



53

M A N G E T I
BIBL. PHARM.

T O M . II .

I - Z





VANGELI

MEDICINAE DOCTORIS.

Medicus in Regia Academia Medica.

BIBLIOTHECA

PHARMACOLOGICO-MEDICA.

Vol. I. Pars I. 1844.

Curavit et Typis in Ipso.

THOMAS A. J. K. U. S.


PHARMACOLOGICO-MEDICA.

Vol. I. Pars I. 1844.

PHARMACOLOGICO-MEDICA.

Vol. I. Pars I. 1844.

Curavit et Typis in Ipso.



MANGETI,

MEDICINÆ DOCTORIS,

& Serenissimi ac Potentiss. REGIS PRUSSIÆ Archiatri,

BIBLIOTHECA

PHARMACEUTICO-MEDICA,

denique

SEU per Soc. Iesu

Rerum ad PHARMACIAM GALENICO-CHYMICAM spectantium

THESAURUS

REFERTISSIMUS.

In quo, Ordine Alphabetico non Omnis tantum,

MATERIA MEDICA

Historicè, Physicè, Chymicè ac Anatomicè explicata; sed & Celebriores quæque

COMPOSITIONES, TUM EX OMNIBUS DISPENSATORIIS

Pharmaceuticis, variis hætenus Linguis in lucem editis, tum è melioris notæ

Scriptoribus Practicis excerptæ:

*Imò secretiores non paucæ PRÆPARATIONES CHYMICÆ, MECHANICÆ &c. in Curiosorum cujusvis
Ordinis usum, undequaque conquestæ, abunde cumulantur.*

CUM INDICIBUS ET FIGURIS ÆNEIS NECESSARIIS.

TOMUS SECUNDUS.



GENEVÆ,

Sumptibus CHOUET, G. DE TOURNES, CRAMER, PERACHON,
RITTER, & S. DE TOURNES.

M. DCC. III.

CATALOGUS LIBRORUM MEDICORUM ET MISCELLANEORUM,

Apud CHOUET, G. DE TOURNES, CRAMER, PERACHON,
RITTER, & S. DE TOURNES, Bibliopolas impressorum,
ut & eorum qui majori in copia apud Ipsos prostant.

- A**lbini Bibliotheca Chymica. 8
Anatomia Corporis Humani Dionis. 8. *cum Fig.*
Atrium Medicinæ & Pharmacopœæ Helvetiorum 12
Aldrovandi Ornithologia sive de Avibus *fol. cum Fig.*
Barbette, Pauli, Opera Medica & Chirurgica, novis Additionibus aucta & illustrata à Joh. Jacobo Mangeto D. M. 4.
II. Vol. *sub Prælo* 1703.
Bayle Institutiones Physicæ, cum Figuris accuratio.ibus. 4.
III. Vol. Francof. 1703.
Bauhini Historia Plantarum. f. III. Vol.
Bœneti Sepulchretum sive Anatomia Practica f. III. Tomi Nova Editio cum multis Addit. 1700.
Polyalthes, sive Thesaurus Medico-Practicus fol. III. Tom.
Medicina Septentrionalis f. II. Tom. *cum Fig.*
Bibliotheca sive Thesaurus Chirurgicus f. *cum Fig.* *sub Prælo.*
Labyrinthus Medicus extricatus &c. 4
Pharos Medicorum, 12
Bibliotheca Anatomica aucta & illustrata f. II. Tom. *cum multis Fig.* 1699.
Medico-Practica, Mangeti fol. IV. Tomi.
Chymica Curiosa ejusdem Authoris f. II. Vol. *cum Fig.*
Pharmaceutico - Medico - Chymica ejusdem Authoris fol. II. Tomi *cum Fig.*
de-le-Boë Sylvii Opera omnia Medica *cum nov. Addit.* fol. 1698.
Boyle Opera omnia Philosophica-Chymica &c. 4. variis Tomis distributa *cum Fig.*
Tractatus varii *separatim.* 4
Burneti Thesaurus Medicinæ 4. Edit. nova aucta & illustrata 1698.
Beguini Tyrocinium Chymicum 8
Bicaiffi Manuale Medicorum 12
de-le-Boë Sylvii Casus Medicinales, sive Historiæ Agrotorum in Nosocomio Leydensi &c. fol. *separatim.*
Censura Celebriorum Authorum, sive Tractatus in quo varia Virorum Doctorum de Clarissimis cujusque sæculi Scriptoribus Judicia traduntur, Ord. dig. per Th. Pope-Blount. 4
Ciceronis Opera cum Notis Variorum 4. IV. Tomi.
Charas Historia Naturalis Animalium, Plantarum, & Mineralium, nec non Theriacæ Andromachi Compositionis Ingredientium, cum Experimentis circa Viperam. 4. Fig.
Catalogus Authorum, qui Librorum Catalogos, Indices, Bibliothecas, Virorum Litterat. Elogia, Vitas, Orationes Funebres scriptis consignarunt, ab Ant. Teisserio adornatus cum Phil. Labbei Bibliotheca Nummaria &c. 4
Cardani Opera Omnia. fol. X. Vol.
Challanæi Catalogus Gloriæ Mundi fol
Charas Opera Pharmaceutica, & Medica 4. II. Vol. Fig.
Chabraz Icones Stirpium, sive de Plantis. f. Fig.
Crollii Basilica Chymica 8
Chalmerei Enchiridium Chirurg. 8
Celsus de Re Medica. 16
Colladonis Sphalmata Medica 8
Cassiodori Opera 4
Cozzandus de Magisterio Antiquorum Philosophorum. 12
Cordemoy Tractat. Physicus de Corporis & Mentis Distinct. 12
Corps de Medecine & de Chirurgie contenant la maniere de guerir toutes les Maladies tant interieures qu'exterieures par Observations & Exemples avec routes les Operations de Chirurgie & les Cures &c. 4. IV. Tom.
Diemerbroeck, Opera Omnia Anat. & Medica 4. II. Vol. Fig.
Opera Medico-Pract. *separatim.* 4
Appendix ad Anatomiam *separatim* 4. Fig.
Dionis Anatomia Corporis Humani 8. Fig.
Duretus in Coacas, sive Prænotiones Hippocratis fol.
Derodonis Philosophia Contracta 4
Opera Omnia Philosophica. 4
De la Fond de Hydrope Tympanite 12
Dictionarium Poëticum, Geographicum & Historicum Henrici Stephani 4
IV. & VI. Linguis 16
Dictionarium Historicum, Geographicum, Poëticum &c. à Cay. Stephano inchoatum, Ad incudem verò revocatum, innumerisque locis auctum & emaculatum per Nic. LLOYDium 4
Græco-Latino-Gallicum Morelli. 4
Dale Pharmacologia. 8
Écrits pour les Apoticaire, Droguistes & Epiciers. fol.
Fabricii ab Aquapendente Opera f. Fig.
Joh. Fortis Consultat. Medic. fol. Tom. Secund. *separatim.*
Fracastorii Opera Medica 8
Fabricii Hildani Opera Medico-Chirurgica cum Severino de Efficaci Medicina. f. Fig.
Ferrarii Lexicon Geographic. *cum Notis* Baudrand &c. f. II. Vol.
Fernelii Opera Medica *cum Augment.* f.
Idem 4. & 8.
Fosterii vera Medendi Methodus. 8
Gæti Nova Febris Idea, seu Novæ Conjecturæ Physicæ circa Febris naturam. 12
Graaff Opera Omnia. 8
Hippocratis Opera cum Econ. Foesii f. III. Tom. Gr. & Lat.
Economia Foesii fol. *separatim.*
Hollerius in Aphorismos 8
Practica Medica 4
Hartmanni Praxis Chymiatrica 8
Historiæ Romanæ Scriptores. f. II. Vol.
Histoire de la Medecine par Mr. le Clerc. 12
Indices Librorum Prohibitorum. fol.
Keckermannii Opera. fol.
Latini Latini Bibliotheca. f.
Lemeri Cursus Chymicus 12
Mufitani Chirurgia Theoretico-Practica. 4. IV. Tomi.
Opera Medico-Chymico-Practica 4. III. Tomi 1700.
Morton Opera Medica cum novis Tract. 4
Munnick de Re Anatomica 8. *cum Fig.* Editio nova.
Malebranche de Inquirenda Veritate &c. 4
Metis Medico - Spagyrica Schrodero - Hoffmanniana f. Fig.
Mayernus de Arthritide 12.
Morelli Methodus Remediorum 8
Medicina Salernitana 16
Magni Philosophorum Arcani Revelator. 12
de Mayerne Praxis Medicinæ. 12
Mufitanus ad Mynsicht Armamentarium Med. Chym. cui accessit Battimelli Auctuarium & Piperi Corollarium. 8
Mynsicht Armamentarium Medico-Chymicum cum Mantissa Mufitani. 8
la Medecine Domestique contenant le Gouvernement de la Santé, l'Apothiquaire, le Chirurgien & le Medecin Charitable. 8
Novum Lumen Chymicum. 8
Peyeri Parerga. 8
Plempii Opera Medica f.
Pharmacopœa Schrodero - Hoffmanniana illustrata & aucta. f. *cum Fig.*
Pienus Tractat. de Febribus, *cum Notis amplif.* &c. 4
Paracelsi Opera Omnia. f. III. Vol.
Pharmacopœa Helvetiorum 12
Riverius Reformatus, sive Praxis Medica Methodo-Riverianæ non absimilis, & alii Tract. Editio nova valde aucta. 8. 1696.
Renodæi Pharmacopœa 8
Rosini Antiquitates Romanorum 4. Fig.
Riolani Schola Anatomica. 8
Rondeletii Opera Medica 8
Rohaulti Physica 8
Riverius Contractus 8
Scapulæ Lexicon Græc. Lat. f.
Scaliger de Emendatione Temporum. f.
Sennerti Institutiones Med. 8
Sylvatici Consilia Medica. f.
Sinapii Paradoxa Medica 8
Sacchi Opuscula Medica 8
Med. Theoretico-Practica f. Parmæ.
Sydenham Opuscula Medica 8. Editio aucta 1696.
Schmitzii Compendium Med. 12
Schola Salernitana. 16
Seminarium totius Philosophiæ. f.
Sylvii Methodus Medendi 12
Opera Medica. f.
Schedulæ, seu Inscriptiones pro Aromataris, & Pharmacopolis. fol.
Tilingii Rhubarbarologia. 4
Tractatus de Poru Caffè, Thé, & Chocolata nova Edit. 12. Fig.
Theatrum Machinarum Bessoni f.
Thesaurus Secretorum &c. *sub Prælo.* 4
Virideti Tractatus Medico-Physicus de Prima Cognitione. 8
Vieussens Neurographia Universalis. f. Fig.
Tract. de Remotis & Proximis mixtis &c. 4. Fig.
Willis Opera Omnia Medica *cum novo Tractatu de Peste.* 4. II. Vol. *cum Fig.*
Wyssii Cursus Philosophicus. 8
Zodiacus Medico-Gallicus. 4. V. Tom. Fig.

CATALOGUS LIBRORUM

MEDICORUM ET PHILOSOPHORUM

ANNO DOMINI 1785

IN BIBLIOTHECA PUBLICA

IN URBE PRAGA

1. *De Medicina* 2. *De Anatomia* 3. *De Chirurgia* 4. *De Pharmacia* 5. *De Botanicis* 6. *De Zoologia* 7. *De Astronomia* 8. *De Mathematicis* 9. *De Philosophia* 10. *De Historia* 11. *De Geographia* 12. *De Meteorologia* 13. *De Ethica* 14. *De Politica* 15. *De Jurisprudentia* 16. *De Poetica* 17. *De Musica* 18. *De Architectura* 19. *De Mechanica* 20. *De Astronomia* 21. *De Mathematicis* 22. *De Philosophia* 23. *De Historia* 24. *De Geographia* 25. *De Meteorologia* 26. *De Ethica* 27. *De Politica* 28. *De Jurisprudentia* 29. *De Poetica* 30. *De Musica* 31. *De Architectura* 32. *De Mechanica* 33. *De Astronomia* 34. *De Mathematicis* 35. *De Philosophia* 36. *De Historia* 37. *De Geographia* 38. *De Meteorologia* 39. *De Ethica* 40. *De Politica* 41. *De Jurisprudentia* 42. *De Poetica* 43. *De Musica* 44. *De Architectura* 45. *De Mechanica* 46. *De Astronomia* 47. *De Mathematicis* 48. *De Philosophia* 49. *De Historia* 50. *De Geographia* 51. *De Meteorologia* 52. *De Ethica* 53. *De Politica* 54. *De Jurisprudentia* 55. *De Poetica* 56. *De Musica* 57. *De Architectura* 58. *De Mechanica* 59. *De Astronomia* 60. *De Mathematicis* 61. *De Philosophia* 62. *De Historia* 63. *De Geographia* 64. *De Meteorologia* 65. *De Ethica* 66. *De Politica* 67. *De Jurisprudentia* 68. *De Poetica* 69. *De Musica* 70. *De Architectura* 71. *De Mechanica* 72. *De Astronomia* 73. *De Mathematicis* 74. *De Philosophia* 75. *De Historia* 76. *De Geographia* 77. *De Meteorologia* 78. *De Ethica* 79. *De Politica* 80. *De Jurisprudentia* 81. *De Poetica* 82. *De Musica* 83. *De Architectura* 84. *De Mechanica* 85. *De Astronomia* 86. *De Mathematicis* 87. *De Philosophia* 88. *De Historia* 89. *De Geographia* 90. *De Meteorologia* 91. *De Ethica* 92. *De Politica* 93. *De Jurisprudentia* 94. *De Poetica* 95. *De Musica* 96. *De Architectura* 97. *De Mechanica* 98. *De Astronomia* 99. *De Mathematicis* 100. *De Philosophia* 101. *De Historia* 102. *De Geographia* 103. *De Meteorologia* 104. *De Ethica* 105. *De Politica* 106. *De Jurisprudentia* 107. *De Poetica* 108. *De Musica* 109. *De Architectura* 110. *De Mechanica* 111. *De Astronomia* 112. *De Mathematicis* 113. *De Philosophia* 114. *De Historia* 115. *De Geographia* 116. *De Meteorologia* 117. *De Ethica* 118. *De Politica* 119. *De Jurisprudentia* 120. *De Poetica* 121. *De Musica* 122. *De Architectura* 123. *De Mechanica* 124. *De Astronomia* 125. *De Mathematicis* 126. *De Philosophia* 127. *De Historia* 128. *De Geographia* 129. *De Meteorologia* 130. *De Ethica* 131. *De Politica* 132. *De Jurisprudentia* 133. *De Poetica* 134. *De Musica* 135. *De Architectura* 136. *De Mechanica* 137. *De Astronomia* 138. *De Mathematicis* 139. *De Philosophia* 140. *De Historia* 141. *De Geographia* 142. *De Meteorologia* 143. *De Ethica* 144. *De Politica* 145. *De Jurisprudentia* 146. *De Poetica* 147. *De Musica* 148. *De Architectura* 149. *De Mechanica* 150. *De Astronomia* 151. *De Mathematicis* 152. *De Philosophia* 153. *De Historia* 154. *De Geographia* 155. *De Meteorologia* 156. *De Ethica* 157. *De Politica* 158. *De Jurisprudentia* 159. *De Poetica* 160. *De Musica* 161. *De Architectura* 162. *De Mechanica* 163. *De Astronomia* 164. *De Mathematicis* 165. *De Philosophia* 166. *De Historia* 167. *De Geographia* 168. *De Meteorologia* 169. *De Ethica* 170. *De Politica* 171. *De Jurisprudentia* 172. *De Poetica* 173. *De Musica* 174. *De Architectura* 175. *De Mechanica* 176. *De Astronomia* 177. *De Mathematicis* 178. *De Philosophia* 179. *De Historia* 180. *De Geographia* 181. *De Meteorologia* 182. *De Ethica* 183. *De Politica* 184. *De Jurisprudentia* 185. *De Poetica* 186. *De Musica* 187. *De Architectura* 188. *De Mechanica* 189. *De Astronomia* 190. *De Mathematicis* 191. *De Philosophia* 192. *De Historia* 193. *De Geographia* 194. *De Meteorologia* 195. *De Ethica* 196. *De Politica* 197. *De Jurisprudentia* 198. *De Poetica* 199. *De Musica* 200. *De Architectura* 201. *De Mechanica* 202. *De Astronomia* 203. *De Mathematicis* 204. *De Philosophia* 205. *De Historia* 206. *De Geographia* 207. *De Meteorologia* 208. *De Ethica* 209. *De Politica* 210. *De Jurisprudentia* 211. *De Poetica* 212. *De Musica* 213. *De Architectura* 214. *De Mechanica* 215. *De Astronomia* 216. *De Mathematicis* 217. *De Philosophia* 218. *De Historia* 219. *De Geographia* 220. *De Meteorologia* 221. *De Ethica* 222. *De Politica* 223. *De Jurisprudentia* 224. *De Poetica* 225. *De Musica* 226. *De Architectura* 227. *De Mechanica* 228. *De Astronomia* 229. *De Mathematicis* 230. *De Philosophia* 231. *De Historia* 232. *De Geographia* 233. *De Meteorologia* 234. *De Ethica* 235. *De Politica* 236. *De Jurisprudentia* 237. *De Poetica* 238. *De Musica* 239. *De Architectura* 240. *De Mechanica* 241. *De Astronomia* 242. *De Mathematicis* 243. *De Philosophia* 244. *De Historia* 245. *De Geographia* 246. *De Meteorologia* 247. *De Ethica* 248. *De Politica* 249. *De Jurisprudentia* 250. *De Poetica* 251. *De Musica* 252. *De Architectura* 253. *De Mechanica* 254. *De Astronomia* 255. *De Mathematicis* 256. *De Philosophia* 257. *De Historia* 258. *De Geographia* 259. *De Meteorologia* 260. *De Ethica* 261. *De Politica* 262. *De Jurisprudentia* 263. *De Poetica* 264. *De Musica* 265. *De Architectura* 266. *De Mechanica* 267. *De Astronomia* 268. *De Mathematicis* 269. *De Philosophia* 270. *De Historia* 271. *De Geographia* 272. *De Meteorologia* 273. *De Ethica* 274. *De Politica* 275. *De Jurisprudentia* 276. *De Poetica* 277. *De Musica* 278. *De Architectura* 279. *De Mechanica* 280. *De Astronomia* 281. *De Mathematicis* 282. *De Philosophia* 283. *De Historia* 284. *De Geographia* 285. *De Meteorologia* 286. *De Ethica* 287. *De Politica* 288. *De Jurisprudentia* 289. *De Poetica* 290. *De Musica* 291. *De Architectura* 292. *De Mechanica* 293. *De Astronomia* 294. *De Mathematicis* 295. *De Philosophia* 296. *De Historia* 297. *De Geographia* 298. *De Meteorologia* 299. *De Ethica* 300. *De Politica* 301. *De Jurisprudentia* 302. *De Poetica* 303. *De Musica* 304. *De Architectura* 305. *De Mechanica* 306. *De Astronomia* 307. *De Mathematicis* 308. *De Philosophia* 309. *De Historia* 310. *De Geographia* 311. *De Meteorologia* 312. *De Ethica* 313. *De Politica* 314. *De Jurisprudentia* 315. *De Poetica* 316. *De Musica* 317. *De Architectura* 318. *De Mechanica* 319. *De Astronomia* 320. *De Mathematicis* 321. *De Philosophia* 322. *De Historia* 323. *De Geographia* 324. *De Meteorologia* 325. *De Ethica* 326. *De Politica* 327. *De Jurisprudentia* 328. *De Poetica* 329. *De Musica* 330. *De Architectura* 331. *De Mechanica* 332. *De Astronomia* 333. *De Mathematicis* 334. *De Philosophia* 335. *De Historia* 336. *De Geographia* 337. *De Meteorologia* 338. *De Ethica* 339. *De Politica* 340. *De Jurisprudentia* 341. *De Poetica* 342. *De Musica* 343. *De Architectura* 344. *De Mechanica* 345. *De Astronomia* 346. *De Mathematicis* 347. *De Philosophia* 348. *De Historia* 349. *De Geographia* 350. *De Meteorologia* 351. *De Ethica* 352. *De Politica* 353. *De Jurisprudentia* 354. *De Poetica* 355. *De Musica* 356. *De Architectura* 357. *De Mechanica* 358. *De Astronomia* 359. *De Mathematicis* 360. *De Philosophia* 361. *De Historia* 362. *De Geographia* 363. *De Meteorologia* 364. *De Ethica* 365. *De Politica* 366. *De Jurisprudentia* 367. *De Poetica* 368. *De Musica* 369. *De Architectura* 370. *De Mechanica* 371. *De Astronomia* 372. *De Mathematicis* 373. *De Philosophia* 374. *De Historia* 375. *De Geographia* 376. *De Meteorologia* 377. *De Ethica* 378. *De Politica* 379. *De Jurisprudentia* 380. *De Poetica* 381. *De Musica* 382. *De Architectura* 383. *De Mechanica* 384. *De Astronomia* 385. *De Mathematicis* 386. *De Philosophia* 387. *De Historia* 388. *De Geographia* 389. *De Meteorologia* 390. *De Ethica* 391. *De Politica* 392. *De Jurisprudentia* 393. *De Poetica* 394. *De Musica* 395. *De Architectura* 396. *De Mechanica* 397. *De Astronomia* 398. *De Mathematicis* 399. *De Philosophia* 400. *De Historia* 401. *De Geographia* 402. *De Meteorologia* 403. *De Ethica* 404. *De Politica* 405. *De Jurisprudentia* 406. *De Poetica* 407. *De Musica* 408. *De Architectura* 409. *De Mechanica* 410. *De Astronomia* 411. *De Mathematicis* 412. *De Philosophia* 413. *De Historia* 414. *De Geographia* 415. *De Meteorologia* 416. *De Ethica* 417. *De Politica* 418. *De Jurisprudentia* 419. *De Poetica* 420. *De Musica* 421. *De Architectura* 422. *De Mechanica* 423. *De Astronomia* 424. *De Mathematicis* 425. *De Philosophia* 426. *De Historia* 427. *De Geographia* 428. *De Meteorologia* 429. *De Ethica* 430. *De Politica* 431. *De Jurisprudentia* 432. *De Poetica* 433. *De Musica* 434. *De Architectura* 435. *De Mechanica* 436. *De Astronomia* 437. *De Mathematicis* 438. *De Philosophia* 439. *De Historia* 440. *De Geographia* 441. *De Meteorologia* 442. *De Ethica* 443. *De Politica* 444. *De Jurisprudentia* 445. *De Poetica* 446. *De Musica* 447. *De Architectura* 448. *De Mechanica* 449. *De Astronomia* 450. *De Mathematicis* 451. *De Philosophia* 452. *De Historia* 453. *De Geographia* 454. *De Meteorologia* 455. *De Ethica* 456. *De Politica* 457. *De Jurisprudentia* 458. *De Poetica* 459. *De Musica* 460. *De Architectura* 461. *De Mechanica* 462. *De Astronomia* 463. *De Mathematicis* 464. *De Philosophia* 465. *De Historia* 466. *De Geographia* 467. *De Meteorologia* 468. *De Ethica* 469. *De Politica* 470. *De Jurisprudentia* 471. *De Poetica* 472. *De Musica* 473. *De Architectura* 474. *De Mechanica* 475. *De Astronomia* 476. *De Mathematicis* 477. *De Philosophia* 478. *De Historia* 479. *De Geographia* 480. *De Meteorologia* 481. *De Ethica* 482. *De Politica* 483. *De Jurisprudentia* 484. *De Poetica* 485. *De Musica* 486. *De Architectura* 487. *De Mechanica* 488. *De Astronomia* 489. *De Mathematicis* 490. *De Philosophia* 491. *De Historia* 492. *De Geographia* 493. *De Meteorologia* 494. *De Ethica* 495. *De Politica* 496. *De Jurisprudentia* 497. *De Poetica* 498. *De Musica* 499. *De Architectura* 500. *De Mechanica* 501. *De Astronomia* 502. *De Mathematicis* 503. *De Philosophia* 504. *De Historia* 505. *De Geographia* 506. *De Meteorologia* 507. *De Ethica* 508. *De Politica* 509. *De Jurisprudentia* 510. *De Poetica* 511. *De Musica* 512. *De Architectura* 513. *De Mechanica* 514. *De Astronomia* 515. *De Mathematicis* 516. *De Philosophia* 517. *De Historia* 518. *De Geographia* 519. *De Meteorologia* 520. *De Ethica* 521. *De Politica* 522. *De Jurisprudentia* 523. *De Poetica* 524. *De Musica* 525. *De Architectura* 526. *De Mechanica* 527. *De Astronomia* 528. *De Mathematicis* 529. *De Philosophia* 530. *De Historia* 531. *De Geographia* 532. *De Meteorologia* 533. *De Ethica* 534. *De Politica* 535. *De Jurisprudentia* 536. *De Poetica* 537. *De Musica* 538. *De Architectura* 539. *De Mechanica* 540. *De Astronomia* 541. *De Mathematicis* 542. *De Philosophia* 543. *De Historia* 544. *De Geographia* 545. *De Meteorologia* 546. *De Ethica* 547. *De Politica* 548. *De Jurisprudentia* 549. *De Poetica* 550. *De Musica* 551. *De Architectura* 552. *De Mechanica* 553. *De Astronomia* 554. *De Mathematicis* 555. *De Philosophia* 556. *De Historia* 557. *De Geographia* 558. *De Meteorologia* 559. *De Ethica* 560. *De Politica* 561. *De Jurisprudentia* 562. *De Poetica* 563. *De Musica* 564. *De Architectura* 565. *De Mechanica* 566. *De Astronomia* 567. *De Mathematicis* 568. *De Philosophia* 569. *De Historia* 570. *De Geographia* 571. *De Meteorologia* 572. *De Ethica* 573. *De Politica* 574. *De Jurisprudentia* 575. *De Poetica* 576. *De Musica* 577. *De Architectura* 578. *De Mechanica* 579. *De Astronomia* 580. *De Mathematicis* 581. *De Philosophia* 582. *De Historia* 583. *De Geographia* 584. *De Meteorologia* 585. *De Ethica* 586. *De Politica* 587. *De Jurisprudentia* 588. *De Poetica* 589. *De Musica* 590. *De Architectura* 591. *De Mechanica* 592. *De Astronomia* 593. *De Mathematicis* 594. *De Philosophia* 595. *De Historia* 596. *De Geographia* 597. *De Meteorologia* 598. *De Ethica* 599. *De Politica* 600. *De Jurisprudentia* 601. *De Poetica* 602. *De Musica* 603. *De Architectura* 604. *De Mechanica* 605. *De Astronomia* 606. *De Mathematicis* 607. *De Philosophia* 608. *De Historia* 609. *De Geographia* 610. *De Meteorologia* 611. *De Ethica* 612. *De Politica* 613. *De Jurisprudentia* 614. *De Poetica* 615. *De Musica* 616. *De Architectura* 617. *De Mechanica* 618. *De Astronomia* 619. *De Mathematicis* 620. *De Philosophia* 621. *De Historia* 622. *De Geographia* 623. *De Meteorologia* 624. *De Ethica* 625. *De Politica* 626. *De Jurisprudentia* 627. *De Poetica* 628. *De Musica* 629. *De Architectura* 630. *De Mechanica* 631. *De Astronomia* 632. *De Mathematicis* 633. *De Philosophia* 634. *De Historia* 635. *De Geographia* 636. *De Meteorologia* 637. *De Ethica* 638. *De Politica* 639. *De Jurisprudentia* 640. *De Poetica* 641. *De Musica* 642. *De Architectura* 643. *De Mechanica* 644. *De Astronomia* 645. *De Mathematicis* 646. *De Philosophia* 647. *De Historia* 648. *De Geographia* 649. *De Meteorologia* 650. *De Ethica* 651. *De Politica* 652. *De Jurisprudentia* 653. *De Poetica* 654. *De Musica* 655. *De Architectura* 656. *De Mechanica* 657. *De Astronomia* 658. *De Mathematicis* 659. *De Philosophia* 660. *De Historia* 661. *De Geographia* 662. *De Meteorologia* 663. *De Ethica* 664. *De Politica* 665. *De Jurisprudentia* 666. *De Poetica* 667. *De Musica* 668. *De Architectura* 669. *De Mechanica* 670. *De Astronomia* 671. *De Mathematicis* 672. *De Philosophia* 673. *De Historia* 674. *De Geographia* 675. *De Meteorologia* 676. *De Ethica* 677. *De Politica* 678. *De Jurisprudentia* 679. *De Poetica* 680. *De Musica* 681. *De Architectura* 682. *De Mechanica* 683. *De Astronomia* 684. *De Mathematicis* 685. *De Philosophia* 686. *De Historia* 687. *De Geographia* 688. *De Meteorologia* 689. *De Ethica* 690. *De Politica* 691. *De Jurisprudentia* 692. *De Poetica* 693. *De Musica* 694. *De Architectura* 695. *De Mechanica* 696. *De Astronomia* 697. *De Mathematicis* 698. *De Philosophia* 699. *De Historia* 700. *De Geographia* 701. *De Meteorologia* 702. *De Ethica* 703. *De Politica* 704. *De Jurisprudentia* 705. *De Poetica* 706. *De Musica* 707. *De Architectura* 708. *De Mechanica* 709. *De Astronomia* 710. *De Mathematicis* 711. *De Philosophia* 712. *De Historia* 713. *De Geographia* 714. *De Meteorologia* 715. *De Ethica* 716. *De Politica* 717. *De Jurisprudentia* 718. *De Poetica* 719. *De Musica* 720. *De Architectura* 721. *De Mechanica* 722. *De Astronomia* 723. *De Mathematicis* 724. *De Philosophia* 725. *De Historia* 726. *De Geographia* 727. *De Meteorologia* 728. *De Ethica* 729. *De Politica* 730. *De Jurisprudentia* 731. *De Poetica* 732. *De Musica* 733. *De Architectura* 734. *De Mechanica* 735. *De Astronomia* 736. *De Mathematicis* 737. *De Philosophia* 738. *De Historia* 739. *De Geographia* 740. *De Meteorologia* 741. *De Ethica* 742. *De Politica* 743. *De Jurisprudentia* 744. *De Poetica* 745. *De Musica* 746. *De Architectura* 747. *De Mechanica* 748. *De Astronomia* 749. *De Mathematicis* 750. *De Philosophia* 751. *De Historia* 752. *De Geographia* 753. *De Meteorologia* 754. *De Ethica* 755. *De Politica* 756. *De Jurisprudentia* 757. *De Poetica* 758. *De Musica* 759. *De Architectura* 760. *De Mechanica* 761. *De Astronomia* 762. *De Mathematicis* 763. *De Philosophia* 764. *De Historia* 765. *De Geographia* 766. *De Meteorologia* 767. *De Ethica* 768. *De Politica* 769. *De Jurisprudentia* 770. *De Poetica* 771. *De Musica* 772. *De Architectura* 773. *De Mechanica* 774. *De Astronomia* 775. *De Mathematicis* 776. *De Philosophia* 777. *De Historia* 778. *De Geographia* 779. *De Meteorologia* 780. *De Ethica* 781. *De Politica* 782. *De Jurisprudentia* 783. *De Poetica* 784. *De Musica* 785. *De Architectura* 786. *De Mechanica* 787. *De Astronomia* 788. *De Mathematicis* 789. *De Philosophia* 790. *De Historia* 791. *De Geographia* 792. *De Meteorologia* 793. *De Ethica* 794. *De Politica* 795. *De Jurisprudentia* 796. *De Poetica* 797. *De Musica* 798. *De Architectura* 799. *De Mechanica* 800. *De Astronomia* 801. *De Mathematicis* 802. *De Philosophia* 803. *De Historia* 804. *De Geographia* 805. *De Meteorologia* 806. *De Ethica* 807. *De Politica* 808. *De Jurisprudentia* 809. *De Poetica* 810. *De Musica* 811. *De Architectura* 812. *De Mechanica* 813. *De Astronomia* 814. *De Mathematicis* 815. *De Philosophia* 816. *De Historia* 817. *De Geographia* 818. *De Meteorologia* 819. *De Ethica* 820. *De Politica* 821. *De Jurisprudentia* 822. *De Poetica* 823. *De Musica* 824. *De Architectura* 825. *De Mechanica* 826. *De Astronomia* 827. *De Mathematicis* 828. *De Philosophia* 829. *De Historia* 830. *De Geographia* 831. *De Meteorologia* 832. *De Ethica* 833. *De Politica* 834. *De Jurisprudentia* 835. *De Poetica* 836. *De Musica* 837. *De Architectura* 838. *De Mechanica* 839. *De Astronomia* 840. *De Mathematicis* 841. *De Philosophia* 842. *De Historia* 843. *De Geographia* 844. *De Meteorologia* 845. *De Ethica* 846. *De Politica* 847. *De Jurisprudentia* 848. *De Poetica* 849. *De Musica* 850. *De Architectura* 851. *De Mechanica* 852. *De Astronomia* 853. *De Mathematicis* 854. *De Philosophia* 855. *De Historia* 856. *De Geographia* 857. *De Meteorologia* 858. *De Ethica* 859. *De Politica* 860. *De Jurisprudentia* 861. *De Poetica* 862. *De Musica* 863. *De Architectura* 864. *De Mechanica* 865. *De Astronomia* 866. *De Mathematicis* 867. <



JOH. JAC. MANGETI BIBLIOTHECÆ PHARMACEUTICO-MEDICÆ

LIBER IX.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

I.

JACEA.



JACEA, quæ Jacea nigra præten-
sis at folia *Casp. Bauhini*, quæque
Jaceæ nigra vulgaris capitata &
squamosa *Ioh. Bauhini*, commen-
datur in Aphthis ac vulneribus,
unde apud Paduanos *Herba delle*
ferit vocatur. Taberna-monta-
nus ejus decoctum in herniis proficuum dicit, ut &
pulverem in jussulo exhibitum. Per analysim Chy-
micam nihil propè præter materias sale acri præ-
gnantes exhibet.

JACOBÆA.

Jacobæa à S. Jacobo, ui dicata est hæc herba, no-
men accepit. Jacobæa acæteris papposis non lactes-
centibus, folijs laciniati, floribus flavis radiatis dif-
fert.

Nomina. Jacobæa vulgaris *I. B.* vulg. Major *Parck.*
vulg. Laciniata *C. B.*

Radix plurimis fibris majusculis alben-
tibus terræ
firmiter adhærescit, ut non sine difficultate possit
extirpari. Caules inde eurgunt non raro plures, in-
terdum unus, teres, striatus, alias glaber, alias non-
nihil lanuginosus, in apicis plerumque purpurascens,
solidus, folijs crebris, nullo aut alterno ordine positis
vestitus, scrobiculatus aut altior, in latiore solo etiam
tricubitalis, summa parte in ramos aliquot divisus,
medium caulem altitudinis æquantes aut etiam supe-
rantes; unde fit ut flores a summis caulibus & ramu-
lis existentes in umbella quodammodo dispositi sint,
magnitudine singuli mediocri, radiati flavi, folijs
marginalibus cuspidatis medio disco concoloribus,
angustis, oblongis, calis floris squamosus, striatus,

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

semen perexiguum, pappo alatum, per maturitatem
rubescent, folia oblonga sunt profunde dissecta, pri-
mo in laciniarum quoddam conjugationes ad mediam
prope costam, deinde in alias lacinias secundarias
subdivisa, glabra & obscurius virentia, præsertim
supina parte.

In pascuis inque incultis & ad vias passim prove-
nit.

Vires. Non Solum eandem formam, sed easdem
cum senecione vires & facultates obtinet, autore *Tra-*
go, imprimis autem vulneribus, inflammationibus &
fistulis medetur.

Observat Hofmannus Jacobeam calidam non-
nullis Cataplasmatibus formâ adversus ventris tormina
(quæ miserè dysenteria affectos exeruciant & tan-
tum non interimunt) felicissimo successu fuisse abdo-
mini applicatam.

JALAP.

Nomina. Convolvulus Americanus Jalapium dictus,
Mechoacanna nigricans sive Jalapium *Parck.* Bryo-
nia mechoacanna nigricans *C. B. I. B.* Jalapium
Ger.

Radice est mechoacannæ simili, sed cortice nigri-
cante vestita inferius rufescens, quæ tessellatim inci-
sa, rotunda, magnitudine & figura calculo aleatorio
respondens ex India gelapæ sive celapæ nomine ala-
ta fuit, ab Alexandrinis & Massiliensibus Jalapium
vel gelapo vocatur, & à Massiliensibus mechoacan-
na nigra vel mas æstimatur. *Casp. Bauhin. in Pro-*
drum.

Gustu est non ingrato & gummoso, & ob copio-
sam gummositatem si carbonibus vel igni admovea-
tur flammam concipit (hoc se nunquam observare
potuisse scribit. *Parkinson*).

A

Vires

Vires. Albam Mechoacain viribus superat, nam ob gummy copiosum fortius humores serofos purgat, cum in ventris levi dolore, & præcipue viscera, hepar & ventriculum roborat, quare 3 j. pondere exhibetur tuto & sine fastidio opus suum exsequitur (cautiores in granis subsistunt: *Schroderus* non ascendit supra 3ß.)

Vis purgatrix potissimum in resina Jalapij consistit, ideoque monet *Schroderus* si jalappam adhibere volueris vel in substantia vel in extracto aut Magisterio utaris, vino enim si infundatur vires suas pro voto communicat.

Jalapij plantæ descriptionem apud botanicos non invenio. *Raius in Histor. Plant.*

Jalapa mechoacanæ & rhabarbari nigri nomine nota radix, in taleolas dissecta ad nos ex Occidentali India defertur, quæ eligenda maxime vegeta, ponderosa & resinosis nigris venis abundans, ac si frangatur, splendida, externa facie. Nigricans, interna rufescens, flammam promptissime concipiens. *Angustani.*

Jalappa est convolvuli Mexicani Xalappa dicti radix oblonga, crassa, in taleolas dissecta Mechoacanni nigricantior & citius flor, sapore acuto, incidenti, muscoso; odore nullo. Planta est Monopetala, seminibus angulosis in capitibus subrotundis, *Hermann. in Materia Medica Manuscr.*

JASMINUM.

Jasminum priscis botanicis incognitum flore ex longo tubo in quinque lacinias expanso totidem folia æmulantes, per quam odorato folijs pinnatis, bacca dicocca ab alijs fruticeis bacciferis differt.

Nomina. Jasminum album *Ger. Park. Parad.* vulgatius flore albo *C.B.* Jasminum sive gelsemium flore albo *I. B.*

Longissimis & lentis, licet tenuibus viminibus, & nisi sustententur appositis pedamentis, proclivis donatum est, cortice viridanti intectis folia septem ad nervum alligantur, acuminata, vicæ folijs fere paria, glabra, atrovirentia, flores velut in umbella, suavissimi odoris, ex oblongo, gracili tubulo in calathum quinque partitum explicantur, colore candido; in frigidioribus regionibus marcescunt flores nullo succedente fructu, unde nonnulli fructu prorsus destitui, secure nimis affirmarunt, quos & nos olim sequuti in Catalogo Plantarum Cantabrigiensium idem tradidimus: verum nunc melius edocti tum à D. P. Hermannò, tum à Jo. Bapt. Triumfetti Romano, fructum proferre, nimirum baccas subvirides semine rotunda nigro circello notata continentes agnoscimus, de loco hujus natali nihil certi traditum invenio, sed ut rectè *Loebelius* in hortorum angulis apricis & pro prædiorum cavædijs furculo pangitur, adque ornamenta pergularum pedamentis erigitur ad fornaces.

Vires. Jasminum album sicut odore fragrat, ita viribus multis pollet. Oleum ex floribus confectum crudos discutit humores, frigidis ac catarrhis confert, & hyberno tempore utile est quibus autem temperatura contigit calidior, his dolorem excitat capitis, & si diutius odoretur, periculum adfert sanguinis è naribus profluvij. Præcipua ejus utilitas ad contractus induratosque artus, articulos, tendines, nervosque calefacit, emollit, aperit. Uteri morbos arcet non solum hypogastricis & locis muliebribus illitum, sed etiam potu aut enemate usurpatum. Simili modo prodest & doloribus colicis quos frigidus & viscidus humor concitavit. Præcipuus florum usus est ad diapasmata & odoramenta, ad chirotecas & linteamina odore suavissimo imbuenda, *Raius in Hist. Plant.*

Duplex est hoc Jasminum, album, vulgatius scilicet & parvo flore, ac humilior Hispanicum grandiflorum quæ ejusdem omnino sunt usus. Sed præterea aliud datur luteum dictum propter flores luteos, à quo des-

cribendo abstinemus, quia nullius est in Medicinâ usus.

JASPIS, vid. sub titulo *Lapis.*

IBERIS.

Iberis vox Latina est ab Iber, iberis vel Hiberis, quod in Hispania copiose nasceretur. Nasturtij species est, à flore siliquis, & odore.

Nomina. 1. Iberis *I. B.* Ib. cardamantica *Lob.* Iberis latiore folio *C. B. Park. Ger. emac.*

Ioh. Bauh. Statim è radice alba, lignosa mediocriter crassa, paucis fibris donata plures profert caules dodrantales & altiores, duros, frequentibus alis concavos. Folia quidem prima longis pediculis appensa, semunciam lata duas, tresve uncias longa per extremum serrata; superiora vero & quæ in caulis ramisque linearia folijs paria, angusta, acuta, nullo pediculo donata, nec crenâ ullâ incisa; sapor omnibus fervidus nasturtij, flores extremis ramulis coacervati hærent, candidi nasturtij floribus similes. Semen continetur minutim in partibus thecis oblongis, quarum valvas dissepit membranula.

In incultis, ruderatis & secus vias ubique fere tum in Germania, tum etiam in Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi.

Nomina. 2. Iberis nasturtij folio *Ci B. Park. h. e.* Iberis *Cam. ep.* & Matth. Mag. fig. Cardamantica tenuifolia *Ger. Emat.*

Nihil aliud est quam thlaspi angustifolium *Fuchs.* Sive nasturtium sylvestre *I. B.* ex sententia *I. B.* cui & nos libenter suffragamur: ideoque iberidem in duas species non distinguimus.

Nomina. 3. Iberis humilior, annua virginiana ramiflorior *Moris.* Alijs piperilis seu lepidium Americanum.

Moris. Hæc facile distinguitur à priore 1. Duratione: 2. Folia producit laetiora, viridiora, magis crenata: 3. Caules humiliores & ramiflores: 4. tandem flores duplo majores & consequenter majores itidem capsulas.

Vires. Iberis dicta odore & sapore est nasturtij, proinde etiam viribus cum eo convenire videtur.

Veteres, Dioscorides, Galenus, Plinius è Democrate ad dolorem ischiadicum eum commendant. Radix contusa magnâ copiâ (difficiliter autem tunditur ætate & recens, tunc enim fortissima, & usus efficacior) cum modica axungia adhibetur toti cruri & maxime coxendici? sinitur per quatuor horas in viris, minus in mulieribus, deinde aufertur & crus in balneo ponitur, post inungendum ex oleo & vino, ac demum terfa pinguetudine & sudore tegendum molli lana, ut ager ambulet. Si opus fuerit repetendum post dies viginti. *Raius in Histor. Plant.*

IBIS.

Antea Ibidem nigram (verba sunt Bellonij) pro hæmaropode habueramus: sed observatis ejus moribus non hæmaropotodem sed ibin nigram esseprehendimus, cujus Herodoti primus meminit, deinde Aristoteles. Corpore est lorij aut paulò minor, omnino niger; capite corvi quaticus; rostro, quæ capiti jungitur, pollicis crassiem superante, sed per extremitatem mucronato, & incurvo nonnihil atque fornicato & omnino rubente, uti etiam cruribus, quæ oblongæ sunt, similia curibus illius avis quam Plinius bovem taurum, Aristoteles ardeam stellarem nominat; collum vero oblongum Ardeolæ instar habet: sic ut cum primum ibidem nigram conspiceremus, Bovi

Bovi tauro corporis habitu similis videretur.

Ægypto adeò proprium esse dicitur hoc genus avis, ut extra eam regionem vivere non possit, asportatumque ocissime moriatur.

Ibes Ægyptijs utilissimæ sunt ad serpentes, locustasque & bruchos delendos, quibus regio illa præcipuè infestatur: ideoque divini honores ijs habiti sunt, *Ibes* (inquit Cicero) maximam vim serpentium conficiunt, avertunt pestem ab Ægypto cum volucres angues ex vastitate Lybiæ vento Aphrico invectas interficiunt atque consumunt, ex quo fit ut illæ nec morfu vivæ nocuant, nec odore mortuæ, eam ob rem invocantur ab ipsis Ægyptijs *Ibes*: quæ præterea veteres de Ibide tradunt vide apud Aldrovandum *Willugbeius in Ornitholog.*

Hujus animalis adeps anodynus & resolutivus reputatur. ICHNEUMON.

Vide ejus descriptionem ex Raio sub titulo *Musfela*, cujus ex mente Doctiss. illius Autoris species est. *Vires* autem quod attrinet; hujus caro jusculo incocta, seu potius jusculum ex eâ confectum sudorificum præstans creditur, colicis passionibus, animalium venenatorum moribus, ac sanguini purificando apprime faciens. ICHTHYOCOLLA.

Ichthyocolla (quia glutinosum habet corium ex quo gluten illud Ichthyocolla, dictum conficitur) Tanais fluminis, ubi frequens est, accolis barbora dicta, (quia superiori maxilla quatuor apophyses carnosas, barbæ instar dependentes habet, quem diligenter describit Bellonius lib. 2. de piscibus. *Charletonius*.)

Ex hoc pisce, qui aliàs *Huso* & *Exossis* propter ossium carentiam dicitur, conficitur gluten illud quod item *Ichthyocolla* vocatur. Sic autem conficitur. Partes pisces omnes ac præcipuè pellis, pinnae, cauda, interanea, nervi aliæque partes mucilaginosæ, in aquam calidam immittuntur ac lento igne decoquantur usque, dum ad resolutionem in gluten abierint, quod extenditur super instrumenta apta, ut inter desiccandum quasi membranaceum evadat, atque postea sub varias formas convolvatur ac reseretur. Batavi hoc gluten præcipuè à Moscovitis coemunt. Debet autem seligi album, pellucidum, inodorum, ac aservari in pixidibus probe obturatis.

Emollit, discutit, ac propterea aliquas emplastro- rum compositiones subingreditur. Non parum præterea utilis est Ichthyocolla œnopolis, quia in vinidolum per frustra projecta illud clarificat. Inservit etiam nebulis lineis dealbandis, nitori conciliando renijs fericis, sophisticandis margaritis &c.

Ichthyocola, ut habet *Hermann in mater. Medic. manuscr.* est substantia ex albo flavescens glutinosa, excocta ex pisce *Huso* dicto, in pelliculas diducta, inque spiras cocta saporis glutinosi, odoris nullius. *Quæ ex carne paratur* alij præferenda. Piscis unde educitur frequens est in Danubio prope Walachiam, qui sale indutatus mensis apprimè inservit.

IGNIS.

Vid. de eo ubi de *Instrumentis Pharmaceuticis internis*, sub titulo *Instrumenta Pharmaceut.*

ILEX.

Ilex Isidoro visum ab illicito deducere, quod mortales eam nondum repertis frugibus in victum elegerint. Sed hoc *Φορτύνωρεπος*, magis verisimile sit esse ab Hæbreo quæ à robore nomen habet nempe ab robustus, Voss.

Nomina i. *Ilex* arborea *I. B.* major glandifera *Ger.* major aculeata & non aculeata *Park. I. V.* Seu folio rotundiore molli modiceque sinuato *C. B.* nec non *Ilex* folio oblongo serrato *C. B.*

Clus. Arbor est mali aut pyri magnitudine, multo frequentioribus brevioribusque ramis prædita quam suber, quos late spargit. Folia perpetua, supernè vi-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

ridia, interne candicante, gustu adstringente, folijs suberis minora & magis orbiculata, in adultis arboribus plerumque sine aculeis, præter novella, & nunc primum enata, quæ aliquantulum incisa & aculeata sunt certè in tenellis arboribus, antequam glandem ferre inciperent omnia folia aculeata observabam. Multos in extremis ramulis fert oblongos julos, qui in flavos & muscosos flosculos, polline & tenui pulvere perfusos explicantur. Glandes è floribus non oriuntur (nam sunt inutiles) verum in alijs quibusdam separatim pediculis: ea autem quernis glandibus sunt similes, nunc majores longioresque modo minores & breviores, quæ nunquam ante maturitatem nigrescunt, & gummi quoddam reddunt, gustu calidum, saporis tamen non ingrati. Maturorum cortex sive putamen nigricat. Nucleus candidus, firmus & dulcis est, præsertim majorum: utraq; tamen à nunnulis maxime expectantur, illisque non minus avide vescuntur, quam nos castaneis & avellanis. Hinc ob causam in foro Salmaticensi aliisque Hispaniæ locis venales mensibus Octobri & Novembri proponuntur, ut non immerito dixerit Plinius, per Hispanias glandem Mensis secundis inferri.

J. Bauhinus brachia ramulosque illici incana lanugine obductos esse observavit: inque folijs & ramis excrementum per verum tempus nigrum & rotundum annotavit. Theophrastus præter glandem granum quoddam puniceum ferre scripsit.

Differentiæ Illicum mihi accidentariæ potiùs esse videntur, quam (ut cum Philosophis loquar) specificæ; nam in arbusculis junioribus folia sinuata, aculeata, lata & agrifolij æmula observavi, in vetustioribus oblonga, aliàs aculeata per margines, aliàs æqualia, neque serrata neque sinuata, & oleagineis similia, prout ea rectè describit Matthiolus, quicquid alij contradicant.

In Hetruria aliisque Italiæ Provincijs, præsertim ad Mare inferum, inque Gallia Narbonensi & Hispania, in Sylvis, Collibus & Campestribus Maritimis passim & copiose provenit.

In Anglia vidimus arbores annosas & grandes quatuor aut quinque in horto D. Francisci Willugdbi, Wollertoni, prope Northinghamiam, quæ tamen glandes suas ad maturitatem non perducunt: quoniam hoc genus arbores, etiam locis natalibus fructum suum tardius perficiunt.

Phellodryn Theophrasti (quam & alio nomine, Ariam eidem dictam probat J. Bauhinus) Plinius videtur eandem existimasse cum subere, quod & phellos dicitur, siquidem ea omnia suberi tribuat, quæ Theophrastus Phellodryj.

Phellodrys sive Cetto fugaro Matthioli, cum nec ab eodem descripta sit, neque Clusio neque J. Bauhino, neque nobis in Italia peregrinantibus usquam confecta, nam ab Illice specie distincta sit meritò dubitamus, si liceat suspicari ex icone (inquit J. Bauhinus), ea accedit ad Smilacem Dalecampij.

Phellodryos quinque species proponit & describit Historia Lugdunensis: verum cum in collibus Rhodano vicinis, aut non procul ab eo disitis, eas provenire dicat: nos autem ibi loci illicis dumtaxat varietates quasdam, non species distinctas, observavimus, phellodryas illas non arbores vel à se invicem, vel ab ilicibus specie diversas esse suspicamur: sed ilices majores folijs ludentes. Fortè tamen phellodryas nigra *I. B.* species distincta fuerit, quam sic describit.

Phellodrys nigra id nominis à ramis nigricante cortice vestris & glabris adepta est. Folia ab iliginis differunt, quod rotundiora multo & latiora, à smilacis folijs quod longè breviora pro latitudine, minutè candida inferius; à suberis nobis traditi, quod duriora, spina mordacioribus magis horrida. Calyx

glandis tradente Dalechampio laevis est. Forte hæc est Ilex folio agrifolij D. Magnol, quæ folia habet spinosa agrifolij, obscure virentia; quam tamen ipsam à vulgari Illice arborea specie diversam esse se nolle statuere ait, quousque culturâ innotuerit.

At neque Smilaces Dalechampij apud Historiam Lugd. ab ilice arborea differe putamus: cum primum genus in agro Monspelienfi frequentem provenire asserit, ubi nulla præter ilicem ejus generis arbor, neque à nobis neque à D. Magnol, observata: alterum in Collibus Rhodanum, respicientibus, totoque eo tractu, qui à Vienna Allobrogum Areleten usque ducit (ubi nihil aliud præter Illicem nobis occurrit) observavit.

Aria & phyllea Bellonij quomodo ab ilice differant, cum eas non describat, nescimus, quæ de ijs habet collegit in unum Jo. Bauhinus lib. 7. cap. 30. Hist. Plant.

Illicis tum folia, tum glandes cum quernis vitibus conveniunt, hæ autem suis saginandis utiliores habentur. Usus in cibus in descriptione attigimus.

E ligno fiunt carbones ad metalla fundenda utilissimi. Matthiolus Hetruscis in pretio esse tradit, non modò quòd ignem diu foveant, sed etiam quòd (ut aiunt) caput minime tentent: arborum trunci ad molarum fabricas & alia opera servantur ob materiæ firmitudinem & durabilitatem, teste Clusio: Plinius rotarum axibus ilicem duritiæ suæ aptum esse ait; ut & malleis majoribus.

ILEX COCCIGERA

E qua grana seu bacca illa qua vulgò sub nomine Kermes veniunt.

Nomina. Ilex coccigera I. B. Ger. aquifolia sive coccigera Park, aculeata cocciglandifera C. B. I. B.

Magnitudine multum cedit alijs Illicibus: ut quæ non temere stolones duobus cubitis altiores proferat eosque non admodum crassos; folia aquifoliæ proxima, minora, muricata, utrinque glabra, verum non ita hilarî virore nitida, flores vel potius julos copiose fert, mucosos: glandem vero maximam, quod in pumila arbuscula mireris, etiam illigna altera majorem calyce asperiore. At præter hæc omnia triplicia excrementa in eis observantur.

1. Unum Maio & Aprili apparet; quod nihil aliud est quam grana in folijs rubra, parva, rotunda, parùm oblonga, ex ipsa foliorum substantia nata, pisis parvis similia, substantiâ intus albâ, non ita absimili substantiæ fructuum oxyacanthæ Matth. gustu nonnihil acido, grato, in quibus tandem vermiculus nascitur.

2. Alterum huic cum ilice majore commune, Maio mense apparens, ramis adhærescit, sed satis breviter, copiosum, rotundum, nigrum, lævi, nitidâque superficie, satis durum, intus liquore albido plenum, cui vermiculi innatant, tandemque inarescit, circa quod fervent sæpe formicarum opera.

3. Tertium denique eodem cum jam dicto tempore conspicitur in folijs, reliquis notius & celebratius: coccum putâ infectorium: grana sunt rubra, saltem pulvisculo albo quo resperguntur absterso, liquore sanguineo plena cum concoloribus vermiculis.

Clusius pusillam & valde amaram glandem Hispanicæ suæ, Illici tribuit: cum ex J. Bauhini observatione Ilex pumila Narbonensis, glandem etiam quam arborea majorem proferat, quod & nos verum comperimus.

Arbuscula hæc in collibus saxosis circa Monspelium, Nemausum, Avenionem, & alibi in Gallia Narbonensi oritur, ubi præcipuus cocci proventus: nec non in Provincia, & Lobelio teste, etiam in Italia, præsertim in Hetrusco, Romano & Senensi finitimo

agro, locis montosis, glareosis, sterilibus, inter varias Illices, smilaces asperas, terebinthos, lentiscos, &c. attamen observante Clusio, non ubique coccum gerit, nam ijs solum regionibus quæ Mediterraneo Mari vicinæ sunt, & magno Solis ardore torrentur oriri animadvertit; sed neque istic perpetuo fert. Cum enim frutex adeo adolevit, ut glandem alere incipiat. Coccum non gignit: ideoque solent incolæ quadriennies aut adultiores frutices urere, ut proximo anno novelli resurgant, qui deinde singulis annis aliquot subsequentibus coccum ramulis inhaerentem instar exiguum pisorum coloris cinerei gignit.

Quomodo gignatur Coccus. Quinquernus declarat, Vere (inquit) medio rostri imbribus frutices coccum hoc modo oriuntur. Ubi imus scirpus se in duo brachia patitur, in horum medio primum omnium increfcit forundum quiddam magnitudine & colore pisi; hoc matrem, vocant, quod ex eo cætera grana producuntur. Matres ineunte æstate æstuque minutissimorum vermiculorum catervum profundunt, fatiscuntque in summitate; in animalia prorepat nova soboles, colore candida, pro se quisque in sublime: at ubicunque vermiculi geminantis Surculi axillis occurrerint, desident & incrementis aucti milij magnitudine fiunt: inde liberius adolescentibus albus color in cinericeum transit, jamque non animal sed pisum rursus apparet tumque ea grana ad maturitatem adepta colliguntur, jam coloratis vermiculis foeta.

Alij grana non in divaricatione dumtaxat ramulorum nasci perhibent, sed etiam in folijs ipsis.

Grana hæc à Philosophis botanicis spurij quidam seu excrementij fructus Illicis pumilæ, equidem folius proprij habita sunt, verum eruditissimus, & ingeniosissimus vir D. Martinus Lister amicus noster summus, ejusmodi grana etiam in Anglia cerasorum aliarumque arborum surculis, tenellis adnascencia observavit, eaque non excrefcencia esse judicavit, sed infecti cujusdam opus, fatibus suis excipiendis & fovendis domicilium seu nidum efformantis, ab eodemque virgulis affixa: quod & nobis etiam (quibus Eboraci grana arboribus adhærentia ostendit, videtur) cum infectis adultis & egressis à surculis facile abcedant & dilabantur. Adeo autem similia sunt hæc grana coccis baphicis, ut agrè queant discerni, eisdem etiam in locis, eodemque modo surculis adnascuntur, unde ab eodem infecti genere efficta esse verisimillimum est, quamvis succus tingendo minus idoneus sit ob diversitatem alimenti. Quæ ex Quinquernano attulimus huic nostræ opinioni de ortu horum granorum, quod scilicet infecti opus sunt, non arboris excrefcencia, favent. Putamus tamen infectum istud ibi loci ubi granum effingit & surculo agglutinat, ejusdem corticem perfundere, & succum inde exugere quo culcillum repletur, quique vermiculis in cibum sufficiat. Verum hæc ex conjectura.

Matthiolus se coccum in Bohemia in quercubus copiose nascentem observasse scribit. Quod quamvis nonnulli carpant & rideant, verum tamen esse potuisse quæ à D. Lister observata protulimus declarant: imo verum esse non dubitamus.

Usus & Vires. Omittis iis quæ Quinquernanus alijque habent de modo colligendi & præparandi coccum ad usum tinctorum, ea producemus quæ D. Verchand Monspelienfis Botanicus & Pharmacopœus insignis ex propria observatione nobis communicavit.

Coccus baphica, inquit, duobus usibus inservit, nimirum Medicinæ & lanis tingendis: pro Medicinæ usu oportet ut in mortario marmoreo tundatur, & deinde per cribrum trajiciatur, ut pulpa inde

separ

separetur, æquali sacchari quantitate permiscenda mixturam hanc conservam appellant, è qua addito saccharo, serico crudo, pomorum succo & aqua rosacea fit syrupus de Kermes qui inservit probasi confectioni illi tantopere celebratæ de Alkermes Mesuæ dictæ.

Pro tinctorum usu granum maturitatem adeptum colligitur, deinde in area complanata, linteis substratis, soli exponitur initio, quando humore abundat, bis terve in die versant, ne incalescat nimium. Cum pulvis rubicundus in superficie appareret eum cribi ope separant, & grana denuo linteis insternunt, usque dum similis pulvis iterum percipiatur, quem secunda vice per cribrum transmittunt, atque hanc operationem toties repetunt donec grana nihil amplius pulveris reddant.

Notandum autem quod primus pulvis è foramine illo exit quo pertunditur granum ab ea parte qua plantæ adhæsit: postremus autem qui sub finem undique in grani superficie apparet, constat è vermiculis intra folliculum animatis eumque penetrantibus, quoniam foramen dictum plerumque obturatum est.

Quamprimum autem granula illa pulveris rubentia se incipiunt movere, aceto acerrimo irriganda sunt & manibus confricanda, deinde in pilulas formanda, quæ soli expositæ siccantur.

Si quis pulverem hunc rubicundum restare sinat, nec aceto aliove acido liquore perfundat, & ut ita dicam, extinguat, è quovis ejus granulo efformabitur musca quædam minima, quæ per unum vel alterum diem huc illuc saltantes volantesve tandem colore mutato mortuæ decident, amore illo quem antea habuerunt omnino privata.

Granum evacuatum seu pulvere penitus exhaustum vino lavant, dein soli exponunt. Siccatum in sacco confricant, ut lucidum reddatur; quo facto sacco infundunt, jam venalem pulvere inde egresso uniuscujusque sacci in medium immisso, ut innotescat scilicet pulveris ad grana proportio. Eo autem fingitur nobilis ille color quem Escarlaticum vocant. Coccus baphica vim habet adstringentem, ejus ratione vulneribus Nervisque fauciatis trita ex aceto convenienter imponitur. Diosc. Plin.

Eximie conferre hoc granum mulieribus abortientibus cum pari thuris pondere in potu sumptum Fuchsius & Matth. testantur. Nostro tempore mulierculas Montpelienfes & Nemaufenses in difficili partu & collapsis viribus ejus pulveris scobem ex vino, aut ipsam etiam Confectionem Alkermes non sine fructu sumpsisse scimus. Medicis Montpelienfibus in quovis casu præcipiti, & morbis acutissimis, apoplexia, paralyfi, & similibus nihil præsentius esse scimus I. B. Mesues eam ad cordis palpitationem, syncopem, mentis alienationem seu desipientiam, & mororem sine causa manifesta celebrat, quomodo autem coccus baphica cor corroboraret & exhilararet eum præter adstrictionem nulla qualitas manifesta in ea percipiatur nos fugit. Odorem quem sentierunt fragrantissimum in vermiculis & granis ipsis inter præparandum lacuna & quinquenarius, mirum cur alij aut non prehenderint aut non meminerint. *Ramus in Hist. Plant.*

ILLECEBRA, vid. sub titulo *Sedum*.

IMPERATORIA,

Nonnullis magistrantia, alijs, astrantia, ostrutium seu ostritium dicitur, veteribus indicta videtur.

Nota sunt, ejus folia lata, colore & odore ad angelicam accedentia, tripartito divisa & subdivisa: radices crassæ oblique: semen striatum majus.

Nomina. Imperatoria I. B. Ger. Major C. B. Imperator. *Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.*

perat. five astrantia vulgaris *Prk.*

J. B. Pollicari crassitudine nonnunquam est radix, sensim gracilescens, rugosa, & lateralibus fibris, quibus se propagat donata, summa tellure oblique acta, carne alba, aromatica, acrimoniâ vehementer linguam vellicante, totumque os calefaciente. Folia terna plurimum juncta (tripartito divisa) macerones, acutiora, rigida, quorum singula rursum in tria segmenta serrata, alias levius, alias profundius dividuntur, caules cubiti & sesquicubiti altitudinem assequuntur, striati, inanes in alas divisi; Umbellæ florum alborum myrrhydis, latæ, semen anethi ferè, sed paulo majus, candidum, plenum & latiusculum (florum petala bifida sunt.)

In montibus Max, Carthusianorum cœnobio imminetibus invenimus. Gignitur etiam in Ananienfibus montibus supra Tridentinum, inque pratis ad radices montium Alpibus Austriacis & Striacis vicinorum magnâ copîâ.

Hujus speciem minorem proponit Camerarius Ep. non alia in re quam partium omnium parvitate à superiore diversam, quam Imperatoriam seu astrantiam alpinam appellat.

Vires. Saporis est acerrimi, radix præsertim, unde per errorem nostratum, vulgò Pyrethrum Hispanicum denominatur. Alexipharmaca ac sudorifica est; discutit misrice intestinorum & uteri flatus, unde in colico cruciatu utilis est, in colicis & flatuosis (inquit C. Hofmannus,) est divinum remedium, ultra certè & Angelicam & Zedoariam, usus præcipuus est in venenatis morbis ac ietibus, in pulmonum tartaro resolvendo & expectorando, in fœtore anhelitus corrigendo, in capitis affectibus phlegmaticis, paralyfi, apoplexia & alijs nonnulli quartanâ eos sanari, qui pulveris cochlearis dimidium si hora una ante accessionem ex mero bibunt. Commendatur & ad hydropem (in hydropo, in quartana, in febribus diuturnis omnibus, non habet sibi parem Medicinam. C. Hofmannus,) extrinsecus in odontalgia, (gargaris aut radice frustulum denti impositum & in ore detentum, copiose etenim pituitam & phlegma elicit.) In catartis exsiccandis (tussiu) in tumoribus ac arthritide frigida. In scabie capitis exsiccanda (lotione, in serpigine, inveterata sananda (cum adipe suillo illita) in globulis sagittifve corpori extrahendis imposita *Schrod. & Matth.*

Hinc non immeritò (inquit) J. B. uhinus) Imperatoriam nomen sibi ascivit, cum tot tantisque viribus præstet, cæterum ut facie externa & odore angelicam refert, ita iisdem cum illa facultatibus dotata est. *Ramus in Hist. Plant.*

INCARNATIVA vid. *Sarcotica*.

INCERNIE LUM, vid. *Instrumenta Pharm.*

INCINERARE.

Nihil aliud est quam materiam aliquam comburere ac in cinerem redigere.

INCRASSANTIA MEDICAMENTA.

Sp. aliter quasi adstringentia sunt *Incrassantia* & *Repellentia*, utraque motui humorum opposita, sed diverso respectu; illa quidem tenuitati internæ & externæ sibi relictæ, hæc influxui & affluxui exterius solum, utrobique respectu ad poros & parietes secundariò habitò.

Incrassans nempe, *ωαχυννός* Græcè, attenuanti est contrarium, estque illud, quod tenues humores reddit crassiores, magisque consistentes. Hinc utimur incrassantibus potissimum intrinsecus ad tenues catarrhos inhibendos, ad ferocientem turgescientemque bilem frenandam, ad materiam, quæ bronchijs pulmonum inhaeret, & ob tenuitatem expectorari nequit, tussi commodè rejiciendam. Si enim supra mō-

A 3 dum

dum tenuis sit, impellentis spir. vi. ruffiendo non facile in arteriam sustolli excernive potest, sed ob tenuitatem ab aere velut incisa disploditur, inque pulmones relabitur, aere solo eluctante. Quare sputum tenuius addensari oportet, ut impetu ruffis & vehemente exsufflatione, quam Græci ἐκφύσησιν appellant, expurgetur. Prosumt ad aquosioris seminis profluvium compescendum, ad hæmorrhoides immodicè fluentes sistendas. Extrinsecus etiam illa hæmorrhagias sedandas, usurpamus; incrassatus enim refrigeratusque sanguis ad fluxum tardior fit atque ineptior.

Cum verò omnis in corpore fluxilitas principaliter sit à sero, adæquatè à salibus, cumprimis nitrosis, vel alcalinis; Cum serum in utrumque extremum declinare soleat, in coagulum & fluorem; quorum illud si contingat, inviscatur & pituitescit, seu pituitæ nomine venit, quale in moco, in creatu rejectis, in alijs apparet, hoc verò da o, torulis suis contineri nescit; facile patet agendi modus incrassantium. Fluxili nempe illi materiæ obicem ponunt, & fluorem, quem adepta est, moderantur, non aliter, ac si aquæ terra inferatur, unde lutum fit. Agunt, quando crassâ suâ substantiâ & terrenâ naturâ, tenuioribus se permiscunt. Incrassantia ergo liquida & tenuibus humoribus συσπνν inducunt solidiorem & compactiorem.

Et quidem incrassantia, secundum dicta, respiciunt corporaturam ipsam, serum fluidius laxioribus repagulis gaudens, aqueis puta; vel stimulum & motorem, particulas salinas. Illud quæ præstant, velut propriè dicta incrassantia, sunt in activis qualitatibus frigida juxta vulgatas regulas, in passivis sicca, seu potius modo substantiæ lentorem præ se ferunt, aqueis explicabilem. Quæcunque etiam per mechanicam hunc possident, illa omnia incrassant, ut mox in exemplis patebit. Frigore igitur cogunt, substantiæ autem crassitie incrassant, & tenuioribus succis, seu sero consistentiam corpulentioris & spissioris tribuunt. Et hanc Galeni quoque esse mentem de incrassantium temperamento, ex fine cap. 20. l. 5. de simpl. apparet, ubi scribit extenuandi & incrassandi facultates esse oppositas, atque extenuandi quidem virtutem in calidis & tenuium partium essentijs sitam esse, incrassandi verò in frigidis crassarumque partium substantijs hære. Sed loqui tamen videretur Galenus de majori incrassantium numero; quædam enim in caliditate & frigiditate temperata esse possunt, quemadmodum in amylo apparet. Quod ipsum tamen, respectu attenuantium & λεπτομελεσ gaudentium, ijs contrariam obtinet vim.

Talia sunt, ut diximus, lentore generatim pollentia, citra activarum particularum concursum, & quidem lentor mucilagineus hic statui potest triplex potissimum; (1) aqueus concretus, qualis eminet in gummi tragacanthæ, ceraforum, arabico, item rad. symphyti, cujus lentor tantus est, ut si cum carnibus coquatur, illa inde velut concrefcere scribantur, id quod in gelatinis videmus quoque; (2) terreus concretus, ut boli omnes, terræ bolares, ac quasi tales. (3) aquoso vel terreo-oleoso constant radix althææ, gelatina CC. lac, aliæque sunt & ex his mixte, ut spec. diatrag. frig. &c.

Hæc ut propriè dicta & velut substantificæ ac in suâ naturâ & mole sunt incrassantia, quatenus in corpus assumpta fluxum alvi vel sistunt ac refrænant, vel contemperant tamen; ita quæ (4) lentorem anodynum, ob sulphur resolubile fixans & concentrans salia, huc vel maxime pertinent, papaveracea uno verbo, unde suspendunt humores & in centro detinent.

Notandum verò, & hunc usum incrassantium per mechanicam insignem esse, quod parietes & membranas integunt, adhærendoque oblinunt, v. g. in dysenteria, ut ab acrimoniâ humorum, bili vel acidis

alijs impeti rodique ita non possint; non aliter ac corticibus arborum defricatis & derasis ceram emplasticam obducere solemus, quæ instar corticis sit. Notum quippe est, intestina perpetuum habere defensore mucum blandum, à sero illuc è glandulis transudante & concrefcente continuatum, cujus ελκωσι quasi & abrasio in intestinis contingit.

Circa usum incrassantium observandum est generale assertum, omni materiæ conveniens; inter indicans & indicatum perpetuam esse relationem. Hinc 1. *incrassantia minus conveniunt, si serum vel deficiat in corpore, vel in coagulum & siccum vergat.* Illius exemplum præbet hæctica & phthisis. Omnino verum est, crassa & viscida obtundere acrimoniam, ut spicula salina vim suam his oppositis amittant; sed si serum sanguini fuerit incoctum nimis, (æqualiter hoc casu, secundum quid,) inde motus imminuetur magis. Ergo proficiuus usus in his morbis intelligendus saltim est. in principio magis, vel ubi serum non ita absumtum est, ut excludare & dissilari cesser, corporiq; hinc nutrimentum debitum fœneret. Hoc in cachecticis valet, unde aperientia magis & incidentia conveniunt, non incrassantia æquæ.

Adeoque 2. *non invertendus ordo*, quod empiricorum est & vulgi, cujus exemplum præbent inprimis affectus pulmonum omnes quasi, siquidem expectoratio sit necessaria. Unicè ibi ad statum humoris, seu lymphæ & seri est respiciendum. Cum igitur expectoranda materia debeat esse ejus corporaturæ, ut ejici, attollique possit, ut è contrario nimis viscida & infarcta minus est mobilis incrassantia non locum habent, v. g. species diatragacanthæ frigida (calida enim exolverunt, per crassam hanc empiriam inductæ scilicet,) vel laudanum opiatum, ubi expectoratio difficilis est, nec succedit ob materiæ copiam, & lentorem, quæ incidenda, attenuanda, resolvenda, potius est, sed ubi acris, mobilis, fluida, tenuis adeoque cruda est, quæ coqui postulet & maturari, ad exitum aptari. Hinc pleuritici, quibus opiata, vel papaveracea, sicut flores papav. rhæados habentur pro specifico, improvidè & citra hanc cautelam dantur, suffocantur & obeunt. Hinc phthisicis narcotica h. m. sæpius sunt νεκρωτικά. Verbo ita semper pectoris affectus curandi sunt, ut libertas viarum nativa salva perferat & expectoratio fieri possit, quo de suo loco plura. Interim tamen opiata non excludimus in laudatis affectibus, quin divinum prædicamus remedium, modò dentur μετ' ἀσφαλείας, cum securitate, providentiâ, modò dentur dosi refractâ, ut in terminis naturæ convenientibus agere possint, cum solventibus item, quorum virtutem & ipsa eximie juvant & adaugent. *Wedelius.*

INDICUM & INDIGO, vid. *Glastrum Indicum.*

INFUNDIBULUM, vid. *Instrumenta Pharmaceutica*

INFUSIO.

Infusa cum decoctis maximam habent convenientiam tum in materiali, neque enim alia ferè eorundem sunt ingredientia, præscribendi ordo, quin & vires ipsæ quadantenus, quin per omnia propemodum coincidunt, tum in formali generico, liquida enim utrobique est forma. Nihilominus seorsim ea quoque videbimus, ut eò penitus in eorundem cognitionem feramur.

Infusi itaque notio non aliundè arcessenda, quam quod duo itidem, ut in decoctis, concurrant, certæ & selectæ species infundendæ, & liquor, in quo eadem immergendæ & extrahendæ veniunt. Notabilia vero duo circa hoc sunt nomina alia, dicuntur enim *noduli* ab inclusione, species quidem ipsæ magis, quod illigatæ vel insutæ infundantur. *Puschel ins Bier oder Wein*, item à liquore ipso *cerevisia* vel *vina medicata*, de quo paulò post.

Definiri enim potest infusum, quod sit medicamen-
tum liquidum diffusius, ex speciebus & liquore accom-
modis, citra coctionem vel fermentationem solâ mace-
ratione vires nactum, pro alterandi vel purgandi usu.
Per omnia scilicet convenit cum ipsius decocti defi-
nitione, præterquam, quæ differentia quoque est spe-
cifica, in præparandi ipso modo potissimum, & ex
parte etiam in liquore, ut mox dicemus.

Infusio nempe vel *conjunctim* & *secundario* sub con-
siderationem venit, quatenus cum coctione in effectū
jungitur, eandemque ferè præsit, v. g. infusa stent per
noctem, manè coquantur; vel *seorsim* & *primario*, de
quo hoc loco nobis potissimum est consideratio, ut
dubium cui videri possit, ipsane coctio latius pateat,
an, quod nos affirmabimus, infusio?

Citra coctionem est & consistit, tunc enim decoctum
peculiariter est auditque, proinde tamen non excludi-
tur lenis calor, unde sicut chemicorum fiunt essentia
menstruis potissimum sulphureis, solâ infusione, di-
gestionem, & extractionem, ita infusa, seu essentia
Galenica, eodem modo, menstruo saltim paulò diffusiori
parantur.

Citra fermentationem vero dicta sunt fieri, ut vina &
cerevisias hinc separemus hoc pacto medicatas, quan-
do v. g. certæ plantæ; ut absinthium, melissa, &c. in vino
vel musto, absinthium, scolopendrium, matricaria, he-
patica nobilis &c. in cerevisiâ potissimum recenti im-
merguntur, ut unâ fermententur, sicque simul extra-
hantur. Neque tamen hinc excludenda penitus, licet
videantur paulò remotius huc spectare, *vina Hippo-
cratica* & *clareta*, quæ per se nullo modo quidem dif-
ferunt; attamen diffusiora paulò sunt, & media, ut
evadat vinum magis alimentosum paulò diffusius, &
infusum quasi implicitum magis.

Quoad *Materiale* in genere, ut jam monuimus, nulla
ferè est differentia quoad ingredientia, nisi quod quæ-
dam melius infundantur, quædam melius coquantur,
quædam indifferenter & medio modo se habeant. Fi-
xiora omnia & diffusiora, ut ossa, cornu cervi, hordeum,
radix scorzonera, herba acetosa, endivia &c. magis
coquantur; aromatica & concentratiora magis infun-
duntur.

Hinc recipiuntur non aliter, ac in decoctis, radices,
folia, flores, &c. duplâ omnia dosi, concisione & con-
tusione aptantur ad meliorem extractionem, licet ci-
tra quendam præparandi ordinem, qui tamen servari
ferè idem in ordinando solet, aliquot tamen cautelis
& privilegiis quasi peculiaribus.

1. *Quæ nec in substantiâ, nec in decocto ipso quandoque
commode dantur, infusi specie commode præscribuntur*, id
quod in primis valet de *degestivis*, seu vehementiorib.,
antimoniatis, colocynthiacis, helleboratis, mercuriali-
bus, &c. unde & fibræ hellebori nigri frequentet infu-
sa purgantia ingrediuntur, refractâ quippe singula hæc
virtute hinc tutius operari consueverunt,

2. *Quæ intimius saporem afficiunt, & ingratiiora sunt,
in infusis quoque refractâ recipiuntur*, Hinc utitur leni-
ter amaricantia, præcipuè Germanis nobis, satis sint
amica, eaque potioris æstimemus in infusis, quam
alia medicata, quippe magis adueta & nota nihilo-
minus tamen refractâ magis dosi eadem indenda, *daß
es nach vvas smecke*; pat ratio est similitum; angelicæ,
scordij, & aliorum,

3. *Quin, quia caput feriunt facilius, parcius quoque in-
denda*, ut notum est, plurimiseo nomine minus arri-
dere absinthiaca, hinc, ut & huic intentioni fiat satis,
vel, exemplo apud *Simon. Pauli in quadrip. botan.* in in-
fuso præservante proposito, loes moderatâ additione
id supplet potest, vel absinthio pontico, loco vulga-
ris recepto,

4. *Mineralia quadam per se infunduntur, quadam
elave opus habent*. Notabilis est infusio, vel decoctio
Adangei Bibl. Pharm. Tom. II.

oculorum cancrorum cum vino, quod inde alcali-
cum saporem acquirit, & dolorum hypochondriaco-
rum & plurimorum aliorum morborum egregia est
medela, id quod ab *Helmontio* maxime laudatur. Præ-
cipuè verò notandum est, martialia commodè, quoque
infundi in vinis aperientibus, verum clave opus habe-
re, cujus vicem obeunt potissimum duo, saccharum &
tartarus, idque præcipuè alterandi & deoppilandi sine.
Neque obstat tamen auctoritas *Geigeri*, qui in *micro-
cosm. hypoch. e. 23. p. 194.* monet, ne vinis medicatis ex
speciebus purgantibus concionatis limaturâ martis
addatur; quod in praxi suâ experientiâ comprobave-
rit, illa vina minus laxare, & alvi laxationem remorari,
minusque penetrare; quo minus etiam his positis cir-
cumstantijs laxantibus addere eandem liceat.

5. *Extinctionem facilitantia, sibi id opus, addenda*,
Sic huic fini inserviunt tum *acida*, ut spirit. sal. vi-
trioli philosophicus, martis, item cremor & crystalli
tartari, ita enim acuitur menstruum extrahens, liquor
affusus; tum *lixiviosa*, ut oleum tartari per deliquium,
maximè in rhabarbari vel foliorum fenæ infusione;
item sal absinthij, centaureij minoris; vel *media*, tarta-
rus vitriolatus, arcanum tartari; tum denique *spiri-
tuosa*, præsertim in alterantibus & confortantibus, ut
spiritus cochleariæ, liliorum convallium, rosarum, &c.
Notandum tamen est bene, ne addit in nta hæc, sive
cotrigendi, sive extractionem adjuvandi, seu vires au-
gendi sine addantur, excedant, valet enim & hinc, cor-
rigentium, adde hoc loco & reliquorum, dosin de-
bere esse minorem.

Ut ergo *Forma* infusi emergat, de liquore commodo
in primis prospiciendum est. Quandoquidem enim spe-
cies concisæ & contusæ, adeoque extractioni aptatæ
sunt, (rarius enim integræ in propriè dicto infuso in-
duntur,) liberum est medico, vel utne ipsas solas ab usu-
ro hinc illigandas nodulo præscribere ex officinâ, an
pharmacopœo committere, ut insuantur in sindone
rubrâ, cum interpassatione, id quod satis commodum
est præsertim in delicatioribus, cum signaturâ, *S. Pü-
schel ins Bier, species in Wein* &c.

Cum verò infusio ipsa, sibi relicta, præterquam ubi
hinc vel coquantur species, vel post extractionem
alia addenda, quod in purgantibus obtinet, non fa-
cile in pharmacopolio fiat: hinc seorsim admonendus
est æger vel ejus ministri, tum de liquore affunden-
do in genere, tum de ejus quantitate & alijs circum-
stantijs.

Liquor ipse purè aqueus raro vel nunquam præ-
scribitur; uti enim ad decocta magis aqua solet re-
cipi, ita ad infusa magis liquores domestici alimen-
tarij, vinum, cerevisia, & alicubi mulla quoque; ita
enim, si horum vehiculo virtus in corpus derivatur,
& gratia in assumendo est major, & corpori ipsi id
amicabile & consuetum.

Serum lactis caprinum, licet ab Arabibus mater in-
fusionum vocetur, tamen itidem paulò rarius; frequen-
tius verò pro decoctione adhibetur in usum, ad adu-
stum sanguinis statum utile.

Hinc porro notandum de pondere, i. *tantum af-
fundendum, quantum sufficit extractioni, & saporis tole-
rabili*; hinc in genere infusa non largâ nimis, con-
tinuâ quantitate, simul & semel paranda, unde
& ultra manipulos sex herbarum ad summum vix
solemus ascendere, tum ob tardium, tum corrup-
tionis metum: Sed præstat, quantitate discretâ pro-
cedere, ut, si usus id exigat, absumto uno modulo,
seu infusione, è speciebus recentibus appareatur de-
nuò medicamentum ipsum. Facile verò hinc est dilu-
torem reddere medicinam, præsertim si diutius fue-
rit infusio facta.

2. *Liquor Affectui sit commodus, non adversus*; hinc
uti notum est, vinum non convenire capite dolenti-

bus, febricitantibus, hæmoptoicis, & ex parte paralyticis, arthriticis &c. hinc eo casu omittendum potius est, nisi æger id iudicat ipsum. Alias enim noxam facile procurare possumus.

3. *Ut similia similibus solvantur, ita, quæ extrahi à liquore non possunt, vel omittenda, vel ad hoc aptanda.* Hinc cum resinosa, sulphurea, non bene extrahantur aqueis, ut radix gualapij, lignum aloës, & similia non bene ingrediuntur infusa; parum enim & improporcionatè fiet extractio.

4. *Ex speciebus aromaticis, saccharo & vino, cum frequentiori colatura per manicam Hippocratis, fiunt claretta;* quæ ipsa tamen apud nos paulò sunt rariora, & magis locum habent in affectibus frigidis & diuturnis. Alias saccharum aliaque non facile adduntur, præterquam tum hocce, tum supra dicto casu.

5. *Calidus liquor fortius extrahit; expressus fortius operatur; sed ingratus.* Hinc si purgandum præsertim sit, stare potest infusio loco calidiori. Sed pro asservatione diuturniori id non æquè aptum est, præstat enim, ut diutius incorrupta maneant infusa; loco frigido eadem locare. Expressio verò non ad eò locum habet, nisi in purgantibus, & ubi æger ipse, ubi sæpe sit, majori spe iuvaminis, id ipsum vult. Ideoque frequentius omittitur, & decantatus clarus magis liquor hauritur.

6. *Tempus extractionis debitum etiam attendendum,* hinc ut plurimum vel per noctem vel per quinque, sex, octo horas infusio relinquenda est prius, quàm in usum, cedat. Quò diutius verò relinquitur, eò fortior extractio, & virtus redditur maior.

Observatis his habetur medicamentum commodum assumtu, cuius cæteroquin consistentia non attendenda, cavendo solum, ne crassior liquor fiat, & vini vel cerevisiæ penitus obscuretur facies.

Exempla infusorum possunt esse sequentia.

Cephalicum in paralyti. *℞. rad. paon. ℥j. helen. ℥ss. fol. bezon. meliss. salv. rosm. a. m. j. fl. cheiri, lil. convall. anth. p. ij. p. mul. ver. p. j. fl. h. b. Amb. m. b. lign. al. ℥j. visc. querc. ℥ij. cinnam. ℥ss. M. Concis. cont. insuantur sintonia rubra.*

Antiphthilicum. *℞. rad. chin. glycyrrh. russil. a. ℥ss. caryophyllat. ℥ij. fol. marrub. scabios. veron. capill. q. a. m. j. scord. m. b. fl. russil. p. ij. 4. cord. a. p. j. lign. sassafr. ℥j. sandal. rubr. ℥ss. M.*

Ictericum. *℞. rad. g. aper. rub. tinct. cichor. a. ℥ij. herb. agrim. hepat. nob. fragar. marrub. fl. cent. min. summit. absinth. a. m. b. hyper. p. ij. sandal. flav. ℥j. curcum. ℥ss. croci ℥ss. cinam. ℥j. M.*

Vinum anthypochondriacum: *℞. rad. cichor. acetos. a. ℥ss. pimpin. ℥ij. fol. cochlear. spicant. summit. fumar. a. m. j. fl. rosar. rubr. hepat. nob. a. p. ij. cort. rad. cappar. ramarisc. curri. a. ℥j. cassia lign. ℥ss. ocul. c. ℥ij. costi ver. ℥j. M.*

Menses sistens: *℞. rad. bistort. torment. acor. ver. symph. a. ℥ij. fol. polygon. millefol. plantag. burf. pass. a. m. b. fl. ros. rubr. balaust. a. p. ij. sandal. flav. ℥ss. M. pro vino rubro.*

Facile verò, in quibus opus est, purgantia fieri possunt eadem, accessione foliorum senæ, rhubarbari, mechoac. alb. agar. troch. &c.

Quod ad utendi modum spectat, 1. *infusa omni ætati conveniunt* præterquam in infantibus & pueris, in quibus, ob delicatiorem præsertim sensum, propriè dicta paulò rariora sunt, nisi eadem in dosi imminuantur.

Assumuntur magis intermedio à cibo tempor., mane, & vespere, noctu, nisi vina vel cerevisiæ per fermentationem sint medicatæ, illa enim locum habent tunc magis. Et licet virtuosiora æstimari possint actu calida, non tamen pari hæc gratiâ se commendant. Notabile tamen est, ut singula alia liquida; ita præsertim infusa manè assumenda calida esse debere, ut ventriculus eadem commodius ferat, & inprimis, ne feriant

caput, unde & tum vina tum cerevisiæ maturatio tempore vel calida assumenda, vel postquam iusculum unâ vel alterâ horâ prius fuit assumtum, non item frigida, jejuno ventriculo.

2. *Quæ purgant, pro ipsius medicamenti operatione vespere vel omittuntur vel continuantur.* Prius, si ab uno præbio corpus jam satis exerceatur; quod ipsum ad dies tres, quatuor vel quinque producit nonnunquam; alterum, si segnius se gesserit idem. Alterantium verò usus discretus continuari potest pro lubitu.

Dosis verò torius dividendi ipsa tanta esse debet, quæ uno haustu vel portione absolvi queat, v. g. tertia pars sextarii, vel sextæ mensuræ, cyathus unus, poculum unum, quod ℥ij. ℥ij. capiat; idque & in alterantibus & purgantibus. Extrahit enim liquor non ad modum agentis absolute; sed ad modum quoque receptivitatis suæ.

Denique quo *Fine & usu* se commendent, videndum restat. Commodissima quidem est infusorum formula, nihilominus tamen minus convenit 1. *in ventriculi debilitate*, siquidem copia ingredientium seu farrago major fuerit. Habent siquidem hoc vitii, quod, cum alimenta medicatam virtutem secum inferant ventriculo, faciliè inde turbetur idem, & flatus parturiant; hinc corrigentia ipsis & ventriculum respicientia consultò adduntur; hinc ab iisdem faciliè etiam non purgandi sine adhibitis laxatur alvus; hinc præter alia quoque aquea menstrua pro infusione minus sunt usitata.

2. *Minus refrigerandi & siccandi, magis calefaciendi, diluendi & humectandi sine in usum cedunt;* tum, ne lædant eâ formâ & sine magis ventriculum, turbentque, tum quoque, quia virtus refrigerantium hoc pacto minus extrahitur, calefacientium verò magis obtunditur. Hinc & in reliquis visceribus refrigerandis cum prima actio in ventriculum redundet, multò minus eadem locum habent.

Cum verò, siqua alia, benignissima sit infusorum formula, plures sanè usus habet, quàm non habere autè *ἀπορί* dici potest. Hinc, ut summatim eos videamus.

1. *Infusa humectant;* hinc in siccioribus, tum in genere tum in specie quoad alvum, habent usum insignem. Actu enim & blandè quidem id præstant, hinc diluunt quoque adustos humores, biliosos & atrabilarios maxime. Et præstantiora quidem sunt ipsis decoctis, eò, quod nihil pereat de virtute extrahendorum, sed omnis quasi & quidem subtiliter concentrata & extracta maneat.

2. *Laxant & purgant.* Hinc squalidis præsertim, debilibus, exhaustis, valetudinariis, siccis, purgantia infusa sunt laudatissima, & ipsis quidem delicatis commodè propinantur; neque tamen obstat, quod veteres infusa ad sola purgantia in genere restrinxerint, ipsique non nisi coacti & egeni eadem æstiment, hodie enim longe latius patent, quàm olim.

3. *Alterant efficaciter & purgant efficaciter,* seu, ut cum insigni emolumento vim purgandi exsequuntur, ita etiam non minori efficaciâ alterant massam sanguineam; hinc ubi sanguis novo quasi caractere, pristino amisso, imprægnandum est, nimis vitiatum & ad aliam peregrinam perductus qualitatem, potissimum in infusis invenit auxilium. Sic in paralyti continuatum infusorum nervinorum usum invenimus probatissimum, idque præstant, quia lentè agunt & successivè, penitusque illabendo, id, quod lentè congestum est, lentè quoque ad motum alium cient; hinc

4. *In morbis chronicis, & in specie obstructionibus ap primè conveniunt infusa,* auferendo successivè *πύλω* illud salum scorbuticum seu hypochondriacum. Hinc etiam defectum seri solantur, in defectu mensum, febribus tertianis, quartanis, maximi sunt usus, hinc in exuberantiâ sanguinis & seri non ita locum habent. Aguntque, siquid aliud, per *ἐμπύριον*, & alterant & purgant

purgant, unde, quod sensim & lentè congestum est, lentè & successivè, sufficienter tamen, reserant.

5. Infusa polychresta sunt, pluribus intentionibus & indicationibus aptissima, habito ad præsentiam feri ubique respectu, quibus, quod de iisdem ulterius dici possit, includimus. Hoc pacto alimenta medicamentorum sunt commoda vehicula, horumque dotibus sigillata massæ sanguineæ adjumentum nobilius adferunt. Sic in vulneribus quoque, ulceribus vetustis, sordidis, fistulosis faciunt officium. *Wedelius.*

Sequuntur jam Infusa varia ad varios usus & variis Autoribus.

Infusio Cathartica communis.

℞. Fol. sen. mund. ℥ij. salis tartari alb. ℥℥. Infund. calide per noctem in f. q. aq. comm. ad colaturæ ℥iv. v. vel plures, pro una dosi.

Addi poterit rhabarbarum, & alia etiam varia pro intentione Medici; sed hic tantum de infusione cathartica verè communi.

Infusum Seri lactis, Mesue à Pharm. Aug.

℞. Foliorum rosarum recentium uncias duas. rhabarbari electi ℥ij. gr. xij. nardi indicæ ℥℥.

Minutim incisa macerentur per noctem in feri lactis caprini ℥j. deinde colentur ac leniter exprimantur.

Sanguinem depurat, bilem quoque flavam, tenues & calidos ichores eidem admixtos clementer ac sine molestia educit & erysipela a juvat.

Infusum aliud Seri lactis ex eadem Pharm.

℞. Florum boraginis, buglossi, fumi terræ, epithymi ana manipulum semis, poppodii querni ℥vj. fœniculi ℥ij. folliculorum senæ ℥℥. feri lactis ℥ij.

Fiat infusio & decoctio ad tertiæ partis consumptionem & colaturæ addantur mellis rosati ℥ij.

Austos humores temperat & expellit cutem à scabie ac prurigne mundificat.

Infusum Hieræ, Mesuæ, ex eadem Pharm.

℞. Hieræ simplicis, aloës ana ℥v. macera in decocti epithymi alibi descripti ℥℥. in vase vitreo, & cola.

Ventriculum & caput expurgat, proinde amborum doloribus assiduus, ac hemicranie confert; nec non febribus antiquis, & morbis melancholicis auxilio est.

Infusiones variæ à Pharmacop. Bateanæ.

Infusio Arthritica.

℞. Anthos ℥j. * volat. ℥j. Pyrami ℥vj. Digere in Laguna opt. obturata in fimo equino & 40. dein infola & 20. f. expressio. Applicetur in declinatione Arthritidis. Extrahit valde frigidos, crassos, & flatuosos humores in articulis, & fortificat.

Infusio Benedicta.

℞. Rad. polypod. qu. turpet. senæ opt. à ℥vj. sem. carvi ℥j. V. alb. ℥xij. macer. (vase clauso) super E calidos ad horas 24. colat. cum expressione facta adde mann. opt. syr. Ros. cum Agar. sacch. à ℥℥. clarific. cum album. ovor. f. a. Bilem utramque cum pituita è capite, ventriculo, aliisque partibus insigniter educit sine fastidio. Dos. ℥iv. an ℥vj.

Infusio Cachectica.

℞. Rad. enul. rec. incis. ℥vj. uv. corinth. incis. ℥viij. sacch. alb. ℥vj. V. alb. ℥xij. macer. in frig. hor. 48. & cola. Dos. ℥iv. bis in die in cachexia, chlorosi, Dysphœra, &c.

Infusio Ictérica.

℞. Anserin. rec. ℥vj. Fol. chelidon. mij. V. alb. ℥

chelidon. simp. à ℥℥. Infunde tepidè hor. vj. cum sacch. abl. ℥ij. f. colat. sape per munit. Hippoc. Dos. ℥iv. bis in die.

Infusio Ictæa.

℞. Rad. irid. nr. rec. incis. uv. pas. ex acin. incis. sacch. alb. cerevis. ten. à ℥℥. macer. dies 3. & f. colat. Detur haustus mane & vespere in Scorbuto, Hydrope, &c.

Infusio Sancta.

℞. Guajac. ℥ix. Tartari ℥iv. glyc. ℥iv. Digere tepidè in Hydropeg. ℥xx. ad & vj. dein f. colat. Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat, omnes obstructions & putrefactiones tollit, & sanitatem optimè præservat. In Scorbuto, Hydrope, Febribus, Luc. & Arthritide, cæterisque morbis tartareis multum facit. Dos. ℥vj. quater in die.

Infusio Aperiens Goddardi.

℞. Flor. sambuc. summit. genij. aa p. ij. centaur. min. p. ij. summit. absinth. vulg. flor. chamom. aa p. j. aq. puleg. hyssop. menth. raphan. composita aa ℥iv. infund. calide per horas 3. colatura adde tinctur. croci ℥℥. syr. de succo aurantior. ℥℥. Dos. cochlear. vj. bis in die.

INGUINALIS, sic dicitur quibusdam Affectibus.

INJECTIO.

Injectio generaliter idem significat ac enema; in specie verò est illud omne remedium liquidum, quod per syringam in quascunque partes internas immititur.

Materia injectionis pro variis partibus & affectibus diversa est. Paratur ex liquoribus, succis, aquis, decoctis; vel ex solis oleosis; vel ex pluribus eorum simul mixtis.

Ufus multiplex est pro variis partibus & morbis.

Primo, in aurium affectibus ad dolorem & inflammationem mitigandum.

℞. Lactis recentem emulsi ℥. ij. liquoris albumin. ovi agitari detractâ spumâ, vel aq. rosar. ℥℥. Misce, fiat tepidè injectio in aurem.

Vel

℞. Succo lactuc. & solani ℥. ss. olei amygdal. dulc. sine igne extract. ℥℥. Misce, fiat injectio.

Si rumpatur abscessus paranda injectio detergens.

℞. Decocti hordei ℥iv. mellis ros. ℥j. Misce, fiat injectio.

Quando materia est crassa & frigida.

℞. Succo apii & porror. an. ℥j. mellis rosati ℥℥. Fiat injectio, &c.

Ad gravem auditum.

℞. Olei anisi arte chymicâ extracti, vel caryophyll. gutt. vj. per se, aut cum oleo amygdal. dulcium, vel amar. aut cum pauco lacte, fiat injectio.

Secundo, In thoracis morbis, & vulneribus, pro empyematè, & vulneribus pectoris ad pus detergendum.

℞. Hord. integr. p. j. fol. agr. plantag. pimpin. an. M. j. liquirit. rasæ ℥. ij. flor. hyper. p. j. Fiat decoct. Colat. ad ℥℥. dissolve mell. ros. ℥j. Fiat injectio.

Tertio, In uteri affectibus.

Injectio fit in uterum per syphonem, qui metrenchyta dicitur, pro virginibus nusquam præscribenda, pro puerperis & recentè enixis, dosis pro unâ vice est ad ℥iv. pro cæteris ad ℥ij. vel iv.

Ad dolorem & inflammationem sedandam.

℞. Aq. plantag. solan. an. ℥ij. Fiat injectio.

Vel

℞. Succo plantag. solan. an. ℥ij. mucilag. sem. cydonior. & psyllii, extracta in aquâ plantag. ℥℥. Misce, fiat injectio.

Vel

℞. Folior. lact. plantag. semperviv. an. M. j. flor. nymph. p. j. Fiat

p. j. Fiat decoct. Colat. ad ℥. β. dissol. salis prunell. ʒiβ.
Fiat injectio.

Ad tumorem uteri œdematosum, vel schitrosum,

℥. Rad. alth. & lilior. an. ʒ. j. fol. malva. parietar.
artem. an. M. j. sem. lini. althæa an. ʒ. β. flor. chamomill.
p. j. Fiat decoct. in aquâ & vino albo, vel in jure oma-
forum. Colatura ad ℥. j. dissolve olei lilior. & chamom.
an. ʒ. j. Fiat injectio.

Quarto; ad ulcus tergendum:

Si adsit acrimonia, ardor, dolor,

℥. Decocti hordei & feri lactis ann ʒ. iij. mellis ro-
sati ʒ. i. β. Misce fiat injectio pro unâ vice sæpè ite-
randa.

Si ulcus sit simplex.

℥. Hordei integri p. j. fol. agrim. plantag. fanicul. ana
M. j. flor. hyperic. p. j. Fiat decoct. Colat. ad ℥. j. dissolve
mell. ros. ʒ. ii.

Si ulcus sit sordidum, & multis scateat excrementis
injectio necessaria est efficacius detergens, modò non
adsit dolor, vel hæmorrhagia, quæ à detergentibus acri-
bus auferentur.

℥. Rad. ireos Florent. gentian. an. ʒ. iij. agrim. plan-
tagin. absinth. & marrub. an. M. j. flor. hyperic. p. j.
Fiat decoctio in sero lactis vel hydromellite. Colatur. ad
℥. j. dissolve succi apii, & mellis rosati ana ʒ. i. β. Fiat
injectio.

℥. Aquæ vel decoct. agrim. ʒij. salis jovis ʒβ. Fiat in-
jectio.

Ad provocandos menses in frigidis, & obæsis, tum
ad deterfionem quando pituitosi humoribus sordet u-
terus.

Utendum pro injectione aquis thermalibus, qua-
les sunt Balerucanæ, præmissis sufficienter universa-
libus.

Quinto in vesicæ, & penis morbis.

Nota, non esse præscribendam injectionem, nisi prius
reddita urinâ depleatur vesica.

Ad dolorem leniendum ab acrimonia, calcu-
lo, &c.

℥. Aquæ hord. ʒij. olei amygdal. dulc. recenter ex-
tracti ʒiβ. Misce fiat injectio.

Potest parari ex lacte tepido cum aqua hordei, vel
ex mucil. semini. alth. & psyllii extract. cum aqua solani
& lilior. si adsit inflammatio.

℥. Aquæ plantag. solan. ana ʒij. camphora gr. iij. Fiat
injectio.

Vel

℥. Fol. sempervi. lactuc. an. M. j. hordei integr. & flor.
nymph. ana p. j. Fiat decoct. Colat. ad ℥. β. dissolv. salis pru-
nell. ʒ. j. Fiat injectio.

Ad ulcus detergendum.

℥. Hord. integr. p. j. fol. plantagin. fanicul. millefol.
& absinth. an. M. β. summit. hyperic. & rosar. rub. an.
p. j. Fiat decoct. Colat. ad ℥. j. dissol. mellis ros. ʒ. ij. Fiat in-
jectio.

Si ulcus sit depascens, & foetidum, sæpè etiam utere
sequenti injectione.

℥. Aquæ plant. ʒiv. collyr. Lanfranci ʒβ. unguenti æ-
gyptia. ʒβ. vel præcipitat. rubri ʒij. Fiat injectio.

Si ulcus sordidum sit, & scateat plurimis excremen-
tis, utendum magis detergentibus, qualia supra di-
cta sunt in ulcere uteri; sed fieri debet decoctio in aqua
& vino albo, vel si magis roborandum sit, in vino
rubro.

Sæpè etiam interjicienda sequens injectio.

℥. Præcipitati rubri ʒβ. vel unguent. ægyptiaci ʒβ. aqua
plantag. ʒij. Fiat injectio.

Nota quòd aliquando cum prædictis ulceribus ad-
sit inflammatio, vel intemperies calida insignis, vel tu-
mor aliquis callosus aut cancerosus: quo tempore non
est agendum nimis exsiccantibus, & calidis, sed tem-
peratis, anodynis, & refrigerantibus, dum præferi-

buntur universalia alterantia, & evacuantia.

Ad exsiccandum, & consolidandum paratur ex me-
dicè adstringentibus, & exsiccantibus, ut

℥. Rad. symphyti major. bistort. an. ʒ. j. fol. plantag.
equiseti, polygon. an. M. j. granor. sumach. plantag. an.
ʒij. summit. hyper. & rosar. rubr. an. p. j. decoctio Colatur.
ad ℥. j. dissolve syrup. de rosis siccis ʒij. salis saturni ʒβ.
Fiat injectio.

Sæpè etiam dissolvi possunt in ʒiv. prædicti decocti
trochiscor. Gordonii ʒii.

Sextò, In ulceribus profundis, vel etiam fistulosis
cæterarum partium, & cavitatum, quando detergen-
dum & exsiccandum.

℥. Radic. gentiana, rhapont. & aristolochia rotunda.
an. ʒ. ij. fol. pimpin. scabios. bugula an. M. pul. cancr.
fluvialitium in nodulo positi ʒij. rosarum rubrarum M.
β. Coque in vino albo ad ℥. j. Quo decocto fove ul-
cera, ter aut quater in die, & ex eo fiat injectio in fistulas
per syringam.

Si ulcus sit sordidum, dissolve in parte ejusdem de-
cocti collyrium Lanfranci, ægyptiacum, præcipitatum
rubrum, ut supra. Toncke.

Injectiones tres à Pharmacopœa Batanæa.

Injectio Alba.

℥. Trochiscor. albor. Rhab. ʒij. camphor. ʒj. solvantur
in aq. spermiol. ʒxij. f. a. Inflammationes & dolores mi-
tigat. Efficax admodum ad ulcera virgæ, Gonorrh. &c.

Injectio Auricularis.

℥. Antibus m. ij. coque in urinâ pueri ℥. iβ. ad ℥. j. colat.
adde Rhodo melit. ʒiv. M. Valet in surditate & aurium
dolore.

Injectio Benedicta.

℥. Aqu. Benedict. ʒ viij. mercur. dulc. subtilis. pulve-
ris. ʒij. M. exactiss. f. a. Vires habet eandem cum in-
jectione albâ.

INSECTA.

Per repetitas observationes eò deductus sum ut
credam terram, post primas illas plantas, & pri-
ma illa animalia, quæ sub ipsa mundi primordia
supremi Creatoris jussu producit, per se, nec her-
bas, nec arbores, nec animalia qualiacunque per-
fecta vel imperfecta produxisse, & quod omnia illa,
quæ vel præteritis seculis nata sunt, vel hoc tem-
pore in, vel ex terra nasci videntur, ex semine plan-
tarum reali & vera, necnon ipsorum etiam anima-
lium nascuntur, ut quæ mediante semine proprio,
suas species conservant. Et quanquam singulis ferè
diebus videamus, ex cadaveribus animalium, nec
non ex omni genere herbarum, florum & fructuum
putridorum & corruptorum vermes nasci infinitos,
juxta illud

Nonne vides quacunque mora, fluidoque calore.

Corpora tabescunt, in parva animalia verti?

Huc tamen feror, ut credam, omnes hos vermes ex
semine paterno generari, & carniū, herbarum, alia-
rumque rerum, vel planè putrefactarum, vel putref-
centium, in generatione insectorum non alias esse par-
tes, nec aliud officium, quàm ut locum vel nidum
commodum præbeant, in quem ab animalibus cum
nendi tempus instat, deferantur vermes, ova vel quod-
cunque aliud vermium semen, qui vermes, statim ut
nati sunt, in hoc nido alimentum sufficiens & nutritionis
commodissimum inveniunt; & nisi a matribus supra-
dictum semen huc delatum sit, nullum ibi vermem,
nunquam inquam quidquam generari. Et ut hoc,

Carole

Carele Dati, quod dico, verum esse perspicias, de paucis & maxime vulgaribus, nobisque notis insectis scribis apud te loquat.

Ergo, secundum ea quæ dixi, & quæ antiqui simul & moderni scriptores, nec non communis vulgi opinio probavit, omnis putredo corrupti cadaveris, & omnis clavies cujuscunque alterius rei putrefactæ, vermes generat, atque producit, cujus rei veritatem indagare volens, sub initium mensis Junii tres ex illo genere serpentum, quos angues *Æsculapii* vocant, interemi, statimque ut mortui erant, in fistulam apertam, ut putrescerent mihi: nec multum temporis intercessit, cum eos vermibus conicæ figuræ opertos vidi, nullo pedum, quantum quidem oculo perspicere licebat, apparente vestigio. Hi vermes devorandis his carnibus occupati continuo crescebant, augebantque, ut videbatur, de die in diem eorundem numerus. Cæterum, ut conicæ omnes figuræ essent, quia tamen diversis nascebantur temporibus, diversæ quoque magnitudinis erant: minores tamen simul & majores; absument carne, sed integris adhuc nudis ossibus, per exiguum quoddam cistulæ oclusæ foramen ad unum omnes sese proripuerant; nec indagare unquam potius ubi locorum sese abscondissent. Ergo majore adhibita curâ, ut finem eorum perspicerem, ii. Junii tres alios ejusdem generis serpentes adhibui; in quibus exacto triduo vermiculos vidi, quorum numerus & magnitudo continuo crescebat; & omnes quidem unius ejusdemque figuræ, sed coloris erant diversi: majoribus quantum ad exteriora candidum referentibus, cum minores in carneum propenderent. Absumentis carnibus anxie fugam circumspiciabant; sed rimis optime clausis, observavi, decimonono ejusdem mensis nonnulla ex majoribus æque ac minoribus quasi sopiti & immobiles reddi. Inoc corugati & in se collecti, in enibilibiter oviformem figuram assumebant, usque dum die vigesimo primo prius transformarentur in figuram ovi candidioris, qui tamen color postea in aureum & paulatim in subrubicundum, tandemque in nonnullis sensim obcurior factus, in nigricantem degenerabat. Ova autem, tam rubicunda, quam nigra, postea quam ad hunc gradum pervenerant, ex mollibus & teneris, ducto cortice, dura & fragilia reddebantur, ut jam aliquam cum chrysalidibus vel auriculis aut nymphis, ut vocant, convenientiam habere viderentur, in qua per aliquod temporis spatium bruchi, bombyces, atque id genus alia insecta transformantur. Curiosius ergo cuncta observans, aliquam in ovis rubicundis & nigris quoad figuram differentiam deprehendi: utrum enim eadem omnia ratione, ex pluribus quasi annulis simul junctis composita viderentur, annuli tamen illi in nigris quam rubicundis magis exculpti, magisque conspicui erant, cum rubicunda quasi polita viderentur, & in altero extremorum certâ quadam exigua concavitate destituerentur, quæ in nigris manifesta & concavitate malorum medicorum tibi à ramis decerpta sunt, non multum dissimilis erat. Separatis his ovis, unumquodque genus seorsim diverso vase vitreo, chartâ bene munito excepi, & exactis octo diebus ex quocunque ovo rubicundo, rupto putamine, musca prodibat coloris cinerei, torpida, ac veluti stupens, imperfecto adhuc opere, & alis nondum exertis, sed quæ intra octavam horæ partem sensim explicatæ, pro modo illius corporiculi, intra idem temporis spatium ad debitam & naturalem partium symmetriam reductæ, ac jam planè formata dilatabantur, & musca deposito livido illo colore cinereo, viridem, maxime vividam, & mirum in modum radiantem assumpserat, totumque corpus ita increverat, ut impossibile videretur illud exiguo illo putamine comprehendi potuisse. At verò si hæ virides muscæ ex ovis rubicundis octidui spatii excluderentur, ex ovis nigris, non nisi post quatuordecim dierum

moram, rudes quædam & nigre majores muscæ prodibant, albore undulata, ventre piloso, & in imo rubente; illius generis, quas per macellâ & domos quotidie circa mortuas carnes vagari & bombos edere videmus. Cum nascerentur deformes erant & tardissimæ alis, id quod viridibus etiam, de quibus supra dictum est, acciderat, non explicatis. Nec tamen nigra illa ova omnia post dies quatuordecim excluderentur, sed erant numero plura quæ in diem usque vigesimum cunctarentur, quo temporis articulo certum genus muscarum prodibat extraordinarium, & à primis duabus generationibus, tam quoad magnitudinem, quam figuram planè diversum, nec à quoquam historicorum, quod ego sciam, descriptum. Muscæ etiam ordinariis, quæ mensas nostras infestant multo minores sunt, alis volitant argenteis & quæ modum corporis non excedunt, corpus ipsum prorsus nigrum, coloris ferruginei, politum & circum imum ventrem splendentis est, quæ parte corporis formicatum alatarum figuram referunt raris, & non nisi ope microscopii, conspicuis tenerioribus pilis cornua oblonga, vel, ut naturalis historia scriptores vocant, antennæ in capite duæ assurgunt. Anteriores quatuor pedes ordinariam in muscis pedum structuram non excedunt, sed posteriores duo multo quam pro tantilli corporis modulo longiores & magis crassiusculi sunt, & ex materia crassiuscula, locustarum marinarum pedibus non dissimili, constant, eundemque, sed magis vividum atque illum in modum rubentem colorem obtinent, ut ipsam etiam cinnabarim superarent, punctisque candidis distinctæ, opus emulantur ex purissimo aere constans.

Hæ diversæ muscarum generationes, ex uno solo cadavere productæ, meam curiositatem non expleverunt; sed instar stimuli mihi fuerunt ad tentandum nova experimenta: & in hunc finem apparatus sex cistulis, sine operculo, in primam mihi duos ex prædictis serpentibus, in secundam pullum majorem columbinum, in tertium duas carnis vitulinæ libras, in quartam frustum equinæ carnis satis magnum, in quintam capum, in sextam cor vervecis, & omnia horarum viginti quatuor, aut paulo majore spatio vermes produxerunt: vermesque, exactis à nativitate sua quinque vel sex diebus, more solito in ova transferunt: & ex serpentinis, coloris rubicundi, & cavitæ earentibus, spatio dierum duodecim muscæ natæ sunt, aliæ coloris carulei, aliæ violacei. Ex columbinis carnibus ova alia rubicunda prodierunt, alia nigra: & ex rubicundis quidem sub finem octidui muscæ virides; ex nigris verò die decimo-quarto, rupto putamine, in ea ovi paste, ubi cavitæ nulla est, totidem nigri culices albo colore undulati prodierunt: eodemque tempore ejusdem generis culices prætextati ex ovis reliquarum carniū natī sunt, hoc tamen discrimine, quod ex corde vervecis, præter prætextatum hoc genus culicum, nonnulli etiam coloris carulei & violacei natī sunt.

Interim ranas aliquot fluminis, excoriatas, vase vitreo excepi, & vase minime clauso, sequenti die cuncta recognoscens, paucos numero vermes inveni, qui ranas depascebant, aliis in fundo vasis, & aqua à carne ranarum destillata natantibus. Die sequenti altero, vermes omnes increverant, natis interea infinitis aliis, qui in aquæ superficie natantes, nonnunquam emergendo, ex reliquis ranarum cibum capiebant, quibus bidui spatii absumentis, natantibus & ludendo per fœtidum illum liquorem ferebantur, & quanquam molles & inquinati pedibus destituerentur, tamen atollentes sese subultabant, & serpendo pro lubitu descendentes, ac circa vitrum delati aquas repetebant, tandem tunc non animadvertente factum est, ut subsequenti die illos in universum om-

nes, superatâ altitudine vitri, diffugisse viderem. Eo ipso tempore pisces aliquot Arni fluminis, qui *Barbi* vocantur cistulæ perforatæ, cum operculo aequè perforato inclusi, eaque post quatuor horas apertâ, innumerablem super piscibus vermium minutissimorum multitudinem, & circa juncturas cistulæ internas, ipsosque aded vermiculos affixam & conglomeratam tenuissimorum ovorum seriem deprehendi, quorum alia candida, alia crocea, cum unguibus tererentur, fracto putamine liquorem emittebant candicantem, albumine ovorum avium subtiliorem & nimis viscosum, Restituta in priorem statum; & postero die apertâ cistulâ, vidi, ex ovis illis omnibus natos esse vermes, & vacuâ liquore putamina, eo quo generata erunt hæere loco, vermesque illos, quos pridie ejus dici videram, duplo majores factos esse. Et quoddam miraculi instar erat, sequenti die in illam magnitudinem excreverunt, ut singuli septem circiter grana penderent, cum antea 25. aut 30. eorundem unius grani pondus non excederent; sed reliqui ex ovis prodentes, minutissimi erant, & nictu, ut ita dicam, oculi, citius quicquid erat carniû in piscibus devorabant, offibus illum in modum denudatis, ut totidem sceleta esset, & ex diligentissimi totius Europæ Anatomici manibus prodisse viderentur: & hi vermes, eo loco aservati, inde effugere, vel sollicitè id quærentes, non poterant, exactis à nativitate eorundem quinque vel sex diebus, more solito in totidem numero ova transformabantur, ex quibus postea determinato tempore muscæ prodibant virides, culicesque cærulei, & nigri alii, albo colore undulati: muscæ item aliæ, locustis marinis & formicis alatis similes, quales supra descripsimus. Præter hæc quatuor genera, octo, vel decem numero muscæ ordinarias vidi, quæ mensas nostras circumvolitantes, bombum edunt. Et quia exacto uno supra vigesimum die, animadverti, ovorum nigrorum aliqua nondum exclusâ esse, diversis illa vasis seorsim excepi, & exacto bidui spatio culices prodibant viginti minutissimi, quorum numerus intra aliud biduum ita adaugebatur, ut numerum ovorum quàm longissimè superaret. Quare aperto vase, & ruptis quinque, vel sex ovis, eadem prædictorum culicum illum in modum plena inveni, ut unumquodque putamen minimum 25. vel 30. & sæpius quadraginta culices contineret: continuatisque multoties istiusmodi experimentis, nunc carne cruda, vel cocta, tauri, cervi, asini, bubali, leonis, tigridis, canis, hædi, agni, damæ, leporis, cuniculi, foricis, vel gallinæ, galli Numidici, anseris, anatis, coturnicis, perdicis, graculi, passeris, hirundinis, apodis, vel etiam varii generis piscium, thunni, acipenseris, piscis gladii & lamia, solæ, mugilis, lucii, tinea, cancerorum marinarum, & fluvialium, necnon musculorum marinorum conchâ demptâ, semper indistinctè mihi nata est, modò hæc, modò illa species prædictarum muscarum, & quandoque ex uno solo animali omne memoratum genus muscarum simul, & multæ præterea oleæ generationes culicum, nigri coloris; quorum nonnulli usque aded minuti erunt ut c. ulis eos vix assequi possem: & super semper his carnibus & super his piscibus, & circa foramina cistularum, non vermes modò vidi, sed, ut supra dictum est, ova etiam, ex quibus vermes nascuntur. Atque hæc nova in memoriam mihi revocarunt stercorea, quæ à muscis super carnibus & piscibus excernuntur, ex quibus postea vermes nascuntur, id quod optime notatum est à compilatoribus vocabularum Academiae nostræ; & pariter observatur à venatoribus in feris æstivo tempore captis, nec non à macellariis, & mulierculis, quæ ut carnes per æst item ab his sordibus conservant, in muscarium illas recondunt aut, linteis candidis cooperiunt. Unde non sine ratione Homerus, libro decimo nono Iliados, Achillem introdegit, metuentem, ne dum vindictam in He-

ctorem pararet, muscæ vermilibus inficerent vulnera demortui Patrocli, δειδω inquit, cum Thetide loquens.

Δειδω μή μοι τὸ Φῶρος Μένοντις ἄλκιμον υἱὸν
Μῦαι καὶ δῦσαι κατὰ γαλκότησας ὡτε λῶας
Εὐλῶας ἐγγεῖναι τῷ, δεικίωσιν δὲ νεκρῶν
Ἐν δ' αἰὼν πᾶσι φάται, κατὰ δὲ χρέα πάντα σάωσεν.

Id est,

*Timeo, ne mihi interea Menæti fortem filium
Muscæ ingressæ in impressa ære vulnera,
Vermes generent deturpenique cadaver:
(Vita autem adempta est) inque corpore omnia putrescant.*

Quare pia mater eidem promisit, divinâ suâ potentia abacturam sese ab illo cadavere importunum hoc muscarum examen: & contra ordinem naturæ per integrum anni spatium illud incorruptum servaturum.

Τέκνον, μή τοι ταῦτα κατὰ Φρησὶ σῆσι μελάντων,

Τῷ μὲν ἐγὼ περήσω ἀλλὰ λκύν ἄλλος Φῦλας,
Μυίας αἱ ῥά τε Φῶρος ἀρήϊ φάτρης κατέδουσιν.
Ἦν περ γὰρ κείτῳ γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτὸν.
Αἰεὶ τῷ δ' ἔσαι χρῶς ἑμπεδος, ἢ καὶ ἀρεμὸν

Id est,

*Fili, ne hac menti tua sint cura,
Ab hoc quidem ego conabor arcere improba examina,
Muscas, quæ viros bello necatos comedunt:
Et si enim jaceret solidum per annum,
Semper huic erit corpus integrum, vel etiam melius.*

Hinc dubitare cœpi, utrum omne hoc vermium in carne genus, ex solo muscarum semine, an ex ipsis putrefactis carnibus oriretur: tantoque magis confirmabar in hoc meo dubio, quanto in omnibus generationibus, meâ operâ factis, sæpius videram, in carnibus, antequam verminare inciperant, reledisse ejusdem speciei muscæ, cujus propago postea nascebatur. Sed vana fuisset, nullo experimento firmata dubitatio. Quare medio mense Julio, in lagenas quatuor, orificii ampliotis, misi serpentem unum, pisces aliquot fluviales, anguillas Arni fluminis quatuor, & frustum lactantis vitulina, oclulisque postea, & optime obsignatis chartâ & funiculo orificiis, in lagenas qualque, tantundem prædictarum rerum demisi, non oclulis orificiis, nec multum temporis abiit, quin pisces & carnes horum vasorum reliquæ verminare inciperent; muscis, cum luberet intrantibus & exeuntibus. At verò in lagenis oclulis nullum unquam vermem natum vidi, utur non unus mensis obierit, ex quo cadavera immista in eas erant. Nonnunquam tamen loris, in charta, excrementorum aliquid, vel vermiculus inveniebatur, qui omni conatû & solitudine id agebat, ut inventâ aliquâ rimâ, intrare in lagenam, & victum sibi quærere posset, omnibus quæ intus erant, jam putrefactis, & corruptis: piscibusque ipsis præter spinas, in aquam sæculentam & turbidam conversis, quæ sensim residens, tandem clara & limpida reddebatur, natantibus in superficie quidam pinguedinis liquefactæ guttis. Ex serpente etiam multum aquæ prodit, non dissoluto cadavere, id quod servato eodem colore integrum & illæsum permansit, haud secus ac si heri recens oclulum esset. Anguillæ contra minimum aquæ dabant: sed intumescences, & inflatæ, deperditâ sensim figurâ in massam quasi glutinosam, vel gluten satis renax & viscosum abibant. At verò vitulina, per multas septimanas atida permansit & sicca. Nec tamen hoc solo experimento contentus fui, sed diversis temporibus & vasis infinita alia ejusmodi experimenta sumsi.

Et ne

Etne quid intentatum prætermitterem, non semel aliquot frustra carnis sub terra sepeliri & humo optimè contegi curavi; nullis unquam, post plurimum septimanarum in terra moram, generatis vermibus; cum carnes reliquæ omnes, in quibus muscæ defecerant, vermes produxissent. Et maximè dignum consideratione est, quod intestina trium caporum, quæ mense Junio in cucurbitam vitream, colli satis longi & aperti conjeceram, ibidem verminarint, & cum vermes exire, propter nimiam altitudinem colli, non possent, recedentes in fundum cucurbitæ, & ibidem morientes, muscis cibi & nidi loco fuerint, ubi non per omne modò ætatis tempus, sed in exeuntem usque Octobrem vermes produxerunt. Fuit etiam cum non exiguum vermium, in bubalina carne generatorum, copiam, necari, & partim in vase clauso, partim in aperto seponi curarem; & in vase quidem clauso nihil unquam generabatur: at verò in altero illo vermes nascebantur, qui in ova transmutati, tandem in muscas ordinarias abibant: Idemque prorsus accidit, cæsis non minimâ copiam muscis ordinariis, eademque ratione sepositis. Etenim in vase clauso nihil unquam natum vidi, at verò in vase aperto vermes nascebantur, ex quibus in ova transmutatis, muscæ prodibant, ejusdem cum illis speciei, ex quibus nati erant vermes. Hinc faciliè conjecturam capere poteris, doctissimum & quâvis laude dignissimum. P. Athanasium Kircherum hallucinatum esse, cum libro duodecimo mundi subterranei experimentum proponit, generandi muscas ex earundem cadaveribus. *Muscarum cadavera*, inquit vir Doctissimus, *collige ea; prius aquâ mellicâ nonnihil macerata supra laminam aneam impone deinde laminam chymico more supra cinerem aut arenam calore lento, carbonibus suppositis, aut etiam fimo equino tepesactum expone, & videbis primò microscopii ope insensibiles quosdam vermiculos nasci, deinde alis assumptis sensibilibus in muscillas & tandem sensim crescentes in perfectas muscas animari.*

Ego verò mihi persuadeo, aquam mellitam tantum intervire alliciendis viventibus muscis, ut his cadaveribus pastæ, semen suum in illis relinquant: & parum aut nihil referre puto, an vase æreo excepta cadavera, ad tepidum calorem cinereum admoveantur, necne. Etenim semper, & in omni loco ex cadaveribus vermes, ex vermibus muscæ nascuntur; tantum ut à muscis ipsis vermes, aut vermium semina generata sint. Ego jam non capio, quomodo hi à Kircherò descripti subtilissimi vermes, in parvas muscas convertantur, antequàm per aliquot dies in ova transferant: & multò minus capio (ingenuè confiteor ignorantiam meam) quomodo hæ muscæ, cum usque ad so exili corpore nascantur, postea increcant. Etenim omnes muscæ, culices, & papiliones, ut millies vidi, eâ magnitudine ex ovis suis prodeunt, quam toto vitæ decursu servant. Sed quam hoc solo experimento male considerato, muscarum renatarum, ex cadaveribus muscarum, gauderent, vel, ut ita dicam, sese offerrent, qui suaviter sibi persuaserunt, mediante fermentatione, vel quo alio simili, aut alieniore labore, ex carne humana posse resuscitari homines. In ea opinione sum, maximi id illis fundamenti loco futurum, & ubi id gloriòse & jactanter enarrassent, exclamatueros illos esse, Phœnicem fatentibus omnibus Philosophis ex cineribus suis renasci. Hinc fortè ad capiendum incredibile illud experimentum, à non uno hæcenus tentatum, sese composuissent, sicut jam antea nugatoriè loquentes audiui. Sed operæ pretium non est, ridiculas illorum nugas refutasse. Etenim, ut Martialis ait,

Turpe est difficiles habere nugas,

Et stultus labor est ineptiarum.

Idque tantò magis, quantò Celeberrimus P. Athanasius Kircherus, libro, undecimo Mundi subterranei, præclare, & solidis rationibus refutavit stultitiam nu-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

gatoris Paracelsi, qui copiosè admodum docere voluit, ridiculam methodum, generandi homunciones, in vasis Chemicorum. Magis me offendunt, qui altissimum fidei christianæ, de corporum resurrectione, mysterium, ex his & similibus nugis atque conjecturis æstimant. Ex eorum numero Georgius Pisida, homo Græcus est, qui resurrectionem corporum urget, adducto exemplo Phœnicis, & inclytus famâ, ac celeberrimus Dominus Digbi, exemplo cancrorum maiorum, qui ex suo sale, chemicè præparato renascuntur. At sancta illa, & profunda fidei nostra mysteria, ab humano ingenio comprehendi non possunt, nec pari passu cum naturalibus causis ambulant, sed specialia & mirabilia opera Dei sunt, quem si omnipotentem credimus, reliqua omnia facillimè, & clausis oculis credi possunt & debent, & oculis clausis credita melius intelliguntur.

Sed missâ hæc longâ digressionem, ut ad propositum redeamus, necessum est, ut tibi dicam, quamquam sufficienter mihi videbar quasi manibus pulpasse, ex caribus animalium mortuorum, nisi ab aliis viventibus animalibus semen afferatur, nullos vermes generari, me tamen ut omnis tolleretur dubitatio, nec locus esset oppositioni, quam quis occasione vasorum occlusorum formare poterat, ac si aer ambiens nec intrare, nec exire, nec innovare sese liberè posset, aliud experimentum tentandum duxisse. Misi carnes & pisces in vas capacissimum, & ut aer eò penetrare posset, vas ipsum subtilissimo velo Neapolitano obleratum, in arculam, arcendis muscis aptam, & ejusdem generis velo Neapolitano obductam, inclusi: nec tamen super his carnibus, & super his piscibus, vel unicus vermis vitus est, non rarò tamen plures in superiore velo & arculæ facie circumvagari videbantur, qui odore carniū illecti, quandoque per subtilissima foramina expansi veli in arculam penetrabant, & si quis segnior in eximendis illis fuisset, forte in vas ipsum penetrassent, tanto studio & industria id agebant, ut per vim eò devenirent. Aliquando observavi, duos vermes, postea quàm primum velum feliciter transmississent, & jam in secundo, quo orificium vasis occludebatur, hærerent, tanto nisu id egisse, ut jam dimidiâ parte corporis velum illud secundum pertransierint, & parum aberat, quin carnibus illis sese explevisent. Et jucundissima res erat, interea vidisse, muscas majores circa circa volitando, & bombum edendo, per vices super primo velo residere, ibidemque vermes deponere: & animadverti harum muscarum aliquam sex septemve vermes singulis viribus ibi reliquisse; aliam in aère antequàm velum tetigisset, eos emisisse. Atque hæc fortassis illius generis fuerunt, de quo Scaliger narrat, fortuitò sibi evenisse, ut musca major ab ipso capta, eadem intra manum exiguos aliquot vermes relinqueret: & hinc ille argumentatur, muscas generaliter omnes, non ova, sed vermes generare viventes: sed quàm egregiè Doctissimus ille vir falsus sit, ex iis, quæ supra dicta sunt, sufficienter adparet. Et certè, muscarum aliquot genera vivos vermes parium, reliquis nonnisi ova deponentibus; Cujus rei certior me fecit experientia, & factum ipsum. Nec me ullo modo convincit, magni alicui ponderis, sapientissimi patris honorati Fabri, societatis Jesu, testimonium, qui vir contrarium ejus quod Scaliger affirmabat, libro de generatione animalium: Nimirum muscas semper ova, nunquam vermes parere, & fieri sanè potest, (quod neque nego, neque affirmo) ut eadem muscarum species, nonnunciam ova & aliquandò vermes producat, & quod natura sua fortè semper ova parerent, nisi anni tempus calidiùs aliud in corpore produceret, vermes scilicet vivos & se moventes, ut millies vidi.

Fallitur similiter accuratissimus Joh. Sperlingius, in sua Zoologia scribens, hos vermes, non à muscis ipsis generari, sed ex stercore earundem nasci: & ut ratione

reddat, subjungit fallam hypothesin: Ratio hujus rei animis candidis obscura esse nequit: musca enim omnia liguriunt, vermiumque materiam una cum cibo ipso assumunt, assumptamque per alvum reddunt. Non observavit Sperlingius, id quod observare quivis potest, nimirum in muscis ovarium in duas cellas divisum esse, quarum unâ ova, excrementum alterâ continentur, sed ita ut utraque per communem quandam canaliculum excernantur, atque incredibili copiâ: nonnullæ enim muscæ virides usque ad eò fecundæ sunt, ut quælibet illarum ducenta ova reddere possit. Erravit itaque Sperlingius, credendo vermes muscarum ex stercore earundem nasci. Sed cum Sperlingio fortè etiam erravit, Doctissimus P. Athanasius Kircherus, qui opinionem fovet, à Sperlingii opinione non multum diversam. Nec minus, quam hi celeberrimi scriptores à vero abit, vir Doctissimus, & mihi charissimus, qui muscam, telæ involutam ad quamvis aranei morsum vermem excernere videns, in eam devenit opinionem, morsum aranei illam habere virtutem & potentiam ut corpora muscarum verminare faciat. *Hactenus Rhedi de Insectorum Generatione.*

Sequitur Insectorum Divisio generalis ex Charlet.

Insecta Græcis *Ἔσχα*, sic dicta, quoniam eorum corpora incisuris præcinguntur, aut parte tantum supinâ, aut etiam pronâ.

Distinguntur generalius in Terrestria & Aquatica, & utraque in Pedata, & Apoda.

E Pedatis rursus alia sunt Alata, alia Aptera, siue non Alata.

Alata subdividuntur in Anelytra, siue, Detritipennia membra nacta; & Coleoptera, siue vaginipennia, quæ alas suas velut in vagina recondunt.

Inter Anelytra, alia favificant, alia non. *Atque hæc de Insectis in genere tantum.*

Postquam de Generatione Insectorum ex Clariss. Rhedi hætenus egimus, ut & de eorundem divisione generali ex Celeberr. Charletono, jam specialius de iis verba faceremus quatenus ad Medicos usus faciunt; verum hoc abundè perficitur sub propriis eorundem nominibus, unde, colligi debent.

INSESSUS.

Sub Inseffus voce non tantum de eò in in specie, sed etiam de Balneo, Semicupio & Lotionibus; quamvis de iis jam alibi.

Inseffus.

Inseffus est quasi balneum ventris, partiumque infernarum. Fit ex decoctione herbarum, radicum, florum, seminum, quorum residentia sacco imponitur, cui resideat æger. Utimur his in affectibus vesicæ, colli, uteri, ani, renum, ventris, ob ægri imbecillitatem, ob balneorum defectum. Horum autem alii sunt adstringentes, alii emollientes, alii aperientes; alii discutientes &c. de quibus in sequent.

De Inseffionibus astringentibus.

Inseffus ad anum prolapsum.

℥. Plantaginis m.j. rosarum rubr. m.ß.

Decoquantur in aqua, cui chalybs antea extincta fuerit. *Andernacus.*

Inseffus ad nimium uteri fluorem, & ani hæmorrhoidas.

℥. Plantaginis, polygoni, equiseti, rubi foliorum ana

m.j. rosarum p.iv. malicorij ℥ij. rad. symphyti ℥j. calycum glandium ℥j.

Decoquantur in aqua chalybeata, fiatque inseffus. *Andernacus.*

Inseffus ad hæmorrhoidas.

℥. Verbasci, plantaginis ana m.j. flor. verbasci p.j. sem. lini ℥ij. cort. malorum puni. orum, balanstiorum, rhus obsoniorum, baccarum myrti ana ℥ß.

In aqua & vino austero decoquantur ad inseffum. *Andernacus.*

Inseffus ad fluorem alvi.

℥. Rad. bistorta, rad. consolidæ major. ana ℥ij. nucum cupressi, nucum pini, cort. mali granati ana ℥ij. rosarum rubrarum, balanstiorum, granorum myrti ana ℥ß.

Decoquantur omnia in vino rubro astringente. *Rondeletius.*

Alius.

℥. Plantaginis, Polygoni, bursæ pastoris, equiseti ana m.ß. aluminis roche ℥ij. rosar. rubr. ana ℥ij.

Decoquantur omnia simul in vino rubro, aut aqua chalybeata: deinde huic decocto infideat æger. *Rondeletius.*

Inseffus ad alvi, uterique nimium fluorem, descensum, hæmorrhoidas, exitum ani, aliaque ejus vitia.

℥. Fol. quercus m.v. rosar. rub. m.ij. gland. querc. ℥ij.

Decoquantur in aqua pluviali, vel fontana. In decocta restinguatur chalybs, aut ferrum candens ter, vel sæpius. *Inseffus* fiat mane ac vespere. *Rulandus.*

De Inseffionibus emollientibus.

Inseffus ad tenesimum.

℥. Malva, althæa, violaria, verbasci ana m.j. flor. verbasci p.j. sem. lini ℥ß.

In horum decocto ex aqua, æger ad umbilicum usque sedeat. *Andernacus.*

Inseffus ad tenesimum alius.

℥. Folia taphi barbati m.v. calculorum sem. lini ℥ß. Fiat ex his in aqua decocto, & inseffus. Ruland.

De Inseffionibus aperientibus.

Inseffus ad menstrua provocanda.

℥. Artemisia, rorismarini, thymi, marrubij, calaminthe ana m.j. sabine m.j. fol. lauri p.ij. flor. rorismarini, sambuci ana p.j. rad. cyperi ℥j. granorum juniperi contus. ℥ij.

Omnia incisa, sacculoque condita, coquantur ex aqua fluviali, quanta ad inseffum requiritur. *Andernacus.*

Alius ad eadem.

℥. Artemisia, salvia, betonica, calaminthe, origani, pulegii, chamameli, meliloti, hyperici, abrotani an. m.ß. rad. iridis, petroselinæ ana ℥j. Coquantur pro inseffu. Fuchsius.

Alius ad menstrua provocanda.

℥. Nepeta, artemisia, thymi, salvia ana m.j. fol. lauri, filicis ana m.j. flor. sambuci p.j. rad. valeriane, rad. apij rad. petroselinæ, rad. feniculi ana ℥ij.

Ex his in aqua decoctis fiat inseffus, quo mane & vespere ante cibum utendum est. *Andernacus.*

Alius ad menstrua indurata, tumoresque & dolores naturalium.

℥. Fœnigræci, sem. lini, pulegii arthem. cucumeris. sylvestr. rad. liliorum alb. fol. dendromalacha ana q.s. Deco-

Decoquantur omnia in aqua, fiatq; infessus, vel balneum simplex dulcis aquæ emolliens & humectans. Antea verò quam utaris, alvus subduci, levareque vesica debet, nam his oppletis, & uterum, qui medius inter illa consistit, prementibus, menstrua nimia angustia cohibentur, tardanturque. *Andernacus.*

Infessus ad menses ciendos.

℞. *Pulegij, sabina aa m. vj. rad. asari ℥iv.*

In sacculo inclusa coquantur ex aqua pluviali, vel fontana, quantam postulat infessus. Utendum hoc ante cibum manè, ac vespere tempore menstruationis.

De Infessionibus discutientibus.

Infessus ad uteri inflammationes.

℞. *Rutæ, pulegij, nepetæ, marrubij, thymi, arthemisia, althææ, &c. ana q. s.*

Decoquantur ad infessum. Post hujus usum, uterus oleo laurino, vel nardino, vel anethino inungatur. *Andernacus.*

Infessus ad renes inflammatos.

℞. *Malvæ, althææ aa m. iv. sem. lini, fœnigræci aa ℥ij.*

Decoquantur in aqua. Hæc postea vali ligneo altitudinis pedalis immittantur ad infessum. *Andernacus.*

De Infessionibus frangentibus calculum.

Infessus ad calculosos.

℞. *Fragmentorum raparum, fragment. pastinacæ, siferis, chamomilla, flor. verbasci, betonica, prunellæ, aquilegij, rutæ murariæ, arthemisia ana m. j.*

Coquantur in aqua pluviali, quantum ad infessum satis est. *Andernacus.*

Infessus ad calculum.

℞. *Saxifragiæ, cœnantes, helxines, malvæ, althææ ana m. j. cicæ rub. ℥ij. sem. petroselinij, lini, fœniculi ana ℥ij.*

Coquantur in aqua justæ quantitatis ad tertias pro infessione. *Fachsius.*

Alius ad calculum.

℞. *Malvæ, althææ, chamomilla, meliloti, parietariæ, scolopendrij ana m. ij. rad. malvæ ℥ij. rad. fœniculi, sem. lini aa ℥ij. fœnigræci ℥ij. rubæ tinctorum ℥ij.*

Incisa omnia, sacculoque lineo indita, ad infessum coquantur. *Andernacus.*

Alius ad calculum.

℞. *Radici althææ ℥iv. fol. althææ, malvæ, parietariæ, aa m. ij. rad. nardij m. β. origani, calamenthi, betonica, abrotani, arthemisia, rorismarini, petroselinij aa p. ij. sem. lini, fœnigræci, anisi, fœniculi ana unc. ij. furfuris brassi p. iv.*

Sacculo indita ex aqua communi coquantur, quanta ad infessum sufficere poterit. *Andernacus.*

Infessus ad arenam, renumque calculos.

℞. *Raparum num. v. Nasturtij aquatici, polygoni ana m. iv.*

Incisa lineo sacculo indantur, ac incoquantur aquæ, quantum satis est infessui. Utatur æger tempore paroxysmi, & ubi ingens urget dolor. *Rulandus.*

Infessus ad vesicæ calculum & stranguriam.

℞. *Raphani num. x.*

Incidentur, sacculo imponantur, aquæ quanta necessaria est, incoquantur, ut fiat infessus, cujus frequens sit usus.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

De Infessionibus dolorem mitigantibus.

Infessus ad dolores colicos mitigandos, curandosque.

℞. *Althææ, rutæ, majoranæ, arthemisia ana m. ij. fol. lauri ℥ij. seminis apij, anisi, cumini ana ℥ij.*

In aqua decoquantur, quanta solum dimidium repleat. *Andernacus.*

Infessus ad colicam passionem, ventrisque torsiones.

℞. *Florum chamomilla, meliloti, anethi, sem. lini ana m. β. mentha, calamenthi, absinthij, pulegij, origani, cumini, granorum juniperi, baccarum lauri ana m. j. spica m. β. sulphuris vivi ℥j. salis natri ℥β.*

Sacculo indita coquantur in f. q. aquæ fluvialis ad tertias, ut fiat infessus, quo utatur æger manè ac vespere, & si opus sit, noctu ac sæpius, donec ex toto remittat dolor. *Rulandus.*

Infessus ad colicum & nephriticum dolorem.

℞. *Origani, calamenthi, anethi, chamomilla, sinonis, lauri ana m. iv. fœnigræci, sem. carvi, cumini, anisi, fœniculi ana ℥ij. baccarum lauri ℥β.*

Quod si varij sint affectus, eorumque causæ diversæ, plura medicamenta instituto idonea adicere licebit: ut, si emolliitione opus sit, folia malvæ, althææ, parietariæ, ac violarum addes. Sin autem incisio quædam, aut meatuum apertio requiratur, radices paragi, rusci, apij, adjungentur. Ad vesicam calculosam eisdem utendum, ita tamen ut ruta addatur. *Andernacus.*

Infessus ad uteri dolores & præfocaciones.

℞. *Melissæ m. x. pulegij m. v. rorismarini m. iij.*

Coquantur in f. q. aquæ fontanæ. Utus ejus est ante cibum manè atque vespere. *Rulandus.*

De Balneis.

Balneum remedium est totius corporis. Horum alia altitant qualitate primâ vel secundâ de quibus in sequentibus.

De Balneis excalescentibus.

Balneum ad intemperiem frigidam.

℞. *Pulegij, origani, hyssopi, thymi, saturejæ ana m. j. salvia, fol. lauri, rorismarini, chamæpitys, Pyrethræ ana m. β.*

Hæc, vel omnia, vel plura ex eis, in aqua fontana vel vino mixta coquantur, quanta ad balneum satis sunt. *Andernacus.*

Balneum ad paralyticos.

℞. *Baccarum juniperi contusarum m. xv.*

Decoquantur in aqua fluviali, quanta opus sit ad lavacrum. In decocta aqua restinguatur sepius chalybs candens, ac renovetur hoc modo tertio quoque die. Infideat ægrotus in isto balneo ad collum usq; tot horis, quot ferre manè & vespere quotidie potest. *Rulandus.*

Balneum ad contractos & convulsos.

℞. *Sambuci m. xx.*

Decoquantur (pro divitibus) in vino, pro pauperibus verò in aqua quantum sufficit. Infideant quotidie diutius in hoc lavacro, & post egressum, in calido lecto bene contexti stragulis sudent diu multumque. Post sudorem perungantur membra contracta isto unguento.

℞. *Pinguëdinis taxi ℥ij. pinguëdinis vulpis ℥ij. massicis ℥β. euphorbij ℥ij. piperis utriusque ℥x. vini boni mens. ij. Fiat decoctio juxta artem. *Rulandus.**

De Balneis refrigerantibus.

Balneum ad intemperiem calidam.

℞. *Flor. violarum, buglossa ana p. iv. flor. nymphaeæ p. ij.*

In aqua coquantur, quanta pro balneo fufficit. *Rondeletius.*

Aliud.

℥. Succo folatri; succi Cucurbitæ, succi melonum ana ℥iv.

Misce aquæ balnei, quanta pro balneo satis esse potest. *Rondeletius.*

Balneum pro heclicis.

In febribus heclicis conveniunt balnea ex aqua tepida, humectantia: quæ ut magis humectent, addimus librâ unam olei violati: aut butyrum recens in prædicta aqua dissolvimus, quod humiditatem æream partibus externis infundit. *Rondeletius.*

Aliud pro heclicis.

℥. Radicum Bismalvæ ℥ij. malvæ, branchæ ursinæ, buglossæ cum rad. ana m. iv. flor. violarum, buglossæ, borraginis ana p. iv. rosarum rubr. p. ij.

Humectantibus balneis admisceantur decocta pedum vervecis, & intestinorum: quamvis illa ad remolliendum potius usurpentur. *Rondeletius.*

De Balneis astringentibus.

Balneum ad juvandum conceptum.

℥. Rad. valeriana lib. ss. rad. cyperi, galangæ, rad. enulæ ana ℥ij. fol. lentisci, arthemisia, calamenthi, origani, lavendulæ, majoranæ, fol. lauri ana m. iv. summitatum lentisci, myrti, cupressi ana m. ij. sem. ameos, lentisci, foeniculi ana ℥ij. cort. mal. granat. ℥ij. aluminis ℥ij. ros. rub. stæchados, flor. sampsoni ana p. ij.

Coquantur omnia in sufficienti aquæ quantitate, addendo vini rubri styptici modicum: & utatur balneo. *Rondeletius.*

Balneum ad conceptum perutile, calefaciens & roborans uterum.

℥. Arthemisia, absinthij, levistici, avenæ, granorum juniperi, origani, chamomilla ana m. ij.

Decoquantur hæc simul in aqua pluviali, quanta opus est. Insidet in isto balneo mulier sterilis, statim post fluxum menstruum quotidie bis, manè scilicet per horam, & tandem vespere, idque continuet octo diebus, ac renovet tertio quoque die. *Rulandus.*

Balneum ad inflammationem, cum fluxus adest.

℥. Plantaginis, polygoni, fol. rub. ana m. ij. malicorij ℥ij.

Coquantur in aqua, quantum ad balneum satis esse putas. *Andernacus.*

De Balneis emollientibus.

Balneum emolliens.

℥. Malvæ cum radicibus, branchæ Ursinæ, violariæ ana m. ij. mercurialis, parietariæ, betæ ana m. ij. sem. lini ℥ij. flor. chamomilla p. ij.

Fiat decoctio pro balneo, in quo æger bis quotidie natet ad horam unam. Hoc balneum valet etiam in affectibus cutis crustosis, squamosis, siccis & squalidis. *Rondeletius.*

Balneum ad inflammationem & duritiem membrorum.

℥. Malvæ domestica, sylvestris, meliloti ana m. ij. seminis lini ℥ij. fenigraci ℥ij.

Ex his in aqua coctis balneum paratur. *Andern.*

De Balneis aperientibus.

Balneum menstrua provocans.

℥. Rad. Ireos ℥ss. galangæ crassæ, rad. rubiæ major ana ℥ij. rad. althææ, cyclaminis ana ℥ij. arthemisia.

nepetæ, matricariæ, origani, mercurialis ana m. iv. pulegii, psyllii, majoranæ, fol. lauri ana m. ij. sem. petroselinii, feseleos, ameos, cinnamomi ana ℥ij. sem. lini, fenigraci ana ℥ij. flor. sampsoni, anthos, stæchados, cicerum rub. sabina ana p. iv.

Coquantur omnia in duabus partibus aquæ, & una vini albi: deinde sedeat in balneo, frequenter admo-vendo ventri inferiori plantas in prædicto balneo decoctas. *Rondeletius.*

De Balneis abstergentibus.

Balneum primum, ad cutis affectus: hoc est, crustas & squamas duras emolliens, & detergens.

℥. Malvæ cum rad. branchæ ursinæ, violariæ ana m. iv. mercurialis, parietariæ, betæ ana m. ij. sem. lini ℥ij. chamomilla p. ij.

Decoquantur pro balneo, in quo bis quotidie sedeat ad horam unam. *Rondeletius.*

Balneum secundum, cutis affectus detergens & exiccans.

℥. Rad. bryonia, lapathi acuti, cucumeris sylvestr. ari, serpentariæ ana ℥ij. rad. asphodeli, vel gentianæ, & squille ℥ss. saponariæ, parietariæ, absinthij, scabiosæ, fumariæ, borraginis ana m. j. lupinorum, fabarum ana ℥ss. flor. centaurij min. p. ij. rosarum p. ij.

Fiat decoctio pro balneo: de qua decoctione addet plus vel minus, pro morbi natura, vel corporis habitu & viribus, & diutius utatur. *Rondeletius.*

Balneum tertium, cutim detergens, ac leviter astringens seu corroborans.

℥. Fol. myrti, vel fol. lentisci, vel plantaginis, taphi barbatii, pilosellæ, hippuris, polygoni ana m. ij. rosarum part. xx. rad. iridis, bistortæ, pentaphylli ana ℥ij. fiat decoctio: in qua dissolve salis communis ℥ij. alum. ℥iv.

Misce, & fiat balneum tepidum, & spongiis novis detergatur diligenter. Ex lixivio etiam fieri possunt, modo non sit nimis acre. Hoc autem balneo non utendum, nisi prius materia per præcedentia balnea fuerit insensibiliter resoluta, vel evacuata. *Rondeletius.*

Balneum ad majores cutis affectus.

℥. Rad. lapathi acuti, ℥ij. rad. enulæ ℥ss. fumariæ, lupinorum, borraginis, buglossæ, parietariæ, betæ, saponariæ ana m. iv. sem. cucurbitæ, cucumeris, melonis, citrulli a ℥ij. acetosæ, lapathi acuti, lentiginis aquat. a m. ij.

Misce simul, & pro balneo decoquantur, in quo potes addere farinæ fabarum ℥ij. Sedeat in hoc balneo æger.

Aliud ad idem.

℥. Rad. bryonia, cucumeris sylvestr. ana ℥ss. rad. asphodeli ℥ij. rad. lapathi acuti, rad. enulæ ana ℥ss. mercurialis, betæ cum rad. saponariæ, parietariæ a m. ij. lupinorum, fumariæ a m. ij. sem. raphani ℥ij. sem. melonis, citrulli, cucurbitæ, cucumeris a ℥ss. lumbricorum per media dissectorum n. iv. fol. senæ ℥ij. fol. borraginis, violarum, buglossæ ana p. ij.

Reponantur omnia pro balneo, in quo dissolve farinæ lupinorum, & cicëris rubr. ana ℥ss. fiat balneum, ut dictum est. *Rondeletius.*

Aliud ad præduram prætumidamque scabiem.

℥. Rad. bryonia, cucumeris sylvestr. ana ℥ij. rad. althææ, rad. litorum alb. rad. lapathi acuti a ℥ij. rad. serpentariæ, hastulæ regie a ℥ij. malvæ, bismalvæ, branchæ ursinæ ana m. iv. lupinorum fumariæ, lapathi acuti, saponariæ, acetosæ, endiviæ, cichorij ana m. j. sem. lini, fenigraci ana ℥ij. sem. raphani ℥ij. sem. cucurbitæ, melonis, citrulli, cucumeris ana ℥ij. flor. chamomilla, meliloti ana p. ij. flor. borraginis, buglossæ, nymphaeæ, hordei

Hordei integri, Cicerum rubr. ana p. ij.

Misce simul, & decoquantur in sufficienti aquæ quantitate pro balneo, quo præsidio utimur ad discutendam scabiem crustosam & contumacem, & emollienda tubercula elephantiorum, quibus tota cutis scaret. Post hoc balneum utendum erit tertio balneo, superius descripto in cutis affectibus. *Rondeletius.*

Balneum ad morbum Gallicum.

℥. Flor. chamomilla, flor. meliloti ana ℥ij. canda equina, lavendula, malva, aristolochia longa, centaurea ana m. ij. fenigraci p. iv. ligni guajaci, vel juniperini ℥ij.

Bulliat in sufficienti quantitate aquæ, secundum artem, deinde coletur, usuique servetur. Post egressum scabies abluatur mixtura præscripta, ex oleo ligni, & aqua plantaginis facta. Et sic æger sanabitur, corpore prius rectè purgato. *Rulandus.*

Balneum abstergens, purgans, rarefaciens, digerens, pro leprosis.

℥. Bryonia, cucumeris asinini, Serpentaria, enula ana ℥ss. cum radicibus, lepathi acuti, acetosa, borraginis, buglosa, saponaria ana m. iij. cum radicibus, fumaria, lupulorum, endivia, cichorii, plantaginis ana m. iij. lupinorum, cort. fabarum, hordei integri ana p. ij. rosarum rubr. flor. nenupharis, trium flor. cordial. tamariscii ana m. v. flor. chamomilla, flor. meliloti ana m. ij.

Fiat decoctio in aqua fontana & pluviali pro balneo, quod ingrediatur manè ventriculo, vacuo. Bis aut ter in secunda vice sumat tabellam unam Diarmarg. frigid. superbibendo ℥ij. aquæ borraginis. Item à prandio ingrediatur longè à cibo. Continuis tribus diebus peragat id ipsum.

Balneum ad scabiem, lepram, ulcera, & omnia cutis vitia, experrum.

℥. Fol. Quercus, pisorum ana max. Coquantur in aqua fluviali q. s. In hoc balneo insideat æger quotidie mane & vespere. Et quando egreditur, cutis infectiones penna in sequenti mixtura intincta laventur, & per se siccantur.

℥. Aquæ plantaginis ℥ss. olei ligni guajaci ℥ij.

Misce. Ulcera verò Emplastro Diatylphuris vinciantur. Hoc enim modo sanavi omnem scabiem, ulcera quæcunque, ac lepram recentem, non ex parentibus contractam, cutisque vitia cuncta. Renovandum est autem tertio quoque die, ut reliquæ artificiales balneæ. *Rulandus.*

Balneum Theophrasti Paracelsi, certè sanans (ut ipsemet edoctus experientia testatur) omnes morbos chirurgicos, eosque qui per cathartica, abstinentiam, sudationes, & balneas curari solent aut possunt.

℥. Aluminis lbx. salis lbxx. Aceti stillatitii q. sufficit.

Commisceantur simul optimè, stetque per quatuor dies in infusione, postea decoquantur ad consumptionem aceti. Cocta hæc massa, seu lapis, incocquatur in aqua pluviali, quanta sufficit; quoad oleositas quædam appareat. Deinceps insideat æger in hoc lavacro pro vulgari modo, & consuetudine, nec ulla utatur medicina.

De Balneis Dolorem mitigantibus.

Balneum ad dolorem colicum.

℥. Rad. althæe ℥ij. Mercurialis, violaria, brancha ursina ana m. j. origani, calamenthi, pulegii, ruta ana m. iij. anisi, feniculi, petroselini ana ℥ss. flor. anthos, sampuchi, stæchados, meliloti ana p. iij. cort. citri sic. ℥ij. lavendula, flor. lauri ana m. iij.

Decoquantur omnia in duabus partibus aquæ, & Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

una vini. Quod si vini Malvatici copia suppetat, illius modicum permisceri poterit. *Rondeletius.*

Balneum ad dolorem nephriticum.

℥. Rad. liliorum alb. bis malve ana m. iv. parietaria, saxifragia, petroselini, feniculi marini, fenigraci ana m. ij. sem. lini, fenigraci ana ℥ss. milu solis ℥ij. fol. siymbrii, violaria, borraginis, buglosa ana p. v. quibus addere potes, rad. raphani ℥ij. fol. senecionis m. ij. flor. chamomilla, flor. sambuci ana p. iij.

Decoquantur omnia in sufficienti aquæ quantitate: deinde permisceantur vini albi ℥iv. olei liliorum, & butyri ana ℥ij. patet balneum, in quo sedeat æger tantisper, dum vehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias evacuationes est saluberrimum: & eo ipso tempore, quo æger in balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt. *Rondeletius.*

Balneum ad lassitudinem.

℥. Hyssopi, origani, pulegii, thymi, satureja ana mss. salvia, fol. lauri, rosmarini, chamapitjos, pyrethri ana m. ss.

Coquantur in aqua fontana, quanta ad balneum satis est. *Andernactus.*

Aliud balneum ad lassitudinem.

℥. Origani, pulegii, chamomilla ana m. iij. salvia, baccarum lauri ana m. ij.

Coquantur in aqua, quanta opus est. *Rulandus.*

Balneum ad dolorem.

℥. Raparum n. vj. ruta m. v. salis m. iij.

Incoquantur simul in aqua, quanta fuerit opus. Insideat æger manè ac vespere, ubi non adest inflammatio. *Rulandus.*

Balneum ad podagram, chiragram, & sciaticam.

℥. Salis ℥ss. aluminis lbj. sulphuris v. vj. ℥ss. baccarum lauri ℥ss.

Bulliant simul in aquæ duobus sextarijs. Atq; ex hoc unicuique balneo tertio quoque die renovando infundatur portio à ℥ss. ad ℥j. Ac insideat in hoc lavacro æger quotidie per hor. m. manè & vespere. *Rulandus.*

De Lotionibus.

Partium quarundam sunt ablutiones, quæ balnei vicem gerunt, videnturque balnea particularia. Unde Lotiones variæ de quibus in sequent.

De Lotionibus capitis.

Lotio ad sordes capitis auferendas.

Caput ad sordes auferendas lixivio, ex cineribus sarmentorum facto, lavatur, corpore recrementis vacuo, & manè ante cibum: sic tamen, ut statim caput abstergatur linteis calidis, & exsiccecur: capilli si adsint, extricentur: non autem expectandum, donec caput, capillique per se exsiccentur. *Andernactus.*

Lotio ad ulcera.

In capitis ulceribus lixivij desiccantibus utimur, ut abrotani, betonicæ, &c. *Rondeletius.*

Lixivium ad Achoras.

℥. Pisorum m. iv.

Decoquantur in f. q. aquæ. Horum juri admisceatur tantundem lixivii fortis: & facta ebullitione reservetur usui. Caput eo lavetur quotidie ante cibum, & mox siccecur. *Rulandus.*

Aliud ad pediculos.

℥. Agarici ℥ss. Coquantur in lixivij dulcis lbj. & ex ea
B 3 irriges

irrigetur, aut lavetur caput in dies. Si ulceratæ capitis partes illinantur parum oleo Balsami, commo-
riuntur uno dies omnes pediculi. *Idem.*

Lotio ad pediculos.

In pediculati morbo, amaris, ut lupinis, nitro, & fellibus, staphide agria, & ad vermes occidendos, & furfures detergendos, & pilos cingendos. In furfuribus, detergentibus: ut melle, siccis herbarum amararum, aut herbis ipsis decoctis, ut cicla, parietaria, saponaria. *Rondeletius.*

Lotio ad tingendos capillos.

Capillis tingendis palea avenæ utimur, cortice & ligno berberis, & floribus genistæ, & hyperici. *Rondeletius.*

Lotio ad Alopeciam.

Ad Alopeciam fit ex alcyonio potentissimum lixivium, quod siccatur & digerit potenter, & morbum curat. *Rondeletius.*

Lixivium ad melancholiam, insaniam, ac vigiliis.

℞. *Majorana*, flor. *betonica*, *Chamomilla* ana *M. ss.* Condantur sacculo, & decoquantur in f. q. vini, quo crebrò lavetur caput. *Rulandus.*

Lixivium roborans cerebrum, nervos, oculos, sensusque reliquos.

℞. *Fol. Sena* ℥j. *rosarum rubr.* p. j. *lavendula* p. j. Fiat ex his decoctio in f. q. aquæ; qua caput mane lavetur. *Rulandus.*

Lixivium ad cerebrum memoriamque juvandum.

℞. *Chamomilla*, *Salvia*, *origani*, *betonica* ana *M. j.* Submittantur cineri in fundum, & lixivium superfundatur, cum aqua pluviali: & pridie quàm caput lavetur, madescat in eo sacculus lineus ex

Rosarum rubr. majorana, *lavendula*, *rorismarini*, *spica*, *betonica* ana p. j. modicè incisorum, *agarici* ℥ij.

Inter lavandum sapo odoratus in pomi figuram (pomarium vocant) addatur. *Andernacus.*

Aliud lixivium ad frigidos affectus.

℞. *Salvia*, *rorismarini*, *origani*, *calamintha* ana *m. j.* *fol. lauri* m. ss. *flor. stœchados*, *heliochrysi* ana p. j.

Ex jure decocti caput irrigetur laveturque. *Andernacus.*

Aliud ad memoriam.

℞. *Majorana*, *rorismarini*, *melisse* ana *m. ss.* *fol. lauri* m. j. *flor. chamomilla*, *flor. stœchados*, *pseudonardi* seu *lavendula* ana p. j.

Coquantur in lixivio, sacculo condita horum jure caput, mane ante cibum, corpore purgato, lavetur: mox siccetur contegaturque. *Andernacus.*

Aliud ad destillationem sistendam.

℞. *Majorana*, *betonica*, *melisse* ana p. j. *flor. chamomilla*, *stœchados*, *anthos*, *heliochrysi* ana p. iij. *nigelle* ℥ij.

Coquantur in lixivio ex bucci cinere, & hoc caput rursus lavetur.

Lixivium ad asthma, siccans & sistens destillationes ex capite ad subjectas partes.

℞. *Salvia*, *betonica*, *hyssopi* ana *m. ss.* *flor. chamomilla*, *rosarum rubr. granorum myrti confusa* ana *m. j.*

Bulliant in q. f. lixivij. dulcis, condita sacculo. Ex hoc caput singulis septimanis lavetur, semel aut bis ante cibum. *Rulandus.*

Lixivium aquas ducens, quod in potu exhibetur.

℞. *Cinereum genista virginica*, *stipularum fabarum*,

Vitis albas uvas proferentis ana *m. j.* *Vini rhenensis* ℥ij.

Ter cola per cineres: fiat lixivium: ad jice

Nucem myristicam n. j. *cinnamomi* ad ejus pondus, *baccarum lauri* p. vj. *cymini*, *fœniculi*, *anisi* ana ℥ij.

Crasse confusa sint semina, & ad jice sacchari ℥iv. ter die de hoc lixivio bibat (spacio menstruo). *Levianthan Rabi.*

De Lotionibus axillarum.

Lotio ad axillas.

Axillæ abluuntur lixivio parato ex astringentibus, ut oleastro, lentisco, additis quibusdam odoratis constringentibus, ut rosis. *Rondeletius.*

De Lotionibus manuum.

Lotio ad manus.

Manus abluuntur aqua & sapone odorato, vel aqua & medulla panis, vel aqua & fursure: additis quibusdam odoratis, ut aqua rosarum, vel naphæ, vel oleo spicæ. Divitum verò manus abluuntur aqua, cui aqua rosata moschata fuerit permixta.

Lotio ad manus tempore pestis, præ-
servationis causa.

℞. *Rad. Angelica*, *zedoaria* ana ℥i ss. *caryophyllo-
rum* ℥ij. *calami aromatici vulgaris* ℥ij.

Omnia macerentur in ℥ss. aceti rosacei optimi, postquam crassiusculæ erunt confusa. *Johannes Bauhinus Junior.*

De Pedum Lotionibus.

Lotio ad somnum.

℞. *Malvarum*, *lactuce* ana *m. ij.* *capitum papave-
rum alborum* n. x. *corticum radicem mandragoræ*, *fol. melisse* ana ℥ss. *aquæ* q. f.

Fiat decoctio ad quintæ vel sextæ partis consumptionem. Addi poterunt flores nymphææ, meliloti: folia salicis, vitis, cucurbitæ, semen Anethi. *Heurnius.*

Lotio ad somnum ciendum in febribus.

℞. *Malva recentis*, *lactuce* *fol. cucumeris*, *cucurbita-
rum*, *violarum* ana *m. j.* *flor. nenupharis*, *violarum* ana p. j.

Fiat decoctio, qua abluantur pedes, cum ibit dormitum: nec tergantur, aut panno humido involvantur. *Rondeletius.*

Lotio pedum polychristos.

℞. *Chamomilla*, *rosarum rubr. betonica*, *origani*, *sal-
via*, *ruta*, *asari* ana *m. j.*

Condita sacculo coquantur in lavacro pedum: ubi verò jam satis infertuerint, sextarius nitri, & salis p. j. addatur. Utor in septimana semel vel bis, mane aut vespere ante cibum, vel etiam ante somnum, in usum adhibeto. Capiti, pedibus, sanguini, & omnibus nervis salubris, multos morbos alioqui futuros arcet. *Andernacus.*

Lotio ad podagram.

In multis usitata podagricis valdè profuit. Lixivium ex fagi cineribus paratur, & ter aut quater colatur: deinde tantum vini admiscetur: aluminis unc. ij. adduntur: omnia in fictili vitreato conjuncta calefiunt ad ignem, sed ita ut non effervescent. Deinde transfunduntur in vas, in quo pedes consistere poterunt: hi autem tam altè lavacro insistent, ut aqua supratelos excedat. Extrahit humidam piritæ materiam in articulis hærentem: quam deinde linteo puro absterges. Tam calidum autem erit lavacrum, quàm pedes terre possint: maneque & vespere ante cibum adhiberi debet. Quin etiam cum malum hoc accessio-
nem minatur, & post ipsam utile esse potest, idque in septima-

septimana quater aut quinquies: ne deterseat te, si pedes tumidos, rubentesq; fieri conspicias. *Andernacus.*

Lotio ad podagram, nostra.

℞. Rosarum rubr. balaustrorum, flor. myrti, plantaginis, verbasci, fol. lauri, origani, pulegi, calamenthi, salvia, thymi, flor. rorismarini ana m. j. baccarum juniperi ℥iij. aluminis rocha, salis communis ana ℥iij.

Bulliant omnia in aqua sufficienti, fiatque lotio. In hac immorandum ad horas duas vel tres. Continuetur autem triduum vel quadriduum manē stomacho jejuno.

Lotio pedum ad dolores, & podagram.

℞. Salis m. iij.

Decoquantur in sufficienti quantitate aquæ: eaq̃ue utatur ager mane, ac vesperi ante cibum. Postea abstergantur pedes linteo. *Ruiandus.*

Alia ad lassitudinem.

℞. Origani, pulegi ana m. iij. salvia m. j.

Decoquantur in aqua, quantum requiritur. Usus ejus esto ante somnum. *Idem.*

Alia ad fœtorem pedum.

℞. Aluminis m. j.

Bulliat in sufficienti quantitate aquæ: in qua usque ad talos immittantur pedes manē atque vesperi, & diu multumque fricentur, laventurque. *Weckerus in Antidotario.*

INSIPIDUS SAVOR, vid. sub titulo Sapor.

INSOLATIO.

Calefactio est, medicamentorum tam simplicium quam compositorum preparationis quidam modus, quo ea ipsa non quidem coquantur, aut uruntur, sed moderate calefiunt, vel in sole, vel igne, vel rerum putridarum calore, ut commodius percolantur, vel malaxentur, vel facilius & felicius exhibeantur. Sic medicamentum infusum, antequam percoletur, calefit, ut illius qualitas non modò tota in liquorem transmittatur, sed ut liquor promptius permeet, & totus eliciatur.

Clysteres colico dolore laborantibus præscripti, solent feliciter à Pharmacopœis paulò calidiores injici, modò non sit à bile: febrientibus verò tepidiores, ne fervor magis incandescat, sed mitescat: Et vomituentibus aqua tepida bibenda datur, ut naturæ motum adjuvet, humorisque fiat sursum per os facilius exclusio. Cum vix quidpiam actu frigidum debeat exhiberi, siue topicum sit remedium, vel introsumendum, ut & balnea, & ipsa linteamina, priusquam ægrotis inserviant, debent modicè caleferi. Multa quoque medicamenta calefactione indigent, ut facilius terantur, misceantur, dissolvantur, & percolentur.

Insolatio calefactioni tam est finitima, ut altera alterius vicem faciliè queat subire. Utraque enim eundem effectum pollicetur, & instar cujusdam coctionis est: ut cum circa caniculam, aut vigentibus cœli squaloribus, dies circiter quadraginta insolatur hydromel, ut sic magis concoctum vinosum reddatur. Non tamen ea arte sola fit vinosum, sed quod paratur ex libris quatuor aquæ fluviatilis & una mellis, tandiuque coquitur ante insolationem, donec ovum crudum supernatet.

Conservæ recentes insolantur, ut omnes earum partes simul fermententur, & humidior quædam materia discutiatur: maxime verò quæ ex foliis aut floribus frigidis paratæ, ad multum tempus debent asservari.

Scyllæ succus, consilio Gal. cap. ult. lib. de pueri epileptico, elicitur insolatione. Obscuro tamen cœlo, gne extrahitur. Et quæ medicamenta insolari hyemis con-

stitutio denegat, eadem igne calefiunt per hyemem, ut æstate per solem.

Olea multa ex infusione florum, vel rerum aliarum permixtione parantur, insolanturque diebus vel pluribus, vel paucioribus, pro insulæ rei quantitate & viribus. Calidiora namque & sicciora, aut nulla aut pauca egent insolatione, frigida & humida diuturniore.

Par est ratio de aceto, variis floribus alterato, Rosaceum enim diutius debet insolari, sambucinum minus, & quod allia, mentham & vetonicæ garyophyllatæ flores admittit. *Renodans.*

INSPERGERE, vid. *Aspergere.*

INSPISSATIO, vid. sub titulo solutio cui opponitur.

INSTRUMENTA PHARMACEUTICA.

De *Instrumentis Pharmaceuticis* hic 1. in genere ex Clariss. Wedelii; 2. de *Instrumentis Pharmaceuticis internis & mensuris* in specie ex Celeberr. Bohnio. 3. de *Instrumentis Pharmaceuticis externis & propriis* sic dictis, furnis nimirum, vasis, &c. ex Curiosiss. Barnerò & aliis quorum figuras itidem adducemus.

De *Instrumentis Pharmaceuticis in genere.*

Vetus dictum est: qui vult finem, velit etiam media ad finem ducentia. Cum ergò de fine generali & speciali, sub distinctis quatuor classibus, singulis velut *sympliciorum & diaphanorum* administris & speciebus, actum hæcenus satis sit; restat, ut de mediis quoque dicamus. Pro variâ verò mediorum & finis consideratione etiam methodus diversa exorta est. Cum enim finis chimicæ sint medicamenta, media *sympliciorum & diaphanorum*, modus duplex subjecti considerandi & tractandi duplicem quoque methodum peperit: (1.) *Syntheticam*, id est quæ respicit magis à mediis ad finem progrediens. Hæc à priori tria regna in sua principia ignis examine resolvit, partes componentes eliciens, & quæ ex quibus quibus haberi possint docens, quali methodo in pharmacopœâ suâ usus est Schröderus. (2.) *Analyticam*, quæ id est respiciens magis à fine ad media progreditur, & partes compositas magis scrutatur, seu à posteriori effectus homogeneos, v.g. aquas, spiritus, magisteria in certas classes digerit, quod observatū videas in pharmacopœâ Londinensi, à *Zwælfhero* & aliis. Utrâque idem obtinetur finis; prior tamen speculativa inquirat, quid possideant, altera practica magis, quæ possidere deprehensum jam sæpius est per experientiam, elicit & præparat. Media & finis sunt eadem, modus diversus.

Supponimus igitur hęc materiam, ex quâ medicamenta chimica & pharmaceutica sint præparanda, esse vel vegetabilia, vel animalia, vel mineralia, singula in suâ latitudine.

Hinc faciliè patet (1.) *pro diversâ materiâ tractandâ, instrumentis aliis atque aliis opus esse.* Fidem hujus rei faciunt sensus, non posse obtineri finem citrà opem instrumentorum; & hæc ipsa adæquata debere esse materiæ. Utut verò omne agens agat saltem ad modulum receptivitatis subjecti, eo ipso tamen necessitas instrumentorum magis confirmatur. Ut in mechanicis limâ modò grossiori, modò mediâ, modò subtilissimâ opus est, cultro item, serrâ & similibus ad eundem modum. Sic etiam se hęc res habet. Unde qui instrumenta novit & materiam medicam, usum quoque faciliè novit, omnes quippe *sympliciorum* in applicatione instrumentorum debitâ consistunt unice. Ex quibus cognitio horum quàm necessaria sit, ad oculum claret.

2. *Ad operandum opus est dirigente, tum totum, tum ignem, & excipiente.* Dubitari posset, quare nunc demum de his agatur, præmittendis potius reliquis omnibus, quæ huc usque agitavimus; Enim verò coronidem imponere generali parti horum recensitiōe non incon-sultum est, ne accinctis ad praxin & à theoriâ digressis

quicquam obiter, vel desit, aut desiderari possit necessarium. Directore ergo harum rerum gnaro, medico puta, omnia probè succedunt, modò ipse his sacris initiatus fuerit, nec infra dignitatem suam reputet hæc egisse. Vices hujus obit pharmacopæus, medici quidem minister, sed, si dicere fas est, sæpe in hoc peritior, unde si quidem non integrum fuerit medico illis operari vel occupari, saltim notitiam habeat oportet, ne fallatur. Sanè si ullibi in hisce falli primum est, nusquàm magis fallendi promptior occasio, adeò pleraque plena sunt fallaciarum, quæ venum exponuntur censoribus ignaris. Censores perpetui debent esse medici, (quod nomen Vespasianus cum filijs, Tito & Domitiano, proprium & singulare sibi esse voluit, testibus nummis,) ne quid detrimenti inde capiat microcosmus, cuius imperator est. Dirigi debet totum artificium, totus processus & ἐγχερσις, ita saltim, ut norit ex effectu, quàm probè progressum fuerit. In spiritibus mineralibus, ne res exemplo careat, spiritum vitrioli nominatim, æri, clyffo, & aliis adeò invalluere fraudes, ut Argum agere ubivis necessum sit, imò cæcus cæcum sæpe ducit. Multum huc facit, ut in singulis speciebus ratio ἐγχερσεως pateat, ut interfuerit loco medicus, cæteroqui videns & audiens fallendus, unà cum iis quibus opem ferre satagit. Dirigi cum primis ignis, ne præcipitando pessum eat omne, nec cunctando, quod tamen respectivè melius est, metu inani an ignorantia, minus exauriatur, quàm par est, mixtum, faciliè utrobivis glauco nate oculis obducendo. Dirigendum in primis negotium hoc in experimentando; si ullibi enim in medicina, etiam hoc casu ἡ περὶ σφαλερῆ, *experimentum periculosum est*; seu in explorandis venenis, quæ ignores, seu in mixturâ nocivâ, quod contigit, qui pulvere pyrium ad hunc modum casu invenit. Dirigens ignis etiâ præcipue sunt furni, excipiens vasa sunt, de quibus in sequentibus. Opus verò esse direttore medico, inter alia vel inde cognoscere est, quod quædam se ipsa propellant & destillant, quod in glasti spiritu evaporante clarissimum est; nisi ergò nares & sensus alios adhibeas, multa latebunt, quæ secus si fiat expromi possunt largiter, industriolo σοφασμῷ & ratiocinio.

3. *Ignis corporum analysta, & διακρίσεως ac συγκερσεως primarius autor est.* Ἀνάλυσις resolutio est & destructio corporum naturalium artificialis, ut quod primâ fronte non statim motu proprio offerunt, hoc motore impulsa præstent. Dubitari de hocce asserto cœptum est, & rationibus adstrui posset dubium sequentibus: (1.) *quod violenter aggrediatur obvia sive oblata, nec tam resolvat vel exporrigat contra mixtorum, quàm destruat & potius confundat.* Sed quis non videt, distinguendum esse inter ignem promiscuè admissum, & refractè providâ curâ administratum ac modificatum, ut sic agat. Destruui oportet omnino, quæ resolvere est intentio, aliàs contradictio esset in adjecto, resolvere & tamen non destruere compagem quamcunque. Si rectè ministres ignem, nulla oritur confusio, sed successivè procedunt & ex debito omnia. Si rem exactius lustremur, omnia elementa sunt etiam destructoria corporum. Emulantur menstrua, quæ solvunt similia; seu ex iisdem, quibus constamus, etiam resolvimur. Non negamus hinc in terrâ resolvere teneriora, & in quæ jus obtinetur, corpora in pulverem, in aquâ in mucilaginem, in aëre in ichorem. Illud verò vel lento & paulatino fit gradu, vel potius insufficienter. Igne & menstruo omnis fit διακρίσις, igne tamen principaliter, menstruo vices ignis humidi gerente. Nominandus ergò analysta alius, si ignem menstruum universale negaveris, nec muneri huic ferundo. (2.) *quod alia potius & nova etia producat, quæ prius non aderant.* Salia non inesse, non sulphura, non alia, nisi igne ingenerentur atque sic producta appareant. Verùm contradictio non minus est, agnoscere in operationibus chemicis

διακρίσιν & tamen novam generationem statuminare vel fingere potius. Si enim διακρίσις est, non generatio est; si generatio nova, non διακρίσις, sive separatio. Quod si quæ alia afferantur his gemella, ejusdè fuerint commatis, eadem responsione digna. Nihil producit ignis, quod non alijs experimentis possit demonstrari, unde rectè principia chimica statuuntur duplicia, ut constitutiva, sive à priori, quatenus κερσις mixti constituant, quicquid etiam in contrarium afferatur; & à posteriori, ut producta, prout b. neficio chimicæ ἐγχερσεως hoc illud concessum fuerit indeque elicatum. Sin ulterius dubitare lubeat, illud opponemus: Scepticos ubique reperiri posse.

4. *Ignis particulas mixti dislocat, quietas in motum ciet, rarefacit, figit.* Sanè motor primus est, & sine igne nil ἄξιον λόγου produci potest. Materiam aggreditur, & dum materiam resolvit, particulas necessariò aliter locat, unde licet formaliter non inexistet prius oleum, sal, tamen materialiter inhæret, unde non potest non à locatione sive positu diverso particularum alia figura, aliud & diversum à priori ens quoad accidentia emergere. Laudari hinc meretur *Cartesius* ex l. de meteor. cap. 3. §. 19. p. m. 225. Palam liquet, inquit, producti hujus vel illius per ignem è mixto partes eadem esse, quæ antea mixtum composuere, sed illas inter se collisas & vi ignis agitas, modò ex rigidis & inflexibilibus plicatiles, ex teretibus planas & secantes evadere, modò ex flexibilibus & plicatilibus in inflexiles & rigidas, modò ex fixis in volatiles, modò ex his in fixas &c. mutari, unde postmodum coloris, odoris & saporis diversæ admodum manant differentia. Ubi obiter notamus, admittere eundem manifestò principia hæc chimica, sed magis quoad structuram figuratam spectata. Patet res per mechanicam. Dirutus paries, concussus lapis, discissum plumbum aliam figuram extimam largitur multò magis id hinc eveniet, ubi è centro suo dislocantur. Nec valet illa objectio, si omnia in mixtis ex iterint, quæ inde prolici queant, etiam vitrum inextinse, quod absurdum est. Notandum enim, considerandum esse ignem in sphaerâ activitatis, & mixta in sphaerâ, ut ita loquar, passibilitatis suæ. Ex his duobus proportionatim habentibus terminus acquiritur, seu finis, quo obtento quiescendum. Quod si verò ultra hanc sphaeram progrediar, non contentus proleclis, & fortissimo urgeam igne, tunc jam improportio est, & non tam fit separatio amplius, quàm compositio. Sufficit tamen, quod noverim, id ipsum fieri à fusione particularum terrearum cum salinis. Ignis quietas in motum ciet particulas, quietas vel quasi non sibi relinquit, sed agitat, propellit, & à detinentibus alijs liberat, v.g. sal volatile ossium, craniorum &c. Ignis rarefacit, evaporationem præstat, quæ rarefactio comes est perpetuus, & indicium manifestum, quæ rarefiant, illa etiam propelli, ac moveri, separari. Hæc origo fuit chimicæ, hæc anima quasi. Rarefacta enim, quæ rareferi possunt, propellantur, reliqua fixa remanent.

5. *Ignis viâ siccâ, ipse tamen non unus, vires mixtorum exhibet.* Ignis quidem latius patet, cum aquâ tamen præcipue ad hoc opus concurrat: ignis activus, aqua passiva est magis. Varios ignes considerare operæ pretium est tum ratione originis, tum graduum. Est enim (1.) *ignis solaris*, quem naturalem vocant, ad digerendum, calcinandum, rarefaciendum, fermentandum, & immutandum aptus. Depurat pinguedines, fermentat confervas, immutat vinum in acetum, calcinat vitriolum insensibiliter, antimonium sensibili flammâ. (2.) *ignis intrinsecus*, sive ab intrâ foras agens, qualis est vinaceorum, fimi equini, glasti fermentantis & similium, qui itidem suos habet usus, exaltandi, digerendi, ut & alio fine dissipandi, & maturandi, ignis sine igne existens, & tamen effectus ignis conformes præstans. (3.) *ignis frigidus*, quo tum menstruum intelligi potest,

tum

tum vis activa intrinseca citra calorem, qualis est consumendi vis in mercurio, tum per motum continuum blandum, lenem, sive tritum præstitus, qualem hodie non pauci ad magnum opus magni æstimaunt, ut & hoc ignis sive trituræ genus ad omnia in chymia referatur. (4.) *ignis culinaris*, administratus vel lignis, non tamen semiputridis, quo de vid. *Lang l. i. epist. 53. p. 274.* vel carbonibus probe exustis, potissimum ex lignis durioribus, saginis, vel, quod idem, tamen minus obtinet, carbonibus fossilibus, quales Cygneæ effodiuntur. (5.) *ignis medius vel immediatus, nudus, vel siccus*, pro artificis variâ intentione, unde & artificialis audit, naturali perpetuo solari contradistinctus, licet, quod supra jam innuimus, formaliter sive specie non differat. De gradibus verò jam sub destillatione diximus. Addimus tamen.

6. *Gradus ignis magis ex proportionemutua agentis erga patiens quam aliunde æstimandos.* Si dicere volumus quod res est, reverà quidem variis artificiis possumus determinare vel cognoscere potius gradus, & mansiones graduum ignis, v. g. ratione stillicidii, vel ipsius totius evaporationis aliorumque; Genuinum tamen modum ex conditione tractandi subjecti perspicere licet. Valet hinc quoque istud *ἡ ἀποδοτικότητα*, propter quod unumquodque est tale, illud magis citale. Ignis propter calcinanda, destillanda, digerenda impenditur, igitur major habenda ratio horum, quam ignis ipsius. Volatilia, teneriora, laxioraque moderato morore egent; fixa, duriora, compactiora fortiori cuneo. Pro modulo ergo subjecti habeat sua fata ignis oportet. Quæ primo gradu propelli fas est, si secundum attingant, non æquè votum satiant, & sic in reliquis. Gradus videlicet ignis faciunt cumprimis & unice pro determinando tempore processûs cujuscunque. Præstat ignem gradatim accendi & sic evolvi, quæ addecer, ad ductum naturæ sensim sensimque, ne præcipitetur propulsio, & missis mediis, ab uno extremo ad alterum fiat progressus. Est enim & hic ut alibi, & nominatim in morborum ætate, considerandum initium, augmentum, status & declinatio. Quæ si invertas, præpostera erit *ἐν χειρὶ*, omnia verò ista variant ad sensuum testimonium, pro evolutione, pro dispositione subjectorum, quamvis hunc in finem & furni & operationes, quod hinc inde delibavimus, ipsæ modum dicant.

6. *Aqua viâ humidâ & velificatur ex promenda virtuti, & præst.* Prius præstat cum igne actuali, hoc menstrui titulo. Reverà enim, quod non semel diximus, ignis & menstruum sunt præcipua omnis operationis pharmaceuticæ subtilioris instrumenta. Pluribus verò modis cum id efficiat aqua, potiores videbimus impresentiarum. Aqua (1.) *diluit* & distemperat, ut compage laxatâ evolvi possint utiles ac desideratæ particulae, sicque discontinuatæ magis igni obtemperare, quod exemplo aquarum, gelatinarum & aliorum patere potest. (2.) *Aqua refranat.* Aquam esse frænum ignis, extra dubium est. Refranat ergo ipsum immediatè, ne impetu pleno aggredi mixta, sed refractè saltim possit, ut in Balneo Mariæ vulgò dicto. Refranat mediatè, diluendo sulphur & partes terreas, ne empyreuma contrahere possint tam facilè, adeoque frænum est empyreumatis. Empyreuma ignis notat prædominiam, & diluentis ac refranantis humoris absentiam; quando torrentur ultra quam par est objecta quæcunque. Hinc quod in viâ siccâ destillatis sulphureis combustilibus & quasi talibus empyreuma est inevitabile, humidâ præcaveretur quam optimè, defenso sic sulphure combustibili, ne odore ingrato empyreumatico, fumoso combustoque, molesta sint. (3.) *Aqua miscet*, miscet salia & terram, impastat ac coadunit, ut coire, ut coagulari & aliis modis misceri possint per intima. Exemplo sint lutea, globuli pro spiritu salis parando, aliæque. (4.) *Aqua solvit*, ut menstruum universale & particulare, variis modis acuata, modò alcalibus, modò acidis sa-

libus, modò spirituosus molimur. (5.) *Aqua excipit*, excipit laxè & mediatè saltim olea destillata v. a. numidâ, ut hoc vectore viam sibi apparent ad exitum. Excipit strictiori complexu & arctiori vapores fumosos, ut in clyffo & spiritibus acidis tantum acquiras aquæ vel spiritus, quantum affuderis ejusdem. (6.) *Aqua vehit*, sive vector est oleorum, seu supernatent eadè, ut ætherea magis, sive saltim provolvantur aliâs fundum petentia. Vehit & solvit spiritus, unde rectificatione indigent.

7. *Aër igni v. tam, rarefactionem aqua dispensans, utrique obfetricatur.* Aër ignis velut externum est pabulum, ut si aërem demas, vitam demas, unde necessum est eundem exingui; hinc aër unice ignem sustinet, ut spiraculis his flammam producere queat. Hinc tantum virum habet ignis, quantum libertatis permittit aër: quò liberius eventatur ignis, eo fortior est, & contrà. Producitur idem & in minimo, sive in compendio durabilis redditur, aëris artificio, intenditur idem folliis ministerio. Torum igitur artificio graduum administrationum ignis consistit in admittance aëris majori, vel minori. Unâ verò aër rarefactionem largitur aquæ & omnibus liquoribus, explicitis vel implicitis, quæ ratio est, quare non debeant vasa, retortæ, cucurbitæ, vesicæ ad plenum recipere materiam quâcunque, ut spatium conveniens sit pro rarefactione & evaporatione; secus enim si fiat, præsertim in paulò volatilibus, vel ignis subdatur ab initio statim fortior, v. g. in destillando oleo anisi, aquarum &c. confestim & cum impetu confusaneus liquor transiit alembicum. Unde & dulcibus & magis spumascensibus aliud frænum poni debet. Cumque instat regulæ calor dilatat aërem, frigus concentret eundem, tanquam rarefactionis omnis *ἀποδοτικότητα*, facile & dicta illustrari queunt & intelligi, quomodo aër frigidus pro asservandis aquis, pro mitigando empyreumate, & aliis præstandis usibus inserviat.

8. *Aër volatilia depopulatur fixa adanger.* Vagum & summè mobile corpus est aër, continuâ calidi & frigidi, humidî ac sicci reciprocatione gaudens, simulque gravitate imò pressurâ suâ poris se insinuans. Tanti est atomorum harum subtilis mutatio, ut sensus quoque fugiat; facilè tamen in macrocosmo deprehendatur motu maris æstuoso, in animalibus brutis, vel ipsis gallinæ testibus, & aliâs, præcipuè in thermometris, in mercurio aliisque. Imò & in microcosmo a posteriori id evidens est, seu ab affectu in prælagis tempestatis doloribus, sero extra suam sphaeram vitalem ad ductum humidî macrocosmici composito, in pollutione nocturnâ, epilepsiâ, sæpe ipso solo momento quadrarum dæ mutatarum irruente, ut taceam menses in feminis, serosioribus viris, statum etiam lunæ ductum, licet ad archæum uteri variantem, sequentes, ut alias videas in novilunio, alias in plenilunio, alias in reliquis quadraturis id pati, sicciore verò exemptas penitus. Depopulatur humidum, si ipse careat moleculis liquidis, aqueis, unde quod invenit citra resistantiam, promptissimè recipit, imò furatur & abripit, uti exiccat plantas, calcinat vitriolum, ejusque & aluminis mineras, evocato humido concidentia, & colore aliisque accidentibus manifestè immutata. Depopulatur humidum spirituosum, naturæ dissipabilis magis, unde licet optimè deligatis orificiis expirant sensim sensimque & imminuntur particulae, exemplo spiritus vini & cum eo paratarum essentiarum. Videas idem quoque in vino, quod hinc, nisi in cadis suis continuò defectum suppleas, facilè spiritum concipit, confestim extirpandum affusione spiritus vini momento. Depopulatur salia volatilia & spiritus sale volatili scotos, ut vix satis defendi illa ab aëre, præterquam cerâ simplici & operculis vitreis, arctiori complexu arcentibus aërem, possint. Hinc ad volatilandâ salia, sive salia volatilia acquirenda aëris quoque sua vis est. Fixa verò adauget aër, adauget fixa alcalina, calcinatione vacua ab humido reddita, quatenus infu-

quando se cum particulis suis aqueis, quibus perpetuo gaudet, perdit eandem gratiotti hospitio & fixiori receptas. Adauget fixa alcalia, deliquando eadem, modò vitro patulo datur accessus, exemplo olei salis tartari per deliquium & similitum. Adauget fixa acida, vel incorporando eadem, ut in spiritu sulphuris campanato videre est, melius parabili aëre humido, densoque, unde cellam eligunt quidam; vel solvendo & deliquando, exemplo liquoris martialis. Recensebimus hujus rei duo exempla egregia. Mediante alcali quidem adaucti exemplo sit liquor crystalli multiplicabilis, quem describit *Poterius Pharmed. c. Spagy. l. 2. c. 23. p. m. 488.* Alcohol crystalli medio, inquit, (est verò alcohol pulvis crystalli calcinatæ, seu ignitæ bis, ter, quater, & in aqua extinctæ, hinc lævigatæ) oleum sit mirabile, quod quidem vi pollet vegetabili, augetur enim sensim vegetabilium in morem, adeo ut uncia una intra mensem vel sesquimensum alteram unciam dederit, contra omnium liquorum naturam, qui ab ambiente continuo absuntur, hoc contra augetur mole & pondere. Tribuit verbis sequentibus id substantiæ cuidam famelicæ, ejusce salium ordini peccati. Parati eundem beneficio sulphuris idem memorat *l. 2. c. 11. p. m. 432.* ubi oleum vocat multiplicabile, & de usu agit. Acidi per se adaucti exemplo sit oleum vitrioli, quod asserturum, etiam clauso cum cerâ vitro firmiori, successu temporis vidimus ita increvisse & intumuisse, ut oras transcenderit & jam priori spatio nullo modo contineri queat, aliquot annorum decursu observatâ illâ curiositate. Utroque igitur modo operationibus pharmaceuticis rertum confert, magis tamen secundariò, igne actuali & potenciali, sive menstruo, principatum tenente, quibus omnia sunt primariò, reliquis adæquate.

9. *Terra operationibus per ignem faciendis modò corpus præbet, modò hospitium.* Corpus præbet, & fundamentum rarefactionis salium, quatenus eadem dissociat, atque sic in fluorem adigit. Vices hujus tenent bolus communis, armena, sigillata, si quis pretiosius operari, licet frustra, velit; item alumen ustum, caput mortuum à spiritu salis residuum. Ita enim hætenus usitatò consuevere fieri spiritus acidi, excepto vitrioli, qui penes se illud corpus habet in ochrâ, ut suo loco diximus; donec curiosior modus innotescat, spiritum è mineralibus, nempe ∇ an fortem, spiritum niri, vitrioli destillari posse sine recipientibus, quæ sæpe franguntur, sed solo vitro unius mensuræ nostratis, beneficio materiæ cujusdam haud peregrinæ, quæ spiritui adimit fluxum, ut ita residere cogatur, id quod in *Act. H. ff. Vol. 2. obs. 133. p. 355.* memoratur inventum. Præbet corpus etiam quandoque liquoribus, uti sit ex terrâ sigillatâ & spiritu vitrioli liquor stypticus Michaëlis, ex spiritu salis & calce vivâ liquor nephriticus quorundam. Præbet hospitium vasis, sive arena, quod cõmunissimum est, sive cineres vel limatura ferri ipsi substituuntur, quod tamen hodiè ferè exolevit. Notabilè verò est à quibusdam assertum, successu temporis arenas catinorum acidas reddi, quo acorem ignis quoque simul itabilire fatagunt; verum si id sit, potius spiritui terræ sic evolutò adscripterim, de acido participante, sive, ut non rarò sit, effusis vel fractis quoque vitris.

10. *Præter instrumenta generalia, specialia mechanica ancillantur operationibus singulis.* Ad apparandum reliqua, & præparanda speciatim faciunt mortaria, contusio-ni & mixturæ debita; cavendò, ne particulæ aneæ misceantur durioribus unde crystallus liquorem viridem exhibet, juxta nonnullos, non ex se sed à miculis venereis inter pulverisandum remixtis. Hinc eligi & hic possunt diversi, lapidea quoque minora ad dispensandum inserviunt; plumbea pro emplastris & unguentis Saturninis. Conchæ ad terendum & miscendum, *Glass-schalen*, cribrum & setaceum ad pulveres, aliquando & pulres transferendos, circuli ferrei ad scindenda vitra, prius candefacti, faciunt, variâ magnitudine, cujus rei ratio est incallescencia vitri respectu totius inæqualis, respectu circuli æqualis, unde, instar regulæ, omnis calor improporciona-

tus & inæqualiter administratus rumpit vitra, sicuti æqualiter, puta quoad totum & successive admissum bene ferunt, & funduntur potius ac subsident, ut in cinabari antimonii quandoque fit, quàm rumpuntur. Eadem ratio est filorum sulphuratorum obduktorum, & accensorum, item funiculi linei mollioris accensi, prosequendo & dirigendo sic fissuram. Hinc etiam nocet potius quàm promovet scissuram accuratam aquæ frigida adpersio, vel vitri in aquam intrusio ut plurimum, quia sic major inæqualitas inducitur, unde fissuræ laterales plures eveniunt. Serra, lima, cultorum usus notus est, ad rasuram, limaturam, concisionem. Marmor ad lævigandum, baculus ferreus ad sustinendas retortas vel carinos, spatula ad dispensandum & miscendum, forfex ad plures usus faciunt, ut & alia plura. Forceps ad carbonem & alia ignita apprehendenda, rutabulum *Rubhacke*, ad cineres purgandos: cochlear ferreum ad ingerendam materiam successive; uncus versorius ad carbonem subigendos. Tacemus prælum ad exprimenda olea, comprimentas pastas v. g. cydoniorum, ollas, ampullas vitreas & figulinas, capsulas, excutiam, malleum, dioptram, seu instrumentum ligneum quadratum pertusum, pro oculis defendendis ab igne, sicuti per chartam acu pertusam observamus solem, ne lucido excellenti visus lædatur &c. Hæc ut præparationi inserviunt; sic

11. *Destillationi rarefactionem humidâ & siccâ viâ moderantia præsent.* Destillationi propria sunt vesica, de cupreo vase prædicari solita, majori & minori, ad destillationem aquarum, & spiritus vini, quod in vulgus abiit, siquidem vasa hæc igni magis resistere apta nata sunt. Par ratio est oleorum, si quidem aquæ commercio parantur. Cucurbitæ de vitreis magis prædicantur, majoribus vel minoribus, imprimis pro spiritibus seu destillandis, seu rectificandis, uti & pro abstractione omni in genere. Alembici ut exceptoria sunt vasa, sic stannei, cuprei & præcipue vitrei esse consueverunt, commodo mechanico consilio, siquidem rotundiori suo fornice quæcunque destillata humida excipiunt, reflectunt, & ad recipientem vas dispensant, ut adeo omnis destillandi & operandi in humidis occasio potissimum in alembico locetur. De hujus significatione ulterius videri potest *Conringius l. de Hermet. Med. p. m. 371.* *Zwinger. exam. princip. chim. p. 88.* Juxta nonnullos *Plinius* calix est dictus. Rostatus est communiter ad destillandum, ad digerendum etiam quandoque, licet rarius, cæcus nominatur, qui rostro caret. Aludel verò audit alembicus continuatus & in altum productus, in sublimatione tantum usitatus. Horum vicem in destillationibus præstat productior celliorti apice alembicus, ad rectificationem spiritus vini in Belgio potissimum usitatus. Quod verò vesica est in metallicorum, cupri imprimis, genere, stannæ enim cucurbitæ dantur quoque; id cucurbita est in vitreorum genere, pro differentia magnitudinis, minor, mediocri & media, ut cucurbita elatior vulgo audit *eine Herrenkolbe*. Nonnunquam etiam sessilis in usu est, basi planâ non rotundâ quæ mensæ vel alteri loco imposita firmo sic stat talo, citra adminiculum aliud, sicuti tum huic, tum aliis usibus similibus coronæ stramineæ conducunt. Phiolæ etiam huc spectant, latius aliquando pro cucurbitâ acceptæ, propriè tamen quæ ex globo in canalem oblongum & æqualem excurrunt. Retortæ vitreæ, terreæ, aliquando & ferreæ, pro diversitatè subjectorum & ignis violentiæ officium faciunt; aliæ simplices, aliæ tubulatæ & pro lubitu artificis aliæ. Collum productius etiam, *Ansoß*, in terreis præprimis ex usu est. Receptacula liquorem destillandum excipiunt, optima quidem vitrea, si quidem ex puriori metallo, ut vocant, producta fuerint: oculis enim exhibent *εὐχρηστία*, satis capacia requisita; *Vorlagen*. Campanæ ad spiritum sulphuris parandum ferè inserviunt, gas ejusdem sic concentrato & beneficio atomorum aquearum corporefacto. Singula in magnitudine variant, pro operationis modulo, unde & cucurbitule minores pro solvendis metallis, pro sublimatione

matione cinnabaris & aliis inserviunt. Tacemus vitra hypocleptica, *Scheidetrichter*; quæ tritoria sunt longiora & attenuata in fine, pro separandis oleis ab aquâ, & similia hinc inde memorata.

12. *Solutioni solventia, præcipitantia, separantia & adservantia velificantur.* Solventia sunt menstrua, quæ etiam sibi opposita sunt præcipitantia. Quæ internosse & ad manus præcipuè habere oportet polychresta, ex spirituosissimis V, qui instar omnium est, præcipuè tartarizatus, & cum vel sine igne rectificatus ac dephlegmatus; cui omnes essentia, tinctura, extracta suam debent originem. Ex salinorum classe sal tri, & huic analogum ac succedaneum cineres clavellati, unde & plurima consurgunt medicamenta; quæ sal hoc largitur ipsum & ex aliis ministrat. Ex acidis acetum destillatum, ad extracta, tincturas, magisteria, solutiones proficuum, inprimis etiam ad figendum, præcipitandum, immutandum; spiritus vitrioli & salis ad acuendum, solvendum, præcipitandum. Hæc juvenis velut universalis titulum sustinent. Tacemus menstrua aquea, aquam simplicem, maximè & hinc polychrestam, & horummet amplissimum usum ad ipsas destillationes, calcinationes, præparationes. *Separantia* sunt filtra chartacea, ex chartâ puriori, typis excipiendis dicata, paratâ, formâ ex pyramidalis rotundâ. Reverâ enim nil aliud sunt filtra simplicia & duplicia, quàm tritorium dimittens, ut poros ejus transeant liquida tenuiora à liquidis spissioribus, ut in oleo tri, & solidis, à calcinatis, tritis, edulcatis. Et ipsa TRm retinent, pressione suâ subinde particulis aliis alias protrudentibus. Lintea filtra quoque commoda sunt ad dimittendum & exprimendum, ut in extractis aloës, opii, tinct. bezoard. & aliis. Certum enim est & ratum, longè efficaciora sic reddi extracta, quàm simplici decantatione, i. e. defusione, vel filtratione, M. H. Sustinent hæc tritoria vitrea, ferrea laminata, imò & corbes aliquando. *Adservantia* vitra præcipuè sunt, pro coctione, sive solutione cum igne, latiora, pro extractione & digestionem angustioris orificii. Hinc cucurbitæ minimæ ad solutiones Oi, Dx, & ad extrahendas tincturas aliarum faciunt. Hinc etiam tincturæ commodius extrahuntur in vitreis lagenis, firmato probè orificio, v. g. essentia J & similes, ut non aufugere in auras particulæ subtiliores tam possint, & calore circulari liquor melius queat. Eteodem artificio ad emollienda ossa & ea præstanda hodiè utuntur, quæ eodem compendio hætenus fieri non potuerunt. Conclusam illam vocabimus digestionem & humidam, ad usum domesticum & medicum. Neque id adeo tamen novum est, sed quibusculis nostris consuetum, ad paranda juscula analeptica ex gallinis, in lagenâ coctione instituta. Nec aliud indigitarunt superioris ætatis chimici per pelicanum suum, hodiè exoletum ferè, quàm circulationem centalem.

13. *Calcinationi firmius ignem sustentia & fusa excipientia auxiliantur.* Quæ enim solâ accensione deflagrant, concidunt in cineres. Quæ verò intimius calcinari vel fundi debent, vase opus habent firmiori & minus poroso, quale est crucibulum. Elegans est consideratio horum, quoad poros. Non sustinent potiùs hi aquam & liquida, sed promptius dimittunt, (unde pro evaporatione aliis utimur; latioribus & firmioribus, terreis vasis, vel metallicis ferreis potius), atque inter absurda pharmaceutica referri potest, si quis Vm coquere in +lo velit. Sustinent verò optimè liquefacta, ut nitrum fustum per se & cum aliis, ut metalla & mineralia fusa. Ex quo experimento efficitur, aliam esse longè horum conformationem quoad poros; sunt enim liquores hi fusi, seu liquores ad ignem, magis viscosi, sive particulis æqualibus respectivè præditi, unde non subeunt poros +li æquè, saltim nō tam intimè, propulsante simul igne & defendente. Et tamen, quod itidem mireris, si relinquuntur salia fusa prius in +lo, efflorescunt per poros particulæ salinæ, modò humidi

acceserit pars. Optima in Germaniâ sunt crucibula Hassiaca, quæ misy simul ingreditur, non facilè in igne fissuras acquirunt. Aliam verò itidem configurationem pororum obtinent catilli cinerei, & testa, *Treibscherben*, quorum omnium definitionem *Harmannus* & *Rhenanus* tradunt. Notabile tamen est, quod quidam asserunt & satis probabiliter, metallica corpora posse se insinuare crucibuli poris, cui probando pondus crucibuli inservire potest. Obtinimus aliquando inter mira alia, quæ subinde ad ignem occupatis obveniunt, ex calcinato, in crucibulo antea usurpato, capite mortuo tartari pro sale parando, regulum elegantissimum. Unde venerit cogitantes, inter alia coniecimus; an prius in crucibulo regulus antimonii fusus fuerit, & pars in poris crucibuli recondita manserit, donec accessione salis in lucem se dederit denuò. Pyramis, ænea vel ferrea, *Gießbuckel*, ad regulos separandos facit, parte metallicâ graviore ad fundum deturbatâ, scorriis supernatantibus. Omittimus alia fundendis & excipiendis hisce vulgò dicata; item crucibula commodè ad sublimationem fixiorum, ut cinnab. vulg. nativæ & antimonii inservire.

14. *Operationes omnes & singula suo qualibet loco & tempore peragenda.* Locus dividi potest in generalem & specialem. Generalis laboratorium audit. Utut verò *evaporisus* peragi etiam possint non pauca in foco, in fornace domesticâ, hoc vel illo angulo, apto ad locandum ignem; ad splendorem tamen & commoditatem majorem facit locus singulis adaptatus, fornacibus instructus & iis omnibus conjunctim, quæ & ad usum & decorem pertinent. Tale fuit in aulâ imperatoris, directoribus Martino Rulando fil. & Oswaldo Crollio. Tale Lugduni Batavorum sumptibus publicis constructum est. Nec reliqua privatorum hinc inde suis carent laudibus & elegantia. Suffecerit locus aptus in particulari huic vel illi operationi, unde & celeberrimi chimici de splendore tali minus solliciti, plus tamen quàm alii emicuisse, exemplo B. Ludovici nostri, & aliorum. Nec tempus negligi debet, modò non superstitiosè illud attendamus, v. g. in parando regulum antimonii, antimonio diaphoretico &c. solum solum cælum eligendo. Studiis publicis gratulor, ait *Helmont. de magn. vulner. cur. p. m. 64.* illique benè favo, qui novit, quomodo antimonium vulgare inter præparandum ad influentiam se continuè dirigat. Id tamen si ad dicta referatur, parum valet. Etenim nullo cælo sæpe nobilior regulus & antimonium diaphoreticum longè elegantius exurgit, quàm sereno. Tempus verò commodius est, quando physicè & moraliter cælum favet, sive condendis & præparandis vegetabilibus, ut vernum; ubi & destillationes vegetabilium commodiores, sive aliter. Sic tempore hyberno commodius sit extractior essentiarum, quod aliud agendo digeri melius sic queant ad fornaces *Wedelins.*

De Instrumentis Pharmaceuticis internis Igne, Aère, Aqua, Terra, item & Menstruis: ac 1^o.

De Igne.

§. 1. Dum in hac & in sequentibus Dissertationibus de Instrumentis Chymicis mihi dicendum præsumo, breviter Lectorem præmonere, necessarium puto, me haud acturum de Furnis, Vasis destillatoriiis, Filtris, mortariis, prophyrice, cribro similibusque utensilibus mechanicis, partim mediâtè, partim immediâtè magis ad Corporum dissolutionem & concretionem concurrentibus: Sed illa saltem Chymicorum Instrumenta lustrare conabor, quæ non tam forma externâ, quàm intrinsecâ suâ extura, motu & potentia, in corpora sibi obvia agunt, hæc modò dissolvendo, modò combinando.

§. 2. Distinguere illa populari quidem licentiâ solent in Naturalia & Artificialia: ut prioris classis sint Ignis, Aër &c. posterioris autem Menstrua non tantum communiter sic dicta, fluida sc. & solventia, sed cuncta concreta

concreta naturalia, solida quoque, quæ ab artifice aliis applicata vel solvendo & discontinuando, vel condendo ac combinando in hæc operantur. Hæc tamen non idèd artificialia vocari volo, quasi alio, quam naturali, modo vim suam in objecta exerant; nec quasi arte saltem parentur: Sed tantum, quia eorum plurima ut plurimum in Officiis Chymicis ex corporibus naturalibus conficiuntur, aut ad minimum in his aliquantum prædisponuntur ad hanc, vel illam operationem specifi. è magis accommodantur, aut determinantur, ac cum aliis eundem in finem miscentur.

§. 3. *Primo* siquidem ratione agendi modi potissimæ & potentiores in Menstruis similibusq; Instrumentis, artificialibus communiter dictis, & quidem quam maximè etiam compositis, singulari acumine inventis ac encheirid. haud vulgari elaboratis, Naturæ partes sunt, quamvis illorum motus Artifex dirigat & moderetur: quatenus v. g. fumus sulphuris, à Mechanico accensi, in ferum sibi expositum vix alia ratione agit, dum cum hoc in Crocum aut vitriolum Martis coit, quam exhalationes sulphuræ subterraneæ, quæ naturæ opus dicuntur, mineras ferri rodentes & Vitriolum naturale cum illis constituentes. *Deinde* nec gloriam hanc natura sibi adimiparitur, quasi arti producere liceret aliquod solvens, coagulans, &c. Quod non per illius quoq; activitatem fieri queat, aut cui simile quoddam, sine artificis manu & concursu, in universitate rerum haud existat. Concipe tibi menstrua acida, vegetabilia, talia sola natura v. g. succum citri, sine artificis cooperatione, suggerit. Concipe potentiora, sc. mineralia, v. g. Spiritum sulphuris, salis &c. hæc mechanicus non tam conficit, quam à mixtis, in quibus cum partibus unctuosis, terreis aut metallicis, coeunt, segregat, aut, si etiam conficeret, idem tam artificium hæc parandi Naturæ non derogat, quæ exhalationes salis, sulphuris, nitri &c. subterraneas per ignem subterraneum excitat, vitriola atque alumina diversorum metallorum similiæque decomposita, æquè ac stigma sulphuris, vitrioli, nitri &c. officinarum formantes. Concipe fumum sulphuris per ignem furni intra retortam elevatum & vapores mercuriales in Cinabarim officinarum coagulantem: invenies hunc in terræ venis, ejusdem texturæ atque minerale nativum condensantem. De urinosi equidem dubitari posset, an solius naturæ productum illa unquam existant? Verum èd ipso, dum Nitrum & Sal ammoniacum naturale, quod prope Putrescentes cum ebullitione & strepitu notabili in terræ cavernis sublimatur, præter acidum urinosum sal fovere certi fumus, urinosum hoc sincerum, antequam in concretis coagulabatur, naturæ terrisq; quibusdam præinexistere non negatem, præprimis, cum, uti suo loco demonstrabitur, terræ argillaceæ diversi generis dentur, à quibus Spiritus & sal volatile urinosum destillando elici valet. Salia fixa sc. alcalia quamvis solius artis opera sint, salforum tamen atque aluminosorum magna pariter per naturam conspicitur farrago, v. g. præter Nitrum & Sal ammoniacum nativum sal commune, gemmæ, Vitriolum, Alumen &c. Ac denique, ut taceam, nihil artem unquam patrare, nisi quod per naturæ regulas contingere poterat, illa ipsa instrumenta chymica, quæ artis opera atque effectus esse, nobis persuademus, merè naturaliter agentium Species, seu ipsius Naturæ proles sunt, quatenus v. g. acetum, tartarus & spiritus vini fermentatione, salia utinosa frequentius putrefactione, alcalia igne &c. producuntur.

§. 4. Naturalium autem vulgè sic dictorum agentium dum quatuor constituo, recedo à *Dornio*, qui in *Chymico-technis philosoph. chymicis*, naturæ & quæ ac Chymistarum solitarium instrumentum Ignem pronunciat: recedo pariter ab *A. Sal. s. 1. aph. 8.* hujusque Apologeta, *B. Illichio*, duo tantum instrumenta chymica, sc. Ignem & Menstruum asserentibus: recedo denique à *Laurentberg. o. ac ejus Defensore, Arnoldo Schroderibus* saltem, nempe Igni, Aëri

& Menstruo agentium in chymia munus decernentibus Adeoque Menstruum, ex hypothesi vulgari, artificiale instrumentum pronuncio, Igni verò atque Aëri Aquam ac Terram jungo: quod quo jure agam, ex insequentibus dissertationibus singulatim innotescet.

§. 5. Ignem instrumenti chymici titulum mereri, nullus unquam dubitavit, ut vel ex recensitorum Scriptorum collatione videre est, ejusque usus in operationibus ferè cunctis quam amplissimus observatur: ita quidem ut, quia agens potentissimum & catholicum magis hic semper creditus fuit, olim jamdum Chymiam Pyrotechniæ titulo ornatint, *Helmontius* verò Philosophum per Ignem propriâ autoritate se proclamavit. Qui autem hunc in externum atque internum distinguunt, non adeò philosophicè differere videntur, cum illæ ipsæ quoque particulae igneæ, quas concretis inexistere, supponunt, totius equidem compagis intuitu, i. e. in sensu populari, internæ dici queant, respectu tamen minimorum seu molecularum, quæ mixta constituunt & ab illis afficiuntur atque agitantur, revera externæ maneant: quatenus movens semper extra mobile & ab hoc distinctum observatur. Cui accedit, quod calor ille, quem nonnulla concreta, v. g. inter fermentandum & putrescendum, præ se ferunt, Igne quodam congenerato, i. e. formaliter & actu inexistente, haud emergat, sed per collisionem potius particularum intestinam, quæ fermentationi & putrefactioni subest, excitetur, hujusque effectus dici debeat.

§. 6. Paradoxum equidem hoc videri posset Peripatheticis, elementis suis ignem jungentibus, hincque ad generationem mixtorum cunctorum, varia quamvis proportionem, materialiter hunc concurrere, asserentibus: at c. m. paradoxa magis hæc illorum hypothesi, quæ eam consequitur, ignis congeniti atque intrinseci potentia satis adhuc dubia erit. Quippe nec ab iis comprobatum, nec ab aliis concessum, est, ejusmodi elementum & substantiam ignis urentem atque lucentem extra solis corpus & hujus radios dari, qualis superiorum seculorum scholæ introducta fuit: illum enim, qui in foco, furnis, cavernis subterraneis &c. observamus, elementum potius aliquod, i. e. particulas sulphureas accensas, seu celerius & ad se invicem determinatâ ratione vibratas esse, adeoque cum pabuli seu materiæ deflagratione absumi, haud equidem mei instituti facio, ipsa nihilominus sana ratio dicitur. Præterea quamvis ejusmodi ignis à sole haud emanans existeret, hujus tamen incoercibilis essentia concipere vix permittit, quomodo, ut principium constitutivum, mixtorum compagem, sub formalitate sua, i. e. ut lueps & adurens, subingredi queat, quatenus destructionem potius rerum machinatur, hincque *Helmontio* modò *Creatura destructa*, modò *Mors artificialis*, dicitur: hæc commodius instrumentum deprehenditur ad corpora dissolvenda seu in partes discernenda, quam ad ullum illorum constituendum ac firmandum; in perpetuo sc. motu existens, hinc minimorum cohesionem & quietem turbans.

§. 7. Ignis E. omnis, dissolutioni atque concretioni corporum inserviens, externus est, sive lucidus is simulque urens observetur, sive calore solo atque urendi potestate se prodar. Ignis micans, i. e. luce & calore gaudens partim Soli, & quidem formaliter seu efficienter, partim talibus concretis, materialiter tamen tantum, inexistit, quæ moleculis sulphureis, resinosis, pinguibus atque unctuosus abundare constat, adeoque inflammabilia dicuntur. Qui autem cæcus, & sine luce calefacit, in salinis quoque aliisque mixtis, quorum particulae ad motum agiliores, aut in hunc facile abripiuntur, deprehenduntur, v. g. in calcè viva, salium acidorum & alcalicorum consursu ac quibuscunque corporibus attritu mutuo incalcescentibus: ita tamen ut, si horum alterutrum, aut plures particulas Areas intertextas habeant, v. g. ligna aut silex & Chalybs, motu concitatore seu attritione diuturniore

denum

demum quoque in flammam abripiantur, ignemque micantem producant.

§. 8. Solem primariam ignis lucidi magisque simplicis scaturiginem existere, & quidem adeo perennem, quæ vix ullo extra se motu atque excitatore opus habeat, augurari facit, quod omni tempore eadem hujus calefaciendi & adurendi ob-servetur potentia, quamvis hanc prout radij ipsius incidentes ac reflexi magis aut minus perpendicular-es sunt sub diverso activitatis gradu objecta exe-rat. Imò non vulgo saltem innotescit, solis infra ho-rizontem moram frigus æque ac tenebras excipere, sed rerum Physico-Astrologicarum indagatores so-lertissimi testantur, eo tempore, quo sol eclipsin majorem patitur, & radiorum illius incidentia ad nos maximam partem inhibetur, aerem notabili-ter simul refrigerari: ita quidem ut illi interdum (quamvis ante & post obscurationem ætus aëris intolerabilis existat) vix sine horrore aut plurium vestimentorum foku se continere queant. Cui ac-cedit, quod eorundem radiorum solarium, ope speculi caustici reflexorum, concentratio, id est, plurium concursus & congestio, in materia habili ignis actualis & omnium compositorum ignium potentissimus evadat, in instanti ferè ferrum, vi-trum, lateres &c. fundens & calcinans, ligna viri-dissima inflammans, hincque vehementissimum ac furni fusorij candentis ignem activitate longè supe-rians; quales effectus speculum metallinum Domini Villetti olim Lugduni Gallorum præstitisse recor-dor.

§. 9. Ast quiescens magis, potentialis tantum, materizque saltem substratæ aut pabulo suo pro-portionatus, est ignis corporum inflammabilium: utpotè quibus intertexta minima sulphurea seu bitu-minosa motu demum superveniente externo ignis formam induunt, sive hunc ab igne actuali, sive à quocunque more adæquato, suscipiant. Hac tamen disparitate, ut ille ad actuanda, & accendenda con-cremabilia cuncta aptior existat, hic autem soli-dis tantum inflammandis inserviat: dum fluida, quæ alias tota inflammabilia, nulla agitatione naturali aut mechanicâ, sine ignis actualis adaptatione, in ignem converti possunt, nisi forsan flamma, quam Spiritu terebinthinæ & Aquæ fortis colluctatio, ob-servante *Nobilissimo Borrichio Act. Hafn. volum. 1. cap. 72.* præstat, huic regulæ exceptionem conce-dat.

§. 10. Ignem actuale, dum corporibus inflam-mabilibus admoventur, motu saltem vim suam in hæc exercere, id est, ea accendere seu ignita reddere, eò ipso palam fit, quod, sicut ejus formalitatem in motu consistere, penes omnes ferè hujus seculi Philosophos in confesso est, ita illis, in quæ agit, objectis præter motum nihil imprimat. Potissimum cum ignis prop-ter summam sui (in particulas non raro præ exiguitate visum fugientes) divisibilitatem moleculis etiam ob-jectorum minimis magis, quam reliqua agentia na-turalia cuncta, applicabilis, per consequens ad cor-pora dividenda horumque particulas dimovendas & exagitandas aptissimus videatur. A que hoc quidem eo impetuosius præstet, quantum ratione suarum ato-morum vix ulterius divisibilis is est, hinc exilissima & levissima ejus corpuscula exigua violentia mul-tum impelluntur ac velocissime vibrantur. Non po-test igitur fieri, quin eadem velocitate atque impetu corpora inflammabilia ignis moveat, hinc potentissi-mum Naturæ ad motum localem instrumentum qui-busdam rectè dicatur, i. e. quod particulas igneas, hæ-tenus in alijs concretis torpidas, motu suo omnium facillimè in motum abripiat atque actuat, Quibus ac-cedit, quod ipsa flamma ex accensione sulphureorum

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

prorumpens nihil, nisi effectus rarefactionis atque attenuationis materiz unctuosæ seu sulphuræ exi-stat, quam ignis, qui crassiori illorum substantiæ, v. g. ligno, elychnio &c. adhærescit.

§. 11. Motu vero externo seu magis mechanico, i. e. attritione ac collisione mutua atque proportio-natâ, pariter ignem actuale excitari posse, pro-lixius ostenderem nisi chalybem silice, clavum mal-leo percussum, scintillas evomere, fœnum madi-dum per putrefactionem, & ligna mutua attritione tandem in luculentam flammam erumpere, per ex-perientiam populatam quoque constaret: ita quidem, ut Indos per collisionem acundinum suarum cum li-gnis durioribus & siccis focos accendere, scriptores perhibeant.

§. 12. Atque his suppositis Entio aliisque facile concedi potest, scintillas attritione seu collisione è corporibus exilientes, ab ipso motu neutiquam produci vel generari, sed latentes saltem educi atque elici: idè quod illa tantum concreta, in quibus moleculas sulphureas abundare, novimus, concremabilia observentur aut scintillas fundant, reliqua verò exagitata ad ignem equidem non lu-centem concipiendum prona sint, nunquam tamen motu quovis concitatissimo ignescere queant, nisi ubi ignem actuale vehementissimum admodum experiuntur. Hunc enim observamus, lateres, Salia & ipsa alcalia quoque (sulphure sine dubio potissimo spoliata) candefacere: Ita tamen ut lu-culentam flammam nunquam emittant, & igne externo remoto hujus etiam impressio mox extin-guatur, id est, lucidam illius partem hæc facile denuo probant. Motus nihilominus est ac manet, qui quod potentia saltem scintilla erat actu talent facit: Quatenus in chalybe, silice, ligno &c. nul-la pars monstrari valet, quæ ignis esse sensibile ha-beat, seu quæ calorem & lucem, aut alterutrum saltem horum, præ se ferat; sed ejusmodi saltem ijs insint atomi, quæ motu ab extra superveniente, id est, collisione, ignis formale induunt. Quod quidem manifestius evadit per illa, quæ *Hooke Mi-crograph. obs. 8.* de textura atque natura scintilla-rum è chalybe excussarum testatur, nempe has, per microscopium observatas nihil aliud quam ramen-ta chalybis, diversæ figuræ, esse, vi percussoris se-parata & ratione sui sulphuris combustibilis ignita ac liquefacta, imò eorum quædam per colliquatio-nem hanc vitrificata: pari ratione, ac limatura ferri aut chalybis, dum per candela flammam trajicitur, momentaneo hoc transitu incandesceret & infinitas scintillas formaret.

§. 13. Quemadmodum autem pro motu ejusmo-di ignifero sustinendo particula saltem exilissima ad-modum, & quæ separatim existentes sensus planè fu-giunt, aptæ observantur, dum verbi gratia, ex rela-tione ejusdem *Boyle de efflu. s. atmospher. summa exi-litate c.* certa ratione præparati cupri granum unum flammæ vividæ, ac amplæ satis, ultra dimidium horæ durantis, tingendæ sufficiens existeret, adeoque in incomprehensibilis parvitatis atomos metallum istud dividebatur: Postquam scil. in cochleari appropria-ti menstrui illud dissolutum, & solutio lampadi vi-treæ exiliori atque elychnio instructæ infusa atque accensa erat. Sic nec quivis solidatum harum parti-cularum motui localis calorem atque ignem exci-tat, sed peculiariter tantum modificatus, i. e. vehe-mentissimus seu velocissimus, atque varius seu ad di-versas plagas determinatus.

§. 14. Vehementiam atque celeritatem ejus singu-larem imperus ignis summus, quem in corpora quæ-vis aut liquefacienda, aut comburenda, ille exerit, sa-tis abundè evincit, qui nullis etiam repagulis coër-

C ceri

ceri aut temperari, valet. Variam autem ejusdem motus tendentiam non irregularem per se mihi persuaderem, quatenus omnium concretorum naturalium motus naturales determinationes suas perpetuas habent: neque cum Velthusio reciprocam & in se reflexam ignearum particularum agitationem, nec cum alijs rotationis & quasi vertiginis motum, dicerem: Sed talem mihi hunc conciperem, quo illæ cunctæ à centro ad circumferentiam, adeoque ad diversas plagas, feruntur. Sicut enim illis modis si agerentur ignifera particula, una alterius motum potius inhiheret, quam juvaret atque intenderet; quatenus patum impetus sibi promittere possunt ab alijs reflexis in motu suo turbata: Ita posteriori hypothefi non patum favere videtur ejusdem ignis vis rarefactoria, expansiva, dissolutoria &c., quam ab intra ad extra tendere, diversa suadent. Ex quibus intrapresentiarum sufficient pulvis nitrarius, aurum fulminans similiaque cum explosione ignem concipientia, quantum sane particula per hunc à centro ad peripheriam feruntur, hinc superiora æquæ ac inferiora & lateralia repagula, si æqualem resistenciam hæc præstent, cum impetu diffingunt ac rumpunt. Imò ipsa ignis flamma à pabuli sui crassiore parte, tanquam à centro, ad cunctas plagas se æqualiter explicaret, & non tam in conum ascenderet, quam sphericam figuram indueret, si materiam modo ubique proportionatam offenderet, ut exemplo candelæ evincitur: Cujus flamma ideo tantum superiora petit, quod pabulum suum seu sebum, calore ignis valde rarefactum, hinc aëre levius redditum, & ab hoc undiqueque æqualiter pressum sursumque coactum sequatur: cum eadem flamma mox deorsum inclinet, si alia extincta, fumans tamen adhuc, candela ipsius parti inferiori ac laterali admoveatur, mox enim ad exhalationes hujus pinguiore, quæ fumum constituunt, deflectit, eamque denuo accendit.

§. 15. Quibus suppositis summæ ad Ignem perpetuandum atque conservandum pabuli necessitatis ratio evidens fit. Eo ipso enim dum ille nihil aliud, quam sui consumptio ac extinctio est & in suis natalibus, quasi perit, quatenus in nullo concreto sine hujus dispendio ignis generatur seu accenditur: huic semper præsto esse debet talis substantia, quæ particulas, dissipatis & expulsi succentrantes, continuo & facile suppediet, id est, sulphurea aut de sulphure multum participans. Negari equidem haud potest, præter particulas sulphureas seu bituminosas, aqueas, salinas & forsan terreas quoque per ignem dissipari: hæc tamen in ignem minimè revera faceffunt, multò minus hujus pabulum dici merentur, cum hujus potius activitatem non leviter obrundant, quatenus nempe à calore ignis accensi agitate ac propulsa maximam fumi portionem constituent, ita ut, cum non æquæ ac sulphureæ penitus dissolvi & absorberi valeant, ultra hujus spheram delatæ aut in rorem aqueum, aut cum parte exhalationum sulphurearum in fuliginem ab aëre crassiore præcipitentur & cogantur.

§. 16. Unde illis, qui acidum igni materiam suppedicare huncque nihil aliud, quam motum particularum acidarum volatilium velocissimum esse, sibi & publico persuadere satagunt, idè quod plumbum, corallia, antimonium &c. per calcinationem pondere notabiliter augeri observentur, Ligna pabulum igni commodum suppediantia, per distillationem spiritum acidum fundant &c. vix adeò simpliciter assentiri possum: anceps adhuc hærens, an acidæ aliæve salinæ ex lignis aut carbonibus per ignem exhalantes particula illæ ipsæ sint, quæ ignem forment? Sicut enim sal illud acidum, quod cum

bituminoso magmate in sulphur commune degenerat, dum hoc accenditur, ignem aut flammam minimè, sed stigma acidum, quod Spiritum sulphuris appellamus, constituit, bituminosa saltem sulphuris parte deflagante ac in flammam abeunte, ita reliqua, quæ pabulum ignis observantur, saltem ratione substantiæ pinguioris, non verò salinæ aut acidæ, tales existunt.

§. 17. Quoniam verò particula hæc ignivomæ motum suum rapidum, juxta Epicureos, sibi congenitum non habent, quatenus scintilla sæpè parva in magnam sæpè incendium explicatur; id est illæ, sibi relictæ adeò turmatim erumpere & obvia quævis tanto impetu perrumpere nequeunt: morose quodam universali, sublumari, eas agitando necesse est, quem sanè aerem, tanquam fluidum proximè ambiens, esse inde augurari convenit, quod is perpetuo vertetur motu, ac sine ambientis hujus influxu nec accendi, nec ardens conservari queat. Quem aeris equidem ad ignem constituendum influxum licet Philosophi, si nominatos Epicureos excipias, ferè omnes concedant, imò hunc animam ignis pronuncient; dissentientes nihilominus maxime in æthiologia & modo agendi determinando, seu habitudine aeris ad ignem declarandam, deprehenduntur, quatenus eorum alij ventilando, id est fuligines absorbendo ac dissipando tantum, huic inservire, alij eundem materiæ quandam portionem ipsi simul subministrare, autumant.

§. 18. Prioribus mox dubium mover Machina pneumatica Boyliana, in cujus recipiente vase, si aer ex illo fuerit exantlatus, lucerna, candela, pruna &c. citius, quam si idem aere adhuc repletum, expirat: manifesto indicio, non à proprijs fuliginibus illa suffocari, aliàs siquidem brevioris durationis in vase aere pleno, quam in vacuo, illorum foret flamma & ignis, utpote quorum illud, propter aeris recessum, plus spatij excipiendis efformationibus suffocationibus concederet, potissimum cum pruna quoque æque celeriter vivacitatem suam deponat, cujus tamen fuligines paucissimæ vixque proportionatæ videntur pro violentia ejusmodi inferenda. Cui accedit, quod etiam sub ipsi primis ignis incunabulis, & ubi scintilla parva in laudorem flammam explicari debet, id est, ubi fuliginum fecernendarum turgescantia nondum adeò urget, plus nihilominus aeris, aut saltem hujus vibratione concitatore atque impetuosiore, per folles v. g. præstanda, opus sit, ac postquam incrementum aliquale igni contigit,

§. 19. Qui deinde aliquid substantiæ aerem igni contribuere putant triplicis denuò existunt hypotheseos: quarum prior spiritum quandam subtilissimum, pinguibus & oleosis inhabitandi similem, altera Nitrum, tertia spiritum quandam Nitro-aereum, seu igneam in aere hospitari vult; hæc quorum concursu ignem modo invisibilem, modo mutuum, modo nullam pronunciant. Verum ratione prioris, quam Bærserus proficitur, Spiritum illum oleaginosum equidem assertum, nondum tamen probatum, adeoque nec reprobationem urgere, judicamus: an Nitrum vel integrum quæ plurimum neoteri-corum sententia, vel Spiritus nitro-aereus, seu nitrosus volatilis aeris insit, insequenti dissertationi ventilandum deferro. In præsent indicasse sufficiat, per experimenta illa, quibus Nitrum, vel spiritum nitrosus aeris, cujus ad ignem formandum tanta creditur necessitas, statuminare ac defendere conantur, non nisi hæc tantum concludi posse, (1) Nitrum sulphuri commixtum, huic inter deflagrandum aliquid ejus præstare, quod aer ipsi præstat; (2) Simili forsan ratione utrumque horum idem agere: Aerem autem vel Nitrum

Nitrum, vel hujus aliquem Spiritum igneum, sibi intertextum gerere, ac hujus virtute similem aut eundem cum Nitro in alijs concretis, adeoque in sulphureis etiam cremandis, effectum producere, per hæc non magis inferre licet, quam identitatem, aut partium integritatem de cæteris, quæ forsan in uno tertio conveniunt, concludere velle,

§. 20. Notissimas esse suppono congelationes aqueorum artificiales, quas præter Nitrum cum Sale communi, Sale ammoniaco &c. alterutro horum nivi commixtis adornare, sicque aerem gelidum in formanda glacie imitari, licet, idque eò fecit: si per Experimentum Florentinorum magnam hanc aliquid Spiritus vini adpargas, quis autem ex hoc phænomeno adeò temerariè colligeret, aerem Vim refrigeratorem atque congelatorem à sale, sale ammoniaco, Nitro, Spiritu vini, aut horum aliqua parte, petere, vel eandem ratione horum exerere? Spiritus urinæ urinosus rodit metalla, quod Spiritus Nitri, Vitrioli & quævis acida præstant. E. Spiritus urinæ fovet acidum, aut acida illa flagmata de urinoso participant: quorum neutrum nemo sanæ mentis largietur. Pariter ille quàm pessimè inferret qui per putredinem, flammam, attritionem, calorem ac ignem, adeoque unum eundemque effectum produci observans, atomos putrilaginosas, urinosas &c. flammæ vel attritioni, aut contra, subesse, argumentaretur, quamvis tria hæc, quicquid in hoc genere agunt, idem, eodem modo id est, motu, agant. Affererem E. potius, aerem aque ac Nitrum, quicquid ad ignem producendum aut propagandum conferunt, motu præstare: ut proin non opus sit, Nitrum, aut hujus aliquem spiritum in aëre piscari.

§. 21. Aërem quippe, quo concitatore motu fertur, eo commodiorem & aptiorem ad ignem accendendum & propagandum eum existere flabellorum æque usus ac ventus comprobant, ita quidem ut his sedatis aut remotis illius fervor atque activitas mox remittat: motum proin aëtis auctum ignem augere, moderatum eundem conservare concludo, vel eum ad materiam combustibilem adigendo, vel hanc igni adducendo, vel sulphur calefactum, instar menstrui universalis, atterendo atque dissolvendo. Posteriores hanc agendi rationem itidem proxima declarabit dissertatio, ignem autem substantiæ inflammabili aëris vibratione atque tendentia appellari inter alia successiva granulorum pulveris pyrii, in eadem serie constitutorum, evincit explosio ac incendiij à proximi pariete ad proprium non raro adificium propagatio: Sicut pabulum igni aërem subministrare in lucerna ardente conspicuum sit, ubi oleum seu pingue linem calore resolutum ac interiori elychnij parte ad hujus fastigium eique viciniorem aërem, ignis actione rarefactam per elasticitatem aut gravitatem suam, haud secus ac Mercurium in Barometro, vel aquam in antlia, assurgere facit. Pari & eodem ferè modo nitrum sulphureis concretis combinatum horum deflagrationem juvat, motu scilicet suo, quem ab igne ambiente actuat, in hæc exierit. Sub illorum enim contactu cum impetu ac explosione quædam, velut flatus è folle aut totidem quasi Æolipilis, & ita quidem prorumpit, ut massam illam huc illuc agiter & sæpè extra vasa cum strepitu notabili & detonatione projiciat: hinc sulphur calefactum dissolvitur, ignis circum circa accensus in motum celeriores concitatur, ipseque cum aëre in corpus subjectum, hocque in illum, impetuosius adigitur, adeoque aëris motui hæ Nitri explosiones & crepitus aliquantum succenturiantur, Aer autem haud materialiter, sed efficienter duntaxat, ad ignem forman-

dum & perpetuandum concutit.

§. 22. Atque hic ignis præcipuus est, qui potissimas Pyrotechniæ operationes peragit, quamvis nec cœcum seu non micantem, nec solarem, chymicorum officinas omnino exulare, ijs, qui hæc visitare non detrectant, constet. Illius fomites, atque pabula diversa observamus, inter hæc tamen frequentioris usus Carbones, verge ables, lignis ipsis idè anteponendi (1) quod particularum igniterarum utpote paucioribus heterogeneitatibus implicatarum, in his & per hos, aqua hior sit, adeoque eorum ignis facilius moderari, hujusque gradus accuratius mensurari queant: (2) quod ob eandem rationem ignis eorum potentior, quatenus horum particula à nullis, aut certè paucis, aqueis obruuntur & obtunduntur: (3) quod spiritus lignorum acidus, quem deflagando eructant, res quibus ita immediate magis applicantur variis modis, præter intentionem atque expectationem artificis immuret, alcalia verbi gratia, in salsa transmutando: ac (4) quod ignis lignorum sæpius cum strepitu & explosione erumpens vasa, quæ lambit, frequentius forsan rumpat. Quod si tamen carbonum delectus conceditur, præferuntur sagi simileve quernis, utpote in quibus acidi salis reliquæ ubiores calorem inæqualem, rebus, verò tractandis vasisque suspectum pariter subministrant.

§. 23. Non raro tamen carbonibus vegetabilium substituantur cespites bituminosi, verbi gratia, in Germania inferiore, ubi horum abundantia lignorum defectum supplet. Imò interdum illi haud satis potentes censentur, pro ignis gradu desiderato supeditando, verbi gratia, qui ad duriorum metallorum liquationem aut emolliationem requiritur, quemque fossiles tantum præstant, quo facit, quod *Ureessvoych in the Gonde Leuv* afferat, acetum antimoniij non nisi carbonibus mineralibus obtemperet. Verum non periculosum saltem, sed suspectum pariter, horum usum censeo, quatenus ab explosivis eorum eructationibus vaporum itidem rupturæ & concretorum insignes alterationes, metuenda.

§. 24. Eidem igni micanti chymico inserviunt olea nonnulla expressa, scilicet sem. Lini, raparum & olivarum lampadis furnum flamma sua actuantia. Quibus sordium evitandarum causa egegisse, succenturiatur Spiritus vini sufficienter rectificatus, flammam purissimam, penetrantissimam atque æquabilem maxime constituens: ita quidem ut minor quoque hujus quantitas idem præstet, quod major dictorum oleorum, utpote totus igneus, adeoque præcijs ejus non parum illius activitas compentetur.

§. 25. Non micantis autem nomine venire solent simus equinus, thermæ naturales & calx viva: quorum illis in digestionibus, hæc in destillationibus quibusdam utimur: non saltem, quod alterius loci, pro destillandorum particulis, ratione terrestritatis suæ, discontinuandis, & acore illorum per salinam suam substantiam imbibendo & præcipitando; sed ut suo simul actu, in quem ad contactum aquosæ humiditatis erumpit, illorum spiritus ac salia volatilia exagiter & in excipulum transferat. Quale quid in spiritus urinæ & salis armoniaci destillatione experimur, dum urina aliquantum inspissata aut sal armoniacum cum aqua solutum calci viva affunditur capitellum cucurbitæ mox adaptatur, sicque spiritus desiderati, absque ullo alio calore, colliguntur. Spectat huc *Nobilissimi Wedelij* encheirisis, pro salibus volatilibus vegetabilium per solam putrefactionem, absque furni igne, sublimandis, quam curioso satis tractatulo amicis æque ac alijs communem esse

voluit. Pariter huius loci videri posset, quam alias igne saltem aut certe non sine igne adornare solent; spiritus vini rectificatio, solo sale tartari aut cinerum clavellatorum nihilominus peragenda: nisi eam alteri cuidam occasione reservassem.

§. 26. Ignem tandem solarem seu cœlicum quod spectat, hic digestionibus atque evaporationibus seu exsiccationibus frequentius, rarius destillationibus, inservit. Sunt tamen, verbi gratia, Poppius, Bartolæus, Febvre &c. qui radijs solaribus speculo ustorio concentratis calcinationes quasdam solent adornare, verbi gratia, Mercurij & Antimonij, quas cœlicas, phycas & magicas appellant: hunc ignem plus longe, quam sublunarem in perficiendis & exaltandis naturalibus præstare credentes, dum verbi gratia, Orthelius mediante illo hæc austerâ & serâ sua cruditæ exui atque ad suavissimam maturitatem deduci asserit; sine dubio, quia homogeneous magis hic est, hinc nec salia peregrina concretis adeo facile imprimit, quod à sublunaris pabulis semper metuendum. Illud interim Febvre concedere haud possum, quasi ignis foci antimonium per se calcinando cum ponderis imminutione tantum emeticum, solaris autem diaphoreticum, cum augmento notabili, illud reddat: Cum etiam carbonum ignis utrumque præstet, pondus autem ejus an radij solares augeant, nec credere nec negare audeo, huius phænomeni nullam adhuc experientiam habens.

§. 27. Sicut autem applicatio caloris decentis à proportionata ignis quantitate dependet & magna ignis regiminis potentia observatur, ac à *Moorhof. de Transmutat. metall.* per diversas observationes deprædicatur: Ita ignis & caloris gradus quatuor constituuntur, singuli tamen suâ latitudine gaudentes. Moderantur hi vel ignis ipsius vim augendo & imminuendo, vel eundem objectis diversimodè applicando: Illud duplici ratione præstamus, sc. aut pabulum, aut aerem, moderando, hoc per variationem vasorum ab igne distantiam.

§. 28. Effectus tandem ignis chymici quod spectat, testantur hi de sua causa, id est, per particularum suarum motum varium diversissimas operationes chymicas is perficit, corporum ipsi expositorum partes variè commovendo, hasque modo divellendo, modo combinando, in destillatione, fusione, exsiccatione, ut digestionis, fermentationis & putrefactionis, igne & calore externo interdum adiutorum taceam. Motu E. omnia dum in concretis, quæ ipsi exponuntur, exequitur, haud mirandum, quod idem ignis in horum diversis, eaque interdum planè sibi contraria, producit phænomena, dum verbi gratia, metalla liquat, salia coagulat, lutum exsiccatur, cetam fundit; quatenus hæc non per potentias distinctas agit, sed unam eandemque, quam motui in acceptis refert, metallorum, ceræ &c. partes homogeneas divellendo hæc ad fluorem deducit, aqueam autem humiditatem à salibus ac luteo expellendo hæc inspissat, id est, pro varia objecti textura ignis motus s. activitas determinatur: Quam tamen determinationem non parum immutat aeris accessus atque exclusio, quorum hæc ex vegetabilibus carbones, ille cineres producit: cujus diversi phænomeni æthiologiam pariter proxima forsitan supeditabit dissertatio.

§. 26. Pabulum moderatur, aut huius substantiam immutando; quatenus carbones fossiles intensiorem reddunt ignis activitatem, vegetabiles remissionem, quos excipiunt ligna, radij solares &c. aut ejus molem & quantitatem augendo, id est, plures vel pauciores carbones supponendo, modo uno, modo duobus vel tribus clychnijs lampadem

instruendo. Aere verò mediante gradus ignis variant, si copiosius vel parcius iste admittatur; sive per spiracula ordinaria, sive per ostiola, per quæ carbones immittuntur, aut cineres extrahuntur hoc fiat per distantiam vasorum non illud saltem spatium intelligendum venit, quod carbones & retortam verbi gratia, intercedit, quodque pro carbonum copia diversa variat: Sed attendendum pariter, an ignis vasa immediatè lambat, an aliud quoddam corpus interjectum ejus vehementiam aliquomodo refranet? Ille ignis apertus communiter dicitur, & ignem rotæ, reverberatorium s. suppressionis includit, imò hic spectat, si corpus, quod destillationi aptum immediatè super prunas per ostiolum furni, mox ocludendum, injiciatur, ut fumus seu vapor, vi ignis elevatus, in rostro seu canali longiore, lateri aut summitati fornacis infixio & vase recipiente munito, sensim in liquorem condensetur, qualis erat fornax, quam Londini apud Drebbelium *Schroderus* se vidisse perhibet, quamque *Glanberius* prolixius describit. Corpora verò interjecta sunt vel Capellæ vacua, vas destillatorium immediatè recipiens, qualem ad rectificandum petroleum nonnulli commendant, quæque rectificationi olei vitrioli quædam necessaria est: vel capellæ, cineribus, arena aut limatura Martis repleta, quæ balneum siccum audit, vel ahenum aqua scatens, ac maris seu Mariæ balneum dicitur: vel idem aut simile ahenum lamina cribriformi coopertum, pro vaporibus transmittendis & vasi destillatorio communicandis, quod balneum vaporis vocant.

§. 30. Imò præter hoc effectus desideratos non raro alius accedit, odorem atque saporem, forsitan etiam virtutes objecti enormiter depravans & vix ulla arte sufflaminandus aut eluendus empyreuma scilicet cujus productionis rationem duplicem auguror, partim texture immutationem, partim novarum & heterogenearum ab igne particularum accessionem. Illam probabilem reddunt varia producta chymica, quorum sub hac forma inexistantiam nemo sibi persuadere poterat, verbi gratia, Spiritus sulphurei, blandissimo calore educti, empyreuma nihilominus indelebile spirantes: hanc autem suspicari jubent, quæ de ponderabilitate ignis & flammæ à *Boyle* varijs experimentis fuerunt asserta, quæque *Borrichius Act. Hafniens.* vol. I. cap. 71. de calcis vivæ recentis oleo crasso & subscrito, item de liquore nigricante, post destillatum oleum per spatium menstruum vi ignis continuata, extillante, refert.

De Aëre.

§. I. Quemadmodum inter Instrumenta Chymica in *Dissertatione antedecæna* Aerem retuli ita mirari nunc contingit *Billichium*, Scriptorem alias eruditissimum, quod, Salam suum contra Laurenbergium defensor, Aerem modò causæ instrumentalis rationem haud obtinere asserat; quoniam non sit in potestate agentis; modo mensuris nihilominus eum accenseat, ideo quod cum salibus deliquescat &c. Siquidem ut illa mea haud faciam, quibus argumentorum horum vim *Arnold. Schroderus* in *defensione* nominati *Laurenbergii* quæst. I. enervavit, ipsa experientia quo idiana pro Aeris activitate Chymico-phycâ prolixè loquitur, nemoque sanæ mentis qui Chymicarum rerum cognitionem non tam ex cerebello proprio, quam ex manuali operatione & autopsia, sibi comparavit, negabit, fluidam hoc non minus, ac Ignem, Aquam &c. instrumenti Chymici munus gerere.

§ 2. Aërem hunc observamus duplicem, internum atque externum; quorum ille, quamvis, ut miscibile & in sensu Peripatetico, concreti aliquam partem integrantem seu elementarem haud constituat, poros tamen hujus, ut heterogeneous quoddam fluidum, subit ac opplet, id est, reliquis hujus minimis (pissioribus, seu solidis, seu fluidis, interjicitur horumque spatiola occupat, hic verò corporum naturalium periphaziam saltem contigit atque ambit, & atmosphæra communiter audit. Quamvis non raro observetur, internum Mixtorum aerem vix adedò firmis sepimentis ac repagulis à contiguitate externi muniti, mutuumque omne ijs denegari commercium, quia qui modò ambiens atque extrinsecus dicebatur, mox penitiores hujus vel illius corporis recessus subeat horumque incola evadat; contra, qui illi quasi conatus, ad exteriora prorumpat, & dum ab hoc solidiores quasdam particulas secum rapit, ratione harum distinctas & individuales cujusvis Concreti atmosphæras determinet. Quatenus ambiens aër Ignem v.g. non saltem varijs modis exagitat, sed nimis quoque hujus se immiscet, Aquam idem subingreditur, ex qua postmodum denuo exhalat, sensibiliter æque ac insensibiliter ab animalibus aura inspiratur, expiratur etiam cum hac substantia acrea in horum corpore congesta, ut illa nunc transeam, quæ *Illustris Boyle in Experim. phys. mechan. continuat.* 2. de aëre factio, i. e. è varijs corporibus naturalibus, exhalante, hujusque paradoxis effectibus differit, pluribusque experimentis declarat.

§ 3. Utriusque E. hujus aëris in operationibus mechanicis magnam esse energiam, cum mihi nunc probandum incumbat, suppono ex *Disert.* 3. Ignis, tanquam Instrumenti chymici potentioris ac frequentioris, animam aërem esse, quemcunque demum hujus illam actuandi modum sibi quis concipiat: id est, cui cum *Rege Alphonso Clav. sapient.* aerem ignem grossum appellare religio est, illum certè experientia hunc motorem atque modificatorem minimorum sulphureorum seu ignivomorum ordinarium magisque catholicum profiteri cogit, ita quidem ut pro diversa hujus fluidi perpetim moti & actuantis admissione vel exclusione, raritate ac densitate, ignis vis seu activitas modò intendatur, modò refrænetur ac planè suffocetur. Imò ratione influxus hujus variantis unius sæpè ejusdemque concreti verbi gratia, vegetabilis ab igne exagitati particulæ modò in luculentam & micantem flammam, tanquam fumum resolutum & rarefactum, si scilicet sub dio libero accendantur, modò in fuligines seu flammam condensatam, in liquorem acidum & oleum crassius coagulabilem, in vasis clausis, abeunt: & posteriore hac ratione tosta carbohes, priore verò cineres, post se relinquunt, ita quidem ut illi intra hæc repagula ignis torturam ad plures annos sine sui in cineres conversione, sustineant. Et flamma quæcunque v. candelæ, si tali modo imposito vitro, ut nullus, vel paucus tantum, aer illam ferire queat, extinguitur seu suffocetur, fumum format, quem eandem flammæ naturam faciliè reassumere, modo aer liberior admittatur, per quotidianas & pueriles quoque observationes, constat.

§ 4. Simili ratione cum Nitro res se habet, quod cum carbonibus, antimonio, tartaro, aut sulphure igni luculento commissum copiosos cum strepitu notabili eructat flammæ, ejusque maxima portio suâ harum contusione in auras abit: retortæ verò tubulatæ si eadem mixtura decenter injiciatur, flamma hæc propter aëris sufficientis aditum interclusum, in fumum rutilantem cogitur, qui in excipulo stigmati acidî, spiritus nitri aut Clystus vulgò dicti,

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

consistenciam induit: hoc est, una eademque Nitri substantia, ab igne dissoluta, nunc flammæ, nunc fumi, recipit speciem; pro variâ minimorum suorum combinatione atque textura, quam ab aëris interfluentis motu, modò rapidiore, modò tardiore, acquirit. Tandem concreta resinosa atque oleosa, verbi gratia, terebinthina, succinum, mastiche, olea, Spiritus vini &c. quamvis sub aëre libero ab igne exiliore exardescant, & tota ferè in flammam facessant, in vase tamen clauso ab intensiore quoque igne in vapores seu fumum saltem resolvuntur, qui in recipiente, pariter contra aëris accessum munito, in sal volatile, phlegma acidum & oleum condensantur.

§ 5. Ast quò immediata magis in contra naturalia, eaque vel combinanda, vel dissolvenda aeris elucescat activitas, constetque, proximi quoque instrumenti chymici titulum optimo jure huic competere: una vel altera operationum producenda erit, cujus, si non formalitatem, certè notabile moderamen, aeris influxus præstat, quatenus sc. mixtis, aut exponendis aut expositis, horumque minimis, determinatos motus imprimit, & per hos illorum texturas notabiliter alterat.

§ 6. Inter has primum locum teneat *Fermentatio*, quæ cum sine motu ac molis dilatatione neutriquam fiat, id est, ejus formalitas in concreti texturæ naturalis dilaceratione seu divulsione consistat, nullum quoque inter corpora sensibus simpliciora, præter aerem, observetur, quod in se magis dilatabile ac condensabile, semperque in motu existat; sit; hunc sane motorem motui illi præstando satis adæquatum esse, quàm probabile sit, potissimum cum aeris externi varius impulsus eum variè moderetur, denegatus verò illum modò in totum, modo in tantum, sufflammet ac turbet, atque hoc quidem in fermentationibus æque, quas naturales magis, quam illas, quas artificiales potius vulgus philosophorum pronunciat. Sic v.g. Aer perspirales vegetabilis fistulas adductus illiusque poris inexistentis & quasi conatus, quia virtute elastica nunquam destituitur, licet intra angustiores hos cancellos compressus magis videatur, vegetationis & maturationis negotium aliquantum inchoat, ipsi tamen perficiendo: nisi ambiens aer suppetias ferat, minus potens existit. Ab hujus enim temperatura atque tono diverso, id est, raritate ac densitate calore atque frigore horumque reciprocatione, quam tempus anni atque diei præstat, idem aër fructuum v.g. horariorum, intestinalis patitur, ac aer thermometro inclusus, quatenus uterque pro diversa ambientis fluidi conditione modò rarefcit, modò condensatur; in vegetabilibus verò horum particulæ adedò diversimodè moræ asperitatem suam deponunt, hinc loco austeritatis suavem tandem dulcedinem fructibus inducunt.

§ 7. In vegetabilibus conquassatis horumque succis expressis aut decoctis res manifestior est, utpote quæ celerius ac impetuosius longè, ac si parenchymati ac pelliculis suis, tanquam vasis aut phiolis accuratius obturatis, adhuc fuerint inclusa, si convenientem atmosphæra texturam atque temperaturam experiantur fermentescunt, i.e. cum sensibilis caloris conceptione turgescunt & in majorem longè molem attolluntur, quatenus particulæ illorum aereæ non saltem majorem libertatem spatiumque sese expandendi hac ratione nanciscuntur, sed aeri quoque externo commodior conceditur aditus, ac internum exagitandi suggeritur occasio. Dum hos ipsos fructus, citius maturefcere deprehendimus, qui ab avibus similibusve animalibus, commorfi aut immaturiiores decerpti fuerunt: eo præprimis, quod per tunicas suas laceratas ac pedunculos confractos plus aeris recipiant, quam integri ac

C 3 arbo-

arboribus adhuc continui, Uno verbo fermentatio hæc fructuum maturativa simili modo se habere videtur ac cerevisia recens, mustum alique succi & massæ fermentandæ, quæ accuratius munitæ seu intra vasa arctius clausa segnius & difficilior fermentescunt, quam aeris libero expositæ: ita quidem, ut intra machinam pneumaticam Boylianam succum rubi ideæ, item mustum, per plures dies integros & immutatos, elapso anno in loco satis calido, me conservasse meminerim, alia horum liquorum portione, sub aura libera ejusdem conclavis, mox per fermentationem fatiscere. Ut taceam, quod pistoribus, Zythopœis similibusque mechanicis notissimum, pro varia atmosphæræ habitudine fermentationum successus variè determinari: ut sub aura tepidiore hæc celerius atque impetuosius contingant, sub frigidiore sufflamineantur & extinguantur, quemadmodum ideo hybernæ tempestatem ad fermentandas res minus aptam, æstivam magis, potenter observamus.

§. 8. In *Putrefactione* ærem efficiënter concurrere, equidem negat *Mariotte, de la nature de l'air*, putrescere tamen in ære apërto fructus, sanguinem aliaque citius, ideo quod eorum substantia facilius exhalabilis in hoc commodius, quam in ære limitibus angustioribus coercito, inveniatur receptaculum; At, quantum mihi equidem judicare licet, ejus experimenta consequentia illa, quam sibi promittunt, vix gaudent, quatenus ærem paucum & occlusum putredinem aliquantum sufflaminare, liberum verò eandem magis adjuvare, tantum evincunt, neutiquam tamen, quod asserit, probant, ærem angustiorum vasorum plus quam receptaculum ære vacuum, putredinem arcere. Aër enim est, cujus partes, nobis ut ut insensibiles, se in corporum poros insinuant, motuque & vibratione sua mobiliora minusque implicata illorum minima expellunt & secum rapiunt, aut harum situm & figuram, hinc totius texturam, ita immutant, ut ista novas & pristinæ formæ incongruas qualitates acquirit. Unde fit, ut quæcunque æris contactum arcent aut ejus motum coercent, concreta, in se alias summè corruptibilia, à putredine præservent: quatenus aquis aut terræ profundius immersa (quo aër externus non adeò commodè penetrare valeat) tardius, partes verò eorum, quæ terræ superficie propinquiores, aut aquis non semper teguntur, facillimè ac brevi putrescunt, & colophonio incrustata, butyro oblita, oleo cooperta, aut in vase recipiente, quod per modò nominatam machinam pneumaticam omni ære exhaustam, conservata vegetabilia æque ac animalia corruptionem vix, aut post longius demum tempus, experiuntur, quamvis de piscibus contrarium testetur experientia, facillè in vacuo quoque putrescentibus. Pariter *Dominus Boyle* per diversa annotavit tentamina ærem compressum in quibusdam vegetabilibus, verbi gratia, Tulipa, Consolida regali &c. putrefactionem ac mucescentiam, quam in ære libeto ac rariore contrahunt, impedire, ita tamen, ut temporis progressu à quantitate æris condensati varia corruptionis quoque quantitas in alijs dependeat diversa: ut illud denique mittam phænomenon, quo ærem calidiorem & humidiorum putredinem accelerare, frigidiorem eandem sistere, quam uberrimè liquet.

§. 9. Præterea *solutiones* per menstrua varia adornandas æris habitudo particularis diversimodè modificat, quatenus per machinam illam digesticem, ærem inclusum comprimentem, quam modo nominatus *Dominus Boyle* intimavit, prolixius verò superiore anno delineavit ac emendavit, *Ingeniosissimus Pa-*

pinus, Tincturas etiam tales, quarum copia alia adeò facillè fieri nequit, ex concretis per menstrua appropriata evocare licet, & brevi quidem satis tempore, verbi gratia, sub directione *Dominici Sclare* intra paucas horas ex sale tartari cum spiritu vini tantæ acrimoniæ tincturam, qualem intra mensem per digestionem ordinariam vix aliquis compararet, item tincturam succini cum eodem spiritu vini, officinali longè potentiorum.

§. 10. Quibus contrarium effectum testantur solutiones in ære ordinario clauso ac in vacuo seu magis rarefacto tentatæ: quarum illæ tardius, hæc tardissimè, quæ verò in ære ampliore, facillimè atque celerimè perficiuntur. Ita verbi gratia, cum spiritu salis armoniaci, in ære apërto, ex limatura cupri, intra sex vel septem circiter minuta notabilem, ac intra horæ quadrantem profundam & saturatam planè, cœruleitatem provocavi: in vase arctius clauso intra dimidiæ horæ spatium vix sensibilem, in Vacuo autem intra horam ferè nihil planè coloris idem menstruum induisse vidi. Donec aër externus per epistomium machinæ reclusum irruens menstruum dictum, hæcenus rarefactum, cum tanto impetu deprimebat, ut hujus quædam guttulæ rorulentæ exultantes in partibus vasis recipientis æneis in momento cœruleitatem contraherent, tingebaturque sub eodem æris appulsu superior primo liquoris pars colore lazuro ac intra tria vel quatuor minuta tota ejus compages.

§. 11. Haud repetam ex *Dissertat. 2. experimentum Grevy*, qui mixturam olei vitrioli atque anisi, sub aura patente facillè in resinam coagulabilem, in vacuo non adeò promptè sibi implicari testatur; nec qua ratione oleum terebinthinæ cum sale tartari ab ære communi in saponem cogatur, multò minus, quæ de offæ Helmontianæ, ex spiritu vini & urinæ parandæ, æris attendenda conditione eodem loco monui: confirmabo potius experimentorum horum fidem per simile & olim Londini in Laboratorio Regio à me visum phænomenon. Sc. destillabat *Dominus le Febvre*, dicti Laboratorij tunc temporis Præfectus, super Vitriolum quoddam venereum spiritum salis armoniaci, qui liquor, quamvis in recipiente limpidus & coloris aquei conspiceretur, talisque in aliud vas effunderetur, cum sedimento seu portione quadam substantiæ metallicæ, retortam simul transcendente, aere nihilominus postmodum in vase apërto superveniente, sedimento eidem venereo reffusus, cyaneum, & quidem in momento, induerat colorem, qualem mora diuturniore & aliquot, horarum sine aeris externi ingruentia, elicere haud poterat. Spectat etiam huc, quod Spiritus Nitri, spiritui terebinthinæ commixtus, sub dio libero citius longè quædam hujus dissolvat particulas, hæc sibi adaptet, quàm si intra vas recipiens, è quo aer probè exantlatus, eosdem liquores confundas, utpote qui post aliquot demum horas sensibiliter coeunt. Denique hic ponderare convenit solutiones metallicas, cum menstruis magis cortosivis instituendas v. g. ejusdem Cupri cum Aqua forti, quam *Do. Papin* equidem *Transact. Philos. Anglor.* Nu. 119. in vacuo segnius, quàm in aura patula, fieri perhibet, cum tamen contrarium successum propria me nuper docuerit, (ni circumstantiæ me fallunt) experientia; qua observavi, dictum menstruum seu spiritum Nitri, limaturæ Veneris affusum, hanc sub aere latiore impetuosè satis aggredi, potentius tamen longe intra excipulum aërè vacuum, ita quidem ut cum spumescencia insigni solutio hæc supra oras vitri, in quo continebatur, erumperet, tantillum verò æris denuo immixtum, mox in eandem solutionem ita vibraretur, ut hæc in momento subsidendo despumesceret, imò cum tanto impetu deprimeretur, qui

ejus

ejus notabilem portionem extra vasculum continens ad fastigium & latera excipuli machinæ elutriaret.

12. Præterea *Destillationum* atque *Sublimationum* quoque effectus aëris externi admittio atque seclusio non parum moderatur, atque immutat. Ne enim hūc revocem, quæ superius de ignis diversimodè applicati dispari successu recensui, quid notius est, quam sulphur sub campana, quam atmosphæra libere perflât, accensum maximam partem deflagrare & in stigma acidum resolvi, quod idem nihilominus sub vasis clausis in flores, sulphuris immixti pondus ferè æquantes, sublimatur, ex vegetabilibus aromaticis quæ per arenam destillantur, aqua & oleum empyreuma spirantia, ex observatione *Celeberrimi Boyle*, ope certi instrumenti, ab eodem *Exper. phys. mechan. contin. 2.* delineati, in vacuo prodeunt, ex eadem arena, suavissimi odoris. Nec repetere hic pigebit phænomenon illud, cujus olim jamdum aliquando mentionem feci. Nempe colchotar Vitrioli rubicundum, antequam aëream humiditatem absorbeat, in retorta figulina aut vitrea loricata, & excipulo conveniente instructa, igni reverberii committatur, hujus portio salina fixior, & alias oleum Vitrioli puniceum formans, ultimâ illius torturâ sub nebula albicantis specie propellitur, quæ tamen minimè in fluidam, sed in solidam & crystalliformem massam condensatur: quod si verò cementum, vasa hæc combinans, isdem refrigeratis tollatur, ita ut aura ambiens excipulum confertim subeat, crystallumque hunc lambat, illa mox hujus quandam portionem in nebulam resolvit atque attollit sulphuream & incautos penè suffocantem; moderate autem & successivè admissa totum illum crystallum in oleum obscurè rubicundum deliquat, quod faciliè tamen & ad leniorem calorem suam fluiditatem deponit. pristinamque spissitudinem & formam reassumit, nisi & hæc pernovi aëris appulsum iterum destruat.

§.13. Alcalibus depurandis quamvis in officinis Chymicorum ordinariè ignis & Aqua duntaxat minitrentur, illaque his mediantibus crebrius calcinata ac soluta ab omnibus heterogeneitatibus terrestribus ac unctuosius videantur liberata: ad puritatis tamen ac homogeneitatis ultimum fastigium demum evchuntur, si aëris quoque vibrationem ad deliquationem usque sustineant. Hinc sal v. g. Tartari, quod per crebriores ac repetitas ignitiones & in aquâ solutiones omni impuritate exutum censetur, si in aëre fluat, fæces ac sedimentum nigricans adhuc post se relinquit, tale, quod nullo igne consumi nullaque aqua elui poterat, sed soli aëris potentiaë separatoriaë cedit. Proin illud *Vigenerii de Aqua & sale* perpetui successus deprehenditur, quod in una istarum in aëre humido resolutionum, quæ per se fiunt, omnia salia & alumina se depurent magis quam in duodecim aut quindecim dissolutionibus, quæ per acetum aut alia similia dissolventia fieri consueverunt. Quamvis enim *Dom. Mariotte, de la Nature de l'Air* promptus largiar, non tam aërem, quam aqueos vapores huic innatantes, salia immediate dissolvere: Ille nihilominus, eosdem incredibiliter discontinuat ac vibrat. his, tanquam appropriatis menstruis. utitur illosque magis attenuatos longè aliaratione, quam si in aquam spissiore coagulati fuerint, impellit, i. e. motum impetuosiores iis imprimit, seu eosdem ad penitiora magis salium dirigit, ita quidem, ut v. g. oleum tartari per deliquium firmioris texturæ observemus, ac Lixivium salis tartari cum aqua paratum.

§.14. Transcam nunc, quæ de aëris potentia in concretis fixioribus volatilifandis præter *Helmontium* ac sæpius laudatum *Boyle of Volatiluræ* alii mechanici attenderunt, eam in salium solutorum in crystallisatione tantum nunc observaturus; quam in acidis, salis & Vitriolis frigidiôr aër præstat, crystallos vero productos tepidus conservat, calidiôr destruit. Contrâ gelidus al-

calia deliquat, eorum solutionem in crystallos diaphanos tepidus cogit, quos aër frigidiôr brevi denudè fundit, prout in salis tartari solutione experiri licet, cujus ad medietatem circiter evaporatæ portio notabilis circa vasis fundum in crystallos angulares, irregularis quamvis figuræ temporis tractu, per teporem blandum, facessit, sub liquore proprio aut in atmosphæra temperata soliditatem suam tuentes. Pariter salia cum aqua soluta in receptaculo aëre vacuo haud adeò faciliè, ac sub aëre libero, in crystallos abeunt, ut quemlibet, machinam Boylianam versantem, mechanica docebit.

§.15. Imò quemadmodum recensitarum hæctenus operationum mechanicarum successus diversâ ætheris conditio variusque aëris impulsus notabiliter variat atque moderatur, sic plures harum aque ac aliarum deprehenduntur species, quas sine præparatione illa præcedanea, quam idem aër subiectis præstat, frustraneo conatu tentamus: ita quidem, ut multi, non minùs ex Philosophorum cœtu, ac vulgi turbâ, aërem corporibus sibi expositis aliquid suæ substantiæ inspirasse aut tument: qualium phænomenorum catalogos prolixos passim videre licet, pauca nihilominus nunc indiguisse, sufficiat. Nempe observant communiter Metallurgi, nonnullas equidem Vitrioli & Aluminis mineras aquæ affusæ mox suam salsuginem concedere, alias tamen econtra non nisi per aëris aliquot mensum aut annorum contactum prædispositas & per incalcescentiam quandam maceratas, fertus suos eniti, ut nihil dicam de glebis seu terris sale suo exhaustis, quæ tandem temporis tractu ab aura circumfluente eodem specie sale de novo imprægnantur, sicut præter *Agricolam de re metall. l. 12. Erker, Bergb. l. 5. & Rocham de aquis miner. 6. r.* quotidiana testatur experientia. In præsentiarum scopum fieret *Magnesia* illa vitriolata, cujus sub *M. eræ Martis Hassiacæ* titulo *Dissertat. 2.* mentio facta fuit quæ sine prævia aëris digestionem ad aquam sibi affusam, nihil vitrioli deponit, nec igni commissa itagma acidum fundit: utrumque tamen liberè dimittit, postquam per aliquot menses istius incubationem sustinuit.

§.16. Denique & hujus loci erit, quod nonnullis mineralium fusionibus ac depurationibus aër crassus atque nebulosus impedimento, cœlum sudum & serenum adjumento sit, v. g. Epatis ac viri Antimonii confectio-ni, quæ sub hoc colorem ac pulchritudinem splendidiorem, sub aëre nebuloso obscuriorem, hanciscuntur, quemadmodum de Epate antimonii *Nobil. Kerkringius in Basil. Curr. triumph. antimon.* perhibet, esse quædam anni tempora, quibus si hoc paratum cum menstruo debito præcipitur, hoc alio prorsus imbuatur colore aliisque præstat viribus, quam id, quod alio tempore confectum est. Quam enim in his simi ibusque operationibus chymicis adornandis advertere jubent, occultiore astrorum influentia dubia adhuc est, vel quod experientia eosdem sæpè effectus diversa sub constellatione sistat, dum optimus v. g. *Regulus antimonii* quovis tempore, modo reliquæ operationis circumstantiæ probè observentur, paratur.

§.17. Ex quibus cunctis abundè satis aëris illum concursum Instrumentalem, sine quo chymicis operantibus haud licet constare puto: cujus tamen ætiologiam seu influendi modum explicari si desideres, non unius, sed varii, genii deprehendes autorum super hæc theorias. Sunt enim primò Peripatetici, qui calori, frigori, humiditati, & siccitati, adeoque aëris qualitatibus primis, omne hoc attribuunt: ast quia calorem aër omnem ab extra, seu à sole aliisque calefacientibus, recipit, hincque ille ipsi vix congenita, sed accessoria ac mutuatitia tantum, affectio est, aër quoque interdum talia præstat, quæ calor sine aëre, cujusunque gradus agere haud potest, v. g. fermentationem, fixorum nonnullo-

rum volatilisationem; qualitas hæc agentis adæquati nomen vix merebitur. Quoad frigus, licet ærem frigidum per se existere, ex dictis supponamus, illa tamen phænomena, quæ frigoris productis analogæ creduntur, multum ab iisdem discrepant, v. g. glacies & salium crystalli, quatenus glacies sub æthere tepidiore deliquescit, salia neutiquam; imò nec illa, quæ frigoris immediati effectus habentur, tales existunt, v. g. condensatio, gravitati potius assignanda. Pariter quia nec humiditas æri essentialis, sed accidentalis saltem, est, utpote quam à pluviis frequentioribus, aut maris, fluminum atque stagnorum vicinitate recipit, moxque denuò deponit, ita quidem, ut, quamdiu sibi relinquitur, ad absorbendas potius & imbibendas aliorum corporum humiditates aptus observetur, quod non contingeret, si natura sua humidus foret; humiditatis effectus non tam æri, quam aqueis ipsi intertextis particulis, assignandi videntur. Siccitati ejus equidem, si præsto sit aliquid potentia concedi posset: verum quia hæc vix tale quid est, quod univoca actione in subiecta sibi exposita agat, sed ær partim corporum humidiorum particulas aquosiores motu suo exagitando expellit, partim per modum quendam relativum, i. e. partium suarum texturam, ad excipiendas & continendas illas aptus observatur, hincque siccus dici valet, nec huic tantum, quantum alias fieri solet, æris conditioni in phænomenis chymicis attribui debet.

§ 18. Deinde observantur alii, qui ærem in corporum dissolutione & combinatione chymica materialiter concurrere credunt, adeoque vel ratione nitri seu salis universalis, vel spiritus Nitro-aerei, vel particularum, à subterraneis corporibus, hætenus quidem ignotis, aut activis maximè, exhalantium, vel solis, reliquorumque planetarum emanationum, fermentationibus putrefactionibus, Viriolorum & salium è marcastis in glebis suis regenerationibus & productionibus ministrari. Quam tamen hypothesin, à multis equidem receptam, non omni ambiguitate destitui, superioribus annis in peculiari chartula monstravi, nec in præsentiarum in illam adhuc adeò simpliciter & ita descendere valeo, ut per eam Operationum Chymicarum, harumque phænomenorum universalium magis, quibus ær præest, ætiologias explicandas credam, quatenus quæ pro illa defendenda à Scriptoribus (mihi quidem innotescentibus) publicè prolata, aut ab Amicis his meis dubiis privatim hætenus opposita fuerunt, ab iis me omnimodè haud liberant, ut alia forsan occasione declaraturus ero.

§ 19. In præsentiarum illud saltem, quod proxima dissertatione promissi, paucis expediam, atmosphaeræ se. universali nec Nitrum, nec spiritum Nitro-aereum, à recentioribus quibusdam suppositum, inexistere: quamvis atmosphaeram hanc vel illam particularem nitri è certis terris exhalationes recipere & secum longius aliquando abrepere, negandum haud veniat. Quippe (1) si secundum *Tabulam smaragdinam* superius hic, sicut inferius & Nitri pater Sol ac mater Luna, locus vero natalis, aer esset, cur non omnis terra, sed illa tantum, quæ per se nitrosa, excrementis animalium, calce viva, similibusque salibus imbuta, ad aviculam hanc Hermetis capiendam æquè apta; Respondent, quia non quælibet harum congruo magnetismo turget, qualis ad apprehendendum & retinendum hoc minerale æthereum exigitur. Revero si determinatus magnetismus seu congruitas quædam certa ad illud alliciendum seu excipiendum necessaria est, cur nihilominus in tam infinita mixtorum generum Nitrum hoc aereum agere, iisque adeò varias & innumeras mutationes imprimere, concedimus, in quorum tamen tanta varietate magnetismus ejusmodi uniformis concipi ac demonstrari nequit? (2) cur ordinariè atmosphaeræ pars inferior tantum minimè superior, illud sal hermaphroditicum

fovet ac enitur? quatenus qui in nitro producendo & multiplicando laborant, operarii cumulos seu acervos illis terræ nitriferæ ulnis sex; vel octo vix altiores congerunt, imò ab inferiore potius, quam superiore, harum parte messem Nitri uberiores petunt ac recipiunt? Quo etiam illud *Mariotti* experimentum facit; qui terram nitrosam, ex qua Nitrum jamdum elixivatum, in contignatione domus quarta & superiore, aeri per duos annos exposuit; observaturus, an illa hic novo nitro imprægnaretur, frustraneo tamen cum successu, cum interim similis terra cellæ imposita notabilem ejus quantitatem recepisset: ita ut terram potius, quam aerem, nitri feracem esse mechanica credere iubeat. Potissimum quoniam, qui Nitro colligendo inhiant, terras ac murorum calce cémentatorum rudera ac pulverem cavearum subterraneum fornicibus insternunt, non ex aere, sed ex illarum atmosphaeris atque exhalationibus, salis hujus proventum uberiores sibi pollicentes: ac in stabulis, jumentorum similibusque animalium excrementis ac fimis obstitis & ab aeris appulsu immediato remotioribus, copiosius, quam in aliis patentioribus locis, eruitur Nitrum.

§ 20. Nec illorum commento satis ingenioso assentiri possum, qui, divisum terræ atque ætheri compingendo nitro imperium decernentes, ex aere spiritum seu saltem quendam igneum, quem *Nitro-aereum* appellant, tanquam partem quandam nitri activam magis, seu impetum facientem, pro hoc formando descendere & à terra absorberi putant. Quamvis enim admittatur, nonnihil aereum ad flammam quantuncumque, constituendam requiri, hoc tamen forsitan non ipsum aerem, sed tantum partem ejus magis activam subtilemque, esse, item, nitrum sulphuri admixtum ac pulverem pyrium in vitro aere vacuo & subter aquis satis promptò deflagrare, adeoque ad sui accensionem substantiâ igneo-aerea ab extra suggesta non opus habere, flammam à nitro deflagrante excitatam non à particulis hujus sulphuris consulari, nec sulphur in loco, aere vacuo flammam, nisi nitrum nisi ad mixtum fuerit, concipere: Cuncta tamen hæc pro spiritus seu particularum illius atmosphaeræ nitro-aearum existentia firmanda minimè sufficiunt.

§ 12. Quippe quod ær non tota sua mole præstat, illud forsitan ratione substantiæ ætheris seu materiæ subtilioris sibi intertextæ, aut per motum vibrationis agit: quod nitrum sulphure temperatum aut pulvis pyrius accensus sub aquis non extinguatur, ab hujus spiritu rarefactorio & expansivo habet, qui aquam expandendo spatium intra hanc sibi parat, in quo ab extra irruens aer, flammam submersam pari ferè modo ventilat, ac qui extra aquam constitutus, ut taceam eundem hunc nitri spiritum elasticitate seu ventositate suâ ignem in carbonibus ac sulphureis nitrarii accensum quasi sufflare. Pati, non tamen eadem, ratione dico, cum extra tubum illum, cui pulvis pyrius impactus, non adeò longe, ac si in aere libero hic deflagret, flamma prodeat, sed maximâ partem intra hujus cancellos coercetur: ut conspiciere commodè licebit, si in vase vitreo experimentum hoc adornes. Aquam verò simul notabiliter expandi hancque aerem externum subire, inde colligere poteris, quod illa intra pulveris pyrii deflagrationem majorem longè in molem efferatur, bullas amplas & copiosas projiciat, imò non rarò ultra oras vasis turgescat hasque elabatur. Ast in vacuo pulveris ejusdem pyrii grana accendi atque explodi vix adeò certum est, ac nonnulli sibi persuadent, quatenus frustraneos aliquot experimenti hujus successus *Experimentissimus Boyle of the difficulty of producing flame without Aer, Experim. 5. 6. 7. & 8.* testatur egoque aliquoties irritò conatu, aliis adstantibus, idem tenuavi.

§ 22. Dicerem proin, Aerem atmosphaericum operationes chymicas moderari horumque phænomena atque effectus variare partim sua gravitate, partim elasticitate

sticitate, partim fluiditate, ita tamen in eam una vel altera per plura horum attributorum atmosphæra vim suam exerat, v. g. in ignis productione atque perpetuatione it. putrefactione per elasticitatem atque fluiditatem; quam vero illius humiditatem nonnulli quoque hujus loci volunt, quasi per eam salium solutiones perficiat, in præsentiarum mittimus, utpote à vaporibus aqueis mutuam, adeoque insequentem occationi reservandam.

§. 23. Gravitationem aeris, Peripateticis paradoxam, ponderosis tamen, ab experientia maximè petitis, argumentis firmatam, prolixè nunc demonstrare, nec icopi, nec paginarum harum, angustiores limites concedunt: præprimis cum qui nostræ ætatis scripta physica solidiora legere non fastidiunt, de eadem vix amplius dubitare queant. Hac E. supposita, aer non poterit non concretorum particulas, spissiores æque ac fluidas minores atque leviores, sibi subjectas, gravitando deprimere, hacque pressione vel invicem, vel aliis corporibus, appellere & adaptare, v. g. aqueas salibus: quorum solutiones in atmosphæra parte inferiore idèb felicius, quam in superiore, succedunt, quamvis hæc vaporibus aqueis, v. g. sub pluviosa tempestate, maximè quoque turgeat; i. e. salia in cella potius, quam ædium fastigio, deliquescunt, sine dubio ob diversam aeris gravitatem, quam majorem longè in locis terræ vicinis omnes per multijugem evincunt experientiam. Ex quo pariter fundamento, seu pro varia aeris ad globum terraqueum tendentia atque pressura, mixtura olei tartari & terbinthinæ in saponem, olei Vitrioli atque anisi in resinam, spiritus urinæ & vini in coagulum &c. sub atmosphæra crassiore, v. g. in cavea pariter subterranea, commodius, quam rariore, hincque levior, facessunt. Idem confirmare videtur Machinæ Digestricis Papiinianæ, aerem ad varios gradus comprimentis, usus, quatenus acri per hanc impressum atque auctum pondus non tantum, ut superius annotatum, menstruum concretis extrahendis potentius impellit, hincque Tincturarum eductiones faciliat, sed ossibus & cornubus quoque animalium, lebei hujus instrumenti inclusis (ne reliqua hujus generis phenomena attingam) modò cum, modò sine, aqua affusa, scissilem ac edilem mollitiem inducit, corporibus his solidioribus humiditatem aut propriam, aut alienam, insinuando atque imprimendo.

§. 24. Ut proinde gravitatem hanc solutionum ac crystallisationum similiumve coagulationum, prout quidem ab atmosphæra adjuvantur, ætiologiam non immeritò suspicer, licet minimè solitariam, quatenus hujus fluorem pariter & elasticitatem, operationibus illis modulum suum conferre, rationi haud absonum videtur. At Elasticam aeris virtutem in specie & manifestius deprehendere condigit in fermentatione atque putrefactione, in singula quippe harum aer internus ac externus, uterque elasticitate gaudens, quam, utpote sensibilem satis & in Scholis Philosophorum plerisque hodie receptam, iterum potius suppono, quam præjudiciis obrutis persuadere conor, in se agunt. Vegetabilibus substantiam aeream subesse, factitius ille aer, quem intra vacuum successivè, quidem, sed copiosè satis, eructant horum plurima, fateri jubet, ita quidem ut Mercurii vivi assensum in Barometro, pariter vacuo incluso, notabiliter variet atque juvet, imò succi horum in eadem machina sensibiliter valdè ebulliant & bullas ab imo ad superficiem suam emittant. Hic E. particulis illorum solidioribus interspersus, ab iis, tanquam totidem repagulis atque pessulis, seu potius sclopetulis pneumaticis, coercetur ejusque spirulæ aut elateres comprimuntur ut è quibusdam concretis, v. g. ex sempervivo, sale &c. si nimirum ab igne incalcescant, cum strepitu ac crepitu prodeat. Imò hujus expansionem præterea impedit aer ambiens crassior ac frigidior,

qui integumentorum solidiorum tenacitati subveniens spinæ interni tenentiam expansivam magis coercet: donec idem calidior redditus intrinseco aut novum calcat stimulumve addat, aut rarefcens interiori cedat, huncque, libertatem quærentem, dilatari & reliquas solidiores particulas in motum, aut fermentativum, aut putrefactivum, abripere, patiatur.

§. 24. Simile fatum experiri videntur mineralia vegetabilibus compactiora, quibus ab aere externo aliqua contingit mutatio, v. g. dum marcasitæ in Vitriolum convertuntur, aliæve minere ad fundenda metallâ, ab hujus appulsu præparantur, quod vel sola eorum, quæ ab hoc iis supervenit, incalcescentia docet, sine motu substantiæ subtilis intrinsecæ haud contingens: quatenus per hunc sulphurea eorum minima contendantur, i. e. simile quid, quod ab igne actuali leniori, perferunt, cui tollionis præparatoriæ causa eadem minere nonnunquam exponuntur, & sic ad promenda mineralia maceratione quasi quadam disponuntur. Quem quidem aeris intrinseci motum aer externus inchoare atque perpetuare idèb videtur, quod (1) sine hujus contractu talia phænomena non observentur: (2) vapores aquei concretorum horum meatulos subeant & cum salinis ac metallicis interdum in vitriolaceam substantiam efflorescant, incuneati quasi ab atmosphæra minimis subtilioribus & continuam vibrationem exercentibus.

§. 25. Tandem n. ratione fluiditatis, i. e. per continuum & nunquam interruptum summamque partium suarum exiguitatem corpora etiam solidissima aer permeat, & horum particulas exagitat, vel easdem ab igne jamdum commotas suscipit, atque atomis aqueis, quas sibi intertextas gerit, combinat, ut in spiritus sulphuris per campanam confectio deprehendimus. Imò quietiores quoque non raro secum abripit, v. g. aqueas, hincque salium quorundam crystallisationem juvat humidaque corpora desiccant, ut salinas sulphureasque taceam, v. g. salium volatilium, spiritus nitri, spiritus vini &c. utpote quibus evehendis & dissipandis intrinseca mobilitas vix unquam sine aere proportionata existit. Imprimis verò hic fluiditatis aeræ motus ad Ignis formalitatem præstandam multum confert, ut ea superiore dissertatione repeti valet, illud saltem sub præsentis colophone adnectendo, quod sicut aer ad moleculas objectorum satis exiguas divellendas commodissimum existit movens, sic etiam pabuli ignei partes sulphureas inter deflagrandum ille distrahat & quasi atterendo ad ignem formandum aptas reddat: pari circiter modo, ac marcasitæ illius Hassiacæ, sæpius memoratæ, sulphur, quod ignis luculentus in stigma acidum & vitriolo formando conveniens menstruum resolvit, in similes exhalationes temporis tractu redigit, substantiam hujus metallicam rodentes & cum hac in simile vitriolum abeuntes.

De Aqua & Terrâ.

Aqua sicut ex systematis mundani fluidis secundis seu particularibus crassissima est, ita usum ejus instrumentalem in officinis Chymicorum sensibus facilius & à priori magis observare contingit, quam Aeris, utpote fluidi, sensoria nostra cuncta non adeò ferientis. Quippe non saltem in Balneo Maris & Vaporoso caloribus, ab igne emanantibus, applicandis conventionibus deprehenditur vehiculum, sed præprimis in solutionibus atque extractionibus varii generis, concretorum æque animalium ac vegetabilium & mineralium, quibus satis frequens menstruum existit, ejus energia conspicitur. Pariter Crystallisationi quoque salium idem fluidum inservit, hisque intrinsecum evadit, i. e. cum substantia horum in Crystallum solidiorem facessit: ita quidem, ut sine proportionata aquæ quantitate nullum sal

sal in crystallum cogiqueat, & hac per calcinationem exhalante, formam crystallinam idem deponat ac in calcem alteriusve texturæ massam abeat. Dum v. g. Vitrioli crystalli, smaragdini, aut saphyrini coloris, si super laminam ferream aut in olla vitreata calcinantur, cum exhalante substantia phlegmatica, pelluciditatem atque tincturam suam sensim perdunt, & calcis albi aut sublati atque opaci texturam induunt, cum notabili ponderis sui jactura: calx verò hæc, si in aqua pluviali solvatur & per congruæ hujus portionis evaporationem ad crystallandum disponatur, pristinam Vitrioli faciem pristinumque pondus recuperat.

§. 2. Aqua interim, quæ concreta dissolvit, frequentius equidem externa, non raro tamen interna etiam, est, quatenus idem Vitriolum non ab aqua saltem extrinsecus affusa, sed per se quoque & per humiditatem illam intrinsecam, quam per crystallisationem suam fecit, in liquamen aqueo salinum abit calori aliquali, potissimum Maris balnei, expositum, utpote qui particulas illas aqueas internas commovet, hæcque exagitando totam Vitrioli compagem dissolvit ac fluidam reddit. Simili modo quædam etiam animalium, v. g. Lumbrici terrestres, item vegetabilia, v. g. flores liliorum convallium &c. per putredinis certam rationem, sine omni humiditate extranea & per phlegma intrinsecum in massam molliorem aut liquamen mucilaginolum resolvuntur, spiritus suos salino sulphureos ad levioris ignis contactum exhalant. Quæ intrinseca quoque salium mineralium aquositas particulas eorum, ab igne vehementiori commotis vehiculo existit, ut hæc destillationi exposita in stigmata acida deliquescent, fluorem suum, cessante etiam ignis activitate atque impetu, retinentia. Sic idem v. g. Vitriolum, quod phlegmate suo per diuturniorem calcinationem maxime spoliatum, per ignis potentioris vibrationem in nebulam quidem seu vaporem elevatur, hic tamen haud in fluidum, sed solidum & crystallinum, cogitur corpus: quod nequitiam sit, si salinum hoc concretum leviter saltem tostum fuerit, hincque proportionatam phlegmatis quantitatem retinuerit, aut si hujus, ad rubedinem obscurum calcinati, particula salina in excipulum, cui aliquid aquæ infusum, per destillationem urgeantur. Et Cornu Cervi v. g. corpus sensu aridissimum, in spiritum fluidum, propter phlegma copiosius, sal ipsius volatile dissolvens, facessit: qui totus salinam soliditatem indit, aquositate hæc per rectificationem separata.

§. 3. Contingit equidem in destillatione Cornu Cervi, serpentum &c. aliquid salis cum phlegmatica, concretorum substantia coire, & cum illa in spiritum urinolum deliquescere, notabili tamen ejus copia sub molecularum salinarum textura lateribus excipuli adhærescente, i. e. à phlegmate non soluta. Ast ratio hujus phaenomeni hæc videtur, quod, quamvis in rectificatione ejusmodi destillati, ubi sal volatile, reliquis concreti partibus magis evolutum, hoc, tanquam levius, prius ascendat, in prima tamen destillatione phlegma illud antecedit & in excipuli fundo colligatur, antequam salina exhalationes prodeant, quæ mox in lateribus ejus condensata nullam ulterius aqueorum vaporum contactum sustinent. Cum, si ignis mox intensior concretis his, nulla habita graduum ratione, applicetur, & destillatio impetuosius urgeatur, ita ut major salis portio statim in principio, vaporibus aqueis intertexta, cum his simul ascendat, minor longe hujus quantitas in lateribus vasis colligatur, majore sc. à phlegmate diluta & in spiritum soluta.

§. 4. Licet autem aqua multis variisque corporum generibus eorumque particulis exagitandis & sustinendis inserviat, vix tamen adeo universalis, ac Ignis atque Aeris, est ejus potentia, dum salina & gummosa si mucilaginosa tantum, rarius terrea, sulphurea aut me-

tallica, aggregantur, prout illi frequentius solent. Et si forsan coniungat, resinas v. g. ab aqueis liquoribus absorberi, ac vitriolum, tartarum &c. quæ præter substantiam salinam, terream quoque aut metallicam continent, ab aqua communi dissolvi, imò ex vegetabilibus & animalibus decocta atque infusa, totius mixtæ naturam referentia, parari: agunt tamen fluida hæc in talia, sibi alias minus congrua, non immediate, sed intervenientibus demum mediatoribus appropriatis v. g. vitello ovorum, resinas discontinuante, ac absorbente, aut per substantiam vitrioli, tartari, reliquorumque corporum magis compositorum salinam, his congenitam, ceteras eorum partes discontinuantem, nunc verò solutam & agitatam. Quando proin *Willisius de ferment.* Aquam universale menstruum pronunciat, modò salinis spiculis acuetur, aquæ malè confert, quod ramentis salinis in acceptis referendum erat, i. e. aqua quidem horum solvens appropriatum est, hæc tamen ab illius fluore mota aliorum simplicium & concretorum menstrua evadunt. Tolle siquidem per evaporationem aquam, & dissolutorum particula sulphurea aut terrestres non cum illa exhalabunt, sed tali combinata in fundo vasis remanebunt.

§. 5. Quia tamen non tantum salina & laxiora mineralia sal. sc. commune Nitrum, Vitriolum, Alumen, Calx viva &c. ab aqua & ipsi congeneribus mensuris dissolvuntur, sed de metallicis quoque nonnullis concretis, v. g. Auro, ferro, antimonio, & mercurio, idem observatur aut observari dicitur, quasi & hæc particulas sui quasdam, & cum his virtutem medicamento- sam, eis concedant; compactior nihilominus horum textura vix à molliore ejusmodi agente sibi aliquid deradi patiatur: quomodo hoc contingat, & in quantum id admitti debeat, explorandum erit. Ubi prius de auro observetur, quod, quamvis *Burhus in epist. ad Bartholin.* 4. cum Antiquitate, hujus candefacti in liquoribus appropriatis, etiam aqueis, extinctioni multum tribuat, & v. g. ad sedandam diarrheam & cordis palpitationem in hanc usque diem nullum præstantius medicamentum receptum fuisse asserat, ita quidem, ut (1) auri pondus frequenter adhibiti ad hunc usum insigniter imminuatur. (2) color ejus in superficie, utut radians, rubigine subcinerea atque subrubra obducatur, tandem (3) aqua libra unius, à repetita extinctione ad quantitatem unciarum trium reducta, color lacteus visus fuerit, hæc verò (4) cum ad siccitatem à destillatione urgeretur, cinerem, ex quo in capella aliquid auri colligebatur, relinqueret. De asserito nihilominus hoc præter expectationem decantati effectus frustra neam nos dubitare jubet, quod metalli hujus particula adeo arcte sibi combinentur, ut ab igne nec commoveri, aut evolvi, nec ab aqua absorberi, queant. Quam enim frequentius extincti auri ponderis immutationem, rubiginem cinerem, & aquæ, in qua illud extinguebatur, colorem lacteum *Autoris* recenset, haud obsetyare potui, qui laminas auri per antimonium fusi, per viginti quinque ignitiones totidemque in aquam pluviam destillatam immersiones, pondus & colorem, aquam verò, tentamini huic inservientem, pelluciditatem pristinam retinuisse, oculis propriis æquè, ac adstantis ejusmodi amici, testor. Ita ut, si liquori forsan, in quo metallum hoc fixissimum extinguatur, vel peregrinus sapor, vel alia qualitas, contingat, non immerito ambigendum veniat, an hæc ab auro, ut tali emergant, an potius à particulis acido-salinis, à pabulo ignis eructatis, illique adaptatis, aut metalli igneitate, quæ texturam aquæ pari forsan modo immutare valet, ac alia concreta per ignem quotidie alterari præter illa, quæ *dissert.* 1. monita, vel exinde constat, dum saccharum per meram super ignem deliquationem novamque inspissationem, colorem, soliditatem &c. naturalem perdit, novamque texturam adipiscitur.

§. 6. Ferrum quod spectat, pariter per ignem candefactum

defectum, hujus sal superficiale, seu immaturo & laxiori portioni adhærescens, ab igne agitata metal- lum leviter corrodit, & cum hoc in vitriolum qf. coit, quod postmodum per aquam abluitur & dissolvitur. Simili quidem ratione, ac de auro modo intus, augu- rati quis posset, rem & hic se habere, sc. salinas, ex ignis pabulo exhalantes, atomos ferrum aggredi & in eo concentratas vitriolum formare, aqua eluendum: sed hypothesin hanc destruit, quod ferrum, per se quo- que aqueis menstruis incoctum aut infusum, his aliquid saporis vitriolici & virtutis deobstruentis ac diureticæ imprimat; ita quidem ut si, cum majore limaturâ Martis quantitate coctio ejusmodi diutius continuetur, decoctumque filtratum ad pelliculam usque evapore- tur, sal quoddam, licet exilioris molis, per crysalli- sationem producat. Ut taceam in præsentiarum, fer- rum aliquandiu in igne fustum aliquomodo vitrificari, quod sine salis cujusdam concursu fieri nequit: & li- maturam martis per solam aquæ pluvialis adpersio- nem in crocum converti, quod à salibus extrinsecis alias contingere, ex mechanicis suppono. Ast maxime mirari subit potentiam aquæ illam, quam in ferrum æque ac in sulphur commune hæc exerit, si illius lima- tura cum hujus pulvere in anatica quantitate misceatur & utraque in pastam redigantur: Sic enim post biho- rium circiter hæc fermentescere & increscere incipit, ut vix manibus vas continens attingere liceat, imò si major hujus materię moles, illa sulphureum spirat odorem ac inflammari videtur, ferrum autem maxi- mam partem in crocum facessit.

§. 7. Decocta ac infusa antimonii crudi, hujus re- guli, vitri & epatis, per aquam communem adornata, pariter vim sudoriferam atque emeticam recipiunt, im- bibendo particulas quasdam salino-sulphureas, quæ iis paulò laxius adhærescunt. Antimonio liquidem cru- do sal quoddam inexistere, ut alia taceam, sal potens comprobatur, quod ex eodem per calcinationem cum calce viva æque ac cum creta, paratur: quamvis in vitro, regulo &c. illius aliqua portio per fusionem si- mileque operationes partim expulsa, partim magis fi- xata, videatur. Concedi equidem debet, parum, aut nihil forsan, saporis peregrini menstruis aqueis à salina hac substantia affricari, i. e. decocta & infusa antimo- nialia potius notabilis expertia observari: non magis tamen, à liquoribus istis hanc non absorberi, dici va- let, ac de decocto calcis vivæ insipidissimo quis asse- rere vellet, hoc à calce nullas particulas salinas imbi- bisse, utpote quarum nihilominus præsentia varia phæ- nomena arguunt. Imò quamvis ramenta hæc, quæ ab antimonio hujusque prole aqua recipit: adeo exigua molis sint, ut cuncti ferè chymici asseverent, Antimo- nialia pluries & infinities infusa, pondere ac viribus haud imminui: corporeas tamen atomos has esse, adeoque sub earum secessu molè quoque totius aliquid, ut ut vix sensibile, subtrahi exin suspicari jubemur, quod vigesies v. g. aut pluries infusa hæc concreta, præ- primis cum vino, vix notabiliter amplius evacuent aut qualvis vires exerant hincque moleculas quasdam acti- vas sibi deratas profiteantur: cur autem detrimentum adeò exile in illis hætenus non observatum fuerit, aut vix observari queat, *Nobilissimus Boyle de summa effluvio- rum subtilitate c. 5. rationes suggerit.*

§. 8. Cum Mercurio res adhuc difficilior videtur, dum & hic virtutem vermes enecandi aquæ communi, cui incoquitur, communicat: dici autem nequit, an ramenta quædam cum toto concreto eadem, an salina saltem, secedant; quatenus mineralis hujus abstracta & portentosa textura, nulli alio mixto communis, ali- quid certi hoc in passu determinare vetat.

§. 9. Atque eo ipso, quia ad quorumvis præprimis salium, vitriolorum, aluminum atque tartarorum spe- cies dissolvendas aptissima deprehenditur, aqua pro li-

xiviis ex cineribus formandis horumque alcalibus evo- candis, pro muris constituendis, concretisque salibus depurandis non tantum adhibetur, & particule sulphu- ris communis salinæ, per deflagrationem expulsa ac in auras aliàs abeuntes, à supposita aqua imbibuntur at- que absorbentur, quo oleum sulphuris communiter di- ctum præbeant: sed idem fluidum solidiora tenacia quoque vegetabilia & animalia eorumque partes subit, ac ex iis salinas, imò aliquas, iis acutius combinatas, sulphureas, ac de totius natura restantes, moleculas, seu tincturam & cum hac odorem ac saporem, depromit, ut in decoctis ac infusis, per aquea menstrua adornatis liquet. Quas quidem extractions maxime salinas esse, inde evincitur, quod (1) infusa & decocta, cum aqua facta, mixtorum illorum, quæ parum salis plus verò resinosa & oleosa substantiæ possident, nul- lius aut exigua efficaciæ observentur, (2) concreta, à quibus decocta aut infusa ejusmodi jamdum parata sunt, minorem longè quantitatem stigmati salini per distillationem fundant, quam quæ nullam adhuc co- ctionem passa, parum quoque salis alcalici incinerata concedant. Quæ quidem substantia salina ab aqua commodius evoluitur partim si aquæ actio j. veat, v. g. per elixationem, partim si per operationes quasdam ministras, v. g. digestionem, fermentationem aut aliam quamvis appropriatam, concreta prædisponantur i. e. ex inviis compactissime permeabilia magis fiant. Ita v. g. aqua, in qua lignum computruit, notabiliorem lon- ge ex hoc alis portio- em recipit, quam ex non putre- facta sensibus mani- estiore reddendam, si aqua eva- poretur; quatenus per putredinem adeo laxantur con- creti pori, minimaque ejus ita disjunguntur, ut, quæ eorum salinæ texturæ, aquea vis, ejus claustra petrum- pens combibat, alias maximam partem ab atmos- phera excipienda.

§. 10. Quam verò in mucilaginosam ac gelatinosam substantiam aqua exerit, vim præprimis experiri in gelatinis ex partibus animalium solidioribus ac com- pactioribus coquendis, ac mucilagibus quatuor- radicum, v. g. althææ, ac seminum, v. g. lini, psyllii &c. evocandis, & in gummatibus v. g. Arabico, tragacan- tha, dissolvendis: quod an, tanquam merè salina, pa- tiantur hæc, equidem absolute determinare vix licet; maximam partem tamen eorum substantiam salinam esse, non improbabile fit, quatenus (1) ossa & cornua, à quibus gelatinæ separata, nihil, aut exiguum satis, sa- lis volatilis, dum distillationi submituntur, fun- dunt: (2) Gelatinæ evocata verò, si igne distillatorio urgeantur, maximam partem in sal volatile & oleum empyreumaticum abeunt, paucissimis terrestritatibus in fundo retortæ remanentibus. Quod autem in ani- malibus est gelatina & gluten, illud in vegetabilibus mucilagine & gummata, proin sale quoque volatili hæc abundare plane paradoxum videri haud poterit.

§. 11. Atque hæc quidem de potentia aquæ effecti- bus sufficiant, formalitas hujus modusque agendi nunc exponendus erit. Sc. Aquam cum sine fluiditate con- cipere haud liceat, necessariò inferre convenit, eam ex pluribus particulis, vario in motu constitutis, componi adeoque nunquam quietam esse, ita quidem ut in aqua, quæ nudis oculis, quoad quævis sua minima, stagnans & quiescens plane apparet, his microscopio armatis motus undulationis & ebullitionis notabilis conspiciat- tur. Has particulas læves seu glabras ac flexiles potius, quam ramosas cum Neotericis supponere decet, idè quod (1) à quibusvis, quibus adhærescit, aut quæ di- luit, corporibus, facilius & levi calore evahatur ac in vapores explicetur: dum ramosæ sibi- que implicite olei particule quibusvis porosis firmius agglutinantur usque altius insignuntur, ut ab iis non adeò commodè se ex- pedire aut detergi valeant; imò oleum aquæ confu- sum & per agitationem huic quoad minima commix- tum,

tum, mox propriam sphaeram repetit, ejusque partes sibi sponte implicantur, idè quod læves & flexiles aquæ moleculæ facile elabuntur, per ramositatem verò suam sese mutuo & per ginglymum quasi quendam excipiant ac detineant. (2) Quod aqua leniter effusa in guttulas separatas & minores decidat, olea econtra, dum stillant, in fila quasi protrahantur, majoresque proin guttas forment. Propterea etiam (3) fit, cur aqua, quamvis facillè dilatabilis, vix, quemadmodum aer, comprimi seu condensari, queat: quod plures sc. aquæ partes, quæ sibi, instar anguillarum lævium ac flexibilium, incumbunt, hinc exigua, aut vix ulla, spacia vacua inter se admittunt, se comprimi haud patiantur; imò propter contiguitatem, hinc glabritiem & flexibilitatem, aqueorum minimorum exactiorem aqua aere longè ponderosior, secundum quosdam sc. millenis ferè vicibus, secundum *Domini Boylei* verò experimentum, quod *Exper. phys. mechan. contin. 2. art. 11.* recenset, octingentis saltem, deprehenditur.

§. 12. Propter quam quoque aquearum particulatum texturam & habitudinem ad se invicem, fluidum hoc, si non plane insipidum, certè saporis, linguam levissimè tantum vellicantis, existit: quatenus ad sensorium gustus afficiendum, aut papillas nerveas, quas immediatum gustus organum nunc tantum, brevitatibus causa, ex Anatomicis suppono, percelli, aut motum spirituum animalium, his sibi que continuis nervis existentium, aliter modificari necesse est. Quorum neutrum à minimis aqueis expectari potest, utpote quæ glabræ partes illas nerveas vix stringunt aut fricant, spirituum verò motui potius obtemperant, quam ut aliam motus determinationem ipsis imprimant: quamvis negari non possit unam aquam præ altera, v. g. fontanæ pluviæ aut fluviali, sensibilius magis linguam afficere, utpote à terrâ, quam transit, particulas rigidiores & ramosas magis, ut plurimum recipiens ac vehens.

§. 13. Quicquid E. aqua in solvendis corporibus præstat, motu egit, dum ejus particulæ cunctæ, partim ab aëre, partim, & quidem potissimum, à fluido illo primo & universali, sc. aura ætherea varix & seorsim agitate, in corpora solidiora sibi obvia motu continuo feruntur: quorum minima, si levius & per contiguitatem saltem laxiorem cohærescant, ab illarum vibratione facillè discontinuantur, ita tamen ut earum aliæ crassiores sc. terrestres, aut ramosæ, nempe oleosæ mox secedant, & pro diversa sua ponderositate aut fundum aquæ petant, aut superficiem ipsius supernantent, salinæ verò, tanquam mediæ naturæ & in minima infinita divisibiles ab illis abripiantur & solutæ detineantur, donec portione quadam aquei earum vehiculi exhalante, hinc reliquarum ejus particularum motu fatiscente, minima salina ad pristinam contiguitatem se recipiant, & sub crystallorum forma ipsi submergantur aut lateribus valis adhærescant, nisi quibusdam horum in crustam latiore coeuntibus, hinc superficiem solventis ratione hujus plantici innatantibus, quatenus si crusta hæc confringatur, ejus fragmenta etiam minima mox ad reliqua submergantur & per gravitatem sibi congenitam fundum petunt.

§. 14. Ut ut autem aqua fluidum satis explicabile & ad vapores usque insensibiles dilatabile sit, minimè tamen, quamdiu fluorem sibi adæquatum retinet, in infinitum se extendi patitur, aut certè à corpusculis ejusmodi salinis solidis extendi potest, i. e. determinatam duntaxat salis, & ab hoc absorptorum. Concretorum quantitatem imbibit seu dissolvit, quod verò illius proportionem illam quam activitatis sphaeram communiter dicunt, transcendit, intactum relinquit & v. g. ad partem unam salis solvendam quatuor præter propter aquæ partes exiguntur, nisi hoc sol compactius aliisque terrestritatibus arctius involutum coctionem pro

sui dissolutione postulet, adeoque, propter evaporationem haud evitandam, paulo plus aquæ expectet. Quibus ita revera se habentibus paradoxum satis videtur phænomenon sequens, sc. dissolvatur tantum salis communis seu marini aut Nitri in aqua simplici, quantum hæc capere potest; quo facto aliqua Sacchari portio murtæ huic immittatur, quam itidem dissolver hæc: hinc Aluminis pariter tantum, quantum illa capere potest, tandemque vitriolum, quæ bina posteriora, licet aqua illa nihil amplius salis aut Nitri, ac sacchari absorbere poterat, nihilominus in hac deliquescent, & quæ ne grano quidem salis communi amplius ferendo aut sustineudo adæquata ad alia salium genera suscipienda apta existit.

§. 15. Utitur hoc experimento *Gassendus*, vacuo Epicuri & Democriti disperso succinens pro comprobandis infinitis per aquam dispersis, diversisque salibus, per diversas suas figuras accommodatis spaciolis: quorum alia v. g. quadrata, salis moleculas cubicas tantum, recipiant, hisque repletis nihil hujus salis ulterius dissolvi queat; aliarum autem figurarum meatus, hæcenus inanes, saccharum, vitriolum &c. admittant. Verum etiam hic disputandi locus haud sit, quo sensu Epicurus ac Democritus inane hoc asseruerint, quatenus forsan alia longè fuerit eorum mens, ac vulgò explicari solet, videtur: ante omnia tamen neutiquam à pororum inanum inexistencia aquæ vis, adeò diversa salia solvendi, peti debet, sed sunt potius intercapedines hæc à particulis salinis, mole & gravitate sua aqueas divellentibus; quæ etiam adeò notabiliter intumescit majusque spatium quærit, prout, præmissis, si in phiola vitrea angustioris & longioris colli hæc solutio heterogenea pareretur, observare contingit. Et si pro salium diversis & innumeris atomis admittendis totidem aquæ conciperentur spaciola vacua, hæc notante *du Hamel*, tota foraminulis parva & spongiosa foret, ac inania aquæ particulas hujus solidiores longè & enormiter superarent.

§. 16. Nec idè tamen eidem *du Hamel* auscultandum, quando cum *Dighæo*, aquam sale communi saturatam propterea aliquid sacchari, aluminis &c. adhuc dissolvere putat, quod illa à salis corpusculis densior reddita sal idem amplius subire non possit, his tamen velut armata spiculis, vitrioli, aluminis aut succi alterius crassioris mineralis penitiora subeat, ejusque partes ingressu suo divellat. i. e. aqua uno tenuiore sale prægnans ad alterius crassioris dissolutionem quodammodo disponatur atque præparetur. Eadem quippe successuum ratio est, sive aquam prius subtiliore, sive crassiore sale imprægnes, dum aliquoties expertus sum, solutionem vitrioli crassioris maximè saturatam æquè promptè sal commune aut Nitrum postmodumque saccharum imbibere, ac solutio salis penetrantioris vitriolum vel alumen in partes divellit atque absorbet.

§. 17. De cæteris hæc aquæ in corpora sibi obvia activitas non parùm, sed notabiliter, juvatur per motum illum, quem quælibet ab extra percellentia, præter motum ipsi naturalem & proprium, inducere valeat: qualia sunt non saltem vasorum & materiæ per spatulam similiave instrumenta concussio, sed quam ignis in super, seu calor hujus, præstat. Utpote ad quem recipiendum hæc magis prona est, ob laxiorem suarum partium connexionem, quæ earum separationem, hinc ad diversa loca motum faciliat: quamvis propter eandem causam calorem intensiorem, quem extrinsecus contraxit, facillè denuò deponat. Recenserem motus illius adjutorii nonnulla exempla, nisi in *dissertatione prima* hoc jamdum factum recorderer; hujus loci illud tantum monendum videbatur solutiones ejusmodi modò immerivas, modò vaporosas, dici posse: illas quidem, si corpus, per aquam solvendum aut extrahendum, huic, sub spissitudine naturali existenti, infundatur; has

has verò si in summa vasis idem suspendatur, adeoque vaporem saltem illius excipiat, qui particulas illius solubiles simul abripiat, v. g. dum gelatina ex ebore C. C. &c. æquè hoc ad illo modo elicitur paratur.

§. 18. Interim & illud fateri cogimur, unam aquam præ altera ad solutiones has vel illas præstandas aptiorem esse, v. g. pluviam ac fluvialem, fontanâ, quatenus hæc particulis heterogeneis magis scatens (1.) ad salia extranea admitterenda non adeò commoda observatur. (2.) faciliè imponit, quò id, quod aquæ, tanquam menstrui, contentum, corporis extrahendi partem credamus: aut (3.) solutorum texturam notabiliter alterare valet; imò (4.) quæ, calore adjuncta, salia admisit, post breve tempus ac tepescens denuò deponit & ad fundum spontè præcipitari patitur: quorum hoc non rarò quoque fiet; si solutioni salinæ, cum aqua pluvia paratæ; aquam fontanam infundas, cum tamen alias, quo plus aquæ, eo commodius salia dissolvantur: licet pluviam & fluvialem quoque heterogeneitates interdum uberimas fore vere mechanica doceat. Imo quamvis aquam simplicem notabilis saporis expertem superius pronunciatim, hujus tamen scaturigines frequentius & quàm manifestissimè variant sapore aliisque qualitatibus; dum harum alia salubrior, alia magis ad decoquendam cerevisiam, alia ad lavanda linteamina; alia ad ferrum temperandum & in chalybem convertendum alia ad Tincturas parandas magis aut minus apta observatur: sine dubio, quod præter particulas salinas metallicas quoque has vel illas complectatur.

§. 19. Ab heterogeneitatibus ut liberetur aqua quavis, communiter equidem commendatur post subsidentiam & filtrationem destillatio, sub qua notabilem salis ac terræ ut plurimum deponit provenitum: est nec hæc encheirisis omnem de homogeneitate ejusmodi aquæ desiderata dubitandi occasionem tollit, quatenus sal quoddam magis volatile huic inherens non tantum simul per destillationem evehitur & per alembicum in excipulum deportatur, sed terrestres quoque alias arctius sibi combinatas secum abripere potest, adeò ut nunquam forsan de vera alicujus aquæ simplicitate nos certos esse liceat. Præcipuis cum *Celeberrimus Borrichius in Hermet. contra Conring. vindicat.* testetur. *aquam etiam limpidissimam, & vel decies per destillationes ab omni fece liberam, in veram, firmam, fixam, & inspidam terram mutari, sic eandem iterum iterumque frequentissimè, ex recentibus semper vasis vitreis, destillando evocet: quavis enim vice tenellam quandam cuticulam terreæ, sed elegantem, ex aqua illa enatam, superficiem vitri interiori agglutinari.* Quod idem cum *Edmundo Dichinsohn*, Medico & Chymico apud Oxonienses Clarissimo, narraret, sibi centesima destillatione hoc compertum hunc asseruisse, perhibet.

§. 20. Ex instrumentis, Naturalibus communiter dictis, siccum & solidum illud Terra scil. ponderandum restat; paradoxo forsan proposito, illis præcipuis qui terram principium rerum constitutivum iners, cadaverosum, mereque passivum credunt, adeoque terræ damnatæ, capitis mortui &c. titulo designant. Quibus equidem litem haud movebo, an, quas post operationes chymicas sæpius tanquam inutiles & effcæas rejiciunt, remanentiæ omnis planè activitatis & seminalis principij expertes ac vacuas jure pronuncient? cum Experimentum *Ioh. Agricolæ*, circa Terram damnatam sulphuris factum, cuprum egregium, & caput mortuum scæniculi post destillationem, incinerationem salisque educationem à *le Febvre* in sterquilinum rejectum, insequente nilominus anno multum scæniculi promens, contrarium confirmet, ut *Domini Lemery*, Scriptoris Chymici

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Galli dexterrimi atque ingeniosissimi, taceam, qui terram nunquam puram à mixtis separari posse, sed illam semper infixas sibi tenere particulas quasdam illorum activas, ita ut aeri per aliquod tempus exposita, inde aliquid novi perat, (melius forsan dixisset, latitans & fixatum ejus principium activum resuscitetur.)

§. 21. Supponam potius seu concipiam in præsentiarum Terram substantiam solidam & fixam, sulphureis & salinis partibus expertem hinc nec igni, nec aquæ (aeri forsan aliquantum) cedentem, eamque vel ordinariam, qualem pedibus calcamus, vel è diversis concretis arte educam, v. g. ossa calcinata &c. Cujus sane usum in Officiis Chymicis multifarium evincunt non saltem furnorum diversorum catinorum, tigillorum, testarum, crucibulorum &c. apparatus, sed multæ quoque destillationes, sublimationes, depurationes, aliæ operationes, immediatum magis illius concursum comprobant, ita quidem ut si ne aut cum hac minus ritè disposita, aut non in proportionem justa adhibita, irritos non raro tentaminum suorum Chymicus experiatur successus.

§. 22. In destillationibus frequentiora contingunt ejusmodi phænomena & potissimum quidem spirituum mineralium acidorum. ex salibus simplicioribus parandorum, utpote quæ salia sola igni exposita à calore hujus faciliè deliquescent, hinc destillationem detrectant; tale prom corpus ipsis admiscendum: cujus particule illorum corpuscula exactius discontinuando fusionem hanc impediunt. Equidem hætenus nonnulli Chymicorum allaborant inveniendi modo, sal commune sine ejusmodi additamento heterogeneo destillandi, sed frustraneo cum successu: ita ut merito aut certæ salis texturæ; aut præviæ præparationi, adscribendum sit, quando *Lemery Cours de Chym. c. 15.* à Viro quodam rerum Chymicarum experientissimo sal quoddam marinum sibi concessum fuisse referi, cui ignis moderatior spiritum quam acidissimum extorserit.

§. 23. Atque horum additameentorum à diversis commendantur diversa, dum alij farinam laterum, argillam, alumen ustum, bolum aut vitrum contritum, salibus admiscenda suggerunt. Arenam, Lateres, bolum argillamque rejicit *Zwelferus in Pharm. Augst.* quasi nempe spiritus acidi, è corporibus suis propulsi & fervidi terras has aggredierentur atque corroderent; hinc multum de particulis salinis in his linquentes partim exiguæ quantitatis, partim phlegmatici seu aquosi magis prodirent: pari ratione ac spiritus iidem destillati, si terris ejusmodi affundantur, totaliter destruerentur, non secus ac si solvendis metallis adhibiti fuissent. Sed metum hunc vanum duplex reddit experientia, quatenus primò omnium mechanicorum observatione constat, spiritus tales cum ejusmodi terreis additamentis paratos acidissimos & in sufficiente quantitate prodirent, modò conveniens additamentorum proportio observetur, & operatio quod reliquas encheirises decenter administretur. Secundò si pari modo in terras adjectas agerent spiritus seu vapores horum commoti atque in his concentrarentur, ac quando condensati ipsis affunduntur, nec mediante igne exinde rursus expellentur! Caput eorum mortuum saporem salinum, scilicet austerum stæilemve, præ se ferre deberet, cujus tamen contrarium lingua cujusvis comprobatur, id est, inspidum ferè hoc deprehenditur. Et quod hunc in finem præ illis commendat Alumen ustum, nisi l prærogativæ præ reliquis terreis habere videretur, id est si hoc probè exustum fuerit, æquè in eo, ac in illis, acidum spirituum mineralium figetur, ut taceam alumen quocunque modo rostum plurimum substantiæ salinæ adhuc retinere,

D. prout

prout vel sola ipsius vis caustica, quam in absumentum ulcerum hyperfarcosi exerit testari posset.

§. 24. Nihilominus & hoc asserere non dubito, quod arena & vitrum inter nominata discontinuantia minus commoda sint: siue mixturam hanc sub pulveris forma Retortæ immittas, siue eam cum aqua in globulos prius redigas. Sub priore siquidem conditione ponderositas dictorum corporum exactiori mixtioni cum salibus resistit; posteriorem verò si intendas, vix succedet, quatenus hæc cum aqua dissoluta non adeò intimè ab illis, utpote porosis minus admittuntur, sed vix illarum partium superficiem exteriori adhaerentia globulorum firmitatem impediunt.

§. 25. In vitrioli atque Aluminis destillatione terreis ejusmodi heterogeneitatibus haud opus est, utpote quæ tantum terræ propriæ & intrinsecæ possident, quantum ejus pro deliquatione substantiæ salinæ inhibenda necessarium. Et Nitro v. g. cui, per se destillando boli ad minimum tres partes combinantur, si ex hoc Aquam fortem parare mens est, additamenti dupla aut æqualis portio sufficit, quatenus terreis vitrioli juncti & proprii & Nitri, salis corpusculis discontinuandis, ac ignis motui facilitando adæquata sunt.

§. 26. Præterea in illorum concretorum, quæ calorem intensiorem sine ebullitione haud sustineat, v. g. terebinthinæ, mellis, mannæ gummi elemi, mastichis, succini &c. destillatione his ut plurimum proturgescentia illa infringenda arena, farina laterum cineres &c. adduntur; quibus in mollioribus & fluidis, scilicet melle & terebinthina stuppæ cannabinæ succenturiantur. Ubi tamen ratione horum posteriorum nempe mellis & terebinthinæ illam corporum terreorum admixtionem non damnamus, nisi per hæc terebinthinæ residuum, quod colophonix nomine non exilem usum in re medica & mechanicis habet, perderetur. Cineres idè vix admitterem, quod ratione alcali aciditatem spiritus mellis, mastichis &c. destruant. Nec arenæ combinatio adeò congrua, utpote quæ, in mollioribus præprimis concretis, ratione ponderositatis suæ ab his facilius secedit & subsidet. Imò cum plerorumque horum destillandorum ebullitio per gradualem ignis applicationem aut vasorum amplitudinem intercipi queat: neglectis illis heterogeneitatibus illa potius igni committantur, nisi ceram similiave excipere mavis.

§. 27. Referri huc pariter debet olei olivarum destillatio cum lateribus candefactis adornanda. Postquam enim hi in oleo extincti pulverisantur atque igni exponuntur: quo facto oleum prodit subtilius empyreumaticum & acore suo intrinseco maximam partem privatum, quod quo jure Philosophorum aut de Lateribus audiat, facile judicare licet: Quippe vix concipi potest illa virtus, quam à lateribus sibi promineret illud oleum, utpote quæ corpora sicca & omnibus partibus activis destituta ipsi nihil communicare valent: Sed & adhibentur pro olei saltem moleculis discontinuandis, hic actionem ignis rarefactoriam facilitandam.

§. 28. At alterius finis gratiâ ossa calcinata salibus volatilibus rectificandis intermiscuntur, v. g. viperarum, Cornu Cervi &c. sublimationem cum recentibus ossibus aut cornubus reperendo. Nam hoc modo oleum empyreumaticum, quod tantum fetorem atque ingratiitudinem ipsi imprimebat, separatur & in ossibus illis porosius retinetur: unde etiam egregium candorem minusque nauseabundum saporem induunt, id est, idem hæc ossa præstant, quod spiritu vini tartarificatus, oleaginositatem salium horum dissolvens ac imbibens, hincque puriora hæc reddens, Memini mihi olim ex eodem principio salis tartari similiumque fixorum volatilifandi rationem commenda-

tam fuisse: quasi scilicet oleaginositas horum salia lixiviosa figens, hac ratione in ossibus calcinatis concentraretur, hinc sui juris & libera dimitteret salina corpuscula. Sed non adeo felicem mihi contigit esse, ut operationis successum desideratum viderim: meliorem aliis fortunam hoc in passu precor.

§. 29. Tandem in vitrificatione terræ usus ignis observatur, quatenus hæc potissima vitri materia existit, ita ut pro hujus puritate majore aut minore cum alcali in vitrum modo magis, modò minus, diaphanum colliquecat. Sed singularis & paucis hæctenus cognitus, attamen hujus loci, ast modus, plumbum ac stannum in granula exilissima, quæ clepsydri formandis maximè accommodata, redigendi, quem *Hook Micrograph. cap. 8.* describit. Nimirum exilior, quantum fieri potest, horum metallorum limatura cum calcis vivæ & siccæ pulvere in crucibulo stratificatur, ita ut ramentorum illa se haud contingant, sed per calcis vivæ interjecta corpuscula terra probe discontinuantur: hinc igni graduale mixtura hæc committitur, ut metallum deliquecat. Quo facto massa aquâ communi diluitur, &amenta metalli liquefacti sub globulorum exilissimorum, seu potius pulveris subtilis, forma in fundo vasis subsidet, facile à calce separanda,

De Menstruis.

Missis illis Instrumentis naturalibus & quæ cum aliis Mechanicis, imò cum Macrocosmo, communia habet Chymicus, ad Menstrua nunc transeo, tanquam agentia huic magis propria, & vel idè quoque artificialia forsitan dicenda, quod Chymico, ut tali, præprimis inserviant ejusque instrumenta proximiora existant.

§. 2. De Menstrui Etymologia haud ero sollicitus cum à Chymicis superiorum temporum, in nomenclaturis inveniendis ac determinandis sæpius satis obscuris, nec sibi constantibus, imò non rarò impertinentibus, si non fallacibus, Notio hæc ad nos propagata fuerit. Illud vulgò describunt per liquorem concreta naturalia in partes solventem: quæ tamen definitio triplici animadversione indigere videtur.

§. 3. Quippe primò præter liquores solventes & extrahentes vitam quoque observantur corpora solidiora, quorum vim agendi in alia quotidie quoque experimur, quatenus verbi gratia, Sulphur in Mercurium, Mercurius sublimatus in Antimonium, Antimonium in Aurum, Sal Tartari in sulphur, Cæmenta in Metalla &c. operantur: adeoque non omne, quod vini solvendi habet, actu fluidum, existit, multo minus Liquoris formam habet. Quamvis facillè largiar, solida ejusmodi menstrua vim exerere in obiecta sibi exposita haud posse, nisi in fluorem redacta fuerint: Sive hunc ab Aere, siue Aqua, siue Igne, siue binis horum simul, munientur. Ita v. g. Sulphur in Mercurium, Mercurius sublimatus in Antimonium, hoc & Cæmenta in Aurum ac in cætera Metalla, nihil agunt, nisi ab Igne agitata & in fluorem resoluta: Sal Tartari aut Calx viva sub consistentia spissiore sulphuris compagem minus aggrediuntur, nisi aut per Aquam aut Ignem aut utrumque; eorum soliditas aboleatur: pariter salina illa substantia, quæ in sulphure Minera Martis Hassiacæ latitat, hujus texturam Metallicam tunc demum laxat & cum hac in Vitriolum abit, postquam sc. per aliquot menses ab Aeris continuo appulsu fluorem suscepit.

§. 4. Deinde & hic observare convenit, Menstrua equidem plurima immediate solutionem corporum, quibus adaptantur præstare, verbi gratia, liquor aqueus salia liquat, spiritus vini scammonium & Aqua fortis Metalla solvit: mediate tamen interdum

solutorum quoque cum alijs concretis combinationem conferre, quatenus eadem salia deliquata à motoribus suis concretis metallicis ita impinguntur horumque minimis uniuntur, ut cum his, in Calcem aut Vitriolum abeunt. Imò, dum Mercurius menstruorum appropriatorum vim sustinet, dubitare licet an hæc illorum actio solutionis; an condensationis seu coagulationis nomen mercatur; quatenus vix concipiendum, qua ratione fluidissimum Hydrargyri corpus in minores atomos ab extraneo dividi queat, adeoque sine præcedanea potius solutione particulis menstrui salinis connubatur.

§. 5. Denique nec solida Menstruorum objectum solitarium existunt, sed fluida quoque interdum eorum imperio subiecta observantur, v. g. olea destillata, butyrum antimonij &c. quorum illa Spiritus Vini, hoc Spiritus Nitri seu Aqua fortis solvit, ut taceam Mercurij vivi, quem actionem menstruorum variorum experiri, modo indigitavi.

§. 6. Possent E. Menstrua dici corpora quævis tam solida, quam fluida, quæ partim ratione suæ agilitatis & motus sive proprii, sive à fluido quodam universali impressi, partim ratione configurationis atque congruitatis particularum, poros concretorum aliorum subeunt, horum minima divellunt sibi que implicant: ita ut hos modò simul in motum abripiant & in fluido statu conservent; modo ab iisdem retineantur & cum illis in decompositum solidum coagulentur, utroque modo texturam corporis sibi expositi sensibilibiter immittent.

§. 7. Motu, aut certè non sine motu, Menstrua in objecta agere, confirmatur (1.) quod eò ipso, dum ab his aut particulas determinatas deradere, aut totius concreti compagem dissolvere, aut fluida condensare debent, eadem penitiora solvendorum subire ac permeare, adeoque locum mutare, id est, moveri, necesse sit: (2.) quid ejusmodi motus in infinitis solutionibus, etiam quæ per menstrua satis blanda & plane aquea fiunt, sensibus pateat: (3.) Motus ab extra, v. g. per agitationem aut ignem, impressus Menstrui activitatem multum levet, ita ut quæ frigida non nisi segniter admodum operantur, incallescendo potentius ac celerius munus suum præstent, imò quæ efficaciam majoris, à calore externo multum juventur.

§. 8. Sed præter particularum Menstrui motum & agilitatem aliud quid ad negotium hoc requiri, vel exinde colligere licet, quod certi liquores corpora nonnulla haud adeo commodè dissolvant, nisi eorum partium motus atque activitas aquæ affusione, aut aliorum vehiculorum torporem inducentium permixtione, debilitetur. Phænomenorum ejusmodi infinita exempla Mechanica conceder, quatenus v. g. Spiritus aut Oleum Vitrioli in ferrum minus congruè agunt, pro Vitriolo inde parando, nisi aut Aqua communi aut Spiritu vini temperentur, hincque adeo sensibilibiter infringatur eorum minorum activitas, ut strepitus longe minor inter solvendum observetur, quam si minus diluta hæc solventia ministrant. Pariter, ut illa taceam, quæ de Aquæ fortis aquæ dilutæ in Plumbum & Argentum potentia corrosiva majore *Celeberrimus Boyle in tentam. physiol.* refert, Idem Menstrui cujusdam mentionem facit, in quo alias Aurum instar glaciei in Aqua tepente, citra ebullitionem deliquescebat & cujus ope alias ex eodem metallo singularia præduxerat, ab eo tamen, postquam ab omni terrea & aqueæ substantiæ miscela hoc liberatum fuerit, nihil prorsus pristinae efficaciam impetrare potuerit.

§. 9. Quoniam verò nullam in rerum natura conciperelicer dimensionum penetrationem, adeoque nec Aquæ Regis in Aurum, nec aliis solventibus in alia

concreta, nisi per poros, conceditur aditus, quo substantiæ illorum nexus dissolvant; poros tamen non ejusdem generis illud suspicari juber, quod prout concreta diversa diversâ substantiâ gaudent, & ex varijs particulis coagmentata videntur, ita numerum quoque figuram ac magnitudinem horum interstitiorum diversam esse, id est, diversitatem minimorum componentium pororum quoque facere diversitatem, seu partium dispositionem pororum sequi confortationem: Solventium etiam particulas seu spicula simili forsan modo, ac clavis seræ, solvendorum poris adaptata esse, id est, habitudinem determinatam ratione figuræ atque magnitudinis hæc ad se invicem habere, verosimile est, sine qua, utut rapidissime mota & impulsæ illa his minime impingi, adeoque solvendorum vinculum divellere possent. Quatenus cuneus major exilem fissuram, & corpus sphericum aut quadratum meatui triangulari minime adaptatur, hinc ad distrahendos & separandos hujus parietes incongruè plane adhibetur.

§. 10. Sicut autem Menstruorum agendi modum duplicem esse, alium quem motu, alium, quem mole & configuratione suarum atomorum præstant, hæc ratione constat: ita eorum nonnulla motu saltem, aut præprimis; alia motu & conformatione simul in concreta operari verosimile sit. Motu quidem potissimum activitatem suam exerunt, Aquea & Oleosa: quatenus porosiora saltem concreta, verbi gratia, salina & vegetabilia, sine strepitu & effervescencia, subeunt ac penetrant, adeoque laxius saltem sibi cohærescentia ramenta discontinuant & secum auferunt, quamvis eo ipso, quod olea ab omni salis consortio vix libera observentur, horumque particulae ramositate quadam gaudeant, configuratione insimul sua plus, quam Aqua, videatur ad solutiones conferte adeoque compactiora & aquæ haud asculantia, verbi gratia, sulphura, dissolvant, ac in metallica quoque corpora, v. g. oleum Lini in corpori purificatione, operentur, salinis vero absorbendis minimis, talibus jam dum saturata, vix adæquata existant.

§. 11. Ast præter motum per configurationem detertam magis videntur agere menstrua salina ac Salino-sulphurea, utpote quorum ramenta rigidiora, acuminata & acuta instar toridem cuneorum sunt: quatenus quæ alcali solvit, intactum relinquit acidum, ac vice versa, imo inter acida quoque notabilis observatur disparitas, dum eorum alia, v. g. sp. Vitrioli in ferrum, Acetum in plumbum, spiritus salis in alia concreta tantum, agit. Et quamvis à laxiore solvendorum textura horumque majore firmitate solventium potentia iuvetur ac suffragietur: dum v. g. ad dissolvendum Mercurium vivum longè minor quantitas spiritus Nitri exigitur, quam si Argentum v. g. aut Bismuthum corrodendum fuerit, & spiritus vini, qui Mercurium sublimatum, per acida jam dum maximè rarefactum, imbibit, vivum ac dulcem, utpote compactiora corpora, minimè penetrat. Salina tamen menstrua tale adminiculum interdum haud curant, sed solidiorum non raro solutioni adæquata sunt hæc, quæ corpora, quorum minima non adeo arctè cohærent, haud lacerant, dum v. g. tartarus ferrum, & acetum plumbum solvens, in Bismuthum & Mercurium nullum jus habeat.

§. 12. Singularem inter immeditandi occasionem Chymicis suppeditant Aquæ fortis seu spiritus Nitri in argentum, & Aquæ Regis in Aurum agentis æthiologiæ: id est, dum alia quædam metalla, v. g. Cuprum & Ferrum, à varijs liquoribus acidis facile corroduuntur, quomodo hæc Aqua fortis Lunam tantum, non Solem, Aqua regis Solem saltem, minimè Lunam, solvat, adeoque singula restrictam satis

congruitatem habeant, ita ut posterior clavis appropriata auri compagi solidiori referenda existat, nullam vero argento, laxioris texturæ metallo, vim inferat.

§. 13. Symbolisationem equidem hanc Chymici atque Philosophi diversi diversimodè exprimere conati fuerunt: nullus tamen eorum, quantum mihi videtur, hoc ita præstitit, ut omnem Lectori ambigendi occasionem demserit. Consulamus primò *Willisium* qui aurum atque argentum compactiora atque à terrestri materia plurima defæcata metalla supponens, ea non à quovis, sed ab ejusmodi tantum solvente, quod sale cum istis homogeneo constat, in partes discerpi suspicatur: cum autem Lunæ compages à sale vitriolico, Solis à sale armoniaco similive, dependeret, Aquam fortem, vitriolica virtute pollentem cum argenti, sale combinari hujusque texturam recludere, Auri verò, quæ à vinculo heterogeneo esset, minimè laxare, usque dum ejus potentia Vitriolica per additum sal armoniacum deleteretur, hincque ejus spicula salina, Luna intacta, Soli tantum adaptarentur. Verum quemadmodum hypothesis hanc ab alijs jamdum examinatam & exturbatam observo, ita præter illa, quæ prolixius ab alijs deducta, *Willisio* illa salium, metallis inexistencia probanda manet simulque negatur menstruorum in concreta potentiam ab identitate aut similitudine, quam cum sale aliave his intrinseca substantia habeat, dependere, & falsum est, quod salina, in salina ut talia agant, sed Aqua potius in salina, salina in terra & metallica, item Δ ea &c. vim suam exerunt. Præterea ut ut haud negem, Aquæ forti aut aliquid salis Vitriolici subesse aut certe in illius destillatione Spiritus Nitri texturam ab hoc additamento non leviter immutari, quatenus Fullones v. g. testantur in pannis scarlatis tingendis Aquam fortem cum Vitriolico paratam hoc præstare, quod simplex Spiritus Nitri peragere haud poterat: animadvertere nihilominus contingit, spiritum eundem eadem, imò forsitan potentiore, activitate Argentum aggredi hocque in partes insensibiles ferè discerpere.

§. 14. Nonnulli Auro plus, quam Argento, Sulphuris subesse contendentes, Aquam Regis à Salis ammoniaci partibus volatilibus ad sulphuream hanc compagem divellendam magis accommodari ac disponi credunt: Qui tamen pariter supponunt, in dubium maximè vocanda. Nam quamvis concederem, nondum comprobatum, Auro plus quam Argento Sulphuris intertextum existere, gratis tamen satis asseritur, particulas salis ammoniaci volatiles seu urinolas in Aquæ Regis confectione Aquæ forti accedere & commisceri: Quatenus (1.) hæ per effervescentiam illam, quæ mixturæ Aquæ fortis & salis ammoniaci contingit, illæ aut exhalant, aut præcipitantur: (2.) Spiritus Urinæ aut Salis Armoniaci vim solvendi aurum Spiritui Nitri seu Aquæ forti non afficit: (3.) verò Sal marinum hoc idem præstat, in quo tamen nihil Salis urinosi somniare licet.

§. 15. Sed qui ex mechanicis magis principijs argumentum hoc in se susceperunt disquirendum, id est, non tam similitudinem aut congruitatem substantiæ, quam modum substantiæ, in auxilium vocarunt, & menstrualium particularum solvendorumque pororum relationem & habitudinem ad se invicem in solutionibus conceperunt, in varias iterum classes secedere observantur. Siquidem sunt, qui in illa generali salis æthiologia subsistunt, adeoque nec pororum in metallis, nec particularum in nominatis menstruis salinorum rationem, determinant: Qui tamen me dubitare patiantur primò an illa salium diversorum figura externa diversa perpetua sit, ita ut virtutibus illorum integris hæc immutari nequeat?

cum contrarium suadeat, olim jamdum quod mihi affulsit, phenomenon. Sc. cohobetur à sale communis seu marino Spiritus Nitri bis vel ter, hincque residuum sal solutum ac ad convenientem spissitudinem evaporatum crystallisationi committatur: quod sane non in stiriis sexangulares & Nitro proprias, sed in cubiformes crystallos, instar salis marini, concrecet, saporem nihilominus Nitrosū, sc. penetrantem, subamaricantem ac refrigerantem, Linguae imprimentes, imò inflammabilitate & cum carbonibus alijsve concretis sulphureis detonatione verum Nitrum exhibentes. *Secundò* eo ipso dum duo modi sunt, qui hanc pororum in solvendis & solventium aculeorum conformitatem præstant, Magnitudo scil. atque Figura, ita ut meatuli v. g. rotundi menstrui particulis ejusdem magnitudinis terebibus excipiendis adequati sint: quid obstabit, quo minus hæ triangulares verbi gratia, aut quadrangulares, ab iisdem poris, modo iis non majores existant, admittantur & vice versa cur meatulum quadrangularem non subintrabit atomus salina triangularis, aut rotunda; si modo illius diametrum hujus moles non transcendat? Et per consequens Identitas figuræ atque magnitudinis ad solutiones haud semper necessaria observabitur. *Tertio* suppono, particulis fluidum constituentibus aliam longè molem ac figuram contingere, quam quâ dum solidum formabant, gaudebant, ad minimum illis, quibus Ignis fluiditatem imperitur: quatenus eò ipso dum hic illas in partes minores discerpit, necessario quoque earum figuram immutat, adeoque ex angularibus, motui valde resistentibus, rotundas forsitan format, quæ, quia non nisi in puncto saltem se contingunt adeoque à fluido illo universali facilius agitantur, seu in fluidum subtilius & penetrantius rediguntur. Nihil E. aut parum, confeceret magnitudo & figura salium integrorum ad stigmatem exinde destillatorum effectus declarandos. *Quarto* tandem, si non omnimode destruit notabiliter tamen confundit porulorum Auri & spiculorum similitudinem, in Aqua Regis hætenus suppositam, paradoxum planè experimentum, Quo certa ratione præparatum Spiritum Salis simplicem Aurum solvere, leviter saltem Argentum arrodere, mihi constat: monstra Tu in menstruo hoc conformitatem, quam ex solo Sale communi præparatum, cum Aqua Regis quacunque in qua semper aliquid Nitri habet communem.

§. 16. Qui autem illam Congruïtatem specialius determinate susceperunt, in varias iterum secesserunt sententias. Sunt enim, qui particulas Spiritus Nitri seu Aquæ fortis crassiores, adeoque ad auri penetrationem hætenus ineptas, per salis Armoniaci admiscelam magis attenuari & exilioribus, Auri poris adaptari putant: ita, ut, licet ampliores patiter Argenti maendros subintrent, ratione tamen summæ ténerritudinis atque subtilitatis nec robur, nec impetum, haberent proportionatum ad ejus partes divellendas. Litem his denunciavit *Lemery*, sc. haud concipi posse, quomodo illi Spiritus Nitri aculei substantiam salis Armoniaci penetrando & dissolvendo magis extenuari queant, cum in omni effervescencia, qualem & hic deprehendimus, acidorum particularum acumen notabiliter obtundatur, id est, agendo in alkalia de aciditate sua multum deponant: imò salis Armoniaci substantiam non volatilem seu urinofam, sed salis marini accedere, quatenus illa inter effervescendum partim in auras abiret, partim præcipitaretur, imò ut jam dictum, sal marinum simplex ad producendam Aquam Regis æque ac sal Armoniacum adhiberetur. Præter quæ alia adhuc penes me ambiguitas manet, quomodo nimirum spicula Aquæ Regis teneriora, Argento divellendo impa-

imparia, compactiorem nihilominus atque solidiorem Auri compagem discontinuare & confringere queant? Aut ubi sunt in menstruo solati superius allegato spicula Nitri attenuanda,

§. 17. Alia & ferè contrariâ ratione negotium hoc recens quidam *Compendij Chymici Scriptor* explicat, idèd Aquam Regis Aurum dissolvere, quod metallum hoc poris angustioribus, irregularibus & magis intricatis simulque superficie adeò lævi gaudeat, in cujus texturam non adeò facilis ingressus esset, sed instat juncorum inflecterentur particulae Aquæ fortis fluidæ: compositis autem particulis salinis Aquam Regis per harum insimul rigiditatem fortiore cum impetu superficiem illam lacerare & viciniam auri particularum deturbare. In Argento autem aliam videri meatuum dispositionem, talem scilicet salium rigidiorum naturam respueret: Insuper in Aqua Regis meatuum & spatiorum nimiam esse penuriam quam quæ particulis Argenti oblongis ac planis recipiendis & retinendis sufficeret. Verum quo ad hanc pororum in duobus his metallis diversitatem nulla ratio apparet, cur flexibilius Aquæ fortis particularum in aurum, ut ut hujus pori irregulares & intricari magis concederentur: ingressus difficilior, cum hæc ipsa flexibilitas, quo intricatissimis etiam meatibus tale menstruum se accommodet, multum faciat. Imò quicquid ratione rigiditatis majoris angustiores & intricatos auri poros permeat, patentiores quoque & minus implicatos Argenti meatulos subintrabit. Præterea dubitare licebit, an plus, an minus, rigida existant atomi Aquæ Regis præ Aquæ fortis spiculis, cum illam ex hac æque, ubi spiritus Nitri propellet per tantillum salis, ac ex spiritu salis, per tantillum Nitri additamentum, parare queamus. Dum verò idem Eruditissimus Scriptor subnectit paucitatem spatiorum in Aqua Regis particulis argenti planis atque oblongis absorbendis non esse adæquatam, præcariam satis videtur: Cum figura hæc corpusculorum argenti nondum probata paucitas illa spatiorum auro non minus ac argento imbibendo obstaculo sit.

§. 18. Omnium tamen maximè paradoxum hoc in passu deprehendimus *Dominum Lemerii* qui in *Cursu Chymico* Aquam Regiam idèd Lunæ solvendæ haud proportionatam, arguit, quod spiritus Nitri cuspides à sale addito majorem molem acquirentes metalli illius poros subingredi detrectent, Auro vero cujus pori ampliores, facilius se insinuant: E contra Aquam fortem aut Spiritum Nitri argentum in minima redigere, quod spicula ejus subtiliora & angustioribus illius mazandris magis accommodata existant. Et quamvis eadem latiores quoque auri meatus, commode subeant, ratione tamen tenuitatis suæ, hincque dependentis flexibilitatis in ejus corpus firmius atque compactius agere haud possent, utpotè quod pro sui laceratione cultris potentioribus magisque secantibus opus haberet. Cui tamen asserto regeri valet, 1. In auro malè ampliores poros quam in Argento supponi, illosque non tantum autoposæ, ad quam provocat, refragari, sed per pondrositatem ejusdem metalli destrui: 2. Spicula Aquæ Regis poris Argenti haud crassiora esse, idèd quod friabilitatem singularem etiam huic introducant illudque in calcem redigant, e contra Aquæ fortis cuspides auri poros haud subintrare, quatenus à menstruo hoc ne minimum quidem patitur, sed splendorem, flexibilitatemque pristinam retinet, cum, uti dictum, ab Aquæ Regis contactu argentum sensibili ter satis corrodatur,

§. 19. Quocunque E. hætenus indigatorum modorum illa, de pororum Auri & Argenti ac ramentorum solventium stigmatum habitudine, hypothesi *Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.*

explicetur, vix tamen negotio huic videatur adæquata & per consequens insimul ad aliud quoddam principium, quod menstruorum diversorum concreta effectus diversificat, recurrendum erit. Hinc præter motum fluidi & magis universalem quibuscumque bet menstruorum salinorum particulis particulatam ac peculiariter magis, seu certa ratione modificationem, assignari debere auguror, quamvis modificationem hanc determinare difficillimum ac fortan impossibile opus sit. Observamus siquidem aut certe concedere cogimur, monente *Nobilissimo Boyle*, in simplicibus non saltem corporibus infinitam graduum æque ac aliarum conditionum atque circumstantiarum Motus differentiam, ut is modò simplex, modò compositus, modò uniformis, modò difformis, modò celerior, modò tardior existat, modò secundum lineam rectam, modò aliquam curvarum, v. g. circularum, ellipticam, fieri queat: sed in compositis quoque particularum primogenearum magnam concipere licet varietatem, non tantum quatenus earum modo plures aut pauciores simul moventur, sese modò arctius, modò laxius, & quidem modò hoc, modò illo, ordine excipiunt, verum prout vel uniformi, vel confuso, æquali vel inæquali vibratione feruntur, & uno verbo, motus, etsi simplex satis rerum principium, multis circumstantiis in solutione corporum quoque variare potest ac debet. Quæ ut Chymicis magis phenomenon applicem, alium sane agendi modum deprehendimus in Nitro, si hoc sub detonationis impetu ac strepitu Antimonium aggrediatur, quam si sine hoc utriusque mixturam Igni committas: dum v. g. Antimonium crudum cum tripla Nitri portione per detonationem in calcem albam s. Antimonium diaphoreticum redigitur, ex eodem verò Minerali cum æquali saltem Nitri parte productum Epar Antimonij per duplum Nitri adhuc adjectum, in similem calcem, quia nulla amplius detonatio contingit non adeò facile convertitur. Pariter referendum puto, quod casu nuper & cum dispendio multi temporis atque laboris expertus sum, nempe Tertiam foliatam Tartari, convenienter præparatam cum in Aqua communi solutam & filtratam evaporationi in vase aperto exponerem, ultra dimidium hujus in auras abibat, quale quid nihilominus in vase clauso & ignis motu atque impressione aliter modificato nunquam observatur. Antimonium potentiorè Ignis torturâ in massam regulinam deliquefcit, ast leniori calori expositum in calcem cinereum abiit non in Antimonium, sed vitrum pellucidum, per ignem fortiorè deliquefcientem. Motum fermentationis utrumque esse, qui mustum in Vinum & acetum, commutat, omnes concedimus, aliter tamen illum modificari, quando acetum, quam quando vinum, producit, inde colligere jubemur, quod per hunc Sulphur, per illum Tartarus seu sal, hætenus per mustum dispersus, magis recludatur. Pariter fermentationis ac putrefactionis harumque effectuum observatur disparitas, eam sola motus diversificatio præstat, alias in putrescente, alias in fermentescente, massa exagitans particulas, & quidem unius ejusdemque vegetabilis. Imo tandem si menstrua dantur, quæ concreta certa solvendi simulque immutandi vim habent, quemadmodum *Dominus Boyle* se ejusmodi Liquoris possessorem in *Origine of Formand Qualities* profiteretur, qui auri partem aliquam dissolvit, partem in aliud metallum transmutat: nonne in uno eodemque Menstruo duplicem, eumque disparem satis, motum augurari conveniet?

§. 20. Ita ut ex dictis confirmari queat quam superius indigitavi, Menstruorum æthiologia, motu scilicet atque conformatione suarum particularum relativa, quicquid aut solvendo aut quocunque

modo in objecta sua agunt, illa præstare: modo sub motus notatione non meram fluidi, sed certam insimul particularum cujuscunque menstrui agitationem intrinsecam & propriam, concipiamus; cujus equidem formale specialius determinare impossibile est, persuadent nihilominus illam aut antecedanea, aut vibrationes illæ sensibiles, quas menstrua diversa, unum idemque concretum dum aggradiuntur, diversas exerunt. v. g. solve aurum cum aqua Regis ordinaria, cum spiritu Nitri bezoardico &c. notabilem, modo vas leviter incalasciat, inter hæc observabis ebullitionem, qualem minimè deprehendes: si cum Spiritu Salis, cujus supra mentio facta fuit, ejusdem Auri solutionem tentes, ut ut intra idem cum priore temporis spatium hæc absolvetur.

§. 21. Imo his suppositis facilius decernere licebit *An Menstrua dentur insipida, seu aut talia qua solidiorum ac compactiorum corporum solutionibus ad æquata & proportionata, in rerum natura existere queant?* Faciunt, siquidem pro affirmativa præter illa, quæ in *dissertatione quinta* de aquæ in nonnulla mineralia & metalla potentia fuerunt annotata, quibus, accedit, quod eadem Aqua cupreo rubiginem inducat, hæc intra vasa cuprea aliquando asservata inde saporem & virulentiam quandam recipiat, quod idem cuprum ab oleo lini, ferè insipido, singulariter depuratur, quod oleum anisi, omnis pariter acrimoniæ sensibilis expers, observante *Langelotto*, Corallia in mucilaginem rubicundam redigat, & Mercurius vulgaris insipidus planè atque inodorus aurum facillimè, & forsan menstruis corrosivis intimius solvat. Primo enim non cuncta, quæ nobis insipida videntur, corpusculis solvendi vim habentibus penitus destituuntur, cum sensuum nostrorum talis sit natura, ut omnia corpuscula minima & dispersa comprehendere nequeant, unde etiam contingere potest, ut solvens aliquod tali suarum atomorum conformatione atque impetu gaudeat, quæ quidem nervos gustatorios vix afficiant, concretorum tamen diversorum hæc vel illa minima, tractu temporis, satis potenter commoveant atque divellant. Quemadmodum *Fr. Bartholinus de Figur. corp.* Aquæ cujusdam, à quodam magni nominis Chymico paratæ, meminit insipidæ, ad alios tamen effectus summæ efficaciz: ut infusorum Antimonij atque Mercurij potentia taceam, quam ijs assumptis corpora nostra experiuntur. Deinde nec rationi, nec experientiz repugnat, aliquod fluidum, salinis aliisque partibus operosis destitutum, vario atque diuturniore suorum minimorum motu tantum à solidioris quoque compagis corporibus sibi expositis successive & frequentius reiteratorum impulsuum interventu, aliquid deprædari, pari circiter modo, ac gutta lapidem non vi, sed sæpè cadendo, cavat, prout *Dominus Boyle de Latentibus quibusdam Aeris qualis.* prolixius edisserit.

§. 22. Dividuntur Menstrua communiter in *Universalia* atque *Particularia*, ut *Universale*, à *Paracello* & *Hellmontio* Alcahest, Circulatum majus, ab alijs Ignis gehennæ, Ignis philosophicus, Ignis frigidus, Azoth &c. dictum, definiatur per ejusmodi liquorem, qui ad quælibet Mixta solvenda indifferenter se habeat, hæcque in vera sua principia materialia absque corrosione ac virium suarum attritione aut perditione, dissolvat. Tale aliquod an per naturam rerum existat, seu produci possit? non immerito dubitarunt multi, v. g. *Conring. de Hermet. Medic. Billich. Observ. & paradox. Chymiatr. Rolsinc. Chym. in artis form. & Moorhof. de Transmut. metall.* quorum hic nunquam fuisse scribit, qui vidisse se talem liquorem solventem catholicum asseruere potuerit, cum sint tamen non pauci, qui ipsum magnum philosophorum lapidem non

semel viderint. Econtra Menstrui hujus existentiam non saltem possibilem, sed veram quoque asserunt *Eudov. de Comitibus de Liqn. Alcahest, Borrichius contra Conring. Stårkey Natures Explication and Helments vindication*, item ejusdem *Pyrotechny asserted and illustrated* ac in Libello posthumo, de *liquore Alcahest* atque *phys. subter. l. i.* ita quidem ut quæ de ejusdem materia materia & parandi ratione *Stabey* in *Pyrotechnia ænigmatice* saltem proposuerat, in opusculo posthumo evidentioribus declararet verbis, quasi scilicet ex Sale urinæ cum Spiritu vini certa ratione combinato emergeret, quod idem ipsum olim quoque in *Literis ad Dnum de la Moniere*, Medicum apud Lugdunenses Præclarissimum, nunc defunctum, testatum fuisse, recordor. Ego interim, qui ex cognitionis negatione existentiam alicujus phaenomeni impossibilem reddere, nefas duco, nec menstruo tali nunquam viso, affirmativam descendere, neque idem negare, mihi præsumo: quamvis an tale, quod revera catholicum sit, i. e. quod omnes corporum species eadem ratione subigat: unquam expectandum veniat, ob rerum variam admodum texturam ambigam.

§. 23. Menstrua autem particularia dicuntur, quæ ratione certæ quæ naturæ atque habitudinis his vel illis saltem concretorum naturalium speciebus, harumque solutioni aut condensationi sunt, appropriata, observanturque vel *Aquea* vel *Sulphurea* vel *Salina*, vel *Sulphureo-Salina*, *Mercurius Antimonium* atque *Plumbum*, quorum tamen tria hæc posteriora, utpote nimis particularia & ad pauca saltem metalla restricta, hujus loci haud volumus.

§. 24. *Aquea* Menstrua sunt cuncti liquores aquei potentiz aliàs omnis activæ, sc. salinæ, sulphureæ &c. expertes, hincque ferè insipidi atque inodori, v. g. serum lactis, succi vegetabilium potissimi, aquæ destillatæ, cerevisiæ &c. quæ qualia objecta agnoscant seu cujus generis mixta solvant, ex illis, quæ de Aquæ, tanquam instrumenti naturalis, potentia in *dissertatione proxima* dixi, facillè patefceret, dum hæc, quæ præsentis loco observantur, Menstrua non, nisi minore simplicitate, ab illa differant.

§. 25. *Sulphurea* autem omnes illi liquores sunt, qui multum oleosæ & inflammabilis substantiæ in se habent, & non, nisi corpora sulphurea, v. g. sulphur, gלבן, aggradiuntur atque ijs conubunt: suntque præprimis olea tam expressa, quam destillata; licet hæc illis majoris efficaciz deprehendantur. Quatenus expressa præter inflammabilem seu resinolam substantiam duplicem adhuc heterogeneitatem intertextam gerunt, aquosas sc. & acetosas vegetabilium particulas: quæ utraq; illorum in sulphurea & resinosa actionem impediunt atque turbant.

§. 26. Menstrua *salina* triplicis observantur generis, sc. Pure salia seu Alcalica, Acida, & utriusque texturam involventia s. Acido-salia. *Salsorum* iterum duæ existunt species, fixa & volatilia, ut fixa suppediteat alcalisata & per calcinationem seu incinerationem ex vegetabilibus, mineralibus & testis marinarum parata salia, cineres v. g. clavellati, sal tartari, Calx viva, Nitrum fixatum & testarum ostreorum, ac cochlearem calces quæ vel in forma sicca solvendis admiscuntur ac cum iisdem in Igne calcinantur, vel per deliquium aut aquam affusam deliquata & in lixivio redacta cum iisdem digeruntur aut coquantur. Objecta horum sunt Sulphurea non tantum, sed in aliter quoque generis concreta v. g. dum v. g. liquor Alcahest Glauberi qui nihil aliud quam alcali ex calcinatione tart. & nit. emergens & per deliquium solutum est, non sulphur solum, sed verbi gratia, myrrham, quoque aloem atque crocum extrahit, adeoque confectioni Elixir Proprietatis sine acido ministratur, Sal tartari

tartari decoctis ac infusis vegetabilium juvandis admiscetur, imò ungulæ alcis appropriatum idem Alcahest Glauberi existit solvens.

§. 27. Sulphura interim quo sinceriora eò magis salium horum potentia subjecta sunt, adeoque pro Lactis seu Magisterii sulphuris communis confectione lixivium Salis Tartari aut Calcis vivæ quam convenientissimum deprehenditur: quo autem minus sincera, i. e. particulis terreis magis obvoluta, v. g. metallica, eo debilius alcalium in hæc observatur activitas, ut vix eorum exteriorum superficiem aliquantum corrodat eisdemque aliquid rubiginis inducant, Sulphur nihilominus Antimonij & Cinabaris embryonatum variis modis eliciant atque absorbent. Et quamvis à nonnullis Scriptoribus Chymicis non raro sp. acidi v. g. ol. vitrioli & Aqua Regis pro Sulphuris v. g. Antimonij extractione commendetur, hocque consilium Mechanicæ respondeat: monendum tamen, sulphuris hujus secretionem neutiquam per modum solutionis talem contingere, quo menstrua illa acida cum atomis hujus coeant & uniantur; alias in sulphur putum magis agerent illudque dissolverent; sed per meram saltem metallicæ vel alterius non sulphureæ substantiæ corrosionem. Ita ut illa, nempe sulphurea, quæ à menstruo acido absorberi, minimè poterat, à vinculis suis liberata, solutioni innatet, cochleari tollenda, vel per sublimationem separanda, aut ramentis Antimonium circumcirca adhærescat instar crustæ cujusdam, sulphuris vivi texturam æmulantis. Id est, pari fere ratione acida in separando sulphure minerali concurrunt, ac v. g. alcalia fixa ad Mercurij vivi à salibus acidis in Sublimato, aut ad salium volatilium, hætenus ab acidorum compedibus devinctorum, vel ad Auri ab Argento per Aquam fortem, secretionem conferunt. Quemadmodum enim alcalia illa non in Mercurium aut Sal urinosum sublimandum, nec aqua fortis in Aurum, sed tantum in acida hætenus fixentia & Argentum vim suam exerunt; ita acida quoque menstrua, regulum Antimonij discontinuando, sulphuri libertatem restitunt.

§. 28. Sale volatili turgida Menstrua sunt Salia & spiritus urinosi quivis, qui non tantum in vegetabilia, & animalia, sed mineralia etiam, agunt, quemadmodum per Spiritum urinæ, Salis ammoniaci, cornu cervi &c. non saltem vegetabilium olea essentialia provocantur, & Tinctura v. g. Castorei elicitur, sed ex Cupro, Argento &c. item ex floribus sulphuris, Tincturas elici, notissimum est.

§. 29. Excipiunt hæc Menstrua acida, qualia vegetabilia, & mineralia potissimum, interdum etiam animalia, prout de formicis & apibus differunt. §. 16. indigatum fuit, fundunt. Operantur hæc in corpora mineralia non salina, alcalica, terrea, imò in vegetabilia ac animalia quoque, v. g. in aurum, argentum, Antimonium, oculos cancrorum, corallia, ebur, spinas & carnes serpentum, gummata & gummi resinas, v. g. myrrham &c. ita tamen ut acetosa illorum particula à metallis difficulter & non nisi Igne intensione abacta, interdum recedant & pristinam formam iis concedant, ab aliis vero terreis, quæ circa sui corruptionem ignem fortiorem non sustinent, avelli planè nequeant, v. g. oculis cancrorum.

§. 30. Restant ex Menstruis salinis Acido-Salsa, v. g. Nitrum, Sal Ammoniacum, Terra foliata Tartari, & his cunctis anteponendum Sal Tartari essentificatum: quæ sicut particulis valde penetrantibus, minus tamen cortosivis, constant, ita eorum quædam vegetabilibus præcipuis extrahendis simulque horum cruditatibus corrigendis inserviunt, v. g. Terra foliata Tartari in purgantium virulentia attemperanda omnium optimum hætenus observatum fuit remedium, & Tartarus ille Tartarizatus catholicus & potentissimus in vegetabilibus referandis existit clavis, ut vel in Elixir proprietatis

confectione, per hoc menstruum adorna-ta saltem experiri licet, cujus ingredientia cuncta quoad minima eidem auscultant. Quædam nihilominus eorum etiam firmioris texturæ corpora subeunt, ita ut dictum sal essentiale Tartari Nitrum & Sal commune metalla non tantum, ex Willsi mente, superficialiter aliquantum corrodat ac cum particulis horum in rubiginem abeant, sed eadem quoque tota in calcem redigunt v. g. in Croco Auri, quem Zosterferus Pharm. Aug. p. 466. & Maniff. Sp. g. p. 316. describit & in Marte solubili cum illo Tartari sale conficiendo.

§. 31. Medio modo se habent Sulphureo-Salina v. g. Spiritus vini simplex & Tartarizatus Tinctura Tartari, Spiritus vini cum sale Urinæ temperatus &c. Spiritum vini equidem vulgo sulphureis meris accendunt, sed malè, non modò quod ab oleis quoad diversos effectus differat, dum illa sulphur commune dissolvunt, hic minime, idem tamen aqueis &c. connubit, quod ab oleis meris nunquam expectandum: Sed quod per fermentationem paratus particulas salinas, vel plures intertextas, vel magis evolutas, gerat, adeoque de harum præsentia minus in hoc quam in oleis, dubitare conveniat. Eundem autem Spiritum Tartarizatum & Tincturam Tartari aliquid adhuc molecularum alcalicarum imbibisse, vel sapor eorum alcalicus odorque singularis, vel hoc testari poterat, quod Sal Tartari, à quo Spiritus vini cohobatus fuit, notabiliter immixtum deprehendatur, Tincturaque Tartari ad siccitatem destillata aliquid, licet exiguum, Salis ejusdem post se relinquat.

§. 32. Refero huc Terebinthinam & vitellum ovorum, quatenus illud in gummatis resinosis dissolvendis perquam commodum observant recentiores Tharmacopœi, v. g. in gummi hedera, galbano, myrrha &c. quæ alias & olim per acera solvere conabantur utpote quod concretum non salinas & mucilaginosas tantum, sed resinosas quoque, earum partes, quas acetum haud attingit, aggreditur. Hoc agere puto ratione æque substantiæ sulphureæ, quam in liquamine illo præpolleat, omnes ultro concedent, ac salina, quam ejus textura resinosa necessario involvit, à posteriore autem confirmat vis diuretica, & sal acidum in spiritu seu oleo terebinthinæ sensibile: quamque pariter concludere jubemur, quod resina illa in aqua communi aliquantulum cocta huic aliquid suæ substantiæ concedat quæ per aquæ frigida inspectionem in pelliculam variis coloribus ornatam & in veram terebinthinam inspissatur; qualem vim solvendi in pure sulphurea aqua alias non habet. Vitelli autem in ejusmodi subiectis dissolvendis energiam hætenus nominata saltem terebinthina experta fuit, nunc eandem tentant Recentiores in resinosis aliis v. g. resina gualappa, balsamo Peruviano, item oleis destillatis quibuscunque. Quod pariter à textura hujus massæ sulphureo-Salinæ contingere, inde anguror, quod oleum ex illa expressum præter oleaginitatem acrimoniam notabilem, vitia cutis varia detergentem, ostendat, adeoque plurimum salis quoque ipsi inesse, suadeat. Bohnius.

De Furnis & Vasis.

Varii Furni describuntur ab Auctoribus, variorum sunt inventiones, quales & furnos quidem Philosophicos, quos sic vocat, integris operibus tradidit Glauberus. Alii apud Sennertum, Rhenum, Libavium, &c. videri possunt. Sed si dicendum quod res est, nulla tot ac tam varios furnos exigit necessitas. Inventionibus suis indulgent Auctores illi, at, sufficient nostri ad operationes omnes, quos paulò post depingemus. Pari modo se res habet, quod obiter addimus, cum Athanor five Furno Philosophico excoquendo lapidi dicato vereque mihi dictum videtur à Scriptore, quodam, facile inveniri posse nitum, dummodo ovum adsit,

hoc est, cognita sit materia mysterij illius, & operandi modus.

Generalis verò furnos construendi modus, quem meritò primò tradimus, sequens est: Infima cujuscunque furni pars *Cinerarium* dicta, positis, intusque applicatis formâ ad rotunditatem accedente, ut æqualiter magis contineatur calor, lateribus constituitur ac relinquitur in medio lateris anterioris cujuscunque *Cinerarij* foramen (*das Aschen-Loch*) ejus altitudini duo lateres sufficiunt. Postea imponitur *craticula*, sex vel septem ferreis digiti latitudine à se invicem distans constans bacillis, & ab eâ circulariter ductis lapidibus alijs erigitur focus duorum itidem latorum altitudine: Foramen habet hic focus superimpositum quasi inferiori, ejusdem cum eo longitudinis ac latitudinis (sufficiunt autem sex vel octo digiti quadrato) ejus per quod carbonēs immittantur: (*das Kohlen-Loch*) Foco huic per medium imponitur ferrum. Catinum basis loco continens, sicque circumcirca in formâ quadratâ vel rotundâ, pro ut vas impositum se habet, apponuntur lateres, eâ altitudine, quam requirit vas ipsum, hoc tamen observato, ut vas sive Catinus à parietibus spatio duorum digitorum per transversum undiquaque distet. quo eo melius ambiens admittatur aer: Superius quomodocunque claudatur furnus, quatuor relinquantur foramina, quæ quatuor digitorum capacitatem quasi habent, & spiracula sive registra audiunt, quia per ea respirat quasi ignis & tegitur. Unde suis operculis illa instructa esse debent, quæ etiam inferiora desiderant foramina.

Sic se habet modus construendi furnos, qui oculari demonstratione melius addiscitur usuque. In specie verò furni, quos necessario requiri diximus secundum quatuor à nobis explicatos gradus, sequentes sunt: 1. Balneum Vaporis ac Mariæ (sive Maris) sic dictum, quod aquam contineat, sicque ex mari factum est Mariæ, in gratiam potissimum B. Virginis, unde Basilio Balneum hoc audit (*das Bad der Allerheiligsten Jungfrauen*) Communiter autem Balneum Vaporis in hunc modum conficitur: inferius est catinus aliquis æneus furno exceptus, qui aquam per tubulum infusam recepit, ei superimponitur alius æneus æquæ, qui hamulis suspensa excipit vasa, ut ea attingat vapor, à quo incalescunt. Per superius foramen aliquod aqua exhalare potest; sed & illud operculo obstructum est. *Observabis verò hoc in balneo tota incalescere vasa, id quod in digestionibus & Putrefactionibus quandoque conducit, in circulatione autem non aque, utpote quæ frigidum expetit in superiore vasis aerem, à quo condensantur spiritus.* Et in hunc finem tum balneum hocce tum aliud & nostrum, de quo paulò post, superiorem fundum superimpositi valis, apertis foraminibus pertundi potest, ut exitum illa præbeant vitrorum collis; illa verò firmanentur, ac foramen ambiens occluditur circulis plumbeis diversæ magnitudinis sibi invicem superimpositis, quorum ultimus exactè collum ambit, luto autem muniuntur omnes. Diximus Balneum hocce calore excedente ad temperiem quandam posse reduci, quod quomodo fiat, ex descriptione Pigri Henrici innotescet.

Succedunt itaque Mariæ Balnea, ad quæ ratione gradus primi ferè venter equinus referri debet. Hunc ut conficias, arcem quasi figurâ quadratâ, eâ, quâ placuerit magnitudine, confice, eique summum recenter calidum immitte, ac vasa impone, tectoque ligneo clauditur cista, hæc, sumo ad medium ferè (cistâ) impleatâ quo exhalationi liber sit locus, Calor hic durabit ad octiduum, quatuordecim dies ferè; Conservari autem diutius potest, si immisceatur firmo, calx viva ad quam per canales patet accessus aquæ calidæ infundendæ subinde; sic enim accedente aquâ suscitatur vapor, à quo furnus incalescit.

Communia Mariæ Balnea ex catino æneo constant, per terreos enim penetrat aqua, excipiuntur illi furnis

generaliter descriptis. Vasa ijs imponuntur vitrea unice ob dictam paulò antè rationem, plumbeis ligata circulis, non æquè verò retortæ adhiberi possunt, in balneis hijs, siquidem ad fundum usque illa non penetrant, nec colla habent egressum, ut tamen retortam ex Balneo etiam possis destillare, ita procede. Catino æneo ollam immitte aggravatam lapidibus, altam ita, ut retortæ venter margini ejus imponi possit, ita, ut collum ejus debite promineat. Superius tegitur retorta linteo madido, ne frigidior aer accedat. Ita se habent Balnea.

Circa Catinos arena & furnos ejus notandum haud quicquam aliud est, quàm quod catini illi non adedè profundi esse debeant: Sufficit spithamæ altitudo, ut venter cucurbitæ solummodò excipiat, nam si nimium promineat catinus, citius incalescit etiam cucurbitæ collum cum alembico, cum dispendio destillationis.

Ignis aperti furnus sequentia observat; à Cinerario usque ad extremitatem sacci, eademque (quæ) generalis structura est. Sacco verò per transversum duo ferrei baculi imponuntur, quæ retortam recipiunt. *Estque de sacco specialiter notandum, quod alius ille ultra spithamam esse non debeat;* in principio enim, dum lento procedimus igne, paucos immittimus carbonēs: Si verò intra retortam & craticulam ingens nimium sit spatium, incalescit non adedè benè retorta; *estque optimus omnium pro furno hoc suppressionis ignis.* Supra ferreos illos bacillos exporrigitur altius furnus, contractis subinde lateribus, usque dum, pyramidaliter in medium aliquod foramen quadratæ figuræ sex vel septem digitorum designat. Ex illâ verò parte, ubi collum retortæ prodire debet, latus integrum relinquitur apertum, quod deinde immisâ retortæ lateribus alijs claudendum est. Hæc formâ si furnus fuerit exstructus, trahitur fortius ignis, estque extremus tunc ejus gradus, quando superius illud foramen unâ cum inferiori & cinerario apertum est, ac luculenta erumpit flamma, unde primus gradus primò adhibendus innotescit. *Furni Anemii* structura sequens est: (*vid. Tab. VI. Fig. 1.*) Capacitas ejus quadratæ figuræ ultra duas vel tres spithamas non exporrigitur, quia solummodò crucibula recipit. Cinerarium verò extruitur altius, ac bonæ spithamæ magnitudine pro copiosiore aeris ingressu. Sic & craticula latior esse debet, cui ex terra vel ferro quasi quidam circulus est accommodatus, qui crucibulum recipit. Imponitur ei quandoque frustum lapidis, quando altius crucibulum componitur, Sicque primò formatur saccus altitudine trium vel quatuor spithamarum, & ultra æqualiter exporriguntur latera, supra tamen saccum distantia spithamæ per transversum ducitur latus, medio pervium foramine, per quod flamma pergit & supra illud tanquam fundum denovo exporrigitur furnus; sicque constituitur quasi quædam camera, unde pro ea interius itidem relinqui debet foramen apertum, cum operculo ejusdem magnitudinis, pro ut interius fuit in cinerario, & tale etiam esse debet carbonum vel sacci foramen, ut crucibula majora immitti possunt. Supra cameram definit furnus in canalem aliquem oblongum & rotundum, foramini, in quod coarctatus est furnus, impositum, per quem flamma exit. Estque hic furnus potissimum inventus à Glaubero, fundendis metallis, etiam sine folle apertissimus. Furnus reverberatorius (*vid. Tab. VI. Fig. 2.*) in eo solummodo à reliquis differt, quod supra saccum suum fornicatus sit, in eum finem (superius) fundo quasi distinguitur, qui duabus ferreis laminis continetur, ita ut undiquaque duobus digitis à parietibus distet, per quod spatium in superiore partem, quâ fornix est, flamma prorumpit. Fundo huic imponitur materia, quæ reverberari debet, valis terreis excepta, antè adeoque pro ingressu, cornuæ januæ loco foramen patet. Et fornix quidem supra fundum spithamæ magnitudinem extructa, undiquaque ostiolis quasi pervia est, ut flamma possit erumpere.

Supereſt, ut jam deſcribamus Pigrum Henricum qui ita dicitur, quod lentum calorem foveat, & ut ordine agamus, ac ea, quæ in ſuperioribus deſunt, ſuppleamus, primò partes ejus delineabimus, dein ex iſdem eum (*vid. Tab. vi. Fig. 3.*) componemus. Balneum Mariæ noſtrum deſcribendum primò eſt: illud verò conſtruitur ex catino æneo vel rotundâ vel quadratâ figurâ, & fundum habet ligneum perforatum, qui à fundo ipſius catini quatuor vel quinque digitis tranſverſis diſtat: ſub eo aqua eſt, quæ per tubululum ex laminâ ferreâ tenuiore factum, infunditur: Fundus, quem ita vocamus, ligneus, paxillo ſtraminis tegitur, & ſuperimponitur linteum expaſum undiquaque per catinum, arenâ ſpithamæ altitudine repletum. Tubulus, per quem infunditur aqua, clauditur: margo lignei fundi circumſcricâ probè eſt obturatus, aqua adeoque vapor per fundi illius foramina aſcendens, madidam reddit arenam linteo impoſitam, quâ de cauſâ illâ non adeò incaleſcit. *Balneum Vaporis* (*vid. Tab. vi. Fig. 4.*) ut debiti & temperati ſatis caloris ſit, per tubulos ex inferiore catino aquâ pleno porrectos, ac epistoimis ſuis inſtructos vaporem admittit, ſed in ſuperiore ſui parte, quæ eodem modo inſtar catini alicujus eſt, fœnum: quod vaſa recipit; imbuit, ſic per epistoimia tantum admitti poteſt vaporis, quantum requiritur, ac prætereâ fundus ſuperioris vaſis foramen habet aliquod, ſuperius pariter ac inferius reſectum operculo, hoc ut frigidior aura accedere poſſit, illud, ut exhalet vapor calidus, ſicque immittuntur vaſa, quæ ſi prominent extra catinum, obturantur circulis plumbeis ſibi invicem ſuperimpoſitis. Inferior catinus aquâ impletus, coopertus eſt æneâ laminâ, aperto unico ſolùm foramine, quod claudi poteſt, & per quod aqua infunditur: Sic enim aquæ vapor per tubulos illos ſuperiora petere cogitur.

Jam componemus Pigrum noſtrum Henricum, (*vid. Tab. vi. Fig. 5.*) circa quem tria præcipuè attendenda, ut etiam locum habeat, quo ceu parte aliquâ ventris ſui foveat nonnulla, quæ ſiccitatem amant, v. g. alkalia, quæ aliâſin aere facile diſſolunt, adeoque baſis ejus Matrix veluti, ita conſtrui debet. Ampliore aliquantulum capacitate erigitur furnus communis quidem modo, ſed tertium habeat operculum præter duo: unde eo uſque porrigitur carbonum ſaccus: Igni enim ac calori ad minimum 24. horarum ſufficere debet. Hiſce ſuperimponitur Balneum Vaporis, quod paulò antè deſcripſimus, ſed ita illud coarctari debet, ut ut pro majori ſuperioris catini capacitate incurvati aliquantulum ſint tubuli, ut à latere quædam quaſi receptacula ſint, latitudine ad minimum dimidiæ ſpithamæ, aperta interius, ac clauſa operculo ligneo, hiſ enim ut dictum, excipi poſſunt vaſa illa, quæ calorem optant. A latere uno Balneum Mariæ extruitur toto furno, ita tamen, ut ſaccus ejus foramine ſit apertus in ſaccum ipſius ventris Pigri Henrici, idque cum in finem, ut quando ſatis ſuperque balneum hocce eſt calefactum, immiſſis carbonibus foveri poſſit calor, à calore ex communi quaſi ventre traducto, in quem finem Binei foramina claudi debent. Ex alterâ parte conſtructus furnus eſt catinis ſuis noſter pluribus diſſinctus, ad quorum ſingulos peculiareſ abeunt tubuli ænei inſtructi epistoimis: & porrecti ex alio aliquo foramine communis ventris, quem ita vocavimus, regiſtris autem ſuis ſinguli catini furni illius ſunt inſtructi; & ex communi quaſi tronco contiguo foraminis illius clathris ferreis munito oriuntur tubuli illi. Furnus eorum communi foramine eſt apertus, ut ad ſingulos fieri poſſit acceſſus, adeoque tubuli illi ita ſibi cohererent, ut diviſi in partes poſſint eximi ac purgari, luto obduci in juncturis ſuis, ſicq; figendis rebus quibuſcunq; majori vel minori ignis gradu inſerviunt illi

catini quæ omnia demonſtrat figura. Sub ipſis verò tubulis æneis ſpatium haud pervium cinerarij foramine, dicta illa vaſa, quæ calorem amant, continere poteſt communiter. Cæterum, altera pars hæcce Pigri Henrici ſuperiorem habet fundum. inſtar catini majoris, ad quem diſtinctè communis ventris pergit calor, & hæc ratione Piger Henricus conſtrui poteſt, qualem ac artiſcioſum 40. annorum decurſu habuit B. M. Dn. Doct. Michael. Furnos hoſce ſive ſejunctim ſive ſeparatim in uſum vocare ſufficit, modo obſerves omnis generis magnitudinis eos eſſe debere, arenæ præcipuè catinos, ne in gratiam vaſis alicujus minoris cum carbonum ac temporis diſpendio accendere neceſſum habeamus; conducit eum in finem furnum etiam habere minorem portatilem & verſatilem, ex ferreis factum laminis, qui pro varâ intentione & ſublimationibus inſervit & deſtillationibus ignis aperti.

Furnum dekimaficum, den Prober-Ofen, ſi placet, adjungere poteris; ejus autem ſtructura à reliquis non adeò diſfert, aperti potiſſimum ignis, ſaltem quod minoris magnitudinis ſit, tribus vel quatuor ſpithamis deſinitæ ex laminis ferreis, luto intus ac lapidibus munitis ſuperius in acumen deſinentis; Ferreos duos elathros tegulam fornicatam, quæ per anterius foramen oſtiolo clauſum ſuo intromittitur, recipit. Tandem & forſan Philoſophicum furnum deſiderares, ac tale aliquid ſimile ei, olei ope ac ellychnij conſtrui à multis; varias hinc inde etiam apud Auctores, Libavium (Bernhardus potiſſimum & Enchiridij Phyſici Auctor furnos verè Philoſophicos deſcribunt) delineationes occurrere ſcio probè, ſed offerre eas haud lubet. Videor enim mihi nidos componere, antequam vel avem habeam, vel ovum; hoc eſt, materia ſit cognita & operandi modus, ſacili negotio & nidos inveniemus. Sufficiant nobis furni noſtri.

Ille verò locus, quo excipiuntur Furni, communiter Laboratorium vocari ſolèr, de quo pauca monere lubet. Talem autem locum cuius cujuſcunque oportunitas designat ac neceſſitas, cui ſi parendum eſt, ſufficit ſibi invicem unâ aliquâ ſerie appoſuiſſe furnos, ita ut medium teneat Mariæ Balneum noſtrum, quod loco vaporofi ſimul erit, habeatque ad latus Furnum Pigri Henrici, alterum inſtructum tubulis, ſub quibus locus erit recipiendis vaſis, quæ in loco calido, ut dictum eſt, reponi debent, deſtinatus. Reliquum ſeries conſtituent furni duo vel ites catinorum diverſæ magnitudinis, ex unâ parte furni illi omnes foraminibus ſuis aperti eſſe debent, ut ordine omnibus imponi poſſint carbones, ex alterâ parte, in quam lux magis incidit, receptacula vitrorum prædeunt. Sic furni in medio alicujus conclavis ordine poſſunt exſtrui, latus ejus tenet furnus ignis aperti cujus ſuperiori foramini ſi cannam ex argillâ applices, & aperturam anteriorem, per quam retortæ collum exit, dimidiâ ac ſuperiore ejus parte claudas, per reliquum enim immittuntur crucibula, loco anemij tibi erit. Hiſ omnibus ſi portatiles aliquot quocunq; in loco reſiſtos addideris furnellos, ferreum præcipuè minorem deſcriptum paulò ante, habebis quantum ſufficiet.

Si verò ornatum ſpectas, elegantiffimum, aliquod Laboratorium nunc in modum conſtrues: Rotundæ vel quadratæ figuræ ſit ædificium, commodior tamen rotunda figura eſt, quæ deſinit in ſpiralem camini ſcil. mediij acuminati, per quæ fumo pater exitus. Rectâ ſub illo camino integer exſtrui debet Anemius furnus, qui lateri non apertis foraminibus junctum habet focum; incinerandis, coquendisque rebus nonnullis deſtinatur. Ad latera officiij in orbem quaſi furni paulò ante dicti omnes, bini ſemper juncti ſibi etiam pro igne aperto apponuntur, ut inter ſingulos binos ſuperſit ſpatium, quod & receptaculis utraque ex parte prædeunt.

deuntibus sufficiat, & accessum faciat liberum. Piger Henricus ignis aperti furni curvaturæ sphaericæ figuræ eleganter possunt accommodari. Porrectus autem supra furnos paries partim fenestras continet, partim receptacula valorum, quæ destillationibus inserviunt. Terram propè ac fundum ædificij, hinc inde per tria aut quatuor foramina facta affabre aëti concedatur ingressus, pro majori furnorum evenilatione, qui per calaminum habet exitum. A latere huic ædificio jungatur aliud quod inferius Museum habeat, in quod ex Laboratorio pateat aditus vel vasis reponendis, vel miscendis materialibus ac adornandis destillationibus destinatum. Ex ejus superiori contignatione deciduis carbonibus per cistam aliquam oblongiorem clausam operculo mobili pater aditus, qui in Laboratorio cistâ aliâ excipiuntur. Ita possumus & necessitati inservire & ornatiui, modò insuper attendamus in Laboratorio omnia ordine fieri debere ac decenter; instrumenta singula suis loci reponi; quot verò eorum desiderentur, dicetur, in sequenti cap. Oportunum esset prolixius hic inquirere, an certum aliquod tempus constitui debeat pro laboribus Chymicis, ac siderum influxus; sic enim marce, e. gr. non nisi horâ martis &c. fundj nonnulli volunt, & vitrum antimonij non nisi sereno cælo: nec negari potest, aerem ambientem alterare etiam vitra destillatoria, unde difficilior destillatio est hyberno tempore & tardior, frigusque repellit. *Sed quanquam concedi posset, pro ratione intentionis attendi etiam debere vel influxum sideris vel certum tempus, quia tamen totum illud negotium vel obscurum est, aut pro ut describitur communiter, sibi non constat, & experientia respondet, idèd observationem haud meretur, labores hi omnes traditi hoc in opere temporum observationes illas haud requirunt, sed possunt omni tempore confici, nocturno etiam fundi vitra, modò diligenter attendantur Enchirises, & in iis sinus exercitati satis. Circumstantias quasdam temporum circa labores observari debere non negamus, v. g. fervidiore sub Sole citius fieri crystallisationes: tempore pluviarum facilius fluat aliquid per deliquium, spiritus sulphuris per campanam fit, sed hac non tam tempore debemus quam tempestate & aëri, cui similes qualitates etiam sine aëre solo calore & aquâ potest producere Ars. A Sole intensiore in crystallos facilius coguntur salia, ratione intensioris caloris, diffiunt alkalia citius in aëre humidioris ratione humiditatis, unde & Caput mortuum vitrioli citius efflorescit, sic & naturæ hoc tribui debet rei ipsius, circa quam occupati sumus, e. gr. quod ros verno tempore colligi debeat; alio quippe non decedit. Siderum influxus si applicari possunt, ascensionis eorum ac positus rationem habendam esse, (sed quod potissimum est, materiam etiam influxui aptam preparandam esse.) utique largior: Optimum interea tempus est illud, ut singula ordine agantur, ac pro indigentia, quam operationes ex se habent, ratione, v. gr. post filtrationem salium, eorum evaporationem esse instituendam, auctor sum. Confer ea, quæ de temporibus balsamicis dicta sunt ab Helmontio. Hæc enim hisce eleganter per analogiam possunt applicari.*

Instrumenta secundaria vocare hic lubet ea, quæ ad furnos spectant (præcipue,) ac officiis villioribus sunt destinata, primaria enim in antecedenti capite sunt enumerata, & iis portiori adhuc jure annumerantur mentis sequenti capite tradita. Ex his nostris itaque instrumentis primò sunt Vitra. Vitrum in genere, optimum verò censetur, quod vesiculas non habet, illa quippe inclusum gerunt aerem, & ex duabus constant laminis, quarum adeoque exterior facile rumpitur, interior non minus, à quâ vitri jactura fit: pari ratione grandines in vitro colligati rumpunt illud facile, vel perforant, cum enim sint lapides, inæqualiter cum vitro incalescunt, & nimio concepto calore, dissilire illud aliquantum faciunt, aut relicto sui vestigio & foramine ex eo profiliunt. Vitrum porro optimum censetur, quod consistentia mediocri est, crallum enim nimis cum

vehementiorem ignem requirat, à quacunque mutatione facilius dissiluit: si verò nimis subtile fuerit, ab illusione frangitur citissime, quod plus satis in retortis vitreis muranis, quæ vel intra manus cum luto munirentur, sunt ruptæ, (folij chartacei tenues,) experti sumus. *Est & hoc præcipue attendendum, vitrum omne, quam primò factum est in Furnis (die Kuhl-Oefen dictis) debite frigi fieri debere, alioquin ab ambiente frigidioris aëre rumpitur facile, Unde enchirisis circa usum vitrorum universalis notari debet, frigida scil. frigida, & calefactis calida (vasis) infundi debere, alioquin & si frigida calidis injiciantur, ruptura fit: Etenim particulæ salinæ in vitro ab igneis particulis, ubi incaluerit, frigidus accedente, solvi quasi incipiunt, certè aguntur & pelluntur quasi, unde vitrum dissiluit. Sic sali communi ab igne liquefacto, si frigidum instillet, subito incipiunt fumi & spiritus exhalare. In negotio hoc enchirisis est, ut dum calidius frigidiori vasi instillamus, aliquantulum ejus premittamus, ac subitò vas moveamus, sic enim calidum non in aliquam partem solummodo agit, sed divertitur quasi, ac vitrum omne equaliter incalescit.*

Circa usum porro vitrorum in genere sequentes notandæ sunt regulæ: 1. *Debitam eorum copiam, habere debemus, (quod frequentissimum est) statim substitui possit aliud, ne differre operationem necessum habeamus. Sane si nullum aliud hoc certè ingens impedimentum est laboris, præsertim quando vitra peregre peri debent. 2. Pro laborum diversitate ordinata ad eam & destinata etiam vitra habere debemus, e. gr. pro spiritibus vini, similibus oleis ac aquis alia, alia contra pro foetidis, destillatione e. gr. spiritus C.C. viperarum &c. Etenim odores foetidorum altius penetrant, nec elui possunt, aut difficile saltem: Foetore autem alia, quæ iis infunduntur, inficiunt. Acida quidem etiam penetrant, sed cum salina sint, facile aqua, elui possunt. Sequitur hinc & tertio subito, postquam finita destillatio est, vasa elui debere, ne foetorem imbibant alius, vel remanens acidum frangat ea, etenim memini sæpius, vasa grandia recipientia non eluta subito, tandem totoque fuisse corrosa & rupta; acidum quippe in alkali vitri agere non desinit, seque cum eo conjungere, ita, ut viderim vitrum circulariter ruptum in crystallos quasi acido cum vitri dicto alkali. Malè adeoque sibi consulunt, qui tempore longiore uno aliquo in vase spiritus acidus reservant: hinc damnum illi patiuntur non unum, dum per se quasi ac in repositoio, lagena spiritui vitrioli plena rupta est.*

Sed jam videbimus Vitra in specie: Ex illis primò sunt Phiola, (vid. Tab. VII. Fig. 1.) quæ in laxiorem ampliata ventrem, strictioris & æqualis colli esse debent, ut Hermetice sigillari possint; pro rectificatione salium volatiliū verò collo laxiore aliquantulum phiola esse potest, ne copiosiore sale obturetur. Phiola verò diversæ magnitudinis ad varios usus haberi possunt.

2. Cucurbita, colli exprorecti protuberantis aliquantulum in extremitate, ut eo melius alembicum recipiat, ac denique ventris æqualiter rotundi, quanquam aliâ etiam figurâ haberi possit, non amplo adeò expansoque ventre. Prior tamen melior est pro rectificatione spirituum, siquidem ex ejus ventre non æquè Phlegma ascendere potest. Dividuntur cucurbitulae in majores, die Herren-Kolben (dictas; medias, quæ Mittel Kolben audiunt;) & minores, quas cucurbitas separatorias, Scheid Kolben vocamus; siquidem in iis Cinnabaris Antimonij rectificatione separari solet. Cucurbitis majoribus, quæ circiter octo vel decem mensuras aquæ recipiunt, quæ majora sunt, recipientia audiunt, suntque adeò:

3. Vasa recipientia, per quæ ea intelligimus, quibus utimur in destillationibus ad recipienda destillata, atque ea quidem omnis generis esse possunt, (Phiola, Cucurbita minore) (vid. Tab. VII. Fig. 2.) estque observandum pro destillatione spirituum, quo majora sunt recipientia vasa, eo melius hoc esse. Unde cucurbitæ colli strictioris

Etioris alembicis applicari possunt. *Ceterum quando destillantur spiritus primâ vice majora requiruntur recipientia*, quæ diversæ non minus magnitudinis sunt. *Est autem observandum, recipientia illa vasa oblongioris esse debere colli, ut si rumpantur, pars colli aliqua demi possit; quod ipsi vasi non officiat*, quia periculum collis imminet, ductu enim quasi spirali spontè nonnunquam rumpuntur, luto muniri debent: *vas integrum ne rumpatur, collum semper obturatur, ne frigidiori aeri pateat aditus, à quo rupturæ periculum non minus est.*

Tandem ut integra servemus vasa hæc in destillationibus, utimur collis vitreis, *die Vorstosse*, quæ quartò medio suo ventre debent esse largiora, ut eò melius ac primùm capiant spiritus. Interveniunt illa potissimum vasis recipientibus, ne illorum colla, dum nimium incallescunt, rumpantur; *sed observandum de iis, ut ventris suo equaliter in apicem desinant*, (quod figura monstrat:) (vid. Tab. VII. Fig. 3.) alioquin si ventricosa nimis fuerint, liquor & oleum ex iis in recipientis non defluit. *Enchirisis est, quo magis collum in ventrem recipientis abit, eo magis continentur spiritus, ne per juncturas exhalent.* Ceterum elegantissimi destillandi modi sunt, quippe quibus fracturæ periculum ac spirituum iactura evitatur, quando scilicet vel collum, vel ipsum vas recipientis instructum tubulo est, cui aliud adhæret vas recipientis.

Quintò, Ita ex Tubulo Phlegma & oleum crassius excidit, spiritus verò subtiliores per tubulum in vas alterum recipientis penetrant, sicque subsequentes spatium amplius inveniunt. Non negamus, alterius illius recipientis aerem obstare, quo minus adeo facile in illud



se recipientis spiritus adveniunt tamen eorum copiam cedere cogitur aer. Aliàs, ut tractum aeris efficiamus, illeque ex altero recipiente respirare quasi possit, ultimo recipienti tubulum angustioris foraminis itidem applicamus, per foramen illud exit aer, non tamen spiritus, siquidem eò usque & in tertium recipientis non perveniunt.

Sextò Alembici, de quibus præcipuè notandum, collum eorum equaliter rotundum esse debere, non figurâ ovalis, nec inequaliter desinentis, aliàs enim ipsæ cucurbitis strictè non possunt accommodari. Rostrum ex iis descendens inclinatum debet esse debet, ut liquor omnis eo melius exstillet, quo rotundius magis est, eo melius: alioquin si compressum fuerit, facile obturabitur à salibus volatilibus. Pro sublimatione etiam salium volatilium adhiberi semper debent Alembici qui rostrum amplius habent, ob eandem, quam modò dixi, causam, hoc enim neglecto, & ubi obturatum fuerit rostrum, vitrum omne vidi sæpius elevatum ad tectum usque fractumque penitus. Ipse venter Alembici quò amplior est, etiam si diversæ magnitudinis ratione, quâ pro collis phiolarum, cucurbitarum &c. opus habemus, collum eorum quo sit strictius, eo melius est, sic enim patet magis locus ipsis spiritibus, salibus, non incallescunt Alembici, adeo cito. Alembicus cæcus est sic dictus, quia rostrum non habet, de cuius usu paulo post.

Septimò Retortæ, de quibus notandum, & collis longioris eas esse debere, sic enim liquor longiore viâ descendens refrigeratur magis, & incurvati eleganter, in gratiam vasorum præcipuè recipientium, quæ eleganter possunt iis applicari, tum etiam ipsius destillationis, siquidem in collis illis magis circulatur liquor.

Octavo Circulatoria, quorum variæ figuræ, nescio in quales spiras & anfractus contortæ communiter exhibentur ab Auctoribus, Pelicani, Dioptræ, vid. de illis Schemata apud Sennertum Rhenanum, Libavium,

aliosque. Sed apparatu illo non indigemus, quinimo vel planè non, vel difficile negotium cum illis succedit, & intra gyros illos contentus spiritus facile eâ rumpit. Sufficiunt nobis Circulatoria ex solis cucurbitis (vid. Tab. VII. Fig. 4.) arctissimè sibi inclusis (ac lævigandos) muniri que luto. Grandior est inferior cucurbita, ne præponderet superior, & collarum orificia unico saltem circulo se contingunt; ut liquor in vas superius ascendere, quod si in medio sui clavum quasi ex solido vitro habeat, ab eo circulatoris liquor decidens medium materiæ protinus ferit, sicque circulationem & solutionem abbreviat. Digerere etiam solemus sub alembicis cæcis, de quibus communis est error, quod externè reliquorum alembicorum adinstar, cucurbitis applicentur, sic enim quod in alembicum elevaratur, iterum ad pristinam materiam non redit; si vel nil quicquam elevari debeat, nec possit, cæcis illis alembicis opus non habemus. Ita collo cucurbitæ suæ alembici alii sunt accommodandi, prout de duplici C C. tã sibi superimpositâ modò dictum est. Alioquin etiam & communiter in Phiolis Hermetice sigillatis circulationes fieri solent, sed certè cum vasis illis procedendum: Acta enim intensiore igne, materia eam facile rumpit. Elegans pro circulatione instrumentum etiam est (vid. Tab. VII. Fig. 5.) liquor enim ascendit, amplioribus receptis spatii tantum periculi non infert, superior ejus pars, vel cum cucurbitâ vel cum cæco alembico dicto modo committitur. *Observandum est de circulatoriis omnibus, ut vasa eorum superiora servantur frigida.* Operationes inferius cap, de Circulatione dicendæ.

9. Rectificatoria, hæc sunt vasa, quæ rectificationibus spirituum volatilium interserviunt, qualia ex descriptis veterum illis circulatoriis (etenim in iis rectificatio cum quâdam quasi circulatione) multa non minus in usum vocata sunt, sed dicto paulo ante successu. Sufficiunt nobis vitra, quæ instat Phiolæ strictioris aliquantulum sunt colli, quo impediatur, ne phlegma alium parietibus supernis ascendat adeo facile. In ventre hujus vasis tubulus aliquis constitui potest, per quem phlegma crassius abit, superiora petente spiritu.

10. Separatorium, (vid. Tab. VI. Fig. 7.) quod quasi duplex filtrum sibi superimpositum est: Foramen inferius minimum esse debet, ne abundante aere adeo facile liquor effluat, amplius est superius foramen cerâ obturandum, sic spirituosâ separantur, quæ in apertis filtris facile exhalarent.

11. Concha, (vid. Tab. VII. Fig. 6.) quibus utimur ad crystallisationes, tum ad solutiones in aere, tum ad exiccationes, distendi enim in iis eleganter potest materia. Illæ, quæ solutionibus per deliquium interserviunt, tubulum habent à latere, ut solutus jamjam liquor in subjectum vas defluere possit.

12. Vasa ampliora, quæ Germanicè *dir Zucker-Glaser* vocamus, pro evaporationibus & crystallisationibus.

13. Mortariola vitrea: (vid. Tab. VII. Fig. 8.) Orichalceis enim ut possumus, quando misceri debent corrosiva, quæ æruginem extrahunt.

14. Denique omnis generis Vasa recipientia, quæ *die Einsafs Glaser* vocamus, pro asservandis scilicet spiritibus ac destillatis omnibus. Hæc communiora vasa vitrea sunt, quibus opus habemus, alia quivis ex Auctoribus petere, vel suo Marte invenire potest.

Instrumenta sunt porro figulina, & parantur ex Argilla, Cucurbitæ scil. Retortæ, Vasa sublimatoria tubulata. Crucibula, Tegulæ fornicatæ &c. Alembici & Recipientia Vasa ex terrâ (figulinâ) hæud confici debent, siquidem cum omnis terra porosa sit, vel transmittant spiritus, vel quomodo destillatio procedat observari nequeat; imò & Cucurbitæ ac Retortæ, nisi proba fuerit, ac firma satis terra, in usum vocari non debent,

bent, (ob eandem quidem rationes.) Sic enim vidi ex retortâ argillaceâ cum sal & spiritus C. C. destillaretur, spiritum omnem fuisse à terrâ imbibitum, ut in recipiens nil quicquam transierit: Retortæ verò fragmenta denudò destillata, omne reddebant, quod imbibierant. Utimur autem vasis terris apertis potissimum in Igne, siquidem non adeò facile, uti vitrea, ab intensiore flamma rumpuntur. Unde crucibula non nisi ex argillâ esse possunt. Attendendum itaque, non omnem argillam ad instrumenta hæc esse idoneam: ob causas, quas jam innuimus. *Hinc in Germaniâ unicam ferè habemus Waldenburgensem, unde vasa Waldenburgensta tantopere commendata sunt, utpote quæ ignem ferunt, quia tamen nimis sunt vitreata crucibula ex iis confici nequeunt, sed usu recepta apud nos sunt Hassiaca, aliaque; quæ Celsæ sigulorum in Austriâ ac propè Noribergam conficiuntur.* Firmior terræ hujus compages est, & ultima illa crucibula à miscelâ Martis nigricant, eaque de causa fusa in iis nigra reddunt aut intescent, de quo vid. Zvelferus. *Quo magis pinguior Terra est, eò melior quidem existit, ut in Igne persistet, admixta arenâ preparari potest: arena quippe pinguedinem illam attemperat, & firmitatem vasis conciliat,* eo ipso dum ab Igne cum eâ colliquatur. Terreæ autem particulæ potissimum consistentiam dant ipsis mixtis, atque sic quidem etiam ex quacunque argillâ, omnis enim pinguis est, optima conficiet vasa, attendendo primum, *ut ei vitrum ac silices subtilissimè pulverisati largitur admisceantur.* Secundo, *ut vasa ex iis conficiantur & optime ad solem exiccata diutius quàm communiter cum ollis culinariis &c. fieri solet, igniantur & vitrificentur:* Waldenburgenfes in gratiam instrumentorum horum ignem ad 16. vel 24. horas continuant. Est & hæc Enchiridis observanda, *vasorum illorum ruptorum ab usu, fragmenta omnium optime pulverisata vasis novis loco vitri & silicis admisceri.* Cum enim vitrum & silices colliquati jam sint, ad faciliorem & solidiorem illorum compagem faciunt.

Deveniamus jam ad vasa ipsa in specie:

Cucurbitæ & Retortæ à vitreis peculiare nil habent. Sublimatoria (vid. Tab. VII. Fig. 9.) autem, pro quibus tamen etiam Retortæ adhiberi possunt, communiter sunt vel cum tubulis, vel sine tubulis. Cum tubulis Sublimatorium est cucurbita, tubulum in ventre habens, cujus collo (Sublimatorii cum tubulis) superimponuntur aliquot (quasi) alembici; sine tubulis instrumentum conficitur ex duabus partibus, ut alterum alteri superiri possit, de horum usu acturi sumus suo loco.

Spectat huc Instrumentum tubulatum, quo utimur in destillatione Clyfforum.

Regula Fornicata, (cujus) usus ex dokimasticorum libris petendus. Sic ex argillâ furni integri, catini, opercula furnorum confici solent, quorum omnium (tamen) descriptionem in antecedentibus jam tradidimus.

Superfunt itaque reliqua instrumenta ex materiâ metallicâ, v.g. Pyramis &c. quæ in sequentibus paulò post tractentur. Jam de usu dictorum instrumentorum præcipuè videndum est; qui tamen, cum alia aut reliqua prolixè huc usque sint tradita, in adaptatione & lutatione eorum consistit; *Estque in antecessum observandum, lutum omnium optimum esse, ipsam rerum substantiam, quæ destillationi subijcitur, ut eam attendamus ac naturam ejus, & conforme iis ignis Regimen instituiamus, alioquin si (quodlibet) luto vasa essent munita, aucto nimis igne jactura introducereur.* Deinde quando exactè arctèque contingunt vasa (*dass sie sich vvol schliessen*) optimum illud lutum est, etenim si interjiciatur nimium chartæ imbibit illa spiritus, convenit tamen aliquantulū interponere, partim ut exactius claudantur, partim ut exterioris vitri fractura evitetur, id quod fieri potest, dum vitrum interius, quod proximè attingit, exterius incalescit. Juncturæ tandem

clauduntur lutis, quale commune est ex farinâ cum aquâ subactâ, quæ chartæ injunctum vitris circumponitur. Sufficit lutum hocce, quia facile iterum removeri potest, modò ea, quæ paulò ante diximus, rite recteque observentur. *Firmius alioquin glutinat ovi albumen vesica inductum, aut si cum eo calx viva, vel etiam caseus recens subigatur:* hoc enim lutum quasi in quendam lapidem induratur, stringente, ut rectè habet Helmontius, aciditate calcis vivæ glutinositatem casei vel ovi albuminis. Fracta vitra eodem luto linteolis inductæ lutare solemus, vel etiam lithargyrio oleo lini subacto, quo utimur etiam pro vasis, in quibus spiritus acidi destillantur: acidum quippe olci cum lithargyrio & sale ejus saccharino sejungendo, detinetur à terrâ ejus, ac acidis præcipuè spiritibus illud inservit. Quia autem in superioribus dictum: acida in oleosis fatiscunt; *sic vitrorum etiam fragmenta glutinat ichthyocolla soluta in Spiritu vini ac inungendo superinducta aliquoties,* etenim glutinosa ejus particulæ in quasi quasdam pelliculas tandem tandemque concreverunt. Ex colophonio, cerâ ac vitri pulvere, cerâ item Hispanicâ obturantur colla illa, quæ calorem non sentiunt, nam alioquin lutum liquefcit. Sigillum Hermetis hoc observat, ut phiolæ collum (majora enim & ampliora ita colliquari nequeunt, quin non rumpantur à copiosiore aere intra cavitatem contento) probè circumpositis carbonibus ab igne colliquatum sit, quod dum sentimus, inclinare illud forcipe calefacto, (ne à frigido rumpatur) aliquo usque in altum protrahere debemus; sic enim in apicem quasi pervium minimo foramine abit, quod, quando vitrum frigidum factum est, tubulo aliquo & candelæ igne clauditur. *Observandum tamen, ut si oleosa & Spiritus vini phiolæ sint inclusa, collum antequam hoc modo sigilletur linteolo esse abstergendum;* videmus enim accensum spiritum vini hoc modo in manibus incauti alicujus vas omne fregisse. Dixi, vasa amplioris colli hoc modo Hermetice sigillari non posse: Pro iis utimur pulvere aliquo Anatron qui 2. lithargyrii 1. scobis Martis, vitri Venetiani 1. silicis calcinatorum 2. pulverisati, per septem horas fluant in crucibulo: ut scilicet vitrum, quod à scobe Martis & lithargyrio vim majorem penetrandi habet, quâ colli lutatione vitrum vitro sociat. Margini colli successivè & probè tamen igni inspergitur pulvis hic, quod dum liquefcit, vitri frustum aliud calidum item factum imponitur, sicque simul colliquefcit.

Reliquorum instrumentorum usus ex doctrinâ de Operationibus, quæ opè illorum perficiuntur, specialiter innotesceat. *De crucibulis saltem notandum adhuc quod semel illa madida facta ignem amplius non ferant: aquam enim imbibunt, à qua quasi fatiscunt.* Ut vero eo melius materiam, quæ in illis fundi debet, contineant (perforantur enim facile ab Antimonio &c.) cretâ interius oblinuntur. *Hæc quippe ceu terra aridior resistit magis, & alterum alteri imponitur, ut rupto forsitan uno, persistet tamen aliud.*

Superfunt Instrumenta reliqua; ex quibus.

1. Est Pyramis, der Gießspuckel, ex ære facta, (usus habetur in cap. de Regulis.)

2. Infundibulum, der Einguss, quo tamen præcipuè Antifabri utuntur.

3. Forcipes, quales tres habemus, Validiorem, quâ utimur ad tollendum crucibulâ fusâ materiâ plena: Longiorem ac Graciliorem, ut aliquid ex vehementiori igne tollere, carbonem eximere, imponere aliquid &c. possimus: Versatilem denique ac minorem ad sigillanda vitra.

4. Circuli majores & minores ferrei (die Spreigeisen) ad scindenda vitra; exactè rotundi illi esse debent, sic igniti probè circumducenda admoventur vitris, quo facto aliquantulum aquæ aspergitur, à quâ rite diffiliunt. Rumpuntur alioquin etiam circumpositis funiculis sulphuratis accensisque.

5. Mortaria aurichalcea, ferrea, lapidea. Elegans





Fig. 2.

Furnus Reverberatorius.



Balneum Vaporis. Fig. 4.




Fig. 5. Piger Henricus.





Figura undecim Tabulae quae in Opere Septima designatur.

Fig. 1.



Cucurbita Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5. Vas rectificatorium.



Fig. 6. Concha.




Fig. 7. Separatorium.



Mortario-lum vitreum.

Fig. 8.



Fig. 9.



Sublimatorium tubulatum.




Instrumentum pyriforme ad mensurandum.




Fig. 11.




Filtrea vitrea liquore impleta sibiq. imposita.



Instrumentum ad mensurandum.







gans est, quam nonnulli Molam Philosophicam vocant, (in quâ quidem per rotas pistillum circumagitur,) sic eò facilius res pulveriscentur.

6. Circuli ex stramine pro reponendis, & plumbo, pro retinendis in balneo vitris. Et plumbei quidem circuli funduntur supra terram intra arenam madidam, in quâ istiusmodi circuli vestigium factum est.

7. Baculus ferreus ad purgandam craticulam.

8. Rutabulum ad evacuandum Cinerarium.

9. Denique Baculi lignei incurvati in apice linteo instructi, quibus utimur ad eluendas sordes. Oleosa autem à C. C. &c. eluuntur aquâ & cineribus, quia alkali eorum in oleum abit, vel etiam furfuribus, illi enim cum prapingues sint, olea itidem imbibunt, ut ex doctrina de principiis patet. Ita vilissimæ etiam operationes suas habent fundamenta: ita lavant lotrices. Acida eluuntur solâ aquâ communi calidâ, quæ eò melius agit: etenim acida quando coagulata vitri parietibus adherent, in sal quasi coagulantur, uti antecessenter, & in hoc cap. dictum: Salia autem solâ aquâ solvi, ex antecedentibus etiam patet. Baculi autem incurvati esse debent, ut in vase purgando vitri ventris parietes attingere possint; alioquin & filis ferreis ad eximendum aliquid uti solemus, modò iis non tractemus alia, quæ ferrum rodunt, urinosa etiam, ea enim spurciciem contrahunt. Denique &:

10. Ut vitra, quæ recipientia vocavimus minora, claudamus, cera opus habemus, quæ & cera comm. p. IV. terebinthina p. j. (hæc additur, ut cera magis tractari possit) simul liquefiant, sed à volatilibus & oleosis cera illa absimitur, adeoque melius operculis ex subere (tractabile enim illud lignum est) consueuntur, illisque superinducitur cera, ac de reliquo opercula muniuntur vesicâ madidâ, quæ melius adhæret & (operculis) filo colligatis. Optimè omnium ac elegantissimè tandem clauduntur orificia vitreis operculis lævigando immisissis, (quod einschleiffen vocamus) & continentur illa ab operculis aliis ex argento vel stanno factis (die Schrauben Germanicè vocamus.) Barnerus.

Explicatio Tabularum Chalcographicarum quibus Furni, vasa, variaque alia Instrumenta Chymicis Operibus dicata è variis Autoribus petita depinguntur.

T A B U L A V I I I.

- A. Cucurbita. Une Cucurbita. Kolbe.
- B B. Cucurbitulæ sibi invicem occurrentes, pro circulationibus peragendis. Cucurbites de rencontre pour des circulations. Kolbe zu circuliren.
- C. Retorta, seu Cornuta. Retorte ou Cornue. Retort.
- E. Recipiens seu Excipulum. Un Recipient ou Balon, Recipient oder Vorlag.
- F. Alembicus vitreus capitello à toto minimè divisibili instructus. Alembic de verre avec son chapeau qui ne se separe pas, ou qui est tout d'une piece avec le reste. Blind-Alembic.
- G. Vas vitreum circulatorium. Vaisseau de verre pour les circulations. Circulier-glas.
- D. Vas vitreum quod Infernum vocant. Enfer de verre. Gießpuckel.
- II. Gemelli, Gemeaux. Doppelt Alembic.
- KK. Crucibulum. Creuset. Ziegel.
- H. Vas circulatorium quod Pelicanum vocant. Vaisseau circulaire nommé Pelican. Pelican.
- u. Ferum pro excindendo collo tum recipientium seu excipulorum, tum cucurbitarum. Fer pour couper le cou des recipients & des cucurbites. Rund eysen die gläser zu schneiden.

Mangels Bibl. Pharm. Tom. II,

O. Matratium longiori collo donatum. Matras à long cou. Kolbe mit einen langen Hals.

Q. Matratii Capitulum. Chapeau du Matras. Helm zu der Kolbe.

R. Recipiens seu Excipulum adaptatum matratii capitello. Recipient attaché & uni au chapeau du matras. Recipient mit dem Helm an die Kolbe verlutiret.

L. Capitellum cæcum. Chapeau ou Chappe aveugle. Blind-Helm.

Y. Vas vitreum oleorum separatorium. Vaisseau de verre pour separer les huiles. Ein glas die olea zu separiren.

X X. Matratium Matratio ita adaptatum ut superius in inferius descendat pro digestionibus & circulationibus. Matras de rencontre pour les digestions & circulations. Doppelte Kolbe.

P. Phiala vitrea infundibulo suo pro filtrationibus munita. Phiole ou bonceille de verre garnie de son entonnoir pour les filtrations. Ein glas mit dem Trechter zu filtriren.

N. Capsula terrea. Capsule de terre. Erdene Capsel.

a. Obturamentum incisuræ capsulæ. Bouchon de l'échancrure de la capsule. Zapfen zu der Capsel.

y. Conus fusorius, seu Cucullus terreus pro proiciendis regulis. Cornet de fer pour jeter les regules. Einguß.

r. Siphon. Siphon. Regal.

M. Ovum philosophicum. Oeuf philosophique. Philosophisch Ey.

e. Forcipes ferrei. Pincettes de fer. Zangen.

T. Catinus vitreus. Plat de verre. Glasschale.

Z. Vasa aptata separationi olei ab aquis stillaritiis mediante ellychnio. Vaisseaux pour separer l'huile des eaux distillées avec la mèche. Scheidglas die olea der distillirten wasser mit einer Lunden zu separiren.

b. Vas vitreum pro separandis oleis. Vaisseau de verre pour separer les huiles. Scheid-trechter die olea zu separiren.

V d. Duo Capitella vitrea sibi invicem imposita quorum inferius per partem sui superiorem perforatum existit. Deux Chappes de verre l'une sur l'autre, dont celle du dessous est ouverte au haut. Zwey gläserne Capseln auff einander gelegt / da die untere oben auffgemacht seyn muß.

f. Vas cupreum pro Balneo Mariæ. Vaisseau de cuivre pour le Bain Marie. Kupffern-kessel zu dem Balneo Mariæ.

S. Infundibulum. Entonnoir. Einguß / oder auch Trechter.

g. Mola chalybea. Moulin d'acier. Stahlene Mühle.

l. Forcipes ferrei. Tenailles de fer. Eiserne Kneipfzange.

m. Funiculus metalli teres typus. Lingottiere. Klumpen.

T A B U L A I X.

F I G U R A I.

- A. Furnus destillatori spiritus vini inserviens. Fourneau pour la destillation de l'esprit de vin. Ofen den Spirit. Vin zu distilliren.
- B. Vesica cuprea intus stanno obducta aquam vitæ continens. Vessie de cuivre étamée au dedans contenant l'eau de vie. Kupfferne Blasen inwendig verszinnet / worinnen der Brandtwein.
- C. Tubulus cupreus terpeantinus columna suffultus. Serpentin de cuivre soutenu d'une colonne. Kupffern Rohr an eine stange gehalten.
- D. Tubuli terpenitini capitellum. Chapeau du serpentin. Helm zu der Kupffern Rohr.
- E. Refrigeratio in n. Refrigerant ou Refrigeratoire. Refrigeratorium.

E

FIGU-

FIGURA II.

- F. Alius furnus destillationi spiritus vini interserviens. *Autre fourneau servant à la destillation de l'esprit de vin.* Ein ander Ofen den Spirit. Vini zu destilliren.
- G. Vesica cuprea itanno intus obducta aquam vitæ continens. *Vessie de cuivre étamée au dedans contenant l'eau de vie.* Kupferne Blasen inwendig verzinnet / woeinnen der Brandtwein.
- H. Tabulus serpentinus itanneus. *Serpentin d'étain.* Zinnerne Röhr.
- I. Capitellum vitreum. *Chapiteau de verre.* Ein Helm von Glas.
- K. Recipiens seu Excipulum. *Recipient.* Recipient oder Vorlag.
- S. Obturamentum ostii seu januæ furni. *Bouchon de la porte du fourneau.* Zapfen der Ofen thüre.
- X. Fulcrum, Excipulum spiritus vini istanneus. *Gueridon portant le Recipient de l'esprit de vin.* Stuhl den Recipient haltende darein der spir. vini stalt.

FIGURA III.

- A. Furnus Reverberii. *Fourneau de Reverbere.* Ofen zu reverberiren.
- B. Operculum fornicatum superius perforatum, furno reverberii imponendum. *Couvercle fait en Dôme ouvert par dessus, que l'on applique sur le fourneau de Reverbere.* Runder Deckel den man auf den reverberirten Ofen sehet / welcher oben offen seyn muß.

FIGURA IV.

- H. K. K. Furnus in quo possunt collocari quatuor Cornutæ seu Retortæ pro destillatione. *Fourneau où l'on peut distiller avec quatre Cornues ou Retortes tout d'une fois.* Ofen damit man auf ein mahl destilliren kan.
- I. I. I. I. Quatuor Receptacula seu Excipula majora quatuor Cornutis seu retortis aptata. *Quatre grands Recipients pour les quatre Cornues ou Retortes.* Vier grosse Recipient für die vier Retorten.

FIGURA V.

- A. Furnus pro Aludele. *Fourneau pour l'Aludel.* Ofen pro Aludele.
- B. Aludel. *Aludel.* Aludel.
- CCCC. Vasa Aludelis. *Vaisseaux ou Pots de l'Aludel.* Fassen zu dem Aludel.
- D. Aludelis Capitellum. *Chapiteau de l'Aludel.* Helm zu dem Aludel.

TABULA X.

FIGURA I.

- G. Furnus ventosus. *Fourneau à vent.* Lust-Ofen.
- H. Furni Porta seu Ostium. *Porte du Fourneau.* Ofen-Thür.
- I. Extremitas tubuli qui ventum in furnum deducit. *Extrémité du tuyau qui conduit le vent dans le fourneau.* Das Ende des Canals / welches die lust in den Ofen hinein führet.
- I. I. Tabulus ventum deducens. *Tuyau qui conduit le vent.* Canal welcher die lust führet.
- L. Follis. *Soufflets.* Blasebalch.
- MM. Lignum sustinendo folli, illique itidem movendo interserviens. *Bois servant à porter & mouvoir les soufflets.* Holz welches man braucht die blasebalche zu tragen.
- OO. Caminus. *Cheminée.* Schornstein oder Kamin.
- P. Quadrum ferreum craticula furni vicem gerens. *Quadré de fer servant de grille au fourneau.* Ein vierrehtige eysen wie ein Rost zu dem Ofen dienende.

Q. Lamina ferrea quæ imponitur Quadro ferreo. *Pièce de fer plate pour mettre sur le cadre de fer.* Eine eyserne Stang so platt / auf das vierrehtige eysen oder Rost zu stellen.

FIGURA II.

- A. Alius furnus ventosus. *Autre fourneau à vent.* Anderer Lust-Ofen.
- a. Laterculus protrahendo crucibulo. *Pièce de briques pour soutenir le creuset.* Ziegelstein den Ziegel zu unterstützen.
- b. Crucibulum in furno collocatum. *Creuset mis dans le fourneau.* Ziegel in den Ofen gestellet.
- C. Tuba ferrea tripedalis orificio furni imponenda pro augendo calore. *Trompette ou Domino de fer pour mettre sur l'orifice du fourneau afin de donner plus grand feu.* Eyserne Trommete auff des Ofens mund loch zu stellen / umb das Feuer größer zu machen.

FIGURA III.

- A. Furnus. *Fourneau.* Ofen.
- B. Vesica cuprea intus itanno obducta. *Vessie de cuivre étamée au dedans.* Kupferne Blasen inwendig verzinnet.
- T. Capitellum. *Chapiteau.* Helm.
- D. Doliolum continens aquam pro refrigerando liquore distillante per tubulum doliolo annexum in Excipulum transmittendo. *Tonneau contenant de l'eau pour rafraichir la liqueur qui distille & qui est conduite dans le recipient par un tuyau attaché au tonneau.* Ein Fass mit wasser gefüllet darinnen eine Röhr durch welche das liquor destilliret und durchgeheth in den vorangezogenen Recipient.
- E. Recipiens seu Excipulum. *Recipient.* Recipient.

FIGURA IV.

- C. Furnus pro destillatione herbarum in Arenæ Balneo. *Fourneau pour la destillation des herbes au Bain de Sable.* Ofen die Kräuter im sand zu destilliren.
- D. Vas cupreum intus itanno obductum herbas continens. *Vaisseau de cuivre étamé au dedans contenant les herbes.* Kupferne Blasen inwendig verzinnet darinnen die Kräuter.
- E. Capitellum cupreum intus itanno obductum. *Chapiteau de cuivre étamé au dedans.* Kupferhelm inwendig verzinnet.
- O. Recipiens. *Recipient.* Recipient.

TABULA XI.

FIGURA I.

- A. Furni pigrificæ. *Henrici pigræ, seu Athanoris Turris.* *Tour du fourneau de paresse ou Athanor.* Thurn des ofens Athanor genandt.
- B. C. Furni ejusdem membræ duo, in quæ calor è turri devehitur. *Deux parties du fourneau de Paresse ou Athanor où se porte la chaleur de la tour.* Zwey Stücke des ofens Athanor genandt / wohin sich der hitze zeucht.
- D. Canalis supernus angustior, sed sensim versus inferiora dilatatus quo carbones continentur. *Canal étroit par le haut, mais qui va insensiblement en élargissant vers le bas, dans lequel sont contenus les charbons.* Enge Röhr für den obertheil / welche aber unten unempfindlicher weyse in außbreitung gehet / darinnen die Kohlen sind.
- E. Exprimis Officium per quod calor à turri in membrum furni sinistrum transmittitur, quod officium in parte dextra non depingitur quia sic contra picturæ leges peccaretur. *E. Exprime la porte ou orifice*




FIG. I.





FIG. II.



B







FIG. III.



X



S









FIG. V.









E

FIG. IV.












FIG. I




FIG. III




FIG. II




FIG. IV





FIG. V



FIG. VI




FIG. VII






FIG. 3



FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7



orifice qui prend dès la tour de l'Athamor & porte la chaleur dans la partie gauche de ce fourneau, on n'a pas pu exprimer la même chose du côté droit, parce que cela auroit été contre les règles de la Peinture. Litera E verzeichnet das Thor oder mundloch / welches den anfang nimbt von dem thurn Athamor / und trägt die hize in die lincke seite diesens ofens. Man hat nicht können eben dasselbe auf der rechten seiten austrucken / weil es wider die Regel des gemahls gewesen wäre.

- FF F. Obstruamenta spiraculorum quæ quatuor in utroque furni membro scil. dextro & sinistro reperiuntur pro variè moderando calore in illa deveniendo. *Bouchons des registres ou soupiraux, qui sont au nombre de quatre dans l'une & dans l'autre des parties du fourneau qui sont à droite & à gauche de sa tour, pour moderer & régler diversément la chaleur que l'on y veut introduire selon le besoin.* Vier Zapfen in dem ofen neben dem thurn / zwey an der rechten und zwey an der linken seithen / umb das feuer zu guberniren / nach dem man die hize haben will.
- P. Obstruamentum Canalis turris, qui scilicet canalis obstruatur postquam carbones in ipsum immitti ignem aliquatenus conceperunt. *Bouchon du canal de la tour, lequel canal on prend soin de boucher quand les charbons qui ont été jetés dedans, ont en quelque façon pris feu.* Zapfen der Röhre des Thurns / welchen man stopffen muß / wann man die kohlen hin ein geworffen / oder adgezündet hat.

FIGURA II.

Hac Figura Furnus depingitur Philosophicus. Cette Figure depeint le Fourneau Philosophique ou Four à lampe. Diese Figur mahlet oder zeichnet den philosophischen ofen oder Lampen-thurn ab.

- a. Furni fulcrum seu fundamentum. *Soutien ou fondement sur lequel est porté le fourneau.* Der grund auff welchem der ofen steht.
- b. Lampas quatuor clychnis instructa quæ elevatur & deprimitur pro exigentia mediante coclidio. *Lampe à quatre mèches qui se hausse ou baisse suivant la nécessité, au moyen d'un vis.* Lampe mit vier lunden / welche sich in die höhe hebt / oder nenget / der nothdurfft nach / und zwar mit einer schrauben.
- c. Tripus vas furno conclusum sustinens. *Trepied soutenant le vaisseau renfermé dans le fourneau.* Dreyfuß welcher das geschirz im ofen hält.
- d. Vas cum ovo philosophico. *Vaisseau avec l'œuf philosophique.* Das Geschirz mit dem Ovo philosophico.
- eee. Pars furni prima, secunda, atque tertia. *Première, seconde & troisième partie du fourneau.* Erster / zweyter und dritter theil der ofens.
- ff. Fenestra ex vitro pro peripicienda materia. *Fenêtres vitrées pour voir la matière.* Gläserne Fenster die matery zu sehen.
- gg. Vitra ovata figuræ fenestris opposita. *Vitres ovales opposées aux fenêtres.* Fenster wie ein ey / gegen das gläserne Fenster.
- h h h. Spiracula. *Soupiraux ou Registres.* Ofen-Löcher.
- n. Thermometrum quo mensuratur gradus caloris. *Thermometre ou instrument pour juger du degré de la chaleur.* Thermometrum.

FIGURA III.

Hac Figura depingitur furnus & vasa quibus oleum seu spiritus sulphuris conficitur. Cette Figure depeint le fourneau & les vaisseaux avec lesquels on fait l'huile ou esprit de soulfhre. Diese Figur mahlet ab den ofen und die geschirz mit welchen man distilliret das oleum oder spiritum sulphuris.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

- A. Furnus à terra cocta. *Fourneau de terre cuite.* Ofen von gekochter erden.
- E. Cucurbitula in ignem immissa. *Cucurbitule qui est dans le feu.* Kolbe die in dem Feuer ist.
- f. Parvulum orificium per quod sulphur in cucurbitam projiciat. *Petite ouverture par où l'on jette le soulfhre dans la cucurbitule.* Klein Loch durch welches man den Schwebel in die Kolbe wirfft.
- H. Capitellum duplici rostro donatum. *Chapiteau à deux becs.* Helm mit zwey Schnabeln.
- g g. Spiracula. *Soupiraux ou Registres.* Ofen-Löcher.
- FF. Receptacula seu Excipula. *Recipients.* Recipienten.
- K K. Fulcra Recipientium. *Soutiens des Recipients.* Stügel der Recipienten.
- ll. Vasa terrea sulphur pulveratum continentia. *Vaisseaux de terre contenant le soulfhre pulvérisé pour en faire les projections.* Erdene Geschirre den gestofften schwebel darein zu verffen.
- m. Prominentiæ in cucurbitula collo quibus capitellum sustinetur. *Prominences ou élévations qui sont au cou de la cucurbitule, & soutiennent le chapiteau.* Höchsteilungen so am hals der Cucurbit / und dem Helm halten.

FIGURA IV.

- V V. Vasa terrea majora pro destillatione spiritus sulphuris. *Grands pots de terre pour la destillation de l'esprit de soulfhre.* Großer erdentr Hafen den spiritum sulphuris zu distilliren.
- OO. Campanæ vitreæ. *Cloches de verre.* Gläserne Klocken.
- II. Crucibula sulphur concludentia. *Cressets contenant le soulfhre.* Tiegel worinnen der Schwebel ist.

FIGURA V.

- CCC. Catini tres vitrei majores. *Trois grands plats de verre.* Drey grosse gläserne schüsseln.
- AAA. Tria Crucibula sulphur continentia. *Trois Cressets contenant le soulfhre.* Drey Tiegel worinnen der Schwebel ist.
- EE E. Tres Campanæ vitreæ. *Trois Cloches de verre.* Drey gläserne Klocken.
- LLL. Tria Capitella. *Trois Chapiteaux ou Chappes.* Drey Helme.

FIGURA VI.

- O. Retorta in Balneo Cinerum posita materia sublimanda & difficilioris dissolutionis referta. *Retorte placée dans le Bain de Cendre, pleine de la matière que l'on veut sublimer & qui est d'une dissolution difficile.* Retorte in dem Balneo Cineris gesetzt / voll der matery welche man sublimiren will / und gleichwohl übel zu dissolviren ist.
- Q. Vas vitreum duobus à latere canaliculis S. T. & uno V. in ventre instructum. *Vaisseau de verre ayant deux canaux de chaque côté S. T. & un autre dans son ventre marqué V.* Gläsern geschirz habend de zwey röhren an beyden Seiten mit S. T. gezeichnet / und ein anders in seinen bauch mit dem buchstaben V. gezeichnet.
- S. Commissura Retortæ in Balneo Cinerum posita cum altero canaliculo vasis Q. *Rencontre ou union de la Retorte placée dans le Bain de Cendre avec l'un des canaux du vaisseau marqué Q.* Vergleichung der Retorten / in dem Balneo Cineris gesetzt / mit einem Röhre gezeichnet Q.
- P. Vesica canaliculo à ventre vasis Q. enato commissa & adaptata. *Vessie attachée & unie au canal qui sort du ventre du vaisseau marqué Q.* Eine Blase / welche am Röhre angeklebt ist / welche aus dem bauch des gläsernen geschirres gehet / gezeichnet Q.

C. Retorta alia super fulcrum X. posita in quam subtilior puriorque pars materiæ à Retorta O. sublimandæ se se infundat, dum alia pertinacior postquam aliquatenus evecta fuerit in v.a. resolvitur & in vesicam P. se exonerat. *Autre Retorte placée sur son soutien marqué X. dans laquelle se porte la plus subtile & la plus pure partie de la matière qui se sublime de la Retorte marquée O. pendant que l'autre matière plus rebelle après avoir été élevée à un certain point, se résout en chemin & tombe dans la vessie marquée P.* Andere Retorte auff seinem stügel gesetzt/ gezeichnet X in welche sich trägt der aller subtilste und aller reineste theil der materi/ welche sich auß der Retorte gezeichnet O. sublimiret/ in dem die andere böse materi/ nach-dem sie in die höhe gezogen in einen gewissen grad/ unterwegens sich resolviret/ und in die blase gezeichnet P. fällen.

FIGURA VII.

2. 4. Retortæ duæ quarum prima supra fornaculam, I. ponitur altera supra fulcrum S. *Deux Retortes dont la première est placée sur un petit fourneau marqué I. & l'autre sur un soutien marqué S.* Zwen Retorten da die erste auff einen Kleinen offen gesetzt/ gezeichnet I. und die andere auff einen stügel/ gezeichnet S.
3. Canalis in inferiore sui parte quinque canaliculis instructus quibus totidem Recipientes signati numeris 6. 7. 8. 9. 10. correspondent. *Canal muni de cinq autres petits canaux par le dessous de son ventre auxquels canaux sont attachés cinq Recipients marqués 6. 7. 8. 9. 10.* Röhre/ welche mit fünff andern röhren versehen ist/ unter seinem bauch/ an welche röhren fünff Recipient angetlebet seind/ gezeichnet 6. 7. 8. 9. 10.

Intra Retortam 2. ponatur liquor distillandus sublimandusque, quo peracto colligatis lutatisque commissuris tam retortæ 2. quam recipientium 6. 7. &c. accendatur ignis lenis, unde liquor in vaporem exaltatus primò resolutus intra receptaculum 6. deinde ulterius provectus intra recipientem 7. & sic gradatim usque ad ultimum perfectionis gradum intra retortam 4. se infundabit. *Il faut mettre la liqueur qu'on veut distiller & subtiliser dans la retorte marquée 2. & ayant en suite exactement luté les jointures, tant de la retorte marquée 2. que des recipients marqués 6. 7. &c. on allumera un petit feu, au moyen duquel la liqueur étant élevée en vapeurs, ce qui s'en résoudra le premier descendra dans le recipient marqué 6. ce qui aura un peu plus de subtilité, d'activité & de force, se portera jusques au Recipient marqué 7. & ainsi insensiblement dans les autres suivans, selon les divers degrés de perfection, jusques à ce que ce qui se trouvera posséder le plus haut degré de subtilité & de perfection, s'insinue dans la retorte marquée 4.* Man muß die liquor/ welche man distilliren und subtilisiren will/ in die Retorte gezeichnet 2. setzen/ und nachdem man fleißig verlutiret/ so wohl die retorte gezeichnet 2. als auch die recipiente gezeichnet 6. 7. &c. muß man alsdann ein klein feuer anzünden/ durch dessen mittel sich die liquor als wie ein dampff in die höhe heben wird/ was sich am ersten resolviret/ wird in den Recipient gezeichnet 6. distilliren/ was aber noch subtiler und stärker/ wird in den Recipient gezeichnet 7. distilliren/ und also unempfindlicher weyse in die andere/ nach der unterschiedene grad der vollkommenheit. Endlich aber was sich auff dem höchst-subtilsten grad findet/ wird sich auch in der retorten gezeichnet 4. finden.

TABULA XII.

FIGURA I.

- A. Furnus sublimationi florum sulphuris inserviens. *Fourneau servant à sublimer les fleurs de soufre.* Ofen die flores sulphuris zu sublimiren.
- B. Capsula ferrea in ignem immissa. *Capsule de fer mise sur le feu dans le fourneau.* Eisen Capfel in dem ofen auff das feuer gesetzt.
- C. Vas terreum tubulatum canaliculis scilicet tribus uno superiori D. lateralibus duobus FF. instructum, in parte verò sui ima perforatum ut materia per canaliculum D. projecta in capsulam ferream descendat. *Vaisseau de terre ayant trois tuyaux, l'un au dessus marqué D. les autres à ses deux côtés marqués FF. ouvert par sa partie inférieure pour que la matière que l'on jette par le canal D. descende dans la capsule de fer.* Erden geschirz drey Canal habens de/ einen oben gezeichnet D. die anderen auff seine beyde seithen gezeichnet FF. offen an seinem unteren theil/ damit die materi/ welche man durch die Röhre gezeichnet D. wirfft/ in den Eisen Capfel falle.
- G. G. Doliola duo fulcris suis O O. imposita & canaliculis lateralibus FF. commissa ut flores à capsula ferrea sublimati per vas terreum evecti in illa progrediantur ut ibidem colligantur. *Deux petits tonneaux placés sur leurs soutiens marqués O O. & unis avec les tuyaux lateraux FF. du vaisseau C. afin que les fleurs qui se sublimeront dès la capsule de fer après avoir été élevés au vaisseau de terre marqué C. passent jusques dans la cavité desdits tonneaux & y soient ramassés.* Zwen kleine Fässer auff ihren stügel gesetzt/ gezeichnet O O. und einig mit den röhren an den seithen des geschirrs C. gezeichnet FF. auff daß die Flores die sich auß dem eysern Capfel sublimiren/ nachdem sie in die höhe des erdenen geschirrs gezeichnet C. gezogen/ in die höhligkeit der benagnten Fässer gehen/ und heraus genommen werden.

FIGURA II.

- A. Furnus sublimationi florum Antimonii alborum inserviens. *Fourneau servant à la sublimation des fleurs d'Antimoine blanches.* Ofen die flores Antimonii albi zu sublimiren.
- V. Vas terreum tubulatum tribus scilicet canaliculis CCC. instructum, in furno collocatum. *Vaisseau de terre ayant trois canaux marqués CCC. placé dans son fourneau.* Erden geschirz mit drey röhren gezeichnet CCC. in seinem ofen gesetzt.
- D. D. Vasa duo terrea majora fulcris suis II. imposita & canaliculis duobus lateralibus CC. Vasis V. commissa aut Antimonium prius calcinatum, (prout illud fit in confectione vitri Antimonii) & per canaliculum seu tubulum superiorem C. vasis V. immisum per utrumque illius latus in ipsa sublimetur atque colligatur. *Deux grands pots de terre soutenus de leurs soutiens II. & unis aux deux canaux lateraux CC. du vaisseau V pour que l'Antimoine calciné auparavant (comme on le prépare pour travailler le verre d'Antimoine) étant jeté dans le vaisseau V. par son canal ou tuyau supérieur marqué C. se sublime par ses deux côtés jusques dans les susdits pots & y soit ramassé en fleurs blanches.* Zwen groffe Erdene häfen auff ihren Stügel gesetzt/ gezeichnet II. und einig mit den zwen röhren an den seithen des geschirrs V. gezeichnet CC. damit der Antimonium antea calcinatum, wie man ihn zuvor prepariret bat pro Vitro Antimonii, in das geschirz V. geworffen sey durch sein oberes Röhre gezeichnet C. sich sublimire durch seine beyde

FIG. I.




FIG. II.





FIG. I




FIG. II



FIG. III






FIG. IV



heyde seibten biß in die vorgemeldte häfen / und die flores Antimonii Albi herauß genommen werden.

TABULA XIII.

FIGURA I.

Icon Molæ Philosophicæ.

Representation du Moulin Philosophique.

Vorstellung der Philosophischen Mühlen.

- A. Capicellum plumbeum satis crassum. Chapiteau de plomb passablement gros & épais. Bleyern Helm ziemlich groß und dick.
- B.B. Axis. Axe ou Essieu sur lequel roule la machine. Wagenart auff welchem das gebäu umbdrehet.
- C. Tympanum dentatum. Tambour dentelé. Trommel die kleine zählein hat.
- D. Tympanum aliud ex totis constans. Autre tambour composé de plusieurs petits bâtons ou fuseaux. Andere Trommel auß viel kleinen hölzern gemacht.
- E.E. Mortarium. Mortier. Mörsel.
- P.P. Pistilla. Pilon. Stößer.
- F. Manubrium cujus beneficio mola agitur. Emmanchement ou poignée au moyen de laquelle on donne le mouvement au moulin. Häßtung / durch dessen mittel man die bewegung der mühlen giebt.
- a. Superius axis est rotunda. Au dessus du tambour l'axe ou l'essieu est rond. Oben auff der Trommel ist der wagenart rund.
- b. Hic axis est quadrata. Ici au dessous du tambour l'essieu est carré. Hier unter der Trommel ist der wagenart viereckicht.
- c. d. Hic utraque pistilla axi affiguntur. C'est ici que les deux pilons s'attachent à l'axe. Hier ist es da sich die zween stößer an dem wagenart anheften.
- e. Hic utraque pistilla per firmum æneum anulum firmantur. Dans cet endroit les deux pilons sont raffermis par un fort anneau de cuivre. In diesem orth seind die zween stößer gestärcket durch ein starken Kupffern Ring.
- f. f. Hic utraque pistilla æneis capsulis firmantur. Dans cet autre endroit les deux pilons sont soutenus & fortifiés par des capsules de cuivre. In diesem andern orth seind die zween stößer unterstützt und gestärcket durch die kupfferne Capseln.
- g. g. Utraque crassa vitrea pistilla. Deux gros pilons de verre. Zwen grosse gläserne stößer.

FIGURA II.

Referri debet ad paginam ubi de præparatione potus Coffi sub titulo CAFE.

Ceci doit avoir son raport à la page où il est parlé de la preparation du Coffi ou Caffé sous le titre CAFE.

Dieses muß getragen werden ad pag. da geredet ist de præparatione Coffi vel CAFE.

- A. Ramus arboris Coffi seu Caffé proferentis. Branche qui porte le Caffé. Ist von dem Baum welcher die frucht Caffé trägt.
- a. Fructus arboris prædictæ. qui fructus est instar fabæ & enucleatus in duas partes dividitur b. b. Fruit de l'arbre susdit, ce fruit est comme une fève & étant sorti de son enveloppe se divise en deux parties marquées b. b. Frucht des vorbenahmbten baumes / diese frucht ist wie eine Bohne / welche wann sie außerhalb der Schalen sich in zwen stücke theilet / und gezeichnet ist mit dem buchstaben b. b.
- B. Ferreum instrumentum per quod fructu Coffi repletum & operculo suo C. tectum transire possit. Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

veru quò ad ignem agitur. Instrument de fer que l'on remplit du fruit nommé Coffi ou Caffé, on le couvre en suite de son couvercle marqué C. & on passe une broche au travers pour le tourner autour du feu. Eisen Instrument / welches man füllet mit der frucht Coffi oder Caffé genandt / hernacher mit seinem deckel decket / wie gezeichnet mit dem buchstaben C. und welche mit einem spieß durchstoehen und an dem feuer gewendet wirdt.

FIGURA III.

Instrumentum vitreum seu phiala pro præcipitatione mercurii vivi per se in Arenæ Balneo. Instrument ou phiole particuliere de verre, au moyen de laquelle on precipite le mercure vis au Bain de Sable sans aucune addition. Instrument oder besonderes gläß durch dessen mittel man den Mercurium vivum precipitiret in Balneo Arenæ ohne eznige zusehung.

O. Orificium phialæ per quod immittitur mercurius decies cum sale & aceto lotus ac toties per corium expressus. Embouchure par où on jette dans le vaisseau le mercure lavé dix fois avec le sel & le vinaigre & passé autant de fois au travers d'une peau. Das loch durch welches man den Mercurium in salze und effig zehen mahl abgewaschen / und auch zehen mahl durch ein leder gesehyer / in das geschirz wirfft.

FIGURA IV.

Hic exhibentur instrumenta pro floribus Saturni conficiendis.

On donne ici les instrumens pour la fabrique des fleurs de Saturne ou plomb.

Alhier giebt man die Instrumente die Flores Saturni vel plumbi zu prepariren.

- V. Retorta terrea duplici rostro per via cujus fundum nonnihil planum sit. In eam immittitur plumbum prius cum sulphure calcinatum quoad friabile fiat, illud subtiliter terendum ac per cribrum trahendum, atque addendum salis tostii tantundem atque boli Armenæ duplum, ut in prædictam retortam hujus immittatur miscellæ non multum simul & semel, sed tantum quoad vix quarta ejus pars impleatur. Retorte de terre ayant deux becs ouverts à ses deux côtés & dont le fond doit être un peu plat, on met dedans du plomb calciné premierement avec le soulfre, en sorte qu'il en devienne friable, on le broyé exactement, & après l'avoir passé par un tamis on lui joint son pesant de sel decrepité, & le double de bol d'Armenie, on met dans la susdite retorte pour une fois une quantité de ce mélange qui ne remplisse tout au plus que la quatrième partie de sa cavité. Erdene Retort zwen offene Schnabel an seinen beyden seys ten habende / und dessen grund ein wenig eben seyn muß / darein man erstlich thuet bley mit schwebel calciniret / auff das man es reiben könne / und nach dem es durchsiebet / thuet man hinzu seiner schwäre decrepitiret saltz und den gedoppelten Bolus Armenæ. Man thut in die oben benahmte Retorte auf ein mahl ein klein wenig von dieser Vermischung / damit es zum meisten nicht mehr fülle als den vierdten theil seiner höhligkeit.
- I. Vas recipiens amplum altero retortæ rostro scilicet tenuiori agglutinatum. Grand recipient attaché au plus petit bec de la cornue. Großer Recipient an dem kleinste schnabel der Retorten verlutiret oder angestlebet.

C. Folliculus quò quamprimum nubeculæ in recipiente conspiciuntur per rostrum recipienti oppositum paulatim & sensum inflatur, ut sic flores cum impetu ab altera parte in vas recipiens erumpant. *Petits soufflets par lesquels dès qu'on voit quelques nuages dans le recipient, on souffle doucement par le bec qui lui est opposé, & par ce moyen les fleurs se portent avec vitesse dans le recipient.* Kleiner blasbalch / durch welchen so bald man einige wolcken oder nebel in dem Recipient sihet / langsam in den Schnabel blaset / welcher ihme gegen über stehet / und durch dieses mittel sich die Flores mit geschwindigkeit in den Recipient tragen.

INTERCIPIENTIA.

Sunt Medicamenta quæ humorum & sanguinis motum interceptiunt, vocanturque aliàs *Defensiva*.

INTYBACEA, vid. *Cichoracea*.

INTYBUS, vid. *Cichorium*.

IPECACOANNA, vid. *Ipecacnana*.

IRIO, vid. *Erysimum*.

IRIS.

Iris Dioscoridi à Cælestis arcûs similitudine nomen accepit, quem variò colore floris quadamtenus figurat. *Nota characteristica* sunt flores enneapetali, folia gladii figuram referentia, acie cauli obverta.

IRIS NOSTRAS.

Nomina. Iris vulgaris *Ger.* purpurea sive vulgaris *Park.* Germanica *Fuch.* vulgaris Germanica sive Sylvestris *C.B.* vulgaris violacea, sive purpurea, hortensis & Sylvestris *L.B.*

Cord. Ab uno cespite plura & erecta erigit cubito longiora folia, duum digitorum latitudine, rectivenia, inferius in radicum capitibus conjuncta, ceu ex omnibus unum fiat, & sibi invicem inserta, singulorum apertio & inciso ventre seu carinâ alterius dorsum excipiente, superius verò alæ modo in latitudinem explicita, & in mucronem gladii figura desinentia: è quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, rectus, teres, & glaber, veluti cinereo polline conspersus, facile abstergentibus cedente, quinque aut sex geniculis interceptus, ex quibus sine pediculo exeunt, singula, caulem amplectentia folia, inferioribus eò minora quò summitati propinquiora: in tres vel quatuor ramos divisus: flores in summitate post medium veris per intervalla erumpunt, primum convolutis in turbinem membranâ paulatim se in novem folia explicantibus: ex his tria inferiora digitali sunt longitudine, circa exortum angusta, reliqua sui parte unciam multo latiora, deorsum reflexa linguæ figura, foris lividi coloris in cinereo & circa principium viridia, intus vero purpurea, seu violacea, lactis & lacteis venis prope exortum, à fimbria productis varia. Adhærat iis in interiori sinu, media folii parte, per longitudinem exprorecta lanugo, oblongis pilis inferius albis, summâ parte luteis composita, lanuginem cujusque folii aliud parvum obteggit folium, in summitate in duas dissectum, ab utroque latere herbacei coloris, (in nobis observato pallidè carulei seu cinerei) in medio livido extante dorso: reliqua tria folia & ipsa linguæ aut cochlearis formam habet, primis tamen latiora & paulo breviora existunt, & sursum reflexa junguntur: color his utrinque, cinereo lividus (imo purpureus, paulo tamen dilutior quam in propendentibus petalis) qua verò prioribus alterno positu adnectuntur purpureis & albis lineis à medio petalo ad la-

tera utrinque productis striata sunt; triduum vel quatrimum durat aut longius pro aëris constitutione, deinde contrahitur & decidit, inferius oblongum ac sexangularem folliculum relinquens, intus in tria loculamenta interseptum, in quibus rotunda sunt & oblonga semina. Radicibus nititur multis, invicem in latitudinem sibi adnatis, duum digitorum crassitudine, geniculatis, in transversum striatis, per superficiem terræ sparsis, foris modicè in flavo rubentibus, intus candidis, ex inferiori parte longas, tenuisque fibras in terram agentibus, graviter tota herba, ut sambucus ferè, dum teritur spirat, præsertim radix, gustu acri, consumptorumque superfluo humore tandem odorata.

Sylvestris ab hortensi, non videtur aliter differre quam accidentibus à cultura ortis, foliis minoribus, & hyemè marescentibus, caule breviorè, floribus præcocioribus & saturatius purpureis &c.

Nascitur editis & clivosis locis inter arbuta.

IRIS FLORENTINA.

Nomina. Iris flore albò *Joh. Bauh.* Hortensis alba Germanica *Casp. Bauh. Parkins.* item alba Florentina eorundem. Iris alba & Iris Florentina *Gerard.*

J. B. Qui præcedentem rectè nôrit, & hanc novèrit, nullam quippe in radicibus, foliorum florumque forma differentiam notabilem animadvertimus, in quibus tamen utrisque coloris non modicum est discrimen. Folia enim colore ad glaucum magis accedunt. Flores paucò, sed eò tamen gratò, odore præditi, lacteo candore perfusi sunt, extimorum costis non minus quàm purpureæ, extrâ virentibus, quibus intus lutea erocomata respondent; imorum autem foliorum margines luteæ striæ percurrunt.

Nos Iridem albam Florentinam à vulgari flore albo specie diversam non facimus. Differentia sola est in radicibus, quæ in Florentinâ majores, crassiores, solidiores, candidiores, odoratiores, ut rectè *Joh. Bauh.* Regioni fortè calidiori diversitati debetur. Sic feniculum dulce & apium dulce in frigidiores regiones translata paulatim in vulgaria degenerant. Forte etiam Florentina dicta sationi primam suam originem debuit, nam ab eodem semine proveniunt Irides flore odorato & inodoro, cur non & radicibus.

Non videtur J. B. propter colorem album particulatim vocanda Iris Florentina, cum utraque abundant Florentini, & utramque indiscriminatim sumant; à bonitate autem potius utramque Florentinam denominari, non propter colorem.

Casp. Bauhinus Iridem Illyricam à Florentinâ specie diversam facit. Differentia est in floris colore, qui in Florentinâ candidissimus est, in Illyricâ dilutè caruleus, pallescens, & odore remissiore. Nobis, his non obstantibus, eadem videtur.

Vires & Usus. Iridis radix in vinò suspensa, aut in cerevisiâ, hanc dulcem conservat, illud jucundò tum odore, tum sapore commendat, illius planè æmulò quem mora rubi Idæi communicant, ut nos in vino rubro sæpius experti sumus. Sed & pisto-ribus ad parandum fermentum triticej panis magnopere usitata est. Hac partim è Trag. Histor. desumpta, partim nostræ sunt observationis.

Plurimæ hujus plantæ radici virtutes à veteribus & neotericis attribuantur. Sic breviter Schröder. *Usus* præcip. in mucilagine seu tartarò pulmonum, tussi, asthmate, obstructione mensium, torminibus ventris infantum. Extrinsecus abstergit cutis maculas & lentigines cum helleborò & melle mixtus. Creberrimus usus modernis est in pulveribus qui

qui capillis insperguntur. Vulgus vocat pulveres de Cypio. Quin & Hydropi confert & lctero.

In Hydrole ad serum in specie purgandum commendatur rad cis ireos succus ab ʒb. ad ʒiʒ. dandus. Honeſta matrona mihi nota ſe plures hydropicos curaffe affirmavit ſolò uſu huiusce ſucci, exhibendo quotidie mane jejuno quatuor cochlearia in ſex cochlearibus vini albi.

In deſperatâ alvi obſtructione ſuccus radicis ireos recens ad ʒi. piopinatus expertus fuit, teſte Schenchiolib. 1. obſerv. Purgat autore Caſp. Hofmann. primario pituitam & aquas, ſecundario bilem, non contra. Hodie ſerè ſolus ſuccus frequentatur in Hydropicis, in quibus cum ſape ardores faciat, non in faucibus tantum, ſed & in totò corpore, quidam prout abhorrent ab illò. Sed diſtinctione opus eſt. In Germanicâ id fieri veriſimile eſt, in Florentinâ non eſt. Deinde verum eſt de ſuccò crudò, per reſidentiam non depuratò. Id autem fieri debet ſi modò tunc curare volumus. Succus crudus non ultra ʒij. exhibendus eſt, depuratus & inprimis Italicus in maiore doſi ſumitur. Caſp. Hofm. videtur unc. iij. ſuperari non poſſe.

E Flandriâ advehitur ad nos in corticibus teſtiſve tellinarum. pulcherrimum quoddam pigmentum, quod vulgari eorum idiomate dicitur *Verdelis*; ipſum verò ita paratur. Iridis florum ſummitatem colligunt antematuritatem perfectam, quam tundunt in mortariò lapideò cum piſtillò ligneò; inde maſſam ſic tuſam recondunt in vitreò vaſe, & in cellâ vel alio loco humidiore collocant per dies quindecim, ut digeratur atque putreſcat: quibus elapſis eliciunt materiam è vaſe, & linteo veteri percolant, nam verſa erit ſerè tota in liquorem, quem igni exponunt in ollulâ vitreâ, ut ſerveat, donec decreſcat tertia pars, cui tum additur aluminis rochæ modicum, plus miſcetur donec diſſolvatur, magis clareſcat & delectetur color, quem experiri poteris, ſi in ipſò liquore maſſa defiat fructum albæ chartæ, & conſpicietur pulcherrimus color, qui ſervari poteſt in Tellinarum teſtis juxta Flandrorum morem. *Canepar. de arram. Londin. impr. p. 30.* Ipſemet idem obſervavi quater vel quinque in locis Belgii Hiſpanici & Fœderati, ut in Diariò meò invenio. Hoc pigmentò uſos obſervavi Belgas ad chartas colorandas, & ad vaſa tum lignea tum ſicilia pingenda; cujus non meminit Caneparius. Hæc ultima Dom. Tancredus Robinſon recentente *Raio in Hiſtor. Plant.*

Joachimus Camerarius in Notis ad Petri Andr. Matth. herbar. Germanic. quod 1590. Francof. prodit de floribus Iridis cæruleis notatu dignam proferit obſervationem; ſcilicet quòd aqua ex illis deſtillata hydropi conferat, quòdque multò efficacior ſit, ſi ita deſtilleretur ut nativum florum colorem ipſa retineat.

Verum ut bene advertit *Elzoltius*, explicare debuiffet prædictus *Camerarius*, quomodo aqua cærulea ex illis floribus cæruleis deſtillari poteſt; ne leſentibus oriretur ſuſpicio per artificium quodpiam remperagi: Sibi enim an vulgari methodò deſtillata hæc aqua cæruleſcat, hæcenus experiri datum non eſſe.

D. *Jacob. Wolffius* Miſcell. Curioſ. Dec. ij. ann. viij. adfert hiftoriam mulieris hydropicæ quæ per radicis ireos Germanicæ ſuccum ad cochleare unum bene habuit, ex eò tantum querula quòd medicamentum fauces læſerit. Verum quid fauces in remediò læſerit ſuprà obſervatum eſt, & hic ſuccus non minus efficax reputandus venit, ac propterea omnino uſurpari debet cum cautelis neceſſariis.

Radix Ireos Florentinæ multum continet olei volatilis ac ſalis eſſentialis. Seligi debet bene nutrita,

ponderoſa, compacta, munda, alba, odore violas martias referens, ſaporis ſubacris ac ſubamaricantis.

IRIS PALUSTRIS, ſive *Acorus Adulterinus*.

Nomina. Iris paluſtris lutea *Ger.* paluſtris lutea ſive acorus adulterinus *I. B.* acorus adulterinus *C. B.* paluſtris, ſive pseudoiris & iris lutea paluſtris *Park.*

I. B. In obliquum radices agit, complicatas & multum fibratas; quæ propter foliorum veſtigia & venenofas reliquias foris villoſæ, nigræque ſunt, intus verò rubentes, ſubſtantiâ poroſæ, & ceu filis quibuſdam venoſæ, ſapore ſtrenuè adſtringente novis quotannis oculis, inſtar Typhæ aquaticæ gemmæ: folia itidis, longa mucronata, quorum ea quæ prope radicem ita ſunt, ſubruſa nonnunquam apparent. Caulis duos cubitos æquat, & interdum ſuperat, reſtus, lævis, teres, ſpongioſus & interdum aliquouſque inanis, in alias diviſus. Flores iridum lutei, inodori; quorum tria folia reliquis ſex majora, extrorſum repanda, lutea, ſimbriæ ſupercilium imitantis loco, & utrinque adjacentibus folij marginibus, lineis nigris variegatis: hæcce intercedunt terna alterno poſitu ſurrecta, valde anguſtia & brevia, tota lutea; ſicut & intima, quæ criſta bifidâ, reliquaque forma cum iride violacea, vulgari conveniunt, ſolo colore luteo excepto, quibus à dorſo appreſſa ſtamina, ex luteolo albedine quædam prædita. Sapore eſt ſlos totus fervidiſſimo, non quidem primò occurſu verum paulo poſt fauces omni pipere ardentius erit. Sil. quæ longe ut in ſpatula ſemen continent ruſſum. Odorem tota herba non ſpirat.

In pratis riguis, locis paluſtribus & ad margines & ripas fluviorum ubique ſerè oritur.

Vires. Calidæ an frigida ſit huius plantæ radix inter botanicos non bene convenit; quòd verò inſignem adſtringendi facultatem obtineat ſere omnes conſentiunt & guſtus abunde conſtat unde ad dyſſenteriam alioſque fluxus alvi & uteri commendatur Sanguinem etiam undecumque manantem cohibet. Hinc extrinſecus ad dyſſenteriam alioſque ſanguinis fluxus præcavendos appenditur: unde patet quanto olim in errore verſati ſunt pharmacopæi, cum huius pro acori veri radicibus facultate plane contraria dotatis uſurparent.

Scribit *L. Bauhin.* ſe Tiguri aliquando deguſtaſſe huius flores qui tantum ei ardorem & fervorem excitant in faucibus, ut ſummam ejus acrimoniam vix potuerit mitigare oxycrato, unde (inquit) nulli ſuaſerim cum Trago uſum tam acris floris ad inflammationem oculorum.

Scoti montani (*Highlanders* vocant) ex huius plantæ radice, per viginti quatuor horas in aqua infuſa aut parum cocta, perpetuo in illa aqua fricandò calculum album aſterioris ſuperficiæ ſuper cultellum aut purioris chalybis fructum per aliquot horas atramentum optimum conſciunt, ex relatione D. Georgii Mackenſij. Sibbald. prodrom. hift. nat. Scotiæ, tranſact. Philoſoph. num. 117. *Raio in Hiſtoriâ Plant.*

ISA TIS, vid. *Glaſtum.*

ISCHAIMA MEDICAMENTA.

De *Iſchemis*; ſeu ſanguinem ſiſtentibus dicturis ipſius ſanguinis occurrit neceſſaria conſideratio. Supponemus enim brevibus de motu hoc ad extra.

1. Sanguinem torulis & alveis ſuis non contentum exitum affectare improporcionatum & oneroſum. Videmus id totò die in plethoricis, quod hæ-

morrhagiam narium, menses immodicos, hæmoptysin ipsam quandoque, patiuntur. Imò vel ex hoc discere possunt αἱμοφύβου, profundà naturâ ipsâ onerosum sanguinem, adeoque abundare posse eundem. Cum abundat non rarò, licet & alia mala det, non tam parentibus hisce visis.

2. Onerosum & improporcionatum reddi sanguinem à nimia rarefactione, motu intestinò majori, salibus alcalinis, biliosis inductâ. Omne humidum calore diducitur, & elasticum, expansivum redditur. Hoc ut in statu naturali ita comparatum est, ne fiat profusio, sed venæ ipsæ & pori expandi possint; sic in præternaturali, vel non naturali quoque inde fit exundatio.

Et vel culinario exemplo notum est, calore majori ollæ limites exuperare aquam simplicem, magis verò sal tam, ut quando pisces elixantur, maximè omnium pingua, oleosa, sulphurea, ut in elixatione olei lini pro vernice parando, in parandis emplastris, in præparatione balsami Δris ad oculum parat, quatenus viscedo Δris hoc pacto in infinitas bullulas expumescit. Hæc duplex mechanica illustrat egregiè ebullitionem sanguinis & efferationem majorem, unde porò ponemus.

(3.) Sanguinem inprimis expumescere magis tum saltum, tum biliosum. Salsedinis exemplum occurrit toto die in scorbuticis, in catarrhis, tussi ipsâ, quæ frequenter hæmorrhagiam narium habet conjunctam, sputo cruento, ubi & sensibus occurrit salsedo utillans, in mensibus immodicis, ubi erodens acrimonia satis se manifestat sæpe in ipsis genitalibus, in dorso quoque ipso. Biliotæ rarefactionis exempla visuntur in febribus tum primariis, tum comitatis. Frequentissime in febribus fiunt hæmorrhagiæ etiam in non plethoricis, quatenus sanguis & ipse biliosus tum magis expumescit, intenso illo calore, & tal volatile peregrinum junctum rarefactionem præstans maximè concurret. Sic & in variolis, morbillis alijsque idem solenniter occurrit, imò cum levamine, quatenus parte spumosa oleosa recrementis tunc cemptâ, reliqua massa archéo redditur magis obsequens, & subjugabilis.

(4.) Adeoque hæmorrhagiam causari modò serum magis, modò sanguinem. Serum enim salsedinis, sanguis biliosus sulphuris vehiculum est magis. Utur ergo utraque sint conjuncta, & ad sensum unita in corpore, id tamen non obstat, quin modò serum, modò sanguinem peccare magis dicamus, quod unumquodque recipiat ad receptivitatis suæ modulū, unde quoque id patet ex effectu, quatenus natura ipsa seorsim serum, licet non æquè sanguinem separet. Sanguis sanè non exideret sæpe, nisi sero acriori & fluxiliori obsecundaret & ipse, nisi fibræ laxiores cohererent ejusdem culpâ; sæpe etiam, si ipsi temperaret magis partes oleosas biliosasque, unde frenum bilis audit.

(5.) Sanguinem rarefacere magis alcali, obtundere acidum; serum verò ab utroque reddi acius. In statu febrili & bilioso prius occurrit, in statu extrâ febrim magis alterum. Hinc non tam tenuis sanguis exstillat, quàm spissus quoque cinnabarino florido colore, qualis etiam à V. S. emissus visitur. Hinc scorbutico calido affectu magis etiam hæmorrhagiis tentantur, quàm frigido vexari. Ast acidum in subdominio, vel seroso statu etiam in prædominio existens hæmorrhagias causari potest quoque, licet magis inferioribus locis quàm superioribus, utero, inquam hæmorrhoidibusque, tanquàm fixius sal, ut alcalicum magis est volatile. Protrahit tamen hic status magis hæmorrhagiam, quàm excitat, exemplo mensium immodicorum.

(6.) Quæcunque ab extra expumescientiam hanc

seri & sanguinis promovent, hæmorrhagias parere. Id quod patet exemplo motus, potus vini, aromatum usus, aëris calidi, æstivi, iræ; mensium supprefforum &c. unde facile vi contrariorum patere potest, quæ hæmorrhagias sedent.

(7.) Sanguinem extrâ ferri sæpe non tam expumescentiâ inductâ, quàm coactum. Duplicitia hujus rei occurrunt exempla, partim frequentiora, partim rariora. Frequens est hæmorrhagia, generali acceptione aliis quoque fluxibus sanguinis omnibus competens, in hydropicis, vel hypochondriacis quoque, ob communionem particularem & lateralem constanter à dextrâ vel sinistrâ nare stillans, prout hepar vel lien affectus magis fuerit. Frequens in aliis quoque, ut mensibus immodicis, hæmorrhoidibus itidem ab obstructione vasorum mesentericorum oriunda; frequens in gibbosis, non crescentibus, uti par erat, unde cum non detur sufficiens spatium, sed inter vehentia vasa & vectum humorem improporcionio, coactus alibi affectat exitum, idque locis parulis & porosis per se, vel adfectis quoque effluxioni per naturam.

Rarior est hæmorrhagia coactiva universalis, cuius duo novimus exempla. Coactivam voco, non tam ob rarefactionem, quo sensu etiam talis in febribus ad mortem usque producta occurrit non rarò, frustra adhibitis remedijs quibulvis, superveniente tandem sudore & frigore extremorum, salvâ ratione, & tandem inevitabili morte; quàm, ubi sanguis contineri spatijs suis, seu corpore, & poris & vasis nescius vi quâdam expellitur, seu ipse diffluit & effluit, quasi expulsus. Universalem verò, quod per nares, per alvum, per urinam id eveniat, imò etiam aliquando per aures & oculos ipsos. Mortuus sic est ante 7. vel 8. circiter annos Chiliarcha Imperialis, quod ex relationibus publicis tunc innotuit. Mortuus eodem morbi genere nobis adstantibus vir primarius, quod alibi describimus.

(8.) Læso quocunque gravius vase, nisi restinguatur, omnem sanguinem effluere posse. Est enim quoad hæc comprimis ὑπόστασις πύλα, unus confluxus, continuâ cordis pulsatione inducta, neque quoad huncce perfectum hiatum effluens sanguis obicem sibi ipsi ponere potest, uti iponte & motu proprio exitum affectans per uterum, nares.

Hinc facile æstimare erit, quænam sint ἰσχαιµα, nempe: 1. Quæcunque sanguinis copiam, ἐργασµὸν, acrimoniam, tenuitatem ac impetum refranant, sunt ἰσχαιµα. Copiam tollunt optimè V. S. & hujus vicaria præsidia alia. Certum nempe & hoc est in praxi, symptoma hoc, nisi sanguine litemus, tolli feliciter non posse; Frustrâ utimur astringentibus in hæmorrhagijs fortioribus narium, repetitis illis, frustrâ in sputo & vomitu cruento, mensibus immodicis quoque & similibus citra V. S. quod toto die nos docuit praxis, hæc verò adhibitâ felicissimè, depleto statim oneroso illo superfluo, per unam V. S. revulsoriam.

Ἐργασµὸν cum rarefactione conjunctum tollunt, quæ sulphur obtundunt & sal volatile figunt ac invertunt, nominatim acida, & aquea. Notabile est assertum, acida coagulare sanguinem, puta fervefactum ac ebullientem nimis, quem coercent duplici illo modo eximio, sive sint acida diffusa, seu concentrata, sive ὀψιχα, seu ὀψα, aliaque. Hinc commendant auctores — ὀψι in sputo cruento ipso, quod cum grano salis accipiendum, quando scilicet vitio lienis & M. S. symptoma illud magis contingit, habere aliquando locum potest, aliàs non item, si vitio pulmonis determinato magis eveniat. Hinc in hæmorrhagijs, vitia hepatis calidioris inprimis ortis, Terrâ viol. cum — ὀψι feliciter sumus usi.

Præstat

Præstat enim eo casu diffundere eundem, satis activum, quam concentrato eodem ventriculum & corpus lædere. Sic eundem in finem faciunt, cumprimis in febribus, julepi diluentes & temperantes; modò aciduli sint, non dulces nimis, dulcia enim in hæmorrhagijs quibuscunque minus locum inveniunt, sed, quod ipsa quoque per mechanicam in spumam & bullulas faciliè rarefiant, nocent potius. Sic etiam aquea insigniter proficiunt, decoctum hord. cum succ. citr. potiones, emulsiones, aliaque hujus com-
matis.

Acrimoniam temperant, tum eadem ista, quæ diximus jam, tum *terrea* quoque, constrictiva, lentore & mucilagine blandâ inviscantia & obrudentia, ex simplicibus corallia, lap. hæmat, sangu. dracon. &c. ex compositis pulv. stypt. croc. & atr. tum Olla quoque ipsa, modò laxitas fibrarum non obstat, eximie proficua.

Tensitatem & fluxilitatem cohibent *incrassantia* & *adstringentia*, nominatim Tinctura lap. hæmat. antiphthis. corall. & atr. rad. alth. & jam dictus pulv. stypticus polychrestus. Non minus enim tenuitatem ac impetum, ipsamque acrimoniam respicit tum hic, tum opiata, varijs formis exhibita, seu sola, seu stypticis maritata. Virgo generosissima à vitijs diætæ patitur diarrhœam, cum abscessus reatu, egerit feces plurimas & cruentas & fœtidas; datâ Tincturâ & atr. cum corall. dato item per vices pulvere styptico anodyno felicissimè convaluit. Rusticus cacochymicus à motu fortiori sentit hæmorrhagiam narium insignissimam per 4. 6. horas, nullâ data interruptione quasi. Noctu petit auxilium, dantur interius eadem medicamenta, feliciter restituitur. Fœmina mensium immoderationem percipit non unâ vice. Simul ac dosin unam alteramque de pulvere styptico cum anod. assumit, fluxus cessat. Hæmoptycus petit auxilium, propinatur pulvis stypticus, ad supra dictum modum, præter alia, paroxysmus statim retunditur. Verbo, probatissima sunt hæc ipsa remedia, innumeris exemplis confirmata, & nunquam non cum successu usurpata. Quæcunque scilicet lixiviosum alcalinum; rarefactum nimis sanguinem concentrant, congelant, mirigant & figunt, dictam indicationem omnibus modis absolunt.

Refrænant verò dictum impetum tum interna, caloris simul debita, qui singulis illis morbis speciebus velificatur; tum externa eidem fini inservientia.

Refrænant ligaturæ mediocres, sanguinis impetuosum partim remorantes, partim dolorifico sensu eundem in vias communes ex proprijs quasi divertentes; item cucurbitula sicca in nuchâ, quatenus & eadem motum feri fluxilioris impedit, & dolore induto simul archeum divertit. Ubi enim dolor, ibi sanguis affluit, quo facto non potest non idem alibi exundans revelli & aliorum deflecti.

Refrænant actu & potentia frigida non una, oxycratum, fronti, collo, temporibus, nuchæ, scroto adhibitum, aqua frigidissima, nix ipsa quoque. Quæcunque nempe loco sanguinis alterationi & refrigerio magis inserviunt, apta nata potissimum sunt, quibus *Ischaima* adhibeantur, quæ inter & vertex est. Ut ergo sint, qui frustra bregmati applicari eadem contendunt, quod non exinde ad nares devolvatur sanguis; attamen ea applicatio secundum ductum vasorum instituitur, & actuali frigiditate activa satis est & alterans. Imò nec ossium vallum obstat, siquidem refrigerans illa vis satis ad interiora usque vibrat suum effectum. Methodum hanc curandi inculcat ipse *Hippocrates* 7. aphor. 37. ubi de vomitu cruento loquitur quidem, at similium eadem est ratio. Curatio, inquit, refrigerandi & adstringendi vim ha-

bentibus perficitur. Refrigerantia magis debentur vijs communibus, poris, ob calorem rarefacientem largius sanguinem invitantibus, tum proprijs quoque seu vasis, quatenus in medio cursu quasi suo eundem ad moderatioris leges inflammant læpe. Hinc & elogio *s. aphor. 23.* frigido in his utendum, unde fluit, aut fluxurus est sanguis, non quidem eodem loci, sed circa ea loca, unde influit; habito nempe respectu ad cor, tanquam fontem sanguinis.

Quod si accedat compressio, tanto præsentius frigida hæc juvant. Exemplo sit imperialis, prius aquâ frigidâ alteratus fronti adalligatus, quo pacto tum infantibus, tum alijs etiam adultis feliciter succurrimus.

Refrænant & concentrant omnia actualia frigida. Cum enim motus hic sanguinis sit ad extra, adeoque idem qui caloris à centro ad circumferentiam, nec sine calore, saltim naturali, & vasorum eveniat; cum corpus infinitis spiraculis polleat, ab ambitu maxime alterabile, frigus verò concentret aërem & poros magis parulos; inde motus contrarius inducitur, à circumferentiâ versus centrum, ab extrâ intrò, & alteratur quoque fervidior sanguinis spuma. Pertinet hic & terror ipse, sive alijs modis incutitur, seu per asperisionem aquæ frigidæ, in nucham vel faciem ex improviso factam, ut tanto præsentius alteret.

Refrænant alia per contactum frigidum, & potentia adstringendi, vel etiam quædam discutiendi, applicata. Cum enim ad objecta non uno modo se habeat calor noster, sed ex illis effluvia partim ferantur, partim calore hoc nostro excitentur, merito quoque ab his appensis, in manu detentis, vel alibi corpori extus applicatis, levamen quoddam sperandum. Quorsum inprimis pertinet summa subtilitas effluviolum, quæ in odoratis quidem actu ob copiam admirari, non mensurare possumus, in alijs verò dari, etiam pigris visis, non negandum est. Hinc quæcunque effluvijs austeris, adstringentibus, terreis, remorantibus archeum universalem afficiunt, & quasi afflant, sunt *ischaima*. Universalem inquam, nam de particulari partium effluentium sanguinem post dicitur. Sic usitatissimum est eo casu adhibere lapidem hæmatitem, in utraq; manu, vel sub axillâ. Est hic de natura martiali, imò martis purior minera, unde hoc pacto duplici modo succurrit, frigore actuali primum, in duris metallicis corporibus profundiori & quasi domestico; deinde effluvijs austeris alterantibus sanguinem. Par ratio est jaspidis. Sic fluxum sanguinis menstrui (quod & de alijs valet) restrinxit *Langium* retentione peræ seu bursæ pastoris in unâ, & jaspidis in alterâ manu. *l. 3. ep. 1. p. 94.* Idem adnotavimus de centinodio in fœminâ nimias hæmorrhoides patiente, ordinariè & cum successu semper adhibito. Sic & buseo exsiccat sub axillis detentus certo experimento sedat hæmorrhagias narium alias, tum ob similia effluvia, est enim animal frigidum & terreum, tum quoque quod archeus inde abhorrescentiam quandam contrahat, unde intrò humores magis vocat, & consequenter hæmorrhagia cessare cogitur. Sic Oculum Cyprium in manu detentum idem præstat. Sic in aulis quibusdam vel gynæceis usitatum est ad menses sistendos, ut ovum ad duritiem coctum sub axillis detineatur. Et quæ alia hunc in finem hinc & inde solent commendari. Radix nigellæstri eadem ex ratione prodest, nisi dicamus eandem sub linguâ positam divertendo quoque & discutiendo agere ob modum.

Cumque de effluvijs dixerimus horum, operæ pretium est de ijs quædam adhuc addere huc facientia & quidem de pulvere sympatherico, qui hæmorrhagias

rhagias narium & vulnerum inter alia feliciter quæque sedat. Inventor hujus celebratur à *Digbæo or. de pulv. sympath. p. 11.* Carmelita monachus, qui hoc arcnum ex oriente adduxerit, à quo hic modum secretum didicit. Paratur nempe vel ex quovis Oli, extemplo adhibito & pulverisato, vel soluto pro renatâ, nam idem præstitisse adseverat *Digbæus*, vel quod receptius est, 7. Olium cyprium, vel nostras quoque calcinatur calcinatione aereâ, expositum solis radijs mense Julio vel Augusto, donec in pulverem album fatiscat, exuto virore vel cæruleo colore suo, addito pro lubitu, quod nonnullis placet, gummi tragacanthæ pulveris. ad partem subdecuplam, seu ad 3x. 3j. imò quidam ana id faciunt.

Experimentum pro hæmorrhagiâ sistendâ, quantum ad nostrum scopum hic facit, illud est, si nempe viâ siccâ stillat sanguis exiens super pulverem illum sympatheticum, uti alter viâ humidâ, si lintamen cruore madidum & exiccatum intingatur solutioni huic Oli; exempla videantur apud *Digb. l. c.* Studiosus medicinæ hæmorrhagiâ narium frequenter corripit solitus familiaritate hujus pulveris se curabat subinde. Gestabat illum secum, vel ad manus habebat, stillato in pulverem sanguine cessabat. Usi sumus eodem cum successu in dysenterîâ, inspergendo eundem, quod & de ω valet, fecibus cruentis. Non semper tamen eundem expectationem satiare rectè asserit *Boyleus Tentam. Phys. p. 120* ubi proprium experimentum adducit, non compescuisse hæmorrhagiam narium in se, licet in alijs contrarium viderit. Describit & memorat eundem *Beverovic. quest. epistol. p. 241.* Edidit & de eo librum *Nicolaus Papius Parisijs*, quem citat *Ol. Worm. & descriptionem ponit mus. c. 10. p. 25.* Meminit etiam hujus, & *Digbæum*, qui eum è Barbariâ attulerit primus, ejusque hypothesein de modo agendi celebrat *Borell. app. ad c. 3. obs. 46. p. 276.* Optimè etiam de eodem agit *Helm. l. Butler infer. p. 470. & l. recepta injecta p. 456.*

Mirum itaque id torfit ingenia, quomodo pulvis hic eminus sanet, citra applicationem immediatam. Quidam id ut superstitiosum rejecere; quod ut Theologus quidam probaret apud *Helmontium*, factâ protestatione expressa adhibuit idem, viditque nihilominus vulnus solito citius sanatum, cruorem quoque statim sedatum. *Digbæus* putat, beneficio lucis (aereâ calcinatione magis irradiatâ & impressâ) aromas Oli & cruoris conjunctorum expandi in aëre, inde verò attrahere easdem vulnera, unde statim dolor mitigetur, & spiritibus balsamicis Oli sanatio fiat. *p. m. 119.* Affinis huic hypothesei Helmontiana est, principium actionis sympathicæ esse facultatem influentis affinem, agentem per irradiationem in objectum sibi appropriatum. Tacemus quæ integris libr's pluribus, à *Sirassio* collectis, de curâ sympathetica fuerint tradita & congesta.

Nos ut dicamus quid sentiendum nobis videatur, supponemus.

(1.) Olium austeritate styptica & terrea pollere præ alijs omnibus, vel saltem esse inter eadem præcipuum.

(2.) Exerere eandem contactu immediato; nil magis è salinorum classe vulnera & ulcera condit & quasi balsamat, quam Olium, imprimis album.

(3.) Olium præ omnibus alijs sui generis esse transpirabile & diffusivum effluviarum, quod in alumine impedit spumosa visciditas & velut gluten, unde & igni magis resistit. Hinc & aërem promptè subire patitur, promptè calcinatur in pulverem. Imò præparatum hoc modo poros exhibere laxiores ad effluvia.

(4.) Calorem & humorem effluvia Oli magis

citare & diffundere; calor quidem diffundendo humidum & poros dilatando, humor verò solvendo id præstat.

Hinc cum cruore actu calente mixto effluvia ab humido & calido promota magis exeunt, & ad locum affectum faciliè perveniunt. Irradiatione leniori & blandâ ergò sanguinem serosum concentrant eadem effluvia Oli austeriuscula, ut fortiori sternutationem cient; eademque cum sero sanguinis communicata & per solutionem emanatione sua ad locum affectum faciliè perveniunt. Imò & aërem alterant, qui, cum corruptor sit vulnere, his effluvijs alteratus amicus iisdem magis evadit. Unde immediatio virtutis hujus agentis cum patiente perspicitur potest. Nec opus est, ut symbolismum seu magnetismum cruoris emissi & corruptionem subeuntis cum sanguine vivido reliquo statuamus.

Quod verò non semper idem eveniat æque feliciter, id improportioni agentis & patientis debetur. Si enim impetus exituri sanguinis sit fortior, si vulnus gravius, minus etiam effluvia hæc possunt sufficere. Sufficit, concurrere & hæc effluvia & agere intra sphaeram activitatis suæ, quod possunt & debent.

Refrænant fluxilitatem hanc & impetum exituri sanguinis *figentia*, *opiata*, insigni quoque argumento, quomodo hæc agant. Si enim in priori hoc casu dicto verum est, sanguinem affectare exitum motu proprio, salino-sulphureo $\delta\rho\gamma\alpha\sigma\mu\acute{o}\varsigma$, quietè & passive se habentibus fibris & paribus omnibus solidis, citra ullum dolorem, ullam coactivam quoad vasa ipsa continentia emissionem, sequitur necessario, opiata agere in partes ipsas fluidas, sistendo h. l. acrimoniam; incrassando & motum spiritibus pacatiorem imperando. Faciunt opiata hoc tam sibi relicta, quam cum astringentibus & ipsis serum incrassantibus ac moderantibus remixta, ut jam diximus. Imò notavimus post opiatorum & adstringentium usum è venâ sectâ sanguinem hinc minus fluxisse.

2. Quæcumque vasorum pororumque emittentium oscula, quocumque modo fissa vel hiantia, constringunt & obstruunt, sunt $\iota\chi\alpha\mu\alpha$. Priori classe dicta magis interiora respiciunt, posteriori hæc exteriora magis, quando sanguis hoc pacto necessit te fluxionis continuæ emittitur, licet quoque ipse vitiosus sæpè & datâ portâ facilius effluens observetur. Unde & è V. S. tantò promptius exilit, quò fervidior vel magis turgescens est. Illa adstringunt, hæc obstruunt.

Utrarumque verò meminimus viarum, communium & propriarum, quod & vulnera partium aliarum adstrictionem sanguinis indicent, & pori quandoque ipsi, uti exempla talismodi hæmorrhagiarum per diapedesin præbent non solum equi, sponte cruentantes, verum & in homine sudor cruentus, vel sanguis ipse quoque hinc illinc extillans, citra manifestum hiatum, qualia exempla recenset *Heer. obs. 23. p. 269.* ubi nemo ullo sensu deprehendere potuit, unde v. g. è minimo manus digito sanguinis magna satis copia effluerat. Quid hoc aliud, quam $\delta\iota\alpha\pi\eta\delta\eta\sigma\iota\varsigma$ est, quibusdam, an detur, in dubium vocata?

Obstruunt emittentia vascula obturantia, ut compressio actualis. Hoc pacto enim labia vel oscilla continentur, & obex ponitur, pariete quasi redintegrato quod per mechanicam valet, factò quotidiano experimento. Facit huc quorundam mos, qui venam sectam statim comprimunt, vel lardum imponunt, nec prius emittunt sanguinem, quam animus ad se redierit, velut collectis spiritibus. Faciunt huc ligaturæ quæcumque tum simplices, tum sple-

splenijs, vel lineis, vel, ut ita nominemus, metallicis quoque stringentes compositæ, quod unice valet in curandis vulneribus arteriarum, siue casu, siue in *σπασμωδω* apertæ fuerint.

Obstruunt emplastica & inviscantia quædam, uti novimus quendam emplastro viscidiori tepesfacto fluido vulnere affuso non raro fuisse hæmorrhagiam. Præstant enim hæc suturam quasi siccam etiam hoc casu.

Obstruunt, quæcunque effluvijs austeris etiam odoretenus constipationem vatorum & villorum procurant, unde sordida quidem medicina est, non incongrua tamen, hæmorrhagiæ narium, si stercus porcinum iisdem adhibeatur, vel asininum. Imò novimus quendam hoc ipsum imbibitum bis vel ter cum succo urticæ internè & externè cum succellu adhuc. Et *Zacutus Lusitanus* præstantissimum & palmarium vocat stercus asini, quod exactissime lævigatum omni juri potuique permiscuit, & tabellæ cum saccharo ex eo formavit, desperatione sic restituit. *pr. hist. l. ult. cap. 2. num. 4. p. m. 638.*

Obstruunt exsiccantia sanguinem. Omne siccum fluido est contrarium, præcipue si terror conjungatur, unde inter probatissima habetur hæmorrhagiæ narium remedia ferri candentis mediata & remotior applicatio, ut sanguinem exstillantem excipiat, cujus ratio ex dictis claret. Facillime inter liquida exiccatur sanguis, exiccatus verò coheret & aggerem sibi ipsi ponit.

Quin omnis sanguis sistit sanguinem, non quidem exiccando, sed glutinante suâ hâc naturâ, ratione partium *γλυκρῶν* sulphureatum. Hinc in hæmorrhagijs narium, ut alias non attingamus, ipse in exitu concrevit, & concrevendo remoram sibi injicit, ut subsistere tandem cogatur, neque etiam hinc, dato illo casu, grumescens sanguis statim è naribus eximendus est; quin nec vulnera arteriarum citius religanda, ne denudè cruentate incipiant, nondum satis factâ obstructione. Sic columbæ sanguinem reprimere hæmorrhagias è membranis cerebri scribit *Tagantius instir. chir. p. 646.*

Obstruunt constringentia austera, liquida & sicca. Ex liquidis atramentum, oxycratum, acétum, exemplo venarum sublingualium, & præ alijs decantatus hodie liquor stypticus, ex O & *Q-lo* per ∇ f. & coctionem unitis confurgens, de quo vid. *Weberus*, licet sint, qui rosæ rubris tingi posse eandem velint, inde verò reverà nigrescens evadit, quod inter *Q-lica* & resinosa perpetuum est. Tacemus adstringentia alia communia, ut usneam turundis inspersam tenuissime prius pulverisatam maximè commendat *Hildanus c. 2. obs. 15. p. 91.* quorsum & terra Japonica referenda est.

Obstruunt dissociantia seu imbibentia. Quò magis dissociatur humor quicunque, eò minus fluit, sed consistere cogitur, inprimis qui in spissitudinem habet in recessu, simulac ex caloris dominio excidit. Dissociando obstruit fungus pulverulentus, seu crepites lupi vulgò dictus, qui dum minutissimis atomis applicatus dissociat sanguinem, maximè imbibit & sistit eundem, seu in naribus seu vulneribus quoque exundet, impositus immediatè & illigatus. Cumprimis verò huc spectat pannus xylinus ustus, cum albumine ovi exceptus & applicatus, posito desuper crepitu lupi & cum splenijs factâ deligatione, quod egregium est arcanum.

Dissociant quoque lanuginosa & mollia alia, unde pili leporis ad hæmorrhagias ipsarum arteriarum commendantur, & alijs casibus quoque. Sic & linamenta concepta optime id præstant, tum per se, tum oxycrato imbuta & compressa, qualem observatio-

nem recenset *Tagantius l. c.* Faciunt huc & pulvères astringentes naribus iustati, vel cum turundis potius blandè intrusi. Quin & turundæ composiæ tales fieri possunt ex fungo pulverulento, pil. lepor. musco cran. human. pulv. gallar. bufoni. exicc. sterc. suill. &c. ut alia humida taceamus.

Obstruunt crispantia, ut adeò & hæc externa partim adstringant, partim obstruant; adstringant continentem parietes ac vasa, adstringant exiturum sanguinem. Crispantia ergò velut utrumque id præstare possunt, & vascula firmant, & exiturum sanguinem refrenant.

Crispant & ferruminant quasi tum potentialia mitiora cauteria; quem in finem probatissimum habetur coleothar *Q-li*, quod *Heer. l. c.* quod *Heurn. comm. in aph.* quod experientia toto die commendat. Crispant, corrugant & crustam inducunt cauteria actualia ignita, summâ simul junctâ exsiccandi virtute; quod inter extrema attamen probatissima remedia numerandum est, modò cum prudentiâ administretur. Fitque id ipsum ferro ignito, quem in finem cauteria varii generis, tenuia quidem, basi tamen aliquantò lata, apud chirurgos in usu sunt, momentaneâ actione id præstantia; unde non item id expectandum est ab actuali igne alio, qualis moræ est, seu *σπασμωδω* ex artemisiâ, neque enim deflagrat, nisi sensim, respectivè, ut fomites alii quoque, nec flagrat splendida flammâ, unoque loco collectâ.

3. *Quæcunque sanguinis motum in ordinem redigunt, & acrimoniam feri scorbuticam alterant; sunt ἰσχυρὰ.* Certum est, à priori sanguinem sæpe in motum extraordinarium citari, quando motus ordinarius non sufficit, vel impeditus est, seu hæmorrhagias fieri ab obstructionibus viscerum. Exemplum communissimum præbet obstructio vasorum uteri. Quas non vias affectat sanguis eo casu, ut exeat? Probare idem possunt hæmorrhoides, quæ quidem ab *σπασμωδω* interno oriuntur quoque, frequenter verò ab obstructione viscerum. Viscera hæc sunt cumprimis quoque lien, hepat & mesenterium, ubi copiosis vasis decurrit sanguis, unde si in his motus ejusdem impediatur, hæmorrhagiæ varii generis consurgunt, ipsique in feminis menses immodici, ut non repetamus jam tactos hydropicos, & hypochondriacos, magis manifestè tales, sæpe enim latet hæc causa, prudenti *ἀναεσις* eruenda.

Certum est à posteriori, sæpe hæmorrhagiam narium à ligaturis auctam, item à frigidis, collo & scapulis aspersis, cucurbitulis siccis aliisque, remotis verò his omnibus, & datis motum sanguinis ordinatum promoventibus cessasse. Exemplò sit spertiola Crollii, quæ itidem constat unâ ex calidis eundem motum promoventibus & obstructiones venarum referantibus; ut sanguis intemerato cursu à corde missus ubicunque penetrare queat. Eadem ratio est ∇ æ theriac. Croll. carfunic. atur. cinam. Tincturæ Pri &c.

Quæcunque igitur vias referant, & ad pristinum spatium arctatos fines reducunt, licet paulò impropiè, omnino hæmorrhagias sedant, præcipue si simul sanguinem, ut faciunt, corrigant. Instar omnium sunt martialia, omni huic indicationi satisfaciunt, edulcant enim acrimoniam, acetositatem tollunt, consistentiam stabiliunt, & in ordinem redigunt sanguinem. Sic & corallia medio loco se habent, & similia, imò & ipsa acida suo modo huc faciunt, ob incidendi juxta & refræmandi virtutem.

Præter aperientia verò hæc & diuretica, ipsaque calida providè remiscenda, etiam motum hunc sanguinis corrigunt, non minus ac acrimoniam feri scor-

scorbuticam, ipta diaphoretica temperata, ex ð diaph. bol. armen. & ðli cachect & similibus, vitatis volatilibus, à quibus sæpe observavimus hæmorrhagias. Fœmina plethorica ad dolorem capitis sumens Tincturam bez. Mich. extra ordinem mensium experiebatur fluxum, quod probè notandum in variolis & aliis casibus. Cumque è suis fontibus hæc nota sint, non opus est, ut ea huc arcessamus latius.

Coronidis loco not. 1. *Non omnis hæmorrhagia seu fluxus sanguinis sistendus est ἰσχαιμῶς.* Non conveniunt in hæmorrhagiâ criticâ, nisi restrictè, spectator tunc esse medicus debet, sed non otiosus. Critica enim hæmorrhagia est à priori naturæ intentione, sed symptomatica evadit, à posteriori, neque enim ipsa moderari æquè fluxus vel sistere apertas vias potest. Non, si minus urget, uti aliàs urgentissimum est symptoma. Non ubi contra indicans, vel affectus etiam principalis aliis obstat, ipsaque est secundaria, vel timendus est gravior status. Absurdum foret, pleuritico, cui salutare est sanguinem ejici cum tussi, per ischaima velle succurrere. Fœmina vomitu cruento laborans, jam provectæ ætatis, hausto adstringente pulvere à chirurgo dato mox moritur, fluxu represso; mentes enim illuc affectabant exitum, aperientibus potius, & V. S. juvandi. Philosophus clarissimus mictu cruento laborans, hoc curato, apoplecticus moritur; id quod in alijs quoque observavimus senibus, mictum nempe cruentum excepsisse apoplexiam.

2. *Modo topicis, modò internis magis ad hæmorrhagias opus est.* Præstat quidem eadem conjungere, moderanda tamen sunt ita, ne frustra simus. Quandoquunque effluit sanguis, illius sphaera intuenda est, ut sistat quidem fluxum, motum tamen naturalem non negligat medicus. Topicis immediatis suus locus est, mediata verò, pro æstuate sanguine alterando, applicanda locis magis torosis & patulis. Quando non cessat fluxus, consultum sæpe est, ut tota spina dorsi aquâ frigidissimâ perfundatur. Sic & plantis pedum ranam vivam cum successu adalligavit Kozack. l. 2, c. 12. de hæmorrhag. p. 678.

3. *Topica ἰσχαιμῶς roborent, non ledant.* Valet id de activis & causticis cum primis. Acerum ipsum in minoribus quidem vasis sublingualibus contrahendis habet locum; quando verò foramina nimis sunt lata, seu magis hiant, eo non contrahi possunt, tunc myrrha & olibanum aliaque inpersa magis prosunt. Corrosiva arsenicalia & ðlia absint penitus. ∇ & ∞ providè applicentur, quorum ultimu momium est tutissimum.

Hinc non ablato interius ἰσχυρισμῶς frustra sunt adstringentia. Hinc præcipere solent practici sanguinem ex hæmorrhoidibus erumpentem etiam largius non esse reprimendum externis stypticis, nisi prius sectâ venâ ejus massa diminuta fuerit. Universalia etiam hic valent sæpe præ topicis.

4. *In remorando sanguine circulus ejusdem non turbandus est.* Valet id tum de alijs hæcenus dictis, tum inprimis quoque de ligaturis extremorum. Hæc, partim pro vasorum compressione, partim pro remorando in poris sanguine, convenire queunt, accedente inprimis levi dolore, qui advocat illum huc ad partem ligatam, adeoque revellit. Sed si fortius stringantur, circulum omnino turbant, ægrum frustra cruciant, & tantum abest ut sanguinem sic sistant, ut potius fluxurum magis ciant & hæmorrhagiam augeant. Neque verò selectus coloris hic aliquid facit, quando rubrum sericeum vinculum eligunt, quin potius rubedo magis motum promoveret, quàm sedat. Wedelium.

IVA ARTHRITICA, vid. Chamapithis.

JUBA.

Juba in Phytologiâ est arundinacea coma laxè effusa, qualis in miliò est. *Rains.*

JUGLANS.

Juglans quibusdam dici videtur à juvando & glande, ut Macrobius. Refert tamen non dubitandum quin sic vocetur quasi Jovis glans, nempe eâ ratione à Joviglans, quâ à Jovipater Jupiter, nam ut dicitur Marspiter & Diespiter, sic & Jovipater seu Jovispater ubi Jovis est antiquus nominativus.

Non est tamen *Juglans* Διὸς Βάλαν Theophrasti, cum ea potius Castanea sit; sed ut nonnullis videtur; nux Persica ejusdem, ut alijs, nux Euboica, nux Basilica Plinio. Nucem Caryon (inquit Plinius) à capitis gravedine, propter odoris gravitatem convenit dictum.

Nomina. Nux *Juglans*, *J. B.* Ger. *Juglans vulgaris*, Park. *Juglans* five regia vulgaris C. B.

J. B. Procera arbor est multis prælongisque nixa radicibus, trunco ad binum ternumve cubitorum complexus sæpius crassescente, materia ampla, ruffa vel subfusca, multis exiguis segmentis scarificata, quibusdam partibus undulatim Crispa, robustâ: firmis vastisque ramis brachiata, cortice cineracea. Crasso, lævi, per senium hiulco, & in rimas altas dehiscente, folia pinnatim disponuntur. Conjugationes claudente folio impari, quorum singularia ampla, sesquipalmum longa, palmum fere lata, principio & mucrone angustiora, venis obliquis à medio nervo deductis, cum tenera adhuc sunt rubicantia, suaviterque olentia, cum adoleverint pulchre viridentia, odore jucundo, fere lauræo, sed graviore & vehementi, sapore adstringente. Iglum profert longum, multiplici callo compactilem, cujus flavescetes paniculæ brevi decidunt: tum flos emergit herbaeus, (ego pro vero & genuino flore Iulum habeo, ut qui è staminibus & apicibus componitur) totidemque calyculacea tegumenta quot flores petiolo contrahuntur, quibus singulis singulæ includuntur nuces. Nucem sive fructum quales. Simul multi confertim ex eodem pendent pediculo jam perfectiorem tegit pulvinatus calyx, acerbi & amari saporis, nec sine acrimonia, nigro colore manus inficiens, cui subiectus cortex rugosus, lignosus, in duas carinas apertilis nucleum continens in binas partes ad medium ferè fissum, & pæne quadripartitum, revolutionibus cerebri similiter inæqualem primo mucosum ac insipidum ferè: deinde per maturitatem callosum candidum, dulcem, cuticulâ pallidâ tectum, exortum trahens ex candida, & ex acido amaricante quadam substantia pulposa, cujus terrestrior, portio in lignea, vel ex ligno membranacea quadam nucleorum dissepimenta abit, qualibus tenerioribus interior ossis cavitas magna ex parte obducta est. Integri & maturi magnitudine minoris aut mediocris perfici, & pulpa viridi seu integumento externo pulvinato, (quem Festus vocat culeolum quasi exiguum culeum) atque carnosio detempto, uncia ferè latiores & hac ipsâ latitudine longiores, ex rotundo in oblongum subumescentes, sed delumbata utrinque qua vulvarum commissura est circinatione rotundi. Nucleus duplici cuticula seu membrana tegitur, exteriore flavicante & subamara, quæ dum nux adhuc recens est facile deglubitur, cum arefcit arctè adhæret nec potest separari, interiore tenuiore & pellucida.

Nuces

Nuces juglandes magnitudine, figura, duritie, sapore multis modis differunt; Recentiores sex potissimum differentias annotarunt. 1. Nux juglans sive Regia vulgaris. Hanc à duro cortice & frangendi mora Moraciam & Moracillam vocari tradit Hermolaus. Non facile à putamine purgari potest, sicutdam nominat Cæsalpinus. 2. N. I. fructu maximo Caballinam Dalechampus vocat. Nostrates i. e. juglandes Gallicæ, Bonitate & pondere ad proportionem reliquis cedunt: non enim intus oppletæ, sed magna ex parte vacuæ sunt; minus sapidæ, malis magnitudine ferè æquales, è quarum cuppis seu valvis Marfupia pueris gestanda fiunt. 3. N. I. fructu tenero & fragili putamine, à Dalechambio Mollusca dicta, quod cæteris generibus Mollior sit; ejusque putamen vel digitis facile rumpatur, Tarentinæ vel eadem est, vel similis. 4. N. I. bifera cujus generis Hermolaus in Silvatiano Patavini agri viculo provenire satis constare tradit. Et Plinius nuper (inquit) Consularem vicum audiivi biferas & juglandes nuces se habere profitentem. 5. N. I. fructu serotino. Nuces S. Joh. dictæ, quia ante diem S. Joh. sacrum neque folia neque nuces offendunt; Cum verò id tempus adest, pares reliquis nucibus quoad fructum & folia existunt: quales Tragus Vassonæ ad Rhenum, binas etiam Giengenbachii extare refert; J. Bauh. circa Tigurum aliquando vidit; Dalechampus circa Lugdunum observavit. Has ego non peculiare genus fuisse existimo, sed differentiam quandam seu varietatem accidentalem & præter naturalem. 6. N. I. folio serrato; hujus nuces teneritudine & longiori formâ à vulgaribus diversæ protulerunt vulgaris juglandis similia, sed longe magis tenella, atque in ambitu serrata Cluss.

His adde Virginianarum Juglandium duo genera: unum forma & sapore parum ab Anglicis differt, putamine crassiore & duriore, alterum maius, cortice scabro & duro, nucleo magno, dulci & oleaginoso, ex quibus confusus lac conficiunt cum suis cibis miscentes. Harum arborum nonnullæ 80. pedes longæ. Park. duas juglandium Virginensium species describit, quæ ab his videntur diversæ. 1. Prior, nux juglans alba Virginensis eidem dicta, arbor est erectior, & minus patula, nuce rotundiore, minore putamine, multo crassiore magisque albicante quàm cujusvis ex prædictis; nucleo etiam multo minore, æque tamen candido & dult. 2. Posterior N. I. Nigra Virginensis denominata fructu potissimâ præcedente differt: niger est & rotundus, asper seu rimosus; putamine adeò crasso & duro ut validis Mallei ictibus vix possit confringi, nucleum intus minimè claudens.

Ubi sponte proveniat nux juglans nescimus in Italia, Gallia, Germania, atque etiam Anglia in viridiariis & agrorum marginibus passim plantatam observavimus. Amat loca montana, humida & frigida; plerumque lapidosa; Autore Palladio, quod in Italia & calidis Regionibus fortasse verum est; at in frigidioribus ut Anglia & Germania, summitates ejus sæpius gelu percutuntur, si præcocius germinaverit; in Germania juniores arbores interdum perduntur, præsertim si loco humidior plantæ fuerint, teste J. Bauhino, quod in Anglia nunquam observavi evenisse.

Iulos gemmasque protrudit Martio, aut initio Aprilis. Fructum ante initium Septembris apud nos non perficit, differunt tamen arbores hoc respectu, aliæ enim præcociiores sunt, aliæ serotinæ, nec ante Octobrem Mensem maturantur; diu est antequam fructum ferat hæc arbor; viginti Annos supervivit, ac mirum in modum grandescit. Cariem, (ut annotat Tragus) vetustatemque non sentit. Teneram esse arborem, & in calidioribus Regionibus locisque apricis feliciter provenire scribit J. Bauhinus, quod ut verum sit, frigidiora tamen non averfatur.

De latrone & infusione hujus arboris Consule Geoponicos. Nucibus seritur juglans, nec inferi vult ut aliæ arbores Trag. Ruell. quod sanè nobis verisimile videtur, quamvis Palladius aliique contrarium affirmant. Ut res sit, Nos cum J. B. infusionis multa curâ non opus esse judicamus siquidem nucleum satis satum facile ac feliciter proveniat.

Ut nuces in proximè annu copiosius proveniant, mos est hodie apud rusticos quosdam ut nuces perticis decutiantur, hinc non inconcinne quidam alludendo cecinit,

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Nux, Afinus, Mulier simili sunt lege ligata,
Hæc tria nil fructus faciunt, si verbera cessant.

Verum hic mos quantumvis apud nostrates etiam inolevit qui & suum rhythmum habent.

Rationi repugnare videtur. Quid enim aliud ab hujusmodi verberatione sperandum est, quam ut gemmæ futuri insequentis anno proventus spes decuterentur.

Umbram juglandis noxiam esse plerique affirmant & capiti inimicam. Joh. Muis in Podalirio redivivo P. 57. 58. decubitus sub hac arbore dolorem capitis inducere experientia D. Boyle probat. Hic autem dolor (inquit) non provenit ab umbra (ut vulgus arbitratur) sed à vaporibus ex foliis arboris egredientibus qui quàm infesti sunt muscis etiam unicuique notum est. Nam æstivo tempore ad muscas abigendas valde familiare est, ramulum juglandis ab arbore avellere; verum quicquid est de muscis, hæc autem mihi persuaserim, imò cum D. Evelyno non tantum innocuam; sed & amenam & salubrem existimo ob odorem gratum quem folia expirant, & deceptos suspicor qui se contrarium expertos affirmant.

Vires. De viribus Dioscorides & Plinius hæc habent: Nuces Regiæ in cibo sumptæ concoctu sunt difficiles, stomacho nocent (bilem gignunt) capitis dolorem inferunt, suntque rufficibus inimicæ; (Plinius de siccis, quæ unguinosiores sunt, hæc tradit, recentes enim (inquit) jucundiores sunt) utiles verò in cibis jejunis ad vomitiones concitandas (pro his Plinius habet inimicas esse vomituris jejunis, atque addit, aptæ in tenebris solo, trahunt enim pituitam) venenis quoque resistunt cum Ficubus & ruta præsumptæ, ac etiam post ipsa venena hausta comestæ, addit Plinius Anginæ prædesse cum ruta & oleo largius esitatz latos lumbricos pellunt. Imponuntur & mammarum inflammationibus, abscessibus, luxatisque cum mellis exiguo & ruta. Cum capæ autem melle & sale contra canis hominisque morsus proficiunt, eadem cum calyce suo perustæ & umbilico ad moræ tormina sedant. Putamen verò combustum tritumque in vino & oleo puerorum capite peruncto capillos condecorat, & Alopecias replet, at qui intra ipsum est nucleus tritus & cum vino appositus mentes sistit; perverserum autem nucum nuclei commanducati & impositi gangrenis, carbunculis, Agilopibus & alopecis præsentis sunt remedio, aliis miscentur ad acrimoniâ ipsorum eximendam: Plin. Capis.

Cortex juglandium lichenum vitio & dysentericis prodest folia trita cum aceto aurium dolori Plin. Antidotum Mithridatis ipsius manu descriptum constabat ex duabus nucibus siccis item ficis totidem, & ruta foliis 20; simul tritis, addito salis grano: qui hoc jejunus sumat nullum venenum nociturum illo die.

Coquitur hæc nux, Autore Galeno, facilius quam Pontica, i. e. Avellana, stomachoque est gratior, & multo magis quando cum caricis manditur. De recenti nuce hæc accipe, nam sicca in succum pinguem transmutatur ut cibo potius sit inepta.

Corticis nucum exterioris succus expressus vel crudus, vel cum melle decoctus ad dandam consistentiam, in ore gargarizatus ad uvulæ relaxationem, tonsillarumque & gutturis inflammationes vi sua adstrictoria cum tenuitate partium conjuncta utilissimus est Galeni experimento.

Virides seu recentes juglandes ventrem ciunt. Galen. Act. Veteres & sicca potius astringenti concoquuntur probè in ventriculis frigidis, in calidis in bilem vertuntur.

Cortex interior arboris siccatus vomitum ciunt validè: Iuli sive nucamenta lenius.

Tinguntur cortice illarum (nucum) lanæ, & rufatur capillorum primum prædeuntibus nuculis. Plin. hist. lib. 25. c. 22.

Inest quoque juglandibus nucibus propria quædam æ peculiaris facultas ad remoratos menses ciendos, aliis medicamentis nihil proficientibus. Macerantur in aqua donec nuclei membranis possint nudari; deinde nuclei ita expoliati macerantur in aqua vitæ per biduum, eorumque duo vel tres quotidie manè jejunæ exhibeantur per decem dies ante tempus menstruæ fluxionis.

Succus radicis violenter purgare dicitur non nisi rusticis

cis exhibendis aqua etiam juglandium immaturarum destillata ad multa commendatur v. g. ad dissolvendos thrombos concreti sanguinis, ad vulnera & ulcera calida, ad Anthracem pestilentem foris imposita. Ad eadem valet & foliorum juglandis aqua: an verò aqua juglandium refrigeret, adeoque Anthraci conveniat merito dubitat J. Bauh:

Nuces juglandes post pisces sumptæ eorum coctionem adjuvare creduntur, unde illud Scholæ Salernitanæ.

Post pisces nux sit, post carnes caseus esto.

Certum est etiam eas venenis repugnare præsumptas in cibis, unde sæviente pestilentia proceres pariter ac plebs infima quinetiam rura costas jejuni mandunt.

In transmarinis regionibus juglandes teneras & immaturas, cortice exteriori acuto cultello deciso atque etiam putam inè duriore, in aqua frigida maceratas aliquandiu & deinde ad molliem coctas in syrupo è saccharo præparato leviter bullitas & in eundem demersas reservat pro bellariis.

Juglandes virides decerpæ Maio vel Junio appetente, antequam earum putamina obdurerint, Saccharo ad servatæ stomacho utiles evadunt. Imo ex nostra observatione juglandes, dum virides adhuc & immaturæ sunt integræ unâ cum corticibus & putaminibus saccharo conditæ, sive (ut moris est) in aqua saccharata decoctæ donec teneferant; deinde eidem aquæ ad syrapi consistentiam coctæ immixtæ ut servantur, si duæ vel tres sumantur sub vesperam à cibo sumpto, alvum leniter subducunt.

Decoctum corticum exteriorum nucum juglandium terræ superfusum lumbricos è foraminibus suis vel elicit, vel exigit.

Tragus scribit quosdam exteriorem corticem nucum juglandium arefacere, inque pulverem redactum piperis loco in condiendis cibis usurpare, cui ad saporem commendandum nonnulli pulverem foliorum salviæ adjiciunt.

Juglandis materies Mensis & utensilibus landatis dicatur, & operto rectorio. In Gallia plurimi fit hoc lignum pro mensis, scamnis, lectis, cathedris, scriniis, bacis & aliis ejusmodi, quæ tela ceræ fricant sæpe; sic egregiè poliuntur, & nitidum splendorem acquirunt. D. Evelynus fabros nostros oleo suo calido affricto lignum hoc expolire solere ait. Maxime autem æstimatur ob colorem suum varium, venas undulatas aut crispas, & materiæ soliditatem.

Enucibus rufis, calefactis & expressis elicitur oleum, quo nonnulli ad gangrænas, carbunculos, ægilopas & nervorum ulcera utuntur. Infusum auribus surditati prodest, & idem utile calidis doloribus illitum. Matthiolus nullius in medicina usus esse scribit, sed ad Lucernas & Lampadas præcipue expeti.

Quod durabilius sit oleo olivarum. Præfertur etiam pictoribus ei quod è lini semine exprimitur; siquidem hoc cerussæ admixtum tractu temporis colorem immutat: illud vero incorruptum perpetuo asservat. At alibi status potenter dissipare, & in coli affectibus à flatu genitis plurimum afferre auxilii tradit, Aetius eandem ei vim tribuit quam oleo amygdalino, insuperque hoc privatim habere tradit, quod inaurantibus aut inurentibus conducit. Siccat enim & ad multum tempus inaurationes & inustiones continet & adservat.

Iscæ (Yonai) Paulo sunt spongiosa quædam corpora in quercubus & nucum regiarum arboribus nascentia, (fungos, puto intelligit) quæ Barbari magis in usu habent. His inter cætera cauteriorum genera usos fuisse antiquos idem passus testatur, in longis stomachi de fluxionibus, inque hydropicis; quomodo autem iscis ad ustionem uterentur sic demonstrat Cælius Aurelianus. Fungos ligneos inferius ac superius angustos formantes, (convenientius inferius latos efficerent, quo melius cuti insisterent) patientibus apponunt locis, quos summitate accensos sinunt concremari donec cinerescant atque sponte decendant. Id hodie imitantes Turcæ sarmentum vitis bene aridum parti malè affectæ applicant & summitatem ejus accendunt. Hoc modo Moxâ dicta utuntur nunc dierum, ad podagram & alios morbos. Cæterum creber est usus fungosum juglandium scolopetariis ad ignem conservandum:

modum præparandi fungos ad hunc usum vidè apud Johanaem Bauhinum in Historia arboris hujus:

Arbor vulnerata initio veris antequam folia emittit liquorem effundit copiosum, minus tamen dulcem quam sit betulæ succus. *Hæc Rains in Hist. Plant.*

Dominus Rosinus Lentilius, Miscell. Curios. Decur. ij. ann. v. de liquore polychresto è radice nucis juglandis eliciendo hæc habet. Terra circum arborem versus orientem sitam, effodienda profunde satis, & ample, sic tamen ut ne radices lædantur. Quarantur postea radicum mediarum succulentæ extremitates, & cultro circum circa præcidantur ad modum turundæ, sic ut angustioris orificii lagenam vitream capere queant. His radicibus applicentur hujusmodi lagenæ, ac omnia bene obturata sepeliantur in fimo equino, cum parre terræ effossæ admixtâ, ita ut arboris truncus fimo equino & terra ad altitudinem circiter quatuor pedum obtegatur & foveatur supra horisontem. Relinquantur ita per 6. aut 7. dies ac noctes, post rursus effodiantur omnia caute, ne scilicet vitra lædantur. Liqueor extillatus si humidum radicale non auget, illud saltem in vigore servat, ita ut fatalem horam sine morbis homo vegetus exspectare queat. Hisce additur ex Camerario, quod ex ejus liquoris usu officarius quidam bellicus lue Neapolitanæ adeo fædus ut vivum cadaver videretur felicissimè restitutum fuisse. Notandum autem quod liquoris collectio cum arboris internû sit conjuncta. De dosi, aut tempore collectionis nihil præterea addit. Collectionem autem quod spectat illa proculdubio tempestate vernâ fieri debet.

Frid. Hofman de Juglande hæc habet.

Nux Juglans capitis habet signaturam. *Cortex sc. exterior pericranii. Interior* sive ligneum putamen Cranii, pellicula circumdans nucleum meningis & membranarum cerebri; Nucleus ipsius cerebri figuram. Nihilominus *Author Noster* cum aliis statuit ventriculum illarum usu offendi, cephalalgiam excitare, difficilis esse digestio &c. *vid. Dioscorid. Lib. i. cap. 179. Plinius Lib. 23. cap. 8.* Unde Nuces à nocendo dici probat *Andreas Sanftleben in Tr. de Nucibus Saturnal. cap. i. p. 8.* Verum distinguendus est usus ab abusu, & Natura. Dicuntur tamen à peste præservare. Sed *Cass. Hoff. Lib. 2. de Medicam. off. in. cap. 102.* omnem vim alexipharmacam juglandibus denegat. Verum, non tamen de nihilo sunt, quæ & alii probati Doctores Medici de earum virtute alexipharmaca prodiderunt; & certum est, maximam esse differentiam & diversitatem in recentibus & rancidis juglandibus *vid. D. D. Simon Pauli in quadripartit botanic. Class. 2. p. 99.*

Putamina externa viridia vi emetica pollent ob Sal vitriolicum, quod in illis continetur & arte ex his extrahi potest.

Cortex interior de arbore deceptus in forma orbiculari, ac per horam in aceto infusus, atque pulsibus in utriusque manus carpo ac plantis pedum in febribus ardentibus loco vesicatorii applicatus mirificè prodest, & præstantioris est energię illo, quod ex cantharidibus præparatur. *vid. Cataplasma revulsorium sect. V. nom. X. in Thesaur. Pharmaceutic. annexo.*

Cortex nucleum ambiens seu luteola illa membranula aut tunica proximè nucleum investiens subamara insigne arcanum est contra Colicam, id quod verum esse sanctè attestor: dosis est hujus pulverisatæ & exsiccatæ, quantum pugilo apprehendi potest in vino vel alia aqua carminativa.

Iuli vomitum excitant, de quibus vide cautelam in modo laudato D. D. Simone Pauli l. c. p. 97.

Communitè instante S. Johannis Festo nostrates fructus adhuc immaturos molles ac virides passim colligere solent, ad condituram, cujus conficiendi modum vide in *institutionibus Cl. Sennerti p. 1398.* confortant stomachum, juvando digestionem, roborant fœtum in utero, præferant ab abortu, &c.

Aqua destillata ex nucibus juglandibus viridibus non postremum est alexipharmacum confortans.

Succus mente Februario vel Martio ex radicibus perforatis destillans ac depuratus non saltem podagricos lenit dolores,

dolores, sed & magno cum successu in febribus & dolore capitis exhibetur. *Thom. Barthol. centur. 111. hist. 97.*

N. *Cardanus* demonstraturus, quantum consensum habeant genitalia cum capite, asseverat, quod si quis canitie deformis unicâ tantum nocte illi nat. serotum succo ex radice juglandis viridis expresso, canitie deposita nigerrimo colore capitis pilos iri infectos, totum annum duraturos. *Heinric. ab Heer libr. 1. observ. 16.*

Rob Nucum, fit ex succo putaminum viridium cum Saccharo in catarrhis tenuibus ad fauces delabentibus, item in angina &c. euporiston est.

Oleum fit per expressionem ex nucleis recentibus. Hoc summum emolliens & resolvens est, unde in colica etiam ad flatus discutiendos & pituitam incidendam mirâ est efficaciz. Mammillarum iridem fissuras optimè sanat recens expressum & inunctum in perfo desuper Saccharo.

JUJUBA, seu ZIZYPHUS.

Zizyphi vox peregrina esse videtur. *Zizyphi* autem notæ quibus à reliquis congeneribus distinguitur, sunt folia trinervia, flores herbacei vel luteoli, fructus olivares seu nonnihil turbinati.

Jujuba Domestica Sativa.

Nomina. *Zizyphus* seu *jujuba* major *Park.* *Zizypha* sativa & *Sylvestris* *J. B.* *Jujubæ* majores oblongæ *C. B.* *Jujubæ* arabum sive *zizyphus* *Dodonæi.* *Ger.*

J. B. quæ in officinis notas *Jujubas* fert, arbor est domestica, sed in fruticem spinosum facile degenerans. Teste *Casalp.* alioqui satis magna, stipite recto, in ramos plures brachiato, quibus in tenuibus surculis quasi pediculis alternatim adnascuntur folia, unciam aut sescunciam longa, semiunciam aut unciam ferè lara, in obtusum mucronem desinentia, splendido virore nitida, tribus secundum longitudinem decurrentibus nervis, per ambitum serrata; ad quorum ortum rami spinis horrent aliis aduncis brevioribus, aliis rectis longioribus (sed cum senescit aculeis caret, inquit *Casalp.*) eodemq; loci flores, plures ferè simul exeunt, pediculis brevissimis ut fere sessiles videantur ribes floribus persimiles, colore herbaceo, apiculis concoloribus. Hosce fructus excipiunt formâ magnitudine olivari, cotno crassiores, per maturitatem rubentes, vel, ut ait *Casalp.* ex pallido nigrescentes, quasi fumo infecti pelliculâ crassiusculâ, pulpam subalbidam mollem, fungosam, melleæ dulcedinis contegente, cui immergitur ossiculum oblongum utrinque acutum, rugosum, in quo nucleus compressus, lentis majoris instar, rufâ pelliculâ tectus, sapore amaro.

Gaudet cælo & solo calidiore, aut certè temperato: in Hispaniâ, Italiâ, & Galliâ *Narbonensis* hortis colitur. *Clusius* scribit nunquam sponte nascentem à se visam. Forte nullibi terrarum *jujubæ* majores sativæ sponte nascuntur: *Sylvestres* nos in Italia spontaneas vidimus. *E Sylvestribus* vero sativæ, insitione & cultu sativas initio factas existimamus. *Sylvestres* *Monspeli* frequentes occurrere scribit: at nobis circa *Monspelim* non observatæ sunt, Neque *D. Magnol.* in botan. *Monsp.* earum meminit. In rupibus & clivis maritimis propè *Tropiam* *Calabriæ* urbeculam spontè & copiosè crescentes vidimus.

Florent Maio & Junio: fructus leguntur Autumno vel post, unâ cum surculis, & in manipulos colligati post aliquot dierum insolationem loquearibus suspenduntur: postremo decerpti in capsulas reponuntur ad medicos usus, sunt qui decerpta *Zizypha*, & cratibus tegetibusque instrata tandiu insolant quousque rugosa ibidem fiant.

Nos *Venetis* recentes apud *Melopolas* abunde venales vidimus, quâvis palato nostro non multû arrideant.

An hæc arbor veteribus Græcis cognita fuerit ambigitur. Vide apud *J. Bauh.* concertationes de nominibus. Inclinat (inquit ille) multum animus, Theo-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

phr. sub loto, & *Plinium* sub ossæ loto de loto *Athenæi* locutos, ac lotum *Athenæi* esse *jujubas*.

Vires. *Serica* *Galeno* (quæ plerique *jujubas* putant) vix quicquam ad sanitatis tutelam pertinent aut morborum profligationem. Mulierum enim aut infantium effrenatorum sunt edulium quod exigui est alimenti & concoctu difficile. Verùm recentioribus Græcis & Arabibus in utum Medicum vocatæ sunt. Moderatè calidæ sunt & humidæ, ideòque febrium ardentium calores leniunt in julepis aut decoctis, sanguinis acridinem sedant; ad pectoris & pulmonis vitia conferunt, tusses asperas, arteriæ asperitatem, spirandi difficultatem; nec non ad renum & vesicæ vitia, urinæ ardorem &c. *J. Bauh.* syrupum *jujubinum* in pulmonum vitiis non à calida tantum causa, sed & à frigida ortis concedendum putat; contra *Matthiolum* & alios, qui in solis affectibus pulmonum Calidis locum habere putant. Sunt enim dulces & moderatè calidæ, ratio & experientia dicit (inquit *C. Hoffmann.*) *jujubas* habere vim temperandi, calidos & acres humores.

Jujuba Sylvestris.

Nomina. *Zizyphus* sive *Jujuba Sylvestris* *Park.* *Zizypha Sylvestris* *J. B.* *Jujuba Sylvestris* *C. B.*

Frutex paliuro similis est, non solum foliis, sed ramis & spinis, quatuor aut quinque cubitos altus, cuius rami se terram versus contorquent ad formam semicirculi, spinis abundantes crassioribus & similiter acutis, binis simul dispositis. Folia disposita sunt ut in sorbo. Fructus similes *jujubis* domesticis, nisi quod multo minores. & similiores *oxycedri* aut *lauri* fructibus, qui ubi maturuerint rubent, & esui apti sunt: non tamen nucleis qui ossæ, ideòque, rejiciuntur, quibusdam in locis fructus hi in vinum immittuntur ut suavis reddatur. Reperiuntur in agris *Veronensis* bus referente *Pona*; nos (ut diximus) in *Calabria* pro *Tropiam* observavimus.

Vires. *Z.* *Zizyph* macerentur in sp. vini donec valde turgant. Accipe j. aut ij. mane & sero, mirabilis eis vis inest præservandi à tussi. *Hartmann.*

Usus *Jujubarum* est in pulmonum asperitate, tussi, pleuritide, urinâ acri, ferverescencia sanguinis, erosione renum ac vesicæ. *Schroder.*

JULEPUS.

Julepus est medicamentum fluidum ex liquore idoneo & syrupo vel saccharo sine coctione paratum.

Compositio ipsius simplex est, & per hoc differt ab apozemate, à syrupo verò quia liquidus est. Præscribuntur liquor & syrupus in ea proportionè, ut pro ratione *ʒi.* (syropi, sint *ʒvj.* vel *vij.* liquoris. Determinatur quantitas utriusque sub hac proportionè, ratione ætatis, consuetudinis, roboris ventriculi, & usus necessitatis; minor enim dosis in pueris, inasuetis, stomacho debilibus, & calore minùs intenso, major è contra.

Componi solet ex aquis stillatitiis, vel ex herbarum decocto: tunc maximè utimur aquis, quando vel decocta fastidit ægotans, vel ob ventriculi laborem non sustinet, vel quando res urget, & deficit tempus decocta parandi, vel quando adest herbarum penuria, ut in hyeme.

Tempus sumendi est horâ quælibet, sed potissimum sexta matutina, & nona vespertina, duabus aut tribus horis post & antè juscum.

Usus plurimi sunt, vix tamen ad alios scopos usurpatur, quàm

Primò, Ad refrigerandum. Pro quo utiles sunt aquæ cichorii, endiviæ, potul. papav. rhœd. nymph. buglos. borrag. syrupus limonum, de cichor. simplex, violatus, capill. veneris, & similes.

Forma julepi hæc est.

ʒ. Aquar. cichor. lact. an. *ʒiij.* Syrupi limonum *ʒi.* Fiat julep. capiat manè & vespere.

Ex chymicis possunt dissolvi vel addi

Sal prunella à ʒb. ad ʒj. *Spiritus vitrioli*, vel *sulphuris* à gutt. iv. ad gutt. vi. vel ad gratam aciditatem. *Spir. salis dulcis* à ʒj. ad ʒb.

ʒ. *Decocti cichor. lact. q. s. syrupi violati*, vel *limon. ʒj. vel de nymph. ʒb. salis prunel. ʒb. Fiat julep.*

Vel ex decocto magis composito pro ʒ. dosibus.

ʒ. *Folior. cichor. totius, capill. ven. acetosa, lact. borrag. an. M. j. quatuor semin. frigidor. maj. ana ʒj. hordei integri & flor. cordial. ana p. j. Fiat decoctio pro ʒ. dosibus. Adde cuique syrup. capill. ven. ʒj. spirit. sulphur. ad gratam aciditatem; capiat vespere & mane.*

Nota abstinendum esse à spiritibus acidis in constitutione valde sicca quando humores sunt adusti, melancholici, major enim ab his fit exsiccatio & humorum fermentatio.

Secundò, Ad sitim extinguendam, & bilis ardorem temperandum.

ʒ. *Aqua hor. ʒviij. succi limon. recenter expres. ad gratam aciditatem, sacch. albi, vel syrupi capillorum veneris ʒj. agitentur simul & sæpe transfundantur à vase in vas. Fiat julep. capiat uno haustu. Vel*

ʒ. *Aquar. papav. rhæad. portul. ana ʒij. salis prunel. ʒb. syrupi violati ʒj. Misce, fiat julep.*

Tertiò, Ad diaphoresim promovendam in febribus malignis & pestilentibus, variolis, &c.

ʒ. *Aquar. cardui bened. papav. rhæad. scorzon. ana ʒij. confect. hyacinthor. & salis prunel. ana ʒb. pulveris viperini ʒb. syrupi limon. ʒj. Fiat julep. Vel*

ʒ. *Aquar. scab. papav. rhæad. ana q. s. salis cardui bened. vel scab ʒb. lapidis bezoardici veri gr. iv. syrupi capill. vener. ʒvi. Fiat julep.*

Potest etiam dissolvi ex chymicis in aquis hujusmodi. *Bezoardicum minerale ad ʒb. Bezoardicum joviale ad gr. viij. Spiritus salis dulcis ad ʒj*

Ad plures usus solet etiam præscribi julep. de quibus exempla passim reperiuntur.

Quando iterari debet julep. sic præscribitur.

Reiteretur julep. sumendus vespere, aut mane, hora &c. *Tenke.*

Juleporum varia formula è variis.

Julepus Cordialis Donzelli.

ʒ. *Sant. rubr. & citr. aa ʒj. lign. aloës crudi ʒij. rosar. rubr. ʒij. Pulveriscentur omnia subtiliss. post iis affunde spir. vini ʒviij. reponantur in digestionem donec videris spir. vini rubrò colore probe tinctum. Tum ʒ. Sacch. alb. ʒij. redige in syrupum cum aquâ rosarum odoratâ; ac postquam mellis consistentiam acquisiverit, misce aq. flor. bugloss. & aq. flor. borrag. ex alembicò vitreò destillat. ana ʒiv. Bulliant simul leviter ac ab igne removeantur: Posteaque illis tepidis misce spiritum vini prædictum probe tinctum & à facibus suis separatim, reducendo in formam julepi.*

Utilissimum est hoc medicamentum in omnibus cordis effectibus, recreat spiritus vitales & vitiosas sanguinis dispositiones corrigit. Dosis ab ʒib. ad ʒiij.

Julepus gemmatus Norimbergensium.

ʒ. *Topaziorum, Smaragd. Rubior. Sapphyror. Hyacinthi, Sarde, Coralliorum rubrorum ana ʒij.*

Subtil. pulverisatis affundè aceti destillati sufficientem quantitatem, ut solvantur; solutum filtretur, & ad siccitatem in balneo abstrahatur.

Deinde ʒ. *Confectionis Alkermes ʒij. de hyacintho ʒj. aqua naph. seu flor. Aurant. ʒb.*

In temperato calore digerantur, decantentur, & superiori solutioni infundantur; clarum per subsidentiam quod erit, addita sacchari albissimi ʒiij. levi abstractione, per Alembic. ad syrupi formam reducatur.

Tandem ʒ. *Mosch. or. ambr. grif. ana ʒj.*

Dissoluta cum spiritu rosarum prædicto syrupo addantur, & fiat Julepus.

Julep rosarum, è Ph. August.

ʒ. *Aqua rosar. odoratissima ʒxiv. sacchar. clarificati & ultra consistentiam tabulati cocti, ʒij. Misce.*

Cordiale plane Medicamentum est: totius corporis exaltationi confert, vitales spiritus reficit, eosdemque evanidos reparat.

Julep sambucinum, ex eadem Pharm.

Paratur eodem modo, ex aqua sambuci è floribus destillata, & sacchari sufficiente quantitate.

Serosos in corpore humores blande temperat, calores febriles mitigat, & sudores elicit.

Julep ex vino, ex eadem Pharmac.

Fit ad modum precedentium ex vino optimo, odoratissimo, albo & saccharo.

Ventriculi & cordis robur tuetur, coctionem promovet, frigidos ctudosque humores partim incidit, partim concoquit, ac caninam famem lenit.

Julep. ex vino Zwelferi.

ʒ. *Vin. Malv. vel si illud propter valorem non arrideat, vini albi Rhen. ʒv. cui immergantur, ros. rec. ʒij. cort. Arantiorum, citri aa recent. ext. ʒj. cinam. acuti ʒij.*

Facta brevi maceratione, abstrahantur in balneo vaporoso destillando libræ tres, liquori huic spirituosissimo & fragrantissimo abjectis speciebus cum vini vappa quæ in residuo remansit porro adde.

Vin. Malv. vel vin. albi potentis ʒij. rosar. rec. sale condit. ʒiv. flor. tunica rec. ʒj. cort. arantiorum citri recentium, cinamomi acuti aa ʒj.

Ac porro brevi factâ maceratione, abstrahantur, destillando in eodem baln. vapor. ʒiij. vel ʒij. quibus adde sacchari can. albiss. ʒiij. & sola ejusdem dissolutione sine ulla coctione aut ebullitione paretur julepium multis encomiis extollendum, ob ejus virtutes cordiales & roborantes quas habet in morbis frigidis, Apoplexia, epilepsia, lethargo, comate vigili, paralyfi & hydrope, senum peculiare est restaurativum, spiritus eorum vitales excitando, roborando, assumendum in vino quod gratissimum reddit, vel etiam alio in vehiculo grato.

Nota. Aqua spirituosissima bina vice à rosis aliisve speciebus superius abstracta, in virtutibus suis magis intendi posset si in eadem corticum Arantiorum & citri ana recent. & extim. ʒj. cinamomi tantundem, ligni aloës ʒij; nec non ambra ac moschi, pro ditioribus, ana grana aliquot, aliquandiu saltem macerentur. Rosæ verò quandoque planè omitti possent propter odorem foemineo sexui adversantem.

Julep Violarum è Pharm. August.

Ex aqua florum violarum, uti præcedentes, cum saccharo conficitur.

Febrium incendia reprimat, vigilias levat, gutturis, faucium, ac asperæ arteriæ afflictionibus à falsi aut acris humoris influxu enatis succurrit: calidis insuper, ac siccis pectoris morbis apprime convenit & & cordi excalefacto auxiliatur.

Julepi varii è Pharmacop. Bateana.

Julap. Antiscorbuticum.

ʒ. *Vin. chalyb. ʒb. Tinct. sacra ʒij. Sp. cochlear. ʒv. Sp. Lavend. comp. ʒb. & lat. ʒj. Syr. Scelotyrb. ʒib. m. Dentur, coch. ix. omni mane.*

Julap. Asthmaticum.

ʒ. *Milleped. vivor. nu. 400. contusis adde ∇ Hyssop. ʒvi. ∇. Limac. magistr. ʒib. sacch. cand. ʒij. f. express. fort. Dentur coch. 2. cum Decoct. Pector. ʒij. quaque hora calide.*

Julap.

Julap. Cretaceum.

℞. Crete albis. ℥at. ʒi. sacch. opt. ʒiβ. ol. st. nucist. gr. iij. Hydropeg. ℥ij. misc. optime f. a. D. ʒiij; pro vice sape. Ev τῇ καρδιαλγίᾳ ἀεὶ 150v.

Julap. Fragorum.

℞. Fruct. fragor. matur. ℥iβ. Hydropeg. ℥ij. Leuc. cœn. ℥iβ. sacch. alb. Syr. Limon. ana ʒiβ. macer. in frig. mens. 3. & cola. In astu febrili refrigerat, &c.

Julap. Hysteric. Camphoratum.

Incende camphor. ʒij. & sape extingue in Font. ℥i. ad totalem camphora consumptionem. Tum cola. Denur coch. 4. vel 5. sape in paroxysmo.

Julap. Hyft. Farinaceum.

℞. Farina tritici puris. ʒij. sacch. alb. ʒiβ. Hydropeg. ʒviij. Agitentur opt. in Phiala, ut f. Julap. albis. Denur sapius coch. 4. in paroxysmo.

Julap. Hyfter. Fœtidum.

Solve Asa fœtid. opt. ʒiβ. in ∇ Ceras. n. ʒvi. sine calore in mortar. frig. ut lactescat, f. a. Sumatur coch. i. initio paroxysmi, & repetatur post finitum ejus.

Julap. Hyfter. Mithridaticum.

℞. ∇ Bryon. c. ʒvi. Mithrid. ʒij. Tinct. castor. ʒij. Syr. Ceras. n. Gran. Actes ana ʒiβ. m. f. a. Dos. coch. i. vel ij. in languoribus.

Julap. Hyft. Moschatum.

℞. ∇ Napha ʒvi. Mosch. ℥iβ. sang. dragon. ℥j. m. pro ij. dos. in parox.

Julap. Idæum.

℞. Fruct. rubi Idæi rec. ℥ij. sacch. alb. ʒij. Hydropeg. ℥iβ. serva simul in frig. ad mens. 3. & cola. Bibatur ad libitum in astu febrili ad sitim extinguendam.

Julap. Perlatum.

℞. ∇ Citri, Bōrrag. Melis. ceras. n. āā ʒiij. Sp. ceras. n. vel Sp. citri ʒj. sacchar. albis. ʒvi. margarit. prep. ʒiβ. Agitentur opt. f. a. Dentur coch. 5. vel 6. in languor.

Julap. Purpureum.

℞. Syr. Viol. ʒiij. Sp. Olig. 30. Hydrocriti. vel Hydropeg. ℥ij. m. f. a. In febris ardentibus ad sitim extinguendam utilissimum.

Julap. ad Rachitidem.

℞. ∇ Ling. cervin. cum 2. cohobis ℞at. ʒv. Conf. Alkerm. ʒij. Syr. Caryoph. ʒj. Sp. ∆ gt. vj. Fol. ∅ num. 2. m. f. Julap. Elegans. D. coch. 2. bis in die. Miranda præstitisse narrant Domina.

Julap. Tartarifatum.

℞. ℥ subtr. q̄ alb. ʒj. ∅ q̄ ʒiβ. V. alb. ℥ij. m. Dos. ʒiij. bis in die per dies 8. in Ictericia curanda.

Julap. Vitæ.

℞. V. tell. ovor. rec. num. 2. sacc. alb. ʒiβ. ∅ cinnam. gt. iij. V. alb. vel Hispan. ʒvi. exactiss. miscantur f. a. In animi deliquio, viriumque maximâ debilitate, vel in moribundis auxilio fuit.

Iulepi duo aperientes ex Goddardo.

℞. Aq. Cinnam. absinth. magis composita, cochlearia compos. syr. de ammoniacō āā ℥iβ. aq. amygdalar. amarar. ℥ix. M. & add. sal. mart. ʒvi. in aq. flor. sambuci triplō pondere solut. per residentiam clarificetur.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

Pro majori compositione.

℞. Superioribus addantur absinth. flor. chamam. āā 3x nuc. mosc. croci āā ʒvi castor. ʒiβ.

Vide rursus plura in hoc argumento sub titulo Potio.

I U L U S.

Est nucamentum quod in corylō, juglande &c. velut prælongus vermiculus dependet, & nihil aliud esse videtur quam florum stamineorum series. Salicum juli à juglandis &c. diversi sunt; nam in fertilibus plantis numerosis vasculis seminalibus constant. Rainis.

J U N C A G O.

Juncago quæ Dominio de Tournesort in sua Historia Plantar. circa Parisios nascentium, Juncago palustris & vulgar. Instit. rei Herbar. Gramen junceum spicatum, sive Triglochin Cass. Baub. Gramen spicatum alterum, Lobel. dicitur. Planta est omnina de graminum familiâ, nullius aut minimi in Medicina usus quia etiam si vias urinarias referare credatur, per alvi adstrictionem sæpius noceret.

J U N C U S.

Juncus Caulibus teretibus, fungosis, panicula vel in summo caule existente, vel ex ejus latere inferius exeunte, & multis feminibus majusculis composita à reliquis graminum foliis distinguitur: gramina Juncea à juncis distinguuntur caulibus foliosis articulatis. Folia etiam in his non semper teretia sunt, sed in nonnullis speciebus compressa, in omnibus tamen fungosa.

Notandum etiam nos communem botanicorum sententiam secutos nonnullas species juncis admiscuisse, quæ ad hoc genus propriè non pertinent, ut, v. g. juncum acutum maritimum Cambro-Britannicum, gramen tormentosum.

Juncus autem à jungendo dicitur, quod cum flexilis sit, res eo jungi possint.

Juncorum varia sunt species quas hic paucis describemus.

Nomina. 1. Juncus Acutus capitulis Sorghi C. B. maritimus Capitulis Sorghi Park. pungens, seu juncus acutus Capitulis Sorghi J. B.

J. B. Densè stipatos tollit culmos, sesquicubitales, crassiusculos, rigidos, cortice spisso, medullâ solidiusculâ, albâ, quos statim à radice, crassis fibris contextâ, involvunt foliaceæ vaginæ, rubentes, dodrantum circiter longæ, Comitantes pinnatis Cristis, Sparti Austriacæ formâ, non autem colorem qui hic rufus, æmulantibus, intra mucronem autem culmorum seminumque glomerata capitula (subrotunda, splendentia fusca, Sorghi æmula, semen minutissimum oblongum & subfuscum continentia) quorum exortui subjectum est folium; indidem erumpens, ex latiore principio vaginam imitata, in acumen desinens.

In Arenosis cumulis ad Occidentale Cambriæ litus Merionethense copiosissime oritur. C. Bauhinus circa Thermas Aponianas frequens esse ait, ut & non longe Monspelio ad pagum Peraule, imò in tota illa ora maritima passim provenit.

Nomina 2. Juncus acutus maritimus capitulis rotundis C. B. acutus maritimus alter Park.

C. B. hic multò procèrior est (præcedente) inquit C. Bauhinus imò nobis observantibus nihilo procèrior: radice crassa, lignosa & nodosa, fibris capillata, ruffo cortice obducta. Calaminis sive scirpis permultis, duos cubitos superantibus, ad exortum ruffâ tunicâ opertis, fungosa medulla farctis, in vertice mucrone pungente duplici, altero sæpe unciis quatuor capitula superante, altero brevior, deorsum reflexo: inter quos scapus diffilit, pediculi prodeunt,

floris leves ac teretes, intus veluti canaliculati: capitula parva, rotunda, aspera, sparganii forma sustinentes: nonnunquam vero capitula plura, aspera, conglobata sine pediculo proxime caulem amplectuntur. Quibus mollis, nivea & tomentosa instar barbulae propendit.

In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi ad maris litus valide frequens est. Nuper etiam in Anglia detexit in Comitatu Somerseti *D. Stephens.*

Ex medulla & ellychnia & alia à circulatoribus fiunt unde columbas commentitias volitantes, atque aëre sese librantes conflatas vidit Lobelius. Adv.

Nomina. 3. Juncus acutus maritimus caule triangulo *C. B. Park. J. B.*

C. B. Radice est repente, fibrosa: à qua aliae radice prioribus exsiccatis nascuntur: hinc culmi, quos ad radicem breviter folia cingunt, pedales, trianguli exurgunt, & in extremitatem pungentem desinunt, & paulo intra fastigium à latere floccus racemosus rufescens, ex granulis tribus lateribus donatis constans, exit.

In maritimis propè Frontignatam & Peraule oritur, apud nos ad ripas Thamesis fluvii tam supra, quam infra Londinum, ut à fide dignis mihi relatum est: quamvis ipse nec ibi, nec alibi eum hactenus viderim.

Nomina. 4. Juncus acutus maritimus Anglicus. *Park.*

Eodem modo radicibus se propagat quo alii junci; sunt autem scapi seu calami sesquicubitales aut altiores, teretes, laeves obscurius virides, duriores & solidiores multo quam junci laevis vulgaris, medullam densam & solidam fardci: alioqui magnitudine illis non multum cedunt; ad imum tribus quatuorve thecis squamosis, ex rubro nigricantibus cincti è scapo in sinum excavato, & in duo cornua, altero admodum brevi, diducto, sesquipalmari aut dodrantali ab apice distantia, erumpit panicula ampla, in plures partiales panicula divisa una præ aliis longo pediculo infidente & supra reliquas eminente ac si separata esset. Panicula in latitudinem minus diffusa est quam junci laevis vulg. colore albi spadiceo tantillo inter mixto, vasculis triangularibus composita.

In maritimis palustribus copiosè oritur, ut, v. g. circa Camalodunum in Essexia & ad occidentale Cambriae latus.

Nomina. 5. Juncus acutus *Ger.* acutus vulgaris *Park.* acutus paniculatus *C. B.* an juncus foliaceus *J. B.*

Radix prope terram superficiem oblique incedit, fibris frequentibus fuscis demissis firmiter depacta; plurimi inde conferti junci è capitulis seu gemmis crassis & velut bulbosis squamis membraneis. Spadiceis splendentibus obvoluti exeunt. Hujusmodi membranosus folliculi, spadiceo colore splendent ac si politi essent, intimo reliquis multo longiore, imum juncum ad palmi & amplius longitudinem involvunt & obvestiunt. Junci sesquicubitales sunt & altiores, graciles & teretes, striati, cortice crasso, medullae intus pauca, non tamen inanes, & radicibus omnes oriundi, nulli (quantum nos observare potuimus) ex aliorum sinibus, ut scribit Dodonæus, eumque secuti alii plerique botanici. Forte alium & à nostrate vulgari juncus acuto seu duro diversum describit in acutos mucrones exeunt: intra quos ad dimidii plus, minus pedis distantiam erumpit panicula sparsa, rufescens semen in vasculis.

In pascuis & ad vias publicas solo humido ore passim provenit, junci panicula arundinacea descriptio apud *J. Bauhinum* in multis ad juncum nobis descriptum accedit.

Nomina. 6. Juncus montanus palustris. An oxychænos sive Juncus acutus Alpinus Cambrobritannicus *Park.*

Fibris majusculis rubentibus radicitur. Folia numerosa, non erecta, sed plerumque supra terram expansa stellæ in modum, brevia, dura, acuminata, non exactè rotunda sed superna parte canaliculata, undè rectius fortasse ad gramina quam ad juncos referendum est hoc genus, è medio foliorum exurgit caulis dodrantalis aut pedalis, firmus, medullam fardci, uno tantum folio prope terram cinctus. Cetera nudus, junceam in summo paniculam gestans, è pluribus partibus compositam, quæ singula è sinu foliis quod in caule ad eorum basim consistit emergunt, flos graminis hirsuti exilis, hexapetalos, cum totidem in medio staminibus fimbriatis luteis. Succedunt capsula majuscula subrotunda, semen continentes.

In montosis palustribus solo spongioso & putrido per totam Angliam copiosè nascitur: ut loca indicare non sit opus. Prope Londinum in ericeto Hampsteadensi.

Figura & descriptio graminis juncei maritimi majoris apud *Parkinsonum* huic nostro convenit.

Parkinsonus speciem hujus minorem habet, quam vocat oxychænum sive juncum acutum minorem p. 1192.

Nomina. 7. Juncus aquaticus maximus *Ger.* laevis maximus *Park.* max. holoschænos *J. B.* juncus maximus seu scirpus *C. B.*

C. B. Hic magnitudine & crassitie reliquos superat, & proceritate Thypæ æqualis est, ex radice crassitudine fere cubitali, geniculata, hinc inde per terram repente, cortice atrorubente intecta, intus candida scirpi seu junci hominis altitudinem superantes, minimi digiti crassitie, virides (qui exsiccati albescunt) rotundi, enodes, medullam candidam, molli & fungosam fardci attolluntur, quorum cacuminibus scirpis reclusis petioli intus canaliculati, foris teretes extenduntur, qui summo apice floccos seu paniculas rufas, inæquales, squamatis compactas metæ figurâ, infernè latiores, superne acuminatiores sustinent. Semen milii magnitudine, triangulum, altera parte compressum, altera dorso elato succedit.

Hic ob fungosam & foramenulentam medullam levissimo vento facile hinc inde, instar arundinis vulgaris agitur in fluminibus, piscinis & stagnis majoribus, aquas semper habentibus invenitur.

Ufus. Juncorum multiplex usus est, ad tegetes, scabella pedum, ad cathedrarum sedes, sportas &c. inter Indos ad tapeta, stragula, pileos, &c.

Juncus seu scirpus medius *C. B. Park.* Sylvaticus Tabernamontani *J. B.*

A præcedente magnitudine potissimum differt, & in Sylvis sed locis aquosis provenit, unde Juncus Sylvaticus Tabernamontano dicitur, plenioris descriptionem videtis apud *J. Bauhinum*.

Nomina. 8. Juncus laevis paniculatus sparsus nostras. An Juncus paniculatus arundinacea *J. B.* jun. laevis paniculatus sparsus major *C. B. Park.* juncus laevis *Ger.*

Ad bicubitalem aut majorem altitudinem assurgit, scapis teretibus, erectis, minimè nodosis, culmo crassioribus, viridibus, glabris, & nitentibus, medulla solidiore & densiore, quam in sequenti specie unde ad ellychnia aptiores sunt, in mucrones acutos desinentibus. Dodrantali cis apicem spatio erumpit panicula sparsa & late diffusa, saltem in locis ubi humor abundat, alias enim paulo compactior est: in petiolis tenuibus vascula propendent, multo quam in sequenti juncus minora pallidiora, quamvis planta ipsa major sit.

In aquis ipsis aut juxta aquas.

Hujus medullae usus est ad ellychnia, ex cortice texunt funes in agro Staffordiensis, vide *D. Plot.*

Nomina. 9. Juncus laevis vulgaris panicula compactiore, an juncus laevis vulgaris *Park.* an junc. laev. glo-

glomerato flore ejusdem. Juncus lævis panicula non sparsa C. B.

Hic à præcedente differt caulibus striatis, medulla rariore & spongiosiore. Unde ad ellychnia inutilis est: paniculâ compactiore & vasculis seminalibus majoribus, superius seu cacumini propius erumpentibus, tempore denique florendi maturiore.

In pascuis & sylvis locis humidioribus copiose non raro oritur, cum superior plerumque in aquis tantum aut juxta aquas: locis centè humidioribus quam hoc loco descriptus.

Juncus Matthioli figura apud J. Bauhinum huic convenit non item descriptio.

Nomina. 10. Junci genus medullâ prorsus niveâ *Hist. Lugd. 7. B.* juncus lævis alter C. B.

Parum differt à juncus lævi vulgari panicula sparsa; ut nesciam an planè distinctus sit.

Nomina. 11. Juncus cacumine reflexo major C. B. *7. B. Park.*

C. B. Radice nritur capitata, & quâ parte alia aliis adhærent & incumbunt, leviter compressa, cortice nigro obducta, fibris plurimis deorsum & ad latera emissis, & in unum cespitem coacervatis: scirpis est sesquicubitalibus, ad exortum tunicâ atro rubente & splendente tectis, qui infra cacumen incurvatum, pedis fere spatio, ad latus scirpo fisso, plures pediculos emittit, qui foliaceæ, membranosa & oblonga vascula, in quinque apices fissa sustinent: quæ fructum angulosum nigrum minuto semine, eoque flavo, refertum continent vel, ut Ruellius, melancranis seu atriceps dicitur: fructum gerit uvarum coherentium modo, in quibus cupidatum semen clauditur. Aquæi & subaustri saporis.

Nascitur in aquis & pinguibus locis, sed pura & præterlabente aquâ fere madentibus.

Nomina. 12. Juncus acumine reflexo alter C. B. *7. B. Park.*

Caule est sesquicubitali, rotundo, lævi, aphyllo: panicula umbellæ similis, atro splendente, pediculo carente, filamentis cæruleis (ut in Aphillante cærulea) donata: quam caulis duarum triumve unciarum, acutus sed mollis parumque reflexus superat.

In Provincia Gallia provenit.

Nomina. 13. Juncus trifidus *7. B.* acumine reflexo trifidus. C. B. *Park.*

J. B. ex radice nigra, geniculata & fibrosa, longiuscula scirpi producuntur plures, dodrantes, valde tenues, quorum singuli per extrema in tres stylos palmares tenuissimos, acutos finduntur: interque hos ad exortum sedentes paniculæ paucæ exiguæ, ex rufo fusæ.

In Monte Fracto Lucernatum, inque Pyrenæis & Montibus Moraviæ provenit.

Nomina. 14. Juncellus omnium minimus, Chamæschænos *Ad. Lob.* juncellus *Lobellii Park.* an juncus humilis *7. B.* an juncellus inutilis sive chamæschænos C. B.

Transversam agit radicem, in superficie terræ repentem, & qua obiter hinc fibræ albentes demittuntur, inde surriguntur junci crebri, qui paniculas producunt, tres uncias aut interdum palmum alti, enodes, unico vel altero ad basim foliolo cincti, setæ equinæ crassitudine aut etiam tenuiores, erumpentibus, propè apicem ad latus, ut in aliis juncis, paniculis brevibus compactis habitioribus (ut mihi videbatur) squamosis absque pediculis, plerumque duabus, interdum unica, rarius tribus, colore primum virentibus, tandem nigricantibus cinereo, Imijunci & transversa radix spadicea sunt.

In Arenosis & glareosis humidioribus oritur.

Nomina. 15. Juncus exiguus montanus, mucrone carent C. B. *Park. 7. B.* an juncus *Lychnanthemo tenuis. Thalii?*

Radice est pusilla, nigra, capillacea: Cauliculo quatuor vel quinque unciarum, cujus summo capitulum parvum, ex fusco purpurascens, quadrifidum, in exiguum, rudigiusculum filamentum abiens insidet: foliola ad cauliculi principium tria, juncea, unciam longa.

In Taurero Raftadiensi Austriæ monte provenit.

Nomina. 16. Juncus lævis paniculâ glomerata nigricante C. B. Lithospermi semine *Hort. reg. Blas. & Paris. Botan. Monsp.*

Magn. Radicem habet ex multis fibris nigricantibus, in unum cespitem coacervatis, compositam, unde plurima folia palmaria, triangularia producuntur, inter quæ plures oriuntur scirpi cubitales, quorum unusquisque capitulum spadiceum producit, scirpo adhærens, ex varijs folliculis compositum, in quibus semina alba, splendentia, lithospermi majoris seminibus minora continentur, folia & scirpi versus radicem colorem habent attrubentem.

Provenit apud nos locis palustribus, putrido & spongioso solo ut v.g. Hinthoniæ & Teversham mariscis propè Cantabrigiam, reperitur etiam circa Monspelium: unde à P. Magnol. pro nondum edito depingitur & describitur.

Nomina. 17. Juncus parvus calamo supra paniculam compactam longius producto.

Semipedali altitudine affurgit, scirpo tenui, gracili, panicula compactâ, tertia circiter totius longitudinis parte, à summo scapi mucrone erumpente.

Tribus hisce notis: 1. Parvitate sua; 2. Paniculâ compactâ. 3. Scapo supra paniculam longissime producto, ab alijs juncis facile discernitur.

In Westmorlandia non procul ab oppido Ambleside dicto invenit *D. Newton.*

Nomina. 18. Juncus capitulis equiseti C. B. Aquaticus minor capitulis equiseti *Ger. Park.* Capitulis longis, sive Clavatus *J. B.*

C. B. Radice est geniculata, graminis aut arundinis modo serpente & innumeris fibris implexa: scirpis cubitalibus, aliquibus tamen ad radicem duarum & trium unciarum, ad exortum subrubro cortice tectis, tenui & fungosâ medullâ planis, quorum verticibus capitula exigua, rufescentia, aliquando rotunda, aliquando oblonga, asparagorum equiseti vel clavæ instar insident: flores candicantes & villosos, in latus exporrectos Maio & Junio Mensibus emittit. Septembri. Mense in hoc, quemadmodum in fecali luxuriante grana, oblonga, nigricantia, dura intrinsecus alba vidimus.

Varietas observatur in stylis vel scirpis, alteri enim triplo latiores, alteri angustiores sunt.

In Rivulis frequentissimus est: reperitur etiam in aquis stagnantibus.

Nomina. 19. Juncus capitulis equiseti minor & fluctans C. *Bauhin I. B.* Juncellus capitulis equiseti fluctans C. B. *Park.*

C. B. Ex radiculis capillaceis juncus tenuissimus recurvus prodit qui in plures juncellos duarum triumve unciarum subdividitur, quorum aliqui erecti, aliqui reflexi capitulum minimum sustinent, & juncellis singulis foliolum tenuæ, capillaceum adponitur.

In Angliæ aquis fluitat auctore Gillenio.

Hanc speciem nos nondum vidimus, sed altam à D. Rob. Plot. in historia naturali Oxoniensi titulo.

Nomina. 20. Juncelli omnium minimi capitulis equiseti.

Qui è radicibus capillorum instar tenuibus exurgit setæ equinæ crassitie, altitudine tres uncias non

excedens; clavam in apicē parvam aliorum hujus generis in modum sustinens; notandum autem juncum hunc non ramosum esse in modum præcedentis, sed simplicibus scapis ē radice exurgere. In pascuis communis Bursii humidis fossis prope Isidem fluvium. Hunc nobis communicavit amicissimus vir rei que herbariæ peritissimus. D. Dodswoorth.

Nomina. 21. Juncus alpinus cum cauda leporina *J. B.* Alpinus capitulo lanuginoso sive schænoliguros *C. B.* à capitulo hujus multum leporum caudæ dissimili. Gramen juncoides lanatum alterum Danicum. *Park.*

J. B. Crebros ex parvis radicibus surrigit culmos, dodrantes, interdum cubitales, striatos, foliis propter terram stipatos, quæ & ipsos culmos aliquosque involvunt, alioqui juncea folia in stylum exeunt, acutum, pauloque supra raditem resuscitantia sæpe in fibras compactas fatiscunt. Cæterum singuli culmi in echinatum caudam, canescentibus, tomentosis squamis compactilem fastigiantur, mollitie holosericum provocantem. Radicatur denique fibris aliquammultis fragilibus.

In palustribus putridis & cænosis locis v. g. in Lincastris, in Salopia, &c. provenit inque Montibus solo spongioso, aquæ bibulo & cænofo.

Nomina. 22. Juncus parvus palustris cum parvis capitulis equiseti. An juncus montanus parvus cum parvis capitulis luteis *J. B.*

Plurimis fibris crassiusculis subluteis, alid in terram demissis, crispis & velut undulatis radicatur, imam Juncorum partem squamæ crebræ pellucidæ, nigricantes obvolvunt ut in aliis fit. Styli palmares tenues, satis firmi & rigidi in ipsa summitate capitulum exiguum gestant ex spadiceo nigricans, unde stamina seu filamenta numerosa sordide flavicantia exeunt. Foliolum in singulis caulibus unicum per breve.

Maior Mense florere.

Nomina. 23. Juncus Alpinus bombycinus *C. B.*

C. B. Ex radice aliorum juncorum simili folia juncea exurgunt inter quæ culmi plures tenuissimi, palmo minores, qui capitulum parvum lanugine alba ornatum sustinent.

In Montibus Moravia: & in locis udīs Vallis Grindevvald Bernatum crescit.

Nomina. 24. Juncus parvus palustris cum parvis capitulis equiseti. Juncus parvus Montanus cum parvis capitulis luteis *J. B.*

Longissimis fibris juncus hic Montanus iisque crebris demissis radicatur; stylos emittit palmares aut dodrantes, tenues, multis foliorum propter terram involucris obritos. Qui cætera æquabiles enodesque in summo fastigio capitulum gestant duplo triploque brevius quam juncus clavatus, inter squamas longiores emicantibus flosculis luteis.

Descriptio hæc & figura *J. B.* satis apte respondet juncō à nobis sæpius observato in pratis udīs & locis palustribus circa Middletonia agro Warwicensi, & alibi in Anglia, fibræ duntaxat radicum vetustiores non rectæ sunt, sed huc illuc reflexæ & velut undulatæ, imam juncorum partem squamæ, crebræ, pellucidæ nigricantes obvolvunt. *Ramus in Hist. Plant.*

Omne junci genus, in cuius 24. speciebus hætenus ex Ræio describendis fufiores forsitan quam par est fuimus, quamque requirat nostra methodus, facultatis est adstringentis, ac propterea ejus semen alvi fluxibus, imò in mulierum hæmorrhagiis exhibetur; imò somnum conciliare creditur.

JUNIPERUS.

Juniperus à junior & pario, quod juniores & novellos fructus pariat antiquis maturefcentibus ut qui

pariat usque ad tertium annum arbori suo in hærente fructu *C. B.* Græcis Ἀρνάθος ὁστὴν τὸ τλῶν ἀγρὸν ἔχον quod ejus odorem omnia reptilia averfentur, vel διὰ τὸ ἔχειν τὴν ἀνάνθηος ἀντιπυρρην idem.

Ostendit Anguillara juniperum Dioscoridis & nostram unam esse ex cedris Theophrasti. Oxycedrus etiam seu cedrus Lycia nihil aliud est quam Juniperi species major. Lignum quoque cedrini nomine ex America allatum Juniperinum est.

Nomina. Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis *J. B.* vulgaris *Park.* vulgaris fruticosa *C. B.* item vulgaris arbor ejusdem Juniperus *Ger.*

J. B. Plerumque densò ramorum stipatū fruticat duntaxat juniperus aliquando in justæ magnitudinis arborem adolefcit, ita ut in Hispania supra Segobium quæ Madritum itur, ex ea trabes & ædium contignationes sibi incolæ fabricent; *Candice* tamen non multum crasso, cortice scabro & deciduo, rubente, materie firma, nonnihil etiam rubescente, maximè si siccata fuerit, odore resinoso, grato. Ramuli in surculos multos dividuntur, minacibus foliis, semper virentibus aculeatisque armati, rigidis, supernè glabris, infernè virentibus, splendidis, ratò uncia longioribus, sæpè brevioribus, valdè angustis, ternis plerumque simul per intervalla *Bacca* per ramos sparsæ, numerosæ, rotundæ, umbilico in tres radios, totidem seminum loculos ostendentes distincto, donatæ, duplo majores granis piperis, primùm virentes, per maturitatem cæruleæ, aut nigræ, in quarum singulis granis tria oblonga, triangula, (nonnunquam quatuor *Cæsalp.*) pulpa nonnihil rusta involuta, sapore acri, resinoso cum quâdam dulcedine, tactū quoque ubi inveterurint oleoso & glutinoso; pro flore tribus foliis minutissimis obseptum insidet futuræ baccae rudimentum, tam exiguum, ut nonnisi à diligenter inspicienti animadvertatur.

Nos pro fructu calyce hæc foliola habemus, non autem pro flore; pro flore enim non agnoscimus quod staminibus & apicibus caret, quæ floris præcipua pars sunt. Unde & multi flores petalis seu foliolis coloratis fugacibus carent, nulli autem apicibus. Apices enim nostræ sententiæ, sunt vascula seu conceptacula seminis masculini in plantis. Atque idcirco *Cæsalpinus* rectè scripsit, Juniperum quæ fructum fert, non florere. Quod & veteribus observatum, nam referente Theophrasto & ex eo *Plinio.* Quidam Juniperorum duo genera tradunt: Alterum florere nec fructum ferre: quæ vera non florent ferre protinus, baccis subnascentibus, quæ biennio hærent.

Per reliqua similis est huic Junipero quæ fœmina (rectius mas) dici potest. flores producens plurimos, aliàs quæ fors tulit, sparios per ramulos, aliàs confertos conorum exiguiorum instar habentes, purpurâ cum croceo mixtu pictos, ex plurimis corpusculis rotundis, papaveris semine minoribus, pulvisculo farinaceo fardis compactiles, intercedentibus raris quibusdam viridantibus acuminatis foliolis, squamatum corpuscula dicta obtegentibus. Videas autem cum dehiscunt effigiem capituli Equiseti florentis, Uniquique squamulæ adnatis apicibus rufis. *Cæsalpinus* vocat flosculos ameneos exiles. Cæterum tantum florum apparatus, quasi ad ostentationem comparatum, nullus fructus sequitur, sed in auras abiens pulvisculus vanam baccarum spem eludit.

Nostræ sententiæ; (ut modo dictum) flosculi hi non ad ostentationem tantum, sed ad usum comparati: si quidem pulvisculus eorum apicibus inclusus fœminarum baccis aspersus spermatis masculini modo in facundandis inseruit. Consentit *Tragus* inquiriens. Maior mense tenuissimus ac luteus pulvis è Juniperis in auras evolare conspicitur, quod semen illius esse animadverti (*Joh. Bauh.* perpetam pro semine florem scribit) Post hunc quem diximus pulverem baccae prorumpunt exiguae, virides,

virides, quæ altero demum anno, Autumno appetente, quod illis tempus maturitatis est, cæruleo tinguntur colore.

Juniperus in ericetis agri Cantiani, Essexienfis & alibi in Anglia copiose provenit, sed plerumque humilis & fruticosa; quoniam jumenta eam assidue carpunt & coërcent & in arborem adollescere non permittunt: in hortis cultu arboris modicæ magnitudinem & staturam assequitur: invenitur etiam non minus frequens in Belgio, Germania, Gallia &c.

De tempore florendi jam diximus. Fructus, norante Cæsalpino, maturefcit anno secundo, ut aliquando fructus trium annorum contineantur. Cum is qui maturus est fervetur ad tertij anni fructum nascentem.

Quæcunque in junipero cernuntur (inquit Tragus) odorata sunt. 1. Humor, qui ex ea, si lædatur cum in succo suo fuerit, effluit. 2. Radices & caudices aridi. 3. Baccæ recentes & maturæ. 4. Folia acuminata.

Ufus & Vires. Lignum præcipue ob suavolentiam commendatur (præsertim si maio, mense cædatur) unde incensum ad aërem emendandum, & odores noxios aut contagiosos arcendos suffumigatur.

Juniperi arbor maio mense cum pluviosa fuerit tempestas luteam à cortice sudat lachrymam, quæ magna copia tanquam fungi exigui arbori adhæret, nec magnopere odorata est.

Lignum vix sentit vetustatem, & carbonēs dat tantum non æternum viventes, Chymistæ, tradente Matthiolo, asseverant carbonem juniperinum æcenfum ac suo cinere obrutum ignem integro anno fovere. Trabes juniperinæ fuerunt in Templo Dianæ Sagunti cui religione inductus Annibal pepercit, ut est apud Plinium.

Rasura ligni non sine causa in cucuphis adhibetur, quippe cephalicum est, nervosumque genus insigniter laborat Schrod; fit etiam cinis ex ligno. Per quem cinerem colatum, vinum tam potens est sudorificum, ut quibuscum exhauserit, aquas, vel pituitam extoto habitu. Ex arido ligno destillatur & oleum per descensum vel retortam; melius tamen elicitur per vesicam extrinsecus ejus usus est in morbis nervinis, in tibiæ serpigine & cancro, vulneribus & ulceribus malis.

Baccæ in cibo esitata stomacho frigido utiles sunt, pituitamque quæ in illo coit digerant, contra inflationes & tormina faciunt, vitia pectoris purgant, tussique medentur, urinam efficaciter ducunt venenumque à corde repellunt, eadem menses & coxendicium vitiosos humores ducunt; suntque Tragi Judicio ad cibos condendos pipere salubriores. Utiles etiam sunt in affectibus capitis & nervorum, differunt autem baccæ aliæ enim dulces sunt & edules, aliæ acres & aromaticæ.

Lapponij baccarum juniperi decoctiones bibunt, quemadmodum nos Caovæ & Thæ, suntque præcipua apud illos medicina pars. Schefferus hist. Laplandiæ earum vires fuisse traduntur à Scharfio de Junipero, & Joan. Michaele de eadem.

Succus extractus è baccis juniperi ad prædicta omnia utilis est & alia multa, si credere fas sit, quæ vide apud I. B. Theriacam Germanorum nonnulli dixerunt, tum quod sit efficax contra venena, tum quod Germanorum corporibus amicissima & maxime salutaris.

Oleum sit vel per destillationem è baccis confusis cum aqua mixtis, oleum enim cum aqua ascendit, vel per expressionem è baccis confusis cum oleo olivarum mixtis. Valet ad tormina aliaque multa. Guttulæ duæ vel tres puerulis verminantibus exhibitæ Lumbricos quibus vexentur, enecant & expellunt.

Vini diureticam in juniperi baccis, earumque oleo (inquit Cargillus) in me expertus tum sæpius manifestam, & tum ex illis paucas devoratas, tum panem hujus guttula tinctum evidenter violarum odore urinas imbuere, non secus ac terebinthinam vulgarem ejusque oleum stillatitium. Cum generoso vino albo decoquenda, & decoctum singulo mane saccharo edulcoratum calculosis propinandum.

Ego fretus hac observatione complurimis commendavi baccarum juniperi blande confus. hiscente solum exteriore cortice insulum in vino, qui perbelles ab illius usu valuerant, & à jugi nephretico dolore vindicati sunt: exemplo sit Laurentius Rostochiensis Professor: is enim quotidie circiter i. pugillum grosse confusarum aut detibus comminutarum bacc. junip. deglutiebat, quo simpl. medicamento obtinuit, ut non solum arenulas, sed calculos minutulos, imo etiam lentis magnitudine si non sine omni molestia, attamen dolore excrevit, cum ante usum harum baccarum sæpe oppido male habuit. Sim. Paulus spiritus & oleum non modo contra calculum sed etiam pectoris vitia valde profunt.

Elixir juniperinum admirandum virium in Calculo: quod insuper stomachicum insigne est &c.

4. baccar. juniper. maturat. & electar. q. v. Confundantur crasse digeranturque affusa aliqua aqua diuretica. Hinc exprime abstrahendoque inspissa ad consistentiam mellis, hujus mellis juniperi cochl. 10. 11. 12. &c. misce optime cum aqua vitæ juniperina, digereque aliquandiu lenissimo calore (solis aut sim.) Schrod.

Baccæ apud Germanos singulari remedio ad grassantia pestilentia contagia depellenda usurpantur; Tragi à nostris sunt & aliæ antidoti ex his baccis contra febres pestilenciales, quas laudo vel ideo quia medicamentum est domesticum D. Bovvle, baccas in aceto maceratas, exsiccatas deinde & in pulverem redactas in peste utilissimas esse scribit. In observationibus ad nos transmissis.

Afferit Clusius Narbonenses Gallos è juniperi baccis oleum exprimere, quod ipsi de Cade vocant, capitis scabiei, ut pecorum etiam scabiei, & ulceribus, quibus à Tonsione infestantur, adprimè utile.

Gummi juniperinum seu vernix sicca, (Arabibus sandaracha seu sandarax, à Græcorum sandarachia, quæ aut pigmentum est longè diversa) recens, pallida & pellucida probatur. Cum inveteravit fit flava & friabilis, masticis modo, quam mentitur in multis: Sanguinem undequaque fluentem sistit, ulcera putria curat, cruditates ventriculi emendat, diarrhæas antiquas sistit, lumbricos necat; Schrodero usus præcipuus est in nervorum affectibus, resolutione, frigiditate, contractione, &c. & in capitis affectibus reliquis à frigiditate subortis.

Quod vernix liquida seu vernigo sit lachryma seu gummi juniperi, falso à Matthiolo, Lacuna, Cæsalpino, & alijs asseritur, inquit Cornarius. Nam factitia res est vernix: non tamen à lachryma juniperi in oleo lini soluto (ut multi volunt) sed ex scobe succini in oleo dicto decocta, ut post Cornarium affirmat etiam Capl. Hofmannus. Usus ejus est ad illustrandas picturas, ad nitorem ferro conciliandum, ad tectoria oblinenda, fabris & pictoribus.

De usu ligni juniperini in Lue Venerea ad modum guajaci, & pro eo substituto, cum dubium sit, an profit necne, nihil dicam Vid. Si placet hist. Ebrodun. l. b. 9. cap. 15.

Umbram juniperi noxiam esse versus ille Virgilij multis persuasit, Juniperi gravis umbra, &c. nonnulli etiam rationem ejus reddere conantur, quia scilicet ob densitatem foliorum vapores è terra noxios exhalantes repercutit & diffusi non finit, unde ibidem

stagnant.

stagnantes aërem prava qualitate inficiunt; ego potius juniperi umbram salutarem esse crediderim ob suavem quem arbor expirat odorem. *Rains in H stor. Plant.*

JUNIPERUS ARBOREA.

Nomina. Juniperus major bacca rufescente C. B. Oxycedrus. Quibusdam Juniperus major baccarubra. *J. B.*

Folia quàm Juniperi vulgaris duplo sunt longiora, latioraque, rigida, infesto mucrone pungentia: Bacca duplo aut triplo Juniperinis majores, coloris non ut illæ cærulei, sed ruffi, sapore tamen & odore simili. Clusius sic describit. Junipero ferè similis est Oxycedrus, magna ex parte contorto ut illa candice, interdum etiam in arbusculam excrefcens, tenui & rufescente cortice. Folia habet Juniperi vulgaris modo purgantia, aliquantulum tamen longiora & rariora, terna semper circa ramulos simul nascentia, ut in Junipero min. Fructum initio viridem, deinde flavescens, postremò cum maturuit punice coloris, Juniperi fructu multò majorem ut interdum Avellanam magnitudine æquet, & tuberculis quibusdam, veluti squamarum rudimentis oblitum, nucleos tres aut quatuor inæquales continentem, majores quàm in superiore, medullâ intus albâ.

Florer Juniperi minoris modo, & eodem tempore utriusque fructus maturitatem adipiscitur. In collibus circa Monspelium frequentem observavimus.

Provenit (inquit Clusius) plerisque Hispaniæ & Narbonensis Galliæ asperis locis: nusquam tamen majorem videre memini quàm supra Segobiam & Evandrianam, itinere Madritiano, ubi arborum magnitudinem & altitudinem interdum æquat, trunco humani corporis crassitudinem Cæsalpino. E fructibus Juniperi majoris cum maturi sunt vino remollitis exprimitur liquor, qui Saccharo exceptus utilissimus: utpote qui ex pulmone & pectore educit purulenta; ac tempore pestis præservativæ loco esse potest. Observavit D. Tancredus Robinson in Gallia Narbonensi itinerans incolas ex Oxycedro elicere oleosam seu resinofam substantiam, eodem modo ut è Pinu, & Abiete, in tædam converso, destillatione rudi facta per descensum, qua utuntur in scabie, & ulceribus pecorum. *Rains.*

JUPITER, vid. *Stannum.*

JUSCULUM.

Cogimur ad usum jusculorum alterantium cum decocta fastidiunt ægrotantes, aut venticulus ea, propter debilitatem pati non potest; vel etiam ut in morbis longis mutetur forma remedii, ne uni familiariter assuescens natura vim illius tandem eludat.

Juscula vel sunt alterantia, vel restaurantia, vel purgantia.

Alterantia fiunt ex radicibus & herbis convenientibus cum pullo gallinaceo, vel frustulo colli carnis vervecinæ, vitulinæ aut caprillæ.

Ad multos usus præscribuntur.

Primò, ad refrigerandum in calore & siccitate attemperandis, ut in febribus biliosis, calidâ hepatis intemperie, constitutione corporis gracili.

℞. Radic. cichor. buglos. an. ʒj. folior. cichor. buglossi utriusque. lactis a. agrim. an. mß. herd. integri p. j. Fiat decoct. cum pullo gallinaceo, aut frustulo colli carnis caprillæ, vel vitulinæ, fiat jusculum pro una dose, cap. at mane continuet per 12. aut 15. dies.

Secundò, ad viscerum obstructions referandas

& intemperiem calidam corrigendum, ut in febribus lentis, intermittentibus longis, obstructionibus viscerum & mesenterij, chlorosi, suppressis menstruis, & similibus.

℞. Radic. asparagi, graminis, brusci an. ʒß. fol. cichor. cum toto, agrim. pimpin. ceterach. polytrichis ana mß. Coquantur cum pullo gallinaceo, aut frustulo carnis colli vervecini, fiat jusculum, quod capiat mane per 10. aut 15. dies.

Addi debet id quolibet jusculo aliquod ex subscriptis aperientibus chymicis, ut

Tartarum vitriolatum ad ʒj. tartarum chalybeatum ad ʒß. crystall. tartari ad ʒß. spiritus tartari ad ʒß. spiritus volatilis salis armoniaci ad ʒß. ad ʒj. spiritus vitrioli martis ad ʒß. ad ʒj. crocus martis aperiens ad ʒß. tinctura martis ad ʒj. tinctura tartari à gutt. iv. ad gutt. viij. magisterium tartari Schroderi ad ʒß.

Liquor tartari spleneticus ad cochlear ʒ.

Spiritus gummi ammoniac. ad ʒß. in contumaci, crassa, viscosa mucilagine pulmonum, mesenterij resolvendâ, tum & in obstructionibus diuturnis lienis, hepatis, uteri, mira præstat.

Quorum omnium compositio traditur à plerisque Chymicis, & præcipuè à clarissimis viris Schrodero, Vulser, Sennerto, Glazero & alijs.

In pallidis virginum coloribus, cachexia, ictero, & similibus.

℞. Radic. brusci, apij, rubiæ tinctorum ana ʒß. fol. chicor. totius, capillarum omnium, ana mß. flor. calendule p. j. Fiat decoctio cum frustulo colli carnis vervecina, aut vitulina pro jusculo, in quo dissolve aliquod ex prædictis aperientibus; inter quæ, sequentia sunt magis appropriata.

Tartarum chalybeatum, tinctura martis.

Spiritus volatilis salis armoniaci ad prædictam dosim.

Liquor tartari spleneticus, tartarus nitratus ad ʒj. crocus martis cachecticus Vulser. ad ʒß. diaphoreticum antimonij Schroderi ad ʒß. ad ʒj.

Aliquando etiam cum obstructions sunt contumaces, nec reluctatur ventriculus, in decocto præscribitur post radices, chalybis præparati in nodulo inclusi ʒj. vel si ad ʒß. pro 4. aut 5. vicibus infervit.

Perseverandum est in usu istorum jusculorum ad minus per decem aut quindecim dies, & in quarto vel quinto quoque jusculo incoqui debet senna ad ʒij. aut ʒiij. cum aniso, & sale tartari ad ʒß. imò & vicibus alternis etiam dissolvi debet manna ad ʒj. aut ʒiß. vel in iis qui infarctus majores patiuntur ab humoribus crassis, etiam diacarthamum ad ʒiij. vel aliquod ex panchymagogis infra dicendis.

Tertiò, Sumitur jusculum ad fluxionis tenuis in pectus fluentis acrimoniam demulcendam, in affectibus catarrhosis pectoris, tussi diuturna, &c.

℞. Radic. bugl. fragaria an. ʒß. radic. schinæ minnri secta ʒiß. folior. cichor. borrag. agrim. capill. veneris pimpin. an. mß. bordei integri ʒß. flor. rosar. rubr. an. p. j. Fiat decoctio cum frustulo colli carnis vitulinæ pro jusculo, quo utatur per 10. aut 12. dies. addi potest in quolibet, saccharum rosar. ad ʒj. lactis seu butyri, aut magisterij sulphur. cochl. ʒ. rotularum pectoral. Vulser. ʒi.

Antimonium diaphoreticum ad ʒj. recenter parari debet, nam diutius servatum malignam suam qualitatem recuperat, nempe quia suum sulphur ob detonationem cum nitro ex parte fixum redditur, dum ex alia parte evaporat: fixum autem quod superest redditur volatile, aut temporis diuturnitate, aut quia aëri exponitur; & sic ex diaphoretico fit emeticum & cordi infensum.

Vide, num cum fluxione humoris tenuis & acris circa pectus decrantis, & tussim excitantis, socien-

tur partium inferiorum intemperies, obstructio, & infarctus: in quo casu non est simpliciter refrigerantibus, incrassantibus & detergentibus utendum, sed etiam leviter aperientibus, & per vices purgantibus, indicatione sumptâ à causa producente vitiosos humores, qui fluxionem conservant, dum propter obstructions viarum, nec segregantur, nec per destinata loca expurgantur, sed cum sanguine confusi, in pectus, aliasve partes dilabuntur.

Quartò, ad tenuem sanguinem incrassandum in hæmoptysi, & ad constringenda vasa, tum quoque ad intemperiem calidam pulmonum corrigendam, ut & in menstruum & hæmorrhoidum fluxu, &c.

℞. Radic. bugl. symphyti maj. an. ʒss. fol. lact. portul. plant. pulmon. & millef. an. mß. rosar. rubr. p. j. Fiat decoctio cum frustulo carnis vitulinæ pro jusculo per 12. dies sumendo. Dissolvi potest unum ex his. Saccharum rosatum tabulatum ad ʒij. magisterium boli armeni. terra sigillata, perlarum preparat. corallorum rubror. oculorum cancri, cornu cervi ad ʒß. crocus martis adstringens à gr. x. ad gr. xv. tunc præsertim ex usu cum obstructions viscerum dictis affectibus præsumt.

Cavendum est, ne dum sanguinem incrassare volumus, viscerum obstructions (si quæ sint) augeamus. Tunc enim, ut dictum est, miscenda sunt remedia quæ leviter aperiunt & detergent cum his quæ vasa constringunt, & sanguinis acrimoniam temperant, ut alterantibus & per vices purgantibus admixtis, causa acrimonix & tenuitatis, sanguinis, in partibus & humoribus, constituta auferatur.

Quintò, In lepra, scorbuto, melancholia, affectione hypochondriaca, quartanis longis, febribus lentis, prurigine, scabie inveterata Rheumatismi, & syphilidis reliquiis, cæterisque casibus in quibus

crassus, piger, impurus, & nimium coagulatus sanguis volatilior reddendus, sequens jusculum viperinum acidorum illuviem conterit, per diaphoresim exturbat, depurat sanguinem, coctionem & fermentationem naturalem juvat, restituit, præmissis universalibus.

℞. Rad. cichor. brusc. buglos. an. ʒß. fol. cichor. agrim. cerefol. pimpinell. ceterac, bugloss. an. mß. Fiat decoct. cum carnis vitulinæ & viperinæ frustulo pro jusculo sumendo per xv. dies & post intervallum octo dierum renovando, inter sumptâ pisanâ purgante post septimum & ultimum jusculum.

Vices viperæ supplet serpens, loco sicco, prope montes, non paludoso degens. Absciinde caput & caudam, exentera, semotique hepate & corde ritè aquâ tepidâ lava & utere.

Sextò, Restaurantia juscula præscribuntur ad vires reparandas, aut conservandas; quorum formula peculiaris non præscribitur, quia parari solet ab ægro ministrantibus. Docere debet solum Medicus hujusmodi jusculum confici ex pingui capone exenterato & in frusta conciso, detractâ pelle & pinguedine, quod deinde ponendum in olla vitreata ritè clausa & lutata sine ullo liquore, nisi parum aquæ rosar. & florum arantium addere volueris; deinde coquitur in B. M. ad putrilaginem, seu ferè ad siccitatem. Exprimitur succus, à quo pinguedo separari debet, & servari in vase argenteo, aut vitreo in loco frigido. Ex hoc succo duæ aut tres uncix pro singulis jusculi libris adduntur, aut in alternis jusculis refrigerantibus duo cochlearia miscenda sunt.

Septimò, Purgantia juscula, de quibus in purgantibus. Téncke.

LIBER X.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

K

K A L I.

K Ali nomen Arabicum pluribus & quidem genere diversis plantis significandis imponitur, liquidem *Kali geniculatum* à *Kali semine cochleato* genere differt. Kali minus album, de quo inter bliti Sylvestris species, ab utroque.

Kali geniculatum, foliorum carentia & furculis viridibus succulentis è quibusdam velut squamis pyxidatim geniculatis compositis, ab alijs omnibus plantis primo statim aspectu discernitur.

Inter varias autem plantæ *Kali* dictæ species est *Kali geniculatum majus*, sive *Galicornia*, item *Kali geniculatum alterum*, vel minus, quod aceto & sale conditum asservatur: Sed præcipuè *Kali* illud *majus semine cochleato*, quod ad Mare Mediterraneum spontè oritur pluribus in locis, & feritur Monspelij in lacubus salis ad sal alkali conficiendum; cujus modum Joh. Bauh. referebant conflatores ipsi.

Scrobiculo effosso propè mare transversim assulas ligneas imponunt, quibus superaggerunt cumulatim herbam prædictam, ex qua accenso igne stillat in subjectam scrobem liquor, qui tandem concrevens fit sal alkali, coloris partim nigri, partim cinericei, valde acre & cathæreticum, salum. Et Saxum hoc, *Kali* vocatum vel sode ad vitrum conflandum aptum

in Italiam inque Septentrionem ex Gallia Narbonensi & Aquitania defferunt.

Galli in tractu Montispeffulano cum sale Kali & oleo nativo gabiano in fonte adversus Beziers saporem parant, quem arte colorare pro libitu norunt. Ex epistol. med. Th. Bartholini. Habui à D. Tancr. Robinson. *Raius in Histor. Plant.*

KARABE, vid. *Succinum*.

KEIRI, vid. *Leucoium*.

KERMES, *Ilex Baccifera*, sub titulo *Ilex*.

K E R M I A.

Kermia, aliàs *Alcea vesicaria* ac *solisequa*, item *Malva horaria* &c. planta est regionum calidarum ut Italiæ & aliarum indigena, quæque etiam in hortis colitur. Succo imprægnatur viscoso, ac multum olei & phlegmatis cum paucò sale continet: eaque propter facultatis est emollitivæ ad instar malvæ. Verùm in usus venit Medicos.

KIN-KINA, sive *Quina Quina*, vid. *Quina*.

KOLLA, vid. *Gluten*.

KOMAROS, vid. *Arbutus*.

LIBER XI,

LIBER XI.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

L

LABDANUM, vid. *Ladanum*.LABRUM VENERIS, vid. *Virga Pastoris*.

LABRUSCA.

L *Abrusca*, aliàs *Vitis sylvestris*, Gallicè *Lambrus*, *ou vigne sauvage*, nihil habet singulare quod scorsim à vitis vulgaris descriptione adferatur.

LAC & ejus SERUM.

Lac est liquor albus ex chylo in mammatium glandulis productus. De quo nota differentias, partes, usum, modum præscribendi, & cautiones.

Differentiæ lactis multæ sunt, aliud enim humanum cæteris temperatius, idè naturæ humanæ magis analogum.

Caprillum aliud mediocris consistentiæ, sed siccioris, ceu minus humidum quàm humanum.

Ovillum crassius, & minus serosum.

Vaccinum crassum & pingue.

Afininum tenue & serosum.

Vaccinum plus cæteris butyro abundat, ovillum caseo, afininum sero.

Ex cæteris animantium speciebus, vix aliud in usu est; ut enim probatur quod ab animali habetur similes humanæ carnes habente, sic longius distans (quod odor carniū in iucundus & fastidiosus ostendit) reprobum est.

Partes lactis sunt tres, prima serosa, quæ refrigerat, tergit, alvum solvit. Secunda butyrosa, quæ laxat, emollit, nutrit. Tertia caseosa, quæ sistit, obstruit, nutrit.

Ufus plurimi sunt, tum in sanis, tum in ægris.

Primò, Ad nutriendum, pro quo hic ordo bonitatis inter lactis genera constituitur, ut primas teneat humanum, deinde vaccinum, postea ovillum, mox caprillum, ultimò afininum. Humanum optimè & omni alio melius nutrit, vaccinum quia pinguius plus humano; cætera minùs, quò sero magis, minùs butyro constant, caprillum ovillo, caprillo afininum frigidius.

Secundò, Ad alterandum, refrigerandum, humectandum, incrassandum, acridinem demulcendam, juxta quos & alios scopos aliud alteri præfertur.

In dysenteria, diarrhœa, mensium, & hæmorrhoidum fluxu, hæmoptysi, & in quocunque casu adest sanguinis tenuitas, acredo, corporis gracilitas, vaccinum eligitur: quòd si ferre non possit debilis ventriculus, ovillo, hujus defectu, caprillo, vel etiam nondum exactè purgato corpore ubi refrigerare, detergere, mitigare, & aliquatenus expurgare intentio est, atque etiam dum timemus ab obstructionibus viscerum & debilitate ventriculi, afinino utendum.

Gal. 3. de facult. alim. c. 15. Si lactis, inquit, injectis lapillis, vel orbiculis ferreis ignitis serum consumatur, non laxat, sed adstringit: facile tamen cogitur in caseum, ob id aquam quidam affundunt, sicque seri acrimonia temperatur.

Tertiò, Ad alterandum & nutriendum, ut in ta-

bescentibus ab ulceribus internis pulmonis, gulæ, ventriculi, renum, &c. febre hæctica, cæterisque casibus, qui refrigerante, detergente, & reficiente remedio indigent, afininum cæteris tutius est; accedit humanum, si vires sint validæ vaccinum: Sed si præsens sit febris putrida, vel ipsius periculum, & in omni casu cum timor est ab obstructionibus viscerum, debilitate ventriculi, coagulatione & corruptela, afininum cæteris præstat: licet enim modicè corrumpatur, utilitate tamen ex sero refrigerante, & aliquali nutrimento superante, alteri prævalet, ut & vaccinum in phthisicis, quibus putridum inest ulcus, quia ob pinguedinis copiam saniosa & purulenta facilius & cum adjumento cedunt exequenti pulmoni: idem quoque tussiculosis & gracilibus, carnosus verò & crasso habitu præditis afininum magis opitulatur.

In hæctica & phthoe si febris sit insignis quæ semper sequax est putredinis vasorum, abstinendum omni lacte, donec alterantibus & evacuantibus alvus & sanguis purior sit, & febris remissior. Tunc verò afininum ex usu est, quia ut magis serosum plus refrigerat, ut minùs pingue non accenditur, ut tenuius facile transit, nec obstruit: ad quos fines superbibenda traditur aqua hordei, & graminis ad uncias tres aut quatuor.

Malignis affectibus sine febre, lepræ, cancræ, ulceribus, lvi venereæ post hydrargyrosim, podagræ, rheumatismo convenit afininum. Venenis omnibus acerbis, calidis, frigidisque, quod magis præsto est: si datur electio, vaccinum præstat, quia butyro adhæret & hebetat venenum, sero deterget, penetrat, & simul nutrit, magnâ copiâ sumptum ab initio vomitum excitat, qui si tardior sit, hydræleo tepenti provocandus, & somnus prohibendus.

In renum debilitate, mictu sanguinis, diabete, ovillum præhabetur, cui in confortando renes, ut loquitur Avic. non est medicina compar. subdit Cardanus, quia magis caseosum, caseus autem nutrit renes, & ob id roborat.

Modus utendi varius est pro diversa lactis natura. Humanum ab ubere fugitur, quodvis ex cæteris recens mulctum & tepidum sumi debet jejuno ventriculo & optimè ab excrementis repurgato, nam ob partium tenuitatem facile corrumpitur; quiescendum ab eo sumpto, non dormiendum capitis doloribus tentatis, & visceribus æstuantibus affectis; Nec comedendum nisi è ventriculo exciderit. Saccharum rosatum aut mel additur, ne corrumpatur & acescat: nonnullis cum Gal. placet ut loco sacchari salis modicum addatur.

Aliquando præscribitur lac humanum, aut vaccinum pro omni alimento maximè in phthisicis, podagræ, cæterisque affectibus in quibus vel timemus ne lac cum alimentis corrumpatur, vel in quibus debilis est vis coctrix ad solidiora alimenta digerenda: aut in quibus non sufficit ut unâ vice in die lac exhibeatur. Tunc verò quarta quaque horâ in ea dosi, quam sine fastidio ferre potest, ventriculus, propinatur. Tempore prandii & cænæ exhibetur panatella vel lac leviter coctum cum panis talleolis. Sensim lacti assuescendum, in principio manè horâ solitâ, & vespere circa

circa horam quartam, dosi lactis est offerenda; quo tempore detrahendum est aliquid prandio & coenæ, idque per sex vel octo dies; & tunc purgato corpore lac sit pro omni alimento.

Modus præscribendi hic est.

Utatur lacte v. g. asinino statim ab ulcere extracto, per mensem integrum, (plus minus prout morbus exigit & tempestas permittit) sumendo primâ die lactis ℥. viij. sacchari rosar. ℥. j. augendo singulis diebus lactis dosim; donec pervenerit ad ℔. j. & sacchari ℥. j. β. plus minus pro ætate & ventriculi tolerantia.

Cavendum à nimia copia; sunt enim qui ad ℔. ij. & ultra propinant, quod quantum noceat vix æstimari potest nisi ab eo, qui exactè considerat, totam lactis molem non distribui in sano, minus in ægro tante, sed ex parte stagnare & in status bilémque converti: unde sæpius cibi fastidium, alvi fluxus, aut febrem nimij illi *γυναικῶν* incurrunt.

Perseverandum in eadem copia, cum qua quisque se sentiat bene habentem, nec gravitate, flatibus, oris inluavitate, cibi fastidio, febre, alvi fluxu, vel aliâ superveniente molestiâ deteriore. Quæ dosi sic inventa quolibet manè sumenda quatuor horis ante juscum, vel alium convenientem cibum: quo tempore neque vehementius sese commoveat, neque dormiat, si capiti timeat. In fine sensim minuatur lactis quantitas, donec redeat ad primam dosim.

In usu cujusque lactis, maxime crassioris ad hoc ut obstructiones, si quæ sint, non augeat, sed facilius transeat, calorem temperet; putredini resistat, superbibenda præscribitur aqua tepens decocti hordei & graminis, vel aqua buglossi, borraginis aliave morbo propria, ægro grata, ad ℥. ij.

Eligatur animal sanum, non nimis pingue, mediæ ætatis: pascatur gramine & hordeo; ducatur ad liberum pastum matutinis & vespertinis horis; nec nimis exerceatur ne incalascet, mundaetur strigilibus, & in loco non foetido stabuletur.

Lac optimum est colore candidum, sapore dulci, odore grato, vel nullo præditum, consistentiâ & copiam mediocri.

Lac gravidæ exiguum & pravum, à partu liquidum, imputum; turbidum: post mensem optimum. Humanum ad annum, vaccinum à tertio mense pingulus. Asininum post sex & octo menses deterius. Quodlibet vere fluidius, copiosius: æstate, tenuius, reliquo tempore crassius.

Cautiones plurimas docet Gal. *com. in Aph. 64. sect. 3.* in quo quibus noceat. & quibus conveniat lac, ostendit. Sed præ omnibus hoc advertendum ne præscribat dum adest febris intensior, dum obstructa sunt viscera, impura, vel calidiora, nisi probe repurgata, referata, & balneis temperata fuerint. Cavendum quoque ne ventriculus, sit valde debilis, & frigidus; nam ut in æstuantem nidorem contrahit, sic & in frigido acescit.

Qui utitur lacte ceu pro remedio, ceu pro alimento; sobriè degat: facile corrumpitur admixtum calidis, acerbis, piscibus & fructibus. Acidis coagulatur: coctum, longo usu, viscera obstruit. Vigiliis, animi & corporis motu vehementi, venere nimia, & vino meraciori abstineat: liberam alvum teneat: ac sit purus; salubrius erit si æger contabescens atque animal è quo lac sumi debet, degant in colle ad meridiem & orientem, non boreæ aperto, juxta mare, qualis erat Tabiarum locus.

Serum lactis non est alimentum, sed remedium alterans, & nonnihil evacuans.

Separatur à reliquis lactis partibus duplici modo. Primo per se, secundo per admixtionem rei separationem juvantis.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Per se secernitur serosa substantia à caseosa, si lac non nimis recentem emulctum calori exponatur.

Juvat separationem flos cardui, coagulum vituli agni, juvat quoque & citò separat liquor acidus, ut acetum, succus limonum, spiritus vitrioli, herba acetofo incocta. Melius est separare cum flore cardui vel cum coagulis quam cum acidis pro his qui ventriculo frigido sunt, tum & pro tussi aliisque pectoris affectibus tabem minantibus obnoxiiis.

Modus separandi hic est, sumatur lactis certa quantitas, ponatur in olla vitreata, ut primùm bullire incipiet, infuse acetum optimi vel alterius prædicti liquoris acidi parum quidem, ne nimium acescat serum: permittit ut bulliant per breve temporis spatium, extrahe ab igne, refrigerato lacte, separatim serum videbis limpidum, si bene præparatum fuerit. Vel quod minus noxium est, utere coagulo vel flore cardui; & si non fuerit perventum ad integram separationem, seretum serum pone in patina, aut olla vitreata, & cum modico succo limonum bulliat, refrigera & cola.

Præscribitur verno tempore per xv. dies aut mensem integrum, corpore ab obstructionibus, & ab excrementis libero, post alterantia & purgantia repetita quantum necessitas exigit.

Dosis est ab ℥. viij. ad ℔. j. aut ℔. j. β. manè jejuno ventriculo, addito saccharo rosato in proportionem ad feri copiam, juxta illud quod dictum est de lacte.

Usus est.

Primò, Ad refrigerandum, in non valde emaciatis, quibus melius competeret lac, vel in iis qui obstructionibus facile implicantur, citius enim penetrat serum quam lac, in iis quoque, quibus æstuant viscera, præmissis tamen universalibus. Sic præscribitur.

Utatur sero lactis caprilli per mensem integrum, sumendo singula vice, &c. ut supra diximus de lacte & de saccharo.

Secundò, Ad refrigerandum peculiariter in morbo melancholico, lepra, scabie, renum, & hepatis ardore, febre quartana, quintana, &c. maxime si herba refrigerantes, ut fumaria, cichorium, aut epithymum, per aliquot horas macerentur, vel leviter ipsi recentè parato incoquantur.

Sic autem præscribitur.

℥. Seri lactis optimè deputati q. s. infunde per noctem, vel leviter incoque folior. cichor. m. j. coletur manè ad ℔. β. vel ℔. j. addendo sacchari rosati ℥. β. capiat manè quatuor horis ante pastum per mensem integrum, augendo dosim singulo die, donec ad ℔. j. feri lactis, & ℥. j. sacchari pervenerit, deinde minuen- do, donec ad parem primæ dosim revertatur.

Utiliter sic præscribitur in prædictis morbis melancholicis.

℥. Seri lactis optimè deputati q. s. statim atque manè paratum fuerit, incoquantur folior. fumariæ m. β. epithymi p. j. Colaturæ ad ℔. β. vel ℔. j. adde sacchari rosati ℥. j. succi pomorum redolentium ℥. j. β. capiat manè &c.

Quandiu continuabitur usus lactis, aut feri lactis, oportet sextam, vel octavam quamque dosim reddere purgantem, ne lac aut serum lactis contactu excrementorum quæ ab ipso aut ab alimentis sobolescunt, corrumpantur. Hoc autem exequimur dissolvendo in lactis aut feri dosi syrupi magistralis purgantis morbo appropriati ℥. ij. vel incoquendo sero lactis sennæ cum aniso ℥. iij. vel etiam in his qui uberiori indigent purgatione, dissolvendo in hujusmodi tincturâ sennæ manniæ ℥. j. vel ℥. j. β. aut sine infuso sennæ in morbis pectoris manniæ & syrupi flor. persic. an ℥. j. β. in aquis papaveris rhæados & cichorii dissolvere oportet.

Quibus inest frigidus ventriculus, somnus suadet statim ab assumpto lacte, quibus verò calidus prohibe-

cur, imò in gracillioribus & calidioribus visceribus per usum lactis, aut feri lactis, balneo, aut semibalneo uti prodest, sumendo lactis aut feri dosim statim in ingressu balnei, aut post horæ quadrantem. *Tencke.*

LAC AUGENTIA, ET LAC MINUENTIA.

De Lactis proventu augendo & minuendo dicturis operæ pretium videtur quædam pauca ex physiologicis supponere, v. g. (1.) lactis γένεσις prærequirere in corpore abundantiam alimenti individualis, non minus ac menses, quæ nisi adsit vel procuretur, lac produci ulterius nequit, unde si vigilijs, mœrore, inedia absumatur corpus, lac suppetit minus.

(2.) Lac esse nihil aliud, quàm serum chylosum, feri & sanguinis aliàs materiam, huc, fermenti glandosæ & tubulorum secretiorum beneficio, impensam alij scopo, ut alteri nempe detur, citra ipsius individui usum proprium.

(3.) Mammæ ex infinitis glandulis constare, iisq; minoribus, vulgò conglomeratis dictis, & ordinariè lympham ad cor dispensare magis, ad lactis verò productionem opus esse excitativo, sive impulsu, sive fermento actuali. Est illud partim internum, naturæ motus, ut alatur fœtus jam in lucem editus, qui finis unicus est, cessante verò eodem, etiam lac cessat, & cessare debet. Hinc plura *ᾠανμῶς* possunt illustrari, imprimis gravidas lac non habere, nec virgines. Deus enim & natura nil faciunt frustra; cessante ergò fine, cessat etiam id, quod ejus gratia instituebatur. Decipiuntur sanè medici, qui inter signa graviditatis recensent lactis præsentiam, illud enim est contra experientiam quotidianam; loquuntur contra auctoritatem ipsius *Hippocratis*, qui *l. de nat. puer. c. 20. tom. II. 12. 13.* expressè contrarium scribit: cum movetur, *ait*, fœtus, tunc sanè lac indicationem sui matri præbet, mammæ enim attolluntur & papillæ gliscunt ac turgent, addit verò: *τὸ δὲ γάλα & χορὴ, lac verò non prodit*; innuens manifestò, non negligendas quidem mammæ, sed non lac actu expectandum præsens, quod edito demum fœtu, ut *c. 22. seq.* succedit, ubi: Et ubi peperit mulier, principio motus factò, (intellige naturæ impulsu, quem diximus,) *χορὴ ἐπὶ γάλα ἐστὶς μάζης, lac in mammæ ipsas procedit*, si lactaverit. Notanter utrumque nominat internum & externum impulsu. Loquuntur contra rationem omnem, nullus enim ibi finis lactis, imò potius lac præsens fœminâ gestante fœtum notat debilem & moriturum, indicio quippe, naturam sine priori relicto alterum jam intendere. Unde lac & menses sunt sororij liquores, unicè speciei producendæ destinati.

Est illud quoque partim externum, nempe suctus, unde si vel fœtus fuerit mortuus, vel ablactatus, vel papillæ desint, quod à variolis in fœminâ quâdam paginâ observavimus, lac cessat, licet aliquandiu sæpe stagnat, & ob molestiam imminuendum sit.

Quæcumque ergò *ἵσunt πολύχουλα*, illa etiam sunt *πολύχουλα*, seu quæ substantificæ serum, sanguinem, & horum materiam primam, chylum, adaugent. Adauget enim materia, ipsam collectionem majorem fieri necessum est, & quod causa est causæ, per vulgatum axioma, illud etiam est causa causati. Infans sanè per diem & noctem ad libram unam vel alteram deplet lac ex corpore, pro ætatis modulo. Hinc ut sine Cere & Baccho friget Venus, ita & veneri litans lac. Pertinent ergò huc, quæcumque ad victum plenum spectant, quæque ex hoc ipso humidum oleosum seu aqueo-sulphureum superfluum principium corpori magis scœnare norunt, alimenta boni succi, digestionis facilis, moderatè calida & humida, & alimentæ medicamentosa, & vice versâ, non confundenda tamen inter se; unde frustra sunt, qui ubera vaccina inter γάλακτος pulveres recensent, quod maxi-

mè inconveniens est.

Pertinent huc emulsiones, tanquàm lac artificiale, lac vaccinum, & cum eo parata decocta, inprimis florum sambuci, quod non sine causâ dilaudat *Langius*. Hi enim flores non minus ac semên nigellæ, fœniculi, anisi &c. oleositate suâ chylo ἐργασμὸν scœnerrant majorem, vegetatis partibus aqueis.

2. Quæcumque serum oleosum reddunt fluxile, & coactioni aptum ab intra, sunt *πολύχουλα*. Fluxile ab intra & mediatè reddunt blanda sudorifera; unde videmus vel ipsa natura indice lactis appulsum à partu fieri cum quadam heterogeneitate, & difficultate, ita, ut nisi accedat sudatio discussoria, & adjuvans hunc illapsu, & prohibens διαχύρῃ morbosam, facillimè & quasi ordinariè oriatu febris, lactaria dicta. Unde diaphoretica eo casu utramque absolunt paginam, lac mammis, sanguini vigorem afferunt. Fluxile ab intra reddunt id ipsum serum temperata alcalina, acorem, sulphuri oleoso contrarium, absorbentia, adeoque coagulum in fieri exuentia. Pellunt quasi à centro ad circumferentiam hanc sudorifera dicta, hæc verò alcalina temperata transcolant quoque, ut imperturbato ordine poris illabatur. Hinc quæ plurimo abundant acido in primis viis, lactis imminutionem experiuntur facilè. Hinc diaphoretica in febribus ipsis ardentibus sæpe præstant lac, ut, quod contra naturam ferè videtur morbi, natura provida speciei lac possideat, ad ultimum sæpe halitum, quod majus est, infantes in ipsis illis morbis malignis, etiam morientibus matribus non evadant solùm illibati, sed & optimè habeant.

Faciunt huc ex simplicibus fl. sambuc. herb. vincæpervincæ, sem. anisi, ex animalibus, lumbrici terrestres, laudati à nonnullis, licet minus commodè videantur in usu frequentari; ex mineralibus crystall. præp. & lac lunæ, de quo integram curiosissimam dissertationem scripsit *Excell. D. Major noster*. Ex compositis species diacryalli, accessione lactis lunæ roborandæ, & ros. lac aug. Myns. aliaque præcipitantia naturæ amica, poros liberos reddentia.

3. Quæcumque serum oleosum reddunt fluxile ab extra, sunt *πολύχουλα*. Invenias puerperas, quæ nullo modo lac augendo fœtui obtinent, vel saltim alterutram mammâ id solùm possident, in alterâ v. g. ob prævium abscessum poris glandosis callescendo subsidentibus. Quibus igitur hæc difficultas fuerit velut nativæ, ibi frustra lac citaveris, renitente quippe naturâ. Uti verò suctio impellens est extrinsecum immediatum, & instar anthæ ex fonte hoc hauriens; ita eundem quoque appulsum citant topica. Frictiones blandè instituendæ, quæ alliciant, non dissipent. Fomenta paulò rariora quorsum pertinet angelica sylv. erratica, herba Gerhardi dicta, quæ externè cum lacte cocta adhibita lac certo experimento augere dicitur. Emplastra rarissima hoc fine.

Topica tria sicca laudantur, pimpinella recens, crystallus & mercurius vivus. Pimpinellæ odor penetrans est, & aperitivus, ut conferre aliquid possit manifestis effluviis, ut & vino indita illud statim alterat. De crystallo vulgaris est opinio, quod dorso applicata lac imminuat, antèrius verò adaugeat, cuius rei ratio non facilè patet, nisi dicamus illud fieri frigore & frictione mediante, (nam de loco Practici consentiunt,) frictione & accubitu, siquidem facilè in rarioribus eorporibus, ut sunt mammæ, apposita poros gestatione suâ dilatant, ut sudent quoque facilè. Crystallus verò inprimis id fecerit, quia alienæ qualitatis omnis est expers. Admitti & suaderi igitur hæc ut indemnâ possunt.

De mercurio vivo res certa est, illum mammis externè adhibitum affluxum citare majorem, & lac restituere. Notandum hanc in rem (1.) quod potenter serum

serum fundat, exemplo salivationis; quod (2.) effluvis volatilibus calore rarefactus poros facillimè afficiat; gaudens maxima vi elastica, quod ad oculum patet, si ad thermometri formam aptetur, vel vase etiam ligneo aperto. Calore dilatantur ejus pori manifestò, ut excurrat, & turgeat, frigore constringuntur, ut interiora petat, & in se subsideat, ad instar omnium humidorum, quod mirandum est. (3.) Convenit tamen, ut omnia hæc magis præsentate impellente intrinseco, & cæteris paribus.

Paret ex his, quod lac generans medicis sumatur tam pro eo, quod materiam ad lactis generationem subministrat, quam quod generatam jam lactis materiam ad mammas deducit, quorum prius quasi materiei, posterius vehiculi magis rationem habet. Priori intentioni prima classis, posteriori duæ sequentes velificantur, quatenus nempe illa lacti materiam suggerant, hæc eandem ad mammas deducunt, & promoveant, ut inibi lactis formam nasciscatur, moderata nempe incidendi, attendendi fluxile, aperiendique poros facultate, quò sanguis chylosus reddatur subtilior, meatus dilaret, ac per illos humorem chylosum ad mammas transferat.

Ufus lac augmentum est determinatus ad nutrices, seu lactantes, quæ aliàs sanæ penuriâ lactis laborant, ad sugentium sustentationem, præcipuè si infans fortius iugat. Nisi enim sufficiens quantitas suppetat, nutrire non potest, unde tormina, inquietudo, clamores. Plurimi sanè infantes moriuntur l. l. etis culpa, unde faciunt hæc ipsa etiam ad lac depurandum quasi, unde consilio assumuntur frequenter ab iisdem semina carminativa, an s. fœnic. carvi, duplici hoc nomine, ut & status abarceant torminificos, & lactis proventum faciliunt, optimo sanè consilio & effectu. Addi & tertium potest, quod subtilisetur hoc pacto lac paulò spiritius & oleosius, faciliè daturum epilepsiam; quod corrigatur lac nimis aquosum, diarrhœas citans. Optimè se eadem gerunt, ut lac in prima culina probè concoquatur, nec cruditates generet.

Utriusque verò hæc generis lac augmentia ut plurimum conjungenda sunt, vel conjuncta saltem efficacius se gerunt. Et suctu ipso videmus toto die continuari illum appulsum, ut ad 2. 3. annos sæpe continuo ordine lac suppetat nutricibus.

Contraria his sunt LAC MINUENTIA, quæ tamen duo dicunt vel complectuntur, in eundem effectum conspirantia, quæ nempe & minuunt, & minuendo resolvunt, ut è dicendis patebit.

Cum ergò intentio sit lac collectum jam & factum emittere, futurum verò arcere, hinc posset quidem & tenuior victus suaderi, id verò cum fieri non æquè liceat, nam ali debet corpus, à naturâ sæpe huc magis intentâ, ut lac adsit pro fortu, quam ut superfluum in corpore alimentum sit; nec concedatur æquè à delicatis, vix ferè, nisi secundariò id præcipi solet. Hinc, præter purgantia, & alia.

1. *Lac imminuunt emollientia.* Non obstat, contrarium videri, posse eadem & lac augere & imminuere; variat enim id pro diverso statu. Emollientia poros lac augèt, non præfens & collectum æquè: emollientia lac imminuunt præfens & stagnans. Quam in rem nota: (1.) omne lac suctu non prolectum stagnat in mammis. (2.) stagnans gravat, & in coagulum abire promptum est. Ergò (3.) omninò dimittendum est. Hinc aliquandiu etiam emulgeri potest & debet, ut sensim depleatur, nec negotium facessat. Viæ ergò proximæ sunt dilatandæ, remotæ constringendæ. Dilatant verò emollientia, calida & humida temperata, mammas ipsis applicata. Emollio hæc prohibet stagnationem; prohibet coagulationem. Optimum hoc sine præsidium est empl. diachylon simpl. frequentissimè à nobis usurpatum cum succèssu. Constat id ex mucilaginibus, & emolliendo uricè prodest.

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

Unum hoc instar omnium est, cataplasmatibus aliisque omnibus contrà proficuum. Ut vero natura ipsa copiam lactis effusione è papillis spontaneâ toto die deplet, ne onerosa fiat; ita suctu omninò ordinario cessante per hanc viam commodissimè depletio lactis restagnantis, laxatis poris, instituitur; quem in finem emplastra illa rotunda quidem esse debent, ut complectantur sphaeram mamme, in medio verò perforata, ut ne effluxus impediatur, maximè expetitus. Natura ab uno extremo ad alterum nunquam sine medio, sibi relicta & citra noxam, progreditur. Cessante ergò suctu, impellente extrinseco, non simul & semel desiccare hunc fontem potest, unde effundendum reliquum, ipsaque adjuvanda.

2. *Lac imminuunt resolventia.* Utròque casu optima sunt hæc ipsa, tum in initio statim, tum in progressu, tumore & duritie jam præsentate. Resolvunt in genere, i. e. calefactionem, grumescentiam & coagulum, urgescentiam ac quietem consequens tollunt *sudorifera*. Resolvunt divertendo laticem ad extimam vestem, serumque dissipando, unâ verò *sæpius* omnem expedientia, ne febris ac inflammatio, ne dolor inde consequatur, datâ hanc in rem Tincturâ bez. camphor. M. S. aliisque paulò volatilibus. Puerperis & ablactantibus sudorifera optima sunt præsidia, & velut universalia.

Resolvunt *salin. amara, sale & sulph. activo facta*, ut ceterosolum, petroselin. alfine, croc. sal. talv. & quæ aliàs semen imminuunt, inprimis enim hæc ipsa oleosum characterem sero demūt, ut attenuatum hinc diffuset magis. Actuali suo frigore aliquo modo repellunt, salino principio activo calefacta resolvunt, & dissipant, vel solâ exhalatione suâ cum glâdulis extimioribus communicant. Pertinet huc etiam herba medica, quam lac extinguere dudum *Aristoteles* asseruit, admovendâ mammas, facillimo & *Æsculapio* remedio.

Resolvunt *frictiones*, quæ grumositatem impediunt, quâ factâ glandulæ, alias conglomeratæ putatæ, ipsas conglomeratas æmulantur duritie & magnitudine. Inprimis verò sperma ceti inter resolventia pectoralia, traumatica, nephritica aliàs laudatissimum, seu cū empl. diachyl. addito gummi ammoniaci cum acet. sol. & camph. parum miscetur; seu sparadrapum Myns. de sperm. ceti apponatur maturè.

Resolvunt, experimento *Helmont.* magneticè quasi prunæ, si in eas vel laterem candentem lac emulgeant. Sine dubio hoc fit ab aversatione archæi, quatenus incutitur eidem velut horror, ut, dum alij fini impenditur idem, hinc amplius renuat profundere hunc utilem succum, ut taceam ipsum hunc actum expressionis per se quoque conferre. Resolv. quoque *acida*, præsentate scilicet coagulo vel quasi tali, & cum alijs mitigatâ sulphur. ut fœtus apud *Morellum* laudatus, modò providè id fiat.

3. *Lac imminuunt repellentia*, quæ, vi vocis usitatæ, illapsum & adventum in poros glandulosos prohibent, vias & aditum præcludunt, ne turgeant tam & dilatentur, quam constringantur poti. Repellunt actu dicta frigida vegetabilia, repellunt, non æquè tamen rûta, oleosa, terrea, aquea. Repellunt acida, austera & quasi talia. Repellunt angustantia thoracem, omnia tamen cum moderatione.

Conveniunt nempe lac imminuentia indicatione præservativâ magis, quam curatoria, imò illa ipsa ferè potior est; tum absolutè, si lac ne quidem generari debeat, sed averti, tum secundum quid, quando generatû subsistere debet, nec stillare & fundi amplius. Una verò eademque est curatio. Suavisimo illo casu emplastra commendata bina, emollientia & repellentia. In junioribus verò ob cosmeticâ, falsò licet persuasæ, studium majus, quasi emplastr. forma decès pereat, notavimus illud non faciliè admitti, ubi noduli saltem suaderi gaudent.

Cauto ergò opus est inprimis i. ne mamma patiantur inflammationem. Inflammatio sequitur subsistentiam, quæcunque ergò inflammationem, subsistentiam &

transpirationem difficiliorem causantur, omnia absint. Absint pingua, oleosa, unguinosa; illa enim inflammationem vel causantur, vel augent, non aliter ac in erysipelate quovis idem fit. Hinc licet videantur dolorem lenire, magis tamen eundem promoveant hoc loco, longe humidiori & delicato, glandoso ac spongioso. Absint spirituosae, quæ aliàs, si locus id permittat, optime prosunt, etiam in gangrænâ, exemplo sp. vini camphor. Laborabat puerpera dolore & inflammatione mammarum incipiente, obstetrix, ut solent primam quasi instantiam sustinere, mammis applicat V: Inde verò febris inducebatur manifesto motu, sudoriferis abacta. Absint aquæ & humida quævis, seu sola, seu cum terreis mixta, sola scilicet & frigida, aqua enim calcis vivæ leni sua alcalina natura discutere apta natura est, modò itidem eum caute id fiat.

2. *Cavendum, ne mamma patiantur suppurationem.* Nullibi in inflammationum accessu tam conveniunt discutientia, quam in mammis; nullibi magis nocent repellentia, quam in mammis, ob copiam nempe maximam humorum, qui istis globis insident, tanquam spongiæ imbibiti, ob infinitos poros, qui facile obstrui possunt, præsentè *βελανωμῇ*. Si qua repellentia conveniunt, prosunt terrea, sicca, ex his, quæ aliàs in erysipelate prosunt. & mitiora, vegetabilia cum resolutivis mixta; prosunt acidulæ, dicto modo adhibenda.

3. *Repellentia origini, quam insertioni viarum certius & tutius applicantur.* Originem intellige viarum; viæ verò, per quas humores appellant, sunt duplices, communes potè, propriæ vasæ, quod nullibi magis quam in mammis patet. Ubi ergò id licet, inconveniens est repellere in loco insertionis, seu influxus. Repellere enim est, non admittere influxum, arcere humorem, defendere poros & partes recipientes. Turpius & hoc loco ejicitur, quam non admittitur hostis. Valet id in aliis quoque, ubi repellentia sub defensorum nomine locum habent, in fracturis, gangrænâ & sphacelo, ac similibus. Tunc nempe ipsi affectæ parti traumatica, sanæ defensiva applicamus, illique remotæ, quæ sustinet tanquam origo & via propior influxui. Si itaque hanc rationem attendamus penitus, facile patet, repellentia hoc casu non mammis, sed dorso applicanda esse. Sine dubio viæ istæ, seu notæ, seu ignotæ quibusdam fingantur adhuc, per quas ad mammam ducitur lac, ab inferioribus respectivè *βω* tendunt, ex quibus tanquam centro ad circumferentiam sphaeræ mamillaræ prodeunt. Hunc in finem nò solum crystallus ibi appendi potest, sed & empl. de sperm. rannar. alb. coct. seu seorsim, seu conjunctim optimo consilio dorso imponuntur, idque immediate citra obductionem sindonis rubræ.

5. *Ex duobus malis minus, & natura propius magisque conveniens eligendum.* Valet id in genere de omni inflammationum genere, tum speciatim de mammis. Seu quodcumque eò usque progressa est inflammatio, ut ob copiam & *σάρον* majorem discuti non possit, naturæ ipsius nutu & ductu, optimum est suppurationem juvare. Nam & serum oleosius in pus abit, imò nullum pus fit sine sero, ut facillimè sanguine & sero magis unitis, difficilius separatis. Hinc tumores glandularum respectivè difficilius suppurationem subeunt, quia minus de sanguine participant. Hinc serum minus oleosum, ut in arthriticis, non suppuratur, sed ad absurda chirurgica id pertinet. Hinc vulnera facilius pus concipiunt. Hinc rebelles sunt cancrofi & cacœthici tumores.

Adjuvanda hinc suppuratio tum emplastris emollientibus, tum ipsis unguinosis & resolutivis, ne nempe augeant inflammationem, quam adjutum eunt. Et mirandum est, sibi relicta natura, hoc modo tamen adjuvata, quomodo tam citò ulcera hæc, à suppuratione mundata, consolidentur, cessante scilicet affluxu, &

continente solum materiâ in pus promota. Contra eam induratio omnis in mammis est periculosa & suspecta, etiam diu duret. Est verò & tunc naturæ convenientius, tolerare quietum, vel in centro detinere morbum, quam suppurationibus irritare. *Wedelius.*

Varie Preparationes quæ quia sunt sub forma & colore Lactis aut saltem liquoris admotæ albescent Lactis nomine veniunt.

Lac Aluminis.

4. Fit eò ∇ a alb. ovor. ζ vi. Ois ζ ij. sp. vin. Hij opt. & diu in vase vitreo conquassatis, ut f. instar Lactis. Arcanum habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Menstruis immodicis, &c. Dos. coch. 2. vel 3. ter in die. Assumptum ad ζ ij. hora ante paroxysmum sæpè curat Tertianam.

Lac Ammoniaci.

4. Gam. Ammon. parif. ζ iii. solve in Δ a Hyssop. frigida ζ vj. in mort. frig. f. a. Detur sæpè coch. pro vice in difficultate anhelitus.

Lac Asæ foetidæ, v. Julap. Hyft. Foetid.

Lac Benzoini.

4. S. Benz. ζ j. ∇ a Hyssop. vel scabios. ζ xij. m. f. a. Astmaticum, Pectorale, &c.

Lac Mercurij.

4. F. ex Q corros. ζ vj. fricatis & agitatis in disco stanneo cum ∇ fumar. ζ xij. ut f. ut f. lactis instar f. a. v. Vires in aq. Mercurial.

Lac Saturni. v. Magist. Saturni.

Lac Scammonij.

4. Q scammon. ζ vj. affunde in mort. frig. paulatim ∇ cinnam. hordeat. ζ vij. inter affundendum diu agitando Liquor lactescens separetur à picea substantia, & servetur ad usum. Vocatur & Liquor Acuens, Dos. coch. 2. suaviter purgat.

Lac Sulphuris.

4. Δ p. i. Ψ , vel Q p. iij. coq. in ∇ a q. f. ad Δ ris solutionem: filtra calidè, & a cum K vel sp. D , edulcora & sicca f. a. Balsamum est pulmonum consumens & exiccans, valet in Catarrhis, Asthmate, Tussi, Phthisi, Colica, &c. Dos. B β . ad Di . Hæc ex Pharmac. Bateanæ.

Lac Virginalè è Pharm. Aug.

4. Alum. crud. ζ iv. decoq. ad 3. in aq. font. Hij . postea.

4. Lytharg. Hij . acci. Hij . dec. ad remanentiam Hij . colentur & commisceantur amba aquæ ut albescant.

Cosmeticum est medicamentum, cuti perpoliende, ac manibus lævigandis commodum, faciem tergit, lentigines debet, nec non serpigines, lichenas impetiginæque sanat.

LAC LUNÆ.

4. Lac Lunare vel lac Luna describit CONRADUS GESNERUS, de figur. lap. p. 50. quod in altissimorum quorundam montium Helveticorum speluncis reperitur, ut Storchornij in ditione Bernensium, & Fracti sive Pilatini Lucernentium: De quo repetam, ait GESNERUS, hic ea ferè verba quæ in fracti montis descriptione nostra ante annos sedecim posui, mutatis nonnullis & additis. In Spelunca quadam, per summum montem fornici adhaerens, nascitur quadam substantia fungosa, friabilis, alba, levissima, quam fungum petreum dixeris, vel agaricum saxatile, tam similis huius est facies. Incola Monmilch appellant hoc est lac luna, à substantia alba & spumosa, ex qua concretus videtur ac lapis, si lapidis nomen meretur. Aqua mixtus, albo lactis colore eam inscit. Inspidum est. Siccat sine morfu. Nulla in eo asperitas, & totum cum saliva mandentis liquefcit, præsertim quod melius fuerit

nam & crassius & asperius reperitur, immaturius nimium & crudius; quod odore etiam caret. Concoctum autem & perfectum, ut asperitatem admittit, ita albius colore, & pondere levius, & suaviter odoratum redditur. Videtur autem Holosteis dictis lapidibus qui in terra arenosa in Palatinatu effodiuntur proximam obtinere: & lapidi quem ab odore cydonitem nominant. Superstitiose quidam, adversus quemcumque morbum agroti cuiusvis, propter quem expresso ipsius nomine à spelunca petatur; salutare esse putant. Lucerna in pharmacopolio venire solet. Pollinem ejus Chirurghi ulceribus desiccandis inspergunt. Sunt qui nutritibus pollinis hujus drachmam exhibeant, ad augendam lactis copiam; & jure, ni fallor (potest autem commodius ex lacte amygdalarum; cui immixtus hic pollen aliquot horis fuerit, colato propinari, cum paucis saccharo & aqua feniculi) Ajunt autem mammillas evidenter hoc auxilio turgere, & repleri lacte.

Præterea à docto quodam viro nuper proditum invenio, lac Luna in profluvio sanguinis utiliter dari, tanquam somniferum; idque sibi experimento constare. Quod ad nomen præscum ego aut ipsum Morochium veterum esse aliquando putavi, aut easdem ceteri illi facultates obtinere: sed amicus quidam rerum omnium fossilium cognitione clarus, Marga fœnalis genus nunciat, Hæc ex Appendice ad Schröderum.

LACCA.

Lacca gummi, ut in officinis habetur, Concrezione bacillis pertinaciter circumnata adhærescit, superficie rugosa inæquali & veluti granulata, pellucida, colore ruffo flavo, aut ex rubro nigricante, intus cavernosa, nescio quid nigri friabilis substantiæ in antris continens, sapore nullo evidente: sputum colore rubro tingit, qui longe apparet floridior, si cum aqua misceatur. Præ his imposita bullat primò, Levem odorem resinolum spirans, tandemque flammescit. Vi detracta bacillis corticem ferè secum rapit, & canaliculata qua adhæsit apparet. Bacilli duarum triumve unciarum aut longiores cortice reguntur satis crasso, melino ferè: materies ut coryli, sed medulla copiosiore farcta.

De hujus generatione & fiendi modo non constat. Nam quod Garcias refert à magnis formicis alatis eam elaborari; ut apes mel conficiunt, materiam ex ipsa arbore exugentibus; nobis non videtur verisimile, sed potius (ut I. B.) ex ipsamet arbore vel ejus ramis & surculis, statim temporibus extrillare liquorem illum, & demum solis vi in eam quam videmus formam concrefcere.

Lac legitimum hujus gummi nomen est. Sic autem dicitur quòd hoc medicamentum ubi ejus usus est, in lac sive loc, id est, mellis crassitiem dissolvatur, in Pegu vero & Martaban, ubi præstantissima est, Trec nominatur.

Duplex habetur: ea quæ cum bacillis, vix enim sine eis adfertur, quam laccam Sumatri vocant, quia ex Sumatra insula, nonnullis Taprobana antiquorum credita, habetur; ut eam quæ in glebis sine surculis affertur laccam Comberri nominant; & altera factitia quæ insectores utuntur, quæ & suas differentias habet, quædam ex fece brasiliæ & cocci conficitur, si ve ex gummi & liquore brasiliæ. Laccam veram resinam & ceram interdum adulterati annotavit Acoſta.

Lacca veteribus incognita fuisse videntur. Nec enim eorum sententiam probare possumus qui Cancamum Dioscoridis esse existimant. Cum lacca non sit odorata, nec suffitionibus apta, ut Cancamum.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Vires & usus, lacca attenuat & aperit, sanguinem purificat, sudorem ciet, diuretica est. Usus præcipue in obstructionibus lienis, vesicæ, fellis, hepatis, & hinc in hydropo, ictero, asthma, apoplemate pulmonum: in expellendis variolis, morbillis atque pestilenti contagio, in ciendis mensibus &c. Schrod.

Ad oppilationes tam hepatis quam splenis, ut & in hydropo & ictero à plerisque medicis unanimi consensu præscribuntur trochisci dialaccæ dicti. J. B.

Ex lacca etiam bacilli parantur ad obſignandas epistolas, ceram Hispanicam vocant.

Alutas & coria vervecina lacca contusa & urina veteri macerata rubro colore infici ex altera parte tradit Clusius ex quorundam sententia.

Cum lacca in ceram Hispanicam redacta, & conchyliorum splendicantium in minutissimis fragmentis, ligna, tabulas, arculas, &c. incrustant ad elegantiam.

Pictores, alique mechanici utuntur Lacca ut vernice, eamque varie colorant, & dissolvunt in sp. vini & ol. Terebinth. Rains.

E Gummi Lacca cum aqua aluminis &c. paratur tinctura pro dentibus vacillantibus acerosis gingivis, de quâ vide Tincturas ex Hadriano à Mynſicht: nos autem in oris profundioribus ulcerationibus multò efficaciorer conficimus ex Lacca pulveratâ, oleo tartari, vel nitri fixi per deliquium extracto, modicè itroratâ, ac postmodum in sp. vini f. q. digesta.

LACCA PICTORUM.

Hæc nihil aliud est quàm Magisterium, è variis plantis, baccis, aut floribus coloratis eductum. Illud autem sequenti modo paratur secundum accuratiss.

D. Le Mort. Z. Herbar. cujuscunque generis q. v. his admisce sal alcali in vigesima circiter parte, plus vel minus, prout libet, deinde adde f. q. a. q. comm. Coq. simul leni igne, ut saturato colore imbuatur liquor. Tincturam per subsidentiam clarificatam præcipita cum solutione aluminis crudi in aq. comm. facta, sic in pulpam quasi coalescet & descendet pulvis, pluribus additionibus aquæ communis edulcorandus, & postea exſiccandus. Quæ autem ejusmodi Magisteria ex radicebus & floribus aut similibus coloratis fiunt, dicuntur Lacca & pigmentis inserviunt.

Hætenus Le Mort, de Lacca autem pictoria sic turſus D. Pomet in sua Aromatum Histor. universali. Lacca Veneta sic olim dicta quòd Venetijs parata undique deportaretur; jam Parisijs exquisitissimè conficitur. Est autem pasta dura ex ossibus sepiæ, tincturâ & Cochenilia Mesteca, ligno Brasiliensi & alio Fernamboug dicto, alumine Anglicò calcinato, arsenicò, ac lixivio è natrò Egyptiacò, seu soda alba, aut etiam Alicantina, præparata, infectis composita, non alia ratione procedendo quam in præparatione coloris (Indigo) dictis.

Lacca autem Colombina dicta è tinsuris pannorum colore coccineo tinctorum, Gallicè (teints en écarlate) paratur, dum scilicet illæ in lixivio mox descripto incoctæ, de liquore filtrato per alumen pulveratum quicquid coloris sustinet præcipitatur, ac edulcoratum in tabellas quadratas crassitie & amplitudinis arbitrariæ cogitur, ac desiccatur. Hætenus Pomet. Qui autem plura de Laccis voluerit consul. Illustr. Robert. Boyle de Colorib. Experim. 49. sed præcipue Ant. Ner. de Arte Vitræ, Tract. lib. vij. de quo sub tit. VITRUM.

LACERTUS.

LACERTOS voco Animalia omnia Quadrupeda ovipara, cauda in longum producta. Ovipara &c. intellige, ut cum Aristotele loquar, &c. enim plerique lacerti &c. sunt. Vera sci. & genuina ova intra se concipiunt, quæ tamen ovorum specie non pariunt.

pariunt & ponunt Avium more; sed in utero fovent & excludunt, & vivos tandem fœtus in lucem edunt. Plerique inquam non omnes: Differunt enim hoc respectu, quemadmodum & Serpentes, quorum nonnulli tam ἐξω quam ἐσω ὠστρον sunt, alij, ut de piscibus Cartilagineis obiervavit Aristoteles, ἐσω μὲν ὠστρον, ἐξω δὲ ὠστρον.

1. *LACERTUS omnium maximus, CROCODILUS dictus. The Crocodile.* Quem *Wormius* in museo sic breviter describit: Capite est lato, rostro ferme suillo, rictu magno, usque ad locum aurium patente, oculis suillis, maxillam superiorem mobilem habens, dentes in utraque acutos, albos, robustos, multos, numero, ut puto incerto, qui fortasse pro ætate etiam variat. Dentes hi instar pectinis conjunguntur: lingua indiscreta: crura, cum pedibus acutissimis unguibus armatis, in latera flectuntur. Caudæ longitudo reliquum æquat corpus: Corio circa ventrem aded molli, ut quolibet gladio facile sauciari possit; sed reliquæ corporis partes adeo dura pelle teguntur, ut telis & sagittis minime cedant, squamis horridis & spinosis refertæ. Colore croceo quibusdam statuitur, sed, quotquot ego vidi, ad gryseum & cinereum inclinant. Forfan vivus ad croceum vergit. Visus est quandoque tantæ magnitudinis ut 26 cubitos æquaverit.

Pigrum est Animal, nec in latus facile vertitur, gratum spirat odorem, perniciosum alioquin, quod unguibus necat, dentibus conterit, densissima ossa dissipat. Ova parit Anserinis magnitudine paria, numero circiter 60. quæ in arena obruit, ubi Solis calore fœta absq;ullo incubatu sponte fœtus excludunt.

Inveniuntur in *Nilo* & *Nigro* Africae fluminibus, inque *Gange* Indiae circa *Bengalam* & alibi.

Ab hoc specie differre non videtur *jacare* Brasiliensibus *Cayman*, Æthiopibus in *Congo* *Marcgrav.* Nam descriptio in plerisque convenit. Linguam (inquit) habet nullam, sed tantum membranam, quæ mandibulæ inferiori interjacet, & linguæ figuram refert, quam tamen sustollere non potest: Oculos magnos, rotundos, claros, [non suillos] castios, pupillâ nigrâ. Crura anteriora breviora & infirmiora, 5 in pedibus digitos, [3 interiores unguibus armatos, exteriores duos unguium expertes] continentia: posteriora longiora & crassiora, 4 in singulis pedibus digitos, quorum unus scil. exterior ungue caret. Ultima caudæ medietas firmâ pinnâ superius erecte stante, ad finem usque dotata est, qua inter natandum more piscium se gubernat. Quod *Crocodilus* solus ex Animalibus maxillam superiorem movet inferiore sci. immobili, non uno in loco *Aristoteles* affirmat, quem securè nimis recentiores ferè omnes secuti sunt, adnotante *D. Grevio* in *R.S. Mus.* Cum ex ossium structura, hoc est articulatione non solum occipitis cum colli vertebra, sed etiam maxillæ inferioris cum superiore, quæ in hoc Animali cum reliquis conformis est, manifestum sit, *Crocodilum* eodem prorsus modo quo alia Animalia maxillam inferiorem movere.

Crocodilus Zeylanicus elegantissimus nigricantibus holosericeis maculis notatus. KIMBOLA Zeylonensibus.

CORDILUS seu *Caudiverbera*, *Uromastix* Græcis. *Lacerta* viridi major est. Cauda rotunda, in circulos quosdam squamatim divisa, squamis durissimis, quæ eam tanquam regulæ domorum culmina cooperiunt ab alijs *Lacertis* distinguitur. Hujusmodi in agro *Montepeliensi* vidimus.

TAPATAXIN sive *Lacertus Orbicularis* Novæ Hispaniæ *Hernandez.* Orbiculari pæne planèque constat corpore, ac *Raiæ* vocatæ quadantenus formâ, ni longè minor esset, nec uncias 4 longitudine aut latitudine æquans. Cartilagineum a. est hoc genus & multicolor, tactu semper gelidum, tardi incessus, ac rarò mu-

tans locum etiam contractatum. Caput durissimum est, aculeis quibusdam, corollæ modo dispositis horrens & elatum. Gaudet ab hominibus apprehendi, madinus gestari contractarique placita quadam securitate ac tranquillitate immobilis. Illud est in eo mirabile, & nulli alijs, quod sciam, commune, compressis vexatilsve oculis aut capite, aut parùm indulgenter tractatis, sanguinis guttas per eos effundere, ac longius jaculari, tanto interdum impetu, ut ad trium passuum distantiam contingat rejectari. Siccatus, in pulverem redactus & 3i. mensurâ ex aqua aut vino potus lûi Venereæ doloribus auxiliatur, eiq; medetur. Vivit in montibus frigidarum regionû, ubi passim offenditur.

LACERTVS vulgaris, The common Eft or Swift. Rostrum habet obtusum ovatum: Color ad ferrugineum accedit. Digtos habet quinos valdè exiles cum unguiculis tam in prioribus quàm in posterioribus pedibus: in his qui indicis locum habet longissimus est, pollici inferior locus datur. Hujus species variæ apud nos. 1. Terrestris vulg. ventre nigro maculato. 2. Terrestris anguiformis in *Ericetis*. 3. Parvus terrestris fuscus oppido rarus. 4. *Lacerta* Terrestris lutea squamosa Anglica *D. Plot. Histor. Stafford.* p. 252. 5. *Lacert.* aquat. fuscus, & niger.

LACERTVS viridis, The green Lizard. A colore ita dicitur: vulgari major est. In Italia frequenti limi habentur. Inveniuntur etiam in *Hiberniâ*. An *Lacertus* *Hibernicus* *Mus. Tradescantii.*

LACERTVS Facetanus *Aldrov.* Romæ & Neapoli *Tarantola* dicta. Aspera est cute, coloris cinerei, torosus & crassior alijs *Lacertis*. In muris & ædificijs vetustis invenitur, Romæ & Neapoli frequens. Color hujus lucidus & aspectus tristis fœdusque horrorem videntibus incutit; facie namque externa malignitatem suam fatetur. Ego sanè cum primum eum viderem naturæ instinctu cohorrui: quamvis doctissimus *Joan. Faber Lynceus* timorem ab aspectu hujus bestiolæ incussum, fanaticum quendam motum sibi videri scribit, ut magis intuentes coloris fœditas atque deformitas quàm animalis ira & malignitas perterrefaciant, cum his, inquit neq; hominibus insidiari, nec hos à *Tarantulis* demorsos & periculum passos fuisse, qui frequentissimas illas viderim, hæcenus observaverim.

LACERTVS Indicus *Senembi* & *Iguana* dictus. Amphib. un est Animal *Lacerti* forma (inquit *Joan. De Laet*) cute partim cinerei partim fusci coloris. Verùm *Marcgravius* totam cutem eleganter viridem esse scribit; maculis nigricantibus & albis in modum pannî undulati variegatam, squamulis quibusdam totam tectam. A cervice ad extremam caudam seriem habet planarum, sed mucronatarum instar serræ spinarum secundum dorsum longitudinem etiam virentis coloris, ad cervicem majores, semperque minores fiunt, ut minimæ sint in extrema cauda. Sub mento ingluviem habet, ad pectus usque propendentem. Reliquam descriptionem vide apud *Joan. de Laet* & *Geor. Marcgravium*: nobis hæc sufficiunt.

Lacertus Brasiliannus TE JUGU ACU & TEMAPA-RA *Tupinambis* dictus *Marcg.* Corporis figurâ, & partibus plerisque cum *Senembi* convenit. Differt 1. Quod corporis color niger sit, elegantissimis maculis albis inspersis variis, ut versus caudam 6 quasi aculeos habeat albos. 2. Quod cauda in exortu crassior sit. 3. Dentatis illis aculeis in dorso careat. 4. In pedibus posterioribus exterior digitus paulò remotior à reliquis sit & brevior. 5. Quod linguam habeat bifidam longam, rubram, glabram, quam velocissimè instar serpentis ad digiti longitudinem protrudit & retrahit. "Αφ' ου est: cruda ova sorbet; inediæ patientissimum est; ut quod 7 mensium spatio nihil omnino comedisse antequam inediâ moreretur expertus est *Marcgravius*.

In hoc *Lacerto* verum esse comperit *Marcg.* quod *Plinius*

Plinius scribit, Lacertis scilicet & Serpentibus caudas amputatas renasci. Nam cum quispiam partem caudæ calcando detriverat, postea de novo ad duos digitos crevit:

TARAGUIRA Brasilienſibus. Longitudo circiter
pedalis: Corpus teres, ſquamulis triangularibus cine-
reis ſeu leucophæis undique tectum. Caret ingluvie
ſub mento, & dorſum ei æquale eſt.

In & prope domos, in hortis & ubique frequens est. Nutat velocissimè capite quando aliquid videt, & celerissimè currit motitando corpus: Si videat hominem dormientem, cui serpens venenatus aut aliud venenatum animal lædendi causa appropinquat, illum excitat nè lædatur.

AMEIVA Brasiliensis *Marcgrav.* Præcedenti per omnia similis est, excepto quòd caudam furcatam habeat, i. e. definitam in duo cornua recta. Non dari in rerum natura hujusmodi speciem Lacerti opinor, Nullum enim præterea quadrupes aut in univèrsùm Animal sanguineum unquam vidi, legi aut audivi, caudâ bifidâ: proinde quæ hujus generis occurrunt monstrosa & anomala videntur.

TARAGUICO AYCURABA *Brafilienfis* Marcgr.
Taraguira alia species est, ſuperiori ſimilis, excepto
quòd cauda ab initio uſque habet triangulatas ſqua-
mas parvulas. Caudæ extremitas planis ſquamulis te-
cta eſt, & præterea 4. maculis fufcis picta: Dorſum &
præcipuè poſt caput undatum maculis variis fufcis.

AMERICIMA Brasiliensis Marcgr. Lacertulus 3.
dig. longus, & pennam olorinam crassius. Crura & pe-
des Senembi. Corpus ferè quadratum videtur. Totum
dorsum squamis vestitur leucophæis; latera, caput &
crura fuscis, cauda verò cœruleis. Omnes a. i. plendent;
& ad tactum apprimè sunt læves. Digni in pedibus in-
star setarum porcinarū. Venenosum animal censetur.

CARAOPEBA Brasiliensis Macgr. Tres, 4, vel 5. dig. lōgus est, venenatus: corporis figura ut reliquorum. Corpus totum hepatici est coloris cum albis notulis, in cauda autem albis lineolis. Hinc indè etiam aliquatū flavi mixtum. Oculi splendentes & q. vitrei.

TEPHUNHANA Brasiliensis Margr. Digi um
minimum crassus est, capiens acuminato ut Senembii:
Cauda teres 61 dig. longa, & instar aciculæ in extre-
mitate acuminata. Caput squamosa cute tegitur; Dor-
sum, latera, & crura exterius cute vestiuntur ad ta-
ctum molli instar holoserici. Cauda squamulis qua-
dratis minusculis tegitur, guttur itidem & infimus
venter, sed majusculis. Caput fuscescit. Dorsum &
latera lineis fuscis & viridibus, punctisque viridi-
bus & nigris secundum longitudinem ductis pet-
bellè pinguntur: quo ordine dispositi sunt hi colo-
res apud Autorem nostrum v de. Caput inferius, gut-
tur & infimus venter candidi sunt coloris sangui-
neis notis variegati: Cauda superius coloris est ce-
rei obsoleti, inferius carnei cum albo mixti.

Præter Brasilienses hosce lacertos à Marcgravio, descriptos, *Rochefortius* in *Historia naturali Insularum Antillarum* Gallice scripta quatuor aut quinque species proponit à *Marcgravianis Brasiliensibus*, quantum mihi videtur, diversas. Primam speciem *Les Andes* vocat, in Domibus ubique frequentem; magnitudine Lacertorum vulgarium Gallicorum, verùm capite longiore; pelle flavicante; dorso lineis cœruleis, viridibus & griseis seu cinereis, à capite ad extremam usque caudam deductis striato. In terræ cavernas seu foramina internoctu se recipiunt; unde per totam noctem stridorem edunt, vehementiorem magis quemolestum quàm est Cicadarum. Interdiu in perpetuo sunt motu, &c.

Secundum nominat *Les Roquers*, qui *Anolis* dictis minores sunt; pelle coloris xerampelini, punctulis flavis aut nigricantibus notati. Pedes anteriores bene longi seu alti. Oculi scintillantes & vividi. Caput in aërem elatum perpetuo tenent: & velut Aves indefi-

nenter fere saltant. Cauda supra dorsum caenus reflexa est, ut circulum & dimidium plerunque efficiat. Hominum aspecta delectantur. Cum à cursu incalescunt, canum more os aperiunt, & linguam exerunt.

Tertiam speciem *Mabonjas* appellat. Colore differunt. Qui in arboribus putridis, locis palutribus, aut vallibus profundioribus quò radii solares non penetrant, degunt, nigri sunt & aspectu horridi, unde *Mabonjas* i.e. Diabolorum nomen ab Indis ijs impositum: Pollicem circiter aut paulò plus crassi sunt, 6. aut 7. pollices longi. Pellis velut oleo inuncta videtur.

Quartam Gallico vocabulo *Gobe-mouches* indigat, quod muscis venandis se continue exercet. Quadrupedum omnium in hisce intulis nascentium minima sunt, Stelliones dictos figurâ imitantur. Sunt qui velut auro aut argento foliato superinducti videntur, alij viridi deaurato, alijsve coloribus mirè splendidibus tincti. Hominibus adeò familiares sunt, ut ardeat & conclavia & cœnacula lubintrent, nec quicquam mali faciant, sed è contra mureis aliisque molestis & importunis bestiolis ea purgent & liberent. Quas mirâ industriâ, dexteritate, agilitate persequuntur, ut venatorum technæ præ ingenio & artibus hujus animalculi planè sordeant. Cætera videlicet apud Autorem. Cæterùm adeò circures & familiares naturâ sunt, ut etiam mentas dapibus stratas confocundant inter prandendum aut cœnandum, & si muscam aliquam videant, ut eam capiant convivantium quadras aut etiâ manus ipsas & vestimenta transcurrere non verentur. Sunt autem adeò mundi & nitidi, ut quamvis ipsa ferula & dapes transeant, nè minimam prandentibus noxam aut fastidium creent. A morte statim evanescit colorum ille splendor & gratia; pelle in pallidum & lividum mutatâ.

Quintam adhuc bestiolam memorat, quam Lucium
terrèstrem [*Brochet de terre*] dominat, quia figuram in-
tegram, & pellem Luciorum fluviatilium obtinet: ve-
rum p. n. narum loco quatuor habet pedes; qui tamen
adeo debiles sunt, ut inter reptandum illis non utatur
sed super terram trahat, nam serpèum modo incedit.
Maximi 15. pollices longitudinis non excedunt, cras-
sitie proportionatâ. Eorum cutis squamis parvis testa
est valdè relucens, colore gryseo argentato.
Durante nocte stridorem edunt horrendum è ru-
pibus imis & cavernarum fundis ubi delitescunt. So-
nus quem reddunt, longe vehementior est & ingravior
ranarum aut Bufonum coaxatione. Rarissimè prore-
punt & te conspiciendos præbent nisi sub vespèram.
Quòd si de die occurrant, eorum motus qualem dixi-
mus terrorem non modicum videntibus incu-
cit.

Tandem & sextam superaddit lacertorum speciem in locis palustribus non rarè inventam, quæ terram carent à puteorum & conceptaculorum aquæ fossoribus aspectu truceem & formidabilem. Septem circiter pollices longi sunt. Dorsum nigris squamulis tegitur, reliquot etiâ griseis inter nigras disseminatis, quæ aded relucunt, ut oleo inunctæ videantur. Venter imus non minùs quàm dorsum, squamosus est. Cutis tamèn colore est flavicante seu pallido. Caput parvum & acuminatum; os in satis amplam aperturam fissum, pluribus dentibus iisq; acutissimis armatum. Oculi parvi, lucem tamen diurnam ferre nō possunt. Quàmprimum enim quis eos è terra extrahit, conantur illico pedibus suis quorū unusquisq; s. ungibus duris & incurvis intruere foramen effodere Talparum more, sèque iterum sub terra condere, cuniculis factis quò volunt viâ sibi facientes. Hortos mirum in modum vastant, Arborum & herbarum radices erodentes. Eorum morsus non minùs venenosus & nocivus habetur quàm perniciosissimi Serpentis.

LACERTVS INDICVS Clus. Ex. Worm. Mus. p. 313.
Bugelugey R. S. Mus. Quatuor fermè pedum Rom. lon-

gitudine erat, 9 unc. ambitu. Capitis & colli longitudo usque ad anteriores pedes, 8 ferme unc. trunci corporis ab anterioribus cruribus ad posteriora 9: cauda in longum & tenuem desinens mucronem pedes 2. & unc. 4. Color fuscus, sed maculis variis ex albo ad cœruleum vergentibus, nunc majoribus, nunc minoribus, quadratis & formâ rhomboidē, inordinatē dispositis per totum corpus variegatas. Cutis squamis vestita, circa caput & collum rotundis, mox ad dorsum quadratis, per caudam oblongis circulariter dispositis.

Rictus pro ratione capitis magnus; dentes parvi, anteriores acuti, posteriores obtusi. Pedes s. crura posteriora, anterioribus, quamvis satis crassis & torosis, duplō crassiora & longiora, majoribus squamis; Digitis longissimis & valdē inæqualibus, unguibus dactylis: incurvis, acutis, & flavescētib; Reliqua vide apud Autorem. Squamis in ventre & vicibus iis quæ in dorso majoribus à reliquis lacertis distinguitur.

Lacerti alterius peregrini iconem, & descriptionem ex pictura concinnatam exhibet Clariss. *Clusius* Exot. lib. 5. cap. 21. cujus longitudo trium pedum erat, ambitus novem unciarum.

Lacerta Zeylanica maxima, ex gryseo cinerea, Chamæleontis capite, pugnax. *D. T. Robinson* è museo *Leideni*. Eundem etiam vidit idem *D. Robinson* in museo *D. Charleton*.

SCINCUS seu *Crocodylus terrestris*. Animalculum Officinis nostris non ignotum, parvam Lacertam magnitudine non superat, utpote pedem dimidium vix æquans, crassitie pollicis, colore cinereo, squamosus, cauda rotunda, capite oblongo, rostro acuto, pedibus q. alatis, digitis quinque unguiculis armatis. Locus Arabia aut Ægyptus. *Worm. Mus.*

Locum obtinuit in variis Antidotis, & ad venerem stimulantem pulvis ejus efficacissimus habetur. Pedem habet planum & latum humanæ manus instar, digitos brevissimos, unguiculis nullis. *D. Grev.*

SEPS sive *LACERTA CHALCIDICA*, Columnæ Aldrov. 628. Hanc Liburni in litore maris arenoso invenimus. Serpens potius pedatus est quam lacerta. Parvus erat, rotundus, lineis nigris in dorso parallelis secundum longitudinem ductis distinctus. Oculos habuit parvos aurēque, in acutam caudam desinebat. Quod imprimis mirabile est, 4. habuit minutissima crura, pedēque in digitos fissos, ad ambulandam inutiles; primum par non longē à capite; secundum prope exitum excrementorum. Squamæ reticulatæ, singulæ sci. rhomboides, diametro longiore ad piscis longitudinem transversa. Venter albet cum tantilla cœrulei mixtus. Prope rostrum extremum duæ nares. Pulmo longus, in duos divisus lobos; Hepar itidem prælongum. Ovaria bina. Columna è prægnantis utero 15 vivos fœtus exemit, quorum alii membranis exuti, alii pelliculâ diaphanâ circumdati erant, ut in viperæ caputulis observatur; unde & viperæ hanc accenset. Cæterum Columnæ descripta à nostra specie fortē diversa erat; nam & multo major, utpote bipedali longitudine erat, & tota æreo colore, non lineis nigris striata. Serpentinam & elegantam hanc Lacertam observavit *D. Tancred. Robinson* in Mus. Clarissimi viri *D. Charleton*.

STELLIO, The Swift or Spotted Lizard. Maculæ quibus pingitur hoc genus non stellatæ sunt, ut nomen innuere videtur, sed rotundæ; minores confusæ & nullo ordine sparstæ; majores in 13 zonas seu annulos dimidiatos dispositæ. In dorso maculæ clariiores sunt magisque distinctæ quam in cauda. In Thracia, Sicilia & Syria invenitur *D. Grev.*

Lacerta dorsostris albis cruciformibus insignito Cap. Bonæ spei *Tachart*. f. 12.

Lacerta Indica tota maculosa *Tockay* dicta ejusdem.

Salamandra terrestris. Lacerto viridi similis est, si

caput & ventrem, quæ crassiora sunt, excipias. Breviorem habet caudam, colorem nigrum maculis rubeis inquinatum, sed quadam lævitate lucidam. In alpihus Stiriacis observavimus, ubi frequentes inveniuntur. Salamandram aquaticam à terrestri specie non differre sunt qui affirmant, quantumvis & colore, & figura præcipue caudæ, (quæ in terrestri teres est, in aquatica lata & compressa) plurimū differant, cum enim aquam deserunt tum colorem mutant, tum figuram caudæ è compressa in teretem. Nos rem in medio relinquimus, cum de eo nondum constet, nihil temere neque affirmantes, nec negantes.

Quod Salamandra sine ullo incommodo in igne vivere possit à vulgo creditum, verum à Doctoribus dudum abunde refutatum est.

Salamandra aquatica, the Water Eft. In aquis stagnantibus & piscinis frequens est. Cauda compressa est & in acumen desinit.

Plures Salamandræ aquaticæ species apud Autores occurrunt. *D. Grev* in Descriptione *Musei R. Societ.* tres enumerat. Primam *Parvam vulgarem* vocat, cui truncus crassior, rostrum obtusum ovale: pedes posteriores ab anterioribus longissimè distantes. Secundam Salamandram *tenuem* seu *gracilem* nuncupat, cui caput, pro ratione crassius, rostrum longius & acutius quam præcedenti, truncus corpus gracilior minusque ventricosus. Pedes posteriores anterioribus propius admoti. Tertiam *Crassicaudam* denominat, cui cauda minùs gracilis & mucronata quam utrivis antecedentium, in obtusum desinens, pedes etiam posteriores anterioribus adhuc propiores.

De Salamandra qui plura velit consulat Doctissimi *D. Pauli Wursbainii* Norimbergensis Salamandrologiam Norimbergæ impressam 1683. Salamandram viviparam esse testatur experientia propria. *V. Jacobaumi de Ranis & Lacertis*, Cap. 1. Ova sua fortē in utero fovet, & excludit vivos fœtus mote viperarum.

Lacertus peregrinus squamosus *Clus. Exot.* Auctar. ubi & icon ejus habetur, ut & apud *Bontium* & *Beslerum*. *Clusius* eum satis prolixè describit, ut & *Grevius* noster in *Mus. Keg. Soc.* Longitudo *D. Grevio* descripti, unius erat ulnæ & dimidii i. e. 12 $\frac{1}{2}$ pedum: capitis (nam collum non habet) à summo rostro ad pedes primos trium tantum unciarum, quod imprimis notabile est; trunci corporis à pedibus anterioribus ad posteriores 11 non plus digitorum erat. Caudam à posterioribus pedibus ad extremum ejus mucronem longissimam habebat, ut quæ ulnam unam & octavam super partem æquaret. Totum corpus, excepto gutture & intima parte ventris, squamis latis, magnis, rigidis, striatis, & mucronatis munitum erat: illæ verò quæ collum & capitis supremam partem tegebant, semunciam non erant longæ: atquæ mediam corporis partem inter crura comprehensam muniebant, binas uncias longæ & fescunciam latæ: quæ deinde per caudæ longitudinem spargebantur, aded amplæ non erant, sed sensim versus ejus extremum procedendo minuebantur, ut extremam caudam occupantes iis quæ collum tegebant vix ampliores essent: earum a. quæ caudæ latera utrinque claudebant forma prorsus reliquis dissimilis: nam planè non erant aliarum instar, sed cavæ & veluti geminatæ, quia pronam & supinam laterum partem tegebant: præter illas totius caudæ prona pars tribus squamarum ordinibus erat munita totidem etiam supina, paulò tamen minoribus, quibus deinde conjunctæ laterales illæ geminatæ: anteriora crura paulò breviora erant posterioribus, eaque suprema duntaxat parte quibusdam squamis tectæ: horum denique reliqua pars cum pedibus nigris villis obsita. Pedes a. 4 unguibus præditi, quorum secundus aliis multo major, unciam, viz. longus, crassus, uncus & niger, alii verò candicabant: & posteriora crura pedum tenuis

tenus squamis erant obfita, & supinam duntaxat illorum partem pili vestiebant; horum similiter pedes 4. unguibus præditi, sed minoribus quam anteriores; parvum insuper calcar anteriore parte adjunctum habebant. Animalis guttur, & ventris ima pars villis obfita. Locus ejus natalis nobis nondum innovit.

Animal mite admodum & mansuetum esse dicitur.

Ex pilis quibus prona pars corporis tegitur ad Animalia quadrupeda Vivipara pertinere existimo, non ad hoc genus; quamvis ob corporis formam Lacertis solet annumerari.

Lacerta volans Indica. *The Flying Indian Lizard*. Hujus iconem ad vivū delineatam *Nicolaus Grimmius* ex Indiis redux secum attulit, quæ sculpta extat in *Ephemer. German.* Anno 12. De Lacerta autem illa hæc annotavit prædictus *Grimmius*, *Hæc in arborum fruticūque ramis vitam conservat suam, formicis vescitur; muscis, & papilionibus, aliisque insectis minoribus; nec hominibus, nec Animalibus unquam noxia.*

Animal ipsum integrum in Spiritu vini servatum vidi nupertimè Londini apud illustrem virum *D. Guil. Charlton* è Medio Templo. An Lacertus volans Bontii? An Draco vel Serpens alatus *Gesneri*? Lacertæ volantis alteram seu secundam speciem apud eundem clarissimum virum *D. G. C.* observarunt alii.

Chamæleo, The Chameleon. Cur bestiola hæc Chamæleo, i.e. Leo pumilus nominetur rationem probabilem non invenio apud Grammaticos aut Historiæ Animalium Scriptores. *Panarolus* à longitudine caudæ ita dicta opinatur, quæ in extremitate ad similitudinē Leoninæ retorquetur. *Licet* quia ut Leo alia Animalia venatur & devocat, sic Chamæleo Muscas prædatur.

E genere Quadrupedum Oviparorum est, Lacertis affinis & similis, præterquam quod caput & dorsum non depressa & plana sunt Lacertinorum instar, quodque crura habet longiora.

Bellonius duas observavit species, nimirum 1. *Arabicum*, qui pusillus est, vix viridem excedens lacertum, colore albicante, subfulvis & rubentibus maculis distinctus. 2. *Egyptium*, qui duplo major, colore inter Indicum & viridem ambiguo, quem ex luteo in fulvum variè commutare solet. 3. *Faber Lynceus* tertiam addit, nimirum Chamæleontem *Mexicanum*; imo quartam. Nam *Bellonii* neuter (inquit) cum neutro nostrorum, h.e. neque cum Mexicano, neque cum eo quem Romanam allatum vidimus congruebat.

Chamæleo ille quem describunt *Parisienses* è genere *Egyptiaco* erat, undecim nimirum digitos & dimidiū insuper longus comprehensa cauda, cum *Arabici* & *Mexicani* sex plerumque uncias longitudine non excedant. Caput digitum unum & decē lineas (mensuræ *Parisiensis*) æquabat; à capite ad caudæ initium 4. digiti erant. Cauda 5. erat digitorum; pedes singuli 2½. Moles seu crassitudo corporis varia erat prout se vel dilatabat vel contrahabat. A summo dorso ad imam ventris carinam duæ interdum uncia erant alias paulo plus uncia una. Hæc autem intumescencia & contractio non tantum per thoracē & abdomen extendebatur, sed ad pedes usque ptiores & postefiores, & ipsam etiam caudam pertinebat. Hi autem motus intumescencie & contractionis, non ut in aliis Animalibus, quæ successive & æquis fere temporis intervallis pectus & ventrē aërem inspirando extendunt & expirando contrahunt, facti sunt. Vidimus enim corpus ad horas usque duas tumidum & inflatum manere, quo temporis spatium quamvis paulatim subsideret & detumesceret, ita tamen ut id agrè percipi posset; deinde iterū intumescerebat; cum hac differentia, ut dilatio multò celerior esset & visibilior; idque longis & inæqualibus intervallis. Vidimus etiam contractum & vacuum per longum temporis spatium durare, & diutius multò quam tumidum, Quo in statu adeò macilentus apparuit ut

spina valde acuta videretur; costæ omnes facile numerari possent, & pedum tam anteriorum quam posteriorum tendines valde clare & distinctè nudo etiam cernerentur oculis. At neque vertebræ instar *Serræ* (ut *Gesnerus* & *Scaliger* tradunt) per dorsum videbantur; neque spinæ illæ parvæ quas pro tutela ei datas *Panarolus* memorat, nobis comparuere: verum quantumvis macilentus & strigosus evaderet, spina tantummodò acuta, æqualis remansit absque ullis dentibus aut punctis eminentibus. Hæc autem macilentia & strigositas adeò insignis erat, ut *Tertullianus* Chamæleonem nihil aliud esse quam pellem vivam non ineptè dixerit.

Ipsius caput secundum *Panarolum* quandam cum Sue similitudinem habet, sed propter acutiem Arietinum emulatur; undique à dura squama mediante, tanquam *Crocodylus* fortiter armatum est. *Ambrosio*, A medio capite retrorsum ossæ pars triquetra eminet; reliqua pars antrorsum colligitur cava & q. canaliculata, eminentibus utrinque ossis marginibus asperis & leviter serratis. *Parisienses* caput Piscis capiti assimilant, thoraci proximè, collo intercedente brevissimo, duabus utrinque cartilagineis eminentiis instar Piscis ad latera recto, annexum. Crista in vertice erigitur, & duæ aliæ supra oculos; inter has cristas in summo capite cavitates seu convalles duæ secundum longitudinem extenduntur. Nasus seu rostrum obtusum duplici acie à palpebris ad extremū decurrente, unde *Raninum* refert. Maxilla inferior ultra superiorem excurrit. In extremo rostro foramina duo, hinc indè unum, Narium instar; quæ *Bellonius* Auditui inservire existimat. Et revèra non alia habuit Chamæleon noster foramina in capite quam nares hæc, per quas respirare cum verissimillimum est, cum os plerumque adeò arctè clausum sit, ut nullum habere videatur, maxillis lineæ vix perceptibili junctis.

Maxillæ dentibus munitæ sunt atque potius ossæ continuo denticulato, qui tamen nullius usus ei ad mandendum videbantur, cum muscas aliaque insecta quæ capiebat integra deglutiebat absque ulla commanducatione. Fortè ei inserviunt ad baculum quo, *Aliano* referente, se adversus Serpentes tuetur, firmiter in ore, transversim se, nè ab iis deglutiat, retinendum.

Os peculiari modo scissum erat. Cum enim in aliis plerisque Animalibus apertura labiorum ulterius quam faucium ad duarum linearum longitudinem extendebatur, & oblique descendebat;

Forma, structura & motus oculorum peculiare quid & ab aliis Animalium diversum obtinebant. In cavo recessu prægrandes erant; sphaerici ossæ videbantur, & ad hæmisphærium extabant, quod palpebra tincta ceu pileo intuebatur, media parte foraminulo pervia, per quod pupilla vivida & lucida citcello aureo cincta satis clare discernebatur. Palpebræ reliquæ cutis instar asperæ erant, & colores mutabant unā cum reliquo corpore. Anterior pars oculi palpebræ affixa erat, ejusque motū perpetuo se tuebatur, nec ut in aliis Animalibus seorsim se exollere aut deprimere potuit. Foraminulum prædictum transversim se claudit & dilatat, ut unicam efficiat rimam, cujus labium seu margo superior cum inferiori exactè coit & unitur.

Verum præcipuè notabilis est & admiratione dignus oculi utriusque motus, ut ita dicam, solitarius; nam uno aliquando immoto alterum volvit, unum sursum, alterum deorsum; unum dextrorsum alterum sinistrorsum flectit; modo quod omnem fere admirationem superat, motus hi adeò notabiles & excessivi sunt, ut oculos sub crista supercilium efficiente eousque ad canthos circumagat Animal, absque ullo capitis, quod scapulis affixum est motu, ut non minus clare quæ directè retro sita sunt aut geruntur cernat, quam quæ ante.

Pars illa corporis quæ truncus appellatur, quæque thoracem & abdomen continet tota fere Thorax erat absque

absque ullo abdomine: costæ enim ad ilia usque descendunt, cum in aliis multis Animalibus in lumbis vertebræ transversas duntaxat apophyses habeant, non costas adnexas.

Pedes omnes similes erant è 5 digitis, tribus anteriorum, duobus retrorsum spectantibus compositi, posticis duobus anticos tres magnitudine æquantibus: differunt, quod pedes anteriores duos ab externa, tres a. ab interna parte digitos habeant; vice versa posteriores duos ab interna, tres ab externa. Ungues recurvi sunt.

Incessus tardior erat quam Testudinis, & ridiculus admodum videbatur, quia cum crura breviora non essent, nec ut in Testudine impedita, verum libera & soluta, affectata quadam gravitate ea movere visa est. Hujusmodi gressum nonnulli pro timiditatis signo habent: verum *Parisienses* cautela & Providentiæ effectum esse existimant. *Panarolus* gressus idèò *ridiculosus* esse ait, quod inconcinne dum pedes in parte sinistra approximat, remouet maximè ex dextra parte alios, & è conuerso dum approximat pedes ex parte dextra, ex sinistra eos quàm maximè retrahit, atque hunc motum fatuè & inconcinne cum aliqua corporis flexione perficit. Sed si super arbores ambuletur, veloces sunt gressus, ut volatum mirifice æmuletur.

Cauda, nimirum cum inflata rotundaretur, Viperæ aut Maris domestici majoris rati dicti caudam satis bene referebat, alias tres secundum longitudinem eminentias habuit è spinosis & obliquis vertebrarum Apophysibus compositas, duas insuper, hinc inde unam, ex Apophysibus transversis factas. Cauda etiam ramis circumuoluta, præsertim quando descendebat, corpus firmabat, eaque tanquam manu utebatur.

Quod Chamæleon linguam habeat teretem Pici Marti in modum, lumbrico terrestri similem, per totum concavam & sacci instar in summo apertam, in cuius extremo spongiosus quidam & glutinosus nodus est, seu, ut alii, caruncula lata & rotunda, caput aciculæ referens, quam [linguam] mira velocitate & velut momento Sagittæ instar in longum evibrans, muscas aliaque insecta agglutinata corripit, in os attrahit, & illico devorat, neoterici omnes qui de eo scripsere consentiunt? Unde patet Veteres falsos fuisse, qui Chamæleonem aëre solo victitare tradiderunt: *Parisienses* etiam ventriculum & intestina muscis repleta obseruauerunt, quin & excrementa cholera flavâ aut virescente mixta, quotidie fere ab eo evacuata, ad modum Apimalium quæ alio genere victus quam aëre utuntur. E recentioribus nonnulli Chamæleonem quod in ediam diutissime toleret, nec mensis interdum spatio muscam unam capiat, ut experti sunt qui vivum aluerunt, partim insectis partim aëre nutriti crediderunt. Consideratione dignissimum iudico (inquit *Franciscus Nydermajer* apud *Joh. Fabrum*) quomodo hoc Animal ex unica muscâ, tanto temporis tractu, plurium non solum dierum, sed unius atque alterius etiam mensis spatio, sufficiens haurire nutrimentum potuerit. Verum facile respondetur, hoc non Chamæleoni peculiare, sed toti Serpentino generi commune esse, rarissime vesci & famem facile pati, quia scilicet naturæ admodum frigidos sint, nec multum alimenti absumant, & per totam ferè hyemem torpida & immota jaceant: quin & nonnulli observauerunt hoc genus Animalia uno tantum anni tempore vesci, quod illis in reliquam ejus partem sufficiat.

Quo artificio seu naturæ mechanismo lingua exeritur in tantam longitudinem & pro libitu retrahitur, inter Physicos non bene convenit. Quæ *Parisienses* habent apud ipsos vide.

Id quoque quod ventis Animal nutritur & aurâ, Protinus assimilât tetigit quoscunque colores.

De priore jam diximus: Quod ad posterius, *Pana-*

rolus Chamæleonis colorem cinericeum esse affirmat, qui etiam post mortem, sed aliquanto dilutior remanet, sed secundum animi passiones, calorem vel frigus colorem variare: videlicet vel aliquid rubri acquirere, ita ut color cinericeus rubescens appellari possit; vel aliquid viridis, ut color cinericeus virescens nuncupari queat: ab objecto autem proximo colorem nullatenus recipere. Quæ *Parisienses* de colorum mutatione habent, quamvis lectu sane dignissima, quoniam satis longa sunt, huc transferre nostræ non convenit brevitati. Videat qui volet apud ipsos.

Liene prorsus carer. Pulmones secundum *Panarolum* & *Nydermajer* admodum spongiosi, rari & parvi formati sunt. *Plinius* aliique pulmonem maximum ei tribuunt: *Bellonius* etiam pulmones magnos describit, per ventris latera exporrectos. Quæ facile conciliantur, quoniam in hujusmodi Animalibus pulmones ex vehiculis constant, quæ propemodum invisibiles sunt, nisi quando inflantur. Verum (ut experti sunt *Parisienses*) aëre per asperam arteriam inspirato vacuitates magnæ in dextro & sinistro viscerum in medio suspensorum latere, membranarum quæ ante inflationem non apparebant intumescentiâ statim reprobantur; nec cavitates tantum, sed & lobos quosdam in utroque latere extendebat status Cyprini vesicam referentes, nonnullos digiti longitudine & crassitie, alios multo minores &c. *Raius* in *Synopsi Histor. Quadrupedum*.

Hactenus de Lacertis in genere jam de Lacerto in specie sic dicto videndum ex Schrodero ejusque Commentatore Hofmanno quid ad Medicinam faciat.

Σαῦρος, σαῦρος, Lacertus, Lacerto, Egochs, Ader, Schiächs, Moll. The Lizard, Neuvot, or Esk. Een Egedis, Egdisse, of hagedis.

Insectum est quod figurâ notum, colore varians; bufonibus ac araneis inimicum.

N. *Lacertus* si dissectus fuerit, pars utraque movetur aliquamdiu, & si concurrerint, coalescunt rursus. Sunt qui oculos si effossi sint, renasci dicunt, id quod & de cauda si amputetur, *Plinius* affirmat. Degunt in cavernis terra, rudibus murorum aliisque locis asperis, vescuntur. *Cicadis, Cochleis, Gryllis, Apibus.*

Lacertus Terrestis, de quo hic & minus veneratus. est. Aquat. qui venenosus habetur, & rarior usus.

N. Commendatur præ reliquis genus lacerti viride & magnum, verum cum in hisce regionibus minus usitatum id sit, lacertum commune hic describimus.

Vires. Elicit è corporibus spicula, vitra, &c. (sectus, vel cum sale tusus & impositus, imprimis v. caput.) capillos renasci facit, (cum ad pe illita caro, vel cinit applicatus.) Ictui scorpionum succurrit. Commendatur item ad herniam infantum, (si decocto lacerti laventur,) ad facilem evulsionem dentium, (pulvis aquaticus Lac affricatus.)

N. Sunt qui ajunt lacerti exiccati pulverem gingivis illitum facere ut sine difficultate sine dolore, atque sine instrumente dentes extrahi queant.

P R A P A R A T.

Oleum infusum.

Fit ex infusione Lacertorum vivorum N. vij. in ol. commun. Riß.

Vires. Commendatur ad faciei rubedinem emendandam (illitum)

HOFMAN *Lacertus*. Meminit & alterius Lacerti orbiculæ Novæ Hispaniæ seu Mexicanæ nomine *Tupayaxin* *Nardus Antonius Recchus* Lib. 9. Cap. 16. Novæ Hispaniæ cujus caput est durissimum & nonnullis aculeis elevatum. Gaudet ab Hominiibus apprehendi, manibus gestari & contrectari, placida quadam securitate & tranquillitate immobilis. Quare amicus hominis

minis *φιλανθρωπος* ab indigenis nuncupari solet. Hoc in eo est mirabile compressis aut vexatis oculis, aut capite, sanguinis guttas per eos effundere, ac longius jaculari, qualis detrahi solet, ab homine temperatissimo & sana favente valetudine, tanto sæpe impetu ut ad trium passuum distantiam contingat rejectari. Siccatum ad ignem & pulverisatum devoratumque ex vino aut aqua unius drachmæ mensura Morbo Gallico & doloribus ab eo ortis summè auxiliari solet, quod multis comprobatum est experimentis evacuata Morbi causa per superna & inferiora ac demum evacuata urina.

Aliàs *Wormius* & alterius meminit *Iguana* vocati, in cujus capite *Lapis* reperitur præsentissimum contra Calculum remedium in *Musæo Lib. 3. Cap. 26.*

LACHRYMA.

Lachryma in Phytologiâ est humor è plantis tum spontè effluens (sive is concreascit v. g. in oleum, resinam, gummi, sive non) um facta incisione emanans. *Spigelius* in eo lachrymam distinguit à Succo, quod liquor qui ex contusa herba exprimitur aut elicitur, Succus vocetur; qui verò vel spontè, vel incisione manat lachryma. *Ramus.*

LACHRYMA JOBI.

Lachryma Jobi, seu *Libospermum Arundinaceum*, ac *Maini*. vid. sub titulo *Milium Solis*,

LACONICUM, vid. *Hypocastum*.

LACTRIA, vid. *Esula*.

LACTUCA.

Lactuca (*βελίδα*) quoddam copia Lactis exuperet dicta est, quodque feminas Nutrientes lacte impleat.

Hujus nota peculiare, quibus à congeneribus distinguui possit, sunt semina brevia, latiuscula & compressa, utrinque acuminata, caules graciliores, firmiores, & minus concavi, capitula minora.

Hujus duo sunt genera, sativum & sylvestre; ad posterius genus reducimus plantas nonnullas Chondrilla dici solitas, unam etiam cujus semen lactucæ semini non respondet, ob capitula parva quibus lactucam refert, nimirum Chondrillam vimineam dictam.

Lactucas hic non ulterius describimus quando quidem satis superque notæ sunt, & ad vires continuo pergimus.

Vires Lactucarum sativarum. Refrigerant, stomacho gratæ habentur, bilis effervescentiam & æstum compescunt, somnum conciliant. Declinante ætate (inquit *Galenus*) ex se infomni, graviter hoc incommodo afficiebar, adversus quod unicum mihi præsentissimum remedium lactuca vespere commanducata fuit; plerique antequam excaulescat in aqua elixa tituntur, ut ego jam facio. (inquit *Galenus*) ex quod dentes mihi deteriores esse caperunt. Lac augent, alvum leniter movent (neque alvum cohibent, uti neque impellunt) ventriculo conveniunt multique ac laudabilis nu rimenti sunt, verum decoctæ, magis alunt, coitum tamen avertere dicuntur, & si assidue edantur visus hebetudinem inducere.

In phrenitide, delirio, febre ardente &c. applica remporibus & suturæ coronali; imò carpis, nempe linteum duplicatum aut triplicatum permade factum aqua lactucæ, in qua verbi gratia in lib. i. pond. medicin. salis nitri pp. & crystallizati aut salis prunellæ ʒʒ. dissolutæ fuerint: quod medicamentum longè præfero his in casibus oleo rosaceo cum lactucæ succo permixto. *Sim. Paulus.*

Vires Lactuca Sylvestris, De viribus lactucæ sylvestres prodiderunt quod scilicet semen ejus non minus quam sativæ libidinum imaginationes in somno amolitur, & venerem arcet, quodque succus ad eadem valet, an huic plantæ convenient dubito. Narcoticam eam esse & soporiferam, adeoque viribus papaveri similem, ut *Dioscorides* & *Plinius* tradunt; opii vehemens & virosus odor abundè convincit. Verum omnia in genere opiata irritare potius quam extinguere appetitum ad venetem me jam pridem monuit *D. Mart. Lister*. saltem modicè sumpta non secus ac vinum ac alii generosi liquores quibus & viribus quodammodo respondere videntur; de lactuca sativa aliter se res habet: hæc enim dum adhuc recens & tenera est, antequam excaulescat, commanducata certo certius veneri adversatur & libidinem extinguit.

Hujus herbæ incensæ fumo animi causa naribus excepto se veluti consternatum & vertigine subita correptum & eodem planè modo affectum sensit idem *D. Lister*. quò solent illi qui nicotianæ fumum haurire primò aggrediuntur. *Hæc Ramus in Histor. Plantar.*

LADANUM.

Videatur de eo in descriptione *Cisti Ladaniferi*, sub titulo *Cistus*. Hic tantum de *Ladano* probe diligendo, ut & de quibusdam ejusdem præparationibus, ac viribus.

Ladanum maximè probatur odoratum, facilè mollescens, resinofum, arenularum aliarumque sordium expers, nec squalore oblitum, quale laudabile, in agros plerumque coagmentatum (massâ uniformi Arabicâ pro viliori reputatâ) ex Cypro defertur Pasta ex caprino stercore, admixtò *Ladano* & pulvere nigro, ejus formam æmulatur; verum id quia resinofum non est, idè adulteratum esse deprehenditur. *Pharmac. August.*

Vires. Calef. sicc. emollit, digerit, maturat, attenuat, aperit, orificia venarum reserat, inspissat. *Ufus præcip. in capite humido ac catarrhoso, in dysenteria &c.* Extrinsecus ejus usus est in emplastris emollientibus, anodynis; tussim sedantibus, in Alopecia (in unge vel coque in vino & lava) in odontalgia, in cardialgia, doloreque ventriculi, (cum modico *Bdellij* faciunt pilulas dandas, Nam 1. & 2 hora 1. ante pastum Crato) in suffocatione uteri [introrsum adhibitum:] cicatrices curat.

PRÆPARAT:

1. Ol. stillat.

2. Pilula de Ladano V. sub titulo Pilulæ.

N. 1. Salâ purificare edoceat in ∇ id solvendo atque colaturam inspissando. Verum me herede minus commodè. Esi enim coctione nonnihil in aqua solvatur, id tamen non nisi portiuncula minima est, relinquitur pars major intacta, quæ non minus quàm illa commoda est.

N. 2. Esi inflammabile ladanum sit non tamen pinguis solvi potest. *Sch. oderus.*

Vires. Calefac. & sic diger. matur. atten. aperit. &c.) Unde usus ejus præcipuus in capite humido ac catarrhoso &c. in formâ pilularum, quas seq. modo præparatas in catarrhis à causâ frigidâ ortis maximæ virtutis semper expertus fui; Recip. *Ladam* depurat. ʒj. Nuc. Moschat ʒʒ. cardamom. ʒj. Mastich. gr. viij. oliban. gr. vj. resin. gialapp. ʒj. Mosch. op. gr. Ambr. gr. viij. ol. d. Cinamom. gutt. vj. d. Citri rec. gutt. v. f. ex his pilul. cum aq. lil. convall. ad magnitud. lentium Dosis harum est ʒ. q. ad noctem sub hotam omni. Externè in emplastris adhibetur anodynis emollientibus ac solventibus, unde ex ejus parte unâ & ceræ duabus Joh. Crato commendat ceratam;

ratur, quod suavissimè calorem fovet innatum & ad flatus dissolvendos & digestionem promovendam plurimum facit. Flatulentia Melancholicâ laborantibus nihil est utilior.

N. Hoc gummi etsi inflammabile sit & oleum ex eo per retortam possit destillari, non solvitur tamen pinguis, sp. vini tamen totaliter referari potest; Etsi etiam aquâ solvatur coctione, pars tamen ejus major manet intacta, quæ non minus, quàm illa quæ aquâ solvitur, utilis est. *Hofmannus.*

LÆVIGARE.

Levigare nihil aliud est quàm super porphyretico lapide aliquid in alcohol, seu tenuissimum pulverem redigere.

LÆCÂNUM, vid. sub titulo *Panis.*

LAGOPUS.

Lagopus, Pes leporinus, seu Trifolium arvense humile spicatum, est planta de Trifoliorum classe, cujus propterea descriptio inibi reperiri potest.

Vires ejus sunt adstringentes, unde in alvi fluxibus, herniis, ac faucium morbis usurpatur.

LAMIUM.

Lamium dictum nonnullis putatur à florum cucullata effigie larvatam lamiam quodammodo representante.

Floribus in verticillis ad caulium nodos foliis urticæ, odore foetido, seminibus majusculis, è vasculis brevibus patulis maturitate illico decidentibus, à reliquis verticillatis distinguitur.

Nomina. Lamium album *ger.* vulgare album sive Archangelica flore albo *Park.* album non foetens folio oblongo *C. B.* galeopsis sive urtica iners floribus albis *L. B.*

Vires. Recentiores flores lamii candidos fluorem muliebrem albidum sistere posse existimant; unde nonnulli ad eum usum parant ex iis conservam, singulis diebus sumendam.

Herba tusa ei imposita valere creditur ad tumores quoscunque discutiendos, nec non ad inflammationes, plagas, ulcera putrida & vulnera.

Ad icterophulas. *℞.* herbæ recentis (lamii albi) *mj.* calefiat inter duos lateres calidos, & tumori applicetur, eum noctis unius spatio plurimum aperit, aperto adhibe mixturam sequentem *℞.* omphacii cochleariæ *vj.* butyri majalis instar juglandis; misce & impone lanæ nigræ oleo è pedibus bubulis madefactæ: intus interim propinetur aqua florum genistæ mane & hora quarta pomeridiana singulis diebus *D.* *Husle è ms. nondum edito:* decoctum lamij rubri ad dysenteriam commendatur in *Histor. Plant.*

LAMPETRA.

Lampetra piscis est qui Gallicè dicitur *lamproye* aliàs *Murena fluviatilis*, ex Anguillarum familia, *Lampetra* autem non tantum est fluviatilis, sed etiam marina, utraque mensis idonea, non tamen marina omnis, sed quadam tantum ejus species.

Adeps *Lampetræ* est anodyna, emolliens, ac resolvens, unde eò inungitur facies, ac itidem manus eorum qui variolis afficiuntur nè scilicet vestigia eorum supersint.

LAMPSANA.

Nomina. Lampsana Dodonæi *L. B.* Lampsana *ger.* *smac. L.* vulgaris *Park.* Soncho affinis lampsana domestica *C. B.*

Radice nititur alba, simplici, surculosâ tamen & variè fibrosâ, Caulis inde exurgit, bicubitalis & altior, teres, striatus, pilis rarioribus hirsutus, rubescens, concavus, ramosus. Folia ad radicem & in ima parte caulis uno vel altero pinnularum pari donata, extremitate latiore, magnitudine & figura fere foliorum Sonchi lavis muralis, aut barbareæ dictæ, mollicella, hirsuta, alternatim posita: quæ in caulibus & ramis superiora, oblonga, angusta, acuta, nullis pediculis fulciuntur, nullis pinnulis lobisve donata. Supremæ caulis & ramorum partes glabræ, in flores terminantur exiguos, luteos, è plurimis compositos flocculis, quorum singulis singula coherent semina oblonga, nigricantia, nonnihil incurva, minimè papposa: utcumque *L. Bauhinus* flores in pappos abire scribat, tota planta vulnerata lac fundit amarum, floret Junio & Julio mensibus, in hortis & cultis frequentissima est.

Vires. Efficax esse censetur in sanandis papillis exulceratis, unde & nomen papillaris sortita esse videtur, apud quosdam. *Ramus in Histor. Plant.*

LAMPYRIS, vid. *Cicindela.*

LANA.

De ea vide sub titulo *ovis*. Hic tantum uno verbo de *lana succida*, Gallicè *laine grasse*, è qua sine alia prævia præparatione cæspus extrahitur. Non omnis autem lana succida est, sed tantum ea quæ è collo & inter animalis femora exsecatur. Hæc lana virtutis emollientis, resolventis, digerentis ac anodynæ; & propterea applicatur genis & faucibus ex fluxione tumetibus.

LANUGO.

Lanugo in Phythologia est mollis fructuum aut filiorum lana, ut Cydoniorum, verbascorum quorundam &c.

LANCIOLATA, vid. *Plantago.*

LAPATHUM.

Lapathum, græcis *Ἀδαρθον*, *ὑπὸ τῇ λαπαίῃ* seu *λαπαίῃ* i. e. *κένεν* movere, evacuare dicitur, quia foliorum ejus decoctum alvum emollit. Latinis rumex, à rumo i. e. fugo quia solerent succum ejus exfugere. *Voss. Nota* Lapathi generice sunt semen triquetrum splendens, flos hexaphyllos, i. e. sex foliolis constans, quorum tria semen obtegunt, arctè interdum adherentia.

Lapathum in tria genera subalterna dividi potest, aliud radice est purgatrice, rhabarbarum dictum, aliud foliis acidis, acetosa & oxalis denominatum, aliud denique foliis magis insipidis, sapore oleraceo, lapathum simpliciter generico nomine dictum.

Primi generis tres species novimus, nimirum.

1. Rhabarbarum verum *ger.*
2. Hippolapathum rotundifolium vel pleudorhabarum monachorum.
3. Lapathum majus sive rhabarbarum monachorum *L. B.* patientiam vulgò dictam.

Tertii septem, si modo lapathum pulchrum Bononiense sinuatum revera specie distinctum sit ab oxyiatho vulgari, eæ sunt.

1. Hydrolapathum majus.
2. Lapathum vulgare folio obtuso *L. B.*
3. Lapathum folio acuto crispo *C. B.*
4. Lapathum acutum sive oxylapathum *L. B.*

5. La-

5. Lappathum folio acuto, flore aureo C. B.
6. Lappathum pulchrum Bononiense sinuatum I. B.
7. Lappathum folio acuto rubente C. B. aliis sanguineum & sanguis draconis.

De iis autem omnibus vid. sub propriis nominibus; hic tantum de viribus Lappathi sanguinei, ex eo quod succum ad instar sanguinis rubrum fundat, facile agnoscibilis, uno verbo; quod scilicet ejus folia in iulculo, alvum cient, ut & itidem totus plantæ succus sanguineus expressus, quodque quamvis oxylpatho nitrorior deprehendatur reliqua cum eodem communia habet.

Semini pulveratum & in decocto adstringente potum singularem habet efficaciam in sistendis nimis mensibus & similibus fluxibus, ut adnotat Cameraarius.

LAPIDIFICATIO, vid. mox sub titulo Lapis.

LAPIS.

Præ ordine in Lapidibus eorumque Viribus describendis procedamus, 1o. De Lapidibus & Gemmis naturalibus in genere, item de Lapidibus ac gemmis arte confectis, & adulterinis. 2o. De Lapidibus naturalibus in specie quatenus ad Medicinam faciunt eorumque propterea viribus ac præparationibus. 3o. De Lapidibus artificialibus ad usus medicos paratis, paucis agemus.

De LAPIDIBUS naturalibus in genere.

Lapidum nomine intelligimus Corpora fossilia, dura, indurabilia, nec in aqua oleove solubilia, ex succo lapidescente, in quo spiritus lapidificus, exorta.

Dividuntur commodissime, ὅσον ἰδιαιτητικῶν καὶ ἐν. in (1.) minus pretiosos, & (2.) pretiosos: & priores rursum in (1.) Majores, eoque vel duos, vel molles, & (2.) Minores. Posteriores autem pariter in Majores & Minores, Qui omnes ordine expendendi sunt.

In Majorum & Durorum Classe constituuntur.

I. SAXUM ex quo integri quandoque constant montes & rupes, Danis 1. een Kampestaen, forsan quod minoribus istiusmodi in bellis uli sint; veteres, eaque fundis & aliis machinis in hostes jaculati sint, ut apud Virgil. 3. Aeneid.

Jamque faces & saxa volant, furor arma ministrat.

II. SAXUM ARENARIUM quia asperum & veluti ex arenis compositum. Durius est ædificis extruendis utile.

III. SAXUM VIOLACEUM, quod colore Violas refert, Cujus mentionem primus fecit Agricola, de Nat. Fossil. lib. 5. cap. 17. & deinde Ol. Wormius, Musei pag. 37.

IV. SAXUM SUILLUM Norvegis, (apud quos insula quædam extat, quæ integris cautibus ejus generis scatet) foetidum exhalat odorem, & talem quidem, qualem spirare sues solent. Nigrum est, fragile, striatum, in se Pyritem argenteum & Talcum habens, unde micæ quædam splendentes de se fundit. Usus habere aiunt, quod in pulverem redactum, & subus quocunque morbo laborantibus exhibitum prodest.

V. SAXUM FISSILE, seu crustosum (quod in crustas findatur, stratis ac tectis utile) cujus non una est differentia. Apud nos tantæ amplitudinis reperiuntur, ut mensas ex eis integras fabricent, aliasque tabulas delectiles. Cæteris vero præfertur Islebianum, quod nigrum est, & in Comitatu Mansfeldia Islebia effoditur. Holum haud incongrue retuleris Lapidem Fissilem Hibernicum.

VI. SAXUM LIMOSUM, (quia facile ab humido in Mangeri Biblioth. Pharmac. Tom. II.

limum solvitur) quali agricolæ nostri nonnullis in locis utuntur ad agros fecundandos. Alii vero in Cornubia pro tuguriolis extruendis. Hoc tamen potius ad Margas, quam saxa referri posse videtur.

VII. SILEX, cujus varia sunt genera.

Ex omnibus vero præcipui censentur.

1. Pyrimachus, qui colore albo & perspicuo gemmas quandoque æmulatur, & liquabilis est. Unde Metallarij metallis suis eum superinijciunt, ut iis supernatet, ne nimium metalli in auras evolet. Vitrarij vero ex eo vitra conficiunt, & Chymici Pseudadamantes, alioque factitios lapides.

2. Ludus Paracelsi, quem Helmontius tantopere ad calculos à corpore humano expellendos commendat, quemque nos etiam in lib. nostro de Lithiasi clare descripsimus.

VIII. Lapis SCHISTOS, qui durissimus ac solidissimus est. Ideoque igne calefactus, calorem diu retinet.

IX. PYRITES (quia ex ejus quadam specie ignis copiose exeat) quem propriè Pyromachum dictum putant nonnulli quod igni repugnet. Nam in arduos conjectus fornaces fluit: & ubi semel defluerit in catinum mox rursus concrevit & durevit. Reperitur ut plurimum in fodinis Metallicis, Metallis quandoque permixtus, quandoque iis destitutus, & variis figuris lusum naturæ ostentans.

X. Lapidēs MOLARēs. ab usu nomine mutato, quod iis frumenta molantur. Qui suas etiam habent species.

XI. Cōs qui lapis durior est, ferramentis acuendis aptus. Estque vel (1.) Olearius, oleo enim illinitur ut aciem trahat, vel (2.) Aquaticus qui in orbem communiter redigi solet, ut motu circulari actus, vel ex alto cadentem, vel in subjecto alveo stagnantem aquam excipiat, quo admotum ferrum commodius terere possit.

XII. MARMOR, Græcis Μάρμαρος (μαρμαρύνει à splendore. Atque hæc causa est cur & mari, ob nitorem aquæ, marmoris nomen tribuunt Poætæ, ut i. Georg.

Infidum remis impellere Marmor)

Cujus varietas sunt differentia, à variis coloribus desumptæ. Dantur nempe Marmora, alba, nigra, viridia, cinerea, rubra, variegata.

Ex Albis sunt

I. Parium (ab insula Paro, ubi olim copiose effodiebatur) veteribus Lychnites dictum (quod ad lucernas in cuticulis cæderetur.) Cujus duo genera statuunt. Unum translucens, ex Phengites proinde dictum, Φέγγω enim apud Græcos significat illumino. Hoc lapide construxerat Nero ædem fortunæ, quam aurea domo complexus est: quare etiam floribus apertis interdum claritas diurna erat haud alio quam speculati modo, tanquam inclusâ luce, non transmissâ, Domitianus item porticum in quibus spatium consueverat, parietes Phengite lapide distinxit: è cujus splendore per imagines quicquid à tergo fieret, provideret. Ut Suet. Tranq. in ejus vita. Alterum non translucens, Alabastrites nominatum. A vulgari Alabaistro duritie differt & splendore. Foditur in Italia, in agro Lucensi ejus genus quoddam, quod ab oppido Caraciense nomen obtinuit.

2. ALABASTRUM, quod, etsi inter molles & raros lapides locum habeat, huc tamen quidam referunt, externæ figuræ & polituræ respectu. Hujus generis vel integras rupes in Angliâ habemus, in agro Gloucestriensi ad litus fluminis Sabrina, ex quo statuas sepulchrales exsculpunt.

Ex Nigris sunt.

1. Basaltis (à voce Æthiopica, Basal, quæ ferrum significat)

significat eo quod Marmoris genus sit durissimum, ferrei coloris, limisque resistens) nonnullis *Basanum* (à *Βασανίζω*, idest, diligenter examino, quia eo Argentum & Aurum examinatur & probatur, non minus ac lapide Lydio.) Variis in locis Germaniæ hodie repetitur.

2. *Obsidianum* seu *Numidianum* Gallis, *pietre de Ténche*, quia auto & argento examinando potissimum inservit Ex hoc Marmore grandia quadrata conficiuntur, quibus Magnatum demortuorum Loculi teguntur. Tabula item Epitaphiis apta. Politum enim instar speculi resplendet & nigerrimum est.

Ex viridibus.

Olīm celebrabantur *Lacademonium*, *Augustum*, *Tiberium* (quorum duo posteriora sic dicta videntur, quod eorum principatu primum inventa) hodie vero frequens est *Ophites* (quæ serpentis formas & maculas distinctas exhibeat) varia ex eo conficiunt Pocula, Cochlearia, Mortaria, Laminas incurvas, aliæque ejus generis. Quandoque mollis est hic lapis, ut liquores imbibat, quod ut impediatur, oleo nucis moschatae inungunt vasa ex eo fabricata. Commendatur ad multa, quæ schedula typis mandata enumerare solent venditores circumforanei sed omnibus, imò aliquibus an fides adhibenda sit, est cur valde ducimus

Ex variegatis sunt

1. *Cinereum Seravetianum* (quod *Seravistia* & aliis locis Italiæ reperiatur) quod durius est, & verè Marmor, & maculis cinereis insignit. Ex hoc globi conficiuntur parvi, ut manibus deinceantur ab iis, qui febre ardente laborant. His enim recreari videntur, dum resijerando dolorem mitigant & ardorem.

2. *Subviridis* ille *Lapis*, italis *Verdello* dictus, eo enim utuntur Lapidis Lydii loco, ad aurum & metalla probanda. Quidam *Ibytemi* Veterum esse arbitrantur.

3. *Garratironum Imperati*, quod pulcherrimum est, literis quasi Arabicis à natura sibi insculptis superbiens, colore aureo in corpore purpureo. Concretum videtur è terra purpurea & putaminibus aureis, superveniente succo aut spiritu lapidifico. In Asia inter ornamenta corporis gestatur, & ex eo manubria cultorum & gladiorum conficiunt. lege plura apud *Ferrand Imperat. Hist. Natural. lib. 24. cap. 85.*

4. *Florentinum variegatum*, quod per se maxima ex parte cinereum licet sit maculis ramen fuscis, & lineis obscurioribus hinc inde ductis & discurrentibus, jam turres, jam ædes, montes, flumina, ac integra civitates exhibet. Variæ hujus Tabulæ in REGIÆ SOCIETATIS Cimeliarchio asservantur, in quibus prærupta turrium rudimenta, urbis inæqualiter sitæ domus & ædificia, aliæque id genus phænomena, discretis coloribus & artificiosè delineata, à natura ludente, sine omnis artis pictoriæ ministerio, repræsentantur.

5. *Embuscatum*, ex monte SINAI Hierosolymitano depromptum quod albicans est ad flavedinem tendens, & quocunque modo secetur aut dividatur, in eo arbuta & frutices, colore nigricante subtiliter à natura depicti apparent. Si supra ignem ponatur brevi evanescit pictura, & nil nisi nudus remanet lapis, sui coloris, adeo durus tamen, ut calcinari nequeat, sed fortissimo igne instar vitri fundatur. Hujus etiam generis Tabula *Embuscata* vilitur inter Rariora naturæ in dictæ Soc. REG. museo collecta. Aliam elegantissimam disertè describit *Ol. Wormius in musæi sui pag. 45.*

Ad Flava refertur.

Phengites, quod venis flavis & transparentibus micat. Tale illud est, quod Roma in Templo *S. Mariæ* in porticu spectatur ubi columna ex eo fabricata visitur dimidiata, colore flavo parietis rimam claudens, & eternam lucem solari fulgore intromittens, ita ut, sole

radios suos in columnam jaculante, ardere videatur. De quo multa fabulantur.

Inter Rubra denique principatum obtinet.

Porphyrites quod durum admodum est, & splendendum ex eo fiunt non solum columnæ, sed & Mortaria, & crustæ ad colotes & Lapidem pretiosos læigandos, attritione enim nihil à se remittit. Ex hoc marmoris genere constant *Obelisci*, qui Roma visuntur, literis Hieroglyphicis insignes, ad templum *Joh. Lateranensis* & in *Varicano*. De quibus consulatur *Plinius lib. 36. cap. 9.* Ubi expressè modum, quo ex Ægypto eò delati sunt, describit.

LAPIDUM Molliorum Classis.

Inter Lapidem minus Pretiosos MOLLIORES occurrunt.

I. *Saxum CALCARIUM*, unde Calx conficitur; Cujus copia ingens passim in tota Anglia reperitur. Opticum verò estoditur prope viculum in agro *Leicestrensi*.

II. *GYPsum*, Gallis *du Plastre*, lapis est albus, mollis Alabastri instar, qui cum leviter uritur, ex eo fit calx ista, quæ Gypsum vocatur, usus est ad statuas ingentes & lævissimas, ad domorum areas & concarnationes. Cum polline lapidum duriorum, pulvere plumbi & lacte, in veros lapides transit, & si colores adjiciantur, Marmor pondere, nitore & colore imitatur quàm maximè.

III. *Lapis BONONIENSIS*, à quibusdam *Spongia Solis*, ab aliis *Spongia Lune*, ab aliis *Lucifer*, lapis *Cassiarolanus*, *Phosphorus* Kircheri, quod singulari proprietate polleat lucem imbibendi & retinendi. Si enim Soli aut igneæ flammæ apponatur, sic illustratur, ut inde translatus ad locum tenebricosum, conceptam reens lucem diutule retineat sibi infixam, adeo ut in tenebris instar Carbonis ad semihorulæ spatium ardeat, idque toties, quoties ita Soli aut lumini fuerit admotus. Verùm hanc facultatem mirabilem non nisi præparatus obtinet. Modum autem eum præparandi docet *Kircherus in art. magn. Lucis & Umbra lib. 3. de Magn. pag. 507. & Wormius Mus. pag. 46.*

IV. *PUMEX*, Græcis *Kirones* (quasi à vermiculis erosus) Lapis est erosus spongiosusque, exiguis caver-nulis repletus, colore ut plurimum cinereo, quandoque candido, nonnunquam nigro, qualem Islandiæ *Hecle* vomit. Huc pertinet *Pumex Vulcani Syracusani*, quem describit *Clar. Bartholinus in Epist. Medicin.*

V. *FLUENTIS ÆTNAE COAGULUM*, massa mimetum quædam coagulata ex Lapidibus, calce, & Sulphure, quæ simul calore flagrantis Ætne liquefacta instar rivi igniti ex Ætne defluunt, sed frigore tandem ambientis densata, massam hanc præbent.

VI. *TOPHUS* *ωάπος*, *Porus*, qui est asper, scaber, porosus, (unde nomen) seu foraminulis plenus, ideoque levis, & facile in arenam attritu solubilis. Repertur variis in locis Germaniæ: copiosè verò prope *Coburgum* in ditione *Mansfeldica*; & in Anglia ubivis penè occurrit. Propter levitatem commodissimus est ad replendas parietum collabentium rimas, cum præ levitate non premat, & glutinat facile extrema. Huic cognata sunt.

VII. *ALCIONIA*. (sic dicta ab avibus, quæ *Halcyones* vocantur, quia ex iis mari innatantibus nidos fingunt & construunt) Quæ etiam lapideum habent naturam, sed ortum tamen ex mari; cujus aquæ cum salis sint, ex ejus spuma, cum tenuissimis sordibus permixta; accedente succo lapidescente, seu sale massam coagulante, in varias figuras concresecunt. Horum plura ponuntur genera ab *Ol. Wormio in Musæi sui pag. 48. & 49.* luculenter descripta.

VIII. *ASius*

III. *Asrus*, vel *Assius Lapis*, quem etiam *Sarcophagum*, vocant (eo quod carnes humanas consumat, nudatis ossibus) quem veteres ad Pumices & Poros referunt. Hic consulendi veniunt *Plinius lib. 36. cap. 17. & Ol. Wormius in Museo*. Unde lineam unam & alteram interim exscribam. Ego in peregrinatione mea gallica, inquit, in templo, D. Hilario sacro parieti austruino infixam vidi tumbam lapideam, coloris cinerei, cujus substantia laxea aut marmorea erat tantæ capacitatis, ut cadaver humanum integrum capere potuerit. Hic lapis pro *Sarcophago* vel *Assio* monstratur accedentibus. Verum porosus non est, sed durus & solidus, ut ex frustulo, quod ex eo excussi, videre licet. Vestibus adstrictum ut incalcescat, & foetorem cadaverosum expirat. Ferunt, cadavera ei indita, viginti quatuor horis prorsus absumi, relictis solum ossibus; An ita seres habeat, ignoro.

X. *STALACTITES*, Generatur ex aquis Nitro, vel succo petrifico copiose imprægnatis, & materiam terrestrem subtilem secum convehentibus. Cum enim aqua per terræ canales effluit, aut ex alto decidit, aut lateribus alveorum agglutinatur, horum ratione varias, dum concrevit, figuras acquirit. Ex alto destillans extenuatus canalis, pyramidis forma quandoque adheret, & eodem modo, eademque forma induratur, quæ e canalibus defluens humor frigore hyemali congelati solet. Hinc tanta inter hujusmodi lapides figurarum obtrigit varietas, quam observare licet in fonte petrifico apud nos percelebri, in agro *Eboracensi* vicino; in quem quicquid ligni immittitur, lapideo cortice brevi obduci & lapidescere observatum est; & in quo diversimode figuratas concreciones videas. In hunc fontem non e terræ venis aquæ nitrosæ scaturiunt, sed ex impendentibus rupibus guttatim destillant.

X. *STALAGMITES*, qui ejusdem naturæ & substantiæ esse videtur cum *Stalactite*, sed figurâ saltem differt, quod semper globose concrevat. Interdum contingit, ut quam plurimi horum lapillorum simul concrevant, & tunc lapis integer massam ovorum piscium majorum exprimit cujusmodi aggerici iconem exhibet *Ol. Wormius Mus. pag. 52.*

XI. *AMMONITES*, seu *Himmites* (quia ex arenis majoribus coagmentatus) qui ovis minorum piscium similis etiam apparet.

XII. *OSTEOCOLLA*, aliis *ossifragus*, *osteites*, *Ammonites*, *osteolithus*, *stelochites*, quia summopere ad fracturas ossium conglutinandas conducere creditur. Lapis est mollis, albo & cinereo colore, figuram ossis exhibens, concavus, quandoque medullam habens friabilem, linguæ adhaerentem, & facile in liquore solubilem, quandoque verò nullam. Crescit per arenam forma Corallii, interdum brachii crassitie. Cum primum e terra erumpit, friabilis est, paulatim verò magis indurescit. Videtur Margæ quædam species esse, quæ per terræ meatus discurrens, in talem figuram concrevit & induratur. Hujusmodi nos in mineris *Cambobritannicis* varios habemus: quorum exempla videantur in inclariss. Soc. REG. Cimeliario, ex Nobiliss. juxta ac Eruditiss. D. *Roberti Moray*, Equitis Aulati, & ejusdem Societatis magni ornamenti, munere eo allata. De viribus *Osteocollæ* videatur *Thom. Erastus*, qui de eo argumento justum tractatum conscripsit. Interea temporis animadvertas velim; quod in officinis plerisque pro *Osteocollâ* verâ, *Stalactitis* quandam speciem, albam, porosam, levem, mollem, albam, porosam, levem, mollem, facile in liquore solubilem, sapore subfalso, quæ tamen ab *Osteocollâ* virtute multum discrepat.

XIII. *Lapis SPONGIÆ*, quibusdam *Lapis Cappadox*, *Plinio Cysteolythos*, qui substantia est friabili, colore albicante, succum lacteum de se præbente. Laudatur

Mangeri Biblioth. Pharmac. Tom. I.

à *Dioscoride* ad vesicæ calculum frangendum: ex vino aliisve appropriatis propinatus.

CORNU FOSSILE, Gesnero *Ceratites*, *Clusio Fossile*, *Cesalpino Lapis Arabicus*, quibusdam *Denis Elephantini petrefactus*, aliis *Lithomarga alba*. Est substantia lapidosa, colore, lavore, & forma quandoque cornu referens; quandoque mollius, cortice exteriori duro, flavescente, nigro aut subcinereo; medullâ molli friabili, absque poris compacta, adstringente, exsiccante, linguæ firmiter adhaerente, odore grato. Invenitur tam in Italia, quam variis Germaniæ locis, in *Moravia*, *Silesia*, *Saxonia*. Materia & modus generationis traditur ab *Anselmo Boetio à Boet. in lib. de Mineral.* Commendatur ad omnes morbos malignos.

XV. *AMIANTHUS* (ab α σπινθηρ & μείω, polluo, quod in ignem coniectus non inquinetur, sed nudiore appareat) alias *Asbestinus Lapis* (quod non comburatur) *Paulo Veneto Salamandra* (ob eandem rationem) ab aliis *Corsoides* (quia canitiem præ se fert) ab aliis *Linum* (quia ejus lanugo manibus netur & textitur,) *Lapis* est *Alumini Schisto* simillimus, ignem respiciens, adeo ut eo non modo uri non possit, sed purior reddatur, colore ad viriditatem obscuram tendente, quandoque & ferreo, attritione facile in tenuia filamenta solubilis. Mollis enim est, & quod efflorescit, dum teritur, plumas refert: Unde à quibusdam *Alumen Plumosum*, & *flos petra* dicitur. Olim in fila aptabatur, & mappæ ex eo tanquam lino fiebant, quæ sordibus conspurcaræ, puriores igne exultæ reddebantur ac magis splendebant, quam filarentur. Regum quoque funera in ejusmodi adurebantur tunicis, ne corporis favilla cum reliquo misceretur cinere. De quo consulatur *Pancirollus de Reb. deperdit. tit. 4. cum Salmuth. commentar.* De modo vero, quo ita præparatur, ut ex eo lina fiant, lege *Ol. Wormium, in Mus. pag. 55.*

XVI. *SELENITIS* (quia ad *Lunæ* motum fulgore crescere & decrescere olim credebatur) Neotericis *Lapis Specularis* (quia perspicui potest, & rei, quæ ab ejus tergo est, imaginem reddit) nempe ex *Moscovia* magna optimi generis copia provenit.

XVII. *TALCUM*, alias *stella Terra* (quod stellarum instar niteat & micet) quibusdam *Argyrodamus* veterum (quia ignis violentiæ resistit;) *Argyrolithos Chymicis*. Cujus oleum sollicitè quærent spagyrici, quos in argentum convertere se posse sperant. Mulieres etiam id avidissime expetunt, ad nitorem cuti conciliandum, variisque modis id perficere tentant, sed irritato hæcenus conamine, quanquam *Jacobus Zvingerus* modum extractionis præscribere ausus sit.

XVIII. *Lapis SCHISTOS*, *Talco* & *Selenitidi* valde affinis, albus, perspicuus ferme, in laminas scissilis sibi invicem coherentes. Repertus in fodinis argenteis *Norvægia*, eique venæ argenti ita innascuntur, ut purum per ejus corpus ramulis eleganter distinctum perreptet.

Lapidum ex ANIMALIBUS desumptorum Classis.

Ad Lapidum minus pretiosorum Molliorum genus ultimum auctores & eos refert solent, qui ex Animalibus desumuntur. Cujusmodi sunt.

I. *Lapis TUBERONUM*. Qui reverâ lapis non est, sed os quoddam ad auditum spectans, in capite piscis *Tuberonis* repertum, & ab Anatomicis *Cochlea* dictum: & cujus loco vulgo divenditur *Lapis Manati*. Pul. is ejus utilissimus censetur ad Nephritidem & urinæ difficultatem, renumque & vesicæ calculos deturbandos.

II. *PERCARUM Lapis*, qui reperitur in capite *Percæ majoris*, circa exortum spinæ, quæ capiti inungitur, duo extant utrinque unus, vesiculis quibusdam inclusi, oblongi, plani, altera parte dentati, qui facile e piscibus coctis eximuntur. Ad calculos comminuendos similiter

laudatur, si cum vino oligophoro pulverisati exhibeantur, drachmæ unias pondere.

III. Lapis CARPIONUM, qui ad calculum pellendum commendatur, pari modo quo præcedentes, magnique sit à multis, credulitati nimium ad dictis.

IV. Lapis CORACINUS, qui ex Pisce *Coracino* petitur, in ejus capite delitescens, candidus, osseus, figuræ ovalis, incurvus aliquantulum, parte convexa lævi, protuberantia præditus, sed juxta extremitatum alteram asperitatem quandam habens; sicut ab *Aldrovando lib. 1. de Piscibus, cap. 15.* describitur Commendatur à quibusdam ad icterum seu morbum Regium, sed & præcipue ad renum, arenulas

V. Lapis LIMACIS, ex iis Limacibus exemptus, qui sine testis in campis & locis subterraneis vagantur, colore fusco. Hi scilicet in capite lapillum gerunt candidum, ovali, figuræ, tenuem, planum, aliquantulum convexum, pondere adeo exili, ut tres scrupulum unicum non superant. Nil aliud esse existimo, quam *Limacis Cranium.*

VI. OCULI CANCROCORUM, vulgò sic vocati, sed malè. Revera enim oculi non sunt, sed ex Gammatorum fluviatilium capitibus eximuntur, idque non quovis anni tempore, sed mensibus Junio & Julio, eum exuvias deponunt. & novam crustam acquirunt, Sibi sunt in c. pitris summitate, utrinque unus. Medicis in usu venerunt ad sanguinis concreti dissolutionem & expulsionem; quia tenuium sunt partium & facultatis diureticæ, quo nomine etiam ad *Nephriticis* dolores ex arenulis commendantur & portionibus *Traumaticis* admiscuntur.

VII. TOPHUS JUVENCULI, qui in Jumentorum ruminantium secundo ventriculo, pilæ rotunditate, concretus reperitur.

VIII. PILA RUPICAPRÆ, Velschio *Agagopila*, quia reperitur in Capris Alpinis, quæ in præcellis Rhætorum & Valesianorum rupibus & Alpibus Episcopatus Salisburgensis degunt. De horum Lapidum generatione & virtutibus medicis singulatim tractatum edidit *Hieron. Velschius*, quem consulas.

IX. CALCULUS HUMANUS, seu in vesica, seu in renibus hominis concretus.

X. ALECTORIUS, qui in ventriculo *Caponis* aut *Galli* decrepiti nonnunquam concretus reperitur.

XI. CHELIDONIUS, sic dictus, quod in ventriculis Hirundinum inveniri putetur, lapillus est exiguus, magnitudine seminis lini, sed figurâ hemisphærica, colore luteo subobscurum, splendente parte convexâ & rotundiore, purpureo & nigricante fessili. *Anselmus Boetius* se in Hirundinibus eum quævisse ait, sed invenisse nunquam. Adferuntur ex insula *Meliteni* Lapilli *Chelidoni* dicti, qui descriptioni *Plinianæ* conveniunt, quos incolæ *Oculos Serpentum* vocant *Petrificatos*. Vires eis adscribunt præclaras in capitis & oculorum affectibus.

XII. UMBILICUS MARINUS (à similitudine umbilici, quem repræsentat) quibusdam *Umbilicus Veneris*, Cretensibus *oculus Marinus* (quod gestatus oculis prodesse dicatur) qui nihil aliud est, quam operculum *concha* cujusdam *calata Aldrovando* dictæ, quæ etiam ad *Turbinus* spectat. Hujus officium claudit eo modo quo vulgæ res hyeme crustâ quâdam testas suas obducunt, ut à frigoris injuria defendantur. Ejus in sanguine sistendo vim eximiam experti sunt quàmplurimi, si parte planâ cum saliva fronti agglutinetur. Et *Hæmoptici*, qui sanguinem per intervalla expectorant, ejus pulvere cum ovo sorbili juvantur. Hujus Lemmatis est & *Umbilicus Marinus Magnus* ex India allatus, quem eleganter describit *Ol Wormius Mus.* pag. 37. Omnes *umbilicos Marinos* Itali indiscriminatim *Drua Lucæ* oculos appellant.

LAPIDUM minus pretiosorum Minorum & Durorum Classis.

Expedito Lapidum, minus pretiosorum & mollium, Elencho, ad *Duros* ejusdem divisionis accedimus. Hujus igitur capitis sunt.

I. MAGNES, (seu à *Magnete*, Armentario, primoque ejus inventore; ut *Plinius*, deducit, seu ut *Lucretius* visum est, à *Magnesia* regione, ubi crescit, seu à *magnis viribus*, ut modernorum nonnullis placuit) *Theophrasto Heracleon* (quod circa urbem *Heracleam* inveniretur) aliis *Lapis Herculeus* (quia ferro, quod omnia domat, imperat) quibusdam *siderites* (calcem de causa, *sidus* nempe ferrum notat) Qui lapis est durus, ferrugineus, nigricans, ferrum aut alium Magnetem ad se trahens vel repiciens, ac plagas mundi ostendens. Hic affinis videtur *MAGNESIA*, quæ colore & duritie magnetem referens, vitro adhuc fuso certa ratione admixta, id perspicuum efficit, & à viridi colore expurgat, plus æquo admixta, nigro colore inficit. Sed lapis hic *Alabandicus* non omnis est metalli expertus. Nam solutus in oleo vitrioli magnum calorem præcreat, qui affusione aquæ identidem excitatur, atque instar ferri rubrum colorem aquæ forti conciliat, acrem emittit fumum, ac demum ubi vitro fuso imponitur, statim vitrum intumescit, quod ei cum cupro & ferro commune est. Cur autem vitrum potius expurgat, quàm suo colore inficiat, id neque tractione fit, quæ forte nulla est, nec præcipitatione, cum nihil in fundo vasis præcipitatum appareat, sed partes insensibiles sic immutat & disponit, ut liberum aditum luminis permittant.

II. CALAMITA ALBA, seu *Magnes Carneus* (quia ut illa ferrum, ita hunc carnem ad se trahere putant) qui lapis est albus, lineis nigris inscriptus, qui lingua admotus firmiter ei adheret. Reperitur potissimum in *Ilva*, *Hetrusci* maris insula sunt, qui ad *Margas Saxatiles* referunt: sunt qui ad *Osteocollas* & *Poros*.

III. HEMATITES (vel quod sanguinei coloris sit, vel quod attritus coribus aquariis succum fundat sanguineum vel quod polleat vi sanguinem sistendi.) Lapis est colore sanguinis concreti, durus, striis *Antimonii* instar exornatus, glebosus, vi sanguinem sistendi præditus. Reperitur in variis *Germania* locis, inter rubricas & ferri fodinas; sed præ reliquis commendatur *Hispanicus*; qui *Compostella* adfertur, figura angulosa, ferri nigricantis colorem habens & splendorem ulceribus, vasorumque rupturis internis, & mictioni cruentæ prodest in pulvrem tritus & cum appropriatis exhibitus.

IV. SMYRIS, lapis est ferrugineus, ad nigredinem tendens, adeo durus, ut ejus pulvere utantur gemmarii ad gemmas sculpendas, & fabri ferrarii ad arma polienda. *Chymici* tincturam ex eo trahunt, quo Mercurium quasi in momento figunt, atque ita fixum quidam vocant *Præcipitatum Miraculosum*, quo ad augmenta sua *Chrysopæi* utuntur. In ferri fodinis reperiri solet, & apud nos copiosè provenit in insula *Sarnia* vulgò *Garnsey* dicta, teste *Cambdeno* nostro in descript. Insular. *Britannicar.* ubi hæc habet. Naturæ munimentis [insula] ubique prærupta cautium corona redimita, inter quos *smyris*, lapis durissimus & asperissimus reperitur, quo Gemmarii lapides expurgant, scinduntque, & vitrarii vitrum diffundunt.

V. LAPIS LAZULI, Græcis *Καὶνὸς λίθος*, Latinis *Lapis caruleus*, ab Arabibus *Hager* vel *Azur* lapis est durus florum Cyani carulei colore, aureis punctulis & venulis exornatus. Duo ejus statuunt genera, unum ignis vim fert, alterum neutiquam. Is qui fixus est, & colorem in igne non mutat, ex Oriente, Asia

Asia, aut Africa adfertur, & *Orientalis* idem dicitur, atque hæc notâ probatur. Non fixus quibusdam in locis *Germania* reperitur, medius est inter *Lapidem Armenum* & *Lazuli*, hoc utique mollior, illo durior, Colores ex utroque patere solent pretiosos, ex *Orientali* ultra-marinum dictum, auro chariorem, qui ætate non mutatur: *Germanico*, ignobiliorem, qui externis injuriis facile læditur, & temporis progressu virescit. Medicis etiam in usu est ad affectus Melancholicos.

VI. LAPIS ARMENUS (id est, ex *Armenia* allatus) Gallicè *Vendazur* (quasi dicas colorem à cæruleo in viridem transeuntem,) qui levis est, colore cæruleo ad viriditatem vergente, friabilis. Olim ex *Armenia* deferrebat, jam vero in variis *Germania* locis reperitur, ut in Comitatu *Tyrolensi*, aliisque argentifodinis. Inter Medicos commendatur ad eosdem affectus, ad quos *Lazuli* lapis, humores scilicet Melancholicos per vomitum & secessum educendos.

VII. LAPIS LIPSIS, cujus, quod sciam, primus mentio *Zacutus Lusitanus lib. 1. Observat. 83.* Colorem habet cæruleum Saphirinum, cum transparentia quadam. Durissimus est, sed in minuta finditur fragmenta. Gustu ita acris & mordax, ut, si tantillum juxta linguam apponatur, excitato ardore eam exulceret. Afferitur à multis mercimoni causa ex *Novi Orbis* Provincia, *Pontose* dicta, & civitate *Lipsis* (unde nomen sortitus est) vocata. Venditur in taleolas reductus; ita ut, si cum à longinquo videris parum distare à merce illa, quam *Lusitani Anil* vocant, Belgæ verò *Indigo*, nisi quod *Lipsis* clarum & transparentem sortitur colorem, *Indigo* verò aliquantulum obscurum. Inter auxilia celeberrima, quæ ad ulcera virulenta & depascentia, præsertim Gallica, coercenda, eorumque putrilaginem absumendam utilia sunt, hic Lapis obtinet principalem. Nam sua vi Caustica eorum malignam & malignitatem infrenat.

VIII. LAPIS COERULEUS ANGLICUS, in agro *Langastrensi* repertus, qui ducendis li. eis idoneus est. Hujus mentionem facit *D. Dr. Merret. Pinac. rerum Natural. Britannicar. pag. 218.*

IX. GLOSSOPETRA (quasi *Lingua lapidea*, ita dicta, quod linguam *Pica* avis figura referat, sed vulgò ita appellatam volunt, quod serpentis linguam exprimere putant. Unde nihil aliud esse existimant quam serpentis linguam in lapidem conversam. Verum falluntur; Serpentium enim linguæ non triquetra, sed teretes & bifida sunt. Lapis est ut plurimum triangularis, basi crassiore, scabra, toto aliòquin corpore levi, & quasi cornuo, minutis quibusdam denticulis ad latera crenato, colore quandoque luteo albicante, longitudine diversâ. Creberrime reperitur in insula *Melia*, nonnunquam etiam in *Anglia*, ubi in variis matricibus præcipue in mineris carbonariis delitescit. Item in *Germania* prope *Luneburgum*, ex Alumino-fodinis eruitur. De hoc Lapide singularum Dissertationem conscripsit *Clar. Thom. Bartholinus*.

X. ASTROITES, *Lapis stellaris*, quia stellulis undique insignitus, nigricantibus, qui est moderate durus, colore cinereo, fusco, nigricante, astericis exornatus, ad capitis humani magnitudinem quandoque excreescens. In Comitatu *Tyrolensi* & circa arcem *Cimmeriam* invenitur, & alibi. Aceto impositus hinc inde movetur, ac si vivus esset, quod fit, aceto per poros lapidis sese insinuante, & aerem inclusum premente, qui exitum seu libertatem potius elasticam sibi quaerens, lapidem trudit & movet. Ad pestilens contagium & vermes puerorum necandos, ejus pulvis, quatuor granorum pondere commendatur. Nonnul-

Mangeti Biblioth. Pharmac. Tom. II.

li eum Amuleti loco gestant. Hic lapis à *Boëtio de Boet Asterias vera*, seu *lapis stellaris*. à *Gesnero Sphragis Asteros*, à *Ferd. Imperat. Stella Judaica* nominatur.

XI. LAPIS CRUCIS; cujus duo statuuntur genera. Unum, quod in corpore cinerei coloris, crucem ostendat candidam. Alterum, quod coloris nigri, aut, purpurei, crucem exhibet. Primum eleganter describit *Laurentius Pignorius in Musæi calceolarii Sect. 14.* Posteriorius *Sepralius in Epist. ad Chiocciu.*

XII. LAPIS JUDAICUS (à loco ubi invenitur *Judea* scilicet sic nominatus) quibusdam *Syriacus*, *Plinio Euros* (quod urinam fluere faciat) & *Tecolirhos* (quod calculum r. solvere putetur,) variarum est figurarum. Naturâ in ejus formatione mirè ludens, unde diversa etiam obtinuit nomina. Qui instar glandis & Balani est, *Phenicitis*, qui instar nuclei olivæ, *Pyrenes* &c. Genus præcipuum (quod frequentissimum apud Medicos) Nuclei olivæ formam repræsentat, striasque & sulcos habet, à radice in apicem usque excurrentes. Reliquæ ejus species sunt *TROCHITES*, quia rotæ aut Tympani fere effigiem. *ENTROCHOS*, cum multæ vertebræ simul junctæ reperiuntur, adeo ut radii unius alterius striis inferantur. *COLONETTA* Italica appellatione, cum articuli longiores sunt, columnulas imitantes, & æqualibus commissuris constantes. *STELLA JUDAICA*, quum articuli non modiolos aut columnulas, sed stellas expriment. Cujusmodi apud nos etiam in *Anglia* propè ostium fluminis *Sabrina* frequenter inveniuntur. Et existimo eosdem lapides esse cum eo, qui *Asteria* *Boëtio* dicitur, *Gesnero Sphragis asteras*, singulis enim partibus utrinque stella figura ceu sigillo impressa videtur, radii eminent suis angulis, & in unguis radiis cavitas media. Octo aut plures interdum cohærent tam affabrè, ut nullus artifex melius potuisset conjungere; facile tamen ab invicem separabiles. Omnes species ad renum calculos imprimis commendantur. Maxime verò *Nephritici* tinctura, quæ nullibi descripta extat. *Morbis* tamen hanc commendat præparationem; infunditur nempe spiritus salis rectificatus pulveri lapidis nephritici, reponiturque in digestionem, sitque tinctura viridis, de qua dentur guttulæ decem in vehiculo convenienti.

XIII. BELEMNITES (à *sagitta*, cujus formam exactè refert: *Βελεμνις* enim sagittam vocant Latini) aliis *Dactylus Idæus* (quod in monte *Ida* reperiatur, & digitum repræsentet.) Quibusdam *Lyncurus* (quod ex urina *Lyncis* ortum trahere falso existimaverint) *Danis Spectrorum Candela*. Lapis teres & oblongus est, in apicem obtusum desinens, colore modo albicante, modo aureo, sagitta extremitatem ad amussim referens, quandoque plenus, quandoque concavus; lineas obtinens à medulla ad extremitates tendentes; communiter pollicis & digiti longitudine. Omnibus à natura inest rima quasi in longitudinem tendens. In *Anglia* passim reperiuntur variorum colorum. Germani contra incubum & renum calculos valere credunt, eumque in finem ejus pulverem exhibent in liquore competenti.

XIV. MOROCHTUS aliis *Leucogæa*, *Leucophrugis*, *Galaxias*, *Graphida*, *Galactites* (quæ eo lineas albas ducere solent *Pictores* & *Mathematici*, & quia, si super cutem cum aqua fricetur, lacteum emittit succum, quo in collyriis utuntur Medici. Lapis est (si modo lapis) mollis, lubricus, quandoque nigro, quandoque subviridi, quandoque melleo colore, qui tamen vestigia alba post se relinquit, si convenienti subjecto affricetur. Repertus in *Hetruria*, *Germania* circa *Hildeshemium*, *Anglia*, & insula *Feroensi* ad littora fluvii

H 3

cujus-

cujusdam ubi instar Tartari concreti cauribus adhæret Dioscorides in Ægypto reperiri ait; & ad lineas vestes dealbandas usurpari.

XV. CERAUNIUS, *Telum Fulmineum*, *Lapis fulminaris*, *Cuneus Fulmineus*, *Telum Jovis*, eo quod cum fulmine è nubibus decidere vulgo persuasum sit; quam verè tamen, à nobis, in *Dissertatione nostra de naturâ fulminis*, fusè demonstratum. Varias figuras præ se fert, maximâ ex parte cuneum refert, Pyramidem, malleum, securim, clavari: longus quandoque pollices septem, quandoque quinque, latus tres aut quatuor, crassitie inæquali, substantia, ut plurimum ad silicem accedit, durus adeo ut limam non sentiat, gravis & ponderosus. Colore variat quandoque cinereo, quandoque nigricante, quandoque luteo subobscuro. Multas & insignes virtutes ei adscribunt superstitioni.

XVI. BRONTIAS (quod cum fulmine scilicet è cælo delabi putent) aliis *ombrias* (quod cum imbris cadat) quibusdam *chelonitis* (quod *chelis* testudinum, figura & colore quandoque repræsentat,) aliis *Ovum Anguinum* (quia caudas anguinas corpus ejus ambientes & in unum punctum concurrentes quodammodo ostentat, Germanis magnus Lapis Bufonius. Lapis est hemisphæricus dimidii ovi galinacei magnitudinis, quandoque major, quandoque minor, colore cinereo, fulvo, nigricante, materia vel saxeâ, vel gypseâ, vel siliceâ, ab apice ad basin per ejus convexum quinque lineas, æqualiter in quinque quasi triangula eum dividentes, hæcens; quæ lineæ semper duplicatæ, ex minutis constant punctis, & quandoque in planam ejus superficiem terminantur, quandoque eum perreptantes in modiolum, quod centrum planæ superficiei, exornant. Si protuberantiæ & eminentiæ quædam in eo appareant, *Ovum Anguinum* nominant. Nunquam, quod sciam animadvertum, quod plures simul in eodem loco aut nido reperti sint. Hujus alteram speciem constituit *Brontius Favosus*, quam *Ol. Wormius Mus. pag. 77.* describit.

XVII. AETITES, seu *Aquilinus Lapis*, vel quod colore sit fulvo instar Aquilæ, vel quod in nidis Aquilatum reperitur: eo enim transferti aiunt, seu ut eonidus Aquilatum stabilior reddatur, seu ut partum ovorum promoveat, dictus. Lapis est rotundus, aut ad rotunditatem accedens, colore cinereo, pullo, aut fusco, alium lapidem vel argillam in se continens, unde concussus resonat. Varia ejus sunt genera, *Plinius* quatuor recenset. *Anselmus Boëtius* tria & totidem *Wormius* se vidisse affirmat *Parturientibus* peculiariter dicatum esse docent veteres non refragante Modernorum experientia. Sinistro namque brachio alligatus, foetum in iis retinet, quæ ad abortiendum sunt proclives: tempore partus sinistro femori alligatus, partum accelerat.

XVIII. OSTRACITES (à Græco *ὀστρακίτης*, quod *testam* notat, eo quod ex crustis multis tibi invicem superimpositis continet) nam Lapis est scissilis & crustosus, ferrugineus seu fulvus: qui ablata unâ crustâ seu testâ, aliâs supinde continet ejusdem coloris & substantiæ Pumicis loco quidam utuntur ad cutim glabram reddendam. Ex *Medicis* nonnulli ad mulierum Catamēnia sistenda, mammarumque inflammationes suppressendas, pulverem ejus præscribunt.

XIX. CONCHITES, lapides *Conchas* figura expri-

mentes.

XX. BUCARDITES (quia *cor Bovinum* tum figu-

râ quàm magnitudine æmulatur) quam primus descripsisse videtur *Ferrandus Imperator lib. 24. cap. 26.* reperitur interdum in *Anglia*.

XXI. FUNGITES (quia fungos refert) cujus non unum genus.

XXII. SCALETON SERPENTIS, qui ossa Serpentis in spiras contorti exprimit. Cui valde affinis est *Ophio morphites*, qui similiter anguem in spiras convolutum imitatur. Hujus generis infinitus reperitur numerus in *Anglia*, in oppido quodam, quinto lapide ab urbe *Bristolliæ*, distante & alibi.

XXIII. PECTINITES, qui piceam *Pectinem* repræsentat, eaque de causa ita haud incongrue nominatur.

XXIV. CORNU AMMONIS, quod quatuor constat circumvolutionibus in se revolutis, instar *Vitruviana* volutæ perpetuis striis & articulatis onibus dotatum, colore nigricante, ad gypseum tendente, substantia sicca, quibusdam in locis armatura aurea splendens. De quo plura apud *Anselm. Boëtium lib. 2. De Gemmis cap. 246.*

XXV. CORNU ARIETIS, quia instar cornu arietini in se retortum & involutum est, rugisque transversim ductis exornatum. In *Anglia* haud rarum est, utpote quod in multis agri *Somersetensis* locis, possimum prope *Thermas sulphureas, Aquas Solis* vocatas, lapidicinis effoditur.

XXVI. HYSTEROLITHUS, sive *Lapis uterinus*, eo quod pudendum muliebre figurâ æmuletur, sic dictus.

XXVII. PRIAPUS, qui fascinum virile mentitur, tum figurâ, tum magnitudine.

Hicce subungere potest Lector curiosus alios lapides, quotquot seu naturalium, seu Artificialium formas aliquatenus exprimere viderit. Istiusmodi quippe lapidum, qui omnes nomina sua à rebus, quas figurâ repræsentant, sortiuntur, permagnus imò ferme infinitus numerus. Atque hæc quidem de *Lapidibus ignobilioribus & minoris pretii*, quatenus ad præsens institutum faciant, dicta sunt.

LAPIDUM Pretiosorum Majorum Classis.

LAPIDES PRETIOSI, quos *gemmas* communiter vocant (licet inter lapidem pretiosum & Gemmam discrimen agnoscant accuratiores) commodissime dividuntur in *Majores & Minores*, quos *Gemmas* strictè dicunt.

E MAIORIBUS sunt

I. JASPIs, qui lapis est variorum colorum seu ob variorum succorum, qui ad ejus generationem concurrunt, mixturam, seu ob particularum, quibus constat, figuras & positiones varias, & tantæ nonnunquam magnitudinis, ut ex eo magnæ statuae & columnæ integræ elaborari possint, sed *Acata* mollior, *Species* ejus sunt *Jaspis*.

1. *Orientalis*, quæ subcæruleo, viridique colore obscura sanguineis punctis conspersa est, & cæteris omnibus præfertur.

2. *Viridis*, quæ maxima ex parte virescit, paucis intercurrentibus venulis sanguineis. Hujus varia genera afferuntur ex insulis *Fœœntibus*.

3. *Grummalis*, quæ aliquid purpurei admixtum, interjectâ lineâ albâ, habet, cæterisque omnibus olim præferebatur.

4. *Tæ-*

4. *Terebinthina* *Dioscoridis*, (quod colore sit flavo, instar *Terebinthina* coctæ, sic dicta)

5. *Purpurea*, croceis & cæruleis venulis interpersa.

II. *HELIOTROPUS*, (ex eo nomen esse videtur, quod aqua immittis angere solis fulgorem sanguineo repercussu, extra aquam radios seu fulgorem, quasi avertere, solemque velut in speculo exhibere credatur, docente *Plinio* lib. 27. cap. 10.) Qui non solum dimidia ex parte rubro colore tingitur, sed & in ipsa viriditate maculas ostendit aliquas rubicundas: quæ nota à *Jaspide viridi*, intermiscetur. Huic affinis est lapis ille spurcius quidem, sed elegans quem *Jasponthem*, id est, Onichem viridi colore tinctam, vocant Gemmarum, quæ in *Insulis Fergensis* reperitur.

III. *MALACHITES*, quæ viridis & opaca est, instar foliorum *Malva* (unde nomen traxit) sed pro diversitate & gradibus colorum, varias etiam obtinet species, de quibus videatur *Anselmus Boëtius de Gemmis*. Tantæ magnitudinis quandoque reperitur, ut pocula & manubria gladiatorum ex ea conficiantur. Optimæ in *Bohemia* effodiuntur.

IV. *PRASIUS* *Theophrasto*, lib. 8. *ἄλβαν, πρασινόν* aliis *πρασινός ἄλβος*, dictus (à *Prasino*, seu, *Porraceo* colore) qui maxima ex parte viridis est, sed raro sine punctis atris, & quandoque alba distinctus. Domus est *Smaragdæ*, ut *Jaspis Prasii*, & *Jaspidis Marmor*, unde tanto mollior *Jaspide*, quanto *Smaragdo* durior, observatore *Cardano*, lib. de *Gemmis & coloribus*, sect. 18.

V. *LAPIS NEPHRITICUS* (quia in doloribus *Nephriticis* eximie proficius) *Italici Osiada del fianco* Gallis. un. *siadre*; Qui ut plurimum viridis est, polituræ accuratæ, incapax, & semper quasi pinguedine quadam obductus & oleosus, maculis seu nubeculis quibusdam obscurioribus intermixtus; ubi in laminam tenuiorem redactus est, quodammodo transparent. Coloris gradibus variat, quidam ex viriditate nigrescit, quidam flavedine cum viriditate coniunctam habet. Saepè ex viridi, albo, flavo, nigro, cæruleo quasi mixtus apparet. Ex utraque *India* adfertur nonnullis *Hispania & Bohemia* locis etiam reperiri quidam aiunt. De viribus ejus in *Renum & vesicæ calculis* atque arenulis expellendis, historiis varias & experimenta unde, in peculiari de eo tractatu conscripto à *Clariss. Casparo Bartholino*.

VI. *ACHATES* (à fluvio ejusdem nominis in *Sicilia*, quod primo ibi inventus.) Lapis est variorum colorum, quorum ratione in varias species dispecitur ut etiam figurarum ipsi à natura impressarum. Quando venis suis & maculis cornu refert. *Cerutachates* dicitur, quando arbores & nemora, *Dendrathates*. Ubi venæ albæ per eum disseminatæ sunt, *Leucathatem* vocant, ubi rubicunda, *Hemathatem*; si sardæ modo rubet, *Sardathatem*; si Coralli in moiem, *Corallathatem*. Summâ, coloribus adeo variat ac ludit, ut jucundum præbeat spectaculum, in primis ubi lineis & suis coloribus res alias naturales aut artificiales exhibet. Ex *India* notæ probatissima adfertur, sed & in *Germania & Bohemia* quandoque reperitur, etiam tantæ molis, ut Pocula & scyphi ex eo conficiantur: item in *Anglia*, in *Cornubia*, vñ ex quorundam relatione scribit. *D. Merret*, in *Pinnac. rerum Nat. Britan.* pag. 209.

VII. *ONYX*, (à corneo unguis humani candore, quem exactè refert) *Italici Nicolo*. Quæ duobus ad minimum coloribus, albo scilicet & nigro. Zonis distinctis constat, & magis opaca est, quam diaphana. Pro colorum varietate etiam varias habet species: sed omnes zonas & lineas habent, quibus colores ab invicem determinantur. Olim tantæ magnitudinis

inveniebantur, ut inde columnulas & pocula, quæ *Myrrhina* dicebantur, conficerent. Ad sigilla conficienda aptissimus lapis, non ceram politus non recipit.

VIII. *SARDONIX*, quæ ex *Oniche & Sardæ* componitur, & cui varias imagines imprimere solent sculptores. Quandoque ex zona alba imaginem sculptunt, ita ut nigra zona loco strati sit, tamque à quibusdam *Memphites* appellatur.

IX. *CALCEDONIAS*, alias *Carthedonius* (à *Carthagine*, quæ Græcis *Καρρυδών*, non quasi Carthagine nasceretur, sed quia è Garamantibus Carthaginem, inde ad alios adveheretur olim) Qui lapis est Gemma quasi per nubem spectata, vel nullo, vel levi aliquo colore tincta, semiperspicua, sculpturæ, propter duritiem contamax. Præferuntur reliquis, qui aliquo colore sunt diluti ac oculis grati, ut illi, in quibus purpureus, cæruleus, ac rubicundus albo miscentur, quique soli expositi radiorum refractione Iridem ostendant. Cujusmodi est *Chalcedonius Grandinosus* (nempe ex grandinibus quasi Margaritis constans, guttulis succi lapidescentis ita invicem concretis, ut ova piscium esse solent) cujus mentionem fecisse videtur *Ferrandus Imperatus* lib. 24. *Hist. Nat. cap. 2.* sub nomine *Ingenmamenti grandinosi*, & qui vererum *chalazia* esse videtur. Huc spectat *Calcedonius Islandicus Crystalloides*, quem *Olaus Wormius Mus. pag. 99.* discrete describit.

X. *CORNE LUS* vel potius. *Carneolus* (quod carnis colorem imitetur, sic dictus) aliis *Sardus* (ab insula *Sardinia* unde olim optimus adferebatur.) Primus lapis in *rationali Aaronis*, sanguini subcitrino aut bilioso, vel loturæ carnis colore similis, semiperspicua & obscura quasi nubecula perfectus magnitudine nunc majori, nunc minori. Variæ ejus sunt genera colores si spectes. Reperiuntur in *Sardinia*, *Armenia*, *Persia*, *Germania*, *Insulis Feroensis*.

XI. *AMETHYSTUS* (ab *αἰθρῆ* & *μεθυστικός*, inebrio, vel quod usque ad vini ex pallido rubentis colorem accedens, in violam desinat: vel quod Magorum vanitas resistere eum olim promiserit) Hebraicè *Achlamma*, Chaldaicè *Eneglo* Lapis est coloris violacei, ex rubri & cæulei mixtura orti, fulgore non omnino igneo, sed deficiente seu languido. Differentia tamen aliqua in colore observatur & ubi ad albedinem accedie. *Amethystus albus*, dicitur. Reliquis præferuntur, quibus in purpura refulget roseus color, Reperiuntur in variis locis *India* utriusque, *Arabia*, *Armenia*, *Cypria*, imò in *Germania*, *Bohemia*, *Misæia*, sed molliores & viliores. Præstantes in *Hispania* vidit nobilis ille juvenis *D. Franc. Willoughbzus*, ὁ *μωραεῖτης*, è monte quodam in oppidi *Vict* dicti vicinia sito, copiosè effossos: quemadmodum ipse testatum reliquit in *Itinerar. sui* pag. 469. ubi totum explicuit artificium quo primum è subnigricantis terræ venis eruuntur, & deinde poliuntur.

XII. *CRYSTALLUS* (à *Κρῖος* gelu, & *σείσω*, contraho, quasi quid gelu concretum) Gemma est mollis, transparent, aquam in glaciem congelatam referens, unde haud pauci ex glacie natam volunt: quod tamen veritati minus consonum esse docet Experientia, cum igne non solvatur, nec aquæ in ea partes igne consumantur. Quandoque colores alios assumit, tumque nomina etiam. *Sisaphirinum*, *Pseudosaphirus*, si *Smaragdinum*, *Pseudosmaragdus* appellatur, & solâ duritiæ à veris differt. Crystalli ut plurimum hexagona nascuntur figura, quandoque pentagona, imò globosa & rotunda, sed tum duriores sunt vulgaribus, ac pro *Pseudodamante* habentur. Hujus fortis esse videtur *Crystallus* ille, qui è rupe *S. Vincentii* prope *Bristoliam* effoditur.

XIII. FLUORES (quia ignis calore, ut glaci s à sole, liquefcunt & fluunt, sic ab *Agricola* dicti) Qui variis coloribus insigniuntur, & diversis figuris concrefcunt gemmasque primo aspectu mentiuntur. Ex iis quandoque conficiuntur colores pictoribus utiles, sed Metallurgi, dum metalla excoquuntur, eos adhibent, ut facilius fundantur. Huc referunt nonnulli lapidem illum (non à natura quidem, sed arte elaboratum) qui

XIV. BEZOAR MINERALE dicitur & Italis *Pietra D'avventura* (quod à Chymico quodam Veneto casu inventus sit) cujus substantia quasi vitrea est, coloris luteo rubentis, micis aureis referta, quæ oculos mire perstringunt.

XV. Lapis SERPENTINUS, Lusitanis *Jo piedra della Cobra*, partim naturalis in serpente concretus, quem Lusitani *Cobra de Capelos*, i.e. colubrum pilosum vocant, partim artificialis, ex variis venenosorum animalium, potissimum hujus Colubri pilosi portionibus confectus; qui intoxicatis antidotum præstat, tempestivè adhibitum, remedium ferè toti Indiæ, & Chinæ usitatum. De cujus virtutibus mira prædicat *Athan. Kircher. China illustrata* pag. 80.

LAPIDUM pretiosorum Minorum Classis.

Inter Lapidem MINORES, ob nobilitatem GEMMAS sensu strictiori vocatos, occurrunt.

I. ADAMAS, (ἀδάμας, ab α privativo, & δαμάω sive δάμαζω, domo, eo quod indomabilis, sive in tantum durus, ut omnia metalla confringat, & ipse non confringatur ab ullo: licet quod de tanta ipsius duritie prædicatur veteres, vanum prorsus esse hodie comperitum sit; nam & in scobem redigi, & facillimè malleo confringi posse, quotidiana docet experientia) Hebraicè *Shamar*, Anglicè à *Diamond*, fortè ab Arabico *Diamah*, à *dum*, quod durare sonat) Gemma est durissima sine colore, aquæ instar diaphana applicatam tincturam ad se quasi rapiens, sibi que ita conjungens ut micantes suos radios procul ejaculentur. Si alieno colore, albo, luteo, aut nigro infectus sit, id illi vitio est, ejusque pretium minuit. Licet *Plinius* plura Adamantum genera agnoscat, nobis tamen non nisi unicum innotuit, quod genuinum & verum sit, sed *Pseudoadamantes* varii, qui à solo natali nomine & differentias invenierunt; cujus modi sunt *Bohemii Annabergici*, *Hungarici*, *Anglici*, tum *Bristollicenses* nempe tum *Cornubienses* &c. sed hi omnes molliores sunt, nec splendorem verorum attingunt, ideoque ad Crystallos rectius referendi sunt. Veri in *Bisnager*, Provincia *India Occidentalis*, & in *Deccan*; item ad fletum *Tanaim* in *Malacca* &c. inveniuntur. Mirum est, quod scribit *Rubens*: Dominam *Heverensem* è *Luxemburgorum* familia, duos habuisse hæreditarios *Adamantes*, qui alios crebro producerent, ut eos qui statis temporibus intueretur, congenerem sibi prolem enixos fuisse palam judicaret. Mirabile dictu, constaret si certa fides, & magnum sane argumentum seminarias facultates lapidibus inesse, quibus in terræ gremio propagantur & sibi similes producant.

II. RUBINUS, (à rubro colore) ab *India*, *Tabes* & *Muncha*, à *Persis* & *Arabibus*, *Jacur*. Est gemma diaphana, rutilans, rubensque ad cæruleum parum inclinans. limum respuens. & ad sanguinis, Cocci, Laccæ *Indicæ* colorem propius accedens, quàm *Minii*. Ratione splendoris & rubedinis quatuor ejus constitui solent genera, quæ nomina etiam diversa sunt sortita, viz.

1. *Rubinus verus*, quo ubi magnus est & radiantis

splendoris, CARBUNCULUS, Græcè ἀνθραξ (quia carbonis instar accensi rutilat & micat) & *Pyropus* (quasi ignitus lapis) & *Apyrotus* (quia ab igne non patitur) de quo vide, quæ ab immortalis *Boyleo* nostro in Epistola quadam ad prænobilem virum *D. Robertum Morrey*. Equitem Auratum de *Adamante* quodam in tenebris diuile lucente & de *Carbunculo* conscripta sunt, ad finem lib. sui de Coloribus.

2. *Rubicellus* qui ex *Balassio* & *Spinello* colorem mixtum habet, quasi similis *Granatis Bohemicis*.

3. *Balassius*, qui exiguum & languidam habet rubedinem.

4. *Spinellus*, qui mollior aliquanto vero *Rubino*, rubi undior *Balassio*, sed non adeo splendet ac verus *Rubinus*. Præstantissimi *Rubini* in insula *Zilan* reperiuntur, ubi in rosæ quâdam matrice, quam *Balassium* esse quidam arbitrantur; nascuntur. Reperti nonnunquam *Ovi Gallinacei* magnitudine testantur *Historia*, à *Purhusio nostro lib. Peregrination. l. cap. 4. pag. 10. tradita*.

III. GRANATUS, Gallis *vermeille* quod *Minii* rubedine flagrat, qui inter *Rubinos* etiam à quibusdam recensetur. Est autem Gemma dura & flavedine obscurè rubens, imitat ignis aut *Minii* nativi tincturam suam in igne non remittens. Ratione loci ubi invenitur, in *Orientelem* & *Occidentalem* dividitur. *Orientalis* ex *India*, *Camboja*, *Æthiopia* adfertur. *Occidentales* coloribus differunt; reliquis vero præstantur *Bohemici*, ob tincturæ præstantiam. Repiuntur quoque in *Norvvgia* dodcaliterum; sed impuriore, vena *Tali* plerumque infecti, colore ad nigredinem tendentes, ut eo primum genus *Orientalium* æmulari videantur, natura quandoque polii.

IV. HYACINTHUS (ab Hyacinthino colore) qui ejusdem census est cum superioribus, colore rutilo & ex flavedine rubenti. Cum varios etiam habet coloris sui gradus, eorum respectu varietas ejus constituuntur species. Sunt qui instar *Minii* nativi & sanguinis biliosi rutilent: sunt qui colore croceo flaveant; sunt qui succinum flavum æmulentur, qui viliores sunt; sunt qui album succinum referant, qui vilissimi habentur. Dantur tam *Orientalis*, ex *India* allati, quàm *Occidentales*, ex *Silesia*, *Bohemia*, aliisque *Germania* locis petiti. *Plinii Hyacinthus* hodie inter *Amethyssos* recensetur, ut veterum *Amethyssus* pro *Granato* accipitur, apud nos in *Anglia*, in agro *Eboracensi* quandoque effodiuntur *Hyacinthi*, sed impuri.

V. SAPHIROS, Σάφειρος (appellatio est ab Oriente, nam similiter Hebrais dicitur *Saphir*; uti *Vossio* videtur, à loco, qui fortè fuerit ejusdem nominis) *Plinio Cyanus*, (à colore,) Gemma est cæruleo colore, pellucida, diaphana, dura, omni carens rubedine *Amethyssina*. Quidam albicat, & à *Plinio femina* vocatur; quidam coloris est saturate cærulei, *Mas* eidem *Plinio*: quidam omni prorsus colore destituuntur, & pro *Adamantibus* quandoque substituti, sed longe his & duritie & splendore inferiores. Alias dividi solent in *Orientalis* ex variis *India* regionibus allatos: & *Occidentales*, in confinio *Silesia* & *Bohemia* in torrentibus, & in præto minore *Isera* inventos. Tinctura & color *Saphiri*, ab eo igne auferri potest, ut *Adamantem* mentiatur. Quidam pro *Oleo Saphiri* (quod contra venena commendatur) vendunt quippiam ex floribus *camomilla* cum *sale Ammoniac* destillatum; à quibus cavendum.

VI. SMARAGDUS, Σμάραγδος & μάρμαρος sine σ, quo *Menander* utitur apud *Athen. lib. 3. (nem.*

(nempe ut dicitur *σμαράγδα & μαργάριτα*, luceo, splendo: ab illo est *Smaragdus*, ab hæc *Maragdus*: Nam *Ovidius*.

In folio Phabus claris lucente smaragdus

A nonnullis, *Prasinus* (à colore viridi) ab aliis *Neronixus* & *Domitianus*, Arabibus *Zamarus*. Qui lapillus est grato virore oculorum aciem ita demulcens, ut omnium viridiorum amœnitatem superet; pellucidus, diaphanus, planè viridis. *Plinius* ejus generi duodecim recenset. Hodie in Orientalem & Occidentalem dispescitur: ille præstantissimus, durissimus, viriditate oculos uberrime satians. Hic rursus duplex est; *Europæus*, qui in *Cypro*, *Britannia* (in agro *Eboracensi*) aliisque locis invenitur: & *Peruanus*, qui licet viriditate excellat, tamen ut Orientalis non ita radiat, & nubeculis ut plurimum sædatur. Mira sunt, quæ de *smaragdorum* magnitudine apud Autores leguntur. *Ol. Hormius* se *Genuæ* vidisse scribit integrum catinum ex *smaragdo* qui in diametro pedem circiter habebat, qui æstimari ob amplitudinem nequibat. Partum id fuit antiquitus ex victoria *Syriaca*, & ad publicum Civitatis ornamentum *D. Laurentio* consecratum.

VII. *CHRYSOLITHUS*, χρυσός & λίθος, quasi aureus Lapis, quia aureo color transluet.) Qui Gemma est viridis, colore *smaragdo* dilutior, utpote cui non nihil flavedinis adjunctum est; diaphana, quandoque per viridem aureum fulgentem habens, & tum *Chrysopatus*, à quibusdam indigitatur. Quod si noctu, igne admoto, vehementer splendeat (*Chrysolampis* *Plinii* est. Non adeo durus est, qui limam sentiat. Quandoque, sed rarissime, in tantum excrevit magnitudinem, ut inde statua confici possint. *Arsinoë* namque *Ptolomæi* *Philadelphii* uxori statua quatuor cubitorum ex hoc lapide (qui veterum est *Topasius*, in delubro sacrata fuit.

VIII. *TOPAZIUS* (ab insula quadam in Maritubo quæ & *Paz* dicebatur, *Opaz* & *Tepaz*; ita derivante *Plinio* lib. 6. cap. 29.) *Topasium* Neotericorum, veterum *Chrysolithum* esse, doctè demonstratur tum ab *Anselmo Boëtio*, tum à *D. Joh. de Laet*. Duo ejus genera statuunt, alterum *Orientale*, quod instar auri obryzi, sive purissimi rutilat; alterum *Europæum*, quod *Crystalli* instar molleat, cum auro colore vel parum, vel multum nigricante. Hujus generis quosdam esse scribunt, qui tum parum flavedinis habent, ut nisi nigredine à *Crystallis* distinguere non possint, atque in *Bohemia* passim inveniunt.

IX. *TURCOIS*, *Turcosa*, *Turchina* vel *Turcheſta* (à *Turcis* à quibus ad nos adferri solet) quæ gemma est opaca, ex viridi, albo & cæruleo quasi composita, viride æs colore exacte referens, sunt *Orientales*, in *Persia* nigris lapidibus adnascens, quarum quædam colorem semper servant: aliæ paulatim viridescunt, ac viliores proinde habentur: vel *Occidentales*, quales in *Germania*, *Bohemia*, *Hispania*, insulis *Feroensibus* colliguntur. Lege *Itinerar. D. Mandelst.* Tantæ magnitudinis *Turcheſta* in *Theſauris Magni Ducis Hetruriae* visitur, ut juglandem æquet; cui *Jul. Caesaris* effigies insculpta est.

X. *BUFONIS Lapis* (quia vulgò creditum est, cum ab annolis *Bufonibus* eructari, quod experientia falsum esse norunt sagaciores.) Qui lapillus est, raro unguem digiti superans, coloris ut plurimum grisei, ad rubedinem quandoque inelinans, oculi modò convexus, quandoque oblongus, quandoque totundus, altera parte planus aut parum concavus. Nascitur fungi ad morem in saxis & petris, non verò in capitibus *Bufonum*.

OPALUS, seu *Opalis*, Græcè ὀπάλος (quem *Isidorus* nomen ex patria obtinuisse vult, quia cum sola parturit India, sed de causa nominis quod offert, verisimilius esset, si locus ejus nominis ullus esset in India; olim *Paderos*, quasi puerorum amor (quod amorem conciliare olim à superstitionis crederetur, vel ob eximiam pulchritudinem) Italis *Girasole*, vel scambio. Gemma sanè elegantissima, omnes ferme colores exhibens. Ex radiorum enim luminosorum refractionibus variis cæruleum, purpureum, viridum, florem rubrum, lacteum, ac nigrum interdum, intuentium oculis ingerit. Unde *Plinius*, inest Opalo, inquit, carbunculi tenuior ignis, *Ametysti* purpurâ fulgens, *smaragdi* virens mare, & cuncta pariter incredibili mixtura lucentia. Hinc fit, ut à quibusdam inter omnes gemmas palma ei deferatur; tum quod arte nullâ adulterari possit. Ejus quatuor constituuntur genera.

1. *Primum* Diaphanum est, omnes colores Iridis exhibens, hocque præstantissimum.

2. *Secundum* ex nigredine igneum carbunculi fulgorem emittit.

3. *Tertium* in corpore flavescente varios representat colores, quietos tamen nec fulgore vivos, & nonnunquam lactea etiam quasi languentes.

4. *Ultimum* cum primo æque diaphanum est, sed parum cærulei, aut flavi coloris in se habet, & luci oppositum, si vertatur, in extremo cardine lucere, propter luminis reflexionem, videtur. Hoc omnium ignobilissimum censetur, ideoque *Pseudo-opalus* dicitur.

Præstantissimi *Opali* in *India* inveniuntur, viliores in *Cypro*, *Egypto*, *Hungaria*: Nullibi verò frequentiores quàm in *Insulis Feroensibus*. Nascuntur omnes in lapide molli, venis nigris, flavis, fuscis distincto.

XII. *BERILLUS*, sive, *Beryllus*, βέρυλλος (nomen ab Oriente accepimus, teste *Isidoro* lib. 16. cap. 7. qui *Beryllus* inquit, in India gignitur, gentis suæ linguæ nomen habens.) *Ultimus* in rationali *Aaronis* *Lapillus*, Circa ejus descriptionem variant Autores. Communis tamen opinio huic gemmæ tribuit virorem marinum. Ex *India* venit & *Phœnicia*; ubi *Ophitæ* venis innascitur, ut *Dionysius Poëta* testatur hoc versu culo.

Φύεται ἐν ὀφθαλμῇ Ὀφίτηδος ἐνδοθὶ πέτρης

Nascitur is venas intra fulgentis *Ophitæ*.

Uti vertit *Raphael Volaterranus*, lib. 27. lap. de gemmis.

XIII. *OCULUS MUNDI* nonnullis *Lapis mutabilis* (quod aquæ frigida impositus, colorem mutet, planeque flavus & perspicuus reddatur, sed inde extractus in pristinum statum redeat) quem *Musæi calceolarii Autor* *Cerurus* *Opali* speciem quandam existimat, *Onycham* colore cinereo quodammodo refert, & *Opali* modo quadantenus perspicua est, lucique applicata in candore luteum quid continet. Hujus generis ego unum vidi à nobilissimo Viro, Philosophiæque experimentalis assertore felicissimo. *D. Roberto Boyle* SOCIETATIS REGIÆ ostensum. Qui aquæ frigida & purissimæ immerſus, exiguo temporis spatio, proprio quasi exutus colore, alium induebat, ex albo nimirum flavescentem, & (quod majorem excitabat admirationem) forma lucidum: ex aqua verò extractus, deposito colore illo, quem in aqua contraxerat, proprium denuo exhibuit intuentibus. Cujus experimenti occasione, ex eruditis spectantibus nonnulli ingenia sua ad investigandum, unde tanta, tamque admiranda coloris mutatio in isto lapillo

lapillo contingeret, tertio exercebant, variasque in medium proferebant conjecturas: quarum aliqua forsitan impofterum lucem videbunt. Interim lectione dignissima existimo, quæ non multis retro ab hinc annis super hoc lapide commentatus est *Clariff. Vir D. Joh. de Laet. Lib. 1. de Gemmis & Lapid. cap. 13.* Extat etiam in Societatis Regiæ archivis hujus gemmæ amplior historia, à D. D. *Jonath. Goddard* (quem humanis jam exemptum serio doleo) conscripta.

XIV. OCVLVS CATTI, Italis *Occhio di Gatto*, ab Hispanis *Torna Sole*, ab Indis *Holtzitziltetl*, à Portugalis *Oio di Gatto* (quia illius animalis oculum probè refert.) Cujus variæ species sunt. Præcipuam autem sic describit modo laudatus *Joh. de Laet. Gemma hæc*, inquit, si invertatur, in altera semper parte candidior & lucidior apparet. Conflare enim duobus coloribus videtur, lacteo penè & fusco, in medio veluti divortio quodam separatis, qui utrinque obscurius translucent, ita tamen ut alteruter color magis lumen admittat. Inspicienti hanc Gemmam desuper, dextra pars candida videtur, quomocumque venteris, imò si bene advertas, linea satis lata candida in medio apparet, & utraque latera fusca, ita ut certo certius sit, hanc coloris varietatem à lumine illi accedere. &c. Magnam horum copiam in *Tototepec* Indiæ Occidentalis *Provincia* reperi, eosque exiguos esse, & præ nimia abundantia viles, scribit *Francismines lib. 4. cap. 18.*

XV. OCVLVS BELI (ob eximiam speciem *Belo*, sacratissimo Assyriorum Deo, olim dicatus; unde nomen) exiguus lapillus hemisphericus, in cuius centro pupilla nigricat, quam ambit latus circulus, Margaritæ instar splendens, tunicam oculi corneam referens, tunc sequitur alter circulus, tenuis, alto purpureus quem excipit ejusdem magnitudinis flavus, ex quibus duobus Iris quasi constituitur, reliquum corporis fulvo est colore. Eadem gemina videtur cum *Gesneri Lycophalmo*, quo similiter quatuor constat coloribus, ita positis, ut *Lupi* oculum probè referat.

Ad pedem hujus Classis apponi possunt.

MARGARITÆ, (*μαργαρίτης*, seu, uti *Eustatius* deducit, à *μαίρειν*, *plendere*, seu à *μαργαρον*, quomodo à *Pausania* in *Arca*. & in *Epigramm.* vocatur: *μαργαρε* vero est ab Hebræo fonte, nam *Jes. 17. ver. 6.* est *Gargerim*, quod in translatione sua *Junius & Tremellius* vertere *Baccas*) aliis *Perla*, & cum majores sunt, *uniones* (quod nulli duo indistincti reperiantur.) Quorum nobiliores in sinu *Persico* & in *India* in primis ad *Promontorium Commoria*, & *Insulam Zeilam* reperiuntur, *Orientales* dictæ; *Occidentales* verò quæ ignobiliores sunt, variis in locis *Europa*, etiam in *Anglia*, *Sootia*, *Dania*, *Norvegia*. Apud nos in *Ostreis* maximâ ex parte, ut & in *Mytilis* (sed impuriore) inveniuntur. *Margaritæ* vitia temporis progressu contrahunt, & quasi senescunt, cum flavedinem induunt, sed pristino splendori & candori restituntur, detractâ superiore cuticulâ spiritu vitrioli, verum quia aliquid earum detrahit magnitudini & pretio, alii pulvere *Alabastris*, corallii albi, vitrioli albi & tartari albi eas mundant, & restitunt. Quidam columbis devorandas præbent, quidam oryza & sale fricant. Maculas tollunt *Gemmarii* rore *Maiali*, in foliis *Lactucæ* collecto, si in eo per diem macerentur.

LAPIS BEZOAR (vel à *Persico Pazar*, quod *Hircum* illum notat, cujus ex ventriculo desumitur, vel ab Hebræo & Chaldaico *Beluzaar*, quod *Domini veneni* significat, eo quod præstans sit in domandis venenis) Lapis est mollis, ex variis crustis coagmentatus, in animalis cujusdam, capræ sylvestris speciem habentis, ventriculo genitus, figura va-

ria, oblonga, orbiculari, modo rotundiore & renem referente, colore nunc nigricante, nunc subcinereo, nunc flavescente, ut plurimum verò est pulvis, spadiceus, ex viridi nigricans, in superficie lævis & blandus, in medullio concavus, vel festucam, vel plantæ fibras, vel aliud quid continens. Duo ejus dantur Genera, viz.

1. *Orientalis*, qui ex *India Orientali*, *Persia*, *Ægypto*, *China*, *Cathajo*, & vicinis regionibus adfertur: de quo optime commentati sunt *Carolus Clusius ad lib. 1. Garcia, cap. 44.* & *Joh. Nierenbergius in Hist. Ind.*

2. *Occidentalis*, qui ex *America* & *Peruvia* & minoris pretii habetur.

Veri lapidis Bezoardici notæ hæc statuuntur, si ex *Capicervis Orientalibus*, in montanis pascua habentibus, sit depromptus; unde *Peticius* refertur *Malacensi*: qui ex nigro seu varo colore viridescit, cuiusque pulvis sub itidis est; qui ablata crusta superiore, inferiorem habet æquè splendentem ac polium, qui in medullio concavus aut arenam lapidis substantiæ similem habet qui aquâ aut vinò liquefit, nihil continens arenosum, si calce vivâ, aquâ admittâ, unctus, paulò post flavescat. Quidam chartam Cretâ fricant, deinde supra Cretam lapidem, & si frictionis linea viridis appareat genuinum esse censent. Quidam acu ignitâ lapidem, & si frictionis linea viridis appareat, genuinum esse censent. Quidam acu ignitâ lapidem perforant, si fumum de se spargat, adulterinum credunt. Certius tamen veri indicium non datur, quam si venenum animali exhibeatur, & mox oblato lapidis pulvere incolumis evadat. Mirum est, quòd *Ol. Wormius* se observasse scribit. Oculis meis, inquit, vidi Lapidem Bezoardicum insignem, *Ovi Gallinæ* magnitudine, manibus ab homine maligno gestatum, & leviter saltem tactum, ruptâ exteriori tunica, in frustra desiliisse, magnâ adstantium admiratione. Ipsos Indos hunc lapidem solerter adulterare, docet *Manardus tractat. de Lapide Bezoardico*. In *Brasilia* conficitur artificiosè ex *Resina*, fructu *crumacino*, radice *Drazena*, *contrajerva* *Lusitanus* dicta: sed in superficie flavescit, intus est cinerei coloris. Huic merito substituit *Jac. Bontius* (*lib. Medicin. Indor.*) Lapidem *Porcinum*, sive *Malacensem*. Qui in *Apro* inventus, quantum forma ac colore Bezoartico inferior est, tantum virtutibus & usu eum exsuperat. Quoties enim liquori alicui per horam solummodo immaceratur. Toties eandem vim cum illi communicat: idque cum tam exiguo ponderis decremento, ut vix animadvertas ipsum imminui à frequenti infusione. Liquor autem ipsius licet aliquantulum amaricet: ingratus tamen nequaquam est, daturque facillime potui, delicatis corporibus, ac teneræ puerorum ætatis, convenitque maximopere febri malignæ, morbo comitiali, ac variolis, cum ob sudorem quem elicit, tum quòd malignitati adversetur. Vide *Tulpii Observat. Med. lib. 1. c. 51.*

LAPIS CERVINUS, qui in canthi oculorum *Cervi*, concrevit, ex oculorum sordibus & sudore in cavitate quâdam exigua collectis diuque detentis. Subalbus est superficie, intus cinereus, & perraro pisi minoris magnitudinem superat. Viribus cum Bezoar vero certare aiunt. Et de *Lapidum* Generibus hæc sufficiant, *Charleton.*

DE LAPIDIBUS & GEMMIS adulterinis seu Arte confectis, eorumque parandorum ratione.

Ars Naturæ in omnibus imitatrix, hoc potissimum intendit, ut quantum fieri potest, ejus effectus, si non vera,

Vera & reali efficientia saltem secundum analogiam quandam & quam verissimillime attingat, quod tum in aliis jam in præcedentibus discussis; tum potissimum in artificiosa lapidum, gemmarum, margaritarumque confectioe elucescit. Quam artem ne præteritis videretur, hic paulo fusius describam, cum ad multa, si fraus absit præsertim in cultus Divini promotione ac Ecclesiasticis ornamentis elaborandis utilissima esse possit. Dico itaque primo quomodo ex sola smaltæ materia sapphiri, smaragdi, amethysti, hyacinthi, Carbunculi, topazii & similes pretiosæ gemmæ ad vivum elaborare possint: & ne hoc loco avaritiæ labe depravatis hominibus imposturæ datur occasio, simul addemus modum, qua ratione adulteria gemmarum facili negotio cognosci queant. Verum ne Lectorem diutius suspendamus; *ἐγκαυστικὴν* ordiemur.

Smaltum Idem esse dicimus; quod veteres *ἐγκαυστικὴν* dixerunt & nil aliud est, quam liquati coloratique metalli pigmentum; Unde *ἐγκαυστικὴν* ii vocantur, qui liquatis metallis colores inurant, encaustum eliquatum auro agglutinant sive metallicum pigmentum auro inurant; aut liquanti coloratoque metallo aurum inducunt; Cujus ope adeo venusta & elegantia sunt opera, ut iis nil sive raritatem, sive splendoris dignitatem spectes, comparare posse videatur. Quomodo autem ac quo ingenio fiant ex Blasio Vigenerio & Bulengero, qui ea ex lingua gallica in latinam vertit, paucis exponam.

Quomodo gemma ex smalto seu encausto confici possint.

Encausticum igitur opus fit è vitro & metallis, quæ inter se naturæ sponte mirifice consentiunt. Vitrum quod ad encausticum opus adhibetur, non è silice aut fago, aut tribulo paludum fieri debet, sed è petra seu lapide, ut vitrum illustre, splendidum & crystallinum fiat, unde encaustum efficiatur metallis inutendum. Cinetes è silice aut tribulo, è quibus fit vitrum, dissolvunt in aqua calida, & segmentis panni candidi adhibitis, aquam puram & claram in vas suppositum transmittunt; quidquid sordium est, in cineribus subsidit in priore vase, nec per pannum transmittitur; sed aqua tantum clarissima & limpidissima, quæ modo dico igne in salem candidum concrevit, quum humidum aqueum exhalavit, qui arena aut lapidi, seu saxo purgato admixtus, & minio pertusus, in fornacem vitri mittitur; minium illud aut minérale est seu metallicum aut factitium è plumbo tisto. Calx illa rubra plumbi fit in igne vehementi & clauso, ne in acre exhalet, *σπινθηρὸν*, aut ignis reverberatus, & in clauso vagus & extans vocari potest. Vitri artifices vas quoddam è terra pingui candida, cum ossibus arietum tritis, & aliis medicamentis capacissimum & amplissimum fingunt, quod nullo igne quamlibet violento corrumpi aut dissolvi possit. Vas illud in fornacem mittunt, & in medio collocant, cineribus vitro faciundo aptis plenum, qui vi ignis liquefunt, mox terreas linguas in vas illud ardens immittunt quibus materia illa & pinguis & liquida adhærescit, & quia vitrea sunt: sal igitur ille Alkali minio perfusus in capedine terrea sex totos dies flammis ardenti perseverat: primo & altero die materia illa miniata flavescit, tertio & quarto vitrescit, duobus aliis albescit, & aeris colorem induit, & crystallina efficitur, è qua sunt adulterina gemmæ; & encaustum seu smaltum. Crystallina illa materia ut cogatur & concrevat, calcem metallicam è plumbo & stanno Cornubiensi purissimo in fornace reverberante ante constaram adhiberi necesse est, ut stanno, encausto, seu smalto adferat soliditatem, & corpus ne sit pellucidum; sine plumbo nullum metallum in vitrum transire potest cum igitur materiam illam crystallinam & calcem plumbi ac stanni, utram-

que tenuissimo pulveri similem inter se miscueris & quasi patulum panem aut suba tam massam ex iis effeceris, foramen in medio fodies, ut exhalet inutilis humor, & per se sensim exsiccati patieris, tum massam illam exsiccatam in fornacem vitriariam mittes coasque, dum liquari incipiat; mox è fornace extrahes & refrigerare materiam lines; tandem in vase terreo, quod igni non solvatur, non liquecere subiecto igne fines, spumam pinguem supernatantem cochlearibus ferreis extrahes; donec 24. horis materia fervens purgatissima & limpidissima fiat, hoc tibi erit smaltum album, quod quocunque colore imbuti poterit. Si smaltum illud cum crystallo in pulverem contriveris, & in fornace vitriaria liquefeceris, & metallicam cautem, seu petram subterraneam metallicam adjeceris; exister nigrum splendidum; si addideris argentum nitum cum sulphure, caeruleum turquinum effeceris; si æs in laminas tenues secueris, & per quinque dies uiseris, & in smaltum illud injeceris efficies virens, æs terustum tingitur smaragdino pellucido. Cassium glaucum, violaceum, cinereum, sunt è smalto illo, cui metallicam petram vario modo temperatam admiscueris. Si nitrum seu salem petreæ indideris, colorem margaritarum expelleris smaltum rubrum. Clarum principatum inter alia obinet; flavum bracteolatum argento addito effeceris luteum paleatum, item luteum aureum, luteum mali punici; sed luteum citrinum fit è ferrugine anchoratum, quas vis maris arrosit, aut ex croco ferti quem ex aceto stillaveris. Smaltum è firmius, lætius & integrus est, quo diutius ignes patitur. Rubrum effeceris si æs in calcem reductum vi ignis vitro seu smalto candido injeceris, una cum ramentis ferri & auripigmento. Si plus vitri injeceris, roseum splendidiorem effeceris, est murex dilutus, vel ostrum dilutius. Si plus plumbi indideris, cave stannum admisceas, minoris enim erit splendoris. Rubrum clarum efficies, si plumbum & argentum vivum auro indueris, item spiritum æris, & sulphur æris incombustibile.

Æris illius tinctura usque adeo saturata est, & eminens, ut colorem auri nativum augeat & exaggeret; Sed color ille exaggeratus igne vehementi delectur. Exaggeratio illa coloris in auro fit per spiritum volatilem æris, quod cum auro sensim in capeduncula terrea excoquitur caliculus metalli fusor: ut igitur colorem auri exaggeres; aliquid argenti vivi cum auro & spiritu æris miscebis; quia vivum argentum prohibet ne tinctura & colores exurantur, & ignis vim motatur id temporis, quod tinctura & color in aurum intime subit. Aurum ita tinctum quasi folium pyropis subicitur: aurum enim quod fulvo tingitur; corpore æris adhibito, semper nigrescens, lividum & marcidum est; quia substantia æris, quæ per se nigricat, nigris maculis liberari non potest, sive radas, sive coquas, sive gummi & sandaraca laves: at aurum quod tingitur spiritu æris est veterum Aurichalcum & electrum, unde pocula sunt quæ venentim; si quod injectum fuerit, indicant & produnt; hoc item aurum spiritu æris exaggeratum, vi solius plumbi, non alterius metalli in vitrum convertitur, unde fit smaltum seu encaustum rubrum clarum: imo aurum vi plumbi fit volatile, aut in oleum mutatur, quod vitrum aureum vocatur: quod S. Joannes in Apocalypsi pavementum celestis Hierusalem, quasi tessellis vitreis stratum esse testatur. S. Hieronymus aurum illud vitreum vult esse electrum Ezechielis hæbreis dictum: non ita pridem argentum aspectum & sincerum cum ære & plumbo excoquebant & concorporabant ut rubrum clarum existeret; quam Nelluram vulgo vocant, quum in grana argentum liquefactum & in aquam injectum eoncideret. Smaltum auro, argento, æri, non aliis metallis inducitur & inurit. Item vitro & testis fictilibus; imo nuper reperta ars inurendi smalto marmora & durissimos lapides, ita ut igne non violentur; ut metalla & ex metallis

Colores

colores inuras, smaltum in minutissimum pulverem in mortario ferreo durissimo tere pittillo ferreo cum modica aqua: melius enim cum mortario succederet, quam si in porphyretico lapide tereres; colores qui ex metallis inuruntur, hi sunt, niger, violaceus, viridis, ferrugineus seu castaneus, cinereus, cæruleus seu glaucus, ruber clarus, luteus ex auro, qui omnes colores pellucidi sunt & splendidi, cum albus & cælius Turquinus sunt opaci. Cum triveris tres metallicos colores in mortario cum modica aqua, effunde quidquid est aquæ, & pulverem illum tenuissimum in patella vitrea reposito, cui tantum affunde aquæ fortis, quam è nitro & vitriolo subjecto igne stillatitiam efficiunt, ut pulveribus innatet eosque tegat, & toties pulveres illos aqua fortis imbutos aqua fontis limpida lavato, donec ea nihil sordium trahat, sed nitida & clara exeat. Aqua fortis pingue metallicum purgat; aqua fontis limpida, quid teræ admixtum erit, abluat & tollit, smaltum tritum in aqua limpida facile integrum serventur, extra aquam sordes concipit. Pulveres isti regulâ æreâ colliguntur & operi hamiltonis formæ magna cura & diligentia inducuntur, ut alij ab alijs sequeantur, ne forte pulverum aut colorum contusio aut perturbatio fiat. Cum probe collocari fuerint, chartam vulgarem aqua madefacta & inter manus aquam ex primito, ut charta sit loco spongiæ, quæ humido exusto smaltum exsiccat, quod siccum latius & hilarius est, quam madidum. Illa pulverum collocatio dicitur vulgo primapellis; deinde smaltum laminæ terreae impositum paulatim in fornacem intruditur, ubi exardescit, donec liquefcere & moveri incipiat tum enim è fornace debet educi, ut refrigescat; mox adduntur secunda & tertia pulverum collocatio, & opus fornaci & igni vehementi permittitur, donec smaltum planè coloribus inustum sit; tum è fornace opus eductum expolitur lapideo idoneo, & absolvitur semio lapide. Ut encausto eminentia cujusvis figuræ, vel opus tumens, aut in umbonem plus minus elatum inuretur, acinos pyri aqua limpida madidos sumes illisque smaltum irrigabis, quod viscosum factum, & quasi glutine illitum, facile operi adhaerebit; aliter non adhæresceret umboni, & extantius signis, aut prominenti figuræ; cum tamen nullo negotio smaltum fundo vasorum & operum humilioris formæ adhærescat. Rubrum clarum non adhærescit nisi auro. Rubrum opacum in argento, & ære probe collocari potest. cætera encausta seu smalta auro, argento & æri inhærere possunt. Tunc dicuntur auro adglutinari, metallicum pigmentum auro inuti, liquenti coloratoque metallo aurum pingi, describi, distinguere; encaustum auro illini, obducere; ubi incausto metallum inustum est, opus est absolutum. In pluribus encaustis seu smaltis admiscetur vitriolum, minium vel humus plumbeæ venæ. Crocus martis seu ferri nitrum, nativa, vel factitia ærugo rasilis, magnesia & rupes metallica, quæ sub agris arentibus & macilentis nasci solet.

Ex hisce patet, generalem massam fieri ex crystallo præparato & per salem tartari ad summum purificato, cui adjicitur sal Alkali fixum; arque hujusmodi massæ contusæ miscentur colores, qui quo puriores sunt, eo vitum sit excellentius & consequenter, quo præparatio est subtilior & coctio ingeniosior, eo lapis sit præstantior. Verbo gemmificii cardo in hoc vertitur, ut facias ex metallis mineralibusque convenientibus smaltum seu vitreos colores illosque illiques materiæ, quæ constat ex una parte crystallo præparati & duabus salis fixi.

Sapphiri Confectionem si desideras, tum accipe salis Alkali bestem, crystallo præparati trientem, Zapharæ semidrachmam commisce; & artificiosè per triduum in fornace vitriaria concoque. Si quæras quid proprie Zaphara sit, dico esse Lazurium illud ex magnesia saturnina, quod bismuthum quoque vocant, & hoc vi-

tream massam cæruleo tingit colore, quo & figuli ut plurimum uti solent: hic enim in porphyretico lapide lavigatus illitusque sicilibus, cruda tingit sub nigro colore qui vi ignium tamen mox in cæruleum abit.

Smaragdus sic fit, Trita crystallo ad duplum minii in fornace vitriaria eliquati; massa siquidem ex eo emergens adeo nativo smaragdo est similis, ut etiam petitos fallat, nisi quod Soli expositus, plumbeus appareat: recipit interdum æruginem, sed in igne ob æris participationem flammam edit.

Alio modo smaragdus fieri potest: si capies minii trientem crystallo præparati unciam, æruginis duas drachmas, misce & colloqua; est enim mira & abdita vis æris ad smaragdum qua facile coeunt.

Topazius fit, colliquatis cerussæ quadrante, & semuncia crystallo in fornace ventosa, quam Anemiam vocant, intra casum argilla munitum clausumque; per cerussam hic aliud non intelligitur, nisi calx plumbi, quam & alii album Hispanum vocant; quidam hunc quoque componunt ex calce æris, minio nativo & crystallo adjecta calcè Jovis quadrupla; quamvis ex his ego non tam Topasium, quam chrysolithum constari existimem.

Hyacinthus cærulei coloris fit ex præparato crystallo, & cerussæ binis uncis, addita vitrioli. Joannes Baptista Porta in hyacintho conficiendo sic procedit: Capit salis communis 5. partes, halonitri 1. misce & projici t in plumbum liquefactum, agitatque cum spatula ferrea & fiet cinis, quem ablutum putè eliquat in gemmam. Si vero hunc ex cæruleo rubrum efficere velis, cape silicis albi partes 4. cineris plumbi, sive cerussæ 2. Nitri 4. Squammarum ferri duas drachmas; in fornace concoque, & habebis hyacinthum rubrum.

Rubinum præstantissimum Isaacus Hollandus libro de mineralibus, unà cum Paracello efficere se posse putat tincturâ rubeâ lapidis Philosophorum; sed uti lapis iste Philosophorum à nemine hucusque visus fuit, ita quoque de rubino omnibus rubinis & carbunculis Orientalibus præstantiori conficiendo, nulla fides præstari debet: sed de hoc in sequentibus futurus. Unde vero ex metallicis calcibus tanta colorum diversitas mirum cuiquam videri posset. Verum quæ ea, quæ in octavo & in nono libro tradidimus, rectè perceperit, originem colorum non potest non videre; Sal metallorum, omnium horum effector est: est enim color cæruleus nil aliud quam sal argenti, ex quo descendunt lapides prædichi; ex cerussa stanni & minio plumbi arte simul & natura juxta differentes coloris gradus cooperantibus idem existunt. Ex spiritu æris fit sal, ac deinde oleum, quod auro junctum constituit elixir ad smaragdum. Ex croco martis fit mercurius, seu aqua ad gemmas potissimum, & adamantes formandos peridonea.

Nullum panè minerale aut metallum est, quod in crystallo cogi non possit; & ratio in promptu est, quum substantia solida mineralium metallorumque, nil aliud sit, quam salina vis naturæ, quæ uti omnibus, uti in sexto libro ostendimus, vim condensativam confert, ita quoque ad consistendum firmitudinem præstat, ea maxime in crystallo cæterisque diaphanis gemmis qui puri puri differentium salium effectus sunt, elucescit; & experientia convincit in arte spagyrica.

1. Aurum in crystallos cogi potest per sublimationem vehementemque ignis expressionem: hoc pacto: aurum aquâ regiâ solutum distilletur iterum iterumque, donec plane solutum sit; deinde abstracta aquâ usque ad oleositatem reponitur in cella, quod ibi tandem in crystallos rubentes abit, in aurum tamen ut alibi docuimus, reducibiles.

2. Argentum, in crystallos cogitur, si solveris id aqua forti;

forti, solutio clara à facibus depurgata distillatur ad mediam partem, ex quibus in cella consistunt lapilli, qui elaborantur deinde, ut fiat medicina vel contra epilepsiam, vel ad gemmam conficiendam.

3. Ex ære crystalli colligunt, solvendo æs aqua forti, æsustum sumitur ad instar sanguinis rubicundum, solutio fiat ad digerendum per mentem in vitro forti, donec crystalli virides consistant ex quibus & tinctura fit veneris & oleum inde extrahitur: nos vero in nostro pharmacopœio nullo paræ negotio nitrum & vitriolum, quod æs liquidum dicimus, in crystallos ducimus, vel per stillatitiam aquam, vel spiritum vini solvendo, & per colatorium transigendo; hoc enim soli in catino fictili expositum, in pulchros crystalli exagonos efflorescit.

4. Ferrum crystallizat oleo rubro chalcanthi cum duplo aquæ fontanæ; in hac mixtura solvitur eliquati ferri scobs; solutio per filtrum purgata coquitur in vitro ad tertiam partem remanentem; quæ deinde frigido reposita loco lapillos reparat, qui tandem aqua stillatitiâ purgantur, filtranturque donec tandem coagulati nitidissimam crystalli indolem assument.

5. Stannum crystallizat, si adjecto sulphure comburantur in cinerem, sive calcem; vel etiam per acetum stillatitium ejus cerussa extrahatur; extracta solvitur aqua pluviali prius distillata; solutio filtrata coagulatur in lentissima balnei evaporatione, repetendumque est hoc opus septies; donec ultimò emergant lapilli crystallini puri & limpidi; & lapilli Jovis dicuntur.

6. Plantum in crystallos cogitur eodem modo, quo stannum ex cerussa videlicet, vel minio quod in aqua dulci prius solvatur, solutum filtratur coaguleturque; & hoc toties repetes, donec crystallinos efflorescentes purissimos comperies hoc pacto mercurium, sulphur cæteraque mineralia in crystallos coeunt spagyrici. Verum quia de ijs alibi quoque dictum est, ijs hic immorari nolumus.

Ad Artificia vitrea & smaltæ, seu mavis encaustica reduci possunt illæ mensæ, quæ hodie spectantur Romæ, uti novæ, ita rara inventionem admiranda, quæ sanè tanta elegantia & nitore fulgent, ut qui artificium ignorat, eas ex nitidissimis marmoribus, jaspidibus, alabastris cæterisque magni pretij lapidibus confectas putet. Artificium sanè elegantissimum paucis describam. Certum Talcæ genus, quam scajolam vocant, ex Sicilia ubi frequens ejus proventus est, non sine sumptibus asportari curant; quamvis & in Hetruria inter Montem Politianum & Pientiam ejus haud obscura indicia observavi. Hinc scajolam in minutissimum pulverem resolvunt, & ex ea pastam, ut vocant, conficiunt; deinde mensam vel tabulam sub quacumque figura ex rudi marmore conficiunt, quam & excavant nonnihil, & fundamenti loco totam pastæ massam gypso marmoreo mistam inducunt nigro seu fuligineo colore oleo lini subactam indunt, atque adeò deplanant poliuntque, ut speculum, aut lydium lapidem exprimat; hoc peracto omni genere colorum massas pastæ separatas imbuunt: deinde quicquid voluerint, supra deplanatam jam tabulæ superficiem, delineant, historias scilicet volucrum animantiumque figuras & imagines foliaturis variis mirè inter se perplexis designant; delineatione rerum paracta juxta varias imaginum umbras subtili graphio excavant, & pro colorum exigentia pastam injectam deplanant, pumicibus expolunt in splendidissimam, atque ad instar speculi lucentem tabulam seu mensam, quam & pro operis splendore & apparente dignitate vili pretio, puta 10. 15. 20. scutis vendunt quæ si ex marmoris variegata intentione facta fuisset, vix 100. 200. vel 300. scutis persolvere.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

tur: ut proinde sola res caras faciat hominū æstimator;

Dum Florentiæ anno 1661 morarer Serenissimus Joannes Carolus S. R. E. Cardinalis Medices in cubiculum pro suo in me me qstudi. affectu introdot, qui dum mihi pulcherrimas nitidissimasque picturas, quibus totum conclave exornabatur, demonstrasset, rogavit, quasnam putarem hujusmodi picturas esse, eique responderem; à nobilissimo haud dubiè pictore factis esse; ille subdidit, falleris mi pater, has picturas penicillum non tetigit; quod cum mirarer, totam picturæ & in ea procedendi rationem exposuit. Et quæ e, uldem prorsus rationis, quam in mensis conficiendis elaborandisque adhibere solent: suntque hujusmodi imagines & picturæ perennes; & si quandoque pulveribus aut humiditate obscurentur, sola simplicis aquæ lotionem ad pristinum splendorem reducuntur. Huc quoque revocari possunt opera musiva, seu musica, cujus modi imagines cupularum S. Petri effectæ sunt; neque distinguuntur à precedenti, nisi quod musivum opus varijs imburum coloribus, & deinde in tesselas sectum in fornace prius coquatur in perenne picturæ opus.

De Gemmarum Adulteris

Seu

De fucata Lapidum gemmarumque Compositione, partim proprio experimento, partim peritissimorum scriptorum auctoritate & amicorū communicatione comprobata.

Priori capite modos nonnullos recensui, quibus gemmas quis imitari possit, hoc capite obiter, quo pacto id ex mente Boëthii fiat, ut facilius falsæ à veris distingui possint ostendendum superest. Majores quam sint, vixite offerunt gemmæ, dum multis superficiebus inferior pars, id est, ea quæ citæ includitur, calatur. Multiplici enim superficierum reflexione, magnitudinis species quædam spectanti promittitur: dum etiam inter inferiorem superficiem, & suppositam bracteam aer intermedius est corpore vacuus, gemmæ majores, quam sint apparent, qui aer corporis vices subit, ac tanto crassiores gemmas, quam ipse est videri facit. Si loco aeris vitrum suppositum sit, aut crystallus, & absque glutino vel colore intermedio; multo major gemma, quam est, videtur. Si color additur in conjunctione cum mastiches lachryma, aut vitrum coloratum sit colore gemmæ; non solum major sed coloratum apparet, atque hic modus frequens & usitatus est. Coloratiores etiam gemmæ redduntur, dum illorum inferior superficies colore perspicuo illinitur, ac deinde bractea splendens supponitur, fit autem color perspicuus, adjiciendo mastichen igne depuratam: depuratur, si granum mastiches culpidi ferro adhærens igni adhibeatur, ut fluere incipiat, & excrementa opaca digitorum pressu à parte perspicua secludantur & abjiciantur, colores qui adduntur variis sunt, & tales quos gemma desiderat, in singulis capitibus veros colores qui singulis gemmis competant, docebo, nam hic tantum in genere fuci gemmarum ostenduntur, dixi nobilissimum fucum esse cum crystallus aut pseudo adamas, aliave gemma colore vacans & diaphana in aqua aliqua colorata maceratur, vel in igne, aliave modo ita tingitur, ut corpus gemmæ intrinsecus colorem perspicuum suscipiat, aqua gemmas penetrans ex terebinthina & aqua vitæ conficitur, huicq; color additur ex metallis extractus, ac in aqua urinæ stillatitia dissolutus ac per alembicum elicitus, in hanc aquam tepidam crystallus tepidus immittitur & maceratur aliquot horis, donec tincturam in se recipiat, recipit autem facile quia mollior redditur lapis: ad rubeum colorem inducendum croco martis, ad viridem æruginem, ad cœruleum lunâ, sale ammoniaco & aqua forti, ad cyaneum æruginem, & lapide lazuli opus est. Cæterum quia ut dixi mollescunt gemmæ, possunt pristinae duritie restitui hac ratione: cystis fit expasta siliginea, huic

huic intruditur crocus martis : deinde gemma vitæ, aut plures chartæ includuntur, ac croco imponuntur, ita ut croco charta undique tecta sit, postmodum occluditur pasta, ac fornaci cum panibus committitur, ac post panem exemptum remanens adhuc per horas sex in furno, recuperant gemmæ pristinam aut maiorem duritiem, quam prius habuerant; In igne tinguntur crystalli integri (Baptista à Porta autore) hoc modo: Sumantur stibij partes senæ, auripigmenti quaternæ, arsenici crystallini ternæ, sulphuris partes & turtiæ binæ, omnia seorsim teruntur, & tenui cribello discernuntur, ac ollæ induntur : crystalli frustula vel æneis pilis suspensa, vel pulveribus demersa igni opponuntur; ut quaternis vel quinis horis excandescant, sed sine follium flatu, ne in partes dissiliant vel liquecant; argumentum legitimi coloris est, si exemptum frustum flagrantissimi & fulgentissimi sit coloris, sin minus, igni denuo tradendum, ac post aliquam horam eodem modo tollendum, diligens autem cura adhibenda, ne dum ex igne tolluntur, refrigerentur extemplo: nam friantur & in plures partes dissiliunt si Hyacinthi Color placuerit, cito ab igne tolluntur, si satura purpura desideratur, diutius in igne relinquuntur: hætenus Porta, Gemmæ coloratæ ut sapphirus, Topazius, amethystus & granatus, si illorum color aufertur, Adamantem effingunt. Solet in eum scopum præcipue sapphirus eligi, qui vel ferri scobe vel cretæ obitus, ignitur, donec artificem voti compotem faciat, ut suo loco docebo. Ignis beneficio etiam & Porta docente, altera tantum gemmæ pars colore suo privari potest, ita ut gemma ex parte Adamas & ex parte sapphirus videatur : eodem modo rubinus una parte Adamantis speciem reddit; ait ille, partem quam proprium colorem servare volumus, creta oblinendam esse, sic alteram quæ igni exposita est, ac flammæ radios nuda suscipit, colorem admittere, ac adamantem ostendere. Gemmæ factitiæ veris satis similes ex crystallo, Topazio, silicibus aliisque mollibus gemmis, vel ex nobiliori vitro, metallicisve corporibus, aut ex illorum commixtione fiunt. Alexius Pedemontanus sequentem pastam ad factitias gemmas describit : recipit plumbi à figulis calcinati uncias tres, ac tantum aquæ suprafundit, ut uno aut duobus digitis emineat, eamque agit digitis, ut plumbum ima petat, postmodum effundit aquam, & servat ad vas vitrandum; ne materia vasi adhæreat : deinde recipit tres uncias minij ficii, immiscet plumbo, adjicit unam unciam crystalli, aut chalcedonij calcinati, ac scrupulos duos aut tres ad summum lamellarum tenuissimarum cupri, his bene mixtis & contusis imponit ea ollæ argillacæ bene plumbatæ & humectatæ aquâ dictâ, ac eam bene obferatam committit furno vitriario, aut ventis per diem, & ita habetur optima pasta.

Ad Smaragdus effingendos accidit sal Alkali, quod dissolvit aqua, filtrat & exsiccari finit, idque opus tertio repetit; postea in pollinem redigit, quemadmodum etiam crystallum : deinde accipit etiam uncias duas & semis crystalli; salis alcali uncias duas, æruginis aceto macerati & colati unciam unam miscet, ac vasculo plumbato imponit, ac luto ne quid expiret, optime munit, ac per triduum exsiccari finit, aut diutius tandemque per diem figuli furno committit, si rubinum cupit, cinnabarim loco æruginis, si sapphirum lapidem lazuli; si hyacinthum, corallium adjicit, calcinat autem Alexius crystallum : vel chalcedonium hoc modo : tartari calcinati uncia una in aqua clara dissolvitur & colatur. Crystallus vero & chalcedonius ignitur in cochleari ferreo, ac in aqua prædicta extringuitur, idque opus septies repetitur, hoc pacto optime calcinatus in pulverem teritur, ac mixturæ seu pastæ adjicitur; si smaragdus optatur, in mor-

tatio æneo, si rubinus, in ferreo tundendus est. Sed quia gemmæ factitiæ molliores crystallo propter additiones alterius materiæ redduntur, docet Alexius aquam, cujus beneficio indurescunt. Juber itaque capere magnetis frustula ac calcinare, ut de crystallo dictum est, ac deinde in pulverem teri, in loco humido poni, ut in aquam solvantur : aquam istam nutrirî vult vitriolo Romano, vel Pannonico crudæ pulvis instar; deinde ex ea præcipit per retortam extillari aquam, ut ea humectetur farina hordei, & fiat pasta dura, in quam imponantur formati lapides; nam si ea dum penis coquitur, in furno relinquatur, ac cum pane eximatur, ait ille duritiem maximam gemmas acquirere. Vidi apud Galium quendam factitias gemmas perquam elegantes & naturalibus quam simillimas, is se non alio quam prædicto modo eas confecisse mihi asserbat, opus dictum neque sumptuosum, neque magni laboris videtur, à me tamen hætenus nondum expertum est.

Pasta ad gemmas factitias nobilior est, Porta teste, quæ ex crystallis, silicibus aut Topazio Bohemico fit; nam si vitrum additur, aut plumbum, graviores & molliores fiunt. Calcinantur autem silices & Topazius ut crystallus : deinde color qui desideratur, additur : minimum & viride æris smaragdi colorem præbent. Cærulea & crocus martis hyacinthi : minimum & cerussa chrysolithi; saphara vel lapis lazuli, item sal armoniacum & argentum sapphiri colorem exhibent : aurum rubini colorem à nonnullis crystallo tribuere asseritur. Stannum Adamantis aquas ostendere dicitur : harum rerum curiosi ex varijs metallorum mixtionibus varios calores in opere ipso deprehendunt, pasta ad gemmas ignobilior est, si vitrum addatur crystallis vel silicibus. Joannes Baptista Porta in sua Mag. Nat. varios modos, quo pacto factitiæ gemmæ concinnari possint, docet, ad quem lectorem remitto. Quæ hic à me desiderari videntur, singulis gemmarum Capitibus tractantur, ubi & gemmarum fuci aut imitationes ostenduntur, hic nihil aliud restare videtur, quam ut si quis fingere gemmas velit, doceatur pastam igne æquali regere; ne inæquales bullæ, vel atomi fucum prodant; deinde pastæ materiam exactè mundare, & à sordibus eluere post calcinationem, ne vitia fucata gemmæ habeant, oportet, quæ sane diligens artifex absque alia admonitione si sedulus fuerit, facile servabit.

Nota de Bracteis seu foliolis, quæ gemmis ad splendoris augmentum supponuntur, ex Boethi L. de Lapidibus.

Spectat hæc praxis solummodo gemmas diaphanas, quæ quidem lucere non possunt, nisi sub se quidpiam quod lucem repercutiat, speculi adinstar habeant : ad hunc finem bractæ seu foliola metallica inventa sunt, quæ non solum id præstant, sed & gemmarum colorem mirifice promouunt; varijs autem coloribus ad libitum tinguntur, ut hoc modo gemmæ prius veluti mortuæ & diluti coloris vivaciore & coloratiores videantur, bractæ ex ære solo, vel ære, auro & argento ad tenuissimam chartæ similitudinem malleo cuduntur, deinde poliuntur creta tenuissima vel argilla Tripolitana, & smiride lapide lævigantur tam diu, donec lapidis vestigia in bracteis non amplius appareant, bracteis præparatis furnus constructur duplex, superius & inferius; in utriusque parte suprema foramen est; in inferiori furno carbonēs accensi, & ab omni prius fœtida exhalatione ex-

At induntur, bractæ vero superiori orificio supraponuntur, aut filis in eo suspenduntur, ut fumum suscipiant, qui hyacinthi colore eas abique alia additione tingit. Si alij colores desiderantur, plumis avium id efficitur: nam viridis viridi, cœruleus cœruleo, ruber rubro, & flavus flavo colore bracteam si furno exurantur, tingent. Sapphiri color plumis anseri cœruleis: smaragdi color buxi folijs, floccisque panni coccinei habetur.

In Bohemia ubi magna Topasiorum, pseudamantium, beryllorumque, coloris tamen expertium copia reperitur, sola supposita bractea aurea vel argentea in diversarum gemmarum apparentiam transmutat: si enim auream, vel auro imbutam bracteam lacca, id est, colore rubro ex auro translucente, Topazio prius in polyedram figuram adaptato subdidetis, pulcherrimi coloris rubinum ille tibi exhibebit si colore viridi argenteam ita imbueris, ut ex argenteo fundo transluceat, ille tibi amœnissimi coloris smaragdum exhibebit; ita sapphirum bractea illa subdita ex cœruleo translucentem exhibebit; hoc pacto pro bractæ coloratæ conditione Amethystos, hyacinthos, chrysolithos, aliasque gemmas pulcherrimas, vel in una crystallo aut beryllo nitidissimo exprimunt: in rotundis huiusmodi crystallis res non eundem successum habent, facile enim fucus apparet, manifestante se oculis bractea colorata, sed in multilateris tantum, quia colores variè circa angulos reflexi bracteola varia sua inumbratione tegunt; sed jam ad aliam fucatas gemmas conficiendi methodum describendam procedamus.

Propositio I.

Rubini Confectio.

Adulterari vel fucati solet Rubinus tribus modis: primo dum ipse si abique aliqua vel pauca rubedine sit, uti paulo ante diximus, rubra bractea, aut color aut vitrum aliquod rubro colore tinctum, & splendens subternitur qui modus nonnullis ideo carere fraude putatur, quod vera gemma scilicet colore non proprio adjuta appareat; verumtamen fraus est, precium gemmæ alieno colore augere. Ob hanc imposturam famæ jacturam fecit gemmarius quidam, dum Rudolphum Imperatorem decipere conaretur. Secundo dum alia gemma nobilis candicans; ut saphyrus albus, crystallus, Topazius aut pseudo-adamas in illius locum substituitur, atque propter colorem bracteam, aliudve corpus diaphanum substratum ita rubet & radiat, ut à vero rubino nihil differat. Terrio dum vitri partes duæ mastiche ita glutinantur, ut mastiche colore cocci tincta per utrumque vitri corpus ita pelluceat, ut verus Rubinus videatur; horum modorum secundus & tertius usitissimi sunt, Verum non adeò difficulter deprehenduntur. Primo modo fucati dignoscantur, quia non exactè scintillant, limam non perferunt, at colore pulchriores veris videntur: horum fraudem solent aliqui ad unguem noscere: nam si colore rubro caruerit, ac gemmæ planicies ungui superponatur, visusque ad superficiem gemmæ & unguis dirigatur, candor abique colore apparebit, verumtamen gemmarum inferiores gemmæ superficies varijs angulis ita artificiose scalpere norunt, ut multiplici superficie in omnem partem reflexu, fraus innotescere perito artifice non semper possit, propter has fraudes Rubini hoc sæculo non ranti, quam olim sunt.


Nonnulli rubinum ementiuntur auripigmento quod excoquant in vase non exactè obturato lento igne; ac frustula vitri lateribus adhærentia, sed admodum frangibilia statuis cereis adhibent, ut ru-

bini vices, quam exactè referunt, suppleant.

Propositio II.

Margaritarum Confectio.

Vix ob aliam causam tanto in pretio sunt margaritæ, quam quod non facile adulterari possunt; aurum adulteratur facillimè; gemmæ ex vitris duplicatis concinnatæ auroque inclusæ ita fallunt oculos, ut gemmarum periti, nisi eas eximant, à veris non discernant. Sola margarita neque corrigi, neque alieno fucò elegantior reddi potest, tradit tamen Linschotanus Indos, ut margaritas pulchras reddant, oiyzam cum sale contundere, ac ea mixtura fortiter illas fricare iā, fieri pulcherrimas crystallo instar, ac splendorem non amittere, non mirum itaque catenas margaritarum ab heroinis, & fœminis nobilioribus, aureis præferri, meliusque divitias ostentare, quam gemmas aut aliud quicquam, quod adulterio fucove obnoxium est: Tradunt varij authores rationes, quomodo margaritæ falsæ fieri possint; nam nonnulli ex pulvere concharum, alij ex creta orbiculos formant, quos postea argenteis folijs obducunt, ac obductos albumine ovi humectant, ac siccati sinunt, ut margaritæ videantur, alij sunt, qui ex margaritarum pulvere concinnant cum albumine ovi, ac postea exiccant, verum pondere & colore facile mangonium deprehenditur. I. Baptista Porta hunc modum scribit. Margaritæ in sacculum unâ cum smiridis, pumicis, sapis ossis pulvere injiciantur, & ex aqua sublatae manibus tractentur usque dum elotas & politas cognoveris, dein resiccatas in pollinem redigito, solvantur limonum succo, ac morentur donec solutas noveris, & pingue quoddam olei instar in humoris superficie natare videas, id argenteo cochleari excipe: postea pulverem in orbem redigito, manibus, vel typis stylo argenteo ac porci serâ perforatas margaritas oleo inungito ac è filo pendentes vitro includito, solique exponito; dum siccatas videris milij vel hordei fermento non salito neque acido involve, ac in furno excoqui finito, aut columbis manducandas præbero, vel in lacte ficus ebuli, & præstantes habebis. Si aliter placuerit, ubi succo, vel forti aqua fuerint dissolutæ margaritæ, clara lavabis lymphâ, vel distillata, lotisque manibus, ne tractando sordescant, & palleant, sic lacteo fici succo cochlearum aqua ferventi balneo distillato aut ovi albore glutinabis, perforabis & siccabis, argentea lavando semper aquâ & commiscendo. Aquam argenti sic parabis: forti aqua solutum fatiscat purgatum argentum, lenibus prunis evolet aqua, tertium relinquendo, mox ab igne vas tractum dimittito, deinde sub dio noctu relinques, donec glaciæ, & argentum in crystallinâ lapilli specie reperies, rite ablues fontis aqua, ut lucidiores conspiciantur quos vitreo condas vase ac putrissimo solvere sinas, quo mergas fictitios uniones & immorari finito, & lucidos argenteo colore pellucen- ti reperies, Hactenus Porta; ubi multa occurrunt quæ asteriscis notari possent, hi enim fucandi modi etiamsi non plane displiceant, non tamen omnino satisfaciunt, quia ex pulvere margaritarum solutarum nunquam ita solidum corpus graveque effici, ut ante fuit, potest; neque video cur columbis prius devorandas det. Sed relinquamus unumquemque suo abundare sensu, ad nostra revertamur, perspectus mihi alius modus, qui prorsus naturam imitatur, deinde etiam modus, quo pacto augeri possint margaritæ, sed tanquam arcana in alium locum consultò reservanda duxi.



Propositio III.

Sapphiri Confectio.

Solet Sapphirus vitro cœruleo inter duos Bohemicos Adamantes glutinato, egregie adulterari: alij ex vitro massam cœruleam in igne constant, eamque expoliri jubent, indurant, & imperitis pro sapphiro venditant: solet id artificium variis modis perfici; plerumque in massam vitream ex crystallo aut silicibus paratam, momentum Zapharæ iniicitur, videlicet drachmæ duæ ad librâ unam & movetur massa igne candens, quam optimè ferreo unco; deinde exempta particula exploratur, num plus Zapharæ aut massæ addendum sit, si juxta mensura apparuerit, per sex horas effervere sinitur, postea eximitur, ac sapphirum referens, massa perito sculptori sculpenda ac spolienda traditur. Si ritè massa facta fuerit, vix à vero sapphiro distingui pseudosapphirus poterit, qui fictitij sunt, plerumque bullas seu atomos in corpore habent, qui propter ignem non æqualiter in massam agentem proveniunt. Ita Boet.

Propositio IV.

Opali Imitatio.

Adulterari duplici vitro, vel colore, ut aliæ gemmæ opalus non potest, scribit tamen à Porta, calcem stanni in vitrum crystallinum excandens injectam illud obnubilare & colorare opali instar: sed oportet sapius ex igne eximere, & accommodare, donec quis voti compos fiat: Quercetanus à spiritu nitri alembicum vitreum intrinsecus ita tingi varijs Coloribus asserit, ut opalus videatur, qui modum tingendi scire cupit, legat libellum, quem edidit de præcorum philosophorum vera medicina.

Propositio V.

Smaragdi Compositio.

Omnibus ferè modis smaragdi adulterari possunt; nobilior modus sit crystallo, vitro, & silicibus calcinatis & fufis, si ijs exigua quantitas minij adjiciatur: ita ego præstantes factos vidi; alij æ ustum in tenuissimum pollinem redactum addunt, adjecto croci ferri dimidiato pondere, ac sex horarum spatio coquunt, ac vas per se refrigerari sinunt, gemmamque polituræ committunt: sic exactè quis operatus fuerit, Americanis omnino similes efficiet smaragdos.

Smaragdus quomodo fiat, aliter ex Cardano.

Majore negotio smaragdus conficitur. Teritur crystallus tenuissimè, additur marcia cocta & ærugo splendidissima, vel vermicularis, foditur later crudus, imponuntur hæc tria, ac in laterem excoquitur inter alios signo addito, id est, extrahitur gleba, Smaragdo similis quæ excinditur, & politur quidem, vitrum tamen est, sed adeo elegans: ut nisi qui primo invenerunt (inventum enim est hoc novum, atque ab annis decem circiter) magnis frustis nimis celeriter voluissent ditari indeque suspicionem copia & magnitudine iniecissent, potuissent & nunc latere fraus cum maximo & incredibili inventorum lucro, quanquam nec sine lucro fuerint: vidi adeo pulchros, ut auro circumdati nativos splendore vincerent: optime succedit, si omnino bullis careant: nam bullæ vitrum esse declarant, & sordidum lapidem faciunt; tangitur tamen limâ, nam vitrum est; omnis enim gemma plumbi odore transit in vitrum, præcipue vero, cum fuerit te-
nem in pulverem redacta.

Sapphirus in Adamantem quomodo verti possit.

Tertius gemmas adulterandi modus longè nobilior ac minus damnatus est, arte cum natura luctante. Gemma in gemmam mutatur ignis ope: sapphirus nitidus, sed alioquin diluti coloris cum auro jungitur, apponitur igni sensim donec liquecat; fervet aurum horis tribus aut quatuor, inde gemma tollitur, & sensim refrigerari permittitur, invenies Adamantem; gemma enim manet, nec lima tangitur, quicquid autem est coloris cœrulei perit, ideo coloris dilutissimi sapphiros quarimus: sunt enim viliores, & celerius in Adamantem transeunt atque perfectius mutantur, qui primum invenit, hoc ditatus est valde, brevique tempore, inde directæ re adhuc lucrum arti relictum est: nitet enim plurimum ob sapphiri duritiem, sunt qui ex aqua marina gemma vilior & molliore faciunt Adamantes pulchros; sunt qui & sapphirum non incoquant auro, sed creta involutum in igne solum, eodemque modo res succedit. Observandum tamen est, ut gemmæ frigida ignis sensim circundetur, ut rursus ut peracto opere permittatur refrigerari ignis extinctione, nam detrudere ex igne haud tutum est; vitium est, si quicquam remanserit vestigij coloris cœrulei.

Propositio VI.

Topazii Compositio.

Topazij aurei coloris ob elegantiam adulterantur omnibus modis, quibus alæ gemmæ adulterari solent, præstantior modus est, dum in crystallo, silicibus & vitro fuso aureus color conciliatur id fit si ad singulas vitri libras quarta uncia pars ferrei croci commisceatur, atque tantillum minij addatur; sed primum addendum minium, post crocus, teste Baptista à Porta; si crystallo calcinato triplum plumbi addatur, Topazius absque aliqua adjectione emergit, si per diem in fornace moretur, aliter sic conficies; fac polinem ex ære usto, cinnabari nativo ac crystallo, quadruplumque stanni usti adde, fusorioque vase ex terra fortissimo indes, fornacique committes per diem, sed ignis vehemens non fit, ac semper eodem gradu permaneat, facile enim fluit pulvis prædictus.

Propositio VII.

Berylli Compositio.

Berylli non sunt in majori autoritate, quam Topazij orientales, olim chrysolithi appellati: proinde eodem pretio æstimari possunt, pro coloris tamen elegantia augetur, vel minuitur pretium, idque in omnibus gemmis servandum est; adulteratur beryllus ijs modis, quibus aliæ gemmæ omnes; nobilior modus est, dum æ ustum in tenuissimum pollinem redigitur, ut omnem tactum effugiat, ac crystallino vitro, aut crystallo calcinato, vitroque illi adjecto miscetur, ac fornaci committitur, aris una drachma pro vitrea massæ libra sufficit.

Propositio VIII.

Crystalli Compositio.

Crystallus non solum ad mundam muliebrem; dum catenæ, nodi, aliaque hujusmodi inde fiunt, sed etiam ad specula, perspicilla, pocula, scyphos, patinas, layacra & similia usui est; adeo dum absque vitio est, hujus modi pocula vel scyphi à principibus appetantur, & sat magno in pretio sint: aureus enim scyphus pedis magnitudine interdum centum scutis dividendi potest aliquando etiam pluris: exigui crystalli, ex quibus nodi
aut

aut coronæ fiunt, viles sunt, ac calaturæ pretium non superant; ex crystallo etiam adjecto vitro, ac arena purissima faleque Alkali nobilissima vitra crystallo vero quàm similia, fiunt Venetiis: inservit etiam crystallos ad gemmas imitandas dum Calcinati plumbi tribus partibus miscetur; huic solent metallica addi, ut optatus Smaragdi, Topazii, vel alterius gemmæ, color prodeat. Crystallos beneficio etiam ignis solet è solis radiis colligi, dum nempe rotunda planities modicum convexa soli ita opponitur, ut corpus id, quod ignem suscipere debet, circa convexi centrum ponatur. In mollioribus etiam corporibus & delicatulis, cauterii ferrei vices supplet, quanquam non minus quàm ferrum urere & dolere existimem. Adulteratur vitro crystallo: quod illi simillimum, verum crystallo mollius & ponderosius est.

Pseudo-Adamantes dum peritè calati sunt, etiam aurò includuntur ac dum exigui sunt, ita veros emulantur, ut non nisi aperitis dignosci possint. Hinc fit, apud Bohemos, Hungaros & Moscos non exiguam habere auctoritatem, majoris tamen quàm calaturæ pretium sit, non venduntur, nisi duri sint, & egregiè scintillant: eadem ratio citrinorum & Iridum, qui omnes supra calaturæ pretium non plus valent, quàm velit emptor. habent enim in satis magnâ copia, magnaque frustra pugni instar nondum elaborata & prorsus perspicua uno, aut duobus scutis tantum dividendur, elaborata & in scyphos aptata venditoris arbitrio ac emptoris deliciis commissa, sæpe satis magno distrahuntur.

Propositio IX.

Chalcedonii Compositio.

Commendatur chalcedonius contra omnia atrox bilis symptomata, hoc est, tristitiam, timorem, demonumque insultus; nec desunt auctores vani, qui gestanti victoriam (quæ tantum à Deo datur) promittant. Ex India occidentali afferuntur nonnulli modicè translucidi, ex albo pallecentes, nonnulli lacteis zonis distincti quos prædicant appensos valere ad lactis ubertatem; hodie propter copiam non magni fiunt; si tamen majora frustra egregie sculpanitur, nec desit color insignis, magno interdum vendi possunt, ac non multò viliori pretio quàm sardonix: adulterium chalcedonius vix meretur; sic tamen imitaberis: igni ad colliquafaciendum crystallo immittes; argenti calcis parum commisceto, per diem fornaci immorari finito & habebis quæsum.

Propositio X.

Onychis Compositio seu Pseudonyx.

Onyx simplicior vix unquam solet ab aliquo imitari, illa vero quæ corpus album à nigro distinctum habet quàm sapissime, ut nempe calata, postea pro cameo dividendi possit: fit autem hoc modo, conchæ parvæ marinæ quibus mulieres Italicæ ad fucum utuntur, in pollinem redigantur, ac in succum limonum aliquoties per filtrum depuratæ ponantur, ita tamen ut succus tribus aut quatuor digitis supernaret; sinatur ita per decem dies succus bene coopertus in calore; postea effunde succum, residuum aquâ elue, ac tere in porphyritide albumine ovi, prius optime conquassato, ac in formas proijcito; postea non formatam partem externam optime expolito; ut supra stratum nigrum optime & dextre collocari possit, & fraud non cuius facile innotescat: inter tereendum alii colores optime triti addi possunt, ita ut sardonix hac ratione etiam fin-

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

gi possit, nec minus aliæ gemmæ, alijs lapilli pretiosi.

Propositio XI.

Turcoidis imitatio.

Turcoidem apprimè Vitriarij Veneti Venetiis imitantur. Vidi Gallum, qui ita dextre imitari poterat, ex alia materia ut à vera gemma propter venulas nigras, quas illi inferebat, cognosci non posset, pro factitiis illas vendeat, ac satis in gno, propter elegantiam pretio, putò chrysololla nativa, ac aqua lapidescente adjectis paucis aliis illum usum fuisse: ut amissum colorem recuperet, nonnulli solvunt calorem transmarinum aqua chrysulca, eaque distillatione abstracta reliquias superstites exsiccant, illque turcoidem fricant; alii aquæ chrysulcæ imponunt, ac abstersum aceto parum committunt: deinde in aquam frigidissimam mergunt, tum enim coloratio fit: verum istis artibus paulatim intrinsecus color in cutim trahitur, evanescit, ac gemma ingratiior & vilior redditur, rectius oleo vitrioli cutis superior exeditur, ut subiectus color elegantior gemmam faciat.

Cardanus fol. 290. lib. de subtr. de Achatum imitatione sic scribit: omnibus tamen gemmis unus apponitur lapis Achates & ipse è gemmarum numero, sed tam varii generis, ut unum lapidem esse non credas; candidus, rubeus, croceus, cinereus, viridis, niger varius, cœruleus; quid moror? huic uni nec omnium aliarum gemmarum colores satisfaciunt, ille lucos, prata, animalia, flumina, flores, arbores, natura ludente refert. Celeberrimus in historiis est Achates Pyrrhi regis, novem Musas cum Apolline in medio cytharam pulsantem referens, singulasque cum propriis ornamentis, ut videtur tunc natura cum pictore certasse, atque hic miraculum dici potius debet, quàm gemma; nobis duo sunt Achates, in quorum altero natura hemisphariorum pinxit cœli, distinctis orbibus, in medio terra rotunda quasi aqua supereminens; in reliquo hiatus terræ fumum emittere videtur, qui aerem obumbrat.

Ceterum illud admiratione dignum, quod alius fumi color, alius aeris, ex eo obscuratur: fumus candidus quasi ac densus, aer subrubens, ac mediocriter perspicuus; alii etiam Achates referunt avium oculos, & nos talem habemus, alii autem piscium; Ponticus qui sanguineis guttis interstinguitur aut atris, montium refert & convallium imagines, quidam humanos oculos leucophthalmi, quidam lupi leucophthalmi, quidam capræ ægophthalmi vocari, vidi & viridem perspicuum lineis duabus candidis pulcherrime distinctum, quem dubiè esse naturæ crediderim, nam velut in animalibus muli ex asino & equa, & sycisca ex lupo & cane, ita & lapides quandoque miscentur ex vario genere, mixta eorum materia causisque illos producentibus.

Ceterum, quod ad Achatem Pyrrhi regis attinet, nimis ridiculum puta, casu illum adeò ad amulsum ornatum ac distinctum fuisse, hoc igitur sic contigit, pictor validis coloribus lapidem aliquem è marmorum genere pinxit, ut novem Musæ pulsantem in medio Apollinem mirarentur; inde seu casu, seu industria lapis ille sepultus jacuit per multos annos, eò in loco ubi Achates gigni lapides solent. Contigit itaque circum circa gigni Achatem perspicuum & aqueum, inde inventus referebat Musas & Appollinem illum quasi naturæ industria fabricatum, cum Achates jam gemma esset; nam si spicæ & muscus arboribus hærens in Achatem transeunt tractu temporis, ut ego Achatem,

I 3 habui

habui eum quinque spicis, quas diceret nunc ex tritico excidisse, & tamen lapis erant, imo gemma sic etiam musci non parva pars aderat, quanto facilius pictus Lapis mollis ille in Achatem potuit transire.

Itaque si quis loca Achatum observaret, ea maxime ubi perspicui generantur, hoc enim est necessarium; sepeliat vero picturam ex coloribus perpetuis, quales sunt cæruleus & aureus è metallo constantes, tum maxime si cera punica paucò oleo temperata, aliove perpetuo sed perspicuo tamen unguento opus liniat, quale est, quod apud nos vernix liquida vocatur, quæ picturis absolutis pretiosioribus solet induci, Achates nascetur sic pictus.

Verum dices, hic frequens esset Achates sit pictus, si tam parva arte parari posset: verum non animadvertis, primo oportere sepeliri ubi gignantur Achates, tum vero Achatem qui circumducitur, esse splendidum & perspicuum, tum vero intra paucos annos transire in gemmam antequam pereat pictura, nec dilui prius aliquo externo humore, ne aboleatur imago, demum contingere ut absolutus effodiat, quot enim pisces sunt, quos nemo unquam piscatur, & feræ in nemoribus, & aves quas nullus unquam cepit, sponteque sua in proprijs locis obeunt, tot esse existima gemmas, quæ latitantes locis quibus genitæ sunt, nunquam in lucem prodeunt sed in primam matrem terram ut coaluerant vetustate, ita eadem revertuntur. Tametsi Achates varietate nobilis sit, quia tamen parum splendet, raro pretium ingens habet inter gemmas. Hucusque Cardanus, quæ non abluunt ab iis, quæ nos in Libro VIII. de genefi figurarum in lapidibus nascentium tradidimus, ad quæ lectorem remittimus.

Propositio. 12.

Auri à Lazulo Separatio.

Quo pacto aurum ex lapide lazuli, postquam tritum fuerit, separandum sit.

Lapidis jam ad porphyrium triti libram commisce uncia mercurii purgati, ac misce optimè in mortario, deinde exprime per linteum, & mercurius una educet per linteum aurum; postea expressam materiam tigillo impone, vulcanoque committe, ita mercurius evolabit in auras, & quod remanebit in tigillo, aurum purum erit; id si relinquatur in igne color junctus, eum magis splendentem, molliorem & in penicillo ductus & extensioni faciliorem reddit.

Propositio 13.

Usus Coloris ad Picturas.

Propter immensum coloris ultramarini pretium non solent eo uti pictores, ut alijs coloribus, sed pingant imagines, quas cæruleas volunt, communi cæruleo & armenio præparato, aut ex vitro illius coloris, quod smaltum vocant; deinde partes eas, in quibus lux hæret, cerussa, post modum coloribus istis, ut res postulat, ritè adhibitis iisque optimè exsiccatis, ultramarini colore humectato oleo nucum, & spiritu terebinthinæ totam illam picturam cæruleam, tanquam vernice, aut limimento quodam tenuissimo oblinunt. Hoc modo per obductum colorem tanquam per glaciem aut vitrum subjecti resplendent, pulchritudinem non solum excellentiorem à velamine nacti, sed & perpetuitatem, & ne ducentis, quidem annis, vel minima lucis, vel pulchritudinis portio decedat; nec mirum, quia quem ignis colorem consumere non potuit, multo minus aer aut sol exedere poterit. Ita Boethius.

Propositio 14.

Color ultramarinus Lazuli.

Quo pacto ultramarinus color alio modo, & brevius à Lapide separatur.

Recipe Lib. I. Lapidis in tenuissimum pulverem redacti, & cum aqua clara ad porphyrium triti, & impone scutellæ vitriatæ, donec pulvis in umbra exsiccetur, quem iterum, si in massam coierit, in pulverem redige; deinde habeas in promptu resinæ pini ℥vi. picis græcæ, mastiches, Thuris ana ℥iii. olivarum ℥ii. patellam vitream supra lentum ignem pone, & primo imponas oleum, & cum bene calidum erit, adde resinam, postea picem, deinde Thus, & postremo mastichem ac move optime: postea alteri scutellæ infunde, & ebulliat parum. His paractis habeas ad manum aliud vasculum, in quod pones siccum lapidis pulverem, cui affundes unguentum dictum, paulatim movendo spatula, & bona fiat mixtio: tum relinque per diem mixturam & cum auferre vis colorem, funde pastam supra aquam bullientem, & move & agita optime materiam & cum aqua incipit refrigerari, eiice, & aliam calidam affunde; idque fac, donec aqua colorem trahat, atque repete toties, donec omnem colorem extraxeris. Singulas extractiones separare potes, ut distinctos colores habeas.

Si color spurcitiem contraxisse videatur, ita restitues: tantum aquæ tartari adice colori, ut ab aqua tegatur; sine per diem postea aqua limpida colorem abluc, & habebis mundatum.

Præparabis lapidem ad dictum opus hoc modo: dum in frusta freris, vasculo impone ac ure, deinde lava cum aceto, sit supererit optima pars, quæ igni resistit.

Artificia varia tincturarum omnis generis.

Addam hoc loco pulchras quasdam ἐγχαρσισεις, quæ tincturas rubino, smaragdo & sapphiro aliisque haud dissimiles facili negotio confici possint, quas Excell. Dom. Utriusque Medicinæ Doctor, Seren. Regis Poloniae Archiater martinus Barnadus mihi pro singulari suo in me affectu, communicavit, earumque me inspectante in nostro pharmacopolio experimentum sumpsit.

Experimentum I.

Tinctura rubra ad similitudinem Carunculi Lucentis.

Accipe gummi laccæ, cui in aqua limpida dissolutum nonnihil aluminis, vulgo di Rocca adiunges, deinde totam misturam indes vesicæ vitreæ, quod matrarium Chimici vocant: quam deinde cineribus calidis impones, & in intensissimam rubedinem ad instar rubini convertetur: cui si non nihil olei tartari infuderis, tunc colorem obtinebis quem vulgo vocant incarnatium. Nobilissimum verò dentifricium obtinebis si gummi laccæ aqua salviæ aut roris marini dilueris, tincturamque extraxeris.

Experimentum II.

Tinctura ad similitudinem smaragdini Coloris.

Accipe syrupi violacei partem intra phialam, cui si aquam limpida superaffuderis, & huic nonnullas guttas olei tartari addideris, habebis perfecta præcipitatione tincturam smaragdino colori simillimam, id est viridem.

Experimentum III.

Tincturam sapphirino colori similem efficere.

Accipe calcem vivam in vase cupreo in aqua limpida

pida dilutam huic adiunges non nihil talis ammoniaci, quod ubi 12. horis circiter consistere permiseris, tandem liquorem totum in sapphirinum colorem cœruleum, & ultramarino haud abfimilem degenerasse reperies. Ut verò colores hi splendidiores fiant per chartam diaphoreticam prius transcolandi sunt colores sive tincturæ. Usus earum est in thermoscoptis concinnandis singularis.

Experimentum I V.

Arcanum rarissimum quo Auri scriptorii conficiendi modus traditur.

Mirantur multi eximiam illam veteribus auro scribendi methodum usitatam, nec modum ejus capiunt. Unde multi putant artem esse uti deperditam, ita inventu difficilem. Nos hoc loco modum quem nos supra laudatus excellentissimus Doctor Martinus Barnardi docuit, bono publico manifestandum duximus, ita autem proceditur: Dissolvatur in vasculo gummi arabicum usque ad crassam instar pultis consistentium, deinde illud per mundissimum linteolum percolabis, ex hoc gummi portunculam quantitatis nucis avellane acceptam in orbem fictilem mundissimum (cujusmodi passim hic Romæ in mensis utuntur) depones. Postea aurum foliatum quanto plus, tanto melius est. Commistum gummi digitis tanto tempore terito, usque dum totum gummi intime contemperetur; quanto enim melius subactum fuerit aurum gummi, tanto res meliorem successum habebit: identidem dum laboras, digitis aquam eidem tepidam affundendo. Quod ubi peractum fuerit, tunc denuo aqua calida superaffusa 12. horis relinquatur: donec per inclinationem aqua effusa, nova aqua tepida affundatur, quod ubi aliquoties feceris, tunc relinque, usque fæces subsederint, quæ est materia auri scriptioni apta. Hæc itaque intra conchas guttatim distributa dabit tibi aurum scriptorium huc usque desideratum; quo si uti velis, unam atque alteram guttam ex aqua glutinis candidi (cujusmodi in Germania melioris notæ præparatur) ad dilutionem superadditam, in usum convertes. Nobilissimum sane secretum, & in præsentia mea comprobatum.

Possẽm hoc loco adiungere ad coronidem Sinicæ vernicis veræ & legitime conficiendæ modum & rationem, sed quia descriptio longior est, quam ut charta admittat, alio forsan loco opportunius lectori curioso id communicandum reservavimus. Communicaui id mihi R. P. F. Eustachius Jamar, Leodicensis ord. D. August. religiosus, qui ad stuporem omnium hanc artem hic Romæ dum hæc scribo exercet. Variæque conficit utensilia adeo splendida, & lucida, ut vernicem Sinicam, si non superet certe æquet; neque puto ad excellentiam artis quicquam posse accedere.

Propositio XV.

Quomodo factitii lapides fiant & saxa ingentia pro Columnis caterisque Monumentis.

Magna inter auctores lis est, utrum factitii lapides per infusionem fieri possint. Nonnulli existimant columnas & obeliscos Romam ex Ægypto allatos, non esse nisi fusiles lapides in tantam molem formis appropriatis eliquatos; sed nos hanc fabulam quæ amplissime in nostro Oedipo & obelisco Pamphilio confutavimus: fuerunt enim ex vivo sacco elaborati cujusmodi fodinæ in Thebaide superiori etiamnum spectantur. Esse tamen modum quandam & certam rerum mixturam, quæ in lapides fundi possit, non abnuo, imo praxin apud peritiores marmo-

rum opifices & latomos me vidisse memini; imo veterum Mosaicarum sive musivas tessellas nil aliud, quam pastam fuisse fusilem in triangulos, quadratos, similesque polygonas figuras sectam vel ipsa *Λιθοτομία* luculenter docet, & ne quispiam ea de re dubitare queat rem experimento docebimus. Non enim solum gemmæ factitiæ sunt, sed saxa & marmora, quemadmodum paulò supra de mensis quæ hic Romæ modo inventæ conficiuntur, sat pater.

Experimentum Lapidis Fusilis.

Lapides, marmora, Jaspides &c. in pulverem redigantur minutissimum, cui jungantur calx, gypsum, sal, sanguis bovinus, quæ omnia commixta aceto, vino, cerevisia, vel lacti aut ejus sero imponentur. Varieque agitentur, donec in pulvem redigantur. Hoc peracto colores metallici, quos volueris, pulvi commisceantur, addito non nihil ex felle bovis, deinde spatula lignea ea industria misceantur, ut marmor fictitium venas omnes coloris, adinstar veri variegati marmoris obtineat. Haud secus ac in carta turcica præparanda fieri novimus, deinde formæ seu modulo jam præparato infunde exsiccaturque duritiem prorsus lapideam induet, quæ deinde pumice deplanata, smegmate vel oleo polituram recipit perfectissimam. Ingenio pollentes ex hac brevi descriptione mentem meam facile percipient, quare ad alia.

Propositio XVI.

De Perlis fictitiis componendis Methodus.

Perlæ fiunt hic Romæ quoad formam veris ita similes, ut splendoris & speciei ratione a veris & nativis vix discerni possint hoc pacto: purgant albumen ovorum per spongiam quam mundissimè in quod inspergunt, miscuntque pulcherrimi talci, aut etiam conchæ perlæ ramenta una cum perlis naturalibus in minutissimum pulverem primò redactis; hoc mixtum in marmore optime terunt, ita ut fiat densum amalgama, quod in solè, vel post fornacem calidam siccetur; ex hac massa formant perlas quantascunque volunt, quas seris suillis perforant, & ad siccandum soli exponunt habebisque negotium peractum; si vero non satis splendeant, exterius ovorum albumine præparato more solito inundatas ad siccandum soli exponunt, & habent quæsitum.

Propositio XVII.

Corallia Ficta.

Simili modo Corallia fictitia fieri possunt: Cinnabarim cum albumine ovorum in marmore tere per horam, postea, ut terram figulinam sicca, deinde finge inde globulos vel ramosum fruticem prout libuerit, sume exsiccata materiam uti perlas; exterius ovorum albumine inunge, & siccata corallia fiunt nativis ita similes, ut vix dignoscantur. Magna sane res latet in albumine ovorum, nam vernisium inde excoqui potest, cui commixta aurea & argentea ramenta lapidem efficiunt, ei, quem venturinum vocant, haud abfimilem.

Propositio XVIII.

Lini in sericum transmutatio.

Si ex calce & cinere Itatidis herbæ acerrimæ fiat lixivium linum in eo coctum in sericeam abit materiam, splendidam & subtilissimam filationi aptissimam. Est & hoc mirabile, si plumæ partes pennarum ex volucris abrase in hoc lixivio coquantur, non secus ac gossipium neri & texi poterunt. Sed & hoc arcanum manifestat asbestinæ materis filandi modum & rationem quam Lib. VIII. in capite de Asbesto conticueram.

Propositio XIX.

Succini Confectio.

Plinii tempore tangebatur ad libitum Succinum, hædorum & anchusæ radice, ac etiam conchylio, id est, violæ serotino colore; hac ætate ars tingendi succinum perit, si tamen verum sit, quod vulgo scribitur, in ceram ferventem immissum, molle fieri, facile quosvis colores recipere poterit. Imitatio succini à multis proponitur. *Cavdanus* ovi candido & tragacanthi lacryma immixtis formicis, culicibus, muscis, paleis, succinique pulvere, ut bene oleat, & festucas trahat, succinum imitari conatur, ac melius aptiusque candido ovi, vitellum indicat, quod coctum humiditatem, putredinis auctorem amittat, ac in lapidem durecat. *Myzaldus* crystalli pollinem, albuminis ovi conquassati, aqua croco addito, miscet, vitro imponit, aquæ ferventi committit, dum duram consistentiam adipiscatur, quam efformat. Verum si corpus diaphanum cupiat, ante coctionem materiam percolat: sed modus iste mihi non placet. *Baptista à Porta* mastichen liquidam per colum trajicit, ut expurgetur, parumque radicis curcumæ adjicit, ac succini speciem imitatur, sed verius & utilius is nativum succinum imitatur, qui id dissolvere ac dissolutum iterum coagulare, vel in massam cogere novit. Quomodo autem id fieri debeat, verus Physicus, ac qui prædicta intelligit, facillimè assequi poterit. Ignaris ac Mulatrum odoribus hæc aperire nefas existimat *Boëtius*.

Sufficiat itaque Naturæ scrutatori, viam ita facilem hoc capite demonstrari, ut falli non possit, qui exactam succini historiam vult *Andrea Libavii*, viri doctissimi tractatum legat.

Hactenus Athanasius Kircherus de compositione artificiali Lapidum & Gemmarum in suo Mundo Subterraneo. Qui plura ac admodum curiosa hoc in argumento, præcipue de Gemmis artificialibus, voluerit, consulat totum tractatum de Arte vitraria Antonii Neri, quem nos sub titulo VITRUM ad ducimus.

De LAPIDIBUS & GEMMIS specialius, quatenus scilicet ad Medicinam faciunt, eorumque Præparationibus.

Schroderus cum aliis, salino-terrestri principio lapidifico causam lapidum efficientem & materialem adscribit, quæ in illis duritiem, soliditatem & coagulationem terrestrem supradictam efficiat. Sed unde probabitur hæc assertio, & quonam fundamento est stabilita? Quis unquam vel tantillum ex tot differentibus lapidum generibus, quod illorum coagulationis causa sit, salis extrahit? Quid salis ostendi potest in corallis, quæ juxta quorundam opinionem in aquâ salsa remanentia mollia, inde autem educta indurecunt? quid salis ostendi potest ex fusi Saturni corpore in corpus Mercurii vivi transire, quod in eo fusi Saturni corpore in corpus equidem salini magna videtur potentia esse in quorundam corporum coagulatione expediundâ, hæc tamen nullatenus provenit à peculiari quâdam vi Lapidificâ; sed ex illorum corpusculorum figurâ & motu, quæ per Naturam magis apta nata sunt, quam plura alia concreta sese aliorum corporum poris insinuare, eorumque particulas tam suismet quidem, quam sibi invicemnectere, idque vel corpuscula illa quasi cuneatim jungendo, vel rigidis & gracilibus suis partibus, vel acutis suis angulis aut aciebus plura eorundem penetrando. Nos statuimus cum sanioribus Naturæ interpretibus, Omnes Lapidem fructus aquæ esse, cum mediante sale circulato suam omnino fixitatem amittant, & tandem in aquam inspidam transeant, æquiponderantem Lapidibus, ex quibus manavit. *BERNARDUS PALISSY*

*Gallus in Libris gallicè editis. De Naturâ fontium, Metallorum, gemmarum, ex aqua omnes etiam Lapidem durissimos deducit, aquas tamen duas statuens, unam materialem, alteram congelantem. Nobilissimus ROBERTUS à Boile Lib. de Gemmis, harum primam originem etiam putat substantiam fuisse liquidam, quæ si tineturis quibusdam mineralibus, dum fluidæ vel molles sunt, imbuuntur, colores pro ratione mineralis obvi acquirant. In Opacis, quales hæmatites, Jaspis &c. lapilli sunt, terram metallicis succis imprægnatam, accessione liquoris petrescentis seu spiritus petrifici in lapidis formam coagulari indicat. Meminit inibi etiam cujusdam liquoris, qui gemmas solvere potuerit. Terram plenam esse menstruis aliisque liquoribus variorum generum statuit, è fodinis, per quas vagantur, variè imprægnatis, qui quibusdam casibus vice menstrui fungi, alio verò modo concurrere ad productionem corporum mineralium possint. Quemadmodum igitur omnia, quæ sunt in Naturâ, ut supra de Rerum Nativarum productione ostendimus, seminis necessitate sunt, ita & Lapidem ex seminibus petrosis, quæ in lapidescibilibus succis, (qui sive tincturæ sive menstrui nomine veniant, perinde est) latent, fiunt, donec fluxu seminum maturato partium corpora constituentium ex aqua sive sale abundant vel non ita disponant, & figurâ & motu apta reddant, ut ex his stabile & solidum corpus lapis fiat. Ubi ejusmodi semina petrosa in aquis delitescunt, quicquid illis injicitur, in Lapidem condensatur, vid. *Robertus à Boyle l. c. item. in Tentamin. Physiologic. & in tr. de Fluidis. & Firmitat. Athanas. Kircher. in Mundo subterr. Tom. 2. lect. 3. Lib. 8. p. m. 78. Thomas Scherley Regis Angliæ Medicus in Dissert. de causis Lapid. It. Ingeniosissimus STENO in dissert. de solido intra solidum naturaliter contento. Doctissimus Morhousius in Epist. de Metallor. transmutat. Hofmannus.**

Lapidem sunt corpora terrea, dura, indurabilia, vi lapidificâ ex materia lapidescente, id est, viscosa terrestri seu tartarea, coagulata.

N. Generantur lapides ex peritomate salino terrestri, quod in nutritione rerum redundat, vique suâ lapidificatione duritiem lapideam coagulat.

Suntque vel pretiosiores, vel minus pretiosi. Illi gemmæ nomen adsciscunt, præcipue si adiaphanæ fuerint; hi nomen lapidis retinent. *Schroderus.*

Suntque vel pretiosiores vel minus pretiosi. Lapidum differentiam *CL. HELMONTIUS* facit triplicem; Animalem, Vegetabilem, & Mineralem. Animalis est Duelech seu calculus humanus, lapis cancerorum, limacum, Bezoar &c. Vegetabilis est capsula nuclei perficorum, mespilorum &c. Mineralis est saxum, filices, adamas &c. Verum Animales lapides & vegetabiles propriè sic dicti Lapidem non sunt, sed minerales tales habentur, qui in calcem verti possunt, quod vegetabilibus lapidibus denegatum, qui potius nodosum lignum, quam Petra sunt; Animales lapides potius ossa saxea, quia cremantur, quam petra sunt. De cætero Lapidem minerales pro mineralis succi vel tincturæ præstantiâ variant, ut in gemmas vel alios lapides minus nobiles descedant. De Lapidibus scripsit *Alber. Magn. Gesnerus, Vallesius, Camillus. Leonard. Casus. Johann. de Laët. Anshelm. Boëtius de Boodt. Christoph. Encelius. Andreas Baccius.* Ex recentioribus *Bernhardus Palissi Gallus* linguâ gallicâ, *Thomas Scherley. &c. Hofmannus.*

Preparata.

Præparationes seu operationes, quibus lapides in usum Medicum veniunt, præcipue sunt 1. Pulverisatio & præparatio in specie sic dicta. 2. Calcinatio

tio, cui subiunguntur. 3. Solutio, Coagulatio, & Purificatio seu Edulcoratio. 4. Liguatio seu Deliquium. 5. Destillatio seu Volatilisatio. His accedit interdum 6. Symplicisatio.

N. *Integrum & insignem tractatum de lapidibus conscriptum Nobiliss. Anselmus de Boodr, Medicus Rudolphi Secundi, quem in describendis lapidibus potissimum sum secutus. Præter hunc inservit Bunnradus Kunrath, qui medullâ suâ destillatoria, integrum fere Tractatum scripsit de Lapidibus pretiosis ac minus pretiosis, utrorumque præparationibus ac facultatibus, part. 1. tr. 10.*

I. Pulverisatio & Præparatio.

Pulverisatio lapidum commodissima fit primùm triu a, quam dein suscipit lævigatio. Præparatio fit, si inter lævigandum ∇ conveniens stillatitia aspergatur, inque pulpam massâ redigatur, in umbra exiccandam. *Schroderus.*

Præparata. Pulverisatio & Præparatio.) Huic inservit *Trius*, qui peculiari molâ philosophicâ convenientissimè peragi potest, cujus iconem infra de AURO insculptum videbis, quâ miranda in Arte Medicâ & chemica perfici possunt. *Hofmannus.*

II. Calcinatio.

Calcinatio, cui lapides subijciuntur, vel ministra est, vel principalis; Ministria est, quâ lapides ad principalem illam suscipiendam, disponuntur; diciturque strictè loquendo calcinatio. Principalis est, quâ lapides propius in usum Medicum veniunt, dicitur solutio potius quam calcinatio, adjunctamque habet coagulationem cum annexa edulcoratione.

Calcinatio, quâ lapides ad solutionem disponuntur, perficitur vel ignitione tum simplici, tum retractorâ, vel corrosione, eâque aut cum Sal. com. aut cum Sulphure, &c.

Ignitio simplex fit, si lapis vi ignis nudi, tum libeti, tum reverberio inclusi comburatur, donec in calcem redigi queat. Exemplo fit calcinatio illa vulgaris lapidum calcinatorum, unde calx viva murariis expetita.

Ignitio retractoria: quando lapis ignitus in liquore aqueo extinguitur, idque vicibus repetitis, donec in calcem redigatur.

N. Est & alius modus calcinandi: Nimirum pulverisati miscentur cum duplo carbonum pulverisatorum, (præstant fagini) inque fornace figulina & 24. Crucibulo cooperculato cremantur.

Corrosio 1. cum Sal. nit. Lapis grossè (saltem) ad minimum contusus, miscetur cum Sal. nitri portione æquali, duplo, plus minus, ignique committitur fortissimo, ut Sal. nit. fundatur & concremetur.

N. Peragitur & hoc modo: Nitrum funditur primùm, hinc fuso super inicitur paulatim lapis calcinatus pulverisatus.

Corrosio 2. cum Sulphure: Lapis cum Sulphuris duplo, triplo, ter, quater pluriesve in Crucibulo aperto ad Sulphuris exhalationem uritur.

N. Præstat Sulphur vivum, vel flores Sulphuris adhibere.

De Calcinationibus hic notandum in genere.

1. Si quidem calcinationes id finis præferunt, ut lapides fiant solubiles, parum interest, utrum uno pluriesve calcinationum modis finem dictum consequaris. Sic perficiunt calcinationem alii uno calcinationis genere (v. gr. Basilus ignitione solâ Corallia calcinat:) alii duobus, (sic calcinat Crollius gemmas, &c.) 1. cum Sulphure. 2. Cum Sal. nit. Kunrath; è contra 1. cum Sale nit. 2. Cum Sulphure: alij præmittunt quoque calcinationem ignitionis & præcipue retractoriam.

2. Si quid indissolutum remanserit, denno calcinandum est, idque vicibus toties repetitis, donec tota substantia, reiectis facibus, sit dissoluta.

III. Solutio.

Solutio Lapidum tam pretiosorum, quam vulgarium varijs potest administrari menstruis, quibus lapides ut plurimum calcinati injiciuntur, locoque tepido reponuntur, ac subinde s. a. id est, toties repetitis novi menstrui affusionibus & decupelationibus donec opus fuerit, & nihil amplius solvatur.

Menstrua idonea solutioni videlicet in solutione Cerialliorum, præcipua tamen sunt Acet. destill. vulgare ac imprimis alcalisatum, terbinthinatum, Acet. destill. mellis, Spiritus Oli. Sal. nitri. Ol. Sulphur. per C. &c. *Schroderus.*

Solutio.) Hujus idonea menstrua sunt Acet. dist. succus Citri, spiritus mellis, Nitri, Sal. comm. Vitrioli, Sulphuris &c. Præcipitatio fit non tantum salibus, sed & spiritibus. Nam notandum est, præcipitat omnem cum salibus factam Magisteria reddere magis fixa, non differentia à præparatis calcinatis, solubilia autem illa esse, quæ à spiritibus præcipitantur. *Hofmannus.*

Coagulatio.

Coagulatio solutorum lapidum fieri potest, vel menstrui abstractione, vel solutionis præcipitatione.

Abstrahitur menstruum, tum evaporando, tum destillando.

Præcipitatio fit instillatione Sal. com. fusi, Ol. Tart. p. d. &c.

Edulcoratio fit iteratis solutionibus, ac coagulationibus, vel abluitionibus.

N. Purificatio, quo sapius iteratur, eò sal præstantius ac purius evadit.

IV. Liguatio.

Liguatio seu dissolutio per deliquium fit, quando Sal lapidum in vitrea marmoreave patina, vel simili, in locum humidum exponitur, ut in liquorem dissolvatur.

V. Volatilisatio.

Volatilisatio fit, si salia sæpe solvantur coagulenturque; atque tandem cum V (vel ∇. dest. appropriata seu quod melius cum Spir. herbæ appropriatæ) & 14. in fimo equino digerantur, multotiesque per cucurbitam humilem vel retortam destillentur, quippe post quamlibet putrefactionem aliquid Sal. cum menstruo ascendit.

N. 1. Destillatum hoc constans ex Menstruo ac Essentia lapidis, (id est, ex sale lapidis volatilifato) dicitur Elixir: verum si menstruum calore (leni) abstractum fuerit, remanet Essentia in fundo.

N. 2. Præstat Vini essentiam cum salis liquore conjunctam, sine separatione asseruare, quippe utraque sese mutuo perficiunt, adeoque vis salis resolviva, qua calculum seu Tart. resolvit Essentia illius vinosa viribus exaltatur, quin & Vini Spiritus fit magis penetrativus & ad calculi resolutionem operativus. *Schroderus.*

Volatilisatio.) In Lapidibus ne micam quidem salis reperiri, quod volatilifari possit, supra jamdum monuimus; Benè tamen ex adjunctorum & connexorum salium texturæ mutatione seu variatione figuræ, motus, situs vel nexus illorum Lapidum partes pulverisatæ minutissimè unâ in sublime evehi & destillari possunt. v. g. Recip. Lapid. pretios. cujusvis 3ß. vel 3i. excandescat & in Acet. dist. exstinguatur, solve in sp. Sal. comm. composito, filtra & per retortam abstrahere, cum acris exstillare incipit, desine, residuum edulcora ∇ fontanâ affusâ; Remanentia exsiccata affunde spiritum vini sale Tartari volas

volatili imprægnatum, pone in fimum equinum per 14. ϕ , postea destilla sæpius per humilem cucurbitam, semper digestionem interpositâ, & sic sal Tartari volatile mutuo connubio secum rapiet particulas quasdam lapidis pretiosi volatilifatas, non autem sal lapidis volatilifatum, quod in lapide non fuit, nec inerit unquam. Interim tamen residuum illud huius lapidis pretiosi sale Tartari jam fixato ex parte à spiritibus salinis turgentis abjicienda, utpote in hoc magna adhuc lateat virtus. Licet enim ex lapidum pretiosorum substantiâ parum eleveatur, elevatur tamen aliquid, quod Sal Tartari volatile in aliud esse transducit; Quemadmodum etiam videmus in fixo alkali salis Tartari, quomodo, quæ illi junguntur, reducat in eandem & sui similem naturam. Sic v. g. sal Tartari calci vivæ nuptum multo potentius efficitur & ferè in igneam transfertur Naturam. Oculi Canc. cum Sal. comm. Tartari vel *liquati in plane aliud esse degenerant. Sal volatile urinæ aliquot cohobis à silicibus nigris calcinatis abstractus plane aliam induit naturam. Non diversa est ratio gemmarum vel lapidum pretiosorum cum salibus volatilibus intercedente digestionem combinationum & sublimationum. *Hofmannus.*

VI. Syrupificatio.

Syrupificatio fieri potest, si solutionem (factam cum succo assumptioni internæ idoneo, v. gr. succo citr. berber.) cum saccharo in syrupum redegeris, affusâ, si liber, aquâ stillar. convenient. *Schroderus.*

Syrupificatio. Ex lapilibus pretiosis v. g. Corallijs, perlis, &c. hæc syrupificatio, optimè peragitur, si hi totaliter prius dissolvantur in f. q. Acet. dist. solutio filtratur, & ad siccitatem per MB abstrahatur, remanente in fundo solutione siccâ, huius solutionis siccæ q. f. solâ solutione vel digestionem fiat syrupus justæ consistentiæ, *Hofmannus.*

Operationibus hisce fiunt ex Gemmis,

1. Gemma Preparata.

Præparantur modo dicto; lævigando, subindeque irrorando, cum ∇ cordiali (rosarum, buglossæ, & sim.)

2. Sal.

Gemma calcinata solvantur interveniente digestionem in Acet. destill. vulgari (vel terebinthinato) solutiones filtrantur: hinc abstrahitur menstruum, salque relictum purificatur eluendo cum ∇ destillata. *Croll.*

N. 1. Sunt qui malunt Acet. destill. à sexta parte cineris herbe Kali ternis cohobis destillatum. Nimirum hoc subdulce nec adeo mordax est. *Hartm. in Croll.*

N. 2. Calcinatio hic fit, vel sola ignitione, scilicet ustione; vel corrosione. Placet hic modum *Crollii* inferere, qui est Gemma lævigata cum Tart. (sicc. Sulphur.) ter quaterve comburuntur, idque igne rota crucibuloque operculato: ultimo tegitur totum crucibulum carbonibus. Calx gemmarum lotionem à Sulphure repurgata miscetur cum Sal. nit. ana. & calcinatur denuo in tegillo clauso igne rota ut fluant. Tandem abluitur optimè Sal. nit. calxque gemmarum exsiccat. Si parata est ad solutionem.

N. 3. Si quid indissolubile manserit, id nova calcinatione comburendum & solvendum idque toties, donec ita ferè gemmarum substantia dissoluta sit.

3. Magisterium.

Præcipita solutionem dictam cum Ol. Tart. p. d. vel Spir. ϕ i.

N. Fiunt quoque Magisteria gemmarum, solvendo eas in spiritu Sal. nit. vel Salis Naturæ, & præcipitando cum Ol. Tart. *Vid. Quercet. in Pharmacop. rest. cap. 24. & 24. Schroderus.*

Sal. Utrum sal quoddam essentielle in intimis gemmarum v. g. Smaragd. Corallor. perlar. vitceribus reconditum sit, magna Philosophico-chemicorum contentio est, *CL. SENNERTUS* in lib. de *Consensu* ubi in se non suscipit causam agere chemicorum, sed ipsorum & Peripateticorum Arbitrium, rotundè pronuntiat, saltem omnibus inesse mixtum & ex his omnibus fieri posse p. 147. Et quod de sale dixi, ait, idem & de Sulphure dici potest. Verum ignorent manes Sennertiani; bonâ ipsorum veniâ probationes solidas huius generalis asserti vel maxime desideramus. Qui de huius veritate me convincere satagit, prius per mechanicam ostendat, quomodo sal vel Sulphur ex gemmis & alijs lapidum generibus sint extrahenda, quos intentus *Δνις* non in calcem sed fusionem reducit. Unde & Nobiliss. *HELMONTIUS* Sp. 409. scio, inquit, ex silicibus, arena & saxis non calcarijs nunquam Sulphur aut Mercurium trahi posse. Sed inquis: Unde autem salia essentialia Nonnullorum, quæ pro panaceis venduntur, gemmarum scilicet: scias, si lia supposititia esse, v. g. gemmæ quando cum Sulphure calcinantur, (juxta *Crollii* modum, quem *Dnns AUTOR* adducit) deflagrante autem & combusto ab his Sulphure aliquoties, sic solutæ verum Sulphuris acidum spiritum in solum recipiunt, alias in campanâ vitreâ coagulabilem, ex quo tal supposititium concipiunt, & post illarum solutionem & coagulationem spiritum pariunt Quemadmodum ex Saxi & metallis difficillimè salia fiunt, sed cuncta facillè dissolvi & quædam in Vitriola, utpote metalla converti; Ita nec ex corallijs, matre perlarum, quæ saxa marina sunt, sui generis, & oculis cancerorum iridem suæ speciei lapillis salia propriè sic dicta paratu facilia aut possibilia erunt. *Hofmannus.*

4. Oleum gemmarum seu liquor.

Sal Gemmarum optimè solutionibus ac coagulationibus purificatum reponitur in cellam supra maream tabulam, ut liquecat.

N. Felicitus fit mensibus Julio & Augusto, *Croll.*

5. Tinctura seu Essentia: Sal gemmarum exaltatum.

Liquori five Oleo (Magisteriove) gemmatum affunditur ∇ alcalifatus E. Extractio f. a. separatur solutio, abstrahiturque menstruum ad formam usque crassiorem: *Hartm. Quercet. in Pharmacop. rest. c. 24.*

6. Oleum per distillationem. Essentia elaboratior.

A liquore gemmatum evoca ∇ cumque recentis ∇ atque Acet. destill. terebinthinati ana. destilla denuo per retortam: post evocatum menstruum procedant sales in forma Olei. *Hartmann. in Croll. sect. de liquoribus gemmarum.*

7. Extractum Gemmarum, crystalli & lapidum S. Closs.

℥. Pulv. impalpabilem cujuscumque gemmæ; lapid. aut crystalli, tere cum tantundem Sal. mar. decrepit. & reverbera vale tecto in furno figuli per 24. horas, materiam resolve in aq. font. calidâ, agita aquam fortiter & quod solutum erit, effunde per inclinationem in vas aliud vitreatum, ita vicissim procede aliam aqu. calidam affundendo & decantando, donec calx in fundo restet insolubilis, quæ novæ remixioni & reverberationi erit submittenda. Decantatas a. aquas residere permitte, & separa à limo subsidente, in illas projice guttatim ϕ o Tart. ut lactescant, filtra per chartam, crassamentum ille adhærens separa,

para, & limo superiori permisce, idemque de novo age præcipitando, colando, dum nullum amplius limum dederit. Omnes has viscosas substantias in unum junctas per ablutiones plures à falsedine vindica, ipsæ Acet. destill. affunde, digere donec dulcescat Acet. destill. abstrahere ad siccitatem, restabit sal griseum, è quo Tincturam trahes cum V opt. eoque revocato per destillationem apparebit Sapa sive Syrupus Lapid. aut gemmæ dissolutæ ulterius in Essentiam (si velis) provehendus.

8. Syrupus.

Fit dicto modo ex solutione & Saccharo. Vide Syr. corall.

Et hæc de Lapidibus in genere, sequuntur jam Gemmæ. Schröderus.

De Gemmis.

Utium Gemmæ & Lapidis pretiosi rectè in usum venire possint med. cum, an secus; plurimi Doctorum dubitant. Negat HERCULES SAXONIA Brassavo-la in exam. simplic. Thom. Erastus in Disp. contra Th. Para. essum. P. Poterius in Pharmacop. spagyric. & Alij, quia sunt durissima corpora, etsi tenuissima, à nostro calore atteri & in actum deduci nequeunt, unde eadem substantiæ à se eodem modo, quo assumuntur, eodem etiam immutatae rejiciuntur. Verum hæc ratio de nichilo est, non enim hæc alimenta sunt, quæ in corporis nostri æconomiam distribuuntur, sed Medi. alimenta, quæ licet corporis nostri meatui non penetrare valeant, variè tamen mireque Acheum nostrum ventriculi alterando afficiunt, ut in morbis curandis sæpè præstent miracula. Nec obstat, per alvinam regionem sæpè eodem, quo assumptæ fuere pondere & modo iterum ejici, tamen nihil hoc derogat salutari illarum effectu, Dni D. Johannis Michaelis specificum cephalicum, bezoardicum Martiale, solare, lunare &c. eodem etiam modo, quo assumpta fuerunt, rejiciuntur, & tamen maximæ sunt sæpè energię. Ejusmodi enim Medicamenta mineralia citrà sui dissolutionem, citrà sui penetrationem & immutationem liberè, imò etiam eminus operantur in sopitum vel succensum Archeum, solo quasi sui aspectu, irradiatione, vel ejaculatione suarum virium in medio productarum, retentis adhuc pristinis & non mutatis pondere & proprietatibus. Hofmannus.

I. Chrysolithos.

Chrysolithos (veterum,) (Topasius Gemmariorum modernorum) est gemma aurei coloris Germ. Chrysolith. La pierre Chrysolite. Chrysolite, Crysolite.

Duo ipsius sunt genera, Orientalis & Europæus, ille ut colore, ita duritie Europæum superat: hic enim instar Crystalli mollis est, & cum aureo colore vel multum vel parum nigricat.

Inveniuntur in Bohemia passim.

Vires. Natura solaris ex signatura judicatur. Proinde creditur timores nocturnos & melancholiam minuire, intellectum confortare, molestisque insomniis adversari (sinistro scilicet brachio alligatus, aut collo suspensus, atque inclusus) alij commendant ejus assumptionem ad morbum comitalem, & pestem. Schröderus.

1. Chrysolithos. Ab Auro nomen habens, idem sonat quod Lapis aureus, cum reverà aureo fulgeat colore. Nonnulli Pyropon appellant. Modernorum chrysolithos non idem est cum veterum chrysolitho, qui TOPAZIUS est Modernorum, sed veterum TOPAZIUS jam pro chrysolitho habetur, qui gemma est viridis colore, smaragdo dilutior, cui nonnihil flavedinis adiunctum est. Diaphanus quandoque per

viridem aureum fulgentem habens, ac tunc Chrysolithus à quibusdam vocatur. OLAVUS in Museo.

Duo sunt ipsius genera, Orientalis & Europæus. Electas Ethiopia mittit. Arabica turbida & interpolati fulgoris sunt, nubilo macularum referta.

Vires. Natura Solaris ex signatura judicatur; creditur Melancholiam minuire & morbum comitalem. Hieronymus Cardanus de admirandis curationibus refert, Casarem Palavicinum, aliumque nobilem ex oppido Gallarati, Melancholiâ & comitali morbo, alternatim (quorum unus jam quindecim diebus cum febre, Palavicinus alter jam sex mensibus, sed sine febre, verum cum clamoribus) laborantes & frustra à Medicis vexatos, somniferis lotionibus capitis, solo poru pulveris chrysolithi ex vino in octo dierum spatio sic liberatos fuisse, ut nunquam Morbus redierit. Hemorrhagiam vulnerum superalligatam sistere, item libidinis incendia compescere tradunt.

N. Reperitur & in Bohemiâ & in jugis Misniaci ac conteminiis locis, splendore tamen ad candidum languido, fragilis & mollis, ut expoliri non possit.

Alias Chrysolithos in frequentiori Medico non est, sed præfertur SMARAGDUS & SAPPHIRUS. Hofmannus.

II. Granatus.

Granatus est Gemma pellucida, ex flavedine rubens, ignis instar, minijque nativi vel factitij colorem ferè referens. Germ. Grenat. Pierre de Grenat. Grenate. Granat.

N. Sunt diversa genera Gemmarum quæ colorem ignis amulantur, adeoque sub Carbunculis (quo nomine à Carbonibus sumpto, Gemmas illas in genere vocant,) comprehenduntur v. g. Granatus, Hyacinthus, Rubinus, &c. Hinc sunt; qui Granatum faciunt Rubinum colore obscuriore, expositus enim luci aut soli, carbonis imaginem ostendit dilucidius, quam ipsemet Rubinus.

Sunt granati alij (vel alia) Orientales, alij Occidentales. Orientales, ut meliores ita & pretiosiores, proinde provinciam officinalem solis Occidentalibus inquant. Hi sunt tum Hispanici, tum Bohemici, tum Silesiaci. E quibus Bohemici reliquos antecellunt.

Vires. Exiccant, corroborant, medentur cordis palitationi, melancholiae resistunt & veneno, spuitionem sanguinis sistunt, Tartarum in corpore resolvunt, collo suspensi iisdem viribus vulgo celebrantur. Schröderus.

2. Granatus. A pomo granato Nomen habet, est gemma rubea pellucida similis balustij coloris rosacei, obscurior carbunculo. Species est Carbunculi vid. Auctorum Nostrum & Andream Baccium de Gemmis p. m. 55. Sunt autem Alij Orientales, Alij Occidentales. Quamvis gemmæ Orientales ferè omnes ob tenuitatem & perspicuitatem meliores & præstantiores sint Europæis, Granati tamen & in primis Bohemici multis parasangis Orientales antecellunt, dum isti vi fortioris ignis liquecunt, & instar vitri alijus coagulantur, hi autem Bohemici Ignem sustinent fortissimum, & in eo neque colorem, nec pondus mutant, nec dissolunt, sed solidi ex ipsis flammis vicissim emergunt.

Vires. Solaris naturæ sunt, unde & nonnulli Sulphur Solare in se habere opinantur. Hinc sibi persuadent, si hoc Sulphur elici posset, quod metallorum transmutationem hoc medio perficere vellent; Alij volunt hoc Sulphure figere Mercurium. Sed omnia vana sunt. Cordis & cerebri affectibus medentur Granati, unde Melancholiæ adversantur, cordis palitationem sedant, spuitionem sanguinis sistunt, Resistunt etiam veneno, unde Zacutus Lusitanus statuit, omnes gemmas vi pollere bezoardicâ contra pestem, dum veniunt in plura pretiosa aptidiora, de quorum saluberrimo usu legatur Stephanus Castrensis

Libro de Meteor. Microcosmic. Cap. 3. quod ipsum utrum verum sit, nihilominus tamen selectus est habendus. Hofmannus.

Preparata.

1. *Granatus preparat. Fit l. com.*

2. *Magisterium.*

Igniuntur Granati & in Spir. Sal. com. aliquoties extinguuntur, donec solvantur. Soluti, oleo Tartari, in lactis cremorem coagulantur, atque ∇ calidâ dulcorati postmodum usui adhibentur. *Schroderus.*

Magisterium. Hoc prout *Dominus Astor* describit, admodum crûdum est, solubilius & præstantius paratur vel cum sp. Vir. ær. vel Acet. dist. granatis solutis & cum sp. Vitrioli Præcipitatis. *Hofmannus.*

N. 1. *Fieri quoque inde possunt & alia preparatorum formula ad modum generaliter datam.*

N. 2. *Sulphur granatorum Bohemicorum describi Agric. tom. 2. pag. 261.*

III. Hyacinthus.

Hyacinthus est Gemma pellucida, ex flavedine rubens, gâisque flammæ imitans. Germ. *Hyacynth.* Pierre de Hyacinthe. *Jacinct* or *Hyacynth.* *Hyacynthus.*

Sunt alij (vel aliz) Orientales, alij Europæi. Hi inveniuntur ad Iseram fluvium, in confinibus Silesiæ & Bohemiæ, suntque Orientalibus ignobiliores. Quoad colorem, referunt alii colorem miniativi, aut sanguinis admodum biliosi; & hi sunt præstantissimi: alii rubedine Croci flavescunt; alii exactè ostendunt fuccini colorem, & hi viliores: alii albi pellucidi succini colorem referunt, & hi omnium vilissimi habentur.

Vires. *Vim habet cor corroborandi, & à peste tuendi: Singulare quoque est specificum contra spasmodum & contracturas. Amuletum quoque antipestiferum habetur collo appensus, aut annulo inclusus. Quercetian. in Pharm. Rest. cap. 26. B. de B. Schroderus.*

Hyacinthus. Est gemma pellucida ex flavedine rubicunda ignis flammam æmulans. Differt ab *Amethysto*, fulgur violaceus in *Amethysto* emicans, dilutus est in hyacintho, gratus primo aspectu evanescens, antequam saliat, marcescens celerius nominis sui flore. Sunt etiam *Alii Orientales*, *alii Europæi*. Mittit *Æthiopia*, *India*, *Arabia*. *Europæi* inveniunt ad Iseram, fluvium, in confinibus *Silesiæ & Bohemiæ*, suntque orientalibus ignobiliores. *Hofmannus.*

Preparata.

1. *Hyacinthus preparat.*

2. *Sal & Magisterium.*

N. *Hartm. in Pract. Calcinat cum æq. parte Sulphur. vivi (minera adhuc conjuncti non in magdaleones redacti, in crucibulo forti, cum operculo tecto, (non lutato) Δ circulari: 1. lentò. 2. fortiori, tandem 3. fortissimo, donec Sulphur omne exhalet, nec amplius Sulphuris odorem spiret. Hinc eluit optimè & denuo cum ana Sal. nit. calcinat Δ circulari. donec in massam abeat in Δ metalli instar rubescentem. Hinc injicitur in ∇ calidam, eluiurque optimè donec amplius Sal. nit. non sapiat. Hinc pulveri affundit Acet. destill. terebinthinatum, solvitque f. a. donec hyacinthi sint soluti relictis exiguis facibus in fundo. Solutionem filtratam exhalare permittit, ad siccitatem pulveremque optimè edulcoratum exhibet [Sal. hyacinthi] aut cum Oleo Tart. præcipitat. [Magisterium.]*

Dosis \mathfrak{ss} . vel \mathfrak{d} . *Schroderus.*

N. *Hartmannus in Practic. calcinat cum equali parte Sulphuris vivi.* Hoc sal sive Magisterium nihil aliud, est, quam sal quoddam ex acido Sulphuris Nitri &

aceri concretum, in calce hyacinthi, nihil diffrens à Magisteriis crudis vulgaribus beneficio sp. Vitrioli, Nitri præparatis, & cum ol. o Tartari Præcipitatis. Hoc & similis farinæ alius processibus facile superfedere possemus, si Nobis copia foret liquores *BIRRII & ROBERTI BOTLII* gemmas solven is, cujus mentionem facit *Excell. Morhusius in Epistol. de Metallor. transmutat.* p. 15. & 20. ceterè amplissimis Praxis chemiatrix muneribus ornaretur. Interim si loco calcinationis cum Sulphure & Nitro factæ, Spiritus Sal. comm. compositus Acet. dist. mitigatus sumeretur, hujus compositio commodior foret. *Hofmannus.*

[Jaspis, præsertim qui undique rubicundus, in hæmorrhagia multum valere putatur, appensus, calculum frangere assumptus (Claudin. Empir. ration.) partum accelerare femoribus alligatus. B. de Boot.]

IV. Lapis Nephriticus.

Lapis Nephriticus est lapis opacus, variegatus, ex colore viridi, aliique permixtus. Germ. *Briststein.* La pierre Nephritique. *Nephritick Stone for the reins.* *Nierzuchtigh-Steen.*

Rarior hic Lapis in se duos colores habet, semperque viriditatem refert; alius subtili et viriditatem ex albedine, alius viriditatem subflavam, interdum subcæruleam; plerumque ex viridi albo, flavo, cæruleo nigroque colore mixtio est. Poliri exactè non potest, semper enim ipsius superficies pinguis apparet, quasi Oleo inuncta esset.

Adfertur ex nova Hispania, In nonnullis etiam Hispaniæ locis, & in Bohemia reperitur. Tantâ invenitur mole, ut pocula inde fieri possint. Quin imo frustum hic Francofurti conspiciere licuit, ultra libras 50. pendens.

Vires. Commendatur adversus nephritidis aut stomachi dolores, sed ejus præcipua laus est ad nephriticos dolores, calculumque, & arenulas expellendas. Medetur his affectibus brachio vel coxendâ alligatus, aut de collo suspensus. Cujus rei gratiâ armillas inde factas gestare solent. \odot m ingrediente insculpsit signum m.

Prepar.

1. *Magisterium D. a. g. iv. ad \mathfrak{d} j.*

2. *Liquor. a. g. vj. ad xxxv. Schroderus.*

4. *Lapis Nephriticus.* Hic in novâ Hispaniâ vocatur *Thibayoteam*, *Quatzalizoili* id est obscurus *Smaragdus* vid. *Rerum Medicarum Novæ Hispan. Nardi Antonii Rechi Lib. 10. Cap. 7. Igiada Hispani* vocant, Est Lapis opacus obscuri coloris viridis. Ex dictâ Novâ Hispaniâ adfertur. Reperitur etiam in *Nonnullis Hispania locis & in Bohemiâ.*

Vires. Hic Lapis admirandas vires, quas vel gestatus tantum, vel intrâ corpus exhibitus, tum in præsentaneo doloribus Nephriticis auxilio afferendo, tum in arenulis per oculos, vesicam, anum ac totius corporis habitum pellendis, potenter exserit, habet. Hâc tamen observatâ semper cautelâ, ut priusquam hic Lapis in usum ducatur, alvus à saburrâ viriosorum humorum sit liberata, aliàs Lapis ille plus nocebit, quàm opem afferet excrementitiis istis humoribus unâ ad renes deductis. Ideoque corpus prius probè evacuandum est antè Lapidis hujus usum vid. de hoc Lapide *Nicol. Monard. Medic. simplic. ex novo orbe delat. Cap. 31. Johann. Francisc. Ulmus de occult. Medicam. proprietat. Lib. 2. Cap. 7. Matth. Untzer. in Florileg. de Nephritid. Lib. 1. cap. 24. N. Majoris tamen erit efficaciz hic Lapis, si arte chemicâ resolvetur & in jucundum Medicamentum transferatur. Ex illo parat Magisterium suum Nephriticum *Dn. D. Johannes Michaelis* seq. modo.*

Recip. Lapid. Nephritic. Lycis. spongiz.

Perca-

Percarum ana ℥ij. judaic. ℥ij.
Cryſtall. ocul. & glaciei Mariæ ana ℥iv.
Aquilæ ℥iſſ. Ophitis. ℥v.
Ovor. k. truch. ℥v.
pulv. ſubtiliſſ. & aſafo menſtruo f. ſ. a. Magiſteriũ.
Ex hoc Lapide Nephritico etiam Liquor Nephriticus
f. m. confici poteſt:

Recip. Lapid. Nephritic. q. v. redige in pulverem
ſubtiliſſ. affunde ſpirir. Salis q. ſ. ſten in loco calido
per aliquot ꝑ, poſt per inclinationem ſepara liquo-
rem imprægnatum particulis lapidis Nephritici,
aliũ ſp. Salis affunde in eadem doſi, riuſus de-
canta poſt digeſtionem & tertiã vice repete. De-
ſtilla ſolutionem lento igne, donec nihil phlegma-
tis prodeat. fracto vitro materiam indurataſ pone
in locum humidum, ut per deliquium ſolvatur, ſo-
lutionem tertiã vel quarta vice deſtilla, & in loco
frigidioris per deliquium ſolve. Tandem cum ſpi-
ritu vini f. q. edulcora, & pro uſu ſerva. Huius doſis
eſt à gutt. vi. ad xxv. Magiſteriũ à gr. iv. v. ad vj. ℥j.
&c. Habet ille *Lapis Nephriticus* nec minus vim la-
xandialvum; commendatur etiam in capitis dolore
& tumoribus pedum œdematoſis curandis. *Hof-*
mannus.

V. Rubinus.

Rubinus eſt Gemma diaphana rutilans, rubenſ-
que, (exigua porciuncula eſt cœrulei coloris) ac li-
mam reſpuens Græcè *Ῥυβινός*. Arabicè *Jacut*. Latine
Carbunculus, καὶ ῥόζιν. Germ. *Rubin*. le Rubis.
Ruby or *Rubin* *Robyn*.

N. Rubedo ipſius eſt inſta ſanguinis, lacca indica
aut coloris coccei, *Kermſine*. Couleur *Eſcarlatte*.
Scarlet or *crimſon colour*. *Scharlae*: *ken colour*.

Nobiliores Rubini in Inſula *Zulan* naſcuntur,
alii qui in mares, in *Coria*, *Calecut*, *Cambia*, & *B f-*
nagar. Optimi in Flumine *Pegu*. Exploratur boni-
tas ore & lingua. Nam frigidiores & duriores, me-
liores reputantur. Naſcuntur in lapidea matrice ro-
ſei coloris, primumque candicant, deinde paulatim
matureſcentes ruborem contrahunt. Hinc albi imma-
turi. Naſcuntur plerumque in eadem todina, ubi
Saphiri reperiuntur.

Vires. Tradunt rubinum geſtatum, vel ebibitum
venenis reſiſtere, ac à peſte præſervare, triftitiam ar-
cere, libidinem coërcere, malas cogitationes, & terren-
tia ſomnia avertere, animum exhilarare, corpus inco-
lume conſervare, ac ſi homini infortunia inſtent, ea mu-
tatione coloris in obſcuriorem ſignificare, uſque præteritis
iterum priſtinum colorem recuperare. *Schröderus*.

5. Rubinus) à Rubore appellatus, qui inſtar
ſanguinis, lacca indicæ aut coloris coccei rubet. Præ-
ter requiſita bonitatis à Dno Autore adducta com-
mendatur etiam à duritie. Inviſtus ab igne perma-
net, adeo ut illorum color igne etiam augeatur,
incola Zeilan inſula inde diu coqui ſunt. De hoc
ſcripſerunt *Salmaſius*, *Angelus Sala*, *Schneberge-*
rus. *P. Johann. Faber*. *A. Baccius* &c.

Vires. Rubinus geſtatus venenis reſiſtit, à peſte præ-
ſervat, Melancholiam arcer, libidinem coërcet, ter-
rentia ſomnia averrit, ſi homini infortunia inſtent,
ea mutatione coloris in obſcuriorem ſignificat, &
pro majori vel minori infortunio ad majorem vel
minorem opacitatem declinat. Sic reſert *Andreas Bac-*
cius de Gemmis p. 63. Cum Anno 1600. d. 5. Decembr.
cum conjuge ſua *Calviam Stugardiã* proficiſcetur,
obſervare in itinere maniſeſtiſſimè Rubinum
pulcherrimum, quem annulo aureo incluſum ab
eadem dono acceptum in manu gerebat, ſemelat-
que iterum ſplendiſſimum colorem ſerè priuſus
amiſſiſſe, & pro ſplendore obſcuritatem acquiſiſſiſſe:
quæ obſcuritas non ſolum per unum vel alterum
diem, ſed aliquot dies perduravit, ut vehementer per-
Manger. Bibl. Pharm. Tom. II,

territus annulum ex digito removerit & in ciſtam re-
condiderit. Quid ſit intra paucos dies conjux ejus le-
thali morbo correpta diem ſuum obiit. Poſt mortem
priſtinus *Rubini* ſplendor ſua ſponte rediit. Tra-
dunt etiam in coitu, ſi quis eundem ſecum ge-
ſtet, mutari. Hoc ab occulto acido in effluvijs de-
luſcente oriri puto, quemadmodum etiam in cora-
lijs rubris obſervamus à pueris geſtatis decumbenti-
bus à Morbo, ſæpè acidum ſpirantibus.

N. Quantam Eſſentiam *Rubini* habet *P. Joh. Faber*
lib. 3. Myroth. Spagy. p. 626. Sed cujus valoris ſit, ſupe-
rius traditæ à me animadverſiones evincunt. *Hofmann.*

Præpar.

Rubini præparat. more communi.

[in febris utilis]

[Tincturâ *Rubini* factum peli *Kozar. reſut. Doſ. ℥iſſ*
vel ℥iſſ. in aq. *Helen. vel Rub.*]

VI. Sapphirus.

Sapphirus eſt Gemma cœruleo colore, pellucida &
diaphana, German. *Sapphir*, le *Sapphir*. *Saphire*. *Saphi-*
rus or *Sapphier*.

Sunt aliquæ colore cœruleo albidæ, aliæ cœruleo
ſaturo: hæc mares, illæ fœmellæ appellantur, aliæ om-
ni colore carent, albæque vocantur.

Orientalis inventiuntur in *Calecut*, *Cananor*, *Biſ-*
nagar, *Zeilan*, & præſtantiffimæ in regno *Pegu*.

Occidentales, varijs in locis reperiuntur. Conſi-
derant *Bohemix*, & *Sileſiæ* ſatis præſtantes ferunt. Præ-
ſtantioreſ tamen ſunt Orientales.

N. Color in igne facile auferitur.

Vires. Eſt frigida & ſicca, aſtringens, conſol dâns,
alexipharmaca, cordialis; ophthalmica. Proinde ocn-
lorum humiditates exiccat, inflammationem arcer &
extinguit (in collyrijs adhibita, aut butyrô loto excep-
ta, palpebrisque obſtricta ſuperioribus,) valet ad omnia
alvi profluvia, dyſenteriam, fluxum hepaticum, hæ-
morrhoidum, ſangu. uſque rejectiones (aſſumpta cum
aq. plantag. tormentill. &c.) Ulcera interna & vulne-
ra ſanat, cor coërcet, & latificat. pſt. [Anthracibus
impoſitus venenum à corde arcere aſciunt.] omni-
que veneno, febribusque malignis adverſatur: cardiacos ac
melancholicos affectus quoſvis lenit, tollitque; (in uſu
exhibita.) Integra Sapphirus fronti adhibita, hæmor-
rhagiam ſiſtit, ac inflammationibus applicata, eas ex-
tinguit. In orbi ulum redacta piſi magnitudine ac per-
poſita oculis impoſita, pulveres, culices, & quidquid in
oculum deciderit, auferit, oculos à variolis & morbillis
tutatur, &c. *Schröderus*.

7. Sapphirus.) Hebraicè, Græcè & Latine ita nomen
obtinuit. Eſt gemma coloris cœrulei pellucida & dia-
phana. Et vel Orientales vel Occidentales ſunt. Optime
ex *Æthiopiã* & *India* afferuntur, quarum illæ præ cæ-
teris commendantur, quæ apud *Medos* & loca *Libyæ*
vicina reperiuntur, quæ hodie ſyrtis *Barbariæ* exiſtunt,
omnium præſtantiffimæ ex *Pegu* veniunt. Occidentales
paſſim *Goldberga*, *Leoberga*, *Boleſlavia*, *Hirſberga* in tor-
rentibus & rivulis inveniuntur. Magni & pulcherrimi
in prato minore *Iſeræ* in *Sileſiæ*, quæ expolitæ ſæpè
pro Orient. veniunt. Præſtantioreſ tamen ſunt Orient.

Tantæ autoritatis fuit hæc gemma apud veteres, eo
quod etiam apud Deum non minimum valere puta-
runt, Unde & *Apollini* ſingulariter fuit conſecrata.
Nam cum Gentiles Paganicis institutis deluſi *Apolli-*
nem tempore ſacrificii pro reſponſo conſulerent, ci-
tius reſponſo ſe dignari ſibi perſuaſerunt, ſi *Sapphi-*
rum tunc ſecum geſtarent. Tradit *Epiphanius Moysi*
in Monte à Deo leges datas in gemmâ *Sapphiro* fuiſſe
expreſſas.

Vires.) Hæc, præterquam quod omnibus affectibus

ab Autore allatis interviat, abstraheretiam tempore Pestis nasci vetat, & super anthracem posita, non aliter eum, quam aqua ignem exstinguit, ut sæpius expertus fuit Nobiliss. Knæffellius Regis Poloniae archiater in tr. de febrib. malign. curat. ex Antonio Guaynerio Papierfi Medico. Nam ejus malitiam & venenositatem reprimat, ne venenata ejus effluvia ad cor ascendat & spiritus inficiant. Oculos si sæpius tangat ante variolarum eruptionem ab illis præservat; ingreditur cum alijs gemmis nobile illud Eleæstuarium de gemmis & alia antidota cardiaca. Hofmannus.

Præpar.

1. Sapphirus præp. fit modo comm. levigando cum ∇ cordiali.

2. Sal.

3. Liqueur seu oleum.

N. 1. ∇ . Sapphirum duplo pondere Sulphuris commixtam calcina, calcem ∇ stillatitiâ sapius ablue, rursusque exicca. Postea spiritu Vini perfunde ac mæsera, tum rursus exicca, quodque in fundo remanet, iterum calcina, destillaque toties, donec in Vino liqueat nixis instar, tandem abstrahere, & provenit sal, quod in loco humido in liquorem solvitur. Boët de B.

N. 2. Alij solvunt Sapphiri pollinem in Acet. dest. R. & succo limonum, solutionemque cum alio cordiali exhibent mixtam. Schröderus.

Liqueur seu oleum.) Ad hujus elaborationem calcinatio cum Sulphure facta non est necessaria, sulphuris loco & substitui potest, vel spiritu Salis comm. composito pulvis sapphiri in digestionem solvi, & humiditate abstracta residuum in aëre humido per deliquium liquefcere potest; Et à liquore demum spiritus vini sæpe abstrahendus est. Hofmannus.

Essentia seu Tinctura.

Calcinator Sapphirus bis, ac postea oleo Θ -i solvitur; abstracto dein oleo Θ -i cum ∇ Essentia extrahitur B. de B.

VII. Sardius Lapis.

Sarda, Sardius Lapis est Gemma semiperspicua, loturæ carnis, seu carni sanguinolentæ similis, unde & Carneolus, vel cut. uprè Corneolus vocatur, Germ. Corneol. La Carneole. Sarda, Sardius, or Carneol of a fleshy colour. Sardius, Carneolus, van een vleeschachtige colour.

Non omnes uniusmodi inveniuntur coloris, alij enim sunt rubri, alij exigua sanguinis rubedine tincti, alij subflavescentes ex rubedine.

Laudatissimus Carneolus in Sardinia invenitur, hinc in Epyro, & Ægypto, sed Babylonius cæteris præfertur, Indici & Arabici etiam non contemnendi, ut nec Europæi. Nam in Bohemia, Silesia, alijsque Regionibus præstantes inveniuntur.

Vires. Pulvis ad omnem sanguinis fluxum propinatur. Gestatus fertur animum exhilarare, timorem pellere, audaciam præstare, fascinationes prohibere, ac corpus contra venena quavis tueri. Imprimis autem sanguinem undequaque fluentem peculiari proprietate sistere: ventrique alligatus partum conservare. Schröd.

7. Sardius Lapis à Patriâ Sardinia denominatus, quæ insula quædam est, naturâ suâ multa genera tinctorum & purpurarum producat, vel SARDIUS Plinio dicitur, similitudine à Sardis sale conditis desumpta, quarum colorem repræsentet: vel quod loturæ carnis similis sit CARNEOLUS appellatur. Non omnes uniusmodi coloris inveniuntur; alij enim sunt rubri, alij exigua sanguinis rubedine tincti, alij subflavescentes ex rubedine. Laudatissimus circa SARDINIAM reperitur, secundum locum habet, qui circa Epyrum, nostro seculo, Albaniam appellatam

& Ægyptum. Omnibus tamen præfertur, qui in Babylone Assyriorum nascitur.

Vires. Sanguinem undiquaque fluentem peculiari proprietate sistit, vel intus propinato pulvere, vel exterius Lapide admoto, ventri deligatus partum conservare dicitur. Gestatus fertur lætitiâ conciliare, audaciam facere, fascinationes prohibere &c. Hofmannus.

Præparata.

Sardius præparat. modo communi.

VIII. Smaragdus.

Smaragdus est Gemma pellucida & diaphana, grato suo virore pulcherrima, omnium gemmarum fragillima, Arabicè Zamarrut, nonnullis Præsius, Germ. Smaragd. Emeraude. Smaragdus or Emeauld. Smaragdus of Smaragd.

Sunt alij Orientales, alij Occidentales.

Orientales, uti sunt virore amœnissimi, ita & præstantissimi.

Occidentales sunt, tum Peruviani, tum Europæi. Hi reperiuntur in Cypro, Britannia, alijsque in locis, sed reliqui sunt ignobiliores.

Vires. Omnem alvi sanguinisque fluxum, & præcipue dysenteriam ebibitus sistit, nec refert utrum à mordaci humore, an à veneno ortum ea habuerit: venenatis item moribus, pesti, febribus pestilentibus medetur.

Dosis gran. 6. 8. 10.

Inter amuleta præcipue commendatur ad Epilepsiam, partum accelerat, (alligatus coxæ) eundem retinet, (impositus ventri) Hemorrhagiam sistit, (ore conditus) dysenterias omnes, ac hemorrhoidum fluxum indubitato compefcit, (ventri adhibitus; teste Guaynerio.) Timores ac Terriculamenta arcere fugareque, ac hamitriticam febrem tollere creditur, & collo pendulus, &c.

N. Frangi Smar. in coitu quandoque experimento comprehensum dicunt. Card. Schröderus.

8. Smaragdus.) A splendendo nominatur, nam nihil jucundius viridi colore splendet, cujus coloris elegantissimi hæc gemma palmam obtinet, est enim gemma pellucida & diaphana, grato suo virore pulcherrima, ut oculos intuentium perstringat, & ubi reliquæ gemmæ jubare Solis aureo fulgente pallidulæ fiunt, & in tenebris constitutæ nubilosæ redduntur, incomparabilis Smaragdus coruscans aërem vicinum & circumfusum splendore suo perstringit, ut nec flamma nec umbra quicquam immutare possint.

Trium sunt generum Smaragdi, quidam in Scythia, Ægypto, & alijs locis reperiuntur. Orientales tamen sunt præstantissimi, uberrimâ oculos viriditate saturantes, à Mercatoribus avidè expetuntur, ut facile non prostant venales plebeculæ. Paliacatta & Bisnagar viridi adulterant vitro. Nonnullos Peru ministrat, sed non ita viriditate superbientes, duriores tamen Orientalibus. Unde non desunt, qui statuunt, Lapidem hos de Peru, Smaragdos veros non esse, sed lapidis Præstii fragmenta, qui in illa insula copiosus est. Tertium genus Mexica supeditat minoris pretii, duriores tamen adhuc Peruvianis & splendidiore, toto cælo tamen differunt à reliquis.

Vires. Specificum est contra dysenteriam à quacunque causa fuerit. Medetur etiam convulsionibus epilepticis, tam intus quam extus loco amuleti gestatus in annulo. Moribus venenatis, pesti & febribus malignis resistit. Alligatus coxæ partum accelerat, ventri impositus eundem retinet. Hamorrhoidum fluxum sedat umbilico impositus. Smaragdo Motus obsec.

obscenæ libidinis valde est molestus, sive enim mas; inquit G. Agricola Libr. 6. de Naturâ fossil. fol. 289. sive fœmina, dum commiscunt corpora, eum gestet, ut cutem attingat, vel à collo pendulus vel annulo gestatus dilumpitur. vid. & Card. de subtilitat. Hofmannus.

Preparata.

1. Smaragdus preparat.

2. Sal. & Tinctura Smaragdi.

Smaragdus pulverisatur, ac per linteum trahitur; hinc superfunditur Spirit. Urinæ, qui aliquid phlegmatis adjunctum habet, ut colorem extrahat; spiritu dein iterum destillatione abstracto, in fundo remanet Extractum (sal) gryseum, è quo tandem (citra edulcorationem) vi V extrahitur color seu Tinctura summè viridis: abstrahe igitur ad aliqualem consistentiam & serva.

Dosis gran. 10.

B. de B. Harim. in Practic. de Dysent. Tentzel. in Exegesi sua, Finck in Enchirid.

Vires. Dysenteria & fluxibus alvi quibuscunque mirifice prodest, nec minus utilis est in cordis & capitis affectibus Palpitatione, Melancholia, Paraphrenitide, Syncope, &c.

N. 1. Urina quicquid potest vis sui salis facit: hinc non errabis, si ∇ stillantiam convenientem Sal. com. urine acutam loco menstrui adhibueris. Imprimis quoque, quia Urina simpliciter destillata, n si sale sub acuatâ sit, laborem irritum facile reddere potest.

N. 2. Tinctura hæc nihil aliud esse videtur; quam Elixr, constans partim ex Smaragdi substantia, partim quoque ex sale Urinæ, dictâ substantiæ, commixto. Schroderus.

Tinctura Smaragdi) Quæritur, An Tinctura h. m. preparari possit? Angelus Sala negativam defendit in aphor. Tincturam h. m. ex gemmis extrahi posse; Huic Laurenbergius contradicit. Et sanè si dicamus, quod res est, juxta præscriptum modum Autoris si laboremus non procedet; experientia edocet chemica, dum spiritus urinæ neutiquam solvit repagula Smaragdi, in quibus Tinctura ejus abscondita. Quod si possibile esset, ut Smaragdus prius beneficio tritute in subtilissimum alkohol redigi posset, & deinde ex hoc cum spiritu urinæ sale ejus volatili acuatâ Tinctura extrahi, haberemus nobilissimum Medicamentum tam in Peste, quam Dysentia epidemica. Hofmannus.

De Corallis.

Lapidibus pretiosis subjungimus Corallia & Margaritas, utpote quæ non modo substantia & viribus; sed & præparationibus, & inde refulantibus præparatis, Gemmis adsimulantur.

Corallium est frutex sub aqua marina generatus; Græcè κοράλλιον & κοράλλειον. Arabicè, Bassad. Meragen seu Mo-gan, Beld. Latine, Corallium, Coralium, Corallum; German. Corallen. Coreaux; Corael.

N. Corallia generari ex succo lapidescente certum est: utrum autem succus ille per se in fruticem lapideum prorumpat, vel an prius ligneam suscipiat figuram subindeque in lapideam vertat, vel denique an plantam (emortuam) sub marina aqua repertam, penetret, transmutet, adeoque hujus figuram retineat, dubium. Dubitandi o: casionem præbet, quod frutices Coralliorum dentur, qui ex parte ligni adhuc referunt substantiam; partim Coralliorum. Nos, posthabitis ejusce farinæ dubitationibus, qualis præter hanc, & illa est, quem habent de fructibus Coralliorum granulatis, quod alii negant, alii perhibent: Item de induratione, quam alij fieri statuunt, simul ac Coralli frutex extra aquas esse incipit, alij etiam in ipsa ∇ Corallia indurari volunt. Manger. Bibl. Pharm. Tom. 11.

lunt: utpote quas scire parum est emolumenti, ignerare parum detrimenti, pergitur ad ea, quorum Medici interest, differentias scilicet, vires & præparationes. Schroderus.

Corallia Nos dicimus lapideam seu saxeam in fruticis speciem concretionem, non casu, sed Naturæ ordinatione sub aqua marina generatam ex succo lapidescibili (sive tincturæ sive menstrui rationem habeat) semine petroso specifico imptagnato. Remota Materia aqua est; quæ seminis petrosi fluxu maturato coralliorum corpus constituentis figura; & motu apta reddita fuit, ut stabile inde & solidum corpus illorum prodeat. Alexander Achilles in Libro Germanico de causis terræ Motus & Mineralium, Coralliorum productionem exhalationibus Auri; Margaritarum v. id. Argenti vaporibus, qui è terris in jectis istarum minerarum feracibus evehuntur, adscribit. In cuius rei fidem experimentum affert de virgula venarum attingentium indice, quæ ad upiones vel ostrea aequè ut argentum se inclinaverit. Hæc utut se habeant, certè magna affinitas ratione virtutis cardiacæ. Aut cum corallis, & respectu cerebri Margaritis cum argento est.

De induratione, quam alij fieri statuunt, simul ac coralli frutex extra aquas esse incipit, alij etiam in ipsa aqua corallia indurari volunt.) Corallia saxei sunt frutices, habentes, ut & aliæ gemmæ, vim vegetativam, eò quod crescant, unde ego vidi apud Nobil. Rolfinckium p. m. instar arbusculæ. Inter ea recepta est inter Naturæ curiosos traditio, Corallia nasci mollia in fundo maris, at cum in aërem liberum fuerint producta; licet magnitudinem & figuram suam retineant, in lapideam concretionem indurescere. Unde Ovidius 4. Metamorph. pulcherrimam de Medusæ capite fabulam affert; scilicet, cum Perseus caput Medusæ abscissum in arenam substratis folijs & virgis ad litus poneret, virgæ induruerunt tactu capitis. Quod fieri cum Nymphæ pelagi viderent, & pluribus in virgis contingere viderunt, sparserunt illas virgas hinc inde per mare, quæ semina quasi mansere coralliorum, id quod scite his versibus exposuit:

Nunc quoque Corallus eadem Naturâ remansit,
Duritiem tacto capiunt ut ab aëre, quodque
Vimen in aquore erat, fiat super aquora saxum.

Idem Libr. 15.

Sic & Coralium quo primum contigit auræ
Tempore durescit, mollis fuit herba sub undis.

Sitne hæc traditio vera an secus, quæritur: Corallia sub aquis mollia non esse, experimentis probare conatur ultima Tirocinij chemici editio à Pelskov vero procurata Witteberge Anno 1650. Sic enim Libr. 2. Cap. 10. p. 153. dissent. Generosus Dominus Johannes Baptista de Nicolao, Eques Massiliensis, & regius piscationis Corallorum in Regno Tunetano præfectus, certò mihi confirmavit, quod cum Anno 1585. mensè Julio in mari Bizertino regni illius Tunetani piscationem instituisset, cupiditate Naturæ corallorum investigandæ adductus, juvenem funibus sufficienter longis alligatum & pondere viginti quinque librarum in utraque manu ad descensum liberiozem, in mare istud centum perticas profundum demiserit, ipsique in mandatis dederit, Corallium ut evelleret; & inter evellendum curiosè attenteque observaret, an molle, durumve esset. Qui, ubi rursus ascendisset, utraque manu Corallum attulerit, constanterque asseruerit, illud non minus in sub mari, quam supra illud durum esse, & se cum ad octo perticas aut circiter propè fundum maris appulisset, magnam ibi frigoris vim sensisse. Imò quod ipsemet etiam cum relationi ejus fidem adeo non haberet, in mare cum retia, quibus corallia piscari solent, contrahenda essent, antequam in ipsam aërem efferentur, ad

profunditatem unius perticæ se immerferit, & corallium reti adherens manu prehenderit; idque tum æquè durum ac cum aëri externo esset expositum observasse. Idem etiam confirmavit *Ong. de la Poitier, Nobilis Lugdunensis*, qui Anno 1613. ab ejusmodi piscatione reverfus est. Retulit quoque *Dominus de Nicolai*, quod vere, quando corallium evelitur, liquor quidam lacteus ex eo inter frangendum emanet, qui decidens super lapidem, lignum, ferrum aut aliam materiam corallii duritiem induit. Contrà *Nob. liff. Robertus à Boile* in tr. de fluiditate & firmitate sect. 65. part. 2. quicquid, inquit, nonnulli dicant ad fidem traditioni derogandam, quin imo quàm fidenter etiam *Beguinitis* eam rejecerit, negandum non est interdum saltem id verum esse. Eruditus, pergit, *Gassendus* in vitâ *Pierreskj* Libr. 4. Anno 1624. verba faciens de curiositate, quâ vir ille incomparabilis ductus fuerat piscandi Corallium propè Tolonem, Nobilem non procul à Massiliâ portum, inter alia hoc refert; Plantæ revulsæ & protractæ nec rubræ erant, nec elegantes, nisi deglubito cortice, in quibusdam partibus molles erant & manus cedebant, uti summittatur versus, quâ fractâ & pressâ Lac, simile lacti ficuum, emittebant. Cui adteritioni adstipulatur *Jesuita Fournierus Gallicus hydrographus* scribens de Massiliâ & Tolone, dum inquit: Hæc plantas nec rubere nec politas esse, quando ex aquâ extrahuntur, donec cortex excutitur; quin imo molles esse, & fractas, vel etiam intra digitos pressas lac quoddam ficuum lac referens emitte, & si premerè desinas, videre licet foraminula seu poros, ubi lac expressum hospitabatur. Et huic etiam subscribit Medicus quidam Practicus in Indiâ Orientali, qui in reditu suo per aliquod tempus in Mohila, Insula prope Madagascar substitit, ubi corallium album copiosè nasci fertur: à *Roberto à Boyle* rogatus, ullumne legisset, & num molle, cum cretceret, deprehendisset? Ipsi respondit, se nuperis annis in illius Insulæ arena aliquoties corallium legisse, & quando legeret, valde album reperisse ac cæpæ ad instar molle, adjiciens, quod licet brevi temporis spatio in aëre duresceret, attamen probè notum sit nautis hanc mercaturam exercentibus, nisi tempestive legatur, non diu durare, sed vel dilabi, vel aliâ ratione diminui. Id quod non disconvenit cum *Pisone* in *Naturali sua historiâ Brasiliæ* Libr. 4. cap. 68. de quibusdam locis oræ Brasiliæ verba faciente, ubi plures plantas lapideas alias arbusculis similes, alias aliter formatas, sereno cælo in fundo maris nascentes videri dicit, quod è fundo erutæ mox durissimæ, si insolentur in littore, sicæ & nivi coloris fiunt. Sed hæc obijciunt nonnulli, si corallia sub aquis mollia existerent, quâ ratione rapido maris motui resistere possent? vel piscium transeuntum impetum sustinere? Et si in aquis omnino essent mollia, unde post eorum extractionem durities? Verum, ut ex hac ambigua disceptatione me expediam, hæc distinctio mihi non adeo absconsa videtur, qua distinguitur in corallorum germinationem, & perfectam illorum formationem. Qui corallia sub aquis mollia offenderunt, illi inciderunt tunc in illorum germinationem, qui autem piscatorum retia ab eorum duris furculis dilacerarunt, perfectè jam formati implicuerunt corallis. Nec obstat corallis mollibus sub aquis germinantibus rapidus maris motus; Nam quamvis ventorum truculentia in superioribus aquæ partibus libidini eorum expositis vastos ciete fluctus possit, vehemens tamen illa agitiatio in partibus profundioribus, quæ à vertice sunt remotiores, per gradus diminuitur. vid. *Nobiliss. Robert. à Boyle* in *Relation. de Fundo Maris* sect. 3. Durities autem post eorum extractionem oritur ab ambientis aëris sale æthereo, sive centrali, quod succi il-

lius lapidifico spiritu turgidi molliem in perfectum saxum convertere aptum natum est; quod corallia in aquis tandem etiam perfectam formationem adeptâ planè lapidescant, nullum est dubium, invalescente spiritu lapidifico & indurante eadem, ut perfectissimam suam acquirant substantiam. Habemus similia Naturæ exempla, quæ allatam sententiam de Corallorum in mari mollietate & illorum in aëre duritie confirmant. Sic succinum interdum molle ex mari extrahitur & in aëre induratur. *Gassendus de Pierreskj* refert, ipsum tempore æstivo lavare se solitum in quodam ex minoribus Rhodani rivulis, sequentem hanc observationem fecisse. Deprehendit aliquando fundum, quod aliàs æquabile & molliusculum observarat, induruisse in globulos & moleculas, qualia ova sunt cortice detractò, ubi coctiora fuerint, id demiratus collegit & detulit aliquot domum, ut Præceptoris ostenderet, & facti causam sciscitaretur. Miraculum verò adauctum, ubi post dies non ita multos, cum redisset ad fluvium, deprehendit moleculas induruisse in fluviatiles lapides. Præterea meminit etiam *Boylus l. 6. sect. 78. p. 2.* argillæ cujusdam viridis quæ reperiatur propè flumen Amazonum, attestante *Petro Pelleprat* in succincta sua de continenti Americana Relatione, & molliis sit, quamdiu sub aqua delitescit, ut quasvis ei effigies imprimere possis, sed aëre exposita eò usque durescat, ut adamantes duritie excedat, & secures ad ligna findenda inde parari queant. *Hofmannus.*

Differentia.

Corallij variæ sunt ratione colorum differentia: aliud enim rubrum est, aliud nigrum, viride, subflavum, cinereum, fuscum, aliove mixto colore ornatum. Cæteris omnibus præfertur rubrum minij nativi colore, quod masculi nomen obtinet; & hoc recipiendum quoties simpliciter corallium præscribitur sine coloris mentione. Palescens fœminæ nomen habet. Huic succedit corallium album; deinde nigrum, (Antipathes olim dictum.) Nam quod alio colore est, neque in usum adhibetur, neque pro corallio, vulgo habetur.

Rubrum, in India & Siene, teste *Plinio*, reperitur, nunc in Mari Tyrieno & Siculo passim invenitur, Neapolimque adfertur, ubi politur. Hoc antequam rubescat, & quodammodo maturum fiat, videtur varijs coloribus tingi. Nigrum reperitur in Gallicia Hispaniæ. Album reperitur rarò, solidumque est, & cavitatibus caret, quibus signis distinguitur à specie quadam, Hispanis Polo dicta, quæ in Catalonia ab ijs qui corallium rubrum quærunt, inventa pro corallio albo pretio viliori divenditur. Caret hoc cortice, cretq; in fundo maris, non in saxis, ut rubrum coralliū.

Vires. Corallium omne exicat, refrigerat, adstringit. Cor præcipue, deinde ventriculū & jecur roborat, sanguinem purificat, ac proinde pesti, venenis, febrisque malignis adversatur, bilarem hominem efficit, (nigrum tamen Corallium homines melancholicos reddere perhibetur,) sistit fluxus quosunque atteri, peni, Gonorrhæam, Epilepsiam infantum præcavet, (si recens nato ante omnem cibum in lacte materno gran. 10. exhibeantur.) Extrinsecus commendatur ad ulcera, quæ carne explet; ad cicatrices, quas extenuat; ad oculos quorum etiam lachrymas sistit visumque recreat in collyrijs.

Dosis à ℥j. ad ʒj.

Rutilantia Corallia ex communicatione *Paracelsi* amuletum exhibent celebre contra terriculamenta, fascinationes, incantationes, venena, Epilepsiam, Melancholiam, Demonum insultus, felmina. Album appensum, ut pectus contingat, hamorrhagiam sistit mulierum, & fluxum album.

Corallii varia sunt ratione colorum differentia; aliud enim rubrum est, aliud nigrum, viridè, subflavescentè, cinereum, fuscum, aliòve mixto colore ornatum. Cateris omnibus præfertur rubrum &c.) Quod rutilante cinnabaris nativæ colore sese commendat & masculi nomine venit. Palescens fœminæ nomen habet; Rubrum jam in mari Tyrrheno & Siculo passim reperitur, & Neapolim adfertur, ubi politur. Coloris rubri incunabula in coralliis prædominantis communiter ex Sulphure Autores deducunt, tanquam fonte omnium realium colorum vid. *Kircher. in Mund. subterr. Libr. 9. s. 3. Cap. 6. P. Faber. in Panchym. Libr. 4. c. 25.* Verùm in examinandâ hac sententiâ tempus non perdens paucis me expediam, reales & permanentes colores ex corporibus metallicis v. g. Φ rio, Θ re, Ψ no &c. extrahi, absque vel Mercurii, salis vel Sulphuris additione vel subtractione, & ex diversis corporibus, quæ singula seorsim coloris sunt expertia, momento temporis colorem valdè saturatum generari; imò unum sæpè colorem in alium transmutari, ut causam habeam sufficientem statuere, colores non nisi vel ex naturali vel merè mechanicâ texturæ in minoris corporum partibus mutatione, vel à textura ex coitione diversi generis corpusculorum emergente dependere, aded ut veri colores planè de novo generari possint, & planè aboleri, vid. *Cartesius in Dioptr. c. 1. §. 8. Denſing. in examin. pulver. Sympathetic. p. 263. & in theatr. Natur. Univers. part. 1. Disp. 3 q. 1. Digbaumi de Corpor. Nat. Cap. II. p. 349. Robert. à Boyle in chymist. sœpt. c. part. 5. p. 213. & in tr. de coloribus.* Jam quod colorem Corallor. concernit, itidem non à sulphure, cujus ne gry. quidem inest, nec per mechanicam ejus separatio à Corallis demonstrari potest, deducimus, sed ex nudâ naturali texturâ diversarum partium figuræ & illarum coalitione. Quæ textura coralliorum rubrorum sæpè ab atomis & effluviis ex corpore gestantium cachecticorum vel cacochymicorum emanantibus & in porosulos eorum penetrantibus invertitur, ut pallore inficiantur, contra verò effluvia ex sanguine hominis sani expirantia rutilantem illorum colorem potius conservant & adaugent.

Non in Saxi, ut rubrum corallium.) Non determinatum habent locum, neque rupibus nec saxi & petris determinatè adhærent, sed adnascuntur etiam lateribus, ossibus, tabulis ligneis, ferramentis, quæ cum Corallis sæpè extrahuntur, imò & ex duro delphini corio Corallia propullulant. Sic Pisis Dux *Heurria* in suo Rarithecio Cranium habet humanum, ex quo corallina planta excrevisse spectatur.

Vires.) Omnis illorum virtus dependet ab occulto alcalisato, quo acidum præternaturale in massâ sanguineâ præcipitant, nec dubium, quin singulari etiam proprietate spirituum vitalium substantiam confortent, illorumque tenorem conservent. *Hofmannus.*

PRÆPARAT.

Operationes, quibus Corallia elaborantur, sunt 1. *Præparatio.* 2. *Calcinatio.* 3. *Solutio.* 4. *Coagulatio.* 5. *Liquatio.* 6. *Sublimatio.* *Sch. oderus.*

Præparationes. Operationes, quibus Corallia subiciuntur sunt 1. *Præparatio.* 2. *Calcinatio.* 3. *Solutio.* 4. *Coagulatio.* 5. *Liquatio.* 6. *Sublimatio.*) Omnes dictæ operationes prout *Dominus Autor* proponit, exceptâ præparatione, quæ fit per tritum seu pulverisationem, potius destructiones, quàm veræ & genuinæ Corallorum præparationes sunt, dum hisce Corallia suis genuinis privantur proprietatibus & potestatibus, contra verò adulterinis imprægnantur & inficiuntur. Prout ex sequentibus patebit. *Hofmannus.*

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

I. Præparatio.

Præparatio nihil à regula communi diversum habet.

II. Calcinatio.

Calcinatio Coralliorum est vel Ignitionis vel corrosivonis.

Calcinatio Ignitionis est tum mitior, tum violentior, tum reſinctoria.

Calcinatio mitior.

Fit igne reverberii, dando tamen calorem secundî gradus, ne tinctura seu color ipsorum ignis violentiâ exhalet. *Querc. de præparat. Medic. Spagyric.*

Ignitio violentior.

4. Corall. integror. q. v. calcina Δ reverberii primùm lento, ut saltem viva flamma corallia in furno reverberii posita, superficietenus lambat. Corallia hoc modo, primo gradu albescentia, tamdiu Δ gradatim aucto fatiganda sunt, donec ex albedine in flavedinem, ex flavedine in rubedinem summam deducantur, corpore toto reddito spongioso ac levi, id quod plerumque biduo vel triduo absolvitur.

Sic Corallia facta sunt habilia ad deponendam in tincturam. *Hartm. in Croll. Sensist.*

N. Si Sal. Coralliorum propriè sic dictum desideras, vehementi uestione eadem in cinerem redige moreque solito lixivium inde faciendo, salem elixiviando extrahe. *Schroderus.*

Si sal Corallorum propriè sic dictum desideras.) Corallia in cinerem velle redigere, est Lapidem exilare; in calcem quidem redigi, sed non in cinerem abire possunt; Et si Sal. quoddam post calcinationem ex illis acquiris, illud tamen nec materialiter, nec formaliter in illis fuit, sed flammæ productum est ex spiritu acido ex lignis aut carbonibus combustis exstuantè, cujus successivus motus à novis accensis lignis aut adjectis carbonibus subinde suppeditatur, suam habens originem, ille dum corallia invadit (nam imbibunt acida) augetur illorum pondus, quâ ratione etiam notum est h. turrium in testâ probatoriâ accepisse incrementum, Quid Marti Vulcani torturæ exposito largitur *Crocum*. Unde colores in flammâ Ignis carulei variegati iridem æmulantes in ratione Φ rij cum Salibus, destillatione spiritus Vitioli, Nitri & Sal. comm. &c. si forte vas sublimatorium vel retorta rimas contaxerit? *Hofmannus.*

Calcinatio Ignitionis extinctoria.

4. Corall. grossè trit. candescant in igne, extinguanturque multoties in Acet. destill. ut solvantur. Filtra dein abstraheque Acet. destill. & consequetur sal. corallorum per deliq. resolubile. *Med. destill. part. 1.*

Calcinatio Corrosivæ, 1. Cum Sal. nit.

4. Corall. tritor. atque Sal. nit. ana crema, ut duodecim horis fusa, liquoris modo fluant: vel combure ad consumptionem Sal. nitri, deinde duas horas candentia in igne consistant. *Less. 1. cap. 8.*

Aliter.

4. Corall. subtiliter trit. ac Sal. nit. ana M. injice per vices in retortam tubulatam candefactam cum Excipulo apposito. Tubulum ab injectione statim obtura, & cum penitus materia injecta fuerit, continuo igne hor. 18. corallia probe calcin.

Hac adscribitur *Hartmanno*, unde Tincturam fecisse dicitur.

2. Cum Sulphure.

7. Corall. tria. p. iij. Sulphur. p. i. (alii an.) calcina Δ circulari per hor. 2. Postea ignita adhuc infunde in Acet. destil. (ad coral. 3j. Acet. destil. \mathcal{V} l.) vas mox operculo claudendo: Hinc digere per ϕ 14. abstrahe, &c. Sennert. Instit.

3. Cum Pumice.

7. Corallia grosse confusa F. cum pumice isto S.S.S. cementoque in vase clauso. Δ reverberii, spatio ϕ 3. Quo opere finito pumex, relicto corpore albo, coralliorum tincturam imbibisse creditur. Gans. de Corall. verum impugnat idipsum Tenzel, in exegefi, p. m. 512. Schröderus.

Calcinatio ignitionis extinctoria. Calcinatio Corrosionis 1. cum Nitr. 2. cum Sulphure. 3. cum Pumice.) Ex eodem censu & hæc sunt, qualia antecedentia fuerunt, ex his enim æquè non Corallorum, sed Acet. dist. Nitr. Sulphuris &c. Salia emergunt. Corallia tanquam soluta facillima faciliè à quovis acido solvantur spiritu, & in soluta corallia, si aqua affusa diluuntur, convertuntur. Hofmannus.

III. Solutio.

Liquores, quorum beneficio corallia solvi possunt, varij occurrunt. Præcipui tamen sunt Acet. destill. commune & radicum: sc. ecus berber. melon. citri. ros. majalis, (spiritus ejusdem cum suo Sal. com. acuat) liquor betulæ: spiritus mellis, (panis,) terebinthinæ, ligni guajaci, buxi, juniperi, quercus, summitatum alni, sorbi sylvestris, spir. Sal. com. spir. ϕ , spir. Tart. ut & \mathcal{V} idem acuat, spir. corallior. ardens; Phlegma \mathcal{H} optimum, &c.

Quinimo corallia cum Sulphure calcinata simplex solvit ∇ .

Modus solvendi nihil peculiare habet: Nimirum corallia in liquoris s. q. solvantur, s. a. donec penitus ferè soluta sint. Schröderus.

3. Solutio.) Allegati liquores omnes ad Corallorum potius tendunt destructi onem, quam legitimam illorum præparationem. Acet. dist. succus berberum Citri. sp. ros. majalis. liquor betulæ, sp. mellis, terebinthinæ, ligni buxi, guajaci, quercus sp. Sal. comm. Nitr. Virioli &c. Corallorum repagula non solvunt, sed arroduct saltē. Verum autem ac genuinum solvens vide infra. Hofmannus.

Purificatio & Edulcoratio salis & Magisterii fit plerumque ∇ destill. vel si placet, adhibere poteris rorem majalem è tritico collectum & destillatum, aut aquam aliquam cordialem: coagulantur dein vel liquoris abstractione, (cum destillatoria, cum Evaporatoria) vel præcipitatione.

Præcipitatio perficitur instillatione Ol. Tart. p. d. spir. ϕ i, vel ∇ destillatæ, vel Ol. Sulphur. p. c.

Reliqua operationes ex sequentibus faciliè innotescunt.

Præparat.

I. Corallia preparata.

Fiunt cum ∇ cordiali (rosarum) s. a.

N. In usu sunt preparata rubra ac alba.

II. Pulvis Corallorum ϕ latus.

7. Corall. rubr. præp. 3j. Ponantur in cucurb. affundendo aq. ros. 3vi. ϕ li 3j. Statim ebullient & elevabuntur in bullas, quibus cessantibus reponatur vas in MB. per horas aliquot, effundatur aq. per inclinationem, qua erit insipida, in fundo reperies calcem albam cum acore astringitorio, sed acrimoniâ carentem.

III. Sal Corallorum.

Fit ex rubr. corall. 1. Unitatiùs per Acet. destill. ut moris: vide supra.

2. Per succum berber. & limon. Quercetan. in Pharmacop. rest.

N. Nonnulli 7. Succu limonum expressi & depurati \mathcal{V} l. liquoris betula mense Aprili collecti \mathcal{V} l. coquant ad casum \mathcal{V} l. cui denuò addendo succi Limon. \mathcal{V} l. destillant aliquoties rectificando. In hoc solvunt corallia, perlas, & simil. solutionemque propinant. Hartman. in Croll. de perlis.

3. Per spiritum seu liquorem acidum Guajaci. Sic purgat optimè sanguinem in lue venerea. Hartman. in Pract.

4. Per spiritum ϕ i.

5. Per spiritum Sal. communis.

N. 1. Solutiones cum spir. ϕ i aut Sal. communis factas si citra menstrui separationem in usum vocare volueris, circula aliquandiu & magnam acrimoniâ partem amittent, præcipue si quoque \mathcal{V} m affuderis.

Vires. Ex superioribus repetere.

Dosis à gran. 6. ad 20.

N. 2. Paracelsus calcinat primo corallia leviter in reverberio cum Sal. nit. ana: hinc solvit digerendo cum \mathcal{V} . Postea \mathcal{V} abstrahit, salque relictum per deliquium solvit, idque vocat Magisterium. libr. 6. archid.

IV. Sal dulce Corallorum.

Calcinentur per biduum in furno figuli ad albedinem summam, solvantur in Acet. destill. Stent in loco tepido per octiduum. Rubescet solutio, menstruum abstrahere lento Δ ad siccitatem usque: sal hoc resolve pluries in Rote majali, filtra & coagula, tandem siccatisimum & albisimum salem denique per 3. septim. in Ciner. calidis, ut majorem acredinis suæ partem deponat.

N. Acet. destill. pro hac solutione bis aut ter cohobandum est super herbam Kali, ita minus fit mordax & tamen non minus corallorum, ut & perlarum solutivum. Schröderus.

Præparata. 1. Pulvis Corallorum Vitriolatus. 3. Sal Corallorum. 4. Sal dulce Corallorum) Hæc in salium illegitimum sunt numero, quæ cum spiritibus acidis corrosivis Acet. dist. Virioli, Salis, Nitr. &c. præparata sunt, & quamvis ex corallis extrahantur ista salia, illa ipsa tamen corallorum non sunt, sed solutiones salinæ corporis totius corallorum à spiritibus acidis inductæ. Hofmannus.

V. Magisterium.

1. Magisterium Officinarum.

Instilletur in solutionem corall. (cum Acet. destill. factam) Ol. Tart. per d. præcipitatus pulvis, edulcoretur ∇ a destillatâ.

N. Alii præcipitant cum spir. ϕ i.

Vires. Ut Magisterium a sale non differt substantiâ: ita nec viribus, nec dosi. Schröderus.

5. Magisterium.) Et 1. Officinarum hoc admodum crudum est, ac minus resolubile, non distans à terrâ mortuâ Optima præparantur Magisteria cum sp. Vir. ær. iucco Citri, Acet. dist. &c. Resolubilia enim sunt, & ob tenuitatem partium in omni liquore solubilia. Hofmannus.

2. Magisterium butyraceum.

Solve coralli. in spiritu magico, (id est, spiritu ros. majalis, vel quod idem, in Acet. destil.) præcipita cum Ol. Sulphur. per C. præcipitatum edulcora ac digere aliquandiu cum \mathcal{V} i, quo iterum abstracto habes magisterium in ore instar butyri liquefens.

Huc

Huc referri potest & Galreda Coralliorum. 74. Corall. præparat. & * Fiat destillatio ex Arena, sic ascendet Sal, remanebitque in fundo massa instar Galredæ.

3. *Magisterium plumaceum.*

Solve s. a. corall. in spiritu non dephegmato, destillato ex Sal. com. & O. ana ℥ij. formatis sc. cum argillæ ℥ij. vel iij. in globulos, videlicet vel per vices injiciendo corallia in spiritum, vel è contra corallis spiritum eundem per vices superfundendo: decanta solutionem, filtra, (affundendo, ut eo commodius filtrari possit, ∇ destillatam rosatam, si placet:) præcipita cum Ol. Sulphur. p. C. vel spirit. & i edulcra aqua cordiali & exicca.

N. 1. Cum corallia velut ascendere desinunt, menstruum debilitari incipit, subsiste igitur & inspissa aliquantulum.

N. 2. Menstruum superius si tandem igne fortissimo fatigaveris, ascendit materia salina rubescens.

Aliter.

Solve s. a. corall. in spir. Sal. nit. filtraque (affundendo aqua pulv. destillatam,) hinc præcipita cum Ol. Sulphur. p. C. edulcora & exicca.

N. Hoc modo in magisteria præstantia redigi possunt & perle, ossa, cornua (e. gr. C. C.) angula, nec non crustacea.

En candide Chymicæ Cultor, insignes plumaceorum magisteriorum processus gratis tecum communico, magni aliàs emptos, quos cum plurimis aliis ex communicatione obtrui Viri solertissimi Dr. Joannis Salz-vvedelii Pharmacopæi apud Mœno-Franco-furteneses celeberrimi.

N. *Querc. solvit in spirit. salis Natura. Pharm. rest. cap. 24.*

VI. Oleum seu liquor corallorum.

N. Oleum Corallorum propriè oleum, non est, sed liquor, vel per deliquium factus, vel per destillationem prolectus; de priori hic agimus, de posteriori paulo post in spiritu. Schiöderus.

6. *Oleum seu Liquor Corallorum.*) Omnes dicti liquores nihil aliud sunt, quàm salia resoluta menstruorum acidorum, quibus corallia corrola fuerunt, aliquid de corallorum substantiâ participantia. Interim quoad vires non dubito, quin salium istorum naturam, quæ in resolutione, & vi diureticâ & aperitivâ consistit, sequantur. *Hofmannus.*

Fit liquor ex sale.

74. *Sal corallorum, repone, ut liquecat per deliquium.*

N. 1. *Liquefit feliciter mensibus Julio & Augusto.*

N. 2. *Liquefit promptius si solutio aliquamdiu (& 14.) digeratur. (ut rubescat) ac dein (Acet. destil. abstracto) optimè dulcorata, defecata & purgata fuerit, (solutionibus ac coagulationibus iteratis ut moris) imò si ulterius cum Vi circuletur. Verùm hoc Oleum appellandum est potius Essentia, de qua vide Conrad. Kunrath. in Medull. destill. p. 1. p. 215.*

N. 3. *Alij 74. Corall. trit. ℥ij. Lapid. prunell. ℥ss. vel 76. calcinant fundendo hora 3. materiam illam tritam ponunt in cellam ad liquefendum.*

Dosis gran. v.

Vires. Præter vires corallorum supra descriptas confert & in calculo.

Dosis à gran. 4. ad 15.

N. *Vide & solutionem Corallorum, cap. 15. in Bezoard. & compos.*

VII. Essentia seu Tinctura Corallorum.

74. *Salem Corallorum (purificatum optimè per iteratas solutiones ac coagulationes, vel magist.) volatilissimum cum V digerendo, ac destillando, (vide volatilisationem lapidum in genere,) Postea abstrahere lenè NB calore Vm, ac remanet Essentia corallorum, quam si placet ex arena per retortam propelle.*

Vide Quercetan. in Pharmac. restit. cap. 24.

N. 1. *Nihil interest utrum sal receperis per Acet. destill. factum, vel per spirit. Sal. com. vel per spir. phlogiston. acet. destill.*

N. 2. *Vi feliciter essentiam corallorum secum per XX transferet, si addideris aliquid camphoræ, e. g. ad Vi, mensur. 1. camphor. 3ß. Schiöderus.*

2. *Spiritus vini feliciter essentiam Corallorum secum per Alembicum transferet, si addideris aliquid camphoræ e. g. ad spiritum vini &c.)* Hæc Essentia sive Tinctura ob camphoræ additionem majores acquirit vires, quæ partim à salibus additis, partim à camphorâ, non à corallis dependent. Et illius rubedo vel reliquijs spirituum salinorum & Sulphuris, vel spiritui vini multum digesto supervenit. *Hoffmannus.*

N. 3. *Conrad. Kunrath; solvit & digerit 1. cum Acet. destill. quo iterum abstracto solvit & digerit; 2. cum aqua pluv. destillata (NB.) recentissima, 3. cum spir. Vini.*

Vires. Ut præparatio Tincturarum operosior est, quam salis ac magisterij, ita & virtus earundem fortior.

Dosis, guttæ aliquot: à vj. ad xv. & ultra.

2. Tinctura Basilij.

74. *Salis corall. (per spir. Sal. com.) edulcoratissimi 3viij. Sulphur 3ß. mixta: leniter comburantur, donec Sulphur consumptum sit: Postea contere tantillum camphoræ cum corallis, idque accenso igne assumes, hinc edulcora & extrahetincturam s. a. cum V, abstrahere V ad consistentiam Olei.*

N. *Maniaci & Melancholici hæc Tincturâ curati sunt, Dr. D. Gans. Schiöderus.*

2. *Tinctura Basilij.)* Hæc Tinctura ex spiritus vini digestionem super salia factâ emergit, non ex Corallorum substantiâ, *Hofmannus.*

3. Tinctura Quercetani.

Extrahet Tincturam s. a. ex corallijs calcinatis, (e. g. ignitione mitiori,) digerendo vase H. cl. cum menstruo cœlesti, destillato scil. cum proprio suo saccharo, (id est, cum rore majali, qui cum melle aë èo destillatus, ad eminentiam digitor. 8. affusus, Menstruo demum abstracto, remanet Tinctura in fundo. *Quercet. lib. de præpar. Med. Spagy.*

4. Aliter:

74. *Magister. Corall. extrahit cum Sulphure bezoar dico ex re vegetabilis prolecto, (id est cum V rectificatissimo) in vase H. cl. ad ignem cinerum. Postea separa & in perfectam Tincturam decoque. Quercet. Pharmacop. cap. 24. Schiöderus.*

3. *Tinctura Quercetani.]* Quid extrahet menstruum cœlestes ex corallis calcinatis? Menstruum cœlestes ex rore majali & melle conficitur, vel loco mellis adsumi etiam potest manna, quæ recens & electa esse debet. De quibus infra Libr. 4. Possunt etiam addi alij spiritus pro diversorum morborum respectu, in quibus Tincturam hanc præscribere animus est, v. g. additur spiritus C C. rectificatus in affectibus cordis: Sic Dnus D. J. Michaelis p. m. habuit Tincturam Corallo-

rallorum anti-scorbuticam cum spiritu anti-scorbutico. De hisce plura inferius.

4. *Aliter. Recip. Magister. Corall. extrahe* (Ec.) Sulphur illud bezoardicum nihil aliud est, prout & Autor innuit, quam spiritus vini rectificatissimus. Sed hæc Tinctura etiam ne gry quidem debet Corallis, & nil nisi spiritus vini per digestionem tinctus est. *Hofmannus.*

3. Tinctura Hartmanni.

7. Sal. corall. (per Acet. destill.) purificatissimum, imprægna Acet. destill. tantisper, donec nihil istius spiritus amplius retinere velit. Sal ita imprægnum digeratur. [& 20.] in MB. Postea destilletur per Ret. Reverberio clauso vel Balneo sicco, ita tamen, ut prius Phlegma inutile evaporet: Postea prodeuntes spiritus albicantes seorsim capaci recipiente excipiantur, continuando destillationem, donec omnes spiritus cum oleo rubro instar sanguinis prodierint, separetur spiritus [qui ardens instar V] per Retortam ab oleo rubro, quod in Retorta manebit.

Hoc menstruum [spiritus scilicet hic partim ab Acet. destill. partim à corallis productus] extrahit ex recentibus corallis impositis tincturam rubicundissimam, quæ si rursus ab hoc spiritu per destillationem liberata, & tandem cum V, vel alia aliqua cordiali appropriata digesta perque cohobia volatilis facta fuerit, elegantissima evadit corallorum Tinctura, suavissimi saporis, fragrantissimique odoris.

N. Imprægna o illa sit hoc modo.

7. Sal. Corall. ʒ i. Acet. destil. opt. ʒ ij destilla leniter, ut extillet solum Phlegma insipidum; secundâ vice affunde Acet. destil. ʒ iij iterumque destilla, atque ita perge singulis vicibus Acet. destil. ʒ j. plus affundendo, donec tam acre Acet. destill. inde prodierit, perinde ac affusum fuerit. *Hartm. in Croll Schroderus.*

5. Tinctura Hartmanni 1.) Sæpius instituta Acet. dist. affusus super Sal corallorum (alias spurium) hanc compositionem etiam reddit suspectam. Et cum ex corallorum suppositio Sale per Acet. dist. facto eliciatur, conjectio facilis est, Tincturam istam demum cum spiritu vini abstractam & digestam potius ex Acet. dist. quam ex corallis emergere. Hac enim ratione & ex albis Corallis Tinctura rubra elici posset, item ex oculis & aliis. *Hofmannus.*

6. Tinctura Hartmanni, 2.

7. Corall. calcina. (ignitione violentiori) q. p. injice in V, vel in alcohol spiritus roris majalis, ac paulò post extrahitur tinctura, facibus, (sine ulla virtute) in fundo remanentibus: Tinctura hæc aliquantulum coagulata, si rubicundissima, cum quadam dulcedine.

Vires. Est tartarum virium, ut post ejus usum aliquoties repetitum, impossibile sit, ullam impuritatem in sanguine totius corporis superstitem esse posse. Exhibetur in vehiculis convenientibus, a gut. 3. ad 10.

N. Hac sanè tinctura Medico commendatissima esse debet, ob stupendas ejus vires, ut quæ cum spiritibus hominum magnam convenientiam habeat. *Hartm. in Corall. Schroderus.*

6. Tinctura Hartmanni, 2.) Præviis istis calcinationibus jamdum destructa est sigillata corallorum potestas, non secus atque Magnes valde calcinatus vim amittit attractivam & succinum ustum vim attractendi paleas. Quod autem ista menstrua calcibus infusa tincturam acquirant, digestio in causâ est, non secus atque super alia alcalia infusa idem fieri solet pro texture & figuræ partium mutatione. *Hofmannus.*

7. Alia Tinctura, per acetum Coralliorum.

7. Corall. contus. ʒ ij. eliciatur per retortam acetum, id est, liquor acidulus, quo prolecto utantur corallia vehementer, donec reddantur albidissima: exempta dein redigantur in pulverem, ex quo s. a. cum aceto illo, digestionem leni, extrahe T. donec Acet. destill. nihil amplius solvere valeat, universisque corallis dissolutis, nihil præter terram inutilem remaneat. Decantatos liquores destilla in arena ad siccitatem, ut separetur phlegma: Dein recipiente murato, fac ut igne auctiori & spiritus sublimis per XX propellatur, qui diligenter colligendus. Tandem relictum pulverem album spiritui G. penitus solve, eundem spiritum G. igne forti abstrahere; corallia relicta fortissimo igne ure, donec colorem ferè nativum recipiant. Hæc affusus proprius ipsorum spiritus tincturam pollicere dicitur.

N. Acetum ex corall. ʒ ij. dest. vix solutioni dicta sufficit. *Schroderus.*

Alia Tinctura per acetum Coralliorum.) Simili modo & hæc tinctura est putatitia, posito, elici ejusmodi spiritum acidum ex corallis contusis, vera tamen tinctura nullo modo ex illis extrahi potest, dum Corallia per Vulcani torturam nativâ suâ sunt spoliata rubedine, & albidinitia ex retortâ eximuntur, qualem igitur tincturam propriis illorum spiritus acidus extraheret, nisi more aliorum acidorum super alkalia fuforum se ipsum tingat, quemadmodum in Acet. dist. super corallia ad albedinem calcinata fuso experimur, illud rubro etiam tingi colore, sicuti super pumice etiam calcinato videmus, ex quibus sequitur, etiam fictitiâ illam esse Tincturam. Licet hic processus alias Boëti de Boodt fuerit inter arcana relatus. *Hofmannus.*

8. Tinctura per spiritum coralliorum ardentem.

7. Corall. trit. q. v. extrahe tincturam s. a. digerendo cum spiritu corall. ardente, [vide infra,] abstrahere menstruum, atque extrahe denuò cum V. *Gans. Schroderus.*

8. Tinctura per Spiritum Coralliorum ardentem.]

Hunc modum propriis etiam manibus pluries expertum fuisse gloriatur P. Poterius. Interim ipse dubitat, utrum dictus liquor potius ex aceto, qui absconditus est in spiritu corallorum ardente, an verò ex Corallis procedat. Liquor, inquit, b Acet. est, ut liquet, color verò non ita, eò quod Acet. dist. ejusmodi rubro colore careat, Odor ille fragrans itidem suspectus esse potest, nec immerito: Nam Saturni spiritus eodem ferè præditus est odore. In utriusque spiritu idem conspicitur color cum eadem rubedine: Ideoque omninò ex Acet. dist. est, cujus vis omnis, quæ in suo sale acido volatili residet, cum solutis corporibus mixta manens, denuò alteratum spiritum fundit, destillatione per retortam ritè institutâ. Et quamvis etiam hic spiritus sapore, colore & odore corporum solutorum, præditus videatur, & postea is non amplius acidus, sed quasi æthereus, Sulphureus, flagrans & virtutes balsamicâ etiam donatus appareat, tamen hic non est ex corporibus solutis, sed per mutationem novæ texture & figuræ partium tam solutorum, quam ipsius solventis Acet. dist. ad ejusmodi qualitates novas ductus, ut hic spiritus ardens nihil aliud sit, quam spiritus vini ex Acet. in corallis resuscitatus, & per digestionem à corallis ita rubro colore spurio & ascititio tinctus. Quæ causa etiam est, quod eam tincturam ipse Hartmannus ejus Autor itidem rejiciat, eam à menstruo oriri putans, ut & CL. Sennertus, qui eodem modo ex albis corallis Tincturam rubram elici statuit. *Hofmannus.*

9. Alia

9. Alia per spiritum seu ∇ mellis.

7. Corall. cum Sal. nit. calcin. extrahe s. a. cum spiritu mellis, (vide de melle) decanta & abstrahere in MB donec in fundo spissus relinquitur succus, huic edulcorato extrahe Tincturam cum ∇ , habes Tincturam coralliorum veram. *Hartm. in Croll.*

Dosis à gran. 4. ad 16. vel 12. *Schroderus.*

9. Alia per spiritum seu ∇ am mellis.) Hæc etiam supposititia est, dum spiritus iste mellis per se facile tincturam adsumit rubram, prævia scilicet digestionem Sic v. g. sic cum spiritu vini mel adjectis larenis digeratur, dat tincturam purpuream, & si jungatur cum Sale Tartari, instar sanguinis mel rubescit, facile igitur super corallia calcinata aliquas eorum particulas absorbendo in leni colore rubram induet tincturam; non autem à Corallis oriundam, nam spiritus hoc à pulvere abstracto rursus per spiritum vini tinctura evocanda, prævia digestionem, & sic in immensum crescet Tincturæ Corallorum apparatus, qui tamen ratione nativi Corallorum coloris solis Corallis non inerat. *Hofmannus.*

10. Alia per Aquam Temperatam.

7. Sal. corall. (per spiritum Θ -i) extrahe s. a. cum ∇ temperata, ex ∇ i & spirit. Θ -i, vide l. 4. in Vino.) decanta, filtra & abstrahere. *Schroderus.*

10. Alia per Aquam Temperatam.) Nec hæc satis facit, Ratio quia spiritus Vitrioli, dum corallia corrodit, & spiritui vini transitum in poros ostendit, pulvisculum illorum recipiendo facile mediante digestionem Tincturam induet. *Hofmannus.*

11. Alia, per Phlegma Hi.

7. Corallia calcinata, superfunde Phlegma Hi, cum spiritu acuto Hi. digerantur vase cl. & rubescat menstruum, abstrahere in VB, affundeque ∇ , digereque denud, ac pelle per retortam, sic exillabit essentia corallorum rubicunda, abstrahere ∇ ad consistentiam. *Job. Agricola.*

Vites. Insigne est cordiale, balsamumque nativum summe exaltat, usqueque præcipue est in terrore infantum, Epilepsia, & simil.

Dosis gran. 3. 4. 5.

N. Eodem modo possunt solvi corallia cruda, sed tardius. *Schroderus.*

11. Alia per phlegma Saturni.] Hujus cum phlegmate Saturni præparati eadem ferè est ratio, quam quæ cum aceto, uti supra ostendimus. Isti enim spiritus nihil aliud sunt, quam spiritus vini vel in Saturno, vel in corallis regeneratus, & in corallis tam albis, quam rubris ex digestionem tinctus. *Hofmannus.*

12. Tinctura Coralliorum Holsatica.

1. Fiat tale Menstruum: 7. Tartari crud. pulveris. 7. iv. phlegm. Θ -i (spirit. suo volatili adhuc gravidi) 7. i. 7. i. stent in digestionem 7. (3.) Dein destilla ex XX per gradus Δ aperto, donec nihil amplius exeat. Rectifica optime.

2. 7. Corall. subtiliss. pulveris. q. v. Superfunde præcedens menstruum, misceque diligenter, stent in digestionem, sic rubescet saturatè. Filtra & abstrahere ad siccitatem in arena, & remanet pulvis rubens. Ex hoc extrahe Tincturam per ∇ temperat.

N. 1. In præparatione ∇ a temperata unio iteratis sæpius rectificationibus peragenda est.

N. 2. In præparatione menstrui prioris verum Tartari Sulphur XX bico adhaerere solet.

N. 3. Ex Colcothare, elegans Tartarus Datus crystallinus parari potest.

Hæc habet Lector ex communicatione viri celeberrimi

mi Dn. D. Langelotti, Chymiatræ in aula illustriss. Holsatiae dignissimi, cui Tinctura hæc familiarissima est; adhuc betque in omnibus affectibus ab imparitate sanguinis oritur. *Schroderus.*

12. Tinctura Corallorum Holsatica.] Licet hæc Tinctura olim Dresdæ & in Holsatia frequentio is fuerit usus, attamen reliquis spiritibus est annumeranda. Nam menstruo hoc à Corallis ad siccitatem abstracto, reliquæ salium Vitrioli & Tartari, ex quibus Tartarus Vitriolatus crystallinus parari potest, affusum spiritum vini vel Aquam temperatam tingunt. Facili viâ & ex corallis albis vel oculis & ejusmodi tinctura confici potest. *Hofmannus.*

13. Per oleum Citri.

His jam addi poterit Tinctura per oleum citri, quod è corallis rubris, crudis etiam tincturam elicit. Huic si dempto oleo vehiculum aliud præbere poteris, tincturam corallorum non contemnendam habebis. *Schroderus.*

13. Per oleum Citri.] Cum aliis oleis destillatis etiam procedit, v. g. anisi, fœniculi &c. Sed qualis hæc est Tinctura? Subtilis hujus olei partes corallo, um aggrediuntur superficiem, & ad albedinem pro texturæ mutatione, tincturam tamen in recessu latente disponunt, & cum oleum ipsum coloris sic aurei, accedente debitâ digestionem facile tincturam rubram acquirit. Idem modus etiam cum corallis albis & oculis cancerorum procedit.

N. Altioris est indaginis Dni D. Joëlis Langelotti Archiatræ Serenissimi Holsatiae Ducis Regentis Tinctura [quæ tamen potius deberet Essentiæ nomine venire] Corallorum rubrorum beneficio digestionis cum oleo quodam inter destillata vegetabilia omnium blandissimo factæ fragmentis primo corallinis oleo immutato quoad odorem & saporem in rubicundissimam mucilaginem, inde cum spiritu vini Tartarificato mediante etiam digestionem in rubicundissimam Tincturam resolutis in quâdam Epistola ad præcellentissimos Naturæ curiosos. In litteris missi ad me missis Anno 1672. d. 16. Decemb. hæc cautelam Vir ille Excellentissimus addit. De oleo, inquit, inter vegetabilia blandissimo rectè conjicis Anisi esse, sed quod ritè debet rectificari, atque à suâ mucilagine crassiorè liberari, ut instar limpide appareat. *Hofmannus.*

14. Tinctura Corallorum S. Closs.

Resolve corallos in s. q. 8. Sal. com. solutionem filtra & abstrahere 8. forti Δ ita ut omnes separentur à calce, cui affundes Acet. destill. ex quercubus novellis mense Martio detruncatis, ad extrahendam Tincturam, quæ erit coloris hyacinthini, evoca menstruum & remanebit pulvis subtilis, cui superfundes ∇ circulatum digere, decanta, fæces separa à tincto ∇ quem iterum digeres, ut novas facies [si adsint] deponat ad fundum, tandem filtra & ∇ ad medias abstrahere. Parum habebis, sed magnarum virium adversus Contracturas.

Dosis 3 ss. per se.

N. 1. Potest etiam parari Tinctura modo Glauberiana cum Sale Tartari instar Tincturæ Silicis.

N. 2. Fit etiam sublimando corallos cum * & tincturam extrahendo cum ∇ ut est in Myroth. Joh. Fabri. Adde Rosinæ tinctur. p. 227. cum sp. lign. Sancti aut Coryl. *Schroderus.*

14. Tinctura Corallorum S. Clossæ.] Rubedo illa etiam corallis accedit vel à salium reliquiis acidorum ex Sal. communi, vel à spiritu vini sæpius affuso & multum digesto.

N. 2. Fit etiam sublimando corallia cum * &c.) Negari quidem nequit, saltem ammoniacum cum pulvere corall-

corallorum r. sublimatum subtilissimas corallorum rubrorum porciones fideli connubio tecum ad sublimare. Quod autem ex floribus ejusmodi rubris à sale liberatis cum spiritu vini tinctura extrahi possit, non procedit.

Examinatis igitur Tincturis Corallorum rubrorum, quas *Dnus Autor Noster* anquam pro veris & genuinis descripsit, reliquum nunc est, ut videamus, An veræ, genuinæ & legitimæ dentur Corallorum rubrorum Tincturæ ex foliis Corallis tubris oriundæ, quarum verum signum est, si in formâ mellaginis faciei rosarum inspissati transparentis sese in conspectum prodant. Deinde si illorum color proprius & iustus, non verò alienus extrahitur. Tercio si tincturâ extractâ reliquum corpus amisso nativo colore pallidum & exsangue facit. Quarto si corporis essentia cum ea simul extrahitur. Quinto si copia ejus exigua. Nos si simpliciter inficias ire non possumus, veram & genuinam Corall. r. tincturam haberi posse. Prostat enim jam supra allata *Excell. Chymiat. Langelotti*, non desunt aliæ, quæ proprium & incitum Corall. r. colorem in se comprehendunt, non beneficio menstruorum acquisitum, adeo ut illarum etiam Essentia cum tincturâ simul extracta fuerit, relicto illorum corpore albo. *Burrus* confecit adminiculo tritus cum molâ philosophicâ infra depictâ *Cap. de Auro*. Ubi primò optimè contrivit & postmodum menstruo suo cœlesti, quod ex rore majali, cum Manuâ vel melle aut saccharo destillato constat, Tincturam in digestionem extraxit. Quomodo etiam aliquot annos egregius quidam Chemicus Parisiis Tincturam Corall. r. elaboravit. Reliquæ, quæ passim hinc inde venales veniunt, nullas valoris sunt, originem suam debent vel in digestionem tinctis menstruis, vel Tincturæ salis Tartari cum granis Chermes vel santalo rubro tinctæ. *Hofmannus*,

VIII. Flores.

Flores coralliorum parantur ad modum, quo perlarum flores parari dicemus.

N. Fieri quoque possunt flores coralliorum sublimatione cum * insinuat.

IX. Spiritus seu oleum.

1. Spiritus corallorum ardens, supra in quinta Tinctura Hartmanni descriptus est, videturque compositum quid esse ex aceto & corallis, addereque ratione spiritus aceti vinosi.

2. Oleum iudem d. l. descriptum est. *Schroderus*.

3. Spiritus seu Oleum.] Spiritum Corallorum multi vel omnino pro non ente, vel saltem pro spiritu vini in corallis regenerato habent. Oleum Corallorum sunt alia per deliquium soluta ab adjunctis salinis menstruis orta. *Hofmannus*.

4. Spiritus Corallatus, Spiritus terra Corallatus.

Fit ad modum quo perlarum spiritus cum terra sigillata. *Vide ibidem*.

5. Oleum Corallorum succinatum.

6. Corall. rubr. pulverisat, lb. i. succin. lb. i. M. & destilla per retortam, vel cucurbitam, sic succinum Tincturam corall. per XX attrahet, in forma coloris sanguinei. In fundo vasis resistet pulvis corallorum colore albus.

Vires. Oleum illud valet in Epilepsia & Apoplexia.

Dosis gutt. 4. ad 8.

N. Hinc similis est modus quo Corallia sale subdanci salita, pinguedineque aromaticâ saginata, destillationi subijciuntur, atque ita tincturam suam dictis

comitibus committunt, cum iisdem per Retortam pelli aptam. *Schroderus*.

7. Oleum Corallorum succinatum.] Hoc non ex corallis, sed succino emegit, licet admodum ingratum habeat saporem ratione succini, præstantissimum tamen est medicamentum, & novit *Dnus D. I. Michaelis Medicum*, qui hoc solo egregias præstitit curas.

N. Hinc similis est modus, qui corallia sale subdanci salita.] Sub sale hoc subdanci *Dnus Autor* intelligit sal, quod à nonnullis æth. reum appellatur, panurgon ab aliis dictum sublimare, quo Natura tamquam parastatâ fidelissimo in suis operationibus utitur. Cujus beneficio salia fixa volatilia & aliæ philosophicæ præparaciones peraguntur, imò claves suppeditantur, quarum ope ad corporum penitissima penetrare, purumque Naturæ verèque essentiale separare Artis cultoribus licet. *Excell. Joel Langelott in præfat. ad D. Johann. Tilemanni experim. chymic. de veris solutionibus*, vid. differt. de Auro Auræ Anonymi ejusd. cum meâ epicrisi annexâ. *Hofmannus*.

X. Syrupus Corallorum.

1. Corall. rubr. grossè contus. q. v. solve in succo Berberorum vel Limonum optimè deputato, corallis ad emendandam digitorum, 3. 4. 5. superfuso, Hinc.

2. Succus illius Essentiâ corallinâ imprægnati part. ij. Sacchar. cand. [vel commun.] part. i. coque ad consistentiam.

N. 1. Colorem dilutiorem si expetas affusâ ∇ destillatâ conveniente, pro libitu conciliare poteris.

N. 2. Poterit similiter fieri solutio cum liquoribus acidis destillatis, Furiperi scil. aut Guajaci.

N. 3. *Hueretanus* monet solutionem instituere, i. in vitro subere vel cerâ Hispanicâ occluso, ne Essentiâ Corallina separetur. 2. In VB.

N. 4. Si quid restiterit nondum solutum, huic recens succus affunditur, donec penitus solutum fuerit.

N. 5. Similiter fieri possunt & Syrupi margaritarum & lapidum pretiosorum.

N. 6. Artificium *Queretani* ad continendum hunc Syrupum, nullum est aliud, quam evaporatio lentissima in VB tepido solutorum corallorum in succo berb. adjunctis 3. vj. sacch. ad libras singulas solutionis, ita ut spatio horarum 12. non exhalet ultra spissitudinem thaleri aut macrocollonis densioris, aliâ certo certius soluta corallia à menstruo separabuntur. *Schroderus*.

10. Syrupus Corallorum.] Postquam Corallia r. in succo berberum vel limonum per hujus repetitam infusionem ad totalem horum solutionem soluta sunt, ut succus ille essentiâ corallinâ probè sit imprægnatus, non Vulcani violentiæ statim subijcienda, ne Corallia sese præcipitent, sed juxta *Joh. Queretani* monitum, evaporatio lentissima in VB instituenda est, usque dum Syrupi acquirat consistentiam vid. *CL. Zwelfer. in animadvers. P. A. & hujus antagonist. D. D. Luc. Schrack. in P. A. R. five E. p. 32. Class. i. Hofmannus*.

Syrupus Corallorum compositus *D. Sam. Cl. & D. de Meyerne*.

1. Corall. rubr. subtil. in mort. marm. lævigat. 3. iv.

Succi limon. depurat. 3. xii.

Aceti quercin. 3. vi.

Digerantur in B per octiduum, quotidie vas bis vel ter agitando deinde filtrentur per chartam.

2. Solutionis colatæ 3. x.

Succi berber. depurat. 3. v.

Tinctur. 10. 3. iv.

Sacch.

Sacch. alb. ℥ss.

M. & mediante cocturâ blandâ in vase argenteo F. Syrupus, cui inter coquendum infundatur Nodus continens.

Santal. citrin. ʒij.

Ligni aloës ʒj.

Ambr. gill. gr. xv.

Mosch. gr. vi.

Dosis cochl. i. mane ac vespere longè à pastibus.

Vires. Ex viribus Coralliorum supra allatis & succo Berberorum vires censenda sunt. Laudatur valde in Diarrhœa, Dysenteria, fluxu hepatico ad restitutionem facultatum naturalium, &c. Schoderus.

Syrupus Coralliorum compositus D. Sam. CL. & D. de Mayerne.) Quem in finem tot differentibus acidis succis Corall. r. solvuntur, cum unus sufficeret? Deinde in coctione istâ partes ballamicæ ambre & moschi volatiles æthera petent, & sic frustra cum nodulo infunduntur coctione perdurante. Idemque commodius est, si compositum Syrupum desideras, sumere Syrupum Corall. r. & ipsi addere Tincturam solar. r. Essentiam ambre cum Moscho paratam, &c. Hofmannus.

XI. Species Diacoral.

XII. Trochisci Diacoral. Galen.

XIII. Troch. de Corall. Nicolai. Schroderus.

De Margaritis.

Medicis usitata nomina sunt Margaritæ, Perla & Uniones. Dicitur μαργαρίον & μαργαρί in neutro. & μαργαρίτης λίθος live μαργαρίτης Mascul. & feminin. genere. Hoc vocabulum postmodum latina civitate donatum est, ut Margarita in usu sit. Quidam, Isidorus dicit in Originum Libr. 16. Cap. 16. Margaritam, vocari dicunt, quod in conchis Maris hoc lapidum genus invenitur. Uniones autem appellantur, quod Indicæ & Persicæ conchulæ singulas aliquoties pariant, sed majores. Unde Alii distinguunt, si parvæ sint, margaritarum, si crassæ & ponderosæ, unionum nomen servant. Verum hæc etymologia suspecta est. Constat enim ex Indicarum rerum scriptoribus interdum septem, nonnunquam decem, imò plures una concha inveniri, non aliter atque in galinis ova, quædam absoluta & magna, sed ea unica, mediocria aliquot, exigua absque numero. Vera igitur Nominis ratio inde colligi potest ex Aldrovando Libr. 3. de testac. Cap. 42. quod nulli duo planè similes inveniuntur, quia scilicet vel magnitudine, vel colore, vel figura, vel alio quodam discrimine inter se differunt. Hofmannus.

Margaritæ, Perla (Uniones, si magnæ sint) sunt Lapides rotundi, in conchis nonnullis ex peritomatate eodem quo testæ generantur, producti. Arab. Lulu, Getm. Perlén. Marguerites, Perles, Pearles. Peèrlen.

Duplices censentur, Orientales & Occidentales. Illæ splendoris sunt, adeoque cæteris præferuntur, & præsertim Persicæ. Hæ lactescunt, minusque sunt splendide. Inveniuntur etiam in Europæ locis multis, ut in Scotia, Silesia, Bohemia, Frisia, locisque maritimis aliis, sed vilioris esse sunt notæ. Majores idem & quæ perforatæ sunt, censentur minoribus, & non perforatis maturiores & præstantiores.

Vires. Cordiale præbent nobilissimum, quo balsamici vitæ oppressi viresque exolutæ insigniter recreantur ac confortantur, proinde venenis, pesti & putredini resistunt, animum exhilarant. Et hujus rei gratiâ in tantum ascendunt honorem, ut vel agonis tantum extrema recreatio communiter inde expectatur. Schroderus.

Sunt Lapides rotundi. Sed pretiosi seu gemmæ in conchis marinis ex humore illo, ex quo testæ concharum concrevit, corticatim contextæ. Illas autem

sub Lapidum pretiosorum numero contineri certum est ob raritatem, pulchritudinem, soliditatem, pretium ac virtutem. Veræ tamen gemmæ non sunt, sed Lapidibus sui generis similes, inter quos nobilissima est margarita inquit Cardanus de Rerum varietate Libr. v. quæ ex Lapidibus cum nihil habeat simile, facile ab omnibus etiam distinguitur.

In conchis nonnullis.) Unde & Margaritiferæ vulgò Mater Perlarum appellantur, cœu nativò solo & solo reperiri ut. Non solum verò in Mari, sed & in fluminibus limpidissimis & purissimis non profundis ac eorum conchis inveniuntur.

Ex peritomatate producti.) Vocabulum hæc ætymologos duplicem habet sensum, utilis & inutilis. Conceditur utile esse excrementum, idem scilicet ex quo testæ generantur. Concrevit ex succulento humore Naturæ negotium diligentè per coagmentationem & appositionem.

Duplices censentur, Orientales & Occidentales.) In Orientali Mari Ormutianæ primas tenent. In Occidentali Mari circa Bosphorum Thraciam minoris testantur, nebulosæ ut plurimum sunt & sublimæ. In Germaniâ circa Bohemiam, Silesiam &c. quæ inter arenas Quissi fluvio propè Gryphibergam lavantur, pulcherrimæ quidem pisi interdum magnitudine, rotundæ, teretes, oblongæ &c. sed sine dubio viribus inferiores.

Vires. Cordiale præbent nobilissimum.) Præsertim majores, quæ enim majores, eò præfectiores, quæ magis sunt cocti & subtiles & solvuntur etiam citius. Temperati sunt, omnis qualitatem excessus expertes. Universam corporis confortant & economiam, cerebri in primis & cordis collapsas restaurant vires, balsamum vitæ oppressum recreant, & non vulgare Archei furiosi sedativum in illis latet absconditum. Unde & illorum vis cardiaca hos adeò insignes & decantatos fecit, ut vel agonis tantum extrema recreatio inde communiter expectatur. Hofmannus.

PREPARAT.

Perlarum præparationes idem sunt operationibus, quibus corallia, calcinatione autem ignitionis haud indigent. Supervacanea igitur illarum extinctio in vitæ ardentissima, quam vult Quercetanus in Pharmac. rest. cap. 26.

Solutio Perlarum iisdem perfici potest liquoribus, quibus coralliorum.

Purificatio quoque & Edulcoratio nihil à coralliorum purificatione peculiare habent.

Præcipitatio iisdem cedit liquoribus, quibus coralliorum præcipitatio.

Hinc

I. Preparata Perla.

Præparantur more vulgari, super porphyrio lapide lavigando, subindeque aq. cordialem, (verbi gratia, rosarum, melissæ & simil.) aspergendo. Schroderus.

Hinc I. Preparata Perla. Præparantur more vulgari super Porphyrio Lapide lavigando &c.) Vide, ne margaritas prius mortario æneo conteras, induunt enim vitriolatam qualitatem, quæ postmodum pro confortatione creat nauseam, id quod poteris experiri, si ejusmodi perlas solvas in aq. vitæ, vitærem contrahunt, sin autem ipsis infundas sp. & salum, tinctura fit lazura. In molâ philosophicâ optimè pulverificari possunt. Licet & hac carere possimus, nam vel integræ & citra digestionem solventi liquori acido obediunt.

N. Nonnulli Medicorum in hac versantur opinione, Margaritas præparatas non esse in Medicum usum.

ulum vocandas, & illarum loco magisteria seu solutiones illarum præstantiora esse, ut quæ vires suas longè exferant celerius præparatis, & multum temporis requiratur, antequam præparata à debili agrotantis ventriculo & depravato fermento acido solvantur, vel prorsus intactæ etiam sæpius excernantur. Verùm circumspexit Medicus facillè dijudicat, quid vel obesse vel prodesse possit. In cruditate acidâ, ubi fermentum ventriculi acidum in excessu peccat, Margaritis præparatis, prout & aliis præparatis nihil convenientius est. In cruditate autem nidorosa, ubi salibus acribus, salsis, amaris &c. fermentum ventriculi inquinatum est, Magisteria sive solutiones acidis liquoribus facta præparatis in usu præferuntur. Inde CL. Zuvelfe us in fine classis vigesimæ de margaritis præparatis dicit, facillimæ solutionis eas esse, atque ab Archeo nostro, innatòque calore utcunque divinci & actuari posse. Hofmannus.

II. Sal Perlarum.

Fit, ut in corallis dictum: Solvendo perlas, vel (quod tutatius) in aceto, vel in succo Berber. & Limon. &c. solutionem filtratam ad remanentiam salis inspissando, inspissatamque ablutione, ut dictum, vel in solutione iterata purificando ac dulcorando.

N. 1. Non opus habent triturâ, quippe vel integra atque citra digestionem Acet. destill. obediunt.

N. 2. Solutionem in succo Limonum ac Betula Destill. vide de Corallis.

N. 3. Fit quoque Sal Perlarum, in quovis liquore dissolubile, beneficio succi citri mali, digestionem depurati. Nimirum perla lota & si placet contusa, in eodem illo succo ad eminentiam 4. digitorum affuso, digestionem interveniente solvantur, solutioni affunditur ros majalis destillatus, vel aq. Melissa, decantaturque solutio: hinc affunditur novus succus depuratus, digeritur, affunditurque iterum ros destill. vel aq. Melissa, atque decantatur, &c. Et hic labor toties repetitur, donec perla penè tota soluta sint, relictis per paucis facibus. Demum solutio lento igne inspissatur, ad remanentiam pulveris.

Dosis à gran. 6. ad 33. Ex aqua roris majalis cum manna destillata, vel ex aq. Cinam. cum aq. ros. &c. Hartm. in practica.

N. Paracelsus, Sali perlarum, ut & reliquis inde paratis maximas vires attribuit. Processus, inquit, harum, etsi simplices, tamen, crede experto, mirifica operatio ipsarum (perlarum) est. Non tamen fit per artem hac virtutum actio, sed in natura ipsarum est, quæ in grossa substantia occultatur, & non potest operari, sicut mortuum corpus sed resolutione factâ, vivificatur corpus ejus lib. 6. archid.

Hinc finitimum est.

Sal sive Magisterium Perlarum Riverii.

74. Perlar. subtiliss. tritar. q. v. impasta cum succo citri vel aurant. & relinque aliquandiu. Postea solve cum Acet. destill. s. a. donec perlæ ex toto ferè fuerint solutæ. Collectum acetum misce cum tertia parte aq. fluvialis, destilla in arena igne primum lento, dein fortiori. Destillatum reassunde capiti mortuo restanti, & denuo solve, postea filtra, evaporaque admodum lentè, & reses erit perlarum Magisterium.

Vires. Præter vires supra allatas, summum est præservativum Arthritidis.

Dosis ʒj. ad summum. Schroderus.

2. Sal Perlarum.) Hoc prout & 3. Magisterium illarum nihil aliud, quàm nudæ solutiones sunt, factæ cum loco citri, berberum, aceto, &c. Unde Magisteria resolubilia, butyracea, & pulmaccâ confici possunt. Nec inæqualis censura sunt, quæ cum sp. Vir. ær. O &

Salis non dephlegmato sunt cum Vitrioli Spiritu præcipitata, eodem modo & cum Spiritu Vitrioli phil. perlæ solvi & cum spiritu roris majalis tritari possunt. Item si Perlæ in Acet. dist. solvantur & cum sp. Vitrioli rect. sic. tritentur & postmodum edulcorentur, Magisterium candidius & resolubilius evaderet, quàm si fiat tratio cum oleo Tartari per deliquium crudiora enim tunc sunt. Hofmannus.

III. Magisterium Perlarum.

1. Commune fit solvendo cum Acet. destill. & præcipitando cum Ol. Tart.

2. Butyraceum eodem modo fieri potest, quo Magister. butyraceum corallorum.

3. Plumaceorum præparatio itidem ex corallis repetenda. Confer Rosinc. Chym. p. 347.

Vires. Vires ex viribus perlarum descriptis facile colligi possunt.

Dosis à gran. 6. ad 15.

IV. Oleum seu liquor Perlarum.

Fit per deliquium: modum ex superioribus repetere.

V. Essentia, Tinctura, Arcanum Perlarum.

74. Perlæ q. v. solve cum Acet. destill. & para sal; Sal ita paratum iteratis in Acet. destill. solutionibus ac coagulationibus (rejectionibus semper facibus) purifica, donec nullæ amplius faces ab ultimis solutionibus restiterint, atque ideo ipse perlæ ab omni immunditie liberata sint. Hinc solve cum aq. pluviali, vel rose majali, destillandoque abstrahe humiditatem, idque toties repete, donec interveniente destillatione perlæ sint edulcoratæ, (id quod ostendit aquæ postremò destillatæ dulcedo.) Hoc s. liq. defæcatum, digere, vase clauso in MB (8. vel 10.) cum V i rectificatiss. ad eminentiam 2. dig. affuso. Sic Perlæ cum tempore Essentiam suam instar olei spissi ad superficiem V i remittent, quam cautè separa, novumque V i affundendo, laborem repete, quoties visum fuerit. Convertitur enim totum ferè sal, relictis paucissimis feculis, in Essentiam. Hanc de novo cum V aliquandiu circula, postea leni destillatione MB V i separa & serva.

N. Eadem perlarum Essentia cum V per Retortam, vel per MB. seu reverberatorium siccum, institutis cohebis tandem omnis transit.

Vires. De usu constat ex viribus margaritarum, fortissimarum autem virium est propter summam subtilitatem.

Dosis à gran. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Arcanum per spiritum Guajaci.

74. Perlar. subtiliss. trit. q. v. extrahe s. a. tincturam rubicundissimam cum spiritu Guajaci rectificato, residuum pulverem calcina leniter, atque extrahe iterum bis aut ter cum novo spiritu Guajaci. Postremò calcina fortius, atque iterum extrahe. Extracta coagula in MB ad apparentiam cuticulæ versicoloris, quippe quæ signum est, abstracto phlegmate, solum arcanum seu Essentiam perlarum cum spiritu Guajaci, in forma coagulata restare.

N. 1. Hac Essentia ac spiritus vix à se invicem separari poterunt.

N. 2. Eadem Essentia seu Arcanum perlarum cum aq. melissæ, & similibus q. s. subito solvitur, inque rubentem pellucidum colorem vertitur saporis elegantis.

Vires. Optimè sanguinem mundificat, magnarumque virium est in lue venerea.

Dosis à gutt. 6. ad 14. Hartman. in Croll.

Alia Tinctura.

74. Perlar. ʒʒ. spic. Sal. com. q. s. solve s. a. decanta;

cantia; abstrahæ, ut fiat pulcicula, quam elue ∇ stillat. Circula cum ∇ septimanas 6. tandem ∇ abstrahæ, le-
ni MB calore. Libav. in Syntagmate.

V. Flores Perlarum.

Solvuntur perlæ cum Acet. destill. solutio digeri-
tur aliquandiu (per mensem). dein abstrahitur Acet,
destill. & tandem formiori igne elevantur flores. Libav.
in Syntagm. lib. 2. c. 25.

N. 1. Sublimari possunt quoque Margaritæ & Corallia
beneficio *

N. 2. Flores perlarum per solutionem in \sim Hni def-
cribit Hartman. in Croll. p. 474.

VI. Spiritus perlatus, seu spiritus terra
perlatus.

\mathcal{L} . Sal. vel Magisterii perlarum \mathcal{Z} VI. Terra sigillata
 \mathcal{H} j. M. acimbibe cum s. q. olei perlarum, & fac globulos
quos exccatos destilla per retortam uti destillatur spirit. Sal.
communis, Rectifica & serva pro usu.

Vires. Summum est secretum in Podagra.

N. Eodem modo fieri potest & spiritus Corallatus.
Schroderus.

4. Oleum seu Liquor Perlarum. 5. Essentia, tinctura,
Arcanum Perlarum. 6. Flores perlarum. 7. Spiritus perla-
tus.) Hæc & similes fænitæ compositiones quocunque
veniant nomine, non solum ex essentialibus & conti-
tutivis perlarum sunt partibus, sed etiam alterius fa-
milie pignora salutari possunt, larvatum perlarum
aristum solum ex Acet. dist. sp. guajaci, Salis Vitrio-
li, & occulto perlarum pulvere compositum. Qui per-
las sic solutas bibunt, tantum abest, ut sola illarum
substantia fruatur lactea, ut etiam una cum perlis sa-
lem Acet. dist. vel alterius liquoris acidii solutum bi-
bant. Si tamen liquores isti cum spiritu vini tandem cir-
culentur & digerantur, eo iterum abstracto præstan-
tiores erunt. Hoffmannus.

De Lapidibus minus pretiosis : qui sunt.

I. AETITES.

Aetites Lapis est veluti prægnans cum quatitur,
alio in utero sonante : hujus genera pro diversitate su-
perficie, (scabraz, scilicet vel lævis.) colorum
tum materie inibi contentæ, constituuntur qua-
tuor.

1. Est exterius scabrum, colore vario, plerum-
que nigricante : continet in se lapidem Collimum di-
ctum.

2. Cinerei coloris est, ac in se argillam vel mar-
gam continet.

3. Terram in se concludit.

4. Præter hos addit Plinius Taphusium nomine,
qui nostratibus est incognitus.

N. 1. Dicitur lapis aquila, quod in aquila nido repe-
riatur ad promovendum partum ab aquila eo deportatus.
Herm. (Adlerstein. Klapperstein.) Pierre d'Aigle. Eagle
stone found in an Eagles nest. Adelaerssteen, of Arenta
steen.

N. 2. Primus Orientalis est, raroque prædi magnitudi-
nem superat.

Secundus & Tertius etiam in Germania juxta Svinfur-
tum reperiuntur, pugni que magnitudinem sæpe aquant.

Vires. Partum promovet, si feminibus alligetur, sin
brachio eundem retinet : observare autem expedit, statim
à partu esse removendum, ne & uterum ad se trahat.
Schroderus.

De Lapidibus minus pretiosis : qui sunt I. Aetites.)
Aetites Lapis ab Aquilâ, Græcis ætēs dicitur. Vel
propter colorem vel ob virtutem illam, quod aquila
line illa parturire nequeat, inde & in aquilarum nidis
reperiatur. Est autem vel candidus, vel gallæ colore,

Mangieri Bib. anth. Pharmac. Tom. I I.

vel subrutilus, vel in rutilo niger. Hujus differentias
vide in Autore. Cinerei coloris in se argillam vel mar-
gam continet, quam terræ sigillatæ facultatem habere
dicunt, unde pesti & febribus pestilentialibus correp-
tis cum aquâ appropriatâ propinata auxilio est, sudor-
es elicit, venenum expellit, quandoque & alvum
mover. Dysenteriam malignam & alvi fluxum sistit.
Boet. de Bogib. in histor. gemmar. & Lapid. cap. 198. p. 398.
Olaus Wormius in Museo cap. 12. De hoc scripsit etiam
tractatum Laurenbergius, ubi tradit de Laplandis,
quod certo modo, præstare possint, ut aquilæ ej-
ciant hos Lapides ex nidis.

Continet in se lapidem collimum dictum.) Reperitur
etiam species albo silice prægnans, quam Christoph. En-
celius invenit ad albam vid. de Lapid. & gemm. lib. 3.
Cap. 47.

Vires.) Partum promovet, si feminibus alligetur,
si brachio, eundem retinet. Olaus l. c. sæpius hujus fe-
cit experientiam, adhibita tertiâ hujus lapidis specie
ab Autore, nominatâ quæ terram in se includit. Licet
Andr. Baccius de Gemmar. Naturâ Cap. 18. p. 212. illam
speciem denominet, quæ lapillum in alvo continet;
Observavit etiam Valeriola, tam vehementer trahere,
ut una uterus excidat, ni maturè removeatur, id quod
accidit Valentia conjungi Ponsoni Jouberti. Tradunt
quidam, si panis supponatur Aetites, in quibus cibus
veneno est infectus, deglutiri illum non posse. Aliâs
tritum & Cetato admixtum epilepticos paroxysmos
sistere, quod dicunt, experientia non repugnat. Li-
quorem Aetitis contra calculum in quibuscunque cor-
poris partibus commendat P. Johann. Faber. in Myro-
thee. ingreditur etiam Dn. D. Johannis Michaelis Magi-
sterium & Liquorem Nephriticum. Dicitur etiam Lac
restituendi vim habere. Collo appensus medetur pro-
lapsui uterino, herniis, epilepsiæ &c. Fabulam sapit,
geitatum amorem & divitias augere, invictum omni-
busque gratum efficere, deprehendi & furta illo tradunt.
Nam panem, cui Lapis ille inclusus fuit, qui furtum
committit, teste Dioscoride, deglutire non potest. Inde
ortum est proverbium, Aetiticus panis illi porrigendus,
in hominem cui furandi vitium natura sit insitum P.
Bollonius Libro 20. observat. cap. 23. testatur, hanc con-
suetudinem adhuc apud Græcos in usu positam esse,
quâ lapidis hujus vi occultâ furta palam faciant. Fu-
rem igitur manifestum facere volentes Græci, omnes
furti nomine suspectos simul evocare solent; id quod
multis peragitur ceremoniis. Caloseri enim cornicant
secum quid clauso murmure, dum sine fermento mas-
sam pinunt, è quâ parvos conficiunt panes, ovi ma-
gnitudine, horum singulis qui convenerunt, ternos de-
vorandos tradunt, totidem boli nullo potu addito
deglutiendi præbentur. Et qui furtum commiserat,
nunquam tertium panem devorare potuit, quin imo
dum deglutire niteretur, parum absuit, quin suffocare-
tur. Græci Monachi hoc observant, tanquam peculia-
re secretum, vid. Andr. Baccius de Gemmar. Naturâ cap.
39. p. 113. Hoffmannus.

Præparationes quædam Lapidis Aetitis, aut quas ingre-
ditur idem lapis ex D. D. BAUSONIO,

Quinta essentia lapidis aetitis ad Calculum frangen-
dum P. I. FABRI, cujus præparatio,

\mathcal{L} . Lapidem aquila, contundatur & pulveretur, con-
nectatur cum pari pondere salis nitri & sulphuris, & in ti-
gillo forti, ad ignem fortissimum igniendus est, & per tres
aut quatuor dies continuos in eo igne retinendus, donec
optime calcinetur & comburatur. Tunc demum à sale nitro,
per lotionem aqua dulcis multoties iteratam, est vindican-
da, & huic calci probe lota & ad ignem exsiccata affunden-
L dum

dum est in vitro acetum acerrimum stillatitium, & vitro clauso digerere, dum est id omne per quindecim dies in balneo repenti, eum demum evaporandum est acetum affusum in vitro magniori, aut in scutella argentea; deinde post desiccationem iterum calcinandum est sal illud in fundo remanens: & igniendum per tres aut quatuor horas; ignitum solvendum est aqua pluviali stillatitia, solum filtrandum est, ut probe depuretur ab excrementis, filtratum evaporandum & desiccandum, desiccatum igniendum & calcinandum, ut prius, donec sal habueris probe purum & nitidum, sicut cera fundens & dulce sicut saccharum, tandem sal illud limpidum & clarum, & ad hanc perfectionem deductum connectendum est cum spiritu vegetabili aethereo ex succo ononidis aut saxifragia extracto in balneo repenti per duos dies, deinde servandum in phialis optime clausis.

In omnibus calculorum generibus, in quibuscunque sint locis & membris, mirè efficax est remedium: sumatur singulis luna quadris cum aqua ononidis, summo mane, jejuno stomacho, à quantitate drachma unius ad duas: potest si phunculo injici in vesicam ad calculum disrumpendum, & viros & stupendos præstat effectus.

Liquor Diureticus Suinfurtensum.

℞. Lapidis spongia, hominis, atitis seu aquila, lyncis, judaici, oculorum cancri, crystalli, ana partes aequales: contundantur & misceantur cum pari quantitate nitri, calcinentur, laventur & edulcorentur, exsiccentur lento igne: pulverentur & indantur in phialam vitream, superfundendo spiritum solis ad eminentiam duorum digitorum supra materiam, digerantur in cineribus, vase probe clauso, quinque dierum spacio: postea spiritus salis per distillationem abstrahatur. In fundo remanebit massa quæ in loco frigido & humido postea, resolvitur in oleum, quod exsicceat lento igne: postea resolvatur in frigido, & iterum exsicceat. Hoc repetatur donec non amplius exsicceat, sed permaneat in consistentia olei quod oleum lapidum nominatur.

Dosis hujus gutt. v. vel vi. in aq. sequentis ℥i ℞. præmisso specifico purgativo nephritico, vel electuario lenitivo antinephritico Quercetani.

℞. Succorum porri, cepæ, raphani, pilosellæ, sigilli salomonis ex radicibus, argentina parietaria depuratorum in B. M. ana ℔ ℞. succi limonum depurati ℥x. crystallor. tartari ℥ij. specierum diatragacanthi frig. ℥i ℞. crystalli calcinati cum aequali quant. nitri, loti & edulcorati, blandoque igne exsiccati ℥j. pulpa cassia recent. extracta ℔ ℞. terebinthina Venetæ ℥j. stercoris columbi albi ℥ij. Omnia, contusis contundendis, indantur in alembicum vitreum, & desiccentur in cineribus, igne moderato ad siccitatem. Quæ tamen aqua præcipue ob additam crystallum distillationi ineptam, vix effugiet quorundam animadversionem.

Liquor diureticus compendiosiori methodo sic paratur.

℞. Oculor. cancri, lapidis judaici, spongia, Lyncis, lazuli, aquila, glaciæ vel specularis ana part. aq. Resolve in spiritu vel oleo salis. Si resoluti sunt, resolutum clarum defundatur de fecibus. Clarum coagula super cineribus calidis in vase vitreo, resolve in marmore. Denuo coagula. Idque toties repete, donec non amplius coaguletur.

℞. Hujus gutt. aliquot in vino quotidie. Resolvit calculum & per urinam expellit illum mucilaginis instar.

Jan. Pharamund. Rhumel in Basilea Chimica tale habet nephriticum.

℞. Oculorum cancri, lapidi judaici, pumicis, silicis. l. spongia, l. cynis, eritis, l. carpinum, succini, crystalli, corall. ana p. aq. superfunde spir. salis ut quatuor digitos emineat: repete effusionem spir. salis, donec nihil amplius solvat: solutiones omnes destilla per alembicum ad siccitatem: pulverem in cella, super marmorem, resolve in liquorem. Dosis à gran. x. ad xx. in cochleari spirit. calis viva.

Norvegicus ætites mas hac peculiari præ cæteris virium dote valet, ut si urina super illum reddatur, eademque postea exhauriatur, frangas ac comminuat, tam renum,

quæ vesica calculum. Femina verò cum aliis hoc habet commune, quod parturientibus auxilium præstet.

Qui plura de ætite, de ejus differentiis, contentis, generatione & viribus, tam veris, quam fabulosis, desiderat, consulat D. D. Bauschium qui tractatum de eo conscripsit.

II. ALABASTRITES.

Alabastrites, Αλαστρίτης, Alabastrum, Onyx, lapis candidus notissimusque est, Germanicè Alabasterstein. Albâtre. Alabaster, Alabastren, Alabaster.

Species statui potest Marmoris, verum accuratè penitatus, ipso mollior est, proinde Marmor incoctum & imperfectum, si ita vis appellare poteris. Hic si ita mollis sit ut cultro scindi possit, gypsum rectius dixeris, & est id lapidis, è quo varia torno finguntur vasa.

Ufus rarioris Officialis est, nec ingreditur usalia, nisi solum unguentum alabastrinum.

Vires. Combustus resina aut pice exceptus durities discutit, stomachi dolores cum cerato levat, gingivæ comprimit. Dioscorid. Schroderus.

2. Alabastrites) Est Lapis ex speciebus marmoris notus in Itali. & Venetiis, ejus tres sunt species. Prima candidat, ex qua fiunt imagines & sepulchra mortuorum. Secunda species nigras habet maculas. Tertia in ruffo candidat, & hæc dicitur Onyx, quia unguis humani colorem præsentat. Et hanc intelligit Dioscorid. dum scribit, Alabastrites qui & Onyx dicitur, crematus, cum resina aut pice durities discutit, quem sequitur & Dominus Autor noster. Postrema dua species etiam apud Nos in Germaniâ effodiuntur in Cheruscis non procul à Northusiâ, & in inferiore Saxoniâ circa Hildesheimium. Cæterum præstantiores tamen sunt, qui in Italiâ reperiuntur, quàm hic locorum. Ufus rarioris sunt in Medicinâ, præparatur tamen ex his Unguentum alabastrinum dictum, quod in doloribus & aliis Capitis affectibus summè prædicatur. Vide Cataplasma Hypnoticum D. D. R. sect. 5. nu 1. in Thesaur. Pharmaceutic. annexo. Hofmannus.

III. AMIANTHUS.

Amianthus (ἀσέσος) alumen plumosum, est lapis alumini scissili non absterilis, adeo ut à nonnullis inter se confundantur, Germanic. Federveifs, Steinflachs, Schieferveifs, Alum. de plume. Earth-Flax, Salamandershairs, Feathered. Allum. Aerde-vlas, geluck. Allum. (quippe sunt, qui tales ex eo conficere norunt,) Steindacht, quod elychnia ex eodem fiant incombutilia.

Differt ab alumine scissili, quod hoc combustile sit, saporisque astringentis, illud non item.

Vires. Veneficiis resistere creditur omnibus, præcipue tamen veneficarum. Præterea abstergit, scabiem sanat; si cum ∇ vitæ & saccharo solvatur, mixturaque ejus exigua portio quotidie mane detur; album fluxum mulieris mox iri sanatum aiunt. Schroderus.

3. Amianthus.) Seu Alumen plumosum, scissile & similis alumini scisso, adeo ut nonnulli inter se confundant, Germanicè Federveifs. Ex hoc utpote flexibili telæ spectaculi gratiâ conficiuntur, quæ ignibus injectæ ardent. Fabula communis est eum ex Salamandræ pilis oriri, quia non consumitur igne, ut Salamandra. Sed Amianthus hic lapis est teste Dioscoride natus in Cypro, differt ab alumine scissili quod hoc combustibile sit & saporis adstringentis, illud non item Veneficiis Magorum resistit: Præterea abstergit & scabiem curat cum ∇ vitæ & saccharo solutus. Si mixturæ ejus aliqua portio quotidie tempore matutino exhibeatur, album fluxum mulierum mox iri sanatum dicunt. Hofmannus.

Præparata.

Præparata Officialia quæ amianthus ingrediatur, præter unguentum citrinum, nulla sunt. Commendant tamen nonnulli supra modum Linimentum ad tinea puerorum, & ad ulcera tibiarum, [addunt etiam quidam unguentis nervinis.]

I V. LAPIS ARMENUS.

Lapis armenus est lapis maculis viridibus, cœruleis & subnigris relucens, sicut lapis lazuli punctis aureis, adeoque non differunt inter se, nisi solâ maturitate, uterque enim in unis iisdemque scapentulis reperitur. Lazuli tamen lapis, cœu maturior, crebrius invenitur in fodinis aureis; armenus in argenteis.

Dicitur lapis armenus seu armenius *Δίος ἀρμένιος*, quod olim ex Armenia solum ad nos translatus sit, hodie tamen & in Germania producitur, verbi gratia, in Comitatu Tyrolensi sub nomine Melochites. Dicitur Arabicè Hager seu Hagiar, Germ. *Armenerstein* Berghlan. La pierre d'Armenie. *Armenianstone*. *Steen van Armenien*.

N. Præfertur colorato cœruleus.

Vires. Desiccatur mediocriter, extergitur cum levicula acrimonia & levissima adstrictione. Interne propinatus purgat sine noxa humorem Melancholicum, *αὐτὸν ἔκκερσιν*. Veram si mul. tates. (12. aliis 50.) lotus fuerit, purgat solum per inferiora. Hinc conducit in Mania, Melancholia, Epilepsia & similibus.

Dosis in substantia ʒj. ad ʒiv. Extrinsicus miscetur Medicamentis ocularibus, uti & Psilothris palpebrarum. Schroderus.

4. *Lapis Armenus*. Est Lapis maculis viridibus, cœruleis & subnigris relucens, sicut Lapis Lazuli punctis aureis; adeoque non differunt inter se, nisi solâ maturitate. Lapis tamen Lazuli cœu maturior crebrius invenitur in fodinis aureis; Armenus in argenteis. Reliqua vide in *Autore*. Hic de Lunâ Armenus scilicet, ille Lazuli scilicet de Sole participat. In Lygiis ad Coldbergam in fossis ac puteis vetustis Aeris Cupferbergi cum pyrite producitur. Hic Lapis Armenus ad P. Poterii mentem in *Pharmacop. Spagyric. Lib. 2. cap. 26.* duplici constat Sulphure, sale item duplici, volatili & fixo. In sale volatili vim emeticam residere, in Sulphure confortantem, roborantem & cardiacam. Si igitur vim purgantem velis, & vomitoriam ab Ænio non admodum dissimilem pulverisatus purus cum aliis mixtus v.g. in pilulis est offerendus. Sin autem vim cardiacam expetis per calcinationem corrigendus est, cuius medio pro diversâ texturâ & figurâ partium mutatione in motu vel quiete omne volatile recedit qualitatis purgatricis causa ac fortificans ac roborans succedit. Specificum autem est in mania, Melancholia, Epilepsia &c. Hujus Lapidis præparationes conveniunt cum Lapide Lazuli, de quibus vide inferius. Hofmannus.

Præparata.

1. Lapis creberrimè lotus, quem præparatum vocant.

2. Pilula d.l. armeno, vide *Diff.*

3. *Magisterium* fit l. commun. Lapis calcinatur per fl. Sulphur. hinc solvitur calcinatus in aceto fortissimo alkalizzato aut mellito. *Quere. Pharm. restit.*

N. Mallem equidem lotum adhibere lapidem, vel solutionem cum V perficere; quippe, vis purgatrix aciditate infringi apta est.

LAPIS CALCARIUS.

Lapis Calcarius, est lapis ille gryseus, ex quo violentiâ ignis conficitur calx muraria, Germanicè, *Kalk-Mangeri Biblioth. Pharmac. Tom. I I.*

stein. Pierre à faire la Chaux. Limestone. Kalk stein. Schroderus.

5. *Lapis Calcarius*. Græcis dicitur *ἀραιός*. Est lapis ille gryseus, ex quo ignis violentiâ calx muraria conficitur. Optimus ad medicinam maximè conductibilis reperitur Naumburgi. Alias totus ille tractus Riphæorum circa Kauffungam, ac si diceret *Kalkfund*, Seittendorff & Riersdorff in Silesiâ hoc Lapide calcario abundat. Novo invento ad Freibergum oppidulum carbone fossili coquitur. Alias calx candidissima etiam in Alpendorff ad Gigantræum montem ustulatur ex Saxo candido Alabastrum æmulante. Quoad Vires ignea est, & tam occultum potentia in se continet ignem, ut & actualem Anem comburendo, mortificando & destruendo superet.

Officialis non est, nisi in Præparatis, quæ sunt.

1. *Calx viva*. Græcè *ἀραιός*. Arabicè *Herach*, *Nure*, *Nura*.

Vires. Est ignea, mordax, adurens, cumque progressu temporis crustam gignens.

2. *Calx lota*, (cuius sal optimè f.a. elixivatum,) Exicat sine mordacitate, adeoque valet ad contumacia ulcera, (verbi gratia, venerea) uti & ad ambusta & alia, quæ non facile curationem admittunt.

3. *Lixivium*, quod conducit ad vulnera putrida eluenda. [Ex hoc fit aqua Chirurgorum pretiosa ad ulcera venerea, serpigines gangrænæ resistens.] Quin imò ex eodem fit V ophthalmica insignis, quam vide lib. 2.

[Cremor calcis vivæ decoctæ cancri exulcerati labia corrupta aufert.]

[Balsamus ad ambusta ex calce decocta Ol. simpl. rolar. ovorum.]

4. *Spiritus*. ℥. Calcis vivæ, q. v. laviga minutissimè, imbibequè cum Vi alkalizzato, (qui ab omni Phlegmate purus sit, alias incassum laboratur,) quantum scil. imbibere illa potest, (non ad eminentiam) abstrahè V leniss. NB. calore, cum cohobis (8. vel 10. repetitis) sic fortificatur vis ignea Calcis vivæ.

℥. Hujus Calcis vivæ lavigatæ, ʒx.

Sal. Tartari puriss. ʒj.

Ⓢ Tart. probè prius igniti ʒxj.

Misc. ac destilla ex Retorta lutata, infra medieta-tem repleta, in excipula duo, quorum unum (in quo sit parum V rectificatiss.) destinatum sit suscipiendo spiritui adeoque capacius alterum (quod vacuum) extillant phlegmati.

Excipulum prius connexum sit cum canali ex alterius illius excipuli collo deducto, posterius sit collocatum, ut phlegma recta delabi possit. Accenso igne stillat primum phlegma quod delabitur in excipulum vacuum; dein auctiori igne prodit spiritus albicans, qui per canalem in alterum illud excipulum ad V recta tendit, eique sese commiscet, ut separati ab invicem difficulter possint.

Rectifica aliquoties, & separa teniss. calore V in phiala, vel accende V qui efflagrabit remanente spiritu Calcis vivæ in fundo.

N. 1. Nisi Calx viva initio cum V, ad modum dictum fuerit imprægnata, adeoque exaltata, incassum laborabitur, quippe destituit in excipulum minus, vique phlegmatis commixti nullius evadit valoris.

N. 2. Spir. primo flavus est, verum leniter in cin. rectificatus clarescit.

Vires. Summum est arcæum in atterendo radicitusque pellendo calculo, cujuscunque speciei, aut loci. Confert & Podagricis. Pulmon. nocet.

In usu Pharmacopætico solvit Crystallinos, occlus &c, lapidesque durissimos. *Kest. lib. 1. c. 80. spiritus minerales volatiles figit. Basil. in rep. L. P.*

N. Alii miscens Calcem vivam cum bismulto, ac

L 2 destil-

destillant ex \bigcirc in receptaculum capaciss. aliquot (sex) mensuris ∇ a adimpletum.

5. Hinc spiritus Calcis vivæ alcalisatus.

℞. Sal Calcis vivæ, solve in spiritu Calcis vivæ, ac forma globulos cum argilla, vel misce cum pulvere laterum, destillaque per retortam. Schroderus.

2. Calx lota (è qua sal optimè s. a. elixiviatum.) Communiter duplicem in calce salis statuunt, Acidum scil. & salum. Sed neutrum ex illa extrahi potest, & horum loco inest potius spiritus quidem igneus, adurens, mordax &c. omnia alia salia volatilia mortificans & destruens. Cum igitur actu nullum sal in calce inest, inepta est ejus lotio & salis elixivatio. Aliàs ex hac Chirurghi conficiunt aquam suam pretiosam, ad ulcera Venerea, & ad ambusta, unde:

3. Lixivium.) Ex hoc dicta aqua pretiosa conficitur, quæ stupendo cum effectu adhibetur in ulceribus Venereis, antiquis corrodentibus. Dum exsiccatur, saturando carne replet inflammationem ardet, extrahit salia sylvestria erodentia, à quibus calor, sedat dolorem, resistit gangrænæ & eam mirabiliter exstinguit, curat scabiem herpetem, serpigines, guttam rosaceam, aphthas tollit, & tumores hydropicos; inde Aquapendens in Chirurgia aquam calcis vivæ deprædicat, in quâ spongiam novam, quæ totum abdomen comprehendit exprimit, eamque superligat. Sic enim aquas hydropicorum insensibiliter absorbi & viscerum intemperiem tolli ac Lienem induratum sanari asserit.

N. Hoc decoctum si in vas æneum infunditur, addito parum * sit aqua ophthalmica Chirurgorum.

Egregium & probatum Decoctum contra scabiem describit Cl. Sennerius in institut. De quo tamen notandum, quod aliquando etiam addatur aliquid de crystallis Saturni, & mercurii dulcis, in primis ubi simul adest inflammatio, prout in fistulis, ulceribus malignis, Lue Venerea & non raro in scabie illud contingit. Expertus est Dom. D. Johanne Michaelis p. m. in scabie manuum, & non repellit, sed dum salia massæ sanguineæ vel laticis corrosiva imbibit, exsiccatur & temperatur; calidè autem vel tepidè applicari & sæpius iterari debet.

N. Cremor calc. vivæ colligitur in decocti superficie, hic si labilis canceri inspergatur, pars corrupta decedit, sana autem remanet.

4. Spiritus. Recip. calc. viv. q. v. laviga minutissimè &c.) Hujus spiritus elaborationi & præparationi album, Nos addimus calculum, licet multum operæ & laboris ad hunc conficiendum requiratur, tamen ejus notabilis energia iterum compensat. Summum est arcanum in expellendo calculo cujuscumque speciei aut loci, Confert & Podagricis. In usu pharmaceutico solvit oculos \bigcirc , crystallos &c. & figit spiritus volatiles.

N. Sequens spiritus calc. viv. compendiosior est.

Recip. calc. viv. tñ iij. laviga minutissimè & misce cum sp. vini, q. v. inde in retortam, & igne aperto pelle in amplum receptaculum, primo exit spiritus, & aucto igne postmodum sequitur sp. viv. in formâ nebulae instar spiritus Salis.

Alius.

Recip. Spirit. Salis non dephlegmati vel cum alumine compendiosius destillari q. v. calc. viv. recentis ana, misce, & statim per alembicum in consuetas effervescencias destilla liquorem urinoso sapore & odore. Reliquo ad liquoris Nephritici confedionem sufficientissimo.

5. Hinc spiritus calc. viv. alcalisatus.) Ex calc. viv. sal. elici nequit, & hujus loco potius inest spiritus quidam igneus mordax, qui aliis salibus & acidi fixis in virtute robur addit, sic v. g. ex calc. viv. Tinctura Nephritica h. m. præparatur.

Recip. calc. viv. part. 10. Tartari crudi opt. part. ij coq. cum ∇ a fontana in ollâ, filtra, coagula & extrahe cum spiritu vini. Præstantior autem erit, si loco spiritu vini pro extractione substituatur spiritus Nephriticus quidam compositus. Vires ejus sunt in calculo & morbo Tartareis.

N. Si tamen ad aliquod salis genus, id quod in calce vivâ prædominatur, est referendum, statuimus, in numerum lixiviorum seu alkalium esse reducendum, observando, quod quamvis evaporata ejus infusio vix sal ejusmodi suppeditet, quale cineres exhibere solent, si tamen colore suo cœruleo Tincturam ligni Nephritici spoliemus beneficio aceti, lixivium calcis vivæ statim fugatum colorem revocabit.

N. Balsamus etiam ad ambusta præparatur ex decocto calc. vivæ cum Oleo simplici vel composito v. g. Oleo lil. alb. rosar. ovorum &c. Hoffmannus.

VI. LAPIS CALAMINARIS.

Cadmia lapidosa, cadmia metalli expers, est lapis fossilis, subflavus, non admodum durus, luteum dum accenditur fumum eructans, German. Galmey, Galmeystein. La Cadmie pierreuse. Calaminaris stone or stony Cadmia. Calaminaris of Cadmysteen.

Reperitur sæpius in metallorum fodinis.

Vires. Succat leniter, extergit, adstringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit. Adhibetur solum externe, creberrimoque usu infantum excoriationibus exiccationis ergo inspergitur.

N. Utuntur eo & ararii ad conficiendum aurichalcum, cuprum enim pallere facit. Schroderus.

6. Lapis Calaminaris.) Vocatur Cadmia Nativa Metallum expers. Est enim Cadmia vel nativa vel factitia. Illa metallica, Cobaltum est, & Metallum expers præfens Lapis Calaminaris dicitur de quo hoc loco. De Cadmia factitia autem infra. Cadmia metalli expers est Lapis fossilis, subflavus, non admodum durus, luteum, dum accenditur, fumum eructans. Germanicè Galmey. Reperitur in metallorum fodinis. Ejus usus est plurimum externus; creberrimo usu infantum excoriationibus exiccationis ergo inspergitur.

N. Hujus Magisterio non opus habemus S. Cloß. ut quod ob Sulph. Antimoniale emeticum suspectum sit. Hoffmannus.

Præparata.

1. Lap. Calamin. præparatus.

2. Emplastr. è lapid. Calaminaris, vulgò Zeltenspfaster August.

3. Empl. Gryseum de lapide calaminar. August. [differt à superiori, quod etiam Myrrham & Camphoram continet.]

4. Magisterium lapid. Calaminar. S. Cloß.

Solvitur in part. x. Mus Sal. com. deinde præcipitatur pulvis rubeus cum Ol. Tart. more vulgari & dulcoratur sæpius aquâ calidâ.

Evacuat per vomitum & secessum, mitius quàm præparatum.

[Oleum lapid. Calamin.]

VII. CRYSTALLUS.

Crystallus, lapis transparens est, aquam in glaciem congelatam omnino referens. Dicitur Crystallus à $\kappa\rho\upsilon\varsigma$, id est, gelu, & $\sigma\epsilon\lambda\lambda\omega$, id est, contraho, Germ. Crystall. Du Crystal. Crystall. Crystall.

[N. Caledarius Crystallum, in cujus medio liquor fluctuans, habuit. Vid. Mus. Veron.]

N. Gemmam, si vocare libet, licet, modo omnium molissimam dixeris, vel à similitudine coloris, qua gemmas colorata Crystallus refert, pseudo gemmam verbi gratia, pseudo-berillum, pseudo-topasium, pseudo-saphirum, pseudo-

pseudo-smaragdum, quæ veris gemmâ molliores sunt. Sic & Iris vocata gemma à colore, quem fronti applicata exhibet, Crystalli species est.

Inveniunt variis in locis, etiam in Germania, Bohemia, Ungaria, Cypro & Lusitania, & nonnunquam in agris.

Delectus.

Quamquam coloratæ minimè negligendæ sint, ut præcipue pseudo-adamas, quæ aliis nobilior, attamen in præparationibus Chymicis recipitur Crystallus propriè sic dicta, quæ eligenda est purissima, pellucidissima, ac eximie intensa.

Vires. *Fuatrius est adstrictoria, adeoque confert dysenteria, diarrhæa, calicæ, cholera, fluxui uterino: præbet lactis abundantiam, atterit calculum totius corporis, hinc prodest & podagricis.*

Si pulvis $\mathfrak{z}ij$. vel $\mathfrak{z}j$. pondere cum \mathfrak{o} . amygdal. dulcium exhibeatur, curat eos qui $\mathfrak{x}m$ hausserunt, Boët. de Boodt, Matthiol. vid. Heer.

N. Sunt qui Crystallum radiis solaribus obijciunt, hisque concentratis cutem inurant, loco cantheri. Schröderus.

7. Crystallus.) Hæc nomen à glacie mutuatur $\alpha\pi\omega\varsigma$, enim genu & $\sigma\epsilon\lambda\lambda\alpha$ contrahit significat, vel quod aquam in glaciem congelatam referat, vel quod ex glaci nata sit. Licet ultimam asseritionem plurimi negent, & statuunt, Crystallum quidem in montium jugis præcellis ex aquâ oriri, ut omnia mineralia, sed semine petroso & lapidifico imprægnata; Nam si Crystallus immediatè foret ex glacie, nec Alabanda Asiæ, nec Cyprus Insula Crystallum procrearet, quibus calor jugis est. Imò etiam igni admotâ liqueceret, quod non contingit. Unde Dioscorus Siculus, Crystallus, inquit, Lapis, ex aquâ oritur puta congelatâ, non quidem à frigore, sed divinâ caloris vi quæ duritiem servat variolique colores suscipit. Hujus rationem reddit pro nostra sententia stabilienda Aristoteles in lib. Meteor. Lapidea de substantiis mineralibus materialiter sunt aqua, ut dicit Richardus Ruffus, Lapides vel Lapidea mineralia sunt ex aquâ; sed tamen, quia habent de terreâ siccitate plus quàm liquabilia, idè non congelantur solo frigore aquoso, sed etiam terreâ siccitate, quæ permittit aquosum terreum in vitreum quando super aquam dominatur. Quod etiam intendit supra allegatus Thomas Sherbey Regis Angliæ Medicus in Dissertatione de causis Lapidum, Et ingeniosissimus Steno in dissertatione de Solido intra Solidum naturaliter contento. Ubi de Crystalli productione multa subtiliter explicat: an inter fluidum & fluidum, vel inter fluidum & solidum; an verò in ipso fluido producat; nam è fluido productam esse, ille nullum habet dubium; frigore tamen concretam ut communiter volunt, negat. Quemadmodum enim vitrum non solum ignis admiculo producit, sed & absque igne humano artificio fieri potest, sic & Crystallus absque ignis ope ex fluido concrevit, & absque igne eadem etiam in fluidum potest resolvi, modò quis verum Naturæ menstruum imitari queat. Fluidum enim, quo Crystallus congelatur, eo modo sese ad Crystallum habet, quo aqua communis se habet ad salia. Hæc assertio per mechanicam item demonstrari potest: Prostat enim singularis liquor, qui vulgare vitrum ad tempus ita flexibile reddere potest, ut ex hoc imagines fingi possint aut illi characteres imprimi. Cujus meminit Excellent. Dnus Morhof. in Epistol. ad Cl. Dn. D. Majorem de Scypho viureo per sonum fracto scripta.

Inveniunt variis in locis.) In venis tam propriis, quàm metallicis, etiam in agris, ubi feruntur & in præruptis montibus. In Hispaniâ, Galliâ, Scythiâ, Norvvegiâ, Angliâ, Indiâ Or. & Occid.

Vires.) Facultatè est præcipitatoriz adstringentis, inde confert in omni alvi fluxu bilioso, cholera, scil. dysenteria &c. Ad dolorem etiam & ardorem ventriculi commendatur ab Heinric. ab Heer. Lib. 3. observ. 16. *Mangeri Biblioth. Pharmac. Tom. 11.*

Item contra Mercurium \pm tum sumptum. Intus adhibita lactis abundantiam præbet; Sin autem in tergo & regione mamillarum applicetur. Eac imminuit, id quod Dn. Dn. Johan. Michaelis sæpius probavit. Medetur etiam Epilepsiæ pulverisatâ propinatâ, & si collo appendatur, contra vertiginem facit, Atterit calculum totius corporis, hinc prodest & podagricis. Hoffmannus.

Præparata.

1. *Præparatio in specie sic dicta.*

Fit. leg. commun.

2. *Sal Crystallorum.*

Crystallus calcinata solvitur in Acet. destill. vulgari, Terebinthinato, s. a. solutio filtratur, abstrahiturque ad siccitatem. Materia remanens, Sal Crystallorum; purificatur ut moris.

N. 2. Alii calcinant Crystallus primo cum $\mathfrak{z}re$, dein cum Sal. nitri, Alii è contrâ, priorem calcinationem cum Sal. com. peragunt posteriore cum Sulphure. Alii alterutra saltem calcinatione Crystallum solubilem reddunt, (Exempli gratia, Quercetanus & Boëtius de Boodt, cum Tartaro. Quidam præmittunt ignitionem, vel simplicem, vel refinctoriam. Quæ diversitas neminem moveat, modo Crystallus solubilis fiat. Vide Notas de Calcinatione Lapidum in genere.

[Calcinari etiam dicitur Crystallus peculiari ∇ & mollescere instar pultis, recuperare duritiem immersione in aceto.]

N. 2. Calcinatio vera Crystalli extat in Nuysemant de l'Esprit de l'Univers, p. 140. Ex hac calce elicitur Sal nephriticum per ebullitionem in aq. urtic. major. fortificat a suo proprio sale & $\mathfrak{z}ij$. spiritus salis marini, colore virid.

N. 3. Si Salis hujus usum sine mora experieris. ∇ . Crystallus grosse conuss. candescat ac exstingue in aq. Raphani, Ononid. Petroselin. & simul acuata spir. & i, vel \mathfrak{o} Sulphur. idque multoties (decies) repetatur: filtratur si liber adde sacchari q. pl. ac habes aq. ononidis, & simil. Crystallisatum. Boëtius de Boodt.

N. 5. Alii loco Acet. destill. adhibent aq. destillatam Urticæ minoris, Boëtius de Boodt.

N. 5. Neque confertim, neque continuo Sal Crystall. exhibere licet præsertim ubi natura languidior extiterit. Hartman. in Croll.

Dosis salis à gran. 6. ad 16.

[Huc pertinet Crystallus Crystallisatus.]

∇ . Φ Crystalli

Utri ana. q. v.

f. solutio in \times hinc evaporatio ad Medietatem, & Crystallisatio loco frigido.

Vires. In febris ardentibus & intermittentibus exhiberi potest, vel solus ad grana aliquot, vel mixtus arcana duplicato.

3. *Magisterium Crystalli.*

Solutioni (cum aq. urtic. factæ, &c.) instilla Sal. com. fusi aliquid & præcipitabitur, decanta, elue exicca.

4. *Oleum seu liquor Crystallorum.*

Solvitur Sal Crystallorum per deliquium, tumoris sennerti. Instruat. lib. 5. part. 3. f. 3. cap. Medull. destillat.

Dosis gran. xv. ad xx.

5. *Elixyr Crystalli.*

Fit volatilisatione Salis Crystallorum. Nimirum.

∇ . Salis Crystall. optimè [iteratis solutionibus ac coagulationibus] purificati, q. v. digere in fimo equino, vel ejus vicario MB, cum ∇ , vel cum aq. urticæ, [vel potius cum ∇ supra urticam destillato,] \mathfrak{o} 14. Dein destilla per cucurbitam humilem retortatave,

L 3 sic

sic menstruum secum aliquid Sal. transferet, remanenti materiæ affunde recens menstruum, idque toties, donec Sal ferè totum ascenderit. Serva pro usu.

Boëtius de Boodt, Beguin.

6. Essentia Crystalli.

Destilla Elixyr Crystalli & abstrahè menstruum lento MB calore, ad consistentiam mellis, vel si placet inspissa.

N. Keslerus Elixyr Crystallorum parat hoc modo.

1. Crystallus calcinat ignitione reſtinctoriâ in Acet. destill.

2. Calcem hanc comburit cum Sal. nit. horis duodecim.

3. Hujus Massæ $\frac{3}{4}$ affundit Acet. destill. $\frac{3}{4}$ x. digerit & 2. vel 3. in MB. abstrahit ad siccitatem Acet. destill. remanentiam resolvit per deliquium, oleumque rubrum seorsim colligit, (neglecto albo quod à Sal. nit.) rubrum illud digerit & cum vino faceseque subsidentes rejicit. Claram solutionem cum liquore, e.g. cum vino exhibet, idque quotidie per Kesler. lib. 3. cent. 44.

7. Cremor Crystalli.

Crystal. in Alcohol redacti, Sal. Tart. defæcati ana $\frac{3}{4}$ ij. calcinetur in furno Aren. vel in fornace figulina, in testâ vitreatâ cum operculo foramine pervio, donec vasa figuli perfecta sint, postea in aq. Urtic. minor. projiciantur, & omnia solventur in aquam lucidissimam viridis coloris: si quid pulveris in fundo maneat, abjiciatur, liquori vero prædicto immitte parum S. l. com. fusi pulverisati, ubi pulvis fundum petet.

Cujus edulcorati dosis erit à $\mathfrak{D}\beta$. ad $\mathfrak{D}\gamma$. vel solitariè; vel cum cremore Tart. in hydropè & calculo commendatur. Habuit S. Cl. ex commun. D. Gregor. Horstii fel. memor.

[Potius liqueris sive olei multiplicabilis (Sulphuris) meminit per Alcohol crystalli, unciâ mensis sp. i. unciam producente.]

[Fulminaris lapis s. Ceraunia, cuius pyramidalis plerunque figura, unde Donnerkeil vel securis, Donnerart. &c. Hunc muliercula in defluxionibus in genas, mammillas, &c. affricant: in Hydropè & lètero etiam proficius dicunt.]

Glossopetra seu lingua serpentina Melitensis, Schlangen- oder Natterzung, cortice splendido subinereo, (qui nigricante melior) minutim ad latera serrata, Terra sigillata vel Boli Armena virtute pollens æstimatur, ad venenatos animalium ictus & morsus, venenæque arcenda, epilepsiam lumbrosos; variolas & morbillos malignos assumpta, dystociam manu detenta, difficultem dentitionem, appensa. Oculi lutei serpentum Glossopetra commasuntur, viribusque æquales putantur. Inveniri etiam in ericeto Luneburgenſi dicunt pyramidales glossopetras.] Schoderus.

2. Sal Crystallorum. 3. Magisterium Crystalli. 4. Oleum seu Liquor Crystallorum. 5. Elixyr Crystalli. 6. Essentia Crystalli.) Istiusmodi præparationes nil nisi salia lavata seu fucata sunt, parum vel prorsus nihil de crystallis in suo sinu recondita habentia, ex diversitate texturæ & figuræ partium minutissimarum orta præsens mendicatum pallium induerunt. Ut tamen & Nostrum symbolum addamus, dicimus, posse, ex sale crystallorum per solutionem Acet. dist. prævia illorum calcinatione parato crystallos cum Nitro confici in febribus non rejiciendos. Recip. Salis crystallorum & Nitri ana q. s. solve in acet. dist. evaporet media pars & crystallifcentur in frigido. Hi crystalli utilissimi sunt in febribus ardentibus ad grana aliquot in cerevisia dissoluti.

N. Magisterium Crystalli.) Si solutio crystallorum per Acet. dist. cum spiritu Vitrioli rectificato in aq. com-

muni diluto præcipitur, humiditas decantetur & residuum cum aq. f. edulcoretur, sit Magisterium. Decantatus Liquor novis crystallis calcinatis affunditur, quod denovo solvit, & secum solutionem retinet. Quando non amplius solvit, filtratur & evaporatur, transit in Liquorem seu Oleum per deliquium Crystallorum.

N. Essentia Crystalli.) Recip. solut. crystallor. per spirit. Nitr. aceto destillato temperat. factam, inde retortâ, abstrahè ad siccit. resid. solut. crystall. siccam extrahe spiritu vini, digere filtra.

7. Cremor Crystalli.) Optimus fit cremor cum *, si scilicet crystallorum s. q. cum s. q. * misceatur pulverisatorum exquisitissime, inditaque retortâ destillantur lento prius Ignis gradu, & deinde fortiori Igne urgeantur, primò extillat sp. urinosus volatilis, postea ex residuo cum deliquio soluta fiat cremor beneficio fractionis factæ cum aquâ fontanâ. Hofmannus.

VIII. Hematites.

Albos æquarimus. Lapis est, vel terra duriuscula, sanguinem colore æmulans. Arabicè Scedenigi. Germanicè Blaisstein, la pierre Hematite, ou Sanguine. Bloodstone. Bloedi-steen.

N. 1. Lapis Hematites nostratibus officinis usitatus, differt à veterum hematine.

N. 2. Interdum Niger est, interdum ferri colorem habet.

Reperitur Lapis Hematites Officinarum in varijs Germaniæ locis. Sæpè inter rubricas & ferri fodinas, quales prope Joachimicam vallem Bohemiæ; item circa Bresiam; aliquando ex Ostracite nascitur, ut prope Hildesheimium contingit. Excoquitur in ferum lapis hic, adeoque ferri materia existit. Fit etiam hematites ex magnete uſto.

Optimus habetur friabilis, saturato colore niger qui per se durus est & æqualis, nulla sorde admitta aut septo intermedio. habetque cinnabari similem colorem, sed saturatiorem; loci naturalis ratione, Hispanicus præstat.

Vires. Refrigerat, exsiccet, adstringit, glutinat, adeoque convenit ulceribus oculorum & pulmonum, oculis lacrymantibus sanguinem, sanguinis exspuitioni medetur, profluvia, v.g. hæmorrhagiam uteri, alvi, &c. compescit.

Datur pollen internè à $\mathfrak{D}\gamma$. ad $\mathfrak{D}\text{iv}$. Externè modo variis adhiberi potest. Schoderus.

8. Hematites.) Germanicè Blut-Stein: ita dicitur, vel quod colore cruorem æmuletur, vel quod sanguinem sistendi vim obineat; Mediæ Naturæ esse videtur inter Terram, lapidem & Metallum. Plinius quinque hujus recenset genera, inter quæ tamen quædam potius ad Rubricas & Cinnabarim Nativam sunt referenda, quàm ad Hematiten. Idem etiam Lib. 36. Cap. 26. Hematiten & Schiston cognationem habere docet, & hematiten discernere venas rubentes & quod sit naturâ friabilis. Differt tamen hic ab illo, quod Schistos sit pallidior & crocei coloris ac friabilis, suapte naturâ fissilis, concreto & alterno coherentium venarum adhæsu armoniaco salis similis. At Hematites venis rubentibus friabilis est & sanguineus. Naturæ Martialis est. Fit hematites etiam ex magnete combusto, seu igni artificialis, seu calore terræ. Hinc non est impossibile, ut, ubi sit magnes, ibi etiam reperiri Hematiten. Hispanicus omnibus præstat; Et qui compositella adfertur, figuræ angulosæ est.

Vires. Habet vim adstrictivam glutinantem, unde in hæmoptoë & omni hæmorrhagiâ, item ulceribus pulmonum commendatur, in dysenteria notabilem etiam præstat energiam. Manu detentus narium fistit hæmorrhagiam vel fronti item applicatus, & tunc misceri potest cum aq. busi. pastor. plantag. spermat. ranarum

rum &c. in nimia uteri hæmorrhagia externè etiam adhiberi potest cum aq. spermat. ran. & aceto rosaceo. Hofmannus.

edulcoratur, edulcoratum succatur, succatum quod coloris rubei est, ad usum servatur.

Flores Hæmatitis.

Præparata.

Hæmatites præparatus fit leg. c. cum ∇ adstringente, verbi gratia, Plantaginis vel Tormentillæ.

N. 1. Hæmatites per \odot exhibet spir. odore ac sapore spiritum \odot i amulantem.

N. 2. Hæmat. cum * \ominus rus pulverem præbet insigniter diaphoreticum, coloris aurei valde jucundum. [Aroph. Paracelsi quasi aroma Philosophorum.]

N. 3. Pollen cum aqu. diaphoretica maximo cum fructu podagræ exhibetur.

Ex communicatione Clariss. Dn. D. Langelotti.

[Tinctura etiam parari potest ex Hæmat. cum sp. \odot comp. vel sp. \odot reclus. per spir. Vini.] Schroderus.

Præparata. Si Lapis Hæmatites lævigando in subtilissimum, & quasi impalpabilem alkohol redactus postmodum cum modico olei destill. Nucis moschatae humectetur vel cum extracto croci Or. imprægnetur, & denique exsicceetur, ad plures alios affectus incomparabile remedium.

N. 1. Hæmatites per retortam exhibet Spiritum. Non per le, sed cum sale acido *ci turgidus summe volatilis ac fragrantissimum largitur spiritum magnorum morborum domitorem si optimè usus fueris luto, spiritus penetrationem impediens ex receptaculo. Si Hæmatiten cum *co ana sublimaveris, flores acquies elegantissimos Aroph. Paracelsi dictos, seu Aroma Philosophorum, in quartana, Plicâ & morbo hypochondriaco maximè virtutis. Hi dicti flores magis diuretici, quam diaphoretici sunt, contra atque Autor statuit.

Recip. Lapid. hæmati. optimè lævigat. *ci ana $\frac{1}{2}$ j. mista & probe confusa ad mra impone cucurbitæ fictili probe lutatæ ac igne aperto per gradus sublimæ adaptato recipiente munito. Primò exstillat liquor volatilis salis urinosus luteus, & deinde ad latera cucurbitæ flores aurantii coloris elevabuntur, quorum tincturam spiritu vini rectific. extrahe, extractiones omnes per destillationem in cucurbita vitreâ abstrahæ ad rutilantis salis siccitatem, qui aurei coloris sal croci spirabit fragrantiam. Unde & Philosophorum Aroma dicitur. Ex Cap. mort. destillatur spiritus acidus Martialis elegantissimus.

N. Tinctura quoque elegantissima paratur ex Lapide Hæmatite prius cum sp. Salis composito vel sp. Nitr. à Sale abstracto recluso ac postea spiritus vini beneficio extracta.

Dosis harum Tincturarum est à gut. xx. ad xxx. in convenienti vehiculo. Hofmannus.

Præparationes variæ Lapidis hæmatitis ex

D. D. Bauschio.

Hæmatitis ustio.

Peragitur si lapis hæmatites igniatur atque in felle bubulo extinguitur.

Hæmatites trochiscatus.

Hæmatites minutissimè pulverizatur, coquitur in aq. comm. vel plantag. destillatæ per horas 7. vel 8. ut fiat instar terræ luteæ, quæ postea effusa & evaporata aqua in trochiscos formari & sigillari potest. Dos. est à $\frac{1}{2}$ j. ad Div.

Magisterium Hæmatitis.

\mathcal{L} . Hæmatitis pulverata $\frac{3}{4}$ vj. calcin. cum sulphur. pariss $\frac{3}{4}$ viij. vel pluribus, donec sulphur absumptum sit. Huic rursus pulverisato affunditur acutum destillatum, bene acuatum cum sp. vitrioli. Post aliquot dierum extractionem in loco calido, vel arena calida, præcipitatur cum oleo tartari per deliquium. Præcipitatum cum repetita affusione aqua calida

\mathcal{L} . Lapidis hæmatitis subtiliss. pulverisati p. j. salis ammoniaci eidem tenuissime triti. p. ij. optime misce, sublimæ per alembicum in arena, igne forti: spiritum salis ammoniaci egressum seorsim serva: sublimatum elue aqua, filtra per chartam emporeticam, præcipita affusione olei tartari per deliquium, donec aqua fiat alba & clara: præcipitatum edulcora, sic habebis flores lapidis hæmatitis.

Tincturæ Hæmatitis.

\mathcal{L} . Caput mortuum quod in sublimatione hæmatitis in fundo cucurbitæ remansit, solve aqua, donec non amplius tingitur; solutiones calidas filtra per chartam, coagula igne forti, & extrahe. postea cum spir. vini (præstaret sumere spir. cydoniorum vel prunorum sylvestrium) affundendo roties, quoties tingitur, Tincturam, quæ per chartam filteranda.

In hac tinctura progressu temporis subsidet pulvisculus subtilis: hic effusa tinctura siccanda: siccato affundenda aqua, ut sal ammoniacum quod adhuc dum ipsi adheret, imbibat: qui pulvisculus denuo ad usum medicum siccandus, & vel seorsim servandus vel floribus immiscendus.

Aqua vero illa evaporanda ut coaguletur sal ammoniacum, quod depuratum, diaphoreticum in febribus esse potest, cum constet ex sale ammoniaco, tanquam specifico febrifugo, & hæmatite tanquam diaphoretico.

Ultimum caput mortuum hæmatitis, seu corpus hæmatitis è quo flores sublimati & tinctura extracta, posset uri & lavari, pro usibus extetnis.

Liquor Hæmatitis.

\mathcal{L} . Lapid. hæmatitis & sal. ammoniaci ana p. aq. subtilissimè pulverata & optimè mixta destillantur. Ascendit spir. salis ammoniaci, igneus urinosus: aucto igne sublimatur sal ammoniacum, & secum rapit flores hæmatitis, instar coriæ aurantiorum coloratis: hos reduc in tenuissimum pulverem, super funde spir. vini rectificatissimum, ut tincturam extrahat: idque roties repete, quoties coloratur spir. vini; spiritus hos tinctus destilla ex balneo: manebit in fundo cucurbitæ sal pulcherrimorum colorum, odore croci, quod serva.

Caput mortuum tere subtilissimè, projice in spir. vini optimam, (possit spir. vini è sale destillatus sumi) qui coloratur: repete aliquoties usque ad extractionem omnis tincturæ: spiritus hos destilla per alembicum ex balneo, remanebit iterum in fundo fac ut prius, hoc destilla lento igne, per retortam vitream lutatam, in furno venti, exibat spir. salis ammoniaci acidus, corrosivus, duplicatus: aucto igne prodeunt flores: finita destillatione conjunge spiritum corrosivum cum floribus in collo retortæ hærentibus: destilla lento igne per retortam vitream: exibat spir. & flores manebunt in fundo, hos flores misce cum superioribus, repone in cellam, ut liquecant in liquorem. Liquor hic insignis est medicina, præsertim cum gummi ammoniaco in pilulas redactus: in hydrope, quartana, scorbuto, plenitudo, tenum calculo, colica, obliatione mercurii, melancholia hypochondriaca, affectibus ventriculi variis aliisque morbis gravibus præterea habet vim anodinam & somniferam.

Oleum hæmatitis ad sanguinis profluvia.

\mathcal{L} . Lapid. hæmatitis subtiliss. contriti p. j. sal nitr. partem alteram c. sulphuris vivi p. ij. commisceantur & in calicem aduratur hæmatites: deinde ex aqua pluviali stillatitia, lavetur aliquoties, rursusque siccetur: postea vini spir. superfundatur, macereturque: tum extrahatur rursus, & quod in fundo remanet, iterum calcinetur, lavetur, siccetur, destilleturque toties donec in vino eliquescat instar nivis: tandem incoquendo sal provenit, quod in loco humido resolvitur in liquorem.

Quinta essentia & sal lapid. hæmatitis.

L. Lapid. hæmatitem cum duplo sulphuris, tere in pulverem impalpabilem, cimenta per horas sex, postea sub tegula in fornace probatoria candefac per horas duas, semper movendo: materiam ignitam projice in acetum acerrimum destillatum: à residentia lentè separa acetum destillatum; pulverem cum aq. comm. destillata edulcora: sicca: dein cum aqua rosarum forma globulos parvos: quibus superfunde spir. Juniperi, digere aliquandiu donec omnis essentia extracta sit: filtra per chartam, spir. in B. M. abstrabe, ut essentia maneat in fundo: caput mortuum edulcora: superfunde aquam mellis corrosivam: abstrabe aquam: Sal cum spir. vini per iteratam destillationem edulcora sic habebis sal parum.

Plura videbis apud D. D. BAUSCHIUM qui tractatum de Lapide hæmatite publici juris fecit.

IX. Lapis Judaicus.

Lapis Judaicus olivæ specie subrotundus, tener & friabilis est, striis secundum longitudinem discurrentibus & æquidistantibus, ac si arte (torno) factæ essent, colore est albo & subcinereo.

Reperitur in Judæa, unde *Isdaunus* dicitur, hinc & in Silesia.

Dicitur Aëtio Lapis Syriacus, aliis Phenicitis, Tecolithos, Arabicè Hager alieudi, & Agiar aliheud Germ. *Judenstein*. La pierre Judaique. *levus-stone*. *Joden steen*.

Aliqui sexum distinguunt, minoresque fœminas vocatas, ad vesicæ lapidem commendant, majores masculos, inter quos aliqui sunt longiores minimi digiti quantitate, ad renum lapidem expellendum.

Vires. Medetur difficultati urinae, calculos vesicæ, præcipueque renum rumpit. (ritus exhibitus.) Schroderus.

Lapis Judaicus.) Ita dicitur, quia in Palæstinâ & terrâ Judæorum reperitur. Similis est glandi, sive olivæ, lineis quasi torno ductis. Dicitur Aëtio Lapis Syriacus, aliis Phenicitis, quia in Syriâ & Phœniciâ reperitur. Dicitur & Pyrena, quia similis nucleo olivæ, item Tecolithos, quod calculum solvat: item Eurhoës Plinio, quod urinam fluere faciat. Hisce vocabulis non plures, sed una saltem indigatur hujus Lapidis species. Reperitur etiam in Saxoniâ, circa Hildesheimium, in Marchiâ antiquâ ad ostium Tangræ, ad littora Albis &c.

Vires.) Medetur urinæ difficultati, calculo &c. Unde ejus pulvis cum saccharo cando infantibus calculosis summo cum fructu exhibetur. Ingreditur Dn. D. Johan. Michaelis Liquorem & Magisterium Nephriticum. Hofmannus.

Præparata.

1. Præparatus fit lege c.

2. Sal. &

3. Magisterium.

Calcina cum Sulphure, solveque in Acet. destill. mellito, vel spirit. Sal. com. hinc abstrabe, habes sal, vel præcipita cum Ol. Tartari, habes magisterium, edulcorando.

4. Oleum seu Liquor: fit per deliquium.

N. Oleum lapid. Judaici Lyncis &c. per deliquium reperiens in Cist. med. p. 112.

X. Lapis Lazuli.

Lapis Lazuli, est lapis opæus Saphiri colore, aut florum Cyani, aureis punctulis aut flammulis exornatus, Armenio durior.

Dicitur Αἰδὸς κυανὸς, Lapis cœruleus. Arabicè Hager, Azul.

N. Ex hoc fit color ille cyaneus, quem ulceram a rinum

vocant; azurum verò ex lapide Armenio, vel cyano Germanico faciunt.

Genera tantum duo sunt, fixus, id est, colorem in igne non mutans, qui ferè ex Oriente affertur, & non fixus qui in Germania reperitur, ac vulgò *Lazurstein*, la pierre d'Azur, *Lazus-stone*, *Lazuyren-steen* vocatur, unde color dictus *Lazurblau*.

Azure or Lazul-bleuv. *Lazayrblæuvv*.

Vires. Viribus convenit cum lapide Armenio, sed imbecillius eas exercet. Purgandi facultate præditus est, præcipuè contra Melancholicos omnes affectus, quartanam, apoplexiam, morbum comitalem, lienis vitia, aliisque complures, à melancholico succo originem ducentes.

Dosis ʒj. in polline subtilissimo.

N. Pro amuleto etiam de collo gestatur, ut puerorum terribilamenta arceat, oculorum aciem robotet, syncopen & prægnantium abortum præcaveat. Verum partu appropinquante, ne foetum retineat, auferendus est. Boëtius de Boodt. Schroderus.

10. Lapis Lazuli.) Arabibus ita dicitur. Est lapis cœruleus aureis flammulis exornatus, inde & Græci κυανέον vocant. Ex hoc ultramarinum conficiunt. Eligitur saturato cœruleo colore coruscans maculas quâdam aureas stellarum modo radiantes habens fractu contumax, & ab igne invictus, in aurifodinis orientali-bus effoditur.

Purgandi facultate præditus est.) Cum hujus lapidis, ut & Armenii virtus commendare ab antimonio non valde dissimilis sit, susque deque purgantis omnes humores; quaeritur: an rectè ingreditur confectionem alkermes, & annon eo nomine potius sit omittendus? Amatus Lusitanus de quodam observationem habet, cui ex frequenti hujus confectionis usu grave sanguinis stillicidium accidit, ob hunc lapidem putans. Verum hic metus inanis est, vis enim purgandi quam in sale volatili consistere putat P. Poterius l. c. per calcinationem vel alio modo corrigi potest, ut in confortantem degeneret. Quid si hoc symptoma, quod Amatus adfert, ex nimio confectionis Alkermes usu ortum duxisset? vel à Moscho & ambrâ, quæ hanc ingrediuntur confectionem, vel à dulcibus fuisset, fermentatione p. n. in massâ sanguineâ excitatâ Moschum autem & ambram sanguinis impetum promovere jamdum supra demonstravimus. Ecce non potius creber hujus confectionis usus diarrhœam vel hypercatharsin movit, quam nudum sanguinis stillicidium? Ideoque hic Lapis philosophicè præparatus admirandam habet vim confortandi & maniacam ac melancholicum *μιασμα* expellendi. Hofmannus.

Præparata.

1. Lapis multoties (in aq.) lotus, quem præparatum dicunt. Lavatur autem ut acrimonia, visque exurendi lotura auferatur.

2. Magister.

Fit cum Sp. Sal. cum melius cum ∇ .

N. Quercetanus Ph. R. calcinat cum Sulphure, & solvit cum Acer. destill. Vini optimi, hinc præcipitat cum Ol. Tart.

Dosis ʒj. &c.

3. Elixir.

Calcinaur Lapis Lazuli in fornace laterum deinde Aq. vitæ solvitur calcinatus.

Florovantus hac solutione multos morbos & febres malignas se curasse scribit, & ulcera etiam pessima in optimum statum ad miraculum usque redegeisse.

4. Oleum seu liquor, qui illius dolores podagricos, inflammationesque levat.

5. Essentia s. Extractum.

L. Lapis Lazuli q. pl. igniatur 6. vel 7. extingua-tur

turque ia ∇ tandem in pulverem redigatur, & eum ∇ mellis ipsius crementa terrea eluantur, (*laß abschleichen*) laiffe l'eau doucement decouler, *let them run ea sly off. laet se stille aflooven.* redigantur in pulverem tenuissimum, & cum ∇ digerantur in calore septim. 3. vel 4. dein abstrahatur ∇ , & remanentiam serva.

Dosis à $\mathfrak{D}\beta$. ad $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$. Hartm. in pra

Cryalli purgantes Lap. Lazuli.

Calcinetur forti Δ donec albefcat, teratur in mar. more, bulliat in f. q. Acet. destill. per v. aut vii. horas Decantatum Acet. destill. inciat in vas fictile non vitrearum, strictique orificii, 5. aut 6. unciarum capax, os testæ cerâ occludatur, reponatur in cella, & transudabit lanugo crystallina intra paucos σ , vâsque testaceo adhærebit, hanc collige, aliam expecta, &c.

[Tinctura per fl. \ast & alcool Vini Hispanici.]

Dos. $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$, ad $\mathfrak{D}\beta$.

[Lapis Lapis novi orbis ∇ stillariâ maceratus cœruleam reddit.

Vires. Mundificat oris ulcera Zac. Luf. Pr. admir.] Schroderus.

Preparata 1. Lapis multoties in ∇ lotus.) Hujus Lapidis lotio supervacanea est, sed sufficit, modò purum, nec nimis saxosum obtineas. Nil absonum veritati loquitur Cl. Zvvelferus, utrumque, quod eluitur, & quod lotionem remanet; purum pulverem Lapidis Lazuli esse nullo planè sapore v. l per se imbutum, nec etiam aquam ab eo imbui. Quicquid contra Alii statuunt. Prout experientia cuilibet manifestabit, si probare libuerit. Falsum est ablutione præparatum vomitum non movere, non lotum autem hoc perficere, cum tam non lotus, quàm lotus *ἀνὰ τὴν κατὰ* purget. Adversio Domini Schræckii Nos etiam frustratur, lixiviosam seu alkalicam Lapidis Lazuli profapiam gustu judicari, experimento enim facto, ipsum opinione falli deprehendimus. *vid. l. c. Class. 20. p. 439.*

2. Magisterium.) Eustadius negat, ex hoc lapide Magisterium præparari posse, dicit enim, si in Acet. dist. solvatur, illud sapotem Vitriolatum acquirere, qui postmodum nullatenus separari aut edulcorari possit. Alii Lapidem hunc cum Sulphure calcinant, postea cum sp. Salis solvunt, & demum cum oleo Tartari p. d. trant & edulcorant. Nonnulli seq. modo præparant tincturam & demum Magisterium.

Recip. fl. \ast in destillatione sp. \ast adscendentium & alcohol vini Hispanici q. f. misce ac digere, & habebis menstruum, quod superfunde lapidi Lazuli subtilissimè trito & statim extrahet in modico calore digestionis tincturam cœruleam. Dos. $\mathfrak{D}\beta$. ad gr. xv. in delitio.

N. Si huic Tincturæ affundes tantum spiritus Vitrioli, usque dum non amplius effervescat, & tinctura mutata sit in ∇ viridem, abstractâ modico calore humiditate ∇ tatum acquires, quod in calore fluit instar ceræ, in frigore autem instar butyri concrefcit. Dosis hujus $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$. in Maniâ.

2. Tinctura cum sp. \ast urinoso præparata commendatur in quartanâ, epilepsiâ, apoplexiâ, maniâ, melancholiâ &c. ab humoribus acidis ortis, Dos. est à gut. x. ad xx. vel ultra.

Magisterium Lapidis Lazuli à Cl. Zvvelfero communiatum in animadvers. P. A. p. 413. & in ejus appendice p. 15. Pictoribus commendamus.

3. Elixir.) Si aquæ vitæ fl. \ast vel sp. \ast urinosus in f. q. addantur, solutio & extractio commodius succedet. Prout & in Essentiæ præparatione itidem modus observandus, & in utroque digestio per plures septimanas in moderato calore continuanda non postponenda.

Cryalli purgantes Lap. Lazuli.) Hi cryalli Vitriolum quoddam sunt ex Acet. dist. & substantiâ Lapidis Lazuli constantes, quibus purgantia acui & in vitibus

exaltari possunt) Hofmannus.

XI. Lapis Lyncis.

Lapis Lyncis, Belemnites, *ὄπτε τὸ βελεμνίς*, à sagitta, cujus effigiem refert, (seu dactylus Idæus, à figura dactyli & Idæ monte Cretæ Insulæ, ubi invenitur.) est lapis teres: pyramidalis, sub variis coloribus repertus. Germ. *Albschoß, Schoßlein, Luchstein, Tappenstein*, (si niger sit.) La pierre de Lynx. Lyncian-stone. *Sten van de lynx.*

Inveniuntur albi, nigri cinerei, pellucidi, vini fæculi instar, Et hic fortan est quem veteres Lyncurium appellarunt, quem succini speciem fecerunt, ob colorem, quo succinum refert, quemque ex urina Lyncis, simul ac ea excernitur, coagulari, nonnulli fabulantur.

N: Vires hic lapis graveolet, & ne ustus quidem odorem deponit.

Reperiuntur multis in locis Germaniæ, in Borussia, Pomerania, Episcopatu Hildesienfi, Halvetia, Ducatu Wirtembergensi. (Göppingæ.)

Vires. Adhibetur ad calculos frangendos, non aliter quam lapis iudaicus, (In febris intercurrentibus nobis utilis. Dos. $\mathfrak{D}\beta$. vel $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$. cum aceto.) Curat vulnera, Putatur etiam ad pleuritidem (quia mucrones habet,) valere.

N. Putant lapidem hunc potum contra Epithitis suppressiones, noctisque ludibria valere, ac fascinationibus succurrere. Schroderus.

II. Lapis Lyncis.) Dicitur & Belemnites, *ὄπτε τὸ βελεμνίς*, à sagitta, cujus effigiem refert, non dactylus idæus à figura dactyli & Idæ monte Cretæ Insulæ, ubi invenitur. Veteres Lyncurium appellarunt, quem succini speciem fecerunt, & ex Urina Lupi cervarii seu Lyncis in sylvis ac montibus coagulata generari tradiderunt. Neque hoc adeo absurdum dicit Christoph. Enchiridius de re metallic. Lib. 3. cap. 27. Urinam Lyncis coire in Lapidem, præcipue calore terræ, tibi simile dicam, inquit, in exitu vesicæ sylvestris porci, apri scilicet, nonnunquam etiam porci domestici castrati, repetitur Lapis coagulatus ex urina calore animalis, flavus & subpallidus nonnunquam, magnitudine fabæ. Cur ergo non fieret, ut urinæ Lyncis calore terræ coirent? Verum hoc non admittitur à Naturæ scrutatoribus, alia enim est ratio & modus fiendi calculi porcini, & aliorum calculum, qui non semper in vesicâ ex urina, sed & aliis etiam in partibus ex petrosis seminibus produciuntur, & aliis hujus Lapidis, qui ex terrâ in sylvis & montibus, quo lynces nunquam stabulati sunt, ex profundo eruuntur. Reperitur in Borussia, Pomeraniâ, &c. Prodest contra calculos, icteritiam, fluxus ventris. De cæteris, constat experientiâ, hunc Lapidem etiam mitificam fermenti febrilis vim habere præcipitantem, ut in febris intercurrentibus pulveris hujus $\mathfrak{D}\beta$. vel $\mathfrak{D}\mathfrak{j}$. in aceto vini propinati horâ unâ vel circiter ante paroxysmum febrilem non facile medentem desetat. Putatur etiam ad pleuritidem, quia mucronem habet, valere, sed non est universalis regula, quia alia habemus præstantissima anti-pleuritica, quæ tamen minimè sunt mucronata.

N. Hæc referri etiam posse videtur Ceraunia seu Lapis fulminaris à fulmine nomen trahens, Germanis Donner-Keiße. Figurâ enim non abfimilis hic est dicto Lapidis Lyncis, licet hic fulminaris præter hanc alias etiam habeat variasque figuras, sed maximâ ex parte tamen cuneum refert, pyramidem, ut repræsentet saccharum pyramidale einen Zuder-Hut, malleum, securim, clavam &c. substantiâ ad silicem ut plurimum accedit, durus adeo, ut limam non sentiat, gravis & ponderosus. Somnum provocare quidam volunt & victoriam in prælio & causis agendis conciliare. Infantes ab hernia præservari, si cum s imponatur, & curari ita, si eo morbo laborent. Domum, in qua servatur, à fulmine tutam esse credunt, ut & hominem, qui easte eum gesta-

gestaverit. Ex hoc paravit etiam medicamenta *Dn. D. Joar. Mubaelis* ad hydropem & ictericiam utilissima. vid. *G. fier. de figur. Lapid. p. m. 63. Kentmann. de Lapid. Ol. Worm. in Museo Cap. 12.*

N. Dicunt Lapidem in India esse *Cocostet* seu *Corvinus* dictus, qui calefactus tonitru edit in *hisor. Brasill. P. Borellus in histor. & obs. C. 2. obs. 58. Hofmannus.*

XII. Magnes.

Magnes est lapis, qui ferrum vel alium magnetem ad se trahit, ac plagas mundi ostendit. Græcè *ἄλσος μαγνήτης*. L. Heracleus, *ἡγεκλειος*. Lat. Hercules, sideritis s. magnetis. German. *Magnetstein*. La pierre d'Aimant. *Loadstone. Migneet, of Zylsteen.*

Reperitur circa ferri fodinas in diversis locis Germaniæ, Norvegiæ, Succiæ, Italiæ.

Delectus.

Vegetior plerumque cæteris esse solet, qui ferri colorem habet.

Vires. Vires habet hæmatitis, teste Galeno, adeoque adstringit, sanguinemque sistit, (ustus) crassos & melancholicos humores educit, sed usus est rarioris. Schroderus.

12. Magnes.) Ab inventore teste Plinio Lib. 36. Cap. 16. nomen accepit (item *Lapis Hercules*, *Heracleus* à civitate *Heradia* Lydiæ vel *Magnetis*, ubi laudatissimus magnes reperitur, appellatur. Vel etiam *Sideritis*. eò quod terram attrahat, *σίδερος* enim ferrum significat. Germ. *Magnetstein*. Est autem Lapis coloris nigri cærulei, densus, non admodum gravis. Ferrum vel alium Magnetem ad se trahit, hoc cedit magneti & patitur à magnete, & quod majus est, ferrum à magnete tactum alterum ferrum trahit. *Ful. Caf. Scalig. exerc. 102. f. 6.* ferrum non attrahere magnetem, sed moveri ferrum potius ad magnetem tanquam ad matricem suam, cujus abditis principiis perficiatur, statuit. Mas enim surrectus rigidus. Fœmina multis adversus maritum quasi blanditiis, & adnutans. Cum ferri pabulo non indigeat Magnes, non illud attrahet. Magnes etiam plagas mundi ostendit. Quam volubile & inconstans hoc sit vid. in *Nobiliss. Roberto à Boyle tentamin. physiologic. p. m. 137.*

Reperitur circa ferri fodinas. In diversis locis Germaniæ, in Silesiâ, Bohemiæ finibus ad *Schvartzbergum*, item *Salveldiæ* in antiquis ferri fodinis, *Gossatiæ* &c. Præterea etiam in Norvegiâ, Succiâ, Italiâ, Hispaniâ (ut fertur) invenitur.

Vires habet hæmatitis.) Suprà diximus, magnam esse magneti tum hæmatite affinitatem, ut Plinio etiam hæmatites magnes dicatur; qui est species hæmatitis *Æthiopici*, & magnes combustus sit hæmatites, & venditur pro illo. Inde & eandem cum hæmatite habet vires. Nonnulli cum multa exhibitum hydropicos sanare dicunt serofos & adustos humores evacuando. Ex collo gestatus spasmus sanare ac nervorum dolores compescere, manuque detentus partum accelerare credit. *Hofmannus.*

Præparata.

Unguentum Magneticum, seu Sympatheticum, vide lib. 2.

N. 1. Sunt qui ex magnete usto & cera Emplastrum conficiunt, idque summè ad podagricos dolores leniendos commendant.

N. 2. Corroboratio magnetis institui potest, si cum Calc. viv. Δ mediocri cemenretur, ac postmodum in solutione vel oleo & extinguatur. *Schroderus.*

N. 3. Sunt qui ex Magnete usto & cera Emplastrum.) Quale etiam *Boëtius* describit; hujus beneficio dicunt extrahi posse ferrum, quemadmodum historiæ referunt de rustico *Regiomontano* & *Bohemico* cultum

deglutientibus. Ad podagricos dolores leniendos summè etiam commendatur. Unde conficiunt nonnulli emplastrum ex magnete, quod salia acida massæ sanguineæ, imprimis si *crocus martis* aperitivus intus etiam fuerit propinatus, exterius locis dolentibus applicatum foras elicere libi imaginantur. Quodque etiam in hernia & prolapsu uterino maximi sit valoris ductu & consilio *Helmontii* p. m. 597. Dum inquit: Dorsum magnetis sicut ferrum, ita & intestinum pellit, curat herniam, omnemque catarrhum de Natura martis. Omnes nempe magnetissimi ad hominis usum sunt ordinati; Vis trahendi ferrum si muniæ muliebri maritata fuerit, tunc dorsum magnetis in femore & ejus venter in lumbis emplastrata arborum jam minitantes tunc præcaver. Venter vero magnetis in femore & dorsum lumbis appositum partum mirificè faciliat. Verum si allegata emplastra in dictis affectib. aliquem præstant notabilem effectum, non ob attractivam hoc sit magneticam vim, sed exiccantem & adstrictivam, in qua magnes ferrum vel hæmatitem æmulatur. Magnes inquit *F. Platerus in quest. Medic. 91.* licet ferrum trahat, non tamen agit eà vi in corpus nostrum, cum quo nullam habet similitudinem, sed potius vi liccante & adstringente, uti & hæmatites &c. Præterea & hic in parte cum *Athan. Kircher* facio, qui lib. 3. cap. 2. de magnetismo Medico statuit, Emplastra ex contuso magnete nulla vi pollere magnetica. Etsi enim scobs magnetica & ferrea libera ex se & sua natura magnetica sint, & vi attractiva mirificè polleant, tamen ubi canali inclusa scobs fuerit, omnem eam attractivæ virtutis efficaciam ob partium se disponentium confusionem perdit, si igitur coarctatus intra canales pelvis magneticus vi sua ob dictas rationes privatur, quanto magis ea destituetur, si madefactus vel unctuosus aliis pinguibus speciebus in Unguentum redactus fuerit: quo præter partium, quæ in simili miscella concurrunt, confusionem, mirum est, quam obtundatur ejus vis, quam hebes & ignava reddatur, imò penitus destruat.

N. 2. Corroboratio magnetis institui potest.) Veteres Naturæ indagatores tradiderunt aliis succo magnetis vim attractivam aboleri, sed *P. Borellus in histor. & obs. 88.* hanc rem falsam esse per experientiam didicit. Corroborati autem magnetem posse liquore quodam otis singulariter præparato, licet *Cl. Zuvelferus* irrideat, experientia testatur. *Hofmannus.*

XIII. Marmor & Ophites.

Marmor lapis est insigniter durus ac ad splendorem suscipiendum, si polliatur, ita aptus, ut statuae vel columnæ egregiè nitentes inde scribi possint, Græcè *Μάρμαρος* (a splendore) German. *Marmelstein*. du Marbre. *Marbl stone, Marmeer-steen*...

Genera multa sunt, cum nec certa illis figura, nec color certus sit. Alia sunt alba, verbi gratia *Alabastrites*. Alia rubra, Alia nigra, ut *Lydius Lapis*. Alia variis coloribus; ut *Porphyrites*, *Ophites*, de quo hic.

Ophites est marmor instar porphyritæ durissimus, colore viridi saturato, dilutis ejusdem coloris maculis quasi aspersus. Græcè *ὄφις*. Latine *Serpentinus*, German. *Serpintinstein*. La *Serpentine*. *Serpentin stone. Serpentin-steen.*

N. 1. *Boëtius de Boodt.* cinereum quoque constituit Ophitem, eumque durissimum, tum & nigriusculis maculis aut punctulis variegatum & hunc mollitie alabastrita.

N. 2. Veteres Ophitæ genera fecerunt. 1. Nigricans durum. 2. Cinereum punctis distinctum. 3. Lineis quibusdam candidis interstinctum, candidum, melle. Hinc apparet veterum Ophitem à nostrate esse diversum.

Foditur noster in locis variis, Italiæ, & Germaniæ, verbi gratia in *Milniâ*, quod tamen ob mollitiem, rectius *Alabastris* accensetur, diciturque *Zebicium*.

Vires.

Vires. Viterum Ophita omnes allegati contra capitis dolores & serpentum ictus (ex signatura) profunt, teste Dioscoride. Qui lineas habent, Lethargo & capitis doloribus auxiliari dicuntur, arcereque pestem petechialem (ex signatura) Galeno lithonripticus est intro assumptus.

N. Ophita nostrati multa vulgus tribuit, videlicet, poculum inde factum, si venenum susceperit, id sudore prodere. Conducere colica, pleuritidi, torminibus, ac ventriculo refrigerato, doloribus podagricis, nephriticis, si calfactus ophites loco affecto applicetur. Opiulari quartanis, tertianis, phthisicis, hepaticis, si poculum quotidiano usui destinetur.

[Lapis Phosphorus, sive Luciferus Bononiensis spongia & retinaculum Solis & Lunæ, mistura chalcanti & Antimonii, Psilothrum præbet.]

[Melachites sive Pavonius infantibus pro extinguendo aestu febrili exhibetur ad gran. 3. vel 4.]

[Myxolithos, Bufonius lapis. Batrachites, Krotenstein, describitur infra] Schroderus.

13. Marmor & Ophites. Ophites est marmoris species, & ita appellatur, quia colore serpentes repræsentat. Et hæc species, lineis cinereis & nigricantibus est, uti sunt in colore chelydri ad ostium Tangræ. Est & alia species Ophitis magis ad serpentis formam accedens, quia squamas habet, ut serpens, & est crustaceus lapis, reperitur in Saxoniâ circa Hildesheimium, fordet instar cornu. Est & tertiâ Ophitis species, quam Encelius L. c. p. 125. invenit ad littora Albis propè ostium Tangræ, & est lapis tenuis, oblongus, in formâ serpentis, ac si serpens in lapidem indurisset, intus coloris nigri in cæruleo nitentis, foras albicantis.

N. Hic quaeritur, Quid de Draconite seu Lapide vel coronâ Draconum Aspidum, vel serpentum sit judicandum? Plinius Lib. 37. Cap. 10. Encelius de Lapid. & gemm. Lib. 2. c. 39. Libavius Lib. 2. Batrach. Cap. 23. & Alii adscribunt huic cum Philostrato Gygis annuli virtutem, Cæl. Rhodgin. Lib. 6. c. 2. Alias Gygis annulus adagium est, quadrat vel in homines moribus inconstantibus, vel in fortunatos, qui veluti virgulâ divinâ quicquid optant, id suo arbitrio consequuntur. Gyges fuit Rex Lydiæ, cui oraculum sciscitanti, cœquis se viveret felicius, Apollo prætulit Aglaum Sophodium Arcada, qui nunquam è tugurio suo fuerat egressus. Plin. Lib. 7. Cap. XLVI. Hujus adagii meminit Lucianus in Votis, ubi quispiam optat sibi complures annulos ejusmodi, quales habuit Gyges, alium, quo disceretur, alium quo gratus & amabilis redderetur, alium, per quem liceret volare quocunque libitum esset. Hic annulus hominem etiam inaspicuum reddebat, si pala ejus ad palmam esset conversa, cum ipse tamen omnia videret vid. Cicero III. de Offic. Ejusmodi magicam vim adscribunt etiam Draconiti. Verum à plumbis dubitatur de hujus existentia. Est enim circumforaneorum impostura plebeis obtrusa, dum nihil aliud sunt, quam chelæ, squillæ marinæ, quæ dentatæ ab uno latere interiore semifalcatæ, eboræ quovis nitidiores. Has affabre eâ parte, quâ dearticulatæ fuerunt, committunt, capsulique ossis & ligneis decenter inferunt. Vulgò vocantur Schlangen. Kronichen. Hofmannus.

XIV. Ostiocola.

Ostiocola lapis est albo cinereo colore, ossisque figuram æmulans. Dicitur lapis Ossifragus, Lat. Sabulosus, Ostites, Osteolithus. Holosteus, Morochtus Matthiolo, German. Beinbruch, Bruchstein, Beinvuvel, Wallstein, Sandstein, Steinben. La pierre Osteocolle. Osteocola, Astone like a bone, bone binder. Ostiocola, Wallstein, geliyck een bæen.

Nascitur Darmstatio in agro in Palatinatu, locis arenosis, (ander Bergstrafs, au chemin, dit près la montagne. On the hills. Arn de bertzstract...)

Item in Saxonia, in Silesia, &c. crescit per arenam formâ Coralli.

Vires. Celebratur ad ossa citò glutinanda, quippe materiam callo idoneam citissime suppeditat, adeoque glutinationem marurare. Adhiberi potest internè à ʒj. ad ʒi β. & externè in catapl. Emplastris &c.

Præparata.

Ostiocola præparat. lævigando cum ∇ geranii. Cremor Weinlini prodest hypochondriacis. Schroderus.

14. Ostiocola. Est lapis albi aut cinerei coloris, ossis figuram referens. Dicitur Lapis Ossifragus. Meindrich. Crescit per arenam in formâ corallorum, Reperitur in locis arenosis Saxoniæ, Silesiæ &c. Commendatur ad ossium fracturam citò callo obducendorum. Dosis est à ʒβ. ad ʒj. Ex hoc Lapide enim Magisterium confici potest ejusdem energiæ cum pulverisato, Hofmannus.

XV. Pumex.

Pumex lapis est erosus, porosus, spongiosus, exiguisque cavernulis, seu foraminibus plenus. Græcè Kiarnes, Arabicè Tanech. Germ. Bymstein. Pierre ponce, Pumice-stone. Pymsteen.

Invenitur ad Confluentiam Germaniæ.

Probantur, qui candore minimoque pondere, ut & qui quàm maximè spongiosi, aridique sunt, trituque faciles, nec arenosi in fricando, &c.

Vires. Refrigerat, siccit, extenuat, ulcera leviter purgat, cicatrices explet, & emendat. Farina adhibetur sæpe medicamentis oculorum, & verendorum. Immiscetur item dentifricis & sternutatoriis. Schroderus.

15. Pumex. Hic est lapis, & non est lapis; Lapis propter duritiem; non lapis propter raritatem, & innatat etiam aquis. Probatur candidus, levis, spongiosus, aridus, tritu facilis, nec in fricando arenosus. Reperitur in maris littoribus, inde quidam sibi persuaserunt, sed falsò, spumam concretam maris esse, Hofmannus.

Præparata.

Pumex usus.

Uruntur trinâ utione, ita ut torreantur carboni puri, ac toties vino retlinguantur albo. Lavantur deinde & siccari conduntur quàm minimè uliginoso loco.

N. Quidam tercia utione refrigeratos potius quam retinctos terere malunt ex vino. Boëtius de Boodr.

XVI. Lapis specularis.

Lapis specularis est lapis fossilis, instar crystalli pelucidus ac in bracteas tenuissimas scissilis. Dicitur communiter Selenites, aliis alumen Scaiolæ, quibusdam Glacies Mariæ, Fraven-Eiss.

Invenitur in Moscovia, copiose item in Hispania, in Saxonia, Thuringia, Marchia, Misnia, &c. Etiam autem ut plurimum candidus sit, attamen reperitur & variis coloribus, melleus scil. niger, fuscus.

N. Veterum Selenitem, (aphroselenitem) quia noctu lucebat, à nostrate diversum esse, nemo non intelligit.

Usus est rarioris, nec adhibetur facile, nisi ad mulierum faciem dealbandam, & rugas depellendas. Quidam tamen commendant in Epilepsia (& provocando partu.) Schroderus.

16. Lapis Specularis. Dicitur communiter Selenites, vel aliis Alumen Scaiola. Huic Asbestus lapis est similis, de quo vid. Ath. Kircher, in mund. subterr. Tom. 2. sect. 3. Lib. 8. p. m. 66. Narrant Geologi Sinæ Lapidem in Xensi provinciâ reperiri, qui juxta incrementum aut decrementum Lunæ crescat, inestimabilis apud eos pretii. Verum & eundem effectum non præstare.

stare apud nos *Seleniten*, seu præsentem lapidem specularem plerique tradunt Naturalium rerum scriptores. Observatum enim est hunc lapidem non solum ad Lunæ splendorem lucere, sed & veluti in speculo quodam Lunæ sive plenæ sive dichotomæ, sive sexatilis figuram perfectè exhibere. Unde de Lunari hoc lapide juxta phases Lunæ nunc crescente, nunc decrescente, fabula nata est, dum enim figuram Lunæ sub quâcunque phasi veluti in speculo exhibet, simplices realis lapidis incrementis aut decremento, phantasmate illo illusi id adscripserunt, quod non nisi in speculari Lapide reflexo Lunæ radio representatur, & inde patet, quod lapis semper sibi similis, nullâ in se mutatione factâ quâcunque Lunæ phasi in quâcunque tandem rerum exhibitionem persistat. vid. *Chinam illustratam* p. 205. *Hofmannus*.

Præparata.

Calx & Liquor.

Comburitur igne in pulverem candidissimum, qui per deliquium oleum seu liquorem præbet, Vide Talcum.

XVII. Silix.

Silix durissimum genus saxi est, vel marmore durius extrinsecus leve. German. *Kiesling, Keisselstein*. Un Crillon. *Flint stone. Keyssel-steen*.

Differentiæ ejus plurimæ sunt,

Nam alii liquabiles sunt, & plerunque foris albi & pellucidi. Germ. *Flusssteine, vveisse Kiesling, Bachsteine*.

White Flint, White Keysselsteen.

Aliqui prorsus, diaphani sunt.

Aliqui ita duri, ut ex iis ignis excutiarur, inde & Pyrites dicuntur. Germ. *Feverstein*.

Firestone. Vner-Keye.

Aliqui opaci prorsus sunt.

N. Qui molliores sunt marmore, non silices, sed lapides simpliciter appellantur.

Virec. *Silicum communium usus internus esse potest, ad tartaream mucilaginem incidendam, caliculi resolvendum, ac proinde ad obstructions referandas. Extrinsecus frequenter in dentifriciis adhibentur.*

Pyrites vim possidet calefaciendi, succandi, discuriendi, digerendi, adeoque Emplastris digerentibus admiscetur. *Schroderus*.

17. *Silix*.) Durissimum genus Saxi est, vel marmore durius. Derivatur à saliendo seu proiliendo, quia ex eo percussione factâ salit ignis. Sub hoc comprehenditur etiam *Pyrites*, imò omnis lapis, ex quo ignis proflit. Ejus plurimas differentias *Dominus Autor* describit. Nos addimus, silicum alios dari Solares, qui propè aurifodinas *Goldkranachii* & aliis in locis reperiuntur, & quàm optimè Medicamentorum præparationibus inserviunt; alios martiales, qui propè ferri fodinas reperiuntur. *Nobiliss. Helmontius* modum novit, quo in Silices Lumen Solis transferre potest, solâ silicis præparatione, ut extra Solis præsentiam sub densissimis tenebris lumen illud acquisitum aliquantisper permaneat, iterumque hauriatur lumen novâ silicis expositione ad solem diurnum, licet obnubilum p. m. 110. §. 95. Quemadmodum de Lapide Phengite idem habet *Robertus à Boyle de systemat. vel cosmicis Rerum qualitat.* Cap. 8. p. 49. Existunt sanè in aère certa quædam subtilia corpuscula, parata & disposita, ut se insinuare queant poris alterius corporis ita dispositi, ut illorum admittat impressionem vel actionem, si in primis cum illis concurrant aliæ nondum observatæ causæ & stabilitæ in hoc universo leg. s.

Vires.) Non omnes silices tunc usibus destinantur internis, sed illi solum, qui molles, friabiles, cultro atteri & faciliè contineri possunt, è quibus ferro alliso

non eliciuntur. Ex hoc præparata medicamenta tartaream saburram optimè incidunt, calculum expellunt & obstructions referant. *Hofmannus*.

Præparata.

1. Sal fit leg. comm. calcinatum solvendo in *.

Dosis gran. 6, ad 10. vel 20.

N. 1. *Calcinatio fit eodem modo, quo Crystallus calcinari diximus.*

N. 2. *Si ex tempore adhibere volueris, restingue silices ignitos in vino generoso, aut aceto, idque toties donec plane in pulverem fuerint redacti, ac exhibe vinum. Hartm. in pract. Medull. destill.*

N. 3. *Querc. solvit cum Acet. destill.*

2. Oleum fit per deliq. (melus. Ph. R.)

Dosis ʒj. Medull. destillat.

3. *Cremor silicum & crystalli paratur etiam facillimè ex liquore Silicum descripto in parte secunda furnorum Glauberi p. 136. si scilicet liquor ille diutius in cella seruetur, tandem Galredam quandam demittit ad fundum, 2º Tart. supernatante, quod tam diu evacuandum erit à dictâ Gelatinâ, quamdiu aliquid liquoris sursum feretur, deinde edulcandum est.*

Cremor hic de facili in quovis vehiculo dissolvitur. S. Clossii experientia, ad Spir. aperit. Benotti. Schroderus.

Præparata. 1. Sal fit l. c. calcinatum solvendo in Acet. Ego etiam ex sol's silicibus calcinatis quibusdam, non omnibus, aëri, sed temporis spatium expositis sal collegi sapore saccharum Furni æmulans.

N. 2. *Si ex tempore adhiberi vulneris &c.) Silicibus ignitis aliquoties affunde vinum generosum & hoc propina calculosis, mirum in modum calculum & urinam expellit, potes etiam vino addere summitates absinthii.*

2. *Oleum fit per deliquium.)* Liqueantur silices cum Sale Tartari, vel *, positi in aere humido per deliquium solvuntur, qui metallorum solutiones præstant. Ex hoc etiam cremor & crystalli patantur, de quibus vid. Auctorem.

N. *Si à Silicibus nigricantibus calcinatis Sp. * urinosum salum aliquoties per distillationem abstraxeris, acquies spiritum coerulei coloris urin. & calculum expellentem. Hofmannus.*

XVIII. Lapis Spongia.

Lapis Spongiæ est lapis prorsus friabilis, in spongiis concretus, colore candido vel gryco.

Dicitur *Cysteolythos* (ab usu,) Lapis Cappadox quorundam. German. *Schwammstein*. Pierre d'éponge. *Sponge-stone, found in sponges. Sponchsteen, in Spongiengervoden.*

Vires. *Extenuat absque insigni caliditate, ad calculos renum vesicæque frangendos utilis est. Valet etiam ad strumas discutiendas, si nempe omni mane fiat haustus propriæ urinae, & postea in ultima Cæ quadra singulis diebus sumatur in vino, cum Sal. communi Tartari & ʒ. Vide Gluckath. Idem præstat spongia combusta Schroderus.*

18. *Lapis Spongia.*) Spongia in quâ hic lapis reperitur, neque animal, neque frutex est, sed tertiam habet naturam animalis & plantæ, unde *Avicenna* definit corpus marinum, laxum, rarum, cui rei adhaeret, ab eâ non separatur, habetque animam. *Dioscor. Lib. 5. Cap. 85.* Ejus duo genera esse scribit, *Marem & Fœminam*. Nonnulli addunt tertiam, atque in hac, non in illis statuunt, reperiri Lapides, qui dicuntur à *Plinio Lib. 36. Cap. ix.* *Cysteolythos*, quia vesicæ succurrunt laboranti & calculum in illâ expellunt. Inveniuntur & in ipsis spongiis in matre & in fœminâ nuclei instar amygdalarum vid. *Encelius l. a. Cap. 45. Lib. 2.*

Vires.) Lapis Spongiæ præterquam quod puerorum lumbricos enecet, calculum renum & vesicæ frangat, strumis insuper certo experimento etiam medetur, vid. *Cl. Helmont, & Dominus Autor noster. Hofmannus.*

Præ-

P R Æ P A R A T A.

I. Sal.

Calcinaur cum Sulphure calcinatione levi, solvitur in Acet. destill. vel spiritu Sal. com. Item; ignitus toties in Acet. destill. extinguatur, donec in calcem resolvatur.

[Stellaris lapis, Astroites invenitur in Gotlandia; Tyrolensi etiam Comitatu. Antiloimicus putatur, & vermes necare exhibitus infantibus, ad gran. iv.]

XIX. Talcum.

Talcum Officinis lapis est, speculari lapidi similis, magis tamen tenuis, squamosus, viridiusculus, igni resistens ac fixus. Dicitur à nonnullis Stella Terræ. German. Talt. du Talc. Talk, the star of the earth. Talt.

N. Invenitur & Talcum rubrum ac nigrum (Paracelsus in Chronic. Carynthia) varum Officinis minus id usitatum est.

[Dicunt Olare, Dare, & eum pro coloris diversitate.]

Electio.

Optimum censetur, quod Vehetiis ad nos transportatur, Muscoviticum tamen æque bonum est, probatur autem præcipue viridiusculum.

Vires ac Usus: Potissimus ejus usus est externus & cosmeticus, adhiberi tamen nequit, nisi vinculo suo liberatum, præparatum, ac in liquorem redactum sit. Schroderus.

19. Talcum.) Officinatum Lapis est, Lapidi speculari haud absimilis, magis tamen tenuis, in laminulas flexiles tamen & varie intricatas argenti modo divisibilis, colore candido lunari, glauco viridiusculo aut nigricante. Dicitur à quibusdam stella terræ. Germ. Taltch.

Igni resistens ac fixus.) Vidit tamen Cl. Morhoffsus de metall. transmut. in Epistol. ad Nobiliss. D. Joël Langelott. vel intra dimidiæ horæ spatium paucissimo igne rudi ad speciem artificis totam ejus substantiam ita calcinatam, ut colore flavo ablato spongiosa facta sub digitis in minutissimum pollinem comminueretur. Quare patet non adeo igni invictum esse talcum.

N. Invenitur & talcum rubrum ac nigrum.) Th. Paracelsus quatuor talci species recenset de miner. tr. i. Rubeam, albam, nigram & luteam. Et fortasse hæ singulæ varias mineralium species complectuntur. In Anglia est Talci species, quod intra unius horæ spatium in calcem niveam igne moderato mutatur. Non desunt, qui pro minerâ solis venditant. Unde plurimi statuant, exinde menstruum fieri posse, ad transformationem ☉ & ☿ hæ, ut Mercurius figatur & tingatur. Verum licet certissimum sit ex quadam talci germanici specie in forti salium alkalisatorum solutione digesta non parum auri extrahi posse, meminimus, inquit Robertus à Boyle in tentamin. physiologic. me aliquantum Talci subfulci possedisse, quod aquæ regis immersum à menstruo illo manifestò solvebatur, quæ solutio deinde filtro depurata à quibusdam chemiæ peritis, qui viderunt, ratione saturitimi coloris, vera auri solutio judicabatur, exinde tamen non sequitur, illum ☿ rium figere posse.

Electio.) Optimum censetur Ventum, hunc saccedit Anglicum & demum Moscoviticum; Multis etiam Germania in locis reperitur ac Norvegæ. Probatur autem ex his viridiusculum, & quod ad tactum pinguis.

Vires ac usus.) Avicenna frigidum esse ait in primo, & siccum in secundo gradu, adstringit, sanguinem.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

nem sistit, prohibet mammillarum & parotidum abscessus. Sunt, qui dysentericis, hæmoptoicis, menstruorum & hæmorrhoidum fluxu nimio laborantibus cum ☿ plantaginis præbeant. Dixi modò laudato Morhoffsus l. c. amicus, novisse se medicum, qui sulphure per singulare artificium ex hoc extracto curare immedicabiles morbos potuerit, ut alterum illi à maximo Elixire locum posuerit. Quod sanè non de nihilo est, latere enim in eo Sulphur aliquod Solare certissimum est. Talcum calcinatum teste Martiano Martini in Atlante Sinico p. 79. vino mixtum ac epotum Sinicis Medicis ut singulare medicamentum ad vitam longam commendatur.

Potissimus ejus usus est externus & cosmeticus.) Hunc ut præter, prius in fluidum resolvitur liquorem necesse est, quæ gratia ab illo ignis torturâ extorqueri nequit. Mitius enim, ait Steno l. c. à naturâ haberi solitum Talcum tantam in venustatis amatoribus lævitiâ indignatur & vindictæ loco Vulcano cedit illam sui solventis partem, quam sibi inclusam conservat. Hofmannus.

P R Æ P A R A T I O N E S.

È præparationibus Talci præcipua est Calcinatio, reliquæ enim operationes, qualis est destillatio & liquatio, per se notæ sunt.

Calcinatio igitur tum est sicca, tum humida. Schroderus.

Præparationes. Ex præparationibus Talci præcipua est Calcinatio.) In præcedentibus jamdum percepimus, calcinationem Talci non adeo difficilem esse, modò quis veram encheirisin cognitam habeat, & modum intelligat, quomodo artificis ignis quoad gradus observandi in calcem redigi queat niveam intra unius horulæ spatium, etiam candela flammâ.

Calcinatio tum est fixa, tum humida.) Omnes hujus descriptiones à Dno Autore traditæ sunt exigui valoris, id quod sanctè testari possum, optimè mihi conscius, quam in his explorandis me non sine tædio & frustraneo effecto torserim. Talcum calcines summâ ignis violentiâ pto lubitu ad diuturnum etiam tempus & omnem vim flammæ eluder. Attamen præter calcinationem igne moderato artificis ad speciem rudi factam, nec minus præparationem per tritum in molâ philosophicâ institutam non adeo esse rejiciendam putaverim, imò Calcinationi per ignem præferendam. Ex hoc igne tenuissimo cum sale Tartari volatili ad septimanas aliquot digesto non equidem liquor pro cosmetico emerget, sed solutio ☉, si quid in Talco absconditum fuerit. Liquores & Tincturæ Talci ab Autore traditi ex propria saltum partim acidorum partim alkalisatorum oriundi parum animum curiositatis amantem exsultant. Hofmannus.

Calcinatio sicca.

1. Contunditur in pollinem tenuissimum pistillo ferreo, postea forti ollæ committitur, operculo addito, imponiturque furno vitriariorum, figulorum vel tælariorum (in vinem Kalkofen, Dans un four où on fait la Chaux. In a lime kiln een kalkoven.) ubi maximæ flammæ sunt. Post triduum aut quatrimum eximitur, & si in calcem redactum sit, servatur, sin minus, repetitur labor, donec perfectè calx dealbuerit.

2. ʒ. Talc. opt. q. v. contrunde in mortario candenti, [sic melius teritur Talcum,] donec nullum amplius splendorem referat, pulverem trajice per cribrum seraceum, ac cum carbonum Tillæ ana. Misc. calcinaque in fornace figulina ☿ 2: vel 3.

3. ʒ. Talc. subtilissime pulver. ʒij. Sulphuri per Sal. com. calcin. ana F. S. S. S. ac cementa in crucib. M clauso.

clauso, aut crucib. candeat. Dein exime ac edulcora. Loco Sulph. prodest Tart. per Sal. petr. calcina.

4. \mathcal{L} . Talc. opt. in laminae tenues redacti, q. v. candefac ac extingue aliquoties, (duodecies vel pluries) in \circ° \mathcal{Q} ri, donec fiat candidum instar nivis. Edulcora ∇ pluviali, & exsicca. Hinc impasta cum albumine ovi, ac forma globulos, quos in calce viva reconditos, atq; crucib. clauso impositos, calcina \circ° 3. in fornace figulina vel vitriaria & fiet Talcum, instar Crystallosum; exime.

5. \mathcal{L} . Calc. opt. part. 1. Sal. p. ij. Misc. & calcina per quatrimum, postea tere & ablue, pulverem exiccatum panno involutum, obducito luto crasso, ac sepeli in Tart. crudo, calcinaque \circ° 15. tere ac solve in ∇ vitæ, solum coagula.

6. Calcinatur cum Metallis; nimirum injice Talcum argento Orichalco, vel cupro, ad ignem fuso horam dimidiam (hoc aliquot.)

Calcinatio humida,

\mathcal{L} . Talc. Venetian. opt. scinde cultello in particulas subtilissimas, digere in sole ferventissimo, vel fimo equino per mensem, cum Acet. destill. acerrimo Vini Hispanici, quotidie aliquid Acet. destill. superaddendo, donec acetum fiat q. mucilaginosum.

Hinc

P R A E P A R A T A.

1. \circ° Talc. destillatum, Cosmétiqueum Hartmanni.

\mathcal{L} . Talcum calcinatione humida, (cum acet.) in mucilaginem redactum, destilla per retortam lutat. Δ nudo, in excip. capaciss. Primo prodit Acet. destill. postea oleum album. Hæc separa.

N. Alii Talc. pollinem cum cochleis olla immittunt, ut Talcum devorent, ubi devoraverint, cum testis in fas vitro imponunt, ac ab aliis aquam extillant, pro mulierum mangonio.

Vires. Aceto possunt manus abluī, \circ° vero fieri inunctiones.

N. Aiunt, si primo facies fuerit diligenter ab omnibus sordibus purgata, succum integrum mensem durare posse. Hariman. in Croll.

2. \circ° Camphora Talcum.

\mathcal{L} . Talc. crud. (præstat calcinat.) optime pulverisati part. 1. \circ° Camphorat. p. ij. digere ut albescat \circ° Vide de \circ° Camphora.

3. Liquor Talc. sive \circ° per deliquium.

\mathcal{L} . Talc. optimè calcinatum, (calcinatione 1. 2. vel alia,) F. Extractio cum Acet. destill. filtra & coagula. Edulcora ac reponere postea ad liqueendum in cella.

N. Alii progrediuntur ulterius, atque \circ° cum ∇ circulant, abstrahuntque aliquot cohobis.

Liquor Talc. S. Closs.

1. Talcum in pollinem terendum est, id quod fit 4. modis, vel enim Talcum exfoliatum calculis fluviatilib. integris permiscetur, sacculo oblongo includitur, & ministerio duorum horum successivis vicibus agitur fortiter, vel lapidi pumicis continuè affricatur, pulvisque decidens colligitur, qui tamen minus sincerus est, vel in mortario calentissimo contunditur. Ego illud longè facilius, beneficio limæ lavigatoria (une lime douce) aurifactorum in scobem attero, cujus \mathcal{H} ß. confundo cum \mathcal{H} ß. 1. Sal. \mathcal{Q} ri. ac in furno venti per hor. xii. calcino, calcinatum repono in cellâ, quod liquefcit separe à non liquefciente, calcem hanc siccata denuò calcino in tigillo Δ vehementissimo cum part. 4. Sal. nit. Ita Talcum colliqua-

bitur in massam albam pellucidam, quæ in cella reposita defluit in liquorem glutinosum.

Vires. Lentigines & maculas faciei exest, cutem dealbat, verum non diu relinquendus est liquor, sed aq. florum fabarum, nenuph. &c. abluendâ facies est, ne Epidermidem arrodât.

Alius liquor atque Magisterium Talc.

\mathcal{L} . Talc. grossè triti (subtilis pulvis separatur) q. v. infunde in Acet. destill. \circ° (3. 4.) Hinc superjiciatur plumbo fuso, calcineturque ad friabilitatem. Hoc solvatur in Acet. destill. Solutioque abstrahatur, Solvatur iterum aliquoties in aq. destillata, purificeturque à facibus. Tandem præcipita cum spirit. \mathcal{Q} i. edulcora & exicca.

N. Solutum ante præcipitationem per deliq. solvi potest, unde liquor.

N. 2. Calcinari itidem potest super aliis metallis, v. g. \mathcal{C} are &c.

Ex communicatione amici cujusdam Hamburgensis.

Cremor Talc.

Pulverisetur uno è modis 4. supradictis, affunde Acet. destill. terve Bull. lento Δ in patinâ vitreat spuma pinguis supernatans colligatur cum cochl. despumatorio, dum dabitur, Acet. destill. cremori mixtum evaporet, cremor a. resolvatur in phlegmate Sal. com. vel pomatæ alicui permisceatur.

Inservit dealbandæ faciei. Ex comm. S. Closs.

4. Tinctura Talc.

\mathcal{L} . Talc. optimè pulverisat, q. v. digere cum \mathcal{Q} i Philosophico, in fimo equino mēnt. 3. 4. sic solvetur Talcum, protrudetque ad superficiem nonnihil instar pinguedinis.

Huic affunde ∇ , digere ac abstrahere cum repetitis cohobis, & transibit tandem \mathcal{X} .

Alia.

\mathcal{L} . Talc. calcinat. extrahe cum \mathcal{Q} u Sal. com. viridi, decanta, abstrahere, ac cohoba aliquoties, sic ascendit tandem & Tinctura, transitque alembicum sub colore rubicundo.

Vires. Præservativum est efficax in peste, quotidie sumptum. Dosis gran. vj.

N. Præstat hic rubrum Talcum sumpsisse, si haberi possit.

Tincturam Talc. rubri vide in Agric. p. 789. tom. secundi.

Alia.

\mathcal{L} . Talc. q. v. affunde Spir. Vitriol. abstrahere aliquoties m. cum Sulphur. reverbera. Extr. tincturâ m. d.

[Sulphur Talc., quod habet solare, extractum, egregium ad gravissimos morbos putatur remedium.]

XX. Unicornu fossile.

Unicornu fossile. Cornu fossile. Ebur fossile. Lapis Ceratites, est lapis colore & levore cornu referens, interdum etiam formâ ipsâ, gegraben Ein-horn, gegraben Eissenbein de l'Unicornu fossile. Unicorn mineral or graven Gegraven Eenhoorn.

N. Sapius tam crassum ac magnum reperitur, ut à nullo unquam animali produci potuerit. Substantia lapidea semper \mathcal{E} vel dura vel mollis est. Exterius ut plurimum dura, intrinsece us plerumque mollis, alba, levis friabilis, compacta, absque poris, lingua firmiter adherens, odore nonnunquam grato. Cortex exterior interdum flavescit, cinereus, albus \mathcal{E} subniger est.

Inve-

Invenitur in variis locis Germaniæ, prope Elbingero- dam Oppidum Comitatus Stolbergenfis, prope Heidelbergam, Hildesheimium. Item in Moravia, Silefia, Saxonia, Haffia, multisque locis aliis.

Materia hujus creditur Marga, aquâ subterraneâ lapidescente irrigata & fluida reddita, quæ pro diverfitate matricum, in quas fluit, vel & pro diverfitate rerum, quibus sese infinuat, fcil. lignorum vetustorum, cornuum, offium subterraneorum, varias quoque fufcipit figuras & odorem.

Vires. Non omnia habent eandem facultatem, aut aque validam, sed differunt pro diverfitate originis, reisque commixta. Utplurimum exiccant, adstringunt, proutque sistunt alvi profluvia, gonorrhæam, menstrua alba, hæmorrhagiam narium, hæmorrhoides. Quod si insuper odor medullis accedat gratus, cordi imprimis grata sunt, idque roborant, Epilepsiam arcant. Quæ cum rebus aliis sunt commixta medulla, pro earum facultatibus natura mixta censentur. Extrinsecus ulcera ad cicatrices perducunt, oculorum lacrymas sistunt, (in Collyriis.)

N. Frustrum hujus generis Cornu non longe Mar- purgo Haffia à terra erutum oblatum mihi est, haud ita pridem, brachium crassitie aquans, ebori simillimum, nisi quod corticem arboris extrorsum figura referret & pro mediano destitutum esset. Huc referenda ossa Scharsfeldica, Schroderus.

20. Un. cornu Fossile.) De hoc vid. Athanas. Kircher. in mund. subterr. Tom. 2. sect. 2. Libr. 8. Cap. IV. V. p. 60. seq. Reperitur in variis Germaniæ locis, Moravia, Silefia, Haffia, Saxonia propè Hildesheimium, Heidelbergam, Elbingero- dam, & in primis ex specu Bumanni propè Hercyniam sylvam eruitur, sæpè in formâ animalium offium in saxeam naturam verforum. Inter quæ sunt dentes molares & incisori- j admodum magni, in quibus evidentissime radices à dente ipso, seu parte, quæ extrâ gingivas pro- minuit, discernes, itemque fragmenta radiorum, tibi- arum, exactissime ipsam offium naturalem con- formationem repræsentantia. Eodem spectat, quod refertur in Ducatu Wirtembergico inventa folia querna lapidescentia, & martyris cadaver ex cæmite- rio Calixti erutum lapideum, narrat Nardius. Ac me- moratu dignum, quod notat Gassendus in vitâ Peires- kii Libr. 1. detexisse hunc non longè ab Aquis sextiis insignem quandam copiam non humanorum modo offium naturæ factorum lapideæ, sed variorum etiam animalculorum, itemque stirpium, foliorum, flo- rum, similiumque hujusmodi. Ita memorat idem ibid. p. 346. intrâ Cavernam Guerinam reperta fuisse folia ex quercu, alno, ilice, Ulmo, Nuce, populo, hederâ, lauro, aliisque arboribus, ita in lapides conversa, ut suis nervulis suas indicaverint species, Sæpius verò contrâ tam crassum ac magnum reperitur, ut à nullo unquam animali produci potuerit. Substantia lapidea vel dura, vel mollis est. Exterius ut plurimum dura; intrinsecus plerumque mollis, alba, friabilis, inter- dum porosa, interdum minus linguæ firmiter adhæ-rens instar cornu cervi calcinati, odore nonnunquam grato. Cortex exterior interdum flavescit, cinereus, albus & tubniger est. P. Borellus in histor. & obs. rer. Cap. 3. obs. 83. Limæces lapideos non procul ab urbe Castrensi in rupe Lunellis multarum specierum inve- nit, albi etiam conchas varias marinas & circa Mon- tispessulum ostrea magna lapidea, imò pisces lapi- deos.

Materia hujus creditur marga.) Quæ causa effi- ciens & materialis sit hujus diverfitatis & ipsius etiam unicornu fossilis, variæ occurrunt Doctorum sen- tentiæ. Libani singular. part. 3. Libr. 8. Cap. 17. ex terrâ aliquâ bituminosâ vel cinere illius effluentibus ex terrâ vel aliunde liquoribus ita compacta esse

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

scribit. Alii materiam hujus simpliciter Margam cre- dunt, aquâ subterraneâ lapidescente irrigatam & flu- idam redditam, quæ pro diverfitate matricum, in quas fluit, vel pro diverfitate aliarum rerum, quibus sese in- sinuat, supra in medium productarum varias etiam fufcipit figuras. Quæ mea est sententia. Et nisi hoc ad- mittamus, vim aliquam plasticam ejusmodi terræ præter omnem rationem concedamus, necesse est. Id quod absurdum. Et potiori forsan jure quis simili terræ tribuat artificium figulinum, quo ollæ illæ fossi- les formentur, ac in terrâ cõquantur, quas in Poloniâ, Lusitiâ, Saxoniâ, Thuringiâ inveniri notum est.

Vires.) Antequam hominibus offeratur hoc cornu fossile, prius in canibus aliisque animalibus pro- bari debet, cum sæpè contigerit, quod ejusmodi cor- nua fossilia aliquid veneni in se habuerint, inde pro medela fatalis excessus vita sublequantur. Alias vim habet exiccandi, adstringendi cum virtute be- zoardica; quæ non solum alvi profluvia, dysenteriam, uteri hæmorrhagias, menstrua alba, hæmorrhoides, gonorrhæam sistit, verum etiam in febribus præfer- tim malignis pestilentialibus, teste Francisco Joële in tr. de Peste mirè commendatur. In insultibus epilepti- cis notabili etiam cum iussu adhibui. Dosis est à ℥ss. ad ʒss. vel ulttâ in appropriato vehiculo injectâ sudore.

N. Præter hæcenus in medium producta Lapi- dum minus pretiosorum genera, dantur adhuc alia nec minus in medica praxi utilia, ex quorum nu- mero est,

Astroites, Latinis Lapis Stellaris, Germ. Sternen- Stein. Stellarum figuras punctatim in se exhibens, est moderatè durus, colore cinereo, fusco nigrican- te, ad humani capitis magnitudinem sæpè creicens. In Comitatu Tyrolensi & circa arcem Cimmeriam invenitur in Gotlandia & alibi.

Vires.) Ad pestilens contagium & puerorum lum- bricos necandos ejus pulvis quatuor granorum dosi commendatur. Gestatus etiam productionem ver- mium impedire, si nudum tangat corpus, afferunt. Tre- morem, apoplexiam, aliosque morbos subitaneos avertere, victoriam conciliare, credunt. Hepatis ac pulmonum vitis succurrere & sanguinem puriorem reddere volunt. Præferuntur reliquis albidiores, benè formatas stellulas habentes.

Bufonius, Lapis Batrachites, Germ. Kroten-Stein, quia ab antiquis bufonibus eructari creditur, quod tamen falsum est, sed fungi instar nascitur in saxi & petris, non verò in capi- bus bufonum. Vires. Commendatur pro certo remedio ad tumores ac inflationes ab animalibus venenatis illatas, quas contactu & af- frictu discutit. Præsentè veneno sudore dissolvit & colorem mutat. Hordeolum in palpebris oculo- rum curat, si annuli palæ incluso eo partem affectam sæpius affrices.

Lapis Bononiensis, quem nonnulli spongiam So- lis, alii spongiam Lunæ, quidam retinaculum luminis cœlestis, lapidem illuminabilem, Luciferum, Phos- phorum &c. appellant. Invenitur in quibusdam col- libus propè Bononiam in monte Paterno, quatuor milliariibus ab urbe distito. Est lapis pellucidus, fos- silis, gypso valdè similis, multum chalcanti & anti- monii admistum habens: vix pugno major inve- nitur, nullam certam habet figuram, colore quo- dammodo variat, aliquando cinerei est, aliquando ni- grioris, aliquando flavi, aliquando rubiginosi, sub- cærulei, imò misti. Ratione materiæ, quatuor ejus observarunt genera. Quidam enim horum in latas lamellas instar talci Veneri sunt scissiles, cortice pal- lente, modo scabro, modo lævigato. Quidam strias habent in modum stibii radiantes & candicantes.

M 2

Qui

Quidam cortice vel laevi vel aspero, colore cinereo radiant, ubique striis vel rectis, vel obliquis ad centrum tendentibus. Quidam stricti sunt ad centrum & friabiles colore nigricantes.

Quamvis in Medicinâ externum saltem præstat usum hic lapis, dum ex eo lixivium pro psilothro parari consuetum, in primis tamen admiranda pollet proprietate, qua singulare visui præbet oblectamentum, dum Lumen ex Sole vel Luna calcinatus attrahit, & inde ad locum tenebricosum translatus illud iterum præsentat, ut in tenebris instar carbonis ad semihoram ardeat, idque toties, quoties ita Soli fuerit admotus aut Lumini ambientis. Verùm hanc vim lucem attrahendi hic lapis non nisi præparatus obtinet.

Pro facultate illa Lucifera P. Poterius in *Pharmacop. Spagyric.* Libr. 2. Cap. 27. duobus modis calcinat, quem vide, ut & *Ol. Wormium in Museo* p. 46. Cæterum posteriore tempore observarunt multiplici calcinatione integrum etiam lapidem calcinari, & ubi fuerit ferè perfectissimæ Naturæ per istorum ignem, à tota substantia penitiori evomere ac veluti sudare ad superficiem efflorescentias quasdam minutissimi rosis grana referentes, in quibus maxime residet virtus concipiendi & retinendi lucem sine ulla rei alterius permissione. Sed si lapis non fuerit ita perfectæ Naturæ, vel ante, vel post primam calcinationem conteri debere, pulveremque vel ovi albumine, ut P. Poterius docet, vel aq. vel ol. Sem. lini cogi in massam, quam nisi concipias ad votum, iterum calcinerur, & ubi contigerit oleo consumpto rursus in pulveres dissolvi, ante dissolutionem projici massam in idem oleum frigidum. Plerumque verò contingit, ut lapis hic heterogeneous habeat partes, unde non solum secundum aliquas probè calcinatus adhuc retinet alias crudas & alias habet nimium exustas. Verùm etiam obtinet nonnullas ad lucem excipiendam præparabiles, alias verò, quæ nullam præparationem adipisci valeant, quæ lucem nunquam in se concipiant. Quin & alii lapides brevi quatuor horarum spatio præparantur, alii longiorem postulant ignem 10. aut 12. horarum: alii longissimam unctionem 24. horarum plus minus in fornace requirunt. Præterea de hujus lapidis legitimo calcinandi modo vid. *Pater Bononiensis Mazotta in Philos. triplici Bononia edita*, & *Fortun. Licetus in singulari Libello*, *Athanasius Kircherus de Magnete* Libr. 3. p. 3. cap. 4. quæstion. 2. p. 581. *Hofmannus*.

LAPIS EQUINUS, HIPPOLITUS, de eo vid. sub titulo *Equus*.

LAPIS PORCINUS

Piedra Puerco dictus.

Reperitur in porcis sylvestribus. Insulæ præcipuè Ceylonicæ, & propriè lapis non est, sed simul compacta pilosaque. Materia bili bestię secundum gustum commixtæ, summamque amaritudinem obtinens. Res hac frequentis nunc usus est apud Incolas, sicut & apud *Europæanos*, sælicemque successum habet in multis gravibus ac subitis accidentibus tanquam quoddam *Alexipharmacum*, *Alexiterium*, aut *Antidotum*. Præcipuè verò bonitatem ipsius expertus sum in (*de Bort*) sive Colera, in Variolis, & subitis febribus quas quædam venenosa qualitas comitatur. Modus eo utendi nil aliud est quam quod illud adjectâ quâdam humiditate super lapide conterunt, sed quia pilositas est quodammodo fastidiosa, eam ob causam ex eodem quandam essentiam extraxi, cujus minima tantum Dosis operationem suam valdè subtiliter & sine motu præstat & hoc modo paratur.

Essentia Lapidis Porcini Ceylonici.

℞. Talem lapidem, quem in minima frustula dissecatum in phialam projicies, eique tantum boni *Spiritu Vini Tartarizati* superaffundes, ut sub duorum digitorum spatio materia submersa jaceat. Vitrum benè lutabis atque per octo dies in calore depones ut fiat extractio. Sic Tincturam Lutei coloris habebis quam claram effundes cumque totam Aromaticam atque fortissimam olfacies. Habes hinc igitur omnes vires simul conjunctas, & hanc Medicinam vel solam vel sub aliis præbere potes. Dosis est gutt. iij. ad gutt. v. *Autor Laboratorii Ceylonici qui Clariss. D. Grim. creditur.*

LAPIS SERPENTIS PILEATI.

Lapis hic in capite, Serpentis cujusdam Indicis reperitur qui Lusitanis *Cobras di Cabalo* vocatur, atque venenosissimus est; De eo hac habet *Nobiliss. Redi* in suis experimentis Naturalibus, ad Athanasium Kircherum inscriptis.

Anno 1662. Sub finem veris, reduces ex India Orientali in Aulam Hetruriæ, tunc Pisis venationibus occupatam pervenerunt tres Patres venerabilis ordinis S. Francisci, vulgo *Zoccolanti* dicti, qui ex illis regionibus multas res curiosas adferentes id honoris obtinuerunt, ut inspiciendi copiam darent Serenissimo Magno Duci Ferdinando II. æternæ & gloriøsæ memoriæ, inter alia non sine pompa ostentantes nonnullos lapides, quos, perinde ut tu mihi scribis, affirmabant reperiri in capite certorum serpentum, à *Garcia ab Horto* descriptorum, & à Lusitanis *Cobras de Cabelo* dictorum, eaque per omnem regionem *Indostan*, & vastissimas duas peninsulas intra & extra Gangem, sed specialiter in regno *Quamby*, ceu probatæ fidei experimentum, securissimi antidoti loco inservire, si imponantur morsui viperarum, aspidum, cerastum, & quorumcunque aliorum animalium, qui morsu vel pungendo inficiunt. Nec non si imponantur quibuscunque vulneribus, à sagittis, vel alio aliquo armorum veneno infectorum genere recens inflictis. Præterea dicebant, talem & tantam & usque adeo miraculosam esse sympathiam horum lapidum cum veneno, ut statim vulnere appropinquantibus, parvarum ventosarum instar se eidem tenacissime applicarent, nec ante loco moverentur, quam omne venenum sugendo imbibissent, quo facto sua sponte soluti in terram caderent, relicto animale sano & immuni à mortifero, quo opprimebatur, morbo: Atque hinc, ut ab imbibito veneno purgarentur, affirmabant boni illi Patres, necessum esse, lavare illos in lacte recens multo, nec non eisdem in eodem lacte macerare, tantisper, donec omne venenum in lac evomuisent, quod ex albo, quale est, abiret in colorem inter flavum & viridem medium. Et quo magis promptè huic suæ narrationi fides adhiberetur, sua sponte obtulerunt, tot se experimenta duros, quot maxime curiosis & minimè credulis placere possent; certo persuasi fore, ut Medici manu rangerent minimè mentium esse Galenum, ubi cap. 14. Libr. primo de facultate naturali scripsit, dari nonnulla medicamenta, quæ venenum eadem ratione attrahant, quæ magnes ferrum. Ergo ne qua mora opus tardaret, dictum est statim, sedulo conquiritendas esse viperas: Interim Dominus Vincentio Sandrini, uni è numero experientissi-

lentissimorum operariorum in aromataria domo Serenissimi Magni Ducis, diligenter inspectis his lapidibus, incidit in memoriam, nonnullos istiusmodi lapides jam diu sub tua custodia esse, eosque repertos his Religiosis exhibuit, fatentibus, eosdem ex eadem cum suis generatione esse, & fortè, imò revera easdem vires habuisse.

Plures istiusmodi lapides habeo, nigri coloris, lapidi Lydio non absimiles, leves & splendentes, ac si Sandaracha infecti essent; Nonnulli ab uno latere; Alii ab utroque maculam cineream habent; Alii planè nigri & sine aliqua macula sunt; alii, circa medium, colorem quandam albescentem sordidum obtinent & in ambitu ingrato colore tincti sunt. Major pars lentis figuram exactè æmulatur; nec tamen desunt inæqualiter longi: Et ex primis illis majores; quos ego vidi, latitudinem nummi, à Florentinis *grosso* dicti obtinent; paulo minores magnitudinem quatrini non æquant. At verò, si vè magni sint si vè parvi, pondere parum inter se differunt. Etenim majores ut plurimum denarium & grana octodècim non superant; Minores denarium & sex grana pendent. Attamen; per hos dies vidi & examinavi unum, qui grana sex super quartam partem uncie pendebat & latitudinem Testonis, ut vocant, non nihil superabat.

Communibus desideriis minimè fortuna favit. Etenim, cum per anni tempus, solito frigidius; viperæ nondum cœpissent prodire, ex saxis illis, in quibus per totam hyemem latent, impossibile fuit vel unam invenire, quæ negotio, de quò agebatur, inserviret. Quare statutum est, ut sequenti die aliis adhibitis venenis experimentum fieret virtutis illorum lapidum: Et hunc in finem multi sapientissimorum & maximi nominis Philosophorum & Medicorum Academia Pisana convenerunt, cupidi in opere ipso videre, id quod Patres verbis declarabant.

Ex venenis quæ vulneribus adhibita necant, oleum tabaci, ceu potentissimum elegerunt, & ducto in acum filo albo duplicato, illud hoc oleo quatuor transversorum digitorum latitudine inunxerunt. Inde acu pulli gallinæ coxam transigentes, filum oleo inunctum per vulnus adduxerunt, & statim quidam ex Religiosis illis cruento vulnere unum ex lapidibus illis applicavit, qui, ut erat prædictum, eidem tenaciter adhæsit: Eo tamen non obstante pullus ille gallinæ post octavam horæ partem mortuus cecidit, læquè magna Religiosorum admiratione, ac eorum unquam fuit, qui rem incredibilem viderunt.

At enim, quod nondum sibi satisfactum putarent, sed in credulitate pertinacissimè persisterent, eodem filo, sed recens inuncto, propriis manibus alterius pulli gallinæ vulnus interfecerunt, qui æque ac prior ille brevissimo tempore mortuus est, cum nihil ei profuissent de prædicatæ lapidis virtutes: Id quod usque adeo novum & insolitum illis visum est, ut tertia vicem experiri voluerint: Idquè experimentum occasionem præbuit, ut sequenti die plura illius generis fierent. Etenim, trajecto pet. coxam tertiæ pulli gallinæ eodem filo, quo priores infecti erant, adhibitoque lapide, pullus non modo nullum futuræ mortis signum, sed ne morbi quidem indicium dedit: Ideoque ex te visum est, eundem denuo sub ala dextra scapello ferire: & affusus sanguinolento vulnere aliquot olei guttulis, ac statim applicato lapi-

de, dignosci non potuit, ullum ei à veneno allatum esse detrimentum. Tantummodo laborare multum, & affligi visus est, ex quo tertia vice, acu & filo in exitiosissimum hoc oleum inuncto sinistra ejus coxa vulnerata est: Sed paucæ aliquot horæ abierunt, cum pristino vigori restitutus est, & sequentis diei maturino tempore saltando & cantando indicium dedit, cibi se potius, quàm mortis desiderio teneri.

Magnam ab hoc eventu delectationem & voluptatem cœperunt lapidum fautores, usque adeo ut resumptis animis, intrepidè & studiosissimè alia & diversi generis animalia adferri peterent: quo obtento, experimentis longè pluribus, & morte animalium evidentissimè constitit, nullam huic lapidi vim & virtutem medicam contra venenosum tabaci oleum inesse. Caterum, quia non raro accidit, ut juxta id quod verum est, ceu tumidus quidam furculus propulset id quod dubium est, hinc evenit, ut nonnulli causarentur, fortè hæc animalia non defectu virtutis, lapidibus propriæ, sed multo potius eam ob causam interiisse, quod transfixis acutis illorum membris, ideoque bicipiti vulnere affectis, necessum esset, non unum, quod hactenus factum erat, sed duos lapides adhibere: Sed exiguo negotio sublata est hæc difficultas, morte aliquot gallorum, quibus antea vulneratis duorum lapidum applicatione subventum est. Oblivioni dandum non est, quod vulneratis uno eodemque momento, in eadem corporis regione, & æquali vulneris magnitudine duobus capis, quorum uni impositi erant lapides, alteri non item; is cui subventum erat lapidibus, aliquot minutis ante mortuus est, quam alter ille, idemque lusus accidit, in aliis aliquot avibus, & diversis animalculis quadrupedibus: Nec forte præter rationem esset credere, obserato à lapidibus vulneris capite, & prohibito sanguinis simul & aliquo veneni effluxu, mortem citius subsecutam esse.

Alia multa, & his similia experimenta aliàs à quamplurimis eruditis hominibus vidi, quos inter nominare possem aliquot Patres Societatis Jesu, & specialiter Patrem Anthonium Veira, famosissimum concionatorem Lusitanum. Patrem Adamum Adamandò, celebrem Matheos Professore, Patrem Erasimum Seales, & Patrem Anthonium Michaëlem Vinci, Lectorem Theologiæ & Philosophiæ, in vestro collegio Florentino, & tandem Dominum Mathæum Campani, virtuosum, & nobilissimis utilissimisque suis inventionibus nulli literatorum per orbem ignotum. Hactenus nihil aut parum attulisse, contra mendosas dotes illorum lapidum, solis olei peti experimentis subnixus, nisi subungere possem illos non magis contra mortiferos viperæ morsus prodesse. Et multi dictis meis verum & vivum testimonium dare possunt, & specialiter venerabilissimæ Societatis vestræ Pater Maracci, homo admodum sapiens, & in rebus Indicis expertus & sagax, quo præsentè ab iratis his animalculis multa animalia morfu vulnerata sunt, nullo in his lapidibus invento subsidio, quibus tunc temporis bonus hic Pater plurimum tribuebat. Et dum hæc scribo, idem in viperis Neapoli allatis, & quæ hic in vicinis nobis chivulis capiuntur, multoties expertus sum, ut certus essem ejus rei, cujus jam ante certissimus eram. Inter alia memini, me nono Maij præsentibus multis doctissimis hominibus, quatuor columbos totidem viperis mordendos exhibuisse,

qui applicatis quatuor lapidibus, decimo, ex quo infecti fuerant minuto, mortui sunt. Idem ferè accidit quatuor pullis gallinaceis, quorum tres viginti aut aliquanto amplius minutis interfierint: quartus, exclamando & concutiendo sese, non nisi exactis quinque horis mortuus est. Nec vero tot expectimentis, & meorum, aut Serenissimi Magni Ducis lapidum virtuti satisfidens, alium D. Doctoris Johannis Baptistæ Cheluzzi, inelyi in urbe Florentina Medicinæ Doctoris lapidem operi adhibui: edetiam hunc, non minus quam omnes alios, deprehendi indigum, & plane expertem omnis proprietatis & virtutis, contra venenum viperarum, & Scorpionum Afficanorum. Multas istiusmodi bestiolas, in experimentis meis de generatione infectorum jam antea descriptas, & Turetò advectas, recens acceperam: ergo quatuor columbis sylvestres quatuor scorpionibus, in parte pectoris maxime carnosâ pungendas exhibui, applicato lapidum remedio, sed cum opprobrio lapidum intra unius horæ spatium columbæ omnes mortuæ sunt. At vero caput, ex quo percussus, & adhibita medicina est, septem horas supervixit: & porcellus Indicus, à Scorpione Turetano percussus, applicato lapidum maximo & speciosissimo, horas octodecim vivus exegit. Nihil tamen causâ est, quominus credam, canem, applicato lapide tuo, & hominem à vipera percussum, applicato lapide D. Caroli Magnini mortem effugisse. Credo illud, & verissimum esse iudico, eique tantum si tribuo, quantum cuique veritati evident ori tribuere par est. At verò absit, ut cogitem, lapidis virtute id factum esse; sed naturæ hic effectus fuit, robustæ, vegetæ & benè constitutæ, quæ fortiter repugnando vim veneni viperæ, solito debilioris, & minus vividi tandem superavit: vel lusus hic, ut ita dicam fortunæ fuit; cuius causas ut plurimum ne summa quidem ingenia comprehendere possunt, ut ut comprehensibiles sint; si accuratum & diligens examen accedat, quo mediante simul illæ, & latentes fraudes cum fallacibus indicationibus detegantur. Placeat tibi, lapidis tui serpentini *Cobra de Cabelo* naturam, & vires denuo in aliis bestiis, quas viperæ momorderunt, experiri: Etenim, si post multa experimenta accuratè facta deprehenderis, illum revera pollere virtute sanandi punctus & morsus venenosorum animalium, ingenuè fatear necesse est; me hætenus deceptum, & lapidem tuum bonum & legitimum, meos vero falsos & spurios esse. Quod si è contra inveneris, nihil in lapide tuo virtutis esse, gaudebimus utrique, inventam à nobis veritatem, & detectum esse mendacium, quod hoc vel illo casu occasionem mortis suppeditare poterat homini ingenuo, qui mortu à vipera vel cane rabido peritus, recusat omnibus aliis medicamentis, omnem suam spem in huius unius lapidis virtute collocaret, quod genus lapidum, ut dicam quod sentio, adulterinum & factitium est; aut si in capite serpentis *Cobra de Cabelo* vel *Pileati* vulgo dicti nascitur, nullum contra viperæ morsum, peti oleum, & sagittas Bantamorum & Macassarorum virtutem habet: quod si omnino aliquam alexipharmaci vim obtinet, nihil quod ei ultra largiamur superest, quam ut dicamus, prodesse eundem contra morsus illorum serpentum, in quorum capite nascitur, & hoc Pater Michaël Boëm Jesuita, semotis fabulis capite octavo de serpente *Gex-tô* in sua *Flora Sinica* scripsit, penes quem ejus rei fides sit. Me quod attinet, non dubito, quin hi nostri lapides, ut jam antea dixi, manu facti sint; & hanc meam sententiam multi viri

confirmant, qui diu admodum in Indiacis & ultra Gangem habitant, affirmantes, illos à solitariis, vel Indorum eremitis, idololâtris, *Jogues* dictis, compactos esse, quos postea in Diu, Goa, Salletta, nec non per omnem Malabar & sinus Bengalenis, Siami, & Coccincinæ oram, omnesque præcipuas maris orientalis insulas divendant. Sed me vel maximè in hac opinione confirmat, quod tu ipse, Virtuosissime Pater, non multum ab hac mea sententia abis, uti paucis ab hinc diebus liquido videre mihi licuit, ex doctissimo tuo libro, de triplici in natura rerum magnete. Ubi mentione facta serpentum cristatorum eorundemque lapidibus, sapienter hunc in modum scripsisti: Qui autem huiusmodi serpentes capiendi modum quam dexterrimè callent, sunt Brachmani, & quos Jogues vocant, gentilitiæ superstitionis eremicolæ: longa siquidem experientia docti, vel ad primum serpentis *Pileati* aspectum ex certis signis norunt, qui lapide turgent, qui non, nec hic sistunt, siquidem comparata horum lapidum copia, conrulos, atque unâ cum reliquis serpentis partibus, addita non nihil ex terra sigillata, aut etiam, quam magni faciunt, terra Melitensi, in massam redactos, lapides efformant artificiales, eadem virtute, qua naturales imbutos, quos deinde magno quæstu advenis vendunt, secreti lapidis conficiendi ita tenaces, ut nullis aut precibus, aut obsequiis, propositisque nummis, id advenæ extorquere possint. Alius quidam Pater Soc. Jesu in suis relationibus de hac re ita loquitur.

Bonam hic virtutem alterius lapidis *Cobra dicti*, quem India habet: hic lapis vocatur, & *Piedra de Cobra de Diu*. Parvus est, & maculas aliquot albas habet. Variis confectioibus & antidotis constat. Jogues illum præparant, homines pagani, poenitentes, & serpentum incantatores, qui in Diu morantur. Nonnulli dicunt illos in capite colubri nasci: sed hi virides sunt, & obscuri certe lapides sunt, ab his artificialibus diversi, & omnes eadem virtute pollent.

Virides hætenus nullos vidi, nec expertus sum: Sed si eandem quam artificiales virtutem obtinent, non sine ratione de eorundem viribus vehementer dubitaverim: quin in eo sum, ut ferè credam, hos simul & illos prorsus omni virtute carere, & hos Jogues ejusdem cum nostris circumforaneis & cantilenarum propolis farinæ esse: etenim per emperia Indiarum vagantur, ostentando serpentes cristatos, eosque collo & brachiis circumligantes, sed ita, affirmante Garzia ab Horto, ut dentes illis omnes antea effregerint, nec non omni veneno spoliaverint. Et fieri potest, (quæ mea imaginatio est) ut his serpentibus, ea ratione præparatis, sese mordendos exhibeant, & medicato his lapidibus morsu, falsam pro vera virtute jactent. Serpentes Cobras de Cabelo, scribit Garzias, capite de ligno Serpentino, circumferre solent. Circumforanei quidem (Jogues appellant) stipem emendicantes, & cineribus sese aspergentes, ut hac ratione venerandos sese sanctimoniarum titulo vulgo præbeant. Circumeunt isti omnes regiones, & nonnulli ex iis circulatorum munere funguntur, gestantque hos serpentes, quos demulcere solent, & collo aptare, (prius tamen exemptis dentibus) vulgo persuadentes eos se incantasse, ne nocere possint.

Attamen, inquit aliquis, necesse est, ut hi lapides aliquam, nescio qualem amicitiam & inimicitiam cum veneno gerant, & ut aliquis inter lapides & venenum

venenum reciprocus amor sit; cum liquido appareat, quam tenaciter sese ad venenosa vulnera applicant. Et vero negari non potest, quod vulneribus illis adhæreant, sed hoc addatur necesse est, illos quibuscunque vulneribus non venenosis, atque adeo cuicunque parti corporis adhærere, quæ quidem molles sint, & sanguine, vel quo alio liquore maddeant: eadem ratione, qua exigui illi panes terræ figillatæ, & omnes aliæ bolorum species. In summa, semper magis magisque obtusus hæreo, ad tanta mendacia, quanta indies de illis medicamentis scribuntur & narrantur, quæ ex ultra marinis, & longius remotis, aut minus cognitis regionibus ad nos deferuntur, nulla veri falsive cura, tantum, ut quæ narrantur, nova, inaudita, & quasi miraculosa videantur; unoquoque id agente, in hac via magis conspicuum sese, magisque reverendum, & simplici vulgo doctiorem ostendet, qui quidem has nugas eadem fide apprehendit, quâ rudes Castiliani crediderunt, veros esse effectus pennæ & carbonum, à nequissimo impostore sibi exhibitorum, cuius mentionem Boccacius facit: prorsus ut falsus sit Azioftus, ubi dixit:

*Chi va lontan dalla sua patria vede
Cose da quel che già credea lontane,
Che narrandole poi non se gli crede;
E stimato bugiardo ne rimane:
Ch'el volgo sciocco non gli vuol dar fede
Se non le vede, e tocca chiare, e piane.*

Id est:

Qui procul à patria sua abit res videt, quas antea procul à vero abesse credebatur: quin ubi illas narrat, nemo illi credit & nugator habetur. Etenim stolidum vulgus fidem ei adhibere non vult, nisi illas clarè & planè videat tangatque.

Certus sum, si de Historico, non de Poëta scripsissem, vel saltem ea puritate sermonis usus essem, quæ ille in Satyris utitur, sapientes, non stultos vocassem; qui lentè procedunt in adhibenda fide omnibus illis, quæ de istiusmodi regionibus referuntur, quæ adiri commodè nequeunt, ad investigandam veritatem relationis. Rem experienciâ probatam loquor & veram: multâ famosa medicamenta, inde ab Africa & Indiis tam Orientalibus, quam Occidentalibus, magna expectatione in Europam delata, mihi tractanti non respondiisse, & facto periculo nullius valoris fuisse. Culpabunt multi zelatores, & nimis forte creduli id quod dico, & murmurantes exclamabunt, me nimis stupida & parum politica sinceritate id agere, ut fidem minuam vel demam illis pharmacis, quam inveterato multorum consensu obtinuerunt maximam. Ego veto per viam experienciæ liberam, & ab affectu immunem incedens, respondebo illis, mobilissimi illius Satyrici Florentini verbis, ad meum propositum accommodatis:

*Dunque tua voglia imperiosa chiede,
Ch'io metta al mio intelletto le pastoje;
Ne più la Scorra, ch'el tuo occhio vede;
Chi si da questi impacci, e queste noje
La verità non ha già per oggetto;
Ma vuol tenere in prezzo quelle gioje;
Ch'essendo false, gli fa gran dispetto
Chi arreca delle vere, e le sua Smaccà,
Mostrandò al paragone il lor difetto.*

Id est,

Ergo imperiosa tua voluntas postulat, ut intellectui meo numellas imponam, ne plus percurrat,

quam oculus tuus videt? qui, si in perplexis & tardiosis iis negotiis veritatem pro objecto non habet, sed in pretio gemmas illas habere vult, quæ falsæ sunt, vehementer succenset ei, qui veras affert, reprobatis illis, monstrando ad lydium lapidem eorum defectum.

*Hælenus Illustrissimus Rēdi quibus sequentia
opponit Clariss. D. Buglivus.*

Ex repetitis D. Rēdi viri accuratissimi experimentis de hoc lapide factis circa venenum potentissimum olei tabaci, viperæ & scorpionis Africani, detectum tandem est virtutem illius suctoriam venenorum supposititiam esse & falsam, ut patet ex ipsius epistolâ ad Kircherum. Diu adhæsi opinioni tanti viri propter grave pondus suorum experimentorum in Aula tanti Principis factorum; sed acceptis gratissimis, dum hæc potissimum scriberem, epistolis Alextio Romam mihi datis per Patrem meum, ab eruditissimò Patre Joh. Dominicò Putighani Soc. Jesu, mutavi sententiam, præsertim cum ex his cognoverim non esse omnino falsam dicti lapidis virtutem, sed ex parte veram, ut expertus est præfatus Pater Paulæ urbe Calabria: Summa prædictæ epistolæ hæc est:

Discedens elapsis annis Sicilia, mecum ferebam nonnullos lapides serpentinos donò mihi datos à Religioso viro qui recens Lusitania Siciliam venerat. Paulam Calabriae urbem me contuli, quò loci aliquantisper commoratus sum. Interea rusticus Calaber Augustò mente morisus fuit in collò à Canbrò Scorpione, & floccipendens illatam puncturam nulla adhibuit remedia; quamobrem supervenientibus gravissimis symptomatis ad extremum ferè vitæ perductus fuit. Elapso triduo certior factus ab amicis de præfato casu, statim accessi ad patientem; ut experimentum facerem eum lapidibus meis serpentinis. Inveni igitur ipsum jamjam morientem, & à filio suo indicatus mihi fuit in collo locus demorsus cui parva crusta supercreverat. Scarificato prius lanceola loco affecto, statim superposui unum ex lapidibus præfatis qui vehementer adhæsit parti; vix que elapsis quatuor vel quinque minutis horæ, patiens summopere suspirare cepit, necnon & respirare frequentius, & post horæ quadrantem integræ sanitati restitutus fuit, præsentibus pluribus contraneis. Observavi in principiò applicationis lapidis quòd oportebat illum statim exonerare sucto veneno, infundendo eundem in lacte in quo veneni semina deponebantur. Quamvis liberatus esset æger à morbo post horæ quadrantem, nihilominus tamen præservationis gratia per duos alios dies lapidis applicationem repetebam, & singula applicatione observavi quòd in lacte adhuc deponebat aliquid venenosæ substantiæ, donec tandem illud non amplius tingeret. Hæc est summa Epistolæ Italico sermone datæ ab eruditissimo Patre.

Colligendum exinde erit lapides prædictos reverè venenum extrahere; quoniam tamen plures sunt adulterini, & vili pretio ab Arabibus & Indis fallacibus venundati nostris Europeis, ut idem testatur Dominus Rēdi; idèò nil mirum quòd frequentissimè votis non respondeant.

LAPIS SERPENTIS IN MOMBASA.

Famossus est hic lapis & in capite vel ventriculo serpentis cujusdam Africani in Mombasa Zanguebaris regione reperitur. Credunt etenim eum maximum probatumque esse remedium accelerando gra-

vidarum partur, idque sine dolore; etiam si factus mortuus sit, si coxæ parturientis alligetur; hac tamen cautione servata; ut statim post partum removeatur. Etenim si diutius ibi alligatus maneat, ob ingentes suas vires omnia puerpuræ intestina ad se traheret. Mirabiliter quoque contra febres prodesse perhibetur, si tempore paroxysmi in potu detur; quin & sanare dolores colicos fertur, & pelle re animo omnem melancholiam, quamvis gravissimam & hypochondriacam. Verum, inquit Nobiliss. Redi, Serenissimo Magno Duci Hetruriz Ferdinando II. dono datus est huiusmodi lapis: figuræ erat sphericæ; ponderis unciarum quinque, eundemque experimento semper inveni inutilem. Lapis est, si exteriora spectes, nodosus, & ex infinitis foliis compositus, quorum unum alteri superinductum est, perinde ut in calculo vesicæ hominum, nec non illis lapidibus quos in Indijs Orientalibus in stomacho cercopithecorum, ovium, cervorum, dammarum; aliorumque tuminantium domesticorum pariter & sylvestrium animalium necnon apud Indos Occidentales in stomacho illorum animantium quæ *Vicunnas*, *Tarvas*, *Guanacos* & *Pacos* vocant, reperire est, quos omnes nomine lapidis Bezoar indigitamus. Fabulosæ illæ inventiones quæ de moderatis medicamentis narrantur, maximam partem originem suam habent à quadam fabula ab Antiquorum credulorum aliquo scripta & creditæ. Et quis non videt ea quæ hic de *Lapide Mombaza* & ejus utilitate narrantur quam parturientibus affert ab illis desumpta esse quæ de lapidis aquilini miris virtutibus scripta fuere.

LAPIDES quidam **ARTIFICIALES**, ad Medicinam facientes, præter alios multos qui in hoc Opere hinc inde reperiuntur; sunt autem hiæ Pharm. Bateana.

Lapis contrayerva.

℞. Magist. c. c. corall. alb. rub. margarit. succin. alb. ocul. 69. ana ℥ij. Rad. contrayerv. ℞. apic. nig. chel. 69. ℥ij. omnibus ritè præp. & commistis adde Gelatin. viperar. q. l. ut f. globuli, folijs ☉ obducendi, atque cautè siccandi, s. a. Sunt qui addunt Ambr. gris. 3℞. Cardiacus, Alexiterius & sudorificus insignis est. Valet maximè in peste, Variolis, Morbillis, febribusque malignis omnibus. Dos. ʒss. ad 3℞.

Lapis de Goa.

℞. Lap. Hyacinth. Topas. Saphir. Rubin. Margarit. ana ℥j. Smaragd. 3℞. Bezoar. orient. Corall. alb. rub. ā ℥ij. Mosch. Ambr. gris. ā 3℞. Fol. ☉ num. 40. F. ☿ subtilis, qui cum Ros. in pastam subactus efformetur in pilas oblongas, ovulis non absimiles, in umbra probe siccandas.

Postea Dentalio, Entalio, seu ulla alia huiusmodi conchâ accuratissimè (ut eleganter niteant) poliantur s. a. *Easdem obtinet vires cum priori. Præterea specificus est contra Spasmodum & contracturas. Dos. ā ʒi. ad 3℞. & ultra.*

Lapis Medicamentosus.

℞. ☉ alb. ʒiv. * 3℞. O. ceruss. AB. ā ʒi. m. f. ☿ coq. cum * q. s. ad lapidis duri consist. s. a. Virtutes hujus variæ sunt. Ulcera & defluxiones tollit: Vulnera inveterata desiccant: Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c. curat. Modus utendi ita est. Liquefcat ʒj. in Aquæ pluvialis ℥i. & filtra. Dein utere, tum lavando, tum linteolum imbuendo ac imponendo.

Lapis Salutis.

℞. * ʒi. O. AB. ā ʒij. ☉ virid. ʒvi. ☉ ʒiij. ceruss. ʒij. m. f. ☿ coq. l. Δ. cum * q. s. donec reargantur om-

nia in lapidem durum. Easdem vires habet cum priori Lapide.

LAPPA, vid. Bardana.

LARDARIA, vid. Evonimus.

L A R E X.

Laricis nomen à Germanico Antiquo *Larch* vel *Larich* dictum esse verisimile est. Apud Cæsarem voces Germanicæ in *ich* terminatæ observantur. C. Hofmanno, mutantur in *ix*. Laricem autem Theophrasto & veteribus Græcis incognitam fuisse cum Bellonio putamus; qui ait universis locis Græciæ per quæ transit Laricem non apparere. Larix à reliquis coniferis & resiniferis arboribus abunde distinguitur quod folio sit deciduo. Verum de tempore quo folia decidunt non consentiunt botanici: Matthiolus folia non decidere hyeme, sed novo vere cum recentia propellunt vetera affirmat; Matthiolo suffragatur auctor *ἀλκιμωστράτης* J. Bauhinus, qui non autumno sed vere folia decidua se observasse scribit. Alii è contra folia autumno decidere & arborem hyeme nudam esse asserunt: præ reliquis C. Hofmannus, quid autem inquit, nisi omnes qui hortum Medicum frequentavimus cæci sumus singulis autumnis folia decidunt. Ego J. Bauhino ut curioso & veraci potius assentior. Observent & litem hanc determinent quibus arborem harum copia est & inspiciendi animus.

Nomina. Laris ger. C. B. Park. Folio deciduo coarctata I. B.

J. B. Caudice recto ac proæro Abieti æqualis est: Cortice crasso, scabro, fuscoque (J. Bodæo cortex inferiore parte quæ ramis subest crassus, asper, undique in rimas dehiscit, præcisus interius rubere conspicitur, reliqua parte lævis, glaber, non nihil foris inalbicans) rami circa stipitem velut per gradus collocantur, longi, graciles, deorsum dependentes. Folia leniter odorata, ramos confuso ordine ambientia, è tuberculis umbilicatis duodecim, viginti, aut triginta simul penicilli in morem conjuncta prodeunt, tenera, perangusta, crassitudine porcinas fetas æquantia, uncialia & longiora, viridantia (stapelio breviora, tenuiora, molliora quam pini, haud aculeata sed retusa, adventante hyeme pallida effecta, (quod & nos observavimus) ad stipitis radicem decidunt) non ante hyeme decidentia quam aliæ initio veris succedant. Non igitur universa simul, sed singula paulatim recedunt, alijs interim successu ab eisdem tuberculis prodeuntibus dilapsorum vicem occupantibus, itaut non defuisse folia, sed novæ juventutis habitum induisse videantur. (at Stapelius alijque nudam hyemem transigere Laricem affirmant) Flosculi seu potius conorum rudimenta Stapellio rotundaj, è teneriorum ramulorum summitatibus erumpunt, arboremque mirum in modum condecorant, quod in purpuram ardeenter rubescentia, comantibusque foliolis miro naturæ artificio annexa, viatorum oculis non parum recreant, suntque odoratissima. Coni pertinaciter ramis hærent brevi, contorto, crassiusculo pediculo, nutabundi, nucis cupressinæ magnitudine, sed paulo longiores, squamulis compacti latiusculis compressis, obtusis, tenuibus, (ex rubro, ut inquit Clusius, purpurascens, nimirum dum tenelli sunt, & nondum maturuerunt) qui dum novelli & recentes sunt, ex eisdem tuberculis è quibus folia prodeunt, petiolo sursum reflexo nitentes, ut mucrone cælum spectent; illosque intercedunt squamulæ foliæ, tenellæ in stylum acutiorem desinentes quæ singulæ continent semina parva, alata, gemina, magnitudi-

ne seminis cupressi, foris cinericeo cortice, intus autem candido nucleo constantes; sapore dulci & pineam nucem referente, materies firma satis & solida, in rectum fissilis, fulva, crispantibus saturationis coloris callis, pectinibus rectis, odorata, flammescens, odorem quoque jucundum naribus aspirans.

In Alpibus Rhæticis & Vallefiacis abundè provenit: nos in Alpibus Stiriacis & Carinthiacis copiosam observavimus, cum Vienna Venetias iter faceremus. In Viennensi saltu, tum alijs montibus Alpibus vicinis, exceptis summis jugis, abundare Laricem scribit Clusius. Plinius, Vitruvium, ut videtur securus, Laricem nec ardere, nec carbonem facere; nec alio modo ignis vi consummi quam lapides scribit. Hoc tamen falsum esse experientia constat, nam apud Vallefiacos quibusdam in locis, non alia ligna in usum foci adhibentur, ac alicubi etiam in Alpibus ad Ferrarias fodinas carbonem ex ea fiunt.

Nec verius est, quod hanc perpetuo virere dicunt cum botanicorum omnium consensu folio sit deciduo: potest tamen hac in parte deffendi Plinius: cum Larix (teste J. Bauhino) non ante folia amittat, quam vere nova producat.

Erravit insuper Plinius Laricem nullo flore exhilarari, nec natales pomorum recursus annuos versicolore nuntio promittere affirmans cum observante Cæsalpino, flores ineunte vere emergant in cæcuminibus, in purpura valde rubentes, odoratique; quod si hi nihil aliud sunt quam cónorum rudimenta, non immerito Plinius arborem floriferam esse negavit. Ego autem in hoc genere non minus quam in alijs coniferis dari flores à fructibus non tantum distinctos, sed etiam disjunctos suspicor.

At vero quomodo Plinium Laricis morbum esse ut tæda fiat scribentem excusum non video: in hunc autem errorem incidit quod *πένω* Theophrasti i. e. pinum pro Larice habuerit, & cuncta Larici tribuerit quæ de pinu Theophrastus scripsit, cujus morbus proprius est ut tæda fiat.

Usum: Larix (auctore Plinio) quam picea materia præstantior longe, incorrupta vis, emori contumax. Fiunt ex ea, (referente Clusio) vinetorum pedamenta, & pali circa Neapolin & supra Badenses (Austriæ) thermas, ut quæ corruptioni minùs sit obnoxia: item longissimi canales tectis supponendi & aptandi ad pluviam & imbres ex iis decedentes excipiendam: sunt enim ad hos usus commodissimi: nam cum firma & solida materia consent, diutissime solis ardoribus, & alijs æris injurijs resistere possunt; nec finduntur aut vitium contrahunt, eaque de causa non picis aut alterius inductione egent. Structurarum pondera firmissimè & diutissime sustinet, adque Baptista Albertus adnotasse scribit, cum alibi tum apud Venetias ex vetustis operibus.

Vires: Folia ejus & cortices adstrictoriam facultatem obtinent: lignum magni fieri adversus elephantiasin scribit Stumpfius, Simlerus contra lepram.

Colligitur ex hac arbore resina liquida, candicans mellis, veluti Attico aut Hispanico, colore & consistentiâ similis, quæ tamen non spontè effluit; sed ex arboris trunco emanat crasso oblongoque terebro ad cor usque excavato; manantem inde resinam vasculis quibusdam è piceo cortice paratis excipiunt. Resina hæc Larix dicitur, in officinis terebinthina appellatur, ejusque loco divenditur. Quod novum non est; nam & sua ætate Galenus rhopopolas Laricem terebinthina loco vendidisse refert. Vide Bot. à Stapel. comment. in Theophrast. hist. lib. 3. cap. 10. ubi è Galeno ostendit eos citra errorem hanc illi substituere.

Parkinsonus & C. Hofmannus resnam Lariceam esse quam officinæ nostræ terebinthinam Venetam vocant affirmant; & C. Bauhinus hanc non tantum pro terebinthina in usum receptam esse, verum etiam solo terebinthinæ cognomento cognitam, ait, nec desunt (inquit) qui in totum Laricis resinam esse volunt quam pro terebinthina officinæ habent.

Ea (inquit Jacob Wagnerus) odore, gustu ac facultate est præstantissima, ex erous ejus ulus in scabie, psora, tinea internus ad ardorem mitigandum in ulcere vesicæ, nephritide, purulenta mictione ad renes detergendos. Diluunt quoque ex Laricea 3). Cum vitello ovi & aq. cardui benedicti egregiè purgat, inebriat pota, quod Rhæti lignatoribus familiare.

Pro usu terebinthinæ vide resin. pini & arietis: & Cap. de pinu lativa & de terebintho. *Ramus in Histor. Plant.*

LARIDUM, vid. Porcus.

LASER MEDICUM, & SYRIACUM, vid. *Assa Fœtida*, ut quidam credunt.

LASERPITIUM.

Laserpitium (*Σίλφιον*) antiquis tantopere celebratum, quæ planta fuerit, hodie ignoratur, quæ de eo Theophrastus, Dioscorides, Plinius habent, apud ipsos vide. Confule etiam si placet J. Bauhinum & J. Bodæum comment. in Theophrast. hist. lib. 6. p. 589. & sequent. de *Laserpitio* fusè disputat. Scien- dum tamen Cyrenaicam regionem laudatissimum silphium protulisse.

Quæcumque tamen planta fuerit veterum silphium seu Laserpitium, id enim nescimus, nos pro Laserpitio habebimus plantam semine multis alis foliaceis (8. in binis seminibus conjunctis) secundum longitudinem, striatum more, decurrentibus donato. Ex hoc etiam numero sunt Libanotides Theophrasti seu latifolia nonnullis dictæ. Laserpitium Alpini & Bodæi ad aliud genus pertinere videntur: Si Bodæi mentem rectè assuor, nam semen foliaceum ei attribuit i. e. compressum & planum, ut ego interpreteror, quamvis tumidum appingat, unde per foliaceum forte intelligit alis foliaceis extantibus circumdatum.

Quidam Silphium veterum Assam fœtidam esse volunt quos refutant Marcellus, Virgilius & Jo. Bodæus à Stapel; quos adi.

Hac de Laserpitio hætenus ex Raio, quibus cum in re obscurissima satis lucis prælatum non credamus, rursus quadâ in eodem argumento ex Plinio ac præcipuis ejusdem Commentatoribus, imò ex ipso Salmasio in Solinum tam doctè pro more scribente, cum propriis conjecturis &c. adjiciemus: Sic autem de Laserpitio PLINIVS. Hist. Nat. lib. xix.

Laserpitium quod Græci *Silphion* vocant, in Cyrenaicâ Provincia repertum; cujus succum vocant *Laser*: magnificum in usu medicamentisque, & ad pondus argenti denarii pensum. Multis jam annis in eâ terrâ non invenitur, quoniam publicani qui pascua conducunt majus ita lucrum sentientes, depopulantur pecorum pabulo. Unus omnino caulis nostrâ repertus memoriâ, Neroni Principi missus est. Si quando incidit pecus in spem nascentis, hoc deprehenditur signum: ove, cum comederit, dormiente protinus, caprâ sternuente. Diuque jam non aliud ad nos invenitur Laser, quam quod in Perside, aut

Media

Mediæ & Armeniæ nascitur largè, sed multò infra Cyrenaicum: Id quoque adulteratum gummi, sagapenò aut fabâ fractâ. Quo minus omittendum videtur C. Valerio, M. Herennio Coss. Cyrenis adveſta Romam publicè Laserpitij pondo xxx. Cæsarem verò Dictatorem initio belli civilis, inter aurum argentumque protulisse ex arariò Laserpitij pondo M. D. Id apud Auctores Græciæ evidentissimos invenimus natum imbrè piceo repente madefacta tellure; circa Hesperidum hortos Syrtimque majorem, septem annis ante oppidum Cyrenarum, quod conditum est Urbis nostræ anno CXLIII. Viam autem illam per quatuor millia Stadium Africæ valuisse. In ea Laserpitium gigni solitum, rem feram ac contumacem, & si coleretur in deserta fugientem: radice multa crassaque, caule ferulaceo, aut simili crassitudine. Hujus folia mas petum vocabant, apio maximè similia. Semen erat foliaceum, folium ipsum verò deciduum. Vesca pecora solita, primòque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in modum jucunda. Post folia amissa, caule ipso & homines vescebantur decocto, asso, elixoque: eorum quoque corpora XL. primis diebus purgante à vitij omnibus. Succus duobus modis capiebatur: è radice atque caule. Et hæc duo erant nomina, rhizias atque caulias vilior illo ac putrescens. Radici cortex niger. Ad mercis adulteria succum ipsum in vasa conjectum, admixto sulfure subinde concutiendo ad maturitatem perducebant, ni ita fecissent, putrescentem. Argumentum erat maturitatis, color, siccitasque sudore finito. Alij tradunt Laserpitij radicem fuisse majorem cubitali, tuberque in ea supra terram. Hoc inciso profluere solitum succum, ceu lactis, superenato caule, quem magydari vocarunt. Folia aurei coloris pro semine fuisse, cadentia à Canis ortu, Austro flante. Ex his Laserpitium nasci solitum, annuo spatio & radice & caule consummantibus se se. Hoc & circumfodi solitum prodidere. Nec purgari corpora, sed ægra sanari, aut protinus mori, quod in paucis accidere. Persico Silphio prior opinio congruit.

Alterum genus ejus est, quod Magydaris vocatur, tenerius & minus vehemens, sine succo: quod circa Syriam nascitur, non proveniens in Cyrenaicâ regione. Gignitur & in Parnassò monte copiosius, quibusdam Laserpitium vocantibus: per quæ omnia adulteratur rei saluberrimæ, utilissimæque auctoritas. Probatio sinceri prima, in colore modicè rufò, & cum frangitur, candido intus mox translucente: gutta aqua salivaque liqueſcit. Uſus in multis medicaminibus.

Et libro xxxi. ejusdem Histor. Naturalis. Laserè Silphio profluens, quo diximus modo, inter eximia naturæ dona numeratum plurimis compositionibus inseritur. Per se autem algores exalfacit, potum nervorum vitia extenuat. Feminis datur in vino. Et lanis mollibus admovetur vulvæ ad menses ciendos. Pedum clavos circumſcarificatos ferro, mixtum ceræ extrahit. Urinam ciet ciceris magnitudine dilutum, Andreas spondet, copiosius sumtum, nec inflationes facere, & concoctioni plurimum conferre senibus & feminis: item hyeme, quam æstate, utilius, & tum aquam bibentibus: cavendumque ne qua intus sit exulceratio. Ab ægritudine recreationi efficax in cibo. Tempeſtively enim datum, cauterij vim obtinet: assuetis etiam utilius, quam expertibus.

Ad extera corporum, indubitatas confessiones habet. Venena telorum & serpentium exstinguit potum: ex aquâ vulneribus his circumlinitur: scorpionum tantum plagis ex oleo: ulceribus vero non maturescentibus cum farina hordeacea, vel fico

ficca. Carbunculis cum ruta, vel cum nelle, vel per se visco superlitum, ut hæreat: sic & ad canis morſus. Excrescentibus circa sedem, cum tegmine punici mali ex aceto decoctum. Clavis, qui vulgò morticini appellantur, nitro mixto. Alopecias nitro ante subactas replet cum vino, & croco, aut pipere, aut murium fimo, & aceto. Perniones ex vino fovet, & ex oleo coctum imponitur: sic & callo. Clavis pedum superaffis præcipuæ utilitatis. Contra aquas malas, pestilentes tractus, vel dies. In tussi, uva, fellis veteri suffusione, hydropisi, raucitatibus: confectum enim purgat fauces, vocemque reddit. Podagras in spongia dilutum posca lenit. Pleuriticis in sorbitione vinum poturis datur: contractionibus opisthotonicis, ciceris magnitudine cera circumlitum. In angina gargarisatur. Anhelatoribus, & in tussi vetusta cum porro ex aceto datur, æquè ex aceto his qui coagulum lactis sorbuerint. Præcordiorum vitij syntecticis, comitialibus in vino, in aqua mulsa linguæ paralyſi. Coxendicibus & lumborum doloribus cum decocto melle illinitur. Non censuerim, quod auctores suadent, cavernis dentium in dolore inditum cera includi: magno experimento hominis, qui se ea de causa præcipitavit ex alto. Quippe tauros inflammant naribus illitis: serpentes avidissimas vini admixtum rumpit. Ideo nec inungi suaserim cum Attico melle, licet præcipiant. Quas habeat utilitates immixtum alijs, immensum est referre: & nos simplicia tractamus: quoniam in his naturam esse apparet, in illis conjecturam sæpius fallacem, nulli satis custodita in mixturis concordia naturæ, ac repugnantia. Et libro xxxii. Percussis vero à pastinaca marina medetur *Laser*.

Haſtenus PLINIUS cujus Doctissimus Commentator Rever. Pater Joh. Harduinus è Societate Jesu plura superaddit ex Theophrasto, Dioscoride & alijs ad textus illustrationem facientia; scilicet quòd v. g. tuber in radice Laserpitij ad modum capituli extuberet, quod sublime penitus exſtet, ut fere in summa tellure esse appareat; ex *Theophrasto*. Quod semen Silphij simpliciter *folium* appellatum sit, ut ex vetustis scriptoribus antea demonstratum est. Unde Theophrasti hæc verba sunt. *Τὸ καλλόμενον φύλλον ἐστὶ σπέρμα, ὃ καὶ ὁ γαν νότος λαμβάνει πνεύσει μετὰ κύμα, διαρρίπτειται, ἐξ ἧν φύεται τὸ σιληθιον*. Quòd eadem anno radix consummatur, perficiturque, & caulis. Unde meritò inter plantas annuæ hæc reponenda. Quod ex Dioscoride præferatur *Laser* modice ruber, atque translucens, myrrhæ æmulus, neque saporis immitis; qui denique facile liqueſcit ac diluitur, & albescit. Quod ex Dioscoride clavos callosque prius circumcisos extrahit *Laser* seu *Silphii liquor*: si quidem cerato ante fuerit subactus. Quod inde *Laser* cauterij vim obtinere dicitur quia fluxiones ac pituitas intus desiccet, acrimonia sibi innata, quibus intercipiendis cauterio esset alioquin opus. Quod de *Silphii* radice non verò tantum de succo seu *Lasere*, etiam Dioscorides tradat, illam excrescentia circa sedem tollere, tegmini mali punici incoctam, & impositam. Quod quibus haustum lac coagulatum fuerit, sive intus concreverit, sumtus ex aceto mulso *Silphii* succus opitulatur, inquit Dioscoride, &c.

Celeberrimus Salmasius in suis ad Solinum doctissimis Exercitationibus nummum Cyreneorum producit qui ab uno latere Hammonis effigiem, ab alio vero *Silphium* insculptum habet, (*vid. Tab. xiv. figur. 1. & 2.*) Superque eo scribit. In *Silphii* nummo hoc insculpti caule folia sunt, quæ hinc inde è thyrsò velut alæ prodeunt, & erumpunt, & caulem ipsum ambiunt, ut in arundine, & ferula, non tamen alternatim, sed ex utraque pariter parte. Apio similia videri neutiquam possunt, tantum quod

quod incisa in extremo, & aliquatenus striata videntur. Cauliculi qui ex mediis foliorum alii exeunt in globulum desinentes, globulus ille, vel granum rotundum semen est. Sed & globosa illa congeries granorum vivæ more sibi connexorum, quæ in summo caule visitur, seminis instar obtinere censenda est. Quod semen quare foliaceum, & *πλάττω* tradiderint veteres, nescio. Rotunda illa grana potius apparent, quam plana, aut foliacea, ut est ulmi semen. Sed fortasseam parvæ illæ pilulæ, maturitate disrumpæ in plura foliacea semina dividebantur, quæ austro flante spargebantur: ut solent etiam ulmi semina vento diffiliari. Ita necesse est credere, siquidem veterum descriptioni fidem habeamus. Proponam hic etiam aliam Laserpitij plantæ figuram (*vid. Tab. xiv. fig. 3.*) eamque admodum antiquam, sed quæ nihil prorsus habeat simile cum ea superiore. Nos eam ex Codice vetustissimo Dioscoridis Græco ante mille annos ad minimum descripto sumpsimus. In eo exemplari omnes ferme, paucis exceptis, plantarum figuræ manu antiquarii, qui librum scripsit. Graphicè expressæ sunt. Utrum ad verum & naturæ fidem eas pinxerit, an ex verbis Dioscoridis ad libitum effinxerit, nescio. Multæ sane ibi extant ad naturam veritatem delineatæ. In hac autem figura multa vitia quæ ad verum expressam credere vetent. Radix non respondet descriptioni veterum. Caulis crassus ac ferulaceus non est, qualem Laserpicio omnes scriptores antiqui tribuunt. Nihil denique in illa pariat cum illa Silphij facie, quæ in veteri Cyrenæum nummo conspicitur, quam tamen genuinam ac Germanam esse constare debet. Folium hæc quidem habet apio simile, & semen latum, ac planum, quod pictori antiquario facile fuit ex verbis potius Dioscoridis, quam ex veris fingere. Dicere heic posset aliquis effigiem hanc esse Syriaci, aut Medici Laserpitij, aut etiam Parnassij, non Cyrenæici. Medicum certe & Cyrenæicum *καλ' εἶδος ἐξαιρέτως* inquit Strabo. Sed hæc incerta. Pictura Dioscoridis Antiquarii, quæ pro Silphio proposita est, plane accedit ad Smyrnij descriptionem, sive Astrantiæ, quam pro Laserpicio veterum quidam hodie nobis obtrudunt herbarij. In ea sententia fuisse videtur herbarius ille pricus Dioscoridis, utpote qui Smyrnium veterum nobis delineavit in locum Laserpitij. *Gallicum Laserpitium* quidam vocant. Idem Salmasius fusè in sequentibus disputat contra eos qui Silphium Medicum, aut Syriacum cum Asa foetida hodiernorum confundunt. Verum in suis de Homonymis Hyles Iatricæ Exercitationibus, postquam per totum prope Caput 96. eandem acriter defendit opinionem sub finem tandem eò delabitur ut Asam foetidam Persicum Laser credat à Cyrenæo gradum tantum minimè verò tota natura diversum. Illucque inducitur Vir Magnus, tum quòd Garcias scribat Asam non aliter præparari quam olim præparabatur Laser quò commodius asservaretur, id referente Theophrasto, atque etiam ex Theophrasto Plinio nostro, scilicet quòd succus qui ex caule inciso fluxit in bubula coria conjiciatur admixta tritici farina: Tum etiam quòd pares omnino effectus Asæ in medicaminibus Indi hodierno tempore tribuant quos veritas Laseri suo assignavit.

Hactenus *Plinius* commentante Harduino, ac etiam ipse *Salmasius* de *Laserpicio*. Nos in re difficili quid sentiamus breviter explicabimus. Convenimus equidem cum Clariss. D. Clerico Collega nostro & amico singulari, de Laserpicio in suæ Historiæ Medicæ part. III. lib. II. cap. 2. scribente fieri omnino potuisse ut apud antiquos sapor Asæ foetidæ non ita ingratus sit reputatus, ac nobis ille videtur, siquidem adhuc dum hodie, succus gummosus qui Asa dicitur, & qui

Germanis propter intensum foetorem *Stercus Diaboli* vocatur, Indis est inter condimentorum ac mentarum delicias; tantopere enim inter se distant variorum hominum gustus, ut in Proverbium merito abierit de gustibus nullatenus esse disputandum. Præterquam etenim nativa quorundam hominum est ad hos aut illos sapores ac odores propensio, qui aliis non tantum ingrati, sed protus abominandi sunt: ut notæ est Imperatoris illius Græci seu Constantinopolitani historia qui stercorebus delectabatur, indeque nomen adeptus fuerat, & nos ipsi vidimus quendam qui pediculis, alium qui araneis magna cum voluptate vescabatur, nihilque oppilatis, ut vocantur, mulieribus magis familiare quam magna contentione ac studio exquirere in stomachum cum voracitate ingerere res eas à quibus tota hominum Societas quam maximè abhorreret. Quis nescit habitudinem à junioribus conquistam annis plura inter delicias reponere quæ prius nauseam ac horrorem aliquatenus incutiebant. Sic aqua quam maximè saturata femine caphe probe rosto, nullo etiam admistò saccharò, in nostris familijs ab ipsis infantulis Patrum suorum exemplo eò inductis, magna aviditate expetitur ac sorbillatur, quam olim multa cum aversatione refugissent. Sic tabaci abominandus sapor in delicijs est apud eos qui illi masticando non aliter assueverunt quam Indi suo *Bet le*. Imò ut ad ipsam Asam revertamur, Joh. Bauhinus, in sua Plantar. Histor. universali, capite de Asa foetida seu Officinarum, asserit quòd quorundam oratione persuasus, condimentum ex Asa aliquando degustaverit, confricato scilicet ea ferculo, quod Palato sic satis atriserit, non tamen adeò ut tales prædicarent suosores, quoniam fortè, inquit, neque iuculis, neque condimentis valde delectaretur. Additque præterea idem, quòd ejusmodi condimenta sibi suo odore non essent molesta, tametsi nullum odorem æquè infectum haberet ac Asæ foetidæ odorem. Ex hisce autem omnibus quamvis facillè concludatur possibile fuisse ut veteres ab Asæ foetidæ sapore ac odore in medicamentis & condimentis non prorsus abhorruerint, non tamen sequitur, ut opinatur Magnus Salmasius, paritatem quandam inter Asam foetidam & Antiquorum Laser interesse, quasi scilicet succi forent è congeneribus plantis stillantes, de quibus videri possunt & Raius in Asa foetida proprio loco in hoc ipso opere descripta, & præcipue Botanice. Celeberr. Joh. Bauhinus in Hist. Plantar. Universali mox præcitata. Signa etenim alia nobis veniunt explicanda pro conformitate plantar. unde Laser & Asa foetida exstillant facienda quam quæ ex tolerabilitate saporis hujus apud quosdam simpliciter adducuntur, dum alia omnia pro conformitate neganda pugnant. Antiqui in descriptione Silphij unde verum Laser stillaret unanimi voce asserunt illud esse plantam folia apij gerentem, feminaque quasi foliacea, qualia sunt scilicet pastinacarum angelicarum sylvestrium aliarumque multarum plantarum, suo tempore promentem; quibus etiam apprimè consona est effigies in nummo à Magno Salmasio allato insculpta, quæ dummodo severo nimium nò subijciatur examini, (ut certè non æquum est ejusmodi subijciantur effigies) nobis prodit plantam, folijs suis caulem loco unde enascuntur prorsus circumcinctibus, angelicis nostris, apijs quibusdam, atque Smyrnijs, seu oleribus attris, (quæ à Salmasio, ut per transennam, male cum astrantijs confunduntur) nò multum dissimilem; foliorum revera extrema non ita accuratè depicta inibi visuntur & quasi lacera & disrumpæ apparent, quia non aliud permittebat nummi angustia; sed caulis est omnino ad formam caulium angelicarum, levisticarum ac pastinacarum, & præterea flos in summo plantæ è thecâ suâ nondum evolutus, illamque vix dum aperiens in globum collectus

non aliter repræsentatur quàm angelicarum, levisticorum ac libanotidum quarundam flores se nobis quò tempore flos prorumpere paratus est se se explicat. Globulos autem quod attinet in eadem figura depictos quasi circa foliorum pediculos è caule hinc inde assurgentes; ijs exprimuntur flores è prænominatarum plantarum caule subinde quandoq; enascentes, illosq; thecâ suâ infasciatis, ac adhucdum minime perruptis involucriis, in globum coactos. Fatemur quidem rursus hac in parte effigiem ab accurata repræsentatione plantæ aberrare, sed quis sedulitatem maiorem in antiquissimo exquisierit nummo, eo tempore quo homines ad umbram suam pingebantur cōfecto; seu potius quis non admiretur effig. ei in nummo insculptæ cum ipsa Silphij repræsentatione in præcipuis suis caracteribus, jam vetustissimis illis temporibus, conformitatem. Alia præterea Salmasij scuncula Tabulæ scilicet hic nostræ xiv. fig. 3. delineata quantumvis rudis, Libanotidas quasdam ad quas inter Botanicorum hodiernorum Principes meritò recensendus Clariss. D. Pitton de Tournefort, Silphium inhæsitanter refert, nō tam male exprimit; aut potius effigies Læserpitij Massiliotici apud Joh. Bauhinum depicti, quod ad Levisticorum aut Libanotidum familiam reducendum venit, omnino accommodatur.

Ast quomodocunque tandem se res habeat, & postea quòd Veteres in suis descriptionibus ac delineationibus à vera Silphij repræsentatione circa multas circumstantias non parum aberraverint, nihil tamen hæc planta habebit consortij cum illa è quâ hodie Asa fætida exsudat. Sive etenim iconem hic Tabul. nostr. xiv. fig. 4. è D. Pomet Historia Aromatum Universali mutuata, consulamus; sive descriptiones à Clariss. Viris Joh. Bauhino & Joh. itidem Raio allatas expendamus; sive omnes illas quas nobis tradunt varij per totam Indiam ac præcipuè Persidem, Peregrinatores ad examen revocemus, nihil prorsus videbimus inter illas & Antiquorum Silphium commune. Scilicet planta unde Asa fætida cujus effigies à D. Pomet affertur, arbusculam, folia rutæ folijs non absimilia gerentem atque in ramos & ramulos longè divisam, exhibet: Descriptiones verò Raij, Bauhini ac variorum Peregrinatorum duplicem faciunt Asæ fætidae plantam, aliam scilicet sarmentosam ad instar salicis aquaticæ quæque de arbuscularum genere sita: aliam verò ac fæcundiorē, cujus radix crassissimos referat raphanos, folia autem ad tithymalorum folia accedant. Verum sit nobis instar omnium Accuratissimus Botanicus qui & ipse per Indiam non tantum peregrinatus est, sed etiam in Orientalibus mundi plagis dudum commorando quid demum veri de plantis varijs exoticis aliisque multis ad materiam medicam facientibus nobis traderetur, diligenti inquirens examine, Asam fætidam in sua Materię Medicæ manuscripta historia, asserit substantiam esse gummosam, & resinofam, aridioris instar cæx lentam & sequacem, ex variis splendentibus grumis; modò albescentibus, modò flavescens, modò elegantissimi incarnati coloris, ex TITHYMALO PERSICO SARMENTOSO, FOETIDO hinc quibusdam dicto, exstillantem ac in massam coactam &c.

Quod autem affert Salmasius de præparatione & purificatione Asæ fætidae, non absimili illi qua Laser, seu succus Silphij ad maturitatem perducebatur nihil concludit pro conformitate succorum. Præterquam etenim illa præparatio non est in omnibus eadem; siquidem pro Asa fætida ex Garcia adhibatur sanguis & farina, dum pro Lasere solum furfur impenditur, idque non tam ad perfectionem quàm ad adulterationē ut ex Plinio videre est; quis nescit res toto cælo diversas unò eodemque modò præparari posse.

Conformitas etiam virtutum inter Laser & Asam fætidam, si quæ sit, nihil magis concludit, quandoqui-

dem innumera reperiuntur in rerum natura quæ etiam si viribus aliquatenus inter se respondeant, nihil tamen in aliis habent commune.

Ratum itaque apud nos maneat Antiquorum Silphium jam ante Plinij tempora deficiens ignotum prorsus hodiernis esse, & medicinas quæ exinde conquirebantur ac præparabantur aliunde jam petendas esse: Sicque hisce finem facimus.

LATHYRIS, vid. Cataputia.

LATHYRUS.

Λάθυρος q. λάθος dicitur, quod venerem maximè excite, à λὰ particula augmentiva, & θῆρος, quod significat ἀφροδισιακὴς ὁρμητικὸς J. Bod. à Stapel. at nobis non arridet illud etymon.

Lathyrus nota generica sunt caules membranulis secundum longitudinem extantibus aucti, compressi & angulosi. Folia ex unica tantum pinnarum mediæ costæ annexarum conjugatione composita. Liceat jam in variorum Lathyrorum speciebus cum Clariss. Raio describendis paulò magis etiam in alijs solitum sit plantis, evagari.

Nomina. I. Lathyrus majoris species flore rubente & albedo minore dumetorum sive Germanicum I. B. Lathyrus Sylvestris Dod. Lathyrus angustifolius Clusij ex sententia I. B. Lathyrus sylv. major C. B. Lathyrus sylv. Dodonæi. Park.

I. B. Lathyro huic longissima sunt flagella, ad cubitos aliquot porrecta, angulosa, & membranulis aucta, in varios ramos divisa: folia ex pediculis palmo longioribus, longa, venosa, & acuta, bina, juncta pediculo inter utrumq; in capreolos abeunte. Proxima fulcra amplexantes flores longis hærent pediculis, pisorum æmuli, rubentes, minores quam Narbonensis Lathyrus. Siliquæ rubræ, angustæ, poenè rotundæ grana continet minora quam viciæ sativæ, nigricantia rugosa nonnihil & maculosa. Hilus mediam partem seminis occupat, sapor leguminosus, radix subest perennis, longa, digito crassior, singulis annis germinans eadem est (ni fallor) quam reperi colore partim albo ac nonnihil ex luteo pallido.

In dumetis & sepibus varijs Germaniæ in locis reperit J. Bauhinus, quæ apud ipsum vide. Nos propè maximum Carthusianorum cœnobium, quin & in Angliæ Suffexia, ni multum fallor, propè pagum rusticum Poynings dictum: item in Comitatu Cantabrigiensi propè Castle Campes Vicum ad sepes juxta viam publicam quæ Bartloviæ ducit, Observante D. Dale.

Aves hujus semina perquirunt, & siliquas perforant ut ea devorent.

Nom. II. Lathyrus major Latifol. Ger. Emac. major perennis Park. Latifol. C. B. Major Latifolia, flore majore purpureo speciosior I. B. Clymenum Matth.

J. B. Lathyro præcedere omnibus partibus speciosior est, membranis alis venosis secundum caules prolixos aptissima folia bina, nervosa rigidiora, in obrusum mucronem desinentia, unciam circiter lata, pediculo membraneo in citros facessente adnectuntur. Flores singulari appendice, dodrantali interdum, nituntur, multi juncti, magni, purpurei & colore grati (addi Parkinsonus & odore) quos sequuntur Siliquæ, trij. longæ aut etiam majores, vix semunciam latæ, nonnihil compressæ, semina parva, quæ viciæ minora, rotunda, nigricantia continentes, & ut vult Gerardus, saporis amari.

In Sylvis apud nos invenitur, sed rarius. Occurrit etiam in agro Monspeliano.

Nomina 3. Lathyrus major Narbonensis angustifolius J. B. Lathyrus angustifolius Park.

Foliorum angustia præcipuè differt à præcedente, imò hac notâ solâ, ut affirmat Camerarius. J. Bauhinus folia quaternaria ad originē pediculi foliati observavit, quorum duo majora & alia duo minora; quæ tamen in ramulo quem habemus sicco non cernuntur. Possent procul

Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 4.

Assa Fetida

E. P.





proculdubio & aliæ differentia observari si quis plantas diligenter inter se conferre voluerit, nam tanta est in folijs differentia, ut vel sola sufficiat ad diversitatem specificam, ut vocant, arguendam.

Morisonus Lathyrum Sylvestrem majorem C.B. huius synonymum facit, quam rectè ipse viderit. Fortè tamen hic fuerit quem Clusius in Francofurtensi agro observatum Lathyrum Sylvestrem angustifolium appellat, quem tamen nos cum J. Bauhino ad primam speciem retulimus.

Circa Monspelium varijs in locis observavimus. V. Boran. Monsp.

Nom. 4. Lathyrus Luteus Sylvestris dumetorum J.B. Sylvestris Flore Luteo Park. Ger. Emac. Syl. Luteus folijs viciæ C. B.

J.B. Ex radice repente, vivaci, angulosis fistulosisq; flagellis atè se propagat, infirmis tamen & humi provolutis nisi sustineatur, bicubitalibus & altioribus. Folia quædam Calamos pinnatis alis amplectuntur, alia extremis adnatorum insident, bina opposita, ut L. thyro siliquâ hirsutâ, vel cicerculâ, breviora: inter quæ tortiles capreoli nascuntur. Flores cæteris Lathyris similes, ex longis pediculis, parvi, lutei. Siliquæ succedunt glabræ, quæ maturæ nigre, striatæ, interdum nonnihil incurvæ; semina parva sex vel septem, pœnè rotunda, lucida, non variegata sublutea.

In dumetis & sepibus passim luxuriat non raro etiam in pratis & pascuis.

Nomina 5. Lathyrus luteus Latifolius Botan. Monsp. Lathyrus species Lutea I. B. an Lath. arvensis annuus Luteus, siliquis hirsutis Morisoni.

J.B. Folia habet bina, oblonga, ex quorum medio capreolus in aliquot partes superne divitus profilit: flosculus Luteus à præcedente diversus, cui flores sunt simul in uno pediculo juncti. Folia etiam sunt minora & tota planta multo major ramosiorque. Quatenus hucusque observare potuit, J. Bauhinus.

In horto Frid. Meier J. Bauhino visa est. Pediculi flores ochroleucos sustinentes in Morisoni planta longi sunt, sesquipedales aliquando, vulgo palmares; Siliquæ longæ, asperæ.

In latis circa Salenavam non longè à Monspelio & alibi Aprilis & Maio mensibus cum flore occurrit.

Nom. 6. Chamæbalanus leguminosa J. Bauh. Lathyrus arvensis repens tuberosus C.B. Lath. Arvens. Sive terrea glandis Park. terrea glandes Dod. Loh. Ger.

J.B. Ex radicis argumento chamæbalanon, quasi teretrem glandem dicis, denominarunt; siquidem ex filis tenuibus, longissimis pendulæ subsunt glandes, crassiusculæ, oblongæ, pulpa candida, dulci, nonnisi alta fossione inveniendæ; unde infirmi emergunt cauliculi, sed longi, cubitales vel majores, ramosi, humi procumbentes: in quibus observare est, bina ferè folia ex adverso sita, viciæ similia, unciam circiter longa, obtusiore mucrone, reliquo pediculo in capreolos abeunte. Flores leguminosi, pisi, plures congesti privato inhaerent surculo purpurei & odorati siliquas relinquētes parvas, oblongas, compressas semina claudentes quatuor aut quinque rotunda, compressa.

Non eget proluxa descriptione hæc planta, siquidem radicibus suis tuberosis, esculentis, ab alijs Lathyris abundè distinguitur.

In agris inter segetes frequentissimè reperitur in regionibus transmarinis, observavimus in Brabantia & circa Genevam: in Angliâ, quod sciam, spontanea non occurrit.

Nomina 7. Lathyrus ἀμφικαρπός, seu supra intraque terram siliquas gerens Moriss.

Moriss. Parvula hæc Lathyrus species cauliculos pedales per terram stratos producit: ad quorum singula genicula bina exeunt foliola, angusta mucronata, atque ex alis inter cauliculos & folia protruduntur Capreolus.

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

li curti, & petioli breves itidem, sustinentes flores dilute rubicundos, papilionaceos, quibus succedunt siliquæ unciales, duplici membranaceâ alâ in prona parte cinctæ, Lathyrus sativi in modum; inque singulis continentur bina, aut ad summum terna semina rotunda, radice constar satis numerosa, fibrillis junctâ: atque insuper siliquas intra terram gerit, continentes in se semina, siliquarum floribus succedentium supra terram paria, Arachidnæ Theophrasti instar semina Chalepo accepta à D. Roberto Huntington: provenit in Asia Syriaque sponte. Floret apud nos Augusto & Septembri; Octobri maturantur semina.

Huic affinis & fortasse eadem est

Araco similis planta ex Hisp. missa Bod. à Scapelo.

Infraque supraque terram siliquam fert parvam, sed magnitudine & formâ æqualem, in qua semen rotundum unicum, colore foris obsoleto sive nigricante. Intus ex luteo albicante. Cauliculos statim è radice emitit plures quincunciales aut paulo majores, tenues humi procumbentes. Foliola è caulium geniculis exeunt glabra, angusta parva, in Mucronem desinentia Araco sive ciceræ Dod. non dissimilia, sed minora, bina uni infistentia, inter quæ medius hæret Capreolus. Flores purpurei.

Seminibus in singulis siliquis singulis à præcedente differt.

Nomina 8. Lathyrus Baticus flore luteo Park. Lathyrus æstivus flore luteo Ger. Emac. App.

Mor. Park. Caules profert ternos aut quaternos, ulnâ excedentes, binis, alis membranaceis auctos aliorum more: quin & bina foliola brevîa, latiuscula, ad exortum pediculi folia sustentis bina angusta, longâ, qui deinde in capreolos abit, flores fert luteos, venis purpureis distinctos: quibus succedunt siliquæ longæ, plures simul junctæ, semina continentes rotunda, aspera & velut reticulata, sena aut plura. Adde ex Gerardo Emac. folia bina minutissima, hinc inde unum, cauli appositâ ad exortum pediculorum foliorum, quæ angustissima sunt: tres uncias longa, flores parvos esse, siliquas glabras, teretiusculas: semina arenæ colore obscuriora.

Nom. 9. Lathyrus Arvensis siliquis pisi minoris Moriss.

Moriss. Hæc parvula & annua Lathyrus species convenit in reliquis cum antedictis; solâ siliquâ curvâ cylindracea ad instar pini minoris ab illis differt & distinguî potest.

Nom. 10. Lathyrus angustifolius leptomacrobolus, semine rotundo, flore rubello Moriss.

Moriss. Folia gerit angusta, longâ & quasi graminea; caules exerit pedales & sesquipedales, procumbentes, è quorum sinubus oriuntur pediculi triunciales, sustinentes flores minores papilionaceos, eleganter rubellos, obsoleti veluti coloris, nunc singulos, nunc binos: quorum singulis succedit siliqua tenuis, rotunda, longâ, triuncialis, sequentis siliquâ tum longior, tum crassior: in singulis continentur semina novena, densa, rotunda, parvula, viciæ Sylvestris More. Radice constar tenui, gracili quotannis pereunte.

Provenit inter segetes copiosè circa Blâtas: floret Junio, & semina maturantur Augusto.

Nomina 11. Lathyrus angustifolius, leptomacrolabus, semine anguloso, flore cæruleo Moriss.

Moriss. Folia edit, quàm præcedentis angustiora, graminea pariter, sed omnino tenuiora. Florem fert parvum, papilionaceum, cæruleum, præcedentis minoris: cui succedit siliqua angulosa, brevior & tenuior quàm præcedentis, continens septena, octona, minuta pariter, angulosa & quasi triquetra.

Floret promiscuè cum præcedenti mense Julio inter Segetes erudo Blâtis ad villam Dom. de la Nove.

Nomina 12. Lathyrus siliquâ hirsuta J.B. an Lathyrus angustif. fil. hirsuta C. B.

J.B. Radice est singulari, tenui, annua, angulosi cau-

N

les

les cubito longiores sunt folia bina Lathyri flore rubro albive, at florum purpurascensium pediculi longi sunt, sesquipalmares aliquando, licet & vix palmares interdum existant in quorum fastigijs plures dispositi flores, qui delapsi siliquas relinquunt, breviores & latiores quam in Majori Germanico, sesquiunciam fere longas, non totam semunciam latas, hirtutas, asperas semina comprehendentes Majoris Germanici seminibus similia, minora ruffa, vel nigrescentia, rotunda, superficie crispata.

Circa agrorum limites in Hochley, Raleigh & alibi sponte nascentem invenimus in Essexia: nec non in transmarinis prope Genevam inter segetes.

Nom. 13. Lathyrus sativus flore fructuque albo C. B. Lathyrus anguloso semine I. B. Cicercula sive Lathyrus sativus flore albo Park. angustifolius flore albo Ger. emac.

J. B. Angulosus, prolixis satis caulibus præditus, in ramos multos divisus. Folia pediculo hærent latiusculo, duabus ad exortum Appendicibus caulem amplectentibus: sunt ea verò gemina, oblonga, acuminata, glabra, striata, inter quæ profusus pediculi reliquum in tortiles abit clavículas, quibus proxima apprehendit. Ex pinnatarum appendicum sinu pediculi exeunt singulares, florem gerentes unicum, majusculum, album, quæ excipit siliqua lata, compressa, duabus membranulis extantibus aversâ parte secundum longitudinem alata, semina claudens angulosa, candida: radix fibrosa, gracilis.

Circa Genevam in agris copiosè feritur; & etiam in Germania.

Nom. 14. Lathyrus sativus flore purpureo C. B. angustifolius flore purpureo Ger. emac. Lath. flore rubro I. B. Cicercula flore purpureo Park.

Dod. Flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinautes: grana angulosa, obsoleta nigroque proxima. C. B. Cætero præcedenti similis.

Hic est, ni fallor, Lathyrus æstivus Bæticus flore cæruleo Bœlij Ger. emac. App.

Nom. 15. Lathyrus angustifolius semine maculoso C. B. Lathyrus quædam, quibusdam Ægyptia Aracus J. B. Lath. Ægyptiacus Ger. Emac. Cicercula Bætica & Ægyptiaca Clusij Park.

J. B. Lathyro albo similis est, infirmus, clavicularum ope bacilli s juxta depactis sese implicans; caulibus angulosis, quibus membranulæ secundum longitudinem adnatæ: folijs culmum latis, acuminatis, crassiusculo pediculo adnexis, binis, striatis, inter quæ Capreoli oriuntur: ad basin autem pediculi duæ veluti alæ, & flores ex longo petiolo inflexo singulares insident pisi floribus æquales, supremo toto lato sursum expanso, foris carneo, intus cæruleo, exceptâ infimâ ora rubente, colore prædito, alis duabus foris coccineis: maculâ cæruleâ medium pingente, intus cæruleis exceptâ angustâ purpurascens obita, carina ex herbaceo albicat, siliquæ laxe, sexunciam longæ, compressæ nonnihil, insigni sulco simbriato altius exarata, semina continent bina vel terna, magnitudine Lathyri albi angulosi, ac fere quadrata, à crassiori latere ad oppositum deversa, & in angustum compressa, coloris fusci, minutissimis maculis anthracinis conspersa, gusti pisorum dulcescente, & denum attritu substantia qualis pisorum æquabili.

Reperitur non in Ægypto tantum sed & Hispania.

Nom. 16. Lathyrus folio tenuiore floribus rubris I. B. angustissimo sive capillaceo folio C. B. Prod. an Lath. major angustissimo folio Park. angustifolius brachyplatolobus flore rubello Moriss.

J. B. Hæc aliàs est cubitalis, aliàs vix palmaris, radice tenui, fibrosa; cauliculi crebri, per quos folia tenuissima longa, caryophylli holostei vel graminis: flores rubri pro plantæ proportionem magni, similes Lathyro flore

rubro, cui forte eadem est, folijs tantum ludens. Siliquæ laxæ sunt, semina continentes tria quatuorve, orbibus existimati magnitudine; pæne rotunda; asperata, fuscis maculis obsita, hilo lineis fuscis pæcto.

Qua itur Monspelio Frontignanum invenit I. B. sicetis & sylvestribus locis Aprili mense florentem.

Nom. 17. Lathyrus flore coccineo. An cicercula flore rubente Park. Lath. Bæticus miniatus Bœlij.

Hic inter segetes nobis inventus circa Genevam, atque etiam circa Liburnum portum in Italia, cauliculis assurgit semipedalibus, erectioribus fere quam aliorum folijs vestitis in oblongo pediculo binis oppositis, angustis, acutis, unciali aut sesquunciali longitudine. ad exortum pediculi bina apponuntur foliola, pro plantæ magnitudine majora latioraque quam alijs plerisque Lathyris. Flores foliorum sinibus exeunt in pediculis uncialibus aut longioribus, tenuibus singulares coccineis; siliquas non observavimus.

Lathyri Bælici miniati Bœlij descriptionem accuratam vide inter Lathyros Parkinsonianos à Johnsono elaboratam, & à nobis Latinam factam ex Appendice ad Gerardum emaculatum, huc translatam.

Præter hunc & alium adhuc observavimus Lathyrum flore coccineo, folijs gramineis, ad radices montis Vesuvij prope Neapolim, in Italia: an

Nom. 18 Lathyrus angustifolius Ervum Monspelien-sium C. B.

Fortè inquit D. Magnol. intelligit C. B. Lathyri speciem quam in sterilibus circa Boutonnetum & in alijs sterilibus satorum marginibus habemus humile cum folijs gramineis, venosis, & floribus Phæniceis.

Nom. 19. Lathyrus Tingitanus flore amplo ruberrimo

Caules ex eadem radice exeunt plures, bicubitales & longiores humi procumbentes nisi adsint plantæ aut fulcimenta quæ arripiant & scandant: compressi, Appendicibus duabus membranaceis secundum longitudinem productis donati. Folia ut in reliquis congeneribus ad singula genicula singula, è binis pinnulis ad mediam costam annexis composita, Lathyri perennis dumerorum magnitudine & figurâ, costa cui adnætantur pinnulæ in Capreolos exit, um caules tum folia glauca sunt, ut in plerisque congeneribus. Ex alis foliorum exeunt furculi palmares & longiores, duos plerumq; interdum tres flores amplos, pulcherrimos saturo rubore & velut sanguineo tinctos sustinentes, quibus succedunt siliquæ tres digito longæ, latiusculæ compressæ, leves, sex, vel etiam octo semina continentes compressæ, oblonga, pulla, obscurioribus lineis varia. Siliquæ ubi semina sunt protuberant paulum, ut in orobo. Planta est annua & semine renovanda.

Semen hujus plantæ cum alijs rarioribus D. Alexander Balam primus, quod sciam, à Tingi Africa urbe in Angliam intulit.

Lathyrorum Vires, (de ijs scilicet qui inter nos magis vulgares sunt quique Gallice vocantur Gesses, hic agimus) sunt propriè in semine, quod non parum enutrient, reputatur. Juscula quibus incoquitur sunt aperitiva & aliquatenus laxantia, imò iis vim Aphrodisiacam, inesse quidam asserunt. At sanè satius fuerit illud columbis enutriendis adhibere, aut pani rusticorum tritico admistum conficiendo impendere, quam in usus medicos advehere.

LAVACRUM, vid. Balneum.

LAUDANUM, vid. sub titulo EXTRACTUM, item Opium.

LAVENDULA.

Lavendula recentioribus dicta creditur quod Balneis sibi Lavacris expetatur. Semen & folia (inquit Lobelius in Adv.) ad affectus matricis commendantur in fomentis & lotionibus. Nonnulli Iphium Plinij suspicantur, quod Hesychius λεβάνθη vulgo dictum scri-

scribit, quæ vox ad lavendulam accedit.

Martinus à *leben* Germanico i. e. *vivere*, deducit; transitive sumptò quia vivificat & valet ad Lipothymiam seu animi deliquium, autore Matthiolo.

Ejus *Nota* sunt flores in spicas tenuiores triticearum æmulas, longis pediculis insidentes congesti.

Vires. Partium est tenuium, cephalica ac nervina, usus præcip. in catharris, paralyfi, spasmo, vertigine, lethargo, tremore artuum; in urina, mensibus ac fœtu pellendo, (unde & parturientibus exhiberi solet) in torminibus ventris flatulentis: extrinsecus in lixivij capitis ac artuum, in masticatorijs (pro catarrho exsiccando ac revellendo ad Palatum, ne ad pulmones defluat.) *Schrod.*

In usu est aqua destillata, conserva ex floribus & oleum spicæ: flores spicæ cum linteaminibus & vestimentis in arculas recondi solent ad odoris suavitatem communicandum, Schroderus eos odore suo pediculos fugare scribit.

In difficili partu sem. Lavendulæ est oppidò conducibile. Duo sequentia remedia arcana præstantissima perhibentur primum est Rondeletij, \mathcal{R} . Sem. Lavendulæ $\mathcal{Z}\mathcal{ss}$. seminis plantaginis, endiviæ ana $\mathcal{D}\mathcal{ij}$. piperis $\mathcal{D}\mathcal{j}$. fiat pulvis. Cape cum aquis sequentibus. \mathcal{R} . aquar. Caprifoli, endiviæ an. $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$.

Secundum est Backmeisteri \mathcal{R} . sem. Lavendulæ $\mathcal{Z}\mathcal{B}$. succini albi præparati, borac. $\mathcal{D}\mathcal{ij}$. ol. cinnamomi guttas ix. f. l. a. pulvis, dividendus in tres æquales partes, propinandus in vino Rhenano: hæc sunt minime fallacia. Siml. Paulus ex annotatis *D. Edv. Hulse.*

In pueris pediculosis hoc expertus sum (inquit A. Hieron. Reusnerus) jussi caput inungi oleo spicæ, & statim moriebantur pediculi *D. Soame.*

At oleum quodcumque illiū insecta exanimat quoniam obstructis meatibus respiratorijs aerem intercipit & excludit, cujus defectu insecta moriuntur. *Rains in Histor. Plant.*

LAUREOLA.

Nomina. Laureola *Ger. Park.* Laureola semper vi-rens flore Luteolo \mathcal{f} . B. semper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas *C. B.*

J. B. Ad Cubitos duos & altius grandescit st. pite lente, aliquando simplici, aliquando in ramos aliquot diviso, quem subcinereus seu albicans regit cortex, & fractu contumax, & flexuosus, folijs fere nudum, quæ circa fastigium porissimum gerit, eaque satis frequentia, adeo ut in orbem umbellæ instar diradiari videantur, Laureorum æmula, nec per hyemis asperitates caduca, ex angustiore principio seu cer-vice sensim dilatata, crassa, glabra, nigricantia, splendens, è foliorum sinibus egrediuntur pediculi un-ciales, crassiusculi, foliolis aliquot concavis velut totidem squamis vestiti, in fastigio flosculos plures gestantes confertos velut in umbella, ex herbaceo luteo-los, è tubo oblongo in quatuor lacinias acuminatas, foliorum æmulas expansa, fructuum rudimenta intimo recessu complectentes, quæ in baccas excresecunt juniperinis pares, nonnihil oblongas, primum virides, per maturitatem nigras, nucleo intus duro, cannabis semine paulo longiore, medullâ interiore candida. Radix subest in aliquot partes divisa, longa, crassa, lenta, quæ difficulter evelli potest. Toti plantæ sa-por fervidus.

In sylvis & sepibus, præsertim umbrosis, satis frequens est Februario & Martij initio floret. Fructus æstatis fi-ne & adventante autumno maturitatem consequun-tur & nigri fiunt.

Vires. Daphnoides Diosc. & Plin. Vires huic conve-niunt, siquidem folia gustata os faucesque vellicant & inflammant. Eadem seu arida, seu etiam recentia pota-piuitosa per alvum deiciunt; vomitus quoque ac mē-ses cient: quin & commanducata pituitam è capite

Mangeri Bibl. Rharm. Tom. II.

extrahunt, & menses movent. Cæterum quindenæ ipsius baccæ (quinæ denarvæ Plinio) purgationis causa sumuntur.

Folia commanducata os & fauces (ut diximus) in-flammant: intus sumpta ventriculū admodum sub-vertunt, vomitum cient, partes internas lædunt & adu-runt: empirici nonnulli tum folia tum baccas exhibent hydropicis ad humores serosos evacuandos. Cæterum, inquit J. Bauhinus, non temere hanc plantā aut aliquam ejus partem præscripserimus ob insignem acrimo-niam, tamen in aceto macerando corrigi potest.

Pulvis hujus in aceto macerata, exsiccata & com-minutæ cancris inspersus prodest. Frigida & repellen-tia conveniunt in cancro occulto, in ulcerato non item *D. Bovvie. Rains in Histor. Plant.*

L A U R U S.

Laurus, unde Laureæ (inquit Vossius) Græcum videri posset, nam apud Hesychium legas *λαύρον τὸ δένδρον*. Sed si à Græcis, potius putem esse à Pergæa voce *λαύρον*, quæ idem signabat, Hesych. *λαύρον δένδρον Περγαίου*. Sin Latinis orig. nem debet, fortasse erat à *lavō*, id est purgo, nam sanguinis purgandi habet potestatem. Vel si veteres potius audiendi, prius fuit laudus, est quæ id à laude; Servius ad Eclog. 8. Cur tamen triumphantes Lauro coronantur hæc ratio est, quoniam apud vete-res à laude habuit nomen, nam laudum diceb. nt Nec tantum laudum pro lauro, sed & pro laurea olim lau-deam vel ludeam dixerunt.

Δάφνη Etymologò quasi *δαφάνη* dicitur hoc est *ἐν τῇ δαίεσθαι φωνῶσα*, quia nempe *ἡ χεὶρ πατομένη* quod ety-mon non improbat Vossius apud quem plura vide.

Nomina. Laurus *Ger. I. B.* Vulgaris *C. B.* Major sive latifolia *Park.* An minor ejusdem?

J. B. Laurus plerumque multis stolonibus luxuriat, vel mediocris arboris altitudinem assecuta, alioqui in justæ magnitudinis arborem excresecit, præsertim re-gionibus calidioribus, caudice enodi, cortice tenui, materiâ rarâ, nec multum validâ, radices habet cras-sas, inæquales & obliquas. Cæterum perpetui viroris est, nitidi in junioribus, in adultioribus saturatoris. Folia ei oblonga, dura, acuminata, sed mucrone aliâs acutiore, aliâs obtusiore, fescunciâ aut $\mathcal{Z}\mathcal{ij}$. lata, palmo longiora, versus pediculum & mucronem paulatim angustiora reddita, quæ secundum lōgitudinem per-currit, costa recta, obliquos in margines nullo ordine nervos exporrigens: sapor acer, aromaticus & sub-amarus. Adherent autem folia ramis viridantibus bre-vi pediculo. Flores secundum ramos exeunt conferti, hederaceisquadantenus similes, majores, alibi (Lobelio flavescentes) multis in medio apicibus: quibus succe-dunt baccæ, Cerasiis minoribus pares, oblongæ, colo-re primum viridi, ubi maturuerint nigra, quæ sub cor-tice tenui Nucleum bifidum callosum ac durum, cum aliqua acrimonia amarum ac pinguem claudunt.

Laurus (inquit C. Bauhinus) quædam claret tantum, flore copioso, racemoso (Uvam Thophrastus vocat) & fructum non fert; alia fructum fert, in quo etiam dif-ferentia: alterius in rotundo modice oblongus est; al-terius oblongus, gracilis, & utrinque ovato mucrone turbinatus. Laurus fulmine non ici veteribus persua-sum fuit. Hinc Tiberius Imp. qui tonitrua præter mo-dum expavit & exhorruit, tonante cælo, contra fulmi-num metus, nunquam non lauream coronam capite gestavit. Verum quàm hoc falsum & superstitiosa cre-dulitate fundatum experientia quam adfert Lacuna, elegantissimæ Lauri Romæ in Palatio Ducis de Castro fulmine ictæ luculenter ostendit.

Eadem superstitione nititur observatio illa de crepitu quem folia Virgæ Lauri inter urendum edunt. Nam si crepuissent abunde ac tonantiùs haud dubie porten-di felicem eventum rebantur, quod sitacita deflagras-sent tristem & inauspicatum.

Laurus Apollini sacram inde fabulatur Poëtæ quod

Virgo Daphne quàm deperibat in hanc arborem conversa est. Vide Ovid. Metamorph. 1.

Triumphantes apud Romanos Coronam lauream gestabant, vel lauri ramum dextrâ tenebant, sed & aliter præterquam in triumphis etiam victoriæ nuncia fuit laurus: nam & tabernacula, & fasces, & literæ & hæves militumque jacula, lanceæ, pila lauro in eam significationem adornata sunt, ut & Plinius affirmat, & Ebrodunensis historiæ auctores adductis exemplis ostendunt.

Laurus cœli frigidioris impatiens est, minus tamen quàm myrtus. In Germania, Anglia, Gallia & Belgio nonnisi sata & diligenter culta provenit. Quod si in Germania hyeme tegenda & hypocausto reservanda est, recte scribit Turnerus in Anglia felicius adolescere, virerèquè quàm in Germania: apud nos enim eam curam & tutelam non requirit, sed intacta & subdio relicta hyemem, nisi præter solitum aspera sit, facile tolerat; quod si quando frigore perusta & corrupta sit à radice denuò repullulat.

In Italia spontaneam observavimus non infrequenter in sylvis & sepibus. In Monte Artho ingentes & præaltæ lauri spontaneæ nascentes ardorem solis omni tempore reprimunt, teste Bellonio, qui quinque species in Græcia notavit: quem consule pro usu olei Baccarum apud Monachos.

Floret Martio & Aprili Baccæ maturantur sub finem Autumni cum olivis, & nisi decerpantur per totam hyemem ad ver usque in arbore hærent.

Vires. Laurus excalescentiam (emollientemq; Diosc. desiccantem, Gal.) naturam habet, & folijs, & cortice, & Baccis; itaque decoctum ex his, maximè è folijs, infessu Vulvæ ac vesicæ vitijis convenit: virentia folia trita & illita vesparum, Crabronumque ac apum, item serpentum venenis resistunt, maximè sepi, dipladis & viperæ (pro sunt & mensibus foeminarum cum oleo cocta Plin.) cum polenta autem quæ tenera sunt trita ad inflammationes oculorum, cum ruta testium, cum rosaceo capitis dolores, aut cum irino. Non temere attendum folijs lauri existimat I. B. in inflammationibus oculorum & testium, aut etiam in capitis doloribus, pro inflammationibus ergo inflationes legi mallet. Eadem profunt suspirijs trita cum melle: cortex radice cavendus gravidis. Ipsa radix calculos rumpit. Jecinori prodest tribus obolis in vino odorato pota. Folia vero pota stomachum gravant, & vomitiones movent. In Græco Diosc. legitur *περίνετον σίμαχον*, id est, mitigat, pro quo legit Cornar. *Βαρύνη* regravat, sanè in alterutro membro clausulæ errorem subesse ostendit eorum inter se repugnantia. Verum is I. B. iudicio, non in primo, sed potius in postremo, certum enim, inquit, est tum experientia, tum ex Galeno laurum Aromaticam esse totam & Amaricantem cum nonnulla adstrictione, hepatis amicam, qualia ventriculorum tantum abest ut subvertant, ut nauseabundum corroborarent potius: hinc lauri folia à recentioribus non raro cum nonnullis cibarijs, præsertim piscibus coquantur: nec ulla inde nausea accedit, sed cibus istis conditus sapidior ac ventriculo gravior redditur: unde *κίνη* vocem in textum irrepsisse & expungendam esse, Plinium autem corrupto Codice usum existimat, verum nos Plinium Dioscoridi saltem cœvum, si non antiquiorem, alibi ex Salmasio ostendimus; proinde Plinium & Dioscoridem ex alio antiquiore autore quæ eadem habent exscripsisse, ideoque cum in facultate illa vomitus movendi Plinius & Dioscorides consentiant, posterius clausulæ membrum proculdubio sanum est, prius corruptum & per illud emendandum, ut recte fecit Cornarius: sive verum sit folia vomitum movere, sive id res vera refutet. C. Hofmannus proposita questione, conferantne an lædant ventriculum, respondet, tot autoritates faciunt, ut credam hoc posterius potius. Ideo, cum Maic. Vergil. & Cor-

nario pro *περίνετον* apud Dioscoridem lego *Βαρύνη* pergunt Dioic. & Plin.

Dacæ magis quàm folia calefaciunt, menses trahunt appositæ trita, vel potæ; in eclegmate trita cum melle aut passo profunt tabi; orthopnœæ & pectoris rheumatismis; tussi veteri detracto cortice in vino potæ: nam & concoquunt puitam & extrahunt Plin. Nostra ætas non ad pulmonis & pectoris morbos Baccis utitur, sed ad ventriculi, jecinoris, lienis & vesicæ, affectus tum Baccas tum folia exhibet: refrigeratum ventriculum concalsciunt; concoctionem crudorum humorum promovent, languentem appetitum excitant, cibi fastidium pellunt; jecinoris ac lienis obstructions aperiunt, urinas cient, menses movent, & ad secundarum expulsionem faciunt. J. B. ad juvandum partum deglutiantur septem Baccæ Lauri ante somnum. Chesneau. Contra Scorpionum ictus ex vino bibuntur, & vitilignes emaculant: (addit Plinius, Epinyctidas ex oleo illitæ, & lentigines & ulcera manantia & ulcera oris, & fures; cutis pruriginem succus Baccarum emendat & phitriasin.) Expressus ex ijs succus aurium doloribus auditusque gravitati auxiliatur cum vino vetere & rosaceo instillatus: (perunctos eo fugiunt venenata. Prodest contra ictus & potus. Baccæ cum vino serpentibus & scorpionibus & araneis resistunt; ex oleo & aceto illinuntur & leni & jecinori gangrenis cum melle, & in fatigatione etiam aut perfrictione succo eo perungi nitro adjecto prodest. Sunt qui celeritati partus multum conferre putant radicem acetabuli mentura in aqua potam, efficacius recentem quam aridam,) Dioic. cortex radice calculos rumpit, partus necat & hepaticis prodest tribus obolis in vino odorato potus. (In remedio uvæ facientis quadrantem pondo Baccarum foliorumve decoqui in aqua sextarijs tribus ad tertias eamque calidam gargarizare convenit.)

Laurus folia trita olfactuque subinde pestilentia cõtagia prohibent, tanto magis si & urantur, hinc Commodus Imperator, Herodiano tradente, tempore pestis, consulens bus medicis, ad loca Lauris abundantia Laureatus secessit. Herba enim perpetuo virentes, autoribus. S. Grems, Cardilucio aliisque Helmontianis, sunt pestis Alexueria, corruptioni resistunt, seque defendunt contra æstum & frigus; unde nobis planè signavit Deus, illas plantas perennes sæper esse ad manum pro quotidiano usu generis humani, continent enim in se balsamum, omnis corruptionis propugnatorem.

Adversus Bœum coriaginem, tradente Colum. prodest Laurum decoquere, & eâ calidâ terga fovere, multoque oleo & vino confectum subigere atque per omnes partes apprehendere & attrahere pestem: idque optime subdio sole fervente.

Medicamenta varia ad lachrymas oculorum, ambustionem, aurium gravitatem & sonos, colicam uvulæ relaxationem, urinæ retentionem, partum facilitandum, capitis dolorem, hemicraniam, è baccis aut folijs Lauri parata vide apud J. Bauhinum Hist. plant. lib. 4. cap. 1. pag. 414.

Olei Laurini multiplicis mentio fit à veteribus & recentioribus. Aliud è Baccis recentibus confusis exprimitur, aliud è Baccis cõtulis vel etiam integris, in aqua fervente bullitis: oleum aquæ supernatans in vasa colligitur; aliud per distillationem elicitur. Sic R. Bacc. \mathfrak{ss} ij. confusis super affunde aq. tepidæ \mathfrak{ss} ij. vel iv.

Postquam aliquandiu steterint destilla per Alembicum vel vesicam. Sic prodibunt oleum & aqua per tritorium seperanda.

Dicitur etiam oleum Laurinum quod fit è folijs aut Baccis Lauri in oleo omphacino decoctis.

Oleo Laurino vis inest excalescenti, emollienti, spiracula venarum aperiendi, & lassitudines discutiendi, quin & malis nervorum omnibus, doloribus aurium ac distillationibus confert: renum vero vitio ex frigore

gore contracto laborantibus illitum est præstantissimum, & maxime si quid aliud utile. Ob vim ejus ex-calfactoriam paralyti, spasmō, ischiadicis sugillatis, capitis doloribus inveteratis, destillationibus, auribus in Calyce punici calefactum illinitur; colō dolenti clystere infusum mire prodest ut & horrori febrili. Verū in calidis & biliosis temperaturis ab eo abstinendum. Vermes & pediculos tam agrestes, quam domesticos & lentes enecat (imō hoc facit oleum quodcunque) in genere utile est in affectibus frigidis maxime exterius illitum, intus sumptum nauseam movere.

Schroderus de oleo stillat. hæc habet. Discutit insigniter flatūs & ventositates, præcipue in spatibus gravidarum, ut & in colica; siderata membra illitu restituit, auribus inditum dolores compescit, auditumque confortat, delet impetigines, lentiginēs & quascunque faciei maculas, denique ichorosis capitis doloribus medetur: phthiriasin & tineas curat.

Emplastrum Laurinum ad hydropem, ad dolores & flatibus aut causa frigida ortos, doloremque colicum utile est.

Electuarium etiam de Baccis Lauri flatūs dissipat.

Si Lauri exsiccatæ ramus ramo frequenter confricetur, superasperso Sulphuris pulvere ignis statim exiliet: quod mirum, cum Lauri lignum leve & spongiosum sit. Sed nihil hedera præstantius quæ teretur, quæ terat Lauro. Plin. Cum attritio utriusque sit, quæ teratur, quæ terat perinde est, ut nobis quidem videtur, In Catalogo hort. Acad. Lugd. Batavi à D. Hermano edito has Lauri species seu varietates invenio.

1. *Laurus Indica* Aldini. *Laurus* regia hort. regij Paris. Hanc nonnulli Persæ arbori Clus. eandem esse volunt. *Laurus* cujus cortex cassiæ ligneæ assimilatur *Park.*

2. *Laurus latifolia*, *πλατυφυλλος* Dioscor. C.B.

3. *Laurus vulgaris* C.B. & aliorum.

4. *Laurus vulgar.* folio undulato Hort. reg. par.

5. *Laurus Tenuifol.* mas Thab.

In Tho. Bartholini Act. Medic. Ann. 1673. inter plantas à M. Stolle Hafniam allatas à Promon. Bonæ spei invenio.

Laurum Africanum serratis folijs, cujus foliū Londino ad me misit D. Tancr. Robinson. Erat id pro magnitudine angustius & longius Lauri vulgaris folio. Ramulū etiam ejusdem habeo ex munere D. Pettiver. An Evonymo affinis Æthiopica sempervirens fructu globoso scabro, folijs Salicis rigidis serratis Herman. Haleyd. Lauro serrata odorata Stapelianæ similis inodora Cap. bon. spei Breyn.

6. Bod. à Stapel habet *Laurum* serratum odoratam.

Alia species Lauri invenitur in horto instructissimo Reverend. Episc. London. D.H. Compton, sub nomine Lauri tulipiferæ Baccis calyculatis quam ingeniosissimus vir D. Banister transmisit è Virginia; folia ei integra non tam viridia & crassa quam Lauro ceraso. *Raim in Hist. Plant.*

LAXANTIA, vid. *Chalastica*, hic de purgantibus non agitur.

LECTIPES, vid. *Lynopodium*.

LEGUMEN.

Legumen, Legumentum, est quicquid è terræ satis in siliqua nascitur, ut faba, pisum, cicer, lens; à *legendo* teste Varrone, quoniam id non secatur, sed legitur manu vellendo.

LENIENTIA dolorem, vid. *Anodyna*.

LENIENTIA PURGANTIA.

Lenientia dicuntur tum ratione actionis, lenis, blandæ & suavis, tum quoque partis, nempe alvi, quæ alvum leniter expediunt, quam in omni morbo apertam esse convenit; unde cum huic fini optimè prospiciant, & primas vias sine molestiâ, sine turbatione liberent, insignissimum habent usum.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Et hinc audiunt quoque *Laxativa*, Barbaris *Mino-rativa* *ἐκκοπρωτική*, q. d. stercorearia, quod scybala promoveant, ut & *benedicta*, ob maximam utilitatem, *ἐπαγωγὴ*.

Indicans primum est alvi lenitio, secundarium humorum vitiosorumeductio; coindicans vires debiles, adeoque purgantium sunt succedanea, succedunt ipsæ in minori cacochymia gradu; succedunt, ubi purgantia minus tui dantur, majorem læsionem post se datura, ut proportio inter agens & patiens, seu potius inter indicans & indicatum, adæquata fiat.

Locum ergo habent in quovis morbo, tum si natura in officio cesset suo, hoc pacto monenda, tum revellendi, & reliqua adjuvandi fine, innoxia singula & indemnata, sive per os adsumantur, seu per clysteres ad-
tas applicentur, seu per epomphalia in usum cedant.

Efficiunt hoc ipsum alia propriè, alia impropriè & per accidens. Propriè lenientia iterum alia humores educendos, alia naturæ stimulum & sentum magis respiciunt, quorum illa diximus per accidens magis, hæc per se magis id præstare, hoc respectu, nempe *ἐπεδιωμὴ*. Unde dividemus iterum in lubricantia, detergentia & stimulantia.

Lubricando leniunt (1.) *aquea*, & humectantia, quæ diluunt feces, seu scybala exsiccatæ, ob defectum humiditatis ad fluendum, seu motum saltim, inepta, ut potius largior. Nil magis enim impedit scybalorum retentionem, (si appetitus ceteroqui benè habeat, & cibibus assumatur,) quam potus parcor, & vita deies, (sedentaria, quieta. Unde maxime errant, qui nescio quæ religiosâ parsimoniâ seu abstinentiâ à potu corpus defraudant genio, & alvi beneficium hinc non experiuntur. Perpetua enim intercedit proportio inter assumpta; digesta & egesta; ut, quod alibi diximus, qui benè ingerit, digerit & egerit, sanus demum habendus sit.

Hinc falluntur, qui in morbis, quando nihil agra assumptum per aliquot dies ciborum, & venter quasi vacuus est, tamen stimulant alvum, non attendentes nisi habere naturam, quod excernat, unde necessariò quiescit. Hinc etiam in fame nimia subsident & corrugantur intestina. Hinc uno verbo largius hisce bibendum est.

Tantò magis verò leniunt & laxant aquea, quando vel activo characterē sunt imbuta, ut thermæ & acidulæ, serum lactis caprinum &c. vel heterogeneis particulis fœta, apta fermentationi, ut mustum, cerevisia recens, & omnia feculentia; alvum turbantia. Utroque nomine cerevisia Numburgensis id præstat, est enim ex nitrosæ naturæ aquâ cocta & turbulenta, vix claritatem acquirens ad instar aliarum. Sic & superbibitus potus prunis, pyrisve coctis, facilius id præstat.

Lubricando leniunt (2.) *emollientia* & *mucilaginosa*, quæ aqueam & sulphuream concretam habent molliem in recessu; tum alimentosa interius assumpta, oleracea omnia, nitroso sale fœta, quod vel gustu spinachia ad pulvrem decoctæ patet; tum medicamentoſa, in clysteribus recipienda. Neque enim hæc interius æquè adhibentur, quatenus ventriculū flaccidiorem reddunt, quod ejus tono adversum est.

Mollificant hæc itidem feces, & motum peristalticum intestinorum adjuvant, præcipue quando naturæ suæ sicciora sunt hæc ipsa. Quidam colicis, alijs non juvantibus, taleolis malvæ radicis; quidam desperatæ velut alvi adstrictione laborans in balneum ductus & sacculo è farinâ lini abdomini toti imposito convalluit. Non minus verò & hæc magis id præstant, quando salino stimulo accipiuntur.

Lubricando leniunt (3.) *oleosa*, *unctuosa*, *pinguia*, *laxigantia*, *laxantia* stricturam, tum interius itidem

tum exterius, v. g. butyrum paulò largius sumptum, modo non nidorofam qualitatem nimio usu fœnere mur, & maxime ante paitum. Quidam Quæstor, ob fecum ficcitatem sæpius colicis afflictus torminibus, ab eo eo tempore nunquam sensit eos repetere, cum prædij & cœnæ tempore primum ferculum statueret panem butyro illitum, suasu medici rationali. Sic & plebis experimento butyrum cum pinguedine anseris & muscerdâ imponitur umbilico pro laxandâ alvo; sic etiam butyrum cum aloë remixtum & putamini nucis inclusum eodem fine facit officium. Sic oleum amygd. dulc. in calculo optimè lenit vias alvi & urinas, alvo enim liberâ & colici & nephritici dolores conticefcunt facillè. Sic & infantum recens natorum primum est alimentum medicamentotum, unico laxandi fine propinandum, ut meconium, feces biliosæ & viscidæ, torminum & symptomatum spasmodicorum causa, educantur. Oleum lini in dysenteria & pleuritide ob lenientem & sanantem vim insignis est. Singula nempe olea tum particulis sulphur-aqueo, mucilag. nosis mollificantibus gaudent; tum salinis in recessu, quod etiam nuces edentibus juglandes experiri facile est, undè expeditissime juvant.

Leniunt *deterfiva* & *stimulantia*, quæ ob particulas salinas variè modificatas, acidulas, amaras, nitrofas, cum vel sine sulphureis lenius irritant & detergunt mucum. Omnia nempe talia stimulant, unâque fluxiles humores reddunt; crassitie & viscedine excussâ. Stimulant *alcalia*, quæ, juxta *Hellmontium*, temibus (per ignem) orbata solam (quasi & præcipam) habent absterfivam, saponariam & resolutivam proprietatem. Hinc in clysteribus stimuli loco adduntur; hinc cum purgantibus sociantur commodè; & speciatim tinctura tartari egregiè se gerit in obstructionibus alvi, tam senili, quam alâ.

Stimulant *acidula* terrea, ut tartarea omnia, tartarus ipse crudus, quem crystallis præfert *Heer. in obs. p. 30.* Et *Angelus Sala* se à doloribus colicis, assumptis tartari crudi ʒij. l. beratam nullis juvantibus alijs deprædicat, causamq; adscribit alleviationis remotioni causæ tartaræ & frigidæ in intestinis collectæ.

Leniunt alvum cremor & crystalli q̄ri, absterfivâ fermentantemq; naturâ, quâ bilem incidunt & fluxile reddunt simul, eandemq; contemperant; dum per se data ante cibum, repetito usu, tum cum purgantibus & lenientibus alijs mixta, ut cum aloë &c. Sic etiam in formâ humidâ talismodi leniens est clyffus antimonij sulph. qui hinc in potum inditus febricitantium & urinam movet, & sudorem promovere, & refrigerat, & alvum apertam servat, unde cum indicationibus pluribus satisfaciât, pristinum constituit remedium. Neq; obstat, acida figere potius & coagulare humores; distinguenda enim sunt & ipsa pariter & subiecta, prout ob particularum diversitatem fermentationem promovere, & irritare hinc diversimodè seu stimulare fibras nerveas possunt. Sic oxymel est leniens egregium, extergendæ pituitæ ex intestinis inserviens, fixante naturâ acidâ alteratâ.

Talia acida sunt imprimis *nitrofa*, quæ omnia detergendo laxant, unde in laxitate ventriculi & diarrhœis alijsque humorum serosorum fluoribus minus danda; unde ab his sæpè sollicitatam alvum novimus, etiam ad instar purgantis. Propinabamus sœminæ ʒj. arcani duplicati, ad moderandas ebullit omnes hypochondriacas, pro tribus dosibus, singulo omnes per tres dies continuos sumendis. Inde verò quotidie 4. 5. 6. purgata cum levamine referebat hinc se à purgante dato hoc pulvere, ut putabat, egregiè adjutam. Quod statum aptissimus est clysterum stimulus.

Leniunt *salia media* seu salia, [quæ diverso respectu possunt ad acida & media referri,] ut sal commune, hinc ciborum condimentum, quod simul excretionem

scybalorum promovere. Lenit abstergendo & stimulando & Q̄tus, quibusdam hinc salis balsamici titulo veniens, siad ʒij. propinetur, quæ tamen dosi pro hoc fine impetrando nimia est, & teneriores facillè ledit. Propinata hæc dosi à medico Serenissimo cuidâ Principi, robustæ & militari vitâ induratæ naturæ, lenivit alvum ʒ. 6. sedibus. Eadem verò Serenissimæ conjugidata, tenerioris texturæ & serosiori, debilitatem induxit, ut lipothymia ipsa surreperet. Sic & tartarus resolutus, [cum sale tartari] leniendi hinc viribus est conspicuus.

Præcipuè verò & stimulando leniunt *purgantia*, tum ipsa leniora, aloë, lenientium apex, manna, cascarindi, tum reliqua & alia, minori dosi data; adeoque purgantia accisâ dosi data, vel fortiora cum lentivis refractâ dosi mixta evadunt lenientia. Faciunt huc anima rhabbari, pilulæ aloeticæ, Francosurtenfæ, Glassianæ, & his affines ex aloë rosatâ, vel violatâ lactæ, sine vel cum scammonio acuatæ; præcipuè si recludatur intimè & resolubilis per fermentationem reddatur aloë, accessione martis, ac cr. tri. aliorumque sic simul cicurandorum, ubi viscedinem resinofam irreolubilem omnem deponit, egregio cum strategemate.

Taceamus alia lenientia hujus commatis, quæ vel ex materiâ clysterum, vel purgantium classe huc referri possunt. In mentem venit, quod vulgus hinc loci in usu frequenter habet leniens, alvo referendâ, dicatum quasi probatissimum, plumas nempe anserum tenuiores, *Pflaum Federn*, tenuiter concissas; quæ quicquid præstant, videntur facere ob heterogenitatem averfam naturæ, unde archeus ad excrescendum confurgit.

Impropriè verò & ex accidente lenientia huc faciunt adstringentia, *καταχρηστικὸς* quasi talia, & effectû aquivoco. Notandum enim, quod adstringentia in iis, qui laxiorem habent ventriculum & debiliorem, alvum non tantum leniant, sed & quandoque purgent, imprimis ex alimentosis cydonia, si sumantur post paitum, ut ante cibum sumpta adstringunt, cujus rei ratio est ex fibrarum naturâ peienda. Adstrictæ enim ante cibum ægrè dimittunt *ύατα*, adstrictæ post cibum propulsionem accelerant. Par ratio est opiatorum, de quo egimus in Opiologia, & pulverem stypticorum. Vir hypochondriacus cum ad vomitum curandum assumeret pulverem stypticum, toties diarrhœam reportabat, idque non semel, ob flacciditatem villorum ventriculi, ut de resolventibus, de quibus inferius plura occurrent, nil addamus.

Pro sunt hæc, ut diximus, *in quovis morbo, ubi alvum apertam bonum est esse*, tum illo sensu, quod statui naturali id sit conveniens; tum altero, ubi natura id indicat, vel alibi impedita est, ut in variolis & morbillis, ubi nec lenientia sine noxâ dantur, alibi occupatâ naturâ. Sin naturæ beneficio alvus naturaliter solvatur, nec citetur ultra naturales terminos, id ipsum quoque bonum est.

Dantur *2. cum cibis*, siquidem observatum est, lenientia optimè hoc tempore dari, immediate ante cibum, vel cum cibo ipso, & potius cum cœnâ, quam cum prandio. Legi meretur de hoc ipso insignis locus apud *L. Septalium l. 3. animadvers. 5.* ubi inter alia scribit: Et ut milles ego expertus sum, & nostrates medici meo exemplo cognoverunt, hoc modo aut uncia semis aut etiam drachmis duabus sæpenumerò major excrementorum copia educitur, quam cum uncia, & etiam uncia una semis per horam, ut moris est, ante prandium exhibetur. Hunc in finem usitatissimè propinantur pilulæ aloeticæ Francosurtenfæ aliæque hujus generis. Conveniens est hoc tempus naturæ, quatenus à somno capto matutino tempore per alvum secludere scybala gestit.

3. *Lenientia purgantium commoda sunt adjuvantia, in specie tartarea, quæ non solum in decoctis purgantibus*

ribus optimo cum successu junguntur; verum & in pulveribus purgantibus.

Neque tamen 4. solis inharendum lenientibus, seu in principio morborum, seu in progressu; quin purgantia in eorundem locum sint surroganda; sicubi à majori copiâ humorum indicentur; unde illud apud Hoffmannum, l. de med. offic. Non curamus ullos magnos morbos, quia nunquam nos expeditus à lenientibus.

5. Non sunt confundenda lenientia & stimulantia. Lubricandum magis in siccitate intestinorum; stimulandum magis in eorundem repletionem. Illa magis feces, hæc scilicet magis respiciunt. Lubricantia in clysteribus, stimulantia in suppositorijs magis profunt. *Wedelius.*

LENITIVUM, vid. *Electuarium*;

LEN S.

Lens vel ex *Lenis* factum est, vel ex *Lentis*, quomodo Vett. dixisse in recto, ait Priscianus in vii. Ratio nominis, esse creditur quia comesta *Lenes* & *Lentos* faciat. Invenio [inquit Plinius lib. 17. cap. 12.] apud audores æquanimitatem fieri vescentibus ea.

Lens à reliquis vicijs distinguitur semine compresso & pro plantulæ modo grandi filiquis latis, brevibus.

Cæterum *Lens* minutum & vile est legumen, unde Proverbium mira de Lente, apud Græcos dici solitum quoties res humilis & pusilla splendidis encomijs magnificisque laudibus attolleretur cui Anglicum nostrum respondet.

Pauperum & tenuium cibus est, quæ fastiditur simul ac huius fortuna contigit, unde Proverbium, dives factus jam desit gaudere lente, in eos dictum, quibus ad uberiorem conditionem evectis fastidio sunt ea quæ prius inopes boni consulebant.

Vires. Quod ad vires attinet, *Lens* ex veterum auctoritate oculorum aciem obtundit, agrè concoquitur, stomacho incommoda est; eumque & intestina inflat: alvum autem sistit si cum cortice edatur, inducit gravia insomnia, ad nervos, & pulmonem & caput incommoda est. Galeno Corpus Lentium siccatur & ventrem sistit, decoctum vero propellit. Quapropter prior aqua diffunditur cum cohibendi gratiâ sumuntur, præcipua vis adstringendi est in cortice, detergendi in succo. *Lens* ergo decorticata illam adstringendi vehementiam & ea quæ ipsam consequuntur, amittit; magis tamen nutrit quàm quæ cortice spoliata non est, verum succum crassum ac prævum gignit, tardeque comeat, non tamen alvi fluxus desiccatur uti ea cui cortex non est ademptus. Externè in cataplasmatibus ad multa adhiberi solebat à veteribus. Vide Dioscoridem & Plinium. *Rains in Hist. Plant.*

LENTICULA PALUSTRIS.

Nom. 1. Lens Palustris Ger. J. B. Palustris sive aquatica vulgaris Park. Lenticula palustris vulgaris C. B.

J. B. Stagnantium aquarum incola Lenticula eisdem innatat, totam superficiem densissimo foliorum, infernè nigricantium, supernè virentium, nitidorum, orbiculatorum, Lentisque modo compressorum stipatu obtegens, quæ inter se capillamentis tenuissimis & albis arctè revinciuntur, iisdemque seu radicibus è limo adhærescente alimentum hauriunt.

In lacubus & stagnis aliisque non fluentibus aquis, ut urbium fossis, innatans, & latè sæpe earum superficiem occupans reperitur.

Quæ de mirabili hujus plantæ Metamorphosi in plantam silymbrio aquatico haud ab similem habent Matthiolus, & post eum Lugdunensis, apud me sanè fidem non inveniunt, quantumvis Lugdunensis operum naturæ indagatorem Dalechampium illud non sine admiratione observasse scribat.

Vires. Vis ei refrigerans, unde inflammationibus, podagræ, & ignibus factis convenit, agglutinat etiam in pueris hernias intestinorum. Vide sis Matthiolum & Lugdunensem.

Nuper mihi communicavit pro secreto infallibili ad icterum infusionem Lentis palustris in vino albo per novem dies 3vj. manè præbendo D. Bales in M. S.

Vescuntur eâ Anates magnâ voluptate, quod & nomen Anglicum i. e. anatum esca, indicat; ut etiam gallinæ eum aquis ex æpta futuribus permiscetur. *J. B.*

Nom. 2. Lens palustris quadrifolia J. B. Park. Lenticula palustris quadrifolia C. B.

Fibrosis radiculis nititur & crassiore aliâ (licet ea tamen tenui) transversa demissis, unde propagantur tam multi, multifariam divisi, atque tum ex iis, tum ex radicibus pediculi ad aquæ superficiem pertingentes; quorum singulorum extremis adhærent aquæ innatantia quaternaria folia, triquetra, per extremum lata, angulis acutioribus ad pediculum cœuntibus; circa vero ramulorum divaricationes pediculorumque exortus numerosa semencialibus pediculis nixa cohærent: grana, nigra, dura, Lentibus majoribus paria.

Nomina 3. Lenticula aquatica trifolca J. B. C. B. Hederula aquatica Ger. Ranunculus hederaceus aquaticus. Park.

Lenticulæ palustris vulgò notæ riu aquæ stagnanti innatans visum panè fugientibus fibrillis limum arripit alimentum sucturis: quibus etiam inter se committuntur folia. Non vulgarem sortita connexum & formam. Folio enim Lentis leguminosæ paripinnæ utrinque foliaceæ transversim squamosæ commissurâ ita incumbunt, ut trahentem leviter sequantur, & iis attractis tenuius redditum folium visum transmittat: tota autem omnium trium connexio trifolcam hederacei folii formam quodammodo exhibeat: at hujus connexus capillari petiolo transversim incumbit folium veluti temere projectum, nequaquam tamen solutum licet adhæsus ratio oculos fallat in aquis cænosis pigrioribus: in fossis paludosis insulæ Eliensis copiosissime oritur.

LENTISCUS.

Lentiscum dictam putat Ruellius quod liquore quodam lentescat: Lentorem quippe foliorum attrectatu quilibet percepit, inquit Lob, in adv. vel forte Lentiscus ob virgultorum Lentitudinem dicitur; ut Stapelius: vel potius quod ipsa Lentescat arbor, dum resinam fundit, ut Vossius. Græcis *ἄλκυος*, *ἀλκυὸς ἕλκων* scindo, fido, quod lignum ejus facile finditur, quodque ejus *ἕλδαξ*, hoc est segmentis seu fragmentis è ligno scissis tolerent uti ad dentiscalpia, ad nitelam alboremque dentium, ut etiamnum fit hodie.

Mastiche *ἄλκυος τὴν μάστικον*, i. e. masticando dicitur: nam & olim & hodie in masticatorijs usurpata est.

Certè Græci in insula Ithio eam perpetuo in ore habent, & ad multa utilem esse ejus assiduam masticationem sibi persuadent.

Nomina Lentiscus Lob, Ger. Park. J. B. vulgaris C. B.

J. B. Multis fruticat Lentiscus stolonibus, medio-criter crassis, flexilibus ramis brachiatis, cinereo cortice obductis. Interdum injustæ magnitudinis arborem excrescit. Ut observavit Clusius. Folia minora quâ pistaciorum aut terebint. glycirr. foliis paria, sed buxeorum soliditate (nobis observantibus glycyrthizæ foliis minora erant) ex viridi nonnihil rubentia, conjugatim sine ullo impari ad Costam Canaliculatam rubescentem annexa in Spinulam plerumque desinentia, inque

eandem fere partem vergentia perpetua, jucundi cum quadam gravitate odoris, sapore acidiusculo & adstringente, iis interdum folliculi vel vesiculæ quædam adnascuntur culicibus exiguis referti haud secus quam in terebinthinis aut ulmeis, ad alæ imum exoriuntur flosculi, veluti racemuli rubentes, vel Colore ex herbaceo pallecentes, nonnihil purpurascens, qui in fructus abeunt, dimidio fere pisis minores in stylum minutum desinentes, rotundos, rubentes & per maturitatem nigricantes, acidos, nucleum continentes parvulum, durum, nigrum, medullâ intus albâ, fructum Cæsalpinus oleaginosum dicit, Nucleum viridem.

In Italiâ, Siciliâ & Narbonensis Galliæ saxosis Collibus, orâ præsertim maritima, Lentiscum Copiosissimam observavimus: nec minus frequens, teste Clusio, nascitur in Lusitaniâ, Bætica, Regno Valentino, & toto illo tractu ad mare mediterraneum obverso: ubi nunquam (quod equidem viderim) justam arboris staturam & magnitudinem assequitur; fortè quia ab hominibus cæsa aut à jumentis depasta & coercita non permittitur adolefcere. Nam quando non cæditur sed negligitur (ut plerisque Locis ad Anam flumen observavit Clusius) in arborem justæ magnitudinis excrefcit.

In sola insula Chio, Bellonio autore, resinam fundit Mastichen dictam, alii in Italia quoque Mastichen præbere, sed non copiosam tradunt, ut v. g. Matthæolus (qui tamen sibi contrarius in Hist. Germ. dicit. In sola insula Chio Lentiscum mastichen fundere) Cæsalpinus & Lacuna. Nos cum in Italia & Gallia Narbonensi peregrinaremur nusquam Mastichen fundentem vidimus hanc arborem, neque quis fide dignus nobis unquam retulit se vidisse. Idem dicit I. B. argumentum tamen ab autoritate negativum nihil concludit, ut loquuntur. Neque enim sequitur non dari in Italia arbores Mastichen fundentes, quia ego aut mille fortè alii non viderimus, & plus valet unius testimonium se vidisse affirmantis ad probandam affirmativam, quam vel mille negantium ad negativam stabiliendam.

Verum nonnullis terebinthus resinam fundens ab Italica specie distincta videtur. Qui in Chio aliquandiu hæserunt Clusio retulerunt Lentisci arbusculas ab aliis quæ in Italia nascuntur nonnihil differre. Et Camer. tunc inquit qui velint Italicam Lentiscum à Chia in eo tantum diffare, quod fruticosa sit illa, hæc vero arbor escat, etiam sine cultu. Audiavi ex quibusdam è Chio oriundis arbores, quæ Mastichen ferunt longè proceriores, pulchrioresque sylvestribus esse, quæ tamen eodem loco nasci solitæ I. B. verum Bellonio potius, curioso observatori & veraci, fidendum, qui Lentiscos qui in Provincia & Italia proveniunt, similes dicit nascentibus in Chio; Mastichen tamen non fundere.

Floret Lentiscus magna ex parte Aprili vel Martio. Fructus Octobri & Novembri primum maturefcit. Ter autem fructum fere tradunt, fortè quod tribus distinctis temporibus eundem perficiat. Cicer. ex Arato.

jam vero semper viridis, semperque granula

Lentiscus, triplici solita est grandescere fœtu.

Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi.

Ciceronem nonnulli inscitæ accusant quod χῖος Lentiscum transtulavit cum vox χῖος apud Theophrastum & antiquiores Græcos Scillam significet Ciceronem quomodo defendat I. Bauhinus, aut potius Cherlerus, apud ipsum vide.

Pires. Lentiscus, autore Dioscoride, omnibus suis partibus germinibus & foliis, fructu, ramorum & radicis cortice adstrictoria est, exprimitur & succus è cortice, radice aut foliis in aqua decoctis, aut etiam

è foliis viridibus tritis, qui valet ad sanguinis rejectiones, alvi profluvia & dysenteriam in potu, itemque contra Sanguinis ex utero eruptiones, atque tum ipsius uteri, tum sedis procidentias, in summa denique Acaciæ & hypocistidis vice eo uti licet, nomas arcet, urinas ciet, dentes mobiles collutione firmat atque stabilis, eadem fere habent Plinius & Galenus

Porro dentiscalpia è Lentisco parata tum priscis, tum hoc seculo magnatibus & delicatioribus præsertim, in usu quotidiano habentur.

Cherlerus sibi alique studiosis saltus & colles aridos Narbonæ peragantibus inserta in os folia non modo suaviter spirabant, sed etiam sitim arcebant & fauces humiditas tuebantur.

Oleum Lentiscinum similiter atque laurinum è maturo fructu confectum, ac prius inspissatum, scabiem jumentorum canumque sanat: pessis, acopis, & ad lepras tollendas accommodatis medicamentis aptè & utiliter admiscetur & sudores quoque cohibet. Galenus in defluvio capillorum Lentiscinum oleum valde commendat, habere namque adstrictionem, sponèque naturæ tale existere quale est ipsum ladanum, quare neque expertum se, neque mente concipere posse ullum præstantius pharmacum ad defluos. Capillos quam quod ex ladanum & lentiscino oleo permixtum constat, oleum hoc ad gingivarum inflammationem summo opere commendat Actuarius, si moderatè calidum ore continetur. Ab Hispanis oleum fructuum lentisci in maximo habetur usu.

Itali lignum Lentiscinum in diarrhœis laudant, & decoctum exinde paratum: transudat nempe ex hoc mastiche: unde in ejus locum decoctum mastiches seu stomachicum nobile in diarrhœis usurpari potest: quod etiam quorundam medicorum fuit secretum. Et null. prax.

Lentisci varietas habetur in hort. Lug. Bat. foliis minoribus & pallidioribus.

De Resina Lentiscina Mastiche dicta.

J. B. Hujus grumi, quales ad nos importati in Officiis habentur Onizæ granum æquant, longè etiam interdum majores, candidi, pellucidi, fragiles, statim sub dente dissiliunt, mox tamen friatura, omnis denique coit continuata masticatione, lentescitque mollitie ceræ (sine adhæisionis ad dentes metu) quam rursus acuit simulac ærem sensit. Prunis injecta flammam concipit, promptius tamen fumat quàm flammescit, contra ac Thus, guttasque assatim destillat, id quod Thuri negatum, odoremque non ingratum spinat, Sapor leviter adstringens cum calore modico.

Olim adulterabatur Thure & Resina Strobilina, sed odore fraus deprehenditur, aut sapore gummi dente lentescens. Scimus (inquit J. B.) inter Mastiches glebas non rarè reperiri glebularum gummi Tragacanthi & Arabici. Præfertur pellucidâ, ceræ Thyrrenicæ candore similis, densior vel plena, acida, friabilis, odorata: viridis minus probatur.

Galenus lib. 2. ad Glauconem Ægyptiacam Mastichen commendat: hoc autem tempore scimus in sola Chio reperiri; ubi Lentisci arbores tali diligentia cura excoluntur, ut non minores in eam rem sumptus fiant quàm apud nos in vinetorum culturam; nec immeritò cum potiores incolarum hujus insulæ opes in Mastiche consistant. Nisi enim diligenti cura colerentur exiguum gummi proventum darent. Mastiches provenus in Chio insula tantus est, ut singulis annis Turcico Imperatori pro 4000. aut 5000. ducatorum pendant, in deductionem ejus summæ quam illi tributum nomine dare debent, i. e. 12000. ducatorum; singulas centenarum libras 105. ducatis æstimant. Quicquid ejus superest sibi reservant. Mercatores Gal-

li Mastiches pretium idem perpetuo esse considerantes, existimant atque etiam referunt incolas collecta ejus certa quantitate reliquum abicere. Sed falluntur. Nam, uti diximus, magnæ impensæ in lentisci fructibus colendis & curandis faciendæ. Quia vero Turcico Imperatori singulis annis pro quatuor aut plurimum, nullum ducatorum aestimatione pendunt, ejus pretium vel augere vel imminuere non licet. Bellonius observ.

D. Thevenot Peregrinat. part. 1. p. 95. mira nobis de lentiscis in Chio cultis narrat, nimirum tortuosas eas esse Vitium instar, & humi provolvi, seu per teram repere. Reptantes hasce arbores mensibus Augusto & Septembri compungunt, eque foraminibus in cortice factis Mastiche exsudat, & in terram defluit, ubi in frustula plana indurecit; Hæc indigena colligunt, & in cribro ad id comparato (à rangurg & ere) agitant, ut pulvis separetur, qui operariorum faciei adeo pertinaciter adhæret, ut absque oleo elui nequeat. Vingt duo in Insula pagi sunt quorum agri lentiscis confiti, ut numerus arborum per annos simul cultarum sit circiter 100000. pro quibus annuatim Turcarum Imperatori pendunt 300. Mastiches cistas, quæ simul efficiunt 27000. Oquas singulis cistis nonaginta oquis attributis. Oqua autem unica 400. drachmas continet.

Vindemiæ (si ita loqui liceat) tempore omnes insulæ aditus vigili cura custodiunt & observant, ne quis Mastichen suffuratus effugere possit. Quicumque autem deprehensus fuerit istius criminis reus ad extremes illico ablegatur.

Matthiolus etiam Mastichen ex arboribus defluentem in terra circumpavita concrescere scribit. Mulctantur autem inquit, sedâ manu qui lentiscum Mastichen fundentem in proprio vel alieno agro exciderint.

Mastiche pota sanguinis rejectioni & veteri tussi utiliter adhibetur. Stomachô quoque est utilis, ructumque movet; additur etiam in dentifriciâ & faciei illitus: quippe quæ nitorem cuti conciliat. Quin & pilos oculorum fluentes glutinat & cohibet. Commanducata oris halitum commendat, gingivæque contrahit.

Oleum unguentumve à Veteribus è Mastiche Chia confici solitum est. Modus præparandi duplex extrat alter simplex, alter compositus. Prior, Mastiches ℥ij. in olei Sesamini sextario coquantur in vase duplici. Alter, Mastiches ℥ij. Vini boni albi ℥iv. alii viij. Ol. ros. ℥j. in vase duplici coquantur ad vini consumptionem. Cerebrum, nervos, juncturas, ventriculû, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat. Posterius hodiè ferè tantum est in usu, quod præstantius est priores I. B.

Ad omnem ventriculi dolorem (ut refert Matthiolus) vomitum & nauseam magni faciunt hoc remedium Alfarabius & Matthæus de Gradi. ℥. vitellum ovi n. i. Mellis despumati cochl. ij. Mastiches gr. xv. Contrita & commista indantur testæ magni ovi Anserini si haberi possit, & in calidis cineribus assentur. Ad dolores ventriculi topicum.

In pulverem redigitur Mastiche inspergendum linteo aut alutæ, quæ calefacta imposita ventriculo vomitum & dolorem compescit. Vel ℥. panem tostum, ferè subtilissimè, cui admisce Mastiches ℥ij. Sacculo immissa & calefacta ventriculo imponentur. Contra omne alvi profluvium, præcipuè verò hypercatharsin. Cingitur atq. dissimè, mox prunis injecto pulvere ex æqualibus partibus Mastiches & Thuris suffumano excipito, exemplo sistit. Egregium & probatum ad inveteratum coxendicis dolorem. ℥. Myrhæ & Mastiches ana part. æquales contrita coquantur in oleo Chamælino. Eo calido inungatur locus dolens. Emplastrum ad arthritidem à frigida causa.

℥. Mastich, Cymini, Puleg. Saly. Bacc, Lauri ana

partes æquales. Subacta cum melle calidè applicentur. Hæc è I. B.

Coquitur ℥ss. Mastiches in aquæ ℥biiij. vel iv. & datur pro potu ordinario in Diarrhæa. Schroderus.

Extensæ super alutam Mastiches frequens usus est in defluxionibus ad dentes, temporibus applicitâ alutâ. Cum enim in vasis cutaneis ferè est materia, ipsa quidem intercipitur, vasa autem clauduntur. In istis dem malis frequentatur suffumgium, præcipuè si non succedat affixio, & argumentum præbeat de via intrinseca. Cap. Hofmannus.

Cæterum Chineses tam viri quàm fæminæ & pueri Mastichen ferè semper in ore habent, ad roborandos dentes & gingivas, necnon ad halitum oris emendandum. Panibus etiam & biscoctis immiscere & in coquere solent, ad eos gustus delicatior reddendos.

Summa Mastiche in omnibus affectibus in quibus adstrichione opus est, præ aliis medicamentis commendatur. Joh. Raius in Histor. Plantar.

LEO.

Leo, Gallicè Lion. Fæmina Leona dicitur. Est autem Leo omnium consensu Animal generosissimum, fortissimumque & Ferarum princeps, capite crasso fronte quadrata. Verum capitis magnitudo carnis musculosæ quæ tegitur copiæ, & ossium quæ maxillas seu gingivas componunt magnitudini debetur, ut Parisienses observant. Pectore robusto & metaphrenolato. At Parisienses affirmant Sternum valdè compressum & acuminatum esse, etiam magis quàm in Equo aut Cane, largum videri ob pilos longos & densos illud undique cingentes.

Collum ei riger, verum non (ut volunt Aristoteles & Alianus) unico simplici & in discreto osse constat, sed vertebris distinguitur. Parisienses tamen spinosas apophyses vertebrarum colli longiores esse, & ligamenti tam duris & fortibus invicem colligatas ajunt, ut unicum os esse videantur.

Ossa medullosa sunt & minimè solida, ut nonnulli prodiderunt.

Quod lingua admodum aspera & aculeata sit, Felinæ instar copiâ mucronum instructa, excepto ejus apice, omnes consentiunt; nobis etiam & viuis & tactus confirmavit. Mucrones hosce ab basin concavos esse, & gulam versùs incurvos tradunt Parisienses.

Cor, omnium consensu, pro Animalis magnitudine amplissimum: unde falsi convincitur vulgaris illa traditio, cor magnum timidi Animalis signum esse. Plinius Leones in corporis vaginas ungues condere, ne mucrones incellu refringantur hebetenturve scribit. Parisienses id negant, verum experientia nostra in Leone juvene, admodum mansueto, quem propriis manibus tractavimus. Plinio suffragatur; & Cl. Vir. Tho. Bartholinus idem affirmat. Quin & ipsi Parisienses in alio Leone idem in parte experti sunt.

Epar Felini in modum in plures lobos, septem nimirum vel octo dividitur: quod & plerisque rapacibus Animalibus carne victitantibus commune est. Retro mingit, & coit eodem modo quo Cameli & Lepores.

Aspera arteria vel bubulâ amplior, teste Ol. Borrichio, aliis etiam de magnitudine consentientibus, unde rugitus ille Leonem formidabilis procedit. Tho. Bartholinus & Parisienses in primo ab illis dissecto Leone cartilagine annulares ex quibus componitur omnes integros circulos fuisse observarunt. Verum Ol. Borrichius & ipsi etiam Parisienses in Leone à se postea dissecto eas imperfectas fuisse, & arteriam postica parte, qua vicina erat œsophago, tantum membranaceam esse compererunt. Singulare esse videtur

videtur quod in hoc Animali *Th. Bartholino*, sed præcipuè *Borrighio* observantibus, primi asperæ Arteriæ annuli cartilaginei, à capite numerando usque ad octavum vel nonum non distinguebantur propriè membrana intermedia, sed squamatim imbricatimve sibi incumbabant, ut solet tectum inferni Lapide scissili, id quod ad robur vocis non parùm conferre creditum.

Musculi temporales vastissimi, ac fermè circa futuram sagittalem se invicem attingentes, ad dentium robur.

Cerebrum proportionè corporis minimum & tamen mira in Animali se produnt indicia iudicii ac rationis: unde Parisiensibus iudicatum, quòd paucitas cerebri sit potius signum & causa indolis ferinæ & crudelis, quàm defectus acuminis.

Colon & vicina intestina ossibus ante deglutitis hinc inde referta *Borrighio* observatum: unde cibi dissolutionem non in ventriculo tantum, sed etiam in intestinis fieri colligit.

Nos etiam in *Rata* piscis intestinis testarum & ossium particulas & fragmenta nondum dissoluta invenimus; in recto a. intest. propè anum nulla: quo *Borrighii* observatio confirmatur.

Digitus Leonis in anterioribus pedibus quinque, in posterioribus quatuor. Leenam, juba quæ caret & binæ in ventre mammae à mari distinguunt. Longitudo Leonis valdè etiam juvenis à Parisiensibus dimensi à summis naribus ad initium caudæ pedum erat 7¹. altitudo à medio dorso ad terram pedum 4¹. In *Asia* & *Asia* plurimi inveniuntur leones, in *Europa* paucissimi aut nulli. Neapoli in Italia, leona una cum leone in eadem cavea inclusa & nutrita quinque catulos peperit & educavit. *D. Willughby*. At qui potuit 5. catulos lactare si duas tantum mammas habuit. *Raius* in *Synopsi Animal Quadrupedum*.

Hactenus de Leonis descriptione, jam de Medicamentis ex eodem animali agendum venit.

Leo exhibet 1. Pinguedinem ad coitum proficuum priapo inunctam.

2. Stercus, Antiepilepticum, ex quo etiam paratur Spiritus ad 33. exhibendus, ingrediens Magnatibus familiarem compositionem.

3. Cruor exiccatus in Vino haustus Epilepsiam tollit. Hujus tamen Spiritus & Sal Volatile efficaciora sunt. *Schroderus*.

Leonis hoc loco facienda est etiam mentio, nec hic sicco pede est prætereundus.

Est autem Animal ferocissimum ac callidissimum, brutorum animantium veluti Rex, certo tempore coiens.

Datur Mas & Fœmina,

Partes Medicinales sunt.

1. Cruor 2. Cerebrum 3. Pulmones. 4. Jecur. 6. Fel. 7. Stercus.

Cruor in furno exiccatus & exhibitus cum vini haustu contrà epilepsiam mira præstat; cujus tamen spiritus & sal volatile in expugnando caduci miasmate majoris sunt energiae.

Ex Cerebro etiam spiritus, Sal volatile & oleum destillari potest magnarum in epilepsia, peste, & suffocatione uterina virium.

Pulmones exsiccati pulmonum exulcerationi adeoque phthisi opitulantur.

Ex Corde Aqua destillatur Cordialis ad modum Aquæ de Corde cervi additis aliis aromatibus.

Jecur exsiccatum prodest cachecticis, hydropicis &c. Fel humanum & aliorum etiam animalium sale volatili oleoso constare plurimi modernorum curiosorum Naturæ interpretum constanter defendunt, ducti manuali experientiâ; Si spiritum, inquiunt Vitrioli aut

Sulphuris cum felle bubulo committas, sale urinoso nativo illud ipsum præmans esse, illico pugna & ebullitio evincet, quæ longè incitator fuerit, si aquam causticam bili permiscueris, adeò ut illico sequatur turbatio, & spuma alba in sublime attollatur. Hinc colligunt, sale volatili oleoso fel turgidum esse, quemadmodum etiam apparet in sale volatili Tartari oleoso, huic si spiritum acidum Vitrioli vel Sulphuris affundas, illud ipsum effervesce & quasi ebullire. Verum satis mirari nequeo, tantæ existimationis viros tanta sæpe pro veritate somnia venditare, cæteroquin ludibria; Ridet Natura, fidem pro sensu notis ex somno poscere & pudenda commenta pro veritate docere. Fel enim non oleosus nec salsus, verum gummosus aqueus liquor est, difficile cum resinosis, facile autem cum aqueis associandus; Et si vulcani examini committimus, deprehendimus, nil nisi aquam præbere insipidam, nullum oleum, nullum sal volatile, relicta in fundo scorii absque ullo salis fixi vel volatilis aut olei indicio. Neque oculato testimonio verum est spiritum Vitrioli vel sulphuris acidum, aut Vam causticam et nuptam ebullitionem aut ullam spumam concitare, sed dicta acida salia felli commista illud prius eminere faciunt, postmodum invicem concussa præcipitantur, ex quâ præcipitatione viridis emergit color instar succi alicujus herbæ viridis, nulla hic in conspectum venit ebullitio, nec ulla (spuma) in fundo præcipitatur succus quidam albus instar chyli. Ex phænomeno patescit, quid de succi pancreatici acidi, ut volunt, cum bile fermentatione judicandum sit, dum & ipse sæpè insipidus interdum, modo acidus, modo salsus, modo acido-salsus repertus, Nos adhuc de vero ejus ac genuino ortu ac usu ambiguos tenet.

Stercus in patris difficultate ex Leone fœmina fœtum jam enixa exceptum non solum per se exsiccatum mira præstat in forma pulveris adsumptum, sed & ad epilepsiam. Spiritus exinde paratur tam simplex, quàm compositus Ant-epilepticus, seq m.

Rec. cinerem cornicis ex nido extract. Turturum unum ustum. Cranii humani combust. ʒi. gran. tilia ʒij. stercor. Leonis ʒß. Hæc seorsim per se in singularibus cucurbitis perfundantur (sp. vini) ad 3. digit. eminentiam. Stentin vasis clausis in digestionem per triduum, aut si una infusio non sufficit, fiant plures. Postmodum adde tantum vini Malvatici, quantum, Aqua vitæ extract. Sacchar. cand. ʒ. v. reponere in vase vitreo oprimè munito.

N. Hæc Animalium ustio rudis potius eorum destructio, quàm Philosophica præparatio jure appellanda est, unde tanquam inutilis rejicienda, qua dicta animalia omni sua virtute Medicinali castrantur & in terram mortuam ac effectam rediguntur. Si quid virium ex hoc emanat, à stercore Leonis solum provenit; Salia animalium volatilis cum sale volatili stercoris Leonis mixta & in Essentiam redacta altioris sunt indaginis. *Hofmannus*.

LEONTICA, vid. *Cacalia*.

LEONTOPODIUM, vid. *Alchimilla*.

LEPIDIUM.

Λεπίδιον Dioscoridi lib. 2. c. 205. sic dictum quod *λεπίδας* seu squamas & maculas faciei delear, vel *λεπίδες*, id est, *ἐκδέρπειν*, quod sua acrimonia urenti ulceret, excoriet, eaque facultate vel ferro notas fronti Servorum inustas delear, de quo forsan Columella lib. 10. Lepidium Plin. lib. 20. c. 17. l. B.

Lepidii nota generica sunt folia integra magna, flosculi parvi albi. Silique itidem patvæ, sapor & odor piperis, & in vulgari specie radix reptatrix.

Nomina. Lepidium latifolium *C.B.* Lep. Pauli *I.B.* piperitis sive Lepidium vulgare *Park.* Raphanus Sylvestris officinarum, Lepidium *Eginetæ* Lobelio. *Ger.* Radix

Radix digitali crassitudine & major, alba gustu acri & calido, sed qui subito evanescit, sub terra reptat. Caules emittit plures, bicubitales, teretes, læves, medulla farctos, ramosos, minimo digito minores, glauco quodam polline, qui facile detergi potest obductos, folia longa, lata, in acutum desinentia, mali citriæ similia, sed sæpius majora, glabra pinguis, obscurius virentia, alternatim adnata, per margines ferrata, quæ radice exeunt & in imo Caule sunt, pediculis longis suffulta, floiculi in summis Catilibus & ramulis pro plantæ proportionem minimi, tetrapetali, albi, conferti & copiosi, pediculis tenuissimis insident, quas excipiunt valcula seminalia minutissime, compressa, apice acuto, semina continentia.

Reptatu suo hortulanis invisæ est, semen autem ad maturitatem raro perducit, ad fluviorum ripas sed rarius apud nos provenit: ut v. g. prope Pontem Hithenlem Colcestriæ, necnon Camaloduni, ad pontem Heybridge dictum copiose & alibi propè Fulbridge.

Nomina 2. *Lepidium glastifolium* C. B. *Lepidium* non repens I. B. *Lepidium* aantum Lob. Ger. Park. Sed perpetam.

Moriss. Radix fibrata, ex qua folia oriuntur, primum palmaria & sesquipalmaria, angustiore principio penes pediculum sextantalem aut quadrantalem, sensim dilatata aut ternas circiter uncias, sensim denud in obtusum mucronem desinentia, nullis per ambitum crenis dentata, sapore Lepidii fervido. Caulem profert bicubitalem & altiore aliaquando, qui superne in multos ramusculos finditur, floiculis onustus plurimis albidis, majoribus multo quam sint procedentis flores, quos sequuntur filiculae rotundæ, planæ, bifidæ, membranæ per maturitatem pellucidæ & alba disseptæ, semina pluvima, subrusta continentia, sapore acri Thlaspeos æmula, folia inferiora glauca, glasti foliorum colore & glabritiæ æmula, superiora, caulibus alternatim aut nullo ordine adnascentia, perquam angusta & tenuia.

Quamvis annum dicatur Lob. & aliis radix tamen hyemem perfert interdum, & in plures annos durat, etiam postquam semen perfectum dederit.

In agris prope Ratishonam in Germania observavimus copiosa enatum. Verum quam ibidem collegimus planta capsulas habuit numerosissimas, perexiguas, sphericas, monospermas, unico in singulis semine ruffo: unde specie ab hac diversa sit oportet.

Nomina 3. *Lepidium Dioscoridis Zanonii* maximum Chalapente Moriss. Radicem demittit satis crassam, longitudine circiter palmari, albam, rupu difficilem, superius viridem & asperam, plurimis radiculis longis, rotundis, a majore hac exeuntibus, quæ huc illuc rependo alias plantas producant, more lepidii vulgaris, quibus undique scatere conspicitur locus in quo plantatur, ut difficulter inde erui & penitus eximi possit. Caulem edit simplicem aut aliquando duplicem rotundum lævem, lucidè virentem, qui in pingui solo proveniens superat cubitalem altitudinem, ex cujus singulis geniculis exiliunt folia caulem ambientia quemadmodum fit in Lepidio vulgari, sed laurinis foliis similia in summis caulibus ramatum prodeunt flores tetrapetali, albidis, cum flaminulis & apice in medio, quibus flavescentibus totidem succedunt capsulae rotundæ, bivalves, includentes in se semina ruffa, nasturtii vulgaris similibus minora.

Sapor hujus plantæ acrior est quam lepidii vulgaris, ac proinde potentius remedium est contra dolorem ischiadicum, lepram & dolorem splenis.

Floret æstate: semina Chalepo transmissa sunt a D. Rob. Huntington.

Pres. Vis foliorum acris est & exsiccans (inquit Dioscorides) quapropter vitæ Herba ischiadicis

præsentissimum est auxilium, si cum Helenii radice quatuor horis illinatur, lienosis simili modo prodest, lepras eximit. Radix appensa collo (adalligata brachio Plin.) dolore dentium liberare existimatur.

Mulierculæ nostrates Buriæ seu S. Edmundi burgi in Suffolcia, referente Parkinsono, ad partum faciendum decoctum in cerevisia propinant Joh. Rain in Hist. Plantar.

LEPUS ac LEPORINUM GENUS.

Lepus, Λαγός Græcis. *The Hare*. Notissimo Animalis describendo non est cur immoremur. Pedes posteriores prioribus multo longiores habet, & musculis validissimis instructos, ad fugam & cursus velocitatem a natura factos: Caput breve & subrotundum, labium superius in medio fissum: oculos extantes, ut radios etiam a postica parte venientes accipiant, quibus apertis dormire dicitur; Auriculas longas mobiles, ad sonum vel levissimum percipiendum. Solitarii sunt, & totos dies immoti sedent, inter noctu pabulantur.

Oesophagus Leporis ut & Cuniculi medio ventriculo inseritur. Intestini cæci & magnitudo & conformatio mira, ulnam ferè longum, duos aut tres digitos transversos in principio latum: Extremitas ejus ad 8. digitorum longitudinem, amplitudine Indicis, vasa sanguinea admodum conspicua monstrat, ipsaque substantia ex glandulis rotundis conflata videtur, e quorum foraminulis, appendice foris pressa, prodiit liquor albus, turbidus. Cæcum reliquum tenue & transparent, quamvis primo aspectu valvulas multas conniventes habere videatur, inflatum tamen unam & simplicem valvam seu laminam ostendit perpendiculariter extensam a circuitu intestini, & curiosissimè spirali ter cochleæ in modum circumvolutam, ab extremo ad extremum per totam Intestini longitudinem ductum. Lepores albi Patavii frequentes sunt, in montibus vicinis capti: Auriculae duntaxat anteriùs cineræ sunt, & extremitatibus nigræ.

CUNICULUS, Λαγώς, *A Rabbit or Cony*. Quod ad figuram corporis externam in omnibus ferè cum Lepore convenit, magnitudine excepta, qua illi cedit. Carnis tamen colore albo ab eo differt, & proprietate foramina, cuniculos inde dicta, in terra effodendi. Partibus internis non minùs quam externis Leporem refert.

Wepferus in Lepore famella in perineo sinus duos laterales reperit, in quibus substantia quasi cerea continebatur, quæ in compendio omnem nidorem Leporis in se continebat, & acri foetore nares pupugit: in sinum utrinque exercebatur ex glandula conglomerata dura, in apice ostiolo prædita: nam illa pressa exibat similis substantia. Non ergo solis Animalibus carnivoris concessi sunt folliculi odoriferi. Eosdem sinus & glandulas observavit D. Willughby, substantiam foetidam, aurium cerumini similem continentem.

Cuniculus Brasiliensis PATETI dictus. Figuræ est nostratis, dupla magnitudine Gliris: pilis & colore ut Lepus, sed paulò fuscior: auribus longis ut nostrates Cuniculi. In fronte rufescit paulum, sub gutture non nihil albicat, & circulum album habet circa collum: quidam tamen illo carent, & tantum sub gutture, pectore & ventre parùm albicant: nullam habet caudam; barbam ut nostrates cuniculi, oculos nigros. Caro comeditur. *Mareg.*

Cuniculus Brasiliensis APEREA dictus *Mareg.* Inter murem & cuniculum ambigere videtur. Auriculas habet murinas breves & subrotundas, cætera leporis. Pedalis est longitudine, crassitie 7. digitorum. Pilorum color leporinus, in ventro tamen albicat, labio lino, dentibus, barba, cum Lepore con-

convenit, & ut Lepus incedit; nam posteriora crura ad suffragines usque callo sunt obducta. Crura priora tres circiter digitos longa, posteriora paulo longiora. Pedes anteriores in 4. digitos fissi, cute nigra, & unguibus parvis non prominentibus; posteriores in tres, medio longissimo. caret caudâ. Caput paulo acutius Leporino. Caro Cuniculi. Vivit & habitat ut ille.

HISTRIX, The Porcupine. Spinosa Italis. Romæ apud Ornithopolas venalem vidimus, integrum, verum exenteratum, in montibus vicinis (ut nobis retulerunt) captum; & pretio satis vilis emimus, inque hunc modum descripsimus.

Figura corporis taxum refert. Ponderabat 23. libras Romanas, visceribus & interaneis exemptis. Longitudo à summo rostro ad extemam caudam duorum plus pedum erat. (Quem metiebantur Parisienses à naribus ad ultimos pedes 18. tantum digitotum erat.) Totum corpus setis vestiebatur, quatum color in scapulis, cruribus, lateribus, inque toto ventre niger erat; in medio dorso, lumbis, clunibus, & cauda ubi spinæ s. calami oriuntur, varius ex albo & nigro.

[Consistentiâ, figurâ & colore setas Porcinas referebant, unde & nomen Animali inditum Hystrix, quasi ὅς ὀπίς]

Collum ei breve, caput crassum, Rostrum obtusum; Nares amplissimæ, non tamen patulæ, sed rima transversa apertæ. Labium superius in medio fissum Leporini instar. Circa & supra nares setas complures habet, nigras, longissimas, veluti Felis aut Mus. In extremo utriusque maxillæ binos habet dentes prælongos, validos, introrsum incurvatos, oblique scissis & forficum more ad incidendum aptatis, non planis extremitatibus concurrentes. Molares in utralibet maxilla octo. Oculi pro corporis magnitudine exigui, iridibus cæruleis: (Canthus major s. interior præter aliorum Animalium normam, minore multo superius situs) *Auricula* (quod notatu dignissimum est) humanis persimiles; circa quas pili cinerei, & molliores quàm in reliquo corpore, excepta maxilla inferiore, in qua lanugo mollis est. In summo capite perque totum collum ad scapulas usque cristam seu jubam erectam obtinet setarum longissimarum (8. circiter unciarum) partim nigrarum, partim albarum, partim ex albo & nigro variarum. *Crura* brevia sunt, digiti in pedibus posterioribus 5. manifesti, *unguibus*, non admodum acutis, & superficie inferiore ad apices concavis. In pedibus anterioribus 4. tantum habet digitos cum suis unguibus, (è quibus extimus maximus est & pollicem æmulator ut in Urso.) Setæ per totum corpus crassæ sunt, in imo compressæ, in tenuem pilum desinentes, pediculo brevi gracili insidentes.

(Spinæ s. calami duum generum, alii firmiores, crassiores, breviores, magisque acuminati, duplici acie ut in subula: alii longiores & flexilliores infirmioresque, pedem longi, acumine compresso. Primum genus ad radicem album, & summa parte obscure castaneum erat: Secundum utraque extremitate album; medio, albo & nigro varium.

Cauda plus palmum longa, spinis horrida, quarum plures habet ordines annulares. In extrema cauda spinarum loco 10. aut 12. habet tubulos, magnitudine spinarum, sed dimidio plus breviores, tenui pediculo nixos, in summo apertos, tennes & prope transparentes.

Hystrix Americanus, *CAUDA* Brasiliensibus *Maregr. Tlaquatzin* spinosum *Hernand.*

Magnitudo Simiæ majoris. Totum corpus cum capite, excepto rostro, imis pedibus, & posteriore caudæ

medietate, munitum est aculeis, 3. aut 4. digitos longis; neque pilos habet. (Ut *Tlaquatzin* pilos albos admixtos habet in modum velleris. *Hernand.*) Flavescunt hi ab initio ad mediam longitudinem, superiore medietate nigra aut brunna, cuspis tamen albicantibus sunt instar pennarum, acuti, & Animal illos potest ejaculari, (qui ita hærent, ut nulla industria aut viribus extrahi possint. *Hernand.*)

Corpus ab occipitio ad initium caudæ pedem 1. Rhynland longum: Cauda ped. 1. & 6. digit. cujus medietas posterior setis raris porcorum similibus tegitur. Auræ parvæ, sub spiculis latitantes; os Leporinum, binis dentibus foras conspicuis; nares patentés, atque idèò ampla & ferè quadrata promuscis: Oculi rotundi, prominentes, fulgidi instar carbonculorum. Barba velut Felina aut Leporina, 4. digitorum. Pedes Simiarum similes, in 4. tantum digitos fissi: unde arbores scandit, sed tardo gressu, quia pollice caret, quamvis locum habeat quasi abscissus esset. Cauda circumvoluta ramo alicui se firmat nè labatur.

Vicitat libenter gallinis; vocem edit ut Sus. Carne est bona & pergrata.

Auriculis, rostri figura, dentibus, facultate spinas ejaculandi (si credere fas sit) cum *Hystrice* convenit. *Aculeorum parvitate, & cavitare; digitorum parvitate in pedibus omnibus numero, caudæ longitudine, facultate arbores scandendi, & victu, ab eodem differt. Mirum autem, carnivorum cum sit hoc Animal, carne esse ipsum laudabili & in cibis accepta*

Qua de aculeorum ejaculatione habet mihi non probantur. Puto Marcgravium vulgi errorem sequutum, nullo experimento facto, calamos ejaculandi facultatem Hystrici tribuisse, quamvis & Parisienses in eodem luto hærent, & veteribus assentiuntur; Spinæ crassiores, breviores, rigidioresque minùs firmiter cuti inhaerere asserentes, adeoque ejus concussionem excuti, & in venatores evibrari posse.

CASTOR sive *Fiber*, *The Beaver.* Longitudo Parisiensibus dimensi à summis naribus ad extremam caudam pedum erat $\frac{1}{2}$, latitudo maxima 12. unciarum: Pondus appensi 30. libras superabat. Nec inferior pondere erat in Rheno captus, & à *Clariss. Wepfero* descriptus. Caput compressum, à naribus ad occiput unc. 5. longum & totidem prope modum latum, unde *ἡρεγγωνοπόσωρον* Herodoto dicitur. Oculi parvi subnigri; Auriculæ minutæ, brevès, rotundæ. Lutrinx, extrorsum pilosæ: Dentes incisores in utralibet maxilla bini, ut in reliquis hujus generis, prominentes, lati, extremitatibus velut oblique sectis ad incidendum, introrsum albi, exterius è flavo pulchrè rubentes; Collum breve, crassum.

Pedes anteriores digitis 5. discretis præditi erant, & unguibus rotundis sed obtusis muniti. Hi manuum usum Animali præstant, ad cibum tenendum & ori admovendum, ut Sciuro. Digitorum proportio & situs, palmæque figura ut in manibus. Posteriorum pedum digiti jungebantur membrana crassa nigra, ut Anserinorum, & obtinebant ungues lutos, nigros, simiarum similes.

Pili quibus totum corpus cauda excepta integebatur duum erant generum invicem tamen commixti utrique, tam longitudine quam colore diversi. Longiores capillorum crassitie, fescunciales circiter, coloris ex rubro nigricantis sed fuligineum tendentis, valde lucidi; substantiæ adeò solidæ erant ut nè microscopio quidem vel minima in eis cavitas potuerit discerni. Breves vix pollicis longitudinem obtinebant, hi etiam & longitudine & mollitie differebant, breviores etenim adeò tennes & molles erant, ut tenuissimæ & mollissimæ plumagini non cederent. Hæc pilorum diversitas & mixtura in Castore, Lutra &

Apro præcipue cernitur, iisque usum præstat necessarium, ad aquam ad cœnum in quo se volutant à corpore defendendum.

Cauda glabra & depilis, nigra, squamosa, ut piscium cutem, referat. *Wepferus* squamosam videri, at non revera esse asserit. At Parisienses epidermide ex squamis pelliculâ junctis composita integri ajunt, & squamas describunt pergamini crassitie, lineam & dimidiam [Parisiens.] longas, & figuræ plerunque hexagonæ irregularis, quæque caudâ pellè nudatâ decidebant, vestigia tamen sua relinquentes alba in cute. Erat autem cauda longa 11. pollices; ab exortu, ubi 3. uncias latitudine non excedebat, ad medium sensim dilatatur, 5. uncias ibidem attingens, exinde paulatim contracta in ovalem figuram terminabatur. Prope exortum 2. propemodum pollices crassa erat; dein secundum longitudinem crassitudo sensim minuebatur, ut in medio pollicem unum non excederet, in extremo ad 5. lineas redigeretur. Margines circumcirca subrotundæ & crassiusculæ erant, multò tamen media parte tenuiores.

Wepferus sub cauda orificium excrementorum seorsim constituit, ut superius sub osse pubis rimam; inquit, in cute integra in pube relicta videbantur duo ostia insignia, superius sub osse pubis est rima, inferius sub cauda podex. At Parisienses tam orificium excrementorum quam exitum urinæ velut communi meatu rima includi ajunt.

Inter hæc ostia [urinæ & excrementorum] in cute depili apparuerunt duo foramina, quæ stylum sed non profundè ad miserunt, &c.

In parte rimæ superiore reconditur penis osseus, sub illò rima, mediante membrana intergerina in duas partes dividitur, quarum quælibet in sinum definit lateralem. Folliculi (Castorei receptacula) quatuor sunt (inquit Schraderus) extra abdomen siti, majores superius, figurâ pyri exsiccati, ligamenti suis ossi pubis annexi, albicante tunica ıvestiti, continentes in se Castoreum siccum Spicci coloris; minores inferius, rubicundis involucris præditi, liquidoque & albicante Castoreo turgentes. Ab utroque folliculorum pari pergebant 4. ductus ad vulvam, in qua eorundem ostiola clarè poterant conspici, limbis membranaceis munita, & extrinsecus oclusa. Horum folliculorum particulares & accuratas descriptiones qui desiderat *Parisienses* & *Wepferum* consulat.

Testiculi sub osse pubis prope castoreum siti; nullis in inguine illic latentium indicijs foris vel visu, vel tactu se monstrantibus: & quamvis Castoreo vicini erant, nulla tamen inter illos & castoreum intercedebat communio sive mediata, sive immediata.

Memorable est quod de ventriculo Castoris observavit *Wepferus*, nimirum in parte sinistra laterali prope orificium superius haberi portiohem rubentem carnosam, palmo longiorem, palmm latam, ovalem, reliquâ tunicâ altiore. Aperto ventriculo intus foramina seu oscula quamplurima in conspectum venerunt, maximam partem rotunda & lentem admittentia, per quæ compresso foris ventriculo exijt mucus albus & gryseus lentus, Castoreum redolens, subsalsus, copiosè. Oscula intus agrè stylum admittebant; foris verò in apice tubulorum inflicto vulnere stylus citra obstaculum per tubulos in cavum ventriculi transit. Remotis membrana tenui nervosa, & crassiore rubicunda, apparent tubulo-

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II,

rum extremitates cæcæ, pulchro ordine sitæ ceu glandulæ conglomeratæ. Pleniorẽ descriptionem videbis apud *Wepferum*. Inservit præculdubio hic mucus alimento solvendo & comminuendo. Quin ad acuendum & excitandum appetitum languentem ajunt Castoreum, folliculo pede expresso, castoreum ore lambere & deglutire; Indosque laqueos quibus utuntur ad Castores capiendos eo oblinere.

Quod ad longitudinem & capacitatem intestini cæci, ejusque appendicem, non multum differt Castor à reliquis hujus generis.

Qui ventriculum dissecuerunt nihil intus invenerunt præter segmenta ex corticibus & radicibus arborum; piscium vel cancrorum nè minimum quidem vestigium, nec contenta pisculenti quidpiam redolebant, ut in *Lutra*.

Foramen ovale in omnibus clausum.

Mira sunt quæ feruntur de ingenio & solertia horum Animalium, quod domos sibi construant inter omnes convenit; easque etiam plurium contignationum bicameratas & tricameratas Alberto.

Castores olim Britannia natos fuisse literarum monumentis constat. Ingeniosissimus vir, & amicus noster singularis D. *Edvardus Lhwyd* Giraldi Cambrensis testimonio id confirmat, qui *Itinerarij Cambria*, lib. 2. cap. 3. ait, *Tervi* solum Cambria fluvium fuisse qui sua ætate Castores retinuit, additque in unico tantum (ut ferebatur) Scotia flumine eorum genus jam tum superfuisse. Verum (inquit) ut Castores in Cambria olim repectos fuisse credam, non tantum Giraldi auctoritate inducor, sed quod nomen eorum antiquum, nimirum *Afange*, quod vocabulum D. *Davies* in Lexico suo Wallico *Fibrum* interpretatur, adhuc supersit, & à vulgò frequentetur, quamvis nunc dierum non eo sensu accipiatur, sed phantasmate: & ipse duos trelve lacus novi qui nomen *Lhynyr afange*, id est, lacus castorei præferunt. Nomen autem *Afange* ab *Afon*, quod fluvium significat, derivatur.

Addit insuper idem D. *Lwyd*. Quod & capreoli quin Cambria etiam incolæ seu indigenæ fuerint, apud Wallos minimè dubium esset. Quinetiam suspicari se, Ursum etiam quondam in hac insula sylvestrem feram fuisse, ob rationem sequentem, nimirum quod inter veteres quasdam leges & consuetudines Britannorum, Antiqua Britannica seu Cambrica lingua manu scriptas, statuta quædam & regulas in venatione observandas invenerit, in quibus continentur; *summam seu præcipua estimationis ferinam esse, Ursi, Leporis & Apri*. Et alibi in eisdem constitutionibus, *E novem quæ venantur ferarum generibus [Games] tria tantum Latrabilia [baitable] esse, Ursum, scandentia [the Climers quo nomine vermineum genus & Sciurum intelligunt] & Phasianum*. Ursus fera latrabilis [baitable] dicitur, quia cum tardigradus sit; nec velociter currere possit, canes eum facile assequuntur, contra quos deinde corpore in clunes erecto aliquandiu se defendit; canes autem initio timidi, nec propius accedere ausi eum allatrant antequam aggrediantur & occidant.

Verum Animalia hæc à Venatoribus tandem ad interectionem usque cæsa, eorumque stirps in Anglia & Wallia penitus extincta est. Ajunt tamen capreolos in Scotia Septentrionalibus etiamnum superesse.

SCIURUS vulgaris. Paulò major est quam mustela, non tamen longior. Color ei in supina

parte, ut capite & dorso rutilus; in prona seu ventre candidus. Reperiuntur tamen alicubi nigri, in Polonia & Russia grisei seu cinerei. Cauda longa villosa, quâ supra dorsum reflexâ se tegit & inumbrat, unde nomen sumpsit.

Clunibus insidens prioribus, pedibus cibum tenet & ori admoveat. Vescitur nucum omni genere & glandibus, verum libentissimè Avellanis, quas æstate congerit & in hyemem recondit, ut pro victu ei inserviant. In arboribus habitat, nidificat & fœtus fovet. Facile autem transilit de ramo in ramum, & aliquando de arbore in arborem.

Mus Ponticus, seu varius Antiquorum censetur.

SCIURUS Virginianus cinereus major, The great grey Virginia Squirrel. Ad Cuniculum vulgarem magnitudine aequat. Nec colore multum differt, est enim griseus. Digiti in anterioribus pedibus 4. in poster. 5.

SCIURUS Zeylanicus pilis in dorso nigricantibus, RUKKALA dictus à sono D. T. Robinson è Museo Leydensi. Variat pilis in dorso griseis.

SCIURUS Americanus volans, The flying Squirrel. Sciuro nostrati quem vidi multò minor erat, colore superne cinereo obscuro seu murino subtus niveo: oculis etiam murinis, nigris & prominentibus; caudâ longâ, planâ & lata seu compressâ. Cutis in lateribus utrinque laxa ab anterioribus pedibus ad posteriores extensa, eisdem annectitur, quâ porrectis pedibus veli instar explicatâ, inter saltandum se promovet, undè & volare dicitur.

In Nova Hispania atque etiam Virginia reperitur. Ad mures potius quam ad Sciuros referenda videtur, pili enim breviores sunt quàm in Sciuro, cauda lata & plana, quam neque in dorsum reflectit, neque in gyrum contorquet ut ille. In commissura colorum pronæ & supinæ partis ærea utrinque linea nigricans cernitur.

SCIURUS Getulus Caij apud Gesnerum, *The Barbary Squirrel.* Coloris est mixti ex rufo & nigro. Eam ab armis ad caudam per latera albæ fuscæque lineæ alternatim certis distinctæ intervallis decentissimè pingunt. Idem aliquibus fit in colore ex albo & nigro, respondentibus etiam in cauda lineis, nisi siquando expansa cauda propter pilorum raritatem eadem dispareant. Venter illi cœlorum colorem imitatur in albo positum. Paulò minor is est vulgari Sciuro, nec aures extantes habet ut ille; sed depressas magis & ferè capiti æquas, orbiculares, & per cutis superficiem deductas in longum. Caput Ranæ ferè est, cætera similis vulgari Sciuro: Nam figura corporis eadem, natura, mos idem & vivendi ratio. Caudâ se contegit more cæterorum Sciurorum.

E Barbaria à mercatore quodam aliquot vivi ad nos allati sunt. Huic eadem nobis videtur *Mustela Africana* Clusij *Exot.* lib. 5. cap. 17. Majoris muris sive Gliris non prorsus adulti magnitudine, corporis formâ Mustelam & Sciurum quodammodo referens. A Sciuro Getulo differt quod caudam quidem attollat, minimè tamen supra caput retorqueat ut Sciurus, sed in latum nonnunquam valdè explicat. Reliqua descriptio cum Sciuri Getuli descriptione satis bene convenit; ut non dubitem idem Animal esse.

Huic similis est Sciurus à *Cl. D. Lyfter* observatus, & sic descriptus; Sciurus è minoribus est, ex ruffis cinereisque pilis ferè ad similitudinem vulgaris Moscovitici coloratur: in medio dor-

so unica linea ex toto nigra; item ad utrumque latus altera, eæque latiusculæ quidem, at multo breviores; earumque etiam mediæ albicant. Huic cauda brevis, corpori concolor, at nigrior, & raris pilis donatus.

MUS domesticus major, sive RATTUS, the Rat. Color ei cinereus obscurus seu fuscus. A mure domestico vulgari seu minore magnitudine præcipuè differt quâ eum quadruplo superat. Cauda longissima, raris pilis obsita, 160. minimum annulis divisa.

MUS major aquaticus, sive Rattus aquaticus. A præcedente differt. 1. Quod multo major sit. 2. Colore magis ruffo seu brunneo. 3. Quod Pedum digiti membranis intercedentibus connexi sint. 4. Quod cauda ei brevior, teres, ubique æqualis & velut abscissa. 5. Dentibus multò longioribus, colore buxæ ut in Sciuris, D. Willughby.

MUS AQUATICUS exoticus Clus. *Exot. auctar.* p. 375, *Worm. Mus. The Muscovy or Musk Rat.* Ratti aut Talpæ erat magnitudine; à capite ad caudam 7. unc. longus; totidem corporis ambitus continebat. Dens & mollibus villis uodique tegebatur, in tergo nigricantibus, in ventre ex albo cinerascens. Caput pro corporis mole satis parvum: rostri pars superior firma, prominula, & pane unciâ longa, nigricans, eâque forma prædita, ut instar Talpæ aut Suis terram evertere posset. Oris hiatus non magnus. Dentes ut in reliquis hujus generis. Oculi valdè exigui & vix conspicui. Rictû, latera longis villis cineracei coloris obsita. Cauda 8. unc. longa, plana, lata, rarissimis brevibusque pilis testâ. Uterque pes anterior 2. fere uncias longus, in 5. digitos acutis unguibus armatos divisus: posteriores paulò longiores & magis pleni: Digiti majores membranis connexi ad commodius natandum.

Ex Russia adferuntur, & odorem musci reddunt, quamvis neget se id observasse Clusius. Fortè in pelle Clusiana folliculi odoriferi amputati erant.

Mus domesticus vulgaris seu minor, The Mouse. Color in dorso ex fusco cinerascens quem murinum vocant; venter nonnihil albet. Oculi magni extantes. Cæcum ingens. Claviculis donatur.

MUS domesticus medius. Hic præcedente major est, colore etiam differt, nam in dorso tincturam quandam ruffi flavicantis habet: venter & pars prona tota albicat: acrius etiam mordet quam ille: nam unius diei spatio asserem quernum digitum propemodum crassum rodendo perforavit. *Thomas Willifellus* hujus (ut puto) generis in agris reperit. Color in dorso niger fulvo mixtus, in ventre albus; Colores linea per utrumque latus ducta terminat. Caput longius quàm in mure domestico minore vulgari, oculorum orbitæ ut & oculi majores & prominentiores; Auriculæ latiores & rotundiores. Cauda longa pilis rarioribus, superne nigris, subtus albicantibus vestita: Pedes longiores, sex tubercula in planta. Quem describo è nido subterraneo exemplum erit.

Mus agrestis capite grandi, brachyuros. Mure domestico minore major est, Corpore longiore, capite grandi; rostro brevi obtuso; oculis parvis nec prominentibus; auriculis brevibus, latis, subrotundis, in Furra s. pilis, (qui longiores sunt quàm in domestico, minore) penè occultatis. Cauda ut in hoc genere brevissima, ut quæ pol-

pollicarem longitudinem non multum superet, pilis quam in Ratto crebrioribus non tamen densis vestita. Crura perbrevia. Color pilorum in dorso obcurior quam Maris domestici min. è nigricante & sordide luteo mixtus; in ventre plumbeus, apicibus pilorum albicantibus, fundo nigro.

Ob crassitiem capitis & colli scapularumque, & brevitatem caudæ insignis est. In paucis indicat.

Georg. Agricola horum meminisse videtur his verbis, Minoribus agrestium brevis est cauda.

Mus agrestis major, macronos. Gesn. Non multo minor est ratto, quin caudam ut ille longam habet ac crassam. *Georg. Agricola* Auriculis est rotundis, capite magno rotundo, nec eminente rostro, colore fusco, ad latera ruffo; barbâ medio inter os & oculos loco rigente. De hac specie mihi non undequa- que satisfactum.

Mus Avellanarum major, Sorex Plinij, Gesn. *The greater Dormouse or Sleeper.* Magnitudo & forma Ratti erat, (describente Gesnero) color murinus per tergum & latera, magis ruffus, præsertim in capite; Auricula magnæ, glabræ; Venter candidus, & eodem colore crura, & cauda parte inferiore extremitatem versus. Nares & pedes rubicundi; Cauda tota hirsuta, & qua desinit albis densisque villis condita; Oculi majusculi, eminentes, nigerrimi, ita ut nihil ferè candidi in ijs appareat; barba partim alba, partim nigra. Color niger infra supraque aures & circa oculos, & in posteriori parte caudæ superioris. Odor in hoc genere & excrementa ita se habent ut in domesticis muribus. Posteriorum crurum pars averfa à suffragine per totam tibiam ad extremos unguiculis glabra est.

In terra cavernas fodit, in quas nuces Avellanas optimas congerit. Tota hyeme à fine Autumni ad veris usque initium dormire Rustici aliquot fide digni Gesnero affirmant. At ego de eorum fide dubito. Plinius tamen Sorici hyemem dormiendo transigi scribit. Eodem victu utitur *Mus Avellanarum minor*.

Mus Avellanarum Minor, Angl. The Dormouse or Sleeper. Muris domestici minoris magnitudinem non excedit. Genus illud quod in Italia vidimus dorso, capite & supina parte tota, excepto caudæ apice, ruffa erat; prona, exceptâ caudâ, alba. Cauda autem pilis longis densis vestita, ferè ut Sciuri. Oculi nigerrimi, splendidi, protuberantes. Qui apud nos in Anglia inveniuntur non æquè ac Italici in dorso rubent, neque sub ventre alben; sed tantum sub guttore; at neque extremitas caudæ albet. Forte species differunt Italici & nostrates. Plurimum dormit per hyemem, non tamen semper: nec ei pro cibo somnus est, ut rectè *Georg. Agricola*, sed provisum pabulum.

Mus Noricus vel Citillus Gesn. In terræ cavernis habitat. Ei corpus ut Mustelæ domesticæ longum & tenue. Cauda admodum brevis. Color pilis, ut Cuniculorum quorundam pilis cinereus sed dilutior. [Gesnerus in pellibus colorem fuscum ex cinereo ferè observavit.] Sicut Talpa, carer auribus, sed non caret foraminibus quibus sonum ut Avis recipit. Dentes habet muris dentium similes. Ex huius etiam pellibus, quamvis non sint pretiosæ, vestes solent confici. *Agricola.* Complures in uno cavo reperiuntur ajunt, cum magna Avellanarum Castanearumque copia in cibo delicati habentur.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

In Bohemia, Austria & Hungaria inveniuntur.

Cricetus Gesn. Major paulò quam domestica mustela existit. [Ratto paulò major, cuniculo minor.] Pedes habet admodum breves. Pilis in dorso color est ferè Leporis, in ventre niger, in lateribus rutilus. Sed utrumque latus maculis albis tribus numero distinguitur. Suprema capitis pars, ut etiam cervix, eundem quem dorsum habet colorem: tempora rutila sunt, guttur est candidum: Cauda, quæ palmum longa est, similiter leporis color. Pili autem sic inhaerent cuti, ut hæc facilius à carne avellatur, quam pili ex ea radicitus extrahantur. Atque ob hanc causam & varietatem pellis ejus sunt pretiosæ. Animal est iracundum & mordax; adeò ut si eum eques incautè persequatur, soleat proficillire & os Equi appetere, & si prehenderit mordicus, tenere. In cavernis habitat non aliter atque Cuniculus, sed angustis, in quos multa frumenti grana congerit. Vorax est & pinguescit admodum. In posteriores pedes cum erigitur colore & habitu Ursi refert, unde *Gelenio* *Arctomys Palæstinorum* censetur.

Dentes habet in anterioris oris ima supremâque parte binos, unde patet murium generi adscribendum esse. Mâlas laxas & amplas importando exportandoque replet, ambabus mandit. Pedibus anterioribus pro manibus utitur ut Sciurus. De moribus, ingenio, &c. *Georg. Fabricius* apud Gesnerum multa, quæ vide. In Turingia & Misnia reperitur.

Mus Alpinus Plin. MARMOTA Italica. Muri Alpino (describente Gesnero, qui eum domi aluit) magnitudo ferè leporis est, aut varius inter cuniculum & Leporem: Fere corpulentior est, sed brevior cruribus. Species ac figura muris, ex qua Mus dicitur: pilis durioribus quam cuniculus, colore ut plurimum ruffo, qui in alijs clarior, in alijs obscurior & fuscus est: [Caudæ tamen extremum nigricat.] Magnis oculis, prominentibus media magnitudine. Auriculas mutilas & quasi decurtatas habet. Priores dentes supra infraque binos ut Sciurus, & longos acuosque habet, Fibriis ferè similes, subflavos. Circa nasum & labra superiora nigra ei & asperæ setæ rigent, tanquam Feli. Longitudo caudæ duo palmi & amplius. Crura brevia crassa, & villis superius referta: quibus & venter imus densis ac longis munitur. Dignitatem pedum Ursinis similes: Ungues longi nigri, quibus altè effodit terram. Posterioribus pedibus non secus ac ursus uti solet, ac interdum ingredi bipes. Dorsum præpingue habet, cum cæteræ corporis partes sint macræ, quanquam hæc verè nec pinguitudo, nec caro dici potest: sed ut mammillarum caro in bubus, inter eas est medium quiddam. In quem usum? An ad frigus defendendum?

Si quando inter se colludunt, ut catelli clamorem faciunt. Cæterum cum irascuntur, vel tempestatis mutationem denuntiant, argutissimam vocem, fistulæ acutæ & aures lædenti similem, edunt. Fructibus & radicibus herbisque vescuntur, cupide verò lacte, butyro & caseo, ut mures. In clunibus residens, cibum prioribus pedibus sumens & ori admovent, mandit, ut Sciurus. Per hyemem in cavernis quas sibi fodit delitescit, & multum dormit; sceno, stramine, samentis cubili strato, ut mollius & calidiùs cubet. De artificiosa foraminum constructione *Gesnerum* consule.

Nonnisi in altissimis Alpium & circa ipsos vertices nascitur.

Ex feris nostri orbis vix ullam reperias quæ adeo mansueta & familiaris homini reddatur : sic cicuratus canes odit, eosque graviter, sæpe mordet.

In planitie non admodum velox est, ut homo eum currendo assqui possit.

Cruribus & digitis est robustissimis, & celeriter fodit, ita ut existimetur fodiendo etiam subterfugere hominem ejus capiendi gratiâ fodientem. Si dormi alantur, multum sæpe damni inferunt, pannis aliisque rebus arrosis.

Plura de ejus moribus & capiendi modo vide apud *Gesnerum*.

Hildanus pinguedinis copiam observatu dignam putavit : inter pellem & musculos $\frac{1}{2}$ in ipso vero abdomine ad $\frac{1}{2}$ collegit ; ejus usum esse ad animal dum hyeme in cavernis profundissimis montium dormit nutriendum existimat ; qui enim verno tempore capiuntur macilentos esse venatores referunt.

Quæ de hoc Animalihabet *Jacobus Harderus* vide *Ephemer. German. Ann. 14. Observ. 121.*

Mus seu *Cuniculus Americanus & Guineensis*, *Porcelli pilis & voce*, *CAVIA COBAYA* Brasiliensibus dictus *Marcgr.* Cuniculus sive Porcellus Indicus *Gesn. The Guiny Pig.* Cuniculo minor est, & corpore breviori pleniorque. Auriculæ humiles, tenues, pellucidæ, patulæ, subrotundæ, glabræ fere. Glirium auribus non dissimiles, eæque recens natis haud multo minores quàm adultis. Rostrum leporinum, ut & barba : Labium superius cuniculi instar, versus nares hunc cernitur. Cauda nulla. Dentes ut in muribus. Pilis porcellum refert, vox etiam porcellorum grunnitum imitatur, unde nostratibus *Guiny Pig*, i. e. Porcellus Guineensis dicitur. Color alijs alius : vidi (inquit *Gesnerus*) totos albos, & totos rufos, & ex albo & ruffo varios, qui apud nos frequentissimi. Anteriores pedes quaternis digitis donantur, posteriores ternis tantum, eorumque medius longior est reliquis, non a. senos anterioribus & quinos posterioribus habent, uti *Gesnerus* & *Aldrovandus* voluerunt. Pedibus anterioribus os & caput scabit ut Cuniculi solent, & horum quoque more pedibus posterioribus insidet, ideòque crura ad suffraginem usque callo obdusta sunt, quemadmodum & pedes. Haud subsultim tamen incedit ; sed alternato pedum gressu porcorum ritu. [Super calcaneis incedit Hominis & Urfi modo *D. Willughby.*] Non fodit ut Cuniculus ; neque ut hic cæcus nascitur. Pugnaturs ferit rostro, porcino more. Osto interdum foetus una vice parit. Omne genus herbis & fructibus vescitur. Caro edulis est & Porcinam sapit. Cumque ad mensam paratur non debet (Cuniculinostratis instar) pelle nudari, sed aquâ fervente (Porcellorum ritu) depilari. Aqua huic Animali nihil opus, modò herbis viridibus vescatur.

Partium internarum descriptionem Anatomicam à Clariss. Viro *D. Georgio Entio* factam vide apud *D. Charleton.* Mantissa Anatomica. *D. Willughby* hæc habet. Pulmones in 4. utrimque lobos divisi erant, quorum duo admodum parvi. [*D. Entius* ternos tantum in utrovis latere Pulmonibus attribuit, quorum infimus valde exiguus, superior autem bifidus cernebatur.] Hepar in 7. dividebatur, è quibus itidem duo perexigui. Fel ex albo lutescebat. Porum cholidochum, & meatum cysticum habebat. Intestina longa, con-

voluta : excrementa ut in Leporibus & cuniculis in pilulis coacta. [*D. Entio* Scybala nucleorum Pineorum instar oblonga sunt, qualia nempe murium stercoreum solent conspici, qualiaque ipsi hi cuniculi excernunt. Hujus a. rei hanc (inquit) causam arbitror, quod colon alicubi acuto angulo curvatum arteque complicatum durefcenti jam stercore ductum longiorem non concedat. Cæcum ingens, etiam ventriculo majus, extrema tamen parte gracilescens, in cellulas ligamentorum validorum ope divisum, quemadmodum colon in homine. Juxta Cæcum Appendix seu tuberculum parvum cernebatur 65. erat digitorum. [*D. Entio* * 56.] Ab Ano ad Coli partem illam ubi excrementa in pilulas formari incipiunt digiti erant 26. [*D. Entio* 25.] E. glandulis juxta anum alba & foetida materia exprimitur.

Penis ingens, qui deorsum caudam versus reflecti videtur. Juxta meatum per quem semen exit foramen est, in cujus fundo Spinulæ duæ albae, æquales, molles. In er anum & penem magna cavitates est, ut in Lepore, è cujus lateribus alba & foetida materia exprimitur. Moriens ejecit crassum liquorem Amyli similem. Sub vesicæ urinariæ collo vesiculæ seminales extendebantur, cornibus uteri similes, 4. uncias longæ, exiles & extremitatibus suis inortæ.

Libet hic Dentium descriptionem quamvis loco alieno subjicere, quoniam *D. Entius* cum *D. Willughby* in eorum forma describenda adeò exactè concordat, ut eadem etiam comparatione utatur. Incisores (inquit) bini utrinque longi, tenues, & acuti, ut in hujus generis reliquis ; molares a. quaterhi utrinque tum in superiore, tum etiam in inferiore maxilla numerantur : iidemque omnes intus pariter forisque incisuris sive crenis inculpi sunt, grato sanè intuentibus spectaculo. Incisuræ istæ in maxilla quidem superiore intus acutangulæ foris obtusangulæ conspiciuntur ; in maxilla autem inferiore contrarium evenit, ideòque quilibet Dens literam W egregiè exprimit.

Mus Sylvestris Americanus Cuniculus magnitudine, *Porcelli pilis & voce*. *AGUTI* vel *Acuti* Brasiliensibus dictus. *Marcgr.* Pili crassi ut in Porcellis ; & splendentes, ex ruffo & brunno mixti cum pauxillo nigro, in ventre magis flavescentes. Caput & barba Cuniculi ; rostrum tamen acutius, inferior maxilla superiore brevior ut in Sue ; Labium superius fissum instar Leporis. Crura glabra & sine pilis fere, anteriora breviora, 4 digitis, posteriora longiora, sex prædita ; ungues acuti. Cauda brevissima glabra ; oculi nigri. Grunit ut Porcellus. Voracissimum est Animal, & cibum anterioribus pedibus tenet ut Sciurus, & devorat quàm ocysimè. Quod reliquum est recondit studiose & fodiendo occultat. Currit velocissimè. Cum irascitur dorsi extremi pilos surrigit & posterioribus pedibus terram fortiter pulsar.

Mus Brasiliensis magnus, *Porcelli pilis & voce* *PACA* dictus. *Marcgr.* Magnitudine est Porcelli, pingui & crasso corpore, & circiter 10. dig. longo : capite Cuniculi ; barba Leporina prolixa ; Auriculis nudis & paulum acutis, naribus amplis. Maxilla inferior superiore brevior, ut & Crura priora posterioribus. In pedibus digiti quatuor. Pili breves, & ad tactum duri, umbræ coloris ; in lateribus secundum

dum longitudinem maculas habet cinereas, in ventre albicat. Cibum oblatum pedibus non tenet ut Sciurus, sed in terra positum devorat instar Suis, arque ad eundem penè modum. Carnem habet eximiam & pinguem; mordet vehementer.

Hoc genus Animalia pilis & voce porcellum referunt; Dentibus & figurâ capitis, & etiam magnitudine Cuniculum; Auribus murem: suntque singularia & sui generis.

Mus Norvegius vulgo *Leming Wormij Mus*. p. 322. Hujus Animalis mentionem primus fecit *Olaus magnus* l. 18. cap. 20. Historiæ Gentium Septentrionalium. Quæ de eo habent *Conradus Gesnerus*, *Julius Scaliger*, *Jacobus Zieglerus* & *Johnstonus* omnia ex eodem fonte, nimirum *Olai* prædicti Historia, hauserunt. Accuratiori inquisitione habita, prolixam ejus historiam texuit *Olaus Wormius*. Animal autem sic describit, Figurâ Murem aut Soricem repræsentat, nisi quod caudâ sit minore. Longitudine est unciarum circiter 5. Pilo subtili, varijs coloribus tincto; capitis extremitas supina nigricat, vertex flavescit, hinc collum & Scapulæ nigra; Corpus reliquum refecit, intermixtis maculis quibusdam nigris parvis, variarum figurarum, ad caudam usque, quæ brevis, vix semuncialis, pilosa, tenuis, ex flavo nigricans. Macularum 4. in omnibus non idem ordo, figura, aut magnitudo observatur. Caput acuminatum. Os cingunt pili multi rigidi, mystacis instar, ex quibus 12. longiores reliquis & rigidiores, utrinque 6. latè dispersi. Os parvum est, cujus superius labrum scissum, ut in Sciuris, ex quo eminent dentes duo, magni, incisori, acuti, incurvi, quorum radices ad oculorum orbitam pertingunt, & molarium inflexionem; parte extrema, quia eminent excavati. Quibus in inferiori maxilla, quæ tribus processibus jungitur superiori, totidem respondent, eodem modo dispositi. Ab his distant maxillares, utrinque numero tres, quorum anterior latissimus, 4. incisuris constans, secundus tribus, tertius minimus, suis alveolis distincti, & ad interiora palati interstitio latè magno siti. Lingua pro ratione oris magna satis & ampla, ad extremitatem dentium incisivorum pertingens. Ramenta quædam palearum in faucibus inveni faculento humore obducta; ut vel hinc colligere liceat inter ruminantia locum habere hoc animal. Oculi parvi nigri: Aures obtusæ in dorsum reclinantibus auriculis. Crura anteriora brevissima; pedes pilosi, 5. acutis & incurvis unguibus armati, quorum medius longissimus, reliqui utrinque ab hac longitudine descilcentes, anteriora spectantes; quintus, pollicis aut calcaris Galli instar, altius aliquanto crura versùs situs est. Posteriora longiora videntur, sed figurâ ab anterioribus nonnihil discrepantia. Mirum quod et si cruribus sit brevissimis, cursu tamen feratur celerissimo & concitatissimo. Pelle est tenuissima & facile corruptibili, nisi quâ labia tegit, ubi crassior apparet, ut pili mystacis in eo melius firmentur. Venter totus albicat ad flavedinem tendens. Ossa tenuia & fragilia admodum, ut ad minimum ictum facile frangantur. Interiora viscera rimari non licuit, quia exenterati & exsiccati fuere hi mures omnes quotquot ad me pervenerunt. Quod lata depopulantur, magnamque pascuis & segetibus cladem inferant, quodque consumpris frugibus quando moriuntur, morbos post se relinquunt pestilentes, non

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

negaverim. Quod vero è putredine ortum habeant, inque nubibus generentur, indeque decidunt in terram, mihi minime probatur; ut qui spontaneam omnem generationem non quadrupedum tantum sed & Insectorum rejicio. Quod detur in ijs sexuum distinctio, agnoscit *Wormius*; quin & audivisse se ait virum quendam religiosum aliquot hujus generis dolio amplo inclusisse; fœnum, contrita frumenta & fraces pabuli loco exhibuisse, atque ita per biennium incolumes conservasse, ut in hoc dolio etiam fœtus suos excluderint: unde patet aliorum Animalium modo per coitum & generationem propagari hosce mures. Quod graminis recentis gustu enecentur falsum & fabulotum esse conjicio. Quæ de eorum generatione & lapsu è nubibus multis disputat *Wormius*, apud ipsum requirenda omitto. At illud præterire nequeo in noviter delapsorum ventriculis dissectis herbarum recentium particulas à nonnullis fuisse inventas. Quomodo ergo in nubibus generari potuere? ni forte non mures tantum sed & herbæ ididem nascantur; ut mirum sit, plantas etiam interdum è cælo non depluere; quod tamen nullum (quod sciam) Autorem habet. Dices, tritico aliquoties pluuisse multi Historici testantur. Ergo, ut videtur, non herbæ tantum in nubibus oriuntur, sed & in segetes succrescunt, & semen tantum perficiunt.

GLIS Gesneri & aliorum, *Roll* vel *Relmus* Helvetijs. Descriptio hujus accurata nullibi, quod sciam, extat. Audio (inquit Gesnerus) *Glirem* majorem esse Sciuro, colore nigricante; vel (ut alij referunt) dorso fusco, ventre albo, cauda brevi, in extremo villosa, facie quodammodo Ursina, mordacem adeò esse, ut rarè vivus capiatur. Esculentus est nec unquam placet nisi inter patinas.

Quæ de hoc animali traduntur adeò varia & incerta sunt, ut dubitem an detur ejusmodi in rerum natura.

MUS INDICUS arboreus Striatus, in *Palmis* cocciferis degens. *Musei Leydensis*. Hunc in *D. Charletoni* museo vidi. *D. T. Robinson. Rajus in Synopsi Quadrupedum*.

Hactenus de Lepore in genere, jam de Medicamentis ex Lepore in specie sic dicto.

OFFICIN. NAT. ex Lepore.

1. *Cinis Leporinus*. 2. *Caput*. 3. *Oculus*. 4. *Sanguis*. 5. *Pulmo*. 6. *Cerebrum*. 7. *Cor*. 8. *Secur*. 9. *Fel*. 10. *Renes*. 11. *Testiculi*. 12. *Uterus*. 13. *Coagulum*. 14. *Talus*. 15. *Arungia*. 16. *Stercus*. 17. *Pili*.

1. *Cinis* fit ex Lepore integro combusto (præstat qui Verno tempore captus,) vel ex pelle tota, ad nigredinem cinerumve colorem incinerata. Præstantissimum Medicamentum est in calculo.

Dosis ad ℥j. & 3℥ vel 3j.

*Alopecij*s item & *Pernionibus* extrinsecus medetur.

N. Laurenberg. leporem non calcinat, sed animal decollat, ollaque inditum exiccat in clibano, pulv. exhibet.

2. *Caput Alopecij* subvenit, (cinis cum melle inunctus,) dentes dealbat, (cinis in dentifricis.)

3. *Oculi Leporini* Martio capti, valent ad partum difficilem, secundinas & molam propellendam, (siccati scilicet cum pipere sine ulla compressione, impositique vertici ut pupilla verticem tangat.

4. Sanguis illius cutis vitia in facie, uti lentiginēs vitiliginēque sanat: *assatus*, Dysenterias & Cæliacorum profluvia sistit, calculum comminuit.

5. Pulmo suspiciosos juvat, Epilepsiam curare dicitur, (*myriā conditus & quotidie cum Myrrha comestus per mensem*;) perniciōes sanat (*impositus*.)

6. Cerebrum gingivis infantum affrictum dentitionem faciliat, tremores artuum emendat (*inassatum & mansum*.)

(Dentes leporini infantibus ad faciliorem dentitionem appenduntur, ut gingivas illis fricent, sicuti Lupini.)

7. Cor dicitur itidem Epilepsiam curare (*simili modo quo pulmo adhibitus*;) dolores uterinos arcere, (*pulvis assumptus*.) Quartanæ peculiariter mederi, (*in partes tres dissectum & præmissis universalibus initio 3. Paroxysmorum, tertiâ parte singulis vicibus propinatum*.)

8. Fecur fluxum sedat, alvi, jecinerosisque opem fert.

9. Fel Ophthalmicum & Oalgicum insignē exhibet.

10. Renes & Testiculi calculosis propinquantur, (*siccatis*;) conceptum juvant (*à mensibus assumpti*;) mixtionem involuntariam corrigunt.

11. Testiculi Urinæ incontinentiam tollunt, Vesicæ morbis subveniunt, ad conceptionem faciunt, (*pulverisati & assumpti*.)

12. Uterus itidem conceptionem promovet (*siccatus & à mensibus propinatus*.)

13. Coagulum sanguinem concretum discutit, conceptionem promovet (*post menstruas purgationes vulva cum butyro impositum*;) potum vero partum enecat, Epilepsiam curat, &c.

N. Præstantissimum est quod eximitur antequam aliud quid, præter Lac maternum degustaverint.

14. Officulum Tali, der hasensprung. The little Bone of the Ankle. Fen slejne Fuctel-been. commendatur ad arenulas, Colicam, Epilepsiam partusque enixionem (*pulverisatum & exhibitum*.)

N. Idem de Vertebra caudæ affirmant.

15. Axungia extrinsecus applicata, maximè si vetusta sit tanta pollet attrahendi vi, ut vel spicula cui infixæ eliciat; insuper abicessus rumpit, dolori dentium medetur; (*pone aures posita*.)

16. Stercus calculosis prodesse dicitur, (*cinis exhibitus*;) Dysentericæ convenit, (*potum*;) ambustis medetur (*impositum*.)

[N. Urina ad auditum gravem celebratur.]

17. Pili Linimentis sanguinem sistentibus miscentur.

[N. Pellis ejusdem cum axungia efficacia putatur; paribus dolentibus in arthritide & catarrhus imponitur.] SCHRODERUS.

Leporis ustio potius ejus destructio, quam genuina preparatio est, dum nil nisi Cap. mort. remanet omni virtute orbatum. Nec minus cineris appellatio ipsi non competit, quia nullum alkali iode extrahitur. Pulvis in clibano exsiccatus jure meritoque illi præfertur. Est Archei sedativum & sanguinis coagulati solvens.

Oculi leporini.) siccati scilicet cum pipere sine ulla compressione & vertici impositi, ut pupilla verticem tangat in partu difficili instar incantamenti cæteris ritè dispositis juvant.

Sanguis &c.) Cruor Leporis in martio capti & per terrorem occisi dysentericæ medetur.

Cerebrum) gingivis infantum affrictum dentitionem faciliat etiam Archei furorem sedando.

Gor) quartanæ specificè opiulatur, in partes tres

dissectum & præmissis præmittendis initio trium paroxysmorum, tertiâ parte singulis vicibus propinatum.

Testiculi) urinæ incontinentiam tollunt, id quod & de utero prædicatur cum brassicâ capitatâ muriâ conditâ comesto, qui etiam ad venerem stimulantem commendatur.

Officulum Tali) contra colicam & calculum commendatur, item suffocationem uteri &c. id quod & de vertebra caudæ affirmatur.

Pili) hæmorrhagiam narium sistunt externè paribus inserti. HOFMANNUS.

LEUCACANTHA, vid. *Carduus Maria*.

LEUCANTHEMUM, vid. *Bellis Major* Item aliquibus

CHAMOMILLA, sive *Chamæmelum*.

LEUCOIUM.

Leucoium, Gallicè *Giroffier*, sive *Violier*, plantæ est non unius sortis; aliud siquidem datur quod folio incano; aliud quod viridi; aliud quod flore luteo & Keiri dicitur. Rursusque illa in varias subdividuntur species de quibus abunde agitur apud Botanographos. Nos hic de Leucoio luteo Keiri nominat.

Hoc genus non tantum foliorum colore viridi, sed eorundem forma, præcipue tamen floris colore à præcedentibus differt, qui in hoc luteus est, in illis natu à purpureus aut albus, nunquam ne ex accidenti quidem (quantum nos hæctenus observavimus) luteus.

Nomina, Leucoium luteum vulgò cheiri, flore simplici I. B. luteum vulgare C. B. Keiri sive leucoium vulgare luteum, park. viola lutea ger.

Radicibus, surculisque seu ramulis ubertim fructificantibus luxuriat, lignosis, albæantibus quos obsident folia nullis appensa pediculis, crebra, unciali & ampliore longitudine, ex angusto principio sensim dilatata, virentia aut canescentia, idque maxime pronâ parte, sapore subacri, flores crebri, lutei valdè odorati, sapore parum grato, staminibus senis styloque chloris, in medio penitus fere latentibus, succedunt filiquæ longæ, in quibus semen latum, rufum, gustu acri & amaro.

In muris passim & copiosè provenit.

Leucojum luteum flore pleno I. B. & aliorum.

Non differt specie ab eo cui flos simplex, sed cultura tantum, cultu & mangonio talem evadere ajunt, præsertim si tenellæ plantæ antequam floruerint sæpius transferantur. Lugd.

Vires. Flores leucoij lutei partium sunt tenuium, discutiunt, extergent, cordiales ac nervini sunt, dolores mitigant, menses cient, secundinas proritant, foetum pellunt: unde medicamentis, quæ Græcis φθόρα dicuntur accensentur à Galeno 7. Simp.

In usu sunt Conserva ex floribus, aqua destillata, & oleum ex floribus infusis, quod præservat ab apoplexia, & paralyticos juvat, estque insignè anodynum in vulneribus & inflammationibus partium nervosarum, ut & in malis uterinis interius.

Quæ de leucoij viribus habent veteres apud ipsos vidè, vel si placet, apud I. Bauhinum hist. plant. lib. 21. cap. 13.

Episcopus Tridentinus ad præservationem ab apoplexia & paralyfi feliciter utebatur conserv. florum Keiri in aqua sua propria adsumptâ. D. Soame ex observat. Hier. Reusneri à Velschio editis obs. ij. Joh. Rajus in Hist. Plantar.

LEVISTICUM.

Levisticum vox à *Ligustico* corrupta videtur, vel potius à *Libystico* Galeni, quod est *ligusticum* Dioscoridis. *Ligusticum* autem à *Liguria*, ubi plurimum nascitur, dictum est. Ejus notæ sunt folia *Apij* majora; odor validus, magnitudo & statura insignis.

Nomina. *Levisticum* vulgare *ger. Park.* *Ligusticum* vulgare folijs *apij* *I. B. lig. vulgare*, an *libanotis* fertilis Theophrasti *C. B.*

I. B. Caulem habet hominis altitudinem excedentem, crassum, geniculatum, cavum, striatum; folia pedalia & ampliora, in alas divisa, quarum extremæ divisiones ad folia *apij* palustris aliquatenus accedunt, sed longè majores, obscuro virore splendentes, odore valido (non tamen ingrato) rami ut & summus caulis umbellas gerunt amplas florum luteorum: semina majusculum compressum, radix crassa est & lignosa. *D. Nid.* amicus notæ singularis & botanicus egregius solebat dicere, *levisticum* pharmacopolij odorem spirare.

Levisticum vulg. in hortis colitur: natalis ejus locus nobis hæcenus incertus: Pona tamen in Monte Baldo reperiri ait, alij in Alpibus *Liguriæ* aut *Apenino*, æstate floret; Augusto magna ex parte semen ad maturitatem perducit. *I. B.* gaudet solo umbroso *levisticum* vulgare germanicum *Park.* quare an differat à vulgari *levistico*,

Vires. Alexipharmacum est ac diureticum, vulnerariumque; ventriculum roborat, asthmati subvenit; menses & lochia ciet; foetum mortuum ejicit, [semen] tartarum lentum resolvit, doloresque inde natos sedat: hepatis, lienis obstructions referat, adeoque præcipue ictero convenit: extrinsecus ejus usus est in balneis, cataplasmatis (utero & ureteribus dictis) in emplastris vulnerarijs & sim. *Schrod.*

Vulgus per. caulem cavum petum haurire suevit, quo tussim sedatum iri sibi persuadet.

In facultatibus porro tam vicinum est angelicæ & imperatoricæ supra dictis, ut non puer necessariam esse commemorationem *C. Hofmannus*: adjuvat digestionem, ventositatem dissolvit & inflationem.

Veteres *Ligures*, ut & hodie *Hetrusci*, semine pro pipere utebantur promovendis mensibus & sudoribus sufficit ʒss. seminis.

Cum odor hujus plantæ adeo validus & pertinax sit præ Angelicæ & Imperatoricæ, verisimile est eam viribus etiam eisdem antecellere.

Nomen procul dubio factum est à *Libystico* Galeni, quod est *ligusticum* Dioscoridis ita dictum quod in *Apenino*, qua parte *Liguriam* attingit frequens est.

Forestus pro secreto habuit succum foliorum *levistici* in secundinis retentis, erat magnum Arcanum famosæ cujusdam obstetricis, quæ id obtinuerat à Judæo medico. Communicavit *D. Tancredus Robinson Joh. Rajus in Histor. Plantar.*

LIBANOTIS CACHRYOPHORA,

Libanotis quod radix ʒς: λεῖανος, thus redolet, dicta est: ejus semen *cachrys* dicitur, *cachrys* autem plurima significat, de quibus consule grammaticos.

Notæ hujus generis characteristice sunt folia tenuiter dissecta, semina tumida, nucis myristicæ parvæ figuræ, fungosæ substantiæ nucleum ambiens.

Vires. Cæterum *cachrys*, autore Dioscoride, vim habet calefacientem & valde resiccantem: unde in smegmate commode miscetur, & ad fluxione laborantes oculos capiti inspergitur, & post triduum desiccatur,

Secundum *Ægnetam* vim habet repugandi, discutienti & calefacienti, ideoque comitialibus subvenit, & iussus felle cum pipere & vino potum; illinitur idem ruptis, convulsis & podagris utiliter. Usus ille etiam est ex oleo contra febrium perfrictiones & cum tremore algores *Rajus*.

Plures dantur *Libanotidum* species, latifolia scilicet ac major, & alia minor; *libanotis* item quæ la-serpitum folijs latioribus lobatis; *Libanotis* Theophrasti quorundam, sive *Seteli* *Æthiopicum* *Matthiolo*; *Libanotis* quæ *Cervaria alba* *J. Bauh.* vocatur &c. quarum maxima pars in montibus nobis vicinis nascitur. Verum nihil opus est illis describendis immoremur.

LIBISTICUM, vid. *Levisticum*.

LIBERA, vid. sub titulo *Pondera*.

LIBYCUS LIQUOR, vid. *Benzoinum*.

LICHEN, vid. *Hepatica*.

LICHENES EQUORUM, vid. sub titulo *Equus*.

LIGNUM.

Ligna sunt varij generis quæ ad Medicos transferuntur usus, de quibus videri potest sub nominibus earum arborum è quibus educuntur, hic tantum de quibusdam eorum in specie.

LIGNUM ALDÆ, vid. *Agallochum*.

LIGNUM AQUILÆ.

Gallicè *Bois d'Aigle*, nullius est in Medecina usus.

LIGNUM BRASILIANUM.

Gallicè *Bois de Bresil*, vel de *Fernamboug*, apud Tinctores est in usu, Medicis non item; quamvis ejus vires, tantali rubri viribus quam maxime consimiles sint.

LIGNUM CITRI.

Aliàs *Lignum Jasmini*, Gallicè *Bois de citron*, vel *Bois de Chandelle*. Vermiculati operis artificibus non parum est in usu, Medicis non item.

LIGNUM CORALLINUM.

A colore sic dictum apud artifices de quibus mox diximus est etiam in usu.

LIGNUM FERRI.

A duritie sic dictum, corticem habet ad eadem quibus *Lignum Guajacum* ejusdemque cortex inser-vit utilem.

LIGNUM COLUBRINUM.

Lignum Colubrinum dictæ sunt hoc genus stirpès quod singulæ mirum in modum utiles sunt adversus colubrorum virulentos ictus & morsus. *C. Bauhinus* clematitides vocat, quia pleræque sarmentitiæ sunt & per arbores repant.

Hoc autem lignum quomodo deprehensum sit serpentium moribus prodesse vide apud *Garciam*: nobis enim fabulam respicere videtur ea narratio.

Nomina. *Lignum Colubrinum* *I. Garcie*, *I. B. Park.* *Clematidis India* folijs persicæ, fructu periclymeni *C. B.*

Duum aut trium palmorum altitudine assurgit; paucis virgulis, quatuor aut quinque duntaxat, tenuibus: radixque maxime in usum venit, veluti tenuiorum nostrorum vitium radices, multis capitibus aut nodis se propagans, ita ut semper radix aliqua extra solum se exerat, & radice una exempta aliæ in

ejus locum succedant: radix hæc candido cinerea est, solida, admodum amara gustu; folia perficæ mali; magis tamen virentia, flos longe à folijs racematim cohæret pulcherrimo colore rubens: fructus sambuci, sed rubens, & durus, racematim cohærens, velut in periclymeno: In Insula Zeilan & multis alijs regionibus & in Goæ continenti nasci tradunt.

Vires. Teritur primum hæc radix, & ex vino aut aqua cordiali propinatur à serpente percussis: teritur etiam ad cotem fantali modo, & vulneribus inspergitur.

LIGNUM COLUBRINUM

aliud, cujus

Nomina. Colubrinum lignum II. Garcie, Clusio scandens I. B. Clematidis indica spinosa folijs luteis C. B.

Arbor est (cum sola provenit nullis vicina arboribus) malo punicæ similis, spinis brevibus & firmis horrida; Cortice candido, denso, rimoso & amaro, non tamen veluti prioris cortex: folijs est luteis, aspectu pulcherrimis: hanc autem (si juxta aliam quæ in pianarborum provenit) per summos ejus ramos terpere, atque cucurbitæ modo amplecti ferunt. Materies Clus. firma, ca. d. da, venis quibusdā distincta, non dissimilis fraxini ligno; cortex cādicans & quasi cinereus: utraque verò degustata amaro sapore esse deprehendebatur. In Insula Goæ nasci ferunt, sed nunquam Garcie videre contigit. Commendatur adversus venena velut primum; & eodem modo usurpatur. Solent ipsum lignum cum cortice & radice permixtum exhibere: præferunt tamen radix.

LIGNUM COLUBRINUM rufus

aliud, cujus

Nomina. Lignum colubrinum III. Garcie Park. Col. Lign. 3. Garc. folijs lentis I. B. Clementis indica folijs lentiscinis candidis maculis aspersis C. B.

Ramos habet paucos, tenues, quatuor aut quinque digitorum longitudine, qui nisi alligati sustentare se nequeunt, sed per solum sese diffundunt, folia rara, lentiscinorum effigie, oblonga non viridia, sed maculosa, sive nigricantibus ex candido maculis respersa, radix tenuis est, dura, nigra & odorata.

Cum Prorex in Jasatiapatan Insula Zeilan contermina esset, dono data est illi hæc radix, quam mirifice adversus venena prædicabant, similem in continenti Goæ nasci ferunt.

LIGNUM COLUBRINUM

aliud, cujus

Nomina. Colubrinum Lignum hederaceum folijs brionie, Acoftæ I. I. B. Lign. Col. I. Acoftæ Park. Clematidis Malabarensis folijs vitis, colore dracunculi B. C.

Nascitur in Malabar hederæ modo, colore dracunculi majoris sive serpentariæ. Folia illi sunt bryoniæ fere similia, integra tamen initio, nervoque prædita per longum excurrente, & quinque aut sex venis in latera vergentibus. Successu temporis accedunt exigua foramina, quæ paulatim cum folijs incrementum sumunt, donec tandem omnino folia scindant eaque vitis folijs similia reddant; Conspiciuntur etiam integra, alia exiguis, nonnulla majoribus foraminibus prædita, omniaque aded inter se dissimilia, ut ejusdem plantæ folia minimè esse videantur, tantam vero habet hoc Lignum cum Colubro similitudinem, ut (Acofta tradente) qui conspicit, vivum colubrum esse existimet.

Solo hujus ligni odore serpentes fugari ajunt, idcirco incolæ maxima ex parte illud circumferre solent.

LIGNUM COLUBRINUM

aliud, cujus

Nomina. Colubrinum lignum Dudafali Canarinis, Acoftæ II. I. B. Lig. Colubr. 2. Acoftæ, Park. Clematidis Malabarensis altera, radice serpente C. Babin.

Planta admodum brevis est & tenuis, triaque lolummodo folia habet mollia, lævia, saturatius virentia. Flos aut fructus non conspectus, nec quisquam se vidisse asserit, radix oblonga & tenuis est, mi. imo digito minor, hinc inde nonnunquam extuberans & summa tellure terpens: cæterum ejus cortex valde tenuis est, & cinereus, nullo dum gustatur manifesto sapore præditus, deinde tamen gustum in ore relinquens suavem, & uti moschus odoratum. Fissus est undique hic cortex, & sponte sese expedit ab alio crassiore flavoq; cortice subtus nascente qui odorem trifolij odorati vulgaris refert, & saporem glycyrrhizæ dulciorem: præmansus odore admodum suavi, nec iniucunda mordicatione, momentanea tamen præditus esse deprehenditur: ipsa materia lignosa est, candida, dura & insipida, folia napi saporem referunt, germen producit radix hæc supra terram, circiter quatuor uncias longum in caput extuberans.

Invenitur in Malabar locis humidis, & inter arbores, præsertim verò circa illas quæ Angelins nuncupantur, nec procul à mari, ad eadem valet ad quæ præcedentia

LIGNUM COLUBRINUM aliud, cujus

Nomina. Colubrinum ligni tertium genus in Malabar vastæ arboris magnitudine Acoftæ, C. B. Colubrinum Lignum Clusij, pac de cobra dictum, forte III. Acoftæ I. B.

De hac arbore in alio libro (qui tamen nunquam quod scimus editus est) è actu scribit Acofta, pingitur à Clusio notis ad Acoftam fragmentum ligni cum tubere sive superiore radicis parte in nodum coacta, quod colubrino 3. Acoftæ idem esse suspicatur, similis fere ligni fragmentum à Jac. Garato acceptum à Clusio, per medium secundum longitudinem sectum, coloris erat pallidius, ipsum quidem lignum amarum, sed cortex paulo amarior, cujus superficies quodammodo flavescit, ipse verò ex candido cineracei coloris est.

Harum omnium stirpium lignum sive potius radix, non modo adversus animalium virus ejaculantium morsus idusue efficax est, Sed etiam ejus pulvis lumbricos necare, papulas, exanthemata & impetigines tollere creditur, & cholicam quam vocant passionem (incolæ mordexi dicunt) sanare. Similiter utile esse medicamentum ferunt adversus febrium circuitus uncie pondere propinatum, prius tamen tritum & aqua maceratum, per vomitus expurgata multa bile; addit Acofta, syncopem, ventriculi debilitatem & cordis tremorem, hinc conjectatur D. Grevius, vel cognata esse hæc ligna arbori ex cujus cortice pulvis patrum fit, vel ejus in febribus intermittentibus vim experiendi & inveniendi occasionem Indis dare potuisse.

Attendamus experimenta Antonij de Heide in centuria observ. 7. quæ ad me transmisit D. Hulse.

Ad febrem quotidianam sedandum ligni colubrini pulverem assumit tornator quidam circa vesperam, subsequente nocte sese satis bene habuit, sed manè surgere vel corpus movere satagens sentiebat tremorem in membris: accessit exhibui mixturam hypnoticam, & intra paucas horas tremore liberatur æger: ejusdem ligni 3ß. assumpta & muliere cachectica præ-

ter tremorem excitavit & stuporem, ita ut ægra nullius rei curam haberet, nesciens (ut mihi retulit) se esse in mundo, vel vivere, curatur mixturâ hypnoticâ.

Retulit mihi illustris Domina famulum suum ab assumpto hoc Ligno instar fatui exiitisse. Hæc pensiculus & conferens cum Symptomatis à nuce vomica in cane excitatis obliquo exaratis (quæ nos in Historia nucis vomicæ retulimus) Libenter susciibo afferenti nucem vomicam esse fructum Ligni Colubrini: hæc mera est Conjectura. *Rajus.*

LIGNUM HERACLEUM, vid. *Corylus*.

LIGNUM INDICUM, vid. *Guaiaacum*.

LIGNUM MOLUCECNSE.

Nomina. Lignum Molucense, Pavana dictum, fructu Avellanæ *L.B.* Molucense, folijs Malvæ, fructu Avellanæ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis. *Lugd. C.B.*

Acosta.

Arbor est domestica, Mili Coronei magnitudine, cujus folia Malvæ vel legumini folijs sunt similia, fructus vero Avellanis, sed minor, molliore cortice & nigricante.

Invenitur in Moluccis, feritur coliturque in hortis diligenter nec alibi facile invenias: tæti enim ab incolis æstimatur, ut peregrinos ne ad ejus quidem conspectum admittit.

Vires. Semen ad aucupia utile est. Ejus pauxillum cum Oryza cocta mixtum avibus sylvestribus exponunt, quæ eo degustato illico decidunt sopitæ & stupidæ; quæ verò avidius id edunt moriuntur, antequam illis auxilium præberi possit, quod est ut frigidâ caput perfundatur.

Lignum in pulverem pelle caniculæ marinæ aut limâ ferreâ redactum, intus sumptum aut foris impositum, omnibus resistit venenis. Ad viperarum, regulorum, aliorumque serpentum morsus intrò assumitur magno commodo ex aqua rosarum vel vulgari, aviumque jussulo pulveris apta quantitas pro necessitate & natura ægri, modo *X. Gr.* non excedat: ipsique moribus inspergitur. Eadem ratione usurpatur ad vulnera à sagittis toxico illiris facta.

Robustissimo cuique pulveris dimidius scrupulus summo manè datus (cena autem diei præcedentis parca esse debet) evacuat omnes humores, præsertim crassos, lentos, & melancholicos: convenit quartanis diuturnis, febribus continuis, Iliacis colicisque doloribus, flatibus, hydropisi, arenulis, renum calculis, urinæ difficultatibus, sævissimæ cholericæ passioni, articulo-rum & tibia-rum inveteratis doloribus, scirrhis & scrophulis. Omnis generis lumbricos necat, & appetentiam dejectam revocat. Observavit etiam illius præstantiam *Acosta*, in inveteratis capitis doloribus, hemiplegia, apoplexia, aurium tinnitu, arthritide, ventriculi & uteri affectibus & astmathe. Si nimia fiat evacuatio bibat æger dimidium cyathum canicæ, hæc decocti Orizæ, aut aviculam comedat & cito cessabit. Accedit, quod neque fetorem, neque tædium, neque metum dum sumitur, pariat, possitque sine Diætæ observatione, etiam iis qui sua negotia foris peragunt propinari. Exhibendus est summo mane, nec cibus aut potus concedendus donec purgati sint quantum necessarium videtur, tum demum cyathus jussuli gallinarum tepidè detur, reliquam diætæ observationem vide apud *Authorem*. Biliosus caliditque ventriculis nonnihil molestie parere donec cibum sumunt & nonnullis vomitum excitare visus est. His pulverem nonnunquam dedit. *Acosta* sirupo acetoso aut carambolâ conditâ exceptum, aut in cataportia cum saccharo rosaceo efformatum. Solet interdum in nonnullis ani pruritus & ex-

coriationem excitare, atque in aliquibus, (sed paucis admodum) hæmorrhoidas. *Rajus.*

LIGNUM NEPHRITICUM.

Nomina. Lignum nephriticum, *Park.* nephriticum cæruleo, & flavo tingens *L.B.* peregrinum aquam cæruleam reddens *C. B.* Coatli seu Aqueus serpens *Hernand.*

Hernandez.

Alijs Tlapalezpatli, seu Medicina sanguinis coccinea. Frutex est magnus, stipitem ferens enodem, crassum, Materia Pyri est, folijs ciceris, minoribus tamen, rutaceisve sed majoribus; flore luteo, elanguescente, parvo & longiusculo, composito in spicas.

Provenit regionibus moderatè calidis, qualis est Mexicana: & interdum etiam fervidioribus, qualis est Quauhchinacensis.

Ejus usus (inquit *Monardes*) jam diu receptus est [in Hispania] ad renum vitia, urinæ difficultates & incommoda: postea experimento compertum est, ejus aquam in jecoris & lienis obstructionibus utilem esse. Fit autem hoc modo, Lignum assulatim & minutim concitum in optima & limpidissima fontana aqua maceratur; atque in ea relinquitur donec aqua à bibentibus assumptra sit: deinde novam aquam ligno affundunt, atque hoc toties repetunt donec Lignum nullam amplius tincturam reddit. Dimidia circiter hora post injectum lignum cæruleum aqua colorem dilutiorem contrahit, qui sensim pro temporis diuturnitate intenditur. Adulteratur ligno illi simili, quod aquam croceo colore inficit, Addit *Hernandez* febres extinguere & colicis mederi; atque hæc potentiùs præstare si radices *Mell.* adjiciuntur; quanquam ventriculum laxent. Exolefcit post quindecim dies virtus. Mirum verò quod saporem aquæ non mutet.

Ex nostra observatione lignum hoc aquam cui infunditur, flavo & si diutius relinquatur, croceo colore tingit, si aqua scilicet colorata phialâ vitreâ excepta inter lucem & oculum collocata per radios refractos spectetur. At verò si oculi situs sit inter phialam & lucem, & aqua per radios reflexos spectetur, cærulea apparet tinctura; ut cuiusvis volenti facile est experiri. Quod idem in vitro croceo colore tincto observatur: quotquot enim radij à vitro ad oculum reflectuntur cæruleum colorem exhibent, quotquot verò per vitrum ad oculum transeunt colorem flavum croceumve repræsentant, ut totum vitrum in hoc situ flavum, in illo cæruleum appareat. *Rajus.*

LIGUM RHODIUM.

Gallicè *Bois de Rhodes, Bois de Rose, Bois de Cypre*, est Lignum Santalo Citrino non multum ab simile coloris flavi, odore rosam spirans. Debet seligi recens, crassum, quinimo tortuosum, coloris subflavi, pallescentis, bene odorum. Apud unguentarios in usu est, siquidem ex eo per distillationem elicitur oleum fragrantissimum. Præterea illud ipsam lignum, ut & eo prolectum oleum cordi ac cerebro roborandis inserviunt. Vocatur Rhodium, ac Cyprium, quia arbor unde educitur crescit præcipuè in Insulis Rhodo ac Cipro.

LIGNUM VIOLACEUM.

Aliàs *Polixandrinum Lignum*, Gallicè *Bois violet*. Lignum est satis pretiosum tessellatis operibus conficiendis apprime idoneum. Est autem duplex, verum scilicet aliud, falsum aliud apud *Hollandos* familiare, quod Gallicè *Bois de la Chine*, utrumque ipsdem opificijs inservienti, & Medicis hæcenus inutile.

Lienisticum, vid. *Levisium*.

LIGUSTRUM.

Ligustrum à ligando dici verisimile est, quia virgulta ejus ob lentorem & gracilitatem facile flectantur & circumvolvuntur.

Ligustrum vulgare non esse Cypren Græcorum probatur, quia nec in arboream magnitudinem unquam excrescit, nec folia ejus capillum rufent: quæ cypri apud Dioscoriden notæ sunt; unde neque Alcanna seu Henne Arabum esse potest, cum Arabes pleraque sua de Alcanna ex Dioscor. Capite de cipro transcripserint.

Floribus racemosis albis, baccis nigris dipyrenis, viminibus lentis ab alijs fruticibus distinguitur.

Vires. Foliorum decoctum, eorumvè aqua destillata commendatur ad Ulcera & inflammationes oris, gargarisatus, ad carbunculos pudendorum ulcera, & ambusta collutu; flosculi aceto macerati frontique impositi capitis dolorem sedant.

Acinis *Ligustri* maturis quidam rubello vino nigrum inducunt colorem, solent etiam illi tam nigrum quam venetum colorem præstare, quo nomine ab his qui chartulas luforias aliasve picturas varijs coloribus illuminant leguntur.

Hyeme baccis vescuntur aves, præsertim merulæ ac turdi; frutex propter lenta & flexibilia vimina, surculosque densos, & folia hilarè virentia ad topiarias scenas expetitur, quas non ineleganter convestit: rectè Laurembergius, inter omnes frutices arbores & herbas nihil est quod in tot figuras & elegantias effingi, flecti aut formari tondendo queat ac *ligustrum* Horticult. L. I. C. 30.

Vires, à Matthiolo *ligustro* traditas ab eo potius effectas rationabiliter aut aliunde mutuatas censet I. B. quam experimento cognitās, ex gustu (inquit) quivis facile vel mediocriter versatus unicuique plantæ vires probabiliter assignare possit. At pro veris & compertis prodere non debet. *Rajus.*

LILAC.

Lilac Arbuscula est flores emittens cæruleos aut etiam albos odoris non ingrati, nullius in Medicina usus, quamvis illius semen pulveratum vel etiam aquæ incoctum reputetur medicamentum adstringens.

LILIUM.

Lilium Latinis à Græco *λίσσιον* deductum est, & literâ in l. mutatâ.

Nomina. *Lilium* album Ger. album vulgare I. B. Park. album flore erecto & vulgare C. B.

J. B.

Florum delicia *Lilium* ex radice bulbosa, multis nucleis constante caulem surrigit rectum, Cubitalem & sesquicubitalem, vel etiam altiore, singularem, teretem: cui ab imo ad summum adnato, folia nullo pediculo, oblonga & latiuscula, viridia, glabra & splendens, versus summum caulem sensim minora & angustiora. Flores in scapo serie quadam plures, non eodem tempore panduntur, odoris suavitate eximia, colore lacteo, tenis pinguibus repandis folijs calidum imitati in quorum medio stylum longiusculum, ex albo viridantem, trifidum circumstant stamina, folijs numero & colore paria, quibus apices insident Croci.

Datur rursus alia *Lilij* species quæ est flore croceo, quamque non opus est hic deicere unum.

Vires. Stillatitiam florum aquam dari utiliter potan-

dam agrè parturientibus, & ad pellendas secundinas addito croco & cassia scribit Matthioli. Crocum & cassiam ad augendam penetrantiam addi non concessit Camerarius; qui aquam stillatitiam solam ad hos usus efficacissimam ait, unde non temere in alijs affectibus dandam. Tragus duo aut tria cochlearia restituere animo linquentes scribit ex aliorum sententia. Schroderus usus crebri esse in affectibus pulmonum, asthmate, tussi & similibus scribit. Virgunculis familiaris & expedita est, ut ea faciei nitorem concilient, tantillum camphoræ & olei tartari per deliquum destillati in ea dissolventibus. Sim. Paullus.

Oleum ex floribus per insolationem fit; Cavendum autem ne folia relinquantur in oleo vetere ad quindecim dies: Cum enim tota planta turgat succo mucagineo, facile putrescunt, & oleum jam redolet non lilia, quæ prima bonitatis nota est, sed grave & foetidum quid. Sufficit igitur triduum, quo exacto imponatur alia, tum denique iterum alia, sufficit enim tertium repetisse.

Hoc oleum maximas habet vires in quibuscunque doloribus & affectibus frigidis: tensa remittit, dura emollit, dolores sedat; usus ob id est in doloribus colicis & pephriticis, in pleuritide, &c. usus etiam est in induratis nervis præcipue, in schirro veteri & inde dependente mensium mora C. Hoffmannus.

Radicis usus internus rarus est, externus crebrior in tumoribus lepiendis & maturandis, in clavis pedum tollendis (axungia vetere exceptæ & illitæ) in pudendis parturientium emolliendis, in ambustis emendandis &c. Schrod.

Stamina exhibentur ad facilitandum partum cum aqua verbenæ vel simili, Idem.

Gulielmus Goderus, Elizabethæ Regine chirurgus, referente Gerardo, multos hydrope laborantes sanavit radicis succo cum farina hordeacea mixto, pane scilicet ex istiusmodi massa confecto egro per mensem aut sex hebdomadas continuas exhibito; quo solo & non alio pane per totum id tempus vesceretur.

Idem eodem referente, radicis tusæ succum expressum cum vino exhibitum, & per duos tresve dies potum venenum pestilens expellere, & facere ut foras erumpat in pustulis & vesicis cutem externam occupantibus. *Rajus.*

LILIUM CONVALLIUM.

Lilium Convallium recentioribus dicitur hæc herba, quod in opacis & lucis vulgè nascatur. *Lilium* inter Spinas & *Lilium convallium* Solomonis. Notæ ejus sunt caulis nudus, flores parvi campanulati, baccæ rubæ.

Nomina. I. *Lilium Convallium*, Ger. *Convallium* vulgo I. B. *Convallium album*, C. B. *Convallium flore albo*, Park.

J. B.

Radice tenui & alba, fibrata, summo cespite reptante donatum, colicolum profert palmarem circiter, angulosum à cujus medio ad summum flores pulchri in unam fere partem vergentes per intervalla, penduli & nutantes, in pediculis tenuibus curvisque nascuntur, parvæ notæ effigie, oris in sex lacinas dissectis, totidem staminibus ex herbido luteis fundo adnatis, stylum triquetrum circumstantibus, odore suavissimo, sapore amaricante: quibus succedunt rubra seminum conceptacula globosa, ut in asperagis; folia bina aut terna, lata, oblonga orchidis folijs similia; potius nervosa polygonati, Majo mense floret.

In ericeto Hampstedienfi propè Londinum copiosè provenit: item in umbrosis ad latera montis Ingleborough & alibi in septentrionalibus Angliæ.

Nomis-





Nomina. II. Liliū Convallium flore rubente *L.B.* C. B. & aliorum floribus suave rubentibus *ger.*

Solo floris colore à præcedente differt. C. Bauhinus florem minorem esse ait & minus odoratum.

Vires. Flores ut & folia, adversus apoplexiam, epilepsiam, paralyfin, vertiginem, aliosque morbos capitis frigidos auxiliares esse feruntur, sunt etiam qui velint cor roborare, ac cardiacis prodesse & lipothymia.

In Germania alicubi conficiunt ex floribus per æstatem ficcatis vinum vindemiarum tempore ipsos calcatis uvis admiscentes, quo postea utuntur ad prædicta.

Sunt & qui recentiores flores cum vetere & generoso vino destillant, vel solos, vel cum floribus lavendulae & roris marini, vitreis organis in balneo aquae, qui fortiolem voluat, reperunt infusionem, iterumque destillant. Sic parata aqua Matthiolo dicitur aurea, quia in vasis aureis, argenteis servatur, & in omnibus periculosis morbis exhibetur.

Non radices tantum, sed & flores exsiccati & in pulverem redacti insigne *πασμύρον* habentur. *Rajus.*

LILIUM AQUATICUM, vid. *Nemphar.*

LILIUM COELESTE, vid. *Iris.*

LIMAX, vid. *Cochlea.*

LIMONADA.

Est potus pro quo v. g. ꝥ. cortic. citr. exter. duorum, infund. in vini & aq. aa. Mens. j. add. sacchar. alb. ꝥviii. & cola. Vel fit simpliciter ex succo citri in aquâ saccharatâ, addito si placet cortice, vel etiam cinamomi momento.

LIMONES & LIMONIA MALA, vid. *Malum Citrium.*

LIMONIUM.

Limonium à *λεμών* pratum nomen suum obtinuit, quia irriguis pratis & consimilibus locis gaudet ut limonium nunc dierum vulgò dictum herba est maritima, in salis palustribus & clivis maritimis proveniens abundè innotescit & ab alijs plantarum hujus classis generibus distinguitur loco natali & caulibus nudis ramosis.

Vires. Semen limonij, ut & herba ipsa, astringit, proinde diarrhoeæ, dysenteriae, hæmorrhagiæ & nimio mensium fluxui medetur, ut veteres prodiderunt, & neoterici etiam consentiunt.

LINAMENTUM.

Gallicè *Charpi*, vetus est linteum in fila digitis discerptum; Illud Linamentum melius reputatur quod è vetustioribus linteis, sed mundis ac albis paratur: inservit autem plumaceolis ac turundis conficiendis, sineque eo nulla vel ulcerum vel vulnerum cura methodica perficitur. Ingreditur Emplastrum de Linamento propterea dictum, quamvis parum ad ejus virtutem faciat.

LINARIA.

Linaria. Dicitur à foliorum similitudine cum lini folijs. Character ejus genericus est flos rictum exprimens, calcari donatus, cui succedit vasculum bivalve.

Nomina. Linaria lutea vulgaris *ger.* Vulgaris nostras, *Park.* vulgaris lutea flore majore C. B.

Vires. Linaria lutea vulgaris alvi turbatrix est, autore Trago, urinam tam potenter pellit, ut inde karnkraut Germanis appellatur. Aquæ quantum vitrum exiguum capiat, admixtâ drachmâ corticis ebulli in pulverem redacti sumpta potio urinam potenter cit, quare hydropicis tantum id medicamentum exhibendum erit, eadem aqua destillata pota alvum laxat, morbum discutit regium, adversus quem herba ipsa in vino decocta ac pota in primis facit, sic ut & jecur obstructionibus liberat, eadem aqua aut succus oculis inditus inflammationes eorum & ruborem tollit, quod se experientia & longa observatione didicisse scribit Tragus: eadem linteolis imposita quævis ulcera emundat si cum ea colluantur loci affecti. Succus idem maculas & vitia faciei emendat. Tragus.

Ictericis non recentibus tantum sed jam ad hydropem spectantibus verissimum & efficacissimum præstat commodum, observante Lobelio in adv.

Sunt qui herbam hanc intra calceos plantis pedum supponunt ad febrem quartanam abigendam.

Ad dolorem hæmorrhoidum 2. Herb. linariæ cum flor. q. s. decoquatur cum adipe porcino quousque adeps valdè vire scat, fiatque unguentum cui expresso & parum refrigerato vitellus ovi admisceatur, ego non soleo vitellum ovi miscere nisi applicationis tempore, utique comperi unguentum in hac regione viriditatem amittere post annum, & cum ea virtutem: id quod Massiliæ non contingebat. Chelneau, habul ab ingeniosissimo viro mihiq. amicissimo D. Edvv. Hulse. m. D.

Linaria sanat incredibiles hæmorrhoidum dolores Gremis & Cardilucio autoribus, item Sennerto. D. *Tancredus Robinson. Rajus.*

Linariam etiam habemus minorem flore caruleo in montibus vicinis è cujus folijs succus non parum glutinans exprimitur, quæque inter vulnerarias plantas merito recensenda venit. Ejus ichonem vide hic adjectam tabulâ quæ inter nostras est xv.

LINCTUS, vid. *Eclegma.*

LINGUA AGNINA, vid. *Arnoglossum.*

LINGUA AVIS, vid. *Ornithoglossum.*

LINGUA BOVIS, vid. *Buglossum.*

LINGUA CANIS, vid. *Cynoglossum.*

LINGUA CERVINA, vid. *Scolopendrium.*

LINGUA EQUINA, vid. *HippeGLOSSUM.*

LINGUA SERPENTINA, vid. *Ophioglossum.*

LINIMENTUM, vid. *Litus.*

LINUM.

Linum à græco *λινον*, à quo non aliter differt quàm modulo syllabæ: nam priorem Græcis corripit, Latinis producit, sæpe utuntur Græci pro rebus è lino confectis, ut pro linteis ac velis.

Lini notæ genericæ sunt vascula seminalia subrotunda, in decem loculamenta, totidem semina continentia dispersita, femina melina plerumque, flores caduci.

Nomina. Linum salivum *Ger. emac.* B. C. *Park.* Linum I. B. ꝥ. B.

Tenui radicula nititur, paucis fibris donata; caule tereti, plurimum simplici, inani, tenui, glabro, cubitum ac sesquicubitum alto, alis circa summum diviso. Folia acuminata, culmum lata, uncias duas plus minus longa, alternatim aut potius nullo ordine caulium apposita, mollia, glabra. Flores cœrulei, pentapetali, petalis ex reme subrotundis striatis, è calicibus in quinque segmenta acuta divisis, pediculis tenuibus longiusculis insidentes, admodum caduci: capitula succedunt rotunda, (ciceris magnitudine, in quibus semina decem continentur, loculis in circuitu proprijs distincta, depressa, in angulum acutum desinentia, superficie valde lævi & splendente, mellei coloris Cæs.) I. Bauhino fusci.

In agris feritur tam in Anglia, quam in transmarinis regionibus.

Vires & Usus. Plinius præmio libri 17. de lini usu ad vela navium agens, in qua (inquit) non occurrit vitæ parte; quodve miraculum majus; herbam esse quæ admoveat Ægyptum Italia? herbam esse quæ Gades Herculis columnas septimo die Ostiam afferat, & citeriorem Hispaniam quarto, Provinciam Narbonensem tertio, Africam altero? audax vita, scelerum plena, aliquid feri ut ventros procellasque recipiat: & parum esse fluctibus solis vehi: denique tam parvo semine nasci, quod Orbem terrarum ultrò citroque porter, tam gracili avena, tam non altè à terra tolli; neque id viribus suis necti, sed passum tusumque & in molliem lanæ coactum, injuriam naturæ ac summam audaciâ: at nos priore libro imbres & flatus cavendos frugum causa fructusque præmonēbamus, ecce feritur hominis manu, metitur ejusdem ingenio quod ventos in mari optet: hæc Plinius, quibus addit I. Bauhinus, at quanta censenda est velorum ex lino utilitas, si ad reliquum lini usum per omnem vitam conferatur? hoc lori detergemur, hoc sordidi defricamur, ex hoc facta veste torum corpus ad cutem integre omnes interdum vestimur, noctu stragulis inde factis incubamus ac integimur, Rusticana gens (in Germania) utriusque sexus pallia & tunicas ex ipso gestat, & mundus muliebris magna ex parte ex hoc constat, sed omnes has necessarias vitæ utilitates facile superat linum chartarum dono: hæc ex ipso penitus detricto & nullius amplius usus rejiculo fiunt, tot hodie ubique officinis, ut multa hominum millia ex præparandi chartas opera, in papyraceis (ut vocant) molendinis se nutriant, his chartis & literarum notis omnes bonæ artes, leges, tota philosophia, & vitæ piæ ac recte agendæ rationes excipiuntur, conservantur, harum utilitatum vix animo quis concipere possit, nedum pro dignitate explicare, quantumvis longa instituta oratione: hæcenus Bauhinus.

Liber impressus ex solo lino constabit, si papyrus ad nigredinem usitam, & oleo lini incrassato mistam pro atramento utaris. Michael Mayerus in Lusu serio.

Quantas injurias, quot tormenta hæc Herba præ alijs omnibus ab hominibus patiat, legat qui velit Geropium Becanum luculenter & rethoricè demonstrantem, Hermath. lib. 3.

Quidam olim Galeni tempore utebantur semine lini tosto pro obsonio cum garo, item melle admixto; sed statuosum est, inquit, stomacho incommodum & ægrè concoquitur: quod paucis abhinc annis Middleburgij in Zelandia (inquit Tragus) animadverti potuit, cum propter frumenti aliarumque frugum inopiam plerique ex civibus pane & cibus ex hoc costis vescerentur, distenta enim his valdè citò hypochondriaca fuerunt, & facies aliarumque partes tumida factæ, quorum non pauci sic affecti etiam mortui sunt.

Oleum lini, quod ex ejus semine exprimitur, multiplicem usum habet, neque enim à pictoribus aut statuarijs, alijsve artificibus expetitur solum, vel ad lucernas tantum utile est, sed etiam medico usui servit; nam & durities omnes emollit, nervorum tensiones contractionesque laxat, dolores illitum sopit J. B.

In angina & pleuritide, alijs addunt phthiri & colica, datur nonnullis bibendum: verum cum cautela ut recens sit. C. Hofman.

Oleum lini est magnarum virium in perineumonia, phthiri, doloribus colicis, ego multoties in pleuritidis doloribus nihil melius expertus sum quam oleum lini propinatum: hoc enim statim respirationem facilitavit, sputumque promovit; in hæmoptycis etiam idem oleum exhibui cum optato successu: Consolidat enim partes affectas vi sua balsamica & emplastica Ephem. Germ. An 6, & 7. ex observatione D. Raygeri, observ. 209.

Oleum lini partes habet adeò subiles, ut in fictilibus servari nequeat quin exudet Michael Meyerus de Lusu serio.

Attramentum typographicum è fuligine lampadis & oleo lini componitur, silex politus si in oleo lini coquatur duritiem invictam acquirit, unde ferendis ijs quæ opus est in tabula marmorea evadit aptior. J. B. in histor. fontis & balnei Bollenfis, ex relatione D. Lutz pharmacopæi Kirchenfis.

Tumores ventris felicissime curantur ab olei lini usu, Ephem. German. An. III. *Rajus*.

LINUM CATHARTICUM.

E radícula tenui, alba, lignosa, fibrillis aliquot donata, cauliculos emittit nonnihil reptantes, mox humo ad palmum & altius se attolentes, tenues, rotundos, rubentes, fastigio sursum ramoso, nutante: folia infima mucrone obtuso & subrotunda sunt, superiora quæ in caulibus bina opposita, crebra, exigua, semunciam longa, culmum lata, glabra, absque pediculis adnata, flores pediculis longis tenuibus insident, albi, pentapetali, petalis acutis, minime bifidis, cum apicibus totidem in medio luteis, è calice quinque partito. Vascula succedunt lini parva, canaliculata, in quibus semen lucidum & lubricum lini compressum & oblongum I. Bauhino, sapor totius plantæ amarus & nauseosus.

Floret initio Junij, & deinceps per totam æstatem, & in pascuis siccioribus præsertim montosis abundat.

Vires. Hujus herba integra cum caulibus & capitulis vino albo per noctem super cineres calidos infusa, serofos humores purgat satis validè, sumi potest vel herba contusa, vel ejus exsiccata pulvis, cum tantillo cremoris tartari & seminum anisi, & purgat sine molestia D. Boovle, *Rajus*.

LIQUARE & LIQUEFACTIO.

Liquare est vi caloris liquidum facere, Competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus. Interdum tamen idem est quod per deliquium dissolvere.

LIQUAMEN SILICUM, vid. *Liquor Silicum*.

LIQUIDAMBAR.

Resina est, teste Moharde, effluens incisis arboribus vastæ magnitudinis, pulchris & ramosis, quarum folia hederaceis similia sunt, Ocosolt Indi vocant, cortice crasso cinereo, huic cortex odoris causâ commiscetur comminutus, ut sci. suavius ac diutius spiret in fustibus. Fra Hernandez arborem liquidambari Xochlocotzo quauhisi Mexicenis dictam Aceris fere folijs esse ait, in tres cuspides duosque sinus divisis, altera parte

parte albicantibus, cætera vero obfcurioribus ferrati q; Corticem fit pitius partim fulvum partim virescentem. Ad- dit Io. Terentius, fructum rotundum esse, sed instar polygoni minus habere angulos luteos, uerficies vero nigras; ubi nascuntur epifimodi arbores, fra- grantissimus est aeris odor, adeo ut Hispani primum eo appellentes, illic aromata nasci, atque adeo eas aromatisas esse arbores existimarent. Eo hic utimur in sufficibus, odoramentis, pastillis styracis liquidæ loco, cujus odor proximè ad hunc accedit, ad o au- tem validus est, ut celeri etiam sufficibus non additum non possit, sed totas ejus, si ejus sit copia atque adeo plateas suo odore repleat.

Vires. Plurimus in medicina illius usus est, nam calefacit, roborat, resolvit & anodynum est. Cere- brum per se illitum aut alijs aromatibus mixtum con- fortat, omnigenosque dolores à causa frigida empla- stri modo impositum mitigat, ventriculo adprimè uti- le stomachici instar adhibitum, nam appetentiam exci- tat & concoctionem adjuvat. Cum styracis, Ambari & moschi momento mixtum emplastri consistentia, & scuti formâ super alutam extensum ad eadem utile est, ex eo recens collecto & loco idoneo. (in sole Park.) reposito oleum quod de liquidambar nuncupant de- stillat multò perfectissimum illoque longe suavius sunt quâ expressione etiam eliciant ut majori quanti- tate colligant, nam chirothecis imbuendis plurimum assumitur, utile est ad plerosque morbos frigidos, ad tumores resolvendos, & privatim ad tumores & ob- stractiones uteri, mensesque provocandos.

Sunt qui ex arboris ramis comminutis & coctis pinguedinem innatantem colligunt, & vendunt pro legitimo oleo, atque hic liquor à nonnullis storax liquida putatur in Aromatoriorum & pharmaco- pœorum officinis vulgo venalis. Fr. Hernandez oleum hoc ex arbore ipsa vel sponte vel incisa ex- tillare ait.

Arboris pampini & summitates in fasciculos collecti vestibus & stragulis ab Indis inferuntur odo- ris gratia, in eumque usum Hispanis etiam ven- dunt.

Fr. Hernandez somni inducendi vim liquidambaro ejusque oleo tribuit. *Rajus.*

LIQUIRITIA, vid. *Glycyrrhiza.*

LIQUOR.

Inter medicamenta liquida tanta occurrit varietas, non minus ac in classibus alijs, ut & ipsorum LIQUO- RUM nomen peculiarem ordinem constituat. De his not.

1. *Liquores sunt solutiones spontaneæ.* Liquores au- diunt strictiori significato, contradistincti ab alijs liquidis quibuscunque, sive naturâ profluentibus, seu arte factis, expressis, prolectis, destillatis. Lique- res sunt medijs inter essentias, magisteria, salia suc- cos. De omnibus ferè participant, pro diversitate tamen subjectorum. Solutiones sunt, non humo- res in latiori significato: solutio duo perpetuò secum importat, solvens & solutum. Duo hæc perpetuò videntur etiam in liquoribus; solutio- nes sunt, unde liquor non est simplex, sed fœ- tus particulis mixti, è quo paratus est, combina- tâ simul virtute. Unde & liquor faciliè præcipi- tari, idque contentum, quod secum vehit, ad oculum demonstrari potest; nisi sit aquosior. Participant saltem de virtute, si non de mo- le in omnibus. Sed solutiones hæc non tam sunt ab extra, affuso liquore sive menstruo, ut in præpara- tione seu solutione p o magisterio perlarum, coralli & similibus; quàm ab intra. Seu solutiones sunt spon-

tanæ, citra solutionem, citra menstruum affusum. Eleganti vocabulo id vocant per deliquium. Liquores sunt deliquio, sive deliquium est liquorum pater. Quando nempe concidunt particule, desumta meta- phorâ à lipo hymiâ, quâ correptum corpus concidit statim, nec consistere potest, eodem pacto quæ so- lida ed sensum fuerant vel esse poterant, deliquio adhibito id nolentes volentes, experiuntur. Ex qui- bus faciliè efficitur, liquores, qui solutiones non sunt spontaneæ, sed solâ mixtio confunt, dici tales paulo latius, rectè tamen, èd quod & in his quædam sit solutio, quædam solutum combinatio, u de sti- nitas & conformitas emergit insignis. Sic liquor ce- phalicus noster duplex conturgit. (1.) simplex è mix- turâ ~us Θ * ci & hl. convall. quò ipso tum alàs usi sumus f licitè, tum præcipuè in epiphsia infan- tum adultorumque, & paralyti. (2.) Oleosus sive la- ctæus, emulsio artificialis elegantissima, exemplo ef- sentia seu lactis cephalici superius laudati. Sic li- quor C. C. vel eboris succinatus sit, si ζ j. ~us ζ j. circiter Θ is volat. per vices ingeneratur, quâ solutio- ne factâ vel per se jam adhiberi potest, vel, ut melior fiat unio & partis oleosæ ablatio, (quæ caput ferit,) abstrahi per alembicum.

2. *Liquores sunt solutiones aeræ.* Cum spontaneæ sint, i. e. citra externam humiditatem accessionem, neces- sum est, ut humiditas quæ emergit & sensu liquorem constituat, vel in ipso concreto litet, vel aliunde accedat. Advenit verò ex aëre. Aër est aqua attenuata, vel saltem plurimas in se continet atomos humidas aqueas, calidi & humidi, quæ mundi constituunt ani- mam, non minus ac in animalibus & mixtis omnibus, determinatum charactèrem indepta, campus Martius patentissimus, seu laboratorium. Calor perpetuò agit in humidum, tum cœlestis ille, ex fonte genuino sole derivatus; tum subterraneus, unde aër modò den- sior, modo tenuior, modò spissatur. Aëreæ igitur solu- tiones sunt, quæ sunt ab aëre, humidi promptuario occulto, aut publico & perpetuo. Duplex deliqua- tionis hujus est ratio in actione & passione, seu rece- ptivitate fundata. Aër premit, promptè se in poros ob- vios ingerit, & illabitur, quæ pressura illum infert necessariò. Invitat verò corpus deliquandum, unde ω ris & ϵ λ ϵ ϵ concurrunt. ω ris sive pullio est in aëre, pressionem vocant communiter: ϵ λ ϵ in sale. Hinc liquores sunt in aëre libero & densiori, seu activis atomis magis ebrio, inprimis vase aperto, non clauso inprimis in cellâ subterraneâ.

3. *Liquores sunt solutiones successiva lente & satura- te.* Successivæ & lentæ sunt; quod morâ opus est, donec accedant & colligantur partes l. q. aqueæ, donec attrahantur ex aere, capiantur & solvant. Mo- râ ergo opus est, ut liquor consurgat, qui non affun- ditur. Fiunt enim magis negligendo, neglectim repo- sito vase, nec curato, nisi ut defendatur ab extraneis quæ illi bi queant, pulvere, araneis, insectis, alijsque, quæ pessundent operationem. Solutiones sunt à po- steriori, contingentes tunc demum, quando sicum quod erat corpus diffuit, deliquaturque, quod in in- stanti fieri non potest. Reliquæ à priori magis, quate- nus affusus liquor in solvendum agit statim & eo usq; donec subigatur & in substantiam solventis transmu- tatur penitus. Et inde quoque liquores hi propriè di- cti longè sunt saturatiores & concentratiores, quàm si ipsa aqua affusa fuerit. Paulatinâ enim & successiva illâ morâ ac solutione intimius confringuntur parti- cule, ut, contractis magis unitis & solutis, liquor inde emergat pondere gravior, sapore insignior, vir- tute efficacior. Sic oleum Tartari per deliquium, i. e. liquor & lixivium paulatim enatum, longè sa- turatius est & efficacius ad præcipitandum, ad primum

latum &c. parandum, quam Tartari simul & semel aqua solutum. Invenit enim quandam repugnantiam, non æquè & penitus auscultantibus potis; terraque obice, remixtæ & corporata. Inter deliquandum verò vincula subruuntur magis. Sic & liquor Ois ex floribus Ois *calbus nigris, in fundo remanentibus, sulphur Ois magis panum exhibet, & liquorem longè tinctiorem, ac efficaciorē, si successivā & spontaneā solutione factus fuerit, quam si extemporaneā solutione fuerit acquisitus. Idem de alijs verum est.

4. *Liquores è salis & aqua connubio seu deliquatione principaliter fiunt, adequatè ex alijs.* Subjèctum genuinum liquorum parandorum sunt salia quæcūq; sibi relicta. Salia sunt magnes aquæ, attrahunt ex aëre particulas vividas, seu appropinquantes & irruentes accupantur, non dimittunt, sed sibi concorporant, confociantque, ut in unum hinc coalescant, & ex salis deliquatione sic fiat liquor. Unde liquor utrinque dicit, aqueum solvens & salinum solutum. Omnia salia liquores largiuntur, quia sunt porosa, & solvuntur ab aqua, tanquam elemento maxime symbolico: unde facile claret, liquores à potiori hocce principio totuplices esse, quotuplicia sunt alia. Promptissime quidem solvuntur alcalia, ut liquor dictus salis tartari, vel ciner. clavellat. unde defendenda sunt curiose ab aëre, velut insidias vitæ struente. Promptissime solvuntur acida, quæ quidem aqua nondum soluta sunt, sive butyrosa, seu concentrata aliàs. Sic liquor butyri Sij fit ex butyro neglectum repolito, solâ subsidentia sic optimè depurando eodem. Sic oleum Oli ita sensim sensimque adaugetur, etiam clauso sic satis vitto; ut duplum ferè tandem emergat, saltem quoad spaciū, ut duobus vitris continendum sit, quod uno servabatur. Sic sal commune toto die, tempore minus sereno, stillat è carris liquorem, sive muriam. Sic sal cum raphano mixtum in liquorem promtè abit, confociatum cum succo quem expromit domestico. Sic liquor nephriticus Drésdensis fit ex S & Tartaro aa . calcinatis & deliquatis. Sic ex calcis vivæ & S *ci combinatione destillato u reliquum sal elixiviatum promptissime in liquorem abit, quem Q rificantem nonnulli vocant. Notanter verò diximus, salia sibi relicta liquores parere, quod duplici sensu intelligi potest, (1.) non soluta jam, sed porosa, & quasi vacua, (2.) non crystallisata atque defensa, crystallisatio enim antidotus & præservativum est deliquij.

5. *Liquores salinis per se magis, sulphure, terrâ, alijsque fieri, mediante sale confiunt.* Fluit id ex doctrinâ solutionis sive menstruorum. Liquorum corpus constituit aqua, animam quasi sal. Cum verò aquæ per se nullum jus sit in sulphur, nisi beneficio dissociantium salium, tum explicitè tum implicitè præsentium, adeoque sal sit mediator, & interpret amicitie inter sulphur & aquam, hinc sal liquorum principium, prout sulphura, terræq; & alias seminales vires his immerfas sibi combinat; ita & liquores varios alios efficit, licet itidem ad alcalinos, acidos, medios, tanquam præcipuos fontes referendos; ita ut alij liquores possint constitui simplicis, ex uno sale, alij compositi, ex alijs in consortium adscitis facti. Sic liquor Ooci , à calcinatione Ooci cum Q , ex alcali hujus & partibus fixioribus correctis veneni confurgit. Sic liquor terre sigill. sive stypticus internus, cujus inventor laudatur D. Bucretius, fit Z Terræ sigill. opt. q. v. superfundatur u Oli rect. sic. ad digit. ij. eminentiam, abstrahere u Oli in aa . novumque u um relicta in O â massæ superfunde, eundemq; abstrahere, & hocce terrâ vice repetere, massam relictam duram in cellâ in rabulâ vitreâ solve, solutum filtra & serva. Deprædicatur tanquam singulare arcanum in febribus malignis, ubi vomitus & alvi fluxus nimius,

item in dysenteria epidemia, Dos. infantibus ad gutt. v. vj. alijs ad gr. xx. Liquor stypticus externus ex O & O lo notus est. Refertur huc merentur liquor cordialis Michaelis, abstracto u Ois ab oc. S , ebor. corall. perl. seu matre perlar. & nephriticus animalis ex u Ois simpl. vel compos. solvendo putam. ovor. struthij; ac mineralis ejusdem, ex lap. lync. judaic. lazul. crystall. spong. nephrit. aquil. perl. oc. S . ratur. eboris, affuso u Ois composito ex Q & S , facillimè inde parando magisterium resolubile, indicio manifesto partium terrearum solutarum, uti de sulphure testatur liquor Ois , qui crocum continet Ois . Sic & scorix reguli O liquorem sulphureum exhibent. In omnibus sal invitat humorem, & retinet.

6. *Liquores usæ salis & solutorum nature conformi se commendant.* Vniutem omnem mutuatur à soluto, quod animam vehenti corpori scenerat, & quo sine inertes & inefficaces sunt omnino. Sibi igitur relicti magis sunt lithonriptici, velut communi penitus usu, cum omnia salia diverso respectu sint nephritica. Roboratur hæc vis, accessione lithonript corum aliorum, uti liquor Q ri lithonripticus Zobelii fit ex lap. judaic lync. spongiæ, oc. S . aliquil. crystall. cum Q o reverberatis. Communem usum hunc vocamus, quod salia quæcūque sint, lithonriptica, diverso respectu, & acida & aliâ, uti ad coagulum quoque singula sunt apta. Specialis usus sequitur naturam sui principalis, tum externus tum internus, licet internus communis statui possit absterforius, quorsum facit Q o seu liquor talci cosmeticus, liquor Ois pro ulceribus Q eis, O ocalis, O li albi, solut. in cacoë hieis alijs. Cumque ob concentratas vires in minimâ mole agant perquam efficaciter, diluuntur etiam commode cum alijs, uti liquor Ois per se est maxime adstringens, cum alijs mitescit, si distemperetur. Adeoque omne sal concretum solvi amat, sibi relictum, cum aqua. Et sic liquores sunt solutiones spontaneæ concentratiores aëreæ, è salinis potissimum acquisitæ, pro usu conformi solutorum naturæ.

De liquore alcahest præstat tacere, quam incerta latius dicere. Notabile tamen est deprædicari eundem ut medicamentum, juxta Paracelsum, & menstruum, universalis titulo, de quo Helmontius legi potest tum alibi, tum l. de febr. c. 15. §. 25. Utrumque verò ex Q li profapia, consensu ferè omnium recentiorum, confurgit, & quidem Alcahest Helmontij u Q H u laudatum, prout quidem communicatione innotuit, (1.) ex repetitâ Q ij Q itione, undecim ad minimum vicibus, (2.) ex ejusdem Q ij vivi cum S *co Q ti tritu, solutione, fermentatione, destillatione, (3.) utriusque hujus combinatione, destillatione & sublimatione, tedioussimâ præparatione absolvitur. Ex quibus patet, Q lis & salinæ esse naturæ, ut sic solutioni metallorum & ulteriori combinatione transmutationi inserviat. Reliqui liquores alcahest, abusivè sic dicti, vel in suo genere convenientes, itidem salinæ sunt naturæ. S scilicet & V sunt menstruum universale. Wedelius.

Hactenus de Liquoribus in genere ex Clariss. Vvedelio, jam aliquot eorumdem Formula ex variis Auctoribus veniunt adducenda.

Liquor Alexipharmacus Zuelferi.

4. Cort. citri, aut limon. recent. S extim. 3. v. l. sem. citri 3 iiii. cardui benedicti, ruta an. 3. ii. myrrha, rubra 3 i ss. Amygd. dulc. decorat. pro exactiori dissolut. myrrha 3 iiii. cortundantur bene in mortario, cum aq. scordij, scor-

zonera

zonera, ruta, an. \mathfrak{z} . iiii. fiat emulsio, quæ colanda, & colatura addenda syr. de scord. simpl. \mathfrak{z} vi. de cort. citri, recent. \mathfrak{z} i. misceantur pro tribus circiter dosibus. hic.

Liquor, seu emulsio extemporanea, (nam ejus substantia ætatem & tempus non fert,) inter pretiosa quæque cardiaca merito notanda. In morbis quorum curatio à centro ad circumferentiam, uti morbilis, variolis, petechijs ipsaque pestæ, tutius, tuto exhibetur.

Liquor Cornu Cervi succinatus, è Lexico Pharmaceutico Clariss. D. Jungken.

\mathfrak{z} l. Salis succini vol. rectificati q. l. solve in ∇ . fontan. & adde \mathfrak{z} is vol. c. c. tantum, donec amplius non effervescent, tunc liquor hic sensim coaguletur & siccetur: postea sume Sal communis hujus \mathfrak{z} s. aqua cerasorum nigr. \mathfrak{z} is. solve & serva pro liquore c. c. succinato.

Vires. Principaliter epilepticis motibus dicata sunt, & multisque alijs hominibus commendandæ in puerorum acido corrigendo, vide valetudinar. infantul. Etmull. D. Michel. \mathfrak{z} l. Sal communis succini vol. & Sal communis c. c. vol. ana, hæc dissolvit, in spir. c. c. rectific. & tum post digestionem evocat liquorem illum c. c. succinatum per distillationem ac cohobationem.

Cordialis temperatus è Pharmac. Reg. Zuvelferi.

\mathfrak{z} l. Rad. cyperi rotundi, ireos florent. an. unc. j. flor. recent. borraginis, buglossæ, rorismarinis cum folijs, tunica ana. unc. j. s. rosar unc. vi. cort. arant. citri, ana recent. & ext. unc. ij. cinamomi optimi unc. iij. ligni rhodij raspat. nucum moschat. macis an. unc. j. croci orient. unc. is. incisa & contusa, quæ requirunt, immergantur in vini malvatici \mathfrak{v} vi. vel viii. facta maceratione, destillantur ex baln. nostro vaporoso ad \mathfrak{v} v. vel vi. exstillationem: aque spirituosæ egressæ porro immergantur cort. arantiorum, citri ana recent. & extim. unc. j. granor. chermes unc. s. ligni aloes opt. gum. \mathfrak{z} ii. croci austriaci \mathfrak{z} j. ambra grysea, moschi orient. opt. ana. \mathfrak{z} j. facta maceratione, duobus circiter diebus, in loco tepidiori, post coletur & filtretur essentia: in qua tandem dissolve, magist. solub. perlar. or. \mathfrak{z} j. corallior rubr. matris perlarum ana \mathfrak{z} ij. porro filtretur, & servetur essentia in vitro optimè munito; quæ, si sic necessitas ferat, syrupo de cinamomo, aut julapio rosarum, edulcorari potest, nam hac ratione, sine succharo & syrupis, essentias à fermentatione, sive & corruptelâ, diu munitas asservabis. Cardiacum est, magnæ virtutis, ad syncopas, tremores, animi defectiones & languores expectandum. A malignis & pestiferis præservat morbis. Dosis aliquot cochlearia.

Cordialis refrigerans. Ex eodem.

\mathfrak{z} l. Cort. arantior. recent. & extim. unc. \mathfrak{z} . citri recent. & extim. unc. j. granorum chermes drach. j. ambra grysea grana v. sem. citri excortic. \mathfrak{z} j. vel drach. β . sacch. can. albiss. unc. ij. contundantur optimè & diu in mortorio, ad pulvis formam; post diluantur aq. melissa, lilior. convallium, rosar. fragrant, de rubo idæo, ana sine addit, aq. simpl. still. unc. vi. flor. arantiorum Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

unc. ii. & colentur: filtreturque colatura; cui superaddito magist. nostro. solub. perlarum, orient. \mathfrak{z} j. corallior. rubr. matris perlar. an. \mathfrak{z} β . succi limonium, granator, ana recent. & jamiam express. unc. i \mathfrak{z} . syr. granatorum unc. ij. misceantur pro potu cordiali, & refrigerante; cujus unc. ij. tres, vel amplius, astuantibus, lassisque agris, iterato propinari poterunt, ambra autem, propter hos, quibus contrariatur, omitti potest; pari ratione aqua rosarum, quarum vices subeat aqua florum tunica.

Ad Gonorrhæam virulentam, ex Eodem.

\mathfrak{z} l. Vini albi rhenani \mathfrak{v} vi. huic immergantur incisa & confusa rad. ireos florent. unc. is. cyperi rotundi unc. j. herb. recent. mentha crispæ, hyperici floresc. ruta, scordij, rorismarin, flor. recent. nymphaeæ, rosarum, papav. errat. verbasci an. unc. ii. sem. fœniculi, agni casti an. unc. is. macis unc. β terebinthina clara \mathfrak{z} iv.

Factâ brevi digestionem, destillantur in balneo nostro v. poroso, evocentur autem saltem aquæ libra quatuor semis circiter, (nam phlegma vini, quod per distillationem ultimâ succedit, plenum nausæ, saporis & coloris ingratisimi, ad extrahendas Essentias ineptum) & paulisper asserventur. Liquori igitur huic, nonnihil spirituosæ, egressæ, oleo Terebinthinæ in superficie ab eo separato (quod eidem affectui etiam solum remedio est,) porro immergantur incisæ & contusæ; nimium.

\mathfrak{z} l. Rad. cyperi rotundi, ireos florentina, cynoglossæ, bistortæ, tormentillæ, an. unc. β . flor. recent. nymphaeæ, papav. erratici, rosar. rubr. an. \mathfrak{z} is. sem. agni casti \mathfrak{z} j. lacturæ, cannabis, papaver. albi, ruta, an. contus. cum modico aqua \mathfrak{z} vi. croci optimi \mathfrak{z} i. sacchari saturni resolut. \mathfrak{z} is.

Digestione factâ per dies aliquot, in loco tepido, fiat colatura cum forti expressione; quæ diligenter filtranda per chartam, & usui asservanda in loco frigido, efficaciter subservit hæc essentia ijs, quos virulenta & diuturnior gonorrhæa pessundedit. Sannat renum & parastaticarum glandularum ulcera, ad aliquot Cochlearia iteratò exhibita; præmissis purgantibus, ijsque à mercurio mutuatis, & injectionibus consimilibus.

Hepaticus & splenicus, ex Eodem.

\mathfrak{z} l. Olei tartari per deliquium facti \mathfrak{v} ij. ab hoc liquore abstrahatur, destillando per retortam vitream, in arenâ, tota humiditas, ad siccitatem alis tartari, in residuo manentis; quâ interim asservatâ, sumito vini albi rhenani \mathfrak{v} v. cui immergantur rad. recent. apij, pimpinellæ, enulæ, levistici an. \mathfrak{z} is. herb. recent. nasturtij hortens. cochleariæ, chærefolij an. \mathfrak{z} iv. roris marini, verbenæ an. \mathfrak{z} is. flor. recent. rosar. rubr. \mathfrak{z} iii. sem. fœniculi, apij an. \mathfrak{z} i. bacc. juniperi \mathfrak{z} is. lauri \mathfrak{z} is. cinamomi optimi \mathfrak{z} is.

Factâ brevi maceratione, abstrahantur destillando \mathfrak{v} iii. aqua egressa spirituosæ cum superiore liquore asservato, à sale tartari stillato, commisceatur; quibus dein immergantur sequentia minutim incisa; ut pote rad. recentis pimpinellæ, cichorij sylvestr. apij an. \mathfrak{z} i. herb. recent. Agrimonix, absinthij nostr. nasturtij hortens. Cochleariæ an. \mathfrak{z} is. flor. rosar. rubr. recent. \mathfrak{z} ii. cichorij recent. \mathfrak{z} j. sem. nasturtij, urticæ an. \mathfrak{z} i. tantali rubri \mathfrak{z} β . cremoris Tartari \mathfrak{z} j.

Factâ denuò digestionem, in loco frigido, aut cellâ, donec, aliquot dierum spatio, omnia sint collecta, fiat deinde colatura cum forti expressione, quæ

filtranda, & ului asservanda, in loco frigido, sine sacchari aut syrupi alicujus additione; ad evitandam fermentationem, quam saccharata in aquosis illico suscitant, poterit autem, urgente necessitate, hæc essentia syrupis appropriatis in instanti condiri ad lubium & gratiam.

Efficax & magnum auxilium hinc sibi polliceantur lienosi, scorbutici, & cujuscunque speciei hydropici; eodum essentia hæc hepatis, lienis, mesenterij, pancreatis angustias & obstructions feliciter referet, & tollat, Dosis ab unc. i. ad unc. i. ss.

Lithontripticus ex eadem Pharmac. Regia
Zuvelferi.

℥. Nucleor. persicor. ℥ii. cerasor. ℥vi. rad. rec. apij, liquiritia, petroselin, pimpinella, an. unc. i. ss. sem. nasturtij, apij, thlaspius, urtica, an. unc. j. bacc. juniperi unc. i. ss. alkekengi, ligni nephritici an. ℥vi. cinamomi acuti unc. i. macis unc. ss. borac. veneta ℥ii.

Nuclei persicorum & cerasorum, semina item, baccæ quoque juniperi & alkekengi, contundantur probè ac minutim in mortario, additâ s. q. aquæ cinamomi ad pulvis formam, his addantur radices recentes, nonnullis radulâ comminutis, reliquis incilis & contusis: quibus omnibus mixtis, atque cucurbitæ vitreæ injectis, superafundantur spir. juniperi rectif. è baccis ℥ii. Cerasorum lib. 3. vini rhenani optimi albi lib. iv.

Factâ digestionem, diebus aliquot, in tepido saltem loco, vitro probè clauso, fiat colatura cum forti expressione specierum, filtrata mox essentia servetur in vitro benè clauso: quæ quotiescunque trahenda in usum, syrupis appropriatis, utpotè acerositatis citri, fragorum, aut consimili, additis guttis aliquot spiritus vitrioli poterit alterari: respicit essentia hoc renum affectiones; celebris proinde est in Calculosis dispositionibus, in Dysuria, Tartaro & sabulo renum exorbitante; auxilio quoque est muliebri utero, cujus menstruum profluvium potenter excitat, absterfis crassioribus humoribus, ejusque sinus dilatando. Dosis unc. j. ad unc. i. ss. vel cochlearia duo, ad tria.

Liquor Silicum.

℥. Silicum calcinator. & pulv. q. v. misce cum Θ. Tartarum an. & probè calcina, tum in loco humido frigido liqueant in liquorem.

Præbet insigne diureticum & nephriticum à guttis, vi. ad ℥j. & ultra, sed sumi debent silices molles qui faciliè cultro atteri possunt, & qui ferro allisi scintillas non emittunt.

Spleneticus aperiens è Pharmac. Regia
Zuvelferi.

℥. Ol. tartari per deliquium facti ℥. ij. vini albi boni ℥. iv. camphoræ unc. ss. fiat per alembicum vitreum, in arenâ, abstractio totius humiditatis, ad siccitatem salis tartari, liquorique egresso iniciantur rad. recent. Apij, bryonia, pimpinell, feniculi, raphani hortens. ana conf. iss. & conquass. unc. i. ss. herb. recent, cochlearia, nicotiana, nasturtij hortens, verbena, persicaria, ana conf. iss. & conquass. unc. ii. sem. nasturtij, urtica an. unc. s. bacc. juniperi virid. unc. i. ss. pulv. gummi ammon, unc. s. vel unc. vi. salis ammon. unc. ss.

Factâ maceratione horis circiter xxiv. fiat Colatura cum forti expressione: expressum, si liber, quamvis non sit opus filtratione; citra quàm intensius agit, Epithema hoc eadem vires & effe-

ctus lienis communicat, quas, supra descriptum, hepatis: quare inde omnis informatio & notæ repetantur.

Liquor Tartari è Lexico Pharmac. Clariss.
D. Jungken.

℥. Tartari crudi ℥. i. nitri ℥. ss. alii ℥. i. pulveris sata exactè misce, ac in crucibulo deponantur, dehinc pulverisa, & affunde aq. fervent. ℥. iv. digere in loco calido per sex dies & noctes, quotidie agitando: postea colentur, colato lixivio adde tartari. el. pulv. ℥. i. digerantur ulterius diebus octo & c. postea filtrantur & servantur ad usum.

Quoad vires insigne exhibet deopipilativum lienis, aliarumque obstructionum v. g. mesenterij, mesium & c. Dosis Coch. ss. ad i. cum vehiculo idoneo.

Liquores è Pharmacopœa Bateana.

Liquor Sulphuris.

℥. Flor sulph. sacchar. cand. alb. aa. ℥j. m. F. Pulvis. induratis 4. ovi (vitellis) include, & probè ligata suspende super prunas, ut liquamen exudet. Quod serva ad usum.

Liquor acuens, vid. Lac Scammonij.
Liquor Cephalalgicus.

℥. Camphor. ℥ii. solve in pyrani ℥ii. qui rhodostigmatis q. s. excipiat in disco, calcificando ad medietatem siccit. tum insperge pulver. nuc. mosch. ℥j. zedoarie ℥ss. Fronti adhibere Cephalalgia.

Liquor Limacum.

℥. Fit ex limac. rubr. concisis & cum sal. comm. aa. in onanicam Hippocr. injectis, & in cellâ suspensis, usque destuant in liquorem, Servandum ad usum.

Liquores ex Hofmanni Thesauro Pharmac.

Liquor Oculor. cancr. D. D. J. M.

℥. Oculor. cancr. s. q. solve in sp. nit. rectif. ac. 2. tô temperatis s. q. inde retorta; abstrahere ad siccit. reliquam solutionem digere cum sp. vini. filtra.

Alius D. G. R.

℥. Ocul. cancr. crudos, misce pulveris. cum oleo tart. per deliquium parato, digere calore MB. per 10. dies & noctes in phiola. coagulato affunde sp. vini, stent in digestionem per aliquot dies & noctes, & effundatur impregnatus spiritus.

Liquor Perlarum.

℥. Perlarum s. q. affunde sp. salis comm. ad 4. digitor. eminentiam, abstrahere residuum & cum spir. vini circula.

Liquor Nephriticus D. D. Ch.

℥. Lapid. lyncis, judaici, lazuli, spongia, percar. ocul. cancr. aa. s. q. pulveris affunde sp. salis optimè rectific. s. q. stent in loco calido per tres dies ac noctes, postea per inclinationem separa solutionem, hanc destilla lento igne donec nihil phlegmatis prodeat, fracta vitro materiam induratum pone in cellam ad deliquium, solutionem tertia vel quarta vice destilla, & in loco frigido rotas per deliquium solve, demum cum sp. vini digere.

Liquor Lithontripticus D. D. Z.

℥. Tart. crudi pulveris. lib. j. lapid. judaici, lyncis, spong. oculor. cancr. crystalli aa. ℥i. ss. reverbera invicem per

per aliquot horas, ut fiat inflar creta. Inde encurbita, affunde aceti still. j. q. digere per 4. septimanas, decanta, filtra, abstrahere per MB. & residuum solve p. d. solutum cum sp. vini digere.

N. Ad eundem modum & liquor Cordialis D. D. I. M. parari potest ex ocul. cancr. marg. ir. corall. rub. lap. percar. ebor. & C. C. solut. cum sp. sal. & demum cum sp. vini circular.

Liquores varii ex Hadriani à Mynsicht Arma-
mentario Medico-Chymico.

Nectar Vitrioli.

℞. Sacch. cand. alb. ℥x. spir. vitriol. rectif. ℥ij. M. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum & sordium injurias per aliquot menses reponere, usque dum materia nigra picis instar appareat. Postea ℞. pulvis hujus nigra ℥iv. aq. rosar. fragrantiss. ℥b. iß. mentha crispæ ℥b. ß. cinnamomi buglossata ℥vi. syr. acetosificatis citri ℥iv. man. Christi simpl. ℥ii.

Vires, Usus, Dosis. Ad ventriculi intemperiem tam frigidam quam calidam valdè commendatur: ejus enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab ℥. ii. ad ℥. iii.

Liquor Vitriolatus.

℞. Syr. Violarum vel rosar. ℥b. ß. suc. citri vel limonum ℥. iv.

Diligenter misce. & mixtis adde:

Aq. endiviæ ℥. x. acetosæ, rosarum an. ℥. viii. nymphaeæ, scabiosæ an. ℥. vi. cinnamomi buglossat. an. ℥. ii. sp. vitrioli q. s. ad gratiam acetositatem.

Denuò misce pro usu.

Vires, Usus, Dosis. In Peste, morbo Ungarico, Febribus ardentibus, ceterisque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucunde humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab ℥. ij. & ℥. iii.

Liquor Ophthalmicus subalbidus.

℞. Aq. ophthalmic. de cancri ℥. ß. euphrasie, fœniculi an. ℥. ii. troch. & pul. ophthalmic. nost. an. ss. i.

Misce. & f. l. a: Collyrium subalbidum.

Vires, Usus, Dosis. Miræ virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum: Gutta-
tim potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum: Cujusvis enim acrimonie expers est. Ex ea etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusculos dies irrigari debent.

Liquor Nitratus.

℞. Aq. è suc. card. bened. destillat. ℥. xix. rob. ribium ℥. iv. man. christi simpl. ℥. ii. nitri præp. ℥. i.

Misce. accuratè, ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis. Est insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum refrigerans, &c. in omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dosis per se ab ℥. j. ad ℥. ii. & ℥. iii.

Liquor Cephalicus.

℞. Aq. apoplectic. nost. ℥. iv. epileptica, lilior. convul. an. ℥. iii. majorana, betonica, salvia, an. ℥. iß. rot. diambra ℥. j. conf. smaragdina ℥. ß. sal. succini ab. ð. j.

Fideliter misce & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis. Ad passiones Capitis valde utilis; Cephalagici; Hemicranici; Mang. Bibl. Pharm. Tom. I I.

Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis, &c. præsentis auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilizat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à Coch. j. ad ij.

Liquor Pectoralis.

℞. Aq. cinnamomi buglossat. caponis ana unc. iv. pulmon. vituli, hedera ter. veronica, farfara ana unc. iiii. lact. sulphuris ℥. iiii. flor. sulphuris ℥. jß. mag. corallorum rub. ℥. j. perlar. orient. ℥. ß.

Misce & cum Man. Christi simpl. ℥. iiii. edulcora, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis. Mirabiliter Asthmaticos; Peripneumonicos, Phthisicos & Hecticos juvat. Cor confortat. Periculose seu graviter ruffientes non sine admiratione liberat & pristinae sanitati restituit. Dosis manè, meridie & vespèri à Coch. j. ad ij. Et priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

Liquor Cordialis.

℞. Aq. cordial. frig. & calida nost. ana unc. iv. cinnamomi buglossat. ex corde cervi ana unc. conf. alhermes ℥. ii. sal. perlarum orient. corallor. rub. ana ð. j.

Mixta edulcorentur Man. Christi simpl. ℥. jß. & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis. Cardiacis & præter rationem tribulatis prodest: Palpitationem, tremorem & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque à Peste, & alijs malis quam plurimis præservat. Dosis à Coch. j. ad ij.

Liquor Acidus Perlarum orientalium.

℞. Aceti à solutione margaritar. orient. in B. M. iterum abstracti ℥. ii. sp. vitriolici cum sp. vini debitè rectif. unc. j.

Misce & accipies liquorem subalbidum; miræ operationis, quem thesauri instar ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis. Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, & cetera membra principalia corroborat. Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepa, Lue Venera, præservat. Aegris convalescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; nec non in Febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à ð. s. ad ß. j. & ℥. s. in vehiculis appropriatis.

Liquor Acidus Coralliorum rubeorum.

Eodem quoque modo fons acidus Coralliorum præparatur ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; nec non ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbosque internos quam plurimos radicitus evellendum, & Spiritus animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à ð. s. ad ℥. j. & ð. s. in vehiculis specificis.

Liquor Nephriticus.

℞. Aq. è citreis malis per se in B. M. destillat. nephritice nost. an. ℥. jß. syr. è suc. violarum ℥. j. saccharicandi alb. unc. j. sal. lap. percarum. pisc. ocul. cancri an. ℥. j. nitri cum flor. sulph. præp. sal. succini, alb. an. ℥. j.

P 3

Vires

Vires, Usus, Dosis. Ad frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, urinam ciendam, doloremque inde natum sistendum, efficacissimusest. Dosis manè jejuno ventriculo, vel longè à cibo à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

Liquor Diaphoreticus.

℥. Aq. Theriacal. nost. ℥. vj. Sp. Tartari aliquoties rectif. ℥. iij. Terra sigillat. per se destillat. rectif. Lig. Guajaci rectif. Liq. Acidi Perlarum orient. Acidi Corrallor. rub. ana. ℥. s.

Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis. Omne venenum à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasiâ, Epilepsiâ, Melancholiâ, Angina, Paralyfi, Hydrope, Ictericâ, Pleuritide, Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus, & putrefactionibus, præ alijs medicamentis hoc solum excellit. In Paralyfi quotidie exhibitus, miraculose juvat. Penetrat omnes nervos, musculos, & totam medullam; & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à Drach. ʒ. ad Drach. j. & Drach. ij. in aq. Cornu Cervini nost. vel Card. bened. aut alia morbum propriè respiciente.

Liquor Refrigerans.

℥. Aq. è Suc. Cichorei destill. Rubi Idai Card. bened. Rosarum, Endivia, Acetosa ana ℥. v. Rob. Ribium & Berber. sine saccharo parat. Syr Acetos. Curi an. ℥. ij. Nitri præp. ʒ. vj.

Misc.

Vires, Usus, Dosis. In morbis æstuantibus, Febribusque acutis &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis ab ʒ. ij. ad ʒ. iij. pro una vice.

Liquor Vulnerarius.

℥. Rad. Galanga min. Zedoaria, Oculorum Cancrini macis ana ℥. s. mumia transm. ʒ. ii. nuc. vomic. Gran. xv.

Crassiuscule contusa infund. in Vini generosi Lib. j. stent in loco tepido.

Vires, Usus, Dosis. De hac mixtura Dosis manè & vesperi Cochl. j. adeo efficaciter operatur, ut si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellar, sed in vulneribus capitis nux vomica omitatur.

Liquor Camphoratus.

℥. Spir. vini camphorat. ʒ. ij. aq. omnium florum spermatis ranar. ana ʒ. js. sulphuris anodyn. Vitrioli ʒ. j. styrac. liquid. opii Thebaici, spirit. Vitrioli an. ʒ. s.

Misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis. Cum petijs loco affecto applicetur: Arthritic. enim dolores à causa calida ortos, egregiè sopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. ʒ. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

Liquor Tartareus.

℥. Vini Rhenani opt. ʒ. fervent. ℥. j. tartari vitriolati ʒ. i.

Mixtis & f. a. dissolutis adde:

Aq. hordei cum passulis min. ʒ. cinamomi coct. Syr. è suc. Violarum. ana ℥. s.

Misc. pro usu.

Vires, Usus, Dosis. Est universale digestivum, quod in morbis quam plurimis, medicamentis catharticiis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensâ Febris aut Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurora, si verò paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continetur, & his per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Alvus semper sit libera; si enim alvo constipata offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & absterfa, cum non possit excerni, in flatu, qui dolores excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opus est, bonus haustus pro una vice.

Liquor Arthriticus.

℥. Mellis virginei cum favo ℥. ii. vitrioli ad flaved. calc. ℥. i. filicem fluv. calc. ℥. s. rorismarin. verbenæ ana ʒ. vj. hermodact. alb. ʒ. iij. gum. ammoniac. mastichis, elibani, myrrha rub. bdellii, opopanax. ana ʒ. ii. sulphuris curin. salis marin. tartari alb. ana ʒ. is. Suc. hyoscyami inspiss. mumie transform. opii thebaici ana.

Mixtis affunde Sp. Vini è fecibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. residui Lib. v. vel q. s. & digerantur per aliquot dies: Postea per alembicum vitreum bene lutatum, addito satis magno capitello, cum Recipiente capaci secundum gradus, quamdiu vides guttas seu spiritus exire, destillentur; dein de frigescat. Caput mortuum seu feces pulverizentur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secundâ vice destilla. Hic labor tertiâ vel quartâ vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires & Usus. In omnibus diuturnis, & inveteratis doloribus, & defluxionibus membrorum & juncturarum, secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen intervallis, donec cruciatus & dolores omnes cessent.

Liquor Antipodagricus trinunus.

1.

℥. Sp. vini opt. rect. ℥. ii. aq. spermatis ranar. ℥. js. mellis virginei ℥. i.

Misc. & in BM. dest. & liquorem evocatum seorsim custodi, capiti mortuo & pulverisato adde:

Lixiv. sarmentor. vitis ℥. ii. tartari alb. ℥. s. Phleg. vitrioli à spiritu nondum separati ʒ. iv. castorei veri ʒ. vj. croci orient. ʒ. s. terebinth. venet. ʒ. ii. salis fusi ʒ. j.

Macerentur per 24. horas; postea destilla & liquorem destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denuò exempto & pulverisato affundatur liquor primæ destillationis reservatus totus. Misc. iterum, & post debitam digestionem tertiâ vice destilla; Ultimo liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B. M. rectifica & serva, signeturque. *Aq. Spermatis Ranarum composita.*

2.

℥. Caryophyllorum. ʒ. vj. Hermodactylor. alb. Rac. Juniperi ana ʒ. s. nuc. moschat. ʒ. ii. herb. verbenæ, fol. sambuci an. m. ii. flor. lavendulæ, spica nard. majorana rorismarin. betonica an. m. j.

Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in vini Rhenani opt. Lib. v. Stent in digestionem per 24. dies ac noctes; postea per alembicum destillantur, signeturque:

Aqua Arthritica.

℥. Alu-

3.

℞. *Aluminis* ℥. ii. *vitrioli alb. virid. aris an.* ℥. s. *Tartari alb. Lithargyrii, ss. sepiæ, cerussæ an.* ℥. iv.
Subtilissimè contusa misce, evapora, & evadit griseus lapis, signetur:
Lapis admirabilis.

4.

Nunc sequitur compositio.

℞. *Aq. sperm. ranar. comp.* ℥. iv. *arthritis* ℥. j. *lap. admirabil.* ℥. iii. *cryst. nitri* ℥. ii. *croci orient.* ℥. s.
Mixa stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

Vires, Usus, Dosis. In hoc liquore (quo hodierni Chymici & Practici felicissimè utuntur) immerge lintea, & calido loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitus evanescant. Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & adventitij humoris impetum propulsiandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quod tribus constet compositionibus.

Liquor Vestimentalis.

℞. *Aq. Fontane* ℥. ii. *cineris clavellat. ad quantitatem nucis jugland. major. malorum citriorum minutim incis. n. i.*

Misce & stent in digestionem per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad usum reserva.

Vires & Usus. Omnes sordidas, oleosas & quasi piceas maculas, tam ex pileis quam vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombicinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

Liquor Mercurij Vivi.

℞. *Mercurij vivi aq. fortis an.* ℥. j.
Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde:

Aq. plantaginis ℥. ii. *lap. medicament. cum aq. rosar. fact.*

Misce & ad usum repone.

Vires & Usus. Liquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniaque ulcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia & sordida desiccant & cicatrice tegit. Morpheam, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos vel dentes attingas.

Liquor Cerussæ.

℞. *Cerussa vera* ℥. j. *Nihil sicci* ℥. s. *lap. calaminaris, lithargyrii ana* ℥. ij. *tutia preparat. spodii ana* ℥. j.

Subtilissimè pulverisatis & mixtis affunde:

Aq. semper-vivi domest. plantaginis major. rosarum rub. an. ℥. iii.

Denuò misce & ad usum repone.

Vires & Usus. Externe membra tumore, rubore, & inflammatione aliqua infestata, refrigerat & desiccant. Dolores sedat, Oculorum lippitudines curat. Citrinæ faciei totiusque cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam & nitentem reddit. Usus ejus in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

Liquor Tutie.

℞. *Tutia preparata lithargyrii, cerussæ, camphoræ,* ℥. j. *aluminis crud.* ℥. s.

Omnibus diligenter mixtis adde:

Aq. plantaginis rosarum an. ℥. iv.

Iterum misce & ad usum communem reponere.

Vires & Usus. Partes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccant, propterea omnibus inflammationibus, & tumoribus conducit.

Liquor Mercurij Saccharatus.

℞. *Aq. plantaginis, rosarum ana* ℥. iv. *cerussæ* ℥. j. *mercurij sublimat. sacchari cand. alb. spir. vini opt. ana* ℥. s.

Misce & adde: *Aq. fortis* ℥. j. & signetur *Flechtenwasser.*

Vires, Usus, Dosis. Impetiginem & Lichenes omnes etiam contumacissimos curat. Ante usum autem, semper moveatur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

Liquor Mercurij Acetosus.

℞. *Vitrioli alb. camphoræ an.* ℥. s. *mercurij sublimat. cerussæ, tartari alb. aluminis ust. an.* ℥. ij. *nihil alb.* ℥. s.

Misce & f. pulvis. ℞. hujus pulveris ℥. s. *Aceti Vini opt.* ℥. iv. Denuò misce, & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis. Utimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfecte sanandas.

LITHANTHRAX, vid. Carbo Petra.

L I T H A R G Y R U S.

Lithargyrus, vel *Lithargyrium* plumbum est scorijæ cupri imprægnatum, & quasi in spumâ metallicâ formam per calcinationem redactum. Paratur hæc materia dum cuprum purificatur postquam è fodinis suis, in Polonia, scil. Suecia ac Dania exemptum est.

Dux *Lithargyri* dantur species, quarum alia coloris est flavi subrubentis, quæ *Lithargyrium auri* vocatur, seu *Chrystitis*, seu *Celaunitis*: Alia coloris est alii quatenus argentei, & propterea *Lithargyrium argenti*, siue *Argyritis* dicitur. Varietas autem coloris in duabus hisce *Lithargyrii* speciebus aliam causam non agnoscit quam magis vel minus intensus calcinationis gradus: Scilicet *Lithargyrium auri* ignem diuturniorem ac vehementiorem passum est quam *Lithargyrium argenti*. In utroque *Lithargyrio* vix aliud quam plumbi materiam reperire est, quandoquidem paucæ admodum cupri scorijæ in ijs restant.

Conficitur etiam *Lithargyrium* dum aurum ac argentum per cupellam seu cineritium depurantur, sed parçâ quantitate, hoc autem à priori non differt.

Lithargyrium seligatur in parvula frusta dissectum, probè calcinatum, purum, coloris intensioris, ponderosum. Quod Dantzicho ad nos advehitur multò pulchrius est quam quod ex Anglia adducitur. Figuli eo utuntur pro eleganti vernice coloris ænei viridis suis operibus conciliando. Adhibetur itidem à pictoribus, tinctoribus, pellionibus atque ijs qui telas cetatas conficiunt. Sed præterea medicis usibus non parum inservit: *Lithargyrium* etenim desicat, deterget, refrigerat, corpusque ac consistentiam præcipuè emplastrorum parti conciliat, dum in oleis ac pinguibus per coctionem dissolvuntur.

Lithargyrium sic vocatur à *λίθος* lapis & *ἀργυρος* argentum.

LITHOPHITON, vid. *Corallina*:

LITHONTRIPTICA, vid. *Nephitica*.

LITHOSPERMUM, vid. *Milium Solis*.

L I T U S.

Litus, seu *Linimentum* consistentiam habet mediam inter oleum & unguentum, oleo crassius, unguento liquidius est.

Componitur ex oleis, axungijs, butyro, pulveribus, medullis, unguentis. Proportio ea esse debet ut ad duas olei partes sit una axungia, aut butyri, pulverum parum.

Dosis totius linimenti est ad ℥iv. plus minus pro partis affectus magnitudine. Cera non est addenda quia poros obstruit.

Uusus est 1. ad refrigerandum & demulcendum dolorem in partibus æstuantibus.

℥. Unguent. rosar. Mesues & cerat. refrig. Galeni loti in oxyc. āā ℥j. sal. saturni ℥j. succi endivia q. s. f. *Linimentum*.

Pars æstuans vel inflammata illiniatur hyeme tepide, æstate frigide.

2. Ad pectus laxandum. In causa calida, ut peripneumoniz, pleuritide, tussi, solo utimur oleo amygdal. dulc. pro pectoris linimento.

3. Ad refrigerandum, laxandum & demulcendum dolorem in nephritide sive febre.

℥. Unguenti de alb. ℥j. olei scorp. Matth. ℥β. olei lilior. q. s. f. *Linimentum quo lumborum regio illiniatur*.

4. Ad resolvendum & roborandum in paralyti, convulsione utere balsamo Guidonis.

5. Ad mitigandos dolores hæmorrhoidum eorumque tumores discutiendum.

℥. Unguenti ros. loti in aq. rosar. ℥ij. mercur. crudi ℥ii. M. f. *Linimentum*, Tencke.

Hactenus de Litibus in genere, sequuntur jam varia eorundem Formule ad varios usus ex variis Auctoribus.

Linimentum de Hi, Balsamus Hi ex Schrod.

Solve Sal H. in ✕, ut optimè eo impregnetur, hinc abstrahere aliquantulum ✕, misceque huius ℥viii. cum olei rosar. unc. iv. &c. agitaque ut f. *Linimentum*.

Vires. Confert Inflammationibus, & ambustis illitum.

Linimentum Hi compositum, seu Linimentum de amianto. ex Schrod.

℥. Amiant. ℥iv. plumb. vst. ℥xii. tui. preparat. ℥ii. calcinentur, deinde pulverisata macerentur cum ✕, ac quotidie per mensem materia agitetur semel: post mensem bullianda est unius hora quadrante, ac quiescere finitur, donec clarescat.

Deinde,

℥. Aceti huius clari. ol. rosar. an. misc. optimè, donec f. *linimentum*.

Vires. Miraculosum est, ad tineam puerorum, & ad ulcera tibiarum sananda. Inungitur scil. pueri caput totum ad scabiem, Ulcera vesperi inunguntur, Boërius de Boodt.

Linimentum dentifricium, ex eodem.

℥. Rad. ireos ℥j. pumic. ℥iβ. alum. vst. ℥β. oc. &c. corallor. rubr. an. ℥j. pulverisata excipiantur melle rosato f. *linimentum*.

Linimentum Errhinum, ex eodem.

℥. Succ. ireos. cyclamin. majoran. beta ana ℥iβ. ol. irin. ℥vi. elaterii gran. vii. cum cera. f. *linimentum*. Crato.

Linimenta varia ex D. Charraz.

Linimentum hæmorrhoidale.

℥. Flor. sulphur ℥ii. olei ovor, ℥β. olei rosati ℥i. m. f. *linimentum hæmorrhoidibus admovendum. vel.*

℥. Sal saturni ℥β. olei camomilla, rosati, succi capillor. vener. an. ℥ii. f. ex a. *linimentum ad formam nutriti. vel.*

℥. Olei lini, pulpa cepa sub cineribus cocta an. ℥i. cera alba ℥β. f. ex a. *linimentum. vel.*

℥. Pulpa millepedum, unguenti populei, olei ovorum an. ℥j. extracti opij ℥β. m. f. ex a. *linimentum*.

Linimentum ad Herpetes.

℥. Mercurij præcipitati rubri, vitrioli viridis ana ℥j. aluminis vst. ℥β. viridis aris, boracis ana ℥ii. succi lapathi acuti ℥i. axungia porci, butyri recentis ana ℥iv. olei hyosciami expressi ℥i. f. ex a. *linimentum*.

Linimentum Ischiadicum.

℥. Canes novissimè natos & talpas viventes ana n. iii. lumbricor. terrestr. ℥j. folior lauri, rorismar. mentha, majorana, lavendula, serpylli, hyperici ana m. j. coquantur in olei communis, & vini rubri an. ℥. iii. ad vini consumptionem, postea colentur, & fortiter exprimantur, addendo expressioni cera citrina, & axungia anseris an. ℥x. & factum erit *linimentum*. Sed ad dolores ischiadicos & rheumaticos calide prope ignem parti affe-da inunctum.

Linimentum ad variolarum cicatrices prohibendas.

℥. Lithargirij auri prepar. cerussa in aq. rosar. lota ana ℥j. olei semin. 4. frigidior. maj. mundator. amygdalar. dulc. & ovorum an. ℥β. aquar. solani, plantaginis an. q. s. f. ex a. *linimentum ad formam nutriti*.

Linimentum ad arcendum vomitum.

℥. Ol. nuc. mosch. express. & aq. regin. hungar. āā. ℥β. olei still. absint. ℥j. mastich. elect. subtiliter pulver. ℥ii. m. f. e. a. *linimentum stomacho calidè applicandum*.

Linimentum Somniferum.

℥. Unguent. ros. & popul. āā. ℥j. olei sem. hyosc. expr. ℥ii. extr. opij liquidior. ℥j. m. f. *linimentum ad usum*.

Applicatur fronti & temporibus pro sedandis doloribus capitis, & somno conciliando.

Litus Varii ex Vveikardi Dispensatorio.

Linimentum pro Renibus.

℥. Pinguedin. cuniculi, capon. mucilagin. sem. althæa cum aq. parietaria facta āā. ℥ii. unguent. ros. ℥i. olei scorpion. ℥β. acer ℥ii.

M. & hoc Linimento lumborum regio inungatur.

Linimentum in Dolore Capitis sistendo utile.

℞. Unguenti alabastrin. populeon. an. ʒ. ii. opij gr. ij. ol. papav. ʒ. j. β. nucis mosch. express. gr. iv. Fiat mixtura qua frons & tempora illinenda.

Aliud in dolore podagrico.

℞. Mucilag. sem. fœnugr. psyllij, sem. Albea an. ʒ. j. β. Additis ol. rosar. & chamamel. an. q. s. extrahantur Mucilagines cum Aceto, & talis mixtura linteis excepta parti dolenti admoveatur.

Linimentum ad intertiginēs.

℞. Medull. seu sevi cervini ʒ. β. Butyri recent. ʒ. j. Ceruss. lot. ʒ. ii. lithargyr. lot. ʒ. i. β. Myrrha. Drach. j. Modico ol. Amygd. dulc. fiat linimentum.

Linimentum ad Mammillarum dolores lacte turgentium & inflammationes usu crebro probatum.

℞. Ol. lini ʒ. iii. papav. ʒ. j. cera nova ʒ. ii. liquefiant, & linteis excepta mammis imponantur.

Aliud dolorem sistens ex inflammatione.

℞. Ol. Nenuphar. papav. hyoscyam. an. ʒ. j. cremor. sem. psyll. rad. alib. sem. lini extracti cum aq. solan. an. ʒ. β. urq. rosar. ʒ. j. β. Misc. f. linim. quo partes affectæ calidæ illinantur.

Linimentum defensivum.

℞. Boli armen. loti, sanguinis dracon. Corall. rubror. lapid. hamatit. an. ʒ. ii. croci martis, cerussa an. ʒ. j. ol. rosar. omphac hyoscyam. an. ʒ. j. aceti vini. ʒ. j. cera modicum. Misc. f. Liniment.

Linimentum ad capitis vulnera cum cranij fractura.

℞. Mellis rosati colati. ʒ. ii. ol. quarum vel rosar. ʒ. j. terebinthin. lota ʒ. β. Fiat mixtura, quæ syndone rubra excepta duræ matri detectæ imponatur, ubi vero dies septima vel undecima præterierit, sequentia parti affectæ applicanda.

℞. Mell. rosat. colati ʒ. ii. terebinthin. lota ʒ. j. spiritus vini, g. x.

Miscēs omnia simul, calefiant lento igne & linamenta tenuissima hisce imbuta actu calida applicentur, & si olei de Myrha ʒ. β. addatur, commodissimum & aptissimum erit.

Aliud ad ossa corrupta, & ulcera maligna quo tamen cautè utendum.

℞. Ol. stillat antimon. ʒ. iii. vitriol. tartari an. ʒ. iii. sulphur. myrh. ligni guaiaci an. ʒ. j. garyophyll. ʒ. β.

Misc. omnia, & cum uti voles, os corruptum bis terve tangatur Bombace in hoc Linimento intincto, quod ad extremum specilli alligandum, ac tum os à carie sanabitur, simulque quod corruptum est dilabetur.

Linimentum in dolore pleuritico.

℞. Ol. chamamel. irini an. part. equal. Aceti vini partem unam, misc. Fiatque Linimentum, quo latus affectum inungatur.

Linimentum ad ambusta vulnera.

℞. Lardi saliti ℥. β. Incidat. minutis. & ad flammam liquato adde. Cort. medior. sambuc. virid. m. i. β.

Coque omnia simul & exprimantur fortiter, colatura inungatur locus adustus bis quotidie.

Aliud Empyreuma extinguens.

℞. Ol. nuc. jugland. semin. lini an. part. æq. unguent. populeon. part. i. vitellor. ovor. num. iv. salis parum: aqua ex spermat. ranar. elicitæ ʒ. j. β.

Coquantur ad Aquositate consumptionem, postea exprimantur fortiter, expresso utere ut jam dictum.

Aliud ad ambusta paratu facile.

℞. Butyri majalis ℥. β. vel ol. rosati, vitellor. ovorum num. 6. nitri albi ʒ. i. capar. minorum incisar. num. ii. corticis medii sambuci p. i.

Misc. & bulliant lento igne donec vitella ovorum prius indurata fuerint, postea colentur cum fortissima expressione fiatque linimentum, quo pars affecta ter aut quater in die inungatur.

Aliud præstantissimum linimentum ad empyreuma pulveris Tormentarij restinguendum.

Butyrum liquefactum summeque fervens in Aquam ex spermate Ranarum destillatam injice, id decies aut sæpius repetendo, donec Butyrum lactis instar albescat, ejus itaque preparati ʒ. iiii. misc. cum ʒ. i. ol. lacteorum ovorum fiatque linim. quo partem pulvere Tormentario maculatam inungas, est enim ad id singulare Remedium.

Sequens etiam laudatur.

℞. Calcis in vino generoso extinctæ ℥. β. Exsicceetur iterum & pulverifetur subtilissimè, misc. cum f. q. ol. communis, fiatque linimentum molle quo bis in die mane & vesperi pars læsa illinatur.

Linimentum ad Scissuras papillarum Laciantium.

℞. Herba vulneraria, quam nonnulli virgam Auream vocant, Geranij an. part. equal.

Colligantur tempore Maji, incidantur & contundantur in mortario, deinde coq. in butyri Majalis non saliti quantitate sufficiente, exprimantur fortiter & expressum reſervetur usui.

Linimentum infrigidans puerorum.

℞. Ungu. Rosati, populeonis an. ʒ. i. β. ol. violar. Nymphae an. ʒ. i. ceruss. lota. ʒ. ii. camphor. ʒ. i. cera virgin. ʒ. i. aceti rosar. ʒ. i.

Coquant. ad ignem donec Acetum fuerit consumptum, removeantur ab igne, & cum infrigidari ceperint, cerussa pulverisata inspergantur fiatque Linimentum.

Aliud in dolore Renum & expellendo calculo.

℞. Unguent. rosar. infrigidant. Galeni an. ʒ. i. β. ol. scorpion. Amygdal. amarar. an. ʒ. β. Amygdalar. amarar. excort. & subtiliss. tritarum ʒ. iii.

Misc. f. linimentum.

Aliud in inflammatione Renum.

℞. Ungu. infrigid. gal. rosar. Populeon. sing. ʒ. j. β. ol. violar. Nymphae an. ʒ. j. Aceti rosar. ʒ. β. spec. Diatrion. sant. ʒ. j. Pulv. rad. plantaginis aquaticæ, ʒ. β.

Misc. & coquant. lento igne exprimantur per linæum, & expresso utere.

Aliud

Aliud Nephriticum, uterere dilatans.

℞. Ungu. rosar. ℥. j. ol. Amygdal. dulc. ℥. ℞. Amygdal. amarar. num. vi.
F. Linimentum.

Aliud in Dolore Pleuritico valde utile.

℞. Rad. Alth. minutim incis. ℥. ℞. sem. lini ℥. ℞. fœ-nugrac. ℥. ii.

Cum aqua Malvæ q. s. extrahatur ut moris est mucago, cui adde ol. Amygdal. dulc. ℥. iiii. de floribus chamom. roman. ℥. j. misc. pro linimento, quo pars affecta bene inungenda, & linteis calidis duplicatis fovenda, valet ad sistendum dolorem in parte quacunque.

Aliud pro Lumbis in dolore calculi.

℞. Mucag. sem. lin. fanug. cum aq. malva extracta an. ℥. ii. butyri recentis loti in aq. rosar. ℥. ii. adipis cuniculi ℥. j. ℞. ol. lilior. albor. violar. an. ℥. j. ol. scorpion. ℥. j. ℞. cheyrini ℥. j. aceti cochlearæ j.

Vel si nulla adsit inflammatio, loco aceti sumatur aqua vitæ simpl. tantundem, fiatque Linimentum, quo spina dorsi circa fornacem calidam mane & vespere inungatur, imprimis valet quando calculus ejici nequit, nam hoc linimentum partim anodynon est, partim emolliens, & aperiens meatus urinarios.

Aliud in Paralyfi & resolutione membrorum.

℞. Ol. vulpini ℥. j. costin. amygdal. amar. an. ℥. ℞. butyri recentis majalis ℥. ℞. pingued. catti sylvestris ℥. iiii. taxi, anatis vel anseris an. ℥. ii. humana, ℥. j. ℞. camphor. ℥. j. stacta ℥. j. pulver. sem. nigell. flor. lavend. an. ℥. ℞. aq. vitæ simplicis cochl. iii.

Misc. lento carbonum igne, & exprimantur per linteum rarum. fiatque linimentum molle quod reseruetur usui in vitro benè munito.

Aliud ad Motus imbecillitatem.

℞. Ol. laurin. mastichin. an. ℥. ℞. juniper. ℥. ij. petreæ ℥. i. stillat. lavendul. ℥. ii. garyophyll. ℥. i. nucist. express. ℥. i. styrac. liquiae ℥. ℞. spiritus vini ter sublimati ℥. j. ℞. sevi cervini ℥. iij.

Misc. pro linimento, quo spina dorsi inungenda.

Linimentum meum Cordiale quando quis peste correptus.

℞. Ungu. rosar. Mesua. ℥. ii. ol. scorpion. simplio. ℥. j. ℞. magni Matthiol. ℥. ii. nucis moschat. express. ℥. j. stillat. cortic. citri. ℥. iv. camphora ℥. i. antidoti Matthioli, theriac. Andromachi an. ℥. j. ss. aceti rosarum ℥. ii.

Misc. fiatque Linimentum quo cordis regio diligenter illinenda, antequam epithemata applicentur.

Aliud cordiale.

℞. Unguenti rosati vel pomata pretiose ℥. ss. ol. stillat. de corticibus citri ℥. ss. cinamom. g. iiii. aceti rosar. g. v.

Misce pro Linimento, cujus usus sit idem.

Linimentum Melluminatum, & aliud Linimentum simplex è Pharm. Batcanâ.

Linimentum Melluminatum.

℞. Pulver: aquileg. salvia, mentha, nucis. moschat. aa ℥. ℞. alum. vsti ℥. j. mellis ℥. iv. m.

Facit pro ulceribus gingivarum, inflammationibus, laxitate.

Linimentum Simplex.

℞. Succu solatri, olei rosar. aa ℥. xxx. coq. ad succi consumptionem colat. add. lithargyr. ceruss. aa ℥. j. m. f. a.

Linimentum egregium in Arthritide vagâ D. le Mort è Collectan. Chymic. Leydens.

℞. Olei castor. vulpini aa ℥. ii. chamamelini, anethini aa ℥. j. sapon. veneti ℥. j. camphor. ℥. j. sp. vini rectif. ℥. ii. agitentur tamdiu simul, donec in linimentum album fatiscent.

Inde fit etiam oleum & spir. egregij usus in diureticis.

Linimenta varia ex Freder. Hoffmanni Thesauo Pharmaceutico.

Linimentum Salutis D. R

℞. Ung. rosar. Mes. ℥. j. theriac. ℥. vj. spec. cordial. temperat. ℥. ii. santal. citrin. ℥. j. croci or. ℥. ss. camphor. ℥. ss. cum ol. scorpion. f. q. & balsam. citri. rhtæ. angelic. salvia. an. ℥. j. f. linimentum.

Usus. Externe in febribus malignis & virium debilitate scrobiculo cordis cum linteo imponitur.

Linimentum Nasale Ejusd.

℞. Fl. lavendul. anthos. salvia. an. p. j. gummi ammoniac. castorei an. ℥. iv. heliebori alb. ℥. iv. semin. nigell. sesel. pyrethri. an. ℥. i. cubeb. piper. alb. an. ℥. ss. scammon. elaterij. an. ℥. ss. moschi ambr. an. g. v. subtil. pulveris. incorpor. ol. urini f. q. pro linimento.

Vires. Errhinum est exquisitissimum contorto linteolo nasibus inditum.

Linimentum ad Ariduras.

℞. Ung. alth. ol. popul. lauri. an. ℥. iis. ol. olivar. junperi. an. ℥. v. lumbricor. ℥. ss. ping. taxi. ut si. an. ℥. ss. sem. cymini ℥. j. sev. cervini ℥. ss. ⊕ ℥. ss. cervi virgin. ℥. ss. f. linimentum.

Linimentum pro Nervo retracto.

℞. Pinguedin. human. taxi, viperar. an. ℥. j. ol. lumbricor. succi alth. an. ℥. ss. cera parum m. f. linimentum.

Linimentum in Contracturâ.

℞. Euphorbij. spec. diatr. piper. semin. urtic. an. ℥. ij. Opiumos. ℥. ss. cantharid. ℥. ss. ping. vulpis. taxi ol. lumbricor. an. ℥. j. f. linimentum molle.

Linimentum pro penis erectione.

℞. Succu pastinac. ol. sinapi. an. ℥. ss. ovar. formicar. magnar. ℥. ss. pistentur & exponantur Olyper & p, deinde misce omnia in formam linimenti.

Usus. Hoc inungatur glans ante coitum; & si penis remaneat rigidus, aqua tepida abluatur, sic enim deprimitur.

Linimentum Antipodagricum W. P.

℞. Vitrioli ad albedin. calcinat. q. v. destilla ut moris

moris est tum separa phlegma vel per alemb. vel per retort. liquorum adhuc per se semel pelle per retort. quo phlegma rite separatur, quod serva.

℞. Pingued. porc. recent. ℥. xxiij. coq. donec nigrescat, inde cucurbit. adde prioris liquoris ℥vi. β. probè obtura & agita invicem: postea coq. in aren. donec penitus nigrescat, non nunquam parum agitanda. Huius, adde vini è caryophyll. cinnam. nucist. zinzib. aliban. mastich. myrrha, craco & spir. juniper. affati ℥iii. ℥vi. ol. spic. ℥ii. pone ad refrigerandum. Hoc linimentum penes ignem locus dolens ter de die illinendus & postea temper obligandus.

Linimenta varia è Pharmac. Persicâ.

TELONI.

Linimentum

Ad sanguinem è naso fluentem.

℞. Farina hordei, balaustiorum, opij, santali albi, ana dr. 3. acaciâ, assè fetide, camphora, ana dung. 1.

Madeant rosacâ, & frontis unctio fiat.

TELONI.

Linimentum

Productionem capillorum prohibens.

℞. Bufonem, ad umbram desicca, & contere; tum sanguinis testudinis fluv. atilis desiccatum, & calcem, & nurum, & lithargirium, & matresperlas uctas q. v. aquâ dilue; quod si hac mixtione pilos sub brachijs, & in inguinibus crescentes jam abrasos linieris, amplius non exurgent.

TELONI.

Linimentum

Efficax contra pruritus, & scabiem siccam.

℞. Pulpa nucleorum malorum Armeniac. Salis edulis, Seminis oxylapathi persici, ana dr. 20. Mercurij enecati dr. 2.

Hæc omnia ex dr. 20. oxygalæ, seu lactis acetosi excipiantur, & in hypocausto fiat linimentum, quod ad horam relictum, postmodum abluatur.

TELONIHEMINCHASSIET.

Linimentum ad scabiem humidam.

℞. Nitri, Myrrhe, Costi, Struthij, a. dr. 10. Stoe-racis liquida, dr. 5.

Madeant oleo rosato, & in balneo utantur ad unctiorem; elapsisque tribus horis, aquâ calidâ adhibita ablutio fiat.

TELONI.

Linimentum

Ad verrucas evellendas, & eradicandas.

℞. Gallarum, Aluminis scissilis, Seminis eruce, ana q. f.

Tenuissimè terantur; & conficiatur linimentum ex felle bovis, quo aliquoties utere ad intentum.

TELONI.

Linimentum.

Ad pustulas humiditas in facie parvulorum ex-crescentes.

℞. Cerussa stanni, drach. tres, Rosarum, dr. duas, Florum granatorum, Croc. indicij, sive Curcuma, an. dr. unam, Camphora, chalcos, 2. Cera alba, dr. 2. f. Olei rosati, dr. 10.

Cerâ in oleo liquefactâ; cæterisque pulveratis, massa fiat ad linimentum.

TELONIGEHETSCHEPESGH.

Linimentum ad pediculos.

Ad infirmitatem quam phthiriasim vocant, probatum remedium.

℞. Staphisagria, Salis petra, ana drach. duas Auripigmenti rubri, sesquidragmam. Argenti vivi enecati, dr. unam.

Fiat linimentum ex aceto, & oleo rosato. Quod si corpus liniatur oleo eanthami, & aquâ, in qua ebullierint folia rosarum, & myrtij ritè abluatur, effectum eundem fortioris.

TELONI.

Linimentum

Ad ulcera corrodentia.

℞. Nitri, Ammoniâ, Euphorbij, Sulphuris flavij, Foliorum ficus, an. q. v.

Fiat linimentum ex aceto.

TELONI.

Linimentum

Ad dolorem capitis sedandum perutile.

℞. Moschi, Aloës, Euphorbij Castorei, Gummi Arabici, Agallochi, Croci an. dung. 2. Opij, dung. 1. f.

Humectentur aquâ Petroselini Macedonici, vel aquâ majoranæ; & fiat linimentum, quod chartæ aptatum, applicetur fronti, & temporibus.

TELONI.

Linimentum

Ventrem adstringens, ac dyarrhæam compescens.

℞. Acaciæ, Cyperi, Myrrhe, Thuris, Fungi marini, Nucis cupressi, Gallarum, Rosarum, Myrobal. belleric. Boli Armenæ, Milij, vel Melicæ, Orizæ, Lentium, Glandis, Balaustiorum, Herba ap-pollinaris, Santali, an.

Fiat linimentum in epigastro, ex aquâ myrti, aut aquâ cotoneorum.

TELONI.

Linimentum

Fœtorem sub brachijs dissipans.

℞. Helenij, Aristolochia longa, Foliorum cucumeris, Chartæ, Vitri, an. q. v.

Pulverentur, & comburantur; adde croci ad pondus omnium: & fiant globuli ex aquâ myrti, & exsiccantur; dein scalpani partem sub humeris fœtorem, donec sanguis erumpat: fiat, & applicetur linimentum per diei integre spatium, constans ex globulo uno rosacæ diluto, & deinceps cessabit fœtor.

Linimenta ex Collectione Clariss. Theophili Bierlingii.

Linimentum D. Agricola contra ariduram.

℞. Euphorb. spec. diatr. piper. sem. urtic. ā. ℥ii. alumin. plumos. ℥s. cantharid. ℥s. axing. vulpis, taxi, lumbricor. ā. ℥i. m. f. linimentum.

Linimentum molle Ejusdem.

℞. Rad. raphan. sylvestr. ℥ii. cantharid. ℥i. sem. urtic. ℥iii. radic. Aaron. ℥ii. piper. long. ℥is. euphorb. ℥s. affunde spiritus vini optimi ℥iv. stent in digestionem per octiduum, postea destilla.

Linimentum contra ulcera cervicis uteri.

℞. Succ. apij ℥i. mell. rosac. ℥vi. cerebinth. ℥ii. farin. orob. vel hordei q. f. linimentum.

Aliud.

Aliud.

℥. Hydromell. q. s. adde marrub. centaur. minor. agrimon. āā. m. ℞. rad. aristol. rot. unc. ℞. coq. colatur. adde Pulv. rad. ireos, farin. orobi, mellis q. s. f. l. a. Linimentum.

Linimentum ad cancrum D. Spigelii.

℥. Succ. virg. aurea, solatr. sonch. āā. unc. j. ℞. violar. rosar. āā. unc. ℞. In mortario plumbeo cum pistillo plumbeo omnia redigantur in formam linimenti.

Aliud probatum.

℥. ℞. rosar. complet. myrrhin. āā. ℥. j. succ. solatr. hortens. plantagin. āā. unc. i. ℞. bulliant ad consumptionem succorum, factā colaturā.

℥. Ceruss. preparat. unc. i. ℞. litharg. ppt. ℥. v. plumbi usi & loti, antimonii preparat. ā. unc. j. camphora ℥i. M. in plumbeo mortario.

Linimentum ad hæmorrhoides.

℥. Gummi opopanax. myrrh. opij ā. ℥ii. Omnibus seorsim pulverisatis, ac invicem in f. q. aceti dissolut. arque ad mellis spissitudinem decoctis, misce paulatim ℞. rosar. unc. ss. vitell. ovor. n. j. Croci orientalis prius invicem conquassati ℥j. muc. lag. sem psyllij ℥iii. pulv. oliban. ℥ii. m. f. l. a. linimentum.

Linimentum nasale pro plebeis D. Georgij Mochingeri.

℥. Theriac. Andromach. ℥ii. santal. citrin. cortic. citr. ā. ℥ii. styracis calamith. benzoes, myrrha elect. an. ℥i. camphor. gr. vj. Cum succo rutæ f. l. a. linimentum.

Linimentum ad pulsus vel salutis ex arbore viæ D. Doreri.

℥. ℞. rosismar. ℥ii. arbor. vitæ ℥iii. spic. Di. ex bacc. juniperi ℥iii. nuc. moschat. express. unc. ii. cere alba ℥iii.

M. f. Linimentum.

Linimentum salutis cum theriaca & mithridatio Ejusdem.

℥. Theriac. Andromach. Mithridat. Damocrat. an. ℥ix. ℞. nuc. moschat. express. ℥vi. pulv. oliban myrrh. an. ℥i. castor. camphor. an. ℥ii. benzoes ℥℞. succin. ℥i. lavendul. ℥℞. juniper. ℥v. citri ℥iii. rut. ℥ii. unguent. pomat. ℥v. mosch. ver. gr. ix. trochisc. gall. mosch. ℥i. alypt. moschat. ℥i.

M. f. l. a. Linimentum.

Linimentum contra vermes infantum.

℥. ℞. rut. laurin. an. unc. i. aloes, theriac. an. unc. ℞. succi absinth. parum, cera. q. s. f. l. a. Linimentum.

L I X I V I U M.

Affines multis modis liquoribus sunt LIXIVIA, ut salium inveniendorum media ac salia dilutiora & fluida. De his not.

1. Lixivia sunt solutiones salina alkalina diffusa. Ad lixiviorum naturam illustrandam non parum facit ipsorum nomenclatura. Lix veteribus duo significavit (1.) cinerem, (2.)

aquam. Ab hac itaque dictum lixivium convenientissime significat ex duobus istis emergentem liquorem, ex cinere & aqua. Sunt scilicet lixivia solutiones, quæ itidem testantur de eo, quo constant, seu soluto. Cumque solutiones variæ sint, genus hoc determinatur differentia specificâ, nempe alcalini soluti, seu solutiones sunt salina alkalina. Proprium est cinerum, ut non exiguè alcali parturiant, tanquam omnium fixissimum sal, unde ex ipsis quibusdam acidis, ut D. confit, reliquis affugientibus magis. Quamvis verò improprie paulò elixivatio & lixivium hinc quoque prædicetur de alijs salibus, magis tamen id la è & cineribus dicitur, ob analogiam, ut lixivium ex Anrimonij diaph. edulcatione residuum. Quandounque igitur lixivium vocari audimus, alcalinum concipere sensu genuino fas est. Diffusæ audiunt hæ solutiones, respectu liquorum, qui solutiones sunt concentratæ magis. Licet in se iterum lixivia alia magis, alia minus saturata sale sint, quod à priori ἀλογέτω, Salzwage, à posteriori evaporatione in sal probati ad oculum potest, ut non laudemus saporem, & tactum, quæ duo organa præ alijs sal afficit.

2. Lixivia è cineribus vegetabilium præcipue consistunt, tum simplicibus, tum compositis. E quibus nempe salia parantur, ex ipsis lixivis consurgunt. Præcedit igitur elixiviationem incineratio, ut sulphure conflagrato, maximam partem, partes salina & terrea restitent, invicem complicatæ, laxiori nexu, unde cineres porosi sunt admodum. Vegetabilium verò principia teneriora sunt, ut igni facillime pateant; & sale fixiori gaudent. Animalia igni quidem itidem promptè obsecundant, ast sale polleant magis volatili, cum sulphure ita connexo, ut simul avolent. Causa etiam est, quod sulphure magis animalia polleant, acido paucio, quod illicat & figit in vegetabili regno partes salinas volatiles. Pro lixivijs verò solis parandis expetuntur magis cineres, qui potulentam vel liquidam saltem formam largiri possunt & debent; unde cineres absinthij, cent. min. dispaci, juniperi, aliique euphorij huc faciunt; pro externo usu magis cineres arborum, utpote aciores & scopo sic aptiores, quercus, fagi, pini, vitium ipsarum farmenta. E compositis lixivium seu liquor benedictus Myns. & lixivium sapientia laudari meretur. Reliqua facillè ad hunc censum referuntur. Notabile hoc loco est, quod è cranio humano lixiviosus quoque liquor paratur, quem ad strumas & scrophulas non sine causâ laudant, quatenus serum tenacius inde fluxile magis redditur. In mineralibus verò, ubi vi ignis sulphuris excuti viscedo, vel terra destrui magis potest, cineres non tam quam calces consurgunt, quarum quædam lixivia etiam largiuntur. Instar omnium est lixivium calcis vivæ, pro usibus varijs expetitur.

3. Lixivia affuso menstruo aqueo vel quasi tali parantur. Hoc enim salium solvendorum genuinum est menstruum. Aqueum esse debet, ut recipere in se possit poros salium, quos non ingrediuntur spirituosâ. Cumque lixivia hæc sola spectentur, citra absolutam & completam ἐκχέουσιν salium inde producendorum, duplicia pro ijs parandis memoranda veniunt menstrua, (1.) aquea pura, pro usu extremo potissimum, (2.) aquea potulentâ, ce-

ta, cerevisia vel vinum. Hæc etenim vel idèd eliguntur, quod & graviora sint & notiora, sicque assumantur facilius, & quod potissimum est, quod corrigant simul; sulphure suo salia, & aquæ cruditatem, alias facile stomacho nocitura; ut vicissim acorem vini tollunt salia. Memini, qui id præstabant cum cinerum clavellatorum modico, prævia leni quâdam effervescencia pro acido vini tollendo, ut minus corpori & præsertim articulis noceret. Quod si moderatè fiat, concedi potest, alias enim acidum, gratum ventriculo, & vino proprium, cum sulphure mixtione facta magis confortativum, exinguitur, plus damni sic laturum, quàm sibi relictum. Vinum itaque & præ cerevisia huic facit stomacho amicum, ut alcalia continuata facile eundem exolvunt, præsertim si acido fixo non delinquant.

4. *Lixivia pro usu primario interno ac externo parantur & inserviunt.* Usus eorundem sanè multiplex est, primarius quidem, ubi sola & per se non alio fine aptantur. Secundarius ubi pro alio mediato quasi & ministrante. Sic primarius usus internus est, ut (1.) urinam pellant, unde hydropicis propinantur, ita tamen, ut rationem habeamus ventriculi, nec dum prodesse volumus, pessundando hujus tonum potius noceamus. Unde etiam lympham viscidam, quod sæpe occurrit in istidem, corrigamus, fundendo, & liquando. Adde, respiciendum semper tum ad ventriculi vires eo casu, tum ad urinæ & consequenter viscerum statum. Sic & eodem fine vinum, in quo silices fuerint extincti, confert calculosis, sive dysuriæ vel ischuriæ correptis, non alia ratio, quàm quod lixiviosum evadat, & sal suum dimittant silices. (2.) Ut acidum exuperans extinguant, in bulimo, seu fame urgentiori hypochondriacorum. Curavimus talem solo lixivio seu oleo tartari p. d. propinando per vices guttas 30. pro re nata, donec contemperaretur fixum acidum & ad frugem rediret. (3.) Ut ichoresecentiam feri tollunt, quod tamen cum grano salis intelligendum. Sic sunt, qui gonorrhœam & simplicem & virulentam sæpe curatam asserunt lixivio caulium fabarum in cineres redactarum; caules deauruntur, cinis in aqua fluvi. 24. hor. maceratur, colatur per inclinationem; dosis ʒ iv. per se, singulis diebus novâ maceratione faciendâ, usu trium dierum tantum. Quod prodest, non sistendi, sed ichorem corrigendi potestate facit; cœteroque enim omnia alcalia serum reddunt magis fluxile, quàm ut sistant ejusdem motum. Exterius vero longè magis conspicuus lixiviorum usus eminet, communis cum salibus. Profunt v.g. eadem (1.) in lotionibus, sive capitis, unde caputlivia varia roborantia & mundificantia. Sordes enim tartareas, viscidas insigniter detergunt ac tollunt, præcipuè cephalicis plantis incoctis, unde lixivium sapientiæ dictum huic facit: modo moderatè & magis in siccori statu eo utamur. Humida enim talia alias memoria, quæ in sicco habitat, adversa sunt potius, unde memini quosdam vel per viginti integros annos, vt memoriam servarent vegetam, abstinuissè studio à caputlivis. Præstant sicca pulveres cyprii, fursures, & ex humidis essent. flor. spicæ vel lavendul. vertici illita. Seu pedum, cum primis in fœtore, quem salia & lixivio unice profligant, sulphur cœnosum, acidum, uliginosum exterminando; seu totius corporis reliqui. Memorabile est experimentum Kozak lib. de sale, qui ante paroxysmos febriles jubet pedes immergere lixivio calido, ut sic corrigatur ad extrema magis laeta magis & æquabilitas humoribus inducatur, de quo legi meretur laus. Idem aliquoties cum successu fecimus saltem ad imminuendum rigorem, poros sic servando apertos, & circulum sanguinis juvando; recurret enim sanguis circa paroxysmum magis versus cor, tanquam centrum. Mittimus alia huic referenda specia. (2.) In epithemate profunt, ubi laudatissimum est lixivium calcis vivæ, in ulceribus, in herpete &c. impostum; item in sphacelo, ubi lixivio argenti putrilagine, *Mangeri Biblioth. Pharmac. Tom. II.*

calidè applicanda, ut melius penetrant.

4. *Lixivia pro usu secundario varia alia constituunt & modificant medicamenta utilissima.* Principaliter largiuntur (1) salia, fixa enim plantarum salia unice lixivio confiunt, salia tum pro interno usu notissimo, tum pro externo & mechanico. Exemplo sit lapis seu sal potius corrosivum, ex lixivio saponariorum paratum, quatenus accessione calcis vivæ acrimoniâ majorem adescunt lignorum salia, per se quoque actiora, item cineres clavellati, i.e. sal ipsissimum lignorum reverberatum. Largiuntur (2) sulphura extractione scilicet, ut salia solutione fiunt: sulphura tum vegetabilia, quod de glasto scripsimus lib. 2. de sale vol. plantar. tum mineralia & metallica, exemplo sulphuris ʒ ii. & aliorum. Mediante enim sale exportigit aqua sulphur, quo cum congregi alias non poterat. Largiuntur (3.) linimenta & unguenta. Curiosum est olea cum lixivio mixta coire in unum coagulum, & præstare sic unguentum; v.g. ʒo ʒi p. d. cum oleo sambuci conquassatum, in vitro vel pyxide, extemplo largitur unguentum epositorum in scabie. Fit verò id ipsum à promptâ coitione salis & sulphuris, ipsius aquæ corporaturâ sic quasi evanescente, æqualiter in utrumque mixtum didita & concorporatâ substantiâ.

Adcoque lixivia sunt solutiones salinæ alcalinæ diffusæ, attuso menstruo aqueo vel quasi tali è cineribus vel calcibus paratæ, pro usu primario vel secundario. *We delius.*

Lixivium Cephalicum è Corpore Pharmaceutico Clariss. D. D. Jungken.

Fiat Lixivium ex cineribus origani, vel alterius herbæ odoratæ quæ copiose haberi potest. In talis lixivii mentura una decoque sequentes species v. g.

ʒ. Herb. salv. meliss. major. serpill. ana m. j. flor. lilior. convall. ros. rubr. melilot. lavend. ana m. ʒ. fol. senæ ʒj. radic. irid. Florent. ʒ ʒ.

Decocto colato caput lavetur calidè in loco calido, tum verò linteis calefactis probè exsicceetur rursus.

Lixivium Diureticum ex eodem.

ʒ. Tartar. ad nigredin. calcinati q. l. cum aq. petrosel. fiat lixivium cui infund. cortic. Arant. præp. Tandem colatura detur ad Cochlear & ultra; sic fabulum in renibus resolvit & repellit.

Lixivia varia ex Hadriani à Mynsicht Armamentario Chymico-Medico.

LIXIVIUM BENEDICTUM.

ʒ. Ciner. Leg. & extrem. frond. Juniperi Artemisia rub. Genista, Fabarum adhuc in paleis, Absinthii ana ʒj. Et cum vini albi potentis l. q. fiat l. a. lixivium.

Vires, Usus, Dosis.

Aqua intercute laborantibus singulariter prodest. Efficacissime enim & valentissime aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanavimus. Dosis manè stomacho jejuno ab ʒ ij. ad ʒ iii.

Lixivium Sapientiæ.

ʒ. Rad. Caryophyllat. pyrethri, asari, visci quercinæ ana ʒj. olivani, succini citrin. ana ʒ ʒ. herb. rorismarin. majorana, melissa, origani, fol. salvia, acut. lauri an. ʒ ij. flor. lavendula, rosar. rub. peonia, betonica, primula veris an. ʒj.

Bulliant in lixivio dulci, postea ad usum reponatur.

Vires & Usus.

Cum hoc lixivio semel tantum septimana, corpore purgato, Caput, in læsa memoria & ratiocinatione à causa frigida & humida, quæ alias frequentissima est, *diligen-*

diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandique facultatem mitificè confoitat; Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsia & Apoplexia præservat.

Lixivium Cephalicum.

℞. Fol. sena elect. 3vj. rad. ireos flor. sem. carus. ana 3ij. herb. eupragia cum florib. verbena, majorana, roris-marin. salvia, origani an. 3ij. agarici alb. & levis 3jß. flor. stachan. citrin. chamomilla, rosar. rub. cheiri ana 3j.

Mixta & incisa coquantur in lixivio bono, postea clarificetur, ut est artis, & sic paratum est.

Vires & Usus.

In dolore Capitis valdè prodest, Insuper Cerebrum, nervos, oculos, sensusque reliquos egregiè roborat. Lavetur autem cum hoc lixivio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi naturæ sunt, capitalibus lotionibus rarius: Qui verò calidi & sicci, frequentius utantur.

Lixivium Antiasthmaticum.

℞. Rad. glycyrrhiza rasa, ireos flor. enula camp. ana 3ß. succini citrin. thuris albi, gran. myrti an. 3ij. herb. salvia min. betonica, hyssopi, origani an. 3ij. sem. nigella, carvi an. 3jß. flor. chamomilla, rosarum rub. papav. er-rat. anthos an. 3j.

Condita sacculo coquantur in Lixivio dulci, postea clarificetur, & usui refervetur.

Vires & Usus.

Ex hoc Caput singulis septimanis semel aut bis ante cibum lavetur: In Asthmate enim siccatur & sistit destillationes ex capite ad subiectas partes: mox siccetur con-regaturque caput.

Lixivium Diureticum.

℞. Herb. Linaria cum flor. genista cum flor. ebuli cum roto fol. sambuci cum frond. ana s. q.

Fiat Cinis, ut est artis, ex quo postea cum vini Rhe-nani s. q. præparetur lixivium clarum.

Vires, Usus, Dosis.

Fortiter Hydropicorum aquas per urinam expellit, & alias in dysuria, ichuria secretum est; Dosis ab 3ij. ad 3iij. per se, vel in vehiculis specificis.

Lixivium Tartari.

℞. Tartari alb. ad nigredinem calcinat. q. v.

Fiat cum aq. pluviali destillata lixivium, in quo pos-tea bulliant Cortices Aurantium, & colaturam cla-ram & tinctam ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, cal-culum resolvit & expellit, nec non omnem tam Re-num quam Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cochl. j. in vehiculis specificis.

Lixivium Tingens.

℞. Lixivii Sarmentor. vitis ʒij. rad. brionia, che-lidonia, curcuma an. 3ß. croci liliior alb. 3ij. flor. verbasci stachad. citrin. genista hyperici an. 3j.

Coquantur simul, & fiat lixivium clarum, ut est artis.

Vires & Usus.

Capillos colorat, clarificat, & flavos facit: sed crines crebri lavandi sunt cum hoc lixivio, donec perfectè tingantur.

LOCUSTÆ in PHYTHOLOGIA.

Locustæ in *Phythologiâ* sunt avenaceæ glumæ singula-res cum seminibus ex longis filis dependentes, ob quandam similitudinem cum *Locustis* dictæ, Extendiunt hoc nomen ad Graminum paniculatorum grana glu-mis involuta significanda. *Raius.*

LOCUSTA ANIMAL.

Locustæ (quasi *loca usta*, quòd messes & alia quæ at-tingunt urant, mortu vero omnia erodant) *Ακρίδαι* καὶ τὸ ἀκρίς ἢ σαχίον ἢ τὸ φύτων νέμεσθαι, quod summitates segetum & plantarum depascantur.

Locusta quarum diversæ species sunt, aliæ vulgares, cujusmodi sunt.

1. *Bruchus* (καὶ τὸ βρούκειν) à mordendo & devo-rando, minor est locusta nigri coloris, alis cinereis, sub quibus rubet.

2. *Atelabus* (καὶ τὸ ἀτλεῖν, quod tam minutis pen-nis conspiciatur, ut eis omnino carere credatur) qui ubicunque exoritur, ibi omnia quasi in pollinem, sive rubiginem conterit, atque absumit.

3. *Gryllus* (à clamore acuto, qui gryllismus ap-pellatur) si campestris sit: & si domesticus, *Ακρίη* Junii, *γρύλλος* locustæ genus, cicadæ simile. Sub oculis eminent citri bini, veluti capillamenta tenuia, pedes seni inter quos posteriores longiores, extemis instar ferræ asperiusculis. Acuti duo appendices in cauda exeunt, longiusculi, hirti, pennis superioribus subjacent membranulæ tenuissimæ; quæ veluti pro-muscis quædam bifida ultra appendices protenduntur. Hyeme ad hypocaustorum fornaces, & fumibulo-rum parietes habitant, stridore suo nocturno, plus quam molesti, quamvis nonnullis admodum sit gra-tus eorum stridor, ut etiam somnum conciliare asse-rant. *Gryllus* campestris corpulentior est domestico, at brevior, coloris nigri, picis instar splendentis: oculis majusculis prominentibus, juxta quos corni-cula duo breviora; ad rostrum vero supra & intra ap-pendiculæ binæ, nodosæ. Alæ, fuliginei coloris, fi-bris varie distinguuntur, pedes seni, utrinque tres ve-luti serrati. In fine alvi superioris, sub alis extant spi-cula duo acuta, sub quibus alii appendices longiores rigidiusculi, setæ instar porriguntur, in extremitate bitidi, in campis, pratis, & aridis colliculis frequens. Aridam fodit terram ut ejus cavernis cubet æstate.

Gryllo talpa, insectum visu horrendum, quadru-plo maximam superans cantharidem, præcipue æta-te si fuerit provectiori, gryllus dicitur quia eundem cum gryllo stridorem nocte appetente facit; & talpa quia terram continuo fodit.

Aliæ rariores ut locusta.

1. *Italica*, Mantis dicta, (vel quia suo adventu ver præfagit, ut Anacreon cecinit: vel famem prædicat, ut Cælius annotavit: vel quia anteriores pedes, ve-luti manus, supplices semper tenet, atque elatas, va-tum more, qui eo gestu orationes ad Deum fundere solebant: unde Gallis *preque Dieu* dicitur), tam Di-vina censetur bestioia inquit Rondeletius, ut puero interroganti de via, altero pede extento rectam mon-strat, atque tato vel nunquam fallat.

2. *Græca*, quæ magnitudine, & forma priori simi-lis, alium tamen colorem ex naturæ locive dono accepit. Habet enim cornicula saturate lutea, hya-cinthinum ocellum, alas ex luteo fatilcentes, corpus reliquum amethystinum.

3. *Afriana*, è Barbaria Mouffeto allata gracilis, quinque uncias longa, cucullata, capite pyramidali, è cujus pene vertice duo cornicula latiuscula, unciam fere longa se exigunt, galcerumque illum Turcicum, bipu-

biplumem, quali Janitarii utuntur, superbientem re-
præsentat. *Charleton.*

Vires Locust. vulgaris propriè sic dicta. Odoris fuffitu
urinæ difficultates juvat, præsertim quæ fæminas malè
habent. Sunt præterea qui locustas collo appensas
quartanam sanare aiunt.

LOLIUM.

Lolium A'æg. Græcis, quasi δόλιον hoc est adulteri-
nium; fieri enim creditur, è corruptis tritici & hor-
dei seminibus. D. autem in L. abt, ut ab Æolico ὀδύρατος
Ulysses, à δάκρυ lachryma, vel dicitur ἀπὸ τῆς λαΐον
ἐλαΐν, id est, segetem perdere, sive quasi λαΐον ὄλον id
est seges noxia, ita *Martinius* & ex eo *Vossius*.

Lolium autem spicâ strigosâ, compressâ, granis
cum glumis utrinque ad scapum in eodem plano sitis
à reliquis graminum generibus distinguitur.

Nomina. Lolium album *Ger. Park.* lolium grami-
neum spicatum caput tentans *L. B.* gramen loliaceum
spica longiore *C. B.* ivraye Gallis quoniam inebriat.

Radix est fibrosis, tenuissimis, capilamentis
cirratis, stipulas habet cubitum unum, duos, tres-
ve altas. Triticeis parès aut paulo minores, quatuor
vel quinque nodis distinctas, ad quorum singulos,
ut in reliquis culmiferis, singula folia, triticeis an-
gustiora, & viridiora, nitentia, glabra, pingua, stri-
ata, culmum ad proximum fere geniculum obvolven-
t a, à quo postquam recesserint in seique palmatam aut
bipalmatam longitudinem produciunt. Culmus in
spicam definit pedalem, figura peculiari, siquidem ex
culmi lateribus alternatim grana terna aut quaternaria
& quina, imò non raro terna aut septena pubillæ spi-
cæ forma pediculis nullis exeunt. Singulis spicis fo-
liolum oblongum eas sinu suo excipiens, exterius
adjungitur. Grana triticeis minora sunt, glumis seu
cortice fusco & simplici inclusa, quæ in acutam &
tenuem aristam, qua tamen aliquando destituuntur,
desinunt inter segetes, præsertim triticeas nimis fre-
quens habetur. Quæ de degeneratione seu transmu-
tatione tritici in lolium, aliorumque frumentorum
& leguminum in sua vitia, à veteribus & recentiori-
bus dicta sunt, superius in parte generali consideravi-
mus.

Vires. Lolium calefacit & exsiccat, attenuat, resol-
vit, abstergit & frugibus ex quibus cerevisia paratur
permixtum ebrietatem promovet, quod si pani co-
piosius addatur stuporem & veluti remulentiam esi-
tantibus parit; hinc nonnullis triticum temulentum,
Gallis ivray quasi ebriosa dicitur.

Triticum in lolium degenerare veteribus plerif-
que & recentiorum multis videtur: quod tamen &
curiosioribus & naturali scientia penitus imbutis me-
rito in dubium vocatur, quia de re superius lib. pri-
mo cap. de specierum transmutatione egimus.

Quamvis autem lolium intro assumptum celerissime
vertiginem inducat, foris tamen cum axungia (adipe
anserino Plinio) admotum idem incommodum tollit
Theoph.

Oculis officit caliginem adferendo propter vapo-
res acres in cerebrum elevatos unde lolio victitare di-
cuntur proverbio, qui visu sunt imbecillo, ut lusciosi &
myopes.

Lolii farina alijs medicamentis idoneis admixta,
ad ulcera putrescentia, impetigines, lepras, strumas,
gangrænas, dolorem ischiadicum &c à veteribus com-
mendatur consule Dioscoridem & Plinium. *Raius in*
Hist. Plant.

LONCHITIS.

Lonchitis Dioscoridi duplex est, altera foliis porri,
quam solam Plinius novit, cujus semen triangulum &
lanceæ cuspidi simile, undè etiam planta ipsa sibi co-
gnomen arrogavit; altera quam alii asperam di-
cunt, folia proferens scolopendrii, sed asperiora mayo-
raque, ac multo magis divisa, quæ hujus loci est, hæc
forte (inquit C. Bauhinus) à λόγχη (lancea) di-
citur, eo quod folia instar lanceæ in acutum desin-
ant.

Est autem duplex alia scilicet *major*, alia *minor* po-
lypodii folio; utriusque radix apertens est, vulneraria ac
diuretica.

LOOCH.

Ita vocatur ab Arabibus, & à Græcis ἐκλεγμα, à
Latinis Linctus.

Est medicamentum consistentiâ medium inter
syrupum & opiatam, utpote syrupo crassius, opiatâ
dilutius, quod ore sumptum rosis ad modum stillat
in asperam arteriam, in affectibus pectoris conve-
niens.

Aliud Officinale, quod non est amplius in usu,
aliud Magistrale, quod ex tempore pro morbi exi-
gentia præscribitur.

Componitur, vel ex pulveribus bechicis, & sy-
rupis; vel ex pulpâ fructuum, pulveribusque & syru-
pis; vel ex decocto pectorali.

Communiter tamen fit ex pulveribus & syrupis, ali-
quando etiam ex conservis.

Tempus sumendi est, cum adest necessitas sputum
educendi & juvandi.

Ulus plurimi sunt.

Primo, Ad sputum juvandum, quando materia
frigida, & crassa est, ut in asthma, tussi à pituita bron-
chiis impacta, & similibus.

℞. Mellis opt. & butyri recent. an. 3 j. sacchari candi
3 iij. cerebinthina Veneta lota in aq. scab. 3 ss. Fiat
looch.

Vel ʒ. Syrup. de tussil. & capill. ven. ana 3 j ss. oxy-
mellitis simpl. 3 j. Misce, utatur ex cochleari sensim lam-
bendo.

Secundò, Ad sputum juvandum, quando materia
tenuis est & calida, in pleuritide, peripneumonia,
&c.

℞. Penidior. & sacchari cardi an. 3 iij. syrupi vio-
lati & jujubini q. s. Fiat looch, utatur cum baculo li-
quir.

Syrupus de pomis sine igne recenter per descensum
paratus refrigerat, lenitque suavissimè, sumitur ex co-
chleari frequenter.

Looch inctassans, leviter detergens in empyemate.

℞. Pulpe radic. alth. vel passul 3 j ss. sacchari candi
3 ss. succi liquir. 3 ss. Cum syrup. de tussil. Fiat looch.

Tertiò, Ad sanguinis sputum compescendum.

℞. Conserva rosar. 3 j. pulv. diarraganthi frigida
3 iij. Syrupi de rosis succi q. s. fiat looch.

Vel ʒ. Succo portul. 3 iij. gummi Arabici 3 j ss. sac-
chari rosati q. s. Fiat looch.

Vel ʒ. Syrup. de ros. sic. & de papav. an. 3 iij. Fia-
mixtura, de qua sumat unum, aut alterum cochlear sen-
sim de glutinendo, diu nocturne.

Cave ne nimis adstringentibus extravasatum san-
guinem in pulmonibus detineas.

Quartò, Ad exticcanda & glutinanda pulmonum
ulcera in phthisi.

℞. Conserva rosar. & consol. maj. an. 3 j. gummi
iraganthi & Arabici leviter torrefacti ana 3 iij. semina
plantag. & papav. alb. an. 3 ss. Cum syrup. de ros. sic.
fiat looch,

Vel quod prodest diuturnæ tussi, pulmonis fauciumque ulceribus glutinandis, asperitatibus arteriæ leniendis, in tussi, sputo sanguinis è faucibus erumpentis, catarrho & raucedine.

℞. Pulpa rad. alth. vel liquir. ℥ iij. mucilag. gumm. Arab. tragacant. extracta cum aqua rosar. ℥ j. sacch. ros. q. s. fiat looch.

Quintò, Ad tenuem fluxionem in pectus ruentem in hæmoptoicis cum tussi, vocis raucedine, cum vel sine febre.

℞. Aqua ros. ℥ vj. semin. cydon. mundat. ℥ i. sacchari candi vel albiss. ℥ ij. Pone omnia simul in phiala vitrea per 4. horas, fiat liquor mucilaginosus, quo utere sape diu noctuque ex cochleari.

Potest etiam parari ex æquis partibus aq. flor. papav. thrad. & rosar.

Syrupus papaver. alb. ad id utilissimus est, pluries diu noctuque sensim lambedo sumptus. Tenike.

Looch varia ad varios usus Formula è variis Auctoribus.

Lohoch de Caulibus Gordonii ex Pharm. Aug.

℞. Succī caulium rubrorum ℥ j. croci ℥ ij. sacchari, mellis an. ℥. s. misce, ut decet, & fiat lohoch.

Raucedini, & vocis ablationi medetur, ac pectus ab humoribus vitiosis liberat, nec non spiritum facilitando thoracis levat angustias; priscis forsan magis quam nobis usitatum medicamentum, ut qui brachicæ plurimum tribuentes, ex ea singulis in corpore membris singula comparant remedia.

Aliter in Pract. Cap. de tussi humida à Mesue præparatur. Recipit enim succī caulium ℥ v. hunc, spumam auferendo, lento igne coquit ad ℥ ij. deinde addit sapæ & mellis an. ℥ j. atque sic coquendo ad justam perducit consistentiam.

Looch De Farsara ex eodem Pharmac.

℞. Radicum farsara ℥ j. coquantur in aqua ad molliem postmodum contundantur, & coentur, addendoque mellis ℥ ij. coquantur ad justam consistentiam.

Tabidis prodest, pulmonis ulcera glutinat, faucium ac asperæ arteriæ asperitates lenit, inter arteriæ medicamenta haud postremum; ad cuius normam & alia ejusmodi simplicia lohoch præparari possunt, utpote lohoch ex althæa, enula, liquiritia & similibus, quibus interdum aromata adjiciuntur, atque in primis crocus pectori conveniens.

De Farsara compositum ex D. Lemery.

℞. Rad. ruffilag. ℥ iv. alth. ℥ ij. coq. in aq. font. s. q. pulpamque cribro exprime; hanc iterum dissolve in ipso decocto cum sacch. alb. ℥ j. mell. passul. ℥ vii. succi glycyrrh. ℥ iv. Agitentur simul valide pistillo ligneo, & inspergantur interim pulver. macis, cinnam. ana ℥ j. croci, caryophill. an. ℥ s. f. s. à Looch.

Serum actius ac falsius in asperam arteriam delabens, inspillet, pectus corroborat, excreationem promover; sugitur in bacillo liquiritiæ contuso.

Looch Lentium Avicenna.

℞. Lentium rubr. p. ij. coq. modicè in aq. font. & rejecta hac prima decoctione, iterum recoq. lentes in aq. font. ℥ ij. ad consumpt. quarta partis, addendo deinde sem. papaver. alb. ℥ ij. post aliquot fervores, adde passul. mundat. . j. coq. donec veniat decoctum ad ℥ j. postea addendo

ros. rubr. ℥ ij. unico fervore facto, & in colat. permisce sacchar. candi ℥ s. Tandem ad consistentiam elegendis.

In faucium doloribus ac raucedine confert, excreationem, juvat & sugitur in cochleari.

Looch de Papavere Mesue ex Pharm. Aug.

℞. Papaveris albi ℥ xxv. amygdalorum dulcium mundatorum, nucleorum pineorum, gummi arabici, succi glycyrrhizæ an. ℥ x. amyli, ℥ iij. sem. portulacæ lactuca, cydonieum an. ℥ iv. croci ℥ j. sacchari penidii ℥ iv. Syrupi de papavere ℥ iij. omnia concissa & contusa syrupo de papavere excipiantur, cujus hac esto formula.

℞. Caput papaveris albi & nigri recentium an. ℥ vi. sem. lactuca, florum violarum an. ℥ i. s.

Coquantur, dum contabuerint capita, in aqua cucurbitæ ℥ viii. expressum & colatum cum sacchari ℥ iv. percoquantur ad syrupi crassitudinem.

Efficax est in destillationibus tenuibus, quæ acrem, salam, & tenuem materiam in thoracem demittunt fauces asperant, vigilias ac febrem pariunt; confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci & pleuritidi.

Looch Passularum ex eadem Pharm.

℞. Radicum pæonia ℥ iv. hyssopi melissa, scolopendriæ, seu ceterach an. m. s. glycyrrhizæ ℥ s.

Fiat omnium decoctio in sufficienti aqua pluviali, facta colaturâ cum forti expressione, adde passularum minorum in mortario bene contusarum, prius ab arillis mundatarum ℥ j.

Decoquantur, & per pannum lineum fortiter exprimantur expressioni addendo sacchari ℥ j. fiat looch ut est artis;

Ulus est ad tussim & pectoris vitia, maxime in puerulis, iisdemque epilepticis, propter pæoniæ radices ingredientis.

Looch de Pineis Mesue ex eadem Pharm.

℞. Nucleorum pineorum ℥ xxx. amygdalarum dulcium, avellanarum, Tragacanthi, gummi arabici, glycyrrhizæ, ireos an. ℥ s. dactylorum ℥ xxxv. amygdalarum amarorum ℥ ij. mellis passularum, sacchari albi, butyri, recentis an. ℥ iv. mellis optimi ℥ iij. ℥ ij. terenda terantur, & incidenda minutissime incidantur, ac melle excipiantur.

Modus confectionis hic est, ut gummi & tragacanthum macerentur in ℥ iij. aquæ capillorum veneris, donec prorsus mollescant, deinde cribro setaceo transmittantur, & cum melle optimo misceantur ad lentum ignem, rudiculâ ligneâ diu movendo, postea ei inspergantur pulveres tenuissimi radicis ireos, capillorum veneris, glycyrrhizæ, sacchari, amyli, ut & pinei nuclei, amygdala & avellanæ contusæ, & optime misceantur. Demum utrumque gummi mistum, & dactyli in pulpam redacti, mellis passularum in quo prius fuerit dissolutus succus glycyrrhizæ, vase ab igne deposito addatur, & diutius omnia agitentur donec uniantur, addito butyro recenti, si statim eo utendum sit; sin verò diutius fuerit adservandum, paretur absque butyro, ne rancorem contrahat.

Diuturnæ Tussi, difficultati spirandi, & asthmatis succurrit, humores in Thorace crassos incidit & attenuat, senibus maxime familiare, peripneumoniam quoque ac pleuritidem, inclinante jam febre, juvat.

Pro melle passularum, aliqui sapam non inepte substituant.

Looch de Portulaca ex eadem Pharm.

℞. Succus portulacæ ℥ ij. trochisc. de terra lemnia 3 ij. de charabe, gummi arabici, sanguinis draconis, an. 3 j. lapidis hamatris, pilorum leporis ustorum, an. 3 ij. sacchari albi ℥ j. fiat lochoch ut est artis.

Sputum sanguinis cohibet, ac ruptis opiculatur pulmonibus: excelsa vasa cruorem fundentia glutinat, & anhelitus vias ab exulceratione tutas reddit.

Looch de Pulmone vulpis Mesuæ ex eadem Pharmac.

℞. Pulmonis vulpis siccati & preparati, succi glycyrrhizæ, capillorum veneris, sem. anisi, feniculi ana 3 j. sacchari clarificati 3 v. omnia trita tenuissime saccharo excipiantur, & ad debitam formam redigantur.

Medicamentum hoc ex Mesuæ cap. de phthisi desumptum, prodest magnopere Tabidis, consumptis, ac ulceratos pulmones habentibus. Ejus loco aliqui solum pulverem pulmonis vulpini cum saccharo rosato exhibent.

Looch Sanum & expertum ex eadem Pharm.

℞. Cinnamomi, hyssopi, calaminthæ, ireos, sem. anisi, feniculi, ana unc. 3. capillorum veneris manip. j. macerentur per viginti quatuor horas in aque fontan. lib. ij. postea destillando abstrahatur circiter lib. j. cum qua ex pinearum mund. drachm. v. amygdalorum dulcium drach. iij. fiat emulso, & solvendo in eo sacchari albi lib. ij. additisque pulveris glycyrrhizæ, tragacanthi, gummi arabici, amyli ana drachm. iij. ireos drach. ij. optime misceantur.

Tussi, vocis asperitati & raucedini à frigiditate natae auxilio est, crassos item in Thorace, & pulmone humores incidit, & attenuat; morbis tamen calidioribus, ut & tussi calidæ, suspectum.

Looch de succo Scillæ ex eadem Pharm.

℞. Succus scillæ lib. j. mellis ℥ iij. coque ad formam lochoch.

Incidit, tenuat, & expulsionem præparat materiam crassam, quæ in Thorace continetur, veterem tussim sanat suppuratis, asthenicis, difficulter spirantibus in magna puris & lentæ pituitæ copia, spiritus vias opprimente, succurrit, promteque hujusmodi obstructa liberat.

Scillas plenas ac nitidas cultello eburneo in partes incidito, ejusque laminas puriores in mortatio lapideo contusas exprimito ac utitor.

Galenus descriptio à Mesuæ non differt, nisi quod Mesuæ succi scillæ & mellis partes æquales ponit.

De Scilla compositum ex eadem Pharm.

℞. Scilla preparata unc. sem. marrubii, hyssopi, ana 3 j. ireos 3 ij. myrrha, croci an. 3 j. mellis quantum sufficit. Fiat lochoch.

Prædicta omnia valentius præstat, tussim ac senum difficilem respirationem levat, pectus à frigida, crassa, tenaci & impacta iis, locis pituita potenter expurgat.

Mangeri Biblioth. Pharmac. Tom. II.

Looch de Testudinibus ex Ant. de Scobis Theat. Pharmac. Italicè conscripto.

℞. Pulpa è testudin. terrest. quibus extrema sint prima exempta, corpusque integrum probe lotum, num. iij. succi liquir. tragacanth. sem. papav. alb. lactuc. portul. spatv. quatuor frig. majoran. ana 3 j. coroneorum, bombacis ana 3 vj. passular. exacinat. sebesten, berber. spodi ana 3 iij. rosar. violar. hord. mund. capill. vener. borrag. bugloss ana manip. j. aq. comm. q. s. sacchar. lib. iv. f. s. a. Looch.

Looch pro Ulceribus pulmonum ex eodem.

℞. Conserv. ros. veter. 3 j. pulp. rad. consolid. maj. 3 iij. tragacanthi torrefacti, & gummi Arabici iidem torrefacti, ciner. cancr. fluvial. ana 3 ij. corall. rubr. boli Armen. terra sigill. an. 3 j. sem. papav. plantag. an. 3 iij. syr. rosar. rubr. q. s. M. f. s. a. Looch.

Looch duo ex Pharmacop. Bateana.

Looch Album.

Fit ex oleo amygdal. dulc. rec. & sacch. penediat. ana exactissime ita mixtis ut in massam unam homogeneam conspirent albisimam. Fieri nequit sine arte Pharmacopæi.

Looch Domesticum.

℞. Olei amygdal. dulc. rec. 3 iv. syrup. j. cubi. ea pill. vener. an. 3 ij. sacch. alb. 3 ij. M. exactissime in mortario marmoreo f. a.

Confici etiam potest melleo elegantius ac inseparabilis (si Ars non desit Pharmacopæo) sine ulla sacch. additione. Expectorationem promovet.

Looch ex Hadriani à Mynsicht Armamentario Medico-Chymico.

Looch Rosatum.

℞. Conf. rosar. rub. cum Spir. Sulphuris tinct. unc. iij. lochoch. de rad. ruffilag. cum saccharo parat. unc. ij. spec. diarrhod. abb. unc. j. lact. sulphuris anc. 3. boli rub. or. præp. suc. glycyrrhiz. ext. ana drachm. ij. croci or. præp. drachm. j. flor. benzoini cardamomi miner. macis ana drach. 3. balsam. sulphuris anisat. scrup. j. ol. rosar. verigran. iv.

Misc. & cum Syrup. Pectorali simpl. nost. f. Lochoch.

Vires, Usus, Dosis.

Diuturnæ tussi, raucitati, pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit purulentas exulcerationes tam pectoris quam pulmonis eorundemque graveolentiam halitus efficaciter sanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Dosis per intervalla, nucis avellana quantitas.

Lochoch Violatum.

℞. Conserv. violar. rec. cum elix. Sulphur. nost. tinct. unc. iv. lochoch. sani & expert. unc. ij. spec. diamargaritæ frig. diatreos simpl. ana unc. 3. flor. Sulphuris compos. ext. rad. glycyrrhizæ ana drach. iij. croci orient. præp. Syrac. calamit. ana scrup. j. ol. hyssopi & benzoin. ana gran. iv.

Misc. & cum Syrup. pectorali comp. nost. f. Lochoch. pectorale.

Vires, Usus, Dosis.

Experimentum est in Tussi, Asthmate, Phthisi, dyspnœa, orthopnœa, cæterisque pectoris vitiis, &c.

Q 2 dose

dosis eadem, quæ in præcedenti Lambitivo obser-
vanda.

Looch Pectorale.

℞. Syrup. Pectoral. simpl. nost. Composit. ana unc. ij.
Lohoc. de rad. farfara sani & expert. ana unc. j. Man.
Christi anisat. drach. vj. spec. diarrhod. abb. unc. ss. zin-
gib. de Bengalâ cond. 3 iij.

Misc. & fiat, ut est artis, Lohoch pectorale.

Vires, Usus, Dosis.

Certissimarum est virium ad tussim quamcunque
& raucedinem à frigore vel pituita crassa in Thora-
ce & Pulmonibus contenta, ortam; nec non in pecto-
ris affectibus quibuscunque, difficultati anhelitus, pleuriti-
di, & dolori costarum medetur. Dosis sæpius in die
nuc. moschat. quantitas.

Lohoc seu Diacodion crocaton.

℞. Cap. papav. num. xxi. filiquar. dulc. abjectis gra-
nis rad. glycyrrhiz. rase ana unc. iij. sem. bombacis, altheæ,
cydoneor. gran. myrti ana unc. ss. ficum pinguium dacty-
lorum, sebesten ana num. xi. flor. malva arb. rub. viola-
rum, jacea ana 3 iij.

Coq. in l. q. fontanæ, ut est artis, postea

℞. Colatura lib. ij. sacchari candi rosar. penidiorum
ana ℥ ss.

F. Syrupus crassus, cui circa finem adde:

Syrup. e suc. flor. papav. errat. jujubini ana unc. ij. extr.
eroci or. 3 ss.

Misc. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam
coquantur, & cum Gallie Moschatæ vetæ ʒj. aro-
matizentur.

Vires, Usus, Dosis.

In omnibus distillationibus seu defluxionibus cali-
dis, tenuibus, acris, ac falsis, à Capite, in Thora-
cem & asperam arteriam, ex continua tussi insomnia
facientibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem
leniendo, sputum tenue maturando, incrassando, glu-
tinando, atque expectorando, sitim extinguendo, cal-
oris incendium, mitigando, somnum conciliando;
Item refrigerando & humectando Spiritus corroborat,
vires reparat, & calorem nativum conservat. Dici
præterea, non potest, quam profit iis, qui acutissimis
doloribus, maxime Colico, Nephritico, Pleuritico, Ar-
thritico, &c. corripiuntur. Prodest etiam ad sanguinis
excretionem & menstruum nimiam evacuationem;
nec non Febribus ardentibus, alvi profluvio & Dy-
senteria, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitat-
ur, confert, Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. tres aut
quatuor.

Lohoch Antiphthificum.

℞. Diacodii crocat. nost. unc. iv. Looch sani & exper-
ti, de pulmone vulpis ana unc. ij. rotul. pectoral. alb. ci-
trin. rubrar. ana unc. j. Syrup. pector. simplic. nost. &
compos. ana drach. vi. zinziberis de Bengalâ cond. unc. ss.
specier. diarrhod. Abbatis, diamargar. frig. ana drach. ij.
M. & cum emulsione sem. papav. albi cum aq. pulmon. vi-
tuli fact. unc. i ss. f. flammâ imbecilli iusta consistentia
Lohoch.

Vires, Usus & Dosis.

In Phthisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho,
Rauedine vocis, cæterisque Thoracis & Pulmonis
vitiis &c. valde efficax est, humoresque excreatu diffi-
ciles extenuat, somnumque conciliat. Dosis sæpe in
die nucis avellanæ quantitas.

LOTIO, quatenus est OPERATIO PHARMACEUTICA.

Lotio constat duplici subjecto. 1. *Lavante*, quod
frequentissime & principaliter est aqua simplex, adæ-
quate etiam destillata 2. *Lavando*, cui generaliter
omnia depurationis vel separationis humidæ indiga
substant, nominatim corpora solida & media etiam
quædam, exemplo terebinthinæ.

Fundamentum Lotionis est duplex, separatio 1. pu-
ri ab impuro, 2. subtilis & levioris à graviori corpo-
re, quem in finem vel sola mixtio aquæ concurrit, ut
atomi terræ alioqui miscibiles cum eadem confusæ
separentur, vel ejusdem solutio; ut menstruum est,
quod exemplis patebit. Hinc & modus non unus est,
sed lotio quædam fit simplici affusione & decantatio-
ne, ut in extrahendis salibus; quædam simplici agita-
tione, ut in terebinthinæ lotionne; quædam fortiori
confusione, ut in terreis dicitur, quædam extractione
perfectâ, ut in aloë lota.

Finis nempe & usus generalis est depurare & se-
cernere, effectus tamen diverso, qui duo distincti usus
esse possunt generales, specialis multiplex. Lotio er-
go (1.) *dealbat* & nitidiores partes reddit, quod
exemplo terebinthinæ manifestum est, siue pro usu in-
terno agitando lavetur, verbi gratia, cum aqua nym-
phææ in gonorrhæâ, pro usu externo in unguento di-
gestivo parando, albicat inde partibus aqueis & sul-
phureis porosioribus confusis. Sic & cera dealbatur,
sic succinum dealbatur flavum coctione cum muriâ, ut
mechanicam dealbationem lintheaminum, ubi vel con-
tinuâ affusione aquæ, accedente calore solis, partes sul-
phuræ unctuosæ elutiantur, *bleichen* vocant, vel lo-
tione domesticâ dealbantur iterum, non memoremus.
Imò salia quoque dealbantur unicè crebriori solutione
& coagulatione, ut in arcano etiam tartari patet ex
parte.

(2.) *Lotio elixiviat*, exemplo tum culinario, ad pa-
randa lixivii, tum pharmaceutico. Omnia enim in-
cinerata vegetabilia affusione aquæ & transcolatione
sal præbent alcalinum hinc lixivium dictum, exemplo,
absinthii, centaurii minoris &c. Quod nempe aquæ
beneficium est, id lotioni seu mixtioni cum aquâ om-
niud etiam quadrat. Aqua vero subit & solvit salia,
imò solvendo unit.

3. *Lotio edulcat*. Aqua ipsa dulcis & insipida est, re-
cipit verò in se salia & salina corpuscula subtiliora, &
alio quàm elixivandi fine. Sic lapis lazuli minutissi-
mè tritus toties aquâ abluitur, probe agitando, donec
affusa aqua omnis saporis vel coloris alieni expertus
manferit. Nec id immerito, salia enim mineralia acri-
moniam suam in corpus vibrant facile, nisi auferantur.
Hinc etiam aqua, quâ cum cinnabaris vel lapis lazuli
& similia lota sunt, non tam facile mucescit, sed vi-
vida permanet. Inprimis hæc edulcans lotio habet
usum, ut habeantur terræ insipidæ; præter usus mecha-
nicos alios, exsiccantes, leviores. Hinc calx lota ad am-
busta usurpatur, hinc terra vitrioli dulcis fit solâ suffi-
ciente lotionne. Par ratio est omnium calcinatorum &
præcipitatorum, si diaphoretici, bezoardici mine-
ralis, sulphuris aurati &c. magisterii perlarum, auri, &c.
quæ edulcantur crebriori traiectione aquæ. Imò hæc
etiam seculæ ipsæ trahi possunt, ubi conjungitur com-
minutio & contractio particularum, & lotio unde pul-
villus mitior minusque acris ex bryoniâ, aro, pæoniâ,
iride confurgit.

Ut taceamus (4.) secundarium usum, jam ta-
ctum, lotionem in tritura etiam *comminutioni particula-
rum ulteriori* inservire, cujus rei experimentum mani-
festum præbet detritio ferri exacuendi sine, *sichleissen*,
ibi enim lotio seu affusio aquæ omnino id moderatur,
unde

unde & aquæ detritæ illæ martiales sunt omnino, & novi qualdam aborum illarum pota medietas inducere.

(5.) *Lotio extrahit* propriè dicto modo, ita ut extracta sistat. Atque adeo non solum lotio instituitur, ut sordes auferantur, relicto puriori, sed & vice versâ, ut puriores particule auferantur, relictis fecibus, seu impuris, minus utilibus. Extractionis exemplum præbet aloe lora, quæ non priori sensu ita dicitur, sed posteriori, unde aloe depurata seu lora fit, quando aloe pulverisata verbi gratia, ad 3ij. solvitur in aqua, (accedente calore, nam lotio est duplex, calida & frigida,) hinc liquor tinctus solutione facta filtratur per linteum, & evaporatione prævia exhibet extractum solutivum elegans. Par ratio est aloes violatæ ipsius, imò & extracti opii liquidi & spissi, quod eodem modo menstruo aqueo paratur, de quo sub extractis latius dicitur. Sic etiam scammonii lac, menstruis aquis factum purgans est extractum, licet minus hodie in usu.

(6.) *Lotio modo leviolem, modo graviolem particula larum secretioni inservit*, quæ scilicet sunt utiliores. *Διαιρέσις* enim omnis debetur primariò utilibus, quarum *σύνθεσις* fieri debet. Sic in 3ii diaphoretici præparatione, facta solutione in olla pro elixiviatione, partes solam tenuiores & subtiliores filtro ingeruntur, crassiores impuræ relinquuntur. Sic lithargyrium præparatum fit, si lavigatum aqua desuper limpidissima affusa agitur, donec ea turbida fuerit, hinc in aliud vas conjiciatur, ut subtilius illud evolutum subsidat. Sic etiam terræ subtiles è calcinatis ossibus aliæve lavantur, *schlemmen, abschrümmen* vocant, ut ex iis catini fiant, ut alia mechanica taceamus; item bolus armena, osteocolle, aliæque hunc censum subeunt, siquidem id opus ducatur. Contrarium huius rei fit in metallicis, nominatim lotura auri, quod illustrabimus exemplo lotionis ex fluvio Schvvarza, nobis vicino. Cum enim ramenta auri cum arenulis visantur conjuncta, uti auri seminum præ reliquis est diffusum metallis omnibus, procedunt ita: Ex flumine hauriunt tertiam & corbi indunt, lapides majores eximuntur & separantur, confusæ reliquæ partes minutiores instrumento ligneo longo, lato & declivi, cui substratum est setaceum, ut olim pillis, ingeruntur, affunditur subinde aqua, junctâ agitatione ita partes terræ tanquam leviores secedunt & deturbantur, auræ ramentosa in setaceo relinquuntur cum terreis minoribus. Unde tandem excussæ in vas ligneum semiovale, *Muldlein*, denuo repetitâ aquæ affusione & separatione sola tandem auri habentur ramenta, plura vel pauciora, non levi tanquam in Schvvarza cum lucro. Idemque de Albi, Rheno aliisque valet, unde habetur aurum statim suum finemque, imò finissimum, ex sinu naturæ matrishautum, citra ignis aliquam ministrantem opem, idque purissimum, crudiori solummodo eoque antiquissimo collectum. Hinc vellus ipsum aureum Jasonis, licet *Suidas*, sub voce *Διέγες*, aliique cum ipso explicent, librum fuisse Alchimisticum, ex vellere ovino, more antiquo, scriptum, qui attem parandi aurum contineret, ex aliis metallis transmutatione factâ; rectius tamen cum *Strabone lib. xi. Geograph.* statuitur, populos Colchos inhabitantes solitos fuisse aurum torrentium mediante vellere ovino excipere.

Sic etiam exemplum utriusque præbet lotionis cinnabaris nativa, prioris quidem si ipsa sit paulò purior, vel saltem non bolatis, ita enim factâ pulverisatione particule utiliores evolvi, & subadendo hinc colligi possunt, quod ante annos aliquot in usu nobis erat, desumptâ hæc colligendi ratione ex ipsius cinnabaris tunc adferri consuetæ modulo; Posterioris verò, si im-

purior & bolatis sit magis, Germ. *Wisser Zinnober*, quatenus proceditur modo contrariò, & in fundo quaritur purior pars, ad instar lotionis auri. Ita enim fit separatio partis utilioris per aquam, seu viam humidam, quæ etiam alio modo per ignem fieri potest, nostro experimento, sublimando eandem ex arenâ, igne debito subdito, manifesto argumento, esse hanc non minus *restriv*, ac illam.

Quin imò nec aurum lavari per totum, vel elui onine, sine distinctione, potest. Sed si arenula commixtum minoribus particulis fuerit, *Goldschlich* vocant, beneficio hinc amalgamationis fecerint amat quoque quatenus recipiuntur auri miculæ à mercurio, à quo hinc beneficio ignis iterum separantur. *Wedelius*.

LOTIO, quatenus est MEDICAMENTUM.

De ea vid. sub titulo *Fomentatio*, item sub titulo *Balanium*.

LOTIUM, vid. *Urina*.

LOTUS ARBOR.

Nomina. Lotus arbor *Park Ger.* lotus arbor fructu cerasi C.B. id est, uticæ arbor à figura foliorum.

I.B. Lotus dicta arbor magna est, caudice crassissimo & ramis cerasi instar brachiata, sed in latitudine magis quam in altitudine extensis, cortice lævi subalbido (ut Cæsalpinus ait, ut Matth. in cæruleum nigrescente) foliis ulmi longioribus, & magis in acutum delinentibus, inferiore parte nonnihil incanis, superna viridantibus, rugosis, in ambitu serratis, in acutum delinentibus, quæ nihil nobis cum illic videntur habere commune. At unumquodque ferè folium est bacca subnigra, cerasi sylvestri similis, minor tamen, ex longo pediculo, pulpam paucam albam continens, cum dulcedine astrigentem, gratam: officulum ad fructus proportionem magnum: bacca tota siccissima, ut vix ea quis satiari possit. Flosculi, teste Cæsalpino, ex binis filiolis constant, summo fructui insidentibus: baccæ nigra; officulum durum, veluti quadripartitum intus unica seminis medulla dulcis.

Si floris situm rectè describit Cæsalpinus, in nostrâ Methodo ad hoc genus pertinet.

Multis Italiæ in locis reperitur spontanea: nos circa Romam in sepibus observavimus, nec non in Gallia Narbonensi circa Montepelium.

Arbor hæc esse non potuit cujus fructuum dulcedine capti Ulyssis Socii, cum lotophagis permanere ut eis fruerentur quam ad socios reverti maluerunt. Quæ enim gratia esse potuit tam sicci & extucci pomi, nisi forte in iis regionibus carnosior atque etiam suavior quam in nostris sit?

Atbotem hoc in loco à nobis è I.B. descriptam ipsissimam Theophrasti, Plinii aliorumque veterum lotum esse pro certo affirmare non aulam, adeoque an vires loto ab iis adscriptæ huic convenient ne scio, fructus astringunt & alvum hñunt, maturi minus, ramentorum decoctum vel infusum dysentericis sœminisque profluvia laborantibus confert, iusat flavosque etiam reddit capillos (quod præter Dioscoridem & Serapionem nemo tradit) eisdemque defluentes conueniunt *Raius*.

LUBRICANTIA, vid. *Hypocistia*.

LUCIUS PISCIS.

Lucius, (vel à Græco nomine τὸ λῦος quod lupum significat: quia hæc interfluviatiles sit voracissimus & edacissimus, quemadmodum inter marinos lupus, cui Græci à voracitate *λῆεγρος* nomen deduxerunt, vel

à lucendo) Gallis *Brochet*, vel aliis *Bequet*, seu *Bechet*, à rostro prominente, Angl. *the Pyke*. (vel ob similitudinem rostri cum hasta, vel quod se instar hastæ projectæ in aqua promoveat: unde Franco-Gallicè etiam *Lanceron* à lancea appellatur) & dum adhuc parvus est. Branchias habet senas, utrinque ternas. Oculi coloris aurei sunt æmuli, maxime ad iridem. Palato ejus natura duos dentium ordines infixit, quoniam in superiore maxilla nulli sunt: inferior maxilla dentibus acutissimis imparibus, & duplici interdum triplici serie extantibus, in os recurvis armatur, ut in carcharia. Cor sub branchiis minutim satyre rubet. Hepar longiusculum, simplex, pallidum: cui anteriore parte fel jungitur majus, cæruleum. Vada petunt, cum parturiunt: ac sæpenumero singulas fœminas mares 12. 13. aut 14. sequuntur. *Charleton*.

Officin. Nat. ex Lucio.

1. Fel. 2. Cor. 3. Mandibula. 4. Officulum cruciforme. 5. Axungia. 6. Ova.

Vires.

1. Fel, Febrim arcere volunt si assumantur. Numer. 3.

Extinsecus inservit oculorum maculis, hebetudini, aliisque eorum affectibus.

2. Cor, adversus Febrium paroxysmos devoratur.

N. Sunt qui Cor vivo Lucio exemptum devorare, luciumque corde orbem denuo in fluentem aquam conjicere jubeant.

3. Mandibula exiccat, abstergit. Hinc datur in pleuritide seu specificum, confert iudem ut & reliqua capitis officula in calculo, fluore albo mulierum, partu difficili.

Extinsecus sistit (cinis) synoviam, vulnera inveterata mundificat, hæmorrhoides exiccat.

4. Officulum Cruciforme ex capite Lucii, commendatur quibusdam ad Epilepsiam (assumptum.)

N. Periapton singulare quibusdam habetur adversus incantamenta.

5. Axungia vulgare Medicamentum est, illiturque plantis pedum & pectusculis infantulorum, ad revelendos atharros & demulcendam tussim.

6. Ova, vomitum ac alvum ciete apta sunt, unde & hujus gratia medicamenti loco à plebeis exhibentur.

Præparata.

Aqua Fellis destillata oculis subvenit. *Schroderus*.

Hujus Mandibula cum reliquis officulis capitis exsiccata & pulverisata egregium præbet anti-pleuriticum, vel per se, vel cum aliis mixta.

N. Nuper ex capite Lucii duos Lapillos instar cancrorum extraxi raro exemplo; quos reservo in meo fariihicio. *Hofmann*.

LUDUS, vid. Calculus.)

LULULA, vid. Oxytriphylum.

LUMBRICI.

Lumbrici terrestres (quasi lubrici, quia labuntur, vel ut Martinius ingeniosus deducit, ex eo, quod ex λυματι βρῦει, hoc est, è sordibus nascatur) Græcis γῆς ἐντερεῖ, terræ intestina & γαστῆρας (quod terram comedant) quorum interanea per accuratissimam anatomem detecta, & iconibus ad ipsius naturæ fidem expressa contemplari licet apud Doctissim. Willisium

de An. Brut. cap. 3. quibus consimiles etiam in hominum ventriculo & intestinis generantur trium generum, viz, lumbrici (1) lati, (2) teretes, (3) ascarides, Σοὶ τῆ ἀσκή, quoniam iis affectos moridicatione & pruritu valde exercent (4) Syrones in cute. De intestinorum lumbricis admirandam sane Historiam hanc tradit Casp. Schvvenchfeld. Novi fœminam rusticam, inquit, cui lumbrici longi teretes palmares & longiores, noveni, per intervalla, aliquot dierum spatio dextra abdominis parte, sponte ex ventre protupere: ulcusculo suapte natura iterum coalescente.

N. Vires. Sunt insigniter diuretici, diaphoretici, anodyn; discutunt, emolliunt, obstructions reserant, lac augent, vulnera, nervosque præcisos glutinant.

Usus præcipui sunt in apoplexia, spasmo (ex signatura) aliisque affectibus nervorum ac musculorum in ictero, (utroque) hydrope, vermiculatione infantum, dolore colico. Inprimis autem specificè profunt in arthritide illa scorbutica, quam vagam appellant, (die laufende Giche die Vahren, The running and wandering Gout, De loepend of vliegende Gicht,) adhiberi intus possunt & extus.

Intus exhibentur vel toti conquassati, recenterque verbi gratia, cum vino trajecti per linteum, vel siccati & pulverisati.

Extus applicantur viri & mortui, viri impositi, donec moriantur, profunt panaritio, morui in cataplasmatibus fere adhibentur. Odontalgia convenire dicitur cinis, (cavitati dentium inditus.) Podagricos dolores leniunt, (pulvis cum farina calidè impositus.)

Præparata.

1. Aqua, fit in MB.

Hydropicis maxime proficua est.

2. Oleum coctum, vide Diss.

N. Ex 300 hoc destillatur cum ▽ raphani, Ol. quod urinam & sudores potenter pellit.

3. Liquor fit in clybano.

Nimirum.

Lumbrici loti & per stupam purgati induntur vitro angustiori officii. Hinc obturatur vitrum massæque panis inclusum committitur, (ut & reliqua massa,) clybano, donec cum panibus eximatur. Post liquor filtratur & servatur pro usu interno & externo.

Dosis à 3 ij. ad 3 β.

4. Spiritus prævia putrefactione, ubi Θ volatile statim elevatur, vel sine putrefactione ex O Δ aperto.

5. Pulvis, fit ex lumbricis in furno exiccatis. *Schroderus*.

Hi tanquam specificum in arthritide vagâ scorbuticâ commendabiles sunt, ex quibus succum expressum ad rusticos & plebeios amandamus cum eorum pulvere. Spiritu cum Sale volatili per se destillato contenti. Atque hic habetur vel cum prævia lumbric. terr. putrefactione, vel sine ea. In ea Sal volatile statim in destillatione elevatur; in hac extrema opus est ignis tortura per retortam Δnc aperto peragenda. Ex hoc cum Essent. chamædr. chamæpyth. salvia, flor. hyperic. anthos. lavendul. ligni sassafras, radic. angelic. &c. Elixir anti-arthriticum paratur, quod in arthritide vaga scorbutica ad gutt. xx. xxx. vel ultra propinatum cum appropriato vehiculo notabilem edit effectum. Nota alias etiam est Essentia lumbric.

lumbricorum f. & c. Dn. Dn. Dravisi in *arthritide vāgā scorbuticā*, vid. & Balsamum Dorſalem seu antiparalyticum D. B. O. in thesaur. pharmaceutico annexo Sect. 4. num. 5.

Lumbrici intestinorum.) Sunt qui pulverisatos offerunt ad lumbricos expellendos. Sed *Henricus ab Heer lib. 1. Observ. 9.* hoc non probat, quia materia illa vermium putris putri puerorum puitæ mixta à magno illorum calore humido iterum animari potest, ut videmus muscas submersas longè mortuas, si non premantur, soli denuò expositas vitam & volatum recuperare. Sic & serpentes in minima etiam frustula concisos ac putrefactos, ut nullum amplius vitæ adsit vestigium, Solis calore in novos serpentes abire, ob serpentum formatrices ideas in putredine non destructas. Verum hic Metus de Nihilo est, hi enim lumbrici non integri, sed exsiccati ac pulverisati offeruntur, ac alias adesse potuerunt in corpore priusquam pulvis Lumbricorum fuit adhibitus. *Hofmannus.*

De artificiali Lumbricorum Productione hæc habet
R. P. Athanas. Kircherus Mund. Subterr.
Vol. II. p. m. 376.

Lumbricos plures siccatos in pulverem concha lateritia, terra pingui & dulci impleta sepelies: deinde aqua pluviali eam subinde rigabis, & intra tres aut quatuor dies reperies totam illam terram novā lumbricorum pullulagine scatere, & primò quidem sub magnitudine vermium qui ex casco nascuntur; deinde quoque pingui illo terra succo nutritos, in veros lumbricos excrecere comperies: cum enim semen in lumbricorum incineratione non pereat, sed virtute maneat, hinc fit, ut intra terram pingui & dulci succo præditam conditus pulvis, calore solis se se exerens, vi latentis, seminis in idem, quod primò erat, animal excludatur. Vel idem quoque duplici alia ratione succedit, vel ex concisis scoriorum lumbricorum particulis terra insitis, pluvialem aquam admiscemus, qua illa eadem est, qua semina lumbricorum aliunde decisa secum portat atque terra committit; hinc statim post pluvias & imbres terram pinguem dulcemque semper lumbricis scatere æprehendimus, tanto numero, ut vel ipsi semitas expleant. Est & hoc admirabile, quod si lumbricum soli ferventi exposueris, is statim sit moriturus, quem postero die ubi examinaris, innumerabili vermiculorum multitudine cooperitum videbis, quos ex cadaveris seminalibus partibus instaurari non est dubium; Unde ingens illa lumbricorum multitudo in terra nascitur, uti enim terram saxosam, sterilem & arenaceam oderunt, ita ex ea non nascuntur; fit tamen subinde ut vel repentes terram illam ingrediantur, sed cum alimentum non reperiunt, ibidem vita functi ex propriis eorum cadaveribus mox ingentem verminagem emittant, qui pluvia in terram pinguiorem delati, ibidem in immensam lumbricorum copiam adoleſcunt.

LUMBRICOS. NECANTIA, vid.
Anthelminthica.

LUNA vid. *Argentum.*

LUNÆ CAUSTICA, LAPIS INFERNALIS,
vid. sub titulo *Argentum.*

LUNARIA MINOR
seu Botrytis.

Nomina 1. Lunaria minor Ger. Park. L. Botrytis
I. B. racemosa minor vel vulgaris C. B.
I. B. Radice tenui, subnigra, inus flavescente folium exit

singulare, una cum pediculo interdum palmate, 4. 5. 6. 7. aut pluribus pinnarum crassarum, ubi nervo medio connectuntur angustarum, in latum & falcatum mucronem desinentium, conjugationibus compositum pinnarum superiorum concavo inferiorum gibbum excipiente, ex eodem pediculo ex infimæ conjugationis sinu sircu'us prodit palmaris, succulentus, crassus, & cujus lateribus alternatim oriuntur pediculi racemulis onusti, jubam imitantes. Racemuli acinos habent congestos, paucos, virides, qui nec flores unquam edunt, nec semen intus habere conspiciuntur, sed pro eo pallido colore putis tenuissimus atque impalpabilis invenitur, quofato an ex eo planta exuat incertum est, sæpe quidem cum expertus nunquam exire aliquid cognovi, inquit Columna.

Ego pulverem hunc ipsam plantæ semen esse minime dubito, quantumvis à columna satum, loco fortasse alieno non provenit.

In montibus Eboracensibus propè Settle oppidum copiosissime provenit & alibi in montosis & frigidioribus variis in locis, tum Anglia, tum in transalpinis regionibus.

Lunaria botrytis minor mult. folia I. B. Jun. racemosa ramosa major C. B. an sit lusus naturæ tantum: an species Lunariæ distincta ambigimus, præfertim cum Camerarius eam in Anglia inveniri tradat: nos autem nihil tale unquam invenimus, nec ab aliis inventum audivimus in Anglia, nisi forte accidentarium & monstruosum *Raius.*

Vires. Lunaria minor seu botrytis vulgaris planta est vulneraria ac adstringens, dysentericis, ut credunt, admodum proficua; Nos vidimus virum quendam qui Herniis curandis non mediocri cum successu allaborabat plantam hanc extus & intus in magno usu habuisse.

Nomina 2. Lunaria botrytes ramosa Silesiaca I. B. racemosa multifido folio C. B.

Clus. de drantalibus est planta, statim à radice upam aut aliam foliorum alam protrudens, sive folium racemosum & multitudine, frequentibus foliis, Lunariæ minoris vulgaris foliis fere similibus constans, sed longioribus & crassiusculis, crebraque incisura divisis, colore ut in vulgari viridi dilutiore, & quodammodo pallescentes; secunda ala, ut teneior est & postremo nata, tenui quadam sed rara admodum lanugine pubescere videtur, succulentiorque est quam prima; ex ejus quasi utero secundum radicem emergit cauliculus pinguis & succulentus, si cinens multitudine & majorem uvam (Rouine an fructus dicere debe in hæreo) quam vulgaris, alioquin admodum similem. Radix vulgaris instat multis fibris late in ambitum sparsis, crassioribus tamen, constat.

In altis Silesiæ montibus oritur, culturam autem respuit ut pleræque montanæ.

Nomina 3. Lunaria racemosa minor Adianti folio Breynii.

Breyn. Vulgari foliis locidariis (cujus effigies apud Camerarium in Matthiolo Germanice edito sub numero 11. extat) per omnia similis præter folia, quæ capilli veneris sive adianti foliis coriandri C. B. in modum eleganter sunt dissecta.

Nascitur in montibus Cassubiæ, sed admodum rara.

Nomina 4. Lunaria racemosa minor matricaria folio Breynii.

Breyn. Montium Cassubiæ est incolæ, unde satis copiose

copiosè allata; cauliculi in omnibus allatis magis curti erant quam vulgaris, racemis brevioribus magisque ramosis, ac foliis brevioribus, plures in lacinias angustiores dissectis, matricariæ haud imparibus onusti.

LUPINUS.

Lupinus nonnulli à *Lupus* dici existimant rationemque hanc adferunt, quòd lupinà quadam naturâ terram voret. Nam (ut Plinius ait lib. 18. cap. 14.) tellurem adeò amat, ut quamvis frutetoso solo coniectum inter folia vepresque, ad terram tamen radice perveniat. Sed rectius Isidorus lib. 17. Orig. cap. 4. qui Græcum esse origine docet, est enim *λῦπος*, quo respiciens Maro J. Georg. ait, tristesque lupini.

Nempe quia, ut loco dicto Isidorus ait, vultum gustantis amaritudine contristant; aquâ tamen si mace-rentur amaritudinem exeunt: unde Zeno Citreus rogatus unde fieret, quòd cum naturâ adeo tetricus esset, vinum si biberet, fieret suavior, sibi hoc cum lupino commune esse respondit. Meminere Athenæus lib. 3. & Laertius in Zenone.

Ex lupino macerato fiebant nummi, quorum in Comædiis usus erat. Plaut. Pæn. A& 3. Sc. 2.

Ag. Agite, inspicite aurum est. Col. Profecto, spectatores, Comicum.

Macerato hoc pingues fiunt auro in Barbaria boves. Verum ad hanc rem agenda Philippeum est.

Hinc Horat. Lib. 1. Epist. 7.

Nec tamen ignorat quid distent æra lupinis.

Ubi ut Turnebus à Mureto edoctus scripsit lib. 1. Advers. cap. 15. per æra intelliguntur nummi ærei, per lupinos, nummi comici è lupinis confecti, ut omnino fallantur qui corrigunt, quid distent æra lupini. Hæc omnia è Clariss. Vossii Etymologico.

Lupini Notæ sunt folia digitata caules teretes, flores in summis caulibus & ramulis in spicas digesti, siliquæ erectæ.

Plures dantur ejus species, scilicet flore albo, qui vulgaris, item flore cæruleo, luteo &c. Hic de vulgari cujus

Vires. Seruntur in Hetruria (inquit Matt. & nos etiam id observavimus,) non modo ad alimentorum usum, sed ad agros impinguandos, & Plinius pinguescere hoc satum arvum vineasque dixit, ita ut optimi fumi vicem repræsentet.

Semen in aquâ dulci calida maceratum amaritudinem, deponit, & gustui gratum redditur, ut citra aliam coctionem esitetur. Galenus elixum cum garo ac oxogaro, vel etiam sine his sale mediocri, conditum mandiscribit, & fieri tunc nutrimentum succi crassi, & tardè descendere. At ubi nativa etiamnum amaritudo manet extergendi digerendique vim obtinet Interficat lumbicos tum illitus, tum addito melle linctus, tum in posca potus; quin & decoctum ejus idem præstat. Foris impositus ex emplasticorum genere est; unde & decoctum in fotu, & farina in cataplasmatibus vitiligines, achoras, pustulas, pforas, gangrænas, ulcera maligna juvat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo. Sunt qui farinam ischiadicis cum aceto illinunt, elicit menses & foetum cum myrrha & melle impositum, & alia multa præstat, quæ vide apud Dioscoridem, Galenum & Plinium.

Quod Theophrastus dixit viridem à nullo animali mandis propter amaritudinem, de fructu intelligendum est: nam hodie etiam pro bouum pabulo feritur inter rapas. I. B. Raius.

LUPULUS.

Lupulum à Plinio l. 21. cap. 15. lupum salictarium

nominatum volunt, Lupulus cur dictus sit me latet, salictarius autem dicitur quia subit scanditque salices & arbuta omnia circumvolvendo: à salicibus autem potius quam ab aliis arboribus denominationem sumpsisse nobis videtur, quia locis humentibus & ad fluviorum ripas, ubi & salices, nasci mat. Lobelius salictarium dictum existimat, quia fulcra quæ scandit ut plurimum saligna sunt. Mæue volubilis folio aspero dicitur: cæterum notæ lupuli characteristicæ quibus à reliquis hujus generis distinguitur sunt, caules volubiles, fructus squamosi in racemis laxis: quibus incotus efficitur ut cerevisia ætatem ferat incorrupta, nec cito in vappam aut acetum degeneret.

Nomina. Lupulus mas & fœmina I. B. 1. seu mas & II. seu fœmina C. B. 1. Sive sativus & 2. sive sylvestris Park. nec enim aliter differunt quam magnitudine & exilitate aliisque accidentibus à cultura ortis. Lupus salictarius Ger.

I. B. Anadendras lupulus, per se infirmus, facilè & proxima adminicula quæ apprehendit, conscendit; non ille quidem capreolorum, quos nullos habet, ope, sed tortilibus asperis, angulosis, purpurascensibus & concavis sarmentis, tenaci pedamentorum complexu, in altum subnitens, cæteroqui hamo se tollere vix potis. Folia è geniculis bina adversa, pediculis palmaribus, asperis, & interdum rubentibus adnexa, modo mori folia imitata, integra in mucronem abeunt plerumque trifariam aut quinquefariam divisa, totidem mucrones ostendantia, tum hic, tum illic per ambitum serrata. Flores in Mare dicto è foliorum alis racemosi, cannabacci, colore herbido pallescentes, sex foliolis & totidem staminibus componuntur, nullo sequente fructu evanescentes. Fructus in fœmina strobilorum instar, squamis compactiles, verum membranaceis & laxis, colore pallido seu ex viridi luteo, semen continet rufum, amarum.

In sepibus passim abundat, & ad dumeta & margines pratorum humentium luxuriat. Lupuli tam in Anglia, quam in Germania vitium instar, in lupuletis seruntur & coluntur, magnâ curâ, nec minore impensâ, depactis prælongis perticis, quas sarmenta conscendunt atque etiam superant. Solo gaudent humidior, lætior & pinguiore, bene stercoreato. Totâ planta culta lætior multo evadit, florum thyrsis foliaceis ex squamosis grandioribus semine etiam paulo majore, vindemiæ tempore uvæ decerpuntur, in furno & ad id præparato exiccantur, in saccos deinde congeruntur & venum exponuntur. Hæc partim ex adversar. Lobelii, partim ex nostra observatione.

Vires. Harum usus notissimus est toti orbi, ad condiendam nimirum cerevisiam nè citò acefcat aut corrumpatur, sed in longum tempus asservetur. Quod præstant mediante insigni amarore quem ei communicant, quæ tamen ætate paulatim evanescit, cerevisia interim vinosum saporem vetustate contrahente, quinimo lupulus incoctus cerevisiam salubriorem reddere existimatur & sapidiorem: diureticam quoque & emmenagogam vim eidem communicare, sanguinem purgare ictero & hypochondriacis affectibus utilis esse. An vero calculo renum & vesicæ atterendo & expellendo conducatur. An è contra ad ejus generationem & coagulationem faciat à nonnullis ambigitur. Qui adversus calculum eum commendant eo argumento nituntur, quod calidus sit & diureticus.

Qui usum ejus in calculo damnant, sententiam suam valido sane tibicine experientia suffulciunt, quâ teste cerevisiæ lupulatæ (quam nos hieram vocamus) usu calculosorum paroxysmi exarbantur, qui è contra Alæ (sic dicimus cerevisiam cui lupulus non fuerit incoctus) potu leniuntur & mitigantur: præterea ex quo lupuli

lupuli in cerevisia usus in Angliam introductus sit, calculum apud nos epidemicum factum esse, multoque plures quam olim infestasse clamitant. Nos iis potius assentimur, qui usum ejus in cerevisia probant & commendant. Salubrior enim inde nobis videtur, & ventriculo gratior, & cibo concoquendo utilior. Nec obstat quod cerevisiæ lupulata potus calculosis à Medicis interdicatur, Alæ præscribatur: illud enim fit ad leniendos paroxysmos, Cui usui Alæ ob lenitatem & lubricitatem seu lævorem suum conducit, non ad morbum eradicandum, ejusve causam tollendam, eum alæ ob lentorem & visciditatem suam, atque tartari aut sæcum copiam quam deponit, calculo generando potius & coagulando quam dissolvendo & comminuendo apta nata videatur. Falluntur autem qui calculum epidemicum factum, ex quo lupuli in cerevisia usus introductus sit, existimant. Nam quamvis lupulus frequentioris hodie usus sit in urbe Londino quam unquam antehac fuerit, pauciores tamen ibi nunc dictum quam superiore sæculo calculo laborant, ut ex accuratis D. Graunt observationibus patet. Quod ad calculum attinet, putamus liquores illos, qui tartarum copiosum continent & præcipitant, generationem ejus in corpore humano promoveri unde & aquæ potiores à morbo illo immunes futuros arbitramur, qui autem vino indulgent, & merum assidue bibunt, persæpe calculo aut podagra vexantur: quorum morborum eadem causa, eadem materia esse videtur, ideoque non raro in se mutuo transmutantur. Observatum quoque est, longe plures in Gallia, ubi vinum quotidianus potus est, calculosos fieri, quam in Anglia ubi cerevisia pro potu ordinario utitur. Vinum autem Gallicum copiosum tartarum præcipitare, notissimum est, verum enim vero cum ingeniosissimus Vir Dom. Fredericus Slare receptam illam opinionem, quod scilicet tartarum calculi materia sit, experientia plane refutavit, quamvis verum sit meri bibulos calculo obnoxios esse, & vinum etiam tartaro abundare, non tamen ideoque calculum generat, quod tartarum copiosum deponat, sed ob aliam aliquam nondum exploratam rationem; deinde ad calculum præcavendum conducere opinamur, ut tenes & uteretes copioso sero seu urina subinde inundentur & proluantur, ita enim & meatus omnes urinarii dilatantur & arenulæ unà eluuntur, hinc qui se plusculum invitant, & strenue bibunt rarissime calculo infestantur. Diuætica quoque si effectum suum sortiantur, & urinam copiosam ciant, calculi materiam in renibus residem auferunt, ejusque concretioni anteverrunt.

Tuiones lupuli velut & asparagi vulgaris verio tempore coquantur cumque butyro aut oleo communi, acci tantillo & sale mentis adhibentur eorum esu sanguinis purgatur, scabies præcavetur, alvus solvitur, hepar & lien obstructionibus liberantur.

℞. Salis nigri, lupulosum recentium, ana manipulos duos, uvarum Corinthiacarum cæcul. lb. ½, probè contusa, mixta, & in massam fragilem redacta carpis applicentur pro epithemate ad febrem quotidianam fugandam Dom. Boyl. de utilit. Philosoph. nat.

Lupulus scandendo perticas motum Solis observat, hoc est, à dextra ad sinistram, seu ab Oriente per meridiem versus Occidentem flectitur, nunquam in contrariam partem, licet ipse manu volvendo, & dirigendo ut eo tendat efficere coneris. Idem & aliis omnibus convolvulis ab hac parte æquatoris nascentibus commune esse aliquando existimavimus. Nunc tamen experientia contrarium edocti sumus, alii enim à dextra sinistram versus flectuntur cum lupulo, ut verbi gratia, Brionia nigra, convolvulus niger, & peris-

clymenuin, alia sinistram, versus dextram ut phaeolus, calcuta, convolvulus major & minor? alii nunc in hanc nunc in illam partem, ut duleamara. Sunt ergo qui solem sequuntur, sunt etiam qui refugunt, sunt denique qui ambigunt.

Idem & cochleis terrestribus accidere, ut id obiter notemus observavit ingeniosissimus vir & singularis amicus noster D. Martinus Lister; quarum quamvis maxima pars à sinistra dextram versus circumactis orbitibus intorqueatur, nonnullæ tamen (minores hæ sunt & acutiori vertice) spiritus in lævam tendentibus falligiantur.

Cæterum non omitenda sunt quæ Clavius habet de lupuli radicem apud Salmanticenses usum.

Vulgus (inquit) & vetulæ Salmanticenses Medicinam empiricam facitare solitæ ad curandam alopeciam à Venerea lue natam hæc ratione lupulo utebantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à sordibus repurgatis per noctem in aquæ libris octo macerabant: postidie in illa ipsa aqua lento igne & fumi expertæ ad tertiam partis consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehementer esset Alopecia. Decoctionem servabant in usum ejus 3 viii. mane ægris jejunis propinabant deinde stragulis injectis sudorem producebant. Addebant interdum apii sive felini horti duas aut tres uncias, & graminis aliquot radices, & nonnunquam etiam passas uvas à gigartis mundatas Raius.

LUPUS.

Circa ejus descriptionem vid. quæ sub titulo CANIS afferuntur, hic tantum de partibus hujus animalis officinalibus, & remediis quæ exinde petuntur.

Officin. Nat. ex Lupo.

1. Dentes. 2. Cor. 3. Hepar. 4. Intestina. 5. Axungia. 6. Offa. 7. Stercus. 8. Pellis.

Vites.

1. Dentes argentei inclusi infantulis familiares sunt, quibus gingivas scilicet ficiant, dentibusque erupturis patere faciunt: alligati pavores eorum prohibent.

2. Cor comitialibus prodesse fertur (costum & tritum).

3. Hepar Epatis utilis confert, ideoque & Hydropicis ac Emaciat, nec non & tussientibus, (siccatum & exhibitum.)

4. Intestina imprimis ad colicos dantur dolores quos iidem attere dicitur circumligata: hoc item fertur de corio.

Dosis Intestin. arefactor. & pulveris ator. 3 j.

[Caro pulverisata comesta Epilepticis utilis experta, & salita appensa, in Hispania.]

5. Axungia non vilioris virtutis est, quam camina: cald digesta, articulis morbis medetur, oculorum lippitudini confert, (si ea fricentur.)

6. Offa ad morbum intercostalem, ut & ad ictus puncturasque valent.

7. Stercus Colicis confert (exhibitum, (3j.) vel brachiis, turibusve alligatum vinculo, ut nonnulli volant, confecti ex lana ovis à lupo laniata, vel ex corio cervi. Vid. Forest.)

8. Pellis lupi commendatur iidem ad dolores colicos mitigandos, (facta inde stragula, vel cingulum, cujus pili ventrem tangant.)

Præparata.

1. Oleum fit si Lupus in Oleo decoquatur.

Vites. Podagricos dolores mitigat.

2. Essentia

2. *Essentia Sanguinis Lupi*, efficax ad dissolvendum sanguinem coagulatum. *Hartman. in pract. Schroderus.*

Ejus Cordis & Epatis Lupini perfectè curat Epilepticos. *Petrus Borellus Centur. 2. obs. 95.*

Intestina Lupi contra colicam commendantur Dof. pulveris ʒj. Per *asperam arteriam pulmonum* Lupi potus haustus opitulatur pueris post variolas in faucibus læsis.

Pellis Lupi ex hac cingulum fieri debet in epilepsia, ventri & lumbis circumcingendum pilis exterius positus. *Hofmannus.*

LUPUS MARINUS.

Lupus marinus *Schonf.* est piscis à voracitate sic dictus: mordax etenim est animal & dentibus terribile, ita ut si anchoram prehendat, sonum edat ac vestigia conspicua relinquat.

In usu sunt Dentes molares, lapis bufonites, officinis dicti, secundum D. Dale, quamvis Clariss. D. Charleton asserat hōice lapides non ex dentibus simpliciter fieri, sed ex fraudulentia Gemmariorum fingi. Hi autem lapides quomodocunque efformantur, sunt bullæ instar, altera parte cava, altera convexa, coloris ex fusco pallentis, aliquando fuci, interdum nigri, albi, viridis, venicoloris. Commendantur autem ad pestem & venena, seu remedium præstantissimum, ut ex Schrodero &c. dicimus capite de LAPIDIBUS.

Quinam existimant hujus piscis junioris ac parvuli applicationem tumoribus frigidis & scrophulosis conducere.

LUPUS SALICTARIUS, vid. *Lupulus.*

LUCINIA.

Lucinia, Gallicè *Rossignol*, est avis omnibus satis notæ ejus usus est in epilepsia si comedatur; & ejusdem fel in vilu acuendo non infimum reputatur medicamentum.

LUTEOLA.

Nomina. Luteola *Ger.* vulgaris *Park.* Lut. herba facilis folio C.B. Lutea *Plinii* quibusdam I.B.

Radicè nititur simplici, albâ, lignosâ, paucissimis fibris donata, crassitie interdum pollicari, sapore nasturtii acti, caules bicubitales, teretes, striati glabri, viridantes, ætiori ubulo pertusi ramosi, foliis crebris, longis, angustis, glabris non crenatis, verum obiter interdum sinuatis aut crispis, nullo ordine pontis vestiti. Folia antequam excaulecat humi in orbem spargit nitentia (J. Bauhinus longitudinem palmarem, latitudinem semuncialem foliis attribuit, saporem subacrem cum lentore) thyrsi florum prælongi, teretes, magnam caulium & ramorum partem occupant. Flosculi singuli brevibus stipati pediculis, quatuor petalis laciniatis componuntur, cum pluribus intus apicibus pallidè luteis; quibus succedunt vascula tripartita, hinc, tribus loculamentis, quæ vix unquam exactè clauduntur, sed in medio dehiscunt, & semina parva nigra, rotunda, continent composita; ad singulos florum pediculos ligula apposita est.

In muris & locis rudatis, non raro etiam in arvis requiritur: Seritur etiam in agris ad usum tinctorum.

Vires & usus. Quæ de hujus plantæ viribus in Medicina à Matthiolo traduntur pro incertis habemus nonnulli contusam vulneribus recentibus imponunt. Lænarum infectioribus (ut J. Bauhini verba usurpem) adde & serici, usus magni esse quotidiana testatur experientia: rudes enim & albas cum alumine decocta colore luteo tingit. Cæruleas autem viridi idque magis minus intenso quo saturatio dilutiove fuerit color cæru-

leus: Ita panni bicolores, uno eodemque decocto, ex eadem cortina extrahuntur. *Raius.*

LUTRA.

Animal sic dictum ab *Æolico* εἰλύδης, pro εἰλύδης, sive εἰλύδης, quod in aquâ ut plurimum versetur, generali nempe nomine, quamquam propriè omnia aquatilia sint εἰλύδης. *Æolos* autem eorumque exemplo Latinos. N. in L. mutare satis constat; unde *λύμη*, *lympha*; ex quo *λύμφαται*, *lymphatici*. Penem habet maximâ ex parte osseum, canum more, pedesque palmatos, ad instar anseris, quo velocius natet. Plura vid. sub titulo *Canis*.

Ejus adeps resolvit & digerit, ac in juncturarum doloribus adhibetur. Hepar desiccatum & pulveratum dysentericis prodest à ʒj ad ʒj. Testiculi iidem desiccati & pulverati Epilepticos juvant si pulvis à ʒj. ad ʒj. assumatur.

LUTUM CHYMICUM.

Conficitur vel ex luto simplici admixto laterum & vitri pulvere cum ferri scoris, & pilis minutim conficis, vel ex farina & aquâ, vel ex ratina cum ovi albuminibus vel ex calce cum iisdem albuminibus, vel ex scobe ferri, farina laterum & oleo lini, &c. de quibus hinc inde in variis præparationibus Chymicis Nos non semel vasa nostra cum successu lutavimus ex cineribus communibus cum aquâ centâ proportionē commixtis.

LYCHNITIS, vid. *Verbascum.*

LICHNIS.

Lichnidis nomen accepisse contendunt hanc herbam *πρὸς τὸ λυεῖν νύκτωρ ἡγρὸν σκοτὸς*, quod tenebras solvat: vel quod tomentous ejus foliis veteres ad Luccernatum utum pro ellychniis uterentur: antiquitus enim gossipii copia non dabatur, ejus ergo vicem quarundam herbarum folia, ut verbaici & lichnidis, præstabant. Placet aliis nomen ichnidis huic datum non à frondium tomento, sed à flammeo rutilanteque floris colore: Lichnis ergo quasi lucidus luculentusque flos. Jo. Bod. à Stapel. qui & alia adfert.

Lichnidis nota sunt calyx floris integer, striatus plerumque & tumidior: vasculum seminale plurimum pyriforme, interdum oblongum & propemodum cylindraceum, summa parte per maturitatem se apertiente in oras dentatas, seminibus turgidioribus non satis, con pressis & rugosis, ut in caryophyllis, in medio sitis ea ambiente undique & protogene vasculo.

Florum petala in lichnidibus sapissime bifida sunt raro integra, rarissime laciniata, nunquam, quod sciam, in margine crenata, quo à Caryophyllorum distinguuntur.

Varie dantur Lychnidis species: Nos hic de Lychnide sylvestris flore albo propriè agimus quæ in palcuis & ad sepes passim nascitur.

Vires. In liquore posset; decocta optimum est remedium in convulsione puerorum D. Palmer, ex relatione D. Hermans.

LYCIUM.

Lycium veterum quid fuit hodie ignoratur; Lycium autem à Lycia Provincia unde allatum fuit dictum creditur. Lycii historia apud Botánicos recentiores valde confusa est & intricata. Nullam novimus Lycii notam caracteristicam qua ab aliis spinosis fruticibus. Rhamno præsertim, distinguatur: quociens frutices hoc nomine à Botanicis donatas rhamno subjungendas

gendas diximus. Nec tamen puto, genere inter se conveniunt stirpes omnes Lyciæ dictæ.

Nomina. Lycium Gallicum I. B. C. B. Palmarum altera peregrina ad lob item lycium latifolium C. B. latia folium Monipelianum Park item Lycium Gallicum Avenionense ejusdem.

I. B. Spinis rigidissimis horret oxyacanthar. Martioli fr. ilibus, circa quas flores parvi, multi simul ex brevioribus pediculis, quibus succedunt baccae; quæ maturæ sub pellicula continent semina oblonga posita, strata: extrinsecus bicocceæ & tricoceæ apparent, buccis spinæ Burgundicæ sic satis similes amara valde; Lugdunum adferuntur nomine grani tinctorii. Folia ad prunum sylv. nonnihil acceduntia tenuia, minora, in ambitu aliquantulum serrata, nervosa, decidua; in siccis nullum deprehendimus manifestum saporem.

Nascitur in asperis & saxosis circa Avenionem & Carpentorat n.

Lycium Delechamp. describitur spina tres cubitos alta, corrice in cinereum pallente; radicibus multis lignosis, aculeis foliolis, fructu piperis magnitudinis, nigro, adnexo brevi pediculo nunc triangulo, nunc quadrangulo, nunc cordis figurâ pro nucleorum numero, è cujus fastigio pilus duplex subtilissimus eminet, sapore ingrato & valde amaro: baccis adtingendum feticum aureo colore inter oles utuntur & vocantur *granum tinctorium*. Hinc patet lycium Delechamp. eandem plantam esse cum lycio Gallico I. B. & C. B. palmarum autem alterum peregrinum Ad. J. Bauhinus lycio suo Gallico idem existimat. Et Dom. Magnol, qui illam prope Montpellier observavit, in eadem est sententia Lycium ergo 4. live latifolium C. B. & 5. live Gallicum ejusdem una & eadem planta sunt.

Granum hoc pro tinctoribus seligatur recens ac bene nutritum. Avenione advehitur. Hollandi ex eo cum citra illæ quædam speciei commixto, componunt calorem illi si visum quem Galli *Sul-e-gran* vocant: materiam autem in massulas contortas cogunt, cujus Lycii partes omnes adstringentes ac digerentes reputantur.

Datur aliud Lycium quod *Indicum* est cujusque *Vires*, in malicatoriis ad gingivas mollificandas & relaxandas confirmandasque cum betle sunt insignes. Medicamentum autem est cum amaritudine adstringens & exsicicans, ad alvi profluvia curanda, & oculorum dolores tollendos optimum, in quibus plerumque optimo cum successu usus sum (inquit *Garcias* ex igno propter duritiem & pondus pistilla sunt deglutanda oryxæ idonea in mortariis ligneis, sex palmos in ambitu continentibus).

Cæterum *Caten Indicum* Lycium veterum esse non posse (ut opinatus est *Garcias*) facile esset ostendere: si quidem Lycium Diosc. folia buxi habeat, & pusilla sit arbor.

Bontius paulo plenius hanc arborem describit lib. 6. cap. 3. Creberrimus in trunco & ramis spinis est oblitus, foliis fere fabinæ vel arboris vitæ, sed non tam pinguibus & crassius: cæterum fabas rotundas fert, puniceæ coloris in quibus tres, aut ad summum quatuor nates clausæ latent, tanta duritie ut dentibus frangi nequeunt: hisce pueri apud nos loco sphericarum lateritarum in lusu suo utuntur. Sapor foliorum attringens unde eorum expresso in ulceribus usus est *Bontius* in aliorum medicamentorum defectu: idem è cortice & foliis multoties præstantissimum excocit, Lycium cupressi aut arboris vitæ species videtur. *Ramus*.

LYCOPERDON. vid. Orbicularis.

LYCOPERSICON, vid. Solanum Pomiferum, sub titulo Solanum.

Mangeri Biblioth. Pharmac. Tom. II.

LYCOPODION, vid. sub titulo *Musci*.

LYDIUS LAPIS, vid. sub titulo *Lupi*.

LYNX.

Lynx, Latinis *Lupus cervarius*, ut multis probat *Joh. Faber* in notis sæpius laudatis, Anglice *the Ounce*, quod nomen Gallis & Hispanis etiam commune est, & à *Lynx* corruptum videtur. *Lynx* autem *Lupus cervarius* non quod lupo sit similis, sed quod pari cum eo aviditate feratur, & in cervos hostiliter eat. *Plinius* tamen *Lyncem* à *Lupo cervario* distinguit.

Color huic Animali albicans, ex fulvo purpurascens, sed maculis oculorum instar variata, ut plurimum nigrescentibus. *Faber*. Academici Parisienses colorem ei vulpinum in dorso attribuunt, nigris maculis interstinctum in ventre & interiore crurum parte cinereum, maculis pariter nigris sed dilutionibus majoribus, minusque frequentibus. Pilorum maximâ pars tam quæ rubra, quàm quæ cinerea apparuit, curiose spectata revera tricolor erat. ima parte grisea summa albentes, media rubra; maculae tamen nigrae bicolores tantum erant nullo in extremitate albo.

Oculi fulgentes & ferè radiantes. quod Animali visu pollere arguit, caput Felinum; Auriculæ etiam Felinis similes, notâ characteristicâ *Lyncem* ab omnibus aliis Animalibus distinguente insignes, minimum apicibus villosis, confertis, instar *Holoserici nigri* splendentibus, mollibus & venustis, ex rariis summitatibus enatis, ac fuscum trium forsan digitorum transversorum longitudine elatis & acuminatis, quorum *Ælianus* in hoc Animalis meminit.

Lingua spinosa & aculeis referta, ut in Leone & Fele; aculei hi ab apice ad medium Linguae duri & acuti, versus gulam inclinati, reliqui ad radicem in contrarium versi.

Dentes in utraque maxilla molares tres ex utraque parte numeravit *Joh. Faber*; at Parisienses duos tantum in superiore maxilla utrinque, in inferiore tres: Duos prælongos caninos in utraque maxilla [in superiore longiores *Parvi*] Inter caninos utrinque incisores sex.

Digitus in anterioribus pedibus ut in hujus generis reliquis, quin, in posterioribus quaterni, unguibus duris recurvis, acuminatis, ex cinereo albicantibus instructi.

Quod ad mensuras attinet, longitudo capitis 7 erat digitorum, colli 4. reliqui corporis 24. caudæ 8. [Fabro 6. summa totius longitudinis pedes 3 unc. 7. Altitudo à summis scapulis ad imos pedum anteriorum ungues 20. unciarum; ab osse sacro ad ultimos posteriorum.

Ventriculus Felino similis. In partibus internis nihil singulare occurrit: nam Intestinatorum brevitates ei cum Leone communis est, Nervus opticus ad latas tapeti seu tunicæ choroïdis non inseritur, ut in plerisque Animalibus, sed prope ejus centrum.

Inveniuntur in Italia & Germania, sed in Asia pulchrius coloratæ. Coloribus, ut videtur, multum variant etiam Europææ. Vid. *Joan. Fabri* notas in *Recchi Anim.*

Siyah Ghush Persicè dictum animal *D. Charletono* descriptum & depictum in *Exercitat. de Nominibus & Differentiis Animalium*, huic idem videtur; ut & icon, & nomen quod nigris actibus prædictum significat, arguunt; aut ei valde simile: Dicitur quod maculosum non sit.

Pardus an *Lynx Brasiliensis*, *Jaguara* dicta *Margrav.* Lustranis *Onza*. Nomen Lustranicum *Onça*, & maculae nigrae hoc animal *Lyncem* esse arguunt, magnitudo Lupi pardum. Capite, barba, palpebris, auribus, digitis cum Fele convenit. Ungues semilunares, acutissimi.

acutissimi : Oculi cælij, noctu instar ignis splendentes. Cauda longa felina; quo à Lynce differt. Tota pellis constat pilis flavescens, brevibus in adultioribus, per totum maculata maculis nigris variis, eleganter dispositis. Crudelissimum est Animal, & hominibus juxta ac bestiis infestissimum. Igne noctu fugatur. *Raius.*

Officin. Nat. ex Lynce.

1. *Axungia.* 2. *Unguis.*

Vires,

1. *Axungia* convenit articulis resolutis.
2. *Unguis* argento & auro includitur, gestaturque adversus morbum Comitalem & Spasmodum (*loco amuleti.*) Schroderus.

LYSIMACHIA.

Lyfimachia à Lyfimacho rege inventore, teste Plinio, nomen accepit, vel à pugna dirimenda, id enim est *ἀνέν τῷ μάχῳ*. Est namque vis ei (si veteribus fides) belluarum etiam animos feroces & mutuos hostiles congressus placandi, & hoc autorem habet Plinium, cujus lib. 25. c. 7. verba sunt. Invenit & Lyfimachus herbam Lyfimachiam, quæ ab eo nomen retinet, Vis ejus tanta est, ut jumentis discordantibus jugo imposita asperitatem cohibeat.

Hujus *notæ* sunt siliquæ flores antevertentes, quæ per matur. quadrifariam partiti & dehiscens, quatuor feminum series ostendunt; flores summis insidentes & integri una cum calycibus decedentes, unde tetrapetali proprie dicti non sunt. Hujus species quas novimus omnes præter Virginianas luteas siliquas producant lanigeras.

Hactenus de Lyfimachiis spicatis in genere sic dictis, quarum species sunt speciosa, spicata major & minor &c. Jam de aliis Lyfimachiis

& 1. *Lyfimachia Lutea.*

Hujus *notæ* sunt capsula bivalvis, flores lutei, quæ nominis ratio, folia salicis oblonga, ad genicula interdum aut terna aut quaterna.

Nomina Lyfimachia lutea *I. B. Ger.* Lutea major, quæ Dioscoridis *B. A.* Lutea major vulgaris *Park.*

I. B. Subrubente radice, reptatrice, summo cespitate hærente nititur, caules autem profert sesquicubitalis & bicubitalis, striatos, hirsutos: Quibus ad genicula adnascuntur folia terna, aut quaterna, rarius bina, salicis latifolia, acuminata, superne atrovirentia, inferne magis candicantia, lanuginosa; flores in extremis ramorum fastigiis lutei, hyperici, acidi saporis, (è quinque petalis compositi, totidem staminibus medium occupantibus. Semen (potius vasculum sem.) coriandro par, sapore haud segnitè adstringente.

2. *Lyfimachia purpurea.*

Nomina. Lyfimachia purpurea spicata *Ger. Park* purpurea, quibusdam spicata *I. B.* Spicata purp. fortè Plinii *C. B.*

I. B. Plures spargit radices digitales, lignosas, albas; caules ad hominis altitudinem lætiore solo adulescunt, rigidi, in alas divisi, angulosi, subrubentes. Folia plurimorum bina ex certis intervallis, alias terna saligna, quam luteæ Lyfimachia strictiora & saturatius viridia, acuminata, sicco gustu; flores in spicis dodrantalibus aut brevioribus & pluribus velut verticillis compositis; hilari purpurâ oculos perstringunt; quorum singulis senis foliis constant, staminibus concoloribus medium occupantibus, ex cauliculis oblongis, striatis subpurpureis, in duodecim segmenta divisi.

Præcipuè notabile est in hoc flore, quod petala non exeant ex imo calyce circa basin vasculi semina is (quod in eodem fere occultatur) sed è summo calicis margine, ut statim patebit ea avellenti, cum jam marcescere incipiunt.

In palustribus & ad fluviorum ripas abunde provenit. Æstate floret.

Vires. Aqua hujus destillata ad vulnera, puncturas & sugillationes oculorum, nec non ad obscuritatem aliarum eorum vitia præsentaneum est remedium autore Parkinsono: specificum est inflammationibus.

LIBER XII.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

M

M A C E R.

Nomina. **M**acer veterum *C. B.* Macer Dioscoridis & Græcorum *I. B.* Macer Græcorum *Park* ulmo affinis, fructu vesiculis membranaceis & semine intus incluso composito &c.

Qui Macerem Græcorum & Macin offic. unum & idem esse opinantur, hæ illi multum hallucinantur. Macer enim cortex crassus est, contra macis tenuis: macer perquam astringit, macis sapore subacris est: macer temperatus est, macis calida. Præterea Arabes, ut Serapio & Avicenna, de iis, ut de rebus diversis distinctis capitibus agunt, & Avicenna Macerem *talisafar* radice corticem vocat. Tandem veteres qui de macere agunt nullam nucis myristicæ, cujus experimentum est macis mentionem faciunt, quod non verissimile est eos ignorare potuisse, aut silentio præterire voluisse, si illorum macer cum maci idem fuisset. Quin

Plinius apertè Macer corticem rubeum radice magnæ esse asserit. Maceris arbor describente Acoſta, vasta est, & multis ramis prædita, ulmo multò major, cum folia sex aut septem uncias longa sunt duos lata, exteriore parte dilutius virentia, interiore saturata. Ea non alium fructum habere creditur præter semen quoddam narii magnitudine, tenue, cordis effigie, colore flavo, sapore verò amygdalæ, aut nuclei Persicorum malorum tenui & candidâ tunicâ tectum, quod vesica quadam tenuissimis duabus simul junctis & transparentibus membranis constante includitur: ea autem vesica in medio folio nascitur, aliis magnitudine non dissimili, sed cuspidè obrustiore, & circa pediculum angustiore, colore medio inter rubrum & fulvum, inæquali, & multis fibris à pediculo ad extremitatem rectâ lineâ ductis crispo & rugoso, haud ab similibus illi quæ in ultimo nascitur, paulo tamen latior & planior.

Succo

Succo lacteo prædita est hæc arbor uti morus, radicesque habet ilici persimiles, magnas, crassas, in latum & profundum diffusas, & cortice rectas crasso, aspero, scabro, duroque, cinereo foris colore, inferius albo dum recens est, cum siccus flavescens & admodum astringens, succo cum adstrictione nonnihil mordicante, quæ tamen mordicatio brevi evanescit.

Vires. Radicis cortice recenti trito, cum oxygala seu lacte acido mixto omnis generis dysenterias & alvi profluvia mirabili successu curant omnes Medici, tum Brachmanes, tum Canarini & Malabarici, aliqui hujus corticis sicci & in pulverem redacti semunciam per noctem macerant in \mathfrak{z} iv. feri lactis, cumque his in die propinant, mane & vespere: deinde medicamento sumpto oryzam sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinaceos coctos maceratos & tritos in oryza decoctione statim ægro exhibent: interdum si necessitas urgeat, opium admiscunt. Solent verò etiam Arabes cujuscunque generis alvi profluvia opio nucem moschata admixta curare.

Hujus item radicis usus salutaris creditur ad vomitus compescendos, & ventriculum roborandum cum aqua mentha & mastices pulvere. Plus autem pollere asserunt Indici Jogues hujus arboris portiunculam in compescendis vomitibus alvi profluvii sistendis quam magnam quantitatem corticis myrobalariorum aut Arexæ, eamque præstantiorem esse Coru Malabarico.

Præterea macæ fructum omnis generis lumbricos in humano corpore natos necare & calculum in renibus frangere. Tum etiam eos qui singulis diebus manere urerentur. Liberos fore à calculo & à coli doloribus, nec inebriari posse.

Similitudo nominum *Macer* & *Macre*, & convenientia in viribus hanc corticem Dioscoridis Macerem esse arguunt.

An cortex ad alvi profluvia in novo orbe Monardis præfert (inquit) novus Orbis prægrandem arborem, foliis cordis edigie, nullo fructu. Ejus cortex digiti crassitudine aut amplior, solidus, durus & ponderosus, tenui candicante pellicula integitur; similis est admodum cortici guayacan, uti gentiana amarus, manifeste astringens, grati tamen seu aromatici odoris particeps, cæterum amaritudinem Monardes cortici suo tribuit. Cujus alii quidem non meminerunt, quantum quidem nobis constat. *Raius.*

MACERARE & MACERATIO.

Macerare nihil aliud est quam per infusionem in liquore seu menstruo apto, corporis alicujus sicci, aut ad siccitatem accedentis poros ita laxare, vitaculaque ejusdem partes colligantia ita extricare, ut facilius igne subigi possit pro commodiori destillatione &c.

MACIS, vid. *Nux moschata.*

MACROTIPER, vid. *Piper.*

MAGISTERIUM.

Magisterii vocabulum communiter sumitur pro subtilissimo pulvere ex certis rebus per præcipitationem præparato. Præcipitatio autem dicitur actio, per quam soluta in præceps aguntur & demittuntur. Hæc autem variè sumitur; Primò generaliter, pro quavis solutorum seu sublimatorum ex mensuris suis repercussione, quæ significatio propriè hic locum habet. Deinde specialiter & vel pro Præcipitatione Mercurii,

Mangeti Bibliorb. Pharmac. Tom. I I.

quæ per aquas fixatorias & gradatorias liquabilis Mercurii sistitur, & ex menstruo suo præcipitatur, sed cum præceps hoc modo in fundum decidat Mercurius & nil minus quoque sit, quam verà coagulatio, obtinuit hætenus nomen, ut ille dejectus h. m. Mercurius Præcipitatus & variè eum præparandi modi *κατ' ἐξοχήν* Præcipitata vocentur. Vel sumitur pro Philosophicâ præcipitatione, quæ ut est apud *Gebrium* Libro *De summa perfectione Capite 99.* Materia Artis in cælum vecta seu Aludelis collum circa spondilia hærens in terram delabi cogitur. Impropiè sumitur pro rubificatione & fixatione præparatorum, quo quidem modo Mercurius in phiala inclusus post repetitas blandas sublimationes ex se & per se instat tubei pulveris in fundo tandem remanet. *Synonyma Præcipitationis* sunt; primò Descensio, quia Præcipitata in fundum descendunt ex corpore liquoris. Secundò Repercussio, quia repercutiuntur soluta, ut repercusi decidant. *Germanicè* Der Niederschlag. *Definitur autem Præcipitatio, quod sit syncrasis seu cunctio dejectoria solutorum ex menstruo suis actione & reactione partium variâ figura & texture præditarum facta.* Hofmannus.

Magisterii nomen etiam æquivocum sit, uti lib. i. dictum, attamen communiter usurpatur pro pulvere, ut plurimum, candido, per præcipitationem ex certis quibusdam rebus præparato. Res illæ tum è mineralibus sunt, ut terræ & lapides, tum è vegetabilibus, ut Herbae, &c. tum ex animalibus; ut ossa, cornua, crustacea.

Modus fiendi.

M. Materiam, ex qua Magisterium parare constitutum est, tere aut comminue grossè, hinc affunde liquorem convenientem; acidum vel similem ut solvatur, vel extrahatur; solutio præcipitatur (affuso liquore vel materiâ cujus vi solventis vis obrundatur,) præcipitatus pulvis abluatur, si opus sit Aq. communi, hinc exsicceetur lente. *Schroderus.*

Suprà docuimus quemvis humorem cuivis extractioni non convenire, sed certum certæ, Sulphureum Sulphuræ, Salinum Salinæ &c.

In *Præcipitationibus*, prout etiam in solutionibus demonstramus, etiam observandum, ut cuivis soluto suum convenientis & appropriatum adhibeatur præcipitans. Sic verbi gratiâ, præcipitat. Ven. Sal comm. & *. ☉ Præcipitat. Mercur. & oleum Tartari per deliquium; Venerem ☿ Præcipitat. Mercurius solutus à Spir. Vitrioli, à Mercurio crudo Spiritus Vitrioli in aluminosam substantiam, à lixivio ex cineribus fagi Vitriolum, ab Acet. Sulphur, à ☿. Sal comm. & Tartar. Antimonium, ab Aq. butyrum Antimonii in Mercurium vitæ Præcipitatur; Quæ Spir. Vitrioli soluta sunt, Præcipitantur ol. Tartari per deliquium, quæ Spir. Sa. com. vel Acet. dist. Præcipitantur Sp. Vitrioli &c.

Sic fiunt

Magisteria.

1. E Mineralibus.

Sic habemus Magisterium Saturni, Magisterium marcastæ, Magisterium ☉ sale Tartari Præcipitatum, Magisterium Vitrioli Antim. liquore Tartari Præcipitatum &c. *Hofmannus.*

Tritis affunditur solvens, solviturque s. a. solutio præcipitatur, eluitur & siccat.

N. 1. Liquor solvens vulgariter adhibetur Acet. dist. tum per se, tum acuatim per Sp. Sa. nit. vel Similes spiritus minerales, s. Vitriol. Sal. com. &c. vel peculiaris destillatur solutioni aptus liquor, de quo sunt locis.

R 2 N. 2.

N. 2. *Præcipitatio fit communiter oleo Tart. p. d. nonnunquam spiritu virrioli, illo modo grisea aliquatenus evadunt præcipitata, hoc, albescunt magis.*

N. 3. *Quæ consistentia sunt durioris, ut lapides, ante calcinari volunt. Vide specialius lib. 3. Schroderus.*

1. E Vegetabilibus.

De his Magisteriis notandum, quod in hisce præcipitans ut plurimum in triplo, & præcipitatum solum in uniplo adesse soleat, exemplo magisterii Laccæ Florentinæ ex granis cherries, quod beneficio aluminis & ol. Tartari elaboratur, ubi duplo plus Laccæ Florentinæ acquiritur, quam fuere grana ante præparationem; potissimam partem alumini debere statuo, quod ex terreo corpore & spiritu acido compositum, quorum hic destillatione abstractus albam terram sine præcipitantis alicujus interventu relinquit. *Hofmannus.*

1. Tritis grossè vel incisis affunde lixivium forte ex Sal. Com. Tart. Aq. pluviali paratum, extrahatur, decantetur ac præcipitetur affundendo aquam aluminis (in qua O solum) exicca lente.

N. 1. *Præstat adhibere herbas mediocriter siccas.*

N. 2. *Sic nobis in usu sunt tam ex alterantibus, quam purgantibus, verbi gratia, Magisterium Rhabarbari, cujus dosis 3 ß.*

2. Sulphureis, id est, quæ oleosâ parte scatent, extrahitur Tinctura beneficio Spir. Vini rectificatiss. præcipitaturque affusâ aq. com. vel aq. aluminis.

N. 1. *Sic fit Magist. Resinarum, Succini, Corticum resinorum, exempli gratia, cinam. Turbeth. Gialap. &c.*

N. 2. *Extractis cat. non immerito annumerari poterunt. Schroderus.*

Sulphureis id est, quæ oleosa parte scatent, extrahitur Tinctura beneficio Spir. vin. rectificatiss. & præcipitatur affusa aq. comm. vel aq. alumin.) Ubi notandum, spiritum tinctum per inclinationem esse separandum, ejus dimidiam partem lentâ in MB. destillatione separandam & residuo demum aquam communem vel aliam præcipitandum esse affundendam. Extractum sensim subsidens lento calore siccandum est. Hofmannus.

3. Ex Animalibus.

Ossa, Cornua, Crustacea seu Testacea exhibent sua magisteria modo, qui de lapidibus traditur. Videlicet beneficio Acet. dist. vel spiritus alicujus mineralis acidi & acris.

Usitatoria sunt.

Magister.	Ovorum struthii.
Concharum.	Pericarum lapillorum.
Corallorum rub.	Perlarum.
alb.	Rubror.
Cornu cervi,	Saphiror.
Crânii humani.	Smaragdorum.
CrySTALLORUM.	Terræ sigillatæ.
Dentis apri.	Turiæ.
Granator.	Vitri Venetiani.
Hyacinth.	Ungulæ alcis.
Lap. Judaici.	Sic & Mag. Jalappæ.
Magnetis.	Scammonii.
Mandibularum lucii.	Succin.
Matris Perlarum.	Turpethi.
Oculorum cancri.	

Schroder.

Magisterium Gummi Gamandræ è Pharm. Aug.

℥. Gummi Gamandra q. v. Dissolve cum s. q. spir. virrioli in vase vitreato, ut instar pulmenti fiat, postea in arenâ exsicceetur, cavendo ne nigrescat, sed colorem suum nativum ut reservet luteum.

In corpore à serosis & pituitosis humoribus purgando conducit.

Magisterium Hepaticum rubrum ex eadem Pharm.

℥. CrySTALLORUM tart. subtiliss. tritorum 3 vj. sal. acetosella 3 ij. tingantur imbuendo cum s. q. tinctura sandali rubri spiritu vini cum sp. virrioli acidulato, extracta, iterumque exsiccentur.

D gestivum est celebre, & stomacho ac hepati confortando dicatum.

Magisterium Jalappæ ex eadem Pharm.

℥. Radicum Jalappæ q. v. crassiusculè contusis adfundatur sp. vini optimè rectificatus, ut tres vel quatuor digitos super emineat. Stent in infusione in loco calido per aliquot dies, postea colentur cum forti expressione: Extractionem hanc toties repetendo quousque sp. vini non amplius tingatur; tandem conjunctis & filtratis adfundatur aqua fontana, & sp. vini destillando separatur. Resinosa substantia jalappæ in fundo cucurbitæ hærens aquâ clarâ aliquoties lavetur, sicceetur & pul. erisetur. Liquor autem reliquus tinctus ulterius inspissetur, qui est extractum Jalappæ.

Serosos biliososque humores commodè evacuat; delicatulis & cætera pharmaca averfantibus maxime adcommodum.

Magisterium Sulphuris vid. Lac sulphuris.

Magisteria quedam ex Pharmacopœa Batæana.

Magist. Antim. Diaphoret.

F. ex 3 Diaphor. in ∇ cocto & filtrato, affundendo Om solum, ꝑando ac abluendo s. a. Dos. 3ß. ad 5j. vires obtinet ceruss. 3 ij.

* Magist. Benzoini.

F. ex Benz. albis in Pyreño soluto, ꝑando ∇ â Lactis, & siccando s. a. Dos. 3ß. ad 5j. Pectorale est nobile.

Magist. Bismuthi.

℥. Marcassitæ pulverisatæ p. j. Solve in Sp. Di rectific. p. iii. ꝑa ∇ â falsa edulca & sicca s. a. Confert ad cutis vitia, Lichenes, Impetigines, Scabritiem manuum & simil. cosmeticum est insigne.

* Magist. Git.

℥. Gum. Git. purif. 3 iij. Tinct. Ros. r. 1ß. succ. limon. 1ß. Sp. Q. li 3j. macera ac evapora ad consist. extracti: vel f. pulvis. Fieri etiam potest ex gum. Git. 3 ij. 00 p. r. p. d. 3 j. V. 3 vi. digestis ac evaporatis s. a. Purgat aivo 2, 2, 2, præcipue humores serosos. Usus est proficui in Hydrope, Scabie, Pruritu, &c. Dos. gr. x. ad 3ß.

* Magist. Jovis.

F. Ex Fl. ℥ial. in ∇ solut. & filtratis, ꝑando vel 00 o tartari p. d. vel One soluto, edulcando sæpe ∇ tepidâ, & exiccando. Dos. gr. 4. 5. 6. &c. v. Salis Jovis Vires.

Magist. Saturni.

Coq. 5 rubr. in * : filtra, ꝑa 00 o Q. li, & edulca, s. a. in phthisi, Hæctica, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Lue 3 rea, Secretum est. Dos. gr. 4. 5. 6. &c. Externè valet in Putredine oris, Ulceribus malignis, cancerosis, Lupo, Fistula, Ambustis, Pustulis faciei rubris, Rubedine oculorum, &c.

Magist. Tartari.

℥. S. tartari q. v. Imprægna * opt. donec tartarum nil amplius aciditatis retinere velit, dein affund. V. cumque abstrahe, aliquoties cohobando. Tandem re-

pone

pone tartar. ad liquefcendum, & habebis Oleum ru-
brum, per inferiora purgans. *Utile est in omnibus morbis*
deploratis. Dos. ℞. ad ℥j.

Magist. Turpethi.

℞. ꝯ. q. s. coq. in ∇ pluviali ad solutionem. fil-
tra, & cum ꝯ. tart. p. d. ☞a; Tandem edulcora ∇ Batâ
s. a. insigne est in Lue Qrea, Tinea, Scrophulis, &c. Dos. ʒss.
ad gr. xv. cum Conf. Hamech. ʒij. vel iij.

*Magisteria quaedam ex Hofmanni Thesaurō
Pharmaceut.*

Magisterium Epilepticum D. D. I. M.

℞. Ungul. alcis, cranii humani violenta morte perempti,
cornu alcis, C.C. an. ʒij. sinaragdor. Orient. ver. ʒj. unico-
nu veri ʒij. Pulverisatis affunde menstruum ex sale & alu-
mine preparatum, f. q. solve & solutum præcipita sp. vitr.
postmodum præcipitatum edulcora, & adde magisterii succini
ʒj.

Magisterium Cordiale D. D. G. M.

℞. Margarit. vel Corall. r. pulverisat. s. q. Affunde succū
citri depurati & cum ꝑ. salis rectificat. acuat. q. s. ad solu-
tionem : solutum cum ∇ f. Tra & edulcora, siccato adde
Ambregryf. solut. in ol. d. rosar.

Dos.à 3ß. ad 3j. in convenienti vehiculo.

Magisterium Cordiale D. D. K.

℞. Matris perlar. Margarit. præp. Corall. r. præp. ocul.
 & præp. Dentis equi marini ana q. s. solve cum ✕ f. q. so-
 lutum Fia cum sp. Oli & postmodum edulcora.

Dolis à $\Theta j.$ ad $3\beta.$

N. Cùm sp. ☉ elegantissima etiam juxta Cl. Zvvd-
fer. præscriptum conficiuntur magisteria, quem con-
sule in Append. ad P. A.

MAGISTRANTIA, vid. *Imperatoria.*

MAGNES.

De eo vid. sub titulo LAPIS. Hic rursus unicam
tantum adducimus ejus præparationem ex *Pharmac.*
Bateana.

*℞. Pulveris magnetis in crucibulo candefacti, & olei
martis, ana, exhala lento igne ꝑ. a.*

Cum cera miscetur in emplastr. & dolores podagricos mirè mitigat.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. *Arsenicis alb. antimon. crudi sulph. comm. ana* ℥iv:
terantur omnia seorsim & eribentur, ac miscantur;
tum pulvis immittatur patellæ terreae non vitreae, &
lenique carbonum fluant, spatulâ ferreâ sæpe moveri-
do, cavendo ne materia accendatur, & quando omnia
bene fluunt, tunc affunde super lapidem in lamellas, &
habebis massam grysei coloris quæ servetur.

Exteri saltem est usus, & ingreditur emplastrum pro curandis carbunculis & bubonibus pestilentialibus, ubi venenum attrahit & maturat; alii item gestant de collo loco amuleti in peste, ac præterea præbet misc. escharoticum, quo urebatur Clariss. Barbette loco lapidis caustici vulgaris, in cauteriis conficiendis.

MAGNESIA SATURNI, vid. *Antimonium*.

MAGNESIA OPALINA, vid. *Antimonium*.

MAJORANA & ORIGANUM.

Majoranam nonnulli dictam volunt, quod majori curâ, diligentiaque, quam cæteræ herbæ lesatur colaturque.

Amaracum ab *Amaraco* puero, regio, fabulam narrat
 Servius: *Amaracus* Cynarus Cypti Regis puer un-
 guentarius fuit, qui casu lapsus dum ferret unguenta,
 fracto alabastro majorem ex confusione odorem crea-
 vit; unde optima unguenta *Amaracina* dicuntur. Hic
Mangui Biblioth. Pharmac. Tom. II.

postea cum nimio odore contabuiſſet in herbam ſamp-
ſuchum mutatus eſt, quæ deinde ab ejus nomine capta
eſt maracum appellari:

Non invenio notam ullam genericam & essentialem
quâ origanum dictum à majorana differat, atque idcir-
co utrumque eodem capite complectar.

Origanum *ὄριγανον τὸ ἐν τοῖς ὄρεσι γάρνυται*, quod montanis delectetur locis, autoribus Dioscoride & Theophrasto, dicitur; Herodianus dictum origanum contendit *ἐκ τῶ ὄρεων* videre & *γάρνυν* clarificare, quod clarificet & illustret, quod Jo. Bodæo non arridet, cum origanum ex sententia Hippocratis, oculis & dentibus potu exhibitum noceat.

Aliud erymon excogitavit Theodosius Grammaticus, teste Phavorino, qui per *ῥῶτος* seu *simp' ex r* scribendum ait, atque à *εἶγος* i. e. algeo, factum *εἶγωνον* additoque ο parvo *ὁεἶγωνον* quasi frigus aliquot, per antiphrasin; calcacit enim, verum nec hoc probatur: primum magis placet.

Note majoranae seu origani sunt flores in capitula squamosa congesti in summis caulibus & ramulis, capitulis & squamis minoribus quam in dictamnio; & folia minus tomentosa & incana quam in illo.

Vires majorana tenui folia, & majori etiam folio. Partium est tenuium, digerit & attenuat, auxiliatur cerebri & capitis frigidis morbis quovis modo assumpta, pulvis herbarum siccarum naribus inflatus sternumenta ciet, & pituitam evocat, cerebrumque corroborat: sed & idem præstat foliorum succus naribus infusus. Valet & ad pe-
ctoris vitia, stomacho præterea utilis est, ac jecino-
rosos & lienosos juvat quovis modo assumpta: Sed & ad u-
teri flatum ac cæteros ejusdem frigidos morbos confert.
*Urinas & aquosos humores in potu sumpta ducit: den-
tium dolores lenit commansa aut apposita, admiscetur
antidotis J. B. Dodonæo & aliis.*

Oleum ejus calefacit & corroborat nervos.

Nicolaus Chesneau Massiliensis M. D. sequens erratum à se saepius expertum in cephalalgia commendat.

R. Radic. *Nellebori albi* ʒi. fol. *sampf.* p. ij. decoq. in aq. ʒvi. ad consumptionem tertiæ partis, ore aquâ pleno utere naribus attrahendo, ex decocto parum calido, in vola mantis posita, in dolore atroci, levem enim exasperat.

Aqua majoranæ catattho Confert, si loco erthini, ore prius simplici aqua vel vino repleto, volæ seu cavæ manus infusa, compressa alterutra nare alterâ exhaustiatur, radice naris aut ossæ erthmoide tenus. Secus si faxis, non ad dictum locum sed fauces aut narium foramina hoc erthino retrahitur. Hoc erthino pater meus summa sua laude usus est, in Principe Watenste-
nio ad coryzam. *Simon Paulus.*

Balsamo majofanæ si pinnae narium & μεσώφρου
inungantur, mirum dictu quantum in catarrho aut po-
tius coryxa is valeat, quo etiam nucha temporaque cum
in modo dicto affectu, tum in aliis frigidis capitis affe-
ctibus inungi solent. Idem, hactenus observationes ami-
cissimo D. Eduardo Husle Medico Londinensi debeo.

Vires Origani. Aperit, abstergit, adstringit origanum, & quomodo hæc conveniunt? usus præcip. in obstructione pulmonum, hepatis ac uteri, & hinc in nulli aſthmate, utero. Augēt lac, ichorosa excrementa per sudorem expellit, (ante balneum assumptum) extrinsecus usu venit crebriore, eoq̃ in balneis uterinis, cephalicis totius corporis (contra scabiem) nos plantam hanc, ut & omnes origana dictas pro majorana speciebus habemus, proinde & easdem illis vires convenire verisimile est. *Raius.*

Nuper ex mandato Dicastri Electoralis Brandenburgici visitavi Pharmacopaeiam viri ex longinquis itineribus famigeratissimi, Dn. Heisen non pridem defuncti; ubi invenimus oleum destillatum majorana in cella per 27. annos reconditum, in vitro angustissimi oris

cerâ & vesica bene munito, $\frac{3}{4}$ vi. continente, ferme totum in sal volatile transmutatum. In aliis oleis destillatis autem hoc non contigit. Patet igitur magnam affinitatem esse inter salia volatilia herbarum & olea destillata: Ideoque quoniam vis integra in oleis destillatis, quod tantopere in herbarum volatilibus sudandum. *Clariss. D. Daniel Crugerus Miscell. Curios. Dec. ij. Ann. 5.*

MALABATHRUM.

Nomina. Malabathrum & folium Indum officinarum L. B. folium Indum seu malabathrum Park. tamalapatta Germ. tamalapatrum sive folium C. B. Cadegi Indi, id est, folium Indum Arabibus eadem.

Cum folium Indum seu tamalapatra, (observante curiosissimo Fab. Columna) à canellæ folio, excepto sapore, vix possit dignosci nervis illis tribus & foliis reliquis signis similibus, ut non ovum ovo magis sit; non est cur in eo describendo laboremus, cum in Historia Canellæ abundè descriptum sit.

Scribit Dioscorides folium lentis palustris modo aquæ innatare, nulla fultum radice. De malabathro (inquit Scaliger) veteres somniarunt. Qui enim omnes Arabias & universas Indias penetramus hodie nusquam folium illud mirabile compertum habemus.

Garcias quoque Græcos in hoc falli affirmat, folium enim Indum non aquis innatare, sed in procera arbore nasci, procul ab aquis, tum multis aliis in locis, tum in Cambaya. Tamalapatram vocant, quam vocem Græci in malabathrum corruperunt.

Nos autem tantisper donec promissum impleat, & diversum esse probet Jacobus Breynius, cum Amato aliisque doctis sentimus folium Indum officinarum Cassiæ odoratæ folium esse, aut saltem cancellæ sylvestris Malabaricæ proxime descriptæ. Cum enim id asserunt Ruellius Cordus, Amatus, Lacuna, alii; cum Garcias scribat folium Indum Caryophylla quodammodo redolere, quem odorem Canellæ Zeilanicæ foliis tribuunt D. Hermannus & Knoxius; cum ipse J. Bauhinus (qui contrariam sententiam tueretur) in nostro folio Indo, ejusque partibus quædam esse quæ respondere videntur cinnamomo veterum fateatur; cum illud ipsum cancellæ folium à plerisque etiam doctis credi scribat Valerius Cordus; cum denique fructum legitimæ Canellæ (uti jam constat) interdum una cum folio vulgari Indo ad nos adferri se intellexisse refert Clusius, unde & Jo. Bauhinus illum pro folii Indi habet; & Clusius Tamalapatræ seu folii Indi ramulo eum appingat, folium Indum dictum seu malabathrum ipsissimum Canellæ seu cinnamomi folium esse, vix ullus superesse videtur dubitandi locus.

Vires. Malabathrum virum viribus cum spica nardi convenite dicitur, urinam potenter ciere, horis habitum emendare, vestes ab erosione vermium tueri. *Raius.*

Malabathrum eligatur quod figurâ ad arboris citriæ folium accedit, tribus donatum nervis per ejus longitudinem excurrentibus, colore ex pallido virefescens, odore, si conteratur, & sapore admodum aromaticum, integrum, læve & nitidum ex una parte, ex alterâ verò asperum. *Pharm. Aug.*

MALAGUETTA, vid. *Cardamomum.*

MALAXARE.

Malaxari dicuntur emplastra dum in massam subiguntur, sive id manu fiat, sive pilâ, vel simili instrumento.

MALICORIUM.

Nihil aliud est quam Malici Punici cortex, de quo vid. *Granatus.*

MALLEOLUS.

Malleolus in Phythologiâ definiente Columella lib. 3. cap. 5. novellus est palmes, innatus primi anni flagello, cognominatusque à similitudine rei quod in eâ parte quæ deceditur ex vetere sarmento prominens utrinque Malleoli speciem exhibet.

MALVA.

Malva Latinis quasi *Malva* quod alvum molliat, ut inquit Festus, secundum tritum illud scholæ Salernitanæ versiculum.

Dixerunt Malvam veteres quia molliat alvum.

Græcis etiam *μαλάχη* dicitur ἀπὸ τῆ *μαλάχην* ob eandem rationem; utrumque Etymon improbat Casp. Hofmannus, nec tamen meliora substituit.

Note Malvæ *Characteristica* sunt Calyx octaphyllos, seu geminus, exterior in tres, interior in quinque lacinias divisus, folia integra, semina in rotulæ caseoli formam circumacta.

Vires. Herba humectat, emollit, lenit dolores urinæ, acrimoniam mitigat, in tumoribus maturandis doloribusque sedandis extrinsecus adhibetur in cataplasmatibus; ad alvum leniendam & dolorem nephriticum mitigandum in clysteribus: præcipua ejus vis est in emolliendo, ut vel ipsum nomen arguit.

Ob lentorem succi syrupus & conserva medentur dolori calculosorum ob calorem illum modicum quem habet, est remedium colicum cum infantibus in butyro frixa. Hoc in propriis liberis expertus sum C. Hofman. in de Medicam. officin. eadem habet S. Paulus. Decocti vel aquæ destillatæ foliorum malvæ $\frac{3}{4}$ iij. cum syrupi violacei $\frac{3}{4}$ i β. urinæ ardorem & acrimoniam mitigat & restinguit illico prima dozi. Grulingius in praxi, nec se aliud in hoc morbo præsentius remedium nosse scribit, cui nostra quoque experientia suffragatur. D. Hulse.

Ad dysuriam \mathcal{L} . Decoct. malvarum cum syrupo violarum hoc remedio semetipsum curasse se testatur Forestus. D. Hulse.

Vires Malva rosea. *Malva rosea* eisdem viribus pollet quibus vulgaris.

Ejus flores coquant in vino veteri, quo porriginis absumunt & sanant, Cam. hort. utuntur etiam ad erysipelatis tubores compescendos; imprimis rubentibus rosis, secuti coloris similitudinem. Ego (inquit J. Bauhinus) in siccitate & ardore linguæ & faucium horum decocto feliciter utor.

\mathcal{L} . Malvæ herbæ rad. sem. q. v. (an. par. æq.) cum farina hordacea in aqua coquo; cui admisceatur oleum olivar. vel rosar. ex hisce omnibus conficiatur emplastrum, & imponatur locis affectis; id quod non sine magna utilitate fiet in tumoribus hepatis, lienis, & maticis: nam resolvendi, discutiendi & emolliendi calidos abscessus vim obtinet hujusmodi medicamentum: idem emplastrum sacris ignibus & aliis id genus inflammationibus auxiliatur, & impetuosos corpori aculeos refigit. Trag. lib. 1. cap. 119: p. 368.

Invenio in adversariis meis idem emplastrum in frequenti usu esse in Nosocomiis Italicis ad inflammationes & tumores ardentes mitigandos & compescendos D. Tancred. Robinson.

Novi ego unguentum simplex è malvæ hortensis foliis in butyro majali non salito decoctis & colatis paratum ad erysipelata & ignes sacros magno successu adhibi.

adhibitur. Ut post alteram vel tertiam inunctionem ea compescere, extinguere & sanare soleat rarissime fallat.

Vires Malvæ arborea maritima.

Vulgare quidem, sed tamen magnæ efficacæ medicamentum, quod confillis habentibus ex floribus malvæ arboreæ ex lacte paratur, quo gargarismatis loco utitur Sim. Paullus.

Doctus quoque sum flores malvæ arboreæ pulverisatos & cum melle despumato, & aluminis tantillo, quantum lingua ferre possit mistos, ac gingivis illitos efficacissimum esse remedium contra omnem putredinem gingivarum, contraque ipsum scorbutum. Idem habuere excerptis D. Edu. Hulse. *Rains.*

MALUM, vid. *Malus.*

MALA ADAMI.

Nomina. Malus Adami C. B. Poma Adami I. B. malus Assyriæ vel poma Adami, *Park.*

Proxima aurantiis sunt poma Adami nuncupata, si fructum spectes orbiculatum illum quidem & aureum, æquabili Aurantium superficie, sed multis numeris majorem, & nonnunquam ad umbilicum veluti ambelum, colore magis fulvo quam aurantia, & odore ignaviori carne citris simili, sed gustu insuavi, multo interim succo prægnante, sapore aurantiis affini: At vero folium in limonum aut Citriorum familiam cooperare jubet, ut cui nulla subiecta pinnula, nam potius quibus pertunditur omnibus communes sunt, veluti & spinæ virorque pertinacis vitæ folii flores Citri.

Pomum Adami dictum volunt, quod in superficie seu infixorum dentium vestigia habere videatur, quasi ab Adamo primo homine commorsum fuisset.

Ejusdem originis est cum reliquis congeneribus & in eisdem locis colitur, iis tamen minus obvia, nec ita passim nota.

Vires. Vitibus cum malo Citrio convenit: peculiariter autem ad scabient valere creditur, si per medium sectum, & tenuissimo sulphuris flore aspersum, deinde cinere ferventi calefactum corpori scabioso affricetur Dalechamp.

Notat Clusius hujus fructus ut & mali Aurantiæ brevibus folliculis comprehendere, cum in reliquis generibus folliculi seu vehiculæ succum continentes oblongiusculæ sint.

Cæterum pomi Adami seu paradisi, lumina dicta, variæ recensentur & describuntur species, nimium.

Pomum paradisi fructu oblongo.

Pomum Adami subrotundius, idque vel Rheginum, Neapolitanum, Romanum, vel fortum alia poma includens.

Lumia sive pomum Adami Spataforum nomen.

Lumia sive malum Assyrium ollulæ aspectu.

Lumia expers medullæ.

De situ, terra, fimo, satione, insitione, propagatione, translatione, collocatione, stercoreatione, rigatione, injuriis cælestibus, morbis, remediis & usibus malorum citiarum, limonum & Aurantium prolixè agit Ferrarius in Hesperid. & nuperrime Commelinus, quos consulat Lector.

Olea expressa & destillata ex harum seminibus, floribus & corticibus præcipui usus sunt in mechanicis & pharmacia. Succus & medulla expressi juvant in febribus, scorbuticis & calculosis affectibus. Cortices siccati & pulverisati in affectibus stomachicis & flatulentis (præsertim in frigida intemperie) commendantur.

Turcæ populi que Orientales varias condituras ex hisce præparant, & suum Sherbet ex horum succis & saccharo componunt. *Rains.*

MALA ARMENIACA.

Mala Armeniaca ab Armenia dicta Romanis, attore Dioscoride, præcocia dicuntur, quod ante alios fugaces fructus maturescant, nominantur & præcoquas Galenus etiam scribit vetus hujus arboris nomen (*μηλέα Αρμενική*) vocare enim omnes tum fructum, tum arborem *πεγκόκκινον*; licet alibi præcoqua ab Armeniacis distinguere videtur, cum illa his præstantiora faciat. *Βεληκοκκία* vox quæ recentioribus Græcis huius fructus dicti sunt proculdubio à Latino præcocia corrupta est: à quo fonte Gallicum *Abricot* profluxit. Plinius præcocia mala inter Persica numerat, & eorum duo genera facit. Supernas amplum & magnum, & vulgare parvum & strigosum, etiam Armenum dictum.

Differunt autem *Præcocia à Persicis*, quod illis folia latiora, pyrum aut populum nigram referentias ossa plena & lævia, cum Persicorum rugosa sint & cavernosa.

Nomina. Armeniaca mala minora I. B. malus Armeniaca minor C. B. Ger.

Vires. Bonitate Persica superant, neque enim, ut illa, in ventriculo corrumpuntur, neque tam facile acescunt, vulgo etiam suaviora habentur, unde & stomacho sunt gratiora. Febres tamen causare dicuntur non minus quam Persica, verum eas breviores & quæ facile solvantur. Cum saccharo condita & asservata, sive liquida, sive sicca inter præstantissima dulciaria seu bellaria à mattonis nostris habentur; ex iis etiam scriblitæ dictæ, omnium optimæ sunt, sive maturitatem adeptis sive immaturis. Oleum à nucleis Armeniacorum expressum mirificè valere tradunt inunctum ad inflammatas hæmorrhoidas, & ad ulcerum tumores & linguarum impedimenta, & pariter ad aurium dolores.

Item potum $\frac{3}{4}$ v. pondere cum vini Cretici $\frac{3}{4}$ j. calculos pellit, & colicos juvat I. B. & Matthiolo. *Rains.*

MALA PERSICA.

Ratio nominis obvia est, siquidem *mala Persica* dicta sunt à perside, unde primum advecta. Malus Persica ab Armeniaca & reliquis congeneribus differt foliis longis angustis. Fructus ossiculo rugis & sulcis profundioribus exarato.

Nuci Persicæ autem à Persicis fructus glabritie differunt.

Nomina. Malus Persica I. B. & aliorum.

Vires. Galenus & Paulus Persicorum omne genus genus damnant ut pravi succi, & quæ noxam ventriculo inferant; suadent itaque & ut initio refecturum ante alios cibos sumantur, & nè aqua superbibatur, sed vinum meracum. Addit Paulus eos qui crebrius iis ad satietatem vescuntur febre corripi: lædere & nervos proprietate quadam.

Ego tamen non video cur Plinii & Dioscoridis sententia, Persica scilicet ventriculo utilia esse, & alvum bonam præstare, nec alium iis innocentiorum cibum, omnino damnetur & rejiciatur: nec enim verisimile est, fructum adeo sapidum & delicatum, qui nostro quidem palato præ omnibus fugacibus arridet, ita ut à natura ipsa nobis ad edendum commendata videatur, noxium prorsus & insalubrem esse oportet, tamen ut delectus pomorum habeatur, & ut modus in iis ingerendis servetur. Hinc quæ de Persicorum noxa à Galeno & aliis dicta sunt, de

præ mollioribus intelligenda esse credit Amatus. Secus enim ait esse de duraciniis, ex quibus optimus spirat odor, suavis, gratus & spiritum recreans: nam eorum sapor delicatissimus est, cum quadam austeritate, qua mediante stomacho conducit & ipsum roborat, imo omnes Principes Hispaniarum & viri delicatissimi ea post victum comedunt, non nisi vino prius infusa, & nullam inde noxam evenite perferunt.

Difficulus adversantur Persica, quia non aliud possum fugacius, ut rectè Plinius, unde à Matronis nostris, aut confectoribus quos vocant, raro condiuntur. J. Bauhinus condiendi modum hunc præscribit: ritè lecta manu, decorticaque & ossiculis exemptis optime purgata cum aqua & saccharo decoquantur ad consistentiam syrupo debitam, mirificè placent ægrotantibus, præsertim siti, & linguæ ariditate vexatis, refrigerando corroborant, & in omnibus calidis morbis apprime conducunt.

Brassavola sub cineribus coctum unum vel alterum Persicum ægrotantibus suis offerebat. Cibum verò delicatissimum esse ægris perquam gratum affirmat Amatus:

Folia ob amarorem suum in cerevisia aut lacte decocta & pueris exhibita lumbricos intestinorum enecant & expellunt. Galenus trita & umbilico imposita id præstare ait. Parkinsonus etiam alvum leniter solvere scribit, si sufficienti quantitate exhibeantur.

Idem præstant & flores, efficacius etiam quam rosa damascenæ in quem usum ex iisdem cum saccharo contusis fit conserva, mane potissimum jejunis exhibenda; sed & syrupus paratur ad prædictos effectus aptissimus, recentes, autore Matthiolo, non tantum alvum deiciunt, sed & vomitiones cient, & hydropicorum aquas pellunt in aceta, iis citatæ, sed non absque ægrotantium labore; aqua destillata maculas faciei delet.

Gummi arboris commendatur ad alvi fluxum, calculus, impetiginem, tumorem faucium, asperitatem arteriæ, sputum sanguinis, vitia pulmonum dysenteriam commendatur. Varios utendi modos ad supra dictos affectus, vide apud J. B. in Hist. è Valeriano, Matthiolo, Gesnero.

Nucleos commendat Matthiolus, ad ventris tormina, ad ebrietatem prohibendam (sex septemve præsumptos) ad Alopeciam (tusorum & in aceto decoctorum puliculam) oleum contusorum ad somnum conciliandam, ad colicam tam potum quam clysteribus infusum: ad iliacam passionem & calculum, quatuor uncias potum: aquam è nucleis Persicorum 50. ceraforum 100. florum sambuci manipulo in vini Cretici libris tribus maceratis, fictili per decem dies in fimo sepulto, destillatum mirum in modum renum calculos pellere scribit Matthiolus.

E Corticibus mali Persici conficitur syrupus cujus virtutes non sunt minus cordiales quam syrupi è corticibus citri.

MALA COTONEA, vid. *Cydonia*.

MALA PUNICA, vid. *Granata*.

MALA AUREA.

J. B. Paradisorum nostri seculi, ubi id solum & cælum concedit, deliciae sunt Medicorum malorum species, æternæ frondis virore, & fructuum ubere quovis tempore proventu & luxurie, aliis primùm è floribus eluctantibus, aliis adolescentibus, aliis maturis, atque his quidem simul omnibus plerumque placentes. Notissima verò reliquisque vulgatiore sunt Aurantia dicta, quibus Aureus ille & rutilus corticis fulgor nomen dedisse potuit. Hæc aliis magis orbiculata, non-

nihil compressa, parum rugoso & foraminulento luteo cortice, interius albicante non multum spisso (feminas vocant) vel crasso, (mares dictitant) amarissimo & evidenter calido teguntur, quæ tamen ante maturitatem vitidis tegit cortex. Sapor succo pro maturitatis progressu aut generis varietate acidus, dulcis aut mediocris, seminibus æqualibus, multa medulla farctis, amaris; folio peculiaris forma, semper virenti, & Hyperici instar infinitis propemodum foraminulis pervio, quippe quod gemellum videri possit, majori lauteo acuminato, nec crenato, alio ceu corculo subjecto. Flos ut & fructus fragrantis, odoris (qui Cordo simi-cum virus nonnihil redolere videtur) coloris candidi, staminulis multis medium obsidentibus, pulchrior quam in Citro, & odorator, intus subcitrinus, per oram vero limbi putrescentes. Arbori, quæ multo major quam Citri, cortex vitidis, spinæ rigidæ sed raræ.

Aurantiam ab auri potius colore dictum puto hoc malum quam ab Orange Gallie oppido, vel ab Arantia Achaie urbe. Aurantie enim nomen prisca incognitum, non ante in usum venit quam Aurantium oppidum deletum est.

J. Bauhinus malum Aurantium potius quam Citium dictum, Theophrasti & Plinii malum Medicum esse (ut superius innuimus) suspicatur, quod auctores hi malum Medicum non comedi dicant, quod de malo Aurantio verum est; de malo Citrio minimè, quod totum manditur; verum pace tanti viri malum Aurantium cortice excepto esculentum est, & vulgò comeditur pro cibo, & non in condimentis tantum, pulpa enim interior Aurantii multo mitior est minusque acida quam vel Citri limonii: & nos in Italia & Sicilia observavimus rusticos & nautas Aurantia mala cum pane pro refectioe comedentes, nunquam vero vel limonia vel Citria: dantur etiam mala Aurantia dulcia quæ mandi posse ipse non negat. Est insuper in Europam nuper inventum Aurantii quoddam genus, esculentum, Chinesè dictum saporis delicatissimi, cujus etiam cortex unà cum carne comeditur. Quocirca quod Domitianus Matianum malum super cænam sumpsit, non obstat quo minus malum Aurantium hodiernum, vel Cestianum, vel Matianum Plinii fuerit.

Requirat idem, ut Scaliger vel alius aliquis subtilitatis Professor respondeat sine cunctatione alteri argumento quo idem probare nititur. Aurantia (inquit) exsiccata vel in multos annos odorem suum retinent, ideoque vestibus interponi ad odorem communicandum & arcenda noxia aptissima esse. Citria vero etsi exsiccantur quoque, sunt tamen evanida, adeoque nec odore nec usu commendabilia.

Aurantiorum plures species sed potius varietates esse nec pauciores quam

Citriorum aut limonum constat:

C. Bauhinus ista genera proponit.

I. Malus Arantia major. Cujus plura genera esse ait ab insitione prodeuntia: pleraque cortice amaro, crasso, aureo: alia subvirente; alia cortice tenuissimò, subrubente, medulla dulci: aliqua è cortice dulci: aliqua in uno pomo duo genera botrorum habent: alia absque seminibus: sic & pulpæ sapore differunt: nam alia acida, alia dulcia, alia vinosa, sive media sunt.

II. Malus Arantia humilis.

III. Malus Arantia cortice dulci eduli: an Chinesè?

IV. Malus Arantia unico grano.

His addit Parkinsonus malum Aurantium Sylvestrem, quæ tamen in Europa non invenitur.

Fertarius has habet varietates.

Aurantium sicciore medulla hybernium.

Aurantium semine carens, quod vel subrotundum, vel oblongum limonis effigie.

Aurantium geminum è crispo folio, & flore duplici.

Au-

Aurantium stellatum & roseum.

Aurantium virgatum & striatum.

Aurantium foemina sive foetiferum.

Aurantium hermaphroditicum sive corniculatum.

Aurantium callosum multifforme.

Aurantium Olyssipponense, Sinenſe noſtratibus & Belgis, quod è regno Sinarum Olyssipponem tranſve-
ctum fuerit. Circinnatæ est rotunditatis, mediocrem
ſupra a odum tumens. Caro cum ipſa cute confun-
ditur, & editur jucundiffimè. Novem ſpicarum me-
dulla blande mordacis dulcedinis tam vehementer
flaveſcit, ut aurum in eam diſtabuiſſe credas. Corticis
inſuper ſeu poſius cuticulæ glabritie & ſeminum pau-
citate à reliquis generibus diſtinguitur. Adde quod in
hoc genus fructu pulſam vitioſam, carioſam aut cor-
ruptam nondum viderimus.

Aurantium Indicum ex iſulis Philippinis.

Aurantium dulci cortice & Sinenſe.

Aurantium omnium maximum.

Malum Aurantium lauri anguſti foliis.

Malum Aurantium umbilicum roſæ inſtar geſens
fructus quidam monſtroſus aut præternaturalis eſſe vi-
detur.

Malus Arantia hermaphroditica, fructu medio Ci-
trio, medioque Arantio odoratiſſimo Herman. Cat.
inſitionis ingenio producta videtur, applicatis ad ſe
mutuo mal. Citriæ & Aurantiæ ſurculis per medium
ſecundum longitudinem ſiſis, aliove aliquo artificio
permixtis ſeminibus; ad eundem fere modum quo mu-
lus alio equam ineunte generatur.

Hujus arboris deſcriptionem vide apud D. Herman-
num in Catalogo Horti Lugd. Bat. qui habet malum
Aurantiam Indicam fructu omnium maximo Pupel-
mum dictam medulla pallescente & ruſſeſcente.

Gaudet Aurantia iſd. m. locis ac regionibus qui-
bus mala Medica, ubi præſtim abundant in hortis & vi-
ſciatis, matutinis præſertim tractibus ut in Liguria cir-
ca Genuam, & in iſulis Stæchadibus Hieres dictis pro-
pe Olbiam Gallo Provinciæ, ubi adeo familiarem eſſe
Aurantia ſcribit Lobelius, ut ſemper vitentium luo-
rum amantate & pomorum ſætura perenni neuti-
quam iniquiſſa videatur. Nos in iſula Melita in Ma-
gno Magiſtri viridario arbores ſatis grandes & proce-
ras vidimus malis majoribus æquales. Abundat etiam
in Sicilia & Italia, nec minus in Hiſpania Hiſpalenſia
apud nos in maximo pretio ſunt. Perægrinæ tamen ſunt
hæ arbores in Europa & aliunde initio advectæ, quem-
admodum Citriæ & Limoniæ, nimirum ex Aſia: au-
rea Heſperidum mala nonnullis creduntur quæ veriſi-
milis Cydonia fuere, ut alibi diximus.

Flores mali Aurantiæ odoris gratia in præcipuo ho-
nore ſunt: decerpti etiam per maria in longinquas re-
giones perferuntur, & aqua quoque fragantiſſimi odo-
ris ex iſis paratur arte deſtillatoria quàm napham vo-
cant: non tantum ad delicias, ſed contra peſtem &
morbos contagioſos utilem, & cordi amicam, quæ &
ſudores movet. Hiſpani parturientibus in difficili partu
propinat cum pauxillo aquæ pulegii.

Cortex amarior eſt ac proinde calidior Citri corti-
ce, ſaccharo conditus verminantibus pueris utilis futu-
rus ni amarorem reſpuerent: per aliquot dies aquâ in-
ſuſus amarorem deponit & edulis evadit, deinde con-
ditus ſaccharo non tantum menſis ſecundis inter deli-
catiffima bellaria inferitur, ſed & medicum uſum ha-
bet, in corde & ventriculo roborando, inque iſis aſſe-
ctibus quibus Citria conducunt: modum condiendi
cortices Arantiorum & limonum vide apud J. Bau-
hin.

Pulpa interior ſeu ſuccus mitior eſt minusque aci-
dus quàm Citriorum & limonum ſuccus, frigidus ta-
men & guſtui gradus, & ad appetitum excitandum uti-
lis, ut & ad ſum extinguendam in febribus. Nos certè

in febrili ardore magnum inde ſolacium multoties ſen-
ſimus.

Mala Aurantia Scorbuto ſanando efficaciffima eſſe
peſhibentur, ut quidam etiam ſolo eſu citius un diu-
turno pereurentur.

Malum Aurantium Hiſpalenſe integrum cum co ti-
ce & carne comestum ante accellum febris intermit-
tentis, præſertim tertianæ, perſæpe paroxyſmum aver-
tit, & febrem ipſam proſtigat.

Oleum è corticibus expreſſum igneæ panæ qualita-
tis eſſe comperti ſumus (inquit J. Bauhinus) quod
facile patebit ei qui corticem recentem juxta cande-
lam preſſerit, ut exiliant guttulæ inſtar roris, vide-
bit ſtrepitum & ſcintillulas flammeas excitari ac ſi pul-
verem ſulphureum in flammam inieciſſet. Sunt qui exi-
ſtiment eodem modo expreſſos cortices in oculos clari-
ficare viſum.

E tenellis deciduiſque Aurantiis ſunt globuli ad mo-
nilia, & ad præculas numerandas, odore ſuo commen-
dabiles.

Semina verminantibus pueris utiliter dantur: ex ſe-
mine terræ commiſſo arbuſculæ primo anno pro-
deunt, quæ in acetarii modum comestæ, admodum
palato ſunt gratæ, ventriculum inſuper corroborant &
appetitum excitant, autore Dodonæo.

Ad lumbricos, R. Malum aureum, perforetur & di-
gitis comprimat, ut ſuccus exprimat, deinde oleo
lini & ſucco abſinthii rutæque patibus portionibus im-
pleatur pauco theriacæ & farinæ lupinorum addito,
parumque bulliant. Hoc linimento pulſus tempora,
nates, ſtomachus & umbilicus linantur & videbis mi-
rabilem operationem. Alexis. Hoc remedium ſemper
mihi placuit inquit Cheſneau, habui à D. B. Hulſe
Raim.

MALA CITRIA.

Malum Citria, Græcis malum Medica & Aſſyria dicitur,
utroque nomine à regionibus, unde primum in Græ-
ciam allata, ducto.

Cum veteres ſcripſerint mala Medica non mandi,
conjectatur J. Bauhinus mala Aurantia noſtra potius
quàm Citria veterum Medica fuiſſe, tantum enim abeſt
ut Citria hodie non comedantur, ut præ cæteris omni-
bus in maximis deliciis habeantur, niſi quis (inquit) ma-
lit probare rationem Athenæi, non ideo abſtinuiſſe ve-
teres à Citriorum eſu, quod non fuerint edulia, ſed
quia in alium uſum, tanquam rem magni pretii potius
aſſervanda duxerint.

Athenæus Citrii nomen extate apud veteres Græcos
negat: ſuſpicatur ille Citrium à cedro tanquam ce-
drium nominatim fuiſſe: propter odorem fortale, in-
nuit J. Bauhinus. Hæc conjectura Voſſio improbat,
Palladii diligentia citrus in Italia primum coaluit,
hunc ſolers imitata poſteritas eam Galliæ & Hiſpaniæ,
ubi nemora jam & campos occupat, communi-
cavit.

Cæterum Citri vox æquivoca eſt & pro duabus ar-
boribus accipitur, altera inſrugiferâ è cujus ligno
menſæ olim fiebant, alterâ pomiferâ, quæ aliter malus
Medica & Aſſyria dicebatur, ut Plinius diſertis verbis
docet, conſule etymologicum Clariff. Voſſii.

Citrus, deſcribente Cordo, arbor eſt fruticofa veluti
cotonea, brevi trunco, longis ramis, craſſis, lentis, & ob-
ſequioſis, viridi glabroque veſtitis cortice, ferendæ fru-
ctuum moli valdè imparibus, & ad terram pronis, ideo-
que ſubjectis per tranſverſum hoſtilibus furciſque ſulcien-
dis. Folia laurinis ſimilia, denſiora tamen, multoq; majo-
ra, & ad juglandis magnitudinem accedentia, oblonga,
utrinque acuminata, egregiæ viriditatis ſplendoriſque;
præſertim ſuperne; infernè enim pallidiora ſunt (per am-
bitum ſerratæ) tota hyemè arborem ſuam exornantia,
odoris acerrimi, late ſpirantis, qualis in meliſſophyllo
ſcitur.

sentitur, cum gravitate quadam camicem imitante, (juncturâ quadam pediculo inhaerentia; Soli si obiciantur, instar foliorum Hyperici foraminibus visum ferè effugientibus, undique punctim trajecta cernuntur. Bod.) spinis armatur sub omnium foliorum annexibus longitudine uncialibus, rectis, acutis ac viridibus (J. Bauhino rigidiusculis, flexilibus tamen nec ita infestis) flores virentes gemmarum calyculi emittunt oblongos, caudicantes, (sæpiusculè forinsecus purpurantes, Calathi effigie, solidos, odoratos, staminibus in medio tenuibus ac capillaneis) horum duplex est genus; sterile & infæcundum quod colo caret; & fertile, quod in medio stylum exerit pensum collo involutum æmulantem, cuique à tergo fructus rudimentum annexum.

Fructus florem sequuntur singuli, longitudine non raro dodrantali, figurâ ovatâ, interdum etiam globosâ, superficie rugosâ, tuberosaque, colore primum viridi, in maturitate verò aureo seu citrino, odore foliorum simili. Cortice ambiuntur tenui, amaro & feruido, cui subest caro cartilagineâ duræque consistentiâ, colore candido, sapore acetosâ conditæ capitatæ brassicæ truncos referens. In medio mala cavitas quædam est, succo vehementer acetoso, suis membranis contento plena, cui immixta sunt oblonga & semuncialia semina, utrinque ferè acuminata, cute floris flavâ striataque intus candido, duplicis nucleo constans, quibus amarus, tenuis & mediocriter fervens est sapor, præsertim cutis, nucleus enim dulcedinem quandam admixtam habet. Radicibus nititur copiosis & tenuibus.

Fructus Citrii magnitudine variant: quidam enim in molem excrescunt melopeponibus parem, ita ut ad pondus librarum decem nonnunquam perveniant, hi nullo ferè succo sunt; adferuntur autem ex Liguria & Adriatici Maris insulis: alii limonum magnitudine sunt: alii paulo majores, quæ à lacu Benaco asportantur; forma etiam differunt Citria, nam alia prælonga sunt, alia rotundiora, alia in varias figuras hominum industriâ vasis figuliois inclusa formantur. Quædam sapore remissiore sunt, quædam vehementiore: in colore etiam observatur differentia, nonnulla dilutiora, alia saturatiora sunt; nonnullum tamen differunt naturâ & viribus. Nos omnes has differentias accidentales & à factione, aut forte etiam insitione ortas suspicamus. C. Bauhinus quatuor distinguit species.

I. Malus medica simpliciter ei dicitur.

II. Malus medica maxima, pulpâ plurimâ.

III. Malus medica fructu ingenti tuberoso, citranguâ quibusdam.

IV. Malus medica ab Imperatore Carolo V. ex Hungaria in Hispaniam delata, quæ omnium mali medicæ generum acidorum suavissimum, ut Clusius in sua Historia refert.

Parkinsonus noster in Theat. Bot. sex recentes & describit varietates, hæ sunt.

1. Malus Citria major.

2. Citria Malus minor, sive limonera, quæ à præcedente differt foliis minoribus & brevioribus: floribus, etiam minoribus & saturatius rubentibus, fructu minore longioreque, cortice mediocriter crasso, flavo, minus scabro, succo copiosiore cum paucioribus seminibus.

3. Citria Malus sive limonera prægnans, alium fructum minorem in se continens. Fructus est monstrosus.

4. Limonera dulcis, Hispanis limones Imperatoris.

5. Limonera acida.

6. Limonera multiformis: has quinque posteriores species, limoneras Clusio dictas C. Bauhinus, & rectius nostra sententia ad malum limoniam refert. His adde è Ferrario, 1. Malum Citreum vulgare belluarum, 2. Ma-

lum Citreum cucurbitinum vulgare. 3. Malum Citreum digitatum seu multiforme. 4. Malum Citreum dulcissimâ medullâ, radice non ita plerumque cuspidato.

D. Tavernier in peregrinationibus suis per regnum Tunquin duo Citriorum genera observavit. Alterum flavum, alterum viride, utrumque adeo acidum & immitte ut mandari non possint, aut deglutiiri absque insigni offensione ventriculi, succustamen quemadmodum apud nos aqua fortis usurpatur ad mundanda metalla, cuprum, stannum, ferrum, antequam deaurantur, ut & ad tincturas præcipue serici. In usu etiam sunt pro lixivii ad candorem lintheaminibus conciliandum, eaque emaculanda. Quin & per totum magni Mogoris Imperium succo isthoc Citriorum utuntur ad pannos lineos Calecuticos dictos candefaciendos, unde interdum adeo nivei & lucidi evadunt, ut splendore nimio intuentium oculos perstringant & offendant.

Vires. Citrii mali partes omnes, cortex exterior & interior, pulpa seu succus, & semina eximii usus sunt in Medicina; & contrarios sibi invicem effectus producunt. Exterior cortex flavescens valde odoratus est & aromaticus, sapore amaro, exsiccatus cardiacum est insigne & alexipharmacum, ventriculum frigidum & flatuosum calefacit & corroborat, flatu potenter discutit, humoresque crudos ibidem aut in intestinis contentos concoquens & digerens, masticatus halitum oris emendat: ciborum concoctionem promovet, & melancholiciæ conducit: in hypochondriaciis morbis, ut in vaporibus, flatibus, palpitatione cordis, obstructionibus & imbecillitate viscerum plurimum commendatur ab experientia Herman. Grube de malo Citreo, p. 36. 37. pulverem corticis exterioris limonum & aurantiorum ad eadem valere verisimile est. Saccharo conditis inter bellaria mensis secundis infertur; electuariis etiam cardiacis admiscetur adversus contagionem & affectus prædictos: quin etiam alvo laxandæ conducit, in quem usum ex eo paratur electuarium de citro solutivum ad humores frigidos & pituitosos evacuandos utile: tuto etiam usurpari potest cum bilis phlegmati admiscetur: inferior & alba pars corticis panè insipida est, nec ullius in Medicina usus; interservit tamen pro confectionibus dulciariis & apophoretis.

Caro seu pulpa interor, aut succus inde expressus quamvis succo limonum minus acidus sit, vi tamen refrigerandi ei plurimum antecellit, inquit Parkinsonus: in febribus ardentibus & pestilentialibus apprime utilis est, ad venenum restringendum, æstum contemperandum, bilis effervescentiam & sanguinis orgasmum reprimendum, sitim extinguendam, spiritus recreandos, appetitum acuendum: aiunt & ebrietati resistere & vertigini conducere.

Semina cardiaca sunt & alexipharmaca, adversus ictus scorpionum aliorumque animalium venenatorum; necnon pestis & variolarum contagia cor minuunt: ventriculi & intestinorum vermes enecant, menses provocant, abortum causant, humores crudos & serosos digerunt & exsiccant tam internè in corpore, quam externe in ulceribus humidis & ichorosis.

Memorabilis imprimis est Historia, quam Athenæo narravit civis quidam suus cui Egypti mandata fuerat administratio. In maleficio deprehensos quosdam ille ad serpentum morsus damnaverat. Productis illis & ad theatrum euntibus destinatum latronum supplicio in via forte caupona quædam misericordia commota, quod in manibus tum habebat malum citrium dedit; acceptum vero illi comederunt: & paulo post ingentibus ac ferocissimis anguibus oblatis, commorisque ab aspidibus nihil læsi sunt: qui tandem cum illorum custodem militem interrogasset, nunquid bibissent, aut edissent, ut id comperit: quod id acciderat, nimirum, absque dolo citrium illis traditum fuisse, postmodum alteri rursus dari iussit, alteri minime:

per-

percutissus hic confestim periit: illaſo altero qui citrium comederet: indeque multis & expertis cognitum eſt Citrium adverſari venenis omnibus.

Citria innoxia & quaſi recens collecta procul mitti poſſunt, ſi arboreo muſco ſingillatim involvantur ramulorum caſuris cerâ vel cretâ ſuperlitis, Ferrar. *Hesperid. l. 2. c. 19. Raius.*

Fructus ſeu Poma Citria magnitudine & loco natali potius variant, quàm genere, Ratione magnitudinis, quædam ſunt *majora* inſtar melopeponum, alia *minora*, alia *Limonum* magnitudine &c. *Alia Medica, Affyria, Alia ex Guinea &c.*

Vires. Cortex caleſc. & ſiccatur. Pulpa autem refrig. & humectans Semen caleſc. & ſiccatur. artem. diger. abſterg. &c.

Integrum Pomum Citrium eſt alexipharmacum, ut patet ex hiſtoriâ ex *Athenæo* deſumptâ, ubi referunt, quendam facinoroſum ad beſtias damnatum integri pomi eſu ab internecone aſpidum fuiſſe vindictum, quod prætereunti è caupona pſalteria quædam ipſi porrexerat. Huius hiſtoriæ veritatem confirmat ſtudioſus Medicinæ Pariſiis Gallorum aliquot retrò annis à viperæ morſu lethaliter ferè decumbens & ſalutifero pomorum citrinorum eſu reſtitutus. Medicinæ ſcilicet ſtudioſus dictis Pariſiis in frequentia quorundam Medicorum de naturâ, viribus ac veneno viperarum diſceptantium in ædibus pharmacopœæ cujuſdam, ubi haud exigua viperarum quantitas ex finitimis locis apportata diſcendi & curioſi ingenti gratiâ præſens fuerat, de præſenti materia ultro citroque cum reliquis verba miſcens arripit manu, quod antea ſæpius illaſus fuerit, viperam tabulæ impoſitam, & ipſo inſcio à pharmacopœo Gallo rudè inter forcipem compreſſum & hinc irâ ſuccenſam, hæc dum ille ſermoni intentus, reflexo capite dente ſuo canino pollicis dextræ vulnuſculum, vix acus magnitudinem æquans inſigit, quo animadverſo illam projicit, vulnere tamen ipſecto. Aſt vix quadrantis horulæ ſpatium interceſſerat, quin dira ſubſequuta ſymptomata, ſyncope, convuſio, continui vomitus, alvi dejectiones, cum torminibus & ilei paſſionibus, cum extremitatum refrigeratione, brachium croceo infeſtum colore intumeſcebat, facies cadaveroſa, labia livida ac tumida, oculis deſidentibus, pollex tum minimè intumeſcebat, niſi ſub fine, nec ex vulnere inſſictione guttula ſanguinis aut ullius humoris exſtillavit. Improviſus & ſubitus hic tragicus, caſus in multas & diverſas præſentium Medicorum conſilia diripuit partes, hic ad Theriacam, alter ad Orvietanum, tertius ad cauterium potentiale, ſed nimis tardè, conſugerunt: Tandem miſer hic juvenis decumbens, vivaciſſimus licet, diſtortus doloribus, ſal viperarum volatile cum aqua theriacali exigebat, inani verò quaſi effectu, continuato enim vomitu hauſtum reſciebat, nec clyſteres ullum attulerunt levamen, tota namque Naturæ œconomia haud leviter turbatâ. Fortè autem fortuna accidit, ut Nobilis quidam exterus ex commiſeratione aëri tactus decumbenti pomum citrium exhiberet, quod vix odoratu, non dicam, guttu, acido ſcilicet ſucco delibatum, incredibile dictu eſt, quàm ſubitaneam & præſentiſſimam tulerit opem, omnia momento ceſſabant ſymptomata, & non aliter fuerat, ac ſi Jupiter ipſe opitulatricem porrexiffet manu. Galli verò pro innata illorum levitate hoc minimè obſervabant. Patiens licet ex virium diminutione antegreſſa haud parum debilis, muſæam tamen ſuam repetiit, & ſumpto electuario quodam ex Conſect. alkerm. & de hyacinth. intermediato Pomorum Citriorum uſu non ſolùm illa nocte placidè dormivit, ſed & brevi iterum ex voto convaluit.

Ex hac obſervatione notatu digniſſima plurima Naturæ phænomena adhuc non ita aperta dilucidanda

veniunt; Facile eſt exinde videre cujuſ. naturæ ſit venenum viperarum, quomodo à viperâ in hominem traducatur, ecquid in maſſam ſanguineam ſeu Archeum noſtrum agat, quales actiones Archæi in morbis cudendis & ſanandis, quomodo medicamenta huius beneficio operationes ſuas peragant, & in ſpecie qua ratione Citriorum acidus ſuccus in venenum à viperâ illatum operetur, illud mortificando & ſigendo.

Pharmacopœus Gallus, in cujuſ ædibus hæc tragœdia incepit, tractatum ſub proprio nomine Chairas (at alieno ſanè Marte) edidit tit. *Les Experiences des Viperes à Paris in octavo.* Ubi ait venenum illud agere in maſſam ſanguineam, eam ſigendo, & circulationem impediendo: Et in ſequentibus, venenum ceu acidum aliquod ſigete ſanguinem &c. Verùm ſi hoc hæc ratione eveniret quomodo ſuccus ille citreus levamen aliquod aſſerre poſſet, de quo ille ſtatuit gaudere virtute fixativâ, ſic enim venenum illud redderetur fixius & circulatione magis magisque impedita mors tandem acceleraretur. Statuimus itaque, perniciem illam dependere ex viperarum ſalivali humore in dentium veſiculis contento extra notabilem quantitatem, prout modernorum Italorum curioſarum experientia pateſcit, qualis D. Redi Archiatri Florentini qui in quovis liquore hauſtus innoxius eſt, ſin verò imago iræ ſeu idea furioſa beſtiæ illius ſuperveniât vulnere a dentibus longioribus tricuſpidibus in corporis peripheriâ inſſicto, quæ in dicto liquore ceu vehiculo ſigillata, ſeu ex viperâ vivâ ſeu ex mortuâ fuerit, Archeus dum expellere exoticum illum hospitem nititur, agitur in furorem, eoque niſu ſub veneni tyrannide omnes functiones interturbat, dum totam ſpirituum & liquorum vitalium ſubſtantiam ſibi aſſimilando evertit; utique dum ex poſtate dotali temerarium, ex cujuſ numero in hac morborum ac ſymptomatum ſyndrome etiam fuit ſuccus ille Citri, ſuperveniât, ſupereminentem & non vulgarem obtinens bonitatem, quâ irati ac ſuccenſi Archæi errores ſopiantur ac corriguntur; Ex his patet, omnem morbum ab Archeo prout errat, vel furioſus eſt, fabricari ac regi, errantemque ac iratum placari & demulceri poſſe remediis poteſtativis in quibus de nudò ſuas reperit delicias, ut à furore remittat. Si enim juxta allatam hiſtoriam morſus viperæ extra notabilem humoris quantitatem & quaſi ſolo tactu ſæpè occidat; & ad liquoris cujuſdam mihi noti inunctionem in manu factam, ſi mentum viri attigerit, paulo poſt barbæ pili excidant, ſuperciliorum ac totius capitis, quidni & remedia dentur, quæ ſcilicet ſolo guttu non dicam tactu Archæi errores compellant citra ullam perceptibilem quantitatem Archeum ſedantia & demulcentia. Quæ ratio, quod ægroti ſæpenumero gliſcente adhuc cauſi & aliorum morborum vigore à ſpecifico quodam remedio in momento quaſi priuſquam à debili tunc ventriculi digeſtivâ in actum potuit deduci, notabile levamen & inſequentem inſanitatis plenam reſtitutionem ſentiant, id quod vel millies in praxi meâ obſervavi.

Fallum eſt, & experientiæ contrariatur, quod de Capite vel alia parte huius animalis vulnere impoſitum reſerunt. Verum autem, caput fixum vel viperam coctam devoratum profuiſſe, ſaporofam, nec ullius veneni participantem.

Miranda eſt hiſtoria, quam habet Caſp. à Reques in Campo Elyſæo jucundarum quaſtion. de Ruſtico quodam à viperâ morſo. Sed hæc in tranſitu, redeo jam ad noſtrum Pomum Citrium, cujuſ Cortex aromaticus, antiloimicus & carminativus etiam concoctionem juvat, *pulpa acida* adhibetur ad febricitantium calorem reſtinguendum. *Semen in Emulſionibus* confert verminantibus pueris & contra vomitus gravidarum adhibetur. Ex recentibus *Cortices conduntur, ex ſucco*

succo syrupus Acetos. Citri conficitur. Et ex corticibus quoque destillatur, unde *Eleosaccharum Citri Essentia Citri, &c.*

N. *Oleum Citri* ex recentissimis & non fermentatis Corticibus Citri solâ aquâ affusâ per V.B. destillatum fuerit, præstantissimum est, naturali gaudens odore, & multos per annos manet incorruptum: secus fit in fermentatis Citri Corticibus, ex quibus ingratum Therebinthinatum spirans odorem oleum destillatur.

Spiritus Citri valdè Cardiacus.

Recip. Pomorum Citri q. v. remota parte albâ effortâ conscinde reliqua, sacchari q. s. add. misce in vasculo optime clauso, stent in digestionem per 7. d. continuos postmodum & la per Alemb. & tandem rectifica per Aren. Spiritus prodibit limpidissimus, cujus aliquot guttulæ in convenienti vehiculo oblata collapsas restaurant vires.

Essentia Citri in formâ liquidâ.

Recip. Malorum Citrinorum num. 100. dividantur primò cortices à pulpâ ipsâ, postea remota parte spongiosâ albâ in partes conscinde minutissimas, ex reliquâ pulpâ internâ acidâ succum exprime, quàm fortissime, & superaffunde probè cum succo mistis invicem corticibus, adde sacchari q. q. & per sesquimensem digere in loco calido; postea per M.B. abstrahere spiritum fortissimum quem leotissimè asserva. Residuum exime & cum expressione trapice primò per pannum album, deinde verò filtra debite per chartam bibulam, facta filtratione inde cucurbitæ convenienti & abstrahere inde 3j. cum supra dicto spiritu fortissimo conjungendam, quod residui liquoris remanserit, in cucurbita supra dicto spiritui permisce & in Pelicano tandiu circulentur, donec liquor ille pellucidus & coloris Citrini evaserit. Tandem effundatur per lentam inclinationem, quod clarum est, & usui servetur, faeces verò in fundo residentes rejiciantur.

Essentia Citri sicca.

Recip. Hæc conficitur ex Cortic. Citri recent. mediante sacchari albi. aspersione, quod abraditur iterum cum parte inversâ cultelli in orbe stanneo, usque dum saccharum consistentiam acquirit siccam.

N. Aquam meam bezoardicam temperatam ex pom. Citri paratam vid. in thesaur. nostr. pharmaceutic. annexo sect. 1. n. 35. *Hofmannus.*

MALA LIMONIA.

Mala Limonia Citriæ seu malò Medicæ congener est.

Limonia nomen haud temerè apud ullum probatum, vel Græcum vel Latinum autorem invenias, videturque posterioris seculi esse inventum, differt à citrio malo fructu minore, cortice tenuiore, copiosiore pulpâ, eaque acidiorè.

Malus autem Limonia magno caudice assurgit, (circa lacum Benacum in eam se se attollit proceritatem in quam aliis in locis salices & ulmi Calzolar) ramosque habet tenuiores, longos, firmis, longis, viribus spinis armatos, (hisque aliquantulum hamatis, multoque pluribus quàm citria, quo fit ut ejus virgæ quandam Rubi imaginem referant. Cord.) folia per ambitum nonnihil serrata, minora quàm Citriæ, consimiliter foraminulenta, densa, viridia, glabra; flos purpureus foris (I. B. purpureus) quam Citriæ paulo minor, alias non dissimilis. Forma pom. oblonga, urbinata, rugosa, & tuberculis inæqualis, sed minus

quàm Citria; color pallidior, magnitudo minor; in eo etiam differt à citrio, quod cortice pulposo tenuiore, minusque carnosio, succo uberiore donetur, eoque acidiorè, ut interdum nihil ferè nisi succum contineat, semen non multum dissimile amarat.

Hujus etiam arboris plurimæ species seu varietates habentur. Quatuor recenset Cordus.

1. Primum Anserini ovi formam ac magnitudinem habet, odore inter Citriam atque Arangiam malum medio.

2. Secundum globosum minusque prædicto, utroque capite veluti eminente umbilico insigne cætera sui parte fruticosum.

3. Tertium oblongum est gallinarum ovi figurâ & magnitudine.

4. Tertio æquale est quartum, sed globosum, & superficie magis æquali C. Bauhinus in pinace novem constituit species.

I. Malus limonia acida, de qua dictum.

II. Malus limonia major dulcis; fructu minore & oblongis limis simili, Clus.

III. Mal. lim. folio serrato, fructu oblongo, cortice tenuissimo, quæ limas primum genus. Clus.

IV. Mal. Lim. fructu rotundo orbiculato. Limas alterum genus, Clus.

V. Limones prægnantes, alium fructum minorem in se continentes, Clus.

VI. Limones variarum figurarum, toti fere carnei, Clus.

VII. Malus Limonia minor dulcis, limonis genus in Hispania, minimo fructu, vix nucis magnitudine, odore cæteris præstantiore, excelliore arbore.

VIII. Limonum Sylvestrium in Syria provenientium inque Ægypto & Africa meminit Scaliger, pomis admodum exiguis, acidissimis.

Limonum à Ferrario & Commelino descriptorum catalogum sequentem D. Tancredo Robinson debemus.

Limon Ligusticus, insigniter variat ut limon S. Remi, Cereus seu citriformis, Genuens, qui à fructu parvo rotundo pusilla pile nominatur.

Limones Neapolitani multum variant, ut limon Cajetanus figurâ ultra vulgarem modum ovata, ut cacumine fastigiata: limon Amalphitanus forma oblonga, apice admodum eminente: limon perpusillus Calabrensis fructu subrotundo.

Limon Romanus à Rio vel rivo, insigniter cuspidatus, nonnunquam digitatus.

Limon prægrandis Dominae Lauræ.

Limon incomparabilis, figurâ inter oblongam & rotundam ovata.

Limon Imperialis, cæteris productior satisque crassus.

Limon medulla dulci duplex, vel vulgaris Italicus, vel Olyssipponensis, qui foliis & fructu facile distinguuntur.

Limon pyri effigie, vulgò Peretta sive Spatafora, isque major & minor.

Lævis vel striatus.

Perettæ consimilis Limon, sed oblongior & angustior.

Lymon Spatafora Rheginus, crasso mucrone fastigiatus, aromaticus. cortice punctim lacunoso.

Limon Rheginus fructu racemoso oblongo, paulatim extenuato in apicem cuspidatum.

Limon striatus sive canaliculatus, summa parte muliebrem in papillam extuberante.

Limon striatus Amalphitanus, mali Citrii magnitudine, cortice per quam verrucoso & scabro.

Limon Shardonius rotundus, manente floris apiculo velut rostratus.

Limon

Limon Rosolinas, umbone retortum in mucronem emissio bene fastigiatus.

Limon Florentinus Barbadorus, foliis serratis, viridi atrore pictis & hyperici modo punctim pertusis & translucidis.

Limon scabiosus lepræ facie.

Limones varii citrati, læves & scabri & alios Limones sæpe includentes.

Limon pseudo citratus Barberinorum.

Limon citratus Sylvestris.

Limon globosus ponzius, isque quintuplex, Ligusticus, rubens, Romanus, Chalcedonicus, Tripolitanus.

Limon Spongicus Calabriae rugosus.

Limon spongicus (spongiosus) Liguria verrucosus.

Lima est multiplex, dulcis, acris, agri Privernatis Romana citrata.

Lima citrata oblonga, scabiosa & monstrosa, quandoque & subrotunda.

Lima subrotunda spinis crassitie & longitudine vastissimis Piorum in hortis Romæ.

Gaudent Limones eodem celo calido, curâ ac cultu quo citria ad nos deferuntur ex Hispania & Italia, in quas regiones ex Media & Persia primum inuenta, nec enim sponte ibi proveniunt.

Vires & usus. Limonia cum gustu reliquis omnibus (aurantio & citrio) sint acidiora, ideo succo frigidior esse probabile est, valent ad eisdem usus ad quæ citria: ad venena tamen ut minus efficacia, ita ad æstuantes morbos potentiora habentur & hæc quidam comedunt, non integra, (ut Jo. Bauhinus ait) sed cortice denudata & in laminas concisa, asperso multo saccharo, quomodo magnam cum palato gratiam ineunt, sitim potenter restinguunt & febrilem ardorem compescunt.

Succi Limonum sunt admodum efficaces in dissolvendis calculis & detergendis partibus Herman. Grube de Limon. p. 10. idem scribit Crato, alique ut M. Blegny in Zodiac. Med. Gallico An. 2. p. 127.

Syrupus de succo Limonum magni fit ad calculum & obstructionem renum, item ad sitim & æstum in febribus ardentibus: cordi & ventriculo robur addit, & bilis effervescentiam compescit ideoque haud infelicitur imbecillitates, lipothymias, fluctuationes, vomitus & singultus febribus ardentibus supervenire solitos curat.

Cortices Limonum non minus quam Aurantiorum saccharo condiuntur pro bellariis & ad eosdem usus valent. Condiuntur & parva integra ad varios usus.

Aqua Limonum, ut & citriorum succo destillata cosmeticum insigne habetur.

Succo Limonum scribuntur literæ occultæ, quæ igni admotæ manifestantur. Eorum acido succo tam elegantem purpureum colorem conservæ rosarum, aut etiam Violarum aliorumque multorum conciliabis, ut nihil supra hinc & tinctoribus utilis est, ad colores multos transmutandos aut figendos, qui magnam ejus quantitatem insumunt.

Ad nephriticos affectus ℥. ligni querc. dersi ʒi. aquæ font. lib. vj. succi Limonum ʒiij. infund. omnia per 24. horas supra cineres calidos, postea coq. ad tertiam partis consumptionem: coletur. Dosis ʒvj. valde prodest calidæ jecoris intemperiei, ulceribus renum, ardori urinæ, sed præcipue pituitam salisam & viscidam e renibus & vesica evacuat. dylur. & strangur. causam potest ex hoc decocto vinum dilui. Mihi communicatum à patre religioso. Chesneau excerptit D. E. Hulst Raim.

MALUS.

Malum priore producta à Dorico & Æolico μάλον pro μήλον est quod non modo pecus & mammillam, sed & pomi genus significat. Arbor ipsa malus Græcis μήλεω Voss.

Pomi vox latius patet quam mali nonnulli enim nucem etiam, quæ Græcis ἀπερδρουν hoc nomine complectuntur. Alii nucem à pomo ita distinguunt, ut pomum sit quicquid foris habet quod edendo est, durum intus includit, nux quicquid foris duriore corio tegitur, intus habet quod edendo est. Sed vulgo genus pro specie accipitur. Pomum autem à πόμα sive potius ποῦμα (nam & hoc invenitur) dictum arbitratur Julius Scaliger: quia sitim tollerent eorum plurima, simulque essent cibo & potui.

Malus autem, cum sit Arbor totâ Europâ notissima, prolixa non indiget descriptione. Quin si indigeret, nostram in eo describendo operam superfluum reddidit accurata I. Bauhini descriptio, quam nonnihil auctam lectori proponemus.

Arbor est mediocris magnitudinis, ramis magis patula plerumque quam alta, cortice icabro, sæpe muscoso, obducta, foris cinereo, intus flavo, ac lævi potius quam aspero, materie alba, vel caudicante, fragili, mediocriter dura, & variis utensilibus præsertim domesticis parandis, atque ad torni artificium haud incommoda radice non valde multa, nec admodum profunda, sed in summo ferè terræ obhærente.

Folia ex rotundo oblonga, vel obtusa, vel acuminate, infernè villosa magis quam supernè, præsertim nova, in ambitu crenata, alternatim posita.

Flotes simul multi, ex brevibus tomentolis pediculis, suave olentes, candidi vel purpurascens, pentapetali, apicibus in medio subflavis.

Ipsa verò mala adeo variant formâ, magnitudine, colore, sapore, maturescendi tempore, ut dinumerare haud sit facile. In genere tamen malum fructus est magnitudine & figurâ varius, quippe aliud rotundum, aliud turbinatum, aliud sessile, quædam etiam angulosa sunt etiam quæ ad pugni gemini magnitudinem accedunt, sunt & parva & mediocria, tunica omnia contexta vel pallidâ vel flavescens, interdum rubra, aut ex toto, aut ex parte, rarius subcinerea, aut ad glaucum vergens, cui caro seu pulpa subest mitis, odorata in maturis, in immaturis & sylvestribus durior: sapore vel dulci vel subacido aut vinoso, vel acido dulci, in sylvestri austera atque acerba, pediculo suo quodque adhære, eo ipso. Longitudine & crassitudine diverso, è parte inferna, atque ut plurimum cavata, rarius prominente emerso: in cuius opposito, parte nimirum superna, est id quod περιχρῶν quidam vocant ex Polluce, alii ὀμφαλον, umbilicus nempe seu cavitas quædam, cui inutile illud floris residuum, (floris calyx) insidet in ipso fructus meditullio, seu volva Scribonio dicta, semina latent oblonga, altera parte obtusa, altera acuta, qua petiolum spectant, intus latentia, per maturitatem nigra, membraceis quibusdam atque duris pelliculis (cartilagineis potius), seu parietibus intergerinis, sejuncta, ita ut singula in singulis latent cellulis, interdum etiam gemina, quorum medulla candida, sapore subdulci.

Mali unam duntaxat speciem agnosco: nam quæ feruntur species, varietates tantum sunt accidentibus quibusdam, magnitudine, figurâ, colore, sapore, maturescendi tempore differentes.

Hæc autem varietates idcirco specie differre non existimo quia rationi originem suam debent, suntque infinitæ, nullo certo aut determinato numero cum ex semine satò novæ indies exoriantur.

Bauhinus uterque pomorum varietatem ex institutionum maxime varietate ortam esse asserunt : nos è seminibus satis varietatem hanc provenire existimamus : cum (ut alibi diximus) in institutionibus fructus surculi seu gemmæ naturam semper ferè sequatur ; non tamen negamus fructum institutione emendari & velut cicurari, succo ex acerbo aut acido in mitem evecto.

Mali apud nos in Anglia florent sub exitum Aprilis, & initio Maij : fructus suos maturant aliæ citius, aliæ tardius, præcoces Julio mense & Augusti initio, ferotina non ante finem Septembris, aut Octobris initium.

Amat quævis ferè loca malus, si ferventiora excipias, sed maxime temperata, aut etiam humidiora (ut recte I. Bauhinus) non tamen frigidissima : raræ sunt in interiore Italia & Gallo-Provincia ob cæli fervorem J. B. Abhorrent etiam loca maritima, sed uspiam nobis visa in ejusmodi locis : ac ne in vicinis quidem commodè coluntur : idem, concludit tandem malos temperata loca quærere, quæ tamen non nihil ad calorem & siccitatem vergant, ut nascantur sapidiora.

Genera illa malorum quæ C. Bauhinus in pinace pro peculiaribus habet nobis non aliter differre videntur quam reliquæ varietates, eæ sunt.

1. Malus pumila, quæ potius frutex quàm arbor.
2. Malus exigua pallidis floribus.
3. Malus sine semine interius in fructu.
4. Malus non florens fructificans tamen ; quæ duæ species sunt degeneres seu monstrosæ.
5. Malus folio pyri.
6. Malus flore pleno naturæ lusus est, ut in Ceraso.
7. Mala sylvestria, persica, &c. quæ & alba & rubra, & majora & minora de his tamen paulò post specialius agemus.

Vires & usus. Vires pomorum variæ sunt pro saporum varietate, acida, acerba & austera astringunt ac proinde alvum sistunt, verum cum butyro cocta cibum febricitantibus præbent commodum, inquit. *Schroderus.*

Dulcia sunt naturæ calidioris & laxantis.

Subacida seu vinosa naturæ sunt mixta, conveniuntque ventriculo & cordi.

J. Bauhinus Aristotelis sententiam probat, ut poma ante cibum sumantur; sumpta enim, inquit, ante cibum facillime alvum solvunt; at si post cibum, nihil fere aliud quàm instat, & status excitando molestiam creant stomacho, ut proprio periculo didicimus. Nostrâ experientiâ commodissimum tempus edendi poma non est matutinum ante prandium, cum ventriculus plane vacuus est & jejunos, ob cruditatem & acorem, uti nec ante cænam ob eandem rationem, at neque statim à prandio aut cæna, sed duabus, tribus, quatuorve horis post utramlibet refectioem, cum ventriculus nondum penitus exhaustus est, nec nimis repletus; poma sanè sunt fungosa & spongiosa, quæ injecta aquæ innatant, contra pyra residunt, unde poma difficulter in ventriculo concoquuntur.

Pyra five cruda five cocta facilius fero, meliusque digero, inquit idem.

Quamvis autem poma ventriculo frigidiori & humidiori fortasse noceant, calidiori tamen & bilioso apprimè conveniunt, & alvum facilem reddunt. Omnibus ferè pomis comune est, quod succus expressus admixto pauxillo croci ebibitus veneno adversatur, & ventris animalia pellit. Punctionibus lateris Camerarius inducit cataplasma ex pomo dulci, cui thus contusum inditur, at simul assentur; idem ad pulveris pyri ex pyreuma extinguendum pomum dulce in plantaginis latifolia aqua coquit ad tabitudinem, dein cum lacte facto cataplasmate vulnere inducit.

Nos in quotidiano usu habemus, ac magni facimus experimentum quod è pomis in aqua coctis paratur, & pulmenti specie oculorum inflammationibus imponitur. Possunt & ex lacte coqui, vel caprino, vel muliebri, vel ex aqua rosac. euphras. vel ex alia aqua frigida, ego tamen feliciter sæpius hoc medicamentum expertus sum, etiam sine lacte. J. B. nostrates non minore commodo pomum putridum oculorum inflammationibus & tumoribus quibuscumque imponunt. Memorabile est experimentum quod refert Simon Paulus, quadrip. Botan. Class. 2. p. 82. recordor inquit honestissimam matronam mihi lassam, sibi à lithotomo quodam Stralsundensi femur gangrænâ correptum, omnino restitutum esse postquam illius suavis poma putrida contusa, & sine ullius liquoris affusione cocta, cataplasmatibus formâ semel atque iterum applicuisset.

Gesnerus in vitis pulmonis & dyspnœa malum assum excavatum & drachma thuris repletum, felici cum successe comedendum dedit.

Denique poma comesta, syrupus de pomis simpli. & compositus cor exhilarare ejusque palpitationi & syncope conferre; inque morbis melancholiæ summopere prædesse creduntur. (Capf. Hofmannus quod tantis laudibus par sit syrupus de pomis se vix credere scribit) pomorum etiam usus est ad nobilem illam confectionem Alkermes.

Cæterum poma commodissime asservantur in loco frigido, & sicco potius quàm humido, in acervum etiam congesta: verum ne à frigore nimio congelentur diligenter cavendum: ideoque cum gelu vehementius ingruit, vel stragulis injectis, vel copioso stramine, (quidam Avenaceum præcipue commendant) contegenda sunt, vel in cellam subterraneam profundiorē recondenda; ubi à gelu etiam vehementissimo tuta & illæsa latitant, ut plurimorum experientia constat.

E pomis contusis & prelo subjectis succus exprimitur, qui postquam fermentatus & partibus heterogeneis secretis probè defæcatus & clarus evaserit, potui idoneus redditur, nec vino multum inferior sapore aut viribus. Variat autem pro qualitate & ingenio pomorum ex quibus efficitur, ut & pro ætate.

Pomaceum parandi modus simplicissimus nobis omnium optimus videtur; succum expressum vase satis capaci & apetto exceptum tandiu restare sinas, donec facies crassiores subsederint, & effervescere incipiat, deinde in dolium clausum & operculatum cerevisiarii aut vinarii simile infundas, ubi cum sese purgaverit & partibus heterogeneis secretis & ejectis clarus evaserit, (quod mensis unius minimum spatium postulat) in ampullas vitreas testaceasve angusti colli & oris exhaustas, easque bene obruratas in cellam aliumve locum frigidum recondas. Hoc modo paratum & asservatum pomaceum in multos etiam annos durabit incorruptum nec in vappam aut acetum degenerabit, quin si ex pomis electis, & boni succi fiat, generosum & lene experieris, quoque vetustius ed ferè melius: nonnulli ut liquor clarior & defæcator evadat, è doliis exhaustum in nova transfundunt, & aliquantisper denuo restare faciunt.

Infinis essem si omnes pomorum usus in cibo & medicina enumerare aggrederer. Sufficiat dixisse omnium apud nos nascentium arboreum fatuum longè utilissima esse, nec sine insigni detrimento iis carere posse humanam vitam. *Ramus.*

MANATI.

Manati (piscis cetaceus, ab Hispanis in Hispaniola sic nuncupatus, quod pinnas ad caput, & veluti binas manus habeat, quibus natat,) Belgis yacca marina (cū quod capite terrestrem bovem referat; tum quod ejusdem more herbis in terra pascatur) adeo magnus est, ut jugo bovum opus sit, ad unum vehendum; animal hoc gemino in terris & aquis victu est, & amicum hominis, ut tali historia patuit. Caramataxius, Gacicus, id est regulus, quidam in Provincia Nicaregua, parvulum Manati quondam captum viginti sex annos in Guinabo lacu, ædibus suis vicino, veluti in vivario, panis fragmentis aluit. His allectus piscis adeo cicur evasit, ut delphinos veterum scriptis celebratos mansuetudine vinceret. Nam quocumque dei tempore inclamatus ab reguli domesticis, Matto, Matto, (ea vox Indis magnificum aut generosum sonat) velud ad familiare signum, ex imo advolat; pastusque è manu, præbebat conscensuro dorsum: adeo ut egressus in ripam pastum in ædes ventitaret, & cum pueris colluderet. Si qui forte animi gratia lacum transmittere vellent, decem nonnunquam exceptos dorso indefessus transtulit: referente Petro Martyre, Ocean. dec. 3. lib. 8. Hic piscis Lutræ prope formam referens, xxxv. pedes longus, xij. crassus est, capite & cauda bovem referens; exiguis oculis; pelle dura & pilosa, coloris veneti, pedes duos elephantinis similes habet. Fœminæ ejus generis, ut vaccæ, catulos pariunt, eosque gemino ubere alunt; ut Hieronym. Benzone hist. novi orbis lib. 2. cap. 14. scribit. Lapides seu ossa in cerebro binâ gerit, parvæ pilæ palmariæ magnitudine & orbicularia; quæ Colicæ passioni & doloribus nephriticis valide adversantur, si primo adusta, contrita & per cribrum transmissa, in vino, drachmæ unius quantitate, assumpta fuerint. Charleton.

Cetorum generibus annumeratur Piscis *Manati* dictus, à pedibus binis anterioribus, quos solum refert, nimirum hos manus Hispani vocant, unde & piscem manatum, ac si diceret manibus præditum, vocaverunt. Belgæ ob similitudinem capitis, quo vaccam mentitur, Vaccam marinam (See-Kuh, Le Manati, A Sea Cow, Een Zee-Roe) appellant. Vid. Clus. Aldrovand. Monard. Gomar.

Officin. Nat.

Lapis *Manat.* seu de Manati, vulgò Lapis *Manatin*, est lapis, os seu crustaceum ex capite, ejus exemplum, idque variforme, nonnunquam enim dentes refert, unde & nonnullis See-Kuh-Zahn, Sea-Cow's Tooth, Tantvan de Zee-Roe, i. e. dens Vaccæ marinæ audit, aliquando officula aurium mentiuntur, adeoque ossa auditus dicuntur.

Prepar.

1. Præparat, fit ex calcinato s. cremato.

N. Præstat irrorare aliqua aqua conveniente v. g. Fœniculi, &c.

Vires. Summè commendatur ad calculos renum & vesicæ comminuendos, dolores nephriticos, ac solicos sedandos.

Dosis ʒj. & ultra.

N. Sunt qui ad ʒj. ascendunt.

2. Magist. Fieri potest solvendo cum spiritu salis vel sal. nitri, ac præcipitando cum ∇. Schroderus.

De variis Cetorum generibus præter *Ulysses Aldrovandum*, *Gesnerum*, *Jonstonium*, vide *Ol. Wormium in Murio & Thom. Bartholin. centur. 4. histor. 24.* Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

N. *Priapus Ceti* à paucis annis pro summo arcano dyenterico adhibitus ex Indorum Orientalium Medicinâ in Europam delato experimento, qui dum frequenter dyenteriâ corrumpuntur, sumpto priapo ceti restituntur, quod & apud Nos sæpè feliciter cessit, ob facultatem suam glutinosam oscula venarum oblinentem & anodynam vim archei furorem sedantem, vid. D. D. Joh. Daniel Major in Tr. de priapo Ceti. Hofmannus.

MANDRAGORA.

Mandragora dicitur, quod solis fervidioris impatiens ad Mandras pecorum, antra, aliasque speluncas umbrosas provenire amet, *Mandre* enim aprica loca quò se recipiunt & stabulantur armenta etiam hodie Itali è Græco significant.

Nota ejus sunt quod nullos caules producat præter pediculos flores & fructus sustinentes, radices grandes anthropomorphas quodammodo.

Mandragora Mas.

Nomina. *Mandragora* fructu rotundo C. B. *Mandragora mas* I. B. Ger. *Mas* vulgatiore *Park.*

J. B. Anthropomorphon dixere *Mandragore* radicem, crassam, longam, bifidam, incoxantem hominem, ut sibi persuadent, referentem; (radix interdum simplex est & indivisa, interdum etiam trifida aut quadrifida) è cujus capite folia exeunt, mari quidem circiter cubitalia, sesquipalmum fere lata, principio & mucrone angustis, atro virore prædita, fœtidæ; inter hæc à radice quoque (nullum enim profert caulem) pediculi exeunt crebri, duarum unciarum, aut palmares etiam, florem singuli sustinentes albidum, ac nonnihil purpurascentem, modice hirsutum, campanulæ fere formâ, quinque segmentis, & calyce foliato, laciniato, itidemque villosa, odore fœtido; pomum sequitur rotundum, parvi mespilæ magnitudine, ex luteo viride, semina continens alba, subrotunda compressa (pomum plene maturum croceum colorem acquirit *Park.*) radicem in officinis præstant solummodo cortices.

In calidioribus regionibus Hispaniæ puta Italia, Creta & Cycladibus Insulis sponte in sylvis & umbrosis exit, necnon propè ripas fluviorum in frigidioribus & Septentrionalibus nonnisi in hortis sata oriuntur.

Mandragoras mas altera *Park.* folijs ex viridi subcinereis & nonnihil complicatis à præcedente differt.

Mandragora femina.

Nomina. *Mandragora femina* I. B. Ger. flore subcæreoleo purpurascente C. B. item *Mandragora* fructu pyri ejusdem. *Mandragoras femineus* *Park.*

Clus. *Mandragoræ* fœminæ folia angustiora, minoræ & nigriora sunt, quàm mari, magis etiam rugosa crispaque, virore & graveolentia & humi expansa: inter quæ longi pediculi exiliunt, per terram strati, quibus insident flores *Melopeponum* floribus formâ pænè similes, coloris ex cæreoleo purpurascentis, quibus succedunt fructus, non turbinati instar pyri, sed rotundi, vesicariæ fructu triplo majores: initio virides, maturitate pallescentem ex luteo colorem adquirentes, odorati, lucci pleni, semine abundantes plano ut maris fructus, sed minore nigrioreque. Radix pedalem aut ampliorem longitudinem æquat, interdum bifida, intus alba, foris vero fusca, cui aliquot fibræ adnascuntur.

Supra Gades itinere Hispalensi, non procul ab urbe Xeres de la frontera dicta, ad arborum margines, quæ secundum flumina sita sunt, & quibusdam

aliis Beticæ locis uliginosis florentem observabat Clusius Februario &c.

Vires. Mandragoræ inter narcotica & hypnotica medicamenta recenseri solent. Quod an de radicum cortice (qui officinis in usu est) verum sit nescio. Fructus certè immeritò suspectus est, Casp. Hofmannus an quisquam pomum ipsum, cum vel sine cortice impunè possit esitare se valde ignorare scribit, Aëtius omnem malitiam videtur rejicere in semen, quasi illo dempto caro sit indemnus, nisi nimis copiosè ingeratur.

Verùm, o bone, pulpam etiam cum semine innoxie esitari posse te docebit, Jo. Faber Lynceus Romæ Simplificum Professor, vir eruditissimus, & fide dignissimus. Is, teste Joan. Terentio notis in Hernandez de Plantis Mexican. lib. 8. cap. 28. coram suis auditoribus magnum Mandragoræ pomum, unà cum seminibus jejunos abstulit, sine ullo vel somni, vel alterius mali signo minimo, & ut experimentum esset certius, jejunos usque ad prandium, per aliquot nempe horas, permansit, & à vino, ne vis pharmaci debilitaretur, abstinuit. Idem experimentum se quoque per sæpe fecisse testatur Jo. Terentius.

Cum ergo Mandragoræ poma & esculenta sunt & odorata, non est cur aliam interpretationem vocis Hebrææ Dudaim, quæ matri suæ Liæ Ruben attulit, quæramus. Cumque veterum testimonio semen Mandragoræ potum uteros purget, verisimile est Rachelem hujusce facultatis consciam poma Mandragoræ expertivisse, ut purgato utero aptior ad concipiendum redderetur, liberosque non minus quam Liæ foret & ancilla Zilpha procrearet. J.B.

Cortex radicis, qui ad nos aliunde, potissimum ex Italia asportatur narcoticus est ac soporiferus (inquit Schroderus) rari usus intrinsecus, extrinsecus ejus usus est in oculorum rubore ac dolore, in erysipellate in tumoribus duris, strumis &c.

Agrytæ & impostores pro Mandragoris circumferre & plebi divendere solent fictitias quasdam imagines ex aliarum stirpium radicibus recentibus efformatas, Altheæ, Arundinis, sed præsertim Bryoniæ. Raius.

Mandragora planta est pentapetala, baccifera, seminibus compressis, rugosis. Quæ nota cum omnium solanorum sit, Mandragora ad solanorum species referri debet. Incipit florere primò vere, quo tempore radix ut plurimum efficacissima colligitur.

Ex odore viroso colligitur ejus vis narcotica, incidens & attenuans; sed omnis hæc vis est in cortice, & medulla inferior rejicitur; unde etiam in officinis nonnullis cortices tantum in umbra exsiccari proficiunt. Specificum uterinum est, sed cautè adhiberi debet, sin in nimia exhibeatur quantitate dira inde sequuntur symptomata, ut spasmi &c. In pulvere dos esse potest ʒj. in infuso ʒij. Circumforanei utuntur contra febres intermittentes, sed minus tutò. Extractum ejus valet contra tertianam & quartanam. Præparata præterea nulla. *Hermannus, in Mater. Medic. Manuscripta.*

M A N N A.

Arboris manniferæ folia conjugatim disposita, sunt, sed quæ pistaciorum folia referunt, subrotunda, minora quam fraxini vulgaris, in ambitu serrata, in quibus medietas interior ad nervi imum brevior quam exterior sæpe conspicitur, id quod in Terebintho & pistaciis usus venire subinde observamus.

Ex Italia attulit C. Bauhinus.

Ex hujus ramis & foliis in Calabria æstivis mensibus exudat Manna, & in granula solis colore concrevit. Nam Mannam vulgarem officinarum non

esse rorem caelestem aut mel aëreum evidentissimis argumentis & experimentis probat tum Altomarus, tum Pena & Lobelius, necnon Monachi qui in Mesuem commentati sunt, nequicquam reclamantibus Matthiolo, Casalpino & aliis. Quæ enim evidentior potest esse demonstratio Mannam ipsius fraxini humorem seu succum esse, gummi modo exudantem, quam quod è trunco, aut ramis vulneratis extillat? quodve experimentum certius & efficacius ad id evincendum eo quod Pena & Lobelius tradunt, ramos magnos laricis & fraxini præciosos, atque in vinariam cellam, quo æstatis tempore Manna colligi solita est, asportatos, Mannam postero die, quanquam non perinde nitidam ostentasse.

Idem quoque mihi cum in Italia peregrinarer confirmarunt tum alii Calabri, tum præcipue eruditissimus vir & sedulus naturæ operum indagator Dr. Thomas Cornelius M.D. Neapolitanus, Consentiæ Calabriae oriundus, testis ævotæ & omni exceptione major, qui in ramulis & foliis à se ipso experiundi causâ limbo circumvolutis & curiosè correctis Mannam sæpius collegit: quod experimentum ante eum ab Altomaro aliisque factum Legimus: Frustra ergo vel huic veritati confirmandæ argumenta accumularem, vel ratiunculis aliorum in contrarium allatis refutandis tempus infumeremus: quæ utrinque adductæ sunt probationes responsionesque apud I. Bauhinum videri possunt.

Mannam autem in Calabria singulis annis circa vel paulo ante caniculares dies & sextiles pluvias colligunt, cum autem pluit cessat fluere.

Est autem manna duplex: quæ è fraxino colligitur.

1. Spontanea, eaque duplex, vel corporis, ut vocant, vel folii.

2. Coacta, quam Sforzatellam vocant Calabri.

Observant collectores in fraxinis Mannam emanare ex ramis ea potissimum parte quæ foliorum pediculi eidem annectuntur.

Notandum etiam, non mane priusquam Sol valde perurat, ut quidam falsò retulerunt, colligi mannâ, sed meridie soleque fervidissimo; non enim à solis calore rasescit, solvitur aut evanescit, sed potius concrevit, & durior ac candidior redditur atque hoc respectu, Altomari experimento, differt manna Calabrina à bombycina dicta, & ut verisimile est, Mastichina, reliquisque orientalibus, quæ fortasse sunt rores cœlestes concreti seu mella aërea. Hanc se ferro ac lateri ignito cum Calabrinæ cranis quibusdam injecisse refert, tam ejus quæ ex foliis, quam quæ ex ramis & caudice colligitur, illam autem protinus solutam & liquefactam: hanc vero aridiorem duriolemque redditam: Soli quoque expositam bombycinam, non quidem ita repente sed sensim liquefactam; Calabrinam vero duriolem redditam & albidiolem.

Notandum insuper colligi Mannam omnem quidem ex fraxino & orno, sed non ex omnibus individuis unde in Calabria venduntur tales arbores quæ Mannam dant, ut scribit Altomarus.

Vires. Mannæ, referente Casalpino, usus est in tota Italia ad alvum leniendam dissolutæ jure aut fero, pondere duarum unciarum aut trium, mitissimum enim est medicamentum, solum tenues humores educens, biliosos & serosos. Tuto exhibetur senibus, pueris, sceminis etiam prægnantibus & delicatis; non ipse solus (inquit Altomarus) sed omnes ante me & juxta me in hac regione medici hac Manna bono ac felici successu citra ullam noxam usi sunt, præsertim ad alvum molliendam. Lenit etiam thoracem & asperam arteriam.

Cautela

Cautelè in ejus usu (inquit C. Hofmannus) due sunt, 1. ne detur cruda sed cocta, habet enim in minus quam cassia flatuosum quid, 2. ut detur cum acris, Thymo, Hyssop. & ut actio sit celeris.

Eligenda recens (anno non vetustior) granis minoribus & rotundioribus qualis est manna folii, candida, lucida, gustu dulcis, & cum his omnibus solida.

Jam si queratur, cur fraxinus in Calabria mannam fundat, in aliis regionibus non item, queram & ego cur Lentiscus in Ohio Insula mastichen manet, in Italia aliisque regionibus minimè. Respondeo autem id evenire vel ratione temperiei celi, vel conditionis soli, vel utriusque, vel forte etiam peculiaris naturæ & constitutionis ipsarum arborum.

C. Hofmannus mannam Orientalem & Europæam ejusdem generis esse opinatur, sed neutrum melleum quid, verum succum seu liquorem arborum: cui suffragatur Garcias, in hist. Arôm. de manna orientali scribens, compertum sibi, esse eam gummi vel resinam arboris persicæ dictæ *quast*. Deinde, cum certum sit, Europæam esse arborem quid, Orientalis autem sit illi per omnia similis; quid ni sit ejusdem naturæ, at vero si ejusdem naturæ sit, cur tanta diversitas liquefactionis & indurationis respectus experientiam appellamus.

Observavit D. Tancredus Robinson in Regno Neapolitano itinerans multas cicadas fugere & depasce-re fraxinum humiliorem, unde suspicatur mannam facilius extillare per aperta vulnera, seu foramina ab hisce animalibus perforata, sicut in India Orientali Larca ex corporibus ab insectis exugitur, & præparatur. Rain.

Agave & *aspé* Galen. Mel ex aëre, cui cælestis natura, Plinio. Men Siracost & Terniabin, Arab. Thereniabin & Trungibin, Terengibil, Serapioni & Avicennæ. Manna purgatoria, Matth. Drosomeli, Cord. hist.

Est ros five liquor suavis, qui ex aëre sublucanis temporibus decidens arborum ramis & frondibus, hinc herbis, lapidibus & solo interdum invenitur in-hærere, brevi tempore coalescens, grumofus instat gummi apparet.

Manna Liquida Tereniabin. strictè Bellon. l. 2. obs. itaque c. 65. Du. { Mastichina } Ha Officinæ est rior { Granata }

Pro diversitate regionum est Manna Orientalis si Syriaca, Persica, Calabrica, Goritiana, Tridentina, Briançonensis.

N. Meminit & Garzias Manna Granata instar se-minis Coriandri, qua nobis penitus incognita, nisi intel- lectum velut graminis semen, Manna nomine veniens, de quo supra Cl. fl. i.

Ex his et si Syriaca laudem omnibus præripiat: at- tamen nostratibus in Officinis primas damus Cala- briensi & præcipue granatæ, i.e. quæ granulis mino- ribus constat, vulgus Mannam foliorum vocat, quod scilicet de arboribus colligatur. Hac inferior est masti- china, i.e. quæ granis majoribus & mastichis guttis prope æqualibus est. Dicunt mannam corporis, quod de ramis colligatur vel impetu ventorum in terram delabatur.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: rus- sa enim & fusca inveterata est. Adulteratur saccharo penidio, herbarum foliis circumvoluto. Sic quoque quæ Sennæ folia granis suis amplectitur factitia est, C. B. Fit quoque Manna factitia ex amylo Manna, Scammonæa semine aliquo & radice lactici-nia, Christ. Acost c. 8.

Vires. Temperata est ad caliditatem reclinans, gut- tur, asperam arteriam, thoracemque leniens, alvum blande movens, bilem serosisque humores educens.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

Dosis infantibus à ʒij. ad ʒʒ. adultis ab ʒiʒ. ad ʒʒʒ. & ʒij.

N. Quia facile bilefcit, in febribus, nisi frigida ad- mista fuerint, non adeo conveniens censetur.

Præparata.

1. Electuar. Diacasia cum Manna. Vide Elect.

2. Electuar. Lenitivum de Manna. Vide Elect.

3. Manna Tartarisata s. Tabula de Manna.

Fiunt ex manna soluta & purgata, quæ more com- muni in tabulas effunditur, ad Mannæ ʒi. Cremor: Tartari ʒj.

[Præstat etiam Manna composita additione Jala- pæ.]

Manna liquida.

ʒ. Mann. Calab ʒi. Crem. Tartari ʒij. Aq. stillat: pro libitu ʒv.

Tartarum primò aquis optimè solvatur, hoc facto, lento igne manna, quæ omnia calidè per linteum tra- jicienda, & cum albumine ovi clarific. in modum syrup. Cui ad conciliandum gratum odorem aqua ci- nam. (Essent. citri) vel simile quid affundi potest.

Ex Communicatione D. D. Johan. Kiefer.

(Dosis à ʒiʒ. ad ʒij. pueris adultis ad ʒv. vel ʒʒʒ.)

ʒ. Spiritus Manna.

ʒ. Mannæ el. q. v. destilla Δ lento ex Cucurbita, & habebis spiritum insipidum.

Vires. Sudoriferam insigne est in febribus tum pesti- lentialibus, tum communibus, sudorem propellens admo- dum foetidum.

Dosis ad cochlear. i.

Solvit itidem Sulphur, unde Tinctura Sulphuris flava Cl. Dn. D. Helvic. Dietericus, Medicus Electo- ris Brandeb. Principp. Dan. & Holfat. amicus meus in- tegerrimus.

6. Spiritus Manna alius.

Dissolvatur Manna røre Maj. li. & tandiu cohobe- tur donec sublimeretur in caput Xxi instar nivis. Hic in spiritus fluidam naturam redactus fit soluti- vum Solis mineralis, seposita omni vi corrosiva, Beckerius in Hermete redvivit.

7. Syr. de Manna laxativus. Dn. D. Echoldi.

ʒ. Polypod. q. ʒvj. Rad. Iræos Flor. ʒʒ. Passul. min: ping. & inc. ʒ. ij. Fl. Violar. Borrâg. Bugloss. ana p. j. Sen. s. st. ʒʒ. Cinam ʒʒ. Aq. muls ʒʒ. ij.

Coque omnia fia. ad consumpt. lib. i. Coletur & ex- primatur. In colatura dissolve.

Mann. calabr. ʒij. Sacchar. penid. Cand. alb. an. ʒi.

Coq. ad consist. syrupi, addendo in fine aq. Cinam: parum.

Dosis ʒi. ad ʒij. & ultra. Schröderus.

Manna) Nostratibus in officinis primas damus Calabriensi & præcipue granatæ, id est, quæ granulis minoribus constat, vulgus Mannam foliorum vocat. Præter hanc alterius adhuc meminit Th. Bartholinus Centur. i. Epist. med. ʒ4. quam ex trunco Arboris orn: stillantem eo modo vidit, quo ex Pino resina, vel ex ceraso gummi & quidem etiam in Calabria, sci- licet alternis ictibus truncum omni cultro vel sectri proscindunt vulneribus & mane sequenti colligunt humorem exstillantem, excipiunt & abradunt cul- tris ligneis, & abstergendo vasis imponunt. Li- quorem deinde in mensa explicant, soli obver- sam, ut absumatur aquea humiditas & aciditas, quæ suavitatem corrumpit, idque, sæpè repetunt. Cicadæ quoque aperiant suctione suâ ornum, ut succo dulci fruantur, deinde per apertum foramen liquor

stillat, quem vulgus postmodum ex aëre deciduum putat, prout & D. Autor eandem fovet sententiam. Licet *Christophorus à Vega* non ex ipsâ Arbore, sed cicadis aut apibus parvis hunc succum guttatim defluere sibi imaginetur, sed falsissime.

Hæc inferior est Mastichina.) Hæc rotunda est instar granorum Mastichis, & ex ramis & foliis arborum ventorum impetu decidit grandinis modo. Verum improprie *Manna* vocatur, cum potius sit *lachryma Arborum* concreta.

4. *Manna liquida*.) Hæc uti suâ non caret laude, ita tamen sequens etiam non postponenda est. Recip. Mannæ el. ℥ij. vel ℥iij. cremor. Tartari ℥j. vel ℥iij. Solve in calore MB. bene muniti cum ∇ font. acidula ℥iv. vel ℥v. adde parum succi Citri rec. vel sp. Vitrioli martis pro grato haustu. Tandem cum albumine ovi clarifica & per chartam filtra, denique cum cortic. Citri recent. f. odor suavis aut cum eleosacchar. f. q. Dos. à ℥iij. ad ℥iv. vel ℥v.

MANNA JULEPATA.

Recip. Mann. el. ℥iv. aq. Scabios. ℥x. dissolve ad Δ & cola, postea adde crystallor. Tartari ℥iij. bulliant insimul lento Δne usque ad consump. tertie partis, cui iterum addatur alia drachma crystall. Tartari, iterumque bulliat ad consumptionem alterius uncie, ita ut tota portio remaneat ad ℥vii. circiter, quæ potest propinari frigida.

6. *Spiritus Manna alius*.) Ros Majalis cum Mannâ calabrinâ & latus exhibet nientium metalla & gemmas solvens; item si manna dissolvatur in rore majali collecto ex rosis aut aliis odoriferis balsamicis, multo erit præstantior, ut quæ in minori dosi majores edet effectus. *Hofmannus*.

Curiosas quasdam Mannæ Preparationes hic addemus ex Abbate ROUSSEAU.

Mannæ libras x. in 40. aquæ calidæ libris dissolutas, & per linteum trajectas, in loco calido ad fermentandum per dies 70. reposui, vasis vitreis materias continentibus probe clausis. Hoc tempore exacto separavi lutulentum quid ad fundum præcipitatum, liquoremque in alembicô cum suo refrigeratoriô destillavi, unde spiritum, spiritui vini viribus non inferiorem, ac directo copiosiores quam ex ipso vino prolixissem, habui. Huic autem spiritui succedebat phlegma lacteum, quod postquam ascendere desinebat, materias meas ex igne cremavi, atque in ipso recipiente quicquid destillaveram quiescere sivi per dies circiter decem. Quo tempore el. pso. clarescebat liquor destillatus illique supernatabat oleum coloris auri, seu potius succini citrini, saporis acris, non parum aromatici, ac ipso oleo cinnamomi essentiali multo preciosius. Tum omnia in aliud alembicum suo munitum refrigeratoriô, pro rectificatione, liquoris destillari, infudi; sicque aqua vitæ prius prolecta in purum spiritum oleo suo aromatico imprægnatum, abiit, cujus odor non vinum, sed ambriam gryleam quammaximè referebat, cujusque virtutes ambriæ grylæ virtutibus superiores mihi videbantur.

Quicquid in fundo vasis dum x. materies destillaveram ad consistentiam ipsius mannæ lento evaporatum calore, grandioribus retortis vitreis immisi, ac igne arenæ probe graduato pro devitandis turgentis vasa disrumpentibus, destillavi; unde phlegma, spiritum rufum ac oleum nigrum fatidum acerrimum acquisivi.

Tum accepi caput mortuum ex hac ultima destillatione restitans quod coloris erat nigri ad instar

gagatis, & prorsus insipidum, aqua calida probe lavi, nec sic tamen vel salis momentum extraxi. Sed quod mirum, ex quo retortam abrumpebam pro isto capite mortuo educendo, illud continuo deflagravit, quod an aliis materiis, excepto sale saturni eveniat nescio, phosphorum etenim natura aliena ab istis prorsus est.

Contrivi itaque caput illud mortuum atque in retortam cum proprio spiritu & oleo immisi, ac ex igne arenæ sub finem vehementiori destillavi, laboremque eundem novies per iteratas cohobationes repeti. Unde in ipso capite mortuo, sale antea prorsus vacuo, sal lixiviosum reperi ab illo facile per lotionem separabile.

Sal illud per elixivationem ex arte extractum, spiritui suo dephlegmato reunitur, atque sic unitum spiritui priori oleo aromatico imprægnato conjugatur, & mixtura digestionem necessariæ pro separatione hypostateos cujusdam quæ fundum petet, committatur. Tunc spiritum vitæ habebis concentratum odoris ac virtutis prorsus admirandæ.

Observandum autem venit quod dum aliæ omnes materiæ è quibus per destillationem olea ætherea ac aromatica proliciuntur, nihil tale postquam fermentatæ fuerint sufficiunt. Manna è contra nullum oleum aromaticum exhibeat ante fermentationem, quod tamen non parce posteam peractam cum copioso spiritu, producit.

De Manna autem Montis Sinai quam Arabum misterio usus ex favore Archiepiscopi ejusdem montis ad 20. ad minimum libras super rupibus ac herbis, (illic enim nullæ sunt arbores) collegi, habeo adnotandum quod in vase aperto aëri exposita, intra quindecim dies, duas ponderis sui tertias partes amittat, quodque majori temporis intervallo integra avolet. Adnotandum inquam de hac manna habeo, quod cum eam in aquæ quadruplo pro fermentatione, ut prius dictum, peragenda dissolvissim, die subsequenti aquam dissolventem inde congelatam viderim, quodque opinatus coagulationem inde enatam esse quod aquam larga satis quantitate non adhibuissim, novamque propterea infudissem, illa rursus sit coagulata, quodque idem quater eodem modo novâ semper additâ aquâ acciderit. Experimentum ulterius deducere mihi non datum fuit, quia in Europam ex Caira Egypti tunc revocatus fui. Aliunde autem vim istius mannæ coagulantem conjecturis meis arcescere non licuit, quam ex virtute lapidifica soli unde colligitur. Super illo etenim, quod oculatus affirmo, melones, serpentes, fungi & ligna, vi loci petrificata subinde reperiuntur. Unde probabile est mannâ per unius etiam tantum noctis moram aliquid de eadem vi exugere quod aquæ communicatum illam congelet, imò forsitan, longiori temporis intervallo in lapideum quid convertat.

MARCASSITA.

Minerale est Metallicum cujus multæ sunt species, omnes etenim lapides qui aliquid metalli vel parvissime complectuntur, hoc nomine donantur. Verum magis proprie sic tres denotantur mineralium species, quarum prima marcaffita aurea, secunda marcaffita argentea, tertia verò marcaffita cuprea, dicitur.

MARCIUS PANIS, vid. Panis Marcius & Pasta Regia.

M A R G A.

De ea vide in genere sub titulô TERRA, & in specie de ea quæ L A C L U N A dicitur sub propriô titulô.

M A R G A R I T A E.

De iis jam abundè sub titulo LAPIS, ubi variaz præparationes exquirendæ. Hic tantum rursus aliquid de *Margaritarum* generatione ac ratione quâ ex imo maricum ostreis suis educuntur, adferemus ex Celeberrimô D. Listero, & Revetendo P. Le Comte. Sic autem L I S T E R U S de generatione.

De Margaritarum natura ita *Sreno*. Margaritarum productio, tam earum, quæ testis adherent, neque ita sphericæ sunt, quàm earum, quæ, cum pororum orificia in animalis superficie obstructa fuerint, figuram rotundam intra ipsos poros acquirunt, eodem modo se habere videntur. Etenim inter Margaritarum tunicas sive laminas, ipsasque Testulas Conchyliorum Margaritiferosum ea tantum differentia est, testularum in his fibras quasi in eodem plano sitas esse, Margaritarum verò Lamellarum fibras in *Sphærica superficie* disponi. Ita fibræ centrum margaritæ cujusque ex unâ extremitate respiciunt.

Item experientiâ didici, margaritas, quæ forte in æqualibus protuberantiis exasperentur, nihil aliud esse, quàm plures exiguas margaritas, eadem crustulâ communi inclusas.

Rursus, è flavescens margaritis plerasque ita colorari, non in superficie tantum, sed in intimis etiam laminarum circulis. Ita ut non amplius dubitare licet, quin iste color animalis *humoribus mutatis* adscribendus sit. Unde laterem lavare conatur, qui aliquo artificio margaritarum colorem in melius corrigere studet.

Fictitiæ quoque Margaritæ nullius momenti sunt. Discendum naturæ secretum: aut Piscinas, alicujus Luculli more, sibi conficiat, qui copiam Margaritarum habere cupit. Hactenus *Sreno*.

Illud autem verissimum est, Margaritas non æque in omnibus Fluviis, aut omni mari nasci, sed quædam maris & fluminum loca iis nutriendis aptiora esse; nempe ob *succum lapideum & petrescentem* iis locis copiosiorum. Igitur nullus dubito, quin si ibi Piscinæ confectæ fuerint, Margaritis multiplicandis utiliores essent.

Ut autem hic reperam, quæ alibi posui: nempe ex internâ testarum parte membranam separavi ex argenteo pulchre cærulescentem, id est, ejusdem coloris micantis cum ipsis testis: neque tamen eâ nudatæ defuit suus elegans nitor pristinus. Unde conjicio materiam lapideam, sive testaceam, pluri membranâ lamellatim dispositis includi, perinde ut in Margaritis. Sed in his orbiculatim, in illis verò eadem membranâ ex plano sibi invicem superextenduntur. Ipsa autem materia lapidea membranâ suis per fibrillas illita, vel obducta, prout ipsarum membranarum textura fuerit, à succo animalis vili decedit atque induratur: unde & nitorem suum elegantem sive micationem illam pulcherrimam ex albedo cæruleam, quam tantopere miramur, acquirit, cum in plerisque conchyliis istum succum ita ex aqua per se, & ex levi coctione colorari, sæpius in hisce exercitationibus diximus. De membranâ verò & *Sreno* & *Leeuwenhoekius* silent, quod fortè corruptis & vetustis Testis experimenta fecerint.

Quod autem Margaritæ non alicubi sunt à Testis, & nisi solâ figurâ ab iis discrepent, illud satis evincit nempe color idem cum testis; ut si fortè rubescat testis pars interna, similiter & rubent Margaritæ, si quæ in iis inventæ fuerint; & sic de reliquis coloribus præ testarum natura atque elegantia. Ita ab Oriente ferè Margaritæ plus resplendent, quàm ab Occidente, quod aliæ atque aliæ Conchyliorum Margaritis ferorum species sunt, unde oriuntur. Ita fluviatiles Margaritæ, & quæ ex ostreis vulgaribus nostris eximuntur ob imbecillam suarum testarum micationem, parvo veniunt, præ iis in *Berberi* antiquorum repertis. Quo autem privatim loco in corpore animalis Margaritæ nascantur, si quæras; respondeo, ipsorum, quantum adhuc ipse viderim, ligamentorum sive *Musculorum rectorum capitibus*, quâ scilicet valvis suis adherent pisces; nimirum in his tantum locis in uno musculo fluviatili, ut supra narratum est, sexdecim circiter Margaritas, à magnitudine papaveris, ad piperis grana numeravi. Ex iis verò minutionibus aliquot fuere admodum rotundæ; cæteræ autem majusculæ, asperæ, & inæquales.

Has equidem senescentium, aut aliàs morbosorum Conchyliorum vitia esse putavi. Nam in parvis multis dissectis non unam quidem Margaritam invenni, etiam si ex iisdem aquis expiscata fuissent. Adde, quod in imis illis musculis, valvas constringentibus, hæ Margaritæ, velut quibusdam thecis collocatæ fuerint, non aliter, quàm calculi in renibus, aut alia in animalium sanguineorum glandulis nati; in reliquis autem Piscibus, unde hæ sexdecim Margaritæ exemptæ fuerunt, nihil inventum est.

Dispositio autem & locus Margaritarum melius tibi apparebit, si parum coquantur Conchyliâ, & non cruda dissecentur.

Cum itaque Margaritarum locus proprius sit musculorum, valvas claudentium, capita, ubi majora sint ista capita, uniones majusculi expectandi sunt. Ita, ut dictum est, in pulchro Conchylio *pulchra* Margaritæ, sic in magno musculo sive ligamento constringente *maxima* Margaritæ spes est.

At de illarum *figura* nulla regula est: etenim Margaritæ vel sphericæ vel diffformes sunt, prout casus dederit.

Inter Margaritas verò nostras è *Musculis Fluviatilibus* plurim. *Tympania*, ut Plinii verbo utar, inventæ sunt, & passim in officinis prostant venales; scilicet ob brevitem musculorum constringentium, unde in earum formatione aliquantulum deprimi necesse habent. Ob parvitatem verò loci, rarissime seculi pondus implent. At in *Berberi* antiquorum & pyri-formes & sphericæ vastæ magnitudinis inventæ sunt, ob loci amplitudinem eximiam. Nam in *Berberi* vestigia musculorum valvas claudentium mensuravi, ad tres digitos longè latèque diffusi.

Atque hæc unica ratio esse videtur cur in Conchyliis *Turbinatis*, etiam si ex iis aliqua vastæ magnitudinis sint, tamen quod iis illi muscoli, quibus Testis suis adherent Pisces, admodum angusti sint, Margaritæ nunquam, quod scio, inventæ sunt: Conchyliorumque adeo bivalvium propriæ sunt.

Igitur cum eadem sit Testarum materia & textura similis, quæ Margaritarum, utpote mera curvatura discrepans, quid dubitemus ipsas Testas, loco Margaritarum, usu medico adhibere: sanè, quantum scio, pulvis Testarum purgatus accommodatissimus est ad medicamenta quævis, in quibus requiruntur vel ipsæ margaritæ, vel oculi canerorum dicti, vel ipsum corallium; item tu deinceps cogites velim, quicquid de Testis dicetur, idem de Margaritis quoque intelligere liceat.

De Margaritarum generatione hæcenus *Listerus* quodd scilicet in senioribus ostreis ex morbo nascantur non secus ac variae aliae calculorum species in aliis animalibus; jam de earundem expiscandarum ratione ex Parte *LE COMTE*.

Urinatores seu Piscatores illi qui ostreis Margaritifera ex imò mari educendis adhibentur, ad infimum ventrem sibi lapidem sex pollices crassum, & pedem longum in arcum efformatum adligant ne motu aquæ abripiantur, aliumque præterea gravissimum lapidem ab altero dependent pede quo ad imum mare rapidius deducantur, sed postquam ad fundum pervenerunt hoc ultimo sese exolvunt pondere quod sursum machina in id adhibita continuò retrahitur. Digtos manuum pluribus etiam circumvolvunt linteis, quò scilicet dum ostreas rupibus arctius adherentes revellunt, non ita facillè vulnerentur, & in id præterea quandoque fuscinas, aliaque ferrea instrumenta apta, adhibent. Tandem eorum quique sacculum retiformem de collo suspensum habet ut in eum quas colligit ostreas immittat. Ex quo autem urinatores isti maris fundum attingunt, sine ulla mora undique cursitant, præcipitanter revellentes quicquid ostrearum in via sua reperiunt. Qui inter istos verè sunt eximij horæ quadrantem sub aquis commodè commorantur, nec in id vel oleo nec alio aliquo liquore, aut adminiculo utuntur, quam quò spiritum toto illo tempore ex adepta usu habitudine non ita difficulter cohibeant; nihilque infestius in tota illa mora vident quàm quò aliquando in marinas belluas incidunt à quibus miserè diserpuntur ac vorantur. Ex quo spiritum ulterius cohibere nesciunt, vel aliud quid funesti prævident funem ad naviculam unde in mare se projecerunt pertingentem trahunt illumque manibus arctius constringentes, à sociis in prædictam continuò reducuntur naviculam, cum onere suo quò quandoque quingentarum est ostrearum. Sic retracti momento pro aëre hauriendo quiescunt, & postea in mare se rejiciunt, idemque exercitium per totam diem repetunt, nec alio tempore cibum assument quàm matutinis horis, antequàm primò in aquas se demergant; & sub vesperam postquam laborem diurnum peregerunt. Ad maris litorea omnes exonerantur naviculæ in fossulas quatuor circiter pedum cubicorum in arenis excavatas: Ostrearum autem non solum in fossulas conjicitur quò illis replendis satis sit sed etiam quò ad hominis altitudinem supra eas elevetur, & in eo relinquitur situ, donec pluviae, venti aut solis ardor, horumque animalium conchas seu testas aperiant, unde brevi enecantur. Tum caro putrescit ac desiccatur, sicque Margaritæ commodius colliguntur, quia scilicet omnes in fossam subjectam delabuntur, dum concha, quæ mater perlarum dicitur attrahatur & extrahitur. Harumque ostrearum maximæ manus humanæ latitudinem non excedunt, earumque caro est optima, unde colligitur quò si, ex quorundam Medicorum sententia, margaritæ procreantur à causa morbida, sicut procreantur calculi, & lapides illi qui sub *Bezoar* nomine veniunt, non sic tamen humorum constitutio in ostreis sensibilibiter alteretur; Urinatores etenim qui illis expiscandis inserviunt, quique ostreas avidè comedunt nihil reperiunt in sapore unde illæ quæ à Margaritis vacuæ sunt ab aliis distinguantur. Quamprimùm repurgatæ sunt fossæ à crassioribus impuritatibus, arena subinde cribratur ac recribratur, ut Margaritæ secernantur: Interea tamen quæcunque demum in id cura adhibeatur, multæ semper ex iis deperduntur, quæ etiam multis post Expiscationem peractam annis in illis locis reperiuntur.

Margaritæ in toto ostrearum corpore resperse videntur, in capite, in velo caput cooperiente, in mus-

culis circularibus ventriculum attingentibus, ac in genere in omnibus partibus musculosis & carnosiss: Itaut nullatenus dici possit illas in ostreis esse quò ova sunt in avibus ac piscibus, præterquam quò etenim natura nullum earum formationi locum in specie assignavit, Anatomici qui curiosè materias hæc rimati sunt nihil reperiunt quò similitudinem aliquam inter locum ubi enascuntur uniones, & cum ubi ova progignuntur, faciat. Interea tamò dici revera potest, quò sicuti in gallinis innumera sunt parvula ova quorum quædam augmentum sumunt, dum alia in parvitate sua subsistunt, sic itidem in unàquaque ostrea videtur aliqua Margarita grandior ac perfectior quàm alia omnes; verum grandior hæc nullum habet locum fixum. Magnitudinem autem quò attinet, grandior illa Margarita, tantam illam quandoque adipiscitur, ut valvarum testæ occlusionem impediat, unde moritur ostrea atque putrescit. Numerus Margaritarum non minus incertus est: sæpius etenim tota ostrea caro iis respersa conspicitur, ast rarum est plures quàm duas majores in uno repetire animali.

Omnes Margaritæ Orientales ex natura sua sunt albæ, variante illius albedinis gradu; pro ratione majoris aut minoris Concharum Medinis. Interea refert *Tavernerius* sibi sex in Indiis dono datas quæ gagatis nigredinem possidebant, quæque propterea in Orientalibus Plagis magni admodum fiebant. Verum ni nos ille fallit Autor, ipse proculdubio fallitur, etenim certo certius est quò in omni illa plaga ubi expiscantur Margaritæ, nigrarum pretium tam vile est ut à piscatoribus tanquam inutiles abjiciantur. Color autem purior, aut sordidior, ac magis aut minus alteratus reperitur prout, Margaritæ in locis enascuntur ubi miscella humorum magis aut minus albedinem naturalem inquinantium coacervatur, siquidem quæ intestinis, aut bilis receptaculo viciniore sunt magis flavescunt, quæ verò in carnibus enascuntur purius ac verius albescent.

M A R M E L A D A.

Marmelada terminus est Pharmaceuticus denotans speciem Gelatinæ Cydoniorum, quæ simplicis, quæ compositæ, aromatibus &c. conditæ & variis coloribus exornatæ. Plures autem dantur earum tum alterantium, ac corroborantium formulæ, è quibus quasdam selectiores jam adducimus.

Marmelada varia è Laboratorio Ceylonicò

Marmelada Cordialis.

℞. Diacydon. simpl. ℥j. pulp. citr. aurant. cond. ana ℥iij. conf. ros. vitriol. ℥j. butyr. perlar. ℥ss. ambr. gryf. mosch. ʒss. M. F. Marmelada.

Hæc Marmelada vitales spiritus & cor ipsum corroboratur atque præservat ipsum à multis Accidentibus. *Dosis est drach. j. ad ij.*

Marmelada Cephalica.

℞. Diacydon. simpl. lib. j. nuc. moscat. cond. nu. iij. extr. rorism. eleosach. calaminth. an. ʒj. essent. rorism. butyr. perlar. an. unc. ʒ. mag. succini dr. j. moschi. ambr. an. dr. ʒ. M. F. Marmelada.

Hæc Marmelada Cerebrum confortatur, & utilissimè adhiberi potest ad eosdem morbos, veluti in *Apoplexia, Vertigine, Lethargo, Paralyti & Tremore.* *Dosis est drach. j. ad ij. drach.*

Marmelada Stomachica.

℞. Diacydon. simpl. lib. j. myrobal. Indic. condit. unc. iij. nuc. moscat. cond. num. iv. zinzib. condit. corric. citri

citr. aurant. condit. an. ℥j. conserv. rosar. vitriolat. ℥ij. mag. succini dr. j. eleosach. calaminth. ℥j. B. M. F. Marmelada.

Ista Marmelada optimè confortatur Stomachum atque Viscera, Appetitum provocat, auxiliatur Concoctioni, adversatur putrefactioni, impedit, ne venti progignantur & prohibet rupturas. *Dosis est drach. j. ad ij.*

Marmelada Pectoralis.

℥. Diacydon. simpl. lib. j. syr. de polipod. Indico, lib. B. pulm. & carn. Vulpis Indici, inomia. Jakhals, exsiccat & prep. Ziv. balsam. sulph. anisati, ℥ij. laet. sulph. prep. ℥j. Fl. sulph. Benzoinat. dr. j. B. M. F. Marmelada.

Hæc Marmelada optima est contra infirmitates Pectoris, ut Astma, Tussis, puris expletio, & præcipue in phthisi quæ exinde provenit. *Dosis est Semidrach. ad drach. j.*

Marmelada Hepatica.

℥. Diacydon. simpl. lib. j. pulpa citr. condit. conserv. flor. iamar. an. Ziv. nitr. vitriol. unc. B. Martis Potabilis, ℥j. B. Salsal. rubr. dr. j. M. F. Marmelada.

Hæc Marmelada præstantissima est quibusdam infirmitatibus Hepatis velut Inflammationibus, Obstructionibus & ejusdem duritiis. Item in Cachexia, Ictero & Hydropsi. *Dosis est Semidrach. ad ij.*

Marmelada Splenetica.

℥. Diacydon. simpl. lib. j. syr. de polypod. simpl. lib. B. Tinct. Martis, ℥ij. extract. filicis. rhabarb. curcumæ. Eleosach. Menthe an. ℥j. M. F. Marmelada.

Hæc Marmelada præstantissima est ad tumores & durities splenis & aperit ejus Obstructiones atque saluberrima est pro morbis qui ex magnis Humoribus melancholicis suam habent originem. *Dosis est j. drach. ad drach. ij.*

Marmelada Nephritica.

℥. Diacydon. simpl. lib. j. succ. liquirit. ℥ij. sal. oc. cancri, ℥j. succini volatil. mag. succini, an. ℥j. tartari Eleosachar. Bacc. cinn. an. unc. j. M. F. Marmelada.

Hæc Marmelada saluberrima est contra morbos Renum atque Vesicæ, dolorem mitigat, & ardorem Urinæ minuit, & suavissimè Tartaream Materiam per Urinam expellit, imò optimè conducit ad Gonorrhæam. *Dosis est ℥j. ad ij.*

marmelada Laxativa.

℥. Diacydon. simpl. lib. j. nuc. moscat. condit. nu. ij. zinziberis condit. ℥j. resin. turbit. ℥vj. Eleosachar. fol. cinnam. ℥ij. M. F. Marmelada.

Marmelada ista suavissime Phlegmaticos omnes humores expurgat & omnium accidentium expers est quæ cætera communia Purgantia nobis procreare solent. *Dosis est ℥j. ad semi unc.*

marmelada cum Gummi Gotti,

℥. Diacydon. simpl. lib. j. gum. gott. rosat. ℥vj. Eleosach. fol. cinnam. ℥ij. M. F. Marmelada.

Hæc Marmelada lenissimè Serum expurgat & præsertim in Hydropi mirabilia præstat. *Dosis est dr. ij. ad semiunc.*

Marmelada varia ex Armamentario Chymico-Medico Hadriani à Mynsicht.

marmelada Cephalica.

℥. Diacydon. simpl. Ziv. rot. diamoschi dulc. diambræ ana ℥ij. rad. paonia cond. ℥j. conf. anthos. ℥ss. nuc. jugland. condit. num. ii. j. moschat. in India condit. num. j.

smaragd. præp. ℥j. Eleosach. succini alb. majorana, rosmarin. an. ℥j.

Misc. & sine ulteriore additamento f. l. a. Marmelada, quæ de ur in scatula.

Vires, Usus, Dosis. Cerebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis speciali, dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & spasmò obnoxiiis. *Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. & Unc. B.*

marmelada Stomachica calida.

℥. Diacydon. simpl. Ziv. rot. aromat. caryophyllat. succulat. Inde ana ℥j. zingib. de Bengalâ condit. calami aromat. cond. myrobalan. chebul. cond. ana ℥ss. cort. aurantiorum condit. citri condit. ana ℥j. eleos. cinamomæ & caryophyllor. ana ℥j.

Misc. & sine ulteriori additamento f. secundum artem marmelada.

Vires, Usus, Dosis. Ventriculū aliasque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat. Flatus discutit. A putredine præservat. Venas aperit. Vomitus & singultum compescit. *Dosis pro una vice, nucis moschatæ quantitate.*

Marmelada Stomachica frigida.

℥. Diacydon. simpl. Ziv. rad. cichorei condit. ℥ij. rot. diarrhod. abb. ℥j. myrobalan. emblic. condit. conf. rosar. rub. ana ℥ss. nitr. vitriolat. ℥ss.

Misc. & sine additione f. marmelada, ut est artis, quæ conservetur in scatula.

Vires, Usus, Dosis. Stomachum calidis humoribus laesitum recreat, confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morbis propugnandis & vomiturientibus juvandis utiliter datur. *Dosis castaneæ quantitas.*

Marmelada Pectoralis.

℥. Diacydon. simpl. Ziv. mors. pectoral. nost. rot. & suc. violar. parati ana ℥ij. flor. sulphuris comp. ℥j. rad. feniculi condit. annula camp. cond. ana ℥ss. suc. Glycyrrhizæ. ext. ℥j. spec. dia ireos simpl. conf. alhermes à ℥j.

Misc. & fiat sine ulteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Usus, Dosis. multum confert Tussiculosis, Pulmonicis, Astmaticis, Pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. *Dosis à Drach. j. ad Drach. ij.*

marmelada Cordialis, calida.

℥. Diacydon. simpl. ℥ij. rad. bugloss. condit. borrag. cond. an. ℥ss. rot. aromat. caryophyll. aromat. rosar. de gemmis, diambra, ana ℥vj. cortic. citri condit. conf. alhermes, an. ℥ss. mag. perlar. orient. corallor. rub. ana ℥j.

Misc. & f. secundum artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Usus, Dosis. maxime Cor & vitales facultates à causa frigida imbecilles, confert & exhilarat, nechon calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proinde senibus & mulieribus ex morbo aliquo convalescentibus mirè subvenit, & multis Uteri affectibus prodest, *Dosis nuc. moschat. quantitas.*

Marmelada Cordialis frigida.

℥. Diacydon. simpl. ℥ij. man. Christi perlat. rot. diamarg. frig. ana ℥ss. pulp. citri condit. conf. rosar. rub. ana ℥vj. rad. cichorei condit. ℥ss. conf. alherm. ℥ij. lap. pretiosior. præp. ana ℥j.

Mixta rediguntur in marmeladam.

Vires

Vires, Usus, Dosis. Cor confortat, & ejus calorem flammeum exstinguit, & æstuantia viscera contemperat: necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à ʒʒ. ad ʒij. & ʒij.

marmelada Hepatica calida.

ʒʒ. Carn. cotoneor. cond. ʒiv. rot. diacubeb. diacurcum. dialacca ana ʒij. rad. pimpinel. cond. fœniculi cond. eryngii cond. ana ʒʒ. cinamomi acut. ʒj. rhabarb. elect. ʒj. sp. salis cum sale absinthii congelati, ʒʒ.

Misc. & fiat marmelada ut est artis, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis. In frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obstructiones referandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis & Hydropsibus prodest: non parum enim ad urinam proliciendam apta est. Dosis à ʒj. ad ʒij. plus, minusve.

marmelada hepatica frigida.

ʒʒ. Carn. cotoneor. cond. ʒij. rad. cichorei. cond. scorzonæ. cond. ana ʒʒ. rot. è suc. berber. & ribium parat. an. ʒvj. pulv. citri condit. lactuc. hispan. cond. a ʒʒ. spec. diarrhod. abb. sp. vitrioli prius irrorat. ʒij. sem. quat. frig. major. nitri preparati, ana ʒj.

Misc. & fiat l. a. marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis. Hepatis, Ventriculi & præcordiorum æstum refrigerat, sitim exstinguit, Febricitantibus & viscerum incendio laborantibus conert. Dosis Castaneæ quantitas.

Marmelada Magnanima.

ʒʒ. Diacydon. simpl. ʒiv. rad. satyrii cond. succulata Indæ, a. ʒij. pinearum mund. pistad. virid. a. ʒj. castanearum vino malvatic. coctar. nuc. moschat. in Indiâ cond. conf. alkermes, ana ʒʒ. ol. macis exp. ʒij galia moschat. vera, mag. perlar. or. a. ʒj. ol. cinamomi, ʒj.

Mixta redigantur sine ulteriore additamento in marmeladam.

Vires, Usus, Dosis. Ad Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculū & Hepar roborat. Pituitam concoquit, &c. Dosis manè & vesperi nuc. moschatæ quantitas.

Marmelada Carminativa.

ʒʒ. Diacydonii simpl. ʒij. cort. aurant. cond. citri cond. ana ʒʒ. rad. fœniculi cond. calami aromat. cond. rot. carminat. nost. ana ʒvj. nuc. moschat. cond. tali leporini, ana ʒij. zedoaria, zingiberis alb. galang. min. ana ʒj. elæosach. caryophyllor. cinamomi, anisi, macis, ana ʒj.

Misc. & f. juxta artem marmelada, quæ detur in scatula.

Vires, Usus, Dosis. Flatibus Ventriculi à crassis & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè usurpatur. Dosis à ʒj. ad ʒij. pro una vice.

marmelada Splenetica.

ʒʒ. Diacydon. simpl. ʒiv. rot. diacurme, dianthos, a. ʒj. rad. belenii cond. scorzonæ cond. a. ʒvj. eff. scopulopendrii, flor. genistæ, a. ʒi. fruct. tamarisci, cort. rad. cappar. a ʒʒ. elæos. rorismarini, caryophyllor. cinamomi, an. ʒj.

Misc. & f. sine ulteriore addimento marmelada.

Vires, Usus, Dosis. Lienem roborat, ejusque tumores & scirrhotas durities solvit, minuit, obstructiones tollit, humores incidit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad ceteros

affectus inde promanantes [corpore tamèn prius purgato] conducit. Dosis manè & vesperi Castaneæ quantitas.

marmelada Stegnotica.

ʒʒ. Diacydon. simpl. ʒvj. rad. symphyti cond. cichorei cond. ana ʒij. pul. rad. tormentilla, ʒʒ. mag. corallor. rosat. ext. sang. draconis. corn. cervi usti & præp. ana ʒij. croci martis per reverberat. fact. smaragd. preparat. terra sigillat. ana ʒʒ. bol. rub. orient. nuc. moschatæ, sem. plantaginis, anthera rosar. a. ʒj. cassie lignea, caryophyllor. ana ʒʒ. croci orientalis, ol. macis exp. ana ʒj.

Misc. & fiat l. a. marmelada justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis. Antiquatum alvi profluvium compescit; Hinc Dysentericis & Cœliacis mirum in modum auxiliatur: mensium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet: Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. & Drach. iij. in vehiculis appropriatis.

marmelada Terebinthinata.

ʒʒ. Carn. cydoneor. cond. ʒiv. terebinth. cypria in vino rhenano lot. ʒij. spec. diarrhod. abb. rad. glycyrrhiz, ana ʒʒ. pul. sem. anisi cum proprio ol. parum irrorat. ʒij. sem. quat. frig. major. a. ʒj.

Misc. & cum ulteriore additamento f. marmelada.

Vires, Usus, Dosis. Reues purgat, eorumqueordes & arenulas expellit. Dorsi lumborumque dolores mitigat. Obstructiones tollit. Urinam movet. meatus aperit. Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne in multiplices usus accommodatum præsidium. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. pro una vice manè in aurora.

marmelada Nephritica.

ʒʒ. Diacydon. simpl. ʒij. rad. eryngii condit. petroselin. cond. fœniculi cond. ana ʒʒ. fruct. alkekeng. matur. ʒvj. acidi tartari, ʒij. mag. lapid. percar. oc. cancri, ana ʒj. sal. succini alb. ʒj.

Mixta redigantur in marmeladam justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis. Calculos & arenulas à Renibus, urteribus & vesicâ, obstructiones auferendo, meatusque aperiendo, expellit, & urinam potenter movet. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. in vehiculis specificis.

marmelada Hysterica.

ʒʒ. Diacydon. simpl. ʒiv. sacchari anthosati, ʒij. calami aromat. condit. rad. peonia cond. ana ʒj. cinamomi acut. fac. bryonia, ana ʒij. sem. pastinac. domest. agni casti, ruta hort. ana ʒʒ. cardamomi min. antophyllorum, macis, ana ʒj. mag. foris Anglici, matris perlar, corallor. rub. ana ʒʒ. elæos. sem. angelica. majora. succini alb. fœnicul. anisi, ana ʒj.

Misc. & f. l. a. marmelada justæ consistentiæ.

Vires, Usus, Dosis. Uteri suffocationi & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluviem quandam pravam, si quæ in locis muliebribus contineatur, meatus aperiendo, & obstructiones solvendo, foras protrudit. Dosis castaneæ quantitas, per se, vel cum vinò calidò, vel aquâ hystericâ congruâ.

M A R M O R, vid. de eo sub titulò, Lapis

M A R R U B I U M.

Marrubium duplex est, Album scilicet & Nigrum de quibus ordine.

M A R-

MARRUBIUM ALBUM.

Marrubium Album, Græcis Περώνιον, Latina vox est non Græcæ originis, nam r. secundum sine aspiratione scriptum ubique legitur: ita dictum putatur quod tabidis & marcentibus conducatur τὰ φύλλα ξηρὰ συν τῷ σπέρματι ἐχόμενα συν ὕδατι ἢ χολιζομβία χλωρὰ δίδουσι μετὰ μέλιτος φθισικοῖς foliorum siccorum simul & seminis decoctum, aut etiam recentium foliorum succus unâ cum melle tabidis exhibetur. Dioscor.

Vel marrubium dicitur, quod folia marcida & fualentia sint quasi rubigine exesa, Joan. Bod. à Stapel.

Marrubii notæ sunt flores in verticillis densis circa caulium nodos, totius plantæ canities; folia serrata obtusa, rugosa; odor validus & gravis non tamen foetidus: quodque minor, humilior, magisque ramosa planta sit quam stachys. Quinetiam marrubium vulgare, nescio an & aliæ species insigni nota ab aliis verticillatis differt, nimirum quod calyculorum striatorum margines non ut in aliis in quinque segmenta acuta dividantur, sed in totidem spinulas quot sunt in singulis striæ, stellæ radiorum instar dispositas.

Nomina. Marrubium album *I. B. Ger.* album vulgare *C. B. Park.*

Vires. Succus expressus cum melle (ut præscribit Dioscorides) aut potius syrupus de prassio Asthmaticis, tussientibus & tabidis opitulatur; est enim pneumonicum insigne. Pulvis foliorum interaneorum vermes necat. Valere dicitur & in partu difficili, Lochiisque retentis.

Syrupus de prassio mesues, annotante C. Hofm. valde calidus est, & qui senibus potius quam juvenibus, frigidis quàm calidis adhibendus sit.

R. Syrupi de prassio ℥ii. olei tartari per deliquium ℥j. misce, sumat æger per intervalla frequentia ad mensuram unius cochlearis. Medicamentum est ad iterum nulli secundum.

Marrubium vesicæ & renibus nocere scribit Dioscorides; quos frequenti usu exulcerat. C. Hofman.

Veteres in iustero marrubio pro errhino usi sunt, ad bilem per nares expurgandam, quæ oculos sæpe contumacissime occupat.

Innumeris comprobavi experimentis marrubii albi summitates, vino albo infusas, & triduo epotas, mirè ad menstrua provocanda (nec menses tantum accelerat, sed remorantes secundinas quoque præcipitat S. Paulus) stomachum roborandum, cachexiam & fædos virginum colores arcendos valere, & fortius cum Chamædrye & centaury minore mixtas. Boell. observ. med. p. 289.

Conserva florum marrubii cum melle parata & per 40. dies exhibitâ in dos. ℥j. nobilem quandam scirrho hepatis diu laborantem integrè sanitati restituit, aliis medicamentis ex ebano & chalybeatibus paratis frustra illis propinatis. S. Pauli quadripartit. Botan. p. 389. habuit Sim. Paulus è Zacuti lib. 2. prax. admir. observat. 48. superbibebat autem nobilis iste singulis matutinis parum aquæ stillatitiæ ejusdem marrubii cum radice, ut invenio in observationibus è Chesneau collectis & ad me transmissis ab Ingeniosissimo & Amicissimo Viro Dom. Edv. Hulsio medico Londinensi.

MARRUBIUM NIGRUM.

Foliis & odore lamii est, à quo differt floribus in singulis pediculis è singulis foliorum alis egressis pluribus confertis.

Nomina. Marrubium nigrum *Ger. emac.* nigrum sive Ballote *I. B.* Nigrum foetidum, Ballote dictum

Park. Nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis *C. B.*

Caules cubitales & interdum bicubitales, plures ex eadem radice lignosa perenni exeunt, brevi lanugine hirsuti, quadrati, inanes, ramosi, rubentes, foliis vestiti ad singula genicula ex adverso binis, melissæ aut potius lamii rubri, rotundioribus & nigrioribus hirsutis & ad tactum mollibus, rugosis. Flores verticillatim caulibus adnascuntur in eodem communi pediculo è folii sinu egresso plures, galeati, pallide purpurei, Saturationibus lineis intus striati, calices striati, oblongi, in quinque acuta segmenta partiti, quatuor singuli semina continent parva, per maturitatem nigricantes. Ex eisdem foliorum Sinubus unâ cum floribus & ramulis exeunt. Odore foetido lamium refert, æstate floret in rudetatis & ad sepes.

Vires. Hujus folia (inquit Dioscorides) sale trita canis moribus medentur ferventi cinere flaccescunt, ut condylomata reprimant: Sordida ulcera cum melle purgant. Plinius eadem eisdem fere verbis retulit.

Decoctum Ballotes præstantissimum est remedium in hypochondriacis affectibus, itidemque hystericiis *D. Boevle. Rain.*

MARS.

Vid. de eo sub titulò FERRUM. Hic tantum tres ejus præparationes è *Pharm. Bateanâ* quarum etiam secunda nihil de Marte habet quanquam ejus nomen præferat, & verius appellari potest *Pulvis fulminans*, quàm *Mars fulminans*.

Mars Diaphoreticus.

Sublima Sal. Armon. cum an. mart. s. a. sublimatum solve in exigua quantitate aq. font. filtra & præcipita affund. guttatim ol. tart. per deliqu. vel sp. sal. armon. præcipitatum exsicca s. a.

Sudores movet & diureticus est, eximij usus in melancholiâ hypochondriacâ, quartanâ &c. Dos. ℥ss. ad ℥j.

Mars fulminans.

℥. Nitri ℥ivss. sulphur. ℥ij. m. f. pulvis s. a. Diureticus est, & menses movet.

Mars potabilis.

Solve Chalybem tartaris in aq. font. filtra & coagula s. a. Optimè valet in Cachexiâ, Hydroke, Scorbuto, Chlorosi, Quartanâ &c.

MARTAGUM, vid. *Hemerocalis*.

MARU M.

Planta est exotica, Majoranæ in facultatibus ac figura similis; adeo ut pro una eademque herba à nonnullis habeantur. Quamobrem cum Maro hisce in regionibus destituamur, Majoranam vel Dictamnem Creticum substituere solemus.

Præparat.

Pilula Marocostina Mindereri. Schroderus. *Marum.* Planta est exotica hinc ad varias referunt plantas; ad Majoranam, ad Mastichinam dictam & ad Origanum Heracleoticum, imò Melissam esse *Hermolani in Dioscor.* statuit.

Plantæ hujus caules sunt lignosi, densa lanugine oberti, in ramos oppositos diducti. Folia è geniculis bina, ex adverso sita Majoranæ sativæ foliis similia cinerei coloris, crassiuscula, odore fragranti, & sapore acri ac aromatico.

N. Hag

N. Hac summè delectari feles statuunt, eaque comesta ipsas semen genitale effundere.

N. Lobelius Mari *Syriaci* meminit, quod cum *Dioscoridis* maximè vult conspirare quoad externam formam & odorem, refertque per decennium plantam hanc odoris fragrantiam retinuisse *Vid. in advers. p. 213.* Et sunt, qui Marum illud ex locis peregrinis allatum id ipsum esse contendunt. *Tabernamontanus Libr. 2. herbar. cap. 2.* variè Mari enumerans species ex Asia dicit & Ægypto in Italiàm quoque deferri, num verò ibidem etiam proveniat, non meminit.

Majoranam vel *Distamnium Creticum* substituere *solemus.* Verùm licet *Marum* maximè ad Naturam *Majoranæ* accedat, & iisdem cum hac polleat viribus, nihilominus tamen non confundendæ sunt hæ plantæ, multò minus peregrinæ in hujus locum surrogandæ: sed Marum, quod ad Nos deferretur, & notis à Dioscoride & Costo descriptis gaudet, retinendum. Hujus iconem vid. in *Dominico Chabreo. l. c. p. 418.* Ex hac *Pilule Marocostine Mindeveri* præparantur, quæ inter cephalica non postremum habent locum, ac unâ ventriculo, jecori, lienî, pectori ac aliis partibus auxiliantur. *Hofmannus.*

MARUM VULGARE DODONÆI, vid. *Clynopodium.*

MASTICATORIA & SALIVANTIA.

Quando abuti solet natura viis alimentariis ad excrementa rejicienda, quod vomitus exemplo clarum est; id inprimis quoque fit per os in genere. Maximè enim interea, ut plura loca essent procrementis eliminandis, speciatim verò sero. Non solum per urinam, & per sudorem ordinarius evacuationis hujus locus est; verùm quoque per os, tum ordinariè pro capite purgando, tum consecutivè pro reliqua M. S. ipsa. Unicuique loco nobiliori tanquam conclavi attextit locum ignobiliorem, ut expurgaretur camarina.

MASTICATORIA dicuntur ab adhibendi modo. Quando ingesta masticantur, promptè affluit, ceu primum & antecedens menstruum, saliva, miscenda cum cibis & deglutienda. Sin opus sit, non pro usu alimentario sed medicamentofo, masticatione uti, quæ id ipsum præstant, audiunt masticatoria.

APOPHLEGMATISMI, seu *σποφλεγματισμού* dicuntur, quod phlegma, seu serum in coagulum abituriens, depleant; SALIVANTIA, quod per pryalissimum seu sialissimum, affluxum salivæ majorem solito, adeoque expuendum cieant. Quo ipso triplici nomine tres quoque gradus diversos exprimemus, sub eodem capite singula complectentes.

Claret ergo ex physiologicis 1. *Salivam seri esse progeniem.* Serosum maximè est cerebrum, nulla pars hac ipsa magis humido pollet. Ut cor est calidi sedes, ita cerebrum quasi humidi regia, unde etiam induci fuere non pauci, ut à capite nutritionem arceant, à succo nutritio, quem vocant, nervorum; sanguis vehiculum est spirituum vitalium & materia; serum spirituum animalium. Fauces verò isthmus quidam & catarcha seri, non tam *ἀνω* tendentis, quod sibi persuadent, qui caput exors catarrhorum autumant, quam potissimum *κάτω* refluui. Per anatonem quippe clarum est, propagari ductum lacteum seu lymphaticum thoracicum versus caput, valvulaque intermedia in ramum ascendentem & descendentem discriminari, utrumque tendentem ad cor & lympham illuc revehentem. Sensu etiam patet defluere modò blandè, modò imperuosè quandoque lympham deviantem ad pulmones & asperam arteriam, quin & tumores amygdalarum & faucium alios causari non rarò.

2. *Stillare salivam è glandulis, quibus numero infinitis labia & fauces tota polleant;* Polleant minoribus, quas conglomeratas vocant, sensui obviis, visui & tactui, & majoribus, conglomeratas dicunt, exigua præter hanc differentia, sublingualibus non paucis, & lateralibus, tonsillis. Illustrant se invicem collata hæ partes cum renibus. In utrisque continua fit stillatio, cessans tamen in faucibus serè tempore somni, ut per ductus detrudi suos queat.

3. *Motu produci & cieri salivam è glandulis,* ut quò plus sunt motæ, plus cieantur aquæ & hæ. Hinc somni tempore, motu omni animalis h. l. cessante, etiam cessat actio hæc. Eo verò impresso fortiori citatur, vel corporeo, facta agitatione labiorum, modò non nimis citato sermone interdum quasi absumatur, facta improportione quâdam, unde exiccantur fauces & spissatur saliva; vel spiritali, si spiritus accurrant magis, seu præ desiderio, sive nausæ ad objecta, utroque enim facto salivâ os repletur magis. Quorsum etiam ventriculus ipse confert aliquando, unde sialismus prodromus est nausæ & vomitus, & in hypochondriacis quoque quibusdam observatur. Hinc salivatio alia est *naturalis*, omnibus communis, perpetuò suppetente liquore hoc utili, licet excrementitio; alia *p. n. & symptomatica* in dictis casibus; alia *critica & medica*, ut in febribus, quin & in gravidis quandoque, facta regurgitatione & copiâ majorihue latâ; alia *artificialis*, per hæ ipsa remedia diversis gradibus inducta.

4. *Adeoque salivam aliam esse utilem, aliam inutilem;* illa dicitur κατ' ἐξοχὴν saliva, hæc abusive, propriè verò sputum, unde melancholici sunt sputatores, unde his ipsis remediis crebrior inducitur sputatio. Utilis illa est tenuior, hæc viscidior, ut alias differentias plures non memoremus.

His positis tribus distinctis nominibus tres quoque diversos gradus in unum eundemque finem generalem collimantes proponemus; 1. *Quacunque in motum cient glandulas miliares faucium, exprimunt salivam,* seu in os citatius colligunt, ut expui vel deglutiri possit, sunt uno verbo masticatoria. Faciunt hoc, quæcunque agitant linguam, subditi globuli quicunque, è crystallo inprimis, quale instrumentum est *Sandorii* pro siti sedandâ, aquâ prius humectatum. Faciunt huc semina coriandri, aliaque rotunda ac orbicularia, ad agitationem & motum quippe præ cæteris aptiora, inprimis verò præ omnibus mastiche, masticatoriorum apex. Cum enim vel solâ masticatione quasi continuo serum eliquetur, his ipsis masticatoriis, calore & motu, fluxiliores è glandulis redduntur humores salivales, porique glandularum miliarium utroque modo redduntur magis patuli & dilatati, unde humor amplius colligitur. Mastiche hoc pacto tota albescit, tota obscurat contusioni, per dentium molam factæ, optima pro sero educendo, optima pro corrigendo, aromaticâ sulphureâ roborante virtute.

Prosunt hæc ipsa masticatoria pro alterando, & deplendo, in factore oris, præcavendo & curando, unde myrrha, cort. citri, costus verus, cinam. caryophylli, fol. Indum, rad. carlin. angel. & alia masticari queunt, inprimis quoque ad præservandum corpus à contagio, seu phthiseos, seu putrilaginis cuiuscunque, seu ipsius pestilentis vel maligni. Talia masticare par est medicum, ut & serum alteret, & aerem quem haurit, & ventriculum, quem primario accusat in peste *Helmont. Thomp. & alii.*

Prosunt in laxitate gingivarum, inprimis ex terr. japon. parata, ut pulveres, trochisci, essentia & similia; optima enim sunt unâ roborantia. Prosunt in hæmorrhagiâ ipsâ narium, ut rad. pseu- dome-

domelanth; id præstat, sub linguam reposita.

2. *Quæcunque serum proximius in faucibus in motum ciet, sunt apophlegmatismata.* Duplici modo conveniunt ad eliciendum humorem hæc ipsa (1.) cum masticatione; (2.) citra masticationem, solâ simplici detentione, qui secundus quasi gradus est, si cætera consentiant quoque. Illa possunt dici propriè dicta masticatoria, quia masticatione absolvuntur; hæc impropiè dicta, seu apophlegmatismi, quæcunque formâ adhibita, sicca, liquidâ & mediâ. Sic pro loquelæ defectu in apoplexiâ curandâ solenne est, è simplicibus faciliè parabilibus, vel solum rosmarinum sub lingua derinere; Par ratio est levistici & similium.

Sic myrrha, costus venus, cort. cirt. zedoaria, aliæque dicta hæc referri possunt, seu *evorpias*, seu præservationis gratia, si alia forma, quàm sola masticatione, quo nomine ad primam classem spectant, in usum veniant. Et illa enim citant quoque salivam, sed quasi incomplere, ut deglutiantur & alterentur. Si sol. Iad eodem refert *Roder. Castor.* Imò diversa medicamenta alia huc spectant, quæ pro applicatione & præparatione alia atque alia ad primam illam & secundam pertinent, v. g. rad. ir. pyrethri, (in doloribus dentium maximè laudata,) zingib. cypri. acori veri, sem. staphid. agr. cubebæ, cardamomum, piper omne, eruca, sinapi, quod à quibusdam pro insigni præservativo epilepsiæ habetur, salvia, rosmar. thymus, satureja, piperitis, & imprimis nico iana &c. Ex iisdem etiam parari possunt cum melle aliisque modis globuli masticatorii, qualis est apophlegmatismus Laurebergij, ex nicot. rec. rad. pyrethri mastic. & zingibere. Ex liquidis spirituosiss. ess. lign. sanct. ∇ apoplect. tinct. catechu, & c. aq. aq. n. nitrosa varij generis. Ex mollibus cont. anacard. theriaca & alia, in aphonia cum successu usurpanda.

Priora sola quasi motu, vel præcipuè saltim partes continentes ad salivam fundendam sollicitant; altera hæc partes contentas magis in motum ciet, non neglectis etiam illis. Masticatoria motu & calore, apophlegmatismi calore potentiali & salina virtute fluxiliores reddendo humores salivales cogunt, ut è dilatatis poris glandularum miliarium in faucibus exsudent citatius. Adeoque hæc ipsa magis sunt acuta, salina, incisoria & fundentia, imprimis sulphurea volatilitate unâ conspicua, quæ ob partium tenuitatem & agilitatem liquatum serum alliciunt, & ex diverticulis proximioribus glandulosis evocant; quorum usus ex dicendis patebit.

3. *Quæcunque serum in motum ciet è centro suo, ut ad fauces confluat, sunt salivantia.* Sustinet hunc titulum *rac. & c. g. u. s.* Licet enim & alia quædam hæc referri possint, principatum remen tenet *Æius*, qui nec in hoc sibi parem habet medelam aliam. Sic novimus quosdam cum successu uti *Q-lo albo*, saltem ad g. j. quotidie dato, eodem fine, minori indicatione, quo facto, & per aliquot dies continuato blanda quædam salivatio oritur, cum successu. *Q-lum* enim est emeticum, dosi iustâ datum, minori verò continuatum, cum movere vomitum non possit, saltim salivam in os movet, uti id ipsum fit in vomituentibus.

Inventum est remedium hoc, salivatio mercurialis, primitus ab empiricis, teste *Fracastr. l. 3. morb. contag. c. X. p. 269.* ad analogiam scabiei tractando luum veneream, & feliciter curando. Hujus cum effectus evidens sit, ratio non item, eandem inquirendo lustrabimus penitus.

Not. enim (1.) in *Æio* esse partes ut rotundas, ita summè mobiles, unde etiam si vel maximè extinctus, quietus, mortuus quasi appareat, mox motu mediante

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

recorporefiat & pristinam assumat faciem.

(2.) Esse in eodem vim summè elasticam, cum humidis alijs æqualem, summè evaporabilem. Ubicunque enim est vis dilatandi & concentrandi in corpore, ibi est vis elastica, quod in aere & liquidis omnibus aliàs clarum est. Evaporabilis verò vis igne patefcit, aufugit enim totus, nisi captivetur claufo eodem, totus, inquam, vix vestigio relicto, si purus sit; imò autem ipsum quoque ex parte deprædat, quando ad inauranda vasa adhibitus, igne mediante abigitur; unde principium evaporabile chimici nominant *Æium*. Tacemus experimenta evaporationis hujus *Æis* alia in aquis, vestibus &c.

(3.) Esse in eodem partes quidem sulphureas, viscidas, coherentes, rotundas, sed cum salinis volatilibus sui generis, acetosis, & terreis intimè combinatas, solutæque. Sulphureæ patent ex colore, quem mille modis fingit, cæruleum, albidum, flavum, rubrum, nigrum & nullum non; patent, si cum acidis rigidis immutentur, ut in *Æio*; si cum iisdem beneficio terrearum, ignis vi, expandantur, uti cum acido sulphuris gas coiens cinnabarin præstat ac exhibet vulgarem, & *Ætam*, communem ac Helmontianam. Salina & terreæ ex gravitate summâ; utraque ex effectis varijs, quatenus intimè penetrat poros metallorum, eaque subigit & devorat, atque alia præstat mira. Soluta verò omnia sunt in *Æio*, quod summè mirabilem illum reddit. Reliqua enim cum alijs habet communia, hoc sibi solum proprium, quod omnia illa non tam mixta, junctâ, unita, sed & soluta obtineat; unde liquor est metallicus, non madefaciens manus, fluidus, menstruum universale metallorum, eorumque camprimis regis. Solvens est & solutum, viscido metallico liquore gaudens, quo destructo nec ipse cessat activus esse.

(4.) Videri quidem frigidum, torpidum, sed alas indeptum summè esse activum. Alas indispiscitur, si solvatur solutionis vinculum. Solutus est & ligatus; solutus, liquore metallico aqueo concentratissimo intimè combinatis particulis sulphureis, terreis, salinis, & quamdiu solutæ sic eadem, tamdiu mobilis; ligatus quoad vires harum, parent enim menstruo, patent solventi. Simul ac verò dissociatur, ut non fluat amplius, nullum sub sole videas magis activum medicamentum, emeticum, sudoriferum, purgans, universale. Alas indispiscitur, à calido & humido vitali; calidum vim elasticam expandit, humidum partes solidas recipit, dissociatione factâ infirmatur ne fluat, sed hoc agat.

His itaque positis facilis clavis est ad lustranda affecta salivationis; live enim intus adsumatur, seu extus applicetur, atomi subtilissimi effumantes fundunt serum, & stimulant, ut & ipsum turgescat, elasticam vim suscipiat, & quidem in centro suo, in ipso sanguine. Lentore ergò excusso, fluere citatius incipit, acrimoniâ salinâ fortum; fluens verò citatius exitum querit. Adeoque à priori & posteriori certum & notum est 1. fundi inde serum, 2. fusum non posse consistere suis torulis, 3. alterari quàm maximè, ut acrimoniam suam & illatam exuat, abstersum defæcatumque reddi, & 4. consequenter effectus præstare in corpore salutare, ipsâ suâ alteratione hæc & exacuatione.

Quas verò vias affectet ad exitum aliàs quàm ordinarias? siquidem ordinariè agat. Ordinariæ viæ sunt ut & fauces, ubi continuo serum confluit & effluit. Huc ergo ruere oportet magis, sibi relicto, huc exire, & sputatione mediante excerni.

Attamen ad instar aliorum universalium, non solum extraordinariè aliquando alvum laxat, in alijs vomitum ciet hæc operatio, (quo casu vix feliciter operatur ex nostrâ experientiâ,) sudorem item ciet; verum etiam ordinariè simul per dictas has vias

T opera

operatur, ita tamen ut operatio primaria, ut decet, procedat nihilominus, præcipue verò per urinam & sudorem, tanquam vias feri educationi quadrantes & congruas magis præ alijs.

Cognitâ itaque materiâ hâc salivationis, seu apoplegmatismi universalis, cum ipsa operatio sit heroica, si ulla alia, ac generosa, operæ pretium erit usum genuinum in praxi monstrare.

(1.) OBJECTUM, seu indicans hujus remedij PRINCIPALE est lues venerea, adæquatum morbi rebelles plures alijs, ex vitio feri graviore oriundi. Cumque remedium nec minus, nec majus ipso morbo esse debeat, accuratè distinguendi sunt luis venereæ gradus, quos tres constituemus hoc loco. Primo & ultimo minus, medio magis convenit & ex usu est. Non primo, quippe stranguria, gonorrhœa, tumores alijs curari queunt levioribus. Non ultimo, quod tum vires alijs curari queunt levioribus. Non ultimo, quod tum vires sint tunc minus pares, tum penitus debito jam ipsa ossa cariola reddita, partesque exesæ.

Distinguendæ etiam accuratè non minus sunt ejusdem species, à nobis in praxi inventæ & introducendæ merito, prout vel ulcera, vel tumores, vel dolores magis diverxant ægros. Observavimus nempe in ulceribus extimis, serpiginibus, tuberculis siccis, unde variola magna dicitur, faciei, corporis totius, penis, profuisse præcipue, & ex fundamento penitus atque penitus, citò & tutò, idque constanter abegisse. Exempli sint historiæ sequentes paucae & multis. Laborabat studiosus luis venereæ hâc specie, summè defœdatâ facie, exulceratis simul genitalibus. Frustrâ adhibitis omnibus alijs, & quod mirum videri poterat, ipso dysentiâ perfectâ correpto, nequicquam tamen adjuto, sed constantissimè tuberculis permanentibus in sede suâ, adhibebatur inunctio glis, procedente salivatione feliciter intra trium hebdomadum spatium curabatur.

Pastor quidam à multis annis sinistro femore & brachio serpiginosis siccis crustis infestatus, cætera sanus & benè habens, ut solent isto morbo laborantes, à curatione hac, mox dicendo modo institutâ, sanissimus evasit & mundissimus. Fæmina vidua tubercula eadem toto corpore patienti, & ipsa sibi & alijs creditur laborare variolis. Medicus eandem curare suscipit, & pro tali quoque tractat, sed ut apud *Poëtam* rusticus expectat, dum defluat amnis; ita hic expectabat ægra, medicusque, donec suppurarent & desiccarentur variolæ, sed frustra. Refertur res ad nos tanquam insolita; accedentes, morbum agnoscimus, & brevi tempore curamus hâc curâ glis.

Fœmina alia conjugata patitur similia, tubercula cum maculis in capite, sub parte capillatâ, cum exulceratione genitalium & intertrigine venereâ, erat enim obesior, cum doloribus capitis, & crurum insigni debilitate, unâ verò filiolus unius anni, & virgo 14. annorum, ille ani intertriginem, quod puerili ætati signum proprium est inprimis, hâc tubercula non pauca exhibet. Medicus ad matrem tractandam eandem itidem pro variolis laborante tractandam suscipit, sed frustraneâ diagnosi & curâ. Vocati omnes & singulos restituiimus eodem divino hoc remedio.

Duo sunt luem veneream curandi remedia: sudatio & pyalismus, utraque universalis, utraque feri vitij debita. Sed licet tutius per primam viam videatur primâ fronte remedium, periculosius per secundam; contrarium tamen reverâ obtinet dictis casibus, ut adeò utraque habere locum videantur commodum, modò distinguantur subjecta, morbi gradus & species. Quantum hujus est loci, utraque remedia ma-

gis locum habent in pituitosis, sibi tamen relata invicem si fuerint, mercurialis medela respectivè magis pituitosis, altera per sudationem magis biliosis convenit, illa fundendo, hæc diluendo. Longè tamen efficacior est prius, è minerali regno, quam quævis sudatio ex vegetabili.

Adæquatum verò indicans constituunt morbi rebelles alijs, inprimis lepra seu elephantiasis Græcorum, & hinc quoque alijs, quos casu sæpe sanat, insignissimè sero per hanc viam correcto. Talia exempla *Ord. & Meta. comm.* commendat & reliquit *Rolsincius*. Modò hæc duo sint paria & sibi respondeant harmonicè invicem, ægri corpus iustitens, & ipsum medicamentum, cum modo ipso benè utendi & applicandi.

(2.) Subjectum activum, seu materia remedij est mercurius vivus, varijs modis adhibitus. Adhibendi hic modus duplex est: internus & externus, ique vel solitarius, vel conjunctus. Intrinsecus commodus est & dulcis, benè præparatus, ex $\frac{1}{2}$ j vivi & $\frac{1}{2}$ triana, datus in pilulis, tanquam formâ aptiori, nostro quidem usu cum extr. scorzon. vel alio; v.g. $\frac{1}{2}$ j. dulc. $\frac{1}{2}$ ss. vel ij extr. scorzon. q. s. v. $\frac{1}{2}$ l. M. F. l. a. pil. xxx. vel pauciores, ita tamen, ut pro dosi circiter v. vi. grana & amplius ad $\frac{1}{2}$ ss. determinentur. Præstat enim pro continuando usu minorem dosin eligere, sensimque naturam aptare. Nonnuquam & $\frac{1}{2}$ j. us tuber dulcis, i. e. ab acrimoniâ spirituum acidorum liberatus beneficio repetitæ edulcationis per ∇ ros. adhiberi consuevit, sed paulò rarius. Notabile enim est de utrisque porro, cavendum esse, ne vel vomitus vel alvi fluxus accedens operationem salivantem impediatur, quod omnino & per se accidit aliquando, & inprimis à datis hisce largiori dosi expectandum est. Melior est & diaphoreticus, etiamsi non ad perfectam salivationem præstandam detur.

Externus vel unguentis, vel emplastris, vel cingulis absolvitur, minus aptè masticatione actuali, vel suffitu. Usitatissima sunt unguenta mercurialia hinc dicta, sive officinalia, seu potius extemporanea, v.g. $\frac{1}{2}$ j. vivi c. f. q. tereb. extincti & invisc. $\frac{1}{2}$ l. ss. vel ii. uagu. pomati q. s. v. g. $\frac{1}{2}$ l. ver. iii. ol. lign. rhod. saliv. a. gtt. iv. amplius. M. F. unguentum, faciliè addendis quoque alijs, si majori apparatu delectemur.

Emplastra glis resolvendi & discutiendi magis sine in gummatibus, doloribus & tumoribus venereis in usu sunt, quam salivandi, inprimis emplastrum de ran. Vigon. cum $\frac{1}{2}$ j. probatissimum ijs casibus; pro salivatione verò excitandâ non item, nisi secundariò & in subsidium, (quod & de zonâ glis valet,) emplastris utimur. Sic pyalissimum artificialem collo circumdatum empl. de ran. Vigon. simplo $\frac{1}{2}$ j. currentis constans longè facilius, quam zonam glis, promoveri & accelerare scribit *Sim. Pauli digr. de feb. malign.* p. 27. ibidemque subinnuit, h. m. luem veneream intra 6. septimanas curari posse. Cingulum gliale constituit idem prius, in unguentum redactus, linteoque inunctus formâ subligaculi, seu cinguli aliàs ad hernias usitati, ita ut occultetur interiorius prius, cingulo ad plures usus suffectu. Novimus talia usurpata cum successu in scabiosis. Majoris apparatus describitur ab *Oberndorffero contra Ru-* land. p. 30.

Suffitus mercuriales, cujus materiam constituit cinnabaris vulgaris, prunis injecta, licet *Rondeletio* & *Parao* alijsque hudentur, qui multos se suffitu glis curasse gloriantur; hodiè tamen magis obsolevit usus, præterquam ad usum particularem, ulcera nempe penis. Ita hoc sine suffimentum fieri

fieri potest quoque ex ὄζij. ῥ viv. vel dulc. ῥss. oliban. mastic. cionab. a. ῥj. aristol. O ῥij. carbon. til. q. s. M. conclusus in ollâ fumus ex pulvere carbon. insperlo afficiat membrum cariosum. Ne verò gratis id dictum videatur, tenendum est, ideò abstinere medicos à suffitu, quia hoc pacto fumus (pro universali usu institutus) pulmones ferit, quàm partes afficit extimas alias, unde facilius læsio quàm usus.

Pro masticatorio verò adhibere ῥium dulcem, itidem non receptum est in praxi selectiori hodiè, nec commodum, tum ne dentes inde lædantur magis, tum quia sic non ita è centro suo ad motum universalem citatur serum, quod tamen requirebatur.

Si fateri volumus quod res est, sufficiunt interius pilulæ, exterius unguentum, reliquis carere possumus facile.

Subiectum passivum est æger lue venereâ vel consimili graviore morbo afflictus, ita tamen, ne viribus fatiscat, vel aliud adsit contraindicans. Non convenit, nisi æger sit ὁπισθοδιδος, sana habeat exteroqui viscera, inprimis pulmones, sero non omni exhaustus. Non infans, puer, nec senex sustinet facile hanc operationem perfectam. Observandum quoque est inprimis, quod diximus, quo gradu, quâ specie laboret luis ῥeæ, quod dum non distinguunt vulgò, varia committunt inconvenientiâ plura, etiam renuntiando & aliàs non tam medicis, quàm vulgus, infamantes sæpe citra culpam, quæ id mereatur, affectos.

Modus absolvitur circumstantijs alijs, quoad locum inunctionis, & tempus cumprimis ac numerum. Æger nudatus locatur ad fornacem calidam, inunguntur manè articuli, humeri, brachij, & manuum, spina dorsû, inguina, genua, circa talum & plantæ pedum. Facto hoc, junctâ simul frictione concinnâ, imò pro re natâ quandoque etiam inunctis partibus speciatim affectis, æger componitur in lectum calidum, ut transpirabili servato corpore actuetur magis vis mercurialis, eoque die reliquitur sibi. Hinc si vel citius labore defungi velimus, vel æger robustus sit, altero die statim idem reperitur, vel interpolatione factâ, quod deprehendimus ex usu naturæ, tertio demum die. Non præscribi potest tam certus inunctionum numerus vel finis, quippe quod variat pro ægri constitutione variâ, inprimis verò effectu. Vidimus primo vel altero statim die aliquando incepisse salivationem, quo facto bis etiam saltem inunctio locum habet, & sufficit; ubi verò tardius procedit, tertiâ vel ad summum quartâ vice repeti potest, factâ tamen laudatâ interpolatione, ut de effectu melius constet. Et hæc de actu ipso, dicturi de cautelis quoque, ubi prius de masticatorijs dicenda absolverimus conjunctim.

Notabile enim 1. *masticatoria particulare esse evacuans capitis, salivantia totius.* Particulare, sunt illa, sive fauces afficiantur solum & ijs indigeant, sive cerebri regimen sanctius depletione hæc gaudeat, sive vicinæ partes aliæ. Hinc profunt in affectibus capitis, catarrhis, vertigine, memoriæ debilitate, affectibus soporosis, & affectibus capitis alijs. Profunt in affectibus oculorum, ophthalmiâ, suffusione; aurium, ut surditate, auditu difficili, tinnitu; faucium & adæquatè ventriculi, in fœtore oris, laxitate gingivarum, dolore dentium, aphoniâ, per accidens etiam ad frim, frigida & improprie dicta, ut erysillus. Universalis evacuans mercurialis constituunt, ubi character peregrinus seminalis M. S. inquinat. Hinc profunt in lue venereâ, pforâ, & alijs affectibus rebellibus cum conspurcatione & iniquatione conjunctis.

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

Non confundenda ergò sunt utraque, sed unumquodque suo opponendum. Non salivantia affectibus capitis, nisi adæquatè, non apophlegmatismi simplices & particulares seri graviori oneri vel vitio tollendo sufficiunt.

2. *Et masticatoria & salivatio ῥlis sero lento, viscido, oneroso debentur, non fluxili, tenuiori, salso, vel deficiente.* Exulcent hinc in febris illa, & ubi motu magis quàm quiete serum delinquit. Hinc, autore *Etzera*, apophlegmatismi in phthisi, tussi, pulmonum affectibus cane pejus & angue sunt fugiendi, etiam si à capite non rarò affluxus fiat, quod in partem imbecillem & plus æquo affectam humorum illicerent magis. Sic etiam masticatoria eadem præsentem dolore, aut sensû cerebri exquisito existente minus conveniunt, ut contra ea optimè excitando inserviunt motui ejusdem.

3. *Faucibus speciatim affectis nec masticatoria, nec salivantia locum habent.* Neque enim per locum affectum evacuandum unquam est, si ipse labem sustineat. Laboret quis uligine gingivarum scorbuticâ, cum laxitate & putredine, masticatoria vix conveniunt, præterquam roborantia. Si quis luis venereæ seminia magis in faucibus se exferentia offerat, ut circa uvulam, & partes vicinas erosio visatur, vel os ethmoideum, cartilago narium affecta, observavimus malè potius sæpe, quàm benè cedere inunctionem ῥlem. Sin copiâ lymphæ educenda, utraque conveniunt, inprimis masticatoria proprie dicta; par ratio est, si ob aphoniam nervi sint roborandi. Sin gingivæ laxiores exposcant remedium, terrea quidem mucilaginosa conveniunt, magis tamen, præsertim graviore casu, electuaria, mella & similia demulcentia.

4. *Masticatoria educunt, sternutatoria excutiunt.* Quodcumque ergò non tam excutiendus, quàm educendus est humor serosus, illa, non hæc conveniunt, v. g. in ophthalmiâ, in ozanâ, polypo & similibus. Hinc etiam excessus in fumo tabaci hauriendo minus respectivè nocent, & facilius tolerantur, quasi per consuetudinem quandam, quàm sternutatoria, nisi & hæc occalleant quasi parietes magis, nec sternutationem inducant actualem.

5. *Actus salivantium vel completus est, vel incompletus, uterque distinguendus.* Completum vocamus, qui pro fine habet pyalimum ipsum, quo continuato materiæ morbificæ fit diminutio, in sero nimirum characterisatæ. Cujus operatio per duas, tres vel 42 quoque hebdomadas, pro renatâ, necessaria est, eo usque *μετ' ἀσφαλίας μετ' εὐφορίας* eandem finire liceat. Incompletum verò nuncupo, quando insensibiliter magis exerunt ῥlia actionem suam, citra salivationem, ex emplo scabiei, & unguentorum ad hanc curandam adhiberi solitorum.

Adeoque completum vel incompletum dicimus (1.) ab effectu hoc. Ut aliàs inter sudorifera & diaphoretica obtinet distinctio in praxi; ita etiam circa hæc ῥlia (2.) ab intentione medici. Ut enim etiam præter intentionem quandoque ab usu ῥij dulcis interno, vel unguentorum ῥlij n, emplastrorumve, alio fine adhibitorum, invitis quasi salivatio accidat, præcipuè in ijs, quorum corpora jam salivationem experta sunt; nec ipsa tamen, vel unguenta, nisi id intendamus, completum edunt ordinariè effectum. Latius ergò patent unguenta & emplastra quoque ῥlia hæc, quàm pro salivandi fine. Hinc instar regulæ notandum: Quod salivantia sunt tota, id dissolventia, vel mundificantia ῥlia sunt parti. Toto die hinc adhibentur in scabie & consimilibus cutis exulcerationibus, seu in pulvere, seu unguento, seu alijs modis, effectu tamen optato consequente, modò cætera sint paria.

6. *Inunctio* *ſilis* *indemnis, tuta, efficaciffima & neceffaria* *eft, nec in ſe quicquam incommodi affert.* Infamem licet illam proclamet *Helmontius*, nihil minus tamen quàm talis eſt, modò rectè utentem invenerit. Hinc leguntur medici aliquot millia lucrati ſolo uſu medicamentorum *ſilium* & applicatione concinnâ. Obijci varia ſolent ab ijs, qui *ſij* genium dari talem fingunt, qualem præſumunt. Non timenda eſt palpitatio cordis vel periculum aliud; multò minus id hiftoriæ & objectiones aliæ eveniunt, vel teſtimonia & autoritates medicorum, qui *ſilium* venenatum habent, quod humores pravos ac malignos in totius corporis habitû contentos ab ignobilioribus ad meliores partes, cor, hepar, & ſtomachum, contra naturæ benè operantis conſuetudinem, non ſine magno periculo repellant. Adde, quod vis maligna, ut volunt, in corpore remaneat, alij corripantur maraſmo, alij deatium caſu, palati corruptione, oſſa capitis aliquibus exedantur, illis os & faciès intorta, quin omnem ſæpè illuviem ad caput protrudat, morbo non curato. Imò quòſdam *ſilium* evomiſſe hinc, quòſdam minxiſſe, alios in capite geſtaſſe ſcribitur.

Tuta & neceſſaria eſt operatio, neque enim æquè decocto lignorum cedit, vel alijs; unicè adæquatus morbo huic *ſilus*, ut ſine hoc heroe giganteum illum hoſtem ſuperare non poſſimus facilè, inprimis æqualiter affectâ M. S. citra febrem ullam. Efficaciſſima verò eſt conſtans, ità ut hoc remedio adhibito, mox exiccentur ulcera, cruſtæ evaneſcant, tubercula, calli deſtruantur, nec opus ſit alijs, ſolo hoc & unico ſufficiente. Et quidem omne ſeminiû morboſum & fermentum perfectè eximitur, ut recidiva nulla ſit imenda ab hoc remedio, modò non ultimo gradu & lineâ morbus conſtiterit jam, & æger denuò relabatur ad priſtinas veneres, vel in utendo error fiat.

Neque etiam opus eſt, ut, non contenti mercurio vulgi, alium *ſilium* quæramus, & cum ſuo auro præparemus ac ſigamus, cum ipſe jam ſufficiat, licet non negandum ſit, hoc pacto præparatum eundem efficacius quoque agere.

Cardanus verò conſil. pro lepram patient. p. m. 351. idem effici poſſe credit alijs inciforijs medicamentis, non mercurialibus, ex Δ viv. \mathfrak{z} ii. Θ \mathfrak{z} ib. g. junip. helleb. alb. a. \mathfrak{z} ii. ſucc. tithym. \mathfrak{z} iii. vel amplius, tithym. contuſ. \mathfrak{z} i. ol. lin. \mathfrak{z} ß. &c. inungendo ſub poplitibus, interiora cubitorum & juxta talum, & juxta carpos manuum, & ſub alijs, & plantas pedum, & loca omnia patientia; quod latius apud ipſum legi poteſt. Sed utut concedamus, ijs caſibus hoc præſtari poſſe, ubi actus *ſij* incompletus ſufficit, negamus tamen id ipſum fieri poſſe, ſi completus deſideretur, & malum ſit gravius.

7. *Regimen agri inunctione factâ ſummè neceſſarium;* ut nempe optatus ſuccedat effectus, aliqui facilè noxiuſ futuros. Quoad interiora ergò ſolemus manè ſub initium operationis propinare pilulas ex *ſilio* dulci ad facilitandam eandem, vèſperi verò bezoardica propinare, ex tinctura bezoard. eſſ. \mathfrak{z} ij. \mathfrak{z} diaph. cinnab. nat., ut hoc pacto & corrigamus ſimul medicamentum, & refrænemus ſerum, & defendamus M. S. ſuaviter diaphoreſin procurando. Exterior verò ambiens debet eſſe calidus aer, frigus verò omne cavendum ſtudioſè (completo expetito actu, pro gradu morbi ipſius,) vinum cavendum, & affectus animi omnes gravioreſ.

8. *Muniri prognofico intereſt medico etiam quòdam medicamenta inprimis, tum alia, tum ſilia.* Maximè commendat medicum, ſi, quæ fieri debere dixerit, eveniant atque ſequantur, in bonum & malum reſpectivè. Cum itaque non jucunda penitus ſit hæc ipſa operatio, ſed conjuncta cum moleſtiâ quâdam, adeò

ut vili ſint ſæpè adeò impatientes ægroti, ut & chirurgum & adſtantes interimere minarentur nonnunquam, ſuaſerim, ut exponat prius omnia benè, & opus eſſe tolerantia, ſatis eſſe, ſi brevi morâ ſuſtinens moleſtiam pleniffimè hinc convaleſcat.

9. *Moderandus ſalivationis actus ad ſuſcepſam naturæ unicè* Moderari conantur quidam eundem externis additis. Sic cum Ψ adminiſtrandum vult. *Meieri* de 7. mont. planet. p. 63. ut calor naturalis excitetur & roboretur, ſicque major excretio fiat; cujus tamen contrarium tuetur *Hartmannus*, ne inflammetur ſanguis. Sic ſi oleum de euphorb. unguentis veneris admiſceatur, per alvi dejectionem & ſudorem, non per profluviû oris vel vomitum fieri evacuationem ſcribit *Lang*, l. 3. epiſt. p. 960. Sed præſtat unguenta dicta ſibi relinquere, nec curioſius illa multiplicare ingredientibus hiſce; ſæpe enim per accidens quæ ſunt, per ſe facta putantur.

Hinc not. non temerè repetendam inunctionem, diſtincto puta tempore, ſi ſalivatio ſufficienter procedens nil juverit ægum; notat enim id naturæ repugnantiam. Hinc præſtat quoque ægum non emaciatum eſſe abſtinentiâ & fame. Utut enim quietè & abſtinentiâ multi magni morbi curentur, quæ *Ceſi* eſt paucioria; non tamen facilè ipſa hæc curatio lui veneræ abigendâ ſatisfacit, pro cibo non niſi pane biſcocto, & amygdalis aliquot; pro potu, decocto hordei vel alio apto conſeſſo. Hinc ſi vomitus inde ſequatur, & id fruſtraneam fore eandem ut plurimum denotat. Hinc non inſtituenda inunctio prius, quàm præmiſſis univerſalibus, purgatione, venæ ſectione, imò & alijs. Si enim rectâ ratione adhibitis alijs cedat affectus, non opus eſt ſalivatione; contra ea verò ſi minus reliqua tentatâ ſuffecerint, audacter hanc amplectimur. Hinc ſi fiſſuræ & tumores linguæ ac labiorum, productâ eadem, ſi deglutitio difficilis, & dolores adſint in faucibus, mel roſatum, gragarismata modò abſterſorio, modò adſtringentia & mundificantia conveniunt. Interius opiata habent locum, provide adhibita, *Wedelins*.

MASTICHE.

De *Mastiche* alibi, ſcilicet ſub titulo *Lentiscum*; Hic tantum aliquid de ejus viribus & præparatis.

Mastiche eſt Gummi Refina ex albo citrina, pellicula, granulata, bene odorata ex *Lentisco* arbore exudans.

Delectus.

Optima cenſetur quæ in Inſula Chio provenit, odorata, candida, inſtar ceræ albæ, ſplendens, adulta, retorrida, friabilis, ſyncera, ſtridens. Reprobatur nigra bitumini ſimilis, viridis, livida, impura. Adulteratur Thure & Refina pini, ſed odore fraus ſtatim depreſhenditur.

N. Quantò vetuſtior, tantò intenſius citrina agit.

Vires. *Caſf.* & ſicc. 2. ſubſtr. emollit, ventriculū roborat. Uſus præcip. in vomitu, nauſea, ac fluxu alvi compeſcendo. Obtundit ac corrigit purgantium acrimoniam, reprimit exhalationes ventriculi, quæ caput alias ferire ſolent, [grana aliquot poſt paſtum deglutita,] roborat caput nervoſumque genus, expuſſioni ſanguinis ac tuffi medetur, emendat oris halitum, pituitam & cerebro elicit (*masticando*) Extrinſecus uſus ejus creberrimus eſt in dentiſtriſcijs, emplaſtris ac cataſplasmatis ſtomachicis.

N. Coquitur \mathfrak{z} ß. ∇ \mathfrak{z} ß. iii. vel v. daturque pro potu ordinario in Diarrhæa.

Præparata,

1. Oleum stillat. f. flavum. 2. Oleum rubrum seu Balsamus.

3. Mastich. q. v. salis parum, (1/2) filic. contus. an. destilla per Om, primò extillat liquor albus um So flavo, tandem Δe fortiore, So rubrum, rectifica per Om parvam: flavum So serva seorsim, rubrum deinde & Balsamum nigricantem, itidem seorsim.

Aliter.

4. Mastich. lb. i. bolipulv. m. ii. V q. s. impasta, digere & (14.) dein destilla per Om Δe nudo, & prodibit So leve supernatans, tum quoque grave & ad fundum secedens, utrumq; rectifica cum bolo ac sale.

N. 1. Habes egregium modum Olei albi. flavi & rubri prima parte Glauber. p. 36.

N. 2. Et aliud sub titulo Quinta Essentia cum spiritu Thereb. Myroth. Fabri. Per se autem factum Oleum præbet incopia, quod si super Om rectificaveris, ac redinis alicujus erit particeps, additæ verò ∇ font. per B. habebitur Oleum flavum S. Cless.

2. Oleum per deliq.

Fit in albumine ovi cocti, aëri humido exposito.

3. Oleum Mastichinum coctum.

Fit coctione mastich. in Ol. Rosar. omphac. Vide Diss.

4. Spiritus Mastichis.

Est liquor albus, [qui in Destillatione olei prodit] rectificatus.

5. V Mastichatus.

6. Mastich. lb. i. V rect. f. lb. digere & (14.) postea affunde aquam fontan. & destilla in MB, i. prodit ~ dein ∇, quæ nullus usus, ~ in MB rectifica & serva.

N. Quod remansit destillari potest per Om, ut profundat So.

Vires. Maxime prædest in ventriculi imbecillitate ac cruditate, in colico dolore &c.

6. Aqua Mastichina F. F.

7. Mastich. lb. β. caryophyll. 3β. macis 3i. vini albi generosi lb. i. destilla per Alemb. cum.

7. Pilula Mastichina. Vid. D.

8. Emplastrum Mastichinum.

Stomachicum, nervinum, Ferrus arteriæ sectæ imponit. Schroderus.

Mastiche.) Græc. πῆλιν σκῆνιν. Resina Leniscina. Alias μασίχιν forsan δὲ τῆ μασίχας πῆλιν, Resina Mastichina. Germ. Mastich. Officinæ Mastix. Est gummi resinofum ex Citrino - album, pellucidum, granulatum, balsamicum spirans odorem ex Lentisco exstillans, qui est Arbor procera, ex cujus radice multi stolones coryli modo concresecunt, ramis lentis & flexilibus brachciati. Folia ab uno pediculo ferè octona cohærent, folijs glycyrrhiza non multum dissimilia, sed duriora; Flores muscosi plurimi pediculis longis adhærent, quibus baccæ succedunt Ervi magnitudine, initio virides, & ubi maturuerint, nigra, substantiâ quâdam pingui & nucleo intus nigro & duro turgida; Ex hac arbore Mastiche colligitur & quidem præstantior, quæ in Chio provenit, candida, splendens, odorata, friabilis. Sola enim Insula Chios, inquit Bellonius, inter reliquas Mastichen generat, et si Galenus Ægyptiam commender, hoc liquidum talem scimus in solâ Chio reperiri. Lib. 2. observat. cap. 8.

N. In Italiæ Senensibus maritimis. toto maris Tyrheni tractu Cajetam usque & circâ Neapolim Lentiscos Mastichen producere, sed non eâ abundantia, quâ in Chio & Cretâ Ægei Insulis, teste Melichio comment in El. Arom. Amat. Lusitan. Enarr. 18. in Dioscorid.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

Delectus. Optima censetur &c.) Probissima est, quæ nitidulæ modo replendens pellucet & Tyrhenicæ aut Hæticæ ceræ candore similis est, crystallâ, friabilis & odorata.

N. Ita feliciter in Chio nascitur, ut non modice vestigal quotannis ex eâ cives habeant. Et refert Bellonius primarias Insularum opes & fortunas ibi consistere, in Mastichâ, quam sola hæc Insula tam copiose & largè subministrat, collectione, nec minore impensa & diligentia Lentiscos isthic excoli, quam in Galliâ vites, nec differre Arborem ab eâ, quæ in Galliâ Narbonensi, tum in Italiâ provenit: majorem tamen in Lentisci arboribus curandis diligentiam ibidem adhiberi vid. Bellon. Lib. 2. c. 8. observ.

Adulteratur thure & resina pini.) Admixtis resinâ pineâ, aut thure; sed solâ resinâ pineâ adulterari potest, ut quæ colore albo in concolore Mastiche facilius fallat.

Vires. Calefac. & sicc. substring. emollit, &c.) Unde usus ejus præcipuus est in vomitu, diarrhœa &c. dum ventriculum roborat & debilitatum ac laxatum in appetendo & digerendo restaurat. Unde dicit Prævotius in euporistis valde prodesse, si quotidie sumatur ex ovo sorbili 3j. Masticata catarrhos sistit, & deglutita cum conservâ rosar. j. veteri in pectus ruentes catarrhos incrassat. Vomitu, uti dictum, compescit etiam cum ros. sic. & caryophyllis Indis in vino rubro cocta. Et præterea balsamica ejus virtus in sanandis ulceribus, ventriculi & intestinorum non satis deprædicari potest. Injiciatur parum mastichis super carbones ignitos & fumus excipiatur ollâ novâ, imple ollam aquâ vel cruda vel decocta secundum intentionem Medici & operiatur optime, suscipit aqua saporem & vires Mastichis, hoc medicamentum est præstans pro ventriculi debilitate & omnibus alvi fluxibus.

Præparata. Ex Mastiche præparatur Oleum, Spiritus, Aqua, Pilula &c. de quibus vid. D. Authorem & Johann. Stephani Stolbergeri Mastichologiam. Hofmannus.

MATER PERLARUM

De Matre Perlarum jam sub titulo MARGARITÆ. Hic tantum patica.

Mater Perlarum seu Margaritarum. Perlen Mutter. Mere ou Nacre de Perles. Mother of Pearles. Moeder van Paerten.

Species est Choncharum, à Margaritis nomen ducentium, quæ inibi frequentius, quam in reliquis invenimur.

Vires. Præter vires choncharum communes sunt quæ vim cordialem hæc attribuunt, verum quo successu, videant ipsimet.

Alij antifebrile ex eadem conficiunt, ad modum, quem supra ex conchis oblongis dedimus.

Præparata.

[In usu est Mat. Perl. præp.]

[Magisterium Matr. Perlarum.] Schroder.

Mater Perlarum.) Species est choncharum: in quibus Margaritæ reperiuntur, ex hac cum alijs marinis v. g. Ocul. cancr. Corall. r. Margarit. Or. conchis oblongis, dente equi marini &c. Magisterium cordiale conficitur, resoluti prius acet. destil. & postmodum sp. Vitrioli præcipitatis. In greditur Mater perlarum pulverem antifebrilem D. D. Strobelbergeri. Hofmannus.

MATRATIUM, vid. sub titulo Instrumenta Pharmaceutica.

MATRICARIA

Matricaria à matrice seu utero recentioribus dicta, quod

quod morbis, uterinis conferat, Parthenium Dioscoridis censetur, quod diminutivum est à Παρθένος virgo.

Notæ ejus Characteristicæ sunt flores velut in umbella, barbulis albis discum medium luteum ambientibus.

Nomina. Matricaria Ger. vulgaris Park. Matricaria vulgò, minus parthenium L. B. parthenium L. sive matricaria vulgaris C. B.

E radice alba plurimis fibris emissis terram apprehendente caules exurgunt plures, sesquicubitales, rigidi, striati, glabri, satis crassi, medullâ fungosâ referti, folijs crebris, nullo ordine positis vestiti, versus summities caulium ex alis foliorum exeunt ramuli, in quibus & in summis caulibus existunt flores pediculis oblongis, plures velut in umbella radiati, non admodum ampli, folijs marginalibus brevibus, albis, discum medium flavum cingentibus: folijs marginalibus marcescentibus discus medius extumescit: folia velut alata ex duabus tribusve pinnularum mediæ costæ adnexarum conjugationibus componuntur pinnulæ hæc natæ sunt, inque alias minores circa margines dentatas subdividuntur, filicis cujusdam fere in modum, color foliorum ex viridi luteolus.

Tota planta odorem gravem & vehementem spirat.

Junio & Julio mensibus floret ad sepes & in locis ruderalis.

Matricaria varietates sunt.

1. Matricaria flore pleno C. B. & aliorum, sola floris multiplicitate à vulgari, non specie differt.

2. Habetur & flore nudo, seu foliolis radiatis medium orbem cingentibus viduo, flore aphylo, bullatis floribus aureis Park.

Matricaria odorata L. B. & aliorum, cum nulla alia in re præterquam odore graviori à vulgari differat, nec ulteriore descriptione indiget, nec species distincta censenda est.

4. Matricaria florum petalis fistulosis majoribus.

5. Minoribus.

Utraque varietas colitur in hort. reg. Paris. & hort. Leydeni, & semini proculdubio originem suam debuit, uti bellis minor florum petalis fistulosis.

6. Matricaria cauliculis rubentibus N. D. Hort. Lugd. B.

Vires. Ad uterinos affectus non parum confert (ut vel nomen ipsum arguit) decoctum & potum, menses & secundas remorantes, uteri suffocationem, &c. quæcunque amara possunt utiliter præstat: ventris tinea expellit, vel herba ipsa, vel succus ejus expressus non secus ac centaureum aut absinthium convenit in arthritide.

Nostratibus, & Germanis etiam, febrifuga dicitur ab effectu, nonnulli, ut apud Tragum, I. Hist. 50. Sapientes mulieres, & Brassavola in Exam. Simpl. vim purgatricem illi attribuant, quam Parthenio suo Dioscorides inesse prodidit.

Palam est apes ferrè non posse odorem matricariæ: quare Plethorici, quos præ alijs pungunt apes & culices, in hortis ambulaturi optime sibi consulunt, si Serviam ex matricaria sibi parent & circumferant: Sic enim apes hujus graveolentiæ offensæ, quasi manu abactæ, illis non nocent.

Eundem effectum expectare possumus à cotula færida, S. Pauli quadrip. Botan: Class. 3. p. 390.

Habui à D. Tancred, Robinson.

Ad Hemieraniam, R. folior. Matricariæ m. j. Calefiat in farragine, & bis aut ter calidi vertici applicetur. Chesneau ex libro Arcanorum matricaria cruda imposita capitis vertici mitigare ejus dolores sæpiusculè solet S. Paulus.

Parare ex ea & floribus chamomillæ cum tan-

tillo artemisiæ decoctum suevi, à cujus usu hysterica symptomata illico cessare, & lochia abunde fluere sæpe competeri, idem RAYUS.

MATRISYLVA.

Peryclimenum dici putatur quasi περικλιμένον, quia admiculis se convolvit & scandit. Caprifolium quod folia sint extremis flexibus capreolata. Lob. Adv.

Descriptio periclymeni apud Dioscoridem, excepta radice, quam crassam ac rotundam dicit, caprifolio nostro vulgari satis benè convenit, verum ob radicem disparem ambigitur an nostrum periclymenum non sit potius κυλάριον ἐρέγγει Diosc. l. 2. c. 195. quam κινάβερμον aut κινόφυλλον vocitant, verum de nominibus disputare, nostri non est instituti, sufficit nobis caprifolij & periclymeni nomina pro hac plantâ usu recepta esse.

Vires. Vehementer calefacit & desiccât, id quod gustu etiam ipso deprehenditur, siquidem folia in ore aliquandiu retenta & degustata, ardorem & acrimoniæ sensum linguæ imprimunt, unde rectè colligitur ea attenuantis, digerentis, dissolventis qualitatis esse: tantum abest ut eorum decoctum ad oris fauciumque tumores & inflammationes incipientes in collutionibus & gargarismis utile sit; prout, inveterato er. die, nequicquam reclamantibus medicis, à vulgo hætenus ea usurpante creditum est, idem dicendum de aqua foliorum aut florum destillata, quæ ad eisdem usus à vulgo frequentatur, non in Angliatantum sed & in Germania; forte locum habere possit in tumoribus faucium à frigidis humoribus ortis.

Recentiores autem easdem fere vires caprifolio suo tribuunt quas veteres periclymeno, exicare enim ipsi tradunt ulcera humida & sordida, sanare impetigines & alias cutis fæditates, lienem abluere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere &c. J. B. Cæterum matrisylva in eorum unguentorum usum venit quæ ad capitis vulnera parantur, vide Matth.

Liquorem periclymeni stillatitium cum semine lavendulæ solitus est ad partum faciendum ad 3. vel iii. propinare Rondeletius.

È caprifolij floribus conficitur oleum Jasmini succedaneum S. Paulus quad. Bot. Class. 2. p. 39. 40. Rayus.

MATURANTIA, vid. *Pepastica*.

MAYZ, vid. *Triticum Indicum*.

MECHOACAN.

Nomina. Convolvulus Americanus Mechoacan dictus. Jeticucu Brasiliensibus seu radix mechoacan Marggr. Bryonia mechoacana alba C. B. Bryonia alba Peruana sive mechoacan Park. Mechoacan L. B. Marggr.

Caulis sarmentosus est, longissime serpens & scandens, multangularis, lentus, rufus, etiam viridis, folia solitarie posita, quodlibet in suo pediculo digitum longo, figuram habens cordis uti pingitur, duabus ad latera auriculis, tenera ad tactum, unum, duos, tres & quatuor dig. longa, saturatè viridia, inferius nervo & venis transversis conspicua; nullum autem præter herbaceum habent odorem folia tria; gaulis verò incissus lacteum succum præbet: florem fert convolvuli magnitudine & figurâ, unico folio constantem, album cum paucis incarnato dilutum, intus autem purpureum. Semen continet pisi magnitudine, fusci coloris, verum haud rotundum, sed quasi duæ particule effectæ essent, ita ut fere triangularis sit figurâ, radix medium aut integrum pedem longitudine æquat, crassities pterumque eadem, & ut plurimum dupla & bifida est, una

parte breviora altera, exterius obscure cinerea seu fusca, recens resinam quandam fundit & est interitus alba.

Hæc est descriptio Marggravij: cui ut oculato testis & veraci fidem potius adhibemus quam alijs sibi minus comperta ex aliorum relatu scribentibus: unde Mechoacanam veram & genuinam esse Convolvuli speciem Minime dubitamus: non autem Bryoniæ, ut vult C. Bauhinus: nam quæ Monardes habet de fructu, Coriandri magnitudine, racematim coherente, ex aliorum relatu scribit, non *Mechocactis* edoctus.

Mechoacana sylvestris Monardis à descripta non aliter videtur differre quam ut planta sylvestris à culta ejusdem speciei.

Missa sunt Clusio ex Hispanijs duo seminis mechoacan genera: unum brevi calyculo sive siliqua, semineque nigro, quale est scammonia aut convolvuli majoris: alterum oblongiore aliquantum calyculo & semine ruffo, quam superius longiore tenerioreque; utriusque siliqua parte interiore lanuginosa erat, postior species forte est quam Monardes describit, flore mali autæ, quinque petalis constante majoribus, subfusi coloris, è cujus umbilico proruberat calyx sive vesicula quædam avellanæ magnitudine, membranâ constans tenui, albicante, quæ in duas cellulas tenuissimâ pelliculâ secretas dividitur & in singulis bina grana, ciceris exigui magnitudine, colorem per maturitatem nigro, gustu insipido, continentur: hæc etiam Convolvuli species videtur, quamvis (ut suspicor) flos minus rectè descriptus sit: semen etiam nigrum; quod differt à Clusiana secunda, prior Clusij species eadem videtur Marggravianæ.

Mechoacana à provincia ubi primo reperta est nomen obtinuit: postea tamen in multis alijs Americæ meridionalis regionibus, ut v. g. Nicaragua, Quito, Brasilia, inventa est;

Plantæ quas describit Fr. Hernandez pro radice Mechuacana Tachuache nomine, floribus oblongis, coccineis, fructu peponis formâ & magnitudine, lanugine obducto candenti, ac semine albo referto, tenui, latoque non sine bombycinis quibusdam filis, argenteis & lentis, ab omnibus à Monardo & Marggravio propositis diversâ videntur, & Apocyno potius affines quam convolvulo.

Ex insula novæ Hispaniæ mechoacan dicta, unde delata est, & nomen obtinuit hæc radix, de ejus facultat. Libellum singularem edidit Æg. Everartus Antuerpiæ, 1587. ut & Jac. Goræus gallice Parisijs, de eadem satis prolixè agit Monardes in Simp. Ind.

Vires. Pituitosos, aquosos serososque humores ex toto corpore, ac imprimis ex capite nervosoque genere, ac pectore blandè ac sine molestia educit: addunt alij purgando etiam partes roborare: quin & bilem flavâque hydropicorum aquas purgat, ex quo ipso cognoscitur (inquit Caip. Hofman) quam non sit mite medicamentum.

Tussi veteri, colico dolori, arthritidi, lûi venereæ plurimum confert, quia tamen calida & sicca, monet Schroderus, ne in calidis constitutionibus ejus usus sit continuus.

Sumitur in substantia fere tantum, sumendo pulverem ipsius cum liquore idoneo, præsertim vino, quamvis etiam cum juscule sumatur in decocto non datur; nam experientia compertum est, coctione vini ipsius petire & exsolvi, liquor non solus exhibendus est, sed pulvis infusus C. Hofm. Liquorem etiam solum purgare scribit.

In pulvere servanda non est: ita enim ut in alijs vis ipsius facile exhalat, pulvis sit crassiusculus.

Dosis à ʒss. ad ʒj. aut ij. corrigitur cum cinnamom. Anisi aut mastich. tertia parte.

Eligatur recens, intus albicans non tamen candida, cortice cinereo tecta, non cariosa. *Rajus.*

Mechoacana, quæ nonnullis *Rhabarbarum album*, alijs *Scammonium Americanum* dicitur, species Bryoniæ exoticæ in India Occidentali provenientis, eligatur albicans ac recens, ponderosa & insipida; improbat nigræ, cariola, & valdè candida.

Adulteratur radicibus Bryoniæ in taleolas sectis, & ad formam Mechoacanæ refectis. Dolus tenebritudine Mechoacanæ deprehenditur; cum bryonia substantiam longè rudiorem sit nata. *Angustani.*

Præparata. Mechoac.

1. Extractum Mechoacanæ

Extractum ut alia extracta parari potest cum V, vel secundum Quercetan. (in *Pharm. rest.* c. 25.) cum V aliqta Epatica, e. g. Endiviæ, succo Limoniæ vel Citriorum acidula reddita. Alij parant cum aceto *Harim. in pract.* verum minus rectè; quippe vis purgatrix hac ratione obtunditur.

Dosis ad ʒj.

N. Nihil lucri in hoc Extracto præ pulvere habes, præterquam quod dissolvi in liquoribus possit.

2. Extractum Mechoacanæ compositum.

ʒi. Rad. Mechoac. el. non cariola ʒii. turpeth. gum. mos. & ab. ʒj. zinziberis albi ʒii. polypod. querni ʒss.

Incisis grosso modo, extrahe digerendo cum V opt. & V Beton. (quæ ab Aloë est abstracta, si adsit) an. ʒss. exprime fortissimè, facibus relictis, aliam afunde Vm Betonica, macera iterum ac exprime, expressis liquoribus adde Mannæ puriss. ʒii. Scammoni. mund. ʒj.

Agitando misceantur; adde

ʒi. g. v. ʒo Cinam. gr. iii.

Redige ad consistentiam extracti.

Vires. Panchymagogen est, omnes humores noxios simul educens, præcipue autem serosis.

Dosis ʒi. plus minus. *Har. in Croll.*

[Parantur etiam Morfili de Mechoacanna.]

[Fecula Mechoacæ] *Schroderus.*

MECONIUM, vid. *Opium.*

M E D I C A.

Medica natales suos ipso nomine fatetur, locumque undè venerit vocabulum indicat, inquit J. Bauhinus. Externa olim Græciæ (verba sunt Plinij) à Medis est advecta per bella Persarum, quæ Darius attulit: hinc Gentile nomen obtinuit.

Gallis *Saint foin* & *Foin de Bourgogne* & *grand Treffle* dicta est: Onobrychis autem vulgaris *Lucern* seu *Lucerne*; quam Auctor Hist. Lugd. perperam confundit cum Medica sativa. Hinc patet quanto in errore versentur tam spermatopola, tum etiam Agricola nostrates, qui pro Fœno sancto seu Burgundiaco, Onobrychidis seu capitis Gallinacei semen habent.

Hoc genus siliquis paucioribus volutis intortis, iisque non contiguis sibi invicem sed paulò remotioribus à Medica minore annua differt.

Nomina. 1. Medica major erectior floribus purpurascens ʒ. B. Trif. Burgundiacum *Ger.* Fœnum Burgundiacum sive Medica legitima *Park.*

J. B.

Valdè quàm luxuriat, obsequioso fœnore cultorem fovens, caulibus ut numerosis ita prolixis: folia ternâ oblonga, per extremam oram, quæ obtusa est, cre-

nara: flores copiosi, velut in spicam digesti, purpurascens: siliquæ cornu caprini instar contortæ, in quibus seme minus & candidum. Radix subest longa, tenuis lignosa, in multos annos virax.

Circa *Genevam* & *Avenionem* in Provincia in agris satam vidimus pro jumentorum pabulo. Circa *Montpelium* spontaneam observavimus.

Siliquæ ejus intortæ quidem sunt sed paucioribus volutis, iisque non contiguis sibi invicem ut unum glomerem efficiant, sed paulo remotioribus.

Nomina. 2. Medica frutescens, sive flavo flore Clusij, Park. Medica sylvestris J. B. Trifolium luteum sylvestre siliquâ convexâ, vel Medica frutescens C. B. Trif. siliquâ cornutâ. Ger. emac.

Clus.

Multos ex eadem radice profert ramos, cubitales aut longiores, humi plerumque fusos, teretes, viminales & flexibiles, in multas alas divisos: Folia terna uni petiolo in hærentia, legitimæ Medicæ folijs respondentia, & dorso eminente, sed longè minora. Flores in extremis ramulis confertos, alterius floribus formâ pares, flavo tamen colore, non inodoros: cornicula deinde plana, contorta, corniculorum legitimæ Medicæ instar, angustiora tamen quàm illa: in quibus grana sativæ granis similia continentur, sed paulo minora. Radix legitimæ radici par, crassiuscula, latè sparsa, fibrosa, perennis, singulis annis novos caules profert.

In montosis & campis patentibus inter segetes, inque aggeribus terrenis floret Junio & Julio.

Flore purpurascens ex viridi variantem observavimus propè Nordvicum urbem, nisi fortè ea fuerat Medica legitima, cum hac specie promiscuè orta, quæ eo loci copiosissimè provenit.

Medica sativa & legitima non modo in varijs Hispaniæ locis spontè oritur, sed etiam diligenter colitur in pecudum pabulum, sed maximè equorum, vice Fœni communis, quippe quod propter libertatem singulis annis pluries demeti possit. Gallis, ut diximus *Saint Foin de Bourgogne* dicitur, inque meridionalibus Galliæ regionibus rigua sua prata ejus seminibus conferunt, ter eundem singulis annis secantes, restibili radice & inexhausta fecunditate. Agro pingui & bene stercoreato delectatur; è contra Onobrychis arido & glareoso seu sabuloso, edito tamen. Quomodo nostrates harum duarum plantarum nomina permutarunt, superius diximus. Morisonus, & rectè, nobilibus & Viris generosis consultit, ut ex agro Turnonensi aut Burgundiaco seminum involucri cochleata (aut ipsa semina nuda) Fœni verè & propriè Burgundici *Saint Foin* dicti acquirant, & serant in agris suis, quæ cum triplici fœnore persolverent ipsis pretium, modo in agris benè subactis & pinguibus seratur. Cum enim apud Gallos ter quotannis secetur, quidni etiam hic in Angliâ? ubi terra pinguior magisque rigua & ubi humor magis abundat ex frequentibus imbribus. Qui in Hispania rem observarunt (annotante Camer. in hort.) ubi quotidianus ejus usus est, referunt nullo cibo tam viridi, quam arido, prius magisque lætari, saginari & pinguescere jumenta pecusque omne, parcius tamen dari, quoniam inflat, & multum sanguinem creat. Agrum stercoreat ac adeo suavis est ac nutrens, ut pecus arcere necesse sit, nè vel distrumpatur aut sanguinem detrudere oporteat. Animalium virijs plerisque medetur; Ad Maciem mularum, ut Columella prædicit, nulla res tantum quantum Medica prodest. Semen (ut tradit Diosc.) siccum jucundi saporis gratiâ conditamento salii admiscetur. Viride quibus refrigeratione opus est illitu suffragatur. J. B.

Semel sata in multos annos durat: Plinius tricenos

inquirit, (mendum in codice subesse suspicor,) rectè; Palladius denos. Rajus.

MEDULLA in Genere.

Medulla in Mineralogia partem molliusculam denotat quæ in saxis nonnunquam reperitur. In Phytologia mediam cujuslibet plantæ partem molliorem & spongiosam significat, quam & cor matricemve appellat. In Zoologia adipem significat in ossium medietate contentam: vel molliorem illam substantiam quæ in spinâ dorsi ac craniò est.

MEDULLA ANIMALIUM in specie.

Mælos, Medulla est pinguedo ossium cavitatibus, velut nutrimentum, insita.

Suntque Officinales.

Medulla bubula seu bovilla, canina, cervina.

Equina, hircina, badina, ovilla, vitulina.

Vires. Calefacit, emollit, rarefacit, ulcera explet. Hinc profusus medullarum usus in tumoribus induratis & scirrhis, &c.

N. Optima habetur cervina, dein vitulina: Medulla Hircina & bubula tum acrior est, tum siccior, ideoque ad molliendum minus idonea.

Est & medulla spinæ dorsalis cerebrique, id est, substantia molliuscula in cavitatibus eorum collocata.

Verùm excepto cerebro leporino, reliquæ usus sunt rarissimi.

Preparata exinde fieri possunt præcipua, Aquæ still. & Oleum. Scroderus.

M E L.

De Melle jam sub titulo Apis; hic itaque tantum de Mellibus quibusdam compositis.

Mel Anacardinum Alzaravij Pharm. Aug.

℞. Anacardia recentia i. e. succulenta atque venustate non corrupta, tere, & in aqua sufficiente quantitate decoque, donec melleum succum in aquam deposuerint, mellis consistentiam redige.

Memoriæ jacturam refarcit, labantes sensus reficit, oblivionem discutit, ac mentem acuit; morbis cerebri frigidis & humidis conducit, nervorumque resolutioni opitulatur.

Fuchsius paulò aliter describit: Anacardia enim trita in aceto justæ quantitatis diebus septem infundit, octavo die lento igne ad medietatem decoquit, & per lintebulum colat, in succo autem mel justæ quantitatis ad spissitudinem decoquit.

Mel Anthosatum ex eadem Pharmac.

℞. Mellis rosati simplicis ad majorem spissitudinem cocti ℥ iii. florum rosæ smarini recentium contusorum m. vi. sicut in infusione, loco calido, horis viginti quatuor, deinde exprimantur, & fiat colatura, ut artus est.

Colicos ac uterinos dolores mitigat, cerebri, cordis & ventriculi vires auget, & crudam in intestinis, ac circa mesenterium pituitam digerit ac flatus discutit: additur in enemata, ubi paræsis ex colica metuitur, nervosas enim partes à noxis defendit.

Mel Elleboratum è Pharmac. Londinensi.

℞. Rad. ellebori albi siccarum & concisarum ℥ j. aqua limpidissima ℥ xiv. post infusionem triiduanam, coque paulatim ad medietatem, factaque diligenti expressione, recoque in melleam consistentiam, cum mellis albisimi ℥ iii.

Mel

Mel Emblicorum è Pharm. Aug.

℥. Myrobalanorum emblicarum numero quinquaginta, contumescuntur mediocriter, & decoquantur in libris tribus aqua ad consumptionem librarum duarum: residuo colato & clarificato addatur mellis despumati tantundem, & ad justam consistentiam coctio instituitur.

Cor, cerebrum, jecur, nec non ventriculorum confortat, corporis odorem commendat, ac hilaritatem parit.

Mel Menthæ ex eadem Pharmac.

℥. Succus menthæ purificati ℥ ii. mellis optimi despumati tantundem, coquantur ad justam consistentiam.

Ventriculum frigidum fovet, Coctionem adjuvat, ac pituitosos faucium tumores discutit.

Idem Zuvelferi.

℥. Aqua menthæ odorifera sine additione ex balneo nostro vaporoso still. ℥ j. cui denuo menthæ recentis odorata librâ unâ additâ, ex balneo nostro vaporoso aqua destillando proluciat, quâ interim asservatâ odoriferâ & spirituosâ aquâ accipe mellis purissimi satis crassi, & legitime uti supra edoctum extracti lib. i v. cui immergantur menthæ recentis minimi confissa ℥ x. vel ℥ ii.

Factaque maceratione loco calido, vase probe clauso, septimana una circiter, fiat colatura cum forti expressione, mel expressum interim asservetur: jam verò ex residua menthæ expressa additis adhuc menthæ recentis lib. j. & succi menthæ recentis expressi & depurati ℥ iß.

Fiat cum suffic. q. aquæ simplicis affusâ, decoctum forte, quod colatum & purificatum leniter evaporet, ad consistentiam & spissitudinem satis crassam, instar electuarij, hoc porro cum superioris aquæ spirituosæ suffic. quant. nonnihil diluatur, ac superiori melli menthæ, quantum ad debitam suam consistentiam sufficere videbitur, jungatur.

Efficax est in affectibus ventriculi & intestinorum, doloribus colicis & hystericeis, tum per os assumptum, tum etiam gutturi inferiori immixtum opitulatur.

Mel mercurialis è Pharm. Aug.

℥. Succus mercurialis ℥ ii. mellis puri ac optimi ℥ iß. coquantur & despumentur, ut artis est.

Eadem cum syrupo vires obtinet, magis tamen abstergit, ideoque alvum (ubi enematibus inditur) feliciter subducit.

Mel Mororum, vid. Diamoron.

Mel Nucum, vid. Dianucum.

Mel passularum ex Pharm. Aug.

℥. Uvarum passiarum ℥ i v. aqua ℥ xii. incise passula macerentur horis viginti quatuor in aqua, deinde coquantur ad remanentiam tertia partis: colentur & ad mellis consistentiam coctione redigantur; ob quam vocatur mel passularum.

Pectoris vitij, præcipue verò destillationi acri, & calidæ à falsis humoribus obortæ conducit, asperam arteriam lenit, & humectat, expectorationem promovet, tussim itidem, ac raucedinem mitigat.

Mel Rosatum simplex è Pharm. Aug.

℥. Rosarum rubrarum recentium ℥ i x. confusa infundantur in aqua fontana pura & calentis ℥ xii. per horas viginti quatuor; colatura ℥ v. addantur ℥ i v. mellis, coquantur simul, ut artis est.

Ventriculum roborat, detergit, viscidosque succos & crudos coquit & expurgat: putredini oris, prout & gingivarum tonsillarumque inflammationibus adversatur.

Mel Rosatum Mesuæ è Pharm. Aug.

℥. Rosarum rubrarum nondum penitus apertarum ℥ ii mellis optimi ℥ vi. coquantur lento igne secundum artem.

Id vulgus quondam plerumque expetijt ac usurpavit: eodem raucedines mitigare, asperæ quoque arteriæ, columellæ, faucium & gutturis noxas depellere, edoctum.

Mel Rosatum Citratum, ex eadem Pharm.

℥. Mellis rosati simpl. ad perfectionem cocti ℥ ii. huic, dum adhuc à coctura fervet, infunde cort. citri recentium & extimorum ℥ j. stent in infusione per mensem; postea mel transcoletur ac reponatur.

Frigidis ventriculi & cordis affectibus eximie succurrit; abstergit, tenuat, concoquit: corruptionem humorum, eorundemque putredinem arceat, ideoque oris fetorem corrigit, requiritur potissimum ad Compositionem oxymelitis hellborati à Juliano descripti, & à Gesnero magnis encomijs celebrati.

Mel Rosatum Laxativum, ex eadem Pharm.

℥. Prædictæ infusionis rosarum simpl. ℥ vi. mellis ℥ ii. conficiatur secundum artem.

Eadem, quas syrupus rosatus vires possidet.

Mel Saponis è Pharm. Bateana.

℥. Sapon. com. mellis añ ℥ iv. ⊕ ꝑri. ℥ ß. ∇ fā. mar. ℥ ii. m. s. a. Cosmeticum est, inserviens apprimè manibus & faciei lavandis ac dealbandis, valet etiam in ambullis, inflammationibus, podagra, &c.

Mel Scilliticum Pharmac. Londin.

℥. Scillam adultam & succi plenam numero unam. tota frustatim comminatur, & in vase vitreo, ore arte clauso, & pelle abducto, quadraginta dies, libere exponatur solis radit; ante scilicet & post exortum canis, viginti, tum demum vas aperitur, succumque in fundo collectum cum optimo melle condendum.

Mel Violatum, ex Pharm. Aug.

Fit, ut mel rosatum simplex.

Refrigerat, lenit, & humectat, alvumque emollit: inditur potissimum enematibus, ubi bilis & caloris acrimonia levanda aut obtundenda est.

Mel Violatum Solutivum ex eadem Pharm.

Fit eodem modo, quo Rosatum solutivum.

Syrupo jam dicto viribus affine est: inditur potissimum enematibus, ubi febres cum alvi adstrictione molestæ sunt.

Mel

Mel Rosatum Agaricatum è *Pharmac. Norinberg.*

℥. *Agarici albiſſimi* ℥vi. *infuſionis roſarum ſolu-
tiua, mellis optimi an. lbiv.*

Colata coquantur l. a. ad juſtam Conſisten-
tiam.

Mel Roſatum Anthoſatum, ex eadem
Pharmac.

℥. *Mellis roſati ſimplicis* ℥iii. *florum roſiſmarini
recentium m. vi.*

Stent in infuſione in loco calido, horis viginti
quatuor, ac factâ expreſſione, fiat colatura, & co-
quantur ſecundum artem.

Mel De Tuſſilagine, ex eadem
Pharmac.

℥. *Radicum farfara lib. j. conuſa bene coquantur,
colentur, addendo mellis lib. ii.*

Coquantur ad juſtam conſiſtentiam.

MELAMPYRUM

Μελάμυρον à *μέλας* & *πύρε*, ex tritici enim mu-
tatione naſcitur melampyrum, ut ex melino nigrum
fiat, teſte Galeno, nos ejuſmodi in plantis ſpecierum
transmutationem dari non concedimus. Caterum
Melampyrum dictum putamus, quod ſemen ejus tri-
ticeum referat magnitudine & figurâ, colore nigro
differat; cum autem inter ſegetes tritici frequens na-
ſcatur, ejuſque grana triticeis ſæpenumero admixta
ſint, hinc orta occaſio fingendi ex tritici mutatione
naſci. *Triticum vaccinum* dicitur quod granus paſtus
ſit bobus & vaccis ſaginandis.

Uſus, Melampyrum (inquit I. Bauhinus) non-
dum quod ſciamus, in Medicina uſum obtinuit,
ſed plerumque negligi ſolet. Scribit Cluſius, eam
in occidentali friſiæ ſeu Flandriæ parte, (ubi
copioſiſſimum ait) panem vitare, & atriorem
reddere: quinimo eos qui eo veſcuntur ple-
rumque capitis gravedine tentari, ſolere, non
ſecus ac ſi lolio victiſſent: ego ſemine hujus
ſæpius quidem panem tinctum obſervavi, ſed
nullum pravam ſaporem ei adferre deprehendi,
nec inſalubriorem à ruſticis ideo thaberi ani-
madverti, nec eam ullo modo ſeparare ſtu-
dent, quin & Tabern. qui admodum lapidum
panem ait, ſe ſine ullo nocumento ſæpe comediſſe
teſtatur.

Gratus paſtus bubus & vaccis ſaginandis,
ut non incongruè forſan pabulum bovinum aut
vaccinum quis nuncupare poſſit. J. B. *Rajus.*

MELANAGOGA.

Sunt Medicamenta Melancholiam purgantia; de
quibus *vid.* ſub titulo *Purgantia.*

MELANTHIUM, *vid. Nigella.*

MELICRATUM, *vid. Hydromel.*

MELILOTUS.

A *μέλι* & *λωτός* quaſi lotus mellea, vel à flavo
colore florum, vel ab odore melleo quem ſiccata
emittit; vel, ut vult Io. Bodæus à melleo ſapo-
re, qui in caule ejus & radice deprehenditur
dum comeduntur: verum hæc de meliloto Ægyptia-
ca intelligendum.

Notæ hujus generis characteriſtica ſunt flores
penduli in ſpicis è foliorum alis egreſſis, ſiliquæ ſeu
folliculi breves, ſcabri rugoſive.

Vires, Leniter reſolvit, digerit, emollit, dolo-
res ſedar, hinc emplaſtris & cataplaſmatis dige-
rentibus ac reſolventibus nec non concoquenti-
bus tum & acopis omnibus utiliter admiſcetur,
utuntur ea vulgò officinæ pro vera veterum me-
liloto.

Ad pleuritidem mitigandam hunc ſotum pro-
deſſe experiemini. R. herbæ meliloti, parieta-
riæ, veræ ana m. ij betonicæ m. j miſta & decocta
in aqua ſæpe pectori ſuperponantur. Simon Paullus

Emplaſtrum de Meliloto Meſue egregium eſt ano-
dynam, diſcutiendo non ſtatuſ tantum, ſed &
frigidaſ crassiſſamque materiam in tumoribus ex-
ternis, necnon hepatis lienique.

Cum Dioſcorides dixit meliloton eſſe boni odoris,
intelligendus eſt de exſiccata herba, quia nullum
fere odorem virens habet, ſed quum aruerit fra-
grantiſſimum, quod neque Theophrasto præter-
miſſum. Lib. 6. de cauſis plantar. Sertula (in-
quit) campana ſiccata plenius olet. Maran-
tha.

Trifolium caballinum Camer. & Italis dici-
tur, quia equi herbam hanc avidiſſime in pa-
bulum ſequuntur, apud nos etiam in Anglia ſu-
binde ſeritur pro equorum & jumentorum pabu-
lo. *Rajus.*

MELIS, *vid. Taxus.*

MELISSA.

Meliſſa. Dicitur hæc herba quia odore ejus apes
delectantur in tantum, ut ſi ſucco ejus alvearia linan-
tur nunquam diffugiant.

Folijs atrovirentibus calaminthæ majoribus
odore citri, floribus in udo pediculo è cujuſ-
que folij ſinu egreſſo pluribus confertis, non
ut in calamintha ſparſis, à reliquis hujus familiæ
diſtinguitur.

Vires, Meliſſa inter herbas cordiales recente-
tur; hinc melancholicis tantum non appropriata
eſt; triſtitiâ depellit, ſomnia præcreat læta,
ſenſusque acuit; hinc in ſyncope & palpitatione
Cordis magnas habet laudes apud Foreſtum &
alios; commendatur à Rondeletio in paralyſi, mor-
bo caduco vertigine aliſque cerebri frigidis affe-
ctibus cum vino cocta, aut macerata & bibita: à
Gratarolo in confortanda memoria, & ingenio
acuendo quocunque modo comedatur; in remo-
ratis menſibus & lochijs puerperarum, ſuffocatio-
neque uteri & flatibus magni uſus eſt, emendat in-
ſuper fœtorem anhelitus.

Mulierculæ in gallia turiones teneros tuſos ovīs,
ſaccharo & roſaceo excipiunt, placentalque pin-
ſunt parturientibus puerperis & emixis quibus vi-
res impediendo dejectæ fuerint & ſecundæ non pro-
bè educæ.

Extrinſecus uſus eſt in uterinis balneis, cata-
plaſmatis &c. iſtibus venenatis apum, veſpa-
rum &c.

Pro officinis monente C. Hofmanno, colligen-
da eſt tempore verno, & extra florem ad quem ubi
pervenit jam cimices olet.

Ad maniam, R. fol. meliſſæ m. j minutim incidan-
tur & infundanur in ſp. vini ℥iv. add. margarit.
p p. 36. Doſis cochl. ij. erat arcanum familiæ
cujusdam Monſpelienſis. Riverius.

Si formulam Medicamenti melancholiam re-
frænantis experatis (inquit Simon Paullus)
hanc accipite. R. Conſerv. Meliſſæ ℥j. borraginis,
bugloſſæ ana ℥6. Confectionis Alkermes ℥j. cum
ſyr.

MELONES.

syr. quinque aperientium, cuius jugi usu præmissis universalibus recorder à pertinaci Melancholia Virginem Sanitati pristinæ restitutam, quæ insuper chlorosi laboraret.

Nostrates Mulierculæ Mellissæ decocto menses sibi concitant & proritant. Novi unam & alteram quæ satis feliciter sibi menses proluciant Mellissâ recenti tibialibus vel sandalijs solum inditâ. Simon Paulus.

Multi cordis tremore laborantes, jam derelicti à medicis curati sunt sola Aquâ Mellissæ cum manu Christi m. ad consistentiam satis crassam, tempore paroxysmi largius adhibitâ.

Quam etiam in epithemate seu porius cataplasmate adhibitam, imitatione Helidei de Padoanis Medici Bononiensis & præceptoris sui miræ effecisse notavit. P. Forest. Lib. 17. Observ. 1. ex Observat. Jeremiæ Martij. D. Soame. *Rajus*.

MELISSA SARACENICA, vid. *Molucca*.

MELISSA TURCICA, seu MOLDAVICA.

Nomina. Melissa Turcica *Gerardi*. Turcica multis dicta *J. B.* Turcica flore cæruleo & albo *Parkins.* Peregrina folio oblongo, *C. B.*

J. B.

Odor & sapor Melissam argunt; at folia in caulibus ramosis, quadratis, subrubentibus, cubitum & sesquicubitum altis, quam Melissæ vulgaris longiora & angustiora *J. B.* Sescunciam (imò duas uncias) longa, vix semunciam lata (imò inferiora in planta vegeta uncia latiora) Lobelius Chamædryis & scordij folijs ea comparat, per ambitum serrata, in acutum desinentia. Flores verticillatim geniculis circumnascuntur, cærulei vel albi, labello bifido, bifidoque cucullo brevior, binisque alis exiguis constant, ex spinosis radiatis caliculis exeuntes. Semen nigrum, apicello albo, dum adhuc recens est conspicuo, insigni.

Hæc planta ex *Moldavia* ad nos primum delata est, ubi sponte per se provenit. Observante Parkinsono, semine lata cærulea albavæ, colorem non mutat; sed quæ flore est cæruleo producit perpetuo plantas flore cæruleo; quæ flore albo, plantas flore albo; quod se per viginti minimum annos in horto suo expertum affirmat: ideoque has duas varietates specie distinctas esse contendit, nec præter rationem. *Rajus*.

Stomachum, cerebrum, cor & uterum corroborat; venenis & animalium venenosorum moribus resistit.

Æ Folijs hujus plantæ conficitur Essentia mirandam in omnibus præhominatarum partium affectibus virtutum; propterea autem minutim conscissa in vas vitreum immittuntur, super affundendo vini albi optimi, q. s. ut duos emineat digitos: vas obturatum reponitur ad solem ut ejus calore materiæ contentæ coquantur per aliquot dies, unde postea educuntur & colantur cum forti præli expressione. Expressio nova folia adjunguntur, materiaque ad solem cocta reexprimitur, eundem laborem ter repetendo. Tandem vinum hoc probè filtratum destilletur organis vitreis in MB. donec in filtrato remaneat essentia ad consistentiam melleam redacta, quæ in vitro conservetur. Est autem Medicamentum insigne in affectibus prædictis ut & ipsâ peste ac pestifero contagio si ad 3i. in jusculo pulli, vel aquâ cordiali exhibeatur. *Felix PAS-SERA in Thesaurò novo Italico arcanorum pharmaceuticorum*.

Hoc genus (inquit *C. Bauhinus*) Palladius Melones quasi *μήλωνες*, i. e. pomeos à malorum figurâ appellavit, vel forte ab odore. Semine albo, angusto, oblongo nuclei pinei æmulo cum cucumere convenit; fructu majore non spinoso, Moschum redolente, carne delicata ab eodem differt.

Vines, Melones quamvis in delicijs habentur apud gulæ proceres, eorum tamen pulpa frigida est & humida, in ventriculo putrescere aptâ, febribus ac torminibus generandis idonea, ego facile Dodonæo concesserim Melones difficilior concoqui quam cucumeres, quantumvis *J. Bauhino* contrarium videatur, ob carnem odoratam; quodque ipse qui ventriculo laboravit frigido & pituitam coacervante, non semel observaverit, cucumeres sibi facile nocere, ventriculo difficulter eos concoquente, ructu diu post esum eosdem respiciente; cum Melones semper sine manifesta commederit noxa, at nos è contra nullum unquam ex esu cucumerum nocumentum sensimus, at ex Melonum maximum non semel, quocirca hæc fortasse idiosyncrasia tribuenda sunt. Ne Melonum caro in ventriculo vitietur & noxam inferat, cum sale & pipere comedenda est (alii saccharo solo utuntur,) & vinum copiose superbibendum.

Semen est è numero quatuor frigid. maj. cum quibus viribus in omnibus convenit. Lac melonum præstantissimum in febribus ardentibus remedium censetur. Seminum autem medullam aquâ fontanâ aut alio aliquo liquore congruo prius contusam per cribum setaceum emulgent angustissimum, aut patinum adinstitutum accommodatum, seminis hic cremor febrientibus utiliter, teste Matthiolo, ex hordeacea prisana propinatur, datur etiam tussientibus, tabidis & marasmo affectis, atque etiam contra urinæ ardores valde prodest, *Rajus*.

MENSES PROVOCANTIA, vid. *Emmenagoga*.

MENSES SISTENTIA.

1. *Menses sistentia sunt, quæ ὀργασμὸν sive turgescen-tiam tollunt sanguinis & feri, sive menstruam, sive aliam extraordinariam quoque.* Non minus scilicet frequenter in praxi occurrit menses immodicum profusum, quam suppressio mensium. Licet enim in feminis, quod instar regulæ valet, minus timenda sit sanguinis etiam largior profusio, quod, ob sanguinis serosiores statum, illam præ maribus ferre magis innoxie possint; attamen id non negligendum, tum propter symptomata, lipothymias præsertim urgentes sæpiissime, tum in futurum propter inde exorituros morbos, nisi præcaveantur.

Præstant ergo id generatim & propriè talia, quæ motum sanguinis refrænant, acrimoniam & impetum exundantem coercerent, tenuitatem, fluxilitatem & turgescen-tiam tollunt, adeoque figunt & congelant. Uno verbo adstringentia, superius jam abunde exposita.

Cum verò ὀργασμὸς hic supponat quantitatem ac respectivam copiam, sive in se & effectivè talem, sive affectivè quoad qualitatem, unde expansus & rarefactus alveis & poris suis exundat, nec è vijs communibus in proprijs recipi potest, notandum est in genere, ipsa hæc adstringentia magis deberi posteriori casui, minus priori, unde observavimus in praxi, ad immodicum mensium fluxum pro ὀργασμῷ illo, sine quo nunquam fiunt, nimio tollendo opus esse depletione quantitatis onerosæ. Depletionem verò optimè præstare venæ sectionem in brachio, non in pedibus, quæ & divinum est tunc remedium, & nisi ad-

minij;

ministraretur hac ipsa, tantum abest, ut adstringentia sola profint, ut potius non raro majorem fluxum cieant, quatenus constringendo vasa vias minores reddunt, impetum verò quantitati debitum retundere nesciunt. Ut non possunt menses promoveri nisi presente quantitate sanguinis sufficiente; ita non fi-
sti nisi absente; quod cuivis experienti liquidum erit.

2. *Menses sistunt, quæ sal volatile & sulphur sanguinis intensius rarefacta & expansa, quantum licet, deprimunt & serum concentrant.* Faciunt id acida, austera, & ni. rosa quoque, habito saltem ad uteri fibras respectu, præcipue in nitrosis, nam fluxilem reddunt magis sanguinem. Sic usurpavimus cum successum Tinct. vis adstringentem vel solam, vel cum Tinct. corall. remixtam, interpolatam cum pulvere styptico anodyno, quæ duo vel sola suffecerant ut plurimum. Sic infusa quoque locum habent ex concentrantibus similibus, quales describit *Rolfsinius in ord. & med. somment.* Sic & Tinct. antiphthifica ad 15. 20. grt. data adstringit menses. Hæc enim & dictam exequuntur intentionem, & serum concentrant, quod in omnibus sanguinis floribus necessarium est. Interim tamen exterius vires refocillandæ sunt ipsis excitantibus, ut balsamo hysterico, & u. salis ammoniaci, aquâ apopl. amar. acidâ & spirituosa cum castoreo, pennis perdicum accensis &c. si lipothymia, ut sit graviori casu, ingruant.

Contra ea vitanda sunt strenuè, quæcunque sal volatile & sulphur sanguinis adaugere vel rarefacere magis possunt, ut vinum, aromata, adeoque tenuium partium, motus ipse, quæ frequentissimè & excitant & propagnant affectum. Addi prioribus etiam possunt portiones diluentes & temperantes, qualis est *Sylviana* ad omnes hæmorrhagias communis, ex aquâ v. g. centin. burs. past. torment. plantag. cum corall. præparat. lap. hæmat. sang. drac. laud. opiat. & sirup. myrtin. subinde cochlear unum vel alterum dando.

3. *Menses sistunt quæ & sanguinem concentrant, & archeum, tonum & villos uteri roborant placantque.* Certum est & menses immodicos fieri non solum sanguinis, & sed & uteri culpâ, quatenus non retinet, sed plus iusto hiat, & *άνωσπρωσις* ejus naturalis plus quam par est continuatur; tum sanguinis transeuntis culpâ antecedente, tum debilitate consequente majori. Patiuntur mensium fluxum immodicum scorbuticæ & hypochondriacæ frequentissimè, quorum serum acrius est, sanguis verò minus γλῆκος & glutinosus, unde *ἀδρῆς* transit nec proprijs illis particulis viscidis aditum sibi, uti aliàs solet, præcludit.

Not. hoc loco, duplicem occurrere in praxi mensium fluxum immodicum, unum continuatum & velut ordinarium productum, ubi tempus longius & quantitas major egeritur; alterum imperuosum. Vidimus inter alias & curavimus scēminam, jamdum senescentem, quæ sæpius, plurium tamen mensium intervallo mensibus non visis, hinc simul & semel vastissimam quantitatem sanguinis profundeabat, unde totum corpus, facies, manus & pedes albissima & omni quasi sanguine exhausta, apparebant; idque iterum fiebat, quando onerabatur superfluitate regenerata corpus, saltem respectivâ.

Profunt hunc in finem, præter adstringentia, simul traumatica, unde iustar omnium est, pulvis stypticus noster. Propinari etiam potest utiliter essentia traumatica, & unguentum comitisæ ad pubem & dorsum applicatum, prodest & fragaria pubi applicata. Memoravimus etiam alibi euporiston ad menses immodicos ex centinodio. Cumque martialia insigniter sanguinem roborent, præ alijs exusu sunt. Hæc nempe singula archeum roborant, vasa nimis

hiantia, laxa, erosa, patula constringunt, glutinant & firmant. Spectant huc & balnea, roborantia & exiccantia, sed infidum præsidium, nisi præservandi sine, extra tempus fluxus, quod ferè magis valet de diutius interpolatis mensibus, quam alio casu. Solet enim ferè repetitione citiori hoc profuvium molestum esse, ita ut & singulis mensibus quasi bis revertatur, & longius sive per plures dies duret. Uti etiam fumus aliquando liquore styptico ipso, loco pessi cum linreamine adhibito.

4. *Menses sistunt sæpe non tam adstringentia, quam aperientia, licet improprie & per accidens.* Aperientia scil. in suâ latitudine, quatenus & amurcam venarum fracidam abstergunt, erodentem, ac findentem acrimoniam scorbuticam, & limo extorlo angustatum prius spatium dilatant, ut liberius in alveis decurrens sanguis non cogatur ad exundandum, exceptis aloeticis, & quæ menses propriè movent, myrrhatis, crocatis, elixir proprietatis &c. Non raro enim obstructionibus vatorum mesaraicorum sanguis ferocit magis, & exitum per loca aliàs consueta affectat. Hinc in graviori & solenniori malo utile & necessarium deprehendimus (1.) uti martialibus, in formâ sicca & humidâ, pulvere cachectico, M. S. antisc. martiali, Tinct. cydon. arcano tartari mart. li. Tinct. martis solari dictâ & alijs antiscorbuticis temperatioribus. (2.) Adhibuimus purgantia ipsa, ad serum *όργασμωδῶς* deplendum; nisi enim serum corrigatur, frustra est curatio omnis. Una causa præcipua morbi est in sero acriori; una cura præcipua, in hoc mitigando, concentrando, divertendo & evacuando. Nec timendum est, purgantibus hisce fluxum excitatum iri, modò extra tempus paroxysmi dentur, nec sint hæmagoga, colocynthiaca &c. (3.) quin & sudorifera utilissima eo casu sunt, ex antimonio martiali cachect. bezoard. Oli. Gio diaphoret. bezoard. minerali, terrâ lemn. cornu cervi philosoph. &c. Hoc nisi fiat, frustra sunt adstringentia, non ablata scilicet causâ materiali, & stimulo illo perpetuo. (4.) Nec fonticuli eo casu sunt de nihilo, exitum sero quantitate & motu cumprimis peccanti largientes.

5. *Menses sistunt, licet itidem improprie, factum roborantia in gravidis.* Instar regulæ nempe est, quandocunque in gravidis fluunt menses, excepto planè extraordinario casu singularis *ιδιόσυνηγίας* & abundantia, tunc vel scærum actu debilem esse, vel talem futurum. Eo casu ergò frustra itidem fuerit, solis adstringentibus uti, vel opius, sed ipse scærus vel roborandus est, vel tutandus, ut Tinct. & pulv. corall. medicamentis cordialibus, perlis, ebore præp. aquâ cinamom. boragin. melissæ, balsam. embryonum, præcipuè exterius quoque, ne dimittat de se alimentum debitum, & hinc fatiscat & marcescat.

Eodem casu quoque laudatissima est venæ sectio, quæ hinc in medijs mensibus, imò etiam ultimo quandoque locum habet, licet quoad repetitionem illam cauto opus sit. Servavimus hoc pacto spem uteri integram non semel. Mensis octavi initio scēmina primaria mensium eruptionem sentiebat, cum metu abortus. Factâ venæsectione, & interius propinatis roborantibus temperatis & stypticis, scærus restitit quatuor integras hebdomadas, salvus hinc editus & incolumis. Aliâ vomitu cruento laborans ultimo mense, factâ V. S. in brachio, brevi post felicissimè enitebatur infantem, adhucdum in vivis existentem.

6. *Fluori albo primariò abstergentia & roborantia (lympham,) secundariò astringentia conveniunt.*
Obi-

Obiter nempe & de illo dicere volumus, ne vel menses decolores, albive cum flore albo, siquidem omnino differunt, & antecedendo, consequendo, concomitando menses, quod variat, manifestò ostendit, non in mensibus sed alibi quærendam esse fontinam hanc, nempe in glandulis, in lymphâ uteri ichorecente. Optimè profunt hinc succinata sive pulveris formâ, cum ebore præp. lapid. cancrorum, corall. castor. sive essentiæ cum bezoardicis, essentiâ lignorum, anodynâ &c. Curavimus aliquando fluorem hunc solo magisterio oculorum cancrorum, cum oleo anisi, item elixir uterini aliquibus dosibus. Eodem spectat rosmarinus & similia, seri vigori restituendo debita. *Wedelius.*

MENSTRUUM, vid *Instrumenta Pharmaceutica Interna, ubi in specie de Menstruis* sub titulo INSTRUMENTA PHARMACEUTICA.

Hic tantum Menstruum *Boylei* non corrosivum.

7. Panis fecalini domestici q. l. conscinde testellatum, & parum arefacto replè retortam, & ex arena gradatim destilla. Post destillationem separa oleum à liquore, & liquorem serva; extrahit tincturam corallorum absque calore; & perficit quod ab acerrimis & maximè corrosivis menstruis vix expectandum.

MENSURA.

De *Mensuris & Ponderibus* Medicis cum vix alius æque accuratè scripserit ac vetus *Massarius* cujus tractatum hoc in Argumento jam anno 1584. innumeris mendis repurgatum Conradus Generus vulgavit. Illum integrum hic exhibemus in curiosi Lectoris majus commodum, cui omnino necessaria est variarum mensurarum & ponderum antiquorum cognitio, ut cum fructu legere possit Medicos Auctores. Sit itaque.

Domici MASSARII Vincentini de Ponderibus & Mensuris Medicinalibus Tractatus libris tri-comprehensus, ex Græcis, Arabicis & Latinis vel Medica Scripioribus diligentissime conscriptus, non Medicis modo, sed omnibus Literarum Linguarumque studiosis perutilis futurus &c.

Liber Primus, qui Pondera & mensuras ordine Alphabetico breviter explicat.

Aben est mensura, quæ observatione communi, habet olei quidem uncias viginti: vini vel aquæ duas & viginti cum Sicilico paulò minus: mellis triginta. Observatione vero Attica olei uncias sexdecim, cum duabus tertijs: vini vel aquæ decem & octo, paulo minus obolo scilicet: mellis autem quinque & viginti. Vide tractat. 3. cap. 44. *Kist* Romanum aliàs.

Acetabulum mensura est Drachmarum decem & octo observatione communi: secundum Atticos, quindecim tantum. Olei autem mensuram exprimimus solam, quoniam si vel vinum vel aquam, aut mel metiri voluerimus, major erit secundum proportionem superius dictam in *Aben*, & in tractatu tertio latius explicandam. Vide in *Kassuf* & *Oxybaphum*. Tract. 3. cap. 20. & 22. Et obiter lib. 3. cap. 2.

Acfati, vel *Acfat* idem quod *ἄξας* Græcè, aut *Sextarius* Italicus Latine, & est mensura Corylarum duarum, pondere uncias decem & octo capiens olei: vini vel aquæ viginti: mellis septem & viginti: observatione communi: quoniam apud Atticos subsesqui quinta proportione minor est. Hanc Arabes etiam

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

Kist Italicum vocant. Vide in *Sextario* tract. 3. cap. 10. Et obiter lib. 3. cap. 2.

Acfeit idem quod *Acfati*, lib. 3. cap. 10.

Acfunessum (vel *Acfunessi*) idem quop *Acetabulum* vel *Oxybaphum*: interdum *Acfuffi* (vel *Acfasse*) legitur, & est mensura apud communes Drachmas decem & octo pondera capiens olei: vini vel aquæ viginti: mellis septem & viginti. Apud Atticos vero olei quidem quindecim tantum: vini vel aquæ sexdecim, cum duobus Scrupulis: mellis duas & viginti semis. Vide tract. 3. cap. 20. & 21. & 22. in verbis *Oxybaphum* & *Anesimen*. Et obiter *Acfasse* l. 3. c. 2.

Adar uncia dicitur. tract. 2. cap. 59.

Alcaubolus, aureus est pendens octo obolos: scrupulos scilicet quatuor communes. Apud Nicolaum vero pendet scrupulos scilicet quatuor semis: obolos autem septem semis. A communibus enim operibus (ponderibus) Nicolai pondera plurimum differunt, ut tractatu secundo planè docebimus. Vide tract. 2. cap. 53.

Alchi Arabicè, idem quod *ὀλχη* Græcè, Latine *Holca* vel *Drachma*, vide tract. 2. cap. 44. 45. 56.

Alchilati (alias *Alkilat*) est *Kirat*, pondus granorum scilicet quatuor. tract. 2. cap. 10.

Alcovanus, aureorum duorum, seu scrupulorum octo pondus est, uncia pars tertia. Vide tract. 2. c. 56.

Alcuatus, mensura drachmarum duodecim, dicta Latine *Cyathus*, id est, uncia & semis observatione communi. Apud Atticos vero drachmas decem tantum pondere continet. In verbo *Cyathus*, tract. 3. cap. 24.

Alduruch vel *Aldorach* (alias quoque *Duruch* & *Doiuch*) Italicum est, amphora Italica, vel *Keramion* Italicum, mensura scilicet pedis quadrati, octo & quadraginta capiens sextarios. Habet autem olei libras duas & septuaginta: vini vel aquæ octoginta: mellis, centum & octo. Vide in verbo *Amphora* tract. 3. cap. 4. *Alduruch* vero vel *Adorach* absolute, sine determinatione prolatum, capit libras tres tantum. Vide supra.

Alhemen, idem quod *Alhemion* mox.

Alhemion (alias *Alhemion* & *Alhemen*) est mina Græca, drachmas pendens centum, uncias scilicet duodecim ac semis. Tract. 2. cap. 69.

Almunesi, *Cyathus* dicitur, mensura scilicet, quæ pars est sextarii duodecima: pondere autem unciam & mediam capiens olei communi observatione: aut drachmas duodecim. Vide in *Cyathus*, tract. 3. cap. 24.

Alsacrajati magna quid, lib. 2. cap. 57.

Alsatii, ex Principe, similiter uncia. tract. 2. c. 61.

Amphora duplex, Italica & Attica. Italica mensura est duarum urnarum tantum capax: Attica, trium: quæ & *Cadus* & *Metreta* nonnunquam dicitur. tract. 3. cap. 2. 3. & 4.

Anesimen, idem quod *Oxybaphus* lib. 3. 2. & 21.

Annulus, idem quod *Obolus*, lib. 2. 18.

Arme, Alias *Harme*, scrupulus. tractat. secundo cap. 25.

Artaba mensura Ægyptia, capiens modios tres Italicos, & modij partem tertiam. tract. tertio cap. 48.

Assabafa idem quod *Nux*: & est duplex magna & parva. Magna quatuor decim capit obolos apud Arabes: apud ignotum vero Græcum, semiunciam. Parva, septem aut sex. In verbo *Sextarius* Arabicus, tract. 2. cap. 57.

Assatis, uncia. tract. 2. cap. 60.

Atogochilos, drachma est. tract. 2. c. 43 & 67.

Avellana drachmam significat. tract. secundo cap. 2. 48. & 49.

Auguen, uncia est. tract. 2. cap. 59.

Aureus multiplex est : Communis, Nicolai, Venetus, Atticus. Est unciae pars sexta. tract. 2. c. 51. & c. 46. & cap. 1.

Autulus, idem quod Kiret, & pendet hordei grana quatuor. Tract. 2. cap. 1. & 9.

Bachates parva, Mystrum parvum commune, est mensura scilicet drachmas capiens sex pondere : sed secundum Atticos quinque tantum. Tract. tertio. cap. 29.

Bachile (id est, Faba) idem quod Balanus. Tract. secundo. cap. 35.

Bachileon, idem. Ibid. cap. 33.

Balanus, est drachmae medietas : idem quod Cochlear minimum. Tract. 2. cap. 32.

Bessis vel Bisse & Bes, & unciae octo. Vide in verbo Librae partitiones, Tract. 2. cap. 64.

Bissiliqua, duplicata filiqua, pondus est granorum octo hordei. Nam filiqua granorum quatuor pondus est. Quare bissiliqua, idem est quod Danich. Tract. 2. cap. 1. & 15.

Bondacate, mensura quae Cyathus dicitur, Cotylae pars sexta. Tract. 3. cap. 26.

Cadus, est Attica Amphora, tres capiens urnas, duos vero & septuaginta sextarios scilicet Italicos. In verbo de Sextario, Tract. 3. c. 2. 4. & 10.

Calyx, Cotylae, medietas, unciae scilicet quatuor semis Tract. 3. cap. 15. & 18.

Canos (alibi Conos) Cyathus est. Tract. tertio. cap. 32.

Cassitium (alias Cassitium) vel capitium, mensura Cyprica, Cotyla vel hemina, quod idem est, sextariis scilicet medietas. Apud aliquos videtur libra. Tract. 3. cap. 23.

Cerates, semiobolus est, id est, grana sex, verius tamen idem quod filiqua grana scilicet quatuor, ut scripsit Simon. Tract. 2. cap. 13.

Ceratium, id est, filiqua, pondus est granorum quatuor. Tract. 2. cap. 12.

Chalcus (Arabibus, Kestus, & Kestuf, Tussus vel Tussugi) est Keratij vel filiquae medietas, quod idem est, grana scilicet duo tantum pendens. Tract. 2. cap. 1. & 6. & 7.

Chaus, lib. 3. cap. 2.

Cheme, vel χημη, Chema vel Chima, observatione communi est Mystrum parvum commune, drachmas scilicet sex pondere capiens. Apud Atticos autem drachmas duas semis tantum. Tract. 3. cap. 28. in verbo Mystrum commune parvum.

Chemerafis (id est, Faba) Alexandrina, drachma media. tract. 2. cap. 1. & 30.

Chinica, idem quod Chœnix ex Dioscoride. Tract. 3. cap. 13.

Choa Graece, Latine Congius vel Chus, mensura sextariorum Italicoꝝ sex, pondere libras habet novem. Tract. 3. cap. 2. & 6. in Chus.

Chœnix ex Dioscoride, Cotyle tres : ex ignoto Graeco & Prisciano Cotylae octo, sextarij scilicet quatuor Italici. Tract. 3. cap. 12. & 6.

Chous vel χοῦς Graecè, mensura quae amphorae Italicae pars est octava, sex continens sextarios Italicos. In verbo Chus vel Congius. Tract. tertio. cap. 2. & 6.

Cianes, mensura obolorum quinque vel sex. Observatione communi drachmam pondere continet : apud Atticos obolos quinque tantum. Tract. 3. cap. 34.

Coanustum, mensura Cyathorum duorum, pars tertia Cotylae, quae & pugillus dicitur, pondere capiens uncias tres : estque idem quod & Mystrum magnum commune. tract. 3. cap. 27.

Coatus, Cyathus. In verbo Cyathus, Tract. 3. c. 24.

Cochlear multiplex : magnum, maximum, parvum, minimum. Cochlear magnum mensura est Mystri communis parvi, pars quarta pondere, drachmas semis capiens vel duas. Tract. 3. cap. 38. & cap. 2.

Cochlear maximum, cyathi communis pars tertia pondere, semiunciam capiens, drachmas scilicet quatuor. Tract. 3. cap. 39. & c. 2.

Cochlear parvum (quod aliquando Flagerim) mensura, quae Mystri communis parvi pars est sexta, drachmam capiens pondere. Tract. 3. cap. 2. 37. & 40.

Cochlear minimum (aliquando Fahaliel) quod est mensura minima, duodecima pars est Mystri parvi communis, semidrachmam pondere capiens. Tract. 3. c. 2. 36. & 41.

Colananos, cochlear. tract. 3. cap. 42.

Conchula, drachmam & mediam pondere capiens, est mensura. Tract. 3. c. 2. in verbo de Cochleari minimo omnium mensurarum prima.

Congius, mensura sextariorum sex, heminae scilicet duodecim. Tract. tertio. cap. 2. & 6. in verbo Chus.

Conos, id est, Cyathus. Tract. 3. cap. 24. & 32. & Tract. 2. cap. 19.

Corboni vel Corbonus, mensura dicta Cotyla. tract. 3. cap. 2. & 11, in Cotyla.

Cotyla (vel Cotillum,) mensura unciarum novem, id est, cyathorum sex, observatione communi : & est medietas sextarij. tract. 3. cap. 2. 1. & 24.

Cuabium (alias Cuabus) similiter Cyathus. tract. 3. cap. 25.

Culeus mensurarum maxima, amphoras Italicas viginti continet. tract. 3. cap. 2. & 3.

Cumulus, vel Anulus, obolus. tract. 2. c. 18.

Cyathus, Cotylae pars est sexta. Habet autem pondere drachmas duodecim apud communes : apud Atticos vero decem tantum. tract. 3. cap. 24. & 26.

Daguanich, idem quod Danich. tract. 2. c. 14.

Danich granorum est octo pondus : drachmae communis pars nona, quae & Bissiliqua dicitur. tract. 2. cap. 1. 6. & 16.

Darchimi Arabicè, Graecè (δερχμή) Latine drachma. tract. 2. cap. 1. 23. & 46.

Darchimia, vel Darchimer, idem & ibidem. tract. 2. cap. 45.

Denarius aureus, hexagium vel stagium : tract. 2. 42. in verbo Numus aureus.

Denarius argenteus drachma sive numus. tract. 2. cap. 41. de aureo, lege tract. 2. cap. 1. & 42.

Deunx unciae undecimae. tract. 2. cap. 64. in verbo Librae partitiones.

Decunx, & *Deunx*. 2. cap. 64. in verbo Librae partitiones.

Dichalcon granorum quatuor pondus est, duos capiens Chalcos : idem quod Kirat, vel Keratium. (Kerarit, Autulus, filiqua.) tract. 2. cap. 1. & 6. in verbo Chalcus.

Dodrans, unciae novem. tract. 2. cap. 64. in verbo, ut supra Librae partitiones.

Dorach Italicum, vel Duruch, amphora est Italica. Vide supra Aldorach vel Aldurach, & infra, tract. 3. cap. 4. in Amphora.

Dorach. Arabum, sextarij duo, l. 3. cap. 2.

Drachma multiplex, communis, Attica, Veneta, & Nicolai, ut sequetur.

Drachma communis, unciae communis pars octava, duo & septuaginta capiens grana, scrupulos tres, obolos sex. tract. 2. c. 37.

Dra-

Drachma Nicolai, unciz suæ pars nona, scrupulos ejusdem tres, obolos quinque tantum capit, grana sexaginta. Tract. 2. cap. 1. & 38.

Drachma Veneta, unciz pars octava, obolos similiter quinque, & grana sexaginta capit. Tract. 2. cap. 1. & 38.

Drachma Celsi major, duo & octoginta grana capit, dualque grani septimas. Tract. 2. cap. primo. & 1. & 39.

Drachma Attica sex & quinquaginta grana cum duabus octavis capit, obolos vero quatuor, cum duobus tertijs oboli, paulò plus quam duas octavas grani. Tract. 2. cap. 1. & 40.

Duella, unciz pars tertia, scrupuli scilicet octo, vel aurei duo communes, grana centum duo & nonaginta. Tract. 2. cap. 1. & 54. 55.

Duruch, lib. 3. cap. 2. & 4.

Eberie idem quod *Enib*. Tract. 3. cap. 46.

Ejub (sunt qui *Enib* legant) mensura est Kist Romanum vocitata, olei quidem uncias viginti capiens: vini vel aquæ, duas & viginti cum Sicilico paulò minus: mellistriginta. Tra. 3. cap. 44. 45.

Ecsunessi, lib. 2. cap. 22.

Emina, Vide *Hemina*.

Exagium (vel potius *Aureus*) scrupulos pendet quatuor. Tract. 2. cap. 42. in verbo *Numus aureus*, & cap. 51. in verbo *Aureus*.

Faba, pondus de quo leges tract. 2. cap. 35.

Faba Syra (Cyriaca) oboli quatuor, scrupuli scilicet communes duo: aut grana octo & quadraginta. Tract. 2. cap. 31. & 36.

Faba Græca, oboli duo, scrupulus scilicet communis, hoc est, grana quatuor & viginti. Tract. 2. cap. 1. & 27.

Faba Alexandrina, drachma media communis, hoc est, grana sex & triginta, aut oboli tres. Tract. 2. cap. 1. & 29. Itemque cap. 30. ubi *Kemerasi* etiam pro *Faba* accipi videtur.

Faba Ægyptia, quod *Alexandrina*. Tract. 2. cap. 1. & 31.

Paclanarium vel *Paclanarium*, cochlear parvum, id est, drachma. Tract. 3. cap. 43. in verbo *Paclanarium*.

Fabaliel, cochlear est minimum, drachma scilicet media. Tract. 3. cap. 41.

Fiala, mensura eadem quæ & *Cotyla*, uncias novem pondere continet olei: vini vel aquæ decem, mellis tredecim & semis observatione communi. Tract. 3. cap. 2. 16.

Flagerim, cochlear parvum pondere, drachmam capiens. Tract. 3. cap. 40.

Goanusus, Cyathorum duorum mensura. Tract. 3. cap. 1. 27.

Gormia Arabicè, est scrupulus communis, oboli scilicet duo grana quatuor & viginti. Tract. 2. cap. 1. & 23. (Nomen à Græco *Gramma* videtur corruptum.)

Gramma Græcè, idem quod *Gormia*. Tract. secundo cap. 1. & 24.

Granum ex ponderibus minimum, lib. 2. cap. 1.

Guanchia, scrupulus. Tract. 2. cap. 21.

Harme (alias *Arme*) scrupulus, nomen à Græco *gramma*, ut videtur corruptum. Tract. 2. c. 21.

Hæfunesi Avicennæ idem quod scrupulus lib. 2. cap. 22.

Hemina nomen est ponderis & mensuræ libro 2. cap. primo.

Hemira, *Cotyla* est, sextarij scilicet medietas pondere: unciz novem olei: vini vel aquæ decem, mellis tredecim & semis. Tract. 3. c. 2. 10. 11. 14.

Hemion, Lege *Alhemion*.

Helagium, Vide *Exagium*.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II,

Holca, à Græcis dicitur, quæ & drachma (idem). Tract. 12. c. 44. & 81.

Johem Arabicè, Congius est, mensura scilicet sextariorum sex libras novem capiens. Tract. 3. c. 6. in verbo *Chus*.

Kararit apud Arabes, pondus est granorum quatuor: idem quod *Kirat*, *Siliqui* aut *Dichalchum*. Tract. 2. c. 1. & 8.

Kasfuf (alias *Kassuf*) *Oxybaphus*, *Acetabulum* idem, *Cotula* pars quarta pondere, drachmæ decem & octo: aliquando *Kissuf* legitur. Tract. 3. cap. 22.

Kasfitium vel *Kassitium*, mensura quæ *Cotyla* videtur. Tract. 3. c. 23.

Kejellari, *Cotylæ* medietas, unciz scilicet quatuor & semis. Tract. 3. c. 15.

Kemerasis Alexandrina, idem quod *Faba Alexandrina*, lib. 2. c. 30.

Keramion Italicum apud Græcos, est *Amphora* Italica, octo & quadraginta capiens sextarios. Tract. 3. cap. 4. in verbo *Amphora Italica*, & lib. eodem cap. 2. 3.

Keratium, idem quod *Kirat*, aut *Dicalchoin*. Tract. 2. c. 1. 6. & 14.

Kermet, scrupulus est communis. Tract. 2. cap. 26. Nomen à Græco *gramma* corruptum videtur.

Kestuf, (alias *Kestus* ut cap. 1. lib. 2.) *Chalestus* est, granorum scilicet duorum pondus. Tract. 2. c. 6. & 7. in *Chalcus*.

Kilat, Lege, *Alkilat*.

Kirat pondus granorum quatuor. Tract. 2. cap. 8. post verbum *Dichalcos*, & alibi, ut lib. secundo cap. 1. 9. 10. 11.

Kist Italicum, mensura dicta *Sextarius* Italicus vel *Xestes* Græcè, *Cotylas* duas continens. Vide Tract. 3. cap. 2. & 8. in *Sextarius* Italicus: & De *Sextario* licet. Item capitibus 44. & 46. in vocabulo *Aben* & *Eberio*.

Kist Romanum uncias viginti capit olei. Vide ubi supra.

Kist Atticum, mensura quæ olei quidem capit uncias quindecim: vini vel aquæ sexdecim cum duabus tertijs: mellis autem duas & viginti semis. Tract. 3. cap. 9.

Kistuf, id est *Chalcus*. Tract. 2. c. 6. & 7.

Libra multiplex. Communis, Attica, Nicolai; Veneta, quarum distinctionem vide Tract. 2. de *Libra* agnosces, Tract. 2. cap. 1. & 62. Plura item de *Libra* leges capitibus 63. 64. 65. ejusdem tractatus. *Libra* communis & *Celsi* conveniunt, lib. 2. cap. 2. *Libra* vero Nicolai & Venetorum differunt ibidem.

Lupinus, drachmæ est medietas. Tract. 2. cap. primo. & 34.

Manes, vel *Manei*, vel *Manij*, mina. tract. 2. cap. 68. (Vocabula corrupta sunt à *Mina* Græco.)

Medimnus est mensura duas Italicas continens amphoras medias, scilicet sex, hoc est, sex & nonaginta sextarios. Tract. 3. c. 47.

Mena, mina, ubi supra. Tract. 2. cap. 68. & lib. 3. cap. 11.

Mestrum idem quod *Mystrum*, liber. tertio cap. 17. & 2.

Metreia duorum & septuaginta sextariorum mensura: idem quod *Cadus* & Attica amphora, tres capit urnas. Tract. 3. cap. 4. & 10. in *Sextario* licet.

Mina Attica, drachmas quinque & septuaginta, quæ & libra Attica dicitur, ubi supra. l. 2. c. 66.

Mina Italica, vel Ægyptia, libram cum triente, id est uncias sedecim, ibid.

Mina Romana, est unciam viginti. Ibid. in verbo, *Mina* multiplex.

Missobaios, est Congij medietas, pondere, libræ quatuor semis. Tract. 3. c. 7.

Mna, *μνα* Græcè, quam nostri minam vocant, communis scilicet drachmas centum pendet. Tract. 2. c. 67.

Modius, Vide Tract. 3. c. 49.

Muchitrum, idem quod mystrum, l. 3. c. 2. & 17.

Munefi, Lege Almunefi.

Mystrum magnum commune mensura est, sextarij pars sexta, Cotylæ tertia. Caput autem pondere olei uncias tres: vini vel aquæ uncias tres, & scrupulos octo: mellis uncias quatuor semis. Tract. 2. c. 23. & Tract. 3. c. 17.

Mystrum magnum Atticum, scrupuli decem, oboli viginti. Tract. 3. c. 30. De Mystro Attico rursus, Tract. 3. c. 33.

Mystrum parvum commune, est Cyathi medietas, pondere vero drachmas habet sex. Tract. c. 23. & tract. 3. c. 28.

Mystrum Atticum parvum, oboli quindecim. Tract. 3. c. 31.

Nabach, Drachma est, aut drachmam pendet. Tract. 2. c. 48.

Numus aureus, Exagium, vel aureus absolute. Tract. 2. c. 42.

Numus argenteus, drachma est Tract. 2. c. 41.

Nux parva, drachmam pendet secundum aliquos: aut drachmam & sextam, id est obolos septem, ut scripsit Serapio & Princeps. Tract. 3. c. 35. in verbo *Nux*.

Nux Magna apud ignotum Græcum semuncia est, cochlear maximum scilicet verum: apud Arabes scrupuli septem aut seminet quatuordecim, quod idem est, ut scripsit Serapio & Princeps. Tract. 3. c. 35. in verbo *Nux*.

Nux Pontifica pensitat Keratia decem & octo. Drachmam scilicet unam communem, aut cochlear parvum, quod idem est. Ibid.

Nux Regalis aureos tres, aut drachmas quatuor communes: semi unciam scilicet pendet, vel cochlear maximum. Ibid.

Obolus, drachmæ communis pars est sexta, scrupuli medietas, granâ scilicet duodecim. Tract. 2. c. 6. 19. 51. 16. Semiobolus granorum sex est. Tract. 2. c. 1. & 13.

Olca (vel potius *Holca*, *ὀλκα*) drachma, Tract. 2. c. 1. 44.

Olinat videtur drachma. Tract. 2. c. 47.

Ominus, est corruptum à *Mina* vocabulum. *Mina*. Tract. 2. c. 43. & 67.

Onolofat, vel *Onoloffich*, id est, Obolus. Tract. 2. c. 1. & 19.

Onolos, Obolus. Tract. 2. c. 1. & 19. in verbo *Onolofat*.

Orobis Grana quatuor, & est Siliqua, aut jurat, quod idem est. Tract. 2. cap. 11. post *Siliqua*.

Ofinachi in secretis Galeni exponitur uncia tres: & est Alystrum magnum commune.

Oxybaphum observatione Attica, est mensura, pars quarta scilicet Cotylæ, vel sesquicyathus: habet autem pondere drachmas quindecim: sed observatione communi drachmas habet decem & octo. Tract. 2. cap. 22. & Tract. 5. cap. 2. 20. 21. 22.

Paclanarium, cochlear est parvum, pondere capiens drachma. Tract. 3. 43.

Paroxis, pondus sex granorum, Tract. 2. cap. 1.

Pugillus, Mensura est, quæ & Mystrum commune magnum. Tract. 3. c. 19. [mensura Cyathorum duorum. Tract. 3. c. 27. Vel Cotylæ tres. Tract. 3. c. 19.]

Quadrans ad libram relatus, est Unciæ tres. Ad unciam, scilicet, id est, drachmæ duæ. Ad Drachmam, grana decem & octo. Ad Aureum scrupulus. Tract. 2. c. 61. & 46. in verbo Libræ partitiones. [Vide etiam in eodem tract. c. 1.]

Quadrantal, Amphora Italica. Tract. 3. c. 4. in verbo Amphora Italica.

Quincuns, Unciæ quinque. Tract. 2. c. 2. & 61.

Rejelati, videtur mensura Cotylæ mediæ, Tract. 3. c. 15.

Rotulus, Libra est. Tract. 2. c. 65.

Sachrajati est, Unciæ tres & octava: drachmæ scilicet quinque & viginti, Tract. 2. c. 57. in verbo Sextarius Arabicus.

Sacros, Unciam significat. Tract. 2. c. 58.

Satil, Vide Alfatil.

Scrupulus multiplex est, communis scilicet, Atticus, Venetus, & Nicolai, quorum differentiam, tractatu secundo, de initio & ortu ponderum, & capitulo proptio tactam reperies. Tract. 2. c. 21.

Scrupulus & obolus differunt, l. 2. c. 6.

Scrupulus variat in numero granorum. lib. 2. cap. 1.

Sequinem, id est, obolus, Tract. 2. c. 17.

Selibra, libri medietas, uncia scilicet sex. Tract. 2. c. 64. in verbo Libræ partitiones.

Semidrachma l. 2. c. 1.

Semisextula, & semisecla. Aurei medietas.

Seminen, Obolus. Tract. 2. c. 1. & 17. & 57.

Seminet, idem. Tract. 2. c. iisdem.

Semiobolus, l. 2. c. 1. & 13.

Septunæ, l. 2. c. 64.

Semissis l. 2. c. 1.

Semuncia, est uncia medietas. Tract. 2. c. 1. & 64. in verbo Libræ partitiones.

Secla, idem quod aureus communis l. 2. c. 51. 52.

Sexcunx, vel *Sexcuncia*, Uncia est semis. Tract. 2. cap. 63.

Sextarius apud Arabes, idem quod apud nostros Stater, Unciæ scilicet medietas. Tract. 2. c. 57. & l. 3. c. 2. & 10.

Sextarius Italicus, mensura est Cotylarum duarum capax: pondere vero unciam decem & octo olei: vini vel aquæ viginti: mellis septem & viginti. Apud Orbasium tamen, ut refert Paulus, olei quidem uncias quinque continet: vini vel aquæ duas & viginti paulo plus: mellis vero triginta capit. Tract. 3. cap. 8. & in verbo Chus. Tract. 3. c. 6. Sextarius Atticus l. 3. c. 9.

Sextans ad Libram relatum, duarum unciam pondus est: ad unciam, aureus: ad aureum, grana sexdecim: ad drachmam, obolus. Tract. 2. c. 1. 63. in verbo Libræ partitiones.

Sextinus, idem quod sextula, l. 2. c. 52.

Sextula, Vide Tract. 2. c. 1. 51. & 52.

Sextunx, Obolus: quoniam drachmæ pars est sexta: Et de aureo quandoque legitur, quoniam sexies multiplicatus, unciam reddit. Tract. 2. 51. in verbo *Sextula*.

Sicilicus, vel Siciliquus, uncia pars quarta, drachmæ duæ. Tract. 2. c. 1. & 54.

Siliqua, granorum quatuor est pondus. Tract. 2. c. 1. & 11. De Bisiliqua, vide tract. 2. c. 6. & 15.

Solidus, idem quod aureus. Tract. 2. c. 51. in verbo Aureus.

Stagium, Vide tract. 2. c. 42. & 51.

Stater.

Stater. Vide in *Sextario* apud Arabes. Lib. c. cap.

64. & 57.

Sunefi Lib. 3. bap. 2.

Thermus, granorum sex pondus. Tract. 2. c. 1.

Tremissis, aurei pars est tertia, grana scilicet duo & triginta observatione communi. Apud Nicolaum vero triginta tantum. Venetijs vero sex & viginti, cum duabus tertijs Tremissem faciunt. Tract. 2. c. 1. & 28.

Trienis, pars tertia ad libram relatus, unciam quatuor pondus est ad unciam, aurei duo: ad drachmam, scrupulus erit. In verbo Libræ partitiones. [Vide etiam eodem tract. cap. primum.]

Tussuc, idem quod Tussugi. Tract. 2. c. 7. & primo.

Tussugi, Chalcus est, hordei scilicet grana duo Tract. 2. c. 7. & 1.

Trublium, vel triblion Græcè, Cotyla est. Tract. 3. c. 11. in verbo Cotyla.

Uncia, multiplex, communis, Nicolai, Veneta & Attica. Tract. 2. c. 1. & 2.

Uncia communis, est pars duodecima libræ communis, continet autem drachmas octo, aureos, sex: scrupulos, quatuor & viginti: obolos, octo & quadraginta: grana vero quingenta sex, & septuaginta Tract. 2. c. 1. & 2.

Uncia Nicolai, drachmas novem: scrupulos septem & viginti; obolos quinque & quadraginta capit: grana vero quinquaginta & quadraginta. Ibidem.

Uncia Veneta drachmas octo: obolos quadraginta: grana quadraginta octingenta. Ibid.

Uncia Attica, obolos septem & triginta semis: grana quadringenta quinquaginta.

Uncia Denarij, quo vocabulo uti videtur Celsus, sexta pars est denarij, vel drachmæ Celsi: grana scilicet tredecim, cum quinque septimis. Celsi namque Drachma grana duo & octoginta, duasque grani septimas capit similiter. Ibidem scilicet tract. 2. c. 1. & 2. 20.

Urna, Amphoræ Italicæ medietas est, pondere libras sex & triginta capit olei: vivi vel aquæ, quadraginta: mellis, quatuor & quinquaginta. Tract. 3. cap. 2. & 5. & in verbo Amphora Italica.

Xestes, Congij pars sexta: idem quod Sextarius Italicus, vel Kist Italicum. Tract. 3. c. 2. & 6. & 57. in verbo Chus & c. 10. in verbo, de Sextario licet.

His quæ hæcenus scripsimus, si fidem, Lector, fortè non adhibes, hos qui sequuntur rogamus legas tractatulos, quoniam in illis diutius immorantes, quæcunque prius nuda, summaque cum brevitate perstrinximus, tentabimus firma, adductis non adductis non paucis illustrium medicorum dictis. Divino itaque freti auxilio, à quo bona cuncta procedunt, de ponderibus primum, ac de mensuris postea, stilo prosequemur sobriore.

LIBER SECUNDUS.

De Initio & Ortu Ponderum.

CAPUT I.

Sicut apud Arithmeticos, numerorum omnium principium est unitas, non aliter apud Medicos, Ponderum omnium initium est Granum, id autem hordeum dicimus: Ut enim omnis numerus divisibilis est, ac nisi ad unitatem redigatur, divisionem semper recipit: sic pondus omne secabi-

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

le, atque ita secabile, ut ejusdem sectio non antea cesset, quam in granum tandem descenderit: Ultra enim non progreditur medicus: Adde præterea, quod quemadmodum ex pluribus simul junctis unitatibus, variæ infinitæque numerorum species procreantur, non minus ex pluribus simul aggregatis granis diversas ac siue numero penè ponderum species coacervari videmus. Ut igitur binarium numerum primum, minimumque duæ simul junctæ unitates efficiunt, non aliter Chalcum pondus primum, minimumque duo simul aggregata grana parturiunt. Sorritum est autem pondus hoc primum nomina plura, apud Græcos quidem & nostrates Chalcus: apud Arabes, Kistus (alias, Kestuf) tussuc, vel tussugi nuncupatur. Nec minus quæ sequuntur pondera varijs sunt appellata nominibus, quorum si meminerimus tædio ne afficiare lector, rogamus.

Grana quatuor, Dichalcon faciunt, alio nomine Siliquam, Keratium, Kirat, Kerarit, Autulum. Sunt autem nomina hæc nomina granorum quatuor pondus importantia.

Graha sex, Thermum, Paroxin, semiobolum, Chalcos scilicet tres faciunt.

Grana octo Bissiliquam, Dahich:

Duodecim, obolum, seminen vel seminer, onoloffat, vel onoloffich & interdum onolos.

Grana tredecim, cum quinque septimis, unciam denarijs, vel drachmæ, quod idem videtur apud Celsum.

Atticis grana decem, novem Nicolao, Venetisque viginti, communibus vero medicis quatuor & viginti, scrupulum complent, communis drachmæ partem tertiam; Aurei quartam, vocatam Græcè gramma, Arabicè gormiam, Latine scrupulum & fabam interdum Græcam.

Sex viginti grana, cum duabus tertijs, Tremissem faciunt Venetis, Triginta ijdem, ac Nicolao Semidrachmam. Apud illum namque idem est.

Aurei pars tertia, tertia tremissis scilicet & semidrachma. Non autem apud Venetos, aut communes medicos.

Duo & triginta grana, communem tremissem faciunt, aurei communis partem tertiam.

Sex & triginta, communem semidrachmam, fabam Aegyptiam, fabam Alexandrinam, Chemeasim Alexandrinam, & Lupinum interdum vocatam.

Quadraginta Venetis aureum medium;

Quinque & quadraginta Nicolao.

Sed communibus octo & quadraginta, aureum medium complent, scrupulos duos scilicet, obolos quatuor, fabamve Syram (Siriacam.)

Sex & quinquaginta cum duabus octavis, drachmam Atticam.

Sexaginta Venetam & Nicolitam.

Duo & septuaginta communem perficiunt vocatam Oleam, Avellanam.

Darchimæ, Darchimet, Denarium argehteum; Bondachate quoque, communis uncia partem octavam, libræ sextam & nonagesimam ex tribus constantem scrupulis, obolis sex. Danich bissiliquis novem: Keratijs, Kirat, Kararit, autulis aut siliquis decem octo.

Grana duo & octoginta & duæ septimæ, Denarium five drachmam Celsi faciunt, uncias Denarij sex:

Quinque & septuaginta, aureum Atticum,

Octoginta, Venetum.

Nonaginta, Nicolitum.

Sex & nonaginta, communem faciunt vocatum plerumque sextula, vel sextulam interdum & sextimum: quoniam sit uncia pars sexta.

Centum quatuor & quadraginta, Sicilicum, communes drachmas duas pendentem.

Centum duo & nonaginta, uncia communis partem tertiam, vocatam Duellam.

Dacenta quinque & viginti, semunciam Atticam.

Ducenta quadraginta Venetam.

Ducenta septuaginta, Nicolitam.

Ducenta octo, & octoginta, communem faciunt.

Quadringenta quinquaginta, unciam Atticam.

Quadringenta octoginta, Venetam.

Quingenta quadraginta, Nicolitam, drachmas ejus novem capientem, scrupulos septem & viginti, obolos quinque & quadraginta.

Quingenta vero sex & septuaginta grana, communem unciam compleant drachmas octo, scrupulos quatuor & viginti, obolos octo & quadraginta capientem.

Nongenta, sextantem faciunt Atticum.

Noningenta & sexaginta, Venetum.

Mille octoginta, Nicolitum.

Mille centum duo & quinquaginta, communem, duas scilicet communes uncias pendentem.

Mille trecenta quinquaginta, Atticum quadrantem.

Mille quadringenta quadraginta, Venetum.

Mille sexcenta viginti, Nicolitum.

Mille septingenta octo & viginti, communem faciunt, trium scilicet unciarum pondus.

Mille octingenta, trientem Atticum.

Mille noningenta viginti, Venetum.

Duo millia centum sexaginta, Nicolitum.

Duo millia trecenta quatuor, communem trientem, uncias capientem quatuor.

Atticis duo millia, ducenta, quinquaginta, quincuncem, Venetis duo millia quadringenta.

Nicolao duo millia septingenta.

Communibus, duo millia octingenta, octoginta.

Duo millia septingenta, Atticis.

Duo millia octingenta octoginta, Venetis.

Tria millia ducenta & quadraginta, Nicolao.

Tria millia quadringenta sex & quinquaginta, communibus, Semissem faciunt.

Grana quinque millia quadringenta, Atticam.

Quinque millia septingenta sexaginta, Venetam.

Sex millia quadringenta, octoginta, Nicolitam.

Sex millia, noningenta duodecim, communem libram perficiunt.

CAPUT II.

Ponderum Diverforum inter se comparatio.

Hac quæ prius diximus diligentius considerantibus nobis, facile apparebit quæ, quantaque sit inter communes, Atticos, Venetos, Nicolaum, ac Celsum de ponderibus dissonantia. Dictum est enim Nicolitum, Venetumque scrupulum ex viginti constare granis: Atticum ex decem & novem ferè: Communem vero ex quatuor & viginti. Nicolai quoque Venetamque drachmam, ex sexaginta, Atticam ex sex quinquaginta cum duabus octavis: Communem ex duobus & septuaginta. Celfo vero placuit Denarium suum, sive Drachmam, ex granis duobus octoginta duabusque septimis facere. Unciam autem ex Denariis septem tantum, quorum tamen summa ad quingenta sex & septuaginta grana conscenderit. Unica vero Nicolai cum ex Drachmis novem integretur, Drachmæque singulæ ex granis sexaginta, novies autem sexaginta, quingenta & quadraginta producant, quingentorum & quadraginta granorum numerum continebit. Communes vero medici, Galenus scilicet Alexander, Paulus, Arabesque omnes eos sequuti,

communiquè observatione utentes, (quoniam ex Drachmis octo faciunt unciam. Drachmas vero singulas ex granis duobus & septuaginta, octiesque duo & septuaginta, quingenta sex & septuaginta producant) ad quingentorum sex & septuaginta granorum numerum extenderunt unciam. Ex quo sequi videtur eorum unciam, Nicolai unciam superare in proportionem sesquiquinta decima. Continet enim illam totam & amplius quintamdecimam ejus partem, grana scilicet sex & triginta. Et consequenter Nicolai libram eadem in proportionem, communis libram eadem in proportionem, communis libra superabit. Venetam vero in proportionem sesquiquinta: quoniam ex Drachmis octo tantum unciam. Drachmam vero ex granis sexaginta faciunt. Hoc equidem Celsi ponderibus, communibus comparatis nullo pacto contingit. Licet enim Celsi Drachma, communi major aliquanto sit, communem tamen unciam, Celsi uncia minimè superat, imo illi ad unguem penitus quadrat. Id quod cuiusvis patere facile potest diligentius speculanti: quia cum Drachmarum numerus, ex quibus uncia constat, non utrobique par sit: quoniam Celsi septenarius tantum. Communium vero medicorum octonarius, sit, ut communis uncia, additione Drachmæ octavæ, recuperet illud omne quod ex granorum diminutione Drachmam constituentium videbitur amittere. Septem quidem communes Drachmæ Celsi Drachmæ septem comparatæ, vincuntur ab eis per excessum granorum duorum & septuaginta. Duo enim & octoginta grana cum duabus septimis ex quibus Celsi Drachma componitur, si sexies multiplicentur, quingenta & septuaginta reddunt. Duo vero & septuaginta ex quibus communis drachma, quingenta & quatuor tantum, quibus si octavæ Drachmæ numerus addatur, duo scilicet & septuaginta, quingentorum sex & septuaginta granorum numerus aggregabitur, quæ etiam Celsi Drachmæ septem congregaverant. Erunt ergo pares inter se uncia, communes & Celsi, eundem præcisè granorum numerum contingentes. Libræ quoque similiter pares, quod de Nicolai Venetorumque uncia aut Libra verificari nequaquam potest, inter quos maxima est de ponderibus dissonantia, minima vero ac penè nulla inter communes & Celsum, quorum uncia, libraque eadem, Drachmæ vero ut diximus, earumque minutia aliquantulum dispares. Verùm Drachmarum minutia, si non Arithmetica, Geometrica tamen proportionem concordant. Ut enim oboli sex, Drachmam communem, haud aliter denarii uncia sex, Celsi denarium integrant, ita ut pene idem videatur uncia denarii Celsi in denario, quod obolus in communi drachma. Veruntamen obolus superatur, ab uncia denarii, per grana quasi duo paulo minus: quia duabus septimis, qui excessus adeò parvus est, ut Hermolaus Barbarus atque nostræ singulare literarum decus, in Plinianis castigatibus scripserit, unciam denarii idem esse, quod obolus: quamvis non omnino idem sit, si verum exquisitius indagari volumus, quod & Celsus ipse testari videtur his verbis, Id, inquit, ad pondera nostra relatum paulò plus est dimidio scrupulo, id est, obolo. Duo enim oboli scrupulum integrant.

CAPUT III.

De Causa & modo Mutationis Ponderum per Nicolaum.

Quid autem moverit Nicolaum, ut hanc de qua dixi-

diximus, ponderum mutationem faceret, hæc causa fortè fuisse potuit: Ardens scilicet gloriæ cupiditas, qua nominis immortalitati studens, quod Attici mensuris plurimis fecisse probantur, hoc ipse ponderibus quibudam fecisse videatur. Illi namque ex communibus mensuris sexta subtracta parte ita proprietates effecere, ut communes penè omnes ad Atticas compararæ, sesquiquinta in proportionem majores inveniantur. Exempli causa, Cyathus communis, drachmas duodecim pondere continet: Atticus decem. Sextarius communis, uncias decem & octo: Atticus quindecim. Duodecim autem de decem, & decem & octo, ad quindecim, proportio est sesquiquinta. Imitatus igitur Atticos Nicolaus, ex communi scrupulo, communique drachma, sextæ partis detractiōe, peculiarem scrupulum, drachmamque fecit, ad quos communis scrupulum, drachmaque communis comparati, sesquiquintam proportionem obtinent. Quatuor enim & viginti granorum numerus, qui communis est scrupulus, & duorum & septuaginta, quæ communis est drachma, ad viginti Nicolai scrupulum, adque sexaginta ejusdem, drachmam, sesquiquintam esse proportionem, nemo est qui ambigat, proportionum sciolorum, sic ut dicimus, in scrupulis, drachmisque constituendis, processit Nicolaus: sed non similiter uncias, sustrahendo scilicet ex communibus: sed addendo potius processisse videt: quippe qui Drachmarum numerum auxerit, ex quibus uncia constat, illam ex novem constituens drachmis, quam ex octo tantum communes effecerant. Asequutus est autem per additionem drachmæ novæ, ut excessu longe minori, ejus unciam communis uncia vincat, utpote inter quas sesquiquinta decima proportio constet, non sesquiquinta, qualem inter scrupulos, drachmasque monstravimus, differentia: namque quingentorum sex & septuaginta granorum, (quæ communis est uncia) ad quingenta & quadraginta (quæ Nicolai est uncia) sex scilicet & triginta, pars est quinta decima numeri minoris communis. Uncia per drachmam mediam tantum, libra vero per semunciam cum sicilico Nicolai, unciam libramque separant. Quamobrem fateti cogimus, Nicolaum Drachmarum quidem auxisse numerum, granorum vero diminuisse, ex quibus vacia constat, diminutione tamen non tanta, quantam in scrupulo drachmaque fecerat, quos sexta sui parte mutilos reddidit.

Veteres vero medici, medium quodammodo inter Nicolaum & communes tenentes, quo ad scrupulos & drachmas Nicolaum sequuti, in constituendis uncis communibus adhæserunt, quam non ex novem ut Nicolaus, sed ex octo tantum drachmis, communium more, factitarunt. Ex quo sequitur, communem unciam, sesquiquinta proportionem majorem Veneta: constat enim Veneta, ex quadringentis octoginta granis, communis vero ex quingentis sex & septuaginta, quorum differentia est sex & nonaginta.

CAPUT IV.

De his quæ sequuntur ex Ponderum assignatione ab antiquioribus deviantium.

Hic varius assignandorum ponderum modus, non parvi erroris causa videtur extitisse: quoniam cum in his quæ à veteribus probatissimis medicis sumuntur antidotis, non servetur componentium inter sese proportio eadem, quæ in primis eorum descriptionibus fuerat: nulla admiratione dignum videri debet, si quæ nunc componuntur medicamina, ab antiquio-

ribus tantis celebrata laudibus, non admirandam illam, ac penè divinam, ita dixerimus, sortiantur in operando excellentiam, quam olim habuisse, clarissimi medicinarum auctores memoriæ prodidere. Quod canone quinto de theriaca scribens princeps Abohali consuluisse videtur. Et meum quidem inquit, consilium est, ut non removeatur quod experimentum juvativum, invenit, fortasse enim illa compositio, cum illo pondere est significans illud, cujus juvamentum invenit experimentum, quod quando ipsa moveretur à suo pondere, non sequitur illam proprietatem.

CAPUT V.

Quod in Arabum Libris, loco drachma, aureus frequenter scribitur.

Adde quod ex Arabico in linguam nostram versis commentariis, locis quamplurimis, ubi drachma scribi debuerat, aureus frequenter legitur: idque apud Principem, cum maxime Canone quinto, Theriacæ descriptione deprehenditur aperuissime, non Pauli solum testimonio ubique drachmam scribentis ubi aureum principis scripsit interpretes, sed & Gentilis, auctoris non spernendi, illud idem affirmantis. Et quod his omnibus majus putamus & magis urget, Andromachi, radicali descriptione, quo ad hoc, à Paulo nullatenus dissentiente. Posset autem & satis probabilis adduci ratio, quædam sumpta ex proportionem mellis ad species, ex quibus Theriaca componitur, quæ quidem dupla esse debet, ut capite eodem, descriptione secunda, Princeps testatur. Est autem ratio talis. Si intelligamus aureos in descriptione prima à Principe positos, in propria significatione sumendos pro sexta scilicet uncie parte, quam diximus, mellis ad species proportio dupla scilicet servari nullo pacto posse videtur, servatur autem si aurei pro drachmis exponantur. Ergo aurei in Theriacæ descriptione positi, pro drachmis exponendi videntur. Hoc autem quod ita sit ostenditur: quantitas specierum in Theriacæ descriptione prima descriptarum, est, aurei quadringenti duo & octoginta & aureos duos: hæc autem libras sex, uncias octo cum triente faciunt. Mellis ergo pondus cum duplex ad species debeat esse, ut Principis sententia diximus, ad libras tredecim, & eo amplius ascenderet, sed ex Serapione, Rhasi ad Almanso-rem, Haliabbate, Constantino, ac Gentili, Mel apponendum est, libras decem tantum. Ergo aureorum scriptura in propria significatione sumptorum salvari posse non videtur, quoniam specierum quantitas major esset, quam tanto mellis pondere convenire auctores prædicti testentur, quod duplum ad species & librarum decem esse confirmant. Quod autem dicta proportio ad unguem servetur, si aureorum loco drachmæ scribantur, aperte monstratur, Drachmæ quadringentæ duæ & octoginta, uncias sexaginta cum quadrante faciunt. Hæc autem libras quinque cum sicilico, ad quas pondus librarum decem, mellis proportionem duplam obtinent. Clarum itaque apertumque esse videtur, quod dicebamus apud Arabes medicos, aureum frequenter scriptum inveniri, ubi drachma scribenda fuisset, maxime apud Principem & Rhasim in Continentis volumine. De quo quamvis innumera adducere exempla possem, ne principalis tamen propositi immemor appaream, pauca quædam adduxisse sat erit. Decima tertij capitulo de asthma in medicina de Synapi, quam à

Paulo Princeps accepit, ubi Paulus drachmam medium, aureum ille medium. Et quod non possumus non vehementius admirari, ubi Paulus obolum medium, grana scilicet octo & quadraginta scripsit interpretes. Sed librarijs forrè, non interpreti tantus error ascribendus erit. *¶* inquit Paulus, Sinapi drachmam unam, nitri Affri obolos tres, elaterij quantum medius obolus. Avicennæ interpretes. *¶* Sinapi aureum unum, salis communis, qui in pane ponitur, aureum medium, succi cucumeris asinini aureum medium. Rasis quoque Continentis vigesimo secundo, cap. CCI. Dioscoridis dicta testatus: Cum sumuntur, inquit, ex castoreo & mentastro sylvestri ana aurei, provocant menstrua, cum tamen Dioscorid. cap. de Castoreo dixerit, καστορεος ὀρχης ποθεὶς μέλα γλῆχωνος & ἡλῆθος δυοῖν, ἐμύλμα κινεῖ, &c. In Græco exemplari: in Latino: Castoreum cum pulegio bibitum drachmis duabus, menstruis imperat. Rasis aureos, Dioscorides drachmas scripsit, cui Plinius lib. 32. c. 3. consonat, inquiens de castoreo dari binas drachmas satis est. Ex his ostensum planè videtur, quare in nobilium medicinarum, quàm plurimis à priscis medicis laudibus innumeris celebratarum, non ille excellentes, admirandæque ætate nostra appareant operationes, quæ priscis illis temporibus apparuisse produntur: quoniam variatis ponderibus simplicium, ex quibus componuntur, compositorum quoque complexionones ex miscibilium refractione resultantes, nec non & proprietates ad complexionum præparationem emergentes variantur, ut Principis attestatione, paulo superius diximus.

CAPUT VI.

De Chalco Granorum duorum pondere.

Chalcus granorum duorum est pondus, uncie pars ducentesima octava & octogesima. Testatur Paulus practicæ septimo de Ponderibus. Obolus (inquit) habet Keratia tria. Keratium chalcos duos. Hinc nonnulli non rectè interpretantes Paulum, quoniam inquit, Keratium, habet chalcos duos, credentes Keratium granorum sex pondus esse, dixere chalcum pondus esse granorum trium, non advertentes ad verba Pauli dicentis, Obolus habet Keratia tria, quoniam si Keratium pondus esset granorum sex, tunc obolus grana decem octo penderet, quum tria Keratia pendeat, quod falsum esse Medicorum omnium benè sentientium schola testatur. Ad quod illud quoque sequeretur, drachmam communem non habere Keratia decem & octo ut Dioscorides, Paulus, ignotus Græcus, Serapio & Avicenna testantur, sed duodecim tantum. Keratia enim decem & octo producerent, grana centum & octo, sesquidrachmam præcise. Quod quum sit evidentissimè falsum, dicendum videtur, Keratium granorum quatuor pondus esse: chalcum ejus dimidium, duorum: oboli partem sextam. Hinc apparet Plinij textum lib. 21. c. ult. videri mendosum, ubi dicitur, obolum habere chalcos decem, cum sex habeat tantum. Obolus enim ut diximus grana duodecim non amplius pender, cujus pars tertia est Keratium, id est grana quatuor, duos retinentes chalcos. Quamvis Dardanus dixerit obolum non distare à scrupulo, nisi nomine, quod medicorum dictis & vero non quadrat. Quare chalcus granorum duorum pondus erit, cui sententiæ Græcus Dioscoridis textus cap. De elaterio consonat,

ἡδὲ τελεία πένσις ὀβολός ἡδὲ ἐλαχίστη ἡμιόβολιον, πένσι δὲ διχάλκων, ist est, ejus perfecta portio, obolus: minima, medius obolus: pueris dichalcos, plus enim periculum affert. Dialchos videtur pondus minus semiobolo, nec aliud esse potest, quam Keratium aut siliqua, quod idem est, granorum quatuor scilicet pondus. Illum Dioscoridis textum referens Serapio de elaterio, Dosis ejus, inquit, completa Onoloffat unum, id est obolus & ad minus medietas ejus. Sed pueris non detur, nisi pondus duorum Kestuf. Est autem Kestuf ex concordia Dioscoridis & Serapionis locis allegatis chalcus. Hali abbas 2. practicæ c. 4. de cucumeris sylvestris succo, Hunc si propinare vis homini, fac ejus ab obolo uno potionem usque ad unum & medium, & minorem tribus chalcis, id est, medium obolum: sed medius obolus est, grana sex quæ divisa per tria, reddunt duo, ergo chalcus grana duo Confirmatur ex concordia Rasis 4. continentis c. i. charta octogesima tertia, columna 4. circa principium De cura asthmatis, cum Paulo iij. Practicæ c. xix. de cura eadem. Medicina inquit Rasis provocans vomitum *¶* Synapi 3. j. nitri Kiat novem, succi cucumeris agrestis, Kirat unum. Paulus, *¶* Synapi 3. j. nutri triobolon, elaterij dichalcon. Rasis Kirat unum, Paulus dichalcon, ergo dichalcon idem, quod Kirat sive Keratum: sed Kirat, est grana quatuor, ergo & dichalcos totidem: quare Chalcus grana duo, Idem Rasis continentis 22. capite de cucumere asinino. De succo ejus dosis, inquit, completa obolus sed infantibus detur in quantitate danich medij. Danich autem ex Serapionis ac Principis descriptione pendet grana octo, cujus medietas est grana quatuor, quod idem est, quod dichalcos aut Kirat. Igitur Chalcus pondus est primum, minimumque duo tantum ut diximus pensitans grana. Nec huic sententiæ nostræ repugnat, quod à Campano dici videtur in octavo propositionis commento libri quattidecimi Euclidis, quod chalcus scilicet est uncie pars centesima secunda & nonagesima, & consequenter esset granorum trium pondus, non duorum, quod nos asserimus: divisus enim quingentis sex & septuaginta granis, ex quibus uncia constat per centum, duo & nonaginta tria exeunt, non duo. Advertendum quod Campani ratio, quæ ab eodem adducitur loco superius allegato, de additione ponderis chalcus, ostendit apertissimè vitiatum fuisse textum suum, scriptumque centesimam secundam & nonagesimam, ubi scribendum fuerat ducentessimam octavam & octogessimam. Postquam, inquit Campanus, majores nostri divisere unciam in duodecim fractiones, Semunciam, Duellam, Sicillicum, Sextulam, drachmam, &c. His addidere chalcum, causa additionis fuit, ut usque ad minimum extremum diatessaron & diapente tonorum, semitoniorumque intervallis distinctarum harum fractionum denominatio conscenderet. Sed hoc non fieret si non ultra centesimam secundam, & nonagesimam fractionem uncie divisio progredieretur: quoniam ut inquit Boetius Musicæ lib. 1. c. 17. diatessaron, (quæ est consonantia vocum quidem quatuor, intervallorum,) constat ex tonis quidem duobus, & uno non integro semitonio, & exemplificat in his numerus 192. 216. 243. 256. Si igitur 256. numerus, comparatur numero 192. sesquitercia proportio fiet, ac diatessaron concinnentiam resonabit. In cap. vero sequenti. Rursus diapente consonantia, vocum quidem est quinque, intervallorum quatuor, trium tonorum & minore semitonio. Ponatur idem numerus 192. & ejus ses-

CAPUT IX.

De Autulo, alio ejusdem Ponderis nomine.

Autulus idem quod Kirat, ut testatur Princeps, Canone quinto, de ponderibus, descriptione oboli. Obolus, inquit, continet danich unum & medium, aut autulos tres, igitur tantundum est autulus, quantum danich medium, sed illud est grana quatuor, ergo & autulus erit grana quatuor: vel aliter, autuli tres, obolum faciunt, qui duodecim pendet grana sed divisus duodecim per tria, exeunt quatuor, ergo autulus est grana quatuor, non novem ut Pandectarius & Simon.

CAPUT X.

De Alkilar, Rursus alio ejusdem ponderis nomine.

Alkilar, ex concordia Rasis ad Almanforem lib. iv. cum Averhoë colligit septimo, in descriptione, pilulorum contra pestem, est Kirat: uterque in descriptione earum concordat. De dosi autem Rasis pondus duodecim alkilar, Averrois duodecim Karatorum.

CAPUT XI.

De Siliqua, Latino ejusdem nomine.

Siliqua iterum idem quod Kirat, sive autulus, & est uncia pars centesima quarta & quadragesima, Campano teste: vel pars quarta & vigesima solidi, id est aurei, teste Isidoro, quod idem est. Orobus idem ex Dioscoride.

CAPUT XIII.

De Keratio idem significante Græco vocabulo.

Keratum idem: grana scilicet quatuor, Paulo & ignoto Græco testibus.

CAPUT XIII.

De Semiobolo.

Semiobolus, dimidius obolus, grana scilicet sex; est autem uncia pars sexta & nonagesima quam Campanus & Isidorus ceratem vocant, qui si ceratem pro Keratio sumerent, admittendi non videntur. Cerates dimidius obolus ut supra.

CAPUT XIV.

De Daguanich, sive Danich granorum octo pondere.

Vide etiam sequens caput.

Daguanich ex concordia Serapionis (secundo practica, c. 8. de passione cordis dicta Caffacam) cum Rasi (vii. continentis charta clvii. col. ij. circa medium) est danich. Danich autem ex Serapione & Principe, granorum octo est pondus. Obolus (inquiunt ambo) est danich & medium, sed obolus (ut in verbo obolus & Autulus exponitur) grana duodecim pendet. Ergo danich octo pendebit.

CAPUT XV.

De Bissiliqua, latino ejusdem ponderis nomine.

Bissiliqua est duplicata siliqua, idem quod danich, & est uncia pars secunda & septuagesima Campano teste.

G A P.

qualiter, qui ad eum diapente faciat consonantiam. Sit igitur numerus 288. Igitur horum & superius deprehensorum 192. ponantur in medio numeri 216. 243. 256. Dudum Diatesseron consonantia, à 192. numeris ad 256. venerat. Nunc vero diapente ab eisdem 92. numeris ad 288. distenditur. Hæc Boëtius. Iaque diligentius considerantibus nobis apparet quod harum symphoniarum extrema, minima est numerus 288. non 142. Nec te moveat quod numerus 288. major est numero 192. rei enim divisæ partes, quo majori numero denominatur, eo minores sunt uncia: namque pars ducentesima octo & octogesima longè minor est centesima secunda & nonagesima, quia in porportionem subsequaltera, ut puta duorum ad tria. Minimum ergo extremum dicendum 288. non 192. quia non est respiciendus numerus signativus fractionis illam denominans, sed fractio signata per numerum. Si igitur uncia fractio, non transenderet centesimam secundam & nonagesimam fractionem, sive minutiam, non pertingeret ad extremum minimum diapente fractionum Uncia denominatio. Rectè igitur cum Paulo, Dioscoride, Rasi, Serapione, Principe dicendum videtur, Chalcum uncia partem ducentessimam octavam & octogesimam: id est, grana duo censendam, quod & Campani ratio sonare videtur, illam benè audientibus.

CAPUT VII.

De Tussuc vel Tussugi, vel Kestuf, id est Chalco.

Tussuc vel tussugi, primo continentis, c. vi. charta undecima, columna, iii. exponitur, Chalcus, quamvis Simon Genuensis, auctore Rhasi, in Divisionibus de sonitu aureis, exponat, grana duo semis. Sed mendosus videtur textus divisionis, quoniam nono Almanforis, c. eodem dicitur, De opio dissoluto in oleo, immitendum est in aurem quantum duo grana hordei ponderant. Non igitur videtur vera expositio in divisionibus posita, quare dicendum, quod tussuc vel tussugi, chalcus, vel Kestuf, quod idem est, grana duo tantum pendeat. Kestuf chalcus ex concordia Dioscoridis cum Serapione de elaterio, ut in verbo Chalcus.

Dichalcos: granorum quatuor pondus, chalcos duos continens, Kirat similiter Serapione & Principe testibus.

CAPUT VIII.

De Kararit seu Kirat granorum v. Pondere.

Vide etiam quatuor sequentia Capita.

Kararit, idem quod Kirat, ex concordia Serapionis ij. practica de tinnitu, cum Rhasi continentis iij. c. eodem. Et confert, inquit Serapio, iterum medicamen hoc ad gravitatem auditus. 7. ellebori aureum unum, castorei danichos tres, nitri (& est baurach rubestorum) Kararit quatuor. Rasi, ubi supra, hoc est medicamen ad ponderosum auditum: Ellebori albi pondus aurei unius, castorei stupulum unum, nitri danich duo & grana duo. Sed danich duo & grana duo decem & octo congregant grana, quibus æquivalent Kararit quatuor & medium, & similiter Kirat quatuor & medium. Ergo Kararit quatuor & medium, idem quod Kirat quatuor & medium, & consequenter Kararit, idem quod Kirat, quia quæcunque sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se, primo Euclidis: & est communis animi conceptio.

CAPUT XVI.

De Obolo, id est, Granorum xij pondere.

Obolus granorum duodecim pondus, Paulo, Serapioni, Principi, Campano, Prisciano, Isidoro & ignoto Græco, & est unciae pars octava & quadragesima. Unciam, drachmam, aureum, solidum, libram, absolute prolata communes semper intelligo.

CAPUT XVII.

De Seminet, Seminen vel seguinem, id est, obolo Arabicè dicto.

Lege etiam tria sequentia Capita.

Seminet vel seminen & interdum seguimen obolus est, testatur Serapio descriptione fabæ Syriacæ. Faba (inquit) Syriaca, est quatuor seminet, & exponens se, addit, & id est oboli quatuor. Idemque Serapio & Princeps exponentes fabam Græcam inquirunt, est seminen duo aut oboli duo. Quod vero apud Principem legitur, seminet est unciae decem & media, videtur mendosum, quoniam apud Serapionem, quem Princeps sequitur, de ponderibus nulla de minis fit mentio: nisi ignoto Græco adhærentes exponeremus, seminen est pars minæ minoris quintadecima, apud quem mina parva quintadecim habet obolos. Est ergo seminet sive obolus pars quinta decima minæ parvæ, non minæ decem & media. Et fortassis hæc fuit Principis mens.

CAPUT XVIII.

De Cumulo vel Anulo, alio Arabico Oboli nomine.

Cumulus aut anulus, ut in antiquis exemplaribus Principis cap. de laserpitio, ex concordia ejusdem cum Dioscoride & Serapione est obolus: *τιτανικός τε ἢ ὀπιθοτονικός ὀβολός ἐστιν περιπλάσας, διδου κατὰ τὴν* Diosc. in Græco exemplari, quamvis in Latino legatur: Si excipiat ex assa pondere holce: Serapio pondere onoloffat: Princeps anulus vel cumulus, & misceatur cum cera. Propter quod Simon exponit holcam, holcam dicit eam significare drachmam ex Isidoro. Sed ex concordia Avicennæ cum Dioscoride capite de assa, est obolus: sed quoniam in Græco exemplari legitur obolus, non holca, talis expositio non videtur admittenda.

CAPUT XIX.

De Onoloffat vel onoloffich, rursus alio Arabico oboli nomine.

Onoloffat vel Onoloffich & interdum onolos ex concordia Dioscoridis, Plinij, Serapionis & Principis & Rhafis de cucumere asinino, est obolus. Dixit Dioscorides de elaterio, *τελείω πόσις ὀβολός*, id est perfecta portio obolus. Plinius libro 27. cap. 1. Modus, portione virium à dimidio obolo ad integrum. Serapio dosis ejus completa onoloffat unum & ad minus ejus medietas. Princeps similiter scripsit onoloffat. Rhafis vero primo continentis cap. v. onoloffich tres, id est, danich quatuor & medium de agarico datum in potu confert epilepsiæ. Danich autem quatuor & medium sunt grana sex & triginta, quæ divisa per tria reddunt duodecim, id est, obolum, ergo ono-

loffich est obolus, Serapio quoque cap. de agarico, confert inquit, punctiōibus & humoribus viscosis, crudis & illi qui cecidit, cum dantur de eo duo onoloffat cum vino. Dioscorides in Græco exemplari: *ποιῶν πρὸς τὴν σερῳπας ἢ ἀμοτητας, ῥήγματα τε ἢ πλώματα, ὀβολῶν δὲ δύοιν πλῆθος διδόμενον*, In Latino, De alto cadentibus utiliter adhibetur bibitis obolis duobus cum vino. Apparet itaque quod onoloffat vel onoloffich obolum significat: & textum Principis cap. eodem de agarico videri mendosum, dicentem dandum de eo Kirat tria, id est, obolum tantum, non duo ut Serapio scripsit, & Dioscorides cap. quoque de bathecha (melone) Dioscoride authore, Radix ejus inquit Serapio, cum desiccatur, &c. & est sufficiens, dosis usque ad duos onoloffat. Dioscorides in Græco exemplari, *ἀρκέσσειν ὀβολοῖς β*. In Latino idem facere possunt oboli duo. Rasis quoque continentis xxii. cap. eodem & competenter vomer, qui sumet quantitatem trium danich, id est, grana quatuor & viginti qui sunt oboli duo. Ex his arguet aliquis vitiatum videri Principis textum, Canone ij. cap. de absinthio in areola membrorum nutrimenti, quum dicitur: Reducit appetitum, cum sumitur decoctionis ejus, aut succi ejus quaque die quantitas trium onoloffat, id est, oboli tres: (quia minima esset decoctionis quantitas onoloffat, id est, oboli tres, nam semidrachma tantum.) Quod Serapionis dicta testantur dicentis, Quando bibitur ex aqua ejus scilicet absinthij, vel decoctione, quaque die quantitas trium conos (canos in Serapione) curat illos qui habent fastidium. Conos autem cyathum significat, ex concordia Dioscoridis cum Serapione capite eodem de absinthio, in Græco exemplari legitur *πλῆθος κυάθων τεταῖν*, in Latino, & datum ad liberandum cyathis duobus vel tribus fastidium tollit. Ex concordia quoque eorundem de cyclamine, ubi enim à Serapione conos, à Dioscoride cyathus scribitur, in Græco exemplari *κυάθων*: in Latino, semen ejus drachmis duabus cum vini cyathis duobus bibitum per dies quadraginta, per urinam ventrem tumentem attenuat. Serapio, authore Dioscoride, cum bibuntur ex semine ejus drachmæ cum duobus conos (his canon scribitur apud Serapionem, ut paulò antè canos, pro conos) vini albi, &c. Cyathus autem, est drachmæ duodecim. Quamobrem apud Principem loco superius adducto de absinthio, non onoloffat tres, sed cyathi tres scribendum fuisse videtur.

CAPUT XX.

De Uncia Denarii.

Uncia denarij, quo vocabulo utitur Celsus, denarij est minutia. Sexta vero ejusdem pars pendens, grana quatuordecim fere, quia minus duabus grani septimis.

Celsus lib. 5. cap. 17. Idem in uncia denarij habeo, quod Græci habent in eo, quem *ὀβολόν* appellant. Id ad nostra pondera relatum paulò plus dimidio scrupulo facit.

CAPUT XXI.

De Scrupulo.

Vide & capita sequentia sex.

Scrupulus multiplex est: communis, Nicolai, Vennetus & Atticus.

Communis, granorum quatuor & viginti est pondus.

pondus, drachmæ communis pars tertia, aurei quarta, uncia quarta & vigesima, libræ ducentesima octava & octogesima, testibus Campano, Prisciano, ignoto Græco, Serapione, ac Principe.

Scrupulus Nicolai granorum viginti pondus est, drachmæ similiter suæ pars tertia, sed uncia septima & vigesima, libræ trecentesima quarta & vigesima.

Scrupulus Venetus, granorum similiter viginti pondus est, & drachmæ pars tertia, Unciæ quarta & vigesima, libræque Venetæ ducentesima octava & octogesima.

Atticus vero scrupulus decem & novem ferè pendet grana.

CAPUT XXII.

De Guancho, id est, Scrupulo apud Arabes dicto.

Guanchus ex concordia Serapionis de simplicibus, & Rasis xij. Continentis de semine nasturtij authore Galeno, videtur scrupulus, quando de eo, inquit Serapio sumuntur in potu duo Guanchi, expellit cholera per vomitum & fluxum ventris, Rasis, scrupuli duo sumpti ex eo provocant vomitum, & purgant cholera. Avicenna, Et quando bibitur ex eo eclunessi, (hec lunessi, in cujus margine, pondus achsuna tasi) facit vomere cholera rubeam & educit eam solutione. Et faciunt illud, tres quartæ drachmæ unius. Quartæ autem tres drachmæ unius, sunt grana quatuor & quinquaginta quæ obolo medio excedunt scrupulos duos. Quare ut quod dicitur à Principe, quadret, Serapioni & Rasi, ita videtur intelligendum, quod quartæ duæ & tertiæ duæ unius drachmæ, id est scrupuli duo de semine nasturtij bibiti, cum achsuneffi, id est, onyabapho, potionis alicujus, supple, faciunt vomere, &c. oxybaphus autem aquæ vel vini drachmas habet viginti pondere, duas scilicet uncias & semis.

CAPUT XXIII.

De Gormia, alio Barbarico scrupuli nomine, & à Græco grammæ, corrupto.

Gormia scrupulus est, ex concordia Pauli prædictæ septimo, cum Avicenna Canone quinto de ponderibus, tam parvi, quam magni mystri descriptionibus. Mystrum magnum, inquit Princeps, habet olei uncias tres, vini, vel aquæ uncias tres, & gormiæ octo. Paulus uncias tres olei, vini vel aquæ uncias tres, scrupulos octo. Mystrum vero parvum, inquit Princeps, est darchimiæ sex olei, vini, vel aquæ gormiæ viginti. Paulus mystrum parvum drachmæ sex olei, vini, vel aquæ scrupuli viginti. Arabes studentes imitari Græcos pro grammæ, gormia, pro drachmi, darchimi, aut darchimiæ & interdum darchimet scripserunt, non potentes enim proferre dra, syllabam, literarum transpositione dar proferunt sicut de Januensibus dicitur.

CAPUT XXIV.

De Grammatæ Græcæ ejusdem vocabulo.

Gramma Græcæ, scrupulus est, Paulo teste, Prisciano, ignotoque Græco. Semioboli duplus est obolus, quem pondere duplo Gramma vocant, scrupulum nostri dixere priores. Hæc Priscianus.

CAPUT XXV.

De Harmæ, Rursus alio scrupuli Arabico nomine, à Græco nimirum grammæ corrupto.

Harmæ quoque scrupulus est. Harmæ (inquit Serapio) est quarta pars drachmæ, aut danich duo, autuli duo. Sed danich duo & autuli duo, sunt grana quatuor & viginti, id est scrupulus qui est pars quarta aurei, non, drachmæ. Ideo subjunxit Serapio, quasi seipsum corrigens in descriptione alia aurei, quæ litera videtur melior. Ille loco eodem paulò inferius septimo scilicet prædictæ de ponderibus. Seminen est pondus harmen mediæ, sed seminem est obolus ut diximus grana duodecim pendens. Ergo harmæ cujus medietas est seminet vel seminen grana quatuor & viginti pendet, & est scrupulus.

CAPUT XXVI.

De Kermet, alio rursus barbaro seu corrupto scrupuli nomine.

Kermet item scrupulus est, ex concordia Serapionis & Principis cap. de colocynthide: Dosis ejus (inquit Princeps) sit duo Kermet, & exponens se dixit, id est, Kirat duodecim, sed Kirat duodecim sunt grana octo & quadraginta, scrupuli scilicet duo. Serapio cap. eodem: cum accipiuntur ex ea onolossat quatuor & conficiuntur, &c. Onolossat autem, ut prius ostensum est, obolus est, constans ex gravis duodecim. Igitur onolossat quatuor, & Kermet duo idem erunt. Sed onolossat quatuor, sunt scrupuli duo, ergo & Kermet duo erunt scrupuli duo: quia quæcunque sunt eadem uni tertio, eadem inter se. Euclidis primò confirmatur. Princeps ij. Canone, capite de polypodio, & potio ejus sit sex Kermet. Kermet enim est sex Kirat, imò sit usque ad drachmas duas: Item ex concordia ejusdem cum Plinio cap. de elleboro, Et potio ejus, inquit Princeps, sit tres Kermet, Plinius vero libro xxv. cap. v. Datur ad leniter molliendum alvum plurimum drachma, sed drachmæ tribus constat scrupulis, ergo Kermet scrupulos tres important. Septimo quoque breviarii Serapionis. cap. xii. de elleboro, oportet inquit, ut detur aureus unus. Exponendus drachma, quoniam apud Arabes loco drachmæ aureus frequenter scribitur, ut abunde satis superius diximus.

CAPUT XXVII.

De Faba Græca scrupulum appendente.

Faba Græca scrupulus: est enim (ut inquit Serapio Prædictæ septimo) seminet duo, id est, oboli duo,

CAPUT XXVIII.

De Tremisse Pondere granorum 30. vel. 32.

Kremissis, aurei pars est tertia, uncia octava decima, grana scilicet duo & triginta observatione communi. Verum apud Nicolaum tringinta tantum, apud Venetos autem sex & viginti cum duabus tertiis.

CAPUT XXIX.

De Faba Alexandrina drachma dimidium pendente.

Vide etiam sequentia sex capita.

Faba Alexandrina, ex Serapione drachmæ medietas.

CAPUT XXX.

*De Kemerasi (id est Faba) Alexandrina
rursus.*

Kemerasis Alexandrina ex eodem idem quod faba.

CAPUT XXXI.

De Faba Ægyptia pro eodem pondere.

Faba Ægyptia, videtur idem quod Alexandrina; quoniam Alexandrina Ægypti civitas est. Quamvis in his, quæ testatur Princeps, ex Serapionis brevuario desumpta, scripserit: faba Ægyptia, oboli (suminet, Avicenna) quatuor: qui sunt paulò plus dimidia drachma. Verumtamen de faba sub nomine Ægyptia, non videtur scripsisse Serapio, sed de faba Syra, quod est seminet quatuor. Quare apud Principem faba Syra, non Ægyptia, legendum fortè videtur, est oboli quatuor. Et tunc nulla erit ambiguitas, nec inter Serapionem & Principem dissonantia. Apud Dioscoridem legitur faba Ægyptia obolus cum dimidio, videtur autem legendum scrupulus cum dimidio.

CAPUT XXXII.

De Balano, id est, drachma dimidia.

Balanus ex Dioscoride drachma media.

CAPUT XXXIII.

De Bachileon Arabico ejusdem ponderis nomine.

Achileon Avicennæ feh. 2. tertij libri, de cura paralytis. (*Bakilleon, in textu: in margine bachele.*) Videtur autem similiter drachmæ medietas ex concordia Pauli tertio practicæ cum Principe loco allegato. Ejus quidem potio scilicet opopanacis, inquit Princeps, sit quantitas bachileon. Paulus ad magnitudinem fabæ.

CAPUT XXXIV.

De Lupino, similiter pro Drachma media.

Lupinus est drachmæ medietas, ut testatur Pauli, Serapionis, & Principis de theriacæ in tussi exhibitione, concordia. Ubi namque Serapio & Princeps inquirunt, Lupinus: Paulus, detur faba Ægyptia, quæ à Serapione vocatur Alexandrina & ab eodem exponitur seminet tres aut oboli tres, quod est drachmæ medietas. Spuentibus quoque sanguinem de recenti, jubet dari Paulus cum oxycrato: ex multo tempore spuentibus, cum decoctione symphiti, utriusque mane & sero quantitas fabæ Ægyptiæ, id est, drachmæ medietas pro vice: ita quod drachma una in die. Avicenna idem de oxycrato mane & sero utriusque ad aureum unum, id est drachmam: quod ita exponendum videtur, ut cum Paulo Principis textus concordat, è quo sumpsisse videtur. Quinto quoque Breviarij de Scorpionum punctura, antidotum scripsit Serapio, Detur ex eo, inquit, quantum est lupinus. Paulus vero Practicæ quinto, detur quantitas fabæ Ægyptiæ. Quare Lupinus & faba Ægyptia nomina synonyma sunt, importantia pondus idem drachmæ scilicet dimidium. Confirmat hoc Serapio breviarij septimo, de probatione theriacæ: detur ei inquit in potu ex theriaca quantitas lupini, & est quantitas media aurei, id est, drachmæ.

CAPUT XXXV.

De Bachila, id est, Faba rursus.

Bachila ex concordia Principis prima tertij, de cura apoplexiæ, cum Paulo iij. practicæ cap. eodem, fabam significat. Inquit Paulus, Castore drachma una, opopanacis ad magnitudinem fabæ in melicrato. Princeps de simplicibus: Castorei drachma una cum aqua mellis, aut ex oxymellite (etiam mellino) cum bibitur bachila una. Sic textus videtur diminutus: quia deest opopanacis, de quo bachila bibenda est cum oxymelite, ut Paulus scripsit. Rasis quoque Continentis 1. cap. 2. charta secunda, columna quarta circa principium. De opopanace: sed perfecti juvamenti erit, si sumatur quolibet die cum syrupo mellis ad modum fabæ. Et scribuntur hæc de cura apoplexiæ.

CAPUT XXXVI.

De Faba Syriaca Scrupulorum ii. pondere.

Faba Syriaca ex Serapione, oboli quatuor, id est scrupuli duo, ut in faba Ægyptia.

CAPUT XXXVII.

De Drachma Communi.

Vide etiam capita xi. sequentia.

Drachma communis, grana duo & septuaginta pendens, uncia pars est octava, libræ sexta & nonagesima. Caput autem scrupulos tres, Kirat decem-octo, chalcos sex & triginta, obolos sex.

CAPUT XXXVIII.

De Drachma Nicolai.

Drachma Nicolai & Veneta, grana sexaginta tantum continet, obolos quinque, Kirat quindecim, & est uncia Nicolai pars nona, Venetæ vero octava: libræ Nicolai centesima octava: Venetæ sexta & nonagesima.

CAPUT XXXIX.

De Drachma Celsi.

Drachma Celsi major est omnibus: quoniam duo, & octoginta continet grana dualque grani septimas & est communis uncia pars septima, sicut apud eundem legitur lib. 5. cap. 17, libræ communis pars quarta & octogesima.

CAPUT XL.

De Drachma Attica.

Attica drachma tanquam omnium minima; sex & quinquaginta continet grana cum duabus octavis.

CAPUT XLI.

De Numo vel Denario argenteo.

Numus argenteus sive denarius, drachma est ex Plinio.

CAPUT XLII.

De Numo Aureo Denario, stagio, vel hexagio.

Vide etiam caput xlix.

Numus aureus, sive denarius, vel stagium, aut hexagium observatione communi habet scrupulos qua-

quatuor communes, drachmam scilicet integram & ejus partem tertiam, non dimidiam, ut ignoto Græco imponitur non recte: apud quem legitur: drachma habet Keratia decem octo, Stagium quatuor & viginti: quorum ad decem octo proportio est sesquitertia, non sesquialtera.

C A P. XLIII.

De Atogochilo, id est, drachma secundum Arabes.

Atogochilos ex concordia Dioscoridis & Serapionis de modo dealbandi lithargyrum drachmam significat. In unaquaque Ominos (id est, mina) lithargyri, scripsit Serapio, posito quinque atogochilos falis ex minera. Dioscorides in Græco exemplari, τῇ μὲν τῆς λιθαργύρης ὀλῶν ὀρυκτῶν α., id est, lithargyri minam falis ex minera drachmas quinque; quare ominos, minam atogochilos, drachmam importabit.

C A P. XLIV.

De Holca Græco vocabulū drachmam significante.

Holca idem quod drachma, Keratia decem octo continens ex Paulo, ignoto Græco & Prisciano. Holca quoque à drachma non re, sed nomine distat, Priscianus. Quamvis legatur apud Græcum ignotum. Holca duas habet uncias: apud Hermolaum in Plinianis castigationibus, holca est libra teste Cleopatra: & apud Titum Livium, Pauli interpretem, holca est scrupulus, lib. iij. practicæ, cap. xxxvi. & apud Simonem hylca est obolus, quæ omnia non videntur quadrare veritati.

C A P. XLV.

De Alchi nomine corrupto ab holca, id est, drachma.

Alchi apud Serapionem Græcos imitantem, pro ὀλῶν scribitur, quod est holca Latine, id est drachma. Libro namque de simplicibus cap. de pinu. Quando, inquit, bibitur ex folio pini pondus alki cum aqua & melle: ὀλκή videtur legendum Græcè, vel holca Latine: quoniam apud Dioscoridem, ut testatur Serapio cap. eodem, legitur, ἡ πτακὴς τῶν φύλλων ὀλκή μία: id est drachma una. Paulus quoque ac Ignotus, olki drachmam interpretantur.

C A P. XLVI.

De Darchimi vel Darchimie, id est, drachma.

Darchimi, vel darchimie, vel darchimet apud Arabes, studentes imitari Græcos, qui δρχμῖν darchimam dicunt, pro drachma frequentissime legitur, quod ex concordia Serapionis & Principis cum Paulo, quum alibi locis quampluribus, tum maxime mystri parvi descriptione deprehenditur. Mystrum parvum dixere Serapio & Princeps, est darchimie sex, Paulus drachmæ sex: cyathus olei est darchimie duodecim, Paulus drachmæ duodecim. Licet admirari Simonem Januensem rerum nostrarum diligentissimum indagatorem, Darchimie, inquit, Arabicè pondus est obolorum sex, obolus est tria Kirat, Kirat est grana quatuor: ergo darchimie pender Kirat decem octo id est grana duo & septuaginta secundum Joannem Serapionem. Idemque inquit Simon, dicit quod darchimie est aureus ex Serapionis verbis. Duo facile Simon poterat intelligere: primum apud Ar-

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

bes darchimie drachmam significare: secundum apud eosdem pro drachma aureum frequenter usurpari, nec scribendum fuerat darchimie drachmam & seminet esse & similiter avellanam in aurei expositione, quum darchimie ad duo & septuaginta grana tantum conscendat, nec ultra extendatur, ut ex obolorum Kirat & granorum computatione convincitur, ita ut pacto nullo possit aureus esse non Nicolai, qui ad nonaginta grana tantum, multoque minus communis qui ad sex & nonaginta progreditur. Itaque dicendum videtur quod darchimi, vel darchimie, quamvis verè sit drachma, à Serapione tamen vocati aureum, Arabum more usitato, nomina hæc aureum scilicet & drachmam sæpissime confundentium, & vice drachmæ scribentium aureum nō raro, sicuti superius tractatus hujus secundi, cap. 4. abunde satis ostendimus & ex Rasi 22. continentis cap. de scammonia apertissime docemus: sumpta, inquit, scammonia pondere aurei medij, aut darchimie quatuor & medij cum sirupō mellis, &c. sed darchimie quatuor & medium sunt grana sex & triginta, id est, drachma media, ergo aureum loco drachmæ posuisse videtur Rasis.

C A P. XLVII.

De Ologinat alio barbarico drachma nomine.

Ologinat apud Serapionem de simplicibus cap. de Esula, auctore Dioscoride, quam pityusam appellat. Ejus autem interpretatio est drachma, non obolus ut scripsit interpres: folia (inquit Serapio) laxant si accipiantur de eis tres ologinat, Dioscorides, τῶν δὲ φύλλων ὀλκὰς γ, id est, foliorum autem drachmæ tres. Interpres: Omnia facere possunt folia ejus tribus obolis accepta. Ego Dioscoridi magis adhæreo quam interpreti. Quoniam Dioscorides de lacte esulæ, tanquam potentiori, jubet dari coclearium, id est drachmam mediam de fructu integram: de radice duas: de foliis, tanquam debilioribus tres. Nec obstat quod à Simone adducitur in expositione holcæ, quod obolum significat ex concordia Dioscoridis & Avicennæ cap. Lassar: quoniam in Dioscoridis Græco exemplari legitur pondus oboli, non olcæ, ut apud interpretem.

C A P. XLVIII.

De Nabach similiter appendente drachmam.

Nabach ex concordia Principis prima iij. de curâ quartanæ, cum Rasi ad Almanforem lib. decimo, de cura eadem, est avellana sive drachma. Est necessarium (inquit Princeps) ut des in potu omni mane quantum est nabach, de eis quæ sunt sicut mendicamen de assa. Rasis post descriptionem confectionis de assa. Sumatur ex hoc medicamine quantum est avellana, & confirmatur ex Principe canone: tract. 1. in fine descriptionis confectionis prædictæ: Dosis ejus sit pondus drachmæ unius.

C A P. XLIX.

De Avellana drachmæ pondere.

Vide etiam sequens caput.

Avellana drachmam significat. Avellana (inquit Princeps) est drachma una. Quod & Galenus sentire videtur de theriacæ commoditatibus libello: mensura, inquit, theriacæ aliâ alia utens bene facies, aliâ autem fabæ Ægyptiæ magnitudinem cum aqua assumens, quando per acutum fuerit futurum tempus vel spacium ad digestionem Aliâ autem avellanæ magnitudinem, sic faciens, bibet quando plus ad digestionem tempus habes. Er

quinque & viginti. Nec obstat quod apud Principem legitur. Allacraiat magna est quatuordecim seminet, id est, oboli. Hunc enim textum mendosum esse, Serapionis dicta Septimo breviarii, à quo Princeps accepit, aperte demonstrat. Cum enim dixisset Serapio: Nux est quatuordecim seminet, subjunxit: Assabassa parva, est seminet septem. Avicenna verò post nucis expositionem, statim subjunxit: Assacraiat magna est quatuordecim seminet, cum tamen Serapio non allacraiat, sed assabassa scripserit. Ipse quoque Avicennæ textus, seipsum arguere videtur erroris, quoniam paulò infra inquit Allacraiat est sextaria sex & quarta. Sed hoc ascendit ad drachmas quinque & viginti, ut præ ostendimus; quod est pondus longè majus quam oboli quatuordecim, quoniam in decuplo majus & amplius, ut bene calculanti facile appareret. Sunt enim seminet quatuor, duæ & tertia pars drachmæ: ad quos drachmæ quinque & viginti proportionem habent decuplam, super decupartientem quartadecimas, drachmæ enim quinque & viginti in seminet, id est obolos resolutæ, centum quinquaginta producunt obolos, qui quatuordecim decies continent & quatuordecimas decem, vel eorum quinque septimas, quod idem est. Quamvis Dioscorus in eo qui illi inscribitur de ponderibus libello videatur scribere & ipse Sacraiat magnum, est seminet quatuordecim, id est, drachmæ quinque & grana sex & triginta. Quod non videtur posse stare, quoniam seminet, ut superius exposuimus, est obolus, quia harme medietas, ut Serapio testatur. Si vero seminet quatuordecim, drachmas quinque facerent, & grana sex & triginta, non esset seminet medietas Harme, id est, scrupuli, imò excederet scrupulum. Si quæ Dino attribuitur, vera esset expositio, seminet contineret grana octo & viginti paulò plus, & consequenter non esset obolus, nec medietas Harme, id est, scrupuli: imò excederet scrupulum per sextam ejus partem, grana scilicet quatuor, paulò plus, quod contradicit Serapioni. Præterea Sacraiat, quod ex Principis ac Serapionis descriptione, habet sextarios sex & quartam, id est, drachmas quinque & viginti, majus est illo, quod drachmas quinque & mediam tantum: & longè majus, quoniam quinquies paulò minus, ergo non illud, sed hoc magnum dici mereretur. Quamobrem dicendum videtur sextarium Arabicum semunciam, Allacraiat uncias tres & octavam significare, vel sextaria sex Arabica & quartam, & in hac significatione usus est libro divisionum cap. i. de Alopecia, dum præcipit potandam scamoneæ quartam drachmæ unius in sex sextariis & quarta lactis acetosi: ac si diceret, in sacraiat uno lactis: dicendum quoque assabassa nucem significare & eam in magnam & parvam dividi, magnamque quatuordecim, parvam vero septem pendere obolos, ut ex Serapionis dictis elicere quivis diligentius considerans indubiè potest. Huic sententiæ nostræ ignotus quidam assentiri videtur parvo quodam suo de ponderibus tractatulo. Princeps nucis majoris pondus dari aliquando jubet, quam assabassam vocat Serapio de nucè: apud ignotum Græcum aliter legitur, ut infra, Deo dante, videbimus.

C A P. LVIII.

De Sacros, id est, uncia.

Sacros ex concordia Serapionis cap. de Lycio, & Rasis continentis xxij. cap. eodem, unciam significat. Quando bibitur (inquit Serapio) ex fructu ejus sacros, laxat phlegma. Rasis, & sumere de fructu ejus ad pondus uncia unius, laxat phlegma aquosum.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

C A P. LIX.

De Auguen & adar, quorum utrumvis uncia est.

Auguen ex Serapione videtur uncia. Adar etiam apud eundem & Principem exponitur uncia.

C A P. LX.

De Assatis, id est, uncia.

Assatis ex Serapione est uncia.

C A P. LXI.

De Assatil, id est, uncia.

Assatilex Principe similiter uncia.

C A P. LXII.

De Libris diversis & earum divisione.

Libra communis uncias habet duodecim, aureos duos & septuaginta, drachmas sex & nonaginta, obolos quingentos sex & septuaginta: grana sex millia noningenta duodecim. Libra Nicolai uncias similiter duodecim, drachmas centum octo, obolos quingentos quadraginta, grana sex millia quadringenta octoginta. Veneta uncias similiter duodecim, drachmas sex & nonaginta, obolos quadringentos octoginta, grana quinque millia septingenta sexaginta. Attica libra habet & proprias uncias duodecim, drachmasque sex & nonaginta, obolos autem quadringentos, quinquaginta, grana autem quinque millia quadringenta, qui tamen granorum numerus, novem tantum uncias communes cum tribus octavis perficit, id est, drachmas communes quinque & septuaginta, unde Priscianus.

*Ter quinque hanc denique drachmis,
Et ter vigenis tradunt explier illam.*

C A P. LXIII.

De Librarum inter se proportionibus.

Librarum inter se proportionēs tales existunt? Communis libræ ad Nicolai libram proportio est sesquiquinta decima. Ad Venetam sesquiquinta. Ad Atticam sesquitercia super quadrartiens septimas. Nicolai ad Venetam sesquiquinta, Venetæ ad Atticam sesquiquinta decima.

C A P. LXIV.

De Libra Partitionibus.

Libram in multas partiri possumus partes: in medietates, tertias, quartas, sextas, octavas, duodecimas, vigesimas quartas. Et ex his quidem aliquotæ dicuntur partes: quoniam aliquoties sumptæ, libram reddunt adæquatæ. Libræ nempe medietas, selibra, vel semis dicitur, uncia scilicet sex. Pars tertia, triens: quarta, quadrans: sexta, sextans: octava, scuncia, uncia scilicet & media: duodecima, unde quarta & vigesima, semuncia, drachmæ scilicet quatuor, stater apud nostros, σάτης apud Græcos, sextarius Arabibus dictus. In libræ vero partes non aliquotæ, deunx, decunx vel dextrans, dodrans, beffis vel bes, septunx, quincunx. Est autem deunx libræ pars illa tota quæ remanet dempta uncia, uncia scilicet

X 2 unde

undecim decunx vel dextans, quod dempto sextante remanet uncia scilicet decem: Dadrans, dempto quadrante, relinquitur, uncia novem. Bessis vel bes quod superest dempto triente, uncia octo. Septunx, remoto quincunxe manet. Advertendum tamen, quod triens, quadrans, sextans, ex se confusæ tantum, non distinctæ quantitatis significationem habent: sed ab his ad quæ referuntur mutantur. Quadrans enim quamvis totius alicujus partem quartam semper significet, quanta tamen dearticulatè sit, apte non explicat, toto non precognito, cujus est quadrans, à quousque adeò distincta quadrantis significatio pender, ut eo variato, & quadrantis significatio necessario varietur. Nam si ad libram refecatur quadras, unciarum trium pondus erit: si ad unciam, Sicilicus: si ad aureum, scrupulus: si ad drachmam, obolus & semis. Idem de triente & sextante proportionabiliter dicendum. Quorum varium significatum, apud Celsum, Plinium, Hali abbatem, Vitruviumque non raro reperire possumus.

CAP. LXV.

De Rotulo, id est, libra.

Rotulus ex concordia Galeni lib. de Phlebotomia; cap. 8. cum Rasis ij. continentis cap. ij. est libra. Scribit de quodam juvene Gal. flegmantes oculos habente, ablatis sunt sibi prima ablatione sanguinis ℥ij. deinde hora nona, &c. Rasis ubi supra & juveni in lib. flebotomia: erat quidam juvenis cui minui & extraxi quasi tres rotulos & in nona hora. Item ex concordia Serapionis ij. brevii, cap. xv. de speciebus vomitus, cum Rasis v. continentis cap. ij. ℞. inquit Rasis granorum granatorum acetosorum ℥xxx. mastice ℥i. coquantur in rotulo uno aquæ usque dum perveniet ad medium. Serapio, ℞. granorum granatorum coquantur cum libra aquæ donec remaneat medietas. Similiter ejusdem Rasis xij. continentis cap. i. descriptione duplici, quot incipit. ℞. staphisagria rotulum unum, &c. cum Avi. xxi. tertii cap. de epithematibus & emplastris ad sciaticam, ubi Rasis rotulum, Avi. libram scripsit.

CAP. LXVI.

De Mina multiplici.

Mina multiplex est: Graia, Attica, Italica, Ægyptia & Romana, Graia Plinio, Paulo, Prisciano & Ignoto Græco, centum drachmas pendet, uncias scilicet duodecim semis. Attica quinque & septuaginta ex Prisciano, quæ & Attica est libra, quamvis apud ignotum Græcum legatur, mina Attica stadia tria, id est, semuncia. Item mina habet uncias novem. Item mina parva oboli quindecim: in Plinianis castigationibus Hermolai, mina est libra. Mina vero Italica & Ægyptia Paulo, Serapioni & Principi, uncias viginti, quæ apud Serapionem & Principem dividitur in sextarios quadraginta, libra vero in viginti. Legendum videtur non viginti, sed quatuor & viginti, quoniam productorum inter se & productum eadem debet esse proportio necessario, sed unciarum viginti ad duodecim est superbipartiens tertias, quadraginta ad viginti dupla, ad quatuor vero & viginti similiter superbipartiens tertias: quia, &c. Advertendum quoque diligenter Minam & eminam non idem esse, ut sentire videtur Simon, imo inter se maxime distare cum altera pondus, altera mensura sit. Eminam mensura est congii pars duodecima, sextarii medietas, cyatos sex continens, mistra magna tria, oxybassos quatuor, de qua

cum de mensuris tractantes latius differemus. Mina vero non mensura, sed pondus existens, multiplex est & ipsa, ut in mina diximus. Graia drachmas pendens centum ut Priscianus testatur. Accipe præterea parvo quam nomine Graia. Minam vocitant, nostrique minam dixere priores, centum fert hæc drachmas. Plinius similiter libro vigesimo primo cap. ultimo, quam nostri minam vocant pender drachmas Atticas centum. De emina, cum acetabuli mensura dicitur, significat eminam quattam, id est, drachmas quindecim. Hic emina, quamvis sit mensura, notificatur per pondus, quod est drachmarum sexaginta, cujus emina pars quarta est oxybassus aut acetabulum.

CAP. LXVII.

De Ominos, id est, mina.

Ominos ex concordia Dioscoridis & Serapionis de modo dealbandi lithargyrum, minam significat. Pone (inquit Serapio) in unaquaque ominos lithargyri, quinque atogochilos salis ex minera. Dioscorides εἴτα μίνας τῇ μὲν τῆς λιθαργύρου ἀλῶν ὀρυκτῶν οὐγγίας εἰ. Quare ominos minam, atogochilos drachmam significat.

CAP. LXVIII.

De Manes (alias manei, manii) id est, mina.

Manes vel manei & interdum manii, ex concordia Serapionis de simplicibus cap. de stilla, & Serapionis vij. Breviarii de modo conficiendi acetum scilicet cum Dioscoride, de aceto squillitico, Minam significat: Servatur (inquit Serapio cap. de squilla) quantitas unius manes, & projiciantur super eam duodecim Kist acetii. Septimo brevii. ℞. squilla minam unam. Dioscorides λαβὼν μνῆν μίαν ἐξ αὐτῆς καὶ τὴν ἐξ ἑσῶς ὄξος καλῶς. Serapio item cap. de mandragora, accipiat de vino dulci amphora una, & projiciatur in ea tres manei de radice mandragoræ. Dioscorides in Latino exemplari, conficitur, & vinum cum cortice radice ejus, ut in unum amphoram vini, tres minas radicum ejus infundas. De loqua quoque squamæ aris scribens Serapio cap. de arei ℞. inquit de squama optimè purgata, mediam manii. Dioscorides ἡμίμνηνον, id est, minam mediam. Stephanus menam.

CAP. LXIX.

De Alhemion, id est, pondere unciarum xij. & semis.

Alhemion apud Serapionem Breviarii septimo de ponderibus, sextaria habet viginti quinque: igitur drachmas centum. Quoniam sextarius apud Arabes stabere est, sive semuncia quod idem est. Quare alhemion est mina Græca drachmas centum pendens, ut Paulus, Plinius, Priscianusque testantur. Corruptus igitur videtur Principis textus cum dicitur: Alhemion est sextarii quinque & drachmas triginta, & auruli quatuor. Ideoque castigandus videtur, ut quadret Serapioni à quo Princeps accepit, & ipsemet testatur. Alhemion est sextarii quinque & viginti. Alhemionem quod Alhemionem.

LIBER TERTIUS

De Mensuris.

CAP. I.

De Mensuris in universum.

Circa medicinales mensuras, (de his enim sermo noster futurus est) præmittendum videtur, quod mensurarum observationes crebriore usu à medicis usurpatæ, apud Græcos quidem fuere communes & Attica: apud nostros Italia & Romana: apud Arabes Ægyptia, Syra & Alexandrina de quibus particulariter suis dicemus locis. Hic tamen præmonuisse placeat quod ad omnium mensurarum notitiam apertior rem, spectare visum est, Quod notificare mensuras duplici possumus via, per mensuras majores & minores, scilicet, aut per pondera ad mensuras relata. Exempli causa, Si queratur quid sit cotyla, & respondeamus sextarii est medietas, aut mensura cujus sexta pars est cyathus, per majorem & minorem mensuram cotylam declarabimus. Per pondus autem, si dixerimus, cotylam uncias esse novem olei: via vero prior certior stabiliorque est, nullius mutabilitatis susceptiva, quod de secunda verificari non potest. Quamvis enim cotyli nulla, major aut minor sit sextarii medietate, nec cyathos plures aut pauciores sex continere possit, nos tamen semper erit novem uncias, imo & decem & eo amplius aliquando reperitur. Una enim, eademque mensura, in se suisque dimensionibus nullatenus immutata rerum mensurarum causa, pondere non æqualium, variari quoad pondus multipliciter potest: Cotyla namque, si quidem oleum mensuret, uncias capiet novem tantum: si vinum vel aquam, decent si mel, tredecim semis. Diversorum, certe ponderum oleum, vinum vel aquam & mel, una eademque mensurata mensura, ita ut sit vini vel aquæ ad oleum proportio sesquino-na, mellis ad idem sesqui altera, ad vinum vero vel aquam sesquitercia paulò plus. Harum proportionum Paulus Practicæ septimo, ignotus Græcus, & Priscianus suis de ponderibus tractatulis meminere. Serapio & Princeps licet aperte non exprimant, intelligentem tamen exemplis multis, ad earum notitiam excitant. At ita esse nos experti testamur. Variantur item mensuræ in se regionum, locorumque varietate. Atticas namque ferè omnes, Italiæ atque communes sesquiquinta in proportionem superant: Italas vero ac communes sesquinona Romanæ, ut suis locis, Deo Dante, monstrabimus. Est & alia distinctio, cum siccis liquida comparantur. Nam si ad res siccas, puta pulveres, mel ipsum comparaveris, ejus ad illos quadrupla nascetur proportio, & hoc illud est, quod Canone quintò Princeps & Breviarii septimo Serapio his verbis admonent. Cochlearium mellis, est aurei quatuor medicinarum unus.

CAP. II.

De Cochleari minimo, mensurarum omnium minima, & via compositionis prima.

Cochlear minimum, mensurarum omnium, mensura est minima, & via compositionis prima. Via vero resolutionis ultima, pondere quidem drachmam mediam capiens, quæ mystri parvi communis, pars est duodecima: cyathi vero quarta & vigesima: Unde Priscianus cochlear extremum est, scrupulum imitabitur instar. Extremum quidem est, quoniam est ultimum, in quod quum mensurarum divisio descendit, non ultra progreditur. Apud medicos imitatur scrupulum: quoniam ut quatuor & viginti scrupuli

unciam, sic quatuor & viginti minima cochlearia, cyathum complent. Cochlearia duo minima simul juncta, pariunt cochlear parvum: tria magnam à quibusdam vocatam conchulam: octo maximam apud medicos idoneos. Quadruplex est cochlear, maximum, minimum, magnum, & parvum, pondere, ut diximus & mensura distincta. Minimum drachmam mediam parvum integram, Magnum sesquidrachmam, aut secundum Aetium didrachmam, Maximum semunciam pondere capit. Cochlearia parva sex, mystrum commune parvum faciunt: duodecim cyathum: brialam Cyathus & semis, oxybaphum, acetabulum ac sunesi, acsasse, anesimen, cyathi duo, mistrum commune magnum, Pugillum, mestrum muchitrum: Cyathi tres, cotylam mediam, calicem integrum: Cyathi sex, mistra magna tria, oxybassos quatuor, cotulam integram, fialam integram, corboni, emnam, calices duos. Cotylæ duæ, Xestem, Sextarium, Kist, acsati. Sextarii duo, duruch vel dorach Arabicum. Sextarii sex congiuntus, chaus, choan, iohen: congii quatuor, urnam. Unæ duæ, amphoram Italianam, vocatam à nostris Quadrantal, à Græcis Keramion Italicum, ab Arabibus duruch vel dorach Italicum. Urnæ tres amphoram Atticam, five cadum Amphoræ Italicæ viginti, culcum faciunt, mensurarum omnium maximam continentem cochlearia minima, ducenta sex & septuaginta millia quadringenta & octoginta. Hæc de mensuris cursim & quasi per transitum quodammodo scripsimus à minoribus orsi, quarum compositione majores concreverunt. Post hæc circa unam quamque diutius immorantes, majorum in minores sectionem faciemus, Ubi si quid occultum aut expositione dignum visum fuerit, tentabimus, quantum nobis divina bonitas tribuerit, explanare, in lucemque deducere, testibus adductis fide dignis, Dioscor. Galeno, Alexandro, Paulo, ignotoque Græco, Principe Aboalij, Serapionibus utriusque, Rasi, Hallabbate, Plinio, Prisciano, ac Simone nonnullam Januensi.

CAP. III.

De Culeo Mensurarum maxima.

Culeus est mensurarum maxima, amphoras Italicas viginti capiens, Plinio teste lib. xiv. & Prisciano de ponderibus & mensuris tractatulo.

CAP. IV.

De Amphora.

Amphora Italica, mensura est pedis quadrati, octo & quadraginta continens sextarii os Festo, Prisciano & Paulo, quam nonnulli ex nostris quadrantal Græci Keramion, ut diximus Ital cum vocant, Arabes duruch vel dorach Italicum & nonnunquam alduruch vel aldorach Italicum, quod idem est apud illos. Habet autem pondere duas & septuaginta libras olei: vini, vel aquæ octoginta: mellis vero centum octo. Hujus dimidium Urnam dicimus: partem octavam, Congium. Quartam & vigesimam Dorach, vel Duruch Arabicum. Octavam & quadragesimam Sextarium. Sextam & nonagesimam Mystrum magnum commune. Tricentesimam quartam & octogesimam Oxybaphum, vel Acetabulum. Quingentesimam sextam & septuagenam Cyathum. Millenam centenam secundam & quinquagenam Mystrum commune parvum. Millenam septingentenam octavam & vigenam Cochlear maximum. Ter millenam quadringentenam, sextamque & quinquagenam cochlear magnum. Sexies millenam noningentenam duodecimamque Cochlear parvum. Tredecies millenam octingentenam quattamque & vigenam Cochlea-

minimum, quod quidem ultimum in divisione, Drachmam mediam pondere continet.

Attica præterea discenda est amphora nobis,

Sen cadus, hanc facies, nostra si adjeceris urnam.

Amphora vera Attica has urnas continet. Amphora Italica duas capit urnas, Attica vero tres ex Prisciano quæ & cadus & metreta dicitur. Quod autem Amphora Italica Keramion Italicum duruch vel dorach Italicum idem sint re, licet nomine differant Græcorum atq; Arabum medicorum cum nostris de mensuris concordia, facile monstrat. Septimo quidem Practicæ Paulus Keramion Italicum, habet choas octo, choa Xestes sex, Xestes autem idem quod sextarius Italicus, ut ostendemus. Octies autem sex, octo & quadraginta produciunt: ergo totidem continet sextarios, apud Græcos Keramion, quod apud nostros Amphora, propter quod unam & eandem mensuram dicendam Amphoram & Keramion, soloq; nomine inter se dissimilia. Eodem modo apud Serapionum Breviarii septima. Duruch Italicum habet chaus octo, chaus unum, est sex acsati. Sed acsati idem quod sextarius, quare duruch Italicum apud Serapionem octo & quadraginta sextarios habet, & consequenter idem est quod Amphora Italica vel Keramion Italicum. Et consimiliter deduci potest dorach Italicum apud Principem eandem esse mensuram, quæ Amphora vel Keramion Italicum, aut quadrantal. Advertendum tamen non temere dictum dorach Italicum Dorach enim vel duruch absolute prolatum, non Amphoram Italicam significat, sed librarum trium pondus tantum, sicuti canone quinto Princeps & Breviarii septimo Serapio exposuere, in qua significatione eorum uterque posuit, cum absinthiacum oleum describere. Fundatur inquit Serapio ex oleo sisamino in pixidem dorach unum, herbæ absinthii uncia duæ. Princeps, & olei sisamini daurach unum, absinthii uncias duas, quamvis in quibusdam exemplaribus corruptè legatur, danich unum. Hoc autem ex Hali abbatis concordia ostenditur, qui uncias duas ex oleo sisamino fumendas scripsit, id est libras tres & absinthii uncias duas, ejusdem olei descriptione.

C A P. V.

De Urna id est Amphora dimidia.

Urna est medietas amphoræ Italicæ, sed Atticæ pars est tertia: excedit enim Attica Amphora, quæ & cadus, ut scripsit Priscianus & metreta dicitur, ut ignotus Græcus. Amphoram nostram, per urnam unam hanc facies nostræ (similem) si adjeceris urnam, scripsit Priscianus in verbo amphora.

C A P. VI.

De Congio.

Chus vel congius, amphoræ pars est octava, sextarios continens sex: corylas sive heminas duodecim, pondere vero libras habet novem olei, vini vel aquæ decem, mellis tresdecim semis. Hanc mensuram nostri congium Prisciano teste,

Ac corylas has si placeat, dixisse licebit,

Heminas geminas recipit sextarius unus,

Qui quater assumptus, sit Graio nomine chœnix:

Adde duos chus, sit vulgò, qui est congius, idem,

A quo sextarii, nomen fecisse priores,

Crediderim, quos eos capiat sex congius unus.

Græcicus vel choam vocitant testibus Galeno, ignoto Græco ac Dioscoride. Arabes interdum chaus, ut Serapio interdum Iohem, ut Princeps. Hoc quod ita

fit, eorum de mensurarum expositione concordia monstrat. Choa inquit Paulus, octava pars Keramij, habet xestes sex: xestes autem corylas duas, erit itaque choa idem quod congius, xestes idem quod sextarius, idemque judicium de chaus & Iohem, cum chaus pars octava sit duruch Italici apud Serapionem: Iohem vero octava dorach Italici, apud Principem, & eorum utrumque acsati sex apud illos obtineat, apparet apud Serapionem chaus, apud Principem Iohem, eandem importare mensuram, illam scilicet, quæ à nostris congius à Græcis vel choa dicitur, quæ libras novem capit olei, ut diximus, & ex concordia Serapionis ac Dioscoridis cap. de resina, convincitur, ubi enim Dioscorides choam, Serapio novem scripsit libras.

C A P. VII.

De Missohaos, id est, congi dimidio.

Missohaos ex concordia Serapionis & Dioscoridis, de modo aromatizandi adipem, cap. de pinguedine & adipe, est mensura congi medietatem capiens. & inquit Serapio ollam novam terream capientem circa libras triginta, & pone in ea adipem, & super hoc vinum missohaos. Dioscorid. & χος & μισον & οινος, hoc est, congium medium: libras scilicet quinque, est enim choa vini, librarum decem.

C A P. VIII.

De Sextarii.

Sextarius Italicus est mensura, quæ congi pars est sexta corylas aut eminas duas continens, cyathos duodecim. Unde Priscianus,

Sextarii cyathus pars est quæ est uncia libra.

Sicut enim libra duodecim continet uncias, ita sextarius duodecim cyathos. Sed si emina, ut scripsit Simon, cyathos novem habuerit, cum ipsa sit sextarii medietas, cyathos decem octo sextarius continebit, quod veritati non videtur quadrare. Habet autem sextarius Italicus, pondere olei quidem, uncias decem octo: vini, vel aquæ viginti: mellis septem & viginti. Romanus verò, ut apud Oribasium legitur, & Paulus testatur, olei viginti capit uncias, vini vel aquæ duas & viginti paulo plus: mellis triginta. Sextarium Romanum Serapio & Princeps, Kist Romanum vocitant, & sextarium Italicum Kist similiter.

C A P. IX.

De Sextario Attico.

Sextarius Atticus, habet olei uncias quindecim, vini vel aquæ & mellis secundum proportionem superius explicatam hujus tractatus, capite primo.

C A P. X.

Rursus de sextario varia Simonis Genuensis expositiones.

De sextario licet multa Simon noster dixerit, nihil tamen determinatum dixisse videtur, unde sciri certè possit, pro qua mensura vel pondere medicorum commentariis accipiendus sit. In emina namque expositione, Emina, inquit, dicta est, eo quod sextarii sit medietas, continet autem cyathos novem teste Alexandro de lacte dysentericis dando. Est autem, ut dixit, secundum Isido. mensura liquidorum, apprehendens libram unam: secundum vero Serapionem & Avic. & Campanum, qui reduxit pondera, quæ ponunt hi duo, ad grana, est undecim millia quingenta &

& viginti, & ipsa est sextaria quadraginta. Sed emina Romana est unciarum viginti, Italica & Ægyptia unciarum sexdecim. Sextarius est vigesima pars libræ. In expositione vero sextarij, Sextarius, inquit, pondus est drachmas sex habens & semis, ut apud Avic. in fine de ponderibus. Secundum vero libros antiquorum, est nomen mensuræ, & habet libras duas. Secundum antiquos: & alibi duas & semis: alibi duas & uncias octo: olei libram unam: mellis tres. Secundum Isodo. sextarius librarum duarum est in fine, Authore Papiæ. Sextarius est sextula pendens scrupulos quatuor, sic dictus, quod sit sexta pars uncie, quod idem est quod aureus. Hæc Simon ex quibus videtur eundem maximè ambiguum fuisse, quid sextarius, quidve emina apud medicos deberet intelligi. Nam si sextarius est mensura, cujus medietas est emina, & emina libram pendet, ut authore Isodo. scripsit Simon, quo pacto sextarius est pars vigesima, cum duas ipse capiat libras. Item si undecim milia quingenta & viginti grana, in quæ resolvitur emina, teste Campano, viginti producant uncias, quomodo emina unam tantum habebit libram, cum supra libram duos addat ipse trientes, quia uncias octo. Quo etiam pacto sextarij medietas appellari merito poterit, quæ eodem major esse videatur. Sciendum sextarium aliter apud Arabes aliter apud nostros accipiendū: apud illos enim ponderis nomen est semunciam denotans, ut in de ponderibus tractatu secundo diximus. Apud nostros mensuram significat, quæ congi pars est sexta, quam Græci xestem, Arabes aelat. & Kist vocant, quo vocabulo in hac significatione frequentissime utuntur: illo autem aelat scilicet perquam rarissime, quod ego legerim. Septima namque quarti de linimentis canitiem prohibentibus, scripsit Princeps, olei omphacini aelat tres. Rasis xxv. continentis olei omphacini rotulos quatuor descriptione eadem videtur legendum quatuor semis, aelat enim tres id est sextarij olei uncias quatuor & quinquaginta capiunt. Rotuli vero quatuor, octo & quadraginta tantum. In descriptione quoque confectionis anacardinae, canone V. aelat legitur tria, quamvis in quibusdam exemplaribus corruptè legatur asepti. Serapio vero acei scripsit, Haliabbas cados tres, & exposuit cadum continere uncias decem octo. Rarissime itaque legimus aelat, frequentissime vero Kist. Canone secundo de cucumere asinino in membrorum nutrimenti areola. Quando decoquitur radicis ejus libra media cum duobus Kist vini scripsit Princeps, Serapio similiter de simplicibus cap. eodem accipitur de radice ejus libra media, & teratur cum duobus Kist vini. Dioscorides in Græco exemplari τῆς ρίζης λαβὴν τε ἡμίλλην μετὰ δύοιν ξερῶν ὅντις μάλιστα λιβαρὲς λεγόμεναι in Latino libra radicis ejus, in vini xestis bullia duabus. Ecce quod Dioscorides xestem, Arabes Kist vocare. Corruptus vero videtur qui sequitur, tam Serapionis quam Principis rextus locis allegatis, scilicet & dentur omni die tres onolossat in potu de decoctione ejus radicis, quoniam minima esset potionis quantitas tres onolossat, quia drachma media tantum, cum onolossat obolum significet, sex autem oboli faciunt drachmam, ut præostendimus tractatus secundi cap. 1. & cap. obolus. Dioscorides etiam ubi supra non obolos tres, sed cyathos tres dari de decoctione jussit, in exemplari Græco, δίδοναι ἐν τῷ τὴν νύκτι, Cyathi autem tres semicorylam faciunt, uncias scilicet quatuor & semis. Selibra radicis ejus inquit Dioscorides in Latino, xestis bullia duabus trita & accepta cyathis tribus per triduum, hydropticis humores ventris spargit. Confirmat hoc Rasis continens xxij. cap. dicens de cucumere similiter asinino, qui decoctionis antedictæ uncias quatuor semis dandas scripsit. Itaque apud Serapionem &

Principem castiganda est litera, ut non onolossat tres, sed cyathi tres scribantur. Quoniam vero hæc quasi digredientes diximus, redeamus unde digressi sumus, ut ostendamus apud Arabes Kist frequentissime scribi, pro eo quod nos sextarium, Græci xestem scribunt. Quartadecima tertij, tractatu quarto, de cura asclitis, in medicina de squilla, quam à Paulo ad literam Princeps accepit. Decoquantur, inquit, squillæ libræ duæ in Kist vini tribus. Paulus Practicæ tertio, cap. xlvij. cura eadem: & hoc inquit est valdè bonum interioris squillæ libræ duæ in vini austeri xestis tribus. Item xxij. tertij, tractatu ij. De epithematibus & emplastris ad sciaticam, & picis humidæ, &c. & paulò post staphisagria Kist unum est & cotile duæ inquit Princeps. Galenus quoque vij. miemir descriptione diacodion secundum mentem propriam: mihi autem inquit experientiam habenti de prædictis constructionibus, visa est esse melior illa, in qua pro quolibet xeste uno aquæ, ponuntur codiæ decem, sicut scripsit Criton, Alexander: Galeni verba quasi ad literam referens, mitte, inquit, in sextario uno aquæ, papaveris capita decem. Avic. canone v. cap. vi. in syrupi de papavere descriptione, oportet inquit ut accipiantur centum papavera viridia vel media. Deinde projiciantur super ea Kist decem aquæ pluvialis. Galenus xestem, Alexander sextarium, Avic. Kist scripserunt. Paulus quoque vij. practicæ descriptione diacodion. Item libro 4. de nervorum vulneribus anethi xestem unam, picis libram unam, oppopanacis uncias tres, quam eandem scribens Avic. vij. quarti de cura morsus à cane rabido, Kist unum. Serapio Practicæ vi. similiter de cane rabido, acetæ libra una & media. Item vij. Practicæ descriptione theriacæ, vini acuti Kist duo & sunt libræ tres. Ex his evidenter apparet, verum videri mensuram illam, quæ à Galeno, Paulo, Dioscoride & Alexandro vocatur xestes vel sextarius, apud Principem Kist appellatam. Apparet etiam Kist non esse mensuram illam quæ hordei uncias capiat decem & octo, vini vel aquæ septuaginta, mellis centum octo, quod apud Principem in pluribus exemplaribus corruptè legitur. Hoc etiam non omittendum videtur, quod apud Haliabbatem Practicæ decimo theriacæ descriptione, ubi Paulus xestem, Serapio & Princeps Kist, Stephanus cadum semper scripsit, vocabuli proprietatem minime servans: quoniam cadus non sextarium unum tantum, sed duos & septuaginta capit: est enim Attica amphora, ut Priscianus: vel meirera, ut ignotus Græcus unarum trium capax mensura, quod & Plin. sentire videtur l. b. xliij. de Cæsaris liberalitate, quem triumphii sui cæna vini Phœlerni amphoras centum, Chij cados centum distribuisse testatur. Idem scribitur à Januense Papiæ authore. Abusus itaque vocabulo videtur Stephanus, qui xestis vel sextarij loco cadum scripsit. Deinde quoque practicæ, olei nardini descriptione, olei fissam cados quinque, & est in cado libra & media. Quod peccati genus Avicennæ quoque interpres xx. ij. cap. xxij. frequenter & aliis aliquando locis incurrisse deprehenditur. Ex quibus omnibus colligimus, xestem sextarium Kist, aelat, vel aelat nomina esse synonyma, mensuram importantia quæ sexta congi pars est, si Kist Italicum, aut sextarium Italicum intelligamus, non autem Atticum aut Romanum.

C A P. XI.

De coryla id est Sextarii dimidio.

Coryla congi quidem pars est duodecima, sextarij medietas, iusta magna tria, oxibaphos quatuor X 4 cyathos

cyathos vero sex capiens, pondere autem, olei uncias novem, vini vel aquæ decem, mellis tredecim semis, quam Græci *κοτύλη*, *τρυβλίον*, & *τρεβλίον*: Arabes corboni, corylum, & interdum corylam. Nostri eminam, Stephanus autem sæpe menam appellant Simon tamen exponit eam, authore Galeno, uncias novem, id est duas & septuaginta drachmas: authore vero Isidoro, drachmas sexaginta tantum, quorum utrumque verum est, secundum diversas tamen observationes. Quoniam Galenus communes, Isidorus Atticos sequitur, quorum mensuræ ad communes relatæ minores sunt sublesquiquinta in proportionem, ut sexaginta ad duos & septuaginta. Nec hoc à vero dissentire videtur, his qui communium mensurarum ad Atticas habitudinem norunt. Quod autem ab ignoto Græco videtur dici, coryla, est oxibaphi duo, non putamus verum, quoniam contradicit Paulo, Serapioni, Principi, Prisciano, & postremo ipsemet dicenti coryla, habet uncias novem quare videtur illud non ignoti Græci dictum, sed superadditum, aut scriptoris vitio depravatum.

CAP. XII.

De Chœnice.

Chœnix ex Dioscoride coryle tres: ex ignoto Græco & Prisciano octo sextarii, licet quatuor Italici.

CAP. XIII.

De Chinica, id est chœnice.

Chinica ex Dioscoride idem.

CAP. XIV.

De Hemina seu cotyla.

Hemina, idem quod Cotyla Prisciano teste.

At Cotylas quas si placeat dixisse licebit.

Eminas geminas recipit sextarius unus.

Habet autem emina, ut in coryla diximus, cyathos sex, non novem, ut scripsit Simon. Cum enim sextarius cyathos duodecim tantum contineat, non poterit ejus medietas novem continere. Quoniam si sic, decem & octo cyathos, sextarius contineret, & tunc cyathus esset pars sextarii decima octava, non duodecima, sicuti Priscianus testatur.

Sextarii cyathus pars est quæ est uncia libra.

Quod si concederetur, cum cyathus sit unciam & mediam capiens mensura, tunc sextarius decem octo continens cyathos, libras duas cum quadrante caperet: olei uncias septem scilicet & viginti, & consequenter amphora, quæ teste Paulo, Festo, Prisciano, Principe ac Serapione octo & quadraginta capit sextarios, duas scilicet & septuaginta libras: olei tantum centum & octo contineret, mellis vero centum duas & sexaginta, quod authoribus antedictis omnibus contradicere videtur. Non igitur videtur concedendum, quod emina cyathos novem capiat, multoque minus, quod uncias viginti, aut grana undecim millia quingenta viginti, quod idem est. Hoc enim dato, cum emina sit sextarii medietas, tunc pars æquaretur toti, imò major esset emina scilicet sextario. Quoniam sextarius est uncia decem octo, ut in verbo sextarius Italicus. Castiganda videtur igitur Simonis expositio, ut dicatur, Emina est sextarii medietas, cyathorum sex mensura. Ubi autem dicitur, quæ emina Romana est uncia viginti, aut grana undecim millia quingenta viginti, prima abrasa litera mina Romana non emina legendum videtur, ut dicitur mina Romana uncias viginti pendet, aut grana undecim

millia quingenta viginti. & tunc inter Simonem & authores antedictos nulla de hoc erit controversia. Et forte taliter scripsit Simon, sed scriptorum negligentia fuit depravatum. Ad Alexandrum verò de lacte dysentericis dando, quem Simon adducit, ut ostendat eminam novem cyathorum esse mensuram, tentemus, &c. ut tota impleatur emina. Sciendum quod liquidorum mensurabilium apud medicos levissimum est oleum, gravissimum mel, ut tractatus hujus cap. primo diximus, mellis ad oleum proportio est sesquialtera, emina namque olei uncias novem pendet, mellis tredecim cum dimidia. Cyathus autem pendet unciam unam & semis. In emina igitur, olei sunt cyathi sex, quo ad mensuram & quo ad pondus: Quoniam mensuras sex, vocatas cyathos, recipit emina olei, quorum quælibet unciam & mediam pendet. Sexies autem uncia una & media sumpta novem producit uncias: In emina vero mellis sunt item quo ad mensuram, cyathi sex solum non plures: Quo ad pondus vero plures quam sex, quia Novem. Nam si dividuntur uncia tredecim semis, per unciam unam & mediam, quod est pondus cyathi, proveniunt novem. Quare in emina mellis, sunt cyathi novem, quo ad pondus licet quo ad mensuram sex tantum. Quoniam mensuræ sex appellatæ cyathi cujuscunque liquoris fuerint, illam replent ad summum, quam cyathi mellis sex, quo ad pondus, non replerent, quia sunt quatuor tantum quo ad mensuram uncia scilicet novem. Ut ergo tota impleatur emina cyathis novem, quo ad pondus, sex autem mensura indigebit. Ad quod respiciens Alexander, inquit, tentemus igitur lac dare quantum capere possunt tres cyathi. Post duas horas alterum tantum aliquibus & tertio damus, ut integra impleatur emina, pondere scilicet, quæ novem constat cyathis. Cyathi enim sex pondere, id est uncia novem non replerent eminam integram ponderalem totam, cum illa uncias tredecim semis capiat, addendi erant iterum cyathi tres pondere, id est uncia quatuor semis, & hoc voluit Alexander, ut sentio. Non ergo dicendum, quod emina cyathos novem contineat, id est mensuras appellatas cyathos, quos sextarii Italici partes duodecimas authores exponunt.

CAP. XV.

De Reielati, id est, mensura cotyle media ut videtur.

Reielati apud Principem canone V. in descriptione unguenti diachylon, videtur corylæ medietas, vocata calyx, id est uncia quatuor semis: cui concordat ignotus quidam, quamvis Mundinus exponat uncias quatuor tantum. Ex Paulo tamen Practicæ septimo ex antidotario, ac ex Rasi ad Almanforem vij. de scrophularum cura, videtur posse elici quod diximus. Similiter ex Serapione vij. Practicæ, & Principe quinto canone, descriptione electuarij, quod stat loco Alcanzi.

CAP. XVI.

De Fiala, id est, cotyla.

Fiala ex concordia Rasis iiij. continentis, charta lxxxij. columna prima descriptione secunda pillar. ad asthma cum Avicena xij. de cura asthmatis, cotylam significat. Post horam scripsit Rasis detur in potu, post eas cotyla media. Et confirmatur idem ex concordia ejusdem Rasis iiij. continentis charta, cap. i. columna iiij. circa principium, cum Galeno V. de interioribus. Rasis enim exponit fialam unciarum novem, mensuram pleuritis reijciunt quaque die sex vel septem fialas, sed fiala est novem unciarum. Galenus vero loco allegato. Si quaque die quantitas sanici

saniei quam ferant condunetur, inveniet illam sex aut octo cotylas. Castigandus vero videtur textus Rasis in prædictatum pilularum descriptione loco prædicto, ubi fialam mediam, exponit uncias novem, quoniam, contradicere dictis suis superioribus & Galeno, & scribendum videtur, uncia quatuor semis, id est cotyla media. Similiter & principis litera corrigenda, ubi post descriptionem pilularum superius immediate descriptarum dicitur. *℥. pulpæ colo- quintidis danich duo, feminis urticæ, &c.* Deinde potentur drachmæ duæ aut tres aquæ mellis. Quoniam loco superius adducto, scribuntur à Rasi non drachmæ duæ aut tres. Et videtur textus Rasis melior. Quare inferri merito potest, fialam & cotylam unam & eandem esse mensuram: quamvis apud igno- rum quendam legatur, fiala est sexta pars sextarii, quod non videtur verum, quia tunc esset cyathi duo & non sex.

C A P. XVII.

De Mystrum communi magno.

Mystrum commune magnum, cotylæ pars est ter- tia, sextarii sexta, cyathorum duorum capax mensu- ra. Habet autem pondere, olei quidem uncias iij. vini, vel aquæ, uncias tres, scrupulos 8. mellis vero uncias 4. semis, testatur hoc Paulus, Serapio, & Princeps. Verum Serapio multum, Princeps mestrum ap- pellat. Galenus vero interdum pugillum ut exposuit Glossator, decimo de ingenio sanicatis, de cura ma- rasmi, ubi in exhibitione lactis asinini, dandum, inquit, prima die lactis pugillo uno non plus. Et infra, licebit tibi offerenti multitudinem lactis augere di- midij pugilli. Cui concordare videtur Joannes Da- mascenus de lacte phthificis dando, & oportet in- quit, ut lactis dandi quantitas comparetur virtuti sus- cipientis, quare incipiendum à quantitate minori dan- do de eo circiter uncias tres in prima die. Et in crasti- na addatur item. Mundinus quoque inquit, Pugillus est mensura unciarum trium. Et confirmatur iterum ex Galeno decimo ut supra. Qui denique ex ira fe- briunt, bibat aquæ frigida cotylas duas, id est, pugillos sex. Duæ autem cotylæ, sunt uncia decem & octo, quæ divisa per sex, reddat tria. Igitur pugillus videtur uncia tres. Quamvis apud Rasin sexto continentis charta 40. columna secunda, circa medium, expona- tur pugillus, Keraria sex, & Keratium est grana hordei quatuor, secundum quam expositionem pugillus esset quantitas scrupuli unius, quod non videtur verum. Ex his arguet quis Avicennæ textum positum decima ter- tij tractata v. de exhibitione lactis asinini, videri men- dosum. Et mulgeatur inquit, medietas sacraia, & est quantitas ejus, quod potu datur, in die primo. Sacraia- ti namque medietas, ut superius ostendimus est ses- uncia, id est, uncia & semis paulo plus. Quoniam Sa- craia ex Principis & Serapionis descriptione, est sex- tarii sex & quarta, drachmæ scilicet quinque & viginti: quare dissentire videtur à Galeno simul & Da- masceno de lactis exhibendi mensura. Quod au- tem ab ignoto Græco dicitur, quod mystrum ma- gnum, est cyathi tres, non videtur verum, quia tunc esset cotyle medietas, uncia scilicet quatuor semis, non partis ejus tertia, uncia scilicet tres, quod Paulus, Serapio, Princeps & Priscianus affir- mant. Quamobrem cogor credere tractatum illum vitiatum fuisse, multaque non rectè dicta ignoti, bene dictis fuisse superaddita.

C A P. XVIII.

De Calyce, id est, cotylæ dimidio.

Calyx, est fiala sive cotylæ medietas mensura scili-

cet cyathorum trium pondere, uncias quatuor & semis habens, ut testatur concordia Rasis iij. conti- nentis, charta lxxxij. columna prima, descriptione secunda pilulatum ad asthma cum seiplo libro eo- dem, charta lxxxv. columna, i. circa finem descriptio- ne iterum pilularum ad asthma, quæ sunt pene eadem, cum primis: cum Avi. x. iij. tractatu primo cap. xl. de cura asthmatis, descriptione pilularum earundem: Rasis post pilulas, charta lxxxij. descriptas, iussit dari aquam mellis ad fialam mediam: charta vero lxxxv. admodum unitis calycis, Avic. vero cotylam me- diam. Idem ergo est per horum concordiam calyx unus, quod fiala media. Sed fiala media, vel cotyla media, est uncia quatuor semis, ut in verbo fiala, igitur calyx est mensura unciarum quatuor semis. Quare mendosa videtur utraque expositio in Rasi su- per addita tam fialæ mediæ, quam calycis unius, cum utrumque exponatur uncia novem. Quare utrobique scribendum videtur, uncia quatuor semis, & non no- vem, hoc enim dato, pars æquaretur toti, quod est im- possibile.

C A P. XIX.

De Pugillo, id est, cotylæ triente.

Pugillus (ut in verbo Mystrum commune ma- gnum) mensura est cotylæ pars tertia pondere uncia- rum trium capax.

C A P. XX.

De Oxybapho, id est, sesquicyath.

Oxybaphum ex Principe, Paulo & Serapione, cyas- thus est cum dimidio, cotilæ pars quarta. Pondere au- tem, observatione communi drachmas habet decem & octo: olei, vini, vel aquæ viginti: mellis septem & viginti. Observatione vero Attica, drachmas habet, olei quidem quindecim tantum: vini vel aquæ & mel- lis secundum proportionem sæpius dictam. Quod vero apud ignotum Græcum legitur: Oxybaphus ha- bet cyathos tres, id est, uncias quatuor semis, non vi- detur verum: quod etiam ab eodem dicitur, habet un- cias duas & stadia duo, si diceret & drachmas duas videretur verum. Hanc mensuram Plinius acetabu- lum, Serapio & Princeps acsuffi vocitant. Verum Princeps loco drachmarum decem & octo, darchimeæ scripsit decem & octo. Interdum acsuffi legitur, ut apud Serapionem cap. de tithymallo, cujus tamen tex- tus videtur mendosus, dum dicitur, quando accipitur ex semine & folio ejus pondus duorum acsuffi, & bi- buntur, faciunt idem quod ipsum lac: Et similiter textus Rasis videtur mendosus, continentis xxij. cap. eo- dem cum dicitur: uncia una & media, videtur legen- dū ex Dioscoride, oxybaphi medij quantitas, drachmæ scilicet novem, quem authorem tam Rasis, quam Se- rapio testantur, folia inquit Dioscorides Latinus mul- ti collecta servant semen & folia ejus oxybaphi di- midiatum mensura, potata virtutem lacrimæ ipsius complent: in Græco exemplari *πλήθος ἡμισυ οξύβαφοι ποτιζόμενα*.

C A P. XXI.

De Anesimen vel acsasse, id est, oxybapho.

Anesimen apud Principem, Acasse apud Serapio- nem, ex concordia utriusque cum Dioscoride de cuncumere asinino, est oxybaphum. Ubi enim Dio- scorides corij rad. ejus quarta parte oxybaphi, in Latino exemplari. In Græco *τὸ τέταρτον οξύβαφον*, Serapio quarta acasse, Avic. anesimen scriptum. Nec prætereun- dum videtur quod Dioscorides & Serapio, ex succo radice & corio ejusdem simul medicamen compo- sum

tum faciunt ad hydropicos: Princeps ex utroque dis-
iunctim unum simplex, utens disiunctiva, aut, quæ con-
iunctivè videtur intelligenda aut scilicet pro,
&c.

C A P. XXII.

De Kassuff, id est, oxybapho.

Kassuff ex concordia Serapionis cum Dioscor. & Plinio capit. de psyllio, est oxybaphum, Ad ramicem puerorum (inquit Serapio) accipiat de Psyllio quantitas duorum Kassuff, teratur, & infundatur in duabus cotylis solutis aquæ Dioscorides enterocelicos infantes, & quibus eminet umbilicus in cataplasmate adhibiturum psyllium maximè curat, oxybapho uno trium & in duobus digitis aquæ infusum, in Latino. In Græco vero, ὀξυβάφης πλῆθος ἐν δυσὶν ὑδατοῖς [Marcellus legit, κοτύλαις] δακτύλοις. Plin. lib. xxv. cap. 19. Acetabuli mensura sextario aquæ densat & contrahit: terere oportet, &c. Quare videtur legendum in Serapione quantitas Kassuff unius, non duorum ex concordia Plinij & Dioscoridis. Item capite de Rura cum sumitur, inquit Serapio, ex semine ejus quantitas Kassuff cum vino: Dioscorides, ὅσον ὀξυβάφης τῷ σπέρματι ποθεῖντος, in exemplari Græco: & in Latino oxybaphus seminis ipsius bibitur. Capitulo similiter de origano scripsit Serapio, si bibitur ex eo sicco quantitas Kassuff cum aqua & melle, superfluitates melancholicas, & cætera Dioscor. oxybaphi quantitas ὀξυβάφης πλῆθος, legit. Aliquando Kassuff, ut capite de origano apud Serapionem idem. Ex his, & capitibus duobus superioribus inferri posse videtur, oxybaphum acetabulum, aclusfi, aclusnes, anesinen, aclusse, Kassuff, vel Kiffuff nomina esse synonyma, mensuram eandem importantia cotylæ scilicet partem quartam, drachmarum decem octo pondus capientem observatione commun. Attica vero quindecim tantum.

C A P. XXIII.

De Kassitio vel Kassitio mensura quæ videtur cotyla.

Kassitius vel Kassitius ex concordia Principis Canone. v. cum Haliabbate Practicæ decimo, & Serapione septimo Breviarij, descriptione Alkanfi, mensura est Cypria, & videtur heminam sive cotylam significare. ¼. inquit Princeps loco ante dicto granorum myrri cassitium semis. Haliabbas, granorum myrri semis heminam: & apud quosdam heminam, de quorum numero Serapio fortè fuit, qui granorum myrri libram unam scripsit, Atticam quidem intelligens libram quinque & septuaginta constantem drachmis, uncis scilicet novem cum tribus octavis, quam tribus drachmis tantum majorem heminam, tractatu secundo de ponderibus in libra, ostendimus. Hæc videtur cassitij significatio, quamvis apud Mundium & ignotos quosdam, exponatur mensura unciarum quindecim, quod rationi consentaneum non videtur, Quoniam medicina, quam descripsit Rasis viij. continentis de colica, charta cxcix. columna ij. infra medium, quam dicit constare ex stercoreis columbini cassitio uno, anethi pugillo uno, & aquæ rotulis duobus decoquendis, donec rotuli medietas remaneat. Si vero unciarum quindecim mensura cassitius sit, adeò spissa redderetur, ut potabilis fieri nullo modo posse videatur. Advertendum Principis textum sextadecima iij. positum, de colica, capite de compositione medicinarum solventium phlegma, videri mendosum, cum dicitur Solutivum aliud forte ¼. cassitium unum simi

columbini, & manipulum unum anethi, & danichi aquæ, daurach videtur legendum, id est, tres. Nec audiendus Pandectarius scribens, cassitium appellari, Stercus columbinum, deceptus ex modo scribendi unitatem Iotam ij. utrinque punctis signatam, non numeri, sed expositionis signum credidit, quod tamen erroris genus, non Pandectario viro doctissimo tribuendum dixerim, sed eorum alicui potius, qui priorum commentaria supplere volentes, ea sapissimè maculant, & sua multa corruptè dicta, aliorum benedictis sine pudore commiscant.

C A P. XXIV.

De Cyatho, conos, coatus, alcantus, vel almunesi.

Vide etiam duo sequentia capita.

Cyathus mensura, quæ cotylæ, vel heminæ pars est sexta, mystri magni communis dimidia. Pondere observatione communi, capiens olei drachmas duodecim: vel aquæ tredecim & scrupulum mellis vero decem & octo, ut testantur, Paulus ignotus Græcus & Princeps Hanc mensuram Arabes coatum, interdum conos appellant: aliquando almunesi alcanta vel alcantus vel alcoatus.

C A P. XXV.

De Cuabo, id est, cyatho.

Cuabum ex concordia Rasis v. continentis, char. cxxij. columna prima supra medium, cum Galeno, viij. Miamir, (hoc est, de compositione medicament. secundum locos affect.) authore Archigene, apud utrumque est cyathus. Quod si fuerit inflammatio (inquit Rasis) cum intestestione lamentabili absque febre, &c. da in potum quidem ad modum trium cuabij cum aqua frigida bis aut ter. Gal. ubi supra in aliis vero quæ circa stomachum, molestus his quidem quibus adurit stomachus cum ex solutione & lipothymia vel inappetibilitate ex quacunque causa præter febrem, cyathos tres vel quatuor aquæ frigide da sorbere bis aut ter per intervalla.

C A P. XXVI.

De Briala, id est, cyatho.

Briala ex concordia Principis (iij. primi, de regimine aquæ & vini) cum Rasi xxv. continentis, cap. i. de Canone cibi & potus, est cyatilius. Super cibum tamen (inquit Princeps) brialas duas aut tres bibere non nocet ei, qui consuevit Rasis quia in autumno debes potu uti super cibum aut post, in modica quantitate tribus cyathis.

C A P. XXVII.

De Coanuso seu pugillo, cyathorum duorum mensura.

Coanulum septimo decimo continentis, de cura hæcticæ, pugillum significat, mensuram cyathorum duorum, ex concordia Rasis & Galeni decimo de ingenio sanitatis circa finem, quem Rasis adducit loco superius allegato.

C A P. XXVIII.

De Mystro communi parvo.

Mystrum commune parvum, quod & chema parva dicitur, cyathi medietas est, testibus Paulo, Serapione & principe Habet autem pondere drachmas sex olei vini vel aquæ scrupulos viginti, mellis vero drachmas novem. Verum Serapio Muchitrum parvum, Princeps

ceps mestrum appellat. Serapio item & Princeps pro drachmis sex, darchimet sex scribunt, pro scrupulis vero viginti, scripsit Princeps gormiæ viginti, ex quo facile sciri potest darchimet apud Arabes drachmam, gormiam scrupulum significare, ut in verbo gormia, tract. ij.

C A P. XXIX.

De Bachates parva, quæ videtur mensura drachmarum quinque, &c.

Videlibro i. in B. litera.

Bachates parva, ex concordia Serapionis Practicæ iij. cap. xv. cum Avicennæ Canone v. summa ij. tract. vi. & Bimafvi continentis v. charta centesima quinta & vigesima, columna ij. supra medium est drachmæ quinque in descriptione medicinz de succo granatorum & mentæ ad vomitum, 4. (inquit Bimafvi) succi granorum granatorum drachmas triginta, succi mente drachmas decem. Avic. succi granorum granatorum drachmas triginta, mentæ & sisymbrij, ana drachmas quinque. Serapio succi granatorum similiter drachmas triginta: succi mentæ, sisymbrij ana bachatem parvam. Idem igitur videtur drachmæ quinque & bachates parva. Confirmatur ex Andromacho octavo Miamir, ut scribitur à Galeno. Ex Theod. quoque Prisciano Practicæ tertio, ca. vi. * parafo incidente stomacho, &c. Ex Paulo item Practicæ similiter iij. cap. xxxvij. ex Rasi etiam v. continentis locis quamplurimis, authore præcipue Bimafvi, qui omnes, medicinam prædictam describentes, granatorum succum triplum ponunt ad mentæ succum. Quare cum & apud Serapionem granatorum succus sit drachmæ triginta, mentæ & sisymbrij erit drachmæ decem, bachates ergo duæ succi drachmæ decem, erunt. Et consequenter bachates parva una drachmæ quinque, ut scripsit Princeps.

C A P. XXX.

De Mystro magno Attico.

Mystrum Atticum magnum, ex Dioscoride cotylæ Atticæ pars est decima octava, scrupuli scilicet decem, id est, oboli viginti, non quatuor & viginti, sicut apud ignotum Græcum legitur, asserentem trium stagiorum, id est, aureorum pondus.

C A P. XXXI.

De Mystro Attico parvo.

Mystrum Atticum minus, ex eodem Diosc. & ignoto Græco & Prisciano, oboli quindecim est enim pars quarta cyathi sexaginta capientis obolos observatione quidem Attica. Communi enim observatione duos & septuaginta capit.

C A P. XXXII.

De Cano, id est, cyatho.

Canos ex concordia Serapionis & Dioscoridis cap. de abfathio, & de Cyclamino, cyathus est utrobique enim, ubi à Serapione conos à Dioscoride cyathus scribitur. Item ex concordia eorundem de urina, cum Rasi vij. continentis cap. de hydropisi. Ubi enim Dioscorides & Rasis dant urinæ caprinæ cyathum unum cum drachma una spicæ, Serapio Canon: quamvis apud Galenum nono Miamir de cura hydropicorum, autore Archigene scribatur, urinæ caprinæ cochlearium unum cum spica: qui locus videtur depravatus & scribendum cyathus.

C A P. XXXIII.

Rursus de Mystro Attico.

Mystrum Atticum justissimum ex Dioscoride, oboli octo.

C A P. XXXIV.

De Cianes mensura obolorum V. vel VI.

Cianes mensura, quæ observatione communi parvum cochlearium dicitur. Habet autem pondere, observatione communi drachmam unam sive obolos sex: observatione vero Attica, cochlearia minima duo, teste Prisciano.

C A P. XXXV.

De Nuce parva & magna.

Nux duplex, parva & magna. Nucis sanè nomen ad pondera potius, quam mensuras pertinere videtur. Parva, quam ignotus Græcus Ponticam vocat, habet Keratia decem & octo apud ipsum, scrupulos scilicet communes tres, aut drachmam communem unam, aut cochlearium parvum unum, quod & Serapionis concordia, primo Practicæ cap. 23. descriptione medicinz ad epilepsiam, cum Rasis continentis, cap. i. & cum Alexandro de cura epilepsiæ, videtur testari. Sed ex medicinis simplicibus (inquit Serapio) est pyrethrum, teratur & misceatur cum melle, & detur ex eo cochlearium unum. Et Alexander similiter de epilepsia Et maxime ad istam facit pyrethri radix trita cum melle, ut electuarium composita. Dabis autem exinde cochlearium. Rasis vero ubi supra. Medicina, inquit, valde bona & experta: 4. seselios, &c. Sumatur ex ea quantitas nucis, & infra. Ex medicinis facilibus est pyrethrum, mixtum cum melle & exhibitum in quantitate nucis. Verum apud Serapionem & Principem describitur nux parva, habere seminet. i. obolos septem, drachmam scilicet unam & ejus sextam. Quod & Rasis ad Almanforem lib. 4. cap. de opio sentire videtur, dum dixit: Detur de Theriaca ab avellanæ ad nucis magnitudinem, ac si diceret, à keratiis decem octo, ad unum & viginti, id est ab obolis sex ad septem. Tra. 3. ca. cxxxiiij.

Nux magna vel nux regalis vocata ab ignoto Græco, tres habet aureos aut drachmas quatuor apud eundem, & est semuncia. Verum apud Serapionem & Principem, non drachmas quatuor, sed duas tantum & drachmæ tertiam id est obolos quatuordecim, quos illi vocant seminet. Quoties autem apud nostros nux absolute scribitur, minorem intelligendam arbitramur.

C A P. XXXVI.

De Cochleari minimo.

Cochlear minimum observatione communi, semidrachma est pondere, ex concordia Plinij, Dioscoridis, Pauli & Principis secundo Canone, cap. de aloem in membrorum nutrimenti arcola, Quando (inquit Princeps) bibuntur ex eo cochlearia duo cum aqua frigida & tepida, infringit appetitum salsum. Similiter Dioscorides, cochleariorum duorum pondere in Græco exemplari *κοχλιαριων ὀλίγος β'*: quamvis in Latino legatur, cyathis duobus, Paulus Practicæ septimo de purgantibus choleram, Aloem drachma una cum melicrato detur: Si minus detur ut tres oboli solim, stercus evacuat. Plinius lib. 27. cap. 41. de aloë: Confirmat stomachum bibitum drachma una. Ad stomachi vero dissolutionem, duobus cyathis aquæ frigidæ cochlearis mensura bis tervè. Inde Diosco.

& Princeps cochlearia duo, Plinius & Paulus drachmam scripserunt. Tantundem igitur est cochlearia minima duo, quantum drachma una ex horum concordia. Minimum igitur cochlear semidrachma jure dicitur.

CAP. XXXVII.

De Cochleari parvo.

Cochlear parvum drachmam integram pondere capit. Testatur concordia Dioscoridis cap. de Castoreo, cum Galeno undecimo de simplici medicina cap. eodem. Illis (inquit Dioscorides Latinus) qui ex plenitudine spasmus patiuntur aut tremorem nervorum, utilissimum est castoreum datum multa drachma una, aut cochleario uno. Galenus ubi supra: ut dicat aliquis tepidam febrem patientibus, castoreum cum pipere albo quantitate cochlearij de utroque per melicratum. Et Galeni verba referens Rasis Continentis xxi. simplici cci. Castoreum, inquit, est maximi juvamenti, cum patiens est absque febre, aut ejus febris est lenta, sicut illa quæ apparet in senibus, & illa quæ est in lethargo, quia plures ex his nos liberavimus cum pipere albo & castoreo, pondere aurei unius de quolibet, cum hydromelite. Ecce ubi Galenus cochlearium unum. Rasis aureum scripsit, qui drachma exponendus videtur, ex Arabum vulgata consuetudine, aureum pro drachma frequentissime scribentium, ut multis in locis ostendimus, & adhuc ex Dioscoridis & Plinij concordia cum Rasi de castoreo, planè convincitur. Castoreum, inquit Dioscorides in Latino exemplari, bibitum cum pulegio drachmis duabus, menstrui imperat. In Græco est *πλεῖς μετὰ γλήχωνος ἢ πλεῖς θυοῖν*. Plinius dari drachmas binas satis eorum quæ adijciuntur singulas. Rasis cum sumuntur ex eo & mentastro sylvestri ana aurei duo, provocat menstrua, ubi illi. drachmas, hic aureos scripsit.

CAP. XXXVIII.

De Cochleari magno.

Cochlear vero magnum ex Aëtio medico illustri Græco, & Georgio Valla, est mensura, quæ mystri communis parvi pars est tertia, duas quidem pondere capiens drachmas, sesqui exagium scilicet, id est aureum cum dimidio, quod idem est quod drachmæ duæ, vel Sicilicus, id est unciae pars quarta. Verum ex concordia Alexandri, Pauli & Principis de apostematibus renum, videtur quod cochlear magnum sit sesquidrachma, id est drachma & media solum non duæ ℥. (inquit Alexander) lini seminis pulveris drachmas duas, amili drachmam unam, dabis in aqua cochlearium unum ad bibendum. Paulus selini partes duas, amili partem unam, bibant cochlearium unum. At verò Princeps ex potionibus expertis inquit, est illud quod tecipit seminis lini pondus aureorum duorum, amili aureum, & est duæ doses, cum aureus pro drachma hoc loco accipiendus sit, ut scripsit Alexander, à quo & Paulus & Princeps accepere quod diximus medicamen, & aggregatum ex tribus drachmis dividendum in duas doses æquales, ut scripsit Princeps, quarum utraque sit cochlearium, ut expressè Alexander. Sequi videtur cochlear magnum dicendum, mensuram quæ mystri communis parvi pars est quarta, non tertia drachma scilicet & media, non autem duæ. Cui sententiæ consonare videtur Serapio V. practicæ, cap. xxxv. descriptione diamargaritonis. Detur, inquit, ex eo cochlearium, aut duo cochlearia, & sunt aurei tres, id est drachmæ tres.

CAP. XXXIX.

De Cochleari maximo.

Cochlear aureum maximum est mensura, quæ cyathij pars est tertia, pondere semunciam capiens, quod mellarium dici posset, cujus Serapio & Princeps de ponderibus tractantes & mensuris meminerunt. De quo Serapio iterum practicæ v. cap. xxxiiij. circa finem: butyri (inquit) vaccini & mellis ana cochlearium unum, & est drachmæ quatuor.

CAP. XL.

De Flagerim, id est parvo cochleari.

Flagerim apud Serapionem cap. de Squilla, ex concordia Dioscoridis cum eo, cap. eodem parvum cochlear significat. Accipiat, inquit Serapio, ex quilla assata pars una, ex sale assato & trito partes octo, & detur in jejuno pondus unius flagerim ad laxandum ventrem. Dioscorides squillæ pars una, salis assati partes octo, accepto cochleario uno, vel duobus ventrem mollit, *ἐν μέρεσσι τῆς σκίλλης, ἁλῶν ὁπτῶν μέρος ὀκτώ, δίδόμενον κοχλιάριον εἰνὴ δύο*. Rasis etiam continentis xxi. si sumeretur pars una ex squilla assata, & octo partes salis similiter assati, & simul tererentur, & daretur ex eis pondus aurei unius, laxaret ventrem, aureum pro drachma scripsit Rasis, parvum inuens cochlearium.

CAP. XLI.

De Fahaliel, id est, cochleari minimo, pondere drachma semis.

Fahaliel ex concordia Serapionis cum Dioscoride cap. de scammonæa, significat cochlear minimum: pondus scilicet drachmæ mediæ, & dosi ejus, inquit Serapio, sit secundum fortitudinem ejus qui sumit, & secunda dosi sit fahaliel trium & mediæ duorum fahaliel, & parva unum Dioscorides in Græco exemplari loco fahaliel, cochlearium scripsit: *λαμβάνεται δὲ πρὸς δύναμιν τὸ μὴ τέλειον, τέλει κοχλιάριον μέσον δὲ β'.* &c. in Latino nihil eorum legimus. In viij. ad Almanforem cap. liij. de scammonæa dicitur, Minus quod de ea datur, est sexta pars drachmæ unius, id est obolus, grana scilicet xij. Plus vero quantitas duarum tertiarum drachmæ unius, id est scrupuli duo, xxij. Continentis cap. de scammonæa, sumpta in pondere aurei mediæ, aut danich quatuor & mediæ, cum syrupo mellis, laxat choleram & phlegma. Et sufficiens sumptio ejus ad leniendum ventrem in quantitate danich trium, tamen in portione & magna in quantitate danich quatuor & mediæ. Serap. vij. practicæ cap. xij. & potio ejus integra secundum sententiam antiquorum est noven Kirat, sed secundum sententiam modernorum, est duo danich. Hæc quamvis dicta sunt præter intentum principale, non inutilia fortè videbuntur.

CAP. XLII.

De Colananos, id est, cochleario.

Colananos apud Serapionem cap. de sulphure, exponitur cochlearium: ex concordia ejusdem cum Dioscoride cap. eodem rectè exponitur. Quando accipitur de eo inquit, Serapio quantitas unius colananos, & sumitur in potu cum aqua aut cum ovo forbili, curat icteritiam. Dioscorides ictericis cochleario in ovo forbili accepto prodest: in Latino exemplari. In Græco vero *ἀποκαθάρσει δὲ τῶν νίκ τερον κοχλιάριον πλεῖος*.

CAP. XLIII.

De Paclanario vel faclanario id est cochleario

Paclanarium vel faclanarium ex concordia Dioscoridis & Serapionis de condyto (quod struction Dioscorides nominat) idem est & ipsum quod cochlearium. Ab utroque dicitur cum melle datum movere urinam. Serapione pondere paclanarij, à Dioscor. cochlearij, οὐν μέλη ποχλαρεῖς πλῆθος. Item ex concordia eorundem cum Principe, Plinio & Paulo cap. de aloë.

CAP. XLIV.

De Aben vel Kist Romano.

Aben mensura est eadem quod Kist Romanum: quæ pondere quidem habet olei uncias viginti: vini, vel aquæ duas & viginti paulo plus mellis triginta. Et ita castigandus videtur Serapionis textus cum dicitur. Aben mellis est minæ duæ, aben olei est minæ & media, quoniam mendosus videtur. Si enim intelligatur, ut sonat proportio mellis ad oleum nullo pacto poterit quæ est sesquialtera. Quare legendum videtur aben mellis minæ & media, & Romanum intelligo. Aben olei minæ una, id est uncias viginti. Sicuti de Ejub mellis scripsit Princeps, quod idem est quod Aben: & tunc mellis ad oleum servabitur proportio sesquialtera.

CAP. XLV.

De Ejub aliter dicta eadem mensura.

Ejub mensura, quæ & Aben, & est, ut scripsit Princeps, mellis habens libras duas semis, id est uncias triginta: olei vero minam unam tantum, non unam & mediam, ut apud Principem corruptis exemplaribus legitur. Minam tamen Romanam oportet intelligas, aliter forte pateretur instantiam.

CAP. XLVI.

De Eberie mensura, quæ videtur Kist Romanum.

Eberie apud Principem (tertia quarti, de curâ lepræ, in decoctione ad leproso) videtur idem quod ejub scilicet Kist Romanum. Bartholomeus tamen Montagnana in consilio ad leproso, eandem describens decoctionem loco eberie, liberam scripsit.

CAP. XLVII.

De Medimno.

Medimnus, ex his quæ colliguntur ex Paulo Dioscoride & Prisciano, videtur mensura tetum siccarum, sex capiens modios: cujus medietas est amphora Italica; modiorum trium capax, octo scilicet & quadraginta sextariorum mensura: quarta vero pars amphora item vocata, modij unius & medij mensura, quatuor & viginti capiens sextarios; quia medimnus modios sex capit Italicos, septem vero Atticos ex Dioscoride, Paulo, Prisciano: quibus assentiri videtur Plutarchus in Attico, quem donasse universos Athenienses frumento commemorat, & ita ut singulis septem modij tritici darentur, qui modus mensuræ medimnus Athenis appellatur. Modij autem septem Attici, faciunt communes, vel Italicos sex, paulo minus. Apud ignotum Græcum medimnus

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

modiorum sex cum tribus octavis legitur. Dicit enim medimnum constare ex xestis centum duabus: quæ dividæ per sexdecim, qui est numerus xestiarum, xestium, ex quibus constat modius, dabunt sex, cum tribus octavis.

CAP. XLVIII.

De Artaba.

Artaba mensura Ægyptia, modios tres Italicos & modij partem tertiam capiens, ut Priscianus testatur. Namque decem modis explebitur artaba triplex: Apud Paulum habet modium unum tantum.

CAP. XLIX.

De Modio.

Modius mensura est, quæ licet apud Hebræos duos & viginti sextarios contineret, apud nostros tamen sexdecim tantum continet. Testatur Priscianus qui dicit, amphoram mensuram pedis quadrati tres capere modios. Sed divisio octo & quadraginta sextariis, ex quibus constat amphora, per tria proveniunt sexdecim. Ergo modius qui est amphoræ pars tertia, sexdecim compleretur sextariis.

Tabula Generalis diversorum ponderum, ac totius secundi libri Dominici Vincentini quasi quoddam compendium, diducens semper majora in minora, & ostendens quoties minor in majore comprehendatur, per GASPARUM WOLPHIUM Tigurinum Medicum.

I. MINA ROMANA.

1	Minam Atticam $1\frac{1}{4}$ hoc est, semel cum quarta ejusdem parte.	
2	Libram communem $1\frac{1}{2}$ hoc est, semel cum duabus ejus tertiis.	
3	Libram semis $3\frac{1}{2}$ quod est, ter & simul tertiam totius partem.	
4	Uncias	20
5	Sextarios seu semuncias	40
6	Duellas	60
7	Sicilicos	80
8	Sextulas	120
9	Drachmas	160
10	Fabas Syras	240
11	Lupinos, seu drach. sem.	320
12	Tremisses	360
13	Scrupulos	480
14	Obolos	960
15	Bissiliquas	1440
16	Semiobolos	1920
17	Siliquas	2880
18	Chalcos	5760
19	Grana	11520

Mina Romana 20. unciarum communium, continet

II. MINA ATTICA.

1	Libram $1\frac{1}{2}$ id est libram unam & ejus partem tertiam.	
2	Semilibras $2\frac{1}{2}$ hoc est libras duas & duas tertiis.	
3	Uncias	16
4	Semuncias	32
5	Duellas	48
6	Sicilicos	64
7	Sextulas	96
8	Drachmas	128
9	Fabas Syriacas	192
10	Lupinos, seu drach. sem.	256
11	Tremisses	288
12	Scrupulos	384
13	Obolos	768
14	Bissiliquas	1152
15	Semiobolos	1536

Mina Attica sedecim unciarum, in se habet

Y

16 Siqui-

16	Siliquas	2304
17	Chalcos	4608
18	Grana	9216

III. LIBRA.

1	Semilibras	2
2	Uncias	12
3	Semuncias	24
4	Duellas	36
5	Sicilicos	48
6	Sextulas	72
7	Drachmas	96
8	Fabas Syras	144
9	Lopinos	192
10	Tremiffes	216
11	Scrupulos	288
12	Obolos	576
13	Biffiliquas	164
14	Semiobolos	1152
15	Siliquas	1728
16	Chalcos	3456
17	Grana	6912

*Libra duo-
decim un-
ciarum
compre-
hendit*

IIII. SEMILIBRA.

1	Uncias	6
2	Semuncias	12
3	Duellas	18
4	Sicilicos	24
5	Sextulas	36
6	Drachmas	46
7	Fabas Syriacâs	72
8	Lupinos	96
9	Tremiffes	108
10	Scrupulos	144
11	Obolos	288
12	Biffiliquas	432
13	Semiobolos	576
14	Siliquas	864
15	Chalcos	1728
16	Grana	3456

*Libra se-
mis uncia-
rum 6. sub
se habet*

V. UNGIA.

1	Semuncias	2
2	Duellas	3
3	Sicilicos	4
4	Sextulas	6
5	Drachmas	8
6	Fabas Syras	12
7	Lupinos	16
8	Tremiffes	18
9	Scrupulos	24
10	Obolos	48
11	Biffiliquas	72
12	Semiobolos	96
13	Siliquas	144
14	Chalcos	288
15	Grana	576

*Uncia
drachma-
rum 8.
capit*

VI. SEMUNCIA.

1	Duellam	1 1/2
2	Sicilicos	2
3	Sextulas	3
4	Drachmas	4
5	Fabas Syriacas	6
6	Lupinos	8
7	Tremiffes	9
8	Scrupulos	12
9	Obolos	24
10	Biffiliquas	36
11	Semiobolos	48
12	Siliquas	72
13	Chalcos	144
14	Grana	288

*Uncia se-
mis in se
comple-
tur.*

*Faba Sy-
riaca pen-
det.*

*Drachma
semis con-
tinet.*

VII. DUELLA.

1	Sicilicum	1 1/2
2	Sextulas	2
3	Drachmas	2 1/2
4	Fabas Syras	4
5	Semidrachmas	5 1/2
6	Tremiffes	6
7	Scrupulos	8
8	Obolos	16
9	Biffiliquas	24
10	Semiobolos	32
11	Siliquas	48
12	Chalcos	96
13	Grana	192

*Duella
valet.*

VIII. SICILICUS.

1	Sextulam	1 1/2
2	Drachmas	2
3	Fabas Syr.	3
4	Semidrachmas	4
5	Tremiffes	4 1/2
6	Scrupulos	6
7	Obolos	12
8	Biffiliquas	18
9	Semiobolos	24
10	Siliquas	36
11	Chalcos	72
12	Grana	144

*Sicilicus
habet.*

IX. SEXTULA.

1	Drachmam	1 1/2
2	Fabas Syras	2
3	Lupinos	2 1/2
4	Tremiffes	3
5	Scrupulos	4
6	Obolos	8
7	Biffiliquas	12
8	Semiobolos	16
9	Siliquas	24
10	Chalcos	48
11	Grana	96

*Sextula
capit*

X. DRACHMA.

1	Fabas Syriacas	1 1/2
2	Lupinos	2
3	Tremiffes	2 1/2
4	Scrupulos	3
5	Obolos	6
6	Biffiliquas	9
7	Semiobolos	12
8	Siliquas	18
9	Chalcos	36
10	Grana	72

*Drachma
valet*

XI. FABA SYRA.

1	Lupinum	1 1/2
2	Tremiffem	1 1/2
3	Scrupulos	2
4	Obolos	4
5	Biffiliquas	6
6	Semiobolos	8
7	Siliquas	12
8	Chalcos	24
9	Grana	48

XII. LUPINUS.

1	Tremiffem	1 1/2
2	Scrupulum	1 1/2
3	Obolos	3
4	Biffiliquas	4 1/2
5	Semiobolos	6
6	Siliquas	9

7 Chalcos

7 Chaleos
8 Grana

18
36

XVI. BISSILIQUA.

XIII. TREMISSIS.

Tremissis
valet.

1 Scrupulum
2 Obolos
3 Bissiliquas
4 Semiobolos
5 Siliquas
6 Chalcos
7 Grana

1¹
1²
2²
4
5²
8
16
32

Bissiliqua
recipit

1 Semiobolos
2 Siliquas
3 Chalcos
4 Grana

1¹
2
4
8

XVII. SEMIOBOLUS.

Semiobolus
pendet

1 Siliquas
2 Chalcos
3 Grana

1¹
2
3
6

XIV. SCRUPULUS.

Scrupulus
in se tenet.

1 Obolos
2 Bissiliquas
3 Semiobolos
4 Siliquas
5 Chalcos
6 Grana

2
3
4
6
12
24

Siliqua
tenet

1 Chalcos
2 Grana

2
4

XVIII. SILIQUA.

XIX. CHALCUS.

Chalcus

1 Grana.

1

XV. OBOLUS.

Obolus ca-
pit.

1 Bissiliquas
2 Semiobolos
3 Siliquas
4 Chalcos
5 Grana

1¹
2
3
6
12

XX. GRANUM.

Granum ponderum minimum, ex quo, tanquam ex unitate numeri, reliqua pondera majora additione vel multiplicatione fiunt.

Abacus sive Tabula Ponderum uno intuitu oculis obijciens, qua precedenti Tabula seorsim fuerant & per Partes distributa.

	Mina At.	Libra	Seli- bra	Un- cia.	Se- munc	Duel- la	Sici- licus	Sex- tul.	Drach- ma	Fab. Sy.	Se- mid.	Tre- missis	Scru- pul.	Obo- lus	Bissi- liqua	Se- miob.	Sili- qua	Chal- cus	Grana
Mina Rom.	1 ¹	1 ²	3 ¹	20	40	60	80	120	160	240	320	360	480	690	1440	1920	2880	5760	11520
	Min. At.	1 ¹	2 ²	16	32	48	64	96	128	192	256	288	384	768	1152	1536	2304	4608	9216
		Libra	2	12	24	36	48	72	96	144	192	216	288	576	864	1152	1728	3456	6912
		Seli- bra	6	12	18	24	36	48	72	96	108	144	288	432	7	864	1728	3456	
		Un- cia	2	3	4	6	8	12	16	18	24	24	48	72	96	144	288	576	
		Sex- tar.	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Duel- la	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Sici- licus	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Sex- tul.	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Drach- ma	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Fab. Sy.	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Lu- pin.	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Trem- missis	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Scru- pul.	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Obo- lus	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Bissi- li.	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Se- miob.	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Sili- qua	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Chal- cus	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	
		Grana	1 ¹	2	3	4	6	8	12	16	18	24	48	72	96	144	288	576	

Mensuræ apud Veteres Græcos & Latinos Scriptores usitata, Liquidorum & Aridorum, ita dispositæ, ut quæ sunt majoris ponderis semper præcedant. Sic enim veteribus facilius nostræ atque aliarum gentium mensuræ conferentur, per Conradum Gesnerum Medicum Tigurinum.

NOTÆ LITERARUM.

R.	Romana mensura.	Att.	Attica.
Geo.	Georgica.	Hipp.	Hippiatrica.
L.	Liquidorum	A.	Aridorum.
C.	Communis.		

Mensurarum nomina minorum in secunda columna, illæ etiam vel Romana, vel Attica, vel Georgica, vel Hippiatrica accipi debent, pro ut in prima ponantur.

Culeus R. L.	Amphoras	20	1600
Medimnus Geo. Att.	Chœnices	48	162
Metreta Att. L.	Choas	12	108
Metreta Geo. L.	Amphoras	2	108
Medimnus Att. & Siculus Ar.	Chœnices	48	108
Hemimedimnus Geo. Att.	Chœnices	24	81
Amphora quadramtal. Ceramium R. L.	Urnas	2	80
Amphora, αμφορεύς Geo. L.	Choas	4	40
Τετράς τριῆς medimni Geo. A.	Chœnices	16	54
Urna R. L.	Congios	4	40
ἑνὸν Geo. A. Sextans medimni.	Chœnices	8	27
Modius R. A.	Seminodios	2	26. 3/8
Chus, Congius Geo. L.	Cotylas 12 vel Sextarios	9	12 1/2
Semodius R. A.	Sextarios	8	13 3/4
ἡμιεὺς, uncia medimni Geo. A.	Chœnices	4	13 1/2
Congius vel congiarium R. L.	Sextarios	6	10.
Chus Att. L.	Sextarios	6	9.
ἡμιδοδεκάτοιν Geo. A. semuncia medimni	Chœnices	2	6. 1/3 9.
Chœnex, χœνιξ Geo. A.	Cotylas	3	3. 3/4 1/2
Chœnex Att. A.	Sextarium	1 1/2	2 1/2
ἑμιαὐνία Geo. A.	Cotylam	1 1/2	1 1/2 1/2 3/4 3/2
Sextarius A. C.)	Heminas	2	1. 3/8

Sextarij liquidorum 12. Assis partium nominibus appellantur, quæ & aridis videntur accommodari posse, non minus quam ipse Sextarius.

Deunx R. L.	Cyathi	11	1. 1/2 1. 1/2
Xestes, id est Sextarius Att. C.	Cotylas	2	1 1/2 (1/2)
Dextans R. L.	Cyathos	10	1. 3/4 1. 3/4
Dodrans R. L.	Cyathos	9	1. 3/4 3.
Cotyla Geo. C.	Oxybapha	4	1. 3/4 1. 1/2
Bes R. L.	Cyathos	8	1 1/2 3/2 3/2 3/2
Cotyla Hipp. L.	Oxybapha	2	1.
Sextans R. L.	Cyathos	7	3 1/2 3/2 1/2
Hemina R. C.)	Quartarios	2	

Cotyla Att. C.	Quartarios	4	0. 3/10
Quincunx R. L.	vel oxybap.	2	0. 3/9
Triens R. L.	Cyathos	4	38. 32. 3/2
Onyphum Hipp. L.	Cyathos	4	36. 31. 3/2
Quadrans Quartarius R. L.	Cyathos	3	0. 3/6
τέτρατον.	Cyathos 3. vel acetabul.	2	0. 3/5
Hemicotylid At. L. vel Quartar. Att.	Oxybapha	2	0. 3/4 1/2
Oxybaphum Geo.	Cyathum	1 1/2	0. 3/3 3/2 1/2
Sextans R. L.	Cyathus	2	0. 3/3 3/2
Acetabulum R. At.	Cyathum	1 1/2	0. 3/2 1/2
Oxybaphum Att. C.	Cyathum	1 1/2	0. 3/2 3/2
Cyathus Geo. C.	Mystra	4	0. 3/2 3/2
Cyathus Hipp. L.	Mystra	4	0. 3/2
Cyathus R. C.	Lagulas.	4	0. 3/2 3/2
Acetabulum R. L.	Cyathum	1	0. 3/1 1/2
Cyathus Att. C.	Conchas 2 vel Cochlearia	10	0. 3/1 1/2
Concha Att. L.	Mystra.	2	0. 3/2 3/2
Mystrum maius Geo. C.			0. 3/5
Mystrum Hip. L.	Cochlearia	2	3 1/2 3/2
Ligula R. C.			
Mystrum minus Att. L.	Chemam	1 1/2	3 1/2
Chema Att. L.	Cochlearia	2	3 1/2 3/2 gr
Cochlearium Hipp. L.	Mystri dimidiū.		4 1/2
Cochlearum Att. C.			3 1/2 3/2

Virorum Illustrum Alphabetica Enumeratio, qui de ponderum ac mensurarum doctrina vel integros libros aut tractatus scripserunt, vel saltem obiter aut summarie in suis scriptis, hanc materiam attigerunt: per Gasparum Wolphium Tigurinum Medicum recens collecta.

Andreas Alciatus Mediolanensis I. C. scripsit libellum de ponderibus & mensuris brevem quidem sed doctissimum. Idem quoque transtulit Galeno attributum de eadem materia, librum.

Andreas à Lacuna, libellum fecit de ponderibus & mensuris.

Angelus Decembrius Mediolanensis partes xi. Politicæ literariæ, explicat ponderum, mensurarum & numerorum vocabula aliquot.

Angelus Policianus scripsit epistolam de ponderibus & mensuris, earundemque notis, ad Franciotum Urinum: quæ habetur impressa epistolarum Politiani lib. 10. epistol. 13. In hanc commentatus est Franciscus Sylvius Ambianates, ubi nonnulla Politiani corriguntur.

Antonii Monachi de ponderibus & mensuris, statimque iniquis: habetur cum Stobæo sermone 56.

Apulicus quidam scripsit libellos duos, quorum alter est de ponderibus, & alter de mensuris, cum earundem motis; Habetur impressus cum operibus Mesuræ in fol. apud Juntas.

Augustinus

Augustinus Gadaldinus interpretatus est librum Galeni attributum de ponderibus & mensuris.

Avicenna caput peculiare habet de ponderibus & mensuris, lib. 3. summa secunda, tractatu octavo: partim è scriptis Alhier cujusdam, partim filii Sem.

Balbus scripsit librum de nominibus mensurarum cujus memini Volateranus.

Bedæ de ratione unciarum libellus: in quo aliorum ponderum ac mensurarum quoque mentionem facit.

Bridfertus commentarium scripsit in Bedæ libellum de ratione unciarum.

Cælius Calcagninus, de ratione ponderum scripsit lib. 5. cap. 17.

Celii Secundi Curionis, de mensuris Romanorum tractatus, ab Hervagio excusus est una cum Livio.

Claudii Galeni liber, de doctrina mensurarum ac ponderum ex variis authoribus collecta, habetur adjunctus operibus ejus, sed falsò Galeno attribuitur. Correxerit hunc lib. Michaël Neand.

Constantinus Monachus, de ponderibus medicinalibus scripsit librum peculiarem.

Cornelius Celsus de medicina libro 5. cap. 17. pauca quædam de ponderum ratione scripsit.

Cyriacus Schreïtman, scripsit Germanico idiomate, de ponderibus, una cum subtilitatibus quibusdam ad Alchimicam & metallicam artem facientia; anno 1578.

Demetrii Alabadi, quædam de minutis: item de ponderibus & mensuris, quæ Venetiis impressa sunt.

Dinus de Garbo, Florentinus scripsit tractatum de ponderibus & mensuris.

Dominici Arcignanei, de ponderibus & mensuris Græcorum & Arabum tractatus sive libri tres.

Diodori cujusdam liber Græcus de ponderibus & mensuris, servatur in Italia. Est autem fortè is author, cujus meminit Georgius Agricola in præfatione in lib. de ponderibus & mensuris his verbis: Non admodum fortè in Græcis ponderibus, opus fuisset hoc meo labore, si liber à Diodoro de his scriptus non periisset. Dolendum itaque est, si author tam desideratus & utilis, privatis usibus tantum reservatus, non tandem in usum reipub. medicæ luci redditur.

Eliz Vineti Santonis emendationes & annotationes, in Prisciani Cæsariensis, Rhemii Farnoj, Bedæ Angli, & Volusii Metiani libros de numis, pond. & mens. numeris eorumque notis, &c.

Epiphanius Cypri Episcopus libellum scripsit de ponderibus & mensuris. Græcè, apud Robertum Vuinter: Hunc interpretatus est Janus Cornarius: & de talento.

Franciscus Bonafides, de ponderibus minoribus & grano.

Georgius Agricola medicus scripsit de ponderibus & mensuris libros quinque quorum.

1. De mensuris Romanis.
2. De mensuris Græcis.
3. De rerum quas metimur pondere.
4. De ponderibus Romanis.
5. De ponderibus Græcis.

De ponderibus & mensuris libellus lingua Gallica scriptus ex Georgii Agricolæ libris collectus, adjunctus est Plinio Gallico à principio.

Guillelmus Budeus conscripsit Breviarium de Assè & ejus partibus: itemque de ponderibus & mensuris.

Manger, Bibl. Pharm. Tom. II.

Gulielmus Philander Castilionius, epitomem scripsit omnium Georgii Agricolæ De ponderibus & mensuris librorum, Lugduni.

Guilhelmus Rondellietius librum scripsit de ponderibus: hoc est de justa quantitate & proportionem medicamentorum. In hoc verò libro, licet pondera tantum medicamenti inter sese permiscendis certa ratione, præscribat, tamen ejus libricaput nonum, huic argumento peculiariter convenire potest.

Heinricus Glareanus scripsit librum de ponderibus & mensuris.

Heinricus Houverde, de ponderibus & mensuris libros duos confecit.

Heinrici Vranii Compendium de re nummaria, mensuris & ponderibus ex Budæo.

Hieronymus Cardanus de proportionibus ponderum.

Jacobus Faber Stapulensis scripsit Commentaria in librum Jordani Nemauroii de ponderibus, &c.

Jacobus Sylvius libro tertio, in methodo componendorum medicamentorum, tractatum scripsit peculiarem de ponderibus & mensuris, quæ Galeno præcipuè, & ætatis nostræ Medicis in usu sunt frequentiore.

Scripsit idem de mensuris & ponderibus Mesuæ consuetis paucula quædam, quæ addidit suis in Mesuæ Antidotarium annotationibus, statim à principio: Cum hac præfatione: Tempestivum mihi jam videtur pauca quædam de mensuris & ponderibus Mesuæ consuetis dicere, ne quorundam novitas inaudita lectori adhuc rudi aut imponat, aut sit remoramento, &c.

Janus Cornarius interpretæ est Epiphani de ponderibus & mensuris.

Incerti authoris tractatus de ponderibus & mensuris habetur cum operibus Avicennæ, ex versione ex Arabico per Andreæ Bellunensem.

Incerti authoris assignatio notarum ponderum ac mensurarum habetur adjuncta operibus Mesuæ.

Joachimus Vadianus de dodrante & uncia.

Johannis Buteonis de libra, & statera libellus. Et alter de fluentis aquæ mensura. De ponderum inter se congruentium forma. De margaritarum precio.

Johannes Fernelius de ponderibus & mensuris succinctè tractat Therapeutica Medicinæ libro quarto, capite sexto.

Johannis Ravisii textoris mensurarum quarundam explicatio habetur in ejus Officinæ tomo secundo.

Johannes Raynaudus scripsit de mensuris, De monetis & ipsarum valore.

Johannes Ruellius libro primo capit. 16. scripsit de mensuris quibus longitudines herbarum dimetiuntur. Item de rationibus ponderum.

Johannes Serapio, de ponderibus & mensuris nonnulla in Breviario suo scripsit.

Johannes Tortelius, de ponderibus, in mentione Talenti, in opere de orthographia.

Jordani Nemauroii de ponderibus propositiones tredecim, & earundem demonstrationes, multarumque rerum rationes pulcherrimæ, Norimbergæ excus.

Josias Simlerus Tigurinus collegit, suppresso tamen ejus nomine, vocabula rei numariæ, ponderum & mensurarum, Græca, Latina, Hebraica, Arabica ex diversis authoribus, ac in ordinem alphabeticum disposuit. Lexicon hoc nominum mensurarum, &c. additum est lexico sive Dictionario Latino

Germahico à Johanne Frisio edito.

Isidorus junior, Episcopus Hispalensis, scripsit libro *Ætymologiarum* decimo quinto, de agris, eorundem finibus ac mensuris. Item libro decimo sexto, de ponderibus, mensuris & signis. De hoc Isidoro & ejus scriptis, sic Alciatus de ponderibus & mensuris sentit, statim ab initio sui opusculi. Ego, inquit, non video, quid hocce summi judicii homines impulerit, ut Isidorum, nequaquam bonum authorem, opinatissimis scriptoribus præulerint, è quibus Plinius lib. 21. cap. ultimo, &c.

Leonhardus Portius, scripsit de ponderibus & mensuris eruditum commentarium.

Lucæ Peti, de mensuris & ponderibus Romanorum & Græcorum, cum his quæ hodie sunt Romæ collatis, libri quinque, Veneti.

L. Volusii Metiani de Asse & ejus partibus: item vocabula ac notæ partium in rebus pecuniariis, pondere, numero & mensura. In hunc scripsit annotationes Elias Vinetus.

Michael Neander, scripsit synopsis mensurarum & ponderum, ponderationesque mensura bilium secundum Romanos, Athenienses, Georgos, & Hippiatricos, ex præstantissimis authoribus hujus generis contracta.

Idem emendavit ac transtulit Galeno attributum librum de ponderibus & mensuris: itemque Dioscoridis de iisdem annotationem.

Nicolaus præpositus, in dispensatorii libro secundo, particula prima, capite undecimo, tractat de ponderibus & mensuris.

Oribasius Synopseos lib. 2. cap. 58. breviter ponderum ac mensurarum rationem tradit, quæ ferè eadem sunt cum his quæ apud Æginetam leguntur.

Paulus Aegineta de ponderibus & mensuris scripsit earundemque notis libro septimo, capite vicesimo sexto.

Petrus Andreas Matthiolus: in suis commentariis in Dioscoridem, mensurarum ac ponderum typos ad Dioscoridis mentem, ex Galeno edidit.

Philippus Melanchthon, de mensurarum ponderumque ad Germanorum usum, nominibus.

Plinius peculiari capite, ultimo scilicet libri vicesimi primi de ponderibus & mensuris tractavit.

Priscianus Grammaticus, scripsit de ponderibus & mensuris. In hunc authorem annotationes edidit Elias Vinetus.

Quinti Rhemnii Fanni Palæmonis de ponderibus & mensuris libellus hexametris conscriptus. In hunc annotationes breves scripsit Elias Vinetus. Vide etiam de eodem apud And. Alciatum in principio libri de materia eadem. Hunc librum, ut & Dionysium de situ orbis, carmine redditum ab eodem: Prisciano alii attribuunt: verum huic sententiæ doctiores repugnant. Alardus Amstelredamus in suis annotationibus in Marbodæum, passim Rhemnii carmina citat de gemmis quibusdam & de Medica herba, unde conjici potest genuina Rhemnii esse, hæc de ponderibus carmina, patebitque hoc clarius etiam ex iis, quæ Gyraldus de Poëtis Latinis Dialogo quarto scribit. Eo in loco authorem hunc Q. Rhemnum Palæmonem vocat, Vicentinum natione. Sunt inquit, ex literatis, qui carmen de ponderibus, quod legitur, huic ascribant: quod perperam fieri ipse contenderim: nam Rhemnio Fannio potius attribuendum, quod alibi dicemus. Scribit autem alibi, Rhemnio Fannio, qui ab aliis Fannius aut Favinus, non recte scribitur, & perperam Palæmon cognominatur, cum multò post Palæmonem vixerit, ei de ponderibus libellum à doctis plerisque

merito ascribi, ineptè autem Prisciano, aliquos etiam translationem Latinam Dionysii Afri ei attribuere, quæ vulgo Prisciani Casariensis nomine circumferatur, & discipulum fuisse Arnobii, & de medicinalibus librum eleganti carmine scripsisse, &c. Vide plura loco citato.

Robertus Cenalis, opus de integro instauratum scripsit, de vera mensurarum ponderumque ratione. Ejus autem operis tituli præcipui hi sunt.

De unciiis variis, in genere & specie.

De libra mensurali & ejus partibus.

De Sextariorum varietate & partitione.

De Cyathis.

De Xeste, seu Sextario Græco, Attico, & partibus ejus.

De Sextario Georgico, & ejus partibus.

De Sextario Hippiatrico & partibus ejus.

De Sextario Hebræo & ejus partibus.

De Amphora & partibus ejus.

De metrete Attico & partibus ejus.

De Medimno. De Medimno Georgico.

De Medimno Hippiatrico & ejus partitione.

De Ephrasi, amphora Hebraica & ejus partibus.

De Amphora Parisina & ejus partibus.

De Artaba.

De Mensuris.

Mensurarum longitudinis & naturalis progressus.

De Assis varia acceptione & ejusdem partitione.

De Obolo & partibus ejus.

De Drachmæ valore & ejus partitione.

De Sicclo & ejus Abaco.

De Denario & partibus ejus.

Denarii Romani abacus.

De Solido ejus partitione & abaco.

De Libræ multiplici ratione & ejus abaco.

De Talenti ratione & ejus abaco.

Talenti minarum Hebraicarum argenti abacus.

Talentorum argenti Hebraici secundi ordinis, sparsim è scripturis cumulatus.

Saladinus Æsculanus, scripsit de dosibus & ponderibus, ac de eorum nominibus & differentiis, in compendio aromatariorum, particula tertia.

Stanislaus Caspius Polonus, De multiplici Sicclo & Talento Hebraico. De mensuris Hebraicis, tam aridorum quam liquidorum. Epitome de ponderibus & mensuris, quæ apud prophanos leguntur authores.

Theodericus Thaminus Dominicanus, de Mensuris rerum librum scripsit.

De Ponderibus & Mensuris specialia quedam hinc inde ab authoribus explicata.

Cujusmodi sit id, Deum omnia perfecisse numero, pondere mensura, Cælius 22. 6.

Ponderum nomina, Textor in Off. 82r.

Quid mina quid drachma, quid assis, denarius, Sestertium, & talentum apud gentes diversas valuerit Alexand. 4. 24.

De obolis vel obelis, Cælius lib. 10. cap. 2.

Mensurarum à corpore humano esse deprompta nomina, Cælius lib. 30. cap. 20.

Quis primus repererit pondera & mensuras, Polyd. 1. 19.

De nummis, vide in politicis vel æconomicis, licet etiam huc ad pondera referri potuissent.

De mensuris, Volateranus 30.

Mensuræ quedam, Textor in Offic. 273.

Hippiæ mensuræ & Pnidoniæ cur Cælius 14. 18.

Πηχὺς καὶ οὐνίον, Τζέζ. 13. 479.

Quid

Quid Chœnix, chœnicometra, & super chœnice sedere, Cælius 16. 17.

De maride mensura & marila, idem 26. 16.

Sara pro mensuræ specie : item cabus & batús, Idem 16. 14.

Exponitur illud Quintiliani, in trichinio Chœa: quid chœus, chœa, chœs, de cotyla item pauca, Cælius 29. 1.

Hemina, Cælius 28. 30.

Nomina terræ dimensionum in Geometricis posita sunt.

PRÆTERMISSA sunt nobis in catalogo de industria multa de numis, & monetis: itemque quæ de Mathematicis & Geometricis mensuris ab authoribus scripta extant quod ad medicinam ferè non spectent: quanquam etiam nonnullorum hic quoque mentio inciderit alicubi. Qui vero etiam horum catalogum requirit, is consulat Bibliothecæ Gesneri partem secundam: lib. 6. de Geometria, tituli tertij, parte secunda: & ibidem in Appendice. Itemque De Grammatica, titulo 12.

Vocabula rei nummaria ponderum & mensurarum Græca, Latina, Hebraica, Arabica: ex diversis authoribus collecta, & in ordinem alphabeticum disposita, per JOSIAM SIMLERUM Tigurinum.

Aben seu Enib vel Evib, Acsat, Kist nomina sunt Arabum & Maurorum ejus mensuræ, quam Romani Sextarium nominant. *Ein halbe maass.*

Acetabulum ex aceto nominatur ad imitationem Græcorum, apud quos *ὀξύσαρον* vas primo dictum, deinde ad mensuram translatum. Liqueoris autem mensura est & sesquicyathum continet. Agricola transfert *Ein halb maass* in alii *ein Becherlin*: sunt autem nostræ mensuræ capaciores Romanis. Est etiam siccorum mensura, cujus frequens mentio fit apud Corneliū Celsū. Agr. *Ein vierteil eines halben masses.*

Achana Persica est mensura, cujus Aristophanes meminit in Acharnensibus, quo loco interpretes mensuram hanc, teste Aristotele, scribit quadraginta quinque medimnorum Atticorum capacem fuisse.

Acsat idem quod Abun, Sextarius.

Actus mensura intervallorum, rei rusticæ scriptoribus in usu: dictus quod in eo boves agerentur, cum aratur uno impetu justo: est autem duplex. Actus minimus area pedum 480. latitudinis pedes 4. longitudinis habet pedes 120. Actus quadratus pedum 14400. latus pedes 120. & longus rotidem is modus & Mina Latine appellatur. *Ein halbe jucharten.*

Adarkon i. Paral. ult. cap. quidam drachmam transferunt, alij nummum significare volunt: videtur autem ita appellari nummus aureus drachmalis.

Æquipondium sacoma Vitr. appendiculum quod per scapum trutinæ Campanæ punctis observatur. *Das gewicht an der schnellvag.*

Æquilibrium Vitr. Equamentum Festo, libramentum Plin. cum neutro inclinat examen, sed æquo momento partitur discrimen. *Das innstehend gewicht.*

Æreolum vel areolus *χαλκός* ponderis nomen, sexta pars oboli Attici, pendit autem duo hordei grana: apud Græcos dividitur in septem minuta. Est etiam nummi genus, qui & ipse septem minuta *λεπτά* pendebat: proinde ad nostrum nummulum qui est 32. pars drachmæ transferre licet, quamvis æreolus 63. pars drachmæ fuerit: *Ein pfennig oder ein angster*, vel antlister, *ein alter angster* apud nos proxime ad æreolum accedit.

Ærarium locus ubi publicæ pecuniæ servabantur, ita dictus ab ærea moneta, quam veteres Romani usurpatunt. *Schatzkamer, stas seckel, statt geltkainer, oder renterey.*

Æs, pro omni genere aureorum argenteorumve nummorum. *Allerley muntz, aller hand galt.*

Æs circumforaneum, quod e tabernis argentariorum, quæ circumforam sub porticibus erant, sœnori petebatur. *Galt auf vucher auf genommen oder entlehret.*

Æs alienum quod aliis debetur, debitum. *Gelt-schuld.*

Æs grave dicebatur, quo non numerato, sed appenso debita exolvi solebant.

Ære mutare, pretio aliquid emere aut venditare: *Rauffen und verkaufen.*

Adarare, ære æstimare, ad pecuniæ taxationem redigere. *Zu gelt schlahen, schetzen.*

Æriscare vetus verbum, æra undique, id est pecunias colligere. *Allenthalb gelt samlen und zu samlen kratzen.*

Agorah idem quod Gerah Hebræis, nummulus argenteus vigesima pars sicli.

Alabastrum, ut Epiphanius scribit, vasculum est vitreum, quod capit olei libram: mensura vero quæ recipit dimidiam sextarij partem.

Alcuathum seu Cuathum, Arabica mensura Cyathum capiens.

Aldorach amphora Arabica trium librarum.

Alki Arabibus idem quod Græcis *δραχμή* seu drachma.

Amah Hebræis cubitum significat. Cubitum autem Hebræis fuit duplex, alterum sex palmorum, quod simpliciter Amah cubitum nominam: alterum septem palmorum, quod cubitum & palmum, sive palmicubitum vocant. *Ein eln.*

Amphora à Græco nomine *ἀμφορεύς*, Quadrantal ab antiquis appellata, à quadrati pedis figura: mensura est liquidorum, quæ duas urnas, sex rarios vero 48. c. *Vier und zu entzig mass, ein Omen.* Agricola Amphoram interpretatur. *Sechsstobichen.*

Amphora Capitolina, Romana amphora Jovi sacra in monte Tarpeio, in quo Capitolium fuit: justæ capacitatis amphora: nam majoribus & minoribus amphoris, non ut mensuris, sed vasis utebantur.

Amphoreus *ἀμφορεύς*, vas quod utrinque ansas habet quibus capi & portari possit: & mensura Græca eodem nomine appellata, à quo amphora nomen Romani mutuari sunt. Est autem Amphoreus seu Amphora Græcorum similis Vrnæ Romanæ, capit cyathos 298. choas quatuor. *Ein halber omen.*

Amphora Attica, ita nominat Fannius Metretens, quæ major est Romana, capit enim 3. Vrnas, Choas seu Congios duodecim. *Ander thalber omen.*

Anesure seu Kalsuf: item Hæsfunefi, seu quarta Aclassæ nomina Arabum & Maurorum ejus mensuræ quæ acetabulo respondet, & sesquicyathum capit.

Ansa in qua examen bilancis versatur.

Apophoreta Martiali, munera quæ convivis asportanda dabatur. *Gast geschenkt.*

Aporrhyma mensura Egyptiorum, quæ capit tria sextarios.

Argenteus aliquando in sacris literis, & apud Josephum absolute pro siclo ponitur, Hebræa phrasi, quæ siclus *Kesaph* argentum aut argenteus nominatur, subintellecto videlicet nummi nomine. Apud Græcos quoque drachma vocatur *ἀργυρὸς*, secundum Alexandrum apud Athenæum, quia fuit alia drachma auri.

Argumentariam facere Cic. pro exercere usuram, aut argentarii nummulariive munus obire. *Wücheren, oder den wuchsel tryben.*

Argentariam dissolvere Cic. cedere foro, quando nummularius tabernæ suæ exercitium deserit. *Vom handel abson, Bankerottieren.*

Arra vel Arrabo, quod emptionis nomine datur, ut constet fides de pretio, quod convenerit. *Goldpfennig, pfundschilling, hauptpfennig.*

Arra sponalitia, quæ datur utrinque à sponso & à sponsa, in matrimonij contractus testimonium. *Das nan man uff die Äegibit.*

Artaba mensura est Persica Herodoto, capiens medimnum Atticum & præterea tres choenicas Atticas. Est etiam artaba medica, medimni Attici capax: & tertia Egyptiaca quinque modiorum.

Arundo seu calamus, apud Hebræos instrumentum dimetiendi intervalla: Apud Ezechielem cap. 40. arundo sex palmicubitorum seu septem communium describitur. *Ein matzstab, ein zollstab.*

Aura mensuræ nomen apud rei rusticæ scriptores habens pedes quinquaginta.

As nomen ab ære deductum, ærei nummi appellatio, qui vario pondere percussus est: primum libralis, deinde sextantario pondere, tum uncialis, postremo semuncialis. Dividitur autem as in partes duodecim, quæ uncia singulæ vocantur, duæ vero sextans, tres quadrans, quatuor triens, quinque quincunx, sex semis, septem septunx, octobes, novem dodrans, decem dextans, undecim deunx. Cum verò as decima sit pars denarii Romani, ejus æstimatio ex denarii valore noscitur: Budeus denarium æstimat quaternis Caroleis, & duobus denariis Turonicis: hoc est octo cruciferis seu cruciatis nostratibus, & duabus quintis unius cruciati: itaque as valebit hac ratione quatuor denariolis Turonicis & quinta unius parte, quinque verò denarioli cruciatum faciunt: itaque his pares sunt minimi nummuli Basilenses, & ad Romanum assem proxime accedit. *Ein kleiner Vassel vierer. Asse Romano etsi non pondere ac æstimatione, usu tamen & partium similitudine, respondent Germanici nummi quos schilling & plappart vocant quamvis diversæ æstimationis: nam Luceriæ aureo æstimantur 50. Tiguri 40. Basileæ 25. Argentorati 10. Mercatoribus vero in usu est aureum 20. schilling, quos schilling in gold nominant æstimare: omnes vero assis instar in duodecim domi notos & vulgares nummulos dividuntur quos heller vocant.*

As cum de ponderibus verba fiunt est libra, vel pondo, & similiter in duodecim uncias dividitur, quæ nomina ante commemorata servant. Postremo quoties solidum dividitur, ut pes, jugerum, fundus, hæreditas, hora & in coelo Zodiacus, as pro solido accipitur: & partes nomina partium assis accipiunt: hinc fluxerunt illæ formulæ. Ad assem reddere, ad assem omnia perdere, ex asse hæres: & similes.

Assarius vel assarion, cum pondus declarat est duarum drachmarum Romani pondus assis ærei sæpe diminuerunt, & tandem lege Papyria semunciales asses fecerunt: istiusmodi autem assis dimidium à Græcis dicitur ἀσάριον, à Varrone assarius: à nummo pondus nomen accepit. Assarij nummi mentio in Evangelica historia Matthæi & Lucæ *Ein Basjel rap.*

Assaron Hebraicæ mensuræ nomen apud Josephum quæ alias omnes, & à septuaginta interpretibus γομύρ nominatur, & est pars decima Ephî, continet sextarios Atticos septem, & quintam sextarij partem.

Asspondium unum pondus dicebatur, ideo quod as erat libræ pondus. *Ein pfundschvvar.*

Auctoramentum quo accepto miles obligatur cum dat nomen. *Verpfistung, vergeltung, lauffgelt, dass man einem knecht aufhand gibt, oder zu der aufristung.*

B

Bat seu Bathus mensura liquidorum Hebræis: quæ capit sex hinas: est autem æqualis amphoræ Atticæ quæ μεπητὴς & καδὸς nominatur, capit autem Cadus 36. *Bussgouvver mass, anderthalben mass.*

Bes octo uncia, seu duæ tertia, aut duo trientes assis seu libræ: intelligimus autem libram Romanam quæ pendit uncias duodecim. *Acht unzen, oder sechszehen lot.*

Bes argentarius, aurarius, seu monetarius, quo monetales utuntur, qui cudunt aurum vel argentum, *Ein mark.* Marca etiam seu Bes nominatur certa pecuniæ summa, quamvis bessim libræ non pendeat: Sic Miseni nummi quatuor, quos *Silbergroschen* nominant, bes appellantur seu marca, cum tamen, si pondus spectes, bes pendeat ejusmodi argenteos nummos octo & octoginta. Apud nos bes nominantur duo aurei cum dimidio.

Bessalis vel pondus intervallum octo unciarum. Vitruvius bessales laterculos nominat. *Gebrante stein, ziegelstein acht zoll lang oder breit.*

Bessis usura, in qua centesimæ bessis solvitur: nam centesimæ usura hic as est. *Wücher oder zinss acht vom hundert ein jar.*

Bicessis idem quod viceffis, à duobus decussibus, hoc est viginti assibus, ductum nomen.

Bigati nummi ita dicti quod nota bigæ essent percussi.

Bilibris, duarum librarum *Zwey pfund schvver.* Cornu bilibre apud Horatium, duarum librarum mensuralium capax. *Das zuvo pfundt maass fasset.*

Bipedalis. Vitruvio, Tegulæ bipedales. *Ziegel zuven schüchlang.*

Bos didrachmi Atheniensis nomen, quod nota bovis signatum esset, ex quo illud, Bos in lingua factum fuit tritum Græcorum sermone proverbium, si quis argento corruptus cum loquendum esset taceret. *Ein pfenning darauff ein ochs gepraget vuar bey den Athenern, galt ein ort eins guldins.*

Bravium, quod victori confertur in ludis. *Die gab so man dem helden im kampf gibt, das best.*

C

Cab seu Cabus mensura aridorum apud Hebræos, quarta pars modij, capit sextarios quatuor ut ex Josepho & Epiphanio annotavit Agricola. *Ein vierling.* Glarsanus tamen ex sententia Rabi Solomonis Cabum facit cyathorum 32. qui sunt sextarij duo & semis: idem tradidit, Santem Pagninum Cabum definire sex medimnis, seu amphoris duodecim.

Cadus & vasis nomen est apud Latinos, & mensuræ apud Græcos, quo & Plinius utitur, sed tantummodo ubi vel Græca transfert, vel de Græcis vinis loquitur. Idem mensuræ genus dicitur μεπητὴς, καδύμιον, κάμυρος & κάμυρον, & Amphora Attica Cadus capit urnas tres. *Anderthalber omen.*

Calamus, Vide ARUNDO.

Canon legitima & ordinaria pensitatio reipublicæ, cujusmodi sunt vectigalia & portoria. *farlich ordinar einkommen.*

Caph Hebræorum magistri mensuram & trigessimam Logi partem esse ajunt: sed in sacris literis Numer. 6. cap. Caph nomen est vasis patuli, parvi & concavi, in modum cochlearis formati, in quo thus

thus aut aliud huiusmodi ponebatur.

Capitha Persica mensura apud Xenoph. quæ capiebat duas chœnicas Atticas.

Caput, sors, summa Cic. Terent. Plinio, principalis summa quæ scœnori datur: quod caput sit scœnoris, κεφάλαιον Platonis dicta, & Hœcрати αρχαίων, quod ex eo tanquam principio orientur usuræ. *Die ganze summe, hauptsumme, haupt gut,*

Census æstimatio fortunarum, pro cuius ratione tributum penditur. *Schatzung eines jetzlichen haab, itein umgele, stür zin/z.*

Centesima absolute, & usura centesima, item usura unciaria, & scœnus unciarum, quæ centesimam fortis partem singulis mensibus capit quando nimirum quotannis duodecim penduntur usuræ nomine: ibi enim assis nomine censetur annus, ut unciarum vices gerunt menses. *Zuvölff vom hunder.*

Centumpondium Cato nominat, quod juniores centenarium appellarunt. *Ein centner, ein gvvist ein hundert pfund schwer, oder een tnerig.*

Census quo majus æris vocabulum non est centum asses, seu denarii decem, itaque Romanus census æstimabitur cruciatis 80. *Zuventzig batzen.* Budei ætate cum pretium auri nondum adeo augmentum fuisset, coronatus Gallicus decem denariis, sive centusse ab eo æstimatus fuit.

Chalcus Vide *Æreolum.*

Charisterium, quod beneficio datur.

Chœnix Attica mensura aridorum, & principium ferè omnis mensuræ, unde & metron appellabatur: capit autem chœnix (ut Agricola tradit) sesquisextarium, corylas 3. oxybapha 12. cyathos 18. Budeus vero Chœnica duos sextarios Romanos capere scribit: quæ diversitas ex medicarum & georgicarum mensurarum diversitate orta videtur: nam inter mensuras Atticas seu medicas, & georgicas proportio est sesquialtera, Chœnix vero cibus erat diurnus servorum Græcorum, quemadmodum fuit demensum Romanorum cibus mensurus, quod quidem continuit modios quaternos, qui faciunt sextarios quatuor & sexaginta: si igitur mensis statuatur 30. dierum, cibus diurnus duo erunt sextarii, sed supererunt quatuor, qui corollarii vice dati centeri possunt. Romanis quoque militibus sextarius castrensis, qui duos urbicos capiebat, mensura erat cibi diurni, & Herodorus tritici chœnica absumentam quotidie singulis viris, qui erant in exercitu Xerxis, partitur: unde apparet eandem victus rationem Græcis & Romanis domi militiæque fuisse. Capacitas igitur Chœnicis ex sextario, de quo loco, apparet. Pretium haud dubiè varium fuit. Cicero in Verrem Modium in Sicilia lege æstimatum scribit ternis sestertiis, aut quaternis si erat imperatum frumentum. Jam cum modius capiat sextarios 6. Chœnix qui continet duos sextarios, emetur asse uno & quadrante *Drey Basel rappen*, si pretium modii fuerint quatuor sestertii: Quare cum in Apocalypsi dicitur Chœnix tritici æstimabitur denario, significatur magna annonæ caritas, vide licet panem diurnum qui alas cruciato aut paulò plus emebatur, octo cruciatis emendum esse, *Ein halber vierling, oder ein imme.*

Chus qui & chœus quoque dicitur vasis primunt genus quo aqua hausta fundebatur, deinde Attica mensura liquidorum, quæ ut apud Romanos Congius sex continet sextarios. *Drey maasz, drey kannen.*

Cicar Hebræorum pondus, quod duplex fuit: Cicar sanctuarii quod Josephus cinchares nominat & in Græcam linguam conversum talentum significare tradit, id pendebat centum minas. Cicar congregationis quod & vulgare nominatur, hoc ut ex

38. cap. Exodi intelligitur fuit quinquaginta minarum. *Ein centner.*

Cimelium, quod reponitur extra quotidianum usum, *κεμικιον. Beschmuck und kleinoter.*

Cistophorus Cic. Asiaticus nummus, cujus pretium fuit pauxillo majus, quàm denarii dimidi: ita dictus, quod ea moneta expressos haberet cistigeros, qui sacrorum arcana cistis inclusa gestarent. Quatuor autem denarii (ut ex Festo colligere licet) efficiunt septem cistophoros cum semisse, ex qua summa ad calculos revocata colligitur ejus pretium ad tres obolos cum semisse, nostra moneta. *Ongsaar zuven Basel plappart.*

Clima agri mensura quæ quoquo versus pedum est sexaginta. Columella auth. *Ein vierung felds sechzig schüch breit und sechzig schüch lang.*

Cochlear seu ligula mensura liquidorum minima Latinis, quarta pars cyathi: Græci mystrium nominant. Est & aliud minus cochleare Atticum, Cleopatrz decima cyathi pars: Fannius cochleare facit cyathi quartam & vicesimam partem: Scribonius Largus minus habet cochlearium: cyathos enim tribuit viginta. *Ein löfsele.*

Coclanarium nominant Arabes medici, vel eorum barbari interpretes, cochleare, è Græco κοχλιαριον nomine coclanarii formato.

Collathum apud Syros est media humidi bathi pars: est vero sextariorum quinque & viginti, ut Epiphanius tradit.

Collecta pro pecunia quæ à convivis exigitur. *Geloch, ürten maalgelt.*

Collybus pecuniæ permutatio. *Wachsel.*

Collybo pecuniam curare, vel mittere. *Gelt durch einen wachselbriefschicken.*

Comistrum quod bajulo datur. *Trager oder fackner lon, karenzicher lon.*

Concha liquidorum mensura Græca (qua tamen & Latini usi sunt, sicut & pro vasis generis) duplex est, major quæ æqualis est oxybapho: minor quæ dimidium cyathum capit.

Congius Græcis χους liquidorum mensura capit sextarios sex. *Drey maasz oder drey kannen.*

Congialis, id est unus congii Plautus, Mulsi congialem plenam faciam tibi fideliam.

Congiarius congii mensura: præterea munus quod à Cæsaribus, vel imperatoribus amicis dabatur: inde fortè dictum quod primò congii vini vel olei dabatur, deinde res aliæ cœptæ dari eadem manente appellatione: scribitur enim à Suetonio Augustum congiaria populo frequenter dedisse, modo quadragenos, modo tricenos, nonnunquam ducenos quinquagenosque nummos. *Fürstengab.*

Contubare Cic. posterioribus creditoribus satisfacere, præteritis veteribus. *Die leste schuld abtragen und die alten bleyben lassen.*

Cophinus mensura est Bœotia tam aridarum quàm liquidarum rerum, capiens congios seu choas tres. *Halt nün maasz oder kannen.*

Corboni medicis Arabibus heminam declarat: interpretès Avicennæ corylam Græco nomine appellat: Rasis interpretès phialam reddidit: cum tamen phiala mensura non sit sed genus poculi.

Cor vel Corus amplissima mensura aridorum apud Hebræos, quæ capit medimnos Atticos decem, sextarios 720. *Ein malter, Mathesius achtet es für zehn Leyptziger scheffel.*

Coronarium quod principi ad inaugurationem seu novum honorem donatur. *Gaab die man einem König oder Fürsten auff seiner Krönung schencke.*

Cotyle vasis genus & mensura humidorum, quæ etiam

etiam ἡμίσητον & τρυβλίον Græcis, & Latinis hemina nominatur, quæ semisextarium sive cyathos sex continet. Vitebergæ *ein halber nössel* Agricola Glareano Benedictinorum poculum: apud nos *ein halbe quartlin.*

Cuathum & præposito articulo Alcuathum cyathus est Mauris, Græco nomine κύαθος Arabica barbarie depravato.

Cubitum & cubitus à Græco fluxit, etenim κύβιτις Hippocrates appellat κύβιτον, id vero habet pedem unum & dimidium, estque extensio inter flexum brachii & supremam medii digiti partem: eadem mensura quæ & ulnæ, iisdem enim nominibus idem membrum appellatur, unde Pollux, πῦχον cubitum inquit, ulnam quoque ὠλένην nominari Petrus Victorius in fine variarum lectionum scribit πῦχον esse duorum pedum, ideoque duobus palmis cubito longiorem. Apud Persas regium cubitum tribus digitis majus erat quam mediocre. *Ein eln, anderthalben schüch.*

Cub. talis πῦχναίος, *Ein eln, anderthalben schüch hoch oder lang.*

Culei dicebantur utres è corio in quibus vinum & oleum portabatur, in ejusmodi quoque culeos è corio paritidæ vivi insuti in proximum mare vel amnem deiciebantur. Culeus etiam est maxima mensura liquorum Romanis, quæ amphoras capit viginti. *Helt zuventzig omen.*

Culeare dolium. *Ein vass das zuventzig omen halt.*

Cyathus τὸ πρὸς τῇ χύειν à fundendo Græcis dictus, poculum quod in sympuli locum successisse in conviviiis dicit Varro, cum in sacrificiis manserit altera appellatio. Inde translatus ad mensuram cyathus, quorum duodecim sextarium complent. Ad cyathi mensuram accedunt minuta pocula quæ fabri argentarii aliquando ex uncialibus nummis cudunt. *Taler bacherlin.* Glareanus cyathi mensuram quadratam facit, longitudine duorum, profunditate unius, latitudine sesquipollicis: quæ contineat liquoris alicujus uncias duas. Quare pueriliter errant qui cyathum mensuram credidere poculum vulgare esse, quale hodie plerumque in mensa convivis præponi solet, cum hujusmodi pocula frequenter quatuor cyathos capiant.

Cyprus mensuræ nomen apud Alcæum & Hippocratem, ejusdem cûjus medimnus capacitatis Hesichio auctore. Epiphanius vero, Cyprus, inquit, apud Ponticos mensura est siccorum germinum modii duo, qui ipsis dicitur esse chœnicum quinque, ut Cyprus sit sextariorum 50. magnus etenim modius eis est sextariorum viginti quinque.

Cyzicenus stater viginti octo drachmas Atticas valebat, taxatur duobus aureis Ungaricis & tribus undecimis unius aurei. *Ongfar vier guldin.*

D.

Daetylus, digitus, minima mensurarum quibus intervalla metimur: spatium digiti lati sive transversi. *Ein zuverch finger.* Est etiam digitus quadratus in longitudine & latitudine æqualis: & rotundus tribus quartis decimis suo quadrato minor, quia anguli deteruntur.

Digitalis, Plinio, Radix anchusæ digitali crassitudine. *Eines fingers dick.*

Daetylodochme, palestè, doron, & dochme, palmus, constat quatuor digitis. *Ein zuverch hand.*

Dadix mensura est sex chœnicum capax apud Pollucem.

Danaces nummus est barbarus, quem isti in os mortuorum imponebant, ut pro vectura solvere possent Charonti, atque sic nummum funebrem ap-

pellavit Callimachus & Plutarchus Aristophanes & Lucianus obolos mortuis datos fuisse dicunt: Juvenalis trientem.

Danicum nummum in magna Antiochia signatum fuisse Suidas auctor est, quo usi sunt ad conficiendas negotiationes exiguas.

Danich pondus Arabum, quod pondus à Græcis δέριμος, à Latinis lupinus dicitur, Arabes Cleopatram imitati ajunt pendere duas oboli tertias partes.

Darchimi apud Arabes & Darchemon apud Hebræos medicos, est Græca vox δρχμή, ab utrisque litterarum immutatione corrupta.

Darius, nummus aureus à Dario Persarum rege percussus: hic enim cum cuperet tale monumentum sui linquere, quale nullus rex reliquisset, ex auro, quod quàm fieri potuit purissimum excoxit, nummos percussit. Valebat autem Darius quantum aureus Atheniensis, ut Harpocratio annotat, drachmas duas Atticas pendens. Falsus itaque est Glareanus qui Darium nummum fuisse tetradrachmalem scribit: gravioreque errore implicitus tenetur Budæus, qui octo drachmarum esse voluit, secutus eos qui ab Harpocratio erroris insimulantur. Hadr. Junius. Agricola Daricum staterem æstimat duobus coronatis Francicis & septem ejusdem auri Francici momentis, *Helt zuvo sonnenkronen und siben esz oder granli.*

Decemmodiæ vasa rustica apud Columellam decem modiorum.

Decempeda, pertica, δέκα πῆχυν instrumentum quo viarum & agrorum metatores apud Græcos & Romanos usi sunt, à numero pedum denominata: *Ein maaszstab oder stangen zehn schüch lang.*

Decempedator, metator.

Decoquere Cic. creditum non reddere, credito fraudare. *Auffreihen, ein frischentisch machen.*

Decussis decem asses, denarius. *Halt zuven batzen, acht crentzer.*

Dementum mensura stata quatuor frumenti modiorum, in singulos menses servis appensa vel ad mensa, à metiendo nomen accepit Plauto Respondet autem demenso Græce σιμπέτεριον, quod in triginta dies datum fuisse militibus scribit Polybius. *Die vaacht.*

Denarius, nummus ita dictus quod denos æris valebat hoc est decem asses, quapropter & decusse signabatur, ut Sosipater annotavit. Aliquando simpliciter nummus nominatur, sicut & sestertius, ut quinquageni nummi Plinio, id est 50. denarii: aliquando ad nummum adjicitur denarius ut verbum ambiguum distinguatur, Varro nummi denarii decuma, libella. Bello Punico denarius sedecim assibus permutatus fuit: fuerunt autem decem asses pediti Romano diurnum stipendium: pratoriani milites duobus denariis merebant: Tacito auctore, Plinius tamen in militari stipendio denarium pro decem assibus datum scribit. Denarius legitimus pendebat septimam uncie partem, drachmam Atticam & septimam ejus partem, itaque etiam pretium ejus superabat: veruntamen etiam apud veteres drachma & denarius idem significare & tantundem valere dicuntur. *Ein halb ore, acht crentzer.* Germani pedites gregarii qui plerumque menstruum stipendium habent aureorum quatuor, similiter ut Romani denarium seu decem asses in dies singulos merent: sed à Gallis Helvetio pediti majora stipendia persolvuntur, denarii ferè duo in singulos pedites diurnum stipendium, exceptis his qui plura stipendia merent, ut sclopetarii, signiferi, & alii.

Denarius pondus denarii, drachma, septima uncie pars, nam in libra denarii 84. apud Romanos incur-

runt:

unt: Halt etwaa mer dann ein quintlin.

Deux uncia undecim, *Einlif untz*, non tantum de libra seu pondere, sed de pede, jugero, hora, sextario, &c. dicitur Martialis, Poto ego sextantes, tu poras Cinna deunces. Deuncem nominat sextarii cyathos undecim. *Ein vuenig minder dann ein halbmass.*

Dextans uncia decem, *Zehen untz*, *fünff sechsteil eines dings*, Omni asse in duodecim partes diviso, decem partes faciunt dextantem.

Diarium. Horat. diurnæ operæ pretium. *Taglon.*

Diaulus duo stadia: Stadium à veteribus dicebatur *αὐλός*, unde *διαυλός* duo stadia: erit igitur diaulos 1200. pedum seu ducentorum quinquaginta passuum. *Zweyhundert und fünfzig schritt, oder zweiff hundert schüch.*

Didrachmum nummus argenteus qui pendit duas drachmas. Didrachmum Atheniense quod haberet expressam bovis effigiem ab una parte, & ab altera Thesei, bos appellatum fuit. *Vierbatzen*, *ein ort eimes guldins*. Didrachmi mentio fit in Evangelica Historia Matth. 17. pendebatur enim à singulis Judæis dimidium sicli, hoc est didrachmum, quotannis sanctuario: hanc pensionem templo ademptam Romani suis magistratibus solvi iusserunt, idque tributum Christus quoque eo loco solvisse scribitur. Septuaginta siclium didrachmum transferunt Numerorum 3. cap. cum tamen sicli sanctuarii, de quo illic scribit, quatuor drachmarum fuerit.

Digitus, mensura minima intervalli, quem latum aut transversum intelligimus, hanc ex quatuor latis hordei granis constare dicunt: vide Dactilus. *Ein zverchfinger.*

Diobolus vel diobolum, Atheniensis nummus duorum obolorum, insculptum habens hinc Iovis speciem, illinc noctuam, unde à non nullis etiam *γλαῦς* noctua fuit dictus. Cum autem drachma habuerit sex obolos, colligitur pretium dioboli majus fuisse duobus cruciatis, duabus tertiis unius cruciati. *Etwaas mer dancin Basel plapart*. Agricola diobolum Atticum taxat *einlif Meissnuch pfennig; ein heller und ein dritteil eines hellers*.

Diobolatas meretrices Pacuvi. & Plaut. Græcos imitati, appellant contempta & abjecta scorta.

Dochme ab accipiendo à Græcis appellata, est ea mensura quam Latini palmum nominant, constat autem quatuor digitis. Vide Dactylodochme. *Ein zverchhand.*

Dodrans uncia novem, *neün untzen*. Cæterum quia spiritame Græcorum (quam quidam palmum majorem appellant) hoc est, intervallum inter pollicem & minimum digitum diductum, constat novem uncis pedis, seu palmis tribus, Latini *πώδων* dodrantem appellaverunt. *Ein spann*. Cujuscunque solidi tres quartæ partes dodrans etiam appellari possunt.

Dodrantis herbula. *Ein kreütlin einer spaan hoch.*

Dolichus est duodecim stadiorum. *Anderthalbe Italianische meil, fünfzehn hundert schritt.*

Donarium Macrobi. proprie, quod in sacrum usum confertur, *ἀνθήνα*. *Birchen. gezierd, oder geschenck.*

Donativum. Suet. quod ab exercitus imperatore militi confertur. *Eins herren geschenck.*

Dorach Italicum apud Arabes idem est quod amphora Romana. *Ein omen.*

Doron Græcis idem quod dochme & dactylodochme & Palestæ, Latinis palmus: *δάρεν* autem Græci appellant palmum, quod munus datio Græce *δάρεν* appellatur: id autem semper geritur per manus palmum. *Ein zverchhand.*

Dos à marito profecta *φάρμακον ἔδωκεν ἄτ' ἀγρίῳ* quæ ab uxore. *Morgengab, heimsteuer.*

Dos profectitia Ulpiano, à parente virilis sexus profecta.

Dos adventitia ab extraneo donata, vel ex ipsius mulieris bonis.

Drachma ponderis nomen est, cujus nomen & usus in mystopoliis mansit, octava uncia pars. *Ein quint.*

Drachmæ nomen cum solum ponitur, Attici nummum intelligunt drachmæ pondere, qui quantum valeat ipsum pondus indicat. *Ein quint silber*. Drachma tamen Ægynæa, quæ etiam Atticæ respectu *πρωχέα* crassa dicebatur, plus pendit: nam cum Attica esset sex obolorum, hæc decem obolos pendit. *Halt zu den 13. creützeren*, Attica vero *zween batzen, acht creützer*.

Drachma in intervallis est pars octava, uncia pediis verò nonagesima octava. *Der achte teils zols.*

Duapondo, Fabio, & pondo dua Scribonio Larago. *Zwey pfund.*

Duella, tertia pars uncia, binæ sextulæ: continet octo scriptula, sive drachmas binas totidemque scriptula.

Dupondius vel Dipondius nummus æreis Romæ duarum librarum, duo enim asses quos pendebat olim liberales erant. Huic pretio responder. *Ein doppel vierer.*

E.

Elephas mensuræ aut potius vasis nomen, tres implebat congios.

Emerere ab hasta, in auctione emere: nam ubi auctio fiebat, hasta olim de more erigebatur, tanquam præcipuum signum, ut Festus annotat: unde & hasta apud Ciceronem pro ipsa bonorum venditione sive auctione ponitur: quod hastarium dixit Tertullianus. *Offentlich kauffen, auff der gant kauffen.*

Epha aridiorum mensura apud Hebræos decima pars Cori: capit tria sata, apud Hebræos: apud Atticos medimno par est, quare etiam sextarios septuaginta duos recipit. *Ein schefel.*

Evangelium Cic. quod læta nuntianti datur. *Das bottren brot.*

Evib. idem quod Aben apud Arabes, Sextarius.

Examen Virg. lingua sive lingula, quæ in ansa huc atque illuc nutant, dum lancibus æquatis respondeat summo puncto. *Das züngle in der waag.*

Extat æs theatricum, quod spectaculorum gratia dabatur. *Gelt so man gibt etwaa ein spyl zu sehen.*

F.

Fahaliel, & Falgerin medici Arabes & Manri cochleare appellant. *Ein laeffel.*

Fasciculus Scribonio, manipulus Celso. *Handvoll, hand büschel.*

Finitor idem qui & decempedator, & metator.

Fiscus principis ararium, à fiscis sive fiscellis, hoc est, sportis quibus includi & asportari pecunia publice principi debita solebat. *Eins Fürstenschatz.*

Fœnus, usura, fructus è pecunia fœnori data collectus, quod ad sortem usu accedat: fœnus vero quod sit accepti veluti fœtus. *Wücher.*

Funiculus, schœnos; Ægyptia mensura sexaginta stadiorum, ita dicta D. Hieronymo auctore, quod Ægyptii in Nilo flumine, sive in ejus rivis solerent naves funibus trahere certa habentes spacia, quæ appellant funiculos, ut labori defessorum recentia trahentium colla succedant. *Schœnos macht 7500. schrit, zuvo ringe teutsche meilen.*

Funiculus instrumentum quo vinearum & agrorum metatores apud Persas & Ægyptios usi sunt. Fuit autem Funiculus Ptolomæo sive potius Marino triginta stadiorum, Ægyptiis sexaginta.

G.

Gabenum mensura georgica, apud quam nationem in usu fuerit non traditur, habuit autem eandem quam acetabulum capacitatem Hesichio.

Garme quod etiam Karmes dicunt Arabes, factum est transsectione & immutatione literarum ex Græco verbo, quod est gramma, & scrupulum significat. *Ein scrupel.*

Gerah Hebræum pondus vigesima sicii pars, pendet obolum Atticum & quintam ejus partem, itaque Græci & Latini obolum vertunt. *Der fünfte teil eins quintlins, ein gran.* In re monetaria Gara in nostra moneta. *Ein doppelvierer.*

Gomor septuaginta Interpretes appellarunt eam mensuram quam Hebræi Omer nominant, Josephus Asaron alicubi transtulit decima pars Ephæ.

Gradus, ut Boetius inquit, est mensura duorum pedum & dimidii: sed vetustiores hoc nomine pro mensura nusquam utuntur, sed illis progressum quendam significat. *Einschritt.*

Gramma Græcum pondus, drachmæ tertia pars Latinis scrupulum, vetustioribus Græcis diobolum. *Eins dritte l eins quintlins.*

Granum nominant quidam drachmæ partem septuagesimam secundam.

H.

Hastæ subicere, Cic. sub corona vendere sustinere, sub corona venire Cæsari, in propatulo vendere, hastam in foro ponere, & bona vocis subicere præconis, auctionari. *Offentlich verganten und verkaufen.*

Hemina ex Græco *ἡμιον*, quod est dimidia pars sextarii, cotyle Græcis, liquidorum & aridorum mensura, continet cyathos sex: Georg. Agr. *Ein halber nassel, item ein halbe maasz:* apud nos *ein halb quertlin.*

Hinc mensura liquidorum apud Hebræos capit Logos duodecim, duos congios, sive sextarios duodecim. *Helt sechs maasz.*

Homer, Vide Omer.

Honorarium quod honoris ergo magistratui aut principi Reipublicæ nomine offertur, non tanquam debitum. *Vereerung, eerenfchemcke zu einem Fürsten oder Oberkeit.*

Honorarium etiam merces quæ medicis, Jureconsultis, aliisque operam beneficii loco præstantibus dabatur. *Eerenfchemck, eerlicher lon.*

Hostorium, Plauto, & radius, lignum teres quo mensuræ æquantur. *Streichholtz, streiche.*

Hydria apud Ponticos mensura est decem sextariorum Alexandrinorum, Epiphania auctore.

I.

Inium Ægyptiaca mensura: Sextarius.

Johein apud Arabes significat Congium.

Isagogicum quod pro rudimento donat discipulus, unde Isagogicum dependere, Budæo, quod ferè consonat cum illo Ciceronis, Rudimentum ponere, & rudimentum tyrocini deponere, Justinus. *Das wvilkum gelt geben und bezalen, Den introitngeben.*

Jugerum ruris modus, quem uno die juncti boves jugo uno exarare possunt, habetque duos quadratos actus: patet 120. pedes in longitudinem; dimidiumque in latitudinem. *Ein juchart, vvas ein par oxsen auff ein tag even mag.*

Jugum scapus bilancis, de quo lances utrinque dependent.

K.

Kasfuf Arabica mensura, quæ etiam anecsufesi

barbaris hacfunesi, & acfasse dicitur: acetabulum.

Keiliati, Arabicum, manat à Græco verbo, quod est *καλυψι* est autem ea mensura quam Græci vocant *πικρον*. Latini quartarium, quod quarta pars sit sextarij.

Kermet Arabicum pondus quod & Garme: Scrupulum *γερμαμα.*

Kestuf apud Arabes, idem est quod Græcis *χαλκός*, Latinis æreolum: quod juxta ipsos duo hordei grana pendit.

Kirat imitatione Græci vocabuli *κεράτιον*, filiqua Est autem omnis Kirat Avicennæ quatuor grana hordei.

Kist apud Arabes ea mensura est, quam Romani sextarium nominant. Eadem mensura Aben & Evib vel Enib & Acfat ab illis appellatur.

L

Lapis terminalis seu terminus quo olim non solum agrorum limites, sed milliaria signabantur, inde legimus ad secundum, ad tertium, ad quartum lapidem: quo modo veteres etiam dixisse ad tertium cippum Valerius Probus auctor est: nam cippus lapidem terminalem & terminum significat.

Lanx. *Wagschüslen.*

Lauria Livio, munera quæ legatis exterarum nationum dabantur. *Fræmder botschafft geschenck.*

Legativum Juliano, quod dabatur legato viatici & impensæ nomine. *Zeergelt einer botschafft.*

Lepton, Vide Minutia.

Lethec aridarum rerum mensura apud Hebræos, media pars cori, recipit ephas quinque.

Leuca Gallicum nomen: nam ut Ammianus Marcellinus scribit, Galli non mille passibus, sed leucis itinera metiuntur, quæ mensura Gallica est mille quingentorum passuum, ut ex decimo sexto libro ejusdem colligitur: hodie tamen duobus ferè millibus passuum à Gallis definitur, & nomen servat. *Ein Frantzösische meil oder Leuca.*

Libella nummus argenteus denarii pars decima, valebatque assem qui erat libralis ex ære proinde as, libra & libella argenti Plauto Libella Cic. & assis, pro eodem accipiuntur. *Ein Basel vierer.*

Libra instrumentum quo responderantur. *Ein vvas.*

Libra pondo. *Ein pfund.* Statuunt autem libram triplicem: mercalem sive zygotaticam, qua negotiatores institoresque quinque merces appensas venundant, utuntur, sedecim unciarum: alteram Romanam duodenum unciarum, quæ Romanis olim usitata & scriptoribus omnibus est decantatissima: & tertiam nummulariam dictam & octonariam, vulgò marcā, quæ Romanæ bes est.

Libra mensuralis *μετραν*. *Ein pfundmaasz in der Apoteck.*

Libralis, Plinio Columellæ. *Eins pfunds schwarz,* Librale cornu Plinio. *Das ein pfund maasz fasset,* Libra mensuralis capax.

Lichas Græcum mensuræ nomen Latino nomine caret, est intervallum inter pollicem & indicem, cum quam fieri possit maxime distenduntur, efficit vero digitos decem, seu palmos, duos & dimidium.

Ligula, & instrumentum est auriendi sicut cochlearium, & certa mensura cochleare. Plinio etiam lingua nominatur. *Ein lafele.*

Log vel Logus mensura Hebræa minima in liquidis & aridis, quam Hebræorum magistri tradunt sex gallinæ ova continere: duodecima pars in liquidis, & in aridis quarta pars cabi: Sextarius. *Ein albe maasz.*

Litrum Ennio, quod pro captivi corporis redemptione penditur. *Rantzung.*

Maetrium

M.

Mzotrum quod obstetrici datur. *Der hebammen-lon.*

Maneh. Hebr. ponderis nomen, quod Græci Hebræos imitari *μᾶν*, Latini minam vocant: duarum librarum & dimidiæ: siclorum sexaginta. Germanice *ein schock*, quod nomen 60. significat.

Manes Arabicum mina, quæ illis duplex est, Romana unciarum viginti, & Alicarica, Balaria, & Ægyptia unciarum 16.

Mantissa Lucilio, additamentum Cic. auctarium Plin. corollarium, accessio Cic. *Zugab, zūmasz, übermasz.*

Marcam hodie nominant argentarii & monetales libram suam unciarum octo, quæ zygotica semis est, Romanæ verò bes: ideoque Marca bes argentearius Latine nominari potest.

Medimnus, Attica aridorum mensura, continet 48. Chœnicas, modios Romanos sex.

Meneroth vasculi nomen apud Hebræos, quod Epiphanius tradidit esse mensuram cyathi.

Menytrum quod indici & exploratori datur. *Geleits lon.*

Mensura, metrum Victorino, *maasz*: sunt autem mensuræ duplices: alteræ quibus moles rerum liquidarum aridarumque metimur: alteræ quibus longitudinem, latitudinem, altitudinem corporum sive intervalla.

Menstruum Ulpiano, pro stipendio militis in mensem. *Ein monat sold.*

Menstruum etiam Ciceroni & Livio, cibarium in mensem. *Fürsehung der proviandt für ein monat.*

Merces Cic. conductionis locationisque præmium, aut pro opera. *Lon, lidlon, taglon.*

Mestrum aut Mustarum Arabibus mensura Græcamystrum.

Metretes, Amphora Attica, Cadus, liquidorum mensura maxima apud Atticos, capit Choas duodecim, sextarios 72. *Halt adertbalben omen ongesaar vrie ein lagelen.* Cum igitur in nuptiis in Cana cum ex aqua Christus vinum fecit, sex hydræ singulæ binas, aut ternas metretes ceperint: Christum intelligimus suppeditalle magnam vini copiam: quæ res pertinet ad miraculi magnitudinem & dignitatem.

Metrum bioticum, Victorinus vocat, quod in vitæ usu taxatur. Quatuor autem modis accipitur, per spatium longitudinis, ut cubitale: secundo per examen ponderum, ut librale: tertio per qualitatem acervalem, ut in modio: quarto per humidam & fluxam qualitatem, ut cyatho, congio.

Milliare & milliarium, mille passus octo continet stadia: lapis etiam ita accipitur, & cippus Valerio Probo: quia millaria olim lapidibus & cippis signabantur, cujus rei documentum adhuc extat in Venetaditione. *Ein meil tusent schritt lang.*

Mina Attica erat quasi libra Attica, fuit autem mina Attica quatuor drachmis gravior Romana libra: sed ut drachmam Atticam denarium Latini transtulere, quamvis septima parte denarius gravior fuerit, ita etiam minam libram transferunt. Cæterum in re nummaria mina quia centum drachmas pendit, à Budæo æstimatur decem coronatis Gallicis qui bilibres sint Francica æstimatione, id ad nostræ monetæ rationem facit duodecim aureos & se missem. *Zwölff guldin und ein halben, den fl. für 64. creützer gerechnet.*

Minerval quod præceptori pro institutione numeratur: à Minerva artium præsidè. *Leer gelt, schül gelt.*

Minutia vel minutum *λεπτόν* septima æreoli pars *Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.*

cum in ponderibus tum in re nummaria: apud nos nummulum qui huic respondeat non habemus. *Is minder dann ein vier teil eines hallers.* Marci 12. Vidua pauper misit in gazophylacium minuta duo, quod est quadrans Evangelista interprete. Quare necesse est alia fuisse Hebræorum minuta, si numerus non sit corruptus, nam aliàs quadrans Romanus valet 6. minuta & præerea tres decimas unius minuti partes. Quidam transferunt minutum seu lepton. *Ein scherfflin, ein myt inde Nit ein myt, re-nuendi formula.*

Missilia in Digestis donaria quæ in vulgus promissæ spargit princeps aut magistratus. *Herren gauben und gelt so man under das volck vuirfft.*

Missiohaus idem quod *μίσσησ*, medius congius. Arab.

Modiolus mensuræ genus apud Plantum, cuius capacitas ignoratur. Quia ei promissum modiolum vini dare. Celsus in diversa significatione *χομδιον* modiolum transtulit. Est & vasis nomen titula. *Ein eimer.*

Modius aridorum mensura maxima apud Romanos, continet sextarios sedecim Agricola. *Ein sechs zehnteil eines schöffels. Nobis ein vierteil.*

Modialis Plauto, Aula modalis, quæ modii habet mensuram.

Momentum *σῆμα* media pars minuti. In rationibus monetariorum momentum. *Ein esz oder ein granlin.*

Momentum *Ausz zug im gewicht.*

Moneta à monendo dicta, nummus, numus, numisma, pecunia à pecore quæsito nomine *Müntz, gelt.*

Moneta proba, *Güte müntz, gut gelt.*

Moneta adulterina, improba. *Falsche und böse müntz, verrüffte müntz.*

Moneta accisa, arofa. *Beschnittner pfennig.*

Monetaria officina. *Die müntz.*

Mustarum, Arab. mystrum.

Munus, munusculum, donum. *Gaab, schencke.*

Mystrum Attica mensura duplex fuit, majus rei rusticæ scriptoribus in usu, decima sexta pars cotyles, minus medicum vicesima secunda pars cotyles. Est autem mystrum appellatum *σῆμα* *τῆς μῦς*: *μῦς* vero conchilii genus est Aristoteli.

N.

Naulum Jvenali quod pro vectura & trajectu solvit. *Für lon, schiff lon.*

Hebel Hebraicum verbum est & significat utrem, Epiphanius mensuram facit sextariorum centum quinquaginta.

Nomen quod nos debemus, aut quod nobis debetur.

Nomina impeta. *Vervorne schulden, alte und verlegne schulden.*

Nomen dissolvere Cic. *Schuld abzalen.*

Nomina facere Cic. obligare scilicet debitorem cautionibus: ita enim nomen accipitur pro debitoris obligatione, in Digestis. *Sich in schulden stecken.*

Nomina exigere. *Schulden erforderen oder eynziehen.*

Nonuffis novem asses.

Numisma Horat *νόμισμα*, nummus ita nominatus tanquam legitimum quiddam, & ut Aristoteles scribit, quod non natura sed lege factus sit. *Müntz, gelt.*

Nummus idem.

Nummus asper Suetonio, recenter & notis suis asperè expressus atque percussus. *Erst oder neuvergeschlagner pfening.*

Nummum percutere, signare, monetam cudere vel argentum, Teten. ferire pecuniam Plinio. *Müntzen, müntz oder gelt schlagen.*

Nummum commovere Cic. pecuniam à mensariis accipere fœnori. *Gelt aufnehmen.*

Nummum commutare. *Gelt wechszlen.*

Nummaria tessera, scheda qua exhibitæ pecuniæ repræsentantur. *Wachselbrieff.*

Nummaria difficultas Cic. argentaria inopia. *Mangel an gelt.*

Nummariam rem constituere. *Ordnung vom gelt aufbringen.*

Nummus aureus, qui & solidus, & aureus stater, viginti quinque denarios valebat, sive sestertios centum, taxatur Rosato quem Anglia dat, tribus aureis Rhenensibus & præterea drachma.

Nummus Daricus, Vide Daricus.

Nummi puri aurei vel argentei. *Die von lauterem gold oder silber one zusatz gemünzte sind.*

Nummus aliquando absolute pro denario, aliquando vero pro sestertio ponitur.

O.

Oblatio legitimæ pensationis genus, quod Latina voce subsidia vocamus. *Gult so man der oberkeit gibt.*

Obolus & ponderis & nummi nomen, sexta drachmæ pars. *Der sechste teil eins quintlins.* Obolo Attico in nostra moneta similis fere est noster as: *Ein Zurychschilling, thut an derthalber creützer:* redundat tamen in drachma cruciatus unus Philippus obolum quinque Mylorum nummulis æstimat, *Fünff Meisz-nichpfennig.*

Oephin mensura Ægyptia est quatuor Chœuicum apud Hesichium.

Ologinat Arabibus drachma, *ὀλκή.*

Olivarium Antistius Labeo ait esse mensuræ genus, apud Festum Pompeium: qui tamen ejus modum non exponit.

Omer Hebræa mensura qua sæpius sacræ literæ utuntur, decima pars Ephæ, capit Cabos duos, sextarios Atticos septem & quintam sextarii partem. *Ongefaar ein halb vierteil.*

Onolostat Arab. obolus.

Orgya Gr. Latine passus (quamvis passus Orgya contractior sit) significat extensionem ambarum manuum, ut & pectus una cum eis metiaris, est autem quatuor cubitorum sive pedum sex. *Ein klassier.*

Orthodoron Gr. palmus rectus, intervallum inter primam palmæ partem, *καρπὸν* Græci nominant, & supremam medii digiti, efficit autem digitos undecim.

Oxybaphon ita primo dictum vasculum ad infusionem aceti, ut in id intingerent cibum sumentes, paratum: deinde mensura hoc nomine dicta, Latine Acetabulum, capit sesquicyathum.

P.

Paleste, vide dochme & dactylodochme.

Palmicubitus, septem palmorum mensura: Hebræi qui duplex cubitus habent, alterum cubitum & palmum nominant: quod nos palmi cubitum nominamus, hoc D. Hieronymus perfectum cubitum appellat. Gellius cum scribit septem cubita facere 12. pedes & quadrantem, de palmi cubito loquitur. Regium cubitum apud Herodotum, digito uno minusest: & de hoc cubito Gellium loqui arbitrantur, qui apud eum legunt Pedes XI. S. & quadrantem.

Palmi pes ex palmo & pede componitur, est digitorum viginti.

Palmipedalis Columellæ, cui mensura est palmi & pedis.

Palmus quatuor digitorum est. *Ein zuverch bend.*

Palmarius Colum. palmi mensura. Per spacia palmaria serere, & inter palmaria spacia deponere. *Ein zuverch hand vweyt von einanderen sayen oder setzen.*

Parasanga, mensura est Persica triginta stadiorum. *Drey tausent siebenhundert und fünfzig schrit, Ein Persische meil, ein lange tütsche meil, 250. schrit meil, dam ein gemeine meil.*

Passus, ex passis, hoc est diductis manibus nomen hoc duxit, habet pedes quinque: *Ein schritt* multi tamen nostrorum per nostrum passum *ein schritt*, pedes duos & semissem intelligunt, quod gradum quidam vocant.

Pecunia à nota pecudum, qua Servius Tullius Romæ as signavit, est appellata Plinio: à pecu Varioni: cum apud antiquos opes & patrimonia ex his præcipue constituerint. Pecuniæ enim significatio ad ea refertur quæ in patrimonio sunt. *Farend unt ligend hab und gut.*

Pecunia otiosa Plin. quæ non occupatur & exercetur, nec in nomina aut prædiorum emptionem collocatur. *Gelt das vveder in kauffman schatz noch auff gevwin außz geben oder an gelegt vurt, müßig gelt.*

Pecunia Calendario destinata, in Calendarium conversa Dig. quæ faciendis nominibus occupata est: inde origine petita, quod Calendis mensium ferè pecunia fœnori daretur. *Gelt so man auff gevwin außz gibt.*

Pecunia attributa Asconio, quæ adnumerari quæstoribus solebat a tribunis æranis in stipendium militum assignationes sunt qui vulgò vocari putent. *Züge stelt gelt.*

Pecunia ærofa, Cod. cui plurima æris portio est. *Rüpperig, oder küpperin gelt.*

Pecunia numerata Cic. argentum præsentarium Plauto. *Bergelt.*

Pecuniam occupare Cic. exercere, & nominibus collocare pecuniam. *Sein gelt lassen gevinnen.*

Pecuniosus Varro.

Peculium quicquid labore nostro partum & repositum nobis est. *Warbgüt, ervvorben gut, gevunnen gut.*

Peculium Jurisconsulti esse volunt eorum, qui in aliena sunt potestate. Huc spectant illæ loquendi formulæ. In orci peculio numerari, hoc est pro mortuo haberi: & Cupidinis peculio adnumerari, pro amoris vinculis captum teneri.

Peculium profectitium, quod vivens pater filio permittit. *Galt so der vatter in sein leben dem son überlaszt.*

Peculium adventitium, quod alius alii concedit exercendum. *Galt das man einem gibt darmit, er vom zu handeln.*

Peculium castrense, quod in militia acquisitum est, aut degenti militiæ donatur. *Kriegs gut.*

Pes, quatuor est palmorum sive digitorum fedecim, dividiturque in duodecim uncias, ita ut duodecima pars pedis vocetur uncia: pollicem dici auctor est Frontinus. Porro pes Græcus & Passus, Romanis sunt longiores, pes quidem semuncia, passus pede uno & quadrante.

Pes porrectus, est iuxta pedis mensura. *Stehender fuß, ein vverch schüch lang.*

Pes contractus, longus & latus semipede. *Ein yngezogner fuß, oder schüch.*

Pes quadratus, longus & latus pede. *Fuß in quadrant.*

Pedalis, Plinio Colum. Pedali intervallo. *Eins schüchs vweyt von ein anderen.* Pedali mensura. *Eine schüchs lang.*

Peda-

Pedaneus Colum. Pedenea scrobs. *Ein grüben eins schüchls tieff.*

Pertica, Vide Decempeda.

Plethrum, Græcum, Latino nomine caret, intervallum est pedum centum. Alii scribunt Plethrum esse mensuram terræ habentem cubita sex & sexaginta tot quidem habet cubita, præterea pedem unum.

Pondo, si solum ponitur, idem quod libra significat. *Einpfund.* sin alteri vocabulo ponderis adjicitur, id quod Græci *σάβμω* vel *ὀλκῆ* id est pondere: sic scribitur pondo uncia. *Ein unze schvvar,* ad differentiam unciae mensuralis. Pondo denarii unius, &c.

Portorium. Cic. quod portitori in portu solvitur pro importatis aut exportatis mercibus. *Zoll.*

Pugillus. *Ein hand voll.*

Punctum unciae pedis pars ducentesima octogesima octava.

Putare rationes. Cic. Plaut. pro puram putamque & absolutam rationem conficere. *Die rechnung lüperen und klar machen.*

Pygme, Gr. cubitum decurtatum minus, digitis sex brevior quam *πῦχος* cubitum: definitur esse mensura à cubito ad digitos conclusos.

Pygon cubitus decurtatus, major vel palmipes, mensura à cubito usque ad extremam manus partem cum digiti inflexi fuerint: digitis ferè quatuor brevior cubito.

Q.

Quadrans nummus æreus antea triuncis vocatus à tribus uncis, teruncius Ciceroni: hujus nota fuit ex altera parte lanus geminus, ex altera ratis: assis pars quarta, unde & nomen accepit: denarii verò pars quadragesima. *Gilt als vil als ein Baszler helbling, zewen als angster, ein quatrin. Etsch vierer.*

Quadrans præterea est, cujusvis assis seu solidi pars quarta. Pigmei non sunt longiores Plinio, quam pedes duos quadrantem, *Zuven schâch und drey zol.*

Quadrans pedis & palmus eadem mensura sunt: sed in hoc reputamus digitos, in illo uncias.

Quadrantali crassitudine. Plinio. *Drey zol dick.*

Quadrantaria, vile scortum quod quadrante se conduci patitur.

Quadrantarius. *Ein hanrein, ein hellerman, oder hellerhöre.*

Quadrantal vocabant antiqui quam ex Græco amphoram dicunt, quod vas pedis quadrati octo & quadraginta capit sextarios. *Ein omen.*

Quadrigatus, nummus signatus quadriga.

Quadrilbris. Plaut. *Vier pfund schvvar.*

Quartarius, quarta sextarii pars, cyathi tres, Græcarum poculum. *Ein bacherle voll.* Manlio cum Gallos Capitolio deiecisset universi milites selibras farris & quartarios vini ad ædes ejus quæ in arce erant contulerunt. Liv.

Quinarius nummus qui & victoriatu à nota victoria, dimidium denarii seu drachmæ, triobulus Atticus. *Ein batz.*

Quincunx. *Fünff unzen oder fünff zöl.*

Quincuncialis, herba quincuncialis Plinio. *Ein kraut fünff zöl hoch.*

R.

Rasta verbum castrense Germanorum: olim, si D. Hieronymo credimus, certum viæ spacium universæ significabat Germaniæ, quod nunc milliare Latino vocabulo appellamus, cum efficiat quatuor millia passuum, atque ita duobus stadiis superet Parasangam Persicam. *Ein gemeine Teutsche meyl.* Hodie etiam milites Germani cum aliquo itinere perfecto humi strati conquiescunt, ut ex lassitudine recreati,

Manges. Bibl. Pharm. Tom. II.

mox rursus ita facere possint, rastam nominant.

Repræsentare Cic. ante diem solvere, vel præsentem pecuniam solvere nulla interposita mora. *Bar gelt dargeben oder legen.*

Reparare Horat nummis è mercium venditione conflatis aliud quid emere. *Et vvas anders an die statt kauffen.*

Rhytum Mart. *πρω* Athen. duos capiebat congios.

Rotulus libra mentalis apud Arabes medicos, aut potius eorum interpretes Rotuli nomine pro libra hodie utuntur incolæ Asiæ minoris, Syri, Ægyptii, Afri, Mauri, ac plures alii,

S.

Sabitha Syum est verbum, quod intepretatum significat vas, quo de lacu tortulis haurimus: apud Ascalonitas est sextariorum duorum & viginti.

Sacoma Vitruv. quod lanci trutinæ appensum aut adjunctum æqualitatem ponderis conciliat. Hinc aurum ad sacoma appendere. *Vol kommen geuvicht golds gaben.* Equilibrium facere.

Sacros unciam dicunt Arabes.

Satum Hebræa mensura proximè ad modium accedit, continet cabos sex sextarios quatuor & viginti.

Schænos Herodoto Ægyptia mensura sexaginta stadiorum. Vide Funiculus.

Scorteus nummus D. Hieronymo ex corio confectus. Hujusmodi nummos signavit Fridericus secundus cum in Italia bellum gereret & eum pecunia deficerent, quorum singuli valebant aureo nummo: eos posteaquam pecuniam confecisset, illum cum aureis commutasse annales tradunt.

Scripulum quarta & vigesima unciae pars, scriptulum Varroni. *Dritt teil eines quintlins, Scrupel.*

Scrupulus lapillum asperum significatâ scrupulo, quo nomine quidam perperam pro scripulo utuntur.

Selibra Livio. *Ein halb pfund.*

Sembella nummulus, libellæ semis, & denarii pars vicefima. *Ein Baszler rappen.*

Semycorylium quod Latini quartarium appellant, tres cyathos capit.

Semyciprum mensura apud Hipponactem, quæ juxta Helychium dimidium est medimni.

Semiobolus pendit siliquam unam & dimidiam, æreolos tres. *Imn geuvicht thüts den zwölfften teil eines quintlins, In der münz ein drutheil mer dann drey helblig, zuven Costentzer pfennig.*

Semipes Catoni. *Ein halber schüch.*

Sempipedalis Colum. Asserculos inter se distantes semipedalibus spatiis. *Eines halben schüchas veyte vor ein anderen.*

Semis æreus nummus dimidium est assis.

Semissis homo Cic. pro contempto & abjecto.

Semodius dictus à semis & modius quasi semimodius, capit autem sextarios octo.

Semodialis Cato, placentia semodialis.

Semuncia. *Ein lot.* Est etiam semuncia mensuralis sicut & libra.

Septunx. *Siben unzen.* Martialis Septuncæ multo deinde perditus stertit. Septunx, septemcyathi & Sesequimodius.

Sescuncia, sescquiuncia. *Anderthalb lot.*

Sesquipes. *Anderthalb schüch.*

Sestertius nummus quasi semis tertius, valebat æris libras duas & dimidiam, hoc est quartam denarii partem. *Zuven creützer.*

Sestertium cum nomine numerali eodem casu, numero, genere congruens, tum numerus non alius significatur quam profertur. Cic. Duo denos sestertios exegisti, id est, ut idè interpretatur ternos denarios, h

enim efficiunt duodecim sestertios. Si verò duo nomina sestertius & numerale iisdem casibus non efferruntur, sed illud genitivo plurali, hoc quod item plurale est & generis neutrius, quovis alio casu, atque non sequitur mille quod à nomine numerali nunquam dissentit casu, semper intelligitur, ut S. l. v. præmium servo libertatem & sestertium centum, id est centum millia sestertium Plinius. Solum foro extruendo. H. S. mille ducentis Cæsar dictator emit, id est sestertium mille ducentis millibus. Si adverbium numerale jungitur cum sestertiis significat centena millia, ut Decies sestertium, hoc est decies centena millia sestertium.

Sextans duæ uncia assis cuiusvis. *Zwo untzen, ein sechster teil.*

Sextarius liquorum & aridorum mensura, capit heminas duas, cyathos duodecim: sextarius appellatus, quod sit sexta pars congi.

Sextarium in liquidis Glareanu æstimat media mensura Brisgoica, Agricola. *Ein nössel*, & in aridis. *Ein maasz.*

Sextula nummus æreus, Varroni æris minima pars, sexta pars uncia: pondus sextulæ, Pharmacopolæ quatuor scrupulos nominant.

Siclus & ponderis & nummi nomen apud Hebræos: pendit autem siclus geras viginti Hebræis, hoc est semunciam seu drachmas quatuor, juxta Josephum. Epiphanius verò securus septuaginta interpretes Siclum facit διδραχμον & quadrantem nominat quasi uncia quartam partem improprie. Hebræorum Magistri duos tradunt siclos, sanctuarii semuncialem, & profanum qui subduplus sit priori duarum scilicet drachmarum. Ex pondere nota est sicli æstimatio, si ex puro argento fuerit. *Ein lot silber*, plerumque tamen drachmæ ratione medio floreno: *Umb ein halben güldin*, æstimatur.

Siglus hummus Sardianus & Persicus, valebat obolos Atticos septem & dimidium Xenophonti. Hesychius semi obolo majorem facit. Differt à siclo Hebræorum, qui pendebat 24. obolos.

Sicilicus quarta pars uncia. *Ein hal blot.* Et in mensuris Gaudericis similiter sicilicus quarta pars est uncia. *Ein vierteil eins zols.*

Siliqua *κεράνιον*, drachmæ pars decima octava, quam quatuor grana lentis pendere dicunt. Monetariorum pondus gren quidam siliquas interpretantur.

Solidos nominat Justinianus aureos nummos, quorum singuli penderent sextulam, sic ut è libra duo & septuaginta signarentur. Dicti solidi respectu semissum & tremissum, qui ex dimidia & tertia horum parte constabat. *Halt onsfar ein ort und zween güldin.* Fuere etiam alii ex auro solidi graviores.

Sors, caput, summa, principalis summa. *Hadpe summ, hauptgüt, die ganz summ.*

Sors nautica Modestino, vel trajectitia, quod trans mare vehatur: quod pro ita redituque in profectioe persolvitur. *Für lon, schiften, feergelt: oder das auff die schiffart aufz gelihen vurt.*

Softum quod medico datur pro curatione & restituta valetudine. *Artzetlon, meiftergelt.*

Spithame Gr. Latinis dodrans, intervallum quantum est digitis extensis inter minimum digitum & pollicem, nempe trium palmorum. *Ein spaun.*

Sportula apud Jurisconsultos, pecunia ab actore & reo communiter deposita constituendi iudicii gratia.

Sportula Suet. Mart. pro cibo aut donario quod in clientes & salvatores erogabatur.

Stadium mensura qua Græci locorum intervalla solent explicare, ut Latini passu, spacium est in sex-

centos pedes porrectum, five centum viginti quinque passuum. *Ein rennvveg, rosszlauff, hundert fünfß und zwentzig schrit.*

Stadium idem est quod sextula *ἐξάριον*. *Der sechste teil einer untz.*

Stater pondus drachmarum quatuor: nummus etian argenteus ejusdem ponderis, qualis fuit quoque Hebræorum siclus. *Ein halber gulden.* Fuerunt etiam stateres aurei, duarum drachmarum, ut scribit Pollux.

Stips Plinio, stipendium Ulpiano, æs militare Africanus, æs peculium castrente Pompon. quod militi pro opera mercenaria solvitur: militare stipendium, teste Plinio, erat denarius in dies singulos. *Sold, kriegs sold.*

Stips collatitia Marcellino, quæ in pauperum usus erogatur. *Allmüßen.*

Strena Symmacho, munusculum quod in anni auspicio donatur. Strenæ autem primum fuerunt institutæ à Tatiano rege, acceptis è luco Streniæ deæ verbenis, novi anni auspiciis. *Das gü jar, ein neüvves jar.*

Summam cavere alicui, Scevola. *Einen versichern, oder einem versicherung geben umb die ganz summ.*

Superpondium, quoddam quasi auctarium, quod super pondus apponitur. *Ubergewicht, aufz zug.*

T.

Talentum, inter pondera est multiplex, apud Vitruvium libro 10. est talentum pondo centum viginti librarum. Habet etiam Helychius diversa talenta, unum librarum centum: alterum librarum centum viginti quinque: tertium centum sexaginta quinque: quartum quadringentatum, & postremum mille centum quinquaginta duarum. Talentum possumus reddere, *Centner*, qui etsi à centum pondo nomen habet, tamen admodum varia quoque sunt & diversis ponderis centenaria.

Talentum Atticum minus sexaginta minarum, *thüt 750 fl.* majus octoginta minarum, *thüt 1000 fl.*

Talentum Æginum, 10000 drachmarum Atticarum 6000. Æginæarum: etenim decem drachmæ Atticæ valebant sex drachmas Æginæas, *thüt 1250 fl.*

Euboicum fuit quadraginta minarum, drachmarum 4000. *hast. 500 fl.*

Talentum Hebræorum, sanctuarii drachmarum 12000. siclorum 3000. librarum 120. & aliud talentum congregationis, quod 2. Sam. 14. regium nominatur, ut quidam arbitrantur, media pars superioris 6000. drachmas pendebat. Quidam talentum regium modo loco statuunt. 9000. drachmarum.

Rhodium fuit 4500. drachmarum, facit 562. & dimidium fl.

Siculum vetus minarum 24. *das ist, 300 fl.* novum 12. minarum 150. fl.

Ægyptium talentum pendit pondo octoginta.

Babylonium fuit 7000. drachmarum Atticarum, *thüt. 875 fl.*

Syrium mille & quingentarum drachmarum 187. & dimidium fl.

Talanta quædam magis ex consuetudine Græcorum, quam ponderis ratione denominata sunt, sic tres aurei Attici dicti sunt auri talentum Polluci: eodem modo Festus scribit Alexandrinum talentum esse duodecim denarium: Neapolitanum, sex denarium: Syracusanum, trium denarium: Rheginum, victoriati.

Tertiarius, *tertius*, tertia pars medimni Attici, capit Chænicas sedecim.

Teruntius minimus numulus argenteus Romanotum, denarii pars quadragesima. *Ein Baszler helbling.*

Tetra-

Tetradrachmum, & retrachmum nummus argenteus quatuor drachmarum, qui & stater: talis fuit Hebræorum siclus. *Ein halber guldin, oder halber taler.*

Tetrastater, Cyrenensis aureus, communi aureorum temperatura æstimatur septem aureis Ungaricis, & septem undecimis unius aurei.

Tetrobolum, cujus nota apud Athenienses erat Jovis simulachrum cum duabus ab adversa parte noctuis. *Fünff creützer, und drißthalben creützer.*

Thepah Hebræis, ea est mensura quam Græci *θαλάσσιον*, Latini palmum solent vocare.

Topin mensura decem Chœnicum apud Hefychium, qui tamen nationem quæ hanc mensuram usurpaverit non profert nominatim.

Trepondo Fabio. *Drei pfund schuwer.*

Tressis nummus tribus assibus æstimatus. *Ein Basel plapart.*

Tressis agaso Persio, pro contempto & abjecto.

Tributum Cic. Ulp. pecunia populo imperata, quæ à singulis tributim pro census portione colligebatur. *Steür, steürgelt.*

Tridrachmum nummus argenteus trium drachmarum. *Ein frantzösischer dick pfennig.*

Triens nummulus æreus, tertia pars assis. Et triens libræ. *Vier Untzen.* Triens pedis. *Vier zol.*

Triobolum nummus argenteus qui pendit dimidiam drachmam. *Ein batz.* Hinc homo trioboli Plauto.

Triuncis nummus æreus à tribus uncis quas pendebat dictus, qui postea quadrans appellatus est.

Trutina Vitruv. statera Cic. qua centenaria appenduntur. *Schüsselwag.*

Trutina Campana. *Ein schnellwag.*

Trutina momentana, vel monetaria. *Goldwag.*

Triblium idem quod oxybaphum in Georgicis mensuris, in medicis autem majus oxybapho, idem quod cotyle, & ita frequentius triblium pro cotyle media sextarii parte accipitur, Hemina Latinis.

Tyodoche, theca bilancis. *Goldwag tafelin.*

V.

Vestigal Dig. proprie portorium quod in itinere præstari solet. *Zol.*

Vestigal Cic. proventus annuus, redditus. Portorium pro eodem Plinius extulit. *Rennt, jarlichs eynkommen.*

Versuram facere Cic. versuram solvere Teren. Aes alienum ex ære alieno solvere. *An einem ortlöschen und am anderen anzunden.*

Versuram facere etiam est, cum quis pecuniam minore acceptam fœnore majore occupat. *Mit gelt auff interesse aufgenommen, vvücheren.*

Victoriatus Plin. nummus signatus victoria, quinaris, triobolus, semidrachma. *Ein batz.*

Vivum Latini sortem vocare solent, quod vel fœnus vel lucrum ex sese pariat. *Das hauptgüt.*

Ulna quam Græci *ἀλέτριον* appellant & cubitus eadem est mensura, Polluci & Suetonio dicta *ὑπὸ τῶν ἀλέτρων*, à brachiis. *Ein eln.* Alii Ulnam volunt esse Græcorum *ὑπὸ τῶν* quæ est quatuor cubitorum: Plinius enim illud Herodoti de pyramide, *παραγωντόργυρος* vertit, quadragenarum ulnarum. *Einkläffier.*

Uncia duodecima pars assis. *Ein untz.* Est autem alia mensuralis, alia ponderalis. Uncia pedis. *Ein zol.*

Uncialis. Literæ unciales. *Grosse büchstaben die eines zols groß oder hoch sind.*

Urna Romana mensura, media pars amphoræ seu quadrantalis, capit quatuor & viginti sextarios. *Batz zuwölff maasz.*

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Urna Plinio, vas urnæ capax.

Usura est fructus, qui ex pecunia quæ alicui data est fœnori percipitur: ita dicta, ut Varro scribit, quod ad sortem usu accedat. *Wücher.*

Usura diurna, quæ singulis diebus ducitur aut penditur: ita hodie Judæi fœnerantur Christianis etiam postquam pignora dederunt. *Daman alle tag den zinsz oder vvücher so er nit erlegt vvirt zum haupt güt schlacht. Juden-vvücher.*

Usura menstrua, quæ singulis mensibus ducitur. *Doman alle monat den zinsz rechnet oder forderet.*

Usura annua, quæ hodie maximè in usu est, & anno absoluto penditur. *Zinsz oder vvücher vom jar.*

Usura nautica non tam tempus habet definitum, quam locum in quo penditur, hæc & trajectitia nominatur, ac duplex est: aut enim persolvitur eo loco ad quem navigatur, aut cum quis redierit eò unde navigarat.

Usura centesima, cum quis menstruo tempore centesimam partem persolvit. *Alle monat vom hundert eins.* Annua centesima. *Vom hundert zuwölff.* Centesima usura est instar assis, cujus ratione reliquæ usuræ censentur.

Bessis usuræ. *Von hundert acht guldin ein jar.*

Semissis usura à Plinio civilis & modica vocatur & à Justiniano permessa est omnibus hominibus, exceptis illustribus personis: talem usuram hodie pendunt Boemi. *Vom hundert sechs.*

Quincuncis hodie in usu est Germanis. *Vom hundert fünf.*

Trientis, seu fœnus trientarium, quod Antoninus Pius exercuit & Justinianus illustribus personis concedit. *Vom hundert vier.*

Quadrantis, seu quarta centesimæ. *Vom hundert drey.*

Sextantis. *Vom hundert zuven.*

Unciaria, Unciarum fœnus Tacito, quum pars centesimæ duodecima singulis mensibus solvitur: in Digestis de Ad. min. tuc. l. 47, ubi tamen uncias usuras legitur. *Vom hundert eins.*

X.

Xenium Mart. quod hospitibus donatur. *Frömbden oder gæsten geschenck.*

Z.

Zereth Hebræis, Græcis, *ζωρη*, Latinis Do-drans. *Ein spann.*

Hactenus de MENSURIS & PONDERIBUS veterum ex MASSARIO plus quam satisne; quid tamen rursus hæc in parte desiderare possit Lector Curiosus earum Characteres ex Clariss. RHODIO excerptos, & tabula Calchographica expressos jam adjiciemus Tabula autem illa est. Num. xvi.

MENTHA.

Menthæ à Græca voce *μινθη* dictam esse haud dubium est, *μινθη* autem *μαγειρόν* deducunt Grammatici, quod purgationes fœminarum inhibeat, vel quod semen copiosius ejus usu minuatur & tabefiat.

Mintham Plutonis pellicem à Proserpina (ut solent pellices semper odisse uxores) in hortensem Mentham transformatam fuisse narrant Poëtarum fabulæ, æterno in æternâ planta hominis monumento, quam vocem Romani magis amantes, quia in ea malè habitæ ob amorem puellæ memoria servaretur unâ tantum aut altera mutata literâ per Græcorum Minthen Mentham suam fecerunt. Marcellus Virg.

Delechampio *μῦν* Græcis dicitur *ῥοτὸν τὸ μῦν* à stercoreis fœtore per antiphrasin quoddam minime fœtida sit. Verum etymologias illas per Antiphrasin merito rejicit & explodit Vossius. Nonnulli *μῦν* interpretantur lanuginem muscosamque pubem humentibus & putrescentibus panem cunctis subditiō apertis obduci solutam, qualem cernere est in olivis & sterquiliniis: cui non absimilis tenera illa hirsuties quæ in mentha agresti, sed præcipuè calaminta visitur.

Notæ menthæ caracteristicae sunt: flos quadripartitus, galea & labello à segmentis lateralibus vix discernendis; odor suavis, unde & Græcis *ῥιδοσμος* dicitur: radicibus vel flagellis repere.

Vires, Menthæ usus præcipuus est in ventriculi imbecillitate, cruditate, singultu, vomitu, flatibus, ardore, hepatis obstructione, intestinorum dolore, capitis vertigine. Menses & album mulierum profluvium compescit efficaciter. Extrinsecus duritiem Mammarum lactisque coagulationem tollit, achores sanat, Schrod. Menthæ folia lacti immersa coagulari & illud in Caseum coire non permittunt. Trag. quin & in ventriculo lac coagulari non patitur. quare (inquit Casp. Hofmannus) sectari illam debent qui vel coguntur crebrius uri lacte, vel aliud alimentum non habent; verum lac in ventriculum receptum, si is bene se habeat, ritè & ordine naturæ coagulari debet: ideoque iis quibus ventriculus sanus & rectè dispositus est, non opus est ut quærantur quæ coagulationem impediant; sed iis duntaxat quibus infirmus, aut nimio acido scatur, ad coagulationem moderandam, quamvis enim lac in ventriculum receptum initio coagulatur, Coagulum tamen hoc antequam in intestina descendit, iterum in liquamen dissolvitur: quod si densius & durius sit, non ita facile fiet. Herbæ succus ejusve aqua distillata ad vomitum reprimendum usus sunt creberrimi. *℞*. Aquæ *℥*ij. semel atque iterum, enormes sistit vomitus *Hartman*.

Eadem aqua destillata mulierculis usitatissima est ad tormina ventris in infantibus compescenda. Turnero autore, odor Menthæ cerebrum roborat, memoriam conservat & auget. Contraria videntur tradere auctores de vi Venerem stimulantem, veneræque infomnia & exoniogmos impediende.

Nostrates Mentham pisæ & Fabis incoquere solent ad eorundem flatulentiam corrigendam.

Ex Menthæ herba sicca, additis æqualibus rutæ partibus & tantillo seminis carvi, omnibus convenienter in aceto cerevisiæ coctis paratur cataplasma, quod mirifice lac coagulatum mammarum resolvit primū, dein omnino generationem lactis prohibet: quo promiscuè puerperæ felici successu utuntur Simon Paulus. Ex excerptis *D. Edv. Hulse*.

Ad anoræxiam, Elixir Menthæ cum spiritu proprio per infusionem paratum, addito pauco saccharo est egregium. *D. Hulse ex Ettmulleri Praxi*.

Vires Mentha Crispæ, Ipse observavi simplex decoctum Menthæ Crispæ (nescio an de hac specie an de præcedentium duarum utralibet intelligat) ita sanguinis motum circularem suffocasse, ut ne illius quidem gutta è pede stillaret, quamvis scalpellum myrtiformem ter vel quater satis profunde in vasis pedis maxime conspicuis adegisset Chirurgus solertissimus, S. Pauli quadr. Botan. class. 3. p. 390. pararat pediluvium famula prius ex aqua in quam iniecerat fasciculos aliquot menthæ, hoc pediluvio domina usa est, forte non causam pro causa habuit. S. Paulus: nobis enim non verisimile videtur mentham talem effectum habere. Ex excerptis. *D. Edvardi Hulse Rains*.

MENTA SARRACENICA, vid. *Balsamita*.

MERCURIALIS.

Mercurialis à Mercurio denominationem sumpsit. Plin. lib. 25. cap. 5. Linozotis sive parthenium Mercurii inventum est, ideo apud Græcos Hermupoa multi vocant eam, apud nos omnes Mercurialem pro Mercurialis speciebus habeo cynocrambem dictam & phyllon; adeoque tres Mercurialis species agnoscō, unam perennem, duas annuas, eæ sunt.

1. Mercurialis perennis repens, Cynocrambe dicta.

2. Mercurialis annua glabra Vulgaris.

3. Mercurialis annua hirsuta, Phyllon dicta.

Nomina 1. Cynocrambe mas & femina Ger. emac. mas & femina, sive Mercurialis repens, J. B. Merc. Sylvestris Cynocrambe dicta vulgaris mas & femina Park. Merc. Montana testiculata, & Merc. Montana spicata C. B.

J. B. Plurimis fibrosis radiculis perennibus & lentis, sapore nonnihil dulci, sed fastidioso per terram repit Cynocrambe tam mas quam femina, nervo duro, fibrarum hellebori instar fractis. Caules surriguntur; multi, teretes, concavi, longis internodiis geniculati, pedales, propter terram purpurascens non ramosi. Folia ad articulos bina opposita, lanuginosa, foliis Mercurialis paulò longiora, duarum scilicet triumve unciarum tenera, (inferiora multo minora sunt) acuminata, in ambitu serrata, pediculis brevibus, gustu nauseoso; ex alis foliorum pediculi exeunt, in mari quidem breviores, quatuor vel quinque, semunciales, unciales ac majores, breviores alios interdum à latere proferentes, quibus insident flosculi herbaceo colore præditi, ternis foliolis constantes, quorum medium occupat loculamenti seminum rudimentum, ex cujus cacumine emicant apiculi bini, corniculati, extrorsum reflexi: loculi hirsuti, compressi, in geminos testiculos lentis magnitudine divisi, semina bina continent, dissepimento membranulæ distincta, in uno pediculo tergemina. At in Cynocrambe femina ex foliorum alis pediculi surgunt tres, quatuor aut quinque uncias, longi, tenues, striati, in quibus flosculi in spicam digesti muscosi, ternis foliolis, herbaceis compositi, in quibus staminula aliquot herbacea, quæ nullo succedente semine intereunt. Dodonæo tota herba vitosi odoris ingratum redolet.

Cynocrambe in sylvis, sepibus, aliisque perinde umbrosis gignitur, primo vere exit, autumno exeunte, folia & caules marcescunt, radice superstita.

Vires. Facultatibus cum Mercuriali convenit Prætorius. Mercurialem Sylvestrem olerum more coctam, & oleo ac sale conditam inter medicamenta serositates benigne enumerat evacuata in libro de medicina paup. quod è Dioscoride hausit.

Nomina. 2. Mercurialis mas & femina Park. Merc. mas & Merc. femina Ger. M. testiculata sive mas Dioscoridis & Plinii, & M. spicata sive femina eorundem C. B.

J. B. Folia ejus ad parietariæ foliæ accedunt, sed glabra sunt, atro virore splendentia & in ambitu serrata, sapore nitroso, calidiusculo & nauseoso, Caules ei angulosi, spithamæ ac etiam majores, geniculati, læves; ex foliorum alis, femina quidem ligulæ rectæ emicant, tenues quas verticillatim seu in spica ambiunt flosculi glomerati muscosi, qui in quatuor foliola herbida sese explicantes, cirros apiculorum luteolorum aut herbidorum ostentant, nullo succedente semine pereuntes. Mari autem ex eisdem alis breves pediculi oriuntur, quorum singulis testiculata bursula, nonnihil compressa, hirsutaque insidet, gemina semina recludens. Radix utriusque tenera & fibrosa, annua.

In hac descriptione J. Bauhinus vulgarem opinionem

hem sequitur, Mercurialem sterilem pro femina; & fertilem pro mari accipiens: cum è contrâ rationi consonum est, & aliarum rerum naturalium analogiâ, ut sterile dicatur mas, fertilis femina. Femina enim est in omni genere quæ fecundat & fructum edit.

Mercurialis reperitur in hortis olitoris, vineis, aliisque locis humentibus ac umbrosis. In maris litore prope Ryde Vectis insulæ oppidulum sponie & copiose provenit.

Vires. Est è numero quinque illarum fomafarum emollientium herbarum; abstergit, alvum movet, aquas ac bilem purgat, unde & hodie in enematis frequentissimus ejus usus.

Sunt è nostratibus mulierculis, qui mercurialem infantibus cum pappâ exhibent, ut alvum solutam retineant, torminaque præcaveant. Schrod. observatum est omnis generis verrucas hujus foliis vel eorum succo tolli; item semen cum absinthio decoctum ictericos mirifice juvare Matth & Ruell.

Quæ veteres habent de vi maris ad efficiendum ut mares gignantur, feminae ut feminae; nobis fabulosa videntur & falsa.

Nomina. 3. Phyllon marificum & feminificum Park. arthenogonon & thelygonon folio incano Monspeliarum L.B. Arthenogonon sive marificum; & thelygonon sive feminificum Ger. testiculatum & spicatum. C. B.

J.B. Pedales & cubitales habet caules, totos candido tomento pubescentes, & per ætatem lignescentes; qui in ramos ex adverso positus ordine certo abducuntur; folia oblonga, subrotunda, crassiuscula, nervosa, mollia, lanuginosa, incana ad articulos oriuntur. Flores minimi in mari quidem ad juncturas, brevibus pediculis nixi, vix apparentes ante fructus, sunt duo apices ochræ colore pallido. Sunt autem fructus gemelli, testiculati, villosi loculis comprehensi. Semina (inquit Lobelius) uti minoris Heliotropii exiliunt, immatura albida, matura verò cyaneò nitent colore, rotunda & quam papaveris majora, gustu fervida, & nonnihil pinguis, radix lignosa, exilis. In femina flores spicati, racemosi que ut in Mercuriali femina.

Theophrastus phylloocyini folia tribuit, & rectè nostrâ sententiâ. Illud inter alia ei cum Mercuriali, Cynocrambe & Heliotropio minore commune est, ut erucæ radices temporis successu caruleum colorem contrahunt. Clus. Quod & nobis observatum, etiam de caule & fructu.

Circa Monspeliarum in fossarum aggeribus & ad vias publicas, præsertim prope aquas oritur; ut nobis observatum. Clusius multis Hispaniæ & Galliæ Narbonensis in locis nasci refert, ubi Aprili florere & interdum maturius, ac in regiones frigidiores translatum nonnisi æstate.

Vires. Salamanticenses utriusque decoctum omnibus animalibus à cane rabido demorsis propinant, magno successu, ut inquirunt. Granatenibus verò, Mauritanis præsertim, ad muliebres morbos magno in usu est. Clus. *Ramus.*

MERCURIUS.

Mercurius nihil aliud est, quam liquor mineralis, seu metallicus volatilis, metallis & præ aliis quæ avide adhærescens.

Dicitur argentum vivum, Hydrargyros. Arabicè Zaibar, vel Z bach. Barbarè, Azock, Azoth. Germ. *Quecksilber.* Argent. viv. *Quiksilver*, et *Mercurius Quicksilver.*

Est natus (de quolibet) & artificialis, è Metallis extractus, qui & Mercurius corporum dicitur.

Nativus Virgineus est nonnunquam per se ipsa naturâ operatrice, separatus invenitur, plerumque tamen ex terra minerali, quam cinnabarim vocant, vi ignis evocatur. Vide & ex plantis apud Borell. c. 3.

Delectus.

Mercurius non æquè bonus omnis existit, sed variat, tum ratione matricis, seu loci natalis, tum ratione inquinamentorum, quibus nonnunquam per se in terrâ consparcatus est, nonnunquam & à malevolis adulteratus venditur.

Natali loco censetur optimus, qui eruitur è minis vicinis auro vel argento, & hinc præfertur Hispanicus & Ungaricus.

Inquinamentorum ratione prævalet, qui minus scæte commixtione arsenicali, antimoniâ, saturninâ, cadmiosa, quibus nonnunquam in terrâ cuniculis venenosus redditur, hinc & qui minus falsariâ artificis manu adulteratus est: adulterare enim eum ad id exactè norunt, (plumbi scilicet & si beneficio Bismuti commixtione,) ut quodque simul per corium transire æquè ea queant, adeoque difficile sit fucum cognoscere. Ea propter ne qua incautus decipiaris, non abs re erit, hæc bonitatis signa observare.

1. Mercurius censetur bonus, qui per retortam propulsus nihil recementi relinquit.

2. Qui in cochleari argenteo evaporationi super prunis expositus maculam cochleari relinquit flavam, aut albicantem, non nigram aut fuscam.

Vires. Internè mundificat sanguinem ab inquinamento, præcipue venereo: fugat lumbricos, difficilem promovet parum, &c. Externè inunctus, sanat scabiem omnis generis, fugat pediculos, resolvit duros tumores. De collo suspensus, præservat à peste, & (ut nonnulli volunt,) ab incantatione, fascinationeque. Imo quoad ejus præparata, nulla res in Officiis est, si quæ ex capids ex qua major medicamentorum supellex elici possit, quam ex Quio. Suppeditat enim purgantia, sudorifera, mundificantia vulnera, atrimoniam, (præcipue in Gonorrhœa,) lenientia, ut patet in formis medicamentorum inde paratis.

Usus & ij crudi internus & externus est. Intrinsecus tamen rarior adhibetur, extrinsecus sapius. Modus applicandi intrinsecus in pilulis, e.g. Barbarossæ. Quia imò, um certo quodam succo pulverisari ac exhiberi potest.

N. Si Quio, (sive crudum, sive præparatum,) exhiberi intrinsecus volueris, convenientius in pilulis exhibetur, quam in alia aliqua medicamenti forma, ne dentes scilicet quibus noxiis est, tangat.

Usus externus est in unguentis, in quibus penitus disparat, in Emplastris (quæ in scabie) complicatæ sunt articuloz adhibentur. Sed cave ne nimium adhibeas. Etiam cum salivatione oris putredinem inducit, loco quocunque applicatus, id quod de præcipitato similiter observatum est.

[Coquunt quidam & vivum & aquam Hermeticam vocant, scabiei convenientem.] Schrod. rus.

Mercurius nihil aliud est, quam liquor mineralis seu metallicus volatilis, &c. Dicitur alias Argentum vivum, Hydrargyros; Arabicè Zaibar, vel Z bach; Barbarè azock, azothi Germanicè *Quecksilber*. Mercurius dicitur ob analogiam, quæ ipsi cum Mercurio Planetâ illo celesti intercedit ratione mobilitatis omnibus sese associantè Planetis; tum ratione varietatis in colore, tum temperamenti, mutabilitatis &c. Argentum vivum dicitur, quod Argentum fustum & liquefactum calore æmuletur; Vivum verò, quod loco motum vivere quasi videatur. Hydrargyros, nomine derivato ex ∇ & γ na, quod ∇ instar liquidus & colore γ nam repræsentet. Mirabilis sanè substantia, mille se in formas fingit ac resingit, quovis tractatur modo, inde & Protheus dicitur. Item servus fugitivus, quod præter omnem spem sæpe aufugiat. Plinius vomicam liquoris æterni vocat.

Et præ aliis ☉ *avidè adharefcens.*) ☉ miro amplectitur amore eique per minutissima se unit. Unde plurimi colligunt, illum primum esse metallorum Ens. Nec defunt hodie, inquit *C.L. Morhofius* l. c. qui idem statuunt. Accedit venerabile illud mercurii nomen, quod in Chemicorum scriptis adeò frequens est: conspirant tot descriptiones, tot requisita, ut vel cautissimus iis omnibus fallatur. Aliqui Virginem mercurium volunt, quem Natura produxit à flammis voracibus nondum tentatum: aliqui è metallis cæteris per artem extractum. *Hæc Morhofius.* Verum de his supra satis jam commentati sumus. Notum enim est aliud esse hunc mercurium vulgi, & aliud mercurium metallorum; ille minerale quoddam est, in suis etiam repertum mineris & recrementum potius metallicum, suo tamen etiam mercurio metallico constans & quidem in magnâ copîâ. Nec suo destitutus sulphure, sed in minori copîâ & quidem albo, uno externo, altero interno. Externum originalem ejus labem continet, quæ quia originalis, idè & difficulter ab eo tollitur; quâ tandem nihilominus separatâ per artem, ajunt periti, mercurium sulphure superfluo externo & immaturo mundatum, quippe deinceps nullo Δni potest in formam terræ præcipitati ob maximam sui simplicitatem, quâ aquæ elemento compagatur. Amisit namque terram (id est sulphur) quæ terra, inquit *acutissimus Helmontius*, in centro suæ essentiæ non minus est ex Elemento aquæ, quàm residuus ejus depuratus mercurius, licet hanc terram prius ab origine sibi profundissimè commistam haberet. Spoliatus isto sulphure mercurius nullo amplius igne mutabilis est, quia est mercurius de mercurio. Alterum sulphur metallorum est internum ipsi mercurio, ideoque intactum ab omni corrosivo, non minus, quàm ab ignis & aëris destructionibus.

Est Nativus (de quo hic) ☿ *artificialis è metallis extractus, qui ☿ mercurius corporum dicitur*) Sed ubi tractavit *Dominus Autor* de mercurio artificiali ex metallis extracto? forsan supra in metallis, ubi de mercurificatione egit? Opinione fallitur. Nisi enim mercurius metallorum in suis inveniat mineris, arcano sanè nec cuivis cognito artificio ex Dnâ, Hno, & ve, & rio separari potest, de quo *Dominus Autor noster* altum habet silentium. Qui autem aliàs ex minerâ mercurii igne aperto destillatur, & coquendo per ollæ foramina dato ignè suppressioni decidit, item per retortam destillatur ex minerâ Cinnabaris Hungaricæ, & ex Qnio, Hno, & cc. vivus elicitur, non mercurius corporum est, sed etiam mineralis, prout præsens natus est.

Nativus etsi nonnunquam per se ipsâ Naturâ operatrici separatus inveniat.) Aut per se liquidus in terræ specubus aut in nonnullarum venarum metallicarum in Dnarium, H ninarum tectis stillatim concretus sui coloris, h. e. purus & genuinus reperitur, virgineus dictus, quod instar virginis sit, & ignem nondum expertus. Ante aliquot annos cum aquileges hîc Hall's Saxorum in Patriâ meâ in foro è regione Magistratus cellarii cerevisiarii & salinatorum tabernæ in ductus hydrophylaceos reparandos inquirentes terram spathis suis effoderent, sub hac effossâ ulnas aliquot duas libras vel circiter mercurii vivi invenerunt. *Turnheiserus etiam Libr. 6. Alchymia Magn. Cap. V.* se in prato quodam salicibus confito ad pagum Pipp. ditionis Solothurensis, elegans argenteum vivum offendisse fatetur. *Casalpini Libr. 3. de Metall. Cap. II.* vidit Argentum vivum Pisis per se inter saxa, dum vetera excavarentur fundamenta. Interdum etiam mercurius in venâ Schisti reperitur, ut plurimum tamen in cinnabrio Nativo copiosissimè. Mirabilis scilicet est & penetrantissima

mercurii vivi substantiâ, quæ sit in mineris per ignes subterraneos dissipabilis, hic facillè se in diversa loca & subjecta insinuare potest. *De Mercurio Plantarum* vid. *P. Borellus Centur. 3. obs. 88.* Habuit Excell. *Morhofius* ab amico frustum ligni, quod ex arbore è terrâ metalliferâ prognata fuerat recisum, in quo per omnes ejus fibrillas & venulas disseminatæ fuerunt Argenti vivi particule, ut valido motu etiam excuti potuerint, id quod facillè fieri potuit, quia laxiores sunt in ligno, quàm in metallo meatus. Si quis in sanguine humano, ut observationes proprias habui, mercurius vivus fuit repertus, ortum suum debuit mercurialibus medicamentis tam internis, quàm externis minus ritè præparatis & administratis.

Delectus.) *Dominus Autor* præfett Hispanicum & Ungaricum. Verum & Ungaricus non omni caret suspitione, nam cum fodinæ argenteæ sint simul H nixæ & H niatæ, item cadiniolæ, laudem bonitatis in totum non meretur. Hispanicus præ cæteris probatur ob puritatem, ille autem est tum in Hispaniâ natus, tum ex auriferis Indiis inventus splendoris argentei. Huic succedit Ungaricus.

1. *Mercurius censetur bonus, qui per retortam propulsus nihil recrementi relinquit.* 2. *Qui in cochleari argenteo ☿.*) Hic secundus probationis modus æquè suspectus est, cum ex hoc concludi nequeat de totâ quantitate & qualitate, præsertim si vel H, vel & aut bismuthum non exquisitè fuerint mercurio mixta, ideoque consultius est per Tartar. & calc. viv. bis vel ter destillasse.

Vires. Internè mundificat sanguinem ab inquinamento præcipuè venereo ☿.) In Lue & nereæ specificum est medicamentum, & quidem primum, adeò, ut, si ad ultimum hic morbus pervenerit gradum, salivatione opus habeat, quæ vel maximè ab hujus usu promovetur. Aliquot ante annos *Archiatro* quidam *Dn. D. Johann. Michael.* p. m. per litteras consulebat, quærendo, an etiam novâ nec unquam auditâ methodo Pestis mercurii vivi adminiculo extirpari possit? Accepit scil. mercurii vivi H j. ij. iij. usque ad iv. & propinavit in quodam vehiculo, præmisso, si res sinat, emetico, & injunxit ægroto infecto quietum decubium, ad 6. usque ad 12. hoc Ubi per alvum iterum fuit egestus per magnetismum attracto veneno pestifero terrâ effossâ occultatum. *Autoris*, qui hanc inivit medendi pestem methodum, mens fuit cum *Athanas. Kircher* in *Scrutin. suo Pestil.* quasi omnis pestis ex verminosâ putredine oriretur, & ita mercurius vivus contra illam esset antidotum. In hoc quæsito meam sententiam modo laudato D. *Johanni Michaelis* p. m. eam à me requirenti sequenti modo transmissi. Quamvis in peste infectorum malsâ sanguineâ nonnunquam vermiculi sint visi, inde tamen non sequitur, eos in omni peste & nullo non tempore adfuisse. Pestis enim non unâ, sed aliâ atque aliâ apparet facie, ut ex ipsius *Athanas. Kircheri allato scrutinio* sect. 1. cap. 9. p. m. 96. liquet: Et posito, vermiculos in quâdam Peste per microscopia cognitos fuisse ob insignem à veneno pestilentiali inductam corruptionem in sanguine, tamen non causam ipsius pestis, sed corruptionis potius judicanus productum, quemadmodum etiam in febribus malignis & scorbutis videmus ob nimiam humorum corruptionem non rarè generari vermes, nec tamen febris malignæ & scorbuti causa sunt, nec propterea ad eor. curatio dirigenda est. Et licet etiam quidam vermiculi Pestis sint causa, minus benè tamen contra eos mercurius per os assumeretur, quia hoc modo inter illos & hunc neque corporalis neque virtualis contactus ad omnem actionem requisitus adest. Non corporalis, quoniam hi vermes non ut reliqui, ad quos abigendos mercurius per

ps exhibetur, in intestinis, sed, uti volunt, in sanguine & lymphâ sunt. Nec virtualis, cum mercurius sibi coherens ac mobilis sit, accedente intestinorum motu insito ac naturali per alvum eadem, quâ assumptus est, quantitate statim antequam resolvi & in actum deduci queat, excernitur, atque ita ob exiguam suam in corpore moram operationem suam perficere & venenum pestilentielle per totum corpus diffusum attrahere nequit. Et si resolveretur, tunc attraheret vermiculos istos virulentos ab exterioribus & ignobilioribus partibus ad interiores & nobiliores, usque ad intestina. Nec etiam mercurius vermiculos magnetice attrahere valet, cum ad actionem magneticam non contrahatur, qualis inter vermes & mercurium, sed similitudo requiratur.

Fugat lumbricos.) Tam in substantia assumptus, quam odoretentus, si scilicet cum hoc aqua communis ebulliat, hæc aqua bullata pauco & innoxio potu omnes in intestinis & ventriculo interimit vermes.

Difficilem promouet partum.) Sic *Matthiolus* Libr. 4. epist. Medic. ut & in comment. suo ad Libr. 5. *Diagor.* Cap. 70. affirmat, se vidisse Goritientes obstetrices mulieribus laboriose parturientibus ℥j. vel 3℔. mercurii vivi felici semper cum successu potandum dedisse. In Iliacâ etiam passione & colicâ commendat *Augustinus* Lib. 2. epist. 1. *Aegineta* Libr. 7. Cap. 3. *Marianus Sanctus in comm. ad Avicenn.* *Henric. ab Heer* obs. 2. Lib. 1. Recip. mercurii vivi cum sulphure extincti & in pulverem redacti 3℔. in globulo ceræ include & offer, post oblationem totus sunt adhibendi continuo & clysteres. *Lazarus Riverius in observat. communicat.* 1.

N. De ejus usu in Dysenteria pridem prodidit in histotia animali *Plinius*. Intelligenda autem est primaria Dysenteria, quando abscissus aut exulceratio excruciat intestina. Tunc Argentum vivum repurgatum cum Unguento santalino vel rosacco & lupi intestinorum pulvere misceri & foris applicari potest. Hoc etiam in epatico fluxu calido, febribus malignis &c. cum plurimo adjumento adhibetur.

Externè inunctus sanat scabiem omnis generis.) Sed cave, ne nimium adhibeas. Etenim cum salivatione oris sæpe putredinem inducit, loco quocunque applicatus: id quod de præcipitato similiter est observatum.

Fugat pediculos, resolvit tumores duros.) Instar incantamenti fugat pediculos, & resolvit tumores scilicet venereos, sed in hno coagulatus & postmodum lamellatus.

De collo suspensus.) Avellanæ scil. inclusus, Quemadmodum & Patavinæ mulieres ob lactis defectum avellanæ inclusum non infelici cum successu collo appendunt. Quamvis, ut refert *Th. Jordanus de Pest. phænomen.* tr. 3. c. 9. ideo superstitiosè adhibeant, quod contra fascinum, quo lactantibus Lac adimatur, profit, unde & ab incantatione & fascinatione præservatur mercurius vivus cum fl. hyperici h. Lunariæ contra incantationem veneream sacculo inclusus in collo appenditur novis nuptis. Cacodemonas in corpore latitare dignoscitur, si mercurium in arundine occlusum & collo appensum nigrum videas. *Angelus Abbatius de viperis.*

Usus mercurii internus & externus est.) Tutò adhiberi mercurium vivum crudum & ritè depuratum per se vel cerâ inclusum audivimus. Nonnulli globulos argenteos vel plumbeos mercurio vivo inungere solent & deglutientes porrigunt. *Dn. D. Erbenius Regis Polonia archiater*, jam autem *Electoris Bavarie* Medicus ex castis scripsit ad *Dn. D. Johann. Michael.* p. m. quod Comiti Iliacâ passione seu miserrere mei graviter detento mercurium vivum ad ℥ij.

reliquis medicaminibus frustra adhibitis propinavit. Patientem verò missis habentis in curru quàm celerimè transvehendum curavit, sed absque omni fructu. Accidit autem ut nona post hoc medicamentum assumptum, nocte alvus aperta fuerit, & excrementa copiosè expurgata, quâ ratione factum, ut æger demum convalesceret, & diu postmodum vixit.

Convenientius in pilulis exhibetur.) Quoad applicandi modum vel est per se, vel in pilulis, aut cum certo quodam succo pulverisari & exhiberi potest, sed cum ligneo cochleari ut offeratur, necesse est.

N. Quamvis mercurius vivus ut vivus, seu ut mobilis non sit venenum, nec ullam cum venenis habeat affinitatem, ut innoxie etiam teste experientia per os adsumi possit: In hoc tamen Medicus cautus ac circumspectus sit necesse est, ne adulterarum aut male præparatarum porrigat, nec hypochondriacis, spleneticis, & aliis ventriculi fermento nimis acido præditis & sanguini salibus acidis sylvestribus ac corrosivis abundante, à quibus mercurius naturam præcipitati induere potest, propinet Mercurium enim resolutum sive præcipitatum sive sublimatum venenum esse symptomata dira & venenis reliquis communia, quæ statim atque in corpus adsumptus est, inducit, evincunt.

Usus externus est in unguentis &c.) Nisi universalia fuerint præmissa, quæ laticem evacuant inutilem, non est adhibendus mercurius. Quibusdam in locis receptum est arcanum corallinum in Lue & neta cum ung. ros. miscere, illudque pro arcano etiam in contumaci scabie habent. Hic non immeritò quaritur; An Cingulum Mercuriale cum succo pomorum vel etiam aliis linimentis corpori scabioso per 9. hor. ut communiter assolent, circumligatum sit tutum auxilium. *Mindererus Libr. 12. Medic. Cap. 14.* castigat empiricos scabiosis audacter hoc applicantes, quod retrum illud mercurii vivi virus in corpus gestantis ejaculentur. Et *P. Hechstetterus Dec. 3. obs. Medic. Cas. 7.* damna illorum recenset, qui cingulo isto ad scabiem temerè sunt usi. Verum hic metus de nihilo est, si universalibus, uti dictum, præmissus, topica mercurialia rectè præparentur & applicentur. Unde & *Petrus in Nosolog. Harmonic. Tom. 1. p. 395.* Unguenta mercurialia, inquit, in contumaci scabie tuto ac utiliter exhiberi possunt, si universalia præmittantur, & inutilis ac nocivus latex prius ex corpore exterminatus sit. Non tamen ejusmodi topica ex magnâ rerum innumeratarum congerie conflata sint, majori cum successu & celeriori effectu operatura. Hæc externè adhibita mercurialia ritè præparata, tantum abest, ut Naturæ motum impediant, ut potius verminosos, putres, salios ac mordaces humores præcipitent, quæ causa etiam quod ex mercurio sublimato & mercurio vivo emergat mercurius dulcis, quod hic vim habeat salium corrosivorum texturam immutandi, præcipitandi atque adeo etiam edulcorandi. Et si quæ symptomata interdum oriuntur, non tam ex mercurio, quàm vitiosorum humorum colluvie & sinistrè adhibitis remediis proveniunt. Inde & rusticus ille *Thom. Bartholin. Centur. 3. histor. 79.* omnes illos cingulo suo mercuriali feliciter restituit, qui puta corpora crebro medicamentorum à medicis præscriptorum usu obtinuerant, cacochymicos autem exitio eripere non potuit. Hic rusticus mercurium cum ol. d. juniperi subegit, & in massam formavit, corioque in cinguli formam refecto illinit, quo medium corpus constrinxit, & ad omnes affectus malignos, caneros, ulcera mali moris, & dolores artuum commendavit. Alii mercurii cingulum ita componunt. Mercurium salivâ aut savo extinctum albumine ovi excipiunt illinuntque supra gossypium, quod in cinguli modum consunt.

Suffu

Suffumigia mercurialis & lotiones in primis Galliâ frequentissimi etiam sunt usus, & præmissis præmittendis etiam non sine notabili successu usurpatur. *Hofmannus.*

Preparationes ☿ ij sunt.

1. Purgatio. 2. Calcinatio & Præcipitatio. 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio. 6. Liquefactio. 7. Salificatio.

I. PURGATIO.

Purgatur ☿. 1. *Expressione*, per corium, qua faci- bus crassis in corio remanentibus ☿ transiit.

N. *Et metalla si benè admixta sint simul transeunt.*

2. Lotione.

Lavetur autem vel per + simpliciter, aut cum Sal. comm. mixtum, vel per lixivium calcis vivæ, & cinerum clavellatorum, vel etiam per lixivium saponariorum, sæpius nimirum cum his agitando, & vicissim à sordibus eluendo.

Quinimo purgatur quoque agitatione forti cum V in vitro obturato, sepatatur enim nigredo ad latera.

3. Destillatione.

Nimirum destillatur in arena per retortam igne fati forti, idque per se, id est, sine additione, vel addito sale Tartari, calce viva, & simil. Optimè vero purgatur amalgamando cum metallis perfectis, ac postmodum, per retortam, à corpore admixto separando.

N. 1. *Sequestrari quoque potest ☿ purissimus, per reductionem ex ☿-io.*

N. 2. *Purgationes quò sæpius iteraveris, eo puriorem ☿ colliges.*

N. 3. *Optima purgatio fit à metallis perfectis aliquoties cohobando.* *Schroderus.*

1. *Purgatio.* Hæc summè est necessariâ, alias variæ symptomatum tragœdæ subsequuntur, non tam ab ipso mercurio, quam à corpore, quo consputatus est. Mercurius purgatur 1. *Expressione*, dum per corium mundum exprimitur. 2. *Lotione*, quæ vel per Acet. aut cum Sale mixtum, vel per lixivium calc. viv. &c. donec isti liquores non amplius nigrescant, instituitur. Et 3. *Destillatione*, hæc omnibus reliquis præfertur, à metallis perfectis aliquoties cohobando. *Hofmannus.*

II. CALCINATIO & PRÆCIPITATIO.

Calcinatio ☿ ii communiter præcipitatio dici solet, voce tamen minus accurata & nimis stricta, quippe quæ solam secessionem ad fundum sonat: nihilominus tamen hunc sequar, calcinationemque Præcipitationis voce exprimam, adeoque ☿s calcinatus nomine Præcipitati veniet, qui vel sine Metallis vel cum Metallis.

Est itaque sine Met.

1. Præcipitatio ☿ ij. per se.

℥. ☿ puriss. ℥ ij. vel q. v. injice in phialam, (peculiariter in hunc usum factam, infernè scil. latam, superne compressam, intus rostro angustissimi orifici in ventrem usque producto, ut tantummodo fundus operiatur: phialæ exactè ad æquilibrium in arenam collocatæ, (ut ☿ æquali crassitie ubique fundum tegat,) subdatur Δ primo lentus, post fortior, donec ☿ in pulverem rubicundissimum instar cinnabaris conversus sit: hunc ablue V is cordialibus, vel V.

N. *Labor est multorum dierum (30.)*

Vires. Sudores valde movet, luem ☿ sexies vel septies exhibitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat.

Dosis à gr. iv. ad vj.

N. i. *Ut plurimum vomitum quoque movet sat violentum.*

2. *Præstantior erit præcipitatus, si fiat cum ☿ Oris, vel Cæ.*

Sennert. Instit. Hartman. in Croll. Tentzel. Beguin.

3. *Potest quoque præcipitari eadem ratione & amalgama ☿s & Cæ, de quibus Crollius. Præcipitavi aliquando, inquit, amalgamata ☿s & Cæ seorsim per duos annos, & quamvis pulverem rubicundum nancisceretur, tamen nondum erat debite fixus, nec ad usum Medicum commodè exhiberi poterat, sine ulteriori præparatione. Hæc Crollius.*

Verum me hercle quia præcipitatus per se exhibetur, quid vetet quo minus præcipitatus hic ☿is, Crisue exhiberi possit, non video.

2. ☿ præcipitatio per silices.

℥. ☿ ii puri ℥ ij. aut ad summum iij.

Silicium magnitud. fabar. ℥ ij.

Detine in Δe arenæ, (aliquoties circumvolvendo, ac ☿ in lateribus adhærentem detrudendo,) donec ☿ planè fuerit præcipitatus, & silicibus adhærescat: Hic ☿ à silicibus concussionem separa ac terva.

Vires ac Dosis convenit præcedenti.

Hartman. in Croll. Kessler. lib. i. centur. 50.

3. ☿ fixatus, Panacea.

℥. ☿ viv. purg. ℥ ij. Sulph. citrin. ℥ ij. ✕ ℥ iβ. Misce exactè; donec nihil ☿ appareat. Postea sublima, sublimatum semper de novo cum faciibus tritum sublima iterum, tandem auge Δ, ut candescat: Id quod infundo remanet fixum, medicina est secretissima.

Vires. Omnes humores noxios exiccat, perque diaphoresin expellit.

Dosis ʒβ. ʒi. 3β.

4. ☿ præcipitatus per ☿ Sulph.

℥. ☿ ij. purgat. ℥ iβ. affunde ☿ Sulph. per camp. ℥ i. digere per dies (2.) in arena, ac destilla postea per ☿ vitream cum cohobis tribus. Quarta vice, si libet aliquid recentis ☿ Sulph. affunde, Δmque in fine auge, ut ☿ incandescat: sic massam habes albam, quam postquam aqua calida abluta fuerit, tere, inque phiala saltem gossypio obtutata, Δi arenæ vehementissimo per (☿ octo) committe, ut si quid vivi super sit Mercurii, sublime: ur. Hunc denique Mercurium fixum trina desuper V incensione ulteriori correctum terva.

N. *Eodem modo poterit quoque Merc. præcipitari cum ☿-u ☿i.*

Vires. Purgat omnes vitiosos humores, resolvit catarrhos, contra infirmitates ex humorum putredine remedium est, quo in morbis deploratis vix experiri licet præsentius: Hic utile est in Hydrope, Podagra, Lue Venerea, Venenis, Peste, Febris, Ulceribus malignis, Scabie.

Dosis à gr. 3. ad 6.

Croll. Sennert. in Institut. Beguin. Utzer. de Merc.

5. Merc. præcipit. per ☿ ☿i. rubic.

℥. Merc. purific. q. v. digere cum ☿ ☿i rubicundum donec sub forma liquida penitus Merc. lateat: Abstrahere ☿ per ☿ in arena, & restabit præcipitatus in fundo.

N. *Ex hoc fit vitrum Mercurii, quod vide infra.*

Disput. Chymico-Med. Hartmann. 7. lib. 127. Basil.

6. Merc.

6. Merc. præcipit. per \sim Sal. nit. Mercurius
Corallatus.

7. Φ purificat. \sim Sal. nitri, optimè rectific.
ana $\text{℥} \text{iv}$. digerè, ut solvatur penitus Φ . Hinc abstra-
he \sim Sal. nitri (in arena per phialam longi colli,) Mercurio relicto trito affunde denuo tantundem no-
vi \sim Sal. nit. ac abstrahe, idque vel tertia vice, vide-
bis in fundo Mercurium corallatum elegantem, quem
 Δ l. panululum igniando calcina.

Dulcis est & sine corrosiva facultate.

Ufus idem est, qui Corallini Φ quidem felicior. Croll.
Hartm. in Croll.

7. Φ præcipitatus per ∇ ovorum.

7. Φ purific. q. v. affunde ∇ destillatam ex ovis
aduritiam coctis, & præcipitabitur in pulverem.
Huic pulveri affunde sæpius ∇ eandem, destillatam
scilicet à putaminibus ovorum calcinatis, cohobaque
igne cinerum, donec Φ sit conversus in pulverem ru-
brum & dulcem.

N. Paracelsus vocat Balsamum.

Vires. Curat ulcera colli vesica, etiam qua esti-
mantur incurabilia, sanat vulnera Φ ulcera externa.
Untzer.

8. Præcipitatus per Tincturam Smiridis, Præcipitatus
miraculosus dictus.

Calcina Smiridem Δ violentissimo donec virescat,
& lateribus \times buli adhærescat, (aliquot horarum
spatio fiet.) Extrahe dein Tincturam per \times vel ∇ opt.
decanita & abstrahe ad oleositatem.

4. Hujus Tincturæ $\text{℥} \text{ij}$. Mercurii $\text{℥} \text{iv}$. confunde &
præcipitabitur Merc. in momento: Mercurium hunc, l.
 Δ in \times bulo candefac. per horam, postea edulcora.

Vires. Purgat leniter ἄνω καὶ κάτω .

Dosis gr. an. 3. 4.

N. Mercurius hic purgat tantummodo per inferiora,
si horis duabus igniatur. sin vero horis quinque vel sex,
evadit fixus ac diaphoreticus.

2. Aptior erit Smiris ad Tincturam eliciendam si ali-
quoties in aqua antea extinguitur.

Beg. Gluck. Kes lib. 3 c. 42.

De solutione in ∇ commun.

9. Præcipitatus communis,

4. Merc. puriss. p. i. ∇ p. ij. solve ac præcipita, af-
fundendo scilicet aquam salfam vel abstrahendo ∇
per destillationem cum cohobis tribus. Præcipitatum
edulcora iteratis ablutionibus, vel reverbera, ut à
spiritibus ∇ liberetur.

Vires. Purgat per inferiora Φ superiora.

Dosis à gr. 6. ad 12.

Beg. Hartm. in pract.

10. Præcipitatus albus S. Closs. Vomitivo Catharticum.

Solve $\text{℥} \text{ij}$. \times ci in $\text{℥} \text{ss}$. aq. font. & in eam projice
Mercurii $\text{℥} \text{ti}$ in pulv. redacti $\text{℥} \text{ij}$. Stent in loco calido,
& intra bihorium fiet dissolutio integra Merc. $\text{℥} \text{ti}$, cui
guttatim superfundes ss Tart. deliquiosi $\text{℥} \text{ij}$. aqua eva-
det lactea, sine subsidere, aquam decanta à pulvere
albissimo, quem phlegmate mellis bis aut ter elues
aut aq. communi calente dulcorabis.

Dosis ss . gr. xij. cum $\text{℥} \text{ij}$. Confect. Hamech. in Si-
phylide, elephantiasis, tinea, scrophulis, deoartata aqua
laventur loci scabiosi Φ Erysipelata præsertim Φ ea, sic-
ciorè curantur.

11. Præcipitatus dulcis.

Miscetur Mercurius crudus cum an. præcipitati
rubri, superfuso ∇ ex arte dulcificati & in calore
arenæ detinentur per 20. ℥ , sic enim sese mutuo coa-
gulant & mitescunt. Schroderus.

2. Calcinatio Φ Præcipitatio,) Calcinatio mercurii
communiter præcipitatio dici solet, &c. Præcipi-
tatio sic dicta est, quod per eam præceps agantur ac
demittantur soluta, unde calcinatio minus accurate
præcipitatio dicitur. Variè autem hæc sumitur;
Primo generaliter pro quavis solutorum seu sublima-
torum ex menstruis suis repercussione, quæ signi-
ficatio propria est. Deinde specialiter & vel pro
præcipitatione mercurii, quæ per aquas fixatorias &
gradatorias liquabilitas mercurii sistitur & ex men-
struo suo præcipitatur. Poterim coagulationem hanc
vocare mavult, sed cum præceps hoc modo in fun-
dum decidat mercurius & nil minus quoque fit,
quàm vera coagulatio illa, obinuit hætenus no-
men, ut ille defectus hoc modo mercurius Φ tatus,
& varii eum præparandi modi κατ' ἑξῆς Φ tatus
vocentur. Ita Libavius metallorum quoque calces
dejectas ex corrosivis suis Φ tatus v. g. Φ neris, Φ ni
&c. vocat. Et Hermetici passim laudant Φ tatum
suum Philosophorum, quem Aureolum vocavit Pa-
racellus. Vel sumitur pro philosophicâ præcipitatione,
quæ est ut apud Gebrum Libro de summâ perfectione
Cap. 99. Materia artis in cælum vecta, seu Aludelis
collum circa spondilia, hærens in terram delabi co-
gitur, quod quomodo sit intelligendum, ipsemet
antiquus ille Magister in laudato suo Libro Cap. 45.
explicat, ubi dicit; Ne sis in præparatione illius
(quæ fit per sublimationem) negligens, quia qua-
lis erit mundatio, talis erit perfectio, ubi per
mundationem intelligit, sublimationem, per fi-
xationem autem præcipitationem explicat, quam
proinde alibi etiam sublimationis perfectionem ap-
pellat. Impropiè sumitur pro rubificatione & fi-
xatione præparatorum, quo modo & hoc loco, ab
Autore Nostro mercurius in phialam injectus post
repetitas blandas digestiones ex se & per se instar ru-
bei pulveris in fundo remanet, qui vel sine metallis,
vel cum metallis. Hæc mercurii mutatio inconvenien-
tèr dicitur Calcinatio, cum neque per privationem
aliquarum partium, nec per additionem Salium for-
mam Pulveris induit, sed saltem post innumeras re-
volutiones, & inflexiones, implicationes & alias muta-
tiones Ejus corpuscula ita sibi invicem connectuntur,
ut fluido corporis loco in rubentis pulveris forma, quæ
Præcipitatus per se dicitur, appareat.

Est itaque sine metallis. 1. Præcipitatio Φ rit per se.)
Hic requiritur phiala peculiariter in hunc ulum fa-
cta, cujus ideam vide sis in Cl. Zuvelferi Mantiss.
Spagyric. part. 1. cap. 7. pag. m. 353. Hujus descriptio
& elaboratio recto suo stat talo, adèd ut nil nisi mira-
bilis in animis multorum relinquatur, æqui si ri-
queat, quomodo fluidum corpus quale Mercurius vi-
vus, idque permanenter, in adèd siccum traduci possit.
Addo permanenter, eò quod in hanc sententiam cir-
câ mutationem aquæ in glaciem, & glaciæ in a-
quam, ut & metallorum in fluida vel dura corpora
per fusionem & refrigerationem dici potest. In hisce
enim exemplis, inquit Acutissimus Naturæ intera-
pres Anglus Robertus à Boyle l. c. acquisita aquæ du-
rities & metallorum fluiditas nuda corporum isto-
rum in aërem temperatum translatione potest amitti;
cum in nostro Mercurio Φ tato acquisita textura adèd
sit durabilis, ut nisi extremam vim externam adhibue-
ris, qualis pleraque alia stabiliâ corpora destrue-
ret, ipsam destruere haudquaquam possunt. Hæc
mutatio Mercurii vivi in Φ tatum adèd sine exem-
plo est, ut licet res inter curiosos spagyristas sic no-
tissima, multi Physicorum ex vulgo ad finem ei ha-
bendam non facile adduci possint. Omnis tamen
ratio à partium dependet textura, ut texture mutatio-
ne non externi vel interni coloris vario posito, eadem
partes ad constituendum humidum vel fluidum
aut

aut siccum corpus reduci queant, & post innumeras revolutiones, inflexiones, implicationes, aliasque mutationes, ita sibi invicem connectentur, ut fluidi corporis loco, licet per microscopium minutissimi globuli ☿ rii vivi adhuc in conspectum veniant, tamen variè revoluti & intertexti, in rubentis pulveris forma appareat. Qui etiam rædiosa multorum dierum præparatione posthabita sequenti modo compendiosius elaborari potest. Rec. ☿ rii vivi lib. j. & Δ ne forti ex retorta vitrea destilla: in vasis fundo & circa ejus latera parum rubri pulveris remanebit, quod nil nisi pars fluidi corporis in siccum corpus aliquot horis mutata videtur.

Vires.) ☿ rius hic ita per se ☿ ratus prout Dnus Autor communicavit, ut & sequens cum \odot vel \odot na, præterquam quod, uti dictum, suam ob dextram præparationem laudem mereatur, magnarum etiam est virium, quæ magis diaphoreticæ, quàm purgantes sunt. Luem eradicat & neream, & febres contumaces repetitâ suâ exhibitione paucorum granorum dosis extirpat.

2. *Præstantior erit ☿ ratus, si fiat cum \odot vel \odot na.)* Præcipitatus est duplex vel cum \odot , vel cum \odot . vel cum \odot & \odot simul, & hac posteriori ratione dicit *Elias Johannes Hefsling* se suum parasse Azoth, quod tamen an verum sit, valdè dubito. Si enim ☿ ratus cum \odot & \odot ritè, fuerit præparatus, egregiam præbet Medicinam. Ex eodem etiam censu est *Panacea de La Vigne Medici Regii Parisiensis*, qua in morbis desperatissimis quasi miracula præstitit. Rec. in amalgama coge \odot & \odot ana ℥ j β . Mercurii vivi ℥ iij. idque indurescat in albam massam, simul ac conteritur, ut ne granula duriuscula maneant, (hæc enim adhærent postea vitro, & non excuti, nec in pulverem converti possunt) statim apparebit materia humidior, & exprimat per linteum Mercurii currentis bona pars, post probè conteratur amalgama, ut subigantur granula omnia, fietque materia subfusca seu nigricans. Si sic relinquatur, statim recandescet & obdurescet, ex tritura verò semper madorem & nigrorem contrahit. Affundatur rursus Mercurius expressus & protinus à materia combiberetur, additur autem semper aliquid Mercurii novi, ita, ut cum initio dupla Mercurii pro simpla seu unica portione massæ \odot laris & \odot naris sit, postremò cum sæpè conteritur & exprimitur Mercurii, decem partes Mercurii ad partem unam Massæ veniant. Hæc omnia infunde phialæ, digerantur Δ ne lampadis continuo, & per 5, vel 6. hebdomadas Arbor Hermetica inde gignetur (tribus chopinis Parisiensibus, *ist nach unsern Hallischen Maass ohne gefahr ein halb Nossel*) olei per Mensem facile Δ alitur, ut ellychnium unum concinnatum ex quatuor filis continuo ardeat, leviter modò claudatur phiala charta, arctius ut claudatur non opus est, quia Mercurius non ultra, quàm ad medium ascendit, indeque decedit, per blandas quasi ☿ rationes, idque circiter decies fit. Ad finem fit pulvis ruber ad omnis generis Morbos vel desperatissimos creberrima experientia probatus.

N. 1. Tota operatio novem Mensium spatio absolvitur, adhibito continuo lampadis Δ ne. Dol. gr. j. vel ij. usque ad v. vel ℥ β . in vehiculo appropriato.

2. *☿ rii ☿ ratiō per silices.)* Hæc ☿ ratiō est facillima, silices tamen sint valdè exigui & minuri, præ primis autem hic locum habeant, qui Goldkranachii reperiuntur de \odot le participantes.

3. *☿ rii fixatus. Panacea.)* Per repetitam enim sublimationem cum residuis fecibus de novo institutam figitur tandem quodammodo ☿ rius à Sale acido * Sciendum tamen non sine salivatione noxios humores, teste experientiâ, excludere.

4. *☿ rii ☿ ratiō per ol. Sulphuris.)* Hæc descriptio cum elaboratione admodum conveniens est, prout & cum sp. vitrioli eodem modo præcipitatio succedit. Hic denique ☿ rius fixus trinâ desuper Spir. vini incensione ulterius corrigendus est, in hunc finem, ut, quod nondum satis est fixatum, cum spir. vini avolet.

5. *☿ rii præcipitatus per ol. vitrioli rubic.)* Melius, procedit, si ☿ rius vivus præcipitetur cum sp. Nitri, prout sequens ☿ rii præcipitatus Corallatus, seu Arcanum Corallinum evincit, & cum sp. vini postmodum edulcoretur, eò quod ol. vitrioli ut naturæ metallicæ non ita separari potest ut sp. Nitri: quem modum etiam Dominus D. Johannes Michaëlis approbavit & in usu habuit. Hic eadem viâ, quâ simplex præcipitatus præparatur per solnm spiritum Nitri pro Mercurii dissolutione & repetitâ quaternâ cohobatione spiritu Nitri recenti semper affuso.

N. Si ☿ rium vivum ol. vitrioli corrodas, & menstruum abstrahas, calx alba remanebit, quæ affusione aquæ limpidæ mox in colorem limonium vertetur.

7. *☿ rii præcipitatus per ∇ ovorum.)* Hic Modus non succedit ex ovis ad duritiem coctis elicita aqua, quid enim nisi aqua simplex elementaris inde speranda? quomodo igitur ☿ rium præcipitabit in pulverem? Melius procedet, si loco aquæ ovorum mercurius cum Calce viva præcipitatus fuerit, qui egregiè in ulceribus desperatis conducit.

8. *Præcipitatus per Tincturam Smiridis. Præcipitatus miraculosus dictus.)* Smiris calcinatur Δ ne violentissimo aliquot horarum spatio, & sæpius in ∇ a extinguitur, donec viridescat, & lateribus Crucibuli adhæreat, extrahitur postmodum Tinctura cum Acet. dist. decantatur, & ad oleositatem abstrahitur. Cum hac Tinctura mercurius præcipitatur, ob ☿ tem qui copiosè in Smiride reperitur. Hic præcipitatus moderno tempore Usus Medicum non agnoscit.

9. *Præcipitatus communis cum aq. forti.)* Hic etiam non est amplius usualis, quia tunc non adhibetur ob ejus vehementiam, *ἀνὰ κρηὶνὰ* purgans, & loco aq. fort. melius sp. Nitri substituatur.

N. Si cum Sale marino vel ejus Spiritu solutus mercurius cum aq. fort. factus præcipitetur, ad fundum descendit in pulveris albi forma; Si autem cum alkali præcipitetur, pulverem subflavum vel fuscum suppeditabit. Si autem nulla præcipitatio, & Menstruum calore convenienti abstrahatur corrosus mercurius in fundo remanebit, in formâ substantiæ, quæ eò redigi potest, ut differentes colores, differentium caloris graduum ope exhibeat. Ut inde pateat, quousque texturæ partium mutatio caloris beneficio facta sese extendat.

10. *Præcipitatus albus S. Closs Vomitivo catharticus.)* Hic processus Mihi valdè arridet. In primis si internus ejus usus, qui salivationem excitat, exulet; Et contrà ex ernus, qui eò tutior est, recipiatur; Decantata aqua laventur partes affectæ.

11. *Præcipitatus dulcis.)* Mitescit præcipitatus ruber, si cum ana mercurii crudi superfuso sp. vini per menstruum spatium in digestionem ponatur. Minus tamen etiam tutus est ejus usus internus sed externus commendatur.

N. Qui unum vel duo Medicamenta ex mercurio ritè præparata habet, reliquis carere potest. Nec quem moveat colorum varietas, quia nec hæc aliquid ad benè esse facit. *Hofmannus.*

CORRECTIO seu RECTIFICATIO
Præcipitati.

1. Dissolve præcipitat. bulliendo ✕ acri per hor. 6. &c. (ut totus dissolvatur,) dissolutioni superfunde V vel 8 Tart. & præcipitabitur denuo, abluè igitur & sicca.

Dosis g. 4. s. 6. *Untzer.*

2. Digere præcipitat. per diem cum spiritu ⑤-i, hinc abstrahè Δ forti, (alii cohobant aliquoties,) super ⑤m affunde V ad eminent. digit. 2. digere (2.) & decantaque alium V. denuo affunde, idque tertiâ vice repete. *Sennert. Institut.*

Vires. Purgat per inferiora.

N. Alii abstrahunt V & cohobant aliquoties.

3. Imbebe præcipitatum communem, (flavum vel album Vâ rosarum aliquoties ablutum,) cum V opt. ac camphorâ ana, vicissimque V l. Δ evoca.

Vires. Purgat per inferiora præcipue materiam febrilem.

Utilis quoque est in Peste morbisque Epidemici.

N. Ante Paroxyssum cum Theriaca exhibetur.

Dosis à gr. 3. ad 6. *Hartm. in Croll.*

4. Vis vomitiva Præcipitatorum Mercuriorum infringitur etiam si in ~tu Huminis solvantur, reverbentur leniter & per aq. ovorum læpius cohobatam figantur.

12. *Mercur. præcipitatus incarnatus.*

℞. Merc. 3 j. solve in V 3 ij. solutioni adde V ca. lida 3 iij. ac infunde postea urinam sani hominis recentem, & præcipitabitur merc. incarnatus aquâ eluendus. *Hartm. in Croll.*

Vires. Solum secessum movet.

Dosis à gran. vj. ad x.

13. *Mercur. Præcipitatus luteus.*

Fit, si loco urinæ, solutioni priori instillaveris 8 Tart. p. d. sic præcipitabitur merc. luteus, quem similiter lotionè edulcora. *Hartm. in Croll.*

Vires. Vires & Dosis eandem cum priori obtinet.

14. *Alius merc. præcipitatus Vitriolatus fixus, dulcificatus.*

℞. Merc. purific. solve in V (ex ⑤-℥ ij. & Sal. Nit. p. i.) abstrahè & cohoba vice tertiâ: Hinc affunde ~m ⑤-i, rectifica, destillaque cohobando, (6) postea affunde V. cohobaque itidem aliquoties (decies) præcipitatum edulcora aquis cordialibus ac serva. *Kesler. lib. 1. c. 2.*

15. *Præcipitatio Mercurii egregia.*

Fac V ex Sal. Nitri. ℥ ij. ⑤, ℥ ij. O non calcinat. 3 x. Sal. Com. 3 v. In hac vel communi V solve mercurii purgat. quantum V solvere potis est, (alioquin non libenter fit præcipitatio,) solutioni affunde aquam fontan. frig. 3 ij. iij. stent aliquot horas extra ignem, ut præcipitetur merc. post affunde multum aquæ frigid. atque repone ad subindendum, præcipitatum edulcora, iteratâ ablutione, ac digere in vitro lati orificii, sive XXI Δ. ad siccitatem. Exiccato huic præcipitatio affunde denuo ✕ acerr. p. iv. digere in MB. per diem unum ac alterum in cucurb. probè obturata, tandemque ut antè in vitro lati orificii exicca. *Hartm. in Croll. Sennert. Institut.*

Dosis gran. i. ad v. vel vj. *Schroderus.*

Correctio seu Rectificatio Præcipitari. Omnes dictæ ab Aurore Nostro correctiones & rectificationes præcipitati merè palliativæ sunt. Proinde & CL. Helmsontius perbenè dixit, quamdiu mercurius revivificari potest, non est turis ejus usus, nec boni viti remedium, prout in præsentibus usu venit, in quibus ad pristinum suum redit ingenium mercurius.

Mangeti Biblioth. Pharmac. Tom. II.

12. *Mercurius præcipitatus incarnatus.* Hic processus præ aliis etiam commendatur, modo pro aq. fort. substituat. sp. Nitri. Et productio colotis incarnati ut & sublequentis 13. mercurii præcipitati lutei, ut supra jamdum monuimus, ortum suum debet coalitioni Mercurialium particularum cum acidis nitrosis & salis urinosi & alkalicis, invicem pro texturæ diversitate, figurarum & positi associatis.

Vires scilicet mercurii præcipitati lutei. Hic mercurius præcipitatus luteus cum antecedente incarnato solum secessum movere perhibetur, ratione ol. Tartari & urinæ æquæ alkalicorum, & licet interdum etiam vomitum eieat, tamen illud non ab ipso præcipitato, sed potius à saburrâ vitiosorum humorum Archeum Ventriculi infestante provenit, à quâ Natura auxiliante bus manibus jam sublevata sese liberat. Seu, ut Dogmatici Galenici loquuntur, provenit potius ille motus per superiora à biliosis humoribus ventriculo substratis, hinc in ictero specificè prodesse statuunt. Verum cum Meliora ac tutiora possideamus, quis frugibus inventis jam ulterius glandibus vescatur? præcipitatis his utique carere possumus.

14. *Alius mercurius præcipitatus vitriolatus fixus, dulcificatus.* Si cum spiritus vitrioli corrigitur præcipitatum, flores supra dicti Papiliones alium colorem aliasque nanciscuntur virtutes: Et V inde per cohobationem destillatur, ut effluvia mercurialia si qua reliqua fortè simul inde avolare queant. Præterea & V cordialibus præcipitatum edulcorandum, præprimis autem iis, quæ mercurium, specificâ vi corrigere dicuntur, ut V radic. enulæ, pimpinell. Scorzoner. &c.

15. *Præcipitatio mercurii egregia.* Hæc à CL. Hartmanno. Nobiliss. D. Sennerto & D. D. Johanne Michaelis p. m. mirificè commendatur, quia Menstruum, prout Dominus Autor tradidit, penitus abstrahi potest, ut nulla ferè remaneat salsedo caustica; Et si qua remanserit, per Acet. destill. acerr. affusum optimè corrigitur. Unde & hic modus antea in usu fuit modò laudato D. D. Joh. Michaelis p. m. Hofmannus.

De præcipitatis cum metallis.

1. *Præcipitatus ① laris.*

℞. 1. ① puri & limat. vel lam. redacti 3 6. solve in V ex Sal. Com. (sine *) facta.

℞. 2. Vitri. 8 ii hyacinth. 3 6. solve in V.

℞. 3. ① ii purgat. 3 iij. solve similiter in V.

Solutiones omnes confunde, abstrahèque V per XX: hinc novam V affunde, sæpiusque identidem evoca, idque tantisper, donec præcipitatus in ignita ferrea lamina nullum penitus fumum de se emitat. Postea præcipitatum totum calcina sub tegula, ut ~V omnes dissipentur. Tandem ab eodem V sexies destilla, atque denuo ⑤m sub tegula lentè igniendo calcina.

Vires. Summum est remedium mundificativum sanguinis ac totius corporis in lue venerea. Magnum quoque fert solamen in Hydrope, pellit aquam per urinam, exiccât fontem. Prodest quoque in caduco, colica, quartana, ulceribus malignis ac cancris subvenit, & simil. *Hartm. in Croll.*

2. *Præcipitatus ① laris regulinus, seu diaphoreticus.*

℞. 1. Regul. 9. 3 j. solv. in V vel R.

Confunde & abstrahè ad siccitatem in arena. Hinc edulcora aquâ & spiritum 8 aliquoties (septies) desuper cohoba, subinde novum spiritum affundendo. Tandem edulcora denuo, ac V tertiâ vice inde destilla, ad siccitatem pulveris flavi.

Vires. Præstantissimum est sudorificum in omnibus morbis, qui diaphoresin requirunt.

Dosis gran. 3. 4.

N. Ut regulus eo feliciter solvatur, imbe aliquoties ejus pulverem \mathcal{R} , hinc solve.

3. Hercules Bovii.

Huic finitimus est Hercules (potius aurum vitæ,) Bovii, qui nihil est aliud quam \mathcal{Q} præcipitatus Solaris cum vitro \mathcal{S} si conjunctus.

Nimirum.

4. \odot purific. \mathcal{Z} i. \mathcal{Q} . purific. \mathcal{Z} iv. utrumque solvit seorsim in \mathcal{V} . Solutionem utramque confusam destillat (Δ gradualem, & in fine aucto) per retortam: præcipitatum quod in fundo remansit, ut & sublimatum, quod parietibus, vel collo retortæ adhæret, solvit iterum in \mathcal{V} nova, & destillat, idque repetit tantisper, donec tota materia in præcipitatum convertatur. Postea calcinat supra ferrum ignitum ad figendos spiritus corrosivos, & denique edulcorat.

Vires. Ex mente Bovii omnibus aliis catartecorum speciebus antecellit: Estque domitor vermium. Luit \mathcal{Q} , Petechiarum, Pestis, Quartana, & aliorum incurabilium morborum.

Dosis à gr. 3. ad 6. vel 8. cum saccharo rosato, & in ovo vel brodio, vel in pilulis, imprimis si conjungatur cum Scammonio, & humectetur ∇ vitæ, quæ desuper comburatur. Tentzel. sect. 3. panchymag. Mercuriali.

4. Aurum vitæ, Hartmann.

1. \mathcal{V} . \odot purgat. \mathcal{Z} β. solve in \mathcal{V} \mathcal{Z} ij. servando solutionem in calido.

2. \mathcal{V} . Mercurii crud. purific. \mathcal{Z} vi. solve in \mathcal{V} commun. \mathcal{H} j. utramque solutionem mixtam, (qua mixtione apparebunt omni nigerrima,) ex arena per \mathcal{X} l. Δ grad. t. m. aucto, destilla, donec, quæ, in fundo, rubescant, & cucurbita tandem subitus candeat: Exemplum dein pulverem sub capite in catillo, subinde cum terreo baculo calcina, donec \sim ab \mathcal{V} probe evanuerint: Abue postea aquâ dulci omnem l. s. dinem & extremo \mathcal{V} correctum ab eodem sæpius per cohobiam destilla.

Ujus ejus egregius est in Peste, ut & aliis morbis quam plurimis.

N. Fit \mathcal{V} ad hoc opus.

3. \mathcal{V} is ex \mathcal{O} : Sal. Nitr. & \mathcal{O} ana factæ \mathcal{Z} iv. * \mathcal{Z} j. Misc. & destilla per alemb. ex arena.

5. Aurum vitæ S. Closs.

Fac \mathcal{A} ā ex Regulo \mathcal{O} ris stellato & \mathcal{Q} io, lava hunc pluries, & exprime per pannum, secundo fac aliud \mathcal{A} ā ex \mathcal{O} & superfluum \mathcal{Q} um itidem exprime, tertio ambo \mathcal{A} āta commisce, ita ut sine Reguli \mathcal{O} ris & \mathcal{O} ana \mathcal{Z} β. \mathcal{Q} ii \mathcal{Z} ij. aut circiter, quarto superfunde Ol. \mathcal{O} li, digere dum colorem ruberrimum acquisierit, quinto Tincturam inde extrahe cum \mathcal{V} extractam, circula per mentem, tandemque rectifica.

Vires. Purgat suaviter & sudores copiosos movet.

Dos. à gr. 8. ad \mathcal{S} β. gr. 12.

6. Aurum vitæ aliud.

4. \mathcal{Q} . purific. \mathcal{Z} v. \odot puriss. laminat. \mathcal{Z} β. F. amalgama quod abluatur $+$, donec omnis nigredo ablata sit.

Postea impone in \mathcal{O} m, & affunde \mathcal{V} m, (ex \mathcal{O} p. ij. & Sal. Nitr. p. i.) digereque (in cineribus vel arena,) ut solvatur \mathcal{Q} & \mathcal{O} in fundo sub forma pulveris remaneat: dein destilla augendo in fine Δ m, ut fundus retortæ incandescat omnesque spiritus corrosivi prodeant. Vasis refrigeratis, tere materiam, abstractamque \mathcal{V} m iterum affundendo cohoba, & invenies in fundo pulverem rubicundum, quem collige, abjicendo quod ad latera retortæ forte fuerit sublimatum. Hinc candefac laminam ferream, cui optime candef-

centi, insperge pulverem illum Mercurialem, non modo ut optime exicetur, sed & ut id quod volatile restat, evaporet. Hinc aufer & reserva in vase clauso.

Vires. Purgat per secessum lentè sine omni etiam vomitu, nisi scilicet ventriculus impuritatibus repletus sit. Summum arcanum est in Hydrope, Lue Gallica & omnibus cutaneis affectibus, atque defluxionibus, ut & ubi corpus scaturit pituitosis humiditatibus.

Dosis à gr. 3. ad 8. cum Terebinth. paucillo aut extracto aliquo. Hartman. in pract. pag. 12. Confer Sennert. in Insitut.

7. Præcipitatus viridis seu veneris.

4. Mercurii purificat. \mathcal{Z} iv. solve in \mathcal{V} commun. in eadem \mathcal{V} solve & \mathcal{Q} is \mathcal{Z} β. conjunge solutiones ac abstrahæ in arena, urgendo in fine ignem, ut maxima pars spirituum tollatur. Præcipitatum exicca ac digerere cum \mathcal{X} in \mathcal{M} β & ac \mathcal{P} : ultimo fac bullire, ut purissima pars Mercurii in \mathcal{X} solvatur. Hinc decanta & abstrahæ atque sicca sine lotionē.

Vires. Est specificum in Gonorrhæa virulenta, quam nimiam tollit, insufficientem promovere, ideoque singulis diebus continuandus ejus usus est, donec omnis fluxus sedatus sit.

Dosis à gr. ij. ad viij. Hartman. in Croll.

N. Signum boni præcipitari est, si aurum fortiter cum eodem fricatum, non dealbetur, ut solet ex contactu Mercurii.

Huc

8. Vitrum Mercurii Cnare.

4. \mathcal{Q} præcipit. (per \mathcal{O} & i rubic.) \mathcal{Z} ij. \mathcal{C} æ calcinat & * ana \mathcal{Z} j. Misc. & sublima. Si ascendit *, relinquit in fundo Mercurio & \mathcal{C} â instar auri purissimi, inde crucibulo & da ignem fusionis, ut in vitrum simul abeant. Vide Disput. Chym. Med. Hartmann. 7. lib. 127.

9. Vitrum ex \mathcal{Q} vitæ, sive Succinum \mathcal{E} j.

4. Mercurium vitæ abstrahæ per \mathcal{O} m partes minus fixas, reliquum fundatur igne forti in vitrum, quod transpatens opacum, vel si diutius in igne contineatur, Hyacinthinum evadit.

N. 1. Dicitur aliis succinum \mathcal{E} ii, quia nihil aliud esse videtur quam vitrum \mathcal{E} ii, non mercurii.

2. Si abstractio partium minus fixarum fortius urgeatur, extillat vicissim liquor instar butyri \mathcal{E} ialis. Schroederus.

De Præcipitatis cum Metallis. 1. Præcipitatis \mathcal{O} ris.)

Hic præcipitatus ob sua aq. fort. corrosiva prout & sequens 2. Solaris regulinus seu diaphoreticus valde suspectus est. Non desunt, qui Cl. Helmontium in hydrope hoc præcipitato usum fuisse statuunt. Verum Mihi ejus scripta sedulo evolventi nunquam persuadere hoc ipsum potui; Dum statuit in progymnas. Meteor. §. 18. ab ejusmodi Menstruis corrosivis interiorem Mercurii nucleum non attingi, multo minus terebrari, sed terram ejus Sulphuream tales solum subite mutationes, quæ spoliatus Mercurius nullo igne manet mutabilis. Proinde & alibi scribit, quamdiu Mineralia virus solutionum adhuc suum obtinent, tamdiu atcanorum nomine sunt indigna, quæ causa etiam, quod in tr. ignotus Hydrops §. 39. scribat Mercurius præcipitatus non juxta nostrum sed Paracelsi præscriptum omnem curat hydropem, non quatenus purgat, sed in quantum materialiter transiens per intestina resolvit causam occasionalem. Sin una vomitum vel alvum cieat, illud hydropi erit per accidens. Ut autem id pro voto succedat, mori oportet Mercurium absque ullo salium externorum sodalicio, aut Spirituum alienorum consortio. Sic tamen mori convenit, ut vivum maneat in plastro. Quæ causa etiam quod in tr. Dispensator. modern.

§. 54. detestetur omnes Mercurii præcipitationes, vi-
trificationes &c. dum nesciunt, inquit, ah nesciunt, aci-
dum venis hostile, ideoque peregrina dissolventium su-
perata & transmutata aciditate ejusmodi minerale pul-
verem esse, vel tale, ut ante.

3. *Hercules Bovii.*) Bovius fuit Medicus, cujus no-
men in Italia longe lateque notum fuit, magno theatro
spectatus hic fere omnes lue q̄nerea infectos hoc solo
curavit Hercule. quod Medicamentum pro maximo
habuit arcano & adhuc in Italia decantatur pro arcano.
Scilicet accipitur ☉ purific. 3 j. mercurii purific. 3 iv.
utrumque solvitur seorsim in aq. reg. Solutio utraque
confusa destillatur per retortam: præcipitatum quod
in fundo remanet, ut & sublimatum, quod retortæ
collo adhæret, solvitur iterum in aq. reg. novâ, & de-
stillatur, idque tamdiu reperitur, dum tota materia in
præcipitatum conversum fuerit, postea calcinatur, ut
salia aq. reg. aversentur. Verum & hic Hercu-
les Bovii valde etiam ob aq. reg. salia corrosiva rema-
nentia adhuc suspectus est: Proinde sequens potius
Solaris præcipitatus est præferendus.

Rec. Mercurii sapius cum Regulo ☿tis sublimati
3 ij. ☉ purissimi 3 vi. f. aâa in Crucibulo Δne mode-
rato, Aurum candefactum in mercurium aditu cali-
dum projiciendo. Hoc aâa toties lavetur Acet. & Sa-
le, usque dum nulla amplius nigredo contendo &
ablucendo conspiciatur: Hinc sicatur, cui probe
mundificato adde præcipitati per se facti rubicundissi-
mi 3 ij. conterantur diu multumque in mortario vi-
treo, quoad bene uniantur, & immittantur phialæ; ac
per gradus Δnis denuo ad siccitatem & summam redu-
cantur rubedinem.

4. *Aurum Vita Hermanni.*) Hoc ejusdem pretii ac
valoris est cum Hercule Bovii.

5. *Aurum Vita S. Clossii.*) Hoc reliquis præfertur,
quamvis Spiritus Vitæ, oleo Vitrioli surrogatus hanc
compositionem commendabilem redderet, ad colorem
rubrum mediante digestionem inde acquitendum & de-
mum, cum sp. vini extrahendum, tamen & sequens in
casibus desperatis non est posthabendum. Rec. ☉ pur-
gat. per 8 soluti in sp. Sal. comm. f. q. 3 β.

Mercurii soluti in f. q. sp. Nitri 3 ij. conjunge cum
reperita cohobatione, postea abluere bene & Acet. dist.
aliquoties imprægnare & abstrahere; Pulvis sub tegula ex-
siccandus, & habebis ☉ lare præcipitatum. Dos. gr. ij.
iv. v. pro diversitate constitutionum, curat Luem q̄ne-
ream, Leptam, icterum, febres quartanas, Maniam
&c. purificando sanguinem.

6. *Aurum vita aliud.*) Fiat fortissima destillatio, in
hunc finem, quo nihil salium causticorum ibidem re-
maneat, imo etiam sub tegula insimul calcinari potest,
ut spiritus corrosivi omnes totaliter evanescant.

7. *Præcipitatus viridis seu veneris.*) ☉ nus probe
purificata esse debet, antequam compositionem ingre-
diatur, vide supra De Cupro Cap. 12. Hic præcipitatus
fuit etiam in usu D. D. Johanni Michaelis p. m. Ubi
notandum, quod licet Materiam peccantem per urin.
expellat, & hac ratione gonorrhœam augere videatur,
junioribus tamen practicis nullum incutere debeat ter-
rorem, dum ejusmodi excretio sæpe fiat cum ☿p̄p̄t̄p̄;
Naturâ hoc modo sese ab hoc malo liberante. Dos
est a gr. ij. ad viii. primò scil. vel secundo die, postea
augeatur dos ad ʒss. & exhiberi potest cum panegy-
magogo Crollii, vel extracto catholico Andernaci.

8. *Vitrum mercurii Mare.*) Sic etiam fit Dna corneas
sed plus de Dna, quam mercurio participat, quia mer-
curius per fusionem abit in auras. Sed nullum in Me-
dicinâ agnoscit usum.

Vitrum ex mercurio vitæ, sive succinum ʒnii.) Succin-
um dicitur à colore, sed non mercurialis, verum
ʒnialis est prospax, ut infra de ʒnio uberius patebit
quo etiam pertinet.

N. Succinum hoc si infundatur, magis leniter vo-
mitum movet, atque Mercurius vitæ. Hoffmannus.

III. SUBLIMATIO.

1. *Mercurius sublimatus Officinarum.*

℥. ☉ in ℥. solut. Vitrioli exicat. Sal. Com. de-
crepit. ana. Misc. exacte & sublima ex cucurbita hu-
mili. Gluckarth. in Beguin.

2. *Alier optimus pro ☉ dulci conficiendo.*

℥. ☉ Purific. Vitriol. rubific. Sal. Com. decrepit.
ana ʒss. Sal. Nit. 3 ix. Misc. exacte aspergendo mo-
dicum ☿ sublima que ut dictum.

Jam denuo.

℥. ☉ illius ʒss. Sal. Com. decrepit. 3 xii. Vi-
triol. rubificat. 3 iv. M. Sublima.

Iterum.

℥. ☉ illius ʒss. Sal. Com. decrepit. 3 xii. M.
sublima.

N. Puriorum Mercurium ☿m si desideras, reitera ad
huc sublimationem, sed sine additione. Beg. Unzer.

3. ☿tus Regulinus.

℥. ☉ Purificat. Regul. ʒii ana ʒss. Vitrioli rubi-
fic. 3 iv. Sal. Com. ful. 3 vi.

Misc. & sublima ex sublimatorio vitreo, desuper
defundendo ℥: sublimatum misce cum ☉, ac subli-
ma denuo, idque vice tertiâ.

Vires. Inservire commodè potest Mercurio dalti, aliis-
que Medicamentis, ex ☉ ☿, præparandis. Schroderus.

3. *Sublimatio. 1. Mercurius sublimatus Officinarum.*

Electio sublimati ad Medicamentorum præparationem
Medico summè necessaria est; & quantum inter vul-
go sublimati & Ejus, quod sicut præparatum
est, operationes discriminis sit, non tantum in me-
talla, sed etiam in humana corpora peritis Arte Me-
dico-chimicâ erit notissimum. Longè alia operatio il-
lius est, qui juxta Domini Autoris primùm & secun-
dum modum, & alia illius, qui juxta sequentes mo-
dos hoc est, qui absque Nitro aut aq. fort. & solum cum
vitriolo & Sale præparatus est mercurius ☿atus, Et
nisi etiam præterea ad crystallinam usque puritatem
fuerit sublimatus, & colorem acquisiverit albidissimum,
in Medicinâ locus ipsi minime concedendus erit
qualis modo adductus Autoris Mercurius sublimatus
officinarum, ubi non sufficit Vitrioli nuda exsiccatio,
sed & necesse est, ut Vitriolum ipsi destinatum ita cal-
cinetur, ne suo spiritu privetur acido? Deinde nec
anatica mercurii in aq. fort. solut. Vitrioli & Salis
proportio sufficit, in primis si corrosivus reddi de-
beat mercurius, ut non solum illorum pondus du-
pletur, sed & sublimatio mercurii addito semper re-
cente Vitriolo calcinato & Sale bis terve reiteretur,
donec in crystallinam sublimetur compagem, & non
per Aren. sed Δne aperto servatis Δnis gradibus in
cucurbita lutatâ, quemadmodum & Dominus Autor
in secundo modo innuere videtur. Hæc ex Cl. Zuvvel-
feri Mantiss. Hermetic. libuit. Quam admonitionem
equidem observari posse & Dominus Lucas Sbrækius
Luc. Filius in Mantiss. Hermetic. p. 543. concedit. Sed
rationem illam Cl. Zuvvelferi, quâ ideo vitrioli perfe-
ctæ ad totalem Spirituum expulsionem calcinati id est,
colcotharis additionem rejicit, quod liquefactionem
& coagulationem salis unâ adjecti quidem impediât,
citius tamen ipsos salis spiritus absorbeat, antequam
mercurium attingant, & sic pro majori parte Mer-
curius in sublimatione semper ascendet vivus, pu-
tat insufficientem, dum pars illa Spirituum salis à col-
cothare

cothare absque praeparatione, non in eo ita figitur, ut non cum Mercurio, & reliquis acidis Salis particulis iterum elevari possit. Alias Spiritus quoque acidi Vitrioli ad cinereum vel flavum colorem calcinati in sublimatione non ascenderent, seque hydrargyro unirent ac ita vitriolum hocce inutiliter ferè pro hac operatione absumeretur. Unde ipse *Zwelferus* Mantiss. spagyric. p. 351. pro altera sublimati corrosivi confectione colcotharis seu Capitis mortui Vitrioli parum addere permittit, quod parum spirituum acidorum quoque partem aliquam à sale absorbet. Postea etiam *Clariss. Zwelferus* Vitrioli & Salis præscriptam quantitatem non sufficere putat, præsertim si corrosivus reddi debeat mercurius; necessum igitur ducit, ut non solum pondus eorum dupletur, sed & sublimatio mercurii additis semper recensibus speciebus, bis terve reiteretur, donec in crystallinam compagem elevetur. Hic majorem quidem dictorum corporum, salis scilicet & vitrioli calcinati, quantitatem commisceri posse, ut magis corrosivus evadat mercurius sublimatus, non etiam impugnat *Cl. Lucas Schræckius*; interea tamen cum præscripta dosi sublimatum eundem non esse corrosivum, non rectè adstrui statuit; quorsum enim, inquit, abierint Salia ista corrosiva Sal. comm. & Vitrioli, cum in relicto Cap. mort. non inveniuntur? certè cum mercurio salinam præ se ferente faciem, conjuncta sunt, unde non nisi corrosivam hinc induisse naturam dici potest. Verum jussu adhuc stat talo *Nobiliss. Zwelferi* de mercurio sublimato ritè conficiendo supra in medium allata censura, dum ejus verba directa sunt ad moderatam, & non totalem, ubi penitus penitusque suo corrosivo aut spiritu acido Vitriolum privatum est, calcinationem; in modernâ enim Vitrioli calcinatione pars illa spirituum salis non ita figuntur, ut non cum mercurio & reliquis Vitrioli acidis particulis elevari possit, quàm in perfectâ, ubi ad totalem spirituum acidorum expulsionem Vitriolum calcinatum spiritus acidus salis absorbet & coagulat, antequam mercurium attingant, ut mercurius vivus in sublimatione absque salibus ascendere cogatur. Alia igitur ratio est vitrioli etiam saltem ad cinereum vel flavum colorem calcinati, cujus calcinatio etiam est moderata, cujus spiritus acidi quoque in sublimatione cum mercurii unione ascendunt. Nec refert, quod ipse *Zwelferus* in mantiss. l. c. pro alterâ sublimati corrosivi confectione Cap. mort. Vitrioli parum addere permittat, particulæ enim salinæ acidæ in hujus sublimati elaboratione superant hoc parum colcotharis, ut ita facilè cum mercurio sublimari possint. Deinde ut sublimatus mercurius commodè in crystallinam elevetur compagem, necessum est, ut non solum pondus vitrioli & Salis dupletur, sed sublimatio sæpius reiteretur, quo sublimatum æque bene corrosivum fiat, id quod *Domino Luca Schræckio* concedimus, at minus hac corrosione, quæ malignam ac deleteriam secum trahit qualitatem, quam si quis in sublimato ex Nitro vel aq. fort. confecto negare ausit, omni rationi & experientiæ repugnabit. Magis igitur ad medicinam sublimatus adaptatur, qui solum cum Vitriolo & Sale, absque additione Nitri vel aq. fort. præparatus fuit, licet ille quoque sit corrosivus, absque malignitate tamen est, & noxâ, cum per se externe ulceribus sordidis veneris aliisque affectibus applicatus, tum etiam ad interna medicamenta prius dulcificatus ad usum tractus, ut infra videbimus, sine sanitatis dispendio aut læsione agit, minoreque periculo usui Medico esse potest, quàm simplex dictus ex Nitro aq. fort. &c. qui Venetiis in magnâ copiâ paratus ad Nos transfertur.

Recip. Mercurii vivi depuratissimi lb̄ β. Vitrioli Ungaric. calcinat. albiss. Salis exsiccat. ana ℥ j. subigantur cum modico aceti, exsiccata terantur, & simul

miscantur in mortario lapideo tamdiu, donec mercurius cum salibus in pulverem abeat. Tritam materiam inde cucurbitæ cum alembico & igne aperto destilla per gradus ad 8. horas servatis ignis gradibus. Hujus sublimatio additis semper recenti Sale & Vitriolo bis vel ter reiteretur, donec instar albidissimorum crystallorum meteorisferur. Hoc modo si sublimatus regulinus conficeretur tertius omnium optimum acquireretur ad mercurium dulcem sequentem & alia ex mercurio sublimato præparanda. *Hofmannus*.

4. ♀ Dulcis vulgaris: Draco mitigatus.

℥. ♀ anti & viii. ♀. crud. purific. ℥vi. Misc. exactè in mortario lapideo, vel super porphyrite, donec Mercurius vivus amplius conspici nequeat. Hinc sublimata calore arenæ in Phiala leniter saltem obturata & sublimabitur totus ferè Mercurius, adhærescetque lateribus Phialæ, remanentibus in fundo sæcibus, quas una cum nigricante materia collo phialæ adhærente rejice. Hinc sublimata denuò, idque vice tertiâ, rejectis semper sæcibus, ut dictum.

N. 1. Si purum inspidumque secundâ sublimatione obtinueris, acquiesce, multa enim sublimatione infringitur vis purgatrix.

N. 2. Alii addunt quoque Colcothar.

N. 3. Optimum Mercurium dulcem conficies ex mercurio regulino, & Mercurio ℥ ii.

Hartmann. in Croll.

Vires. Omnes humores noxios sine perturbatione blandè expurgat, unde vel infantibus exhiberi poterit.

Dosis: Dari quidem potest ad ℥ss. Verum ut eò citius operationes suas perficiat, nec diu in corpore delitescat, acui solet purgantibus aliis fortioribus, exempli gratia, Diagrida Trochisc. Alhand. & simil. Daturque cum iisdem à gran. 8. ad 15. & plur.

Hartmann. in Croll. Sennert. in Inst. Tentzel.

5. Alius.

℥. Mercurii in aqua Vitrioli soluti & edulcorati.

Mercurii crudi ana.

Sublima aliquoties ut dulcis fiat.

Vires. Lentè purgat per inferiora.

Dosis à gran. 6. ad 12.

N. 1. Eodem modo dulcescit & Mercurius præcipitatus luteus si per se sublimetur, dulcificatusque leniter alvum movet.

Dosis gr. 8.

2. De usu: Ex omnibus hisce Mercuriis dulcibus potest parari aqua utilissima ad inflammationem, fistulas & ulcera maligna, non tantum detergenda, sed etiam cicatrificanda, præcipuè in Lue venerea; valet etiam ad scabiem, sine noxa penitus curandam.

Nimirum.

Projicitur Calc. viv. recens in aquam bullientem, relinquiturque aliquamdiu, hinc filtratur, in filtraturâ ℥ i. dissolvitur bulliendo Mercurii dulcis, q. s. colatur & solvatur. Fallopius vocat aquam aluminis. *Hartm. in Croll.*

6. Sublimatum dulce Talcosum s. Closs.

Fit si M. cum Sal. Nit. irrorando guttulis aliquot ʒo Sal. Com. hæc tria constituunt Axungiam Talcosam fluentem.

Vires. Suaviter purgat absque vomitu, deobstruit & refrigerat, estque securum febrium intermittentium solamen.

Lanugo perlata sive flores Argentæ ex inventione S. Closs.

1. Facta est ℞ ex ana Sal. Com. & Sal. Nit. triplo boni communis ad modum ℥ 2. in ℥ j. hujus spiritus

rus soluta fuisse & crudi $\frac{3}{4}$ x. & abstractâ \mathcal{R} ad duas tertias, collecti fuisse cryſtalli probeque edulcati 3. perfuſi ſunt idem \mathcal{V} Tartariſato, ad 3. digit. ſupereminentiam ſicque per menſem in putrefactione, MB ſtatete, 4. materia in \mathcal{O} conſecta eductoque \mathcal{V} pars quædam & ij. ſublimabatur Δ auctiori, pars in rubrum abibat præcipitatum. 5. ambobus iterum conſuſis \mathcal{X} affundebatur, & poſt digeſtionem unius diei ac filtrationem calidam, tota materia ſoluta in floccos argenteos goſſypio perlato fulgentique ſimiles fuit converſa incaleſcente menſtruo. 6. hos flores cochleari vitreo detraxi & in charta bibula quadrupl. exiccavi, ita enim ſplendorem non amittunt. 7. cum alio \mathcal{X} ſuper reſtitantem materiam conſecto novos flores collegi, idque ter quaterve repetii.

Vires. Ex Untzero repetend, qui longè operoſiorem nobis methodum aliam reliquit in Anat. \S ij. p. 255. Ubi enim illic per grana & ſcrupulos abraduntur flores, hic per uncias & libras congeruntur.

Dofis eorum eſt gran. vj. in formâ pilul. cum paucillo Extracti liquir. Educit abſque violentiâ humores vitioſos in febre quotid. ſcabiæ, Lepâ.

8. Mercurius \mathcal{R} -tus rubeus non corroſivus, Arcanum Crollianum.

\mathcal{Z} . Mercurii optimè purgati, $\frac{1}{2}$ j.

Sal. Nit. optimè purificat.

\mathcal{O} -i ad rubedin. calcinat. ana $\frac{1}{2}$ ij.

Pulverifentur & miſceantur optimè. ſubindè irro-rando & incorporando cum \mathcal{X} acenitimo, donec diſpareat penitus Mercurius. Hinc ſublima ex arena, in cucurbita lutata, cum capitello, & exit primum phlegma, dein auctiori Δ , v'ginti quatuor horas continuato, ſublimatum proximè à materia rubeum, paulo altius flavum. Utrumque rubeum ac flavum, cum Sal. Nit. $\frac{1}{2}$ j. & \mathcal{O} leniter calcinati, $\frac{1}{2}$ j., miſce impaſtaque cum phlegmate $\mathcal{+}$, ſublimaue denuo ut prius (horis duodecim,) & aſcendit iterum ſublimatum rubicundum ac flavum, collige ſingula ſecotim, rubicundum elue ∇ is cordialibus, ac ab eo efflagrare ſine \mathcal{V} ; flavum calcina igne mediocri, ut rubefcat, hinc elue ſimiliter ac corripge cum \mathcal{V} deſuper accenſo.

N. Feces nigriantes cum Mercurio in capitellum aſcendentes, abſiciantur in ſingulis ſublimationibus.

Vires. Purgat, per inferiora præcipuè, magnumque ſecretum in Hydrope, morbo Gallico, Podagra, Scabiæ, Ulceribus, Cancro, &c. Crollius.

9. Modus compendioſior, Laudanum Mercuriale ſive Metallicum.

\mathcal{Z} . Salis extracti ex \mathcal{O} o ∇ is, (ex \mathcal{O} . & S l. Nit. ana fact.) $\frac{3}{4}$ vi. \mathcal{P} urific. $\frac{3}{4}$ ij. Sal. nit. purific. $\frac{3}{4}$ ij.

Pulverita ac miſce optimè impaſtando cum $\mathcal{+}$ ſublimaue, ut dictum, ſic aſcendit pars quædam alba, quædam lutea, quædam crocea; quædam rubicundiffima, collige croceam ac rubicundam, abſectis cæteris, ſublimaue denuo per ſe ex arenâ igne ſat. forti, ac omnia rubefient: hinc elue ac corripge \mathcal{V} ſupra accedendo.

Vires. Eaſdem habet cum præcedenti. Hartmann. in Croll.

10. Manna Mercurii, ſeu Mercurius dulcis \mathcal{O} laris.

\mathcal{Z} . Mercurius dulcis vulgaris, q. v. tantisper ſublimationibus iteratis eleva, donec in fixos abierit Cryſtallos, poſtmodum in liquorem ſolvito.

\mathcal{Z} . Huius part. iij. \mathcal{O} calcin. p. l. Miſce. ac digere per menſem, cohoba donec in cucurbita inſtat ceræ ſuat.

Vires. Ad ſummum Medicina gradum Mercurius ita redactus eſt, & in Epileſiâ, & morbis Veneris admiranda virtutis Tentz.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

N. Ego met Mercurium dulcem ter ſublimatum miſui quondam cum Deſolia; ſublimationemque ad ac quartâ vice iteravi, quibus peractis ſublimationibus eſtantem materiam igni ſubjeci fuſorio, ut quid \mathcal{C} æ reſtaret colligerem; verum ſine commodo, quippe Cum merc. penitus fuiſſet ſublimata; viâ autem illius ſublimati ſudoriſera potius fuit, quam deſectoria.

11. Arcanum corallinum correctum S. Cloſſ.

\mathcal{Z} . \mathcal{O} . Sal. com. ana $\frac{1}{2}$ ij. \mathcal{O} calcinati & \mathcal{Z} ii ana $\frac{1}{2}$ j. Omnibus arte mixtis detur Δ \mathcal{A} mationis in ſine bene fortis; quod rubefcit ſublimatum collige, bene edulcora, tere, & digere in \mathcal{X} ad 4. digitorum extantiam per 2. aut 3. \mathcal{O} , evacua per inclinationem, aliud affunde digere, donec nil amplius ſolvatur tandem evapora remanebit pulvis luteus, quem lavabis ſæpius aq. calidâ.

Dof. mirificata huius Aquila eſt à gr. v. ad \mathcal{D} ß, cum Pauchymag. Felicius adhuc operabitur, ſi ejus gr. vii. cum auri ſilopet. & croci \mathcal{O} ana gr. iij. in conſ. ſorum borrag. aut pil. de aloë lota exhibeantur.

Ad \mathcal{X} \mathcal{A} pertinet quoque.

12. Cinnabaris Officinarum artificialis.

\mathcal{Z} . Sulphuris commun. $\frac{3}{4}$ iij. vel iv. Huic liquefacto infunde Mercurii vivi $\frac{1}{2}$ j. ſpatulâ lignèâ bene agitando incorpora, donec Mercurius à Sulphure planè conſumptus videatur. Hinc maſſam refrigeratam tere ſuper marmore, atque ſublima, ex ſublimatorio lutato; igne primo leni, dein auctiori, & c. Primo aſcendit fumo citrinus, paulatim rubefcens. Quando itaque fumus nigro-rubeus aſcendere incipit, urge igne v. olentiſſimo quatuor vel quinque, & ſublimabitur cinnabaris, adhæreſcetque lateribus, quam exime, rejectis ſæcibus in fundo & capitello.

Paracelfus in Chirurg. lib. 1. manual. pag. 1. 702 Brendel.

Aliter.

\mathcal{Z} . Sulphur. $\frac{3}{4}$ iij. \mathcal{X} $\frac{3}{4}$ iv. M. ac ſulphur. aliquantulum efflagrare ſine, ut pulvis remaneat niger; hinc ſublima ſemel ac iterum, ut cinnabarim nanciſcaris rubeam.

13. Panacea \mathcal{X} ii purgans.

\mathcal{Z} . Mercurii vitæ p. ij. mercurii vivi in deſtill. butyri \mathcal{Z} ii proveniens p. i. ſublima ut mercurium dulcem.

Deſis à grav. v. ad viij.

N. Mercur. vite ad hoc opus fit ex merc. p. ij. \mathcal{O} optimi vel reguli p. i. deſtillatur & \mathcal{F} itur aq. com. ut moris & de ſupr. ſtagret aliquoties Spir. Junip.

Cl. D. D. Joh. C. Fauſ. Schroderus.

4. Mercurius dulcis vulgaris: Draco mitigatus.) Dominus Autor poſuit mercurii ſublimati $\frac{3}{4}$ viii. & mercurii crudi $\frac{3}{4}$ vi. Verum exacta mercurii vivi quantitas determinari nequit, quia quo magis corroſivus eſt mercurius ſublimatus, eo plus requirit de mercurio vivo pro ſua edulcoratione. Ideoque ſumitur tantum mercurii vivi, quantum mercurius ſublimatus capere po-teſt, & ſublimatur etiam igne aperto in cucurbita vitrea inſtra lutata, ita tamen, ne ignis totam lambat cucurbitam, ſed paulò ultra, quàm quouſque cucurbita mercurio adimpleta eſt, ignis eam circumdare poſſit.

N. 1. In mortario lapideo.) Vel ligneo cum piſtillo ligneo vel lapideo exquiſitiſſimè & diu miſcenda ſunt.

N. 2. In phialâ leniter ſaltem obturâtâ.) Ne alembicus firmiter & penitus claudatur, ſed ſtatim leniter ut fuligines venenofæ exhalare queant quemadmodum hoc etiam obſervatur in ſublimatione cinnabaris \mathcal{Z} ni.

N. 3. Si purum inſpidumque ſecunda ſublimatione obſinueris.) Si ambo ingredientia probè fuerint purifi-

cata, sublimatio absolvi potest secunda vel tertia vice, alias mercurius ille nimis redditur dulcis, id quod per crebriorem sublimationem fieri potest, & inde vim purgandi amittit. Ex quibus constat, quomodo interdum corpora adminiculo ignis mixta satis quoad fixitatem & volatilitatem discrepantia, adeo tamen prima ignis operatione combinentur, ut vix ipse postmodum ea separet, sed tantummodo in pulverem redigat, sic in presenti mercurii dulcis præparatione salinæ vitrioli, salis marini & nitri interdum ad sublimatum conficiendum adhibitorum particulæ adeo se se cum particulis mercurialibus primò ad parandum, deinde ad edulcandum sublimatum usurpatis uniunt, ut salinæ juxta metallinæ partes in multis sublimationibus successivis, ac si unum duntaxat corpus constituerent, una ascendant.

N. 4. Mercurium sublimatum admisto arsenico fucari solere vulgo notissimum est; at quantum inter hujusmodi sublimati & ejus quod fideliter præparatur operationes discriminis esse valeat, non tantum in metallis, sed etiam in humana corpora (nempe cum mercurius dulcis aliaque medicamina ex eo conficiuntur) vix illi facile concipient, nisi quibus facultates Arsenici hominibus æquæ ac metallis noxiæ innotescunt. vid. *Nobiliss. Robertus à Boyle in tr. infidus successus experientiarum* p. 84. Sed arsenicale vitus in ære agnoscitur, si aliquid ol. Tartari per deliq. superfundatur, & mercurius sublimatus nigrescat, adulteratus est arsenico, sin verò flavescat, probus utique est.

Optimum mercurium dulcem conficies ex mercurio sublimato regulino, & mercurio antimonii) Ex eodem fonte promanat *Cl. Riverii Anti-quartium*, quod componitur, ex triplici Hercule (mercurio, Sale & vitriolo) duodecim laboribus h. e. sublimationibus ad summum nobilitatis gradum evecto. Quibus tamen Quartus Athleta additur, operis complementum efficiens (Mercurius vitæ, eo modo, qui ab *Autore Cl. Riverio* in instituitur. *Medic. lib. 5. part. 2. s. 1. p. 1. cap. 12.* describitur correctus) commiscetur itaque ex mercurio dulci duodecies sublimati & mercurio vitæ.

Recip. Mercurii sublimati superius edocti q. v.

Argenti vivi vel purgati, vel ex antimonio præparati inferius descripti q. v.

Misce exactissime in mortario lapideo vel ligneo cum pistillo ligneo, ut mercurius vivus non amplius appareat, & sublima s. a. sublimationem hanc duodecies reiterando.

Recip. Hujus mercurii dulcis part. 4.

Mercurii vitæ part. 1. seq. modo præparati.

Recip. Mercurii vitæ q. v. pone in patinâ terreâ vitreatâ supra foculum mensatum aut furnulum exiguum semper movendo. Fumus exhalat ater & foetidus, qui venenositatem intus latentem continet & illa operationem continuando par. 2. vel 3. horas tota absumitur. Peractæ sufficienter operationis signum est, quando nullum emittit fumum. Si post istam operationem vomitum adhuc cieat, iteranda & optatum habebis effectum, sit pulvis colore griseo. Hujus vires, usum & dosin vide in *Cl. Riverii observationibus*.

N. Ex mercurii dulcis præparatione etiam innotescit, quomodo salia corrosiva beneficio mercurii ob variam partium texturam & figuram singularemque potestatem miscere & in tertium quid transire queant.

Vires. Omnes humores noxios & c.) An mercurius dulcis sit universale purgans & panchymagogum minerale disceptatur inter Chemicos? Nos negamus; Interim negari nequit, in Lue venereâ ad salivationem excitandum mira præstare, cum alioquin notum sit, præcipuam hujus mali curam in salivatione consistere, cum illa omnes impuritates ipsius etiam ossibus infiltras eluere & extrahere possit. Et admiratione dignum in

hoc mercurio dulci, in aliis affectibus nullam salivationem excitare, si rite præparatus fuerit, nisi in corporibus Lue hæc infectis. Unde & infantibus utò exhiberi potest à gr. iij. iv. v. vi. vii. &c. modò cum aliis purgantibus colliquativis non misceatur, quia lia scammonia, colocynthiaca &c. præsertim in vermibus, scabie, &c.

N. Non desunt, qui mercurii dulcis correctionem per sublimationem super scorias æris instituant, vel per sp. salis fortissimi affusionem trinâ vice cohobando, & acquiritur optimè rectificatum mercurium dulcem.

5. *Alius. Recip. mercurii in spiritu Vitrioli soluti &c.*)

Hæc etiam egregia est præparatio, ad usum medicum tam internum quàm externum commendabilis, eo quod absq; sp. nitri, cum sp. vitrioli solum præparata sit.

N. i. *Eodem modo dulcescit & mercurius præcipitatus luteus.*) Verùm difficulter procedit sublimatio cum hoc præcipitato luteo, dum cum ol. Tartari præcipitatus est, quod sublimationem salium impedit, ut nudus solùm mercurius meteorisetur.

2. *De Usu. Ex omnibus hisce mercurii dulcibus potest parari una utilissima.*) Cum hæc aqua ulcera luis & necre maligna optimè curantur, si una aliquid mercurii dulcis in decocto calc. viv. & inflammationibus sacchari huius addatur, & externè applicetur. Valet ad scabiem, nec ullam infert noxam, nec tepellit, ut vulgaria linimenta & unguenta.

7. *Lanugo perlata sive flores Mercurii argentei.*) Melius fort. quàm aq. reg. substituitur, cum hæc nimis acris & corrosiva sit, illa autem ex Vitriolo & sale, non nitro confici debet, neque ex sale, non nitro confici debet, neque ex sale & nitro; ideoque seq. modo melius paratur.

Recip. Mercurii vivi optimè cum Sale & Acet. dist. purificati & per corium trajecti & expressi ℥ i. aq. fort. ex Sale & Vitriolo ℥ iij. commistæ stent in loco frigido, donec coaguletur prius instar crystalli, ubi aliquam partem vides congelatam, crystallos exime; reliquum repone, idque tamdiu, donec nullos amplius crystallos emergere cernas. Crystallus hosce omnes collectos contunde, affuso ol. Tartari optimè parato, donec fiat instar pulcullæ nec spumofum amplius appareat; Tunc superfunde aquam pluvialem & latam, ad 3. digitorum eminentiam ponatur in digestionem cinerum tepidam, per 3. vel 4. o. aquam cum ol. Tartari filtra. Relictum Mercurium in chartâ loco tepido vel ad ☉ exicca, denuò effunde ol. Tartari ac procede ut antea, hocque ter. Tandem affunde Acet. dist. & similiter repone ad digerendum calore forti Vir. ær. per triduum, filtra, idque etiam tertiâ repere vice. Ultimo aquâ pluviali & latâ edulcora, filtra & flores Mercurii in filtro restantes leniter exsiccatos reserva usui. Dos gr. iij. vel iv. purgant per alvum lenissime & pro humorum redundantia copiose absque ulla vomitus suspitione in formâ pilul. in febribus inveteratis quotidianis, scabie, &c.

8. *Mercurius præparatus rubeus non corrosivus. Arcanum Corallinum*) Hic mercurius non adeo est in usu interno, sed tantummodo externè adhibendus est, cum calc. viv. decocto.

9. *Modus, compendiosior, Laudanum Mercuriale, sive metallicum*) Extrahendus est sal. com. ex Cap. mort. fort. quæ ex Nitri & Vitrioli æq. part. fuit destillata; Hujus Salis Recip. ℥ v. vel vi. eique imprimatur sub continuâ agitatione per corium vervecinum Mercurii vivi purgati ℥ i. vel ij. conterendo diu in mortario vitreo, quousque prius vivus non amplius conspiciatur. Hinc sublimetur gradatim in alembico, & ascendet primo luteus, secundo croceus, tertiò rubi undus, quem separatim serva Dos gr. iij. iv. v. in lue venereâ.

10. *Manna mercurii seu Mercurii dulcis Olaris*) Dicitur ab *Hartmanno* aquila Mercurii Olaris, ipique in secreto fuit.

Opi.

Optimè autem præparatur ex part. iij. Gr̃ii dulcis sæpius per Δ ationem evecti, donec in crystallos albissimos abierit, & optimæ \odot calcis vel per tritum, vel ad modum Cl. Zvvelferi confectæ part. 1. miscendo ac digerendo per mensem cum cohobatione, donec in cucurbitâ instar ceræ fluxerit. D. Hartmannus hoc etiam pueris præscripsit, & summæ est energię in Lue Gnereâ, scabie, aliisque corporis impuritatibus, item in epilepsiâ in primis à vermibus ortâ. Eiusdem est sortis Nobil. Zvvelferi mercurius \odot laris dulcis in mantiss. Spagyr. p. m. 315.

11. Arcanum Corallinum correctum S. Closs. (Hoc optimè etiam succedit, nec ullâ indiget encheirisi.

12. Ad Δ atum pertinet quoque Cinnabari Officinæ artificialis.) Exatissima etiam est hæc compositio. Liqueunt scil. Sulphuris z viii. & immisceantur illi Gr̃ii vivi ss j. & z iv. Ex his mixtis fiat Δ atio & acquiritur cinnabari artificialem. Hæc in Italia ad suffumigia, emplastra & unguenta contra Luem Gneream adhibetur. Internè autem loco cinnabaris antimonii adhiberi nequit: Licet non desint, qui, dum specificum cephalicum Dn. D. Johann. Michaelis conficere volunt, loco cinnabaris antimonii officinarum cinnabarim substituunt, sed non sine miserandâ mortalium clade, Sulphur enim antimonii, ex quo cinnabaris Gr̃ii cum mercurio constat, naturæ est \odot laris; Artificialis verò seu officinalis cum Sulphure communi parata sæpè arsenicalis. Si verò quis mercurium vivum desideret purissimum, illum ex hac officinatum cinnabari elicere potest, qui postmodum in medicinâ egregium utique sortietur locum. Alias quidem ex observatione constat, septuagenarium fuisse à pueritiâ cinnabaris confectorum, qui ad levem contractum vel appensum ducati illico illum dealbare potuerit.

13. Panacea Gr̃ii purgans.) Si Gr̃ius vitæ à salibus exquisitissime liberatus fuerit, non succedit hujus panaceæ elaboratio nisi butyrum Gr̃ii eum Gr̃ii vivi conubio sumatur, sed tunc ob vim corrosivam suspectum erit medicamentum. Seq. autem modo commodius conficitur. Recip. Gr̃ii dulcis z iij. reguli Gr̃ii z i β . misce exactè & in pulverem super porphyrite diu conterendo redige, quibus deinde cucurbitâ vitreâ immixsis adde sp. virioli opt. z iij. digere triduo vel quatuor in cinetibus calidis, deinde ex Aren. destilla & abstrahatur tota humiditas ad pulveris siccitatem, ex quo cum sp. vini Tartarisato extrahe tincturam, & spiritus tincti omnes in MB. ad siccitatem pulveris rubei abstrahantur, qui asservetur.

Dosis ejus est à gr. iij. iv. ad v. in morbis diuturnis chronicis, obstructionibus, & febribus abigendis, item in melancholia hypochondriacâ, ictero, & Lue Gnereâ curandâ efficax est remedium Hofmannus.

IV. Destillatio.

1. \odot Gr̃ii. Mercuriale, seu Butyrum Gr̃ii: Liquor gummosus.

Δ . Gr̃ii pariss. Δ ti ana Misc. exactè in mortario lapideo destillentur per \odot m vitream ex Arena Δ primo mediocri: sic liquor seu butyrum antimonii instar glaciæ egreditur, qui si concreverit in collo, ne id obruat admove cautè carbonem, ut liquecat. Finitâ destillatione liquoris, auge Δ , daque ignem suppressionis, [id est, supra Δ m,] & sublimabitur cinnabaris antimonii, [de qua vide suo loco, in sublimatione antimonii:] Liquorem egressum rectifica per retortam vitream.

N. 1. Præstat hoc \odot Cinnabari suâ ante rectificationem impregnare. Nimirum, Cinnabarim tritam adde dicto \odot o stentque in digestionem (hor. 24.) vitro clauso in cinere, sic fiet unio, hinc rectifica per \odot m.

N. 2. Felicior procedit destillatio Δ aperto, sed sensim

& successivè aucto. Item si \odot m cum materia ante destillationem in cellam per triduum reposueris.

N. 3. Alii Δ . Reguli & merc. Δ ti ana, singula seorsim trita miscent, & ut concretionem in collo præcaveant, ad liquefendum in cella reponunt, Liquoremque deinde destillant.

N. 4. Beguinus eodem modo ex merc. Δ ti p. ij. Δ . li. mat. p. 2. \odot o e'icit, unde pulvis fit præcipitatus, quem vocat Δ diaphoreticum, vide in Δ .

Vires. Usus hujus glaciæ per se est externus solum, in gangræna & sphacelo, in quibus si pars mortua illinitio- ne hujus Olei circumlinatur, non serpit ulterius putredo, sectione felicius peragitur. Simili ratione Carbunculus pestilentialis oleo hoc circumlitus paulatim emoriendo excutitur, adeoque aptus redditur, qui postmodum Emplastris aliis obediat. Usitatum itidem corrosivum Chirurgis existit. Schroderus.

4. Destillatio 1. Ol. antimonii mercuriale, seu butrum antimonii; Liquor gummosus.) Quo purius est antimonium & Gr̃ius Δ -matus fuerit albus crystallinus exquisitè bonus, eò etiam præstantiora fiunt medicamina ex butyro antimonii præparata. Alias exacta & accuratâ etiam est descriptio butyri antimonii ab Autore Nostro tradita.

N. 1. Destillatio etiam per retortam fictilem institui potest optimè lutatam amplioris colli, & tunc non ex Aren. sed Δ ne aperto, adaptato recipiente per gradus destilles, alias metus est, ne si butyrum ibi congelet, vas rumpatur, laborque & sumptus irriti fiant.

N. 2. Da Δ nem suppressionis non statim in Δ ationis principio, sed postquam aliquandiu operatus fueris, vel potius in fine.

N. 3. Qui ante rectificationem butyri antimonii cinnabarim addunt, egregium utique acquirunt butyrum antimonii, quod revera Gr̃iale est multique in morbis v. g. apoplexiâ, epilepsiâ, aliisque gravissimis affectibus valdè proficuum est. Et hic modus merito inter arcana reponendus, unde elegantissima utique bezoardica acquiruntur, quæ in officinis non reperiuntur. Alias qui cinnabarim non addunt antè hujus ol. rectificationem Medicamentum acquirunt saltem antimoniale non Gr̃iale. Scilicet cinnabaris Gr̃ii trita butyro admixtâ ster in digestionem per 24. horas vitro clauso in cinere, sic fiet unio, & postmodum per retortam rectifica.

N. 4. Felicior etiam procedet Δ latio, si retortam cum materiâ antè Δ lationem in humidum locum per triduum reposueris; optima erit encheirisi, adeo, ut si magnam butyri copiam ad mercurium vitæ vel etiam ad alia bezoardica desideres, massam antè Δ lationem in cellam repones. Si verò cinnabarim quis in majori copâ habere intendat, statim post mitionem instituat Δ lationem.

N. 5. Egregiâ quoque ratione loco antimonii crudi Regulus antimonii substituitur, quia sic purius & efficacius impetratur bezoardicum: Sic etiam qui in præparatione antimonii diaphoretico loco antimonii crudi substituant ejus regulum, medicina melioribus nobilitatam virtutibus acquirunt. Sumi autem potest vel regulus \odot ialis, jovialis &c. de quibus infra plura.

Vires.) Ol. hoc carbunculo pestilentiali illitum extrahit venenum, ne ulterius serpat. Ante omnia autem observetur, ut locus accuratè muniatur emplastris convenientibus. Adhibetur etiam ad fonticulos, ita ut lignum quoddam hoc ol. impregnatum in globulum efformet, eoque locum fonticulo applicando aptum tangat, hæc tamen cautelâ, ut locus muniatur emplastris usitatis defensivis, ne vi suâ causticâ serpat ulterius, atque sic ol. illud carnem absque molestia & dolore exedit. Hofmannus.

Ex hoc \odot o fit & Merc. vitæ & bezoardicum minerale.

I.

Mercurius vita.

℞o præcedenti sive Butyro ☿ ii, infunde aquam, ac statim pulvis albus præcipitabitur, qui abluatur donec nullam amplius acrimoniam sapiat, deinde excetur.

N. 1. Candidior ac purior erit, 1. Si ad destillationem Butyri, loco ☿ ij crudi, regulum ejus receperis. 2. Si per Omillud rectificaveris.

N. 2. Appellatur ☿ Pulvis Angelicus, Pulvis Algoreth, Aquila alba.

Vires. Totius corporis, ☿ præcipue prima regionis humores noxios, per secessum ac vomitum expurgat, usque insignis est in Peste, Capitis morbis, Lue venerea, Ulceribus malignis, Febris, Arthritide, Hydrope, ubi ☿ ut plurimum sine vomitu operatur.

Dosis à gran. ij. ad iv. Macerare quoque licet gr. ij. ad iv. in haustu vini, eumque filtratum exhibere.

Sunt qui infusionem Mercurii vitæ in promptu habent.

Nimirum.

℞. ☿ vitæ Dis. vini generos. ℥ xviii.

Dosis ℥ j.

N. 1. Vulpurgatrix hujus merc. ut ☿ vitæ ☿ ij. nunquam exhauritur.

N. 2. Triduanum ejus usum saepe providentiam an periculosam exstitisse compertum est, cavendum itaque nimium ejus usus.

Croll. Senn. in Instit. Bequin. (qui ℞ ☿ p. i. ☿ p. ij.) Sala in Ternar. Emer. Kest. 1. c. 26. Tentzel.

Quia autem hic Mercurius vitæ sat violenter operationes suas, ac imprimis per vomitum perficere solet, solliciti fuerit Medici de hac violentia certis modis corrigenda, deque vi ejus vomitoria mitiganda.

Hinc

1. Mercur. vitæ correctus.

℞. Merc. vitæ in phiala Δ atenæ fove, donec rubere inceperit, postmodum V sapius ab eo abstrahere.

Vires. Purgat sat commode per alvum, impuritatesque quasvis educit.

Dosis g. 4. 5. 6.

2. Merc. vitæ Catharticus.

1. Merc. vitæ cum Sal. comm. aliquoties diutiusque teratur, & saliedo postea per ▽ commun. abluatur; sic solam vim per secessum purgandi obtinet. Hartm. Senn. Tentzel. Agricola.

2. Sal. nit. ad Δ fuso adde mercurium vitæ sensim injiciendo & agitando; post refrigerationem, Mercurium in fundo instar Reguli invenies, quem edulcora.

Alii hanc correctionem paulò aliter absolvunt.

Unde

Laxativum minerale.

Fit, si Sal. nit. fusi ad Δ. ☿ ij. Mercurii vitæ, ℥ss. citius, vel ℥j. paulatim injeceris: & postea omnem falsedinem Vā ablu. ris. Pulveri huic exiccato denuo adde Sal. commun. duplum & tere diligenter in marmore per horas duodecim. Tum rursus aquâ dulci elue.

Dosis à gr. 6. ad 12.

N. Injice primo ℥j. atque cooperi statim, donec fumus cesset, post perge injicendo ℥j.

N. 2. Habetur egregius ☿ jus vitæ ☿ arii per inferiora purgans in Anatomia ☿ ij. Untzeri, qui fit ex Oleo mercurii ☿ u Sal. nit. super calcem ☿ affuso, donec Tincturam attrahat quod post madum cum ☿ co aut ☿ Turc. præcipiatur. Schtoderus.

1. Mercurius vita.) Hic nihil aliud est, quàm delicatissima ac tenerissima stibii prætes in Butyrosolum liquamen aut gummosum glaciem resoluti, id quod reductio edocet, & quod butyrum ☿ nii & mercurius vitæ absque ☿ nato fieri possit, Quando vero mercurius vitæ additâ cinnabari ☿ nii paratur, tunc quodammodo mercuriale medicamentum emergit. Non desunt, qui Cl. Helmontii parallela de Lilio & mercurio vitæ, qui insensibiliter fermentorum peregrinorum immutatione, absterfione, & ablatione, ac sequenti spirituum seu virium restauratione potens est, ad hunc vulgarem emeticum cogunt, quem tamen cum aliis hujus farinæ purgantibus Cl. Helmontius planè damnat, & ex Medico foro exulare jubet.

N. 1. Nisi butyrum ☿ nii per sæpius repetitam rectificationem à suis impuritatibus probe purificatum sit, flavus fieri solet, ut ingentia damna corpori inducat, & ex mercutio vitæ sæpe mortis fiat Mercurius.

Usus insignis est in Peste.) Ego ob vim suam emeticam nemini sualetim usum eius internum in Peste, feliciori autem cum successu in lue Venereâ, in primis cum vitiosorum humorum saburra stipatâ, & cum Mercurio dulci mixtâ ad Anti-quartii Riveriani supra descriptum processum. Item in scabie, febribus intermittentibus, inveteratis, & Arthritide nonnulli utuntur. At cum mihi benigniora alia suppetant remedia, ejusmodi drasticiis nunquam usus fui, nec usus ero, dum vixero. Mirantur quidam, quod hoc violentissimum pharman in hydrope adhibitum ratò per superiora, ut plurimum verò per inferiora hydropicorum aquas educat. Sed qui novit beneficio salium acidorum volatilitatem purgantium figere, ita ut saltem per inferiora purgent, hic facile etiam hujus rei rationem reddere potest, siquidem acidofalsæ aquositates in hydropicis abundantes hanc vim pariter exerceere poterunt. Dosis est à gr. ij. ad iv. P. I. Faber etiam ad gr. xii. præscripsit, summo tamen ægotantium cum periculo, nec velim quemquam facile imitari, nisi fuerit in infuso, cum sic tutius non solum usurpetur, sed etiam suas vires ed melius exerit; nam in substantiâ adhibitus facile hypercatharsin excitare potest, quia illius pulvis citissime tam in intestinorum, quàm ipsius ventriculi plicis sese insinuans tandiu purgat, quamdiu ibidem retinetur, imò ex observationibus constat, tantam vim colliquativam sæpe exferuisse, ut post obitum etiam nonnullis fæces alvinas extorserit.

N. 1. Vis purgatrix hujus mercurii, ut ☿ vitæ Antimonii nunquam exhauritur.) Hæc quia ejusdem sunt prolapæ, unde ex mercurio vitæ etiam vitium antimonii conficitur, de quo vid. supra, eundem etiam sortiuntur effectum; Antimonium enim est quasi chaos, abyssus & favissa inexhausta largissima spirituum mineralium.

Hinc 1. Mercurius vitæ correctus.) Hujus genuinam correctionem vide supra, ubi tradidi Cl. Riverii Antiquarium de mercurio dulci. Hic correctus coloris grisei esse debet.

2. Mercurius vitæ catharticus. Nitri. ad Δ fuso adde mercurium vitæ &c.) Si scilicet nitri ℥ iij. in Crucib. Δ ne aperto sed moderato fuso mercurii vitæ ℥ ij. sensim ac pedetentim injiciantur, ac per semihorulæ spatium in Δ ne detineantur; Hinc elixivatio nitri per repetitam Vā f. affusionem probè edulcoratus pulvis usui asservetur. Ex eodem fonte promanat etiam tertia correctio, Laxativum minerale dictum: Nisi autem justam nitri dosin adjeceris, habebis diaphoreticum.

N. 2. Habetur egregius mercurius vitæ ☿ laris ☿ c.) primò ol. mercurii vitæ sive butyrum Antimonii & spirit. Nitri accurate misceantur; Deinde digerantur aliquandiu, ac postea destill. ut fiant homogeneum menstruum. Hoc affundatur calci vel foliis ☿ rium

rium digitorum circiter altitudine, & solutio per duas digestionem procuranda, vel per modum Tincturæ, vel per nudam solutionem, abstractâ humiditate aliquali reliquum aquâ communi diluendum, vel ol. Tartari vel * præcipitandum est.

N. Mercurii vite gemina præparatio pro Pilulis Benedictis Jos. Quercetani seq. est,) Rec. Animonii crudi el. Vitrioli parum calcinat. & pulveri. salis marini decrepitat. aa. part. æq. redige separatim in pulverem, mixta pellantur per retortam, ignem secundum gradus regendo, exibat aqua clara, & coagulum albidissimum ac pellucidum, quod in fundo residet, rectifica per retortam vitream, aquam separa à coagulo, quod aquis cordialibus frequenter abluatur, donec omni fetore & vi sua corrosivâ spoliatum redigatur in pulverem subtilissimum, albidissimum. Hofmannus.

II.

Bezoardicum Minerale.

1. ☿ Diaphoreticum Crollii seu Bezoardicum Minerale simplex, seu Officinarium.

℞. Butyr. ♂ii rectificat. c. g. ℥iv. affunde guttatim ~ Sal. nit. rectific. ℥iv. (alii ~,) abstrahere deinde ~ Sal. nit. iterumque affunde ~ Sal. nit. novi ℥j. idque tertiâ vice repetatur. Præcipitatus hic postea teratur, abluatur & igniatur.

N. Crollius butyrum hoc facit ex ♂ii p. 3. & ☿ ~ti, nempe ☿ ~ti parati per ☿m & Sal. com.) p. 1. sed sufficit proportio anatica.

Vires. Magnum est Alexiterium saluberrimumque remedium Bezoardicum, quod sudores provocando magnos effectus monstrat in omnibus pestilentialibus & venenatis affectionibus.

Dosis à gr. 6. ad 12. vel ultra.

Quercet. in Pharmacop. restit. Croll. Sennert. Institut. Kester. 1. cap. 70. Hartm. in pract. ut ☿ in Croll.

De Controversia: Utrum Medicamenta ex butyro ♂ii facta sint Mercurialia, an ♂ialia; legat qui velit Tentzelium in Exeg. titul. de Bezoard. Salam. in Ternar. Bezoard.

Probabilius videtur, naturæ id esse ♂ialis;

2. Bezoardicum ☉lare compositum.

℞. Bezoard. mineral. solar. ℥j. Sal. Rut. Guajac. ana ℥ij. solut. Corall. rubr. ℥i ℔.

Misc. optimè per horam in mortario vitreo.

Hinc adde subinde

Spir. sulphur. ℥℔. Tinctur. l. extract. Croc. or. ℥℔. Ol. caryophyll. succin. cinamom. ana ℔j. Lap. Bez. or. ℔℔. vel ℔j. si placet.

Stent in cinere repido, clauso vitro, ☿. 3.

N. 1. Bezoardicum minerale solare ad datam compositionem fit.

1. ℞. Butyr. ♂ ℔℔. ☿ factit. præparat. (vel ☿ ☿.) ℥j. F. solutio in Phiala oblongi colli, Δ arenâ n. c. diocri, (ut leniter bulliat,) sic rubescet Solutio. Hinc affundendo ∇ calidæ ℔℔ aliquot, & ~bitur ☿ albus, quem decantato sensim liquore flavescente, eadecora optimè in ∇ abluendo, tandem exicca blando calore solis vel hypocaufti.

2. ℞. ☉ Ungar. laminar. ℥ij. solve penitus in ℥ij. ∇, destillatæ ex ∇, cum s. l. com. 1.) Hinc abstrahere ∇, cohobaque vicibus 4. Dein solve denuò: Solutionem funde super pulveris prioris ℥ij. digere hor. vigint. postea abstrahere sensim, cohobaque vice tertiâ. Tandem auge Δ ut ~ ∇ prorsus evanescant Postmodum affunde ∇ cumque aliquoties iterum abstrahet sic paratum Bezoard. miner. solare.

N. 2. Solutio Coralliorum fit.

℞. * Purificati, (id est sublimati 1. à tantundem

sal. com. decrepitati, 2. sine sal. com. per se,) Corall. rubr. pulv. ana ℥℔. Misc. & ~ a denud: sic elinquetur in fundo ~torii Calx Corallorum, quæ in pone supra tabulâ vitrea ad liquefendum. Residuum quod in solutione supererit, denuò cum * purificato submittit sublimationi & solutioni, donec tota Corallorum substantia sit soluta.

N. 3. Tinctura Croci fit cum ∇i, quæ iterum abstrahitur ad consistentiam mellis.

Vires. Sudores valèdè ciet, adeoque confert in Apoplexia, Paralyse, Arthritide, Podagra, Tremore artuum.

Dosis à gr. 4. ad 8.

Ex communicatione Affinis mei colendi, Dom. Johannis, Graferi Chymici industrii & Pharmacopœi hujus Reipubl. meritiissimi, qui & hoc inter Chymica sua extrare voluit.

3. Bezoardicum Solare Crollianum.

℞. Butyri ♂ii ℔℔. solve affundendo sensim ~ sal. nitri.

℞. ☉ fin. ℥℔. solve in ∇.

Utramque hanc solutionem claram confunde, abstrahereque menstruum gradatim, abstractum iterum affunde, cui adde ~ sal. nitri. nov. ℥j. abstrahere, idque repete aliquoties.

Calx hæc du'coranda & ignienda est.

Vires. Vires hujus Bezoardici summis Crollius effert laudibus in Lue venerea, Peste, Podagra, hydrope, Febribus, obstruct. Lienis.

Dosis gr. 3. ad 8.

N. Hoc Bezoardicum licet suis haud careat viribus, tamen ob corporeitatem, quam ☉ adhuc obtinet, præstantius censetur quod sequitur. Viaticet.

4. Bezoardicum Solare verum.

Fit eodem ferè modo.

Nimirum.

Si loco ☉ illius corporei, substituatur ☉ in spiritualem substantiam exaltatus: de qua exaltatione vide in ☉lu Volatilisatione, vel Tinctura ☉.

Nempe.

℞. 1. ☉ illius spiritualis ℥℔. solve in ∇.

2. Solve in eadem butyri ♂ii rectific. ℥iv. [vel ut alii vi.] utramque solutionem confunde, abstrahere menstruum per ☉m, destillationibus sæpe repetitis: Postea per calcinationem sub tegula, (unter einen Aufsel, under a covered crucible, onder engedeckte smeltkroes,) reduc in ☿rem violaceum, si lenis, vel in purpureum, si intensior calcinatio instituitur.

Vires. Vires easdem obtinet, quas prius, sed efficaciores.

N. 1. Hartman in Croll. Sennert. in Institut.

℞. Aurum (per ~m nitri bezoardicum,) spirituale redditum, junge cum butyro ♂ii, in ~u nitri vel ∇ soluto repetitis destillationibus unientur ac figentur: abstrahere tandem & habebis interveniente calcinatione Bezoardicum solare purpurei coloris magnarum virium.

Dosis eadem quæ priorum, à gran. 2. ad 10.

N. 2. Tentzelius solut. i nem illam ☉ oleiformem educat, supersundendo & abstrahendo aliquoties acetum forte. Postea extrahit Tincturam, Menstruo Basilii affuso digerendo per mensem, &c.

Hinc

℞. Tinctura hujus à menstruo separata p. 1. Butyr. ♂ii in ~ nitri solut. p. vj. vel viij. Miscet ac unit cohobanda ultimo calcinat.

5. Be.

5. Bezoardicum Lunare 1.

℥. Butyri ♂ nī in ☿ nitri. solut. ℥ iv.
Tinctur. ☿ viridiusculæ ℥ β.
Junge ac destillando aliquoties ad siccitatem fige.
Vires. Bezoardicum hoc viridiusculum utilissimum est,
ad capitis affectus præsertim ad Erysipelas capitis muliercu-
larum.

Dosis à g. 6. ad 12.

Tinctura ☿ fit

☿ in solvendo in ☿, hanc rursus abstrahendo, &
Tincturam per ☿ i extrahendo vide suo loco.

6. Bezoard. Lunare 2.

℥. Extracti Cœrulei ☿, (ex ☿ cum Sulph. calci-
nata per ☿ m urinæ extracti,) soluti in ☿ p. i.
Butyri ♂ ii, itidem in ☿ soluti p. x.
Junge ac destillando vel circulando uni.
Habes Bezoardicum Lunare ejusdem, vel etiam
majoris virtutis.

7. Bezoardicum Lunare 3.

℥. Extracti seu Tincturæ ☿, (mediate ☿ extra-
ctæ ex ☿ in ☿ soluta & instillatione ol. Tart. p. d.
præcipitata.)
Et Butyr. ♂ ii, procede ut supra.

8. Bezoard Lunare 4.

Præstantissimum fit Bezoardicum ☿, in ☿ cum
☿ tu Sal. nit. in ☿ m redacta & cum butyro ♂ ii, ☿ a,
in pulverem fuerit fixata.

9. Bezoardicum venereum.

Ex squama ætis elicitur Tinctura cum butyro ♂ ii
rectificato, dein figitur per ☿ m Sal. nit. ut in prio-
ribus dictum.

Bezoardicum ☿ iale.

Ex croco ☿ per reverberationem extrahe cum bu-
tyro ♂ ii. Tincturam dein fige per ☿ m Sal. nit. mo-
re usitato.

Vires. Est specificum in omnibus fluxionibus ventris,
præsertim ab Epate originem capientibus.
Scheunemann. in Hydromant.

11. Bezoart. ☿ iale.

℥. Reguli ♂ ii sine ☿ facti ℥ iij. huic fuso, (in ☿
bulo,) adde Jovis Anglici puriss. similiter fusi, ad ℥ ij.
ut fiat de novo Regulus postea læviga, & admisce di-
ligenter ☿ ti, ℥ v. Destilla ex ☿, Butyrumque in-
de destillatum cum ☿ u Sal. nit. ternis destillationi-
bus fige, postea calcina, ignitumque in ☿ extingue, &
exicca, fit pulvis gryseus.

Vires. Potentissimè movet sudores, insuper ad obstru-
ctiones Epatis Polychreston non contemnendum est.

Dosis à g. 2. ad 6. vel 8.

12. Bezoard. ☿ ninum.

Cum Butyro ♂ ii non rectificat. extrahe Tinctu-
ram ex vitro ☿, atque cum ☿ u Sal. nit. dicto mo-
do fige.

Vires. Prodest in affectibus Lienis.

Dosis ad g. 6.

N. Vitrum ☿ i fieri potest ex minio & silicibus.

13. Bezoard. Mercuriale.

Fit eodem modo quo Bezoardicum Saturni, ex vi-
tro scil. ☿ ii vitæ & butyro ♂ ii.

De omnibus hisce Bezoardis legi potest Hartman. in
Coll. Tentz. in Exeg.

Nos ad destillata revertimur, inter quæ sequitur,

2. ☿ seu ☿ ☿ ii album diaphoreticum.

℥. ☿ ti tenuiter pulverisati p. i. Argillæ turb.
p. iij. Misc. & fac cum ☿ communi globulos in um-
bra exiccandos, destilla dein ex ☿ vitrea per Are-
nam ☿ e suppressionis, (gradatim tamen) horis dua-
bus adhibito, prodit elegans ☿, quem serva.

N. Si quid ☿ ii sublimetur, cum recenti argilla misce, &
procede ut antea.

Vires. Diaphoreticum est. Dos. gr. i. 2. 3. vide spiritum
sequentem.

Rhenan. chymotech. l. i.

3. ☿ seu ☿ ☿ ii rubrum.

℥. ☿ ti, tenuiter pulverisati, Limatur. ☿. ana.
Misc. ac resolve per deliquium in ☿ flavum, quod
diligenter collige. Residuo (quod non solutum,) af-
funde ☿ m comm. ac extrahe Sal. Sal purificatum &
coagulum denuò ☿ o junge, fietque autem vel cro-
cei coloris. Destilla in Arena ex cucurbita humili per
☿ brevis rostri, primò exibat phlegma, quod seorsim
colligatur, auctiori deinde ☿ ascendit rubedo,
quæ partim in excipulum (quod mutatum sit,) destil-
labit, partim in ☿ o & rostro, butyri instar adhæres-
cet. Urge ☿ m, donec nihil amplius ascendat, tunc
cessa.

Phlegma destillatum unà cum rubedine ad spondi-
lia cucurbitæ elevata, redde capiti suo mortuo, reite-
raque destillationem per ☿ eundem, vix incalescente
☿ bico, (imo vel à vaporibus,) liquecet rubedo in ☿
☿ hærens, extillabitque rubicundissimè in Excipu-
lum: postquam rubedo hæc extillavit, mutato Excipu-
lo suscipe phlegma subsequens, ac postea rubedi-
nem reliquam igne auctiori, ut antè collige, idque re-
pete tot vicibus, quot opus fuerit.

Vires. Utriusque hujus spiritus magnus est usus, in pri-
mò verò rubei; expediunt per sudorem quodcunque in cor-
pore noxium fuerit, aliisque Medicamentis difficulter cedit.
In Luc Gallica pustula hujus usu sponte cadunt, tubercula
minuuntur, dolores sopiuntur, ulcera fetida manantia
exiccantur & consolidantur.

Dosis gr. i. 2. &c. in ☿ Theriacali mistura simpl. ☿ u
Guajaci, Decocto & simil.

Hartm. in præct.

2. ☿ Mercurii diaphoreticum dulce.

℥. ☿ ti q. v. solve in ☿, digere ac abstrahere ☿
ad siccitatem, residuum in ☿ digere cum ☿ rectificatiss.
donec fiat crassus liquor. Hinc destilla ex Are-
na ☿ forti & prodibit liquor instar lactis. Lacteam
hunc liquorem reafunde materiæ in fundo relictæ, de-
stillaque denuò. Sic extillat ☿ album ac fragrans sine
corrosione. Kest. lib. 3. c. 30. lib. 4. cap. 35. vide etiam
Liquores Mercurii.

N. Alii contenti sunt solâ digestionem ac destillationem cum
☿ per acta Kest. lib. 2. cap. 29. lib. 4. c. 34.

Vires. Curat ulcera maligna, cancrofa, præsertim Re-
num & Vesicæ.

Usus tam internus quam externus est.

5. Oleum fragrans, Astrum dictum.

℥. Mercurii septies sublimati, totiesque per Cale-
viy. rectificati, q. v. solve in ☿ Sal. nitri calore me-
diocri: dein abstrahere ☿ m Sal. nitri, edulcora optime
coquendo in ☿ ut corrosivus sapor eluatur: postmo-
dum abstrahere quoque ☿ & denuò elue, affundendo
☿ m pluviam stillariam, hinc exicca, & digere ali-
quamdiu cum ☿ rectificatiss. ana. Postea pelle simul
per ☿ m ☿ initio leni, dein fortiori: corpus residuum
serva pro conficiendo inde sale: Extillato verò deme
☿ in MB. Et reman. bir in fundo Mercurii fragrantis-
simum, quod Astrum Mercurii. Basilus.

Vires

Vires. Diaphoreticum est & peculiare curativum Luis venerea: easdemque vires obtinet, quas Sal Mercurii ex corpore residuo paratum, vide infra.

6. Aliud Oleum Merc. diaphoreticum fragrans.

℞. Mercur. ℥i p. i. * fixi, (in liquorem, p. d. redacti & mundificati,) p. iij. solve p. d. Liquore imbua-
tur charta bibula: Charta sic perfusa mattracio vitreo
includatur cum suo XX & recipiente: destillando liquo-
rem Mercurialem igne arenæ elice. Hunc si rectifica-
veris, dulcissimum odorisque fragrantissimi ac gratissi-
mi, moschum redolentis nancisceris oleum.

Vires. Aptissimum est in saporibus ciendis.

Quercetan. in Terrard. In descriptione Panaceæ antimo-
nialis.

7. Oleum Mercurii Saccharatum, Spiritusque.

℞. Merc. ℥ p. j. Sacchar. p. iij. Misc. optimè ac de-
stillata per Om vitream luto obductam in receptac. ca-
pac. Primò accende paulatim carbonem supra Om,
ut calefeat: hinc accende & infra ac continua ignem
lentum dies 2. aut 3. Quod extillavit committe destil-
lationi MB. Exhibit ~ Mercurii subacidus, & o Sac-
chari remanente in fundo.

N. Lentè procedas memento, ne operam ac oleum per-
das. Saccharum enim astu nimio irritatum, vi sibi exitum
quarere solet.

Ufus. In Ulceribus Vesicæ, aut aliis Affectibus, ex morbo
Gallico relictis, magni est solatii.

Dosis: spiritus exhibetur gut. 3. 4. Schroderus.

2. Bezoardicum minerale.) Hoc ab Antimonio dia-
phoretico non realiter, sed modi præparandi ratione
differt, nihilominus tamen, qui hoc præscribere inten-
dit, ad reliquorum differentiam illud denominet. Alias
præfens bezoardici mineralis descriptio (Si aq. fort. ad
fixationem butyri planè omitteretur) satis est accurata.
Scilicet butyr. Antimonii cucurbitæ vitreæ immisso
sensim affunde sp. nitri rectificati tantum, usque dum
butyrum totaliter fuerit solutum, nec ulla amplius
effervescentia conspiciatur. Hinc in Aren. sp. Nitri ab-
strahatur ad siccitatem. Hujus Spiritus Nitri affusio &
Qlatio tribus repetenda est vicibus cum novo spiri-
tu Nitri, augendo ignem ultimò quoad omnes spiritus
fuerint expulsi. Massa residua Crucib. inmissa igne
aperto per hor. unam leviter calcinetur.

N. Nonnulli, prout & Dom. D. Moebius fecit, Be-
zoardicum hoc minerale s. commodius elaborant, si
separato prius spirit. Vitrioli philosophico à butyro An-
timonii, Mercurium vitæ figant in viâ siccâ cum Ni-
tro in Crucib. fuso, instar Antimonii diaphoretici
sensim inferendo, vel in viâ humida à Mercurio vitæ
sextuplum boni sp. Nitri per Aren. ad siccitatem perfe-
ctam abstrahendo, pulvere residuo citra cohobia aut
ulteriores calcinationes & innocentis acoris elutriatio-
nes sat valido ac tuto.

Vires. Ebullitionem sanguinis in febribus arden-
tibus tam boni moris quàm mali moris mirè compe-
cit, ac in primis sequens bezoardicum solare, si in
primis succenturiatu adsint salia volatilia urinosa,
qualia Sal Tarrati volatile, C. C. cruoris cervi, &
&c. cum essentia theriacali nupta, fermentum febrile
venenatum ac malignum causam istius ebullitio-
nis figendo, invertendo ac per diaphoresin & diure-
sin expellendo. Hujus autem virtus non tantum ab
Antimonio & Ole, sed etiam à Nitri. oritur, quod
abundè in Antimonio & Ole figitur, id quod pon-
deris auctio & incrementum edocet, salvâ manente
vi suâ refrigerante & sedativâ (paucis cognitâ) quæ
tamen magis enotescit, quando totum Nitrum ver-
titur in terram albißimam inspidam per encheirisin
à Clariss. Helmontio explicatam. De Lithias. cap. 4. §.
7. & in complex. & mission. Element. figmento §. 24.

N. Quoties à Natura spontanea illa coctio vitio-
sum humorum in febribus sepius venit expectanda,
toties Arte promovenda est, inquit *Mens Sylvus in*
Practic. Medic. pag. m. 944. & quidem medicamen-
tis omnem humorum acrimoniam, & in primis aci-
dam (unde illa penitior humorum in lymphâ & san-
guinis massa permittit effici solet) blandè temperanti-
bus & arctam humorum unionem iterum solventi-
bus. Præ omnibus autem aliis blandè acrimoniam
humorum, & acidam quoque cruditatem temperant
Sulphura mineralium & metallorum fixa & ad sum-
mam suâ perfectionem exaltata. Quibus proxime ac-
cedunt salia volatilia oleosa, & aromatica: Quorum
prudenter usurpatorum vi, caput humanum in mul-
tis superante, non tantum Naturæ humanæ conve-
nientissima conciliatur in intestino tenui & Corde hu-
morum subcontrariorum effervescencia, verum etiam
dissolvitur iterum in sanguine & lymphâ concretio &
coadunatio humorum acriorum præternaturalis, sed
prius ab ipsis moderatorum. Hujus generis volatiles
spiritus seu salia volatilia circumspectè ac cum deli-
catis adhibita pro diaphoresi ab initio febrium malignarum
sepe plus præstant additâ essentia anodynâ in ce-
phalalgia, cardialgia &c. Quàm Bezoardicum mine-
rale s. five C. intentionis malignitatis seminaria raro
compescencia, adjunctis vel intermediatis pro cir-
cumstantiarum ratione absorbentibus temperatis, in-
vertentibus anodynis. Si nausea & vomitus ab initio
symptomaticè complicati & solum fixiora illa bezoar-
dica ex Antimonio opposita fuerint, malum, quod su-
pra notatis alexipharmacis volatilibus solitariis aut
anodynorum tantillo exaltatis facile sopitur, sepe-
mero magis exasperant. In ejusmodi morborum pro-
gressu non raro cruda simplicissime præparata ex ani-
malium & fossilium classe evidentius operantur abso-
bendo ac figendo fermenta maligna ac venenata v. g.
C. C. f. Δ & cum Δ præparatum, Tertia-gill. uni-
cornu fossile, cetaceum, dens equi marini &c. Quæ in
aliis febribus cum bezoardico martiali & joviali, si non
fuerint malignæ ab initio ad resolutionem & inversio-
nem commodè alias adhiberi possunt.

2. Bezoardicum Solare compositum.) Hic notan-
dum, Sal rucæ, guajaci & solut. corall. r. tantæ effica-
ciæ, non esse, ut hoc bezoardicum Solare in virtute suâ
exaltent, vi suâ alexiteriâ per vulcani vehementiam or-
bata, nisi juxta jam monitam cautelam prius salia vo-
latilia oleosa vel Tinctura bezoardic. cum salibus vo-
latil. parata in convenienti vehiculo adhibeantur & in
progressu usus bezoardici Solaris interpositis cordiali-
bus ex corallinis, cinnabarinis, Cervinis, Lapide be-
zoar &c. sequatur.

N. 1. Bezoardicum Minerale Solare ad datam composi-
tionem fit.) Si loco aq. reg. tanquam nimium cortosivæ
& noxiæ substituat sp. Nitri, præfens descriptio erit
accuratior, & seq. facta modo commodior.

℞. Butyr. Antimonii clari s. q. huic affunde sp. Nitri.
& abstrahere per Alemb. cum hoc spiritu abstracto solve
Q. v. recipe postea solutionem hanc Solarem & af-
funde butyr. Antimonii rectific. seorsim in cucurbitâ
apertâ in loco aperto collocatâ ℥iij. hoc facto etiam af-
funde sp. Nitri rectific. guttatim tantum, ut emineat ad
2. vel 3. digitos postea digere per aliquot h., deinde in
Aren. per Alemb. abstrahere, sed non ad omnimodam
siccitatem, saltem ut materia instar pulvis flavæ quo-
dammodo siccata remaneat, huic quod extillavit red-
de, addito novo sp. nitri ad ℥ij. circiter, misce & digere
iterum, post digestionem iterum destilla, hunc laborem
ter vel quater repete. Sic Q. perfectissimè cum suâ massâ
unitur & fit Pulvis siccus: calcina sub regulâ per horam
unam vel alteram. Dos est à gr. iij. ad v. ℥ss. vel ℥j. in
omni morbo repentino.

N. 2. Soc

N. 2. *Solutio corallorum sit.*) Hæc solutio minus philosophica est, nec genuina, de qua vid. supra cap. de coralliis.

3. *Bezoardicum ☉lare Crollianum.*) Hoc suo etiam stat talo: attamen ob fixitatem, quam ☉ adhuc obtinet, censetur præstantius quod sequitur.

4. *Bezoardicum ☉lare verum.*) Si loco ☉ illius corpori substituat ☉ in spiritualement substantiam exalratum, quod perficitur vel per philosophicam trituram in pulverem subtilissimum cum philosophico mortario institutam, vel sublimationem cum *co, vel per secundam aut tertiam ☉lationem cum nitro bezoardico, ut liquorem suppeditet duraturo colore ☉lari tingentem. Hoc Aurum spirituale solve in sp. nitri non aq. reg. & solutionem abstrahe ad siccitatem, destillationibus sp. nitri sæpius repetitis. Postea residuum calcina sub regulâ, (*unter einen Müffel*) &c. Nonnulli bezoardicum ☉, antequam igniant sub regulâ, irrorare solent sp. vini & postea calcinant, probe tamen agitando in violaceum vel purpureum colorem, hic licet non semper acquiratur, etiam à flamma ignis procedens, nihilominus tamen ritè præparatum erit, modo easdem obtineat vires. De quibus supra in Bezoardico f.

N. *Rec. Aurum (per spiritum Nitr. bezoardicum)* spirituale redditum &c. cum antecedenti convenit. Et Menstruum illud Basilii nihil aliud est, quam spir. vini subtiliss. cum sp. Salis digestus & ternâ ☉latione per alembic. unitus ex MB. Solvit ☉ non radicaliter, sed ex partium texturâ tincturam acquirit.

5. *Bezoardicum Dnare 1.*) cum Dna non nisi depuratissima & ab omni ♀ nere per capellationem liberata ad hoc bezoardicum assumi debeat, nisi vomitam vitriolatam vim concitare velis tinctura Dnæ viridis cum aq. fort. parata hic exulet, utpote à ♀ re non à Dnâ oriunda, & ejus loco substituat Dna capellata in spir. nitri soluta ac butyro Antimonii nupta, seq. modo conficienda: *Rec. Dæ finæ laminatæ 3 lb. solve in sp. nitri f. q. butyri Antimonii rectific. 3 lb. spiritus nitri f. q. sensim butyro Antimonii affunde, usque dum omnis effervescencia & strepitus subsideat. Has solutiones conjunctas abstrahe in cucurbitâ vitreâ destillando igne Aren. ad siccitatem massæ albæ cœruleæ. Huic residuæ massæ alijs recens sp. Nitri affundatur & abstrahatur, idque tertiâ vel quartâ vice repetendum, ultimo fortissimo igne uigendum, ad omnimodam spirituum corrosivorum expulsionem, singulis tamen vicibus ante repetitam sp. Nitri affusionem massam in mortario vitreo conterenda; Massa denique residua aquâ f. sæpius affusâ edulcoretur & à spiribus corrosivis liberetur, & bihorii spatio in Crucib. igne aperto calcinetur.*

Tinctura Dæ sit.) Loco Tincturæ sumi potest Magisterium Lunæ ex Lunâ finâ cum sp. Nitri paratum & cum muriâ præcipitatum. Ex quo enim Tinctura Dnæ parari, potest cum spir. * & spir. sal. tartari volat. Hoc Magisterium cum butyro antimonii etiam congiungi cum sp. Nitri, f. a. figi potest, ut jam supra ostensum.

6. *Bezoardicum Dnare. 2.*) Hic loco extracti cœrulei Dnæ soluti in aq. fort. & extracti ex Dcum Sulphure calcinati per spiritum Urinæ jam dictum Magisterium substitui debet, & cum butyro ☉nii non in aq. fort. sed spirit. nitri solutum jungi potest, ut supra jamdum traditum fuit. Similiter etiam cum Bezoardico Dnari 3. prout & cum 4. procedendum erit.

9. *Bezoardicum venereum.*) in Luc ♀ nereâ, gonorrhœâ virulentâ, & ubi renes partesque genitales vel exulceratione vel alio laborant Morbo, est egregium Medicamentum, si juxta Domini Autoris præscriptum elaboretur.

10. *Bezoardicum ☉tiale.*) Quamvis Domini Autoris descriptio hujus bezoardici ☉tialis non sit rejicienda, dum cum butyro ☉nii ex croco ☉tis per reverberationem facta tinctura extrahitur, quæ per spiritum nitri more usitato figitur. Tamen optimum sit ex regulo ☉tis cum mercurio sublimato in butyrum redactis & cum sp. nitri vel fluore nitri ad fixitatem perductis. Prodest in febribus cum diarrhœâ conjunctis, item in dysenteria epidemicâ, nam ratione ☉tis aliqualem habet vim adstringendi & ratione nitri etiam anodynam.

11. *Bezoardicum ☉viale.*) Hoc juxta Domini Autoris præscriptum etiam succedit, sed non sit pulvis gryseus, verum albus subcœruleus. Est egregium Medicamentum diaphoreticum in Epatis obstructionibus & in omnibus uteri affectibus, præprimis in purpurâ, ubi scilicet cum feculâ bryoniæ, aliisque uterinis commiscetur, quia malignitati resistit & uterum una purificat. Item in epilepsiâ ex utero cum feculâ pœoniæ & bryoniæ decantatissimum est remedium. In Epatis obstructione cum pulvere epatico rubro miscetur. Imò in ipsâ Peste etiam cum Magisterio cordiali Dom. Dom. Johannis Michaelis p. m. ut lissimum deprehenditur tam ratione præservationis, quam curationis.

12. *Bezoardicum Hninum.*) Hoc non adeo est usu receptum. Ex Minera Htutni autem & mercurio sublimato ana per retortam ☉latis acquiritur butyrum Hninum & cinnabaris Htutni, ex quo cum spir. Nini fixato bezoardicum Htutninum sit magnatum in Peste virium, prout & in pleuritide, scorbuto, scabie, melancholia hypochondriacâ. Hoc butyrum Hni super faceham saturni infusum & per retortam destillatum largitur liquorem subrubrum dulcem, externe in ulceribus serpentibus utilem, quemadmodum etiam ex hoc mercurius vitæ confici potest in Morbis saturninis commendabilis.

N. Alembic. Htutni quomodo conficiatur, vide supra de Hno.

13. *Bezoardicum Mercuriale.*) Hoc utut Mercuriale dicatur, nihil tamen de Mercurio realiter participat, sed ☉niale est, alembic. enim mercurii est succinum seu alembic. ☉nii, licet aliquando colore differant.

Nos ad destillata revertimur, inter qua sequitur 28 *Spiritus seu ol. Mercurii album diaphoreticum.*) Hic spiritus seu ol. ne quidquam de Mercurio participat, sed nisi salia in fluorem redacta sunt Mercurii ☉ati per argillam causata. Totum autem artificium hunc ☉atum conficiendi in eo consistit, ut mercurius sublimatus cum argillâ probe commisceatur & conteratur, illudque aliquoties repetatur, alias loco spiritus ascendet sublimatus. Commendatur in partium genitalium exulceratione.

3. *Spir. seu ol. Mercurii rubrum.*) Accurata est hæc descriptio, sed præterquam quod adstringendi vim à ☉te acquirat, non minoris cum antecedente fortis & profapiæ est. Est autem nihil aliud, quam Tinctura rubra ☉tis salium beneficio in Mercurio sublimato reconditorum supra alembicum evecta. In Cap. mort. nobile delitescit Vitriolum quod sublimatum & in ol. per deliquium redactum elegantissimam præbet Tincturam adstringentem vel per se, vel arcano Tartari nuptum, ad tonon viscerum confortandum in hæmorrhagiâ, vomitu, diarrhœâ & omni alvi fluxu ruita efficaciaz.

4. *Ol. Mercurii diaphoreticum dulce.*) Cum solo V absque aceto destillato solutio etiam succedit, sed digestio per aliquot Menses continuanda in fimo equino, aliâs in cassum laborabis: *Rec. Mercurii cum Vitriolo & sale sublimati q. f. Solve in sp. vini rectificatiss. factâ solutione in alembico appposito capitulo cœco per aliquot Menses fiat in fimo equino digestio, quâ peractâ,*

spir.

Sp. vini in MB. abstratur, hoc abstracto ad oleositatem, residuum urgentiori Δne in Aren. ex retortâ vitreâ in aliud receptaculum pellatur. Quoad vires contumacissimis renum vesicæ, partiumque genitalium affectibus hoc oleum prout & reliqua plurimum præstant, etiam internè propinari absque ullo possunt periculo. Qui hisce mercurialibus caret oleis, adumat mercurium dulcem, qui etiam non contemnendas in hujusmodi casibus habet vires.

5. *Oleum fragrans. Astrum dictum.*) Astrum mercurii habetur vel in formâ liquidâ, prout & *Domini Autoris* est, quod succedit, si mercurius sublimatus præparatus fuerit ex vitriolo & Sale; deinde cum V solum solvatur, & tertio digestio in fimo equino ad aliquot dies continuata fuerit. Vel habetur Astrum in formâ siccâ quæ emadmodum sequens ex cinnab. Rec. Primò fiat ∇ Nitri hoc modo.

Rec. Nitri optime purgati ℥iij. misce cum ℥iix. terræ figulinæ præparatæ & nondum excoctæ, & la per retortam cum amplo collo, ut spiritus transire queant, adaptetur capax recipiens cum luto optimè lutatus, lutum prius probè exsicceetur, ne spiritus transire queant: Postea per 3. Horas Δne lento & la, hinc fortiore, donec spiritus nulli prodeant; postmodum rectifica, adde partem dimidiam Salis gemmæ, stent in digestionem per 2. 8, postea effunde, & adhuc semel rectifica. Rec. cinnabaris fossilis Ungaricæ, opt. pulveris, & exsiccæ, Rec. hujus q. v. in alembic. affunde dictam aquam Nitri ad trium digitorum eminentiam, permitte in solutione, effunde aquam de terra damnata, abstrahæ aquam ad partem dimidiam, & pone in cellam ad crystallandum, crystalli sunt instar nivis inde hos iterum in ∇am destillatam ad solutionem, soluto affunde ol. Tartari & in momento tantur soluti crystalli instar croci.

N. Quidam postea in ∇ philosophica ex * & Nitri. al. facta solvunt ∅ purissimum ad ℥iij. solut. ℥j. ac cum eadem ∇a repetitis cohobationibus & digestionibus ∅ solum per Alembicum ducunt, donec totum transeat. Hanc solutionem conjungunt cum prioris Zinnabaris solutione abstrahunt sexies Aquam ad medietatem usque repetitis semper iisdem cohobationibus postea ad siccitatem destillatur. Tandem vel per sp. Tartari vel V omnis corrosio aufertur. Confert in apoplexia, epilepsia, febribus malignis &c. Dos. est a gr. j. ij. ad gr. v. in vehiculo appropriato.

6. *Aliud oleum Mercur. diaphoreticum fragrans.*) * figitur h. m. calcinatur scil. * cum calc. viv. aq. part. igne forti tribus vicibus, semper tamen affundendo calidam ipsum Salem separantem. Sal dissolvitur, filtratur & coagulatur, hic labor repetitur semper reassumendo calc. viv. ad unamquamque operationem, usque dum * figatur & liquabilis instar mellis reddatur. Hoc Sal in locum reponatur humidum & brevi in pellucidissimum liquorem converteretur, quem mundificabis & cum illo juxta Autoris præscriptum procedes.

7. *Oleum Mercurii Saccharatum, Spiritusque.*) Hoc in Gallia & Ungaria Chirurgorum est Arcanum. Caute la hæc, quam *Autor* apposuit, ut scilicet lentè in ol. hoc deli lando procedatur, exactissimè observanda est, ne alembic. dum saccharum nimis effervescit, disrumpatur. Verum quemadmodum in aliis etiam supra à *Domino Autore* adductis Mercurii oleis nihil est, quod Mercurii substantia ingrediatur, cui illorum effectus sit ascribendus, sed salia sunt quæ defectum ejus suppleant: ita etiam in hoc ol. Mercurii saccharato nihil est de Mercurio, (nisi odoretenus velis) sed liquor est compositus ex salibus corrosivis & acido sale sacchari quæ Mercurio æmato immersa & in ∇atione Mercurii vitæ sp. Vitrioli philosophicum constituunt. Rectificatus hic spiritus ol. præbet fulvum. Quoad

Mangeti Biblioth. Pharmac. Tom. II.

usum; Spiritus hic internè cum liquoribus appropriatis convenit in Lue Venerea: Externè oleum etiam in articulo doloribus nonnullis commendatur, qui tamen usus ob corrosivitatem meritiò est suspectus. *Hofmannus.*

V. EXTRACTIO,

Unde

1. Sulphur seu Tinctura Mercurii, Aquila celestis.

℥. 8. 2ti (cum Sal. com. & ∅o elevat.) q. v. affunde *, stent per septimanas aliquot, ut extrahatur flavedo f. a. Decantatos liquores destilla ad siccitatem & habebis pulverem rubeum, qui verum Mercurii Sulphur.

Vires. *Paracelsus maxima huic attribuit præconia, in curanda Podagra, Epilepsia, morbo Gallico, &c. Quorum radicem per sudorem expellit.*

Dosis gr. 3. 4.

2. Alia.

℥. Vitri Mercurii (quod succinum 8ii vocatur,) extrahe cum * decanta & abstrahæ.

Vires. - Sudorem movet.

Dosis gr. 2. 3.

N. *Uti vitrum illud, non est nisi vitrum 8 ij: Ita Extractio hæc non nisi 8 ij censenda erit. Vid. Bittich.*

3. Oleum Mercurii 8ialis, Tinctura.

℥. Mercurii ex 8 fact. part. 1. ∅o ∅ li rubr. rectificatiss. p. 19. abstrahæ leniter, ut cum Mercurio maneant, dein auge Δ, & sublimabitur aliquota Mercurii pars. Sublimatum redde Mercurio in fundo, tantumdemque novi ∅o ∅ i adde abstrahæque & sublima, idque vice tertiâ; tandem tere, & affunde tripl. m. V rectificatiss. circula, sic fiet separatio, & Mercurius in ∅o abibit supernatans. Hinc separa ∅o idque circula ∅o cum * acerrimo. Sic ∅o recipiet ponderositatem, fundumque petet, & quod noxium in 8 erat * o immixtum maneat.

Vires. *Basilus maximis encomiis ∅o hoc celebrat, vim, que ei attribuit corroborandi Cerebrum, curandi Apoplexiam, imo loco Panacea habet. Schroderus.*

V. Extractio. Unde 1. Sulphur seu Tinctura Mercurii, Aquila celestis.) Hæc descriptio ferè cum supra allato ol. 8 rii diaphoretici dulcis convenit, eò quod hæc æque solutionem, digestionem & abstractionem Acet. dist. ad siccitatem præcipiat, illa autem hisce præviis extractam ex decantatis liquoribus cum Acet. dist. super Mercurium sublimatum factis flavedinem pro sulphure 8 rii venditet. Verum hæc extracta flavedo, quæ post destillationem in pulverem rubeum degeneravit, non ex 8 rio, sed etiam ex salium diversorum variâ texturâ orta est. Interim tamen notandum est, quod si Acet. destillat. à mercurio sublimato vel butyro 8nii sæpius abstrahatur, per secessum purgare, unde & hoc dictum Sulphur mercurii purgantibus admisceri potest.

2. Alia.) Hoc vitrum mercurii nihil aliud est quam succinum 8nii, ex quo loco Acet. dist. convenientius cum sp. Vir. æt. tinctura extrahi potest, & tinctura extracta cum spiritu vini circulari. Verum non mercurii, sed 8nii inde tinctura rubicunda elicitur.

3. Oleum mercurii 8nialis, Tinctura.) Mercurii 8nii elaborationem vide infra de Antimonio. Interea præsens *Domini Autoris* descriptio non est de nihilo. Elegantissimum etiam æratum fit ex mercurio antimonii, Vitriolo calcinato & sale tribus supra nominatis athletis fortissimis ad contumaces febres expugnandas. Loco ol. Vitrioli f. substitui debet ol. vitrioli 8tis vel vitrioli hermaphroditi ex vitriolo 8tis & Bb veneris

venetis paratum. Tandem post Δ ationem affunditur triplum sp. vini rectificatiss. & cum eo circulator ut dulcescat; Alias etiam ex sp. vitrioli & sp. vini rectific. præmissa debita combinatione per circulationem & destillationem fit spiritus cephalicus Dn. D. Joh. Michaelis; item, spiritus catharrhalis, cephalicus, apoplecticus, de quo infra pluribus. *Hofmannus.*

Vl. Liquatio.

1. Unde Liquor.

\mathcal{L} . \mathcal{Q} Δ -ti q. v. digere in phiala vitrea calore mediocri, (40.) hinc solve per deliquium.

Vires. Curat Ulcera ac Vulnere maligna, inflillatus.

Alius liquor Mercurii præcipitati.

\mathcal{L} . \mathcal{Q} per ∇ præcipitat. q. v. affunde ∇ opt. digere & cum acer factus fuerit decanta. Hinc affunde alium, donec acimonia sublata, & calx attenuata sit. Tunc affunde \mathcal{X} digere, decanta, affunde novum \mathcal{X} , idque toties, donec totus pulvis in \mathcal{X} abierit: abstrahere \mathcal{X} , pulveremque reponere in cellam ad liquefendum cum aqua Chelidoniae.

N. Quod si \mathcal{X} calci huic insufficiens fuerit, denuo calcina.

3. Alius.

\mathcal{L} . \mathcal{Q} Δ -ti q. v. solve in ∇ , (ex Sal. nit. p. ij. & \mathcal{P} . i. destillata,) digere vase clauso, postea destilla: residuum tere, rursusque aquam affunde, idque tantisper reitera, donec omne sublimatum in fundo fixum remaneat. Fixum hoc sublimatum per horam unam ac alteram leviter reverbera, dein tere, digere cum ∇ , abstrahere cohobando, donec in \mathcal{O} i formam abeat. *Untzer.*

Vires. Confert Podagricis, lue Venereâ infectis, Cancro, Fistulis, & omnibus ulceribus sordidis, putridis atque inveteratis, siue intrinsecus, siue extrinsecus adhibeatur.

N. Sic quoque figitur per \mathcal{X} , fixumque per ∇ dicto modo in mucosam pinguedinem abit: qua si ex arena gradatim destilletur igne fortissimo, lacteum humorem sudat, digere hunc ac destilla, accipiesque \mathcal{O} candidum & suave.

Vires. Usus ejus tum internus est ad Renes exulceratos, atque calculum, tum externus ad ulcera.

4. Alius, \mathcal{O} \mathcal{Q} ij diaphoreticum dulce.

\mathcal{L} . \mathcal{Q} Δ -ti puriss. q. v. tere & solve, p. d. super tabulis ferreis stanno obductis. Liquor affundatur ∇ , fiat destillatio, cohobis toties repetitis, donec ∇ acescere incipiat. Tandem abstrahere leniter ∇ , manebitque in fundo \mathcal{O} Mercurii dulce. *Harmann. in pract.*

Dosis à g. 2. ad 6.

N. Alii pellunt igne fortiori ex arena, nanciscunturque lacteum liquorem, qui rectificatus per \mathcal{O} m evadit fragrantissimus sine corrosione. Vide supra in destillatis.

5. Liquor \mathcal{Q} Jovialis.

\mathcal{L} . Merc. crud. \mathcal{L} is ana \mathcal{Z} ij. F. Δ ia. Huic adde Mercurii aliquoties sublimati \mathcal{Z} v. Trita solvantur per deliq. Liquorem digere cum ∇ per mensem. Postea abstrahere ∇ m Δ e lenissimo in MB ne \mathcal{O} simul ascendat F. cohobatio quater vel quinque. Ultimo remanebit in fundo \mathcal{O} merc. \mathcal{L} iale.

Vires. Potest adhiberi intrinsecus & extrinsecus.

Dosis à g. 2. ad 6.

6. Liquor Merc. Δ -ti.

Sublima Merc. Δ -ti \mathcal{Z} j. cum ana \mathcal{X} ci, adde ∇ ad eminentiam 3. digitorum, digere simul per 6. \mathcal{O} & per \mathcal{O} pelle. Post ∇ egreditur Oleum, quod in frigido coagulabitur in massam albam, quæ in cella posita resolvetur in liquorem \mathcal{O} em dissolventem, eumque in volatilitatem adducentem.

Ex S. Closs. Schroderus.

6. Liguatio unde 2. Alius Liquor mercurii Δ -tati.) Hæc prout & 3. sequens descriptio nil minus affinis est cum supra jamdum examinatis oleis.

4. Alius, ol. mercurii diaphoreticum dulce.) Hoc etiam suam meretur laudem. Usus tamen ejus saltem externus est in ulceribus malignis.

5. Liquor mercurii \mathcal{L} ialis.) Convenit hic cum Dn. D. Johann. Agricola descriptione ol. mercurii, quam tradidit in notis ad Poppium, & repetit Cl. Zvvelferus in mantiss. Spagyric. part. i. cap. 7. p. 355.

6. Liquor mercurii sublimati.) Si mercurii sublimati justa proportio cum \mathcal{X} ana & sp. vini per aliquot dies digerantur, & postmodum per retortam destillentur. Post sp. vini egreditur ol. quod in frigido coagulatur instar butyri, & per deliquium solutum postmodum metalla solvit.

N. Quomodo ex mercurio cum calce vivâ & sale Tartari fortissimo alkali Cl. Zvvelferus in mantiss. Spagyric. part. i. cap. 7. p. m. 355. Liqueorem Alkabeft summum Nobiliss. Helmontii arcanum etuere in formâ aquæ præsumat, evolvi potest; Verum de hujus successu valde dubitatur vid. & Dominus Luc. Schrœck. in Mantiss. Hermetic. p. 513. seq. Negari quidem nequit, posse in hac Zvvelferi præparatione unâ cum mercurio aliquid aquæ in vase recipiente colligi. Sed non ideo mercurius in aquam resolutus dici potest, cum longe aliam habeat originem, scilicet à vaporibus vel poros mercurii ingressis, eo ante destillationem, acri humido exposito, vel ex vaporibus recipienti inclusis. Unde & Nobiliss. Robertus à Boyle in paradox. chemic. p. 71. Posse inquit, certo quodam tractandi Argentum vivum (vel saltem aliquod ejus genus, nam non in omni mercurio ita feliciter succedit) artificio, ab ipso, nullâ factâ additione, minimum quintam vel quartam limpidi liquoris partem separari, qui à vulgari Peripaterico pro aquâ haberetur, quemque vulgaris chymicus phlegma vocaret, qui tamen reduci in mercuriam nequit. vid. l. c. *Hofmannus.*

VII. Salfificatio.

\mathcal{L} . Corpus ex præparatione \mathcal{O} i \mathcal{Q} ii fragrantis residuum (vide supra) affunde idem illud \mathcal{O} fragrans, digereturque & extrahetur sal. \mathcal{Q} . Extractioni decantatæ, affunde ∇ quantitatem bonam, demum abstrahere ∇ in cinere, & ascendet post ∇ & \mathcal{O} \mathcal{Q} ii relicto sale in fundo.

Vires. Summum est & efficacissimum arcanum in extirpanda Lue venerea, etiam radicata & inveterata, sanguinem mundificat, adeoque omnis generis ulceribus sine & cum malignitate conjunctis medetur, scabiei confert, imperigines sanat.

Dosis g. 1. ad 2. vel 3. Schroderus.

7. Salfificatio.) Ex hætenus in medium allatis medicamentorum mercurialium præparationibus versipellis ille ac larvatus Mercurius ex habitu ejus externo (ex Sulphure ejus externo) satis superque innotuit, dum cum quibusdam divetis menitruis mutatus modo in liquorem cum aq. fort. vel in rubicundum, vel album pulverem, modò cum ol. Vitrioli in sublavum, cum Sulphure in sanguineam ac volatilem cinnabarim transformatus fuit. Cum aliis salinis quibusdam corporibus sursum latus, salis formam, cum regulo animonii butyri speciem, cum

cum aliis adjunctis vitri, imò etiam olei substantiam induit. Nihilominus tamen ex hîcce omnibus concretis exoticis reduci & pristinam essentiam, quæ solummodo in istis larvabatur, induere potest. Tantumque abest, ut hæc involucria salina aut Sulphurea partes sint mercurii constitutivæ ex ejus substantiâ elicitæ, ut potius etiam composita sint corpora ex mercurio & menstruo, aliisve additamentis ad ipsum lavandum adhibitis constituta, uti exinde, quod in mercurium pristinum reduci queant, abunde elucescit. Prout sal in aquâ solutum sal manet & inde sine salis mutatione reperitur. Si autem hic vulgi Mercurius à Sulphure suo externo, seu labe originali liberatus sit, non sinit se amplius à sulphuribus aut sale apprehendi, quin hæc confestim sumat ac veluti conficiat. Ideoque interior Mercurii nucleus, seu Philosophorum Mercurius in igne constans à dictis dissolventibus non attingitur, sed altioris est indaginis. Interim tamen cum hæc medicamenta mercurialia, si ritè præparata fuerint & methodice exhibita, non vulgarem etiam in Medicinâ præstent usum, tamdiu iisdem immorabimur, usquedum Cl. Helmontii potius mur Mercurio diaphoretico, arcano corallino, Glaucæ Augurelli &c. Hofmannus.

Mercurii aliquot rursus Præparationes à PHARM. BATEANA.

Mercurii Purgatio.

Diversimodè perficitur. Vel trahendo per alutam, vel lavando cum \star & \ominus mixtis; aut cum ∇ à Calcis vivæ sæpius agitandò cum Sp. V. in vitrò obrurato. Vel destillandò in \odot per \ominus in Δ e forti; idque per se, vel additò Se tartari, calce viva, &c. vel aâandò cum \odot vel ∇ , ac postea per \odot à corpore admixto separando.

* Merc. præcipitat. Albus.

Solve ∇ in ∇ : ∇ à falsa, ablue, exicca. Albus subulcis. Solve ∇ in Sp. \odot , ∇ acum Sp. V. ficca, & sæpe combure cum ∇ f. a. Dosis eadem cum ∇ io dulci. Usus in Lue ∇ , Hydrope, Podagra, Ictero, &c.

Merc. præcip. correctus.

∇ . ∇ per \odot & \star purgat. ∇ ij ∇ duplic. ∇ viii. Abstrahere ∇ em ex \odot , cohobando. Tum matetia trita affunde \odot li ∇ ij. Digere, & \odot m abstrahere super ∇ m affunde Sp. V. Digere \odot iij: decanta, aliumque Sp. V. affunde idque tertiâ vice repete: tandem, sicca. Dosis gr. 3. ad 10. Purgat per inferiora. in Lue ∇ rea curanda præstantissimum remedium.

Merc. præcip. fixus.

∇ ∇ purgat. ∇ iij. \star ∇ i ∇ . Fl. ∇ ∇ iij. m. & ∇ a: ∇ acum cum facibus titum ∇ a iterum idem auge Δ em ut candescat. id quod in fundo remanet fixum Panacea vocatur. Omnes humores noxios exiccat, perque diaphoresin expellit. Dosis ∇ B. ad ∇ B.

Merc. præc. flavus.

(Id est) Turpeth. miner. Dosis à gr. 5. ad 10. Eisdem habet vires quas Arcan. Corallinum.

Merc. præc. griseus.

Turpeth. mineral. in ∇ os. lotum & siccatum imbibe cum Pyreño, & (addit. camph. in Pyreño solut. a.) l. Δ . Pyreñum abstrahere f. a. Dosis an. gr. iij. ad viij. &c. Purgat. per inferiora.

Merc. præc. incarnatus.

∇ ∇ i. in ∇ ∇ iij. solutæ adde ∇ fervidæ ∇ iij. ∇ a ∇ rec. ablue ac sicca f. a. Solum per secessum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Dosis gr. vj. ad xij.

Merc. præc. laxativus.

F. ex ∇ cum \odot li, vel ∇ in ∇ a B. crystallisato, & in \star bulo indito ut per horam candescat ope Δ is: dein in aquam calidam projecto, ut fiat pulvis

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

flavus. ∇ am decanta, lava, exicca, & ∇ supra eum incende f. a. Purgat ∇ a ∇ a ∇ a. Dosis gr. 3. ad 10. minè proficius in Lue ∇ rea extirpanda; Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.

Merc. præc. per se.

∇ pone in vitrum infernalem, exactè in \odot . colloca, & gradatim auge Δ m, donec ∇ in pulverem rubicundis conversus sit. Ablue ∇ opus est multorum dierum. Sudores valde movet. Luem ∇ ream sexies vel septies exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat. ut plurimum vomitum quoque movet sat violentum. Dosis gr. 3. ad 6. præstantior erit præcipitatus, si fiat cum parte octavâ \odot is. v. infra.

Merc. præc. Ruber.

Solve ∇ p. i. in ∇ p. ij. Abstrahere ∇ à ∇ io per destillationem cum tribus cohobis, donec in pulvis pulverem rubrum evadat. Vires imitatur præcedentis.

Merc. præc. Solaris per se.

F. ex aâa facto ex ∇ ∇ iv. cum \odot per ∇ fusi ∇ B. in vitro infernali posito ut supra, materiam sæpe eximendâ, & conterendâ, f. a.

Merc. præc. Viridis.

∇ ∇ ∇ iv. ∇ ∇ B. Solve separatim in ∇ , & misce postea. abstrahere ∇ em, digere ∇ acum cum \star , filtra ac sicca f. a. Specificum est in Gonorrhœa virulenta, quam nimiam tollit, insufficientem promoveret: ideoque quotidie continuandus ejus est usus, donec omnis fluxus sedatus sit. Dosis gr. ij. iij. ad viij.

Merc. sublimat. Ruber & Flavus.

∇ ∇ . \odot , \odot calcin. an. ∇ vi. exactè mista ∇ a: cum ∇ ato misce \odot & Oparum calcin. an. ∇ iij. Impasta \star to, & ∇ a iterum. Rubrum à flavo separatim seorsim ∇ à ablue, & ∇ supra utrumque incende f. a. Purgat præcipue per inferiora, magnumque Secretum in Hydrope, Lue ∇ , Podagra, Scabie, Ulceribus, Cancro, &c. Dosis gr. 5. 6. 7. &c.

Merc. Vita correctus.

∇ m Vita in phiala Δ e \odot a fove donèc rubere inciperit: postmodum ∇ sæpius ab eo abstrahere f. a. Purgat sat bene per alvum, Impuritatesque quasunque educit. Dosis gr. 4. 5. 6.

Merc. Vita purgans.

Si ∇ m vita cum \odot aliquoties teras, & salsedinem postea per ∇ am abluas, vim solam purgandi per se dem obtinebit. Dosis à gr. vj. ad xij.

MESPILUS,

Ac primò Mespilus folio laciniato.

Hæc duplex est vel major non spinosa Cratæge Theophrasti, & Sorbus torminalis Plinii credita; vel minor & spinosa, eaque iterum duplex vel mitior, fructu majore, Mespilus Aronia dicta, vel spinosior, fructu minore quam oxyacantham vocant.

Vires, Mespili non spinosa Sylvestris. Fructus maturi & jam fracidi eam acerbiteratem quam cruda habebant ex parte deponunt, & subacidum acquirunt, nec injucundum saporem relicta tamen etiamnum aliqua acerbitate in callo quicis inest.

Alvum astringunt sicut Mespila, eis tanquam singulari & præsentî remedio contra tormina (dysenteriam) utuntur qui Hercynios montes accolunt rustici, ut testatur Cordus. Matthioli etiam eandem eis vim tribuit; quam inesse nos quoque in parte experti sumus.

Rob Sorbi, speciatim torminalis est nobile specificum in diarrhæis epidemicis, item in diuturnis, quæ ab usu fructuum horariorum superveniunt. Etmuller cap. de Diarrhæa. Communicavit D. Hulse eadem omnia possunt quæ sorba domestica sed inefficacius, eodem auctore; imo, me judice efficacius, certè febricitantibus aptiora sunt cum refrigerent non minus quam astringunt.

Bb a ∇ vsus

Ufus Mespili spinosa fructu majori esculento. Fructus maturi ab Italis pro deliciis crudi appetuntur in cibis: nec tantum crudi sed etiam saccharo conditi & asservati eduntur. Lazaroli autem Italis dicti sunt ab Arabico Alzaror. Nobis certe crudi grata aciditate placent hi fructus, & Mespilis delicatiores visi sunt, moderate admodum astringunt, iisque qui alvo sunt laxiore cibus est utilissimus.

Vires Oxyacantha. Quæ de hujus fructus viribus tradunt Tragus, Matthiolus, Schvvenckfeldius, quod scilicet astringit, & omnis generis fluxus sistit non probat J. Bauhinus, nec enim subausterus est (ut vult Lobelius) sed gustu aliquantulum glutinosus & dulcis: at neque è contra assentitur Anguillaræ eum ventrem lubricare & fluxus provocare. Nec tamen negat aquam ex floribus pleuriticis utilem esse posse, aut calculosis prodesse. Certe hujus vel aquam destillatam, vel siccati pulverem, vel infusum in vino conferre adversus arenulas & calculum consentiunt Botanici.

Quamvis oxyacantha frutex potius quam arbor censenda sit, cum fruticis modum plerumque non excedat, commodum tamen locum nata, si permittatur in proceram & justæ magnitudinis arborem adolescit.

Mespilus vulgaris foliis integris.

Nomina. Mespilus vulgaris J. Bauhini, vulgaris siue minor Park. Germanica folio laurino non serrato, siue Mespilus Sylvestris C. B.

Parva est arbor, foliis quam pomi longioribus, angustioribus, laurinis fere paribus (Matthiolo cerasorum) infernè incana lanugine pubescentibus, superne quoque nonnihil pilosis, sed saturatius virentibus, alias serratis, alias non serratis; flores singulatim nascuntur candidi seu dilute rubentes (quinque petalis amplis, obrutis, in medio bifidis compositis) Cotoneæ mali: quibus succedunt poma exigua, fulva, per quam acerbi saporis, pyris sylvestribus paria, hirsuta, ex angusto principio in umbilicum latum excavatumque desinentia: ex cujus supercilio emicant quina folia oblonga, angusta, acuminata, quæ stotem antea tegebant. In singulis autem pomis quina fere officula, compressa, triangula, caro dura, alba, adstringens valde: quæ tamen fracida reddita acidulum suavemque acquirit saporem, & mensis secundis instruendis inservit.

Passim hodie colitur in hortis & viridariis Germaniæ, Italiæ, Galliæ & Angliæ. In Germania etiam sponte provenit: verbi gratia, inter Argentinam & Badenses Thermas in Sylvis. Quæ non infitæ sunt, spinosæ ferè sunt & parvos edunt fructus: sed major, & præstantior non nisi culturâ comparatur. Inseriturque apte pyro sylvestri aut spinæ albæ. Floret Aprili & Maio, fructum perficit Septembris fine aut etiam tardius.

C. Bauhinus eumque secutus Parkinsonus quatuor genera distinguunt,

1. Mespilus Germanica folio Laurino non serrato siue Mespilus sylvestris C. B. Mespilus vulgaris siue minor Park.

2. Mespilus folio Laurino major C. B. maxima sativa Park.

3. Mespilus Italica folio Laurino serrato C. B. minor folio serrato Park. J. Bauhinus in Mespilo vulgari minore se utriusque folia serrata, & non serrata, observasse scribit.

4. Mespilus fructus albo C. B. fructu albo magno Park.

Vires. Mespila eiusdem temperamenti sunt cum Sorbis, & ad eadem valent, vomitum, dysenteriam & omnes in genere alvi fluxus. Ventriculo noxia esse

aiunt, præcipue dum duriuscula & acerba adhuc sim: nam emollita & fracida facta adstringunt minus. Si decocto immaturorum colluantur os, & fauces, reprimunt fluxiones in fauces, dentes atque gingivas. Paratur quoque ex Mespilis siccis, succo rosarum, caryophyllis, pauco corallii & nyce moschata cataplasma, quod applicatum regioni orificii ventriculi potenter compescit vomitum ciborum. Mespila viridis in magna quantitate devorata multas diarrhæa perinacilaborantes sanaverunt, aliis remediis nihil proficientibus Forestus.

Folia similem cum fructibus vim obtinent.

Herbariorum plurimi officula in pulverem detrita tam ad renem quam ad vesicæ calculum conterendum & expellendum commendant nec Herbarii modo, sed & practicum pars major id faciunt & passim in suis libris calculosis præscribunt: atque ita quæ primum data porra est, ceu impetu quodam ruunt omnes, inquit J. Bauhinus, magno mehetecle & artis & rationis ludibrio: qui idcirco iis strenue se opponit, & multis probare nititur contrarium. Ipsum si plagi consule Rains.

METALLUM.

Metalla sunt corpora dura, ductilia ex succo salino siue Mercurio vi sui sulphuris in terra coagulato.

N. Libro primo diximus, res secundarias ex peritoma mater rerum primariarum fieri. Peritoma ero macrocosmicum veniens in matricem, siue locum metallificum, id est, metallorum generationi aptum, si ibidem subsisterit, suscitatur spiritus seu ignis illius peritomatis, subinde quoque vi matricis metalline in naturam metalli facessit. Duobus ergo ut omnia, ita & metalla constant; humiditate scilicet quæ Mercurius dicitur, & spiritu seu igne, qui Sulphur. Duo hæc in sale fundata sunt viriolato, id est, in naturam talem transmutato, qualem natura ad generanda metalla proxime requirit. Hoc sal alteratur ulterius paulatim, nec enim statim metallum evadit perfectum. Quare, cum in natura constitutum sit, ut partes diversæ invicem misceantur atque insuper mixtio & maturatio fiant successivè, particulis scilicet nonnullis, citius ad maturitatem pervenientibus, aliis tardius, aliis crudis aliquæ reulum manentibus; & in hac metallorum generatione varietatem quandam esse necessum est, quæ particula aliæ maturiores, aliæ minus matura. Maturiores ergo partes id esse suspicor, quod Philosophi sub titulo seminis metallini eliciunt. Licet enim in Metallis partes adeo compactæ & unitæ sint, ut difficulter invicem separari queant, unde fieri convenit, plerasque laborationes, maxime vulgares, non separatrices, sed solum preparatorias seu exaltatorias esse, id est, quibus metalla circa separationem puri ab impuro, solum alterantur, ut eo melius à calore nostro superari, inque actum deduci queant: attamen separationem illam contra multorum experientias hinc inde annotatas, impossibilem statuere, pertinacium potius est, quam virorum cordatorum. Quin imo non modo cuidam ex amicis meis, sed & mihi fors favit, ut oleum rubicundissimum, aqua supernatans ex \odot eliceretur.

De viribus Metallorum in genere nihil addo, nisi quod tanta inibi à majoribus deprehensa sint, ut principalioribus macrocosmi stellis, macrocosmiquæ membris principalioribus & dicarint, & nomina communia imposuerint, ut patet partim ex sequentibus, partim ex lib. 1. cap. 9. Schroderus.

Quod D. Autor iterum de peritomatis macrocosmici spiritus in locum metallificum, ut loquitur, sese influante omnium metallorum causâ efficiente producit, Calisthenem sequutus, quasi omnia metalla in hoc spiritu tanquam formâ specificâ conspirarent, & in-

ter se convenirent, ac non nisi accidentaliter pro majore vel minore puritate; maturitate vel cruditate, fluiditate vel firmitate &c. differrent, hoc partim supra Libro primo jamdum explosum est, partim in sequentibus refutabitur. Metallorum causas & originem sunt, qui in astutis inquirunt & principem saltem eorum partem eo deducere conantur. Quæ causa etiam, quod certis metallis Astrorum nomina fuerint imposita hisce originem suam quasi debentibus. Quæ sententia sanè adeo non adspicienda est. Globorum magni hujus Orbis Planetarii, inquit *Excell. Morhofius* l. c. p. 15. tum qua totum systema, tum qua partes nobiliores, inter quas in terrestri globo omnino referendi sunt spiritus metallici per vastissimum hoc corpus dispersi, nullam esse conspirationem aut mutuam efficacitatem, nemo mihi temerè persuaserit. Quis enim negaverit, aliquod communi aëre subtilius adhuc corpus, quod Ætherem appellare possumus, per universum hoc diffusum dari, quod secundum diversam texturam & figuram partium, item magnitudinem, motum &c. Omnia corpora pervadere & adequate poros implere possit illorum, quæ figura & magnitudine diversis portionibus insinuantis materiæ respondeant? Quod autem talis sit in hoc universo substantia, ex multis phænomenis probari potest. Refert *Digbam*, sed ex fide amici, radios solis per vasa vitrea & concava certo quodam modo disposita in purpureum & minutissimum pulverem præcipitari. Scripsit jamdudum *Th. Paracelsus* de solari pulvere ex speculis per radios solis collecto, quo rite præparato excitare in nobis igneam naturam queamus. Imò nonnulli eo deveniunt, ut statuunt, Solis ipsius substantiam ex auro liquefacto constare. Mirum igitur, si non semina etiam per terram spargeret ac in eâ substantiam sibi similem produceret; Solis & Lunæ vires in hæc inferiora satis perspectæ sunt. Illi cum Auro, huic cum Argento singulare intercedit commercium, quod nec Saturno cum Plumbo, nec Marti cum Ferro, nec Jovi cum Stanno, nec Veneri cum Cupro, nec Mercurio cum Argento vivo denegari nequit; Solis & Auri similitudinem ostendunt splendor, color, qui à sulphure optime digesto, quod à sole huic ingenerari creditur, provenit. De Sole, inquit *laudatus Morhofius* l. c. vulgaris opinio est, quod plumbo ac cupro, quo templa & ædes regi solent, aurum ingeneret. Quam licet anilem fabulam vocet *Honoratus Fabri*, novitamen, dicit, qui à plumbo ac stanno veteri per repetitas calcinationes & eductiones non contemnendo lucro aliquid auri & argenti expresserint; sive id à causis quibusdam latentibus productum, sive separatum fuerit. *Albinus* in *Chronico suo Metallico* p. 29. observavit, semper in fodinis Schnerbergensibus argentum copiosum sub Saturni in signum Cancræ ingressum accedente Lunâ repertum fuisse. De Margaritis Garcias ab Horto prodidit, eos post plenilunium captos cum tempore minui & decrescere; qui verò ante plenilunium capiuntur, huic vitio non esse obnoxios. Verùm magno Orbi planetario generalis ac universalis quidem influxus ac conspiratio cum metallicis hisce inferioribus Planetis denegari non potest, interim specialem ac particularem illorum causam sive constitutionem non absolvunt. Præterea *Dominus Autor* duobus metalla constare statuit, humiditate scilicet, quæ Mercurius dicitur, & spiritu seu igne, qui Sulphur. Duo hæc in sale fundata esse vitriolato &c. Verùm nolo hic multa de tribus dictis istis Principis Chemicorum hypostaticis disquirere, de illorum existentia, numero, & an omnibus insint corporibus & quantum à se discrepent in diversis subjectis, sed Lectorem remitto ad *Nobiliss. Robert. à Boyle* in *Chemiâ Scéptico*, item *Hamelium* *Lib. de consensu veteris & novæ Philof.* Lib. 2. Cap. 4. & *Ex-*

Langui Biblioth. Pharmac. Tom. II,

cellent. Rolfinch. in tr. de Chemiâ in Art. form. redacti. Vetetes illi ante *Paracelsum* Mercurium & sulphur tantum metallica statuerunt Principia, & quidem proxima, ut quæ manibus tractari & in oculos incurtere possunt, remota autem illis corporum principia fuerunt Elementa. Per Mercurium & Sulphur non intellexerunt illi, quæ vulgò sic vocamus, nam hæc potius recrementa metallica illis fuerunt, quàm vera Principia. Mercurius illis est substantia metallica ex perfectorum metallorum familiâ, immatura, ad levem calorem fluidissima, ponderosa, volatilis, summè durilis, non currens, ut vulgaris Mercurius, unicum & summum naturæ metallicæ agens. Hoc ita crudum in Naturâ inveniri ajunt, unde summâ arte eliciunt substantiam purissimam viscosam, quæ proxima materia est metalli constituendi. Hoc omnibus metallis commune est principium, sed prout sulphur vel purius vel impurius illud temperat, aliam vel aliam mistionem sortitur: unde vulgò diversæ illæ metallorum species constituntur. Hanc materiam in perfectorum metallorum incunabulis inquirere, cumque inter perfectâ metalla ab Auro compacto sperari nihil possit, ab Argento, vel aliquo, quod illi cognatum est, petere jubent. Hanc materiam ignem, Aquam, acetum vocant, quod in metalla perfectâ ita operetur, quemadmodum ignis in corpora inflammabilia, aqua in salia & glaciem, acetum in corpora, quæ in illo solvi possunt. Hanc substantiam tradunt exhibere se interdum instar lenti humoris, qui postea in optimum coagulatur argentum, cujus historiam refert *Albinus* in *der Berg-Kronick* p. 110. & *Nierenbergius* in *histor. nat. Lib.* 10. Cap. 19. Alterum Principium Sulphur est, spirituosum, penetrans, coagulans materiam metallicam. Ex Auro illud elici volunt, sed per materiale illud principium prius soluto; reliquorum metallorum sulphura, ut impura contemnunt. Sulphur illud in Auro longâ alteratione infixum, purum & incorruptibile evasit constituens, ex quo etiam, quamvis tenacius illic hæreat, separari posse testantur tam veteres, quàm recentiores Chemicis; Fitque hoc modo, ut quantum ponderis habuit Aurum, ex quo tinctura educta est, tantum argenti ipsa tinctura, si illi superjiciatur, colore suo tingat & in ipsum Aurum convertat. Quod cum fit, candida ex Auro massa remanet, æquè ut prius ponderosa, cui per excrementa color suus reddi potest, qui flavus ex purpurearum ac candidarum particulatum accuratâ mistione oritur, non secus ac cum ex cupro & Zinco inter se iustâ proportionem commissis substantia Auro haud ab similis resultat. Si Sulphur extrahitur, candidum fit Aurum, quod Lunam fixam appellant, cum pondus Auri habeat & in aquâ forti non solvatur. Hæc duo dicta Principia in sale vitriolato fundata esse statuit *Autor noster*, Utram autem illud universale sit, an secus, non explicat. Magna quidem Naturæ Architectonicæ instrumenta sunt ignis & salia, eleganter loquitur *Morhofius* l. c. sed varia, ut varia sunt corpora corporumque mistiones, quorum ministerio, pro subjectorum ingenio in compositione & dissolutione eorum utitur. Ea tamen illorum essentiam non ingrediuntur. Miræ in corporibus metallicis beneficio salium Natura facit vicissitudines, quæ subterranea pyrophyllacia per omnes terræ sinus & anfractus dispergunt, in fodinas metallorum, ex quibus varia inter se salium & sulphurum corpuscula in mineris deprehenduntur; attamen ad metallorum intimam constitutionem pertinere nemo dixerit. Hæc *Excell. D. Morhofius* l. c. Nos statuimus metallorum proximam materiam esse Mercurium & Sulphur in quovis specie distincto metallo specie etiam distinctum; remotam autem esse aquam. Quemadmodum enim totius universi Conditor omnia corpora naturalia in primâ mundi creatione ex aquâ

B b ; produx

produxit & iisdem vim sibi simile in posterum producendi concessit. Cui metallaita spadonia & infelicia dimiserit, quin etiam ex aquâ produxerit & virtute plasticâ donaverit? Scilicet ex aquâ minerali fermentis metallicis imprægnatâ, in quibus spiritus seminalis sive Sulphur sui multiplicativus gliscit, Bux metallicum efficitur, quod teste experientiâ & observationibus sæpe in profundis venarum & fodinarum specubus vel vaporetenus, vel instar liquidæ substantiæ oberrat & pro diversitate metallorum specificâ vi plasticâ donatum, longo annorum spatio sibi symbolizantem materiem matricum parietibus affigit ac perficit, ut hic crescat Aurum, ibi Argentum, alibi cuprum, ferrum, stannum, &c. Immo quod etiam minerale vel metallum prius non fuerat, tale postea etiam fuerit factum, quemadmodum ex probæ notæ Autoribus constat. Non raro contingit, ut Metallurgu in fodinis saxa dituens parietem lædat, ut dehiscat in timam, inde aliquid aquæ subalbidæ virescentis emanat, quod mox concrevit instar saponis liquidi, mutato pallor subviridi flavescit vel albescit, vel saturatius viridescit, & demum indurescit. Succus ille sive Mercurius Philosophorum interno suo spiritu seminali sive Sulphure Philosophorum fermento metallico tincto, quod aquam imprægnat, condensat, & sensim in succum mineralem in terrâ transplantat, perficitur. Nec minus verisimile videtur, alia etiam mineralia etiam solidissima antea fluida fuisse, antequam in lapides vel alia dura corpora concreverint, ex eo, quod in quibusdam locis aqua mox delapsa in lapillos condensetur; Nec novum in mineris Antimonii, Saturni, Jovis &c. Particulas lapidum metallicis corporibus circumfusorum inveniri, & alia Naturæ phænomena occurrere, quæ nostram sententiam stabiliant. Hancque etiam sine dubio uvatum, vitium aurearum & auri in arborem sæpe reperti causam fuisse puto, dum succus aurificus ex aurifodinis à succo vitium vel arborum in radicibus coactus & condensatus occultâ vi fuit attractus, ut dum vitis germina emisit, mirabili Naturæ instituto Aurum simul eruperit. *Alexander ab Alexandro Gen. D. 4. 9. Gaudet. Merul. Cosmograph. 10. 27. Mizaldus 2. memor. referunt, in citeriore Germaniâ intra Danubium, etiam in toto Mœni tractu & Nicri vites, cum per hiemem nivibus humo contactæ jaceant, liquatis post nivibus calore cœli redeunte mirifice germinare & frondes geniculatas emittere, sed vini parum effundere, inter eas quasdam claviculas & plerumque candicantia folia ex puro Auto germinantia habere, & simul coalescere, hasque Principibus una cum palmitibus vitis rimoso cortice dono datas ingente miraculo fuisse Fortun. Licetus Libr. 4. Cap. 72. de spontan. viv. ori. Varia hujus rei documenta adducit, ubi inter alia ex Petro Martyre in Novis Orbis Hispaniâ Insulâ Aurum è terrâ vitis modo circa arbores surgere testatur. Si Americanorum artificium locum invenit, qui Aurum per aquam quandam ita mollescere possunt, ut instar ceræ digitis tractari queat, & undique gemmæ inferi firmatis labris, palis & oris, nihil veritatis nostræ decedit sententiæ. Assertionem nostram præterea confirmat metallorum vegetatio accretio & multiplicatio, ubi per observationes constat, illa in matricibus crevisse & aucta fuisse. Si quis negaverit, Arbores illæ Philosophicæ ex argento vivo productæ, & mirabilis illa Arboris argenteæ in aquis ex eodem metallo germinatio, quæ à San-Simonio Bruxellis injecto pulvere, quem homo Leodiensis ignotus illi dederat, peracta est, teste Borrichio Lib. de Orr. & Progress. Chem. p. 103. demonstrare & ob oculos ponere possunt. Ingeniosus Casalpinus in Italiâ mineram ferri copiosissimam observavit, ob quam etiam illa fuerit nobilitata, Tyrtheni maris Insula incredibili*

copiâ illud producens. Nam terra eruta, dum minera tota effossa procedente tempore iterum in mineram ferri conversa; Cui & adstipulatur Fallopius & Georg. Agricola, ad Sagam, inquiens, oppidum Germaniæ in pratis erui ferrum, fossis ad altitudinem bipedaneam actis, addens decennio renatum denovo fodi, non aliter atque Ilvæ ferrum. Sic & de Plumbo Galenus scribit, illud crescere & augeri, de quo etiam Plinius Lib. 34. histor. natural. cap. 17. dudum prodidit, mirum, inquiens, in his solis Plumbi metallis, quod derelicta fertilius reviviscant. In Plumbiis secundo lapide ab Ambergâ dictis ad asylum recrementa in cumulos congesta exposita solibus & pluviis annis paucis reddunt suum metallum cum fœnore. In Auri & Argenti generationem si inquirimus, invenimus illa nec minus in fodinis augmenta capessere & multiplicari. Sic in valle Joachimicâ teste Gerardo Medic. argentum graminis morbo è Lapidibus minere veluti ex radice excrescit digiti longitudine. Ita aqua cœrulea Annebergæ inventa est, ubi argentum erat adhuc in primo ente, quæ coagulata redacta est in calcem fixi & boni Argenti. Simili modo in profundis fodinarum Hungaricarum specubus Aurum sæpe, ac si arborum rami fuissent, crescens viri fide digni ac periti observarunt. Cui subjungit A Costa in Nat. & Mor. Histor. Indic. Lib. 3. Cap. 5. fide propriâ se nativi & puri Auri moleculas aliquoties vidisse, quæ complures ponderarent libras, & ita ex peculiari venâ suâ incrementum sumplissent. Ex quibus luce meridiana clarius apparet, ex aquâ seu succo quodam metallico principio seminali plastico imbuto metalla generari, & quotiescunque hæc in terræ visceribus debeant produci, sufficere ex liquoribus sui generis interdum etiam in formâ halituum volitantibus metallicis rudimenta quædam semina in se continentibus produci, quorum virtute formatrice temporis tractu in hanc vel illam massam metallicam ex suo Mercurio & suo Sulphure constantem degenerant, perinde ut limpida aqua virtute seminalis sui principii in varia corpora vegetabilia effigiatur. *Hofmannus.*

Metalla non ineptè in classes tres collocantur, idque tam secundum conformitatem disparitatemve duritiæ, quàm secundum convenientiam præparationum.

Prima continet Metalla nobiliora, ☉ & ☿.

Secunda ignobiliora duriora, ♄ & ♀.

Tertia, Ignobiliora molliora, ♀ & ♄.

Præparationes Metallorum sunt.

1. Purgatio.
2. Calcinatio. 1. Immersiva. 2. Vaporesa ac Illinitionis, 3. Amalgamatoria. 4. Cementatoria. 5. Reverberatoria.
3. Volatilisatio: unde Metallum volatilifatum, id est, in spiritualement naturam redactum.
4. Extractio: vel potius maturatio: s. exaltatio; unde Tincturæ.
5. Sublimatio: unde Flores.
6. Salificatio: unde Sal.
7. Mercurificatio: unde ☿ s. *Schroderus.*

Super METALLORUM PROBATIONIBUS, vid. quæ sub titulo DOKIMASTICE METALLICA.

METALLURGIA.

Super ea hic exhibemus quæ habet Athanas. KIRCHERUS in suo Mundo Subterraneo, ubi scilicet agit

*De Artis Metallica requisitis, foderarumque
conditione.*

Et primò

*De Objecto Metallurgia; item de Causa materiali
& formali Metallorum.*

Relictis omnibus iis, quæ scholastici de objecto artium, & scientiarum, item materia & forma compositi naturalis tradere solent, tanquam vulgo notis; nos ad ea tantum calamum nostrum, quæ proximas causas metallogenesis concernunt, extendimus. Sed ut capram instituti nostri telam prosequamur, Ariadnæo filo arrepto, eo potissimum, quæ in difficili Physicæ labyrintho conduntur hucusque inextricata, Deo assistente, nos evoluturos confidimus.

Objectum nostræ Metallurgiæ materiale est mixtum perfectum pure metallicum, exclusis cæteris, de quibus jam in præcedentibus ubertim egimus, mineralibus: sunt autem aurum, argentum, æs, seu cuprum, ferrum, plumbum.

Formale verò objectum, modum & rationem dicimus, quæ ea in visceribus terræ natuta generat. In quantum verò erui possunt ex suis natalibus locis, & fundi, formarique in statuas, transmutati in invicem, cudi, fundi, liquari, fingi & figurati in annulos, torques, armillas, nummos, omnis generis instrumenta utensilia; variarum artium objectum esse possunt. Nempe Metallicæ, Statuariæ, Alchymicæ, Ferrariæ, Aurificinæ, monetariæ; ut verò negotiatorum subduntur permutationi, dant suam speciem arti collybistarum; de quibus in hujus operis decursu fule agetur.

Materiam proximam Metallorum, non materiam primam Peripateticorum, non stellarum influxum, non elementa, sed vaporem & exhalationem Sulphureo-sale Mercurialem dicimus quo unice Metallica corpora, tanquam ex semine chaoticæ massæ concreta, originem suam nanciscuntur. Materiam vero remotum, Hylên, elementarium quælitatum concursum, influxum stellarum dicimus; quæ omnia quomodo intelligenda sint, ex sequentibus patebit.

Notandum itaque in chaoticæ massa latere succum quandam pinguem salinum elementis congenitum, qui à subterranei ignis potestate in vaporem actus, per universas Telluris fibras dispersus, ubi matricem invenerit proportionatam, ei adhæreat, idemque longo temporis tractu coctus tandem in metallum glebæ seu mattici terræ appropriatum degenerat. Dixi succum primò, quo Mercurialem liquorem, sive spirituosam substantiam, quam humiditatem radicalem, omnibus rebus inexistente indigitamus. Dixi secundo succum pinguem, id est sulphur, quam pinguedinem illam omnibus rebus ad partium nexum inditam, & in sulphure potissimum elucescentem appellamus. Dixi salinum, quod sal terreneum elementum, utpote quod omnibus mixtis firmam consistentiam & fixam substantiam subministrat, quod quidem non tam in succo prædicto, quam in ipsa terræ glebâ potissimum natales suos ponit. Atque hæc tria sunt, quæ ad omnium metallorum compositionem concurrunt, ut postea ostendetur.

Atque hanc nostram sententiam congruam primis Philosophis esse, ita demonstro. Aristoteles lib. 3. Met. expresse ait, materiam metallorum esse va-

porem; quod ut ostenderet, præmittit duplicem halitum, unum vaporosum, alterum fumosum; & fossilibus quidem siccis, ut sunt Sandaracha, ochra, minium, & lapides, qui liquefieri nequeunt, halitus siccus competit; metallis verò, uti sunt, Aurum, Ferrum, &c., utpote quæ metalla ductilia, & liquefactibilia sunt, vaporem ad eorum genesin decernit, quod postea luculentius explicat lib. 2. de Gen. Animal. hisce verbis: metalla itaque habent in se humidum plurimum aqueum, passum tamen ita ab elementis, ut factum sit glutinosum. Scias tamen velim, Philosophum hoc loco vaporem non simplicem ex puro elemento aquæ intellexisse; quod inde pater, quod aqua attenuata ex simplici elemento aquæ non aliud à se specie differens generet, sed in id, quod fuit, tandem resolvatur, ut videre est in aquæ bullientis vapore, qui operculo in guttas abit, in aquam videlicet eandem ex qua in vaporem abiit: patet & in pluviiis, nivibus, grandinibus, similibusque de quibus in Meteorologicis. Aliud itaque sub isto vapore *μεταλλογεννητικῷ* latere præter simplicem aquæ vaporem, pulchro & nostræ sententiæ congruo sane ratiocinio, dum Aristotelis sententiam explicat, Albertus docet hisce verbis: materia proxima metallorum est humidum subtile, unctuosum, & viscidum sicco terrestri attenuato optime permixtum. Quid per humidum subtile aliud, nisi mercurialem naturæ humorem? quid per unctuosum & viscidum, nisi sulphur? (nam ut alibi ostendimus) est sulphur essentialiter pingue, unde tam facile accenditur, & colliquatur; quid aliud, sicco terrestri attenuato optime permixtum, nisi sal naturæ, quod composito consistentiam, corpusque præbeat, connotat? quia vero halitus ille vapidus semper exhalationem calidam, & siccam adjunctam habet, utpote sine qua non elevaretur; hinc fit ut quod in glebis metallicis siccum est, ab exhalatione sicca & calida proveniat, quod autem à vapido, id in metallorum materiam, ipso Aristotele teste, cedat: atque hoc est, quod Albertus dicit, terrestri subtili attenuato optime permixtum.

Imò hanc nostram opinionem variæ Auctorum sententiæ approbant: Gilgil Arabs, uti est apud Albertum, metallorum materiam asserit esse calcem & lixivium, sive cinerem aquæ madidum, ubi nemo pro calce, aut cinere, calcem, aut cinerem nostræ calci, & cineri similem intelligat velim; sed absque dubio intellexit terram comminutam, sive salem naturæ terræ inditum, quæ aqua infusa, sive mercuriali sulphuris vapore imprægnata, tandem in metallum abeat. Inest enim metallorum materiam humidum quoddam viscosum, ejus indicium est, quod ignis calore liquata fluant, frigore vero aëris, & aquæ rursus densentur. Hoc autem ita, teste Agricola, fit ut aquæ plus in ipsis sit, terræ minus: simplex enim aqua non est eorum, materia, sed liquor Mercurialis mixtus cum terra chaoticæ massæ inexistens à principio, quam deinde varii motus pariunt, aquæ fluxus terram molliens, terra cum aqua permixta, vis caloris agens in mixturas, ex quibus denique succus ille *μεταλλογόνος* elaboratur & gignitur, ita quidem, ut quatuor elementa, non nisi vehicula quædam sint instarum in vapore supradicto virtutum; sine hoc viium complexu coquatur terra, & aqua, quantum velis inde tamen non aliud extrahes, quam quod prius fuerunt, scilicet aquam & terram. Sed si spermaticus hic vapor (sic enim per analogiam quandam voco ad vegetabilium & animalium sperma) elementis accesserit, tum enim vero primo vires suas exerent, & pro condi-

tione materia, seu terrestrium glebarum, metallum specie differens producent. Sed hæc omnia in sequentibus libris, variis experimentis comprobabuntur. Ex quibus luculenter patet, metalla proxime ab aqua elementari, & simplici minime generari, sed à vapore singulis appropriato.

Quomodo verò in tantam durtiem crescant, merito quipiam dubitare queat, dico itaque non à frigore, nec à calore simpliciter sed solius humidi attenuatione, seu evaporatione, vel exsiccatione id fieri; cum enim duplices spiritus dentur in natura rerum calidi, & frigidi: ex iis quidem procedit calor in rebus principium: hi non secus ac illi, etiam à natura frigidi sint; sunt tamen subtilissimi, & spirituosi, uti ex vento Septentrionali constat, ut vulgò notum est, quandoque itaque abundant spiritus calidi: si sunt nitrosi, atramentosi, sulphurei & similes, tunc res, quas pervadunt, temperiem calidam acquirunt; si vero frigidi fuerint, uti ventorum Septentrionalium Spiritus, & ii, qui per loca nivosa transeunt, vel venti subterranei qui frigidissima loca glebarum, quæ naturâ frigidi temperamenti sunt, pervadunt, tunc res, quas pervadunt, frigidam temperiem acquirunt. Unde fit, ut uterque humidam glebam pervadens spiritus, calidus quidem eam attenuando in vaporem, frigidus vero eam exsiccando, & ab omni superflua humiditate exonerando, debitam unicuique rei, sive lapidibus, sive metallis durtiem inducat. Cuius rei veritatem Philosophus agnovit, qui loco supra allegato ubi duplicem halitum exposuisset tandem infert, res omnes calido agente, & frigido temperante calorem constare. Concreta itaque corpora, sive lapides sint, sive metalla non solo frigore concrefcere, dicendum est, sed calore, quo superflua & impura glebarum terrestrium humiditate consumpta, res juxta vaporis conditionem in hunc, vel illum lapidem, vel in aliud, aliudve à natura intentum metallum evadunt. Omnia itaque sunt vi caloris, tanquam principali instrumento; ex spiritu metallico, uti cætera proportionata affluente humido, generatur marmor & lapis quilibet alius & ex eodem metallum. Sicuti itaque marmor non generatur solo frigore, ita quoque metallum, quamvis postquam genitum est liquetur calore; sed firmatur, formaturque vigore spiritus metallici, dum unitur cum fixo mediante humido, semper agente calore. Sed quia alibi uberius hæc explicuimus, ad alia progrediamur.

Ad formam verò metallorum quod attinet, sunt nonnulli qui volunt, formas metallorum ex formis elementorum constare; verum cum forma elementorum accidentales sint, sequeretur metallorum quoque formas non nisi per accidens distingui, quod uti absurdum est, & sensatæ experientiae repugnat, ita quoque hanc sententiam superfluis verbis minime refutandam censeo: sanius itaque philosophabimur.

Dico itaque formas elementorum substantiales esse, & specie inter se distingui, quæ unicuique Metallo dant esse propriam, propriasque virtutes à cæteris distinctas; quod non tantum verum est in multiplici gemmarum, lapidumque differentia sed & in metallorum speciebus. Sic Adamas, Ophites, pumex est id quod est; quilibet enim lapis, & qualibet gemmæ propriam suam formam, quæ hæc, & illa gemma dicitur, & ab alijs specie distinguitur, habet: forma verò hæc non ab elementorum mixtura, non à frigore, calore, humiditate, & siccitate proxime producitur, sed à seminario, & spiritu Architectonico materiae inxi-

istente, qui illam prout seminatium postulat, efformat, & pro certa & indivisibili combinationis lege elaborat, per quod quidem seminarium nihil aliud intelligimus, quam Sulphureo-sale-Mercuriale Chaos, ex quo à primordiis rerum à divino Architecto producta sunt omnia. Legat Lector lib. VI. Sect. I. ubi de Seminariis Naturæ uberius ratiocinati sumus. Seminarium verò adeo creata sunt tanquam rerum principia, ex quibus singulæ rerum species essentielles suas formas nanciscuntur: quæ quidem seminaria non semper certis corporibus, distinctisque concluduntur, uti in herbarum seminibus fit, sed sæpe in materia ita manent, ut conspici nulla ratione queant; sic in ramo salicis seminarium arboris confusum est, neque enim salix ulla semina profert, quod tamen ibi esse, propagatio arboris sat superque docet; nam si ramus amputetur, ac terræ committatur, producit ex ramo arbor, ac ex illa infinitæ aliæ; quod & experientia in arte phytetica monstrat: eodem pacto in lapidum, gemmarum, metallorumque Genesi Seminarium etsi conspici non possit, id tamen & gemmis, & metallis principium præbet, & plastica spiritus facultate vel in gemmam vel in metallum abit: quemadmodum enim platanus, morus, tilia, abies, differentes ramorum formas habent, ita diversa metallorum genera, ut Aurum, Argentum, Ferrum, &c. Adinstar arborum suas à mineris efflorescentias, seu plantas metallicas producant quæ uti illæ, ita & hæc formas, virtutesque habent specie distinctas quæ in X I. libro variis, & miris experimentis Deo dante comprobabimus.

Cum itaque Metalla ex Sulphureo-sale-Mercuriali vapore halitui sicco mixto generentur proxime, nos Metallum in genere ita definimus: Metallum est corpus fossile, durum, igne liquabile, & malleo in omnem partem ductile. Dixi corpus fossile quia ex fodinis eruitur; durum, quia corpus concretum & compactissimum; igne liquabile quia ex sulphurea pinguedine coaluit; ductile quia viscositate pollet, quæ partes partibus veluti glutine connectæ facile malleo extenduntur. Si verò ex simplici aquæ elemento, & frigore concrefcere non secus ac glaciæ calore nimio, ob incomptam durtiem diffunderent, igne liquata maderent, neque durtitate pollerent ulla; ergo ex simplici aquæ elemento, aut frigore constare non possunt. Ab hac definitione rejicimus Mercurium, qui neque ductilis est, neque fuit in igne, sed in halitum resolvitur, corpus tamen metallicum est primario ad *μεταλλογενέσιν* concurrens.

Utrum Cælum & Stelle ad metallογενέσιν concurrant, & quomodo Sidera ad Metallorum productionem concurrere possint.

Opinio, quæ docet, ex Astrorum influxu Metalla originem suam compositionemque habere, ita passim invaluit, ut etiam in sapientissimorum Philosophorum, quod satis mirari non possum, animis locum invenerit: putant enim vim stellarum influxivam adeo subtilem esse, radiis tanta vi penetrandi instructam, ut vel in intima, & profundissima Telluris viscera vibrati, proportionatam glebam, concurrentium elementorum actione, in hoc vel illud metallum cogant, ut proinde septem metallorum species, ex septem Planetarum influxu sortita sint denominationis exordia; solem enim Auro;

Argen-

Argento Lunam; Jovem Aeri; Martem Ferro; Venerem Stanno; Argento vivo Mercurium; Plumbo Saturnum præsidem ponunt, & patres matresque metallorum vocant; quam denominationis rationem Alchimici ambobus, ut dici solet, brachiis amplexi, eandem ob causam dicta metalla suis etiam Planetariis characteribus insignite non sunt designati, uti in margine videre est. Sed qui hæc penitiori rationis turina expendit, illa sola divinatione niti, videbit, & apud imperitam plebem ingenti plausu excipi: re tamen vera meras nanias, & aniles fabulas, quæ in Philosophiam per supersticiosos Chaldæorum, Ægyptiorumque Astrologos irreperunt esse comperiet, uti fusc in Oedipo Ægyptiaco de Astrologia Ægyptiorum exposuimus; nemo tamen dum hæc assero, hoc ipso cælestium corporum, siderumque influentias me negare existimet velim; hæc enim negare non tam imprudentis, quam imperiti Philosophi esse existimo. Hoc tantum dico, fieri non posse, ut stellæ actinobolitis suis, seu quod idem est, ignea Lucis suæ irradiatione immediata in profundissimis terræ abyssis metalla producant; cum tantum absit, ut illi radii terram penetrent, ut potius, simul ac terræ superficiem tangunt, mox in alias aliasque partes retroacti reflectantur; Si enim ulterius pergerent, nulla in terræ superficie reflexio fieret, quod omni experientia repugnat; sequeretur etiam, nullum in extrema terræ superficie calorem procurari, cum calor in diversis climatis major, aut minor intensio non aliunde proveniat, nisi ab altitudine Solis, uti fusc demonstravimus in Arte magna lucis & umbræ.

Sed Dices: hanc sententiam *μεταβολόν* non in radiis, sed in occultæ cujusdam virtutis defluxu consistere, quæ vis omnia penetrans, effectum metallicum tandem in proportionata materia consequatur. Sed cum omnium occultarum influentium virtus non nisi per calorem, & lucem, quem radii secum semper à natura initum habent (utpote quæ dictarum virtutum influentium vehicula quædam sunt) deferantur, utique cum reflexis radiis, virtutes una quoque reflecti, & viciniori aeri communicari necesse est, aer enim iis imbutus deinde aquis vegetabilibus, sensitivis, inanimatisque communicat, uti paulo post videbimus. Atque hinc patet, vanam esse eorum opinionem, qui per calorem, & lucem, aut radiationem stellarum influentium quidpiam intra terram produci posse existimant.

Cum itaque lucem, calorem & influentias Cæli, siderumque supra minimè me negare asseruerim; quomodo itaque ad productionem subterraneorum concurrere possint, jam explicandum restat.

Dico itaque, omnia cælestia stellarum, siderumque tam errantium, quam inerrantium corpora, non solum per calorem, lucidosque radios, sed & per virtutes específicas unicuique cælestium corporum proprias, in inferiorem mundum, id est, elementarem agere; de quibus uti in primo Tomo Libro quarto, & in nostris itinerariis copiose egimus, sic ea reiteranda non duxi: Solum hoc dico, latere in singulis sideribus vim quandam specificam à Deo Optim. Maxim. Sapientissimo Architecto, tanquam naturalem corporis dorem, quam per continuam *Συμπύκνωση*, seu effluvium, elementaribus corporibus intuant. Has autem virtutes influxivas semper secundum analogiam quan-

dam respondere iis virtutibus, quæ in mixtis sublunaribus elucescunt, quemadmodum in quarto libro hujus operis, de Lunari in Mari influxu sufficienter ostendimus. His itaque positis, quomodo Astra ad subterraneorum Genes concurrant, explico.

Virtutes hæc specificæ Soli, Lunæ, stellis inditæ, quas influentias alii, nos *πνεύματα* vocamus, sunt veluti semina secundum analogiam quandam producendis rebus implantata, quæ primo quidem influxu suo aeri, aer hisce veluti tinctus in aqueum elementum derivat. Aqueum elementum iis fœtum, per Solem & Lunam influxus, & refluxus quotidianos agitur, eos per occultos subterraneos canales in abditos terrarum tractus derivat; ignis verò, seu Sol subterraneus aquas coctas in vapores resolvit, vapores resoluti, qua data porta patet, per intimas terrarum rimas, fissurasque, veluti sanguis per venas, capillares vocant, diffusi, ubicunque similem & proportionatam glebam reperiunt, eidem adhærentes, veluti per magnetismum quandam naturæ similitudine tandem attracti, nunc in hanc, nunc in illam gemmam, aut lapidem, modo in hoc vel illud minerale, aut metallum degenerant. Atque hoc pacto cælum & sidera ad subterraneorum genes, mediantibus videlicet elementis, & subterraneo Sole Vulcanio concurrere posse existimo. Sed hæc paulo amplius deducam.

Cum Deus universam Mundi machinam cum omnibus quæ in ea continentur, ex chaotica illa primordialis mundi massa in principio eduxerit, singula astrea corpora sua soliditate, humo, is fluxili natura, ignea ad hæc ipsis addita portione instruxerit, quæ uti in sublimibus illis cælorum tentoriis ab omni sæcum miscella summe ea depurgavit, ita verisimile quoque est, inesse ipsis ex mira illa rerum combinatione nonnihil, secundum analogiam quandam, earum rerum, quibus omni in hoc sublunari mundo constare videmus, videlicet præter quatuor elementorum portiones, sulphuri quoque nostro, mercuriali nostro liquori, & sali nostro analogum; quæ uti pro tenuitate, & summa subtilitate ad nihil aliud, quam ad corporis sui conservationem conserunt, ita per defluxum sublunari mundo, crassioribusque elementis communicata, tandem corpus acquirunt, atque per admirandum cælestium, terrestriumque magnetismum, tandem in earum rerum varietatem, tum extra, tum intra elementaris mundi abditissima reconditoria, quam satis mirari non possumus, degenerant.

Cum itaque Mundus Inferior, teste Aristotele, à Superiore gubernetur, certe non per solum motum, calorem, lucemque id præstare censere debemus, sed per virtutes unicuique astreo corpori peculiare, quarum actinobilissimi Stellarum quædam veluti, uti supra dixi, vehicula sunt, omniumque virtutum bajuli; qui primum aëreo elemento communicati, illis deinde aër imprægnatur, sine cujus ministerio quicquid in sublunari mundo, sive in aëre, sive in aquis, terrisque oritur, in esse suo perfectio, & naturali, sine cælesti illa virtutum aporrhæa, quæ aëri peculiari quodam modo inest, conservari minime potest; hic denique cælestibus sætus impressionibus, uti perpetuo aqueum elementum motu suo flagellat, ita quoque illi virtutes sibi insitas, una cum cælesti profluvio implantat; unde cælestibus, aërisque spiritibus innumerabilem illam rerum varietatem paritur, quam in Oceano, Maribus, Lacibus, fluminibus contuemur. Cum enim aër, solus

ex se, & sua natura nutritioni nequaquam servire possit; utpote tenuiori substantia præditus, hinc aqueo elemento virtutes cælitus hausas communicat, ut corpus aliquod ad nutritionem rerum omnium acquirat: hoc enim pacto nulla res aqua, seu humido carere potest, imo sine eo Mundum interire necesse foret.

Nos itaque ingens ille Geocosmi uterus humido hoc in subterraneorum Genesi destitutus videri posset, hinc summa & ineffabilis Dei sapientia effecit, ut aer pro naturæ suæ subtilitate per terræ poros, aqua verò per constitutos à natura canales hydrogogos in intima terræ viscera, & profundissimas abyssos delata, inde subterranei Solis ope, universam Telluris molem diffusis halitibus, tum ad generationes fossilium, metallorumque, tum ad vegetabilium, quæ ex ipsa terra ortum suum nanciscuntur, Geneses, fecundaret, aleret, conservaret.

Ex quibus aperte patet primò, elementum purum, & simplex ad rerum compositionem concurrere minime posse; neque dum elementorum mentionem facimus, nos elementa intelligere. Hoc pacto in terreno corpore qualicumque tandem modo salem potissimum dominari dicimus, cujus mira facultas coagulativum rerum elementum asserimus inter cætera quatuor; quod quidem nunquam credidissimè, nisi id Spagyrica ars me docuisset; siquidem in quacunque tandem terrestrium corporum Anatomia seu resolutione, salem quendam igneum incombustibilem, fixum & permanentem spiritum contineri vidi, cujus virtutes adeo mirabiles sunt, ut vix iis, qui hujusmodi abdita naturæ sacramenta ignorant, credi posse videantur; experieris quippe humidum cum ignea pinguedine, hanc cum Terrena quadam substantia, qui ipse sal est, tanta æqualitate coaluisse, ut abinvicem amplius separari non possint; ut proinde non male per humidum istiusmodi, mercurium naturæ; per igneam pinguedinem, sulphur; per ipsam terrestrem substantiam, salem Chymici intellexerint, sine quibus, nisi elementa imprægnata forent, certe ex se, & sua natura nil prorsus heterogeneum producere possent. Terra siquidem pura cum puro humido conjuncta nil nisi lutum conficeret omni virtute destitutum.

Secundo patet, cælum & Astra tanquam principium universale, & remotum ad metallorum, cæterorumque mineralium Geneses concurrere, in quantum virtutum cælestium, impressionumque astralium veluti quædam vehicula sunt; proxima verò metallogeneseos principia, esse virtutes devectoras per aerem, & aquam in intima terræ viscera, ubi per vulcanium ignem coctæ, digestæque, tandem in semen cedunt omnium eorum, quæ ex terra originem suam sortiuntur. Adeoque proxima Efficiens causa proprie ignis subterraneus est, materialis vapor sulphureo-sale-mercurialis; Formalis, proportio tenenæ glebæ ad hoc, vel illud metallum, aut minerale producendum: Finalis denique causa, usus infinitus ad humani generis & naturæ necessitatem.

Quomodo Humor ille unctuosus, ex quo Metalla componuntur, à natura elaboretur, & quid in eo Sulphur, Mercurius, & Sal sint?

Diximus in præcedentibus, pura elementa, aquam & terram, nisi ea aliis rerum, quibus conferra sunt, seminibus alterentur, ad compositionem metallorum concurrere non posse: uti enim naturâ suâ homogenea sunt, ita semper in homogenea resolvuntur, atque ex igne patet, qui attenuatum humidum in id quod primò fuit, resolvit; aqua verò pura terræ puræ juncta, lutum facit, quod calore attenuatum in ea, quæ prius fuerunt, scilicet pulverem terræ, & aquam calido resolutam revertuntur. Cum itaque supra metalla, corpora dura, firma, solida, malleo extensibilia definierimus, illa certe aliquid aliud, quo in hujusmodi formas degenerant, intra se occultum habere cognoscuntur: quomodo enim in solidam illam duritiem sola terræ simplicis cum aqua simplici mixtura degenerare possunt? quomodo inseparabilis illa pinguedo & viscositas, qua metalla malleo sine ruptura extendi, aut sine ullo humidi defluxu aut madefactione, solo simplicium elementorum ministerio eliquari valeat? illud sane nemo concipere potest. Cum nihil det, quod non habet. In intimo itaque elementorum centro latere tantorum causam effectuum, quod metallis originem suam præbeat, necesse est. Quod quidem nihil aliud esse dicimus, quam humidum illud unctuosum, & viscidum, cujus vapor continuo expirans, & intra intimas telluris fibras, montiumque abditos ductus diffusus tandem ubicunque puritatis, impuritative, nunc repererit, ibi pro ratione puritatis, impuritative, nunc lapidem, aut gemmam, modo minerale, aut metallum cum corpus generat.

Quomodo verò à natura hoc humidum unctuosum, & viscidum elaboretur, merito quispiam dubitare posset. Dico, id ex defluxu astralium virtutum, spirituumque cælestium derivari, qui Spiritus uti ex origine sua purissimi sunt, & ab omnibus terrestribus sæcibus quam purgatissimi, ita quoque ob summam, & inexplicabilem, tenuitatem, subtilitatemque, statim omnia elementa penetrantes, magnetico quodam attractu iis, quæ in primordialibus rerum chaotica massa idem fuerunt, mira quadam ratione junguntur; elementa verò aer, & aqua iis facta per maris accessum recessumque, Solis & Lunæ ministerio causatum, in intima Telluris reconditoria diffusa, ibidem à subterraneo igne denuo decocta, digesta, depurataque per multiplicem, iteratamque coctionem in humidum illud unctuosum, pingue & viscidum evadunt, cujus vapor per abditas terrestrium venarum fibras delatus primo insitas & invisibili salis virtute in terram saluginosam convertitur, quæ continua ejusdem resoluti vaporis irrigatione irrigata solvitur, & depuratur multis modis, tum sublimatione tum filtratione per terræ poros facta. Atque hoc pacto ab omnibus terrestrium sæcum quilibet expurgatum, tandem in genus quoddam candidissimi sulphuris degenerat; quod quidem sulphur purum, totumque matricibus terræ conclusum calore vulcanio, & sui ipsius ulterius coctum, multorum annorum decursu in argentum proprii salis spiritibus figitur.

Si verò hoc sulphur album, & incombustibile fortiori adhuc igne ad rubedinem usque torqueatur, id

tandem depurgatissimum sub æquali humidi pinguis, & terræ portione, inseparabili unione in aurum purum transmutatur. Quæ omnia undecimo libro experimentis ad naturæ exemplar accommodatis ostenduntur: Si vero hujus humidi unctuosum, & viscidum vapor nondum ab omni impuritate & fœculentis recrementis expurgatus fuerit, tum pro ratione gradus puritatis, impuritatise, nunc in perfectius modo in imperfectius metallum convertitur. His itaque expositis.

Jam merito quispiam querere posset, quidnam sit illud humidum unctuosum, & viscosum? Dico illud nihil aliud esse, quam humidum illud radicale naturæ, quod uti à primordiis rerum cahotica massæ ineffabili divini Architecti sapientia inditum fuit, ita in omnibus, & singulis rebus in hunc usque diem perseverare; & passim Mercurius naturæ dicitur, cujus unctuosum, & viscidum nihil aliud est, quam calidum illud pingue naturæ rebus omnibus insitum, quod & analogia quadam, Sulphur naturæ vocant Chymici; quod verò terrestre sub ipso latet, sal naturæ vocant, eo quod omnibus rebus firmam substantiam, & corpus præbeat. Atque ex hisce omni constare, Ars spagyrica jam dudum experimento comperit. Ne verò quatuor elementa in rerum natura otiosa viderentur, naturæ humidum hoc Mercutiale ab initio rerum aquæo, Sulphureo-calidum innatum igneo & aëreo; terreo verò elemento fixativum naturæ saltem inest, ut veluti, vehicula quædam forent eorum principiorum materialium, ex quibus omnia constarent. Hinc omnes fere Philosophi pro materiali principio metallorum, in genere constituerunt humidum terræ mixtum vaporem, uti ex præcedenti capite patuit. Quia tamen proximum naturæ progressum in ordine ad metalla componenda non attigerunt. Hic eum Lectoris gratiam, fusius forsan, quam par erat, sola experimentalis notitia doctus, ductusque elucidandum existimavi; cum in Physicis rebus sine experimento philosophari, idem sit, ac si cæcus de colore judicium ferre insipientius præsumeret.

Quomodo omnia ex terrestris & humidi caloris efficientia producantur: item, quid sit illud, quod metalla reddit in igne flu da, non verò lapides, & plantas cæterasque res? & quomodo natura in dissolvendis & perficiendis rebus procedat?

Singulare hinc naturæ secretum pandam, quod ut intima compositionis rerum mysteria enucleat; ita quoque futurum spero, ut hisce probe intellectis, metallorum origo, & causæ, Lectori quam penitissime innotescant; quod tamen aliis terminis proponam, quam in scholis usurpari assolet, idem tamen Aristotelem sensisse, si verba ejus recte expendantur, patet.

Duo sunt in rerum natura (si res sepositis omnibus Metaphysicis contemplationibus sub rigore Physico considerentur) quæ ad omnium rerum subsistentiam concurrunt, omnibusque insunt, omnium generationum, & corruptionum causa sunt. Et primo quidem est materia terrestris, spiritiosa, concreta, corpulenta; in cujus centro latet, id quod rebus substantiam, corpulentiamque præbet, quem fixum naturæ saltem appellamus; ut verò materia talis, quam descripsimus sit, id ab insito fixativo elemento habet. Dixi materiam, quia omni vi activa se-

cundum se considerata caret, & in tantum quidem agere dici potest, in quantum innato appetitui, quo prædita est, sive quod idem est, insito quodam magnetismo, trahit ad se partes illas, maxime sibi consimiles, & proportionatas. Dixi, materiam hanc terrestrem esse spirituosam, subtilem, activam, id est, centalem naturæ saltem volatilem, qui actuando perficit & complet alteram partem; dum illi conjungitur, & uti ex illa alia hæc accipit corpulentiam, consistentiamque, ita quoque communicat illi vim activam, formalem & specificam. Et quandocunque hi spiritus subtiles, & tenues evaporant, materia dissolvi dicitur, remanente materiali substantia fixa; & uti hæ partes formales ad agendum, ita illæ materiales ad patiendum nature sunt; ut patet ex artificiosa resolutione mixtorum, quæ partes ex diversis mixtis essentialiter diversæ extrahuntur: sic spiritus nitri, aluminis vitrioli diversissimi sunt, à spiritibus, qui ex vegetabilibus vini rosarum, liliorum, aliorumque innumerorum distillantur, extrahunturque. Ut proinde non immerito, quemadmodum à Petipateticis resolutio in materiam primam non conceditur, ita quoque nullum corpus omnino spiritus experts dari possit, si enim quantumvis corpora in cineres resolveris (quæ omnium aliorum siccissimi creduntur) tamen & illi ulterius adhuc partim in saltem sublimantur, partim, si violentiori igne torqueantur, in vitrum fluunt: hæ vero partes, materia videlicet, & spiritiosa substantia, cum inter se valde diversæ sint, ut inter se uniantur, maxime vinculo opus habent, quo strictis amicitia legibus uniantur, copulenturque: quod quidem nihil aliud est, quam humidum, medium quid inter volatile, & fixum, inter corpus & spiritum, sive quod idem est, inter crassum & subtile. Quia tamen nulla rerum mutatio sine humidi hujus attenuatione, sive dissolutione fieri potest; hinc natura deputavit calorem, veluti Archæum quendam, cujus ope humidum glutinum naturæ attenuatum dissolvatur, quo dissoluto, & partes dissolvuntur, spiritiosa evolvant, corpora concidunt. Quanto verò hoc humidum facilius resolvitur, tanto quoque corpus facilius corruptioni subjacet: quanto verò humidum pinguius, viscosius, compactiusque est, tanto difficilius quodque dissolvi necesse est; & consequenter ob partium probe commixtarum constipationem minori corruptioni obnoxium est. Hinc patet, cur aquea humiditas parum viscositatis habens, facile attenuata in vaporem abeat; quia videlicet vapor humidum aqueum habet valde indigestum, partibusque suis haud probe connexum; contra quæ humiditatem habent magis coctam digestamque, ei partibus intime commixtam, illa prædominante pinguedine, & viscositate, veluti tenaciori vinculo difficulter dissolvuntur.

Patet itaque ex his quomodo materialia nostra principia; ex quibus omnia constare diximus, intelligenda sunt: siquidem, quid spiritiosa illa substantia aliud denotat, nisi sulphur? quid aliud fixum, nisi sal? & quid denique aliud humiditas illa viscida, quam Mercurium designat? uti in præcedentibus ex mente veterum sapientum diximus, pari pacto in vegetabilibus, & vividis, pars volatilis anima, fixa corpus, humiditas vero vera & Physica unio dicitur, quo anima corpori copulatur.

Cur verò humiditas illa in vegetabilibus animalibusque tam facile, in mineralibus, metallicis quæ corporibus tam difficile solutu sit, merito quispiam dubitare posset; quoniam verò in hac magna rerum natura

naturalium cognitio consistit, eam paulo fufius enodabimus.

Nil notius est, quam quod humiditas in quibusdam calore attenuata mox in vaporem evanescat: in aliis verò etiam igne vehementissimo in vaporem resolvi non possit: quomodo autem id fiat, id paucis notum esse existimo. Dico itaque humidum illud mercuriale inter sulphur, id est, spirituosum & salem, id est, fixum, medium quoddam esse, uti supra innuimus: hoc verò humidum viscosum & naturæ gluten, pro diversitate corporum jam aliis vel minime adhæret, sub minima parte miscetur; aliis vero mediocriter, ei per partes ei commixtum conjungitur. Unde triplex humidi species exsurgit; prima est, aquea quædam humiditas, prorsus incompacta, & omnis fere viscositatis experta: altera compactior: tertia compactissima reperitur. Prima videtur in luto, quod ex pulvere aquæ commixto fit, quot uti incompactum est, & exigua viscositate constat, ita quoque vel minima externi caloris attenuatione in sua elementa dissolvitur; si verò terrenum pulverem oleacea materia subigas, tum enim verò massa fit, quæ non tam citò ab externo calore, nisi à vehementiori igne urgeatur, resolvitur; quia materia pinguis, & viscosa pulveri intimius nectitur, unde spiritus ne avolare valeant, continentur: quod & in cera fieri experientia quotidiana docet. Causa enim cur calore attenuata & rarefacta dum fluit, spiritus non avolent, est ob viscidum illud humidum, quo partes partibus ita copulantur, ut calor cum in auras eam evaporare non permittat, saltem eam in fluxum resolvat, ob tenacioris humidi viscidum vinculum, quo partes partibus nectuntur.

Atque hinc patet quoque, cur ligna, & lapides igne comburantur, & illa quidem in cinerem, hi verò in calcem, metalla vero liquata fluant. Nam ligna, & vegetabilia quævis, uti non bene compactum humidum ob viscositatis defectum habent, humiditasque eorum magis aquea est, lapides verò exigua humiditate pollent; hinc fit, ut in utrisque partes spirituosæ ob defectum viscidum humidi vegetabilium partes fixas in cinerem, lapidum vero ob sulphuris pinguedinem in calcem resolvant: metalla vero ut humiditate viscosa pollent, ita quoque partibus partes intime commixtas compactasque habent; hinc fit ut ignis ministerio humiditas quidem illa attenuetur, & in majusculum incrementum assurgat, non tamen separetur, neque à corpore suo recedat, sed totum in liquorem abeat.

Quicumque itaque hanc naturæ operationem penitus considerat, is necessario fateri cogetur, metalla igne sollicitata minime fluere, eo quod aqueo prædominio prædita sint, sed ob insignem radicalis humidi visciditatem; qua partes partibus ita nectuntur, ut eas in fumos, vaporesque abire non permittat: sic enim humido aqueo simplici constarent, illa utique ignis ope non fluere, sed in calcem converterentur, quemadmodum in lapidibus igne tortis accidit; fluunt itaque metalla igne, quia humiditas illorum, quo spiritus metallici cum vapore colligantur, vi caloris non recedit, sed ita attenuatur, & excrefcit, ut attenuet quoque & rarefaciat partes, quas nectit; & hinc est metallicarum fluxus partium. Quod & inde patet; si enim metallis heterogenearum partium miscellæ, glebarumque terrestrium quiescentiæ admixtæ fuerint, solæ homogeneæ metalli partes fluent, cæteris diversi generis rebus vel in scotiam, v. l. lappam pompholigam, fuliginemque, cum aliqua metalli diminutione abeuntibus.

Atque hæc est ratio, cur metalla igne torta puriora evadunt quia partium heterogenearum miscellæ non bene compactæ, & humido aqueo abundantes, ignis attenuatione defectuque visciditatis avolant, metalli humido ob visciditatem irresolubili, quod verò metalla fluxu rarefiant experimento Fabri compertum habent; si enim in candente ferro foramen effecerint, id multo candente adhuc ferro latius, quam ubi id refrigeratum fuerit, reperiunt: sicut enim ferrum calore majorem, ita frigore contractum minorem locum occupat. Sed de hisce pluribus in undecimo libro de metallicis artibus, ubi & hæc omnia experimento comprobata reperies.

Atque hinc luculenter colligitur, quomodo calore attenuentur & fluant omnia, utique sapientissimo naturæ consilio, ut videlicet perpetua, perennique rerum vicissitudine universa geocosmi facies mutetur; & quia humiditas est vinculum, quo partes spirituosæ cum corpore, & materia conjunguntur, soluto vinculo spiritus à corpore sine ullo tamen eorum interitu, sed separatione tantum facta, ita recedant, ut semper tamen in materia nonnihil spirituum adinstar naturæ seminum, remaneat: qui si rursus ad istiusmodi corpus deferantur, magnetica quadam lege, ab iis qui intus remanent, attracti, unitique novo humido colligantur. Atque hæc est mira in natura rerum physica *περικυκλωσις*.

Hinc patet quoque omnium meteororum geneses dicta naturæ industria fieri, atque adeo omnes generationis, corruptionisque leges, tam in majori quam in minori mundo inde pendere: quamvis enim omnium spirituosorum effluviis variae & innumerabiles pene differentiae constituentur, ad duo tamen, tanquam ad genera reliquæ omnes revocari possunt; scilicet ad humida & sicca, quorum ista vaporum, hæc halituum nomine indignantur; quæ cuncta in triplici natura regno minerali, vegetabili & sensitivo vires exerunt mineralia, & metallica corpora subterraneo vulcano sollicitata, attenuataque in vapores, vel halitus resoluta, in superficiem usque terræ extimam exaltantur, ubi caelestibus radiis percussa, & ad maximam subtilitatem redacta magnum illud æreum Mare replent: vegetabilium vero sensitivorumque omnis generis spirituosæ substantiæ pariter caelesti lucæ percussæ, resolutæque rursus æreo concreduntur oceano, ubi frigore resolutæ, denuo per nives, grandines, pluvias, nebulas, rores, terræ redditæ, quisque spiritus, ad id, unde avolaverat, corpus nativum magnetico quadam tractu confluit. Sed de hisce fufius ultimo libro, ubi novam physicam forsitan hucusque vix notam aperiemus. Atque has naturæ operationes ars imitatur, quæ mineralia, vegetabilia animaliaque distillando, inde tot aquas, olea spiritusque extrahit differentes, quot in rerum natura differentia mixta sunt: itaut per salem fixam materiam physicam, per mercurium humidum, omnium gluten; per sulphur verò omne spirituosum veteres Philosophi intellexerint; ex solo enim simplicium elementorum confluxu, tantam, tamque innumerabilem rerum diversitatem, nasci, credat, cui placuerit, ego aliter à natura doctus, hic non ea, quæ Metaphysicos conceptus, sed quæ Physicam experientiam concernunt, tradenda consultius esse existimavi.

*De Metallorum, cæterorumque Mineralium
Fodinis, Fossorumque morbis &
remediis.*

& I.

*Quenam ad perfectam Metallica Artis notitiam
requirantur, sive de conditione Præfecti
fodinarum.*

Antequam Artis nostræ metallurgicæ adyta profundius ingrediamur; primo quidnam ad omnimodam hujus artis notitiam requiratur, quibus dotibus, & naturæ talentis instructum eum esse oporteat, qui hujus facultatis professionem suscepit, paucis exponamus.

Primo, metallurgus, sive fodinarum præfectus, divinum cultum omnibus cæteris præferat, memor illius; quærite primum Regnum Dei, & cætera omnia adjicientur vobis; ne, dum sollicitius terrenos, caducosque scruta ut thesauros, avaritiæ voragine haustus, animæ suæ jacturam pariat. Timori itaque Domini juncta assiduitas, & diligentia, qua omnia juxta mellicæ artis canones, regulas & præcepta disponantur, hoc ut plurimum bonum adducit, ut his, qui & norunt ea, quæ facere oportet & curant ut perfici possint, pleraque omnia secunda, & prospere eveniant.

Secundo, ut metallurgus omnes prohi peritque viri partes expleat; necesse est, ut artis suæ sit peritissimus; nimirum ut primo noverit, qui mons, qui collis, quæve vellestris, aut campestris positio utiliter fodi possit, aut fossionem recuset. Deinde venæ, fibræ, commissuræque saxorum ipsi pateant: mox multiplices, variæque terrarum succorum, gemmarum, lapidum, marmorum, saxorum, metallorum, mixtorum species perfectas habeat, omnem quoque operis sub terra faciendi rationem cognoscat. Nota sint ipsi materiæ experiendæ, parandæque artificia ad excoctionem, quæ uti diversæ sunt, ita quoque indifferentibus metallis differentem exigunt modum: Alium quippe exigit aurum, argentum alium, cæteraque metalla alium, aliumque, quod & de succorum concretorum, salis, nitri, aluminis, chalcanti, sulphuris, & bituminis excoctione diversimode peragenda intelligas velim.

Tertio, metallurgus antequam *μεταλλορύτιν*, sive venarum fossionem aggrediatur, hæc septem secum consideret. Primo loci genus, habitum, aquam, viam, salubritatem, dominium, vicinum. Quod ut possideat, multarum artium disciplinarumque notitia instructus sit oportet; primo Philosophiæ, ut subterraneorum ortus, & causas, naturæque cognoscat; secundo Medicinæ, ut fossoribus, cæterisque operariis providere possit, ne in morbos, quibus præ cæteris expositi sint, incendant, & si inciderint, vel ipse eis curationes adhibere, vel ut medici adhibeant, curare. Tertio Astronomiæ ut agnoscat cæli partes, atque ex his venarum extensiones diducet; Geometriæ quoque haud sit imperitus, ut quam alte sit puteus fodiendus, ut per cuniculum, qui usque eo agitur, pertingat, certosque cuique fodinæ, præsertim in profundo constituere fines, terminosque, juxta statas Geometriæ leges mensurare queat: numerorum, sive Arithmeticæ insignem notitiam habeat, ut sumptus, qui in machinis construendis, fossoribusque fiunt, ad calculos revocare queat. Nihil autem hujusmodi Metallurgias præfidi adeo necessarium est, quam statica, qua subtractiones fodinarum,

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

machinas tractatorias, hydraulicas vel per se ipsum fabricare, vel aliis earum fabricandarum rationes exponere norit; præterea docebit hæc eum metallorum pondera differentiasque unius metalli ad aliud. Statica si jungatur pictura, tum enim verò absolutam notitiam consecutus diceretur, si cuniculorum diverticula juxta Ichnographiæ leges recte designare, machinarum requilitarum prototypa, uti & montium, camporumque situm, positionemque recte repræsentare possit. Quia denique sæpe magna circa fundorum jurisdictiones dissidia oriuntur. Legum quoque peritum esse oportet, ut de dominis rerum rectum judicium formare possit.

*De variis Officiis eorum, qui metallurgiam
curant.*

Præfidi totius metallicæ negotiationis subsumunt post supremum Dominum, & possessorem, magistrum operarum jurati quos vocant, scribæ fodinarum, præfecti cuniculorum. Magister operarum in omnes fossores imperium exercet, exceptis monetariis, Argentique purgatore; per pœnas quoque in negligentes operas animadvertit; controversias circa fodinas ortas dirimit; jus fodinarum petentibus dat, confirmatque, fodinas metitur, earumque terminos statuit, quid in unaquaque fodina faciendum doceat, & præscribit, cui omnes cæteri operarum præfecti rationem de pecunia præcedenti hebdomade expensa, reddunt, quam scribæ codici consignant. Hunc fabrum lignarium esse oportet, ut possit puteos extruere, columnas collocare, ac facere substructiones, quæ montem suffosum sustineant, ne fossores obstruantur, cuniculos perforare, ad aquas ex venis, saxorumque commissuris promanantes alio derivandas; debet & venas cognoscere, & fibras, ut utiliter fodiant puteos, effosamque materiam, unam ab altera discernat, aut per se, aut per alios solitis jam præceptis de Juratis instructos, cognitionem præterea habeat lavandi, depurandi, coquendi que metalla; tandem quicquid fossoribus ad labores necessarium est suppeditet, ferrum ad instrumenta, coria ad vestes, levum ad lucernas, &c.

Jurati debent esse bonæ fidei viri, rei que metallicæ periti, quorum quidem numerus pro fodinarum multitudine assumitur. Horum officium est fodinas invisere, quid agatur, actumque sit, inquirere, de machinis, substructionibus, novisque fabricis consultare faciendis, cæterisque omnibus, quæ bonum fodinarum concernunt, deliberare: fossionum in duris, asperis, & saxosis locis; item in mollibus, argillaceis similibusque labores subeuntibus juxta Arithmeticæ proportionis leges solvere. Item negligentes, fraudulentos, aut furaces, pro delicti gravitate punire. Juratis denique absentibus præses omnium nihil propria auctoritate decernit.

Ad operas quod attinet, hoc pacto labores suos transigunt: diei naturalis spatium is dividitur in tres partes, ita ut singula spatia temporis septem horas comprehendant: primum septem horarum spatium incipit ab hora quarta Astronomica, & durat usque ad undecimam. Secundum incipit ab hora duodecima; & durat usque ad septimam pomeridianam, quæ censentur esse operæ diurnæ. Tertium incipit ab hora octava, & finitur hora tertia post mediam noctem, tunc autem sive ex pureis hauriant aquam, sive venam fodiant, ad nocturnas lucernas perpetuo vigilantes; & ne vigiliis aut lassitudine dormiant, cantus

Cc nes

nec rudi prorsus, nec injucundo duos solantur labores: ad quos subeundos campanæ sono admonentur, quo dato vicatim hinc inde ad labores sese accingunt: cum verò septem horæ fuerint finitæ, tunc dato signo novo, vel pulsu tabellarum, quo percepto subterranei fossores faxis illiso malleo dant signum in interioribus montium cuniculis laborantibus, laborem esse finitum; quamvis etiam sevi in lucernis proximus defectus luculentum illis completi temporis signum sit.

De Morbis Fossorum.

Cum subterranei cuniculi magnis mineralium spiritibus conferti sint, fieri non potest, quin subinde fossores insolitis morborum generibus infestentur: unde pro diversitate aquarum, halituum aërisque, diversos morbos nasci necesse est, quorum alii affligunt artus, alii lædunt pulmones, oculos alii, alii denique exitiali quadam, & suffocativa vi protinus eos interimunt. Aqua frigidior, quæ in puteis profundissimis stagnare solet, ut plurimum crura, nervos vitare solet, unde nisi ocreis in hunc finem factis se tueantur in conclamas penè infirmitates ut incidant, necesse est. In fodinis verò siccis, & humiditatis expertibus, majus ipsis malum imminet; dum enim terram continuis concussationibus exagitant, & ad venarum ductus detegendos metallicarum glebarum, matrices altius adoriuntur, fieri non potest, ut medium variis pulverum effluviis non inficiatur, quæ unà cum aëre hausta, pulmonibusque insinuata, primò Asthma, id est, spirandi difficultatem, deinde phthisin generant; quæ si præterea corrodingi vi polleant, tunc exulceratis pulmonibus diram tabem gignunt. Quin etiam cadmiæ quoddam genus est, quod operarum pedes aquis madidos, itemque manus exedit, pulmones, & oculos lædit; unde multi pedes ocreis, sed & manus chirothecis, faciem verò vesicis muniunt, ne pulvis is nocere possit: hac ratione confectores mini, apud veteres Romanos contra mercuriales spiritus sese munisse Plinius tradit.

Accidit nonnunquam, ut saxa metallica igne adhibito frangere & rumpere cogantur fossores, quod dum faciunt, nisi à fumo tempestive se subducant, dici vix potest, quam monstruosa morborum genera, quæ proximam illis necem adferunt, incurrant: in his quippe aër mirum in modum inficitur veneno quodam subtili & spirituosissimo, quod ex venis commissurisque glebarum metallicarum ignis vi expressum, diffusumque exhalat; hoc si fornicibus fodinarum sub forma rutæ, pompholygis, aut fuliginis adhæserit, ac deinde cum tempore in lacunas deciderit, maximum sanè fossoribus aqua istiusmodi lethiferis spiritibus tincta damnum adfert. Experientia siquidem docuit, quod si stagnantium hujusmodi aquarum lacunas vel jactu lapidis commoveris, spiritus virulenti, qui inde protinus evolvant, quemcunque offenderint, sine ullo remedio conficiant: idem fumus igne nondum extincto symptomatis prorsus exoticis præstare compertus fuit: corpora enim fossorum isto veneno infecta continuo ita turgescunt, ut omni sensu & motu destituta sine dolore intereant: qui verò se infectos sentiunt, dum scalarum adscensione saluti consulturi fugiunt, interim prævalescente veneno, manibus pedibusque ita in globosam formam tumescunt, ut dum se scalarum gradibus tenere amplius non queunt, ex scalis delapsi, vitam infelici morte commutent. Fossores itaque multorum mor-

te cautiore igne intra fossas extructo, ad biduum integrum sese à fodinarum ingressu continent, donec lethiferum virus per aërem diffusum igne paulatim consumatur.

Rursus, ubicunque arsenicum, auripigmentum, sandaracha, similesque venenosorum mineralium matrices reperiuntur; ibi aër sese offert tanto perniciosior, quanto virulentioribus dictorum mineralium, unà cum mercurialium venarum halitibus imbutus fuerit; quemadmodum Agricola refert, in specubus ad Planam oppida non evenire, qui certis anni temporibus, halitum ex acidulis emittunt lucernas extinguentem, & si quis diutius ibi manserit, necantem; alibi depressis puteis sulphurata, & aluminosa putearios enecant. Hujusmodi Spiritus in Neapolitano Agro juxta lacum Agnanum in Antro quodam, (canum vocant) exhalant, quod canes exigua mora ibidem detentos statim stupidos & veluti exanimes reddit, diutius verò detentos prorsus suffocat. Tales hiatus quoque in Agro Tybutino, & Volaterrano uti in nostra Hetruria, & Latio exposuimus, reperimus, qui & homines, & animantes incautus accedentes interimunt. Vide quæ in quinto libro finis de hæc discurremus. Talis itaque proprietatis lethifera sunt halitus illi, qui subinde ex novis effossis cuniculis magna fossorum strage occurrunt.

De Cura morborum metallicorum.

Quemadmodum omnes morbi metallici oriuntur, vel ex vaporibus virulentis metallorum, vel ex fumosis halitibus aërem inficientibus, natura & proprietate diversis, ita quoque diversissimos morbos in subterraneis fossoribus efficiunt: alii enim pulmones, stomachum alii, quidam cerebrum, nonnulli articulos; non desunt qui hepar, renes, vesicam petant, in quibus deinde per continuam aëris infecti insufflationem, vel intus calore nativo, non secus ac ignis vi intra Alembicum, jam sublimantur, modo præcipitantur, nunc in alias, & alias partes distillatione derivantur, unde exoticæ fiunt coagulationes, corrosiones, putrefactionesque, ex quibus cunctorum morborum seminaria originem habent. Quomodo itaque hisce se fossores, metallorumque coctores munire, & præservare queant, paucis quantum ex medicis, qui conducto stipendio curam habent operarum metallicis subjectorum, intellexi, ostendendum duxi.

Ad triplicem itaque methodum revocari potest metallici morbi cura: ad prophylacticam dietam, & genuinam medicamentorum rationem, prophylactica ita se habet: qui nondum infectus est, is excellentissimum, & specificum medicamentum seligat ab essentia tartari, cujus hæc est compositio. Misceantur simul liquor tartari, laudanum papaveris, oleum ex colocothare elicatum: est autem colocothar nil aliud, quam vitriolum ad rubedinem calcinatum: quæ distillata liquorem præstabit, qui trium granorum dosi quolibet semestri sumptus ab omnibus venenosis metallorum vaporibus, halitibusque liberum, immunemque reddere dicitur. Qui verò jam putrefactionem ex corrosione metallicorum halituum inciderint, iis maxime præscribi solet balsamum vel ex vitriolo, vel ex urtica, aut chalybe eductum. Balsamum vitrioli ita parant: abstrahunt à vitriolo phlegma suum tam diu, donec fiat mellis instar dulce, & ad purpureum colorem inclinè; dosis est una gutta in aqua veronica,

Balsa-

Balsamum urticæ sic parant : sal ex urtica extractum in sua aquositate tandiu rectificetur per ignem moderatum cinerum , vel arenæ , aut etiam roris , donec olei pinguedo conspiciatur , quæ à suis facibus separata , quotidie trium guttarum dosi exhibeatur in aqua veronica.

Balsamum magnetis sic paratur : Magnes in alcohol , id est in pulverem tenuissimum redigatur , cui superimposita æquali pondere limatura chalybis in vitreo vase quam optime lutato coquatur , in oleitate cinerum Istatis herbæ ; postea accipiunt limaturam , seu scobem magnetis quæ in eam vino rectificato tam diu digeratur , donec vinum rubescat : separato itaque vino à rubedine in fundo balsamum magnetis reperiunt , quod sumpta dosi supra posita , nullum membrum putrefieri permittit.

Dixam peragendam fossoribus hac cura præscribunt : ut videlicet homines metallicis & subterraneis laboribus fodinarum occupati , cibos suos quantum fieri potest , sale petraë condiant : simili ratione aromatum loco utantur sale aluminoso , quod quidem ex alumine extractum nil falsedinis habet , imò cibos optimè condit.

Contra Asthma non putridum , quod metallici ut plurimum ex mercurialibus halitibus contrahunt , præscribere solent aquam panis porcini , unicum contra pulmonum vitia remedium : est enim vis ejus mirum in modum diaphoretica ; si enim affecta membra , id est , hepatis , ventriculus , pulmo in diaphoresi conserventur , eis nulla nocebit spiritus mineralis virulentia , & si quod damnum illis illatum est , id per vim diaphoreticam expellunt , uti mucilaginem , refinam , aut tartarum , quæ cum diaphoretica seu sudorifera vi , neque in vesica aut renibus calculus , aut arena consistere possunt : est enim sudor in hujusmodi infirmitatibus summum præsidium.

Non desunt alia domestica remedia tam pro iis , qui in subterraneis cuniculis metallis eruendis operam dant , quam pro iis , qui lavandis , depurandis , excoquendisque metallis operam dant ; nonnulli maximè in usu est Theriaca , aliis metallica remedia ex sale , alumine , sale nitro , salpetra , vitriolo , tartaro confecta , quorum ope , usque maximum levamen se sentire fossores farentur ; quod utique non alia de causa fieri existimo , quam ex sympathica quadam affectione , qua similia intra corpus suscepta collectaque metallicorum effluviis corpuscula ubi confluerint , mox una quoque secum humores absterfiva vi salium per naturæ secessus educant. Sunt quippe cujuscunque tandem generis salia , ubi rite depurgata , & in suam puritatem redacta fuerint , insigne contra maleficos mineralium halitus Alexipharma ; totum enim , quod in salibus malignum latet , & ex heterogeneis malignantis naturæ glebis , quibus miscetur , conflatum.

Iterum contra hujusmodi pestiferum subterraneorum fossarum aërem optimi , & præstantis vini , antequam ingrediantur fossores , haustus , vel jusculorum præpinguium sumptiones cum butyri , caprarum , nucumque juglandum esu , nonnulli Zeduarum , aut alterius specifice qualitatis radicem ore masticant ; quidam etiam contra mercuriales spiritus aurea folia ore tenent : uti enim mercurius aurum naturali appetitu mirum in modum ambit , ita quoque au-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

reis foliis inhærens spiritus ; ultra non tendit ; contra pulmonis vitia , vel ipsum balsamum , vel flores , aut butyrum , ut vocant , sulphuris mirificam vim habent ad depurgandos pulmones , maxime ubi in hydropem inclinaverint. Contra peripneumoniam maximè prodest , si semilibram aquæ melissæ cum una libra tartari , una cum vino rubro melioris notæ , admixtis baccis juniperi , floribusque cicchorii , in aquam distillatione resolveris , quam quotidie cum vino generoso dosi quatuor drachmarum sumperis , cætera vide apud Paracelsum , Agricola ; quæ hic scripta ab iis , qui fodinis præsumunt , medicis , mihi concredita fuerunt.

De Remediis , quibus malignus aër in Cuniculis Metallicis purgatur.

Duo maximè natura apposuit obstacula , quod minus ex desideratis mentium thesauris homines perfectam felicitatem consequerentur , ut proinde natura in hoc non tam se matrem , quam novercam exhibuisse videatur : quorum primum est , inexhausta stagnantium aquarum colluvies qua uti venarum metallicarum tractus ad ulteriorem fossionem impeditur , ita quoque incredibile rei metallicæ damnum confert. Alterum sunt virulenti , & exitiales prorsus metallicarum venarum , sive vapores , sive halitus quæ non solum *μεταλλορρυσ* impeditur , sed & operis seu fossoribus , si non repentinam mortem , saltem uti in præcedenti capite ostendimus , inevitabilia exoticoorum morborum genera , magna miserorum hominum strage conferunt. De hoc primo , de illo naturæ incommodo postea differemus.

Quæritur itaque primo , quamvis arte , & industria virulentus fodinarum vapor , & halitus expurgari , & fodinæ à tanta peste , cum salute operarum liberari queat : non desunt , qui putent , primò id fieri posse rogo ex salutaris lignis extracto. Ego verò dico , tantum abesse , ut istiusmodi consilium quicquam remedii afferat , ut potius tum fumus , tum calor in tantis angustiis concentratus , majora pericula , majusque malum , imò viciniorem letho portam aperiat. Legerant ipsi forsitan , Hippocratem integras urbes salutarum lignorum rogis per vicos , & compita dispositis à peste liberasse , quod & nos in nostro tractatu de peste fieri posse præscripsimus ; ac proinde idem in profundissimis terræ locis fieri posse cogitarunt. Sed aliud est , in longe , lateque externi aëris magno mari hac industria uti , aliud intra conclusa terræ viscera , ubi id fieri nulla ratione posse , ex duobus capitibus ostendo.

Primò , quis nescit , ignem in subterraneis locis nisi suis caminis instructus fuerit , durare non posse , vel si prope vicinum putei inferioris ostium extruatur , ita omnia summo replere , ut is operas multò compendiosiori via , quam vel vehementissimi veneni halitus , ad portus mortis , suffocatione deducat. Ignis sine aëre vivere non potest , vel si aërem sufficientem non adipiscatur , fumo susque deque vertit omnia cum extremo laborantium exitio : accedit hisce , quod rogos instructus in abditis terræ latebris tantum abest ut aërem pestiferum consumat , ut potius halitus , vaporesque , qui primò intra matricem receptacula sopiti jacebant , caloris vehementiā excitet , eorumque sublimatione rarefactos per universos fodinarum meatus aërem virulentum facultate tingat & inficiat. Experti sunt summo suo malo nonnulli

Cc 2 fossores

fossiles huiusmodi malum; qui accensis luminibus, dum in loco sulphureo-bituminosis vaporibus referta appropinquant, totus aer in fodinis existens inflammatus, partim suffocatus, partim exustos extrinxit; quod & usu venit in nonnullis, qui puteos fodientes simili vapore eos invadente, in momento extincti fuere. Rogum itaque in fodinis extruere tantum abest, ut virulentum aerem consumat, ut potius cum exitis calore aliis, aliisque ex venis metallicis halitibus, mirum in modum augeat.

Quodnam itaque contra tanta mala remedium? Scio plerumque aerem in fodinis folium subsidio expurgari solere; sed nisi id negotium recte instituat, non multum emendationis conferet, si enim extrinsecus aer aliunde non attrahatur & putridus ex alia quapiam parte non aperta dispellatur, semper eundem aerem quieto jam aere, remanere necesse est.

Duplici itaque via aerem expurgari posse existimo; vel folium ope, vel sine ullo folium usu, quod antequam ostendam, scire lectorem velim, aeri ita à natura comparatum esse, ut quamvis ex uno loco ad alium subterraneum locum ruens aer admitti possit, nisi tamen putidus hic aer alium locum habeat, quo se recipiat, alius externus admitti nunquam poterit, quem tamen si invenerit, is mox recedendo aeri externo locum præbet. Et innumeris id experimentis comprobari posset, si omnibus vulgo notum non esset. Ut itaque aer dispellatur, duo officia eum tenere necesse est: unum, quo recens, & extrinsecus insuffletur; alterum, quo exsuffletur.

De modo exhauriendi aquarum colluvies, quæ fossoribus magno impedimento sunt.

Alterum avaritiæ mortalium, quo minus ad intimam Auri, Argenti cæterorumque mineralium gazophylacia penetrent, frænum natura objecisse videtur; & est stagnantium aquarum in subterraneis fodinis colluvies; quæ quidem tanto est perniciosior, quanto maiora occurrunt in ea evacuanda impedimenta. Primum est profunditas aquarum, quam si antliis aut coriaceis saccis exhaureris, quo eam derives, vix sine novo canali perfosso, dispicias. Alterum est, angustia locorum quæ omnem hydraulicarum machinarum dispositionem impedit, & cum ut plurimum ferro adornentur, ei confestim cubicem ponit mineralium aquarum acrimonia, quæ exiguo tempore ferramenta non solum exeduntur, sed & in scoriâ cum totius machinæ dissolutione abeunt. Agricola lib. 4. de re metallica variâ quidem instrumenta, & hydraulicas machinas proponit, quarum tamen vix ullæ in magnis istis fodinarum gurgustis ob laboriosam earum structuram, usum habent; ut enim ingentibus expensis construuntur, ita quoque tum ob ferreas catenas, haustrea ferrea, perticas ferreas, quibus agitantur, tum ob mineralium aquarum acrimoniam, saliumque edacitatem diu durare non possunt. Accedit locorum angustia, quæ sine magnis sumptibus, ut machinarum capaces sint, dilatari nequeunt; neque antliæ, quibus ut plurimum utuntur, durare queunt; cum qualicumque tandem metallo conficiantur, semper minerales aquæ illis inimicæ, in eas rodendo tandiu agent, donec vel ærugine, vel rubigine consumantur. Unde ex puro ligno, aut lateribus coctis illa construere oporteret, ut subsistere queant. Vitriolata aquæ,

ubi ferrum, aut æs, cuprumve reppererint; statim ea adhæsione corpusculorum ad ultimam usque scoriâ rodere non cessant; nitrosæ verò aquæ matricem, piulcumque Antliarum, mox ubi quæverint, lapidifico succo ita vestiunt, ut amplius vix extrahi possint.

Est & ad aliud impedimentum, quod post aquam exhaustam vel novus canalis fodiendus sit, ut extra derivari, vel per fodinæ puteum, quod plerumque fit, coriaceis saxis extrahi queat; sed ne sic quidem magnum emolumentum expectari potest, cum ex fossis, occultis plerumque scaturiginibus implentur, quantum extraxeris aquarum, tantum ex scaturiginibus fossæ novæ aquæ accedant; accidit etiam, ut aquarum metallicarum pondere sacci seu bulgæ coriaceæ plerumque rumpantur. Quocumque itaque te veritas, semper alia, aliaque impedimenta reperiuntur: labor tamen improbus uti omnia vincit, ita quoque vel venarum obstructione, vel aliis mediis, modisque invitæ naturæ tandem fræna injicit, ut intento suo potiatur: Antliis, & coriaceis saccis res in Hungaria, uti mihi scribitur, peragitur.

Unum restat, quo pro meo quidem tenui iudicio rem meliori modo confici non posse existimo, quam si fossarum profunditas unâ cum putei, quo intra fodinas descensus datur, altitudine ad libellam prius cum respectu ad externam montis declivitatem examinentur. Si itaque fossa altior, sive profundior, aut æqualis fuerit campestri cuidam planitie, tum enim verò oleum, operamque perdis in aquarum ex fossa aliorum derivatione; aliudque non restat consilium, nisi ut per putei officium foras extrahatur; si verò campestris, aut vallestris planities profundior fuerit, tunc spem habebis, aquam per canalem data opera factum extrahendi. Qui verò suctu, aut attractu machinarum hydraulicarum ope negotium confici posse existimant, illi non nisi speculationibus metaphysicis fulti, rem expediri posse censent; ubi enim aquam in receptaculum aliquod extraxerint, quò eam derivabunt? Relinquendus ita mos est, & consuetudo diuturno usu in diversis Europæ metallorum fodinis introductus; cum enim ad huiusmodi necessitatibus succurrendum, ingenia hominum maximè ad aliquid inveniendum, quo à tanto naturæ incommodo se liberare possint, quotidie acuantur; nihil autem hucusque, quod plene Metallurgorum votis satisfaciât, præterea, quæ diximus, instrumenta, & machinas, certè ea usurpanda sunt, donec Deus Opt. Max. aliquid aliud inspiret, quo res desideratum exitum fortitatur.

Atque hæc quidem dicta sint de iis aquis, quæ in visceribus fodinarum collectæ exitum ob dictas causas non habent. Si verò aquæ illæ commode derivari possent ad os inferius putei, tum majori commoditate, per instrumenta, quæ Agricola lib. 4. præscribit, educi possunt. Ne verò catenæ & ferramenta machinarum ob mineralium aquarum edacitatem consumerentur, illa oleo ex plumbo extracto probe inuncta, contra omnem consumptionem durare possent. Cum nihil sit in rerum natura, quod ferramenta etiam marino submersa liquore, ab omni corrosione & rubigine liberiora conservet, quam dictum oleum. Sed cum majori huius olei copia ad tot catenas, & ferramenta tingenda, quam expensæ tolerent, opus sit, ita quoque

ad negotium conficiendum non exiguam difficultatem habet.

Atque hæc sunt impedimenta, quæ metallurgiam subterraneam unâ cum insigni, & irreparabili damno impediunt; & sunt siccitas, & humiditas fodinarum, cuniculorumque. Siccitas è calore, & consequenter virulentissimis halitibus magnam fossoribus ruinam molitur. Humiditas verò, inaccessis fodinarum venis obicem ponit, nisi conferta operarum multitudine, eâ, qua solent, industria exhauriatur: ubi enim aquarum dominatur humiditas, ibi sine nocumento operæ subsistere non possunt: frigus tamen aliquo modo prodest, hoc enim uti & aquarum, earumque commotione omnis mineralis auræ virulentia proscibitur, nisi aquæ longo tempore immotæ, & stagnantes cutem ex venenoso halitu contraxerint; quæ tamen multum obsunt, nisi ipsa agitatione aquæ depulsæ alio se receperint, accidit enim, ut subinde in hujusmodi fossis vel projectu lapidis virulentæ aquæ vapor adstantibus irremediabile malum adducat.

De multiplicibus Venarum fibrarumque mineralium Ductibus.

Expositis jam impedimentis, & obstaculis, quibus spectatus metallicorum hominum fructus, comatusque luditurque, nihil restat, nisi ut jam intimius nos insinuant, sinus quoque, utroscunque fossilium conceptui ortuique dicatos scrutemur, quos Plinius, Dioscorides, Vitruvius, Albertus, Agricola, venas vocant, juxta illud Ovidij.

*Nunc quoque jam veteris percepto semine venæ
Arvarigent, auri madidis pollentia glebis,*

Sunt autem Venæ mineralium seu metallorum nihil aliud, quam vasa quædam, seu receptacula materiæ, quam ad fossilium formationem, seu materni uteri ad prolis propagationem concipiunt, transumpta similitudine, ab animantium venis. Quemadmodum enim hæc singulis membris disperuntur, atque per eas ex jecinore sanguis in universum hominis corpus diffunditur; sic illæ disperguntur tum per totum terræ globum, tum vel maxime per montanos locos, aquis per eas manantibus & effluentibus. Præterea sicuti singulæ venæ aliam venularum saturam connexam habent, quas capillares vocant; ita quoque venæ metallicæ venulas adjunctas habent; ex commissuris saxosæ materiæ mineralis exortas, quas & fibras vocant; quamvis contraria ratione fundant humorem; venæ corporis humani sanguinem in capillares exonerant venulas; contra venulæ metallicæ conceptum humorem in venas majores diffundunt; de quibus vide Senecam lib. 3. nat. quæst. cap. 15. ubi hanc venarum analogiam non eleganter minus, quam eruditè describit. Si quis venarum, venularumque fibras rectius consideraverit, is intra saxorum commissuras, non secus ac absolutissimam arboris in varios ramos divisam intuebitur imaginem.

Est autem multiplex venarum differentia, sive longitudinem, sive latitudinem, aut altitudinem spectes; unde triplex eas denominandi forma resultat; ut aliæ sint profundæ, aliæ, dilatatæ, cumulatæ aliæ. Profunda ex summa telluris superficie in imam ejus sedem descendit. Dilatata veluti medium inter terræ superficiem, ejusque pro-

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

fundum sub terra latens, in vulcum se spatij dilatat. Quæ verò magnam alicujus loci partem occupat, in longum & latum ducta, cumulatæ vocatur. Quod autem est medium inter duas venas, intervallum nominatur. Rursus, profundarum venarum aliquæ passum unum sunt latæ; aliæ duos cubitos; quædam unum, nonnullas pedem, quas omnes metallurgi vocant latas, quæ in nonnullis locis subinde usque ad duodecim passus extenduntur. Quædam etiam tantummodo latæ sunt palmum unum, aliæ tres digitos, duos aliæ quas angustas vocant.

Dilatatæ verò inter se differunt altitudine: earum enim aliæ passum unum, aut duos, aut plures sunt altæ, aliæ cubitum, pedem aliæ, aliæ semissem, quas omnes altas vocant: quas verò humiles vocant, aliæ sunt palmum, aut tres digitos, vel duos, vel unum, ut in figura apparet; quæ iterum variè dividuntur, ita ut aliæ sint rectæ, alæ curvæ, quædam obliquæ & tortæ, aliæ transversæ, & circulares, quarum omnium differentias hæc Typo, ut longiori descriptioni parcamus, exhibemus. Quid verò finem, caput & caudam venarum vocent metallurgi, uti passim notum est, ita ulteriori expositione non indiget.

Sumuntur præterea venarum differentia ex partium mundi situ, ita ut aliquæ ex oriente in occidentem, quædam contra ex occidente in orientem, nonnullæ ex Austro in Boream, & contra ex Boreâ in Austrum extendantur, aliæ denique intermedias Cardinalium punctorum plagas servant, quæ initium suum à saxorum commissuris sortiuntur; quæ si, v. gr. occasum versus vergant in profundum venia dicitur ostendi ex oriente in occidentem, & sic de cæteris; quæ valde tamen inter se discrepant; dum aliæ ex summo montis vertice per devexum descendunt in vallem, aliæ contra ascendunt quæ omnia vide apud Agricola fusiustractata.

METALLOGNOMIA,
sive

*De Signis Metallorum latentis, & qua Arte metallorum
vena cognoscantur.*

Uti hoc sagacis est ingenii argumentum, ita quodque pari mentis industria tractandum est. Cognoscuntur itaque variis modis latentium metallorum thesauri; voco thesauros; quia quicquid in humani generis conservatione, tum ad splendorem & magnificentiam, tum ad necessariorum usum pertinet, ex subterraneis gazophylaciis originem suam nanciscitur, quæ alibi fusiustraprosecuti sumus. Sed jam instituta nostri filium arripiamus.

Subterraneæ metallorum venæ triplici ratione innotescunt; modo naturali, artificiali, & casu. Modo naturali, primò per vapores, & halitus metallicos; secundo per montium, herbarum, arborumque in eis constitutionem; tertio per venarum ab imbrium, torrentiumque defluxu detectionem; quarto per flumina quæ ramenta metallorum ut plurimum secum abrasa devehunt. Modo artificiali, per aquarum mineralium, limique fluminum lacuumque distillationem, Chymico more peractam; secundo, per virgulam divinatoriam, de qua paulo post. Casu, per arborum eradicationem, sylvarumque incendia, per fluminis cadentis, saxaque findentis violentiam; secundo, per aratri, sulcorumque campestrium demolitionem; tertio equorum, porcorum, aprorumque terram fodientium opere; quarto, per folia vitium, quas spiritus auriferi in aureum colorem tingunt, uti sæpe sæpius in Hungaria compeitur. His itaque propositis, jam telam prosequamur.

Cc 3 Signa

Signa itaque quibus metallicæ venæ deprehenduntur, sunt sequentia, partim ex Agricola, Cardano, partim propria experientiâ comperta.

Dico igitur primò, metallicas venas interdum vi aliquâ (quam si casum, seu fortunam dicere malis, perinde est) sine hominis industria & labore aperiri non uno modo.

1. Eas cute nudat torrentis impetus, id quod olim accidit in Fribergi Argentariis.

2. Vis ventorum radicitus extrahens, & extirpans arbores, quæ supra venas creverunt.

3. Abruptio saxi è monte: id verò abruptit vel diuturnus, & laevis imber, vel terræ motus, vel ictus fulminis, vel violenta nivis devolutio, vel impetus ventorum. Virg. lib. 12. Æneid.

At veluti montis saxum de vertice praeceps.

Cum ruit avulsus vento, seu turbidus imber.

Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas.

4. Aratrum venas reteggit: aratri enim vomere glebas Auri excissas esse in Galecia Justinus memoriæ tradit.

5. Sylvarum incendium metalla prodit, quod Argentariis Hispaniæ accidisse scribit Diodorus Siculus. Hinc Lucretius lib. 5. de Natura rerum.

Quod superest, as atque aurum ferrumque re-
pertum est.

Et simul argenti pondus, plumbique pote-
stas,

Ignis ubi ingentes sylvas ardore cremarat

Montibus in magnis, seu cœli fulmine misso,

Sive quod inte se bellum sylvestre gerentes,

Hostibus intulerant ignem formidinis ergo,

Sive quod inducti Terra bonitate, volebant

Pandere agros pingues, & pascua reddere
rura:

Sive feras interficere & ditescere prædâ.

Nam fovea, atque igni prius est venerariæ or-
tum,

Quàm sepire plagis saltum, canibusque cie-
re.

Quidquid id est, quacunque è causa flammeus
ardor

Horribili sonitu sylvas exciderat altis

Abradicibus, & terram percoxerat igni;

Manabat venis ferventibus in loca Terra

Concava conveniens argenti rivus, & auri,

Æris item & plumbi.

6. Denique venas reseat alia quæpiam vis: etenim equus (si huic narrationi fides habenda est) Gofelariæ venam plumbariam ungula patefecit, Istit igitur modis fortuna nobis venas largitur.

Dico secundò, reconditas fossilium venas posse humana arte, modis, qui sequuntur, investigari.

1. Observandæ sunt scaturigines fontium, quæ à venis longe abesse non possunt, quod ex ipsis earum aqua manet.

2. Spectanda sunt fragmenta venarum, quæ torrens ex terra eruit; longinquitas enim temporis aliquam eorum partem rursus obruit terrâ. Verùm huiusmodi fragmenta, si supra terram jacuerint, aut sint levia, venæ ab ipsis plerumque absunt longius, quod torrens extracta procul à venis abriperit, & ea propellendo, levia fecerit; sin terræ infixæ, vel aspera fuerint, ad venas proprias adsunt.

3. Situs etiam considerandus; nam is in causa est, quod & venæ magis, aut minus terra obruan-

tur, & fragmenta longe, aut minus longe protrudantur.

4. Observandæ pruinae, quibus omnes herbae candicant, his exceptis, quæ crescunt super venas: venæ enim quia siccum expirant calidumque halitum, pruinae concretionem impediunt; quo igitur loco herbae humidæ non congelant pruinas, subest vena, quæ si spiravit valde calidum, fert ea terra humiles herbas, & colore sublanguido.

5. Indicium venæ latentis est, si arborum folia tempore verno livida sint, vel subcærulea; si rami, præsertim superiores, infecti nigrore, aut alio colore minus naturali. Si stipites bifidi, si rami nigri, aut discolores; ea namque opera efficiunt calidi & sicci venarum halitus, qui neradicibus quidem arborum pareunt, sed eas adurentes prorsus infirmas reddunt: qua de causa vis ventorum frequentius hujus generis arbores dat ad casum, quàm reliquas.

6. Montium cacumina, quæ ad meridiem tendunt, radicibus ad Boream spectantibus, argumentum metalli præbent, & maxime argenti, cujus fodinæ feraciores recta ex Oriente in Occidentem tendere solent.

7. Color montium & lapidum, ac terræ, non solum metallicæ ibidem esse, sed & qualia sint docet: viridis fit ab ære, niger ab argento, & aurum; purpureus à pyrite, lividus à plumbæ & ferro, luridus à chalcantho & similibus ejusmodi succi, cinereus & obscurus à sulphure.

8. Recenseri & odor potest inter venarum signa: cum enim duos ejusdem montis lapides simul attriveris, si metallum monti subest, olent sulphuris non parum.

9. Montes steriles metallici omnes sunt: nam humor absimitur intus, unde plantæ generari nequeunt, & mali halitus jam natis etiam plantis vitam eripiunt.

10. Gravioribus etiam lapides, aut terra, quàm ratio postulet, certum est metallicæ materiæ argumentum.

11. Si aliqua etiam parte nimis splendeant lapides, vel solidi existentes non careant omni splendore, subesse materiam metalli certò scias.

12. Lapidés si igne liquefeceris, deprehendes simul, & metallum adesse, & genus ipsius, & quantitatem.

13. Aquæ etiam effluentes levem quandam hujus conjecturam afferunt, quæ si odorem, aut colorem præ se ferant alienum, haud dubie metallum in monte esse pronunciabis.

14. Fundum quoque alvei diligenter explorabis, nam partem metalli invenies: vix enim fieri potest, ne longo temporis progressu, aliquid semper addente die, ex descensu gravioris partis, vestigium metalli non appareat.

15. Præterea montium rimæ indicant acres metallicorum halitus.

16. Ad hæc non desunt plantæ, quæ metallorum societate gaudent raræ illæ quidem, at quo rariores, eò, si adsint, evidentius testimonium illorum præbent. Generatim tales sunt, quæ fructum non edunt, aut exiguum; juniperus humilis, hedera, caprificus, pinastrer etiam; & aculeatarum pleræque. Sunt etiam folia arborum aut pallida, aut decidua, & trunci exiles, marcentque omnia.

17. Ex montium apicibus, in quibus plerumque vapores expirare solent, metallorum latentium indices sunt.

His demum addimus Virgulam divinatoriam, qua plerumque metallurgi in explorandis metallis

utun-

utuntur. Est autem virgula bifurcata ex variis arboribus, seu fructibus, pro explorandorum metallorum conditione, effecta: putant enim plerique superstitiosiores hujusmodi, effectum consequi non posse, nisi die dominica Paschatis, aut die solstitii fuerit excisa, aut supra venam excreverit; neque negotium ullum successum habiturum, si explorator non fuerit die dominico natus. Verum uti natura rerum hisce superstitiosis circumstantiis ad agendum non indiget, ita quoque suapte sponte ostendunt, hujus artis magistrum alium non fuisse, nisi Satanam, qui homines auri divitiarumque plus æquo avidos, in sua retia trahere, cum ultima animarum ruina satagit. Unde nonnulli differentes construunt virgulas, diversis metallorum speciebus explorandis appropriatas. Hoc pacto columnâ virgulâ utuntur ad argentum: Fraxineâ ad æs: piceastri ad plumbum: Ilati caule ad ferrum &c. quidam enim Magicis utuntur speculis, additis carminum incantationibus, in metallicis venis detegendis. Unde passim à peritis & timoratis seu magicæ illusionis ex quocunque tandem pacto introducta vanitas respicitur: neque enim ulla ratio dari potest, cur virga bifurcata utroque cornu firmiter apprehensa, etiam omni magico pacto excluso, tantam tamen violentiam à vaporibus metallicis sustineat, ut eam deorsum trahant. Certè ego sapius hujus rei supra metallica corpora auri, & argenti, experimentum sumens, semper spe mea frustratus sum: atque luculenter adverti, manifestam esse non demonis, sed virgam tractantis illusionem, dum imaginationis vi deceptus, putat, virgam ad metallum suapte sponte vergere, cum ipse eam inadvertenter detorqueat.

Quod & alias usus venit in iis, qui anulum filo suspensum duobus digitis intra scyphum immitunt, putantes anulum hinc inde Scypho illisum currentem horam monstrare. Pessima sane deceptio, cum totus ille pulsus nonnisi pulsu venarum in extremis digitis agitatarum, contingat; si enim fortiter filum presseris, anulus agitabitur: si leniter, sine motu subsistet: quam fallaciam ego multis viris physicarum rerum haud imperitis, in quadam Academia, quam Princeps quidam hinc Romæ de hujusmodi prodigiola annuli agitatione, instituerat, demonstravi. Erat dictus Princeps ea in opinione, singula metalla dicto modo suspensa, digitisque primoribus apprehensa in certas mundi plagas magnetica quadam vidirigi; itaut ferrum in Boream, aurum in Orientem, in Occidentem argentum, æs in Meridiem, & cætera in cæteras plagas divergerent, quod & in pretiosis lapidibus fieri opinatus est: sed experientia omnium risu excepta fuit, quando immobili transverso ligno metalla filo affixa dimittebantur, vel etiam firma manu leviter apprehensa tenebantur, tunc enim indifferentem pro ratione torti filii, situm fortiebantur. Totum itaque istiusmodi merum fuit phantasiæ ludibrium, dum quod pulsus venarum moverat, ille occultæ motionis proprietati ascriberet.

Idem igitur in virgula divinatoria usu venire certum est. Si quidem fieri non posse puto, ut virgæ non æquilibratæ, sed violenter tortæ latentia metalla tantam, & tam subitanam vim imprimant, ut illa ultro se ad terram usque inclinare cogatur, is qui magneticarum motionum peritiam habuerit, attestabitur: ut enim sympathicæ rerum naturalium actiones effectum habeant, dici vix potest, quanto ingenio, & industria opus sit, & quam exacta & præcisa æquilibratione corpora disponenda sint; ut proinde omnes ridendi sint, qui virgulas illas bifurcatas manibus apprehensas, à tam subtili halituum vi con-

ciare posse sibi imaginantur.

Ne itaque sine ullo fructu virgulam divinatoriam condemnasse videamur, alium modum hoc loco præferibam, quem uti experientia multiplici certum comperi, ita quoque omnes eos, qui eo utuntur, intento suo nequaquam frustratum iri confido.

EXPERIMENTUM I.

Fiat ex salis fossilis fragmento lanceola uno palmo longa, quam cum quolibet ligno ita committes, ut lignea pars salinæ lanceolæ commissa, in æquilibrio supra obelum affixa, vel etiam filo suspensa liberè moveatur, hanc lanceolam ligneosalinam impone supra ollam supposito igne, aqua salina seu muria bulliente, & comperies, spiritus volatiles in halitus abeuntes salinæ lanceolæ, tanquam sibi simili corpori, magnetico influxu adherere; unde lanceolæ corpusculis salinis aggravata, paulatim deorsum versus ollam inclinabitur. Hoc idem contingere posse existimo, si supra mineram salis simile instrumentum poneretur.

EXPERIMENTUM II.

Fiat una lanceola ex ligno, & aurea virga subtili ad æquilibrium commissa, uti in præcedenti diximus, hanc supra ollam statuas, in qua purum argentum vivum positum sit, quod si supposito igne evolare feceris, totum Mercurium aureæ virgæ se jungere reperies, unde eo gravata aurea virgula, se profunde inclinabit. Idem si supra mineram Mercurii aurea virga exponeretur, evenire censendum est. Pari pacto si argenteam glebam in pulverem contusam, ollæ impositam igne evaporare feceris, lanceola ex ligno, & argento fabricata, ei supraposita, corpuscula argentea Magnetico quodam attractu in se derivabit; unde aggravata, necessario se illuc, unde vapor exspirat, inclinabit, quod idem virgulæ supra mineram æratam accideret, sive vapor, & halitus æratæ mineræ, per internum vulcani sive per externum solis calorem eleveetur.

CONSECTARIUM.

Ex hisce patet, omnium eorum, quæ sympathico quodam attractu ad se confluunt, hujusmodi virgulis absconditam matricem indagari posse, dummodo virgula sympathica ad alterum vi prædita, supradicta ratione constructa fuerit. Hoc pacto virgula ex iis materiis, quæ amicitiam cum aqua simplici fontana elementari habent, uti sunt alnus, nymphaea, mentastrum aquaticum, ranunculus, similiaque, quorum sive radix, sive caulis, cum alterius non sympathici, sive ligni, sive metalli virgula connexa, in loco, cui latentem aquæ venam subesse suspicaberis, superimposita, vapore aqueo cum tempore aggravata sese inclinabit, & sine omni superstitione, solo, quo pollet, magnetismo, latentem aquæ venam demonstrabit. Quod non dicerem, nisi experimento à me sumpto, id certum cognossem. Cujus quidem rei rationem docuerunt nonnullæ arbores venis metallicis superinsistentes, quarum folia, ramique vapore gravata, & velut cuticula quadam induta, deorsum vergebant, itaut penè terram tangerent. Et ex arboribus ad ripas, fluminum sitis id luculenter quoque patet, quarum rami vapore aquæ aggravati, ad ipsam usque aquæ superficiem sponte sua cum tempore inclinantur.

EXPERIMENTUM III.

Inter ferrum, & vitriolum insignem intervenire

sympathiam, constat, cum soli ferro, reliquis metallis veluti repudiatis, avide adhæreat.

Fiat itaque virgula ex ligno & ferro rite commissa, quam si ollæ vitriolum impositum, ignis ope exhalare sinas; mirum dictu, ferrum protinus colore ferrugineo in æruginem fuscā mutato, in æs quasi transformatum, ac pondere pressum, totum se in ollam inclinatum diverget. Atque hæc sunt, quæ lectori de Virgula divinatoria proponenda duxi.

De Fodinarum Metallicarum Natura, proprietate, variis accidentibus, varia ad Auctorem responsa.

P R Æ F A T I O.

Cum operi huic summa cura insistenti complures difficultates occurrerent, ex quarum labyrintho me evolvere vix possem, metallurgos Hungaricarum fodinarum (queis in Europa celebriores non reperiuntur, si in ullis aliis terrarum locis, certè hinc potissimum divitias suas, & ludibundam industriam natura cumprimis exponit) consulendos duxi. Litteras itaque propediem expedire visum fuit, in quibus novemdecim propositionibus, occurrentia circa res metallicas dubia comprehendebam. Quoniam verò nullus eorum, qui fodinis præsent, virorum, mihi notus erat, ope Patrum nostrorum, qui Neosolii, vicinisque Hungariæ montanis civitatibus, potissimum P. Andreæ Schafferi opera usus sum; qui uti metallicæ artis haud imperitus, ita quoque incredibili ad cœptum negotium promovendum, cura, diligentia, & sollicitudine, una cum P. Georgio Weber, Residentiæ Neosoliensis superiori amplexus, quæcunque tandem ad meum institutum necessaria esse judicabat, inquisivit, tantumque cum fodinarum Præfectis, quibus cum jam dudum ei summa necessitudo intercesserat, effecit, ut & ii suam quoque ad operis promotionem, symbolam se collaturos pollicerentur. Singulis itaque fodinarum Hungaricarum præsidibus unum mearum petitionum exemplar tradidit, ut ad ea responsa sua scriptis huc Romam transmitterent, quod & factum fuit. Nomina eorum, qui ad Novemdecim puncta, à me transmissa responderunt, infra ponentur. Sed ut horum virorum fidem, & diligentia fera cognoscat posteritas, hæc responsa eorum, prorsus eo ordine, quo in originalibus manuscriptis habentur, pari candore & sinceritate ex Germanica, in Latinam Linguam translata, exhibenda duxi.

De Fodinis Hungaria rebusque memorabilibus, quæ in iis occurrunt.

Et 1.

Responsio Schemnitziana ad Novemdecim puncta ab Auctore iis proposita.

Cum R. P. Athanasius Kircherus Societatis Jesu presbiter, per Rev. Patrem Andreæ Schaffer ejusdem Societatis supra Novemdecim puncta metallorum mineraliumque conditionem necnon fodinarum in hisce partibus constitutionem concernentia, instantibus precibus nonnullam sibi informationem dari petierit: Nos infra scripti, rerum metallicarum præfecti, jurati, cæterique officiales, fodinarum montanarum administratores, & inspectores, ejus obsequentes petitioni, coacto Schemnitzii in Hungariæ inferioris urbe consilio, supra di-

cta puncta deliberantes, tandem ad singula nobis proposita dubia respondemus, uti sequitur.

Ad primum, de aquarum mineralium proprietate & experientiis quibusdam metallicis.

1. Resp. I. Aquæ, quæ fossoribus occurrunt in principio, plerumque sunt insipidæ, claræ, odoris expertes, leves & frigidæ, progressu verò calidiores, graviores, turbulentiores, prout à succis metallicis tinguntur, vel alterantur, quædam albæ, rubræ, virides, vel cæruleæ, vel nigræ sunt, certo quodam odore, & dum sunt minerales, acquirunt saporem acrem, ut in illis pisces vivere nequeant.

2. Quando aqua in fodinis diu stat immobilis, tunc generatur in superficie ejus instar cuticulæ quædam nebula mineralis, quæ agitata & respirando attracta, præsentaneam adfert mortem. Reperiuntur etiam aquæ pravi odoris, & saporis, nullius tamen pravitatis. Datur etiam ibidem aquæ genus, quod in figuram saccharo haud ab similem degenerat, videlicet in lapillos albos: cæteras intrinsecas Aquarum proprietates ignorant fossores, easque relinquunt inquirendas chymicis, & medicis. Docet quidem experientia, tribus milliaribus à Schemnitz, quandam mineralem aquam reperi, quæ bibentibus strumas generet, & econtra sex milliaribus abhinc esse aliam aquam, quæ strumas à dicta aqua contractas bibendo tollit.

Ad 2. De efflorescentiis metallicis in arbusculis, & ex quibus salibus, vitriolo &c. nascuntur?

Resp. I. Aliquando in fodinis occurrunt crystalli filis argenteis pilorum instar tenuissimis circumvolatæ; & cætera similia. Superioribus annis fuit repertum Argenti granum purum putum (Germanicè Gediegen) in lapide fatuo (Germanicè Taubenstein) in quadam materia alba cretæ simili, quæ vocatur medulla lapidea, ac si studio ibidem fuisset reconditum, ponderavit libras duas. Est alia species crescentium, quod Latine sonat vestigium (Germanicè Blactmabl) hoc adhæret lapidibus fatuis purum purum, ita ut ferro plumbi instar possit scindi. Similia crescentia igne forti fiunt volatilia, & dum similia in fodinis reperiuntur, fossoribus spem æris tollunt, quia habent pro augurio, si illa ubi æs est, reperiuntur, æs tollere, ubi verò æs non est, ibi id producere. Ex quo sale, vel vitriolo nascantur, ignorant mineralium fossores.

Ad 3. Quænam potissimum mineralia corpora inveniuntur in fodinis auri & argenti, cupri, stanni, plumbi, & an ubique reperiuntur argentum vivum, & sulphur, quomodo cognoscantur Sympathia, & Antipathia metallorum?

Schemnitzii ut plurimum reperitur argenti vena, quæ parum auri continet: inveniuntur quoque venæ argenti cuprum, vel plumbum continentes, ordinarie quanto plus argenti venæ versus Septentrionem currunt, tanto plus continent plumbi; in valle Hoderitzsch, in profundioribus mineræ invenitur aurum & argentum: versus summitatem verò marchasita, & ferrum absque auro, & argento. Ferri vena est duplex, una quæ fluxui seu fusioni inservit, ruda vocatur, dissimilis specie ab altera, ex qua ferrum eliquatur. Notandum, aliquot annis elapsis in vena Rudæ lapidem magnetem fuisse repertum, ex quo aliquot centronum centenaria ferri educta fuerunt: rursus venæ argenti Schemnitzianæ ut plurimum plumbis mixtæ Antimonii non parum habent, etiam cinnabrii; & interdum occurrit cinnabrium minerale minio haud dissimile, argentum continens. Quapropter cum similia mineralia ustulata, & liquata sulphureum vel Mercurialem odorem præbeant, omnino tamen creditur ibidem esse, etiam si argentum vivum,

& sulphur ibidem non sint acti; attamen esse in potentia, vel habere cum iisdem quandam analogiam. Similiter habetur quoddam minerale, quod Germanicè *Belff* sonat. Hoc fluxum seu fusionem in mineralibus promovet, & liquando cum argento aurum adducit; e contra vena plumbi rapax, & prædatrix est; & est aliud genus *Marchasitæ* in argenti venis frequens, quæ interdum argento vacua, & interdum argento mixta, ubi hæc reperitur, ibi fossiores augurantur, ubi æris mineræ non sunt, ibidem easdem gignere, at ubi sunt, eas corrumpere. Lapidēs virides vel flavi, auri & argenti venas significant.

Ad 4. Quibusdam machinis exhauriant aquam subterraneam? respondit ad hæc Georgius Agricola de re metallica lib. 6. &c.

Ad 5. Quomodo resistant operæ auræ pestiferæ ex spiritibus metallicis genitæ? respondit, spiraculis & follibus, ut supra.

Ad 6. an compareant Dæmunculi subterranei vel pygmæi? Respondit affirmative, & narrat plura exempla.

Ad 7. 8. 9. Utrum incidant in animalia quædam, quæ nonnisi infra terram habitare possunt, & utrum Tempestates, fulgura, tonitrua, fulmina, terræ motus, & similia experiantur fossiores, sicut & de fluminibus, & fontibus subterraneis &c.

Respondit, Schemnitzii nihil horum reperiri & experiri.

Ad 10. Omnia denique quæ naturæ miracula sapiunt, notentur. Resp. naturæ miracula breviter describere, esse impossibile, debere nos potius creatoris mirari potentiam & sapientiam, quàm singulorum naturam penetrare.

Ad 11. De aestu, & frigore fodinatum, quibusnam in partibus maxime domingatur: utrum quo profundiores, eo calidiores sint, & num videantur ignes subterranei?

Respondit, in venis illis nullum immodicum æstum vel frigus percipi, nisi auræ liber transitus impediatur, tum fossas semper calidiores, usque dum iterum transpiratione libera fruantur, mediantibus spiraculis.

Ad 12. De ventis subterraneis, utrum per fossarum rimas eorum sit eruptio? de æcis subterraneæ constitutione ejusdemque purificatione.

Respondit, ventos non percipi in fodinis, sed potius praves vapores, qui, ut supra narratum est, spiraculis, & follibus expelluntur.

Ad 13. De Terræ motibus subterraneis &c. Resp. simile nunquam Schemnitzii accidisse.

Ad 14. De aquis subterraneis, num incidant in rivus subterraneos, fontesque aquarum dulcium, nitrosarum, vitriolarum &c.

Respondit semper in nonnullis locis aquarum prægrandem reperiri colluviem.

Ad 15. De venarum metallicarum ductibus, quàm mundi partem potissimum respiciant, & an ferri vena Boream, &c.

Respondit, Metallorum ductus versus unam partem solam respicere nunquam, sed jam versus hanc, postea illam &c.

Ad 16. De metallorum Sympathia & Antipathia mineraliumque exterorum &c.

Respondit, istas ignorare fossiores.

Ad 17. Quisnam sit modus separandi metalla &c. Respondit dimittendo ad separatores &c.

Ad 18. Quænam signa habeant cognoscendi venas auri & argenti &c.

Respondit, esse impossibile, breviter signa describere, cum unum quodlibet metallorum habeat suum proprium lapidem, debere hoc addisci longa expe-

rientia, certissimam tamen esse illam probam, quæ igne perficitur.

Ad 19. Nominentur loca, in quibus, & quæ effodiantur mineralia? item de thermis, & acidulis, & quanta sit profunditas minerarum?

Respondit, Schemnitzii sunt venæ auri, & non procul abinde, est vena argenti vivi.

Schemnitzii sunt venæ argenti, ferri, plumbi, cupri, &c.

Neosolii est vena cupri.

Puggantii, est vena auri.

Regio monte, & Dullæ vena auri, Lubethan venæ ferri & cupri, Wazæ & in monte Angelico est vena auri.

Thermarum sunt duæ prope Schemnitzium, aqua Thermarum ubi transit, faeces deponit, quæ successu temporis in lapidem flavum mutantur.

Prope Schemnitzium duæ Thermæ reperiuntur.

Duobus milliaribus à Schemnitzio, ultra flumen Granum prope pagum Bukovvina reperiuntur Acidularum duæ.

Prope Schemnitzium quoque habentur acidulæ.

Summa fodinarum profunditas est 150. Klaßer, id est, ulnarum.

ITA TESTANTUR

Joannes Georgius Weis, Fodinarum præfectus.

Julius von Lansée, Rationum fodinarum juratus.

Elias Angerman, rei metallicæ juratus.

Joannes Zuerig, fodinarum scriba.

Andreas Ungeden

Michael Reuter

Georgius Ulricus Kaiser

Joannes Henricus

Martinus Sepp

Michael Korsch

Rei Metallica
inspectores.

II.

Responsio ad quæstiones propositas, Joannis Schapelmanni, S. Caf. Regiæque Majestatis, minerarum Cuprearum præfecti in Herrengundi in Hungaria.

Prima quæstio, de aquarum mineralium proprietatibus, & de experienciis quibusdam Metallicis.

Responsio: Apud nos Neosolii reperitur genus Aquæ vitriolatæ, in qua ferrum in cuprum transmutatur, faciunt singulis annis 50. vel 60. Centones, qui sunt circiter quinque, vel sex librarum millia cupri. Hæc aqua vitriolata acuitur sale vitrioli, vitriolum autem nihil aliud est, quàm album sal tertæ; hoc sal solvitur ab humiditate, postea transseundo per mineras cupreas, illas solvit, & inde colorem viridem acquirit: Si autem mineram cupream nigram transit, continentem argentum, tum coloratur cæruleo colore; fuerunt etiam huic aquæ cuncta alia metalla imposita, at nullum præter ferrum tangit, quod primò in subtilissimum pulverem vertit, & postremo in optimum cuprum mutat, ac si studio in igne liquatum, & in cæram formam fusum esset; prorumpit etiam ex durissimis lapidibus aqua quædam mineralis, quæ sedimentum deponit flavum, qualis autem sit materia, & ejus virtutis, hæcenus est incognitum.

Reperitur quoque aqua quædam alba, quæ in lapidem durum abit: Si verò hæc aqua ante suam coagulationem mineram cupream transiverit, tunc generatur ex ea lapis, qui Melochites vocatur, quando verò aqua illa perfluit cupream mineram continentem argentum, fit ex ea pulcher lapis cæruleus similis Turcoidi: hæc aqua autem nullibi frequen-

tius

ius reperitur, quam in mineris lapidibus Siliceis copiosis, & cupreum cum argento continentibus.

2. De efflorescentiis metallicis in arbusculas, ex quibus salibus & vitriolo, similibusque originem suam trahant.

Resp. Reperiuntur aliquando in minera hac efflorescentiæ cupreæ ex cupro puro puto (Germanicè gediegen) sicut supra terram flores, & herba, &c.

3. Quænam potissimum mineralia corpora reperiuntur in fodinis auri & argenti, cupri, stanni, plumbi? an ubique reperitur argentum vivum, & sulphur, quomodo cognoscatur Sympathia & Antipathia metallorum?

Plerumque in fodinis metallicis quasi ubique reperitur Marchasita, cui sulphur inest; at argentum vivum, vel in cinnabrio aliquando saltem in fodinis argenti & auri reperitur, quia argentum vivum, vel cinnabrium suam propriam habet mineram. Apud nos Herrengrundt in fodinis cupreis argentum vivum non invenitur.

4. Quibus machinis exhauriunt aquam subterraneam?

Resp. Antliis, coriaceis saccis & similibus.

5. Quomodo procedunt adversus pestiferam auram, & quomodo eam tollunt in fodinis?

Quando fodinæ sunt profundæ, ita ut bona aura inspirari, & prava expirari nequeat, tum folles magni ita adaptantur, ut bona aura insuffletur, & prava expellatur; si verò aliquis ab aura subterranea læsus fuerit, alio medicamento non utitur, quàm ut protinus ad auram apertam deducatur.

6. Utrum compareant Dæmunculi seu pygmæi in fodinis?

Resp. tales visos fuisse, & auditos pluries.

7. Utrum reperiantur animalia in fodinis?

Respondit, talia minime reperiri, nisi vermiculos quosdam nigros in lapidum poris aliquando habitantes.

8. Utrum experiantur fossiores fulgura, tempestates, fulmina, terræ motus &c.

Olim in Herrengrund priusquam in fodinis spiracula facta fuerunt, observatum est vapores in fodinis coacervatos fuisse, qui facillime intrante accensolumine incensi sunt maximo cum fragore, & ab hoc igne tacti, ita ambusti fuerunt ut cutis facile detrahi potuerit, ac si aquæ ferventi adusti essent. Cæterum terræ motus contingunt sub terra, sicuti supra terram.

9. De fluminibus & fontibus subterraneis, an reperiantur?

Reperiuntur aquæ subterraneæ in fodinis, pro fodinæ situ plus vel minus: ex quibusdam fodinis singularibus ductibus educitur, alibi instrumentis Hydraulicis extrahitur.

10. Omnia miracula naturæ significantur.

Respondit, hæc nihil aliud novum, vel mirabile præter lapidem quendam varias figuras repræsentantem.

11. De æstu, & frigore fodinarum, quibus in partibus maxime dominantur, utrum profundiores calidiores, & num videantur ignes subterranei?

Respondit, fodinæ dum sunt siccæ, quantò profundiores, tantò calidiores sunt, quia impossibile est illis spiracula sufficientia facere, ob profunditatem; quando verò aquas habent, non sunt ita calidæ, etiam si profundæ: Si verò profundæ & siccæ, & venas habent Marchasiticas, semper sunt calidiores.

Tempestates igneæ apud nos non sentiuntur; mul-

toties verò videntur in montibus metallis divitibus, nocte flammæ caruleæ.

12. De ventis subterraneis, utrum per rimas fodinarum eorum sentiat eruptio; de aëris subterranei constitutione, num & quomodo, ne noceat, purgetur, & quibus instrumentis?

Respondit: venti subterranei apud nos non percipiuntur. Prava aura ex fodinis expellitur follibus, & spiraculis, vel si fodinæ non admodum profundæ, commotione aëris per instrumenta idonea.

13. De terræ motibus subterraneis, an in tantum concutiant terram ut operantes opprimant?

Respondit, contingere, & exempla plura contigisse narrat.

14. De aquis subterraneis, num incidant in rivos subterraneos, fontes dulcium aquarum, nitrosarum, vitriolarum, bituminosarum, aquarum, & si exitum non habeant, quomodo eas exhauriant, & quibus instrumentis?

Respondit. Reperiri in fodinis aquas dulces potui aptas, aliquando putridas & impuras, item, vitriolares aquas, quæ ferrum in cuprum mutant, ut supra narratum est? rivi verò educuntur per aquæ ductus, vel per instrumenta Hydraulica.

15. De venarum metallicarum ductibus, quam mundi partem potissimum respiciant; an ferri venæ potissimum ad Boream tendant.

Respondit, ductus metallorum tam ferri, quam aliorum aliquando versus meridiem, aliquando versus Boream, etiam aliquando ductus esse cruciformes.

16. De Sympathia, & Antipathia metallorum & mineralium & in quibus illa consistat?

Respondit: quælibet minera habet singulares suas proprietates: quædam unum tantum metallum producit, alia plura simul, de cætero eorum Sympathiam & Antipathiam prius ignorant Metallurgi neque illas perquirunt.

17. Quisnam modus sit separandi metalla à suis mineris?

Unum quodlibet metallorum variis modis separatur: generalis verò modus est, ut minera prius leni igne ustuletur, ut evaporet Δ , id est, sulphur combustile, postea abluitur usque dum omnis levior terra simul cum corrosiva qualitate recesserit: gravior verò, quæ singulis lotionibus fundum petit, exsiccat, & pro metalli conditione liquatur, & ultimo separatur, prout fufius tractat Agricola, & Lazarus Erkerus.

18. Quænam sint signa minerarum, & qua ratione cognoscantur venæ auri & argenti?

Minerarum venæ potissimum cognoscuntur longa experientia, & exercitio, quia quælibet vena suos singulares habet lapides. Terra argillacea nigra, & tenax plerumq; mineras circum, vel sub se habet auri.

19. Nominentur loca, in quibus, & quæ effodiantur mineralia in Hungaria. Item de Thermis, Acidulis, & quanta sit profunditas minerarum.

Neosolii effoditur minera cuprum solum continens, & ibidem effoditur alia minera nigra cupri, eumprum & argentum simul continens. Quantum ad profunditatem fodinarum; quædam sunt profunditatis 147. alia 137. Klaßier id est, ulnarum.

Cremnitzii reperitur vena auri. Schemnitzii reperiuntur venæ argenti & plumbi. Regio monte est vena auri, item Pugantzii. In Dielen, uti & in Huldritz venæ argenti inveniuntur.

Thermæ sunt: Stubnerbadt: Bomberbadt & Schemnitzii Thermæ prope vitrariam: iterum apud nos reperiuntur Acidulæ plures; quarum vires mihi sunt incognitæ.

Hactenus ex relatione Joannis Schapelmani minerarum

nerarum cuprearum præfecti in Herrengrunt.

III.

Georgii Schütz sua Sacra Cesarea Majestatis in Camera Schemnicensi Rationum in mineralium negotio Præfeci.

1. De aquarum mineralium proprietate, & experientis quibusdam metallicis.

In superiori Hungaria in Schmolnitz, sicut etiam Neosolii in Herrengrunt reperitur tam potens aqua vitriolaris, in qua ferrum aliquanto tempore positum, in cuprum degenerat, & ea, quæ in Schmolnitz reperitur potentior est. Hoc cuprum in igne durat, deficit in bonitate à lapide cupreo; si frigescat; unde huic solum immiscetur. Hic Schemnitzii in adjacenti aqua, visa est adhærere quædam spuma solida in lignis aquæ mineralis inhærens; per modum naturalis lapidis, quæ necdum tamen probata fuit quid rei mineralis in se contineat.

2. De efflorescentiis metallicis in arbusculis &c.

In mineris argentiferis inveniuntur sæpe efflorescentiæ argenteæ, ubi argentum nitidissimum in modum fili, vel capilli ex lapidibus metallicis se exerit: imò inveniuntur digiti crassitudine tamenta argenti puri, licet subnigra, & coloris utcunque plumbei; exerunt se etiam non raro crystallinæ partes, licet non in ea quantitate, ut argentum, tam puræ nihilominus, ut bene elaboratæ Bohemicos, & Ungaricos adamantes superent.

3. Quanam potissimum mineralia cuprea repetantur?

Cremnitii & in Königsberg in mineris auriferis mineralium fluxus sulphurei sunt; ubi & sulphur cum solo auro sine damno commotatur, magno licet aliis metallis nocumento, & sicut id aurum purificat, ita cæteris splendorem & decorem tollit.

In mineris istis argentiiferis inveniuntur pariter cinnabrium, seu cinnabaris, Marchasita; & experientia docet, cinnabarim metallo officere aliquando; nihilominus jucundum est videre fossoribus in primis fodinis fissuras cinnabaris tinctura refertas.

In mineris cupreis in Schmolnitz, & Herrengrunt invenitur pyrites, itaut inducar ad credendum, ex eo vitriolico humore commixto, accedente calore interno & influentiis cælestibus, cuprum generari: habetur enim experientia, in montibus ubi minera cuprea deficiunt, pyritem quoque spurium reperiri.

Argentum amice sociatur cupro, & magis quam aliis metallis, imò, in excoquendo ab eodem ad maiorem puritatem promovetur; cavendumque est, ne inter excoquendum ab insita eidem comixta maligna qualitate totum deperdat, cum vel maxime vires suas instrumentis cupri quibus commiscetur exerat.

4. Quibus instrumentis aquæ ex mineralium cavernis hauriantur?

Primo maxime juvant stabiles cisternæ in montibus exstructæ, ad quas per fissuras decidunt ex superiori parte montis aquæ, inde verò deducuntur per certos ductus.

Quidquid verò aquæ decedit infra has cisternas, vel extrahitur Anthea, si non est aqua copiosa; vel per artificium Hydraulicum aliud; nempe per canalem majorem trium orgyiarum, quæ infra tympanum superne rotam habeat, & catena transit per canalem, rotam & tympanum; in hac catena affiguntur sacci ex corio, qui in inferiori parte canalis aquam hauriunt, extrahunturque per illum canalem. Vide figuram V. in ultimo hujus sect. Capitulo propositam.

Talia artificia sunt ultra septendecim, unum su-

pra alterum, & per quodvis aqua deducitur in cisternam quandam, ex illa rursus in aliam, donec in communem cisternam supradictam effundatur.

Aliud est ex diversis Anthiis confectum, in quo diversæ Anthiæ unius perticæ ferreæ motu moventur, & hoc pacto deducitur aqua, ut supra.

5. Quomodo aura pestilens inhibeatur?

Aura hæc pestilens est defectus recentis auræ, quæ vapores dissipantur, atque hæc per modum Nebulæ subsidit aliquando in scrobes, quæ odore quodam dulci, instar multi at maligno illas commoventes corripit, sæpiusque suffocat; dissipatur hæc aura maligna introductione recentioris per folles bonam auram instantes, aut etiam assidua ejusdem pestilentis auræ commotione. Verum de hisce machinis, earumque structuris vide in fine hujus sect. c. 6.

6. Utrum dæmunculi compareant in fodinis?

Longiori abhinc tempore ii comparuerunt bono semper flosorem omine. Videat lector in præcedenti libro de dæmonibus subterraneis, ubi omnia ad hoc argumentum pertinentia reperiet exacte tractata.

7. Utrum animalcula quædam reperiantur in fodinis, vel tempestates?

Nihil animadversum est, à fossoribus, præter terræ motus.

8. De fluminibus & fontibus subterraneis.

Præter supradicta non dantur; ab infra tamen notantur continuo aquæ Scaturigines tam vehementes ut violenter etiam per opposita erumperent, nisi alio meatu educerentur. Non procul Neosolio in pago Walaschia dicta, tam potens rivus è rupe erumpit, ut molendino impellendo par sit.

9. Omnia miracula naturæ.

Videtur hoc fatum, quod in superiori Hungaria minera ex cupro, ferro, & plumbæ adeo commisceantur, ut non raro in supremitate ferri, in medio cupri, in profundo plumbæ materia reperiat, & quod alibi etiam fluores cuprei infecti plumbæ sint. In lapidibus argentariis animadversum fuit, abundare eas plumbæ, itaut ex lectis similibus lapidibus inventum sit centenarium lapidis talis continuisse libras plumbæ 20. 30. 40; etiam 50. non tamen in magna quantitate tales lapides reperiebantur, deventum enim brevi est ad lapides alios minus plumbæ divites.

RELATIO

Patris Andrea Schafferi de Differentibus mineralibus, quæ in Fodinis Hungaricis reperiantur.

1. Specificatio mineralium Neosolio, Schemnitio, & in aliis montanis Hungariæ Civitatibus collectorum, quæ dictus Pater, tum in ornamentum Musæi, tum ad notitiam mineralium acquirendam, Auctori, Mundo subterraneo intento transmissit, &c. sequuntur.

Numerus primus, Marchesid von Silber, gleit ohne fugend; id est, Marchasita argentea, quæ licet videatur aliquid continere, in igne tamen nihil nisi scoria manet.

2. Gelf bey m artzt, id est minera continens cuprum, argentum & aurum; quod auri splendorem habet, purum cuprum est; quod minerale Germanico termino Gelf vocant, ad distinctionem lapidum mineralium, qui nigri cum appareant cuprum non solum, sed & argentum continent.

3. Marchesid bey m Kies, id est pyrites; reperitur hæc adulterina minera ibidem, ubi effoditur sub numero primo posita minera.

4. Bleharitz

4. *Bleyertz*, id est, minera plumbi: hæc sub numero quarto continet triplicis coloris rationem; primus color est niger & splendicans, & est minera puri plumbi; secundus color habet stiam albam, & nihil continet, sed species silicis est, quam vocant in fodinis Quartz, quæ est quasi matrix minerarum: Tertius color est, & nihil est aliud, quam minera cupri.

5. *Eyferertz*, vel ruda, minera ferri est non procul Schemnitio, & ibidem foditur, ubi etiam sunt thermæ calidæ, & in copia magna, ibidem etiam ante aliquot annos effodi sunt magnetes, quos in fornacibus liquatoris in ferrum elaborarunt.

6. Est minera ferri non Schemnitio, sed ex alio loco civitatum montanarum Hungariæ dicto Ronis, qui locus Neosolio distat versus superiorem Hungariam 4. Milliaribus. Continet hæc minera etiam ferrum, quæ ibidem de facto pro usibus camerarum Ungariæ excoquitur. Circa quam mineram notandum, in toto hoc promontorio chalybem nullum reperiri, sed ferrum tantum excoqui, non adeo probatum. In hoc eodem promontorio reperitur minera ferri instar globorum, quibus hostem è musquetis petimus.

7. *Marchesidt mit Silberertz vermenget*. Minera hæc argenti est, quæ simul admixtum habet aurum; quod tamen in hoc lapide auri fulgorem habere videtur, aurum non est, sed Marchasita vocatur.

8. *Kies*, minera hæc nulli usui est, nisi ut faciat mineras argenti in *grossen Mercken*, id est, in magnis processibus, fluere, id eo vocant hinc, *einen Fluß*.

9. *Erzt mit Cinober*, aut minium. Color hoc in lapide niger, minera argenti est, quod admixtum habet aurum. Ruber color cinnabarim, cui vivum argentum inest, denotat.

10. *Eyglentzig erzt*, minera est, argentum continens & aurum, splendorem habens mineræ plumbi.

11. Mitto hinc R. V. mineram Marchasiticam, uti crescit in montibus argentiferis Schemnitii, ex qua videbit R. V. qualiter natura producat crystallos, quæ & lucidissimæ, & in magnam quantitatem aliquando excrescunt: mitto utriusque speciei sub numero 12. & 13. paradigmata. In qua re mirabile est naturæ artificium, quod omnes crystalli hic crescentes sint sexangulares à natura, poliatæ & cuspidatæ.

12. Crystallus est ex terra Schemnicensi eruta, tota pellucida, ut apparet.

13. Hæc crystallus eruta est in montibus cuprifertis Excellentissimi Domini Francisci Wassellini Comititis de Hadat, Palatini Regni Hungariæ, ubi anno elapso in ea quantitate reperta est crystallus, ut ultra 100. libras, seu plusquam centenarium ponderavit: unde hac reperta, Excellentissimus D. Palatinus motus fuit, ut per expeditos homines inquireret de artifice, qui crystallum hanc aut in formam monstrantiæ, aut similem quampiam excindere & efformare sciret, ac postmodum, uti decrevit, suæ Sacræ Cæsareæ Majestati præsentaret.

14. Hinc mitto R. V. Cuprum quod in valle Dominorum, (quem locum Germanicè vocant *Herrengrunds*) per aquam vitriolatam, quæ in ipso monte fuit, ex ferro factum est: & vocant *Zemendkuppfer*, de quo inveniet R. V. inscripto sub Littera A. numero primo, & hoc sciendum est de hoc cupro ex ferro in Cuprum verso; primò quod ferrum in laminas cusum, ac in hanc aquam injectum, in quantitate aliquot centenariorum intra hæc aquas in Cuprum versatur. Secundò hoc Cuprum hoc habet peculiare præ alio cupro, quod non tredecim aut quatuordecim ignes subire debeat, uti cuprum ex mine-

ris eliquatum, sed immediatè in quidvis elaborari possit. Tertio, hoc cuprum ex ferro factum magis aptum est ad calices & similes delicatiores labores, quam quoddam mineræ suppeditant.

15. Est solea equi aliqua ex parte per vitriolatam aquam, id est, per *Zementwasser*, in cuprum versa, quæ tota in cuprum abiisset, si debito tempore in dicta aqua relicta fuisset.

16. Mitto hic particulam magnetis qui effoditur Schemnitii, & quatuor circiter milliaribus Neosolio, ac in pluribus aliis Hungariæ locis reperitur. Quod si R. V. plus desideret, suppeditabo.

17. Pulveres isti vocantur Neosolii termino Germanico *das Schwartze Fischverct*: reperitur in valle Dominorum, ubi cuprum effoditur; per aquam ex monte pulveres isti educuntur, continent cuprum & argentum.

18. Sunt similiter pulveres ex eodem loco, & vocantur *Belff Fischverct*, nihilque nisi cuprum continent.

19. Vocatur hic color termino Germanico *Zerbergrien*, colligitur in *Herrengrund*, ubi per aquam in monte per cupri mineralia defluentem evehitur in certas ad hoc opus paratas cistas, in quas aqua influit, & subsidentem hunc in fundo colorem post se relinquit. Notandum, uti ex harum rerum peritis habeo, pulverem hunc seu colorem adeo cupri esse divitem, ut centenarius hujus cupri igni commissus ultra 54. libras cupri det.

20. Hic lapis vocatur communi nomine *Steinmilch*, à fossoribus: ejus origo sic se habet: per venas minerarum cupri flavi seu nigri fluit aqua, quæ ubi stillatim in Trabes, quibus mons sustentatur ad ingressum fossoribus faciendum, effluit, in lapidem hunc vertitur.

21. Est minera sulphuris, quæ duobus milliaribus supra Neosolium in magna quantitate effoditur. At licet hæc minera sulphuris admodum boni dives sit, & etiam aliquantilli auri ferax; ad alium tamen usum non effoditur de facto, nisi ad liquationem argentiferarum minerarum & auriferarum facilius & felicius faciendam, unde vocatur minera hæc sulphuris, *ein Rhes sum Flues tanglich*.

22. Lapis hic vocatur *Steintohlen*, integer mons est inter Neosolium & Cremnitium duas civitates Montanas Hungariæ, prope fodinas Hydrargyri, quod ibidem una cum cinnabari effoditur. His carbonibus nemo hinc utitur pro mineris liquandis, neque liquatores, nec fabri ferrarii pro suis officinis; aut ullus alius. Quæsi causam, responsum accepi, nimis vehementem suscitare calorem, ita ut ferrum consumat, & omnem liquationem destruat.

23. Est minera cupri, quam vocant *Belfferzt*; nihil in se argenti vel auri continet, sed solum cuprum: major harum trium est eruta ex nova fossa quam anno superiore felicissime repererunt & in tanta benedictione, ut ex hac sola fossa putetur sua Sacra Cæsarea Regiaque Majestas proventus annuos habitura, 50. millia Imperialium. Secunda hujus generis etiam in *Herrengrunds* effoditur, & nihil nisi cuprum continet; lapis albus, qui ibidem reperitur, vocatur Quartz. Tertia species nihil nisi puri cupri minera est.

24. Est minera cupri, quam hinc vocant *Schwartzertz*, continet cuprum & argentum, cujus eam effodiunt copiam in *Herrengrunds*, ut annuè per separationem septingentas circiter, quandoque plures, quandoque pauciores argenti marcas extrahant.

25. Minera hæc est Antimonii, quæ simul non nihil de auro habet, effoditur in Civitatibus Montanis in magna copia.

26. Minera hæc à nonnullis vocatur *Roth-guidenertz*, ab aliis *roter Schmetel*; ad varia experimenta, quidnam contineret, probarunt quidem, & certi nihil

nihil hujates deprehenderunt, nisi quod magnum sit venenum.

27. Est minera cupri in mero gypso, quæ minera etiam hîc in civitatibus montanis effoditur.

28. Hæc minera est ex hujus collegii bonis & tertis, prope civitates montanas adeo dives, ut non modò ex probatione per me facta, sed etiam ex aliorum plurium, in hac re expertorum, & suæ Sacræ Cæsareæ Majestatis juratorum experientia desuper facta, centenarius minimum duodecim lotones, hoc æs 12. Loth argenti (quod potiori tamen ex parte aurum sit) continere deprehensum sit.

29. Pulvis hic ad spiracula fornacum, in quibus argentum à cupro separatur, mediante saturno; colligitur & vocant *Bleyrauch*, in eadem officina uti duplices sunt fornaces, ita duplex hic pulvis albus & flavus colligitur, & aliud nihil est, quam Arsenicum, pulverem hunc operarij tanquam sumum horrent venenum.

30. Est cinnabaris, quæ adhuc argentum vivum continet, effoditur prope Neosolium.

31. Pulvis hic est cuprum selectissimum colligitur & fit hac ratione, est fornax una ita præparata ut in eam immittantur facile 80. 100. & plures centenarii cupri non adeo adhuc excocti: hoc ubi liquefcit per meras flammæ, quas folles ab aquis attracti excitant, cuprum liquefactum nimio flau follium extra foramina efficitur, & ibi in sarragine aquâ plena excipitur: quæ in pulverem redacta materia adeo tenuis est, adeoque expurgata ut nobilissimæ inde clepsydræ fieri possint.

32. Hæc est aqua ex Valle Dominorum, seu Herregrund prope Neosolium, ubi sunt cupri fodinæ, quam hîc vocant *Zementvveser*, sive simpliciter *Zement*, fluit per mineras cupri, quæ per se vitriolata est, in hanc iniiciunt ferri laminas, & intra tres menses centenarii & amplius ferrearum laminarum vertuntur in cuprum. Schemnitzii locus est, Neosolio octo circiter miliarium distantia distitus, ubi similis aqua majoris efficacis & quantitatis reperitur.

33. Est minerale Schemnitzii mihi transmissum, cujus vim & virtutem cum mihi non communicaverint per ullam adhuc informationem; eam jam petitam proxima jam expeto occasione, R. V. quam primum possim communicare.

34. Mitto hîc R. V. mineram omnino pretiosam cum hoc tempore rarius simile quid inveniat, ubi videat R. V. argentum in filamenta sua efflorescens; flavam quod splendet, purissimum est aurum; quod nigricat, argentum est auro permixtum.

35. Lapidès hi virides similiter ex aqua, uti supra numero 20. scripsi, efficiuntur, cum hac tamen differentia, quod lapis hic viridis generetur ex aqua per mineras cupri fluente, sic uti lapis ille sub numero 20. ex qua per mineras argenti fluente generatur.

36. Transmisit lapidem hunc, quem à viro dignissimo fide accepi, qui retulit, integram Alnum Arborem cum ramis suis in aqua repertam fuisse in similem lapidem conversam, ex qua arbore sic in lapidem versa hoc mihi frustum ex speciali gratia donavit.

37. Plumbum hoc, argentum in se & aurum continet, quod transmittit pro exemplari aliquo liquationis argenti ex minera sua: porro modum ex mineris aurum & argentum educendi, specialiter R. V. communicabo.

RELATIO.

De Tyrolensibus Mineris facta à Pranobili & clarissimo Viro, Domino Joanne Ger-vick Archiducis Seren. Consiliario.

Præter Communia alijs, narratur quod mineræ vitreæ argentum, & æs contineant.

Fossoribus hîc notum est, ubi elaborantur fossæ minerales, inveniri magna montium latera ipsâ naturâ interne ab adhærentibus partibus divisa, eandemque divisionem magno sonitu percipiunt, bonumque iis omen est, inventiendi opulentas mineras.

Ex lapidibus ærarijs hic inventis in loco Teuffers dicto, vitriolum optimum conficitur.

Item ex ferro cuprum faciunt durius quam commune, pulchrius tamen colore, res procedit hoc modo: primo vas ligneum impletur utcumque aqua, huic sat magna quantitas marchasitæ imponitur; aqua hæc ad bulliendum disponitur scoriis ferri *Schlaecten* dictis: Secundo, infunditur aqua in aliud vas, ubi iterum tantum Marchasitæ imponitur, & ad bulliendum disponitur: item fit tertio, unde aqua utcumque vitriolaris evadit: deinde relinquitur quieta, donec subsidat densior materia marchasitæ, & aquæ effunditur in lebetes cupreos, cui imponuntur laminæ ferreæ, & sic coquitur, ut vitriolaris aqua ferum invadat, fit verò ut inter coquendum se partes quædam ferri solvant, quæ fundum per modum densæ materiæ petunt. Cocta sic aqua vitriolaris refrigerat, & in vasa lignea affunditur; vasa hæc superne ampla, inferne stricta sunt; relinquitur in his, donec vitriolum ad partes adhæreat, quod non adhæret, infunditur in vas ex larice, in quo imponuntur aliquot frusta ferri, & relinquitur donec se ipso bullire incipiat, & dum cessat, effunditur aqua ad primum vasculum, reservaturque illa materia densa, & hoc sæpius repetitur, donec aliquot centenarii talis densæ materiæ fiant: deinde siccat hanc materia, & hinc excoquitur in fornace nigrum primo cuprum, donec *Goltgruben* dicto, in pulchrum cuprum mutetur.

De particularibus Fodinarum Conditionibus variisque in metallicis mineis effodiendis, lavandis, concoquendis, separandisque unum ab altero processibus.

Et I.

De Purgatione Metallorum.

De venarum conditione in superioribus sat superque dictum est: uti verò natura metalla plerumque procreat impura, & mista cum terreis, & succis concretis, & lapidibus, necesse est eas res fossiles plerumque à venis metallicis, antequam excoquantur, quoad fieri potest, separare, itaque quibus modis venæ discernantur, conteranturque malleis, pilis tundantur, adurantur igne, in farinam molantur, cribentur, laventur, cremantur, dicendum restat.

Periti itaque metallurgi, non omnia simul commixta, pura cum impuris, inutilia cum utilis committunt decoctioni; sed primo tundendæ, & in minutas particulas resolvendæ sunt glæbæ metallicæ, sive in terrestribus speciebus, sive concretis succis, sive denique in lapidibus inextiterint:

D d dein.

deinde multiplici laborantium ministerio pura ab impuris, vilia à pretiosis sepatanda sunt, deinde lavanda, & urenda, tandem concoquenda, ut suo scopo potiantur.

Uruntur autem duplici de causa glebæ metallicæ; vel ut ex duris molles & friabiles factæ facilius tundantur, vel ut res pingues comburantur, sulphur, bitumen, auripigmentum Sandaracha, tanquam omnibus præterquam auro nociva metallis, tum vel maxime quod ferro, minus reliquis noceat: quoniam verò nullum aurum ferè invenitur, cui non aliquid argenti commixtum sit, hinc huiusmodi quoque glebæ, ut excoquantur, urendæ sunt, sulphur enim, & bitumen, quod plerumque admixtum habet, in ardentissimo igne in cinerem resolvit metallum, argentumque consumit, uti in cadmia bituminosa videre est. Modum verò urendi vide apud Agricola & Erkerum. In craticulâ fornacis ferreâ frusta in coni formam disponunt, deinde igne supposito torrent: tum cæteras metallicas glebas addunt, tum potissimum pyritarum qui quod mirum est, cum tertio uruntur, ea, quæ in supremo fastigio collocata sunt, frusta exsulant quiddam subviride, aridum, asperum, tenue adinstar Asbesti incombustibile, quod & in Schisto lapide, ex quo in Misnia æs educunt, observatum fuit. Aqua quoque subinde adspargitur venæ metallicæ, ut mollior, friabiliorque evadat; cum enim vis ignis ejus humorem exsiccat, aqua calentem facilius dissolvit, uti in calce fit.

Tria itaque tormenta antequam ad suæ perfectionis terminum glebæ metallicæ pertingant, sustinere debent; prius est, Contusio, & in minutissimas particulas resolutio, quod multiplici modo, & ratione fit. Duriora molis in hunc finem constructis, quarum pistilla dentibus tympanis rotæ aquariæ insertis eleantur, & depressione, illis neque dentibus, saxis illis (quemadmodum in chartaceis & pulverariis officinis fieri solet) in farinam resolvunt. Alii lapidibus molaribus haud secus, ac frumentum conterunt; molliorem verò materiam ferreis malleis comminuunt, hisce peractis, farinam metallicam separant, cribrant, cribris variè maximis, minoribus, minimis foraminibus pertusis: non desunt, qui setaceis quoque cribris utuntur ad materiam in minutissimam farinam reducendam.

Alterum tormentum est, Adustio, quo materia metallica primum tum ad faciliorem materiæ comminutionem, tum ad meliorem rerum heterogenearum separationem, probe aduritur: fitque variis modis, quos vide apud Agricola.

Tertium tormentum est ipsa Coctura, qua tandem finem suum consequuntur, de qua in sequentibus. Materies verò metallica, quæ igne non indiget, sola lotura depuratur; quæ variis quoque modis perficitur, & ne loturæ sive lotoriæ artem omisisse videar, ego præterea quæ ab aliis passim usurpantur modis, & præsertim apud Agricola lib. 8. de re metallica, alios hic modos, tum vel potissimum nonnullorum Principum postulatione, addam, qui in nonnullis fluminibus auream arenam dum invenissent, adeò tamen minutam, ut vix ita lavari potuerit, quin maxima aureorum corpusculorum pars ob subtilitatem unâ cum limo inter lavandum non deflueret, rogaverunt, ut modum aliquem facilem, & particulatam invenirem, iisque suggererem; ut quemadmodum ferri ramenta ab heterogeneis partibus magnetis ope separantur, ita quoque daretur aliquid, quod auream scobem à terrestribus reliquorum metallorum portionibus separaret, & quamvis in majoribus aureis ramentis à reliquis separandis

nulla difficultas sit, eo quod, uti metallorum gravissimum est ita quoque inter lavandum suapte sponte, reliquis heterogeneis miscellis defluentibus, ejus ramenta lavatorii canalibus fundo sitim ter adhæreant; de minimis tamen ramentis id dici non potest; cum plerumque ob instam exigua molis quantitatem, unâ cum reliquis scoris defluant, ne vero eorum postulationi refragari viderer, duo potissimum media suggesti, quibus etiam insensibilia auri ramenta à quicquillis terrestribus, quibus insunt separari queant: prius est per Mercurium; alteram per Antimonium erudum: per Mercurium res ita instituenda est: limus, cui aureorum ramentorum scobs inexistit, scutellæ indatur, cui quantamvis mercurii portionem infundas, deinde spatula limum una cum mercurio probe commisceas. Cum vero mercurius naturali suo appetitu aurum cum primis appetat, & ubicunque tandem illud invenerit, ad id magnetico quodam coitu consuat: arenæ mercurium commiscebis; quod ubi factum fuerit, separatis, quæ mercurio innatant, terrestribus limi miscellis, hoc pacto solus mercurius aureis vellitus ramentis remanebit: quorum separationem obtinebis, si mercurium igne evolare feceris, ne verò mercurii elapsi jacturam facias, quomodo eum integrum recipere debeas, inferius docebitur.

Alter modus per Antimonium liquefactum, cui si miscellam dictam, in qua aurea ramenta continentur, infuderis, sola aurea ramenta fundum perent, reliquis, quæcunque tandem fuerint, metallicis, terrestribusque portionibus Antimonio innatantibus, atque hæc est ratio, qua minimus etiam auri pulvisculus ab impuris miscellis sepatetur.

Alius Modus.

Soleht probatores metallorum jurati, in fodiis mineralium probandis, primum in exigua quantitate, accipere venam cujuscunque tandem metalli, & explorare, quidnam, & quantum contineat, fitque per ignem hoc modo: ex cumulo mineralium lapidum prius comminutorum unam, verbi gratia, unciam accipiunt iuste & quam exactissime ponderatam, usque ad millefimam, bismillefimam, aut etiam termillefimam partem unius libræ, quam Germanico idiomate, *probireenten*, vocant per ignem postea probant. Comperto itaque pondere per regulam auream Arithmetico ita procedunt: Millefima, verbi gratia, pars mineræ dat centesimam partem, jam per probationem compertam, unius libræ auri argenti vel æris, plumbive; ergo alia 999. partes dabunt tantum auri, argente, id est 99. ex gr. unius septenarius mineralium tantum & tantum continet in se argenti, vel auri, pro uno verò centenario dictorum metallorum elaborando, quanti sumptus impendendi sunt? & peracta operatione præcise & pondus auri ægentive, aut sumptus impendendos reperiunt, unde & sumptus ab auro argentove subtracti, illico lucrum produnt, probationem verò faciunt in exigua quantitate, ne in magnis probationibus sumptuosissimi dominus incompto lucro damnum incurrat. Bilancibus utuntur adeò exactis, ut vel ipsos pilos, ac quasvis minutiores res facile ponderare possint, valæ vero in quibus probatio fit, sunt plerumque ollæ testaceæ, sive catini, in quibus metallica materia prius comminuta, & plumbo commixta, hi deinde catini fornaculis ad eliquationem imponuntur; quorum formam in sequentibus proponemus, pro diversa verò metallicæ glebæ conditione diversas probationes habent: verbi gratia, aliam probationem

...ant & alia quæ aurum, aliam quæ argen-
tum, æs, aliudque metallum continet, his ita-
que prælibatis, tunc ad præparandum procedunt, qui
sequuntur.

*alia Metallorum præparandorum Ratio,
ex Agricola.*

Homines operarii imprimis, referente Agricola, invenire debent cuneos, laminas, malleos, bacilla, contos, verticula, ligones, & batilla: hæc enim instrumenta fodinis metallorum eruendis sunt maxime necessaria: fodina autem in loco montoso sita esse debet, nec ab aliquo fluvio, vel scatebra, vel rivo remota, ut materia effossa ante excoctionem commode lavari possit, & quoniam venæ metallorum inter rimas saxorum clauduntur, ideo foliores interdum bacilla ferrea rimis impingunt, & venam decutiunt; quando vero per latera saxorum venæ discurrunt, tunc malleis utuntur, & quando talia instrumenta in carum adhibent, tunc violentia ignis saxa separando venas eximunt, verum metallici primum in adinventâ venâ periculum facere debent; utrum exiguam vel nullam metalli quantitatem contineat: nam quando laborantur cum dispendio, vena est relinquenda. Experimentum sit ex coctione modicæ quantitatis: hinc cognoscitur, num multæ quantitatis excoctio detrimentum, vel emolumentum sit allatura. Excoctio igitur multifariam videtur, non solum ut metalla ad usum præparantur, sed etiam ut à se invicem ignis ope separantur: sunt enim plerumque mixta, & eorum vitia per ignem emendantur, hoc itaque pacto in Germanicis fodinis procedere solent.

Primum homines operarii fragmina venarum in capsulas coniungunt, ut pistillis capite ferreo munitis à rota aquaria agitatis tundantur; temper enim procurant rivos aquarum ingentes de montibus eductos qui rapido cursu magnos rotarum orbes circumagunt; lapides autem crassiores quibus metalla sunt mixta malleis primo facile minuuntur, in lacunis lavantur, & denuo cribrantur, ut tandem molantur: & his omnibus modis materia metallica, in quibus venæ liquefiunt, & argentum ab ære separatur, dum folies ingentes vi rotæ aquariæ sublevantur, & assiduo flatu atque motu magno cum fragore flammam in fornacibus excitant, & tum viri operarii metalla superius injiciunt, & alii metallum fustum & à contusis saxis separatim magnis cochlearibus exhauriunt & in modulos transfundunt. At non solum hoc modo metallum pretiosum à vili; & vicissim vile à pretioso secernitur, sæpius enim duo metalla in una, & eadem vena reperiuntur, quoniam naturaliter quædam portio auri cum argento, & ære mixta reperitur; in plumbo nigro, & in ferro, exigua argenti portio, plumbi nigri aliqua pars in argento, & denique aliqua ferri portio in ære. Aurum autem ab argento plerumque separatur, aqua forti parata ex atramento futorio, vel alumine, & halinitro, quæ ad segregandum ab auro argentum summopere est idonea. Vulgaris compositio hujus aquæ constat ex libra atramenti futorii, salis tantumdem, & aquæ fontanæ tribus partibus. Aliter etiam paratur ex quatuor libris atramenti futorii, duabus halinitri cum semilibra alumini, & aquæ fontanæ sesquilibra, qui autem volunt cuicunque metallo molliorem inducere, superasperguant sublimatum, boracem, & euphorbium, in pulverem redactum; sin velint metalla in calcem, & aquam redigere, metal-

lum nobilius in vilius trahere, vel illa invicem transmutare; legendus est Weckerius in libro de secretis, ubi multa hujus generis arcania patefecit.

2. Auri, Argenti ac Æris fodinis, generatione, & proprietatibus, de quibus in sequentibus KIRCHERUS, vid. sub titulis, Aurum, Argentum, Æs, ubi quæ ab hoc Autore scripta sunt adducimus.

Metallorum Mistura.

Natura in terra vero progignens metalla interdum duo vel tria, vel quatuor permiscet, ut alibi enucleavimus: hinc homines è natura edocti, teste Agricola, rationem mixturæ metallicæ ad usum reduxerunt: in eo aliquando casus idem monstravit, quando referente Plinio, incensa Corintho, aurum & argentum & æs in unum confluxerunt, & sic fortuna quodammodo tribus Corinthiæ æris generibus temperaturam assignavit, quorum candidum quasi argentum refulgebat, quoniam id in mistura prævalbat: alterum, in quo fulvus color, ob auri dominium nitebat: tertium, in quo æqualis omnium mistura constituebatur, itaque naturam & fortunam ars & fraus imitantur: dum metalla addentes metallis, homines varias producunt Misturas, quas Græci *νεγμαζα*, Latini temperaturas appellant. Artifices igitur duo, tria vel plura metalla simplicia aut mista copulare queunt, aut metallum simplex cum misto, & vicissim, ad duo simplicia cum uno misto, & viceversa, vel tandem plura simplicia cum uno misto vel duobus, & in his pariter vicissitudo servari potest: item vile aliquando metallum cum pretioso solvitur, & è contratio, pretiosum vili additur; primo auro argentum multifariam miscetur, & hæc omnes mixturæ carent nomine, ut superius fuit manifestatum, solum mistura auri recipiens quintam portionem argenti, electrum nominatur.

Ceterum quando homines portionem vilioris metalli cum massa pretiosioris compendii causa fundunt, absque dubio fraudem incurrunt; licet Artifices aliqui posse id fieri sibi persuadeant concessu & beneficio principum, ut nummi aurei non puri, sed cum modica argenti portione cudantur. Hodie quoque Principum concessione in cudendis nummis, mistura metallorum utuntur, quam opifices & Aurifabri legam nominant: nihilominus. Tacitus Imperator, referente Flavio Vopisco in oratione ad Senatum cavuit, ne quis argento publice vel privatim æs permiscere, neque auro argentum, neque æri plumbum auderet; alioquin cum proserptione bonorum capitale iudicium incurrere, quamquam olim, Vopisco teste, nonnulli plumbum æri addiderent, ut nummos nime probatos cuderent. Fabri argentarii sibi per leges licitum esse hanc misturam procurare pronunciant, dum sumunt decem uncias cum dimidia argenti, & dimidiam æris unciam, sicque libram argenti massam constant. Chymicorum nonnulli æs dealbatum argento addunt, & pro sincero argento vendunt, cum tamen hæc fraus sub vitæ periculo sit prohibita, hodie plumbi nigri decimam partem miscent cum stanno, & ex hac mistura, patinas, vasa, & mista alia hujus generis opera formant, quondam etiam æri ferrum miscuerunt, quod multis fraudi fuit. Tot igitur modis metalla viliora pretiosiori permiscuntur; at vice versa hoc criminis loco non est reponendum, quando metalla pretiosiora vi-

libus adduntur, postremo sunt quædam metallorum mixtura, quæ ab operibus ex illis resultantibus nomen sortuntur, ut ollaria mixtura, quæ ex ternis vel quaternis plumbi argentei libris, & centenis æris integratur, quæ varia vasorum genera ingreditur; alia mixtura vocatur bombardaria, quæ tormenta bellica fabrefiunt, hæc autem fit, dum singulis libris viginti æris una plumbi candidi additur. Tertia fit mixtura, quando ob sonitum sexdecim libris albi plumbi semilibra plumbi cinerei copulatur. Quarta mixtura componitur, quando duæ portiones plumbi nigri, & tertia albi conjunguntur; hanc veteres stannum tertiarium appellarunt, quo ad fistulas solidandas utebantur, hanc mixturam vulgus saldædurum nuncupat, quinta mixtio est, quando æquales portiones utriusque plumbi permiscuntur: hæc mixtura Plinij ætate stannum argenteum vocabatur; ex hac nostris temporibus orbes & patinæ parantur, pariter de alijs mixturis tam simplicibus, quam compositis differendum est cum mixtis omni tempore addi possint.

Sympathia & Antipathia.

Consentiunt metalla cum variis lapidibus, & præcipue cum illa silicis specie, quæ, ab Aristotele pyrimachus appellatur, id non est ignotum viris ad fusionem metallorum incumbenibus, qui super liquefacta metalla id genus lapidis inspergunt, ne metalla, in auras evolare possint: imò cum illo genere pyritæ variis coloribus insigniti facile conveniunt: quapropter opifices hoc genus pyritum loco plumbi, metallis addunt, ut in coctione metalla liquidiora evadant. Deinde cuncta metalla argentum vivum in amicitiam receperunt, quia libentissime omnibus copulatur, consequenterq; in familiaritatem sibi adjungunt illam hæmiatitæ speciem, quæ argento vivo prægnans est; quocirca hic lapis ad se metalla trahere perhibetur, imò inter ipsa metalla Sympathia, & Antipathia observatur; namq; ab auro, & argento plumbum amatur: hæc enim dum simul funduntur, facile commiscuntur. Vicissim æs à plumbo temperamenti contrarietate abhorret, item stannum ab auro, & argento ita dissentit, ut ea penè consumat, id in fornacibus manifestissimum, dum plumbum album liquatur, apparet: argento enim supernatat, & bacillis ferreis facile extrahitur.

Ex altera parte metalla, & animantia contrarietate maxima dissident, quia spargunt quosdam halitus spiritus animali inimicos: idcirco nullibi legitur, metallis aliquod animal fuisse nutritum: imò ubi venæ metallæ inveniuntur, ibi neq; plantæ crescunt, neq; animantes versantur, & in hujus confirmationem intelligimus, quod in fodinis metallorum crura opifum plerumq; viciantur, quæ postea in fodinis Assij, sive sarcophagi lapidis sanantur: hæc etiam causa mori medici prohibent, ne in præparandis margaritis, vel alio hujus generis medicamento, utantur metallis, sed solum lapidibus marmoreis, quoniam impendet periculum, nequid metallicum medicamentis præparandis adhereat, quod è diametro naturæ humanæ adversaretur, & inde gravia symptomata emergere possent, uti in sectione de venenis docuimus. Certe Plinio recte odores à fodinis metallorum dimanantes, omnibus quidem animantibus sunt ingrati, sed canibus potissimum maximo sunt detrimento, qui ex argenti metallo exhalant.

De Scoriis, & Excrementis Metallorum.

Excrementa, seu scorix sunt metallica factitia, quæ in primis & secundis fornacibus fiunt, dum venæ metallorum excoquantur, dum metallum à metallo separatur, vel dum æs liquefactum tingitur: hæc autem sunt, scoria, diphryges, cadmia, pompholix, spodos, lithargyrium, molybdæna, & squamæ. Nonnulla sunt, quæ fiunt

extra fornaces, ut ærugo, caruleum, & similia, de quibus sigillatim in libro n. entio facta sunt. Sciendum igitur, in excoctione metallorum scorias quædam venæ excoctæ recrementa, quæ opifices loppas appellant, generari: hæ metallo supernatant, & frigefactæ & congelatæ, tanquam vitrum fragiles redduntur, & siquid humoris metallici retinuerint, graves fiunt, quo separato in pumicosam levitatem abeunt, itaq; pars metalli ceterior, & sæculentior abire in scoriæ, quæ est purgamentum venæ in fornacibus coctæ, ut dictum est; loquendo tamen de venâ auri, argenti, æris, ferri, & utriusque plumbi: nam venæ argenti vivi, & plumbi cinerei scorias non producant, cum non excoquantur, non dicimus tamen ex plumbo cinereo, cum alijs metallis mixto, & liquefacto, coriam exire non posse, hæc metalli fordes græcis σκωρία merito dicitur, quoniam apud ipsos τὸ σκῶρ, est sterces, à Celso, metalli recrementum nuncupatur.

Argentæ scoria, seu recrementum habetur tantum quando vena argenti in fornace purgatur, sed si cæra esse nequit, quoniam opifices ad purgandum argentum ei nonnihil plumbi addunt, hæc scoria Argenti vocatur helcysma, τὸ ἑλκυσμα ab ἔλκω traho, eo quod hoc incrementum ita lentum reddatur, ut iustarum vilci trahatur. Scoria verò quæ ab ære & ferro colligitur, plerumq; est nigra, fordida, & spongiosa, sive pumicola. Scoriæ majorem copiam ferrum, quam æs fundit, cum sit metallum impurum, & magis terreum; quæ quidem non solum, quando ferrum in fornace funditur, obtinetur, sed etiam quando ferrum in ustrina fabri ferrarii mollescit. Scoria verò plumbi à cæteris maxime differebat, quia minime lapidosa est, neque fragilis, ut reliquæ, sed admodum lenta, ob molliorem metalli observatur.

Inter has metallorum scorias recensetur Diphryges, & nihil aliud est, nisi æris recrementum, vocatur utem δὲ φρυγες, quasi bis ustum; nam φρυγῶ apud Græcos est, torreo: quatuor Diphrygis species inveniuntur: prima resultat ex limo quodam Cypri, qui primò sole arefcit, deinde sarmentis circumdatis aducitur: ideo jure optimo bis crematum, primò calore solis, deinde ardore ignis, nuncupari potest, & hanc speciem in Cyprio tantum fieri scribebat Dioscorides. Secunda species, nihil aliud est nisi sedimentum æris in fornace adusti, quod Galenus in Cyprio ab artificibus projectum observavit. Tertia species paratur ex pyrite æreolo cremato, donec colorem rubricæ contraxerit; sed advertendum est, quod ochrausta eandem colorem induit, & propterea huic tertiæ speciei Diphrygis assimilatur, & aliquando pro Diphryge perperam venditur: quarta species oritur ex quibuscunq; Lapidibus post excoctam metallorum venam in fornace inventis; & hæc species semper aliquid metalli habet permixtum: hujusmodi Lapis primò torretur, mox in fornace coquitur, deinde quinquies in alia fornace crematur, ita ἐπὶ φρυγες, iusta de causa appellari possit, hodie opifices in secundis fornacibus sic Diphrygem parant, quando aliquid auri vel argenti inesse æri suspicantur: de novo æs cum plumbo fundunt, quia plumbum abluit, & secum aurum vel argentum abducit, quo peracto in extrahendis plumbi reliquiis, ignem temperatum adhibent, ut plumbum fufum descendat, æs verò nequaquam; sic enim tanquam lapis spongiosus redditur, qui fufus, & percoctus in æs purgatum mutatur, cujus scoria est Diphryge purgatio, quam illa, quæ ex primis fornacibus exierat: hanc homines operarii raminam vocantes, singulis vendunt.

Amplius dum Aurum, Argentum, æs, & plumbum percolantur, oritur aliud recrementum, quod vocatur cadmia, quæ secundum nonnullos ita nuncupatur ab infidendo, est autem nomen antiquum apud Græcos, ideoque adhuc nominis

minis etymon latet, nili velimus asserere, cadmiam olim observari fuisse, dum lapis ætneus excoqueretur, quem aliqui cadmiam indigitarunt, fortassis primò in Cadmo monte sit repertus. Galenus scriptum reliquit cadmiam ex lapide pyrite interdum fieri, nihilominus metallicam ex ære paratam præcæteris commendabat: hujus quatuor species à Dioscoride monstrantur: prima vocatur Borrytes, quasi racemosa; quia *Βοτρυς* racemus, exponitur: secunda nominatur onychites, est enim *ὄνυξ*, unguis, cum venas instar unguis discurrentes habeat: tertia cognominatur phicodes, *πικνὴς* crustosa, quoniam est segmentis quasi quibusdam zonis cincta, quare & *ζώνις* dicitur: quarta appellatur ostracites, *ὄστρεα* testacea, quæ tanquam pessima omnium rejicitur. Plinius præter quatuor genera à Dioscoride descripta, quintam speciem, nempe capoitim, scilicet fumosam addit; *καπνίος* enim Græcis fumus dicitur, sed hæc ad pompholygem potius, quam ad cadmiam est reducenda: nostra ætate cadmia fornacum similis corticibus arborum, sub nomine tutiæ Alexandrinæ affertur; quod signum est hastis ferreis adhæsisse. Tutia est nomen Arabicum quod tamen non cadmiam, sed spodium significat: hic animadversione dignum est, quod Tutia Lusitanorum, non est metallica; hæc in Quirmon Persarum regione, & Ormuz finitima paratur ex cineribus cujusdam arboris nomine Goan, ita enim fructus hujus arboris cognominatur, & à nonnullis hæc Tutia Alexandrina dicitur, non quod Alexandriæ fabrefiat; sed quia ex Quirmon delata Ormuz, inde Alexandriam exportetur: Auctores tamen non hanc, sed metallicam in medicamentis commendant.

A cadmia ratione tenuitatis substantiæ, pompholyx, & spodium discrepant, quandoquidem cadmia, ut fuit expositum, in quandam solidam materiam condensatur, sed pompholyx, & spodium instar pollinis parietibus fornacum adhærent, cum tamen ex eadem materia ex illis fornacibus originem trahant, in quibus æs perficitur, vel in quibus cadmia crematur. Pompholyx autem levior est, quia evolans ad fornaces, bullarum instar agglutinatur, unde nomenclaturam traxit; quoniam *πυμφίλος* Græcis bulla est. Spodium in comparatione ad cadmiam ponderosus est; quocirca super terram instar cineris cadit, unde nomen accipit, *σπείδιον* enim cinerula dicitur: verum Antispodium arte paratur ex folijs myrti vel oleastri crematis, quod cinerulæ nimirum spodij vicem præstat. Avicenna historiam hujus rei metallicæ confusam scribit, dum asseverat, Tutiam esse fumum sublimatum: succudum verò, quod in fundo residet, forsitan per Tutiam, pompholygem, & per succudum spodium intellexit.

Ad scoriam plumbi referri potest lithargyrium; oritur enim ex plumbo in fornace diutius percocto; nam est spuma, quæ colligitur, dum argentum purgatur, & concrevit instar lapidis, & vocatur *λίθαργυρος*, à lapide, & argento nomen habens, quasi lapis argenteus, ab Arabibus Marrech, & à Latinis spuma argenti nuncupatur. Dioscorides voluit, lithargyrium sine argento posse concrefcere, dum in secundis fornacibus argentum plumbo permixtum purificatur: etenim tunc fervente mixtura plumbum violentia ignis extenuatur, & acquirens levitatem, argento supernatur, & sit veluti scoria, quam artifices paulatim ad latera pellentes tandem projiciunt, & gettam nominant, quâ postea figuli uti solent. Nonnulli perperam putant, spumam argenti ex auro factam vocari chrysitim; ex argento, Argyritim; ex plumbo Molybditim: cum tamen lithargyrium ex so-

lo plumbo, cum alijs metallis, præcipue cum argento, ad faciliorem fusionem, vel purificationem mixto dimanet; & quamvis interdum auri, & interdum argenti colorem adipiscatur, tandem id ex majori, vel minori adustione provenit, nam si statim atque plumbum exustum supra argentum liquatum apparet, de catino auferatur, tunc lithargyrium colore argenteo refulgebit; sin diutius ibi manserit, colorem aureum acquirat.

Duplex lithargyrij genus opifices constituunt: alterum vocant naturale, quod egreditur ex vena Argenti, mixta cum vena plumbi, & in fornacibus liquata: aliud verò Artificiale quod modis superius descriptis præparatur, hujus Dioscorides tria ostendit genera: primum genus ex arenâ plumbaria in fornacibus perfecte cocta: secundum ex purificatione argenti: tertium ex plumbo resultat; hujus species flava dicitur chrysitis; candida Argyritis; livida molybditis: optima spuma Argenti in Misena, & Bohemia paratur: Dioscorides tamen primas tribuit Atticæ, quæ cum in monte Laurio fieret. Lauritis vocabatur; secundas Hispaniæ, & tertias Puteolanæ assignabat.

Minera Plumbi, ejusque Conditiones.

Quamquam plumbum ut plurimum à metallurgis ob summam impuritatem, & terrestrium quicquidiarum abundantiam, metallum imperfectum, leprosum, & parum fixum habeatur, si tamen admirandas ejus qualitates paulo penitius intueamur, maximi id haud immerito æstimari debet, cum sine eo nulla nec auri ab Argento, nec argenti à reliquis metallis separatio obtineatur, neque pretiosi lapidis, gemmæque splendorem nativum nisi hujus beneficio consequi possint: ubi enim magni venarum auri argento mixtarum cumuli effodiuntur, ab illis sane nulla alia re metalla melius, quam plumbo, uti paulo ante vidimus, separantur; adeoque aurum & argentum ad debitam suam perfectionem, non nisi solius plumbi ope perveniunt, sed de utilitate hujus metalli inferius fusus.

Invenitur potissimum in diversis saxis, glebisque terrestribus semper fere cum aliqua auri, & argenti mixtura, primo in saxo quodam spongioso, candido, & duro, quod columbinum vocant; cuius indicium dant nigra quædam macula, & granaper lapidis superficiem hinc inde disseminata, subinde quoque reperitur in lapide coloris rubri, seu ferruginei, deinde in certis terrestribus glebis coloris cinerici, cujusmodi in Andalusia Hispaniæ reperiri fertur; & uti facili negotio à venis suis separatur, ita quoque haud difficili labore depuratur, funditur exiguo igne, tum se solo, tum alijs mixtum metallis, quæ associata plumbo facilius in igne fluunt, & quod mirum est, id reliqua metalla, ne potenti igne ab arsenico comburantur, aut ne cum mercurio avolent, conservat; cur vero solum plumbum hac virtute separativa posseat, adeoque cæteris metallis, potissimum argento, amicum sit, istius causa est, quod ex se, & sua natura, cum parum fixum sit, & aquositate præ cæteris polleat, Argentum verò, & æs, arida metalla sint; hinc fit, ut aquositas illa plumbi ariditati juncta, lentore suo aquoso aridum impinguet, & consequenter ijs incorporatum facilius fluere faciat. Est & alia in plumbo proprietas, quod calcinatum per ignem reverberationis potentissimum, tantum abest, ut quidquam à mole, & pondere suo amittat, ut potius in calcem redactû gravius, ponderosiusque cõperiatur: cujus

quidem rei ratio alia non est, nisi per calcinationem clausis omnibus poris, spiritibusque aereis, aqueisque evaporatis, multo ac in priori statu naturali, densius reddatur; quanto autem corpus densius constipatiusque est, tanto quoque gravius id effici, experientia docet: & pater in cadaveribus, quæ multo graviora, quam dum vita ipsis inerat, existunt, eo quod vivens corpus aëre, spiritibusque plenum quadantenus allevietur; mortuum vero omnibus depulsis spiritibus, canalibusque occlusis, compactius reddatur.

DE FERRI FODINIS.

Et I.

Ferri Natura & Proprietas.

Quamvis Plinius naturam, & affectiones huius metalli multis verbis explicaverit, nos quidquid experientia nobis constitit, de Ferri natura, proprietate, præparatione hinc adducemus: Ferrum metallum impurum, & terreum ex sulphure adusto copulatur exiguo humori aqueo cum terrea exhalatione non bene permixto: propterea in igne præ cæteris metallis fumum foetidissimum spargit: hac de re Metallum vile, & ignobile vocatur, idque ex colore illius livido patet, hinc quoque Albertus ferrum ex mixtione argenti vivi impuri pariter, & ex sulphure immundo, & terrestri resultare prædicit: non est igitur admiratione dignum, si ferrum ferro percussum scintillet; cum id ex sulphure prodire quisque noverit: habet præterea ferrum aliam materiam congenitam, quæ nullo modo comburi potest; etenim observantur in fornacibus, in quibus ferrum in massas componitur, vapores quidam à materia ferrea exhalantes, qui in lanuginem parietibus & tectis officinæ adhaerentem convertuntur, cui natura tantam vim præscripsit, ut magna ignis vehementia consumi nequeat: his ita constitutis nonnulli ponderantes ferri temperaturam illud in caliditate, & siccitate constituunt, ut proinde Astrologi, ferrum sub dominio martis planetæ calidi & sicci collocarint. Præterquam quod experientia calidum ferri temperamentum declarat, dum ab ipso superflua ventriculi humiditates absumuntur, & obstructions contumaces referantur; ex altera parte Galenus ferrum ad frigiditatem, & siccitatem reducere videtur, dum illud substantiæ lapideæ comparat, quæ ob frigiditatem, & siccitatem stabilis est: hanc postea sententiam multi auctores in medicina non proletarij secuti sunt: nam conciliator ferrum frigidum pronunciat; Jacobus de Partibus in Commentarijs ad Avicennam, ferrum frigidum & siccum declaravit; Manardus aquam chalybeatam frigidam, & siccam esse stabilivit, imo multi alij hanc opinionem uno ore confirmare videntur, quapropter ad conciliandos tantos viros, qui de temperatura huius metalli varie scripserunt, asserendum est juxta dominium primarum qualitatum, ferrum refrigerare, & siccare: & quoniam nonnullæ portiones sulphureæ ab illo possidentur, ideo ijs stomachus roboratur, excrementa in illo contenta absumuntur, & vasa obstructa mirandum in modum aperiuntur.

Cum igitur hoc metallum ex substantia terrestri, crassa, & combusta constet, igni vehementer resistit, & tandem mollescit, & non nisi vehementi flammæ incendio funditur, quamvis autem natura tantam huic metallo congenuerit duritiem, nihilominus eadem natura aquam produxit, quæ ferrum absque difficultate erodit, qualis est putealis in Cepusio Smolinij, & ejusdem conditionis est styx fluvius circa Theffalica Tempe, siquidem huiusmodi aqua in vasis ferreis diu contineri nequit, quin ipsis erosio efflucat, imo majori admiratione dignum est, quod animantes huic metallo sunt detri-

mento: Narrat enim Theophrastus, in Syro insula expulsis incolis ferrum à muribus erosum fuisse, & nonnulli referente Mizaldo pronunciarunt apud chabbas Mures in ferrarijs officinis magnam jacturam fecisse; hinc colligendum est, duritiem huius metalli non esse adeo notatu dignam, quin manibus ferrum contorqueri possit. Vidimus aliquos mira facilitate clavum ferreum confringentes, sumebant enim duas fascias longitudinis trium ulnarum, partim ex crassiori, & partim ex subtiliori filo contextas, quibus ita ferrum involvebant, ut pars subtilior clavum amplecteretur, & tunc simplici manuum contorsione clavum in duas partes dividebant. Denuo ferrum alias affectiones patitur: primò candens malleo percussum scintillas emit, quæ Nonio stricturæ vocantur, & in excoctio- ne recrementum, nempe scoriam, vel loppam reddit, quæ à metallarijs, & à fabris ferrarijs projicitur; hæc autem est illa materia, ex qua chymici lapidem philosophorum constare asseverant, postremò rubiginem patitur, à qua tractu temporis prorsus absumitur, juxta illud carmen.

Ferrugo rodit ferrum, lignumque teredo.

Verum quando à sanguine humano inquinatur, celerius, Auctore Plinio, rubigine vitiat, hoc vitium à ferro, ad mentem Plinij, arcetur gypso, cerussa, & pice liquida, pariter omne ferramentorum genus rubiginem non sentit, si medulla cervina, pinguedine Felis, vel cerussa cum rosaceo mixta perlina- tur: stannum quoque ferro superinfusum, effectum rubiginosum impedit, sed cum ferro permixtum, ex sententia Alberti, illud frangibile, & minime ductibile reddit.

Sympathia & Antipathia.

Ab animantium, herbarum, & lapidum natura fer- rum minime dissidere comperimus: in primis huma- næ naturæ neutiquam adversatur: cum ferrum in vul- neribus occultatum, citra patientis incommodum delituerit, etenim narrat Zacutus lusitanus mulieri cui- dam profundum vulnus, per verticem capitis acuto cultello inflictum fuisse, quæ somnolenta pluribus diebus quievit, & tandem obducta cicatrice minime de actione animali conquesta, iterum domestica ne- gotia obivit; sed cum transacto octo annorum spatio maligna febre oppressa decesserit, curiosi chirurgi, aperto cranio, inter duram meningem, & cranium, mediam partem cultelli, quò olim fuerat vulnerata, rubiginosam invenerunt. Inter bruta animantia nul- lum est, quod tantopere ferro delectetur, quàm struthiocamelus: hæc enim voveris, objecto clavo, vel clave ferrea, uti Melitæ non semel expertus sum, illi- co fit obvia, & non secus, ac canis viso panis frusto; ferrum apprehensum avidè deglutit digeritque, cu- jus causam alibi reddimus, hoc quidem à veritate non est alienum, nempe cimices ferri odore summopere delectari, nam ferrum loco infixum, in quo nidulan- tur, paulò post omnes quasi concordēs illud ample- ctuntur, propterea non desunt vegetabilia, quæ amicitiam ferri diligunt, & hac de causa super mineras ferri sæpissime crescunt: inter has plan- tas Isatis potissimum sylvestris, & Erythradanum recensentur, quoniam quadam qualitate ferrea insignitæ, non solum magneti conservando con- ferunt, ut in arte magnetica ostendimus, sed & in cineres redactæ, & fornacibus vitrarijs in- ditæ, sedimentum quoddam ferrugineum in fun- do catini relinquunt. Vicissim sunt aliæ plantæ, quæ naturæ ferreæ penitus adversantur, idque de-

ocymo Gaudentius Merula pronuntiavit, pariter ferrum Mercurio, Auro, & Argento nullo amicitiae vinculo conjungitur, cum illis difficillimè copulatur, & propterea carinis ferreis officinae monetariae quidquam prædictorum metallorum adhæsisse opifices nunquam observarunt.

Ferri præparandi & temperandi ratio.

Narrat Plinius, quod in cappadocia homines non multis laboribus se exercent ut copiam ferri habeant, quandoquidem certo flumine terram petunt, & ex illa terra ferrum producit, tanquam à fornacibus prodiret, similiter habitantes supra Amaranum Hybernæ urbem, hastam ligneam in stagno quodam defigunt, & post aliquot menses partem hastæ luto involutam in optimum ferrum degenerasse reperiunt: pars in aquamersa Cos evadit, & quæ supra aquam remansit, propriam ligni naturam servat, sic in insula Hybernæ pariter circa oppidum quoddam lapis invenitur, qui simplici combustione in ferrum vertitur. Aristoteles talem ferri præparationem assignat, dicens, vehementi virtute ignis ferrum more aliorum metallorum rûndi, & multam scoriam separari, sicque ferrum purius, & durius reddi, & reiterata operatione ferrum in chalybem converti, cæterum antequam vena ferri excoquatur, diligenter est examinanda, num ferri dives, vel inops esse possit, itaque sumitur minera ferri alicujus notiponderis, quæ in minutissimum tecta pulverem supra tabulam æneam subtilem collocetur, posito subius magnetis frusto, quod dum paulatim movetur, grana ferri magnetis motum sectantia, à terra separantur, & hac facili ratione quantitas ferri in vena contenta cognoscitur, hodie in Germania bifariam ferrum præparatur; primò ex quibusdam lapidibus elicitur, secundo ex terra rubra ferrugine quasi læsa excoquitur, quod opus in Silesia peragitur: præterea sunt etiam nonnulli in Germania, qui ex magnete optimum ferrum eliciunt. Animadvertendum tamen est quod variis laboribus se exercent illi, qui præcipuè bonitatis ferrum excoquant, diversis laboribus corpus fatigant, qui circa venam ferri difficulter fusilem & ærosam versantur; qui modi apud Agricola legendi sunt. Si jam ad temperaturas ferri animum convertamus, ferrum recoctum, & à scoria diligenter separatum, duritiem non vulgarem adipiscitur. Artifices tamen in officinis colorem candentis ferri primò observant, deinde liquorem juxta intentionem eligunt, ut ferrum in illo extinctum, duritiem vel molliem nanciscatur, quando igitur violentia ignis ferrum ultimam candoris notam acquisiverit, vocant argentum, & tunc illud non extinguunt, quoniam consumeretur, ut si croceo colore, vel rubro tingatur, ferrum roseum, vel aureum dicitur, & tunc liquoribus mersum, durius efficitur. Hodie in officinis quadruplex ferri tinctura observatur: prima colore est albo, quæ nimis dura est: secunda flava, qua ossa, & lapides scinduntur: tertia ex purpureo, & caruleo mixta ad secunda ligna idonea: quarta est nigra, quæ nimium mollis esse perhibetur, ex altera parte ponderandi sunt liquores, in quibus ferrum candefactum pro varia temperatione extinguendum est, multa flumina ad ferri temperaturam apta celebrantur: hac de causa ferrum in Norico scriptis veterum fuit commendatum; hujus conditionis sunt Biblis, Tarassius, Salo, à Justino chalybs, & ab alijs Iberus, unde Iberæ lorice pro fortissimis, apud Horatium leguntur: De Salo Flavio Martialis sit cecinit.

Quam fluctu tenui, sed inquieto

Armorum Salo temperator ambit.

Pariter in Italia amnis Comum interfluens, & Lambros Mediolanum hac eadem prærogativa gaudere perhibentur, quapropter de hoc postremo flumine sic canitur.

Nec nisi duratum Lambro thoraca volebam.

Virgilius quoque de gladio Turni in Stygio amne optime temperato verba faciens cecinit in hunc modum.

*Ensis, quem Danno ignipotens Deus ipse parent
Fecerat, & Stygia candentem tinxerat unda*

Cum igitur in ferro interdum molliet, & aliquando durities desideretur, erunt assignandi modi, quibus utrumque facile assequi possimus. Glaucus ille Samius, qui ferruminandi artificium invenit, referente Suida, ferrum, quod molle esse voluit, oleo & quod durum, aqua extinxit: nonnulli ad communicandam ferro molliem, plumbum in cavitatem ferri collocantes, totum candefaciunt, donec plumbum in fumum abeat, & hoc opus toties repetunt, donec ferrum instar cere mollescat. præterea sæpius ferrum candefactum, & per se refrigeratum mirandum in modum tenescit: id experientia docet in filis ferreis, quæ ignita, & per se refrigerata, mollia & ductilia evadunt, alij in succo malvæ aut fabarum candens ferrum extinctum, inde molle extrahunt, alij ferrum oleo Amygdalarum amararum liniunt, illudque cera cum assa foetida, & modico Alkali mixta cooperiunt, & totum nitro, & luto ex firmo equino involvunt, & in igne carbonum per noctem relinquunt, indeque ferrum tractabile & molle habent.

Præterea ferrum diligenter elaboratum mollius, & durius, juxta operantis intentionem temperari potest, cum aliam temperaturam enses, aliam lima, aliam arma in tutelam parata expostulent. Albertus tradidit, ferrum acrius fieri temperatura succi raphani, & aquæ lumbricorum terrestrium, quod experimento respondere negavit Porta. Enses igitur tali indigent temperatione, ut nervosa exilitate sint præditi, ne dum punctum feriant, rumpantur: similiter acutam aciem possunt, ut cassum feriendo fecerint; quapropter oleo & butyro ensis corpus temperatur, acies vero acribus extinguitur, ut in cadendo robur, acquirat: & hoc opus, monente Porta, vel canalibus ligneis, vel laneis pannis madidis opifices assequuntur. Scalprum verò ex eodem Porta, pro ferro incidendo in ustrina rubefiat, & quando in ipso rubicundus rosæ color apparuerit, in aqua extinguitur, deinde secundus color fulvus expectetur, & denuo in aqua mergatur, item ad scalpenda marmora ferrum ex optimo chalybe paratum, & ignitum, apparente roseo, vel rubeo colore, aqua madefiat, mox remorum, apparente colore aureo, rursus aqua mergatur. Lima ita temperanda est, ut aliud ferrum commodè limari possit: sumatur ergo saligo summatum cornuum, vel ungularum bovis, portio vitri triti, & salis communis, & omnia aceto misceantur, deinde hac mistura lima imbuta igne candefacienda est, post modum in aceto, vel aqua frigida illico extinguenda est. Hamus piscatorius simili indiget temperatione ut piscium moribus minime flectatur; vicissim ferrum pro phlebotomia mollem temperaturam exigit, ne in operatione aut flectatur, aut rumpatur, item falces herbariæ, quia tenues sunt fortem temperaturam non requirunt.

Postquam ex ferro purgato, & diligenter temperato varia instrumenta, vel arma fuerint fabricata, nonnullis Iconibus, aut characteribus insigniri solent: idcirco ad hoc peragendum opus, pyrites aurei colo-

ris in pulverem redactus, per diem naturalem in aceto maceratur, & vase igni admoto, ut ferveat, aliud acetum superadditur, quo exsiccatum, materia vitreis organis distillatur in liquorem, quo Icones, vel litteræ, in quovis ferreo instrumento designantur, quæ prima facie nigræ apparebunt, sed siccata, & panno lineo fricata, aureæ conspiciuntur.

Multi occasione extinctionis ferri in varijs liquoribus, & ejus temperaturæ ferrum, & natura, & artificio in cuprum maturari posse arbitrantur. Sed advertendum est, quod ferrum à natura non ita excoquitur, ut æs evadat, quemadmodum Scaliger in suis exercitationibus optime probavit, præterea ferrum merum in aquis vitriolatis, tum naturalibus, tum ex arte paratis dissolvitur; & quoniam hujusmodi aquæ vitriolum participantes, æs etiam sive cuprum continent, ideo materia ferri soluta, in fundo harum aquarum cuprum reperitur, quod ex ferro non generatur, sed potius beneficio ferri præcipitatur.

Chymici ad solvendum ferrum utuntur aqua valenti rubea, quæ ex quadrante vitrioli albi, ex septem Unciis vitrioli ungarici, triente salis, ex semiuncia aluminis constat, verum Pandolphus Anglus, qui de fossilibus scripsit, ferrum melle restinctum melius liquefieri retulit, denique ferrum æri, & stannio permiscetur, sed agrestius, & fragilius redditur.

Atque hæc ex varijs auctoribus collecta sufficiant, qui plura artificia desiderat, quibus ferrum purgetur, nec non auro & argento tegatur, ultimum librum consulat, qui horum arcanorum longam seriem recitabit.

De Ferri fodinis Ilva, vulgo Elba, quæ maris Tusci insula est.

Uti nullum metallum adeo humanis usibus necessarium est, quam ferrum, ita quoque nullum est, quod ubique fere locorum majori ubertate proveniat; ita ut vix in orbe Regio comperiat, ubi id non præsto sit: adeoque provida natura id ubique eo fine obvium adesse voluerit, quod in humana æconomia nil sine ferro confici possit, hinc Italia, Germania, Francia, Belgium, Hispania, Polonia, Asia, Africa, America, uti Geographica relationes docent, Ferrifodinis plenæ sunt, ut proinde superfluum ducam, hoc loco ampliorem ferrifodinarum orbis terrarum catalogum attexere, Dicam solummodo in insula Ilva tantam esse ferratarum mineralium copiam, ut tota Insula non nisi ferrum dici possit, non infimæ notæ, sed nobilissimum & præstantissimum omnium, & quoniam insulam ante complures annos proprijs lustravi, & modum ejus extrahendi, præparandique, ac in chalybem convertendi summa diligentia observavi, hinc visum fuit, modum & rationem prout vidi & observavi hoc loco adducere.

Dico itaque, ferrum uti & reliqua metalla non semper in eodem perfectionis gradu reperiri, est enim ferrum dulce, ut in Ilva insula, tantæ perfectionis, ut vel glebæ minerales simplici, & ordinario fabrorum igne in nobile & tractabile ferrum in omnem usum accommodatum fundantur, cujus rei causa est, summa ferri puritas, in alijs vero locis ferrum non hujus bonitatis, sed crudum, incoctum, asperum, terrestribusque aliorum metallorum odoribus, quisquilijque ita reperitur corruptum, ut vix nisi ingentibus fornacum, igniumque tormentis ad meliorem indolem, magno sane & laboris & sumptuum impendio deduci queat: sunt tamen & aliæ minera, quæ plus, minusve hujusmodi impuritatum misturis obnoxia sient: quomo-

do veò purum ab impuro separari possit, experientia oculari doctus exponam: ita autem ut plurimum proceditur.

Primo, opus est homine minerarum ferri perito, qui glebas minerales ferri puri ab impuro separare norit: has itaque selectas, & in frusta contractas ad partes seponat.

Secundo, magna imprimis carbonum ratio habenda est; hic in Italia plerumque lentisci, Ilcis, ulmi, fraxini, similiumque arborum carbonibus utuntur, utpotè, quæ ignem potentissimum, efficacissimumque suscitent.

Tertio, Frusta glebarum ferrearum in fornacem apertam contracta coquantur, excocta iterum extrahuntur, & pluvij, solisque ardoribus exponuntur, hoc enim p. cto ferri materia veluti ad perfectionem debitam consequendam maturatur, & digeritur.

Quarto, hoc peracto, frusta sole, pluvijque imprægnata iterum in partes rumpantur, diligenter observando, si alterius metalli, odorem emittant, si repereris, iterum dicto modo coquantur, donec deposito odore simplicem ferri odorem referant, & sic tandem solum ferrum dulce dabit & malleabile: contingit tamen subinde, ut illiusmodi adeo in sua duritie sit obstinatum, ut omnem coctionem respuat, hoc casu, in chalybem id destinabitur, eo, quem paulo post exponemus, modo, ut autem signa habeas puri, aut impuri ferri; nota, quatuor esse ferrinæ minera species.

Prima species est, mineralis gleba ponderosa, compacta, à terræ, saxi, catæorumque metallicorum corporum societate sejuncta; coloris bruni, & hæc est perfecta, & unice desiderata.

Secunda habet nescio quem adjunctum splendorem unâ cum granosa substantia, quæ facile digitis in pulverem conteratur & passim tanquam malæ venæ indoles reprobat.

Tertia gleba mineralis est grossioribus referta granis coloris nigri, quæ uti semper æs, cuprumque olet, ita quoque passim negligitur.

Quarta denique species minutioribus constans granis, pro conditione matricis nunc melior, nunc peior reperitur.

Sunt præterea aliæ glebæ, quæ facili quidem ob reliquorum liquabilium metallorum mixturam funduntur in ferrum, malleum tamen difficulter ob debilem partium nexum, sustinent; & contra, sunt quæ malleum sustinent, difficilem tamen liquefactionem habent; illa uti plerumque alium usum, quàm in tormentis bellicis fundendis non habent, ita hæc in melioris notæ ferrum reduci possunt.

Quæres quænam sint signa ferri puri, aut impuri, & quomodo cognoscantur.

Dico, quod etiam si ferrum in terrestribus substantijs reperiat, illud tamen optimum habetur, quod eruitur ex ijs montibus, ex quibus aquæ frigida, & gustui haud ingrata emanat, præsertim si locus salubriori aëre constet: sæpenumero quoque id in quodam candido saxo, marmori haud ab simili, generatur, quod si una cum saxo fuderis, durum plerumque ferrum obtinebitur: secus accidet, si puram mineram à saxo junxeris, fornacique immisum liquefeceris, invenitur & nonnunquam in terra rubra, & flava, minera ferri facili in arenam attritu resolubilis, aut etiam instar maltæ mollis; in cujus colligendis glebis te tempus perdere nolim, cum nil boni inde resultet, ut autem ferri puritatem, bonitatemque cognoscas, sic operare.

Primo, mittatur intra forte lixivium cujusvis minera species, & deinde post aliquod tempus ex-

extractâ, ignique supra posita, folle applicato paulatim ignem exussiles, diligenter bullulas, varique coloris vapores observando; quos si observaveris, id luculentum varii metallorum commercii signum est; si sine colore & bullulis, optimum, & compactissimum ferrum esse judicabis.

Secundò. Ferri boni signum est bolus terra fusca, & mollis, pinguisque, quæ dentibus apprehensa, nullum stridorem excitat.

De Ferri in chalybem transmutatione.

Quomodo ex ferro chalybs fiat, processum totius, ea quæ potero, brevitate, & claritate describam.

Cum chalybs nihil aliud sit, quàm ferrum ad ultimum perfectionis suæ, puritatisque statum reductum: quod duplex est: naturale & artificiale. Naturale uti paucis in locis reperitur, ita metallici liquatores naturæ defectum supplentes, ferrum quodvis ea ingenii industria, quam subjungam, in chalybem convertunt.

Primo, accipiunt ferrum, jam, uti supra dictum fuit, in fornace probe excoctum, ejus quantitatis, quæ eorum intentioni sufficiat; hoc in partes minutissimas rumpunt.

Secundo, in foco vulcanio constituunt receptaculum rotundum pro chalybis conficiendi quantitate, majus, minuscve ex luto, cujus una tertia pars sit argilla, duæ verò tertiæ sint carbones in pulverem redacti, optimè aqua misto, amalgamatoque compactum, in cujus centro foramen fit, per quod folles veterum exonerare possint ad exussandos carbones.

Tertio, hoc receptaculum tum ad igneum fervorem reverberandum, tum ad ferreorum frustorum, carbonumque imponendorum congeriem firmitus retinendam, lapidum circumpositione, veluti muro quodam muniatur.

Quarto, totum hoc receptaculum carbonibus usque ad summum replentur, qui ubi folium sollicitatione in summum fervorem astuaverint: ita porro procedunt.

Quinto, ex ferro in chalybem convertendo, & in frutula comminuto, particulas paulatim una cum contriti marmoris, aliorumque silicum fusilium pulvere mixtas (partim intra coacervatos carbones jam succensos injiciunt, & hoc pacto ferrum facilem fusionem intra receptaculum sustinet,

Sexto, hoc peracto ex eodem ferro jam ante virgas mallei vi coactas intra hujus receptaculi solum liquorem impositas quatuor, aut quinque horis relinquunt, continuo folium vento ignem, carbonisque tollititando, nec non ferrea virga longiore materiem tandem movendo, circum agitandoque, donec virgarum ferrearum pori, subtili fusæ jam infra receptaculum materiæ substantias expleantur: quod ubi opifices observaverint, statim forcipe unam post alteram ereptam supra incudem malleis parumper distentas, in præparato seorsim aquæ frigidæ balneo extinguunt: quas si necdum debita perfectione sibi constare deprehenderint, denuo igneo fusæ materiæ balneo injiciunt, & hoc toties repetunt donec ultimam perfectionem consequatur, ita autem hac industria depuratur, perficiturque, ut duritie, compactione, colore, levitate, & nitore, specificam à ferro differentiam induisse videatur, nonnescio, alios quoque hujusmodi laude facta ferramenta, in ceteris herbarum succis extinguere insigni sane successu, uti in præcedentibus patefecimus.

De Ferri in æs Transmutatione.

Magnum inter chymicos, & metallurgos de ferri in æs transmutatione dissidium est; quod omni, qua fieri potest, diligentia modo opportune decidendum est.

Paracelsus, ejusque sequaces transmutationem, perfectam unius metalli in aliud affirmant, eo forsitan sine & intentione, ne artem illam magnam de ridiculo illo lapide philosophico tantopere jactato, quem & perfectam transmutationem subire dicunt, conelamatum concedant: sed enim hanc vel ipsi metallicarum fodinarum præfides, mira in metallis eruendis, lavandis, coquendisque peritia, alii arcanarum rerum dotitia instructi prorsus non dicam negant, ut potius rideant.

Certe, quemadmodum pater Joannes Schafferius mihi scribit, in Hungariæ fodinis, quas Herrengrund dicunt, magno sanè Cæsaris annuo proventu, ex ferro æs optimæ notæ confici: quomodo verò in hac metalli metamorphosi procedant, uti in octavo libro modum ostenderim, hoc tamen loco paucis illum repetere visum fuit.

Ferrum rubiginosum, & inutile, uti variorum veterum instrumentorum supellectilem accipiunt, atque fornaci, inditum ad incudem reductum, in tenuissimas laminas extendunt: hoc peracto has laminas rivi vitriolati, qui in profundissimis fodinarum cuniculis profuit, fundo imponunt, impositas ad nonnullos menses relinquunt. Constituto itaque tempore rivum adeunt, & laminas in pulcem subflavam amalgami adinstar abiisse reperiunt; hisce aëri, ventisque expositis in optimæ notæ æs indutatur, atque sic proceditur Neosolii in Hungaria.


Quaritur itaque, utrum vera hæc ferri in æs transmutatio dici possit? Dico veram hic transmutationem dari minime posse cum non totum ferrum in æris substantiam mutetur, sed ex accidente tantum; me explico: cum enim in vitriolo infinita ærata corpuscula inexistant, & quemadmodum illa maximam sympathiam cum ferro habent, ita quoque fit, ut statim ad ferrum confluant, atque in ejus se poros intime insinuant, cum vero ingentis acrimonie spiritibus polleant, hinc intra ferrum in sinuata, illud mox rodere incipiunt, usque dum omni pinguedine ferri consumpta, ferrea substantia dissoluta, in scobem seu rubiginosum pulverem abeat: corpuscula vero vitriolata in consumpti ferri locum se substituentia, nativa tum ferri, tum propria pinguedine, in unam massam conglutinantur, quæ primò quidem intra aquam mollis, aëri tamen liberiori, ventris, folisque radiis exposita, in perfectum æs induratur; atque hoc pacto idem fit, quod antea fuit: antea quidem per ipsorum corpusculorum in aquis dispersionem, modò per eorundem à ferro tractorum unionem. Si enim vera hic daretur transmutatio, nil amplius ferri superesset: sed experientia docet, tantum ferreæ rubiginis manere, quantum ferè massa prius ferrea pendebat: & hujus rei experimentum exactus sumerem, supramemorati fodinarum Hungaricarum præfides per supra dictum Patrem Schafferium, phialam dictæ aquæ vitriolatæ, unâ cum solea equina ex media parte cuprea, ex altera ferrea pro eorum in me benevolentia transmiserunt, huic itaque phialæ filum ferreum indidi, quod intra triduum totum consumptum fuit, pulve in fundo relicto, quæ à scoria separata purum æs reddidit, scoria autem fere ad ferrei fili pondus accessit, ut proinde de hoc negotio à nemine amplius dubitari queat, est & hoc admiratione dignissimum, quod pater Schafferius de quodam medico sibi multum familiari, magno chymico, scribit, est ei nomen Morlandus: hic frequenti experientia doctus, magnam differentiam inter cuprum, quod ex ferro per aquam vitriolatam fit, & illud quod ex mineris eruitur, reperit; ex cupri siquidem arte per aquam vitriolatam ex ferro confecti

fecit concentricis, 27. lotones auri se extraxisse refert, cum ex cupro niter tum nequidem sex lotones educere potuerit, rogatque à mea benignitate hujus rei rationem. Respondi, id mirum non esse, cum enim aqua vitriolata non attamen totius tantum corpusculis, sed & aureis una cum vitriolo ex propriis venis abrahis profluat, hinc fit, ut ea à vitriolatis corpusculis ex naturali Sympathia attracta in unam farinaceam massam in fundo subsidant, ex qua deinde aeris ambientis siccitate indurata aurum id eliquatione separetur, quanto autem per ditiores auri venam fluxerit aqua vitriolata, tanto major aërolis corpusculis auri copia inerit; quod tamen nequaquam fieri posse putem, nisi in aqua vitriolata per auream venam transeunte, quod deinde in aëre minerali non tanta auri copia eruatur, ratio est, quod plerumque terrestribus sordibus involutum, exiguum auri copiam illi inexistentem præbeat, si vero aureæ venæ aërola conjuncta fuerit, non video, quare non eadem auri copia, quæ ex aëre vitriolato, inde educi queat, dependet itaque ea solutio ex eo, quod chymicus ille in aërola substantia auro inope, in vitriolata vero aëre auro divite experimentum fecerit; ut proinde nil in hoc admiratione dignum occurrat, quomodo vero ex argento, ex quo omne aurum jam, ut scilicet, extractum nihilominus ex uno lotone tantum adhuc auri extraxerit, quantum octo grossorum pretium erat: Arcanum hisce verbis mihi communicat: Accipe Antimonii, tartari, salis niri unam unciam ex singulis, commisceantur simul, & alia frigida fontana diluantur, aquibus si unam unciam Argenti separaveris per cupellam, id dabit unam unciam Auro octo grossis æquivalentis: Si vero secundo hujus experimenta cum argento feceris, nihil extrahes, argento remanente sterili, miratur autem, quomodo ex argento, ex quo omne aurum extractum est, nihilominus adhuc aurum subsidio dictorum ingredientium extrahi possit, dico itaque falsum esse, omne ex argento aurum extractum fuisse, cum argentum non ita depurari possit, quin adhuc aliqua particula ei inexistat, quæ postea Antimonio, in quo semper non nihil auri inexistere omnes chymici fatentur, auctæ, aurum illud ad octo grossorum pretium exaltant.

Hattenkirch REISERUS, veniat jam in Scenam Clariss.

REISELIUS qui de Metallifodinis Bohemia præcipuis sic in *Miscellan. Curiosor. Decur. 1. An. 2.*

Ut promissis satisfaciam, quicquid in itinere meo nupero Bohemiæ, cum genitolo Dn. Comite de PARS. Cæs. Mai. jussu Anno MDCLXX. ad inquirendum in statum modernum Metallifodinarum suscepto, notatu dignum vitum est, fidelissimè referam brevibus tamen, quia iter tardius, est declinante anno institutum, me in montosis illis locis morari diutius prohibuit, Primus itaq; visitationis locus erat *Kuttenbergæ*, locus alias amarus, bene situatus, & quoad temperiem aeris valde benignus, per totam illam fodinam & unica vena cumulata argenti cum cupro permixta, in uno loco tamen ditior, quam in altero, non adeo profunda in quibusdam locis, nam in fodinam *Nova Spei* (sic dictam, quia nova est, & bona spe tactenus Metallici ibi nutriuntur) sunt tantum 40. Orgiæ seu passus Metallici (notandum illos ibi habere orgias uno & medio pede longiores, quam alibi, & hic vocari *Thumplachter*, ibi vero *Berglachter*, ego puto *Thumplachter*, esse orgias Græcorum, *Berglachter* vero esse orgias Romanorum, ad mentem Agric. de re Metall. l. 4. ad initium) & sanè jam ibi optima minera extrahitur, descendendo in puteum machinæ hydraulicæ (*Kunst-Schacht*) usq; ad cuniculum sub ostiis, ubi aqua extracta effluit, (bis auf d. August-Schacht.) sunt undecim orgiæ inde usq; in *Wolfschtreck*, (est cuniculus, in quo descenditur) ad fodinas live ad areas, sunt 150. Orgiæ, ex *Wolfschtreck* in fodinam *Suchin* dictam, sunt 24. Orgiæ; vena in hac fodina lata est, ad quartam circiter partem unius orgiæ non adeo dura, caudam suam tendit intra primam & secundam horam p. m. & satis magna humiditas ibi reperitur, inde usq; ad fodinam *Aaronis* sunt 18. Orgiæ: hæc vena est magis dives altera prædicta, minus tamen humida, inde transeundo per fodinam *Phasiani*, reliquis duabus ditiozem, descenditur in fodinam *Commissarii* 12. Orgiæ, qui locus siccus est, & Metallum quidem ditissimum, ita ut ibi quasi cumulus & caput venarum videatur, de argento autem modicum continet, reliquum totum cupreum est. Tribus circiter orgiis inde est alia fodina, quæ *Bernireck* dicitur, pariter tam dives est hæc vena, sed durior & aëre caldario (*Glockenspeis*) prægnans, & locus venæ per se etiam siccus est; inde ascenditur 44. Orgiis in *Opzimmolt*, quæ fodina uti apparuit, multas divitias in se jam non continet, humidior tamen est; exinde descendimus fodinas (*sind zum tag aufgefahren*) Totæ vena hæc *Kuttenbergensis* fodina, uti eam mihi imaginor, talem tenet formam.



Ubi, a, est illa fodina *Commissarii* sive cumulus minere, sive materia illa Metallica ventris figuræ extuberans, (*die Gange machen, oder Vuerffen einen Bauch auf*.) & b. b. sunt venæ exinde provenientes, reliquas fodinas constituentes: ad profundissimum locum, ex quo nunc minere extrahuntur, plus minus 218. Orgiis Græcis (*Thumplachter*) descenditur: puteus autem machinæ hydraulicæ est altero tanto profundior, in cujus fundam quamquam ob copiam aquæ descendere non potui, nihilominus tamen adverti, aquam illam succo Metallico ita esse impregnatam, ut non tantum intus in puteo guttæ decedentes, icalas (*die Farten*) ligneas in lapideas convertant, aut alias transfluens aqua rivulus canales suos aliis canalibus quasi tartareis obducas, sed intus etiam in Syphonibus talis materia lapidea accrescat, ita ut ultra spatium 3. annorum rarissime ejusmodi Syphonibus uti possint, coganturque eos abicere ob copiam accretæ materie pilum impediens, hujus materie frustulum hic transmitto unâ cum particula minere kutterbergensis communis, nigrior, longior & obscurior particula est ex *Phasiano*, altera magis alba & brevior est ex *novâ spe*: aliam particulam minere Kutterbergensis melioris invenies etiam quæ parum argentum rube (*gediegen Silber Erz*) in se continet, ut cetera rubra fuit. Item adest particula *Minera argenti & cupri* Kutterbergensis ex cuniculo *S. Mariæ Magdalene*; hic locus est humidior reliquis omnibus, & ob hanc causam jam ab aliquo tempore fodinam illam colere non possunt, mihi videntur illi Crystalli esse flores cupri, quibus tota fodina, quantum videre licuit, plenissima est. Transmitto, ut puto, *Cadmiam fornacum*, & quidem eam, quæ conficitur in primis fornacibus, in quibus venæ cremantur (*Rost-Ofen*) de qua loquitur Agric. l. 9. de naturâ fossil. circa initium, & ad finem l. 8. de re Metall. Nam ibi Kutterbergæ vocant, *Gist von denge-often reich Silber haligen Erz*, & accipiunt ex illis fornacibus, ubi ista materia parietibus sese adhaeret variis coloris, flava, alba, cærulea, nigricans &c. ego flores Autepicales existimo, nam & fumus & materia hæc malignum spirant odorem, si vero supra carbonem signitos projiciatur, pulvis iste fumat potenter, & sulphur redolet, quantum sit venenum, proximè probabo. Adest & *Pyrites* aureo & argenteo colore (*Kupfer und Vvasser Kiss, vel gelber und Vveisser Kiss*) continet etiam aliquid argenti in se, & ejusmodi magna copia Kutterbergæ invenitur. E regione fornacum, in quibus venæ excoquantur (*Schmoltz-Ofen*) est aliqua inculta fodina, ubi quondam *Antimonium* fuit extractum, cujus Minere particula hic invenitur. Notavi præterea, cum alias omnia loca herbis, arboribus, fruticibus impleta sint, coles Metallicos ibi circum circa omnes esse calvos, & fumum ex fornacibus exhalantem, quia gravis est, & statim terram repetit, quæ se basin circumferentia, aut quæ sub suo tractu communiter crescunt, arefcere, incrementum impedire, aut planè consumere, & vaccas, quæ ibi circa fornaces pascuntur, l. e. aut insipidum, aut malè olens præbere. Medio millari Kutterbergæ est certus tractus terræ, ubi præstantissimi & deliciosissimi raphanus rusticanus in tota Germaniâ crescit, ita ut oppidum illud ex puro raphano se sustentet, *Lipsiam* & *Viennam* usque adducunt propter suam præstantiam. Plura in illo loco temporis injuria mihi notare non permittit, itaque inde in vallem Joachimicam perreximus, qui locus est montosus, austerus & rigidus valde, ita ut vix frumentum ibi ad maturitatem pervenire possit, & aliquando planè non vena nupquam: Mense Octobri. Ribes & cerasa ibi adhuc immatura invenimus, alias quoad herbas & arbores locus fertilissimus: inveni ibi *Rosellam*,

Angelicam, Libanotidem, Bistortam, Tormentillam, Caryophyllatam, Helleborum album & nigrum, Rhabbarum Monachorum, Fabariam, Telephium purpureum, Gentianam majorem, & minorem, Aristolochiâ utraq; Centaureum minus, Carlinam, Origanum, Pullegiû, Thymû, Saturejam, Serpillum, Imperatoriâ. Pollium montanû, varias species Testicularû, Liliû Convallium; Lunariam ibi reperiri, à fide digno relatum est, Alarum, Lyfimachiam purpuream & siliquosam, Saxifragiam, Umbilicum Veneris, Anchusam, Pentaphyllum Petræum, Papaver corniculatum, Solanum majus sive Bellam Dōnam, Polypodium, sed non quercinum, aliasq; plurimas herbas in magnâ copiâ, quarum omnium non amplius recitator. Conjectio inde, aliquando magnas divitias extractas fuisse, eò quod ut in ejus loci delineatione videre est, quàm stupendè locus ille subfossus & transfossus sitibi plerumq; per cuniculos descendunt ad fodinas, raro per puteos, nisi abbreviandæ viæ gratiâ. Diverse ibi sunt fodinæ, quæ omnes venas habent durissimas, & rarò ultra latitudinem 4 aut 6. digitorum transversorum sese extendentes (loquor de venis argenti) sed ditiores sunt, quàm Kuttnerbergenses uti sub n. 8. illa particula probat. Omnes verò fodinæ universaliter loquendo sunt ibi valdè humidae, ita ut in quibusdam locis duplices cuniculi unus supra alterum ob copiam aquarum (numeravi enim ex uno cuniculo parvo aquæ ductus, præter aliam copiosam aquam, quæ abundantiè effluit quocunq; tempore sicco, adeò superflue, ut si alia aqua deficiat, omnes inibi Molendinæ sola aqua ex uno aut altero cuniculoeductâ (sufficienter impelli queant) inveniantur. Similis quasi Minera ex unâ sicut ex alterâ fodinâ effoditur, paucâ habitâ differentiâ: fodinâ quæ nunc ditissimam Mineram ibi præbet, est *fodinâ pulchra Maria*, in qua nunc sæpè *argentum rude* reperitur, uti in transmissâ particula sub n. 9. quædam bractæ argenteæ finissimæ & candidissimæ videntur. Hæc fodinâ valde etiam humida est, sed in qualitatibus activis alias temperata: inventa fuit ante aliquot annos ibi quædam vena *argenti rudis plumbei coloris* (*Glass-Ertz*) cujus particula sub n. 10. est, ejus medietatem transmitto, quia valde parum acquisivi, nihil enim ampliùs de venâ illâ reperitur. Inventâ etiam fuit aliquando alia vena hujus argenti penes illud oppidum, *Goites Gab.* dictum, nunc nec hic, nec ibi ampliùs tale quid invenitur, an nihil remanserit, vel an homines non tam diligenter ampliùs, ut antea solebant, querant, non scio. Apparet enim ibi dictas venas quæ sitas superficie tenus ubique fuisse, adeo tota terra transfodi incepta est (*es ist alles geschorfft.*) sub n. 11. sunt duæ particule de *argento rubro rudi* (*roth Golden Ertz.*) quia mihi ita fuerunt vocatæ, tantam tamen claritatem, ut Authores notant, in hæc Minerâ non invenio, quapropter ego magis argentum rude purpureum (*gediegen Braun Ertz*) esse existimo: subeat censuram. Inventum fuit etiam hoc argentum in valle Joachimicâ ante aliquot annos, nunc verò rarissimè aut nunquam. Reperitur ibid. in unâ fodinâ *medulla saxi* (*Steinmarch.*) certum genus terræ albæ, de quâ *Agric. in Bermanno*, est sub n. 12. locus, unde excepi, est ultra 300. Orgias (hic habent Orgias Romanas, *Berglachter*) profundus, saxum integrum, habens in medio fissuram ad latitudinem unius palmi, altam ad 4. Orgias circiter, altiore & profundiore esse benè apparet, sed quia saxum (durissimum) integrum est, certa altitudo & profunditas, donec totum fuerit delectum sciri non potest, in dictâ istâ fissurâ invenitur hæc medulla, quæ licet sit materia pinguis, non tamen ardet, nec ad ignem liquefcit; insipida eadem planè est, exhibeturq; ibi forma pulveris ea quantitate, quam cultri cuspis capit, cum cochleari aquæ Petrosilini in Obstructionib. Urinarum & dolorib. Nephriticis: Nam expertum est, illam calculum & urinam pellere. Datur & ibi aliud genus certè cujusdam terræ, de qua etiam *Agric. l. c.* hæc

& tota nigra uti videtur sub n. 13. est. & alba, non tamen pinguis, & rubra in unius ejusdem fodinæ vena: hæc fodinâ est inculta & occulta, saxi, terra, sepibus, lignis, variisq; rebus cooperta, sine usitato accessu, exceptis tribus vel quatuor, reliquis omnib. antehac non cognitis, 30. aut 40. ad summum Orgiis profunda, & tam angustî introitus (per modum cuniculi) ut non nisi serpendo homo macilentus tantum, in longitudine 7. vel 8. Orgiis intrare possit.

Notandum prætereâ, illam viciniam semper esse nebulis plenâ, ita ut instar nubium continuo ibi circûvagantium permeent vapores isti, & tamen tam alta, ac vallis Joachimica, non est. Ab extra videtur formosissimus hic collis ob copiam variarum herbarum supra & circum circa triticum etiam copiosum crescit, ab intra verò est caverna & specus horrendissima; non est saxû integrum, sed totus mons apparet, ut cumulus saxorum grandium & minorum, intra quæ terra ita disposita est ac si naturâ loco calcis eâ ad fabricandum hunc collem ula fuisset. Si quis incaute offendant caput ad lapidem, decedit longus tractus terræ, ita ut videantur omnia velle corrui: invenimus quoq; in illo angustî introitu, varia quadrupedum & piscium ossa, intus verò totam fodinam (magna non est) variis cuniculis hinc inde inordinatè transactam, pervagando, nullum animal inventum fuit, mira & mira de hac fodinâ narratur, etiam à loci igharis, inter quæ quoque narratur, quod certi quidam Itali alternis vel ternis annis venire soleant, pro excipiendâ hæc terrâ, ex qua postea illos aurum conficere fama est, modus verò hinc aurum extrahendi omnes later, certum tamen est; non adeò pridem homines intus fuisse: vidimus enim vestigia recentissima surreptæ istius terræ, nigræ, præcipuè, imò unam talem divitem venam lapidibus rectam & occultam in quodam cuniculo reperi, ubi magna copia istius terræ jam tum ita collectæ, dispositæ & studio asservatæ later; sunt variæ venæ, nec omnes suas caudas ad unam eandemq; oram tendunt; locus aliàs non est adeo humidus, respectu viciniorum; nam esse loca quâplurima, ubi ad profunditatem 2. vel 3. Orgiarum jamdum aquam inveniunt, uti ab incolis illius vicinæ, fide dignis viris, sanctè mihi fuit assertum; nec terra illa aut vena dyra est, digito enim & cultro excipi potest, nec spirat fumum virosum, vel aliam auram pestilentem aut putidam, totam enim illam fodinam, aut totum illum collem, aër transpirat & pervolat (*es ist gutes Wetter darin, und ziecht auff und ein.*) Narrantur etiâ de illa fodinâ, quod ab illis Italis ita maledicta ut per spectrâ aut Dæmones metallicos truculètos intro ad custodiendâ hanc venam amandatos munita sit, & ingredientès nec aliquid excipere, & si tamen quid excipiant, inde nihil efficere aut experiri possint.

Uno milliari ex valle Joachimicâ in confinibus Bohemiæ & Misniæ crescit lapis *Granatus*, cujus unam particulam hic transmitto sub n. 14. omnia in illis confinibus repleta sunt hoc lapide, & notavi, (quoniam integri montes sunt Granati, aut ut melius dicam, tota minera mons merus est) in superficie terræ istius mineralis Granatos lapides apparere quidem, sed omnes à sole exustos & consumptos. Cuniculos quæsi, & inveni eos aliis humidiores, & lapides Granatos bonos & recentes, velut hic transmitto; intrare ultra duas Orgias non potui, quia lampadem penes ne non habebam, valdè tamen humidum illum cuniculum reperi, hinc apparet lapides istos humiditate conservari. Unus centenarius horum lapidum continet (ut dixerunt, relata, non experientiâ probata refero) aliquot uncias argenti puri, est minera, uti apparet, mollis valdè. In eadem valle Joachimicâ in cuniculo, ut puto, *S. Susanna*, reperitur arbor in lapidem conversa, cujus particula est sub N. 15. videtur ibi figura ramorum, corticum & radicum, tota arbor quasi excavata jam est cuniculus ista usque ad illam arborem sese extendit. sul-


tra 2000. Ogyrium, putant fuisse fagum, & ita in lapidem convertam, tempore diluvii sabulo & arena sic obrutam, & tractu temporis in talem materiam lapideam conversam fuisse: quæ ratiocinatio licet absurda adeò non sit, (nam ille cuniculus ibi per omnes partes similis non est, nunc enim transit integrum saxum, nunc arenam, nunc argillam, nunc terram, iterum saxum, jam lapides, paulò post iterum ferrum, jam humidus, jam siccus, hic calidus, ibi frigidiusculus, denique planè heterogeneous est, & ibi ubi putatitia ista arbor hæret, apparet mera arena, quæ glutine & viscosa quadam humiditate successu temporis exsiccata, & quasi conglutinata est, non est petra vera, nec pura terra, nec pura aut verà arena, sed videtur arena cum limosa terra conglutinata.) Quoad ego conicere possum, existimarem ibi fuisse succum lapidescentem, qui casu talem figuram arboris formavit: sed quid de cortice? quid de illis fibris dicendum, quæ magis indicant, si arbor unquam fuerit, fuisse quercum? nam nunquid dantur pisces, & aliæ multæ res fossiles? libentissimè iudicium subibo. Est & in eadem valle *minera ferri*, quæ videtur *sub N. 16.* hanc mineram vocant ferrum rude purum (*gedigen Eisen-Eritz*) dicuntq; esse plurimam partem ferri, & accipiunt transeuntes pro lapide hæmatitide, & ita quoque eà utuntur, ego credo esse Crocum Martis naturalem (hic pulchrum esset discurre, cur ferrum per mucrones, argentum per bracteas, lamellas, fibras & strias, plumbum & stannum per massas & cumulos sese prodant.) Cuniculus profundus adeò non est, constat & terrâ & saxo non adeò duro, sed omnia sunt rubicundissima, ipsamet aqua intus stagnans, quæ adeo copiosa non est, putatur ob colorem & densitatè suâ verus sanguis: ego in me fui expertus, illâ terrâ esse valde vulnerariâ, nam cum essem in fodinâ, cecidi, & vulnus triângulare ad palmû dextrum mihi infixi, & cum nihil penes me haberè, apposui recentî vulneri illâ terram rub. â naturali humiditate præditâ, ligavi manum, & ita perrexi, idem de die bis repetij, & cû nullam inflammationem in manu sentirem, nec viderè, causâ ab hac experienciâ desistendi non habui, quarta die vulnus mihi perfecte sanatû fuit, ita ut cicatrix nûc vix videatur; nûc hic Viennæ in quadâ muliere operatione hujus terre iterû expertus fui, cui inter alia ob Rheumatismû venæ sectione in pede ordinavi, & quia sectione hujus venæ chirurgus majus jussu vulnus venæ infixerat, sanguine præterea tenui & calido existente, sanguis ex venâ tanto impetu profluens, cum summa difficultate sisti potuit, de nocte mulier incautè, pedè offendens, venâ absq; hoc satis latè dissectâ rumpit, qua rupta sanguinè ad deliquium quasi fudit, iterum omni adhibitâ diligentia sanguis stetit, triduo post ligatura fuit aperta (omnes vulnus sanatum credidimus) & ecce iterum cû summo impetu absq; spe sanandæ venæ sanguis profluit, ita ut convulsiones jam inciperent. Cum verò locus unctioni non esset aptus, neq; alia quævis remedia sanguini sistendo adhibita, quicquâ conferrent, tandè ego accedens massam confeci, ex crepitu lupi cum albumine ovi, superasperfi bonam quantitatem hujus terre in tenuissimum pulverem redactâ, maceravi hanc massam in aceto rosaceo forti, & supra venam ligavi fascijs & linteis omnibus in aceto illo rosaceo cum reliquo pulvere hujus mineralis terræ mixto intinctis, & spatio unius noctis tam perfectè sanata fuit ut altero die circumambulare tutò potuerit. Colliculus unde hæc materia extracta est, plenus apparet junipero & pinohumili & alta, habet & alias herbas, sed paucas. *Plumbum* ibid. etiam promissue invenitur, cujus mineræ particula est *sub n. 17.* rarius autem *plumbû cinereum.* (*Bissmuth*) cujus mineræ particula notatur *sub n. 18.* Liquescit hæc minera ad flammam candelæ. De hoc plumbo cinereo purificato, quando tantum stanno additur, quantum requirit (unum stannum plus, alterum minus) reddit stannum illud jamdum ad usum præparatum quod so-

num & apparentiam simile argento, & ultra quadrantem horæ factâ commixtione istorum duorum metallorum auditur strepitu interno in patellâ, orbe aut alia re fusâ, jamtû refrigerata etiam sonitus actionis & reactionis internæ. Extrahitur & ibi magna copia *Cadmie metallica.* (*Kobolt*) cujus mineræ particula est *sub n. 19.* Conficiunt inde colorem illum cæruleum, quo utuntur mulierculæ pro tingendis collarib. Varia metalla, pro varietate loci, unde extrahitur, in se continent. Utuntur ibi etiam ut veneno contra muscas: ego proximè quantû venenum sit probabo, hoc tantum interea pro certo affirmare possum, ad reditum meum Mosam plenum muscis inveni (fuit tamen in meâ absentiâ ab hominibus frequentatum,) postquam ergò mineralia mea publico aeri ex cista exposueram, inter quæ erat & Cadmia ista, spatio 6. vel. 7. dierum taliter evanuerunt muscæ, ut jam vix unam aut alteram & rarissimè quidem advertam; sed exposui præterea varias scutellæ confectione Cadmiæ metallicæ & fornacum cum aquâ & lacte infectas, pro interficiendis muscis, nec quantum mihi observare licuit, unicam muscam inde gustare vidi, advolarunt quidem, sed in momento avolarunt, hinc mihi imaginor, solam illam evaporatione in aërem vicinum mactasse muscas, quia & ibi in Valle Joachimicâ tantum hinc & inde mineram istam collocant, & ita omnes muscas ex hypocaustis abigunt, nunquam etiam ullam muscam supra mineralia mea diu ambulanti hætenus observavi, sed cum ego odorem aliàs valde acutum habeam, nullam inde nauseam, contrarietatem aut horrorem adverto, cum tamen Napellus me jam tum duabus vicibus solo odore vix non mactasset, meum herbarium vivum, in quo napellus est, penes me tantum habendo, & id pervolvendo. *sub n. 20.* transmitto *Mineram Arsenici*, cujus ibi magna copia invenitur, attamen, uti authores scribunt, eam tam pinguem non invenio. Hæc fodina alta est, satis sicca & grave olens, cujus sœtorem quanquam non sentirem, difficilem tamen respirationem causavit, intravi solus cum metallicis illis ordinariis, reliqui mei socii cum intrare nollent, me foras expectarunt, alias illis, ut etiâ inassuetis, quin idem accidisset, nullus dubito. Habeo enim pulmones, Deo sint laudes, tam bonos, ut certò cum nullo eos mutare vellem, etiam si id possibile esset, certum tamen est, arsenicalem illum vaporem mihi id causasse, cum eodem plane modo idem mihi contigerit Kutenbergæ: Ibi enim cum derepente ad fornaces, in quibus venæ cremantur (*Rostofen*) incautè accederem, & ibi videnda circumspicerè, quamvis nec spatio unius medi quadrantis horæ intus permanerem, tantâ difficultatem respirandi sentire capî, ut per horam me colligere nullatenus potuerim, & suffocatione timuerim.

Metallici, qui per aliquot annos in illa fodina laborant, acquirunt tremores artuum & moriuntur, idem contingit illis, qui in fornace, in quâ huius venæ flores conficiunt, laborant, cujus delineationem, proximè, ut spero, etiam transmittâ, omnes laboratores ibi sunt, ut illos aliquo modo depingam, sicut sceleta viva, pallidi, sicci, oculos habent concavos, verbo, sunt tam macilentî, ut cutis vix ossibus hæreat. Ad hujus fornacis caminum etiam accedere planè non potui, nec in fumo aut circa fumum salvâ respiratione permanere, ad ignem tamè & fornacem ignitam liberè accessi. Observarunt præterea ibi morantes laboratores, quod quoniam fornax hæc in medio sylvæ sita est, ad illam viciniam, quâ fumus tangit, nulli unquam cervi accedunt, ut ut circumcirca non pauci degant, sed quam primùm fumum olfaciunt, quantocius recedunt. Ex hac minera postea conficiunt *Arsenicum Crystallinum*, uti *sub n. 21.* quod est sine sulphure, & *Arsenicum flavum*, uti *sub n. 22.* quod est cum sulphure paratum. Duobus milliariibus ab istâ valle alius situs est pagus, qui vocatur *Donum Dei*, est tam miserabilis locus, ut vix passer ibi degere possit, alius, in continuis nubibus, & nebulis, nec herba, nec fru-

frutex, multo minus arbor ibi invenitur non habent hujus loci incolæ nisi tres partes anni, de æstate nihil sciunt, frigidus, summopere præterea humidus, & quidem adeo, ut gramen (quod ibi relinquunt, quoniam aut usui nulli est, nec enim bestia ulla eo pascitur, aut si usui esset, siccat non potest) annuatim unum supra alterum putrescat, massa hæc putrida per totam illam viciniam ultra unam & mediam Orgiam profunda, nigerrima est & pinguis, sicut finus vacinus putrefactus, & quando quis subitus est, ut aliquando contingit, si vena sit paulo profundior, maleolentem & nauseabundum spirat odorem. Sub eadem massa est terra lutosa & argillacea quasi, quam lavant, exque eâ Mineram Stanni extrahunt, instar arenæ gravem & nigram, aliquando plurem, aliquando paucior, frequentissimè tamen ex terræ fæxx. circiter extrahunt ℥iij. vel ℥iv. vocantque hoc stannum, *Saigerzin*, & est valde bonum stannum. Sub illâ terrâ est terra arenosa & firma, inanis & nihil in se continens; sunt in illâ vicinâ paludes ita rectæ gramine suo, ut pro firmâ terra habeantur, tantæ profunditatis, ut homo cum equo ibi submergi possit, quod aliquando contigisse, incolæ mihi nararunt; Est quoque in illis cavernis magna copia stellionum (cavernæ ultra 4. vel 5. Orgias profundæ non sunt) quos vidi: De Salamandris quoque interrogavi & eas descripsi, & secundum meam descriptionem eas ibi etiam reperiri mihi asseruerunt, nullam tamen vidi, non autem nisi per dimidium diem ibi permanere potui. Homines illi continuo pervolvunt illam terram ex una parte in alteram, & semper inveniunt in eâ mineram stanni, ita ut terra illa jam tum aliquoties fuerit revoluta, stanni, semper inventi, gratiâ. Ex hac valle discessimus *Schlackenvaldum*, ubi integra vena *cumulati stanni* reperitur, cujus Mineræ particula est *sub No. 23.* Hæc vena caudam suam in profundum extendit (*es fast in die Tiefe*) & quidem usque adeo, ut venæ cauda reperiri nunquam possit. Quo enim diligentius fodiunt, eò majorem & cumulatiorem venam semper inveniunt, & quod magis mirere, dum infra fodiunt, supernè iterum recrefcit minera. Qualia edificia, quantæ cavernæ & excavata spatia sunt ibi sub terra istius fodinæ, nemo credit, qui non vidit, transivi quasdam cavernas ultra 50. aut 60. passus longas, & 30. aut 40. latas, altitudinem videre non potui, tam horrendæ sunt. Placidissimè & distinctissimè intus Echo resonat & respondet; omnes fornicatim excavatæ, & sine fulcris quidem: majores adhuc cavernas esse, mihi asseruerunt, totam enim fodinam non vidi, quia ad illam totaliter visitandam requiruntur 3. integri dies, tam magna est, & variis ædificiis substructa, non adeo humida, nisi ubi est machina hydraulica, memorabilis sanè; Dicunt intus morari Dæmonem quendam metallicum, qui sæpissimè apparet sub varia figura, jam ut metallicus, jam ut magister metallicorum, jam ut juratus, jam in forma muris, canis & variorum animalium, aliquando auditur saltare, & ducere choreas, inflare tibiam, & millenas alias nugas illum ajunt incipere, cumq; pro malo omine habeant, si illum audiant aut videant, summopere omnes tumultus aut clamores aliasque insolentias in fodina prohibent: ego cum desiderium haberem, illum videndi aut audiendi, incepti fistulare, & metallici me per omnes Deos & Deas, quatenus ab hoc abstinerem, rogarunt, fortassis si respectum Comitum non habuissent, non verbis, sed verberibus mihi silentium imperassent, cumq; causam hujus indagarem, dixerunt, illum Dæmonem solere alias statim respondere fistula, saltu, aut risu potentissimo, & cum aliquoties damnum quibusdam inflixerit, illos præcipitando per scalas, torquendo, tundendo, lampades extinguendo, seducendo &c. Illi adeo fidendum semper non esse. Apparet itaque, illum Dæmonem esse jocularium & nugatorium, ego verò nec quippiam audiivi, nec vi-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

di de illo in hac fodina. Hic non sicut in aliis fodinis jaculari solent, sed ignem substruunt, quia, cum patientissima sit, & spiracula plurima habeat, ignem bene substruere licet, deinde si jacularentur (jaculari autem vocant, quando foramine rotundo terebrâ in mineram incusso, id pulvere pyrio implent, candelam sulphuream longiorem penes accendunt, & ita mineram dissilire faciunt) valde timendum esset, ne terra supra corrueret, & aut Metallicos aut venam obrueret. Vena enim in tali figurâ  procedit, ubi a, est superficies terræ, b, c, d, totus cumulus venæ, adeoque uti videtur etiam extra fodinam, terra manifestissimè se ad venam inclinat, etiam in una parte aliquid corrui, & fregit illis rotam machinæ hydraulicæ una cum ejus cavernâ (*das Rad mit sampt der Rath stuben*) quarum mutum jam substruunt fortissimum, & in ista vicinâ fodere sacrosanctè prohibent, nam in aliis locis sufficientissimam mineram habent, quia est integer cumulus, & quicquid decurritur, minera est. Hic etiam est quædam *argenti* fodina, ex qua est particula *sub No. 24.* non profunda ea est, valde tamen humida, & terra lutea repleta; conicere licet, quondam magnas divitias ibi fuisse extractas, vel solo ædificio id denotante, in quo antiqui longissimum quendam cuniculum ad aquam tantum educendam egerunt, à parvo tempore fodinam istam colere incepterunt, sub ipse adhuc laborantes: Nam quantum hæcenus extrahunt, non sufficit pro solutione metallicorum. Media hora *Schlackenvaldo* distat *Schönfeld*, qui locus participat in fodina stanni cum *Schlackenvaldo*, & propter continuationem molendinarii ubi tunduntur venæ, [*Puchverck*] & fornacum unus idemq; locus quasi putatur: & quod admiratione videtur dignum, quod cum ejus situs in mineram planitiem se diffundat, nihilominus tamen continuis nebulis, pruinis, frigore, aliisq; Cæli injuriis perpetuis obnoxius, ita quidem ut ibi integro mense & amplius hyemem longiorem habeant, quam *Schlackenvaldi*: hic erit aura temperata & serena, ibi ninger aut pluet, hic tota die à sole torrentur, ibi nebula & pruina omnia devastabunt, hic homines forniosi, ibi stiumosi, præcipuè fœminæ; hinc equidem totam mutationem & diversitatem inibi latentem Mercurium conjicio, & si quærerent, certò puto, illos Venam Mercurialem reperituros, quin imò asseverare auserim, post aliquot annos, si ita versus *Schönfeld* in fodina Stanni continuaverint, derepentè Venam Mercurialem illis patefactum iri: *sub No. 25.* est quidam *lapis niger*, quem vocant *zinnkrauppen*, est *stannum rude*, idem ac *gedigen zinn*, paulo rariore sunt, quam minera prior *sub No. 24.* vidi alium talem lapidem ad magnitudinem unius pugni, sed tales rarissimi sunt. Etiam *Schlackenvaldi* per totum illud tractum, ubi aqua ex machinis, in quibus venæ pilis præferratis tunduntur, [*Puchverck*] fluit, lavant arenam, & iterum quantitatem aliquam stanni, nunc majorem, nunc minorem inveniunt. De reliquis notavi, totam Bohemiam & Moraviam plenam esse *Micâ* [*Katzen-Silber*] uti apparet *sub No. 26.* de qua scribit *Agric. in Berman.* qualem, licet nullius usus sit, tamen unâ transmittere volui.

Et hæc sunt, quæ brevi hoc itinere annotare potui, proximè expectabo alias mineras, quæ si rariore fuerint, etiam communicabo. Expecto etiam quasdam delineationes fodinarum & fornacis, in quâ conficiuntur flores Arsenici, quas pariter transmittam, unâ cum modo, quo conficiuntur, & declaratione, quare unum crystallinum & alterum flavum sit. Addam insuper pleniorum relationem eorum, quæ pro nunc fortassis oblitus sum, nec non quorum experientiam facere constitui. Expecto etiam aliam Mineram Antimonii, aliasque Granatos, qui si figura à modo transmissis different, fidelissimè eos communicabo. Optarem equidem etiam atque etiam, liceret sequenti æstate denuò fodinas hæc

visitare, citra dispendium meæ praxeos, absque hoc enim si esset, tædiosum minimè foret, sæpius atque sæpius transvagare cavernas & visitare mineras: neque enim intima terræ viscera unquam abhorrerem, modò penitiùs contemplari naturæ opera possem, &c.

Coronidis loco duo Experimenta à me facta communicare placet.

1. Cadmiam fornacem probavi, nec mures, nec glitres eam attingunt: Cato dedi, qui vertigine correptus, aliquot diebus post periit.

2. Cadmiam metallicam dedi cuidam cani, qui horrendissimè vomuit; non quidem periit, sed tamen huc usque malè valet. Observavi insuper quod.

3. *Aqua Lapidescens* in minera plumbi Tarnomontana, in confinibus Silesiæ & Poloniæ No. 29. signata, crescit ita ad instar bacilli longi teretis & quasi per annulos distincti inque medio perforati; exhibetur ibi in obstructionibus urinarum & in calculo.

4. Minera H. Tarnomontana, No. 30. signata, argentum in se continet sed paucum, adeoque valde parvum, inde lucrum acquirunt, &c.

5. *Sal Polonicus* in sua fodina est mollis & levis, extra in momento ita durefcit & gravescit, ut unicum frustum quod in fodina ab unico homine tractabatur, extra eam vix quatuor boves, movere possint. Observavi hæc præcedenti anno, quando cum S. Maj. Imperatrice Eleonora, Sponsam Regis Poloniæ Comitante Cracoviam, eò proficiscebam.

Hactenus REISELIUS de Metallis fodinis Bohemicis.

MEU Sive MEUM.

Meum Græcis μένιον vel μένιον à μένιον, quia foliis constat omnium herbarum tenuissimis; quibus ut & semine magno, oblongo, striato ab aliis congeneribus distinguitur.

Nomina. Meum Ger. *Vulgatius Park.* Foliis anethi C.B. Meum vulgare seu radix Ursina J.B.

J.B. Herba hæc cujus folia cubito ferè longiora, longos habentia pediculos striatos, eorumque supremæ partes foliis fœniculi similes sunt, capillaceæ, crebriores tamen & molliores, nec capilli usque adeò longi; caulem edit similem fœniculo, minorem tamen multo, striatum, inanem, ramosum, umbellam florum alborum Anethinis similium, pentapetalorum; semina magna, longa, striata; radix interdum una, interdum plures, dodrante longiores, modo tenuiores, modo crassiores, & quarum lateribus ut plurimum oriuntur obliquæ radices, satis longæ, quæ sursum interdum tendere deprehenduntur, nec passim in aliis radicibus sic adnatæ pervenire solent. Cortice vestitur primo nigricante vel potius cinericeo, tenui, deinde altero crasso, albo, gummoso; in ejus medio est matrix. Odore est satis jucundo, pastinacæ ferè, magis tamen aromatico, sapore non ingrato, nisi quòd acris & nonnihil amara. Quum verò radix hæc ex iis sit quæ hyemem perferunt, & Alpina magnas habet comas capillatas, ex foliis arefcenibus.

In Westmorlandia Angliæ Provincia copiose provenit in pratis & pascuis duobus à Sedberg pago m. p. viâ quâ ad Orton pagum itur.

In exteris etiam Regionibus Germania, Italia, Hispania in montibus invenitur.

Vires. Flatus discutit, usus præcip. in inflatione ac ructu ventriculi, in mensibus ac urina ciendis, in uteri suffocatione; in torminibus ventris, in catarrhis tartaroque pulmonum expectorando. Schrod.

Multas ingreditur cõpositiones & ipsam theriacâ, Idè.

Habet autem radix, non secus ac mentha humiditatem quandam excrementitiam, quâ ad caput latâ est κεφαλαλγίης; unde intelligitur non adeo frequentem debere utam ejus esse, in iis præcipue qui aut voverunt castitatem, aut alias venore uti non debent. Quâ enim

vi agit illud, ea agit hoc quoque. C. Hofman.

Geshero Mei pabulo in Apulia vaccæ plurimum & optimum lac reddunt, & inde caseum cabalinum dictum confici se audivisse ait, at nobis caseum illum ex lacte bubalino seu buffelino fieri narratum est.

Lobelium monuit Turnerus in Alpibus Chevioticis Scotiæ finitimis hanc stirpem magna ubertate scatere. Nobis in montibus illis plantas indagantibus non comparuit. *Rains.*

MEZEREON GERMANORUM.

Nomina. Chamælæa Germanica sive Mezereon Ger. Germanica, sive Mezereon vulgò *Park.* Laureola folio deciduo, flore purpureo; officinis laureola fœmina C.B. Laur. fol. decid. sive Mezereon Germanicum J.B.

Frutex est ad trium cubitorum interdum altitudinem excrefcens radice in aliquot partes divisa, minimi digiti crassitudine, vel etiam crassiores, longâ, altèque se demittente, alba; ex qua assurgunt virgulæ plerumque singulares, lentæ, teretes, tenues, obsequiosæ, cortice duplici testæ, exteriori cinereo, tenui, fragili, interiori exterius virente, interiori albicante valde & fractu contumaces, lanuginem quandam bombycinam dum divelluntur ostendentes, cui subest lignum candidum, solidum, medullâ paucâ præditum. Flores ad ramulorum latera sine pediculo, nunc singulares, nunc plures simul juncti ex nodulo ante folia prodeunt, palliduli, ex rubello purpurascens, colore ad flores persicæ accedentes, oblongi in quatuor foliola mucronata, reflexa, divisi, odore iuavi, in medio staminula aliquot crocea. Folia ex tuberculis plerumque; plura simul, colore herbaceo, laureolæ folio perpetuo accedentia, molliora nec ut illa splendidantia. Baccæ cum maturitate rubentes, quæ resiccata nigricant, quarum interior nucleus cannabis semini similis, medulla candida. Tota planta, ut odore gravi est exceptis floribus, ita sapore acerrimo & urentissimo.

Amat loca sylvatica & montana. In Germania & montibus circa Genevam & alibi observavimus. Flores, (ut in descriptione dictum) folia anteverrunt, & Martio Mense exeunt. Baccæ in virgis diu durant. In Anglia non habetur spontanea; sed ob florum præcocium aspectum pulchrum & suavem odorem nostratibus in pretio est, inque hortis & viridariis magno studio passim colitur. Variat floris colore pallidius rubente, & albo. Hujus baccæ officin. Coccignidii sc. grana Cnidia vocantur. Schrod. Cord.

Vires. Mezerei vis est ignea, acerrima, exulcerans & mordens; commanducatum fauces & œsophagum adurit, diu multumque vexante impressione, Lobelio & experientia testibus. Febres accendit, cordis præcipuarumque partium vires exsolvit, validissimè bilem biliosasque serositates purgans. Corrigitur macerando hor. 24. in aceto (ut elleborus ac elusa) succo mali punici aut Cydonii, portulacæ, mucilaginis seminis psyllii. Alii corrigunt infundendo in vino & iterum exsiccando alii triduanam macerationem in aceto requirunt, singulis diebus novum affundendo, & tandem aquâ bene eluendo.

Verum folia, cortex, baccæ quomodocunque præparatæ & correctæ ob malignitatem rarissime in usum veniunt, nec nisi in tutiorum medicamentorum inopia & casu aliquo desperato exhibenda sunt, idque magna consideratione. *Rains.*

Officin. Nat. ex Mezereô.

Cortex, Folia & Grana.

Vires. Mezerei est ignea, acerrima, exulcerans, mordens, febres accendens, cordis principumque partium vires exsolvens, validissimè bilem, biliosasque serosis.

Jerositates purgans. Corrigitur macerando hor. 24. in aceto (ut elleborus ac Esula) succo mali punici aut Cydonii, portulaca, mucilag. sem. psyllii.

N. Alii corrigunt infundendo in vino, & iterum exsiccando. Alii triiduanam macerationem in acet. requirunt, singulis diebus novum acet. affundendo, & tandem aqua bene eluendo.

Dosis Fol. ac Cortic. Mezerei optimè præparatorum & correctorum (sine correctione exulare debent) est gr. viij. ad xv. Grana à gr. vj. ad xv.

N. 1. Rejiciantur fibra, dum teritur.

N. 2. Ob malignitatem rarissimè in usum venit.

Præparata.

Pilula de Mezereo. Videtis apud Augustan.

N. Est & Mezereum Chamelæa Tricoccòs, C.B.I. Chamelæa foliis magnis & tenuibus, Mesfæo, Chamelæa latif. vel alba, Serapioni. Chamelæa, Matthiol. Dod. Cord. in D. Bellon. Lon. Clus. Tricoccòs, Lob. Cast. Mezereum Arabum, Lob. Tricoccòs, Tab. Chamelæa vera, Cam. Germ. Seidelbaff. Great Leaved Chamelæa, or humble Olive. Zeebass. Verùm officinis nostratibus non adeo vulgare, quamvis sint, qui pro Mezereo officinarum habeant. Schröderus.

Cum Mezereo, utpote valdè drastico Pharmaco, Nobis hic etiam nihil est commercii, sed D. Lectorem remittimus ad D. A. scilicet Schröderum. Hofmannus.

MIL I U M.

Milium Græcis κέχυρος ut Varroni placet à Græco derivatum est, nam illud prius μίλιον, post μέδιον dicebatur seu μέδιον communi cum panico nomenclaturâ. Verum probat Vossius μέλιλον vocem apud Dioscoridem, Galenum aliisque veteres pro panico duntaxat accipi. Probabilior ergo quibuldam videtur Festi opinio, milium dictum à copia seminum, quasi millesimum ferat granum.

Milium autem effusâ jubâ, granis minoribus subrotundis lucidis ab aliis frumentis paniculatis distinguitur.

Vires & usus. Milium refrigerare & siccare veteres & recentiores consentiunt. Mali succi est, difficulter concoquitur, alvum cohibet & flatu generat. Attamen hoc multis gentibus in cibis gratissimum fuisse, & hodie quoque esse, inter omnes constat. Meliorum frugum inopiâ in panificia olim cogebatur, uti testantur Galenus, Plinius, Dioscorides alique è veteribus apud Italos (inquit G. Bauhinus) vidimus frequenter panes ex milio confici, qui flavent, quique calidi devorati sua dulcedine placent, & à multis, etiam non urgente necessitate, expetuntur; eum verò panis ex milio obduruisset planè nigritus est. Ex farina quoque ejus & lacte Itali lagana & placentas parant; quæ nisi mox cum coctâ fuerint edantur, in mandendo glutinosæ & ingratae sunt. Pultem candidam ex milio olim factam fuisse testatur Plinius. Sarmatarum quoque gentes hac maxime pulte aluntur, & cruda etiam farinâ equino lacte vel sanguine è cruris venis, admixto. Hæc plus etiam Germanis hodie in usu est, cum lacte cocta, butyro addito, & saccharo plerumque asperso: Hujusmodi etiam pulles in Angliam pridem introductæ & in usum receptæ sunt.

Cæterum milii farinæ olim usus fuit in fomentis ad tormina, capitis quoque & nervorum dolores. Foris impositum fuit in sacculis; nam in cataplasmatibus ob friabilitatem difficilis ejus usus est. Qui plura de ejus facultatibus & usibus desiderat C. Bauhini Theatrum Botan. & J. E. historiam adeat.

Si membrana cerebri fuerit vulnerata, egregiè ipsam conglutinat (inquit Archigenes) calaminthæ

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

succus infusus, & farina milii arida inspersa.

Ad sudorem provocandum, R. decoct. milii cum pasulis & ficibus. Nobile sudorificum & diureticum vocat Otho Heurnius vel R. decoct. milii ad crepaturam coct. ℥iv. vini albi ℥ij. exhibe calidè ægrotanti. Vocatur Syrupus S. Ambrosii, Chesneati.

MILIUM ARUNDINACEUM.

Nomina. Milium arundinaceum, multis lachrymæ Jobi I. B. Lachryma Jobi Ger. Park. Lithospermum arundinaceum.

J. B. Culmis donata est cubitum unum aut alterum altis, geniculatis folia autem habet turcici frumenti, cubito subinde longiora uncias duas lata, quibus minora sunt illa quæ in ramis nascuntur, ex quorum alis petioli emicant, quibus transfadiguntur singulis grana ut plurimum singula, rarius bina, lævoris politissimi, nitida; ante maturitatem flavescentia, matura ex nitido rubescentia, duritie lapidea, Ciceræ quantia, superiore parte turbinata; unde exit inanum glumarum spica mutica.

In hortis colitur. Parkinsonus in Creta insula, Rhodo, Syria aliisque Orientalibus Regionibus sponte provenire ait. In Anglia & frigidioribus semine ægrè maturat.

Semine maturo & aqua ferventi intincto globulos parant quibus funiculo trajectis utuntur ad numerandas preces.

Vires. Est etiamnum, si expertus hæc scribit Lobelius, ad calculum renum & vesicæ saburram pollinis & decocto præsidium vulgatum.

MILIUM ARUNDINACEUM

Aliud.

Nomina. Milium Arundinaceum Semine plano & albo C. B. Sorghi album, milium Indicum, Dora J. B.

C. B. Hoc radices fibrosas & duras habet, terram à summo petentes eique infixas, quo plantæ moles firmius contra ventorum impetum firmetur: Quare quindenis diebus singulas radices è geniculis profert, è terræ proximioribus incipiendo gradatim sursum ad quartum tendens: Culmis Mayzio vel potius Cannæ Saccharinæ similibus. (Qui sex vel octo cubitorum) medulla alba, dulci, Arundinum Sacchariferarum modo, farctis: quorum summitatè panicula speciosa, Milio prædicto major alba, semipedalis longitudinis insidet: ex qua post flores delapsos è filamentis capillaceis exiguis & rigidis grana dependent, folliculo albo inclusa, candidissima, lentis modo compressa (Orobi magnitudine in Arabia) fractu durissima, nigro puncto, quo spicæ vel petiolo, è quo ægrè divelluntur, hærent.

In Arabia circa Urbem Anam, cum Babyloniam veterem flumine peteret, utrinque ad fluminis ripas agros consitos Rauvvolfius observavit; & quidem solo arenoso, tenui & satis profundo, quod Octobri Mense jam maturum & partim collectum erat. Et Bellonius in Cilicia & Epiro, ubi rustici magnos saccos refertos Coreyram in forum devehunt, Notavit.

Usus. Hæc planta Dora Arabum censetur; quæ sicca est, parum nutrit, & ventrem stringit, grana candidissima farinam panificiis aptam promunt, ex qua ut Rauvvolfius habet, panem bene sapidum cinericeum conficiunt, placentarum forma, circa digitos quatuor transversos latos, sex longos, & duos crassos: & ut Bellonius, molas habent domi, quibus grana conterent, & ex farina massam duram pinunt, quam tenuiter admodum complanant.

E e 2 tam

tam radiis solaribus coquunt: aut veteri Romanorum militum more, qui regulæ ab igne calefactæ, & lapidibus utrinque sustentatæ, massam pistam complanatam imponentes coquebant: eadem ratione rustici panem coquunt; at urbani in clibano. Incolæ ex culmis, eo quò ex cannis Saccharinis modo, masticatis, succum suavem & dulcem eliciunt, qui in his magis in superiore parte, in saccharinis autem in inferiore continetur. Corcyræ insulæ incolæ hoc columbas alunt: in Cilicia ob lignorum penuriam ferunt, cuius calamos pollicari crassitudine incolæ diligenter colligunt, & ex illis ignem servant. *Rains.*

MILIUM SOLIS.

Lithospermum à lapidea feminis duritie nomen accepit, Milium solis officinis dicitur, licet fortasse rectius Mauritanorum imitatione milium Soler vocaretur, quandoquidem (ut scribit Serapio) frequens nascitur in montibus Soler: milium autem dicitur à feminis similitudine, quod & splendore & duritia cum semine milii convenit. Nostratibus corrupte dicitur pro milio griseo.

Notæ ejus sunt semen lapideum, splendens, flos in quinque segmenta expansus.

Vires. Semen Lithospermi renes absterget, urinam ciet, calculum insigniter comminuit & expellit, Aurore Dioscoride, at qua id qualitate præstat? Diuretica, docente Galeno, eoque calida & sicca esse convenit, ut liquare & fundere sanguinem possint: Lithospermi semen nec acre est, nec amarum nec ullius alterius qualitatibus particeps quæ calorem indicet. Oportet ergo ut specifica ut vocant proprietate calculum comminuat. Nullus autem hic à nimia dosi metus, cum nulla hic insignis qualitas sit.

An autem frangere lapidem jam concretum, quod quidam promittunt, equidem valde nescio, (inquit C. Hofmannus) & J. Bauhinus, ego quidem non existimo, neque hoc semen nec ullum aliud remedium calculos frangere. Pituitam & crassos humores, arenulas aut calculos glutinantes dissolvi & pelli posse medicamentis idoneis, fortè, etiam hoc semine, concedo.

Matthioli 3ij. magno (ut ait) successu dat in lacte muliebri parturientibus. *Rains.*

MILLEFOLIUM.

Millefolium, Græcis *μυρίοφυλλον* & *κίλιον* à multitudine foliorum, Achillea, *Ἀχιλλέα*, ab Achille primo ejus inventore dicta est, Plin. lib. 25. cap. 5. invenit & Achilles Discipulus Chironis quæ vulneribus mederetur, quæ ob id Achillea vocatur, hac sanasse Telephum dicitur.

Hujus Characteristicam facimus flores in umbellæ formam dispositos, barbulis medio disco concoloribus, folia tenuissime dissecta.

Nomina. Millefolium vulgare Park. Vulgare album C. B. terrestre vulgare Ger. M. Stratiotes pennatum I. B.

I. B. Ubique viarum obvium est millefolium; caulibus dodrantalibus cubitalibus, & altioribus surgens, rigidis licet tenuibus, teretibus, striatis, hirtutis, medullâ farctis, qui circa summitatem in aliquot furculos dividuntur, atque hi rursus in plures petiolos qui flores in umbella ferunt odoratos, parvos, colore albos aut subpurpureos, quinque, septem, paucioribus aut pluribus foliis constantes ex caliculo squamato. Cæterum discus floris medius è plurimis flosculis albis in quinque acuta segmenta partitis componitur: folia margi-

nalìa, quæ discum in circulum ambiunt frontata sunt, fronte duplici crena in duos denticulos divisa, folia pinnata ad costam alligantur, tenuibus chamæmeli divisuris, sed compositioribus rigidiusculis, suave olentibus, sapore acrisculo radix lignosa & fibrosa nigricat & in terra se diffundit.

Folia in toto hoc genere (corymbosarum) quantum memini, singulatim caulibus adnascuntur.

Millefolium vulgare purpureum minus C. B. & aliorum, cum solo floris colore à precedente differat, diversa species censenda non est, Variat enim hoc modo millefolium vulg. floris colore in pascuis ubique.

Vires. Hujus vires Schroderus sic breviter recenset. Vis ejus ad sanguinem sistendum. Usu itaque interno convenit in hæmorrhagiis & fluxionibus omnis generis, narium, uteri, alvi, vulnerum, scœatu sanguinolento, vomitu, urina retenta, calculo, mictione sanguinolenta, gonorrhœa, hæmorrhoidibus, fluore uterino, mariscis &c. extrinsecus adhibetur utiliter cephalalgia, hæmorrhagiæ narium & vulnerum, vulneribus consolidandis, tumoribus hæmorrhoidum, herniæ, ictibus venenatis, tumori penis &c.

*Recentior observatio (inquit C. Hofmannus) docuit millium nostrum tantum abesse à facultate hæmorrhagias sistendi ut etiam ciet, (at I. Bauhinus quod millefolio sanguis è naribus irritetur ex affricu contingere arbitratur) tam etiam vehemens esse diureticum, ut diuturniore usu cruentas urinas pariat. Hofmannus ergo distinguit & millefolium quod acerbum est vim illam glutinandi obtinere putat; quod amarum deobstruendi & dissolvendi, urinas educendi, lumbricos necandi &c. acrimonia & amaror sunt manifesta in millefolio minore Cordi, itemque nobili Tragi.

Verum quacunque tandem qualitate id efficiat, multa exempla hæmorrhoidum curata decoctionibus millefolii adducit Riverius in observ. Centuriis & multi alii scriptores, ut nos monuit D. Tancredus Robinsonus. *Rains.*

MILLEPEDES.

Millipes, *Asellus* (à colore Asinino) *ὄνικος* Galeni, *ὄνος* Dioscorid. *τίλος* Plinii, *νύκτος* etiam (seu à forma fabæ cui similis est dum se in globum contrahit: seu quòd è fabarum folliculis & culmis prodire soleat) Latinis *Millipes*, *Multipes*, *Centipes*, *Poycellio*. Bestiola est è vermibus terræ, subcinerei coloris, multis pedibus arcuatim repens: ad contactum se in orbem vertit. Tenuium est partium, digerit, extenuat, abstergit, aperit. Ex vinò potus calculo renum, urinae difficultati & regio morbo medetur. Cum melle anginis utiliter illinitur. Tritus & in cortice mali Punici calefactus, doloribus aurium, additò rosaceo, convenienter instillatur. Panno lineo involutus in vino albo maceratur: colatura potui datur asthmaticis; dictu mirum quàm cità saturatos pulmones depleat. *Schruvenfeld.* Ferè eadem etiam tradit *Dioscorides*. *Charleton.*

MILVUS.

Pondus ei 44. unciarum. Longitudo à summo rostro ad extremam caudam 28. digitorum, alæ extensæ 64. digitos æquabant. Rostrum ab apice ad angulos oris, duorum erat. digitorum. Uncus ipse ad digiti semissem propendebat.

Caput & mentum ex albo cinerea, lineis secundum plumarum scapos descendentibus nigris. Collum rufum, mediis plumarum nigris. Dorsum fuscum ut in Buteonibus pennæ tamen caudæ proximæ eidem concolores, mediis seu scapis nigris. Minores ordines alas vestien-

stentium ruffo, nigro & albo varii, nigro semper medias pennas secundum scapos occupante. Scapulares longiores lineas nigras ut remiges obtinent. Alas subtrus tegentes rubræ sunt mediis nigris. Pronæ partis plumæ sub mento primum cinerascunt marginibus, deinde rubescunt, mediis nigris, nigra autem pars continue angustior fit ad caudam usque: sub cauda tantum scapi nigricant: color quoque ruffus dilutior est.

Remiges alarum pennæ 24. è quibus extimæ quinque nigræ proximè sex è nigro cinereæ, dein omnes iterum nigricant ad ultimas, quæ ruffo, albo, fusco variantur. Præter 5. vel 6. exteriores, omnes limbis seu pinnulis exterioribus lineas nigras transversas obtinent, arcis intermediis albeantibus, præcipue à sexta ad undecimam. Priores secundi ordinis pennarum Alæ nigræ ut & alia notha, Alæ complicatæ mediis caudæ pennis longiores, extimis breviores.

Cauda forcipata mediis pennis 11. digitos longis, extimis 14. color spadiceus seu ruffus. Pennæ extremæ nigricant, omnes autem (exceptis mediis) Limbis interioribus lineas transversas nigras obtinent, Apices omnium albeant. Rostrum nigrum vis ulla habet Appendices. Lingua lata, crassa, ut in aliis carnivoris. Palato cavitas inest linguæ æqualis. Rictus & cutis narium flava, fissura seu rima in Palato duplex. Oculi grandes, iridibus ex albo pulchre flavis, pedes lutei. Digitus extimus medio ad medium fere membrana adnectitur. Ungues nigri. Postici unguis maximus. Medii unguis ex parte interiore in aciem tenuatur.

Cystis fellea magnâ ingluvijs quoque grandis. Intestinum infra appendices multum dilatatur, ut in aliis hujus generis.

Alis expansis in aere se librat, adeò ut in eodem loco diu velut immobilis quiescat: quin nulla vel rara Alarum agitatione de loco in locum provehitur velut fluxu aut lapsu quodam.

Vel caudæ figurâ sola ab omnibus aliis quas hæcenus novimus rapacibus distinguitur.

Videntur (inquit Plinius) hoc genus aves artem gubernandi navem homines docuisse caudæ flexibus, in cælo monstrante natura quid opus esset in profundo, hinc enim (ut pergit Aldrovandus) Clavum immittere homines didicisse est probabile, quippe cum observassent Milvum cauda modo hac, modo illa flexa remonis vice uti, qua iter suum in aere dirigeret: ipsi quoque simile quid moliri, clavum navi addiderunt, quem huc illuc contorquendo navem per undas minime incerto itinere fluctuantem quo vellent recto cursu impelleret.

Milvi aves sunt migratoriæ, quæ pro anni tempestatibus loca mutant, cum aliquando (inquit Bellonius) in litore Ponti Euxini, ea parte qua Thracia est, verissemur, ultimo fere Aprili, in colle quodam eminentissimo, columnæ illi quæ ad ostium Bosphori est proximo, ubi recte tenderet auceps capiendis nifis, qui à dextra maris plaga advolabant, observavimus Milvos gregatim eò adventantes, recto tractu, frequentè adeò numero ac denso agmine, ut miraculi loco nobis ea res esset, nam novitate spectaculi velut attoniti, animo concipere nequibamus, ubinam locorum tanta Milvorum copia victum sibi esset paratura. Si enim quindecim dierum durante spatio, singulis diebus numeroso adeò phalange, atque tunc temporis visi sunt prætervolassent, ausim asserere numerum viventium hominum superaturos fuisse. Verum apud nos in Anglia omni anni tempore conspiciuntur nec hyemes nostras, ut videtur reformidant.

Plinius Milvos non alio cibo quam carnibus vesci scribit: verum Bellonius in Ægypti urbe Cayro Milvos sibi visos in palmas devolasse & dactylos comedisse asserit. Hoc autem eos fame compulso ob defectum familiaris alimenti fecisse minime dubium est.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

insidiatur avibus domesticis maximèque pullis gallinaceis, anatinis & anserinis, inter quos è sublimi speculatus quempiam, qui extra securitatem prodierit, aut incautius à cæteris se dixiunxerit, aut alia quavis ratione rapinæ opportunus fuerit, sibi eligit, atque aliquandiu in gyrum circumvolitans observat. Deinde ex improvviso dicto citius devolans incogitantem abripit, frustra conquerente matre & hominibus tam clamoribus quam lapidibus eum territantibus. Imo, quæ est audaciâ, domos, urbes locaque hominibus frequentata affectare ubi rapiat evidenter conspicitur. Adeò ut ab illius rapinis ne domorum quidem atria areæve securæ sunt. Atque hac de causa mulierculis nostris maxime invisus & odiosus est.

Græcis *ἰκνίος* & *ἰκνίος* & frequentius *ἰκνίος* dicitur Willughbejus.

Officin. Nat. ex Milvo.

1. *Milvus incineratus*. 2. *Caput*. 3. *Epar*. 4. *Sanguis*. 5. *Fel*. 6. *Stercus*. 7. *Pinguedo*.

1. *Milvus incineratus* Podagræ, Epilepsiæque subvenire dicitur, (*exhibitus*.)

Dosis ℥ss. ad ℥j.

2. Idem de capite affirmant, ac *Epate incineratis*.

3. *Epar* insuper oculorum Medicamentis adhibetur.

4. *Sanguis* podagricos juvat, (*cum Urtica mixtus & impositus*.)

5. *Fel* Oculariis additur.

6. *Stercus*, articulis cum successu imponitur.

7. *Pinguedo*, articulorum doloribus illinitur.

Preparata.

Sunt qui Milvum vivum in F. Eq. 40. & macerandum sepeliunt, & ex vermibus, qui ex eo procreantur, unguentum ad dolores podagricos conficiunt. Aldrovand. Schröderus.

In hujus carne exsiccata, capite, epate, & cruore, specificum latet anti-arthriticum. Hofmannus.

MINERÆ & FODINÆ, vid. de his sub titulo *Metallurgia*.

MINERALIA.

Sub eò titulò comprehenduntur ea omnia quæ in *Mineris* seu *fodinis* efformantur tam scilicet *Metalla* perfecta, quam imperfecta.

MINIUM, vid. sub titulò *Plumbum*.

MINORATIVA, vid. *Purgantia*.

MISTIO, vid. *Mixtio*.

MISTURA MEDICAMENTUM, vid. *Mixtura*.

MISY.

Misy secundum *Dioscoridem* Chalcitidis species est, seu materia mineralis, vitriolica, dura, splens, coloris aurei, quæ olim reperiebatur in fodinis cupreis Cypri insulæ. Verum hodie nescitur qualis demum sit hæc materia, atque in ejus absentia substituitur vitriolum rubrum naturale, quod Chalcitis nominatur, quodque iisdem gaudet qualitatibus quæ olim *Misy* assignabantur.

MITHRIDATIUM, vid. *Electuarium*.

MIVA, vid. *Gelatina*.

Hic tantum aliquot *Mivarum* compositiones ex Pharm. Bateana.

Miva Borraginis.

Coque radic. Borraginis ad mollitiem, contus. trajice per setas. cujus. ℥. ℥j. sacch. optimi tantundem, coque ad Miva consistentiam s. a.

Ec 3

Miva

Miva Consolidæ.

Fit ex pulp. radic. & sacch. aa ut supra, addendo singulis libris nuc. mosch. ʒvj. Usus in Hæmoptysi, Rupturis &c.

Miva Dialthææ.

Fit ex pulp. radic. & sacch. ut supra, addendo singulis libris nucis mosch. ʒj.

Miva Satyrii.

Fit omnino ut supra cum nuce moschatâ additâ. Venerem stimulat, &c.

MIXTURA MEDICAMENTUM.

Mixtura vocem obtrudit imò civitate donat necessitas, designatque ea Medicamentum Chymicum variis constans ingredientibus, mediæ inter liquida & solida naturæ.

*Mixtura duæ PHAR. BATEANA.**Mixtura Anticolica.*

ʒ. Mann. optim. ʒij. cremor. tart. sperm. ceti a. ʒij. m. Detur in haustu jusculi pulli. Remed. probatiss.

Mixtura Tubularis.

ʒ. Cortic. extern. pistach. ʒij. fol. tussilag. betonic. rorisnar. succ. aa ʒij. incidantur & adde Xylagii ppti ʒij. succin. alb. olibani crasse confusi aa ʒij. gummi lentisc. ʒj. ol. still. nucis mosch. ʒij. M. F. Mixtura instar Nicotianæ haurienda:

Vel.

ʒ. Fol. beton. tussilag. aa ʒij. Anthus, cortic. pistach. extern. aa ʒj. sem. cardamom. min. ʒij. incid. f. a. adde olei anisi gtt. xvj. ol. cinnam. gtt. viij. M. aliqui addunt Nicotianæ optimæ pptæ ʒj. Utilis est præcipue in catarrhis exsiccandis, defluxionibus sistendis, tussi &c.

*Mixtura varia ex ROLFINCII Chymia in Artem redactâ.**Mistura Diaphoretica simplex.*

Celebris est ea, quam, sub titulo ARCANI CADUCI, describit Paracelsus libro de rebus naturalibus cap. 8. & consuetudine quâdam mistura simplex dicitur, ad differentiam aliarum, quæ hanc agnoscunt basin, & libri hujus nostri 3. sect. 1. art. 2. cap. 29. sunt explicatæ.

ʒ. Spiritus ʒ-l. correcti part. j. sp. ʒri correcti seu a ʒ suo rectif. part. iij. spir. theriacalis camphor. part. v.

VIRES, DOSIS, UTENDI MODUS. vid. sub titulo SPIRITUS, ubi scilicet Auctor hic de Spiritu Tartari.

Compositæ Misturæ, quæ priorem agnoscunt ceu basin, & 1. Antiapoplectica.

ʒ. Mistura ʒ-lata, Tartarificata, theriacalis unc. ij. spirit. C. C. ʒ volatili imprægnati unc. j. lil. convall. sanguin. humani ana ʒij. extract. granor. juniper. rorisnar. salv. beton. serpill. ana unc. j. essent. lavendul. lilior. convall. ana ʒij. sirupi fl. lavend. paon. ana ʒij.

Misce omnia exactè. Stent in digestionem ignis lentissimi, spacio ʒ-l. in cucurbitâ, donec in fundo vasis appareat hypostasis, seu sedimentum spissum crassumve, reliquum verò clarescere incipiat & rubescere, rubini aut vini instar rubri. Purum ab impuro sepatetur per inclinationem. Quod si quid in digestionem exstillaverit per alembicum suprapositum, adde colaturæ, quæ iterum coletur. Colatum servetur in vitro benè claudendo. Vitrum ipsum indatur in capsulam ligneam benè claudendam. S. Mistura antiapoplectica.

Non inconsultum est mista omnia, sine colaturâ servare.

VIRES indicat nomen. DOSIS ʒj. ʒij. ʒij.

MODUS UTENDI in jusculi, vinive cochleari horis matutinis & vespertinis nonâ & quartâ.

Mistura antiepileptica, antidinica, antiparalytica.

ʒ. Mistur. diaphoretica, aliàs simplicis dicta ʒx. spir. cranii humani ʒj. essent. lilior. convall. fl. calend. paonia ana ʒij. salv. ʒ majoran. fol. ana ʒj. ʒ volat. cornu cervi ʒj. sirup. stæchad. cinamomi ana ʒiv. M. suspendatur in nodulo ligneo.

ambra ʒij. moschi ʒj.

In vitro digerantur & serventur benè operata. S. Mistura antiep. din. paral.

VIRES titulus significat.

DOSIS & MODUS UTENDI eadem sunt.

Mistura ophthalmica.

ʒ. Mistura simplicis ʒv. extract. rad. valerian. filv. fenic. ruta, chelidon. major. ana ʒij. essent. fl. euphrag. calendul. cyani cerul. rosar. alb. ana ʒij. sirup. fl. paon. ʒvj.

Mista omnia exactè, digestionem decente prægressâ, serventur in vitro. S. Mistura ophthalmica.

Mistura antiasthmatica.

ʒ. Mistur. simplicis ʒiij. spir. ʒ. campan. ʒi. asthmatici compos. ʒj. extra. enule. ireos fl. aa ʒj. salis sanguin. cervi vol. ʒj. essent. croci roris ʒij. thymi salv. aa ʒij. sirupi de prass. hyssop. viol. veronic. aa ʒj. Mista omnia vel colentur post digestionem, vel simul serventur usui. S. Luffe mistur.

Mistura contra Tussim.

ʒ. Spir. ʒ. campan. Tartar. correcti aa ʒij. theriacalis camphor. ligni sancti rectif. ana ʒij. extract. polypod. q. tussilaginis aa ʒij. tinctura papav. rhæados ʒj. essent. fl. nymph. viol. aa ʒij. sirupi hyssopi, de marub. aa ʒij.

Mista omnia vel colentur, vel simul serventur ad usum. S. ut supra.

Mistura contra Cordis infirmitates

ʒ. Spir. Tartar. correcti ʒ a fæore liberati ʒij. ʒ-l. optimè rectificati ʒij. elixir vite Matthioli ʒij. extract. meliss. scorzonera aa ʒj. conf. alcherm. Eustad. ʒij. ʒ corn. cervi vol. ʒij. sirupi de pomis redolentibus, cort. citri, granat. dulc. borrag. bugloss. violar. aa ʒj. ceras. ʒ caryophyll. hortens. aa ʒij. ambra, moschi, in nodulo susp.

Servetur ad usum cum titulo: Mistura cordialis vitalis.

Mistura stomachalis.

ʒ. Mistura ʒ-l. Tartar. theriac. camphorata ʒij. extr. bacc. junip. acori veri card. bened. pimpinell. zedor. essent. mentha aa ʒij. sirupi mentha ʒiij. cinam. ʒij. Stent in digestionem. Post colaturam, vel sine colaturâ serventur in vitro. S. Magen mistur.

Mistura antisceletrybica.

ʒ. Succ. cochlear. nasturt. aq. sedi semper vivi muralis aa ʒij. extract. absinth. liquidi spir. Tartar. salis rectif. ana ʒij. cochl. cum vino de ʒij. ʒij.

Dige-

Digerantur leni igne per & bene clauso vase. Quod clarum decantetur; reliquum coletur. S. ut suprà.

VIREs. σὺρην, ἡ τὸρῆω, *tumulum scorbuticum* sedat.

DOSIS ℥℥ ℥j. in liquore competente.

Mistura contra calculum.

℥. *mistur. simpl. ℥℥. salis st. p. fab. ℥j. essent. rad. saxi-frag. granulata, albiflora. folior. veronic. virg. aurea aa. ℥iiij. sirupi de alth. Fernelii ℥j.*

Digerantur clauso vase per & Colatura servetur in vitro. S. ut suprà. DOSIS ℥℥ ℥j.

Mistura contra pestem.

℥. *mistura simpl. diaphoret. ℥iiij. essent. gran. junip. vino Malvat. parat. angelic. ruta, scord. meliss. card. bened. gentian. aa. ℥j. croci ℥ij. spir. C. C. cum Θ volat ℥j. ligni sancti. ebeni rect. aa. ℥ij. sirup. a. etof. citri, scordii, card. bened. ceras. & caryoph. scorzonera aa. ℥v.*

Stent in digestionē horarum xxiv. Adserventur in vase, in quo suspendatur nodulus.

ambra ℥℥. moschi ℥j.

Est alexiterium illustre. DATUR ℥ij. iij. in vino ad præservationem, in aquâ scordii ad curationem.

Mistura sudorifica catholica.

℥. *mistur. simplicis Clata, & risata. theriacalis camphorata ℥j. spir. ligni sancti acidi ℥℥. querni acidi rectif. ℥vj. corylini ℥℥. sirup. card. bened. scordii, acetosif. citri perlati a. ℥j.*

Mistura varia è Collectione BIERLINGII.

Mistura antihypochondriaco-scorbutica D. Finckii.

℥. *Spir. cochlear. ℥j. & r. rectif. ℥iiij. Cl. rectif. ℥iij. Tinct. cit. ℥j. Santal. rubr. q. s.*

Digere & fiat Mistura. Dosis 30 gutt.

Mistura antipilepticalis.

℥. *Mistur. simplic. El. x proprietat. Tinct. cit. a. ℥j. M. & digere per 10. & & P, quod clarum effunde per inclinationem. Dosis à ℥j. ad ℥℥. cum gutt. 3. spir. **

Mistura antihypochondriaco-scorbutica D. Michælis.

℥. *Spir. herb. cochlear. super, recentem herbam cochlearia s. rectificati ℥ix. Spir. Cl. cit. rectif. ℥iiij. & r. rectif. ℥vj.*

M. & rectifica per retort. Δ. aperto. Usus est insignis in affectu hypochondriaco cum scorbutico conjuncto & obstructionibus hypochondriorum. Dos. gutt. 20. ad 25.

Mistura arthritica in doloribus articulorum vagis à sero scorbutico ortis.

℥. *Essent. lumbr. terrestr. S. acuat. ℥v. sarsaparill. ℥iv. Mistur. antihypoch. scorbut. super. descript. ℥iiij. Spir. flor. sambuc. ℥j.*

M. Dos. gutt. 30. ad 40. movet sudorem. Ex literis D. Sachsi.

Mistura odontalgica.

℥. *Cort. rad. hyoscyam. mandrag. a. ℥iiij. pyrethr. ℥℥. althea ℥℥. Rasur. lign. guajac. buxi a. ℥vj. Caricar. pingvium. Capit. papav. alb. a. n. iij. Mastich. ℥j. Flor. balaust. rosar. rubr. a. pij. melior. malv. a. M℥. Fol. serpill. salv. a. pij. C. C. raspat. ℥vj. Coq. in s. q. aqua simplic. Colatur.*

& ℥j. adde mellis anthos. tyr. de papav. a. ℥j. laud. opiat. gr. i. M.

Mistura Bozardica Angeli Salæ.

℥. *Spir. Tartar. Ag. vite juniper. a. ℥iij. Theriac. Andromach. opt. ℥iiij. Camphor. ℥℥. & o. rad. carlin. petasit. angelic. a. ℥℥.*

Camphoram primò cum oleis dissolve, additâ theriacâ in mortario probè misce, & in massam, satis magnam redige, postea supra præscriptos spiritus

masa superaffunde, vas optimè claude moderato calore per octo dies digere, & per MB. liquorem ad theriacâ siccitatem distilla; distillato liquori spiritus nitri correcti ℥℥. immisce; cum croci optimi ℥℥. liquorem tinge, & in vase probè clauso ad usum serva. Observandum autem est quod si parva olei quantitas liquori supernatet, id non sit separandum; sed potius relinquendum, & usus tempore cum liquore miscendum. Per spiritum nitri correctum intelligitur ille qui ex nitro cum bolo armenâ in pastam redactò distillatur, quique additâ æquali spiritus vini creticæ vel Hispanici quantitate, rectificatur. Est alexiterium summum cujus dosis à ℥j. usque ad ℥j. in aquâ appropriatâ.

Mistura contra calculum D. Kolbii.

℥. *Extract. lychnotript. ℥j. virg. aur. ℥℥. Cremor. & r. ℥℥. Sacchar. alb. ℥iv. & o. stillat. foenic. gutt. xvj. anis. gutt. viiij. menth. gutt. vj. M.*

MOLVCCA.

Peregrina est herba Asiaticæ originis, Constanti-nopoli primum delata; Calycibus florum ampl. simis, patulis, acetabulorum æmulis, ab aliis omnibus verticillatis prima facie cum floret facile discernitur.

Nomina. Moluca I. B. melissa molucca lævis Ger. molucca lævis, five Syriaca lævis Park. melissa molucana odorata C. B.

I. B. Caulem habet rectum, sesquicubitalem vel majorem, glabrum, subrubentem, fere quadratum, satis robustum, paucâ medulla factum, in ramos multos satis diffusum, eosque binos oppositos: folia sub-totunda, per ambitum serrata (idque profunde) longis pediculis appensa, foliis marrubii nigri similia, verum non ita nigra, plane glabra nervosa in caule ramisque à medio ad summum usque ex intervallis calices magni, patuli, calathoides, eutanei, nervosi, senî verticillatim digesti flosculos comprehendunt galeopseos, ex albo purpurascētes; galeo hirsuta, apicibus in medio, tandem seminibus succedentibus triangulis. Cæterum unicuique verticillo folia bina adherent, longo interveniente pediculo, inferioribus similia, ad pediculorum ipsius exortum spinulæ aliquot longiusculæ profiliunt. Radix lignosa est & fibrosa, annua est herba, cui folia amara, flos fere insipidus. hujus plantæ odor mihi gratus. Raius.

Eadem dicunt habere vires quas Melissa vulgaris, & propterea illam in cordis affectibus ac uteri morbis adhibent. Falix Passera.

MOLYBDÆNA, vid. Plumbago.

MOMORDICA, vid. Balsamina.

MONOCEROS.

De Monocerote, seu Unicorni vero; Animalis scilicet quale apud veteres depingitur, an revera extiterit, & adhuc dum in rerum natura subsistat, non parva est inter Neotericos controversia: Dum maxima eorum pars illud non minus fictitium volunt quàm Sphyn-ges, Geyphos atque Chimæras, alii verò constanter affirmant tale animal & repertum esse & reperiri. Nos, (ut in re litigiosa, quid sentiamus verbo dicamus) omnino credimus non ita derogandum esse fidei virorum proborum & non ignoti nominis qui ejusmodi animal se vidisse asserunt, ut cum Doctorum aliorum multitudine nullibi inveniri pronunciemus. Ast audiamus quid utrinque à negantibus & affirmantibus adducatur, & propterea non incongruam arbitretur hic Clariss. Viri Cornetii STALPARTII Dissertatiunculam in hoc argumento conscriptam exhibere cui iterum pauca quædam nos subjungemus.

Sic itaque STALPARTIUS de Monocerote.

Nostræ hujus de Unicornu disquisitionis initium constituat pars quædam literarum, quas vir Amplissimus Cornelius Neolandius Bröderodius Fæderati Belgii procerum auctoritate regni Angolensis in Africa Concilii politici quondam Assessor ad honorandum admodum virum Godefridum Syndicum Genevensensem dedit 23. Martii 1643. in ejusdem regni urbe Loandâ S. Pauli scriptas : harum autem partem hunc in modum verti.

Ipse equidem tibi nihil omnino novi de hac Orbis terrarum parte litteris significo, utpote in qua nihil geratur, quod ad tuas pervenire dignum sit aures, præsertim hominis universi theatri Europæi spectacula oculis usurpantis. Flagro, mehercle, atque conficior pene desideratissimæ illius terrarum partis (elapsô præcipue, in quod proceribus obstrictus triennio) amore, in qua vel otiosus mallem existere spectator quam hic locorum inter quoscunque tandem præcipuus. Contigit mihi, fatebor equidem hisce in regionibus cum regibus, principibusque unâ esse, & veras audire & reddere voces, à quibus honoribus affectus, nec sine reverentiæ testimoniis dilectus sum; neque etiam inter nostros potentia, auctoritatisque mihi quidquam deest. Verum enim verò non isthæc animi delectant, nec juvant tantis terrarum intervallis, mariumque immensis fluctibus ab optimis divisum amicis, quibus, quas debeo, dignas grates persolvere non datur.

Cæli partis, sub quâ hic vivitur, insolitis noxia admodum est qualitas: pauci enim sunt, qui mortem, vel gravissimum ad minimum effugiant morbum. Servavit me in hunc usque diem laudanda Dei benignitas, quem mihi usque mansuetum precor, speroque; si vero aliter quidem de me statuerit, fiat, quicquid voluerit.

Sua quidem sponte harum regionum sterilis est tellus, nullosque, vel oppido paucos producit fructus; fluviorum autem ripis non desunt mali Aurantia, citreæque, nec aliæ in Brasilia, Europaque, notiores herbæ, sed magno constat harum cultus, propter immensam servorum, quos hic requirit, multitudinem. Ovium etiam, boumque, ac porcorum, aprorumque nobis abunde est: copiosè etiam admodum cervi, cervæque, ut & rupicaprae reperiuntur, & ferinam præstantes carnem phasiani, perdicesque, palumbes, ac coturnices, necnon galli, gallinæque variegati coloris, longè aliis autem, quam quales in patriâ meâ vidi, reguntur plumis, palatoque longè sunt amæniores. Adhuc & anseres feri, anatæque, ac querquedula cum ficedulis, aliisque, quas ignoratis, natantibus Avibus. Feræ Bestiæ quoque hic dantur plurimæ, Elephanti videlicet, leonesque, ac Tigres, lupi & bubali, omnes profecto feræ admodum. In aquis autem Crocodili, ut & Hippopotami, ac sirenes degunt, in terris longius ab Oceano recedentibus Rhinoceros etiam Zebraque apparent, quæ omnia animalia cursus celeritate superant. Invenitur & unicornu Afris *bembe*, ac *pocabembe* dictum: hujusmodi animalis cornu servo, longe ab his, quæ in Europa hoc circumferuntur nomine, diversum, mihi certè quam compertissimum est hic, licet rarius, veram reperiiri monocerotem.

Hujusmodi aurem cornu nullum unquam experimentum feci, affirmantibus licet unanimiter Afris, præstantissimum id contra quævis venena antidotum, quandoquidem Bezoardico plus fido lapidi, qualem instar gallinacei ovi domi meæ habeo: hunc namque crebrior mihi magis commendavit usus. Alia rariora paucis hisce in plagis reperire est, ac quod monstri simile, nihil monstri hæc profert Africæ ora, præter

barbaras, ac sanioſe ratione carèntes plurimorum Maurorum animas. Quibus autem maxima insunt humanitatis vestigia, pleniorque judicii facultas, Congenses dicuntur. Dantur ad me quandoque à rege, ejusve fratre *Bamba* duce literæ nonnulla indicia humani habentes ingenii, in cæteris autem non, nisi proborum, vitiorumque videas congeriem, hisce &c.

ANNOTATIONES

Ad hanc Literarum Partem.

Utrum verum, ac tale, qualis meminit S. Scriptura, detur unicornu diu multumque fuit certatum: ad hoc autem ut respondeatur, sciendum duplicis nominis intellectu unicornu scriptoribus usurpari. Hinc enim factum est, ut, neglecta quidem ista distinctione, erraverint plurimi.

Significat itaque generaliori nomine unicornu omne animal cui unum frontem defendit cornu. Hujusmodi autem bestia plures sunt. Quatuor dari animalium genera, quibus uno superbiat frons cornu, Laurentius Catalanus Pharmacopæus Magdalonensis, aliique scribunt.

Primum genus est Avium, quas inter *Dynon* etiam in Æthiopia degentem numerat: ibidem reperi aves, quibus unicum sit cornu, Ælianus auctor est libr. 17. hist. animal. cap. 10. ille autem hoc loco generalius cornu intellexit, ita ut eo nomine etiam frontis quandam protuberantiam comprehendat.

Avibus non quidem cornua, sed excrescentias esse scribit Bartholinus cap. 7. de unicornu pag. mihi 46. Scaliger exercitat. 231. nu. 5. cornutæ aves in insula *Catigan*, quæ in mari pacifico, sive del Zur sita est, nasci scribit, quæ magnitudine gallinis nostratibus pares sint.

Vormius autem cap. 17. fol. mihi 293. per *Catigana* insulæ aves illas intelligit, quas *Topan* Indi, avem Rhinocerotæ alii dicunt. Ipse inter alia Cranium, Cornutumque; hujusmodi avis rostrum servo, quod mihi quidam ex India Asiaticâ redux dono dedit; illud autem maximi rostri intuitu minimum est, neque enim anserino majus est multo. Ipsum quoque ulnæ semiffi fere par est longitudine rostrum: quodque hujus superiori parti annectitur cornu crassum, ac non nihil recurvum, ejusdemque substantiæ, cujus illud, est. Hoc autem cavum, tenue ac molle, ejusdemque fere materiæ, cujus sunt cancri marini conchæ, quartam, & amplius, ulnæ partem æquat longitudine, nec non circuitu.

Deinde etiam pisces inveniuntur cornuti, quos inter animal marinum *uletif*, sive *illetif* nomine est, cujus Joh Renodæus lib. 3. mat. med. cap. 24. nec non Thom. Barthol. de unicornu cap. 14. pag. 92. meminere de aliis etiam piscibus unum fronte gerentibus cornu Olaus, Albertusque scripserunt, quos inter & ille referendus est, cujus mentionem faciunt Clusius lib. 6. exotic. cap. 17. ac Bartholinus fol. 93. ut & marinus canis, quem *haa* hic vocat, epist. med. cent. 1. fol. 373. denique & unicornu æquoreum *narhual* nomine apud eundem de unicornu cap. 15.

Tertiò etiam cornua gerunt locustæ quædam quales Catalanus cum pisce *uletif*, servare se scribit.

Scarabeorum quorundam meminit Vormius, quibus unum ibidem cornu sit. Agit & de his Bartholinus de unicornu cap. 8. fol. 53. qui & exactam in qua conspiciuntur picti, exhibet tabulam; qualem etiam dat Mouſerus de insectis. Albertus magnus quoque, ac Ulyſſes Aldrovandus ad amuſſim insuper de cornutis scripsere serpentibus; de quibus videtis Bartholinum de unicornu, fol. 55. cap. 9. inveniuntur & bicornes, tricornes, multicornesque: à cornibus enim

nomina

nomen accepit Ceraſtes ſerpens perquàm maleficus, & peſtilens. Recenſet & volatilia infecta unicornia Aldrovandus: è quorum genere & bicornia ſunt, quale eſt illud quod cervus volans dicitur. Quia cornua ſimiliter, ut cervi, ramaſa habet.

Quarto quadrupedia quædam animalia ſingula unum fronte gerunt cornu, quæ inter nonnulli & Rhinocerotæ numerant, quamvis revera duo huic ſint cornua.

Inter quadrupedes autem beſtias quibus unum cornu eſt, *Onagri* etiam, ſeu *æſini agreſtres*, reperiuntur, in *Æthiopiz* degentes deſertis, de quibus etiam *Ariſtoteles* 2. hiſtor. animal. cap. 8. & 3. de part. animal. cap. 2. necnon *Ælianus* libr. 4. cap. 25. *Plinius* que libr. 11. cap. 37. & 41. ut & *boves* quidam, *vaccæque* & *bubali*, quorum etiam *Plinius* libr. 8. cap. 2. mentionem facit, quibus unicum, tantum iſtis in regionibus cornu obtrigit, ſicut & *equis* nonnullis in *India*.

Bovis etiam in ſylva *Hercinia* *cervi* figurâ, cujus à media fronte inter aures unum cornu exiſtit excelſius, magisque directum notioribus cornibus, meminit *Julius Cæſar* libr. 6. de bello *Gallico* pag. mihi 246.

Solinus *Polyhiſt.* cap. 65. fol. 194. de *bubus unicornibus* & *tricornibus* reſert.

Aliis autem in regionibus, ac præcipue in *Africa*, *Caprearum* genus quoddam unico cornu notatur, quibus & accenſendi *oryges* de quibus *Bartholinus* dicti tractatus fol. 62. 69. ac 73. legi poteſt: meminerunt tamen & horum *Ariſtot.* 2. de hiſt. animal. cap. 1. ac libr. 3. de partibus cap. 2. necnon *Martialis* libr. 13. epigram. 95. ut & *Juvenalis* *Satyr.* 9. verſ. 140. cornutorum etiam *leporum* Gaſſendus *vita Peireſcii* libr. 2. pag. 96. meminit, qui ex *Norvegia* allati *Lovanii* fuerunt viſi. Denique & verum unicornu eſt, *Indis* *Carcazonus*, *Arabibus* autem, *Perſiſque* ac *Tartaris*, &c. *carcand*, ſive *carcandan*, teſte *Æliano* hiſt. libr. 16. cap. 20. quamquam illi pro locorum, in quibus degit, varietate, diverſa obveniant nomina.

Atque hæc quidem generalius de animalibus quibus unum cornu naſcitur, præmiſſa ſunto.

Strictius autem unicornu certum quoddam deſignat animal *κατ' ἐξοχὴν* ſic dictum, quod unum ei cornu ſit. De illo autem ſolo noſtra eſt inſtituta deſcriptio. Quâ maximè videndum erit, deturne huiusmodi animal alicubi gentium, an ſecus? Verùm quidem hoc unicornu *Ogigi* diluvii tempore interiſſe nihilque de eo reſtare, præter ea, quæ hodieque in *Bohemia* *Mifniaque* necnon ſylva *Hercynia*, ac extremis *Thuringiz* finibus e terra eruuntur cornua, nonnulli acriter contendunt, at illud ebur, cornuve foſſile monocerotis cornu verum dici nequit.

Thom. autem *Brovvnii* *pſudo-doxiz* epidemica, ſeu de vulgierioribus cap. 23. pag. 301. hæc eſſe fragmina lapidis ceratiti ait. Qui vulgo cornu foſſile, cujuſque varia, ac plurimæ in *Germania* è terra ſinu producuntur ſpecies, verique unicornu nomine paſſim venduntur.

Hæc autem fragmina nil niſi duriorum quarundam materierum ſunt petrificationes, ut cornuum, dentium, offium ramorumque arborum, quorum nonnulli adeo non omnino mutantur, ut originis proprietatem, odoremque etiamnum ſervent, uti ille de *fraxinotum*, *juglandumque* fragmentis teſtatur. *Similia* *Deuſingius* diſſertat. De unicornu *J.* 39. pag. 278. quandoque & in *Hollandia*, præſertim paluſtibus locis, ac interdum in æſtuario *Groniogenſi*, ut & *Comitatu* *Meuſenſi*, abique reperta ſuſſe perhibet. Horum etiam meminit *Sennertus* *Epitom. natural. ſcientiz* libr. 5. cap. 4. de lapid. & gemmis fol. mihi 74.

Quam facillime autem ſaxea hæc, ac fictitia cornua à veris diſcerni poſſunt: hæc enim firma admodum, duraque ſunt, ut vix radi, nedum contundi queant, lingueque admota non adhærent, ut illa quæ non dura, ſed veluti calcinata ſunt; offa quidem videntur, cum tamen lapides minerales ſint, quare nullo diſſolvuntur negotio, confundunturque, ac veluti terra ſigillata, lingue adhærent. Uſus autem eorum eſt ad vulnera, & offa fracta conglutinanda, ulceraque ſananda, dicunturque etiam epilepticis & alvi infantum torminibus prodeſſe.

Dictu tamen difficile eſt unicornu iſto periſſe diluvio: neque enim permiſſiſſe videtur immenſa Dei providentia, ut qualecunque tandem eo extingueretur animalium genus, nec revivifceret, ſive ex ſervatis in *Arca* animalibus, ſive aliis quibuſdam modis. Hæc autem de re lege, *ſodes* *Genef.* cap. 6. v. 19. 20. ac cap. 7. v. 2. 3. 9. 15. 16. & certè ſi ejus meminit *Jobus* ſcriptor ſacer, ut mox liquebit, non eſt ſtatuendum, *Spiritum* *S. chimeram* induxiſſe, ſi itaque poſt diluvium fuerit ab illò memorarum, tanquam animal notum, ſaltem formâ, & exiſtens, qui potuit cataclyſmo periſſe: ut jam non in partes voceretur *Ariſtoteles*, qui, ut ſe, rerumque omnium genera conſervet, diligentiffimam ſcribit naturam; ſtauit quippe ea animalia, quæ ſemel producta ab univerſi creatore fuerint, ſemper, quanquam ſera in propagine, ſuperfore.

Dari non tantum animalia unico inſignita cornu, ſed monocerotem per excellentiam vocari, ac à reliquis, quibus unum fronti cornu inhæret, animalibus longe diſſerre, non pauca adſtruunt ſanctioris pagine teſtimonia, ut num 23. v. 22. 24. ibidem 24. v. 8. *Deuteron.* 33. v. 17. *Hiobi* 39. v. 1. ac 9. *Pſalm.* 22. v. 22. *Pſal.* 29. v. 6. *Pſal.* 9. 2. v. 1j. *Eſaiæ* 34. v. 7. qui utique omnes viri *ἑσπερίως* poſt fatale ſcripſerunt diluvium, ac graphicè admodum, opinor, depictum unicornu nobis, non fictitium tamen, etiamnum exhibent.

Animadvertendum inſuper cenſeo illis locis non nominari tantum Monocerotem, ſed & myſticam in eo latere doctrinam quam exponere huius loci non iudico. Certe dubium non eſt, quin hæc illi tacuiſſent, ſi non exiſteret ejuſmodi animal. Unicornu præterea non tantum nominat ſacra pagina, ſed & eruditæ admodum ex ejuſdem natura imagines format, miræque recenſet qualitates, ut, primo prædicatur ejus ferox indoles: *Jobus* quippe cap. 39. v. 12. &c. num tibi ſervire voluit unicornis, aut ad tua præſepia manebit; num tu unicornem ſubjugio ligabis in ſulcis, ut poſt te *liras* occer? Tu ne ei, qui ſit magni roboris, confides, aut laborem tuum committes? an credes fore, ut tibi ſata referat, & in tuam comportet aream?

Hæc autem manifeſtè indicant verba nulla domari arte, nullis contineri vinculis, nec ullis tubactam inſidis manſueſcere monocerotem; cum tamen vel ferociſſimis jugum fuiſſe impoſitum animalibus, ut leonibus, tigribusque &c. ab ipſo mox tempore, quo producti eſſent, arte domitis etiam nuper *Hagienſibus* meis conſtitit.

Secundò, memoratur nobile, præſtantiſſimumque robur: dictum enim cap. 39. v. 14. ita legitur; tu ne ei, qui ſit magni roboris, confides.

Numer. etiam cap. 23. v. 22. ita *Bileamus* de populo *Iſraëlitico*: eduxit illum ex *Ægypto* Deus robore præditus Monocerotio. Confer *numeror.* cap. 24. v. 8.

Tertiò illius indicatur animoſitas, quam non ſine laude *Bileamus* extollit, cum dicit: Deus *Iſraëlem* ex *Ægypto* eduxit, eſt enim ejus robur (aliis altitudo, aut animoſitas) tanquam unicornu adde & *Pſalmum* 29. v. 6. ubi vox *Jehovæ*, inquit *pfalter*, conſrigit cedros *Libani*, & exilire facit quaſi juvencoſ, *Libanum*,

num, & Sirion more pullorum unicornium.

Denique quartò refertur indomita Monocerotis feritas, nemo quippe, teste Jobo cap. 39. v. 12. &c. asperissimum hoc animal domuerit, Ælianus, Plinius, Solinusque, ut & posteriores, nec cicurari, nec vivum capi posse audacter affirmant, teste Bartholino de unicornu fol. 207. cap. 28. atrocissimum, inquit Solinus Polyhistor. cap. 65. fol. 194. Monoceros est animal, quod vivum non venit in hominum potestatem, & interimi quidem potest, capi vero non potest. Sed hisce obitare videntur S. Scripturæ loca genef. 1. v. 28. genef. 9. v. 2. Psal. 8. v. 9. ut & S. Jacobi Epistol. Cathol. cap. 3. v. 7. ubi legitur: omnis natura enim, & volucrum, serpentumque & aquatiliū, humana industria domatur, & domita est.

Verum sciendum est illas bestias revera domari non posse, cum jam diutius in sylvis degerunt iisque assueverunt tandem. Neque enim unquam hujusmodi unicornu domitum fuisse constat. Subigi autem quid vetat unicornium catulos, nec sylvis, nec feritari assuetos? certe poterit arte hisce imponi iugum. Neque aliter accipiendum crediderim B. Jacobum.

Simili plane modo Leones, Tigresque (uti modo diximus) & quicquid ferarum est, b eo tempore, quo modo geniti sunt, humanæ industriæ traditi mansuetiores fiunt multò, ac quamquam feritatem istam, nunquam omnem exuisse videantur, rectè tamen domitos dixeris.

Unicornes autem cum propter asperitatem, ac robur, tum quòd remotis, inaccessisque ut plurimum lateant locis, ab hominibus non domantur.

Ad indolem hujus feræ etiam cornu excellens pertinet, neque enim illius in sacris paginis tantum reperias elogia, ut Deuteron. 33. v. 17. ubi super Josepho ita Moses: primogenitus ejus bos majestate præditus est, & cornibus Monocerotis, quibus populos protinus ad extremum terrarum feriet. Psalmo etiam 92. v. 11. David ait de Messie regno: extolles meum cornu veluti unicornis, verum illud etiam hodieque Medici, imò & Barbari, eorumque locorum incolæ in quibus colunt monocerotes, plurimi faciunt, præstantissimumque adversus quævis venena antidorum credunt.

Verum equidem est in sacro codice *Rem*, seu *Reem* modò *monoceros*, modò *Rhinoceros* verti, utpote quo significetur exaltatus est; unde etiam fit, ut promiscue hæc multi sumant interpretes: passim tamen Hebreorum *Rem*, sive *Reem* Septuaginta, plurimisque hodiernis interpretibus quos enumerat, Sam. Bochartus de animal. S. S. part. 1. pag. 951. unicornis est: ut ex num. cap. 23. v. 22. aliisque locis constat, vulgata autem latina versio ista nomina per Rhinocerotam in Mosis, Jobique Scriptis reddidit, in Psalmis autem, Esaiæque, per monocerotem. D. etiam Hieronymus, nunc hoc, nunc illud intellexit Animal, quod quibusdam S. Scripturæ locis non unicum tantum reperiatur cornu, sed per numeri enallagen, cornua.

Ideoquæ Psal. 22. v. 22. Rhinoceros vertit, pauci tamen, nisi qui eum sequuntur, hanc admittunt versionem. Videatur quoque de Jobi, Davidisque locis Joh. Pierius Hieroglyph. lib. 2. pag. 21. qui modo unicornem, modo naricornem verius legi existimat. notum enim est, Rhinoceroti duo esse cornua, quamquam negantibus nonnullis, illorum autem alterum in ima fronte prope nasum, quo Elephantos aggreditur, iisque ventres perforat, alterum minus prope dorsum est.

Hebræorum verò *Reem* geminum attribui cornu Deuteron. 33. v. 17. adeoque Rhinocerotem designari Hieronymus ait, quòd monoceroti unum tantum sit

cornu. Vide tamen late de eo differentem Sam. Bochartum de animalibus S. Scripturæ part. 1. lib. 3. cap. 27.

Rhinoceroti etiam bina nasci cornua ex Martiale lib. Spectac. Epigram. 22. palam est; qui sic de illo:

*Namque gravem gemino cornu sic extulit ursum
Jactat ut impositas Taurus in astra pilas.*

Quamvis longe aliter exponente Bocharto d. lib. 26. Testatur etiam Pausanias lib. 9. non unum, sed duo Rhinoceroti esse cornua, alterum ingens, ac supra nasum natum, minus alterum, sed validissimum, paulo ad cervicem recedens.

Convenit I. Cæsar Scaliger exercitat. 205. nec non Pierius Hieroglyph. lib. 2. pag. mihi 21.

Acutissimus hujus rei indagator Hieronymus Lusitanus gente, è Soc. Jes. itidem gemino cornu insignem statuit Rhinocerotam, cum Æthiopie descriptione Germanorum linguâ edita (neque enim aliam videre licuit) distinguendum dicat *Unicornu* ab *Abada*, sive *Rhinocrote*; id enim vel ipsa evincere nomina, cum *Monoceros* illud, hoc *Rhinoceros* vocetur animal, quibus utique non unum, idemque significetur. Corporis figura longe etiam hæc differre notat animalia; esse quippe Monoceroti unum, idemque longum, rectumque cornu, quod efficacissimum sit contra venena remedium, Rhinoceroti autem sive *Abada* bina cornua esse, nonnihil recurva, & ea quoque, quamvis non ita promptum, adversus toxica antidorum præstare scribit: differunt præterea multum hæc feræ colore pedum, capitis, pellisque forma &c.

Gualterus Scouterus lib. 3. Itinerarii Indiæ Asiaticæ pag. mihi 124. tradit animal, quod *Abadam* appellant Lusitani vix capi posse vivum, propter vires, imensumque robur, hujus autem cornu non tam longum esse ait, quam quod gerit Monoceros, cui alia plane sit forma: breviora quoque Rhinoceroti crura esse asserit, rostrumque suillo non multum dissimile, sed proportionem habita, acutius paulo cornu ei ex naso assurgere, atque initio crassius, versus superiorem partem multo tenuius evadere, colorisque è fulco viridis, non omnino nigri (ut quidam falso) esse, quod autem cinericeum, albescensve sit, carius longe vendi, idque ipsos plurimi facere ait Indos. Addit & aliud huic animali cornu esse circa primam dorsæ vertebra.

Utrum verò illi, qui unum tantum Rhinoceroti cornu esse contendunt, minus illud cornu non considerant tanquam tale, an verò variæ dentur Rhinocerotum species, quarum hi uno, gemino illi insignes sint cornu, non usque adeò exploratum, quamquam verisimile esse scribat ejusdem generis animalia variis in regionibus forma nonnunquam aliquomodo differre: Hircis quippe diversis in terrarum plagis interdum unum, bina quandoque, imò & tria aliquando esse cornua ita ille pag. 1203.

Varia etiam est cervinorum cornuum, aliorumque animalum pro regionum diversitate, forma.

Dari autem verum, ac κατ' ἐξοχήν sic dictum unicornu plurimorum etiam, doctissimorumque testatur virorum monumenta, quos inter Cresias qui primus teste Plinio lib. 8. cap. 12. de eo scripsit: nec non post hunc Philetas, Ælianus, Plinius, Isidorus, Albertus, alique.

Philetas Scriptor Græcus hoc descripsit animal cap. 30. unicornu, inquit, est animal calcibus, & morsu crudeliter feriens, cui cornu ferissimum media prominet in fronte, non concavum aliorum instar cornuum, nec leve, planumve, aut politum, sed limâ ferreâ asperius, ad modum tamen limacis convexum, & striatum, teloque acutius, eo quod recurvum non sit,

fit, sed directum, nigrumque, excepto mucrone: eadem legas *Æliani* variar. hist. lib. 16. cap. 20. *Plinij* lib. 8. cap. 21. fol. 138. qui omnes hoc animal vivum capi negant. His adde *Solinum Polyhist.* cap. 65. pag. mihi 199. nec non *Gregorium* lib. 31. moral. cap. 13.

Paulus Jovius hist. lib. 18. fol. mihi 872. de *Gogianis* in *Africâ*, Nilique fontibus agens ejusdem Regni incolas affirmare tradit alaros ibidem reperiri dracones, necnon *Monocerotem*, qui sit pulli equini forma, color cinericeus, cervix jubis decora, hircina b. rba, ac cubitale cornu longe efficacissimum contra venena antidotum.

Montanus descript. Americæ cap. 3. de *Novo Belgio* fol. 125. in *Canadæ* oris nonnunquam conspici animalia scribit, quæ equis non omnino sint dissimilia: his autem bifurcas ungulas, ac hirsutas jubas, necnon caudas, quales sunt apris, nigros oculos, & cervinas cervices, singulisque unum media in fronte cornu esse ait, hæc etiam vastissima, ac quàm maximè deserta petere loca, aliudque ab alio ita timeri tradit, ut nec mares cum femellis pascantur nisi coitus tempore, quo feritatem poni, postea vero illa eadem, quàm antea, ferocitatem non quævis tantum animalia sed & sui similia aggredi ait.

Idem pag. 214. in *Insula California*, quæ est Regni *Quiviræ*, feros reperiri equos testatur uno, sed ingenti, frontem insignes cornu, quibus mustelina pellis, cervinumque caput, ac cervix brevior, nec non ab una parte dependentes jubæ, ut & tibie graciles, caprinique sint pedes.

Paulus Venerus lib. 3. cap. 15. de Regno *Basman* in *Java* minore sic habet: *veniuntur apud eos Elephantæ & Unicornes* in magna multitudine, & sunt unicornes paulo minores Elephantæ, pilum habentes bubali, & Elephantæ pedem, habent caput, ut aper, & more porcorum libenter morantur in luto, & aliis immunditiis, in medio frontis, gestant cornu unum grossum, & nigrum; Linguam habent spinosam quæ lædunt homines, & animalia.

Ut autem magis liqueat veram, proprièque dictam *Monocerotem* existere, *Plinium* in partes vocabor hic enim *Lib. 8. Cap. 21.* postquam modo adducto capite de multis, admirandisque egisset animalibus quibus unicum fronti cornu esset, ac tandem feræ ejusdam, *Libero Patri Sacra*, cui nomen *Axi*, mentionem fecisset, *Orse*, inquit, *Indi* simias candentes toto corpore venantur. *Asperrimam* autem feram *Monocerotem* reliquo corpore equo similem, capite cervo, pedibus Elephantæ, cauda apro, mugitu gravi, uno cornu nigro, media fronte cubitorum duum, eminente: hanc feram vivam capi negant. Videretur autem *Plinius* per *Orseos* *Nysæ* *Indiæ* urbis incolas intellexisse. Hæc autem ad *Meri* montis, ubi *Bacchum* à *Nymphis* eductum *Diodorus Siculus* tradit, radicem sita est. Urbem autem ac montem *Deo* isti sacerant *Prisci*, testantibus, præter *Plinium* dicto loco, *Juvenale Satyr. 7. v. 63.* *Lucanoque Pharsal. lib. 8. v. 217.* aliisque. *A Nysæ* autem urbe, cui præerat *Bacchus* forte *Dionysius* dictus est. Quam maxime autem animadvertendum censeo, hisce omnibus, quæ à *Plinio* cum de *Monocero*, tum de urbe *Nysæ*, sacrisque in *Bacchi* honorem ab incolis institutis traduntur, convenire cum monetâ quadam libro miraculoso *Pyræti Ligorij*, excellentiss. *Ferrariæ Ducis Antiquarij* ob eam memoriâ solam religiose asservanda, interâque, cui insculptus est *monoceros* inclinans caput, & Cornu *Cantharo Baccho* sacro immittens cum hac inscriptione *Nysæon*: quo symbolo non tantum religionem in *Bacchum*, sed & venationis laudem quam sibi jure merito, quod tam asperam feram venati essent, deberi credidere, significarunt.

Unde *Baccius* de Unicornu fol. mihi 62. è conjectu-

ris bonis rationibus fundatis colligere se ait, fuisse hunc *Alexandri magni* nummum; quod *Græca* inscriptione, *Nysæon* insigneretur, quæ *Chaldææ* minime, ac multo minus *Latine* sit. Certum quoque est nullum *Græcorum*, aliorumve *Europæorum* præter *Alexandrum* in hos jus habuisse populos. Hic enim victo *Dario Persarum* rege totum nominis sui terrore orientem implevit ita ut prospero successu *Herculis* terminos, qui in urbe *Nysæ* erant, ac *Gangem* transgressus fuerit, *Brachmanesque*, quos hodie *Braminos* *Indi* dicunt, viderit, ille autem *Nysam* urbem, aliosque populos, apud quos, ædis erectis, solennia instituit *Baccho*, *Herculi*que sacra præcipue tutatus est. Ac sicuti summus ille terrarum Rex, quacunque pateret imperium ad insignium victoriarum memoriam passim arcus, aras, pyramidasque, aliaque *Trophæa* erigere solitus erat, quæ *Ptolomæus* in *Riphæis* etiam montibus, ac prope *Caspium* mare, necnon apud *Sogdianos* in *Asia*, *Indiaque* in *Hydaspis* fluminis *Nysam* præterfluentis ripis erecta describit. *Solinusque* cap. 65. ac *Plinius* lib. 6. cap. 8. aras *Alexandri Magni* itinerum terminos in *Hyphasis* ulteriori ripa positas vocant. Ita etiam verisimile sit, *Macedonem* augendæ famæ, gloriæque ergo, quàm tot clarus victoriis longe, lateque extendere cuperet, ejusmodi nummos cudi jussisse, qui qualescunque sint, evidenter, quales animal *Monoceros* sit in *Nysæ* proprie monibus ortum, demonstrant.

Ne quem au em altum scribentium de Unicornu moratur silentium, cum tamen per tot, tantasque terras se diffuderint *Alexandri* arma, ac nomen, sciendum est *Onesicritum Philosophum*, *Historiographumque* (quem & *Medicum* fuisse ac in *Insula Asypalza* natum, nec non in *Diogenis Schola* eruditum *Alexandro* militasse, ejusque originem, laudesque monumentis ad posteros transmississe apud *Strabonem* lib. 15. Legimus, ejusque *Curcius* lib. 10. & *Solinus* cap. 66. mentionem faciunt) memorare apud *Prasios* (gentem *Indiæ* celeberrimam, cujus & *Ælianus* hist. animal. cap. 20. *Pliniusque* lib. 6. cap. 19. meminere) equos unicornes cervinis capitibus reperiri.

Verum jam nunc audire mihi videor dicentes, si, quales modo descripsisti, *Monocero*tes dentur, qui sit, ut tam raro conspiciantur, atque adeo varie de his scriptores loquantur. Hæc autem nihili faciet, quisquis mecum consideraverit *asperrimam* esse feram *monocerotem*, ac in vastis, desertisque degentem locis, montibus videlicet *Africæ* ut plurimum ideoque rarius in hominum prodire conspectum adde, quod & indomitum sit animal, nisi forte capiantur catuli, quales ad *Prasiorum* Regem olim fuisse adductos, *Ælianus* hist. animal. lib. 16. cap. 20. auctor est, quam historiam *Plinius* lib. 8. cap. 21. confirmat: qui festis dein diebus robora ostensuri in arenam producti fuerint.

Accedit, quod hæc fera, si casu quodam grandior in hominum pervenit potestatem, ob aeris alimentique mutationem facillime extinguitur in longinquas abducta terras.

Sunt tamen plurimi, qui vidisse se *Monocerotem* testentur, sic *P. Venerus* lib. 3. cap. 15. in *Tartaria* vidisse se unicornu scribit.

Ludovicus Vartomannus itineris sui *Æthiopici* lib. 1. geminos unicornes *Mechæ* se vidisse asserit. Majorem equino pullo 30. menses nato haud ab similem credit. Prominet in fronte cornu unicum longitudine trium cubitorum, longe natu minor est alter, utpote anniculus, ac equino pullo simillimus. Ejus cornu quaterni palmi longitudinem non excedit. Coloris est id animal equi mustelini, caput cervi instar, collo non oblongo, rarissimæque jubæ ab altera parte solum dependentes. Tibias habet tenues, easdemque graciles

graciles admodum, hinnuli modo. Ungulas anteriorum pedum bifidas habet. Caprinos pedes ferme referentes. Tibiarum posteriorum pars exterior villosa est, pilique plurimi. Sane id animal ferum videtur, verum ferociam nescio quâ comitate condit. Advehi sunt ex Æthiopiâ ab Æthiopum Rege ad Mechæ Sultanum, quem vocant.

Aloysius Cadamustus itinerarii sui cap. 50. itidem conspexisse se unicornu ea in novi (quem vocant) Orbis parte memorat, quæ Indiæ quam maxime propinqua est.

Idem ille, cujus supra memini, pater Hieronymus Lusitanus è soc. Jesu indagator strenuus tradit descriptione Æthiopiæ, quendam etiam è soc. Jesu itineris socium qui aliquo tempore in Æthiopia, sive Presbyteri Joannis (quem vocant) terris degisset, avidum maxime fuisse hujusmodi cornuti animalis habendi: quapropter ad eum adductum fuisse à matre recentem catulum. Hic autem usque adeo laborum impatiens erat, ut paucis post diebus extingueretur. Meminit & idem Lusitani cujusdam Tribuni, qui ipsi narraverit, quomodo cum viginti exercitus militibus in iisdem oris viderit parvæ vallis densa nemore cinctum equum perfectum formâ, pilisque ac colore, cujus unicornu esse dicitur. Dixerat quoque ille equo mediocri animal illud magnitudine par fuisse, coloreque subnigro, ac cauda, ut & jubeis nigris, pilisque brevibus, ac paucis, nec defuisse fronti elegantibus distinctum lineis cornu, cujus quinque circiter spithamas longi color albesceret.

Thom. Bartholinus hist. anat. cent. 2. hist. 61. Franciscus, inquit, Marchio de Magellanes Africanus, nomine Regis sui Guinensis ad Curlandiæ Ducem Legatus Hafniæ 1652. subsistens, in patria sua unicornu reperiri dixit, è genere quadrupedum sæpe à se visum, nec de eo in Africa dubitari. Atque ex ejus relatione se comperisse idem scribit unicornu Afris *Tirè bina*, quod est cornutum animal, dici, velocissimumque ac ferum animal in deserto *Cano* oberrare, unde vivum capi nequeat, sed sagittis figatur; cadaver tamen reperiri, quod à veterum Monocerotem non multum distet, Magellanicus tamen vivum non viderat. Unicornu autem illud, referente ibidem Afro, magnitudine, & forma mediocrem exprimit equum, capite, cruribus, & pedibus pilosis, juba brevi, vixque spithamam longa, cauda equina, nec valde pilosa, cutis omnis glabra, pilisque brevissimis; linea nigra per dorsum cinereum excurrit, à maxilla autem inferiori ad abdomen color candidissimus est. In fronte crinium fasciculus visitur; è cujus medio cornu unicum prodit, cui ille quamvis à fronte separato adhæret. Cornu autem vix tres superat spithamas octo vel novem circiter pollices in basi crassum: nec tamen hoc in gyros instar borealis cornu contortum est, sed exiguas tantum habet incisuras: color ei flavus est circa radicem cavo. Mas solus cornu isto, femina cætera mari simillima sine eo visitur. Reliqua videtis apud Bartholinum d. I.

Vincentius Blanquius cap. 25. fol. 129. itinerarii per totum terrarum Orbem, tradit se in civitate *Canaranensi* quæ est Regni Peguani in India, apud hospitem quendam fuisse commoratum, cui duo monocerotum cornua fuissent, quorum alteri ossis frontis etiam tum adhæssisset pars. Ille virum hoc interrogatum, viventiane vidisset hujusmodi animalia, respondisse narrat, se duo tantum conspexisse quibus parvis admodum nondum essent cornua; alterumque à rege venante fuisse captum, matrem vero nunquam apparuisse quavis quæsitam industriâ; monocerotes enim hominum conspectum fugere, serpentumque majorum vitare dicuntur occursum, utpote qui ipsis quam maxime infestâ noceant.

Memini equidem, ait idem, me illud unicornu in Peguensi regio septo vidisse, cum longe ejus linguam ab aliorum animalium linguis, utpote longam, asperamque differre, caput autem cervino magis, quam equino simile esse animadverti. Pilis etiam ea animalia plurimum discerni tradit. Qui vero monocerotem regunt, alimenta quoque præbent; impuram feram dicunt, suoque delectatamque fatore, nec unquam demittentem cornu in aquas vidisse, cum biberet, dicunt.

Indorum reliqui tam multa, diversa quæ de hac tradunt ferâ, ut, cuinam credendum sit, vix videas.

Braminorum (quos ille vocat) è numero quidam dicebat dictumque jurèjurando confirmabat, se Regi Casubi, cum horum unicornium unum caperetur, adfuisse, illud autem candidum, ac valde annosum, maxillisque eò usque foras prominentibus fuisse, ut cure nudati longo ordine conspicerentur dentes. Memorat etiam ferociter se defendisse, cornuque inter arboris cujusdam ramos avulsi, caputque, ac vincitum regi traditum quinque tantum superfuisse dies: neque enim quidquam cibi sumebat, quod vapulasset inter capiendum post Regis Nepotem vulneratum. Unde indomitam, flectique nesciam esse feram quivis conjiciat. Scribit & Reginas ex illius ossibus armillas, confici jussisse, Regem Casubi, autem sibi retinuisse cornu, ut & se Courbeum quendam itineris socium, cum per quinque menses in aula regia degissent, rogasse, uti cornu illud conspiciendi licentiam peteret, Regem autem allatum cornu Courbeo donasse, qui præstan. issimum, ut munus munere compensaret, horologium Regi dono dederit. Illud autem cornu multum colore tradit Blanquius ab iis diversum fuisse, quæ Mechæ, alibique vidisset, cum id è cinereo albescentis hæc autem subfusci essent coloris. Regem etiam ipsis conjugis suæ armillas ex alia ejusdem cornu parte confectas, ac optime olentes, totiusque capitis ossa à Principe quodam istius Regni in arca conservata ostendisse memorat.

J. H. Seyfrid Medulla memorab. naturæ fol. mihi 593. ex Orthono Guerike tradit anno 1663. Quedelburgi in Saxonia in campo quodam integrum monocerotis skeleton, quâ formâ hujusmodi animalia jacere solent, sed capite elevato, fuisse reperiunt, cujus fronti adhæreret cornu quatuor plus cubitos longum, ad longitudinis proportionem crassum, cornu autem caputque unâ cum aliquot costis, (spina dorsum, atque ossibus reverendæ admodum Principi Abbatissæ ibidem degenti traditum fuisse.

Testes autem hosce oculares inter se, aliosque qui ex aliorum tantum scripsere relatu, ita in describendo cornu discrepare non adeo miremur: ita nonnulli, qui animal id non videre, Cornu istud, Cui diversos admodum colores attribuunt, modo lævem, modo inæqualem, striatumque ajunt, modo negant, alii tres spithamas longum dicunt, quidam etiam quinque, incisusque asserunt nonnihil pedes, refragantibus iterum aliis.

Cornuum autem, pilorumque colorum diversitatis causa haud dubie est ætatis, (ut ex Blanquio adductis liquet) vel etiam regionis differentia.

Ita Candidi reperiuntur corvi, ursique, ac lepores in Islandia, nova Zemblâ regionibusque Arcto vicinis, albos etiam quoque cervos fuisse conspectos Aristoteles libro de coloribus, Pliniusque lib. 8. cap. 32. fol. mihi 142. ac Bochartus de animal. S. Scripturæ pag. 963. tradunt. Albentes etiam nonnunquam reperi fuere Elephantum, quos divinis Pagani affecerunt honoribus. Reliquas vero circumstantias regionum, aerisque, ac alimentorum, opinor, varietas efficit, ut id aliis non tantum animalibus, sed & ipsis contingit hominibus, quibus indoles, moresque pro ætatis, plaga-

plagarumque necnon nutrimenti differentia longe differunt.

Illis autem, qui cum ex relatu, aliorumque, tantum fide scripserint, errarunt, ignoscendum esse reor.

Anne etiam differentium videmus de Rhinocerotis opinionum agmina, qui copiosius multo, sapientiusque reperitur, quam Monoceros, ita ut dixerit *Ælianus* histor. animal. libr. 17. cap. 40. supervacuum fore, si quis Rhinocerotam descripserit, quem tot Græci, Romanique coram aspexerint, optimeque norint, multum tamen plurimarum de eo discrepant monumenta. Ajunt namque *Bontius*, ac *Neoholius* eum coloris esse subcinerei, *Plinius* autem, & *Strabo* in spectaculo à Pompeio Magno instituto, Rhinocerotem subflavi coloris conspectum fuisse memorant.

Testatur *Anderseus* pellem ei esse è nigra caruleam, quidam plicatam eam, squammeam vero nonnulli tergumque scutulatum, ac veluti perpetuo thorace munitum asseverant. Duo huc feræ cornua alii attribuenda, unum tantum alii pertinaciter contendunt. Denique illud modo nigrum, modo cinericeum, albumve, unumque pedem, cubitive partem quartam longum dicunt, minus autem esse varii, duos vere pedes longitudine æquare ab his diversi statuunt.

Considerandum denique reor verum unicorni rarius in hominum potestatem pervenire ac reperiri. Atque hinc quidem contigit, ut tot arte, fallaciaque veritatem imitante conficta, vel aliorum etiam animalium cornua pro veris habita, magnatibusque obtrusa sint, utque tot, tantique viri splendide fabulam Monocerotem, vanumque ejus cornu contra quavis toxica crediderint antidotum quam & hi culpâ qualicumque absolvendi sint, quod miris, nec adeo compertis difficiliter fides habeatur: ut *Horatianum* illud huc transferam.

*Segnius irritant animos demissa per aures
Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus.*

Præsertim cum usu didicissent has isti cornu vires non esse, quod, cum esset alterius animalis, falso monocero is crediderant.

Absit tamen, ut quisquam propter hanc scribentium discrepantiam inane tantum nomen existimet unicorni, quandoquidem enim rarior hæc fera est, solique lateat in locis, atque non ita multis nota sit, non erraverit forassis, qui nonnullos eam pro lubitu, erroneisve narrationibus, picturisque inductos descripsisse dixerit, non inepte enim *Flaccus*.

Ficta voluptatis causâ sunt proxima veris.

Denique quoniam plura sunt uno frontem munita cornu animalia (ut supra notatum) quæ hoc certe, cum sit unicum unicornem excellentiorem referunt, facile contingere potuit, ut errores, nævique in eorum scripta propter multum à se distantiam bestiarum male conjunctas, separatasve qualitates irrepserint.

Quod si quis scire gestiat, qui fiat, ut nec *Hippocrates*, nec *Galenus* Monocerotis meminerint, cum ejus cornu tam præstantissimum dicatur contra quavis venena Antidotum.

Interrogari poterit, quid causæ sit, quod non æque scire desideret cur nullam rhabarbari, aloesve *Hippocrates*, nullam idem fol. Sennæ Alexandrinæ, Camphoræ, spermat. ceti &c. *Galenus* fecerit mentionem, cum tamen eorum illa tempore extiterint.

Certum etiam est nec *Hippocratem*, nec *Galenum*, Dioscoridemve unquam vel fama tantum Ambram

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

Gryseam, lapidemve bezoardicum au. *guaiacum*, vel *falsafra*, *falsamve parillam*, *guttamve gemou*, aut denique *mechoacan*. novisse. Licet autem his Viris egregiis ista minus fuerint nota, ideone eorum temporibus eodem, quo nunc producuntur modo orta fuisse sanus quispiam inficiabitur.

Plurimum insuper rerum, quæ è longinquis ad nos apportantur plagis, vel etiam desertis proveniant in locis, ac minus solitæ, rariioresque sunt, licet formam, aliasque ignoremus circumstantias, optime tamen innotescit usus. Quam variantes etiam de *Rhabbarbo* bene multi opiniones scriptis fecere notasse ignorabatur quænam esset planta, & quibus hæc venisset ab oris. Quam incertæ etiam de castoreo sententiæ sparsæ sunt, quod ex fibri testiculis nonnulli constare hariatati erant: quam ambigue etiam multi ceti semen Ambram *Gryseam* monstrive cujusdam excrementum, vel piscis alicujus hepar, aut avium fragrantibus nutritarum herbis alvinas faeces fluctibus imate ac celsis detrusas rupibus aut denique fungorum marinorum quoddam statuere genus.

Similiter etiam nuper varia admodum, discrepantiaque de succino prolata sunt judicia, aliis illud biuminis quandam speciem, cretamve, resinam aliis ab arboribus quibusdam promanentem, nonnullis autem bestiarum quoddam excrementum clamantibus.

Quam aliena etiam à veritate nuperrime de spermate ceti prodita sunt, ut & ipse *Caspar Hofmannus* de Medicam. Officinal. paralipom. cap. 66. fol. mihi 678. se nescire, quidnam sit, aperte, ac ingenue fateatur. *Schroderus* Pharmacop. med. Chym. lib. 3 cap. 31. fol. 170. inter scriptores de ejus origine non convenire ait, quandoquidem quidam balenæ genituram dicant, sed immerito, ut sentit ipse, quod illud ipsum etiam iis reperiat in locis, quibus nec vola quidem, aut vestigium balenarum sit. Alii salis florem dicunt, cujus meminerint veteres, adeoque sal maximum spumofum vocant. Sed nec hi saniora sentiunt, flos enim salis veterum rubebat, eratque tenuis, aquosusque, ac subsalsus, necnon detergere aptus. Harum autem qualitarum spermati ceti nulla inest.

Hoc autem, quin è ceto proveniat, dubitare non finunt non ita dudum nota argumenta.

Piscis enim quidam à balenarum generibus in litus impulsus *Norfolcensis*, tepertusque à piscatoribus fuit 60. pedes longus, cujus è capite fluentia olei, ac ceti spermatidis profluere, ac à piscatoribus collecta, asservataque sunt diligenter. Aperto autem capite ipsa spermatidis reperta fuit, ut sic dicam, officina, certis conclusi cancellis iusto ordine dispositis, qui anserinis ovis magnitudine pares, laminisque vel adulti hominis caput magnitudine æquantibus obrecti, favorumque forma albentes, atque oleo scatentes essent teste *Brovnio* pseudodoxiæ Epidem. fol. 318.

Hoc autem sperma ceti naturale est, nostrum autem quod passim in Pharmacopoliis prostat, mere factitium & compositum duplicis est generis: alterum è cerebro, alterum quod à balenæ conficitur pinguedine.

Sed nec dum etiam satis constat, cujus arboris sit *agallochum* sive lignum aloës, quibusve crescant *Malabathri* folia uruncis. Illius namque tantum scimus arborem desertis, inaccessis florere in locis, nec nisi hujus frustra tantum conspici, quæ quotannis exundantes *Ganges*, *Indus*que, aliique orientis fluvii trans ripas elcujunt, ac bene olentia accolis colligenda relinquunt. De *Malabathri* foliis autem (quæ tanquam præstantia aromata Theriacæ plerumque admixta fuere, ac quorum defectum nunc simile quid supplet) non convenit inter scribentes. Verum non ita diu

ff constitit

constitit illa canellæ arboris esse folia, quamquam huiusmodi arborum varia genera in Malabaria, insulisque Ceylanâ ac Japanâ alibique sint, aliæque verum cinnamomum, cassiam ligneam aliæ, Malabathri autem folia nonnulla producant, annotante Jacobo Breiicino obs. 130. miscel. cur. med. phys. Anni 4. pag. mihi 439.

Nuperrime quoque dubitarunt nonnulli, unde Camphora originem duceret. Certatum quippe diu, atque in diversas itum est sententias, illis eam è frutice prodire, his minerale dicentibus. Agricola 4. fossilium Fuschius lib. 1. de compon. M. dicam. ac Cæsalpinus metall. 33. Indicam, sulphureamque ajunt Camphoram terram esse; Matthiolus in Dioscorid. libr. 1. cap. 75 fol. 104. arboris cujusdam gummi esse statuit in montibus Indicis, quibus sit vicinus Oceanus, tantâ crescentis multitudinem, altitudineque, ut centum l. quoties homines simul patulo tegmine, umbraque contegere queat.

Garcias ab Horto Archiater quondam Vicarii Regis in India cap. 11. aromatum fol. mihi 48. satis ostendit minus recte se hanc novisse arborem, licet diutius istis in Regionibus vixerit, is autem Mercatores Lusitanos insinuat, qui dummodo lucrum bonum esse odorem ex re qualibet sciant parum sint solliciti, quas ferat tellus, quam adeunt arbores, quibusve hæ insignes existimentur fructibus.

Ante paucos autem annos demum constitit è cortice radicis canellæ arboris oleum, ac sal quoddam volatile per distillationem prodire, quod postea frigidum ab oleo sejungitur, ac deorsum vergit, quamvis per coctionem etiam ab illo Camphora sep. non possit.

Quispiamne etiam scire se autumet, cujus arboris sit Thus nobis adeo usitatum, & unde plurima gummi proveniant. Temerarium certe ducio, quod non videris, continuo velle negare, quando rerum etiam naturalium sæpius multa caligine tegitur ratio, ut non nisi multa erui possit industria præcipue si rariores sint, ac in longinquarum tantum terrarum pene inaccessis reperiantur locis. Humanum igitur est, si quis in hæc erret.

Statuo itaque, quandoquidem multorum, quorum quotidianus est usus, vix innoscit origo ac indoles, non negandum esse Unicornu existere, quamvis non ita multis notum sit, cum quod rarius propter jam dictas rationes reperiat, tum quod nunquam fere vivum capiatur & observandum profecto est omnes uno ore scriptores hoc ipsum asserere.

Sed nec sic quidem cuivis satisfecero. Erunt quippe, qui dicant, alicubi in terris hoc existat animal. cur non Romani etiam, quorum imperium Oceano, fama astris fuit terminata, hoc animal in triumphis (quos victoribus sæpe decrevere) circumduxerunt, vel quidni etiam pugnatum more Rhinocerotum, Elephantum ac Tigrum, nec non Leonum Urorumque, ut & Urforum, atque Orygium in amphitheatra induxerunt.

Sed & his, quod sæpius dictum, respondendum: animal rarissimum esse Monocerotem, ac nunquam fere vivum capi, quin & indomitum esse, captumque, dum alio transfertur per mare, facile extinguui, uti & Rhinoceros, Cameli, aliæque feræ: cujus rei Ælianus quoque lib. 10. cap. 18. fol. mihi 295. rationem reddit. Bacciusque fol. 36. aliæque testimoniis confirmant. Idemne etiam plurimis herbis, aromatibusque è longinquis regionibus hæc in terras advectis contingere videmus.

Verum quottu quisque est, qui Romanum Imperium nequaquam ad eam Indiæ partem, quam Indus, Gangesque rigant, ac in qua Monoceros copiosius reperiuntur extensum fuisse ignoret: ipsi namque Romani nunquam Parthis virtute militari superiores fuere, utut quandoque de his fuis, fugatisque triumphaverint. Vix enim trajecto Euphrate eorum quam latissime patentes fines viserant, cum paulo post amissis cecidit Crassus signis, inultaque erravit umbra.

Quid autem de Cornibus quæ in Europa nostra Reges plurimi, Principesque, aliæque potentiores quam religiosissime tanquam Unicornium asservant, dicendum.

Verisimile est ea, quæ sæpius conspiciuntur, non unius, ejusdemque animalium generis esse, sed plurimum, quibus tamen unum tantum frontem tueatur cornu. Alia enim lineis circumductis distincta cornua, glabra alia, ac modo candida, modo nigra sunt. Sic etiam duo cornua colore nigro Mucronibus acutis ac superficiebus in spiras contortis Ferdinandus II. Imp. Rom. sibi comparavit quondam, sed onagrorum illa erant.

Quæ bina in S. Marti arario custodiuntur Veneris, æqualia, glabraque sunt, ac onagrorum cornibus quam maxime sunt similia.

Illæ autem quæ in S. Dionysii Fano prope Luterias nec non Windsoræ in Anglia monstrantur, in spiras quoque contorquentur qualia sunt omnia, quæ in Daniâ, Moscoviaque necnon Germania, ac Trajectu ad Rhenum visuntur; ideoque non tantum credunt Dani, sed & demonstrare posse se dicunt, omnia hæc ex ipsorum Regno provenire cornua, quibus testis accedit Bartholinus Epist. cent. 1. fol. 237.

Frequentes enim hæc fuerunt olim merces, cum libera, notaque esset è Norvegia in Groenlandiam navigatio, ac quotannis in utramque regionem ut plurimum hinc inde institueretur. Dani autem tum temporis falsa hæc cornua non piscium quorundam dentes, sed monocerotia dicebant.

Scribit Vormius Musci sui lib. 3. animal. cap. 14. omnia ista quæ inde proveniunt immerito dicta cornua dentes esse cujusdam balæne, quæ in Groenlandia, Islandiaque *Narhual* vocetur, ac si balænam dicas alimento viventem. Est enim *hual* balæna, *nar* esca. Bochartus autem Islandis ita vocari scribit, quod Cadaveribus vesci credatur, lib. de animal. S. S. part. 1. p. 956. horum autem piscium quidam vel 40. longi sunt cubitos, iisque, scribente Vormio, summo in capite duo sunt foramina, ad ipsum os penetrantia, per quæ respirant, immo istamque pro lubitu aquam egerunt, hosce autem dentes esse hinc liquere ait, quod singuli superiori mandibulæ affigantur parti, dentes etiam, non cornua vocat Angimus Japæ specimen Islandico.

Censet etiam Aristoteles omnibus Monocerotibus media in fronte cornu nasci; hi autem pisces falsa ista cornua anteriori mandibulæ parti, cujus cavernis plerumque aliorum inseruntur dentes, affixa gerunt. Id aut, quod antea cornu creditum fuit, ex huiusmodi piscis frontis osse dentem esse constat, quoniam isti per symphysin osse non conjungitur, sed superiori maxillæ per gomphosin infigitur. Nulli autem præter hunc maximum balæne isti dentes sunt, quo glaciei fragmina ingentia, si quibus cingatur, non sine violentia rumpit, ut transitum sibi aperiat, unde & ille interdum læditur, partemve sui amittit, quales sæpe in littore reperiuntur: dens autem ille prope cranium aliquomodo cavus est, atque in eo parvulum quandoque

dorque cornu, si ita vocare liceat, crescit ejusdem plane formæ, cujus est ille, uti apud Vornium cap. 14. fol. 285. legere est. Unde Simon Viresius libr. 1. Groenlandiæ antiquæ fol. 39. credere se ait hisce piscibus dentes istos, tandem excidere, aliosque iterum nasci pari modo, quo instantibus, ac interdum adultioribus contingit, ut à novis crescentibus dentibus priores illi propellantur, protrudanturque. Atque ideo quidem credit tot ejusmodi dentes à piscium separatos capitibus in Groenlandiam Islandiamque à glacie provehi.

Paulus etiam Jovius libr. 18. histor. de vero Monocerotio agens, cornu, id, inquit, vivo animali non detrahitur, cum ullis insidiis intercipi nequeat. Cornu tamen sponte decisum in desertis reperitur, ut in cervis accidere videmus, qui ex senectæ vitii, renovante natura, vetus cornu exuunt, venantibusque relinquunt.

Rochefortus de Insulis Americæ præsentis cap. 8. fol. 159. aliam quandam unicornis marini describit, speciem qualem in Testudinum insula, quæ non procul Sancto Domingo est, littore fuisse expulsum narrat annò 1644. hic autem piscis octodecim pedes longus, ac totum corpus squamis magnitudine nummi Imperialis, vel Philippi (quem vocant) coloreque cæruleo obtectum erat, isti autem unicorni equino paulo majus caput erat, sed forma pari, pulcherrimoque frons conspicua cornu, quod novem cum dimidio pedes longum, directumque, ac sensim tenuius acuto spectabatur mucrone, hujus autem partis capiti proximæ circuitus sedecim pollices latus erat: ipsum autem cornu instar cochleæ torcularis contortum erat, quin & coronæ quædam imago capiti inhærebat, piscis autem formam ipse exhibet pag. 162.

Nunc autem de hujusmodi cornuum viribus nonnihil dicam; ipse etenim quævis quadrupedum, sive unicornium sive multicornium cornua contra venena antidota præbere statuo, quod volatile quoddam sal contineant hoc autem spiritus concitat, sanguinemque longe reddit tenuiorem, necnon cor ipsum maxime roborat, venenis adversatur, & pestilentibus febribus insigne est remedium humores noxios per sudorem & urinam expellens: longe tamen majorem huic, quam illi cornu resistendi venenis inesse efficaciam. Imo vehementius sese his opponere crediderim cornua quæ in calidioribus reperiuntur plagis quod plurimum haud dubie volantis Salis includant.

Nec veteres cornuum virtutes salutaris ignorasse videntur. Hinc enim est quod olim cornibus biberint. Unde *Σοφὸς τὸ κέρας κερῶν* miscere, ac bibendum præbere: hinc autem *κεράτι*. Urorum etiam cornua potuum gerula facta fuisse inter regias mensas Solinus cap. 32. prodit. Tradit etiam Alianus potentiores apud Indos cornibus asini Indici bibere solere, quod & affirmat Philostratus vitæ Apollonii Thyanaei lib. 3.

Septentrionis autem incolis maxime cornua poculorum vices supplerunt. Sic Saxo etiam Grammaticus hist. Daniæ lib. 7. illos Urorum bibisse cornibus testis est. De Cornibus autem veterum, Regumque poculis legatur Athenæus lib. 21. Diphosoph.

Observandum quoque puto in calidissimis Orbis terrarum partibus pessima etiam, ac maxime noxia gigni toxica, ideoque providentissimum mundi Arbitrum illis etiam locis præstantissima suppeditasse antidota, quibus ista suffocentur, obtrundanturque crediderim.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Propriæ dictæ equidem Monocerotum admittendas esse dotes, viresque quibus letalia, ac minus cognitis necantia modis venena supprimat, ac vincat, nulla ratione negare quempiam posse statuit. Brovnius Pseudodoxiæ Epidemicæ cap. 23. quando enim alcis ungulæ, cornuaque comitiali laborantibus morbo prodesse dicuntur, quando etiam non tantum os cordis cervini, sed & ejusdem cornu est corroborans, Hyacinthorumque confectio nemve ingreditur, quid causæ est, quod illam Monocerotio cornu inesse negemus potestatem minime vero se credere idem Brovnius ait, hujus tantam esse antidoti efficaciam, ut, quod tamen haud pauci volunt, sublimato, aliisque, quæ secundâ (ita ait) qualitate sive partium rosione necant, resistat venenis.

Memorat Ulysses Aldrovandus Judæum quandam Venetiis unicornu vendere voluisse, ac ut verum esse probaret, cornu parte circulum in mensa duxit, immissoque primo scorpionem, mox & araneam, illius terminos superare minime potuisse, sed huc illuc reptantes intra horæ quadrantem nec ante antidoti vi interisse. Simile quid Stephanus Rodericus Caltrensis lib. 4. de meteor. Microcosm. cap. 4. magno quopiam cornu factum se vidisse tradit, quod nobilis quidam Lusitanus ipsi monstravit, Regique cognati sui, esse dixerit, hic autem cornu, ut minime fictum esse ostenderet, araneam imposuit, quæ cum quàm citissime aufugere niteretur, vi retenta brevè sola antidoti vicinitate extincta est. Testatur hinc insuper vidisse se in Lusitania monocerotis ossa quam plurima superasse venena, asseritque paucos admodum absque hoc insigni remedio Magnates ex India in Lusitaniam reduces esse.

Narrat etiam Monardus Tract. de lapide Bezoard. similem se Hispani ab hujusmodi cornu frusto provenientem vidisse effectum quamobrem hoc omnia omnino præstanti virtute antecellere antidota statuit: nec dissentit vir eruditissimus Ficinus de vita cælitus comparanda, qui Cornu illi cælestes propemodum dotes attribuit. Idem censent Brassavolus, Dioscorides, Matthioli, Baccius atque omnes fere, qui de pestilentibus, malignisque febribus plura scriptis consignarunt, uno tamen omnes fatentur ore rarius illud reperiri, atque inter Regum, potentiorumque thesauros numerari pretiosiores.

Amatus comment. in Dioscorid. lib. 1. enarrat. 52. omnes qui in India fuerint, asseverare ait monocerotis cornu apud Reges, Principesque maximo esse in pretio, imò & Lusitanos, qui diutius medicinam in India laborantibus fecissent, dixisse medicos nullam excellentius Indis veneno, contagiosive infectis febribus propinquant remedium posse, atque ideo quondam Indi proceres Monocerotio cornu auro præminuto bibere soliti fuere, ne qua forte tradente Aliano, toxica nocerent, in Ethiopia quoque Regiis illud imponitur mensis, quo explorent Aulici, nunquid veneni epulis inditum sit. Memorat etiam Paulus Jovius libr. 32. Clementem vij. Pontificem Romanum Franciscum I. Galliarum Regi hujusmodi cornu bicubitale, calatoque innixum auro dono dedisse, quo cujusvis cibus admixti veneni vim eluderet. Hanc quoque ob causam magnæ in India auctoritatis viri ex ejusmodi cornu confectis ornantur armillis: uti supra è Blanquio annotatum.

Laudat quam maxime Aloysius Mundella hoc cotou tanquam à cane rabido, aliisque insectorum toxicis certissimum remedium. Ne cui itaque mirum sit, si illud cum propter raritatem, tum propter eximias dotes tanto pretio olim fuerit divenditum, ut

Ff 2

etiam

etiam memoret Baccius pag. mihi 105. Germanos quosdam Mercatores Romam venisse, ut Cornu Monocerotis quibusdam Principibus offerrent, quod 90000. coronatis æstimarent. Julius iij. p. m. scribente eodem, officinam aromatariam, pretiosissimamque refertam pharmacis, quam Vaticano in palatio extrui curaverat donavit inter alia Monocerotii cornu fragmento à Ragusinis mercatoribus 12000. coronatis empto. Quo Baccius Augustinum Riccium Medicum Pontificium usum fuisse se scire ait, qui illud interdum pondere scrupuli unius, quandoque 10. granorum ad minimum, vel cum aqua aliqua cordi appropriata requirente necessitate, cum felici successu multis, qui huius ope magna evitarunt pericula, propinaverit.

Quamquam autem dens ille piscis *Nerhuat*, non cornu sit iis, tamen insignis est doribus, quas bene multi quendam ei, tanquam Monocerotio cornu, attribuerunt. Non animadvertuntur, scribente Brouvvnio d. libro fol. 301. in plurimis quamvis non in omnibus, quæ apud nos reperiuntur. Plurimique fiunt, cornibus istæ qualitates, quæ aliis inesse solent. Neque enim igne, coquendoque, aut liquoribus mollescunt, nec multum gelatinæ iis decedit, nec facile calcinatione philosophica dissolvuntur, sed rimis fatiscunt vel in laminas solvuntur, contra, quam aliis accidit cornibus.

Addi etiam id ipsum confirmantem Bartholinum Epist. med. cent. 1. fol. 100. Testatur hic quoque Epist. med. cent. 2. fol. 579. necnon Hist. anatom. rarior. cent. 2. histor. 56. cent. 4. histor. 4. & cent. 5. histor. 46. se non sine prospero successu febricitantibus, præmissis ex methodo præmittendis, huius dentis pulveris dragmam dimidiam præbuisse, qui veluti maxima quadam vi sudores expulerit febremque minuerit. Quod ipsum se & in malignis grassantibus febribus, tertianisque expertum ait. In aliis etiam morbis, quos ejectione sudorum tollere quis gestit, non minus felici eventu huiusmodi rasi, posteaque contusi dentis pulveris intus sumitur.

Memorat idem cent. 2. fol. 662. Kyperum Professorem quondam Lugdunensem in Batavis huius dentis pulverem peste laborantibus prospere exhibuisse. Quin & N. Tulpus obs. med. cent. 4. obs. 58. conducere unicornum marthum expellendis variolis & morbillis, domandisque febribus malignis, se non semel expertum esse scribit.

Martinus Forbissenus navigatione in Regiones Occidentis & Septentrionis piscem mortuum in Septentrionis mari se invenisse narrat, qui undis agitabatur & in rostro unicum cornu rectum gerebat longitudine unius ulnæ cum semisse. Hoc autem intus cavum fuisse, ac quosdam in id araneas injecisse, quæ è vestigio fuerint mortuæ, scribit.

Statuunt tamen nonnulli qualitates quas S. pagina animali *Rem* attribuit, omnium optimè Orygi convenire.

Est tamen oryx æque, imo magis ignotus, quam proprie dicta monoceros, ac de utroque pari varietate loquuntur scriptores.

Primo namque caprea generaliter latinis capra, ac præcipue, fera est, cujus tamen plures species, Rupicapra, Dama, Ibex, Bubalis, Pygargus, Capra strepsiceros, Dama vulgaris, Capra moschi, Bezoardica, Oryx &c.

Oryges autem Columella lib. 9. cap. 1. cervis; at Plinius lib. 8. cap. 53. Bochartusque de animalibus S

Scripturæ cap. 28. partis primæ paginæ mihi 974. ac Franzius hist. animal. Sacr. part. 1. cap. 23. Capreis annumerant. Ita ut huiusmodi Caprea nonnullis oryx, quibusdam Dorceas, vel Bubalis, aut Dama, Gazelæ, aliisque Ibex sit nec cui potissimum adhæreas dicere promptum sit.

De Orygum origine, locisve in quibus degant, non una etiam est opinio. Herodotus lib. 4. animalibus accenset, quæ prope Tritonis Africæ fluvii fontes proveniunt.

Orygem quoque in illa orbis parte nasci tradit Plinius lib. 10. cap. 73. vocatque Getulum Orygem Juvenalis satyra 9.

In Æthiopia produci Agatarchides, Strabo Diodorusque, ac Heliodorus contendunt. In Ægypto etiam reperiri Plinius lib. 2. cap. 40. Ælianusque hist. animal. lib. 7. cap. 8. necnon lib. 20. cap. 29. scribunt. Idem etiam lib. 14. rupicapras summis montium Lybiæ cuminibus degere tradit.

Formam intuper Orygum alii, atque alii diversam faciunt, dum modo unicum, modo duo illis concedunt cornua; qui Capreis annumerant, bina tribuunt, quos inter B. Bochartus, quamquam pag. 939. ita dicat: reperitur in Segestanæ & Bulgariæ Sylvis, Damir, Charis fera, quæ in medio capitis cornu habet unicum quod etiam p. 967. repetit.

Plinius etiam lib. 11. cap. 46. unum Orygi tantum esse cornu asserit: ita quoque Aristoteles lib. 2. hist. animal. cap. 1. ac lib. de part. animal. cap. 2. ut & Oppianus de venatione lib. 2. versu 445.

Ælianus hist. animal. lib. 14. cap. 15. quatuor cornua Orygibus esse scribit non directæ, sed recurva, ac prope humeros contingentia, unde de Damis, Orygibusque Platycerotibus locutus videtur.

Binas exhibet Orygis figuras Jonstonus, verum utrum magis illum, an Asinum referant Indicum, sive Onagrum, ac Aldrovandum quidem dicere ausum ait pag. 86. fateturque nihil omnino certo sibi de ejus formâ liquere. Bochartus etiam cap. 27. part. 1. de animal. S. Script. fol. 966. non plane *Reem* naturam (quo Orygem significari contendit) sibi perspectam scribit. Ac passim Orygi, licet obscurius duo adscribi non diffitetur cornua, cum etiam quandoque unicornem esse ex Aristotele, ac Plinio constare pag. 970. dicat.

Sed nec de substantiâ cornu inter scriptores convenit. Meremburgius cap. 3. histor. naturalis fol. 111. longa, firmaque huic fera cornua, Bartholinus autem de unicornu pag. 70. ac 71. cava esse variaque, ut arcus, citharæque, ac fistulas ex iis conficiant.

Oryges meticulosos alii, timidosque, ut Athenæus lib. 50. Virgilius *Ænæid.* lib. 10. Ovidius *Fastorum* lib. 5. necnon Bartholinus de unicornu, crudeles vero alii ajunt.

Hoc autem inde natum crediderim d. ssidium, quod bicornes Capræ (quibus illos nonnulli annumerant) timidiores sint proprie dictæ, ac unicornu Oryge, quem sævum Oppianus lib. 2. de venatione v. 446. Martialisque lib. 13. Epigram. 95. necnon Plinius lib. 2. cap. 40. scribunt.

Columella lib. 9. cap. 1. cum cæteris animalibus ad usus humanos mactari Oryges scribit his verbis. Feræ pecudes, ut Capreoli, Damæque, nec minus Orygum, Cervorumque genera, & Aprorum, modò lautitiis & voluptatibus minorum serviunt, modò quæstui, ac reditiibus.

Bartholinus etiam de Unicornu p. mihi 72. Orygis Corpus sanum admodum, homineque nutrire aptum, ideoque illum inter pura quoque animalia populo Israëlita

Israëlitico commendatum scribit, ut Deuteron. 14. v. 5. constat.

Gratissimi saporis hæc Carnes fuisse, lautissimasque conijcias, quod Romanorum dapes constituisse scribat Juvenalis Satyr. 11.

Dissentiunt denique de Orygis longitudine ac magnitudine quotquot ferè eum describere, Herodotus enim Ælianusque lib. 4. hist. animal. cap. 15. bovi magnitudine parem dicunt: Oppianus lib. 2. v. 55. illum Rhinocerotem non multo esse majorem scribit. Verùm Aristoteles hist. animal. lib. 3. cap. 2. Capream inter minima cornuta, quadrupediaque animalia ponit, dicitque se non nosse parvum animal Cornutum, Capream autem, quæ nescat, omnium esse minimam.

Hirco parem, barbatumque sub mento Orygem scribit Albertus Magnus, barbam etiam attribuit Ælianus lib. 14. cap. 25.

Atque hæc quidem de Oryge. Cæterum, quisquis illa rectè perpenderit, fatebitur utique omnia, quæ de *Rem* sive *Reem* sacra profert pagina, de Oryge, capreave bicorni, non posse dici. Constat quippe ex numeror. 23. v. 22. *Rem* maxime altum esse animal, contra quam Aristoteles, ac Albertus Magnus de Oryge testantur.

Animali *Rem* excelsum etiam cornu esse è Psalmo 92. v. 11. liquet: extolles meum cornu sicut *Rem*: verùm cervorum etiam altiora esse cornua, quam Caprearum, quis ignorat.

Nec tamen inscius sum Capream saltare ac lascivire, nec non Cornibus petere solere, atque hac consideratione illud Deuteron. 33. v. 17. sunt ejus cornua tanquam *Rem*, quibus populos amittabit, capreae tribui posse. Verum & insolita feritatis *Rem* est, quare ab hujusmodi ferarum cornibus defendi cupit Regius Psalter Psalm. 22. v. 22. cum tamen viri docti, atque ipso rerum usu facta fides, capreas timidiore esse demonstrent.

Illud etiam quod Jobus cap. 39. vers. 14. de *Rem* scribit, capreis attribui nequit, quæ propter virium defectum ab arandi necessitate eximuntur.

At dicet forte quispiam Orygem, qui ex caprearum genere sit, fortem esse sævumque, verum equidem est eum capreis esse sæviorem, sed tamen illi passim duo tribuuntur cornua omnes insuper unanimi consensu proprie dictum unicornu nec capi, nec sub juga mitti posse perhibent. Cum tamen & Sancta Scriptura, alique (quos inter Martialis annotato Epigrammate 95. lib. 13.

Savus Oryx constat quot mihi morte canum.

Cervos Damasque, ac Capreas, ideoque & Oryges retibus, canibusque vinci doceant. Facile laqueo capi posse Orygem tradit Albertus Magnus, teste Jonstono: memorat etiam Athenæus lib. 5. in superba Ptolomæi pompa Orygum bigas septem fuisse: Horus etiam Apollo lib. 1. cap. 46. Egyptios Reges huic insedisse animali auctor est.

Nec quicquam effecerit, quisquis è S. Scripturæ locis superius adductis duo *Reem* tribui cornua, ac proinde non esse Unicornu dixerit. Kimch us enim, Aquinasque, ac Pomarius, alique Hebræi, atque Arabes *Rem*, animal unico frontem spectabile cornu scribere. Animadvertendum insuper est S. Scripturam per numeri enallagen plura *Reem* tribuere cornua. Quando autem legimus Deuteron. 33. v. 17. cornua ejus sunt, tanquam *Reem*, non necessarium habemus vertere monocerotis, sed dici utique potest Monocerotia, ut plurimi vertunt. Ita

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

ut non videam, quid impulerit. Hieronymum ut Psalmi 22. versum 22. Rhinoceroti attribuerit, Neque enim posteriori illo modo confusio, quam vitare voluisse S. Pater videtur, quæpiam oriri potuisse. Sed hic loquendi usus apud Hebræos, aliosque notior est, quam ut multis exponatur.

Verùm etiam nonnulli loco Monocerotis obtrudere volvere. Sed quam invita id fiat ratione, vel ipsum nomen clamat, quod recentius longeminusque notum, quam unicornis. Hujus enim quadringentis ante Christum annis Ctesias ævo Artaxerxis Mnemonis meminisse: is enim in excerptis apud Photium, sunt, inquit, Asini sylvestres in India equis pares, aut etiam minores. Verùm autem quis ante Cæsarem novit? certe post hunc pauci admodum illius fecere mentionem, tacente etiam omni Græcorum turbâ. Atque ideo Plinius, Lib. 28. cap. 10. hos Uros novisse, nec bisontes tradit, quamvis bubus feris quam maxime abundant India saltus. nec constare ait Bochartus, pag. 962. Uros alibi fuisse, quam in Hercyia sylvâ, aut locis parum remotis: unde Moïsis ævo Judæis innotuisse nemo sibi persuaserit. Nec est, qui, ut scribit idem, Syriam, Palæstinamque Uros producere asserat. Moïsem igitur, Jobum, & Balaamum voce *Reem* necesse est aliud significasse.

Tandem etiam Onagrum nonnulli proprie dictam Monocerotam statuere, scimus equidem hujus feræ cornu à Monocero io forma differre, sed & non minus præsens adversus venena esse remedium quamquam & hoc animal unicornu magnitudine par sit, variis tamen distinguitur modis; pilis videlicet longitudine, æqualitate, ac colore cornu, nec non pedibus &c. quæ omnia etiam pro regionis, in qua nascitur, diversitate differunt. Cornu namque in India Asini agrestes sunt, ut & in Scythia, Africaque, tradente Herodoto lib. 4. nec non Æliano hist. animal. lib. 10. cap. 40.

Quin & ipsa sacra pagina Jobi cap. 39. vers. 8. ac 12. unicornem, onagrumque distinguit, ac diversa utrique tribuit nomina. Quamquam Onager etiam solitarius sit, ut Olæ cap. 8. v. 9. Jobi cap. 24. v. 5. Esaiæ cap. 23. vers. 14. nec non Daniel cap. 5. v. 21. liquet.

Addere vivos capi, domarique onagros, testibus Varrone de re rustica lib. 2. cap. 6. Plinio lib. 8. cap. 43. ac Anatolio Hippiatric. cap. 14. Martiale, aliisque quod de Monocero vera utique asseri non potest, ait enim hic epigram. lib. 13. epigr. 101.

Pulcher adest Onager: mitis venatio debet

Dentis Frythra: jam remoretur sinu.

Scribit etiam Jonstonus de quadrupedibus: cap. 4. quosdam ad generandos mulos onagros jam domitos eligere, quod hæc quam facillime sub jugum veniat fera, subactaque rarius solita repetat loca. Onagros ab Arabibus in desertis laqueis, aliisque capi instrumentis testatur Leo Africanus p. 215.

Nec dissentit Jobus cap. 39. docet enim liberum vinculis incedere onagrum, qualis quamdiu manet, in desertis degit, civitatumque frequentiam tenet &c.

Atque ita quidem Lectori constare censuerim, nec dentem piscis *Narhual* cornu, multo minus Monocerotium, nec etiam Orygem *Rem* esse, cum quod bina plerumque feratur gerere cornua, tum quod timidior sit, dometurque, nec non lautas luxuriosis præstet epulas. Quamquam enim animi intrepidi, sævusque sit Oryx quandoque, capitur tamen, ut sæpius dictum. Verùm enimvero si doctiss. Sam. Bochartus de Animalib. S. S. pag. 961. & 962. veterum testimoniis abunde se probare dicat *Rem* non in

Ff 3 boum,

boum, sed caprearum esse numero. ac p. 970. Jobum ita exponat, ut scilicet dometur quidem *Rem*, attamen ab arandi eximatur necessitate: ne videlicet negetur posse intelligi Oryx, qui domatur ac propter roboris defectum aratri immunis est. Si idem Bochartus etiam 968. feritatem orygis, ac robur, quale Jobus, alique *rem* tribuunt, docte, atque eleganter ex prophanis demonstrat, anne igitur, ut eruditissimo Viro assentiamur, necesse est, dicamusque *rem* non unicornu excellentius, sed Orygem esse? minime vero ille enim isthæc omnia, quod pollebat, ingenio conquirit una, eaque maxima, ut putabat ratione, quam apertissime p. 954. indicat, ductus, quod nempe de eo nupiam legisset, inaudivissetve ab iis, qui peregrinis etiam indagatores accuratiores in terris vixerint, quam etiam ob rationem viri magni Mercurialis, Paræus, Deodatus, alique existere verum negant unicornu.

Ipse itaque unicornu verè sic vocatum ab omnibus hisce quamaxime distare animalibus, atque illud ipsum non modò propter similitudines à Spiritu Sancto ab eo sumptas, sed & propter expressas quàm apertissime proprietates, ferocitatem videlicet, robur, animositatem, feramque indolem ac denique propter veterum, recentiorumque monumenta, atque ocularium testium fidem, non tantum ante Ogygium existisse cataclysmum, sed & hodieque, ac præcipue quidem in Africa, existere, atque reperiri existimo.

Hactenus de Monocerote Clarissimus STALPARTIUS, quibus nos Subjungimus.

Quod non tantum ejusmodi animal in Spectaculis ac Amphitheatris Romanorum aliarumque Gentium expositum visum non sit propter feram admodum indolem cicurari prorsus nesciam; sed etiam quia nihil prorsus noverant ejusmodi populi de regionibus quibus est familiare, quarum præcipua procul dubio est Æthiopia superior ejusdemque tractus maximè montani, à peregrinatoribus tam parum etiamnum hodie frequentati, tum propter locorum asperitatem, tum propter aditus difficultatem, tunc propter omnium mercium inibi totalem prope inopiam; tunc etiam propter inhabitantium populorum ferociam, ut pauca admodum de iisdem sciri, exindeque advehi possint. Interea tamen ut è variis testimoniis ab Auctore nostro allatis satis patet, à quibusdam fide dignis quorum curiositas difficultates præmemoratas superaverat, visum fuisse ejusmodi animal, ac propterea concludendum unum aut alterum ejusmodi testem oculatum existentiam Monocerotis asserentem prævalere debere multitudini aliorum qui idem negant quia non viderunt. Raritatem autem animalis ex eò petendam credimus, tum quod adversum habeat serpentis quoddam genus quod magnam ejus stragem faciat; tum quod præ feritate mares rarius cum feminis coeant; tum etiam asserente Patre Hieronymo Lobo quod homines eorum locorum ubi nascitur unicornu indigenæ non parum ipsius carni sint avidi ac propterea ex eo occiso vescantur familiariter. Taceo testimonium Joh. Gabriëlis Lusitani qui in Regno Damot animal vidit, cujus frons cornu pulchro, albo, sesquipedem longo insigne erat, cujus magnitudo & forma equinæ non erant ab similes; cujus color erat badius, aut phœniceus, juba, pilique caudæ breviores ac nigri. Taceo etiam Marmolii pluriumque aliorum auctorum testimonia, ac concludo ea tantum propter, inter figmenta ac entia rationis repositum fuisse à viris plumbus doctis Monocerota, quod à quibusdam ad risum po-

tius quàm ad veritatem sit descripta hac fera, dum scilicet afferebant cum Plinio & aliis non minus quàm gryphum fabulosum de variis participare animalibus, ac ex pluribus componi, si ita loqui fas est, naturis.

MORSELINE vid. *Rotula*.

MORSUS DIABOLI Seu SUCCIDA:

Nomina. Succisa sive Morsus Diaboli *L. B.* Morsus Diaboli *Ger.* Diaboli vulgaris flore purpureo *Park.* Succisa glabra *C. B.*

L. B. Quà radici, minimi fere digiti crassitudine, fibræ longæ albæque circumnascuntur, ea præcisâ seu præmorsa apparet, sapore misto acri & amaro, folia oblonga, acuminata scabiosæ quanquam non dissecta sed integra, vel paulum quid, præsertim quæ superiorem obtinent locum, serrata magis quidem supra quam infra virentia, brevibus utrinque & vix conspicuis pilis hirsuta, ut omnino glabra videantur, bina ex adverso pediculis ad basin coeuntibus caulem amplexa; magis crebra in caule quam vulgaris scabiosæ. Caulis cubito altior, teres solidus, rubescens, ramosus. Flores in summis caulibus & ramulis cærulei, non adeò plani ac scabiosæ vulgaris, verum globosi: omnes quoque flosculi florem totalem componentes ejusdem figuræ sunt & magnitudinis, cum in scabiosa marginales interioribus majores sint. Flosculi autem ut in scabiosa quadripartiti sunt cum stylo & staminibus intus.

Seriùs quàm scabiosa & sub Autumnum flores in pratis & pascuis, locis præcipue dumerosis.

Variat florum colore carneo & albo: interdum etiam foliis hirsutis invenitur.

Vires. Alexipharmaca est & vulneraria, ut facie sic viribus cum scabiosa convenit; imprimis celebratur in epilepsia, peste, uteri dolore, sanguine coagulato, abscessibus occultis, lue venerea ejusque ulceribus; in vulneribus recentibus, &c. extrinsecus in Angina tumoribus tonsillarum quæ ægrè ad suppurationem perveniunt (gargaris) in sugillationibus, Bubonibus &c. *Schrod.*

Dodonæus adversus diuturniores faucium tonsillarumque tumores, qui ad suppurationem ægrè perveniunt, valde commendat, & nulli secundam affirmat successam; cujus auctoritatem ego secutus, plurimque gargarismis, ubi veneris & aliis ulceribus fauces gingivæque scætant, felici successu miscere soleo; succum ipsum Camerarius utiliter admodum addi gargarismis in Angina ait Sim. Paulus. *Rains.*

M O R U S.

Vocis *Mori* multiplex Etymon adfertur; quæ Latine esse volunt à *mori* seu *morandò* deducunt, quod Arborum postrema frondes germinaque producat. Verum mora & morus non conveniunt quantitate primæ syllabæ; alii à *maueris* id est, niger dictum volunt quia bacca ejus nigra sunt, alii & rectius à Græco deductum exstimant. Nam & arbor ipsa *μωρεα* appellatur à Nicandro: fructum verò *μωρεν* dici Æschyli, Sophoclis aliorumque auctoritate comprobatur Athenæus libro vj. alii *μορὸν* id est, exitio, supplicio, infortunio deductum putant, quod exitii quondam causa fuit illis qui exstindebant, at quibus quæso aut quando? nec defuere grammatici (qui literam pro litera ponendo) *μωρον* κατ' ἀντίφρασιν dictam arbitrantur, id est stultam cum sit sapientissima, Plin. lib. 16. c. 25. novissima urbanarum germinat morus, nec nisi ex isto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Idem l. 18. c. 27. Cum germinare videtis morum, injuriam postea frigoris

frigoris timere nolito: eadem de causa sapientissima fertur. Verum Etymologias istas *not' ἀντιόχου* exposcit Vossius in Oratoriis.

Cum mori albae Julos longis pediculis hærentes observaverit J. Bauhinus: cumque etiam in mori nigrae iconibus juli longis pediculis dependentes pingantur. Fructus autem utriusque brevibus nigrae brevissimis insidere dicuntur, suspicamur Julos à baccis disjunctos esse nec fructus iis succedere, ut nonnulli volunt, quamvis nihil affirmemus, sed rem observatione diligenti determinandam relinquimus.

Ufus, Foliorum mori usus est insignis in Italia, Sicilia, Hispania, Gallia ad bombyces alendos, & in eum utum moros albas magno numero circa urbes & oppida ferunt; harum enim foliis maxime delectantur vermiculi. Quidam mori foliis deficientibus Ulmi folia & urticae germina substituunt: alii lactucæ, endiviæ aut dentis Leonis folia præbent: quæ omnia & nos experti sumus: sed junioribus tantum danda sunt, nam si majoribus paulo, aut nimium des, alvo fluida facile dissolvuntur & pereunt. Quocunque autem pabulo præter mori folia eos alas nunquam tex rinam inchoabunt, & tela Sericea se includent. Colligenda autem potius vetera folia quam nova, mane cum ros solaribus radiis dissipatus fuerit: aut si madida fuerint diligenter prius abstergenda, aut ad ignem siccanda sunt: nam nimius humor obest bombycibus. Verum de bombycibus & serico agere hujus loci non est, sed ad historiam insectorum pertinet.

Vires, Fructus Mori nigrae (mora Celsi Officinis dicti) immaturi refrigerant, siccant & astringunt validè (ubi aruerit Galen.) itaque ad diarrhoeas, dysenterias, affectiones Coeliacas, fluxus menstruos: expuitionem sanguinis accommodi sunt. Extrinsecus in oris fauciumque inflammationibus & ulceribus profunt.

Mori fructus Dioscoridi [de maturo loquitur] alvum solvit [initio pastus & ante alios cibos sumpta] facile corrumpitur, [post alios cibos] & ventriculo inimicus est. Plinio [cui etiam experientia suffragatur] refrigerant, sitim sedant, appetentiam excitant si non superveniat alius cibus intumescunt: cui etiam ad stipulatur Galenus. At è contra Horatius.

Ille salubres

Æstates peraget nigris qui prandia moris

Finet, ante gravem qua legerat arbore solem.

Alii etiam ventriculo grata & amica esse volunt. Galenus autem conjectatur, mora exigua in seipsis habere facultatem ejusmodi qualis magna medicamentibus purgantibus inest, cujus beneficio non modo facile secedunt, sed corrumpuntur, etiam si diu in ventre manserint; imo totam adeo arborem in omnibus suis partibus mistam aliquam vim obtinere putat ex restringente & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoriam cum quadam amaritudine exsuperare, adeo ut & latum lumbricum interficiat.

Maturorum succus ad stomatica medicamenta utilis: stomaticen quàm polychreston vocat, sic describit Plinius, Sextarii tres succi ex pomo, leni vapore ad crassitudinem mellis redigatur post additur Omphacii aridi pondus denar. ij Myrrhae denar. j. Croci unius, simul trita miscentur decocto. Neque est alius oris, arteriæ, uvæ, stomachi jucundius remedium. Alios modos stomaticen componendi ibidem. Vide.

Folia vel sola vel cum cortice costæ odontalgiam sedant (Gargaris) Schrod. Eadem trita cum oleo (ex aceto Schvvenchf.) imposita ambustis igni medentur. *Doscor.*

Syrupus mororum gratâ suâ aciditate in febribus

ad sitim extinguendam & ardorem temperandum utilissimus est: & item ad inflammationes, pustulas, seu ulcuscula oris, palati, uvæ, tonsillarum, gutturis & faucium cominodissimus.

Materies utilis est operibus quæ flecti postulant; estque solida, nec in aquis minùs durabilis quàm firmissima quercus. Aeternam esse arbitrantur, tradente Theophrastò, & vetustate Loti modò nigrescere. *Raius.*

MOSCHATA, vid. *Nux Moschata.*

MOSCHATELLINA.

Nomina. Moschatellina foliis fumarie bulbosæ: *J. Bauh. Tournefort.* Ranunculus nemorosus Muschatellina dictus. *C. Bauh.* Radix cava minima viridi flore *Gerard.*

Est plantula quæ de radice suâ cauliculos duos tresve promit sex pollices longos, tenues, molliculos, coloris viridis pallidiusculi, è quibus oriuntur folia incisa & divisa ad instar eorum fumarie bulbosæ, coloris itidem viridis. E mediis enascitur foliis pediculus iis non multò longior, in cujus summitate sustentantur flores quinque minimi coloris herbacei, pentapetali, quibus ad instar caliculorum subjacent foliola tria. Floribus succedit fructus mellicellus, succidus, in quo vulgò reperiuntur semina quatuor, lini seminibus non multum absimilia. Radix est semuncialis & uncialis, crassa, candida, pluribus squamulis se invicem excipientibus cincta, fibras emittit plurimas, alias quidem tenues, albas, prælongas, quibus alimentum haurit; alias majores, albißimas, filorum similes, ad intervalla rariora obiter denticulatas, tandemque in capita intumescences, quibus sub terrâ repens latè se ptopagat. Flores & folia moschum olent. Martio mense floret in umbrosis sepibus & senticetis.

Radix hujus plantæ virtutis est resolutivæ, detergentis ac vulnerariæ. Tota planta non parum continet olei, phlegmatis ac salis essentialis.

MOSCHUS.

De Moscho ac Animal-Moschifero tam eleganter scribit Clariss. Lucas Schröckius filius, Medic. Doctor & Physicus Augustanus, ut super vacanum credamus aliunde huc adferre quod de illo ac ipsius viribus exhibeamus. Veniat itaque in hanc scenam tam Ingeniosi ac Doctissimi Auctoris Tractatus integer, quamvis pro ratione Operis nostri paulo fusior nequam tamen ingratus futurus.

Moschum, Odoramentum illud nomine & fragrantia suâ notissimum, naturâ autem & operatione paucorum notitiam adeptum, dum publico hoc scripto illustrare instituo, nemo meum reprehendere conatum jure poterit. Cum enim Medicæ Artæ me addixerim, quæ remediis simplicibus, à Naturæ bonitate suppeditatis, finis sui impetrandi causa, uti cogitur, adeoque nec naturalis scientiæ adjumento carere potest, non generalem tantum rerum physicarum notitiam, sed specialem etiam simplicium cognitionem mihi perquam esse necessariam, semper credidi; eamque non ex libris unice haustam, sed ipsa autopsia confirmatam; ne numerum eorum augerem, qui, juxta *Heraclidis Tarentini*, apud *Galenum* lib. 6. de simplic. medicam. facult. comparisonem, Præconibus sunt simillimi, servi fugitivi formam ac notas sæpè præconio publicantibus; propius tamen fortè adstantem minime agnoscantibus.

Quod verò paulò prolixius id negotium hîc pertractaverim, Moschumque curiosiore indagine excusserim, non *Seneca* tantum lib. de otio sapient. stimulum addidit, ubi curiosum nobis Naturam animum dedisse, artisque suæ ac pulchritudinis consciam, spectatores nos tantis rerum spectaculis genuisse, profiteretur, ut nempe sciremus, *illam spectari voluisse, non tantum adspici*: Sed & ipsa, cui totum me devinxi, *Illustris Sac. Rom. Imp. Academia Naturæ Curiosorum* voluntas id à me requisiverat, imò & ipsa quoque materia, præter intentionem meam primam, inter scribendum sic excreverat.

Fateor quidem, me jam quatuordecim abhinc annis, ut ingenii vires periclitarer, & qualescunque meos in studio Medico profectus Parentibus ac Patronis comprobarem, similem materiam conscripsisse, typisque commissam publicè postea, sub præsidio Nobil. atque Excell. D. D. *Joh. Theodori Schenckii*, Professoris in Academia Salana celeberrimi, *in ædibus*, commilitonum examini subiecisse: hîc tamen longè alia indutus facie, & ad majorem maturitatem perductus, Moschus sistitur; quem nempe accuratius perpendere, plurimum augere, & magna ex parte immutare conatus fui.

Si verò ullum ex divite Naturæ penu in hominum utilitatem hucusque productum simplex, Moschus certè considerari meretur; cujus incertissimos hactenus natales inquirere, fragrantissimum odorem expendere, nobilissimas vires deprædicare, nec utilitate caret, nec jucunditate: Illa necessitati nostræ consulimus: hac vitæ hujus præsentem ubique & Medicis imprimis infestam miseriam quodammodo condimus. Alii per me eandem ignobili otio edulcorent, nostrosque curiosos labores, quos adsequi ut plurimum non valent, contemnant; mihi animum nobiliori isto otio reficere, & *nunquam otiosum* cum illis esse, adlubescit.

Quod enim *Cicero* §. de finib. in genere scriptum reliquit: *in ipsis rebus, quæ dicuntur & cognoscuntur, invitamenta insunt, quibus ad discendum cognoscendumque movemur*; id imprimis, de Moscho etiam fateri necesse habeo; qui, non obstante, ortus ejus vilis admodum quod revera existat, & vel excrementa inter animalia, quibus aliàs nihil solet esse projectius, referri debeat, animum tamen multorum Clarissimorum Virorum ut curiosius exerceret ac delectaret, potens satis, hucusque comparuit.

Frustraneam quidem hîc navare operam videri possem, si facile nos carere Moscho, statuere alicui placeret; præcipuè cum & Medicinæ Principes, *Hippocrates*, *Galenus*, alique Medicorum antiquiorum eodem, absque ullo Artis detrimento, carere potuerint.

Ast salva res est! Rigoroso isto judicio (ut absque ullius id scribam injuria) procedere, ac scrupulosius cuncta discernere si vellemus, Medicinam sane, ut primitus fuit, paucissimarum herbarum, describente eam hoc modo *Seneca* epist. 95. circulo circumscribere cogéremur. Absit verò hoc, ut Naturam ullâ labe oneremus; quæ nec humanæ indigentiae deesse voluit; nec multiplicia producendo, ullius prodigalitatis rea fieri debuit. Deprædicemus potiùs ejusdem benignitatem, & sponte oblatos thesauros, si non necessitati nostræ, saltem meliori commoditati profuturos, grati suscipiamus! Quo Cl. *Salomonis Alberti* *ἐπιφώνημα* in Orat. de Mosch. si accipiamus, ad plausum utique ei dabimus: *Ita me hercle Moschus necessarius, ut si usura ejus Medicinam orbaveris, ipsa mutila protinus sit ac diminuta*. Cæterum non nobis Veteres illi in legem dati, aut omnes Naturæ thesauros exhaustisse credendi sunt; nobis etiam, quod ageremus, reliquerunt; quibus si ista fortuna, quæ po-

steris adfulsit, contigisset, Moschum contemnimus haberi, magna eorum solertia & indefessum juvandi studium non admisissent. Sequamur potiùs proprium eorum exemplum, qui & ipsi alienæ terræ remedia in usum suum trahere non omiserunt, & medicamentorum variationem, cum paucioribus contenti vivere potuissent, amplexi fuerunt.

Sed peregrinum, instas, quid esse Moschum, magno redimendum pretio, facile inquilinis aliis supplendum, nostro non enatum sub climate, ideoque nostræ non æqualem naturæ, adulterationi obnoxium, nativo vigore non ampliùs turgidum, imò natalibus suis obicurissimum &c. Verum mihi cum amicissimo *Wedelio* meo, procem. Opiolog. mediam ingredi viam, & nec nostrâ spernere, nec, ubi opus est, exotica rejicere, placet. Si concentratam vim cordialem, magnamque in parva dosi virtutem expectas, cum eodem nunquam satis laudando. *Wedelio*: *Moscho quid cordialis?* quæro. Paupertas aliàs verò invita omnibus, aurum gemmasque vel ab extremis Indiis petitas desiderat; cum tamen domi habeat, quibus honestè & commodè vivere queat: Eandem cur medica suppellex tam anxie quærat? Cur alienæ terræ opes, sponte oblatas rejiceret? Ex pharmacis nostro quoque sub climate enatis paucissima, si ulla (neque etiam opus est) æqualem corpori nostro ostendunt temperiem; intemperatas illas terræ nostræ soboles, rationis & experientiae solertiâ inventas, prudentia Medici intemperato itidem corpori admovet, naturalem temperiem eidem ut restituat. Cur id in exoticis succedere pariter nequeat, causa nulla subest. Majus, fateor, ut plurimum, quod Institutorum ipsis imponit avaritia, pretium deposcunt; sed activitate sua, & concentrata virtute Moschus, ut cætera transeat, illud in Medicina reddit tolerabilius; ægrotorum imò nonnulli nequaquam leviori sumptu comparabilibus, sed pretiosis omnino & cærioribus medicamentis (exemplum videatur egregium apud *Galenum* lib. 3. de compos. medic. per gen. cap. 8.) curari exoptant; quibus si repugnaveris, confidentiæ in te maximum momentum negliges. Mangonium sæpiùs pati, non aliena solum, sed nostra quoque, toto die experimur: Doctum rationis lumen si adhibeatur, à veris supposititiis facile dignoscuntur. Perierit aliqua peregrinis istis, cum tempore, per viarum longinquitatem, virtutum particula; eandem nec in nostratibus, præsertim odoratoribus, præcavere semper possumus; sufficit, potior, eamque efficacissimè operantem Moscho superesse partem. Obscuri natales curiosum equidem animum torquere possunt, notissimæ tamen vires, experientia & ratione confirmatæ, Medicum reddere securum. Nec tanta hîc metuenda perpetua est obscuritas: Opinionum licet ingens occurrat diversitas, fabulisque sæpè plus quam animalibus, diuturnitate temporis in immensum aductis, historiæ involvatur veritas, ita ut nihil periculosius hisce singularibus historiis, cum *J. C. Scaligero* exercitat 211. de subtilit. §. 3. fateri cogamur, magnumque adsit scribendi periculum, quando fides, nostra ex aliorum fide, interdum & mendaciis pendet; cum sæpè nos scribente alicubi magno *Thom. Bartholino*, otiosa ingenia & faceta deludant, nonnunquam & lucris multa fingantur, quæ nusquam neque picta fuerunt, neque scripta, non rarò quoque inventis & visis aliquid sive ex ingenio addatur, sive ex ignorantia: Adcuratior tamen investigatio si non omnes, crassiores certè dispellet nebulas, & nostri usus Moschum clariori luci restituet. Interea tamen cum ipsum Moschi adire locum natalem, nec mihi, nec millesimo Medicorum liceat aut libeat, tantisque res ista tricis involvatur, facile huic quoque labori meo errores, passim

passim circa nostro quoque sub Sole nata simplicia observandos, immiscere se posse; praveo, quos, si certiora aliquando noveris, ut moneas, aut emendandi eos occasionem mihi præbeas, haud repugno; qui tam obstinati nunquam esse volo animi, ut, veritatem penitus si inspexerim, ejus in gratiam, priorem mutare sententiam detrectem. Modò veritatem absque convitiis aut livore propositam adplausum mereri, iis verò oneratam vilescere consideraveris. Veniam itaque potius, quam reprehensionem ab æquioribus rei æstimatoribus mihi polliceor. Interea tamen eò adlaborabo, ut nemini, quantum per conjecturas meas ratione fundatas licebit, fidem temerè omnem derogem; cui ex *Q. Curtio* lib. 9. Histor. nobilitatem canum Indorum transcribente, hoc potius semper animo obversabitur: *Nec adfirmare sustineo, de quibus dubito: nec subducere, quæ accepi.*

De Nomine Moschi.

Quamquam scrupulosiorem nominum speculationem minimè fori nostri esse debere, supercilioso alicui Censori videri queat, eandem tamen adcuratorem rei alicujus tractationem minimè fastidire, quinimo requirere, nemo facile negaverit; cum plurimis rebus communia probè distinxisse nomina, varia etiam conciliasse, rudiora emendasse, vel obscuriora explicuisse, in ipsius sapè rei certiorum, tutiorum, facilioremque nos deducat cognitionem, atque idcirco nominibus propter res utendum esse, lib. 2. meth. med. cap. 1. rectè *Galenus* edixerit, talique in sensu magnò nostro *Hippocrati* lib. de arte, τὸ ἐνὸμαστος τῆς φύσεως audiant νομοθετήματος. Quo ipso sanè respectu Ill. Naturæ Curiosorum Societas nominis non minùs habendam esse rationem in materia, à Collegarum aliquo pertractanda, prudenter voluit. Cujus itaque methodo & decreto insistendo, primò omnium impedimenta illa, quæ Moschi nomen parere posset, remove stat sententiis.

Inprimis autem vocabulum hoc in numero τῶν πολλαχῶς λεγομένων, eorum quæ multivariam dicuntur,prehenditur. Prout ὁ μίσχος tenellum ramum sive germen arboris denotat; *aleam*, ut habet *Clar. Casp. Hofmannus* lib. 2. de medic. offic. cap. 162. §. 110. ex arbore decerptam, & alteri insitam, unde est μίσχος δὲ ἢ μίσχος δὲ. *Propfen*, apud *Theophrastum*. Quidam volunt claviculam esse, qua vites v. g. arbores proximas apprehendunt scanduntque. Et *Gabr. Fallopius* comm. in lib. 1. *Dioscor. de mat. med.* cap. 24. Græcis nomen hoc pediculum denotare scribit, quo flores olea sustentantur.

Mόχια nominari vascula illa ceparum, semen in summo caule servantia, autor est *Marcell. Virgilius* Com. in *Diosc.* cap. de Musco, quàm fortè appellationem sortita fuerunt, quòd ὄχειν apud Græcos unam ex tunicis istis, testes animalium involventibus, scroti sub erymo communiter notam, designet; vascula autem illa ceparum semina similiter involvât.

Vegetabile porò illud, quod Græcis βῆλον, apud Latinos ut plurimum quidè *Muscus* dicitur, à nonnullis tamen etiam *Moschi* & *Muschi* nomen obtinuit.

Quin & proprium quorundam Virorum nomen id esse, legimus. Sic Medicus ille Græcus, qui librum scribit περὶ γυναικείων νόσων, de morbis mulierum, *Moschio*, vel *Moschus* adpellatur. Eiusdem aliorumve *Galenus* passim in suis Operibus nemini: uti lib. 4. de differ. puls. c. 16. lib. 1. de comp. med. sec. loc. c. 1. lib. 5. c. 2. lib. 7. cap. 2. lib. 2. de comp. med. sec. gen. c. 14. lib. 2. c. 18. lib. 3. c. 9. lib. 5. c. 14. necnon *Aur. Cornel. Celsus* lib. 3. cap. 18. Grammaticus etiam & Poëta *Syracusanus*, de quo *Suidas* consulendus, *Aristarcho*, Grammaticorum tum facilè p̄ncipi, familiaris, *Moschus* fuit di-

ctus. Similiter *Horatius* lib. 1. epist. 5. cujusdam, quem Rhetorem, patria Pergamenum fuisse interpretantur, mentionem facit, de eo canens:

Mitte leves spes, & certamina divitiarum,
Et Moschi causam.

Alium in Elide Philosophantem, perque totam vitam aqua tantum & ficibus viventem, ex *Hegesandro Delpho Athenensi* lib. 2. Deipnos. recenset. Primum quoque atomorum doctorem quendam *Moschum* *Sidonium* vel *Phœnicium* existisse, *Straboni* ex *Posidonio* in 16. Geogr. debemus; Quamvis eundem à sapientibus Hebræorum vetustam illam sapientiam mutualisse, *Isaaco Cardoso*, Medico Veronensi, & ipsi Hebræo, pag. 9. *Philosoph. liber*, credibile videatur, non refragante Ill. *Roberto Boyle* Chym. sept. part. 2. cum Phœnices maximam eruditionis suæ partem ab Hebræis acceperint. Eodem nomine ægrotus gaudet, qui apud *Hippocr.* lib. 2. de morb. popul. sect. 2. calculo graviter, & palpebræ superioris hordeolo laborans proponitur, tum & cujus morbus lib. 4. pag. 1127. *Cod. Foes.* de p̄n. gigitur. Nec prætereundus est famosus ille *Demetrius Phaleri* Coquus apud *Athenam* lib. 12. (qui etiam lib. 6. 7. & 9. aliorum hoc nomine doctorum meminit,) ut & imperitus *Citharædus*, qui citra respirationem in longum producebat vocem inconditam; à quo enatū adagium: Μίσχος ἄδων βοιωτέων, *Moschus canens Boeoticum*; habet *Erasmus Roterd.* chiliad. 3. cent. 3. n. 76.

Integri quoque Asiæ populi, Colchis & Iberis finitimi, sic nominati fuerunt, à quibus & montes *Moschici* nomen acceperunt. Vid. *Sam. Bocharus* lib. 3. de dispers. gent. cap. 12. Hos *Meseck* in sacris Litteris dici scribit *Montanus* in Appar. Bibl. Qui verò hodie *Moschi*, sive *Moschovita*, vel *Moscovita* audiunt, versus Occidentem magis vergunt, Rulciæ albæ sive majoris incolæ.

Urbem *Moschum* in Polonia magna nobis proponunt in tabulis suis Geographi; quos inter *Nicol. Joh. Piscatorem* nominare lubet.

Non minùs & *fluvius*, qui vulgò *Morava* audit, ita dici obtinuit. Et *Elias Herckmannus*, cum Anno 1641. in expeditione Brasiliensi, circa fluvium *Tambahujam* odorem suavem, à Crocodilis nonnullisque Serpentinibus exhalantem percepisset, eundem *Moschi* epitheto condecoraverat; Confer. *Dapperi* descript. Americ. lib. 3. cap. 4. pag. 559. edit. Germ.

ὁ δὲ ἢ μίσχος Græcis vitulum & vitulam denotat, quæ vox ad bovem quoque novellum seu tertiæ ætatis sefe, quorundam judicio, ex endit.

Simile nomen etiam Elephantis pullo, *Bubalidis* castulo, *Agno*, & *Arieti trienni* imponi, *Samuel Bochartus* Hierozoici part. 1. lib. 2. cap. 23. & 28. ostendit.

Lachrymam porò cervinam eodem vocabulo dignatur *Casp. Schuvenckfeldius* pag. 85. Theriotroph. Siles. cap. de cervo.

Quæ omnia tamen adcuratorem hîc consideratorem non subibunt, cum potius de re longè ab his diversa, odoramento nempe præstantissimo, ab animali quodam, nobis Europæis peregrino, suppeditato, agere sit constitutum; cui scilicet Recentiores Medici nomen *Moschi* imposuerunt, eâ prærogativâ gaudens, ut, simpliciter vocabulo isto in Scholis & Libris Medicorum prolato, nemo de alio, quàm simplici hoc medicamento cogitet.

Licet autem receptissima hæc ejus sit adpellatio, & quæ sola sefe civitate, ut ita dicam, literaria donatur, perpetua tamen haud est, varia Synonima recipiens. Utracumque, quòd à quibusdam *Moschon*, *Moschum*, *Mosus*, & *Muschus* pronuncietur, corruptè satis, si *Moschus* apud Latinos nomen id à Græca nomenclatura: Μίσχος, acceperit, quò nempe vocabulo *Aëtium* inprimis & *Sethum* usos primò fuisse scimus; *Muscus* præcipuè passim à plurimis vocatur, id quod tamen barbariem aliquam redolere, sunt qui arbitrantur, in quam

quàm idcirco adcuratiores Medici meritò animadvertant, hincineptè admodum id fieri, *Leonh. Fuchsi* lib. 2. de comp. medic. cap. 54. est iudicium, & *Valer. Cordus* annot. in *Dioicor.* l. c. *Recentiores*, scribit, *muscum & moschum diversissimi generis medicamenta nominis similitudine decepti confundunt*. Et *Symphor. Campegius* in *Castig. Pharmacop.* lib. 1. c. 7. Officinas Moschum falsò Muscum adpellare, monet cùm sic à lapidum, fluminum, arborum &c. villosò musco minimè discernatur. Cujus erroris causam in utriusque non faltem vocis adfinitatem, sed & Officinarum inscitiam, & Librariorum in exscribendo incuriam rejicit *Salom. Albertus* in *Orat. de Moscho*. Et *Joh. Placotomus* in sua *Pharmacop.* de emendatione corruptorum vocabulorum agens, multa eorum partim Medicorum incuria, partim impertitia Græcæ Latinæque linguæ corrupta esse monet, quæ & restitui debeant, & parvo negotio possint, idque vitium aut in genere. aut in declinatione, aut in orthographia tantum consistere, corruptis ò muscus, integris verò sive emendatis ò moschus pag. 94. adnumerans.

Quidam *Castoreum* nominant, quos inter in primis memorandus *Interpres* ille Latinus *Vartomanni*, scriptoris Itali, reprehensus propterea à *J. C. Scaligero* exerc. 211. §. 6. Cui errori ansam dedisse creditur Moschi recentissimi in odore gravitas, in folliculo generatio, colorisque citrini, quem *Ebn Sina* in eo commendabat, observatio, quæ omnia pariter *Castoreo* esse propria, ipsi sensus edocent. Quanta autem discrimina, à *Sal. Alberto* etiam l. c. proposita, feminis præcipuè, immineant, si duo hæc medicamina confundantur, unūq; pro alio sumatur, cùm re ipsa pateat, ostendere prolixius haud opus est. Ut ideo immensum errasse, vel tyrones discernere valeant, qui, *Constantini Africani* testimonio tract. de gradib. med. cap. de musco, Moscho non invento, *Castoreum* æquo pòdere valere dixerāt.

Nonnulli *Zibethum* vocant, cùm tamen diversissimi generis sint odoramenta, ideoque invicem minimè confundenda.

Matthæus Sylvaticus in *Opere Pandect.* c. 540. & alii quidam *Abonasa* vel *Abohanisa* vocant. Quod stultissimè esse scriptum, *Conr. Gesnerus* histor. animal. lib. 1. de quadrup. vivip. judicat. Hoc certè verum est, prædictas voces non aliud, nisi Autoris nomen indicare, cujus verba *Sylvaticus* ex *Joh. Serapionis* part. 2. de simpl. medib. cap. 185. de Moscho recitat.

Dicitur etiam, pro varia Autorum intentione & sententia, *Sanguis coagulatus*, *Excrementum*, *Pus*, *Sanies*, *Apoſtēma animalis moschiferi*. Sed qua probabilitate, ex subsequentibus, ubi de natura ejus sermo erit, clarum evadet. Cum additione quoque Moschus *aromaticus*, *odoratus*, *Alexandr. Orient. Occident.* &c. profertur:

Mauritani vocant *Mesch*, vel *Misch*, sed potissimum articulo: al addito, *Almisch*, Arabes imitati. Quod vocabulum hodie à Lusitanis juxta ac Boeticis, h. e. Hispanis (quibus nempe *Almizcle* vel *Almizq;* dicitur,) receptum esse, tradit *Amat. Lusit* comm. in d. l. *Dioscor.*

Sinæ, referente *P. Martino Martino* in *Atlante Sinico* cap. de Provincia Xensi, pag. 44. animal ipsum *Xe* nominant, à quo *Xehiang* formant, quod animalis *Xe* odorem seu fragrantiam, i. e. Moschum denotat: Ipsum verò Moschum à *Boymio* non benè itidem *Xe* adpellari, inferiùs videbimus.

Germanis *Bisam*, *Bisem*, *Bysem* dicitur: cujus vocis originem *Gesnerus* d. l. ex Hebræicis fontibus deducit: cùm *בִּישָׁם* *bisem*, vel *bosem*: *Aroma* interpretentur; ceu ejus specimen *Exod.* cap. 30. vers. 23. videre licet. Idque faciliùs ut credamus, Hebræorum sive Judæorum in ipsis Indiis, Portugallia, & Venetiis multitudo, ac mercaturæ dedita vita persuadere possunt: à quibus nempe in Germaniam nostram ex locis istis fortè delatum primò, transmissumve odoramentum istud sic adpellari obtinuit. Quod si ita esset, corruptè admo-

dum *Disam*, *Thiesem* vocaretur.

In Etymologia non minùs variæ discrepantes sententiæ occurrunt, dum Moschi, vocabulum vel *μῶσχος* *moschos* *χῆδαι* *è medio fundi*, derivant. quòd scilicet è medio umbilici animalis Moschiferi fundatur, vel à verbo: *μῶω, μῶ, vehementer cupio, quero*; quia odoris propter excellentiam magna cupiditate desideretur & quærat; vel ab *ὄζω, oleo*, quòd odorem de se emittat; vel à privatione odoris, cùm *ὄζω* *benè & malè olore* significet, & litera *μ.* privationis loco præfixa sit. Aliis, dum *πῶσχος*, ut supra dictum, apud Græcos vitulum etià novos teneriores arborum stiones, & membranacearum vasculorum denotat, nominis indè rationem petere placuit; animal moschiferum fulvo colore, natura, & magnitudine vitulum referre, sibi imaginantibus; in quo novi, ad dictorum germinum similitudine, odoramento illo pleni nascantur folliculi, quiq; ipsi à cepaceorum vasculorum figura non multum recedat, Moschum instar seminum in se recondentes: Aliis autem à Musci illius arborei specie, quæ à *Galeno* *βόων ἀρωματικόν* dicitur, & apud *Dioscoridem* lib. 1. de mat. med. c. 20. Aromata inter locum meretur, ad varia Odoramenta & Unguenta à Veteribus adhibita: Aliis denique à Mure, quem moschiferum esse, *D. Hieronymus* (uti infra dicitur) innuere videtur. Quos omnes tamen deceptos fuisse, nullus dubito. Et quis non ridiculam quorundam, obscuram, aut longissime petitam derivationem videat; ut certè, diutius immorari illis, aut vanitates istas perstringere pudeat.

Arabica autem originis esse, & Græcos, ac consequenter etiam Latinos, ab Arabica voce, qua *Mosko* & *Moschmumo* vocatur, suum derivasse Moschum, longè videtur verosimilius; præsertim cùm primam ejus notitiam & Græci, & Latini, aliæque Nationes Europæ debeant Persis & Arabibus, Moschum cum aliis Aromatibus per Mare rubrum ex Sina & India Alexandria deferentibus, à quibus illi edocti nomen ipsum cum re familiarem sibi reddiderant. Qua in sententia plurimum me olim confirmaverat magnus Orientalis Literaturæ Doctor, *Exc. D. M. Joh. Frischmuthius*, ejusdè in Academia Salana Professor Publ. celeberrimus; qui & ipse in lingua Arabica genuinam vocabuli Moschi originem esse quærendam statuit. Utrum verò à radice *Masaka, tenuit apprehensum*, rectè quidam deriverint à *Mesko*, quod idem ac *Moscaton* Persica origine Moschus; pretiosum odoramenti genus, ab Arabibus *Moschmumo* vocatum; vel an alium agnoscat fontem, aut etiam primitivum sit apud Persas & Arabes vocabulum, incerta sunt omnia, nec scire ea, multum referre potest. Satis itaque verborum; rem ipsam potius jam adgrediamur.

De Moscho, ex folliculo, ab animali deposito.

Nobilissimi Odoramenti hujus natales variè in Eruditorum aliorumque monumentis describuntur, ut ferè nescias, cuinam adhibere fidem debeas. Singulatim itaque omnes primò recensere & examinare, quantum licet, maximè est necessarium.

Magna verò Scriptorum pars in quodam tumore, seu eminentia abdominis, eaque vel naturali, vel præternaturali adquiescit. Unde ex. gr. *Joh. Renodens* lib. 1. de mat. med. cap. 15. sanem quandam adpellat, reliquas omnes Moschi varietates bonitate superantem. Et *Gabr. Fallopius* de mat. med. in lib. 1. *Diosc.* cap. 24. cum tumoribus cysticis comparat, *Credo*, inquit, quòd *addiveritis à me* & *ab aliis*, quòd nascuntur in corio hominum quedam tubercula, quæ habent vesicam in qua continetur sanies, quæ est aliquando crassissima veluti substantia lardi. Ita in quodam animali Indico concrevit aliquando gemina, aliquando multiplex vomica in corio, in qua colligitur sanies crassior subnigra, inclinans in rubedinem, & hanc vocamus moschum. Et *Joh. Jacob. Weckerus* lib. 1. Antidot. spec. sect. 30. de excrementis rer-

tiæ concoctionis agens, excrementum nominat in tumorem concretum. *P. Mart. Martinus* partem continentem pro contenta describens, *Quid Moschus sit*, scribit in *Atl. Sin. l. c. dicam plus vice simplici testis oculatus: Tuber seu exuperantia quædam ad umbilicum animalis est, parvum marsupium referens, subtili pellicula ac subtilissimis pilis vestita constans.* *Leonhard. Fuchs* lib. i. de comp. med. cap. 16. pus odoratum quidem nominat, ast quod ex tumoribus naturalibus, quales in Castore sunt & Leporibus, proveniat; quod & *Rondeletius* lib. de Amphib. cap. 8. adserit.

Quidquid sit, de illa tantum Moschi specie hoc in Capite agendum mihi proposui, quam ex tumore aliquo abdominis aperto ipsum animal effundere nonnulli tradiderunt.

Illud enim cæstro agitatum venereo, furibundum hinc indè vagari, cibum & potum averfari, crebroque se humi volvere ac fricare, adserunt, quam fricaturam sanguinis in folliculum seu receptaculum & officinam Moschi à Natura destinatam adfluxus excipiat; qui satis inibi accumulatus, inque Moschum convertitur, pruritum dein animali excitet; unde continua corporis sui versatione utriculorum terræ impingat, aut obviis arborum truncis rupibusve asperioribus, Solis calore & radiis illustratis, magna cum delectatione adfricet, qui magis magisque hac ratione attenuatus tandem rumpatur, atque materiæ contentæ liberum effluendi spatium largiatur; quo sanguine evacuato, iterum consolidetur, novum illuc decubiturum sanguinem deinceps rursus excepturus atque evacuaturus.

Moschum tali modo ab animali depositum, & Solis calore coagulatum, aërisque & cæli bonitate coctum ac digestum, Regionum istarum incolæ, quibus loca & mores animalis cognita satis & perspecta sunt, colligere, Magistratui offerre, ab eoque præmio vel certo constituto pretio, redimi, perhibetur. Ne commodum autem destituatur repositorio, ipsorum animalium, venatu caprotum, abscissis folliculis includi, vel in plumbea aliæ pyxide adservari, creditur. Et hac ratione collectum raro ad manus nostras pervenire, nobis persuadere pergunt, cum in Regum, Principum, & Magnatum usus impendatur, quo veluti munere insigni ac illustri donentur.

Relatio hæc omnium est antiquissima, cujus primos, qui ad nos pervenerunt, Auctores sunt Arabes, quos inter merito nominare decet *Johannem Serapionem*, sive *Ebn Serapionem*, profundissimum & antiquissimum Arabem, quo eum elogio exornat *Nobil. D. Guern. Rossinius* tract. de dolore capit. lib. i. sect. i. cap. ii. Quem tamen cum nonnisi Latine, vulgari & barbarâ versione *Abrahami Judæi* & *Simonis Januensis* indutum habeam, verbotenus exscribere, consulto supersedeo. Hunc sequutus dein *Constantinus Africanus*, *Monachus* tract. de gradib. medic. Ex Græcis etiam Scriptoribus *Simeon Sethus*, *Antiochenus* in lib. de aliment. facult. lit. M. part. 6. Πάντες, inquit, δὲν ὀμφαλῶν δρογύνωνται ζωὴν ἰνὸς μονοκέφαλος, μέγιστος ὁμοῖος δροκάδι; εἰς ἐμμανὲς γὰρ τὸ ποιεῖν τὸν ὄγκον τὸν ὀμφαλὸν. καχυμερὲς αἷματος ἐν τῷ συναγμῷ, καὶ ἰλιαιῶτα νομῆς καὶ πρὸς ἀπέχεται, καὶ κυλίσσει ἐπὶ γῆς καὶ δροβάει τὸν ὀμφαλὸν αἵματος πλήρη βαρβαρώδες, ὡς περ πηγνύμενον μετὰ ἀνακρεῖν, ἰκανὸν, ἐκκρίνεται εὐωδία. Omnes autem (species Moschi) in umbilico animalis cujusdam unicornis, maximi dorcadi similis, nascitur; nam cum istud animal veneris cæstro percellitur, intumescit ei umbilicus, ob crassum sanguinem in eo collectum, quo tempore cibo & potu abstinet, & humi se volutans, umbilicum sanguine cæstro repletum abjicit, qui debito tempore coit, & bonum odorem acquirit.

Serapionem dein plurimi alii suum fecerunt, eandem historiam paucioribus modò, modò pluribus circumstantiis proponentes & immutantes; quos inter nominare decet *Alex. Benedictum* lib. 13. pract. c. 26. *Anron.*

Mus. Brasavolum Exam. Sirup. Franc. Alexandr. Apoll. Pharm. rad. i. pag. 17. *Vincent. Burgundum* Bibl. mund. lib. 19. Spec. natur. c. 93. *Bernh. Dessenn.* lib. 6. de comp. medic. cap. de Gal. mosch. *Petr. Andr. Matthiol.* l. b. i. herb. cap. 15. & com. in lib. i. Diosc. de mat. med. cap. 26. *Joh. Renod.* l. c. *Theod. Corbejum* in bipart. simpl. & comp. pharm. class. 3. sect. 1. *Contr. Kunrathum* medull. destill. & med. part. 2. tract. 17. *Vopisc. Fortun.* Plempium schol. in Avic. lib. 2. tract. 2. c. 13. *Joh. Jonstonum* taumatogt. natur. de admir. plant. class. 5. c. 28. *Johan. Schröderum* Pharmacop. med. chim. lib. 5. class. i. cap. 27.

Quæ tamen num veritatis laudem omnia mereantur, haud immerito dubitatur, fidem inprimis derogantibus plurimis ex iis, qui alios colligendi & conficiendi modos hoc seculo nobis descripserunt. Mihi tamen nec absque discrimine negare cuncta, nec admittere etiam simpliciter adlubescit. Ut enim sanguinem, vel succum potius ei quasi analogum, in folliculum colligi, ipsa eorum anatome ostendit: ita eum quoque restagnantem, & plus justo acriorem redditum, posse pruritum excitare, quis jure inficias ire queat? Quin & eundem, in præternaturali statu quandoque constitutum, putrescere, inque purulentam materiam converti, quæ disrupto à fricatu & c. folliculo effluat, non est impossibile. Quanquam hoc, si unquam observatum, rarum quid sit & extraordinarium, nec ideo in omni animali isto moschifico contingat. Alia tamen etiam nonnulla subesse fictitia, haud planè negaverim.

Et quidem temporis determinationem quod attinet, dum sanguineum liquorem illo tantum tempore, quo animal in venerem ruit, ad receptaculum suum confluere perhibent, non usque adeo infallibilem veritatem proponunt. Licet enim tum majori in ὀργασμῷ sanguis sit constitutus, adeoque etiam copiosior & spirituosior in locum istum confluat, à quo dein ipse quoque folliculus magis intumescat, cum tamen hic non simplex & statuto solum tempore intentetur à Natura intumescencia, vel cutis aut cuticulæ à substrato corpore separatio; sed revera corpus aliquod naturale, cavitate insigni, & structura singulari exornatum præexistat, minimè videtur ambigendum, quin & alio omni tempore commeatus ille succedat, præcipue cum specialis ista temporis expositio merum sit Recentiorum nonnullorum, qui Indias nunquam perlustrarunt, aut etiam animal nusquam viderunt, in cerebro natum figmentum; cujus antiquissimi Scriptores, *Serapio* & c. nullam prius fecerant mentionem. Unicus tandem *Sethus* voce: εἰς ἐμμανὲς utitur, quæ decepisse dein reliquos potuit, dum eadem, cum veneris cæstro percellitur, nonnulli fuerunt interpretati, aliis tamen simpliciter & cautius cum stimulat exagitatque, exponentibus. εἰς ἐμμανὲς enim propriè furorem quemvis veluti cæstro incitatum innuere, nemo qui ipsam vocis naturam considerat, potest ambigere. Licet aliàs ad insanum saltem libidinis stimulum non minus vox illa in specie transferri queat, absque tamen prægnantiori aliqua causa unico illi stimulo adjudicari neutriquam debet. Animalia verò non solum, in venerem dum ruunt, sed aliis quoque ex causis furere, plus quam est notissimum. Nihilominus eo ipso tempore, quo Capiteoli moschiferi libidine agitantur, majorem humorum ad folliculum contingere adfluxum, & indè magis intumescere eum, atque in apricum prodire, minimè nego, ut ita, dum antea delitescerebat quasi, neque oculos admodum incurrebat, tum demum enatum esse, in cautioribus imponere, fabulæque isti ortum dare potuerit.

Pari nituntur incertitudine, qui modò in Plenilunio, modò in Novilunio Moschum produci tradiderunt. Sic *Odoard. Barbosa*, citante *Laur. Catelano* c. ii. de conf. alkerm. Moschum saniem esse apostematis, in Summar. regn. & popul. Orient. scribens, transire eum in hanc perfectionem, subjungit, Lunâ in plenitudine existente.

Econtra Novilunii tempore abscessum hunc protuberare, *Henric. Salmuth.* in Comm. ad Guid. Pancirolli lib. 2. Memorab. tit. 1. perhibet. Quæ fortè opinio ex altera illa, menstruo mulierum sanguini quâ comparatur, ortum traxit, ita ut juvenularum ad excretionem aliqui, ad provectionem ætatem alii respexerint. Nisi conciliare fortasse eisdem liceat, Novilunium collectioni, Plenilunium perfectioni destinando. Verùm mera hæc esse ingeniorum somnia videntur, quæ eadem facilitate, quâ producuntur, negari etiam possunt. Hinc cautiore alii *certum aliquod anni tempus* nominando, nil certi determinare maluerunt. Et mihi cuncta ista liceat conjungere, ac, quod omni tempore, sive plenâ, sive novâ, sive etiam falcata facie Luna sese ostendat, Moschus in animali isto generetur, concludere.

Ex hoc itaq; sponte jam elucescit, quid de *Joh. Ruellii* sententia statuam, quâ hanc Moschi productione quotannis, sive semel in anno fieri existimat; cui accedebat *Zacut. Lusit. Medic.* Princ. hist. lib. 1. hist. 9. *Portentofum*, scribens *natura miraculum videre est, nempe animal quoddam Indicum, pretiosissimum odoris genus ex umbilici vomica quotannis deponens.* Annuæ huic creditæ generationi ὀπυαζόν illum venereum ansem dedisse, nullus dubito, quem semel in anno contingere, sibi fortasse peruaferant; nec adeo improbabili, cum & nostris in terris cervino generi semel in anno, declinante scilicet ætate, vel sub ingressum autumnii, idem maximè familiaris deprehendatur. Ratum interea sit, Moschum in folliculo semel in anno, i. e. ut ego interpretabor, semel & semper elaborari.

Utrùm verò ab ipso animali folliculus vi quasi dirumpatur, Moschusq; evacuatus reliquis omnibus præferatur, paucis nunc dispiciemus. Mihi sanè id minimè videtur. Qui enim talia ad nos perscripserunt, receptaculum Moschi esse tumorem aliquem præternaturalem, vomicam, vel apostema, ipsumq; contentum succum saniosum quid esse crediderunt; quem cum sanguini reliquo non remisceri aut in corpus readsumi, substantiaque sua acri atque insolita vicinis partibus non posse non molestum evadere, considerarent, stimulatam exinde animal, volutatione & fricatione dirumpere vomicam, egregiè cõmenti fuerunt. Dum verò naturalis illa Moschi collectio in omnibus istius generis animalculis existit, & per meatum à natura concessum faciliè evacuatio fieri potest, meritò præternaturales illas excretiones rejicimus; præcipuè cum in tot, quot vidi, folliculis nullum relictæ cicatricis vestigium deprehendere valuerim; nec tamen omnia animalia ista, à quibus præfati folliculi abscissi, juniora indiscriminatim fuisse, ideoq; Moschum contentum primum saltem, qui collectus ibi fuerit, esse dicendum, nec cicatricem eapropter, ob nullam antea factam rupturam, adesse potuisse, sit credibile; imprimis quia plurimos illorum folliculorum densa admodum præ reliquis substantia & corio præditos, provectionis ætatis animalibus fuisse ademptos, non inanis planè sit suspicio. Quamvis, ut paulò superius innui, eundem liquorem in præternaturali statu sic aliquando evacuari posse, non adeo sit impossibile.

Ut verò meam hîc conjecturam proferam, animalia hæc libidinis stimulo agitata, in terra se & super saxa volutare posse, aut etiam, cum eo in statu contentis in utriculo humor acrior, spirituosior & turgeatior dubio procul reddatur, arborum truncis &c. sese adfricare, pruritumq; ita demulcere, existimo; quâ ipsa frictione ad exitum propior & in vivo animali liquidior, imò in allatis etiam ad nos recentioribus quibusdam folliculis nonnihil liquidiuscula aliquando Moschi substantia fortè extruditur atq; exprimitur, sicq; arborum truncis vel saxis adhærens, ruptæ vomicæ persuasionem, purulentiq; humoris suspicionem præbere rudioribus spectatoribus potuit, præsertim cum & in folliculo recenti foraminulum ab ulcere relictum, aut

in aridiori aliquid cicatricem quasi referens, meatus scilicet naturalis ab exsiccatione factam corrugationem, postea conspicerent.

Ubi sanè non omnem analogiam cum animali Zibethico, sive Hyæna odorifera, ut *Petr. Castellus* in libello de ea conscripto vocat, exclusam velim, quod à repletis Zibethiferis suis vasculis inquietum reddi, humorisque istius evacuationem, confricando se arborum truncis, moliri, communiter, nec refragante experientia, adseritur.

Veruntamen tali naturæ instinctu expurgato, diuturniorq; sub Cælo & Sole mora, ac venditata digestionem perfectò Moscho quis tantâ, quæso, tribuere queat excellentiam, ut non nisi Regiû ac Principibus dignû cõferi debeat donariû? Annon longioribus aëris injuriis subjectus, ardentioribus etiâ Solis à radiis exsiccatus, subtilissimâ sui parte, & cõsequenter odore excellenti, si non omnino, saltem maxime ex parte exueretur? Ut anile propemodû sit figmentû, talem regia inter dona collocari, qui vix à plebiis leviori pretio redimeretur.

Ex dictis nunc colligere etiâ quilibet poterit, de illorû opinionibus quid decernendum sit, qui non tantum menstrui cû sanguinis fluxu cõparare Moschum, sed cû fœda insuper apostematû sanie conferre ausi fuerunt. Meras utpote esse ingenii fictiones, aut fabulas, falsis ex hypothesebus & rationibus sēsimeatas atq; cõflatas.

Nimîum ergo se aliosque ludere voluisse dicendus est *Oswald. Croll.* qui ut in cæteris etiâ Signaturis explicandis sæpe ad nauseam usq; laboriosus est, ita & hoc in passu, dū Medicos & Chirurgos multa morborû remedia, ac rerû virtutes à brutis animalibus edoctos fuisse adserens, in specie, vomicæ curationem, Chirurgis Capreas has silvestres, ut vocat, demonstrasse perorat, tã procul à vero aberrat, ut ne quidē refutari mereatur.

Menstruû autè sanguinè quod attinet, imprimis *A. M. Brassavolus* l. c. (diffusius idem explicante *Sal. Alberto* in Orat. de Mosch.) materiam hanc odoratam naturaliter per illam viam, per modum crisis expelli prodidit, addens: *sicut in multis aliis menstrua sunt.* Absurdum tamen hoc esse, *Catelanus* objicit, cum hac ratione in femellis solum inveniretur; id quod à veritate alienū putat, cum utriq; sexui æquè competat. Justo tamen rigorosior animadversionem parat, licet enim utriq; sexui Moschi generatio competeret, quod equidè incertum, nec à quoquam determinatum, haud tamen est incredibile, præsertim cum & Zibethicû animal utriusque sexus pinguedinem istam largiatur, considerare nihilominus debuisset, analogiam saltem aliquâ Moschi inter & sanguinis menstrui evacuationem proferri, non quæ ex omni parte conveniat.

Esse verò humorem excrementitium, è corpore propellendum, tum meatus illius naturalis, eidem exitum concedentis præsentia, tum alterius alicujus, eundem receptaculo in corpus reducentis absentia, clarissimè evincunt. Cæterum an utilia inter excrementa, vel quæ ipsi animali usum aliquem, post sui in folliculo collectionem præstet, recenseri debeat, an inutilibus adnumerandus sit, qui simpliciter excerni postulet? meam fateor ignorantiam, quam nempe sola crebrior istiusmodi animalium, natali præsertim in loco inspectio, tum etiam anatomica perlustratio discutere fortassis valeat; quibus sanè subsidiis hætenus destituimur; cum illi, quibus fortuna hoc concessisset, lucto tantum vel aliis rebus potiùs intenti, hæere in ignorantia, aut mendacibus aliorum relationibus nimium fidere, aut etiam præconceptarum opinionum nebula dementari maluerint. Mihi tamen excrementum esse inutile, statuere interea libet, usque dum aliquando certiora edoceat; prout & in Zibethico animali, magis noto, strigmentum illud unctuosum, animalis ipsius intuitu, inutile & excrementitium prorsus esse, extra omne dubium hætenus fuit positum.

An vero sanguinis hic aliquam purgationem à biliosa & acri superfluitate Natura molitur, hæreo; certe sapor amaricans, sedini alicui mixtus, ut & color flavescens, non planè illud improbant.

Quo cæteroquin modo secretio ista peragatur, præstat meam fateri ignorantiam, quàm & in cunctis, notioribus licet, terræ nostræ inquilinorum animalium, imò ipsius corporis humani secretionibus, atque speciatim in evidentiori hepatis officio candidè non dissimulavit candidus Collega noster curiosus, Nob. D. D. Joh. Conr. Peyerus exerc. secunda de gland. intest. pag. 82. & 98. Cui interea amplam fidem adhibeo, nullam scilicet in animalibus secretionem, nisi per glandulis fieri, ut ideo neque in hoc nostro animali eandem aliter succedere conicere queam; quantumvis tales hætenus ob minimam molem & folliculorum recentium denegatam inspectionem oculos nostros & notitiam effugiant, à curioso aliquo forrè olim in aprium deducenda. Illas enim, quas inferius Cap. X. recensabo, ob situm earum, circa meatum excretorium ipsius folliculi occurrentem, huc trahere minimè audeo.

Unde veniam hac incertitudine utique merebor, præsertim cum nemo hætenus Anatomicis nostris, licet oculatissimis, vitio vertere soleat, quod in tanta subjectorum anatomicorum copia, & infinitis cadaverum humanorum sectionibus, nondum, utri plurimorum clarissimè post multas conjecturas tandem fateri coguntur, Lienis, Renum succenturiatorum & c. usum & officium verè detexerint, aut extra dubitationem omnem posuerint.

Sed aliorum etiam sententiam perustrare, & qualem *Catellanus* conjecturam proferat, inspicere decet, qui nempe vesiculam istam ad umbilicum à Natura positam fuisse, venditat, ut instar receptaculi cuiusdam humoris crassi esset, cum quo certum, qui vesiculæ insit, meatum linguam humectans, partes corporis sui dolentes, pedes præcipuè & genua, inungere soleat hoc animal, ut ratione hac, veluti refectioe quadam lassitudine medeat, quam ex continuo cursu & per scopulos saltatione contraxerat. Cui tamen adversatur *Andr. Chioccus* in *Mys. Calceol.* sect. sexta, id nec cerâ ratione, nec Autoris alicujus fide probari, obiciens; humorem præterea illum esse odoratum, calidiorem, atque eapropter siccum valde, & longè distitum ab ea humoris temperatione, qua partes oblini atque ad motum refici possint. Et cum non raro integris ablatis vesiculis, alias denuo animalibus isti in campestria loca remissis enasci, *Catellanus* perhibuisset, si hæc vera sint, ad oblinendos artus humorem hunc non facere, *Chioccus* regesserat. Ego quidem *Catellano* lubentius accederem, si, quæ magna cum confidentia dicit, à *Moscho* confirmasset, quæ tamen ipsum oranino destituit. Quamvis cæteroquin odoratus ille humor spirituosæ substantiæ suæ effluviis lassitudini, à motu vehementi, depauperatis spiritibus, inductæ, medelam aliquam adferre, spiritusque restituere posse, utique dici queat. Per meatum tamen illum naturalem num eundem, qui à me postea describeretur, intelligat, parum refert. In hoc autem non exiguum errorem commisit, quod ablatis etiam integris istis vesiculis, & animalibus mutilatis in campestria loca iterum in libertatem dimissis, paucos post dies, odoriferarum herbarum pastu, alias vesiculas, veluti vomicias prægnantes, regene-

rari dixerit cum Natura parens partes ejusmodi organicas & magnâ industria fabricatas, si semel fuerint abscissæ, regenerare nunquam soleat, imò à recenti ista lassitena dimissum animal vitam ulterius vix protrahere valeat.

Ipsè vicissim *Chioccus* sicciorém animalis istius naturam, continuum cursum, & herbarum siccicarum odoratarumque pascum intuitus, nec minus lienem, expurgando crassiori & sicciori succo qui par esset, tam grandem haud obtinere ratus cum motui validiori & crebriori impedimento esse queat, providam Naturam, quæ nunquam in necessariis deficit, effingendo has vesiculas sive vomicias splenis defectum eleganter & fructuose supplevisse concludit, ut humor omnis illè siccior & crassior, alendo minimè idoneus, perfectè evacuetur. Sed hic quoque omnia incertissimis nituntur fundamentis. Nam 1. continuum cursum *Phil. Marini* relatio, inferius adducenda, quod in dubium vocare queat, ut non dicam, nostrorum certè Cervorum & Capreolorum familia, corporis agilitate maximè licet polleat, vicariò ejusmodi liene destituitur. 2. Quamvis nardò aliisque siccis & odoratis herbis pro cibo utatur, solas tamen illas in pabulum cedere, & alias etiam, contrariâ qualitate imbutas, quis spondere, quæso, nobis poterit? Quin & nostri capreoli ac cervi, non frigidas tantum & humidas, sed & siccâ, calidâ, atque odoratâ qualitate præditas herbas depascunt. 3. Lienis parvitas est commentitia, neque oculorum fide comprobata; quod si verò talis fuerit, eo ipso Naturam, dum ob motus celeritatem, cibique creditam salubritatem & spirituositatem, excrementitiam, qui in viscere illo elaborari ac separari olim credebatur, humor perpaucus producit, parvulum etiam lienem concessisse, facile posset regeri. 4. Lienem magnum, naturalem tamen, valido motui obesse, non quidem simpliciter negaverim, ast parvum eidem periculo subiacere, pariter dixerim, præcipuè cum in celeriori motu sanguis justo concitator minus expandi & rarefieri in parvulo corpore queat, ideoque molestiam eò promptius eidem communicet. 5. In folliculo moschifero nullo quoad structuram cum liene similitudo deprehenditur, quæ aliqualis facilius admitteretur, si illa à quibusdam olim falso credita lienis cavitas inveniretur.

*De Moscho, cum folliculo ab Homini-
bus adempto.*

Cum Moschum in extruberante quodam abdominis receptaculo naturaliter inveniri, sponte tamen ab animali moschifero, per pruritum incitato, in usum humanum non evacuati, jam demonstratum sit, paucis nunc de altera illa opinione, quæ odoramentum hoc violentiâ quadam humana auferri prodidit, est agendum.

Crescente enim illius desiderio, & spe præcipuè largioris inde ex impetrata copia proventuri lucri, ipsum in animalis corpus sævire tandem homines incepisse, creditum fuit. Qui itaque non destiterunt, laqueis atque sagittis animali struere insidias, quo suam in potestatem tam vivum, quam interemtum redigerent. Atque spe suâ hoc modo potiti, folliculum turgentem unâ cum humore in eo collecto abstulerunt, quem tamen ingrato odore inquinatum perfluentes,

liberiores aere suspenderunt, ut Cœli serenitate Solisque ardore digestus atque exquisitiùs percotus, quidquid injucundum fœtidumque haber conjunctum, deponeret, sicque suavissimus efficeretur.

Hunc collectionis modum & ipse nobis *Serapio* primus tradidit, quem tot alii postea descripserunt, qui, juxta vulgarem versionem, Venatores in terris Theberth & Seni, extensis funibus laqueisque Gazelas illas capere, scribit; *Aliquando vero* (liceat, cum pace tua, L. B. ipsa reliqua verba, ex interpretatione cujusdam *Abrami Juda*, & *Simonis Jannensis*, adjungere) *sagittant eas & absciunt ab eis folliculum, & tunc est in odore ejus horribilitas, suspendunt ergo eos, relinquentes aliquo tempore, donec maturentur, & recedat fœtor eorum, & mundetur in aere, & sit tunc in eis Moschus bonus.*

Moschum hunc aliqui adulterium quidem proclamaverunt, ideoque in usum trahi eum, minus tutum & inconveniens fuerunt opinati: Eundem tamen pro tali acceptare, aut ex Pharmacopoliis, manibusve Medicorum relegare, minimè audeo. Qui sanè optimus & perfectissimus Moschus omnino est censendus, cujus copiâ qui potitur, omni reliquo carere facile potest. Atque, ut *Franc. Alexandri* voto utar, *utinam legitimus hoc modo ad nos traduceretur!*

Quamvis, si prior ille, ab animali sponte depositus, antequam meliores ejus particule in auras dissipentur, colligeretur, præstantissimi & perfectè elaborati elogium utique mereatur, non tamen alter iste omnino damnandus aut parvipendendus simpliciter erit; cum, si in ea ultima maturitate, qua titillare & ad folliculi apertionem perfricatum stimulare solet, auferetur, eandem ferè perfectionem habere dicendus foret: quæ sana admodum (si latentem de titillatione & fricatione fabulam excipias) decisio *Brasavoli* notari utique hîc debuit.

Utrum verò hac ratione in utriculo hærens malè oleat, aëris demum adflatu, Solisque ardore in suaviter odoratam materiam vertendus, merito disquiritur? *Brasavolus* sanè Venetiis odorare se voluisse adhærentem adhuc animali folliculum, gravemque omnino odorem se deprehendisse testatur; quem ideo nondum ad maturitatem pervenisse judicat. Quin & omnes reliqui, ingrato odore primùm displicere, Solis demum ac Cœli virtute coctum, odorem acquirere gratissimum pethibent. Verùm eadem hîc accidere posse, dicere mihi liceret, quæ in Zibetho, Balsamo, aliisque fragrantissimi odoris simplicibus deprehendimus. Hæc enim quò longius à nobis distant & levitè nares subeunt, eò citiùs suavitate suâ eas feriunt: quò propiùs autem admoventur & majori quasi quodam nixu odoriferæ ejus atomi naribus attrahuntur, multum ista sua de suaveolentia amittunt. Particulæ quippe odoriferæ unitæ in organum odoratûs confertim, & ita non sine violentiâ quadam (prout & reliqui sensus à sensili excellenti lædi solent) irruentes, illud lædunt, ideoque ingratæ potiùs eidem videntur, cum vicissim distantiori in spatio magis magisque expansæ & divulsæ, blandiori modo sese insinuant, atque ita etiam gratiorem impressionem efficiant. Ut eapropter coctione illâ deprædicatori solari & aereâ nihil aliud fortasse impetrari dici posset, quàm ut admixta humiditas, maximâ ex parte evaporans, subtiliores quasdam, in

motu ad exhalationem jam constitutas particulas in copia secum abripiat, reliquis minùs resolutis, ideoque ad exhalationem copiosam non dispositis quasi quiescentibus, sicque minori potestâ efficiâ organum odoratorium petentibus, & illud absque singulari vehementiâ tantùm demulcentibus. Idem sanè in Moscho folliculis suis incluso, siye etiam in pyxide aliqua servato quandoque experimur, qui nempe, si recens & bonæ notæ fuerit, naribus magna in quantitate propiùs objectus, ingratissimi temper odoris deprehenditur, imo tanti, ut vel Castorei gravitatem quidem lubentius, quam istam perferre velint; cum tamen, si longiùs ab illo recedas, non possit non gratioso odore suo mor perplacere. Id quod sanè haud fieret, si non antea particulæ suaviter odoratæ præexisterent, suâque libertate gauderent.

Non tamen ibo inficias, illis ipsis benè fragrantibus atomis aliquas naribus graves molestas conjungi; quæ sanè, si bonæ notæ Moschus & recentissimus eis exponatur, mox sese offerunt, stercorei quadantenus, vel hircosi quasi aliquid referentes. Quò spectat ingeniosi *Vermii* conjectura, quam (excrementum illud moschatum probi esse odoris, cum reliqua plerumque fœteat, admiratus,) cent. nono Hist. natur. profert, quod nempe voluptatis excessum refugiat sensus, ingrati potiùs alicujus gaudens consortio, non secus ac Musica repugnantes sonos in concentum temperans, omnibus gratissima accidit; quo ipso, fœtidos ab excrementitia putredine spiritus Moscho inesse, voluit innuere, qui odoratissimos reliquos temperant, gratiamque illam sic naribus nostris offerant. Uti ita, si justâ temperie neglectâ, putridi ingrati reliquos bonos superent, eosdem unâ quasi obtundant, se ipsos verò naribus potentiores vel sensibiliores ingerant. Hîc ergo ingratoribus & minùs elaboratis particulis in aère liberiori exhalantibus, reliqua massa suaviter odorata remanet, vel eadem benigniori Solis calore ultriùs digestæ, naturam priorem exuere, inque beneolentes pariter transmutari poterunt.

Heterogeneitatem illam partium in floribus & suffimentis jam olim animadvertit Aristoteles, dum in Problematibus suis causam indagaturus: Cur remotiora suaviter oleant, propiora autem ingrata magis existant? alias præter eaque satis obscuras causas, terræ quoque particulas simul prodire suspicatur, quæ ob gravitatem suam reliquis præferantur, vel eas quasi præcurrant. Licet autem hanc celeriore exhalantium particularum ponderosiorum, e contra levium tardiorum motum imaginari mihi nequeam, præsertim cum graviore longiùs haud provehi, sed cadere vel subsidere, in seqq. Ipse moneat, terrestriores tamen illæ non displicent, quibus & humidiores addendæ, utraq; à calore nondum satis digestæ, concoctæ, vel elaboratæ, quæ utique in propinquo naribus objectæ, unâ cum suavis organum odoratûs subeunt, in gratum quandam odorem ei imprimere possunt, ponderositate verò suâ longiùs provehi ineptæ, solas tenuiores levioresque in remota loca ferri permittunt.

Ut de judiciorum circa odores diversitate, soli fortè persuasioni & consuetudini adscribendorum, multa jam non proferam, quâ facile posset contingere, ut Moschus revera suavissimus, seu ingratus naribus displiceret, non secus ac Japoniis Europæorum pretiosos suffitus, tanquam fœtoris reos, displicere; nobis verò quæ malè olere videntur, optimè fragrare, *Arnoldus*

Montanus Legation. Batav. ad Imper. Japon. circa princip. recenſet.

De Moscho è ſanguine parato.

Quamvis deſcriptum in præcedentibus Moschum maximè genuinum vocare nullus dubitem, alios tamen eundem impetrandi, vel potiùs æmulandi & fingendi modos dari, non minùs conceſſerim. Iuprimis dum auri ſacra-famæ, & cuius vel è re qualibet odor bonus avaris atque lucri cupidis putatur, ad maiorem ejus obtinendam copiam homines allicit, ſicque varias genuinum & antiquum illum naturalem quodammodo æmulaturas præparationes, vel etiam omnino novas ex aliis ſubjectis productiones iisdem diſcit.

Maximè vero dum contentum in folliculo Moschum ſanguinis ad naturam accedere obſervarunt, reliquum non minus ſanguinem, ſi arte ad cutem proliceretur, odoriferà iſtâ qualitate imbutum iri, quosdam credidiſſe, admodum veriſimile videtur, quod etiam verberibus animal probè vexando & dedolando obtinuiſſe, quorundam ſcriptis edocemur.

Sic Nobil. Joh. Albert. Mandelslo libro primo Itinerar. ſui cap. decimo nono ex Mercatorum Anglorum oculata fide idem perhibet, hunc in modum in vernacula noſtra ſcribens: *Es vvid der Muſcus von einem Thier genommen, vvelches einen Rebe gleich ſihet, daſſelbe Thier ſollen etliche, wann ſie es fangen, eine vveil in ihren Hauſſeren halten, mit einem Prugel ſtarck ſchlagen, vvelche nache Pegu handeln, daſz groſſe Beulen darvon auſlauſſen, darinnen ſetzt ſich eine Materie, aus vvelcher der Muſcus kommt. Diſz haben mir die Engliſche Kauſſente berichtet, dann ſie es ſelbſt geſehen haben.*

Quæ paulò fuſius, ex Mercatoris cuiuſdam relatione, à Cl. Nath. Highmero, diſſert. de paſſ. hyſter. cap. ſexto proferuntur; cuius iplamet verba præſtat audire: *Incole animal inventum primo canibus venaticis diu inſequuntur, deinde cum perſecutionem ultra ferre nequit canum, feſſum & anhelans plagis abundè excipiunt, donec tota cutis ſanguine grumoso à verberibus canumque morſibus maxime inſletur & intumeſcat, tum cum incaleſcit adhuc, pellem ubivis attollunt & ligaturis ſtrictioribus illam cum ſanguine illo grumoso incluſo circumligant totam in nodos, deinde ſtatim, vivente adhuc animali, abſciſſis nodulis ſanguine illo plenis, pro moscho optimo reſervant, qui nobis ſic in buſſis coriaceis, ut ab animali abſcinduntur, à Mercatoribus tranſfertur.*

Similia, licet paulò mutata, apud Gabrielem Sionitam de Monte Libano, Profefſorem Pariſinum, occurrunt, quem Exc. D. Thom. Bartolinus Vol. 2. A&. med. Haſn. obſerv. decima nona tanquam oculatum teſtem, ita Moschi generationem adducit deſcribentem: *Baculo animal pluribus uno eodemque loco ictibus verberatur, adeo ut ſanguis in unum concurrat locum, ac tum pellis inflata ſanguineſque plena ita ſtrictè ligatur, ut inde ſanguis concluſus egredi nequeat. Pellem illam in unam aut plures veſicas contractam exſiccaturi ſupra dorſum animalis ſunt, donec abſque ulla vi, nulloque adhibito instrumento ex veſica cadant, ubi ille ſanguis ſuaviſſimus in moschum beneolentem poſt unum meſem converſus reperitur.* Si hanc unius loci percuffionem ad ipſum jam conſtringere liceret folliculum, quin largior Moschi proventus ſic promptè ſuccederet, fortè non eſſet ambigendum. Unde etiam deſatigatum curſu ani-

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II,

mal fuſtibusque benè permolitur, ſanguinem faciliùs ad cutem ejuſque tubercula naturalia amandare judicat prælaudatus Bartolinus Vol. 1. A&. med. Haſn. obſerv. 58. *Sicut ubera ovium, ad dens, manu concutiunt femina, ut lac uberius fundant.* Aſt hac ratione ad Caput potiùs præcedens eſſet referendus.

Mercatorum autem Anglorum enarratio ſi de tumoribus aliis præternaturalibus, & à folliculo diverſis ſit intelligenda, eò maiorem merebitur fidem, ubi juxta prolatam à Scaligero in exerc. 21. de ſubril. ex India advectam, & Joh. Fabri in Hiſt. nat. Mex. indicio, ex Barboſa mutuata hiſtoriam, ſanguineus ille utriculi humor ad reliqui cruoris, etiam ſine verberibus impetrati condituram adhibetur, quam tamen ipſius Autoris verbis adducere lubet: *Capta fera, eam partem (in qua ſcil. ſanguinis collectio in tumorem abierat) cum corio ſimul abſcindunt; quæ inter ſecandum guttæ ſanguinis effluunt caduntque, ea pro moscho optimo atque excellentiſſimo aut excipiuntur aut colliguntur. Huius minima portiuncula beneficio ad ceteri cruoris condimentum muntur. Ubi ſecuerunt, hiruſines admovent tamque diu, quoad earum ſuſu cruor univerſus cum ipſa vita detrahatur. Eum ſanguinem exſiccatum atque in pulverem redactum, prioris illius perpanxilla quantitate, viribus vero efficaciſſimis perſciunt. Quippe centeſimam ſatis eſſe produnt.*

Poſſe autem aliis etiam in locis fuſtigatione iſta acriori ſanguinem extravasari, inque tumores ab ejuſdem collectione cutem attolli, minimè eſt incredibile. Quod ſane mulier illa magno ſuo cum damno experta fuerat, quæ ictibus & verberibus miſere tractata, poſt mortem, Anatomico olim dexterrimo, D. Joh. Rudolph Salzmanno (vid. obſ. anat. 2.) ſanguinem cutem inter & carnem per univerſum corpus effuſum exhibuerat. Quod etiam ovium, vitulorum, boumque exemplo illuſtrat Exc. D. D. Dan. Ludovici Miſcell. Germ. Cur. Ann. V. obſerv. 205. in quibus ſapenumero, lanionibus. ante ſe agentibus ſeverius fuſtigatis, poſt jugulationem detractâ cute, ejuſmodi collectiones in ſuperficie adparent. Capillaria enim ad corporis ambitum tendentia vaſcula ſanguinea, vi illâ aperta & lacerata, contentum liquorem ſuum intermedia in ſpatia effundunt, à venarum oſculis compreſſis inque ſitu alteratis non tam promptè reſorbendum, ſed iſtas ſuggillationes & vexationum notas efficientem. Qui ita extra naturales ſuos vitales terminos ſubiſtens, magnam ſubire alterationem cogitur, & putredinem aliqualem concipere, quâ latentes ſulphureæ volatiles particule in libertatem forte vindicantur, atque occultatum antea odorem jucundum exhalant.

An autem fragantiſſimo illi folliculari odoris & virtutis excellentiâ talis æquiparari queat, eſt incertiſſimum, inò mihi omnino non credibile videtur; cum moschi follicularii & ſanguinis coagulati ſubſtantia admodum differant & follicularius ille ſi non ejuſdem ſolis & baſamus, ſaltem excrementum odoratum unicè exiſtat, ſanguine in folliculo ſegregatus.

De Moscho ex renibus & teſticularis conſecto.

Miſſâ nunc animalis noſtri parte fluidâ, ſolidiores itidem atendi merentur, quas inter Teſticulos inprimis verum præbere Moschum, ſunt qui perſuadere laborant. Illos ſanè Georg. Bertinus in ſua Medic. lib. 18. cap. decimo ſexto jamdudum nominaverat. Quos etiam ex D. Thevenoti Itinerario, ipſummet eſſe Moschum, confirmaverat Nob. D. Henr. Oldenburgius; licet Autor Ephem. Gallic.

cumulum sanguinis pro testiculis repofuerit. Vid. Acta philosoph. Soc. Reg. in Angl. Num. 14. cap. 7. pag. 171. edit. Lips. Et Cl. *Henr. Salmuth* optimum ac præstantissimum Moschi genus esse, notat quod ex testiculis animalium quorundam colligitur.

Eosdem inhuere voluisse celebrem floræ Sinensis scriptorem, *P. Michael. Boymium*, ipse textus persuadet, dum sub lit. Z. præter renes alias quoque partes indicat, quem ipsum ideo audire lubet: Porro quod Sinenses propriè vocant *Xe*, & *Lufiani Almifcar*, atque Latini *Muschum*, est caro renum animalis supra dicti, & id quod natura infra abscondit. Verumenim verò Mercatores totam carnem animalis cum sanguine commixtam contundunt, & pappos: (ita sacculos, ex pelle pilosa ejus vocant, quasi forent testiculi ipsius) & hoc quoque verum *Almifcar* est, licet sit non adeo perfectum sicut prius. Hunc tamen conficiendi modum in dubium vocat supra jam citatus *Laur. Catelanus*, semen & testiculos planè excludens, talibus inprimis argumentis inductus: tum quod certissimum sit, nullos reperiri conductus necessarios, ab hisce vesiculis ad membrum genitale transeant, nullaque cum vasis spermaticis demonstrari possit communio; tum quia vesicula illæ utrique sexui istorum animalium ventri sint adpositæ, cum econtra in omni animantium genere testiculos femineos in corpore abscondi sit compertum. Et quamvis ipse quoque Moschum præstantissimum & genuinum testiculorum ut productum vel substantiam neutiquam considerare, aut folliculum Moschi utriculum genitalem, testes sub scroti nomine involventem, statuere velim, incertum tamen est, annon aliqua folliculis illis cum membrò genitali vel spermaticis vasis communio intercedat; neque id facillè *Catelano* crediderim, qui ista nobis; non oculati ex inspectione, obtrudere ausus fuerat, sed unicè ex ingenii sui libertate effinxerat, promptiorem adfensum inventurus, si per conjecturæ modum id nobis saltem proposuisset.

Ast nihilominus ipsorum etiam testiculorum substantiam, si non separatim, (de quo multum dubito) saltem aliis partibus mixtam conficiendo Moscho fortasse inservire, non negabo, dum, quod tot oculati etiam testes fatentur, integrum quoque animal in Moschum convertitur.

Ipsè quidem folliculus bursæ sive involucri testicularis formam obiter intuentibus facillè præsentare potest. Unde etiam ex vulgi opinione errorem hunc propullasse, *Catelano* promptius concesserim. Quam ipsam rotundam & testibus æmulam figuram *Leonhard Fuchs* libro primo de comp. Medica. cap. 26. nosse statuit, qui Moschum adulterant, subjungens: Nam in testiculi formam effingunt, & pelle animantis involvunt, ac testiculum Moschi appellant. Quod pariter *Joh. Hugo à Lindschotten* in Itin. Orient. monuerat.

Atque hæc similitudo dubio procul quosdam permoverat, ut animal hoc odoriferum testiculos sibi metipsum amputare crediderint; qua de castratione *Salmuthum*, ex prædicto *Lindschottano*, audire placet: Animal ipsum naturali instinctu, cum pretium testiculorum suorum intelligat, de fuga aliàs desperans, eodem dentibus ac morsu avellit, & in lytron veluti libertatis abjicit; ita occupato collectione testiculorum venatore, necem aliquando evadit, quod ipsum & de fibro sive castore proditum accepimus, quem urgentibus venatoribus & canibus, sibi ipsi partes genitales ampu-

tare, gnarum, se propter ipsos peti, cum Græci tum Latini prodiderunt. Sicuti autem quæ de Castore vulgò circumferuntur, præter antiquiores illos, *Dioscoridem* libro secundo, cap. 23. *Plinium* Hist. nat. libr. 32. cap. tertio, ipsis etiam Venatoribus fabulosa hodiè admodum habentur, plurimis jam præclarissimæ famæ Vuls falsitatis convicta, & præsertim ab Exc. D. D. *Joh. Joh. Wepfero*, cum anatomen aliquot Castorum in Anno II. Ephem. Germ. Cur. observ. 251. docuimus, ut omnia sua, exponeret, manifestissime explicata, ita & quilibet non vanè credulus, quæ de moschiferi animalis effera ista & stolidæ audacia referuntur, eodem titulo dignabitur. Neque feles silvestres aut marinas, uti vocantur, simiasque mihi quis objiciat, libidinosa animalia, quæ petulantia suæ modum finemque nescientia, vel indignè captivitates suas continuas ferentia, vel denique fame immodicè allecta, genitalia sibi ipsis & caudas amputasse & devorasse, aliquando observatum fuit. Si enim unquam in animali nostro similis in proprium corpus sævitia fuisset deprehensa, quod tamen permagnâ adhuc indiget confirmatione, quis inde naturalem instinctum ad talem perpetrandam laniationem, vel tantum intellectum & prudentiam bruto isti tribuere valeat, ita ut testium suorum pretiosam naturam, quæ tanta revera non est, (nisi quatenus generationi inserviando, multiplicationi etiam odoratorum istorum animalium inserviunt) intelligere, reliquæ autem partes quæ non adeo expetantur, nosse, dicendum sit? Mihi sanè, cum *Salmutho*, ex invidia Castorem id facere, contra alios negante, paucis mutatis verbis fabulam hanc claudere lubet, & homines è propria sua opinione scientiam & prudentiam brutis istis quod adscripserint, dicere. Unde enim brutis animalibus tanta scientia, quam homines non sine experientia & ratiocinatione addiscent?

Unde pariter nunc illorum similis vana patet traditio, qui de alio aliquo animali, in Sinarum regno, ac novo Mexico inveniendò, narrant, testiculis id oneratum esse adeo enormibus, ut suspensos minimè gerere, sed terram contingentes trahere cogatur, & qui æquales cum toto reliquo corpore sint pondere, quibus oppressum, cum à canibus agitur atque evadere non potest, ipsosmet dentibus mordicus detruncet & liberrimè postea aufugiat. Ipsi his testiculis à Venatoribus dein collectis ac confusis optimum Moschum præbentibus, recensente ita apud Cl. *Joh. Fabrum*, Lynceum Comment. in Nard. Anton. Recchi Hist. nat. Mexic. pag. 559. *F. Gregorii de Bolivar*. Quod tamen ipse cum nunquam viderit, quidquam certi propterea de eo adferre aut adfirmare minimè potuit, voluitve Nec certè credulus adeo & ego esse velim, ut tam enormiter testatum animalculum reperiri, mihi persuaderi patiar, præsertim quia in nullo probato de Regnis istis Scriptore (quot quidem evolvere mihi licuit,) ejusdem mentionem factam recordor, quod ob raritatem aliàs vix intermisissent.

De Moscho, ex toto Animali producto.

Nihil denique in hoc Animali esse inutile, & quod non in Moschum convertatur, multorum constat testimoniis. Quod considerans P. Philippus Marinus in histor. sua de Tunchino, nullam ejus partem projici, & pluris valere animal mortuum, quam vivum, dicere consuevisse istarum regionum incolas, perhibet.

Unde non tantum ex apostemate sic credito, sive folliculo provenire, sed omnem animalis istius carnem, & excrementum dici Moschum, Isidorus atque Albertus prodiderunt.

Job. Mendoza libro. primo cap. quarto descriptionis regni Sinici, (à Job. Kellnero in Linguam Germanicam conversæ, & Francofurti A. 1589. editæ, Anno autem 1597. Lipsiæ quoque sub Matthæi Dresseri nomine publicatæ,) sive Benedictus Goës, uti in descriptione Navigationis in Indiam Orient. parte duodecima horum Autor vocatur, Moschum ex Animalibus vulpecularum formam habentibus præparari narrat, quorum verberibus enecatorum, obturatis prius omnibus meatibus, per quos sanguinis fieri posset effluxus, corpora tam diu percutiuntur & contunduntur, usque dum ossa cute testâ comminuantur omnia, tandem post exsiccationem in frusta cum cute conciduntur, & in folliculos efformantur, Lusitanis Pappos dictos.

Eadem ex Petro Farrico recitat Job. Euseb. Nierembergius libro nono Hist. natur. cap. 56. additis virgarum fustiumque verberibus enecari animal, tradens, ut toto sanguis fundatur corpore, cadaver autem putridum & jam aridum frustatum, non detractâ pelle, discindi, sacculosque inde prædictos parari.

Job. Peer. Maffei Hist. Indic. lib. 6. pag. 142. Moschum è feris quibusdam vulpecularum effigie, crebro verberare enectis, dein putrefactis, parari docuit.

Non minus Odoardus Barbosa, Lusitanus, in Summar. regnor. ac popul. Orient. Moschum etiam ex animali capræ simili confici perhibet, cujus excoriati caro cum sanguine contusa in vesicas ex ejus pelle efformatas reponatur, quod etiam ipsa Moschi massa innuat, in qua ossa contusa reperiuntur, communem illam de apostemate aliquo relationem falsam ostendentia.

Et P. Mich. Boym, Mercatores totam carnem animalis cum sanguine ejusdem commixtam contundere, & sacculos cum pelle ejus pilosa exin parare, l. c. testatur.

Similia habet Job. Hugo à Lindschotten, cui suam quoque historiam debet Henr. Salmuth. l. c. monumentorum nempe Historicorum regni Chinesis se fidem secutum innuens, & hunc in modum scribens: Bestiola ibi sunt vulpecula aut catellorum magnitudine atque imagine. Ha ad necem verberata ac plagis mollita cum carne pariter & sanguine putrescunt; tum ex pelle, carne & sanguine incola rotundas unciualesque pilas sive crumenuas conficiunt, quæ filis undique consuta venduntur.

Et Hieron. Cardanus libro. decimo de subtil. p. m. 574. Moschum, qui ad nos defertur, totam esse carnem cum ossibus contusam, & vetustioribus vesicis impositam, id quod passim in nostro Moscho parva ossium frusta indicare, subiungit.

Similem, paulò tamen mutatam historiam Amatus Lusitanus suo in Dioscor. libro. primo Commentario, text. 20. inseruit his verbis: Animaculum hoc, vivum cum est, virgis primo flagella-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I.

tum neci traditur, à quo detractâ pelle & interaneis demtis, universam carnem à verberibus lividam cum ossibus contundunt pinsantque; quæ quum optimè est pista, manu tractatur, ut si qua duriuscula in illa fuerint ossicula, resciantur. Hanc ergo carnem sic optimè pistam, manu in globos quosdam redigunt, & frusto pellis ab eodem animali excoriata obvolvunt.

P. Philippus Marinus, cujus verba Italico Idiomate exarata P. Aθανασius Kircherus Chinæ suæ illustratæ, cap. septimo inseruit, quatuor Moschi generum, bonitate inter se differentium, l. c. mentionem facit: 1. Capto animali totum sanguinem, seorsim adservandum, extrahi, vesiculam sub umbilico sitam, sanguine vel alio odorato humore coagulato plenam adimi, posteaque pellem detrahi, scribens. Quod si Moschum, eodem referente, summe perfectum desiderant, dimidium animalis, inferiora nempe è renibus (*lamerà dell' animale, cioè dalle reni in giù*) in magno lapideo mortario optimè contundunt, superinfundentes tantum sanguinis, quantum ad effingendam massam requiritur; quâ siccata sacculos ex ejusdem pelle factos implent. 2. Si verò Moschum non adeo perfectum, bonum tamen & sincerum voluerint, omnes animalis partes conquassant, & cum sanguine in massam redactas exsiccant, in vesiculas dein pariter teponendam. 3. Aliud porro genus non adeo purum, bonum tamen & verum ex partibus superioribus, à prioris illius electissimi elaboratione relictis, conficiunt. De quarto genere, composito utpote & adulterino, nil attinet hic quidquam dicere.

Tandem audiri meretur apud Job. Fabrum Comm. in Recchi Histor. natur. Mexic. in Schol. ad cap. de Zibeth. animal Americ. pag. 557. & 558. F. Gregorius de Bolivar, Hispanus Placentinus, ordinis S. Francisci, curiosus rerum naturalium indagator, atque Orientis & Occidentis Solis Regnorum perlustrator, qui suam de Moscho sententiam Hispanico idiomate hunc in sensum Fabro communicaverat: Hæc certe conficiendi moschi verissima est Historia, quam oculis meis ut vidi, ita sæpè experientiâ confirmata fuit, &c. His artibus autem ab illis, qui moschi mercataram exercent, hæc animalia capiuntur: circumdant loca, in quibus dimorari eadem norunt, vel igne, vel rebus ac canibus, atque in subterranea loca profugere compellunt, quæ postea subfodiendo, vel aliâ industriâ extrahunt, in tanto sæpius numero, ut ad trecenta etiam capiantur. Hæc subito jugulant, sanguinem qui in ipsis maxime abundat, in vase aliquo mundo (Porcellanæ vocant) colligentes. Tanta autem, quod mirum est, sanguinis copia in quovis horum animalculo invenitur, ut sæpenumero, quando extractus fuit ac concrevit, videatur totius reliqui corporis molem superare. Posthæc pelles ipsis abstrahunt, extenterant, & ab omni illuvie intestina emundant. Quamvis aliqui, ut majorem moschi quantitatem nanciscantur, impura cum puris relinquunt. Qui verò priore modo procedunt, cum sanguine meliorem & teneriorem armorum ac coxarum musculosam carnem, cor ac epar simul, in lapideo mortario unam in massam contundunt, ex qua folliculos, sive ex pelle horum, sive aliorum animalium paratos inferciunt, loco umbroso suspendunt, siccantque. Et ubi jam semiaridi fuerint, sub terra defodiunt, omninoque in umbra exiccare permittunt. Et hic est præstantissimus moschus, qui pro Rege ac Principibus saltem conficitur. Sed ille, qui communiter circumfertur moschus, crassiore Minervâ elaboratur. Contunditur enim totum simul animal cum omnibus suis

„ suis partibus, ossibus, intestinis, & pellis quoque
 „ portione donec ad massam tenerrimam redigatur,
 „ ex qua utriculi illi ex ejusdem animalis pelle confe-
 „ cti implentur, & intestini aliquâ parte obvolvun-
 „ tur, paulisper siccantur, loco ubi urina effunditur,
 „ sub terra per paucos dies reconduntur, & denuo in
 „ umbra suspensi exsiccantur.

Huic F. Gregorio Rochus Ezechiel Bauthschner jun-
 gendus, qui in Lusitania talem conficiendi modum
 usitatum enarraverat, quem cum liber iste non om-
 nium sit in manibus, verbotenus quoque ex *Fabro*
 volui describere: Laquei ac pedicæ ex filo æneo paran-
 tur, & cuniculorum modo illaqueata capiuntur.
 „ Horum sanguinem Venatores extrahunt, carnes
 „ separant, & loco perscrutabili, ubi nec Sol, nec
 „ humiditas dominantur, resiccant. Aves deinde
 „ capiunt quasdam, ab ipsis Aquilas vocatas,
 „ Aquilæ tamen minimè sunt, sed Accipitribus
 „ nostris formâ similes quidem, mole verò du-
 „ plo majores. Harum itidem carnes ac sanguinem
 „ reponunt siccantque & ad Aprilis mensem
 „ usque reservant, quo tempore viret, vigetque
 „ maximè herba quædam, ab Incolis Pico de
 „ Grulla dicta, hanc quoque tunc demetunt.
 „ Est autem planta hæc tam fragrantis moschati
 „ odoris, ut certè affirmare possim, me lon-
 „ ginquis è locis eandem crescentem olfecisse,
 „ evulsiße non raro, & pro mea recreatione in
 „ itinere mecum detulisse; Ab hac planta odo-
 „ rifero plena humore determinatam quandam
 „ succi quantitatem exprimunt, & cum prædi-
 „ ctis carnibus ac sanguine commiscant, in mar-
 „ moreo tundunt mortario, & reliquam, ut me-
 „ moraverat F. Gregorius, ad unguem adhi-
 „ bent operam. Tum in loco, in quo sæpe uri-
 „ na evertitur, benè involutam pastam sepeliunt;
 „ vel utriculorum aliquot horum in vase illo,
 „ *σκυβαλον* vocant Græci, in quo (sit auribus honor)
 „ humanorum tam siccorum, quàm liquidorum col-
 „ luvies recipitur excrementorum, suspenduntur, ad
 „ tres quatuorve dies detinentur. Exemptos in-
 „ de & in umbroso cubiculo benè siccatos ex-
 „ ternis mercatoribus divendunt. &c. Moschi qui-
 „ dem opificium ipse ego non vidi; animalia ta-
 „ men & plantam moschatam sæpius vidi. Reli-
 „ qua curiositatis gratia ab Incolis didici, quibus
 „ fidem denegare piaculum duxi. De quo tamen
 „ inferius, CAP. XI. judicium meum pro-
 „ feram.

Diversum ab his omnibus Moschum describit
Pantoja, referente *P. Petro Jarrico* lib. 2. Thesaur.
 rer. Indic. cap. 17. è ventriculo animalis cujusdam
 ferri, quod fele paulò grandius, educi Moschum cre-
 dens, nec in China ipsum, sed in regione proxima
 reperiri. Ubi tamen Cibettam intelligi debere, *Jar-
 ricus* suspicatur, vel credendum, nobiliorem ac pre-
 tiosiore Moschum ventriculo alyoque educi. Quæ
 quidem cuncta, ut incertissima, recensuisse suffice-
 rent. Per ventriculum attamen utriculum moscha-
 tum vel Zibethicum etiam innuere potuit *Pantoja*. *Ge-
 mara* tamen tract. Berachoth fol. 43. cap. 1. Moschum
 similiter stercus esse perhibet. Aliàs Moschum nobi-
 liorem ex ventriculo alyoque educi, non faciliè con-
 sentirem, nec quisquam alius fide dignus simile quid
 unquam scripserat. Licet & dictarum partium con-
 tenta, imprimis verò scybala fermento isto odorifero
 bilioso quoque imbui, faciliùs concesserim.

Ast dum *Rabbi Abraham Ben Esra* comm. in
 Exod. cap. 30. vers. 23. Moschum è gutture colligi scri-
 bit, consensum à me haud difficulter impetraret, si per
 guttur folliculis ille umbilicalis intelligi posset, vel,

quod paulò credibilius, sanguis ex jugulato, eo for-
 tassì in loco, animali extractus, atque ad Moschi con-
 fectionem, qualem ex. gr. Scaliger exponit, collectus
 innueretur. Modò non omnis illa, aliena ex relatione
 à *Ben Esra* hausta traditio sit fictitia.

Reliquis in præcedenti discursu expositis relatio-
 nibus (quas omnes testimonio, si vera sint, quæ nar-
 rantur, oculari vel saltem aurito innixas; licet in plu-
 rimis idem proponant, speciatim cum L. B. venia ad-
 ducere volui, cum in multis etiam varient, plures mo-
 dò, modò pauciores, quin & discrepantes in præpa-
 ratione *εγχειρησις* proferentes,) etiã si verita-
 tem subesse aliquam inficias ire nolim, subinde
 tamèn fabulosa aliqua conjungi, nullus dubito;
 quæ cuncta tamen esuere, mearum non est vi-
 rium. Hoc saltem, ne vanè id scripsisse videar,
 monendum, neutiquam capere me posse, quâ ra-
 tione animalculorum istorum ossa, integrâ perma-
 nente cute, in mortario comminui ita possint, ut
 molliorem istam, quæ in Moscho observatur, con-
 sistentiam induant, cum à violenta ejusmodi con-
 tusione cutis, imprimis dum nativo adhuc rug-
 get humore, non possit non fatiscere, di-
 cerpi, & grandes experiri rupturas. Et mearum
 etiam, per quos sanguis emanare posset, frustra
 obturari, est credibile, præsertim si maximâ, ut
 illa F. Gregorio memorata, animalia sanguinis co-
 piâ abundarent. Nec intelligo, quomodo contusi
 animalis è pelle, à reliquis partibus non separati,
 sed exsiccata, sacculi parari queant, quibus moscha-
 ta illa substantia includatur, cum hæc illius quan-
 titatem longè excedat. Quin & nonnullorum histo-
 rias ex aliis supplendas necessario esse autumo: ve-
 luti in Mendoziana corporis contusioni exsicca-
 tionique putrefactio addenda, nisi eandem illo ipso
 tempore, quo exsiccationi exponitur, sufficienter
 succedere, debeat supponi. Sed hæc & similia urge-
 re prolixius supersedeo, quæ nempe accuratiorum
 & multiplicem observationem in ipsis locis, ubi ta-
 lia concinnantur odoramenta, requirunt.

Excerptis Antecedentium.

Tot itaque cum sint de Moschi ortu opiniones,
 multis è se invicem parasangis distantes, cuiam ad-
 hibere fidem præster, suspensum merito reddere ali-
 quem possent, præsertim cum plurimi oculorum fi-
 de nitantur, vel saltem riti eâ videri velint, qui-
 bus sanè absque sufficienti causa eandem denegare,
 magna foret temeritas.

Hoc certum est, ab eo tempore quo innotu-
 scere Moschus ceperat, plurima semper genera
 fuisse agnita.

Duorum meminit *Scrapius*, è sanguine sponte ab
 animali ex folliculo depositi, alterius autem vi ho-
 minum erepti.

Hieron. Cardanus, atque cum eo *P. Cass. Schottus*
 in *Phys.* curios. & apostema, & totius animalis cum
 ossibus contusionem admittunt.

Andr. Libanius part. 3. singular. lib. 4. cap. 5. ter-
 tium genus addit, nempe testicularem Moschum, quat-
 res sententias mutuo se non evertere arbitratum.

Clar. Adam. Olearius in not. ad *Itinerar. D. Joh. Alb.*
 à *Mandelslo*, postquam *Ruellii*, vel à quibus
 eam hausit, *Serapionis*, *Sethique*, *Scaligeri* item &
Boymii relationes exposuisset, Scriptorum horum
 opiniones omnes, à *Mandelsloana* non admodum
 distantes veras esse posse, prudenter concludit, cum
 in unum animal Moschiferum omnes illi præpa-
 randi modi cadere, proque diversitate locorum
 diversi etiam modi attendi queant, ita ut unus
 hunc,

hunc, alium alius observaverit. Confer. Nob. D. Dan. Ludovici dicitur us, Anno IX. Ephem. Germ. Curios. observ. 38. insertus.

Mibi sanè, simili fundamento insistenti, unicum quidem esse veri Moschi genus, intrepidè adfirmare libet, illud nempe, quod ex folliculo depromitur, alterum tamen illud, quod ex sanguine, carne, vel toto denique animali, eoque non unius, sed duplicis speciei & differentiae elaboratur, pariter dari, tot testibus coactus, non pernego. Ast nihilominus alterum hoc, non quidem omnino fictitium, secundarium tamen, & bonitatem si spectemus, longè inferius proclamare interea sustineo, usque dum meliora aliquando edoctus fuero.

Et follicularem quidem illum ipsa quotidiana ocularis inspectio, in ipsa nostra Europa, & in specie quoque Germania, extra omnem dubitationis aleam, contra quoscunque aliter sentientes, vindicat.

Tot enim quotannis ad nos deferuntur genuini folliculi, quos è falorum numero tum singularis conformatio protius eximit, tum & Moschi in eis præsentia, quæ juxta cum odore præcellenti, integra ex omni parte cutanea ista substantia, nullo foramine aut scissurâ prædita, naturalem, & vivo adhuc in animali sensum ibi collectum, non autem artificio aliquo confectum eique intrusum, ostendit.

Reperiri autem in animali quodam tales folliculos, *Brasavolus* & *Cardanus*, oculati testes, præter alios, perhibent. Quia & ipse Anno 1675. tres similis animalis Noribergâ ad nos delatas exuvias vidi, singulas urriculo isto instructas, quorum unum dein à poss. flore, Dn. Johanne Biermanno, Pharmacopœo nostrate solertissimo, me præsentè, apertum, Moschum continuisse fragrantissimum, recordor. Sic & Heerfordiana animalis moschiferi pellis, à Nob. D. D. Segero in Anno VI. Ephem. Germ. Curios. observ. 128. exposita; Ludolphiana, quam Francofurti Ill. Dn. Jobus Ludolfus servat, à Celeberr. D. D. Georg. Wolffg. Wedelio primò per literas mihi indicata, & postea uberius ab amiciss. D. D. Sebastiano Schefpero exposita; Stoberliniana, quam Noribergæ Dn. Joh. Leonh. Stoberlinum Pharmacopœum peritissimum possidere, maximus Fautor meus D. D. Joh. Volckamerus, additâ ejusdem icone, nuper mihi notum fecerat; nec non illa à Nob. D. Joh. Bapt. Tavernier part. 2. Itinerar sui lib. 2. cap. 24. memorata & Parisios delata, omnes, inquam, pelles ista tuberculo, folliculo vel vesicâ moschiferâ fuerunt instructæ. Quem ideo Moschum frustra explodere, & tanquam merum figmentum proclamare nonnulli ausi fuerunt.

Et hac certitudine antiquissimâ innixi jam dudum aliqui, alterum illum modum, qui ex carne &c. animalis confusa parari Moschum monstrat, omnino rejecerunt. Quo intuitu consimilem istum *Amati Lusitani*, processum non legitimum Moschum, sed admodum adulteratum suppeditare, *Fuchsus* l. c. objicit. *Chioccus* tamen, explodendam omnino atque exhibilandam *Amati* sententiam dum vocat, quæque conjecturâ capitis sui ductus protulerit, minus audiri meretur, cujus ideo *Amati* patrociniū laudat *Faber* non immeritò suscipit, pag. 560. cum plurium *avosia* eundem propugnet. Licet & ipse acriori suâ in *Serapionem* & reliquos censurâ aliorum indignationem, haud injustè sibi contraxerit, dum reverà ista de folliculis &c. omnia falsa & mendaciorum plena esse, nimis concitato calamo coarguerat.

Instat quidem *Gabr. Gallopius* lib. 1. in Dioscor. cap. 24. ideo carnes maceratas & putrescentes Moschum haud esse, quia carneas non habeat fibras. Cui tamen idem *Faber* satisfacere videtur, dum Unguentarios & Chirothecarios Romanos certissimò sibi fuisse adtestatos, monet, se, dum in aquis odoriferis illum solvunt, filamenta sæpius reperire, ac veluti nervosa & carnosa quædam corpuscula, pelliculas quoque, quæ ubi diutius aquâ fuerint maceratæ, aliarum etiam membranarum instat, intumescant. Si jam *Falopius* in Moscho genuino ex folliculo desumpto fecerit experimenta, faciliè carnosarum fibrarum absentiam eidem concedemus, quas sanè, in alium non admodum diligenti contusione discripto ex animali paratum si incidisset, facilius quoque invenisset. Modò Unguentarii & Chirothecarii ille Romani, minùs curiosi harum rarum observatores, *Fabro* non imposuerint, aut pilosas ac membraneas Moscho folliculario sæpe aut semper conjunctas particulas, pro nervosis & carnosis corpusculis vendiderint.

Singulari autem in tumore Moschum non colligi, contra *Fuchsium* disputat *Faber*, erroneâ eum opinione duci existimans, cum animal moschiferum, *Capreolum* æmulans, tam rarum sit & peregrinum, ut ex uno atque altero tumore tanta quantitas Moschi eximi nequeat, quæ cunctæ Europæ, Asiæ, Africæ & Americæ sufficiat; in solo autem Peruano regno plus Moschi in cibis, potu, dulciariis, vestibus, aliisque consumatur, quàm in Europa universa, & ex China locisque vicinis, ubi paratur, quotannis mille Arroba, h. e. viginti quinque librarum millia vehantur, ac per varias Orbis partes distrahantur. *Tantam autem Moschi copiam, addens, quomodo vix nomine etiam nota bestia nobis subministrabit?* Quæ equidem simpliciter absque ullo discrimine non impugnabo, ita ut haud coactus credam, tantam quotannis Moschi quantitatem ex China locisque vicinis exportari, eumque porro ex unico animalis tumore, qui nec duas interdum drachmas concrementi odorati largitur, non desumi, interea tamen, nullum omnino Moschum ex folliculo aliquo depromi, nequaquam inde sequitur. Quam videlicet omnesque alias dubitationes sola Moschum parandi diversitas promptè solvet atque discutiet. Ignoram cateroquin adeo esse nobis bestiam illam, nemo amplius hac ætate facile consentiet, multò minùs maximæ quantitatis Moschi collectionem adeo incredibilem reputabit, si regni Sinici & vicinorum tot aliorum amplitudinem, nec non Animalium moschiferorum in eis multitudinem, plurimum, uti *Mandelslo*, *Tavernier*, *Martini*, *Mendoza*, *Massei*, & *Pauli Veneti*, testimonio fundatam consideraverit.

Mihi tamen adfirmare sanctè licet, omnes bonæ notæ Moschi species, quas hæcenus videre contigit, (contigit autem conspicerè plurimas,) non alias, quàm eandem cum follicularia fuisse, cui utpote exactissimè responderunt, ita ut, nisi tot ocularum testimonia, non faciliè falsitatis incusanda, obtitissent, promptissimè in eam descendissem sententiam, omnem reliquum esse fictitium.

De Genere Moschi constituendo.

Moschum simplicibus medicamentis adnumerant Arabes. Præter alios testem cito Principem

Ibn Sinam, vulgò *Avicennam* dictum, Canon. medic. lib. 2. tract. 2. cap. 13.

Neque alium ei quisquam locum adsignare hucusque ausus fuit, vel compositis adnumerare, maxime si strictè vocem medicamenti compositi quis accipiat, quidquid scilicet ex duobus, tribus, aut pluribus diversarum specierum ingredientibus artificiosâ methodo, & sub cërta forma invicem permixtis, est compositum, ad differentiam puta simplicium non ita præparatorum, sed sibi solis relictorum, quæ nempe non nisi improprie, si heterogeneous eorum à natura acceptas partes quis considerare voluerit, composita adpellari consuevere.

Conveniunt etiam in hoc, quod animalium classi inferendum statuunt. Nec obstat, quod *Aristoteles* in *Problematis* solam *Pardalin*, sive *Pantheram* inter animalia benè olere scripserit, (cujus odoræ suavitatis etiam *Alianus*, *Solinus* & *Plinius* meminerunt,) ideoque Moschum ab animali aliquo ortum minimè trahere, suspicari quis posset, à *Panthera* natales ejusdem nemmo hætenus deduxerit. Aut enim aliarum bestiarum tantum respectu, non hominum, fragrantia illius sensum esse intelligendum, cum *Joh. Fabro* exposuit in *N. R. Recchum* pag. 541. dicemus, aut, quod utique verum est, moschifera & Zibethica animalia Antiquis istis fuisse incognita, aut, quo magis inclino, merum esse figmentum istam odoris à pardali exhalationem, potius respondebimus.

Mulrò minus obstat, quod odoris excellentiam attendentes aliqui, in diversam ab Animalibus classem reponant. Veluti in *Taxa medicamentorum officinalium Wittebergensium* cap. sexto, sub titulo *Odoratorum* & pretiosorum simplicium, juxta cum *Ambra* & *Zibetho* legitur. *Libera* enim hîc cuique, pro varia intentione, est potestas, nec coordinatio ejusmodi alteri illi adeo repugnat.

Attamen in *Clar. D. Joh. Tilemanni* libello de mater. med. sect. secunda ubi de Pectus calefacientibus agitur, Resinas inter, nec non Cor & Caput calefacientia ubi recensentur, inter *Marina*, minus adcuratè, sive *Amanuens*, sive *Typographi*, aut cujuscunque demum hallucinatione contrigerit, collocatur, cum neque resinofam habeat substantiam, neque maris aliquod productum existat. Licet dein, *Alexipharmaca* & semen argentia dum enumerantur, Animalium in ordine rectius memoratus fuerit.

An verò integrorum animalium, an partium eorum, an productorum ab illis, an denique excrementorum catalogo inscribi debeat, quæri posset? Ubi, distinctione factâ, ut carnem, ut sanguinem consideratum, animalium partibus jungi: ut humorem in folliculo collectum, ad productorum vel etiam excrementorum censum rectissime posse reduci, rehero.

Quod si tamen recensita genera omnia veri quid habuerint, & ita unum aliquod genus omni Moscho competens placeat constituere, Partem dicere commodè liceret, lara cujus adpellatio ipsum quoque sanguinem, & inde enatum productum, vel excrementum nobilissimi odoris sub se comprehendit.

An denique Aromatis epitheto dignus habeatur, paucis videndum? Adfirmant *Jacob Primerosius* in *Arte pharmaceut.* cap. de humect. *Joh. Renodans* lib. 2. Institut. pharmaceut. cap. 6. alique pluri. Ast contrarius videtur esse *Joh. Manardus* lib.

8. Epist. medicinal. 1. amaritudinem adeo à proprie vocatis Aromatibus alienam esse decernens, ut, quibus adest, quocunque odore præcellant, nomen Aromatis auferant. Ast ipsum Aromatis vocabulum si consulamus, quod ab *ἀρω* seu *ἀρι*, particulâ intensivâ, & idem ac valdè denotante, ut & *ὄζω*, oleo, benè oleo vel *ὄδμη*, *ὄσμη*, odor, derivatur, quis Moscho id nominis denegare poterit? Unde *Henricus Smetius* lib. 9. Miscell. pag. 467. Aromata res odoratas dici, scribens, quæcunque nimirum odorem suavem & natibus gratum spirant, mox iisdem Moschum adnumerat. Vel etiam ab *ἀρω*, *apto*, si descendat vox ista, quod nempe cibos aptos, i. e. aptos ad edendum suavesque reddat, hac quoque ratione Moschus Aroma erit, cujus in cibis condiendis usum exponere inferius occasio dabitur. Imo tantum abest, ut amarities Aromatibus sit deneganda, ut etiam Aromatis vox simpliciter posita *Myrrham*, omnium notitiâ amarissimam, denotet, vid. *Joh. Ant. Lindani* Select. med. pag. 308. Quod si saporis suavitatem juxta cum odoris grati præcellentia quis strictè exigat, amarum multis esse in deliciis & gratissimum, recordabitur.

De Animalis Moschifero.

Nunc quale sit animal, à quo Odoramentum jam explicatum depromitur, inquirendum occurrit.

Non uno autem sub nomine ab omnibus proponitur; dum modo *Caprea*, *Dorcas*, *Capreolus*, *Gazelus*, *Gazela* vel *Gazella* (quam vocem originè Arabicam explicat *Samuel Bochartus* part. 1. Hieroz. lib. 3. cap. 18.) cum additione etiam: *fera peregrina*, *Orientalis*, *Indica* adpellatur. Nonnunquam simpliciter *Moschius*, uti *Joh. Schrodero* in *Pharmacop.* *Moscharia Anton. Fumanello* cap. 4. de peste, *Moschus Hieron. Cardano* vocatur, reprehensio propterea à *Scaligero* Exerc. 211. de subtilit. sect. 3. *Aldrovando* *Capra moschi* audit. Sinis sub nomine *Xe* venire, cum *P. Martinio* *Joh. Neuhofius* in descript. regn. Sinic. cap. 16. innuit. *Hiam* ab iisdem dici, *Adam Olearius* l. c. ex *Boymio* refert. *Kircherus* verò utrumque conjungens, *Xechiam* à Sinis nominari monuit. Quæ tamen præfati *Boymii* sit opinio, ipsiusmet verbis indicare lubet: *Litera Sinicè scripta Xe, Lusitanis Almiscar, Latinis Muschum significat: hoc sumitur ex animali, quod Sinenses Hiam vocant: Littera ut supra vides, (vid. TAB. XVI. Fig. 1. in qua lit. a. notat Lo, i. e. cervum, b. Xe, cervum moschatum, d. Hiam odorem, c. autem idem ac a. sive Lo denotare autumo.) ex duabus aliis componitur, nemp. ex Littera Xe, quæ supernè est, & Littera Hiam, quæ infernè, illa cervum, hæc odorem denotat, quasi dicas Cervus odoratus &c.* Item: Porro quod Sinenses proprie *Xe*, & *Lusitani Almiscar*, atque *Latini Moschum*, est caro renum &c. Hinc corruptè satis in *Centone philosoph.* 6. *Musei Septali*, *Retiam*, typographi fortè &c. negligentia, vocari, elucescit; Licet reliqua ibidem addita huc optime quadrent, & quousque *Cervus* vocari mereatur, clarè satis edoceant: *Cervum immaturum (un Cerviuto, ut habet Marinus, cui hæc deberi autumo,) corporis mole aquat, lupino capite, duos sub labris terram versantes, longos exerens, plus timoris quam damni inferentes. Obscurioribus cervo tectus pilis tarde movetur. Xe Hiam à Phil. Marino in Kircheri Chin. illustr. vocatur, alienâ tamen culpâ literæ X. facile Y. substitui hîc potuit. Ubi celeberrimi Sinicæ linguæ Interpretis, D. Andr. Mulleri & *ἡμῶν*, nuper benevolè ad me perscriptam, adnectere conveniet, quâ cervum moschiferum Mandarinicè *Xe*, nostrum verò Europæum cervum eadem linguâ *Lo* adpellari, *Hiam* quo-*

quoque (pro quo alii *Hung*, *Chiam* scribunt,) odorem, non moschum simpliciter, nec cervum illum significare, utrumque autem conjunctum *Xe-hiam*, tam cervum istum quam moschum denotare, me admonuit.

Isidorus & *Albertus* qua ratione *Musquelibet* (quum voem etiam retinuit *Vincentius Burgundus*, aliis : *Musquelibus* legentibus) nominent, *Conr. Gesnerus* nescire se profitebatur. Sed à Moscho, quem Muscum vulgus adpellare solet, sic adpellasse, *Ulyss. Aldrovandus* suspicatur, quod equidem uti credibile satis est, ita plenariam tamen nominis istius rationem nondum exhaurit.

Marcus Paulus Venetus lib. 2. de regionibus Orient. cap. 37. & 38. de regione Tebeth & Caniclu verba faciens, inveniri ibi animantia tradit, Moschum producentia, quæ *Gadderi*, vel, ut aliqui legunt, *Quidderi* vocantur.

Adam. Lonicerus de succis concret. *Zabethion* & *Zibettum* vocari scribit. Et Germanorum non pauci, minus accurate qui nomina distinguere norunt, aut consulam tantum Odoramentorum istorum scientiam habent, selem vel catum *Zibethicum* vocant. Sic *Martin. Zeilerus* in Itiner. Ital. Florentinum thesaurum describens, inquit : *Man halt darinnen eine grosse Zibeth oder Bisem Katz ; die erwas grossers ; doch in Gestalt einer Katzen , mit grossen Augen. Ihr Speiss ist Eyer und rohes Fleisch , von der alle vier Tag hinten einer Haselnus gross. Bisem genommen wird.* Non minus Anglis *Muske Katt*, vel *the musc goat*. i. e. moschi felis audit. Et apud *Joh. Langium* liber. primo. Epistol. medic. 63. dum *Catoblecta animalia* (vel *Catoblepta*) odorifero *Zibethi* unguine turgida ponuatur, in margine additur : *Catoblecta Bisemthier*. Prout & in Oriente ipso moschum tam de *Zibethico* animali, quam de Cervo moschifero non raro dici, modò laudatus *D. Mullerus* testis mihi sit omni major exceptione. Animalia tamen Moschum & *Zibethum* ferentia sic confundi, facile cuivis sponte adparet, qui utriusque naturam & diversitatem considerat.

Nonnulli *Gazela* nomen competere ipsi negant, alique *Dorcadem* non dici posse, contendunt, *Gesnerus* tamen, hanc, bene ait, *feram Dorcadem*, *Capreamve*, aut *Gazellam Indicam*, peregrinam, vel orientalem appelles, aut *Dorcadem moschi*, vel simpliciter *Animal moschi*, parè interest. Sed *Capreoli* sub etymo commodè repoti, adeoque *Dorcadem*, *Capream* & *Gazellam* dici posse, ex seqq. patet.

Si tamen & alterius generis animalia moschum suppeditantia dari consideremus, in genere de quovis, absque discriminatione hujus vel illius speciei, sermonem habentes, omnium optimè *Animal moschiferum* adpellabimus, quod vocabulum nemini non notum quamlibet sic dirimere litem valebit.

His ita nunc enodatis, diversæ Antiquorum atque Recentiorum Autorum & Historicorum descriptiones adducendæ veniunt, ut plenius constet, qualem illud sit animal, quod tam fragranti hos Odoramento in sui admirationem trahit.

Inprimis verò *Serapio*, sive *Masudius* apud eundem, primum denuo locum meretur, qui illud à *Capreis* figurâ, colore & cornibus non differre, sed caninis tantum dentibus discrepare adserit. Nam, Interpretum ejus verba ut exhibeam, habet duos dentes caninos, egredientes ab ore ejus, sicut egrediuntur ab ore porcorum, & sunt dentes isti albi valde & recti, longitudinem unius pal-

mi, aut plus habentes. Vel, ut idem *Masudius* apud *Bochartum* habet : *Capreoli musci* ab his nostris nulla in re differunt, non formâ, non specie, non colore, non cornu. Tantum eos dentes distinguunt, quos habent instar dentium elephantis. Nempe singulis *capreolis* duo sunt dentes ex maxillis prodeuntes, erecti, elati, albi, ad spitham mensuram plus minus. Quod & *Damir* apud eundem testatur, esse nempe moschi *Capreolum nigri* coloris (quales pilos etiam *D. Thom. Bartholinus* se vidisse refert in Act. med. Hafn. Vol. 2. observ. 19.) tenuitate crurum & ungularum divisione nostratibus similem, nisi quod unusquisque illorum duos in inferiore (superiore legendum est,) maxilla dentes ex ore exsertos habeat, versus faciem erectos, (versus terram protensos, rectius,) uti apri dentes, infra spitham longitudinem.

Non dissimilia apud *Ebn Sinam* in Canon. med. libro secundo, tract. secundo, cap. decimo tertio inveniuntur, videlicet esse Moschum animalis, capræ non dissimilis umbilicum, caninos duos dentes candidos exsertos gerentis, & introrsum reflexos instar cornuum.

Et *Elluchasem Elimithar* (quem nonnulli Indum fuisse perhibent, noster autem *Welschius* in M. SS. Variar. Lectio. liber. secunda. cap. 12. nomen omnino confictum aut certe huic ineptè adtributum notat, cum verus Autor potius sit *Ebn Giezla*) in Tabulis de tuenda sanis. ibidem *Gazelo* simile animal illud tradidit.

Græcus etiam *Simeon Sethus* capræ illud sive dorcadi simile statuit.

Nec contrarium *Joh. Terrentius*, ex Cervorum nimirum vel *Capreolorum*, genere esse, picturamque ejus se in libris, quales Sinicos libros historiam animalium tradentes Europa nostra hætenus tantum in votis habuit, impressam vidisse, quâ similis sit *Dorcadis*, sed sine cornibus, in Epistola ex ipsa Sina ad *Fabrum* perscripta, referebat.

Accedit & *P. Boymius*, reverà cervo & tygridi (an ob maculas pelli impressas ?) simile esse pilosumque, sed coloris ærei subobscure nigri, innuens. Imò *P. Martinus* quoque, testis oculatus, quadrupes esse, exili cervulo non absimile, pilo paulò magis nigrescente, itidem testatur.

Cum hisce consentiunt *Brasavolus* & *Cardanus*, uterque ἀλώμενος, ideoque fide dignissimus, quorum hic l. c. talem in modum loquitur : *Moschi animal mortuum vidi in via Vexillariorum Mediolani, magnitudine, formâ, ac pilo, nisi quod coloris est magis glauci, capreolo simile est, pilus tamen etiam est crassior pilo capreoli : supra binos & totidem infra dentes habet, hocque solo differt & odore à capreolo, nam pili varietas à regione ortum habere potest.* Ille autem, in colore Cervo simile ait esse, *Dorcade* aut *Capreolo* paulò majus, & nonnunquam æquale, in figura quoque *Capreolo* simile, ungues multividos habens ut *Capreolus*. quod ideo *Caprea* aut *Dorcas* peregrina nominari queat, & tale Mercatores Venetiis Illustriss. Alphonso Duci Ferrariæ vendere voluisse, Moschum in folliculo habens. Quam datam à *Brasavolo* descriptionem *Bernhard. Cessennius* libro sexto de compos. medicam. verissimam esse profiteretur, utpote qui ipse etiam hujusmodi animal in horto elegantissimo Illustriss. Ferrariæ Ducis, Herculis Estensis, quem in Pado flumine possidebat, (sive, ut *Brasavolus* loquitur, Padana Insula, quæ Alcinoi hortos æquat,) spectaverat. Unde etiam Excellen. D. D. *Segerus* Animalis moschiferi delineationem in Ephem. Curios. German. Ann.

Ann. VI. observ. 128, daturus, Capream illud adpellare iustituit, quum toto corpore suo, solis dentibus prominentibus exceptis, Caprea seu Dorcadis nostra is mediocris magnitudinis figuram referat. Et Clar. Medicus Amstelodamensis, Amicus meus honorandus, D. D. Adolph. Fischerus, An. 1668. d. 17. Jan. in literis Amstelodamo missis ad beatum D. D. Joh. Theodor. Schenckium, eo ipso tempore tale se vidisse manibusque tractasse animalculum mortuum, quadraginta Imperialibus venale, testabatur, Capeolo nostrati satis simile, nisi quod longioris parum colli ac longiorum crurum fuerit.

Quæ omnia esse verissima, quantum quidem ad Capreoli magnitudinem attinet, memet quoque tres istæ à me memoratæ Exuvie certissimum reddidere.

Nec silentio prætereundus Jul. Caf. Scaliger, laudatus hoc in passu à Chiocco in Mus. Calceol. pag. 662. Animal illud Gazela simile album (qualem alias colorem nemo, nec etiam Barbosa, cujus historiam ex India petitam Scaligerum fuisse sequutum, ex Fabro superius monui, indigitavit, & talis si aliquando conspectus fuerit, merito ratiore inter referendus foret,) esse, ex historia ab Indis advecta, exerc. 21. de subtil. memorans, cujus ex inferiore mandibula (rectius: superiore) aequè dentes utrinque singuli exeruntur. Nec non exercit. 21. §. tertio Gazelam hanc totam Capreoli facie, neque aliud sane esse, quam Capreolum, refert, subdens: Unam Mesjana mihi Rhodius ostendit Eques; strigosior erat tota quam capreoli nostrates, curibus exilioribus erectioribus, ipsa magis sima, dentibus exsertis binis, quales attribuunt Arabes, Serapio & Avicenna: ceterum non tam grandibus, quantos ille scribit: atas fortassis adhuc tenera, nondum illos ad eam provexerat magnitudinem, candidi fuere ii, ac paulisper inflexi; Cum id è Sicilia rediens enarrassem Affinibus nostris, qui in Syria fuerant, dixerunt mihi, gazellam penitus esse figura capra, non autem capreoli; earum greges se vidisse multos. Quibus tamen Affinibus luis neutiquam fidem, merito habuisse Eum, insequentia mox verba evincunt, de scribendi periculo, ex aliena fide metuendo, dum Cardanum admonet,

Catelanus horum sententias rejiciens, unicam Petri Bellonii admittit, qui Observat. libro secundo cap. 51. (non decimo quarto & decimo quinta cum in cap. decimo quarto de ave Onocrotalo, serpente Jaculo, & Turcicorum militum modestia, cap. decimo quinto de navigatione Autoris è Rhodo in Alexandriam, Egypti urbem, agatur,) Gazellarum silvestrium genus quoddam, quod in arcè Cayri viderat, prolixè depingit, hasque solas Catelanus moschiferas esse existimat. Contra ipsam tamen Bellonii mentem, qui moschatam Capream nec alibi in istis Observationum libris, nec ibidem describere unquam in animo habuit, unde etiam nullam Moschi, vel odoris mentionem eum facere deprehendimus. Consentit Ul. Aldrovandus, aliud ibi Caprae genus delineari, admonens. Confert. Chioccus in descript. Musc. Calceol. & Casp. Hofmannus Paralip. de medicam. officin. sect. 3. c. 38.

Nonnulli Animal hoc idem cum Capreolis nostratibus faciunt, contra quos Fallopius l. c. decernit, qui licet simile esse concedat, differre tamen, vel ex dentibus concludit, quos nempe prominentes instar apri vel elephantis habeat, id quod etiam Joh. Jacob. Manlius de Bosco Comm.

in Lumin. maj. sect. prima cap. Elect. è gemmis, animadvertit, cum Avicenna, contra Serapionem sentiens, licet utriusque illius /Arabis relationem non dissentire, ex ipso textu sufficienter constet.

Sunt tamen & alii, qui diversum planè ab hoc jam descripto animal nobis exhibent, illudque magnitudine & figurâ vulpem & vulpeculam, aut etiam canem referre volunt, ceu imprimis apud Maffejum, Mendozam, & Nierembergium videre est, quorum hic, Animal, ait, est vulpis magnitudine, silvas incolere solitum. Vulpeculae autem formam seu effigiem nominant Mendoza & Maffejus. Figurâ & magnitudine parvo cani adsimilari, Joh. Hugo à Lindschotten cap. vigesimo tertio Itiner. Orient. (vid. pars secunda de India Orient. à Joh. Dieterico, & Joh. Israële de Bry 1613. Francof. edit.) aut etiam vulpem referre, cap. vigesimo sexto (vid. pars quarta dicti libri) scribit. Mediocris canis formâ & magnitudine esse, G. Gregorius de Bolivar Fabro testabatur, cujus denuo verba, ut notavi digniora, lubet adducere: Animalcula quædam repertum, quæ in silvestribus locis, ubi Cuniculorum modo terram suffodiunt, generantur. Magnitudine & formâ suâ mediocrem Canem ex parvorum illo genere æquant. Colore sunt pardo, ut Hispani dicunt, sive ex obscuro rubro, ac cinereo mixto, aliqua tamen albis nigrisque maculis signantur: pilos raros, difficos ac duriusculos habent. Pedes ipsi sunt largi, unguibus canis instar armati, sed longioribus acutioribusque quibus facile sibi speluncas in terra fabricant. Rostrium oblongum, caninum, dentibus probè munitum. Aures habent curtas & rotundiusculas, oculos parvos & minimè alacres, similes illis, qui morti vicini sunt. Non quidem multum agilia, sed vasa admodum sunt, ubi abscondendi sub terra necessitas, illa urget. Qui omnes sanè unum idemque nobis animal siteri videntur; quod cum talem in modum circumscribatur ab istis, qui fere omnes in Indiis istis Orientalibus dimorati fuerunt, partim etiam animal ipsum à se visum perhibent, quis diversum à priori, Capreolo scilicet, Animal eos innuere amplius dubitare queat? Nec certè eosdem tam cæcos ac quasi dementatos fuisse, facile dixerim, ut in animali, Capreolum quam maximè referente, Canis aut Vulpeculae formam sibi imaginari fuerint, idèoque de fide eorum, nisi certiora edoctus fuerim, scrupulum movere hic neutiquam possum.

Ut eapropter cum Casp. Schotto libro octavo Phyl. cap. vigesimo sexto §. sexto fortassis non unum tantum animal moschiferum est, scribente, quamvis paulò confidentius, non unum solum, sed duplex Animalis moschiferi esse genus, malim concludere.

Ipsos verò Capreolos moschificos plura in genera dividere nollem, quamvis in colore, aliisque nonnullis accidentibus varietas subinde in eis occurrat. Ista anim. speciem non mutant. Aldrovandus quidem contrarium opinatur, cum Brasavolum nullum exsertorum illorum dentium mentionem faciat. Ast, quæ humani ingenii est imbecillitas, in describenda re quapiam occupati, facile vel notatu digniorum circumstantiarum oblivisci possumus, quod & Brasavolo contigisse potuit, Nisi fortè dentes illos animali, quod viderat, ætas, fortuitusve aliquis casus abstulerit, aut Brasavolum aliis magis intentus studio omiserit. Idem sanè in Martino & Neuhofio deprehendimus, quorum uterque de exsertis dentibus ne verbum profert, cum

cum tamen eisdem figuris, quas exhibent, Animalis istius adpingi curaverint.

Utrum tamen hisce vel illis adnumerare liceat Animal moschiferum, quod parvum & subrubri coloris esse, *Gabr. Sionita de monte Libano* scribit, quivis per me, quidquid voluerit, credat, parvum quidem dici potest utrumque respectu habito ad alia majora genera, Oriente non infrequenter occurrentia, subrubri etiam coloris pilos non planè denegabimus. Suspecta tamen fides ejus redditur, quòd Moschum in Oriente ex Urbe & Districtu Haleppi provenire statuat, id quod nemo alius unquam dixerat, nec etiam veritatis aliquam speciem apud Historicos inveniet, cum omnes Moschus, qui Haleppi venalis exponitur, Sinarum potius & Indorum è regionibus illuc transportetur.

An autem *Baathschneri* relatio, *Fabro* communicata, aliquid certi contineat, oculatiores alii dispiciant, dum nempe animalcula illa, ex quibus Moschum in Lusitania confici narrat, paulò majora esse perhibet, quàm illa, de quibus supra *F. Gregorius* historiam suam pertenuit, figurâ quoque non cani, sed feli esse persimilia, habitare in locis saxosis plerumque ac silvosis, ubi oleastri præsertim & quercus occurrunt, glandes dulciores castaneis nostris, animalibus illis pergratas, ferentes, & necessitate, ab abscondendis illis feris inservientes. Mihi sanè illa suspecta admodum sunt, nec in Lusitania veri Moschi proventum dari, persuasum habeo, ut ideo vel fictitia omnino illa sint, vel ad Moschi tantum adulterationem bestiarum hæc inserviant. Et licet *Baathschnerus* in certis Lusitaniæ desertis, quæ peragraverat, animalcula talia talia viderit, vel omnino decipi nimis credulus à fabularum conditoribus, vel etiam fictitii Moschi elaborandi modum edoceri potuit.

Nec tandem *Amatus Lusitanus*, testimonio authentico destitutus, mihi probatur, qui Animal huic Leporis tantum magnitudinem adsignat, quem falsè cæteroquin traducit *Franc. Alexander* in Apoll. suo Pharm. rad. 1. Cui tamen *M. Paulus Venetus*, qui ipsam Chinam sive Chatajam adierat, patrocinari videtur, pulchrum id esse animal, testatur, catti, vel, ut alii legunt, *katha habens magnitudinem, & pilos grossos, ut cervus, pedes quoque ungulatos*. Vitium tamen aliquod hinc subesse, & catti loco, capreoli (vel etiam caprea) esse legendum, autumat *Aldrovandus*. Nec sanè aliud animal eum indigere, quàm quod Capreoli nomine supra perlustravimus, tum ipsa ejus descriptio, tum nominata juxta umbilicum vesica sanguine plena evincit. Liceat & hoc addere, quod libro 2. cap. 9. Animalia Moschum ferentia, Cervos inter & Capreas media reposuerit.

Ut autem *Bolivariis*, cæterorumque cum eo facientium Animal, minùs utpote cognitum, nec genuini sive follicularis moschi ad nos deferri soliti autorem, nemine insuper hætenus depictum, aut ad vivum delineatum, publicique juris factum transiliam, de altero illo, Capreolum referente, id saltem jam monere lubet, omnium optimè illud à prælaudato Nob. D. D. *Segero* fuisse descriptum, cum quo tamen etiam, si lubeat, altera à me, Anno VIII. Ephem. Curios. German. numero 53. inserta descriptio conferri potest, quæ ideo speciatim adducere supersedeo, cum utilissimi illi Ephemeridum Academiæ nostræ Curiosæ libri omnium ubique Curiosorum in ma-

nibus versentur. Hoc saltè innuere paucissimis placet, quod, si Dorcadem nostratem, mediocris, majoris, vel etiam minoris magnitudinis ob oculos ponas, cui variegatus, & maculis quasi conspersus in cute pilosa sit color, caput tamen lupinam quodammodo faciem (si non in vivo animali, saltè in ejus exuvils,) referens, dentes prominentes duo, inque abdomine infra umbilicum parum exstans protuberantia, eo ipso videas Animal moschiferum.

Dentes tamen, cornua, & cursus ejusdem, antequam ad alia transeam, ulteriorem adhuc deposcunt considerationem.

Illos quod attinet, *Serapionem* & *Avicennam* duos caninos extra os prodeuntes ei tribere, ex adductis superius eorum verbis liquet, hac tamen cum differentia, quòd *Ebn Sina* eisdem introrsum reflexos instar cornuum, *Serapio* autem, Interpretibus si fides haberi queat, rectos esse edixerit. Ubi tamen *Ebn Sina* magis crediderim, cum aliorum testimoniis fulciatur, prout sanè *Segerus*, *Boymius*, *Kircherus*, *Calceolarius*, *Tavernier*, & *Neubosius* suis animalium iconibus incurvos ejusmodi dentes adpingi curaverant, quales & ipse in Exuviis omnibus sæpius jam è me memoratis deprehendi. Eandem reflexionem *Scaliger* etiam in viso à se animali notaverat, & *P. Phil. Marinus* hæc profert: *ha due denti longi, come di vecchio Cignale, che li escon fuori di sotto al labro superiore & rivolti all' ingiù verso terra*. Quamvis, quod in Ludolfiana pelle benè notavit *Exc. D. Schefferus*, tam curvi revera non existant, ac in Itinerariis communiter lineari solent.

Ast dum *Cardanius*, ultra binos illos superiores è maxilla prodeuntes, totidem etiam infra habere scribit, quod non minùs *Marc. Paulus Venetus* tradidit, quid certi regeram, vix invenio, qui & memoratos, *Segerum*, *Volckamerum*, *Boymium* &c. duorum tantum cognitionem habuisse, nec plures me observasse, considero. Unde differentiam aliquam hinc dari, fortè dicendum foret. Quamvis statuere malim, præconceptam opinionem de eorum cum Aptorum dentibus, quorum à nonnullis quatuor poni constat, plus justò latius extensa similitudine, duos reliquos, inferioris nempe mandibulæ inconsideratiùs addidisse, vel eminentes nonnihil quandoque præ cæteris, non tamen ipsam oris cavitatem egredientes, aliquos dentes decepisse eosdem, quales nempe *Clar.* etiam *Segerus* observavit, & de inferioris maxillæ octo dentibus verba faciens, hunc in modum scripsit: *quorum duo medium occupantes locum, reliquis sunt prominentiores*. *Serapionem* itaque, qui primis porcinis dentibus comparare eos sustinuit, duos verò tantum assignavit, sequi præstabit. Quos tamen unius palmi longitudinem aut plus habere dum scribit, scrupulum novum injicit, quem ex ætatis differentia tollere laboravit *Scaliger*. Certè nec *Segero*, nec mihi longiores, quàm duorum pollicum transversorum comparuerunt. Uti verò Natura in dentibus humanis mirè ludit, sic & in Capreolis istis variare potest. Vel *Serapionem* unà cum radicibus intra alveolos reconditis considerasse, vel quod credibilius, omnino deceptum fuisse, dicamus.

Cæteroquin etiam ab aprugnis, ratione sitis, multum differunt; his, scil. in Apris, superiora versus mucrone profurgentibus, illis verò terram versus reflexis; quo ipso jam etiam adparet, quousque cum elephantinis dentibus, quos adducit cum *Masudio Fallopius*, convenient.

Et dentes hi in causa esse potuerunt, ut Animal huic cornua nonnulli tribuerint, non secus ac ipsi Elephanti, piscique Narthual eminentes extra oris rictum dentes quibusdam imposuerunt, ut illum cornutum, hunc verò monocerotem crederent. Dùm nemo aliàs ex illis, quibus Capreolos istos fuisse visos certò constat, ullam cornuum fecerit mentionem. Imò Martinus cornuum omnino expertus esse, clarè satis innuit, & Nob. Visscherus in literis suis Animal, quod Amstelodami viderat, absque cornibus fuisse, referebat, Exc. quoque Segerus & Nob. Volchamerus cornua nulla, imò ne quidem eorum vestigia adfuisse, testantur, quod pariter & ipse de Exuviis, quas videre datum fuit, adfirmare possum. Et Job. Terrentius, ut paulò superius dictum fuit, picturam ejus in libris Sinicis impressam Dorcadì quidem adsimilari, sine cornibus tamen esse, consentit. Unde verò Celeberr. Welschius in Diss. secunda de Ægagrop. pag. decima tertia Capreolis moschiferis exiguas subulas simplicibus subulorum radicibus perquam similes esse, hausert, me latet, qui apud nullum Scriptorum, quos evolvere sat multos & præcipuos datum fuit, tale quid invenio. Aldrovandus quidem, cum suam de Quadrup. bisulc. historiam conscriberet, jam ante multos annos Bononiæ Gazellam tam marem, quàm femellam, cum suo pullo visam notat, corporis figurâ & capite vulgarem Dorcadem, sed cornibus vulgarem potiùs Capram, & colore Cervum exprimentem, quarum etiam effigiem adnectit, marem sine cornibus, femellam autem cornutam faciens: At Dorcadis genus illud fuisse verè moschiferum, ferè dubito, præsertim cum ipse dentium prominentium, ut & folliculi nullam, neque in discursu, neque in schemate, mentionem fecerit.

Hic verò scrupulum aliquem mihi movet Animal moschiferum, quod in Horto aulico Frisingæ Bavarorum, hinnuli cervini specie præditum, vidisse se, Wolffg. Höferus Hercul. medic. libro septimo. cap. secundo. refert, (licet Höfero non visum, sed ex relatione aliorum tantum fuisse descriptum, Nob. DN. Andr. Hueberus, Medicus Ducalis ibidem meritissimus suspicetur, nec in horte Episcopali aulico, sed apud DN. Buecherum, Ecclesiæ Cathedralis Decanum &c. existisse, qui illud ex Italia acceperat, unà certiore me reddiderit,) quod A. 1648. fortissimo Suecorum Archistratego DN. Car. Gust. Vrangeliò donatum, & cum in Sueciam deduceretur, Suinfurti à duorum Academix Nat. Curios. Præsidum veneranda biga visum, cornibus fuisse instructum, Ill. DN. Fehrius noster me nuper monuerat, additâ etiam figurâ, (quam æri insculptam TAB. XVI. Fig. secunda. oculis subijcio,) juxta cum tali descriptione: *Forma ipsi erat capreoli (quantum quidem de eo per fenestram in obfcura camera tum oberrantem dijudicare licuit) sed minoris paulò, & rectiora crura, duo statim ob oculos ex media fronte eminebant cornua dodrantali longitudine, subfusca, rotunda & striata, non ramosa (ut capreolis) & leniter resupinata: Nulli ipsi dentes ex ore deorsum (ut apris sursum) extantes, auricula parva; Dorsum pilo splendido, aquali subrufo seu castanino capreol. nostr. instar vestiebatur, subtus tamen & in ventre albescebat, nullo ibi folliculo moschifero, sed caudâ nigricante spithamam longâ spectabilis, quâ canis instar spectatoribus sæpius ablandiebatur. Fœminam eam*

dicebant duces, cum tamen cornua capreolis nostris fœmelis, ut cervis desint, nisi id errantè quædamque formatrice fiat, quod cervæ isti cornuta in Anno Ephem. nostr. X mortem attulit, li et in caprillo genere fœmella itidem sint cornuta. Capreolum igitur nostrum diversum quidem fuisse, à Tuo vel pluribus Tuis ex diversis Auctoribus allatis, sed itidem moschiferum constat: abducto enim eo in Sueciam, camera ista, ubi aliquot dies fœno & avenâ alebatur, moschi odorem post satis diu spirabat. Ad subulorum Velschii aut Gazellam Aldrovandi propius accedere videtur. Sed hæc & alia ex vicina Frisinga certius pliniusque exquirere poteris, mihi tum temporis inter turbas ac tumultus bellicos tantum otii non supererat. Iconem autem genuinam affabrè dipingendam curavi Magnif. noster Præses & Fundator Acad. N. C. DN. Job. Laur. Bauschius à παρὰ τοῦς, in cujus adiutorio curabatur, cujus copiam licet rudi penicillo delineatam hic Tibi mitto, ut descriptioni meæ lucem quandam præeraret, minorque magnoperè, nullam de eo pro Germania provincias cavea lignea incluso in Sueciam deportato (quod quidem sciam) extare memoriam. Hoc sanè animal idem cum Aldrovandino esse videtur. A quo nec diversum est quod sub Gazellæ nomine D. Job. Jonstonus Histor. natur. de quadrup. tab. 29. delineatum dedit, Gazellam quoque, cujus in Clæve medic. pag. 107. meminit, masculinam tamen cornutam fuisse, Excell. D. D. Job. de Murato, Nobil. D. D. Job. Conr. Peyerò, meæ sollicitatione peramicè favente, interrogatus, respondit, cujus verba integra ex literis Tiguri A. 1681. 15. Augusti exaratis huc excerpere placet: Undecimus annus agitur, ex quo Gazellam Parisiis cum Anatom. Regio DN. Ludov. Gaian, Hospite & Præcepto meo charissimo, secui: Interim præter ea, quæ in Clæve mea exaravi, memini nobis subiectum illud in Regio traditum esse (du Parc de Versailles) quo plurima rara nutriuntur animalia ex India allata: pulcherrimos & in ventre albos tenebat, caudâ pendente crinita obscuriore: Cornua acuta, oblonga, leviter in tortâ, obusorem capram instar nasum, caput rotundum, nullos in superiore maxilla ore dentes, sed aures præres in inferiore habebat, pedibus bifidis, unguitibus præbè armatis intersepiente membrana incedebat, genæ cute atrita & dura vestita fuerunt. Sub umbilico folliculos, materia instar cera dissoluta plenos monstratos, sed non tam benè ac moschum olentes memini dixerunt & leperes quandoquæ talem materiam in eodem recondere &c. Hanc Gazellam, à præsedato DN. Peyerò Capræ Africanæ sylvestris nomine insignitam, cum Aldrovandina, Jonstoniana & Fehriana eandem fuisse dicerem, nisi pedes, quos hi unguatos pingunt, ille unguitibus armatos memorat, obstant. Monstruosa tamen inter animalia referre illud num propterea liceat, hæreo; quamquam multiformes ibi animalium partus esse, varietatè feminis cujusque generis mares aut vi aut voluptate miscente, Plinius (quâ fide, nescio,) lib. 8. Hist. nat. cap. 16. scripserit, unde etiam vulgare Græciæ dictum fuerit ortum, semper aliquid novi Africam afferre. Quidquid sit, hoc tamen certum est, sic persequente dentium ex mandibula superiore eminentium defectu, caudâ præsentia, & folliculi absentia, vel etiam duplicati & instar eorum, quos in Castoribus & Leporibus reperiri, præter alios, Rodolphi lib. de amphib. cap. 8. & cum eo Fuchsius l. c. nec non celeberr. D. Jo. Jac. Wepferus Miscell. Germ. Cur. Ann. 2. obs. 251. & Ann. 3. obs. 167. fidem fecerunt, ingrati odoris excrementum continentis præsentia, longè diversa hic animalia à notioribus istis moschiferis supra descriptis recenseri; ut ita reliquorum

eternua negotium ullum mihi amplius hinc facere nequeant. Et quamvis odorem moschatum Bavarica illa bestia exhalaverit, Moschum tamen suppeditasse, tale nempe odoratissimum concrementum, quale vulgò in Officinis prostrare solet, inde vix sequitur, cum huius illi odorati rarum quid in isto esse potuerint, quale quid nonnunquam in hominibus, crocodilis, leporibus, mustelis, cochleis &c. deprehendi constat, & infra memorabitur.

Attamen & *Sim. Sethus* Moschum provenire statuit in umbilico *Ἰὸς πὺς μονόκερος, μυγίς, ὁμοίς δονάδι, animalis unicornis, maximi, caprea similis.* Sed errasse hinc *Sethum*, *Gesnerus* (quod etiam *Fuchs* notat) optimè monuit, cum aliorum nemo id, quod nempe sit animal unico cornu præditum, scripserit, ne oculati quidem Auctores; falsissimum quoque id esse, *Bochartus* demonstrat. Maximum insuper hoc esse Animal, ab unico *Setho* minus bene scribi, idem *Gesnerus* animadvertit, pro *μυγίς* idèο *μάλιστ'* legendum, suspicatus, quod equidem hac ratione ad veritatem propius hos deduceret, MSSorum tamen, quorum varias lectiones, à beato *Welsch* nostro collectas, ære meas feci, consensu destituitur.

Tandem morsu in persequentes sævire capreolos istos, exentis verò dentibus longioribus manuscere, ut raro vivæ capiantur, in *Alex. Benedicti* lib. 13. Pract. cap. 26. legimus. Verùm sævitiā hanc in mordendo esse imaginariam, dentesque illos longiores, ad corporis suā fame potius, quàm externis injuriis aliis defensionem, live radices in cibum cessuras ut istis effoderet, à Natura concedi, autumo; quæ non minus *Cl. D. Schefferi* erat conjectura, Mendocianā famæ relatione, quā odoratam tantam, digitalis crassitie radicem, Camarum dictam, animali huic in cibum venire dicitur, confirmanda, si eandem cum capreolo hoc bestiam Autor ille describeret; aut etiam radix illa cum Behmeno eadem esset, quam Dorcadi huic in cibum cedere, ex *Ebn Sina* discimus. Hinc non minus, plus timoris, quàm damni dentes istos inferte posse rectius cum *Exc. D. Paul Mar. Terzago* cent. philosoph. 6. Mus. Septal. regeritur. Cujus vitæ incolumitati Natura magis cursus velocitate consuluisse videtur. Saltu enim cursuque perniciā hęc esse animalia, tum ipsa cum capreolis, velocitate & agilitate suā hominibus signaturam dantibus apud *Oswald. Crollum*, convenientia, tum pedum structura ad agilitatem comparata indicat. Nullam autem hinc parit difficultatem *P. Phil. Marinus*, Animal moschiferum ad cursum esse lentum atque tardum, adserens, cum mox, adeo stolidum esse, subjungat, ut labor Venatoribus nullus, quàm inveniendi incumbat, quia inventum occidere possint, absque motus aut defensionis alicujus actu vel resistentia, siquidem membra ad velocissimum cursum idonea possidere, & eadem ad evitandas hominum insidias nonintendere, in uno facillè concurrere possunt animali. Nisi relationem à *Tavernierio* factam huc trahere, & quod debilitati dandum fuerat, stoliditatem adpellasse *Marinum*, dicere malimus. Sic enim *Tavernier* l. c. ex Gallico idiomate in Latinum conversus nos instruit: *Mense Februario & Martio, cum fame colluctata fera ista (propter vires, quæ ibi 10. vel 12. pedum altitudine terram tegunt,) versus meridiem progrediuntur ad gradum usque 44. vel 45. ibique tritici & oryza nova segeti inhiant, at rusticum eas expectant in transitu cassibus hinc inde dispositis, captasque sagittis vel etiam fustibus necant.* Nonnulli asseverare, me presente, tam macilentas eas esse, tamque debiles, ex fame hyberna, ut multa earum cursu ab homine pedestri capi possint. Nec obstat *Fr. Gregorii de Bolivar* historia, Animalia moschifera non multum agilia edifferens, cum, si vera illa sint, quæ profert, longè diversum, nec satis adhuc nobis cognitum animalis genus designet.

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

Cæterum ut ista, quæ hæcenus dicta fuerunt, eo melius animis imprimantur, figuram Animalis hujus, si ve Capreoli moschiferi, *Tab. xvi. Fig. 3.* exhibere placeat, ad normam Segerianæ (non exclusâ Stoberlianâ,) adornatam, paulo tamen, juxta formam Exuviarum Augultanarum, immutatam. Alias tamen consulto volui omittere, veluti Aldrovandinam, Boymianam, vel, quæ eadem est, Kircherianam, Calceorianam, Camerianam, Gesnerianam, Jonstonianam & Neuhofianam, præsertim quia easdem in Anno IIX. Eph. Curtios. Germ. jam memoraveram, meumque de earum insufficientia judicium breviter protuleram. Nec ultimo etiam visam in *Tavernieri* Itinerario iconem huc si ponerem, multum is conferre posset, quam si cum nostra hac comparare velis, pariter non satis probare queas. *Martini*, in Atlantis Sinensis Tab. provinciarum tertiarum, Xenii dictæ, posita, non adeo, ut aliorum quædam, inconcinna est, cumque Neuhofiana coincidit. Nisi fortè in ipsis istis Capreolis, uti in magnitudine & colore, ita etiam in ipsa reliqui corporis figura aliquam dari differentiam, in istorum quorundam excusationem dicere liceat; ad quod tamen credendum difficiillime inducor. Quamvis aliàs quidquam honoris aut quoad cætera fidei Viris istis celeberrimis decedere nequeat, qui patrim infidâ, incertâ & falsâ aliorum relatione unice instructi, adeoque facilius decepti, partim etiam Pictorum & Sculptorum, qui suo tantum ingenio Naturam sapius adumbrant, artisque suæ arrogatâ licentiâ nimium abutuntur, aut etiam rudiori & imperitiori manu laborem absolvunt, figmentis subiecti, vel inviti disseminare errores coguntur. Quod sane & mihi, magnis si liceat componere parva, cum figura *Calceolari* accidit, quo de loc. cit. pluribus à me actum fuit.

De Folliculo moschifero.

Folliculo, ut moschiferi Capreoli præcipuè parti, in qua selectissimus reperitur Moschus, & aqua ademtâ, ad Moschum progignendum Animal id aptum deinceps non esse, merito credimus *Brasavolo*, proprium destinare Caput, æquum est. Quem exuperantiam quandam, parvum marsupium referentem, & subtili pelliculâ ac subtilissimis pilis vestitâ constantem, *Atlantis Sinici Auctoris* circumscriptione, supra vidimus. Quod & re vera ita sese habere, modo subtilis pelliculâ, non simplex aliqua & similis pars, sed organica & dissimilari intelligatur, quivis facillè deprehendet. Ut ideo ab ipso Moscho folliculum, tanquam continens à contento, distinguere omnino necesse sit, atque minus accurate idcirco *Johannes de Sancto Amando* Expos. sup. Antid. Nicol. cap. de Pot. mosch. Moschum esse folliculum quendam in animali quodam inventum, scripserit.

De ejus imprimis loco Scriptores non unam fovent sententiam. Ut enim *Fallopium*, pectoris quoque mentionem absque fundamento ullo facientem, haud curemus; multò minus *Johannem* modo dictum, apostema hoc pedi adjudicantem, ipsum umbilicum, *Ebn Sina*, *Ellachasem*, *Sethus*, pluresque alii à prædictis ita edocti, nominant. Ill. etiam *D. Thom. Bartholinus* obs. 58. Vol. 1. Act. med. Hafn. receptaculum illud, oculari inspectione adjunctus, ita describit: *Externa pars tuberculum habet duriusculum, rotundum planum, pilosum, sed pilis à circumferentia centro incumbentibus. Ex centro prominentia extat, quæ umbilici vestigium signat. Pili circumjecti in cute limbi densiores, & vario fluxu hinc inde sparguntur, albi plerique, non ita membrana incumbentibus. Et Nob. D. Daniel Ludovici Eph. Germ. Cur. Ann. V. obs. 205. prominentiam hanc rotundam esse, ac nucistam majorem æquare vel superare scribit, cum manifestis coalituræ umbilicalis, sed citra aper-*

Hh turam

turam quandam, notis, de cætero Bartholinianæ dictæ delineationi adprimè correspondere, intus autem adhuc manifestius antiqui meatus coalitum inter corrugationes quasdam ostendere, cum adhærente funiculi umbilicalis particula. Alii tamen umbilicum, sed regionem infra eundem sitam proponunt. Sic *Marinus: di sotto all' umbilico*, id est, *sub umbilico*, vesicam istam comparere; scribit; *infra umbilicum*, *Cardanus*, quo etiam *M. Pauli Veneti* sententia trahenda, juxta umbilicum inter cutem & carnem eandem collocans. Nec aliter sentit Celeberr. *Severus*; in abdomine non longe à posterioribus pedibus tumorem hunc eminere testatus. *Tavernierius* quoque imæ ventris parti, propiore genitalibus quàm umbilico, eum adhærere, tum in *Itiner. l. c.* tum libello, cui titulus: *Observations sur le Commerce des Indes Orient.* notans, si nempe de animali masculo loquatur, idem innuit. Nimis autem ab umbilico hunc remove videntur *Isidorus*, *Vincentius Burgundius* & *Platearius*, dum in inguine subsistere volunt. Mihi, cum *Brasavolo*, circa umbilicum Moschi folliculum esse quærendum, concludere libet, sive in umbilicali regione inferiori, quem etiam umbilico modo paululum propiorem, modo ab eo aliquantulum remotiorem esse posse, haud admodum negabo, inprimis pro diversitate magnitudinis in ipsis animalibus. Umbilicum tamen ipsum huc accersere vix audeo, cum revera paulo declivior, quàm quo umbilicus solet occurrere, abdominis locum occupet, & singularis ab ipso ortu dubio procul congenita Folliculi conformatio simplicem umbilici extensionem & intumesceniam non admittat. Quamvis verò in Folliculi acumine coalitura quasi umbilicalis vestigia existant plerumque, ea tamen revera meatus aperti, non ita in exsiccatò corpusculo sensum incurrentis, esse indicium, paulo post demonstrabitur. Mihi sanè nulla umbilici in folliculo nota, multo minus funiculi umbilicalis particula unquam visa. Aliorum tamen circa hæc experimenta vel conjecturas potius non impugnavo, id solum recensens, quod oculis meis in perlustratione multoties se obtulerat.

39. Unicum autem tantum Folliculum singulis Capreis nostris esse à Natura concessum scimus. Nec *Fallopianus* supra citatus ullam hinc parit difficultatem, aliquando geminum, aliquando multiplicem eum oriri scribens, quem nempe unanimis tot oculatorum testium confessio, unius tantum conscia, redarguit, & imaginaria cum abscessu præter naturæ intentionem vel ordinem generato comparatio deceperat.

Cæterum Folliculi moschati icones Lectori Curioso, tam quoad internam ejusdem, quàm externam figuram in Tabula III. exhibere volui. Alteram vero illam, quam olim ligno incisam & Theſibus meis Academicis additam, postea verò ab aliis quoque mutuatam, novæque *Gesneri* de Quadrupedibus editioni, nec non *Castelli* de Hyæna odorifera recula Exetasi insertam, nunc planè deletam volo; quem quidem Folliculum elegantissimum, haud negabo, ast non unam mihi, dum alium nullum, quo cum conferre potuissem, tum temporis habueram, etrandi causam præbuit, cum inprimis minimè duas in cavitates aut sinus à Natura, sed violentiâ quadam extraneâ & compressione, quâ varias adipisci figuras solet, divisus, ideoque sibi relictus unicâ tantum cavitare præditus sit dicendus.

Ast dum ubi substantiam ejus cutaneam, partim etiam quasi carnosam edixeram nec jam mutare penitus sententiam est animus. Licet enim in exsiccatò uti ad nos deferri solet, illam carnosam demonstrare non adeo promptum fuerit, ubi tamen eundem aquæ aliquandiu immaceraveris, à qua partes ejus exsiccatæ denuo intumescunt & ad naturalem statum propius reducuntur, absque magna difficultate cultri ope oculos incurret. Verum & alia, quæ mihi hanc vitam ingresso observa-

re contigit, in elegantiori folliculo inprimis (eum aliquam dari differentiam in quibusdam haud negare velim, in essentialibus tamen omnes, quotquot hæc methodo examini subjeci, convenire observaverim,) brevissimis enarrare, & libet, & jucundum ac utile erit.

Abrasis itaque & abscessis primò exterioribus pilis, ne tædium qualecunque remoramque sectionis adferrent, aut foraminula sub eis latentia oculis eriperent, mox sub eminentia illa acuta foramen sic satis amplum, Lunæ falcata formâ, sese obtulit, ipsum in folliculi cavitatem oblique anteriora versus penetrans. Quin & ipsa eminentia sive fastigium non solidum, (quod & *Cl. Severus* cavum esse pronunciat, dum moscho exitum præbere adstruit,) sed meatu aliquo (in cujus extremitatem pili, setarum ferè ad instar duri, implantantur, caput rufum, à moscho ex vicino meatu exstillante ita fortasse tinctum, reliquâ eorum parte intus latente albidâ, exferentes, suaque protuberantiâ fastigium illud inprimis, repræsentantes) prædita itidem comparuit, cui immixtus stylus per folliculi dorsum promptè subiit ad oppositam usque partem, ubi abscessus ille, dum nempe folliculus ab Animali olim auferebatur, ulteriorem sui inquisitionem, & ubi tandem in corpore terminetur, denegavit.

Hic incitatus Folliculi pellem internam, eo latere quo abdomen respicit glabram, quo verò cum pellicula mox describenda jungitur, rugosam circum circa abstuli, & mox pelliculam quandam fuscâ, in ipsius folliculi mediam cavitatem propagines quasdam emittentem, imò in Moschi etiam ipsius substantiam immerfam, prout & per foramen falciforme sive semilunare extra utriculum protensam, cæterum à subjacentis membranæ nervosæ rugis pariter in rugas contractam, facili tamen operâ ab eadem abscedentem, atque licet per se admodum tenuem, diligenti tamen manu in quatuor alias tenuissimas membranulas haud difficulter divisibilem, atque moschum undique ambiente & ceu in loculo eundem continente deprehendi ad separatavi. Quæ naturâ suâ quidem albicans est & argenteo quodam nitore resplendet, eo tamen latere, quo Moschum proximè ambit, fusco colore tinctu; cujus lacinias Mercatores Moscho commixtas sæpius vendere solent, in Moschi electi & follicularii substantia promptè deprehendas. Quam itaque magni ut faceret *Fallopianus*, satis causâ habuit, hunc in modum scribens: *Ex his vesiculis aliqua sunt ita vetusta, ut nullum odorem servant, aliqua odorata sunt & recentes, & sunt illa in quibus adest folliculus & membranula, ubi continebatur Moschus. Ideo videte, quando emitis: Scalpitis digito si adest pellicula, ematis; sin minus, linquite, quia odorem amittit citius; non ergo negligatis pelliculam internam.* Revera enim major folliculorum fragrantia membranulæ illi, à moschato humore tinctæ debetur; diutius etiam ideo in eis persistens, cum istâ ablata, cæteris dein folliculi in partibus citius avolet, utpote non ipsâ Moschi crassiori ac durabiliore substantiâ imbutis, sed odoratis tantum quibusdam tenuioribus atomis, quas exhalantes in se receperant, imprægnatæ, quibus avolantibus, minus delectabilis odor & folliculo ac pelli naturalis remanet. Atque illa ipsa pellicula in causâ fuisse videtur, ut *Fallopianus* folliculum moschatum tumorem tunicatorum, sive qui in folliculo aliquo membranoso saniem instar lardi &c. continent familiæ, quamvis minus bene, ut supra ostendit, inseret. Sed ad cavitatem receptaculi hujus potius revertor.

In qua circa orificium meatus prædicti moschiferi, tenuissimis satisque longis rufescentibus pilis munitum, glandularum (forte liquorem serosum ad humoris moschati naturâ crassioris dilutionem exstillantium) manipulus, in quas radices pilorum istorum implantati videntur, oculis sese objicit, latentes tamen alia sub illa tenui situm nacta, nervosa magis & crassa, in pluri-

fig. 2.



fig. 4.



fig. 6.

fig. 7.



fig. 5.



fig. 8.



fig. 3.




fig. 1.

鹿
射
鹿
香

a
b
c
d

E.P.

mas etiam fibrosas particulas, aliarum quarundam in modum, cultro separabilis & ipsius cutis propago existit, utpote à qua eandem separare non potui, unde hæc cutis duplicatura glandulas modò dictas, ductumque mox describendum & musculum, cœu in sacculo quodam complectitur.

Sub hæc itaque laret carnosa aliqua & verè musculosa substantia, circularibus suis fibris, oculorum si iudicium me non fefellerit, utrumque meatum incingens, cœterum crassa admodum & valida, cutique arctè adhærens, cujus carnosæ fibræ exsiccatis, membranosis tamen non omnino exclusis, folliculi ipsius soliditatem & renitentiam adseribo. Musculum autem hunc succi imprimis moschati retentioni inservire, verosimile est, quem Natura hoc artificio à continuo effluxu coercere voluit, non secus ac (h. notioribus intestinorum & vesicæ excrementis, quæ iusto tantum tempore evacuari expediebat, simili ratione prospexerat.

Incumbit eidem Canalis ille supra dictus in superiorem eminentiam foramine oblongo exitum habens, qui pro corpusculi follicularii parvitate latus admodum & amplius, recto itinere per dorsum ejus decurrit, crassus satis & membranofus, dissectusque plicis eleganter instructus, & in extremitate circa pilorum radices glandulis aliquot conspicuus, in quo humoris nihil reperiri unquam, licet vehendo & excernendo alicui succo inservire, situs ejusdem & cavitas abunde confirmant, quem verò à succo moschato esse diversum, exinde conjicio, quòd nec odore admodum moschato, nec colore citrino aut fusco sit imbutus, nec etiam in ipsam folliculi cavitatem abeat; cujus tamen humor ille sit naturæ, me omnino fugit, cum & canaliculi ipsius ortus sive principium, longius nempe à folliculo locatum, me lateat. Unde inanibus conjecturis Lectoris benignitatem dum onerare nolo, isto nude recensuisse sufficiet.

De vasibus sanguiferis, quorum multa in folliculo spatium occupant, nihil dico, cum eorum ortus me lateat; unicum, quod canaliculi dicti latus utrumque stipat, magnitudine suâ spectabile, & ad musculosam carnem progrediens nominasse satis erit.

Si cui tamen fortuna ipsum tale Animal secare concesserit, ille successum, curioso cultello impetratum, uberius fideli calamo si publicæ utilitati communicaverit, non levis Curiosos quosvis beneficio beabit & vel mea experimenta atque conjecturas hoc gratiosè confirmabit, vel saltem amice emendabit; quem in finem imprimis Angli, Galli, Veneti, Bavarique exorant sunt, quibus facilior hac in parte fortuna adidet, nec patientiâ, industriâ & peritiâ instructissimi desunt Anatomici.

Externam verò Folliculi faciem tum icon adjunctæ, tum descriptiones ab aliis factæ, satis edocent; quam tamen in magnitudine, quæ in sibi relicto ovum gallinaceum modò minusculum adæquat, modò longè minor observatur, & atque interius nucistam majorem minoremve capere potis est, & jam drachmas duas, jam quatuor, plus minusve continet; in figura porro nunc rotundiori, nunc oblongiori, crassiori vel strictiori, ex varia compressione, quam majoris ad remota loca in transportando commoditatis ergo subire debent, ortâ discrepare, in naturali autem statu rotundiores & nonnihil ovalem esse; in pilorum etiam, quibus vestitur, colore, albidior vel obscurior, variare, unice monere volui.

Iconem autem ejus Tabula XVI. Fig. 4. continet, litera a. locum orificii moschiferi, b. orificium canalis longi, c. ejusdem partem truncatam, d. plus à circumferentia centro incumbentes tenuiores, e. pilos crassiores limbo in hærentes denotante.

Tab. XVI. Fig. 7. exhibet Folliculi faciem externam, detalis tamen nonnihil circa orificia meatuum dictorum, evulsis à canali prominentibus, & reliquis etiam

abscissis pilis; in qua lit. a. meatus moschiferi orificium semitotundum apertum, b. orificium canalis longi, la- biis tamen ejusdem diductis ostendit.

Tab. XVI. Fig. 6. internam præsentat faciem, polliculâ tamen fuscâ moschatâ intima, una cum altera eadem subjacente membranâ nervosâ adematâ; & quidem lit. a. meatum moschiferum aliquantulum ampliatum, b. glandulas eundem cingentes, pilis tamen omnibus evulsis, c. canalem longum in situ naturali, sed dissectum, ut intè iot ejus facies videri queat, d. ejusdem orificium cum glandulis instratis, e. vasa sanguifera insigniora juxta eum decurrentia, f. musculum circuli rem, g. cutaneam substantiam.

Cum etiam in Ephemeridum German. Curios. Anno VIII. observ. 53. de cavitate pilorum Capreoli moschiferi quædam dixerim, eorundem delineationem si hic subjunxero, rem non ingratam me facturum credidi; itaque.

Tab. XVI. Fig. 7. pilum animalis illius crispum exhibet, in quo lit. a. cavitatem in eo designat, reliquis pili partibus b. b. medullâ fungosâ expletis.

Tab. XVI. Fig. 8. pili cavi particulam dissectam, & quidem lit. a. eandem nudis oculis contemplatam, b. per microscopium observatam ejus foraminulentam vel reticulatam texturam denotat.

Locus natalis Animalis Moschiferi.

Patrium Animalis nostri solum descripturus, Indiam denominare illud possem, si, juxta nonnullorum consuetudinem, quasvis remotas Orientis oras nomine isto donare vellem. Cum tamen adcurtiones alii non usque adeo illud extendant, juxta cum India Tartaria quoque & Sinam constituere lubet.

Ubi imprimis Chataja primum sibi deposcit locum; qua de consili potest eruditissima Disquisitio Geographica & Historica Viri celeberrimi D. Andreae Mülleri, Amici & Fautoris mei honoratissimi. Sub ea autem Tartariæ partem esse intelligendam §. 19. monuerat; cumque Gens illa Sinas quoque occupasset, Chatajam dein illam etiam regionem dici potuisse. Cuiusque igitur regioni, live Tartariæ, live Sinicæ, nomen hoc imponatur, considerationem hic aliquam requirit.

Illam quidem, Tartariæ, & quæ extra Murum Sinicum quærenda, in majorem & minorem, juxta Kircherum, dividitur; & hanc minorem borealibus Sinis continetur Thebet vulgò adpellari, in P. odrom. Copt. statuit. Provenit autem in Thebet Moschum, effato plurimorum constat; Serapionis imprimis, sic Interpretum verbis l. c. scribentis: in Thebet sunt multa civitates, sed moschus omnis, qui circa ea loca colligitur, arvehitur à civitate, quæ proprie totius regionis nomine Thebet nominatur. In præcedentibus quoque Tumbascini Moschi mentionem facit: Terra in quibus sunt gazelle musci, & sunt regiones Tumbasci & Seni, & sunt terra confines. Verum musci regionis Tumbasci est melior muscio Seni &c. At Tumbasci ipsam Thebeticam esse regionem, alii norant; & imprimis Bochartus pro: Thebeti interpretem posuisset Tumbasci, vel potius, ut reliqua, mirè corripisse, animadvertit. Quod pariter Vopisci Fortun. Plempii in schol. ad Avicent. Can. med. consensu illustrare placet. Dum enim Ebn Sina de Moschi differentia bonitatis ratione, differens, Thebetico primum locum assignat, Plempius his verbis in vocem illam commentatur: Tebezus ab urbe Tebet, quam alii Tumbascum vocant. Rabbi Benjamin in suo Itinerario dicit distare quatuordecim à Samarianda urbe magna, & Timurlani natalibus nobili, in ejusque vicinis sitis inquit moschum inveniri. Golius scribit esse regnum Septentrionali Sinarum regioni ab occasu conterminum, quod multi volunt idem esse ac regnum Chatai. Itaque & regnum est seu regio, & civitas regno cognominas, Geographus Nubienfis vocat Tobbat, & statuit eam in regno Kati

Hh 2

mach

machitarum part. 10. dim. 4. In his regionibus, inquit, exstant animalia moschi magna in copia. Aliis *Tuboth*, *Tuboth*, *Tubeth*, *Tubet*, *Tubath*, *Tobbat*, *Tubacum* legitur. Apud *Sim. Sethum* in quibusdam exemplaribus τὸ Πάτ occurrit; quod ideo *Ruellius*: *Pat*, vertit; cum tamen, ut rectius alii, & MSS. quædam habent, duæ istæ Syllabæ conjungendæ sint. atque *Tupat* legendum. Hanc quoque regionem exprimit *M. Paulus Ven.* lib. 2. cap. 37. multa animantia ibi inveniri tradens, quæ Moschum producunt. Nec *Rabbi Benjamin*, modò apud *Plempium* citato, fuit indicta, qui cum de Samarcant, urbe magna in Persici regni confinio condita egisset, inde, inquit secundum versionem *Constantini l. Empereur*, *quatrinduo petitur Tuboth, civitas, in cujus vicinis silvis moschus invenitur.* Quod tamen *Tuboth* vel *Tobboth* antea, cum de magni Persidis Imperatoris dominio ageret, per τὰ: *insignes*, (*Arias Montanus* in sua versione: *optimas*, habet,) vocis תבית homonymiâ deceptus, reddiderat: ut & alias *insignes regiones, in quarum silvis fera reperiuntur, unde moschus colligitur;* quo de tamen *Virum Clar. & plur. Rever. D. M. Matth. Frid. Bekium*, Amicum meum colendum, qui ejusdem Judæi novam editionem cum notis meditatur, pluribus olim acturum expectamus.

Huic Thebeticæ regioni versus Occidentem provincia *Caniclu*, eodem *Veneto* testante, cap. 38. adjacet, magna in abundantia Moschum suppeditans.

Ebn Sina l. c. Moschi *Carchirensis* meminit. Qualis verò sit ista regio, & an, quod nominis adfinitas suadere potest, cum *Carcham Veneti* conveniat, alii doctiores judicent? Quod tamen esse nequit, si *terra Carchir*, ut vult *Geographus Nubiensis* part. 10. clim. 3. Mari Sinico proxima existat.

Huc pertinet, quod *Brasavolus* recenset, Venetias nempe Mercatorem quendam ex *Chatai* attulisse Moschum, quæ regio sit pars Scythiæ extra Imaum; incolas regionem, ubi optimus Moschus nascitur, *Ergimul* vocare, particularem verò urbem *Singui*. Ubi *Ergimul* vocem, quæ *Venetis* etiam utitur, corruptissimam esse, ut pleræque alias, in Literis humanissimè ad me perscriptis laudatus *Dom. Müllerus* monuit, addens: *Qui volet, Fer-Mogul legat. Est autem Mogul spatium terra supra murum Sinensem ad Borrhapeliotem. Hujus tractus litoralis Su Mogul dicitur; mediterraneus Fer-Mogul. Su verò agrum, Fer terram significat. Pro Fer-Mogul, Jec-Mogul Vincent. Bell. & alii scribunt; Ergimul Venetus; reliqui rectè.* Per *Singui* autem *Socheu* intelligendum; cum procul dubio, *D. Mülleri* nostri iudicio, *Venetis Singui* scripserit, *Gui* verò esse Sinicum *Cheu*, quod Urbem denotat.

Cæterum in ipsa etiam *Chataja nova*, sive *Sina* Odoramentum hoc suos nancisci natales, ex *Serapione* supra dictum fuit, ubi regionem *Seni* Gazellas moschatas alere ipse narraverat, quam sanè regnum esse *Sinarum*, *Amatus Lusitanus* Comm. in *Diosc.* consentit, licet in hoc fortè minus adcuratus, dum ex regno *Sciam* ipsi dicto ad *Sinas* Moschum deferri scribit; cum tamen *Sinæ* ipsi Moscho inquilino abundant, & quidem probatori, (uti *Ebn Sina* refert,) quàm sit ille in *maritima India* ortus, cui nempe regnum *Sciam* meritò accensetur. Et huc etiam sæpius jam nominati *Veneti Chatajam* referemus, in qua optimum inveniri Moschum, & quo melior in mundo non reperitur, lib. 1. cap. 62. prodidit. Num porò *Etronis* istius *Turcæ* relatio, apud *Auger. Gelen. Busbequium* epist. 4. trahi huc queat, incertum est, non tamen improbabile, præsertim cum post absolutum longissimum itineris spatium, ad angustias ac veluti claustra regni *Chataini* se pervenisse innuerit, & quod intrari nequeat, nisi per certas fauces, quæ Regis illius prædiis tenentur. Isitaque *Turca*, in urbe *Chataja*, regia sede, frequentes esse tabernas odori illius aromatis, *Busbequo* enarraverat. E Recentioribus

quoque *J. Petr. Maffejus* *Sinarum* regionem tum Odoramentis aliis, tum præcipue Moscho abundare testatur, quod & *Mendosa*, *Lindschottanus*, pluresque alii fatentur.

In specie verò quænam ejus Provinciæ hunc largiantur, *Martinius* cum primis in suo *Atlante Sinico* indicavit, nimirum in *Xensi*, *Suchuen*, *Tunman*, locisque aliis ad occasum vicinioribus ingentem Moschi reperiri copiam, pag. 44. memorat. Et in specie, de provinciæ *Xensi* urbe tertia *Hanchung* pag. 48. agens, territorium ejus montibus ubique altissimis ac frequentissimis exurgere, qui valles complures easque peramœnas claudant, unde quibus ad vitam opus, abunde petantur omnia, præterque alia, ingens Moschi copia. Et pag. 52. de ejusdem Munimentis sive locis militatibus verba faciens, in *Taocheu* & *Hochu* multum Moschi colligi. Porò in sextæ Provinciæ *Suchuen* urbe *Queicheu* pag. 69. & ejus vicina urbe militari quarta *Chinching* pag. 72. Moschi abundantiam monstrat, imò montem ibi quendam à Moschi copia *Xehing* (*Dapperus* in *Descript. Sinæ* pag. 108. exprimit: *Xehiang*) dictum pag. 70. indigitat. In septima insuper Provincia, *Huquang*, colligi, pag. 83. & in decima quinta Provincia, *Tunman*, abundare, pag. 155. 162. & 165. legitur. Ideoque tam in *Sina boreali*, quàm australi Animal nostrum invenitur.

Hicce in *Thevenotti* varior. Itinet. curios. relatione *Honan*. Provincia additur. Præter Provinciam *Xensi*, etiam *Chiamsi*, nec non regnum *Tunchinum* sive *Tuengking* ab *Athan. Kircher*o *Chin. illustr.* part. 4. cap. 7. nominatur. De *Xensi* similia *Neuhofius* effatur in Itinet. *Sinic. Auch liefert diese Landschaft sehr vil Muscus.* Et de eadem, nec non *Suchuen* cap. 16. description. *Sin. In der Landschaft, Xensi, vwie auch auff dem Gebirge bey Paoning, in der Provintz Suchuen finder man das Thier Xe, davon der Muscus oder Bisem kommt.* Et *Gregorio* illi *Bolivario*, apud *Fabrum*, in *Provinciarum Xantien*, *Quinsay*, aliisque locis silvestribus reperiri dicitur.

Tandem ex *India* quoque, ut natali solo, petitur, Sanè in *India* maximum Moschi proventum esse, inter omnes convenit: *Henr. Salmuth* effatur. Ad quam cum *Pegu*, *Siam*, *Patana*, & *Bengala* &c. pertineant, quid ab eis sperandum, nunc indicare opus est.

Et quidem regnum *Pegu*, multorum confessione, non postremum hic locum efflagitat, in quo magnum adesse Animalium moschiferorum numerum, Nob. à *Mandestlo* Itinerar. *Orient.* lib. 3. hicce confirmat verbis: *Althier findet man vil Thier, von wvelfchen der Muscus oder Bisem gesammelt vviird.* Quem etiam ex *Sina*, *Tartaria*, & *Pegu*, *Amadabadam* venalem deportari, lib. 1. cap. 19. scripserat. Et ille ipse Moschus *Peguanus* non fuit ignotus *Paulo Ven.* dum lib. 2. cap. 34. Provinciam *Achalech Mangi* Animalia habere moschifera, refert. Quam utpote ipsum esse regnum *Pegu*, doctè, ut cuncta sua, ostendit prælaudatus *D. Müllerus* hebdom. observ. de reb. *Sinic.* cap. 3.

Barbosa de regno *Aracan*, inter *Bengalam* & *Pegu* posito, ait, his vicinos esse montes *Capelongam* dictos, cujus habitatores Moschum ad magnam civitatem *Ava* transportent.

Tavernierius regnum *Boutan* maximam ejus largiti copiam, refert; eundem etiam non tantum ex *Tunquinensi*, sed *Cocinchinensi* quoque regno, ast non ea in quantitate adferri, notans.

En regno *Gnai* haberi, *Phil. Marinus* ostendit.

Non minus in regno *Lu* idem Animal reperiri, ex *Martini* præfatione *Atlant Sin.* colligimus, ubi regnum *Laos* Moschum ex vicino *Lu* regno habere testatur, Animal tamen ipsum ex regno *Lu* in alterum illud *Laos* abductum brevi, ut pilcem extra aquam, emoti subjungens; idem etiam inde transcribens *Neuhofio*. Unde in libello *Mirandorum Natura in Sina* &c. cap. 1. errorem aliquem latere dicendum erit, dum *Laos Sinici* imperii aliquando fuisse, pattemque

Provin-

Provincia Junnan, mediam inter Tungking & Cochinchinam. Lu vero regnum esse ipsissimam Provinciam Junnam, perhibet: si Martini, in rebus Sinicis veracissimi, fidem sequi velimus, moschum in Provincia Junnan, ut supra modò dictum abundare, tradentis, qui tamen regna Laos & Lu ab ipsa Provincia Sinica non obicure distinxerat; & multiscii etiam Dom. Andr. Mülleri suffragio, Lu regnum ad Sinenſe referri non debet. Quare vix alibi commodius, quàm reliqua inter Indiæ regna memorari illud merebitur.

Est apud Indos regnum amplum, ab incolis ejusdem loci Siam dictum, & ut melius dignoscas, ultra Malachiam situm, inque Animal hoc reperitur: verba sunt Amati Lusitani. Quamvis verò Sinas nominibus variare, novum haud sit, ideoque regnum suum quoque Sciam, uti Neuhofius tradit, vocare aliquando potuerint, & revera diu ante tempora Nat. Ch. isti ita vocaverint, hic tamen non Sinam, sed diversam ab ea terram intellexisse Ananum, vel reliqua ejus v. rba satis evincunt, dum ex regno Siam dicto Moschum in Sinarum regnum deportari perhibet. Nec Catelani lectionem improbaverim, qui Siam, Indiæ Orientalis regionem potentissimam, uti Claverius vocat ponit, præsertim cum regno Pegu, quam maximè moschifero, sit contiguum, & non minus ad maritimam Indiam, ut supra monui, referri debeat, in qua Moschum provenire, ab Ebn Sina dictum fuerat.

In insula Bæro Gualeh Schulzcius lib. 1. Itin. Orient. cap. 9. Moschum colligi indicat: In den Bergen findet man auch einige Bisen-Kaizen, vuvvon die Wilden den Biscin auffamen, und den Unfrigen um einen billigen Preiß verkaufen. Sed cati sive felis moichati denominatio non exiguum de Zibethico odoramento suspicionem præbet. Nec ullus alius, in hac, aliave aliqua Insula Animal nostrum occurrere, indicavit. cum vicissim Zibethicum, sæpe, ut supra dictum fuit, cum moschato confundi solitum, in Insulis isto in Oceano sitis, uti Ceilan, Sumatra, Java &c. hospitari, longè certius sitimus.

Persia hic etiam nonnulli denominant. In Persia reperiri quidam prodidere: Nob. Dom. Joh. Jonstonius Histor. natur. de quadrup. lib. 2. tit. 1. cap. 2. art. 6. punct. 5. pronunciat. Sed Moschum, quo Persæ utuntur, aliunde, ex India imprimis, adportari, sunt qui ita tuant; quod, præter alios, D. Tavernier suo confirmat consensu. Moschum nempe omnem, qui in Perside venditur, ex Patna advehi. Sed in Petri à Valle patre 2. Itinerarii Germanice editi epist. 4. ubi de venatione Sciah Abbas, Regis Persiæ, A. 1618. in Ghilan, regione ad mare Caspium situatâ, olim Hircaniâ dictâ, agitur, innumerum Animalium moschiferorum multitudinem in illa, tum etiam alias semper, in prædam cessisse recensetur; quæ tamen rectius Capreolorum nomine insigniri ab Interprete debuissent, cum textus Italicus simpliciter Gazellas innuat, sic expressus: *Senza le Gazelle, che non entrano in questo numero, e son sempre immumerabili.* Ubi itaque Gazellarum nomini, origine Arabico, idemque Animal, quod apud Græcos δόπραξ, & apud Latinos Caprea vel Capreolus dicitur, denotanti, epitheton moschatarum neutiquam jungi debuisset. Unde mihi de Moscho Persico dubitare interea liceat, usque dum oculari hominum fide dignissimum testimonio aliud edoceat.

In Syria quandoque bestias has conspici, Alex. Benedictus autor est. Sic & Scaligeri adfines, qui in Syria fuerant, Gazellarum harum multas ibi se vidisse greges, eidem dixerant. Ubi tamen de fide eis adhibenda merito dubitalle eundem, conjicimus. Adcoque regio ista huc nequidquam pertinet. Quod & de Halepo, urbe Syriaca, jam in præced. monui.

Secundum Joh. Bodinum in Theatr. natur. Moschi Caprea est in Africa interiore. Et Brasavolus, cum de Mangeri Bibliot. Pharmac. Tom. II.

de Moschi nomine differeret, pluribus in Africa locis Animalia hæc nasci, nec non in Ægypto etiam inveniri, edixit, quem dein, præter alios, Joh. Bapt. Porta lib. 2. Phytognom. cap. 27. sequebatur. Ast rectius omnino Alex. Benedicto, ex Indiæ partibus in Persiam primùm, inde in Amanum, atque dein in Ægyptum (addo ego & Africam. contra ipsum Benedictum,) inveniri, creditur, ut ita nullum adferre momentum queat Moscho impositum vulgare admodum Alexandrinæ epitheton, utpote non locum natalem, sed emporium ejusdem designans, Zibethica quidem animalia Africam alere, non negatur; ast de moschifero nemo probatorum Historicorum illud unquam enuncia- verat.

Imò Americani quoque sunt qui huc ponendam judicant. Veluti Laur. Catelanus Orientalem Moschum, qui Venetiis, longè Occidentali, qui ex America Portugalliam adfertur, præferendam esse opinatur. Quod ut prudenter & scite scriptum Andr. Chiocchus maxime adprobabat. Ast neque hi adplausum merentur. Cum in America Moschum non generati, sit longè credibilis. Et mihi sanè, quotquot itineraria Americana, Scriptoresque de rebus naturalibus Americanis evolvere contigit, nusquam videre talia perscripta licuit. In Portugalliam quidem à Mercatoribus Moschum adferri, satis est probabile, ast ex America illuc deportari, minime liquet. Et quis, quæso, Lusitanorum in Indiam & reliquis Orientis regiones, antiquas & recentiores nesciat navigationes? Ex quibus Moschum advectum, multo veritilimilius adstruitur; & v. g. P. Jarricus Sinas Lusitanis eum divendere, expressè memorat. Occidentalis tamen dici Lusitanicus ille convenienter potest, nostrarum regionum respectu, quibus nempe Regnum illud versus Occidentem situatum est: Qua ratione etiam Catelanus & Chiocchus eum in Galliam & Italiam ex Lusitania delatum, Occidentalem, vel de Ponente rectissime perhibuissent. Subscriptis opinioni huic Amatus Lusitanus, disertè concludens: *Venetis Orientalis moschus duplo venditur pretio, carior Occidentali, quam tamen ab eadem regione portetur.*

Perlustratâ sic Asia, Africa, & America, nunc in Europam deducimur, quæ certè matrem Animalis hujus se jactare nequit. Licet enim ex Fabro superius Cap. 6. Bauhshineri relatio de Moscho in Lusitania conscribendo fuerit enarrata, quin ipse tamen, uti Cap. 9. edixi, & jam repto, fuerit deceptus, nullus dubito, præsertim quia opus icium ipsum à se non conspectum, ipsemet fateatur, in istâ solum Incolarum fide instructus. Quis verò doctis, aut doctorum etiam saltem speciem præ se ferentibus, si creduli nimis fuerint, ab indoctis vel jocosissimis ingenis sæpe fabulas obrudi, jocosve parari nesciat? vel saltem fictitiam illam & adulterinam esse falsam dicemus, ab odoratissima herba, Pico di grulla dicta, moschato odore imbutam; Cui itaque genuinum inter Moschum locus minime concedendus. Si enim Lusitani Mercatores, lucro deditissimi, in patrio solo Moschum levibus adeo impentis parabilem ipsi possideant, tam dementes eos haud fore crediderim, ut alium remotissimis è Mundi partibus, magnis sumptibus & periculis, sint advecturi. Accedit, quod Barbosa, Amatus, Zucutus &c. omnes Lusitani, Moschi tantum Indici, patrii verò nullam omnino mentionem faciunt.

Eutopa tamen propriæ non unice inhærentes glebas filios, curiososque Naturæ Amasios per plures sustentans, exotericorum Animalium ut est cupidissima ita hujus quoque odorati præsentis delectatur. Quod Magnatium ideo exornate Aulas, Divitumque & Curiosorum in oblectamentum cedere solet, peregrino ex Orbe isto advectum. Sic refert Brasavolus, se Venetiis Mercatores vidisse, qui Alphonso Duci Ferrariæ Gazellam Moschum in folliculo habentem, vendere voluerint, qualem etiam in sua Padana Insula eundem aliquando in deli-

cus habuisse, idem memorat. Pariter à *Bernh. Dessenio* in horto isto *Herculis* Esthensis, Ducis Ferrariensis, Animal huiusmodi conspectum, supra dictum fuerat. *Scaligero* unum Messanæ *Rhodium* ostendit Eques. *Cardanus* Mediolani & *Vischerus* Amstelodami, sed mortua jam, conspexerunt. Venetias A. 1621. unum advectum, & ad *Calceolarium* Veronam transmissum fuerat, *Catherinum Zenum*, Patricium Venetum, huius generis Dorcadem habuisse, apud *Gesnerum* existat. De animali vero in horto aulico *Frisingæ* Bavarorum ab *Höfero* conspecto supra vidimus. Et quis nobis Europæis curiositatem hanc jucundam exprobrare queat, qui & ipsi Sinis in delicis ea esse animalia, ex *M. Paulo Veneto* novimus, in Viridariis regiis Cambalensibus, juxta cum Cervis Capreis &c. eadem discursasse, perhibente?

Cæterum multi ea sunt in opinione. Animantia hæc in nostram terram advecta, neque Moschum præbere, neque diu vivere, à *Brasavolo* ita edocti, qui Animalia ejusmodi Moschum quidem apud nos maturare judicat, si eum habuerint, quando convehuntur, postea tamen non aut ineptè emittere; quod ratione cœli, æris & victus evenire arbitrantur, propterea quoque nostro in cœlo brevi expirare, cum diu vivere nequeat, nisi ita expurgetur. At quamvis credita illa violenta sanici seu potius humoris moschati expurgatio sit omnino fictitia, eundem tamen nec adeo perfectè nostris in regionibus in folliculum separari, & ibi percoqui, nec etiam ea in quantitate & bonitate illuc deponi, ideoque Animal hoc tum istam ob causam, tum reliquarum rerum, æris nempe in primis & pabuli consueti deficientis intuitu, diu superstitem vitam quandoque agere apud nos Europæos non posse, satis est verosimile: præsertim cum plurium mensium continuato, si ve terrestri, si ve marino laborioso itinere multum vitalis eidem decedere vigoris necesse sit: Posse tamen quandoque diutius vivum conservari, non penitus indidem inficias ire vellem. Si enim tot itinerum molestias, ærisque in iis & pabuli mutationes innoxie sustinuit, cur, quæso, blandiori dein loco traditum, molli terque tractatum, mortis devitare fauces præproperas nequeat: præsertim cum mox, in Europam postquam delatum fuit, minimè expirare, exempla testentur, secus ac eidem in Oriente contingit, ubi ex regno Lu in vicinum Laos regnum abductum brevi emori, supra vidimus.

De Moscho adulterino.

Si quis Sinarum consideraverit ingenia, quin Moschi adulteri rationi magnopere eosdem studere quilibet sibi sit persuasurus, nullus dubito. Ut enim aliorum testimonia pede sicco præteream, unicum *P. Martinium* audire juvat, pag. 5. Atlant. Sinic. sagaces eos & subdolos vocantem, & qui ingenii acumen perperam sæpe ostendant dolis & fucis, quibus aliis imponant. Mercatores insuper eorum industrios esse ac solertes, gentem totam otio inimicam & desidia, ubi vel minima lucelli adfulget spes, nullum eis laborem gravem, honestoque sæpe utile esse potius & antiquius. Nec non pag. 54. non solum callidos, sed mendaces & avaros eosdem adpellat. Quod sanè de aliis etiam vicinis eis populis non omnino negari potest. Sed neque hi soli mendaces sunt, avari. & in dolis ac fucis ne tendis callidi, propriamque utilitatem honesto & bono publico anteponunt, cum & Europæorum quorundam Sycophantarum impiger in decipiendis aliis labor & industria plus, quam facere queat, sit notissimus; nec in ipso Moscho, ob pretiosam ejus naturam deteriore reddendo rapaces exercere manus desistant, idque non tantum clam & subdole, sed & plena in luce factitate nonnulli audeant, Moschum diversi pretii à se confectum distrahentes.

Quas itaque cognoscere fraudes, non Pharmacopæis

tantum, sed & Medicis (aliarum professionum Magistris ut taceam) quam maxime incumbit. De illis quidem *Helmontium* tract. de flatib. §. 37. audire decet: *Quantum simplicium demerita, adulteriæque sint plus Mercatorum, quam Sepiasiarum: attamen illa non discrevisse, tantum ignavi, ignari vel avari est pharmacopæi.* Quæ paulò mutata in Medicos quoque nullam in simplicium cognitionem habentes distorquere licet. Conferantur, quæ simili in materia *Nob. D. D. Jo. Mich. Februs*, Acad. Nat. Curios. Præses meritissimus in præfat. tract. de absinthæ. peroraverat. Quamvis iidem cum *Galeno* lib. 1. de Antidot. cap. 13. spuria ejusmodi Simplicium ex ordine medicamina, vel nullatenus, vel non exade ab adulterinis sæpe secetni posse. fateri cogar, ita ut ex c. 4. d. l. exercitatissimos etiam ea in re viros decipiant,

Commodius autem in spurii Moschi cognitionem devenies, si diversos eundem corrumpendi modos præsciveris, quos itaque hoc in Capite enumerare constitui. Obstat quidem *Galenus* tum l. c. tum lib. 9. de simpl. medic. facult. cap. de Diphtryg. Cui nempe sitius videbatur, quibus rationibus Opobalsamum, Lycium, cæteraque adulterentur, haudquaquam adscribere, cum scelerati homines in lucro ponant, talia posse addiscere. Sed magnus nebulonum istorum ad fallendum ardor, absque ista fraudum in plena luce commemoratione, similia jam ante cognita habet signa, in proximi damnum celebranda, ita ut metus iste tanti momenti esse nequeat. Quin & hac ratione nec genuinorum pharmacorum notas propalare sæpe liceret, quas utpote impii isti omni dein studio imitari laborant. Mihi tamen nova aut publice non nota fraudum artificia edocere, non est animus, sed quæ tradiderunt alii, tantum ostendere, & quæ evitari queant cautela, monstrare intendo. Idque eo magis, cum raro bonum reperiri, *Joh. Jacob. Mantius de Bosio* in Lumin. maj. sect. 1. conqueratur. Quamvis nostram hanc quod attinet Civitatem, Moschus laudabilis non exigua in quantitate semper haberi queat, id quod procul dubio aliorum etiam locorum testimonio proprio confirmabitur, ut ita raro bonum ac legitimum his in oris reperiri, ullo modo conqueri haud debeamus. Licet & mangonio defœdatus sæpe occurrat, à quo itaque cavendum sibi merito quivis reputabit.

Illud autem eo facilius obtinebitur, si genuini notitiam, quam seq. Cap. tradere conabor, longiori in primis usu comparandam, quis habuerit. Sincerum enim & verum cognovisse, esse, fucos deprehendere, merito cum *Weckero* fundamenti loco ponitur. Quale quid *Galenum* quoque fecisse, ipse fatetur, dum Opobalsamum usque adeo pluribus artibus adulterari considerans, idem ex arbore sua resudans adspicere voluit, exque eo particulam tanquam regulam cæteris cognoscendis semper habere.

Omnia Moschi genera, unico excepto illo, quod in Animalis folliculo bene digestum ac elaboratum fuit, haud pauci adulterinis, ideoque rejiciendis adconsent. Follicularem quidem illum existisse primum, nostram qui devenit in cognitionem, inque usum fuit ductus, & reliquos, auri sacræ fame sic persuadente, ad ejusdem imitationem postea demum fuisse excogitatos; posteriores tamen hos etiam bonitate priori admodum cedere apud me non sit dubium, propterea rejiciendos prorsus nequaquam judico, cum vel aliis in rebus idem sæpe effectus, licet diversis ex operandi modis, obtineatur. Modo enim massam ex Animalis odorifero, absque aliis heterogeneis additamentis confectam, genuinum Moschum odore, si non apothecarum multitudine, saltem qualitate referentem, & revera odoratissimam obtineas, de inuili Moscho omnis in te exulare potest suspicio, quæ nempe largius in usum ducta, & desideratam aliis rebus fragrantiam conciliare, & salutares in corroborando successus obtinere.

Verſipelles tamen in Sina Mercatores capropter non excuſatos velim qui ex ſanguine, pelle, aliſque Animalis exuviis Moſcho additis maſcupia, quæ pellis Animalis ſubminiſtrat, teſte *Martinio*, infarciunt, ac tanquam vera & genuina venditant, præcipuè ſi ſola rudiori modo confecta maſſa intrudatur nec per debitam prius putrefactionem odoratæ in ea ſeſe extricaverint particula. Quod etiam de illorum ruſticorum Butanenſium fraude, quam *Tavernierius* adnotat tenendum. qui hepatis particulas minutim conciſas cum animalis ſanguine Moſcho admiſcent. Aſt hæc ipſa maſſa facile ſe proditura eſt, quæ fibroſam venarum &c. ſubſtantiam inquirenti patefaciet, nec etiam vehementi odore illo, quem genuinus exhalat, fragabit. Quod ſi animalcula quædam, quæ tractu temporis, poſt unum ſcil. duos vel tres annos innacſi Moſchum genuinum ipſum depaſcentia, *Tavernierius* prodidit, ſint immixta, eo certior in fraudis cognitionem deducet.

Ab aliis itaque diverſo è fonte deducti Moſchi generibus merito cavendum, ſive genuinas ille admixtis rebus aliſiſinodoriſ multiplicatus, ſive etiam ex alterius generis odoratiſ ſimplicibus fuerit.

Sic avis cujuſdam ſimo adulterati, *Alexander Benedictus* admonet, qualis tamen ſit illa, non exprimit. Quod ſi verò hoc ita ſe habeat, forte ſtetcoris illius, quod ab æve quadam emiſſum *Exc. D. D. Juſt. Fid. Klobius* in hiſt. Ambræ pag. 33. & ſeq. ipſammet eſſe Ambram veram, probare conabatur, ſuſpicio quæpiam tangere poſſet. Aſt nec Moſchi, viliori pretio comparandi, fraudulentam elaborationem Ambræ ſubſtantiam, ut longe cariorem, ſi genuina exiſtat, adhiberi eſt credibile, nec Ambram agnoſcere dictos natales, ſed reverà magis bituminofos eſſe, ipſa ejus reſinola natura evincit, relationibus, quæ in contrarium adducuntur, nil quidquam ſolide comprobantiſ, à meritis tantum auritiſ & inſidiſ, nulliſ oculatiſ teſtibuſ proſectiſ.

Aſt muſcerdam sæpe pro Moſcho, genuino ſcilicet immixtam, vendi, *Monachi in Meſſen commentantes* habent. Sic & Muſtelarum odorato excremento quodaſ pariter abruti, *Aldrovandus* animadvertit. Ubi ſane, prout in cæteriſ omnibuſ, jamjam recensendiſ, ſi parce & caute heterogenea iſta ſint conjuncta, diſſiciliſ & vix unquam, niſi à peritiſſimo aliquo, in fulci deprehenſionem pervenitur. Sed largiſ admixta ſcybala iſta odoratiſ imminutio inprimiſ certiuſ patefaciet.

Iſta materia, ſcribit *Fallopiuſ* de Moſcho, ſolet corrumpi, & ita apud Chymicoſ infinite habentur deſcriptioneſ conſciendi & multiplicandi moſchum. Accipiunt humanum ſanguinem, ſuſpēdunt in cloaca in veſica, admiſcent poſtea moſchum. Sed nī majori, quàm decebat, in Chimiſcoſ odio prolata fuerint, uti ubique, ſic & eoſ inter, qui Chimiſcorum adſectant nomen, deceptoreſ dari nemo inſiciat ire poſeſt. Nec tamen inſinitæ illæ multiplicandi deſcriptioneſ in Chimiſcorum libriſ deprehenduntur, quin pleræque aliæ, paſſim obviæ, rudioſe tantum & omniſ pyrotechniæ experteſ confectioneſ, ſimpliceſque mixturaſ exhibent. Prout & illa cum ſanguine humano, foetoreſ inter ſuſpenſo celebrata reverà nihil artiſicii Chimiſci oſtendit. Imò credita hæc impoſtura, ſi unquam peracta, tam craſſa eſt, ut nec imperitiſſimum aliquem facile poſſet decipere. A ſimplici enim illa in cloaca ſuſpentione non poſeſt non ſanguis foetidiſſimus in liquamen abire, cujuſ odorem addita, pariori inprimiſ manu, Moſchi portio obtundere gratumque reddere nullo modo valebit.

Alias ſanguinem diverſorum animalium hunc in uſum adhiberi, legimus, dubio procul ideo ei deſtinatum, cum Moſchus vel ſanguis potiuſ quaſi analoguſ quodammodo humor eſſe videatur.

Moſchum ſimulare maſſam quandam è ſanguine hædino, pane aſſo, ladano ac moſcho conſtantem, *Auſtiani mei* in Pharmacop. Prolegom. cap. 2. admonent.

Quod *Joh. Renodauſ* lib. 4. inſtituit, Pharmaceut. cap. 17. uberiuſ proponenſ, Moſchum, ait, ſimulat maſſa, quadam è ſanguine hædino, pane aſſo, & trito, atque ladano ſubacta, in pyxide aut alio vaſe idoneo ſervata, in quo diu moſchus veruſ aſſervatuſ fuerit. Frauſ ſubtiliſ occultatur, ſi portio moſchi optimi commiſceatur. Sed detegitur non modo conſiſtentia & colore, ſed odore, qui in ſilitio cito evaneſcit. Quod etiā in *Joh. Plateariuſ* jamdudum lib. de ſimpl. medie cap. de muſco edixerat. Moſchi nempe parti unicaſ treſ quatuorve ſanguiniſ hircini modicè aſſi vel panis aſſi admiſceri. Conter. *Joh. Bapt. Porta* Mag. nat. lib. 11. c. p. 11. Sanguinem columbinum impoſtoreſ quodaſ aromatibuſ quibuſdam excipere, iſſique ſiccatiſ ad ſolem, iterumque tritiſ, & aquâ roſaceâ moſchatâ aliquotieſ rigatiſ ſiccatiſque, tertiâ vel quartâ parte moſchi veri admixtâ, eundem adulterare, in *Gul. Van. de Boſche* hiſtor. med. animal. lib. 1. cap. 20. legimus. Quodaſ vero ſanguinem noctuæ eligere, ejuſque in regula ad ſentum ignem ſiccatiſ 3j. moſchi 3j. cum aqua roſarum permiscere conſtat.

Præter ſanguinem hædinum & panem aſſum, carnem etiam columbinam ſiccataſ huic fraudi opulataſ, *Jacob. Sylviuſ* de ſimplic. medie delect. teſtatur. Verum panem aſſum cito frangi, vel reddere maſſam friabilem nimis, & ſanguinem hircinum lucidam ac claram, *Plateariuſ* ſtatuit. Sed ſplendorem iſtum ſuppeditare incertum admodum ſignum, in *Ann. VIII. Miſcell. Germ. Curioſ. obi. 53.* oſtendi, ſicciora genuini Moſchi granula ſplendidam intuſ faciem aliquando mihi exhibuiſſe, adnotanſ. *Renodauſ* vero, ut dictum conſiſtentia non modo & colore, ſed & odore, qui cito evaneſcit, ſucum detegere laborat; quem ultimum, odorem nempe, omniū optime huc accerſiſ, non dubito, non tantum cito evaneſcentem, ſed & antea non eo, quo alias pollet, acumine naſeſ ferientem; qui optimuſ etiam index erit, ubi jecore hædino arefacto quoſ alioſ uti *Alex. Benedictuſ* reſert; vel lupino, juxta *J. J. Manlium*; aut bubulo, ex *Lindſchotano*, fuerit permixtuſ. Nam licet cum hepate v. g. bubulo facta frauſ odoratiſ qualitatem, ut bene notat *Baldus Balduſ* in *Rom. opobali*, propugnât 3. non immutet, cum illud odore careat, fragrantiaſ tamen magnitudinem multum imminuit.

Boymiuſ cum ſanguine draconis Moſchum miſceri, ſicque ex uno pappo ſive viticula duōſ aut treſ alioſ fieri ſcribit, quæ tamen mixtura cognoscatur, ſi ab aduſto tali carboniſ inſtar aliquid remaneat; quanquam & ſelectiſſimuſ Moſchus, igni commiſſuſ, nunquam evaporare omnimode obſerveretur, ſed carbonem quaſi quendaſ relinquat. Aſt ſi neque naſeſ, neque linguaſ dolum iſtum manifeſtarent, oculiſ certe tubicundo colore ſuo, in vero Moſcho nunquam, quod ſciam, deprehenſo, mox ſeſe proderet.

Semine angelicæ Moſchi ponduſ à quibuſdam augeri, ſiſtitiumque diverſiſ modis, vel ex N. M. macei, cinnamomo, caryophylliſ, ſpicâ nardi, vel è benzoë, cera, carie fraxini, vel ſtyrace, ladano & xylaloë parati, *Porta* & *Gefneruſ* recensent. Quoſ & quartum illud Moſchi genus à *Marino* proditum reponemus, Mixturaſ ſcilicet ex ſuccino & Zibetho, dum ſcribit: Un'altra ſorte di muſchio ſi compone, che viene in Europa in più abbondanza, che non viene il vero; la ſua miſtura è parte quell' ambrà, che à certa ſtagione ſi peſca intorno alle ſpiagge di alcuno Iſole dell' India Orientale, e parte il ſucco, che ſi ſava dal corpo del gatto detto di Algalia, e rieſe con tal temperamento più grato l' odore, che non farebbe quello della ſemplice ambrà, che dà ſe il manda aſſai forte, e poco grato alle naſi; nec non *Bauſchnerianum* ſuperiuſ expoſitum. Sed omneſ haſ impoſturaſ quilibet, qui emunctæ naſiſ eſt, & genuini aliqualem habet cognitionem, haud diſſiciliſ deterget.

Plumbi quoque particulas, atque argenti limaturam, ut ponderosior fiat, jam olim admiscere consuevisse quosdam, ex *Elluchasem* discimus, quod & postea *Mendoza* &c. tradidit, neque hoc etiam tempore esse insolitum, *Tavernierius* consentit. Idem alii cum arena attentant. Qui sanè licet non minus haud leve committant scelus, præ aliis tamen tolerabiliores se præbent, non ipsam utpote Moschi substantiam contumpendo, sed ponderis tantum adventitii augmento, nummos emtori suffurando. Rapax vero hæc avaritia, si nimium limaturæ plumbeæ vel argenteæ admiscuerit, pondere notabili sese ipsam est proditura, dum genuinus Moschus, trutinâ examinatus, levem satis exhibet substantiam. Quod si extra folliculos venalis exponatur, metalli limatura vix oculos subterfugiet, arenulas autem masticatio absque mora manifestabit.

Tandem salis ammoniaci spiritu conspersum, & à vagabundo Myropola aliquando oblatum memorat *Excellent. Dom. Ludovici*, qualem etiam paucis ante annis ad nos, tanquam electissimum transmissum à quodam fuisse, recorder; quem tamen exoletum esse corpus, paucò odore nativo imbutum, comperii, particula ejus per noctem aeri liberiori, suavis meo, cum exposita fuisset, sic enim avolante urinoso spiritu, qui antea moschato junctus odore acuto nates fellebat, parum odoratum corpus remanserat, quod itaque Moschi opprobrium mox ad Possessorem remissum fuerat. Haud dispati admodum ratione celebris quondam apud Neapolitanos Pharmacopæus, *Joseph Donzellus* in Theatr. Pharmaceut. cap. de Elect. Alkerm. Mel. idem cum ipsa urina quosdam tentare adnotat: *Falsificano i truffatori il muschio in diversi modi, e specialmente non si vergognano alcuni temerarii humettarlo coll'urina, per augmentarli il peso.* Quæ fraus si Moschus cæteroquin sit bonæ notæ, non facile deprehendetur, nisi quis emunctissimarum narium homo fuerit, & verè adcuratissimam habuerit notitiam, idque eo facilius, ubi largâ adfusione liquoris istius luctum majus impostor quæsiuerit. Quid cum exoleto Moscho alii, latinarum fœtoribus eum exponendo, faciant, inferius inquirendi & discutiendi ansa dabitur. Verum satis de fraudibus.

De Moschi Electione.

Adulterini Moschi cognitionem merito nunc genuini signa excipiunt, quæ plurima passim adducuntur. Cum tamen non æque omnia satisfaciant, singula percurrere, & quantum iis fidendum sit, inquirere necesse est.

Et ut primus iterum de folliculis sermo habeatur, bonum se possidere Moschum nonnulli credunt, modo folliculos integros sibi comparaverint. Quo intuitu Tebericum *Mesudius* apud *Serapionem* præferebat Sinenſi, eam quoque ob causam, quod Teberienſes non soleant eum è vesiculis suis eximere, secus ac Sinæ factitent. Sitamen *Monachos*, qui in *Mesuen* commentati sunt, cum *Gesnero* & *Porta* sequi velimus, folliculis istis integris fides statim adhibenda non est, cum impostorum etiam manus simillimos, variisque rebus impletos, & interposito Moscho vero, odore ejus imbutos, supponere non ignorent. Et Saracenos ex pelliculis genuinis incitis legitimum Moschum auferre, easdemque adulterino infarctas iterumque, conglutinatas divendere, *Platearius* memorat. Quod & rusticos Butanenſes, nec non Sinas, folliculos genuinis similes efficiendo, probe callere, *Tavernierius* & *Lindſchottanus* admonent, atque superius jam *Fuchsius* pag. 21. nos edocuit. Ast quod *Platearius* Moschum hoc modo depravatum cum pelle sua duplo pondere graviolem fieri, addit, cum sincero si conferatur, nullius robotis esse potest. Uti enim fictitius non semper

in pondere genuinum superat, si nempe ex rebus levioribus componatur: ita folliculi isti repleti graviores minime redduntur. Imò diversitas ipsa ponderis in genuinis vesiculis sufficienter illud revellit, dum modo majores, minores modo existunt, Moscho quoque magis minusve, eoque vel humidior vel siccior turgere deprehenduntur. Conglutinatio autem venditata, adcurati emtoris in manus si inciderit, vix lateat eum poterit. Neque ex alia hujus alteriusve Animalis pelle unquam naturalibus adeo similes effingentur urticuli ut non, veros qui probe inspexerit, absque ulla difficultate ab eis dignoscere tales valeat, id quod, inprimis, pili adhaerentes, in folliculo longe aliam faciem & situm, quam in reliquo corpore nacti, nec non meatus in acumine vestigium prompte suppeditabunt.

Ast integris nihilominus folliculis, & nullâ proflus exterius labe comparente, fidem absque ulla hæsitatio minime adstruerem, cum (ut de Moscho in odore languescente, qui intus latitare potest, nihil dicam,) ex recentibus illis vesiculis Moschus naturaliter inibi collectus & adhuc liquidior dubio procul per meatum falciformem exprimi, perque dilatatum eundem tum pasta alia aliqua, tum & plumbi &c. particula intrudi queant. Quam fraudem, exsiccatò præsertim postea folliculo, contrahente ita se meatu dicto, nemo oculis aliove indicio cognoscere poterit.

Quod si tamen integrum istud receptaculum aperitur, supposititiæ massæ omne periculum evitabitur, si nempe conglobatus in eo Moschus, & pellicula illa tenuis per substantiam reptans, conspiciantur. Quod sanè Naturæ artificium per istas meatus angustias nulla fraus humana facile imitabitur.

Propter etiam. Vesiculas arte conglutinatas non simpliciter rejicere decet, quæ optimum nihilominus possunt continere moschum, qualem beatus *D. Dam. Ludovici* Eph. Germ. Cur. Ann. IX. obs. 38. memorat, doctaque conjecturâ dilucidat.

2. Collectionis & præparationis modum qui attendunt, modò vi abrepto, aut ex sanguine etiam, testiculis vel carne præparato primum locum tribuunt. Ubi, quæ mea sit opinio, ex superioribus abunde constat, qui, purulento plane, seu imaginario, valere justo, primum semper folliculario illi humanâ ope exempto, adstruo, reliquis dummodo bene ac decenter parati fuerint, & quod magis est, fabulosi haud existant, non omnino damnatis, parum tamen à me æstimatis, raro utpote ad nos adportari solitis; id quod forte (ne nugaturum quenquam reum faciam,) Mercatorum Europæorum, aut aliorum Moschum ad nos deferentium, solertia in dignoscendo ac conquirendo illo acceptum ferre possimus.

3. Magnum respectum Autores habent regionum, in quibus Moschus provenit. Eatenus quidem consentiunt omnes, quod Orientalis sit nobilissimus, viribusque suis Occidentalem longe post se relinquit. Cujus rei causam reddere conatur *Amatus Lusitanus*, Ulyssiponam per mare sex mensium advectum ideo alteri illi, tertii itinere Venetias delato, bonitate, & consequenter etiam pretio cedere, scribens, quia diu in mari permanens plurimum suæ amittat generositatis, ejusve nimia contractâ humiditate hebetetur. Cui patrocinari videtur Nob. Dom. Joh. Joach. Becherus Phys. subterr. lib. 1. sect. 5. cap. 2. pag. 409. Vini &c. si pauci insint spiritus, ex Δ eis & Θ nis partibus constantes, facile ab inhalantibus aquæ fluvialis vel marinae atomis & corpusculis superati eos perhibens, ut potius omnino vappescat ac deficiat, addens: *Et clarâ experientiâ videmus, ea aromata, quæ per terram ex Oriente Venetias afferuntur, fortiora esse, quam quæ magno isto itinere marino per Belgas mari, Hollandiū usque vehuntur.* Quod equidem de vigo, cianamomo, pipere, similibusque

libusque aromatibus haud negaverim: aut idem ad Moschum quoque extendere si quis veller, non parum fortasse erraret. Dum enim hic accuratissime ut plurimum, in plumbea etiam pyxide, reconditus adfertur, eo ipso ab humidioris aeris adpulsu satis immunis remanet; cum e contra dolia vinaria, saccosque aromatibus condendis destinatos longe promptius subire eum, spirituosaeque corpuscula abducere secum valeat. Unde Occidentalem aut negligentius custoditum, aut additamentis quibusdam depravatum pronunciare mallet, alias eodem in pretio cum Orientali eum habiturus, cui etiam non cedere, plus vice simplici expertus fui.

In specie verò *Ebn Sina* meliorem sequentibus verbis determinat: *Optimus est sua fodina*. (i. e. originis) *ratione Teberiensis*. Atque ita patescit, quam longe à sensu textus Arabici verus aberret Interpres, qui: *Melior est secundum mineram suam Antebium*, reddidit. Idem apud *Serapionem* confirmat *Masudius*, Tebeticum nempe Sinico meliorem esse, tum, quod antea dictum receptaculi conjuncti causâ, tum pabuli melioris intuitu. Atque illa ipsa haud dubie causa *Geographum* etiam *Nubensem* impulit, ut in fine clim. quarti: *Moschus Tubiensis praestat reliquis ex India & Sina*, scriberet. Proinde, verba sunt *Bocharti* huic loco addita, *quamvis etiam in India proveniat muscus*, *Tubetiensi tamen Indi lubentius utuntur, tanquam suo praestantiori; utpote quem Damir cap. de caprea, malum adpellat*. Quod in primis de Indico matitimo verum esse. *Ebn Sina* persuadet, Sinenſi tamen idem bonitatis encomium non denegans, quod & *Paulus Venetus* eidem largitur, atque non minus *Indico Tavernierius* pluresque alii. Incertissimum itaque ex hoc capite indicium desumitur. Quod & nobis mediterranea & remota adeo loca inhabitantibus parum emolumenti dare queat, qui per tot Mercatorum manus antequam ad nos perveniat, eundem pervagari scimus, ut de patrio ejus loco non nisi infida ut plurimum fides nobis superſit.

4. Vicius Animalis differentiam parit, quam *Ebn Sina* exponit: *Ratione pabuli fragrantissimum dant Moschum ea animalia, qua utrumque bihmenum & nardum, deinde qua marrubium pascuntur; cui etiam Masudius consentit, Moschum Sinicum ideo deteriorem esse Tebeticum, judicans, quod alia animalia spicâ odoratâ aliis, quae herbis aromaticis non aequae pascantur. Licet autem vicius determinatus sit admodum incertus, & merè potius imaginarius, si tamen ejusmodi fuerit, quin odoratis suis particulis Moschum praestantiorē reddere valeat, non est dubitandum. Attamen hac ratione nec Sinicus, nec etiam Indicus, vel ipse matitimus, ultimo loco ponendus erit, cum & ibidem vel nardum istam, vel alias odoratissimas plantas, quae in pabulum cedere queant, crescere, sit certissimum. Omisſa itaque & hac minus solidâ electionis notâ,*

5. Ipsa Moschise offert substantia quam siccam esse debere contendunt. Sed qui siccitatem non nisi ab aeris libertiori accessu, ætatisque incremento oriri, humidum verò sic satis ut plurimum in folliculis Moschum contineri, eumque praestantissimum, observavit, palmam huic potius, quam illi tribuet. Ego cateroquin nec humidum simpliciter laudarem, extra folliculum in primis exhibitum, cum ab extraneo aliquo humore illum contrahere madorem, & vel urinoso conspergi liquore potuerit; nec etiam siccum eapropter praefeream, utpote non exiguo odoratarum atomorum effluxu quod nimodo depauperatum. Ob id ipsum tamen siccus non omnino rejiciendus erit, qui licet cum humidatarum particularum exhalatione odoratarum etiam aliquam fecerit jacturam, potiores tamen & potentes admodum nihilominus in sinu suo abcondit.

Neque 6. quem meliorem judicat *Alex. Benedictus*,

conglobato fidem simpliciter habeo, qui & manuali operâ facile talis effingi potest, nec etiam maxime licet genuinus, in ipso folliculo talis semper omnis occurrat.

Neque *Platearius* mihi probatur, eum dilaudans, qui non omnino clarus vel splendidus sit, sed cujus grana sint lata, perque totum aequalia, ad modum *xilocaractæ*. Verum nec splendorem istum adulterini praebere indicium, Cap. praeced. jam fuit dictum, nec absentia ejusdem quidquam commendat, cum utramque in Moscho lincero, ex unica etiam vesicula deprompto, quandoque posse deprehendi, ipsa experientia me edocuerit. Grana verò modo latiuscula, modo rotunda, aequalia, modo inaequalia esse, eadem operâ didici, ita *ξυλοκάρα* (*xilocaractæ Plateario* ineptè, aliis imò multo obscurius: *xiloceraunia* dicta,) sive siliquæ, aut earum seminula in pulpa latentia cum Moschi granulis comparati adeo generaliter non mereantur.

7. Multis probatur *Sim. Sethi* in exploratione *εὐπρόεισος*: *δοκιμάζοι δὲ πλεον τῶν ἑταῶν ἐν κατυγέσσει καὶ λεκάνῃ, ἢ χερνίβῃ μετὰ τὸ σαθρῆσαι πηλασιν αὐτὸν, εἴτω πάλιν σαθρῶσι καὶ εἰ μὴ τῷ σατμῷ ὑπερέξει ἀνθρώπων αὐτὸν ἡγένηται, εἰ δὲ μὴ, νεοθδμῶν λογίζονται*; id est. *Quidam eum probant: postquam ipsum ponderaverunt, in pelvim humidam aut gutturnium injiciunt, & iterum aquâ lance expendunt, si verò pondere praestat, genuinum ipsum aestimant, si secus, adulteratum pronunciant*: *Martini Bodgani* versione. *τὰ ὑπερέξει* itaque *Bodganus*: *pondere praestare*, vertit *Gyraldus* etiam, qui legit: *ὑπερέξει, pondere superat*, habet; cui accedit *Gesnerus*, *ὑπερέξει* tamen legendum judicans, licet τὸ ὑπερέξει MSSorum plurimum fide nitatur. *Ruellius* contra, *Fuchsius* & *Sylvius* eum, qui superfetatur, leviorque evadat, praefertunt. Nec fortean adeo male, cum τὸ ὑπερέξει tot MSSorum, istorum etiam, quibus *Bodganus* fuerat usus, auctoritate polleat. Quamvis reuera omnia hæc nullius sint utilitatis, siue istam, siue illam quis versionem amplectatur, cum probandi hanc rationem quæ admittere queamus minime videam. Uti enim diversæ sunt Moschum corrumpendi artes, ita quædam earum modò resolvablem magis, modò resolutioni diutius resistentem producant; unde illum in pondere imminui, equidem non negandum, alterum verò ob adhaerentes aqueas particulas crescere potius necesse est. Unde ipse genuinus si humidiusculus adhuc è folliculo depromptus fuerit, aquæ praesentiam expertus dein quasdam sui partes facilius dimittit, & in primis si paulò diutius aquæ junctus fuerit, absque ullo dubio aliqua ex parte solvitur, sicque per consequens, lance expensus, levior postea comparet, & adulterati suspicionem hoc modo præter meritum incurreret.

Ubi illorum etiam meminisse licet cum *Plateario* laudem isti defertunt, qui neque citò solvitur, neque multum resistit. Id quod in legitimum Moschum cadere posse, equidem haud ibo inficias, aut nec temper id est necessarium, siquidem humidus magis quæ est, promptius etiam solvitur, sicciore verò & in granula probe compactus diutius resistit. Ut taceam, eandem solutionis qualitatem in fictitium non minus quandoque cadere. Humidâ idcirco exploratione non succedente, quid

8. Ignis *δοκιμασία* valeat, dispiciamus. Quosdam enim prunis ardentibus eum exponere, & si liqueſcat olei in modum, tenuisque veluti pellicula aranei figurâ relinquatur, pro sinceritatis signo habere, sin infletur tumeatque, ac veluti calcis massæ similis reddatur, spiritui notam esse, *Aldrovandus* memorat. At si terrestres multas in Moscho (quas ipsa ejus origo testatur) commixtas esse partes, quis consideret, tenuem saltem pelliculam ab ignis violentia relinqui, nemo amplius sibi persuadebit. Unde etiam in genuino si experi-

experimentum capiamus illum prunis ardentibus impositum intumescere, corpusque aliquod crassum relinquare videbimus. Liquefactio autem ista & tenuior restitans pellicula longè certius à fictitio, qui v. g. ex resinosis estringitur, sunt separanda. Unde neque hæc bonitatis nota attentionem merebitur.

6. Plurimi ex colore signa desumunt, in eo tamen determinando dissentientes. *Ebn Sina* citrinum censet optimum. Nos autem, *Brasavoli* decisione, hujus coloris moschum nunquam vidimus, nisi per citrinum, ferrugineum colorem habentem intelligat. Et *Jacob. Sylvius* lib. de simpl. medicam. nat. subflavum meliorem judicat, quam nigricantem; ex Cathai tamen nigrum præstantissimum hodie adferri, & nostrum ferè esse ferrugineum, non quem *Avicenna* probat, citrinum, subjungit. Sic quoque subnigrum odoratissimum apud Mercatorem, qui ex provincia Cathai se attulisse eum fatebatur, vidit *Brasavolus* Venetiis. Nigrum etiam pro sincero habet *Alex. Benedictus*. Omnino tamen nigrum non probat *Platearius*, qui eidem subnigrum præfert, optimum tamen & laudatissimum subrufum esse pronuncians, omnino accedentem ad colorem spicæ nardi, qualis habeatur ex capreis, quæ spicam nardi depascuntur, & vix (sed quæso: Cur?) adulterari possit. Subnigrum etiam (*dessen Farb auf schwarz oder dunkelbraun fallet*.) planè rejicit *Conr. Kunrath* part. 2. Medull. destill. tract. 7. cum effectus sit & virium expers, qui vicissim subluteum commendat, inprimis qui madefactus manui adfrictus luteo eam colore tingit. Quod *remmexov* Illustr. Regia Societas in Anglia perpendens, alias inter quæstiones in Indiam missas, hanc quoque reposuerat: An verus moschus discernatur à falso per suam flavedinem, si manus fricetur, & per constantiam ejusdem coloris & odoris; uti videre est in Actis Philosoph. A. 1667. 11. Martii. Qua in animorum fluctuatione, à causis tum internis, tum externis colorem Moschi suas intensiones & remissiones suscipere omnium primò est quod moncam; non secus atque Ambra, quæ primò album, deinde gryseum, citrinum, fulvum nigrumque colorem, secundum aliquos, suscipere, vel quod certius, ex gryseo in albescentem senio confecta transire dicitur, aut prout Zibethum initio albidum, ætate verò procedente melleum, lenoninum, & subfuscum colorem ostendit; quod idem quoque in Vîno, Balsamo, aliisque liquorum generibus, juxta eorum ætates, puritatem, impuritatem, locum maturitatem, cruditatem, corruptionem, adulterationem, præparationis varietatem fieri, experimur quotidie. Sic nempe in Moscho, ejusdem ab ætate, loco natali, in hoc illove anni tempore generatione, adulteratione, præparatione, Animalis victu, ætate, sanitate &c. admodum variare posse colorem, non est dubium. An itaque cum *Laur. Catelano* cap. 11. de Confect. Alkerm. coloris in electione magnam non esse habendam rationem, dicemus? qui cæteroquin obscuritatem & nigredinem hunc ferè commendare addidit. Certè obscurum illum & ferrugineum colorem ut plurimum in Moscho (loquor autem unice de eo, ex ipsis folliculis deprompto, sincero & genuino) occurrere scio, nigrum tamen propriè dictum videre mihi nunquam contigit, prout nec luteum, aut qui colorem paleæ habeat, quem ut meliorem commendat *Guil. Platentinus* de medic. flavescens tamen quodammodo vel potius subrufum non unicâ vice observavi, imò utriusque præsentia in uno eodemque folliculo aliquoties sese oculis meis exhibuit, qui tamen in odore sibi erant persimiles, ideoque nullus præ altero prærogativam aliquam vindicare sibi poterat. Hinc neque ad flavum colorem qui accedit, neque etiam subnigrum negandum aut omnino rejiciendum puto. Imò insuper à nulla re heterogenea admixta defædatur, sed maximè genuinum, equè folliculo ipso à me exemptum, subfuscum, albicantibus, nonnunquam etiam rufis

quali atomis superficiei tenus conspersum unâ alteraque vice observavi. Quo intuitu nec certum à colore bonitatis indicium subministrari, nec tamen ullam ejus in electione habendam non esse rationem, adfirmo. Flavadinem autem illam, à fricatione in manu excitatam, in omni, quem captopter examini subjeci, Moscho conspexi, ut ita eandem in vero folliculario adesse debere penitus mihi persuadeam; ita tamen, ut præsentia ejusdem infallibile sinceritatis indicium neutiquam præbeat, cum & in fictitio impostorum manus eandem imitari valeat, quæ alias flavedo tam constans est, ut etiam à sicco & diu jam adservato Moscho, si manui vel chartæ adfricetur, impetrari queat; quam ideo odorati nati & constanti junctam ad genuini certitudinem cognoscendam aliquod adferre momentum nullus ambigo.

10. Amaritiem, vel subamarum potius saporem in genuino requirunt tantum non omnes, *Platearius*, *Catellanus*, *Donzellus* &c. Ipse etiam subamarum esse, ut *Sal. Albertus* in Orat. de mosch. vocat, vel leviter amarum, cen *Alex. Benedictus* loquitur, semper hactenus deprehendi. Ut sanè *Dominic. Auda*, de folliculario agens, errasse dicendus sit, dum in Practica de Speciali illum judicat esse meliorem, qui non sit amarus. Alias si ex solo sanguine vel carne paratus scrutinium hoc subeat, quin amaritudo ista abesse queat, minùs dubito. Sed nec amarus sapor ille quidquam solidi largitur à fraudulentis artibus facillè eidem conciliandus. Cum itaque Moschus selectior sit amaricans, quid de *Galen*i credita positione, lib. 4. de simpl. medic. facult. cap. 22. amarum nunquam odoratum esse, dictitante, sentiendum sit, vel ex solo perspicere quilibet potest; quamvis mendum subesse ibidem, alii jam notaverint, unde etiam mox, in odore suavissimis, veluti rosâ &c. amaritudinem non paucam adesse, ipsemet subjungit. Majori itaque probabilitate, amarum saporem esse principium grati odoris, odoratumque, quod non sit amarum, facillè reperiri, *Theophrastus* lib. 6. de caus. plant. cap. 13. eduxerat, vel ut *Plinius* lib. 21. Hist. nat. cap. 7. loquitur: Odorato sapor raro ulli non amarus, è contrario dulcia raro odorata. Odorata tamen dulcia dari, vel solum anisi semen comprobare valet.

11. Adduci meretur *Scaligeri* sententia, exercit. 21. de subtil. consignata Adulterationem aut sinceritatem ita vel deprehendunt vel probant: Sincerrum naribus admotum illico sanguinem elicere. Et exerc. 211. §. 6. Ejus excellentiam probant Persæ, si odorantibus sanguis è naribus proluciat: sed ita demum, si periculum jejuni faciant. Quod & antigonista ejus *Hieron. Cardanus* lib. 10. de subtilitat. his verbis exponit: Ipsum moschum è Perside advehitur: ubi si recens fuerit, & neque adulteratum, tam vehementis odoris esse fertur, ut jejunis naribus admota vesica, ex eo statim sanguinem proluciat. Quod *Vartomannus* quatuor viris uni post alium contigisse adfirmat. Quam explorationem tantum faciebat *Fallop*ius, ut fuerit ausus scribere: Probatio in nulla ratione consistit, nisi in hoc: quum aperitis vesicam, admoveat naribus, si excitat sanguinis fluxum, bonus est; hoc facit etiam; si quis in toto vite curriculo sanguinem non emisit. Et *Tavernierius* in Itiner. certum putat, vesicas genuino Moscho instructas, si naribus admoveantur, odoris vehementiâ sanguinem esse elicitoras; *Franc. Alexander* verò sincerum ori inclusum, sanguinem è naribus cedere, vel æstum vehementissimumque calorem, aut si præstanti proximis, ingentem capitis dolorem. Cui itaque grave illud sanguinis stillicidium, quod ex frequenti Confectionis alketmes usu cuidam accidisse *Amatus Lus.* retulerat inque lapidem lazuli culpam rejecerat. *Excel. Dom. Freder. Hofmannus* in Calv. pharm. Schröderus pag. 181. adsignate rectius maluit. Alit cui, qui ad nos adfertur, virtute illâ ἀνασφαιτική haud polleat, eam raro, aut etiam nunquam sanguinem eliciat, si

figuratur? *Sal. Albertus* eundem non tam sanguinem esse in tumorem sub ventrem collectum, respondet, quam cruorem potius, hircinum suctu, post folliculi avulsionem admotarum, detractum, & perpauillâ quantitate illius efficacissimi, è folliculo deprosmi, condirum. Quod tamen haud ita esse, ex antedictis jam clarum est. *Cardanus* verò non nisi adulteratum ad nos deferri, idcirco credit, ad quod tamen ut confugiamus, nulla nos cogit necessitas. Aliter statuit *Franc. Perla* de Opobals. Orient. *Perrard*, scribens, eâ felicitate naturalia agunt, quæ à Scriptoribus prædicantur: nec tamen, ubi aliquid non exactè respondet, ut falsum repente proclamandum est. &c. Moschum eadem ratione rejiciemus, naribus namque admotus, nunquam ferme sanguinem odoris vehementia elicit, ut Scriptores de ipso insinuant. At hoc est nimis ex syngrapha agere: neque enim Scriptorum verbis ita inharendum est, quin eorum mens potius spectetur, & quod dicunt, cum salis mica accipitur, aut si quid deterius, aut perperam annotatum ab iis sit, ad veritatis normam redigatur: Scriptores etenim, licet gravissimos non omnia ex propria scientia literis consignasse putandum est, sed multa ex imperitissimorum etiam hominum relatione. Mihi equidem de aliorum fide scrupulum hoc in passu movere, non est animus, ita ut aliquibus Moschum prolicuisse sanguinem, minimè contradicam, aut indubitatum boni id habendam esse requisitum, neutiquam credam. Præsertim vero in loco ipso natali, paulò post Animalis necem, è folliculo aperto exhalantem odorem oscula vasorum, in cavitate narium delitescantium appetere, vel sanguinem potius vicinum in motum rapidiorem, & ita per laxiora vasa eruptionem concitare in quibusdam posse, non adeo est incredibile; quod & in Opobalsami, recentissime è cortice scarificato prolecti, odore acutissimo quandoque contingere, *Prosp. Alpino* cap. 14. de plant. Ægypt. & cap. 3. Dialog. de Bals. debemus, quæ tamen odoris acuties ac vehementia tempore obtundatur. Licet nihil obstat, quo minus nostris quoque in regionibus aliquando hæmorrhagiam talem effluere queat Moschi odor excellentior, si subjectum ad illam dispositum, sanguine nempe in motum rapidiorem prono, laxioribusque vasorum oscillis in naribus præditum, tempore etiam calidiori, inveniat; prout vicissim ex contrariis causis, recentissimus quoque in loco natali fluxum illum ut excitet, haudquaquam opus est. Ut itaque hic bonitatis adit index infallibilis. Eadem de capitis dolore dicta velim, quem à Moschi, non quidem præstantissimi, sed boni etiam odore oriendum dixit *Alexander* supra citatus; cum multi absque tali eventueundem hauriant, multi etiam vel levissimam ejus fragrantiam absque eo minimè perferant.

Tandem 12. Odor quam maxime considerari meretur, quem *Ebn Sina*, Moschi delectum proponens, colorati adjungit, scribens: Quod ad colorem attinet & odorem, qui malis est amulus ac luteus optimus censetur, secundum *Plempii* versionem; vel aliorum: pomalis citrinus. Ubi per pomalem communiter odorem pomi præditum intelligunt. Quem tamen nares captare meæ nunquam potuerunt. *Alex. Benedictus*, solitudinis odorem habere, aut anguim quorundam statuto tempore, aut eujusdam avis sumi, perobscurè enunciat. Aliis melius, proprii illius odoris determinatione omisâ, fragrantissimus olfactui si occurrat, optimi notam præ se ferre creditur. Cuncta enim odorata, quo odoratiota sunt, eo meliora etiam reputari solent.

Cui fundamentum *Donzellii* experimentum insitit, his verbis ab eo l. c. consignatum: Si passi un'aglio con aco, e poi questo aco si passi per un pezzetto di muschio, se la punta dell' aco sentira d' odor d' aglio, il muschio non sarà del perfetto; ma se odorerà di muschio, è segno certo esser bono. Verum non succedere hanc explorationem, expertus sum, siquidem eam acu, postquam bis terque eam alio intruseram, eaque fœtore illius potenter exin-

imbuta fuerat, mox glebulam moschatam selectissimam, & quidem semel tantum compunxi, ac neque in glebula, fateor, neque in aëni ullum percipere alii odorem potui, solo prævalente moschato; id quod tamen etiam successit, quamvis non cum pura è Moscho massa, sed æquali sanguinis hircini parti commixta experimentum hoc tentavetim.

Consuevisse, refert *Platearius*, quosdam Mercatores Moschum emittos; naribus obturatis & respiratione cohibita ad medium jactum lapidis currere, indeque aërem ore (cur non naribus?) attrahentes; si Moschi odorem sentiant, eundem emere atque probare. Plurimum tamen hic refert, quo in loco respiratio ista instituatur. Si enim in aëre libertiori, & vento adverso, aut apud Myropolam, aliorum etiam aromatum copiam venalem exponentem, illa fiat, vix succedet, effluvis nempe moschatis aut nimium in spatioso aëre huc illuc delatis ac divulsis, aut aliorum abreptis, aut denique confusione aliorum oblitteratis vel obtusis. Quin & clauso in conelavi Moschum, ex genuino odoratissimo & alia aliqua re non admodum largè additâ commixtum, satis potentem largè dispergere odorem; compertum habeo. Ut ita facile bonus rejici, adulteratus autem eligi queat.

Nec silei debet *Hieron. Cardani* monitum lib. 17. dederet. variet. cap. 97. Moschum per se odoratum, ladani &c. tamen parti permixtum; si hujus odore moschatus obtundatur, falsi indicium præbere. Quod sanè ita se habere facile crediderim, ita ut Moschus exigua, vel etiam pari ladani quantitati mixtas; si hujus odor alterum illum oeculet, merito falsus aut etætus reputari queat; cum econtra tamen ladani magna portio addita odorem moschatum in genuino etiam quodammodo obtundat, sique infidum suppeditare posset judicium.

Cæterum bonitatis ab odore petiit argumentum tantopere placuit *Wolff. Höfero*, ut solâ fragrantia excellentiâ dignosci eam posse, certum judicaverit: Tot enim, addens; fraudulentorum hominum sunt deceptiones, ut neque sapor, neque calor, neque gravitas, vel levitas, soliditas, vel friabilitas dolum detergere sufficienter possit.

Qua in fragrantia, eaque nativâ & propriâ adquiescere, stat sententia, ita ut illa confertim nares subintrans, graveolentiam potius præ se ferat, eminus tamen ob latè dispersos suaveolentes spiritus, qui communis erant concentrati, singulari gratiâ olfactui blandiatur. Cui odori si ex reliquis supra adductis signis aliqua notatu digniora, veluti integritas folliculi, sapor amaricans &c. respondeant, eo majori certitudine Moschi puritas cluescet ac demonstrabitur.

De qualitatibus Moschi.

Qualitatum & temperierum doctrinam à *Paracelsi* *Helmontii*, aliorumque vilipendio vindicaturus *Excelentiss. Dom. Wedelius* noster in Doctiss. suo de Medicament. facult. tractat. lib. 1. sect. 1. cap. 1. citra ejusdem cognitionem impossibile judicat, partibus humani corporis solide posse si eam, utpote quæ calido innato instructæ subjectam sint Medicinæ, quod ideo à medicamentis vel intendatur vel deprimatur. Quo ipso tanquam indestructibili fundamento innixus de Moschi temperie & qualitatibus agere jam instituo.

Calidum autem esse eum & siccum eunctorum unanimis est confessio. Calidum esse nemo dubitat, & etiam caliditate insigni, quod sanguinis concoctio indicare potest, præter experientiam, quæ rerum magistra est. Si enim corpori nostro adplicetur, manifestissime calefacit: uti *Brasavolus* loquitur. Ut verò de sanguinis dicta concoctione, insignem caliditatem indicantē, revera tamen dubia multa invol-

involve, nihil dicam, de experientia tamen non est dubitandum, quâ, ex Galeni sententia lib. 2. de aliment. facult. cap. 6. si quis ipsam cum propriis limitationibus fecerit, facultas ipsa planè invenitur; ubi etiam odore atque sapore plantarum temperamentum omne statim ostendi edocet; lib. 4. de simpl. medic. facult. cap. 22. odorata omnia calida demonstraturus, eorum substantiam esse vaporosam, vaporum autem copiam à calore provenire, determinat. Licet idem lib. 2. cap. 3. non quidquid bene redolet, calidum esse vel calefacere adstruat; quod tamen lib. 4. cap. 23. explicat, scribens: *Odorata tenuia utique sunt quadantenus & calida: verum ejus tenuitatis caliditatisque quantitas haud etiam indicatur. Porro maxima potissimaque causa, quamobrem in odoratis nihil evidens de temperatura indicari queat, inequalitas est substantia; id quod postea Rosæ exemplo illustrat. Scilicet qualvis particulas odoratas esse calidas, nec Galenus, nec alii negant, adjunctas tamen frigidas præpollentes vigorem istarum quasi enervare, & quo minus calefacere vel possunt, vel sentiantur, efficere, haud vane creditur. Id quod de Moscho dici nentiquam debet, in quo particularum calidarum exuperantiam odoris fragrantia constans, insignis & quasi vehemens abunde ostendit. De cujus itaque caloris gradu non neglectâ alterâ illâ passivâ, eâque, omnium consensu, siccâ qualitate, jam potius dispiciamus; in quo adsignando disparēs admodum foveant sententias.*

Ebn Sina calidum & siccum ordine secundo (licet in lib. de Medicin. cordial. eidem adscripto, tract. 2. cap. 3. tertius ei gradus assignetur,) constituit, quem *Constantinus* fr. lib. de grad. medic. *Platearius* &c. sequuntur. Plurimis tamen aliis ab eo recedentibus, & tam activam, quam passivam qualitatem aliter proponentibus. Illas enim in tertio gradu collocant *Aali Ebn Aabbasus* sive *Haly Abbas* theoric. lib. 5. cap. 33. *Isaacus*, Medicus Hebræus, *Israhelita* ideo dictus 5. theor. cap. 104. *Meseha* apud *Serapionem*, & *Sim. Sethus* l. d. cumque iis *Joh. Prevotius* de remed. mat. &c. Quos postea siccitatis ratione sequebantur *Amatus Lus. Petr. Andr. Matthiolus, Joh. Jac. Weckerus, Joh. Renodius, Joh. Schroderus, & Joh. Georg. Macasius*. Quæ opinio nec *Ebn Sinam* latuit, nonnullos (confer *Serapio*.) siccitatem ejus intensiorem perhibere, scribentem. Est tamen & qui primi gradus siccitatem adjudicat, videlicet *Joh. Guintherius Andernac.* de Medic. vet. & nov. comm. 2. dial. 5. Ubi difficile satis videtur negotium, tam differentes circa *αἰθρῶν* Moschi versantes conciliare velle sententias. Veruntamen componi forsitan poterunt, si tum varii eum colligendi & parandi modi, ætatique differentie, tum multivarie ejusdem adulterationes &c. perpendantur, pro quorum omnium diversitate diversos quoque eum sortiri temperaturæ gradus satis est probabile. Purus enim qui ex folliculo Animalis depromitur, procul dubio majorem caliditatis & siccitatis gradum obtinet illo, qui ex reliquis simul partibus admixtis concinnatur, cum præsertim majori odore polleat, & minori in dosi operationes suas perficiat. Ætatis ratione vires ejus & calorem multum immutari, probatione ullâ haud indigebit, evincitque illud cum aliorum simplicium, tum ipsius Moschi quotidiana inspectio, ita ut antiquiori, præsertim non exactissime custodito, multas odoriferas & simul calorificas decessisse particulas, comperiat. De Moschi etiam adulteratione testem adduco *Ul. Aldrovandum*. *Adparet variare autores in designatione temperamenti propterea, quod diversimodè corrumpitur atque vitiatnr.* Quæ ipsæ nempe fraudes in causa esse possunt, ut modò calidior, modo in calore remissior occurrat; illius, cum aromaticis acrioribus, maci, caryophyllis, &c. hujus cum sanguine columbino, &c. permissione exemplum suppeditante. Mihi itaque, puro & selectissimo secundi

gradus finem, cum *Averrhoë*, assignare libet, quia sensibilibiter quidem, sed citra manifestam læsionem calefacit; ita tamen ut ad temperatum maxime corpus, ceu fieri æquum est, habeatur respectus, si enim periculum in calidiori fieret, absque ullo dubio ad tertii gradus medicamina calida foret referendus, cum notum sit, quantas in tali subiecto molestias & læsiones, dolorem capitis &c. inferat. Unde *Haly Abbatem*, & qui cum eo sentiunt, vel hujus phænomeni considerationem habuisse, dicendum est, vel, quod pro conciliatione reliquorum commodius dici posset, finem gradus alijus sæpe à Medicis initium sequentis, & ita finem secundi initium tertii appellari. Ita ut *Ebn Sinam* &c. finem secundi gradus innuere voluisse credamus, quem sanè *Averrhoës* lib. 5. Collig. expressè denominat; reliquis ad tertii gradus principium respicientibus. Idem siccitati ejus adplicare si velimus, fortè non errabimus.

In secundis qualitatibus ejusdem *λεπτομερῆς* inprimis, sive tenuitas partium considerata est, quam & *Ebn Sina*, & *Sim. Sethus*, pluresque alii ipsi adscribunt.

E quibus jam attenuandi & discutiendi, secundum *Schroderum Macasium* &c.; dissolvendi & consumendi juxta *Platearium*; pituitam præparandi, ex *Primerosio*, *Riverio* &c. vires elu. elcunt; quæ tamen omnia prolixius deducere ac demonstrare superfedeo, cum de iisdem in seqq. ubi de viribus facultatibus ejus in specie agetur, commodior passim sese offerat occasio.

Utrum adstringendi aliquam habeat virtutem merito hic inquiritur, quam utpote haud obscure quidam eidem tribuunt. *Tradunt, ambram & muscum, stypticam habere virtutem*: verba sunt *Marsilii Ficini* lib. de vit. cap. 9. Ast vel musci vegetabilis vim adstringentem, & nominis ejusdem in Moschum nostrum derivationem induxisse erroneam hanc opinionem, est credibile, vel etiam virtus Moschi corroborans passim decantata, ut tale quid fingeretur, ansam præbuit, dum multi cum antiquis illis Methodicis, à *Galeno* de opt. sect. cap. 51. memoratis omnem confortandi vim unice adstringentibus adjudicare solent; quanquam veritati minus hæc esse consona, alii jam ostenderint, imò nec tenuitas partium, quæ in eo præpoller, facultatem ejusmodi admittat, nec terrestres, quæ eidem commistæ sunt, ulum adstrictorium saporem præ se ferant, terræ mortuæ & evanidæ prorsus instar hac ex parte se habentes, quin & ipse effectus contrarius repugnet, quo ab ejus usu sanguinem aliosque humores in motum majorem concitari, atque, ut quâ datâ portâ erumpant, agitari ac stimulari, experimur.

Præter manifestas vires, nobiliores atque occultas si ita loqui cum nonnullis liceat, eundem obtinuisse, vel inde colligere quis posset, quòd Alexipharmacorum numero adjungatur, & quidem non saltem specialiorum, sed & generaliorum vocatorum classi, prout paulo post pluribus disputabitur.

De Odore Moschi.

Licet ordinis ratio, in præced. Cap. de Moschi odore ut ageretur, requirete utique videatur, cum tamen excellentia ejusdem diligentior investigationem mereatur, cujus utpote beneficio eum, in quo nunc residet, gloriæ thronum occupat, singularem ei locum tribuere æquitas postulabat. Imò non tantum odoris ob præstantiam id fieri decet, sed & unice eidem vitam suam cum debeat.

Quod *Philipp. Theoph. Paracelsus* clarius expressit, Moschi vitam non in alio, quam suavi ejus odore consistere innuens, quo amisso, mortuus & evanidus redatur. Sic enim lib. 4. de vita rer. natur. loquitur: *Der Aromatischen Dinge Leben, als da ist der Bysem, Ambra, Zibetha, und was da einen starcken lieblichen Geruch hat,*

ist nichts anders, als ihr guter Geruch, dann so sie denselben verlieren, schein sie tödt, taugen noch sollen nichts mehr. Cui aditipulatur Joh. Bapt. Helmontius tract. Tria prima Chim. princip. &c. §. 84. Muscus scribens, & aromata moriuntur, si crasis abscefferit, licet corpus in se sospes manserit; Crasi autem optimam rerum partem; & in specie aromaticorum ipsum odorem aromaticum esse, in præcedd. innuerat. Quamvis nec in terrestriore corpore illo, particulis odoriferis casto, omnis propterea virtus medica exules; prout sanè vix ullum Caput, quod Chimicis ita dicitur, mortuum omni virtute medica destituitur, sed respectu tantum ad priorem, quam in vita ut ita loqui liceat, possidebat, facultatem habito, cadaver adpellari meretur. Sic Moschus, à quo temporis edacitas odorem abstulit, sapore adhuc amantissime pollet, & in ignem si conjiciatur, foetidum eructat fumum signo ubique evidentissimo, non simpliciter cyanidam & damnatam esse terram, sed revera adhuc sale & sulphure aliquo imprægnatum; cui illud Clar. Bernhard. Svalbii competit, in Disquisit. therap. general. prolatum: Spiritus solus natura non produxit; etiamque ex fece remedium exsurgit.

Cæterum Moschus, dictante subtilissimo J. C. Scaligero exerc. 21. rerum omnium odoratissimus, simul earundem omnium acutissimus est. Acutissimus quidem, quod odor omnis cito penetrans, & fortiter celeriterque sine fastidio sensum feriens, acuti nomen apud quosdam inereatur; idque Moscho competere, nemo, qui experientia non repugnaverit, negabit. Odoratissimus vero, cum nullum ex Simplicibus in Naturæ regno amplissimo detur, quod odoris suavitate, magnitudinis junctâ, eum superet, adeo ut ejusdem intuitu ipsa Ambra, Zibethum, & Opobalsamum inferioris conditionis esse reputentur. Ita Joh. Cuthnerus Andernacus l. c. Moschum odoratiorem quam Ambram esse dissentit profiteretur. Et Haly Abbas d. l. Actionem hujus odoriferam, Moschi actioni esse proximam, scribit, ita tamen ut ei in actione subiaceat. Sed non opus est, plura congerere testimonia, cum nates cujuslibet sibi ipsis testes sint omni exceptione majores; unde Ambra odorem sine nostro odoramento debilem admodum esse, communiter edicitur. Neque etiam Ambra suavitatem, qua talem, simpliciter concesserim, si nempe dispersæ magis Moschi atomi cum ea conferantur. Licet concentratarum odor si expendatur, facilius accedam Fallopio, de Moscho scribenti: Superat omnia aromata: adest quoddam aliud cui cedit suavitatem, sed nullam habet se majorem vehementiam junctam suavitati; quoddam vehementiam, non suavitatem habent; sed nullum est, quod æque junctâ hæc habet. Reperitur odoramentum; & est ambra, sed non ita validum est. Ubi tamen diversorum nates diversum quoque de suavitatis prærogativa judicium ferre posse scio, cum, ut in aliis, sic in his etiam non omnibus æque placeant omnia. Hoc interea certum est, tam gratum, amicum & desideratum esse utriusque odorem, ut duo ista Simplicia conjungi in compositionibus medicis ut plurimum experiamur, particulis eorum ita se invicem permiscensibus ac temperantibus, ut gratissima inde profurgat fragrantia, & unum videantur esse Simplex, unamque etiam spirent & odiant, nec omnimodè divellere ista ullâ arte sit possibile. Quo forte Huseinus fil. Mansoris, à Mucladiro Bagdali Ann. Hegir. 309. sive A. C. 921. crucifixus repperit in versu, cujus aliorumque similitum causâ mortem subisse, Georg. Ebnacinus refert:

Ligatus est spiritus tuus cum spiritu meo, sicuti ligatur ambra cum moscho puro.

Siquidem mox subjungit:

Cumque prebendo quidquam, ecce tu ego non separamur.

Hoc enim ardentissimam & fidelibus suavissimam Divinitatis cum humanitate conjunctionem, sive Christi Manget. Bibl. Pharm. Tom II,

salutiferam incarnationem exprimere libique adplicare unâ voluisse eum, reliqua ab Ebnacino prolata haud obscure indicant.

Porro Zibethum recens tetris & horribilis esse odoris, postea vero successu temporis ex se non minorem, ac Moschum, spirare, non adeo tamen suavem, Amantiss. Lufit. bene decernit.

Opobalsamum Orientale odorem efflare suavissimum, cum Alpino concedit Joseph. Donzelinus, sed intra suum proprium Retinarum genus, ita ut illas inter sit odoratissimum, ideoque Opobalsamum Moscho suavius olere, negat in Apolog. ad suam de Opobals. synops. cap. 3. Et Cl. Joh. Vestlingius in Opobals. Vindic. pag. 20, 21. contra Petr. Servium, laudans hoc ævo præcipuis Odoribus illud præferentem, hoc modo perorat: Dissuadebit rem omnem, quisquis discernendis odoramentis, non tantum rationis trutinam, sed bene temperatum quoque sensum attulerit: Mihi quidem selectius Opobalsamum odoranti (odoratius autem sum frequenter) eximiam semper fragrantiam ingessit, optimi olibani, myrrhaque evectiora superiorem. Non ea tamen, quam simpliciter vel ambra, vel moschi minus perceptis odoribus prætulerim, quos gestantium corpori, aut vestimentis conciliant. Et: Habeat Opobalsamum, limatissima Theophrasti judicio, præstans quid, & odore excellens, sed inter vixitantes dæmones, lachrymales humiditates, quales abietis, pini, rebinthi, lentisci, olibani, myrrha, & si quas hujus ordinis alias Eresia Suada recenset, longe retro actis seculis cognitâ; quibus non dissimilia pag. 47. contra Stephanum de Gasparis innuit. Confer ejusdem Vestlingii annotat. 19. propuls. physicar. oppugn. dicti Stephani; & Baldi Baldi Rom. Opobals. propugnat. 1. & 3.

Unde vero odoris hujus natales deducendæ sint hunc inquirendum venit. Ubi tamen controversiam illam: An odor mediante corporeo aliquo halitu à re odorata emanet prius tangere utique necesse erit. Id quod cum Galeno plures adfirmant, & nostro tempore tantum non omnium ritè philosophantium est sententia, ita ut qualitas odorifica ad sensorium odoratus cum corpore delata sensationem istam ibidem efficiat. Contradictentibus tamen Peripateticorum plurimis, omnem odorem, sicque etiam moschatum, nudam solummodo esse odoris speciem reagentibus, à re odorata plane spiritualiter, sive uti, obscurius & termino intellectu vix concipiendo loquuntur, intentionaliter prodeuntem. Quamvis autem ipse odor, in propriissima sua significatione, & quatenus à sensorio percipitur, revera non sit substantia, sed qualitas potius dicenda, hæc ipsa tamen qualitas nunquam merè spiritualiter si ve intentionaliter, sed mediante corporeo aliquo subiecto, odoratus organo, à Nobil. Dom. D. Contr. Vict. Schneidero in libello de Off. cribriform. præ aliis dilucidato, imprimi potest; quod scilicet subiectum ita comparatum esse debet, ut qualitatem illam sensui communicare queat. Sive, ut verbis Anton. Santorelli lib. 9. de sanit. natur. cap. 16. loquar: Odor etsi non sit exhalatio, fundatur nihilominus in vapore; aut cum Joh. Magiro lib. 6. Philosoph. Peripath. cap. 9. dico: non me statuere, odores ipsum defluxum corporis & substantiam esse, sed substantialem & corporeo subiecto inesse ipsos in aëre. Neque obstant, quæ hisce communiter olim obiciebantur, videlicet: 1. ab effluxu illo substantia vaporosa, sive, ut alii vocant, fumosa, necessario subiectum odoratum immitti debere & contrabescere; id quod non fieri, ipsius Moschi exemplo confirmare nonnulli nituntur, quos inter præcipue est Sylv. Rettray de simp. & antipath. Imò ob vastissimum, quod sape, & quidem diutissime, implem spatium Odorata mole perexigua, tantæ corporali expletioni impar futura, etiam si tota in vapores resolverentur. 2. Si corporeus esset ille vapor, fieri non posse, ut per quinginta miliaria, si nonnullis credere volumus,

ex odorati multorum cadaverum vultures eo avolasse compertum sit; prout etiam *Plinius* lib. 10. Hist. natur. cap. 6. ex *Umbicio*, Aruspicum illius ævi peritissimo, triduo aut biduo antea avolare eos notet, ubi cadavera futura sunt. 3. Pisces quoque in aqua odores percipere, dum verò odoris natura in sicco à calore elaborato consistat, atque exhalationes sursum adscendant, neque ad fundum aquæ pervenire eum posse, neque integritatem suam in aqua conservare, cum alias res odo atæ, si humectentur, odorem amittant. Quæ speciosa equidem satis adparent, facili tamen operâ enervari possunt. Nam 1. Moschum odoris sui exhalatione non imminui, licet quidam statuunt, sunt tamen vicissim alii, contrarium qui adferunt. Et quidem perceptibilem ac valde visibilem eam in Moscho deprehendi, *Illustr. Com. Digbaeus* in Orat. de pulv. symp. tradidit. Id quod oculati etiam fide comprobatur. Respondemus scribit *Sanctor. Sanctorius* Comm. in art. med. Gal. quæst. 57. odorabilia semper resolvuntur & pondere diminui: Si enim pomum hodie ponderaveris, die sequenti illud invenies minoris ponderis: Similiter muscus non oculus citius minuitur. Et: Si hodie perpendamus lance exquisitâ muscum, cras erit ponderis minoris. Conferatur Ill. *Boyle* de Atmosph. corpor. consist. Audire quoque hac de re lubet *Horat. Augemium* tom. 1. Epist. med. lib. 7. ep. 2. ubi substantiæ à rebus odoratis effluxum aliquando admodum esse sensibilem, aliquando verò sensu imperceptibilem, scribens, addit: Si tenuior est materia, magisque ignea, effluvium sit insensibile, ut in mosco, ambra, & reliquis, quod ex his exhalet quadam substantia, hinc videre licet, quod si hac odorata aliquo tempore teneantur sub dio, odor amittitur, ac ab illis rebus evanescit: si vero clausa retineantur, ut non respirent, longissimo tempore odor conservabitur. Et licet ob vastissimum spatium, quod Moschi granulum exiguum odore suo adimplet, impossibilis substantiæ corporeæ (quam *Hellmontius* vocat: Gas, exprimit, uti tr. Magn. Oport. §. 36. Odor non dispergitur sine odorabili, quod est Gas rei) resolutio, cumque odore præsentia videatur, si tamen rerum aliarum in minutissimas atomos, cæca corpuscula *Lucretio* eleganter dicta, divisionem contempleremur, non incredibile adeo adparebit amplius. Sic *Digbaeus*, omne corpus, etsi minimæ sit quantitatis, in infinitum dividi posse, scribens, non quidem quoddam actu infinitas partes habeat, sed possit semper in novam partem dividi, nec tamen ad divisionis finem perveniarur, exemplo 3 j. auri comprobatur, quam bractearius in mille vel longè plura folia attenuat, è quibus folium dimidium ad deaurandam superficiem massæ argenteæ trium vel quatuor unciarum sufficit, hancque ipsam deauratam massam illi, qui aurum & argentum nere solent, in fila ducunt tam longa & subtilia, quantum quidem fieri potest; quæ tamen in longitudine nullum reperietur vel unius atomi spatium in sua superficie quod non sit planè deauratum; Imò autem, subjungit, in quot atomorum decies centena millia inaurata hac linea discindi forficula posset? Idem de stupenda Auri extensione experimentum, cum plurimis aliis, in libello, quo miram effluviis subtilitatem evincit, Nob. *Boyle* protulit. Quod pertinet, quod *Joseph. Gallaratus* System. renov. physiol. medic. lib. 1. cap. 7. pag. 62. in thuris grano combusto, pili magnitudinem non superante, *Magnenum* sagacitate suâ demonstrare referat, fuisse atomos elementales ad minimum 777600000000000000. (quæ calculi certitudine, oculatiores dispiciant.) Consul. etiam magnus *Dan. Sennertus* Hypomnem. phys. 3. cap. 2. Quamvis de relatione illa, vultures, quingenta licet milliariam spatio distitos, multorum ad cadaverum odorem avolasse, dubitari utique posset, ut tamen hac in re faciliores se præberent alii, volatilia ista non ab odore allata, sed aliâ occasione impulsâ illuc venisse, aut altè volantia, cum sint acuti visus, corpora ista intersecta vidisse, aut deni-

que etiam evaporationem ex iisdem cadaveribus elevatam à vento in distita loca fuisse impulsam, vulturesque odoris præstantiâ commendatos, juxta tritum, quamvis non per omnia adeo verum, versiculum:

Nos aper auditu præcellit, aranea tactu,
Vultur odoratu, lynx visu, simia gustu:

allicere suspicantur. Id quod sanè prælaudatus *Digbaeus* illustri exemplo clarum ex parte reddidit, dum odorem rorismarini, qui ex parte Hispaniæ efflatur, maximam intervalla penetrare refert, seque ipsum ter vel quater has oras præternavigando semper observasse, quod navis ad unguem quali teneant, quando 30. vel 40. milliariis ab hac regione absint, idque ex fragrantissimo rorismarini odore illinc efflato. Imò, subjungit, ego etiam ipsemet odorem hunc aquè validè percepi, ac si avulsam rorismarini ramum manibus tenerem; accidit autem hac nobis res duobus vel tribus ante diebus, quàm in conspectum terra proveheremur; tandem adverso tum temporis vento se fuisse ulos, fatetur. Et *Boyleus*, ingeniosi cujusdam viri, in Indias Orientales profecti relationem cap. 4. de Natur. determin. effluv. adducit, quâ ad littus insulæ Ceylonis, cinnamomi & fragrantium gummi copiâ famigeratæ, appropinquantibus ventum tum forte à littore resultantem, advexisse ab insula aërem omnino odoriferum, narratur, quanquam complura milliaria (forte viginti aut viginti quinque,) à littore adhuc distarent. Et hæc ipsa odoris in hanc illamve partem à ventis agitatio substantiæ alicujus præsentiam evincit; qualitates enim sic dictas intentionales à ventis non moveri aut impediri, sunt qui animadvertunt, dum ex. gr. medio in eorum furore qualitatem visibilem nihilominus perfecte ad oculum deferri observant, ac si tranquilla forent omnia, cum econtra vento adverso odor quidem ad nares feratur, in oppositam verò plagam tendente, planè non persentiantur. *Plinii* autem omnino nihil huc facit autoritas, partim ex aliena fide illud memorantis, partim meram aruspicinam, ideoque insignem vanitatem involventis, imò de odoris natura nil quidquam insinuantis. Vid. quæ hoc de efflato *Pliniano* disserit *Jul. Casserius Placentinus* lib. 3. Anatom. sect. 2. cap. 10. & *Ulyss. Aldrovandus* lib. 2. Ornitholog. cap. 1. 3. Licet odoris naturam in sicco esse fundatam, concedatur, siccum tamen illud cum humido absque sui destructione commisceri vel confundi posse, nemo, qui sensuum integritate pollet, negare potest, quod vel numerosa aquarum ex rebus odoratis destillatarum series sufficienter evincit; imò exigua satis Moschi particula in magna aquæ quantitate diluta odore suo eandem egregie imbuat. Exhalationes etiam sursum ut plurimum adscendere conceditur, si nempe sibi relinquatur, & tranquillo in aëre placide evaporent, ubi tamen hunc ventus &c. agitaverit, tam sursum, quàm deorsum, & quaquaversum impelluntur, quod in aqua, piscium ferae nunquam omnino immobili, nullo modo negari potest. Res autem humectatas odorem amittere, omnem est contra experientiam, ut etiam plurimæ antea quali inodora, ab ejus irrigatione odoratas exhalationes spargant, sic ipsa Salia volatilia, omni phlegmate orbara atque ita eleganter fixata, quamprimum liquore aliquo humectantur. Pisces tamen, ut hoc quoque moneam, non tam odor ferum, hamo junctarum quam earundem species, per aquam diaphanam ad oculos eorum delata sæpius allicere videtur. Quod si immaterialis vel intentionalis tantummodo esset qualitas, ablato corpore odorato, statim etiam odorem cessaturum esse, merito opponitur, cum tamen contrarium fieri, facili negotio deprehendatur; Moschus quippe vasculi alicujus fundo impositus, bambacem in fummitate, ita ullum non attingat, locatum odore suo imbuat, tamque constanter, ut ab omni Moscho dein remotissimus diu nihilominus eandem fragrantiam exhibi-

exhibeat, id quod absque corporali molecularum odoratarum communicatione fieri, nemo imaginari sibi poterit. Alia plura, quæ pro hujus adferti confirmatione passim adducuntur non omnino contemnenda; brevitate causa omitto.

Caterum odoris suavitatem à siccitatis exacta cum humiditate proportionem, aut secundum alios, ex æreis partibus ab igneo calore exactè mixtis provenire, illi statuant, qui olim primis qualitatibus nimium tribuere consueverunt; à qua optimè temperata & elaborata substantia dein corpus aliquod vaporosum *Galenus* &c. fumosum *Heraclitus* & *Plato*, intentionalem speciem *Aristoteles* emanare docebant. Quam exactam mixtionem vel proportionem à coctione, cujus instrumentum est calor proficisci, communior est adfertio. Namque per coctionem suaviora omnia & odoratora fieri, cum ex opposito imperfectam coctionem foetida designent, tam à Medicis, quam à Philosophis plurimis hætenus fuit creditum. Et hanc in Moscho à calore externo. Solis scilicet aerisque peragi, *Serapio* & *Sethus* existimant, quorum vestigia magnus Scriptorum numerus etiamnum premit. Moschum, per se & naturam suam foetidum, tractu demum temporis ab aeris bonitate digestum, Solisque calore coctum & elaboratum in suavem mutari, persuasus. Alii verò internum calorem respiciunt, quem imprimis explicare conatur *Sal. Albertus* Orat. de Mosch. eundem in Animali nostro esse maximum, adstruens.

Cum verò à qualitatibus his primis odoriferarum particularum ortum deducere, multis improbetur, in alias atque alias subinde sententias itum fuit. Sic putredinem *Helmontius* tractatur, quo tria Chemicorum principia, neque eorundem essentias de morborum exercitu esse, docet. § 81. Sunt, inquit, plura simplicia, quæ fragrantiam, quam ante sua in specie non habebant inveniunt in sinu putredinis, qualia sunt Moschus, Zibetta, ambarum, stercora quadam brutorum, atque ligna putrentia. Fraxedo quippe varia illis suboritur, unde semina fragrantiam sibi hauriunt, et transplantantque in novam generationem. Aroma ergo balsamo vitæ media alligatum, per partium separationem, in putredine non superatur, commodiusque corruptum sequestratur. Quam putredinem in folliculatio Moscho ego quidem agnosce minime possum, utpote quem sanguinem esse putrefactum haud facile concesserim, sed alium potius humorem à massa sanguinea segregatum, ibique collectum ac innata folliculi virtute sive fermento in odoratum istud liquamen elaboratum; non secus ac bilis in vesiculam felleam, & semen in vascula spermatica congeritur quorum neutrum à putredine ullus hætenus deducere usus fuit. Scilicet in folliculis his sanguis convertitur in succum odoratum natura necessitate, *Bartholino* Volum. 1. Act. med. H. fin. obl. 58. ad stipulante. De putredine autem cogitandi ansam præbuit erronea illa de præternaturali & apostematibus in modum facta Moschi generatione opinio, quæ jam destructa, altera etiam sponte corruit. Si tamen putredinis vocem latius quis extenderit, ita ut mutationem solummodo seu alterationem designet, faciliorem is censuram merebitur.

At ex sanguine etiam, vel carne &c. Animalis si paretur, modis nempe supra propositis, quin primas putredo quam maxime partes teneat, nullum est dubium, quæ nempe particula odorata, antea in sanguine, carne &c. delitescens & subjugata, in libertatem vindicantur, non secus atque in vegetabilibus etiam inodori Spiritus ardentis odorati, & Salia volatilium per putrefactionem sive mixti resolutionem in actum deducuntur, atque à fixioribus inodori discernuntur. Quam sane volatilium cum fixioribus actionem connexionem ipsum Animal moschiferum ostendit, quod vivum, & antequam separationem istam subeat, odore Moschato prorsus destituitur. Licet enim *Cardanus*

illud, quod Mediolani mortuum viderat, totum iucundo admodum odore præditum referat ob vaticam tamen connatam id accidisse; nec ipse diffidetur, & Exc. D. Dan. Ludovici pellem odore magis forinsecus fragrare existimat, cui meum etiam qualemcunque calculum adjicio. Imò si totum odore tali tantoque præditum foret, antequam per putredinem aliam naturam indueret, cerè pro cibo vix inservire caro ejus posset, cum tamen à vniis usui isti adhiberi *Martinus* testetur. Tanti hoc argumentum fecit *Chiocci* in descript. Mus. Calceol. ut *Amati Luf.* sententiam de Moscho ex carne & ossibus Animalis parabili exhibilatus, utriusque Indiarum incolas carnem istam tanquam escam optimam in deliciis habere, *M. Pauli Veneti* testimonio, ex fide *Catalani*, memoret, quanquam tale quid à *Veneto* scriptum reperire ego nequeam.

Putredinis etiam magnam hoc in passu vim ipsa Moschi exolei à nonnullis credita per foetores resuscitatio arguere posset, si vera essent, quæ cum in finem passim à nonnullis cum admiratione decantantur. Nam, icribente, *Plateario* si odorem, sive aromaticitatem amiserit, postius ore aperto suspendatur in cloaca & recuperabit odorem. Atque odoris amissi vim in foetoribus atque latuinis recipere, contra foetorem eluctando, & sic quasi luctando reviviscere, ex *Isidoro* habetur. Multorum id experimento comprobatum, *Joh. Bravus* de sapor. & odor. cap. 17. addidit. Cautior *Jacob. Sylvius* similem odoris restitutionem proponens: Si *Plateo* credimus, concludit Ego sane, ut candide faciat, minime illud credo, nec etiam *Renodæo* lib. 4. Institut. pharmaceut. cap. 12. credibile videbatur. Quin & cum naribus meis hæc in parte plenam ut adhibeam fidem, nihil prohibeat, ipsemet Moscho acri liberiori per longum temporis spatium exposito, sicque omni odore spoliato, crassum istud artificium nihil suavitatis reddidisse comperi. Quod autem illud multorum experimentum attinet, quinam isti sint, ignoro, apud *Bernh. Dessennum* tamen cap. 6. de medic. compos. sequentia verba invenio: Odorem deperditum cloaca foetore recipere dicitur, quod ego usu verum comperi. Ne itaque mei experimenti veritatem infringam, forte Moschum tractu temporis exsiccatum ideoque consipatis quodammodo & arctatis porulis atomos odoratas pauculas restant, sicut etiam complexum, raræque emittentem, accedentibus fecibus humidis & volatilibus vaporibus reclusum, & que ideo copiosiori exhalationi aptum fuisse redditum, dicere licebit; cum alias idem hic valere mihi persuadeam, quod *Lindshottanus* notat, Moschum videlicet tempore corruptum, & odoris expertem, utinam pauculis adpersione reviviscere, si modo aliquis vigor subest, ut *Salmuthus* interpretatur. Certè si omnes odoratae molecule avolaverint, superstes corpus essetum nunquam prioris fragrantiae ne minimum etiam gradum recipiet, nisi ab externo aliquo adminiculo novæ denovo in illud inducantur, quæ sanè à volatili isto foetore nunquam sperari debent.

Chimici ut omnis odoris præcipuam originem à sulphure deducunt, ita in specie boni odoris, & consequenter suaveolentiae moschatae causam in purioris sulphuris particulas referunt; quas tamen, si terminis eorum consuetis uti liceat, non sine salis & mercurii connubio esse, aurum, cum eorundem præsentiam & volatilitas & acrimonia abunde ostendant. *Chimicis* ortus suaveolentiae sive odoris aromatici acceptus solet referri sulphuri puriori, ritè ac singulari conventu cum sale ac mercurio misto &c. scribit Exc. D. Herman. Grube Comment. de modo simpl. medicam. facult. cognosc. sect. 3. art. 2. Coniunct. Celeb. D. *Wedelii* Physiol. med. sect. 4. cap. 4. Eiusdem est sententia *Joh. Rudolphi*. Glauberus part. 3. Furn. philosoph. c. 26. Zibethum & Moschum fortè illum gratumque odorem à subtilissimo felium istorum spiritu urinoso (durch der Katzen subtilsten Urin-

Geist acquirere itatuens, quo nempe singularis in corporibus eorum pinguedo digeratur, inque odoratam ejusmodi materiam redigatur. Ut jam erroneam illam de moscho Animali, Catorum familiæ inferentem, persuasionem non reprehendam, num Moschus à pinguedine descendat, solum est tangendum. *Casalpinus* sanè lib. 1. de medic. facult. cap. 13. *Multitudo*, scribit, *exhalationis odorata magis reperitur in pingui substantia* &c. *Moschus & Zibethum non sine pinguedine sunt animalium illa ferentium*, quod & jamdudum *Theophrastus* lib. 9. *Hist. plant.* cap. 1. docuerat, quæcunque nimirum aliquà pinguedine constant, odorata esse, econtra pinguedine carentia sine odore provenire. Licet autem ex pinguedine proprie sic adpellata, tanquam ex materia, Moschum follicularium (ut de altero illo ex ipso Animali corpore elaborato nihil dicam,) generari, neutiquam mihi persuadere queam pingues tamen & unctuosas, variæque alias sanguini partes inesse considerans, easdem compositionem ejus ingredi non penitus negaverim. Quod si sulphur & pinguedo à Chemicis pro uno hic accipiuntur, prout sulphuri pinguedinem, & pinguedini sulphur tribui, non est ignotum, tanto facilis locum pinguedo inveniet. Accedit ipsa natura Moschi, quæ cum bile non parvam convenientiam ostendit, quinimo ex sanguine bilioso *Cl. Nathan Highmore* Exerc. de p. II. *hyst.* cap. 6. generari dicitur, hancque multum oleosi & pinguis in naturali statu continere *Celeberr. D. Franc. de le Boë Sylvius* in primis edocuit. Moschus etiam violentiori ignis examini subiectus, ut alia ex animilibus, oleum quoque foetidum eructat. Hoc itaque sulphur, vel hanc pinguedinem à sale volatili, omnibus animalibus concreto, solutum, cumque eo unctum ac digestionem exaltatum, in odoratum succum converti non est incredibile.

Tandem corpusculari Philosophiæ additi moleculas figuratas mira quadam harmoniâ, uti *Cl. Grubius* loquitur, à natura inter se mixtas adducunt quam *Exc. D. Joh. Ant. Lindanus* Meletem medic. Hipp. part. 1. §. 126. dilucidat, odoratorum effluvium esse halitum quasi sulphureum statuens, qui si suavis existat, corpuscula habeat lævia, utpote quæ organo dum inseruntur, amicabilem se gerant ideoque illud demulceant. Et *Anton. le Grand* *Hist. nat.* part. 2. art. 6. suavem ex Moscho odorem ideo emanare refert, quoniam halitus, qui ab eo proficitur, filamina subtilia & flexibilia habet, quæ facile cerebri appendices penetrant, & absque ulla asperitate se ipsis insinuant, ita tamen ut corpuscula illa sulphure ac sale contineri certum reputet. Diversitatem autem effectuum non solum à movente materia subtili, verum etiam à motorum particularum figura & quantitate sive magnitudine pendere, *Cornelius ab Hoghlande* in *Oeconom. anim.* admonet, unde fiat, ut aliter Moschus, aliter Ambra, aliter Rosa nasum adficiant. Confer. elegantissimus *D. Nebem. Grevii* discursus de natura, caus. & virib. mixtion. *Eph. Cur.* Anno X. additus.

Nec illi sunt prætereundi, qui remotiora tantum principia spectando, in locis, ubi nardus aliæque odoratissimæ plantæ nascuntur, Animal hoc reperiri, illisque pro cibo uti observantes, odorem Moschi præstantem ab illis ipsis rebus aromaticis provenire existimant. Unum omnium loco testem nomino *Joh. Bapt. Portam*, qui *Phythognom.* lib. 2. cap. 8. Moschi cap. eolum herbis odoratis pasci fateretur, spicâ nardi & myrrhâ, obque id sanguinem ejus in umbilico collectum evadere in Moschum; quæ ex *Elluchasem* Tabulis primò esse desumpta, nullus dubito, in quibus Animalia moschifera, in maritimis locis commorantia myrrhâ, remotiora verò loca incolentia spicâ pasci traditur, quamvis quod de Myrrhâ refertur, vix apud me fidem inveniat.

Nonnulli ad occultas qualitates confugiunt, quibus

præcipuè *Andr. Libavium & Sal. Albertum* adnumeros, quorum ille *Singular.* part. 3. lib. 4. cap. 7. *Natura*, inquit, *insita ista proprietas est*: hic verò d. l. *idiosyncrasy* Animalis moschiferi necessario caulis reliquis, temperamento nempe victus bonitati &c. adjungendam esse putat.

Mihi neque absque ullo discrimine cuncta hæc jam prolata admittere libet, neque etiam penitus rejicere, habito nempe respectu tum ad materiam, odoratis illis effluviis emittendis atque constituendis, aptam, tum ad causam, ad tale constituendum opus pro eadem requisitam. Quoad illam, singularem siccitatem, humiditatem, ætheream & igneam particularum mixturam & harmoniam non omnino damnare volo, utpote quas adesse, ipsi sensus nostri, natura & effectus Moschi nobis insculcant, ita tamen, ut earum insufficientiam & obscuritatem nemo non, præconcepitis antiquioribus opinionibus nimium non addictus, t. teri cogatur; quam itaque Chemicis sulphure suo ac sale, nec non Carthesiani atomorum gratâ levitate, evidentiorum haud inani conatu reddere laborarunt, ut itaque Moschum, præter cæteras heterogeneas partes, quatenus nempe est odoratus, moleculis temperatis, sulphureis & salinis, illisque levibus constare tandem concludere queamus.

Neque negandum est, nardum, aliaque vegetabilia, sive actu ipso odoratas exhibeant particulas, sive potentia tantum tales contineant, ventriculi demum aliorumque viscerum digestionem vel fermentationem evolvendas & in actum deducendas, in Moschi odore augmentando aliquod conferre posse momentum, odoratas nempe atomos suas moschatis jungendo, vel in moschatis transmutandas suppeditando. Prout sanè alimenta magnam in corporibus animalium alterandis potestatem habere, nemo, qui vel à limine æconom. in animalem contemplatus fuit dubitare potest. *Compertum est idiotis omnibus animalium carnes mirabiliter mutare colorem, odorem, saporem, consistentiam, gratiam, bonitatem, pro alimentorum, quibus vescuntur, naturæ varietate.* Nam calidiores, frigidiores: duriores, molliores: densiores, laxiores: suaviores, insuaviores: salubrioris, insalubrioris minusve incoctibiles, & ad nutrimentum habiles: pro passionis diversitate effici, ita notum est, ut neminem id latere & quæ plura habet *Thom. Erastus* de Auro potab. Et memorari in primis meretur, quod *Exc. Medicus Tigrinus, D. Joh. de Muraltio*, non ita pridem per literas mihi recensuit, vaccas nempe & capras in Alpibus Helvetiorum. Muttelinam Pastorum, sive Meum alpinum umbellâ purpurascens *Cl. Casp. Bauhin*, edentes, non saltem butyrum sed & carnes styracis instar fragrantis præbere; Confer. ejusdem *Bauhini* addit. ad *Matthioli Dioscoridem* lib. 1. cap. 3. & *Conr. Gesneri* hort. German. Quamvis soli pabulo fragrantiam hanc Moschi non esse adscribendam, *Libavium & Albertus* sufficienter demonstraverint. Ut in specie non urgeam, de spicâ nardi & behmeni pastu relationem non planè extra omnem dubium esse positam, quas sanè plantas in omnibus illis regionibus provenire, quæ Capiteolos moschiferos alunt, adhuc probandum esset. Imò & aliis plantis inodoris eisdem inhiare, *Tavernierianæ* relationi debemus, quæ eos fame pressos tritici & oryza novam legem depascere constat, & supra jam cap. 9. perceptus.

Causam vero materiam hanc odoratam reddens, calor potest constitui. Præterquam enim quod idem generatas jam & explicatas odoratas particulas movendo & agitando ad exhalationem impellit, easdem etiam, antea cum reliquis mixti crudioribus, fixioribus & figentibus particulis connexas, in libertatem ac volatilitatem adserit. Isque est potissimum, quem internum vocant, ab externo tamen adjutus, quandoque & in actum deductus, qui coquendo, digerendo, alterando, odoratasque particulas à cæteris separando

& extricando, officio suo defungitur; non quod fœtida quævis imperfectam coctionem designare, cum quibuldā, autumem, cum v. g. Asa fœtida, Opium, ingrato odore imbuta, interno igne illo coquente quæ maxime abundant, externo etiam calore in calidioribus utpote regionibus provenientia, nullo modo careant, & naturalis ac propria cujusque rei perfectio, quæ tam suaveolentiam, quàm *acropius*, fœtorem & graveolentiam complectitur, finis sit perfectæ concoctionis. Iste autem calor non tantum mitis & temperatus, sed & maximus interdum ut sit, requiritur, prout nempe materia magis minusve resistit, & ad emittendas particulas odoríferas disponitur. Moschum tamen maximo calore indigere vix credo, quem temperatus potius & blandus generare valebit, neque enim ipsi Moschi substantia maximum calorem, si gustu & c. expendatur, ostendit, neque etiam folliculi situs & conformatio tam fœvdi temperamenti suspensionem præbent, quæ potius blando fortè digerendo operam tuam promittunt. Quod & in aliis Moschi speciebus, putrefactione imprimis productis, observatur, putredinem enim absque caloris interventu dari, nemini unquam in mentem venisse puto, quæ tamen quæ ratione hic concurrat, superius jam ostensum fuit. Quod si calorem quoque externum spectare libet, non aëre tantum sub calido ori, sed & temperato Animal nostrum repetiticonitat, provinciis Sinicis: Yunnan & Xensi illud confirmantibus, istam enim, Linææ æquinoctiali vicinam, præ reliquis Provinciis longè calidiori, hanc suavi mitique aëris temperie gaudere, constat, quo de v. g. videndus *O. Dapperus* in descript. regni Sinici.

At etiam hæc omnia ita sese habeant, nihilominus intellectui nostro occulti quid subesse, tandem dicere haudquaquam vereor. Licet enim istis occultarum qualitatum, quas sibi nonnulli olim finxerunt, tenebris immergere me non laborem, revera tamen aliud adhuc præter, jam dicta, superest, quod nec Peripateticorum elementa, nec Chemicorum sulphur, nec Corpusculatis hypothesi hæctenus satis explicuerunt; idque est ipse odor moschatæ proprius, quo talem suavitatem, nec aliam fragrantiam aliquam, qualem Ambra, Zibethum & c. impressionem organo odoratorio exhibet; quod interea, usque dum commodius aliud suggeratur, seminale principium, specificam virtutem & potestatem, à Summo rerum Creatore impressam, vocare lubescit. Quod cum non minus obsecrum sit & intellectu non satis comprehendendi queat, præstabit tamen, humani ingenue fateri, quàm manifesta, sine omni luce, crepando, culpam quamcumque incurere.

De Moschi adversatione.

Cum in Cap. præcedente vitam Moschi in odore ejus consistere, dictum fuerit, & revera potiores ejus virtutes hinc descendant, quidquid ablationem & mortem ejusdem minatur, studiose cavendum esse, sponte elucescit. Unde etiam de commodo cum adservandi modo nunc quædam subjicienda veniunt, ne præstantis medicaminis & odoramenti loco depravatam, evanidum aut languidum concretum emergat. Idque non tantum hanc ob rationem, nec sc. aëri libero, in perpetuo motu constituto, negligenter expositus continuam subinde molecularum odoratarum exhalationem patiatur & languescat, sed &, quod negligentius custodit alieni quoque odoris molecularæ, non sine nativæ aliquo detrimento, sese adloccent, id quod à lavendulæ oleo ipsi accidere, *Perr. Andr. Matthioli* Comm. in Diosc. lib. 1. cap. 6. & *Anton. Mizaldus* in Alexikep. camp. 3. aræ 11. tradunt, tum quoque liberius ita exhalando, vicina quæ sunt ex Simplicibus aliis vasibus & uterilibus, quod inficiat, non sine rædio & noxa illorum, qui

suaveolentia ista averfantur, ceu plerumque ex mulieribus hystericae sunt, ex vitis, qui debile cerebrum habent. Unde accidit quandoque, ut quidquid ex pharmacopolio adlatum est, ægroti nauseent, quia, uti aiunt, *Sorobus* & c. juxta *Libanum* l. c. vel aliud peticulum incurrant, quale strangulationis uterinæ perpessa fuit Venetiis Nobilis quædam à Siupo, manibus odore Moschi & Ambra fragrantibus parato, apud *Vist. Trincavellum* de compos. medic. lib. 2. c. 3. Quare provide satis in *Statutis Medic. & Pharmaceut. Passav.* Anno 1586. edit. §. 12. Pharmacopœis injungitur, ut Moschum & c. separatim & sedulo adservent, non alia inter medicamenta repositum.

Idem tamen adversandi modus non omnibus probatur. *Haly Abbas* Pract. lib. 2. cap. 57. medicamenta jucundi odoris in vasibus argenteis, aut vitreis, quorum capita diligenter obturanda, adservare præcipit. *Saladinus de Asculo* in compend. aromatarior. omnes Species aromaticas in valis aureis, vel argenteis deauratis, aut in porcellanis, vitreis conservandas esse inculcat. Vitreum vas, spissum sive densum & cerâ diligenter oblitum, vel potius plumbeum, ut frigidâ & humidâ hujus metalli qualitate eo magis salvus persistat, eligit, vel saltem duo aut tria plumbi frusta adponi jubet, & quominus odore suo spoliatur, cavendum esse monet *Platearius*, ne quid aromaticum addatur. Pyxidum quoque plumbeum *Alex. Benedictus*, eamque cerâ oblitatam *Fuchsius, Sylvius, & Weckerus* commendat. Ad hoc ipsum pariter respexit *Henr. Smerius* lib. 9. Miscell. medic. pag. 466. dum pixidulam plumbeam huic conservationi optimam judicavit, quia sit materia non tantum frigida, sed & densa, & quæ contenta non nimis exsiccati permittit, quæ nempe exsiccatione non exigua effluviis odoratorum deperditio contingeret. Plumbeorum econtra vasculorum usum *Libani* prolixâ disputatione rejicit, cujus ipse compendium his verbis proponit: *Si moschus debet cerebrum & cor defendere, rectius in pyxide ex auro, argentoque seu electro & succino conservabitur, quam in plumbo, quod hydrargyri similes halitus expirans, cor cerebrumque offendit.* Verum inanis hic adesse metus videtur. Licet enim plumbeos halitus ab omni noxa esse exemptos, minime adstruam, eisdem tamen, nisi vehementer calore plumbum liqueatur, & liquefactione hac poruli ejus aperiantur, spirituosæque noxiæ particulae una expellantur, neutiquam emittit. Neque tamen supersticiosos adeo nos esse decet, ut Moschum necessario in plumbeum talem carcerem (de addendis plumbi frustulis, ceu plane superfluis, ut taceam,) esse detruendum credamus, cum & alia ex materia elaborata vascula seopo eidem optime inserviant modo ita comparata sint, ut nec porosa admodum effluviis moschatorum nimium in se recipiunt, eumque ita sensim depascantur, nec proprias particulas eidem communicent. Hinc neque argentea, euprea, ferrea, si minima quævis curare animus est, pro recondendo Moscho electissimo probare admodum possum, metu, ne humidæ, acres, quodammodo & urinosæ Moschi particulae substantiam eorundem corrodendo, atque æruginem dein vel rubiginem ipso Moscho adfricando, qualemcumque labem & impuritatem imprimant. Aurea vero reconditoria ad pompam magis, quàm necessitatem faciunt; Cui tamen facultates suppetunt, pretioso thesauro pretiosum tale adaptate receptaculum, per me esse liberum. Majorem tamen inde in corde roborando sibi ne spondeat efficaciam, quæ ne hilum quidem ei cederet alius, in vilissimo etiam plumbeo adversatus Moschus. Vitrea quoque divinum, pauperiorumque facultates non despiciunt, si pura sint, officio non usque adeo ampla donata, cerâ diligenter oblitumata, vesicâ & charta constricta, inque locum ab aëre calidiori, humidiori vel liberiori, àque ventis satis alienum reposita. Sed cur *Platearius*, aromaticis quid ne addatur, vel ne cum aromatico servetur, cavendum esse

monuerit, causam subjungit, quia aromaticitatem suam amitteret, id quod in *Quirici de Augustis Lumin. Apothec. distinct. 1. descript. 19* vel, qui sub *Theaur. Aromaticar.* similem librum iisdem penè verbis edidit, apud *Paul. Suardum* etiam ex eo monitum invenimus, quasi scilicet vim suam & odorem amitteret, si cum speciebus aromaticis conservaretur, recuperandum, si in cloacam ponatur. Licet autem aliorum Aromaticum viciniam & contactum Moschi odorem auferre, nemo facile concesserit, eidem tamen aromaticas alias atomos commisceri, sicque genuinum obtundere quodammodo, haud est negandum, ut ita vel hoc intuitu separatim instituta ejus reposicio attendi utique mereatur. Nec simpliciter negaverim, eum peregrino tali odore imbutum, in cloaca odorem suum proprium recuperare, vel potius denuo purum exhalare, avolantibus nempe in aëre liberiore & ampliori heterogeneis aromaticum moleculis, quæ superficiei tantum Moschi substantiæ adhæserant, quibus idcirco evanescentibus, alius radicata moschata atomi nates dein solæ iterum subeunt, ita tamen, ut Moschus una cum aromaticarum cæterarum fugâ propriarum etiam non exiguam jacturam perpetiatur.

Cæterum Moschum suo adhuc folliculo inclusum melius servari, quod præfati *Quiricus de Augustis*, nec non *Paulus Suardus* volunt, non est dubium, modò ipse etiam folliculus alio in vase, plumbeo &c. abcondatur, cum solus alias odoris effluvium cavere sufficeret.

Quamdiu verò absque virtutis suæ odoriferæ deperditione servari queat Moschus, si *Hieron. Cardanum* de rerum variet. lib. 17. cap. 97. consulamus, centum annos eundem durare, percipimus. Quamvis alii terminum hunc ad decennium saltem contrinxerint. Mihi hac in re nihil certi definire libet, aut licet. Eriam si in vase probe occluso, & ab omni aëris atque caloris accessu, qui odoratas particulas in motum concitare & expellere queant, si conservetur, plurimorum annorum ætatem sustinere posse, nullus ambigam. Ut itaque generali *Renodæi* decisione præstet adquiescere, quæ medicamenta, tam simplicia quam composita, sedulo ferventur, diutius durare: si negligenter, celerius senescere edixerat.

De Incommodis Moschi.

Difficillimum esse, invenire remedium, quod citra ullam læsionem & noxam magnifice proficit, jam olim *Galenus* 11. Meth. Med. cap. 12. pronunciaverat. Vel ut *Ovidius* lib. 1. Trist. eleganter expresserat:

Nil prodest, quod non laedere possit idem.

Eripit interdum, modò dat Medicina salutem.

Idque sua etiam ex parte esse verissimum, ipse pariter Moschus sufficienter ostendit, cujus immensas virtutes licet omnis deprædicet Orbis, salutaris tamen omnibus medicina nequaquam existit. Quapropter de incommodis, usum ejus haud rarò insequentibus, pauca quædam prælibare necesse erit, quo prudenter eodem esse utendum elucescat.

Antequam verò id adgrediar, principio *Franc. Perlam.* Odoramentorum noxam in genere proponentem, audire juvat. Sic enim adnot. 8. Propuls. phys. oppugn. Steph. de Gasp. de Opobals. Odores, scribit, non modò quidquid prosunt, sed si quid præterea obsunt, id ratione subiecti est, exhalationum nempe, quæ aut nimis copiosæ sunt, aut nimis calidæ & renues; nam copiam quidem caput implent, ejusque membranas distendunt, calore alterant & accendunt, vehementique refluxum partium appulsu irritant; ex quo sternutamenta commovent, excitantque dolores à distensione atque intemperie, & ad deliria usque interdum compellunt. Non admodum dissimile de Moscho feren-

dum est judicium. Ut itaque odoriferæ ejus atomi, quæ pollent tenuitate, vel, ceu Moderni loqui amant, volatilitate, eaque non simplici salvi volatili urinoso, sed & sulphureo quam maxime explicato atque activo adscribendæ, non sanguinem tantum biliosum in effervescentiam prorum, spiritusque agitent, & magis accendant, sed & tenuiores alios vitiosos humores in opprobrium ciant, à quibus dein variorum symptomatum ortus est pertimescendus.

In specie calidum offendere caput ac dolorem excitare, *Ebn Rasai*, vulgò *Rhasis*, *Sim. Serhi*, *Jac. Sylvii* aliorumque est opinio. Unde etiam cephalalgia inter causas Moschi &c. suavi odore alteratus aër sapius à Medicis nominari solet, cujus specimen habemus in *Celeber. D. Guern. Rolsincii* lib. 2. de dolor. cap. sect. 2. art. 1. part. 1. c. 25. Quò ideo nonnulli referunt aphorismum 18. *Hippocratis* sect. 5. aromaticum suffitum, sive ut quidam interpretantur, aromaticum odorem *καρυφάειον* inducere innuentem; & *Galenus* clarè in lib. de arte Med. cap. 14. de calidi cerebri signis agens, calidis cibis, potibus & odoribus caput impleri & gravari scribit. Quod imprimis in biliosis ac cerebro imbecillo præditis contingere *Joh. Fernelius* lib. 5. Meth. Med. cap. 21. atque moschatum odorem vehementiam suam & copia caput offendere *Joh. Placotomus* pag. 15. Pharmacop. monuit. Non secus ac *Strabo* lib. 16. in Arabia felice eam odorum circumfluere copiam refert, ut fastidium & *καρυφάειον* inferat incolis Sabæis odoris adfudit. Quo intuitu hic quoque illud: Omne sensibile excellens lædere sensus, valere judicat *Exc. D. Wedelius* de Medicam. comp. exemptor. sect. 3. cap. 5. Interdum tamen & absque copia ista eandem læsionem inducit, si debile caput intravetit, & sanguinem biliosum vel molestem admodum, spiritusque, facile irritabiles offenderit, qualis constitutionis fuit Generosus ille sexagenario major, qui ex Moschi &c. vel levi etiam odore statim de capitis dolore, non sine narium hæmorrhagia leniendo, conquerebatur, apud *Nathana. Highmorum* diff. cit. Et *Rob. Boyle*, hominem egregium, firmæ, sed perquam sanguineæ temperiei se novisse cap. 6. de insigni effic. effluv. scribit, qui violentos ex odore Moschi percipiat dolores, eundem ad functiones subeundas aliquo modo ineptum reddentes. Ipse quoque *Pictorem* satis egregium, narium tamen capitis debilitate laborantem, ejusdem mox dolore, non sine lipothymia præludiis, correptum vidi, cum vix vel levem moschifici folliculi, aquis antea immacerati, odorem haussisset, ut ita absque mora eundem denuo recondere delineationemque, huic Operi destinatam, ab alio deposcere cogeret. Ubi sane cerebrum fragrantia moschatæ minus adfuetum impressionem odoratarum atomorum eò promptius persentiet. Quale insuetudinis nocivæ exemplum habet *Auger. Gislén. Busbequius* epist. 1. *Narcissus* & *Hyacinthis* abundare Græciam, miro fragrantibus odore, referens, sic ut, cum multi sint, odorum hujusmodi insuetis caput offendant. Hinc & adfuetis odoribus foetidis haud difficulter quandoque curantur, qui saavibus penè fuerant enecti, quales depingunt. *Levin. Lemnius* lib. 2. de occ. nat. mir. cap. 6. *Henr. Smetius* lib. 12. Miscell. Medic. epist. 6. *Zacutus Lusit.* lib. 3. Prax. admir. obs. 99. *Philip. Salmuth* cent. 3. obs. Med. 71. & *Pet. Borellus* cent. 3. obs. Med. phys. 70.

Ex eodem fonte oritur, quòd Moschus catarrhos facit, citare dicatur. Unde odoramentorum usum frequentissimum dissuadet *Dominic. Leonus* Art. Med. sect. 2. lib. 3. cap. 4. ne læso cerebro catarrhus excitetur. Nobiliss. quoque *Henr. Ranzovius* cap. 4. de conserv. valet. odores nimis calidos improbat quia caput repleant & catarrhum generent. Quam repletionem à Moscho induci, credidit *Sanctor. Sanctorius* Comm. in art. Med. Gal. quæst. 57. tum per se, exhalatione scilicet calidâ corporis, tum per accidens, quatenus cerebrum ratione caloris

caloris, nova attrahat excrementa. Quamvis nec corporea illa repletio magni adeo momenti esse queat, cum paucis sæpe minimisque exhalatio ista constet corpusculis, nec excrementorum attractio probari admodum possit, quam fusionem humorum potius adpellabimus, prout Cl. *Dan. Sennertus* lib. 1. Medic. pract. part. 1. cap. 10. res vehementer odoratas itidem caput replendo, atque humores fundendo nocere statuit.

Atque causæ huic paralytica quoque affectio & tremor adscribi possunt, quibus unguentarios esse obnoxios, *Guil. Rondeletius* Meth. cur. morb. lib. 1. cap. 23. advertit, ob Moschi nempe & Ambra, vel aliorum odoratorum continuum usum, cerebri & nervorum substantiam, uti is loquitur, exsolventium.

Quam humorum à Moscho &c. fusionem etiam in Septentrionalibus populis, & frigidis regiones qui incolunt, agnoscit *Casp. à Rejes* Elys. jucund. quæst. camp. quæst. 84. quorum corpora esse corpulentiora, humidiora, & excrementosis cruditatibus referta putat, unde ab Aromatum sumtorum vel odoratorum calore crudillius & excrementitii humores attenuentur, agitentur & conturbentur, motique vapores crassos excitent, vertiginem & animi deliquia inducentes.

Et talis vertiginosa affectio atque *καρῖα* Hippocratica non admodum distat ab ebrietate, quâ nempe, uti *Juvialis* satyr. 6. canit:

vertigine tectum

ambulat, & geminis exsurgit mensa lucernis.

Non mirum itaque, quod *καρῖα* excitare Moschus dicatur *Libanio*. Postquam enim ejus & Ambra odorem fortorem caput gravare perhibuisset, subjungit: *Ideo inebriantur cito, qui super ambra & moscho bibunt, vel ex vasis ambra & moschum olentibus.* Modicum etiam Galia moschata in vino posita suaviter inebriare, *Guilelm. Gratarolus* cap. 4. de vino prodidit, aut ut *Porta* Mag. natur. lib. 14. cap. 12. loquitur: *Moschum in vinum adauum ebrietatem exasperat.* Spirituosa quippe spirituosius juncta, caput dum ascendunt, citius replent feruntque, & sanguinem plus justo rarefaciendo vaporesque excitando, tum in reliquo corpore, tum in capite cumprimis turbare valent omnia, ac spiritus animales modò inordinatos in motus & confusiones compellunt, modò halituum è sanguinea massa elevatorum blandiorum copia quasi obruunt, & ad quietem componunt. Ut ideo narcoticum aliquod sulphur vel potestatem aliam in Moscho fingere, nequidquam opus sit. De Ambra eundem effectum præstante vid. *Exc. D. Just. Fid. Klobii* histor. de ambr. quæst. 2.

Epilepsiam porro producere in nonnullis, quosundam est sententia. Sic *Joseph. Quercetanus* frequentissime experientia didicisse tract. Terr. graviss. capit. effect. cap. 18. de epilepsia agens testatur, ejusmodi calefacientibus & odoratis remediis auctos potius & excitatos fuisse hos affectus, quam imminutos aut superatos. Causam quoque in eo sitam esse suspicatur, quod Moschus & similia odorata sint *καρῖα* sive caput gravantia, & cerebrum opplentia, causasque plethoricas augmentia. Licet verò rationem hanc non omnino rejiciendam putem, insufficientem tamen esse, quilibet judicabit, si epilepsiam non à simplici inanitione vel repletionem omni posse consideraverit, cum necesse sit, & aliam aliquam irritantem causam una addesse; quam itaque hoc in casu sanguini bilioso, à moschatis atomis in fervorem acto & quasi excitato, suæque dein acedine, ab ipsis Moschi sulphureis particulis accedentibus adaucta, nervorum genus debile & ad epilepticas convulsiones jam antea primum irritanti adscribere præstat. Quin & immediato contactu suo nervis odoratoriis sese innuantes illæ Moschi particulae, non omni, uti dictum, acedine destitutæ, membranosas maximeque sensiles partes cerebri pungere, ut & intemperatos animales spiritus in motus irregulares compellere valent.

De lypothymia Moschi odori adscribenda paulò superius jam actum fuit; & quilibet etiam sibi imaginari effectum illum poterit, si non tantum vim ejus in rarefaciendo sanguine, sed & biliosis ejus particulis exacuendis ruminaverit, quæ nempe in animi deliquio producendo non minus locum habere Celeb. *D. Franc. de le Boë Sylvius* lib. 1. Prax. Med. cap. 35. imprimis edocuit.

Huc commodè utri sic dictam suffocationem referemus, quam si non ipsam esse synopen, saltem haud multum ab eadem distare, Viri quidam doctissimi ostendere conati fuerunt. In quo uti plenum merentur adsentium, ita ab utero tamen symptomata illa horrenda, in morbo isto occurrentia, & speciatim suffocationis metum quandoque sumere originem: ideoque utrinam cognominari tunc posse, haud absolum videtur. Non secus ac alii quoque affectus: epilepsia, cephalalgia &c. uterina adpellari solent. Quâ verò ratione symptoma hoc à Moschi aliorumve suavi odore navibus haurito inducatur, plurimæ passim adferuntur opiniones, multis utrum singulari quadam proprietate & sympathia eodem delectari, & eapropter ad jucunditatem itam plenius percipiendam furtim moveri atque ascendere, statuentibus, aliis verò in uterum male affectum culpam referentibus, ita ut caput ab odore percussum, uterum in consensum trahat perturbet, & humores praves in eo agite, vaporesque inde suscite, aut etiam vasorum obstructions augeat, aliis autem aliter sentientibus, quæ tamen cuncta adducere, aut quid in eis placere queat ostendere, nimis prolixitatis culpam hoc in loco incurteret. Mihi præ omnibus ingeniosa Cl. *Nath. Highmori* sententia hic probatur, sanguinis tenuioris, setosi & flatuosi, in feminis præcipue choleicis, ebullitionem ac fermentationem, à Moschi tenuioribus, biliosis & igneis particulis admixtis concitatam, ejusdem in pulmonibus stagnationem, vasorumque distentionem & infarctionem, ac consequenter suffocationis periculum inducere, innuens; quam ipsam sanguinis rarefactionem & commotionem, spirituum quoque animalium à tenuissimis Moschi effluvis agitatorum impetuosior in illum insinuatō & commixtio insigniter valet intendere; à qua etiam turgescientium spirituum influentia fibras nervosas, & in specie cordis, multum distendi, contrahi, & sanguinem vehementius in arterias & pulmones propellere, aut etiam ob inordinatum & furiosum quasi adventum in motus irregulares ac convulsivos, ex *Willisii* doctrina concitare possunt. Quam creberrime autem affectus iste à moschato odore soleat descendere, vel aniculis passim notum est. Memorari tamen meretur, quod *Relationes* sive *Novellæ* quæ ita vocamus publicæ A. 1667. Mens. Februatio indicant, Antverpiæ nempe trium vel quatuor mensium spatio puerperarum plus quam 120. ob sacchari usum cui Moschus admixtus, vel saltem adpositus fuerat, Libitinæ censum ingressas fuisse, quod numverum sit, meum non est judicare, qui multis sæpe fabulis tales Novellas conspersas esse novi; saltem tamen non est impossibile, præsertim cum Antverpianas feminas magis, quam alias, eundem averfari, *Casp. à Rejes* l. c. testetur. Et cum majori feminarum numero noxam hanc odor ille minuetur, rarissime, imò nunquam Medicus eundem medicamenti conciliat, nisi probe ipsi prius, hanc illamve ab eo minime lædè confiterit.

Ab usu etiam moschatorum, uti conf. alkerin. in dispositis non minus ac à melle, nasturtio &c. pollutionem nocturnam certo aborsiri, monuit in literis ad me scriptis Celeber. *D. Wedelius* noster, sero in *opyari* inde magis concitato, hujusque hinc flori, semini, causam tribuens.

In hamorrhagia insuper qualibet, ubi sanguis sisti debet

Moschum fugiendum *Wolff. Höferus* lib. 2. Hercul. med. cap. 3. admonet vehementiâ odoris, tenuitateque eximiâ sanguinis fluxum adaugentibus. Oculum huc dixerit *Hieron. Mercurialis* lib. 1. de comp. medic. cap. 15. dum Moschum, omnium corporum odoratissimum; venenum esse existimat, si ut medicamentum intus capiatur, hac adductus ratione, quod sincerus naribus adpositus statim proluciat sanguinem, hinc & interne vi quadam insigni, quâ pollet in aperiendis vasis, ob tenuitatem & acrimoniam substantiæ, pariter sanguinis exitum esset procuraturus Cui adstipulari videtur *Paracelsus*, lib. 2. de Tartar. cap. 3. in Comment. omnia, quæ generantur ex elementis, spiritum in se habere mineralem, suo more scribens, qui sit venenum: *sicut anthos, musus &c. non tam nobilis, qui non in se etiam habet venenum: nam bonum & malum conjuncta sunt in omnibus rebus, quas produciunt elementa.* Quod & *Helmontius* tract. Pharmac. ac Dispensat. modern. §. 44. confirmat, vix aliquid immune Naturam habere scribens, quod suum toxicum sibi clanculum admistum non habeat, ipsasque rosas & violas sub tanta odoris fragrantia veneni contagia occultare. Quamvis nihil in rerum natura dari, sponte concedatur, quod, juxta cum salutari effectu, nocere nequeat, ob id ipsum tamen venenum mox adpellate, nimium reputo, nisi quàm latissime nomen id acceperis. Non habet Moschus in se venenum, nisi eodem tu abusus fueris. Virgulam ideo censoriam *Joh. Domin. Sala* lib. de aliment. cap. 17. sustinere coactus fuit *Mercurialis*, quâ divites & delitiosi homines cibi ac potui Moschum innoxie, Medici etiam cordialibus medicamentis cum fructu miscentes opponuntur. Imò exterius tam facile & frequenter hæmorrhagiam excitare, *Sala* rectè pernegat. Et *Casp. à Rajes* l. c. mala illa forsitan causare potuisse respondet, nisi assumpti vis in corpore statim frangeretur, aut major justo illius quantitas sumpta fuisset; *Sed*, pergit idem, quando in minima datur, idè minus offendit, & viros tamen præstat effectus, quia in exigua licet portione maximam obinet efficaciam.

Porro ob ejus odorem in tabem sive corporis extensionem quosdam incidisse, scribit *Joh. Guintherius Andernacensis* de medic. vet. & nov. comment. 2. dial. 5. Quod à frequentiori usu, præcipuè in habitu corporis ad caliditatem & siccitatem naturâ inclinante, contingere posset, virtute nempe ejus calefaciente atque siccante toridas corporis partes depascente, sicque tandem ad marcorem deducente.

Pallore etiam corpus inficere, ex *Sim. Sethi* relatione habetur. Causam verò *Sal. Albertus* reddere conatur, quod videlicet sanguinem adurendo, ulteriorem bilis in corpore proventum acceleret, à qua corpus lurido postea colore offundatur. Quam tamen biliosarum partium in sanguine evolutionem vel augmentum colorem istum esse daturum, non, nisi copiosior usus & in corpore bilioso accedat, est credibile. Nec admodum probare possum *Joh. Bapt. Porta* lib. 3. Phytognom. cap. 4. sententiam, dum flavi coloris plantas in alimentum assumptas flavam bilem augere, icterum inducere, & membra decolorare, scribens, Moschum, utpote qui colore est subflavus, membra utentium pallore decolorare, simul notat. Signaturas etenim illas adeo certas, aut tincturam Moschi flavam tam constantem esse, persuadere mihi nequeo, cum illæ in utr. mque sæpe partem inclinent, ita ut tam bonum, quàm malum effectum exin imaginari sibi quis valeat, hæc autem à tot digestionibus in corpore subeundis pariter immutari diversimodè queat.

Quapropter cautum & cautum in rebus, odore ejusmodi quæ sunt imbutæ, exhibendis decet Medicum, ne malum malo adgraver, & leviori ex morbo periculosiorem, vel ex periculoso letalem omnino efficiat. Quem in finem etiam Sirupum de cortici-

bus citri, Confectiones, Species aromaticas &c. tam completas, quàm incompletas, id est cum, & sine Moscho paratas bene constituta Pharmacopolia exhibent, id quod in specie *Augustani* mei, in gratiam inprimis mulierum hysterice passionibus obnoxiorum, class. 11. Pharmacop. cap. de Aromat. Caryoph. Mes. diligenter adnotarunt. Nec inutile est *Guil. Rondeletii* Pharmac. offic. hac in parte datum consilium, quo in multis compositionibus odorata ejusmodi auferenda censet, quia in multis morbis, uti adfectibus uterinis, qui per consensum fiunt, dolore nempe capitis, epilepsia, vertigine & scotomate, non conveniant, tum quia ægri odoratis offendantur, tum remedium pretium intendant; Medicus autem si imperet, facile ista addi à pharmacopola possint.

Et ita de Moschi usu in certis subjectis vitando cautela omnium optimam suppeditat ejusdem correctio nem, atque ne noceat, præservationem, ut istâ non indigeamus animadversione, quæ in libello *Ebn Sina* adscripto, de medicam. cordial. tr. 2. habetur, caliditatem nempe ejus cum camphora, & siccitatem cum oleis humidis, violaceo, rosaceo &c. reprimi. Ut taceam, frigidam in Camphora creditam qualitatem esse commentitiam, jam dudum penitus explosam, Moschi autem siccitatem tantam non esse quæ correctionem deposceret, neque in parva, quæ in usum trahi solet, dosi quidquam nocere posse.

De horum autem incommodorum omnium curatione speciatim agere, longius à scopo meo esset positum, quam unusquisque, si causam istorum perpenderit, absque magna difficultate deprehenderet. Temperatis itaque, vel etiam fortididis, narcoticâ virtute aliquantulum præditis odoribus, qualibus ad gravedinem, à florum & fructuum fragrantia contractam, ex alphalto & tragopogone, vel potius barbæ hircinæ pilis Sabæos fuisse usos, *Srrabo* auctor est dum scribit: *Καὶ μὲν οὖν ἐν τῷ τῶν ἐνδοκίων, ἀπὸ τοῦ τῶν ἰσχυρῶν ἀσφαλτῶν διπλάσιον, καὶ τῶν τῶν ἰσχυρῶν: ubi fragrantia eorum induxit, bituminis sufficit & hirci barbâ eum abigunt, aliisque remediis fervorem sanguinis compescere, spiritus fetoces in ordinem redigere, & si quæ vitiosorum humorum abundantia, fluxusve ad hanc illamve partem contigerit, eosdem educere, conveniet.*

De Moschi virtute alexipharmaca.

Medicas inter virtutes, quibus Moschum esse donatam creditur, alexipharmacam primo recensere loco libet, quem nempe Arabum ille Princeps, *Ebn Sina*, antidotum adversus venena, vel ex eo *Christoph. Georg. de Honestis* super Antidot. Mes. theriacam venenorum adpellat. Quo etiam nomine à *Johan. Georg. Macasio* Prompt. Mat. Med. lib. 2. sect. 10. cap. 1. aliisque Alexipharmacorum generalium in catalogo fuit collocatus. Id quod de interno ejus potissimum usu prædicare videntur, de externo tamen & alii similia testantur. Hinc *Ranzovius* cap. 48. de conserv. valet. *Quidam ferunt*, scribit, *ambram, muscum, vel lapidem busonii gestantes à venenis tutos præstare.* Quod encomium num Moscho jure imponatur, ne credulitate nimia errori patrocinari videar, nunc merito disquiritur. Quamvis autem diffiteri nequeam, cum Excellent. *Dom. Simone Pauli* class. 4. Quadrupart. botan. cap. de coriandr. ab omnibus Autoribus, qui de venenis commentati sunt; veram & accuratam definitionem veneni hucusque me desiderare, & ideo non minus ejusdem etiam remedium sive alexiterium eadem obsecritate involvi necesse sit, si tamen communiori loquendi modo venenum omne id vocare libuerit, quod peculiari facultate cordi est infensum ac deleterium, Moschum alexipharmacâ naturâ esse præditum, non omnino negari posset, cum eandem cordi &

spiri-

spiritibus ejus quàm maximè gratum, amicum & salutare esse, nemo non fateatur, ideoque ista cum corde & spiritibus sympathia, tutela atque medela, irruentes in illud qualescunque noxivas turmas abigere posse videatur. At cum venenorum maxima in effectu sit diuersentia, ut modò figendo, modò resolvendo, corrodingo &c. partes vel humidiores, vel solidiores vel spirituosas destruendo ac corrumpendo, operationes suas peragant, omnibus istis vitæ nostræ hostibus efficaciter resistere posse Moschum, nemo, qui rem accuratius expendit, facile persuadere sibi poterat.

Hinc etiam, si cum *Ebn Sina* lib. 3. tract. 1. cap. 4. illud alexipharmacum esse remedium diceremus, quod ex sua proprietate conservat sanitatem & virtutem in spiritu, ut veneni noxam à se repellat, facilius rem confiteretur. At *Cl. Sennerti* hic unique prævalet decisio lib. 6. Medic. pract. part. 5. cap. 6. Cordialia nempe omnia in morbis venenatis esse utilia, quia corroborant, ut veneno fortius resistere possit, ipsum tamen venenum non adeo expugnare, sicut alexipharmaca propriè dicta, istoque respectu ipsum quoque Moschum in morbis venenatis curandis utilem esse posse, ibidem concedit.

Generale itaque propriè cum non sit Alexipharmacum, an aliquibus tamen venenorum speciebus, seu adpropinata Antidotus, opponi queat, nunc pariter investigabimus.

Ubi inprimis immatissimum Napelli venenum singulari quadam proprietate profligare, cum *Ebn Sina* pluri testantur, dummodo tempestive adhibeatur. Quàm sæva autem napellus excitet symptomata, curationemque reddat difficilem, passim in Libris recensetur. Sed determinare, in quo venenum ejus propriè consistat, meum superat ingenium. Tenuissimæ quidem inherere substantiæ, quæ etiam leviculâ in apice linguæ degustatione, seu *Helmontio* contigit, (Vid. tr. Dæmonis Idea §. 12.) vel solo odore, juxta *Nob. D. Joh. C. org. Greifselum* in Ephem. Germ. Curios. Ann. II. obs. 78 umbrâ secundum *R. P. D. Athan. Kircherum* in Mund. subterr. lib. 9. sect. 2. c. 2. & lib. 4. Latii antiq. & nov. part. 2. c. 6. vel contactu nocet, ex relatione *D. Paterfoni Hunii* Ann. III. dd. Ephemer. obs. 233. & *Petr. Andr. Matthioli* Comm. in lib. 4. Diosc. cap. 73. extra controversiam esse puto, quæ non sine generis nervosi noxa, magnam in sanguine & spiritibus agitationem vel fermentationem, imò destructionem, atque ab hisce laborum, linguæ & totius faciei intumesceniam, oculorum prominentiam, syncopen, cordis compressionem, partium tremorem, horrorem, vertiginem, lethargum, aliaque symptomata, pro subjecti scilicet, cujus interitum molitur, inprimis diversitate, efficiat. At cujus naturæ sit subtilissimus ille virosus spiritus, in tam parva etiam mole tam magnam, quale corpus humanum est, molem, & brevissimo quidem temporis spatio perfundans, quis nobis sufficienter explicabit? Certè nec sola caliditas, nec etiam salino-alkalica volatilitas rem sufficienter expedient. Symbolum quidem addere aliquale possunt, verum necessario aliud aliud esse conjunctum, arbitror, quod si à Deo, omnibus mixtis ingenito principio sperare quis velit, equidem non repugno, aut diversitatem ingentem ejusdem, nec non abstrusas proprietates considerando, in eo ipso occultum aliquid subesse, fateri cogimur. Licet enim occultatum qualitatibus, eo modo, quo olim à plurimis obtrudebantur, incertitudini mancipare me nolum, respectu tamen ad nostrum intellectum habito, revera occultas istas dari, & ita, omnia ad manifestas velle reducere, non quidem cum nonnullis dementiam, sed impossibilitatem hucusque esse adiero. Et quamvis ex corpusculis Philosophiæ fundamentis res clarius

proponi possit, quæ sanè ratione in sua Ciceronæ aquatica historia curiosissima Celeb. *D. D. Jo. J. Wepferum* gentia nuper præstitisse nemo dissimili queat, ita ut Napellum etiam, succo acri & mordaci præditum, aculeos ejusmodi continere dici possit, qui nervosum genus ubi attingunt, pungere illud, vellicare, sicque ad convulsionem irritare & symptomata illa horrenda suscitare soleant, cum tamen & alia, si non longè aciora & mordaciora, saltem non inferiora, gustum ubi consulerent volumus, uti piper &c. dentur, quæ tamen symptomata ista haud inducunt, eo ipso vel aliud aliquid una latere, vel saltem in ipsis corpusculis istis aculeorum hæcenus impervestigabilem diversitatem occurrere necesse est. Unde etiam, si Moschus tam specificum contra Napellum sit venenum, (id quod experientia confirmandum relinquo,) nec tantum, naturalem sanguinis & spirituum nervorum conservando & intendendo, aut spiritus animales systematis nervosi prædenti demulcendo, eidem contrarietur, occultam pariter in eo opitulandi virtutem hic producere cogimur; cum certè, quæ ratione spicula illa pungentia extrahere aut obtundere &c. valeat, intelligere hucusque nequeam.

Porro Coriandri succum venenis ad censeri debere, nonnulli *Dioscoridem* lib. 3. de mater. med. cap. 62. & lib. 6. cap. 9. sequuti adstruunt; de quorum sententia quid sentiendum putem, prolixius in Pharmacop. August. Restit. class. 20. pag. 425. & seq. exhosiui. Proprie non esse venenum, quod minima in dosi magnam nocendi potentiam ostendat, extra omnem est controversiam. & inprimis à *D. Simon Pauli* l. c. egregie fuit ostensum; largius tamen sumtum mentem turbare, & alia quandoque symptomata, vertiginem, somnolentiam &c. inducere, iidem constat. Quam itaque noxam cerebro illatam speciebus diamoschi & ambre expugnari monstrat *Matthiolus* Comm. in lib. 6. Diosc. cerebrum nempe & spiritus animales confortandi, eorumque *dux Georg. Low* frigidam corrigendi vi præditis; quin & cum narcoticum vel stupefactivum aliquod Coriandro viridi inesse, incommoda nimium ejus alium insequentia, tum & ipse odor foetidus persuadeant, tali quoque intuitu Moschus ob Δ r suum contrariâ qualitate donatum, suavi & maximè mobili suâ volatilitate poros cerebri aperiendo, spiritusque animales resolvendo & suscitando, pristinam capiti serenitatem conciliare valet.

Quo respectu etiam Moschus à plurimis Opiatorum medicamentorum compositioni adjicitur, non tantum ut tetrum odorem istum, sed & venenum, aut, seu nonnullis videtur, frigiditatem nimiam Opi emendet, virtuteque suâ confortante à noxis pertimescendis præstet. Hinc in Philonis antidotum quosdam Moschum recipere *Mesue* in Antidot. monuit, suoque in Anodyno specifico *Paracelsus*, in Laudanis *Crollius*, *Agricola*, *Poppius*, *Beguinus*, *Freitagius*, *Poterius*, *Myschibus*, *Hartmannus*, *Tillingius*, *Augustiani*, pluresque alii, in Tabulis vel Trochiscis narcoticis *Platerus* locum eidem aliquem concesserunt. Opium tamen ab ista veneni libè esse immune Exc. inprimis *D. Georg. Wolff. Wedelius* lib. 2. Opiolog. sect. 3. cap. 4. nec etiam tantam inesse frigiditatem lib. 1. sect. 1. cap. 5. erudite ostendit. Quamvis frigidum id esse, ab effectu demonstrare placuit nuper *Celeberr. D. Ol. Borrichio* in tr. de somno & somnif. Doctissimorum itaque hac in re Virorum *Smellie* nullatenus displicet, opiata nempe medicamenta, prudenter administrata, satis per se esse innoxia, nec, ut Moscho aliove additamento corrigantur, opus habere. Interea tamen non negaverim, si quæ ab inconsiderato usu noxa contingat, à Moscho præsidium aliquod sperari quandoque posse, prout sanè *Dioscorides* veterinosos ab epoto papaveris succo factos odoratis excitandos esse admonet, quæ inter *Matthiolus* in Comment. Moschum in specie commendat.

Præterea sub umbra Juglandis arboris si quis diutius versetur aut dormiat, ingenti capitis dolore, vertigine, apoplexiâ, vel epilepsiâ corripitur, ideoque plantam illam ostendere venenatam naturam, tum alii, tum *Dan. Sennertus* lib. 6. Med. pract. part. 7. cap. 17. innuit, atque exemplis *Bald. Timæus* lib. 7. Cas. medic. 8. illustrat. Quale quid etiam de juniperi umbra *Virgilius* Eclog. 10. cantare voluit; Vid. tamen *Illust. D. Febrii* nostri *Scorzonera* curios. pag. 123. Ipsam quidem umbram malorum adeo effectuum ream non esse, merito cum *Ill. Boyleo* cap. 5. de nat. determin. efflux. dicitur, vicinæ tamen arboris nâciferæ effluvia noxia satis capitis esse possunt, cujus dolorem sibi metipsum in æstuantibus regionibus induxisse, ibidem fatetur. Satis enim efficacia esse ista effluvia ipse odor, quem graviter olentem (sive quod *Clusius* lib. 1. rar. plant. hist. cap. 10. de *Lentisco* habet, cum quadam gravitate jucundum) *Matthiolus* vocat, evincit. Nocere itaque nonnullis, ratum habeatur, quosdam tamen, inculpatæ qui sunt valetudinis, seu vigilantes, seu dormientes, impune sub arbore ista morari, atque ut noceat, corporum dispositionem certum requiri, *Timæo* non minus adfentior, quæ scilicet Δ reatum istarum improporionaturum atomorum impulsu, sanguinem & spiritus inordinatum in motum concitari, & energiam earum corpori imprimi facilius patitur. Quibus tamen incommodis Species diambæ diamoschi dulcis, & Trochiscos galix moschatæ opitulari, *Sennertus* tradidit, quibus nempe naturæ amicis pristina tranquillitas reductitur.

Comperitum etiam esse scribit *Arnoldus Villanovanus* de doab. theriacal. Moschum singulariter obviare letali veneno, quod dicitur Cornu ipicæ, id quod ex *Ebn Sina* adscripto libello de Medic. cordial. ab eo latinitate donato, ubi idem adferitur, dubio procul hauserat. Esse autem hoc Cornu fructum seu additamentum quoddam, in Spicæ cujusdam specie horribilis odoris enascens, *Sant. Ardoynus* lib. 3. de venen. cap. 2. prodidit. Cum verò satis naturam Vegetabilis hujus perspectam habeam, commemorasse ista, sufficiat.

Felis cerebrum qui hominem dementare observant, hi, exigente necessitate, singulo mane diamoschi Confectionem, tribus vel quatuor horis ante cibum ægotanti offerunt, quinimo Moschum per se ad $\Delta\beta$. cum vino, an idotum veluti excellentem, absorbere præcipiunt. Similiter felium adversus pilos deglutitos, earundemque halitum naribus attractum commodè usurpari eum, auctor est *Matthiolus*, atque cum ipso *Macassius*. Et quidem felis cerebrum esse venenatum, vel potius noxium, nemo amplius dubitat, idque exemplo stoliditatis, ab eo comesto inductæ *Henr. Salmuth* cent. 1. observ. Med. 47 & cent. 3. obs. 09. confirmat. Cerebrum enim felinum siccum valde esse *Ferdin. Ponzettus* lib. 2. de venen. cap. 26. statuit, si cum hominis temperie conferatur, unde meatus cerebri obstruendo, transitum spirituum animalium ad ventriculum posteriorem prohibere autumat, addens: *Tunc prohibetur memorari, ideo reputatur sine mente*. Quamvis hic sola illa siccitas (ut non tangam reliqua) inepta planè sit, quæ tantum efficere defectum queat, nec ipsa etiam cura à *Ponzetto* tradita, per aromatica, Diamoschum & Vinum clarum, siccitatem istam admittat, à medicamentis talismod, siccandi virtute præditis, potius adaugendam. Meatum verò vel pororum cerebri aliqualem (non universalem, apoplexiam minantem,) obstructionem probabilius defendere potuisset, qua nempe spirituum animalium naturalis transitus, & in debita quantitate prohibita generatio ac distributio merenda est, sicque mentis quandam imbecillitatem occurrere valet. Licet hic potiore culpam in ipsi spiritibus sitam esse, credere

malum, qui à cerebri felini in caput delatis particulis nonnihil figantur, & in torporem conciantur, vel alio modo turbentur aut corrumpantur. Idque eo magis fieri, credibile est, si felis, antequam neci tradatur prius in furorem concitetur, qua ratione ipsa etiam ejus cato, comedentibus eam, noxia evadit, quod egregio exemplo *Athan. Kircherus* sect. 2. cap. 2. de pest. illustrat, quam alios absque omni periculo devorari *Ill. noster Præses D. D. Joh. Michaelis Febrius* in Anno VI. Mi. cell. Germ. Curios. obs. 38. *Bald. Ang. Abbatius* cap. 6. de viper. & *Henr. Salmuth* cent. 1. obs. 47. scribunt. De pilis felinis, utrum venenatæ æmulam vim possideant, non parum dubito, qui, si laryngi illapso suffocationis metum non inducant, vix alio modo nocere poterunt. De halitus etiam noxa major fortè in plurimis metus subest, quam periculum, eum, ut *Sennertus* verbis loquar, sæpe videamus infantes gestare feles, & secum in lectis cubantes habere sine damno. Quibusdam tamen, cæteroquin sanis, singulati & explicati vix possibili proprietate halitus istum naturalem felium nocere posse vix dubito, quæ ratione etiam multis magnam cum felibus esse antipathiam passim est notissimum, ita ut eorum vel in obscuro latentium præsentiam iidem mox exhorrescant. Marasimum tandem vel tabem nonnullos à crebrius attracto in pulmones felium halitu, incidere non omnino negabo, ita ut sanguini ibidem mixtus tandem à naturali eundem dimoveat, temperiem & consistentiam ejus debitam immutet, sicque nutritias in eo particulas energet, quo tamen, venenum subesse, minime evinci potest.

Fel denique viperinum perniciosum adeo depingit cum aliis *Matthiolus*, ut animi deliquium statim adferat, id quod de felle deglutito esse intelligendum, vomitus, ab eodem summopere commendatus, evincit, post quem Moschum & c. exhibitum esse saluberrimum, pronunciat. Id quod etiam jam dudum *Rafes, Albucases, Avicenna & Guilelmus Placentinus, à Sant. Ardoynus* lib. 3. de venen. cap. 14. citati tradiderunt. Ast hoc remedio non esse opus, ipsa felis viperini natura evincit, in qua venenum in corpori illatum non consistere, *Excellent. D. Franc. Redus* præcipuè & *Mos. Charas* exposuerunt.

Idem dubio procul judicium Fel. Leopardi, cum Cerebro Urino merebitur.

Ad ipsum porò venenum pestiferum debellandum, sive id præservando, sive curando fiat, utiliter adhiberi Moschum, sunt qui statuunt. Hos inter *Jul. Palmarius* lib. 7. de morb. contag. cap. 18. de simplici materia, in febre pestilente in usum trahenda, agens, Moschum odore suo suavissimo ac fragrantissimo pestilentem aeris perniciem repellere, dissipare, atque extinguere posse, vires præterea cordis recreare, spiritus omnes erigere, dissipatos colligere ac resarcire, cerebrum sensuque omnes robotare, & partium omnium, maximeque cordis languorem discutere, decantat. Unde & apud ipsum, aliosque tot passim eum in finem, pro interno pariter & externo usu, variæ extant conscriptæ formulæ, Moschum recipientes, v. g. apud *Joh. Cratonem* Consil. à *Laur. Scholtzio* collect. 266. 275. 276. 277. *Dan. Sennertum* lib. 4. de febr. & Fascicul. medicament. contra pest. *Philipp. Hôstetterum* decad. 7. obs. Med. cap. 2. *Matth. Untzerum* lib. 2. de lue pestifer. *Thom. Jordanum* de pest. phænomen. tract. 3. cap. 2. 7. *Jac. Theod. Tabernemontanum* de pest. *Gerbrandum Hai* Medic. pestifug. mixt. var. *Theodor. Turquetum Dom. de Mayerno* consil. Medic. *Laurent. Joubertum* de pest. *Ambros. Paracelsum* lib. 21. Oper. *Nicol. Massam* de febrib. pestilent. *Marc. Anton. Florium* de morb. epid. & c. Quin & suaves odores jam olim scopo huic inservisse, *Heronym. Mercurialis* lib. de pest. cap. 22. ex *Herodiano* docuit. Et ipsum *Hippocratem* (quod & ante eum

Acronem Agrigentinum fecisse scribitur,) pestem ex Æthiopia ad Græcos venientem non alio prædicio reputasse *Galenus* cap. 16. de theriac. ad Pisonem autor est, quàm aërem ignis, tum è simplici materia, tum beneolentibus coronis floribusque accensis purificando, addens: *Talia siquidem ignibus alimenta subministrari consuevit, & ut unguenta quàm pinguißima infunderent, & id genus alia bonum odorem fundentia, ut hoc pacto cives bonum odorem inspirantes ab imminente lue tuti forent.* Unde etiam à Senatu populoque Atheniensi magno honore privilegiisque ornatus fuerat, ceu Atheniensium Senatufconsul-tum, *Hippocratis* Opetibus additum, edocet.

Hanc verò odoratam in aërem inducere qualitatem multi eum in finem laborant, quo putredinem ejusdem, in qua contagii pestilentis ideam consistere arbitrantur, siccando delectant, fæctoremque ejus obtundant atque emendent, in certissimâ tamen hypothesi innixi, cum non tantum putredo ejusmodi sæpe nulla addit, sed etiam nec fætor ullus percipiatur. Id quod ipse *Jacob. Trunconius* lib. 4. de pest. cap. 4. ex parte fateri cogitur, dum pestilenti aëri fæctorem quidem adesse, inde colligit, quia putrefactus sit, per olfactum tamen prævum illum halitum non adficere, mox concedit. Licet alias speciatim Moscho quoque in corporibus à putredine præservandis non omnem laudem adimam, ast num excitatam jam reprimere sufficienter valeat, admodum dubito, quin & ipsius substantia ab eadem omnino sese vindicare nequit, odor autem solus corporum tam violentam resolutionem vix potest sistere. Hinc alii, quos inter *Joseph. Quercetanus* lib. 2. pest. alexicac. cap. 5. & *Athan. Kircherus* scrutin. pest. sect. 3. cap. 8. nominare libet, Moschum virtutis tantum, quâ pollet, corroborantis ratione prodesse in peste adfirmant, quâ nempe cor, vel potius ejusdem spiritus, cum sanguine, primario à virulentia impetiti, suscitari, augeri, inque lætitiâ, pavore pestilentiali contrariam, deduci queant. Id quod paucis exposuit *D. Nicolaus Ellain*, Medicus Parisiensis, tract. de peste, suaves odores ad aëris noxiæ susceptionem impediendam opportunos esse existimans, eo quod facultatem animalem vitalemque confortent, ob eamque causam cuilibet corruptioni facilius obsistant. Conferatur etiam noster *Raym. Mindererus* cap. 16. de pestilent.

Hicce tamen alii sese opponunt, & Moschum non tantum non juvare, sed & nocere in dira lue, acriter insistant. Ita *Clar. Joh. Rhodius* Analect. in Septal. lib. 5. cum, ut nimis acrem & calidum, aëris in peste mutationem non convenire, spiritus enim levioribus odoramentis refici, gravioribus dissipari, vel etiam evocari, unde promptius inficiantur, & cum odore grato tanquam vehiculo venenum crebrius inspiratum, cor promptius subire, ex *Th. Gressio* aliisque ostendit. Sic & *Angelus Victorius* consult. medic. 69. valde odorata rejicit, à quibus spiritus confundantur, calidum innatum exterminetur, proinde & putredo accersatur. *Clar. Paulus Barbette* tract. de pest. quâquam medicamenta inter pesti contraria Moschum sub Aromatum titulo denominaverit, & in Julapium etiam ipsa in febre pestilenti præscriptum reperit, postea tamen, cum de remediis prophylacticis ageret, eundem non solum malignitatem non corrigere, sed venenum magis attrahere, & experientia juxta cum ratione id confirmante, valde nocere, adstruit. *Johan. Zuvelferus* etiam class. 13. Pharmacop. Reg. contagium pestiferum cuilibet naturali corpori, unico excepto Sulphure, (id quod ex *Helmontii* Tumulo pest. desumpserat; licet & ipsum Sulphur in se consideratum pro insontia haud facile reputaverim, acensione tamen resolutum aliam rationem habere concesserim, prout & alia quædam corpora in actum deducta miasma potius enervare, quàm proprie suscipere, dicendum est,) ipsi proinde Moscho sese adglu-

tinare, animadvertit, adeo ut, unde tibi panaceas homines compromittant, arcanas insidias ac delictum virus experiantur; moschata etiam ambriata, delicatiora inventa, nonnulli speciosos titulos alexipharmacos mentientia, (qualia tamen ipse class. 12. pag. 132. & 133. Trochiscos nempe sublinguales, & class. 17. Unguentum cordiale, proposuerat,) plus palato, quadris aut bellariis, quàm cordi in malignis tuendo, dedicata sint, violenta autem effluvia nolentibus etiam ac sponte ingruant, ut odoris fragrantia allicere eadem non opus habeamus. Sed, omaibus hicce quodammodo ut satisfaciam, odorata ista, ad aërem purificandum & alterandum adhibita, tantæ caliditatis non esse, *Trunconius* l.c. respondet, ut scilicet tenacior ab illis exhalans materia ambientis caliditatem adaugere valeat; vel, ceu *Pius Aeneas Caprilus* lib. 2. de febrib. putt. habet, non tam caliditas quàm vitulentia considerari debet; aut, quod alii observant, Medicus prudens temporis, frigidioris nempe vel calidioris, diversitatem hic perpendere non intermittet, imò & temperamentorum in individuis, ætatis, sexus, consuetudinis, & mediocritatis, nunquam non ipse sponte recordabitur. Et quamvis cum odoratis atomis ipsæ quoque malignæ inspiren-tur, harum tamen ab ingressu per nares, os, poros, etiam si odoratis non utaris, minimè te vindicabis, eum perpetuâ aëris inspiratione corpus vivum carere nullo modo queat, præstabit itaque, cum hostili turba auxiliatrices etiam copias, spiritus animales atque vitales ad certamen quasi provocatos confortaturas, ingredi, quàm sine his majorem nocendi libertatem illi relinquere. Ast adpropriata magis & certiora odorifera Alexipharmaca haberi posse, si quis instet, non nego equidem, hæc tamen illorum usum propterea non omnino tollere, rehero. Imò, si omnibus corporibus, Sulphure excepto, malignæ atomi adherere queant, nec Accutum, nec alia quævis alexiteria, ore, naribus, poris hac ratione haurienda forent; quanto cum fructu, similes Censores per me experiantur licet. Moschum autem pravas moleculas istas aut here, hisque veluti analogum & homogeneum esse, neutiquam *Zuvelfero* concedere possum, postquam enim ipse pag. 140. Amuletum ex pulvere bufonum, serpentum, luscino citrino, ladano, panetrito, Moscho, & Zibetho parare docuisset, atque egregie commendasset, pag. seq. 144. Amuleta hæc talibus constare debere, necesse arbitratur, quæ veneno sint veluti analogæ & homogeneæ, sive quæ ratione symboli venenum ad se alliciant & attrahant. Quis verò utquam attractivam illam in Moscho vim observavit quonam certo ratiocinio fundatur? Ut virulentas apothecæ à moschata pasta copiose attractas, unâ cum hujus continua exhalatione copiosius etiam ad nares ascendere & consequenter promptius inficere debere, contra *Zuvelferum* jam non urgeam. Imò ipsum in corpus admissum non saltem venenum illud non attrahet, sed & virtute suâ quâ sanguinem rarefaciendo, ad diaphoresin laticem ejus disponit, per poros ut eliminetur, compellet, quam nempe vim sudoriferam ratio ei satis vindicat, non repugnante omnino experientia, quæ verbi gratia, quartanam in Aromatario quodam perfecte curatam, apud *Lazar. Riverium* observ. medicæ cent. 4. observ. 35. legimus. Conferantur *Gabriel. Fallopius* lib. 1. Sectet. & *Andr. Libavius* epist. 248. Cist. med. Hoanung.

Ego cæteroquin in hicce trepide satis in hanc illamve sententiam flectere me pariat. Postquam pestiferi veneni naturam exactamque cognitionem nostrum intellectum adhuc latere, & reventa ad Deum, sive divinum Hippocratiem imitari, omnes fateri cogimur. Si, verbis Barbettianis loquor, ex aliis quæras, quæ in re contagium illud consistat, multa quidem respondebunt, sed ne gry quidem

quidem digna sunt. Accedit & ejusdem morbi diversitas, quâ mutabili semper hucusque facie sese ostendisse eum, historiarum ex collatione discimus. Quo in labyrintho constituti solo experientia filo ad remedii impetrationem deducimur. Multa sine passim remedia proponuntur antiloimica moschata, quæ utiliter fuisse in usum ducta, fide digni Practici adnotarunt. E contra *Isbrand. Diemerbræk* lib. 2. de pest. cap. 5. Suffitus suaveolentes in peste Noviomagenli, quam describit, non tantum parum profuisse plurimis maximè noxios extitisse, aëreque calidiore inprimis caput tentasse, illos etiam, qui gratis adfueri erant odoribus, si forte malum quendam fetorem alicubi persentiscerent, magis ab eo exterrefactos & gravius adfectos fuisse, & annotat. 15. ad lib. 3. cap. 5. Moschum hoc tempore ægrotos omnes, viros æquè atque mulieres, ægerrime tulisse, & post ejus usum se multò pejus habuisse, observat. Neque id mirum, cum symptomata inter febrem malignam, æstus internum magnum, ingentes capitis dolores, hæmoptyses, narium & uteri hæmorrhagias &c. frequenter adfuisse, referat, quorum sanè intuitu Moschus, inprimis liberaliori in dosi & crebrius adhibitus, non adeo prodesse poterat. Si itaque natura ægri & symptomatum admitteret, suaveolentia non planè proscriberem, ita tamen, ut ea alexipharmacis longo usu adprobatis non antefeream, nec sola, sed hisce commixta in usum traherem, quâ ratione spiritus vegetiores redditos alacrius sese & fortius hosti esse opposituros, haud vana magni *Sennerti* est sententia. Nec damnosum adeo esse moschatorum in peste usum, dira quæ nuper Lipsiam invaserat lues ostendit, confectioe Alkermes completè ad vires sudore ac vomitu falescentes instaurandas utiliter ibidem in usum ductâ, testante id ex autopsia *Exc. D. D. C. W.* in tract. german. de ea emissio §. 19. Quinimo & corpuscula moschata pestiferis non ex ipsa natura sua esse contraria, eademque haud interimere & destruere, nondum est comprobatum, neque enim *Helmontio* simpliciter crediderim, qui venenum hoc aromaticis junctum, ab iisdem saturari tantum, vel simpliciter sese eis commiscere, eaque comitari tradiderat. Imò si in dicta modò Lipsienſium peste alcalica medicamenta, tum fixa, tum volatilia, palmam aliis præripuisse, saniorum Practicorum experientiâ edocto, amicissimo meo *D. D. Gabrieli Claudero*, ut &, quod in nuperis suis ad me litteris statuebat, causa mali in acido volatili constiterit, credere, uti quidem Vir optimus mereretur, velimus, Moschi inde virtutem antiloimicam divinare facile poterimus.

Moschi virtus confortans, in genere.

Egregiam in confortando opem corpori præstare Moschum, quis nesciat? Cujus intuitu omnibus odoriferis confortantibus ab *Averrhoë* lib. Collig. antepositur Et aromatico odore suo vires & spiritus corporis omnes, idque momento, propter partium tenuitatem, corroborare, *Gesnero* dicitur. Spiritus autem proximum animæ instrumentum, & vehiculum facultatum animæ nonnullis audiunt, cum, norante Nob. *D. J. Theod. Schenckio* Schol. part. sect. 1. part. 1. c. 2. sine illis humores & partes solida non sufficiant; quin tantum fortior quis altero habetur, quantum spirituosior existit. Atque hæc robotandi intentio eo magis obtineri ab ipso potest, cum immediatarum cum spiritibus odores habere contractum non ineptè *Helmontius* adferat nec Moschi, aliorum quorundam more, citò resolvatur vis odorifera, sed tenuissimas suas apothecæ longo satis temporis tractu sentim, liberali tamen, ut ita dicam, manu emittat, modò violentiori igne non omnino destruat.

Quam blandissimam potestatem suam non externe solum, sed & internè in corpus exercet. Sic *Aben Mesuai* apud *Serapionem* scribit: Fortificat cor & membra interna,

quando bibitur aut ponitur exterius in emplastro. Hinc Ambra moschata minimâ etiam in dosi deglutita omnium viscerum confortativum maximum passim salutaratur. Interna verò, quæ spiritus quantitate deficientes regenerant, ex odoratis, Moschi granum unum plus facere, quàm dimidium Ambra scrupulum, *Job. Walavi* in Meth. med. edisserit. Ideo etiam variis remediorum generibus adaptatur, qualia sub pulveris, Unguentorum, & Massa forma *Job. Renodæus* lib. 5. Institut. pharm. sect. 3. c. 26. ad spirituum robur parare edocet. Et *Gesnerus* Cataplasmatis in formam redactum non modò cor & viscera omnia toborare, sed membris etiam omnibus, quin ipsis ossibus quoque vires copiosè largiri proficitur. Quod, si spirituum in toto corpore, adeoque ipsis non minus solidissimis in ossibus præsentia, & omnium partium communis conspiratio perpendatur, non incredibile omnino videri potest.

Hanc ipsam virtutem respexisse Aërium credidit *Gesnerus*, dum medicamento ex *Hermodyctylis* purganti, Arthriticis dicato, Moschum quoque intulit tetrabibl. 3. ferm. 4. cap. 46. restaurandi nimirum causâ particulâ vi pharmacorum debilitatas. Quam ejus cum cathartics commixtionem & aliis non displicuisse, Electuarium rosatum *Mesues*, quod Galiam moschatam recipit, & apud *Petr. Joh. Fabrium* Pilulæ mercuriales Myrothec. spag. lib. 7. cap. 1. antimonialis cap. 2. vitriolatæ cap. 3. ebulinæ cap. 4. & agatici cap. 6. nec non Sapi. nt. univers. lib. 3. cap. 5. Extractum helleborinum testantur. Admodum etiam liberalis hac in parte fuit *Leonard. Florentinus* lib. 2. Cogitat. variar. sive Capricc. medicin. cap. 8. 12. 13. 15. 35. 59. & 70. variis compositionibus eundem adjungens. A quibus tamen discedit *Andr. Tenzelius* Exegesi. chimicæ. part. 3. sect. 3. Moscho, ut vehementer odorato, nullum cum cathartics consortium esse debere statuens, cum inde medicamentum in humores directum, cor, caput & uterum simul impetuosius feriat, spiritus resolvat, & quandam molestiam intolerabilem inferat. Et *D. Frid. Hoffmannus* lib. 1. Meth. med. cap. 7. particularia alterantia & confortantia ex Moscho &c. purgantibus addere, risu ac sibilo dignum judicat; quæ ipsa ex *Joh. Zuvelfero* hausisse videtur, qui in primis Animadvers. in class. 4. Pharmac. August. de Elect. astat; Moschum tamen urbanè, Gallia moschatæ additionem perstrinxerat, Species etiam cordiales purgantibus miscere, rationi non consonum esse class. 5. edixerat. Verum roborantia, & in specie odorata, purgantium compositionem intrare, posse, *Hippocratis*, *Galeni*, aliorumque Medicinæ Procerum exemplo, rectius dicemus, quos præterea neque experientia, salubriter id fieri confirmans, neque rationis robur destituunt, scilicet non tantum insuavitatem medicamenti ut emendent, ejusque tarditatem stimulent, sed & noxiam qualitatem quamcunque corrigant. Quo in censu itaque Moschus etiam toleranti utique poterit, qui odorem ingratiorem cathartici gratiæ suâ occultare, tardiores ejus operationem calore & tenuitate suâ promovere, simulque spiritibus, tum à motu vim passis, tum ab ipso pharmaco labefactandis subvenire valet. Sic *Gabr. Fallopius* de medicam. purg. simpl. c. 27. insuavitatem purgantium quatenus olfactui talia adpareant, Moschi admixtione removeri scribit. Turbæthum, quoniam ventriculū & totum turbet, tardè que operetur, Galia moschatâ corrigi *Jul. Casp. Claudinus* li. 2. de ingt. ad infirm. sect. 2. c. 11. admonet. & *Casp. Marcutius* in Quadripart. melancholicorum inprimis curatione, purgantibus summa cum ratione sociari ostendit. Tenzelianam quidem objectionem in quibusdam subiectis locum habere aliquem, non penitus negabo, quorum n. mpe natura eundem etiam alias præferre nequit, ceu in anteced. fuit dictum, aut morbi ratio prohibet, quibus utique non solum purgantibus, sed

sed & quibuscumque aliis medicamentis, odorem ejus exhalaturis, permistum exhibere nullo modo addeceret. Ast uti ejus propterea non omnibus est interdicens, quem tamen moderatum semper, & ex arte commensuratum esse debere, præsupponitur, qua ratione nec cor, nec cerebrum &c. impetuosius feriet, spiritusque resolvat, sed suaviter potius adficiet & confortabit. Fundamentum etiam, sicut *Tenzelius* opinionem suam superstruxisse videtur, incertissimum est, quo nempe hujusmodi certis partibus ad propria credita Simplicia (v. g. Moschum cerebro, cordi, utero,) reliquorum in compositis additorum Pharmacorum vires secum ad partes istas adducere statuantur, id tamen qua ratione fieri queat, ego quidem capere nequeo, multò minùs concedere, quòd ad propria ista ad loca tantum illa sua abeant, & non æqualiter in totum corpus distribuuntur, licet in hac vel illa parte virtutem suam exferere magis valeant. *Zuelfero* autem pag. 88. 91. & 92. Pharmac. August. Recte cum abunde, nemine hactenus contradicente, responderim, eadem hic repetere nil attinet. Et certe illum Moschus rigorem si mereretur, penitus videlicet à cathartico consortio excludendus, nihil prohiberet, quò minùs aromatica quævis eadem sententia dampnanda forent, quod tamen nec ab ipso *Tenzelio*, *Hoffmanno* & *Zuelfero* facile concessum fuisset, utpote qui omnes odorata & aromatica purgantibus jungere neutiquam intermiserunt.

Ubi non possum non illorum Globorum, majorum minorumque, facere mentionem, in plurimis Pharmacopoliis prostantium, & saccharo, amylo & moscho confectorum, àque nostris: *Byssen*-vel *Wind Kugeln* vocatorum, qui inter *διμορφωτικὰ* locum communiter inveniunt, dum in anum immitti, feces emolliendo, faciliorem excretionem earum procurant, de quibus *Nobil. D. Melch. Sebizius* Manual. medic. pract. part. 1. sect. 1. cap. 1. videri potest. Quin & stimulo aliquid conferre, & ubi irritum in cavo intestinorum dominatur sævitia, discutendo, imò & in debilibus subjectis simul confortando, nullus dubito: Sic puellæ 5. septimanarum, præ torminum magnitudine continuo ejulanti, abdomine distenta, tandemque lipothymia correpta intrusum hujusmodi globulum, alvo copiosissime deturbata, sanitatem reddidisse, Excell. *Joh. Nicol. Binningerus* cent. 2. observ. 70. recenset. Verum satis de solutivis.

Nunc qua ratione illam roborandi facultatem Moschus exferat, dispiciamus, ne & ipse censuram illam *Henr. Smetii* incurram, quâ nihil quidem magis in ore Medicorum, & nihil magis usitatum, interim tamen etiam nihil minùs apud Practicos esse cognitum, quâ roborantium naturam, lib. 1. Miscell. med. epist. 4. scribit. Ubi præter reliquos *Jul. Casp. Claudinus* l. c. cap. 2. monstrare id laborat, dum Moschum, Galiam moschatam &c. quantitatem spirituum illico refarcire perhibet. Latius illam extendit *Andr. Casalpini* lib. 1. de med. facult. cap. 14. odores nempe suaves, ratione temperamenti naturalem spiritus qualitatem conservare, ratione verò substantiæ familiaris eundem nutrire, utriusque autem ratione vires collapsas utilissimè restituere. Mihi non tantum spirituum frigidiorum attemperatio, deficientiumque aliqualis tum ab ipsarum Moschi volatiliū particularum, natura sua, vel sale volatili animali, spiritibus nostris analogarum accessione, tum sanguinis & feri fixioris ab iisdem in spirituositatem vel volatilitatem deductione, restitutio, sed & languentium eorundem excitatio hic locum habere posse videtur. Ut ideo *Joh. Veslingius* in Parænes. ad rem herbat. jucunditatem ex cultu plantarum exponens, odoris in eis suavitati non deesse eximium usum, sive bonam valetudinem, sive adversam spe-

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

ctemus, optimè peroraverit; utpote qui hominis spiritus recreet, & inspirato purioris conditionis halitu, vitæ stimulum blandè excitet, subjungens: *Atque hac potissimum causa est, ut tradit Justus Lipsius, quòd veteres illi Sapientes in hortis habitarent; Eraditi hodie doctique viri delectentur hortis, & in iis divina illa pleraque scripta procusa, quæ mirantur, quaque nulla temporum series, aut senectus abolebit.* Hinc etiam Platonicos quatuor inter spirituum alimenta odorem etiam, juxta cum cantu, sono, & lumine, eleganter repositum novimus.

Moschi virtutes cephalicæ, in genere.

Moschum insignem obtinere virtutem cephalicam, extra omnem est controversiam, quàm in ipsa capitis tum sanitate integra defendenda, tum vacillante eadem restituenda præclare ostendit. Hac sanè ratione ipsum etiam animum reficere Suffimigia & Odoramenta perhibentur, quorum nempe finem esse *Liberti. Esthæus* de formul. tract. scribit, qui sese in animum intendant; & *Συμψυχα* sint quasi *Συμψυχάσματα*, præsidia animos reficientia. Unde etiam ad vitæ longævitatē non parum præsidii quandoque adferre valent, qua ratione *Marsili. Ficinus* lib. 2. de vita cap. 15. maximum vitæ sibi vindicare adjumentum putat, quicumque inter res Medicorum arte laudatas potissimum eas eligit, quæ corpori simul & ingenio profunt, in quarum dein numero Moschum quoque collocat.

Ceterum quamvis similia, juxta tritum axioma, conserventur similibus, cerebrum autem communiter frigidas inter & humidæ corporis partes recensetur, num Moschus dici cephalicus mereatur, dubitari posset. Sed frustra, cum Cerebro aliarum quarundam partium, & cordis imprimis, respectu tantum temperies ista adjudicetur, quod alias revera in se, atque ut vitæ præditum, calidum dicemus, sanguine utpote, caloris vehiculo, abunde perfusum. Hac ideo naturali temperie si fruatur, Moschum non plane respuit, ejus nempe ab effluviis moderatissime advenientibus in statu isto facilius conservatur. Ut eapropter ab *Ebn Sina* temperatum cerebrum confirmare rectissime perhibeatur. Siccandi autem in Moscho virtus, ob exiguam, in qua is propinatur, dosin, tanti momenti haud est, ideoque ut magnopere hic attendatur, minùs requirit.

Sin verò à mediocritate illa recedat, & frigidam humidamque temperiem, cui satis frequenter est obnoxium, induat, à Moscho magnum experitur præsidium. *Τον τὸν κεφαλὴν πὺν ψυχρὸν, f. idum corroborat caput;* scribit *Sim. Seibus*. Et ante ipsum ad frigidos in capite adfectus omnes perquam utilem *Rhases* lib. de simpl. pronuntiaverat.

Quam laudem utramque ipsi competere dicemus, quatenus atomi ejus odoratæ cum animalibus spiritibus magnam habere adfinitatem creduntur, ideoque etiam, faciliè in eorum consortium admittuntur & in eosdem convertuntur. Sunt enim tenuissima, subtilissima & purissima corpuscula, non solum tantum animali volatili, quale minutissimum in ipsis quoque dictis spiritibus hospitari, doctorum fert sententia, sed & sulphure, suavissimo prægnantia, quo æthereas illas substantias mirum in modum illustrare, demulcere, inque sui amplexum & connubium concitare possunt. Quin & torpidiores si existant spiritus, hac ratione eosdem excitant, inque motum celerem adigunt; aut impii obnubilatos halitibus pristinae serenitati, discussis istis, restituant. Nec spir. tantum sed & sanguinem ipsum, serumque cum sanguine adflueos, quàm nervosa corpora irrigans, & minùs respicit, hujus incrasationem tenuitate sua præcavendo & emendando,

K x. ac

ac superfluitatem exsiccando, illius verò *negotium* conservando, atque intemperiem, paupertatem & coagulationem partibus suis calidis, sulphureis, homogeneis atque spirituosissimis emendando, supplendo ac tollendo. Quo facto, robur debitum capiti non potest non suppetere, ita ut actiones suas nobilissimas absque ullo impedimento facillimè obire valeat.

Idque tum internè, tum externè adhibitus operatur. Ibi quidem, dum ori immixtus quibusdam suis particulis sese mox nerveis in lingua papillis insinuat, & hinc (si Recentiorum nonnullorum sententiæ accedere liceat,) per nervos ad ipsum cerebrum abripitur. Eisi enim nervosum succum spiritusque conjunctos à cerebro potius & plerumque promanare admodum sit credibile, aliquando tamen retrorsum quoque tendere, Clariss. Viri, Franc. Glissonius Anat. hepat. cap. 45. Thom. Willis cap. 20. Anat. cerebr. Marcell. Malpighius, & Carol. Fracassatus in Epist. de lingu. adferunt, ideoque etiam alimenti ingesti tenuiores quasdam particulas in illos recipi suspicantur; quod & alibi in corpore fieri, Willisius non dubitat, filamenta nervosa, non tantum quæ gustus sensorium, sed viscera quoque coctioni inservientia obducunt, libamina quædam ab ingestis alimentis & cardiacis immediatè excipere statuens, quibus in magna inedia & spirituum exolutione ipsi cerebro suppetiæ citissimæ terantur. Nec sanguinea venosa vascula planè excluderem, quorum oculis in nerveam ventriculi & intestinorum tunicam dehiscensibus sese insinuare facillè possunt moschatæ moleculæ, atque ita sanguini immediatè confundi. Si enim, quod prælaudatus Willis part. 1. Pharmac. ration. sect. 1. cap. 2. habet, chyli subtilior portio in illa valet irrepere, multò magis subtilissimæ istæ odoratæ atomi illuc perringere & penetrare poterunt. Patentiori autem, certiori, & quasi regia via in venas lacteas receptæ, atque hinc thoracicum ductum permeando, tandem in vena axillari & ulterius in corde cum sanguine confusæ, posteaque per carotides arterias sursum delatæ, cerebrum attingere quòd valeant, longè est certissimum. Quod & de Moscho exterius in usum ducto dici debet: ita ut & nervosa, & venosa, imò & serosa vascula intromissas per cutis poros subtilissimas Moschi aporrhœas suspiciant. Quam inspirationem Clar. Guil. Harveius cap. 16. de motu cord. & sangu. exterius scilicet adhibita medicamenta vires intrò exercere suas, ac si intrò sumpta fuissent, intuitus, constare hinc posse arbitratur, non esse irrationabile, dicere, venas per orificia ab extra admotis absorbere aliquid, & intrò cum sanguine deferre. Sed hæc per sanguinea & lymphatica vasa ad cerebrum virtutis moschatæ adductio licet per longiores fiat ambages, non tamen omnino nulla est. Evidentior tamen & celerior longè, per nervos quæ absolvitur. Atque ad hosce etiam cephalica Moschi narius objecti vis meritis refertur, dum odoratæ ejus atomi inspiratione ad earum membranam internam derivatæ, fibras nerveas processuum mammillarum in eam extensas attingunt, penetrant, inque cerebri interiores recessus sese insinuant.

Diversimodè autem hunc finem impetrare communiter laborant Practici, varia sub forma Moschum offerentes, quæ omnes hîc recensere supersedeo, duobus saltem, tam internis, quàm externis, usus exemplis adductis. E quibus primi sint Trochisci cephalici *Timaani*, ab eodem in fine Casuum med. descripti, ex Magist. succ. alb. Spec. diambr. diam. dulc. ā. ℥ij. cardam. min. ℥iij. ambr. gr. v. mosch. gr. iij. cum trag. in aq. apopl. solut. conficiendi. Tincturam cephalicam amburatam in Append. Ann. VI. Ephem. German. Curios. Nobil. D. Martin. Bernhard à Bernitz communicavit, & Spec. diambr. ℥℔. lign. aloës, carpobals. ā. ℥ij. ambr. ℥j. mosch. ℥℔. sacch. Can. ℥j. cum Elix. Mart. aq. carb. ā. ℥ij.

spir. rosar. & aq. spir. cinn. comp. ā. ℥j. extrahendam. Balsamum pro cerebri corroboracione, occipiti & cervici inungendum, ex Bals. major. succin. ā. ℥j. Ol. N. M. expr. ℥iij. Ol. stil. sal. v. caryoph. ā. gr. iij. moich. ambr. ā. gr. iij. descripsit Aug. Thoner. conf. med. 12. Præter alia, Odoramentum ad cerebrum frigidum confortandum, mirabilis effectus, solutis in aq. majoran. ℥iij. moschi gr. v. inter Empirica Epiphani Contr. Gesnerus exposuit. Quæ omnia, pro varia Medici intentione, voluntate, & necessitate, mutari, emendari, minui, vel augeri poterunt. Id quod sanè unicuique petito Medico, artem componendi & præparandi pharmaca edocto longè erit facillimum.

Moschi vires cephalica, in specie, ad certos adfectus determinata.

Quamvis cephalicum Moschi usum in genere consideratum qui cognoverit, facillè, ad quos capitis adfectus in specie conferat, perspecturus sit, cum tamen hinc indè in plurimis ejus passionibus ab Autoribus commendetur, in specie eadem adduxisse, non plane erit superfluum.

Inprimis verò Dolorem ejus abigere, multorum constat testimonio. Ubi quidem mox Hippocratis autoritas, experientia crebra confirmata, obstare videtur, quæ Aromatum suffitum vel odorem capitis inducere gravitatem perhibetur. Quod tamen superius à nimia tantum copia atomorum in caput admissa, vel sanguine bilioso, & ejus in debili capite mobilitate nimia, spiritibusque facillè irritabilibus fieri, adeoque non in omnibus locum habere, reipsa patescit. Scilicet

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

Sic & in dolore capitis ex pituita oriundo medicamenta calida & odorata nocere posse, benè animadvertit Alex. Massaria Pract. med. lib. 1. cap. 7. si quis ante universi corporis & capitis evacuationem illis utatur, post celebratam verò istam, eadem dissolvere materiam, nullumque dolorem, tum internè, tum externè utratum, inducere. Unde communiter etiam in illa tantum Cephalalgia, quæ ab intemperie frigida ortum habet, laudari solet. Sic Ebn Sina Moschum unicum cum croco & modica camphora naribus inditum, capitis dolorem ex frigiditate ortum lenire scribit; quinimo solum quoque præstare id posse, quia discutiendi & roborandi facultate polleat. Scilicet non cerebri tantum dyscrasiam frigidam calore suo emendat, sed & spiritus à tristi sensatione agitados ad quietiorem statum blanditiis suis componit, vapores conjunctos tensivos & gravativos tenuitate sua resolvit, atque serosam vel pituitosam materiam ab evacuatione antecedente residuam attenuat ac discutit, imò & punctoriis doloribus, ab acore præternaturali excitatis, sale suo volatili eundem enervando, contrariatur. Quem in finem commendari potest Cucupha à Joh. Costero Tabul. med. 2. præscripta. Et D. Petrus à Castro in Pract. MS. inunctionem ex ℥j. Ungu. dialth. cum gr. ij. moschi subtilissimè triti ultimum remedium in ejusmodi forti dolore capitis adpellat. Joh. Agricola animadvertit, in Popp. medic. chim. part. 2. tr. de laudan. Aquam verbenæ à flor. rosar. &c. in B. abstractam, & ambr. ac moscho imprægnatam vocat incomparabilem in cephalalgia, non tantum externè, sed internè pariter in usum trahendam. Et Zacutus Lusit. in Conservam, contumaci & rebeli cephalalgia utilissimam, qua sola per mensem oblata juvenis quidam, per biennium graviter afflicta, fuerit perlatam, moschi etiam ℥j. receperat, lib. 1. Pract. hist. cap. 3.

Quòd eandem roborandi, calefaciendi & siccandi facultatem, in ipsis etiam Catarrhis passim præscribitur, ideoque Pulveris nicotianæ non absq; ratione Moschum &c. admisceri, Greg. Horst. Probl. med. dec. 1. quæst. 4. arbit.

arbitratur, & lib. 2. obs. med. 4. eundem Trochiscis pro fumo adiungit, nec non Pulveri pro suffitu *Dan. Sennertus* lib. 1. Med. pract. part. 2. cap. 34. unâ cum Errhino ex aqua majoranæ conflato. Oleum auribus nari-
bulque iungendum, Saponem pro capite abluendo, Ceratum commissuræ coronali & sagittali adplican-
dum, cum Moscho proponit *Joh. Bapt. Montanus* cons. med. 144. Lixivium moschatum profert *Adr. à Myrsicht* Armament. med. chim. sect. 9. Pomum odorife-
ram *Arnold. Villanovanus* tr. de cararrh. cap. 5. Pilulis quoque internè usurpandis eadem intentione inseri-
tur, quales in Thef. Pharm. Hoff. sect. 20. leguntur.

Ubi Hydrocephali etiam aliqua mentio facienda, cui ob vim confortandi, calefaciendi, exsiccandi, re-
solvendi, & discutiendi opem ferre non omnino recu-
sat. Atque idcirco à *Sennerto* lib. de infant. curat. par. 2. cap. 6. Balsamo naribus illinendo, necnon à *Jac. Prime-
rosio* de morb. pueror. part. 2. Oleis atrium & narium cavitati immittendis admiscetur. Confer. *Petr. Forestus* lib. 3. obs. 6. Ipse quoq; *Paracelsus* lib. 2. de Tart. cap. 6. septem hydropis genera recensens, Pulveri internè in cerebri hydrope fumendo eum adjecit. Quò tumo-
rem referre liceat, infantium recens natorum in ca-
pite quandoque conspicuum, & frequenti Itolorum experimento, gossypio moschato imposito curabi-
lem, memorante nostro *G. H. Welsch* cent. 2. Mixto mim. obs. 32.

Potè memoria defectui opitulatur, quatenus illa cerebri frigidam vel humidam quoque intemperiem, spirituumque animalium defectum, debilitatem, im-
puritatem, vel obfuscationem pro causa agnoscit. Hinc *Floravanti* l. c. lib. 2. cap. 11. Moscho tale tribuit encomium: *È la memoria quasi incorruttibile, i. e. memo-
riam quasi incorruttibilem efficit.* Cui non minimam idcirco laudis partem debet Diamoschi confectio, quam inter remedia ad memoriam ex morbo deper-
ditam utilia commendat *Zacutus Lus.* l. c. cap. 9. *Guil. Gratarolus* lib. de memor. præter Oleum auri-
bus instillandum, vel Unguentum naribus illinendum cap. 2. descriptum, Catapotia insuper ad memoriam efficacia Moschi additione cap. 5. perficit. Cui jun-
gendum Oleum *Fumanelli* in *Gesneri* Evonymo pag. 221. delineatum, nec non Pessulum erihinum *Christo-
phori à Vega*, de quo agit lib. 3. de art. med. sect. 1. c. 10.

Nec minus in Fatuitate salutariter adhibetur. Unde *Lalins à Fonte* consult. med. 129. Nobis Veneto, post diuturnas animi curas molestiasque, necnon immo-
deratam Venerem Morosi adfecto, præter alia reme-
dia, Odores quoque conducere plurimum posse arbi-
tratus fuerat, quos inter Moschum præcipuè deno-
minaverat, ut qui internè & externè usurpatus præ-
rogativa quadam cerebro opituleretur, exuberantem ipsius humiditatem exsiccans. Magnam nempe spi-
rituum animalium exolutionem ab immoderata Ve-
nere contingere, extra dubium est, qui ita imminu-
ti ac debilitati, quin & consequenter à liquore nerveo inertiori reddito impediti, in naturali suo motu & operatione admodum turbantur atque impediuntur. Quin & violentas animi passiones spiritus cerebrales plurimum dissipare atque ab invicem distrahere, ut priorum motuum suorum vestigia reperere postea ne-
queant, ingeniosa *Th. Willisii* de anim. brut. lib. 2. cap. 13. est sententia. Quare Moschus spiritus istos confor-
tando, augendo, demulcendo, superfluumque humo-
rem exsiccando vel volatilisando non poterit non plurimum prodesse.

In ipsa Phrenitide *Penoti* Epithema cephalicum ce-
lebratur, quod ex Moscho, camphora & aqua rosa-
rum tinctura santalina imprægnata paratur. Id quod somnum conciliando & cerebrum confirmando præ-
stare *Laz. Riverius* Prax. med. lib. 1. c. 11. autumat. Maxi-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I I.

ma tamen hîc opus est cautione, ne febrilis, qui adest, calor magis indè exacerbetur; ideoque temperatis magis remediis qui insister, majori cum securitate medebitur.

Nec satis video, quomodo in Mania idem medica-
mentum, seu à nonnullis deprædicatur, utilem certò præbere operam queat. Quæ nempe licet sine febre existat, revera tamen, omnibus id attestantibus, non sine spirituum animalium exastuatione & fervore subsistit. Unde vel omnino non proderit, vel, si pro-
fuit, spirituum fervorem amica sua præsentia com-
pescendo, aut etiam sacci-nervei & sanguinis qua-
lemcunque dyscrasiam emendando, illud fiet. Quin & confortantia cardiaca in hoc adfectu esse necessa-
ria iudicans, iisdem Moschum in specie adnumerat *Sebizius* l. c. part. 2. sect. 2. cap. 6. Licet *Villius* d. l. cap. 12. in hoc morbo analepsi opus non esse, & nec vires resumtivis restaurandas, nec spiritus cardiacis reficiendos voluerit. Sed quòd *Paracelsus* tr. 2. de morb. ament. cap. 2. duplicem mania curam expo-
nens, in priori materiam peccantem refrigerari & congelati scribit, hoc etiam addito medicamento, ex Ol. camph. ʒj. (vel, ut alii legunt, ʒj.) & Ol. mosch. ʒj. mixtis, dimidiæ drachmæ pondere fumen-
do, aut etiam fronti temporibusque illinendo, quod mirabiliter maniam auferre, calorem corporis ex-
stinguere, fervorem sanguinis tollere, & materiam non secus, ac in glaciem à frigore aqua cogitur, coagulare restatur, id, inquam, mihi ingens est paradoxum. Quis tantam sibi à tam fervido me-
dicamento refrigerationem spondere audeat? nisi frequentiori & liberali nimis usu, ipsius caloris na-
turalis suffocationem, & consequenter frigidam mor-
tem adducere voluerit.

Quid in Melancholia valeat. *Ebn Sina* edisserit, hi-
laritatem ab eo induci, tristitiamque melancholiam dispelli scribens, cui consentit *Averrhoës* lib. Collig. melancholiam eum abigere testatus. Quem in finem etiam dubio procul *Joh. Mesue* divinum suum Electua-
rium, quod confectio Alkermes dicitur, & *Actua-
rius* Linctum lib. de medic. composuit. territis & atra-
bile vexatis dicatum, Moscho exornaverant. E Re-
centioribus etiam, ut reliquostaceam, *Honor. Herin-
gius* sect. 1. de Melanch. cap. 9. eundem commendavit, & *Balth. Brunnerus* ex medicamentis interioribus Melancholiae hypochondriacæ adcommo-
dati Moschum & Ambram præcipua esse Consil. medic. 7. pro-
nunciavit, necnon Pilulas ex Ambra & Moscho, cum Extr. Alkerm. & gumm. ladan. huic scopo idoneas *Joh. Hartmannus* in Prax. chimiæ. Electuarium ve-
rò & Aquam perlatham *Claud. Deodatus* Panth. hy-
giast. lib. 3. cap. 21. proposuit. Externè insuper Pilæ odoriferæ, ac Linimento odorem illum jungere libuit *Hieron. Mercuriali* de adfect. capit. lib. 1. cap. 10. Ce-
rebrti nempe confortandi causa id fieri inprimis solet, cum spiritus animales in hoc adfectu maxime lædi credantur, quantenus & impuriore redditi sunt, at-
que variè in tranquillitate sua ac temperie impediun-
tur & depravantur; ut massam sanguineam in aco-
rem pronam & sulphure suo depauperatam à Moscho correctionem expectare hîc non urgeam.

Præterea Paralyfi contrariatur. Nervis enim dica-
ta est medicina, qui frigidis offendantur, calidis verò siccisque delectantur. Videlicet ista in nervorum re-
solutione cum spiritus animales motui dicatas partes sufficienter irradiare cessent, siue nervosos funiculos frigidus crassior humor, lympa, vel pituita ob-
struens, transitum ipsis liberum denegat, siue etiam qualiscumq; frigidior adflatus aut narcosis torpidiores reddiderit, & quasi coagulaverit, Moschum resolvendo, attenuando, discutiendo, exsiccando, calefaciendo,

excitando, conducere mox elucescit. Quocirca si naribus cum aliqua croci parte inferatur, prodesse dicitur *Haly Abbati Theor. lib. 5. cap. 33. & Isaac. Israëlitæ lib. panthechn. 5. theor. cap. 104.* Quem etiam Balsamo, Cucuphæ, & Rotulis addidit *August. Thonerus lib. 5. consil. medic. 5.* Et membra paralytica à Moscho cum petroleo mixto roborari *Euchar. Rôstinus Herbar. part. 3. perhibuit.* Nec fileri debet Melicratum vel Claretum à *Joh. Anglico in Prax. med. lib. 1. pag. 89. descriptum,* atque ex vini, mellis à. lbij. cinnam. 3v. spic. aromar. 3j. Zingib. ligni aloës, macis, à. 3 ij. saly. 3ij. croci 3i. moschi 3j. concinnatum.

Dum verò Paralyti maxima cum Caro, Lethargo, & Apoplexia est adfinitas, & judicio *Pauli Barbette Prax. lib. 1. cap. 3.* gradibus saltem differunt, eandemque partem adfectam & causam agnoscunt, vel potius, uti *Laz. Riverius tom. 1. Prax. med. lib. 1. cap. 2.* habet, pro majori tantum vel minoris humoris copia, plures aut pauciores cerebri partes magis aut minus adficiente differunt, ideoque iisdem remediis omnes hi adfectus curari possunt, Moschi virtutem ad illos quoque sese extendere, nemo dubitabit.

Sic in Lethargo, qui vel à spiritibus animalibus narcosi percussis, vel etiam extra corticales cerebri debilis, humidi nimis aut frigidi poros ejecti, docti *Willisii* sententia, oritur, præderit. Unde tum in ipso paroxysmo, tum extra eum utiliter odorata adhiberi plurimi observarunt, Balsamum eapropter & Morfello *Ill. Guerner. Rolfincio in Ord. & meth. medic. spec. consult. lib. 2. conf. 5.* Pulverem sternutatorium, Eleatuarium, Cucupham, Balsamum *Joh. Costero Tabul. med. 3.* Moscho exornantibus.

In Caro etiam, qui Lethargo major censetur adfectus, paulò altius versus cerebri medullium penetrans, eapropter conducit, atque à *Valesco de Tharanta lib. 1. medic. pract. cap. 4.* externè & internè commendatur. Quin & præter alios utendi modos, sapius vel continuò ad odorandum esse porrigendum *Joh. Stephanus paraphras. in 1. fen. Avicenn. lib. 3. tr. 4. cap. 3. & Dominie. Leonus art. med. sect. 1. lib. 2. cap. 3.* admonent. Hunc tamen ipso in paroxysmo neutiquam, sed fœtida potius convenire, ne humores in caput trahantur, post accessionem tamen & capitis expurgationem demum ex usu esse *Benedict. Silvaticus cent. 1. conf. med. 75.* scribit, præeunte *Hier. Mercuriali l. c. cap. 7.* Quod monitum licet omnino non sit inutile, limitationem tamen aliquam pati, si adfectiones has ab humoribus, non tam quantitate, quàm qualitate, eaque narcotica tantum lædèntibus, aliquando excitari, consideretur. Videantur etiam, quæ hac de materia *Nob. D. Conr. Viß. Schneiderus lib. de morb. capit. tract. de Caro cap. 7.* differunt.

Nec Apoplexia, interna cerebri penetralia obfudens, eundem planè respuit, laudatum ideo à *Joh. Wittichio in Consil. apoplect. inque varia medicamenta illatum.* Quibus accendere etiam licet Pilulas ab *Abram. Scyllero in Laur. Scholzi Epist. med. 8.* descriptas, easdem ferè cum illis, quas *Riverius l. c. in adfectum soporosorum, apoplexiæ &c. curatione, ad caput roborandum exhibuerat, & Exc. D. Joh. Dan. Majori in Delic. Hybern. sive Trib. nov. invent. med. cap. de inunct. vertic. recensitum pretiosissimum Magni Ducis Hetruriæ Linimentum, vertici in apoplexia inungendum, ex oleo moschi Orient. ambr. N. M. expr. & bals. Peruvian. concinnatum.* Hinc tot porro Balsamorum & Aquarum apoplecticarum occurrunt descriptiones, Moscho nobilitatæ. Quas tamen Aquas, (quibus & Balsama odorifera moschata &c. jungemus) licet ob vaporum humorumque frigidiorum discussionem & dissolutionem, caloris nativi & facul-

tatis sopitæ excitationem, cerebri roborationem, ac spirituum animalium conservationem vel à natura sua degenerantium in pristinum statum reductionem, in minima etiam quantitate maximam vim obtinere, ac subito penetrare, inque apoplexia à vaporibus narcoticis, & spirituum animalium vitio, aut pituita sine sanguinis permixtione inducta, frigidæ constitutionis & senilibus subjectis commodissimè posse exhiberi, *Sennertus Med. pract. lib. 1. part. 2. cap. 33. qu. 4.* concedat, in apoplexia à sanguine ortum habente, vel etiam ubi sanguini humores jam permixti abundant, mox in principio non satis tutò usurpari monet, cum humores fundendo & caput replendo morbum augent. Qua de materia non minùs legi meretur *Phil. Höchstetterus noster Observ. med. dec. 9. cas. 5. & Ill. D. Paulus de Sorbait observ. medic. cap. 7.*

Quamvis autem in soporosis istis adfectibus Moschus conducatur, & ipse tamen in Vigiliis compescendis, somnoque blandiori corporibus frigidioribus & humidioribus inducendo, aliquid confert; quem in finem *Celeb. D. Joh. Crato in cons. 118. apud Scholz. Pilulas ex Specieb. diamb. diamosch. dulc. &c. nec non Eleatuarium cum eo parare edocuit, medicaminum horum calida atque odora virtute vaporum in Senibus contemperationi studens; quo de elegantius differentem consulere juvabit Exc. D. Wedelium lib. 1. de medic. facult. sect. 3. cap. 1. necnon Cl. D. Simonem Pauli Quadripart. botan. class. 2. cap. de Iride.*

In Epilepsia debite adhibitus laude sua non caret. Quo itaque varii Pulveres antepileptici exornantur, quales delineant *Math. Unixerus ιεγοροδογ. chimiar. lib. 2. c. 11. Petr. Joh. Fab. Sap. univ. lib. 3. c. 15. Laz. Riv. d. c. 8. Guern. Rolfincius Chim. in art. form. redact. lib. 5. sect. 5. Dispensat. Noric. ult. edit. class. 1. sect. 5. pag. 38. & Achill. Gasser. in Syllog. obl. à Welschio edit. obl. 7. Inter externa quoque occurrit Emplastr. in Frid. Hoff. Thes. Pharmac. sect. 10. pag. 63. Moschum recipiens, id quod *Joh. Cratonis inventum esse, ex Scholz. Epist. 161. constat, tam in pueris quàm senibus bono cum successu adhibitum.* Cæterum in specie puerorum in epilepsia eundem commendat *Jac. Primerosius part. 2. de morb. puer. Eamq; Moscho cum vino subtili curatam refert Th. Carth. in Welschii Chil. 1. exoter. obs. med. 562. Quod ipsum remedium etiam ex Georg. Kufnero Joh. Georg. Schenck. exoter. exper. cent. 5. obl. 85. laudaverat. Ubi prætatus D. Hoff. in Clav. Pharm. Schröd. lib. 2. c. 76. de Crolliano odorifero verba faciens, odoratis talibus multos excitari animadvertit, non quòd planè morbus indè tollatur seu curetur, sed quòd via præparatur: per virtutem enim odoris corpori communicatam sanguinem moveri, & cor supra modum refocillari. Ast si epilepsiæ causam, & Moschi naturam perpendere velimus, in ipso etiam morbo isto tollendo Moschum posse quandoq; efficacem esse, fateri cogimur, utpote quòd, si non semper, ab acido tamen aliquo heterogeneo, nervosas cerebri partes irritante & vellicante sæpe oriri, tum apud plures est in confesso, tum & curatio per acorem illum hostilem absorbentia volatilia, quibus Moschus jure adnumeratur, & fixa ostendit.**

Unde non minùs in Convulsionibus & Motibus convulsivis, parùm scilicet à morbo sacro differentibus, conducit, prout Balsami, in tremore manuum, jeftigatione, spasmo, tortura, stupore, à *Petr. Foresto lib. 10. obs. med. 99. & Nicol. Pisone lib. 1. de cognof. & cur. morb. c. 21. pro spinæ & nuchæ inunctione commendati, virtutem accessione sua exaltat. Et in specie Caninam sic dictam convulsionem citò, tutò, & jucundè Bolo moschato, l. c. cap. 12. existente, curari P. J. Faber proponit.*

Nec in Vertigine debellanda, dū cerebrum infirmè roborat, & vaporum, spiritus animales in motu perversum concitantium, discussionem promovet, auxilium depe-

denegat. Cui nempe opitulari, capiti & naso illitum, *Conr. Kunrath* Medull. destill. part. 2. tract. 17. & *Franc. Fogerolæ* de senum affect. part. 2. cap. 5. consentiunt, exemplitque salutarem usum testantibus comprobant *Martin. Rulandus* cent. 2. curat. empiric. 66. atque *Georg. Hier. Welschius* in observ. med. Reusner. 10. & Hecatoft. 2. observ. med. 28. quibus meriti jungitur *Fidejustus Reineccerus* lib. 1. thesaur. chim. experimenta inter uti probata Linimentum ex oleo N. M. lil. convall. vel succin. ambra, moscho, & Zibetho adducens,

Moschi usus ophthalmicus.

Ingentibus & variis casibus oculi nostri patenti. Qui cum magnam partem ad vitam simul & usum, & dulcedinem conferant, summa cura tuendi sunt: ut *C. Celsus* lib. 6. de re med. cap. 6. loquitur. Ubi nec Moschus salutarem denegat operam, cujus vires ophthalmicas tum recentiores, tum antiqui Medici nobis proponunt.

Hos inter imprimis *Ebn Sina*, robur oculis illumi addere, eorum humiditates exficcare, & tenues Albugines extergere fatetur. Quod & *Hachim Ebn Hunaim* pronunciat, Interpretum verbis sic apud *Serapionem* locutus: Administratur in medicinis oculi, & abstergit albuginem subtilem, & desiccatur ejus humiditatem. Hinc Aqua fœniculi eundem solvere, oculisque immittere *P. A. Matthiolus* lib. 1. Herbar. cap. 15. præcipit. Et *Nicolaus Myrepsus* Aquæ suæ, sect. 24. de comp. medic. descriptæ immacerat, quam, præter alios usus, etiam ad albugines crassas & nubeculas oculorum probatam prædicat. Albugo autem docente *Sennerto*, vel ab humore pituitoso, vel sero crassiori corneæ impaeto, vel, quam major Autorum pars vulgò tradit, à cicatrice cum oritur, in hac posteriori specie curanda tantopere prodesse vix poterit, quæ emollientia, qua virtute is destituitur, potius requirit. In priori tamen vi sua resolvendi, attenuandi & discutendi, ut & abstergenti locum utique inveniet, præcipue cum volatili sua tenuissima exhalatione densam corneæ tunicæ substantiam penetrare, ejusque lamellis sese insinuare egregie valeat. Nec tenues ideo tantum caligines istas, sed & crassiores paulò seri stagnantis concretiones & nebulas dissipandi robore pollet.

In constrictione etiam pupillæ ab humiditate orta Collyrium præscribit *Hæron. Mercurialis* l. c. cap. 35. cui Moschum adjungit. Cum enim uvea tunica pupillam constituens ob humiditatem laxatur, & quasi enervata in se ipsam collabitur, vel ab ejusdem humoris nimio adfluxu, aut etiam humore flatuoso intumescit, Moschus eadem virtute, qua serofos humores disgregare, & juxta cum flatibus discutere, sicque partem exficcare potest, hinc etiam operabitur, & naturalem parti temperiem restituet.

Quapropter in ipso quoque Suffusionis principio medelam aliquam conferet, atque ita non incongruè à *Joh. Bapt. Montano* conf. med. 84. & 101. Mixturæ cephalicæ, necnon Saponi; pro lotionis capitis composito, fuit additus; aut alio modo administrari poterit.

Pelliculam ab eodem detrahi *Conr. Kunrath* l. c. autor est, quæ oculis supercrescere soleat, quâ dum procul dubio *αλεπούριον* sive Uaguem oculorum, quem nervosam membranam vocat *Celsus* lib. 7. cap. 7. innotuit, num utilis in eo esse queat, meriti dubitatur, quia exsiccando quidem ulteriori ejusdem incrementi obfistere, generatam autem vix tollere, nedum detrahere potens est. Licet aliquem facilius inveniat locum, si Pterygium nihil aliud esse dicamus, quàm ca-

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

runculam in angulo interno oculi extensam, dum humore viscido, ut cum *Cl. Anton. Molineto* loquar, imbuta caro illa, expandens se adinstar membranulæ, multam oculi partem obnubit, vid. ejus Dissert. anat. pathol. de sensib. c. 6. Quo certè in casu humoris istius viscidæ fusionem, rarefactionem & dissipationem particulæ Moschi volatiles promittunt.

In Lippitudine porro, sive Lachrymis involuntariis curandis locum invenit, non siccandi tantum, & ita lachrymalia vasa constringendi vi quadam effluxum illum moderando, ipsumque abundantem humorem discutendo, sed & cerebrum partesque nervosas ac glandulosas calefaciendo & roborando, sicque nimiam feri generationem & separationem præcavendo. Unde ita dictas Pletes cum moscho & ambra Species pro usu interno commendat *Piso* l. c. cap. 27. Moschum ipsum odorandum *Christoph. Wirsungus* Medic. part. 1. cap. 7. §. 7. consulit, & Collyrio *Joh. Mesue* de morb. intern. curand. immiscet.

Nec humiditates solùm morbosas, verùm & flatuosos oculorum adfectus, ceu *Constantinus Africanus* scit bit, eadem efficacia dispellit; imò spirituum animalium vigorem & augmentum procurando, visorij unâ eundem fructum impertitur, sicque præstantissimam illam actionem, quam visum adpellamus, variis modis adjuvat atque emendat.

Moschi virtus in Aurium morbis.

Quàm miserranda Surdorum, & tædiosa Surdaestrum sit conditio, neminem, qui divini illius sensus, Auditus nempe, usum perpendit, latere potest. Illis autem medelam sæpè Moschus adferre promptus est. Quod jam olim *Averrhoes* tradidit, Surditati cum mederi cessat. Et *Hæron. Mercurialis*, *Galen*i doctrinæ innixus, qua medicamenta adfectibus istis adcommodata calefacientia, incidentia, extenuentia, & altè penetrantia esse debere monet, hisce tract. de aurium affect. Moschum adnumerat. Proderit autem, sive in tympano, sive in remotioribus magis partibus causa mali lateat. Illud enim ab humoris frigidiore adfluxu humectatum incrassescit, àque naturali sua tensione remittitur; hæveo vel crassiore humore obliuuntur, implentur, ac ita allentis: Et is percussione non, vel imperfectè sentiunt, vel denique ipsi spiritus animales cerebri in temperioris culpa pauciores geniti parte admodum communicantur. Unde Moschus humores illos attenuans & discutens, calorem torpidum suscitans, & spiritus adaugens, debitum siccitatis ac tensionis gradum, cavitatum puritatem, meatuum libertatem, spirituumque copiam abundè suppeditando, *αυροποιον* & *αυροποιον* quamoptimè debellabit. Majorem hinc virtutem Oleum illud auri instillandum nanciscitur, quod ex *Alexandro Benedicto* *Joh. Georg. Schenkus* obs. atq; exper. cent. 3. obs. 50. & cent. 7. obs. 67. adducit. Id quod, sed paulò, Moschi imprimis duplicato pondere, mutatum, magnoperè extollit *Bart. Montagnana* conf. 65. canon. 12. suum id inventum adferens. Aliud simplicius habet *Dom. Leonius* l. d. lib. 5. cap. 2. aliudq; cap. 5. Trochiscos etiam, usus tempore raphani & succo solvendos, cum Moscho parant *Joh. Zecchini* consult. 43. & *Fel. Platearius* Prax. tom. 1. lib. 1. cap. 8. Auris in super, post liquoris instillationem gossypio, quod Moschum conservaverit, ocludere jubet *Reiner. Solander* sect. 1. conf. medic. 4. idque alias etiam aëre frigido, humido, & nebuloso observandum præcipit conf. 10. & 11. Non minus in gravi auditu Liqueores auribus dicatos eodem imbuiere suadet *D. Bernhard. Verzascha* obs. med. 91. Moschum gossypio involutum auribus noctu indere *Rod. à Fonseca* t. 1. Prax. med. 14. idem etiam ad boretale & Aquilonium frigis arcendum *Aloys. Mundella* Epistol. medicat. 20. consulit. Tale remedium

K x 3 per-

perpetuū usurpatum Viduam quandam Delphensem à surditate satis diuturna liberaverat, apud *Forestum* lib. 12. observ. 15. Vid. quoque ejusdem observ. 7.

Similis remedii applicatio depravato auditui, sive aurium tinnitui medetur, commendata propterea ab *Hier. Mercuriali* tom. 1. consult. med. 48. *Benedicto Silvaticocent.* 2. conf. 22. *Thom. Mermannol.* lib. 1. consult. med. 33. aliisque. Cui & aliàs diversimodè opponitur; imprimis verò cum aliis distemperatus & mixtus auri instillatur, usui huic inserviente Aquâ à *Petro Bayro* Enchirid. pract. dist. 4. cap. 4. recensita. Vel Moschus cum aliquot olei fœniculi guttis, notante *Gregorio Horstio* lib. 2. de sanit. tuend. cap. 4. de bambace excipit cavitati auris imponatur; ut plurima alia passim notata prætearam, quæ ab odoramento nostro non minimam virtutem mutuata flatulentos illos & vaporosos halitus, æm aurium internum replentes & agitant, versusque sensorium impellentes, valent dispellere.

In aurium dolore non minùs utiliter adhibetur, sive à flatulento spiritu, vehementer membranas tum in auribus internis, tum præcipuè in exiøre earum cavitatē distendente, sive ab humoribus frigidis simulque acris, & acore præsertim mordacibus ille proficiatur. Hinc oleum moschelimum ab *Arnoldo Villanovano* Breviar. pract. lib. 1. cap. 31. Oleum chamæmelinum, vel Castoreum Moscho permixtum à *Petr. Andr. Matthiolo* lib. 1. Herbar. cap. 15. laudatur; & gossypio etiam moschato auris oclusio à nonnullis præcipitur.

Idem dolor, & quidem ut plurimum à pure circa partem illam coacervato ac generato oritur, in quo casu Moschus præriter conferre creditur, teste *Theodor. Corbejo* Pharmacop. bipart. lib. 2. class. 1. sect. 2. cap. 7. Et *Forestus* multos, quibus auris sanie longo tempore maduerat, sola imposta bambace, in qua is reservabatur, curasse se l. c. testatur. Si enim serosi humoris collectio in aure, ob partis hujus intemperiem accidat, longiori dein in anfractu illo mora in purulentum quid ejusmodi faciens, vel etiam excrementitia ista humiditas ab aliqua cerebri humiditate p. n. vel imbecillitate generetur, & illuc descendat, corroborante virtute sua cephalica, & viscerosorum humores discutendi ac siccandi, ulteriori puris productioni posse Moschum resistere existimo.

Moschi vires in narium vitiis.

Cum naribus imprimis dicatus videatur Moschus, quas benè temperatas, odoris sui singularem ob præstantiam, minè adficiit & demulcet, indignum laude ejus foret, malè adfectis iisdem opem si denegaret. Odoratus sanè nocuentis sive impediementis, si ab intemperie frigida, ut plurimum contingente, dependeant, alia inter etiam Moschum naribus haustum proponit *Joh. Mesue* lib. de morb. intern. Potestate itaque sua calida id præstabit; quamvis & alio modo languescens, vel oblitteratum sensum illum suscitare ac restituere valeat. Cum enim ejusdem diminutio vel abolitio non organi solùm, quod odorabile atomorum tum receptioni, membranæ videlicet narium internæ, nervosis à processibus mammillaribus & tertia nervorum conjugatione fibrillis copiosè instructæ, tum ad ipsum τὸ πῶτον αἰσθάνεσθαι delationi & dispensationi inservit, sive nervorum jam nominatorum intemperiei simplici, sed & obstructioni sit adtribuenda, reserationem horum particulis suis penetrantissimis utique promover, pituitosos humores incidendo, ad exitum vel in vasa receptionem disponendo, organum roborando, sicque & atomis odoriferis ad nervosas fibrillas, spiritibusque animalibus, earum-

dem vectoribus, ad ipsum cerebrum liberam viam sternendo. Quod agnoscens *Platerus*, ad olfactum excitandum sæpe Moschum ei esse offerendum statuit tom. 1. Prax. lib. 1. cap. 8. Ideoque etiam non inutiliter Pulveribus sternutatoriis eum in finem adhibendis permiscetur, ejus exemplum delineat *Franc. Osvald. Grembsius* Arb. integr. & ruin. hom. lib. 2. c. 1 §. 11.

In Fœtore quoque narium passim adhibetur, quem non tantum odoratissimis suis moleculis palliando vel obfuscando quasi, sed & ipsa in causæ remotione operam suam conferendo, emendat. Cum enim semper alicui partis intemperiei humidæ, imò putredini etiam debeatur, unde exhalantes fœtidæ moleculæ ad sensorium delatæ graviter illud inficiunt, Moschus vi sua exsiccatoria, balsamica & aromaticâ intemperiem corrigit, & putredinis fomitem ac subiectum alterat atque extinguit. Quapropter *Guil. Rondeletius* lib. 2. de compol. med. in Unguentis ad Ozœnas præparandis odorata, Moschum &c. admiscendum, & *Reverius* tom. 2. Prax. sect. 3. cap. 4. ad fallendum tetrum istum odorem Galiæ mochaicam in vino odorato dissolutam sæpe esse attrahendam monuerat. Quod ipsum etiam remedium in *Gesneri* Evonymo, & *Sennerti* Medicina practica producit. Mesue quoque Pilulas oleo nardino, vel aqua rosarum solendas, aliasque naribus insufflandas, huic usui destinatas l. c. descripsit.

Uusus Moschi in oris fœtore, & odontalgia.

Cum perquam molesta sit adsistentibus ex ore fœtida quorundam exspiratio, imò ipsis etiam symptomaticè hoc adfectus noxia, continua nempe inspiratione pulmonibus & consequenter vitali sanguineo liquori spiritibusque vitalibus, nec non ipsis quoque animalibus communicata, rectè omnino Medici emendationi ejusdem omni tempore studium & operam impenderunt. Cui fini Moschum nostri dicare non omiserunt. Id quod *Ebn Sina* docere verbis Arabicis voluit: Quæ licet ab aliquibus: *Animam reddit fœtorem*, vel: *facit oris fœtorem*, quando porrigitur in cibo, vertantur; alii tamen: *Animam pellit fœtorem*, legunt, nonnulli verò simpliciter interpretantur: *evaporat*, & præciso fœtore, quem quidam tunc generari persuasum habent, ne quidem in rebus coctis eum vi suam amittere consent: Prout hæc supra laudati *F. Frischmuthii* benevolæ communicationi debeo. Ubi sanè alteram versionem esse præferendam existimo. *Ebn Sina* utique textui illi titulum *Decorativus*, uti *Gerardus Carmonensis* vertit, præposuit, eo ipso, de Moschi virtute, quæ ad corporis, & in specie oris decorem conciliandum efficax est, sese acturum innuens. Neque experientia aliud persuadet, quæ cibis odore forti alio non præditis recentem injectum odoris suavitatem, non fœditatem conciliare ostendit, indeque ori ingestos cibos hosce fragrantem atomos ei inspirare, ac terros reliquos suppressere, consequitur. Namque fœtorem radicitus tollere licet rarò soleat, egregiè tamen sulphur illud impurius atomis suis purissimis sulphureis emendat atque obnubilat. Hinc parum Moschi si manducetur, oris fœtorem palliari, *Joh. Platearius* perhibuit. Quo sensu etiam eum à rebus fragrantem odorem spirantibus obscurari, Moscho nempe, Trochiscis bechicis albis cum eo paratis, Moschardinis, Confectione alxermes, Aquâ rosarum cum Moscho odoriferâ, Nob. *Melch. Sebizii* Spec. med. pract. part. 2. sect. 4. cap. 25. tradidit. Nec alium in finem Aquæ oris collutioni dicatæ à *Guintherio Andernacensi* de Med. vet. & nov. com. 2. dial. 8. immiscetur. Quibus selectiora addantur, quæ ex Moscho parata exhibet remedia Ill. *Guern. Rolfincius* Ord. & meth. medic. specul. comment. lib. 7. sect. 2. cap. 11. Licet in ipsa insuper mali hujus causa tollenda non

non omnem operam deneger. Uti enim gemina cura ejus vel in fordibus circa dentes & gingivas hærentibus emundandis, vel in putredine, si quæ partibus quibusdam in ore subest, tollenda consistit, ita Moschus sulphureis suis, calidis & siccis particulis ejusdem exsiccationi opitulabitur, quin & ventriculi cruditates, aut pulmonis ulcera cum sæpe in culpa versentur, idem virtute suâ stomachicâ, caloris naturalis confortationi debitâ, pulmonibusque amicâ, quâ de inferiùs discurrere dabitur, ne generari tam promptè queant, ansam præscindet. Quò respexisse puto *Alexandrum Benedictum*, Tragematum mixturæ additum oris halitum commendare, scribentem, quibus jungere licebit Vinum & Electuarium, à *Bened. Victorio* lib. 1. cap. 11. tanquam experta remedia singulariter commendata. Sed hujusmodi ad odorata nonnisi post ipsius causæ sive putredinis remotionem esse deveniendum *Job. Bapt. Montanus* advertit, cum aliàs fœtor magis adaugeatur, quem tamen metum esse inanem ipse usus demonstrat, modò particulis odoratis in decente quantitate oris cavitas imbuatur, atque mephitis exhalans summo in gradu non sit fecidissima.

Quid in dolore dentium præstare queat, ex relatione laudatissimi *D. Wedelii* constare potest, qui in Marchia superiori Belgam militem vidit, odontalgiam cito cum adplausu in plebeiis grano uno vel altero piperis in cochleari aquæ leviter cocto, in divitibus autem grano uno moschi, saltem in cochleari super prunas calefactione facta, curantem, dum liquorem istum tepidum in aurem lateris adfecti injiciebat. Cujus medelæ rationem ex Anatome patere, ejusdem *Wedelii* eruditum est judicium, succedente scilicet, ob consensum meatus palatini & nervorum, eorundem roboratione, ac discussis humoribus serosis frigidis ac dolorificis. Similes inauit vires *Georg. Bertinus* lib. 18. medic. cap. 16. dum frigidum dentium dolorem mitigare perhibet, non determinato tamen ejusdem operandi vel utendi modo, quem tamen ad normam prædictam *Wedelianam* posse exigi, sufficiat.

Moschi vires pectorales & pneumonica.

Missis jam superioribus corporis partibus, ad mediū ventris considerationem progredior, ibique Pulmonibus prodesse Moschum deprehendo. Ut ideo Thoracicis calefacientibus, attenuantibus internis rectè cum adcescant *Mich. Schonbornius* pag. 60. Manual. med. Pract. & *Job. Tilemannus* sect. 2. de mat. med. ac inter specifica Arteriaca reponat *Gothofr. Möbius* Synops. epit. medic. pract. tab. 18. Idque nec Sineses latere Medicos, ex *Mich. Boymii* Flora Sin. discimus, qui pectori malè adfecto prodesse, & humores abigere malos statuunt.

Quapropter in Asthmate imprimis, ut singulare ad propriatum, passim adhibetur. Sic in Trochiscos pectorales ab *Augustanis* meis, in Elixir pectorale asthmaticum à *D. Guern. Rolfincio* Chim. in art. form. red. lib. 4. sect. 2. cap. 3. in Tragma pectorale Dissert. chim. de Δ . cap. 13. recipitur. Trochiscos suos, Aliptæ moschatæ nomine descriptos *Nicolaus Alexandrinus* pueris asthmaticis & pectoris angustia, vel anhelitus difficultate pressis commendat tr. de comp. medic. cap. 368. nec immeritò, non styracis tantum & ladani, sed & ipsius Moschi intuitu, ut ideo haud ob stare queat, quòd *Johannes de Sancto Amando* in-exposit. ob odorem solum, non virtutem pectoralem, hunc esse additum voluerit, quæcunque enim *Nicolai* fuerit intentio, sufficit, quòd virtus ista Moscho ratione nullâ denegari possit. Celebre autem imprimis, atque à plurimis laudatum est medicamentum, de quo *Joach.*

Camerarius in Hort. med. & philos. cap. de croc. pag. 50. sequentia habet: *Crocus adeo est thoracis affectibus amicus, ut sint qui ad $\mathcal{D}\mathcal{S}$. atque etiam unum, cum dimidio moschi grano & vino optimo calido, propinando asthmaticos curaverint. Ad respirationem ex nimio frigore prohibitam eodem modo plurimum conducit.* Quod ipsum, paulò tamen immutatum, ab aliis quoque recensetur, prout *Oswald. Gabelkboferus* lib. med. part. 1. sect. 2. croci scrupulo moschi grana duo, vel croci granis novem moschi grana tria misceri admonet, & *Nob. D. Joh. Ferdin. Hertodt* cap. 7. Crocolog. in Moschardinos crocatos croc. $\mathcal{D}\mathcal{J}$. & moschi $\mathcal{D}\mathcal{S}$. cum sacchi & tragacanth. decoct. rad. ireos solut. redigit, atque in magna morbi istius ferocia Pilulam ex croci gr. iij. opii gr. iij. moschi gr. j. *Petr. Poterius* curat. & observ. cent. 3. cap. 22. exhibet. Conferantur quæ hoc de remedio *Welschius* Exoteric. curat. & observ. med. chiliad. 1. obs. 144. memorat. Vid. etiam *D. Dan. Sennertus* Med. pract. lib. 2. part. 3. cap. 2. Nec tantum hac ratione deglutitus, sed etiam in vaporem resolutus ad pulmones detruditur. Quale suffumigium, ut vocant, humidum ex Moscho in decocto seminis ocyymi soluto prostat apud *Jul. Cas. Claudinum* consult. med. 1204 & *Job. Freitagium* Autor. med. lib. 2. cap. 13. Scilicet cum Asthma sæpe ab humore crasso & viscido, bronchia pulmonum obstruente oriatur, Moschus virtute suâ attenuante eundem resolvit, & faciliorem ad ejectionem disponit. Quin & dum à tenuium serosorum copia non minus quandoque inducitur, illam quoque calidâ suâ potentiâ diminuere valet. Quod si in ipsis vesiculis, aut venosis, nervosis, vel lymphaticis pulmonum vasis causa mali lateat, inque iis vel sanguis vel serum coagulationem passa fuerint, vaporesve aut flatus ea distenderint, rarefaciendo, resolvendo, discutiendo non parum emolumenti promittit.

Ex quo insuper vis ejus auxiliatrix in Tussi patet, quem ideo *Job. Crato* in Oxytel consil. 793 descriptum immiscuit, & Pulvere cum Trochiscis gallicæ moschatæ parato feliciter in quodam infantulo usum fatetur *Phil. Gruelingius* cent. 1. curat. 45.

Nec dubito quin & in ipsa Phthisi aliquando conducere queat, cum *Galenus* ad exsiccanda pulmonis ulcera Hedychroum, spicata & foliata Unguenta afflictuè naribus admota laudaverit, & *D. Christian. Langius* Miscell. curios. med. cap. 9. penetrantem Odoramentorum fragrantiam phthitici summa solamen adferre perhibuerit, id quod non tantum exsiccando ulcus, & expectorationem promovendo, sed & sanguinem insigniter corruptum restituendo præstare *D. Hermann. Grube* de simpl. med. facult. cognosc. sect. 3. art. 4. commentatur. Et secundum *Willisium* part. 2. Pharmaceut. rat. sect. 1. cap. 6. Vaporations & Suffitus in Phthisi nondum deplorata plus quam alia quævis remedia interdum prodesse solent, quatenus pulmonem ipsum attingunt, adeoque adfectione immediatâ materiam impactam solvunt, expurgant, exsiccant, aciditates p. n. destruunt, à putredine vindicant, corroborant, ejusque ductus aperiunt.

Tandem & à *Sennertò* l. c. part. 2. cap. 17. memoratum aliorum *εὐρωπαϊκῶν* in Pectoris vulneribus penetrantibus (quorum in curatione, sanguinis etiam, qui in thoracem effusus est, evacuationem indicari prædixerat,) adduci meretur, nimirum: Si acuto vulnere nullus sanguis effluit, isque in pectore detineatur, ager granum unum moschi sub lingua teneat. Ita enim statim sanguis fluere incipit, quod nonnulli pro secreto habent. Licet verò in sanguine commovendo Moschi virtus negati nequeat, utrum tamen in exigua adeo mole, & tam repente sanguinem, eumque vel ob extravasationem jam grumefactum, expellere queat, nonnihil dubito; & sanguinem, si quis ab ejus usu efflueret, ex ipsis potius vasis in labia vulneris dehisc-

centibus proditurum, suspicor, sicque usus iste Moschi tantopere probari haud deberet. *Höferus* tamen *Herc. med. lib. 2. cap. 3.* remedii hujus aliam paulò rationem assignat: *Ubi in pectoris vulneribus*, scribens, *sanguis nullus profuit, ne in cavitatem ruat, immitte ori sub linguam gr. j. moschi, &c.* Sed neque hoc modo satisfacit. Sanguinis enim è thorace sic perforato effluxus sistitur, sive quod vasa sponte cruorem stillare intermittant, sive quòd vulneris labiis concidentibus exitus ei denegetur: Si illud, Moschi exhibitione vitalis liquoris non necessaria, imò periculosa expulsio tentatur: sin hoc, nisi labia vulneris arte dilatentur, & æger situ conveniente locetur, frustraneus erit Moschi conatus, sanguine aliàs facilè non minùs in ipsam cavitatem penetraturo.

Moschi virtus cordialis.

Quàm insigne in corde roborando, illudque à quamplurimis malis vindicando robur inest Moscho, tum crebra experientia, tum infinita penè Medicorum docent testimonia. Sic *Haly Abbas Theoric. lib. 5. cap. 33.* confortandi ejus facultatem proponit, eamque in cordis intemperie frigida, mediante Sirupo pomorum, cum moscho, spica & aromatibus condito, vel per Confectionem Diamoschi dulcis cum vino, in *Pract. lib. 6. cap. 16.* propinat. Simile eum maciat *encomio Ebn Sina*, epotumque & illitum *Matthiolus* omnibus cordis adfectibus opem præstare adfirmat. Cor etiam confirmare *Setho* dicitur. Et in *Raym. Lullii lib. 3. Secret. medicamenta* inter cordialia Galangam, Melissam, & Moschum esse mirabilia, scribitur. Idem innuere voluit *Marfil. Ficinus lib. 3. de vit. long. cap. 1.* dum solaribus medicamentis eum adposuit. Solem verò cor vitalemque spiritum significare, tum alii, tum idem *Ficinus cap. seq. 6.* adnotat. Et quidem calefacientia esse, quibus Mars & Sol dominantur, in *Iatro-mathematicis Pseudo-Hermetis* legitur, quæ inter *ωάρια τὰ εὐώδη, omnia grati odoris* in specie recensentur. Hinc liquorem exornat cardiacum apud *Angel. Salam tract. 2. de var. Chemic. & Galen. errorib.* Spiritum in *Andr. Tenzelii Exeg. chim. part. 1. sect. 1.* Aquam apud *Joh. Agricolam* animadv. in *Poppii chim. part. 2. Sirupum in Dispensatorio Norico Novo, class. 2. sect. 2. & Londinensi pag. 100.* Nec decantatum illud cordiale magnum Anglicum *Walteri Rawlichii* inter præcipua ingredientia eundem respuit, cujus examen *D. Albert. Otho Faber, Reg. Maj. Angel. Medicus & Chim. Prof. publico scripto* edidit, Germanicè etiam nuper *Medicina experimentalis Digbeana* parti secundæ, Noticistypis excusæ, adnexum, sed falsò *D. N. de le Febvre* adscriptum. Hinc porro externè Balsama cordialia ingreditur, quale est illud *Schonbornii Manual. pract. pag. 98.* memoratum. Hinc Peruanos etiam ad Epithemata cordis usurpare, in *Joh. Fabri Hist. nat. Mexic. recensetur.* Quà verò id ratione peragat, *lib. 2. Meth. ad prax. clarum quodammodo facere laborat Joh. Heurnius, & Simplicia quædam spiritus lætiores reddere scribit, totâ, ut ajunt, substantiâ, quædam autem apertâ & occultâ potentiâ permixtis, istis Rubinum, Sapphyrum &c. his Moschum &c. adnumerans. Quam tamen à multis creditam occultam confortandi proprietatem rectius alii non admittunt. Genuinam rationem in compendio exhibuit Nobil. D. Wedelius Theorem. med. part. 5. sect. 7. theor. 15. Cardiacæ vel rarefactionem sanguinis secundum naturam restaurant, vel præternaturalem impediunt, vel resolutionem sanguinis auferunt, vel grumescens resolvunt, & theor. 16. Rarefaciunt tum sulphurea spirituosâ &c. tum salina &c. volatilia, nec non theor. 19. Quæ statum sanguinis in motu, calore, consistentiâ respiciunt, sunt Cordalæ. Moschus autem cum sulphure spirituosissimo & sale volatili abundet, his mediantibus, sangui-*

nem ad grumescens pronum resolvere, ac partem ejus in debita unione conservare, frigidum, effectum ac torpescens particulis activis calidis instruere, rarefacere, ac consequenter etiam spiritus languidos suscitare, deficientesque restituere aptus est; sive jam per poros corporis cutaneos intret, ac externè ad motus sanguini & lymphæ præterlabenti sese adtociet, sive cum aëre per fistulam pulmonariam ad pulmones deferatur, sive stomacho oblatus, venis vasisque lymphatis & chylosis se insinuet, ubique ad sanguinis vivifici miscellam tandem deportandus. Et sic vigore sanguini aucto vel reddito, ipsum etiam cor roborare dici potest, quatenus motus ejusdem à spirituum vitalium, h. e. partium sanguinis subtilium defectu impeditus, ab alterato ac mirificè correcto sanguine corrigitur ac immutatur. *Conf. Cl. Grubius l. c. sect. 7. art. 2.* Quin & cephalica Moschi virtus, quæ nervorum incolas, animales spiritus, grata ejus fragrantia demulcet, suscitatur, augeat, cordi non exiguum addere robur, dici debet, ita ut spiritus isti copiosi & vegeti influentes actionem cordis in sanguine elaborando, vigorando & circumpellendo egregiè adjuvent, quo de uberius agit *Thom. Willis Pharmac. ration. part. 1. sect. 6. cap. 1.* Quàm potenter verò odorata ejusmodi confortandi virtutem suam exserere queant, cum viribus sic satis integris ad ipsum cor penetrent, singulari observatione docuit *Exc. D. Joh. Sigism. Elsholtz in Ann. VII. Ephem. Germ. Curios. observ. 225.* Unde etiam virium per odores restitutionem merito tantopere extollit *Helmontius*, quos contactum immediatum cum spiritibus vitalibus servare, tract. Complex. atque mistion. clem. figm. § 34. scribit, & tr. Imag. ferm. imprægn. &c. § 18. & 19. odore spiritus delectari adserit, eò quòd odor illos, etiam abstractos, immediatè attingat, ac penetret.

Moschi usus in quibusdā cordis adfectibus.

Nunc famosissimis cordis passionibus, Palpitationi, Lipothymia & Syncopi quàm eximie conferat, spectatim inquirere adlubescit.

Et Palpitationi imprimis mederi, *Ebn Sina* scripserat. Quod ad illam tantum alii restringunt, quæ vel flatibus, vel intemperiei frigida ortum debet. Quamvis non desint, qui & in causa calida eundem non planè exclusum velint, ceu *Marc. Gatinaia Prax. med. cap. 30.* in simili casu aërem ad frigiditatem per odores frigidos, aceti, rosarum, camphoræ, alterandum, semper tamen odoriferum aliquod & aromaticum calidum, Moschum &c. eis jungendum esse scribit, *ut faciant frigida penetrare*; Supervacaneâ prorsus curiositate, cum & frigida ista credita odorifera per se satis superque in corpus penetrare valeant, ipsaque experientia edoceat, nec oleum igni addere conveniat. Adfectum autem hunc humoribus, ut & vaporibus frigidis ut plurimum deberi, quandoque etiam à sanguinis crassi multitudine, vasa sanguifera & cordis ventriculos nimium gravante, aut lymphæ in pericardio magna copia concitari, communior jam olim fuit sententia *Cl. Franciscus de le Boë Sylvius lib. 1. Prax. med. cap. 35.* humoribus flatibusve multum viscosissimisque acribus, & præsertim acidis potiorē causam tribuit. *Willisus* verò vitium hoc maxima ex parte aut sanguini, aut vasis cordi adpensis l. c. cap. 4. imputat, ibi nempe sanguinem aquosum, particulis segnioribus & non satis activis constantem, ideoque ad effervescentiam minùs aptum, è cordis sinibus non liberè & expeditè eici, unde stagnando accumulatus, à corde summo nisu propellatur, aut etiam grumescens, sanguinis exilitionem liberam & totalem impedit: hinc verò causam merè convulsivam adesse, quæ nervi arteriæ aortæ trunco circumligati, eum coarctando sanguinem è corde non nisi per minutas por-

iones exsilire permittant. Sanguinem itaque in concretionem istam abeuntem, sero crasso, viscoso mixtum, aciditate inimicâ contaminatum, vaporibus flaturibusve turgidum, innatis activis particulis depauperatum, Moschus egregiè ad statum naturalem reducere potest, dum sulphureis suis & salinis tenuissimis atomis massæ sanguineæ debitam fluiditatem tribuit, principii ejus activa evehit, multiplicat, crassos humores attenuat, acorem hostilem extinguit, vapores & flatus discutit, sicque naturalem sanguini motum restituit; imò spasmodicas etiam adfectiones fugat virtute suâ, quâ cerebro nervisque gratus adeo existit, spiritus nempe tumultuantes suaviter ad tranquillitatem deducendo, ut & irritantem causam enervando. Hinc spiritum suum, quem ita vocat, regium, Moschus imbutum, in ejusmodi pathemate maximè proficuum seprehendisse *D. Frid. Hoffmannus* Methi. med. lib. 1. cap. 19. scribit. Et præter alia, Trochiscos inprimis moschatos deprædicat *Jacob. Hollerus* de morb. intern. lib. 1. cap. 29. Salutare Electuarium *Epiphanius Ferdinandus* observ. medic. hist. 22. quo, ut & Confectione alkermes, Diamoscho dulci, nec non Pomo odorifero, Epithemate, ac Sacculo cordialibus, moschatis, Viduam quandam à magna cordis palpitatione cum animi deliquio liberaverat. Et Unguentum exhibet *Lac. Riverius* tom. 1. Prax. med. lib. 7. cap. 2. ex Ung. ros. ol. cinnam. & caryoph. moscho & ambra confectum; quamvis Unguento rosato axungiam gallinaceam, ob majorem penetrationem (quæ tamen hîc necessaria tantopere haud esse videtur) *Joh. Crato* in consil. Scholz. 104. præferat. Videatur etiam *Eustach. Rudius* lib. 1. de hum. corp. affect. cap. 54.

Porro ἐκλυσιος & ἀποφυξίος, exolutionis & deliquii animi Moschus præsentaneum est remedium, prout in defectione cordis ex frigore & membris deficientibus confortantem ejus vim recenset *Isaac Israelita* lib. Pantehn. 5. theor. cap. 104. Utilem quoque eum ad revocandos animo deficientes viriumque resolutionem *Sethus* pronuntiat. Atque præter experientiam ratio idem dicitur, à vi ejus rarefaciente penetrantissima perita, cum uterque adfectus à sanguinis circulatione, ob hujus coagulationem, & spirituum influxum imminutum vel inhibutum proveniat. Tenuis itaque atomi illa corpus ingressæ non sanguinem solum torpentem crassiorem alterant, attenuant, eique volatilia sua effluvia confundunt, sed & languentes animales spiritus excitant, sicque continuato itinere ipsam etiam cordis regiam invadunt, pristinam ei serenitatem motumque restituentes, sive jam per se, aliis solidioribus, liquidioribusve corporibus permixtus ori immittatur, naribus obiciatur, aut alibi cutaneis potis adponatur. Prout eum in finem internè & externè adhiberi potest Elixir vitæ, nec non naribus & ori insufflari Pulvis, à *Guil. Fabricio Hildano* lib. de gangr. & phac. cap. 20. descripta.

In ipsa tandem Syncope eum auxiliari, *Averrhoës* lib. de reb. marin. tradidit, quæ cum gradus saltem magnitudine à Lipothymia & Eclysi differat, eundem juvandi modum pariter obtinet. Atque virtutem hanc tam in accessione, quam extra ipsam exserit, quare eundem per se, aut in Sacculis vino odorato conspersis admoventi debere *Christophorus à Vega* de arte med. lib. 3. sect. 6. cap. 9. monuit, cum vitali & animali spiritu per illos recreato, vires quoque subito recreentur; Nam, addens, quandoque vidimus imminuentem accessionem synopes bonis odoribus, naribus admotis, propulsatam. Moschum similiaque jucundè odorata non solum ægotantis naribus admovenda esse, vult *Dionys. Fontanonus* de morb. intern. curat. lib. 1. cap. 2. atque ex eo *Nicol. Piso* de cogn. & cur. morb. lib. 1. cap. 17. sed & tenuissimum in pulverem redacta naribus insufflanda. Et in Præct. theor. empir. *Joh. Marquardi* in paroxysmo

Aqua rotarum cum pulv. caryoph. & moscho remixta circa infirmum spargenda, extra tempus verò illud Sacculus moschatus gestandus proponitur. Internè autem conducit medicamentum, quod ex quodam *Hugone Petrus Aponus* addit. in l. br. Mel. de Morb. int. cur. adducit, integram Moschi drachmam recipient, Pulvis item cum Aqua perlata *Claud. Deodato* lib. 3. Pan. h. hygiast. cap. 33. nec non Electuarium *Petro Hispani* (qui postea, cum Pontifex Romanus effectus creatus, *Johannes XXI.* dictus fuit, Vid. *Platina* de vit. Pont.) in Thes. paup. cap. 23. descriptum.

Moschi virtus hepatica.

In hepate curando Moschum aliquod symbolum conferre, *Albertus M.* de rer. propr. existimat, dum in ejus imbecillitate illum commendat, & *Zacutus Lusit.* Medic. princ. hist. lib. 3. hist. 9. hepar. frigidum ab eo sanari, edocet. Unde etiam à *Petro Joh. Fabro* tr. insign. curat. var. morb. cap. 69. in curatione juvenis hydropici, anasarca laborantis, ad hepar & ventriculum roborandum, Electuarium moschatum per mensem felici cum successu usurpatum fuerat. Quibus sanè contradicere vix quisquam sustinebit. Si enim varias sanguinis dyscrasias, & in specie, quam frigidam vulgè vocant, consideremus, sanguis autem copiosè ad hepar feratur, eo ipso frigidam ei intemperiem vel hac ratione communicari, nemo diffiteri potest, à quo etiam imbecillitas ejusdem, ob contingentem unâ spirituum paucitatem & inertiam, ortum habet. Hicque positus, cum sanguis crassescens & effusus promptè stagnare, inque viscere cumprimis illo, tot minutissimis vasibus copiosè instructo, obstructions parere soleat, imò nec bilem inertem & viscidam sufficienter colare & à sanguine separare hepar valeat, talique interum statu hydrops facilè producat, Moschus ubique remedium adfert, calorificis suis particulis intemperiem frigidam corrigendo, spirituum defectum succurrendo, sanguinem attenuando, atque ad motum majorem incitando, imò iidem sulphureis suis & alcalicis spiritibus ac revera biliosis atomis inopiam bilis supplendo, visciditatem resolvendo, inertiamque stimulando.

Moschi vires spleneticæ.

Nunc, quid in morbofo liene curando efficiat Moschus, paucis insuper indicandum erit.

In melancholia quidem hypochondriaca, leni ut plurimum (utpote quod viscus sæpe hîc coadificatum est) adscripta, ejusdem usus supra jam fuit ostensus, ubi de Capitis morbis agebatur, cum tamen hæc non aliam tunc nisi quæ enus capitis vel cerebri sobolem, animales, spiritus, læsam respicit, considerationem subierit, meritò hîc etiam in adfectum illum, hypochondriacum dictum, melancholici quid ferè semper habentem, inquiritur. In quo Moschum confortantis præcipuè vicem subire passim docetur. Prout *Malachias Geigerus* tract. de melanch. hyp. cap. 12. & 28. ejusdem usum externum, & cap. 27. internum quoque commendat. Et in Elixirio citri cordiali *Rolfinciano* Moschum vires cordis in tali casu graviter laborantes mirum in modum reficere in *D. Herm. Grubii* Analysi mal. citr. cap. 2. art. 1. Cichunde etiam confectionem singulariter prodesse apud *Paul. Zacchiam* lib. 1. cap. 32. de affect. hypoch. legitur. Verum & in ipsa morbi causa, sive melancholico humore præparando, *Riverii* judicio lib. 5. Instit. medic. part. 2. sect. 1. partic. 1. cap. 4. conducit, qui equidem, cum frigidus, siccus, crassus & terrestris esse statuatur, talia potius, quæ juxta cum calefaciendi, attenuandi & incidendi virtute humectandi unâ vim obtineant, requirere creditur; impossibile tamen judicat *Riverius*, aliquod reperire medicamentum, quod calefaciat &

attenuet

attenuet, simulque humectet, unde effectum hunc aliorum admixtione, quæ peculiarem humectandi vim præ se ferant, esse obtinendum. Quæ cuncta nunc rigorosiùs discutere non lubet; mihi sufficit, quòd Confectionem alkermes & Diamoschum dulce præparantibus istis adjunxerit. Cæterum si in hoc quoque viscere copiosa & minutissima vasa sanguifera, adeoque faciles in iis à sanguine & humoribus junctis crassioribus, tartareis ac evanidis obstructions & inflationes, ut & humoris serosi, naturaliter ibi, secundum quosdam, segregandi in acorem vitiosum, humori melancholico Veterum respondentem, pronitatem perpendamus, quid Moschus hic præstare queat, ex sæpiùs jam dictis principiis sponte elucescit, quibus nempe sanguinem ejusque serum attenuat, vigorat, in motum liberiores agit, ab acore inimico liberat, flatusque exortos dissipat.

Vsus Moschi stomachicus.

Ventriculo Moschus salutare inspirat atomos, eundem confortantes, coctionemque ciborum promouentes. Ad ipsum enim non minùs, quàm ad alia prioris ævi odorifera pertinet, quod *Galenus* lib. 8. de comp. med. s. l. cap. 3. quemadmodum scilicet graycolentia omnia stomachum subvertere soleant, sic odorifera confortare, scripserat. Ut ideo benè stomachica inter medicamenta simplicia à *Joh. Georg. Macasio* lib. 2. Prompt. mat. med. sect. 10. cap. 9. fuerit relatus, & à *Joh. Guintherio Andern.* de medic. vet. & nov. comm. 2. dial. 5. ventriculum corroborare & exsiccare, nec non humores in eo pituitosos à putredine vindicare perhibeat.

Hinc ad intemperiem ejus frigidam alterandam Moschus à *Sebizio* laudatur part. 4. Manual. pract. sect. 1. cap. 2. atque Sirupo, ad ventriculi frigidi ac phlegmate vitioso laborantis curationem destinato, à *Constantino Africano* lib. de stomach. cap. 11. ut & Diaromati ad frigiditatem stomachi ex phlegmate præscripto permiscetur. Externè etiam, inter ventriculum calefacientia, Ceratum *D. Joh. Tilemannus* sect. 2. de mar. med. eodem exornat, Scutumque stomachicum, mediante corone moscharo, autore *Cassaro Bravone de Sobremonte Ramirez* sect. 6. Tyrocin. pract. cap. 9. effingitur.

Eam ipsam ob causam & ventriculi inflationi succurrit. In hoc siquidem symptomate, *Sebizii* judicio l. c. cap. 8. flatu discutuntur & ventriculi calor augetur iisdem remediis, quæ in frigida ejus intemperie profunt. Sic *Arnoldus Villanovanus* Pulverem huic scopo optimum, cum vino vel cibo sumendum, lib. 2. Breviar. Pract. cap. 13. & *Them. Fienus* lib. de flarib. cap. 18. Unguentum, regioni ventriculi inungendum, describunt.

Nec minùs dolori visceris illius idcirco medetur, prout contra stomachi dolorem ex frigiditate Moschum simpliciter cum vino, vel aliis exhibendum esse *Platearius* cum *Isidoro* præcipit.

Sic in Cardialgia, purgato priùs ventriculo, Eleotarium Moscho conditum proponit *Petr. Joh. Faber* Sapient. univers. lib. de morb. ventr. cap. 3. Et celebre, nec inelegans est Emplastrum ex ambra, alypta moschata, & styrace concinnatum, à *Nicol. Monardo* simpl. med. hist. cap. 7. delineatum. Quam ipsam quoque Massam in Pilulas redactam flatu discutere, adpetentiam excitare, & concoctionem juvare, idem Autor perhibet. Debili nempe ciborum digestionem juvandæ Moschus non minùs conducit, ideo Pulverem aromaticum in *Mesues* Antidotario, Spiritui vini aromatizzato *N. de le Fevre* part. 2. Chim. nec non Aromatico rosato *Gabrielis* additus, in quo Moschum cum Ambra &c. ut basin esse considerandum, *Gabr. Fallopius* de comp. med. cap. 30. statuit. Externa inter præcipuè me-

morandum est Ceratum stomachicum, *Monardiano* illi ferè simili, quòd Regi Hispaniæ ejusque Proceribus esse familiare, in *Joh. Prævotii* Hortulo med. pag. 15. refertur, ab Exc. etiam *D. Cass. Theoph. Bierlingio* Advers. Curios. append. cap. 23. pag. 144. sed paululum aliter enarratum.

Et in specie Puerorum debili stomacho convenire medicamenta moschata *Sebast. Astrucius* cap. 36. de puer. morb. ejusque Commentator *Nicol. Fontanus* consentiunt.

Nauseam insuper abigere, & appetitum restituere, *Ebn Rasaus* autor est, prout & Trochiscos alipræ moschata Pilularum formâ transglutitos adpetitui prostrato conferre *Joh. Platearius* in addit. Antidor. Nicol. testatur. Sic Juvenis quidam toto anno cibi fastidio laborans Pilularum cum Moscho paratarum usu fuit restitutus, apud *Zacutum Lus.* lib. 5. Prax. histor. cap. 1. Videantur etiam Pilulæ lib. 2. cap. 12. obf. exstantes.

Quamvis autem eam hic Moscho laudem adsignare nolim, quâ laudatissimis aliis stomachicis præferri aut conferri queant, virtute tamen suâ calidâ, tenui, volatili & alcalicâ non sanguinem tantum, & consequenter calorem ventriculi confortare, languidoque in nervis spiritus excitare & roborare potest, sed phlegma etiam, salivam, vel pituitam vitæ diorem, gravantem, aut fermentum obtundentem, aut fomitem flatibus præbentem incidit & attenuat, aciditatemque p. n. destruit, atque ita inflationes morbosas discutit, dolores abigit, nauseam dispellit, adpetitum auget, fermentum libertati restituit, coctionemque promover.

In Bulimo denique à nonnullis usus ejus adducitur, licet ut plurimum ad symptomatis tantum conjunctioni, i. e. lipothymia curam & præservationem illo dirigatur, quâ ratione ægrum odore Moschi, Ambra &c. excitari, ipsique pullum assatum & aquâ rosarum moscharâ adpersum odorandum & comedendum offerri debere, monet *Leorellus Faventinus* Pract. med. cap. 35. Ipsam tamen etiam causam morbificam ex dictis fundamentis enervare potest, tum in morbi principio, spirituum esurinum acidiorum quasi dulcificando, tum in ejusdem progressu, cruditates viscosas incidendo & corrigendo. Hinc minùs adquietere possum in *Vict. Trincavellii* judicio lib. explan. in lib. 1. Galen. de art. cur. ad Glauc. cap. 14. dum procurando animi deliquio in bulimo non quoscunque, vel etiam gratos Moschi &c. odores, sed esculentos offerri scribit; cum delectando tantum illi, non alendo spiritus confortent. Ut enim scrupulosius hæc jam examini non subiciam, sufficit, quòd Moschi odor spiritus deliquium passos suscitare & vigori suo restituere queat, requisitam enim simul in adfectu isto nutritionem prout Moschi, ita vini quoque tostarumve carni nidor haudquaquam præstabit. Aliud itaque erit lipothymiam in bulimo abigere, aliud: ventriculi & partium aliarum indigentiam necessario commeatu instruere.

Moschi virtus anticolica, & anthelmintica.

In torminibus ventris, colicisve doloribus Moschum facultate calefaciente, discutiente & absorbente prodesse aliquando posse, nullum videtur esse dubium, sive jam frigida aliqua intemperies intestinalis adfuerit, sive flatu illa distenderint, aut infesta vel acrior acide una materia vellicaverit. Quin & cum colicam sæpius ab humore nerveo impuro in mesenterio congesto, crassiore, viscoso, & in lymphæ ductus excipi, aut in cavitatem intestinorum deponi minùs apto, generari, facile *Cl. Willisio* credere debeamus, hæc quoque ratione Moschus conveniet, dum vitiosam istam lympham attenuabit, alterabit, atque resolver. In colica

colica sanè crassos intestinorum flatus ab eo resolvi, jamdudum *Averrhoës* tradidit, cum quo, præter multos alios, facit *Georg. Bertinus* lib. 18. de nat. medicam. cap. 16. colicum dolorem ab eo dissipari scribens. Et tanti hanc potestatem fecit *Paracelsus*, ut in quibusdam colicis doloribus tanquam specificum & arcanum quoddam extulerit. Uude *Paragran. tract. 1.* morbos ab arcano sive remedio denominandos esse docens, colicam Zibethinam, colicam muscatam sive moschatam, non ventosam, biliosam esse vocandam adstruit. Hunc in finem Aquæ suæ carminativæ procul dubio eundem addidit *Ang. Sala* append. ad hydrelæolog. cap. 14. & Boko anticolico *P. I. Faber d. l. de morb. intest. cap. 2.* nec non in colico dolore, à crassa letræque pituita orto, ad noxi humoris à purgatione reliquias, frigidamque ventriculi & intestinorum intemperiem emendandam, alvumque roborandum Diamoschum consuluit *Nicol. Abrah. Frambesarius* Consult. med. lib. 5. tit. 5. cons. 2. Externe non minus conducit. Eapropter in ventris torminibus Olei moschelini inunctionem suadet *Jac. Theodorus Tabernamontanus* de therm. & acid. c. 6. & Moschum oleo rutaceo solutum *Jacob. Hollerius* de morb. int. rn. lib. 1. cap. 41. laudat, non solum parti dolenti inungendum, sed & cum clysteribus injeiendum. Quare ipsum etiam Elixir vitæ *Matthioli*, scilicet cum alio, tum Moschi ob accessum, in clysteribus cohorum, præsentaneo auxilio, ubi à flatu aut frigidityte morbus provenit, addi, *Augustani* mei class. 15. Pharmacop. suæ testantur.

Vermibus inuper, in intestinis communiter stabulantibus, eum resistere, eosque in corpore necare, in *Conr. Künrathii* Medull. destill. legitur. Quare in Pulveres anthelminticos à *Barthol. Montagnana* cap. 10. Antidot. receptus, & Compositioni ad vermes commendatæ *Joh. Bapt. Montano* cons. med. 222. additus. Nam dum balsamica sua & amaricante virtute putredini resistit, eamque quodammodo tollit, eo ipso vermes, in putredine, vel cum ea persistentes enecat, atque ne amplius generentur, prohibet. Ut symptomatum gravissimorum, verminantibus familiarium, àque Moscho debellandorum nullam mentionem faciam, quale exemplum apud *D. Joh. Nic. Binningerum* cent. 2. obs. 83. invenire dabitur.

Moschi vires uterinae.

Utero Moschum esse pergratum, à plurimis passim adseritur, medicamentis idcirco hytericis adjunctus à *Macasio* in suo Prompt. mat. med. *Let Moscho & Zibetho nihil videatur vilius & abjectius, inter odoramenta tamen utero indenda principem habent locum*: verba sunt *Zacuti Lusii*. Med. princ. hist. lib. 3. hist. 9. Inque inprimis ex illo phænomeno communiter sibi persuasum olim habuerunt, quod ab ejusdem odore naribus hausto feminæ ut plurimum in suffocationem dictam hystericam, sive uteri adscensum incidant, ab eodem autem infernis partibus admoto iterum restituantur, ita ut ad ejusdem exhalationes captandas uterus motu aliquo sursum deorsumve feratur. Imò tanti hoc nonnulli fecerunt, ut animal aliquod esse uterum consinxerunt, *Platonis* auctoritate ita persuasi, ζῷον ἐπιθυμητικὸν τῆς παραγωγῆς, animal generandi avidum, in *Timæo*; nec non *Aretæi*, σπλάγχνον γυναικίον ἀγχίστα ζωῶδες, muliebres viscus, animalis ferme naturam adeptum, & ὁ νοῦς ἢ ζῶον ἐν ζῶῳ, velut animal in animal lib. 2. de caus. & sign. acut. cap. 11. vocantis. Hoc autem suaveolentium desiderium & concupiscentiam *Franc. Perla* lib. de loc. ex benè elaborati seminis grato odore deducit, quod semen cum naturali instinctu uterus avidè adpetat, alia quoque odorata quælibet analogia

quædam sub seminis specie eum desiderare putat. Verum nonnullæ feminæ ex Moscho graviter interdum cum adficiantur, opinionem hanc minus adprobat *Joh. Bened. Sinibaldus* Geneanhr. lib. 10. tit. 3. cap. 2. idque tò magis, cum uterus odores, quæ tales percipere nequeat, organo utpote odoratorio destitutus. *Aretæo* verò uterum non esse animal, sed cum animali quandam saltem habere similitudinem, ipsa ejus verba evidenter edocent; apud *Platonem* etiam duntaxat secundum analogiam aliquam sic dici, benè animadvertit *Melch. Sebizius* Manual. med. pract. part. 5. sect. 1. cap. 8. Conferatur quoque *Joh. Languis* lib. 1. Epist. med. 23. Iste autem uteri adscensus, præsertim qualis olim ad præcordia usque venditabatur, uti merè est imaginarius, ita etiam Moscho nullam vim uterinam hîc adstruere potest. Quamquam aliàs virtute sua, qua cerebrum & cor, eorumque humores nativos, ac nobilissima contenta, spiritus respicit, utero tum sanitate prædito, tum etiam quædam morbo egregiè prodesse queat.

Licet itaque Moschi odor hystericam dictam passionem in multis, seu Cap. XVII. ostensum fuit, producat, eandem tamen curare quoque posse, communiter statuunt, *Averrhoëm* secuti, Collig. lib. 5. de reb. mar. suffocationi matricis eum subvenire, scribentem, idque inprimis, partibus inferioribus si admoveatur. *Quibusdam mulieribus*, inquit *Jac. Sylvius* meth. medic. comp. ex simpl. lib. 1. cap. de animal. uteri præventionem adfert, aliis in pecto contra hanc mirè prodest, utero valde gratus. Maximum ideo ejus usum in Pessis *M. A. Brasavolus* Exam. Sirup. monet, quales passim plurimi proponuntur, inferius Cap. XL. explicandi. Quin & inunctio cum eo facta laudatur, qualem ex oleo de behen cum moscho consuluit *Rodericus à Fonseca* tom. 1. consult. med. 33. & lanam xylinam oleo moschelino, in quo Moschus fuerit resolutus, madentem suadet *Platearius*, summeque utilem inunctionem istam deprædicat atque exemplis confirmat *Petr. Forestus* lib. 28. observ. med. 26. & 33. nec non *D. Joh. Schönerus* in Cons. med. à *Joh. Wittichio* collect. cons. 54. & 55. Emplastra etiam huic malo, sed præcipuè ad præventionem destinantur, quæ modo ipsi imponere umbilico præcipiunt, quale est Ceratum *Joh. Bapt. Spuntoni*, inter Selecta remedia recensitum, ad retinendum videlicet uterum furem. Tamen eam hac item in emplastri formam cum Moscho ac Ambra redacta *Nic. Monardi* in Hist. med. simpl. & simile *P. Fr. Berardini Christini* cent. 1. obs. med. 2. & 16. nec non cent. 4. obs. 26. modò infra illum, umbilicum nempe inter & pectinem, adplicant, cujus exemplum in *Dion. Fontanoni* lib. 3. de morb. int. cur. cap. 20. & *Guil. Rondeletii* meth. cur. morb. lib. 3. cap. 69. habetur. In fumum quoque resolutus in uterum immittitur, uti specimen ejus proferunt *Joh. Agricola* animad. in *Poppii* part. 1. tract. de Vitriolo, & *Horat. Auguinus* Epist. med. lib. 12. ep. 7. Aut inter coxas tantum adligatus consiluitur, seu videre est in *Horat. Guaranti* re poss. var. tract. 4. Quæ dum fiunt, graveolentia simul naribus adplicare, corpus verò reliquum diligenter munire, Practici præcipiunt, ne suaveolentia sua caput perat, morbumque adaugeat. Verum, ut liberè, quid hîc sentiam, edicam, iste Moschi & consimilium suaviter fragrantium, circa inferiores corporis partes, usus ex falsa illa, de uteri è loco suo versus superiora motione & adscensu, nec non singulari erga odorata illa sympathia & adpetitu, hypothetici enatus, istis in corporibus, quæ à gratè odoriferorum halitu naribus admissio suffocationis periculum incurrunt, neutiquam convenire potest, cum enim & ibi moschatæ atomi nervos uterinos, arteriasque & venas penetrando, spiritibus ac sanguini morbosam illam rarefactionem & agitationem inducere valesant,

eo ipso sanè adfectum fovebunt potius & contumaciorē reddent, quàm profligabunt. Quod si tamen ab ejusmodi adplicatione cessare quandoque videatur, partim rerum foetidatum & graveolentium eodem tempore naribus majori quantitate objectarum, validiori operationi, qua sulphureis suis & narcoticis quasi atomis ebullitionem præternaturalem sopiunt, spiritusque animales compescunt, partim etiam, quòd ab alia causa, quàm sanguinis tenuitate & caliditate, eodem nempe crassiore & flatuoso, ortum trahat. Cæterum nec planè rejecerim *Ludov. Septalii* animadversionem lib. 7. §. 161. consignatam, qua Cerata prædicta ex tacamahaca, cum duobus aut tribus Moschi granis medietati horum impositis, facta felici cum successu imponi negat, cum ex calore corporis & lecti elevati benè olentes vapore præfocationes potius concitent, si nempe ex omni parte cuti arctè non adhæserint. In suffitu porò dum Moschus in usum venit, suaviter odorata ejus moleculæ ab ignis violentia combustæ & in foetidas conversæ spiritus animales non ampliùs demulcere, & in tripudia quasi concitare, aut sanguinem admodum rarefacere, sed coëscere possunt. Imò si Linimentorum & Pessorum adplicationem consideremus, non tam ab ista, quàm juncta vel jungenda ei confricatione & titillatione adfectum, à genitali humore oriundum, cessare, fateri cogimur, quàm scilicet confricationem studiosè nonnullos, & vel *Ebn Sina* lib. 3. sect. 21. tr. 4. cap. 18. talem spurcitiam consulentis, autoritate permotos, præcipere scimus, sic e. g. *Fontanonus* l. c. obstetricem duobus digitis, indice & medio, Linimento moschato inunctis, os vulvæ oblinire, ac intrinsecè fricare tantisper jubet, dum humor corruptus è vulva excidat, quod & religiosæ Virgini consuluit *Nic. Abr. Frambesarius* Can. & conf. med. lib. 5. tit. 14. nec non Juvenulæ cuidam venerex è suo consilio benè cessisse *P. Fr. Berardinus Christinus* cent. 1. obs. med. 2. refert, & *Anton. Guainerius* Pract. de ægrit. matr. cap. 6. Sapissimè, ait, corruptum sperma seu humor alius venenosus ex confricatione tali egreditur, & præfocata ab ægritudine solvitur. Qua ratione etiam *Galenus* lib. 6. de loc. adfect. c. 5. Viduam quandam à gravi adfectu hysterico liberatam fuisse recenset, cum à manibus obstetricis titillatione obscœna inter curandum suborta, semen crassum plurimumque excrevisset. Unde ipsum coitum paroxysmo tali mederi, Prædici notant; nec tamen necessarium adeo est aut utile, membrum genitale mariti priùs oleo moschatelino, aut alio quovis, in quo Moschi granum fuerit dissolutum, illinire, ceu hujusmodi usus meminit *Joh. Riolanus* in Instit. medic. de morb. curand. Illam titillationem tamen & perfrictionem à Christiano homine omnino ablegandam, præter alios, meritò judicat *Septalius* l. d. §. 159. eamque ob causam Pessos non minùs odoratos, cum tentiginem maximam promoveant & satyriasin sæpe inducant, in ista suffocationis specie, ex retento, quæ fit semine, non ita tutò in usum duci, §. 160. concludit. Licet etiam hac methodo usurpatus Moschus, dum vasa aperit ac sanguinem fundit, hystericis, quas menstrua suppressa tales efficiunt, non possit non conducere. Ubi sanè *Galeni* consilium lib. 1. de arte cur. ad Glauco, cap. 14. locum invenit, dum in defectu animi ex utero, parti huic odorata, & ea, quæ laxare ac calefacere possunt, medicamenta offerre suadet. Confer, *Cl. Franciscus Bayle* probl. phys. med. 78.

Nunc quid de interno Moschi usu in hac uterina credita adfectione tenendum sit, pariter dispiciendum. Ubi suum maximopere commendat experimentum *Augenius*, quo moschi gr. v. cinn. caryoph. N. M. ā. 3j. vino odoratissimo distemperata propinat; & *Bened. V. E. rhus* lib. 1. Empir. cap. 35. moschi gr. ij. cum Spec. aromat. ros. Sir. cort. citr. & Aq. rosar. deglutire præci-

pit. Aliam porò ex *Solenandro* potionem magnopere extollit *Laz. Riverius* tom. 1. Prax. med. lib. 9. cap. 6. & cent. 1. obs. med. 65. moschi nempe & sanguinis drac. ā. gr. xij. in aq. flor. aurant. 3ij. soluta, adstipulante ipsi Illi *D. D. Paulo de Sorbait* tract. 1. Med. pract. cap. 78. Pilulas quoque suas proponit *Barth. Montagnana* conf. 226. quas de musco nominare solebat, ab *Augenio* etiam, paululum tamen immutatas, immentia laude decoratas. Et *Joh. Zuelferus* Pharmacop. reg. class. 6. cap. de Pil. de cynogloss. anodyn. Moschum intro propinatum summo esse emolumento scribit, cavendo tamen, ne nares feriat. Videatur etiam lib. 3. obs. serv. *Nicol. Chesneau* cap. 14. obs. 1. Ast malum hoc muliebri si à sanguine tenui, bilioso & igneo dependeat, minùs moschata ejusmodi convenire, etiam si odor eorum naribus non hauriatur, ex dictis jam elucescit, cum & in stomacho ac intestinis sanguineos, lymphaticos atque nervosos ductus intrare, & sanguinem in motum concitatorum instigare valeat. Unde si tali in casu cum fructu adsumatur, ille reliquis admixtis gravi odore præditis, & volatiles biliosas Moschi particulas obtundentibus ac contemperantibus debetur, vel saltem adfectus ab alia causa, uti sanguine ad fusionem non ita proclivi, sed crassiori, obstruente vel flatuoso fovebitur.

Quæ morbi etiam diversitas in causa esse potest, quòd dentur hystericæ, à suaveolentibus in ipso paroxysmo odoretenus summum levamen, à graveolentibus autem majorem potius afflictionem percipientes. Quamvis consuetudinem quoque multum hinc conferre posse, negare omnino nequeam, quæ sanè, quò minùs in motus inordinatos sanguis & spiritus rapiantur, sed potius retrahantur, efficere valet. Nec traditam à quibusdam *ἰδιότροπον*, sive singularem & inexplicabilem penè certorum subjectorum naturam, qua isto ab odore minimè offenduntur, sed summopere delectantur, penitus explodere velim. *Dantur*, inquit *Sennertus* Med. pract. lib. 4. part. 2. sect. 1. cap. 4. quæ nullo modo moschi, ambra vel similibus odore offenduntur, sed eos benè ferunt: quales multa reperiuntur in gynæceis Principum & Nobilium, quæ vestibus moschi vapore, & fumo infectis utuntur. Conferatur *Franc. Moraus* de malign. febr. parox. tr. 1. cap. 13. obs. 6. Gravissimi adfectus hystericus exemplum adnotat *Greg. Horstius* obs. med. part. 2. lib. 1. obs. 24. in Matrona ab adhibitis medicamentis adpropriatis foetidis graviora symptomata perpeffa, à Moscho autem & Ambra feliciter restituta, & obs. 38. nobilem Virginem religiosam in ipso paroxysmo ab odoratissimis, Moscho &c. mirè refecta adducit idem & se observasse *D. Guern. Rolfincius* Epitom. meth. & cur. partic. corp. affect. lib. 3. cap. 24. *D. Thom. Bartholinus* cent. 3. hist. anat. 28. & *Nicol. Chesneau* l. c. testantur. Matronas à foetidis valdopere lassas, beneolentibus verò itidem sanatas *D. Simon Pauli* cl. 3. Quadrip. botan. cap. de angel. & *D. Cass. Theoph. Bierlingius* Advers. cur. 54. Virginem etiam adfectibus hystericis spasmodicis exagitata, & Ambra odore mirè refectam *Phil. Höchstetterus* dec. 9. obs. med. cal. 1. recensent. Et hæc verissima esse, in praxi sua sæpe expertus fuit, hancque diversitatem A. 1680. deprehendit in duabus Virginibus illustribus Magnificus noster *D. Febrinus*, quarum altera 26. annos nata ex durturna hæmorrhoidum & mensium obstructione subito in convulsivos dolores lateris sinistri ad collum descendentes abripiebatur cum metu suffocationis, syncope, palmo cordis & levi delirio modò cum risu, modò cum lachrymis, cum pavore continuo, præsertim noctu, & aphonía interpolata: Præcedebant nausea, vomitus, ventris inflatio, murmura, sternutationes crebræ in tres & quatuor horas (quod rarum & mirum) continenter explosæ, dolor item dorsi & lumborum, capitisque quandoque intensissimus, à quo plerum-

plerumque gravissimi paroxysmi exortus, qui non nisi suavissimis moscho & ambra prægnantibus remediis fitebatur, cum econtra castoreum ipsi adversissimum esset, quod tamen illustri Sorori natu majori nuptias penitus averfanti, ideoque sæpius hoc malo correptæ in hoc adfectu Panacea unica, & à suaveolentibus tantus horror, ut nec aquam rosarum aut cinnamomi perferre potuerit. Prior autem illa meliori fidere afflata paulò post febris tertianâ correpta cum sternutatione semper incipiente, duplici hoc irritamento concussa, mensibus confertim prorumpentibus, evasit.

Ad uteri porrò prolapsum sive descensum, aut, ut ipse loquitur, matricis præcipationem, conducere Moschum, si naribus odor illius attrahatur, ex Plateario patet. Ambram, Moschum, Galiam moschatam, Aliptam moschatam, & his similia naribus continuò admovenda, usque dum in suam redeat sedem. *Lud. Mercatus* de mulier affect. lib. 2. cap. 11. suadet, inguinibus etiam Unguenta, Cerata, & Emplastrum moschatum ad retrahendum, tum retractum in sede sua conservandum uterum, ibidem proponit. Ad quem posteriorem scopum etiam in *Roderici à Castro* lib. 2. de morb. mulier. sect. 1. cap. 16. duo Emplastrum, è regione umbilici utrique lateri admovenda, recensentur, quorum unum ð. alterum ð. Moschi recipit, quamvis typographicum hîc subesse mendum, nimia Moschi dosis persuadere queat. Et *Amatus Lusit.* cent. 1. cur. med. 14. in juvencula, uteri procidentia afflicta, Moschum & Galiam moschatam naribus, econtra graveolentia pudendis, nec non Ceratum moschatum pubi feliciter adplicatum memorat. Verùm hæc ipsa in symptomate illo Moschi administratio priori illa erronea opinione nititur, quæ uterum odoratis, quæ talibus, delectari, atque ad ea motu locali ferri putatur, quæ odoris infectatio cum sit, si æstia, non minùs omnis ille usus ejusdem valoris erit æstimandus. In *Amati* sanè exemplo nisi manuali operâ facta repositio accessisset, neque supernus, neque infernus Moschi usus quidquam conduxisset. Interea tamen, ne omnino frustraneam hanc & frivolum adhibitionem proclamare velle videar, (licet minoribus sumibus, remediisque magis adpropriatis hîc rem peragi posse non diffitear,) Moschum roborando cerebrum & nervos, sanguinem porrò emendando, & spirituosus ac calidis particulis instruendo, symbolum aliquod ad curam facilius absolvendam quandoque contribuere arbitror, cum plerumque procidentia ista nimia partis illius & vicinarum à laxitate, ob frigidam humidamque intemperiem producta, descendat, sive jam ipse uteri globus propendeat, quod licet à *Theod. Kerckringio* Spicileg. anat. obs. 20. & 53. *Henr. Roobusio* lib. 2. obs. chir. & *Jobo Mezerano* obs. chir. cap. 51. impossibile judicetur, interdum tamen, & præcipuè post partum, ferri posse, non omnino negaverim, sive vaginæ tantummodo rugosa tunica ampliata & dilatata illum emendatur.

Menstruum insuper proritate fluxum, non immerito statuitur. Cum autem Emmenagoga triplici communiter sub capite proponantur, debiliū nempe vel mitiorum, mediocrium, & validorum, mediis adconsere Moschum consueverunt, quos inter est *Jacob. Sylvius* comm. de mens. mul. *Lud. Mercatus* l. c. lib. 1. cap. 9. *Rodericus à Castro* d. l. lib. 1. sect. 1. cap. 4. & *Joh. Prevotius* de morb. uter. cap. 4. Quin & ad ipsum pertinet, quod Hippocrates sect. 5. aphor. 28. scriptum reliquit: γυναικῶν ἀγώγιον ἢ ἐν ἀπόμασι πρὸς τὴν Suffitus, vel odor aromaticum, rerum bonè olentium, muliebria, menstrua educit. Quo ipso vim expultricem uteri excitari, atque venarum, quæ uterum attingunt, obstructions aperiri, compactiorem uterum rarefieri, algiosum recreari,

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

& materiam lentam incidi, *Joh. Heurnius* alique interpretantur. Scilicet Moichus virtute sua attenuante non pituitosos tantum humores, obstructions vasorum uterinorum concitantes fundens atque resolvens, sed & sanguinem ipsum crassiores & ad motum tardiores rarefaciens inque ὀπρᾶσθον concitans deprehenditur. Idque tum internè, tum externè in usum ductus efficit. Sic profunt Pilulæ de moscho, sive ut corruptè vocat, de dyamocho, *Barthol. Montagnana* in Antidot. cap. 20. Pilulæ & Pulvis *Prevotii* l. c. *Morselli Anton. Cermisani* in Consil. med. cap. de ægrit. matr. ca. 6. Cum Moscho, qui miram habeat sanguinem elicienti facultatem, pro ditioribus confici Pessarium, in *Joh. Varandæo* de morb. mul. lib. 1. cap. 2. legitur, quales Pessaria & Nascalia passim plura describuntur, v. g. in *Jacob. Hollerii* lib. 1. de morb. int. cap. 58. *Fel. Plateri* Prax. lib. 2. cap. 14. *Cermisani* cap. de ægrit. pecc. conf. 13. cap. 7. *Zacuti Lus.* Prax. hist. lib. 3. cap. 10. Feminam, quæ ex solo Moschi odore menses suppressos provocaverat, Neapoli invisit *D. Thom. Bartholinus*, ceu refert cent. 2. hist. anat. 87. In Suffitus etiam utero dicatos, qui capite munito, ne fumus ad nares pertingat, excipiendi sunt, adsciscitur, qualem ex pulvere aromatico & Galiam moschatam, carbonibus accensis injecto, convenire *Joh. Cas. Claudinus* de ingr. ad infirm. lib. 2. sect. 2. cap. 26. arbitratur. Neque negandum, satis efficaces hos esse posse, cum penetrantissimi eorum salino sulphurei habitus ipsum uterum immediatè attingant, crassitiam vel lentorem humorum egregiè incidant, si quod acidum oscula vasorum constringat, illud absorbeant, sanguinem ut moveatur exagitent, sicque vasorum sanguiferorum extremitates reserare valeant. At Moschi pretiosum corpus effumationi huic destinare, opus haud est, cum leviore pretio aliud aliquod comparandum facile eundem præstare queat effectum, Moschus autem carbonibus vivis injectus suavitate exurâ, ingratum potiùs in fumum abeat & destruat.

Sed quòd nonnulli immoderato in Mensium fluxum itidem eum adhibeant, non semper probari potest. *Prevotius* quidem l. d. cap. 5. medicamenta fluxum istum sistentia interdum cum vehiculo exhiberi notat, quando nimirum vasa uteri constringere consilium est. At eum medicamentorum, simplicium ingredientium mixtura vel confusione paratorum tanta non sit unio, ut unum nexu indissolubili alterum ad hanc illamve partem comitetur aut dirigat, sed magis resolvable, quale in primis Moschus est stomacho elabatur, non expectata cæterorum fixiorum, uti adstringentium, actione & distributione, vinculi istius infirmitas abunde elucet. Imò Moschum esse specificum uterinum, ita ut partem hanc magis, quàm aliam quamcunque, nervis aliisque vasis abundanter, & nescio quâ occultâ proprietate respiciat, magnum adhuc est dubium. Licet fortasse in usum venire aliquando posset, si fluxus ille uterinus à frigida humidaque uteri intemperie, eundem debilitante, osculorumque laxitatem efficiente produceretur, ubi virtute sua roborante, calefaciente, &, exiguum illud si attendendum, siccante aliquid contribueret, vel si grumescens unâ sanguis, juxta cum adstringentibus, dissolventia requiratur.

Cæterum facultate, quæ menstruum remorantem sanguinem propellit, Lochia non minùs segniùs prodeuntia exterminat.

Prout & Secundinas abigere, foetusque exitum hac ratione urgere vel facilitate creditur.

De Secundinis retentis testatur *Kunrathus* in Medull. destill. quod carbonibus injecti Moschi fumus per infundibulum corpori immixtus citò easdem expellat.

Ex Sinis didicit *Boymius*, facilem partum reddere doloresque abigere parturientium. Id quod interno pariter & externo usu efficit. Sic Trochiscorum

Galizæ moschata pulverem cum vino albo datum diffusculter parturientibus accelerare partum, scelerum quoque mortuum & secundinas exterminare, *Gualth. Ryffius* Enchir. med. lib. 2. cap. 3. §. 89. scribit. Roborando imprimis hoc præstare, clarè satis *Varandæus, Rondeletius, Platerus, & Sennertus* innuunt, Confectionis ideo alkermes, & Pulveris diamoschi exhibitionem laudantes. Ipsi imbecillis parturientis nanibus Moschum admoveere præcipit *Dion. Fontanonus* l.c. cap. 25. addens: *Nec verendum, matricem, qua bonis odoribus deletatur, sursum revocari, sicque partum impediri. Nam sceleris gravitas uterum deprimit sursumque ascendere prohibet, atque interim bonis illis odoribus parturientis vires & spiritus roborantur valdeque juvantur.* Quod & *Zacutus* Prax. hist. lib. 3. cap. 18. nec non *Joh. Wittichius* Consil. pro gravid. & partur. monuerunt. Ast feminis adfectui isti hysterico obnoxiiis moschatorum ejusmodi utrum minùs commodum esse posse, nullus dubito, quem sanè sceleris gravitas nullo modo inhibet, cum creditum illum adscensum esse commentitium, ex superioribus pateat, inque gravidis & parturientibus eadem sanguinis & spirituum dispositio esse queat, quæ à Moscho excitari, symptomatumque istorum productionem causare valeat: Prou vicissim feminæ, aliàs adfectui huic ex suaviter odoratis minimè obnoxia, præstans inde remedium in partu facilitando sibi polliceri utique possunt. Quales fuisse suspicor, quarum inter parturiendum defectionibus moschata plus vice simplici securè exhibita memorat *D. Dan Ludovici* Pharm. mod. sec. adplic. pag. 646. Quin & in Suffimigiis usus ejus ab *Ebn Sina* lib. 3. sect. 21. tract. 2. cap. 23. &c. commendatur, quâ ratione magnum iterum encomium meretur Galia moschata à *Joh. Plateario* addit. in Antidot. Nicol. & Hier. Mercuriali de morb. mul. lib. 2. cap. 3. Ipse quoque Moschus &c. prunis ardentibus impositus partum facilem procurare, locos muliebres aperiendo, & ad inferiora trahendo, dicitur *Joh. Guintherio Andern.* in Gynæc. comment. Et difficili admodum in partu Linimento moschato uteri collum frequenter illinire docet *Johannes le Bon* cap. 2. therap. gravid. Videlicet cerebrum & nervos cum roborat, coiplo etiam uteri, ut corporis maximè nervosi, vires egregiè adauget, ita ut expulsionem fortius peragere valeat, imò totius corporis vires ad actum illum concurrentes firmando prodest, spiritus etiam conturbatos & inordinate se moventes dolorificos compescit, ac suavitate suâ demulcet. In fumum autem resolutus acribus suis effumationibus uterum ad expulsionem stimulat.

Aliàs etiam, ubi tempus maturitatis sceleris nondum advenit, uturpatus, moderatè tamen, ne nimio usi sanguis justò commotior abortum potiùs acceleret, gravidas confortat, abortumque inhibet, Mixturæ ideo à *Roderico Castrensi* l.c. lib. 3. sect. 1. cap. 22. pro foetu roborando præscriptæ (pro cordis etiam cæterarumque partium in gravidis confortatione à *Zacuto* cap. paulò tamen aliter propositæ), additus, Emplastra quoque vel Cerata hîc trahi in usum solent, quale ex *Claudino* desumptum sibi multâ experienciâ & usu familiarissimum deprædicat *Nobil. D. Franc. Ignat. Thiermairius* lib. consil. med. 1. cap. 13. uteri regioni admovendum. Sin ex humiditate aliqua aut frigidityte præternaturali uteri metuendus sit abortus, Suffimenta, Linimenta, Emplastra *Rodericus à Castro* lib. 4. cap. 4. Pessaria cum Moscho parata *Arnoldus Villanovanus* in breviat. præct. lib. 3. cap. 3. proponunt.

In Uteri dolore, si à sanguine crasso & coagulato suscitetur, Pastillorum moschatorum suffitum describit *Rodericus* modò nominatus, quo grumosum dissolvi sanguinem, atque tenuiorem reddi, verissimè pronunciat, Aquam theriacalem etiam & Laudanum

opiatum contra affectum hunc internè sumenda adjungens. In eodem à flatuum copia orto Emplastrum odore isto imbutum maximi semper fuisse momenti *Ludov. Mercatus* lib. 2. cap. 14. perhibet.

Unde non minùs in Uteri inflatione fumum ex Trochiscis moschatis ei immittendum præcipit *Balib. Brunnerus* consil. med. 67. & Moschum ac Zibethum singulariter uteri tumoribus conducere, cum modica lana suppositum, *Joh. Guintherius Andernac.* de ver. & nov. comm. 2. dial. 6. arbitratur.

Ex quibus jam sponte elucescit, quòd in Uteri debilitate, in temperie frigida, vel humida utiliter adhiberi queat; quales remediorum formulæ tum apud dictum sapius *Castrensem*, tum alios pro lubitu videri possunt.

Moschi vires venereæ.

Moschum insigne pharmacum esse aphrodisiacum, omnibus in confesso est. Quod ex Veteribus jam olim Averrhoi notum fuit, dum coitum augere docuit. Unde etiam pollutionem nocturnam producere in nonnullis solere, supra jam percepimus.

Zibethum in folliculis animalis sui abundans, quia ad excretionem sui ipsum irritat, Naturam nobis per id vim ipsius ad coitum incitandum significasse putat *Castellus* cap. 10. de Hyæn. odor. Idem de Moscho dicere possemus, quem abundantem in folliculo suo, dum venereis stimulis agitur, animal magis stimulare non omnino negabimus; modò naturales illæ signaturæ & indicia aliquod in Natura fundamentum haberent, ingenique signa non existerent.

Hinc Indi, si in venerem procliviores esse voluerint, ex Banguæ, plantæ cannabi haud absimili, nec non Moscho & Ambra, cum Saccharo Electuarium conficiunt, referente *Christophoro à Costa* libr. Aromat. cap. 55. Hinc & apud alios frequens in Electuariis ejus usus solet esse, quale magnopere dilaudat suum lib. 2. Prax. med. admitt. obs. 120. descriptum *Zacutus Lusitanus* aliudque sub Confectionis magnanimitatis nomine *Hadr. Mynschius* sect. 13. Armament. med. chim. Elegans est, quod tum *Bald. Timæus* lib. 3. cas. medic. 30. tum juxta cum Morfulis delineat beatus noster *D. Phil. Jacob Sachsus* lib. 2. Gammar. sect. 2. cap. 6. sect. 6. ut & Spiritus radicum satyrii Ill. *Guerneri Rosinchi* Chim. in art. form. redact. lib. 3. sect. 1. art. 2. cap. 7. Tabellæ *Riverianæ* cent. 4. obs. med. 70. & Pilulæ obs. 79. aliæque *Cardani* observ. 5. imprimis verò *Wedeliani* sapius expertæ, quas sect. 2. de medicament. compend. pag. 117. describit, ex ambra, moscho, resina xylaloe, & laudano opiato (quod concentrando spiritus prodesse statuit,) compositas. Porò Aqua vitæ diafatyrionis *Ang. Sale* cap. 8. App. hydrel. Rotulæ, Pulvis *Aqua Thom. Mermanus* lib. 5. consult. med. 29. proposita. Pretiosi & regii sunt Trochisci viperini confortantes in App. Ann. VI. Eph. Germ. Curios. à *Nobil. D. Mart. Bern. à Bernitz*, juxta cum aliis medicamentis huc facientibus, tit. 20. memorati. Sexagenario, ut virum ostenderet, Moschi grana aliquot cum olei et pini nucleis ʒi. bibenda suavit *Henricus ab Heer* obs. med. 9. Ova quoque aliosque cibos eo conditos *Balib. Brunnerus* consil. med. 64. Externum pariter ejus usum ex Medicis Persicis tradit *Serapio*, si nempe cum oleo cicino resolutus virgæ illinatur, cum sit in eo humiditas quædam, per quam coitum excitet. Cum oleo vero sambucino femoribus vel ventri inungere, quoddam *Constantinus Africanus* autor est. Cum Balsamo distemperatum laudat *Barth. Montagnana* consil. 61. canon. 12. Et Regum impensam esse scribit *Petr. Forestus* lib. 26. obs. 19. virilitatem Opobalsamo, & renum partes cum mero diluto Moscho inungere, Quæ cum

Vino distemperatum, Moschum, & membro virili adpositum, in veneris impotentia ex *Gilberto* quoque laudat *Petrus Hispanus* cap. 45. Thef. paup. Nec nominari recusat Linimentum à *Rein. Solemandro* sect. 4. conf. med. 17. præscriptum, alterumque *Riverii* l. c. obl. 70. parum ab illo differens, sed ob Ambra accessum multò pretiosius; ut & Balsamum *Timeanum* loc. cit. ac Linimentum *Mermannianum* consult. 30. Quæ inunctiones non virili tantum membro, sed & vicinis partibus, scroto, perinæo, lumbisque destinantur. Ast quòd à nonnullis ipsæ etiam plantæ pedum, aut dextripedis pollex, ceu illius exemplum apud *Guaierium* tr. de ægri. matr. cap. 24. hujus apud *Myschum* Armam. sect. 34. prostat, inungi præcipiuntur, partim superstitium, partim supervacaneum, aut non usque adeo valde proficuum est censendum. Licet prodesse nonnihil queat, cum & suavis exhalans odor ipsas etiam nares feriat, sicque cerebro &c. communicetur, & per poros cutaneos subtiliores quædam atomi penetrant, sanguini ac lymphæ mox commiscendæ. Quâ ratione non minus aliqualem usum præstabit, si gossypio inspersus in Saculo cordis regioni adpendatur, prout tales *Mermannus* conf. 28. & *Claudinus* conf. 12. & 103. consuluerunt; vel Unguenti formâ pectori inungatur, ceu exemplum habetur apud *Brunnorum* l. c. vel si cum eo in spirituosos liquoribus soluto cordis regio foveatur, qualem forum profert *Rod. à Fonseca* tom. 1. conf. med. 10. Quam Moschi energiam, jucundo halitu genium titillantem, libidinemque vellicantem ponderans, eandem ob causam, antiquâ consuetudine, nuptiales thalamos floribus & jucundissimo thymiamate perfundi solitos, ac *Commodum* Imperatorem, grassante peste, Unguentis cum esset usus, majores ad libidinem flammæ concepisse, ex *Niceta* refert *Joh. Bened. Sinibaldus* Geneanthrop. lib. 2. tract. 2. cap. 11.

Cum verò ad actum illam, propagationi generis humani dicatum, non partium tantum solidarum, vel pudentiarum, sed & seminis inprimis, sanguinis atque animalium spirituum vigor requiratur, Moschus quam commodè hic operetur, facile colligitur. Utpote qui sanguinem activis calidis, spirituosos particulis non sufficienter instructum, iisdem exornat, agit, & impellit, spiritus animales torpidiores excitat & quasi vivificat, succum nerveum vel potiùs serum attenuat atque emendat, semini turgescientiam conciliat, eique acrem nonnihil stimulantem virtutem imprimit, sicque genitales partes calefacit, inque debitam tensionem deducit. Utrum verò semen ipsum adaugeat: quod *D. Joh. Tilemannus* & *Joh. Georg. Macasius* innuunt, si materiam seminis spectemus, negatur, si ejusdem perfectionem, haud gravatim admittitur. Ast flatuosam in eo humiditatem, quâ *ἡ ἀφροδισια πλεονάζει* creditur, cum *Sal. Alberto* assignare ei nequeo, quia neque flatuosa ei inest substantia, nisi vocabulo hoc ad spirituosam denotandam abuti quis velit, neque humiditas singularis aut aphrodisiaca in corpusculo ejus sicco dominatur.

Ipsas denique feminas in venerem irritare valet. Qualem prolis quidem cupidissimam, sed veneris desiderio nullo modo laceffitam enarrat *Petr. Pachecus* in obl. *Riverio* commun. 19. cui Electuario, Confectione alkermes & Moscho exornato, stimulos istos sopitos voluptatemque restituit. Pariter cum oleo liliaceo moschato perunctum vererem mulieris ignaviam ad venerem discutere, immisso etiam in dormituræ sinum *Pess. rio Joh. Huchernus* lib. 1. de steril. pag. 8. scribit. Mulieribus porrò, quæ minus propensæ sunt in venerem, Moschi externum usum suadet *Forestus* lib. 28. obl. 58. quem noctu sub pulvinaribus habere debeant, aut, suffocationi uterinae si obnoxie sint, coxis adligatum.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I I.

Virus Moschi in sterilitate muliebri.

Licet variæ conceptionis impeditæ sint causæ, in uteri tamen intemperie aliqua frigida aut humida, vel etiam vasorum & ductuum uterinorum obstructione sæpius consistere certum est, quod *Hippocrates* sect. 5. aphor. 62. his verbis expressit: *Qua frigidos & densos uteros habent, non concipiunt. Et qua humidos uteros habent, non concipiunt. Extinguitur enim in ipsis generatura.* Quam spissitudinem etiam ab humorum crassorum & frigidorum copia prodire arbitrat *Lud. Mercatus* lib. 3. de mul. aff. cap. 3. Uteros verò, si humidiores, quàm eorum naturæ conveniat, existerint, siccandos, iisque suffitum esse admovendum *Hippocrates* lib. 1. de morb. mul. prodidit. Quibus consideratis, posse Moschum huic malo mederi, concluditur, dum sanguinem & serum frigidiora calefacit, crassiora dissolvit, iusto humidiores partes exsiccat, pituitosos & mucosos humores attenuat, sicque obstructiones tum vasorum, tum aliorum meatuum & pororum aperit, quò nempe semen virile immissum nec obtundatur & enervetur, nec ab ulteriori penetratione prohibeatur, sed calore moderato foveatur, actuetur, atque ad muliebri ovarium absque impedimento deferatur, sicque fecundatis ovulis, eadem liberum nacta transitum in uteros temperatos recipiantur. Quem in finem *Dom. Leonus* in arte med. sect. 3. lib. 6. cap. 13. Electuarium in mulieris expertum profert, cum Moscho compositum. Et ovum recens excludum, unico illius granulo admixto absorptum, ad conceptionem juvandam optimum se reperisse *Joh. Bapt. Porta* refert lib. 8. Mag. natur. cap. 7. Suffitus & Pessus moschatus legitur in *Roderici Castrensis* lib. 3. sect. 1. cap. 11. Pluresque alias hujusmodi Pulverum, Confectionum, Injectionum, Suffimentorum, Pessariorum, Linimentorum &c. formulas tum alii, tum *Platearius*, *Sennertus* lib. 4. Med. pr. part. 2. sect. 4. cap. 2. *Platerus* Prax. tr. 1. lib. 1. cap. 17. 19. & observ. lib. 1. *Bened. Silvaticus* cent. 4. conf. 23. 34. 36. 46. *Riverius* Pr. med. tom. 1. lib. 15. cap. 15. *Wutichius* de steril. mul. *Huchernus* d. 1. lib. 2. *Rocheus* de morb. mul. cap. 20. *Ruffus* de generat. hom. lib. 6. cap. 7. consignarunt.

Moschi usus arthriticus.

In malis arthriticis Moschi nonnulli medicamentis permiscere consueverunt: Qualis est Aqua illa, quam *Conr. Gesneri* Evonymus pag. 430. contra omnes morbos frigidos, epilepsiam præcipuè, membrorum mollificationem, podagram & articulorum dolores producit, nec non altera Aqua vitæ, arthriticis & contractis pag. 454. dicata. Quibus addantur, ex Consiliis medic. *Scholzianis*, conf. 229. Pilulæ, quas in arthriticis multis saluberrimas fuerat expertus *Hieron. Donzellinus*. Licet cæteroquin cujusvis arthritidis curationem omnem à Moscho posse absolvi, nequaquam adstruam, aut præ infinitis aliis remediis singularem prærogativam habere cum credam, quandoque tamen in ejus perfectiori curatione symbolum posse conferre arbitror, cum eadem cerebri sæpe vitio, serofas, & vel per ipsos nervos, fluxiones ad articulos concitantis, oriatur, quo itaque fonte non exsiccat, constans & firma medela haud est speranda. Unde ad cerebri corroboracionem, frigidos humores generantis, Specierum diambrae, diamoschi &c. usum tum alii, tum unà cum Balsamorum moschatorum temporibus, vertici, & naribus inunctione *Martin. Panfa* cap. 14. Conf. antipodagr. non ineptè proposuit. Imò ipsis quoque membris dolentibus, commodè quandoque adplicatur, iisdem, si ab humore calido & bilioso non occupata fuerint, virtute suâ attenuate, resolvete,

ac discutiente succurrens, cujus etiam intuitu, non grati tantum odoris causa, in Pulverem antipodagricum *Cnoffelianum* in Append. Anni VI. Miscell. Germ. Curios. tit. 22. cap. 4. fuisse receptum suspicari liceat. Uxoris hostilis, in arthriticis sæpe furientis, à Moschi sale volatili qualemunque mitigationem, haud improbabilem, pluribus non persequar.

Moschi virtus contra faetores.

Tædiosus admodum & abominabilis adeo quorundam è toto corpore, ejusve partibus, alis præcipue pedibusque (de narium & oris faetore supra jam fuit actum) exhalans est odor hircosus, ut passim exprobrare eundem Poëta non omiserint. Prout pessimum illum Poëtam, *Mevium* à *Virgilio* quoque *Eclog.* 3. inculpatum, *Horatius* *Epod.* 10. cum naufragium ei imprecaretur, satis mox in principio se perstrinxisse credidit, olentem *Mevium* ipsum appellans, & *Epod.* 12. Anum libidinofam increpans, gravem hirsutis cubare hircum sub alis &c. objecit. *Plautus* porro in *Mercator.* Act. 3. scen. 3. Seni venereo sic accinit:

*Jam plenus ætatis, animaque fœtida,
Senex hircosus, tu osculere mulierem?
Uti ne adveniens vomitum ex utero mulieri.*

Catullus etiam *Rufum* hoc epigrammate irridet:

*Ledit te quedam mala fabula, quæ tibi fertur
Valle sub alarum trux habitare caper.*

*Hanc metuunt omnes; nec mirum, nam mala valde
Est bestia. &c.*

&c. *crudelem nasorum interfice pestem.*

Quam graphicè *Thais* faetorem exagitet *Martialis*, lib. 6. *Epigr.* 93. videre est.

Cum verò mephitis, illa non naribus tantum sit execrabilis, conversationi humanæ contraria, & conjugalem sæpe amorem suppressens, (exemplum præhæntibus apud *Antigonum* cap. 13. rer. mirab. Lemniis mulieribus,) imò quorundam populorum, præsertim Græcorum consuetudine, *Joh. Jac. Pontani* in rer. Danic. histor. indicio, sufficiens divortii causa, ideoque artes inter amandi ab *Ovidio* munditiarum studium inculcerur:

Nec malè odorati sit tristis anhelitus oris,

Nec lèdat nares virque paterque gregis.

sed ipsi etiam corpori non parum noxia, sanguinem & spiritus inficiens, omnesque corporis partes pervadens, meritò ejusdem quoque curationi operam navant Medici. Quam equidem ipsius causæ eradicatione omnium convenientissimè tolli, facillè conceditur, antequam tamen id impetretur, suaviorum odorum usu ut obscurerur, non minùs requiritur. Quo in passu Moschi odor nobilissimus prima inter remedia facillè locum inveniet. Quantumvis enim humiditatem illam corruptam & putrescentem discutere & exsiccare quodammodo valeat, debiliior tamen hinc ad perfectam curationem absolvendam, aut magnopere adjuvandam vis ejus competitur, ita ut palliativam, quam vocant, curam potius peragat.

Hoc igitur respectu contra virus axillarum, si eo inungantur, atque diligenter confricentur, commodum judicavit *Platearius*, quod in earundem, nec non interstitii mammarum faetore cum eo in olei caryophyllorum & cinnamomi guttulis aliquot, vel quæ Moschi intuitu, ob odoris, quæ relinquitur, libertatem, commodior est, lavendulæ aquâ soluto, peragere *Kun. ahus*, & *Sennertus* lib. 5. Med. præct. par. 3. sect. 1. cap. 9. Linimenta moschata alia conficere, aut etiam Pilam odoratam sub alis gestare edocuit.

Quamvis ea sæpe ingratarum ejusmodi atomorum sit multitudo & efficacia, ut nec validissimi odores eundem obfuscare, si loqui ita liceat, valeant. Quales sanè fuisse certum est in Literato quodam,

quem beati *D. Sachsi* scholion obs. 191. Ann. II. Miscell. nat. Curios. indicat, quibus nec penetrantissima tot odoratorum ingredientium effluvia, in Thæriacæ magna mixtura contingentia prævaluerant, quod & in *Thaide Martialis* notaverat hoc disticho,

*Cum benè se tutam per fraudes mille putavit,
Omnia cum fecit, Thaida Thais olet.*

Scilicet major odor, sive jamille fœtidus, sive suavis existat, obscurat minorem. Prout nempe in cujusvis pharmaci operatione, si scopum præfixum attingere debeat, proportionata ejusdem quantitas, quæ morbo major sit, eumque debellare consequenter valeat, requiritur: sic & in hoc passu eadem requisita proportio est attendenda, ita ut suaviter odorata exhalationes & numero & virtute superent fœtidas, quæ ingratarum aliàs odorem accessione suâ potius adaugerent. Quæ sanè explicatione problema *Aristotelicum* commodè satis resolvitur, quo: Cur unguentorum magna pars sudori permixta malè oleat, quædam verò suaviter aut non pejus quæritur.

Hæc Moschi fragrantia in aliis etiam fœtoribus suppressendis eapropter utilis esse potest, cujus idcirco usum in Pomis, Aquis, Balsamis & Chirothecis, ad Anatomicos fœtores fallendos tangit *III. Bartholinus* *Consil. de Anat. præct.* qui ipse tamen nunquam, cum sacra hæc tractaret, Unguenta placuisse sibi testatur. Nimiùm sanè delicatæ nares ad Sacra ista utique minùs quadrant, inprimis si manus unâ sectioni admovere lubeat, ubi semel remotis istis delictis odoratis, continuò naribus objici inter secandum cum nequeant, fœtor cadaverosus eò potèntius nares feriet, quo aliàs semel imbutæ magnopere postea eundem haud perferunt, aut ab eo contristantur; quinimo, si necessitas urgeat, ab alio aliquo, juniperino &c. fumo penetrantissimo &c. longè feliciter præstantur.

Eadem fœtoris tollendi intentio in Cadaverum vulgata conditura Moschum admittit, quem sæpius scopo huic adaptari novimus, exempla suppeditante *Petr. Foresto* lib. 29. obs. med. 29. in schol. *Wolffg. Hæsero* *Herc. med. lib. 5. cap. 2. & Georg. Hier. Welschio* observ. Reusner. 200.

Idem fallendi artificium considerantes Præctici, in Scabie etiam Moschum adhibent, dum topicorum quorundam ingratarum odorem ab eo obtegi vident. Multi enim, teste *Petr. Borello* cent. 2. obs. med. 7. ob Unguentorum fœtores sæpe curare scabiem renuunt, quod non facerent, si aliquod jucundum, facile & non fœtidum extaret remedium, cujus deinde formulam subjungit; quamvis hæc, quoad Moschum, ab unctuosio corpore reliquo obtusum, voto minùs respondeat.

Quod in Fonticulis quoque *Casp. Bauhinus* lib. 1. de remed. form. cap. 63. observat, linteolum vel pisum in aqua rosarum moschata humectatum iis, si fœteant, imponendum monens.

Talis etiam ejus usus in Lue venerea quibusdam aridet, quem Unguentis & Sufficibus mercurialibus, ob fœtorem concomitantem, adjungunt. Quamvis nonnulli, ut hydrargyri, morbi istius alexipharmaci quasi specifici, corrigens addere, aut etiam ut per se singulare remedium ipsi opponere ament, qualem nimirum curandi & Moschi exsorbendi integram drachmam pro dosi requirerent modum *Leonh. Floravanti* lib. 2. Thes. vit. hum. cap. 20. habet, siccandi, tumores gummosos resolvendi, atque sudorem provocandi vim Moscho tribuens, prout *Rondeletius* pariter eundem Pilulis ad tophos digerendos, doloris materiam abluendam &c. destinatis admiscet lib. de morb. Ital. hancque vim hydropicam in fumum quoque resolutum *Alex. Massaria* Med. præct. lib. 8. & *Gabr. Fallopius* cap. 74. de morb. Gall. adjudicant. Quam operandi

randi potentiam negare et si minimè velim, cum tamen siccandi illa & sudorem eliciendi vis violenta admodum sit, & sanguinis atque humorum aliorum violentam nimis agitationem includat, ad propriam verò alia tutiora ac certiora plurima prostant, pretiosa ista prodigalitate rectius omnino abstinere Medicus. Nec cinnabaris, corporis utpote mercurialis, virulentiam à Moscho corrigi *Paracelsus* lib. 1. de morb. Gall. objicit, quod uti de usu ejus in suffitu, à *Paracelso* propriè indigitato, haud gravatim admittitur, ita inunctione, vel deglutitione adsumti malignos effectus, nervis adversos, emendare quodammodo posse, nullus dubito. Hinc quoque *Rondeletio* lubens accesserim, qui cinnabarinis istis suffumigiis, (alias tamen omnino à *Clar. D. Godofr. Schultze* trig. cinnabr. membr. 2. c. 4. & 10. necnon membr. 3. cap. 4. non sine ratione damnatis,) ad odorem ingratus retundendum, Moschum rectè addi pernegat, non quidem ob rationem ab ipso adductam, qua sudorem virtute ejus adstrictoria retardatum iri credit, sed quia accensus odoris gratiam cum fœtore commutat, cæteroquin nec singularem adstrictionem ostendens, nec sudorem prohibens.

Lapidis tandem Bononienfis, qui vehementiori igne calcinatus redditur fœtidissimus, & ob eausticam inductam potentiam philothrum per opportunum præbet, Moschi additione odor ingratus corrigitur, ceu cum *Petro Poterio* lib. 2. Pharm. spagir. *Fortun. Licetus* cap. 23. de lap. Bonon. admonuit.

Id quod ad alios etiam fœtores retundendos perquam commodè applicabitur.

Dosis Moschi.

Pondere vendi non minùs in foro civili, quàm in medico dispensari Moschum, mos est vetustissimus, justitiæ & æquitati, naturæque consentaneus.

Mercatorium quidem, ponderis ratione variantem, aut etiam ex folliculorum numero dimetiendum, hic non tangam, qui medicam saltem, hodie usitatam, per uncias drachmis octo, singulis tres scrupulos, vel sexaginta grana continentibus, circumscriptas, methodum sectabor.

Missolibræ pondere, quod rarissime à Medicis, in similibus pretiosorum & efficacissimorum medicamentorum simplicium usu, præscribi solet, nec etiam, quantum ego memini, si unicum ex antiquis *Aërium* tetr. lib. 1. quo *Naptes orduacian* tradit, integram Moschi libram ei admiscentem; atque inter recentiores *Petr. Joh. Fabrum* Myrothec. spag. lib. 1. cap. 26. Moschi libram unam aut dimidiam, pro Quintæ Essentiæ præparatione, denominantem excipias, in ullo Dispensatoriorum, Practicorum, imò aliarum quarumvis professionum libro reperitur; rarissimè unciali pondere compositionem Pharmacorum intrat, frequentius drachmis, frequentissimè autem solis grani dispensatur, cui nempe sæpius *Ant. Guinth. Billichii* judicium, lib. 2. cap. 2. observ. & paradox. chimiatr. de oleorum vegetabilium stalaeticorum dosi prolatum, adcommodare liceat, ut nimirum dosin non granulis, sed granula dosibus dimetiri æquum statuatur. Quò respexisse videtur *Paul. Suardus* in Thes. aromat. Moschum in modica quantitate magnæ esse qualitatis & operationis, parumque ejus in compositione sufficere pronuncians, ne in magna quantitate noceat, aut reliquorum Operationes corrumpat aut occultet, quod pariter *Eust. Rudius* lib. 1. de hum. corp. affect. cap. 54. advertit, eum nempe, aut alia valde aromatica, Antiquorum exemplo, in parva dosi, comparatione facta ad alia, permiscenda esse.

Aliquam tamen hic parit differentiam Medicamentorum diversitas, quæ officinalia & magistralia (vid.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

Petr. Morelli Meth. præscrib. form.) variant. Illa enim quovis tempore, absque speciali Medici præscriptione, in Officinis prostantia, multorumque usui adcommodata, majorem utique hæc verò extemporanea dispensatione, à Medico in rem præsentem ut plurimum pro uno ægroto ordinata, minorem, hancque pro una pluribusve dosibus, intensiorem vel remissiorem recipere solent quantitatem.

In speciali quoque hoc usu non uno semper præscribi & ægris offerri pondere posse, morborum diversitas, ægrorum temperamentum ætas, sexus, consuetudo, anni tempus, regio abunde ostendunt. Nec ipsa medicamenti raritas, ideoque carioris pretii æstimatio hic negligenda, cum indistinctim præscriptus, non habita simul ad facultates ægrorum ratione, Medici facili facile ambiguum reddere, pauperiorum verò ægrorum crumenam nimium offendere valeat. Sed & cum aliis ejusdem, quæ in Moscho quæritur, virtutis simplicibus vel compositis permixtum, minor in præbio sufficere, satis per se est notissimum. Internus porro vel externus adhibendi modus dosin variare potest, cum hic plurimæ ejus particulæ quò minùs inutiliter in auras evaporent, prohiberi sæpe nequeant, ibi verò integræ corpus ingrediantur, ideoque, jactu ista ut resarciatur, major copia requiratur. Quamquam etiam externus ille usus non unus existat, narius enim in Balsamis, Errhinis, Suffumigiis &c. dicata, cum potentiori effectu se exierat, & facile *καρποβαλει* aut alia mala inducat, minor paulò dosis sufficit, cordi autem, pulsibus &c. adplicitus majorem admittit. Quin & præscriptionis finis rem variat, qui si medicus verè sit & primarius, morbi natura cum cæteris coindicantibus perpendatur necesse est, sin ad odoris gratiam medicamento conciliandam potiùs tendat, præter ægroti desiderium & voluptatem, ingredientium reliquorum natura potissimum rem determinat, quæ ipsa ingrediètia præterea vel per se suaviter odorata, vel fœtida, vel inodora deprehenduntur, hisce, inodoris nempe, exigua accessione contentis; istis diffusiofiorem, si odoratarum quædam harmonia, aut etiam longè majorem, si moschatarum eminentia quærat, deposcentibus. Ut itaque Meditus in hisce & similibus ubique tempori & occasioni sese adcommodare debeat, eoque ipso prudentiam suam, à Medicastrosum indocto vulgo eum discernente, ostendere queat.

In genere tamen, ut aliquid certius determinetur, à dimidio grano ad ij. iij. & x. usque Medici communitè adtendunt. Quam dimidii scrupuli dosin ultimam eidem quoque tribuit *Cl. D. Gerard. Blasius* pag. 408. Medic. general. Licet alii, notante *Gesnero* & *Aldrovando*, dosin ejus quatuor aut quinque ad summum grana faciant, prout grana ij. iij. iij. vj. pro interno usu *Phil. Grulingius* part. II. cap. 1. Florileg. Hippocr. Galen. chim. itidem posuit, alii verò etiam dimidium transcendere scrupulum non dubitent, id quod cuilibet patere ex antecedi. potest.

De Medicamentis à Moscho liquidis.

Magnà cum sit medicamentorum compositorum varietas, ad necessitatem pariter & jucunditatem comparata, Moschus autem rariùs in substantia & per se exhibeatur, qui busnam admisceri potissimum soleat, aut mereatur, vel in quam redigi formam queat, nunc ut dispiciatur ordo deposcit.

Ubi liquida inter pharmaca primò omnium Aquæ destill. sese offerunt, quarum connubium sæpius obtinet, ita ut vel cucurbitæ immittatur, sicque odoratas suas aporrhæas calore resolutas cum aqua in alembico cum elevari permittat, in vase excipiente recolligendas: vel ipsius alembici rostro impositus à sensim adpellentibus halituosis, atque adfluentibus aquosis guttulis paulatim resolubilioræ sui partè dimittat: v. l.

etiam destillata jam aquæ immerfus eandem ipsi communicet.

Hinc Aquas inprimis odoriferas, ob gratæ fragrantia eminentiam, tam narium oblectamento, quam corporis refectioni destinatas exornat. Cujusmodi describunt *Augustani* class. 15. Dispens. *Thom. Bartholinus* Consil. de Anat. præt. & *Frid. Hoffmannus* Thes. Pharm. sect. 2. *N. de le Febvre* Chim. part. 2. *Ang. Sala* Hydrel. app. cap. 3. & 4. *Joh. Carol. Rosenbergius* Rhodolog. part. 2. cap. 22. *Claud. Deodatus* Panth. hygiast. lib. 1. cap. 14. *Joh. Ernestus* tr. de oleis chim. destill. *Joh. Bapt. Porta* Mag. natur. lib. 11. *Alexius Pedemontanus* de Secret. part. 1. lib. 2. *Dominic. Anda* in Secret. *Andr. Furrerius* lib. de decorat. nat. hum. Inprimis verò Aqua moschata dicta est celebratissima, quam modò simplici Moschi odore, modò etiam ambraceo & Zibethico simul imbuunt. Qualem simplicissimam *Bul. aser* profert, Aquæ nempe rosaceæ libras ij. à Moschi aureo j. abstractas, aliamque *Ferdin. Epiphanius* in Empir. Zibethi scil. & Moschi à 3j. cum Aqu. rosar. ℥ij. infusionem. Et *Luert. Esthius* de formul. tract. part. 1. sect. 8. cap. 8. ex Moschi ʒij. ambr. & Zibeth. à gr. v. cum aq. rosar. ℥ij. infusis, Solisque calore digestis, vel etiam simplici destillatione, aut quod ipsi placet, nodulo moschato alembici probolici immisso, similem proponit. Eadem *Rosenbergus* paucis indicat, Pharmacopœos nonnullos Moschum & Ambram pro placito in aqua rosarum fragrantissima dissolvere, eamque infusionem Aquæ rosar. moschata nomine venalem habere scribens.

Multi adjectâ Lachryma odorifera Javenfi, sub Benzoini nomine vulgò cognita, idem tentant, Aquam inde odoriferam, cum simplici fontana multiplicandam conficientes. Quos inter *Leonh. Floravantius* lib. de Capricci medic. cap. 20. Moschi in mortariolo aurichalceo contrit, & cum saliva soluti grana decem, benzoini verò unciam unam in aq. rosar. opt. ℥vj. usque ad hujus quartæ partis consumptionem decoquit, remanentem verò cum aquæ communis, prius per horam dimidiam ebullitæ ℥xl. commiscet, hac insuper addita cautela: *Avvertendo, che se tale acqua commune non fosse bollita, e calda, quando s'accompagna con l'acqua rosa, e muschio, che l'odore non penetraria: e perciò si bolle.* Ast præterquam quòd istud multiplicationis encomium omnibus quoque cæteris Aquis odoriferis nitè paratis, aliquibus etiam in excellentiori gradu competat, Moschi cum saliva vel sputo solutio sorditiei vituperio digna est, & superfluum curiositatem redolet, elegantius multò & commodissimè in aquæ rosarum particula instituenda, Benzoinum quoque, licet paucas aliquas odoratarum suarum atomorum inspiret, penitus tamen in aqua rosarum non dissolvitur, suæque resinositatè vel vasis adheret, vel aliàs conglobatur: Aquæ verò moschatae ad quartæ usque partis consumptionem ebullitio (quam *Deodatus* in vase probe clauso peragendam esse monens, impossibilitatem adjungit), excusationem nò admittit, tum quia absque illa, simplici tantum digestionem, eadem moschatarum & benzoinarum particularum per universam aquam dispersio obtineretur tum coctio maximè damnofa existit, ita ut, quæ odoratissima poterat esse Aqua, maxima ex parte fragrantissimis atomis, unicè hinc desideratis, in auras propulsis, orbata compareat. Neque etiam aquæ fontanæ per dimidiam horam ebullitio est necessaria, quia sola, breviori multò tempore impetranda, ejusdem calefactio odoratorum effluviis morum, inque auras secessionem abunde promoveret. Imò ipsam frigidam adhibere præstaret, cum omnis illa maxima quætitas non pro una vice in usum trahatur, ideoque post mixturam etiam, Autoris monitu, (*lascia stare così, se si raffredderà*) refrigerationem su-

bire debeat, faciliè, si in usum veniat, excalefacienda. Magis ergo placet *Gabr. Fallopi* processus lib. 2. Secret. quo aquæ rosar. Mensuræ ij. à Moschi 3j. & benz. 3j. in Balneo abstrahuntur, quòd tamen destillatam hanc Soli per 15. dies exponi vult, & aquæ font. Mensuras xij. remanentia adfusas, per insolationem pretiosum pariter odoriferum liquorem præbere putat, ibi superfluum, hinc vòro non benè respondentem laborem requirit.

Ubi tamen meritò disquiritur: An Moschus destillationi dicatus rectius ipsi cucurbitæ, vel Alembico, vel vasi recipienti, i. e. liquori destillando, destillanti, vel destillato imponatur? Mihi, pro varia intentione, modò hunc, modò alterutrum modum esse eligendum, videtur. Si enim solus odor, & quidem in liquore pellucido non colorato desideretur, omnium optime ipsi cucurbitæ Moschi corpus injicitur, secus, si una terrestriores vel fixiores ejus partes expectantur, nec color flavescens, in his subsistens, displiceat. Ubi tamen, sive alembico, sive receptaculo immittatur, nihil refert, ubique eadem partium salutarium extractione succedente. Unde *Ang. Sala* (Vid. etiam *Joh. Agricola* com. in Popp. part. 2.) minùs consentire possum, rectius eum facere judicanti, qui Ambram & Moschum vel in substantia, vel in spiritu vini, aliove liquore adproprio solutum, ad usum eligit, quam qui alteri horum adfusum spiritum, aut aquam destillatione iterum abstractam usurpat: quandoquidem præcipua & balsamica, ac inprimis, ambræ substantia, perpetuò in fundo vasis destillatoris hæreat. Quod equidem ratione Ambræ adeo impugnare nolo, de Moscho tamen inanis metus est reputandus; quanquam etiam jam destillatum spiritum aut aquam aliquam, ob unicam Moschi extractionem, denuo destillationi subicere velle, inutile laboris augmentum foret. Hinc non minùs jam patet, quid de *Joh. Zvelseri* sententia statui debeat, dum in Animadvers. class. 15. Disp. August. Moschi nodulo inclusi pro extractione in destillato liquore suspensione neglecta, eundem capitulo destillatorio imponere præceperat, ut & in ipsam cucurbitam conicere, class. 15. Pharm. Reg. pag. 252. prohibuerat. Absurda quidem, in Arte Pharmaceut. *Jacob. Primerosi* pag. 173. cap. de Aquis, proclamatur Moschi & Ambræ in rostro alembici repositio, vel cum liquore permixtio, non enim, uti verba ipsius habent, *virtus ejus cum aqua miscetur, aut exhalat*, sed revera, si Moschum spectemus, ipso sensuum testimonio, judicium hoc absurditatis convincitur. Conferatur historia de aliquot Chemicis à Moscho alembici rostro, ipsis insciis, indico & aquam predeuntem suo odore imbuente, egregiè delulis, ab *Exc. D. Joh. Georg. Elsholzio* Destill. curios. cap. 6. recensita.

Huc etiam Liqueores Spirituum nomine insigniti commodè reducuntur, dum ille præcipuè, è vino vel rosis prolectus Moschi virtute imprægnatur. Quales in *Rosinciana* Chimia in attr. form. red. lib. 3. sect. 1. art. 4. cap. 7. & 25. exhibentur. Huc porro spectant: Spiritus vini ambratus *Ang. Sala*, in quo tamen (alia ut taceam) S. V. dosis, 3j. designata, typographi fortè errore, nimis concessa est, facillimè tot uncias designanda: Spiritus ambratus in part. 2. Medic. experim. Digb. Spiritus regius *D. Frid. Hoffmanni* in Meth. med. lib. 1. cap. 1. ut & Clav. Pharm. Schönd. pag. 337. atque Thes. Pharm. sect. 26. pag. 102. necnon Aqua odorans potentissima *Joh. Bapt. Besardi*, in Antr. Philosoph. part. 4. part. 155. descripta.

Paucis quoque hic tangenda sunt Fermenta, i. e. Hydrosacchara & Hydromelita prædicti *Sala* in Saccharol. part. 2. proposita, è quibus compositum c. 7. spirituosum cap. 8. & cordiale cap. 11. Moscho exornantur. Licet verò Moschus per se satis jam liberæ & retolubiles partes contineat, simplici mixtura liquoribus

bus promittē communicandas; quin tamen fermentatione accedente magis eandem exaltentur; atque per minima cum reliquis misceantur; nullus ambigo.

Potionem moschatam in Dispensat. habet *Nicolai Praepositus*; quam etiam exhibet Antidotarium *Arnoldi de Villa nova*; variarum rerum mixturam continentem; quæ tamen pulvères solo rosaceo Sirupo excipi jubens quâ ratione titulum istum sibi vindicet, nescio; cum potius Linctus vel Electuarium dici queat. Magis nomen illud tuebatur Claretum moschatum *Mynsichti* Armament. sect. 22. cui jungendum Vinum Hippocraticum *Digbeannam* l. c. *Alex. Pedemontani* part. 1. lib. 2. de secret. & *Joh. Bapt. Porta* Mag. nat. lib. 14. cit.

De Viris moschatis sive moschatelinis dictis; aliisque Porum moschatorum generibus ad delicias comparatis; inferius agendi locus erit.

Nunc ad Olea deveniendum; quæ inter antiquitatem se commendat Oleum moschatum *Nicolai Myræpsi*, Moschelæum; ab aliis etiam moschelinum; muscelium; muscatellinum &c. corruptè adpellatum; quod nunc à Moscho; vel à Nucis moschata nomen impetaverit. scire; parum quidem teferret; à Moscho tamen id nominis habere; facilius credo. Cujus compositione mirè variat; ita ut consilio hic opus esse judicaverit *Cass. Hofmannus* lib. 2. de medic. offic. cap. 162. §. 123. Alia ut præteream, Moschum nonnulli ab eo excludunt; arboreum muscum à *Nicolao* indigirari; ideoque ab hoc; non illo; nomen mutuari somniantes; quorum tamen error; cum Græcis muscus ille *ῥόσχος* dicatur; *Nicolai* autem *ῥὸν ῥόσχος* ponat; mox patescit. In ipsa quoque Moschi dosi plurimum variant; Si *Nicolai* textum consulamus; ejus *℥vj.* comparebunt. Minus tamen errant; qui eandem quantitatem pro varia intentione auctam vel diminutam sumunt; prout *Augustani* quoque dosi minor placuit; modò enim Medicus ipsius descriptionis; in hoc vel illo Pharmacopolio usitatæ; notitiam habeat; errare minus poterit; efficax in qualibet descriptione Oleum habiturus; cui dein; si lubear; aliorum; ipsius etiam Moschi; additione vires intendere; perquam erit facillimum. Ut hoc ipso Oleo; prout pluribus aliis passim usualibus; ad pompam magis; quam ad usum idoneis pharmacis; catere. Officinas posse credam. Modum ideo præparationis tum *Veterum*; tum *Zwelferianum* excutere; & quid utrinque erratum fuerit; dispicere hic; vel illam ob causam superfedeo.

Per additionem materiæ cujusdam oleaginosum quid; pretiosum & suavissimum exprimi posse *Kurrathis* innuit; modum tamen ipsum silentio involvens. Favere ei videtur *Casalspinus*; cui Moschum non sine pinguedine animalium esse illum ferentiam; supra jam adnotavi. Quod si certo modo admittatur; tantum tamen pinguedinis aut oleositate in eo nemo deprehendet; multò minus adeo liberam à cæteris terrestrioribus &c. particulis; ut; relictis his; in oleosa forma sua tam facili negotio conspiciendum se præbeat. Licet addito cuidam corpori oleoso particulas quasdam sui Tartareas communicare; adeoque olei proprii formam ludere posse non contradicam. Id quâ ratione fieri queat; (*Kurrathis* secretum suum; si aliud fuerit; ut sibi reservec;) vel ex antiquiore; quam ipse est; Scriptore jam videbimus; videlicet *Alexio Pedemontano*; qui lib. de Secret. fructus Bani in quatuor partes divisos & scribro injectos; suppositis in vase amplo terreo Moscho & Zetho; aqua rosarum solutis; & igne subitū locatō incalcescentibus; vapore odorato imbuere docuit; forculatis opè postea exprimendos; vel amygdala in duas partes dissecta & aquâ rosarum Moscho imbutâ usque ad mollitiem macerata; in Sole demum exsicanda; tandemque labore hoc quinquies vel sexies peracto; exprimenda proposuit. Faciliorem etiam alium modum monstravit idem; pretioso florum auran-

tiorum oleo; ex amygdalis dulcibus; prius per strationem cum dictis floribus odore isto amenissimo imbutis; expresso Moschum admisceri; perque octiduum Solis radis exponi volens. Id quòd Oleo & Balano myræpsica expresso; cum rancori magis resistat; fieri commodius posset; aliove aliquo consimili; teu *Porta* lib. 10. Mag. nat. cap. 5. Oleum è semine citri hoc modo prolectum ad extrahendum è Moscho odorem; optimum menstruum judicat. Nec silenti debet modus; lib. 11. cap. 3. ab eo propositus; quo Moschus cum amygdalis repurgatis; inque senas vel octonas partes concisiss; pixidi plumbeæ per 6. dies includitur; atque per expressionem postmodum oleum odoratissimum educitur; licet hac ratione moschatæ atomi parcius nucleos istos ingrediantur; unde etiam ab operatione ista Moschum non admodum deteriore reddi; *Porta* benè suspicabatur. Imò si de omnibus prædictis modis experimentum sumamus; parum profecto Moscho decedere comperiemus; illudque ipsum; quod fortè cum eo copulatur; à viscosis vel unctuosus olei particulis ita obtunditur; ut gratiam suam omnino deperdat. Id quod sanè mihi; cum hæc experiri laborarem; contigit. Num aliæ exercitationes & feliciores insuper hac in parte sint; me latet. Interèa uti prædictos Scriptores multas præparationes alias; solius ingenti immaturos quasi paratis; successu omnino carentes; audacter satis tradidisse; nemo negare potest; ita quoque his in Oleis calamum eos solum exercuisse; nec mahus ipsas operi admovisse; suspicari mihi liceat. Ut ita alia; quæ in processibus istis censuram deposcerent; excutere libentius superfedeam.

Qualiter verò se habeat Oleum moschi Orient. Florentinum; ejus ex Deliciis Hybernis Nobil. *D.D. Jo. Dan. Majoris* supra Cap. XXI. fecit mentionem; & an prædictorum centuriam mereatur; hætenus me latet.

Per destillationem insuper parate odoratissimum & pretiosissimum Moschi oleum; sunt qui intendunt; modumque; Balnei calore absolvendum; prolixius demonstrat *L. 10. c. 9. Porta*; qui sanè Balnei calor; si tantum oleolarum particularum; destillatione expellendarum; in Moscho luxuriaret; non esset spernendus; cum revera tenuissima quidem ei insit essentia; blando solum calore impetanda; olei tamen forma nunquam est proditura. Et si auctiori ignis gradu oleiforme quid tandem obineatur; nonnisi fetidissimo combustionis nidore infectum erit. Moscho enim non in quæ aphorismus chimiatur. 18. sect. 2. *Aug. Sala* adplicatur; quo impossibilis esse decernitur Oleorum è sanguine & carnibus quorumcunque animalium sine adustione destillatio. Videatur etiam ejusdem tractatus de erroribus Pseudochemicorum; ubi fallaces eorum; circa Oleum quoque Moschi commistas cap. de Ball. atomat. perstringit. Nec verè Oleum Moschi est dicendum; quòd; additis aliis quibusdam rebus oleosis vegetabilibus; minori igne propellitur; cum saltem quædam Moschi subtiliores particule; oleo vegetabili mistæ; eidem odorem qualemcunque impertiantur; cujusmodi Oleum in *Joh. Bapt. Besardi* Antro philof. part. 4. pag. 157. legitur. Et tale etiam foret; nimis Ambra & Moschi prodigalitati junctum; quòd in lib. 1. cap. 18. *Secretor. Mich. Nostradami* legitur; si tueri sese ab empyreumatis labe posset.

Tandem se Tincturæ; Essentiæ; & Elixiria sistunt; quæ medicamenta equidem aliquam inter se distinctionem licet patiantur; sæpissime tamen eorum nomina confunduntur; ut; unumque pro altero recipitur. Mihi itaq; præcipue dum curiosior illa distinctio parum utilitatis importat; istis; quibus ab Autoribus suis proponuntur; nominibus inhætere; est constitutum.

Tincturam Musci *Paracelsicam* Gerard. Dorneus Fascicul. Parac. medic. tract. 2. ex lib. de virib. membr. cap. 4. desumptam exhibet, eundem in vino vitæ in succum instar styracis liquidæ coquendo, quam ipsam Extracti Moschi titulo dignatur Andr. Libavius lib. 2. Alchim. tract. 2. cap. 2. & cum infusione Melissæ, vini spiritu facta, parare edocet.

Quintam Moschi Essentiam per Spiritum vini terebinthinatum extrahit Kunrathus, eamque Moscho in substantia exhibito, utpote penetrantiorē sicque efficaciorē præfert. Spiritumque illum tanquam pro Moschi proprio dissolutivo Joseph. Quercetanus de medicam. spagir. præpar. sect. 2. cap. 4. reputat, quem equidem nonnullas ab eo partes extrahere vel à crassioribus separare, negari nequit, ast proprium ejus propterea vocare dissolutivum vel menstruum, nimis libera est assertio, cum idem encomium cæteri quoque liquores omnes, in quibus Moschus diffuere quasi amat, veluti quivis alius Spiritus, Aqua destillata &c. imò & acetum, (vid. Exc. D. Phil. Jac. Sachsii Ampelogr. lib. 2. sect. 3. cap. 3. pag. 572.) mereantur, quin & eorum nonnullos magis proprios dici posse, certum est, si nempe menstrua intentioni medicæ, aut cuivis alteri magis respondentia, extractioni adhibeantur.

Paracelsus Archidox. lib. 4 Moschum oleo amygd. dulc. macerat, donec instar pastæ fiat, cui expressæ Spiritum vini adfundit, eumque essentia Moschi imprægnatum, post 6. dierum digestionem, calore cinerum destillando separat, relicto in fundo amygdalorum oleo, ipsum autem Spiritum vini in B. denuo abstrahit, remanente in fundo oleiformi quinta Moschi essentia. Quem modum Joh. Bapt. Porta lib. 10. Mag. nat. cap. 13. à Paracello mutuatum paulò aliter describit, oleum balaninum pro maceratione etiam admittens, decem dierum digestionem præcipiens, & vini spiritui aquam fontanam ter quaterve destillatam jungens. Quem Porta processum pariter Andr. Libavius part. 3. Singular. lib. 4. cap. 9. & lib. 2. Alchim. tr. 2. cap. 6. reperit.

Petr. Joh. Faber lib. 1. Myrothec. spag. cap. 26. Ambram, Moschum & Zibethum tota sua substantia, modò pura sint, in essentiam converti, (quod tamen de Moscho penegeo,) aliquam tamen indigere scribit, ut partes heterogeneæ, non solum à natura, sed etiam impostura adjunctæ separentur. Moschum ergo in Arcanum sive Quintam Essentiam redacturus, spiritu vini alcoolisato solutum, in vase vitreo oblongo, optimeque clauso, igni lenissimo, pro penitiori partium solutione & heterogenearum separatione exponit, spiritumque per inclinationem depletum, in alio vase vitreo oblongi colli per 15. & ad parium resolutarum ulteriorem depurationem in MB. digerit, toties laborem hunc repetendo, usque dum omnimode à fecibus depuratus sit, tandem lentissimo igne ad consistentiam mellis destillans.

Superius citatus D. Faber, Angelus, in Examine Cordial. magn. Ravvlich. Moschi Essentiam hac ratione parandam edocuit, eum nempe in mortario marmoreo cum paucis saccharo canthio albo pulverisatum, & Pelicano inditum in B. vaporoso cum spiritu vini circulandum, spiritumque dein calore blandissimo in eodem Balneo usque ad Sirupi consistentiam esse abstrahendum perhibens.

Hieron. Reusnerus in suo tract. MS. de Pollinot. cadaver. Q. Moschi Essentiam idem exhibet, eundem cum spiritu vini ad iij. vel iiij. digitorum eminentiam superfuso, in vitro Sapientiæ luto occluso & panis medullæ indito, calore fornacis pistorii solvendo atque post filtrationem spiritum in M. B. abstrahendo, remanente sic in fundo Moschi extractione.

Sed ut jam non urgeam abusum epitheti Tincturarum, aut Quintæ Essentiæ nomen labili admo-

dum fundamento inniti, quod imprimis Joh. Bapt. Helmontius tr. Asthma & tuss. §. 44. & 79. ostendit, has saltem jam recensitas omnes inter non Entia refero, Anonymum autorem sequutus, qui Q. E. Moschi, in qua odor & virtutes incredibili modo sint auctæ & exaltatæ, & quæ extractione subtilissimarum partium paratur, pro non Ente reputat. Si enim præparationes istas spectemus, inutiles revera labores, & magno cum conatu præstantiorum atque essentialium Moschi atomorum dispersionem ubique inveniēmus. Quid enim, quæso, opus erat Moschi cum oleo amygdalino impastatione, cum ipse vini spiritus substantiæ Moschi adfusus eundem mox facis superque dissolvere vel extrahere possit, oleum econtra ejusdem actioni admodum resistat; Quid tot dierum, & vel in clibano ac pasta frumentacea digestionem, cum vel intra horulæ unius spatium Moschus contritus menstruo succum suum simplici labore impertiat? Quid sacchari canthi additione, quæ laborem, quo partium terrestrium inodoratarum segregatio intendebatur, suo exigui hinc valoris corpore irritum reddit? Ultima autem ubique requisita ad extracti liquidiusculi consistentiam abstractio præcipuarum odoriferarum atque essentialium atomorum cum spiritu vini separationem procurat, quamvis enim lenissimo tantum igne hujus evocatio quæretur, Moschi tamen atomos odoratas præ illis, quæ vini spiritum constituunt, esse fixiores ut credam, nemo me adeo facile permovebit, ita ut hæc solæ, relictis illis, in alembicum elevari nequeant, quin magnam moschatarum unâ copiam secum abripiant, id quod Spiritus vini sic destillati odor abundè docebit. Unde quotquot hac ratione odoratæ aporrhœæ ex Moscho cum spiritu vini junguntur, tot necessario Essentia remanendi decesserint.

Quo itaque intuitu vel ipsum Moschum in substantia exhibere, vel simplicem solutionem & filtrationem suadet, plurimum præstatet. Cum Moschus sit sanguis animalis concretus & calore Solis cælique bonitate satis elaboratus, non indiget ulteriori extractione aut præparatione chimica. Cum enim odor iste in tenui atque aërea ejus substantia consistat, affusione aquarum aut liquorum ad extractionem utilem, odorata qualitas dissipatur ac diminuitur: (scilicet accedente postea insuper eorundem liquorum abstractione aut exhalatione,) hinc vel in substantia ad solidiores compositiones assumitur, vel odor ejus in aquas cephalicas aut cordiales, ut est aqua carfunkuli & aliæ, transfertur: verba sunt Laurent. Euchstadii cap. 13. de confect. alkerm. Hinc sanè etiam Petr. Poterius, multos spiritus perire, Moschum verò ipsum veluti quintam quandam essentiam esse, considerans, meritò à sordibus eo tantummodo repurgato nos uti lib. 1. Pharmac. spagir. sect. 6. subjungit, & lib. 3. sect. 3. Ambram & Moschum adeo à natura esse exaltata, scribit, ut præparatio eorum frustranea videatur. Atque pro Arcani Lulliani compositione, quam Cl. D. Joh. Gerardus, Professor olim Tubingensis, cum tractatu Medic. univers. defens. edidit, requisita Quinta Moschi Essentia, simplici ejus in vini spiritu solutione paratur, optima sanè intentione, quam tamen subsequens dein in ipsius Arcani mixtura destillatio non parum enervat. Ut ideo hac quoque ex parte verissima sit Helmontii eximioris §. 45. Nat. contrar. nesc. scriben. is: Ut Spagyria deducit multa ad gradum majoris energię, quatenus ens novum suscitatur: sic aliàs rursus multa clam suffurando debilitat. Naturam scilicet ignavia atque imperfectionis accusat, quisquis eandem citra ignem nil ex polivisse autumat.

Et cum hac inutili menstrui abstractione Moschi quoque decoctio quodammodo convenit, non exiguum

quam utpote odoriferarum partium jacturam ugens, cujus exemplum præbeat Oleum Fioravanti, quod Olio excellentissimo per far buona memoria vocat, cujus præparatio uti plura animadversione digna, ita etiam in specie Moschi coctionem inutilissimam continet. Genuina namque & hæc est Helmontii censura §. 40. tract. Pharmacop. ac dispensat. modern. Cum Aromaticum vis genialis atque præcipua sit in odorabili, hæc si ultro evanescat, & sponte odoratum feriat, quitandem bulliendo & affando non fiet, præcipue ubi gradus accesserit: quod nostra nos docent odoriferorum destillationes. Id quod perantiquus ille Scriptor, Arnoldus Villanovanus cap. 9. Antidot. jam innuerat: Sciendum, inquit, quod sunt, quæ non sistent decoctionem, ut moschus. Et Jacob. Sylvius lib. 2. de medic. simpl. præpar. Moschum ab igne depositis, & jam tepentibus Decoctis esse injiciendum monuit. Idem & de Emplastrorum præparatione Jac. Primerosius in Art. Pharmaceut. & Joh. Heurnius Meth. ad prax. med. lib. 1. nempe Moschum & cum Emplastrum jam refrixit, esse admiscendum, perhibent, id quod tamen non de omnimoda refrigeratione adcuratam mixturam prohibitura, vel difficilem admodum redditura, intelligi debet. Cui convenit ipsius Galeni quoque sententia, qui lib. 6. de comp. med. s. l. Myrrham & Crocum in fine coctionis, aut ollâ jam in terram posita, adjicienda voluit, cum ampliori coctura aromaticorum medicamentorum facultas destruat. Qui utique, si Moschum habuisset cognitum, id multo magis de eodem monuisset. Unde nec parvam cocturam abque quarundam partium subtilium deperditione Moschum admittere, certum est, secus ac Quiricus de Augustis & Paulus Suardus in suis Dispensat. voluerunt, qui medicamenta in illa, quæ multam, parvam, & mediocrem sistent decoctionem, dividentes, mediis illis Moschum adposuerunt.

Huc spectat etiam Magisterium Moschi, inter Selecta remedia à Joh. Bapt. Spumono, cum de Pulvere vipæno egisset, recensitum, dum à Moschi recentissimi Zii per retortam vitream in B. M. tota humiditas, tanquam pars mercurialis, evocatur, atque à remanentia Spiritus roris majalis abstrahitur, eidemque postea super porphyritem trita redditus, denuo calore cinerum instar aquæ crocæ destillatur, tandemque per B. M. spiritus, pro hujus ipsius laboris iteratione adhibendus, separatur, remanente in fundo Moschi essentia sulphurea, feces autem tredecim dierum spatio calcinantur, cumque priori spiritus sal elicitur, solutionibus & coagulationibus depurandum, cumque mercuriali liquore, & sulphureo extracto permiscendum. In quo sanè processu magnas conatu magno agi nugas, feverior aliquis Chemicus exclamaret. Ut enim labores plurimos omnino inutiles & penè ridiculos taceam, Spiritus ille roris majalis, qui tamen mixturam illam ultimam non ingreditur, potiores Moschi odoriferas particulas continet, Sal autem ex fecibus vel nullum, vel tantillum, & imò hoc ipsum nullius virtutis singularis præ quolibet alio, ex vilissimo etiam ligno &c. collecto, spectari debet.

His sanè omnibus judicium Ang. Sala l. c. cap. de Extr. quadat, quo extractiones istas rerum aromaticarum peragere, perinde esse innuitur, atque cum evolavit avis, caveam claudere; quamvis residuum illud non nisi spissitudinem terrestrem, omni potentia & virtute exspoliata esse, propterea cum Sala decernere nolim, qui aliqualem, satis tamen castratam, ei derogare nequeo.

Hic etiam Essentia ambræ, quæ aliquando ob majorem Moschi, quam Ambræ dosin, nomine moscharum, vel urriusque, quorundam imitatione, essent dignæ, tangendæ sunt, quales nobis Miscellanea Natura Curios. Append. Ann. VI. Ill. Collegium

Noricum Dispensat. sui A. 1666. studio nunquam satis laudandi D. D. Joh. Georg. Volckameri editi pag. 165. & Hafnense class. 20. Nobil. D. Guerner. Rolsincius Ch m. lib. 4. sect. 1. art. 2. cap. 3. Exc. D. Joh. Lud. Hannemannus Id dispens. sui, Mindererus noster in Dispens. August. Mantiss. hermet. D. Christophor. Glaserus Manuduct. ad Chim. lib. 2. cap. 21. D. N. de le Febvre part. 2. Chim. Joh. Zvelferus Animad. Pharmaceut. aliique exhibent. Quibus consimiles qui parare voluerit, diversis pro lubitu in f. q. adfusus mensuris & prævia vel paucarum horarum digestionem, absque ulla destillatione impetrare facile poterit.

Elixiria denique huc spectant, quorum specimen Elixir vitæ Matthioli, in Officinis nostris Augustanis proflans, Elixir vitæ Fioravanta, Elixiria citri Rolsincianum, Feburianum, necnon Barth. Pielat in Laborat. Ceylon. pag. 114. & 115. suppeditabunt.

De Medicamentis è Moscho siccioribus.

In sicciorum classe primò de Pulveribus agere, non erit inconveniens. Quos tamen exornare neutiquam posset, si Monachos, qui in Mesuen commentati fuerunt, sequi vellemus, utpote non coiteri debere eum opinatos. Id quod ob virtutis, dum pulverisatur, evaporationem esse omittendum Quiricus de Augustis & Suardus admonent. Nonnulli tamen sententiam hæc mitigantes, trituram quidem, sed minorem, quam aliis Aromatibus, ei deberi statuunt, prout Joh. Bravus de sapor. & odor. cap. 20. de Moscho, Ambra &c. verba faciens, hæc aromata, inquit, teruntur quidem, quanquam minus, quam alia &c. quia cum tenuia raraque existant, & facultatem superficiariam sine adepta violentia, aut magis quam par sit, diuturno ictu facile exolvuntur, celerimeque languent, meliore illarum parte in tenuissimum pollinem abeunte: accedente etiam & calore, ex attritu corporum durorum genito, imbecillanti medicamenti facultatem dissipante. Et Hier. Mercurialis lib. 3. de comp. med. cap. 5. Moschum crasso modo esse conterendum, arbitratur, quia, cum sit rarissima substantia, facile evaporat; imò qui volunt conservare musci facultates, inter conterendum addunt saccharum, quia, si per se solus conteratur, facile ejus facultas tota moritur. Alii verò, uti Joh. Renodens lib. 2. Instit. pharm. cap. 6. siterendus sit, humectationem ejus suadent, ne subtiliores partes ac magis odoratæ dissipentur: vel, quod Jac. Primerosius Art. pharmaceut. pag. 55. habet, ne vis odora exhalet. In qua tamen opinionum varietate nulla est, quæ mihi placeat, qui trituram Moschi nullatenus rejicere sustineo. Quamvis enim, recens si fuerit, in pulverem, ob humiditatem nativam conjunctam, conterî per se nequeat, tractu tamen temporis exsiccatus, aut siccioribus aliis admixtus, cur redigi in pulverem non debeat, sufficientem causam haud video. Aëri quidem libero expositus, interno inprimis agitante spiritu, quasdam odoratas sui atomos subinde emittit, easque calor externus tritura inductus eo promptius expellit, necnon corpus ejus in minutiores particulas divisum, plura etiam quasi emissaria nanciscitur, tantum tamen in operatione illa non decedit, ut propterea eandem sæpe necessariam omnino omittere, aut facultatis notabilem exsolutionem, dissipationem vel languorem pertimescere debeamus, præcipue quia compactæ adeo non est substantiæ, quæ violentiam nimis ac diuturnam trituram requirat, facile à pistillo in corpuscula minutiora discernenda, mulò minus autem pollinem ejus tenuissimæ adeo texturæ esse scio, ut melior illa pars pulverulenta avolare queat, ac ita aquæ rosarum &c. pulverisationem potius inhibeatur, (quam quidem à vini aut aquæ irroratione facilitari, Primerosius pag. 59. credit), atque ob humiditas suas exhalationes moschatarum quoque fugam aliquam promoturæ, aspersione indi-

indigeat. Moscho autem superficiali aut imbecillam facultatem ad iudicare, experientia repugnat, quâ tam potens & altè radicata illa comperitur, ut etiam magnam aquæ quantitatem exigua ejus particula odore suo imbuere valeat, remanentque corpus terrestrius quasdam nihilominus odoratas sibi relinquit molculas. Ratum ergo sit, Moschum conteri omnino posse, idque vel per se, ubi siccior fuerit, aut in liquore hac ratione dissolvi debeat, vel, si humidior præsertim existat, cum aliis, quâ ratione saccharum, ubi medicamento desiderari forma & operatio non reluctatur, nequitiam rejecerim, non quod ipsanti Moschi facultatem artificio hoc à morte præservari credam, cum ob majorem partium à sacchari interventu disgregationem major etiam odoratarum atomorum (si minutias istas cum Autoribus illis attendere velimus,) exhalatio potius contingat, quia Moschus, dictante *Dan. Sennerto* de cons. & diss. Chim. cum *Aristot.* & *Gal. cap. 11.* quò in minores partes dissolvitur, eò plus odoris sp. rat, sed quia partes ejus hac ratione, uti dixi, melius divelluntur, sicque copiosiora odoris effluvia impetrantur, vel saltem humidiores in pulverem ut abire queant, disponuntur.

Varii itaque Pulveres Moscho, non odoris saltem ob gratiam, sed etiam virtutem, sicque ut basi, adjuvante, corrigente, aut dirigente, nobilitari passim soliti, omnino hîc recensendi sunt, quos partim in substantia, ut dictum est, partim &, quod nonnunquam melius, rosarum aquâ &c. dissolutus ingreditur.

Hos inter Species aromaticæ vulgò in Officinis dictæ plures eundem recipiunt. De quibus, uti *Diarrhodon*, *Diambra*, *Diamoschi* &c. *Guil. Rondeletii* censuram, quâ, unum eorum medicamentorum qui habet, altero carere posse tract. *Pharmacop. offic.* innuit, non omnino rejecerim, nec omnino adprobaverim. Ut jam plurimas similium Specierum huic vel illi parti, morbo, aut aliæ indicationi magis minuve competere non urgeam, multas earum virtute convenire, nemo sanus inficias ibit. Merito autem, si unus tantum Medicus in loco aliquo praxin exerceat, aut plurium consensus obtineri queat, carere tot descriptionibus Officinas posse adstruitur. Ast sæpe, imò, ubi plures degunt, tantum non semper idem, quod contra *Zvelferum*, multitudinem Pilularum reformantem, in *Pharmacop. Aug. Rest.* pag. 96. dedi, iudicium, quot capita nimirum, tot esse sentus, huic Medico hanc, illi aliam compositionem magis arridere atque in usu esse, varietatem insuper delectare, est decernendum. Licet cæteroquin nec omnino damanda sit illa *Asclepiadis* à *Scribonio Largo* adducta, & huc quadrans sententia, qua ultimæ sortis esse Medicum contendit, qui non ad singula quæque vitia binas ternasve compositiones & expertas protinus paratas habeat. Ut verò reliquas jam missas faciam, solas *Diamoschi* dulcis Species attingam, quarum plures equidem apud *Mesuen*, *Rasæum* ad *Galienum* lib. 9. cap. 69. *Isaacum Israelitam* *Pantech.* lib. 10. pract. cap. 42. *Actuarium* de medic. compos. *Nicolaum Myrepsum* *Joh. Renodæum* *Offic. pharm.* lib. 3. sect. 1. cap. 4. descriptiones prostant, Mesuana tamen illæ, in nostro etiam Dispensatorio Augustano propositæ, in Officinis frequentiores existunt, quas ablinthii, rosarum, aloës, castorei & levistici additione amuras & efficaciores præterea reddere *Mesue* laboraverat, ob omnimodam tamen gratiæ jacturam ex Officinis jamdudum proscriptas. *Rondeletius* tamen (confer etiam *Renodæus*) & alterum illud, dulce vocatum, medicamentum relegandum putat: tum quia ob paratum jam *Diambra* pulverem, qui ejusdem sit facultatis, & Moschi in eo dosi augeri facile queat, carere eo possumus, tum varia sit ejusdem descriptio, tum & multa parùm probanda recipiat. Cui, cæteris paribus, refragari admodum nollem. Licet enim di-

versæ descriptiones scrupulum hîc movere nullum debeant, à determinata earum una, Medici rationalis iudicio facta, elect one mox eximendum, revera tamen *Diambra* Species eundem effectum spondens, aliqua etiam absque ulla hæsitacione omitti possunt, imò, veluti sericum crudum tostum, si minutissima quævis prosequi opus sit, debent.

Cæterum communiter cum & sine Moscho paratæ Species istæ adservantur. Causam superius, cum de Moschi incommodis agerem, attuli. Unde cum *Joh. Ant. Lodetto* *Pharmacopœos* fraudis accutare simpliciter nolo, si in Aromatico rosato aliisque compositionibus Moschum excludant, Medici intentioni, & ægrorum necessitati ita attendentes, prout tamen, si qui solius lucri causa incompletas ejusmodi Species pro completis distrahare præsumant, reprehensionem pœnamque severam utique merentur. Alias, quam similes Pulveres, negligentius præcipue adservati, multorum annorum ætatem vix perferant, sed sensim extolvantur, ideoque rectè eos facere merito statuatur, qui ad mentem *Hier. Mercurialis* lib. 3. de comp. medic. cap. 13. in exigua semper copia parantes, eòque sæpius elaborationem eorum iterant, ne sine optato Medicis frustretur, eosdem tamen propterea planè rejicere, quod fecit *Fallopium* de medic. comp. cap. 30. 31. cum de Aromatico rosato, & *Diambra* ageret, nimis rigorosum foret. In Electuarii quidem formam, Mesues exemplo, effingi *Diamoschum* &c. commodè potest, tantum tamen autoritas illa non est effrenda, ut eapropter non etiam Pulveris sub specie, aut etiam sacchari &c. accessu, Rosularum forma prostratæ queat, præcipue cum hæ, benè adservatæ, citæ corruptioni non fiant obnoxie, ille autem quovis tempore, addito melle aut Sirupo aliquo commodo, Electuarii faciem induere valeat. Interea tamen, res mei si fore arbitrii, *Rondeletii* iudicium tract. *Pharm. offic.* prolatum amplecterer, quo, consimiles Species sine odoratis istis si pararentur, nec Medicis, nec Pharmacopoliis illis nempe imperare, hisce exequi, molestum fore stuit, ubi ea ex tempore, usu exigente, jungerent.

Pulveres hosce Ambra moschata *Mynsichti* sect. 1. *Armam. med. chim.* excipiat, qua cum magnam adnitentem habent: Ambra essentificata vel rectificata, Augustissimi *RUDOLPHI II. CÆSARIS*, & Serenæ Anglorum Reginae *ELISABETHÆ* medicamentum, à *Joh. Hartmanno* in *Prax. chimiatri*, & not. in *Basil. chim. Croll.* descriptum, atque à *Guil. Maxwello* lib. de medic. magnet. cap. 15. Zibetho auctum, necnon Ambra moschata & Elæosaccharum cordiale compositum *Appendic. Ann. VI. Ephemer. Germ. Curios.* pag. 92. 97. Essentia ambrae sicca *Dispensatorii novi Norim.* pag. 166. *Hafniensis* class. 20. *Diaromaticum essentiale ambrae-moschatum Rolsfincianum* *Chim. lib. 4. sect. 1. art. 2. cap. 4.* Elæosaccharum moschardium, ambritum sect. 6. cap. 2. ut & cephalicum Ejusdem *Mesue* med. (pec. comment. lib. 7. sect. 1. cap. 4. *Diaromaticum essentiale Ang. Sala* descript. *Antid. pret.* ejusdemque Pulvis ambrae aut Saccharum ambratum descript. *Aq. sudorif. Diamoschum ad Magnatum corda* roboranda *Andr. Tenzelii* *Exeges. chim. part. 1. sect. 1. & Diamoschum dulce* sect. 3. ut & Spiritus rosarum compositus *Christoph. Glükradtii* not. ad *Joh. Beguin.* tytochin. chim. lib. 2. cap. 2. Tinctura confortans *Tob. Dornreili* *Dispensat. nov. part. 1. cap. 6.* aliaque, facili opera, subtrahendo quædam, vel adjungendo ingredientium dosi, aut numero, imitanda, ita tamen, ut requisitam à quibusdam Ambra & Moschi &c. cum rosarum spiritu repetitam irrorationem, seu inutilem & aliquo modo damnosam, aliamve justo curiosiorrem digestionem minus necessariam, aut depravatoriam evaporationem haud ineptè omitti posse, obiter animadvertam.

Tabâcinos, sive sternutatorios Pulveres odoris sui gratia & virtute non minùs commendat. Licet enim caput, uti Exercit. 8. §. 5. de Tabacis loquitur, replere potius Moschus, quàm ei exonerando prodesse, si ad certa quâdam individua id restringatur, *Joh. Chrysof.* Magnè sponte largiar, omnibus tamen præcipuè viris, quorum delictis ille magis inservit, eundem effectum minimè causare, sed caput potius quibuscum roborare, crassorumque excrementorum attenuatiōnem promovere passim videmus. Ipsum tamen Moschum esse caputpurgium, vel sternutatorium vim possidere, quam nonnulli ei tribuunt, haud observatur, cum tam acres non exferat particulas, tactu suo vellicationem istam in narium membrana quæ ciere possent, nisi tenui & calida sua facultate serum attenuando & agitando aliquid præster, aut etiam salino suo principio sensibiles admodum nares offenderit. Tot autem inter descriptiones unicam *Augustanorum* class. 9. Dispens. loco secundo exhibitam indiguisse sufficiat, vel, si potentior Pulvis desideretur, *Rolsincianam* sect. 2. de purgant. veget. art. 1. cap. 30. propositam.

Suavitatem etiam odoris, in delicatiorum præferentiam usum, dentifriciis Pulveribus conciliat. Quos inter ad dentes dealbandos pumice pulverisato nihil esse præstantius *Alexius Pedemontanus* part. 1. Secret. lib. 4. putat, quem Moschi & Ambrae momento conditum tanquam pretiosam rem quâdam nonnulli divendant, qui etiam granorum chermes, vel santali tinctura imbutus, alumine auctus, & Moscho rosarum aqua solutus ornatus in *Joh. Bapt. Zapata* Secretis dilaudatur.

Pulveres itidem, crassiores ut plurimum, Cucuphis parandis destinati, non bambace tantum moschato excipiuntur, sed ipsam etiam Moschi substantiam sæpiusculè admittunt. Cui usui inserviunt Pulveres violacei odorati in *Dispensatorio August.* & à *Joh. Freitagio* lib. 2. Auror. medic. cap. 25. propositi.

Cum quibus Sacculi cordiales, aut vestibus interponendi, necnon Scuta stomachica coincidunt.

Tandem non indisti abire debent Pulveres dicti Cyprii, ornati præcipuè non solum capillorum, sed & capitis interdum exsiccationi ac munditiei, imò ægotantium utilitati dicati. Qualem moschatum *Vidius* de curat. membr. lib. 2. cap. 3. descripsit. Cæterum hi ut plurimum (ut de aurea scobe, quam *Verum Antoninum, Commodum, & Gallienum, Imp. Romanos*, comis adpersisse referunt, nihil dicam) ex musco aliquo arboreo, querno &c. variatum rerum, Moschi præcipuè odore, tum per effumationem, tum stratificationem, tum substantialem admixtionem imbuto, parantur. Aliis pulverem resinofum è musco terrestri clavato collectum, ossa sepiæ, ovorum cortices, lignum cariosum, aut etiam amyllum usui huic inservire novimus. Bononienfes pigmentarios marmoris vel alabastris pulverem cum Moschi portiunculâ usurpare *Petr. Poterius* Pharmacop. spag. lib. 3. sect. 3. refert, qualem marmoreum, aut etiam ex concha margaritifera paratum *Joh. Bapt. Besardus* Antr. Philosoph. part. 2. pag. 160. delineat, eundem quò antiquiorem, eò meliorem esse pronuncians. *Alexius Pedemontanus* stercus vaccinum in mense Majo collectum, exsiccatum & pulverisatum, Moschique &c. odore exaltatum part. 2. Secret. commendat. Alii verò aliter procedunt. Quamvis si intentionem medicam, capitisque corroborationem respiciamus, pulverem aliquem ex herbis cephalicis concinnatum omnibus reliquis esse præferendum, vix superfit dubium, pro exsiccando tamen capite muscus imprimis commodissimè inservire potest. At solius voluptatis, aut artificiosæ canitiei causa qui eam frequentant inspersioem, quid eligere debeant, parùm curo. Nemo autem

nili vanitati isti impense deditus ultimo in modo sciens volensque deicias facillè capiet. Moschus cæteroquin omnium optinè in aqua aliqua odorata solutus fragrantiam suam per illos pulveres dispergit, id quod etiam de aliis rebus, sive corporetenus, sive in liquorem fragrantem resolutis dictum velim, cum in effumatione & stratificatione nimium de odoratis particulis disperdatur, satisque tardiolus labor sit superbeundus.

Plures Pulverum species ut jam sicco pede transeâ.

Nunc ad aliud medicamenti genus me converto, Moscellos nempe, Moschi itidem præsentia sæpe condecoratos, quorum selectiores formulas Ordo & methodus med. spec. comment. *Rolsinciana* lib. 8. sect. 2. cap. 4. Exc. *D. Wedelius* de medic. compos. extempor. sect. 2. cap. 12. & *D. Joh. Tilemannus* sect. 2. de mat. med. suppeditant.

Quò spectant etiam Rotulæ, quales elegantes Imperialium nomine insignitos *Hadr. à Mynsicht* sect. 7. Armam. ut & alios *Rosenbergius* part. 2. Rhodolog. cap. 22. describunt.

Quibus Tabulæ, Manus Christi vulgè dictæ, jungendæ, ab *Ang. Sala* de var. Chim. & Galen. error. tr. 2. *Rosenbergio* l. 1. *Claud. Deodato* Panth. hygiast. lib. 2. c. 2. necnon Tabellæ à *Riv.* cent. 4. obs. med. 70. & Tragea magistralis à *Zacharia à Puteo* clav. medic. ration. sect. 20. descripta.

Qua ratione verò Moschus medicamenti hisce recensitis commodius adjiciatur, *Joh. Schröderus* Pharm. n. ed. chim. lib. 2. cap. 69. docere voluit. In morsulis parandis olea destillata si occurrerint, in fine ea instillare oportet, vel paratis morsellis illinire. Idem judicium de Moscho & Ambra, quæ in aqua rosarum dissolvuntur, atque paratis tabulis illinuntur. Verum quod illinitio nem hanc concernit, cum superficialia illa Moschi cum Morsulis Rotulive unio non diu duret, sed justo citiorem odoratarum atomorum exhalationem admittat, nisi adcuratissimè in vase aliquo recondantur, simulque breviori tantum usui dicata sint, non adeo commoda esse potest. Cui meritò itaque ipsa cum saccharo cæterisque ingredientibus incorporatio præfertur, sive jam cum sacchari particula aliqua, aliusque pulveribus probè tritus, inque minutiores particulas segregatus, sive, quod ob pellicularum aut etiam pilorum mixturam, ad medicamenti elegantiam impetrandam necessariò separandorum, imò Moschi ipsius meliorem disgregationem, est convenientius, in portione aliqua rosaceæ alteriusve adpropriatæ aquæ dissolutus, in fine demum coctionis, saccharo jam ad debitam consistentiam deducto, pro minori fragrantia jactura, admisceatur. Pro minori, inquam, fragrantia jactura, omnem enim, minimam etiam, præcavere vellet, non est possibile, nec adeo necessarium. Sed quòd *Zacharias à Puteo* Moschum & Ambram non esse commiscenda seridè hortatur, antequam saccharum caliditatem dimiserit, quoniam, ut verba ejus habent, omni eorum præstantia & odore facillimè spoliarentur, sed ejusdem sacchari tepiditatem expectandam esse, non satis capio. Saccharum enim adhuc calens, fluidum, & antequam intepescat, esse in requisitam formam effundendum, omnibus Pharmacopœis est notissimum, cum aliàs mox, concresecendo, nec Moschi aliorumque pulverem amplius recipere, nec debitam in formam effundi queat.

Hisce subjungo Pastam regiam, panis dulciarii genus, cui interdum Moschum addi posse *Casp. Bauhinus* de remed. form. lib. 1. cap. 27. & *Joh. Heurnius* Med. ad ad prax. med. lib. 1. monuerunt.

Ejus speciem quandam constituunt Mostaccioni, sive Mustazzuoli, Italici ita dicti, aut etiam Muscardini à Moscho, ab eodem *Heurnio* descripti. Confer. *Th. Jordanus* de pest. phoen. tract. 3. cap. 6.

Nec

Nec multum differt Massa illa, quam Panem Martium, Mazam panis &c. Italicè Marzapane, (vid. *Celeberr. D. Octavii Ferraris* Origin, lingu. Ital. pag. 200.) Latine autem Diamygdalatum, vel Pineolatum vocant, cujus cum Moscho parandi rationem exposuit *Joh. Renodius* lib. 5. Inst. pharm. sect. 1. cap. 6.

Accedant & Marmeladæ, (vid. laudatus *Ferrarius* pag. 199.) qualem cordialem, ac cephal. c. moschat. *D. Barth. Pielat*, pag. 88. & 89. Labor. Ceyl. exhibuit.

Trochiscos inter Galia moschata eminet, vulgò Gallia moschatæ nomine nota, de cujus etymo *Renod.* lib. 3. Antidot. sect. 3. cap. 5. evolvi potest. Sed tali sub titulo duplex diversæ descriptionis medicamentum in Antidotariis cum proponi soleat, unum à *Mesue*, alterum à *Nicolao Alexandrino* delineatum, probè hæc esse distinguenda *Joh. 7. 16. Manlius* in com. Lumin. maj. sect. 1. & *Laur. Jonbertus* Pharmacop. sect. 3. rectè monuerunt. Ideoque in nonnullos *Pharmacopæos*, hac in parte imposturam committentes, *Joh. Anton. Lodettus* metirò passim in suo tract. de fraud. pharmac. invenitur.

Galia itaque Mesuæ xylaloes part. v. ambr. part. iij. mosch. part. j. recipiens, cum mucilag. trag. in aq. ros. solut. conficitur, prædicta nempe tria simplicia per se pulverisata & trita, vel &c. quod alios facere *Mesue* notat, Ambra in vase vitreo cum pauculo oleo de been prius dissolutam, cum glutine isto in trochiscos compingendo. Id quod verno tempore, manè, aëre sereno, in aureo, marmoreo, vel vitreo mortario peragere jubet *Arnoldus Villanovanus* Antid. cap. 14. hyemali & humido tempore medicamento corruptionem, calido verò multam virtutis exhalationem veritus, cupreum etiam vel ferreum vas Moschum & Galiam corrumpere, aureum contra virtutis suæ aliquid communicare ipsi autumans. Ast vana admodum persuasione, præcipue si glutinis tragacanthini nimium non fuerit assumptum, sed tantum, quantum ad uniendos pulvres unice suffecerit, nec parati Trochisci aëris liberati omnino subtrahantur, aut fervidioribus Solis radiis exponantur, quo in passu neque corruptio, neque fragrantia nimia exhalatio, quocunque tempore parentur, est metuenda. Quò dubio procul respexit *Guil. Rondeletius* Pharmac. offic. in pauca quantitate conficiendos esse notans, quia semper liceat eosdem parare.

Hanc ex Oriente adferri, sed non benè præparatam, *Joh. Manardus* annot. in comp. Mes. eandem tamen facile pariri posse, lib. 18. Epist. monuerat. (Vid. etiam *Gualt. Ryffius* Pract. part. 1. cap. 3.) Ex quo jam, *Hier. Reusneri* in observ. à *Welschio* edit. 98. decisio quousque locum invenire queat, perspicimus, quia nempe Galiam moschatam veram haberi vix posse innuitur; Sive enim ex Oriente solum olim adlata, mangonii metum, ob pretiositatem suam, incusserit, sive Ambra & Moschi, prout ad nos adfertur, adulterationi quam maximè, & nonnullorum sententia, semper obnoxiam substantiam perpenderit, magnopere ipsi succensere haud possumus. Licet cæteroquin *Welschiana* animadversio minimè excludenda sit, qua veram Galiam istam nos habere aut parare cur nequeamus, causam nullam fingere licere adnotat, cum certè simplicia ista apud nos genuina inveniri sit certissimum.

Ex istis autem jam elucescit, dolosè agere eos, qui Ambra gryseæ loco nigram illam minoris pretii, fragrantia, & virtutis sumere, aut etiam largo sacchari additamento quantitatem augere consueverunt, eandem dein isto, quo legitime paratam, pretio divenientes.

Cæterum Mesuæ huic suam præfert, ac maximo-pere commendat *Leonb. Floravantius* lib. 5. de Secret. cap. 27. dum ligni aloës ʒiij. ambr. gryf. ʒiij. Moschi Orient. ʒij. N. M. cinnam. ʒ. ʒj. in spiritu vini anisato,

inque hoc postea tragacanthum dissolvit, mixturam istam post debitam evaporationem in Trochiscos compingens. Verum licet major additio Moschi efficaciores hos utique reddere queat, Ambra tamen minor, cæterorum respectu, dosis una occurrit, Nux moschata verò & Cinnamomum tantum eis encomium minimè conferunt, aut præparatio singulare quid ostendit, quamvis enim spiritus vini anisatus Ligni aloës inprimis extractioni, & Ambra dissolutioni satis quadret, scire tamen vellem, an spiritus vinitarum, quantum ad integram istarum rerum extractionem ac solutionem requireretur, sit adsumendum. Hoc enim si fiat, cum ultimò ejusdem exhalatio sit instituenda, magnam unà partium utilissimarum ac subtilissimarum copiam in auras secum abripier, sicque medicamentum longè deterius efficiet. Sin parciore manu adfundatur, parum etiam pro extractione & solutione conferet, imò cum trochisci exin, absque sacchari alteriusve sicci corporis sufficientis additione, sint compingendi, necessariò omnis penè iterum exhalare debet, sicque resinotarum partium prægressa solutio parum utilitatis contribuit.

Nicolai verò Galia moschata (quàm rectius massichinam vocari posse *Joh. Steph. Strobelbergerus* in *Massicholog.* pag. 67. & 69. arbitratur) nobis minùs usitata, minoris etiam, quàm illa *Mesue*, valoris, præter Moschum, insuper mastichis ʒij. gum. Arab. ʒj. camph. ʒj. caryophyll. cinnam. N. M. ʒ. ʒj. aquam rosatarum moschatam, & oleum sambacinum sive jasminum recipit, cujus ultimi quidem communiter ʒiij. præscribere solent, cum tamen *Amati Lusit.* cenitura, (ut alio taceam,) cent. 6. curat. med. 83. rectius quartam tantum uncia partem sumendam esse, ipsa ingredientium series commonstret. Proluxiori autem à *Nicolao* ostensa præparatione haud indigemus, dum simpliciori mixtura gummi Arabico prius in aqua moschata, & camphora in oleo sambac. solutis, commodius fieri potest.

Sequuntur ejusdem Autoris Trochisci aliptæ moschata, vel potius moschati aliptarum *τρυχισμοί αλειπτοι*, literatissimi *Welschii* nostri Variar. lect. lib. 2. M. S. judicio dicendi, quorum parandorum modus fuit antiquissimus, ut diebus canicularibus Ladanum & Styra in catino, tenui linteolo adversus pulvisculos illapsuros cooperto, Soli exponerentur, cujus vi remollita, in mortario æneo, Sole excalescente, cum pistillo ferreo itidem calido validè conterenda, donec nigrescant, addito dein Xylaloes pulvere, Ambra & Camphora, ac tandem Moscho in tribus aquarotarum uncis dissoluto. Solari tamen illi calori stridè nimis inhaerere non est necesse, cum vel *Dd. Hafnien-sium* exemplo, Dispensat. class. 11. lenis Balnei caloris, vel, quem *Renodius* Antidot. l. c. cap. 6. & *Phil. Guiberti* in Med. offic. innuere mihi videntur, alius quivis idem præster, adeoque non tantum caniculatum, sed alio etiam tempore confici queant. Tanta autem rosaceæ aquæ additio minùs probari potest, quia necessaria ejusdem exhalatio multorum simul odoratarum particularum fugam ex reliquis procurat, cui itaque longè minor, & quæ sufficiat pro Moscho ac Camphora diluendis, subrogari potest.

Tandem se Trochisci moschardini sistunt, quos alias etià, cum non semper Pastillorum forma eis concilietur, sed in oblongiora, vel rotunda granula, aliave figuram quandoque, modò cum tragacanthi mucilagine, modò solius caloris & manuum beneficio, compingantur, moschardinam vel moschatam Confectionem, imò Corpus sine anima nimis licentiose appellare solent Officinæ, cum revera satis nobilem animam spirituosissimæ Moschi atomi eidem inspirent. *Pastilli sunt*, inquit *Petr. Morellus* Meth. præscrib. formul. lib. 1. sect. 3. cap. 6. ab odore, què à moscho habent. sic

Alti &c. Componuntur vel simpliciter ex ambra, moschi gr. iij. iv. &c. ut volueris, & sacchari soluti in aq. ros. q. s. cum amyli tantillo; vel sunt compositius ex pulv. rerum aromaticarum suavis odoris, ut cinnam. sandali 3j. moschi, ambra gr. iij. iv. pro lubitu, sacch. &c. Joh. Schroderus Ph. n. lib. 2. ad Moschi aq. ros. dissol. 3j. sacch. albiss. 3vi. amyli 3v. recipit, & massa cum mucilag. tragac. facti grana instar hordeaceorum conficiens, Petr. Poterius verò Moschi 3j. cum sacch. alb. 46j. & amili 3iv. in trochiscos effingit. Petr. Andr. Matthiolus Comm. in Diosc. Sanguinem draconis superaddit. Alii etiam plura a se adiungunt, quales in libr. Secretor. passim cum & sine Amylo, cum Sandalo rubro, albo, Cinnamomo, Mastiche conficere edocet Pedemontanus, cum Ammoniaco gummi & Terra sigillata Joh. Hucherus lib. 1. de sterilit. cum Ireos Florent. radice Aug. Thonerus lib. 2. obs. med. 14. Quæ sanè pro varia Medici intentione variè mutari absque ulla difficultate possunt. Hanc ipsam, simpliciter tamen, confectioem Saponæ nomine, à saporis suavitate orto, inter Condimenta retulit, atque elaborare edocuit Joh. Manardus lib. 20. epist. medic. 1.

Pilulas insuper, utero dicatas, alicubi esse monet Cl. Cass. Hoffmannus sect. 3 Paralip. offic. c. 38. quibus nomen Pilularum Moschi sit impositum, *nos autem Georg. Melichius Dispensat. sui sect. 9. sub titulo Pilularum muscatarum magistralium inseruit. Nihilominus tamen Moschus, sive tritura, sive liquore disgregatus, Catapotia ingredi utiq; aptus est, variis adfectibus, & vel ipsis uterinis adhibenda, ceu illud Pilulæ superius jam recensitæ, quas de musco nominare solebat Barb. Montagnana, nec non alteræ ejusdem de dyamisco testantur. Alias ut jam silentio præteream.*

Proptèr & aliorum Globulorum structuram non respicit, quales sunt illi præ alvo cienda supra memorati, nec non Lapides badzahardici artificiales à Sponto descripti.

Sic & Massæ illæ, vulgò Pomambræ, vel Poma ambigè dictæ, tum in aliis morbis, tum peste præcipuè usualia, sive jam nudis tractentur manibus, sive involvantur sindone, sive capillis aureis argenteis &c. includantur, Moschum frequenter recipiunt, quæ itaq; & Poma moschata non minus dici possent, vel saltem Poma odorata, cum sæpè nihil vel parum Ambre plurimum autem Moschi aliorumq; aromatum adjunctum habeant, unde etiam Germani *Bysemappel*, vel *Bysemknopff* ea vocare consueverunt. Componuntur igitur ex pulverib. odoratis (terrâ sigillatâ, bolo Armen. coraliis &c. à quibusdam præscribi solitis, ut planè inodoris, penitus exclusis), addito ut plurimum Moscho, Ambra, vel Zibetho, interdum & Oleis destillatis, ac modò cum resinosis, uti Ladano, Styrace, Balamo Peruviano, Terebinthina, modò cum cera, oleis, aquis, succis, tragacanthi mucilagine, gummi Arabico, modò seorsim, modò uno alterove permixto, in massam compinguntur. Solum Ladanium cum Styrace calamita, non alio nominato excipiente, habet *Arnoldus Villanovanus* de ornatu. mul. ut & cum Benzoe, Mastiche, Olibano Joh. Schroderus Ph. n. lib. 2. c. 75. Ladanium cum rosarum aqua Joh. Fernellius l. 4. Meth. med. c. 21. & Bern. Dessennius l. 10. de medicam. compos. Ladanium cum succo meliss. bugloss. & aq. ros. *Arnoldus prædictus* c. 3. de conserv. juvent. Styracem & benzoen cum aq. ros. *Jacob. Sylvius* comm. in Mel. antidor. Styracem liquidam cum majoranæ aqua *Gualt. Ryffius* par. 1. præf. c. 3. cum ejusdem succo *Dom. Leonus* sect. 1. Art. med. l. 1. c. 9. Balsamum Indicum vel Peruanum *Ang. Sala* tra. & de pest. Eundem cum aqua rosarum Joh. Schroderus, Terebinthinam idem *Schroderus*, & *Gerard. Blasius* in Medic. gener. nec non eandem cum tragacanthi mucilagine, vel aqua rosacea *Di-*

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I I.

spensatorium Augustanum class. 13. Ceram *Paul. Suardus* in Thes. arom. *Plus Aneas Caprilus* l. 2. de febb. putr. *Rein. Solenander* sect. 2. conf. med. 19. & sect. 3. conf. 23. additâ à quibusdam vini portunculâ. Oleum amygd. dulc. præter Aquam Damascenam *Jul. Palmarius* de morb. contag. l. 6. c. 13. Oleum florum aurantium & caryophyllorum *Hier. Mercurialis* lib. de pest. c. 22. Mucilaginem tragacanthi *Alexius Pedemontanus* part. 2. de Secret. Eandem cum gummi Joh. Guintherius *Andernac* de medic. vet. & nov. comm. 2. dial. 8. Quis verò jam modus, Moschi nostri respectu, melior sit statuendus, meritò queritur. Solum excipientis loco adhibitum Ladanium, aliæve duresiores resine, licet calore liquatæ Specierum receptioni sic satis faveant, mox tamen iterum obdurescant, & sic conglutinationis poris, exhalationem odoriferarum, præcipuè etiam moschatarum atomorum admodum impediunt. Sin cum aquis saltem Ladanium cæteraq; Species subigantur, friabiles nimium relinquunt massas. Peruvianum balsamum & Syrax liquida Moschi odorem glutinosi & oleosis suis particulis admodum obtundunt. Tragacanthi mucilaginem (quod & de Gummi Arabico intelligendum voluit Joh. Heurnius l. 1. Meth. ad Prax.) improbat præfatus *Sala*, quia massa cum ea elaborata sæpè ita induratur, ut odorabilem rerum qualitas suffocetur & exhalare nequeat, quam citam indurationem, atque ab ea odorabilem effluviolum aliquam quasi fixationem, si sola illa, quod rarissime fit, adhibeatur, nemo utique negare potest, à Terebinthina quidem & c. si, quod crebrius fit, unâ accedat, præcauendam, quæ ipsa tamen resina, si aquosæ mucilaginis partes exhalaverint, viscositate suâ Moschum involvendo ejus odorem suppressit. Quare non minùs Oleum amygdalinum &c. unctuofo lentore suo moschatos poros obviscans, gratiamq; odoris imminuens, excludendum videtur. Quæ sanè incommoda me facile permoverent, ut Moschum ab harum Massarum odoris gratiâ expectarum mixtura omnino exterminandum censerem. Ut itaq; hoc respectu, si tantopere ejus consortium expectatur, cum non admiscendum, sed Poma superficiei sæpius tantum oblinendum esse, *Heurnio, Solenandro & Morello* promtius assentiar. Ubi, foraminula etiam massæ insculpta Moscho repleri posse, nonnulli admonent, exemplum præbente *Christoph. Wirsungo* par. 1. Medic. c. 2. §. 1. & par. 2. c. 2. §. 1.

Huc Odoriferum *Crollianum* pertinet, Basilic. chim. cap. 7. propositum, nec non Specificum odoriferum *Paracelsicum* l. 7. Archidox. descriptum, quod equidem, licet ob longas, sed minimè necessarias digestionem animadversionem mereatur, non prorsus rejici potest, ut omnibus tamen cæteris Odoriferis palmam præripere, cum *Clandio Deodato* l. c. lib. 1. c. 14. dicamus, nullam causam video. Referte etiam huc licet Ambram factitiam *D. D. Joh. Pontani, à Joh. Wittichio* consil. medic. 77. &c. memoratam.

Ad Pessorum insuper ut & Nasalium dictorum compositionem frequenter cum Moschus adhibeatur, de illis quoque commodè hic aliquid dicendum est. Bambax itaque moschatus, sive odore Moschi imbutus, idem Moscho perfusus, Galia moschata, Alipta moschata, ab *Hollerio* l. 1. de morb. intern. cap. 59. indicata hîc conducunt. Sic lanam xylinam Moschelæo madentem, & in quo resolutus fuerit Moschus, *Placcarius*, atque petiam tenuem Galiam moschatâ ad castaneæ quantitatem infarctam *Leonellus Faventinus* cap. primo. de matr. ad sect. commendant. Idem etiam Moschus aliaque aromata &c. non saltem cum oleo & bambace, sed & terebinthina, cera, melle, balsamo, styrace liquida, ladano, vitello ovorum, coagulo leporino, adipe, vino, aquâ rosarum &c. excipitur, & ita in digitalem formam fastigiatus, immediatè & per se, si fuerit solidior, vel, quod præstat,

M m ling

lenteolo tenuiori ac molliori, aut rarioris texturæ findoni inclusus, in sinu pudoris imponitur, vel ipsi uterino collo intruditur. *Sunt qui majusculum ficum findant, inversumque ambrâ, cinnamomo, mōscho, aut alio conveniente pulvere farciant, deinde fastigiatum in orbem circumdant ac consuunt, siccatum demum compungunt, ut conclusum aroma possit transpirare*: verba sunt *Lubert. Esthii* de formul. tract. par. 1. sect. 8. cap. 1. Sed exsiccatio ista ut fiat, non opus est, quam itaque *Heminius* non determinavit, dum ficum inversum diambra, cinnamomo, & Moscho implendum, filo sericeo orbem consuendum, & tandem sæpe percutiendum esse prodidit. Ubi etiam non possum non *Pessarii* saccharini mentionem facere, quod *Balth. Brunnerus* Consil. med. 64. proposuit, Morsellum nempe in formam pessarii, vel veretri efformatum, in impotentia aphrodisia devotandum, qui ut Ambrâ, ita & Moscho perquam aptè condiri posset, & non tantum virtute suâ medicâ conformationem partium generationi interservientium respicit, sed & formam istam ob externam, facultatem imaginativam consopitam, cum objecta moveant sensus, quodammodo excitare potens est. Quamvis ex figuratis illis pharmacis nemo fortè alius, quàm lascivior aliquis delectationem capere, & Medicus abique honestatis macula, similia coordinare vix posse, videri queat.

Nec Saponem tandem moschati, tum capiti in remedium cedentes, tum odoris, in lavando & mundando capite, manibus &c. gratiâ expetiti, hic sunt tacendi, quorum varias descriptiones, majoris minorisve apparatus, *Fallopio, Andæ*, nec non *Dispensatorio Augustano*, class. 13. Exc. *D. Casp. Theoph. Bierlingii* Advers. curios. append. cap. 24. *Joh. Bapt. Porta* Mag. natur. lib. 11. cap. 7. *Lub. Esthii* l. d. sect. 9. cap. 6. *Greg. Horstio* de tuend. sanit. lib. 2. cap. 1. *Joh. Agricola* in Popp. chim. part. 2. *Hadr. Mynsichti* Armament. chim. sect. 9. *N. de le Febvre* Chim. par. 2. *D. Joh. Helf. Iunken* cham. exper. cur. sect. 2. cap. 11. aliisque. Hisce jungere liceat Unguenta saponaria, Saponis Neapolitani nomine, qualem plurimum laudatum nostro hoc tempore Monachi Olivetani vendere Neapoli solent, insignita, quorum parandi rationem *Alexius Pedemontanus* par. 1. lib. 2. de Secret. & par. 2. edocuit, cui aliam addere libet, ab *Hieron. Reusnero* in suo tract. MS. de pollin. cadaver. recensitam, àque *D. Simone Simonio*, Professore quondam Lipsiensi acceptam, qui Sapo ex *ibij.* pingued. cerv. & *ibj.* lixivii acris cum calce viva facti, invicem lento igne permixtis, sensimque Solis vel fornacis calore ad debitam consistentiam redactis, sive quousque inter agendum quasi fila ducere incipiat, conficitur, admixtâ tandem aquæ rosaceæ librâ dimidiâ, in qua prius styrac. calam. *ziii.* cinnam. caryophyll. *ā.* *3β.* N.M. *ḡj.* ambr. mosch. *ā.* gr. x. trifol. odorat. *ziii.* in M. B. vase benè clausa infusa fuerat. Quæ ipsa ab artis perito facile mutari inque elegantiore formam redigi possunt.

De Candelis fumalibus, Aviculis Cypriis vulgò dictis, sæpe cum Moscho componi solitis, nihil dico, quia ingratum potius fœtorem, dum comburuntur, hisdem adfricat, cum tamen odoris se gratiâ commendare debeant,

De Medicamentis Moschatis media consistentia.

In medicamentorum, mediæ quæ sunt consistentiæ, serie primum locum Electuariis, tribuo, interque illa nobilissimo, ab *Ebn Masvia*, sive ut communiter vocatur, *Joh. Mesue*, Damasceno, invento, ex granis

quod sub Confectionis Alkermes homine in Officiis ubique ferè locorum proflare solet. Cujus tanta est dignitas & præstantia, ut *Joh. Schyronio* lib. 2. Meth. med. cap. 44. mortuorum vita audiat, iis nempe, quibus auro conspersa oculos pascit, odoris suavitas spiritus recreat, & dulcamara saporis amœnitas vices instaurat, sicque virtutum suarum gratiosâ & immensi congerie vix ulli cedens remedio. Nec, alios ut præteream, consensus dandus *Joh. Manardo* anno 1600. compos. Mes. in hac, scribenti, nunquam jactare pœcunias, cum neque in serico, neque in cocco aliam vim adstringentem agnoscat, rubrique coloris rationem cor potius lædat, quàm juvet, spiritus nempe & sanguinem, propter similitudinem trahendo, cyaneum verò lapis vomitum & secessum proritet quidem, præ exigua tamen ejus quantitate non promovendo magis noceat. Sericum equidem magnum compositionis momentum addere non credo, ita ut abique hæsitacione ulla omitti possit facile largiar, ob id ipsum tamen compositum totum rejicere, nimis rigorosum est judicium, cyanei vero lapidis & cocci innocentiam *Nob. D. Guerner. Rolfincius.* Ord. & meth. lib. 8. sect. 2. cap. 31. satis vindicatam exhibet. Prout nec audiri meretur *Joh. Zvelferius* in Vindicta contra Vernium, odoris saltem gratiâ Moschum additum perhibens, cum revera cordialem imprimis propter virtutem huc accedere dici queat, quam rectè insinuant *Joh. Ludov. Bertaldus* tract. de conf. alkerm. & *Joh. Bapt. Cortesius* Miscell. med. dec. 9. epist. non quidem ob reliquorum ingredientium virtutem, cor deductionem, sed propria ejus ab energia sperædam sanguinis & spirituum refocillationem. Ex eo, non secus ac granis coccineis, ambrâ, xylaiorâ, cinnamomo medicamenti efficaciam, gravis aliæ ejusdem censor *Ang. Sala de Chim. & Galen.* em. tr. 2. deducit. Hinc sanè minùs improbandum consilium, quod olim *Joh. Falco*, Universitatis Mospeliacæ Professor, dederat, suorumque Collegarum consensu, Moschi pondus auctum, ab aliis dein multis pariter adprobaturum, voluerat. Quamvis enim Ambræ dosin ob majorem tantum, quàm nobis conveniat, à *Catelano* creditam, & bituminosæ sulphureæ, ad inflammationem propensæ naturæ adscriptam caliditatem, imminuere hæud deceat, cum tantus ipsi calor non inhæreat, qui in parvula illa dosi magis, quàm auctum Moschi pondus nocere queat, qui Moschus utique caliditate Ambram facile superat; neque etiam altera à *Catelano* adducta ratio, quâ Moschum occidentalem, quo nos hodie uti cœgemur, orientali, Veteribus quondam usuali, puritate & perfectione longè inferiorem esse, multisque modis adulterari solere scribit, multum evincat, dum uterque orientalis & occidentalis, impetrari hæc hæud difficulter potuit, imò hunc alteri illi bonitatem minimè cedere, superiùs jam demonstratum fuit; utrumque eidem adulterationis periculo, imò Orientali, ut cariorem, magis quàm illum, esse obnoxium est certissimum. Nihilominus ipsius Confectionis virtutem, cordis spirituumque confortationi ac serenitati dicatam, auctiori pondere egregiè adaugere poterit. Cur autem *D. Falco* Ambræ dosin immutare voluerit, *Laurent. Ioubertus* sect. 3. Pharmacop. verosimilem causam assignaverat, videlicet: ut minùs carum esset medicamentum. Moschi contra adaugetur: ut saltem odoratum maneret medicamentum. Quâ verò ratione Composito huic is admisceri debeat, peritum pharmacopœum latere nequit, atque ex superioribus, Aquæ rosatæ, vel etiam ipsius Sirupii chermesini particulâ solum commodissimè eidem uniri, facile colligitur. Qui modus etiam *Catelano* placuit; in pulverem tamen redactum adde-

addere quod veritas fuerit, ne in vapores evanesce-
ret, supervacaneum ejus fuisse timorem, meritò ad-
struitur, illis, quæ antea de pulverisatione ejus fuerunt
dicta, abunde id testantibus. Ut ignorantia idcirco
maculam, quam Augustanis imple, circa ambra admix-
tionem, inurbanus voluit inurere, si retorquere luber-
ret, haud foret difficile. Licet enim Confectionem al-
kermes raro esse in usu, propter *operosam* ejus com-
positionem, scripserint, *operosum* tamen illud ad Am-
bræ artificium difficile, restringere non docet, cum
operosum esse, & difficile esse, non parùm differant.
Ambra autem in Sirupo Kermesino facilem liquatio-
nem jam antea *Augustani*, vel ex ipso *Mesues* textu,
facis cognitam habuerint. Cæterum omitti olim po-
tuisse & benè etiam posteriori in editione omissa fuisse
verba ista in nostro Dispensatorio, præfractè non ne-
gaverim.

Ipsam descriptionem lib. de antid. *Mesue* tradidit,
quam tum alii, tum *Augustani* Dispensatorii suis in-
seruerunt. Mutatam quodammodo illam in usu ha-
bent *Monspelienses*, jam in antecedenti discursu ex par-
te indicatam, sed peculiari scripto à *Laurent. Gatela-*
no Gallicè publicatam, Latine postea per *Stephan. Stro-*
belbergerum, omisiss inutilibus, edito notisque illustra-
to. Alià longè & duplici quidem facie eam exhibuit
Herc. Saxonia, dulcis & amaræ nomine insignitam,
aque *Phil. Müllero* lib. 5. Mirac. chim. & *Johann.*
Prevotio de remediar. descriptam. Eandem non mi-
nùs alià facie indutam produxerunt *Nicolaus Myrè-*
psus in Dispensat. sub titulo Antidori è lapide radian-
te; nec non *Nostradamus* in singulari libello.

Chimico etiam labore, vulgari rejecto, concinna-
tas delinsant *Laurent. Eichstadius* tract. special. de
conf. alk. *Petr. Job. Faber* Myrothec. spag. lib. 9.
cap. 6. *Ang. Sala* de Chim. & Gal. error. tract. 2.
& *Petr. Poterius* lib. 3. Pharm. spag. sect. 3. Quæ ta-
men, si examinare cuncta esset animus, censuram
non effugerent. Placet, magni Viri *D. Sim. Pauli*
judicio, huic vel illi magis minùse competente, in
class. 2. Quadrip. botan. p. m. 69. stare: Ex confe-
ctione alkermes extractum parare velle, quid aliud est,
quam actum agere, cum ipsa per se ritè parata satis sit
elegans medicamentum, quod hac arte solum pretiosius,
non efficacius redditur.

Quid *Zuelferus*, & quo successu immutaverit, plu-
ribus in class. 14. Pharm. August. Rest. pag. 246. &
segg. ostensum fuit.

Indè ipsis in *Mesues* operibus, tract. de Simpl. c. de
lap. itell. alia ponitur ejus descriptio, tum cæterorum
ingredientium quantitate diversa, tum lapidis in pri-
mis azuli dosi auctà conspicua, quam cum fortè *Herc.*
Saxonia vidisset, illam priorem improbare part. 2. Præ-
lect. c. i. sustinuit, licet 3xii. errori Scriptoris *Jacob. Syl-*
vius not. in Mes. adscribere maluerit, quam licet ta-
men meam non faciam, cum utraque, pro diversa in-
tentione medica, locum habere queat.

Usus attamen ejusdem non omnibus convenire,
præcipuè ob Moschi odorem, plures adnotarunt, &
rectè quidem, unde etiam nonnullis in Pharmacopo-
liis incompleta, i. e. sine Moscho & Ambra parata,
prostat solet.

A quibusdam, ut & hoc memorare hîc liceat, in for-
mam siccam transmutatur, quod jam olim *Anst. Foësius*
sect. 1. Pharmacop. adnotaverat, quam ipsi consisten-
tiam largior sacchari additio facili conciliat, ut pluri-
mum verò in Trochiscos, mucilage tragacanthi insu-
per, pro firmiori partium unionis, accedente, compin-
gitur, Moschi etiam & Ambra augmento sacchari mo-
les compenstat, qualis v. g. preparationis modus non-
nullis *Augustanorum* Officinis probatur sequens: 14.
Conf. alkerm. Mes. compl. 3i. succi Kermes 3ii. mo-
schigr. viii. ambr. gryl. gr. vi. sacch. Tabarz. penid 2. 3ix.
Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

cû mucilag. tragac. aq. rosat. f. & q. f. F. Trochisci. Aliis
verò: 74. 1. 1. alkerm. 3i. sacch. alb. 3. xvi. moschi, ambr.
gryl. 1. 1. 1. mucilag. tragac. c. aq. rosat. fact. q. f. F. Tro-
chisci. Quam utramq; compositione à *D. Parente* meo
communicatam Exc. D. D. *Cass. Theoph. Bierlingius* Ad-
vers. curios. append. c. 18. p. 91. nuper interuit. Quales
Ampliss. Collegium Medicum Noricum in usu habeat, in
Dispens. novi class. i. sect. 4. tit. Trochiscorum sublin-
gualium monstravit. Color, saturatio non succi tantû
Kermes, sed & particula Laccæ Florentinæ melioris,
aut ipsius Cochinellæ ope tuto conciliari, Ambra quoq;
& Moschi dosi pro cujusq; libitu augeri potest.

In Tabellas tamen, & ita consequenter etiam Tro-
chiscos efformatam multò esse inefficaciorem *Bertal-*
dus admonet, id quod ob largum sacchari additamen-
tum negari nequit, nisi aucta postea Moschi & c. dosi
istum defectum suppleat.

Plura porro Electuaria alia moschata apud *Mesuen*
inveniuntur, nempe Aromaticum moschatum, sim-
plicitate pariter & virtute se commendans. Electua-
rium dulce è Moscho, Tryphera moschata, Tryphera
falsò Galeno adscripta, pluraque alia. Nec inelegans,
sed minùs usuale Electuarius moschatum apud *Ebn*
Sinam lib. 5. sum. i. tract. 3. invenitur. Aliquot Anti-
dotorum è Moscho nominatorum compositiones ha-
bet *Nicolaus Alexandrinus* in suo Dispensat. Confe-
ctio porro hyacinthina, passim nota, eodem exornata
est, cujus tres species diversæ apud *Petr. à Castro* sect. 8.
de febr. punct. malign. aph. 17. 18. & 19. existant.
videatur in Pharmacop. August & prolixissima apud
Zachariam à Puteo sect. 20. clav. med. rational. Mo-
schi quoque largam satis quantitatem medicamentum
illud Sinicum, Cachunde adpellatum, à *Zacuto Lus-*
lib. 1. de Med. princ. hist. 36. & lib. 2. Prax. admir.
descriptum, atque ex eodem tractatui de Adfect. hy-
poch. à *Paulo Zacchia* insertum, recipit.

Conditis etiam quandoque Moschi odor concilia-
tur, quorum exempla in Citriis pomis, Aurantiis,
Persicis, & Cydoniis habentur in cit. *Pedemontano* p.
1. 2. & *Franc. Alexandro* Apoll. rad. 7. & c.

Conservam citri moschatam profert *Joseph. Quer-*
cetanus Pharmacop. dogm. rest. lib. 1. c. 21.

Nunc ad Unguenta progrediamur, quæ equidem
non aliud quàm Olea apud Antiquos fuerant, à qui-
bus odoris saltem ratione, non crassitudine differe-
bant, Vid. *Vidus Vidius* lib. 8. de medicam. c. 12. Qua
ratione *Paulus Aegineta* lib. 7. cap. 20. Unguenta in-
ter, quibus ad gratum duntaxat odorem utuatur, Mo-
schelæa quoque recenset. Licet Romanorum quos-
dam Unguenti crassitudine maximè delectatos, *Pli-*
nus jam lib. 13. Hist. natur. cap. 3. scripserit, qui illi-
ni jam, non solum perfundi Unguentis gaudebant.
Quale etiam, moschati sub epitheto, habet *Aëtius* re-
trabibl. serm. 4. cap. 115. *Zuehlwegi* i. e. *Unguentum sic-*
cum illud, ad differentiam alterius, Olei consistentiam
fluidam habentis, adpellitans. Aliud moschatum *Job.*
Georg. Schenckius in lib. 4. paternar. observat. cap. de
uteri suffoc. delineat, ex Zibethi gr. iii. Ambr. & Mo-
schi 1. gr. j. cum succini oleo incorporatis, compo-
situm. Simile ex iisdem tribus odoramentis, æquali in
dosi, cum oleo amygdalino dulci subactis, invenitur
in Secretis *Pedemontanis*, quod etiam *Job. Guintherius*
Andernac. de Med. vet. & nov. com. 2. dial. 8. protu-
lit, iisdemque verbis recensuit *Job. Heurnius* Meth. ad
prax. med. lib. 1. pag. 57. Cum amygdalino *Job. Bapt.*
Besardus Antr. philos. part. 2. pag. 162. ol. u. n. jasm-
ini & florum citri substituit. Alii aliam dosin observant,
prour Moschi 3iii. Ambr. 3ii. Zibethi 3i. cum oleo
amygd. subactas, ex *Isabella Cortesia* *Job. Jacob. Wecke-*
rus lib. 5. de Secret. cap. 5. exhibet, & Ambra gr. x.
cum Zibethi ac Moschi 1. gr. iij. interventa aliquot
succu limoniorum spiritusque rosati guttularum, in

Unguentum componit *D. Otto Tackenius* cap. 9. Hippocrat. medic. clav. Plura alia ut præteream.

Hilce merito adnumerantur Balsama odorifera, Linimentorum nomine quandoque prostantia, exempla suggerere te *Matth. Untzero* lib. 2. cap. 7. sect. 2. part. 1. de lue pestifera, Moschi add. tamento nobilitata; æque *Tenzelio* Exegesi chim. part. 2. sect. 1. superius traditam ex Moschi, Ambrae, & Zibethi partibus mixturam, cum rosarum oleo institutam, Balsamum odoriferum adpellante. Inprimis verò Cephalicis Balsamis compositis, Apoplecticorum nomine possim exstantibus, sæpe utiliter admisceri solet Moschus, qualia describuntur à *Celeb. D. Dan. Sennerto* Med. pract. lib. 1. part. 2. cap. 33. Magnif. *D. Guern. Rolfincio* Chim. lib. 4. sect. 5. cap. 3. *Angustanis* in Mant. hermet. Cl. *Georg. Hier. Welsch*io obs. med. *Reutner*. 10. *Osv. Crollio* Basil. chim. *Hadr. Alynfichio* Armam. med. chim. sect. 34. *Joh. Pharam. Rbunmelio* in Balsamotechn. P. Fr. *Bernhardino Christino* in Arcan. River. atque nuper à Cl. *D. Joh. Helfric. Jünken* chim. experim. cur. sect. 6. cap. 7. Quibus adnumerandum & illud, quod in Aula Brandenburgica Olei apoplectici (Aulicis *Schlag-Salbe*) nomine in frequenti olim usu fuisse scripsit *Franc. Hildesheim* de cerebr. & capit. morb. intern. spicileg. 6. & quod Elixir balsameum ad apoplecticos vocatur in *Andr. Libavii* lib. 2. Alchim. tr. 3. cap. 1. Gelebre apud plurimos est, quod Romanum adpellatur, in Collegio Romano S.I. parari solitum, à Nob. *D. Mart. Bern. de Bernitz* in Fasciculo 2. medicam. Cnoffel. communicatum, nec non *Michaëlitantum*, celeberrimo quondam Medico Lipsiensi usuale, cujus descriptionem dederunt Viri clarissimi, *D. D. Frid. Hoffmannus* Thes. pharm. sect. 4. & *D. Cass. Theoph. Bierlingius* l. c. pag. 54. Licet paululum in Ambrae dosi eadem invicem differant, prout & ipse ab Amicis acceptas alias duas habeo, utramque Zibethi non ineleganti accessione, ut & asphalto, pro nigredine inducenda, conspicuam, alteram etiam in quantitate ingredientium, ol. N. M. 3viii. moschi, ambræ. Zibethi ā. 3ii. ol. cinnam. 3ii. caryoph. 3iii. lign. rhod. 3vi. Bals. Peruv. 3vi. requirente, admodum variantem, licet, ob plurimum testimonium, priorem illam genuinam magis esse facilius crediderim. Nec sileri debet *Wedelianum*, inter prima facile collocandum, quod tum *Evopulus* causâ, tum pro vertice, naribus, temporibus & lingua inungendis, usui ejus inserviens, mecum tamen, imò occasione hac ferente, Tecum etiam, Lector benevole, communicare voluit, olei nuc. mosch. expr. 3ß. caryophyll. cinnam. ligni rhod. succin. rutæ, spicæ, salv. ambræ liq. ā. 3j. moschi, Zibethi, ambræ ā. 3ß. bals. Peruv. 3j. gum. asphalt. 3ß. vel j. recipiens; id quod, addendo particulæ, v. g. ad 3j. guttas aliquot olei C. C. foetidi, hystericum ex tempore reddere solet. Ubi sanè nulli horum suavitatis eximie laudem denegare, aut unum alteri præferre simpliciter aut pertinacius vellem, cuilibet proprium ut placeat judicium, permittens; qui nonnullis Zibethi, Cinnamomi alteriusve à prævalente odore gratiorem comparere mixturam, haud ignoro. Ut enim, verba sunt *Joh. Heurnii* Med. ad præx. ubi de Pomis odoratis medicinalibus agit, huc maxime adplicanda, varia hominum facies sunt, ita ferè nihil commune habet cum alio, cujusque suavissimi odoris judicium; his mosco fragrantius est cinnamomum: illis utriusque caryophyllus: adeo ut nulli sit de odoris dulcedine judicium idem. Quod & in saporum judicio, ut reliquos sensus præteream, aliis in sacchari dulcedine, aliis in absinthii amaritie delicias palati quærentibus, observatur. Nihilominus tamen, ut quid mihi videatur, edicam, confusam obtinuisse fragrantiam, ita ut distinctorum ex

ingredientibus effluviis, in suo per aërem actu se adlociantium, coalitio unam in sensorio, ut *Ill. Rob. Boyle* de nat. determ. effluv. cap. 3. loquitur, evolvatur pariat; sive, ceu *Cas. Cremoninus* lect. 16. de sens. extern. h. bet, novum aliquem odorem faciat, artificii laudisque palmam mereri, credibilius videtur. Quam tamen harmoniam non certa ingredientium quoad pondus determinatio infallibiliter spondere valet, ob eorum in vigore, modò validiori, modò remissiori, maximam discrepantiam, vel in solo Zibetho, olea ut taceam, à Nob. *D. D. Claudero* cap. 4. meth. bals. corp. hum. pag. 89. & 90. luculenter ostensam, sed ipsa potius mixtura providè instituta, & sincero narium judicio comprobata. Quanquam cæteroquin ullius suavitatis laudem in majori Unguentorum horum parte, si præscriptum methodum simpliciter imitari quis velit, à Moscho conciliari, ob excipientis, quod totum oleosum est, unctuositatem moschatarum atomorum exhalationi reluctantem, minimè persuadere mihi valeam, atque ita, moschata fragrantia si desideretur, frustra hac ratione eandem expectari, Moschumque inutiliter profundi arbitrer; nisi Spiritus volati, alteriusve alicujus humidi aquosi consortium, quo cum Moschus ante mixturam teratur, accesserit, odoriferi ejus particulis ab oleosarum penitiori obvitatione hoc modo præmunitis, & liberiùs ita exhalantibus.

Moschi usus sacer.

Odor divina res est: inquit *Jul. Cas. Scaliger* Exerc. de subtil. 104. §. 4. Divinam esse rem, priscis ceremoniis Veteres prodidere. Suffitibus enim profitebantur aëris locorumque naturam aptam reddi ad Numina suscipienda. Quibus honorem cultumque eis sacrare, siquæ iram eorum, si quæ impenderet, placare, & in vota sua DEUM trahere superstitioni laborarunt. Hinc sacra turæ priscos Ethnicos adolere frequenter consuevit, proditum est. Et magnus ille *Alexander, Macedo*, in pueritia sine parsimonia aris turæ cum ingereret, & illo modo supplicaret, admonitus, tum turiferas gentes devicisset, postea Arabiâ potitus, onustam thymiamate illo navem ei miserat, exhortatus, ut largè DEOS adoraret, ceu loquitur *C. Plinius* Hist. nar. lib. 12. c. 14. Hunc in finem Cypheos odore templa quotidie DEORUM honorem suffumigasse *Ægyptios*, & id similitudinem ejus *Andromachum* dein illud Cyphodis medicamentum, pro elaboratione Theriacæ requisitum, composuisse notat *Galenus* lib. 8. de comp. medic. sec. loc. cap. 7. Neque hodierno adhuc tempore Paganorum in Indiis quidam Deos suos odorati venerari fumis intermitunt. Id quod ex quodam *Ladovico*, de Sumatræ insulæ incolis apud *Joh. Langium* lib. 1. epist. med. 62. in specie recensetur, quorum nempe Sacerdotes, Dæmonum cultores, fragrantibus suffumentis plurimum in sacrificiis utantur.

Scilicet superbus ille Spiritus, divinos adfectum honores, hac quoque ex parte DEI simiam agere voluit; Cui suavia placuisse thymiamata, æque Populo suo in Veteri Testamento religiosè accendi, imò & Sacerdotes, Templum, & Suppellectilem sacram odorato Unguento perfundi jussisse, non ignorabat. Vid. *Exod.* cap. 28. 29. 30. 40. & *Levit.* 8. 16.

Quin & hodierno adhuc tempore Odorum in templis quorundam Christianorum frequentatum usum perspicies *Scaliger* exerc. 203. §. 1. laudatissimam illam vocat consuetudinem, spiritusque hominum ad mētis suscitationē eos disponere concludit. Quæ equidē examinare, mei non est fori. Hoc tamē indubitatum habeatur, suffitus illos, licet pretiosissimos, nihil omnino valere, si cordis puri ac pij fragrantia non cōcurrat. Atq; Divinæ Majestati hos potius esse abominabiles, ex

Prophetis, *Esaia* cap. 1. v. 13. ac *Jeremia* cap. 6. v. 20. colligimus; Ut ideo commendari mereatur illud Arabum proverbium, quod *Mahommedi*, pesti illi Christianæ Ecclesiæ alias perniciosissimæ, adscribunt :

Graveolentia oris jejuni gratior est DEO, odore moschi.

Quæ ut hîc adducam, Medici illius Cæsarei, *D. Petr. Andr. Matthioli*, *Senensis*, verba, Comm. in lib. 1. Diosc. cap. 20. scripta, me permovent, qui & Moschum in orbiculos à quibusdam componi, eisque funiculi trajectis, angelicas salutationes, ut ipse loquitur, in cælum eructari, notat, ut *DEI* param Virginem odoris suavitate conciliant, Quamvis nec *DEUS* ipse, nec Cœlicolarum ullus hîc adficiatur, nisi, ut alia taceam, Animas illas beatas corporeas dicere, atque Creatorem impiè quis creaturam proclamare vellet.

Ipsæ Preces pio corde effusæ verum illud sunt Incensum vel Suffimentum (*Psalm.* 141. vers. 2. & *Apostolus* cap. 5. vers. 8. cap. 8. vers. 3. 4.) quod Divinam nobis gratiam conciliat, à corporali isto fumo suaveolente & alta petente quasi adumbratum, ideoque etiam, *Zacchariâ* adolescente, Populum adorâsse, uti *D. Lucas* cap. 1. vers. 9. habet, memorari meretur.

Moschi usus politicus.

Suavia Odoramenta & Aromata priscis jam temporibus fuisse Regiis in deliciis, vel ex Sacro Codice novimus, Thesauros utpote inter Judaicos Regis *Hiskie* 2. Reg. 10. vers. 13. 2. *Paralip.* 32. vers. 27. & *Esaia* cap. 39. vers. 3. Babylonico Legato ambitiosè ostentatos, reposita; & Regibus digna inter donaria reputata, qualia Reginam illam Arabicam Sapientissimo *Salomoni* obtulisse, 1. Reg. 10. & 2. *Paralip.* 9. legitur. Moscho autem nostro quamvis vilior ortus Magnatum ad Aulas adspirare vix concessisset, odoris tamen nobilitas, virtutis excellentia, ipsaque ejus raritas, ut magno habeatur in pretio, efficit. Hinc & dona inter Regia locum invenit, quibus tum fœdera confirmantur, tum Principum gratia sollicitatur, Sic non ita dudum Serenissimis Saxonie Ducibus à Magni Moscovie Ducis Legatis Folliculorum quoque moschiferorum donaria fuisse oblata, ex *Cl. D. Dan. Ludovici* relatione in Ann. V. Ephem. Germ. Curios. obs. 205. percepimus. Et Augustissimo CÆSARI, MATTHIÆ, Ann. Chr. 1615. Turcicum Legatum, alia inter munera, Moschum quoque attulisse, ex *Metterani* lib. 22. Hist. Belg. D. *Just. Fid. Klobius* in sua Ambræ hist. jam notaverat. Quem & Sacratissimæ Cæsareæ Majestati, LEOPOLDO nostro, ad Cujus Augustissimos Pedes Thesauros, Victoriæ signa, supplex ut Oriens deponere porro cogatur, Cœlum devotè veneramur! à regnante hodie Turcarum Tyranno transmissam Ann. Chr. 1665. fuisse recordamur, inque *Theatr. Europ.* To. 9. pag. 1510. videri potest.

Moschi sanè pretiositas in causa est, ut thesauros inter regios eum reponere Peguani soleant, testante id *Casp. Balby*, *Veneto*, in Itinerar. Orient. Vid. & *Nobil. D. Erasmi Francisci* pars. 3. des *Ost-und West-Indischen Lust-Gartens*. Quod etiam apud Turcas observari *Tavernierius* in libello: *Relation del' interieur du Serrail du grand Seigneur* cap. 8. perhibet.

Quàm proficiuus sit Moschi proventus Sinarum Imperatoris ærario ditissimo, ex *Joh. Mendoza*, lib. 3. descript. regn. Sinic. cap. 4. notum est, cum priscis temporibus vestigal, à Moscho contributum, subsequenti tempore etiam longè auctius decies centena & triginta quinque millia Taës annuatim addiderit, quæ nostræ monetæ æquiparata, summam Imperialium tredecies centena & viginti unum millia, octingenta & nonaginta quatuor, cum tribus unius parti-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I L.

bus constituit; Monetâ utpote illâ Sinicâ Taës trecentos sexaginta quatuor Marrevadis Hispanicos, Imperiali verò ducentos octuaginta quinque Marrevadis adæquante.

Moschi usus Oeconomicus.

Hîc primò ad Culinas divertere animus est, in quibus sæpe, pro condiendis cibis, Moschus contumitur. Licet autem *Cl. Joh. Bapt. Montanus* consil. de febb. 23. perspectissimum illud esse judicaverit, res nullas sibi iavicem magis adversari, quàm egregium coquum, & præstantissimum Medicum, cum contraria penitus sint eorum instituta, hoc utilitatem & sanitatem, illo delectationem & adulationem pro fine habente, ideoque Moschi etiam odor à Medico aliisque sanitatis avidis coquorum manibus subducendus videri queat, id quod aliquando non improbaverim, interdum tamen & prodesse, & delectare simul cibus ita conditus valet. Unde *Joh. Dominic. Sala* lib. de aliment. & eorum rect. administr. sect. 1. cap. 8. de alimentorum condimentis agens, sæpe esse ea necessaria statuit, ut cibi indè vires aliquas adquirant, nocumenta amittant, atque ideo ad sanitatem magis conducant. Quæ inter etiam, ut benè oleant, requirit, atque tanti equidem, addens, *facio hanc conditionem, parum absit, quin odorata tanquam alteram condimentorum differentiam à sapidis proponam*, Moschum deinde iisdem adnumerans. Scilicet cum alimenta vix dentur simpliciter talia, quæ non medicamentosa simul existant, & alterandi aliquam vim possideant, cur Moschus admisceri iis nequeat, nullam causam video, hinc ab eodem *Sala* alimentis, atrenuandi, discutiendi, venerem stimulandi, & cor roborandi virtute præditis Moschus quoque ad censetur cap. 15. & 16. Quæ alterandi potentia licet Odoramento nostro denegari nequeat, ipse tamen an benè alimentorum solidioribus corporis partibus dicatur in catalogo reponatur, disquiri potest? Si non a iud, quàm sanguis, caro, renes, aut testiculi animalis moschiferi foret, aliquam nutriendi vim utique possidere non dubitarem, si tamen eadem partes putrefactionem, antequam in odoratum istud liquamen abirent, paterentur, cum hac ratione gelatinosæ illæ, fibrosæ, crassæ, & concrescibiles particule nutritivæ attenuentur, ac quasi destruuntur, nutriendi potestatem retinuisse, dici amplius vix possent. Ast dum singularem aliquam succum in folliculo collectum esse ipsum innuitur, nec sero nutritivo; glutinosiore scil. fortè omnino destitueretur, à quo etiam compactiora illa granula in folliculo qualitatem istam, trituram nonnihil difficiliorem reddentem, nancisci autumo. Cum tamen minima in mole, quâ famelicus venter nullo modo saturatur, in usum venire soleat, eo ipso magna nutritivæ, in eo facultatis consideratio haberi haudquaquam debet. Utinam verò, quatenus odoratas continet particulas, nutriat, magnâ vix opus est disquisitione? Licet problema hoc de odore nutriente tot alii ad nauseam usque pertractaverint. Paucis: Nutritio quatenus & evidens est, & solidiores corporis partes respicit, odori moschato, subtilissimo cuidam & quasi incorporeo Gas aut exhalationi, nullo modo competere potest, quatenus autem subtiliores corporis partes, Spiritus, una spectat, revera eodem nutrire, augere & restaurare, non inconcinne adstruitur. Quò spectat *Hippocraticum* illud lib. de alim. *Quicunque celeri adpositione indigent, humidum medicamentum ad resumendas vires optimum: quicunque celeriori, per olfactum.*

Missâ idcirco nutritivâ illâ, ut & medicatâ potentia, alteram istam, quâ odoris gratiâ cibos, tum fami sedandæ, tum gulæ demulcendæ destinatos, perfundit,

paulisper intuebimur: Moschum sanè primas inter hominum in cibis delicias haberi, *Anton Fumanellus* cap. 4. de pest. scribit, & à *Georg. Bertino* lib. med. 18. cap. 18. alimentorum inter odoramenta & condimenta reponitur. Hinc in Gallia aliisque locis aves eodem, cujus tandem odorem referant, enutriti, *Burrhum* etiam Ambrâ & Moscho gallinas cibasse, ovis earum indè odorem istum suscipientibus, *D. Gregor. Horstius* in Gesnero suo aucto, lib. de quadrup. prodidit. Quamquam curiosa hæc sint, & Moschum adsumtum in foetorem non commutari, quod innuere videtur *Ioh. Bapt. Helmontius* §. 46. tract. de flatib. adprobent, si culinarium tamen saltem spectemus usum, prolixitate illâ haud opus est, cum ipse Moschus cibis immixtus odorem facillè suum eisdem largiatur. Hac ratione quosdam salaciores, ut potentiùs in venerem ruant, ovis forbilibus vel frixis vesci cum multo Moscho, *Ioh. Renodius* lib. 2. Instit. pharmac. c. 28. testatur. Istâ tamen ipsius Moschi immixtione, haud exiguo cum emolumento, carere liceret, si artificium ab *Hier. Cardano* lib. 13. de subtil. pag. 696. propositum, eventu responderet; hæc autem sunt ejus verba: *Modus alius in his Apitii ad compendium rei familiaris, quo odor & sapor manet, seminaque cinnamomi in totum annum sufficit. Cinnamomum tenue odoratum, divisumque in frustula semina pondere inter 12. aut 26. amygdalas excorticatas reponito, ac constringito: his pro usu subtilis, alias reponito. Sic etiam parvâ impensa edes omnia Moschi odore fragrantia; Quæ licet aliquo modo ita se habere, negari nequeat, nimium tamen ὑπερβολικὸς esse dicta, nemo non facillè deprehender.*

Quam prodigi sint Peruviani in Moscho pro ciborum conditura absumendo. *F. Gregorius de Bolivar* apud *Ioh. Fabrum* in Hist. natur. mexic. retulit, apud quos sine eo parari vix posse cibum creditur, si vel pulmentata fuerint, si vel illinctus, intrita, aut panis dulcarius, crustulata, liba, placenta, aut artocrea coquantur.

Convivium Regis Peguani coronatione dicatum cibos moschatos & ambratos exhibere, in *D. Erasmi Francisci Horto Ind. & Sin.* pag. 1526. memoratur.

Splendorem etiam ex eo convivii suis Turcæ conciliant, quod inprimis *P. Paulus Tafferner* testatur, Illustriss. *D. Comitis de Leslis* Legationem ab Augustissimo LEOPOLDO nostro demandatam receatens, Convivium etenim à Turcatum Imperatore Adrianopoli factum describens, ferculorum pompam potissimum è saccharo, & ambrâ confecto fuisse pag. 60. effatur.

Quod & aliæ passim Nationes, ipsique Germani nostri variis suis in Conditis & Confectionibus, saccharatis, amygdalinis &c. observant.

Patavini Lucanicas parare solent Moschi odore non ingratis: mixturam, quam Diasynapin, vulgo Moscardam sive Mustardam vocant, Itali instar Electuarii conficiunt cum Moscho suavissimam, in nostram etiam hanc Urbem quandoque Venetiis advehi solitam, sapore & odore egregiè se commendantem, cujus mentionem quoque facit d. l. *Ioh. Dom. Sala*.

Quamvis autem *Franc. Valleriola* lib. 1. Enarrat. med. 4. odores suaves, non alimentares, qualis est moschatus, si alimentis misceantur, ingratos plerumque esse solere, perhibeat, ita ut locum fecerint proverbio: ἐν φάρμῳ μίγνυ: in lente unguentum, idem tamen de Moscho edici acquirit nisi ab ejusdem odore, cuicumque rei aliæ adjuncto, naturâ suâ, vel aliâ etiam simplicitati viscus studens quis abhorreat, vel adplicari debeat illud *Seneca* in Consol. ad Helviam cap. 9. dictum: *Quod dissolutus deliciis stomachus vix admittat, ab ultimo portatur Oceano.*

In potu insuper locum invenit. Quod itidem de Peruanis Autor antea ex *Fabro* adductus refert, eo nempe in singulis ferme poculis potus sui non tantum solvere & abligurare Moschum, sed integris etiam vinorum in doliis compositionem ex Caryophyllis, cinnamomo, citri & aurantium corticibus, cum plurimo Moscho in sacculos congestum suspendere. Et præfatus *Tafferner*, apud Proto-Vezirium, Siri ætemperandæ, frequentius Schorbetum, potum ex delectis liquoribus confectum, saccharo, ambrâ & Moscho redundantem, fuisse adnotum, pag. 70. memorat. Qualem non minus delicatissimum innuunt *Perus della Valle* part. 1. Itinerar. epist. 21 & *Ioh. Bapt. Tavernier* loc. antea cit. cap. 3. Idem de Ægyptiis eloquitur *Prost. Alpinus* lib. 4. de medic. Ægypt. c. 3. qui maximè & frequenter delectentur tum Potionis genere, itidem, ut ipse pronunciat, Sarbet (de qua voce videri potest *Ioh. Veslingius* not. ad Alpin. cap. 34.) sive Potu per excellentiam vocato, ex saccharo cum magna aquæ quantitate dissoluto, limonumque succo, quantum ad acidiusculum saporem aquæ inducendum sufficit confecto, & à Nobilibus modico Moschi & Ambræ condito: tum & Anguriarum aqua, dum optimam eamque amplam Anguriam perforant, Moschumque & Ambram, cum modico rosaceæ aquæ dissoluta, per foramen injiciunt, sicque cum aqua permiscant. Conferatur ejusdem Cap. 38. de plant. Ægypt.

Qui odorata cum potu miscendi modus antiquior etiam apud Romanos invaluerat, testantur id *C. Plinius* Hist. natur. lib. 13. Cap. 3. & : *Quum perfusa mentum sumant unguenta Falerno*, canente *Juvenali* sat. 6. Vid. *Hier. Mercurialis* lib. 2. Varior. lect. Cap. 19. & inprimis incomparabilis *Ottav. Ferrarius* lib. 1. Cap. 3. cum Nob. *D. Thom. Bartholino* hypomn. 1. de cruce Christi, §. 3. Ipsosque etiam Græcos, ceterosque *Ælianus* lib. 2. de var. hist. & *Athenæus* lib. 15. Cap. 15. referunt. Quod tamen Potionis genus, præsertim repleto jam stomacho, oleosas innatantes guttulas, tantam gratiam haudquaquam obtinuisse potuit, quantam Moschi commodior mixtura nostro tempore promittit.

Fructus insuper odoratiores & suaviores ut fiant, Moschi beneficio quidam tentant efficere, exemplum suggerente *Rev. P. Athanasio Kircher* Mund. subterr. tom. 2. lib. 12. sect. 3. Cap. 4. pag. 319. Quod in specie cum Melonibus instituendum artificium à *Alexii Pedemontani* Secret. part. 1. lib. 3. *Ioh. Bapt. Porta* Mag. natur. lib. 3. Cap. 16. *Hieron. Rubi* dup. de melonib. pag. 3. & *Jacob. Theodori Tabernamontani* Herbar. lib. 2. sect. 3. Cap. 42. edocetur, semina nempe illa in cacumine aperta & aquâ moschatâ macerata, post exsiccationem terræ mandando: vel etiam, quod *Ul. Aldrovandus* inquit, semina primo in terra germinantia, eadem aquâ irrigando. Sic & *Præni* surculos Moscho intinctos, fructus odore illo imbuitos spondere, ex *Costeo Aldrovandus* adnotat. Idem cum Vitis surculo, Moscho deliniendo, & aliquantisper in aqua rosarum moschata macerando, prædictus *Porta* à *Paxamo* commonstrat. Pyra etiam moschata simili arte provenire, se expertum id credere innuit *Carol. Stephani* lib. de re hort. taleæ nempe in parte inferiore fissæ Moschigranum immittendo, sicque inferendo; alios autem vel trunci fissuræ eum imponere, vel taleam in fissura, ut dictum, eo instructam, ipsam in terram defigere perhibet. Idem in finis artificium tum in aliis, tum Ceraso arbore instituendum tradit *Euchar. Roslinus* Herbar. part. 4. pag. 72. vel etiam Moschum arboreo trunco perforato imponendo.

Quod cum Floribus itidem quomodo impetretur, eleganter modum peroravit *Ioh. Bapt. Ferrarius* lib. 4. de flor. cult. Cap. 7. Ubi sanè in minutioribus istis ve-

perabilibus experimentum fumendi facilius negotium succedere potest, quàm in majoribus, & ad arboream expansionem ac magnitudinem accedentibus. Licet hæc ipsa nonnunquam præ illis gratam imbibiti odoris moschati exhalationem magis promoveant, si cæteroquin notabili per naturam odore destituantur, adeoque in minimis atomos per poros earum diffusa mochi particula suum eò liberius odorem exferere queat, cùm e contra sæpe in minoribus plantis, qualis Vitis & Pruni respectu est Caltha Africana, abundans odor graveolens moschato multùm reluctetur, antequam superato ingrato sulphure, suave illud sese ostendere libere valeat. Me sanè experimentum simile in Calendula studiose fumentem (peratus eventus destituit, nullaque vel minima nativi odoris in flore & herba ista mutatio contigit.

Ad Vestimenta etiam à tineis præservanda *Paracelsus* lib. 3. de conservat. rer. natur. Zibetho, Ambra, & Moscho &c. nihil inveniri posse præstantius, innuit. Ipsas moschi vesículas ad vestes à tineis & corruptione vindicandis apud femineum sexum magnò esse in usu, *Laur. Eichstadius* Cap. 13. de Conf. alk. scribit. Id quod dubio procul ex *Fabr. Fallopio* hauserat, qui *Com. in lib. 1. Diosc. Cap. 24.* idem edixerat, addeas: *Nam hoc opportunum est, & omnia etiam odoramenta corrumpunt tineas, & sunt in causa, ut dentes earum pereant.* De quo tamen quid sentire debeam, ferè hæreo. Vesículas quidem per se, ut tales consideratas, virtute hæc esse instantis, nemo facile sibi persuadere poterit, cùm odori potius eis adhærenti mereatur adscribi. An tamen ipse etiam moschas efficere id queat, dubium adhuc superest, præcipuè si modus operandi à *Fallopio* indigitatus attendatur. Quamvis enim tineis dentes denegare, ipsi, quia mobilia, corporum, solidiorum sæpe, corrosio prohibeat, capere haud possunt. Nec aromatica illa odoris vis hîc simpliciter attendenda est, cùm & membranas sæpe, sive vesicas bubulas &c. quibus vitra oleis aromaticis aut similibus plena munebantur, corruptas ab eis viderim. Unde si non singularem aliquam cum hoc odore antipathiam, creditu perquam difficilem, quâ subtilissimus moschi spiritus flammulam vitæ in animalculo isto perpusillo minimam extinguere possit, fingere velimus, virtutem istam revera omnino commentitiam, & mundarum beneque elaboratarum vestium diligentem ac convenientem repositionem, cui delicatæ istæ feminæ, deliciarum talium odoratarum studiosæ, maximam ut plurimum curam impendere novimus, omne hîc complere punctum, aut etiam odoris quæsitam conciliationem speciosior hæc larvâ excusari à quibusdam, mallet dicere. Imò minùs hæc credibilia reddidit ipsa folliculorum à me observata auper corrosio, quam vermes exterius adveientes, atque per membranosam carnem illorum substantiam in ipsam usque cavitatem, Moscho laudabili turgidam, penetrantes effecerant.

Paucis tandem hîc tangenda est Electuaria & Massarum pilularum per Moschum quæsitæ conservatio, à *Leonh. Floravanti* lib. 5. Secret. Cap. 29. prædicata, quâ nimirum fiat, ut medicamenta ista, per se corruptioni obnoxia, nunquam putrescant, aut vires deperdant. Id quod sanè nunquam à Moscho impetrabitur, nisi medicamentis ex sua natura ætatem ferentibus id adscribere quis ipsi præter meritum velit. Certum itaque apud me est, si aquosis & putredini facile obnoxii abundant, balsamicis verò careant partibus, qualia solent ut plurimum esse Decocta, à *Floravanti* etiam circa finem memorata, Moschum tam egregiam operam præstare nequaquam posse, præcipuè cùm & ipse humido aquoso solutus à putredine diu se vindicare minimè valeat.

Moschi usus Cosmeticus.

Quàm prodigi in odoribus disperdendis Antiqui fuerint, vel ex *Plinio* abunde colligimus, cùm & pedum vestigia Unguentis tingere, solia is temperare, parietes balnearum adipergere, pulverulentam mō illa & custodiis horrida signa, Romanas aquilas, mungeri quòd consueverint, loc. superius cit. scripserit. Quæ tamen, licet odoratissima, ideoque etiam commendatissima, (juxta illud *Catulli*,

*Unguentum dabo, quod mea puella
Donarunt Veneres Cupidinesque;
Quod tu cùm olfactes Deos rogabis,
Totum ut te faciant, Fabulle, nasum.)*

Magna ex parte exolevisse postea, constat, cùm Moschus, Ambra, & Zibethum, illis utpote longè suaviora, innotescere atque ad nos adferri cepissent. Ita ut Moschi usum ad luxuriam usque hodie frequentari, ac plus de eo voluptatis, quàm ad sanitatis cultum absumi videamus. Unde *Alex. Benedictus* l. 13. Pract. C. 16. *Animalis vitium seculo nostro placet, & in vitium vertitur:* rectè scripserit, si, quod putabat, ejus generatio apostematis instar se haberet.

Collo sanè, auribusque suspenditur, vestimentis interponitur, chirothecis illinitur, crumenis includitur, ore circumfertur, barbæ & superciliis inungitur. ordine hæc enumerante *Marthiolo* Comm. in *Diosc.* Tales moschatos globulos, tanquam monilia, collo mulierum vel carpis adpendendos *D. Cass. Bauhinus* lib. 1. de comp. medic. Cap. 59. delineat, ac mulieribus in Hispania & Italia esse familiares *Joh. Guintherius Andernac.* de med. vet. & nov. comm. 2. dial. 3. *Amatus Luf.* comm. in *Diosc. lib. 1. text. 20.* atque *Al-drovandus* l. c. testantur. Sacculos odoratis rebus, ipsoque Moscho impletos, vestibusque interponendos habet *Alexius Pedemontanus* part. 1. & 2. Secret. Pastam ad barbæ inunctionem Quadripartitum botan. *D. Simon. Pauli.* class. 3. Cap. de Gelsemino. Chirothecarum aliarumque pellum odoratarum conficiendarum artificium, præter alios, imprimis *Joh. Bapt. Besardus* in Antr. philosoph. *Joh. Bapt. Porta* Mag. natur. & citatus *Alexius* in Secr. tradiderunt; quamquam illos modos, cum jasmini oleo, aliisve hujusmodi unctuosos quos instituunt, Moschi intuitu minus adprobare queam, cujus utpote odori pinguis illa reluctari supra ostendi, & si quam pelles istæ fundant gratiam, additæ potius Ambra, Zibethi, Stryacis & Benjouini, florumque odori eam deberi, nullus dubito, ut itaque magis commendem, licet & pretiosiores, modum, quem illi ipsi cum solius Ambra, Moschi, & Zibethi mixtura proponunt, illisque prioribus ipsimet præferunt, quâ ratione quoque Linimentum *Tachenianum*, pellibus adfrictum, incredibilem spirare odorem. Autori facile assentior, præcipuè cùm spiritus rosarum & limoniorum succus eidem jungantur.

Sed & plures insuper alii Moschum consumendi dantur modi. Hinc indusia, strophioles, aliaque mensæ & lecto inservientiæ linteamina, ut & vestes, ipsaque triclinia & cubilia odoratis guttulis vel (altem halitibus imbui novimus, dum aquâ rosacæ &c. solutus, lenique carbonum igne supposito, in cocula, sic ex *Pompejo* à *Joh. Retiæ* dictâ, æneâ vel argenteâ, quam etiam alias Cassioletam adpellant, attenuatus, subtiliores & odoratas sensim atomos suas cum aqua exhalat, atque obviis quibusvis inspirat, qualem Aquam, ut reliquas multorum præteream, exhibet *N. de le Febvre* in sua Chim. Ipsi Aquis cosmeticis, propriè sic dictis, non infrequenter additur, talesque plures delineavit *Dom. Auda* in Secret. Alii tamen sic cior exhalatio magis arridet, quem in finem Pulvere, Candelas, Trochiscos & Pastas frequentant, de quibus

in superioribus jam ætum fuit; in primis verò Massas Hispanicas, Italicas Pastiglia di Spagna, Bacillos pro fumo alias dictas commendant, reverà à Pomis odoratis non differentes, eo ipso commodiores; fornaci tantum calenti adfricentur, sicque calore isto resinosa partes eliquata, ceteræque etiam excalescunt odorem suum blandè dimittant, cum omnes illi Suffitus, vivo carbonum igne excitati, mixturam Moschi inutiliter recipiant, qui utpote violento igne combustus empyreumaticum ingratum odorem eructat, ideoque rectius in compositione tali planè omittitur, nisi hujusmodi Trochisci laminæ potiùs alicui, argenteæ, ferreæ &c. calenti imposti, ad emittendas aporrhœas odoratas mitiori violentiâ resolvantur. Quam mire suffumigandi rationem proposuit *Angelus Sala* Myrothec. sect. 7. §. 34. de Trochiscis xylaloës agens, non subito eos carbonibus exponendos, sed batillo excalfacto superimponendos esse dum monuit, & beat. *Sennertus*, Med. pract. lib. 1. part. 2. Pulveres istiusmodi & Trochiscos accendi non debere scripsit, cum sine flamma suaviorem ac fortiorem spirent odorem; imò ipsum *Aristotelem* id non latuit, Cur acutiùs ac diutiùs oleant aromata cinere suffita, quam igne? idcirco in Problematicis disquirentem. Hinc etiam ad ignes artificiales excitandos frustra Moschus, quem nonnullis hac ex parte laudatum scio, consumeretur, quamvis enim muscoso alicui, v. g. in terrestri illo Musco, Perfic. Moschis &c. teste *Clar. Adam Oleario* Itinerar. Perfic. lib. 4. cap. 24. familiari, occurrenti pulveri mixtus, non ingratus quandoque odorem in deflagratione spargere deprehenderetur, vel additi Moschi exiguum ob quantitatem fœtor nares haud feriret, vel gratus odor muscosæ potiùs resinæ deberetur, quem accensum odore suo oblectare posse, vel Larignus ille, cujus *Matthiolus* in Comm. lib. 1. Diosc. cap. 20. mentionem facit, luculenter ostendit. Sic & frustra ob odoris gratiam indè quæsitam eundem consumerent *Peguani*, si, quod *Cass. Balby* in Itiner. memorat, ad Regis sui cadaver comburendum adhiberent, odorquetalis suavis benzoino potiùs aliisque junctis odoriferis deberetur. Quin & in durum Martis corpus odorem moschatum transferre tentarunt, quales cultros gladiosque odoriferos nonnunquam curiosi aut delicatuli ostendere solent, prout *Exc. D. Thomas Bartholinus* in Dissert. epist. de transplant. morbor. ferrum infornacibus accenso igne excandescens bonos odores poris suis recipere perhibet, quem modum, ut & leniorem alium, ac, ex meo quidem experimento, ob resolutas quasdam inter fricandum Moschi, præsertim recentis & humidiusculi, particulas, per linei noduli porosam texturam penetrantes, sicque ferreo corpori se adglutinantes, meliorem *Besardus* l. c. par. 1. pag. 227. delineavit. Quin & vaginalium interiores partes moschato odore imbutæ ferrum reconditum vicinitate suâ valent inspicere. In Practica manuscripta Celeb. *D. Pestri à Castro* hauriendi fumum tabaci modum invenio, ingeniosi atque jucundi encomio insignitum, quo nempe fumus per aquam rosarum moschatam deductus miro odore imbui scribitur. Sed quantumvis fœtoris tabacini vehementiam ipsa simplex etiam aqua fontana, oleosæ, fuliginosæ, empyreumaticæ quasdam absorbendo, quodammodo emendet, nunquam tamen Moschi in ea soluti odor in præpollente fumo percipietur. Alias & Persas interdum, quibus fumum istum hauriendi modus ille est familiaris, aquæ odoratas alias admiscere, testis est præfatus *Olearius* libro quinto cap. decimo septimo. De Saponibus & Pulveribus Cypriis in præcedentibus quædam dicta fuere, obiter tantum itaque hic memorandis.

Nec Europæos tantum nostros hoc odorem fasci-

navit desiderium, quod cum primis & remotissimas quasdam gentes occupat, quales regni Siam incolæ *Straussius* in Itinerario memorat. Frequentissimus in India Betre sive Betele usus apud opulentiores Moschietiam mixturam, pro commendatione oris, admittit, referentibus id *Garcia ab Horto* Aromat. & simpl. hist. lib. 1. cap. 18. *Arnoldo Montano* Legat. Batav. in Japon. & *Joh. Neuhausio* descript. regn. Sinic. cap. 15. Quos nostri succo Catechu cum Moscho & Ambra in cylindros &c. efformato imitantur, Imò in India quosdam adeo odoribus esse deditos idem *Garcias* l. 2. c. 1. scribit, ut plerunque abstineant cibis, quo habeant, unde odores sibi comparare possint. *Perruanorum* in Moscho prodigalitatem *F. Gregorius de Bolivar* apud *Fabrum Lynceum* enarravit. Quam turpiter & lascive mulieres Egyptiæ Odoramento hoc celebratissimo abutantur, referente *Prosp. Alpino* de med. Egypt. lib. 3. cap. 15. nec quidem commemorare libet.

Tot ergò aliisque modis odore Moschi se exornare & oblectare amat hominum voluptas. Sed quam benè, paulisper dispiciamus. Ubi satè mox agmine denso hisce voluptuariis odoribus sese opponere multos novimus, in partes suas Poëtæ, plurimosque alios pettrahentes. Mollitiei ideo vitiosæ, lasciviæque notam suaviter fragrantibus inurunt, aut etiam innati fœtoris ac turpitudinis suspitione eos onerant. Unde *Martialis Posthumum*, & *Coracinum* reprehendens, de illo lib. 2. epigram. 12. canit:

Hoc mihi suspectum est, quod oles benè, Posthume, semper.
Posthume, non benè olet, qui benè semper olet.

de hoc verò lib. 6. epigr. 55.

Quod semper castique, cinnamoque
Et nido niger alitis superba
Fragras plumbea Nicerotiana,
Rides nos, Coracine, nil olentes;
Malo, quam benè olere, nil olere.

& lib. 3. epigr. 63. *Cotilum* lasciviæ addictum hinc perstringit:

Balsama qui semper, cinnama semper olet.

Imò meretricia ideo Unguenta ista aliquibus dicebantur, quorum, ut *Plinius* loquitur, summa commendatio, ut transeunte fœmina odor invitet etiam alios agentes. Hinc *Themistii* patiem, cum *Epicurum* Philosophorum choro exturbaret, Unguento super caput effuso, exprobrare ei voluisse legimus, quòd toto corpore profectus fuisset voluptatem, & *Diogenes* cuidam Unguento delibutos habenti capillos, cavere capitis evadere vitæ durabilis adducat, dixisse. Hinc *Heliogabalus*, qui præter alia libinis & scelerum genera, semper, ut ait *Lampridius*, aut inter flores sedit aut inter odores pretiosos, tam malè ubique audit *Luxum Nomentani* & *Apicii* contemnens *L. Ann. Seneca* cap. 12. de vita beat. loci etiam, in quo luxuriant parentarunt, variis odoribus infecti meminit. Hinc *Vespasianum* Imperatorem dilaudant, qui, referente *Suetonio*, juvenem Romanum, pro data Præfecturæ gratias agentem, quia Unguenta olebat, non contentus manu rejecisse, contumeliam hoc verbo aut præfatus: Mallem allium oboluisse, literas quoque datæ Præfecturæ revocavit. Hinc laudes inter *Lacedæmoniorum* reponunt, quod, narrante *Athenæo* Deipnos. lib. 15. Unguentarios Spartâ ejecerint. Hinc *P. Licinium Crassum*, & *L. Jul. Cæsarem*, Centores, ne quis Unguenta exotica venderet, rectè pœnisis hibuisse, ex *Alexandro ab Alexandris* Genial. lib. 1. cap. 11. & *Plinio* statuunt. Hinc *C. Plorinum Plancum*, à Triumviris præscriptum, in Salernitana latebra ad Unguenti odore proditum, cum ex *Valerio Max.* lib. 6. cap. 8. perspicimus, & *Myleasses*, Rex Te-

netatus, ex infelici prælio, scribente *P. Iovio*, profugus, simili occasione è latebris quod fuerat protrahens, infortunii proprii auctores fuisse, meritoque perisse iudicant. Neque Succos hinc præterire debeo, quamvis enim hyperboreas gentes omnes, & præsertim Sucones ac Gothos, hospitalitate esse insignes *Olaus Magnus* lib. 16. de gent. Septentr. Cap. 13. testetur, non diu tamen gratiam retinere stationem hospites Cap. 14. perhibet, qui graves odores, veluti Moschum, in vestibus aut sarcinis secum deferunt, quia feminæ abortiant eo odore hausto; imò ob tales peregrinos odores, incolis suspectos fieri, ne proditores sint regni; unde plerunque accidat, tales odoriferos satellites, præcipue collimitaneos Russos, seu Moschos, aut Danos, rusticorum, quibus ille displicet odor, ferocitate sustigari.

At cum abusus monetarum non tollere debeat usum, neque moschatam illam fragrantiam, elegantiam obtinendæ causâ quæsitam, ob insignem quorundam luxuriam & libidinem vitiosam, tanto nequitiam cum contemptu eliminare convenit. Ut enim Principum, & quos Terrarum Deos ac Dominos Cœlestis Favor esse voluit, actiones hac ex parte non attingam, nec de virtute moschi odorifera, quâ sanitatem fortisque emendationem, in antecedd. prolixius expensam, respicit, quidquam hinc reperam: in communi sanè vita, quidquid hominis, quem elegans & mundum vocat animal *Seneca* Epiæt. 92. ad ornatum facere potest, retinendum potius, quàm eliminandum esse videtur. Pulchritudinis enim ratione in ipsa etiam odoris gratia consistere, *August. Niphus* lib. de Pulchro. Cap. 39. facilem apud me consensum meretur. Quantumvis etenim in *Plauto* in mostell. act. 1. scen. 3. quæ nihil olet mulier, rectè olere dicatur, mediumque illud, in quo naturalis corporis temperati non ingratulus odor consistit, foetido non tantum, sed opposito quoque eidem suaviter ac fucate fragranti, haud dubiè sit præferendum, sicque *Horatius* in utrumque *Serm.* lib. 1. satyr. 2. bene luserit:

*Pastillos Rufillus olet, Gorgonius hircum:
Nil medium est.*

Et magnus *Thom. Bartolinus* diss. 7. de medic. Danor. domest. fucum se in corpore odisse prudenter contestatur, quod suâ pulchritudine se commendare potest. Cum tamen hominum non eadem ubique sit mens atque voluntas, & non nobis solis nati sumus, sed & Amici aliique vitæ nostræ partem sibi vindicent, quod vel horum in gratiam tales odores amicos quandoque admittamus, nemo jure culpæ potest. Hoc inprimis femineo in sexu, quod pulchrum & delicatum esset, atque ita ad generis humani propagationem stimulum virili adderet, ipsa Natura voluit, minus culpandum erit. In ipsis Conviviorum solemnitatibus, cum non lingua solum saporum deliciis, aures jucunditate sonorum, oculi totius apparatus splendore demulceantur, nemo, nisi austerior aliquis Stoicus, nares hac odorem, moschi inprimis, suavitate ut careant, condemnabit. Sint itaque moschatæ illi halitus-luxuriosi, venerei & impudici animi in quibusdam argumenta, sint in quibusdam incitamenta, commendent Philosophi, ad vitæ necessitatem, simplicem utique & frugalem, quæ faciunt, proscripta olim fuerit ars unguentia, repulsi calamistrati, ad vincula deducti profugi unguentati, alii ob fragrantiam sustigati &c. nondum hæc Moscho exterisque universale exilium è cultiori Regno, & Republica indicunt. Philosophi non omnem, qui jucundior & ornatam magis reddit, integram tamen scelerisque puram relinquit vitam, odoratorum usum damnabunt. Faceat rusticæ gentis inurbanitas, quam ipse nobilior locorum istorum Sanguis ipso facto improbat, & ipsa cultior temporis ætas emendat! Seve-

riorem nimia odoratorum profusio animadversionem subeat! Supervacanea cultura & fastus, inque ipsis miseris luxuriæ pœnam exigit! Moderatus usus triumphet!

Tandem an Medico licitum sit odore Moschi se inficere? ubi quæritur, negativè ut plurimum respondent, viro gravi indecorum esse rati, muliebrem quasi odorem istum redolere, multos ægrotantium eundem minimè perferre posse, feminæque cumprimis in strangulationis periculum conjici, alia verò plura, quibus uti queat, odorata tutiora supererere, quos inter nomino *Rodericum à Castro* Medic. Polit. lib. 3. cap. 4. *Zacutum Luf.* Introit. ad prax. præcept. 11. *Ludovicum von Hornigk* part. 1. de medicastro apella cap. 6. &c. Obstare tamen his videtur *Hippocrates*, qui vario modo gratificati ægrotis debere Medicum lib. 6. Epidem. sect. 4. præcipit: introitu, sermone, habitu, vestitu, unguibus, & odoribus. Multos autem dari, quos odor Moschi oblectatur, crebra ostendit experientia; quibus itaque Medicus, seipsum odore illo exornans, gratiosorem se reddere valet. Nec contrarium dicat ratio, cum in morbis ut plurimum vires debilitentur, quas ut reficiat, atque restauret, Medicus omnem omnino occasionem capiet necesse est, id autem Moschum, quocunque adhibeatur modo, præstare, extra omnem controversiam versatur. Imò interdum ipsa id requirit necessitas; Medico corporis aliquâ graveolentiâ laborante, quâ ægro ne se invisum reddat, inque nova & gravia pericula conjiciat, meritis præcavet, hujusque odorem in beneficio commode impetrat. Verum mediâ qui incedit viâ, eum minus aberrare posse existimo. Abusus utique vitandus, moderatus usus tolerandus: Ut laudari nequit, qui nunquam non & ullo absque discrimine Moscho se oblinat, ita nec commendari debet, qui eundem Medicorum propriæ utilitati & usui omnino eripit. Non placent, quos odorata semper ubique comitatur aura, & qui graviore, v.g. cadaverum odores nimium nauseant, carbonum & chimicorum laborum foetores fugiunt &c. justè à *Gerard. Dorneo* in epist. dedic. Fascicul. med. Paracell. & nostro *Raym. Minderero* præfat. de chalcant. propterea reprehensi: nec tamen placent, qui nihil olere unquam volunt, monitumque illud Hippocraticum proflus negligunt; quod tamen generalis l. c. positum, in libro Medico (si modò Hippocraticus is fuerit) ad certos magis odores cum restringat, an hoc inter Moschum reponi queat, merito ulterius inquiritur? Unguentis, itaque, ex *Fœssi* versione, scribens: utatur benevolentibus, citra omnem odoris suspicionem; (vel ut *Heurnius* habet: securum odorem ad omnia habentibus,) istud enim jucundum esse ægrotantibus solet. Secutum ideo odorem ad omnia habentibus utendum esse unguentis, admonet; talibus nempe, quæ morbum non excitent aut exasperent. Tales verò inter odores, minus scil. securos, cum revera sit Moschus, viris æquè nonnullis ac feminis adversus & suspectus, à Medico admodum frequentari haud debet, præsertim ubi ægrotos, quorum huc in passu naturam vel cognitam nondum habet, vel lædi prænovit, curandos habuerit. Aliàs etenim nec Medicum isto otbari proflus æquum foret, quo intuitu *Leonb. Botallus* de medici & ægr. munere §. 25. in ægro, cui Moschus est adversus, abstinere eo debere Medicum dicunt, quoad saltem agrum restituerit. Si verò luxuriæ stimulo actus, aut vano aliquo fastu inductus, odore illo fragrare, aliorumque sanorum etiam, naribus eum immittere studeat, culpam merito incurret. Caterum ingrati odoris occultationi quammaximè esse studendum Medico, vel ex *Hippocrate* notum est, qui lib. de decenti ornatu. ipsi circa ægrum versanti strepitus quoque & odores vique præcipue fugiendos esse & permutandos, monuit; odorumque nomine, tum

aromatum qui sunt, tum & *fœtorum* subintelligi debere, *Heurnius* animadvertit, quo respectu etiam *Galenus Quintus*, Medicum, aliumque Asiaticum in lib. 6. Hipp. de morb. vulg. comm. 4. text. 9. reprehendit. Ubi sanè nec Moschi usus prorsus damari debet, nisi aliud quid ex antedictis obstitit, quo in casu nec alia plurima, vitium illud efficaciter emendantia, deesse poterunt.

Moschi usus Emblematicus.

Pauca hic sunt, quæ ex aliis possunt adduci, plurima, quæ possent excogitari, si instituti ratio prolixitatem admitteret. Solus Cl. D. *Joach. Camerarius* Symbolor. & Emblem. cent. 2. embl. 45. Capreoli moschiferi figuram (licet non admodum cæteroquin adcuratam) hac cum inscriptione: *Munera digna feram*, exhibet, tali insuper additâ subscriptione:

*Munera qua Dominis fuerint data, tempore sunt
Uberiora, velut Moschus odore placet.*

Desumptâ occasione ex illorum sententiâ, qui pretiosum hunc succum ex odoratarum herbarum pastu, sanguini odorem illum conciliantium, generari existimant. Unde imago sit Principis, qui subditorum suorum opibus & sumtibus sustentatus, majora illis vice versâ, securitatem largiendo, reddere cupit.

Nobil. *Henricus Ranzovius* cap. 34. de conserv. valet. Liberos suos allocutus: *Mementote familiaritates ipse eorum, quibus gratia cælestes affluunt. Quod ex bonis animi, corporis & fortuna cognoscetis. Sicut enim odor ex musco, sic ex bano vicino boni nonnihil exhalat in proximum ac perseverat infusum*, hoc quasi Emblemata depingere voluit, Moschi nempe folliculum in vitro bambace contextum, tali cum epigraphe: *Vicino fragrat odore, & cui sequentia subnecti possent.*

*In socium socii virtutis gratia transit;
Vicino inspirat bambaci Moschus odorem.*

Mihi Ill. S. R. I. *Academiam Naturæ Curiosorum* aperto moschifero Folliculo comparare, sicque depingere liceat, ut aureæ pateræ impositus in vicinum aërem libere odorem suum exhalet, cui inscribatur: *Latere nescius, & subjungatur:*

*Fama latere nequit, meritorum gloria complect
Orbem, ceu Moschus suavem diffundit odorem.*

Vel, inscripto *Naturæ Curiosorum* symbolo *Academico: Nunquam otiosus, legatur:*

*Naturæ claros, fugientes otia, Mystas
Semper fragranti Moschus odore refert.*

De rebus naturalibus Moschatis.

Restat, quarundam rerum ut fasciculum adnectam, quæ vel odorem Moschi similem emittunt, aut emittere creduntur, vel etiam ob suavem magnatove fragrantiam moschatorum epitheton obtinuerunt. T. lia autem in omni Naturæ regno invenitur, vegetabilis nimirum, animali, & minerali.

Vegetabilia inter non reperam, quæ arte illum acquirere odorem paulò superius monstratum fuit, ad naturalem solum fragrantiam attendent.

Ex Herbis itaque Floribusque percelebre est Geranium moschatum, sive Acus moschata, quod Moschi odorem adprimè referre *Joh. Renodius* lib. 1. de mat. med. sect. 4. cap. 61. scribit, idque circa vesperam imprimis & manè contingere *D. Joh. Fomskonus* Th. unatogr. natur. class. de admitt. plant. cap. 28. animadvertit. Unde *Joh. Bap. Porta* lib. 1. Phytognom. cap. 17. ubi ex actionum similitudine cognosci posse plantarum vires, demonstrare inten-

dit, Geranium illud, aliaque similia, non secus ac Moschum, ob æmulum ejus odorem, cordi ac cerebro subvenire concludit. Huc referendum Geranium triste *Jacobi Cornuti*, in Hist. plant. Canadens. cap. 44. & Act. medie. Hafnens. Volum. 2. observ. 26. descriptum, nocturno tempore moschato odore pollere creditum, quem suavem equidem, moschatum tamen haud judicare potui, cum idem in Horto medico Paravino olim lustrâsem.

Non minùs notissimi sunt ut plurimum in hortis Jaceæ montanæ moschata: flores albi vel purpurei scentes, suaviter ac Moschum nonnihil redolentes, qua de, præter cæteros, *Jac. Theodorus Tabernamontanus* lib. 1. Herbar. sect. 5. cap. 11. consulendus.

Plantula etiam invenitur, Moschatelle communiter adpellata, cujus folia odorem spargere Moscho similem putat *Valer. Cordus* lib. 2. Hist. plant. cap. 184. atque inde nomen invenisse. Quam Fumariæ bulbosæ seu tuberosæ minimam speciem facit *Tabernamontanus*, alii verò Ranunculis, Thaliætris, vel Dentariis adnumerant. Planta Sylvestris est, quæ sibi relicta multò majore Moschi odore, teste *Joach. Camerario* in Hort. med. pollet, quam in hortum translata.

Ivam sive Chamæpithyn moschatam, ob suaveolentiam Moschi æmulam, sic dictam idem *Tabernamontanus* l. 2. f. 2. c. 30. aliique describunt. Quo ipso Ivæ moschatæ nomine etiam Polii quoddam genus montanum dari, ut & Tanacetii, ac Acetylidis, ex *Dalechampsio* Ul. *Aldrovandus* lib. 1. de quadrup. bisule. cap. 20. admonet, qui etiam in Alpibus Apenninis Ocimum quoddam odore suavissimum se invenisse memorat, moschatum ideo dicendum, quo etiam nomine, loco Alfengemisch, à *Monachis Mesues Commentatoribus* proponatur.

Nec silentio prætereundus Hyacinthus botryoides moschatus, colore varius, Moschus Græcus etiam dictus, & Moscari vel Muscari Turcarum, suum vocabulo, ut elegantissimus *Joh. Bap. Ferrarius* lib. 3. de Flor. cult. cap. 9. loquitur, aliàs dictus, cujus flores quidem odoratissimi sunt, vel, cui laudatus *Ferrarius* habet lib. 2. cap. 4. mera in florem collecta suavitas, propriè tamen Moschum nimè redolent.

Satyrium moschatum *Aldrovandus* commendat, nec non ex *Joh. Rhellicano* noster *Gregor. Hier. Walschius* dissert. 1. de Agagrop. pap. 38. atque Orchidem odoratam moschatam, ob insignem odorem, invisam hyssericis plantam exhibent Viri celeberrimi, *D. Simon Pauli* Quadripart. botan. class. 1. c. de Satyr. p. m. 146. & class. 3. p. 203. atque *D. O. Borrichius* Act. med. Hafn. Volum. 1. obs. 60.

Andr. Casalpini lib. 13. de plant. c. 47. de Carduo benedicto agens, florem ejus è medio spinarum erumpentem, luteum, Moschi odorem referre judicat. Nec sanè diffidendum, moschatuli aliquid eundem naribus obijcere. Quod & *D. Simon Pauli* class. 3. c. de C. B. placuit, fragrantissimum florem Pyrorum moschatellinorum odorem æmulare enuncianti; ubi & aliorum Carduorum floridam fragrantiam insinuat; quo ergo etiam spectat echinopus ille, à *D. Joh. Bauhino* in Hist. font. & baln. Bollenf. lib. 4. c. 2. p. 182. nominatus. Vid. quoque Nob. *D. Christoph. Georg. Petri* Card. sanct. c. 5. p. 58. & Celeb. *D. Cass. Hofmanni* lib. 2. de med. off. c. 30. §. 32.

Muscum super saxa enatum suaveolentem, ideoque verè *βρύον αρωματικόν*, odore ad Moschum parumper accedentem profert *Joach. Camerarius* in P. A. Matthioli Herbar. lib. 1. c. 15. Qualem etiam in quadam Musci clavati specie notavit Exc. *D. Joh. Sigism. Elsholzius* in Horticult. lib. 6. cap. 4. atque

in Musco alpino *Conr. Gesnerus* lib. 3. Epist. med. pag. 89. alios ut sicco pede transeam.

Rosæ moschatæ reliquis Rosarum generibus, ob odorem inprimis nobilem & delectabilem, regio hocce epitheto palmam præcipiunt. Quo tamen sub nomine plures Rosarum differentias contineri, ex Botanographis novimus, videatur cumprimis *Ioh. Carol. Rosenbergius* par. 2. Rhodolog. Cap. 6. De his Damasceenis rosis agens *Carolus Stephanus* in libello de re hort. pag. 31. odore eas Moschum referre putat, ab institutione potius, quam à natura. Verùm cum exiguum, vel imò nihil sit, mearum quidem narium iudicio, quod moschatum in Rosis istis odorem exhibeat, ab odoris tantum excellentia sic vocari, rectius cum *Andr. Casalpino* lib. 3. Cap. 10. statuemus. Si tamen vel unquam tales odores sese probaverint, utique & ipse A. ti id adscribendum esse non contradicerem.

De Agerato, Lilio convall, Majorana, Viola &c. moschatis quiddam dicere, brevitatís causâ, supercedeo.

Radices inter Mexicana illa herbæ Coapatlis vel Thamacazquipan, nec non alterius Coapatlis, Teoitztlæ dictæ, Moschum redolere narrantur à *Francisco Hernandez* in lib. 2. rer. medic. Novæ Hispan. N. A. Recchi Ca. 1. & 2. Suavissimo quoque hoc odore imbuta radix Curutzeri laudatur Cap. 13.

Ex Seminibus se commendat Hab el mosch Arabum. Ipsa planta, cujus soboles sunt, sub Bammix, uti *Alpinus* & *Veslingius* habet, vel Bamiæ, seu *Welschius* noster Cap. 7. pag. 164. Exercit. de Ven. Medin. scribendum putat, moschatæ nomine venit, ad Malvas pertinens, à que *Ioh. Veslingio* observ. & not. in libr. Prosp. Alpin. de plant. Egypt. pag. 65. descripta, additâ simul plantæ florentis iconè, Ipsa autem spermata fragrantia sua ad Moschum accedunt, quem satis manifestè simulant, non tamen adæquant, ideoque Hab el mosch, *granum moschi* nuncupantur, & à multis Ægyptiorum, quibus suatum tenuitas Moschi usum denegavit, illius loco, inprimis ad Sorbetorum condituram, nec non membrorum putorem reprimendum, usurpantur.

Ex Arborum familia flores istius Indicæ, cum notu duntaxat hi sese expandant, tristis cognomen adeptæ, Moschi odore fragrare, *Aldrovandus* refert, de quo tamen apud *Garciam ab Horto*, *Christophorum à Costa*, *Carolus Clusium*, & *Iacob. Bontium*, qui ejusdem aliâ historiam præcipuè conscripserunt, altum est silentium, licet odoratissimos, & Jasmini florum ab odore haud multum dissimiles eosdem fateantur. Si tamen Arbor illa cum Frutice moschato, sive Bidmisk *Petri della Valle* coincidat, odorem moschatum si plane denegare fortè non liceret. Vid. Itinerar. par. 2. epist. 1. & par. 3. epist. 14.

Quin & aliud arbusculum sive fruticem, ab Arabibus Alcauna sive Henna adpellatum, quem etiam Cyprium Græcorum vel Ligustrum Latinorum vocant, reperitur, in Ægypto præcipuè, cujus folia arida, magnum incolarum quæstu, fucis inservire *Petr. Bello-nius* lib. 2. observ. Cap. 74. flores autem à Turcis & Mauris, ob odoris suavitatem, ad Moschum accedentem, magni fieri, noster *Leon. Ramovolfius* par. 1. Itinet. Orient. Cap. 4. additâ lib. 4. ejusdem figurâ, testantur.

Alium porro in Americæ insula Montferrato moschatum fruticem exhibet *Dapperus* lib. 2. descript. Americæ. Cap. 11.

Lignum santalum album moschatum in Practicorum libris quandoque legitur, quod tam suave spirat, ut muscatellini cognomen invenerit: scribente *I. C. Scaligero* exerc. de subtil. 104. §. 12. Quo tamen elogio Santalum flavum potius alii coronant, id ceu præstantissimum & fragrantissimum reliquis præferentes, cum album exilem admodum odorem spiret. Licet sint, qui

utrumque pro uno & eodem ligno habeanr, quæ tamen aliqualis in colore differentia, & odoris inprimis major minorque præsentia satis determinant.

De Agallocho ob magnam fragrantiam moschatellino dicto videatur Ill *Guern. Rolsincius* de purg. vegetab. sect. 1. art. 2. Cap. 2.

Arboris Tolutanæ balsamif. ræ liquorem odore Moschifragrantem sistit *Aldrovandus*, addens: *Si quis volâ manus eo illinat, is non aliter, quam si I. smino Catalonico, quod Moschum similiter redolet, oblitus foret, delictissimo odore fragrabit.* Verùm ut Jasminum illud odorem à moschato longè, si me nares meæ non fallunt, diversum, & sui generis expirat, ita & Tolutanum, quod ad nos nomine isto desertit, Balsamum ab eodem recedit. *Nic. Monardus* sanè Cap. 10. Simpl. medicam, hist. eundem succum accuratius exponens, odorem quidem excellentissimum, sed qui Limonum quodammodo aut Jasmini fragrantiam tantum referat, in eo agnoscit.

In Fructuum numero primatum hic potissimum obtinet Nux moschata, cujus in *Wormiano Museo* lib. 2. cap. 30. tria dantur genera: mus, femina, & regia. Femina est notissima, aromaticam propter virtutem suam Pharmacopolarum non tantum, sed Coquorum etiam manus frequenter exercens, ob suavitatem odoris moschata dicta, non quod Moschum oleat, sicut benè notat *Renodens* lib. 1. de mat. med. sect. 3. Cap. 11. *Aldrovandus* tamen recentem in patrio solo Moschum egregiè referre scribit; incertum tamen, quo id autorem vel teste persuadeat, aliis Scriptoribus omnino tacetibus.

Inter innumera Pyrorum genera, præcocia illa minima; moschatellina, se commendat, nonnullis superba Pyra, ob odoris, saporis & coloris, jucundo quasi certamine in parvulo corpore confusorum, eminentiam, adpellata. Moschatula à gratioso sapore, moschum referente, nominant: ceu modò citatus *Renodens* loquitur sect. 6. Cap. 2. vel, ut *Valer. Cordus* lib. 3. de plant. Cap. 9. edisserit: *saporem habent suavissimum & aromaticum, veluti modico moscho condita essent, unde etiam nomen sortita sunt.* Quæ encomia, nec non virtutes præstantes medicæ, quas habere creduntur, & lib. 2. de art. med. *Christoph. à Vega* alibique recensentur, ut reliquis Pyrorum generibus præferantur in Officinis, faciunt.

Melonibus insuper nonnullis Moschi odor aliqualis innascitur, quos *Cordus* & *Dodonæus* recensuerunt & moscatellos sive moscharellos ab odoris sui præsentia dici *Aldrovandus* adnotavit. Nec silentio involvendi parvuli illi Persarum melones, Schammame ipsis vocati, Pomorum aurantiorum magnitudine, non quidem sapore, sed odoris amœnitate gratissimi, descripti à *Cl. Adam. Oleario* lib. 5. Itiner. Pers. Cap. 5.

Hic jungendi Cucumeres moschati, Galiam moschatam mirâ similitudine odoris, sed fugacis, referentes, à *Nard. Ant. Reccho* l. c. lib. Cap. 61. descripti; nec non alius fructus Cap. 86. expositus.

Quis porro Uvas moschatellinas ignorat? utpote quarum non tantum expressus liquor seu Vinum, sed ipsa etiam Vitis eodem insignita nomine commendatur. Sic *Ioh. Manardus* Vina moschatula à Moscho; suavissimo aromate, nuncupari iudicat lib. 8. epist. 1. & nativum ea Moschi habere odorem epist. 2. subjungit. Nonnulli tamen hoc in dubium rectius vocant, nec Uvas moschatellinas; sed muscatellinas dici debere contendunt, eò quod à Muscis summo opere impetantur, idcirco etiam *Plinio* Apianas vocari, quia Apibus sint gratissimæ. Sic à Muscatum telis, quibus impetitur, potius quam à Moscho cognominatam benè arbitrat *Gnid. Pancirollus* l. 1. rer. memorab. tit. 17. consentiente Ill. DN. *Præde nostro* apud meritissimum *Philipp. Jacob. Sachsium* append. Ampelograph. pag. 21. Conferatur hujus lib. 2. sect. 2. Cap. 2. pag. 102.

& 103. Nec sanè, linguæ nariumque iudicio si stare lubeat, quidquam in hisce occurrit, quod Moschi odorem repræsentet. Sufficit aliàs, quod grato odore, & jucundissimo sapore præditæ deprehendantur, quarum ideo fragrantès dulcesque saporès insectentur apes, vespæ, non ipsa tantùm animalia perfectiora. Rectius itaque nomen illud donabimus Vinis, simplici Moschi additamento, odore ejus nobilitatis, qualia Hispanos cum Vinis patriis, & cum Vino Græco per infusionem parare perhibuit laudatus *Sachsus* Ampl. pag. 399. quorum elaborationem quoque monstrat *Guil. Gratarolus* de Vin. c. 20. Moschum nempe cum vini particula, (aut, quem modum habet *Porta* Mag. nat. lib. 14. c. 11. cum vini spiritu) solutum vasi infundendo.

Nec Fungi denique abibunt indisti, valde odorati & Moschum redolentes in Pisanis collibus & Pyræneis inventiendi, ex *Laur. Eichstadii* testimonio c. 15. de consilkeris. Quales etiam ex *Columella* notavit *Celeb. D. Morbhus* diss. de paradox. sens. c. 1.

In Animalium classe Homines imprimis dari moschatos, vel suavem odorem qui de se spargant, traditur. Ita mihi à Nobiliss. *D. Wedelio* relatum olim fuerat, nuperque per literas confirmatum, novisse se Studiosum, cujus corpus Moschi odorem, & quidem æstare magis, atque post corporis motum, de se sparserat; non dissimilem fortè ille *Alexandri M.* Macedorum Regis, quo de ferunt Historici, *Plutarchus* imprimis ex *Aristoxeni* commentariis, in vita ejus, & lib. 1. Conviv. quæst. 6. per os & membra ipsius jucundos admodum exspirasse halitus, ut & interiores tunicæ mirabili fragrantia complerentur. Animal enim quodcumque, licet odorem aliquem emittere jam olim *Theophrastus* lib. de odorib. rectè edixerit, in homine tamen sano ab aliis hominibus illa vix percipitur, ut ideo rarissimum quid, vel talem præternaturale sit, suavem foetidumque ab eo emitte. De hoc quidem nemo est qui dubitet, cum frequens admodum existat, ille autem rarior est, ita ut vel in dubium vocare celebratam istam de *Alexandro M.* odore gratissimo, quam aliqui moschatum absque ullo ramenti fundamento venditant, relationem, & si quis fuerit, adventitium magis ab assumptis, atque fucatum ab externo odoratorum usu, proclamare haud fuerint veriti. Sic *Ezechiel à Castro* lib. 1. de ign. lib. cap. 5. *India Reges*, ait, continuo haustu odorati pharmaci odoratos exhalant vapores, quod forsitan & magnus operabatur *Macedo*, ut tetros frequentis crapula nidores arte vinceret & obtunderet. Similia de *Abdollo* ho *Ebn Zobur*, ex *Saïdo* refert *Cl. D. Georg. Hier. Welschius* lib. 2. variat. lect. cap. 10. MS. Matrem nempe ejus libram Moschi bibendam ei dedisse, cumque in prælio occisus esset, homines multis diebus è corpore ipsius Moschi odorem olfecisse; licet hinc vel sola Moschi insignis quantitas fabulæ aliquam suspicionem movere queat. Adulationis quid latere in illa de *Alexandro M.* relatione potuisse, non immerito suspicabatur beatus *Sachsus* in schol. ad obs. 191. Anni II. Ephem. Nat. Curios. Quam sanè erga Regem illum maximum maximam etiam fuisse novimus, quod vel solum divini illi, quibus colebatur vivus, & coli volebat, honores ostendunt. Hinc non minùs dubitandum, an cadaver quoque ejusdem aromaticum emisserit odorem, quo de neque *Plutarchus*, neque *Q. Curtius* quidquam prodiderunt, *Curtio* potius, cum ab Ægyptiis pro sepultura corpus condiretur, odoribus fuisse repletum, lib. 10. hist. suæ fidem faciente. Quamvis aliàs impossibile minimè arbitrer, cadavera gratum, quacunque demum ex causa id fiat, effundere posse odorem, quod *Leonh. Donati* Venerorum Ducis, *Olai* Regis Norvegiæ, & *Wilhelmi* Episcopi Roëskildensis exuvie persuadent, de quibus Exc. *D. Thom. Bartholinus* lect. 3. de hepat. exautor. desper. caus. nec

non cent. 4. epist. med. 87. videndus. Ubi tamen & has ipsas relationes hyperbolen quandam sapere, Rhetoribus condonandam, aut artificium quoddam aliud à conditura accessisse *Welschius* l. c. arbitratur. Aliàs, quantum ad *Alexandrum* attinet, nihil obstat, quò minùs suaves exhalationes ab eo prodire vel tum saltem potuerint, cum victoribus Orbem pervadens armis, temperantiæ primò intra limites sic satis sese continerit, id quod *Plutarchus* ferventi corporis temperiei, humorum digestionem suavem gignenti odorem, adjudicat; optimà, ut aliqui explicant, humorum concoctiones & superfluoꝝ expulsionem subsequente, quæ nempe sulphureas odoratas atque volatiles in sanguine particulas digerit, evolvi, explicari ac perfici potuisse, nullum videtur esse dubium. Quanquam majori jure dubitetur, num d. u. perque totam vitam ita continuaverint, si victorum hostium ad exemplum, in omnem tandem luxuriam & intemperantiam pronum, foedis potiùs puridisque habitibus obnoxium evadere potuisse, consideretur. Licet & in ipsa putredine ac corruptione odoris gratia quandoque hospitari videatur, dum insita principia per putredinem è carcere suo liberata virtutem suam produnt, cuius itaque fragrantiam illam *Olai* Regis &c. *Bartholinus* assignaverat. Ut jam nil dicam de *Isidis* miræ fragrantia, apud *Plutarchum*, nec non *Tzetzi*, cujus corpus aromatibus oluisse, ipse in exposit. diæ. & oper. H. si od. memorat.

Hominem excipiat animalium quadrupedum vastissimum, Elephas, cujus odorem moschatum suavissimum enarrat *F. Gregorius de Bolivar* in Joh. Fabri Exposit. animal. Mexic. fol. 564. Si quis, autem, addens, suborem illum conchyliorum testis, quod Indis facere consuevit, est, detergat, & in vascula corruet, moschi odori minime cedentem, & suaveolentem naribus succum inerat. Quæ itante relatione, mirum, tot diligentissimos viros de India Orientali Historicos nihil de odorato hoc sudore literis consignasse, nisi fortè & hic quibusdam tantum eundem Naturæ concesserit.

Non minùs Crocodili Moschum redolentes observantur, de quibus videndus Exc. *D. Thom. Bartholinus* cent. 6. hist. anat. 52. & conferendus *Nard. Ant. Ruchus* in hist. nat. Mexic. lib. 9. C. 3. *Joh. Jonstonus* Hist. nat. lib. 4. tit. 1. C. 8. *Joh. Petr. Maffejus* Hist. Indic. lib. 2. pag. 47. *P. Joh. Ens. Nierembergius* lib. 12. Hist. nat. C. 5. Fluvium Tambahujam in Brasiliæ ab *Elia Herckmanno*, ob odorem moschatum à Crocodilis exspirantem, Moschi nomine fuisse donatum, CAP. I. dictum jam fuit. Eundem in Insularum Americarum aquis dulcibus repertiundos Crocodiles possidere, *Philipp. Baldani* C. 52. descript. Malabar. & Coromand. ex *D. Rochefort* refert, hominesque eo ipso, ut sibi caveant, admoneri suspicatur. Quin & à specie excrementa eorum benè olere, *Plinius* jam lib. 28. Hist. nat. Cap. 8. tradidit, duo Crocodili generi recensens, atque de altero, in terna tantum, inquit, odoratissimis que floribus vivit: ob id intestina ejus diligenter exquiruntur, jucundo nōdore facta, Crocodileam vocant. Conf. *Joh. Rhodii* not. in Scrib. Lat. compos. 14. Cl. etiam *D. Olavi Borrichius* lib. 1. Herm. Ægypti, Cap. 10. pag. 277. non omnes gratum illum spargere odorem observavit.

Ex Cercopithecis Brasilianis quosdam suavem, Moschi quodammodo instar, spirare odorem *Cur. Clusius* in Auctar. ad Exotic. lib. testatur. Eodic. Et coincidunt cum Cercopithecorum generi à *Jul. Casp. Schlegero* memorato, quod nihilo insuavius, quam quodvis Moschum fragrat. Mediocriter tamen, ac sine fastidio, exerc. 211. de subit. §. 2.

Lepores dari, cum *Gesnero Aldrovandus* scribit, qui ab odoris vehementia, Moschiæ dicantur, quorum vestigia tanto spirent odore, ut, dum ea perfici-

quantur canes in furorem quasi ab eo agantur. Quod si non mera sit fabula, impossibilia tamen haud esse ista effluvia facile concesserim.

Buffalinam vulvam exsiccatam Moschi odorem spargere, centuriæ r. epistola Bartholin. 49. indicat, quam itaque servant, eaque in Unguentis utuntur Myropolæ Neapolitani.

In caudæ vulpinæ superiori parte pilos flavos tenuissimos enasci monet *Casp. Schvvenckfeldius* l. 2. Theriotrop. Siles. violam martiâ odore eminentes. Quem etiam Moschi æmulum ab Ill. Barone quodam fuisse creditum, in Volum. 3. obs. 21. proferuntur.

In Italia Muris genus, Moscardino vulgo nuncupatum, sive Murem corylinum, Moschi odorem præ se ferre legimus, & qui ipse est exiguus ille Musculus, totus gratissimè Moschum inspirans, *Aldrovando à Ludovico Gozadino*, Patritio Bononienfi, communicatus, atque à *Joh. Fabro* in Recchi Hist. natur. Mex. fol. 586. descriptus. Murem etiam moschatum in Germania, rarius, tamen occurrere *Gasp. Schvvenckfeldius* facit. Postò in India alicubi Mures esse Moschum olentes, ex aliorum fide refert *Andr. Libavius* Singular. p. 3. l. 4. Cap. 1. qui fortè idem sunt, quos in orientali India *Dapperus* in descript. regni Magni Mogolis, velia Virginia & Inula Tabaco reperti odoratissimos, idem l. 2. descript. Americ. Cap. 4. & 11. memorat. A quibus non multum recedere videntur Russici illi mures vel Sorices, quorum exuvias trinas in splendidissimo Museo Septaliano me vidisse recordor, indigatas etiam ab Exc. *D. Paul. Mar. Terzago* in ejusd. descript. c. 30. Ipseque talem possideo pelliculam, liquet per agnos admodum odorata & verè moschatam, nunc verò diuturnitate temporis ferè totam exoletam. Tanta aliàs odoris in istis fragrantia excellit, ut ex Moschocompacta videatur, ceu in Museo Kircheriano pag. 29. describuntur. Videatur quoque *Ol. Wormii* Muscum l. 3. c. 23. Ino vulgrium Murium excrementum nonnunquam olere Moschum, cum *Ruellio* plurimi fatentur, eoque moschum adulterari.

Utrum simile animalculum innuerit *S. Hieronymus*, ceu quidem vult *Aldrovandus*, incertum est, dum nempe lib. 2. adversus Jovinian peregrini muris pelliculam inter dissolutorum & amatorum odoramenta reponit, & in Vita marcellæ factum Romanarum Matronarum describens, tolere easdem fragrare musso mure, innuit, nec non Epist. ad Demetriadem Virginem cincinnatulos pueros & calamistratos, & peregrini muris olentes pelliculas reprehendit. *Gesneri* tamen aliorumque magis placet sententia, folliculos Animalis moschiferi ob eo innui, hariolantium, cum in illis pilosis moschus adfuerit soleat, ut fortè muris genus esse putaverit, pilosâ eorum substantiâ, nominisque vicinare deceptus. Potuisse autem *Hieronymo* innotescere odoramentum hoc, satis est credibile, quamvis enim prioribus, uti *Hippocratis* & *Galeni* tempore, nihil de eo Græcis & Latinis constiterit, subsequenti tamen à Christo nato Seculo quarto ejusdem usus jam increbuit, unde etiam in *Pauli Aegineta*, qui Anno Ch. 420. floruit, & *Aetii*, qui Anno Chr. 455. vixit, Scriptis mentionem ejus fieri notum est; *Hieronymum* autem circa Sæculi quinti initium à Christo nato mortuum, Historici referunt.

Nec inditum abire debet venenosissimum animal, Aldofarcad vel Algeforum à quibusdam nominatum, cujus ex *Megiseri* descript. insul. Madagasc. meminit Nob. *D. Just. Fid. Klobius* in hist. Ambr. cui sæpius prope umbilicem apostemate gravato avis illa, Aschibobuch dicta, saniem ex fugat odoratissimam, à qua deinde feces alvinæ in substantiam pretiosam, Ambræ nominæ ubi que notam, abeant. Verum uti Ambræ natales illi meritò ficticii re-

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

putantur, ita etiam de altero animali facta relato idem meretur judicium, & quod præconcepta ab opinione de moschi ex abiceffa origine ortam fabulam redoleat.

Vulgatissimum insuper est quoddam genus Mustelæ silvestris, ob ferocem atque rapacem naturam Martis nomine (German. *Marter*) notum, cujus excrementum Moschi odore nobilitatum à multis expectitur, & sub Moschi nomine inter plebejos sæpius lupperbit. Licet primò foetere, & postea denum suaviter olere à nonnullis tradatur. *P. A. Matthiolus* com. in Diosc. lib. 2. Cap. 24. Mustelæ cujuslibet finum nonnihil Moschum redolere scribit, quod tamen non semper contingere constat. Confert. *D. Joh. Jonston* hist. natur. de quadrup. Hinc sanè alimenti devorati diversitati, & in specie Uvis comestis, suaveolentiæ causâ à quibusdam assignatur, quos irridet *Andr. Libavius* Singular. part. 3. lib. 4. Cap. 7. cum ab homine Uvas comedente ejusmodi excrementum non proveniat; alii odorato è fruticibus ac herbis cibo adiciunt; alii aliter sentiunt. Quamvis verò alimenta odorata multum conferre valeant, in præcedentibus tamen digestionibus, antequam in scybala vertantur, multum immutari ea necesse est, ita ut odorata etiam particulæ eandem sortem experiantur, atque sulphureum illud volatile figi quandoque ac inverti queat, sicut vicissim è rebus actu non odoratis, accedente separatorio aliquo principio, latentes in eis odorata partes extricari, atque emergere possunt. Quo intuitum à bile scybalis permista, tum etiam ab alimentis diversis, odoratis & inodoris, Mustelarum illam fragrantiam commodè derivamus.

Imò in ipso humano excremento alvino hujusmodi latere suaveolentiæ & Moschum, Chymici non dubitant, quem illi, quibus mysteria hæc placent, mediante digestionem educere, & *Carbon Paracelsi*, seu Zibettam occidentalem adpellare solent, quo de imprimis videndus *Joh. Hartmannus* not. in Basil. chim. Croll. Quod & cum stercore vaccino tentare institunt, ex quo, trium mensium digestionem &c. pinguedinem odoratissimam ad *Paracelsi* doctrinam lib. 7. Archidox. *Joh. Agricola* unâ alterâque vice separaverat, uti testatur part. 2. not. in *Joh. Popp. medic. chim.* Quam suaveolentiæ ab immixto felle dependere Exc. *D. Frid. Hoffmannus* Clav. pharmac. Schrod. lib. 2. Cap. 76. arbitratur, cum bilis, præviâ digestionem, destillatâ & ipsa Moschi æmuletur odorem. Non minus Nob. *D. A. H. Communi* 1668. Hanoveriâ ad beatum *D. D. Joh. Theod. Schenckium*, in Martis suaveolentis vesicula fellea bilem optimi instar Moschi odoratam se reperisse scripserat, quæ gossypio excepta per duas septimanas fragrantiam conservaverat, usque dum sensim sensimque deficeret, Excrementorum, addens, odorem foetidum videm emendari posse, nullum dubium, cum illa bile copiosissime sine perfusa, & ab illa sulphur suum & sal volatile haud parva in quantitate acceperint. Idem vult *Cl. Nathan. Highmorus* differt. de pass. hyster. Cap. 6. bilem nempe, si destilletur, aut concoctione ulteriùs elaboretur, odore Moscho equiparari. Similem in Tinctura fellis lupini aliquando se observasse laudatus *D. Schenckius* mihi affirmaverat, cum in gratiam illustris cujusdam Personæ, doloribus colicis oppressæ, eandem præparasset. Quò referre liceat aromaticam illam tincturam ex lapide porcino Ceylonico bilioso à *D. Barth. Pielat* paratam, inq; Laboratorio ejus Ceylonico descriptam. Imò absq; digestionem illa longiori stercus quandoq; vaccinum, Majali imprimis tempore collectum, odorem gratum acquirere, certum est, ut ideo *Alexius Pedemontanus* ex eodem siccato Pulverem Cyprium odoratū conficere edoceat, & Officinæ nostræ aquâ ex eo odoratâ,

N n h e

nomine Aquæ florum omnium notam, eliciant.

In volatilium numero Avem quandam in Umbria, Muscardo vulgò nuncupatam, nobis recenset *Aldrovandus*, incertus tamen, num à Moscho nomen id acceperit, licet Moschum avis cujusdam excremento adulterari considerans quodammodo eò inclinet.

Anates moschatæ peregrinæ, in nostra Germania satis jam notæ, Moschum in vertice redolent, de quibus adeundus noster *Georg. Hieron. Welschius* Hecatost. obser. phys. 71. *Cass. Schvvenkfeldius* lib. 4. Ther. Sil. pag. 196. & 197.

Quin & ipsis in nodis moschata circumnata animalia. Sic piscem Brasiliæ Ougri describens *Dapperus* l. c. lib. 3. Cap. 4. pag. 404. in fluminibus repertiundum, Moschum odore eum scribit.

Polypum moschatum nominat. *I. B. Porta* lib. 6. Phytognom. Cap. 6. Græcis recentioribus quoque *μοσχίτην*, à moschato odore, Italis verò muscardinum vel muscarolum vocitatum, qui vivus mortuusque Moschi odorem, & quasdam ejus virtutes referat, *Aldrovandi* monitu, Alias *Osmylus*, vel etiam *Ozæna*, ab *ὄζω*, oleo, audit, consentiente *Schvvenkfeldio* lib. 5. pag. 408. quem tamen non suavem innuere videtur *Plinius*, dum à gravi capitis odore, ab omnibus Mariis expetito, *Ozænam* esse dictam lib. 9. Hist. nat. Cap. 30. prodidit, eundem tamen à quibusdam exficari, ibidem scribens, *ut vestibis fragrantiam in aquis conciliet*. Imò adeo benè olere eum, tradit *Nob. D. Joh. Jonstonus* Hist. nat. de exanguib. aquat. l. 1. tit. 2. Cap. 1. ut *Gyllius* nihil moscosius se sensisse etiam tum, cum mortuus esset, scripserit. Utrùm itaque diversa hæc dentur Polypi genera, tam suaviter nempe, quam graveolentia? vel an fistula tantum illa, cirros inter & caput locata, è qua tetrum emittere odorem *Pollux* memorat. ingratum: reliquum verò corpus suavem emittat odorem? quibus hæc scrutari occasio datur, judicent.

De Achkari piscis ovis ex *Ulrico Fabro* narrat. *J. o. Eus. Nierembergius* Hist. nat. lib. 11. Cap. 6. quòd Moschi saporem (an potius odorem?) habent.

Hic etiam Unicornu illud Helveticum, si, ut reliqua, dens belluæ marinæ, è genere cetaceo fuerit, commodè memorandum venit, quod ad oram fluvii *Arulæ* prope *Brugam* A. 1520. inventum, Moschi odore, igni præsertim vicinum, excellere traditur. Id vel fictitium quid, vel diurnâ odoratorum viciniâ sic imbutum credere maluit *Th. Bartholinus* Cap. 27. observ. de Unicorn. Quæ etiam sententia est *Andr. Baccii* de Monocer., hoc Cornu scil. olim præparatum, cum ejusmodi rebus odoriferis sepultum fuisse, quarum ratione odorem aliquem sibi adquisiverit. Cum aliàs sibi relictum inodorum esse, tum ali, tum Augustani mei apud *Ol. Wormium* lib. 3. Mus. Cap. 14. innuant. Nisi fortè volatilia ejus principia longiori in aquoso loco morâ, solisque calore soluta & digesta, aut etiam vicinarum quarundam ad ripam fluvii putrescentium &c. herbarum à contactu quandam fragrantiam vel odoris gratiam adquisiverint.

In Serpentum genere Biffa angela vulgò Italis dictus reperitur, aliàs Serpens *Æsculapii* creditus, qui non modò Moschum redolere, verum etiam loca, in quibus latuit, eodem odore imbuere fertur. Sic & Serpentes in orientali India, inter Calicutum & Cananor, dari, tum ex aliis, tum *Hieron. Cardano* lib. 9. de subtilit. constat, quibus spiritus adeo procul redoler, ut Moschus videatur. Nonnulli Serpentem venenosum magnumque, Aspidis speciem, dari volunt in Cyro, Cusso patriâ voce dictum, qui moriturus odore Moschi fragret. Et Celeberr. *D. Joh. Rhodius*, cum in *Petr. Castelli* Cap. 2. de Hyæn. odorif. Serpentium quorundam recrementa dictum odorem fundere legisset, idem in monte Baldo, immensâ Viperarum

frequentia abundante, se deprehendisse cent. 3. observ. med. 98. refert, quamvis delusos fuisse eos credere maluerit *Redus* observ. de Viper. pollicem ei præmente *J. C. Scaligero* exerc. 189. de subtil. §. 2. contra *Cardanum*, iterum Serpentum quorundam benè odore scribentem, sic decertans: *Ubi in Serpentum Muscardam odoratus es? An persuaserunt agrestes opera tua, aut pastores, propter sepes ambulanti tibi, atque odorem bonum naribus haurienti: Angues ibi stambulare? Hoc enim nobis quoque adolescentibus occinebant. Cum tamen & inde haleret aura illa odorata propter frutices, & muscosum solum, quod in sylvis frequenter evenit, quoties humi mucor à Solis radiis ad virgultorum pedes elaboratus est: & è cavis, ubi serpentes vitam agitant, quod experti sæpe sumus, aut odor nullus, aut teter exeat. Quod equidem ut plurimum esse verissimum, haud est negandum, qui & ipse in Collibus Euganeis circa loca Viperarum feracia obambulans, nullum, neque moschati, neque suaveolentis alterius exhalationis vestigium, multotiesque in Viperis Patavium magna in copia delatis, vel eorum excrementis, aut nullum, aut tetrum saltem odorem deprehendi. Licet interdum pro Serpentum varietate, & vario eorum alimento, jucundo excrementa odore posse imbui, haud planè negaverim. Ut ideo *Cardanus* simpliciter hac in parte animadversionem meritis non fuerit, qui de omnibus Serpentibus id nequam affirmaverat, sed plerumque tantum stercus illud benè olere edixerat; quamvis, si unquam, ratio tamen id contingere, rectius omnino dicendum videretur.*

Limacum etiam quosdam in horto domestico collectos suaveolentiam quasi moschatam, sed fugacem satis, præ se ferre, aliquoties expertus est Collega & Amicus meus honoratissimus, *D. D. Vir. Riedelius*, causâ fortè in quarundam herbarum hortensium odoratarum pastum referendâ; sicuti etiam *Matthiæus Comm.* in lib. 2. Diosc. Cap. 9. Cochleas serpillum, pulegium &c. depastas odoris gratiâ commendari notaverat.

Ex Insectorum cohorte parva vaginipennia oblectavit *Petr. Castellus*, quæ contrectata suavissimum spirabant odorem, quales in floribus *Dipladi* percipiuntur. Vid. Cap. de Hyæn. odorif.

De Muscis Pisanis odoratis exstat Epistola *Val. Clementellus* in fine libri: Marmor Pisanum de honore *Bassellii*, quarum odor inter Moschum & Zibethum fragrans, validus, perdurans in vivis & mortuis, integris & contritis, deprehenditur.

Tandem se Mineralia sistunt, & quidem *Lapis Mariæbergicus*, in Vena Divi Fabiani & Sebastiani repertiundus, quem Moscho olere *Joh. Kentmannus* Nomenclat. rer. fossil. p. 37. & *Anf. Boëtius de Boodt* Hist. gemmar. & lapid. l. 1. Cap. 6. & l. 2. Cap. 292. prodidit, quod Musco, saxis istis adnato deberi, ex Agricola ostendit *Gul. Laurebergius* descript. Ætitis.

Caraben vel Succinum moschatum, sive Moschum redolens *Balib. Brunerus* conf. 40. & 48. præscribit, quale tamen nec ego unquam observavi, nec apud ullum alium descriptum reperio; ideoque si tale deest, rarum adeo esse, necesse est, ut in Officinis pro ullo medico proflare nequeat.

Ex frequentiori Sulphuris usu excrementa alvina moschatam induere fragrantiam, referunt. Quod *Athan. Kircherus* tom. 2. Mund. subterr. lib. 9. sect. 3. Cap. 1. mirum non immeritò videbatur, cum Sulphur cæteroquin putidi & intolerabilis sit odoris. Quem singularem etiam digestionis animalis effectum *Joh. Rudolph. Glauberus* agnoscit, dum p. 2. Furn. Philosophi Cap. 97. Sulphur in liquore Silicum vel arenæ solutum, atque coagulatum, dein cum Spiritu urinæ ex-

matum, & hoc abstracto, cum Spiritu vini digestum, tandem odorem acquirere docet, nec Moschi nec Ambra odore inferiorem.

Neque fileri denique debet, quod *Paracelsus* lib. 7. Archidox. de Aquâ Oli cum Se ammoniaco destillata monuit, eandem nempe Moschi referre odorem digestionisque opus id esse, innuens.

Eodem modo Vitrioli spiritum roridum per cohobia paratum vapores, Moschum gratissimè redolentes, per vasorum commissuras spirasse, in Fasciculo 2. Medicamentor. Cnoffel. Miscellaneis Curios. addit, tit. 7. pag. 59. adnotatur.

Hic ob Destillatoriæ artis cognationem addere liceat, quod post salis volatilis plantarum, Coxiano modo putrefactarum destillationem, in vase odor Moschum ferè redolens constans se offerat. Vid. Exc. *D. Georg. Wolffg. Wedelii* Experim. chim. de sale volat. plant. cap. 3.

Magis curiosum est, quod Nob. *D. D. Andr. Hueberus*, Archiater Frisingensis, in literis, A. 1681-19. Augusti ad me missis retulit, esse nimirum ibi Chemicum quendam, omnia Salia fixa volatilifantem, & citra Moschi additronem, ad Moschi fragrantiam exaltantem; quæ tamen, uti dein 10. Septembr. me monuit, ob nimiam volatilitatem ultra quatuordecim dies non perduret.

Cortices cerafi minutim incisi, perque descensum igne forti destillati ineunte vere liquorem Moschi odore stillare, ex Cl. *D. Frid. Hoffmanni* Clav. pharmac. Scroder. pag. 434. colligitur.

Sulphurum nempe particulae uti pro varii sitûs & commixtionis ratione modò hîc se colore exhibent visendas, modò alium ostendunt, seu id in Violarum Sirupo cœruleo; à Spiritu vitrioli, natri, salis ammoniaci variè colorando, est notissimum; ita & odoris respectu, dum aliæ à salinis exaltantur, aliæ præcipitantur aut expelluntur, nonnullæ antea omnino sopitæ suscitantur, magnam subire diversitatem, ac differentes ordine odores sistere possunt.

Utrum verò recensiti hæcenus odores Moschum verè referant, in expertus equidem de multis adfirmare nequeo, nullus tamen dubitans, quin, prout aliàs gratum aliquem odorem moschato æquiparari, novum quid hæc est, licet revera attentius examinatus talis non comparèat, magna hîc quoque in nonnullis attendi posset differentia, seu revera Vinum quoque illud guajacium apud *Amatum Luf.* cent. 1. curat. med. 32. inter ebulliendum aliquam ex se fragrantiam spirans, ita ut Moschum ibi esse Adstantes dixerint, moschatum tamen odorem minimè exhalaverat.

Et hîc meum quoque hunc Moschum lubens adscribi patiar, qui, Lectoris genium æmulâ moschata fragrantia potestate licet suaviter aut utiliter non adfecerit, aliqualem tamen odoris grati sensum ei si impresserit sufficiet.

MOTACILLA.

Pssim nota est hæc avicula; corpore oblongo; pondere sex drachmarum; longitudine à nostri cuspidæ ad finem caudæ digitorum 7.4; latitudine inter extrema alarum expansarum undecim. Rostrum tenue, digito brevius, acutum nigrum. Lingua bifida & tanquam lacerata. Os intus nigrum. Oculorum irides avellanæ. Pedes, digiti, ungues longiusculi & ex atro fulci. Postici digiti unguis prælongus, ut in Alaudis. Extimus digitus ad sul exortum medio adnascitur. Superiorem Rostrî mandibulam & deinde oculos plumæ albæ circumambiant, utrinque ad alas ferè productæ. Vertex, collum primum & superius ad sternum usque & dorsum nigra sunt: venter & pectus alba: medium dorsi ex nigro cinereum. Uropygium nigrum. (in alia ave ad imum gulæ semi-

circulare spatium nigrum observavi, cornibus maxillas ferè productis.)

Alæ expansæ figuræ sunt semicircularis. Reriges in utraque 18. è quibus tres ul imæ in acutiores mugones desinunt; mediarum apices obtusi sunt & crenati; ultimæ angustis lineis albis decorantur. Tegeres prior ordinis nigrae, apicibus & marginibus albis; secunda ordinis tegetum apices tantum albi. Cauda prælonga, digitorum 31. quam continuè motitat, undè ei *Motacilla* nomen impositum. Pennæ duodecim, quarum mediæ duæ reliquis longiores & acuminatæ, cæteræ æquales; extremæ ferè totæ albæ sunt, reliquis nigris. Color plumaginis in hoc genus avis lubinde variat, aliàs magis cinereus, aliàs nigrior. Hepar coloris pallidi. Circa aquas versatur, ubi muscas & verm culos capiat: quin & aratrum, Vermium causâ, quos versat & exhibet cum gleba, sequitur; ut cum Aldrovando nostrates etiam agricolæ observârunt mihiq; retulerunt. In Septentrionali Angliæ parte hyeme non apparet, estque rarior etiam in Meridionali, seu quod frigoris minus patiens sit, seu cibi penuriâ quod muscæ aliæque insecta pennata, quibus præcipuè videtur per hyemem non inveniantur. Ventrículo dissecto insecta farinariis familia exeminus. Cucullis pullum ab hac avicula nutriti Geinerus aucupes apud suos observasse scribit. Albertus quoque & nostra etiam experientia (ut alibi retulimus) idem confirmat.

Hujus ollæ obstructæ inclusæ & in furno tostæ una cum pennis, pulveris drachma una vel altera cum aqua Saxafragiæ aut vino albo generoso ad calculum renum præcipuè utiliter propinari dicitur. Alexander verò Benedictus existimat Recentiores quibus hoc medicamentum commendatur pro Motacilla per errorem passerem troglodytem intelligere, quasi Motacillæ vis lapides frangendi non sit. Geinerus [cui & nos libentes assentimur] parum referre putat, quænam avis comburatur, cum cineris propè omnium vis eadem videri possit. Prætulerim tamen, inquit ea avium genera quæ insectis vescuntur, ut muscis, formicis & similibus. *Willughbejus*.

MOXA.

Quod de Africâ in proverbio olim erat, illam semper aliquid novi apportare, & duobus hîc seculis de Indiis reverà valuit, id imprimis de medicina hodiernâ verum est. Nova quærimus, nova exhibemus, & venditamus. Sordent vetera, non cordi habentur unicè. Anni sunt non ita multi, cum innovuit orbi pariter & medicis Europæis *Moxa Sinensis*: novum nomen, nova medicina, eo maxime de prædicata nomine, quod aedatus podagiæ, morbo Magnatum incurabili credito, vel saltim, si quis aliis, rebellis. Celebrata primitus fuit ab *Hermannio Buschovio*, Seniore, Trajectino, edito de eadem Tractatu. Belgico & Germanico idiomate, subiecta experimentis hinc illinc, felici partim, partim infelici successu, mirantibus plerisque quale sit, & cujus origini novum hoc & inauditum medicamentum.

Abblandiuntur sanè peregrina omnia magis, & gratiam applausumque merentur majorem, quam antè fores nata, præcipuè apud nostrates, qui genio suo modesto induci aliena præ suis æstimare consueverunt. Nec caritas precii deterret, modò curiosum quid, & quod maximum est, utilitatem cum novitate præ se ferat.

Duo ergo potissimum occasione Moxæ Sinensis hujus inquisitioni digna se obtulere: morbus cui medetur, & remedium, quo morbum non solum podagram, sed omnes in universum quasi dolorificos insulsus, de bellare posse visum est. Et hoc quidem tâto magis salivâ movit curiosis inquisitoribus, quod minus notum fuit hæcenus. Ignota enim magni facimus, notavilipèdimus cõmuniter,

ter, la quotidiana assuetudine velut familiaritatem induere contemptum post se trahente.

Non nostrum est, alios jam laudare, qui publicis Suptis in Moxam inquisivere. Quot capita, tot sententiarum. Unus quisque hoc scire satagit, ac inquirere; na tamen est & simplex veritas, una Moxa, licet plura succedanea. Habeant ergo pro Moxâ Sinensi herbam exoticam, quicumque velint; alii molluginem papposam quam clematis sepium, ut nos vocare solemus, offert; utrumque bonum est, nosse, quid prosit, & quid itidem æque prosit, idemque præstet effectu, licet non idem sit specie.

Audiamus Autorem ipsum, qui *l. de Curat. Podagra, par. 2. c. 4. p. m. 91.* quid Noxa sit, & ubi reperienda, quærens, respondet, esse Moxam lanuginosam & mollem substantiam, artificiali præparatione, ex certâ paratam cuius nomen & præparatio ipsum quidem Autorem lateat, certum tamen, nobilissimam omnium esse plantam, optimoque jure matrem herbarum vocari posse. Habere in arcanis, addit, Sinas & Japones Moxam parandi hunc modum, licet magnâ copiâ haberi possit.

Suo linquimus loco, reverane nescierit. Autor herbam, modumque parandi, an studio id sinxerit, ut auctoritatem medicamento conciliaret majorem. Satis nobis sit, ipsum illum nominasse eandem satis sapientibus. Id verò ne nobis venditemus, jubet candor & gratitudo, magni à nobis æstimatæ virtutes, si reperiuntur in Medico.

Detexit nempe nobis & herbam & parandæ Moxæ modum Vir excellentissimus, nobisque præter meritum faventissimus *Johannes Hartmannus Kornmann, ab Hornsbach. Phil. & Med. Doctor, Consiliarius & Archiater Hassiacus*, plurimorum arcanorum naturæ callentissimus. Moxa, undecunque nomen traxerit, mollugo arthemisiæ est.

Recipiantur folia arthemisiæ, quantum lubet, excisacata probè & caule suo decerpta conterantur manibus eo usque, donec excusso pulvillo viridi lanuginosæ interiores fibræ, velut subtegmen substratæ, remaneant. Sin madefiant udore manus, repetendum opus est, ad desideratam teneritudinem.

Innotuit ipsi ἐγγέλῳ hęc indè quòd cùm ex Belgio non nemo, dives æque ac curiosus, magnam quantitatem Moxæ afferendum curasset, ipsique ad examinandum misisset, foliola deprehendit, lanugini adherentia, quæ microscopii ope inspecta penitus artemisiæ exhibuerint. Experimento hęc subjecta respondit ex voto, ut ovum ovo, simillimam lanuginem, seu Moxam potius largiens.

Eandem quoque excoluit ulterius, carminando, ad instar lanæ, ut flexa adhuc tenerior, meliorque reddi & variari possit magis. Quod si igitur non æque statim respondeat, huic Sinensis illa dicta, & cum bacillis suis aromaticis, [quoad exteriora quidem, non interiora] recondita differre videatur paulum, tenendum est, in culpâ esse partim herbam non unâ ætate collectam, partim leviolem, vel curatiorem parandi modum. Quin facile est, vel affuso sp. vin. virorem extrahere, eoque evocato, folia instrumento lanæ aliàs pectendæ debito aptare operi, vel eadem præparata aquæ aluminosâ depurare & albidiora reddere, ipsove fumo sulphuris id tentare.

Geminum hunc processum esse, duo evincunt extranea argumenta, sensus & affectus, quorum uterque Moxam Moxam esse testatur; unumque domesticum, Autoris confessioni innixum, licet non primâ fronte obvium legenti. Vocat enim l. c. *matrem herbarum*, matrem Moxæ. Ast hoc nomine venire Botanicis artemisiæ latifoliam vulgarem, testimonio *Lobeli, Dodonæi*, aliorumque est quam clarissimum. Ut adeò non opus sit,

trium vel quatuor imperialiam pretio Moxæ 3j quantum nimirum scatula oblonga capit, redimere, sed facillimo negotio eandem liceat comparare.

Ut vero hęc illustremus magis, notamus 1. *lanuginem plantarum duplicem esse, aliam exteriorem*, qualis in tussilagine, gramine lanigero, clemati sepium, aliisque observatur; *aliam internam*, qualis in radice tussilaginis pro ὡνοκαύματαυν laudatur à *Scaligero Exert.* 180. n. 2. p. m. 585. & in notissimo lino occurrit. Talis est & artemisiæ dicta Moxa.

2. *Non novum esse, hunc ipsum, curandi dolorem, modum, per inustionem actualem*, quod tamen nil derogat commendationi, sed pondus potiùs addit. Laudabimus hanc in rem unum Hippocratem, antiquissimum Medicinæ parentem, qui libro de *Affect.* c. 39. l. 12. Si in unum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, καῦσαι, inquit, καὶ ὅσον ἂν τόπον τυγχάνῃ ἐξοα ἢ ὀδύνη: καλεῖν δὲ τὴν ἀρολίαν, urito, quocunque loco fuerit dolor: urito autem lino crudo. Non potuisset sanè ipsius Moxæ tam decantatæ meliorem descriptionem dare, & quoad materiam, & morbum, cui debetur, ipsamque medendi methodum. Quod ut magis pateat, tenendum est, per linum crudum non intelligere ipsum sine uliâ præparatione tale; sed nondum in fila aptatum. *Prosper Martiannus Comm.* in l. de *Affect.* f. 2. v. 25. p. 170. processum integrum doctè & nervosè his descripsit. accipiat linum crudum, & arctè conglobatum, reducat in formam pyramidis, cujus basis latior in angustum coarctetur. Magnitudinem seu latitudinem basis indicabit locus inurendus: non ignoreto, ustionem aliquanto latior fieri, quàm sit basis pyramidis. Hęc igitur in summitate accensa loco inurendo apponatur, ibique resideat, donec tota materia absumpta sit; nam ignis serpendo ad cutim perveniens ustionem facit. Et quod mirum videtur, ferè insensibiliter, & sine dolore. Extincto igne porrum elixum imponebat Hippocrates, donec, quod exustum est, decidat. Nostri butyrum cum caule adhibent; indeque ulcus apertum servetur ad libitum.

Hęc transcribere, visum fuit operæ pretium, cum per omnia concordet cum recentiori hęc inurendi materiâ, Moxâ. Quæ verò subjungit alia, quibuscum alii laudatas ustiones parant, videantur apud ipsum l. c. Præstant nempe eundem effectum sicciora filamentosa, vel lanuginosa & potiora corpora quævis, telæ araneæ, [quibus eodem modo adhibitis, Vir supra laudatus celeberrimus verrucas in manibus multis etiam insignibus Viris sive dolore abstulit, post inustionem ablata verrucâ & imposito emplastro, undè intra unum alterumque diem res peracta est] fungi arborum, medulla junci, sambuci, & alia similia.

3. *Inustionem per Moxam factam prodesse magis in doloribus profundis, nec cum ardore & rubore conjunctis.* Observatum est, aliis profuisse eandem eximie, aliis nocuisse, quin periculum gangrænæ intulisse. Distinctione ergò opus omnino fuerit eadem, quæ communis est cum verificatoriis vel cauteriis etiam actualibus. Partim afflicta ipsi dicto modo non addenda est afflictio; tutò verò profuerit id remedii genus magis, ubi humor serofus frigidus consistens, nullo contrâ indicante ad exitum invitandus, vel absumendus est. Quod si verò promiscuè eandem applicueris, exacerbari malum facile potest, & in deterius verti, cùm contrâ ea datâ ichori portâ proficuum esse possit præ alijs, factâ simul discussione, factâ

facta velut partis ipsius quadam per ignem hunc roboratione WEDELIUS, in *Miscellan. Curios.*

De Moxa ulterius.

Ad quæstionem propositam de *Moxa* Rev. D. Buschovii, cujus in libello de ea conscripto meminit, an scilicet ipsa sit Artemisia, utpotè quæ prius præparata eandem cum Moxa in urendo vim exserit, vel an hæc illi falsò substituatur? Scias 1. præparationi hujus herbar, Artemisæ, quæ in lingua Japonica proprio nomine *Moxa* appellatur, multum deberi, cum subinde alius præparationem ejus elegantius præ alijs instituat; 2. herbam Japonicam, *Moxam*, nihil esse aliudquàm Artemisiam; quamvis negare nolim, plures dari herbas, eundem effectum, atque ad urendum commoditatem daturas. Præparatio verò communiter hunc in modum peragitur; Artemisia, & præcipue, quæ præstant, ejus cymæ in umbra bene exsiccantur, ligneo instrumento vel cylindro conquantur & manibus tam diu agitantur, usque dum cortex exterior separetur, ac præter internam lanuginem nihil super sit; quæ dein elegantius, pectinis ope, pro lubitu carminari potest, ut ex Artemisia esse confectam, vix credere queat, qui ipse parantem non viderit, aut saltem ab eo edoctus haud fuerit.

Cum in Itinere meo ad urbem Jedo & Aulam Cæsarem Japonicam plures transcendere montes debuissim, multas ibi plantas Europæas observavi, *Moxam* quoque ubique contexi, ipsis etiam scopulis adnascentem. Cujus in præparationem accuratius inquirens, nullum aliud discrimen offendi, præter quod jam olim indicavi. Lanuginem illam albidiorē & nitidiorē quandoque esse, præparationi debetur, majori studio institutæ; qua ratione etiam sericum, linum, cannabem & lanam non parum differre scimus. Absinthium eidem huic usui, ac Artemisiam, inservire, non vidi; quamvis Ponticum vel Romanum in hunc finem eligere mallet, quod levitate & siccitate præpollens, in montibus arenosis Japonensibus plurimum deprehendi; nullibi verò in itinere illo meo vulgare alterum vidi, aut licet ut obtinerem illud sollicitus fuissim, impetrare potui. CLEYERUS in *Miscellaneis Curios.*

Experimentum circa MOXAM.

Experimento sequenti infortunium meum ansam dedit. Cum enim Ann. 1682. Mente Octobr. præcipiti de scalâ casu ruerem, accidit, ut dorsum meum, & brachium sinistrum, licet exterius nulla vel inflammatione, aut sugillatio, contusione animadverteretur, adeò contunderim, ut quidē dolores inde orti hoc tempore ultra biduum his in locis me non infestarent, annuam sequentis Mensis Martii acerbissimo, & spasmodico punctiois sensu, nihil tale animo præsumens, in dorso superiori, cervicē, occipite, scapulis, & brachiis, ut vel immobilis sedere cogerer, vel motu etiam minimo acutissimos sentire cruciatus, neque declivis in lecto jacere, aut somnum capere possem, quo per dies noctesq; aliquot coactus carui, quin potius, quoties caput in pulvinar reclinarem, quasi pondus appensum esset occipiti videbatur, & caput non nisi manu opitulante attollere poteram. Dolor iste ferè intolerabilis primâ vice per septimanas quatuor durans, singulis annis bis, Vere, & Autumno, in primis circa æquinoctia vel solstitia magnâ cum ferocia, & quoties curru vel motu citiori veherer, mixior quidem, rediit, meq; afflixit muneris mei expeditioni ineptum me reddens, simulq; sensus etiam internos turbans, ut adeo, nihil levaminis percipiens, ex omnibus, artis præscripto adhibitis internis & externis, fomentatione, linimentis, balneis, vesicatoriis, paregoricis, tandem &

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

fonticulo, de aliquo remedio præservativo maxime sollicitus evaderem. Incidit autem commodè Ann. 1687. circa Solstitium hiemale, decumbenti iterum mihi morbo isto contumaci, *Moxa*, quam præter alias Autorum commendationes illustrem mihi reddiderit felicissimus eventus, quo Fœmina quædam non ita pridem ab ejus inustione in pede doloribus nulli alii remedio cedentibus, & incoercibilibus, ad incitas redacta, fuerat mactata. Experimentum & in meo affectu facturus in præsentia duorum Medicorum, Amicorum meorum, d. 19. Decembr. *Moxam* loco primum affecto, vertebra nempe dorsalis, in quam casu alliseram ad scalam, applico, & in ipso urendi actu quasi fulmen curiosissimo sensu percipio quoddam, omnes partes dolore affectas in momento transire, & dolorem extemplo omnem evanescere, ut ligatus ante visus nunc metu liberimo gauderem, surgens. Anno elapso leniter redeunti statim eodem remedio obviatus, tantum per Die gratiam obrinui, ut per biennium nihil ejus quicquam amplius me infestaverit. BÜRGIIUS in *Miscell. Curios.*

MUCAGO, MUCILAGO.

Mucago, seu *Mucilago*, liquor est glutinosus, in gelatinam quasi coactus, ac propterea ad *Gelatinam* forsitan non male referendus, qui è radicibus althææ, Symplicii &c. è seminib. lini, fenigræci, cydoniorum, psyllii, gummi tragacantho, Arabico, ceraiorum, prunorum, item ex ichthyocolla ac ipsis pellibus aquæ incoctis extrahitur. *Mucilaginum* autem usus in emolliendis tumoribus duris, ac acrimoniis humorum obtundendis & demulcendis, item in hæmorrhagiis sistendis &c. pro varietate simplicium unde extrahuntur, adhibetur.

Mucilagine varia ex D. LEMERY.

Mucilago emolliens ordinaria.

℞. Radic. alth. ʒi. sem. lini & fenigræci āā ʒi. Infund. calide per 12 horas in aq. com. ℥. xv. deinde coquant. igne lentò ad medias, & coletur mucilago cum expressione.

Duritates remollit, dolores mitigat, si ea pars affecta calide foveatur.

Mucilago Gummi Tragacanthi.

℞. Gummi tragacanthi alb. ʒi. spirit. ʒi. infund. calide in aq. com. ℥. ʒ. per duas aut tres horas & fiat *Mucago*.

Valet in acrimoniis pectoris, in tenuiori sero per pectus excreando incrassando, ac propterea syrupis admiscetur pectoralib. Non minus item fructuose applicatur fissuris mammarum, labiorum ac manuum. Consistentiam præterea præbet pastis unde trochisci conficiuntur. Pro varietate indicationum hæc mucilago ex variis etiam extrahi potest aquis stillatitiis.

Mucilago ad Hæmorrhagiam sistendam.

℞. Sem. psyll. & cydonior. āā ʒi. infund. calide per XII. horas in aquar. destillat. plantag. & rosar. āā ℥. ʒ. Deinde coquant. igne lentò ad consumptionem tertie partis, coletur & exprimantur.

Sistit hæmoptysim ac alias hæmorrhagias, in quem usum syrupis cydonior. & rosar. rubr. commiscetur, ac cochlearum torbillatur.

Mucilago Ichthyocollæ

℞. Ichthyocollæ minutim incise ʒi. infund. in aq. com. ℥. ʒ. F. *Mucilago* s. a.

Durities emollit ac propterea varia subingreditur emplastra. Varii autem succi pro varietate indicationum, locò aquæ com. possunt adhiberi. Si humiditas nimium consumatur, nec ejus satis super sit pro solvendâ ichthyocolla, poterit addi aquæ calidæ q. s.

Mucilago Pellis Arietinae.

℞. Pellem unam arietinam recentem cum sua lana in partes dissectam, coq. igne moderato in aq. s. q. donec pel-
lis omnino in aq. dissoluta fuerit, coletur decoctum lana-
que fortiter exprimatur.

Remollit ac etiam corroborat & propterea in em-
plastro pro herniis adhibetur.

Pellis anguillarum, ac aliorum etiam animalium
eadem prout ratione in mucilaginem coquitur.

*His adde Mucilaginem Nephriticam
è Pharm. Bateana.*

℞. Gumm. Tragacanthi ℥i ss. Arabici ℥iii. cerafor.
℥ss. aq. rosar. rubr. ℥xxx. aq. plantag. portul. āā. ℥i ss.
Macerent. in frig. horis 48. colaturæ adde sacchar.
cand. alb. ℥iv. M. D. ℥iv. bis in die cum aq. lactis
haustu, præmissò balsam. Peruanî Dr. in pilul. cum
glycirrh. pulvere redactò.

MUGIL.

Mugil à *Mucò* dicitur; Græci nempe *μύζων* dixere,
quasi *Mucosum* seu *Muconem*: siquidem *βίονεται τὴν
μύζων ἀπ' αὐτῆς* mucò suò vescitur, ut explicat Aristote-
les. Ejus quinque sunt species, scil. *Cestrem*, *Cephalus*
cognomento *Labeo*, *Cephalus* cognomento *Peicas*, seu
Transitorianus, *Sargus*, sive *Sargo Myxo*, seu *Men-
co*. Charleton.

E Mugile seu ex ejus ovis salitis *Bostargum* hòc mo-
dò paratur. Folliculos ovarum exemptos sale triò
asperò operiunt per quatuor aut quinque horarum
spatium; deinde inter duos asseres seu tabulas ligneas
opprimunt per diem & noctem, postea lavant, tandem
tredecim aut quatuordecim diebus continuis in sole
exsiccant, noctù sub tectum recipientes. Alii ad fu-
mum suspendunt procul tamen flammâ, ne vehemen-
tem calorem sentiant. Dejectam appetentiam excitat,
sitim proritat, vinique gustum jucundiorē reddit.
Willughbejus à *Rajo* illustratus in *Ichthyologia*.

Ejus ventriculus desiccatus ac pulveratus vomitum
sistit, & ventriculum corroborat. Lapis qui in capite
reperitur aperitivus est & attenuando vesicæ calculo
aptus.

MULLUS.

Mullus à *mollitie* forsitan, est enim carnis teneræ, seu
potius ut aliis placet, à colore mulleorum calceamen-
torum quibus priores Albanorum Reges, postea Pa-
tricii usi sunt dictus: *τεῖγαν* item denominatur quòd
ejus fæmina ter unò annò pariat. Quadruplex est, scil.
Barbatus major, *Barbatus minor*, *Mullus imberbis*, &
Mullus asper. Charleton.

Colicos dolores sedat, fluxum hæmorrhoidalem
provocat, imò, ut quidam volunt contra omnem ve-
risimilitudinem, venereos coercet stimulos. Ejus ova
vehementer purgant.

MULSA, vid. *Hydromel*.

MULTIPEDES, vid. *Millepeda*.

MULUS.

Circa hujus animalis descriptionem vid. quæ ad-
ducimus sub titulò *Equus*. Hic rursus

Officin. nat. ex *Mulò*.

1. Ungula. 2. Urina. 3. Stercus. 4. Cor. 5. Epar, &c.
Vires. 1. Ungula sufficit menses nimium fluentes
sistit. Cinis potus steriles reddit; *illius* alopecie sub-
jeat.

2. Urina cum luto suo pedum clavos curat.

3. Stercus Mensium fluorem sistit & Dysenteria
opitulatur (combustum, tusum, cribratum & potum.)
dolori Lienis subvenit.

4. Cor, Epar, Renes, Uterus, Testes, Spuma oris.
singula hæc sterilitatem inferre dicuntur. *Schro-
derus*.

MUMIA, vid. sub titulò *Homo*.

MUREX.

Piscis est testaceus, cujus sanguis purpureo in-
cit colore, sic dictus quòd ejus testa muris figu-
ram aliquatenus referat.

Facultatis est aperientis & ejus testa pulverat
urinas provocat, diarrhæas sistit & vi suâ alka-
licâ acidos humores reprimat. à Dr. ad Dr. ij. Ad-
hibetur itidem pro mundandis dentibus.

MURIA, de ea vid. sub titulò *Sal item*,
& præcip. *Garum*.

MUS.

Circa *Muris* descriptionem generalem vid. quæ
sub titulò *Lepus* tradidimus. Jam ad

Officin. Nat. è *Mure Domesticò*

2. *Mus ipse*. 2. *Stercus*.

Vires. 1. *Mus* vivus dissectus & impositus extra-
hit aculeos, ipicula, sagittas, &c. curat ita
scorpionum, extrahit venenum. Cinis micæ
involuntariæ s. nocturnæ medetur, (*potus*) alo-
pecie succurrit (*illius*), tussi retractariæ me-
tur, (*cinis*) vide *Forest*.

2. *Stercus* mover alvum infantum (*exhibendum
gr. tria, quatuor, quinque, sex, vel subatum*) mæ-
vit cyteribus & glandibus, alopecie succurrit,
furturæque capitis abstergit (*illius*). Calculi
renum & vesicæ, atterit: Condylomata omni-
generis verrucas, ficus mariticas & mora
tollit cinis cum vinò coctus & applicatus. *Schro-
derus*.

Pellis detracta & imposita Ganglio, opor-
tetur. Stercus murium majorum non solum
mensium obstructione, sed & difficultate par-
commendatur N. 9. *Hofmannus*.

Sanguis muris minoris ex animale per mediu-
dissecto calide strumis aliquoties affricatus, col-
deinde appensò filò eodem sanguine infectò, tu-
diu donec filum hoc per se decidat, strumas
quando curasse narrat *Clariss. Hagendornius in Me-
scellan. Curios*.

MUS ARANEUS.

The Shrew, or Shrew-mouse, or Harp Shrew
Colore (describente *Gesnero*) partim fulco, par-
tim rufus est, inter se mixtis: Venter albus
Pedes posteriores planè in postrema parte corp-
ris hærent. Totus graviter olet, & vel odore ve-
nenum suum prædit. Caudæ brevissimis pilis ob-
sita longitudo digiti duo; reliqui corporis vel
vel insuper dimidius: Ocelli nigri & minui-
sunt, paulò majores quàm talparum, magnitudo
ne capitis minimæ aciculæ, ut non mirum
ferè cæcum esse hunc murem. Dentes ut minui-
sunt, ita situ figuræque ab aliorum tum *Quadr-*
pedum, tum murium dentibus differunt, com-
ponente quodammodo serpentium & murium de-
tes in unum animal naturâ. Anteriores bini ob-
longi, non ut aliis muribus simplices sunt, sed
alijs binis aut ternis denticulis enascentibus ex-
aspe-

asperantur, tantillis ut nisi diligenter inspicias aut non appareant, aut dentes per se videri possint: Hoc etiam differunt à cæteris muribus, quod bini illi oblongi non separati sunt à cæteris interioribus spatio aliquo medio, sed unus omnium continuus ordo est. Asperi planè & acuti sunt serræ instar, quidam binis, alii ternis cuspidibus, tam exiguis ut ferè visum lateant, laterentque magis nisi extremæ partes cuspidum quarundam ruffo colore notarentur. Dentes circiter quini sunt utrinque [in reliquis muribus quaterni tantum] & insuper duo longiores supra, infraque totidem. *Gesner.* Notabilis est in hoc animalculo maxillæ superioris ultra inferiorem producti longitudo. Cæco intestino caret. Murem araneum feles capiunt quidem & occidunt, sed tanquam venenosum non edunt.

In omnibus ferè terris inveniuntur, & apud nos in agris frequentissimi sunt.

A mure minore domestico (*D. Willughby* adnotante) differt. Primo. Quod minor. 2. Quod rostro porrectiore sit Porci instar. 3. Numero digitorum in pedibus, qui huc tam in anterioribus quam in poster. quinque sunt. 4. Oculis minoribus. 5. Auriculis brevioribus. 6. Colore nigriore. 7. Unguibus longioribus albis, sed pedibus brevioribus. 8. Quod dentes incisores à molaribus non distent. *Rajus in Animalium Quadrupedum Synopsi.*

Vires in Affectibus Sedis peculiari commendantur experimento, si nimirum ustus illinatur cum axungia anteriora. Schraderus.

Venosa istius animalis qualitas non tantum in eo vivò reperitur, vidimus enim non semel equos & boves ab ipso commotos, nihil proficientibus medicamentis, paulò seriùs adhibitis occisos fuisse. Sed præterea etiam in animali mortuò aut ejus partibus, siquidem assertum nobis est à fide digno *muris aranei* sanguinem desiccatum ac in pulvere nefariè propinatum, phthisim inducere.

Mus TERRENUUS, vid. *Talpa.*

MUSA ARBOR.

Musa Arabibus dicitur: *Pala*, ut putamus, *Plinio* à voce *Bala*, quâ hodiernum, ut olim, *Malabaribus* annotescit.

Cæterum quamvis ab omnibus Botanicis arboribus accenseatur, vix tamen fructex, nedum arbor, censenda est, cum caule annuò sit.

Oviedo aliisque *Platanus* dicitur; à quò fonte nomen nostrum Anglicum (*the plantain tree*) profuixisse videtur: ni potius à plantagine, ob folia nervosa plantagineis similia ita dicta fuerit.

Nomina. *Musa Arbor* *J. Bauh. Park.* *Musa Serrapionis Gerard.*

Palma humilis longis latisque foliis *C. Bauh. Pa-*
coeira Pison. Marggrav. Bala H. M.

Hujus radicem Horti Malabarici Autores sic describunt; crassa est, duas aut tres spithamas longa ambitu rotundo, pluribus fibris intus lignosis callata, exterius nigricans, carne intus albicante, quæ saporis aquei, subdulcis & subastringentis est, & incisa humorem albicantem non nihil unguosum, subdulcem & valdè astringentem exillat, brevi in subtribum *Perficum* colorem abeuntem. Intervallo ferme pollicari ab ambitu annullo seu circulo tenui & parum lignoso ac etiam molli in orbem pertexta conspicitur, ex quo fibræ radicis filamenta accipiunt, ac plurima filamenta lignosa, tenuissima versus corticem hinc inde deducuntur, rarissima autem ac breviora ver-

sus interiores annuli partes.

Reliquam descriptionem è *Marggravi* historia mutuabimur.

Ex radice propagatur: hoc modo, Primò erumpunt folia duo aut tria, in fistulam convoluta, (ad modum foliorum *Cannæ Indicæ*, quibus similia sunt) paulò post secundò se produnt ad quodlibet latus unum, in medio est fistula foliacea, & sic sensim plantæ trium aut quatuor Mensium spatio in quinque sex, septem pedum altitudinem adolecit, caudice tibiam humanam crasso aut paulò crassiore, spongioso, foliis convolutis similis, & uno ictu facile descindi potest, superius octo, novem, etiam duodecim folia expandit, quodlibet quatuor, quinque interdum & octo pedes longum, quatuordecim aut quindecim digitos latum; in utraque extremitate paulò angustius, nervo secundum longitudinem digitum humanum crasso, qui etiam sex aut septem dig. crassus per sex aut septem digitorum longitudinem se extendens è folio pediculi vice fungitur. Nervus hic in superiori superficie tanquam canal. excavatur, & transversim lineæ subtiles à nervo ad latera extenduntur: suntque folia eleganter viridia, ad tactum levia & solida, instar chartæ membranaceæ, & eodè modo crepitant: ideo non diu integra manent, sed à vento agitata dilacerantur secundum ductum striarum, & strepitum excitant commota.

Ex summitate caudicis hujus spongiosi seu è medio foliorum prodit ramus seu brachium, qui primò cum quasi semipedem longus est, tener & pollicem humanum crassus, in extremitate sua continet corpus turbinatæ figuræ, magnitudine strobili majoris, circa quinque digitos longum, constans è foliis latis ellipticæ figuræ, brunei coloris obscuri, striatis, quibus quasi pulvis cinereus aspersus: hæc complicata invicem constituunt illud corpus turbinatum: singulis autem diebus unum, duo aut tria folia se pandunt, sursum verius se convolvendo. Subter foliis hisce expansis apparent sex, septem aut octo flores, ordine juxta se positi, ex albo flavescentes, quilibet duos circiter digitos longus, scapus autem similis parvæ scaphe, cujus pars quæ insidet exortui suo sit prora, altera extremitas puppis, ex qua prominent quinque foliola angusta, figuram habentia illius instrumenti quo utuntur nautæ in humectandis velis: eminent autem è puppi floris digiti longitudine, ex albo flavescentia, & in ambitu lateritio colore simbrata: in medio porro eorum stamen luteum crassiusculum insidet, figurâ baculi cum nodo in extremitate, quali incedunt *Nigritæ*: Dimidia autem parte scaphæ tegmine subtenditur à prora incipiendo, ut in scaphis nostris lusoriis: sub hoc tegmine intus in scapha manna seu lentus humor continetur, ad tactum frigidus, saporis mellei, consistentia & colore similis albumini ovi recentis: in hoc humore ortum sumunt quinque illa foliola cum stamine: delectantur valdè formicæ illo nectare.

Flores hosce sequuntur fructus, ordine in quibusdæm quasi verticillis, arctè inter se positi, quilibet brevi pediculo nitens, & ostentans primò in umbilico suo florem, qui postea decedit, fructus autem indies augetur. Continentur plerumque in uno ramo 10. 12. 14. aut 16. nu. (imo 18. aut 20.) ita ut una planta proferat 70. aut 80. (imo 100. 150. aut 200.) Fructus autem justam magnitudinem nactus Cucumerem nostratæ æquat, oblongus, & trilaterus quasi, scaphoides, corio crassiore textus, quod facillimè in tres partes se dividit, sicut deorsum caulem versus nutans. Pulpa mollis est instar butyri, medullam quasi cucumeris per mediam longitudinem habens. Boni est saporis, & frequentissimè comeditur vel solus, vel cum farina *Mandiocæ*, vel coctus & fixus in oleo aut butyro.

Ramus autem ille fructibus onustus interea dum ille maturefcunt augetur, & ad duorum pedum aut majorem longitudinem excrefcit, floresq; ſemper extrudit ex corpore illo foliaceo, ſed qui decidunt ſine ſpe fructûs: Nam una planta non facit plus fructuum quàm nutrire & ad augmentum perducere poteſt.

Maturis porro fructib. ramus cum illis abſcinditur, ut & tota planta, nam unum tantum vivit annum, & ſemel tantum facit fructum. Sæpiſſimè autem accidit ut antequam fructus maturi ſint planta cadat ac pereat ni fulcris ſuſtenteſur; ſive autem cadat, ſive præcidatur perindè eſt; nam antequam ſeneſcat plantæ filius unus aut alter ex radice natus eſt, & adſtat parenti, morientique ſuccedit, & ſic in infinitum propagatur. Toto anno habetur fructus venalis.

Ita *Marggravius*, & quidem prolixè ſatis, hanc plantam deſcribit, & tamen *Horti Malab. auctores* in ea deſcribenda multò ſunt prolixiores, quos conſulat cui nondum ſatiſfactum eſt.

Fructus hi in deliciis habentur, nec ad ſatietatem comeſos ullam unquam noxam cuiquam intuliſſe ajunt. *Linſchotanus* eos guſtu farinam & butyrum dolci mixtione repræſentare ait, ideo panis ac lacticinii loco ſerviunt, ſimplici victu, quo corpus hominis abſque alio cibo facilè poſſit ſuſtentari. Varios modos eos præparandi ad eſum vide apud *Garciam*.

De Viribus ſic *Alpinus*, Fructûs ſubſtantia mollis, lenta, pinguis, dulcis, atq; apprimè ſuavis eam comedere aſſueſtis, multum nutrit, ſed ſtomachum gravat, difficulter concoquitur, ſuccum generat craſſum ac lentum quo viſcera obſtruuntur, præſertim hepar. Opitulatur tamen tuſſientibus & ſuſpicioſis ex calore factis. Ejus decocto utiliter utuntur *Ægyptii* ad tuſſim ex calidiorum humorum deſtillatione genitam, atq; ad pleuræ & pulmonum inflammationem, atq; ad inflammatos renes, & ad urinae difficultatem: ajunt & comanducatum vel decoctum Venerem incendere.

Horti Malabarici Auctores hæc habent, *Radix* contrita ac epota in lacte vertiginem ſedat; ejus aqua cum ſaccharo mixta proſicue bibitur pro ardore renum; quin & eadem aquam ſimpliciter epota pro doloribus ex urina ortis confert, daturque proſicue iis quorum corpus argento vivo infectum eſt. Corculum arboris ſeu medulla albicans quæ fructum fert, tritum & cum melle intus ſumptum malis oculorum convenit, ad quod etiam ſervit butyrum, in quo fructus ſeu ſici in fruſta ſecti toſti ſunt, epotum.

Pro diverſitate fructuum varias dari hujus arboris ſpecies ajunt: verùm has varietates non ſufficere putamus ad diverſitatem ſpecierum inferendam, non magis quàm in *Pyris* & *Pomis*, quorum fructus figurâ, magnitudine, colore, ſapore, floreſcendi & matureſcendi tempore immenſum variant, nec tamen ob id ſpecie differre concedimus.

In omnibus *Indiæ Orientalis* ut & *Occidentalis* provinciis inveniuntur, nec non in *Africa*.

Ficum Indicam *Linſchotani* Muſæ varietatem eſſe opinamur, non ſpeciem arboris diſtinctam. Eandem certè eſſe quam *Horti Malabarici Auctores* deſcribunt ex Synonymis colligitur, ut & à locis natalibus. *Malabarenſibus* enim *Palan*, *Bengalenſibus* *Quelli* dictam ſcribit quæ nomina ad *Bala H. M. & Keli* accedunt: inter ſpecies etiam ſeu varietates tum in *Hort. Malab.* tum apud *Linſchotanium* unam inveno *Cadalin* dictam.

Folia hujus quæ ulnam longa, tres ſpithamas lata (*Lapathia* qualici, ſex pedes longa, duos lata *Lerio*) in variam ſupelleſtilem *Indis* in *Goa* cedunt, quibus & *Turcæ* papyri loco utuntur. Surculus ſæpè 100. ſicubus prægnans eſt, uvarum modo in ſe compreſſis: Acini ex quibus dependent ſæpè in tantam molem grandeſcunt, ut à binis bajulis tranſverſâ perticâ vix geſta-

ri poſſint. Toto anno fructifera eſt, & *Indis* com-
meatum quotidianum largitur. R A J U S.

MUSCA.

Muſca infectum bipenne, ſive binis advolans alis, ſic dicitur, vel à Græcò *μῦς*, quod idem ſignificat, inter-
tòs. more antiquò & hinc deducit *Voffius*; vel à *Muſca*.
lò quia detractis muſcæ alis, caput nervoſum, corpus molle & cauda tendinoſa muſculum non malè refe-
runt. Hoc infectum fungis muſcariis dictis, lacte vel melle pertritum, facilè enecatur, ſi eos guſtaverit.
CHARLETON.

Muſcæ, vel potiùs earum capita. Alopetiis ſubveniunt. Ex iis præterea aqua deſtillatur, vel per ſe, vel cum melle, quæ capillorum proventum promovet, & prædicatur ad oculorum affectus. SCHRÖDERUS.

MUSCULUS PISCIS.

Muſculus & *Mytilus* magnitudine & rotunditate tantum differunt: Hic ſcilicet majore eſt, ille minor. Ex *Norvegiâ* magnitudinis ſtupendæ adferuntur mytuli; ſed eorum caro palato minùs grata & delicata. In *Scotiæ* littoribus qui capiuntur, *Margariti* ſcarent, ſed impuris, immaturis, nulluſque pretii.
CHARLETON.

Teſtæ Muſculorum, ut & Concharum omnium vim habent exſiccandi, ſudorem movendi, abſtergendi &c. Hinc uſus earum internus præcipuè eſt in febribus, quibus interveniente ſudore medentur. Externè conveniant in dentiſſiciis, in maricis & condylomatis ani reprimendis, ſi earum calx applicetur.

Adhibentur autem Conchæ, tum pulveriſatæ ſolum modo, tum calcinatæ & pulveriſatæ, vel & ſimul lege communi, cum aquâ cardui bened. & ſimiliter lavigando præparatæ.

E teſtis Concharum vulgariuſ fit famoſum illud Antifebrile Crollianum hòc modò.

℞. Teſtas prædictas, aſſund. acerum quod ſtet per noctem, unde extrahitur mucor, quò abraſo teſtas calcina ad albedinem & pulverem ſerva.

Ciet ſudorem ſat largiter, adeoque inſtante paroxylmò, præcipue tertianò, exhibitus febres ſolvit maximè ſi vice ſecundâ, vel tertîâ iteretur. Doſ. ℞. ad ʒi. Crollius autem exhibit in hauſtu cereviſiæ calidæ cum tantillò butyri.

Caro Concharum, ideſt ſubſtantia edulis, culinaris potiſſimum eſt, & in cibo quæſtanis convenit & citur. SCHRODERUS.

Ex hiſce teſtis magiſterium etiam conficitur cordiale cum aceto diſtill. vel ſpir. vit. æris. HOFMANNUS.

MUSCULUS ANIMAL QUADRUPES, vid. de eo
ſub titulò *Mus*, *Mus Aquaticus*.

MUSCULUS.

Muſcos terreſtres hòc capite comprehenſos vocat quavis & horum plerique arboribus interdum aut adium teſtis innascentur, quoniam in terra matrem partem oriuntur.

Muſcus pyxioides Saxatilis I. B. C. B.

C. B. Tubulis eſt longe minoribus, copioſioribus nec ita candidis qui petris ſaxiſve latiffimis innascentur, eaque obtegunt quemadmodum in via *Telamontium* verſus videre eſt inquit,

Vires. Musci pyxioidis vulgaris pulvis in Zytho-
galo, Cerevisia tenui, aliòve convenienti vehe-
culo per aliquot dies exhibitus tussim convulsi-
vam puerorum, non nullis catarrhus ferus seu feri-
nus dictam, specifica proprietate lenire & sanare di-
citur.

MUSCUS ARBOREUS.

Nomina. Muscus Arboreus : Ulna officinarum
C. B.

Muscus arboreus vulgaris & quercinus *Park.*

Muscus quernus *Ger.* Muscus arboreus villosus
L. B.

L. B. Ex arboribus adultis, imprimis verò senio
confectis, nisi frequentem senserint putatoris fal-
cem, villi dependent incani, lignosi, tenuibus con-
texti filis, gustu adstringente.

Varius est, unus tenuior, crassior alter, quidam
brevior, alius prolixior : omnes candescentes,
pauci rugilantes, quandoque nigri, Reperitur
potissimum in quercu, populo, ulmo, betula,
pomo, pyro, pinu, picea, Abiete, cedro,
larice & aliis quamplurimis : verum primæ nobi-
lilitatis, & odorati sunt cedrinus, lariceus, pi-
neus & abietinus, secundum locum tenet po-
pulneus : candidus præstat, nigricans improbat, rutilans medium locum tenet : vilissimus quernus C.
B. è Dodonæo.

In annosis quercubus & ilicibus Valenæ syl-
væ reperitur non longe Monspelio, unde phar-
mocopœis defertur, est enim pulvis ejus ba-
sis pulveris Cyprii Monspelienfis dicti, &
vulgò ibi dicitur *Corps de Cypre Gris.* Botan.
Monsp.

Apud nos in Anglia rarissimum est hoc mu-
sci genus, nec mihi, quod sciam, unquam
conspicuum; forte in exteris regionibus frequen-
tius, quamvis & ibi rarissime nobis in con-
spicuum se dedit. Semel in Bavaria in Abie-
tum vetustarum Sylva copiosissimum observavi-
mus muscum è ramis dependentem, Musci arbo-
rei villosi Dod. descriptioni egregie respondentem,
qui à nobis collectus & inter chartas repositus
eas colore ex flavo rubente, ac si igne torreretur
inciperent, tinxit : imò sæpius translatus novas
adhuc chartas eodem colore infecit, etiam post
multos annos; quocirca nisi abundet magis cir-
ca Monspelium quam alibi, minime sufficeret pro
base tantæ pulveris Cyprii quantitati, quanta quot-
annis ibidem præparatur & divenditur, quin si
quercubus & ilicibus innascens interserviat pro
corpore famoso illi pulveri odorato Monspelien-
fi, non adeo vilis sit oportet ut vult C. Bau-
hinus, nisi forte ob melioris penuriam eo uti
coacti sint, quod non videtur verisimile, quo-
niam pulvis Cyprius Monspelienfis in hac gene-
re nobilissimus censetur : ego, ut verum fatear,
suspitor.

Monspelienfis pro corpore pulveris sui cy-
prii adhibere seu assumere Muscum arboreum,
ramosum nobis cum I. Bauhino dictum, nec non
promissuè muscum arboreum pellarum & scutel-
larum ejusdem, [eum intellige qui quercubus &
ilicibus innascitur] partim quia hi ubique inve-
niuntur maxima quantitate, partim quia Fer Impe-
ratus utrumque hunc muscum odoramentis admi-
sceri scribit, effectu pari, Imperatus autem, phar-
mocopæus ipse cum fuerit, hujusmodi pulverum
odoratorum Compositionem ingredientia optime

novit, hæc ex conjectura scribimus, non ramen ne-
gamus muscum arboreum in hunc etiam usum as-
sumi, si quando offeratur.

Muscus capillaceus longissimus C. B. non vide-
tur à descripto specie distinctus; vel si differat ex
solo titulo satis innotescit.

Vires. Muscò arboreò pulverisato extrinsecus
Sanguinem è vulneribus effluentem compescere
solere Chirurgos in Germania scribit D. Sachs. *Ephemer.*
Germ. An. 2. pag. 92.

MUSCUS PULMONARIUS.

Nomina. Muscus arboreus pulmonarius C. B.
Muscus pulmonarius sive lichen Arborum *Park.*
Lichen arborum *Ger.* Lichen arboreus sive pulmona-
ria arborea L. B.

Licheni sive hepaticæ fontanæ si nilis, sed ma-
jor per omnia squamato foliorum incubitu, inef-
fabili laciniarum variatione, profundiorum quam
in hepatica, quæ quæ matri suæ hærent albicant,
altera vero parte virent, rugosa, lacunis eminen-
tissimè inæqualia sapore amaricante non sine ad-
strictione.

Annosis rimosisque caudicum quercus, fagi
aliarumque arborum corticibus innascitur, in opa-
cis ac densis sylvis. Dod. observavimus etiam in
saxis coacervatis in umbrosis jacentibus : apud nos
quercui plerumque, raro aliis arboribus adnatum
invenies.

Vires. Siccat & astringit, unde sanguinem pro-
fluentem compescit, vulnera recentia glutinat,
alvum ac menses sistit; utuntur ea vulgo ad pul-
monum affectiones, asthma, tussim, suspiria, no-
strates etiam ad phthisin & tabem, confecto ex
eo pulvere, syrupo, aut aqua destillatâ, non si-
ne successu.

Eum qui quercui innascitur in iætero omnium
medicorum solertiam eludente efficax remedium
expertus est Andreas Golius Mercator. De hoc au-
tem musco accepit manipulum additâ libra ce-
revisiæ secundariæ, quam in olla fideliter occlusa
ad dimidium decoxit, postea trèdecim cochlearia
tepidâ mane atque vesperti imbibit. *Ephemer.*
Germ. ann. 3. obs. 290.

MUSCUS CRANIO HUMANO INNATUS.

Non videtur nobis species musci ab omnibus
aliis distincta, sed musco arboreo crustaceo con-
gener. Celebratur ille à plurimis autoribus in hæ-
morrhagia, præsertim à Chymicis usnæ titulo.
Ingreditur autem compositionem famosi illius un-
guenti Armarii dicti, vide *Ephemer.* German. An. 2.
p. 100. & sequentibus.

MUSCUS CLAVATUS.

Nomina. Muscus Clavatus, sive Lycopodium
Gerard. *Parkins.* terrestris repens, sive clavatus
G. B. terrestris repens à Tragò pictus I. Bauh. Pli-
caria & cingularia *Polonis.*

Longe lateque per terram serpit, subindeque à
transversis ramis demissis fibris longis, lignosis
crassiusculis radicator; ipsi vero rami variè in
multos furculos diducuntur, funiculi instar ha-
bens crassiusculi, foliis amicti occultatque con-
fertissimis, camphorata ferè nisi latiora essent,
adultis plantis succrescunt.

Pediculi aliquot, ex ramis postremis producti,
sc-

selequipalmæres, tenues foliis ferè nudis, singuli in geminam, teretem, sextantalem, mollicellam, imbricatam clavam desinentes, coloris sulphurei, quæ autumnali tempore digiti percussu pulverem subtilem copiosum de se spargere solent.

In Hampstedienfi Ericeto non procul Londino invenitur, estque in montibus Wallicis, Eboracensibus, Derbientibus, aliisque in Septentrionalibus Angliæ frequentissima, hæc planta nec minus in transmarinis, ut patebit herbarios consulenti.

Vires. Vino decoctus & potus calculos comminuit & educit experimento certissimo, ut plerique testantur Trag. Contusus aut in vino decoctus dolorem aut inflammationem sedandi vim obtinet; ideoque podagræ calidæ impositus prodest, pulvis ejus drachmæ pondere sumptus cum vino rubro cohibet fluxum alvi & dysenteriam, & si decocto abluatur os, tremulos dentes confirmat.

Vino pendulo impositus intra paucos dies illud restituit.

Mense Augusto & Septembri collectus pulverem dat subtilissimum flavum, qui vi fulminante gaudet; Persis non ignota, uti notat Olearius itiner. Moscovit. Persic. Lib. 4. cap. 24. Persæ enim ut & Moscovitæ pulverem Augusto colligunt, in fornacibus siccant, & ignibus artificialibus sub nomine *plaven* instar pulv. pyrii adhibent, pulvis recens dum est & probe exsiccatus majus concipit incendium præ illo qui dudum collectus est, prunis injectus non tonat, sed flammæ, puta candelæ accensæ immixtus aut inflatus [pulvis resinæ idem præstat, teste Oleario] huic pulveri si aliquid addatur de thur. mastic. succin. & Benzoe pulv. & per flammam sufflatur, non solum fulgur edit, sed & odorem suavissimum excitat instar pulveris pro suffumigio. Si folia betulæ pulverisata simul misceantur strepitum majorem edet. Commendatur hic pulvis in Epilepsia præcipuè infantum, inque Cardialgia eorundem & torminibus ventris flatulentis. Egregie urinæ faciliat exitum, si quantum cuspide cultelli contineri potest propinetur. Ephem. German. Acad. Natur. Curios. Anno primo observat. 97.

Poloni & maxime Rutheni ac Litvani ob consuetum & jam quotidianum hujus plantæ usum in extirpanda & cavanda plica, morbo sibi familiari, plicariam, & Cingulariam eam nominare solent. Accipiunt autem plantam hanc seu muscum, quem prius cultello aliquo sursum versus dissecare solent, postea infundunt decocto Brancæ ursinæ, prius optime calefacto, & post unam aut alteram lenissimam adhuc ebullitionem adiciunt aliquid fermenti [panis siliginei] illudque reponunt postea ad fermentandum propè fornacem, decoctum hoc vel per se, vel cum ovis recentibus, in forma jusculi quotidie bibunt & comedunt, exterius cum illo decocto prius excalesfacto, & aliquando ad majorem potentiam seu virtutem secunda vice cum recenti musco incocto instat lixivii obscurè rubri coloris, lavant caput his in septimana, nullo amplius adhibito pectine &c.

Unguentum ad plicam. \mathcal{Z} . plicariæ & radicum bryoniæ partes æquales, adipis erinacei quod sufficit, ex his tribus optime commixtis in vase vitreo bene obturato & coctis in B. M. per horam fiat unguentum s. attem, cum quo radices capilli-

ti in capite complicati bis in die inungantur: oleum ex erinaceo quod ad confectionem hujus unguenti requiritur, parare solent in olla novâ foraminata igne circulari per descensum more consueto.

Mulierculæ rusticæ in Ukraina in nimio fluxu menstruorum & doloribus ac stragulationis uterinis cingulum ex illo faciunt circa nudum corpus applicandum: pariter ad hæmorrhagiam narium caput eo cingunt seu corona Ephemer. German. Ann. Secund. observ. 52.

Semen hujus plantæ à gr. xii ad ði. præsentaneo cum successe exhibitum erat in epilepsia cum ischuria complicata ex observatione Wedellii Ephemer. Serman. Ann. 3. p. 21. *Rajus*.

MUSCUS MARINUS, vid. *Corallina*.

MUSCUS SAXATILIS, vid. *Lichen*.

MUSTELA ANIMAL QUADRUPES

& sub eò

MUSTELINUM GENUS, ac *Vermineum*

Hoc genus Mustelinum à Mustela Animal notissimo & ubique ferè obvio dicimus. Ab aliis Quadrupedum rapacium & carnivororum generibus differunt. 1. Parvitate sua. 2. Corporis figura gracili longa, capite parvo sublongo, pedibus brevibus, unde in cuniculos & foramina angusta sese insinuandi, & irrependi facultate præditæ, & ad id veluti naturâ factæ videntur. 3. Intestinorum brevitate & simplicitate; nullum enim in his colon, nullum cæcum, nulla tenuium & crassiorum distinctio evidens. 4. Dentium numero qui in canino genere ad quadraginta ascendunt, in hoc 32. non excedunt.

Mustela vulgaris, *the Weasel or Weefel*. Eboracensibus, *the Fomart or Fitcher*. Græcis, *Γαλέν*. Animal est parvum, Putorio minus, dorso & lateribus rutilis, gutture & ventre albo, Albèdo à summo mento seu angulo inferioris maxillæ per guttur & ventrem ad posteriores usque pedes extenditur. Rostrum Caninum: maxilla superior ultra inferiorem procurrat. Mystacem setæ ornant. Dentes primotes in superiore maxilla manifestè sex, parvi, erecti, sibi mutuo proximi, pectinis dentes referentes; in inferiore maxilla quantum discernere potui, totidem, verum minimi erant & brevissimi. Dentes canini in utraque maxilla prælongi & validi. De molarium numero constat, nec enim cuspides à dentibus distinguere potui; erant autem tres quatuorve in utroque latere. Oculi parvi, nigri. Auriculæ breves sed latæ, subrotundæ, pilis brevibus, densis tamen textæ; & quod præcipuè notabile est, ima parte duplicaturâ quadam velut geminatæ. Interior auris cavitas amplissima cum aliquot protuberantiis. Corpus gracile, spiramixæ plus longitudinis (in carulo quem descripsi) à summo rostro ad extremam caudam. Cauda 2¹ uncias circiter longa paulatim in acumen tenuatur. Crura breviora; Pedes lati, in quinque digitos singuli, tam anteriores quàm posteriores divisi, unguiculis parvis muniti. Quod ad partes internas attinet. Cor pro Animalculi magnitudine amplissimum: Pulmones in plures lobos divisi; Hepar etiam amplissimum, in septimo lobos fissum, cystis fellea ampla in lobo parvo pro-

pè supremam Hepatis partem : Lien etiam longum , grande. In hoc Animali ventriculus multas habuit plicas ab œsophago ad pylorum excurrentes. Glandula mesenterii media per ampla ; Renes maximi.

Gula s. Oesophagus (describente D. Grevv) in Mustelâ ab auriculis ad caudam decem digitos longâ , quinque erat digitorum , diametro $\frac{1}{2}$ dig. æqualiter ubique latus & tenuis. Ventriculus tres uncias longus , diametro ad superius orificium unciali , ad $\frac{1}{4}$ unc. versùs intestinum flexuram habens , tenuis & lævis absque plicis , ut in aliis Rapacibus.

Intestina tenuia plana , perpaucis glandulis , ex iis præcipuè quæ in aliis plerisque carnivoris Animalibus conspicua sunt ; ultimam circiter longa , semunciali diametro ; absque ulla notabili contractione , aut differentia magnitudinis aut substantiæ à ventriculo ad anum usque ; aded ut præter normam aliorum , quæ ego quidem dissecui , Quadrupedum , unum & simplex intestinum esse videatur.

Ad anum folliculorum par intestino adnascitur , utrinque unus , Pili majoris hortensis magnitudinæ ; liquore flavo crassiusculo foetidissimo , odorem Animali proprium & peculiarem gradu intensissimo expirante , repletus. Folliculis hiæc una cum ano superextenditur Sphincter musculus , qui eisdem & anum simul comprimendo ad contemporaneam egestionem compellit. Folliculi hi , quantum hæcenus observaverim , Quadrupedibus omnibus carnivoris communes , & solis proprii sunt D. Grevv. Imo aliis præterea Animalibus conceduntur ut Cuniculo , Lepori , &c. Serpentibus etiam id adnotante D. Tyson.

Viverra Indica Quil & Quirpele dicta Garc ab Hort. Aromatum Histor. Libro primo cap. quadragesimo quarto. Animal omni serpentum generi inimicissimum. Quotiescunque (inquit Garcias) cum Serpente congressurum est hoc Animalculum , istam [Ligni Colubrini] radicem (quæ multa illic [in Insula Ceylon.] nascitur) ea parte quæ extra solum eminet præmorder. Præmorsa radice , pedibus anterioribus salivâ conspersis , caput primum , deinde reliquum corpus sibi demulcet : postea Serpentem aggreditur , nec eum dimittit donec occiderit , &c. Hujusmodi pugnarum spectatores plerique fuerunt Lusitani. Reliqua apud Garciam vide loco citato.

Viverra Indica ex griseo rufescens , Mungo Lusitanis , Mungathia Zeylonensibus. Mus. Leyd. Cat.

Mustela candida s. Animal Ermineum Recentiorum. The Ermine. or Stoat. Mustelæ est figura , toto corpore candidum , extremitatè tantum caudæ nigerrima. Circa oculos fulva est seu grisea , ejusdem coloris macula in medio capite cernitur , item inter humeros & supra caudam. Verum color pro ætate aut anni tempestate variat. Circa fluvios & prata versatur : Mures & talpas vorat. Ungues huic albi , D. Willughby.

Mustela Sylvæstris Viverra dicta , The Ferret , nonnullis Furo seu Furunculus , Græcis Iarls. His nostrates in cuniculorum venatione utuntur , non meatus subterraneos & foramina ingredientibus animantes expellunt. Cum eas in foramina dimittunt , labio consuunt , nè cuniculos

morfu petant , & dilanient. Cuniculos unguibus scalpunt donec eos fugere & exire cogant. Lacte , carne avium , canum , &c. aluntur. Facile cicurantur , cœunt , & foetus educant , qui sponte naturæ cuniculos venantur.

Putorio minus est hoc animalculum , mustelâ paulò majus : capite parvo depresso , reliquorum hujus generis more ; auriculis arrectis magnis patulis , at brevibus ; rostro acuto longo , Porci , instar ut in toto hoc genere : oculis rubicundis.

Figura corporis tenuis longa ; color ex albo buxeus , proha in parte saturatior. Digiti in pedibus tam anterioribus quàm posterioribus quinque. Africa incolæ esse dicitur , indeque ad nos translata. D. Willughby.

Putorium , The Polecat or Fitchet , odore foetido insignis , Mustela vulgari major est & nigrior. Tota oris circumferentia alba ; paulò ultra angulos oris incipit cingulum , quod in principio & medio capitis fulvescit , partibus intermediis albidum est. Pili longiores nigri sunt , breviores flavescunt , sed guttur , pedes , cauda reliquis partibus nigriores sunt Superior maxilla ultra inferiorem prominet. Auriculæ latæ breves , fimbriis albicantes. Digitorum , intimus minimus extremus & ab extremo quartus æquales : ungues ima parte albi , summâ fusci.

Cæterum longitudo totius à summo rostro ad extremam caudam 22 erat digitorum ; caudæ $6\frac{1}{2}$. Pedum anteriorum à secundo articulo $3\frac{1}{4}$. Posteriorum $5\frac{1}{2}$. D. Willughby.

Hujus gula & ventriculus Mustelinis similes ; intestina differunt ; ut in quatuor distingui possint Primum $\frac{1}{2}$ ulnæ longum , semunciam latum , tenue admodum , & planum s. æquale.

Secundum $\frac{1}{2}$ ulnæ longum , $\frac{1}{4}$ digiti latum , præcedente multò crassius , glandulosum glandulis minimis aciculæ parvæ capitelli magnitudinæ : unaquæque tamen orificium habet , unde mucus quidam manifestè exprimi possit.

Tertium sesquipedale , latitudine semunciali. Circa hujus mediam partem glandularum agmen s. area , duas uncias longa , $\frac{1}{4}$ uncia lata ; ad extremam etiam intestino quarto vicinam alia similis area duplo latior habetur : singulæ glandulæ seminis Sinapeos magnitudinæ sunt , suæque orificiæ habent ; non ductum communem ut in Pancreate , quod aliàs magnitudine excepta referunt. De glandulis hisce notandum , quod eo intestini latere sitæ sint , quod vasorum insertioni directè opponitur.

Quartum à præcedente contractio s. angustia quædam separat , longitudine est propemodum quincunciali , propè anum diametro $\frac{1}{4}$ uncia.

Folliculi ad anum ut in reliquis hujus generis liquorum continent supra modum foetidum : unde Anglis in Proverbium cessit , Foetet ut Putorius. Gallinas & ova rapiunt.

Martes aliis Foyna , A Martin or Marilata. Duum generum sunt , Aliæ Abietum dicuntur , Aliæ Fagorum , Gallis Foynes. Hæc magis fuscæ sunt , majorèque cauda & nigriore quàm Martes Abietum ; gutture etiam albo , cum illæ flavo sint ; nec sylvestres tantum sunt , sed circa domos etiam & sâxa versantur. Martis flavæ seu Abietum pellis triplo vel quadruplo pluris variet quàm albæ. Miscetur tamen inter se hæc generâ.

Cæterum Marti magnitudo quæ Felis, sed paulò longior, crura verò habet breviora, itemque breviores ungues. Totum ejus corpus pilis in fulvo subnigris vestitur, excepto gutture, quod candidum est in Marte Fagorum seu domestico, flavum in sylvestri seu Abietum. Dentes peralbi sunt, inæquales & asperi: Canini infra supraque oblongi eminent, inter quos transversa lineâ rectâ sex parvi incisoriorum loco habentur, quorum illi perexigui sunt quos inferior maxilla continet. Molares serrati, & quidam ex iis trianguli sunt, octoni infra, & totidem supra, summa 32.

Gefnerus Martem prorsus cicurem aliquando habuit; canis quo cum nutriebatur amantissimum, quem in itinere etiam faciendo sequi solebat. Soluta vinculo circa ædes & recta vicinorum, & longius quandoque vagabatur, semper reverti solita. morficatim sæpe cum cane & hominibus ludebat, & unguiculis supina, ut Cati solent, nec ladebat aut minimum.

Mustela ZIBELLINA, The Sable.

Agricola paulò minorem Marte facit, obscuro colore fulvam, præter guttur, quod cinereum est. Hujus pells omnium est pretiosissima. Apud clarissimum virum D. Charlton Medii Templi Animal ipsum vidit D. Tancred Robinson M. D. Ei magnitudo Felis Cyprinæ, obscuro colore fulva; anteor pars capitis & auriculæ ex albedo cinereæ, pili ad supercilia, nasum, & os longissimi. Dentes peralbi, inæquales, asperi, canini productiores, molares serrati, sicut in Marte.

GENETTA vel *Ginetta*, est Bestia paulò minor vulpeculâ, colore inter croceum & nigrum, maculis interdum nigris ordine in pelle dispositis, mansueta satis nisi lacessatur. Ardua non ascendit, sed in humilibus locis, & juxta rivos degit, & ibi victum quærit.

Scaliger in Hispania generari hoc Animal Cardano consentit. Constantinopoli per domos cicures vagari sinunt, tanquam catos. Bellon. Genettæ pellem Gefnerus describit & depingit. Caudæ circuli nigri octo, & totidem cani vel albicantes. Bene olet pellis, moschum quodammodo. Quærit an sit genus aliquod Thoïs, vel Pantheris minoris Oppiano.

ICHNEUMON. Omisiss veterum fabulosis de hoc Animalis narrationibus, Descriptionem ejus à Bellonii *avrois* observationum libris mutuam dabimus. Melis est corpore, eodemque pilo. [Corpus quàm feli longius & compactius est.] Rostro nigro & acuminato instar Vivetræ, absque barba; nare prominula; Auriculis brevibus & rotundis. Color leucophæus ad subflavum inclinans, quemadmodum Cercopithecii. [h. e. in superficie; nam pilis, quos iratus surrigit, duos tribuit colores, albicantem seu subflavum & cinereum per intervallo.] Crura ei nigra sunt, digiti quinque in pedibus posterioribus, quorum calcar interius breve est. Cauda longa & crassa ab ea parte qua lumbos attingit. Lingua & dentes Felis. Hoc ei peculiare, unde Scriptores tam mares quàm feminas concipere putaverunt, quod meatum peramplum habeat undique pilis cinctum, extra meatum excrementi, genitali muliebri non dissimilem, quem per magnos æstus aperit, (clauso interim excrementi orificio) ut ejus cavitas appareat. Testiculos felis habet, & à vento admodum formidat. Exiguum est Animal & valdè munda-

Animolus & agilis est, ut cum magno Canine configere non vereatur; si Catum invenerit tribus dentium idibus strangulat. Et quoniam rostrum ei nimis acutum est, ægrè crassiusculum aliquod mordere potest, & nè hominis quidem pugnum clausum. Vaser est in præda occupanda; erigit enim se in pedes posteriores, & observata præda, summa tellure adrepens magno impetu sese in eam vibrat. Vescitur a. indifferenter quibuscvis viventibus, limace, lacerto, chamaeleonte, quovis serpente, rana, muribus & aliis hujusmodi. Aves imprimis appetit, & præcæteris gallinas ac pullos. Magnus est Ægypti Serpentium depopulator. Quamobrem hujus loci vulgus Ichneumonem in privatis domibus, ut & nos Feles educat, muremque Pharaonis appellat. Catellos rustici Alexandriam venales inferunt.

Ova Crocodili Ichneumonem conterere non tam ea comedere Diodorus scribit. RAJUS. in Animal. *Quadrup. Synopsi.*

Haftenus Mustelinum genus ex Clariss. Rajo descriptissimum. Superest jam ut de Mustela in specie sic dicta viribus aliquid addamus.

Mustela cerebrum & hepar in Epilepsiâ conducere creduntur; ventriculus & caro contra morsus serpentum valent, si in pulvere assumantur, aut extus parti demorsa applicentur. Fel oculorum nebulas ac maculas consumit, si aquæ fæniculi immistram sæpius instilletur. Partes genitales retentis urinis medentur, si in pulvere assumantur. Dosis autem omnium hujus animalis partium est à ʒj. ad ʒj. Stercus resolutivum est ac glandulis durioribus remolliendis aptum. Sanguis in doloribus podagricis conferre reputatur, si parti afflictae inungatur.

Vires illius Mustelæ speciei, quæ Gallicè Hermine vocatur, eadem sunt quæ alterius.

MUSTELA PISCIS.

Mustela piscis est de fluviatiliu genere. Mediolanensibus *Botta* dicitur, tum quod utri similis sit, ut Cardanus deduxit; tum etiam quòd capite ranas referat. Charleton.

Officinalia ex *Mustela* fluviatili sunt i. Epur. 2. ventriculus, 3. spina. Hepar in vitro suspensum, caloreque expositum in liquorem liquefit flavum, admodum utilem oculorum hebetudini, ac tuberculis. Ventriculus commendatur summè ad affectus uterinos, præcipuè autem fertur secundæ nas pellere, colicosque dolores abigere, si intus assumatur. Spina pulverisata caducum abigere fertur. Schroderus.

Lapides *Mustelæ piscis* malo epileptico medentur. In spinæ initiò inveniuntur, hi annulò inclusi & gestati, ita ut nudam attingant cutem contra ardorem ventriculi minè opitulantur, & qui crurum vel pedum spasmo vexantur, eos ab insultibus crebrioribus præservant. Hofmannus.

MUSTUM, vid. VINUM & præcipuè *Vitis Vinifera*.

MUTICA.

Spica dicitur quæ arstis caret, quasi *mutila*.

MYAGRUM.

Myagrum nomen accepit quod insidentes vel prætervolantes muscas lentore suo implicet, retineat, nec non capter.

Nos hoc in loco *Myagrum* habemus pro herba tetrapetala filiculosa, capsulis tumidioribus, floribus luteis, seminibus oblongis aut subrotundis.

Nomina. *Myagrum Ger. Sativum C.B. Sylvestre seu Park. item Myag. Sativum ejusdem.*

J. B.

Ex uno caule cubito altiore rami tenues, teretes, recti, subhirsuti, fungosâ medullâ facti, ramosi prodeunt; quibus alternatim latiore basi adnascuntur folia drabæ, oblonga, mollia, non aspera & Rubiæ cui *Myagrum* Dioscorides comparat, pallida, pinnis caulem amplectentia, leviter in ambitu serrata, sapore oleraceo. Ex pediculis satis longis flores pusilli, luteoli, quadrifolii quorum singulis singula succedunt, pericarpia, gigartii uvarum aliquatenus similia, turgidula, oblonga, cum quatuor angulis vel costis, semina continetia, multa, oblonga, triangula, nasturtio minora, coloris fere sænugræci, sapore nasturtii, quæ in ore retenta contrahunt mucilaginem quandam. Radix ubi adolevit lignosa nonnihil & fibrosa inter segetes lini non raro invenitur.

Non est cur Parkinsonus pseudo *Myagrum* Matthioli à sesamo Tragi diversam speciem faceret, cum C. Bauhinus qui in phytop. & Matthiolo à se edito ea separaverat in pinace iterum conjungat, & errorem illum emendet. Vide I. Bauhinum in hac planta, qui fratrem notat, quod ea in phyt. & Matth. distinguerat.

Aliquibus in locis (inquit C. Bauhinus) feritur olei causa, & latioribus foliis est, multis locis sponte proventus, & hoc strigosus: hinc figurarum varietas, ut in Matthiolo nostro videre est. R A I U S.

Vires. E *Myagri* semine per expressionem educitur oleum cutis asperitatibus remolliendis ac mitigandis cum primis dicatum.

MYOSITIS, vid. *Auricula Muris.*

MYRICA, vid. *Tamariscus.*

MYRIOPHYLLON, vid. *Millefolium.*

MYRMÆCIUM, vid. *Formica.*

MYROBOLANI.

Myrobalanus Arabum inventum esse putatur, à quibus ad Græcos recentiores, ut Actuarius, ejus cognitio derivata videtur, ex sententia Arabum, ut ostendit J. Bauhinus, quatuor duntaxat earundem genera sunt: posteri verò chebulas & citrinas differentes fecerunt: quales tamen vix essentialiter differre, (saltem ut in officio hoc nomine habentur) quis existimaverit, qui eas inter se exactè contulerit, hujus sententiæ sunt Monachi in Mesuem, qui chebulas & citrinas verissimè ex una & eadem arbore esse affirmant citrinas immaturas, Chebulas vero maturas; Joubertus Cordus in Diosc. Pena & Lob. in Adv. aliique quibus se opponit Garcias, inquiens, falluntur tam ii qui omnia Myrobal. genera in eadem arbore nasci putant, quam qui flava & Chebula tantum. Nam quinque sunt diversa arborum genera, & quod magis mireris in regionibus 60 aut 100 leucis inter se distantibus nascuntur. De reliquis facile illi assentior. Diversas arbores esse illarum productrices de citrinis & chebulis præterea.

Balanus Myrsefica Græcorum Veterum ab his diversa videtur.

Officinis quinque habentur Myrobolanorum species, quæ hoc disticho comprehenduntur.

Myrobolanorum species sunt quinque bonorum

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

Citrinus, chebulus, bellericus, Emblicus, Indus,

Cæterum Myrobolani dictæ quamvis nomine conveniunt, non sunt tamen omnes ejusdem generis. Emblicæ enim saltem in methodo nostra, ad Myxæ sive Sæbesten genus pertinent.

Myrobolani à reliquis prunis differunt costis aliquot elatis secundum longitudinem ductis & ossiculis majoribus crassioribusque nucleis minoribus.

Vires. Myrobolani omnes refrigerant, siccant & astringunt, ut vel sapor indicat, acidus cum tantilla acrimonia, ut in Sorbis. Propterea usus est ipsarum in affectibus oculorum (inquit C. Hofmannus) qui cum frigidi sint, facile laborant morbis frigidis, in defluvio capillorum, in dentium mobilitate (quos tamen dentigant) in ventriculi hepatis. Omnium adeo viscerum ætiorum, in quibus tantopere & Mesue commendantur, ut dicat corpus floridum & juvenile servare, exhilarare, colorem cutis, odorem oris & sudoris commendare. Sunt etiam e numero purgantium. Purgant autem chebulæ bellericæ & Emblicæ pituitam: citrinæ bilem flavam; Indæ atram.

Myrobolani scorsim & in substantia exhibentur (qui modus exhibendi cum purgare volumus, nunc non est in usu, minimum purgant, sed vehementissime astringunt, & hoc eo magis qui tenuius pulverisantur, ut Mesue, vel longius decoquantur, ut Melichius in dispensatorio, Tostæ (quomodo quidam in dysenteria dant, Ut & rhabarbarum) exiguum purgant, sed validè astringunt, (imo astringunt tantum C. Hofm.) hoc amplius faciunt usæ. In infuso felicius purgant & parcius astringunt quam in decocto. Tamen, ut Garcias scribit, Indi in purgationibus utuntur tantum in decocto, sed in dosi majori quam nos. Conditæ etiam minus purgant, imo astringunt. Condiuntur autem vel recentes si fructuum est facultas, vel siccæ & industria humectantur. Illæ valde activæ sunt, hæ contra languidæ. Chæbulæ etiam præferuntur Emblicis: hæ conditæ; Autorem Mesue, ventriculum firmant appetentiam invitant, coctionem promovent, rationalem animæ partem vegetam reddunt, visum acutunt &c.

Tria sunt quæ in Myrobolanis correctione indigent: 1. vis adstrictoria qua obstructions faciunt, ob quam exhibendi non sunt iis qui obstructionibus obnoxii. Corrigitur hoc incommodum admixtis aperientibus acris & diureticis, ut sunt semina odorata. 2. acrimonia quæ hærent ventriculo ita ut non descendant, sed nimis tardè operentur. 3. quod corrugent substantiam ventriculi & intestinorum: quæ duo incommoda corriguntur per pingua, inungendo sci. Myrobalanos ipsas oleo Amygdalarum dulcium vel butyri dum atteruntur & comminuuntur, vel miscendo cum ipsis passulas aut cassiam fistulam. Hæc è Mesue.

J. B.

C. Hofmannus à Myrobolanorum usu libenter abstinet etiam in iis febribus in quibus obstructionum metus nullus. Dubitat insuper Annon Myrob. etiam conditæ in d. febribus habeant aliquid malefici? neque modicum earum usum securum putat.

Quoniam in substantia minimè purgant, Medici ita non dant, nisi cum aliis, v. g. in elect. elecroph. hamec triphera Persica, &c. idque propterea ut retundant vim aliorum purgantium.

Fallopianus infusi & decocti (utriusque eandem vult esse rationem) summam dosim esse ait ℥iv. ad quam nunquam ascenderit, contentus ℥iii ad ℥iii. R A I U S.

Eligendi sunt Myrobalani carnosiores, cressiores, ponderosiores.

Vires. *Myrobalani citrini seu flavi bili flava educenda apti nati sunt. Indi s. nigri, bili atra, chebuli, pituita ac postea bili, Emblici ac Bellyrici, iidem pituita.*

Dosis à ℥vi. ad ℥iiss.

OO

OFFI.

OFFICIN. NAT. de Myrobalanis.

- [1. Myrobalani conditi.]
2. Pilula de 5 generibus Myrobal.
3. Extractum Myrobalan.

2. Genus Myrob. quodcumque volueris exemptis nucleis, tere partem carnosam subtiliss. Macera dies aliquot cum ∇ , dein exprime & inspissa. Sala.

N. Alii adhibent succum pomorum redolentium, indeque conficiunt Extractum Myrobalanorum pomatum.

[N. Emblicorum Mel officinale est. Vires. Vid. Disp. Aug.] SCHRODERUS.

Myrobalanus Mauritanorum seu Arabum est inventum, à quibus Græci acceperunt. Isti tamen ut Dioscorides & Galenus dicitur τὸ ἀγοβαλάνος vocabulum Nuncem unguentariam intellexerunt, nec in usu habuerunt fructus eos, quos Avicenna & Serapionis interpretes vocat Myrobalanos ut qui rectius ad pruna referuntur.

Quinque ejus genera figura & viribus discrepantia à Schrodero afferuntur. Bellirici & Emblici nascuntur in Javâ, ac præter dictas Myrobalanorum species Jacobus Bontius l. a. in Javâ nasci vidit hæcenus Nostri incognitas, figurâ rotundâ, ac quæ sine striis ac incisuris sint, leves planè ac æquales, cæterum trunco, foliis ac sapore reliquis Myrobalanis similes sunt, in primis Belliricis, nisi quod de purgativâ cæterorum Myrobalanorum virtute non participant, ac magis adstringentem vim obtineant. Unde conditi dysentericæ, cholericæ ac biliosæ febribus ac putredini egregiè resistunt.

Nascuntur in Arboribus magnitudine Prunis similibus, sed ut fructu, ita foliorum diversitate discrepantibus. Flava Sorbi profert folia, nigra seu India foliis est Salicis Bellirica foliis Lauri, sed pallidioribus & subcineritiis. Chebula folia habet persicis similia.

Magnitudine & colore quoad formam externam distinguuntur, in eo autem conveniunt, quod manifestam possideant qualitatem tonum viscerum roborandi & simul alvum solvendi.

N. Citrinam ex Indâ fieri statuit Cordus, relicta Indâ in Arbore, usque dum matureseat, Citrinam oriri. vid. Dominic. Chabreus in histor. stirp. universal. & in Scialograph. p. 13. Hofmannus.

Myrrha.

Myrrha Græcis Σμύγνα & Μύρρα at Μύρρα pro Σμύγνα Æolicum est, à quibus Latini mutuati sunt. Myrrhæ nomen (ut Poëtæ fabulantur) accepit à Myrrhæ Cinaræ regis Cypriorum filia, quæ nefando patris amore capta, cum aliquot noctes auxilio nutritis cum illo concubisset, tandem illato lumine agnita, cum illam pater occidere veller, noctis beneficio elapsa in Arabiam confugit, ubi in arborem sui nominis est conversa. Vide Fab. Ovid. Metamorph. 10. Verius Erymon est à μύρεν unguentum. De Myrrhæ arbore nihil certi traditur, nec à veteribus nec à recentioribus Theophrastus Myrrham quam Thuriferam Arborem & Minorem & humilio-rem esse dicit, fruticosioremque caudice duro contorto-que juxta terram, crassio-remque sura hominis; folium habere thuris, aculeatum tamen & non læve ut illius. Dioscorides Myrrhæ arborem similem spinæ Ægyptiacæ esse dicit. At Diodorus Thuriferam Arborem spinæ Ægyptiacæ similem facit; Myrrham autem Lentisco cui Dioscorides Thuris Arborem comparat. Quod de Bellonio 2. obs. 8. recensent quidam (inquit Casp. Hofman) quod viderit Ramæ in Palæstina manere. Hariolatur tantum (ut Scaliger loquitur) ex vicinia cum Acacia Ægyptiaca, cui comparari audiverat à Dioscoride l. 1. c. 78. interim non contemno spinosam arborem Penæ Adv. f. 428. quod & Acacia spinas habeat in trunco, licet alio modo. At Theveti Arborem, quam Hist. Lugdun. etiam dat, rideo.

Myrrham sic describit J. Bauhinus. Glebæ Myrrhæ a iæ, ugillares ferè, aliæ Ave lanæ magnitudine & mi-

nores, colore fulvo, ruffo, aut ferrugineo, aliæ pellucidæ, aliæ minüs, subinde etiam unguibus eximii albis præditæ sapore amaro, subacri: odore nates ferè acriter, ubi adoletur, nam flammam concipit. Dentibus attritæ friabiliores apparent quàm quod pro bdellio exhibent nec aquæ immersæ dissolvuntur ut gummi, sed diutius in ea relictæ limi instar disflunt & flavescunt, digitis etiam facilius confringuntur, terunturque Quibus notis (inquit) facile distingues ab admixto adulterato gummi & supposititiis glebis.

Myrrham officinarum legitimam non esse suspicatur Fuchsius, quod notæ Myrrhæ apud Dioscoridem illi non conveniant. Quin ipsi bdellii indicia magis respondere videntur. Concludit autem siquidem Myrrha sic eam esse speciem quæ Caucaalis & ergasine Dioscoridi cognominatur.

Brassavolus alique Myrrham officinarum pro bdellio habuerunt: & revera tanta intercedit inter bdellium & Myrrham similitudo, ut facile ab incautis & minus expertis unum pro altero accipi possit. Verum Myrrha facile discernitur, quod impense amara sit, non autem bdellium, præterea pallidior, pinguior, fragilior, odoris acrioris & magis pungentis, minus denique pellucida quam bdellium.

Langius & alii benzoinum dictum omnes Myrrhæ electæ proprietates habere scribit, at ipsius confusione desiderat ut amaritudo, quam Dioscorides in Myrrha requirit. Plerique Myrrham officinarum improbant, & pro genuina & optimæ notæ Myrrha non habendam statuunt, sed vel Ergasinem Dioscoridi dictam, vel Indicam à Plinio vocatam. Verum J. Bauhinus, Parkinsonus alique in simplicibus medicamentis examinandis versati veram Myrrham ad nos adferri statuunt, quamvis sæpius adulteratam cum gummi, & argumentis in contrarium allatis respondent.

Notæ optimæ Myrrhæ Galeno sunt, quod sit mundissima & tactu aspera quidem, & arida, & fragilis & levis, & globulis pusillis, extrinsecus uno colore, intrinsecus deinde subruffa, & veluti venulas habens albicantes, odore suavi, gustu amara & exalfaciens. Adde ex Dioscor. quod sit recens Τρόφαρ. Hæc dubio procul (inquit Casp. Hofm.) illa est quam vocat λυγαρὶν & λυγαρὶν & λυγαρὶν copiosum staten.

Omnibus autem præfertur quæ à loco unde convehitur Troglodytica appellatur, colore pallescens seu subviridis, splendens ac mordax.

Pro secunda nota ut sit friabilis φάβρεγ Casp. Hofman ponit & φάβρεγ non friabilis, cujus rationes apud ipsum vides nobis non satisfaciunt. Nam eadem nota habetur apud Plinium qui Dioscoridi vel coævus erat, vel antiquior, & apud Galenum. Aliarum notarum explicationes vide apud C. Hofmannum prædictum.

De Myrrhæ generibus non attinet dicere, cum nihil certum sit, & omnia mercatorum fraudibus consent, ut nec de Myrrhæ adulteriis. At vero inquireret fortasse Lector quid sit Opocarpasum seu Opocarpasum, à quo maxime cavendum jubet Galenus ne Myrrhæ admixtum sit. Opocarpasum ex sententia Casp. Hofm. est Myrrha Indica Plinii, quæ ibidem quadam è Spina colligitur siquidem hac Plinius fallacissime adulterari Myrrham scribit. Galenus autem Opocarpasum mentiri posse optimam Myrrham ait: at quei possit esse major fallacia. Mera hæc est conjectura, nec nostro judicio valde probabilis, cui tamen refutandæ immorari operæ pretium esse non ducimus. Opocarpasus certe succus erat venenatus, soporem & strangulationem præcipitem inducens. Et Galenus in ætatis suæ decursu se multos vidisse refert mori, quod Myrrham cui Opocarpasum admixtum esse nesciebant, sumissent. Cujusnam autem plantæ arborisne an hærbæ succus esset Opocarpasum dictum nemo veterum nos decet, nec recentiorum quicquam

quam novit. Adjuvantur autem qui hunc hauserunt epora cicuta remediis.

Stacte in genere nihil aliud esse videtur quam myrrha liquida. Duplex autem ejus colligendi modus apud veteres occurrit. Sponte ex arbore non vulnerata exudat, Sudant (inquit Plinius.) arbores myrrhæ sponte priusquam incidantur Stactem dictam, cui nulla præfertur. 2. exprimitur ex myrrha cum modica aqua confusa, ut docet Dioscorides. Hoc modo Cordus ex electa myrrha se stactem expressisse asserit: qua vix aliqua reperitur quæ diutius & latius oleat, odore aromaticum modo jucundo, & Valerandus Doures è myrrhe trita & calefacta eo modo quem præscribit Dioscor. stactem præparabat: quam sane satis jucundi odoris & peramaram experiebatur. J. B. hoc modo & oleum liquidam è resina ejusdem nominis exprimitur.

Stactem Arabes Styracem vel Storacem liquidam appellant, quos secuta officinæ & medicorum vulgus. At vero quicquid sit de Arabum Storace liquida, officinis ita dictam Stactem non esse ostendit Cordus.

Vires. Myrrhæ Dioscorides has vires tribuit, vim habet calefaciendi, soporem inducendi: (non in omnibus inquit Casp. Hofman) sed in Capitibus, aut frigidis naturæ aut alioqui piritæ occupatis, in quibus aromata id faciunt. At cordus Stactem propter gravitatem aliquam sensoris irrepentem facile somnum conciliare scribit) glutinandi, siccandi, adstringendi, (alii myrrham astringere negant, cum menses & partus celeriter ejiciat) mollit etiam uterum conclusum & aperit. Ducit item menses & fetus celeriter cum absinthio, aut lupinorum cremore, aut rutæ succo apposita. Myrrha etiam nunc dierum à multis commendatur in partu difficili, (quod menses interdum sistat, id sit siccando & serum absorbendo) sumitur etiam pro Catapodio magnitudine fabæ ad tussim veterem, & orthopnæam & laterum ac thoracis dolorem alvi que solutionem & dysenterias (hoc efficit non adstrictoria vi, qua caret, sed quatenus siccet & digerit humores acres & rodentes. Casp. Hofman.) solvit quoque rigores ante accessionem cum pipere & aqua magnitudine fabæ pota. Arteriarum etiam asperitatem & vocis raucedinem corrigit, Lingua supposita, & succo inde deglutito. Necat & lumbricos amare nimirum, & ad oris graveolentiam manducatur. Ad Alarum dolores illinitur cum Alumine liquido. si vero cum vino & oleo colluatur gingivas & dentes corroborat: inspersa quoque vulnera in Capite glutinat. Et contusas aures & denudata ossa cum Cochlear carne imposita sanat. Et pure fluentes inflammataque aures cum papaveris succo, Castoreo ac glauco illita. Ad varos autem cum cassia & melle illinitur & impetigines deterit cum aceto. Defluos item capillos cum ladano & vino myrteo oleo illita corroborat. Mitigat quoque diurnas destillationes naribus cum penna illitis. Replet ulcera in oculis ac ea quæ pupillistenebras offundunt & asperitates deterit.

Exsiccatoria & abstertoria vi pleraque hæc præstat, unde & olim insignis ejus usus erat in conservandis cadaveribus est inquit J. Bauhinus, myrrha non ex omni parte beata est. Scimus enim cum Galeno myrrhæ odorem plurimis etiam sanis capitis dolorem inducere. Et Galenus, citante Casp. Hofman. 5. simpl. 19. Myrrham habet inter ea quæ ob copiam humiditatis, si largius sumantur quosdam demerant, quibusdam etiam mortem inferunt.

Recentiores nonnulli myrrham hydropicis conducere scribunt, Marthiolus cum agrimonia potam.

Schroderus extrinsecus prodesse ait in igne sacro gangrena, tumoribus vulneribus inveteratis ac recentibus, præcipue capitis, unde in emplastris sticticis, ut vocant, usus ejus creberrimus esse solet.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

Myrrha Bæotica Dioscor. quam dicit arboris ejusdam in Bæotica nascentis radicem esse, & calefaciendi, emolliendi vim habere, utiliter etiam in suffitus admisceri. Hodie prorsus incognita est.

Ægyptii hodie tempore pestis myrrham masticare dicuntur. RAIUS in Histor. Plantar.

Delectus Myrrhæ.

Laudatur friabilis, levis, undiquaque concolor, minutis glebis, amara, acris, odorata, & quæ confracta, venas unguium modo candidas & leves ostendit. Omnibus autem antefertur, quæ à loco unde convehitur, Troglodytica nuncupatur, colore palecens, subviridis, splendens ac mordax. Inutilis est ponderosa & coloris picci seu nigra, hæc (myrrha) animineas Amati.

N. Stactem nihil aliud esse quam myrrham liquidam, testatur Dioscorides. Ejus autem colligendi diversos comprehendimus modos. 1. Sponte ex arbore non vulnerata exudat. 2. Exprimitur ex myrrha, ut oleum Liquidambar ex Resina ejusdem nominis.

Vires. Myrrha calf. & sicc. 2. (al. 3.) aperit, subastriat, maturat, discutit, putredini resistit. Usus præcip. in uteri obstructione, fetu expellendo, in pulmonum & intestinorum mucilagine, ac inde nata raucedine, tussi & angina, pleuritide, colica, lumbricis: compescit diarrhæam ac dysenteriam, febrium rigorem, præcipue quariana arcet. Extrinsecus prodest in igne sacro, gangrena, in moribus, vulneribus inveteratis ac recentibus, inprimis capitis, unde in Emplastris sticticis, ut vocant, usus ejus creberrimus esse solet. Masticata ac subinde deglutita halitus fetorem emendat, coryzamque curat. &c.

Dosis à ʒss. ad ʒii vel ʒi.

PRÆPARATA ex Myrrhâ.

1. Myrrha Depurata.

Deputatur more solito: Myrrhæ subtiliss. trita affunde expressum succum, decoctum, vel infusum [intentioni tuæ appropriatum,] vel vinum ad eminenti digit. 2. digere in MB, ut mollescat, dein calida exprime & inspissa lentè. Vide, Quercet. Pharm. Rect. cap. 15.

2. Myrrha Extracta.

Extrahitur cum V rectificatiss. a abstrahitur V, inspissaturque extractum ulterius in vitro, vel vitreato vase ad consistentiam olei.

3. Oleum Myrrhæ.

Destilla per Om. ex Arena.

N. 1. Sunt qui Myrrham cum serratura abietina macerant, ac postmodum per Vesicam oleum eliciunt. Verum id aliqua ex parte abietinum est.

N. 2. Alii liquori myrrhæ V affundunt, digerunt, ac per XX. Sant. Med. destill.

N. 3. Alii digerunt Myrrham pulverisat. cum * atque hinc Sant.

N. 4. Neque per se, neque cum silicibus, arenâ, bolo aut farinâ laterum, Ol. profundit, sed solum cum gravem & acidum aq. fetentem. Fiat igitur utroque modo, ut dixi de Mastiche S. Closs.

4. Liquor Myrrhæ.

Impone Myrrham pulveris. albumini ovi cocti adhuc calido, ac repone in cellam ad liquecendum, vel mixtam cum eodem albumine repone supra tabulam vitream ut liquecat, destillet in vitrum suppositum.

O o z

Vires.

Vires. *Abstergit maculas cutis, stigmataque ex lue-
Vererea.*

[Oleum Myrrhæ per deliquium dicitur.]

5. *Trochisci de Myrrha. de quibus*

vid. sub titulo Trochisci. SCHOEDERUS.

Myrrha. Græc. *Σμύrna*. Bola Indis. Est gummi resinum Arboris nascentis in Arabia, Ægyptiacæ spinæ similis, quæ incisa in substratas tegetes destillat, pars vero citrà caudicem concrevit. *Theophrastus 9. histor. Plantar. cap. 4.* Arborem dicit minorem esse & fruticosiorem arbore thuris caudice duro, contorto, cortice lævi, folio aculeato, crispo, spina horridulo.

Myrrha alia π *διόσιμα* & seu *campestris*, quæ expressa destillat & excipitur *Stacte*. Quamvis quidam *stactem* putent esse rorem, qui ante corticem ferro solutum sponte & sine plaga quasi saliva quædam exsudat. Alia *χαβιλία* Inter ejus verò species primas tenet *τρωγλοδιτική*, à loco natali denominata, quæ subviridis, pellucida & mordax. Deinde *tennis*, *Bdellii* modo *lentescens*. Tertiò, *καυκάδης*, nigra & *retorrida*. Quarto *ἐργασίμη*, quæ *aspectu gummi refert*.

Eligenda est friabilis, lævis undiquaque concolor, quæ contracta intrinsecus lineas candidas intercurrentes habet, Uguium speciem præ se ferentes; minutis glebis, amara, odorata, acris, ponderosa & picei coloris inutilis. Non hîc posthabenda utilissima *Galenî observatio lib. 1. de Antidot. c. 11.* ubi ait: Myrrham transmutari in *Opopocarpatum*, suscipiendo non solum ejus figuram, sed venenatam etiam qualitatem. Si igitur in Myrrha animadverterimus multas esse glebas diversas, quoad odorem & saporem differentes à vera, non absque ratione judicabimus eam mutatam in *opocarpatum*. Ita etiam observatum Galbanum mutari in *Sagapenum* & cassiam in *cinamomum*.

Vires. *Calefac. & sic. aperit, subadstring. atten. maturat, discutit, purgationi resistit &c.* Unde hujus præcipuus est usus in uteri obstructionibus, mensium scilicet suppressione, partus difficultate, asthmate, tussi, febribus malignis &c. quæ causa, quod ingreditur *Elixir Proprietatis & Tincturam beZardicam &c.* Externè prodest in erysipelate, vulneribus &c.

Prepar. 1. Myrrha depurata &c. Quamvis vinum Myrrhæ genuinum solvens non sit, sed sp. vini, sufficit tamen hoc loco, quod ita in vino soluta & calidè colata per linteum à sordibus depuretur, & cum reliquis speciebus necessitate exigente intus permisceri possit.

2. *Myrrha Extracta &c.* scil. cum sp. vini extrahitur rectificatissimo, & inspissatum redigitur in extractum beneficio MB. Ex hac destillatur etiam oleum per retortam ex Aren. potest autem ei ante Nationem addi arena, bolus vel calx viva &c. *HOFMANNUS.*

MYRRHIS.

Verisimile est à Myrrhæ odore dictum esse Myrrhida & Myrrhim, inquit Marcellus Virgilius. Nullus tamen, quod invenerit, aperte id testatus est è Græcis aut Latinis J. Bodæus plantam quam Dioscorides *μυρρίν* vocat nomen recepisse ait *διὰ μυρρίαν* & *ἐν δὴ εἰναι*, quod odorata sit quasi unguentum redoleas. Quod si verum esset *μυρρίν* scribi deberet cum simplici *g* Jo. Bod in *Theophr. hist lib. 7. p. 809.*

Nomina. Myrrhis magno semine, longo sulcato, *J. B.* major vel cicutaria odorata, *C. B.* major vulgaris, sive cerefolium majus *Park.* cerefolium magnum sive Myrrhis *ger.*

J. B.

Myrrhis radicem habet insigniter crassam, adnatis plurimis & crassis donatam, albam, sapore dulci, subacri, grato aromatico qualis est seminis anisi sapor. Caulis surrigit aliquot proceros bicubitales & tricubitales, hirsulos fistulosos: folia magna, pinnata, cicuræ foliorum facie, magis albicantia, & albis maculis subinde respersa,

tactu mollia, nervis averfa parte pilosis, sapore anisi pediculis. Flores in umbella gerit candidos, leviter odoratos, quorum singuli foliis quinis constat bifidis seu cordatis, extimo intimis duobus oppositis simul utrisque majore, lateralibus binis, medio modo se habentibus, bifurcato stylo albo cum staminulis albis medium occupante. Particularium umbellarum batin sustinet senum radiorum Stella. Succedit semen notatu dignum, magnam, longum, angulosum, sulcatum, sapore anisi dulci jucundo. Aiunt apud Germanos in pratis alicubi nasci, ut in Hassia circa Casellas referente Gillenio J. B.

Hujus folia filicina quodam modo referunt unde nostratibus filix dulcis appellatur. *RAIUS. in Histor. Plant.*

Valet hac planta in provocandis sceminarum menstruis & accelerandò partu, item in Cachexiis, phthisi, asthmate, epilepsiâ, venenis.

MYRTILLUS seu VACCINIUM.

Vaccinium Latinum ab Hyacintho deducit Salmasius in præfat. ad Synon. Hyles. laticæ, nam pro diminutivo *ὕακινθιον* Æoles scribebant *ὕακινθιον* & *ὕακινθιον*. Literam v. per. s. efferentes ut *φῶσα* & *φῶς* & *φῶσα*, *ὕακινθιον* pro *ὕακινθιον* & similia, & sanè vaccinium Virgilii, Theocriti Hyacinthum esse, & de flore dici luce clarius est: unde ineptè id nomen hujus fruticis fructui attribuitur.

At neque vitis Idææ Theophr. descriptioni Tatis aptè respondet ulla hujus plantæ species, ut ostendit post Dodonæum J. Bodæus à Stapel. Verum cum veteres in describendis plantis non valdè accurati erant, hæc autem planta ad vitem Idæam accedat. Non video cur ad id genus non possit referri, eodemque nomine generico insigniri. Myrtilli autem dicuntur hi fructus ab eorum similitudine cum Myrti baccis.

Vires. Baccæ hæc, Dodonæo tradente, frigidæ sunt & cum manifesta adstrictione resiccant. Ventriculo æstuanti conveniunt, sitim sedant, ardentium februm calorem mitigant, alvum reprimunt, vomitum sistunt, dysenteriam à flava bile ortam curant, adversus cholera morbum profunt. Sed ad hos usus Rob sive succus cum saccharo vel melle inspissatus ipsis baccis longe præferendus, quoniam frigidæ cum sint, crudæ si edantur, ventriculum debilem & frigidum offendunt, alvumq; perturbant potius quam adstringunt *Casp. Hofman.* Myrtillos loco apico natos cum bene maturos nullatenus eò frigiditatis ascendere putat ut alvum frigiditate sua perturbent &c.

Idem Myrtillos nigros rectè & ex ordine myrtis substitui posse putat cum his conditionibus. 1. Si sumantur Septentrionales non Italici & Hispan. 2. Si non exadè maturi 3. Non virides seu recens decepti, sed exsiccati, non succus crudus, qui ob aquositatem multam multum refrigerat, adstringit parum, sed in Rob densatum.

Partes tenues huic succo inesse, eumque etiam vehementer adstringere ostendunt notæ pæne ineluibiles manibus & ori manducantium impressæ. Hinc eo utuntur tinctores ad inficienda linteamina & chartas cæruleo colore.

Pastores & montana plebs baccis hisce libenter vescuntur: nam suavitate sua cum aliqua aciditate conjuncta gustui placent.

Myrtillorum vires & usus in scorbuto apud Norvegos vide apud Sim. Pauli. quadrip. Botan. Clus. 3. p. 406. 407 *RAIUS in Histor. Plant.*

MYRTUS.

Myrtus, Græcis *μυρτίνη* & *μυρτίνη* à *Myrtine* Atheniensi puella, pulchritudine & robore insigni, amica Palladi, quam juvenis ab ea cursu & palæstra superatus interemit, invidiâ ductus, quod elegantia cæterisque naturæ dotibus reliquis virginibus præstaret: arbutula in demortuæ locum successit, semper Minervæ ut olea chara. Sunt qui velint sic vocatam propter myrrhæ quandam amulam odoris gratiam, qua pollent bæcculæ, ut anno-

rant adversaria: quamvis dubium adhuc sit. Utrum Græcis innotuerit prius Myrrha an Myrtus. Nobis sanè (inquit Jo. Bauhinus) longe petita videtur nominis derivatio, & Myrrhæ odorem longe diversum à Myrti baccis agnoscimus.

Myrrhum Veneri sacrum dicatamque Camerarius ideò judicat. Quia multos habet usus in morbis muliebribus: Sane in quibuscunque fluxionibus rite administrata plurimum potest. Jo. B. nos potius iis assentimur qui ob odoris suavitatem Veneri dicatam putant: Veneri enim conciliandæ odores & unguenta plurimum valent: Ut è contra ad appetitus venereos refræmandos & extinguendos nihil efficacius est odoribus tetricis & ingratis.

Myrtus foliis perpetuis, suaveoleatibus: baccis umbilicatis cum pluribus intus seminibus albis incurvis ab aliis arboribus congeneribus distinguitur.

Plures ejus species seu varietates habentur. Clusius annotat se in Hispanica sua peregrinatione, aliisque locis multa genera Myrtorum observasse, nec dubitare quin ex sarione major adhuc varietas oriri possit. Nos pro specie distinctis agnoscimus Myrtum communem Italianam, Myrtum Baticā latifoliam Clus. & Myrtum Tarentinam dictā: reliquæ an distinctæ sint necnè dubitamus.

Vires. Vis tum ipsi Myrto, tum etiam fructui adstrictoria. Galeno valenter desiccant. Tum folia, tum germina, tum fructus, tum succus non parum inter se in astringione dissident. Folia arida viridibus plus desiccant. Restringendi tamen omnia vim habent tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus, unde in cibo dantur sanguinem excreantibus, vesicæque erosione laborantibus virentibus baccis succus expressus stomacho utilis est, & urinam ciet. Prodest cum vino à phalangio demorsis & à scorpione ictis. Fructus quoque decoctum capillos ringit, is ipse cum vino subservefactus & impositus ulcera in extremitatibus corporis nata sanat. Cum tenuissimo verò polente polline impositus oculorum inflammationes lenit, quin & ad ægilopas illinitur. Vinum portò Myrtites, quod expresso & aliquantulum fervefacto fructu fit saliter enim paratū acescit) præsumptum crapulam arceat & ad eadem ad quæ fructus valet. Utile quoque ipsum in deflectionibus vulvarum & sedis proci-dentia, itemque foeminis fluxione vulvæ laborantibus, detergit etiam furfures, ulcera capitis manantia & papularum eruptiones, fluentes quoque capillos continet. Additur & in emplastris lenibus quæ Liparas vocant, veluti etiam quod ex ipsius foliis conficitur oleum. Quin & foliorum decoctum ad infellus convenit: eoque laxati & ægre solidescences articuli, itemque fracta quæ non conferbuere utiliter foventur vitiligines quoque emaculat. Ad aures purulentas & capillos denigrandos infunditur. Sed & eorum succus eadem efficit. Ipsa verò folia trita & ex aqua illita humidis ulceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, cœliacisque profunt, Si

quidem admisto oleo omphacino, aut exiguo rosaceo cum vino valent ad herpetas, Erysipelata, testium inflammationes, epinyctidas & condylomata. Arentia verò folia trita paronychiis & pterygiis, itemque alis semini-busque humentibus, adeoque tetrum virus spirantibus, utiliter insperguntur, & cardiacorum sudores prohibent. Cæterum cremata aut etiam cruda cum cerato, ambustis, pterygiis & paronychiis medentur. Exprimi-tur & foliis succus affuso vino vetere aut aqua Cœlesti, cujus recentis usus est, nam exsiccatum situm contrahit, viresque amittit.

Myrtidanum magis quam Myrtus astringit, tufum vero vino auctero addito coactum in pastillos, sicca-tumque in umbra reponitur. Efficacius porro est tum fructu, tum foliis ceratis, pectis, inflectionibus & cataplas-matis admixtum, ubi constringendum aliquid est. Hæc omnia Dioscorides.

Quæ præterea habent Plinius, Galenus, Serthi, aliique vide apud J. Bauhinum. Hist. Plant. lib. 5. c. 1.

Ufus internus foliorum aut baccarum nunc dierum rarior est, adhiberi tamen possunt in diarrhæa & expui-tione sanguinis.

Syrupi usus est ad catarrhos calidos, tenues præcipue cum pectus occupant.

Oleum duplex est in officinis, alterum fit ex baccis myrti, alterum ex foliis oleo communi infusis; atque ut differentia sit, quod ex baccis fit myrtinum vocatur; quod ex foliis myrtillorum. Ego (inquit Casp. Hofman) non magni facio, & sicubi opus est illo extrinsecus, in fluxibus alvi, ambustis, inter triginibus debilitate generis nervosi, &c. utor potius melino.

Facultates myrti omnes dependent à vi siccandi, adstringendi, & suavitatis odoris. Myrtusque emendat odorem oris. Seren. Aqua è floribus myrti destillata ob odoris suavitatem Myropolis plurimum expetitur.

Plinius apud antiquos, antequam piper reperiretur myrti baccas illius obtinuisse vicem tradit. Quodam etiam generosi obsonii nomine inde tracto, quod etiam nunc Myrtatum vocatur eademque origine Apiorum sa-por commendatur, plurumque ad intinctus additis myrtis.

Varios modos faciendi vinum myrtites, & oleum myrtinum apud Veteres vide apud Plinium, Columellam, Dioscoridem, Catonem, Palladium. Consule etiam de his & eorum viribus si placet, J. Bauhinum loco modo citato. Bellonius refert Illyricos myrti foliis coria perficere, quemadmodum Macedones Rhoe; Ægyptios Acaciæ siliquis: Asiæ minoris incolæ glandium Æsculi calicibus; Gallos quercus libro; Phryges Sylvestris pini corticibus. Clus. hist. lib. 2. c. 12. in myrtis coccum nasci unico animali vivo vesicula incluso præditum observa-vit Bellonius. R. A. Ius Hist. Plant.

MYRTULUS, vide *Musculus Piscis*.

MYXA seu MYXARIA, vid. *Sebasten*, imò etiam *Myrobalanus*.

LIBER XIII.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

N

NACRA, vid. MATER PERLARUM, præcipue sub titulò *Margarita*.

NAPELLUS, vid. sub titulò *Aconitum*.

NAPHTHA.

& sub ea

PETROLÆUM, OLEUM TERRÆ, ASPHALTUM. quia scilicet horumce omnium substantia non multum est diversa.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

ASphaltos est vel vera, vel substitutia, quæ Asphaltos communis Officinarum audit, & proprie *Pissasphaltum* dicitur: compositum, seu factitium quid ex Pice & Bitumine unde nomen accipit.

Ασφάλτος vera, Ασφαλτὸν est *Bitumen*, (sevum, resina) Macrocosmi, picis instar durum, &c. Supernatante primum aquis conspicitur, seu lacubus, hinc ad littora propullsum conerescit, densatur, renacissimumque redditur.

Præfertur reliquis Judaicum Bitumen, quod mortui maris [Ασφαλτίνες propterea dicti.] genitura, German. *Jude-pech*, Bitume ou limon glutineux de Judée. *Fevus pich*, *A fat clay or stime*, of the nature of brim stone, *Jode-pick*, een vette kley brandende gelik Solfer.

Ejus verò probatio est, ut purpuræ modo splendeat, [scilicet in nigrore] sitque ponderosum, & validum, odorem vibret; nigrum autem & sordidum vitiosum est.

N. 1. Quia rarissimum est, nostratibus ejus loco Pissasphaltos in usu est quam vide lib. 4.

N. 2. Oleum illius datur ut Succini.

Naphtha est colamen bituminis Babylonii; consistencia liquidum, ignis rapacissimum.

N. Nec & hæc nostratibus usitata, sed loco ejus Petrolæum usurpare solent.

Petrolæum, Oleum Petræ, Steincle, du Petrole, ou huyle de pierres. *Stone-oil*, a fat liquor flowing from rocks and other stones. *Steen-oly*, Van rots steenen een andere steenen vloeijende. Est liquamen [axungia Macrocosmi.] pingue, liquidum, è pettis & saxis effluens.

Vires. Calfac. & sic tenuium partium est, digerit, & resolvit, cerebro ac nervoso generi confert.

N. 1. Petrolæum in Italia regione Mutinensi stillat candidum & rufum. In Sicilia fontibus innatat. Apud Mejanum pagum in tractu Parmensi album est. Babylonium autem in suo fonte flagrare dicitur, secus Italicum.

N. 2. Rectificatio Petrolæi fit in Capella vacua, ita habebis limpidissimum. & in fundo Vernicem, seu Colophoniam nigram, solidandis vulneribus apissimam, Spiritus autem pernionibus ulceratis confert, nervosque illi cum V roborat.

Oleum terræ oleum est pellucido-rubicundum, odoris fortis petrolæum æmulantis, sed gravioris.

Ante paucos annos nobis innotuit ex India Orient. asportatum, ubi ex monte quodam effluere dicitur.

Vires. Acribitudi vagæ maximo est solamini innun-ctum. SCHRODERUS.

De Oleo Terra Franciscus Hernandez Lib. x. Cap. 2. ita commentatur. Purpureo splendet colore, ac trifolii Asphaltitidis, rutæve gravem quandam spirat odorem & eisdem pollet facultatibus. Septentrionali scaturit Oceano, & liquidum fluens statim in hujus Hispaniæ novæ littora decurrit. In laminas cogitur, bina passuum milliaria quandoque longas, crassas verò duas trêse spithamas Vili ob copiam in his regionibus venditur pretio. Uruntur eo Mulieres Mexicanæ comman-so ac passim non sine voluptate quâdam ore retento ad extergendos & pristino nitore restituendos dentes. Aliàs usum internum non agnoscit.

Bitumen Judaicum dicitur *Juden-Pech*, eò quod in Lacu Judææ nascatur, & ad eò lentum esse fertur, ut avelli nequeat, præterquam filo, quod menstruum mulieris infecerit.

Nostratibus ejus loco Pissasphaltos in usu est; Hoc picem bitumini mistam redolet, & in Apollonio Epyri invenitur, quia fluminis impetu ex montibus devolvitur Cerauniis, & in glebas cogitur, idque nativum est. Aliàs datur & factitium compositum ex pice ac bitumine, unde & nomen accepit; Nonnulli etiam Pissasphaltum mummiam Arabum vocant, de quo Libro V. de Mumiâ.

Naphtha, Petrolæum non essentiâ, sed accidentibus tantum secundum magis & minus differunt: ita ut pars spirituosior sit Naphtha, huic proxima Petrolæum, & oleum terræ, crassior & feculenta Asphaltum.

Præter hæc nobilis etiam Naphtha species ex Sumatrâ affertur, Javæ regno è regione in conspectu sita. Quam Miniac Tannah Indi vocant, quod oleum Terræ significat, & non secus ac nobis cognata Naphtha, seu Petrolæum è terra erumpat, vel ex rupibus in subjecta flumina præcipitur. Hoc oleum à Barbaris in tanto habetur pretio, ut Rex Achinensis, qui potentissimus istius Insulæ tyrannus est, sub capitali poenâ istud evehi inde pro-

hibeat, ita ut incolæ nocte intempestâ, si quæ Batavorum aut Anglorum navis eorum littoribus appellat, ad hoc istud furtim deferant. Hoc oleum partibus paralyticis illitum miraculi instar solvatur, odore est gravi, sed minus fastidioso. *Jacobus Boninus* in not. ad Garc. ab Ori. *Hofmannus*.

NAPUS vid. *Bunias*.

NARCISSE

Narcissus, non à *Narcisso* adolescente, nimium seipsum adamante [ut Poëtæ fabulantur] sed à vi stupefaciendi, quam *vâx* siv Græci vocant, dictus est; seu, ut Plinius, à *Narces*, quam vim *Narcisso* inesse l. 21. c. 19. testatur: hinc Plutarcho in symposio quasi nervos hebetans, & torpidas gravitates efficiens, dicitur. C. B.

Narcissus à reliquis bulbosis tunicatis certissimâ notâ, calyce in medio flore distinguitur, ut plures addere non sit opus.

Narcissi dividuntur in *latifolios* & *angustifolios* seu *juncifolios*, latifolii iterum subdividuntur in *monanthes* seu unicum in uno caule florum gerentes & *polyanthes* seu pluribus in eodem caule floribus donatos. *Monanthes* denique subdividemus in eos qui calice, seu tubo longissimo præditi sunt, in eos qui calice mediæ longitudinis & in eos qui calice brevi donantur. RAIUS in *Hist. Plantar.*

Narcissus, ut in Etymologia à Clariss. *Raio* mox adducta, facultatis est soporiferæ si vel diutius odoretur, vel intus assumatur. Verum radix seu bulbosus extris adhibitus, deterisivus est, anodinus, imò & agglutinans.

Narcissus Sylvestris pallidus, calice luteo, vomitiorius est & nervis inimicus; extrinsecus tamen ambustis prodesse dicitur, ut & vulneribus ac herniis. Vomitorio autem huic *narcisso* ita non est peculiaris quin etiam omnes hujus plantæ species eadem vi polleant, unde Lobelius rusticam plebem *narcissorum* radicibus vomitiones ciere asserit. Folia præterea contusa in Erysipellate conducunt ex D. Hermannò.

NARCOTICA, vid. *Anodyna*.

NARDUS, vid. *Spica*.

NARDUS MONTANA CELTICA, vid. *Valeriana*.

NARDUS SYLVESTRIS, vid. *Asarum*.

NARES VITULI, vid. *Amiyrbinum*.

NASALIA, vid. de iis sub titulò *Errina*.

NASCALIA, vid. sub titulò *Pessus*.

NASTURTIUM

Nasturtium *καρχαμον* Dioscoridi, l. 2. c. 15. Theophr. 7. hist. 1. vel quasi *καρχαμον* quia *καρχαμον* caput dormat. h. e. purgat acrimoniâ suâ. Nam id quod nigrius est capitis vitia purgare ait Plinius l. 20. c. 13. vel est id nomen à *καρχα*, quod cordatos facit. Nam dicunt τὰς ἐσθλὰς *καρχαμον* ὁ *ἐστὶν* τὴν *διάνοιαν* γινέσθαι. hinc proverbium in pigros & desides *καρχαμον* *ἐστὶν*, *nasturtium* comedit. Quo Plinius respexit, cum verbis ante allatis subjungit & inde vigoris significatio proverbio id vocabulum usurpavit, veluti torporem excitantis. *Nasturtium* autem quasi *nastorium* dictum est, quod nasum torqueat, odore & seminis acrimonia sternutamenta provocans. Plin. Varro. Isidor.

Nasturtii notæ characteristice sunt sapor acris, odor acutus & nares feriens, folia plerumque variè incisa.

NASTURTIUM SYLVESTRE

Vires. Spiritus *Nasturtii* [nescio an de hoc intelligat] exhibetur à Danicis Medicis maximo cum successu. Sed hic spiritus fermentatione elicitur circulator, & unitur cum proprio suo sale fixo & oleo. Modus præparationis extat in Tho Bartholini act. med. An. 1671. Obs. 184 hæc nobis suggestit D. Tancredus Robinson.

Castra ego in Germania secutus observavi complures meorum commilitonum hydrope vel dysenteria laborantium pristinae sanitati esse restitutos, quibus suavis Chirurghi Castrensis singulis vicibus seminis 7 blaspeos 36. propinabatur S. Paulli quadrip. Bot. Class. 3. p. 509.

NASTUR.

NASTVRTIVM HORTENSE.

Vires Acris & calida est tum herba, tum præcipue semine: unde atten. aper. abstergi. usus præcip. est in tumido liene, mensibus obstructis fætuque mortuo expellendo: tartaream mucilaginem pulmonum incidit, & scorbutum confert. Vulgo quidem ad expellendos morbillos intervit semen. Extrinsecus usu venit in apophlegmatismis, erithinis, phænigmis: surfures ac scabiem fædum capitis, aliarumque partium sanat tritum aut fixum cumque porci axungia illitum. *Schrod.*

Usurpatur passim ad ciborum condimenta & intin-
ctus. Venit quoque vere & per æstatem cum Lactuca at-
que aliis herbis oleo, aceto & sale, in mensas. Lactucæ
frigidityatem attemperat, ventriculum calore suo refocil-
lat, & concoctionem promouet.

Belgæ nasturtio cum pane & butyro Maio mense fre-
quenter utuntur, facit ad grave illud malum quod scor-
butum appellant: nec minor est hujus quam vel cochlea-
riæ, vel nasturtii aquatici in hoc morbo vis & facultas.

In affectibus Comatosi seu Lethargici nil præstan-
tius est quam nasturtium tam coctum, quam in acetariis
ab experientia P. Foresti observ. med. lib. 10. obs. 39.

Ex Paræo observat Sim. Paulus ad fædam crustosam
puerorum scabiem nihil tam promptum esse & efficax,
quam nasturtium hortense tritum aut fixum cum porci
axungia: nam intra viginti & quatuor horas crustæ ut
decidant perficit, quin etiam si eo quis utatur diutius
persanatur, ut ille experientia cognovit.

NASTVRTIVM AQUATICVM

Radices vicem suppleant capillares fibræ candidæ, quas
intra aquas egeniculis demittit. Causas oblogi, proci-
dui fere, satis crassi, concavi, striati, glabri, ramosi, ex viridi
nonnihil robentes. Folia virida & atro-virentia. Eracæ
faciæ, è duab. tribusve pinnae conjugationibus com-
posita, cum impari in extremo, glabra, sapore nasturtii
hortensis mitiore. Flores in summis caulibus & ramulis
parvi, albi, quadrifolii / apicibus in medio luteis, qui
quoniam sensim aperiuntur, in longas velut spicas pro-
currunt. Succedunt siquæ in pediculis semuncialibus
unciales, fere, à caul. extantes, sursum nonnihil incur-
væ, bene habitæ, duobus seminum exiguum fulvo-
rum ordinibus repletæ.

In aquis vadis circa piscinas & rivulos frequens
Julio & Augusto præcipue mensibus apud nos in Anglia
flore, interdum etiam maturius.

Ufus. In acetariis utuntur, & juscula ad sanguinem
purgandum æno tempore ex eo conficiunt nostrates.

Nasturtium aquaticum specificum contra scorbutum
medicamentum censetur: ad calculum etiam valere cre-
ditur: utrum ciet, menses educit, hydropicos juvat.

Septentrionales, (ut vere Lobelius) in quadragesimo ve-
ris jejuno multum in acetariis vorant ad sanguinem
purgandum ac portionibus ad calculum admiscunt, nec
mal. cedit, jusculis etiam incoquant.

Viribus cum nasturtio hortensi convenit, ut plura
adere non sit opus.

Hoc modo Sennertus spiritum nasturtii aquatici com-
paravit, 2℥ magnam capiam nasturtii aquat. Contunde in
mortario marmoreo: exprime manibus succum, in quo
portio aliqua fermenti solvatur, ut succus consistentiam
sape dilutioris acquirat, ex hoc succo & nasturtio mani-
bus expresso, seu glebis aut pilis nasturtii fiat quasi SSS.
piscantur omnia forriter manibus aut pistillo, reponan-
tur in convenientem locum per octiduum: deinde 1. a.
per B. destilletur spiritus. Dosis c. 1. aut 1. hybernis men-
sibus scorbutum laborantibus ad hunc modum Sp. Cheli-
don. Beccabung. Cochlear. Trif. fibrini elici potest. Sim.
Paullus. Ex notis Cl. Viri D. Edv. Hulsi.

Modus præparandi salem volatilem e nasturtio Aqua-
tico, Cochlearia &c. extrat Ephemer. German. An. 6. & 7.
ex observ. D. Belovv. observ. 21.

NASTVRTIVM INDICVM.

J. B. Peregrinæ elegantia est ex Indiis delatum na-
sturtium, cui cum nostri orbis nasturtio præter odorem

& saporem nihil est commune: folia peltata, circinata fe-
re rotunditatis, sæpe latiora quam longiora, nonnun-
quam & hederæ modo angulosa, superne glabra, infer-
ne brevi lanugine hirsuta; medio fere ut in coryledone,
unde radii in ambitum porriguntur, pediculum excipi-
unt palmarem & sesqui palmarem subrubentem, torti-
lem, & capricolorum ritu, bacillo depacto se se circum-
volventem: quo etiam complexu nituntur cum ramis
caules. Cæterum ex foliorum alis undatim tortiles pedi-
culi rubentesque extorti florem sustinent, delicias artifi-
cii arguti plenas, postica parte productum corniculum,
sextantem circiter longum, ex flavo puniceum, in quin-
que lacinias digitatas concolores, striatas quâ reliquo fo-
lio committuntur faciens, quarum ternæ duo suprema
florum foliola sursum explicata à tergo suffulciunt, co-
lore luteo prædita, miniatis lineolis ad basin striata, per
supremam oram subrotundam mucrone breviusculo
donata; id quod in reliquis tribus est videre, minoribus
licet & rotundioribus ac veluti cordatis radiatim dige-
stis, quorum tamen basis non virgata, sed Rhomboide
maculâ, miniata insignis, utrinque barbitio comans.
Semen tricovum, accedens ad Heliotropion tricoc-
cum, rugosum, mediocri magnitudinis.

Peruvia indigena est hæc herba, unde non modo in
Europam, sed & in alias Indiæ Occidentalis regiones
translata est. Per totam fere æstatem & in multum Au-
tumnus floret, donec tandem frigore, cuius minus pa-
tiens est, corrumpitur. In calidioribus regionibus toto
anno viret, floresque producit, nisi hyems asperior ejus
luxuriam coerceat. Ex surculis depaictis & semine deci-
duo in hortis facile provenit. Semina quamprimum ma-
turuere statim decidunt.

Vires & usus. Adhibentur flores acetariis quæ ex
oleribus parantur, gratiamque ita & saporis & aspectus
addunt. Ventriculo ex frigida causa imbecilli aut ex fla-
tu dolenti subvenit.

Aliam hujus speciem habet C. Bauhinus nasturtii In-
dici minoris titulo, foliis rotundis, lenticulæ paulo ma-
joribus, videtur etiam floris colore variare, vel aureo,
vel luteo dilutior, vel sulphureo.

Singularis & sui generis planta est, nec quicquam cum
nasturtio præter saporem habet commune.

Recordor à quopiam fide digno ex America reduce,
instar horribilis secreti mihi fuisse communicatum ad-
versus contumacem & malignam scabiem itemq; vul-
nera recentia præstans oleum è nasturtio Indico per sim-
plicem infusionem paratum S. Pauli quadr. Bot. Claf. 30,
p. 44. R. A. I. U. S. Hist. Plantar.

NENVPHAR, seu NYMPHÆA.

A Nymphis dicta putatur. *Δενειή ὁ ἑρμῆδος Νυμφαία*
διὰ τὸ ἐν δένει φικεῖν τῶρον, quia aquosa amat loca Plinius
deducit à Nympha. Zelotypa erga Herculem mortua,
quæ in eam transformata fuit; unde inquit Heraclion
vocant aliqui, alii Ropalon à radice clavæ simili; ideoque
eos qui biberint eam duodecim dies coitu genituræque
privari, lib. 25. c. 7.

NYMPHÆA LUTEA.

Nomina Nymphæa lutea *Cer. J. B. major lutea C. B.*
Park. nenuphar luteum Brunf.

J. B. Haud temerè herbam Aquaticam invenias, quæ
majore radice nitatur, quam Nymphæa, quippe quæ hu-
mani cruris crassitudinem nonnumquam assequatur. Ha-
rum quæ lutea est radicem habet foris virentem; intus
albam, fungosam & porosam, sapore subamari prædi-
tam cum quadam adstrictione cui multa appensa, adna-
ta, crassitudine digitali, foris nigricantia, fibrisque multis
capillata, folia aquæ innatant Spithamam aut sesquipal-
mum longa. Latitudine palmari, formâ Solæ equinæ,
propemodum rotunda, paulo oblongiora quam Candi-
dæ, pinguis, lentoque virore splendentia, superiore parte
glabra & lævia, inferiore verò fibris aliquot distincta pe-
diculis digitali crassitudine, cubitos duos aut tres lon-
gis, aut etiam longioribus, teretibus, medullâ fungosâ,
creberrimis rectis caniculis pervia: quibus ad exortum

interdum concurrentib. plurib. pediculis lanugo candidissima, quæ & folia nondum explicata hastæ mucronem æmulantia exteriore parte obvestit, flores pediculis consimilibus insident, Sapore cum dulcedine aliqua strenue adstringente odore Symbrii Cardamines, quinque foliis crassiusculis constantes, colore luteo præditi, exceptis unguibus, qui externa parte virescunt: intra vero septum foliorum quinque duplex est corona prior minutissimorum foliorum, quæ externis appressa rugosa conspicuntur, & similiter lutea, quo etiam colore prædita est interior, sed dilutiore, ex compluribus ligulis retroactis, & apicibus priorem coronam contingentibus, medium occupat pericarpium rudimentum ex luteo viride; quod delapsis coronis foliisque florum, toris jam viridantibus, saturo virore, sed nitente fingitur, papaveracei capitis magnitudine, sed formâ urceum affabrè exprimens, turgido ventre in angustam cervicem desinente, quæ sensim dilatata margines urcei effingit striis extantibus asperatos & orificii loco aliquo ulque pertusos in his semen continetur, splendens, majus quam albæ, triticeo grano minus.

Flos hujus spiritum illum ardentem seu liquorem destilla quem aquam vitæ vulgo vocant, odore refert nobis vilis est.

In fluviis & fossis palustribus majoribus inque aquis stagnantibus majoribus crebro reperitur.

NYMPHÆA ALBA.

Nomina. Nymphæa Alba Gerard. Joh. Bauh. Alba major C. Bauh. Luteæ ante floris productionem simillima est, rotundioribus tamen foliis. Radix crassissima cortice tegitur nigriore intus candida & fungosa, unde plurimæ exeunt fibræ quibus in fundo hæret: Flores autem longissimis aquas trajicientibus pediculis hærentes, candoris emaculati, nonnihil odorati, liliaceis floribus similes multiplici foliorum agmine stipati; verum extima folia exteriore parte ex albô virescunt, ut Ornithogali: medium occupant stamina numerosa. Dodoneo Autore, post florem capitulum prodit rotundum in quo semen nigricans, splendens, miliô majus.

Nymphææ utriusque albæ & luteæ radix, folia, flores, semen in usu sunt adversus fluxus, præcipue vero gonorrhæam & pollutiones nocturnas, seminis acrimoniam sanguinis æstum & tenuitatem; extrinsecus sæpe adhibentur folia & flores ad febriles æstus & vigilias sopiendas (in lotionibus pedum, in impositione foliorum scilicet, lumbis, temporibus plantis pedum) Schrod.

Multi hujus plantæ usu cavent, eo timore nè iis coeundi tum vires, tum desiderium minuantur: compertum enim aiunt usum seminis atque radice homines reddere ad venerem valde frigidos & tardos. Plin lib. 25 c. 7 coiturus genituraque privati scribit qui biberint eam duodecim diebus.

Radix Nymphææ candidæ vino nigro decocta & pota mensium muliebrium abundantiam sistit efficaci remedio, etiam iis qui de omni auxilio desperant. Item de semine intellige Trag.

Henticius Petrus radicem Nymphææ albæ vino coctam & potam commendat in nimio mensium fluxu, & Dolæi lib. 3. c. 4. sect. 18.

Turcas perhibent per noctem flores Nymphææ in aqua macerare, quæ si nares inungant, vel eandem bibant, putant se à multis gravissimis morbis immunestuturos, & se à iis præservari posse. Nos ex floribus albis conservam & syrupum conficimus quæ somnum conciliant, segnius tamen papaver. Sim Paul. quadrip. Botan. Class. 2. p. 94. 95.

Experientia scio in excoriatione palati vel vulvæ & Linguae à materia calida adusta aq. nenupharis cum casura conducere ex observationibus Marcelli Cumani ab Hieronymo Velschio editis Ratus in Hist. Plant.

NEPENTES, vid. Laudanum.

N E P E T A.

Nepetam à Nepa Scorpius deducit Martinius, quia

contra eos & alias venenatas bestias facit.

Mentha Catarrha dicta est recentioribus hæc Planta. Antiquis forte incognita, peramœni spectaculi argumento (inquit J. Bauhinus) vix dum enim conspectum ubi olfactarit catus, amplexatus & dissuaviatus fuerit, lasciviendoque jam illi accedendo, jam recedendo sese utrisque pedibus diu & multum affricuerit, colludendo tamen miris gestulationibus, universam avidè liguerit.

Foliis urticæ incanis ex odore menthæ graviore, floribus in spicas habitiores digestis à congeneribus differt.

Vires. Nepeta calf. & sicc. partium est tenuium; ut præcip. in morbis uterinis (scilicet obstruct.) sterilitate, fructu pellendo, tum quoque in tartaro pulmonum incidendo &c. extrinsecus in balneis pro utero. Schrod. decoctum ejus in suffocatione uterina non minus utile est quam melissæ. Idem in scabie singulare experimentum est si manus ei imponantur. C. Hofman.

Nepetæ odor selem murilegam repræsentat & plerique omnibus ingratus est. C. Hofman. at nobis nepetæ majoris odor non ita ingratus videtur. Hanc herbam ex agris in hortos translata à felium ore & toto immisso ad volutandum corpore conteri & penitus confici sæpius vidimus. Adeo ut etiam locum in quo comminutam plantam triverint ostendat humus eorum corporibus compressa & lævigata; nec in alia quacunque planta ex agris in hortos translata simile quidquam hæcenus observare potuimus. Omnes enim quas transtulimus à felibus intactæ sunt, hac una exceptâ, quæ semper nisi spinis contexta dicto modo corrumpitur. Ut multoties experti sumus, idque diversis in locis. Si vero aliquandiu in horto defendatur donec coalescat & floreat, in posterum intacta manebit, sicut & ea quæ ex semine deciduo ortæ sunt plantæ: adeo ut videantur felles languidam & marcescentem appetere. Vegetam non curare. Ratus.

NEPHRITICA.

Cum non solum toto die expriamur, ex arthritide fieri nephritin, & vice versâ, phur loco variat materia morbifica, & hypochondriacæ quodque idem factum experiri, ratione consentiente merito statuitur, convenire tres hosce morbos: calculum arthritidem ejusque species, & affectum hypochondriacum quoad causam materialem; Generalem verò tanquam materiem esse affectum hypochondriacum, ex quo & fonte proxime scaturiunt. Neque differunt nisi coagulo, seu quod illud ipsum materiale tartareum, minori in reliquis, majori in calculo quantitate adest; in illis fluidum, in his concretum; in illis potentia, in calculo actu, magis coherens.

Tres verò classes Nephriticorum constituimus, neque enim plures indicationes circa hæc loca præcipiæ dantur, neque materia amplius pater. Resolvunt coagulum, seu materiale calculi; mitigant dolorem conjunctum & acrimoniam; pellunt, seu exclusioni calculi vacanti, laxando vias & pellendo serum.

Optima & præcipua ac universalia quasi sunt res solventia. I. Resolvunt, quæcunque materiam tartarem disjiciunt, & coagulum fieri non permittunt, exturbando sabulum & salinum vinculum, quæ ipsa sunt generis lithontripica.

Coagulum ergo hoc respiciunt res solventia, seu in fieri constitutum, & materiale antecedens, qualia sunt amurcam venarum & sanguinis tartaream hypochondriacam defecantia, aperientia, anthypochondriaca & abstergentia, de quibus hæcenus abundè diximus; seu concretionem & separationem in renibus subsiens, salis & terræ, interdum & pituitæ, symbolisatione.

Præstant illud principaliter salina, prout diffusa vel modificata aliter sunt, magis vel minus activa. adeoque etiam resolvunt improprie paulò aquosa, diluendo & abster-

& abstergendo; quæ quod magis vel minus caractere salino sigillata sunt; ita quoque magis vel minus resolvunt, latitante sæpè sale, acumen satis efficaci. Talia sunt aqua alkek. cerefol. petrofel. fragor portulac. onon. urtic. noli me tangere, nephriticæ aquosæ compos. ut lithontr. & autinephrit. *Mys.* succus betulæ & exinde parata cerēvisia, quod quidam fieri curarunt, it. juscula, decocta, infusa varia.

Resolvunt etiam *salina-sulphurea*, tum temperantia, præpollente sulphure magis rosido & aquoso, ut rad. glycyrrh. semen dauci *Helmonio* celebratum, lithospermæ, seu milii solis, violatum, cujus in ischuriâ usum expertissimum deprehendimus, laxatâ simul alvo, (quod in nephriticis pro beneficio est;) it. semen lycopod. seu anthera musc. terrest. clavar. Ex animalibus seu marinis celebre est sperma ceti, cujus usus resolvens & in asthma, casu ab alto, tussi & aliis casibus notissimus, & in calculo quoque eximius, cum ocul. *Sc.* v.g. & sale vol. succin. mixti. Tum magis activa, sulphure volatili resinoso & sale magis fœta, ut terebinthina succinum, baccæ junip. rob & malv. juniper. ol. junip. spir. & ol. tereb. spir. nephriticus compos. Viola-cœo odore urinam tingunt hæc ipsa oleosa, imprimis terebinthinata. quatenus intimè in sero resolutam resinositatem suam sulphuream balsamicam in sero, & consequenter urinâ expandunt & explicant.

De virgâ aurea non dubitamus insignissimum ac elegantissimum locum ex *Barclaji p. 1. p. 51. seq.* totum laudare transcriptum. Sponder enim calculoso triduanam curationem. Cui cum adnuisset æger, in proximo monte, vora faciens Esculapio, virgam auream offendit, herbam scilicet quæ calculo bellum indixit multò felicius, quàm aut veratrum amentis, aut vulneribus ascyron. Hæc laciniatis foliis piloque ita brevi, ut penè in obtusam speciem oras secantibus; mediocriter assurgit. Radix caulisque lignea subtiliorem succum in herbam transferunt. Planta ad ingenium terræ nunc cubitalis, plerumque eminentior, insigne fastigium floribus ad examen turgentibus cingit, & virgæ aureæ est nomen, sive quoniam aureæ ac penè divinæ virtutis est, sive quod præstantis metalli colorem exigui floris venustas æmuletur. Cæterum contusum in renibus calculum in innoxium pulverem solvit. Non in latere, non in vesica dolor; adeò ut tam facili remedio pudeat calculum simuisse. Etenim in hyemem siccatur æstivis umbris planta, & ubi gravitas lateris coeuntem morbum prælagit, aureus pulvis ad drachmam mero delibutus sumitur, sive ovo levissimè cocto permixtus. Recenset verò observationem, quod ubi recentem plantam adhibere coactus fuisset autor, primo die nil visum sit ad morbum fecisse medicamentum: sed biduo deinde repetitum supra fidem est, quàm egregiè refellerit acerbissimum morbum: sordidus pulvis abundè vesicam exoneravit, cœnosumque saccharum penè sanguinis imagine pinxit.

Pulveris ejusdem virgæ aureæ mirabilem successum, à se primò divulgatum, felici successu nobilem matronam comprobasse in innumeris nephriticis scribit *Car. Piso l. de serof. colluv. p. 388.* item probarum dicit *Solander consil. p. 66.* Decocto verò herbæ theæ utentes Sinenfes calculum nesciunt, quod absterisivâ subamaricante vi egregiè exitum facili ter generato ex necessitate materiæ calculo.

Potèrò omnia ossæ & lapidosa, è vegetabili & minerali regno, sunt lithontripica. Sic baccæ alkek. acac. arilli cynosbati, ossa dactylorum, nuclei ceraforum, mespilorum, persicorum, lap. *Sc.* percarum carpcionum, ludus humanus, lap. judaicus, lyncis, nephriticus, pisolithus huc faciunt. Item lignum nephriticum, aquas inficiens, millepedes præparati, ob sal nitrosum volatile, quo polent, ex compositis troch. de alkek pulv. lithontripicus A. ex acidis crem. & cryst. *Q* ri, -us *⊕* lis simpl. & coagul. clyst. *⊕* i uterque, Tinctura aperit. ex *⊕* lis *⊕* lat. *Mys.* arcan. duplic. ejusdem, ex alcalinis sal succini vol. liquor & magist. ocul. *Sc.* Tinctura *Q* ri simpl. & compos. it. liqu. nephrit. animal & mineral. *Mich.*

Resolvunt ergò *salina* omnia, seu *Acida* seu *Alcalia*, seu *media*, singula diverso respectu & suo agendi

modulo; salia verò volatilia, si sal succini sulphureum & unctuosum simul exceperis, in hoc censu fixis minus sunt efficacia, facilius quippe dissipabilia, nec operationem suam illuc differentia.

Resolvunt etiam *salina-sulphurea*, tum temperantia, præpollente sulphure magis rosido & aquoso, ut rad. glycyrrh. semen dauci *Helmonio* celebratum, lithospermæ, seu milii solis, violatum, cujus in ischuriâ usum expertissimum deprehendimus, laxatâ simul alvo, (quod in nephriticis pro beneficio est;) it. semen lycopod. seu anthera musc. terrest. clavar. Ex animalibus seu marinis celebre est sperma ceti, cujus usus resolvens & in asthma, casu ab alto, tussi & aliis casibus notissimus, & in calculo quoque eximius, cum ocul. *Sc.* v.g. & sale vol. succin. mixti. Tum magis activa, sulphure volatili resinoso & sale magis fœta, ut terebinthina succinum, baccæ junip. rob & malv. juniper. ol. junip. spir. & ol. tereb. spir. nephriticus compos. Viola-cœo odore urinam tingunt hæc ipsa oleosa, imprimis terebinthinata. quatenus intimè in sero resolutam resinositatem suam sulphuream balsamicam in sero, & consequenter urinâ expandunt & explicant.

Resolvunt mixta, quæ utroque principio fœta & mixta inter se sunt ex diversis particulis, duplici sine satisfactientia Sic pulvis commodus resolvens est ex *Q* ro *⊕* lato, lap. *Sc.* cryst. *Q* ri & sem. lycopodii, aliq. similes. Singula hæc salis tartarei eminentiam, seu salis & terræ simbolisationem enervant, arenulas & sabulum cum urinâ educunt, archeum tenum confortant, coagulum & fermentum calculi disjiciunt cumque atterunt, pituitosum verò mucum attenuant & liquant.

I I. *Mitigant* dolorem & acrimoniam, vellicationem & tensionem spasmodicam plexus nervosi & membranosi attendentia. Hæc ipsa ut maximè sunt necessaria, ita id præstant in genere, quæcunque spicula acuta, triangularia, salina edomant, & ad frugem reducant, seu pondere & mole conjuncta sint renibus onerosa & molesta, seu solâ rosione.

Mitigant (1.) *aqua pulposa & gummosa*, quæ invisitant quasi & obtundunt salium vim illam, ut rad. alth. pulpa cassiæ &c.

Mitigant (2.) *aquea oleosa*, ut emulsionem, lac & semina in emulsionem liquata; quæ & stranguriam respiciunt, & cantharidum sunt antidotus. Exemplum tale annotavit *Langius l. 1. ep. 47.* & nos consimile quoque observavimus, Refrigerando hæc & temperando simul stimulum seminalem *ὀργασμωδῶς* temperant.

Mitigant (3.) *traumatica, nervina, balsamica*, & pro re natâ leniter adstringentia. Inter traumatica plantago, ejusque essentia, extractum, sirupus, laxitatem tenum, imprimis diabeticam, egregiè corrigunt; essentia item traumatica, pulvis stypticus. Sic & cianabarina in paroxismo cum oc. *Sc.* seu solventibus & anodynis sunt laudatissima.

Mitigant (4.) acrimoniam simplicem, seu cum fervore & *ὀργασμω* saltem, non item cum rosione conjunctam, *acida* quorum instar omnium, præter dicta alia, est hepaticum rubrum.

Mitigant (5.) *anodyna*, unicum naturæ laborantis & afflicte solatium. Hæc quippe non remoram injiciunt viis, vel obstruunt, sed urgentes dolores sopiunt, unaque roborant naturam, ut non tendatur membranosum genus nimis, & induciis concessis fortius insurgat, quin ita juverit, ut tolerare possit, aut vincere. Ut enim pellentibus summa noxa infertur nephriticis; ita à sedantibus summa virtus expectanda.

Profunt illa tum aliis in casibus, tum in calculo paroxysmante, & mictione cruentâ potissimum. Opiata verò magis in renibus primariò affectis & lancinatis, non item in seminis æque vitiis.

I I I. *Laxant* vias & educunt partim *agnosa*, ut præter alia laudata, thermæ, acidulæ, & potus ipse; nisi enim

enim hic suppetat, non æquè & commodè educationi aptatur calculus, nec viæ per quas, renum tubuli, ureteres, & ductus urinarii è vesicâ, æquè expeditantur quæ in actu præservationis & curationis officium faciunt.

Inter hæc laxando mitigantia & mitigando laxantia sunt optima, breviter, oleosa liquida vel quasi talia, internè & externè optima, v.g. ol. amygd. dulc. tum solum, tum cum vino malvarico haustum. Hæc ipsa sanè in ischuriâ & præclusionè exitûs à sabulo vel calculo majori insigniter prosunt. Adeoque & in paroxysmo nephritico cum reliquis, imprimis resolventibus, quæ anima quasi sunt lithonripticorum, maritata, plurimam opem præstant; præcipuè illa, quæ utrumque præstant, & emolliunt scilicet & resolvunt, at sperma ceti, aliaque, & dolores ipsos leniunt.

Exteriùs huc faciunt *clysteres* ex emollientibus & nephriticis; *balnea* ex iisdem, *linimenta* ex ol. scorpion. & Matth. junip. succin. chamæm. anis. &c. parajitem *unguenta* ex unguent. dialth. c. oleis destillatis remixto, & *Cataplasmata*, quibus omnibus curatio calculi absolviatur reverà, unà cum symptomatibus ipsum comitantibus.

Circa hæc verò, non minus ac in aliis, cautela quædam habent locum: 1. *Quæcumque remibus, eadem & vesicæ conveniunt.* Officium enim habent mutuum & sororians, mireque sibi consentiunt & connectuntur. Unde non alia sunt medicamenta pro vesicæ calculo, quam pro renali; non differunt nisi loco, qui solus tamen attendendus probè est, cum & ischuria alia vel ea plenâ, alia vacuâ fiat. Neque obstat, in vesicâ quoque calculum augmentum capere & concretescere posse, uti ad aliquot uncias sæpè excisus fuit, qui à renibus nunquam potuisset salvâ vitâ detrudi; à renibus tamen materiale calculi suppeditatur, quod ab archæo vesicæ læso, quatenus ibi sit segregatio major, quam fieri non debebat, in coagulum ibi faciscit, non quod spiritus lapidificus sit in renibus, sit in vesicâ, sed in ipsâ matetiâ coagulabili, salino tartareâ. Conveniunt utraque generali illo magmatis tartarei obice, differunt specialibus ut morbis, ita & remediis, habito tamen semper ad se invicem respectu, id quod etiam de mictu cruento, diabete & aliis valet.

2. *Qualibet remedia nephritica debentur suo indicanti speciali.* Felix, qui hæc tum in his, tum aliis quoque novavit. Noverit enim reverà specifica morborum omnium remedia. Hinc ipsa dicta nephritica inter se non sunt confundenda. Singula nempe sunt nephritica, sed non omnibus æquè nephriticis proficua; non sunt ergò temerè confundenda inter se, ne doloribus pellentia pellentibus anodyna substituamus. Distinguenda sunt tempora, distinguendi sunt affectus, distinguenda etiam remedia. Cumque imprimis pellentia noxia esse possint & soleant, pellentia urina, pellentia cum urina, calculum, de iis seorsim dicemus. Duplicia hæc sunt diuretica, calida & frigida, quæ utraque nocere possunt, partim licet per accidens, quatenus compactionem calculosæ materiæ juvant, factâ in decenti separatione eorundem usu. Adeoque calculum in fieri compingunt magis, ablata v.g. portione aqueâ, relicta tartareâ; partim quatenus præsentem calculum, cumque quietum, in tempestivè ad pelvim è loculis & tubulis suis præcipitant, unde ischuria promptè consequitur. Inter calida sunt olea destillata nephritica, succin. junip. tereb. & cum his præparata, bals. & is v.g. largiori etiam quantitate hausta. Vidimus inde non raro ischuriam, vel dolores saltem auctos, quandoque & mictum cruentum exortum. Inter frigida succus betulæ, & acidulæ imprimis hac vice memoranda; à quorum primo diabetem vidimus factam, ab altero ischuriam lethalem in B. Wigando cum in paroxysmo nephritico, medico inconsulto, bibisset acidulas, unde ab ipso illo momento urina substitit, ad mortem usque per xi. dies.

3. *Videndum in singulis, quid magis urgeat, quid con-*

tra indicet. Hinc licet resolutiva *ναλ' ερως* sint nephritica, expellant obstructions & coagulum tartareum ac pituitosum, ut urinæ secretioni & collectioni liber detur transitus, adeoque calculosi, infarctui renum & ureterum, educationi arenularum, ischuriæ unicè conveniant, archæumque renum debilem sollicitent; attamen dantur calus, ubi stant post principia & nociva potius quam proficua sunt. Quando nempe vel erosio adest, ubi non nisi temperatiora ex his simul prosunt, ut o. S. ubi asperitas viarum lenienda est in scabie, calculo, exulcerationibus, ardore à cantharidibus doloribusque inde productis, quod & de *νεσμοις* valet omnino, sed & mitigantia nervina, roborantia, pægorica, anodyna, prosunt, roborando, consolidando & mitigando debita. Vel excretoria actio nimis citatur, ut freno egeat, in diætiis partim, partim verò & præcipuè in diabete, mictu cruento, viarum laxitate, & suo modo quoque in pollutionibus & gonorrhœâ, incontinentiâ urinæ. Proficua tunc potius sunt temperantia, mucilaginosa, terrea, glutinosa, traumatica, leniter adstringentia, remorantia & refrigerantia, intus & extus adhibenda, quæ sopiendi & demulcendi usu naturæ succurrunt.

4. *Nephritica, si quæ alius, vehiculo egent humido.* Et eo quidem tum alimentario, tum medicamentofo. Cum enim perpetuum ibi fiat stillicidium, illud nullo modo interrompendum, sed juvandum potius potu & humectantibus. Hinc calculosi, cum non possit nisi mediante urinâ provolvî sabulum & calculus à potu manifestè juvantur. Neque verò onerandi etiam renes nimis sunt, quod in ebriosis fit, unde & vesica plus justo extenditur sæpè, & renes debilitantur in excretionè.

5. *Topica internorum vim juvant, illi loco applicanda ubi penetrare, vel juvare magis per accessum possunt.* Juvant vim internorum, seu laxandum, seu mitigandum, seu resolvendum fuerit, quæ tria præcipua diximus circa lithonriptica. Quin in genere topicorum magna vis est in toto corpore, quod vis eorum à calore advenit, per poros communicetur, & morbo ejusque causis sit contraria. Sic, præter balnea & clysteres emollientes, pægoricâ vi conspicua, unguenta lumbis applicata laxant & mitigant, non obstat te vallo ossium, accedente calore sacculorum externorum cumprimis. Variant verò & pro diversitate locorum.

6. *Renibus pro re natâ & calefacientia & refrigerantia topica conveniunt, horum verò selectus notandus.* Calefacientia ex oleo tereb. destillat. & aliis etiam in ipso mictu cruento vi balsamica suâ prosunt; item in calculo, ischuriâ, abundè jam exposita. Refrigerantia verò imprimis in diabete, de quo legi meretur *Cardanus lib. de Curat. admr. cur. 27.* ubi scribit, ex urinæ profluvio felicissimè & sæpè unâ die se sanasse, abstinendo à purgantibus medicamentis, abstinendo à pinguibus, dando uras passas, lentas, calidas utens; renibus verò adstringentia imponendo. Merito init etiam se invenisse remedium ad diabetem specificum, quod inter secreta retulerit. Addimus verò, unguentis ad gonorrhœam & pollutionem nocturnam fidendum minus esse, quod vi unguinosâ laxent, terrea non penetrent. *W E D E L I U S.*

Sequuntur

ANTINEPHRITICA

Specifica è Fasciculo Medicamentorum singulari Clariss. CNOEFFELII.

Specificum Antinephriticum, seu

Medicamentum Crystallinum

S. Reg. Maj. ULADISLAV IV. &c. usibus dicatum à Cl. & Excell. Dn. D. Andrea Cnoëffelio.

℞. Magister. cryst. all. montan. lithonriptici ana ʒi. ʒii. Olati crystallizati ʒss. spir. Oli. coagulati & fixi, scandal. rub. pulv. ana ʒi.

Misc.

Misc. probè subigendo in mortario vitreo in alcool. Sign. *Medicamentum crystallinum pro S. R. Maj. U. lad. IV.* Summum & arcanum in frangendo, atterendo, radicitusque pellendo calculo, cujuscunque speciei, & loco, ideo in arthritide aliisque morbis & reis sumitur, omnem enim impuritatem limosam, per utinam expellit, & gonorrhœam curat. Dos. à ℥i. ad ℥i℥. & ℥i℥. in brodio, vino, vel alio aliquore destillato, bis, ter quater in septimana.

Magisterium Crystallorum montan.

℥. *Crystallorum pellucidarum* ℥i. spir. Oli non dephlegmat. ℥i℥. Crystallus igniatur, extinguiturque in spir. Oli, qui labor decies repetendus est, tandem super porphyritem redigatur in subtilissimum alcool. Sign. ut supra. Vires hujus magisterii sunt ad calculum totius corporis atterendum. Prodest & podagricis, & aliis quamplurimis morbis. *Petrus dissert. 40. Nosologia sua.* Crystallus est medicina calculi, qua non præstantior alia. Et *Paracelsus in annot. ad cap. tract. 3. lib. 1. de art.* In lapillo duro (scilicet resolvendo) non est præstantior medicina crystallo, felix ille qui possit præparare.

Spiritus Oli, post præparationem crystallorum relictus, filtretur per chartam & reserveur interim; signeturque spiritus Oli crystallifatus. Vires censetur habere diureticos. Dos. gr. vii. ad x in jussulo carnis, decocto petroselinii, aquis destillatis specificis, vel alio vehiculo idoneo.

Tartarus vitriolatus crystallifatus.

℥. *Spir. Oli crystallifati*, part. i. *salis Oli liquidii* part. ii. Affunde guttatim spir. Oli, super liquorem salis prius tamdiu, donec strepitus cesset, idque in vitro capaci; sic fiet coagulum, sedatâ ebullitione, & evaporatâ humiditate, & quidem lento calore ad siccitatem, residuum ervetur pro specifico antinephritico, vel per se ad alios usus.

Est insigne digestivum quod in omnibus obstructionibus viscerum exhibetur. Dos. à ℥ss. ad ℥i. in conveniente liquore.

Magisterium lithonripticon.

℥. *Spir. Ois opt. rectificati* ℥i. Solvantur in illo lap. *Judæic. lyncis spongia, aquila ana ℥ss. oculor. cancri ℥vi.* Infundantur lapides (prius contriti & pulverificati) spiritu Ois, stent per aliquod tempus in digestionem, donec plane sint soluti. Solutiones claræ & flavescerent decantentur, & filtrentur, & cum spiritu Oli crystallifato, guttatim instillato præcipitentur in butyrum dulce. Pulvis præcipitatus exsicceatur asservetur in vitro puro.

Not. Præcipitatus pulvis & cum spiritu ardente baccharum juniperi circulari potest, quo iterum abstracto remanebit in fundo vitri coagulum, instar butyri, est medicina dissolubilis in omni liquore.

Vires habet lithonripticas Dos. à ℥ss. ad ℥j. & ℥i℥. per se vel cum diuretico aliquo alio, præcipuè verò dicatur componendo specifico nostro antinephritico, ad quod etiam requiritur.

Spiritus vitrioli coagulatus.

Fiat prius sal fixum nitri, cum frequentissima sulphuris in crucibulo ignito iniectione, ut scis. Secundo à sale hoc fixo in MB. identitè abstracte. Spiritum Oli rectificatum, eo usque quo sal hoc nitri fixum, nihil amplius receperit.

Pilulæ in calculo renum & vesicæ.

℥. *Magisterii nostri lithonriptici* ℥i diaphoret. re-

sol. ana ℥i℥. *salis succini*, ℥ss gr. v. *extr. nostri solutivi* gr. iii. *succ. glycyrrh. inspiss.* gr. xii.

Misceantur & fiat massa, ex qua formantur pil. n. 21, pro tribus vicibus, pro qualibet dosi n. 7.

Sumuntur circa 8 superbibendo bonum haustum aciduli vegetabilis.

Aqua antinephritica.

℥. *Fragorum rec. mensur. Pol.* n. iv. (4. stoff) *baccarum alkikengi* ℥i℥. *rad. raphani radula concisa* ℥i℥. *sem. dauci vulg.* ℥ss. *succi beul.* mens. *Mario coll.* ℥xxiv.

Mixta per B. V. l. art. destillentur. Liqueor projectus inde fervetur ad usum destinatum attenuando, incidendo, & detergendo, urinam movet, renes, uteretes & vesicam ab omni saburra Tartarea liberat, calculum frangit, & educit, ejusque efficientes antecedentes omnes tollit causas. Dosis aquæ hujus ℥i ad ℥i℥. per se vel cum sir. dialthææ vel alio idoneo.

Sorbetta anti-nephritica.

℥. *Sorbit* [seu *scerbet Turc.*] *inspissat.* ℥viii. *liquoris beul. clarificat. mens.* i. [℥i℥.] *essent. citri ex cort. rec. extr. ad placitum.* M. & fiat potus gratus.

In defectu Sorbet. Turc. (quæ ab Armenis Leopoli, ac Varsaviæ, tempore comitiorum facile venalis invenitur) fiat.

Limonada antinephritica. S. R. M.

℥. *Liquoris betula fermentati ac clarific.* ℥i. *succi expressi acidi citri tantum*, quantum tria poma citria in se continent. Post in alio vitro

℥. *Succi seu liquores beula* ℥i *sacch. albissimi* ℥viii. Miscet tamdiu donec saccharum penitus sit dissolutum.

Misc. liquorem superiorem acidum, cum liquore saccharato invicem sæpiuscule transvasando; postea limonada tali modo parata, subtilissimo colo trajiciatur, & ad usum asservetur. Si placet, limonada tandem cum essent. citri, ex corticibus rec. extr. f. q. aromatizari potest, quod unum erit cum sorbet, seu scerbet Turcic. In Italia, Hispania aliisque regionibus calidis vilioris conditionis homines aquæ fontanæ tantum permiscerent, succi citri seu limonum, quantum pro grata aciditate sufficit, qua portione absque saccharo non solum æstivo tempore, verum etiam in febribus ardentibus pro extinguenda siti sæpius utuntur; beneficio salis & nivis etiam congelari solet, qui potus glaciatus, vel glacie infrigidatus, minime approbatur, rationes inquireret B. L. in tract. curioso ac utili Cl. Dn. D. Bartholini, de usu nivis.

Conciliatur & scorbettum seu limonada apud nos hiemali tempore (ubi scilicet poma citria & limones non semper recent. haberi possunt,) beneficio pulveris acidi & grati, cujus descriptionem exposuit R. P. Ferrarius in lib. 3. cap. 34. de malorum aureorum cultura. qui talis est.

Pulvis acidus ex succo Limonum.

℥. *Limones minusculi*, in frustula circulari secantur, & filo tenui transiuntur, ita, ne inter se contingant. Deinde in cistella componuntur, & caldaria cella, ferno imposita, diebus decem pluribusve habentur, donec leni calore perarescant. Tum aridæ medullæ cultro continguntur, ut solvantur in pulverem. Collectus hic in lapidea pila ligneo pistillo minutissime conteritur & seponitur in usum, nempe ut aquæ potio jucundè mordax, utque dulcacida compositio, quam sorbetum vocitant, concinnetur.

Primum

Infusio Ligni Nephritici.

L. Ligni nephritici veri & in particulas parvas prius concisæ § iv. liquoris betula purificati (seu vini Rhenani) § xxxij. Macerentur simul & tamdiu, donec liquor infusus colorem caeruleum diluorem contraxerit. Adde sacchari citrati ad placitum in difficultate urinæ, & dolore nephritico, mirabiles experiuntur effectus ex hac infusione ij. qui assidue eâ uruntur.

Dosis § iv. manè tribus horis ante prandium, per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium atque vinum ea diluunt.

Hanc infusionem, (quæ gratissimi est saporis) per aquam fontanæ seu acidulas Eggenfes, sibi ipsamet parare solita est Regia Majest. p. m. Uladislav IV. Dominus meus elementissimus.

Ludum Crocæliani Com. Secrerii præparatio Paracelsi & Helmontii.

Nemo miretur, me oleum Ludî Cl. Crocælii, cum illo, quod ab Helmontio lib. de lith. cap. 3. §. 28. & ante illum à Paracelsi lib. de morb. tartareis, edit. Germ. cap. 20. p. m. 314. & tractat. 2. cap. 1. p. 485. describitur, sub uno titulo, & una præparatione, hic comprehendere, cum tamen Medici insignes & quamplurimi Paracelsi & Helmontii ludum ex solo & uno subiecto, extrahi velint. Sed incidit in mentem, quod Author noster quandoque mihi & Cl. Dn. D. Paulio p. m. narravit, cum nobis lapidem quendam pallidi coloris, magnitudine pollicis & formæ tabulatæ monstraret, dicens, hic est verum ludum Helmontianum, mihi ex Brabantia transmissum. Sed non solum hic lapis talem habet virtutem, calculos in corpore humano comminuendi, sunt & plures lapides saxifragi, qui eandem habent facultatem. Et uti Helmontio concessum erat, eligere sibi saxifragum, in territorio Antverpiano, quem Paracelsus forè nunquam vidit, neque in illis terris fuit, sic & mihi potestas permixta est hoc facienda, & eligendi saxifragum, qui in Præssia & mea villa, non procul ad ripam fluminis Nagot invenitur. Hic solum agitur de præparatione, quæ primò beneficio liquoris alicujus Ikahæstini instituitur, pro ludio meo composito fieri solet, & cum Helmontiana una est. Hæc erant verba Domini Authoris nostri. Jam sequitur ergo ejus compositio.

L. Lapid. lyncis (alias ludum nostr. vocatum,) Judaici, spongia, cancerorum & aëritia ana q. pl. Pulveris & opt. contritis, & in alcohol quasi redactis affunde ~ *Sis nostr. ad supereminentiam trium digitorum.*

Stent in digestionem tamdiu, donec videris spiritum assumpsisse, quod potuit, tunc modica inclinatione, quod clarum est, effunde; affunde novum spiritum, donec vel totum, vel magnam partem solveris. Celerius expeditur extractio, si ista prius fuerint calcinata, quod alias omittitur. Solutiones seu extractions in vitrea concha coagula, si liquorem vis perdere, sin minus destilla, & abstrahere ~ *Sis*, ad siccitatem usque. Coagulum contritum, exactissimeque levigatum solve deliquio, in cella, vel alio loco humido; coagula denovo & solve, idque dum nolit amplius cogit & siccificere. Oleum hoc per deliquium paratum hermetice claudatur in ovo philosophico, & observato ignis regimine, stet tamdiu in digestionem, donec abeat in formam pinguedinis instar liquecentis. Dosis hujus olei ludi est gutta una usque ad vi. & x. ex vino albo præbita. Frangit & atterit omnem calculum totius corporis, hinc convenit & podagricis. Plura de virtute hujus quare in Helmontio de lithia si.

Præsentissimum hoc remedium à Paracelsi primò inventum, (lib. de morb. Tartar. cap. 20. tom. 1. pag. Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

314. & tom. 2. de Tart. fol. 485. German. edit.) & ab Helmontio lib. de lithias. cap. 3. item in Libavii Synag. arcan. chim. tom. 1. lib. 3. cap. 24. Untzeri de lith. & Cunrado Kunrad. in medulla distillatoria p. 148. descriptum, vocavit Clariss. D. D. A. Cæcili. Olum lithontripicon, quod in S. R. Maj. Subcamerario, Illust. Dom. Theodoro à Cœhnoff expertus est, in dolore renum & inguinum & hærente urina, quam mox copiosissime cum uno & altero topthulo ejecit, sub hac formula:

L. Sui hujus lithontripici § B. ~ *ris & melissæ an. 3j. 7a nostr. arthritic. intern. in forma julapii seu acidularum absque sir. violaceo f. q.*

Dosis hujus mixturæ 3ij. primis diebus, mane & à meridie in jusculo carnis seu cerevisia calida sumenda, usque dum dolores remiserint, reliquis diebus tribus vel quatuor sumitur solum mane, & semel in die.

Liquor Lithontripicus.

In defectu hujus medicamenti antea præscripti, Cl. Dn. D. A. Cn. aliquando & sequentem substituit liquorem.

L. Ocul. & lap. judaici, lyncis, spongia, aërit. ana q. v. scilicet 3j. Pulveris affunde ~ *li philosophi 3i B.*

Stent in digestionem ad totalem quasi dissolutionem. Solutioni filtratæ postea addantur ~ *li rectificati ord. 3j. Mi. cc.*

Dosis gutt. ix. usque ad x. in brodio vel vehiculo convenienti.

Arcanum sanguinis hirci contra calculum.

Aliud adhuc medicamentum specificum contra calculum possidebat p. m. Cl. Dn. D. A. C. ex sanguine nempe hircino prius præparato, quod

L. Sanguinis hirci, secundum Helmont. præparati, magist. lithontripici nostr. descripti. ana 3℔. sacchari albi pulv. 3j. essent. citri ex cort. extim. rec. extr. ad pl. M. F. pulvis. Dos. ʒij. ad 3j.

Sanguinis hircini & capræ passim apud Autores fit mentio, de quo vid. Henr. Petrai Nosolog. Dissert. 40. Meminit & hujus Vidus Vidius l. 10. cap. 20. Joh. Arculanus & Heurnius; Sanctorius lib. 15. cap. 4. Rondeletius in Consil. Craton. Consil. 150. Lelius à Fonte, in Consult. 84. Casalpinus lib. 3. cap. 29. Pract. Forest. in schol. ad Observ. 25. lib. 24. Mich. Paschalius lib. 1. meth. cur. 47. Renodanus lib. 3. cap. 3. 15. Borellus Cent. 2. Observat. 88. R. F. Athan. Kircherus, lib. 3. de magnet. Kyperus in Institut. Phys. lib. 5. cap. 2. §. 7. & alii quamplurimi: præsertim verò ille magnus Medicus Helmontius, qui & in pleuritide hoc remedium commendat. Et Osvaldus Gabelkofer. in lib. Medico. Wurtemberg medicamentum quoque egregium ex sanguine hircino contra calculum renum conficere docet. Scaliger Exerc. 344. nu. 8. ait: Hic cinum sanguinem frangere in renibus ac vesica lapidem, tam verum est, quam solem meridie lucere: quamplurimos enim ejus vi comminimus. Verum ita simpliciter fieri nequit, nisi hircus seu capra lithontripicis herbis prius fuerit pastus.

Præparationem sanguinis hirci inveniet B. L. apud Helmont. in tr. Pleura Puren §. 32. item apud Zöveser. in animadv. in Pharm. Aug. p. 419.

Lapis Nephriticus factitius Internus.

L. Magisterii crystal. montan. n. descr. lithontripi. nostr. ana 3℔. ocul. & cum infus. lign. nephrit. præpar. 3j. petroselin. adhuc humidi & recenter facti adtingendum colore viridi q. s. Miscantur, & cum mucilagine tragacanthæ per infusionem ligni nephritici facti q. s. Fiat massa, ex qua postea formentur lapides signati instar terræ sigillatæ, vel alterius cujusdam formæ.

Hic lapis omnem calculum in corpore humano atterit, & cum urinâ expellit.

Dosis à ℥j. ad ℥ij. vel ℥j. in liquore convenienti prius dissolutus, vel in pulverem redactus.

Lapis Nephriticus factitius externus.

℥l. Vini ℥ni, ex minii part. ij. & silicium fluviatili pulvis. part. j. parati, Ori purificati ana ℥iv. Uniantur fusione in ♁bulo, materia adhuc liquida effundatur supra tabulam cupream calefactam, à lateribus argillâ munitam; & sic habebis lapidem vitri instar splendentem, qui lumbis & regioni renum applicitus, eundem cum lapide nephritico naturali præstabit effectum: de quo Auctores inspicendi. Omnem enim intemperiem calidam renum emendat, & ingorrorrhœa virulentâ auxilium est rarum: quod etiam tabula ex Oro solo fusa aliquando præstare solet. Sunt qui vitrum ℥ni pulverisatum & sacculo inclusum regioni lumborum applicant, sicque eundem sentiunt effectum.

NERIUM, vid. Oleander.

NERPRUNUM, vid. Rhamnus.

NICOTIANA, vid. Tabacum.

NIDUS AVIS.

Nomina. Orobanche affinis Nidus avis I. B. Orchis abortiva ruffa sive Nidus avis Park Satyrion abortivum sive Nidus avis Ger. Orchis abortiva fulea C. B.

I. B. Caulem surgit modo singularem, modo duos vel tres, pedales aut cubitales, albicantes; foliis vestitos concavis, pellucidis, striatis, neutiquam acutis, sed obtusis, superna parte quodammodo cordis formam exprimentibus: quorum summa florum thyrsus orchidum modo & forma occupat coloris helvi aut pallidi, qualis & foliorum tabidorum? ac occlusi quidem è brevibus pediculis, ad quorum exortum foliola parva, singula sese exerunt: ubi vero se aperiant, orchidum modo hiant. Galea exigua sub qua pistillum breve cum apiculis albicantibus, quod utrinque ad latus bina foliola cingunt: Labellum magnum, ima floris occupans, cavum intus: nullus odor notabilis. Dehiscuntibus floribus utriculi pulvisculorum succedunt striati, angulosi, residuis florum petalis marcidis insigniti. Radix crassis fibris, succulentis, fragilibus tota perplexa, nido um avium structuram imitans quorum extrema obtusa observavimus. Sapor, radicis ac totius plantæ amarus horridus.

In Sylvis & opacis invenimus in Cantio prope Maidston oppidum, inque Suilolcia non longe ab Aldeburgo: in transmarinis etiam montibus & sylvis opacis reperitur. *Raius.*

Detersiva & vulneraria hæc reputatur planta, si extus applicetur.

NIDUS AVIS ESCULENTUS.

Nidus avis esculentus qui ad Europæos à Siamensibus ac variis peregrinatoribus demandatur, figurâ suâ craterem rotundum non malè exprimit, est autem substantia sicca & alba quam credunt in nidos sic congestam ab Alcedine Indicâ, è cujus rostro ad modum salivæ spumosæ, eo tempore quo mares & feminae invicem coire appetunt, eructatur, ac solis calore induratur. Sapor horumce nidorum nullus prope est, substantia glutinosa. Chineses eorum sunt avidissimi, ac cum Zingibere decoctos comedunt. Idonei creduntur pro ægis convalescentibus restaurandis, ac ventriculo corroborando.

Hæc è vulgari de *nido avis* opinione, at verò de iis aliter Nobiliss. D. Rhedi in suis *Experimentis Naturalibus*. Antiquis in usum fuisse nidos avium quarundam notissimum est, ejusque rei mentionem faciunt Hiera Cappadox, nec non Andromachus & Aesclepiades apud Galenum; at verò, ut eibi loco interserviant hiniidi, id verò non memini me unquam legisse, vel audivisse: atque adeò existimo, ingeniosam hanc inventionem, soli hodiernorum ingluviæ deberi, quæ novitatis semper avida, tanto cuncta magis æstimat, quanto locus ex quo ad nos deferuntur magis distat. Dantur aviculæ hirundinibus non multum absimiles quæ in scopulis mari Coccincinæ imminentibus nidos struunt exiguos, coloris subalbi, ex materia ichthyocollæ non absimili. Hi nidi à rupit usillis avuli quamplurimo veniunt, ad nobilitanda convivia; minus solennia, adeoque vilia futura, nisi hoc novo genere ferculi condirentur; illecebrosi sanè saporis, si ab ingenioso coquo ex præscripto artis præparetur. Modus præparandi hic est: Nidos in jus vituli vel capri probè decoctum mittunt, usque dum macerati emolliantur, inde in hoc jure illos decoquant, & postea butyro, caseo, & vario genere aromatum condiunt; & hætenus quidem nihil quod dicam habeo. At verò ubi hunc cibum efficacissime & tuto prodesse volunt illis qui cum Petroniano Polieno neque puero neque puella bona sua vendere possunt, lorunque in aqua non inquinâ habent, dicere cogor. Nuga profecto majores fabulis & nugis quas avicula ad focum fila ducentes narrarunt unquam. Nimis profecto sibi blandiuntur qui in hoc tali medicamento spes suas ponunt: quod si mihi non credunt, periculum ejus rei faciant, ut jam antea in simili occasione fecerunt nonnulli.

NIGELLA.

Melanthium, Gith Plinio, recentioribus *Nigella* à foliis minis colore nigro dicta, foliis tenuiter dissectis, flore magno, conceptaculo itidem seminis magno, membranaceo, in plura loculamenta quinque plurimum, diviso, singulis loculamentis summa parte corniculatis, à reliquis pentapetalis distinguitur.

Vires. Semen nigellæ præcipue in usum Medicum venit: in mucilagine scil. pulmonum resolvenda & expectoranda lacte augendo, urina ac menibus cietidis, moribus venenatis corrigendis. Specificæ, in febribus quartanis & quotidianis. Extrinsecus crebri usus est in cephalalgia sedanda catarrhis exticcandis, in cucuphis, epithemat. &c. applicatum. *Schrod.*

Radix sistit proprietate sua hæmorrhagias, si dentibus masticeatur, naribusque imponetur. *Idem.*

Exprimitur ex semine isto oleum, quo imperiti pharmacopæi plerique pro oleo nardino non absque gravi utuntur errore.

Vide excrementum tiam humiditatem plurimam habet, ob quam non nisi cum periculo intus sumitur, ut Tragus monet, ideo (inquit Casp. Hofmannus) ut semen carvi post ablutioem laboriose siccat debet: ita Melanthium quoque, quam ob causam fixum potius quam crudum in catarrhis & coryzis usurpatur, fixa aut ustulata incredibili succellu in catarrho aut coryza usurpatur: in his casibus comendo hunc nodulum.

℥l. Sem. nigellæ rost. styrac. calamit. ana ℥j. ambliæ griseæ gr. ij. m. ac inde syndoni rubræ f. l. a. nodulus subinde naribus admovendus *Sim. Paulus.*

Ad amissum odoratum, ℥l. Nigellæ romanæ q. b. redigatur in pulverem, & cum oleo veteri subigatur in mortario. Ex hoc liquore, capite supino & ore aqua pleno immitte in nares attrahendo spiritum. *Galenus.*

Nobilissimam Dominam à gravi coryza liberavi, postquam ei illud errhinon cuius in historia majorana facta est mentio commendavi hunc nodulum.

℞. Sem. nigellæ tosti ʒ i. ʒ. abelmosch. carvi, foliorum majoranæ ana ʒ ij. styrac. calamit. tabac. ʒ j. ambra griseæ gr. vii. olei ligni rhodii gut. iij. m. f. s. a. Nodulus, quo postea catarrhis valde obnoxia se ab eis præservavit. Sim. Paulus.

Nigellæ flores, quamvis cærulei sint si manibus chartæ aut linteis eos affrices colorem pulchre viridem reddunt, D. Merret. Observ. in Anton. Neri. p. 388. *Raim.*

NIGRICA FABRILIS.

Nigrica Fabrilis, seu *Plumbum Nigrum* officin. invenitur in fodinis; mollis est, sed tamen consistentiæ firmioris, lævis & splendens, non petrosa, in frusta variæ magnitudinis divisa. Refrigerat, siccatur, repellit. Usus præcip. adversus Strumas, tumoresque, frigidos & phlegmaticos. Optima censetur quæ in Angliâ invenitur, quæ in Hispania adfertur fragilis est, pessima quæ ex Indiâ Orientali advehitur.

NITRUM de eovid. sub titulo *Sal.*

NOCTUA.

Noctua (quod noctu canat & volet) γλαύξ, *Minnervæ sacra*, (à glauco oculorum colore.) *Charleston.*

Ejus *Curo* curat paralyticos & melancholicos. *Cinix* noctuæ integræ nec deplumata in fauces immixta angina apostema generabiliter aperit. Fel ad maculas oculorum valet. *Pinguetudo* aciem oculorum acuit. *Schrodus.*

NUCAMENTUM, vid. *Julus.*

NUCES CUPRESSI, vid. *Cupressus.*

NUCISTA, vid. *Nux Moschata.*

NUCLEI PINI, vid. *Pinus.*

NUCULA TERRESTRIS, vid. *Bulbo Castanum.*

NUMMULARIA.

Nummularia à foliorum figura rotunda nummi æmula dicta, flagellis reptatricibus, floribus à foliorum alis exeuntibus, loco natali in aquis, ab aliis hujus generis distinguunt.

Nomina. Nummularia *Germ.* vulgaris *Park.* major lutea *C. B.* num. sive centimorbia *J. B.*

Longis sed tenuibus viticulis angulosis, è geniculis fibras longas demittentibus proserpit: quibus ex brevioribus intervallis folia bina opposita adnascuntur, subrotunda & nonnihil crispata gustu vehementer citra morsum siccante adstringenteque: ex quorum alis, flores ampli, flavi, quinque foliis acuminatis compositi (quæ tamen ad unguem juncta sunt, ut flos integer decidat) totidem in medio staminibus cum suis apicibus luteis stylo tenui non capitato vasculo feminali insidente, pediculi florum semunciales aut longiores, ex alis foliorum singulis singuli exeunt, ut ad singuli genicula bini plerunque flores sint. In nonnullis ramulis terna folia & totidem flores ad singula genicula observavimus. Delapso aut marcescente flore calicis folia connivent ut in convolvulis, & vasculum seminale rotundum, admodum exiguum, semine intus minutissimo & vix conspicuo repletum occultant.

Juxta serotes & fluentia, aliæque ligna loca provenit, subinde & in humidis reperitur sylvis, ut recte *Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.*

J. Bauhinus, à Maio Mense in multam altatem floret.

Vires. Sicca est & adstringens, vulneraria è præcipuis. Flores & folia trita & imposita vulnera & ulcera quævis glutinare valent.

Eadem cum vino sumpta dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanant. Conducunt & ad sanguinis rejections, profluvia muliebria, & ad omnia interancorum vulnera & ulcera, potissimum pulmonis. Commendatur & in Scorbuto. Præcipuam autem vim ejus esse dixit Matthiæolus ad puerorum enterocelas tum illitæ, tum in pulvere haustæ; *Raim in Hist. Plant.*

NUTRITIO

In Præparatione Medicamentorum.

In *Nutritio* duo concurrunt, 1. *Nutriens*, id est liquor apius scopo quem imbibere debet recipiens (seu Nutriendum, unde & insuccatio, imbibitio, imprægnatio, inebriatio audit. 2. *Nutriendum* seu quod potius recipere unendum intus liquoris debet, atque vi legum nutritionis, eum fiat per similia, etiam hic requiritur ut liquor sit similis, homogeneus, unde hoc fundamentum est etiam Pharmaceuticæ: similia similibus nutriuntur, solida humidis pro diversis usus.

Sic enim *nutritio* (1.) *corrigit*, ut vis quædam seu virosa, seu alia mitigetur, quem in finem semen coriandri & radix ari imbibuntur aceto, ut & ipsa radix angelicæ, vel carlinæ, item cortex radices esulæ, quæ omnis præparatio usibus internis eadem magis aptat. Sic & vulgatissimum est & exemplum, ut amyllum cum *V* i imbibatur aliquoties, ut eo magis hinc lavigari & impalpabile reddi in pulvere cyprio possit. Sic etiam vitrum *Qui* corrigitur à nonnullis imbibitione cum spiritu vitrioli.

(2.) *Nutritio lavigat.* Qui usus est mechanicus, solidis proprius, non pulverisatis. Sic in usu est Germanis *das Oeltranken* dictum sive charta imbibatur oleo, sive lignum ipsum, quod in pavimentis solent nonnulli, ut alia taceamus. Par ratio est in officinis chartæ incertæ pro operculis electuorum &c. Ita enim partes oleosæ complanant magis particulas hispidas, minusque firmiter coherentes.

(3.) *Nutritio viribus imbuunt.* Sic sterco asini imbitum succo urticæ ad hæmorrhagias & spatium cruentum prodest. Sic aloë tofata, violata, vires laxandi impetrat majores, easque correctas; & hæc præstantior longe sennatæ martialis. Sic sarcocolla vires demulcentes accipit à lacte. Imò id quoque valet de perfumatione, quando stratum super utratum sit in perfumandis seu odore grato imbuendis chirothecis, beneficio olei jasmini & odoratorum aliorum. Sic linteamina spermate ranarum aliquoties imbuta & exsiccata vires acquirunt ad erysipelas tollendum. Linteamina sanguine asini imbuta ad melancholiam, sanguine leporino ad dysenteriam sistendam usurpantur. Facemus spatadrapa varia, imbuta efficaci vi medicamentosa hæc illa.

(4.) *Nutritio tingit*, seu tincturam impertit. Spectat hæc tinctura folis, seu linteamina succo heliotropii imbuta; par ratio est, si cum succo motorum aliorum inficiantur, intincta & exsiccata. Sic & hepaticum rubrum nil aliud est, quam pulvis crystallorum tartari, nutritus seu imbibitus Tincturâ sandali rubri. Par ratio est rosæ vitæ mineralis, lapidis prunellæ tincti, & similia chimicis.

(5.) *Nutritio miscet & diffundit, seu dissociat.* Hujus rei exemplum insigne præbent varia chimicorum opera, imprimis præparatio mercurii dulcis, ubi mercurius sublimatus quasi nutritur & imbibitur mercurio vivo

vivo ana, additâ ad moderandam siccitatem & impastationem urinâ, vel aquâ simplici potius. Sic etiam miscet & diffundit Olea expressa, exemplo olei olivarum, destillari enim minus potest, nisi imbibatur lateribus frustulâtim discussis & candefactis; ita verò hæc frustula imbibita oleum hinc penetrans præbent. Par ratio est spiritus salis, in globulis, aliisque similibus, ubi terreæ particulæ deglutiunt quasi & intus sibi applicant partes salinas, mediante impastatione, quæ aliâs fluorem nancisci renuunt.

6. *Nutritio solvit*; quod exemplo amalgamationis ad oculum clarum est, ubi mercurius ad leges solutionis, majori dosi, v. g. octuplâ, receptus, 3ij. auri quasi deglutiit, devorat, atque cum eodem soluto per intima miscetur. Pertinet huc etiam mercurius coagulatus, id est, plumbum imbibitum mercurio, quod & in processibus alchimie locum non raro habet, ubi nutrire jubent Philosophi aurum, argentum &c. Ut taceamus elæosacchara, balsama & similia, quæ itidem nutritione gaudent.

In singulis formalis quasi ratio illa quoque adest, ut id fiat aliquoties, seu repetitis vicibus, successivâ imbibitione, & exsiccatione. cum aliquâ tamen latitudine, quod ex dictis claret. *Wedelius.*

NUTRITUM vid. *Unguentum.*

Nux JUGLANS, vid. *Juglans.*

NUX MEDICA.

Sic dicitur quod ad Medicos usus apud Indos non parum adhibeatur est fructus magnitudin. castaneæ, durissimus oblongus, coloris ex flavo-rubescens ex insularum Maldivarum deciduus. Partem accelerat, secundinas educit, cerebrum corroborat, & epilepticis confert, intus assumtus.

NUX METELLA.

Nomina. Nux vomica *Ger. Park.* vomica in officinis *C. B.* vomica vulgo offic. compressa, hirsuta *I. B.*

I. B. Nux vomica perperam vocatur hic fructus cum vomitum non moveat. Est ea orbiculata, nummo aureo quem scutatum vocant æqualis, subinde minor, compressa, calamum scriptorium vix crassa, tenera & tactu molli superficie, villum holosericeum imitata, coloris ex calio cinerei, & vario lucis objectu renidente, umbilico utrinque medium occupante, sed altera facie expressiore. Villus densus comminuto adianto similis quodammodo Cordo teste. Fissa in geminas abie crustas duritie fere corneæ, coloreque ex fulvo candicante, sapore insigniter amaro. Ipsa substantia tritu & confusu contumax, adeo solida lentaque est, nec nisi probè siccata frustula, & ea quidem vix ac ne vix contundi seu in pulverem redigi apta. Cum in duos orbiculos finduntur uterque in orbis circumferentia exiguum foramen habet, quo continetur (ut annotat Cordus) germinaturæ & ex semine hoc sato exituræ plantæ rudimentum, exiguo pediculo & veluti parvo Tiliagineo aut hederaceo, venoso, duplicique folio constans, tam exquisita perfectaque figurâ, ut cum veri folii consummata forma de perfectione certet. Ejus unica tantum pars, hoc est, pediculus prædicto foramine vel caverna continetur foliola vero duplicis fructus commissurâ clauduntur.

Reperitur sed rarius formâ oblonga.

Nonnulli nucem vomicam radicem esse opinati sunt, sed erronee: at neque fungus est, ut aliis videtur: fructum esse ex descriptione patet, verum an arboris, an herbæ incertum.

Nucem Metel Arabum nonnulli cum nucẽ vom-

icâ eundem esse, volunt, verum descriptiones ei non conveniunt.

Vires & usus. Nux vomica narcotica est, virulenta & vel opio deterior, in pulverem redacta & cum cibo exhibita canes & feles interimit; exempla habes apud & Gesnerum & J. Bauhinum. Quibus addemus ea quæ nobis communicavit D. E. Huhnus, excerpta ex Antonii de Hude centuria observationum obl. 50. duas (inquit ille) nuces vomicas, in frusta incisâs, pari butyrato mixtas cani apposui, qui ea avidè devorabat post semihoram ingurgitabat se ossibus & cartilaginibus coctis sed alterâ elapsâ semihora tremebat totus, de loco in locum discurrens: erectus stare haud potius erat nisi fulcro innitens: rigore & convulsionibus crura afficiebantur: tertia semihora finita ut mortuus corruit: brevi postea respirare cepit celeriter, & adjunctus pedibus insistebat: ad minimum rumorem horere videbatur, & celerius respirare. Hoc in statu per quantam semihoram superstes mane canis, & tandem subito moritur. Dissecanti mihi canis cadaver hæc occurrere phænomena. Stomachus ingurgitato cibo repletus erat admixtis nucis vomicæ segmentis, quæ nullam mutationem passa videbantur, quam quod molliora essent: idem acciderat segmento per idem temporis spatium in aqua calida detento porro stomachus, œsophagus & intestinum naturali constitutione gaudebant chylo: pulmones solito rubicundiores, & cordis ventriculi ejusque auriculæ debito tumidiores erant. Ex dissecto cordis ventriculo dextro, vena cava ascendente stricta magna sanguinis copia effluebat, in thoracis cavitate statim coagulans. Circa cerebrum nihil præter naturam notare potui, felis ab assumpta nucẽ vomica aliquandiu in aqua macerata, & partim excoxiata iisdem symptomatis impetebatur ac prædictus canis, ut & alius canis, qui tantum reliquias à fele prætermittas devorabat. Defuit occasio investigandi dosin hujus nucis vomicæ requisitam ad animal interitendum. Ex observatis patere putem hanc nucem virulentam potissimum inficere fluidum cerebrum nerveoque irrigans: hinc enim inquietudo, rigor convulsionis, horror, tremor & respiratio inordinata facile derivantur. Prædicta symptomata me ab usu hujus nucis in homine absterrent. Licet bestiis non hominibus eam noxiam statuunt quidam. At statuunt illi quid velint, mihi minime dubium est quin eosdem in homine haberet effectus: avibus certe non minus perniciosum esse constat quam bestiis: nostrates enim ejus pulvere carnibus infuso corvos, cornices aliasque aves noxias inescare & perdere solent. Adolphus Occo in sua Pharm. testatur Julium Alexandrin. ad se scripsisse. Nucem vomicam ablegandam, nec ad compositionis illius usum admittendam quippe adversaturam semper naturæ humanæ, nec quicquam tamen interea unquam commodi allaturam, quæ doctissimi viri Sententia (inquit J. Bauhinus) nobis perplacet: nec quæquam hactenus vidimus, qui suo experimento aliquid laude dignum illorum usu perfecisse prodiderit. Hinc non immerito nuperi Medici in Pharmacopæis suis in electuarii de ovo (quod olim ingrediebatur) descriptione eam omiserunt.

Si pulverem nucis vomicæ velis ea radula deterenda est, nam in pila tundendo ob corneam substantiam comminui nequit. *Rains.*

NUX MOSCHATA.

Nux moschata sive myristica recentioribus dicta veteribus incognita, nonnullis (ut C. Bauhino) creditur. J. Bauhino, ut & Gallandino, Comacum Theophrasti, Cinnamum & Caryopon. Plinii esse videtur. Idem & Chrysobalanon Galeni esse suspicatur.

Ob florem fructui contiguum, & fructum lanuginosum, pulpa densa aliaque convenientias, arborem hanc ad pruniferas potius quam nuciferas referendam cenſeo, & malo perſicæ non nuci juglandi ſubjungendam. A reliquis autem hujus generis diſtinguitur triplici fructus integumento, nucleo ovato exteſius rugoſo, pulpa interiore venis flavo rubentibus variâ, aromatica.

Vires. Nux moſchata ſubſtringit, ſtomachica eſt, cephalica & uterina: ſtatu diſcutit, coſtioneſt promovet, halitum foetidum oris emendat, foetum recreat, lipothymia ac palpitatiſ cordis ſuccurrit lienem minuit, alvi fluores compeſcit, vomitum ſiſtit, urinas ciet, viſum etiam acuit, Aëtiuſ pulmonibus oſtendere ſe ſolent.

In dyſenteria aliſque fluxibus nux moſchata, merito celebrari poteſt, quandoquidem diverſas facultates, omnes in hoc affectu neceſſarias continet. Ejus oleoſa ſubſtantia illinit inteſtina, ne radantur ab acerbis humoribus, & dolores lenit: aromatica qualitas, in aëreo ſpiritu conſiſtens, partes nobiles penetrat, & miſiſce corroborat: terreſtris pars adſtringit & exſiccatur ulcera cicatricemque inducit. Fab. Hildanus lib. de dyſenteria cap. 10.

Nuce moſchata ſaccharo condita utuntur Brachmanes in omnibus frigidis cerebri morbis, paralyſi & aliis nervorum & uteri affectibus, quin & cardiaca cenſetur. Jam à multis annis ad nos adferri ceperunt ex Indiis nuceſ moſchatae ſaccharo conditæ pro ballatis ad epulas lautiores. Delicatiores etiam nucamento ſeu exteriore corice viri delectantur ſolo, cumque ipſi nuci præſerunt, dum plane eſt immaturus, tam propter odoris ſuavitatem, quam propter ſaporis adſtringentis, atque ob id ſtomacho amici jucunditatem. Docuit interea uſus non omnino innoxias eſſe iſtas delicias, neque tantum quando ſine, ſed quando cum ſuis nucibus ſumuntur, pollent enim, eaque inſigni facultate narcotica, qua frequentiore aut largiore uſu ſoporofos invehunt affectus. Hinc non diſtimit veri eſt quod tradit Dom. Tavernier, nimirum, cum hæ nuceſ maturæ incipiunt Aves paraſiſcas harum veſcendarum avidas magnæ gregibus ad Moluccas inſulas convolare, non ſecus ac turdos vindemiæ tempore in Galliam; nec tamen deliciis ſuis impune fruuntur, nam cum fructibus hiſce ad ſatiæatem ſe ingurgitant, vertigine correptæ in terram velut ebriæ decidunt, ubi jacentium crura formicæ brevi comedunt.

Nuceſ ipſas ſiccatas (immoderate ſumptas) eadem facultate donatas eſſe comprobatur Hiſtoria quam narrat Lobelius: nimirum ſe in Anglia vocatum ad generoſam Matronam prægnantem, quæ cum ſummo deſiderio avide duodecim nuceſ moſchatas tantum panem commanducaſſet, incidit in delirium vel potius ebrietatem, ſed poſt impetratam quietem & ſomnum copioſum, repellentibus capitis admotis, convaluit.

Vulnus cujuſdam militis cito conſolidatum ab uſu nucis moſchatae interne ſumptæ refert Taehenius in lib. de morborum principe p. 110. hic fructus etiam celebratur à le Febvre & à Wedelio in vulneribus conſolidandis. J. Bauhinus cum in Apenninis montibus frigidam avidius bibiſſet ſubito incidit in inſignes veſicæ dolores ſtatibus in ſcroto vexantibus accedente

tumore, ſine tamen ulla hernia præcedente. Cum exiſtimaret ſe in monte præ doloribus periturum, iſneris ſociuſ Oſwalduſ Gabelkover amice obtulit nuceſ moſchatas, quas ſecum habebat. Devoratis quatuor ſubito per D. g. & hoc remedio liberatuſ fuit à doloribus, atque iter perfecit ſoſpeſ & incolumiſ. Memorabile in primis experimentum ad paralyſim partium d glutitioni inſervientium nux moſchata maſticata & deglutita eſt egregia. *Emull.*

Exprimitur ex nucibus recentibus contuſis & in ſartagine ſeſveſactis Oleum 1. comuni, ad multa utile verbi gratia, ad ventris tormina & dolores nephriticos (in liquore calido exhibitum) ad tormina infantium umbilico inunctum, ad nervorum articulorumque diuturnos dolores à frigore excitatos. Extrinſecus conciliat blande ſomnum temporibus illiſ.

M A C I S:

Macin ſeu ſecundum involucrum nucis myſiſticæ cum macere Græcorum confundunt è recentioribus Botanicis non pauci, vicinitate nominum, ut veriſimile eſt, inducti: cum tamen hæc duo motum inter ſe diſſerant. Macer enim cortex eſt radicis in Malabar naſcentis ſubſtantia frigidiſoris & terreſtioriſ, & ob id ſiſtendiſ alvi fluxibus deſtinatuſ. Maciſ e contra tegumentum nucis indiæ, & quideſ egregie aromaticum eſt, multoque & ſpirituſo calore plenum, unde & adverſuſ frigidoſ affectuſ, itemque venenatoſ ſoleſ uſurpati.

Maciſ autem ille priuſquam ex pleno maturuſ, & adhuc colore eſt elegantiffimo coccineo. conditi apud ſuoſ ſale & aceto ſolet, & inſerri primæ menſæ ad excitandum appetitum. Poſteaquam vero maturuſ maciſ, adimitur nuci & exſiccatur ad Solem, collectuſque cum cura reponitur, ſervaturque. Odore ſemper quideſ grato eſt, ſed recens mire jucundo: ſapore aromatico & ſuaviter amaro, & qui quandam à ſe ſiccitateſ ori relinquit. Eaſdem vires quæ nuci ei adſcribuntur, quia tamen partium tenuioſum exiſtit, ideo & operando citicacior, & magiſ penetrant habetur.

Maciſ oleum ut oleo nucis quantitate cedit ſe qualitate antecellit: magiſque commendatur in nervorum affectibus & aliis frigidis morbis: quin & podagram (mirabile dictu) pedi oblitum ſanare Croemburgiuſ refert.

Ad ventum utero incluſum, Accip. Nucem moſchataſ non vitioſam decid. in parteſ IV. projice unam ſuper carboneſ accenſoſ, & fumum accipiat mulier per infundibulum, terque id faciat. Hoc remedio Bonnæ mulierem juvenem curavit Hartmannuſ. Communicavit D. Huſſe. Raiuſ

Nux PINEA, vid. *Pinuſ.*

Nux PONTICA, vid. *Avellana.*

Nux RECIA, vid. *Juglans.*

Nux VOMICA, vid. *Nux metella.*

NYCTICORAX, vid. *Noctua.*

NYMPHÆA, vid. *Nenuphar.*

LIBER XIV.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

O

OBOLUS vid. sub titulo *Mensura & Pondera.*OCELLUS CERVI, idem quod *Elaphoboscum.*OCHRA, vid. sub titulo *Terra.*OCIMUM, vid. *Basilicum.*OCULARIS PLANTA, vid. *Eufrafia.*OCULI in *Phythologia.*

Oculus seu *Gemma* est tuberculum in arbotum surculis unde fit germinatio, unde *inoculatio* institutio- nis species. *Schroderus* oculos exponit florum prodromos, inque flores explicabiles, nimis restrictè, nam oculus æquè latè paret ac *gemma*.

OCULUS BOVIS, seu *Bupthalmum*idem quibusdam est quod *Bellu Major.*

Verùm

BUPHTHALMUM VULGARE

aliud est & ejus hæc sunt

Nomina. Bupthalmum vulgare *Gerardi.* *Dioscorid.* *C. Bauh.* *Matthioli*, sive vulgare *millefolii foliis Par-*
kins. *Chamaemelum Chrysanthemum* quorundam *J. Bauh.*

Caulibus cubitalibus & majoribus, tenuibus, & incanâ lanugine obductis pluribus, propter tetram rubentibus, ex lignosâ *radice* obliquè exortis, ramosis *fo-*
lia adnascuntur itidem lanuginosa, millefolii, denticulata, pinnataque, multò minora, quippe quæ non temerè unciam longitudine superent, odore *chama-*
meli. In singulorum ramorum fastigio *flos* unicus, *chrysanthemi*, totus luteus, sive quæ in ambitu sunt folia spectes, sive discum, qui rigidulis apicibus asper est: *Calyx* porro cui inidet incanus, *chrysanthemi* instar squamosus est.

Variis Germaniæ in locis hanc plantam observavimus spontaneam; circa Florentiam quoque Italiæ in alveis *Torrentum* & alibi. *Raius.*

Planta hæc multum continet olei, sed salis essentialis modicum. Detergens est, vulneraria, emolliens ac resolvens.

OCULUS CATI, vid. sub titulo *Lapis.*OCULIS UTILIA, vid. *Ophthalmica.*OCYMASTRUM TRAGI, vid. *Scrofularia.*OCYUM, OCIMUM, vid. *Basilicum.*

ODONTALGICA, seu ODONTICA.

Sunt Medicamenta Dentibus, tum mundificandis, tum firmandis &c. dicata, qualia sunt cinis è variis plantis, ossa desiccata, oculi seu lapides cancerorum, cornu cervi, ac concharum omne genus, pumex, lapis spongiæ, alabastrum, lapis specularis, dactylorum myrobalanorum & olivarum nuclei, corallium, sal commune, sal gemmeum, alumen, nitrum, sal, alkali & axungia vitæ, tartar. alb. crusta panis. Hisce autem omnibus rite pulveratis admisceri possunt aromata varia, lignum v.g. aloës, rad. ireos, muscus, am-

bra, mastiche, thus & myrrha. In doloribus dentium valent olea still. caryophyll. baccar. juniperi, item oleum camphoræ ut & spir. vini laudano opiato imprægnatus.

Atque hæctenus de Odonticis in genere, jam de iis in specie quatenus in Fasciculo Medicamentorum singularium *Clar. Cnosselii* reperiuntur.

Pulvis ad Dentificia. moschatus Serenissimæ
Cæcilia Renata Reginae Poloniæ.

℞. Oryzæ finiss. ʒij. pumic. calcin. & aliquoties in lacte extincti, corallior. rubr. tritor. lapid. silic. calcin. & nuc. mosch. in pulver. redact. ana ʒj. rad. ireos pulver. ʒj. ʒij. alumin. usti, sal. comm. ana ʒj. mosch. & ambr. anagr. vj. olei rosar. ver. still. gut. iij. fol. auri num. iv.

Fiat omnium pulvis non admodum subtilis. Mucosos dentes à solidibus purgat, & omnem tartarum corrosivum abstergit, dentes quoque dealbat, & vacillantes firmos reddit.

Pulv. ad Dentificia alius Ser. Reginae
Ex ord. Dn. D. Teuberi, Medici Ord. Ser. Reginae.

℞. Lapid. pumicis pulv. ʒβ. corall. rubr. & alb. ana ʒii β. aluminis ʒβ. rad. ireos flor. ʒj.
Fiat pulvis non admodum subtilis. Cui adde ambra & moschi or. ana gr. v. ol. rosar. stil. ver. ex floribus gut. iij. Misceantur probè, pulvis in scatula munda servetur ad usum ad dentes purgandos & dealbandos remedium excellens est. Cujus quotidianus usus adhuc in Polonia apud multas matronas observatur.

Not. Ex pulvere præscripto, cum mucilagine traganthæ (per aq. sal. facta) fit massa tenacissimæ consistentiæ, ex qua formantur styli dentificii in umbra lentè exsiccandi. Omnem nigredinem & colorem vitiosum abstergunt, & dentes de novo albos & politos reddunt, si quotidie his fricentur.

Tinctura perbella Ser. Reginae Cæciliæ ad gingivas tumentes & sanguinolentas.

℞. Aq. sol. salvia, quercin. ana ʒvi. phlegmat. Olib. Ono ana ʒij. gummi lacc. (in bacillis) pulver. ʒvj. aluminis ʒβ.
Mixa stent in digestionem per diem & noctem, postea filtrentur per chartam. Tinctura rubini instar servetur usui. Vires titulus indicat.

Tinctura Odontalgica D.D.C.

℞. Rad. pyrethri, lign. sassafras ana ʒij. sem. hyoscyami, caryophyll. masse pil. de tribus ana ʒj.
Incisa & confusa infundantur, in sp. n. sedativi simpl. ʒvj.
Stent per dies tres in digestionem vel diutius, filtratæ TRæ adde extracti sedativi liquidi citrati, seu rinct. granorum quietis ad plac.
Dentibus dolentibus summo opere medetur, si dimidium cochlear hujus TRæ in ore per dimidium quadrantem horæ contineatur, postea iterum expuatur, & si opus est,

est, secunda & tertia vice usus reiteretur. Idem præstat & seq.

Balsamum Odontalgicum.

℞. Ol. sil. caryophyllor. camphor buxi ana ℥j. nuc. mosch. express. q. s. pro consistentia balsami, adde extr. opi ℥ss. fuliginis splendentis q. s. pro tingendo in nigredinem. Fiat balsamum. Omnem dolorem dentium (glossypio ex prum & cavernis impositum) ex quacunque causa ortum, tollit.

Balsamum aliud Odontalgicum.

℞. Ol. caryophyllor. 3 j. in quo dissolve camphor. gr. xxiv. adde ol. nucis moschat. express. q. s. pro consistentia tandem admiscetur extr. granor. quietis gr. xv. fuliginis splendentis q. s. pro tingendo. M. F. Balsamum. Odontalgiam subito aufert, quod ipse sæpius expectatus.

Balsamum Puerorum dentientium.

℞. Butyri majalis non saliti 3 iv. pinguedinis galline anatis ana 3 ss. succi expressi canrorum fluvial. sedi majoris ana 3 iij. Coquantur in diplomate ad consumptionem humiditatis, in fine adde sanguinis extracti ex crista galli ℥v. & post unam & alteram reiteratam ebullitionem exprimantur, ubi adhuc admiscere poteris sacchari canti q. s. pro dulcedine. M. F. Linimentum pro gingivis infantium.

Massularum aliquot genera in Odontalgia.

1.

℞. Opii correcti, fuliginis splendentis ana ℥j. sem. hyoscyami, camphor. ana ℥ss. Cum ol. nuc. moschat. expressi q. s. Fiat massa pro dentibus dolentibus.

2.

Vel ℞. Gum. tacamahaca, laudani opiat ana gr. iij. camphor. gr. ij. cum ol. caryophyllor. q. s. Fiat. massula.

3.

Item ℞. Oli ussi 3 j. opii correct. ℥ij. cort. mandrag. & philosophor. ana ℥ss. mass. pil. Ruffi q. s. pro consistentia. Fiat massa.

4.

℞. Extr. granor. quietis ℥j. ☿ Oli anod. ℥ss. camphor. gr. vi. (in ol. caryophyll. q. s. dissol.) & nuc. Mosch. 3 ss. pulv. caryophyll. q. s. M. F. Massa duriuscula. cavernis dentium imponenda, Granum piperis in V maceratum & accensum, subito dolores dentium sistit, si cavernis imponitur.

Linimentum ad gingivas tumentes & putridas
Cl. Dn. D. And. Cnæffellii.

℞. Sang. draconis, myrrh. mastice ana ℥ss. croci & ris, aluminis an. ℥j. mellis rosati q. s. M. F. linimentum pro dentibus vacillantibus. Adde ol. jasmimi guttas aliquot.

Remedia quedam pro Dentibus ex Pharmac.
Bateana.

Dentifricium Dominarum.

℞. Crystall. preparati 3 i ss. pulver. laterum, lapid. pumic. ana 3 ss. ossis sepia, corallii utriusque ana 3 ij. margarit. caryophyllor. ana 3 j. mosch. gran. iv. M. F. pulv. subtilis, cui adde rhodomelitis q. s. ut f. pasta mollis.

Dentifricium infantum.

℞. Butyri recent. 3 j. Anaphromelit. 3 vj. corall. rubr. preparat. 3 ss. f. mixtura f. a. quâ fricentur gingivæ bis vel ter in die ad dentitionem facilitandam.

Dentifricium Scorbucicum.

℞. Sal. cochlear. macis ana 3 j. salviae Div. alumin. ussi 3 ij. sal. deprecipari ℥ij. f. pulv. subtilis cui adde rhodomel. q. s. f. mixtura pro dentibus fricandis ante usum lotionis sequent.

Dentifricium Scorbucicum.

℞. Radic. bistort. sem. cochlear. ana 3 ij. alumin. 3 j. mastich. 3 ij. coque in aq. font. q. s. ad ½ j. colat. adde rhodomelit. 3 ij. M. f. Lotion.

ODORAMENTUM, vid. Suffitus.

OELUROPUS, vid. Pilosella.

OENANTHE.

Ονάνθη, το αἶθος τῆ ἀμώλης, quod colore & quantenus odore non ut viâ dissimilis, vel potius quod cum vite floreat, & in flore ejus odor qualis in pubescente vite sentitur.

Radicibus tuberolis, è multis glandulis compositis, & loco natali, palustri scilicet & aquoso, ab aliis quibuscunque umbelliferis plantis facile distinguitur.

Nomina. Oenanthe aquatica C. B. palustris seu aquatica Park. item aquatica major ejusdem, Filipendula aquatica Ger. Oenanthe sive Filipendula aquatica L. B.

Vires, Sapore est amarissimo cum lvi adstringente, calidæ & siccæ naturæ, aperientis & adstringentis facultatis. Mover ut nam & arenulas extrinsecus intrinsecus usurpata: aperit obstructions & expurgat meatus urinarios. Rains.

OESYPUS.

Oesypus, Officinis Isopus humida, est succidarum latinarum arte detracta & concreta pinguitudo, à quâ emplastrum quoddam à Philagrio descriptum Oesypatum dicitur: quod ad lienis dolorem, stomachi & hepatis duritiem, & aliarum partium nodositates commendatur. Emollit enim Oesypus & explet, præsertim ulcera sedis ac vulvæ cum melle & butyro. Sine excelsu caefacit, & dolorem lenit.

Conficiendæ autem Oesypi ratio hæc est; lanæ succidæ è collo, faminibus, & femoribus ovium sumuntur, aquâ ferventi horas octo macerantur, commiscuntur, & rudiculâ aut baculo agitantur, deinde fervefunt quousque in aquam deposuerint totam pinguedinem.

Ium expressis & semotis lanis, aqua illa pinguis ac sordida ex alto in aliud vas ita infunditur ut multum spumescat. Spuma denuo accipitur, atque adhuc tamdiu agitur in aquâ, donec amplius nullam spumam emittat.

His ita peractis pinguedo collecta in aquâ purâ lavatur, & manibus agitur, donec oesypus admora linguæ leviter tantum astringat, nec mordeat & candida spectetur: tum in fictili vase reponitur. Verum omnia sub fervido sole fieri debent. Nonnulli addunt ad lotionem aquam marinam, sed dictus modus usitator & melior judicatur. Renodam.

OLEA ARBOR.

Olea Græcis ἐλαια, Latini nomen à Græco factum est, aut diphtongo in e abeunte, sic ab ἐλαϊον oleum. Ελαια autem à λαϊον, i. e. læve vel lubricum deducitur, aut à λαῖον lævigo, lubrico, quod producat id quod lævigat lubricatque, videlicet oleum.

Olea prunifera arbor est foliis perpetuis, fructu racemoso, pulpa liquore, pingui, scateante, officulo duro scabro.

Ex eadem oliva differunt succi: primum omnium è cruda atque nondum inchoata maturitatis, omphacinum vocatur. Hoc præstantissimum; quin & ex eo prima unda præli laudatissima, ac deinde per diminutiones. Quanto maturior bacca tanto pinguior succus, minusque gratus.

Optima autem ætas ut jam diximus ad decerpendum inter copiam bonitatemque incipiente nigrescere bacca, Amurcæ color est qui olivam cogit nigrescere, ideo incipiente nigritia minimum amurcæ, ante eum nihil. *Plinius.*

Olivam collectam in tabulatis servandi nec prius quam sudet premendi, morem improbant Cato, *Plinius* alique, cum omni mora oleum decescat Amurca augeatur, addit oleum non tantum minui, sed & deterius fieri. Oleum quidem inde deterius fieri non denegaverim quod olæ in acervo concalescant prævia quadam ad putredinem alteratione, & amurca forte si in bacca remanserit olei saporem contumpat; at vero mora in tabulato oleum minui, amurcam augeri ne utquam concesserim, cum amurca aqueus sit tumor & calore facile evaporet; oleum autem cum sit succus pinguis & tenax, non item; sed magnam caloris vim exigit ut elevetur & ascendat, aut dissipetur.

Quapropter (inquiunt) dubitare non debemus, olivam lectam primo quoque tempore premendam. Ergo ut primum distincta fuerit oliva, substratis tegibus aut pannis expandi debet, quo aequalitas ex ipsa rescietur, & à foliis ac virgulis repurgetur; hæc enim commixta olei diuturnitati obsunt. Tum diligenter mundata protinus in torcular deferri & integra in fiscinis novi includi, præloque subjici, ut quantum possit paulisper exprimatur. Postea resolutis corticulis emoliri debebunt, adjectis binis sextariis integri salis in singulos modios. Quod defluerit in labrum protinus decapulator depleat, & in fistilia labra, huic usui præparata defundat; hoc enim suavissimum est & tenuissimum. Nam æneis & plumbeis vitiatum oleum. Longe melioris saporis est oleum quod minore vi præli quasi lixivium defluerit. Nam si nuclei confringantur olei saporem vitiant. Deterius est quod ex reliquis fratribus premitur, sed paulo graviore pondere. Hoc torrivum non male dixeris oleum sed tertiatione multo deterius oleum exit.

De Vitiiis olei emendandis consule R. R. scriptores.

Olivas condiendi solliciti fuerunt veteres (verba sunt *Cherteri*) quanquam revera nihil aliud sunt quam palatus blandimenta. Tam ingeniosus fuit venter ut & amara, nec ab ipsa natura percocta suæ quoque voluptati placere coegerit. Quid quæso gustu hominibus oliva sive maturâ, sive immatura, at suavitatem invenit ars, quam non potuit natura. Plurimos eas condiendi modos tradiderunt *Columella* & *Palladius*, quos apud ipsos requirendos omittimus. Nam nunc dierum unico tantum, eoque simplicissimo modo, mutua ex aceto & sale parata condita ad nos ferè adferuntur.

Olivæ quamvis per maturitatem nigrae sunt, sapore quoque acri, amaro & nauseoso, oleum tamen quod inde exprimitur, ferè pellucidum est, nonnihil flavicans, sapore dulci & grato, unde patet saporem hunc & odorem parti aquæ seu amurcæ inhærere. Laudatissimum apud nostrates habetur oleum quod coloris omnis & saporis maxime expers est.

Olivæ maturæ ex veterum sententia temperate calidæ sunt: verum facile corrumpuntur, ventericulo-

que oculis ac vesicæ nocent: torrefactæ tamen & illitæ nomas sistunt & carbunculis emarginant: immatura exsiccant. *Colymbades* adstringere, ventriculum roborare, appetentiam excitare dicebantur. Quæ ad nos adferuntur condita sunt antequam maturerent, intelligo tamen Italos maturas & nigras etiam interdum condire.

Oleatum folia refrigerant, exsiccant & astringunt, usus externus & præcip. in fluxu alvi, mensium, in herpetibus & similibus, oculi medicamentis (autore *Dioscoride*) ob vim suam mitiorem convenientiora sunt oleastri foliis. Quod intra fructus nucleum est cum adipe & farina scabros ungues exurit. Succus fruticis accenti recentis destillans sanat lichenas, furfures, manantia ulcera, plures foliorum usus vide apud *Plinium*.

Oleæ materies præcipuæ commendationis est apud operarios pictores & statuarios, à quibus ad præstantes operas desideratur, cum ebena, propter densam & tractabilem ejus substantiam, & colorem subrufum & varium (quem tamen aqua forti assusâ inducunt) quem ductus & nervi intorti referunt. Ad nos allata non mensura sed pondere venditur *Lampadibus*, aliisque usibus mechanicis inservit.

Olei usus adeo multiplex est, tum in cibo, tum in Medicina, ut omnes explicare plus temporis & olei requireret quam instituti nostri operis ratio patitur. De his consulendus *Galenus*, tum *Dioscorides*, *Plinius* alique tum è veteribus, tum è neotericis.

Pollionem *Romulum*, referente *Plinio* cum centesimum annum excedentem *Div. Augustus* hospes interrogaret, quænam maxime ratione vigorem illi animi corporisque custodiret, respondisse intus mulso, foris oleo. *Cardanus* etiam tui præcipuè ad longævitatem facere affirmat, nimirum lac, mel, oleum: intelligit autem non foris inunctum, sed intro assumptum & in cibis vitatum. Oleum & salem emere oportere *Aristoteles* autumavit, utique quod utrumque ad prorogandam vitam quam maxime conduceret.

Oleum naturæ aeræ particeps esse videtur, unde aquæ innatat nec cum humidis aqueis permiscetur, sed quamvis simul cum illis agitur, ob levitatem suam brevi se expedit & sursum ascendit. Ejusmodi autem humida (oleosa & aquea) simul agitata, conquassata & per minima mista colorem album contrahunt & lactis speciem exhibent.

Oleum ad usum per sanitatem optimum (inquit *Dioscorides*) quod ex immaturis olivis exprimitur, unde omphacinum dicitur; excellit in hoc genere recens, minime mordax atque odoratum; tale ad unguentorum compositionem utile. Quinetiam propter adstringendi vim stomacho accommodatum. Ore si contineatur, gingivas contrahit, dentes firmat, sudores cohibet. Refrigerat, siccatur, astringit, adeoque multas compositiones ingreditur.

Oleum ex olivis maturis expressum calfacit & humectat moderatè (vetus calidius est recenti) emollit, digerit, vulnerarium est, alvum laxat, (cum cerevisia calida assumptum $\frac{3}{4}$ j.) ariditatem pectoris corrigit, tormina ventris mitigat, meatus urinarios laxat, erosos abstergit & consolidat. Extrinsecus creberrimi usus est in clysteribus, tumoribus calidis &c. cum aqua tepida assumptum movet vomitum, unde exhiberi solet contra venena.

In patria mea *Westphalia* (inquit *Schroderus*) usitatissimum est vulneratis quotidie exhibere oleum olivarum cum cerevisia calida, quo adeo largè utuntur, ut quoque sudor oleum redoleat.

Ad alvum laxandam segmentum panis rosti oleo intinctum.

intestum & bene madidum quotidie mane comedendum commendatur: quod præcipuam suavitatis gratiam nobis habere videtur, inquit Charlerus. V. P. Borrelli observat.

Oleo odores maxime conservari testatur Plinius. Oleum etiam membra recreare eidem dicitur. Et membra recreans olei liquor. Et sane veteribus utilissimum erat oleo corpus inungere, quod vigorem & robur ei addere existimabant, & tonum conservare. Verum hic mos jamdudum obsolevit, nec immerito nostra sententia partim quod ejusmodi inunctio res sordida nobis videtur, partim etiam quod cutis poros obstruat & transpirationem impediatur, qua nihil sanitati corporis tuendæ utilius magisque necessarium sit.

Oleo quidem non Apes tantum, sed & omnia insecta exanimantur. Plin. lib. 2. cap. 19. quod Clariss. Vir. M. Malpighius in bombyce aliisque experiundo verum invenit. Ratio obvia est, quia scilicet oleum meatus spiracula sive poros quibus aer attrahitur & redditur, obstruit, ob cuius defectum Animalculum illico moritur. Nec enim minimis hisce insectis respiratio minus necessaria est ad vitam quam majoribus animalibus, quin potius magis, cum vasa in his aeri excipiendo destinata majora proportionem, plura, magisque per omnes corporis partes dispersa in his sunt quam in perfectioribus illis.

Oleum picem à pannis extrahit, quod aqua non facit, Plin. vulgatum est (inquit Sennertus) ut si quis manum pice inquinaverit, eam aqua non mundet, sed oleo aliquo aut pinguedine quæ picem liquefaciat.

Olei suprema regio melior est, nam ima ab amurca turbatur, summum vero optimum, quod remotissimum sit à nociva parte, nec sua spissitate ab aere læditur. Plutarch. Sympos. idem legitur apud Macrobi. in Saturnal. qui & vini mediam regionem, mellis imam optimam esse ait.

Oleum dealbandi modum vide apud Dioscoridem: item modum parandi oleum Sicyonium dictum.

Oleum etiam ex olei surculis paratum ad multa utile meminerunt Dioscorides & Galenus: quanquam ille ex oleæ surculorum pinguedine illud oleum fieri dicat, hic in oleo illo conficiendo tantum addi solita germina illa scribit.

De amurca quid sit superius diximus. Multiplex ejus usus describitur à Catone, Varrone, Plinio, Galeno, Columella; amurca subigi areas terendis messibus, ut formicæ rimæque absint, & ne curculio noceat, neve mures lædant. Quin & lutum parietum ad testoria & pavimenta horreorum frumenti, vestiarum etiam contra terebines ac noxia animalia amurcâ aspergi. Commendatur maxime ad ulcera inveterata. Reliqua vide apud Autores citatos. Cum enim rarioris hodie in Medicina usus sit, nec à nobis facile parabilis, non erit operæ pretium de ea disere. *Rains.*

OLEANDER sive NERIUM.

Frutex hic ad Apocyni genus pertinet quocumque partibus præcipuis siliquis & feminibus convenit. Verum quia locis nonnullis fruticis modum excedit & in arboream magnitudinem excrevit, nec succo lacteo turget, Apocyni in modum ab herbis separandum & cum arboribus conjungendum credimus.

Nomina. Nerium sive Oleander *Ger.* Nerium sive Rhododendron flore rubro & albo *L. B.* Nerium floribus rubescentibus, & Nerium floribus albis *G. B.* Oleander sive laurus rosea *Park.*

L. B. Arborea est planta, caudicæ recto, rectifque ac firmis ramis brachiata, croceis seu ex viridi pallescentibus, in quibus folia multa acuta, longa, unciam circiter lata, ut plurimum terna simul Orien-

tia, interdum bina, ubi rami dividuntur, transversum fere digitum invicem diffusa, rigida, dura, crassa, superiore parte atro-virentia, ut lauri folia, interne magis asperas hinc inde maculas, albidas, ex succa. Supremi rami in surculos aliquot divaricantur, quibus insident flores multi simul juncti, odori, pulcherrime rubentes, quali fere colore rosæ incarnatæ conspiciuntur, aut albi, divisurâ quinque partita Clematidis Daphnoidis: singulisque divisionis partibus interne adnata quædam triolca appendix: in medio apices quinque simul juncti, albi, pilosi, floris vero longi velum calycis intum extrinsecus obvolvunt foliola intense rubentia: Siliquæ marcidis floribus succedunt qualis Apocyni vel Atlepiadis sursum spectantes. Papposo semine plenæ.

Nasci in maritimis & juxta flumina Autor est Dioscorides, & experientia confirmat. Passim ad aquarum fluentia in Creta reperitur: Autores Anguillara & Camerarius: quin & in Sicilia ad rivos è monte Ætna delabentes: ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis Senensibus. Matth. in tractu Alpino & Montuoso Liguriæ inter Nicæam & Genuam cum siliquis colossissime Ludg. in montis Baldi parva insula Monachorum Minorum Franciscanorum ex Saxi nudis prope aquam pullulans abundanter provenit floribus rubris & albis: Pona.

In nonnullis Cretæ insulis ad ædicularum trabes conficiendas aptum est, cum alibi parvum sit. Vide lib. 1. cap. 27. p. 51.

Vires. Dioscorides & Plinius Nerei flores & folia mulis, asinis, canibus, ovibus, & quadupedum plurimis venenum esse tradunt: hominibus vero, contra serpentium morsus conferte è vino pota, & magis rutâ additâ, imbecilles etiam animantes, ut pecus & capras, si quam bibant in qua folia ea maderint mori. Ast Galenus, cui magis credimus, Nerion foris quidem illitum digerendi vim obtinere, intro vero in corpus assumptum perniciosum ac venenosum non solum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus esse.

Cæterum nerion Jo. Bodæo à Stapel dicitur hic frutex à vâ particula privata & *eguias* amò quasi inamabilis herba: alii à nymphis nereidibus nomen impostum scribunt. Alii *δωρ τὸ νηπῖον*. Quod corpus minime fluidum reddat, sed porum repente intolerabiles exciter angustias: intumescit enim venter, & subsequitur universi corporis inflammatio, omnisque humidi extinctio. Rododaphne dicitur à flore rosæ simili & foliis laurinis: Rhododendron i.e. rosæ arbor, quod alicubi in magnitudinem arboream excrecat, & roseo flore sit.

Ob florum elegantiam & perpetuæ frondis honorem in hortis nostris studiose colitur. *Rains.*

OLEUM.

De Oleis notandum.

1. *Olea sunt liquores inflammabiles, unctuarii & levis.* Liquores sunt, quatenus & sulphura alia sunt solida sive sicca, alia spissa seu mollia, alia fluida, pro diversâ consistentiâ quam obtinent. Ad liquida verò spectate olea, sensus testatur, alieno enim termino sive spatio contineri debent. Sunt inflammabiles liquores, *τὸ φλογιστὸν* enim de essentia est sulphuris. Quodcumque itaque oleum inflammabile non est, olei nomen non meretur, ut tum acida, ita dicta dicta, olei *Q. li.* *Q. is* exemplo (qui spiritus sunt saturati & concentrati magis,) tum alcalia & media, exemplo olei tartari p. d. Et quæcumque olea magis sunt inflammabilia, p. æ aliis etiam sulphur eminens & purius ac sibi relictum possident. Unde decantata est pristinis temporibus naphtha, quod ignem ad se quasi rapiat, & petroleum, quod naphtha creditur, oleaque destillata respectu aliorum id latè demonstrant. Unctuarii sunt liquo-

non adulterato aliquot guttulæ aquæ subinde instillantur, paucorum dierum spatio incorporatur & imbibitur eadem. Possumus etiam statuere, ubi definit aqua, ibi incipere sulphur; seu rudimenta prima sulphuris consistunt in lentore grosso subtiliando hinc, digerendo & exaltando calore & adjunctis. Ut terra gignit sal, ita aqua gignit sulphur, quæ duo gignentia sunt materia prima, & universalis genuina communis omnium corporum mixtorum. Sal vero & sulphur gignant mercurium, tanquam evaporabile principium, quæ singula veterum rerum illustrent magis & sunt curiosissima, addenda illis quæ alibi de principiis rerum commentati sumus.

6. *Salia sulphuræ oleosa liquata modificant, acida, urinosa, vel neutra.* Admixta cum sint individui sulphuris salia, etiam liquidi seu oleorum, merito diversitas præcipua oleorum, & affectiones ac phænomena alia ex hoc fonte sunt arcessenda. Acida bituminum conjugium magis amant, ut propriè loquendo bitumina vocanda hoc sensu, & teste experientia sunt, quæ sulphuri copulatam habent acidum; exemplo bituminis ipsius seu gummi aiphilii, quod si destilletur, oleum copiosum cum spiritu acido fœnerat; exemplo sulphuris ipsius communis, ubi acidum fere superat sulphur, vel ita nexum est intime, ut facilius separari possit acidum à sulphure, exemplo spiritus sulphuris, quam sulphur ab acido, beneficio ignis. Volatilia resinis in his junguntur, exemplo camphoræ, & plantatum roscidarum. Sane verum quidem est, resinas non paucas stipatas esse acido sale, ut resina gialapæ, scammon. ligni sancti &c. Ast id fit ob diversitatem mixturæ & resinatum ipsarum. Satis interim nobis sit, acidum fixioribus resinis combinatum esse magis, & ipsa verò bituminosa sunt resinæ; urinosum alcalinum volatilibus, & prout hæc se invicem superant, acidum sulphur, acidum urinosum alcalinum, vel vice versa, vel se temperant, moderantur & sustinent, sic & variare reuera olea. Neutra autem vocabimus, quæ sensum ferè fugiunt, neque separari ita queunt, fixa tamen magis sunt, & ad acidum refractum inclinant, exemplo pinguedinum quarumcunque liquidarum, unde dulci sunt olea recentia expressa, olivarum, buryrum ipsum è spiritibus oleis, &c. ast temporis successu rancescunt & acrimoniam salinam extra vertunt, unde nuces vetustæ rancida rursim & rancidinem excitant, cum tamen recens oleum eandem potius deliniat. Imò sal illud etiam in recentibus nucibus juglindibus observatur, si enim largius comedantur, inducunt linguæ quandam manifestam asperitatem, ob abiterationem continuatam.

7. *Olea maxime è seminibus plantarum & fructibus, hinc floribus, foliis, radicibus & lignis proliciuntur.* In semina vis plantarum omnis tandem decumbit & transit, unde in iis vis oleosa pro novi germinis vitali sulphure, reconditur. Hinc semina largissime omnium largiuntur olea, tum exprimenda, tum destillanda. In illis, verbi gratia, seminibus 4. frigidis sulphur aquosum, lentorem quasi contrahit, unde ibi persistit; in aromaticis verò sale volatili sulphur embryonatum vilitur. Ad semina merito referuntur nuclei, tanquam semina arborum, ut & acini, ailli aliaque ejus generis. Ex fructibus scotum olivæ instar omnium sunt. In quibusdam verò corticibus magis immersa pollent olea, ut in citris & aurantiis pomis. Adeoque, mirè dispersi est vis oleosa, sive sulphur plantarum, ut, instat regulæ, in quibus partibus plantarum seu vegetabilium sulphur roscidum hospitarur copiosius, ex iis quoque olea *καὶ ἐξ ὧν* eliciantur. Indicio hujus rei tum alia sunt dicenda, tum quoque præ ipsæ antheræ. Hinc post semina & fructus consimiles huc faciunt flores, unà cum antheris suis. Antheræ enim plantarum nihil aliud sunt, quam sulphur efflorescens subtri-

lius. Hinc consultum est easdem in destillatione oleorum ex floribus non abjicere, sed retinere. Sic v. g. flores rosarum utique parco proventu largiuntur oleum, sed ut hoc habeas atque acquiras, non solum folia, verum quoque antheram assumas oportet, illa enim oleum continet, quod monitum non est de nihilo. Utque floribus antheræ, sic semina ipsa obstetricantur floribus ad parturiendum oleum, unde si oleum rutæ parandum fuerit, nisi semen una cum folliculis contusis remiscueris, vix ac ne vix quidem quid olei obtineris, sed operam perdis, verba sunt *Simonis Pauli in quadrip.* Idem dicendum de majoranâ & aliis. Operæ ergo pretium est, *καὶ τῶν* quædam notare de obtinendis & parandis oleis.

8. *Quacunque sunt magis unctuosæ, roscidæ, odoriferæ, gelatinosæ, resinosæ, illa etiam copiosius largiuntur oleum.* Omnia quidem mixta pollent principio hypostatico, sulphure, non omnia verò oleum largiuntur, nec eadem quantitate. In quibus sulphur minus potest liquari, ob vincula intimiora, in iis quoque olei separatio, etiam si maxime sit resinosum, difficilior est, exemplo laudati sulphuris communis, & camphoræ, & contra. Duplex verò potissimum medium patefacit olei præsentiam, seu ad oleum præparandum aptitudine, (1.) odor. Ubicunque sulphur magis pansum est; inde quoque cæteris paribus oleum elicitur magis. Odor, inquam, testis sale volatili remixti sulphuris, adeoque resinæ volatilis ætheris, & consequenter olei consimilis exin impetrandi. Odor contradi distinctus sapor. Unde è contrario, in quibuscunque sapor præeminet præ odore, etiam si volatili acrimonia conspicuus, illa respectivè parcius & minus oleum fundunt. Valet id imprimis de iis, quæ alterâ dicendâ qualitate non simul sunt conspicua. Atque hinc patet, quare ex cochleariâ, nasturtio, lepidio, omnibusque antiscorbuticis plantis oleum non nisi parcissime destilletur, cum tamen sal volatile copiosum largiantur, quare piper, cubebæ & similia minori quantitate itidem & vix desideratâ quantitate idem exhibeant, imò quare oleum piperis vix acrimoniam illam allequatur, quam offert piper in substantiâ. Utur enim & sal volatile maxime pansum sulphur junctum habeat, prædominatur tamen sal, & sulphuris texturam in se mutat & abripit. Excipiuntur verò, quod innuimus, illa, quæ ob intimiorem texturam aqueæ substantiæ accessionem excludunt. (2.) Substantiæ modus & textura, unctuositas, undecunque emergens & demonstranda, seu visu, sicubi se offerat resinositas, pinguedo, bituminositas, seu tactu, verbo, unctuositas & huic connexa inflammabilitas ibi oleum impetrare licet magis per artem, laudatis processibus; id quod eum in seminibus extet magis, hinc enim præ reliquis oleis pollent. Eadem ratio est gelatinositatis; unde ossa omnia copiosissimum largiuntur oleum. Eadem resinositatis solius, citra odoris eminentiam, quamvis si emineat magis id valeat, exemplo ligni rhodini, quod oleum abundè fundit. Contra in lignis aliis fixior est paulo resina, ut in ligno aloës, sancto &c. unde &, nescio quâ credulitate persuasi, nonnulli frustra oleum ligni sancti inter non entia retulere, quod tamen jamdudum ipse *Scaliger ex. 161.* in luc. 9. ea interius etiam commendavit; idemque cum oleo caryophyl. & camph. odontalgicum constituit probatissimum. Idem de lignis omnibus valet, unde ad alendum ignem magis expetuntur, & in fuligine quoque abundantissimum oleum, quod ignis injuriam prætervectum est, ostendunt. Imò communiter segmentis ligni pini vel abietis (ligna enim resinosa magis oleosa) proventus quorundam oleorum, ut chamomillæ, facilitatur. Ut non adducamus, ex lignis quoque omne genus oleorum & picis, velut bituminis, posse demonstrari toto die. Et solent oleo pini vel pinistri quoque

quoque, in primis Austriaci, *Krumholtz* vocant, pro panna vulgouti, imò & balsamum sulphuris vili pretio in copia cum eodem parare in quibus verò (3.) utrumque concurrat, odor & unctuositas resinosa, ea copiosissimum præ aliis præbent oleum, exemplo olei nuc. mosch. imò & radicum, ut angelicæ, baccatum, ut juniperi &c.

9. *Liquationi sulphuris siccæ & dispersi in plantis prius maceratis & ignis inservit.* Diximus quidem jam de liquatione sulphuris intrinsecæ, quod eandem faceret aqua, tanquam primum liquidum, interpretare sale; at hoc ipso nondum emergit oleum, seu sulphur liquidum, nisi quoque accedat liquatio extrinsecæ; qua utraque demum obtinetur oleum. Sulphur sic cum liquandum est, aqueis enim distemperatur potius sape, ut minus elutriari possit. Observavit idem quoque *Fernelius*, species, è quibus oleum fuerit destillandum, siccas esse debere innuens, ut humoris alimentarii & aquei extementitii minuat portio. Secundario etiam hoc facit concilio & confusio, ut exigi sic magis sulphur & in liquidam afferi formam possit. Illud quippe est necessarium & primum requisitum macerationis instituendæ; alterum constituit aqua, affundenda & per unum alterumque diem sic relinquenda. Videmus sane aquam alluvione suâ & beneficio motus, & cum primis partium salinarum, sensim vel è lignis elutriare & suffurari resinam oleosam, teste ligno aquâ vecto, *Flosholtz*, quod porosius & respective minus igni fovendo aptum, ac sibi extra elementum aquæ relictum, & terrâ asservatum. At si tertium accedat, longe melius id succedit, id vero est sal commune & tartarus. In quibus scilicet dispersæ sunt magis particule unctuosæ sulphureæ, ex iis non, nisi magna quantitate destillantur, oleum acquiritur; & vice versa. In utriusque talis maceratio convenit & necessaria est ad melius. Tacemus sic etiam digerî & quasi fermentari ex parte plantam; unam sufficit nominasse macerationem. Macerationem dico, nam putrefactio minus concinna est. Quamvis ergo sint, qui ex corticibus citri vel aurantium corruptissimis per putredinem optimum oleum destillari velint; rectius tamen recentes aut saltem non corrupti exiccari assumentur. Vegetius enim & magis seminale ac genuinum oleum citri & aurantium sit, ut in prioribus sal volatile oleosum mirum quantum immutatum est. 10. Igitur ad destillationem herbarum verbi gratia, majoranæ, vel florum, ut chamomillæ, & seminum, ut carvi &c. & comp. M. j. vel alterum, pro quantitate materiæ destillandæ, & tartari contus. unam alteramque unciam. Affusâ aquâ stent in digestionem per aliquot dies. Hinc l. a. destillantur. Ita enim ignis liquationem ulterius juvat, & liquidum oleum cum aquâ evehit, vitro hypocleptico hinc separandum.

10. *Æthereis oleis destillatio humida magis convenit per vesicam; reliquis magis siccâ.* Duplici *ἐκκυσθη* liquatur sulphur. Ex quibus liquari potest viâ humidâ, affusione aquæ & digestionem, melius longe est & consultius eam eligere præ siccâ ob necessarium nempe empyreuma. Possunt sane impetrari olea ex plantis quoque, ex corticibus & reliquis solo ignis impulsu & liquatione, exemplo olei rutæ; verum illud simul immutatur & empyreuma contrahit, narcoticum etiam simul, & vaporosum evadit. Cum itaque & ob subtilitatem ascendere possint ac evehi, ob dispersionem verò & salis volatilis admixtionem evaporatione humidâ liquari & resolvi, regulâ destillationum generali gaudent, quæ hisce solum competit. Eligitur verò ignis vesicæ, tum quia fortior est, talis enim requiritur ad sufficientem propulsionem, cautius tamen in volatilibus & per gradus administrandus; tum quia capacius hocce vas & copiâ opus est plantæ, ex quâ destillandum oleum. Quod si vero in extantiori

sulphure viâ siccâ uti placeat, & verbi gratia, ex caryophyllis, ex cinamom. oleum propellere, eligendum fuerit MB. licet magis id in recentibus succedat in Indiis, apud nos enim minus in usu est. Tale etiam empyreuma in oleis secundario destillatis sine occurrat, ut 9. tartari foetid. serpent. lumbrie. C. C. &c. Empyreuma enim adustum sulphur notat, magis quancumque verò sulphur vel minus subtile est, vel aquæ non obtemperans ob copiam & cohesionem, aliasque remoras, in oleum non nisi viâ siccâ facessit. Liquidum verò semel per alembicum rectificatur. Exemplo sit oleum succini, quod frustra per alembicum pellat, propulsum verò per retortam ex alembico seu vesicâ vehiculo aquæ separatur, ut pars subtilior ascendat, reliqua sub olei nigri spissi seu biruminis concremento remaneat. Singula hæc illustrat terebinthina Cypria, ex quâ oleum paratur viâ utraque, affusâ aquâ & sine eâ per alembicum, ex residuo grossiori etiam per retortam. Variant enim olea, utpote sulphuris liquidum foetus, pro huius vario modulo. In quibus sulphur est aquosius, terreæ substantiæ immersum, ex iis olea crassa expressione consurgunt, nec destillari ex eadem integrum est, viâ humidâ, exemplo seminis hyoscyami, vel similium. In quibus vero sulphur sale volatili embryonatum est, adeoque æthereum magis, illa olea destillata & ætherea fundunt, licet, quod jam diximus, & media dantur, exemplo 9. nucis moschatæ, quod ipsum tamen magis est æthereum, & magis ob copiam quam aquositate exprimi gaudet. In quibus autem sulphur medium est, subtile quidem acido tamen magis sigillatum, exemplo ligni sancti, succini tartari ipsius, illa fundunt quidem oleum, sed non æque super alembicum, præterquam quoad partem subtiliorem, evehendum.

11. *Olea viâ siccâ destillanda dissocianda sunt prius, exceptis bituminosis etiam per se destillabilibus.* Sulphura ab igne patiuntur præcipuum impetum, concreta & siccâ funduntur vel aduruntur, (conclusa vasis hoc loco,) liquida agitata spumascunt & *ἀπυρρῶν* patiuntur mirum quantum. Hinc sibi relictæ nec aliis particulis dissociata pleatilibus suis ramis se invicem detinent, ut concatenata non tam in oleum abeant, quam integra liquata consociantur. Cum itaque fluorem subire debeant sulphura, ut liquidâ formâ se conspicienda præbeant, & quæ liquida jam sunt, destillatione attenuentur ac subtiliscentur magis, facile efficitur eò magis esse dissocianda, quo magis sunt liquida. Hinc (1.) *olea expressa destillanda maxime omnia sunt dissocianda*, exemplo olei laterini, seu phosphori dicti, quod sit, si fragmentis laterum prius calefactis aliquo modo, ad meliorem imbibitionem, affundatur successive oleum olivarum, & quibus imprægnatis destillatio fit in recipiens capacius per retortam. Ita enim particulis terreis incarceratum spumascere nescit, uti igni appposito, exemplo coctionis pro emplastris, pro pigmento typographorum, *Farbesieden*, id apparet toto die, sed liquatur & in oleum stillat pacate, cæteroqui mox retortam transiit eadem facie in receptaculum (2.) *Pinguedines & quasi tales, aliaque molliora his analogâ destillanda, optimè dissociantur terreis & salinis, s. q. commixtis.* Exemplo sint adipēs, pinguedo humana lapo, cera ipsa. Potest quidem pinguedo humana ad instar olei laterini destillari, si ossibus humanis, ut nonnulli eligunt, in frustra g. m. contusis imbibatur, sed citra illum apparatus aliis minori sumtu id peragitur alcalinis quibusvis, (&) cineribus. Si cineres dictis illis, igne liquabilibus corporibus, quibus addi etiam possunt lumbrie, facile per se destillati spumascunt, in retortam vitream politis superingerantur s. q. ad ipsum quasi collum, & sic per 3. am destillantur, non indigentes fere rectificatione ulteriori (3.) Globulis vel d. util.

destill. *Uis* Θ is residuo. Id sanè observavimus longè optimum & ad dissociandum, & compescendam effervescentiam, (etiam in spiritibus ex talibus proliciendis,) ut in cera & aliis. Ex quibus patet unà, Θ o saponis nihil aliud esse quàm oleum pinguedinis, è qua coaluit sapo, destillatum & subtilisatum, unde in contracturis magis quàm podagra locum habet; laterinum nil aliud esse, quàm ol. oliv. ex imbibitione laterum destillatum & subtilisatum, quod resolvens est egregium. Pertinet huc & oleum ad scrophulas *Langii in epistolis*, ex quo idem mutuatus est *Helmont. l. 7 non in pot. p. m. 205.* Succinum verò, & alia bitumina huic affinia, possunt destillari in oleum & per se, quod oleum æthereum & oleum fixum, crassum, bituminosum, phlegmate acidulo, sale volatili & terra hæc singula sustinente constet. Per se inquam, v. g. \mathfrak{H} j. & ex retort. vitrea per \mathfrak{A} am destillatur, sed cavendum est, ne ignis primitus subdatur fortior, ad præcavendam ebullitionem, secus instar picis profluit in recipiens, hinc verò perfectè destillandum sub finem fortiori igne. Potest etiam fieri eodem modo cum \mathfrak{U} *Uis* Θ is, utrobique rectificando, ex vesica cum aqua, oleo flavo vel albo. Quæcunque enim, (ut in spirituum quoque destillatione exemplo, \mathfrak{G} -li, &c.) terram dissociantem jam secum possident, minus egent hujus additamento.

12. *Color oleorum destillatorum pro varia sulphuris ab igne & sale expansione variat.* Visa *εγχειρησ*, curiosum erit attendere & affectiones resultantes, & primum quidem colorem. Occurrit imprimis color albus, flavus, nigricans, & cæruleus. Hæc ut seorsim in aliis visuntur, sic conjunctim quasi in succino occurrunt, quod omnes istos colores exhibet, adeoque instar omnium esse potest. Album oleum ex albo magis succino habetur, quod subtilius est, & terreis partibus magis dissociatum firmitusque. Uti aliàs quoque album colorem obtinent olea magis ætherea, blandiori calore propulsa, sale volatili subtiliori remixta, qui ipse tamen color non æquè constans & permanens est, sed ab expandente magis magisque sale volatili sensim & sensim in flavum declinat. Flavus ille color medius & magis ordinarius est. Hinc ætatis oleorum duo cumprimis sunt indices: color albicans, privativè puta, magis aquetus, tenuis, reliquis carens, & fluiditas major, utrisque conjuncta subtilitate. Quò magis verò ab his duobus defleunt, eò majoris sunt ætatis. Et mirum est, quomodo olea caryophyllorum, cinamom. & aliorum sale magis foetorum tincturam illam auream assumant & expandant, insensibili omnino motu. Albus color quò magis fuerit, eò oleum est magis æthereum, flavus mediat, nigricans bituminosorum oleorum ferè proprius, exemplo Θ o succini nigri, præon. destill. lign. sanct. Tartari, &c. Picis ille est æmulus, fixiori balsamo gaudens. Præcipue verò curiosus est color cæruleus, qualis resplendet *ναλ εγορν* in chamomilla. Cæruleo splendore pulcherrimè enitet, qualis aliàs est \mathfrak{Q} is expansæ, unde prima facie videri potuit vasis cupreis deberi, sed frustra, siquidem aliis oleis æquè subtilibus idem non obtingit, & si instrumentis stanneis vel vitreis paretur, idem obvenit. Eundem colorem etiam observavimus ordinariè in oleo succini per retortam perfectè destillato, prius quàm rectificaretur. Eundem videre toto die in infuso ligni nephritici, cujus affectio propria est, quod aquam cæruleo colore inficiat, eà tamen notabili differentia, quod variet hic color, pro diverso lucis oppositu. Cæruleus apparet à latere, transversis magis radiis oculo observantibus; flavescens, seu ex flavo ruber, si medius

inter lucem & oculum verteretur liquor. Præter rationem verò hanc, ex luminis positu petendam, deducere id intimius licebit ex sulphuris, tanquam matricis lucis, textura diversa seu peculiari. Illustrabimus id experimento mechanico, quod rem totam & genuinam rationem patefaciet magis: miscendo nempe v. gr. essentiam ligni aloës cum *Uis* Θ is \mathfrak{K} ci, ubi extemplo idem color cæruleus, qualis est ligni nephritici, habetur ad oculum. Ex quo arguere licet, colorem cæruleum adscribendum esse soli volatili cum resina expansa saturatori combinato, ita, ut se invicem subpræcipitent. Confirmat hoc exemplum laudatum infuso ligni nephritici, & aliis. Atque hinc quoque oleum succini & chamomillæ nervinum & paregoricum est egregium.

15. *Consistentia oleorum destillatorum, concretum vel fluidorum, pro proportionem salis volatilis & sulphuris commixtorum itidem variat.* Dignum admiratione est, olea quædam destillata butyrosa, vel potius ad instar spermatis ceti velut coagulata ac crystallisata apparere, frigori exposita. Sic Θ o anisi præ aliis ad frigidi aeris appulsum mox gelatur quasi, & solidam fingit formam, exurâ fluiditate omni. Idem visitur in oleo rosar. destillato, imò & in oleo scæniculi & cinamomi minori quantitate asservato vidimus, hastulis crystallinis egrediis se offendentibus. Sic & oleum ceræ ordinariè ad mediocris frigoris appulsum butyrosus est, seu eodem modo, ac dicta, se habet in suo genere. Non verò id fit tam ob coagulum aquei inexistentis, ut aliàs frigore urgente videmus spissari oleum olivarum, quàm ob proportionem salis & sulphuris tenuati, quando scilicet salis volatilis vel quasi talis consimilis proportio excedit aqueo-oleosi *ουσαν*, ita ut quando frigore concentrantur poris, mox expandat alas & sui reddi juris gestiat sal volatile; unde consurgit talis concretio.

14. *Oleorum levitas sulphuri æquali & fluidiori, gravitas & subsidentia sali ponderoso, & sulphuri concreto magis debetur.* Duplex hoc loco attendi meretur ratio, quare olea misceri aquæ renuant, & quare quædam seu plurima supernatent, quædam subsideant potius sive fundum petant. Prius fit ob discrepantiam pororum & figuratum: particule oleosæ sunt rotundæ ad intra, & ramosæ, plicatiles, viscidæ; aquosæ non rotundæ, nisi ad extra, & apparenter, subrotundæ magis unaque laxæ, unde diffunduntur facilius, neque sibi invicem sic inhaerent. Alterum ob levitatem vel gravitatem. Omne leve fluido non miscibili junctum, seu fluidum, seu solidum, si fluido illo fuerit magis leve, supernatat, quantum nempe occupat spatii dimensionem. Omne gravius è contrario, sive fluidum, sive solidum, fluido commissum, cui ob atomorum discrepantiam misceri renuit, fundum petit. Non dicemus de fluidis aliàs sibi homogeneis, quæ ob motum transmissionis diversum non è vestigio se invicem subire deprehenduntur, sed insigni sæpè spatio sub vel subter feruntur, exemplo quorundam fluminum concurrentium, sed de quietis aliàs. Exemplo sit argentum vivum, cui omnia metalla supernatant solo auro excepto. Exemplo olea, quorum alia supernatant aquæ, alia subsident. Cum itaque certum sit, non omnia olea supernature aquæ, licet plurima id præstent, quin quædam potius fundum petere, ratio diversitatis hujus investigatur curiosa est. Illustriora hoc censu sunt ol. cinamom. & caryophyll. quæ, ut communiter prostant & destillantur, tantum abest ut supernatent & emineant, ut potius ad fundum mox præcipitentur, vel hoc signo quoque bonitatis notam exerente. Idem verò non novum est observare in aliis, ut vel in ol. tartari foetido patet,

cujus pars summa petit, pars in imum detruditur. Imò idem rectè oleo anisi tribuitur à *Guiffonio epist. apud Poterium*, oleo ligni sassafras, teste *Sala*, item o benzoës ab aliis. In quibusdam enim vegetabilibus præ aliis manifestum oleum destillatum duplex habetur, [1.] aëreum, volatile, subtile & supernatans, [2.] saturatius & ponderosius fundum aquæ petens. Cum igitur indubiè ponderi debeat majori subsidentia, sal verò gravitatis sit principium, unde ligna quo plus habent salis eò ponderosiora, exemplo quercus, & contra, exemplo suberis; & digestionem oleorum cum salibus idem impetrari possit, ut quæ in sublimi innatabant prius, jam fundum petant; concludere rectè licet, id contingere à salis volatilibus majori vel minori consociatione. Hinc ol. caryophyllorum & cinamom. acrimonia & caliditate majori gaudent, unde & in sphacelo præ aliis eliguntur, & illita cuti ardorem & rubedinem, salibus propriam, inferunt. Hoc ipsum ut de æthereis & per vesicam vel Xcum destillatis præcipuè valet, ita altera ratio in aliis addenda est, conglobatio seu spissitudo particularum oleosarum major. Quæcunque olea etià destillata magis sunt viscosa, ea facilius subsident, nō aliter ac balsama quoque fluida seu mollia id faciunt, cohesione enim illa sua gravitatem acquirunt majorem. Exemplo sit oleum tartari & simile, ex acido juncto vel bituminoso propulsorum magis: item, quod experimenti instar esse potest, oleum juniperi. Hoc ipsum recens destillatum, aëreum, tenue, tenerumque est, & supernatat aquæ; aliquot verò annorum spatio lentescens & spissius redditum aquæ instillatum, modò plures guttulas instillare pergas, mergitur. Ex gemina verò allata causa, una & prima stabilitur gravitas & ponderositas major, seu improporatio molis se sustentantium corporum.

15. *Olea expressa, coctione vel infusione varianda, viribus emolliendi potissimum polent.* Vires oleorum dum expendimus, commodè dispelci possunt [1.] ratione subjectorum in genere, aliæ nimirum longè sunt expressorum aquosiorum, aliæ destillatorum. [2.] aliæ sunt in utrisque genericæ, aliæ specificæ & seminales. [3.] aliæ quoad usum & applicationem ipsum internæ, aliæ externæ. Quod itaque expressa olea attinet, in genere virtute emolliendi omnia conveniunt; æmulantur quippe pinguedines, unde laxant, leniunt, lubricant, & duritiem, tensionem, siccitatem corrigunt. Habent enim in se humidum copiosum, habent mucilaginem. Hinc oleum amygdalorum dulcium, tanquam mage polychrestum, in colica, in ardore faucium, ad citandum vomitum, in calculo cum vino malvatico, vel succo citri, ad leniendam alvum in infantibus cum saccharo penidio, ad abdomen illinendum in gravidis, in clysteribus, in doloribus tensivis &c. locum invenit. Idem suo modo valet de oleo olivarum, ovorum, quod in fissuris mammillarum, hernia, nævis variolarum, & aliis prodest, lini, quod in pleuritide & dysenteria leniendi illa vi commendatur à *Rulando* & aliis. Præ aliis etiam polychrestum est oleum hyosciami, pro externo usu instar omnium. Singula hæc, inquam, æstimanda præcipuè sunt ex virtute generali, unde & oleum nucum juglandium & papaveris ipsum huc spectat. Cum verò olea illa expressa de virtute seminali non æquè participant, distinguì potest [4.] inter olea expressa aquosa & aromatica: hæc magis specificæ, magis seminales sunt, exemplo olei macis expressi, olei nucis expressi, olei laurini expressi, olei juniperi expressi, quæ virtutem suorum simplicium sequuntur, imò exhibent genuinam. Addi etiam potest oleum sinapios ipsum. Et hinc factum est, quod olea illa viribus seminalibus vacua ars exaltare sustinuerit, parando olea per infusionem, coctionem & expressionem, tum simplicia, tum composita,

exemplo olei absinthii, menthæ, anethi, cheirini, verbatci, momordicæ, ad partum inter alios usus difficilium, oleum scorpionum simplex & compositum &c. His per aliquot secula usi sunt medici, prius, quam destillata invenirentur. Sed ut verum fateamur, parum virtutis seminalis expectandum est ab hisce solis; siquidem prædominans vis oleosa emolliensprehenditur in singulis, unde cavendum est, ne dum roborare volumus, hisce solis utamur, v.g. in affectibus ventriculi; robur enim ex robore villorum & fibrarum juxta ac caloris dependet, debilitas ex flacciditate. Hinc satius est, vel balsamis uti molibus, vel oleis expressis liquidis coctisve, accessione oleorum destillatorum roboratis, ita enim optimè res succedit, correctæ laxitate & torpore expressorum, & retusa exhalatione volatili destillatorum. Sic in paralyti possumus quidem uti oleo cheirino, castoreo, costino, irino, satius autem fuerit, olea destillata, succini, lauri, rosmarini, majoranæ, spicæ addere, quæ ipsa per se illiæ brevi temporis spatio exspirarent. Ita verò coercita & longius & efficacius operantur. Idem valet de resinis inibi liquatis, uti oleum bezoardicum ex camphoræ p.p. in olei amygdalorum dulcium parte tripla vel quadrupla, calore arenæ soluta, sit, addito momento olei citri, & tinctura ab alkannæ radice, quod in anxietatibus præcordialibus & febrilibus eximie medetur, in febribus malignis, pleuritide, dysenteria optimum, externè quoque oleum renovativum ingreditur, addito oleo amygdalorum amarorum & pinguedine viperina. Hinc etiam oleis adstringendi sine fidendum non est, ut & unguentis.

16. *Olea destillata calorem & spiritus roborant, balsamica, traumatica, carminativa, diuretica, resolventia, specifica.* Calor oleis destillatis intenditur manifestè, interius cumprimis, quod particulis gaudeant & adagentibus oleosis, & rarefactivis, salinis, volatilibus. Ubicumque ergo intendendus est idem seu in toto, in cachecticis, frigidis, paralyticis, olea destillata eximia sunt, seu in parte, frigiditate ventriculi, nervorum, ligamentorum. Singula virtutibus genericis, balsamicis, calefacientibus conveniunt. Utque balsamum sanguinis vitale deficiens restituunt; ita cavendum est, ne exacuent id ipsum, unde in dosi parcius mercandum est. Ob eandem virtutem balsamicam sunt quoque traumatica, exemplo olei terebinthinæ, olei tartari foetidi, quod expertissimum est, &c. statim enim sic condiuntur, vulneratæ partes, ut absque omni suppuratione promptissimè coeant. Hinc ut destillata traumatica sunt, ita expressa & infusa, præterquam balsamica, vulneribus & ulceribus sunt inimica. Sic oleum ceræ in fissuris papillarum & dysenteria experimentum est egregium. *Carminativa* sunt, quod & calorem roborant & resolvunt, unde in colica, inflationibus, aliquando & in ipsis clysteribus, aliàs verò & interius & exterius profunt. *Diuretica* sunt, quia fundunt sanguinem magis, atque ad vias urinarias hinc impellunt, addito calore, motu & stimulo. Hinc largius assumpta faciliè diabetea causantur, quod à balsamo sulphuris vidimus factum. *Resolvunt*, seu sunt humorum & spirituum promovent, ubicunque demum sit remora; sunt enim summè activa, sunt ex chimia præparatis præcipua, & vires velut concentratas habent, in minima mole maximam virtutem exerentia. Hinc etiam sunt genuina anodyna & paregorica, dissipativa, promptè sabveniunt interiorius cita resolutione, exterius penetranti virtute. *Specificæ* demum sunt duplici nomine, tum determinata magis virtute, tum indicationibus specificis appro-

appropriata. Sic oleum succini catarrhale est, antepilepticum, oleum majoranæ odoratum roborat, oleum caryophyllorum in febribus intermittentibus, cardialgia, fugore, odontalgia expertissimum, oleum cinamomi & caryophyllorum cordiale, stomachicum, angelicæ bezoardicum est. Tacemus alia, & ipsum balsamum vitæ confortativum insignissimum.

17. *Oleorum sibi similia commoda aliquando permixtio; adulteratio dignoscenda est.* Sunt quæ inter se odore conveniunt simplicia & eorundem consequenter olea, quæ hinc substituitur non raro, tanquam succedanea genuina. Valer id notissimo exemplo olei ligni rhodini & rosarum, quod tanto magis licet, imò necessarium est, quod parciore hoc proventu, illud largiori & minori pretio proveniat. Magis tamen id valet de usu externo, quam interno. Alio enim charactere seminali pollent, oleum ligni rhodini magis resinofum est, spissius respectivè, oleum rosarum subtilius & tenerius, puta quoad texturam intrinsecam. Solet tamen & in hoc consulto notari, si oleum rosarum præscribat, ut addatur: veri. \mathcal{Z} . \mathcal{O} . rosar. ver. &c. Ipso verò sulphure roseo longè adhuc subtilius est violaceum, quod fugax est, volatiliusque, unde nec destillari ex violis oleum potest. Neque enim resinofum est, nec liquabile æquè. Sic & in aliis similibus se res habet, lignum sassafras & fœniculum sibi videntur odore homogenea, ut & olea eorundem, differunt tamen omnino, unde & delicatissimum & elegantissimum oleum ligni sassafras commendandum venit, quod præcipuum est inter destillata ex lignis. Cum itaque non per omnia conveniant, nec pro interno usu sibi substitui queant olea destillata alioqui conformia, longè minus cum fructu adhibentur olea destillata adulterata. Possunt adulteria hæc concedi in aliis quoque externis, ut oleo chamomillæ, modò id sciamus, neque adeò noxia sunt, sed cæteroqui indemnita, ast scopò minus apta. Sic olea rosmarini, citri, spicæ, cum oleo terebinthinæ vel pinastri adulterata confortandi finem parum assequuntur, licet & ipsa hac resinofitate sua substantiali illis ex parte accedant. Sic oleum cinamomi cum oleo been vel amygdalorum dulcium adulteratum tum aliis artificiis deprehendi potest, tum infallibilibus illis *vermetis*, odore, sapore & lentore, præcipuè in mixturis.

18. *Olea destillata & cum fœccis quibusvis imbibiti, & in liquida concentrata & diffusa didi amant.* Misceri cum fœccis solent, tum sui gratia, tum additorum. Illud fit, ut ne ob activitatem vel caliditatem noceant, sed diffundantur latius, quod & de aliis in genere valet. Hoc, ut pulveres v. g. terrei & alias segniores vel gravantes quoque sic correctionem inveniant. Quis nescit oleum pulveribus purgantibus eo fine remisceri toto die, non minus ac confortantibus, stomachicis, cordialibus, absorbentibus & præcipitantibus? Sanè solo oleo caryophyllorum, cum conchis remixto, obtundimus ardores, singultus & cardialgias in dysenteria & aliis extra febrem. Omittimus pulveres febriles eodem acutendos præprimis & roborandos unice, ut & pulverem absorbentem, in lipothymia præcordiali, aliisque & syncope ipsa probatissimum. Elæosacchara ad senos invitant, quibus olea vel simplicia destillata, vel composita excepta intelligimus cum saccharo, forma sicca. Ita verò & disjunctio impetratur, ut guttulas dosibus metiri possimus pro lubitu, & miscendi olea cum liquoribus etiam aliis commoditas, ut vel sic vina etiam medicata haberi possint, quatenus saccharo incorporatum oleum mellissæ vinum mellissatum & sic in aliis quoque præstat, citra ullam difficultatem. Elæosacchara ergo parantur, tum pro intentione primaria, v. g. roborandi ventriculum, diffi-

pandi flatus; tum, quòd ferè frequentius, secundaria, modò seligantur & illo fine olea magis ætherea, recentia, non rancida; nec majori dosi remiscenda, ne ingrato sapore nauseam cieant, v. g. ad \mathcal{Z} j. sacchari \mathcal{D} ss. ad \mathcal{D} j. vel ad \mathcal{D} ss. sacchari gutt. j. licet & minuire id adhuc possimus.

19. *Olea salinis, aromaticis & mollibus mediantibus præcipuè & frequentius alia subeunt.* Salina, quidem juvant, si accesserit una spiritus vinosus. Ex his, præter jam laudatum saccharum, tanquam sal sui generis, duo potissimum memorabimus; fixum & volatile. Cum tinctura tartari saturatori, vel antimonii tartarifata, oleum destillatum hoc illud, pro re nata, v. gr. sassafras, anisi, fœniculi, citri &c. remisceri potest optime. Salia recipiunt olea solvendo & uniendo, tum cum spiritibus velut magis affinibus, tum etiam cum aqueis ipsis, si id opus fuerit, licet hæc dimittant facilius, vel non admittant consortium. Exemplo si spiritus salis ammoniaci, aquosus non recipit olea, vinosus recipit, sed, quod ex superioribus patet, saltem ætherea ac subtiliora magis. Sic spiritus salis \mathcal{M} ci cum oleo majoranæ in odoratus diffcultate, fœtore vel coryza, cum oleo rutæ in epilepsia infantum officium facit. Idem verò in aromaticis valet quàm maxime, quo fine commendabimus elixir proprietatis oleosum duplex, sive v. gr. cum eodem misceatur oleum caryophyllorum, quod promptè absorbet, sive, (unde fit volatile oleosum,) cum oleo destillato quocunque, tertio interveniente simul spiritu salis \mathcal{M} ci, qui alias nec ipse ferebat illam mixturam, cum hoc verò facilius, additò etiam pro lubitu liquore \mathcal{O} li ipso. Idem valebit sine dubio de essentiis & elixiriis aliis aromaticis, item de sale volatili oleoso Sylvii, de quo inferius. Frequentius etiam idem accidit intermediis mollibus. Ita non solum, beneficio sacchari incorporantis, oleum caryophyllorum in febribus adhibuimus in potionibus, ut oleum febrile non laudemus, sed & mollissima id præstant feliciter, exemplo potiorum quarumcunque ferè, quibus alium atque alium largiuntur effectum, teste Sylvio passim, & aliorum. Exemplo sit liquor balsamicus seu mixtura cordialis balsamica, sæpè à nobis in palpitatione cordis, syncope, virium debilitate &c. usurpata. Ita distemperantur magis olea & mitescunt, unaque coæquantur, ut illius vel bibi substantiatenus æquata possint. Fieri id potest etiam ex solis oleis & spiritibus sine molli intermedio, conqussatione facienda mixtura. An verò, ut hoc tangamus, odorifera hujusmodi oleosa poris ferri vel chalybis intimius insinuari possint, valde dubium est, si non impossibile. Aliis potius artificiis occultitur intus moschus, zibethum, & similia, qualem cultellum elegantem possidemus, Romæ ab amico allatum, ubi parietibus ferri sepultus odor per subtilissimos commissuræ poros expirat, satis tamen & sic mirando artificio. Olea ergò sunt liquores inflammabiles, unctuosi, leves, a sulphure vel cum aqueis, acidisque, vel salinis volatilibus particulis variè li- quato, pro usu emolliendi & roborandi. *Wedelius.*

Hactenus de oleis in genere, jam eorundem variis preparationibus & compositionibus in specie. Schroderus Pharmac. Illustrata & aucta repetuntur.

Olea propriè sic dicta, triplicis generis in Officinis veniunt. 1. Destillata. 2. Expressa. 3. Infusa cocta.

Olea destillata.

Olea stillatitia ex singulis simplicium familiis parari possunt, mineralium, vegetabilium, ac animalium.

Qq 2 MI

MINERALIA, quæ Oleum fundunt, maximè sunt ex genere sulphureorum; ut succinum, carbo Petreæ & simil.

Destillatio illorum eadem est, quæ resinarum vel gummatum.

VEGETABILIA primaria, ex quibus olea destillantur, sunt herba, flores, fructus, semina, radices, ligna, cortices, aromata.

Secundaria sunt olea, resina, gummi.

Modus destillandi olea ex primariis, eadem opéra perficitur, qua Aquas ac spiritus destillari diximus, & ut plurimum per vesicam.

N. 1. *Felicius oleum ascendit, 1. Si nonnihil Sal. com. vel Tart. immisceatur.*

2. *Si digestio fermentatiove præmittatur, cujus promovenda gratia nonnihil facum cerevisiæ, vel & Sal. com. Tart. addi poterit.*

3. *Si oleum præcipue expectatur statim auctiore igne destillatio incipi potest.* Schröderus.

Felicius oleum ascendit.) additio Sal. com. vel Tartar. supervacanea est, modò regimen Ignis observetur, quem æqualem esse convenit.

Fermentationis promovenda gratia.) ad fermentationem promovendam faciunt fæces Keuterlingii, vini, item Saccharum factum S S S.

Auctiore igne.) Intenfiorem Ignis gradum requirunt nonnulla olea graviora; ut Cinamomi, caryophyllorum &c. quàm quæ leviora; ut oli d. Citri, chamemel, sapphirin. Majoran. Menthæ. Spicæ &c. Hofmannus.

I. Ex herbis.

℥. Herbas virides, vel siccas, q. v. contunde ac affunde Aquam, [additoque Sal. com. manipul. uno ac altero, colloca ad putrescendum] hinc destilla per vesicam.

N. *Herba sicca plus olei suppeditant quam virides.* Schröderus.

Hinc destilla per vesicam.] Vesica cuprea statim sit obducta, nec nimis alta, capitello ejus amplius efformato ad formam capitelli vitrei; Et si etiam capitellum vitreum fuerit, ad olea destillanda præsertim ex lignis & corticibus fuerit conducibilis. Hofmannus.

II. Ex Floribus.

[Siccis præcipue] olea ad eundem modum destillantur, præcipue si contusi dies aliquot [14.] adjecta parte Sal. com. $\frac{1}{2}$ [vel hujus loco sacchari.] cum Aq. fuerint macerati. Sic fiunt oleum chamæmillæ, lavendulæ, rosarum, &c.

III. Ex seminibus.

℥. Semen e. gr. fœniculi grosse contusi, libi. affunde Aq. font. ferventem, q. i. addendo Sal. com. M. i. [vel insuper si libet Tart. ℥j. aut ij.] digere dies [8.9.10.] hinc destilla Ign. mediocri per Vesic.

IV. Ex fructibus.

E. g. baccis juniperi, lauri, & similibus, simili ratione, uti dictum, oleum educitur.

N. *Fermentatio promoveri potest addito tantillo facum cerevisiæ.*

V. Ex radicibus.

℥. Radices, conquassa ac digere cum Aqua aliquamdiu, hinc destilla per vesicam.

N. 1. *Præstant sicca uti & quæ collecta fuerunt, antequam in stolones abierint.*

2. *Majorem olei copiam si expetas, destillationis residuum cum Aq. illa destillata macera ac destilla iterum.*

VI. Ex corticibus.

Non lignosis oleum ad eundem cum radicibus paratur modum, v. gr. ex cort. arantior. citri.

N. *Præstant cortices nondum exsiccati.*

VII. E lignis & viscis.

℥. Segmenta lignorum arida, q. v. imple retortam terream, [lutatam,] ac destilla in excipulum sat amplum, igne nudo gradatim adhibito, sic extillat primum liquor clarus, continuato hoc igne post horas [4.5.] sequentur spiritus nebulosi, tandem auge ignem, ut fundus retortæ candescat, sic ascendit oleum nigricans & foetidum, quod à liquore separa ac rectifica. Sic fiunt olea à ligno guajaci, agallochi, buxi, coryli, ebeni, juniperi, fantali, serpentariæ, sic & viscorum coryli, querni & simil.

N. *Fieri quoque possunt per descensum, sed nostratibus inusitatum est, oleumque crassius exhibet.*

2. *Cautè procedas, nec nimium properes, spiritum enim impetuosi receptaculum disjicere proclives sunt.*

3. *Elici quoque possunt olea hujus sortis ex resinosis lignorum Extractis, ad modum resinarum aliarum destillatis.* Kest. cent. 86.

4. *Sunt & ligna, sed pauca, quæ oleum suum, [quod subtilius ac volatilius est,] per vesicam cum Aq. fontana destillata tarde licet, profundunt, ut sassafras, lignum rhodium, cypressinum. Videlicet lignum serratum vel minutim incisum, maceretur in Aq. aliquamdiu, dein destilletur per vesicam; destillatione dies aliquot continuata, prodit tandem oleum.*

Rectificantur olea, tum ex cucurbita, tum ex vesica cum Aquæ copiosa quantitate destillando. Nonnunquam tamen, si ponderosiora sint, arenæ immixta per retortam rectificari opus habent.

VIII. Ex aromatibus.

℥. Aromata grosse contusa, [pulvères minues olei fundunt,] macerentur cum menstruo idoneo, per aliquot dies, [4.5.6.] hinc destilla per vesicam, sic prodit oleum & Aq.

N. 1. *Poterit itidem & aliquid Sal. com. vel Sal. nit. vel Tart. admisceri.*

N. 2. *Alii in ejusmodi oleis eliciendis amygdalas rebus addunt, ut majorem copiam nanciscantur, sed fraudulenter; etenim partem majorem ejusce olei amygdale sibi merito vendicant.*

N. 3. *Alii digerunt primo aromata in spiritu Terebinthina cohobato aliquot vicibus supra al. com. calcinato. Verum nec hi purum oleum aromaticum nanciscuntur.*

N. 4. *Separatio olei ab Aq. fieri potest 1. Subsidente. Nimirum si aliquandiu [14.] destillatum immortum in cella steterit, subsidet oleum. 2. Filtrando per chartam 3. Per gossypium. Vid. l. i. c. 14. Schröderus.*

Ex Aromatibus.] Sic v. g. Recip. caryophyll. libi. fecum vini cochl. iv. Tartar. calcinat. M. ij. Aq. betonice. f. q. misce in vase vitreo; stent in fermentatione per 8. & finita illa destilla per Alembicum simili modo ex aliis etiam olea parantur. Hofmannus.

IX. Ex resinis.

℥. Resinarum lib. 2. vel 3. affundatur Aquæ quantitas copiosa, destillenturque per vesicam.

Sic prodibit Oleum, quod primo clarissimum stillat Aquæ supernatans [dicitur vulgò Spiritus.]

Hinc incipit paulatim flavescere, muta itaque receptaculum, & suscipe flavum hoc oleum, (si placet seorsim,) continuando destillationem, donec nihil olei amplius extillet, [dicitur Oleum.]

Tandem exime materiam in vesica restitantiem, (quæ

(quæ colophonia dicitur,) eamque destilla ex retorta in arena, & extillabit oleum crassum rubrum, (Balsamus vulgò.)

N. Possunt quidem Olea hæc & Balsamus una eademque destillatione per retortam elici, igne scil. gradatim adhibito, verum enimvero p. astat per vesicam priora illa elicere, tum ut præcaveatur empyreuma, tum quoque ne eorum astu labor irritus reddatur, quod alias facile accidit. Si nihilominus volupe sit per retortam ea simul destillare, exsustatio præcavèri potest, si arenam resina liquefacta immiscueris.

Sunt autem resinae usitæ Lentisci, (Terebinthina cypria,) Laricis, id est, (Terebinthina vulgaris,) pini. Schröderus.

Ut præcaveatur empyreuma. Hoc eluxur sequenti modo. Scilicet Recip. Ace. dist. & olei destillati, quod adustionem sapit ana q. l. destilla simul in MB. & habebis oleum multum sine graveolentia, quæ cum Acet. dist. commixta recessit. Et licet etiam graviore odore prædita sint olea per retortam destillata & empyreuma spirent, minus verò forteant olea cum aqua rectificata, nihilominus tamen non tam ad odorem magis gratum, quam ad efficaciam salubriorem Medicamentorum prospiciendum est.

N. Omnia olea destillata præter salia sua volatilia concentrata in se etiam habent occultum quoddam acidum, quod unctuositate sua salia hæc oleorum volatilia detinet, quo minus cum aquis aliorum salium ritè misceri queant. Horum beneficio salium alkalium volatilifatio peragitur, dum istorum acidis particulis ab alkalibus partes terrestres separantur, & ita volatiles redduntur. vid. Acutiss. Helmont. cap. 4. de febr. & accuratissimus David von der Beck, in Experimentis & meditat. circa rerum naturalium principia. Hofmannus.

Ex gummi resinis.

4. Gummi resin. B. r. inde retortæ vitreæ, (vehementer capaci) ut saltem tertia pars impleatur, destilla per arenam in receptaculum, aliquota parte Aquæ adimpletum, primo Igne lento, & prodibit oleum, dein auctiori, & extillabit Balsamus.

N. 1. Ut fervescant præcaveat, arenam aliquid admiscere poteris: Alii loco arenæ addunt triplum silicis grosse contusorum, vel salis aliquid, quo ascensionem olei promoveant.

N. 2. Rectificari potest hoc oleum per cineres cum Aq. destillando, vel & laterum fragmenta ignita eo imbibendo, atque ita destillationem peragendo non secus, ac destillatur oleum de lateribus.

Sic fit oleum è Gum. Anime, Elemi, Tacamahaca.

XI. Ex gummat. (Præcipue ferulaceis) Olea elici possunt ad eundem modum quo ex resinis. Nimirum oleum subtilius per vesicam cum Aq. destillando elicitur, crassius ac ponderosius per retortam. Vel si mavis destillatione una eademque utrumque per retortam elicere, destilla initio calore leniori, ac suscipe oleum subtilius seorsim, dein collige crassius igne auctiori, Præstat tamen per vesicam, ut de resinis dictum.

N. Felicius eliciuntur hæc olea ex Extractis resinosis, ad modum quem in resinis dedi. Schröderus.

Nimirum oleum subtilius per vesicam cum Aq. destillando elicitur. gummata resinosa minus dextrè ejusmodi humidis destillationibus committuntur, cum potius destillatione per retortam egeant, pro oleis eorum essentialibus eliciendis, moderato tamen Igne cum & sine additione. Hofmannus.

Reliquorum oleorum præparationes, si qua ab hisce discrepant, specialius in singulis edocebimus.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

EX ANIMALIUM familiâ exhibent Oleum, cornua, medulla, cerebra, ossa, ungula, pinguedines, sanguis, stercora, (vide de Aquis.)

Cornua, ossa, ungula, igne nudo per retortam (terra lutatam) pellantur, fundantque uno ac eodem labore liquorem seu spiritum acidum, (phlegmate commixtum,) oleum ac sal volatile. Oleum id rectifica.

Medulla cerebri ac spina fundit oleum, si admixto Sal. com. per retortam vitream ex arena destilletur.

Pinguedines, (axungia, sebum, butyrum, cera,) destillantur aliis rebus commixtæ, ex cucurbita vel retorta vitrea, idque per cineres aut arenam, commiscuntur autem, vel cum lateribus pulverisatis, vel cum silicibus calcinatis, vel cum cinere arenæ, ut eâ facilius oleum ascendat.

N. Quantitatem rei adjicienda edocebit pinguedinis destillanda consistentia, quæ in aliis mollior, in aliis durior, plerumque autem sumitur pars tertia vel quarta, interdum pondus æquale.

Sanguis destillatur igne nudo ex cucurbita figulina alta ac spatiosa, ad remanentiam terræ nigræ, levis ac spongiosæ. Destillatum liquorem filtra per chartam, & transibit liquor, remanente in charta oleo færente, (in parva quantitate,) Liquor hic exhibet spiritum, Salque volatile hinc inde vasis destillatorii adherescit.

N. Præstat sanguinem calentem recipere, (metretas scil. 2. vel 3.) eumque in MB. clauso vitro digerere (& 9. vel plures) hinc per gradus destillare.

Olea destillata usitatorum.

Oleum Absinthii.

phorum. A.

Anethi.

Lavendulæ.

Angelicæ.

Lauri ex baccis.

Anisi.

Levistici.

Aurantiorum.

Macis.

Benzoin.

Majoranæ.

Butyri majalis.

Mastichis.

Calami aromatici.

Melissæ.

Camphoræ.

Menthæ.

Cardamomi.

Myrrhæ rectificæ.

Carvi.

Nucis moschatæ.

Caryophyllorum.

Origani.

Ceræ rectificatæ.

Piperis.

Chamæmeli.

Pulegii.

Chærefolii.

Rorismarinæ.

Cinamomi.

Rosarum.

Oleum Citri cort.

Rutæ.

Coriandri.

Salviæ.

Cornu cervi.

Saponis.

Cranii humani.

Savinæ.

Cubebarum.

Serpilli.

Cymini.

Smegmatis.

Euphorbiæ.

Spicæ.

Feniculi.

Styracis Calami.

Fuliginis.

Succini albi.

Galbani.

Flavi.

Guajaci.

Tartari.

Myssopi.

Terebinthinæ.

Juniperi è baccis.

Thymi.

ex ligno, August. Zedoariæ.

Laterinum Philoso- Zopissæ.

Olea expressa.

Exprimuntur Olea ex seminibus ac nucleis nonnullis oleosis.

Modus.

4. Nucleos siccos (exempli gratia, amygd.) non rancidos, excortica ac contunde in mortario lapideo

Q9 3

minu.

minutissimè, hinc inde sacculo, ac exprime fortiter sub prælo.

N. 1. *Præstat ut plurimum massam illam tritam in sartagine torrere, vel vapore aq. calida tepescere. Exemplo sit vulgaris ille modus exprimendi olea ex semine Lini, papaveris, & simil.*

N. 2. *Elciuntur quoque Olea, sed pauca, per decoctionem rei in aqua quâ decoctione pars oleosa supernatat, sic sit Balsamus peruvianus, oleum lauri, & similia.*

N. 3. *Olea sine aq. expressa sunt saporis gravioris.*

Usitatoria sunt.

Oleum amygdalarum amararum, dulc.

Avellanaarum, A.

Balanium è balano myrepfica.

Cannabis.

Oleum Carthami, A.

Ceraforum, ex nucl. A.

Citri è granis, A.

Erucæ sem.

Hyoscyami, ex semin.

Juglandium, ex nucleis.

Lauri, A.

Lini sem. A.

Macis.

Nigellæ, ex sem.

Nucis moschatæ, A.

Olivarum ex olivis maturis.

N. *Hoc Oleum intelligitur, quoties Olei simpliciter mentio fit.*

Omphacinum ex olivis immaturis.

Ovorum ex vitellis.

De Palma, s. de palla.

Papaveris.

Perficor. nucleor.

Pinearum.

Pistaciorum, A.

Raparum sem.

Ricinum, s. de Cherva.

Sesaminum, A.

Sinapios.

Olea per infusionem & coctionem, &c.

Olea per infusionem & coctionem.) In horum præparatione cautè ac circumspèctè agit Autor noster, quòd digestionem & insolationem coctioni anteponat, hæc enim indifferenter adhibita in omnibus non locum habet, nisi ingredientium, in primis spirituosorum, vires velimus perditas. Nam herbarum balsamicarum, florum & aromatum vis in volatilibus & subtilibus eorum partibus residens levi coctione quàm citissimè æthera petit, ut adeò rectè simplex digestio aut insolutio commodior sit. *Hofmannus.*

Olea hæc cum simplicia, tum composita officinis usitatissima sunt.

Modus parandi.

1. *Simplicia recentia incisa coquuntur oleo mixto aquæ, vino, aliivè liquori convenienti, idque tantisper donec humiditas aquea exhalarit.*

2. *Sicca simplicia in oleo mero macerantur.*

Commodior modus hicce est.

Herbis exiccatis ac pulverisatis affunde oleum, digereque in MB. horas [12.] dein exprime fortiter, expressionem expone calori leni, ut fæces subsideant, quas separa.

N. *Oleum communiter adhibetur olivarum, interdum omphacinum, vel aliud, de quo peculiaris semper occurrit admonitio. Schröderus.*

Donec humiditas aquea exhalarit.) Ne olea infusa aut insolata rancorem contrahant ob humiditatem

extraneam admixtam, optimè expressa per inclinationem ab aquositate subsidente, quæ fundum semper petit, separanda, & subsidentia aquosa cum pauco oleo, quod illi adheret ad omnimodam humiditatis absorptionem coquenda, & colatura superiori oleo per inclinationem separatè addenda est. Sic v. g. Recip. fl. ros. r. rec. vellil. alb. tunic. &c. s. q. infunde in lib. ij. olei puri, macerentur aliquandiu & radiis solaribus aut calori tepido exponantur, & si lubet, coquantur parum in cucurbita appositò alembico, illud quod adscendit balsamicum, seorsim servetur, & quod in fundo remansit, per inclinationem à subsidente aquositate separa & colatum superiori balsamico commisce. Vel si simplicem velis infusionem Recip. olei olivarum rec. lib. iij. immerge summitat. majoranæ recent. incis. ℥xij. factâ maceratione loco calido in vitro probè clauso die una, fiat postmodum colatura cum expressione forti. Oleo expresso denuò summitat. majoran. recent. incis. ℥xij. infunde & digere in calore die uno & altero, facta colatura & forti expressione iterata. Repetatur tertio eadem infusio ac macerati. Quibus peractis exprimatür oleum, & si qua humiditas remanserit per decantationem segrega. *Hofmannus.*

Usitatoria Olea insolata simplicia.

Oleum Absinthii, cum Oleo Omphacino.

Abrotani.

Anerhi.

Chamæmelinum.

Cheyrium.

Cydoniorum, c. Omphac.

Enulæ, cl. Ol. Sesamin.

Euphorbii, c. Ol. Cheyrino.

Febriifugum. 1.

Formicarum.

Hederæ terrestris.

Hyperici comp. Göleri, 2.

Ellenberg. 3.

Jasminum.

Irinum.

Ligustrinum, Cyprinum de alcanna.

Lilinum.

Liliorum convall.

Lumbricorum, c. Ol. Omph.

Mastichinum, c. Ol. Omph.

Menthæ, cum Omph.

Melilot. ex fl.

Momordicæ, ex fruct.

Myrtillorum, cl. Ol. Omph.

Myrtinum, c. Ol. Omph.

Nardinum simpl.

Nicotianæ.

Nimphææ alb. c. ol. Omph.

Pestilentielle. Bartol. 4.

Populeum.

Purgans comp. 5.

Ranarum.

Rosatū vulgare.

Omphacinum,

Rutæ.

Sambucinum.

Scorpionum simpl.

è Styrace.

Verbasci.

Vernisum. Vernix, ex Ol. Lini.

Vide libr. 4. Juniper.

Violarum ex fl.

N. *Huc pertinet & Balsamus Sulphur. Lithargyrus & simil. quæ nihil aliud sunt quam Oleum s. spiritum Terbinthine mineralibus istis imprægnatum.*

Olea

Olea cocta composita.

Oleum de Capparibus:

Castorei.
Costinum.
Croci.
Hyperici.
Liliorum.
Majoranæ, f. Sampfuchium.
Mandragoræ.
Moschellinum.
Nardinum comp.
Papaverinum.
de Piperibus.
Resolutivum.
Rosarum Mesuæ.
Scorpionum compositum magnum.
Stomachale Cratonis.
Vulpinum.
Zanerinum Melichii.
Cord. in append.

1. Oleum febrifugum Strobelbergeri.

℞. Ol. Nymphaeæ unius saltem anni. Lumbricor.

Rolar. Hyperic. Amygdal. am. ana. ℥j.

Mixtis impone scorpiones vivos N. ix. Exponantur soli (paretur si possibile in ingressu solis in signum Scorp. vel Canc.) donec moriantur scorpiones, tunc etiam adde Theriac. Andr. opt. opt. ℥β.

Relinquatur insolari per 8. 14.

Vires. Easdem vires cum aliis scorpionum oleis lib. 3. descriptis obtinet. Inprimis tamen inservit Emplastro febrifugo conficiendo. Schroderus.

Oleum febrifugum Strobelbergeri. Cum hoc oleum per simplicem infusionem & insolationem præparatum fit, & ingredientia etiam magnarum virium, suam meretur laudem. Hofmannus.

2. Oleum Hyperici compositum f. Balsamus Hyperici, Nobiliss. Georg. Göleri à Rabenstein. Balsamus Magius etiam dicitur.

℞. Olei Hyperic. opt. ℥i. Vini generos. sextar. tres.

Ol. Terebinth. Laterin. Lumbricor. ana. ℥ij. Cera ℥j.

Pinguedin. human. destillat. Ol. de medulla (hum. vel cerv.) destill. ana. ℥ij. Theriac. Andr. Mithridat. ana. ℥j. Visc. querc. Til. Coryll. ana. Mj. Fol. Persicar. Rut. murar. Pyrol. an. M. iij. Flor. Antirrhin. M. vii. Hyperic. M. vi. Verbasc. M. ij. Betonic. Centaur. min. Prunell. Consolid. aureæ Ptarmic. Austriacæ. Chelidon. ana. M. i. Sem. Antirrhin. ℥β. Hyperic. ℥iβ. Rad. Dracuncul. maculat. Aristoloch. rot. Symphyt. ana. Mβ. Scrophular.

Fabariæ f. Crassul. maj. ana. Mj. Bulliant sive coq. in diplomate vase optimè clauso ad consumptionem Vini. Exprimentur fortiter; postea imponentur

Croc. 8. Mumia. Mastich. Thur. Myrrh. ana. ℥ij.

Denuo coq. leviter, dein pro circulatione ponantur ad solem, hyemè ad fornacem.

¶ N. Non opus est prædictum oleum vel Balsamum de novo sæpius conficere, siquidem Balsamus iste ad solem collocatus facile ex novis floribus, superius annotatis & foliis Persicariae & Pyrolæ, nec non de semine Hyperici augeri potest, & de novo restaurari, & tantum injiciendo & ad tempus aliquod in sole digerendo, postmodum hyemè colando & ad fornacem collocando. Quo enim vetustius hoc oleum fuerit, eò efficacius & nobilius evadet.

Usus & Applicatio: id est, Hoc oleum sive Balsamus excellentissimus existit contra hausta venena, intestinum. Hac tamen conditione, ut prius concitetur Vomitus per lixivium vel oleum olivarum calide bibulum, vel quod melius per aq. Nicotiana f. Tabaci.

2. Calculum & arenas pellis, sæpius in ovo cocto assumptum.

3. In magna quantitate exhibitum vermes ventris necat & expellit, præsertim si aq. Persicaria exhibeatur.

4. Prædicto modo usurpatum, corpus ab omni corruptione & multis ulceribus præservat, ne planè nullis in corpore humano sive interius sive exterius nascantur.

5. 6. Auriginem quoque & Hydropisum discutit.

7. Internam idem vulnera & quæ contusa sunt mirabili effectu curat.

8. Vomuum sanguinis & Dysenteriam vi compescit, atque constringit.

9. Vulnera omnia externa, quæcunque sint etiam ea quæ Venenatis armis insicta fuerunt, miræ celeritate Balsamici vi contrahit atque conglutinat, omnia aliæ vulnerum symptomata prohibens ac tollens, si linteola rasa in eo madefiant & vulneribus imponentur, illa sæpius lavando & extergendo. Possunt insuper hoc oleo omnia Emplastra Stictica, quemadmodum & reliquæ in sua virtute & efficacia solâ malaxatione confortari, ut majoris inde virtutis & energia sint.

10. In capitis v. vulneribus ubi cranium quoque ad duram vel piam matrem læsum fuerit optime & studiosè cavendum, ne prædicta linteola nimis humida vulneribus supponentur, sed antea perquam bene expressa sint: Si vel una gutta sola super duas illas membranas caderet, jam de vulnerato actum esset & insaniam incurreret.

11. Præterea omnes impressiones magicas, ab inaginatione, jaculatione, imprecationibus & laniarum prestigiis insictas suspendo planè modo irritas facit, & persanat, tam interius assumptum, quam exterius illitum, applicatum vè.

12. Quod si alicui cultri, ligna, vitra, seta, pannu lacerati, filæ acus, crines, testa & quæcunque alia intra corpus & stomachum vel & guttam, unde suffocationis periculum incurrat per in. antamenta & prestigias impacta fuerint, sique nullis aliis medicamentis cadere velint, hoc oleo inungantur, ac ipsis quoque ad bibendum exhibeatur, quantitate trium cochlearium, admirabilem vim expereris: Vel enim prædicta omnia, per aliquod magnum ulcus exiccatum, tanquam aliquod emunctorium protrudet, vel per vomitum rejiciet; aut tandem per infer. ora coget, ac tandem ager penitus incolumis citra omnem perditionem evadet: Balsamum hunc mecum communicavi Clariss. Dn. D. Joh. Christophorus Eisenmenger. Physicus Imperialis, Reip. Heilbronnensis, Amicus ac Fautor meus honoratissimus. Schroderus.

Oleum hyperici compositum &c. Hoc oleum commodius per insolationem conficitur, quàm per coctionem dum virtus quorundam ingredientium balsamica non levem inde patitur jacturam, ut etiam Dominus Autor monet l. c. Quemadmodum etiam 3. illud D. Erhardi Ellenbergii longè compendiosiori modo paucioribus infusionibus ac breviori tempore confici posset. Cur non sex vel octo manipuli fl. hyperici in ol. Scorpionum f. lib. iij. infundi possent & in MB. coqui, donec sanguineum acquisiverit colorem? Cui postea colato per tres vel quatuor infusiones iteratas reliqua ingredientia nihil illis demendo conjungenda forent, multò efficacius hoc oleum emergeret. Hofmannus.

3. Oleum Hyperici compositum D. D. Erhardi Ellenbergii.

℞. Fol. Hyperic. recent. M. iij. Contunde modicè, deinde superfunde. Ol. de Scorpion. simpl. ℥iij. Ponantur in sole per 4. postea in MB. per hor. 24. coque & fortiter exprime. Cola oleum per Colatorium vino albo lotum. Deinde adde Flor. Hyperic.

recent. contus. M. ij. Relinquito denuo ad solem & 4. & mox coquito in MB. cola ut ante. Idem repetendum cum floribus semper recent. bis terve, donec oleum sanguineum acquisiverit colorem. Hinc.

℥. Cymar. (femin.) Hyperic. immaturarum, modico vino albo generoso madefactatum ℥ ij. Coque in MB. per & 3. postea exprime ut ante, & hoc reitrandum quater, semper cum cymis recentibus. Post hæc,

℥. Card. sancti (benedict.) Meliss. Verben. Scabiosæ. Betonic. Chamædr. ana. Mß. Contunde modice & coq. in MB. per triduum: deinde cola. Colaturæ injiciantur Sum. Galeg. Scord. rec. an. M. i. Centaur. min. Diptamn. Cret. Roris marin. ana. Mß. Coq. in oleo prius herbis contusis per & 3. in MB. F. colatura. Deinde.

℥. Rad. Zedoar. Diptamn. alb. Angelic. gummos. Aristoloch. utriusque. Carlin. Valerian. Gentian. Tormentill. Vincetoxic. Cort. citr. ana. 3ß. Contusa infundantur & coq. per & 4. in MB. exprim. fortiter ac interim injiciantur. Caryophyllor. Macis. Schoenanth. ana. 3ß. Santal. rubr. 3ß. Bacc. Junip. Laur. an. 3j. Cinam. ac. 3j. Benzoin. Storac. cal. an. 3vi. Contusa & hæc ponantur in MB. per & 3. dein colentur. Postea.

℥. Bufon. N. ij.

Natricem { Serpentem, nobis *Unck* dictam, seu
N. i. { boam. Une maniere de Serpent d'eau, où
un' espece de Serpent venimeux. V. intra.
A Water-Snake. Een Water slange.

Araneæ. viv. N. CC.

Injiciantur in oleum prædictum & coque per & 2. postea abjiciantur & imponantur.

Rhabarb. el. Myrrh. fin. Aloës Epat. an. 3ij. Croc. 3j. Spic. nard. 3ß. Theriac. Andr. Mithridat. an. 3vi.

Coque in diplomate per & 4. nec amplius coletur, sed conservetur pro usu.

Ulus. *Valer præcipue contra omnia venena. Illinitur arteriis manuum, pedum & cordis, repetitur illitio tribus alternis horis. Pestem tam curat, quam præservat Febriles insultus arceat (inunctum dorso, & metacarpis manuum, pedumque plantis.) Dolores colicos demulcet. Urinam provocat. Vermes per secessum expellit (illitum umbilico.) Valet ad vulnera venenata qua vel animali venenato, vel ferro infecto sunt insicta. In paronychia nihil præstantius. sistatim ab initio, antequam inflammatio venenosa supervenerit facta fuerit inunctio.*

Hoc o'eo frueri ex communicatione Jacobi Holtzapffel Pharmacopæi nostratis diligentissimi, Affinis mihi dilectissimi. Schroderus.

Oleum Hyperici facilius è Pharm. Colleg. Reg. Lond.

℥. Vini albi generosi lib. ij. flor. recentium hyperici cum suis seminibus m. iij. Tere, & macera in vitreo vase arte clauso, biduoque exacto, coque in MB. & valide exprime: in colaturam novas injice summities, tertioque idem facito. Tertia autem colatura singulis libris affunde olei veter. lib. iij. terebinthina 3j. olei absinthii 3j. dictamni. gentiana. cardui benedicti. tormentilla. carlina, vel cardui marie. calami aromatici; tritorum ana 3ij. lumbricorum. pluries in vino albo lotorum, 3j. Insolentur quinque aut sex septimanas, & bene obstrata reponantur.

4. Oleum antipestilentielle Bartol. Bonacursi Itali.

℥. Flor. Hyperic. ℥ j. Rad. tormentill. Carlinæ. Aristol. rot. Centaur. maj. an. 3vi. Sant. omnium. Spic. nard. Celt. Dictamn. Bacc. juniperi. Zedoar. Gentian. Imperat. Card. ben. an. 3ß. Carpobals. Doronic. Cort. citri. Fol. persic. Arremis. Rutæ. Beton. Scord. Chamædr. an. 3ij. Radic. Pimpin. Valerian. major. Vincetox. Been utraque 3ij. Anthor. Scorzon. Bistort.

an. 3vi. Moschi. Macetis an. 3ij. Caryophyll. 3ß.

Macerentur per 3. dies in vini malv. ℥ v. coq. exprim. expresso adde recentes species supra dictas, adde

Bufonem magn. vivum. Viperam vivam. Ranam. Lacertas. Cochleas ana v. Scorpion. L. Ligni aloës 3ß. Theriac. Mithrid. an. 3ij. Benzoin. Galbani an. 3ß. Laudan. Succini. Myrrh. an. 3j. Ol. hyperic. ℥ j. Oliv. vet. ℥ v.

E Cineribus destillentur omnia, fiatque ter cohobatio, tandem oleum decantetur, quo inungitur cordis regio sub axillis, & inguine ad arcendam pestem. Schroderus.

Oleum antipestilentielle Bartol. Bonacursi Ital.) Hujus præparatio nullius etiam est momenti, coctione enim ista tota destruitur nonnullorum ingredientium ut fl. hyperici, santal. omn. Spic. Nard. celtici dictamn. bacc. juniper. Zedoar. Moschi &c. vis balsamica & spiri uosa, & licet recentes species denuo addantur, tamen per destillationem ex cineribus cum reliquis additis iterum erunt perditum. Ideoque seq. modo commodior fiet hujus elaboratio.

Recip. radic. tormentill. carlin. aristol. rot. centaur. maj. an. 3vi. pimpinell. scorzon. bistort. ana. 3ij. ol. hyperic. lib. ij. olivar. veter. lib. v.

Macerentur & coquantur, postmodum exprime, expresso adde fl. hyperic. lib. j. Santal. omn. Spic. Nard. Celtic. dictamn. nostr. bacc. juniperi. Zedoar. gent. an. imperator. carpobalsam. cort. citri. fol. rut. betonic. scordii chamædr. ana. 3ß. radic. valerian. vincetoxic. anthor. ana 3ij.

Stent in infusione vase clauso in loco tepido per 8. & 9. postea colentur; Colaturæ adde ol. d. benzoi. galbani. Ladani. succini. Myrrh. ana 3ß. Sal. viperarum volatilis 3i. j. M. Hofmannus.

Oleum antipleuriticum Petri à Castro in Miscell. curios. German.

℥. Cucurb. longiores, (qua Italici storti & Zucchè vocantur & semina habent quasi quadrata) suspendantur in loco concluso quo solis radiis non pertingunt, discendantur, & pulpa abjiciatur, cortex asservetur, & à cortice caro separetur, itant cortex crassitiem majorem non habeat quam Patavinorum moneta lustina dicta, qua 26. solidos valet. ℥. hujus cortic. ℥ j. olei olivarum vetustiss. (10. 20. imo si possibile 100. annorum) ℥ ij. huic oleo incoque corticem, donec humiditas corticis omnis sit absunta. Signum absoluta coctionis quando culmus straminis, huic oleo intinctus, & candela ardenti applicatus & oleo imprægnatus accendatur, sine strepitu ardet, & cortex quoque apparet fere combustus, & in carbonem quasi redactus; tunc cessa à coctione, colo oleum per manicam. Denique accipiat sartago ferrea, geminum aut ad. minimum unum habens orificium in latere, ut oleum possit transire: fac ut candeat sartago & per candentem sartaginem oleum transfunde, itant per unum orificium infundatur, per alterum rursus exeat in vasculum subjectum pro inunctione lateris dolentis.

Explicatio altera rationis parandi olei antipleuritici descripti.

℥. Cucurb. longas quas tromboni (tubas) vocant, quando ad debitam magnitudinem excreverunt, idque, ideo, ne fiant nimium dura. Raduntur ista (tota) ad modum quo raphani, sed advertatur, ne mundentur ad modum pomorum, sed solum radantur & inde auferantur pellicula illa subtilis, qua illas contegit, unde permanent unides. Hoc facto secetur incurbata per longitudinem simbriatim circumcirca, ut singula simbria non magis lata fiant quam esse solet latitudo cultri Genuensis, & abjiciatur, aut saltem coquantur residuum cucurbitæ, quod

quod est album (pulpa alba) quoniam nihil pro nostro usu confert. Hoc peracto, ponderentur omnes illæ striae sive frustula, quæ excisa sunt à cucurbita, ipsam intrinsecus mundando à dicta pulpa, & sumatur tantum olei olivarium (quod id præstantius, tantò magis inserviet) quantum pendit cucurbita. Etsi cortices cucurbitæ pendunt duas libras, duas pariter libras olei oportet sumere, si quatuor, quatuor, & sic consequenter tantum esse oportet pondus olei, quantum est cucurbita. Hoc facto immittatur oleum & cucurbita, in ollam figulinam satis validam & novam, ob rationem infra dicendam, & coquantur ad ignem carbonum vel lignorum (modo non adflamma) cucurbita in frusta concisa, usque dum reddatur omnino sicca, & ita loquendo, adusta. Peracto hoc, eximatur cum cochleari ex oleo cucurbita arida & exsiccata & abiciatur, quia nullus usus est. Postmodum oportet transmutare ferrum (non chalybem sed ferrum) nullis antea usibus adhibitum, sedecim aut octodecim vicibus calefactum & bene fervens per dictum oleum. Procedi potest modo sequente. Olla cum oleo mandetur deferri in officinam fabri ferrarii; isque in ignem jubeatur mittere sex frusta, paulò grandiora dimidio palmo, ferri virgine; sc. usum nullum experti, & quando candefacta sunt & bene fervent, unum post alterum submergatur cum vulsella, & extinguatur in dicto oleo, deinde iterum in ignem coniiciatur, & quando hæc opera ter repetita fuerit, ferrum (quia sunt sex ferri frusta) octodecim tunc vicibus transivit, & tantum sufficit ad perfectionem olei. Sed quoniam dum ferrum immergitur candefactum & fervens per dictum oleum, quandoque oleum incenditur, oportet habere ad manum operculum pro contegenda olla, ut suffocata flamma extinguatur; sed quia potest accidere ut suppressa flamma rumpat ollam, ob id supra monitum, ut adhibeatur olla validior, & quo magis securus esse queas, antequam ferrum ignitum in ollam demergas, oportet illam reponas in aliud vas terrenum, ne si in dicta operatione olla frangeretur, oleum profundatur; id refrigeratum in vitream lagenam infunditur & pro usu necessario asservatur.

Modus utendi hic est. Accipiat parum huius olei in patella (in qua ova tremula apponuntur) & bene incalasciat, quoad (tactu) perferri possit, & infundatur oleum; post accipiat mappella immunda, quæ usurpata fuit & compliceur in quadruplum, pariterque calefacta, in quantum perferre potest patiens, ponatur super stupam, & cum ligamento adalligetur, ne motu oleum à parte effecta recedat. Quoniam quandoque dolor etiam alteri lateri communicatur simili etiam ratione alterum inungitur; imponitur stupæ & mappella, & quoniam dolor interdum ab una costa in aliam serpit, inungatur perseverando dolorem quocunque processerit. Quando patiens nimis est dicto modo, si non incipiat spuiare, post quinque horas, renovetur inunctio, sed rareriter opus erit repetitione, cum experientia comprobatum sit, quod intra paucas horas, apostema rumpatur, pro argumento est, quod multi exteri fere agonizantes, post adhibitum in nosocomiis remedium potuerint iter sani & liberi prosequi.

5. Oleum purgans compositum S. Clossii.

℞. Ricini American. & vulgar. an. ℥iij. Sem. cataput. minor. Ebuli mundat. ana ℥ß. Rhabarb. pulverif. ℥i. Santal. citrin. ℥ß.

Contund. fortiter, donec abeant in pastam, ex qua per expressionem forte eliciatur Oleum.

Dos. gut. vi. in iusculo præpingui, alias ardorem in gutture excitat, quamobrem à nonnullis, pilula unica ex micâ panis duabus guttulis huius ol. inebriatâ fingitur, vel inter duas oblatas concluditur. Purgat àvò & natos hydropæ affectos. Schröderus.

Oleum purgans compositum S. Clossii.) Hoc oleum licet ad olea expressa spectet, tamen cum semina ricini American. & nostrat. cum cataput. minor. ob vim

eorum causticam & colligativam suspecta sint interne usurpanda, satis est hoc oleum planè omitti. Hofmannus.

Oleum contra Surditatem. D. CHARRAZ.

℞. Olei expressi sem. porror. amygdalar. amarar & laurini ana ℥ij. spirit. nardi, castorei & colocynth. d. incisor. ana ℥j. succi ruta & vini albi ana ℥iß. Omnia maturatio oburato excepta in MB. tepido hor. 24. digerantur, deinde aucto calore R. ad humidam consumptionem coquantur; postea colentur & exprimantur; oleumque ad usum servetur; postquam in illo moschi optimi gr. vj. diluta fuerint.

Hoc oleum in aures intromissum surditates à natiuitate non perdurantes, mirum in modum dissipat.

Olea varia ex variis.

Oleum Abrotoni Pharm. August.

℞. Abrotoni recentis incisi & contusi ℥ij. Mace-rentur in Olei clarissimi libris tribus per triduum, deinde coquantur, donec prunis inspersum non amplius strepat oleum; quod colatum usui servetur.

Adhibetur ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum Ladano & urfi pinguedine Glabris locis illinitur.

Oleum absinthii ex eadem Pharm.

℞. Olei olivarum ℥iij. Comarum absinthii pontici recentis Contusarum ℥j. rosarum rubrarum ℥ß. Mace-rentur per triduum in loco calido, deinde coquantur, usque dum prunis injectum non amplius strepat oleum, quod colatum servetur.

Calefacit & roborat, præsertim ventriculum, adpetitum excitat, obstructions aperit, lumbricos necat, & ventriculi flatus dissipat.

Oleum Acousticum Ambratum ex eadem Pharm.

℞. Olei Amygdalarum amararum ℥iij. nardint Comp. lilior. alb. an. ℥ij. succi origani, majorani, ruta, porri, raphani, caparum an. ℥j. mixta coquantur ad succorum consumptionem, postea oleo colato adde

V. Mille pedibus prius impregnati, aceti vini accerr. an. ℥ß. Ambra grisea, flor. serpilli, bac. sabina, sem. Cymui, macis an. ℥j. cubeba. um, Hellebori alb. mastichis, ladani, styrac. calam. an. ℥ß. Castorei veri, piperris longi, croci or. nitri prepar. an. ℥j.

Omnia per se pulverisita, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnificè bullientis ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, postea oleo expresso & bene colato immisceri.

Oleum Amygdalorum amarorum ex eadem Pharm.

℞. Amygdalorum amarorum seccorum, non tamen rancidorum, à cortice membranofo mundatorum quantum voles. Contundas minutissime, postea secundum artem prælo exprimas.

Primo ordine calidum est, in humido & sicco temperatum; unde calefacit, attenuat, incidit & digerit, aurium tinnitus ac flatus è crassa & frigida materia ortos dissipat, auditumque hinc obtusum restaurat, obstructa aperit, cutis maculas, & asperitates tam reliquarum partium, quam faciei (quas ephelidas & panos vocant) delet, manantia capitis ulcera furfuresque detergit, nervorum affectus frigidos, duos, & dolentes calore renuante ac digerente sanat, amaro lumbricos necat, & frigidis uteri malis prodest, cuius dolores, strangulatus, inflammationes sanati capitis dolores instillatam sedat, urinæ difficultati pubi illitum, calculosis renum vitiis, stranguriæ in fistulam urinariam immisum medetur, suspitionis, lienosis, jecinerosis & tabidis subvenit.

Oleum

Oleum Amygdal. dulc. ex eadem Pharm.

Fit ut oleum amygdalorum amarorum.

Eo utitur ad Gutturis, faucium, & bronchiorum asperitatem leniendam, vel per se, vel adjecto saccharo, præsertim Cantio violato; duritiem omnem ac siccitatem articulorum corrigit, cutem erugat, scabra & aspera polit, densa emollit, phthisicis & atrophîa laborantibus ac consumtis utile, alimentum enim humidum & lentore mediocri diuturnum præstat, extenuatum corpus reficit ac impinguat; calore est temperatum, humidoque secundum ordinem attingit, quo nomine omnem intemperiem sedat, ac semen genitale promovet, uteri, vesicæ, & urinæ ardores mitigat, colicos ac nephriticis cruciatus cum pari portione olei amygdalorum amarorum mirifice levat, partium difficultates & labores torminosos discutit, & lenit, nephriticis & loci acrimonîa laborantibus per syphonem injectum tepidum mirè confert.

Oleum Anagallidis ex eadem Pharm.

Oleum Anagallidis paratur ut oleum abrotoni.

Præsentaneum remedium est variis puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis, à flatulentis, fabulosis, biliosis & pituitosis contentis; sive enematis admistum injiciatur, sive exterius adplicetur.

Oleum Anethinum ex eadem Pharm.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi, ac oleo clato eodem modo, quo oleum abrotoni.

Anodynum est, tumores concoquit, & resolvit, somnum conciliat, rigorem febrilem spinæ & partibus nervosis accessionis initio illitum tollit, Cephalalgiam mitigat, uteri duritiem emollit, menstrua provocat, lassitudines discutit, dolores articulorum levat, calefaciat & emollit, nervis gratum ac convulsionibus medetur.

Oleum Antapoplecticum Cephalicum Zvelferi.

℥. Olei ex styraçe, cum oleo majorana parati ℥j. olei stillati succini albi ℥ss. Coriandri, Lavendula, majorana, rorismarini, salvia nuc. mosch. an. ℥j. misceantur pro usu.

Est oleum cephalicum efficacissimum, roborat cerebrum, & principium nervorum, vertici capitis, temporibus, nuchæ, & spinæ dorsi, ad os sacrum usque, inunctum: sedat & compescit defluxiones à Capite ad partes interiores. Quare in Catharris suffocativis salutare existit; ut & membris paralyticis, contractis, doloribus colicis, à frigida causâ exortis ventositatibus, & uteri debilitatibus, auxilio est.

Oleum Aranearum Mindereri, è Pharm. Augst.

℥. Olei nymphaeæ, Lumbricorum terrestrium an. ℥vi. hyperici ℥ij. foliorum ruta, florum sambuci ana recentium M. ss. aceti rosacei, Calendula an. ℥ij. Aranearum crassarum magnarum numero quadraginta quinque, decoquantur omnia ad humiditatis consumptionem, colentur & exprimantur, in hoc colato infundantur rursus Aranea crassa numero viginti quinque, ac addatur Camphoræ cum spiritu rosarum diluta ℥ss. digerantur & reponantur ad usum.

Proderit hoc oleum ad inunctionem regionis Cordis & arteriarum, in febre maligna petechiali, ad venenum evocandum.

Oleum Balaninum ex eadem Pharm.

Fit è Balano Myrepica vel glande unguentaria, quam granum Ben vulgò vocant; terendo, oleum-

que exinde exprimendo.

Tergit, expurgat, obstructa liberat, auri injectum tinnitui & surditati confert, strumas, hepatis & lienis Scirrhum emollit ac digerit, affectibus frigidis nervorum & juncturarum, ipsismo & arthritidi medetur, alphas, lentigines, varos, maculas, cicatrices nigras, & reliqua sæda cutis vitia corrigit, alvum potu solvit, sed stomacho adversatur.

Oleum Balsamicum.

Varie dantur ejus præparationes de quibus vid. sub titulo BALSAMUS.

Oleum Benedictum è Pharm. Londin.

℥. Rad. Cardui benedicti, valeriana an. ℥j. florum hyperici, ℥ij. tritici puri sesquuncium, olei vetustissimi ℥ij. Terebinthina Cypria ℥viii. Thuris pulverat. ℥j.

Radibus & floribus contusis affunde tantum vini albi quantum hisdem mergendis sufficiat. Post bidui in olla macerationem, injice eum tritico comminuto oleum, & simul coque, donec vinum evanescat. Hinc exprime, additisque Thure & terebinthina, parum rursus ut coquantur sine, & serva.

Oleum ad Calculum è Zvelferi Pharm. Reg.

℥. Amygdalarum amararum, nucleorum persicorum sicc. & excorticat. aa ℥j. sem. Caparum, nasturtii, Thlaspios, urtica an. ℥ij.

E contusis omnibus exprimatur, lege artis, lehi calore, oleum, quod pellendo calculo, illique minuendo, ac proprietate substantia resistendo, non parvæ operationis est. Dosis ℥ss. ad ℥j. & ℥j.

Oleum de Capparibus Pharm. Augst.

℥. Corticis rad. Capparum ℥j. Tamarisci, florum Tamarisci, seminis agni casti, ceterach, cyperi an. ℥j. ruta ℥j. Trita & cum aceto irrigata, cum olei olivarum ℥j. coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, colentur & exprimantur.

Lienis Tumoribus duris ac scirrhis, ejusque obstructionibus medetur.

Oleum Carminativum anticolicum, è Pharm. Reg. Zvelferi.

℥. Olei olivarum recent. ℥ij. cui immergantur sequentia, crassiusculè incisa, & contusa: utpote, herbi recent. Anethi, cum summit rorismarini, mentha crispæ, pulegii florecent. an. ℥ss. flor. Chamomille recent. ℥ij. Cortic. Arant. or. recent. & extim. ℥ss. Baccar. Lauri, recent. Juniperi virid. an. ℥j. sem. carvi, Coriandri, anisi an. ℥vi. opis Thebaici ℥j.

Stent in infusione die una, factaque post una a: que altera ebullitione, in alembico vireo, suo capitulo munito, ut id, quod ebulliendo, transit, reaffundi possit, colentur dum adhuc parum calent, & exprimantur species fortiter: oleo expresso adde & in eo liquefac, lenissimo calore.

Camphoræ ℥vi. ol. still. carvi, feniculi an. ℥j. misceantur & servantur pro interno & ac externo usu, verum Anodynum, & Carminativum oleum; colicis & hystericis affectibus perquam salutare est.

℥. Amygdalar. amararum excorticat. ℥j. sem. carvi siccati ℥v. feniculi ℥ss. Coriandri ℥j. & si libuerit, macis ℥vi. vel ℥j.

Ex mixtis & contusis omnibus exprimatur, s. a. oleum præstans, ad status discutiendos, Tollendos, sedandos, vel internè, ad ℥j. in vehiculo convenienti exhibitum, vel externè, linteolis eo irroratis, & regioni stomachi, ac una umbilici applicatum.

Oleum Carthami è Pharm. Aug.

Fit ex semine Carthami Trito, affato & expresso. Obstructa

Obstructa liberat, tergitque, ideo morbo regio, ventriculo dolenti, & colo confert; Thoracem ac pulmonem expurgat, & clariorem vocem reddit.

Oleum De Castoreo Jacobi de Manliis è Pharm. Aug.

℞. Castorei, styracis calamita, Galbani, Euphorbii, Cassia lignea vera, croci, opopanacis, cubebæ, spica nardi Indica, costi an. ʒj. Cyperi Schananti, pipæris longi, nigri, Sabina, pyrethri an. ʒiij. olei tbiij. omnia calore arena conjunctim digerantur in vase clauso, postea colentur.

Valet ad omnes nervorum & Cerebri affectus frigidos, tetanum, convulsionem, tremorem, ac paralytin, rigoresque febriles sedat, spinæ dorsii illitum.

De Castoreo Compositum Zuvelfferi.

℞. Olei puri & recentis olivarum tbiij. huic immergantur sequentia incisa & confusa: castorei pinguis recentis ʒj. rad. pinethri ʒβ. herb. recent. rorismarini, sabina, salvia, an. ʒβ. cubebæ, pipæris longi an. ʒvi. caryophyllorum ʒβ. croci opt. ʒij. styracis calam. ʒj. opopanacis, galbani an. ʒβ.

Facta maceratione brevissima, die circiter una, additaque duntaxat vini albi ʒj. vel ij. fiat, in alembico vitreo, suo capitello munito, uba atque altera ebullitio: id autem, quod ebulliendo transit, reafundatur Oleo; coletur, dum omnia paulis per refrigerant, & exigua humiditas adjuncta, prægressa aliquali digestionem, per residuum tandem, decantationem, aut filtrum, uti supra notatum, separetur; addendo ultimo.

Olei lavendula still. ʒβ. Servetur usui hoc præstans oleum, ad omnes nervorum & cerebri frigidos affectus, Convulsionem, tetanum, tremorem & paralytin: contra atrophiam, & marasimum, perquam utile accidit.

Oleum Catellorum, è Pharm. Londin.

℞. Olei olivarum tbiij. Catellos nuper natos a duos, vermium terrestrium vino albo ablutorum tbiij.

Coctis catellis ad osium compaginis dissolutionem, injiciantur vermes & paulo post exprimantur. Dein cum terebinthina Cypria ʒij. spiritus vini ʒj. perficiatur oleum f. a.

Oleum Chamæmelinum, è Pharm. Aug.

Oleum Chamæmelinum fit ex floribus chamæmeli recentibus, & oleo claro, ut oleum de abrotano.

Phlegmonas mitigat, moderatè resolvit; fluxiones vi suâ modicè adstringente cohibet, ideoque colicis, arthriticis, aliorumque dolorum initiis salubre est; lassitudines juvat, hypochondria tensa laxat, febres discutit, præsertim quæ a stipata cute proveniunt.

Oleum Cheyrinum Mesuæ è Pharm. Aug.

Oleum cheyrinum fit ex leucois luteis, hoc est, ex cheyris citrinis, & oleo claro, ad modum præcedentis.

Attenuat, lenit, ac digerit, dolores ex flatibus à materia frigida & pituitosa mitigat; ventris torminibus succurrit, nervorum & juncturarum dolores levat, thoraci, pectori, vesicæ ac renibus confert, menses provocat, uterique suffocationi medetur, lumbrosos interimit, partum faciliat, arthriticis etiam ac resolutis auxiliatur.

Oleum Chrysomelinum, è Pharm. Londin.

Paratur per expressionem, ex nucleis mali armenii: quo modo etiam sunt olea ex nucleis cerasorum, mali persici, pineis, pistaciorum & prunorum: nec non ex seminibus Aurantiorum cannabis, Carthami, dictum cnicinum, citri, cucumeris, cucurbitæ citrulli, ebuli, Hyssopami, lactuca, lini, melonum, papaveris, petroselinum,

lini, raphani, rapæ, ricini, dictum oleum cicutinum, recinnum & de Kerva, sesami, dictum sesaminum; sinapis & ex uvarum acinis &c.

Oleum è Granis citri è Pharm. Aug.

Grana citri teruntur, torrentur, & exprimuntur Arthritico dolori ac succedenti tumori conducit, calculum vesicæ & renum expellit. In pestilenti statu Alexiterium optimum; lumbrosos enecat potum aut illitum.

Oleum Diacolocynthydos è Pharm. Aug.

℞. Olei absinthii, ruta an. ʒj. Fellis bubuli, agnini an. ʒβ. pulpa Colocynthis, hellebori nigri an. ʒj. coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem, & colentur.

Umbilico vel inferiori ventri illinitur, quando alvus est obstructa, vermes enecat, aliisque insuper usibus inservit. vid. Philipp. Gualingius in Florilège Hipp. Galen. chym. part. 6. cap. 30.

Oleum Costinum Mesuæ è Pharm. Aug.

℞. Costi amari ʒij. cassia lignea vera, ʒj. summitatum sampsuchi ʒviij. olei sesamini tbiij. trita macerantur biduo, deinde colentur.

Calefacit, ideoque nervorum ex frigore injurias propellit, paralytin confert, nervos roborando, ventriculum, mæculos, tendines & ligamenta confirmat, spinæ illitum mitigat febrilem rigorem, capillorum deflavium prohibet, ac mucosa humore canitiem accelerante consumo, eam moratur.

Oleum De croco Mesuæ è Pharm. Aug.

℞. Croci ʒβ. myrrha electa ʒij. Cardamomi ʒiij. olei ʒix. digerantur omnia leni calore, colentur & exprimantur.

Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, convulsionique & uteri noxis confert.

Oleum Cydoniorum Mesuæ è Pharm. Aug.

℞. Cydoniorum non excorticatarum tbiij. olei olivarum tbiij. post factam macerationem fiat coctio ad humiditatis aquosæ exhalationem, colatura & expressio.

Melum Dioscoridi dicitur, stringit & refrigerat, ad ventriculi & jecoris imbecillitates utile, ventrem totum inferiorem ac nervos laxos roborat, stomacho in vomitiones effuso, henteria, diarrhæa, ac dysenteria medetur; spinæ illitum & thoraci, sudores immo-dicos cohibet.

Oleum De Enula Mesuæ è Pharm. Aug.

℞. Radicum enule recentium confusarum tbiij. olei sesamini tbiij. coquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem, colatura servetur usui.

Calefacit, tenuit, digerit, ob id affectibus nervorum, uteri & vesicæ frigidis prodest. Febrim quoque rigori, & colo à flatibus dolenti medicatur.

Oleum Antepilepticum Zuvelfferi ex ejus Pharm. Reg.

℞. Nucleor. persicorum excort. tbiij. cerasorum ʒiij. sem. peonia ex ori ʒj. bardana majoris, Basilici an. ʒj. cubebæ, caryophyllorum aa. ʒvi.

Ex confusis & mixtis invicem exprimatur oleum, f. a. quod præstat in affectibus cerebri frigidis, Epilepsia, apoplexia, lethargo; non solum externâ inunctione temporum verticis & nuchæ; verum etiam ab intra receptum, & ori immissum.

Oleum de Euphorbio Mesuæ, è Pharm. Aug.

℞. Euphorbii triti ʒβ. olei cheyrini ʒv. coquantur & colentur; in frigidis cerebri noxis, hemicrania, cephalalgia & Lethargo adhibetur; epilepticis medicaminibus utiliter admiscetur; alopecias & capillorum

rum deflūvia sanat, in coxæ aliorumque articulo-
rum doloribus inveteratis, laudatissimum remedium;
ast cautè & nonnisi vehementer frigidis vitiis adhi-
bendum: in aurium tinnitu, sibilo, & hebetiore sensu
ex frigidityate contracto tepidum adhibet Galenus 2.
compol. medic. localium.

Oleum Exceſtrenſe è Pharm. Lond.

℥. Herbarum Absinthii, centaurii minoris, Eupa-
torii, fenculi, Hyſſopi, lauri, majorana, meliſſe, nepeta,
pulegi, ſabina, ſalvia, thimi an ℥iij. abrotoni, beto-
nica, camapityos, lavendula, an ℥vi. roriſmarini ℥ij.
florum chamameli, geniſta, liliorum alborum, ſambuci,
ſem. cymini, fenugraci, rad. ellebori albi, nigri, corti-
cum fraxini, limonum an. ℥ij. Euphorbii, ſinaeos,
caſtorei, pyrethri an. ℥j. olei ℥xvi. vini ℥ij.

Herbis, floribus, ſeminibus & E. phorbio contu-
ſis; incifis radicibus, corticibus, & caſtoreo; mace-
tatiſque horas duodecim, affuſo vino & oleo, ad
balnei calorem; & coctis demum lento igne ad vini
& humoris abſumptionem; coletur oleum, & ſer-
vetur.

Oleum formicarum Nicolai è Pharm. Aug.

℥. Formicarum ℥ij. olei ℥ß. macerentur æſtate ad
ſolem, vel alio calore, diebus quadraginta, poſtea
colatum oleum reponatur.

Eo partes generationi dicatas ab venerem conci-
tandam & imprægnationem promovendam inun-
gunt.

Oleum Hæmorrhoidale Faventini è Theat. Pharm.
D. de Scobbiſ.

℥. Olei ſem. lini & nucleorum mali armeniani ana.
℥iij. aſellorum vivor. lumbricor. terreſtr. mundat.
ana. ℥j. vini alb. q. ſ.

Coquant. in MB. ad conſumptionem humidit.
aquæ, & poſtea oleum colatum uſui aſſervetur.

Mitigat dolores hæmorrhoidales, tumidiſque hæ-
morrhoidibus dum medetur, durities etiam earum
non parum remollit.

Oleum Hirundinum ex Pharm. Londin.

℥. Hirundines integras n. ſedecim, Chamameli,
rata, plantaginis majoris, minoris, foliorum, lauri, pu-
legii, anethi, Hyſſopi, roriſmarini, ſalvia hyperici,
Baſamita an. m. j. olei communis ℥iij. vini hiſpanici
℥ij. conſice ſecundum artem.

Si verò tantum butyri majalis accipiatur quantum
olei, & prædicta cum eo coquantur; unguenti & no-
men & conſiſtentiam acquirat.

Oleum Hyoſcyami è Pharm. Aug.

Semina hyoſcyami contunduntur, torrentur & ex-
primuntur. Dioſcorides ex ſemine hyoſcyami albi
recentis, & ficcati, aquâ calidâ conſperſo, tritoque
hoc oleum parare docuit. In phlegmone & exulcera-
tione partium pudendarum utriuſque ſexus præ reli-
quis locum habet.

Oleum Hyperici è Pharm. Aug.

℥. Florum hyperici ad maturitatem ſeminis ſerè
accedentium contuſorum ℥iij. croci ℥iij. olei clari
℥ij. poſt factam trium dierum macerationem, bulliant
ad humiditatis aquæ conſumptionem, poſtea exprimantur,
& expreſſum commiſceatur cum terebinthina
clara ℥ij.

Calefacit & ſiccatur, eſſentiæque eſt tenuis, unde ad
omnes dolores à frigido contractos adhibetur, &
anodynum exiſtit, iſchiadicis præterea & varicibus
utiliter adhibetur, contra dentium dolorem, poda-
gram, chiragram, articulorumque dolores ſalubre

remedium, nervorum puncturis & vulneribus effi-
cax eſt, & illitu ac ſotu convulſiones prohibet, am-
buſtis cicatrices ducit, & vulnera glutinat.

Oleum Hyperici compoſitum è Pharm. Londin.

℥. Vini albi odori ℥ij. ſummitatum hyperici, cum
floribus & ſeminibus ℥iij.

Tritæ macerentur in vaſe vitreo, obturato ejus ori-
ficio, totum triduum, in olei olivarum veteris ℥ij. ad
ſolem, vel balnei calorem, & exprimantur. Fiat eodem
modo, vino non addito, ſummitatum hyperici ſecunda
infuſo & tertia. Tertium demum, poſt vinum coctione
ſerè abſumptum, exprime; additiſque terebinthina ℥ij.
croci ℥j.

Rurſus parum coque, & reponere.

Hyperici magis compoſitum ex eadem Pharm.

℥. Vini albi generoſi, ℥iij. florum recensium hy-
perici cum ſeminibus m. iij.

Tere, & macera in vitreo vaſe arctè clauſo; bi-
duoque excocto, coque B. M. & validè exprime; in co-
laturam novas injice ſummitates, tertioque idem fa-
cito, Tertix autem colaturæ ſingulis libris affunde.

Olei veteris ℥iij. Terebinthina ℥vi. olei abſinthii
℥ij. diſſamni, Gentiana, cardui benedicti, tormentilla,
carlina, vel cardui marie, calami aromatici, tritorum
an. ℥ij. lumbricorum, pluries in vino albo lotorum, ℥ij.
inſolentur quinque aut ſex ſeptimanas, & bene obtu-
rata reponantur.

Oleum Hypnoticum Zuſſerſeri, ex ejus Pharm. Reg.

℥. Olei nymphaeæ juxta n. modum facti ℥iij. ſemi-
nis papaveris expreſſi ℥ß. Hyoſcyami expreſſi ℥ß. his
mixtis oleis immergantur ſequentia incifa & contuſa:
utpotè, croci Auſtriaci ℥ij. majorana recentis ℥ß.
ladani optimi ℥ij. opi Theb. ici ℥ß. vini albi boni ℥j.

Facta maceratione brevi, fiat, in alembico, ſuo ca-
pitello munito, una ſalem atque altera ebullitione,
quæ tranſit, paucula humiditas, reaffundatur, cum
omnia refrigerint: fiat poſt colatura, cum forti ex-
preſſione; expreſſum à paucilla humiditate, præ-
greſſa aliquali maceratione, per reſidentiam ſepare-
tur: Cui ultimo adde, & in eo liquefac. Olei nuchæ
moſchat. expreſſi ℥ß. ligni rhodii ſtill. ℥iij.

Reponatur uſui in vaſe benè clauſo. Præſtans eſt
oleum ad ſomnum conciliandum, fronti temporibus,
ac naribus illitum; inflammationibus capitis, &
podagricis doloribus ſedandis, perquam ſalutare eſt.
Doloribus etiam colicis, dyſenterix, lienterix, cum
externè inunctum, tum clyſteribus immixtum, cum
ſummo emolumento ſubvenit.

Oleum Jaſminum è Pharm. Aug.

Fit ex floribus Jaſmini, & oleo nucleorum Ben, vulgè
Ben diſcorum, vel etiam oleo amygdalorum dulcium:
goſſypium nempe ſcarptum oleo imprægnando, & cum
floribus Jaſmini recentibus aliquoties ſtratiſicando, tan-
demque exprimendo.

Uſus ejus potiſſimum nobis eſt ad odoris gratiam;
quamvis nec medicas ei vires denegemus, quas cepha-
licas & cordiales poſſidet.

Jaſminum aliud ex eadem Pharmas.

Fit ex floribus Jaſmini, & oleo veteri clauſo, ut eſt
oleum cheyrinum.

Frigidis affectibus adfert remedium, unde partibus
calefactionem & relaxationem deſiderantibus utili-
ter adhibetur; chamamelino aut cheyrino viribus
proximum.

Oleum irinum Meſux è Pharm. Aug.

℥. Radicum ireos ℥ij. florum ejusdem ℥vi. ma-
cerentur in decocto aliarum radicum ireos quantum
ſufficit;

sufficit; postea addantur olei veteris lbij. coquantur & exprimantur.

Vim habet calefactoriam & emollientem; roborat, tenuat, resolvit, tergi, & maturat, convulsionibus efficax, aurium sonitus tollit, quæ in Thorace sunt & pulmone concoquit, asthmaticos juvat, tussim compescit, strumas dissipat, aliosque Tumores duros hepatis & splenis, articularum dolores & durities emendat, facit ad intestinorum tormina acilei cruciatus, naribus illitum destillationibus & ozænis medetur. Datur iis qui cicutam, coriandrum, aut fungorum venenum hauserunt, ut præstantissimum Alexipharmacum.

Oleum Iridinum aliud ex Pharm. Londin.

℞. Radicum Iridis Florentina ℥iij. & ℥iij. florum liliorum alborum, abjectis unguibus flavis, ℥xv. radicem cyperi recentiorum ℥vi. helenii ℥ij. Anchusa ℥ij. cinnamomi, spica nardi, asa odorata, sive Benzoini an. ℥j.

Contusa, ut decet, omnia, in sole, calidove loco, macerentur in olei veteris, ℥xv. aquæ fontanæ ℥iij. & β. post quartum diem coque in B. M. & absumpta aquâ, cum refrigerint, premendo cola, & repone.

Oleum Lacertarum contra hernias Zuelfferi ex ejus Pharm. Reg.

℞. Oleum Jugland. recentè expressi lbij. cui immergantur lacertarum viridum num. xlv.

Et in eo suffocari & emori permittantur. Digerantur in vase vitreo, per diem integrum; coquantur deinde in alembico vitreo, apposito capitello, affusa humiditate, quæ pertransit, ubi omnia refrigerint. Fiat dein colatura, abjectis lacertis: oleum servetur ad curandas hernias præstantissimum: secretum sane, non nisi magnorum Principum; qui cur id multa annorum serie latere voluerunt, ignoro. Inungitur eo locus affectus, ubi intestinorum eruptio ac provolutio deprehenditur, prius repositis intestinis, superimposita dein particula omenti cujusque animalis, hoc oleo illita, ac inspersis pulvisculis adstringentibus, fit ligatura apto cingulo, ad prohibendam ulteriorem intestinorum irruptionem & verò, licet (prout secretum hujus olei descriptio fert,) lacertarum maceratio, uno mense insolando, peragi deberet, ad conciliandam, ipsa mora, infuso efficaciam; eam tamen non approbo. Tanto enim tempore lacertæ, quæ à prima, quæ descendunt, genesi, corruptioni vel maxime obnoxia sunt, (ut potè est putri generatæ) coöperante cum solis, tum olei, calore, & fluida omnium substantia, ad summum putredinis gradum, & cadaveris pestilens miasma, deducerentur; ut unde remedium, & secretum præstolaremur, areano nos toxico & pestilenti fracedine, periclitari deprehenderemus. Accedit, quod spiritus vitæ, seminalis lacertarum, tam diuturnâ maceratione fatiscat, & dispergat: cum tamen (me ita philosophante) ejus præsentia, ad effectum talem producendum, unice desideretur. Hæc enim consolidatio, & cura, nequaquam sensibili, materiali, aut conspiciua, actione perficitur; sed influxu purè spirituali, ac actione sympathetica; quatenus activitas terroris alieni, & spiritus immialis lacertarum, per ejusmodi imagines, ac phasmata, spiritus vitales microcosmi, vel ipsas partes operativas viscerum, & partium, determinant, ut, juxta connaturalem, ac propriam sibi impressionem, se contrahant, & claudant, ac peregrinum spiritum arceant; unde naturaliter dein solidatio partis, & optata sanitas exoritur: quod non contingeret, si spiritus hic lacertarum, prævia ani-

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

malis corruptela, migraret, aut formæ cadaveritatis succumberet. Quare, ut hæc peritonæi contractio, ac herniarum cura, feliciter succedat, brevem lacertarum macerationem insuerim. Sufficiat, te spiritum, suffocato in oleo infecto, superstitem; compendioso labore natum; nec salubrius quid à cadaveroso miasmate præstolere & licet scorpium (qui tamen solidior lacertis est, & non facile putrescit) diu in oleo, uti & scarabæi, superesse videantur; suadet tamen ratio, & eos maturius eximere, ut tanto purius oleum nanciscaris, vitam, & spiritus ipsius animalis possidens.

Oleum Laurinum è Pharm. Aug.

℞. Baccarum lauri recentium electarum maturarum & contritarum quantum voles. Ea in aqua coquantur, colentur & exprimantur; cui expresso, postquam refrigeratum fuerit, oleum supernata.

Vis ejus calefactoria vehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exsicans, intemperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat, cerebri, nervorum, articularum, ventriculi, intestinorum, præsertim coli, hepatis, lienis, renum, & uteri affectibus frigidis medetur, ac dolorem his succedentem abolet, rigori febrili spinæ dorsii illitum, paralyti, nervorum vitis, algoribus, ischiadicis, capitis doloribus inveteratis ac destillationibus auxiliatur, auribus illinitur, renum morbis frigore contractis succurrit, lassitudines discutit, scabie infestatis, & aspera impetigine laborantibus in balneo inunctum medicatur. Fugendum tamen in scabie, aut impetigine inflammationem minantes, & calidis ac biliosis naturis, vermes & pediculos enecat, capitis furfures, ophiasim, & alopeciam delet, capiti tamen calido non admovendum.

Oleum Ligustrinum Mesuæ è Pharm. Aug.

Fit ex floribus recentibus ligustri, cum oleo, ad modum olei chamamelini.

Arabibus de Alcanna dicitur, nobis ligustrinum, quod ex ligustri floribus fiat. Calefacit & moderatè adstringit emolliendi vim habet, vulvæ ac nervorum affectibus subvenit, pleuriticis, opisthoronicis, & angina laborantibus succurrit, capillos à canitie vindicat.

Oleum Liliorum alborum simplex è Pharm. Aug.

℞. Liliorum alborum florum, abjecto quod croceum est, olei an. lb ij. macera & insola per dies octo, postea coque & exprime.

Dicitur & crininum, lilinum, ac susinum, resolvit, digerit, concoquit, dolores à frigore, Thoracis, ventriculi, coli, uteri, renum, vesicæ, & nervosarum partium sedat, ac mitigat, convulsionibus prodest, colicis item doloribus inunctum aut suppositum confert, utile est cum primis muliebribus malis, uteri suffocationes & durities solvens, gravidis ad facilem partum auxilio est, ulcera capitis manantia, furfures, varos, fervidasque eruptiones sanat, vibices, cicatricesque celerrimè ad colorem reducit, & omnem inflammationem cum vitellis ovorum inunctum discutit.

Liliorum compositum Mesuæ ex eadem Pharm.

℞. Mastiches, calami aromatici, costi, carpos balsami an. ℥j. caryophyllorum, Cinnamomi an. ℥ss. craci ℥iij. omnia post sufficientem macerationem in olei liliorum alborum simplicis ℥iij. colentur.

Rr

Oleum

Oleum Liliorum convallium è Pharm. August.

Fit ex floribus liliorum convallium, & oleo claro, ut oleum liliorum simplex.

Spasmo, convulsioni ac tremori, aliisque frigidis nervorum noxis succurrit, puerulorum item tormina mitigat.

Oleum Seminis lini è Pharm. Aug.

Lini semina contusa & assata exprimantur.

Viribus proximum chamamelino & Anethino, Anodynum est, convulsionem curat, articulorum, musculorum, nervorum, ac cervicis durities mitigat, ani affectibus confert, abscessus ejus, fissuras & hæmorrhoidum dolores curans. Manardus pleuritidis linctu aut potu exhibebat; quod magnopere probavit Gesnerus, qui in epistola quadam ad Clar. Adolphum Occonem hunc in modum scripsit; jam quater aut quinque feliciter propinavi, primum bis ante sesquiannum in pleuritide cruda & maligna, jam desperatis fere virgini & mulieri, quarum unaquæque mox magna admiratione mera restitui cepit. Postea juveni in morbo quodam interiore incognito fere nec satis jam memini, etsi annotavi. Quarto in tussi ac dipnæa ante paucos dies mulieri Gutturisæ, quæ heri ad me venit, & pro hoc consilio gratias egit. Omnibus paulò post soluta alvus est satis copiosè. Tres aut quatuor uncias una vice bibi jubeo. Odoris quidem ejus gravitas plerisque adeo molesta est & fastidiosa, ut secundo sumere nollent, sed nullum periculum, nullam incommodum sequitur, & medicus necessitatem in gravissimis morbis, non voluptatem sumentium, spectare debet. Si ritè pureque paretur, & medicus domi haberet, confidentius dari posset, etsi Brassavolus non admodum laudet; ego pro cognita felicissima, & admiranda ejus facultate Deo gratias ago. *Hactenus Gesnerus.*

Oleum Lucatelli è Pharm. Londin.

℥. Cera citrina opt. ℥j. liquecat miti igne in pari quantitate vini canarini. Dein adde olei olivarum opt. Terebinthina ven. in aqua rosarum ad albedinem lota an. sequilibram. Bulliant leni foco ad vini evaporationem. Demum ab igne semotis insperge santali rubri subtil. pulv. ℥ij. continuo agitando donec refrigerint. F. balsamum.

Oleum Lumbricorum simplex è Pharm. August.

℥. Lumbricorum terrestrium ℥ss. laventur in vino, deinde immittantur in olei rosati ℥ij. coquantur ad humidi aquosi consumptionem.

Anodynum est, & cujus fori nervi recreantur, unde in nervorum vulneribus, eorundemque resolutionibus utile illud experimur.

Lumbricorum compositum ex eadem Pharm.

℥. Olei lumbricorum simplicis ℥ij. Florum hyperici ℥ij. stillantii rosmarini ℥j. misce. Servetur ad usum.

Viribus cum simplici convenit, ad supradicta tamen majoris efficaciæ compertum habemus.

Oleum Mandragoræ è Pharm. Aug.

℥. Corticum rad. Mandragoræ ℥j. capitum papaveris nigri ℥vi. contundantur & coquantur, in aqua sufficienti, colato decocto addantur succorum Hyoscy-

mi albi ℥ij. cicuta tenera ℥j. olei violarum ℥ij. opii, styracis calamita an. ℥ss.

Succi cum oleo coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, & colentur, addendo tandem styracem & opium.

Commendatur ad omnem inflammationem extinguendam, somnum conciliandum, capitis dolores sedandos, phreneticis, febricitantibus, & vigilantibus conveniens, fronti, temporibus, ac naribus illitum.

Oleum Mastichinum Mesuæ è Pharm. Aug.

℥. Olei rosati ℥ij. in qua dissolve Mastiches ℥ij. fiat colatura.

Mediocriter calefacit, adstringit, & emollit, ventriculum firmat, illitum in lienteria & intemperie frigida sicca salubre existit, ad cæliacorum, stomachicorum ac dysentericorum cruciatus utile, tumores duos lenit cerebrum, nervos, & juncturas roborat, phlegmonis gingivarum, linguæ & totius oris medetur.

Oleum Meliloti è Pharm. Londin.

Oleum meliloti, ex herba summitatibus, eodem modo, ut chamamelinum, paratur.

Oleum Menthæ è Pharm. Aug.

Fit ex mentha domestica crispa, cum oleo, ut oleum de abrotono.

Ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur, eum namque calefacit, roborat, nauseam abigit, vomitionem sistit, adpetentiam excitat, & concoctionem promovet.

Oleum Momordicæ.

Oleum momordicæ, & pomorum amoris sunt, si poma infunduntur in oleo amygd. dulc. vel hyperici, ac insolatur.

Oleum Moschelinum Nicolai Alexandrini è Pharm. Aug.

℥. Olei puri ℥vi. macis, nardi indicæ, costi, mastiches an. ℥ss. styracis calamita, croci, myrrhæ, cinnamomi, cassia lignea vera an. ℥vi. carpobalsami, caryophyllorum, Bdell. an. ℥ss. nuc. moschat. numero duas.

Omnia post biduam macerationem in vase probe recto, leni arenæ calore factam colentur, & addatur moschi in particula spiritu rosarum soluti ℥j.

Μαχελανον potius dicendum à moscho, qui ejus compositionem ingreditur. Frigidis affectibus est præstantissimum ventriculo præsertim debili, quem roborat & calefacit, dolorem lateris illitum sanat, stranguriosis, colicis, ac nervorum omnibus propè vitii confert, pomis odoratis cogendis est aptissimum.

Oleum idem ex Pharm. Londin.

℥. Noces moschatas numero duas, moschi ℥ss. folii seu macis, spica nardi, costi, mastiches, an. ℥vi. styracis calamita, cassia lignea, myrrhæ, croci, cinnamomi, caryophyllorum, carpobalsam. vel cubebarum, Bdell. an. ℥ij. olei puri ℥ij. vini generosi ℥vi.

Terantur ex arte & confusè mista, sensim, dum vinum evanescat, bulliant; admisto f. a. moscho, post colaturam.

Oleum

Oleum Mucaginum è Pharm. Amstelodamensi.

℞. Rad. althææ recentium incisarum ℥iij. scilla recentis confusa. ℥i. sem. fanigraci, lini, integrorum an. ℥i.ß.

Macerentur in s.q. aquæ: deinde leniter coquantur, donec remittant crassam & viscosam mucilaginem, cui adde.

Olei anethini, chamamelini, liliorum alborum an. ℥xvi.

Coquantur simul ad humiditatis aqueæ consumptionem, subinde agitando ne adurantur.

Oleum Myræum seu pigmentatum ex Renodæo.

℞. Summitatum botryos herbe granulis onustarum m. iij. baccarum botryos fruticis ℥viij. vini albi optimi ℥i.ß. olei bovi ℥i.ß.

Misce, & septem dies in sola: dein in balneo mar. simul tandiu totum incalescat, ut vinum vaneat, expressum oleum servandum.

Oleum Myrrhæ è Pharm. Londin.

Ova aliquot recentia coquantur donec induruerint; per mediam longitudinem incidantur, vitelli eximantur, cavitates myrrhâ trita impleantur, & denuo coniungantur albumina, floque parum constringantur, & craticula inter duas paropsides collocata imponentur. Tum in cella vinaria, vel alio loco subterraneo & humido ponantur. Sic enim myrrhâ liquatus humor in paropsidem inferiorem destillabit.

Oleum Myrtillorum è Pharm. Aug.

℞. Olei olivarum ℥iij. myrtillorum ℥i. myrtilli contundantur, atque si exsiccati fuerint, vino conspergantur, postea cum oleo ad humiditatis aqueæ exhalationem coquantur & colentur.

Adstringit & refrigerat, cerebrum, nervos & ventriculum roborat, viscerum phlegmonis, utile, gingivis, dolori dentium, dysentericis, cæliacis, vulvæ exulceratæ, ulceribus vetustis vel manantibus, cum squama æris & cera medetur, attrita, furfures, rhagades, condylomata, articulos luxatos, & omnia quæ adstrictionem desiderant. Hæmoptoicis, & sanguinis ex pectore rejectioni confert, & ad arcendam phlegmonem in ulcere pulmonis Gal. illinit, capillorum defluvium prohibet, adjecto præsertim ladano, Galen. l. de comp. med. sec. loc. cap. 2.

Oleum Myrtinum è Pharm. August.

Oleum Myrtinum fit ex foliis myrti, ut myrtillorum oleum.

Eisdem ferè vires obtinet, quas oleum myrtillorum; adstringit enim & roborat.

Oleum Narcissinum è Pharm. Londin.

Fit ex floribus recentibus narcissi albi, & oleo, ut rosaceum.

Oleum Nardinum simplex è Pharm. Aug.

℞. Olei sesamini ℥i.ß. spina nardi aromatica ℥iij. post factam digestionem colentur.

Calefacit, tenuat, digerit, modice adstringit, quocirca auxiliatur stomachicis, cæliacis, destillationi ac Thoracis vitio obnoxiiis, ventriculum firmat, & cognitionem procurat, viscerum phlegmonis, jecoris

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I l.

inflammationi, ac pulmonum ulceribus medetur, cerebri & nervorum frigidos affectus sanat, ac aurium dolores mitigat, Tremulis & paralyticis summum est remedium, uteri præfociones, & Tumores suppositum discutit, aut etiam injectum vesicæ dolori, renūque calculis opitulatur.

Oleum Nervinum Zuverfferi ex ejus Pharm. Regia.

℞. Olei olivarum recent. non racidi ℥iij. cui immergantur, successu temporis, incisa & confusa sequentia.

Gemmar. populi arbor. recent. ℥vi. summitatum Abietis, vel laricis arb. ℥iij. vel iij. herb. recent. calamith. mont. majoranæ, melissæ, rûæ arithetica, origani, salvie min. Thymi, flor. recent. chamomilla, lavendula, spica an. ℥ij. baccarum lauri, juniperi virid. an. ℥i.ß.

Macerentur septimanâ unâ, vel alterâ, donec omnia collecta & immersa sunt. Postmodum ebulliant parum, in alembico vitreo, capitello suo munito, ut particula, quæ prodit, humiditatis reâffundi queat. Tum fiat colatura, & fortis herbarum expressio; oleo autem expresso ulterius adde.

Lumbricorum terrestrium vivorum & lotorum ℥viij. & facta adhuc unica ebullitione, in alembico, uti antea suo capitello apposto, denuo coletur: colato vero oleo superadde.

Olei still. majoranæ, salvie an. ℥ij.

Fiat oleum nervinum efficacissimum. Si ipsa hujus olei nervini, ut & aliorum præceptum & subsequen- tium oleorum, ingredientia & præparaciones, inspiciantur, & accuratè considerentur, suspensa hæc erã reverã opus non fuerit, quã obrem, in encomiis recensendis non est, ut longus sim, sufficit hic dixisse, quod hoc oleum sit præstantissimum in omnibus nervorum affectibus frigidis: quod tamen tantum abest, ut nimio opere calefaciat, ut potius virtute roborante, confortante, & penetrante, egregiè polleat.

Oleum Nervinum Slotani.

℞. Olei olivatum ℥vi. catulorum junior. n. ij. ranarum viv. n. xii. lumbricorum ∇ loter. m. iv. ∇ juniperi absque vino dest. ℥iij.

Coquantur omnia leni igne, donec carò catulorum ab ossibus separetur, & humiditas omnis fere consumpta sit. Tum colato oleo adde.

Axungie human. olei scorpion. amygd. d. muris alpini an. ℥i.ß. m. & in olla capaci inditis adde recent. gemmar. populi nigr. ℥iij. flor. prim. veris. Tussilag. Berthonic. Genist. hisp. Chamom. rom. violarum, lilior. Conv. lavendula, sambuci, Anethi, salvie, cheiri, ruta, serpilli, Anthos, cent. min. veronica, origani, Tanacetii, ligustri, Agrimon. pulegii, meliloti, verbasci, Absinth. vulg. rosar. r. an. m. j. hypericonis nondum penitus apertorum ℥iij.

Flores omnes ab herbis separati oleo immittantur, alia viridescet & oleum, quod alias rubicundum esse debet ex flor. hyperici: flores successive prout per ætatem florent oleo immittuntur, vase interea clauso, donec omnia probe infusa steterint: Tum oleum tandem decantatur & asservatur.

Oleum Nardinum compositum Mesuæ è Pharm. Aug.

℞. Spica indica ℥iij. majoranæ ℥ij. ligni Aloës, Enulæ, maicis, calami aromatici, foliorum lauri, cyperi, sebananthi, cardamomi an. ℥i.ß.

Ri 2 Conj

Contundantur omnia crassiusculè, deinde cum olei
sesami ℥iij. aliquandiu macerentur & colentur.

Oleum Nicodemi è Pharm. Londin.

℥. Seminum, seu summitatum hyperici, Terebin-
thina veteris an. ℥j. lithargyri ℥vi. Aloës hepatica,
turcia Alexandrina an. ℥iij. croci ℥j. vini albi optimi
℥iij. olei veteris ℥ij.

Absumptâ quartâ vini parte per lentam omnium
in balneo cocturam; alicubi, in arena, soli canic-
ulari exponantur & per pennum candidum post
decimum diem, colentur, seorsumque à vino serve-
tur oleum.

Oleum Nicotianæ ex eadem Pharm.

℥. Succu nicotiana sive Tabaci aut peti. Olei com-
munis an. ℥j. macerentur & coquantur ad succi ab-
sumptionem item.

Fit Oleum nicotiana ex succi nicotiana, & olei com-
munis, an. partibus aequalibus, in balneo s.a. coctis.

Oleum Nucum juglandium.

Conficitur ut oleum Amygdalorum amarorum.
Flatibus crassos dissipat, tumores dissolvit, nervis pun-
ctis cum calce lota utiliter adhibetur, scabiei medetur,
& variis vitiiis cutaneis.

Oleum Nucis moschatæ.

Nuces moschate radula attrite, aut concise, & di-
ligenter contuse, aqua calida vapore irrigantur, ex
quibus postmodum, dum adhuc calent, oleum expri-
mitur.

Ori ventriculî inunctum mirè eum roborat, de-
glutitum calefacit mediocriter, & Anhelitum com-
mendat, illitum Veneris rentiginem excitat, stoma-
chicis quoque frigida & humida intemperie laboran-
tibus conducit.

Oleum Nucis Indicæ.

Paratur ut oleum nucis moschate.

Nervorum dolori confert, Thoracem & pulmo-
nes lenit, clariorem vocem facit, impinguat, ac
genitale semen auget. Hodie ferè usurpatur ad
conceptus procuracionem nec non seminis incre-
mentum.

Oleum Nucleorum persicorum.

Preparatur ut oleum Amygdalorum amarorum.

Obstructa aperit, aurium & sedis ab hæmorrhoidi-
bus dolores ac tumores sanat, lumbricos enecat, in
renum affectibus injectum & epotum valere adserit
Manardus.

Oleum Nymphææ è Pharm. Aug.

Fit ex floribus Nymphææ, ad modum olei de Abrotino.

Refrigerat, cephalalgiam ex febrium incendio, in-
deque enatum delirium. Papaverino mixtum, miti-
gat, insomnium abigit, urinæ ardori, intemperiei
calidæ renum, eorumque ulceri, & vesicæ commo-
dum, illitum aut injectum, gonorrhœam arceat, & ten-
tiginem propellit, genitalibus illitum.

Oleum Olivarum commune.

Exprimitur ex olivis maturis; sed è carne sive pulpa,
non è nucleis.

Oleum Omphacinum?

Fit ex pulpa olivarum, sed ante maturitatem.

Oleum Othalgicum D. Le Mort.

℥. Ol. Amygd. amar. papav. alb. Terra an. ℥ij. petra
℥j. rorismarini still. ℥ij. camphor. ℥℥.

Dolores aurium sedat, sordiditati confert, nervorum
affectibus frigidis succurrit.

Oleum è granis Præobix è Pharm. Aug.

Preparatur ut oleum è granis citri.

Ulus ejus tam intra corpus quàm extra in epilepsia
& similibus morbis præclarus existit.

Oleum Papaverinum, è Pharm. Aug.

℥. Caput papaveris, foliorum papaveris, florum
ejusdem an. ℥℥. contusa infundantur in olei ℥iij. postea
sufficienter coquantur & colentur.

Intemperiem calidam sanat, febrium ardores ac
insomniam mitigat, fronti, auribus, naribus, & tempo-
ribus illitum, somnum conciliat, asperam arteriam
lenit, renumque doloribus ex intemperie calida me-
detur.

Oleum è Papaveris albi semine ex eadem Pharm.

Preparatur ut oleum seminis hyoscyami.

Utile est anodynum ad ardorem febrium mitigan-
dum, fronti & temporibus adpositum somnum con-
ciliat, & dolores capitis tollit.

Oleum Antipestilentielle Ludovici de Leonibus ex
Weikardo.

℥. Ol. Terebinth. laurini, Abietis an. ℥℥. Gummi
elemi ℥j. hedera ℥j. Thur. ℥j. ligni Aloës ℥j. B. mastich.
myrrh. ladan. sagapen. castor. an. ℥j. galang. cinam.
caryophyll. nuc. mosch. cubebar. Zedoar. an. ℥j. opoponac.
℥j. resina pini, picis navalis an. ℥℥.

Terantur terenda, & in vase vitreo posita stent per
mensem in putrefactione, postea lento igne destil-
lentur, hoc si indicium pestis appareat non solum-
modo corrigendum, sed etiam pulsus regio scilicet
temporum, brachiorum & pedum. Quod oleum Lu-
dovicus practicus magni nominis Bononiæ, Regi
Matthiæ Hung. mille nummis aureis Ungaricis acce-
ptis præscripsit, cujus tamen usus cum valde sit cali-
dum non omnibus convenit.

Oleum de Piperibus Mesuæ è Pharm. Aug.

℥. Piperis longi, albi, nigri, an. ℥iij. myrobal. chebu-
lorum, emblicorum, indorum an. ℥v. radicem apii, feni-
culi an. ℥iij. Turbith. ℥ij. Zingiberis ℥iij. summitatum
hyssopi, ruta viridis an. m j.

Coquantur in quantitate aquæ sufficienti ad ter-
tias. Colaturæ adde olei Amygdalorum dulcium ℥j.
Recoque ad consumptionem aquæ, in fine addendo
sequentia Gummi in aceto diluta: sagapeni, opopana-
cis, ammoniaci an. ℥iij.

Cerebri & nervorum frigidas noxas propellit, quia
calefacit, tenuat, abstergit, discutit, aperit, eoque no-
mine calculo medetur; ad paralytiam, spasmus, tremo-
rem, epilepsiam, uteri, coli, renum ac vesicæ affectus
frigidos & articularum dolores adhibetur, menses
evocat, & ventriculum imbecillum firmat.

Oleum

Oleum ex Pistaciis & Pineis è Pharm. Aug.

Exprimuntur ut alia olea è seminibus & nucleis expressa.

Hepatis & renum dolores potenter leniunt, impinguant, semen augent, ventriculo non ingrata, Tussim & Thoracis dolorem compescunt, ac intemperiem emendant.

Oleum Polychrestum è Pharm. Londin.

℞. Spiritus vini ℥i℥. sarsaparilla alba & medullosa incisa ℥v.

Infunde in vase vitreo, donec spir. v. colorem aureum induerit, tum colaturæ adde Gum. Guajaci, leni calore in eadem (agitatione subinde facta) solvendi ℥viij. demum adde Balsami Indici, sive Peruani, cochlear unum. M. F. Balsamum.

Oleum Populinum Nicol. Alexandrini è Pharm. Aug.

℞. Olei communis ℥viij. ℥ij. Gemmarum populi arboris recentium, veris initio collectarum ℥iij.

Gemmæ populi terantur & macerentur in oleo, postea coquantur ad consumptionem humiditatis aqueæ, colentur & exprimantur.

Emollit, Tenuium est partium & calidum, arthriticis ac podagricis utile.

Oleum purgans Zuvelfferi ex ejus Pharm. Reg.

℞. Olei lini recentem expressi ℥i℥. huic immergantur sequentia minutim incisa & confusa.

Rad. recent. brionie, asari, cucum. asinini an. ℥i℥. rad. recent. hormodact. ireos nostrat. esula an. ℥ij. herb. recent. Anethi, gratiola, malva, mercurialis, Tanacet. an. ℥ij. corallina ℥vi. flor. recent. rosarum pallidarum, myrrha rubra, Aloës hepatica an. ℥ij. pulpa colocynthis, sem. Cynæ, cataputia, Ebuli an. ℥vi.

Facta maceratione, die una vel altera, bulliant leniter, ad consumptionem ferè humiditatis; colentur postea, exprimanturque species fortiter: separatetur oleum purum per residentiam: quod ad usum seponatur; addendo tamen ultimo Camphora ℥i℥.

Solvit alvum, umbilico inunctum, vel petia in eo intincta, & umbilico, aut toti ventri, superapposita tenecat vermes, eosque expellit, delicatis, purgantia interna abominantibus, puellulis, à symptomatibus vermium quasi insensibilibus, aut medicamentis intrinseca respicientibus, proficuum.

Oleum aliud purgans ex eodem.

Conficitur & aliud purgans oleum, per expressionem, sumendo nimirum semin. cataputia ℥ij. carthami, cucumeris asinini an. ℥iij. ebuli ℥iij. lini ℥iij. vel v.

Ex his simul conquassatis, & confusis exprimatur, modo usitato, oleum per prelum, fortiter; quod pro utu serve ut. Potenter alvum mover, umbilico illitum; educit vermes intantum, si cum linteolis, in eo madefactis, ventri imponatur.

Oleum Ranarum è Pharm. Aug.

℞. Ranarum fluviatiliū ℥℥. olei sesamini ℥i℥. coquantur usque ad ranarum dissolutionem, postea colentur.

Refrigerat, ob id podagram & alias Arthritidis species calidas mitigat, ac incendium febrium ar-

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

dentium compescit, fronti & temporibus illitum somnum conciliat.

Oleum Resolvens vulgo resolutivum è Pharm. Augst.

℞. Radicis cucumeris Asinini, Bryonia, Althææ an. ℥iij. olei communis ℥x.

Macerentur aliquandiu, coquantur postea secundum artem, & exprimantur.

Resolvit, digerit, mollit, alta penetrat, ac frigidos & contumaces dolores mitigat.

Oleum Rosatum, è Pharm. Aug.

℞. Olei communis, rosarum damascenarum nondum penitus apertarum & confusarum an. ℥iij.

Macera & infusa per dies octo, postea cola & exprime. Nonnulli tres instituunt infusiones, pro singulis ℥xvi. rosarum recipientes, in ultima verò infusione rosas relinquentes.

Vim habet repellentem, mitigatoriam, concoquentem, & discussoriam, inflammationes extinguit, refrigerat, roborat, rheumatismos sistit, alvum solvit, ventriculo æstuanti, uteri inflammationi, capitis & meningum cerebri vulneribus succurrit, dolores mitigat, ac somnum inducit, in dolore dentium inter initia utiliter adhibetur, ulceribus in capite manantibus, & fervidis eruptionibus illinitur, lumbricos & ascarides potum deturbat, podagricis doloribus ac inflammationibus, & hæmorrhoidibus commodè illinitur.

Rosatium omphacinum, ex eadem Pharm.

℞. Olei omphacini, id est, olivarum immaturarum, rosarum rubrarum nondum penitus apertarum an. ℥ij. fiat ut oleum rosatum superius descriptum.

Rosatium compositum Mesuæ ex eadem Pharm.

℞. Olei olivarum vulgaris, rosarum rubrarum apertarum & confusarum an. ℥ij. infusi rosarum ℥℥.

Coquantur ad humidam aquosam consumptionem, colentur, & exprimantur.

Oleum Rutæ ex Pharm. Aug.

Preparatur ex ruta, & oleo vulgari, eodem modo, quo abrotoni oleum preparare docuimus.

Calefacit, tenuat, & digerit, illitum & cum clysteribus injectum colicum dolorem sedat, vitreum phlegma ejiciens. Iterum, renum, vesicæ ac uteri dolores à causa frigida juvat, nervorum & spinæ resolutioni, convulsionibusque medetur & flatus dissipat.

Linaeum rutaceum ex eadem Pharm.

Ex foliis rutæ recentibus & oleo seminis lini expresso, sumendo amborum aequales partes, coctione & expressione paratur.

Singulare admodum est adversus lienis schirrosi, & duritiem, tumores enim emollit, ratione olei lini, eisdemque discutit ac digerit, ratione rutæ. In enematibus, ubi flatus discutiendi, antecedenti præferendum; variis insuper aliis usibus in morbis accommodatum existit.

Oleum Sabinæ.

Fit oleum sabinæ similiter ut rutaceum.

Oleum Sambucinum è Pharm. Aug.

Oleum Sambucinum fit ex floribus sambuci & oleo clarissimo, ut oleum Abrotoni.

Levit, abstergit, cutim mundificat, ictero & hepatis obstructo confert, articularum & nervorum doloribus

R 1 3 utile,

utile, eos namque roborat, epotum aut injectum alvum irritat, ierosaque excrementa per interna educit. Fit quoque ex medio sambuci cortice similiter macerato oleum, quod ad ambusta Italici usui est.

Oleum Sampsuchinum; Id est majoranæ, è Pharm.
Aug.

℥. Foliorum sampsuchi m. iij. serpilli m. ij. foliorum myrthi m. j. Abrotoni, sisymbrii, seu mentha aquatica an. m. β. cassia lignea vera ℥. j. olei omphacini ℥. iij.

Concidantur & contundantur omnia, postea addendo olei olivarum ℥. iij. in vase optimè clauso macerentur ad solem, vel alio calore diebus octo; dein exprimantur, & expressum oleum infundatur, recentibus speciebus, & hoc etiam tertio faciendo.

Σαμψυχίνον acopum est, & lassitudinibus utile, frigidis cerebri & nervorum vitiis prodest, spinæ in balneo inunctum paralytin juvat, & spasmus Cynicum naribus immisum, aut ore detentum, sternutamentum leviter ciet; in opisthotonicorum, & convulsorum cataplasmata additur, auribus immisum tinnitum à flatu dissipat, menses, secundinas ac parvus expellit, uteri suffocationi, & scorpionum moribus medetur.

Oleum Sarcoticum D. Le Mort.

℥. Olei lini ℥. j. cera ℥. β. Bals. crass. flor. hyperic. ℥. iij. sarcocoll. ℥. iij. Aloës ℥. ij. Camphor. ℥. β. sacch. Saturn. ℥. j. M. digerantur simul in fimo equino per 14. dies. Colatura postmodum usui servetur.

Vulnera quæcunque recentia vel mundificata citissimè conolidat.

Oleum Scorpionum simplex Mesuæ è Pharm.
Aug.

℥. Scorpionum numero triginta, olei amygdalorum amarorum ℥. iij. macerentur in vase vitreo stricti orificii per dies triginta, in loco calido, postea colatum ad usum reponatur.

Vesicæ ac renum calculum dissolvit, lumbis, pubi, perinæo in solii egressu illitum, & in porum urinarum immisum venenis præcipuè à scorpione ictis, ac pestilentia adeo resistit, ut ejus solo usu quendam cum famulatio à pestilentia contagio servatum scribat Marardus, & ex sola inunctione aliquos esse liberatos, qui sævissima venena biberant.

Scorpionum compositum Mesuæ ex eadem Pharm.

℥. Aristolochia rotunda vera, Gentiana, cyperi, cortic. radicum capparum an. ℥. j. olei amygdalorum amarorum ℥. β.

Macerentur in oleo contusæ radices ad solem fervidum, vel alio calore, deindè coquantur aliquantulum, injectis tandem Scorpionibus numero viginti: postea excolatum oleum reponatur.

Scorpionum compositum Matthioli ex eadem Pharm.

℥. Olei olivarum vetustissimi ℥. iij. florum hyperici virentium ac modicè conquassatorum m. iij. insolentur simul in vase vitreo probe obturato, recondita per dies decem vel duodecim, dehinc in calente balneo maria macerentur horis viginti quatuor, tum vero colentur & exprimantur. Hoc facto.

℥. Flor. hyperici recent. Chamadryos, calamintha, cardui benedicti an. m. j. flor. & herb. prun.

contusa oleo admisceantur, macerenturque in balneo per triduum, postea colantur & exprimantur. Post hæc.

℥. Florum hyperici à caulibus repurgatorum, ac modicè contusorum m. iij. submergantur in eodem oleo, ac per triduum iidem in balneo macerentur, colentur & exprimantur, eandem infusionem readsumptis semper recentibus floribus ter vel quater reiterando, donec oleum sanguineum colorem adquirat. His peractis.

℥. Granorum viridum hyperici quod desloruit, in cacumine plantæ natorum in quibus semen continetur m. iij.

Contundantur & vino albo meraco perfusa in prædictum oleum immissa per octiduum insolentur, postea verò tridui spatio in balneo macerentur, colentur & exprimantur, laborem hunc novis semper readsumptis seminibus ter vel quater sic repetendo, ut oleum obscuri sanguinis colorem referat: tunc vero.

℥. Scordii recentis, calamintha, centaurii minoris, cardui benedicti, verbenacæ, dictamni cretici an. mβ. tusa ac in oleo priore demersa, per biduum in balneo macerentur, colentur & exprimantur ut supra. Postea.

℥. Zedoaria, rad. dictamni, Gentiana, tormentilla, Aristol. rotunda an. ℥. iij. scordii m. j. hæc omnia tusa ut prius in balneo adfuso priore oleo per triduum rursus macerentur, colentur & exprimantur: expresso & colato huic infunde denuo.

Syracis calamita, laseris seu benzoini an. ℥. vi. baccarum juniperi ℥. β. melanthii ℥. j. cassia lignea vel cinnamomi odoratissimi ℥. vii. junci odorati, seu schanami, cyperi rotundi an. ℥. β. sandali albi ℥. β.

Contusa in oleum immitantur, rursusque ut antea per triduum in eodem rorido balneo macerentur, tum colatum ac expressum oleum calens superinfundatur recentis scorpionibus vivis diebus canicularibus lectis, qui prius vitreo vase conclusi, ac calidis cineribus superimpositi in iram exarserint, & sudare inceperint. Hi unà cum hoc oleo tridui spatio in balneo macerati exprimantur, oleumque abjectis scorpionibus percoletur.

In hoc rursus infunde rhabbarbari selectissimi, myrrha, Aloës hepatica an. ℥. iij. spica indica ℥. j. croci ℥. j. Theriaca, Mithridati an. ℥. β. Tundenda contundantur, ac cum cæteris oleo prædicto immergantur, macerenturque sic simul omnia in balneo calente per triduum, postea absque colatura reponantur in usum.

Viperarum, aspidum, ac venenatorum animalium moribus auxilio est. Pulsibus ac extimæ cordis parti ad sinistram mamillam inunctum, repetita per ternas horas illinitione, omnibus venenis per os sumtis, si modò ea erodentia non fuerint, efficacissimè succurrit, quin etiam pestiferis morbis sic adhibitum medicatur, nec non ab iisdem præservat.

Oleum Scorpionum magnum Augustanorum.

℥. Olei olivarum ℥. iij. summitatum hyperici m. x. scordii m. β. calamintha, cardui benedicti an. m. j. herba contusa & in oleo macerata coquantur ad humiditatis aqueæ exhalationem. In colatura infundantur.

Rad. Zedoaria, dictamni albi, gentiana, Aristolochia rotunda an. ℥. iij. Baccarum juniperi ℥. β. cinnamomi ℥. vi. schanami, croci an. ℥. j. syracis, benzoini, myrrha, Theriaca, Mithridati an. ℥. β. scorpionum vivorum numero trecentos. Macerentur per triduum in balneo, vase bene tecto, postea colentur & exprimantur.

Cum alterum illud oleum scorpionum Matthioli, verè,

verè, si compositionem & præparationem spectes, Magnum dictum, magnos requirat sumtus & longum pro elaboratione tempus, nec omni censura careat, eidem præsens hoc contractius substituere volumus; cujus usus imprimis in febribus malignis externè si inungatur, esse poterit.

Oleum Sesaminum è Pharm. Aug.

Fit ex semine Sesami eodem modo, quo oleum papaveris.

Olim ex Alexandria Ægypti Venetias, & inde ad nos comportabatur sincerum; adulteratur oleo nucum & papaveris. Hodie apud nos paratur ex sesamo clarum est & candidum, gustu in cibis ac dulcedine delicatissimum.

Vires. Habet impinguandi, semen genitale augendi, asperitates & durities leniendi, siquidem asperam arteriam emollit, ac clariorem vocem reddit, aurium dolores sanat, & ulceribus quæ serpunt, ac mali moris sunt (caccæthe vocant) medetur, pectori & pulmonibus confert, pleuritidi adcommodatum, puerorum tussim sedat, cum saccharo cantio paulatim deglutitum.

Oleum Sicyonium è Pharm. Londin.

Oleum Sicyonium ex radicum contusarum cucumeris agrestis, & succi ejusdem, an. parte dimidia, olei maturi parte una, coctis in duplici vase ad succi exhalationem, paratur.

Oleum Solani ex eadem Pharm.

Paratur Oleum solani, ex baccarum solani maturarum parte una, coctarum in olei maturi, vel rosacei, partibus tribus.

Oleum Spermatum ranarum è Pharm. Noriberg.

℞. Olei communis q.v. coquatur cum dimidio spermatum ranarum pondere, donec stridere desinat.

Oleum stomachicum Cratonis è Pharm. Aug.

℞. Olei Absinthii ℥ij. Summitatum absinthii m. Caryophyllorum, sandali citrini an. ℥ij. rosarum rubrarum, macis an. ℥ss. mastiches ℥ss. macerentur aliquandiu in vase optime clauso, & post lenem ebullitionem, coeuntur.

Hoc oleum Crato mirificè prædicat in ventriculi doloribus & infirmitatibus, maxime verò frigidis, quod cum nobis crebro usu terviat, meritò huic Pharmacopœiæ nostræ inferendum esse censuimus; prout & sequens:

Oleum Stomachicum Florentinum ex eadem Pharm.

℞. Mastiches ℥vj. nucis moschate, caryophyllorum, an. ℥ij. Schœnanthos, macis an. ℥i. ligni aloës ℥v. olei mastichini ℔ij. Coquantur in vase bene cooperto, & coeuntur.

Oleum hoc, sub epitheto Magni Ducis Hetruriae notum, & Florentia etiam ad nos adferri solitum, in Joh. Prevotii Hortulo medico describitur, in calefaciendo & roborando ventriculo, flatibusque discutendis sese commendans:

Oleum Stomachicum Zovelfferi ex ejus Pharm. Reg.

℞. Olei olivarum recent. & clari ℔ij. cui immergitur sequentia minutim concisa, contusaque, scilicet herb. recent. Absinth. nostr. mentha crispæ, rorismarini, salvie an. ℥ij. rad. recent. calami Aromat. ℥ij. baccar. juniperi virid. lauri, styracis calamita, an. ℥ss. cinamomi opt. ℥i. caryophyllorum ℥vj.

Facta digestionem brevi, ebulliant parum, in alembico vitreo, suo capitulo munito, ut pauca, quæ

transit, humiditas reasundi queat residuo; coeuntur. Tandem oleum, dum adhuc parumper calens, speciesque exprimantur: expresso, colato, & à residua postquam aliquandiu quiete staterit, separato, vel decantato oleo adde, ac in eo liquefac.

Mastichis electa ℥j. ol. nuc. moschatar. Expressi ℥ss. vel unam integram: Misceantur exactè, leni in calore: fiat oleum stomachicum nobile, cum externo, tum interno usui destinatum, confortat enim ventriculum, concoctionem adjuvat, & flatum pellit, atque discutit.

Stomachicum aliud ejusdem.

℞. Amygdalar. amarar. deorticat. ℔ij. sem. carvi ℥ij. macis, nuc. moschatar. caryophyllorum an. ℥ii.

Exprimatur ex omnibus, mixtis & contusis, oleum; quod præstat in affectibus ventriculi frigidis; quem roborat, digestionem promovens, & nauseam, cum vomitibus spontaneis, compescens.

Oleum ex Styrace è Pharm. Aug.

℞. Styracis ℥ij. olei communis ℔ij. coquantur in duplici vase, & coeuntur.

Galefacit vehementer & emollit, ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, utero, musculis, juncturis, tendinibus, eorumque durities insigniter emollit, ad nervorum injurias, & vulnera fortè commodum, ob id Chirurgis expetitur, ac ad scabiem efficax, ut scribit Manardus, addiat hellebori albi octava portione.

Oleum contra venena Magni Ducis Hetruriae à D. de Scobbis in suo Theatro Pharm. descriptum.

Illud quandoquidem ab oleo scorpionum composito Matthioli, aut potius ab Oleo Scorpionum magno Augustanorum supra allatis parum admodum differt, huc adducere superfedebimus.

Oleum è floribus verbasci è Pharm. Aug.

Fit ex verbasco floribus, ut oleum è floribus liliorum alborum.

Ad pedagricos & alios dolores præsertim calidos laudatissimum, commendatur etiam in hæmorrhoidibus.

Oleum Verbenaceum è Pharm. Londin.

Oleum verbenaceum, ex herba & oleo, ut oleum mentha.

Oleum Violaceum è Pharm. Aug.

Oleum violaceum seu violarum fit ex floribus violarum ac oleo olivarum sicut rosaceum.

Frigidum ac humidum est, tenuium partium, leniens & modice aperiens, ad inflammationes idoneum, inemperiem calidam extinguit, phlegmonas omnes sedat, fistulæ pulmonariæ asperitatem, pulmonem & thoracem lenit inuncto Thorace, unde & Tabidis & hecticis præsentis est remedio: in phrenesi ac vigiliis fronti & temporibus impositum so unum conciliat, hepatis ac præcordiis adhibitum febrium ardentium æstus mitigat, renumque ac jecoris immoderatum calorem extinguit.

Oleum è vitellis ovorum ex Pharm. Aug.

℞. Ova recentia numero centum coquuntur, donec penitus indurentur. Postea vitellos ovorum exime, & comminutos assa in sartagine donec rufescant, & pinguedinem quandam emittant: deinde adhuc ferventes & forti sacculo inclusos exprime.

Cutis fæditatem mirè aufert, cicatricibus decorem addit, iis præcipue quæ in ambustis relicte sunt, aurium, dentium, sedis doloribus, easque reliquis affectibus convenit, pilos auget, imperiginem, serpiginem,

piginem, & alia cutis vitia eluit, lentigines & fœdas oris maculas detergendi, ac resolvendi vi delet, rhagadiis utile, fissuras manuum, pedum & ani sanat, dolores ulcerum, articulorum, omniumque locorum nervosorum sedat, ad aurium quoque dolores ac ulcera facit, ambustis utile, & in membranis cerebri partes contusas à sanis feliciter separat.

Oleum Vulnèrarium Mindereri è Pharm. Aug.

℥. Terebinthina Veneta ℥ij. Gummi Elemi quantum in ea solvi potest, olei hyperici ℥j. olei cera destillata ℥ij. misce.

In vulneribus recentibus singulare remedium est, si lineæ eo medida imponantur.

Oleum Vulnèrarium aliud Weichardi.

℥. Ol. rosat. ℥x. rhabarb. minutim contusi ℥vi. hac firmiter contexta in lagenâ stannea per tres dies stare facito. Deinde lagenam una cum prædictis in Abennum ferventis aqua immitte, & ad horæ medietatem prope bulliant, hæc sic decoctis adde.

Mastiche pulverisati ℥vi. Thur. bdellii, opopanac. camphor. an. ℥ß.

Coquantur iterum parum, postea per pannum mundum laneum excolentur, itaut omnis virtus prædictarum specierum inde exprimarur, & habebis ol. præstantissimum ad vulnera, non autem capitis, sed quæ reliquis corporis partibus inflicta.

Oleum Vulpinum Mesuæ è Pharm. Aug.

℥. Vulpem integram exemptis interaneis, aqua fontana ℥ij. olei veteris clari ℥ij. salis ℥vi. coquantur & inter coquendum adjiciatur Anethi, Thymi ℥j. coctionem continuando, donec ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur oleum ac repōnatur.

Potentissima in digerendo & discutiendo facultatis est, quo nomine ad nervosi generis injurias frigidas & articulares affectus præcipuè valet.

Vulpes benè habita & vegeta, non strigosa, ætatis mediæ, non juvenula, aut recens nata esto.

Sequuntur Olea Destillata quædam ex

PHARM. AUGUSTANA.

Oleum Absinthii.

℥. Summitatum Absinthii ad maturitatem seminis accedentium quantum vis. Incidantur atque cum aqua fontana destillentur per vesicam, & exibat aqua cum Oleo; separetur Oleum per bombacem, vel vitrum quod communiter separatorium dicitur.

Ufus hujus Olei idem est cum Vegetabili suo, è quo extractum est: sicut etiam subsequenteria plura naturam æmulantur eorum, è quibus prolecta sunt; vires tamen longè potentiores & in minima quantitate exlerunt.

Hac ratione paratur:

Oleum Mentha.

Ruta,

Salvia.

Oleum Angelicæ:

℥. Seminis Angelicæ contusi quantumlibet.

Cum Aquæ fontanæ sufficiente quantitate infundantur, postea destilletur per Vesicam, & Oleum separetur ab Aqua.

Eodem modo fiunt.

Oleum Anisi.

Carvi

Cumini

Fœniculi

Baccarum Juniperi.

Oleum Aurantiorum.

℥. Corticum exteriorum recentium, non putridorum Pomorum Aurantium sufficientem quantitatem.

Incidantur & absque præcedente fermentatione vel maceratione, copiosius quidem, sed tamen deterius Oleum daturis, cum aqua fontana destillentur per vesicam; Oleum postea ab aqua separando.

Eodem modo fiat.

Oleum Citri.

Oleum Caryophyllorum.

℥. Caryophyllorum aromaticorum sufficientem quantitatem.

In pulverem crassiusculum contusis affundatur aqua tepida, & post quatrduanam digestionem, ex vesica destillentur, separeturque Oleum modo solito.

Modum conficiendi eundem habent.

Oleum Cinnamomi,

Macis,

Nucis Moschata,

Piperis,

Zedoaria.

Oleum Chamæmeli Romani,

℥. Flores Chamæmeli Romani siccos, contunde, & cum aqua calida parum maceratos destilla per vesicam, ac Oleum flavescens ab aqua separe.

Ia etiam paratur.

Oleum Flor. Chamæmeli vulgaris Cæruleum.

Lavendula,

Majorana,

Rorismarini,

Rosarum,

Spica.

Oleum Ligni Rhodii.

Lignum Rhodium in scobem redactum in vase capaci cum magna aqua quantitate maceretur per quatuordecim dies, postea ex vesica, igne moderato destilletur, & Oleum ab aqua separetur.

Oleum Camphoræ Sennerti.

℥. Camphora libram semis,

Argille libram unam semis.

Misceantur diligentissime, & ex retorta in arena lento igne destillentur, ascenditque cum phlegmate Oleum, quod separandum est.

Oleum Mastiches.

℥. Mastiches libram unam,

Silicem calcinatorum libram unam semis.

Mixta destillentur ex retorta, in arena, igne moderato, postea limpidum Oleum à phlegmate separetur.

Oleum Succini, & Sal Volatile.

℥. Succini crasse contusi libras tres.

Fiat ex retorta capaci, igne arenæ gradatim adhibito destillatio, vas recipiens cum aqua calida, ut sal volatile in ea solvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam prius aquâ madefactam ab oleo separetur, & post factam ejus exhalationem sal colligatur. Oleum verò cum duabus partibus cinerum mixtum ex retorta lento igne rectificetur, Oleum limpidum primò exstillans seorsim asservando, alterum verò subsequens coloratius aliis usibus destinando.

Insignes vires tam Oleum, quam sal volatile obtinet, quas inter cephalica, Alexipharmaca, nephritica, & uterina eminent.

Oleum, sive Butyrum Antimonii.

℥. Mercurii sublimati corrosivi,

Antimonii electi ana libram unam.

Pulve-

Pulverifata in mortario marmoreo optimè miscantur, cavendo à fumo exhalante, & retortæ, tertiam circiter ejus partem vacuum linquendo; injiciantur, superinfuso uno alterove aquæ simplicis cochleari; postea ex arena fiat destillatio in liquorem crassum instar butyri, quem dein CINNABARIS, sensim ad latera colli retortæ adhærens, inlequitur; quæ fracta retorta colligatur, & aliquoties aqua fontana abluatur; butyrum verò per residuum depuretur.

Butyrum Antimonii causticum insigne est. Si ejus v. g. uncia una cum aqua frigida uncias decem miscatur pulvis albus, MERCURIUS VITÆ dictus, emeticam vim habens, ex eo præcipitatur; liquor autem reliquus acidulus, si rectificetur, sub nomine SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICI, aliorum Spirituum acidorum, salis præcipuè, naturam habens, notus est. Cinnabaris autem epilepsia, vertigini, hystericiis, arthriticis, aliisque malis egregè medetur.

Oleum Antimonii Sennerti.

℥. Antimonii libram semis;

Sacchari cantii uncias sex.

Pulverifata miscantur & destillantur in arena.

Oleum Cerae.

℥. Cerae flavae purae libram unam.

Hujus in retorta capaci liquatae superinfusa largam cineris cribati quantitatem, ut retorta eo impleatur, postea igne per gradus aucto, ex arena destilletur.

Resolvit, discutit, & articulorum doloribus confert.

Oleum Saponis.

℥. Saponis Veneti libram unam;

Arena munda libras tres.

Mixta ex retorta igne arenae destillantur in Oleum, quod cum cineribus rectificetur.

Resolvit imprimis & dissipat frigidòs tumores, necnon paralyti & podagra conducit.

Oleum Philosophorum, sive de Lateribus Mesuræ.

Lateres in pulverem contusi & calefacti miscantur cum Olei Olivarum clari sufficiente quantitate, sive quantum imbibere possunt; postea ex retorta, igne aperto & per gradus adhibito, secundum artem destillantur; Oleumque prolectum super cineres rectificetur.

Essentia tenuitate penetrat, digerit, materiam excrementitiam consumit. Aurium tinnitui à flatu crasso, iisque verminantibus medetur, paralyti, spasmò cynico, ischiadi, gonagra, podagra, cæterisque articulorum affectibus prodest, splenis tumores solvit, comitiales naribus inunctum excitat, cerebrum calefacit, memoriam firmat, dentium dolorem sedat, injectum utero menses provocat, fetum vivum aut mortuum educit, calculum vesicae pellit, ora venarum aperit, & sanguinem concretum dissolvit, pulmones purgat ab humoribus crassis & viscidis, oculorum suffusiones delet, vermes interficit, venenis insuper frigidis potenter resistit, ad scorpionis ictum conducit.

Oleum Saturni.

Sal Saturni crystallinum tere, & in phiole adfuso Spiritu Terebinthinæ, in arena digere, tincturamque extrahe, ut è Floribus Sulphuris fieri solet; quam ex retorta igne aperto destilla, primò lento igne, quoad Spiritus Terebinthinæ exierit; deinde mutato recipiente, paulatim auge ignem, quoad totum Oleum exierit.

Habebis Oleum, quod viribus naturale Balsamum excedit, malignis & excedentibus ulceribus, cancro, polypo, inunctum egregè medetur.

Oleum Terebinthinæ.

℥. Terebinthina pellucida quantum volueris.

Destilletur lento igne ex vesica, in cucurbita, vel per retortam, & prodibit, præter phlegma acidulum, primò Oleum album, quod Spiritus nomine vulgò donatur; postea flavum; & ultimò rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum; hæc Olea separata reserva; rubrum in arena potest rectificari.

Olea varia Essentialia è vegetabilibus elicienda prout in Clar. D. LE MORT Chymia Medico-Physica describuntur.

Illa vegetabilia, quæ succo austero-acido salino gravida sunt, nunquam vel raro Oleum essenziale præbent. Ratio est densitas pororum ramosorum, qui repleantur acido fixiori, prout videre est in Oleo terebinthinæ subtili cum Oleo vitrioli combinato: ibi enim, non solum fluiditas, sed & volatilitas perit: utpote quod antè præcedebat in destillatione ipsam phlegma, jam sublequitur, & violento quidem adhibito igne. Crassities partium ab iisdem causis dependet, unde plerumque vel paucò vel nullo odore prædita existunt.

Odorifera autem ex inodoris evadunt, ubi magis extricata talia levissima terra junguntur per motum intestinum; & pressionem violentiorem in tubulis angustioribus; ut in maceratione & putrefactione patet. Hinc sæpius talia attenuata, plurimas secum rapiunt particulas terrestres, quibus artius ungiuntur, olea etiam destillata præbent, quæ alias fixiora jacebant sub forma gummi-resinæ. Tanta enim in plerisque corporibus est partium viscidiorum intricatio, ut nullum tale Oleum præbeant, nisi post torturam ignis immediati adhiberi, vel post solutionem continui putridam, quæ prior in mineralibus, attamen paucis tantum, admittitur, in Animalibus autem utraq; locum obtinet ob copiam aquæ. Ideoque hæc Olea & Vegetabilium familia fere sola eruantur. Animalium enim internæ partes, quamvis scateant sale volatili, attamen tam viscosi & mucilaginosi particulis incarcerationum hoc sal est, ut sese extricare, non nisi summa cum difficultate, ex iis queat: hinc prius dissolutionem & lationem continui requirunt, antequam ullum divortium ineant; unde raro vel nunquam inde tale quid sperandum, nisi fatidum & corruptum rectificatione sæpius repetita eoque subtiliandum, donec phlegma suum seu aquam additam præcedatur: ulterius in Oleis empyreumaticis declarabitur.

Olea hæc dicuntur Essentialia respectu aliorum, quæ magis ab essentia sui simplicis degenerarunt, id est, quæ à nativo suo odore & sapore descivere, haud leviter immutato & concusso pororum sui & figura, quæ hic, quantum possibile, integra servatur. Extrahuntur mediante vehiculo aquoso, quod ignis ferociam lenit, & integritatem totalemque destructionem texturæ corporis præservat. Variò modo tractantur Vegetabilia, ut inde non solum Oleum eliciatur, verum, ut & in satis magna copia illud exhibeant. Primum ergo exemplum sequens esto:

Oleum Seminis Fœniculi.

℥. Sem. Fœnic. grosso modo contusi ℥vj. Salis communis M. iv. Tartari crudi M. ij. Aq. pluv. ℥xxx. Macerentur simul per sex vel octo dies, dein destillationi committantur in vesica: tamdiu abstraheliquorem, donec nullum amplius Oleum in superficie appareat. Aquas omnes destillatas separa per tritorium, ut Oleum supernatans, & aqua scorsim asservari queant.

Notæ

1. Loco *seminis*, etiam *viridis Fœniculi folia & flores* in usum adhiberi queunt.

2. *Macérationis* tempus non nimis diu protrahendum est in *feminibus calidis*: quoniam cito avolare solent, & jacturam admittere *Olei*, itaque etiam *recentia & viridia* in usum adhiberi possunt, utpote plurimo *sale spirituofo* referta.

3. *Separatio Olei* faciliè etiam perficitur cum *panno aqua humectato*, quæ in ipso *vitro* partim propendet, extra *vitrum* alia parte delabente, sic guttatim continuè emanat *aqua*, restante *Olea*, ita simul & semel *destillario* & *separatio* fieri queunt.

4. Omnia *ramosa*, *sale proprio* vel *extraneo graviora*, vehementius cum *aqua simplici* agitata, mixturam qualemunque ineunt, ut apparet diversis experimentis, in *sapone*, *balsamis Chymicis* &c. Hæ etiam in *destillatione* particulæ *salina ramosa & aquea*, valido illo motu incitæ & concussæ, *turbulentam albicantem* efficiunt mixturam, quæ sensim denuo à se invicem secedunt motu vehementiori cessante. Hinc satius est, si per *tritatorium* separandum veniat *Oleum*, ut illud una cum *aqua propria* per viginti quatuor horas quietè in cella perstet, sic nempe omne *Oleum* sursum elevatur, & facili modo separatur.

5. *Sal & tartarum* *separationi Olei* à particulis terrestribus, interveniente vehiculo, quo accelerandæ; adduntur, nec inæquis est, ut *figantur salia volatilia oleosa*, cum non semper ingreditur ad interiora pateat illi externe accedenti, præcipue multo sero diluto; cocticem enim *externum* hic denudare est animus, ut *interni* contentus facilius pateat exitus; quod semel pro semper monuisse sat sit.

6. *Destillationes* hæc per *vesicam*, non vero per *Maria Balneum* proponimus, ut in *majori copia* simul & semel *destillari* possint, & ut *quantitas Olei* multo abundantior obtineatur. Hæc duo liquis in *MB.* obinei posse credat, per me licet, quamvis experientia 24.imo plurimum annorum me contrarium docuerit, attamen illis, qui *pompæ & pretio* medicamentorum in immentum augendo indefesse student, ista via multo *generosior* videbitur, nihil æstimantibus *violenti labore* acquisita. Si enim per *MB. 3j.* *Olei* eliciatur, per *Vesicam 3j.* vel *3ij.* elici poterunt, &c.

Vires. Flatus discutit, colicis doloribus succurrit, *ventriculi concoctionem* adjuvat, & *ventris tormina* sedat. Notissima ejus est *aqua & familiarissima* plebeis pro infantibus. *Dosis Olei* à gutta una ad guttas sedecim, in vehiculo conveniente.

Eodem modo *semina calida* omnia *destillantur*, ut ut *semen carvi*, *dauci* &c. *Seminis anisi Oleum* autem, cum facile concreseat in ipsa *serpentina* ob refrigerium externum, vel in *recta* descendente *serpentina*, non vero in *gyros circumflexa*, *destillandum* venit, vel aucto origine propellendum est, nulla recenti frigida affusa, sic *incalescens serpentina Oleum liquidum* vomit; quod in cella repositum induratur postea à *liquore* eximendum.

Vegetabilia Cephalica & Uterina Medicis dicta, gradu in suo *salino consortio* diversa, quæ plurimo *sale tenui volatili*, paucioribus *ramosis particulis* juncto, prædita sunt, videntur mixturam duplicem obtinere suarum partium: prima & præcipua est *salina spirituofo*, quæ paucissimis *aqueosis & ramosis* implicita particulis; ejus celerem motum alias retardantibus, extempore *halituosis & odoriferis* suis vaporibus vires fat manifestas & sapius mirandas edunt instar *salium mere volatilium*; hinc odore ceteras herbas præcedunt: ut in *maro Syriaco*, *thymo*, *lavendula* &c. patet. *Secunda* constat ex *crassioribus ramoso-salinis* partibus, quarum *textura solidior* respuit facilem in

altum elevationem, sed prout *austera omnes* particulæ *fixiores* existunt, ita ut aliarum ope indigeant ad suam *sublimationem & exaltationem*. Hæ rationes videntur 1. confirmare *masticatio* istarum herbarum, quæ primo *tenui odore & levi sapore* nervos linguæ efficiunt, postea *austero gustu* ingrata evadunt. 2. *destillationis* diversimode institutæ effecta; sic ex gr. *herba recens*, cum pauca *aqua* *destillationi* commissa in *M. B.* neaduratur, nil nisi *roridam aquam* præbat, cum *exigua portiuncula* *subtilioris Olei*; Eadem herba dein *exsiccata*, duplo imo triplo plus *Olei* exhibet, hac autem cum *differentia*; *prima aqua* erit multo gratior *secunda*, ut & *ramosa pars* sit *gravior* & *feridior* præcedenti.

Exsiccationis necessitas in *acquirenda Olei copia* (quoniam dantur, quæ ullum *Oleum* stillare negant *recentes humida*) duabus à rationibus dependet. *Prima* est *fuga particularum salinorum*, *crassiores ramosas* in hoc motu vehementiori deferentium, æreum chaos peccante *spiritu*. *Secunda* est *dilutio* leviorum *ramosarum* partium in *liquore aqueo*, quarum fere nulla fieri potest *separatio*, & per consequens *frustranea* esset *collectio*. *Duplex* ergo *commodum* (si utrumque saltem pro *Oleo* *acquirendo* ita nominare liceat) *fuga spirituosioris* talis parit *exhalando*. Nam, ut antea diximus, *dilationem & spirituositatem* *liquoris* promovet, quod hic *noxium*: *sublatio* illo motu *nimio* dein *conjunctio* intima fit *salis reliqui volatilis* cum *ramosis particulis*: quæ unita postmodum, ut sequitur, *destillationi* subiciuntur.

Oleum Sabina.

4. *Fol. Sabin.* exsiccat. conficissorum q. v. *Salis* communis *Mß.* pro singula libra *Aqua* communis q. l. ut ei innatare possit.

Macerentur per duas vel tres *septimanas*, dein *destillantur* more vulgari, & *Oleum* *separatum* ulni reponet.

Notæ.

1. Quo *siciores & tenaciores* herbe existunt in recenti statu, eo *diuturniore maceratione* indigent, quoniam non facile admittunt *aquam*, & *texturam pertinacius* conservant. Hinc facile *liquer*, *rosmarinum*, & *thymum* *longiori infusione* egere, quam *lavendulam*, *mentham* & *rucam*, minus adhuc *melissam*, *hyssopum*, *pulegium* &c. quarum *textura mollior*, & *raritas major*.

2. *Aqua destillata* jam fere repleta particulis *ramoso-salinis* *recenti herba destillanda* affundatur, unde *major copia Olei*, & *aqua spirituosior* obtinetur.

Vires. *Menstrua* promovet, *urinam pellit*, *arthritidi* commendatur. *Dosis* à guttis ij. ad xx.

Eodem modo omnia *hujus generis vegetabilia* *destillantur*, *macerationis* tempore debito observato, prout superius innuimus: ut *origanum*, *matricaria*, *salvia*, *hyssopus* & similia.

Aromata *stricte* ita dicta, sunt corpora densiora, in quibus præter *salinas spirituosas* particulas, *duplex corpus ramosum* non raro conspicitur; *quidam unum*, aliquando *itidem duplex* scilicet *levium* *aquæ supernatans*, alterum *gravius* ad *fundum* *deciduum*: In aliquibus *fluidum Oleum* *destillatione* elicitur: *solidum* vero præli *tortura* *expressum* prodit. In aliis *levi destillatione* *subtile Oleum* *producitur*: vehementiori autem calore, & *iteratis ignis* *examinibus* *gravius* extorquetur. Ex his concludere possumus *duplex effectum* *illarum partium*: *Primo* *leves* *illarum Aromatum* *particulæ* *ilico* *festinantes* ad *ulteriorem* *progressum* *fluidioribus* *nostris* *corporis halituosis liquoribus*, qui *spiritus* à Medicis dicuntur.

dicuntur, se permiscunt, & odore grato demulcentes nervos odori destinatos, cerebrum & cor exhilarant, etiam blande fermenta nostra & spiritus exaltant: Secundo graves, diutius in fermento ventri-
li perstantes, illud si debile sit, particulis suis ramoso-
salinis fixioribus augeant, & acrius efficiunt: Unde
major concoctio sublequitur. Fermenti enim nostri
vis in levi acredine, id est, in particulis mediæ con-
sistentiæ fluidis, consistit: ubi nempe ramoso-visco-
sa partes, cum salinis non nimis fixis, nec volatilibus
particulis, & aquosis consortium inierunt. Illud enim
muriaticum quasi sal blandum volatile inesse, varia
experimenta demonstrant in Medicina & Chymia: sic
saliva, quam fermenti spumam quasi dixeris, h' sce
duabus abundat particulis leviter acido-salis, quod
demonstrat *Analysis Chymica*. Sic plurimi, & sæpius
diversi morbi diversis h' sce, contrariis vel congruis
humori morbifico salibus, sanantur, ita ut in uno eo-
demque simplici verum possit esse, quod contraria
contrariis, similia similibus curentur. *Acetum destil-*
latum, quod proxime huic, prout & fermento specifico
accedit, cum acido & alcali luctam init. Imo rarius
vel nunquam aliquod fermentum conspicitur, è sali-
bus vel facibus confectum, quin in sua expansione
duplici dotetur sale. Ratio fat est manifesta, si ex-
pendamus, nullum dari corpus, quod non *diversas*
edat particulas salinas, arte Chymica tractatum. Cau-
sa est *discrepantia* pororum & meatuum secundum ex-
tensionem & situm; meatus enim sunt *interstitia* ma-
jora inter *diversas superficies*, quæ ab aëris nitroso sa-
le subacido occupantur, minima tantum cum immu-
tatione suæ figure: e contra vero ad *intimiores recessus*
perductæ illæ particule majori intricacioni & immu-
tationi destinantur, ubi ipsos poros minores subire
coguntur in valde exilia ramenta dividendæ, & ter-
ra conglobata arctius permiscendæ, in sal volatile
sulphureum convertendæ. Ubi igitur motu vehemen-
tiore totum corpus agitur, confunduntur sæpius
partes in *acrem* quandam *mixturam*: ex hac *acredine*
sæpius etiam malus successus oritur, si particule fe-
rociores factæ sua *copta* & *fluiditate* corrosivæ fiant.

Hæ particule duplices ramosæ, prout majori copia
salum dotatæ sunt, eo liquorem magis albicantem
reddunt: sic *cinamomum* rite tractatum aquam plane
lacteam reddit, Oleum autem in *minori* copia exhi-
bet, quam fere ullum aliud aroma: sic & piper &c.
U. vires & copia ergo particularum extrahendarum
debito modo respondeant, exemplum unum atque
alterum proponemus.

Oleum Caryophyllorum.

℞. Caryophyll. ℥i. Spiritus salis cum oleo Vi-
triol. præpar. ℥ss. Salis communis ʒj. Aquæ pluv. ℥xx.
Macerentur per 14. dies, dein distillationi com-
mitte in vesica cum alembico & serpentina stan-
neis instructa: aquam proleptam ab Oleo in fundo
subsidente separa, eamque iterato iisdem Caryo-
phillis superfunde, & destilla denuo, idque ter-
tio repete, vel quamdiu Oleum ascendere videas.
Omnia conjuncta asserva, & cum aqua spirituosa
supernatante tam diu relinquantur, donec ru-
bedinem satis intensam acquisiverit, deinde sepa-
ra ad usum.

Nota.

1. Cohobatio illa fit, quoniam Oleum illud gra-
vius ascendere, & consortium corporis sui ægre de-
relinquere solet.

2. Spiritus salis & sal commune egregium in il-
lis existunt vehiculum, & simul odorem empyren-
maticum præcavent.

3. Color Olei intensior redditur, si diutius in aqua
propria stillatitia detineatur, unde crassior ejus eva-
dit consistentia duas ob rationes. Primo ob *effluvia*
aquæ, sensim sese insinuantia in ipsas particulas ra-
mosas, motum celeriores ibidem retardantia; Se-
cundo ob spirituum diversitatem, in aqua ex Oleo
contentorum: hos enim in *mutuo concursu* aliqua-
lem inire *precipitationem*, &c. varia experimen-
ta edocent, ut in Oleo terebinth: postea latius, ut &
in oleo & sp. vitrioli, & similibus patet. Hæc ergo
mixtura salino-aquosa in causa est, cur spissius & ma-
gis tinctum appareat Oleum: si verò citius ab aqua se-
parantur Olea, diluti coloris & tenuia existunt ob
motum summum internum, illas particulas immi-
nuentem, & variis modis disponentem.

Vires. Ventriculo corroborando, cephalalgia, odon-
talgia, vertigini & similibus succurrit, febribus in-
termittentibus è pituita & flatulentis humoribus or-
tum ducentibus prodest, sudores movet. Dosis à gutta
1. ad guttas vj.

Eodem modo destillantur Oleum cinnamomi, pi-
peris & similia.

Oleum & Aqua spirituosæ Cassiæ lignæ.

℞. Cassiæ lignæ ℥iij. Sacchari albi ℥ij. Sal
communis ℥ss. Aq. calent. ℥xxx. Facum cerevisiæ
cochlear. ij.

Fermententur simul per 3. septimanas, vel eo-uf-
que, donec viscosa consistentia aquæ perierit,
dein destilla per vesicam, & serpentinam stan-
neam, quamdiu aquam albicantem præbet. Oleum
post secundum diem in fundo aquæ delitescens,
separetur per tritorium. Aqua & Oleum seorsim ad
usum reponantur.

Nota.

1. Fermentatio hic requiritur, ne tantitas elevatio-
nes viscosus nimis liquor in *coctione* sustineat, sæ-
pius cum *jactura olei* & opera conjunctas, nisi valde
caute procedat Artifex.

2. Sal muriaticum hic additur ad incidendam
visciditatem mediante motu intestino, & conservan-
dum à putredine liquorem &c.

Vires. Cardia um est gratissimi odoris & saporis; ea-
rundem est virium cum cinamomi Oleo, & aqua, sed
mitius est. Dosis Olei ad gutt. ij. Aquæ ad ʒij.

Oleum ligni Sassafras.

℞. Rad. major. ligni Sassafras ℥iij.
Recenter confissas destilla cum decupla quantita-
te aquæ communis per vesicam. Oleum fundum aquæ
petens separetur post plenariam subsidentiam, ut in
præcedenti diximus, quod in vitro accurate clausq
servetur ad usum.

Nota.

1. Ob rariorem ligni texturam & volatilitatem
summam partium, nulla maceratione opus est, & ex-
tempore in usum trahi debet confissum lignum.

2. Nullum additamentum requirit ob easdem cau-
sas: hic enim magis officeret, quam proficeret.

3. Si spirituosæ expetatur Aqua, immittatur li-
gnum musto, in vinum jam fere exaltato, ibidemque
per duos dies vase clauso reservetur, postmodum ad-
dita parva quantitate salis alcali destilletur lento igne.

Vires. Antiscorbuticum est gratissimum, menses ape-
rit, obstructions plerasque reserat, ventriculum roba-
rat, spiritus confortat. Dosis ad gutt. v.

Oleum Macis.

℞. Macis ℥ij. Spirit. Sal. communis. ʒj. Aq. com q. s.
Mace-

Macerentur simul per 14. dies, dein in retorta magna vitrea ex arena destilla: sic limpidum & tenue prodit *Oleum*, instar spir. terebinth. quod ab aqua separandum. Fæces in retorta residuas calide per prælum exprime, sic nancisceris *Oleum* crassum, expressum dictum, quod ab aqua tincta eximi potest, hoc in unam massam mediante calore funditur.

Nota.

1. Nullum hic additur sal, ne inquinet *Oleum Balsamicum*.

2. In retorta peragitur operatio, 1. ut nullibi adhæreat *Oleum tenue*, & nulla fiat fuga partium tenuium, quod & in aliis observari potest, *minorem Olei copiam* præbentibus. 2. Ut præcaveatur corrosio spir. salis, qui *vasa ænea* aggreditur, & *Oleum* restans viridi inficit colore.

3. Fæces calentes è retorta vitrea effundantur, ne *Oleum Balsamicum* hic illic latera occupet frige factum, & jacturam hujus Artista faciat.

4. Hoc in omni genere hujusmodi destillationum observandum; fæces denud cum vino adusto, vel sp. vini rectificato permixtas & maceratas, plurimis viribus illum imbueri è residuis particulis ramosis fixioribus, sese cum sp. vini unientibus: quæ manifesto odore & sapore prodeunt: sic omnis vis extrahitur relicta inutili parte.

Vires. *Cardiacum, stomachicum, diureticum, & carminativum est, unde frigidis in morbis summi usus.* Dos ad gut. xij.

Eodem modo nux moscata & bacca lauri tractantur, & *Oleum duplex* fundant &c.

Radices, Cortices, & Ligna, quæ solidiori firma consistentia, & cohesione tenaci gaudent, diuturnum macerationis tempus destillationi subjicienda requirunt: vehiculo enim aquæo prius sejunguntur & elevantur. Ubiunque ergo aqua ingressum nullum obtinet, inde nullum sperandum est *Oleum essenziale*. Differunt autem Ligna &c. à præcedentibus, ut resina solida ab oleo fluido. Concludimus igitur brevitatæ causa, hujus generis vegetabilia, quo magis resinosa & solida, eo infusionis tempus magis protrahendum esse, donec molliora evadant, nisi quis contentus esse velit minima Olei subtilissimi quantitate, ut satis superque antehac diximus, ut his duobus exemplis demonstratur:

℞. Rad. Calam. Aromat. ℞x. Sal. communis ℥ij. Tartar. crud. ℥iij. Aq. communis q. s. Macerentur, donec pulpa albicans interior mollis fiat; attamen absque putredine: dein, addita majori aquæ copia, fiat destillatio in vesica s. a. *Oleum* ab aqua ad usum separetur.

Nota.

1. Non opus est iterato dicere, *salia duplicem Fructum in maceratione* exhibere: Nempe in putredine præcavenda, & in aqua acuenda, cum hæc sæpius ante dicta sint.

2. Cave ab ulteriori maceratione; nam statim dissolutio integra continui fieret, & foetore ingrato *Oleum* imbutum prodiret.

Vires. Particulas obtinet sat acres, ventriculi fermentum stimulant: unde à nimio ejus usu abstinendum, flatu discutit, febribus intermittentibus, è pituita & serosis humoribus oriundis, medetur. Dos. ad gut. x. in vehiculo.

Oleum Ligni Rhodii.

℞. Ligni Rhod. ras. q. v.

Maceretur in sufficienti quantitate aquæ salæ per duos menses, dein fiat destillatio, addito manipulo uno vel altero tartari crudi, *Oleum* ab aqua separetur modo prædicto.

Nota.

1. Omnia recenter destillata Olea & aquæ empyreumaticum redolent odorem ob materiæ subtilis nimiam ibidem existentiam & concussionem irregularem illarum partium in destillatione factam, & quoniam nullo modo ferè præcaveri potest, quin aliquæ saltem vicinæ particulæ in fundo & lateribus vesicæ immediate ab igne attingantur, & unctionem aliqualem recipiant, unde reliquis particulis odorem adustum communicare solent; cessat verò ille odor & sapor temporis tractu motu vehementiori sedato, unde genuinus iis odor & sapor redeunt.

2. Non opus autem est, ut aquæ &c. vase aperto soli exponantur, ut quidam volunt: cum non solum hoc modo spiritus empyreumaticus, sed & nobilior fugam petat, restante liquore, penuria spirituum suavius olente. Sic enim exempli gratia moscus, ambra & similia, fortiolem halitum spirantia molesta & fetida nobis videntur ob nimiam exhalationum salino-aerearum copiam, nervos nostros vellicantem, & spiritus nimis moventem, unde Cephalalgia, Vertigo &c. At vero, si hæc odora simplicia in minori quantitate dispergantur in liquoribus, pulveribus & similibus, statim odor fit gratus, non, quoniam sapor sublatus, sed, ut diximus, ob penuriam partium; sufficit ergo, ut vase clauso ferocia sedetur.

3. Grosso modo conscissa vel contusa esse debent, ne vehiculum aquosum ullibi arceatur ob coagulum & facilem coherentiam pulveris subtilioris, unde minorem præberent quantitatem Olei, ut &, quoniam ad fundum vasis pertinacius adhærere solent pulveres subtiliores, unde fatidum conciliarent odorem.

Vires. Odoriferis plerumque inservit hoc *Oleum*, variis internè assumitur, nisi pro diuretico.

Olea varia è Pharmac. BATEANÆ.

Oleum Aloëticum.

℞. Aloë par. ℥ij. myrrh. ℥ij. thuris ℥ij. m. ac & in s. l. Δ. Illitum umbilico purgat, & vermes necat.

Ol. Antim. Saccharatum.

F. ex Iris ℥ij. crud. & sacch. ā. ex Δe fortiss. Satis s. a. Utile est tum ad externos, tum internos morbos. Dos. ā gut. iij. ad vi. in Quartanis ante paroxysmum.

Ol. Balsami. v. Balsam. Paralyticum.



Ol. Balsamicum.

℞. Anchus. ℥ij. o. olivar. ℥ij. coq. ad colorem rubicundum. colat. adde Tereb. Cypr. in ∇ Viol. lot. ℥ss. o. Bacc. lauri, o. Hyper. ā. ℥j. o. Junip. & Petræ, ā. ℥ss. o. Rhod. & Spicæ, ā. ℥j. o. it. è sena. Angel. & Anis. ā. ℥j. m. s. a. Omnibus affectibus frigidis subvenit; statusque dissipat. In Paralyti, Surditate, Otalgia, &c. Mulium facit. In Spasmo, Colica, Hydropo, &c. internè & externè usurpant præstans est Remedium. Dos. ℥j. ad ℥j. in vehiculis appropriatis.

Ol. Bufonum.

Coq. Bufones 4. vivos in o. oliv. ℥ij. per horam, vel ad crepaturam, colatumque serva. Confert in Pustulis labiorum, cancroque mammarum. In Hydropo valet ad urinam ciendam inungendo renes.




Ol. Camphora.

℞. Camph. ʒij. argillæ ʒvi. & in ʒ. ex  vitreâ fa. Vel, fieri potest solvendo camph. ʒij. in Sp.  ʒiv. in loco tepido. *Diaphoreticum, & Hystericum. Dos. ad gut. x. &c.*


Ol. Charta.

Accende Chartam ac impone laminæ *℞is*, ut comburatur. Sic adhærescet *℞i* oleum colligendum. In *Alopecia, Herpete, Impetigine, &c.* mira præstat. *Anodynum est, & Odontalgiam sedat.*




Ol. Cosmeticum.

℞.  Amygd. amar. ʒiv.  tartari p. d. ʒij.  Rhod. gt. 4. m. f. a. Ad cutem detergendam & erugendam.

Ol. Cremoris.

℞. Cort. intern. virid. rec. Sambuci, m. iij. Crem. lactis opt. ʒij. coq. bene, donec in  n effluatur cremor. f. express. adde cort. rec. alior. Sambuc. miv. coq. iterum ad cortic. siccitatem. f. expressio. In *Hæmorrhoidibus, combustionibus, erysipelate, &c.* optatiss. Remedium.

Ol. Heracleinum.

Fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collecto, in taleolas secto, & gradatim per  in ʒ. & aro.  m ab  â separetur f. a. *Calfacit, incidit. Anodynum, Epilepticum, ac præcipue Odontalgicum est, Gutta 2. 3. 4. &c. assumpta cum mica panis lumbricos in instanti necant, & per secessum educunt.*

Ol. Linteorum.

F. ex Linteis accensis & suffocatis in laminam *℞is* f. a. Optime valet ad *Ophthalmiam* curandam cum gutta una saliva mixtum.



Ol. Ludi.

Materiam tartaream matulæ inhærescentem calcina, & solve p. d. f. a. Ad tartarum in omnibus corpora partibus, imò ad calculos etiam grandiores resolvendos, & expellendos, adeoque ad obstructions inde ortas referandas mirifice conducit.



Ol. Lumbricorum.

Destillatur in ʒ. ex Lumbric. terr. V. Hispan. lotis f. a. Ad *Paralyfin* curandam mira præstat.

Ol. Martis.

Fit ex Rubigine *Oris* per  am Stygiam irrigatam contractâ, ablucendo  â, filtrando, & exhalando ad oleaginositatem f. a. Summum est obstructivum. Dos. gr. 4. 5. &c.

Ol. Milvium.


℞. Milvum è nido, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Picis num. 4. coq. in Aq. ceras. n. q. f. (adjectis Rad. *Pæon.* ʒij. castor. ʒj. ruta m. iij. Flor. roris. lavend. an. m. ij. Hypetic. ʒj. Rad. Valerian ʒij.) ad putrilagineum cum  olivar. ʒij. f. expressio.  innatans aufertur pro usu. Instante *Paroxysmo epileptico* inungantur plantæ pedum nares, & nucha cum seq.

℞. Ol. Milvin. dict. ʒj. ol. st. ruta, & succin. an. ʒj. m.

Ol. Paralyticum.


℞. Sem. sin. p. ʒij. Castor. ʒβ. caryoph. ʒij. nuc. m. ʒij. Sp. V. ʒiv. confusa opt. macer. in MB horis 24. Deinde valenter prelo exprime ol. Spina nuda, cum partibus affectu sape inungantur.

Ol. Polypodii.


F. ex Radic. siccis per  ex ʒ. destillatis f. a. *Magnet. Bibl. Pharm. Tom. I L.*

Intervit piscibus capiendus.

Ol. Pomosum.

℞. Fol. stramon. pomosi rec. ʒj. confus. adde  olivar. ʒij. coq. ad succi consumpt. expref. adpress. adde Fol. rec. ʒβ. Infolentur & 14. postea coq. ad succi consumpt. & exprime. Ad miraculum omnes inflammationes, omnesque combustiones, sive ab igne, sive ab aqua fervida, plumbo fuso, pulvere bombardico, vel à fulgetris contractas, subito sanat.

Ol. Ranarum.

Coq. Ranas vivas num. 12. in  oliv. ʒij. per horam, & exprime. Faciei Ruborem & Impetigines curat. Erysipelati & Gangranis subvenit. In cancro est specissum.





Ol. Sacchari simp.

Fit ex sacch. cand. & Sp. V. â, adutendo Spiritum ad Syr. consist. f. a.






Ol. Sacchari comp.

℞. Dactyl. incis. ʒij. ficuum ʒij. hyssop. m. j. glyc. sem. anis. bombac. an. ʒvi. Rad. irid. flor. ʒj. V. ʒij. coq. adurendo ad consumpt. dimid. f. colat. per manic. Hippocr. adde sacch. cand. q. f. Ad *Asthma, Tussim, &c.* confert.

Ol. Saponis.

Fit ex Sapon. Venet. raspat. & Sp. V. â, per  âtis, primò l.  â dein fortiori gradatim urgendo.  m innatans  â viridi separetur. Ad Convulsiones, Cephalalgiam, &c. illinantur cum isto Tempora, nucha, & nares. Ad Tineas, Contusiones, Podagram, &c. Ungantur loci affecti, tegendo postea brassiæ folio.

Ol. Saturni v. Bals. Saturninum.





℞. Rad. Raphan. rustic ʒvi. fol. cochlear. miv. flor. lavend. m. ij.  ex pedibus bovinis ʒj. coq. l.  â ad succi consumpt. expref. adde Sp.  sis ʒij. Sp. cochlear. ʒj.  cinnam. & caryoph. an. ʒβ.  origan. ʒiv. m. Cum isto inungantur partes affectæ per horam semel in die calidissime.

Ol. Silicum v. Liguamen Silicum.

Ol. Tabaci.


F. ex fol. siccis per  â. Vel ex sem. confusis & expressis. Usus in doloribus Podagra, Arthritidis vaga, Odontalgia, vermibus, &c.

Ol. Talchi p. Deliq.

℞. Pulver. Talchi, tartari per  â calcinat. â f. S. S. ac cementa in  bulo clauso horas vi, ut  bulum candeat. exime & edulca. extrahe cum  â. filtra ac coagula: edulcora ac reponere postea in cella ad liquesendum. Cosmeticum censetur præstantissimum. Lenigines, maculasque faciei aufert.

Ol. Tartari purg. v. Mag. Tartari.

Oleum Terebinthæ.

℞. Abrotani rec. confus. ʒβ.  veteris ʒβ. V. rub. ʒβ. coq. ad siccit. herbæ. f. expressio. Reperet hoc opus ter cum novo abrotano. Colat. adde Axung. Ursin. ʒij. m. exactis. Ad Alopeciam curandam maxime commendatur.

Ol. Tritici.

Fit valenter exprimendo Triticum confusum inter laminas candentes, ut oleum effluat. In Rimis manuum, Ulceribus pedum, Fissuris labiorum, Herpete, cutis scabritie, &c. Mirifice proficuum.

Oleum Viperarum.

℞. Viperas viventes largas & pingues num. 3. Vin. S f Hispan.

Hispan. ʒ ij. ʒo Hyperic. ʒviij. coq. in MB vase angustuli orificii ad consumpt. humiditatis, fiatque exprestio. Cutem exstergit. Impetigines, &c. sanat. Podagra tophos tollit. Leporam curat.

Ol. Viridis aris.

℞. ʒ ij. ʒo ʒ iij. ponantur in catillo, & incend. carbone, donec deflagarint. Tum solve p. deliq. in cella. Cauticum est. Ad Pustulas & reas, & verrucas absumendas conducit.

Ol. Vitrioli Dulce.

℞. Ol. ʒ li rectif. p. j. Alcoh. V. ʒb4. Digere ʒ 30. vel 40: & postea ex ʒ cum 3 vel 4 cohobis ʒa ad uniendum s. a. Proficuum in calculo, morbis tartareis, Catarrhis, &c. Dos. ʒj. in liquore idoneo.

*Olea destillata varia ex Frider. Hofmanni
Thesaur. Pharmaceutico.*

Oleum Anti-Podagricum D. Ch.

Rec. rasur. Ligni Guajac. Chii x. Sassafras, ana ʒiij. Stillā per retortam optime lutatam liquorem, oleum Spiritu & phlegmate imprægnatum & in recipiente capaci collectum, semel atque iterum per cucurbitam rectifica. Quater rectificatum liquorem, phlegmate per distillationem simplicem remoto, separa, & in distinctis recipientibus collige, tam Spiritum, quam oleum. Spiritum, phlegmate leni distillatione in cinere abstracto, ad usum bene munitum & tantum in arcanum in multis affectibus summā cum utilitate applicandum reserva. Oleum indiget vicissim diligenti rectificatione, quæ fit per cucurbitam in MB. Facta rectificatione ol. in cucurbita, remanet fuliginosa materia indurata & instar speculi recipiens objecta visibilia, nisi hoc fiat, olei rectificatio non rite facta est: sed denuo repetenda in cinere & tandiu continuanda, donec materia remanens in cucurbita indurescat, & speculi instar sit pellucida & apta ad recipiendam quamvis formam visibilem. Hoc modo rectificatum oleum collige in cucurbita vitreā, & ʒ v. adde Laudani opiat ʒ ij. ʒij. olei Ligni guajaci ʒ iij. ol. d. succini albi rectific. ʒvi.

Stent in digestionem per menses duos in loco calido vel Sole meridiano, postea destilla in ʒ. per 24 hor. Oleum Nigrum anti-podagricum, quo locus dolens inungendus ante fornacem, subito penetrat & dolorem sistit.

Spiritum supra dictum in ∇ card. ben. scabios. Pimpinell. ana f. q. ad gutt. xii. tempore curationis propines.

Tempore autem præservationis una atque altera gutta semel in septimana in haustu vini assumat cubitum iturus, cui subjungat olei inunctionem pauca manu.

Oleum Saponis.

Rec. Spirit. vini ardent. saponis opt. trit. ana impone retortæ & olla lento Δne, urge sub sinem Δnem, ut materia egredi possit; ol. subruffum innabit ∇æ viridi ab ea separandum, & rectificandum.

Usus & Vires. Illitum antiquas sanat convulsiones, contusiones, tineam, ulcera maligna, cephalæam, si temporibus illinatur.

Oleum Carminativum.

Rec. ol. succin. alb. aurant. chamomill. an. ʒ ij. cymini. anili. corni. ana ʒiij. anethi ʒ j. M. & ad usum reserva.

Vires. In omni flatulenta affectione colica, hy-

sterica, &c. notabilis est effectus. Dosis est à gutt. iij. ad iv. vel v.

Oleum Nephriticum.

Rec. Ol. d. juniperi. Succini alb. rectif. ana ʒiij. Terebinthin. ʒ j. Sal. tartari albi. fermenti panis ana ʒiij. Sal. commun. ʒvi. Aq. perroselin. heder. terr. ana ʒiij. destilla per XX, separa oleum & pro usu reserva. Dosis est à gutt. v. ad vi. in vehiculo appropriato.

Oleum ad defluxiones externum.

Rec. Gummi galban. carann. an. ʒiij. Opii Th. an. ʒvi. ol. hyosciam. Laurin. an. ʒiij. saponis venet. ʒiij. destilla per retortam. Rectifica una cum ∇a per XX ex arena, & separa oleum.

Usus & Vires. Externe inunctum lenit dolores à defluxionibus ortos.

Olea infusa & cocta ex eodem.

Oleum Antepilepticum probatissimum.

Rec. radic. aristoloch. long. rec. & optim. mundat. ʒj. Cactorei, Euphorbii. ana ʒj. ol. olivar. ʒiij. vel ʒ v. circiter.

Radix aristoloch. incis. prius cum oleo olivarum coq. & demum reliqua addenda sunt ingredientia invicem mixta recta operculo coquenda & demum per linteum colanda.

N. Oleum hoc insultu Epileptico & singulis Lunæ quadraturis spinæ dorsī à nucha incipiendo usque ad coxendicem inunctum mira præstat, in ipso paroxysmo & extra paroxysmum, manè ac vespere, ex comm. amici.

Oleum Vulnerarium D. à C.

Rec. Myrrhæ el ʒj. thuris Mascul. ʒiij. ol. d. terebin. ʒiij.

Lento Δne ferveant in vase fictili vitreato, tum remove ab Δne, & paulò post pulver. Myrrh. & thuris cavendo ne faciem comburas, quapropter citò cooperiatur, postea iterum parum ferveat.

Vires. Valet ad omnia vulnera & ulcera præcipue in partibus nervosis.

Oleum admirandi effectus in Pleuritide & quovis dolore cujuscunque partis.

Rec. Fl. cyclaminis q. v. mundentur à pediculis. Olei olivarum optim. ad eminent. duorum digitorum, bulliant in olla vitreata Δne lentissimo, postea exprime, & in hoc oleo expresse infunde denuò tantundem florum prædictorum & insolentur per mensem, postmodum cola & pro usu serva.

*Olea varia à Clariss. Theophili Bierlingii
Collectione.*

Oleum tartari per deliquium.

℞. Tartar. ad albedinem calcinati q. s. inde vesica bubulæ, atque in aquam simplicem injice, sic brevi resolvetur in liquorem, quem filtra, & habebis oleum tartari per deliquium.

Oleum probatum contra matricem.

℞. Rad. petasitid. ʒij. ʒo olivar. ʒiij. macerentur per mensem in loco calido, colentur, adhibeatur oleum ad gutt. 6. vel 7. in cerevisia vel vino calido. Ex MSS. D. Gregor. Horstii.

Oleum terræ sigillatæ.

℞. Terra sigillat. Strigens. rudis nondum præparat. q. v. affunde aquam pluvialem destillat. stent. per aliquot septi-

septimanas in loco temperate calido & incipiet fermentari, & supernabit pingue quid, quod destilla per retortam, & prodibit oleum aurei coloris, materiae pingui affundatur alcool vini, & destill. oleum supernans per tritorium separetur. Relinquitur in fundo retortæ instar perlarum materia alba, dura, extrahe per aquam pluvialem sal, idque misce & digere cum suo oleo, vel ipsam materiam relictam citra salis extractionem misce & digere cum suo oleo, iterumque destilla per retortam, habebis antidotum contra omnes venenatos morbus, pestem, febres malignas, dyenteriam contagiosam, morsum canis rabidi, naturalem b. l. samum reficiens, vires restaurans, cor instar o. potabilis confortans.

Oleum sive Liqueur sanitatis.

℞. \odot Commun. sicc. \odot crud. an. ℥j. inde ollæ vitreæ in igne aperto, ut fluant, si fluunt, imponentur ollæ sublimatoriæ & accendatur materia carbone ignito, tunc ascendunt flor. \odot i elegantiss. Materia in fundo relictâ minutissime pulverisata, & supra tabulam sperâ, inque cellam translata resolvitur in oleum, quod in calculo & aliis affectibus mirè commendatur à quibusdam.

Oleum contra Podagram.

℞. Mellis ℥ij. \odot l. calcinat. ℥j. Spir. vini rectif. ℥℔. Later. ℥j. destilla per retort. primo egredietur phlegma, dehinc aucto igne spir. prodibunt & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

Oleum Arthriticum D. Arnisei.

℞. Rad. pyrethr. nucis moschat. caryophyll. an. 3 ij flor. salu. beton. anthos. stachad. arab. spic. nostrat. celtic. an. 3 ij. rad. Aristol. rot. ver. hermodactyl. an. 3 j. baccar. juniper. 3 ij. laur. 3 j. M. contusis omnibus affund. aq. vitæ 3 vi. terebinth. ℥j. stent. in digestionem per p. dies, destill. in \odot . per. XX

Oleum Cordiale.

℞. Ocul. \odot . rasur. ebor. corall. perlar. matr. perlar. an. q. v.

Stoffe es alles mit einander klein, geuß darauff spir. salis und setze es in Keller, daß es sich solvire, geuß wiederumb spir. salis drauff so lange bis die lapides ganzlich solviret sind, als denn thue es in einen Kolben, setze es in Sand, zeuch den spiritum salis heruber, nud treibe dasselbe so lange, bis es ad siccitatem getrieben ist, als denn setze das rückständige in Keller, so solviret es sich, und wird in oleum verwandelt, welches du filteren mußt.

Oleum \odot l. dulce Orithelii.

Solve tartar. \odot l. bene prius ignitum cum \times abstrahere aliquoties, donec acetum consumatur, solve deinde in spir. vini correcto, quo etiam aliquoties abstrahito, resolve id quod in fundo manet super marmore vel per deliquium. Hoc resolutum destilla per retort. & exhibit \odot l. dulce ut saccharum, & rubicundum instar sanguinis.

Oleum contra venena Magni Ducis Herreria.

℞. Olei vetust. ℥vj. scorpion. purgat. per 4. dies cum basil. sic. ℥v. pone in boccia Hermetice clausa per 30. dies in \odot . Tunc bulliant in MB. per 6. horas, exprime, adde Rad. bistort. gentian. tormentill. vincetoxic. imperator. an. 3 ij. bulliant per 4. horas, exprim. colatur, adde Rhabarb. elect. myrrh. aloës, xyloaloes, croci an. 3 iß. iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde Theriac. misbradat. ana 3 iß. M. Inungitur pulibus exterius singulo triduo ad minimum semel. Interne datur cum \times in febribus malignis.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

lignis ad gut. iv. pro aliis venenis cum ∇ . citi.

Oleum ex pomis amoris.

℞. Succ. pomor. aureor. 3 vii. fol. eorund. 3 iij. pomor. integr. 3 vi. fol. hyosc. recent. Solatr. recent. an. m j. olei olivar. ℥j. vini odorifer. 3 iij.

Macerentur simul in vase vitreo clauso in loco calido per 12. dies; coq. lento igne ad consumptionem succi, adde opii Thebaici 3 ij. Commisceantur, digerantur iterum per biduum, & colentur pro usu.

Oleum mirabile Caranitz Medici Pape Clementis VII. contra omnia venena non corrosiva.

℞. \odot veter. ℥xx. in quibus infunde flor. hyperic. eritor. minutiss. ℥℔. mitte in vas vitreum ampla capacitatis, sigillatum bene colloca in urna ad \odot octo dies, aut in putrefactionem in balneo 3. dies, & 12. horas in MB. cola & exprime subinde. In expressione hac in eodem quidem vase infunde parem novorum florum quantitatem, id quod ter facito. Hujus expressioni ℥j. adde.

Terebinth. 3 j. vernic. euphorb. castor. an. 3 ij. croci 3 iß. lumbric. terrestr. in vino albo lavator. m j.

Mista singula infunde in dicto suo vase per 6. horas in MB. Cola postmodum & exprime. Cuilibet libræ expressionis adde Scorpion. num. 120. in diebus canicularibus capt. & 12. dies in oleo probe maceratos, & fol. basilic. pone simul in vase munito & accommodato per 8. horas in loco calido, hinc cola, fortiter exprime. Tunc pro qualibet libra expressi olei.

℞. Zedoar. tormentill. an. 3 j. theriac. misbradat. rhabarb. femin. papav. errat. an. 3 ix. cera nova 3 v. 3 j. spicar. alii sylvat. num. xv. rhapontic. 3 iß. rad. serpent. major. 3 j. Aristol. rot. myrrh. elect. aloës epatic. spica nardæ an. 3 ij.

Incisa & contusa grosso modo irrota vino Malvatico, & cum antedicta expressione pone simul in MB. per hor. 24. observato calore competente, post cola, exprime. Colaturam bene obturato & sigillato vitro inditam serva diligenter, poneque per mensem ad \odot . ut clarescat. Vires. Qui venenum (modo non corrosivum) assumpsit, cor, pulsus temporum, manuum & pedum inungat hoc oleo, & spatio 6. aut duodecim horarum pro quantitate veneni salvabitur. Notandum etiam, quod talia loca forti & generoso vino sæpius lavanda, Malvatico, Græco & c. Moribus quorumcunque animalium venenosorum & rabiosorum medetur, & ungatur locus affectus, modo observetur, ne tangatur cutis pars læsa, sed regio circumvicina curi. Præservat à morbis contagiosis, his qui cum morbidis versantur, multum conducibile. Pleurisin sanat, vermes necat. Qui comedit herbas, fructus, fungos venenatos, aut vulneratus fuit cum armis venenatis, ei sublevabitur saluberrime. Uti quæ tamen notandum quod non sit ipsa rupta cutis, & locus affectus inungendus (esset enim lethiferum, si oleum in ipsam partem influeret) sed regio circumjacens, & primo omnium cor præmunire convenit, ut inde venenum extirpetur. Ischiatici cor locum dolentem & pulsus ungant, post cubitum abeant, & sudent, quo plus, eo melius. Secunda vice ad ignem ungant se, quod fuit probatum ab aliquo, qui 13. annos ischiate vexatus fuerat. In omnibus febribus continuis & malignis debite adhibitum excellentissimum remedium apprehenditur.

Oleum contra vermes, ischuriam, hydropem, egregium.

Fratrium D. Justine Patav.

℞. Medull. ossium persicor. amyg. amar. spica hortens. alii, lumbric. terrestr. scalonior an. 3 vj rad. gentian. diptam. alb. fraxin. gramin. herb. imperator. pæon. moror. vel foliis croci calam. aromat. caryophyll. aloës, Galban. cotocynth. zingib. nucist. cinamom. macropiper. thuris, carpopals. corall. rubr.

rubr. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. theriac. opt. $\mathfrak{z}\text{vj}$. menth. absinth. abrotan. centa-
 taur. minor. fol. persicor. pyrol. pilosell. apii, pulegii rubr.
 ruta origan. plantag. marrub. laur. thym. salv. chamadr.
 aneth. rorismar. an. m. \mathfrak{B} . abrotan. foem. major. betonic. cort.
 pomor. aurant. granator. acid. m. \mathfrak{B} . sem. apii, portulac. ra-
 phan. caulium, plantag. porror. sancti, cydonior. foenic. petro-
 selin. pilosell. lupiner. segalin. phaseol. bacc. lauri an. $\mathfrak{z}\text{vj}$. C.
 C. ust. $\mathfrak{z}\text{ij}$. fell. taur. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. aceri albi $\mathfrak{H}\text{ij}$. $\mathfrak{z}\text{vj}$. olei mastice pe-
 trol. laurin. spica an. $\mathfrak{z}\text{vj}$. vesust. optim. $\mathfrak{H}\text{xxv}$.

Contusa & incisa macerentur in oleo ad solem per xv.
 dies, ebull. in M. B. & colentur, in fine addatur Theriac.
 in aceto solut. bene misceantur, obturentur, & serven-
 tur ad usum. In vermibus profligandis tempora, nasi
 foramina, latinx p. æcordia, pulsus, & umbilicus in-
 ungantur, brevit. r. operationes edit stupendas. Ischu-
 riam & calculum sublevar. In hydropse efficacia ad-
 mirabilis.

Oglio per li Vermi nella Speciar. Vecchia Venetiana.

\mathfrak{L} . Rad. gentian. dipeamn. alb. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. absinth. m. \mathfrak{ij} .
 centaur. minor. m. \mathfrak{j} . aloes elect. $\mathfrak{z}\text{vij}$. C. C. ust. $\mathfrak{z}\text{ij}$. sem. sancti
 $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. fell. taur. n. r. vini alb. acerrim. $\mathfrak{z}\text{viij}$. sem. colocynth.
 $\mathfrak{z}\text{ij}$. olei commun. $\mathfrak{H}\text{ij}$.

Contusa grosso modo bulliant ad consumptionem
 vini, adde picis navalis liquid. $\mathfrak{z}\text{ij}$. bulliant parum, fa-
 cta forti expressione adde \mathfrak{o} spic. odorat. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. M.

Oleum ad strumas. D. Cocci.

\mathfrak{L} . \mathfrak{o} . bacc. laur. $\mathfrak{z}\text{vj}$. philosoph. $\mathfrak{z}\text{ij}$. thur. alb. gumm.
 arabic. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. mastich. terebinthin. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. ac dest. ill. lento igne per alembicum vitreis organis
 r. primi destillat. liquoris quantum perfluxerit, adde
 cinet. quercin. dimidiam partem, commisce, indatur
 alio vitro atque destilla secunda vice. Hic liquor de-
 stillatus servetur usui.

Oleum pestilentielle D. Cocci.

\mathfrak{L} . Olei terebinth. $\mathfrak{H}\text{v}$. cinamom. opt. $\mathfrak{z}\text{ij}$. croc. integr.
 $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. succ. alb. mac. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. sulphur. viv. $\mathfrak{z}\text{iv}$. rad. osnitri $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 nuc. moschat. n. vj. zedoar. $\mathfrak{z}\text{ij}$. polypod. $\mathfrak{z}\text{vj}$. destill. f. a.

Oleum vulnerarium.

\mathfrak{L} . \mathfrak{o} . commun. $\mathfrak{H}\text{ij}$. semin. lin. $\mathfrak{z}\text{iv}$. hiperic. $\mathfrak{z}\text{ij}$. ro-
 sac. $\mathfrak{H}\text{B}$.

Hiscce omnibus commistis adde succ. seq. herbarum
 expressum simul contusarum & perfusarum

Aceti $\mathfrak{H}\text{ij}$. herb. plantag. sanic. alchimill. tabac. millefol.
 consolid. sarrac. artemis. rubr. fol. quercin. an. m. \mathfrak{j} .
 Coq. simul, donec succus penè evaporet; post adde
 Virid. aris $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. gumm. ammoniac. galban. bdellii solut. acer.
 calid. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. myrrh. thuris aloes, Mastich. sarcocoll. an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 colophon. $\mathfrak{z}\text{iv}$. pic. naval. $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. terebinth. clar. $\mathfrak{z}\text{ij}$.
 Coq. simul & excola balsamum.

Oleum \mathfrak{G} . dulce.

\mathfrak{L} . \mathfrak{G} . optim. q. v. pulveris. imbibe cum \mathfrak{o} . \mathfrak{G} . l. ut fiat
 quasi pasta, manda digestioni per 14. dies. ut f. massa fe-
 re pulveris. postea adde sacchari candi p. \mathfrak{ij} . M. affunde
 V. rectific. p. \mathfrak{ij} . pone per diem unum in locum cali-
 dum, destilla deinde lento Δ per retort. & videbis oleum
 rubicundissimum, hoc serva, das \mathfrak{G} . zerreib. geuß v. vie-
 der das \mathfrak{o} . \mathfrak{G} . l. druber, und. procedire v. vie vor, und das
 thue cohobando 4. mahl. Magst. auch einen V. allezeit
 zugeissen. Usus: In podagra gr. vi. in vino, sudet per 3.
 horas, & repetatur usus per triduum. In apoplexia in-
 stilletur linguæ guttula una, & intra 6. horas melius ha-
 bebit. Si manus. pedes, aut brachia arthritide correpta
 fuere, propinentur. 3. gr. in vino calido. Contra phthi-
 sin in ∇ . borrag. gr. 3. manè per octo dies. In morbo
 gallico manè gr. vi. jejuno stomacho in ∇ . destillat.
 lign. lassati. per 14. dies. In peste gut. 3. in vino absinth.
 Annotis & anhelosis propina initio veris & autumnis

per 3. dies v. gut. in vino, & singulis mensibus, vide-
 bisque mira. Hoc \mathfrak{o} experientissimus Chemicus Tho-
 mas Lindlerus Medicus Dantiscanus sæpius usus est, &
 multis eo auxilio fuit.

Oleum contra calculum

Landgr. Wilhel.

\mathfrak{L} . \mathfrak{o} . Spic. juniper. petrol. amygd. amar. rosar. cha-
 momill. lilior. albor. scor. \mathfrak{m} . an. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

M. & inungatur regio pubis ex MSS. A. G.

Olea varia Composita ex Hadriani à MYNSICHT Armamentario Medico-chymico.

Oleum Otagicum.

\mathfrak{L} . Rad. hellebori nigri $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. pulp. colocynthid. $\mathfrak{z}\text{ij}$. fol.
 sena elect. lauri an. $\mathfrak{z}\text{ij}$. millepedum vivor. alipta moscha-
 ta, caryophyllorum ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. herb. rorismarin. auricul. mu-
 ris, majorana, sabina ana m. \mathfrak{B} .

Coq. in vino & \mathfrak{L} . Colaturæ $\mathfrak{z}\text{ij}$. ol. amygdalar.
 amar. $\mathfrak{z}\text{ij}$. bac. juniperi, petra ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. formicarum $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$.

Denuò coque ad consumptionem humiditatis &
 oleum ad usum reserva.

Vires & Usus.

Auditus difficultati confert & tinnitum tollit. Ma-
 re autem & sero paucula guttulæ prudenter auribus in-
 stillentur, vel madefiat gossypium imponendum.

Oleum Acousticum ambratum.

\mathfrak{L} . Ol. amygdalar. amar. $\mathfrak{z}\text{iv}$. nardi comp. lilior. alb.
 ana $\mathfrak{z}\text{ij}$. suc. origani majoran. ruta, porri, raphani, caparum
 ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Mixta coquantur ad succorum consumptionem,
 postea oleo colato adde.

Sp. vini Mille pedibus prius impregnati aceti vini acer.
 ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. ambræ grisea, flor. serpilli, bac. sabine, sem. cymini,
 macis ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. cubebarum, hellebori alb. mastichis, laudani,
 styrac. calam. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. castorei veri, piperis long. croci or.
 niri præp. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Omnia per se pulverisata, & diligenter conqussata
 denuò in B. aquæ magnifice bullientis ad consumptio-
 nem humiditatis coquantur, permitiendo refrigerati,
 postea oleo expresso & bene colato immisceri.

Ol. formicarum anisi ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. gallia moschat. subtilissi-
 me pulverisat. $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Misce & ad usum reponere.

Vires & Usus.

Contra surditatem & lgravitatem auditus nec non
 tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatu ex-
 pertissimum est: Aurium etiam dolores sistit. Aposte-
 mata rumpit, & ulcera manantia curat. Usus est, ut
 aliquot guttæ in aures manè & vespere stillentur, clau-
 dendo cottone moschato; Sic tribus aut quatuor die-
 bus sæpe auribus medetur.

Oleum Carminativum.

\mathfrak{L} . Ol. sem. cymini $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$. feniculi, anisi, carvi ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$.
 aneti, aurant. chamomill. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$.

Misc. & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Medicamentum verè anodynum est: Discurit enim
 flatum, Hysteralgiam & omnes morbos ex ventositate
 ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ven-
 triculi, Lienis, intestinorum, renum & vesicæ lenit
 atque placat. Melancholiæ flatuosæ seu hypochond-
 riacæ auxilio est. Dosis à gutt. iv. ad v. in vehiculis
 appropriatis.

Oleum Nephriticum.

℞. Succini alb. rect. terebinthina juniperi ana ℥iv. fermenti panis cibarij. sal. communis tartari alb. an. ℥ij. aq. hedera ter. petroselinij ononidis, ana ℥ij.

Misc. & per alembicum destilla : postea separa oleum, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Virtuosissime & potentissime calculum Renum & Vesicæ frangit, & per urinam expellit; Insuper Colicos dolores sedat. Uterum roborat & partum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum Capitis affectibus, nervorum resolutionibus, morbo atonico & Comitiali succurrit; nec non naribus inunctum ab omni veneno & aëri pestilenti præservat. Dosis manè à gut. v. ad vi. in vehiculis specificis.

Oleum septem florum.

Paratur ex oleo Olivarum per multas repetitas infusiones florum, Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvæ arbor. rub. infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim digerantur in Sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque, & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus &c. Sic tandem Oleum anodynum & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis quam calidis doloribus appropriatum, quod uti reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Adonydum est. Capitis dolores & Cephalagiam mitigat. Phreneticis & vigilibus fronti ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Uteri & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præsentis est remedium. Februm ardentium æstus intolerabiles placat. Jecoris & Renum immoderatum calorem sedat. Omnem Intemperiem calidam extinguit. Uteri durities emollit, & multos alios vulvarum casus componit, omnes tumores calidos vel maturat. Lassitudines discutit. Valet etiam ad ambusta cum albumine Ovi mucilag. Sem. Cydoneor. mixtum. Per clysteres denique injectum dolores ventris sistit, alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit.

Oleum Sabinæ Croceum.

℞. Ol. stil. sabina ℥ij. croci orient. ℥ij.

Misc. & affunde spir. vini super Artemis. Centaur. min. & Cinamom. rectif. Unc. iij. Coq. ad spiritus consumptionem. Postea separa oleum, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Ad cienda muliebria probatissimum. Dosis manè & vespri à gut. v. ad vi. & vii. in aq. Artemisiæ, pullegij &c. Item in vino Malvatico vel alio generoso & forti in decoctione nostra contra Menfes suppressos commodissime offertur. Tempore autem, quo menstrua fluere consueverunt, exhibendum, ut sic adjuvante natura eo efficacius operari possit.

Oleum Balsami.

℞. Ol. olivarum ℥ij. hyperici, bac. lauri an. ℥j. gran. juniperi, petra ana ℥β. lig. rhodini, spica, ana ℥ij. sem. angelica, anisi ana ℥j terebinth. cypria in aq. violar. lot. ℥β.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I I.

Misc. & cum f. q. Rad. Anchusæ f. l. a. Oleum seu Balsamum rubicundum.

Vires Usus Dosis.

Calefacit aperit, discutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregie dissipat; In paralyti, nervorum origini inunctum, multum facit. Surditati, sibilo, & dolori aurium, à frigidityte, medetur. Dolores & rigores Februm, spinæ dorli illitum, tollit, & Febres abigit. Putredini & pesti resistit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores provocat. In spasmo, Colica, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitato, &c. interne & externe usurpatum, præstans est remedium. Dosis à ℥j. ad ℥j. in vehiculis morbum respicientibus.

Oleum Formicarum.

℞. Formicarum vivar. sem. eruca ana q. v.

Misc. & contunde, ut fiat quasi pasta: Hanc vitro inde, & sub dio solitamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separa, & ad usum pro Balsamo nostro Venereo reserva.

Vires & Usus.

Si hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perineæ ungantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

Oleum Lignorum.

℞. Ras. lig. sancti ℥ij. sassafras rhodini ana ℥v.

Mixta destillentur, ut est artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ seorsim aliquoties rectificentur, & ad Usum ferventur.

Vires & Usus.

Spiritus habet vim diaphoreticam, & per sudorem expellit, quodcumque in corpore noxium. Dosis à ℥β. ad ℥j. in vehiculis specificis. Oleum vero Experimentum est in Gonorrhœa; Contagioni etiam & putredini maxime resistit: Ea enim ratione morbo Gallico mire subvenit: Cujus ulcera, pustulæ, crustæ, vesiculæ &c. nec non serpigines & scabies ex Oleo hujus limitatione, curantur Dosis interne à gut. vi. ad gut. iij. in liquore convenienti & appropriato.

OLIBANUM, vid. Thus.

OLIVA, vid. Olea.

OLLA, vid. Instrumenta Pharmaceutica.

OLOR, vid. Cygnus.

O L U S.

Olus, Oleris, denotat quamcunque herbam effectuentam, & ab olla nomen sortitur, quod scilicet in cibum veniat. Scaliger nomen Olus ab Oleo cresco deducit, quod olera in hortum translata ex agrestibus culta fiant, sique adaugeantur & exerceant.

OLUS ATRUM, vid. Smyrnum.

O M A S A.

Sunt propriè interanea animalium ruminantium ab Omaso uno ex ipsorum ventriculis sic dicta, unde decoctum omasorum vocamus decoctum interaneorum animalium ruminantium, eoque in clysteriis, balneis & fortibus quibusdam utimur.

Sf 3

OMPHA.

OMPHACIUM.

Omphacium, Gallicè *Veriu*, est succus uvarum immaturarum, coloris viridis, saporis acidi, stiptici ac adstringentis, continens multum salis essentialis ac phlegmatis, parum olei.

Deterisivum est & adstringens, siticulosus confert, bilem præcipitat, cor exhilarat, humorum acrimoniam alkalina temperat, cutim mundificat. Usus ejus internus est & externus.

Omphacium autem ab *ἰμφοῦς* uva acerba vocatur, quia scilicet ut jam diximus ex uvâ immaturâ ac propterea acerbâ exprimitur.

ONAGER.

Est Asinus sylvestris cujus vires non multum differunt ab iis quas in Asino domestico descripsimus.

ONAGRA.

Onagra, seu *Lysimachia lutea corniculata*, *Virginiana* &c. Planta est exotica, quæ adstringens, deterisiva, vulneraria, ac sanguinem sistere creditur.

ONOBRYCHIS.

Onobrychis nonnullis ab *ὄνος* Asinus & *βρυχίς* quasi Asini palmes dicta putatur: aliis ab *ὄνος* *βρυχίς* fren-deo, ab asini ruditu, quodd eo depasto fremant Asini, nec injuriâ, siquidem cum semen jam maturuit depalcantur: semen enim rigidis suis aculeis eorum palatum & os compunget.

Nota ejus generica sunt floris spicati, siliquæ aculeatæ monococcæ.

Nomina. *Onobrychis* sive Caput gallinaceum *Ger.* *Onob.* vulgaris *Park.* foliis vicæ, fructu echinato major *C. B.* *Polygalon* Gesneri *I. B.* & nunc hodie vulgo nota nomine *Saint foin*.

I. B. Multarum notarum argumento *polygalon* indigebat Gesnerus herbam è radice mediocriter crassa, longa, vivaci, cortice obrecta, nigro, intus alba, ramos proferentem multos, palmates vel etiam cubitales, rubentes, in terram reclinatos; è quibus orti pediculi folia conjugatim disposita sustinent lentis, inferius magis albicantia & pilosa, superius viridantia magis, plurima, cum impari in extremo, mucronata; & foliorum alis exeunt pediculi prælongi, florum spicas sustinentes in longum excurrentes unde &, sentina non coarctata sunt sed rarius disposita. Flores pulchre rubent supremo folio (quod plerunque reflectitur) lineolis saturatioribus eleganter striato, è calice hirsuto. Sequuntur seminum conceptacula subrotunda, modice compressa, spinulis asperata, & per ambitum gibba, cristam serratam, membrancam erigentia, semina singularia reniformia continentia.

Ad latera collium *Gogmagog* dictorum prope *Cantabrigiam*, inque satorum ibidem marginibus nec non campestri planitie prope *Novum mercatum*, inque ejusmodi planitie montosa *Salisburyensi*, ut & alibi in *Anglia* sponte provenit, semper tamen solo cretaceo & sicco, locis apricis, ut circa *Royston* oppidum. Intransmarinis prope *Genevam* copiose provenientem observavimus in pratis, ubi & *J. Bauhinus*.

Hæc est quæ non ita pridem seri apud nos cæpit pro jumentorum pabulo *Saint foin* i. e. *Sancti fœni* nomine, semine è *Gallia* petito, maximo multorum emolumento. Multam enim ex ejus esu *Vaccis* & aliis animalibus lactis copiam contingere compertum est, unde *polygalon* & merito Gesnero dicitur: præterea solo gaudet sterili & cretaceo, aut sicciore, nec graminis neque frumenti admodum feraci; unde à quo seri cæpit hujusmodi agrorum annui redditus soli Do-

minis multoties iterantur,

Diensibus *Allobrogum*, ubi pratorum copia non est in asperis & lapideis locis, paucula terra tectis, bidente tantum scalptis, injecto fimo & diligenter comminuto ea gens ferit, & humo insperso stercore operit. A satu imber si subsequatur facillime comprehendit, & optime proficit dispersis huc illuc cauliculis, sic vestiens & operiens solum ut in jejuno & squalidissimo solo latissimi prati speciem ostendat. Secatur singulis annis ter, cum adolevit & corroborata est, & pecori gratissimum pabulum est. Gaudet præcipue locis aridis & sabulosis, in quibus floret æstate & semina perficit Autumno. *Moris*.

Ingeniosissimus vir & rei herbariæ petissimus *D. Sloane* exhibuit nobis ramulum siccum *Onobrychidis* cujusdam quam majorem non descriptam vocat. Vulgarem *Onobrychidem* foliis & spica refert, sed florum color videtur esse cæruleus. *Ramus*.

ONONIS.

Nomina. *Anonis* spinosa flore purpureo *C. B. Park.* *An.* sive resta bovis *Ger.* *An.* sive resta bovis vulgaris, purpurea & alba spinosa.

I. B. Longè lateque radices spargit albidæ, fractis contumaces: ramis verò lignosis, simplicibus & frequentibus fruticat, cubitum unum aut alterum longis tenuibus, rotundis, hirsutis, rubescentibus, lentis, spinis longis & rigidis armatum, interdum vero nullis priusquam decidant folia. Folia spinis ferè proximo ortu, incondita, sublonga cicoris singulatibus foliis simillima, nigricantia, hirsuta, in ambitu crenata, sapore leguminoso, tactu glutinosa, odorataque (imo farida) flores coluteæ sed colore purpurecente vel carneo, rarius albo. Siliquæ parvæ rotundum semen continent, vicæ formâ & sapore.

Anonis spinosa lutea major *C. B.* spinosa montana lutea major *Park.* foliis paulo majoribus & longioribus, floribus luteis, ejus quæ spinis caret similibus à descripta differt, aliam adhuc speciem seu varietatem proponit *Parkinsonus* quam spinosam luteam minorem vocat, quæ non alia in re quam brevitate & parvitate sua à præcedente differt.

In pascuis sterilibus passim.

Vires. Cortex radicis, ut & radix ipsa, urinam ciet, calculos renum & vesicæ atterit, carnosam ramicem absumit, dentium dolores mulcet, hepatis infarctus liberat, vel in pulverem redactus, & vino albo tenui infusus, vel in posca decoctus, & aliquandiu bibitus, hujus radici, aut potius radicis cortici (inquit *Sim. Paulus*) vix suppar remedium reperitur, quod cum eo componi queat, tam in vesicæ quam renum calculo. *Matthiolus* in *Dioscorid.* notat, se novisse quendam, qui radicis hujusce pulvere duntaxat pluribus mensibus sumpto carnosum ramicem absumit, licet à Medicis nullo alio modo quam sectione ustioneve curari posse statutum esset.

Hæmorrhoidibus cæcis maricisve discutiendis infusum aliquandiu bibitum prodest.

Antequam spinas produxit conditur cum sale pro cibario *Schrod. Raius*.

ONYX, vid. sub titulo *Lapi*.

OPALUS, vid. sub titulo *Lapis*.

OPHIOGLOSSUM.

Nomina. *Ophioglossum* *I. B. Ger.* *Ophiog.* sive lingua Serpentina *Park.* *Ophiogloss.* *I.* sive vulgatum *C. B.*

I. B. *Ophiogloss* floris arguta cuspis (inquit *I. Bauhinus*

hinus) linguam serpentis exertam imitata, nomen impertivit, fictum quidem ex Germanico: veteribus inditum esse nonnulli existimant; certe quo nomine illis innotuit inter Botanicos non convenit.

Multis & satis crassis fibris in fasciculum velut cotledis cincta, ellebori modo, si præsertim pinguis nanciscatur solum, radice donatur, post dulcedinem quam primum linguae ingerit, caloris & acrimoniae nonnihil in palato reliquens & paululum amarescens Cam. huic surgit pedicellus palmaris folium singulare sustinens, betæ parvæ quodam modo, pinguis tamen & carnosum, minimeque nervosum, modo angustum & longiusculum, modo latum & subrotundum, læve, erectum, sapore dulciusculo cum viscositate & virositate aliqua; e cuius finit qua pediculo committitur ligula exit bifurcata, non tamen secta, in acumen sensim desinens, citra extremitatem utrinque denticulata, scobinæ aut limæ aurifabrorum effigiatâ. Seminis loco (inquit Camerarius) ei tenuis quasi pollen in linguae infectionibus adest, illeque per maturitatem dehiscentibus excidit.

In pratis & pascuis humidioribus frequens invenitur. Aprilis vel demum Maio mense prodit, & adusque Junium viget, paulo post tota superficies marcescit, radice in terra superstiti; quæ profunde demergitur, ut extirpata difficilis sit.

Vires. Vulnerarium est insigne; tum intus sumptum in potionibus, tum extrinsecus applicatum. Recentia folia vulnera conglutinant & enterocelas sanant. Datur poranda ex aqua equisæ ad intrinseca vulnera. herbæ pulverem aliquot diebus exhibitum ramices omnes curare posse affirmat Baptista Surdus.

Verum non modo ad vulnera recentia sed & vetera ulcera & ramices præ ipse æstimationis est oleum quod ex foliis ejus in oleo olivatum vel omphacino ad solem diutius maceratis, vel brevius ad ignem decoctis donec inarescant & exsucca evadant, deinde expressis conficitur, præsertim, inquit Parkinsonus, si æthinæ terebinthinæ tantillum in eo dissolvatur.

Ophioglossa ratione magnitudinis inter se differre depictendit Mentzelius circa oppidum Furstenvaldiam. Minimum ultra unciam cum sua lingua & foliolo non assurgit. Medium vero bis unciale folium habet longius & lingua ultra tres uncias excrecentem. Majus autem folium obtinet quatuor uncias longum, & unum cum dimidia latum, lingua in altum satis se erigente.

Ibidem quoque trilingua ophioglossa, nec non bilingua reperit idem. *Ramus.*

OPHIOSCORODON, vid. *Victorialis*.

OPHITES Lapis serpentinus, vid. sub titulo *Lapis*.

OPHRIS.

Sob *Ophridis*, seu *Ophrios* nomine duæ veniunt plantæ, quarum prima quæ Gallice *Double feuille* vocatur, Bifolium, latine, & Pseudo orchis dicitur. Secunda eo quod tria gerat folia, *Ophris trifolia* nuncupatur. Utraque autem vulneraria est, consolidans, ac vulneribus apta.

OPHTHAMICA MEDICAMENTA:

Vulgata est paræsmia: non patitur lulum fama, fides, oculus. Non patitur lulum ob teneritudinem, & artificium structuræ summum, tum à nocentibus quibusvis extraneis, tum à juvantibus vel quasi medicamentis.

Sunt hæc ipsa ad instar aliorum (1) vel *communia* vel *propria*. *Communia* sunt, ut auribus quoque simul debita, emollientia, paregorica, repellentia, adstringentia, traumatica & similia; *communis*, non quidem

respectu membri affecti, cujus ratione ea ipsa sunt & dicuntur propria potius, verbi gratia, adstringentia in uveæ dilatatione, repellentia in influxionibus, traumatica in vulneribus; sed ratione materiæ medicæ. Præcipuum illorum exemplum præbent vesicatoria, & his affinia setacea, quæ in affectibus paulo gravioribus unice oculis opem ferunt, ad nucham applicata. Tamen purgantia ipsa, quæ in ipsis quoque his affectibus sæpe omne ferunt punctum; utraque evacuandi scopo adhibita, & quidem feri, oculis copia, motu & influxu, ut & acredine molesti. Virgo viginti annorum debilitate visus laborans, & maculas obversantes sibi in oculis sentiens, unico purgante dato melius habebat.

Sunt itaque (2) *ophthalmica* vel *interna* vel *externa*, utraque ab usu ita dicta, & quoad partes læsas, interiorius vel exteriorius obvias, divisa. *Interna* uno nomine dici possunt *oedepnæ*, seu *visum acuentia* & roborantia, (id quod tamen adæquatè & externis competit, ut hæc ipsa sint quasi ophthalmica præcipua & specifica,) proficua, ubicunque actio oculi cessat vel debilis est, tum in sensu præcipue, tum etiam in motu. Sunt scilicet hæc ipsa cephalica ferè, nervina balsamica, quæ conjunctim spiritus, humores, nervos & caput horum fontem respiciunt; verbi gratia, præter cephalica jam exposita radix valerianæ, helenii; herba nepethæ, euphrasia, verbenæ, fumariæ, ut cephalicæ rorismarinum, melissam, non laudemus denuo. Item cubebæ, semen anisi, fœniculi, etiam inspiratu utilia, lignum aloes, succinum &c.

Externa licet pleraque polychresta sint & mixta, paucis exceptis, possunt tamen sub certis quoque classibus speciatim recenseri, quibus ipsa velut certis quibusdam terminis absolvuntur. Sunt nempe partim *extergentia*, ad motum humorum promovendum, *scurv* dispellendam & coagulum removendum, in ungulis, excrecentiis, cataactis, & pustulis utilia; ea que tum *terrea* exsiccantia, ut perlæ præparatæ, flores cinci, saccharum saturni, vel potius magisterium, unguentum nihili, tutia præparata, margaritæ troch. M. siæ album, pompholyx; tum acriuscula salinâ qualitate sigillata, saccharum canariense, *olum* album, aloë, fel lucii piscis, ejusque essentia, pinguedo asciæ piscis, serpentum & viperarum delicatissima, quæ ad roborandum visum & affectus oculi plurimos laudari satis nequit. *Vid. Ephem. Germ. Ann. II. obs. 125. p. 206.* Pertinet huc aqua saphirina, parata ex lixivio calcis vivæ, salis ammoniaci accessione paucâ roborato, in pelvi æneâ virorem infusione indepto.

Partim *defendentia*, *demulcentia* & *traumatica*, ipsum cum primis bulbum ejusque concamerationem respicientia, quod in ophthalmia, variolis & morbilis, vulneribus & punctationibus ipsis pro suffusione tollendâ valet, ut *mucilaginosæ*, auricula Judæ, albumen ovi, alumen, mucilago seminis psylli, cydon. emplastrum de pomis dulcibus, apud *Sculter.* aqua frigida, chelidonis majoris, euphrasie, rosarum verbenæ, essentia Veneris &c. Faciunt huc, quæ, ad restitutionem humorum extravasatorum communiter, vel seorsim commendantur.

Legi meretur hanc in rem observatio elegantissima apud *Heerium observ. 4. p. 71. seq.* qui succo vesicularum ulmi tempore verno reperibili, primum humorem oculi in gallinis, hinc & in homine restituit, citra tamen visionem salvam restitem.

Hinc *Burrhus in epistolâ ad Bartholinum* hoc ipsum tetigit, quâ de edidit hic considerationem physiologiam occurrentium quorundam in epistolis duabus fr. Burthi de cerebro & oculis. In harum posteriore p. 36. seq. agit de artificio oculorum humores restituendi, quò multoties dissectos profundè ac transverse brutorum hominumq; oculos ad pristinum sta-

tum tam feliciter restituerit Amstelodami, ut nec litura cicatricis minima superesset. Quem in finem infervisse sibi pag. 37. pronunciat aquam laudatis aliis jam autoribus adhibitam, destillatam per MB. ex foliis chelidoniz, (majoris,) addito tantillo camphoræ ad arcendam putrefactionem, vel etiam ex simo ejusdem chelidoniz, seu herbâ in putrilaginem resolutâ, spontaneâ effervescentiâ prolectâ in alembico, concluso inibi, aquâ. Hâc restitui ait citissime oculos exsectos avium, & tantâ cum venustate micare in eis iridem & fulgorem radiorum, ut longè superet pulchritudinem oculorum naturalem; imò in iis, qui bis dissecti fuerint, levigari tanto splendore renatos oculos, ut niteant, quasi essent perlæ orientales. Cautelam tamen addit, ut summâ diligentia vitetur nervi optici læsio, profundioribus quippe hujus fibræ læsibus, curationem difficilem aut infelicem fore, de quibus tum ipse. tum *Exc. D. Major*, noster in curioso dicto commentario legi latius meretur, laudatis etiam fel humanum destillatum. Notabile verò est, jamdudum *Crollium* aquam chelidoniz compositam pro oculorum vulneribus in usu habuisse, quod descriptum & explicatum exhibet *Tenzel. Exeg. Chim. pag. 669.*

Si ab his duobus abierimus, *Th. Kerckringius Spicileg. anatam. Obs. 100. p. 198.* proponit se nosse artificium, quo oculus crystallino cæterisque humoribus spoliatus vitum recuperare possit, non artificio illo Buttriano, quo ipse quidem viderit canem restitutum, cæcum illo oculo manentem, sed alio, quod tamen revelare non dignatur, tanto minus admirandum, quò obscurioribus tenebris obvolvitur, tantò magis verò, si ad posteritatis & communem usum propalare illud sustineat vir celeberrimus.

Candidus & in hoc & laude dignissimus est *A. Sala*, qui in *septem planet. terr. spagir. recens. Operum p. 211.* ophthalmicum admirandarum virium tradit, describit & experimento comprobatum exhibet, ex \varnothing bracteæ, ζ iii. vini malvæ ζ xviii. seu \mathfrak{H} .b. circulentur ad solem, vitro bene clauso, donec liquor viridis & transparentis instat smaragdi fiat. Qui usum noverit, præter alia addit, miranda efficit. Imò, ut ex historiâ additâ patet, humores restituit, 1610. ait, Noribergæ Juvenis quidam lithothomus ex urbe Basileâ lusu gladiatorio serio oculum dextrum effossum habuit, ita ut ex capsulâ ad longitudinem nucis propenderet. Concionatoris, uxor in locum reposuit oculum propendulum, & talis adjumento liquoris fixum reddidit & sanum intra 14. dies, visum tamen amisit, nam ex ictu exciderat pupilla.

Novimus etiam pinguedinis viperinæ beneficio vulnus oculi consolidatum, & ex albuminibus ovorum conquassatis vel destillatis quoque credibile est tale quid effici posse, vel ex ipsis etiam humoribus oculi bubuli, utpote maximè affinis.

An verò & crystallinus exemplis restitui possit, & sic cæcitas vel saltem confortatio oculi curari, dubium est maximum, nam de humoris aquei regeneratione res clara est. In læsione oculi consimili *B. Rolsincius* aquam calcatrippæ unice adhibebat. Sufficiat, nulla alia ratione restitutionem fieri posse, quàm principaliter quidem à natura, morborum cumprimis horum medicatrice; adjuncta medicamentis traumaticis, oculi archeo amicis & specificis, prohibita inflammatione & suppuratione. Unde aqua chelidoniz vel consimilis ob vim aquosam repellit & roborat; ob vim nitrosam terream refrigerat, discutit, & optima est inter omnes ophthalmicas; succus etiam flavus æmulatur bilem abstergendo insignis.

Partim discutientia ibi consistentes seu vapores & halitus, seu humores in coagulum abituros. Patet id imprimis in fugillatis, vexatos vocant Latini alias, ubi radix sigilli Salomonis specifica est; & hinc quoque in humo-

rum impurorum affluxu, extravasatione. Faciunt id *deprimè* interna, aperitiva item & cephalica; Exterius verò laudata ophthalmica, illa scilicet quæ polychresta sunt, & singulis ferè hisce indicationibus singula proficiunt, eadem cum extergentibus.

Referri huc etiam merentur forus & suffimenta, parcius tamen & cautè administranda, fumus enim lædit oculus nimia morificatione, modica non nocet. Nocent quippe & pulverulenta oculis, indicata tamen commode insperguntur, ut perlæ, sacchar. magister. saturni & lapis stibis ipse, cum quo novimus cæcitatem asinorum corrigere molitores. Nimio verò calore concretionem humoris albuginei in cataractam promoveri posse, notavi in studio, qui in pueritia fortibus talismodi intemperativis, suâs medici, utens eandem reportavit. Notabile enim est, leni acrimonia extergente & discutiente sigillata esse debere ophthalmica, quod oculus in se pars sit spermatica, excarnis, frigidior, membranosa, moderanda tamen pro affectuum modulo, cujus rei exemplum præbere potest pinguedo viperina, nunquam satis laudata; hæc recens magis demulcet, vetustior magis extergit & discutit. Vidimus unâ nocte ejus beneficio unguitulos curatos.

Pertinet discutientia etiam lenis palpebrarum frictio, imprimis cum succino, smaragdo, sapphiro, quod in variolis pro defensione oculorum cum successu suavisimè sæpius.

Tacemus ex dictis mixta, seu in uno, seu in pluribus vis illa emineat. Talismodi etiam sunt crocus metallorum uterque, vitriolum album, & ex his parata & mixta alia, ut unguentum nihili, collyrium Plateri, & alia descripta apud *Rolsincium in O. & M. Comment.*

Notabile est hepar bovillum vel hirci à *Coo* & aliis commendari in nyctalopia pro specifico, cujus experimentum felix in famulo suo fecit *Mæbius*, idemque experimentis comprobatum notat *J. Th. Schenckius histor. humor. general. c. 2. p. 36.* Vim suam exerit incrassando, unde spiritus animales quoque non tam effusè influunt. Meminimus & opiatum curatum affectum.

Valent verò de his cautelæ observandæ (1) in oculis affectis non solum locus, sed & forus spectandus est. Locus quidem est oculus, fomes tum caput, tum hypochondria, tum M.S. acris, serosa, catarrhosa, scorbutica.

(2) Repellentia repellant, non impellant, seu impingant. Imprimis nimis frigida, debent enim hæc ipsa defendere & reprimere, munitis poris, humores serosos, non in quiete detinere. Præstat utplurimum revellere in his casibus, quàm repellere.

(3) Suppuratio oculi funesta; omnibus modis arcenda, idq; frigidiusculis & discutientibus, V.S. revulsione &c. Timenda hæc est in ophthalmia insignissima, ubi ipsa salus sæpe si servare oculum velit, non tervabit. Hujus verò nota pus est. Studiosus gravissimam talem ophthalmiam patiens ad se nos vocat, ostensurus oculum cum lintamine pus ostendit, desperato cum prognostico. Non verò intelligitur tam suppuratio exterior, levior & palpebrarum, qualis nonnunquam fit, quàm interior, & ipsius oculi inflammationem patientis, quæ necessario corruptionem partis post se trahit. Addi hinc potest superius traditis de emollientibus, hæc non convenire tum oculis promiscuè, sed magis frigide quàm calide, ut discutientia, (contrario modo,) tum nervis vulneratis, quod exemplo illo Galenico adolescentis *de compos. med. per gen. c. 7.* patet, ubi ab emollientium usu putrilago secuta est. Vid. *Hist. Gal 74.* apud *Sylvatic. p. 371.*

(4) Emplastica & anodyna medicamenta oculis inflammatis tantum abest ut prosint, ut potius noceant. Et inter hæc opiata, frustra in collyria recipi solita. Præstat mulcere & defendere, quàm anodynis his curam tentare, morificant magis, quàm ut dolorem sopiant. Confer. *Galen. 6. aphor. comm. 31.*

(5) Acuscula in tempore exhibita optima sunt ophthalmica

amica; tum quia humores ibi subsistentes in motum cient, tum quia oculus frigidus & membranaceus est, unde leviora quæ sunt archæum ejus minus movent; quæ vero acriora, lædunt. Id tamen non facile fit, quod casu & formâ innotuit; quæ enim partibus tam delicatis nocitura videbantur, non nocuerunt ob robur tunicarum, quod ex anatomicæ patet. Ex eo tamen non inferendum, promiscuè oculis inferenda acriora, irritantia quippe, unde errant, qui seu ex vulgo, seu ex medicis camphoram, qui O-lum album & alia ultra moderationis terminos collyriis jungunt, unde inflammatio augetur, citato affluxu, & mortificatis fibris.

(6.) *Unctuosâ-aquosâ oculis amica, unctuosâ etiam quadam oleosâ*; exemplo pinguedinum viperarum, & huic succedaneorum, alia verò seu calidiora, seu tenaciora non item: unde absurdum fuerit oculis emplastra apponere.

(7.) *Quacunq̃ affluxum cient oculis, cavenda.* Et inter hæc præmica, torum caput concutientia, unde & sani compatiuntur oculi, comprimuntur, illachrymantur productâ sternutatione, & sollicitantur. Longè magis id in ægro & debili bulbo timendum est. *Wedelius.*

Hactenus de Medicamentis Ophthalmicis in genere, sequuntur jam formulæ quædam eorum specifica ex Fasciculo Medicamentorum singularium Clariss. Cnæffellii.

Vinum Medicatum Polychrestum, primariò quidem & principaliter directum ad vitia oculorum, sive ad visus obscuritatem ex humoribus frigidis causatam: secundariò autem ad oppilationes venarum & omnis generis venena, S. R. Maj. Sigismundi III. Pol. Pol. & Suec. Regis.

℞. Herb. & flor. euphrasie m. x. rorismarini m. v. betonica m. iv. botrys, salvia ana m. iij. chelidonii, verbenæ maris man. i β. cardui benedicti m. ij. flor. calendula m. j. stoechad. Amb. sem. fenic. sileris montan. ana m. ij. core. citri man. iv. ligni sassafras concisi ℥x. rad. zedoaria ℥j. diptami albi, ireos flor. ana ℥ij. cardamomi ℥j.

Conscindantur herbæ paululum exsiccatæ, demptis stipitibus, & cum reliquis ingredientibus crassiusculè contusis misceantur, & in tres partes æquales divisæ; sacculique oblongis immisæ, ac in vini Rhenani recentis, seu multi vasculo, quod Amam vocant, immergantur, macerenturque per tres vel quatuor septimanas, ut hoc pacto vinum illud cum herbis effervescat, & vis illarum extrahatur, cumque vini substantia uniat. Postea sacculi extrahantur è vase, ut feces ad fundum resideant, & vinum clarescat, atque ad usum accommodari possit.

Dotes & vires. Vinum hoc medicatum licet propter sua ingredientia præstantissima variis polleat viribus, tum ob herbas ophthalmicas, præcipuè euphrasiam quæ basis hujus compositionis est, valet mitificè ad omnes affectiones oculorum, ex frigida & humidâ causâ ortas; utpote ad incipientes cataractas seu suffusiones, lippitudines, aliæque visus debilitates tam avertendas, quam profligandas, eò quod cerebrum debile roborat, & defluxiones ejus frigidas exsiccat; imagines, culices, mûscas, aliæque corpuscula oculis observantia dispellit, oculosque caligantes emendat, spiritus visivos reficit, roborat & auget.

Secundariò autem propter alia ingredientia cephalica, stomachica, hepatica, cordialia & alexiterica compositioni huic inserta, hepatis oppilationes aperit, icteritiam sanat pectoris & pulmonum vitiis succurrit, asthmati & orthopnœæ medetur; paralytin, epilepsiam, vertiginem, colicam, & alios morbos ex frigida causa ortos extirpat: uteri superfluitates ac intemperiem fri-

gidam & humidam tollit. Venenis ac præcipuè lui petiferæ præstantissimum est remedium, tam præservativum, quàm curativum.

Quod si autem vinum illud medicatum ad solam visivam potentiam roborandam, & organa ejus conservanda, dirigi debeat, tunc sequens compolitio seu recepta accipiat, quæ ut simplicior, ita etiam gravior erit palato:

℞. Fol. & flor. euphrasie betonica, salvia, chelidonii ana m. j. rorismarini m. iij. sem. feniculi ℥iv. siler. mont. ℥j. ligni sassafras concisi ℥ij.

Incidentur herbæ remotis stipitibus, & misceantur, sacculoque oblongo, extela munda, aut sindone alba immittantur, & sic musto seu vino recenti rhenano immersæ, macerentur per tres aut quatuor septimanas, ut vis herbarum eo melius extrahatur, & cum substantia vini uniat.

Hanc descriptionem, S. R. Maj. Uladislaus I V. ad examinandum, Collegio suo Medico obtulit, quam adhuc à Parente suo p. m. Ser. Pol. & Suec. Rege, Sigismundo III. recommendatam habuit.

Aqua Ophthalmica D. D. C.

℞. Aq. still. spermatis ranarum ℥xvi. phlegmatis O-li ℥viii. spermatis ceti ℔ij. essent. rosarum gutt. aliquot. TRAcosmet. myrrhisat. pro pauca lactescencia q. s. misceantur.

Hanc compositionem in duplo Cl. Dn. D. Cnæffellius Anno 1656. d. 29. Junii sibi præparavit, pro futura ægtorum & sufficiente provisione.

Vires sunt in amblyopia, amaurosi & suffusione.

Aqua Ophthalmica alia D. D. C.

Qua curatus fuit Dn. Præcopius, Theol. in Xenodochio ap. S. Elizabetham Dantisci, & Thomas Sarabanda, obocæcatus è cataracta.

℞. Mucag. aquat. O-l. per XX ℥ij. cruda, transcolat. phlegmatis O-li ana ℥j. aq. nivis seu glaciæ mens. Mart. collecta ℥iβ. quibus adde, ad singulam liquoris ℥iβ. spermatis ceti ℔j.

Misceantur probe, stent in loco temperato per aliquot dies, postea filtrentur per linteum putum. Patiens de hac mixtura instillet decies, seu vigies, pluribus & paucioribus pro commoditate vicibus in dorso decumbens, usque ad meliorationem & totalem recuperationem visus.

Collyrium Cl. Dn. D. Joan. Felveri.

℞. Phlegmatis O-li & aluminis ana p. æqual. scilicet ana ℥iβ. croci metallorum, sacchari Ani ana ℔iβ. rutia præparata quàm subtilissime ℔j.

Stent per mensem in digestionem, postea filtrentur; cum extremitate subtilis penicilli, hac mixtura imbuti, oculus subtiliter abstergetur, vel ad canthum externum una & altera guttula instilletur.

Aqua Ocularis externa.

℞. Succ. ex amput. palmitibus vitis, spermatis ranar. reservati ana ℥iβ. phlegmatis O-li ℥iβ. Quibus immergantur suo tempore flor. calendula, cyani, cichor. rosar. herb. chelidonie, euphrasie, feniculi ana q. s. Stent per dies aliquot in digestionem, post adhuc adde cancerum contusor. num. viij. hepata mustela piscis, prius in clibano in liquorem reducta nu. xxx.

Mixta destillantur in B. vaporoso ad siccitatem ferme totalem florum & herbarum. Liquor stillatus fervetur in vitro bene clauso.

Magnarum virtutum est, ad omnem visus infirmitatem, inflammationes & oculorum ruborem nempe aufert, sordes detergit, lachrymas exsiccat, ulcera sanat, suffusionem & cataractam curat & impedit, insuper ad claritatem oculis augendam & robur tunicis conciliandum, est aqua efficacissima.

Enth

Erthinum Cneffelianum, in suffusione oculorum.

74. *Flor. lilior. convall. in alcool redact. 3 ij. rad. ireos flor. 3 j. cœniotomii nostr. pro conditione morbi q. s. essent. ros. seu ol. Rhod. gut. iij.*
Misceatur in mortario lapideo & F. pulv. subtilissimus, in scarula munda seu pyxidula asservandus.

O P I U M.

De *Opio* præterquam quod aliquid adducitur sub titulo *Papaver*, Hic rursus præcipua quædam è Clarissimi Viri Georgii Wolffgangi *Wedelii Opiologia* exscribemus.

Opium Græcam agnoscit originem, dictum ὀπίον, ὁπὸ τῆς ὀπῆς, à succo, unde Latini sibi mutuati sunt nomen, opium vocantes, licet *Bantius animadvers. in Garc. c. 4. p. 42.* credat, Græculos, à vetustissimo populo, Indis & Arabibus, vocabulum opii derivasse, cum ab omni memoria illi eo usi sint.

Per ὀπὸν succus non intelligitur quivis, in generalissimâ loquendi consuetudine, sed vegetabilis. Humorem in venis, totaque plantâ contentum simpliciter *Menesstor* appellavit ὀπὸν, succum, alii in quibusdam succum, in aliis verò lacrymam. Vid. *Spigel. Isagog. in rem herbar. l. 1. cap. 3. p. 24.*

Succus hic cum variet in plantis tum substantiâ cum alius sit resinofus, ut in pino arbore, lentisco & aliis, alius aqueus, ut in betulâ, vite, &c. alius lacteus, ut in papavere, esulâ, scorzonera & cæteris similibus;

Tum accidentibus & extrahendi seu eliciendi modo: Quidam sponte extillat, ut resinæ, gummata: quidam fissurâ, ut betula, visis: quidam exprimitur, ut in floribus rosarum, violarum &c. herbis, plantagine, rutâ, fructibus, uvis, pomis, pyris, cydoniis;

Hinc varia sortitus est nomina: ὀπὸν, χυλὸν, δάκρυον, quæ, quid significant proprie, dignum videtur disquisitione.

Χυλὸς itaque in nostris hæc terminis denotat humorem seu liquorem, qui ex contusâ herbâ exprimitur aut elicitur, seu succum expressum ex herbâ tritâ & contusâ, adeoque differentia τῆς χυλῆς à reliquis consistit in expressione, unde id, quod ex herbis exprimitur, proprie dicitur χυλὸς.

Δάκρυον seu lacryma vocatur succus, qui ab incisione factâ, vel sponte dimanat, & defluit, sub se comprehensens & resinas, & gummata & gummi-resinas.

Ὀπὸς denique est quasi vox omnium communis, & generalius aliquantò vocabulum eorum, quæ ita stillant, & appellatur ὀνομα κοινὸν τῆς ὑγροῦς τῆς οἰκίας τῶν φυτῶν, nomen commune humoris proprii plantarum, teste *Theophrasto l. 9. hist. plant. c. 1.* Communiter itaque designat qualemcunque liquorem vel humorem, vel succum, qui alicunde emanat, sive id fiat mediante expressione, incisione, vel etiam spontaneâ protrusione, luxuriantis substantifici succi, ut adeo modo succum, modo lacrymam significet. Vid. *Gorraus desin. med. & J. B. Sylvat. lib. 1. de ther. compos. p. 143. seqq.*

Hæc tria diversa, ut sub unum certum genus redigeret *Galenus*, quæcunque ex alio effluunt, sive succi, sive liquores, sub humoris appellatione comprehendere præcepto generali statuit, *comm. 6. in l. 6. epid.* Et hæc quidem generalis est nominum notio.

Specialiter verò ὀπὸς designat qualemcunque liquorem, non sponte, seu resinæ & gummata nonnulla solent, sed μετὰ κατὰρχαμῶς, scarificatione, castratione, te-

entem, ut sunt opobalsamum, opopanax, galbanum & alia. Inter hæc duobus ὀπῆ nomen præ reliquis uti & eminentia singulari obtrigit I. succo sulphurii, seu laserpitii, latinis laserpitium, & alia fœtida dicto, unde *Galen. in Lexico Hippocr. ὀπὸς ὁ τῆς σιλφίης καὶ ἐξ ὀρχνῶν*, dicit, ὡς περὶ καυλὸς, succus sulphurii dicitur ὀπὸς per excellentiam quemadmodum & ejusdem caulis; & l. 8. de facult. cap. 24. ὀπὸν titulotenus pro asa eadem ponit, ubi, quamplures, scribit, habentur succi. Quavis enim radice incisa aut caule, quod ex vulnere crassum ac lentum effluit, succus est: cæterum specialius, & veluti per excellentiam quandam Cyrenaicum ita nuncupant & Medicum & Syriacum. Qpon verò Cyrenaicum hunc asam fœtidam expressis verbis inter alios interpretatur *Petr. Pichot. l. de rheumatism. p. 136. Massaria l. de febr. c. 27. & Marth. Sylvat. in Lex. seu pandect. licet alii per Jaser Syriacum eandem denotari malint.*

II. Idem nomen καὶ ἐξ ὀρχνῶν ab antiquis attributum fuit succo papaveris, qui ex ejusdem capitibus vulneratis exudans dictus est ὀπὸς, & ὀπίον, utpote ad stupefaciendum doloresque sistendos longè valentissimum.

Itaque, ut rectè scribit *Spigel. l. c.* in quibusdam plantis propria sunt indita herbarum succis seu liquoribus nomina: nam in papavere, qui in capitibus incisis emanat humor, opium nuncupatur; qui ex reliquis partibus, præcipue caule & foliis tulis, exprimitur, meconium, quo de paulo post.

Hinc cum opium frequentius apud veteres miscetur antidotis, opiata nomen ab ingrediente potissimum opio, improprie tribuitur electuariis. Sic opiata Salomonis describitur à *Renodæo*. Sic tales opiatas sæpe describunt autores Practici alii, quorum exempla videri possunt apud *Horstium Weckerum, Hartmannum in pract. chimiar. & alios.*

Arabibus opium dici amfiā vocalibus illis inter se commutatis, quod Aristoteles ὠπὸν ἀπὸ τῆς ὀπῆς dixit, prolixè tradit *Scaliger exerc. 175.* Mutata est hæc ipsa pronuntiatio opii in amphionem & osium. De quo *Fragosus tract. 4. med. Indor. c. 12. p. 111.* Quod Lusitani dicunt amfiā, ab Arabibus (quos Indi sequuntur) dicitur osium, deducto à Græcorum opio nomine. Pleraque enim nomina à lingua Græca acceperunt Arabes, mutando Plin. E. quod sint literæ multum affines, ut pro Pœonia, Faunia, pro opio osium. Parallela loca videri possunt apud *Gardam l. 1. Hist. arom. cap. 4.* qui modò citata verbatenus etiam tradit, & *Olearium in descript. itin. Persic. l. 5. c. 17. p. 597.* Verum nomen Arabicum est Afium (& ita in toto Oriente vocatur) i. q. Lac seu succus papaveris, & quidem nigri, id est, ὀπὸς opium vulgò cognitum. Gol. in Lex. Arab. p. 128. (2.) i. q. deliquium mentis & torporem asferre, potius Narcoticum: & hinc opium dictum esse volunt. Sed prior est habenda etymologia Græco ὁπὸ τῆς ὀπῆς & posterior significatio Narcotismi. *Castellus in Lexico. Haptaglotto p. 200. & Golius in Lexico Arab. l. 6.*

A Paulo nominatur τῆς μήκωνος ὀπὸς papaveris succus l. 5. c. 42. quod ipsum cum adjuncto subiecto apud *Galenum* & alios frequenter occurrit.

Synonymum est meconium, autoritate *Pergameni l. 1. de antidotis c. 34.* ubi papaveris liquorem & meconium & opium vocant, licet recentiores *Dioscoridem* & *Plinium* secuti ea distinguant.

Interdum simpliciter narcoticum pro opio ponitur, unde *luminare majus sect. 1. p. 22.* rectè monet: quando simpliciter ponitur narcoticum, forte vel aliud, opium debet intelligi. Sopio antiquis dictum fuisse pro opium, annotat *Rhodius in not. ad Scribon. Largum compos. 21. p. 60.* annde *Galeorum Martium de promissi. doctrin. c. 5.* apud *Catullum carm. 38.* pro sopionibus legere sopionibus tradit. Audit & lacryma papaveris Thebani.

Germanis dicitur *Mohnsaft, Oelmagenassa, Schlaffsaft*

Duplex est opium ratione collectionis. Quod

Duplex est opium, ratione collectionis. Quod scapo decussatim inciso emanat, κατ' ἐξοχὴν & proprie opium vocatur: quod verò ex capitibus & foliis ejusdem concilis, expressis, vel, ut in succo glycyrrhizæ fieri solet, decoctis colligitur, μεκωνιον, meconium proprie dicitur, & quod idem passum, si exsiccatum sit. Differentiam hanc annotavit, uti jam innuimus, ipse Dioscorides.

Qualenam nostrum hodie sit opium, quaeritur, an ὡς κατ' ἐξοχὴν λεγόμενος, succus per excellentiam dictus opium, an verò meconium?

Quod solum meconium ad nos feratur & in usu sit, plurimorum est sententia, 1. ob copiam & abundantiam. Commentator Dioscoridis Marantia docet, cum opium ad nos in tantâ feratur copiâ, verisimilius esse, non verum opium, sed potius meconium illud esse.

2. Propter parandi modum. Unde idem sentit Matthiolus, idem Scaliger, premi in usum familiarem innuens: præ premi enim nil aliud notat, quam expressionem succi tenuioris simul & crassioris. Sic & Nardius Noct. genial. 8. cap. 7. p. 578. opium vulgare confici ait ex succo expresso à totâ plantâ, soleque indurato.

3. Ob festucas & folia, quæ in ejus massâ confractâ quandoque reperiuntur, (quæ quidem nos externe eidem circumvoluta plerumque, in massâ verò ipsa non facile invenimus) quæ evincere creduntur, extractum illud esse, & torculari expressum ex capitibus & frondibus papaveris. Ol. Worm. l. 2. Musæi cap. 34. p. 228.

4. Ob additamenta, quæ genuino licet & verè parato addunt mercatores, teste Bellonio, qui observat, compingi in Natoliâ seu Asia minori opium ad pondus 3 iv. mercatores dimidium addere, & quod Venetias apportatum, 16 j. sæpe ponderare. Addunt alii, Turcas non permittere exportari verum opium, imò alii cum Cratone planè dubitant, an nostrum opium cum veterum congruat.

Sed, utur oculari hæc quàm optimè decidi debeant testimonio, & experientiâ accuratiori, si tamen licet à viribus seu posteriori concludere, videtur opium nostrum constare partim ex opio, partim ex meconio, tum propter signa, quæ opio vero adscribuntur, ardet enim, tum maxime propter vites, quibus pollet maximis, incidunt procul dubio papaverum capita, & opium eliciunt, sed partem succi expressi forteam miscunt. Cum ergo concessum sit, μεκωνιον ἀδραγνέειναι τὸ ὄπιν meconium viribus longè inferius esse opio, nostrum autem opium viribus istis omnibus, quæ opio attribuantur abunde instructum sit, necessum est, ut statuatur opium nostrum non esse purum putum meconium.

Cum verò quaeritur, an differat opium à meconio? Resp. utique, quia hoc expressione consistit ex totâ plantâ, & χυλὸς est, illud castratione & vulneratione capitum effluit, χυλὸς αἰμα. ὡς γένειν. Illud fortius, hoc ignavius operatur, unde secundum magis & minus differunt, sunt enim uti in animalibus, sic in plantis, triplicis concoctionis, velut effectus quidam, χυλὸς, χυμὸς, ὡς, ut loquitur Zvingerus apud Craton. l. 3. epist. 28. p. 241.

Viliissimum verò meconium est, teste Bontio, animadvertens, ad cap. 4. Garciae p. 42. quod Indi Orientales infimæ sortis ex succo foliorum & stolonum papaveris parant & excoquunt, & hinc soli indutandum exponunt.

Hippocrates opii expresse non meminit in scriptis suis, quæ extant. Ingreditur tamen antidotum ejusdem, descriptam à Nicol. Alexandr. 1. de compos. medicam. 278. Et ipse 1. 6. epidem. sect. 6. text. 46. meminit ὡπνιῶν soporiferi, seu, ut ex contextu patet, narcotici.

At Dioscorides & Galenus illius usum noverunt &

largè scriptis exposuerunt. Inde Arabes frequentiore illius usum in forum medicum introduxerunt, varia illo exornantes composita.

Dicitur est, confieri opium ex papavere. Hoc cum vel sativum sit, vel sylvestre, & utriusque species plures dentur, in quatuor tamen quasi summa genera distinguitur. Vid. Diosc. l. 4. c. 65.

Primum est hortense, quod Græcis Σουλανίτης fuit dictum, ites alias species sub se comprehendens, (α) oblongum habet capitulum & semen candidum. (β) Caput habet insidens demillumque, semen vero nigrum, à nonnullis τειθίτης vocatum, hoc Dioscorides sylvestre papaver appellat. Dicitur tamen & ποιδας quod ex scapo illius succus emanet lacteus. (γ) tertia species quasi magis sylvestris, multo his longior & capitula productiore.

Alium genus papaveris est erraticum, quod ποιδας vocant, quod flos ejusdem protinus defluat, seu decidat, inter segetes in arvis plurimum nascens, oblongo capite semine rufo.

Tertium est corniculatum, seu μέκων κερατῆτης, dictum, semine sub calyculo inflexo pusillo & nigro recondito.

Quartum est spumofum, seu Heracleum, ἀφραδες, totum candidum. Quibusungi potest & Spinosum, flore flavo, & semine nigro.

Opium prognoscitur ex genere primo. Hoc verò cum duplex, ratione seminis ita distinctum, detur: album & nigrum, quodnam horum fundat de se & præbeat opium, disquisitionem meretur.

Plinio l. 20. c. 18. & Avicenna lib. 2. c. 526. autoribus, non abneunt. Dioscoride l. 4. olim parabatur ex papavere nigro, quibus ad stipulantur Renodius Wormus, & alii complures, licet ille, ex albo quoque papavere vulnerato optimum haberi opium à recentioribus statui, scribat.

Alii indiscriminatim ex papaveris capitibus, cortice inciso in Thebaide & aliis locis calidioribus opium stillare asserunt.

Alii ex solo albo fieri contendunt. Retulit illustri Scaligero Nicolaus Brixianus, præfectus stabulis Regis Navarræ, qui in Ponto, Bithyniâ, Ciliciâ diu egit, opium fieri ex alio papavere; feri passim multos agros, longè lateque, præmiquæ ad usum familiarem, qui etiam Turcis ipsis sit frequentissimus. Exerc. 175.

Ad stipulantur Bellonius l. 3. obs. c. 15. ex albo papavere opium Turcas parare perhibens.

Addi his potest, quod Garcia refert, totâ Indiâ non facile provenire papaver nigrum.

Nil tamen obstat, quin dicamus, ex utrisque opium parari posse. Sed an valentius ex nigro, quàm albo, si quaeras? ex nigro valentius fieri probabile, quia hoc vaporibus excrementitiis sylvestribus, vel si mavis sulphure magis abundat.

Modum præparandi exhibet Dioscorides l. 4. c. 65. ex quo alii auctores omnes eum transcribere. Cum enim meconii faciendi primum docuisset modum, subjungit: Ὅπῳ ζῶντας δὲ δει μετὰ τὸ τὰς κεφαλὰς ἀνιμασθῆναι, περὶ γεφέν μαχαλεῖν τὴν ἀσπείριστον, ὡς μὴ εἰς τὰ ἐντὸς σπλάγχνων, ἢ ἐν πλεγμαίων δὲ τῆς καρδίας ἐπὶ ἀσπείρης ἐκτεμνῶν ἐξεπιπλῆης, ἢ δὲ τὸ φῶν τὸ δάκρυον ἐπερχόμενον δακτύλῳ εἰς μύακα. At opii faciendi ratio hæc est: Cum ros exaruerit, stellulam (quæ in summo papaveris capite visitur) cultello ita scarificare oportet, ut ne penitus intro adigatur, & à capitis lateribus per directum summam cutim incidere, & erumpentem lacrimam digito in conchulam abstergere. Addit, redeundum esse non ita multo post, & postero quoque die, repetendamque denuo condensatam ex vulnere pridem facto lacrymam. Hæc in pillâ teri jubetur, & in pastillos coacta reponi.

Cauto tamen opus esse concludit, ne liquor vestium affictu deradatur & pereat, unde retrocedendum esse monet.

foliis expositum diffunduntur, & ad lucernam accensum, minime atrâ obscurâve lucet flammâ: quod denique postquam extinctum fuerit, suam odoris vim etiamnum conservat.

Hæc meritiò ceu normam proponimus nobis ante oculos, cum reliqui autores, veteres præsertim, pauca præter hæc ipsa Dioscoridea ponant verba.

Ex recentioribus audiat *Bellonius*, qui l. c. optimum pronunciat opium, quod amarum, gustu calido, fauces incendens, flavescent, leoninorum pilorum modo.

Color in nostro opio hodiè probatur, ad aloen ferè accedens hepaticam, ex nigredine rufescens, cum frangitur, splendore quodam nitens. Nec obstat, quod *Dioscorides* candidum illud requirat, (quod cum prima specie *Garcia* albicante convenit) cum procul dubio is vel ad lactea respexerit primordia, vel recens adhuc collectum statim, prius, quàm color & aer ambiens illud alteret, innuat, latius paulò vocem candoris extendens.

Odor adest vehemens, graveolens, nauseabundus, papaveraceam redolens profapiam, uno verbo, *наростко*.

Sapor inest acris & amaricans, qualis iidem est papaveris, si gustetur, lactei liquoris. Primo gustu non omnem simul de se spargit saporem, sed sensim magis magisque illum in lingua explicat.

Consistentia compactum est, & grave, faciliè aqua, accedente simul calore, dissolvitur, non tamen instar cere & mucaginis cuiusdam lentescit. Non rarum est & friabile, non asperum, nec grumosum, sed ponderosum, densum, solidum.

Quoad alia accidentia maximè eligitur purum. Licet enim quoad extimam vestem admixta interdum habeat sedimina, si modò interiora integra sint viscera, opium pro puro habetur. Solet ut plurimum foliis propriis quasi tegi, quæ, si ad usum vocetur, faciliè removeri possunt.

Flammæ objectum opium accenditur, nec atra obscuraque nec splendida lucidaque exardet flamma, plus tamen ad obscurum vergente. Extinctum eandem vim odoris non retinet integram eodem gradu, ut prius, sed ex parte, papaveraceam videlicet. Accenditur, teste *Plinio* l. 20. c. 18. difficilius, & crebrò extinguitur.

Varia hæc inflammabilitas secundum siccitatem adjunctam, quæ iterum pro aëre externo variat.

Accensum laudanum seu extractum nostrum opii luculenta candidaque exarsit flamma, facillimè tamen seu statim extinguiibili, & terreum relinquens pulverem. Contra extractum aloes nostrum purissimum licet, ea promptitudine, ut opium, non accenditur, & plures relinquit facies, ceu cineres, ob fixum sal, & terrenum magna magis in eo abundans; minorem verò quantitatem tñ *φλογος* sulphuris.

Meconium nec accidentibus modò dictis, nec inflammabilitate cum opio, nisi perquam remoto gradu, æquiparandum est, sed particulis multis heterogeneis, aqueis præsertim, terrestribus & similibus, ab opio diversis, pollet.

II. Respectu aliorum admistorum consideratum opium, veterum testimonio sæpius fuit adulteratum, quò majori lucro cederet mercatoribus, magno cum damno humani corporis.

Dioscorides l. c. meminit variorum mangoniorum, v. g. 1. glaucii, 2. gummi, 3. succi sylvestris lactucæ, quem, quod viribus papaveri aliquatenus sit similis, nonnullos olim meconio permiscuisse confirmat l. 2. c. 166. 4. adipis, quibus omnibus variè de-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

turpatum dignoscendum benè moneri, vitari enim colorem à glaucio, quatenus aqua solutum & colatum croceum tunc reddit colorem; odorem, consistentiam viresque à reliquis, unde fiat invalidum, inodorum, pellucidum, asperius, ut hinc liceat quasi generale axioma formare, illud opium, quod supra recensita non habet, ratione coloris, odoris, saporis, consistentiæ, & consequenter, virium, pro genuino nequaquam esse habendum.

Garcias l. c. scribit, à nonnullis statui adulteratum opium Indicum, quod odorem thymaleæ referat, subinfert tamen, nec in Cambaja, nec tota India, quoad sibi visum, provenire illam plantam.

Amatus Lusitanus comm. in *Diosc.* l. c. amaritudinem in opio repertam adscribit glaucio, vel succo agrestis lactucæ, quibus plerumque adulteretur, faciente id *Dioscoride*. Si enim opio, addit, naturalis illa inesse amaritudo, dubio procul calidum esset dicendum, non verò frigidum. Tantum potest præiudiciis occupata mens.

Per microscopii adhibitionem lustratum opium, apparuit nobis, integrum quidem, ut *Σium*, vel minera ejus, striatum; fuscum cum candore, particulis tamen resinosis refectum. Derasæ verò particulæ inspectæ resinosum flavescent aliquid præ se ferebant, instar succini, resinæ pini &c.

Elementa opii quænam sint, chimici omnium optime curiosa indagant manu.

Paracelsus anatomiam opii ex professo non instituit, solummodò papaver esse anodynum vi compositionis, quàm obtinuit, perhibet *libr. 7. archidox. p. 813.*

Petrus Severinus Dantus in idea medicina philosophicæ cap. 7. p. m. 71. ita de opio: Diu multumque de opio dubitatum est, qua ratione in tanta amaritudine stupefaciendi virtus excelleret. Nos substantiarum facta separatione, Δ vel ο sum quippiam deprehendimus, planè narcoticum: Eiusdem naturæ sulphura ante contempseramus, eadem industria, in multis naturæ partibus, in Θ-lo, Θ, Slibus ferè omnibus, in Δe vulgari, in herbis plurimis. Itaque nec calori, nec frigori, nec humiditati, nec siccitati, nec tenuitati, nec crassitie, hanc opii proprietatem adscripsimus, sed tali corpori, i. e. Δri narcotico.

Unum hoc est elementum opii, detegens ipsi, unde sit narcoticum. Pergit jam & producit & alterum: Eadem separatione, anatomia, analysi, in opio sal quoddam diaphoreticum deprehendimus, quod subtili resolutione penetrando sudores movet: cuius similitudinem in multis naturæ partibus similiter demonstrare possumus.

Joh. Bapt. Helmont. in *Duumvirat.* §. 8. p. 211. deprehendisse se, scribit, in opio salem acrem sudorificum, & amarum oleum, longè ab opii odore recedens, attamen soporiferum. Quod *Tr. de lithiasi* c. 9. §. 87. p. 63. reperit, ubi sulphur amaricans, & sal acre ac sudoriferum ex opio recenset.

Conformia his sunt illa *Quercetani* l. 1. defens. c. 20. quod in papaveribus, dicentis, atque opio narcoticum est, id nihil aliud est, quàm pars quædam oleosa ac sulphurea, flammam concipiens.

Subiectum à nobis Vulcano ad torturam opium exhibuit, per O vitream illud per se ex 3. Qdo, 1. Phlegma, 2. um volatilem, seu Ole volatilem referunt, urinosum, qui cum u O li aliisque acidis commixtus effervescebat, odore restante foetido. 3. Oleum nigricans, ex quo patet vis agendi opii, mox pluribus delibanda. Inest Δ copiosum, seu substantia oleaginosa, inflammabilis, inest Δ pius, seu Θ volatile vaporosum, seu halituosum, præter aqueas & terreas passivas, & salinas fixas in Θ residuas partes. Hæc certo

T t modè

modo invicem mixta sunt elementa opii & somni effectiva, quæ fundamentum nobis præbent, de activitate ejusdem uberius differendi.

Ut vis soporifera opiatorum perspicuè & penitus pateat, paulò altius videtur arcessenda somni origo.

Tres diversos somnus habet gradus, prout vel major, vel minor, seu prout profundior, diuturnior, breviorve & placidior contingit. Hinc elegantia divisione, 1. alius est absolute naturalis, 2. alius non absolute naturalis, & 3. præter naturam. De quibus tamen non agemus h.l. nisi quantum ad scopum nostrum attinet.

Somnum naturalem omnes concedunt producere suaviores & blandas *ἀναδουμάσεις*, seu vapores primum *αισθητήριον* demulcentes, qui cum spiritibus animalibus mixti torpidos quasi illos reddunt. Ascendunt nempe à coctione probe peracta in caput vapores non ingrati, utpote primi fores ciborum, ut loquitur *Verulam. Hist. vit. & mort. p. 252.* & sic, ut loquamur cum *Agrieta l. 1. c. 97.* ob *χρηστὴν ὑγείαν* & *παύσησιν τὸν ἐγρηφάρον* succedit somnus.

Præter hanc quotidianam & naturalem somni vicissitudinem, idem variis ex causis producitur & extenditur. In genere somnus augetur ab omnibus iis, quæ poros cerebri obstruere, & ut concidant, efficere apta nata sunt, sive id positivè faciant, vaporosis scilicet effluviis, seu privativè, absumptis spirituum particulis, quæ dilatant eisdem. Sic illud fit v. g.

1. A lassitudine, nimia exercitatione, laboribus, quibus cerebrum ipsum fatigatum & siccatum, spiritibus animalibus multum absumptis, & requie simul & refectione eget, unde pro indigentia hac animali diutius protrahitur quies, & hos altior tunc somnus premit. Sic & à morbis exantlatis præsertim calidioribus, circa declinationem ferè continuò dormiunt ægri, quod sub febrili in primis continuorum abitu, cum aliis signis bonis, semper salutare observavimus.

2. A sanguinis profluviis, venæ sectione, præcipuè largiore, ut quotidiana testatur experientia, vulneribus &c. Videmus hinc admodum pronos in somnum labi ægros.

3. Ex casu, percussione, contusione capitis, maxime musculorum temporalium.

4. Ex præcedentibus vigiliis diuturnis. Sic ipse *Galenus* vidit in ægris quibusdam, qui tres vel quatuor dies vigiles egerant, difficilem excitatu somnum supervenientem, qui prorsus nocte deique perseverans magnum attulit auxilium. Idem & infantes hoc modo non unum solum, sed duos ex ordine dies absque ullo incommodo dormientes observavit, in *1. prorrh. comment. 2. aph. 29.*

5. Ab humiditate in cerebro existente copiosa, ut in hydrocephalo, hinc & infantes magis & crebrius dormiunt.

6. Ab humidis & humectantibus cum quadam energia adsumptis. Ut enim videmus, vigilias contumacissimas oriri v. g. in statu p. n. in febribus ardentibus, absumpto quasi omni sero, à nimia siccitate, in mania; in quibus morbis sanguis V. S.eductus vix micam feri sæpe exhibet; in statu etiam naturali ipso, in biliosis & temperaturis siccioribus, in senibus; ita etiam tum ab humiditate abundante in corpore, tum ab humectantibus largius propinatis subsequi somnum, & vigilias corrigi quotidie observamus. Pertinent huc emulsiones, & aquæ hypnoticæ, quæ sanè parum vel nihil de opio participant, effectum tamen omni non destituuntur, ob id ipsum, quod humectant.

Quod veteres somnum & soporosos affectus frigori adscripserint, inde reverà ortum primitus videtur,

quod ea vidissent somnum movere, quæ humectarent largius, & ut sic loquamur, substantialiter. Hæc cum simul crederent frigida, uti quidem nonnulla sunt, activæ magis qualitati, frigori, quam passivæ, humiditati id acceptum ferre voluerunt. Concedant enim, & passim id scribit *Galenus* & alii, à potu vini, & quidem modicè diluti, non meraci, non acri, qui, somnum fieri, cum tamen optimè noscent, omne vinum calefacere, & calidum esse. Hinc vinum omni quæstaqueo phlegmate orbatum, si in corpus biliosum siccum recipiatur, tantum abest, ut somnum procreet, ut potius vigilie contumacissimæ inde oriatur, quo de vide elegantissimum exemplum apud *Galenum l. 2. de loc. aff. c. ult. circa fin.*

7. A vaporosis assumptis liquidis, liberali vini, cerevisiæ, maxime liliacæ, V, tum veri, tum frumentacei potu. Spectant hinc illa *Theophrasti l. de lassit. pag. 271.* *ὁ ὕπνος μᾶλλον γίγεται ἐπὶ τῷ πλείονος ὑγρῶς & ζυμῆς, καὶ ὁπότε τοῖς μεθύουσιν.* Somnus verò multus fit à calidi & humidicopia, ut ebriis accidit. Ea enim cum particulis oleosis seu *ἄλεις*, & volatilibus conjunctam habent aquositate.

In specie à V non somnus solum profundissimus, sed & stupor maximus sequitur. Hos, qui V, aquam vitæ communiter dictam, immoderatè sumptam, primum summoperè accendi, postea artonitos stupere, ac si opium bibissent, & stertere ad mortem usque, multoties observavit *Platerus l. 1. obs. p. 17.* Vidimus hujus exemplum insigni mense Julio anno 1672. intertitanio. Hic morbi & medicamentorum pertæsus, cum ob corporis cacochymiam voto diutius affligere febris, ut illam abigeret, ante paroxysmum bibit V frumentacei ultra $\frac{3}{4}$ ix. Hinc in somnum delatus profundissimum per duodecim horas absque sensu & motu, oculis apertis decubuit, nullo modo excitabilis, cum rônchis. Noctu ad illum vocatus jussi testibus applicare lintea, oxycrato imbuta, & curâ natura se ab hac farragine (comederat enim multum unâ panem) spontaneo vomitu ex parte liberasset, magno labore vix excitato propinavimus elixir cephalicum c. *Surinoso* & ei fortius acutum. In somnum relapsus per 8. vel 10. horas adhuc dormivit. Die sequenti acida & refrigerantia dedimus, calebat enim cum summa siti, & sic à somno quidem & stupore liberabatur, febris tamen nihilominus ita hora rediit, cum per unum & alterum diem solum vi *ἄει* medicamenti vis ejus obruta esset.

8. A croco. Unde communiter mulierculæ infantibus pro corrigendis vigiliis solent supponere facculum, quo crocus fuit adservatus. Referenda hæc alia spiritiosa. Sic, doctè id observante *Simone Pauli, quadripart. Botan. par. 71. & 145.* hypnotica sæpe præposterè in senibus ad somnum provocandū præscribuntur, qui speciebus diambæ & diamboschi in forma electuarii & similibus sæpe molestas abigunt vigilias.

9. A purgantibus. Sæpissimè observavi, vigilias infantum cum clamoribus, torminibusque conjunctas, absque diarrhœa tamen, omnium felicissimè sublatas, data mechoacanna, vel gialapa. Mirum est, quàm subito obdormiverint, in quietem dati, non aliter, ac si opiatum sumpsissent. Et, ut hoc obiter addamus, notandum est, infantes facillimè ferre purgantia, & ipsa etiam correctiora emetica. Dedi sæpius infantibus duorum vel trium saltim dierum laudatum modò gialapium, ad duo, tria & quatuor grana, felicissimo cum successu, hoc modo & somnum concilians inquietis, & humores leniter educens; quod ipsum à variis symptomatibus eos præservat. Et quod majus est, certissimum est, infantes hæc ipsa purgantia respectivè & proportionaliter longè commodius & in majori dosi quàm adultos ferre.

Neque hæc eatenus solum somnum conciliant, quia vapores & humores, à quibus spiritus lacessuntur, expugnant, quæ ratio est *Thomæ Erasti Dissut. de somno §. 79.* sed & aliis de causis, quæ ex sequentibus colligi facile possunt, cum jam prolixius de iis agere non sit locus.

10. A capituluviiis, & pediluviiis. Hoc modo
 sapius cum successu jussimus ad vigilias tum alias,
 tum melancholicorum, caput lavare cum deco-
 cto lactucae, aliarumque herbarum humectan-
 tium. De pediluviiis verò videantur longè ele-
 gantissima apud *Rolsincium consult. med. lib. 2. conf.*
1. quàm sub illius ductu elaboratam ventilavimus,
& Lang. l. 2. epist. 45.

ii. Possemus hinc recensere exempla eorum, qui à vapore musti, quale ipsimet novimus, ab exhalatione ardentium prunarum, ab evaporatione calcis testoria, & stupore & morte correpti fuerunt, aliaque plura; nisi jam opinione amplius effemus digressi. Videri interim de his exempla possunt apud *Plater. l. 1. obs. p. 17. & 19. Solenandr. consil. med. sect. 5. consil. 6, p. 461 Camerar. oper. subciscr. cent. 1. c. 27. p. 137. Moeb. Epit. Instit. l. 2. pars 2. c. 6. p. 121. & alii. De caro ab odoriferis nimis producta vid. *Scribo l. 16. geograph. p. 535.**

12. Adduci possit & illi, qui in nive & intensissimo gelu lethali sopore obruuntur. Sed hæc & præcedenti paragrapho recensita, magis videntur insidians, quibus vitalibus, ejusque concernere præcedentem, vel simultaneam dissolutionem, unde cerebrum quoque eclipsin patitur, & pori ejusdem lethali sopore subsident.

Agendi autem vis foporifera ad nullam claffem ap-
pius referri poffe videtur, quàm ad effluvia vaporo-
fa, quibus icatere & abundare opium, præter alia,
preftat odor gravis, teter, penetrans, item exhalatio
vaporum fulphureorum, quibus abſumptis, nihil le-
thiferi, nihil ſomnolenti in illo remanet.

Elegans hæc in rem extat locus apud Philosophum
 I. de somno & vigil. cap. 3. ubi, ἐν ἑσῳ, inquit, ὁ πῶ-
 ρος ἀδυναμία πάσας τὰ αἰσθητὰ. ἀλλ' ἐκ τῆς πλεονεξίας
 ἀναθυμιάσεως γίνεται τὸ πάθος τῶ το διὰ μάλα γίνον-
 ται ὕπνοι διὰ τῆς θερῆς, ἀσθενος γὰρ πολὺ τότε ὑγρὴ καὶ
 σωματικῶδες ἀναφέρεται σημεῖον ὅ τῶν καὶ τὰ ὕπνωσι-
 καί. Πάντα γὰρ καρδιακὰ ποιεῖ, καὶ τὰ πρῶτα, καὶ τὰ
 βρώσι, μήκων, μανδραγόρας ἵβρος, αἶρας. Non est som-
 nus impotentia qual be- prius sensitus, sed ex evapora-
 tione circa alimentum passio fit hac. Et ideo maxime
 sunt somni a cibo, nam repente tunc multum humidi
 & corpulenti in sum fertur. Signum autem horum ὅ
 SOMNIFERA, omnia enim gravedinem capitis fa-
 ciunt, & potabilia & esculeia, ut papaver, man-
 dragora, v num, lolium.

Soporifera cuncta tuavi quadam evaporatione ad cerebrum accedente, sive per nares sive per os, sive per carotides venas & arterias, sive per gulam, quam stomachum vocant, somnum movent, inquit *Spigel. Hag. l. 2. cap. 9.*

Ab opio lumpio caput aliquandiu aggravatur, manifeste indicio, ab insigni fermentandi, seu in halius vertendi opii vi plurimum horum se spirituum animalium viis infusasse, ac eas aliqua ex parte oppilasse, ut loquamar cum *Wepfero Tr. de apopl.* p. 252.

Modus itaque hic agendi opii consistit in *ava* *du-*
piacere ejusmodi, quæ porulos cerebri à vigilis ni-
mijs apertos & dilatatos obstruit, spirituum anima-
lium effluem influxum impedit, eodem quasi coa-
gulat, & addentat, adeoque suavissimam corpori
conciilat quietem. Confer *Hippocratem l. de flatib.*
c. 20. l. 8. seq.

Neque interim negamus, nervos ipsos stomachi-
Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I L.

cos statim in se una recipere vaporosum illud. Non
intelligimus vapores ejusmodi crassos, qui in caput
ex ventriculo immediate ferantur, & tum demum
operationem suam exerant, sed blandam spirituum li-
gationem, quam nervi stomachici & ductus alii, cum
chylo, communes statim cum capite & sanguine com-
municant. Hinc mirum non est, etiam nondum egres-
so e ventriculo opiato, effectum sentiri. Ipse sic cibus
à famelico assumptus statim famem sistit, cum vix in
chylum mutandus ab ore assumptus est. Offerret se
hoc loco latissimus campus, de hoc ipso modo distri-
butionis chyli e ventriculo, & inde resultantis refe-
ctionis pluribus differendi, sed ne extra oleas vage-
mur, aliò id discutiendum differimus, hinc verò de
opiatis solum aspiciemus.

Neque moramur nonnullos, ut *Helmontium*, *Duum-*
vir. §. 6. *seq.* p. 110. & *Grembsum* l. 1. c. 7. §. 7. qui negant, ob
effluvia vaporosa agere opiata, quoniam $\frac{4}{5}$ B. li anodynū
fixum sit, Concessum itaq; est à posteriori, dependere
ἀνάγκη αὖ αἷμα animalium libero in & exitu agi-
li cessante, sive obstruantur, densentur, constipentur, &
quali coagulentur & figantur: sive quovis modo
meatu seu pori cerebri blandè claudantur.

Sed plus ultra! Nondum satisfactum est curiositati.
Queramus porro, & insistamus viâ, donec ad exoptatam
tam veritatis metam deur accessus.

Eleganter *Helmontius* virtutem somniferam ad-
scribit phantasis formarum mixti, & proprietates
eiusmodi formales manare à phantasis formarum
trium principiorum, Salis, Sulphuris, & Æli. de ma-
gnēt. vuln. curat. §. 153.

Negari nequit, qualitatem seu vim illam anody-
nam & itupetactivam *τηνών τῆς μίξεως, modum mix-*
tionis sequi, in qua mixtione elementa non inodō
æqualiter vel inæqualiter miscentur, sed etiam pro
materie secundæ dispositione variè patiuntur &
agunt.

Exposita sunt suprà elementa opii, & per Vulcanum in aprium collocata; Eminere in eo dictum est inprimis Δ copiosum, & \ominus volatile seu Σ ium, adeoque hæc quali à priori, ita e habere, quàm certissime demonstratum est, A posteriori tria potissimum idem evincunt:

Primum odor. Hunc sulphuri unice deberi, in confesso est: partium enim Δ earum effluvia Δ alium op^e volatilata & subtilizata intervenu aeris ad nervos olfactorios delata odorem efficiunt, quorum mixtio ut variat, ita diversi generis exurgere odores necesse est.

Deinde *sapor amarus*, qui eosdem agnoscit natales; salino adscriptus principio, primario puta, & plerumque in iis videndus est, ubi cum Δ & Quo penitus terra commixta est.

Tertio inflammabilitas, quam ad Δ referendam, ex vulgatissimo axioma Paracelsico: *quicquid ardet, sulphur est*, palam est.

Hinc quaestio exoritur, an vis narcotica Δ i prima-
rio, an O io seu sali volatili sit adscribenda, praesuppo-
sito hoc, & reliquorum quodvis symbolam tuam
conferre.

Argui posset pro sale volatili & activitas, agit enim in minima quantitate, & virtutem suam quam occisivam in corpus vibrat, 2. quia figitur acidis, quæ ipsam in genere soporosis affectibus profundit. 3. quia in distillatione, non minus quam $\frac{1}{4}$, apparet, & oculotenus se sistit.

Verum enim verò plurima sunt, ex quibus sal volatile copiosum educi potest, & quorum vires ab illo ipse Oleo volatili dependere creduntur, quæ tamen longe diversos ab opio effectus in corpore nostrædunt. Nunquam talis effectus à sale volatili antiscorbuticorum, quæ id eminenter possident, observa-

tus est; nemo id à volatilibus cephalicis unquam evenire notavit. Quin contrarium potius visum est. Observavimus in quamplurimis scorbuticis volatilia ejusmodi varia symptomata potius excitasse, nisi in quibus fixi humores volatilia indicant. Et, quod palmarium est, vidimus in soporiferis affectibus longè præsentius se gerere urinosa volatilia, quàm ulla alia medicamenta.

Verius ergò & rectius narcoticum illud omne in Δ re principaliter quæritur. Plerique chimici sulphur narcoticum pro genuina causa habuerunt hætenus, neque id sine causa, modò rectè explicetur res, alias enim paulò aliud vocabulum, quam occulta qualitas obtruditur, res verò nullo modo explicatur.

Constant nimirum & abundant non minus Δ re, v.g. castoreum, & camphora, quæ tamen vigilias potius quàm somnum inducunt, unde opii genuina antidota habentur, ut infra patebit; in quo ergò consistat sulphur hoc narcoticum, disquirendum est.

Nobis, ut, quæ hæreat sententia, explicemus, videtur opium constare Δ RE blando, *FACILE RESOLUBILI*, idque potissimum, quod in quolibet menstruo solvitur, absque deperditione saporis, & consequenter virium, hinc acidis, aqueis, & oleosis seu oleosis extrahi potest, ipsique salinis. Ita pariter in corpore nostro omnibus aut plurimis humoribus lubenter obsecundat, inprimis verò serosis, aqueis.

Notum est ex Chimicis, quodlibet mixtum proprium sibi deposcere menstruum, præcipuè verò præ omnibus Δ ea. Sulphur commune nunquam solvitur aqueis, nunquam obsecundat, & vincitur acidis, nec ipsi cedit aquæ forti, aliisque stygiis, licet salinis fixis intimius remixtum sit particulis. Nullum oleum cum acido, vel aqueo per se combinatur; nullum sulphureum, neque spirituosum Δ ea æquè parent. At opium, ut suo loco latius docebitur, omnia æquè amat menstrua.

Hoc ergò opiatum Δ in corpore resolutum spiritus vaporosos & sulphureos cum sanguine, & cerebro communicat, qui cerebri conceptacula opplantes, ut loquitur *Kircherus de peste* f. 3. c. 3. p. 103, cerebri ventriculos opplentes, juxta *Quercetani Pharmac. dogm. cap. 24.* seu poros potius, secundum *Cartesium*, soporem inducit.

Combinatur hoc cum sulphure vitali nostro, & facillima resolutione evaporationes halituosas suas cum ipso jungit. Sal sanguinis volatile cum sero resolutionem hanc sulphuris multum adjuvat, hinc particulis suis viscidis, oleosis, balsamicis poros cerebri & nervorum leniter obstruit, sanguinem verò blandè concentrat, adeoque somnum efficit. Opium, quod *Theophrastus* de odoribus dicit l. de odor. διὰ τὴν καφὸτητα, μάλιστα δύνειται ἢ συμπληρεῖ τὰς πόρας, ὥστε ἡ αἰσθησις καταλημμένη, ἢ πλήρης ἔσται, κείναι ἀδυνατεῖ. Ob levitatem (sulphuris cum sero juncti) penitus pervadit, porosque obsidet, ut nimirum sensus occupatus & oppletus judicare non possit.

Ubi sulphur exuperat \ominus volatile, & in se est resolubile, opio effectus consimiles deprehuntur in aliis. Ita ∇ , vinum ipsum, crocus, carbonum vapor & alia supra delibata, eodem Δ e resolubili pollent, unde effectus edunt quàm simillimos. Contra verò si abundet in mixtis \ominus volatile præsulphure, & sulphur resolubile non sit, sive sua natura, sive ob defectum laticis in sanguine, vigilias potius inducunt, ut exemplo camphoræ & castorei inprimis docuimus. Habent hæc copiosum sulphur, sed non resolubile, unde evaporationes quidem faciunt, sed non halituosas blandas, viscidas, sed subriles penetrantes, meatus & poros aperiendi potius, quàm occludendi vi præditas.

Imò ipsum opium, si effectus ejus contrarii & velut extraordinarii nonnunquam spectentur, idem evincit. Verissimum est, & in praxi tota die occurrunt casus, ubi exhibitum opium, etiam in magna satis quantitate, tantum abest, ut somnum inducat, ut potius vigilias augeat. Siccat enim magis, nisi humor aqueus serosus sufficiens sit in sanguine, qui ipsum possit resolvere, qualia subiecta supra nominavimus, unde necessarium colligimus axioma, opium quidem omnibus facillè solvitur, ut verò somnum conciliet, opus esse sufficienti humore, qui ipsum & resolvat, & didat. Unde nobis certò ex praxi & creberrima observatione innotuit: *Opium non operari, nisi serum sit in sanguine proportionatum.* Ut serum est $\delta\chi\mu\alpha\ \tau\acute{\iota}\varsigma\ \tau\epsilon\phi\alpha\lambda\acute{\iota}\varsigma$, *alimenti vehiculum*; ita & medicamenti tum hujus, tum aliorum: quo vectore si destituatur sanguis difficillimè obtinetur sopor, sin debito modo abundet, facillimè.

Videas hic mirum quantum sæpe peccari. Dentur in istis casibus humectantia, & quidem substantiæ, vel cum his misceantur opiata, & voto damnavit æger juxta ac medicus.

Patet hinc, quibus opium magis conveniat, & quibus magis somnum moveat; ut enim id denique repetamus, qui serosis abundant humoribus, seu in statu s. n. s. p. n. ab opio eminentiores perferunt vires, unde datum hoc hisce facillè somnum affert. Contra qui biliosiores seu secundum naturam, seu præter naturam, minus subiguntur, quo de & inferius dabitur dicendi locus.

Equidem, ut verum fateamur, nullum vidimus affectum soporosum, verè talem, ubi non adfuerit simul calor p. n. cujus unicū solū recensebimus exemplum. Villici cujusdam filia anno 1671. tempore autumnali per unam & alteram septimanam prius torpore, lassitudine & somnolentia correpta, hinc & aliquali diarrhœa, horruit, hinc calore continuo laborabat, cum perpetuo somno, ut ægerrime excitari solū pro cibo vel potu assumendo potuerit, idque per integros fere decem dies duravit. Obviam itum febris alterantibus & cordialibus, mixtis acidiusculis. Nil verò magis sopori debellando profuit, quàm \ominus *ci volatile cum ag. lil. convall. ∇ uosa ritè administratus internè. Externè inunximus nares, tempora, & præcordia, oleo succini, & camphoræ, cum pinguedine castorei, & in sacculo appendimus camphoram, nigellam & castoreum, quibus probè applicatis præter omnium spem evasit.

Quin paralyfin universalem, omnium consensu affectum frigidum notavimus semper fere antecessisse calorem, cum torpore. Hinc licet obiter asserere, quodcumque somnus copiosior adest, ibi sanguinis Δ a sero copiosiori resolutum esse, & hinc poros cerebri obstrui, ita quidem, ut ∇ ius seu sal volatile activitatis humanæ, seu vitalitatis instrumentum a Δ re superetur. Ubi verò acidis v. g. congregatio & præcipitatio horum fit, uti mechanica demonstratione in chimicis notissimum est, sulphura à salibus liquidis resoluta, acidis præcipitari; vel urinosa propinata cum morbo conflant, ut sulphureæ partes iterum sui fiant juris, & obtusum \ominus volatile sibi restituatur; vel sulphura non solubilia, ut camph. castoreum, nigella, sanguinis sulphur adaugeant, ut vinci & subigi tam facillè non possit, omnia iterum vegetantur in œconomia animali, & splendent.

Observavimus sæpius, soporosos & apoplecticos magis excitari urinosos, quàm aromaticis, vel sulphureis, tum internè, tum externè applicatis, quo casu vel solū \ominus * cum in quodcumque lixivium infusum & naribus obiectum feliciter se gessit.

Objectum quidem sæpius fuit chemicis, quod narcotica virtutis in opio causam Δ ri adscripserint, 1. quod id nihil sit aliud, quàm dicere, commune esse particulare, & viceversa, 2. quod in aliis maximam partem Δ eis id non deprehendatur, vid. *Gregor. Martin. Tr. contr. 11. cap. de consens. & dissens. Sennertus*, p. 69. Quis ergo hinc evadat doctior? quis animus solidæ scientiæ cupidus saturetur? quis non sentiat, sibi fucum fieri petitione principii & verba dari? inquit *idem*, *loc. p. 151*. Gemina his sunt illa *Thoma Erasti disp. contr. Paracelsi*, p. 2. p. 81. ubi, quid enim, quæso Te, inquit, in causa est, ut oleosa pars in opio stupefaciat, non item, quæ in aliis rebus inest? Si ad mixtionem partium referant, eodem recident, ut plura, quæ ibi acriter contra assertum hoc disputat, non allegemus. Sed ex dictis jam facile lis dirimi potest, modò ipsi ad meliorem inclinare velint mentem.

Neque hoc pacto assentium merentur illa, quæ *Glückradus not. ad tyroc. chim. l. 2. c. 6. p. 162*. scribit, narcotizantum crasso & feculento Δ ri competere, non item illi, quod per anatomiam efflatam emergit purum & spirituosum.

Memorandum hoc loco est *Willisi*, viri celeberrimi, de opiatorum virtute iudicium. Hic libro, *pharmaceutice rationalis* inscripto *sect. 7. cap. 1. p. 285. seq.* statuit, opiata constare Δ e & fœtido, hoc est, Δ e, cum Oleo fixo & materia terrestri simul combinatis, & ad effertationem evectis, adeoque vires suas exercere, spiritus animales perimendo, profligando, debellando, consternendo, & extinguendo, idque, si in iusta dosi sumantur, quibusdam solum accidere, quasi in prima acie collocatis, unde cæteri consternati aut interius compulsi, aut saltem ab effluxu in partes nervosas solito revocati pensa sua derelinquant aut aliquantisper remittant; sin verò in magna nimis dosi dentur, eosdem planè, prorsus & omninò pessundare. Addit, maximè eadem adversari spiritibus animalibus, eorumque extinctoria seu potius VENENA esse, venenare ergo eosdem & in maxima copia destruere; sanguinem tamen non vitare, nec huic ipsi simul venenosas esse opii particulas, sed potius alexiterias, immiscibiles nihilominus & heterogeneas prorsus, nec assimilari eidem, sed expelli quanto citius è sanguinis confinio.

Assentiri his potest, qui vult, nos mentem nostram satis explicuimus, & per totum hoc opus exposuimus, neque jam nostrum est *ἀντιδρῶν* in alterius viri docti præjudicium aggredi sed id omne cordato lectori committimus. Interim certum est, nimia opiatorum dosi pericula quidem vitæ imminere, sed id ipsum non tam fieri extinctione spirituum, quam obnubilatione, ut sui juris amplius non sint, adeoque functionibus sibi demandatis præesse nequeant, ceu id ipsum exemplo V, copiosius hausti, aliorumque similium est quàm evidentissimum.

Claudat agmen opinio, quam fovet *Anton. le Grand histor. natur. part. 7. artic. 9. p. 369*. narcoticam vim papaveris aliorumque adscribens *uliginoso* humori, quo huiusmodi plantæ abundant, unde oppleti choroidis plexus pori spiritus à corde venientes ad cerebrum transmittere nequeant, adeoque somnifera statuit humectando & refrigerando agere. Sed uti de humectantibus *ἐπερὴν* id verum est, ita vix illud licebit applicare ad opium.

Quod *Galenus* ait *l. 11. meth. medend. c. 11*. difficile esse, ejusmodi aliquod auxilium invenisse, quod citrullam noxam magnificè profit, illud etiam in opio vel maximè locum habet.

Magnificè prodest, si ritè præparatum sit, & circumspectè *Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I I.*

cumstantiæ in dosi, indicationibus &c. observentur. Nocet, si temeratio & vano ausu, præcipuè crudum & ut vocant, incorrectum porrigatur, non absque vitæ instantaneo detrimento.

Utut enim vis major quibusdam simplicibus in sit, quàm eorum essentia, approbatore *Helmont. in tribus princip. chim.* qui etiam *pharm. ac dispens. nov. p. 458*. ait: Credo simplicia in sua simplicitate esse sufficientia pro sanatione omnium morborum; nihilominus tamen repagula, ex sententia chemicorum, demenda, auferenda noxia, addenda corrigentia, ut omnibus modis ceu potestate totali medicamen voto nos damnet.

CORRECTIO opii occurrit duplex: 1. ut adsumendi, 2. ut adsumpti.

De priori si quærat *an corrigendum sit opium?* 7. quod sic, probatione desumpta, tum *ῥῶτον τῶν ἐξωδῶν* autoritate, tum *ῥῶτον τῶν ἐσωδῶν*, ratione ac experientia.

Autoritas adest omnium adeò medicorum, veterum & recentiorum, ut superfluum ducamus, adducere testimonia.

Correctionem inprimis urgent *Chimici*, *παύει γὰρ τὸν ὄλον μίμνησιν, ποτὶ δὲ λυγροί*, pausa enim immixta esse bona, multa verò noxia, unde homogenea ab heterogeneis separanda censent.

Ratio subsequitur. Cum redundant in opio halitus & excrementitiæ particulae, quæ chemicis lentum & fœtidum sulphur audiunt, utique correctionem aliquam exposcere videtur. *Experientia* idem confirmat, testata, non æquè proficuum eventum ex incauto & incorrecto usu ejus promanasse. *Felix*, ait *Helmont judicium*, §. 64. æger, cujus auxiliator medicus novit lethalia è papavere separare, retento auxilio. Alioqui sanè nocuum cum proficuo simul assumuntur, unumque impedit alterius profectum.

2. *Quid & quomodo corrigendum?* Aliter corrigunt *Galenici*, aliter *chemici*. Veteres, cū frigidum in quarto gradu statuerent, calidis id præstare annitebantur, pipere, zingibere &c. Succo papaveris admiscebant euphorbiū, mandragoram, aliasq; herbas conclamati frigoris pipere temperabant, *Macr. l. 7. Saturn. c. 5. p. 522*.

Hinc in compositionibus illa opiatis perpetuò addebant, duplici de causa, 1. uti jam innuimus, quod frigiditatem hanc intensam corrigerent, obtunderent, adeoque ne corpori humano adeò nocere possent, efficerent. 2. ut vires suas mediantibus calidis penitus in dolentes partes vibrarent. Utrumque coniungit & eleganter declarat *Pergamenus l. 8. de comp. med. tot. c. 4*. ubi: quò stupefactio non cum magno detrimento fiat (statuit verò narcotica frigida) & ut per altum dolentium corporum frigiditas penetraret, calefacientia miscentur, quæ refrigerantium stupefactionem deducere possunt, cum illa ipsa per se tardi transitus existant.

In specie verò *idem l. 8. loc. cit. c. 3*. scribit, oppositum ferè opio facultate esse castoreum. Sed tum hoc ipso loco, tum *l. 3. precedente c. 8*. manifestis verbis innuit, castoreum opio admixtum esse ab *Apolonio & Asclepiade*, ut videlicet vehementiam refrigerandi facultatis in eo obtundat. Hæc hypothesis cum hodiè per suprà dicta sit falsa deprehensa, non necessum est, ea de causa correctorio hoc uti, nisi forte dicere velimus, castorei vires in affectibus soporosis tollendis esse notissimas, adeoque etiam soporiferis corrigendis nō destitui virtute singulari. Sed quantum de eo accedit, tantū virtutibus opii decedit.

Idem castoreum *Abuali l. 4. fen. 6. tr. 1. sum. 3. c. 1*. opio theriacam, quod succurrat corruptioni opii, & nocuimento & veneno ejus *l. 3. fen. 13. Tract. 5. c. 13. Guainerius de venen. cap. 9*. opii bezoar adpellant.

Casp. Hoffmannus, animadvertit in *Montan c. 7. §. 166 p. 81*. ejus antidotum dicit esse malvaticum, quod ipsum jam *Pergamenus* scripserat *l. 3. de simpl. med.*



It 3 *facile*

facult. c. 19. ubi vinum calidum ebibitum, sed vetus, generosum, polyphorum, præsentissimum opio sumpto remedium esse & docet, & experimento confirmat. Sic etiam *Rondeletius*, *Grevinus*, *Conrad. Kuhn-rath*, & alii alexipharmacum opii ajunt esse vinum, & præsertim meracum, generosum, unde in compositionibus opiatis dissolvi jubetur eodem, seu solutivo & correctivo, itidem ob hypothesin, opium esse frigidum & siccum. Quo de observationem habet *Christoph. à Costa l. arom. p. 236.* ubi Turchus Adensis in penuria opii vinum sibi & sociis dandum petiit, aliàs ne biduum quidem supervicturos; id quod tamen ob analogiam potius, calefaciendi & roborandi, quam opium obtundendi, factum esse facile patet. Et vinum ipsum ex hac opinione adsumpto magis, quam adsumendo opio prodest.

Prædicantur & alia opii corrigentia ab autoribus. Ita præter castoreum corrigi id scribit croco *Fernel. l. 4. meth. med. c. 7.* myrrha idem *l. 6. meth. med. c. 5.* salibus *Dioscorides l. 5. c. 126. circa fin.* ubi contra haustum opium & fungos salia cum oxymelite bibuntur; unde & inter recentiores *Helmontius*, sopores tam morbosos, quam artificiales seu opiatorum optimè debellari per lixiviam ceræ, *jus duum vir. §. 31. p. m. 188.*

Hæc potissima sunt, quibus opii tum malignitatem, tum soporem ab eo incauto usu, & dosi excedente, nimis longum inductum corrigere medici sunt soliti.


Jungi his queunt illa, quæ in affectibus soporosis à Practicis adhibentur, inter quæ non immeritò locum tuetur suum camphora.

Nos in ejusmodi casibus essentiam castorei, elixir nostrum cephalicum cum  ci,  um formicarum volatilem, potissimum laudamus, quæ tum externè, tum internè, non omittis quandoque acidis, profuisse novimus. Acida enim sulphura tum salium, tum alia, obtundunt, præcipitant, invertuntque, ac exhalationem & resolutionem remorantur, quod infinitis experimentis chemicis demonstrari posset, si id hujus esset loci. Nec vomitoria pro re nata omittenda sunt, ut quasi veste quodam extrudant, quicquid in ventriculo hærens naturam gravat.

Si nimium opii præbium humores adeò incrassaverit, ut alvus officii sui obliviscatur, *Platerus* leniens adsumendum suadet. *Walens* contra *meth. medend. p. 154.* optimum judicat, si validum exhibeatur purgans, ut attenuentur humores incrassati; nec est, *inquit*, quod superpurgationem timeas, nunquam enim illa in hoc casu à pharmacis fit. Refert idem, binos medicos de causa mortis accusatos: alterum, quod valido purgante superpurgationem excitaverit, alterum, quod hanc sistere volens exhibuerit narcoticum, agro mox mortuo.

Nos, si ab adhibitis opiatis alvus officii sui obliviscatur, in praxi nostra feliciter solemus interponere pilulas aloeticas nostras, quas eodem cum opio menstruo paramus.

Bacsius l. 7. de thermis c. 23. p. 474. usum balnei aquarum temperatarum ad eos commendat, qui ex opio adsumpto gravi sopore submersi, & quasi commortui jacent, ingenti pruritu interdum cruciari soliti. Eadem etiam commendat *Grevinus l. 2. de venen. cap. 16. pag. 208.* ob maximam frigiditatem medicamentis, quæ cutim densissimam reddidit, & illarum partium sanguinem in grumum ferè redegit, aut certè ob erosionem, quam excitare potuit. Balnea cum sint calida & humida, cutim extendunt, partes refrigeratas & exsiccatas corroborant, & per insensibilem transpirationem exhalare faciunt id, quod inter carnem & cutim relinqui potuit, sanguinemque pristino vigo i suo restituunt. Locum hæc habent, si ad sanum sensum redigantur.

Notissima in scholis chemicorum est correctio opii per ignis mediatum contactum, quæ sit leni  cta fœtidi, *Φλογισ*, immaturi, evaporatione, & creditur hoc modo cogi, ut maleficium quod in se habet, exsudet. Hermetici enim quamplurimi, è quibus nominamus *Quercetanus*, *Hartmannus*, *Brendellius*, *Zuvelferus*, alique moderni id corrigunt totione super lamina ferrea seu patella. Scinditur in minuta frustula opium, & in laminam, orbemve appositè collocantur segmenta, ite se tamen arctius attingant invicem particulae, subdito moderato carbonum igne sensim exhalare finitur sulphur dictum vaporosum, donec odor papaveraceus teter exspirat, & in pulverem facile teri possit, ad siccitatem instar aloes redactum. Expectant quidam, donec aromaticum de se spiret odorem, quem inde sibi pollicentur.

Inprimis celeberrimus *Zuvelferus append. ad animadvers. p. 79.* opium *inquit*, per exhalationem narcotici sui spiritus super patellam ferream igne leni paratum, laudano cuiusque ferè esse æquiparandum. Nonnulli ad præscriptum *Severini in vipera Pythia part. 3. c. 6. p. 460.* simul tantillum succi arantiorum acerbiorum inspergunt, & ferro subinde eoque versant, dum absumpto pauxillo & refrigerato videas, num ita induruerit, ut pulverisari possit, cavendo sedulò, ne amburatur.

Alii totionem hanc eò usque procrastinant, ut planè calcinetur opium, cineresque propinant, qui tamen omnes penitus vires amiserunt, avolantibus narcoticis & soporiferis particulis omnibus, & essentia per ignem destructa.

Mirum enim est, quod autores nonnulli liberare opium contendunt à sulphure suo narcotico, cum tamen illam ipsam intendunt, quærantque & expectent virtutem ex opio. Non castrandum est opium virtute narcotica, non sulphur narcoticum separandum, aliàs evanidum fiet & nullarum virtutum. Sed heterogenea sunt semovenda. Nam opium si torreatur supra carbones, unde flamma exciteretur, quomodo ero certus, quod non vis illis illa, quæ operationem narcoticam efficere debet, torrefactione pereat, & saltem noxa abeat; hac illæsa, ut illa *M. Meieri de septim. mont. Planet. cap. 1. part. 69.* huc applicamus, ubi & mirandum esse, ait, quosdam promittere horum à se præparatorum medicamentorum, aliàs fortissimorum, doses duplices aut triplices, imò ut pro saccharo tuto assumi possint absque noxa, cum tamen ab innatis virtutibus multum spoliatur & destruat. &c.

Excusari tamen posse videntur, si distinguatur inter sulphur hoc anodynum, quod ab effectu est & dicitur narcoticum. Duplex enim est hoc ipsum, ut innuit *Quercetanus tetrad. cap. affect. cap. 16. p. 213.* aliud putidum ac narcoticum, aliud mitigativum. Sed si rem penitus introspeciamus, differunt solum magnitudine, seu gradibus, jam magis & minus non variant speciem. Excessivum illud sylvestre & capiti grave sulphur, ut in terminis loquendi maneamus, separatur, ne nimia evaporatione noceat cerebro & spiritibus animalibus, & ad eum gradum redigendum, qui temperamento animalis hujus œconomia sit appropriatus, unde cum opium narcotico præ nimium tinctum sit & infectum, eatenus correctio quædam & concedi potest & necessaria videtur, de qua tamen jam plura. Sed cavendum est, ne, dum vitia vitantur, totione in contrarium fiat transitus, & virtus una pereat.

Hinc non solum ex recentioribus *Poterius*, Chemicus non infimi subellii, hoc suffumigatum laudatum minus virum obtinere observavit, unde tantum probat *V. pharmacop. spagy. p. m. 251.* Sed & dudum id

id culpavit *Galenus* (neque enim præparatio hæc nova est) qui de hac ipsa l. 3. de compos. med. vol. 10. cap. 8. prolixè agit. Ibi enim disquirens, quàm ob rem non modò *Apollonius*, sed alii etiam quidam celebres viri opium (loquitur simul etiam de castoreo, quod verò hujus loci non est) torrefacere jufferint, duas potissimum ob causas illud factum scribit, 1. quò vehementia virium ipsius minueretur. 2. ob ejusdem malignitatem. His fusius responderet, & binis vicibus repetit, & inculcat, torrefactum hoc modo opium efficaciam perdere, & id se sæpius esse expertum.

Ex hoc loco quoque *Bernhardus Dessen. Cronenburg. l. 1. de compos. medic. p. 8.* torrefactionem opii damnat.

Mentionem hujus præparationis facit & *Abuali l. 2. tr. 2. cap. 526.* quam subtilem videtur affirmare, opium, inquit, affatur super laminam ferream ignitam, & fit rubeum.

Consultius existimamus, aut omittere hanc præparationem, aut levissimo saltem calore ita tractare medicamentum, ne vires perdamus, quas tam sollicitè quærimus, idque eò magis, quod ipsimet hujus correctionis patroni fatentur, dicto modo torrefactum opium vix flammam concipere, manifesto indicio, illud sulphure, adeoque viribus narcoticis exutum esse.

Par ratio est, si quis instar scammonii sulphurati fumo sulphuris id præparare sustineat, ut præter calorem & acor accedens majus pondus addat correctioni. Veremur enim, ne tantum virtutis amittat, quantum aciditatis admittit.

Si fateri volumus, quod res est, correctio opii consistit in ejus depuratione, quod habet commune cum aliis, v. g. attende aloem, scammonium, ladanum; Hæc si cruda quæ intrò dare velit, uti olim illud totò die factum est, tormina, & quæ ab aloe præsertim & scammonio timentur incommoda alia, consequi, facile colliget is, qui hæc præparavit manu suâ, vel saltem præparari vidit. Remanent scilicet longè magis, quàm in opio ipso arenosa & aliæ excrementitiæ partes, quæ corpori nocent. Et id certissimum habemus, nunquam ab opio ulla timenda esse incommoda, si benè depuratum sit.

Depuratio fit solutione & separatione. Solutione, mediante calore & digestionem facta, pars instar spumæ ad superficiem fertur, pars in fundo subsidet, media purior & desiderata est, prior verò utraque per lachryas, vel filtrum separari potest, & remanet, optima verò perfuit & seorsim colligitur. Hinc de accommodo & appropriato genuino menstruo solliciti sumus, necesse est.

Uc verò sub tribus solventium tota familia continetur generibus, & menstrua sunt vel aquea, vel sulphurea, vel salinagita & triplex hoc opium extrahendi datur menstruum.

Frequentius hætenus in usu fuere menstrua spiritiosa & acida, disceptantibus tamen inter se autoribus, quænam harum præparatio sit melior.

Sub acido militat, acetum tum simplex, tum destillatum, succus citri, cydoniorum, limonum, & tum Quis sulphureum, quo opium extraxit B. D. Ausfeld. teste *Nob. D. D. Vollgnad nostro, Diss. de Hemicrania*, spiritus S. O. li, aliaque, quæ nuper *exercitatione de menstruis* latius exposuimus.

Hinc alii solum acer, superfundunt aliquoties, exiccant iterum & pulverisant, cujus loco iterum alii unum S. li summè rectificatum, alii succum citri affundunt, sæpeque irrorant & exiccant.

Apud Indos, teste *Bontio l. 2. de meth. med. Indor. cap. 4. p. 10.* etiam per acetum corrigitur, ubi utilissimum & ipsi laudatissimum extractum croci Indici,

per quem intelligit curcumam, seu potius laudanum opiatum describit.

Alii opio pulverisato affundunt acetum, destillant per XX igne forti, donec opium in fundo ad summam siccitatem perveniat, idque cohobant tertiat vice.

Plerique verò, qui acida eligunt, opium grosso modo conscindunt, affundunt & ad aliquot digitorum eminentiam, digerunt, filtrant, & leniter inspissant in extracti formam. Inter hos primarios nominamus *Quercetanus, Horstius, Sylvius, Langius*, &c. Sunt tamen, qui opium leniter torrefaciunt prius, quàm illud affuso aceto destillato extrahant. *Glauberus furn. Philos. part. 3. c. 24. p. 56.* recludit opii 3. v. usque Elis. 3. 3. & 7 purgati 3. hinc extrahit cum V.

Elegans compositio est Chimiatri excellentissimi *Dn. D. Joelis Langelotti*, quam primò ad *Bartholinum cent. 3. epist. 15. p. 188.* & hinc longe fusius ad *Academiam curiosam*, descripsit, vid. *Ann. III. Ephemerid. Germanæ obs. 59. p. 100.* ubi sub titulo novæ opium præparationis veræque ejus essentia describitur. Fit 1. ex opii Thebaici 3. succi cydoniorum 3. x. S. tri puri & sicci 3. 2. addendo, cum per diem unum & alterum stetit, sacchari 3. v. 3. Blando calore promoveretur fermentatio. 4. Hinc medius purior liquor, à superiori spumosa, & inferiori terrestri parte cautè separatus, filtratus ad mellaginem inspissatur. 5. Denique V alcohol hæc dissolvitur, digeritur, & ad justam consistentiam abstrahendo servanda vera opii essentia.

Ad salinum menstruum pertinet & lixivum. Cum enim ex supra dicta Helmontiana hypothese sopores nimii per lixiva optimè debellantur, & *Elia Dioscorides* contra opium commendet, hinc multi credunt, opium optimè corrigi & extrahi posse cum lixiviosis v. g. 7 eis. Sic *Glauberus* per alkalest mitescere ait, *oper. mineral. p. 1. p. 61. D. D. Ettmüllerus in chirurgia infusoria c. 3. conclus. 2. §. 7.* Sic alkali fixo in primis præ cum terebinthina debitam opii fieri per digestionem correctionem, scribit, & fieri sic opium tutum & mirabile in magnis quoque morbis remedium. Sic cum tinctura 7 ri etiam id ipsum non infelicitè quidam moluntur, unde consunt essentia elegantes & splendide.

Rationes, quibus acidorum extrahentium patroni utuntur, potissimæ sunt. 1. quod acetum venenis adversetur, & in hyosciami opique adsumptorum correctione optimè se gerat, quàm & contra serpentum etiam venenatissimorum ictus faciat, teste *Celso, l. 6. cap. 27. 2.* acrimoniam & caliditatem opii corrigit. Ut mitescant S. ia volatilia ab acidis & quasi fixantur, ut rad x aric, aceto præparata non amplius linguam ita mordicat, sinapi, raphanus rusticanus, nasturtium & alia cum aceto apposita mitescunt, ita & Elis volatilis opii fixationem quàm optimè præstat, in quo correctionem ejus genuinam consistere credunt. Contra ea V tantum 4 extrahere, S verò intactum relinquere (quod pro extrahendis Slibus particulas non aptas obtineat) acetum verò utrumque, & malignitatem insinuat edomare, perhibent.

Eadem ratio est succorum aliorum è vegetabili regno acidorum. Accedit 3. quod succus cydoniorum acidaque recensita, stomachum, cui opata non æquæ profunt, confortent. Præparatio hæc cum succo cydoniorum Helmontiana quoque est, quam *Helmontius* filius eadem obtinere virtutes, cum ea, quæ fieret per Alcahest, & medicum felicem, qui opium ita præpareret, asseruit apud *Tachenium epist. de liq. alcahest. pag. 27.*

Nos, ut breviter in nostram exponamus, in genere quidem libenter concedimus, ab acidis obtundi opata, sigi eorum sal volatile, & hinc rutilius ea

adsumi posse, sed an id fiat virtutibus & qualitibus, quas tamen exin elicere est animus, illas, de eo mirum quantum dubitamus. Hinc, ut illa ex *Glasero* veritatemus *Tracté de la chymie l. 2. c. 11. p. 322.* qui considerant in opio partem Δ eam volatilem, & salinam interram, quibus primario suam debet virtutem, ea verò cum acidis habent contrarietatem, tantum abest, ut correctionem illis perfici credant, ut potius multum, si non totum, destruantur, & castrerur. Deinde, qui præparavit opium, seu ejus extractum confecit cum \times to, negare non poterit, remanere multum de salinis acidis aceti particulis, quæ nares odore constanti abundè & mordicant & feriunt, ut aded imminui ex parte saltem, si non maxime, vim leniter demulcendi ob acres, acido (ve humores dolentes partes, & poros cerebri occludendi, certo sit certius. Quamvis tamen sensu suo abundare libenter patimur.

In specie consultius videtur, acetum simplex ob partes crassiores, & eas admistas, quas in Ω tione videre est, planè omittere, ne subtiliori parte ejus per evaporationem ablata, excrementitia, liceat has ita nominare, cum opio jungantur, & feces cumulentur fecibus.

Quoad succos expressos alios acidos vel his confines, egregias inde conturgere compositiones, fatendum est, sed id tamen monere videtur operæ pretium, salvâ manente cujusvis agendi libertate, & neminis in præjudicium, quod necessariò, si cum eis extrahatur opium, horum extractum proprium, forte paris, si non majoris, cum extracto opii ponderis, simul emergat, quod ipsum tamen vires non auget, sed imminuit, diditis inter ea opiatas particulis, & sit v.g. rob. cydoniorum opiatum, extractum cydoniorum opiatum.

Si addantur Θ lia, v.g. ol. Φ ri per deliquium, vel crystallinum, siccum, verenda est & fermentationis annihilatio, quæ interdicitur tamen, & ne extracti forma, ob humidi attractionem, salibus familiarem, ad pilularem consistentiam aliasque compositiones opiatas sibi relictas fiat aliquo modo inconveniens, ut alia, quæ in contrarium dici posse norunt naturæ periti, silentio involvamus. Judicium *Tachenii* sincerum est, *loc. cit.* non aliam minorem virtutem ab ejus exhibitione deprehendi, quàm ex solita & simplici correctione.

Cum oleosis aromaticis extrahendi modus hactenus usitatus non fuit, cum spirituosus verò non infrequens.

Quidam illum opii corrigendi modum amplectuntur: Decoquant illud in vino Hispanico dulci, & benè maturo, idque tamdiu lenissimo igne continuant ad evaporationem vini Hispanici, iterando etiam affusionem, & coctionem priori modo, donec acquirat consistentiam mellis, addendo tunc pro lubitu alia mollia vel solida, quæ descriptio est *Lindenii in not. mss. ad praxin. Hartmanni Tit. de anodyn.*

Illustri etiam *Boyleo* opii ea videtur optima præparatio, ut in vino cum æquâ parte purissimi salis Φ ri digeratur, teste *Hamelio l. 2. de corp. affection. c. 5. t. 8. p. 488.*

Thomsonus epilogism. chim. 130 p. 76. Σ um Θ lis vinosum, quem *pag. seq.* describit, pro menstruo commendat, cui hinc Θ tartari jungit, & Δ oris, hinc cum Ψ alcali fæto extrahit.

Sennertus, Poterius, Billichius, Zuvelferus, & alii opium per Ψ corrigunt, essentiam eliciunt, extractoque ad justam consistentiam redacto, tincturas spec. diambæ, diamoschi d. cum magisteriis & oleis cordialibus, vel extractum croci, corallinum pulverem & guttulas aliquot Σ us Θ -li &c. jungunt.

Mediâ viâ incedunt, qui primum \times to, hinc Ψ extrahunt, ut *Londinenses*, vid. *Pharmac. Londin. p. 230.* & qui *Beguinum* secuti opium extrahunt Ψ ,

cum Σ -ibus acidis, Θ -li, Δ -is, acuto.

Rationes pro Ψ , quod pertinet & frumentaceus, item Σ -us sambuci, citri, theriacalis, alique, sunt, non quod opium reputetur frigidum, cum omnis iterum Ψ per evaporationem, vel Ω tionem avolet, adeoque à calore hujus correctionem realem expectare non possit, sed 1. quia opium abundat Δ -e, seu resinofitate, jam verò Ψ his est homogœneus, cum iis symbolizat, & genuinum resinolorum est menstruum. 2. quia vapidas & halituosas opii particulas naturæ amicas reddit, neque vires obtundit.

Nec timendum est, quod superius modò tactum fuit, Ψ intactum relinquere, neque extrahere, cum experientiâ chemicâ constet, illum ipsum non solum non respuere conjugium volatilium salium, (qualia in opio eminent) sed ex parte ipsorum etiam vulgò dictorum fixorum, quo de vid. *Specim. experim. nostræ de Θ vol. plant. c. 5. p. 36. & exerc. de mensuris cap. 3.*

Nec sufficiens est altera objectio, Ψ um se unire intimius cum partibus narcoticis, sulphureæ ejusdem naturæ symbolicis, illas elevare secum in evaporatione vel abstractione, quod verò in fundo restat, tantum esse substantiam terrestrem, dotibus suis principalibus orbatam. Si enim praxin & experientiam sequamur, tantum abest, ut Ψ i opiatas, seu ab opio abstractus sit narcoticus, anodynusve, præter propriam ipsius agendi sphaeram, ut potius *τὸς μὲν πρὸς τὸν πῶτος* non dimittat hancce opii virtutem, sed eandem tantam tectam relinquant Σ -uosa hæc menstrua.

Quod verò quidam dicunt, intendi à corrigentibus hisce spirituosus vim narcoticam, & exaltari deleterias qualitates, non videtur admittendum, cum, ut dictum jam fuit, omnis Ψ iterum avolet.

Notanda est curiosa observatio, quâ constat, extractum opiatum, cum Ψ paratum, majores exercere narcoticas vires, quàm quod cum aceto destillato factum fuit. Hoc ergò modo *4. opii Thebaici, puri succosi, pulverisati q. v. partem* verbigratiâ *j. Ψ probe rectificatæ partes vi.* Digerantur leni calore, extracta tinctura decantetur, vel filtretur, & abstracto Ψ , si in majori copia præparetur extractum, vel evaporato, si in minori, pro lubitu tamen, ad consistentiam desideratam redigatur.

Dictum est notanter, requiri Ψ probe rectificatum & dephlegmatum, aliàs enim feces, quas secum vehit, cum opio relinquit, ventriculo & toti corpori nauseabundas, inutiles, quod ex chemicâ praxi etiam de vino Hispanico notum est. Neque incommodum est, sed longè optimum, si quis Ψ tartarifatum loco communis recipiat.

Restat, ut & de aqueis dicamus solventibus, ut sunt aqua simplex vel Ω -ta, ros majalis Ω -tus, & alia.

Sic *Martinus Rulandus junior in excuss. apologet. Oberndorfer. p. 89.* refert, Muscagiam Cæsareæ Majestatis medicum opium contusum lavasse, & effusa aqua coxisse, restibili succo mellito addendo spec. diambæ. Cujus nepentheos, addit, & opiatæ simplicis filo parati usum tutum nos plerique experti sumus, admirantes simplici coctura opio malignitatem illam narcoticam demi, & aded benignum fieri & innoxium.

Ita & *Glaserus l. c. p. 320. seq.* opii extractum præparat cum Ψ roris majalis, & ut eum in latum trahamus sermonem, ceu omninò meretur processum ponit sequentem: 1. jubet opium conscindere in partes minutas, 2. hinc illud explicatum in patinâ terrefræ vernificatâ, aliquo modo torrere, donec fiat friabile digitis, vitando interim effumationes nocentes, 3. Δ -e narcotico provenientes, 3. superfundere huic sic præparato rorem majalem Ω -tum, q. s. digerere per 4. Φ in MB. liquorem tinctum decantare, reaffundere men-

menstruum dictum, donec sufficienter fuerit extractum. 4. filtrare totum id, & evaporare in MB. ad consistentiam extracti. Ita habebis, *concludit*, opium bene præparatum & liberatum à Δ e suo narcotico, & omni terrestreitate.

Menstruum hoc ob hanc rationem commendat p. 323. quod neque priver opium virtute salina, ut acida, nec illam secum auferat, ut V, sed cum leve & subtile sit, facile evaporetur, sine ulla virtutis privatione.

Sunt, quæ moneti pauca circa processum possint, sed cum supra jam discussa videantur dubia, eo superfedebimus. *Hamelius* l. 2. de corpor. affectib. c. 2. t. 9. p. 344. hanc præparationem viris doctissimis maxime probari scribit.

Certum verò est, aqueum hoc menstruum pro extractione opii non superficialium, sed maxime essetum accommodatum, tum elegans, tum utile & proficuum.

Hoc pacto odor nauseabundus opii perit, sine virium deperditione, nec aliis eidem imprimitur, ut fit cum X. opium est quasi medium quoddam, inter gummata & resinas, hinc aqua facile pater, & facillime dissolvitur, quod requisitum est Dioscorideum, ex quo ipso loco probabile emergit, jam olim hanc ipsam extractionem per aqueum menstruum fuisse usitatam, cui enim bono alias id aqua dissolverent, nisi ut deperarent? quod ex eo etiam probari ulterius posset, quod idem *Dioscorides*, dilutionis in sequentibus verbis, loco supra citato, meminit. Sed hæc obiter.

Observatu dignum est, gummosa ejusmodi, cum aqueis extracta vires suas cum corpore nostro melius communicare, quam cum spirituosiss. Id e. g. de aloë est quam verissimum, quam qui cum V extrahit leniendi alvum scoponæ ille egregie fallitur. Quin vel ex *comp. simp.* apparet, statim totam quasi substantiam aloës immutari, cum V affunditur. Opium agit potissimum ob Δ suum solubile, ut supra ostendimus, quicquid igitur resolutionem ejusdem impedit, id cum natura ejus non adeo convenit, quam quod eandem promoveret. Faciunt verò hoc aquea.

3. Sumptibus hoc modo multum parcitur. Facillior jactura est aqueorum, quam vel acidorum, vel viscosorum, licet ad alios usus per Xcum possint recipi.

4. Quam elegans verò emergat opium præ reliquis extractis, hocce menstruo paratum, tum experientia cujusvis relinquimus, tum pluribus in sequentibus tangemus.

Ut de nostra præparandi ratione mentionem faciamus, elegantissimum opium extrahendi modum invenimus cum phlegmate Xtiæ præparatione arcani tartari resultantis. Instand tur *opii Thebaici* pulverisati pars j. cum partibus vj. vel viij. aque ab arcano tartari residua, mediæ, hinc vitrum calenti imponitur arena, agitatione cum spatula facta solvitur, ubi pars impuriior spumosa summa lambit, pars terrestrior ima petit. Colatura per linteum facta evaporatur ad mellaginem, vel in extracti formam redacta adservatur, laudano quovis etiam pretiosiori virtutibus par, si non major.

Quæ verò circa menstrua hæc dici forsan latius debuiss. n. ea possunt huc peti ex *Dissertatione nostra*, de menstruis, nuper edita.

Ingreditur opium, ceu basis, plures compositiones in officinis usitatas, theriacam, mithridatium, Philonium Romanum & Persicum, Requiem Nicolai, Auream Alexandrinam, trypheram magnam, pilulas de cynoglossa & multa alia, in quibus omnibus ferè peccatum pluralitatis esse, cum *Helmontio* statuere nemo ambigit, qui vel tenuiter in chemicis instructus est.

Quorum, verba sunt *Helmontii*, in aurea Alexandrina 65. ingredientium confusio facit? Quorum simplicium nulla est cognatio cum opio & mandragora, columnis confectionis? *Pharm. ac disp. modern.* §. 424 & 44.

Celeberrimum in foro Hermetico est LAUDANUM OPIATUM, ceu laudatum ex opio medicamentum, quasi laudatum & ferè laudabile remedium dixeris, *Holzem. de ess. helleb. c. 6 p. 42.*

Laudanum, quasi lauda non, misochimicis audit, ut *Sagruerio schol. in pharmacop. Fernel.* unde *Libavio*, licet chimico, vocabulum est barbaricum & Paracelsica dementiæ conveniens l. 8. *syntagm. arcan. chim. c. 44.* *Billichio* barbarum & ineptum, l. 2. *obs. & parad. chim. c. 2. p. 110.* sine ulla causa & ratione in vacuum nomen detonantibus.

Laudanum, & non ladanum, est medicina Paracelsi, ex auro, coralliis, unionibus &c. composita; Est etiam materia perlata, ut tradit elucidator ejusdem in *ditionar. Paracelsi. Gerhardus Dornæus p. m. 133.*

Nonnulli laudanum dictum esse putant ab articulo barbaso & anodyna, quasi dicas L'anodyna; alii quod ladanum Cyprium amuletur. Vid. *Rivin. de agryp. §. antepenult.*

Dicitur & Nepenthes opiatum, ita primitus & *Zwingeri* nominatum, quod imitetur nepenthes Homericum, quo Helena omnem animi morbum, omnes animi languores & dolores abegit, hilaritatemque conciliavit. Est verò nihil aliud, quam extractum opii, cum aliis confortantibus remixtum.

Laudani hujus descriptiones tot ferè reperias, quos autores illius meminerunt. Aliam descriptionem habet *Theophrastus, Crollius, Quercetanus.* Pluresque collegitales *Grülingius, Schroderius*, & plures alii, Aliam *Wirtz part. 3. de vulner. cap. 3. p. 663.* imò penes ipsos pharmacopæos modernos in officinis mirum quantum variant. Quatuor descriptiones videre licet apud *J. P. Lotichium, dissert. de febb §. 59. p. 103. seq.* Ex quibus & aliis formulis vel abunde satis clarum est, inquit, quam providum & peripicacem esse oporteat medicum in præscriptione LAUDANI, cum diversam descriptionem præparationemque alius pharmacopæus ab alio exhibeat facile, & contingere possit, ut in eadem civitate laudani usum in plures officinas præscribens medicus, pro diversitate operationis medicinæ hujus opiatæ, aut desiderata efficacia frustretur, aut respectivè pharmaco expeditius operante, culpam erroremque penes ægros incurrat, nisi ipsi uniuscujusque officinæ descriptiones apprime cognita fuerint. Præstaret igitur, regia isthæc & exquisita remedia, uno eodemque modulo, in officinis prostare, ne error damnumque committatur inde, dum unum pro alio præscribenti, neque semper adstanti medico obtruditur.

Non opus est, Lectores proluxa descriptionum congerie onerare, quas ausim dicere ultra trecentas hinc inde prostare, si quis omnes curiosè vellet colligere.

Notari verò circa hoc laudatum medicamentum potest, primum, saniores chymiatros ab ipsius confectione excludere essentiam radicis hyoscyami, succumve, quæ admiscet, ex descriptione tamen aliorum, *Theophrastus Paracelsus, Crollius*, & alii. Neque enim vel vires adauget hyoscyamus, quas intendimus, intendimus verò blandas naturæ, non inimicas, quibus opium jam per se maxime pollet & instructum est; neque id ipsum corrigit, sed potius non dicam deleteriam vim, sed dementationem, quam corrigere animus est, ipsi imprimit. Novimus doctissimum medicum, qui essentia hyoscyami probè correctæ & despumata feliciter utitur, sed cui bono huc illam trahimus, & multiplicamus entia præter ne-

cessitatem? Deinde cum divina hæc *id est natura*, quod simpliciora, eò perfectiora facilius finem suum adsequantur, si naturam, quæ simplicibus contenta est, multum verò compositis non raro gravatur, æmulantur, & compendiosiori commeatu vires suas exerunt, quid attinet tot magisteriis pretiosis, tot pulveribus cordialibus, tot oleis calidioribus aliisque vel obtundere medicamentivim, vel pretium & dosin augere?

Quæ junguntur opio pro laudani confectione, diversis de causis junguntur, 1. ut vim narcoticam adaugeant, ut succus hyoscyami, essentia vel extractum croci, (quod alii loco corrigentis, & odoris gravitatem ac pravitatem obtundentis, addunt) &c. *fac. Zuvinger. exam. princip. chim. c. 11. p. 174.* in consortium opii admissos flores *¶* is præclarum, *scribit*, condere miræ virtutis remedium, *το νηπενθε*, quovis Homericò præstantius. 2. ut corrigant & remorentur vim narcoticam, ut castorium, camphora. 3. ut consistentiam legitimam concilient, & simul confortent, ut perlæ, corallia, eorumque magisteria, ambra moschus &c. quæ juxta nonnullos 4. & grati odoris conciliandi gratia addi scribuntur.

Horum primo jam reposuimus, non indigere opium juvante, sed ipsummet omnibus indicationibus, quibus debetur, sufficere. Ad alterum dicimus, si strietè velimus loqui, & ut in rei veritate se habet, opium considerare, correctione nulla indiget, nisi depuratione, quæ ipsa sola etiam ingrator odor infringitur. Tertium finem, seu consistentiam pro massa pilularum, seu laudani ex solo obtinere possumus opio. Neque odoris gratiam tantum venerantur ægri, quam auxilii promptitudinem. Laudanum nostrum simplicissimum ita comparatum est, ut extemplo & in pulverem redigi, & in pilulas formari, & si id quoque expetatur, facile in liquorem solvi possit.

Non deficit hoc in necessario auxilio, neque excedit ulla violentia, neque aliorum luxuriat accessione. Si morbus vel symptoma indicet adjuvans vel dirigens, promptissimè & statim misceri quævis possunt. Sic pro electuario misceri potest, si placeat, *confectio alkermes*, vel alia, *extractum croci* & alia.

¶. confect. alk. incomplet. ʒj. extr. croc. ʒß. laudan. opiat. liquor. g. vj. cum sir. pap. rhæad. M. F. l. a. elect.

Dosis magnit. nucis avellanæ minoris. Sic si ad caput roborandum velimus præscribere opium:

¶. Mpil. de ladano ʒj extr. croc. g. v. laudan. op. g. iij. pulv. cephal ʒß. vel plus, M. F. l. a. pilulæ. S. Starckende Hauptpillen. Et sic in reliquis.

Dignum memoratu est hoc loco, quod instar omnium potest esse, *SPECIFICUM ANODYNUM Paracelsi ex l. 7. archidox. p. 815.* quod somnum non tam homini, quàm morbo conciliat; sæpe, ait *Hermes hic*, in morbis nonnullis se desertum fuisse ab omnibus arcanis, solum specificum hoc anodynum miracula præstitisse, extinguens morbos, sicut ignem aqua.

¶. Opii Thebaici ʒj succi arantiorum, cydoniorum a. ʒvj. cinamom. caryophyll. a. ʒß. M. Contusa, indita vitro, apposito coopertorio cæco, digerantur in sole, vel furno per mensem. Post ʒ digestum, exprime, iterum impone, & digere cum sequentibus.

¶. moschi ʒß. ambra Div. croci ʒß. succi corall. magist. perlar. a. ʒß.

M. Digestione per mensem denuò facta adde *quint. essent. Ol. ʒß. M.* Tollit omnes dolores internè & externè.

Tueri hoc optimo jure potest nomen laudani opiat. Oris, quod aliàs admixto bezoardico vel magisterio Oris, obtrinetur.

Ad mentem nonnullorum, sc. *Galenii, Abuali,*

Gruinerii aliorumque sequenti modo concinnari potest laudanum:

¶. V. simpl. rectificatiss. vel sambuci, curi, croci &c. q. l. partem textuplam v. g. vel octuplam, opii Thebaici ʒj. castorei ʒi. vel ʒij. Extrahatur l. a. decantetur, inspissetur, & ad usum servetur. Si magis corrigere mens sit, camphora parum in prædicto spirituofo menstruo dissolvi potest, quod dehinc una cum tu iterum avolat omne.

Notabile est, si Tinctura opii seu essentia liquida cum V facta ad medium circiter evaporetur, & dehinc reponatur, ut frigescat, consurgere in vitri parietibus crystallulos, oblongos, elegantes, quos aliquoties observavimus, manifestissimo indicio, *¶*is volatilis. Similes cum *D. D. Hagendorn.* collega honoratissimo observavimus in benzoe ante aliquot annos, vid. *Ephem. German. ann. II. obs. 240. p. 342.* ubi sensim expirante hujus essentia elegantissima crystallorum spicula se nobis obtulerunt, quos una viderunt mecum tunc *D. D. Ksnerus & D. D. Witte.* Videmus idem ex cydoniis; quando enim paratur V cinnamomi cydoniata cum s. q. succi cydoniorum, in fundo cucurbitæ, si rite operatus fueris, neque ad empyreuma omne humidum evoces, remanet extractum cydoniatum cinnamomifatum longè elegantissimum, in quo sensim & sensim concreescunt crystalluli pulcherrimi.

Fit hoc quandoque in aliis quoque extractis, v. g. chelidonii majoris, plantaginis, & aliorum.

Egregii & multi usus sunt *TROCHISCI* vel *TABULÆ NARCOTICÆ Felicis Plateri tract. 2. prax. cap. 13. p. 549.* descriptæ, ubi & pilulari & electuarii forma plura habentur ex opio medicamentata.

¶. Opii ʒij. infund. in vino malvat. vel V ʒij. & postquam dissolutum sæpeque agitatum fuerit, rursusque subleiderit, liquor clarus à fecibus effundatur & filtretur adde

sacchar ʒij. cinam. ʒij. moschi ʒß.

infus. gummi tragacantha in V rosar. fact. q. l.

M. instar pastæ, sicceturque eò usque, donec in tabulas formari queat.

Potest omitti moschus, quod etiam de aliis compositionibus intellectum volumus. Dantur enim sæpe casus, ubi moschata & odorifera ejusmodi alia vel non æquè conveniunt, vel planè nocent, etiam in maribus ipsis, præsertim autem in fœminis hystericiis, quæ vel maximè inde læduntur, à volatilitate eorundem agitatissimis, vitiosis & excrementiis humoribus. Hinc pro re natà melius est admiscere, quàm semel admixta promiscuè propinare.

Locum habent trochisci opiat. seu narcotici, asterisco signati, tum in aliis affectibus, ubi opium adjuvandum, tum maximè in hæmoptysi, & catarrhorum acrium, & salforum tenuium ad pulmones defluxu. Hos perpetuò secum gestabat *B. Dn. D. Schenkijus*, multis annis effectum eorum salutare in proprio corpore expertus.

In forma pulveris opiat. confiunt nobilissima. In *MAGISTERIUM ANODYNUM Rolsincianum* splendore superbit suo, descriptum *chim. in A. F. R. l. 5. f. 2. cap. 4. p. 321.*

¶. laudani opiat. de tribus q. v.

sacchari canthii vel solius, vel cum magisterio matris

perlarum misti, vel etiam solius magisterii q. l.

In mortario æneo terantur, misceantur pistillo diligenter & in vitro mundo ad usum servantur. Dosis gr. v. vj.

Germinus huic est *PULVIS ANODYNUS confortativus B. Dn. D. Michaelis.*

¶. magist.

℞. magist. cordial. 3vj.

℞. laudan. op. Soc. 3j. M. F. pulvis, cavendo, ne laudanum aduratur. Dosis adulto ʒss ʒj.

Magisterium hoc anodynum, seu pulvis anodynus, fieri etiam cum aliis accommodè potest. Omnibus enim pulveribus misceri potest laudanum opiatum. Ita nostrum conficitur ex *laudani opiat.* part. j. *pulveris febrilis ex conchis* part. x. ita ut v.g. ad ʒss pulveris sumatur g.ij. vel g. ʒ. opii, ut hoc modo gr. j. ejusdem in 10. vel 20. partes dividi possit, ipsis tenellis infantibus sine omni periculo vel metu exhibendum.

Ita quidam miscent cum C. C. philos. ppto. Cum cianabari nativa mixtum laudatissimum fit medicamentum in arthritide vaga scorbutica, aliisque gravibus affectibus, à sero acri acidoque dependentibus. Medicus quidam celeberrimus miscuit quoque cum succini, post distillationem perfectam olei residuo. Toto die id miscemus pro occasione morbi & indicationum, cum pulvere cephalico, cum bezoardicis, cum adstringentibus, v.g. corallinis, hamatitè &c. adeoque cum omnibus pulveribus misceri aptum natum est, ubi id intentio vel primaria vel secundaria requiritur.

Norandum verò est in præparatione, ut extractum opii vel adhuc paulò liquidius sit, vel siccius, ut teri possit. Medio enim modo in mixtione conglobatur, & jungi renuit.

Concinnè datur, tum per se in forma sc. pulveris, tum cum emulsionibus factis ex sem. papav. alb. 4. frigid. major. &c. cum aq. endiv. lactuc. hypnorr. Dornrell. addito pulvere hoc anodyno, & saccharo perlato, vel sir. pap. simpl. q. s. ad grat. Conspicitur inde medicamentum suavissimum & nectar anodynum, quod in melancholicis, maniacis, febribus quandoque ardentibus, ubi aquæ bezoardicæ temperatæ misceri queunt, ut scorizoner. cordial. Herc. Saxon. frigida &c. præsentaneum edit effectum.

Sumitur hoc loco vox magisterii latius, sicut & quandoque pro ipso laudano opiato scripta legitur. Sin *MAGISTERIUM OPII* strictè sic dictum, quis exspectat, sit illud per præcipitationem tincturæ opiatæ menstruo acide, si fuerit cum aqueo vel spirituoso extracta; vel salino si cum acido parata sit. Præstat tamen ipse pulvis, vel Tinctura per se data.

Mentionem jam supra fecimus distillationis opii, unde consurgit *SPIRITVS* & *OLEVM*.

Spiritus opii est volatilis, sudorificus, qui admixtis acidis effervesceat, ob volatile, quo copiosè pollet & cum quo maritatus est. Si rectificetur, longè eminentior consurgit, sicut etiam ipsum *oleum* rectificatum splendidum est.

Præmissis memoranda venit *ESSENTIA*, seu *TINCTURA OPII*, quæ sub *TRAE ANODYNÆ* titulo nobis venire solet, vel eo nomine magni æstimanda, quòd hoc pacto singulæ doses in plures dividi guttulas, guttulaque dosibus mensurari possint. Imò cum aliis hoc modo liquidis commodè libita quantitate additur & miscetur, pro varia medicinali intentione.

Fieri potest ea vel conjunctim, in præparatione laudani opiat, ut pars evaporetur, ad extracti consistentiam, pars liquida adserveretur forma, idque cum variis jam delibatis menstruis. Quæ enim apta sunt solvere opium pro extracto, eadem quoque in liquido posse idem exhibere, in confesso est.

Ita v.g. cum eodem *phlegmate* &c. extrahitur Ra. *℞. opii Thebaici 3j. vel ij. pulverisetur grosso modo, infunde ʒa ab arc. ʒ. resid. medietate aquosa, p. vj. vel viij. Digere in arena calida, agitando cum spatula, donec solvantur omnia. Solutum coletur per linteum, & evaporetur ad mellaginem, affunde ʒ. plus minus, prout saturatior vel dilutior expetitur TRa. & in mo-*

mento acquiritur essentia anodyna longè pulcherrima.

Eadem etiam conficitur commodè cum ʒ. temperata; vel *℞. opii electi q. v. v.g. 3j. extrahatur cum ʒ. 3vj. addendo ʒ. l. 3ʒ. l. 3vj. libent in leni calore ad sufficientem extractionem. Elegans tale laudanum liquidum describitur à Schrodero l. 4. pharmacop. el. 2. c. 3. 14. p. 207. licet ipse optimè judicet ibidem, essentias aliorum, & cariora omnia, quæ vulgariter laudans adduntur, pretium potius, quam virtutes augere.*

Essentiam opii cum succo citri extractam commendat Angelus Sala, illamque antidoto pestilentiali specificæ jungit, descriptione ibidem quoque posita, tr. de peste.

Dosis harum Rarum vel essentiarum sunt gtt. x. xii. xv. xx. Nos felicissimè utimur iisdem in defluxionibus catarrhalibus, in tussi, rucedine, &c. præter alios usus in variis affectibus infra nominandis.

Nonnulli præ concentratori præbio diffusius amant, adeoque extractam essentiam cum lixiviosis præcipitant, v.g. cum Ole. ʒ. ri, qualis est *ESSENTIA OPII LIQUIDA ANODYNA* Zuvelfferi Pharmacop. Reg. classe 7. p. m. 563. edit Batav. quæ ad 3ʒ. ij. vel iij. in vehiculo convenienti exhibetur.

Alii cum Artemisia, absinthii, aliisque eandem præparationem præstare sat gunt.

Nos simpliciore amamus viam; si enim hand rectè calcemus, varia exinde pro lubitu & diffusioni dosi possunt fieri composita.

DOSIS opii est vel *ORDINARIA*, vel *EXTRAORDINARIA*.

ORDINARIA opiatorum dosis est triplex, infima, media & summa, quæ pro præparandi opium modo admodum variant. Dosis enim opii consideranda est duplici modo, vel ut *mixtum* est cum aliis, seu compositum, ut laudanum opiatum horum vel illorum aurorum; vel ut *simplex* est extractum.

Si enim solum sibi relinquatur, nec admisceantur multa extracta cordialia, corrigentia, confortantia, utique minori præbio venit adsumendum. Hinc v.g. in adultis infima dosis ordinariè est pars quarta vel dimidia grani, vel gr. j. media gr. ij. vel iij. summa gr. iv. vel v. Sin, uti communiter fieri adsolet, illa opio abundè maritata fuerint, dosim extrescere & ascendere utique oportet.

Sæpè enim in ʒss. vel gr. v. admixtionem seu totius compositi vix granum opii, plus, minus, ita aliis combinatum est. Hoc modo *Horsius* laudanum suum opiatum cum magisteriis sæpius ad viij. vel x. granum cum felici successu propinavit. vid. l. 8. obs. 16. p. 417.

Exhibetur opium ad gr. ij. vel iij. Quatuor vel quinque non facillè exhibemus, nisi præcedentes doses absque effectu jam sint exhibitæ. Correctum verò esse debet, utpote est laudanum opiatum, ait *Walaeus m. m. p. 67.* Est enim minimò pondere narcoticum.

Avicenna dosim ejus dicit non extendi supra duos danich id est, ʒj. l. 2. c. 526. item potionem ipsius esse jubet quantitatem lenticulæ magnæ. Idem tradit *Serapio cap. de papav.* Dosis ejus est, *inquiens*, ab uno danich ad duos, & quantitas occidens ex opio est ʒij.

Notandum verò est ex præi medica, opium præscribi vel *INTENTIONE PRIMARIA*, prout vel dolorem, vel vigilias, vel excreta, aliæque symptomata urgentia attendit medicus; vel *SECUNDARIA*; quando ob aliud finem, v. g. roborandi tonum partium, sanguinem nimis fluxilem concentrandi &c. aliis aperientibus, cephalicis, hystericis, aliisque medicamentis specificis, ipsisque adeo purgantibus, additur, ut & quando prædictæ symptomata, quibus primariò debetur, quasi per *innoxia*, ob vires debiles, affectus ipsius qualitatem, aliaque circumstantias tollere est animus.

Primo modo in majori dosi ad gr. j. ij. iij. & ultra præscribitur, in liquida, solida vel media forma. Posteriori ita illud moderari fas est, ut pro dosi una quarta, tertia vel dimidia pars grani adsumenda veniat, præprimis, cum frequentior ipsorum indicatur usus. Hoc modo recentiores sæpius opiata in formulas ejusmodi recipiunt, exemplo celeberrimi *D. D. Sylvii*, cujus in praxi talia exempla ubivis occurrunt, & eadem medendi ratione nos feliciter in praxi hætenus tota die utimur.

Ut purgantia ipsa sæpe aliis medicamentis adduntur in solito minori quantitate, non ut purgent, sed ut aliorum medicamentorum virtus intendatur, ut tum ad aperendum, tum ad sudorem aut urinam movendam fiant efficaciora, quo de vide locum longè elegantissimum apud *Prosp. Martianum comen. in l. 2. de morb. f. 2. vers. 214. p. 176.* Ita qui opiata cum aliis, pro re nata, artificiosè miscere noverit, nã ille feliciter rem suam geret. Talia exempla hinc inde præsertim in sequentibus videre licet.

EXTRA ORDINEM dosi sæpe extenditur, tum propter consuetudinem, tum ob morbi urgentiam, tum denique ob temperamentorum diversitatem.

Turcas, Persas, aliosque orientalis plagæ incolas ad 3ß. & 5j. assumere opium, notius est, quàm ut testibus egeat, quam dosin tamen non facilè transcendere eisdem, scribit *Bellon l. 3 obs. c. 15.* vulgatissimum nempe esse apud Mauritanos, Africanos, & Asiaticos opii usum, autor est *Christoph. à Costa libr. arom. p. m. 236.* & ejus usui ita aduetos, ut etiam abstinere eo nequeant sine manifesto vitæ discrimine, & gravissimis symptomatibus, *Garc. ab Horto l. 1. b. st. arom. c. 4.* Idem de Egyptiis testatur *Prosper. Alpinus, l. 4. de med. Egypt. c. 1. § 2.*

Apud Europæos non quidem nisi pro medicamento in usu est, & in minori, ut diximus, dosi; unde si paulò liberalius sumatur, damna manifesta inde consurgunt. Ita 22. grana in febris tertianâ nothâ ad dolorem capitis & vigilias præscripta in pilulis, eaque pro lubitu sumenda brevi devorata, brevi morti ægrum dedisse, annotat *Wepferus Tr. de apopl. p. 256.*

Medicaster parochus sæpe in doloribus capitis & dentium propinavit opium ultra 5j. ignaris plebeis, sed cum detrimento maximo illud expertus pellio, qui eccentricitatem rationis inde passus ad amentiam fuit perductus, apud *Nester. consil. antidysent. c. 11. p. 249.*

Attamen non rarò legitur sine incommodo propinata & largior solito dosi. Ita *Zacutus Lusitanus l. 1. M. P. H. observ. 45. p. 103.* dedit incorrectum opium ad gr. xij. in vehementi dolore circa umbilicum; item *Dioscorides*, unde nonnulli crudum imbecillioris operationis esse, quàm præparatum, volunt.

Dn. Charas in histor. nat. ingredient. theriac. semetipsum asserit vel sex sumpsisse opii grana, neque tamen majorem inde somni vim sensisse, quàm consuevisset; Imò tantum abesse docet, ut inde debilitatus fuerit, ut potius mirum in modum se corroboratum senserit. Addit insuper, se novisse delicatioris etiam naturæ hominem, qui vel triginta sex, id est 3ß. gr. vj. de eo sumpserit, nihil tamen inde mali ipsi accidisse, sed ægrotum contrà adhibito illo medicamento tam benè se habuisse, ut in una septimana eandem sumere dosin bis vel ter continuaverit.

D. D. Welschius, P. P. Lipsiensis celeberrimus, retulit *D. D. Geygero* nostro, quod ante paucos annos noverit ægrotum, summis doloribus in articulis è lue Gallica laborantem, cui Noribergæ præscriptæ fuere pilulæ ex mero laudano opiato, quibus usus incipiendo à gr. v. usque ad 3ß. cum euphoria, licet palliativa,

dolores enim redierunt, & quod mirum, non rarò una die duabus vicibus iis fuit usus & quidem in tanta dosi.

Testantur autores, quosdam cotidiè supra 3x. comedissee opium, & doctissimè nihilominus de rebus omnibus disputasse. Tantum potest consuetudo.

Ab *Rondeletio* accepit *Hollerius*, militem in summo æstu opii 3ß. sine noxa devorasse, de *morb. intern. p. 54. vid. & Mæb. Fundam. med. Physiol. p. 160.* & inprimis *Ephemer. Collegii nostri Ann. II. obs. 99. p. 127.* seqq. ubi *B. Dn. D. Sachsins*, collega etiam post fata honoratissimus, elegantissimè in rationem inquirat, cur apud Orientales largiori sumatur dosi, quibus id solùm addimus, quod cum orientales populi respectu septentrionalium sint biliosiores, hi verò illorum intuitu serosiores, sulphur opii apud illos non tam benè resolvitur, quàm apud hosce, id quod ex suprâ dictis elici pluribus potest.

Quis ergò nostrum auderet eo ascendere, quo orientales populi? Mirum est, quod refert *Monconys Itiner. Angl. Tom. II. p. 61.* Legatum Galliarum Regis ad Angliarum Regem, cum ægrotaret, ut dormire posset, integras opii uncias assumere opus habuisse.

Cum verò proportio debeat fieri inter agens & patiens, nec in indicationibus contrarium solùm, sed & gradus attendi mereantur, hinc si adsit urgens indicatio, nec dosi minor juvet, ascendi potest ad 5ß. Memorandum hoc loco est, quod *B. D. D. Joh. Theodorus S. benckius*, præceptor & promotor noster, sæpius pro cathedra nobis retulit, se sanctè testari & religiosè, quod ipse sæpius ad 5j. assumpserit opiatum laudanum ad inhibendum sanguinis motum, (laborabat autem hæmoptysi & defluxionibus aliis acribus frequentius) sine ullo notabili mentis stupore. Idem nos adhibuimus sæpius in diarrhæis contumacioribus, dysenteris & urgentissimo dolore, aliisque casibus ad 5ß. Si enim dosi minor non ferat levamen, repetita licet, quid obstat, quò minus, urgentibus morbi stimulis, ascendi ulterius possit? omnia tamen fieri debent *μὲν ὁ σφαιραῖος*, & prodigos nos eo casu non esse oportet, sufficit, esse liberales.

Opio est opus, veterum erat paræmia, quoties morbum capitalem innuebant, & vitæ periculum imminere. Nos rectius id de opio affirmamus. **OPIO EST OPUS** in quamplurimis morbis & symptomatibus.

Generalem opiatorum usum declarat *Galenus l. 12. meth. med. c. 8.* Ait enim illa esse, *χρησιμα, 1. ὡς αἰσθησεως νουησιαστα, utilia, ut sensui stuporem inducentia. 2. ὡς συνισταντα ἢ παχύνοντα τὴν τῶν ὑγρῶν λεωπότητα, ut humorum tenuitatem cogentia & INGRASSANTIA. 3. τὴν θερμότητα ἐμψύχοντα Calorem REPERGERANTIA.* De ultimo usu non recepto jam suprâ egimus. Narcotica vis eminet in doloribus & vigiliis corrigendis. Motus humorum inhibitio locum habet tum aliàs, tum potissimum in excretorum viris. Ut peramica naturæ est crassioribus humoribus & spiritibus coagulatis dissolutio: Sic non minus grata est dissolutis resolutivè coagulatio.

Pro dolore tria medicamentorum genera proponit *Galenus l. 1. de simpl. med. facult. c. 19.* aliisque locis. Primi ordinis communiter audiunt *paregorica*, qualia sunt blandè calorem nativum demulcentia, emollientia, digerentia, & roborantia; secundum *anodyna*, *Scaligeri* iudicio languida ac laxa voce, *exerc. 348.* Tertium *narcotica* constituunt, prout sc. vel causam, vel dolorem ipsum, vel partem dolentem respicimus.

Inter propriè talia **SISTENTIA DOLORUM** primas tenet **OPIUM**, quod facultatem habet distrahendi & stupefaciendi, intuitu tristis sensationis quoad perceptionem.

Locum potissimum invenit, cum citrà materiæ affluxum dolor partem occupat, vel ubi sævitia sua medicum, licet invitum, & aliis indicationibus satisfacturum, ad se trahit.

Delenit & sopit dolores opium 1. *somnum procurando*. Hic dormitor malorum, requies animæ, omniumque dolorum mirum sopimentum. Hinc dolor inprimis urget, illiusque faces magis accenduntur, quando ægri dormire nequeunt. Hujus blandâ effumatione demulcetur cerebrum, ut clamosi dolores conquiescant, quæ verba sunt *Servallii querelæ ventric. p. 251.*

2. *spiritus figendo & demulcendo*. Si quæ pars dolet, sanguis & spiritus impetuosè adfluunt, partem distendunt, distendendo continuum solvunt, sicque dolorem majorem reddunt, quod *Helmontius* eleganter exemplo spinæ digito infixæ explicat, ubi *Archæus* statim advocat in subsidium copias opium verò materiam dolorificam separat, spiritus obtundit, condensat, coagulat, unde effrenis motus inhibetur.

3. *humorum ichorumque atrimoniam temperando*, quorum imperum retardat, mordacitatem contemperat, feritatem mitigat, eisdemque quasi concentrat, *Staphysæ* prohibet & ad statum naturalem reducit, hinc sensum tristem in his illisve partibus inde exortum obviat, & molestas tum contracturas & vellicationes, & fibrarum inæquales mordicationes, tentionesque, tum alia principalia vitia sedat. Hoc *Helmontius* consueta loquendi formula vocat *Archæum* furem compescere, unde novo vigore armata natura fortius contra hostem insurgit, eumque feliciter depellit & subigit.

A dolore sæpe virtus adeò debilitatur, ut sæpe hinc vitæ periculum ægroto immineat. Nihil tam contra naturam est, dictante *Tullio*, quàm dolor.

In centro derinet causam morificam opium. Dolorum lethæam infert oblivionem, *Opium weggs wâsse odvâs* meritò dictum.

Ubi-dolentem nec *Phrygius lapis*,
nec purpurarum sidere clarior
delenit usus, nec *Faleria*
vitis, *Achæmeniumque costum*,
opiata exprompta succurrunt opera.

Ridet vitalis perfusa papavere virtus.

Nec mirum est, subjugari ab opio dolore, *ὕπναι νύκτι αἰ ὀδύνας πόνον ὑπερῶν τόνον*, sanantur dolores contrarii. *Hippocr. l. de loc. in hom. c. 51. p. 394.* Cum ergò dolores ab opio sisti sit vel ipsis sensibus & experientia notissimum, contrarium id esse dolori, faciliè licet concludere. Est verò eidem contrarium opium, cum & sulphure abundet, & Ole volatili non careat. Quæ enim Ole pollent, dolores lenire deprehenduntur; sic pyrethrum, lignum sanctum, buxi, caryophylli & horum olea, in dolore dentium, optimè se gerunt. Sic dolores Gallici decocto lignorum quiescunt; sic oleum caryophyllorum in cardialgia est nobilissimum, ut alia plura, circa linimenta, unguenta &c. huc non trahamus. Ut acida corrigant & obtundunt narcotica, ita narcotica & anodyna, acido & acri sunt contraria, illudque temperant.

Quæ Ole volatili pollent, dolores itidem leniunt, quod vel solo exemplo spirituum volatilium, cornu cervi, *ci, lumbricorum, formicarum & plantarum patet. Vidimus à spiritu lumbricorum urinoso volatili sæpe in momento dolores arthritidis vagæ conticuisse, ubi alia prius debito modo secundum veram medendi methodum fuere applicata.

Hinc igitur ipse hic

sæpe tulit lassus succus amarus opem,
congregat spiritus & in morbos quosvis naturam ar-

Mat.
Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

Audiunt hoc nomine quibusdam malè opiata, quod torporem potius & hebetudinem sensibus inducant, quò minus illi sentire possint, quàm quòd dolorem leniant, vid. *V. Trincavella l. 12. de rat. curand. affect. partic. c. 4. p. 459. & l. 9. c. 7. p. 315.* hinc illam rationem ad veram & propriam curationem non pertinere, quia non dolorem, non causam doloris, non læsionem tollunt; sed sensum, ne læsio percipiatur, auferunt, unde non utendum sit hac curandi ratione, nisi maxima cogamur necessitate; neque speremus alia via prius sedari posse dolores, quàm vires concidant. Modum hunc curandi membra relinquere plurimum labefactata, quantum ferè ad omnes operationes attingit.

Sed ut obiter hisce respondeamus, reliqua in caput de *invektivis* differentes, proscibenda est hypothesis illa, quæ assertum per aliquot secula fuit, opium esse narcoticum eo sensu, ut partibus externè applicatum illas quasi indolentes reddat quatenus calorem nativum reprimat, extimamque corporis vestem attonitam & imperceptibilem efficiat, non secus ac frigida actu talia torporem & stuporem ejusmodi concilient. Et hæc quidem de usu externo, ad dolores. Internè verò causis dolorificis resistere opium, per antecessentia jam asserta negari nequit.

Occurrit verò hoc sæpius in praxi, ut urgentibus doloribus, (quod inprimis in dysentericis arthriticisque vel centies observavi) datum opium afferat dolorum lenimen, & secessuum levamen, sed quando jam quasi evanida redditur & definit medicamenti operatio, denuò desaviant singula, quia quamdiu particula ejusdem rosida balsamica, & temperant acres, salinas, acidas, vel lixiviosas humorum, hinc præpollentibus rursus hisce & suis juris factis fieri aliter vix potest, quin denuò occipiant novas creare molestias, donec denuò tum his, tum aliis obtusa, absorpta, inversa genium suum mutant.

Alter generalis opii usus consistit in *VIGILIARUM* delentione.

Sunt quoque quæ faciunt altis medicamina somnos,
victaque lethæa lumina nocte premant.

Cum excessus immoderatus omnium actionum anti-malium urget: cum hæc diutius, ac par est, exercentur, vel invito ægro, indicatio adest, somnum provocandi. Hoc apprimè expedit opium.

Quando vel vigilæ superflue dolorem excitant, nimis exsiccando: vel dolor vehemens vigilas parit, sensum tristem efficiendo, una fidelia & dolorem & vigilas auferit opium, ut uno ablato cedat & alterum.

Vigilæ immoderate vires corporis labefactant, ac perdunt, cruditates pariunt, cerebri & sensuum functiones debilitant, naturales autem imbecilles reddunt, universum denique corpus resolvunt & siccant. Vid. *Fuchs. instit. med. d. l. 2. sect. 4. c. 7.* Ita celebrantur tricennales Mæcenatis vigilæ, & *Livius* testatur, Hannibalem, itemque Philippum perperis vigiliis *μονοφθαλμῶς* & coclites, ut *Plinius* loquitur, redditos fuisse. Quin & immoderate vigilæ, ex siccitate inprimis provenientes desipientiam vel convulsionem lethalem minantur 7. *aphor. 18.* Testatur enim experientia, sapissimè inde deliria concitari. Prohibet hæc omnia opium.

Non cessandum ergò in curatione, ubi urgent vigilæ, ne ceu ex equo Trojano varia exsurgant symptomata.

Probè verò hic observandum, quando & quibus in vigilis opiata convenient, deinde & aliæ circumstantiæ benè sunt attendendæ. Sæpe enim tantum abest, ut opium moveat somnum, ut potius sumpto eo,

Vu ægri

ægri minus solito dormiant, neque verò idcirco opium desinit esse somniferum.

Tria requiruntur, ut quis placido somno obdormiat, 1. cerebrum temperatum, 2. vapores benigni, & 3. animus quietus, vid. *Heurn. comm. in l. 2. aph. 1. p. 29. & l. de morb. cap. c. 16 p. 132.*

Horum alterutrum si peccet, in primis, si v. g. cerebrum sit vel ob ætatem senilem, vel aliis de causis ficcius, & animus curis plurimis & profundis cogitationibus distrahatur, accedente ob stomachum debiliorem, aliaque vitia vaporum & ἀναδυσμῶν defectu, opium licet detur, tamen ex sententia somnus non succedit.

Ita quosdam novit *D. Willis* scorbutica labē tactos, qui licet dolorum aut ipsas morum immunes fuerint, etiam animis affētu quovis immodico liberi, per plures tamen septimanas dies & noctes propius vigiles duxerunt, ac sæpe opiat, licet validioribus adsumptis, ne tantillum somni capeffere potuerunt, de *scorbut. c. 5. p. 270.*

Ut tria sunt purgationis requisita. 1. dispositio humorum. 2. dispositio viarum. 3. facultas expultrix, hæc tamen usitate ita dicta, seu natura, unde si purgantia ad votum non operentur, semper impedimentum in hisce tribus querendum est: ita & suo modo se res habet in opiat. Hinc & corrigere, quæ se offerunt vitia, debet medicus, & ægrum hortari, ut si somnum videre velit, ne ipse sibi vigilias, curis, mœrore, aliisque animi affectibus procuret, & promoveat, adeoque obicem medicamento ponat activitati.

Locum verò hic habent omnia superius recensita opiat, quæ recensere & repetere super sedemus.

In vigilis senum miscuimus sæpe — Oli volatilem cum tinctura anodyna, felicissimo cum successu. Vir cachecticus, asthmaticus, cum aliquot noctes insomnes molestissime duxisset, ab eodem medicamento suavissimam sentiebat quietem.

℞ — Oli. volat. Parac. 3j. tinctura anod. 3℔. vel 5j. Dof. gr. xx. xxv. xxx.

Memoranda hoc loco etiam est opii agendi varietas, interdum enim dolorem magis sedat, quam somnum facit, ut exemplo ceu ad imperium quoddam & monstrato Gorgonis capite conquiescant dolores, tormina, cruciatusque, ut adeò non somno solo interprete illorum oblivio capiat ægros, sed & absque eo, propria opii acrimoniam temperandi & spiritus demulcendi, ac humorum salinorum impetum coercendi, virtute; interdum unà cum dolore & quidem ut plurimum vigilias aufert, & somno induto tristi sensationi intentum animum abducit & sibi restituit.

Somniferum ergò tam in opio, quam alibi potestas est, donumque creatoris specificum, *Helmont. de lithias. §. 87. p. 63.* & ad omnia longè efficacissimum, *Fernel. l. 6. c. 1. meth. medend. p. 377.* quod spiritibus quietem conciliat, ut missis exterioribus, circa quæ abstracti per vigilias occupabantur, secum habitent, & toti incumbant in id, quod ad salutem œconomiae propriae pertinet, sive in digerendo, excernendoque, sive aliis modis, quibus morbo obviam iri potest.

Quidam distinguunt inter *SOMNIFERA* & *SOPORIFERA*, quæ differant, ut somnus & sopor, seu ut magis & minus. Illa sunt refrigerantia leniter & humectantia, ut lactuca, nymphaea, emulsiones ex sem. 4. frigidis major. papav. &c. externè oxyrhodina, & quæ his sunt confinia: hæc stupefacientia, ut opium, neque ante ad hæc veniendum jubent, in vigiliarum excessu, quam illa non sint satis, & res urgeat. vid. *Valles. l. 2. meth. medend. c. 8. pag. 88.*

Potest & cum illis dari opium, & per se, pro medi-

ci intentione & variatione circumstantiarum.

Cedit opium intentione somnifica, interdum in abusum, uti exempla prostant, semine stramonii, opio, aliisque similibus à furibus sopitos hospites, ut prædæ ipsis loco infervirent.

Captivus quidam ob enormia delicta medicus petiit per literas ab amico, ut butyrum ad se mitteret, dimidia parte opio medicatum, altera impermixtum. Ille vit panem, & ipse comedit sincerum, reliquum largè panem illitum propinavit custodibus, qui profundissimo somno sopiti ansam dedere evadendi.

Tertius generalis opii usus est in *SYMPTOMATIBUS EXCRETORUM*. Si ea, quæ retineri debebant, vel si contrà, non ἀδρῆστος & βίαιος subito & confertim, ratione magnitudinis, violentiæ, copiae, temporis, excernenda, opium fermentum placabile inducit, verbis utimur *Helmontii*, ut sola restauratione & alteritatis Archæi restitutione, morbus conculetur. Hic locum habet & illud *Helmontianum*: Pro remedio restaurativo Archæi non requiritur uncia-rum & drachmarum quantitas, sed pauca grana h. l. opii illud exequi norunt.

Opium enim quamvis humorum acrimoniam corrigit, *Sylvius l. 1. prax. c. 20. p. 285.* quamvis eorundem effervescentiam coerces præ omnibus aliis, *ib. l. 1. c. 19. p. 271.* affluxum remoratur, eccentricitatem & ἀσχημονὴν disaggregationem prohibet impetum coerces, volatilitatem & citatum gradum figit, verbo, ad naturalem statum quàm optimè perducit, & ad sanguinis laudabilis productionem & motu in primis peccantis correctionem, legitime usurpatum valet. Elegans est sententia *Martiani comm. de loc. in hom. pag. 76.* & fontibus genuinis Hippocraticis conveniens, opium disaggregationem humorum sistere & prohibere. Cum, aut, ad omnes destillationes concurrat humorum disaggregatio, seu hæc concutatur sub ratione causæ externæ, seu internæ & proximioris, patet ratio, propter quam opium concoquere dicatur Dioscoridi, & quare medicamenta stupefacientia appellata destillationes miraculo quodam sistant, & ex toto interdum etiam curent; cum enim per hæc humorum & spirituum motus sistatur, non modò fluxiones compescunt, quæ in motu humorum consistunt, sed etiam prohibent disaggregationem, quæ est fluxionis causa. Hinc opium τὴν νοσημάτων τῶν σφοδρότερον ἀμείλνει, morborum vehementes impetus obtundit. *Hippocr. l. de arte c. 4. §. 5.*

Pertinent huc omnes fluxiones tum sanguinis, in hemorrhagiis, & teri, in defluxionibus catarrhalibus, aliisque excretionibus, tum excrementorum aliorum, vel sponte sua & à natura institutorum, vel ab arte, de quibus paulò post plura.

Ad generalem opii usum referri quoque posse videtur *VIS SUDORIFERA*.

Qua autem ratione opium sudorem moveat, & summum sudoriferum sit, indagatione dignum. Quæ sudorem movent, non habent vim incrassandi. Contrarium adest in opio, ideoque videntur hæc secum pugnare. Opium δὲ χυμῶν humorum sistit & impedit, quomodo ergò sudorem ciet?

Causa est opii compositio. Θ ejus volatile, cum Ἀ re intimè combinatum, primariò sudores efficit, quod aliàs in — C. C. viperar. Θ lis *ci videre est. Sulphur ejus resolubile humores figit, quod tenuius superest, à sale volatili propulsum per cutim expirat, ut etiam hac ratione fixationem humorum medietur opium. Adde, quod natura refocillata, (confortativa enim ipsius naturæ est Laudani sotirella) excretionem per sudores molitur, & quod somnus ipse omnes fluxiones sistit, excepto sudore. Neque tamen solus somnus ad productionem sudoris sufficit, cum & vigilantes ex opio sudant, & in somno non

non semper fiat sudor, nisi corporis repletione præ-
sente, 4. aph. 41.

Confirmat propulsiōem à centro ad circumferen-
tiam, quod observantē *Zvvingero*, in pueris ab ejus
exhibitione exferat se efflorescentia faciei, seu, quod
facies rubore suffundatur, apud *Cratonem epist. 251. p.*
470. ubi & de vi sudorifera statuit per accidens sudo-
rem subsequi, congelatis spiritibus malignis; sed ro-
boratis nativis.

Quin ita interdum perspirabile redditur corpus ab
opio, ut sudor inde prolektus nonnunquam odorem
eiusdem referat, quod testatur *Dioscorides l. 6. c. 17.*
scilicet inquit, τὸ φαρμακὸν δι' ὅλης τῆς σώματος ἐκδιδόσκει,
odor opii toto corpore expanditur, quod iidem verbis
reperit *P. Aegineta l. 5. cap. 43.*

In opio teter & virosus odor cum amaritudine &
acrimonia purgatricis potentia signum existunt, teste
Erasto Tr. de occult. pharmac. potest p. 181.

Confirmat id *Quercetanus l. 1. de medicina prisco-
rum philosophorum mat. cap. ult. p. 79* ex *Sle opii, scri-
bens*, à suo oleo seu Δ e narcotico fieri purgans, haud
minus sanè, quam ex omnibus amaris; ut gentiana,
centaury & similibus, separato nimirum, dextreque
præparato eorum sale.

Quod verò non purget ordinariè, subinhiit eo ipso
idem quod partes Δ e impediant salinas, quas præ-
ponderant. *Erastus l. c.* duas affert causas 1. vim stupe-
faciendi, quæ, ut ne sentiat mordicatio, efficit. 2.
medicam ejus, quæ exhibetur, quantitatem. Accedere
ait 3. quod plerumque aliis multis vim ejus hebetan-
tibus miscetur.

Purgantem vim in sylvestri papavere annotavit
Plinius lib. 20. Hist. nat. cap. 19.

Alvum turbare, & vomitum sæpe manè altero ab
exhibitione laudani sequi, testatur experientia, & te-
stantur *Helmont. in jure d. umvir. t. 62. p. 192. D. D. Rot-
finc. chim. in A. F. R. l. 4. f. 3. c. 6. p. 248. alique.*

Observavimus sæpius à dato laudano opiato secu-
rum vomitum, raro diarrhœam, & quidem, si pilulari
fuerit exhibitum forma; à pulvere enim anodyno, reli-
quisque opiatorum formulis nil ejusmodi unquam
observare licuit.

Mirum hoc vidimus in Gallo quodam, qui cum pi-
lulas opiatas vesperi sumisisset, laborabat autem hemi-
crania, vomitum sequenti die expertus est, non manè,
sed post meridiem horâ quartâ, quod cum per acci-
dens primâ vice factum videri poterat, alterâ & tertiâ
vice idem adsumenti contingerat.

Causam alii rejiciunt in opii malignitatem, quod
natura id abhorrescens ceu venenum, robore si
polleat, exturbet. Relictum Δ æ fœtidum ventri-
culum relaxare & ad vomitum stimulare, signo per-
pessi per noctem ipsius laboris, scribit *Svalve querel.*
ventric. p. 252.

Notandum est, in culpa quandoque esse ipsam
præparationem. A laudano opiato cum ∇ correcto
solum ferè observavimus ortos vomitus, à nostro
verò, quod cum phlegmate \times ti fieri diximus, nun-
quam vomitum, vel nauseam saltem, contigisse memi-
nimus.

Deinde non parum confert cacoëchymicorum hu-
morum in ventriculo præsentia, qui *αυαπποσις* suâ *αίνα*
vel *αίνα* viam affectant. Potissimum enim hæc vis
emetica ab opio accidit in naturis biliosis, & quo-
rum ventriculus scaturit amaris, acerbis, vitiosis hu-
moribus, præsertim, si rarior textura corporis acce-
dat. In phthisicis imprimis opiata sæpe purgantis vi-
cem obeunt.

Denique in principiis chemicis seu mixtione ipsa
causa querenda est. Certum enim est per experien-
tiam, quod illa, quæ Δ e copioso pollent, cum ∇ e
fixoacri, purgare, modò *αίνα* seu per vomitum, prout
Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Δ longè superat sal; modò *αίνα* per alvum, si ∇ suo
modo excedat, modò per superiora & inferiora, mo-
dò vehementius, modò lenius, prout mistio horum
variat. Ita, ut affinia solum opii consulamus, tabac-
cum, non solum ratione infusi purgans est, satis ve-
hiemens, quod, experientiâ teste, vel illinitione solum
corpori applicatum in scabiosis, ex observatione no-
stra, vomitus sat enormes concitare solèt; sed etiam
ipsius fumus per os haustus eundem edit effectum, &
experimento Anglorum clysteris instar per inferio-
rem gutturē inspiratus purgat. Vid. celeberrimus
*Bartholinus, cent. 6. hist. 66. pag. 311. 312. Simon Paulli
quadripart. botan. p. 461.* Sic mandragoræ succus duo-
rum dunaxat obolorum pondere haustus atram bi-
lem ac pituitam instar veratri purgat, menses quoque
partusque excludit, teste *Thom. Erast. Disp. de narcot.*
Quin si paulò curatius in vires purgantium & emeti-
corum inquirendi hic locus esset, idem pluribus de-
monstrare possemus. Ita antimonium totum ferè in Δ
converti potest, & nisi extravertatur hoc ipsum, ut
cum ∇ e sortiatur prædominium, vomitum non mo-
vet, uti constat, & in substantiâ contra epilepsiam
dari, vel per se, vel cum castoreo, asâ fœtidâ & gummi
 \times co mixtum, unde consurgit pulvis niger dictus, in
epilepsiâ hystericâ magni usus. Par ratio est ∇ li,
asari &c. unde concludere licet, cum abundant humo-
res acres salini in corpore, adsumpto opio facile posse
accessu Δ is opiat, & ∇ lis acris talem mistionem
oriri, ut vomitus vel alvi turbatio sequatur.

Adscribit hanc virtutem emeticam *Capacius* salî
 ∇ -lato, quod penitiori Vulcanico igne patescat, &
enormes vomitus concitare aptum sit, apud *Severini
viper. Pyth. in auctar. p. 516.* Id verò in opio vix reperi-
bile est, sufficit tamen denud, vomitoria pleraque ob
acrimoniam salinam volatilem stimulantem, vel ex-
plicitam vel implicitam, præcipuè accessu Δ is, ven-
triculum subvertere, ceu asarum, sedum minimum,
raphanus rusticanus, aliaque, ne transeamus ad aliâ
regna amplius, sunt emetica.

An in FEBRIBUS intermittētibz conveniant
opiat, lis est inter autores.

Si veteres consulimus, opiat & soporem indu-
centibus ad febrium paroxysmos tollendos eos usos
esse, cœrum est.

Sic *Hippocrates l. 2. de morb. c. 39.* ad quartanam se-
men hyoscyami & mandragoram commendat.

Galenus eodem nomine passim dilaudat theriacam,
in primis *l. de theriac. ad Pisonem c. 15.* ubi propria id
ipsum confirmat experientia.

Non minus *Trallianus l. 12. c. 8.* varia ad quartanas
præscribit antidota, quarum plurima gaudent opio &
alterco, cum aliis calidis & attenuantibus.

Cur opiat febrilibz mista sint, si queratur,
respondent alii, qui veterum sententiæ addicti sunt,
ut refrigerando aliorum caliditatem obtundant;
alii, ut virtutes simplicium in unum coactæ magis
& diutius conserventur. Eleganter *Prosper Martianus
in l. 2. de morb. f. 2. p. 174.* statuit, ea peculiari virtute fe-
bri conducere, non solum, quia refrigerant, quod ta-
men admittendum non est, sed & quia humorum mo-
tum compescunt, unde disgregatio eorum prohibe-
tur, quam causam morborum *Hippocrates l. de nat.
hum. exposuit.*

Si convenirent autores in causa febrium assignan-
da, quo de libro *x. praxeos clinica*, seu *de febribz*, pro-
pediem edendo plura dicemus, utique etiam magis
constaret, utrum opiat sint concedenda.

Conveniunt hæc in illa curandi febres methodo,
quæ extraordinaria quibusdam audit, (cum ordina-
ria per ablationem causæ statuatur) & morbificæ cau-
sæ fixationem infert, impediendo scilicet, ne materia
ex fomite ad cor deferatur, sique in centro suo deti-
neatur.

neatur. Quin causam ipsam earundem suo modo respiciunt, quatenus humores peccantes corrigunt, sudoremque movent.

Notandum tamen, quod hæc primaria intentione non promiscuè usurpanda sint, nisi quid potenter urgeat, & præmissis universalibus materia sit præparata & depleta. Tunc enim si reliquæ quædam remaneant, rebelles tamen, & sæviores insultus, optime profunt opiata.

Adde, si minus cacochymici sint ægri, & cum nimia sanguinis ebullitione, maximè verò cum virium resolutione, dolore & vomitu conjungitur febris, tunc sæpe nullo alio proficiente heroicum hoc medicamentum hostem superat indomitum.

Metuunt quidam, paroxy(morum initio exhibita opiata, cum materia ad cor jam ruit, facillè illud prorsus suffocari posse, si per narcotica motus ille inhiberetur. Sed metus est inanis, observatis modò dictis circumstantiis.

Eleganter hanc in rem *Horstius* problemat. therapeut. decad. i. quest. 7. plurimas, ait, febres intermittentes, præserim quartanas, post præparationes & purgationes debitas cum ꝑ *Orzo*, extr. *helleb. nigr.* & *diaph.* &c. auxilio *laudani opiat* sublatas fuisse, duabus vel tribus horis ante paroxysmum exhibit.

Si experientiam nostram confulerimus, non raro hoc modo curatae febres. Novimus studiosum ex recidiva tertianarium, & quidem simplici tertiana in duplicem commutata, qui nullo specifico antifebrili curari poterat, donec tandem tres pilulas ex laudano opiato propinaret illustri etiam post fata *Rolfincius*, quibus sumptis indormiit patiens; forte expergefactus leviculè bis inhorruit, calor emanfit penitus, neque ulla amplius sequentibus diebus *Antiquario* febrilis sese prodebat, quæ à prandio ut plurimum se manifestabat antea.

In usu nobis est, pulveres antifebriles , ante paro-
xysum justo tempore adhibendos ex ①①-10, &
diaph. conchis vel nostratibus, vel marinis, matre per-
larum, lap. ☉ preparatis, C. C. usq, ☉ abs. cent. min.
& similibus miscete cum anodynis intentione secun-
daria, addito olei antifebrilis nostri , quod ex oleo
caryophyllorum, piperis & camphoræ componitur,
una vel altera guttula, qua ratione, interpositis pro ra-
tione circumstantiarum correctioribus emeticis, vel
purgantibus, absque V. S. felicissimè & brevissimo
tempore febres plerasque curavimus , absque ullo
recidivæ metu.

Hæc enim si observentur, non metuendum est fulmen *Billichii* obf. § *paradox. l. 2. cap. 2. p. 113.* ubi flagris dignam cenfet Paracelfistarum audaciam, qui febre periodica detento, hora ante suspectam accessionem, pilulam exhibet opiatam, sic jugulaturi febrim, quando resistunt paroxysmo. Cum symptomatis fallace atque intempestivo fomento adulantur ægrotis, sæviunt in naturam, hujus motum pervertunt, materiam peccantem visceribus altius impingunt, infarciuntque tenacius; ad mala ipsa febre deteriora, cachexiam, arquatam, aquam inter cutem, abscessus, stabilem faciunt gradum. Vis horum ex dictis jam abundè pater. Confer *Plater. l. 3. Prax. Tr. 2. c. 2. p. 148.*

De *FEBRIBUS* verò *CONTINUIS*, inprimis malignioribus, major est controversia.

Agnovere in opio vim alexipharmacam veteres, cum præter jam supra dicta contra morsus animalium venenatorum illud commendarint. Ita ex *Erasistrato* morsus à basilisco præter castoreum etiam τὸν τῆς μήκρας ὀνὸς commendat *Dioscorides l. de venenat. animal. c. 35*. Confirmat idem *Avicenna*, qui, licet morsum illius immedicabilem asserat, conferre tamen maximè, si quid aliud, castoreum & succum papaveris, eo enim loco semen pro succo papaveris

perperam legi non abs te credit 7. *Ant. Saracen. schol.*
in *l.c. Diof. c. p. 140.*

Antididori eorundem omnes ferè gaudent opio.
Opium movet sudorem, ebullitionem & fermenta-
tionem p.n. sistit, poros cordis & ~~venarum~~ ^{venarum} contra ma-
lignitatis atomos & ~~venarum~~ ^{venarum} munit.

Sed si in ullo affectu, certè in hisce cautè cum opio
mercandum. Latet anguis in herba, unde infauſta ex-
hibitionis opiatorum in cauſo, & malignis exempla
non rarè ab imperitis harum rerum exhibitorum oc-
currunt, qualia in ſpecie adnotavit præter alios *Ballon.*
libr. I. conſil. 69.

Quando ægri de immodicis vigiliis conquesti fuerint, poriferum à medico sollicitant, non facillè parendum est, ne malignitatis vis cor penitus petat, sicque subito hominem jugulet.

Si tamen necessitas hujusmodi remedia suadeat, tutius alexipharmaca, bezoardica & cor munientia alia adjunguntur, ita ut minor semper ratio habeatur vigiliarum, quàm malignitatis. Hinc in pauciori opiata danda sunt quantitate, v. g. si laudanum opiatum cum diascordio Fraecastor. ad gr. j. præbeatur, ut h. m. sudor, crebra corporis investigatione prohibitus, commodè excitetur, naturaque vigiliis debilitata & morbo, robur acquirat valentius, ut taceamus delirium ita præcaveri.

Alii distinguunt inter tempora febrium. In principio & statu non convenire *ajunt* opiata, quippe illic turbare magis humores, crudiores reddendo & retardando; hîc impedire crîsin, & *αἰσίν* à natura institutam inturbare, utrobique verò malignitatem magis cum corde communicari. In declinatione verò tantum abest, ut noceant, ut potius prudenter adhibita magnum afferant emolumentum, pacata reddendo omnia, vires roborando, & sanguinis tonum restituyendo. Opportunè etiam dari posse in morborum incremento *l.c. Ballonius* observat.

Hanc in rem egregiè prodest electuarium mitigativum in febribus ardentibus, à Zuvelffero descriptum *pharm. reg. class.* 14. p. 588.

Elegantè de hoc ipso differit *Riverius* l. 17. *Praxi-
med. cap. 1. pag. 544.* ubi in febribus malignis, si ma-
gna sit vehementia symptomatum, non solum recen-
tem theriacam commendat, adeoque opium in ea, ad-
huc vigens, sed etiam, præcipuè morbi principio vel
augmento, laudanum opiatum ad gr. ij. cum alexi-
pharmacis permixtum, cujus rationes ponderosæ
ibidem videri queunt. Confer *D. D. Joh. Dan. Hov-
stium judic. de chir. infus. p. 45.* ubi inter alia, crede
mihi, inquit, in febribus malignis petechialibus, va-
riolis &c. opiata utramque paginam absolvunt. Ex-
empla etiam alia faustè adhibitorum opiatorum ve-
deri possunt ap. *D. D. Herm. Grubium l. de medic. simpli-
cognosc. p. 148.*

Nos quotidianousu observavimus, longè feliciter operari v.g. tincturam bezoardicam cum tinctura nostra anodyna combinatam, quàm solitariam, refracta tamen semper opiatorum dosi, ne nimis figendo sanguinem ad receptionem veneni cor magis disponant, quatenus ligant ferè tunc ipsius actionem, & contra id insurgendi promptitudinem. Hac verò ratione salubrem opiatorum opem plus vice simplici experti sumus, & hoc ipso præcavimus aliâ timenda symptomata. Deinde, ubi nihilominus vigilæ contumaciores, ad se auxilium vocaverunt, cum temperatioribus bezoardicis & fixioribus non raro miscuimus opium, v. g. cum pulvere bezoardico, qualis est Sennerti vel noster, illudque, interpositis præcipuè humectantibus & paucitatem acrimoniamque seri corrigentibus, non sine successu adhibuimus, idque tum aliàs sæpius, tum hoc ipso anno ante paucos menses in laborante continua maligna febre.

febri studioſo expertiſſimus proficuum, qui, aliàs tamen ſeroſior, per aliquot dies delirabat; & jam floccos legere videbatur, cum ſignis inſtantium mor- tum convulſivorum, nihilominus tamen feliciter evaſit.

Nec temerè in his ſe gererè oportet medicum nec timidè. Nos ſemper loco regulæ in his obſervavimus & reſpeximus ſerum, ut defectu ejusdem reſtituto hu- morum ſub conſiderationis jugum reſtituatur exor- bitantia.

Si ſolitaria opiata & in majori doſi indicent & cogant quaſi circumſtantia, per ſe tamen ex ſpeciali medendi methodo liquet, & antè & poſt illa be- zoardicis vel fixis vel volatilibus, & inter illa v. g. Oſis, eſſe inſiſtendum, opium verò ut colopho- nem quandam acceritendum, qui urgentiora debel- let ſymptomata, motus furibundos compelcat, orgaſ- mum humorum ſiſtat, & quæ alia indicantia attendi merentur.

Quando verò cum febris junguntur dolores in- tenſi, vel excretiones humorum quæcunque impe- tuoſiores, in ſpecie catarrhi, tuſſis, vomitus, diarrhœa, &c. tutius longè & præſentius ex crebriori noſtra ex- perientia opiata officium præſtant, quod infra exem- plo pleuritidis & dyſenteria reddemus clariùs.

Inſtante criſi vel die critico non temerè dandum opium ne natura à conatu ſuo impediatur.

Idem ſerè dicendum venit de *PESTE*: ubi me- thodus non ordinaria; ſed extraordinaria & coacta quaſi locum habet, pariter non tam ſolitaria, quàm cum alexipharmacis ſociata in uſum vocanda opiata.

Pulcrè hanc rem *D. D. Gieſelerus de peſte Brunſvi- cenſi obſ. 36.* opiata, ait, cum ſudorem ſoleant movere, etiam initio turgente materia quandoquæ cum fructu adminiſtrantur, tunc ſcilicet, ubi recta medendi methodo progredi non licet, ut in deliriis & vigiliis efferis, verum pauca quantitate, & ad- mixtis alexipharmacis, uti ipſe non ſemel in peſte illi ſuit expertus.

Huic geminum eſt teſtimonium *Job. Henneman- ni Reiſingii*, qui in *idea loimode pag. 38.* ſe exper- tum ſcire ſcribit, quid opium poſſit, ſi alexiphar- macis miſceatur, in fervore hoc ſpiritali extinguen- do. Addit, quando expulſivis miſcetur in recta doſi, tunc ſpiritus illius contagioſi motum ſiſtere, ubi ex- pulſivum medicamentum poſteſt illum unà cum cor- rupto humore faciliùs à corde arcere & ad cutem propellere.

Hinc, uti jam ſæpiùs diximus, opium antidotis & aliis medicamentis contra venena, & maximos quoſque morbos rectè miſcetur, ut conjunctim cum iſdem pluribus ſatisfaciat indicationibus. Hinc, quæ verba ſunt *Gefneri l. 1. epiſt. p. 45.* ipſa rhe- tiaca plurimum habet opii, non quidem, ut fervorem aut acrimoniam aliorum mitiget, corrigatve, (frigi- dum enim non eſt) ſed propter vim ſuam peculia- rem, quæ tollit dolores, & ſubtiles ac penetrantes humores vaporesque venenofos coercet ac ſiſtit, ut alia prius via evacuentur, quàm ad cor perſtingant, tum quia ſudorem movet. Addit idem vir doctiſſi- mus his loco epiphonematis: His antidotis opium aut ſimilia aufer, animam abſtuleris hoc eſt, baſin & vim præcipuam earundem. Confer. *Bonet. animadverſ. in Girc. c. 4. p. 42.*

Conſirmant opiatorum in peſte uſum *Rondeletius, Platerus, Angelus Sala, Mindererus*, alique. Vide- tur huic aſſeritio contrariùs *Rhaſes l. de peſtil. c. 6.* & *Diemerbroeck l. 3. de peſt. c. 8. p. 233.* qui lethalis eventus ab adhibita portione narcotica meminit *l. 4. hiſt. 49. p. 302.* Sed mitiganda eſt ſententia. Verum eſt, non prin- cipaliter & ſolum ſomnum provocandum, omiſſa

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I. l.

malignitate, ſed non efficitur eo ipſo, nullum planè locum habere in peſte opiata.

Par ratio eſt in *VARIOLIS & MORBILLIS*. Licet enim in his pro negativa contra opiatorum uſum adduci poſſit, quod ſpiritus quaſi ſigat, & torpidos reddat, ituporemque inducat opium, ideo- que eo abſtinere ſatius ducatur, ubi expellere ani- mus ſit; Nihilominus ſi convulſionum advertantur indicia, ſi vigilæ vel dolores gravioreſ adſint optimo conſilio pulverem bezoardicum cum *ZZ.* nativa ſe- lectiſſima, vel *ſſi.* & *ſſi diaph.* & paucis granis magi- ſteri anodynii feliciter eo in caſu miſcuiſus. Accedit quod hoc pacto materia ſubtilis aliquo modo redda- tur ad expellendam aptior, & alvi fluxus, uti aliàs à natura bene agente tunc ſtudioſè ſolet adſtringi, præ- cavetur.

In *PHRENITIDE* ſpiritus efferveſcentes in- domitos demulcet & coagulat laudanum opiatum ad *iiij. iv.* vel plura grana datum. Sic Principi cuidam Germano phrenitide cum febre acutiſſima laboranti laudani gr. v. propinavit *Paracelſus*, quorum uſu ſex integras horas dormivit, & ſtatim febris abiit, ceu vi- dere eſt in ejusdem *obſervatione 106.* & apud *Finck- enſch. dogmat. hermet. c. 3. p. 13.* Exempla alia videri poſſunt apud *Horſtium libr. 2. obſ. 25. pag. 92.* & alios.

Quamvis febre vigente in phrenitide narcotica non omninò proſint, neque deſtinatum à medico ſco- pum feriant, tamen opportunè & in declinatione morbi adhibita præclaros effectus edunt. Rationes curioſas adducit *Thom. Sydenham. meth. curand. febr. ſect. 2. p. 52.*

Certiſſimum idem ibidem pronunciat, laudanum vel alia narcotica quævis in principio, augmento vel ſtatu morbi ad ſymptoma hoc (phrenitidem) levan- dum vel non prodeſſe omninò, vel, quod ſæpe accidit, etiam obefſe. Verum in ejusmodi morbi declinatione eadem mediocri doſi exhibita, v. g. die 12. vel, quod melius, 14. non ſine ſucceſſu uſurpari. Si per vires ægri liceat, decem vel duodecim horis ante narco- tici uſum purgans præmittit. Sed quis nescit, poſt 14. diem ut plurimum morboſtales acutos extra pe- riculi aleam poſitos? Aſſeri omninò poſteſt, etiam h. l. cum bezoardicis & aliis morbo debitis ſuam manere opiatis laudem, etiam in initio, ſi inquietudines magnæ moleſtæ ſint, & vigilæ laborioſæ vires infe- ſtent, & febrim augeant, vid. *Hartm. prax. chim. c. 8. p. 60.* ne quid tamen nimis.

Supervacaneum eſt adducere teſtimonia, adhi- bitorum feliciter opiatorum in *DOLORE CA- PITIS* & ejusdem ſpeciebus, maximè hemicrania. In hac aliquoties poſt præmiſſa, quæ addecet, ſudo- riſera; inprimis verò non omiſſo veſicatorio, omne tulit punctum laudanum opiatum ſuaſu noſtro adhi- bitum, vel in *liquida* forma, cum *ſſi* cephalico, vel in *ſolida* cum mineralibus anodynâ habentibus & cephalicâ vim, v. g. cum ſpecifico cephalico re- mixtum. In cephalalgia urgente *Enſtack. Rudius* dat gr. *ij.* vel *iiij.* opii correcti cum croco *l. 1. de hum. corp. affect. c. 1. p. 9.* maximè à cauſa calida, à qua dolores pertinaces ſunt.

Uſus opiatorum non minimus eſt in *VERTIGINE*, autore *Tralliano lib. 5. cap. 4.* ubi diacodium commen- dat illis, quibus vertigines ob calidos vapores ex ven- tre, aut corde, aut jecore aſcendentes oboriuntur. Lau- danum opiatum ſacrâ ſæpe eſt anchora, figendo hu- mores & ſubtiles ſpiritus, ſive in capite ipſo proprio vitio extra ordinem in circulum motos, ſive, quod frequentius contingere vidimus, ab hypochondriis illuc derivata labe.

Hypochondriacus vir magnificus, cum inter alia ſymptomata pateretur vertiginem adeò, ut in ſubli- me trahi & hinc rotati videretur, non ſine metu lapſus

subitanei in terram, feliciter curabatur. Olibus liquidis, Tinctura v. g. \odot cum arcano Φ per infusionem parata, essentia \odot ta antiscorbutica, combinatione \odot l Φ ci & tertæ Japonicæ extracta elegantissima, & pilulis confortantibus cephalicis ex ladani extracto, specifico cephalico & laudano opiato confectis, quatum usum plus vice simplici experti sumus & in aliis salutarem. Profuisse in vertigine opiatum hoc laudatum, experientia sua confirmat *B. Rolsincius* noster *Dissert. VI. de affect. capit. p. 34.*

An in *MANIA*, alitque deliriis, opiatia conveniant, lis est inter scriptores medicos.

Taxavit eo nomine suo jam tempore sectæ suæ contrarios *Cælius Aurelianus l. i. tard. pass. c. 5.* quod cupiant certis, medicaminibus maniacis somnos altos efficere, papavere foventes, & pressuram potius atque gravationem capitis, non somnum ingerentes.

Advertant, *Helmontius* insurgit, qui amentes per soporativa sanare intendunt. Nam narcotica vix somnum conciliant amentibus quadrupla dosi, sed amentiam insuper augent *l. retenta pag. 382.* Confirmat idem *jus duumvir. §. 56. p. 191.* ubi ait, sæpe per immania soporifera mania succurrere frustra est tentatum. In quadruplo sui nempe vix somnum conciliant: ideoque terrore plena est eorundem exhibitio. At non minuitur furor per sopores aut vincula. Narcotica namque dant somnum somniaque molesta.

Et libro de lithias. cap. 9. text. 84. qui maniam opiatibus compescere satagunt, insigniter errare docet, 1. cum omne opiatum in se sit amens, quia amentia nil præter somnium vigilans. 2. vix decupla opii dosi somnum amenti conciliet, minori autem dosi efficiatur nihil. Ergo, innuere vult, vel frustra adhiberi, vel cum somno periculo. 3. diffare, ait, somnum sponte propria amenti obvenientem, illum enim, ut ex causa bona provenit, ita & sanitatis præcursores indicem, amentiam solum iri, spondere, somnum verò ab opiatibus excitatum laborem adferre, & consequenter malum esse. 4. addit, quod in opio sit connexum aliquod virus, unde lethalia papavera somno decantata.

Ipse verò extollit in \odot li delitescens somniferum saccharinum, quod suavem apportet somnum, cum facultatum principum instauratione.

Omnia hæc hypothese innituntur illi, dari verum \odot li anodynum, cujus præparandi ratio legitima vulgò in Paracelsi, aliisque desideratur. Neque enim processus à *Quercetano*, *Penoto*, *Hartmanno* &c. propositi expectationi æquè satisfaciunt. Alii in \odot lo vim talem soporiferam & anodynam planè negant. De processu verò Helmontiano \odot is hujus pluribus agemus in *Diatr. nostra de \odot co.*

Concedimus utique Helmontio, medicamentum à se sub \odot is hujus \odot li nomine commendatum prodesse posse maniacis, edocti experientiâ, in \odot lo & \odot le Φ co vim cephalicam insignem, in melancholicis & maniacis sæpissimè nobis comprobata, delitescere. Verum eo ipso non tollitur opiatum in deliriis usus.

Si Helmontium rectius attendimus, videretur se ipsum explicare *l. c. jus duum vir. §. 57. innuens*, mentem suam fuisse, non, quod omnino opiatia non danda sint maniacis & melancholicis, sed solum, non ut medicamentum primum, non solum; sed causam esse attendendam, quæ in hypochondrio sedeat plerumque. Quin ipse paulò ante dixerat *§. 40.* opiatia suspendere lienem ab operosa phantasmatum seriorum exercitatione. Jam verò delirantes diversimodis phantasmatibus continuò quasi urgentur, operosè & feridè in absurda labuntur, emota ex orbita sua, ut sic loquamur, ratione.

Observarunt alii, dato opiato laudano ægros maniacos & melancholicos evigilantes majores insanie perferuisse stimulos, quibus urgentibus in proximos furunt.

Sed non sola opiatia adhibenda sunt. Præmittenda sunt universalia, V. S. purgatio, alterantia, humectantia, & refrigerantia. Seri enim defectus præcipue in causa est, quod opiatia non possint vires suas exerere, quod Δ e balsamico opii gravidum eo ipso irrigare poros cerebri, & spiritus demulcere supra evincimus. His non juvantibus, quid obstat, quod minus opiatibus sanguinem fervidiorem atque inordinatè motum sistamus, somnum, cujus defectus præ reliquis urget, provocemus, cum à vigiliis non interpolatis delirium augeatur, sicque spiritum effrenem & inordinatum impetum ligantes ægrum liberemus. Volatilitas ergò bilis obtundenda v. g. acidis & figenda opiatibus, quibus solummodo sæpe maniacos curatos novimus, non neglecta seri restitutione proportionata.

Non agere opiatia in his, nisi auctiori dosi, non obstat. Si enim mediocri dosi datum non proficit, ascendendum ulterius, ut indicatum indicanti respondeat.

Delirare quosdam magis à dato opio, concedi potest, & verissimum est, in iis, quibus serum parcius est, & Δ sanguinis prædominatur, idem tamen non valet in omnibus. Reliqua ulteriori discussione non opus habent. Somnus itaque, elogio *P. Aegineta l. i. cap. 97.* divinam illam auræ particulam, mentem scilicet fluentem, emendare consuevit.

Scribit *Petr. Victor l. 4. var. lect. p. 46.* tigrim, quæ catenis etiam vincita, tuto tractari non potuisset, opio in stuporem conjici necessum fuisse, (quod tamen cum succo mandragoræ omnino videtur confundere,) ne per urbem ad ipectaculum deducta læderet. Ferinum furorem maniacorum ligat opium, ne irruant, & lædant obvios.

Eleganter *Paracelsus l. de morb. ament. Tr. 2. c. 2. p. 501.* remedia mania dividit in alterantia, & figentia materiam peccantem. Utrorumque exempla proponit plura, figentia verò constituit opiatia, eademque de meliori commendat.

Exempla feliciter adhibitorum opiatorum in mania, cum cordialibus & humectantibus, videri possunt apud *Hildan. cent. 4. obs. 9. p. 293.* in melancholia ad maniam vergente *Horst. l. 10. obs. 3.* alioque.

Nos in iisdem casibus aliquoties utiliter in usum vocavimus opiatia, præmittentes vel emetica, vel purgantia, & præter alia appropriata interponentes modò acida, modò urinosa, in furore uterino bezoardicum ζ le, ζ zrin nativam, alia.

In *EPILEPSIA* sedativa seu narcotica, & in specie opium, ritè tamen præparata *Paracelsus l. c. cap. 1. p. 499.* commendat. Hæc, doctissimè ait, mirabilem contra caducum habere efficaciam, si cum volatilibus misceantur. Repetit idem præconium & dicit, si v. g. cum arcano \odot li misceantur opiatia, prodesse in epilepsia, ultra quàm credi possit.

Neque id immeritò, sive id fieri credatur, quia acrimoniam humorum vellicantium sistant, sive eorundem visciditatem incidant, sive ligent in centro, & partem roborant, adeoque vapores & spiritus morbificos congelent, dissipent & confortatis visceribus propellant, & epilepticum spasmus inhibeant. Hinc eadem antepileptica, \sim \odot li volatili, elixirio cephalico cum \sim urinoso, in forma liquida, essentia v. g. anodyna, pulveribusque cephalicis in forma sicca cum fructu miscentur, præcipue, si v. g. in infantibus ipsique adultis tormina & partium membranarum vellicationes adsint, quod internam epilepsiam vulgò vocant, quod multis probare possemus experimentis. Hinc, monitore *Sennerto l. 1.*

l. i. præf. part. II. cap. 3. p. 594. ubi paroxysmi epileptici instantis signa præsentit ager, pilula una laudani opiatæ, cuius partibus quatuor una olei camphoræ admixta fuerit, assumi potest.

Hinc *Quercetanus* *tetr. aff. cap. 6. 16. p. 214.* nepenthes tuum epilepsiæ promptissimum ac singulare eff. re subsidium, *scribit.* Exemplum huius rei observatum in puella bimula trium horarum convulsione laborante, nepenthes opiatæ curata, extat apud *Cratonem* *epist. p. 251.*

Videndum tamen hic, ne, si natura ad exteriora contendit materiam morbosam depellere, motu hoc inhibito resistens circa cor materia suffocationem exciter, quale exemplum contigisse ante aliquot annos novimus.

Si *CATARRHI* deplui à capite, ex sententia veterum, seu solutum quasi in cloacam sanguinis excrementum negotium facebat, & tenuitate sua acedineque molester, opium openi fert, tum causæ radicalis respectu, tum producti posterioris intuitu. Si ad unum vel alterum granum deint laudanum opiatum, ad miraculum utque catarrhos sistit, eoque ita ad *πεπαισµον* deducit, ut sine noxa & periculo excerni facile possint.

Celebris medicus, cum catarrhis tenuibus serosis affligeretur frequenter, trochiscos narcoticos Platei semper pro comitibus secum habebat. Nos in iisdem casibus feliciter sæpenumero suavisimum opiatæ, quæ ob hanc suam *ἐνέργειαν* merentur, ut *κρίν' ἐξοχλῶ* nominentur ad catarrhalia medicamenta, *Flusx-pulver*, *Flusx-pillen*, *Flusx-essentz*, & hoc ipso nomine lubentius ab ægris adsumuntur.

In *TUSSI* optime se gerunt opiatæ, præcipue, *ὅπου λεπτὸν ἐστὶ καὶ δεινὸν τὸ ἐπιρρέειν, καὶ ὁ θώραξ ἐκ ἐστὶν ἐχὼν ἀντιώματος πλῆθος*, quando id quod influit, tenue est & acre, thoraxque recrementi copiam non habet, & quibus fluxio tenuis à capite in asperam defluit, quæ propter insequentes tussis dormire non permittit. *Πάνυ γὰρ ἐστὶ συµµέτρως διδύµηται καὶ πῖσις, καὶ ὠφελιµώτατα, καὶ παλαιὰς βήχας ὑπὸ λεπτῆς ῥέυµατος γυνώσκας ἰσχύει.* Nam cum moderatè offeruntur, præstantissima sunt ut lissimæque, & veteres tussis à tenui fluxione concitatas persuadent.

Hoc ipso modo in suffocationem molientibus catarrhis insigniter profunt, tussim tollunt, materiam peccantem coquunt, & ad naturalem statum deducunt, ut & excerni possit, & sine molestia id fiat.

Sunt verò ὅ γέναι καὶ *μυσήλειον*. Quin nulla tussis sine opiatæ feliciter tam citò, tam jucundè & tutò tollitur.

Licet enim, ubi viscosi, crassi & glutinosi humores in bronchiis pulmonum continentur, & abundant, minus convenient, & suffocationem intentatequeant; est tamen illis & in hoc casu suus locus, refracta, secundaria dosi, si *δεόντως* decenter cum incidentibus vel maritentur vel interponantur, cum & ipsa incisionem & attenuationem hoc modo juvent, & imperum sistendo, naturam roborent, ut felicius excerni possint.

Merito igitur in tussi hæc commendat præter veteres, in primis *Trallianum* l. 5. c. 4. *Helmontius* libro *jus duumviratus* inscripto §. 62. faciunt enim non solum, ut melius longiusque aut quietius dormiant, sed, observante eodem, etsi infomnes nihilominus urgent noctes, tussim tamen pacant, & copiosa flava compactaque sputa compescunt, ut materia vitiosa imminuatur, & *πεπαισµῶ* præcedente in melius mutetur. Commendat in specie laudanum opiatum *Paracelsi*, ut, secundum ejusdem principia, indignatio archæi sopiatur.

In priori casu etiam sola dari possunt, ut acredo humorum salforum & serosorum corrigatur, illo-

rumque *ἐκσπύρις* in pulmones cohibeatur, in altero remixta, ut cum elixirio pectorali, &c. Hæc, verbis *Osavii Horatiani*, lib. 2. part. 2. cap. 7. (ubi pro apium, rectius videtur legi opium) & coagulare valent phlegmata, & somnos invitare; hæc sui natura & soluta constringunt, & beneficio præstanti, tussire minus faciunt dormientes.

An verò in *ASTHMA* opiatæ convenire possint, non immerito disquiritur. Vulgò quidem parum de usu contra hunc affectum constat, quin prohiberi potius solent, ut quæ respirationem potius difficiliorem reddant, quàm faciliorent.

Nos in asthma præcordiali, præmissis emeticis, utiliter dedimus tum fomitem in hypochondriis respicientia, *Opia*, præsertim *Plata*, tum eundem sedantia, opiatæ, quæ & resolvunt in gummos aptum sanguinem, & prohibent vapores, ne vel ad diaphragma vel ad pulmones ferantur, & hoc modo feliciter invenere auxilium suspiriosis, quibus etiam elixir pectorale nostrum cum *σκι* volatili, vel gummi etiam *σκι* commodè interposuimus, cum aliis solventibus ex spermate ceti, mineræ *Opæ*, lacte *Δ*, & diaphor. cum præcipitantibus aliis.

Laborabat asthma sæpissimè & per intervalla primum, ultimis annis verò prope continuo vi primarius, cum sputo purulento, aliis arthriticis, quoque passionibus frequenter afflictus, hic verò à nullo medicamento majorem sentiebat opem, quàm ab opiatæ, quibus circa noctem datis, manè altero coctam aliquantò materiam excernebat & liberius spirabat. Post mortem à nobis apertum corpus exhibebat pulmones undique & undique firmissimè adnatos, & aqua purulenta plenos.

Cum itaque certum sit, sæpe asthma fieri etiam à fluxili materia, quæ apta nata est pulmonum bronchia obstruere, quod hoc loco latius probare institui nostri non est, cur non utilissimè illi opponantur opiatæ? Cum ex hypochondriis tantum non semper eleventur hi vapores ac halius ad thoracem, & motum diaphragmatis juxta ac pulmonis interturbent, quidni ligata per eadem & fixata primigenia labes opiatæ debeantur asthma? Taceo vi tunc, quam habet resolvendi & disjiciendi humores, quo nomine theriaca etiam non raro commendata fuit etiam apud veteres suspiriosis & anhelosis, modò *ελαβὼς* omnia fiant, & benè consideratis circumstantiis, sicuti inepetum foret, in asthma hydropicorum, sicubi restagnans ichor, spiritalibus jam intentat periculum, aliisque ejus generis speciebus, opiatæ uti.

In *PLEURITIDE* narcotica opiatæ fugienda esse, sedulo inculcat *Trallianus* l. 6. c. 1. *Φόβος ἢ inquietὸν ἔχει καθεὶν καὶ τὸ φλάνειον, καὶ ἄλλο ἢ τῶν παρηγορητικῶν φαρμάκων κινδύνος ἢ μεγίστος ἐπιφέρεισι δυσαναστοχῶν πάντα τὰ ὅ γε ἐργαζόµεθα, μετὰ τῇ μεταβάλλειν καὶ νεκρῶν ἢ τῶν δυνάµιν.* Fugito autem diacodium, & *Philonium*, aut aliud quoddam leniens medicamentum, maxima namque pericula inducunt, dum omnes humores eductioni contumaces reddunt, præterquam, quod etiam vires prosteruant, reddantque emortuas.

Idem tamen ibidem ipse hoc limitat, eademque concedit, *εἰ ἢ ἐὶ δύνῃ σφοδρῶ καὶ ἀκατήρτος, ἢ γυναικὶ πῶλη τῆς δυνάµεως ἐρρωµένης, si dolor vehemens, & intolerabilis urgeat, vel etiam vigilia multa viribus robustis torqueant.*

Nos non dubitamus specificis antipleuriticis ac censere opiatæ. Si enim in principio morbi opponantur bezoardica volatilia, v. g. *Tinctura bezoardica*, cum essentia anodyni nostra remixta, parcius scil. sub dictum initium, succedente verò tempore, præsertim circa declinationem magis eadem maritentur specificis fixioribus, ut cum *dent. apr. philos.*

ppt. lapid. & mandib. luc. pisc. & diaph. ZZ. nat. ana
Dj. laudani opiatu gr. j. vel ij. dici non potest, quàm
 promptè morbus auscultet medico. Expectatio hinc
 melior succedit, vires confortantur, & ipse morbus
 feliciter longè ad finem decurrit, & hoc pacto tæpif-
 sine, etiam abique ulla V. S. restituimus pleuritico-
 cos. Omittimus alias rationes, quæ ex præcedenti-
 bus colligi possunt, ne eadem toties repetamus.
 Adeoque effatum Apollineum *Gabrielis Fontani me-*
dic. antithermet. p. 418. minus tale est, narcotico-
 rum & soporiferorum remedium usum in pleu-
 ritidis dolore etiam urgentissimo esse nocentis-
 simum.

In pleuritide epidemia & pestilentiali, ex sero
 scorbutico, laudanum opiatum commendat *Drav-*
utius Tr. de scorbut. sect. 7. p. 242. etiam in vulgari
feu simplici ibid. pag. 232.

Hoc ipso nostro pulvere dato mirandos sæpius ef-
 fectus vidimus non solum in vera pleuritide, verum
 etiam in aliis pectoris apostematibus, adeò, ut ali-
 quoties præsentaneo cum levamine per alvum puru-
 lentam materiam inde evacuatam viderimus. Et hic
 ipse longè excellentior est, quàm alii etiam secretis-
 simorum nomine hinc inde commendati. Notavi
 etiam *Dia & Atrata* talibus casibus antipleuriticis
 remixa paulò gravius ægros affecisse, unde hætenus
 majori cum fluctu eadem his exclusimus, non igna-
 ri nihilominus, quantoperè & profint alias & com-
 mendentur.

In *PHTHISI* optimum est opium, si prove-
 niat morbus à *καταρροή* humorum acrim, salto-
 rum ad pectus, vel à sputo sanguinis; sublatis
 enim hisce, seu causis, tollitur consequens, seu
 producendum.

In phthificis verò ab ulcere pulmonis, annotante
B. Rolincio ch. m. l. A. F. R. l. 4. f. 3. c. 6. inhibet &
 sistit sputum. Inde periculosa ejus exhibitio. Suffo-
 cantur inde ægri non rarò, qui unum aut alterum
 diem supervivere potuissent.

Respicendum est semper ad expectorationem fa-
 cilem, quamdiu illa benè procedit, prorogatur vita
 phthificorum. Sin supprimatur, opiatu dosi ordi-
 naria adhibitis, noxa præsto est. Dosi verò minori
 refracta, quæ distinctio quàm maximè attendi mere-
 tur, commodè in usum vocari & cum aliis misceri
 potest.

In *CORDIS* affectibus quidem non primariò & so-
 litariè prodest opium, unde inter cardiaca propriè &
 strictè dicta locum non obtinet, nihilominus, ubi
 virium exolutione spiritus deficiunt, aliquoties pro-
 fuit opii grani unius tertiam partem cordialibus res-
 cientibus admiscere, & maximam præstitit utilita-
 tem. Hoc enim modo non solum spiritibus materia
 suppeditatur, sed & eorum dissolutio prohibetur,
 unde maximus virium lapsus dependet, seu optimè
 alicubi observat *Kyperus*, adeoque suo modo confor-
 tat quoque opium spiritus.

Debetur opium grumescentiæ sanguinis, quam li-
 pothymia, syncopes & palpitationis cordis causam
 adduximus *Ephem. Germ. ann. II. observ. 197. p. 298.*
 crassiores partes ejusdem resolvit, tenuiores alterat
 & dissipat, actiores verò temperat & corrigit.

Hinc in ejusmodi ægris, lipothymia sc. syncope &
 cordis palpitatione laborantibus, quæ symptomata
 sanè in hypochondriacis sæpissimè observavimus, ces-
 santibus etiam in prioribus omnibus operationibus
 animalibus & vitalibus ad sensum, nil præsentius in-
 venimus & consultius, quàm resolventia & præcipi-
 tantia opiata per vices adhibita. Abegimus affectum
 & illum præcavimus his solis.

In usu nobis est eum in finem *pulvis absorbens* di-
 ctus ex *Q. lo &*, cum *Q. diaph.* vel in mulierib. bez. *z.*

conchis, lap. & coralliis & cinnabari compositus, ita
 ut singula dosis constet grano uno solum vel altero
Q. l. &, & tota compositio recipiat simul opium. v. g.

℞. Q. li & g. vj. conch. ppt. lap. & ppt. corallior. &
diaph. ZZ. nat. a. 3ss. gr. xv. Dj. laud. op. gr. j. ol. ca-
ryoph. gr. j. M. F. pulvis. D. in charta S. auff 6. mahl.
 Potest dari pro circumstantiarum urgentia singulis
 horis, cum aquis cinamomi, meliss. aliisque spirituo-
 sis, vel solum cum vehiculis domesticis, cerevisia vel
 vino. Addere etiam licet pro ditioribus, si cui id li-
 beat, perlas, lap. bezoar, ol. cinam. & alia.

Non possum satis deprædicare effectus, quos ab
 hoc uno pulvere vidi, quàm citò omnia conquie-
 rint inde symptomata, quàm feliciter tono suo resti-
 tutus sanguis, quàm optimè etiam symptomata hyste-
 rica huic ipsi morem gesserint, subsecuto sæpius vo-
 mitu cum maximo juvamine, uti ab ejusmodi resol-
 ventibus novum non est in praxi, & alvum & vomit-
 um quandoque cieri, licet effectu æquivoco. Præfe-
 rendus eo nomine hic meritò tot siropis, speciebus &
 compositionibus cordialibus.

CHOLERA humida, à phlogosi ventriculi, se-
 danda est laudano & adstringentibus refrigeranti-
 bus, non pulveribus stomachicis calidis, ait *Riolani*
ench. r. anat. pag. 123.

Cavendum tamen est, ne intempestiva opera
 vomitum in illo morbo opiatu cohibere satagentes,
 eo cohibito, non minus periculosam malorum ca-
 tervam invehamus. Permittenda acribus humori-
 bus corruptisque tantisper evacuatio, donec suffi-
 cienter depletis iis, viribus succurri possit roboran-
 tibus & sistentibus.

Sin autem urgeat symptoma, absque omni metu
 cordatè iis uti licet statim. Ita *Riverius cent. 3. obs.*
85. tertiana maligna media æstate laboranti, cum
 tercia accessione tanta conjungeretur humoris bi-
 liosi malignitas & ferocia, ut concitaretur vomit-
 us, ac alvi fluxus frequens cum summo ægri pe-
 riculo & maxima virium jactura, cum felici succes-
 su propinavit laudani opiatu gr. iv.

Nos essentiam theriacalem cum anodyna con-
 junctam feliciter eo casu adhibuimus sæpissimè, dan-
 do eandem vel miscendo cum *Q. cinam. c. v. aq.*
menthae, aliisque, unde statim simul & semel sæpe
 numero omnia conquieverunt.

CARDIALGIAM solantur opiata. Urgente
 dolore inflammatorio, cum lenientibus ea admisceri
 possunt in pauca quantitate: sic enim neque actio-
 nem ventriculi impediunt, dolori succurrent, &
 intemperiem immittunt, verba sunt *Lindov. Sep-*
tal. l. 7. animadvers. §. 3. p. 221. Hinc *Albucasis* non
 revelandum remedium in dolore ventriculi vocat
 destillatum opii cum capitibus allii apud *Holler. l. i.*
de morb. intern. c. 32. p. 532. juxta alios cum decocto
 fl. chamæmeli datum laudanum statim juvat. Miscui-
 mus eo casu lubenter opium x. cum *carminativis*.
 Viotor cardialgia laborans, cum summa anxietate,
 adsumpta dosi essentia carminativa cum anodyna
 paucis guttis extemplo levabatur, magno cum no-
 minis incremento, initio quippe praxeos id con-
 tingebat nostræ. 2. cum *precipitantibus & oleosis*.
Fœmina, coriarii conjux, 46. ann. dysenteria gra-
 vissimè decumbebat anno 1669. accedebat singul-
 tus, & cardialgia cum tanto ardore oris ventriculi,
 ut prunam se ibi sentire quereretur, spe vitæ ferè om-
 ni abjecta; dedimus pulverem *Q. tem* ex conchis &
 lap. & c. pulv. Bezoard. ol. caryophyll. & opii pa-
 rum. Dictum factum omnis conquievit ardor, om-
 nis dolor, omneque periculum evanuit.

In *SINGULTU* quovis curando præ aliis omni-
 bus conducere opiata, verissimè scribit *Sylvius lib. i.*
prax. c. 23. p. 325. §. 19.

Uti sumus egregio cum successu opiatum in singul-
tutum alio, tum inprimis convulsivo; aliquoties.
Commiscuimus ex castoreo parata in liquida vel so-
lida forma; neque unquam nos frustratus est eventus.

VOMITUS sistunt opiata, sive ab hyperca-
tharsi eveniant; ubi vel sola essentia theriacalis cum
aq. cinamomi sufficit; vel præbium opiati alius me-
dicamenti; sive ab aliis causis irritetur ad *avandasp-*
eriv hanc & supinitatem ventriculi natura. Hic illud
observavimus singulare; quod sæpe à propinata lau-
dani opiati una vel altera pilula unicus rediit vomit-
us; quasi confortata natura reliquum omne ejicere
molestum satagat, dehinc verò quievit prorsus. No-
tabile & illud est, solidam pilularem formam aliis
omnibus esse in hoc affectu præferendam; nisi
quid impediatur. Soliti sumus dosim pilularem quan-
doque theriacæ miscere & confectioni alkermes,
sicque forma boli felicem eundem obtinimus effe-
ctum. Addi etiam possunt ol. menthæ vel cinamomi
gtr. j. vel altera.

Rationes horum ex supra dictis de usu generali
patent.

In **APPETITU NIMIO** aliquot vicibus
suppetias nobis tulit opium. Vir nobilis hypochon-
driacus, delatis ad ventriculum humoribus acidis
& acerbis, eumque *evaidim* alias sollicitantibus,
laborabat fame immodica; quæ nullis sedari po-
terat cibis. Dedimus ol. Tartari per deliquium &
sub noctem paucas doses opiati pulveris absorben-
tis, & sublatus fuit molestus ille affectus penitus.
Hinc in aucto appetitu; si malum sit contumax, ad
opiatum confugere licet; quod præcipue in *Bealpus*
proprie dicto locum habet.

Huc adeste **HYPOCHONDRIACIS, SCOR-
BUTICI**, qui indies novis affliguntur symptoma-
tibus, doloribus, vigiliis, aliisque promptum habe-
re remedium, opium.

Lubet hæc illustrare non tam nostra frequentî ex-
perientia, quam celeberrimi viri, & non solum de
Principum & Electorum aulis, urbibusque prima-
riis, sed potissimum de medicina nostra longè me-
ritissimi *Dn. D. Johannis Danielis Horstii*. Ita verò
laudatissimus vir in literis ante aliquot menses ad me
datis: Singularem casum hisce diebus notavi hy-
pochondriaci cujusdam, opiatum restitutum. Is à ca-
chexia scorbutica varia passus symptomata: stupidi-
tatem, vigiliis, anorexiâ, tremorem & terrâs
convulsionem epilepticas; præmissis præmittendis,
opiatum feliciter restitutus est, præter omnium spem
& expectationem. Tam sæva, multiplicia & gravia
symptomata & mihi & adstantibus animum ita tunc
barunt, ut actum putaverimus. Tandem post reite-
ratas & sæpius exhibitas opiatas medicinas incidit in
somnia x. horarum, ex quo expergefactus totus
mutatus erat, & ab enumeratis symptomatibus pla-
nè liber, non sine adstantium summa admiratione.
Affinis ejus illustr. *Wilhelmus Curtius*, Regis An-
glie Consiliarius & Eques Baronettus, nobis jam
præfens, licet de morore, vigiliis & servitiis las-
sus, nescio qua hilaritate compulsus ad carmen est,
idque paucis horis condidit, tradiditque filio ad-
huc scilicet prætextato, qui id mihi primo mane
tanquam suos labores porrigeret:

*Hippocrates que sparsa dedit prognostica fati
in Fago erant tremulo conspicienda simul.*

*Sex soles Lunaque exsomis es, tunc epilepsis
& pulsus nullus, nulla salutis avis.*

Præfata jam planctu diras placaverat umbræ,

& dederant anceps murmura nostra V A L E.

Fortior at Parcis certamen ut Horstius intrat,

jam lassâ Lachesis projicit arma manu,

Cardiacis, opio nequiens obfistere Clotho.

nec purga- cerebro Cerberus hellebore.

Rem gratam liceat saltem laudare modestè:

Gratior est nobis Horstius Hippocrate.

Rectè hinc in scorbuticorum quibuscumque affectio-
nibus, inquit *Willisus Tr. de scorb. c. 10. p. 323*, se malle
quovis præter à medicamen. o. ù genere, quàm opia-
torum usu destitui, nec enim solummodò contra do-
lores & vigiliis pertinaces; verùm in paroxymis
asthmaticis, in vomitu, diarrhœa, quin etiam in ver-
tiginè & pathematis convulsivis, quoties natura suprà
modum irritata inordinatæ immantiores concipit,
nullum præstantius remedium sæpius expertus est,
quàm ut narcotico tuto adhibito somnus concilieretur.

Et licet in doloribus v. g. scorbuticorum non in-
termissio totalis, infallibiliter tamen insignis mitiga-
tio sequitur, teste *Dravotio de scorb. f. 8. p. 330*.

In **COLICA** quibuscumque malè audiunt opia-
ta, tum, quod solum errore relevationis fallant;
ob præsentis temporis perditum sensum, hebetu-
dinè partium suffecta; quæ verba sunt *Cal. Aurel.*
tard. pass. l. 4. c. 7. tum, et si mox omnem dolorem
tollant, plerumque tamen eorundem usum con-
tractura membrorum sequatur, & hinc vitanda es-
se præcipit *Maffæ in prax. Miss.*

Quin ipse *Pergamenus* antidota ex opio, mandra-
gora, alterco & styrace, cautè usurpanda ait in in-
testini laxioris doloribus *com. in 6. epid. c. 5. aph. comm. 13*.
ista enim membra circumfrigerantia, ut iterum ab
iisdem causis offendantur, paratiora efficere.

Neutrùm tamen argumentum tanti est, ut usum
opiatorum in colicis excludere omnino possit, modò
non fecum in intestinis adsit infarctus, cui prius
medendum est. Opium binis rationibus colicis au-
xiliatricem præbet operam, 1. *per se*, quando effera-
to dolores persistunt freno; aliisque cedere renuunt
medicamentis, quo passu potest dari laudanum opia-
tum, vel magisterium anodynum, cum oleis carmi-
nativis. Nos utiliter solemus uti essentia nostra car-
minativa cum anodyna in aq. aneth. cort. aurant. &c.
Est verò hæc:

*℞. Rad. Zedoar. ʒj. carlin. galang. ā. ʒss. cori. an-
ran. sem. anis. caro. fl. chamem. Rom. ā. ʒj. Caryophyll.
aromat. bacc. laur. acor. ver. ā. ʒss. macu ʒj. M. Ex-
trahantur contusa & concisa g. m. cum cori. curi.
acidulato satis. ℞. Q. qui extractione per aliquod
tempus facta addi debet. Dosis gtt. xx. xxx. Inde ob-
servavimus sæpius præsentaneo cum effectu subla-
tum omnem dolorem.*

Præcipue verò convenit opium in colica biliosa,
calidiore temperie præditis & ob tenuem acrem
que dolorem dolentibus. His enim non solum non
nocent talia anodyna, sed magis opitulantur, dum
tenuem, acrem & biliosum humorem crassum red-
dunt, ad concoctionem perducunt, ad bonamque
temperiem convertunt, non refrigerando, sed acri-
moniam corrigendo, & status discutiendo. Vid.
Trallian. l. 10. c. 1.

2. Opiata colicis conferunt cum purgantibus mix-
ta. Hæc enim purgantia ægè sæpius retinent colicis
avapponas humorum ad ventriculum facta, ideoque
vel acida addenda, ℞. li &c. vel lauda-
num opiatum refracta dosi miscendum. Non enim
inflammat tunc operationem purgantis medicamen-
ti, sed juvat, & simul dolores sedat. Cum enim na-
tura hoc modo roboretur, fortius exsurgit, ut medi-
camentum *katarticon* in actum deducat, hosticam-
que exturbet materiam. Vid. *River. passim in obs.*
Thoner. l. 3. obs. 5. & alios, inprimis *Erastum disp. con-
tra Paracels. part. 4. p. 248.* ubi in colica ʒj. spec. hieræ
vel aloës adjicit opii & castorei a. g. j. vel sesquigranū,
interdum etiam duo, quod facere se addit, ne diutius
quàm par est intra corpus maneat, pag. 249.

Quidam

Quidam tunc purgantia in majori dosi danda esse volunt, si opiata misceantur. Imò etiam cum emeticis, sed quantitate parva, jungi possunt opiata. Vid. *Sylv. prax. l. 1. cap. 15. §. 29. p. 187.*

In *ILEO*, ubi implacabilis dolorum sævitia torquet, anchora sacra & extremum sunt solatium opiata; laudani e. g. granum unum vel alterum per se dari potest, vel, ut in colica annotatum, unà cum purgantibus, ut una tollatur fidelia & dolor & materia morbifica, vel quod nos facere consuevimus, primò opiato nepenthe doloribus succurratur, hinc purgante extimentur alvinæ feces & vitiosi humores.

Utut verò ratio utique consulenda sit, ne fortè agonisanti & desperato jam iliaco propinquetur, indeque sinister eventus consequens vel medicamento, quod multos juit, vel medico imputetur; In his binis tamen, purgantibus scilicet & opiatis, unica versatur iliacorum salus.

Exemplum hujus rei dedimus & consignavimus *ann. II. Ephemer. German. obs. 238. p. 340.* quod ibi videri potest, neque enim huc transcribere animus fuit.

In *DIARRHOEIS* ἢ δὸν τῶν φαρμάκων, ἢ δὸν τῶν χυμῶν ἐλάττειν ἢ μοχθηρῶν, sive a purgantibus fortioribus, sive pravis vitiosis humoribus indutis, statim sæpe sedant fluxum opiata, magna cum ipsius ægri & adstantium admiratione.

In *DYSSENTERIA* malè quibusdam audiunt narcotica. Speciosius hanc in rem extat locus apud *Trallianum l. 8. c. 6.* ubi imperitos medicos mox inter initia narcotica dare asserit, ad quod somno dolorem levare videantur; falli autem ipsos, dum ægros accepta portione tota nocte dormire & ventrem teteri conspiciunt. Cum enim, addit, dies illuxerit, inutilis labor deprehenditur: quia humores in unum collecti sine intermissione dejiciuntur, & capite gravato, viribusque labefactis ventrem reddunt deteriorem, & majus cibi fastidium inducunt, & ideo nunquam ea medicamenta dari debent, nisi fortè necessitas urgeat.

Minadous Doctor Patavinus observavit, omnes illos dysentericos, qui de consilio medicorum opiatis usi sunt, mortuos esse. Additque ratio, quod ulcera intestinorum ab opio putridiora & sordidiora reddantur, citante *Hoffmanno de usu & abusu med. chim. p. 30.*

Ut verum fateamur, pace plerorumque Practicorum scriptorum, negativam statuentium, & opium in dysenteria vel damnantium, vel timidè admodum exhibentium, dicere aliter non possumus, quàm sine opio nullam veram dysenteriam curari commodè posse, oleumque & operam cum aliis adstringentibus sæpenuerò perdi.

Bone Deus! vidimus in dysenteria, statim in principio 40. 50. 60. intra 8. 9. (Incredibile dictu) agros fuisse maceratos, dejectosque sedibus. Dato convenienter opio, statim pacatiori rivo mali sentina effluxit. Nec fluxum tam sistit opium, quàm moderatur, quàm corrigit, dolores minuendo, morbumque, quod sæpius repetimus, in centro detinendo, aut affluxus & effluxus sit moderatior. Sanè testor, me omnibus dysentericis, quorum ultra quadringentos curandos habui, cui felicissimo successu propinasse opium, & plerosque illos evasisse feliciter notavi, qui non vel morbi vel malignitatis vi, vel aliarum circumstantiarum ratione abrepti, in tempore, quod rerum omnium est primum, auxilium petierunt.

Dantur in dysentericis optimè opiata cum bezoardicis, tum volatilibus in principio, seu mediis potius, tum fixioribus, in fine. Hac methodo felicissimè per-

multas dysenterias expugnavimus. Utut enim nongemus, posse quandoque in dysentericis benignis, quæ a vaucis valorum Potius oriuntur, quæ irritatione & erosionè, quæ item ab ingestis, turgentibusve vitiosis humoribus negotium facessunt, posse, inquam, initium curationis fieri à rhabbaro seu colto, seu sibi relicto, junctis abstergentibus, & dehinc adstringentibus curationem perfici. Sed ubi mali moris est morbus, seu aeris vitio epidemio, ut plures decumbant, seu domestico pravorum humorum, acrimie puta, tallorum, aut in graviore statu arsen. calium, in corpore putredinosa fermentatione ortus, uti quidem plerumque observavimus, tumidissima & nobis hæcenus frequentata est supra laudata methodus. Dedimus initio Tincturam nostram bezoardicam cum anodyna remixtam, ita enim miasmata maligna dilcuiuntur, corrigunturque, febris incrementum prohibetur, (quæ tantum non semper adest, ut sæpissimè petechias ipsas conjunctas viderimus,) putredo arcetur, adeoque acrimonia humorum sopitur. Hoc solo medicamento decenter dato & repetito, morbo huic ferali sæpe in principio frenum injicimus, ut præsentaneum ægri senserint auxilium.

Si dolor & fluxus urgeat, majori dosi opus est, ut proportio sit inter morbum & medicamentum.

Consentit *Hæferus l. 3. Herc. med. c. 5.* asserens, per laudanum opiatum, præmissis præmittendis, se olim salinarii cujusdam secretarii liberos omnes, & inter hos semestrem puellam, à dysenteria feliciter sanasse.

Eleganter idcirco *Jacob. Bontius in not. ad cap. 4. Garc. ab Horto pag. m. 41.* scribit: Certè laudes hujus succi ex papavere expressi, si vellem referre, viderer chemicis velle suam honorem præripere; hoc saltem dico, si nobis hic de opio ac opiatis non esset prospectum, frustra in calidissimis Indiæ Orientalis regionibus medicinam faceremus dysentericæ, cholericæ, febrilibus ardentibus, ac reliquis biliosis affectibus orgasmo turgentibus. Idem sua experientia probat & laudat *Horst. consil. dysenter. c. 3. p. 226. illustris Boyleus* rhabbarum cum grano uno laudani consulti tum enemata ex lacte bubulo.

Exemplum lethiferi successus habet *Thoner. lib. 3. obs. 8. p. 167.* sed à medicastro dato laudano.

Illud tamen notandum, quod in dysentericis indolentibus cautius sit adhibendum sacrum hoc medicamentum, ibi enim bezoardicorum vis debet esse fortior, licet omnes hoc modo affectos mortuos esse, nec ullis vel generosissimis remediis servari potuisse *anno II. Ephemer. German. obs. 43. p. 82.* adnotaverimus. Et hinc valet illud *Tulianum*: carere omni sensu doloris, miserius est, quàm dolere.

In *HÆMORRHOIDIBUS* immodicis, valdeque dolentibus, præsertim si mali vehementia nimis urget, & vix expultrix irritata est, laudantur opiata.

Maxima tamen in horum adhibitione requiritur circumspectio, ne *Horatianum* illud incurrat medicus:

Stulti dum vitant vitia, in contraria currunt. h. e. ne alvus constingatur, & vasis occlusis, sicque caloris *ἡσυχίας* ventilatione prohibita, accendatur febris, qui metus est *Sennerti l. 4. prax. part. 2. §. 2. c. 6.*

Consultum verò est, cum hæmorrhoides maximam cognationem habeant cum affectu hypochondriaco, unde & cacochymia & imperfecta sanitas indicium præbere solent, præter opiata alia & aperientia alia generosa adhibere. Observavimus aliquot ægros, qui fluxum hæmorrhoidalem aliquoties experti, cum per aliquod tempus urerentur Tinctura 8. aperitiva temperatiori, illas non sensere amplius.

Vidimus etiam binos immorigeros, qui dolore carum hæmorrhoidum vexati ab opio & amulero nostro,

nostro, fabaria, opem tulere, (cujus sanè effectum præter nostra experimenta continuata plurima, præter alios *D. D. Bartholini l. de transplant. morbor. pag. 18.* & *D. D. Schræckiorum*, Haffniae & Augustæ Vindelicorum testimonia, exceptione majora comprobant,) cum verò non curarent ea, & internis visceribus illuc ceu ad sentinam humorum confluxum amandantibus non prospicerent, redeunte malo putredinem ibi passos, & degenerasse morbum in cancerum quasi oculum, unde *venæ interaneorum* subsequente miserrimè periére.

Neque inconueniens est sæpenumero, interponere purgantia, eo potissimum casu, quando bilis copiosius intestina lata fluentium hæmorrhoidum cursum continuat. Vir primarius per aliquot menses fluentibus hæmorrhoidibus molestatus, assumpto leni purgante aliàs ipsi familiari, plurimis evacuatus est sedibus per biduum, nec post feces aliud subsecutum est, quàm liquor planè biliosus unde illic hæmorrhoides subitè eré, nec per plures septimanas post vel minimum de illis sensit amplius.

An in *CALCVLO* convenient opiatà, dubium occurrit. Sunt qui omnes eos, quicunque opiatà nephriticis exhibent, sinistrè exhibere credunt, siquidem illis facultas expultrix sopiatur & ligetur quasi, cum tamen eadem potius roboranda sit, & ad expellendum instiganda.

Sed si v. g. dolor urgeat, calculus sit magnus, vigilique inde & denique forsan lipothymia oriatur, propina, quælo, expellentia, stimulantia, facultatem expultricem roborantia, ipsamque vitam cum gemitu expelle. Non possunt expelli calculi, ut lumbrici. Quin sæpe, cum calculus jam intravit ureteres, insignesque ciet cruciatus, neque tamen expelli potest, adhibitis aliis externis, quæ eundem retrahunt, cessant dolores.

Contra ea, observatum est à nobis sæpius, datis ejusmodi demulcentibus facultatem longe magis roborati. Neque sopitur eadem hoc modo in totum, ut nil amplius agat, sed dolores sopiuntur, ut facultas expultrix eò valentius insurgere possit. Ita pulvis ex lapidibus & cinnabari minerali, & opio, constans ab *Excell. Du. Ludovici*, fautore & compatre nostro colendo, *Dissert. 1. Pharmac. modern. pag. 448.* commendatus, crebriori nostra experientia longè optimus est, cui resolventia alia ex spermate ceti, aliisque quandoque non inutiliter miscuimus.

Ita *Unzerus* laudanum opiatum, reliquis medicamentis in eassum adhibitis, felicissimo cum successu ad placandos nephriticos dolores non semel in usum duxit, quando scil. calculus nondum renibus fuerit egressus, aut saltem leviter inde emotus. Eo autem egresso, atque ipsis ureteribus impacto, tum inefficax hoc remedium deprehendit. *lib. 1. de neph. it. 7. p. 986.* & quamvis exhibitum tunc non nihil levaminis initio visum fuerit attulisse, tamen momentaneum tantum illud fuisse observavit, recrudescente nimirum paulò post eodem dolore, saeviusque quàm antea affligente.

Exemplum feliciter in nephriticis cruciatibus usurpati opii, vid. apud *Horst. l. 10. obs. 3.* quæ tota de viribus laudani opiatì agit. Confer. *Barthol. cent. 3. epist. 46. p. 192.* ubi in teneismo & calculo proficius opii usus deprædicatur. *Hæchstetterum decad. 6. cas. 1. p. 675.* ubi plura ex Veteribus adducuntur loca, hæc non transcribenda.

In *PODAGRA*, præcipuè si dolor causæ vestem induat, & urgendo ad se curationem trahat, ad opiatà confugiendum, ceu ad asylum.

Arthritidem vagam scorbuticam unicè ferè debellare possunt eadem. Consueta nobis hæc curandi methodus, in quam plurimis felicissimo suc-

cessu probata, maxime in mulieribus, quæ in Thuringia nostra frequentius viris ea effici videas, est 1. antiscorbuticis & Olibus. 2. universalibus, tum purgantibus, tum saluberrima in his affectibus venæsectione. 3. specificis opiatis in pilulari vel alia forma administratis. Qui enim præmissis hisce noverit, metallicum solare cum opio maritare, & prudenter adhibere, næ felicissimè hunc perdomare noverit & alios morbos.

Exterius in articulari hoc morbo quandoque etiam opium adhiberi solet, cum aliis mixtum. Nos ex intentione adhibere solemus linimentum nostrum nervinum ex ~ formicarum, lumbricorum volatili & Olib. ~, vel C. C. vel utriusque, addito interdum liquore opiato, vel ipso ~ opii.

Notandum tamen, ne opiatis ipsis liberaliore usu hoc pacto insistentes, quàm ut doloris lævitiæ aliquo modo leniant, magis noceamus, quàm proficiamus, viam parantes humori peccanti ad topheam duritiem. Opiata enim articulis adhibita incautè, nocent.

Obiter hoc loco illorum culpandus venit mos, qui in arthritide externis oleosis, unctuosis, & pinguibus, modò his, modò illis, prout dolor jubet, utuntur, vel solis vel cum opiatis remixtis. Vidimus hæc ut plurimum plus nocimenti quàm commodi post se reliquisse, & id ipsum inter causas topheorum & nodorum omnino referendum judicamus.

In *AFFECTIBVS HYSTERICIS*, suffocatione, hysteralgia, mensibus immodicis, fluore albo, aliisque, opium divinum est auxilium, sive additis castoreis aliisque laudanum hystericum inde constiat, seu pro re nata cum appropriatis misceatur, qualia exempla plura apud autores, inprimis *Hartmannum*, *Paracelsum*, *Platerum*, aliosque prostant. Et nos ipsi frequenti experti sumus experientia, quantum utilitatis ad uterum redundet ab opiatis. Ita pulverem absorbentem supra citatum invenimus in hystericis accidentibus utilissimum; elixir uterinum cum anodyna tinctura mixtum facit officium; si cum ebore ppt. succino, castoreo & magist. lap. ~. misceatur opium, in fluore albo confert egregium medicamentum, modò rectè quoque utatur. Extant hujus rei vestigia apud *Courty* ipsam, qui *lib. 2. de morb. mulierum c. 87. p. 610.* in affectibus hystericis τὸν μὴκρον ὁρὸν papaveris succinum cum aliis præscribit.

Hinc rectè à *Paracelso l. de morb. ament. tr. 2. caps. 4. p. 503* in ei confortantia matricis refertur quinta essentia opii. Exemplum laudani opiato feliciter curati furoris uterini in nobili scæmina sanguinea refert illustris *Bartholinus centur. 5. hist. 85. p. 165.* Alia exempla ad symptomata hystERICA videre est apud *Decker. meth. medend. p. 118.* & alios.

An aphrodisiacum sit opium, & Qem excitet, auctorum non una mens est.

Cardanus, *Scaliger*, & *Nicol. Monardes* Amphionem illum, quo ad venerem eiendam utuntur Indi & Turcæ, nil aliud esse, quàm opium testantur.

Confirmat id ipsum relatio *Joh. Jac. Suar. itiner. Ind. Orient. p. 11.* qui expressis verbis scribit, parare Indos in Bantam electuarium ex opio, quod Affion vocant, coloris cineritii, saporis dulco-amari, cujus usu feroces fiant; Chineses verò in Batavia eò uti ad excitandam venerem, cujus usu adeò veneris cæstro incitantur, ut per totam noctem veneri litent, sæpe aufugientibus, nec ulteriorem vim sustinentibus scortis. Vid. de hoc latius *B. D. D. Sachs. etiam post fata celebratissimus Tom. II. Ephem. Germ. obs. 69. p. 126.* ubi & alii citantur.

Garzias è contratio l. c. non solùm aphrodisiacum esse

esse negat opium, sed & usu ipsius steriles factos se observasse memorat. Sic & *Renodans l. 1. de mat. med. f. 10. c. 2. p. 279.* experientia constare scribit, opium libidinis æstrum potius coercere, atque ignavos carnis reddere motus.

Utut verò variet tum aliorum medicamentorum, tum opii nostri effectus, pro diversitate regionum, temperamentorum, individuorum, & utendi modorum, adeoque opium in aliis venerem excitet, in aliis frænare eandem queat, probabilius tamen videtur prior sententia, non obstante, quod immodico & quotidiano usu sterilitas exinde subtequi possit.

Qui verò venerem opium esse negant, videntur falsa niri hypothesi, stimulos nempe Quis infringi ab opii frigidityte, & valorum spermaticorum contractione.

Universale assertum est *Macrobi*, omnia calida Quem provocare, & semen excitare, & generationi favere, *l. 7. Saturn. c. 6. p. 525.* quod quidem generaliter huc non applicabimus, neque probabimus in totum, experientia tamen sæpius deprehendimus, ab assumpto opio in calidioribus, præcipuè verò dispositis, ortas fuisse Pollutiones nocturnas cum ténigine, cujus rei plura exempla possemus in medium afferre, nisi nomina ægrorum præpalare religioni nobis duceremus. Hinc si cum ambratis maritetur, sive in substantia, sive in essentia, aphrodisiacum confurgit non contemnendum.

An in amputatione crurum σφακελόδων narcotica sint adhibenda? quærit solet. Hæc enim recisio & extirpatio putridæ & corruptæ partis, ubi η συνπεπληρωμένη νέκρωσις τῆς ὅλης εἰσίας, consummata mortificatio totius substantia adest, ut loquitur *Galenus, 7. aph. com. 50.* omniud requiritur. Hoc cum sine dolore vehementi ut plurimum peragi nequeat, quidam pro remotione hujus narcotica in usum trahunt, stupefacientia sensus & spiritus animales, adeo ut multum dormiant, nec dolorum faces accendi adeo sentiant.

Negat quæstionem *Fallopian Tr. de tumor. c. 26.* quoniam, cum dolor sit adeo intensus, oporteret ut esset somnus mortis. Si soporifera sint levia, inquit, non juvantur, si valida, sunt valde periculosa.

Guilhelm. Fabricius Hildanus l. de gangran. & sphacel. c. 19. itidem negat, quod perquam periculosa sint ista narcotica, propter gravissima, quæ inducunt, symptomata, imò & mortem. Citat pro negativa etiam *Guid. de Cauliac. tr. 6. doct. 1. c. 8. Joh. de Vigo l. 4. tr. 7. cap. ult. Petr. Pigray. l. 1. c. 9.*

Gre. Horstius l. 10. obs. 3. meminit quorundam chirurgorum, arte sua celebrium, qui in magnis operationibus v. g. quando membrum aliquod ense rescindendum est, ne pars sincera trahatur, ægris per biduum nullum somnum concedant, donec ex summa virium debilitate somno corripiantur, ne convulsiones graves per somnum oriantur. Ipse vero consultius suadet, mox prima nocte laudano somnum provocare, qua ratione non tantum vires colliguntur, sed simul etiam sanguinis motus & fervor inhibetur.

Idem ibidem quoque meminit, chirurgum doctum & peritum graviter vulneratis mox exhibuisse dosin laudani, tam quietis conciliandæ causa, quam etiam eam ob causam, ut inflammatio partium læsarum minor expectanda sit. *Alibi sc. l. 8. obs. 8. p. 409.* addit & illam rationem, fieri id posse ad hæmorrhagias præcavendas, & affluyum ad læsas partes inhibendum.

Semper ad circumstantias alias accuratè σοφισμὸς medicus dirigendus. Nil obstat, quò minus præcedente operationem nocte ægro opiatum propinetur moderata dosi, ita enim & animo alacriori parietur uri & secari membrum, & varia præcavebuntur symptomata.

Par ratio est in sectione calculi, de quo vid. *Horst. l. 9. obs. 31. consil. 2. p. 457.*

Ut medicamenta opiata in actu deducantur, opus habent vehiculo, quo mediante in corpus adsumantur.

Dividi hoc potest in *GENERALE & SPECIALE. GENERALE* constituunt alimentosa, domestica & corpori amica, vinum, cerevisia, joscula, quibuscum ordinatè & optimè quidem propinari solent. Imò lubentius ægri pauxillum hoc medicamenti in solito sibi quotidiano liquore adsumere consueverunt, quam aliis. Valer hoc præcipuè, si opiata per se adhibeantur, proprio & principali fine.

Sin tamen *SPECIALE* vehiculum eligere sit animus, appropriata cum opio combinari amant. Facem præbet hac in parte *Mynsichtus, qui sect. 3. armament. chim. p. 72. seq.* aliquot foliis varias in omnibus ferè affectibus, quibus opium confert, formulas congestit, excepta pulverum, & opiatorum liquidorum forma. Inter tot enim egregias mixturas nil aliud occurrit, quam mixtura & boli, maximè tamen commendanda, unde lectorem eò amandamus.

Cum verò consuetudine recentiorum sæpius quoque in pulvere vel Tinctura dari soleant opiata, facile cuivis pulveri, qui communem cum opio habet intentionem, misceri potest laudanum, vel Quod anodynus, facile etiam cum quolibet liquore conjungi possunt eadem anodyna liquida, qui non diverso extractus est menstruo.

Exterius variis dolorum generibus auxiliatur opium. Ad leniendos dolores acerbos v. g. capitis, extrinsecus moderatè appositum, omnium efficacissimum opium pronunciat *Fernel. l. 5. m. m. c. 17.* quod vel naribus illitum odore solo conferat, hac tamen cum cautela, ne ejusmodi externa actuali frigidityte excedant, sicque materiam repellant. Alibi, nempe *l. 6. m. m. c. 5. p. 398.* desperatis duntaxat levioribus auxiliis admovendum in ardore summo & intolerabili cruciatu, cum exquisito sensu, concedit.

Sic & in mania & phrenitide externè opium in unguentis, narium foraminibus & temporibus inungendis præscribitur, ut & aliis casibus, ubi non tam dolores quam vigiliæ urgent.

Unguentum expertissimum ad dolorem capitis commendat *Valentinus Polidamus libro de dolorib. capitis p. 78.*

℞. Opii Thebaici, camphora ā. ʒss. fortiter tere & dissolve cum oleo rosarum, quo ungantur *PLANTÆ PEDUM.*

Ingreditur eo fine, scil. pro sopiendis doloribus capitis & vigiliis coercendis frequenter unguenta, linimenta, epithemata, balsama, aliaque externa, qualia exempla apud omnes practicos innumera occurrunt, ut iis colligendis studio supersedeamus.

Nos in vigiliis, doloribus capitis, & dentium saepe solum extractum opii, vel cum extracto opii combinatum applicavimus temporibus, instar emplastri. Sicuti vel sola theriaca eodem modo emplastrata, vel etiam simul pone aures applicata utiliter ob opium somno proliciendo juvamentum præbet.

Sic etiam opium commodè miscetur cum ol. nuc. mosch. expresso, & ol. nucl. persicor. itidem per expressionem parato, prout id in quotidiano talibus urgentibus casibus nobis est usu.

Ad podagiam opium lacte muliebri dilutum commendat *Scribon. Largus compos. 158. p. 87.*

Pertinet huc monitum è textu *Galenic. l. 2. de comp. med. mat. lib. c. 2.* collectum, ne opiata applicentur suture coronali, neque parti posteriori propter principium spinalis medullæ, idè admovenda fronti, ut ipse trochiscos cum opio applicabat. Vid. *Engsch. Rhod.*

Rhod. l. 1. de hum. corp. affect. c. 1. p. 9. Attamen *Langius l. 1. epist. 10. p. 47.* arteriis carotidibus & temporibus rectius medicum peritum medicamenta soporifera, quam fronti illinere ait. Potest utrumque locum habere, potiora tamen sunt tempora.

Quæritur, quomodo opium externè applicatum dolorem sistat? Hic sanè si, quæ externè præscripta à variis autoribus sunt, attendantur, illa ut plurimum ad eorum opinionem potius, quam secundum rationem posita esse, res ipsa evincit. Veterum enim hypothesis, opium dolores sistere stupefaciendo partem dolentem præ nimio frigore, ut sensum omnem quasi amittat, hodie penitus expirat, quam non solum Experimentum *Plateri* refutat, quod *tract. 1. prax. lib. 1. cap. 5. p. 156.* recenset, ubi nunquam se deprehendere potuisse refert, quod ab externo nocturno narcotico cuti applicato, ea stupida aut indolens reddi queat, licet, ut certi aliquid cognosceret, massam opii emolitam parti podagrica dolenti, sed sine fructu applicavit, sed & nos inde nunquam stuporem partis ab impositione opiatorum observare potuimus. Agunt itaque opiata, quatenus per poros subtilior pars Δ ea & Γ ialis cum sanguine communicatur, & hinc vires suas ordinarias, licet remissiori longè gradu & refractè exerit, cerebri & nervorum vi simul obtusâ.

Modus applicandi quorundam notari meretur. Ita *Joh. Langius l. 3. epist. p. 911. scribit*, ubi somni conciliatione opus est, medicum quandam celebrem aliquando etiam sanguisugæ post aures accommodare, & remotis sanguisugis granum unum opii vulneribus imponere felici successu solitum esse.

Notandum tamen, sæpe ab autoribus huic vel illi causæ adscribi effectus, qui tamen nihil minus sunt. Sic eundem medicum scribit item *Langius*, in phthisi arsenico commodè usum. Quis hoc auderet hodie?

Idem memorat *Joh. Mich. Savonarola de febr. cap. 8. rub. 10. p. 177.* eo solum discrimine, ut angulis oculorum applicatio fiat.

Confirmat *Geiger. microcosm. hypochondr. c. 32. pag. 472.* prodelle ad vigilias corrigendas & somnum conciliandum granum opii ad motum puncturæ hirudinis, pone aures admotæ.

Credibile est, utur opio suas vires neque hoc pacto denegemus, sæpe hunc effectum adscribendum potius hirudinibus, quam opio.

Idem *Geigerus* ibidem pilam odoriferam componit pro eadem intentione ex Δ B. opii cum cort. rad. mandragoræ, sem. hyosc. papavere, styrace, laudano & cerâ, cum carbone salicis.

Tales *Pile* soporifera etiam ab aliis commendantur pluribus, imò à quibusdam habentur pro secreto.

Exempla videri possunt apud *Savonarol. l. c.* ubi & talia super umbilicum ponere jubet. Memorabilis de hoc ipso applicandi α s, umbilico, locus *Octavii Horatiani libro 4. pag. 99.* ubi describit unguentum somniferum mirabile, ex opio, myrrha, ruta, thure & cerâ, quod jubet pro chalcastico umbilico imponere: Tam Somnum Præstat, addit, quam etiam Ventrem Movet.

Ita & Balsamum ex eodem confieri potest, uti modo diximus, commiscendo corpus pro balsamis ordinarium, & olperfic. express. vel opii Ω tum quoque: Neque emplastris jungi retinuit, uti ingreditur *emplastrum carminativum Sylvii* & alia; discutit enim & vehementer emollit tophos nodosque, unde & in scissillis is commendatur.

Locum habent externa hæc maximè in tenebrosioribus, quibus facile ad hunc vel illum effectum recipiendum aptum est cerebrum.

Hæmorrhagiam contumacem ab arteriâ vulneratâ, *Manget. Bibl. Pharm. Tom. 11.*

quæ reliqua remedia penitus eluserat, ad miraculum ulque mox restinctam, appposito paucillo magistrali opii ad arteriam vulneratam, observavit *Horstius Tom. 11. l. 9. obs. 12 p. 446.*

Narium hæmorrhagiam desperatam curatam refert *Crollius* è gr. xvi. laudani duas pilulas formando, & utramque nares pilulâ unâ occludendo, *basil. chim. p. 235.*

Curaverat sibi dentem evelli vir militaris celebris in maxilla superiore, inde verò sanguis non poterat sisti, licet varia fuerint adhibita; dato à nobis interius opiato pulvere cum lap. hæmatite parato, & externè alio ex Δ l. uineâ, sangu. dracon. & opio, qui cum linteaminis carptis imponebatur, omnis statim subsistebat sanguis. Idem in Juris candidato observavimus, qui fere exanimus jacebat mediâ nocte, cum ab eadem causa hæmorrhagia copiosior ipsum affligeret.

An in vulneribus sclopetorum conveniat, disquiritur. De eo sic *Felix Wirtz part. 2. de curat. vuln. cap. 16. p. 294.* Andere vverden gefunden, die das gummi opium in die Brandsalben brauchen; aber so viel als ich mich darauf verstehe, mit schlechtem Nutz. Solches gummi ist in keinen Wunden nützlich; denn es kühllet keine Wunden auf, sondern brennt in den Wunden und Schaden, als solches die Erfahrung selber bezeuget: darumb es denn keinen Brand von Buchsenpulver loschen kan.

Binis sententiæ hæc affirmantium nititur hypothesibus falsis: Prima est, opium refrigerare. Altera, communior propemodum, ardorem à pulvere sclopetario in vulneribus excitatum extinguendum esse.

Opium autem ait autor citatus, non convenit ex hypothesi primâ opium, quod non refrigeret, sed potius uredinem inducat.

In Ulceribus uteri *Hieron. Mercurialis l. 4. de morb. mul. cap. 7. p. 281.* ubi dolor est conjunctus, in extremis necessitatibus addit aliis opium, nec se timendum est, inquit, propterea quod uteri mala sæpe ad mortem mulierem deducunt, præsertim dolores. Opiata utero infusa possunt quidem sterilitatem facere, mortem nequaquam, si prudenter adhibeantur.

Non desunt, qui in *Cauteriis* adhibent opium non quidem actualibus, sed potentialibus. Inspissatâ materiâ salinâ acri, corrode, siue ex calce vivâ, seu aliâ, paratâ, si cauteriis faciendis utamur, & opii addamus modicum, opus suum sine dolore perficere, annotat *De Francisc. Hiltesheim. specul. 1. de affect. cap. p. 14.* Idem tamen paulò ante dixerat, licet dolori (à cauterio excitato) opiatum permiscendo occurrere possimus tamen non semper esse tutum uti opio; vidisse enim se, quod talia potentialia cauteria cum opio administrata tandem gangranam induxerint.

Ita & cauterium potentiale seu ruptorium *Vigonis l. 8. cap. 13.* recipit opii Δ j. *Melchioris Welandi*, opii lixivio soluti \mathfrak{z} iij. quæ videntur apud *Glundorp. gazophylac. polyplu. c. 4. p. 24. seqq.*

Ad extinguendum coitum ungere jubet membra genitalia & renes pectinem aquâ, in quâ opium Thebaicum sit dissolutum, *Francisc. Hiltesheim. specul. 2. de mania p. 151.*

In pruritu partium genitalium idem *ibid. p. 152.* commendat sequens: \mathfrak{z} ceræ \mathfrak{z} vi. Δ citrin. \mathfrak{z} iij. opii \mathfrak{z} j. M. cum aq. & applica partibus genitalibus. In eundem usum cum unguento refrig. Gale. i & populeo miscet opium *Hartmann. prax. chim. c. 275.*

Nos in molestissimo hoc affectu observavimus pleaque externa frustraneam navare operam. Juvenis plethoricus 24. ann. à tribus annis senserat pruritum intolerabilem fere in seroto, cum tensione, titillatione & pollutionibus nocturnis. Medici ipsi præscriperant emulsiones internæ & externæ, epithemata item ex acidis, camphorâ & aliis. Pinguibus exasperatus fuerat

semper affectus. Consulimus præter universalia usitata, V. S. purgationem & c. aquam calcis vivæ, sed levi cum fructu, hinc cum omnia ferè externorum genera ab aliis jam ordinata frustra fuissent, consului vesicatorium in femore, à quo cum levamen sentiret manifestum, applicato fonticulo in parte domesticâ tibiz in hunc diem libertimus ab isto malo vivit.

Opium prohibet pilos nasci juxta *Savonarol. pract. tract. 6. rubric. 29. p. 85.* ex hypothesi, quia stupefacit & infrigidat locum, qui tamen usus ob superius dicta vix attendi meretur. Posset hinc latius deduci externus opii usus in dysenteria, podagrâ aliisque affectibus, sed cum ille partim ex dictis pateat, partim passim receptus sit, eo superfedere jam lubet. In dysenteria commode adhibuimus theriacam cum oleis stomachicis remixtam & stomacho impositam, quod & cum *Θ-λο-σ-τ* & terrâ sigillatâ fieri potest.

In *dentium dolore* pilula ex laudano opiato denti dolenti excavato intrudi commode potest. Sic & *pilula Herlicii* in ore detenta omnem dentium dolorem mirificè sedare scribitur à *Sculeto armam. chirurg. obs. 28. p. 89.* quæ conficitur ex semine apii, hyoscyami, opio & situpo papav. ubi quidam sedato dolore os eluere jubent decocto rosar. sal. major. spicæ hyssopi & similibus, ut noxam ab opiatis impressam tollant. Locum habet balsamum odontalgicum;

℞. Laudan. op. ʒj. ol. camphor. caroph. an. gutt. v. corp. pro bals. 3 β. M. F. balsamum, cum bombace dolenti denti applicandum. Nos frequentius usi sumus seq.

℞. Tinctur. odontalg. nostr. ʒij. anod. ʒ β. Teneatur in ore, & cum humor satis attractus fuerit, exspuatur. Temperat acrimoniam, odontalgiam excitantem. Cum attenuantibus his felicius quam per se usurpatur, imò bene respicienda est causa, cum sæpe tutius sit & melius interius eadem propinare, sæpe dolorem non tollant, sed magis & violentius insuperprovocent, quale exemplum videri potest apud *Hippocr. l. 6. epid. sect. 6. t. 46.*

An citius & tutius in actum ducantur opiatorum vires clysteribus immistorum, quam per os exhibiturum, quæri potest.

Savonarola Tr. 6. c. 1. rubr. 9. de vigiliis, securius est multum, ait, opiata per exterius quam per interius approximate, unde eadem in clysteribus & suppositoriis quoque commendat. Sic & *Erastus* audacius per clysteres infundi iussit opium, cum sapâ in colicâ, quod non diu inhaereat. *part. 4. contr. Parac. p. 249.*

Alii quoque affirmativam tuentur, præcipuè cum in acutis & aliis gravioribus morbis vigiliæ vel ex doloris vehementiâ, vel humorum nimio æstu adedò invalescunt, & vires frangunt, ut opiata amplius tuto ventriculo committi nequeant. Ne itaque natura omni auxilio destituatur, authores suadent immiscere opiata clysteribus. Sic *Sennertus l. 1. med. pract. part. 2. p. 334. cap. 7.* in phrenitide, in summo virium lapsu, ubi opiata non commode interius assumuntur, clysteribus ea admiscenda monet. Affirmat id ipsum quoque *Mercatus l. 1. de recto praesidiis art. med. usu c. 3. p. 58. & 63.*

Pro negativâ vero facit 1. quia remotior locus est à nervorum origine & primo αἰσθητικῶν. 2. Facilius à principio nervorum ad posteriores propagines mittitur medicamentorum vis, quam vice versâ, uti in simili exemplum est in clysteribus nutrientibus dictis, & aliis.

Utroque modo officium faciunt, melius verò & præsentius ὅμως assumpra, quam κατω inferiori gutturi infusa.

Imò usus internus tutior longè est quandoque externo. Admirandum, quod opium crudum dentibus applicatum, quod nonnulli affirmant, clysteribusque in-

fusum homines necaverit.

Clysteres tales anodynî bene componuntur ex parergoticis, cum emollientibus mixtis in lacte vaccino, vel jure vervecum coctis. Hinc colaturæ addi potest opium, si extremi urgeant dolores, sed non in magnâ dosi, v. g. philon. Rom. vel theriacæ recentioris ʒj. vel laudani opiati gr. v. vel iij. Vid. *Regner. Graff. Tr. de clyster. p. 188.* vel requies Nicolai ad ʒij. *Dravvitz. de scorbut. f. 8. p. 330.*

Ut ubique, ita & h. l. cautè agendum; cum enim gummata v. g. *sagapenum ammoniacum* & c. per clysteres infusa mortem intulerint, quia adherent, nec repelli possunt, ceu annotat *Schenckius ex Rondelet. tom. 1. l. 3. obs. 250.* pari modo opium, cum viscedinem quandam instar prædictorum in se contineat, pariter intinuando se plicis intestinorum moram trahere, sui que exterminium impedire potest.

Ita Monspeffuli pharmacopæi cujusdam uxor, cum atrocissimis coli doloribus laborans opii ʒj. clystere receperat, in coma incidit, ut habet *Salvuth cent. 2. obs. 97. p. 109.* quod curatum fuit clystere alio ex vino malvatico injecto.

Hinc solvendum prius est & benè diluendum, si cum clysteribus id applicare sit animus.

Par ratio est suppositoriorum. In collyrio, quod Avicennæ interpretibus est suppositorium, adhibitum opium mortem accelerasse testatur *Abunli l. 3. fen. 16. Tr. 1. c. 4.*

Exemplum simile consignavit *Gattinaria in comm. 9. ad Almanf. 6. de sodâ cholericâ* & ligato sermone id ipsum refert *Boussuetus l. 2. de art. m. d. p. 32.* Plures autores de utroque casu ex *Galeno, Rhase, Marcello Drinato, Alexandro Benedicto*, & aliis collegit *Sennertus l. 6. med. pract. part. 7. c. 1. p. 291.* Videatur & *Sinibald. geneanthrop. l. 3. tr. 2. cap. 10. it. Zacut. Lusit. M. P. H. l. 1. hist. 60. p. 426.* Hæc proinde exempla quemvis cautius mercari nec opium temere per guttur inferius intrudendum doceant.

Tutius erit somnum per enemata procurare corrigendo hypochondriorum & viscerum siccitatem, mitigando humorum æstum, vel sedando dolorem. Eliguntur mitiora, ut *Philonium Romanum, Periscum*, aliaque jam dicta. Neque tam opium crudum, quam bene præparatum eligendum, ut laudanum opiatum, confectio opiata, ut & narcotica *Mynsichti.* Notandum etiam, ut dosi semper sit minor. Non diu præterea ejusmodi enemata retineantur, nec corrigentia negligantur, qualia sunt oleum castorei, anethi, chamomillæ, de baccis lauri. Tandem, si opus videatur, rejecto clystere opiato malvaticum infundendum.

Sin caute adhibeatur, in exulcerationibus intestinorum & doloribus convenire suppositum potest opium. Ita *Francisc. Joel. l. 4. pract. f. 3. p. 337.* suppositorio ex opio factæ sæpissime dysentericum fluxum cohibuit, quod experimentum bis adhuc in operibus suis commendat. Addit: crebro autem glans ex opio ano inferatur, sed ultra quadrantem horæ in intestinis non est dimittenda, sed rursus appenso filo eximenda, quod ipsum quoque monet *Guainerius.*

Neque novum illud est, sed jam à *Tralliano* dudum commendatum, quem vid. *l. 8. c. 6. p. 357.* ubi varia ejusmodi suppositoria describit.

Cautela circa Opiatorum usum.

Cum cautelâ opium dari debet, inquit *Petr. de Cist. cent. l. 6. commod. oper. rural.*

Divinum medicamentum est opium, δέσας δὲ ἀσφαλείας καὶ μετρίτης, circumspeditione verò & moderatio, ne opus habet.

Sacra vitæ anchora est opium, bene & circumspedè agentibus: cymba autem Charontis in manu imperit, &

& eu gladius in manu fustosi. Cavendum ego, ne vapores hanc venam teneant.

Temerarius hypnoticorum usus quantum pariat damni explicat *Ballonius lib. 1. consil. 65. & lib. 2. hist. 4. p. 123.*

Quantumvis igitur opiata in infinitis morbis insignem & egregium præstent usum, imprudens tamen & indiscriminatus eorum usus mortem multis intulit, licet exempla talia rarius annotentur, exitus enim felices diligenter colligimus, *Soporosis* autem & mortis nec animadvertimus.

Vires ut semper primatum obtinent in indicationibus, ita & hoc loco circa usum opii. *Primo*, ne morbo, cui contra ire animus, atterantur, *deinde*, ut pares sint huic medicamini, quod propinandum venit.

Circa illud tenendum, ut maturè succurratur; circa hoc, ne agonisanti & in extremis versanti ægro, viribus penitus eclipsantibus, præbentes medicamentum, quod multos juvit, illi notam malignitatis inturamus.

Nec solum præsentis spectandæ & attendendæ sunt vires, sed & futuræ.

Eleganter *Trallianus l. 1. c. 13. ei dē, inquit, ὃ ἀδυνάμει ἢ δυνάμει ἢ παρὰ τὴν φύσιν δυνάμει πρὸς τὴν ἀναισθησίαν. Ἐπὶ τῶν ἀδυνάμει τῶν δυνάμει ἐχόντων ἐξ ἧς ἢ τῆς ἡσυχίας βλάσθη τῇ πόσει τῶν πρὸς τὴν ἀναισθησίαν, ἀλλὰ δυνάμει δὲ οὐκ. Sin vires quoque imbecilles fuerint, tunc maxime vitandū, ne quid de narcoticis exhibeas. Nam in his, qui infirmos habent vires, non vulgaris noxa talium potionum comitatur, immo mors inde sequitur.*

Et l. 6. c. 1. ei dē ἀδυνάμει δυνάμει ἐπὶ, φέρεται πρὸς τὴν ἀναισθησίαν τὴν παρὰ τὴν φύσιν δυνάμει. Si virium imbecillitas adsit, vitato prorsus narcotica. Consilios est, auctore *Lindano*, non expectare tam diu in exhibitione ejusmodi medicamentorum, donec spiritus jam planè consumpti sint, sed in tempore usurpanda, si adhuc vires constant. In rebus desperatis ad opium non est fugiendum, sed antequam ad desperationem perventum sit.

Falli potest medicus in exhibitione medicamenti, ob defectum necessariæ talis conditionis, quæ rectè non assumitur, præcipue *Ratione Temporis*. Exemplum lucidissimum præbet laudantium opiatum, probatissimum medicamentum.

In tempore cum erit medicus exhibendi, & porrigit ægro extreme debilitato, vel in summo senio, vel in agone, vel phthisicâ ulcerosâ dispositione, dum spiritum supprimitur, viaticum est ad vitam æternam, distante laudatissimo *Be Rolsacio, commentar. in aphs Hipp. l. cap. 10. p. 20.*

Medicus quidam Practicus in usu habebat, in agone versantibus, ut minori defungerentur mortis anxietate, sed facilius residuum quod esset lampadis vitalis jam extinguendæ, minori cum auxilio extingueretur, propinasse laudantium opiata. De eo in cætera quædam personæ in agone constitutæ nosmet moniti, malimus abstinere, quam famæ subire dispendium.

Hollerius l. 1. de morb. intern. c. 27. p. 278. Nunquam utendum esse scribit narcoticis recens paratis, sed semestri spatium esse expectandum, aut eo plus. Caute hæc ab ipso etiam *Tralliano* jam proposita *l. 3. c. 4. δειλὸν δὲ, inquit, ὅτι τὸ ὀπίον ἐκλεγετο καὶ τὸ παλαιόν, ὅτι τὸ φάρμακον ἦν ἡμᾶς τὸ πρὶν ναρκοτικὸν αὐτῶν. Consuevit autem opium deligendum esse vetum, eo quod nos magnam ipsius in torpore inducendo facultatem vitamus.*

Tanti tamen hic metus non est; recentissimis licet opiatis uti, modò id *μὲν ἀσφαλέως cum cautione fiat.* Quò recentiora eo efficaciora quidem sunt, neque tamen vetustum inefficax, *καθὼς* quippe obrinuit non ita facile dissipabilem, utrumque tutum est, & sine ullo periculo datur.

Nonnulli danda censent narcotica calido semper ægro, & cum cætera frustra sunt, quinque horis à tenui cœna.

Post cœnam opiata danda monet *Hercul. Saxon. prælect. pract. part. 1. c. 10. §. 6. p. 37.* Saltem quinque horis ab accepto cibo: & cœna sit parca, ait, ne opium, quod replet caput, impensè concurrente vapore cibi copioso, apoplexiam inferat. Rectius tamen id limitat *Casparinus, & duabus vel tribus horis à cœnâ dari scribit. l. 1. art. med. c. 13. pag. 33.*

Distingui & hic potest 1. inter dosin ordinariam & extraordinariam, si primariâ intentione dentur, tempus nocturnum optimum est, 3. vel 4. horis à cœnâ. Sin secundariâ, etiam manè & post meridiem. 2. Inter tempus electionis & necessitatis, quod quidem per se patet.

Arragossus apud Cratonem epist. 55. pag. 78. Periculosam scribit exhibitionem laudantium opiati, ubi 1. vires ægri non sunt firmæ, 2. Corpus non est evacuatum, 3. & humores crassi sunt. Testatur etiam ipse *Crato epist. 138. p. 241.* Quod impuris atque crudis corporibus nocere re ipsâ compertus sit.

Quæritur ergo non immerito, an prius, quàm adsumentur opiata, purgandum sit corpus? *Galenus* & alii affirmant. Nos, inquit *Prosp. Martian. comm. in l. de morb. mult. f. 4. pos. 171. p. 274.* vestigia Hippocratis sequentes, in curatione eorum morborum, in quibus aut dolores vigent, aut humorum importunus motus, aut eorum aeris qualitas viget, symptomatibus statim succutrimus prius, quàm ad purgationem deveniamus, idque si urgeat dolor, per aliquod medicamentum, quod opium recipiat, verbi gratiâ, theriacam, aut pilulas de cynoglossâ, aut requiem Nicolai aut Philonium, prout res exigit, & Deum testor, hunc curationis modum mihi successisse feliciter, nec quicquam incommodi semel quidem ægrotanti contigisse novi.

Si licet, præmissis præmittendis, Venæsectione vel purgatione, si morbus ea indicet, post principia dari possunt opiata; sin circumstantiæ methodum variant, etiam circa hæc.

Caspar. de Calderâ de Heredia, Tractat. tribunal medicum inscripto ait, post narcoticum assumptum, altero die venam non secandam, illud enim esse lethale. Nos, si valde adstringentiâ præbeantur, sanguinis motum impediri novimus, ut venâ sectâ nullus elaboratur sanguis, unde utique cauti esse debemus, ne insciâ acculetur medicus.

Hæmoptysi laborans, tinctura opii adstringenti & opiatu diu usus, curabat medicus sui jussu aperire venam; sanguis verò stetit instar glaciei, ne gutta quidem exeunte.

Ne in paroxysmis ipsis, verbi gratiâ, hemiericæ, febrium, epilepsiæ dentur opiata, multi quàm maxime cavendum jubent, idque non immerito, ne natura hoc modo à pugna suscepta revocetur, & devinctæ quasi armæ exturbentur, Strategemata morbos hos ligandi & abigendi later in tempore, debent enim dari medicamenta ante paroxysmum, præcipue si perisodum justam observet morbus. Limitari tamen hoc ipsum quoque potest ab urgentibus circumstantiis quandoque, & concedi tunc opiata succisa dosi.

Tam provida solet esse in paroxysmis quoad illa medicamenta, quæ retrahere illam ullo modo queunt, ut illorum actionem differat, pugnae suæ intentæ sic datum purgans durante paroxysmo sæpe interpolatur, post illum demum officio suo fungens. Quando itaque opium ea dosi in paroxysmis pro re nata datur, ut naturam non intesturbet, non liget sed juvet, eatenus etiam tunc locum habere potest.

Pat ratio est in morbis spontaneis seu à natura institutis, per quemcunque locum expellat materiam naturam, ut in diarrhoeis, morbillis, variolis, aliisque morbis criticis, in quibus narcoticorum fortiorum usus plerumque funestus fuit observatus. Melius est, debilitari ægrum & infirmum ad aliquot dies persistere,

quàm protinus extinguere. Idque adeò in omnibus malignis locum habet, uti supra jam innuimus, ut cautissime in ulum vocentur opiata.

Memoranda hoc loco illorum consuetudo, qui in usu habent instante partus tempore laudanum opiatum exhibere, spe certâ confisi, si justus adest terminus, naturam inde roboratam iri, sin minus, dolores immittit. Quæsti in simili & quidem illustri casu, an consultum esset, eo uti, abnuimus, præcipue cum observationibus nobis constaret, dato hoc modo opio, sæpe dolores, parturientibus necessarios, inhibitos fuisse, & difficiliorem nixum inde ortum.

Refert *Forestus* l. 9. obs. 14. de caco-chymico, cui imperitus medicus in dolore calculi stupefaciens exhibuit opium, quo degluto nec amplius evigilavit æger, atque ita, quem dormire voluit, excitare postea non potuit, quod *Celsus* cavendum monet lib. 3. cap. 14.

Ita & novimus viduam, cum menses resistentes per os viam quærent, sanguineo vomitu subsequente, obstructis viis inferioribus, ab imperito chirurgus sumfisse poculum adstringens, cui admixtum erat opium. Sana & salva quæ videbatur, & modò cibum cepetat, desubito extincta est. O cæcitatem, ô temeritatem tonforiam!

In frigidis affectibus, aut subjectis, minus de opiatis exhibemus, quàm in calidis; humoribus crassis pituitosis & viscidis minus eadem conveniunt. Hydropici unius grani opii exhibitione moriuntur, notante *Walao Meth. med. p. 153*. Consummati scilicet, ubi liberè vibrari nequit diaphragma, nec flabellum ordinatum ventilationem suam præstare, inde ab opiatis piuriâ intentione datis facillè tota sufflaminatur actio, alias enim, pro re natâ, etiam hydropicis quandoque ex usu esse potest, ceu à *Scribonio Largo comp. 126. p. 75*. opium in hydropse inter alia commendatur. Ubi roboranda est natura, magis quoque convenit, & quibus ab ejus assumptione alvus movetur. Exemplum hujus rei egregium vid. apud *Barthol. Centur. 3. epistol. 46. pag. 192*.

Opium & opiata in omnibus ventriculi affectibus, nisi urgente dolore inflammatorio, fugienda esse manet *Septal. l. 7. §. 3*. Cavendum est ab ejus usu in iis, quibus debilis est appetitus, qui facilem habent alvum, & infirmum ventriculum, in iis enim ut plurimum alvum solvit, & appetitum prosternit.

Dixgoras & Erasistratus usum opii damnarunt in aurium doloribus & oculorum lippitudinibus, quod & visus aciem haberet, & sopotiferum esset, teste *Dioscoride* l. 4. c. 65. quod ex eodem repetit *Plinius*. Addidit *Andreas*, protinus excæcatum iri, qui eo illineretur, nisi adulteraretur.

Confirmat idem *Pergamenus* l. 2. de compos. medic. cap. 7. ubi: Raro cogimur pharmacia ex opio uti cum videlicet præ doloris vehementiâ homo de vitâ periclitatur, quanquam & tunc solidæ partes ex ejus usu offendantur, adeò ut post hæc correctione opus habeant. Sic & ex opio collyria multis detrimento fuerunt, adeò ut debilem oculum reddiderint, & visus hebetudinem, amblyopiam Græcis vocatam, induxerint, velut etiam auditus gravitatem inducunt, quæcunque ad vehementem aurium dolorem ex opio composita sunt, seu, ut l. 8. c. 4. ejusdem Tractatus loquitur, ea ad immedicabilem frigiditatem particulas deducunt.

Idem pluribus, quænam collyriorum ex opio usum damna sequantur, exponit l. 3. m. m. c. 2. & l. 13. cap. ult. ac proinde subjungit, si quando illis uti nos cogat necessitas, non ita multo post ad illa transeundum, quæ vim opii maleficam corrigere valent.

Avicenna l. 2. Tr. 2. cap. 526. in doloribus oculorum & ulceribus concedit usum opii, cum lacte mulieris,

alibi tamen non utendum eo censet, nisi in acerbissimo dolore, ex materia subtili & corrodeente, ubi syncope & extrema dejectio virium metuitur. Videatur hanc in rem *Christoph. à Vega art. med. l. 3. sect. 2. c. 1*.

Hinc in ophthalmiâ opii usus neque frequens esse debet, nec multus, animadvertente *Septalio* l. 6. §. 93. quia ob amarorem mordet & dolorem auget. In summo ergo dolore interdum opiata miscenda, sed in minima dosi.

In osalgia quoque cautè utendum opiatis. Nihil enim magis auditum reddit difficiliorem, quàm narcotica faciunt. Sæpe & in odontalgia præstat ea interius assumere, quàm dolentibus partibus applicare, quod jam dictum.

Ratione ætatis Infantibus & pueris opiata rarius & parcius danda. Ita solet vulgò iisdem quandoque exhiberi theriaca, quod si in paucâ dosi fiat, adeò incommodum non est. Sin secus, debilitatur facillè ingenium, & memoriam obtundunt opiata, quin ipse cerebro nociva creduntur. Vid. *Septal. l. c. l. 3. anim. 46. l. 1. Scharandau l. de rar. conserv. san. 6. 12. p. 103*. An vero tenellæ ætati, atque angusto pectori juxta perniciosum sit, juxta monitum medicum *Tulpii* 39. absolute nemo facillè affirmaverit. Si enim & tenellæ ætate constituti malè habent infantes, ut indicetur opium, dosi ipsi proportionata, utique tutissime dari potest, quod felicissime in praxi experti sumus vel millies successisse ex voto.

Senibus non adeò conveniunt ac aliis ætatibus. Quin præposterè sæpe his ad somnum provocandum præscribuntur, qui spec. diamb. & diamosch. in forma elect. & aliis calidis sæpe molestas abigunt vigilias, teste *Sim. Pauli Quadrip. Botan. p. 71. & 145*. Verum est, vaporosa ejusmodi, calicium nativum roborantia, convenire senibus in molcillissimo ipsis pervigilio, usus tamen opiatorum similibus movere ad mixtorum tutissimus est. Causa autem, quod interdum perperam adhibeantur in senibus, interdum non tutò frequenter, est partim siccitas, & defectus humorum; partim metus ne in apoplexiam dispositio præsens augeatur. Nos cum spirituosis & humectantibus ea feliciter eo casu adhibuimus, inprimis miscendo tincturam anodynâ cum Oli cephalico volatili.

Habent secum hoc vitii narcotica, quod plerumque exsiccent corpus, unde nunquam sine humectantibus offerenda, aut si hoc non liceat cum ipsis, ante tamen vel post ista danda, præcipue isto casu, uti diximus, cum sufficienti seri quantitate sanguinea massa destituitur, unde resolutio opiatorum impeditur.

Tacemus hic alia, quibuscum misceri possint opiata, utpote de iis jam supra diximus.

Ratione usus & applicationis quædam etiam dicenda occurrunt.

Jam olim *Mnesidemus* apud *Dioscor. l. c.* usum duntaxat olfaciendi probavit ad conciliandum somnum: alioqui ceu noxium damnavit. Rectè veto subjungit *Dioscorides* tum huic asserto, tum præcedentibus modo citatis, ὡς περ ἐστὶ ψάδι, ὑπὸ τῆς αἰσθητικῆς ἐλεγχόμενα, ὅτι πὶ ἐπιμαρτυρεῖται τοῖς ἐργαῖς τὸ ἐν γαστρὶ τῶ φαρμάκου. Quæ quidem omnia commentitia esse, experimento deprehenditur, siquidem effectus virium hujusce medicamenti fidem facit.

Hercules Saxonia l. c. prælect. pract. part. 1. c. 10. pag. 36. quem & alii sequuntur, extrinsecus prius adhibenda innuit, ubi si nihil effecerint, intrinsecus quoque præbenda.

Imò etiam externè à quibusdam cautelæ adduntur, præcipue quoad caput. Externis cephalicis urgente rei usu non raro adduntur opii aliquot grana. Admonet tamen *Francisc. Hildesheim spicil. 1. de dol. cap. p. 16*. dum illo extra uti volumus, ne admoveamus illud communi-

suræ coronali, sed fronti. Cerebrum enim minime tolerare potest opium citra noxam, commissura autem, quia est pars capitis rarior facile opium recipit, quod non contingit, si fronti applicetur, quo de supra jam actum fuit.

Quoad *Dosin*, quidam à levioribus semper incipiendum suadent. Vid. *Fabrit. Hildan. lib. de gangr. & sphaceli. c. 24. p. 826.* Generalis h. l. repetenda est cautela, semper tutius esse subsistendum infra summam dosin, & præstare, repetita potius vice ut voti compos fiat medicus, quam extrema statim tentando opprobrium sibi accersat. Peccatur hic magis in excessu, quam defectu. Sic narcotica si immoderatus assumantur, etiam sola apoplexiam effecisse non raro observatum fuit, teste *Wesfer. de apopl. p. 25.* Neque valet, quod olim methodici gloriabantur, cum usu narcoticorum sublato dolore, quanquam mors sequeretur, se tamen morbum abegisse, teste *Galeno lib. 2. ad Glauco. cap. 2.*

Ex supra dictis etiam fluit, ut bene & fideliter ab exercitato artifice sint præparata, quod allegato loco *Hildanus* quoque monet.

Non vero statim desperandum, si legitima observata methodo, datis opiatibus æger per longum tempus dormiat, præsertim si vigilæ præcesserint continuatæ.

Retulit nobis venerandus *Rolsincius*, se aliquando collegæ suo medico, Dn. D. Zachariæ Brendelio, Lipsiæ reduci, ubi per plures noctes insomnis commoratus erat, & hinc aliquo modo sensibus perturbatus, propinasse laudari opiat gr. vi. cujus usu cum indormisset, 24. horas & amplius, evigilans sanitati redditus fuit integerrima.

Plures cautelæ, eæque elegantes videri possunt apud sæpe citatam *Septalium l. 3. animadvers. 43. & seqq. Nester. Consil. antidyssenter. cap. 11. p. 248.* *Grabium de med. simpl. cognosc. p. 147.* *Crollium Basil. chim. p. 235.* & alios.

Aque hæc ex Clariss. VVedelii doctissimo de Opio Tractatu hæctenus forsitan paulo fusi us

OPOBALSAMUM.

De eo abundè satis actum sub titulo *Balsamum*, ubi scilicet de *Balsamo vero*. Hic tantum uno verbo de ejus selectione ex Augustanis.

Balsamum genuinum esse indicat odor thuris & rebinthinæ æmulus; sapor subamarus, adstringens & modicè mordens; calor si mediam ætatem attigerit, aureus, vel in senio, mellens; lactis ab eo infusi aliqui-
lis coagulatio; & resinosa in panis adhæsiō, quem non olei instar intimius pæctia, aut maculam indelebilem adficat.

OPOPANAX.

De eo vid. sub titulo *Panax*. Hic tantum de *Opopanaci* selectione ex Augustanis.

Commendatur purissimus, amarus, internè albus, aut subfulvus, foris ad aureum colorem inclinans, lavis si frangatur, pinguis, galbani instar lentescens, tener, statim in aqua eliquescent, & lactescens, gravi-
que odore præditus. Improbatur niger ac mollis, nec non ammoniaco aut cerâ fucatus; dolus agnoscitur, ex eo quod in aqua digitis fricatus non resolvitur, nec lactescit.

OPUNTIA.

Quamvis frutex hic Theophrasti & Plinii *Opuntia* non sit, cum illa, ab *Opunte* oppido citra quam provenit nomen sortita, herpula sit non frutex nedum arbor, merito tamen *Opuntia Indica* arborea, aut fruticosa dici possit, quia insigni proprietate è folio radices

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II,

emittendicum *Opuntia Theophrasti* convenit, nec alia quævis præter eam, quod hæctenus audivimus, arbor aut herba. Quinetiam *Opuntiam* hodie (ut puto) in *Loetide* frustra quæseris.

Cum dico illam è foliis radices agere apparentiam potius & opinionem vulgarem sequor, quam rei ipsius veritatem. Quæ enim folia videntur revera non sunt sed potius rami. Nam 1. folia non germinant, aliaque ex se folia emittunt, sed rami 2. folia intra annum saltem spaciū in justam magnitudinem extensa postea non augentur. In hac autem stirpe quæ dicuntur folia quotannis augentur & incrementum capiunt, & in nonnullis speciebus lignescunt. 3. Addit *Gul. Piso*, folia contigua tantum esse arbori, è contra omne quod rami vicem subit continent: se autem in quibusdam ficibus dissectis radices immediate continuatas vidisse frondi. Tandem, 4. Folia plerisque omnibus plantis, etiam virentibus, tandem decidunt; at in hac proprie loquendo perpetua sunt. Verum argumentum hoc non concludit, quoniam dantur nonnullæ v. g. *epiphyllospemæ* in quibus folia durant quandiu caules: ut neque quod hæc fructum è foliis dictis emittant, nam *epiphyllospemæ* quoque idem faciunt.

Forma tamen æterna lata & compressa cum foliis conveniunt, & à ramis differunt, qui in omnibus aliis stipibus teretes sunt.

Licitur autem hic frutex Botanicis ficis indica, ob aliqualem fructus cum fico similitudinem.

Vires. Tum fructus tum folia refrigerant & humectant, salivæque sunt, quo fit ut eorum succus expressus febres ardentes maxime extinguat, & sitim expleat. Grana sicca & astringentia sunt: hinc poma cum granulis loco cibi sumpta alvum sistere dicuntur: gratum præbent alimentum refrigeransque, etsi flatuosum & corruptioni obnoxium si largius sumantur, quemadmodum alii horatii fructus, æstuantibus jucundissimum, succus plantæ aut aqua stillatitia admirabilis est adversus biliosas febres. Auxiliantur radices ejus cum *Hieracii* quadam specie enterocelis, & erysipelatis medentur. Indi succo expresso pro aqua utuntur; & *D. Hughes* se fructibus hæc in inopia aquæ sæpe sitim sedasse refert.

Experientia constare aiunt folia eorumve succum vulnera recentia mirabiliter sanare. Tumores etiam & apostemata, quæ nautis plerumque accidere solent in Americam trajicientibus, potenter discutunt. *D. Hughes* folia charta madefacta involuta, & sub cineribus tosta ejusmodi apostematis cataplasmatibus formâ applicare solebat, successu supra spem & expectationem prospero, ut nullum vel præstantissimum medicamentum compositum ad hunc usum æquè commodum & proficuum fuerit. *Ramus.*

ORBICULARIS.

Nomina. Fungus pulverulentus, crepitus lupi dictus *J. Bauh.* Crepitus lupi, live fungus ovatus *Park Fung 3.* live Orbicularis *Ger.* Fungus noxius 42. live rotundus Orbicularis *Casp. Bauh.* Fung. nox. prima species *Clus.*

Clusus. Nullo ferè conspicuo pediculo natus, glomeratæ rotunditatis, juglandis magnitudine & majoris & minoris, primò albâ cute & medullâ itidem albâ conspicuus, postea ex albâ vel lividâ; medulla cum contumitur in tenuissimum siccissimumque pulverem abeunt. Calcatus crepitum edit & fumum pulverulentum emittit. Nobis observatum dum juniores adhuc æscent, cute quidem albâ ad cinereum tamen tendente, eaque non lævi & aquali, sed velut granulata recti erant, eorum autem pulpa interior mollis interdum, initio candidus, inde virelens.

In pascuis & pratis siccioribus, ubique ferè autumnino invenitur. Hujus pulvis gravem & fætidum spirat odorem. *Imper.*

Siccatur admodum & astringit, unde vulneribus infusus sanguinem sistit, ulcera inveterata desiccatur, hæmorrhoidum fluxum cohibet: oculis tamen inimicus, imò perniciosus censetur. *Raius.*

Quod oculis sit inimicus satis superque constat ex observatione Clariss. *Job. Meys*, qui ex ejus pulvere in oculum suscepto enormem ophthalmiam genatam vidit, ut in sua *Chirurgiâ* habet *Rationali*.

Alia *fungi orbicularis* datur species quæ capitis humani quandoque magnitudinem æquat, quo *Chirurgi Germani* cum fructu ad sistendas hæmorrhagias in membris amputatis utuntur, eo scilicet velut pileolo seu cucuphæ extremam partem unde facta est amputatio, & in qua vasa sunt aperta, obvolventes.

ORCHIS.

Orchis i. e. testiculus, cur dictum sit hoc plantæ genus, neminem qui ejus radices unquam erexit latere potest: quod si quem forte lateat *Spigelium* attendat in *Isagoge* ad rem herbariam, rationem reddentem his verbis. Cunctæ herbæ quæ bulbosas binas aut ternas habent radices instar testiculorum, semen humanum quodammodo redolentes, orchides censentur.

Satyrium à Satyris dicitur ob incendium libidinis, quod veneris incentivum, ut vocant, esset præ reliquis bulbis. Satyria dicuntur quibus unicus est bulbus, orchides quibus geminæ, autore *Dioscoride*. *Spigelius*, nescio quo autore, satyrium proprie dici ait quod ternas habet radices, orchidum radicibus similes, unam quæ sursum erigitur virilis membri formâ, duas alias inferius, ex eodem initio testiculorum modo dependentes. Quod si verum sit, nulla fortasse, certe paucissima erunt satyria.

Vires & Usus. Orchis calf. & hum. saporis est dulcis. Usus præcip. (ex signatura lasciva) ad viridem fortitudinem restaurandam: sic & uterum confortare creditur & ad conceptionem disponere. *Schrod.*

Ad conceptionem juvandam *℞.* Sat. satyrion. *℞.* cum vino malvatico aut aq. vitæ mulieri sæpius post menstruorum fluxum. Multas fœminas hoc remedio curavit *Hartmannus*. *D. Hulse.* *Raius.*

Datur Orchidis quædam species minima flore purpureo saturato & non parum odore, in montibus nobis vicinis admodum familiaris, è cuius flore, seu spica non semel elegantem concinnavimus conservam in debilitata virilitate non mediocriter sanè usus.

Orchidem autem vulgarem quod spectat ex ejus radicibus bulbosis vulgò testiculis vocatis remedium vidimus pro herniis concinnatum non inefficax, scilicet earum certus quidam numerus in vino albo per noctem maceratus mane jejuno stomacho per aliquos dies continuos potandus exhibebatur.

OREOSELINUM, vid. *Daucus Apii folio* sub titulo *Daucus*.

ORICHALCUM, vid. *Aurichalcum*.

De eo conficiendo vid. sub titulo *Æs*.

ORIGANUM, vid. *Majorana*.

ORIZA, vid. *Oryza*.

ORMINUM, vid. *Horminum*.

ORNITHOGLOSSUM, seu *Lingua avis*, vid. sub titulo *Fraxinus*.

ORNITHOPODIUM, vid. *Polygala*.

OROBANCHE sive *Limodorum*.

Orobanche dicta est *ὀροβανχὴ τῆς ὀρχέας*, quia viciis strangulat florum figura ad orchidem accedit, so-
lorum viridium & herbariorum carentia, diuert tum

ab Orchide tum ab aliis plantis. Est autem vel radice simplici non repente squamosa, *Orobanche* simpliciter dicta; vel radiculata repente dentaria; vel radice multis fibris crassiusculis implexis composita, nidus avis.

Vires Orobanches vulgaris. Herba condita aut ejus syrupus ad splenicos & hypochondriacos affectus usus est eximii; unguentum ex eadem cum axungia ad tumores duros & schirrotos. *D. Bourle.*

Orobanche flore minore *L. B.* adeo parum differt à præcedente, ut specie diversum esse mihi persuadere vix possim. *Raius.*

OROBUS:

Orobus dicitur *ὀροβὸς τὸ ἐρεπτεῖσθαι ἀπὸ τῶν βοῶν* quod boves eos vescantur & saginentur *Dioscor.* lib. 2. cap. 131. *ὁ βοὸς δὲ λιπαίνει τὸν ὀροβόν* boves autem saginant si elixum apponatur.

An *Orobus* vulgò creditus seu *Mochus* Italorum sit verus antiquorum *Orobus* ambigitur: non esse arguit quod nulla huic insit amaritudo nullusque ingratus sapor, sed leguminosus & pisorum vulgarium: inter legumina præter lupinum nullum amarum inveni, inquit *J. Bauhinus*. *Orobus* ergo antiquorum huic ævo incognitus videtur. Adde siliquam non esse cylindraceam ut *Orobi Theophr.* è contra *Honorius Belli* ex *Cydonia* *Cretæ J. Bauhinum* misit semen (ut ipsi videbatur) *Orobi vulgaris*, hac addita inscriptione *Orobos ὀροβὸς* sive *ῥόβος*, quod rustici ferunt singulis annis & boves eo saginant antiquorum more.

Hujus nota est siliqua nodosa, torulis seminum protuberantibus velut articulata.

Nomina. *Orobos* sive *ervum* multis *J. B.* *Or.* receptus herbariorum *Ger.* vulgaris herbariorum *Park.* siliquis articulatis, semine majore *C. B.*

Cauliculis infirmis, ab eadem radice pluribus affurgit, pedalis aut altioribus, angulosis glabris, ab imò statim ramosis. Folia longa decem aut duodecim, aut etiam pluribus pinnularum obtusarum extremo crenatarum conjugationibus ad medium nervum seu *ῥαχὶν* adnexis, composita, nullo in extremo impari pinnâ, neque vero claviculâ, è foliorum alis ut in hujus generis reliquis, exeunt pediculi flores in summo gestantes nunc singulos, nunc binos, exiguos, quam lentis tamen majores, folio clypeiformi exteriorius purpurascens, interioribus albo, purpureo cæruleis lineis striato. Flosculis succedunt siliquæ unciam longæ, tenues, cylindraceæ, per maturitatem albentes, articulatis torulis, in quibus semen rotundum (angulosum redditur ubi siccum) leguminoso duntaxat gustu, non amaro.

In agris circa *Monspelim* & *Genevam* vulgaris est, *Raius.*

Vires. Semen *Orobi* deterisivum & resolvens reputatur.

ORYZA.

Oryza ut semen ex India primum fuit allatum, sic è indidem nomen *Lobelio* ascriptum videtur.

Oryza gluma seu cortice crassiore arcte adhærente granis, spica laxa, è pluribus composita à reliquis frumentaceis distinguitur.

Nomina. *Oryza* *L. B. C. B. Ger. Park.* & aliorum omnium.

C. B. Radicibus est triticeis culmis bicubitalibus, striatis triticeis & hordeaceis, crassioribus ac robustioribus, geniculatis: foliis longis, arundinaceis, canosis, portaceis haud absimilibus; in culmi cacumine non spica, sed juba milii autem panici modo, in ramulos divisa, in quibus semen utrinque impari omni & alternatim provenit, cortice subauro, albero; & angu-

angulosis lris in longitudinem donato, supernè villosis, ovi figura, rectum, & aspera arista armatum est, quo exuto granum quovis præstantissimo Tritico candidius, pellucidum durum, Avenâ brevius & crassius conspicitur.

Flores ut in milio purpureos esse, & eodem tempore flores & semen proferre dicunt.

Oryza præcipua omnium Indiæ Orientalis regionum annona est, indeque primum ailata in Græciam & Italiam. Hoc etiam seculo in universa India frequentissimus ejus usus est, ut in omnibus fere ejus regnis, Provinciis, insulis copiosissime seratur & colatur, ut Bengala, Pegu, Cambaia, Ceylon, &c. quin etiam in Ægypto magno proventu seritur, aliubi etiam in Syria, & fortunatis insulis: inque Hispania & Italia ubi nos in Ferrariensis ditionis locis palustribus satam observavimus.

Humidis locis delectatur, & in ipsis aquis crescit. In insula Zelan aquas in stagnis reservant ad oryzæ sata irriganda: & ibidem, (aiunt) terra pinguis perpetuis exundationibus ita mollescit, ut Oryzæ messem facturi ad dimidium genu in aqua versentur: sic autore Porta, in Salemitano agro, ubi patenti, uda planitie maximo proventu seritur, euripis & silicibus & fluviis ductis quoties opus est rigant, alias nullam aut casam segetem laturam: ita ut mirum sit tam siccam & exsiccum granum tam humidum requirere solum: terramque humidam uliginosam tam præstantis soporis & salubris nutrimenti tamque siccum fumentum procreare: maturescit æstivis solibus, ejusque messis serotina est circa æquinoctium autumnale: quare Septentrionales regiones, hi et humentes magis, tamen ut algosâ respicit, nec ibi ad frugem pervenit.

Vires & usus, in cybis Oryza admodum est familiaris, apud omnes nationes Orientales præcipue apud Indos; concoctaque facilius evadit & origratior, ubi ex lacte bubulo amygdalarum cremore, aut carniû pingui jure decocta fuerit, datur utiliter in cibis dysentericis, coeliacis & diarrhoea affectis, præsertim ubi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi fuerint extincti, decoquatur. *Matth.*

Oryza Indis panis loco est, variis modis præparata: præparandi modos vide apud C. Bauhinum Theat. Bot. lib. 1. sect. 4. cap. 29. potum quoque in multis Indiæ locis ex Oryza conficiunt. Vide C.B. loco citato. Turcæ quoque ex Oryzæ pulvis efficiunt, & multa ex ea fercula parant. Varios Oryzam ad cibum præparandi modos in Europa, ubi triticeum in panem venit, vide apud prædictum autorem loco laudato.

Vulgi animos opinio pervasit Oryzâ frequenter vescentes, obesiores reddi; quare in quibusdam locis feminæ graciliores & macilentiores ea frequentius utuntur ex lacte & largiore saccharo assumentes. Sed veterum medicorum sententiâ contradicunt: ut qui inter *dyureses* seu leviter alentia & *diarrhoeas* live quæ difficultè conficiuntur eam retuleret. Nobis aliter videtur, & vulgi potius opinioni accedimus, nec audemus damnare edulium tot gentium, tot seculorum usu approbatum: alvum modice astringere concedimus: unde & in hepatico fluore & mictione sanguinea, inque tussi utile esse aliis astringentibus additis non abnuimus. Farina etiam cataplasmatibus repellentibus admiscetur, & iis quæ mammarum incipientem inflammationem arcent, floribus chamæmeli & rosarum additis. In hæmoptysi laudat Helmontius Oryzam q. vel lacte chalybeato coctam. Dol. lib. 3. c. 8. f. 6. *D. Soam.*

Oryza tenuis decoctum, in aqua, usitatissimum est apud Indos multorum medicamentorum vehiculum.

Liquorem vinosum ex Oryza extractum *Arak*, aliud vocant. *Ramus.*

ORVIETANUM, vid. *Electuarium*.

OSMUNDA REGALIS, vid. *Filix florum*.

OS DE CÔRDE CERVÏ, vid. sub titulo *Cervus*.

OSSI FRAGUS LAPIS

Idem quod

OSTEOCOLLA

De quo vid. sub titulo *Lapis*.

O S T R E A.

Ostreâ (vel *Stræ* & *Stræna*, vel quasi *Stræa*, quod testâ veluti ossea tegantur) quorum differentia, a loco & colore desumpta, variaz sunt. Ratione loci celibrantur.

1. *Pelagia*, quæ in alto mari nascuntur, parva & rara.

2. *Αιμωσπασ*, ut Aristoteles vocat, quæ in stagnis marinis degunt; cujus fortis sunt apud nos Colceuti-entia dicta, quæ puteis & stagnis, quæ mate singulis æstibus inundat, aluntur; indeque pinguiora & satidne gratiora evadunt.

3. *Littoralia*, quæ in littoribus inveniuntur; nec non inter saxa, limi & aquæ dulcis expertia. Parva sunt dura & actia.

4. *Britannica*, quæ omnibus præferuntur.

5. *Santonica*, quæ magis salia & actia judicantur.

6. *Burdegalsis*, inter quæ Medokina (ab oppido vicino *Medoc*, dicta) suavitate præcellunt.

7. *Circæ*, quæ ab Horatio Satyr. 4. commendantur.

8. *Abydena*, quæ olim à ganeonibus celebrati solita Clemens Alexandrinus in pædagogo prodidit.

9. *Lucrina*, (à Lucrino Campaniæ lacu, in sinu Bajano, prope Puteolos, ita dicta) quæ à Plinio celebrantur.

10. *Brundusina*, de quibus ita Plin. gaudent peregrinatione, transferrique in ignotas regiones. Atque ita Brundusina in Averno compacta, & suum retinere succum, & à Lucrino adoptari creduntur.

11. *Cumana*, quæ Strabo præstantissima facit.

Quid? Ostrea illa, inertissimam carnem cœno sanguinatam nihil existimas limosæ gravitatis inferre? See. nec Epist. 95.

Quod colores, *ruffa* sunt in Hispania; *fusca* in Illyrico; *nigra* & carne & testa sunt *Circæ*, quibus palma mensurarum diu tributa est; in mari rubro *flammeis* illustantur *zonis*, hisce demum subjunguntur.

Gaideropoda (quasi pes asini, apud Græcos, qui gaideron hodie Alimunt vocant) *Chariton*.

Ostrea pestiferos bubones loco transferunt & virus omne ad se trahunt: sunt autem agglutinanda brachiis parâ quâ axillaris decurrit, videlicet si bubo in alis sit, in vero inguen obfederit lineamenti femotis quæ vena cruris describit Schroderus ex *Hollerio*.

Ostreorum testæ vim habent exsiccandi, sudorem movendi, abstergendi &c. Hinc usus earum internus præcipue est in febribus, quibus interveniente sudore medentur. Externe conveniunt in dentificiis absterforiis, in mariseis & condylomatis apprimendis. *Dale.*

OSTRITES, vid. *Osteocolla* sub titulo *Lapis*.

OSTRUTIUM, vid. *Imperatoria*.

O T I S.

Avis est grandior quæ Gallicè vocatur *Ouarde* cujus stercore resolutivum ac in scabie conducibile reputatur.

OTICA MEDICAMENTA.

Ut delicatissimum membrum est oculus ad extra, ita delicatissimum quoque est auris ad intra, unde natura intra petras microcosmi eandem abdidit, ne tam facile injurijs externis esset obnoxia.

Dividi & Otica ad instar ophthalmicorum possunt in interna & externa. Internis & externis communia sunt (1) *Roborantia*, quæ spiritus vigorant, ut influant, nec stationem suam deserant, seu ab intemperie capitis frigida, seu defectu spirituum, seu obstructione pororum nervorum influxus vacillet, ut in auditus gravitate, difficultate & sensus læsionibus alijs. Inprimis huc faciunt, quæ volatili subtilitate id præstant, ut ipsissima cephalica recensita pleraque, salvia, rosmarinus, stœchas arabica &c. Deinde & præcipitania cephalica omne tollunt punctum, præcipuè & principaliter cinnabarina. Vix in illo affectu capitis tam insignem hæc edunt effectum, quàm in aurium his affectibus. Unde & in febrium continuarum & ardentium declinatione omnium optima sunt, iis in casibus, quod sæpius experti revera testari possumus.

2. *Aperientia & discutientia*, partium iudem volatilium & spirituosarum, sale volatili oleoso inprimis polentia, cum dictis concidentia. Sunt verò & alia hujus classis. Sic instar regulæ practicæ commendandum est: in affectibus aurium quibuscunque, non à causâ solâ externâ oriundis, medicamenta splenetica & hypochondriaca esse optima. Restituimus hoc pacto sæpius *durantios*, solis vel potissimum adhibitis martialibus & aperientibus alijs.

Sic *diaphoretica* in affectibus aurium, inprimis in otalgia unice profunt. Lympha enim plerorumque, si non omnium, affectuum aurium est causa, quæ omnibus modis corrigenda, dissipanda, in ordinem redigenda est.

Sic *carminativa* auribus quoque specificè medentur, tum internè, halituositatem ex primis viis & consequenter ex M. S. quoque tollentia. Neque enim sonitus, sibilus & tinnitus aurium nisi ab exhalatione peregrinâ seu subsistentis lymphæ, seu cessantium spirituum, seu heterogeneis particulis halituosis inductis oriuntur. Unde *carminativa & roborantia* inter Otica optima sunt, v. g. semina carminativa, bacca lauri, & ta anisi, carvi, anethi.

Inter externa verò laudanda apprimè, præter polychresta roborantia, ex aquâ apoplecticâ, Anhaltinâ, acovisticâ Mindereri essentia ad auditum Michael. ambrâ, moscho, (qui solus impositus quoque egregie juvat.) V. otalg. Mynsicht. sunt (1) *Extergentia*, quæ obstructiones referant & mundant, ut actiüscula, raphanus rusticanus, cepæ, portum, & amara, ipsaque purgantia, ut radix hellebori, colocynthis, flores persicorum, ut absinthium in lacte coctum, asarum, plantæ cephalicæ rosmarinus, chamomilla, oleum amygdalorum amarorum, velut basis omnium oticorum externorum &c. in ulceribus, vermibus, sordibus proficua. Utraq; simul vias & parietes meatuum præstant liberos. Sic & vapor seu suffimentum ex fatinâ fabarum huc spectat.

(2) *Exsiccantia*, nihil enim auris archeo tam alienum est, quàm humor peregrinus vel quasi talis; auris enim, ut sonus quoque, siccis gaudet, exthure, mastiche, succino, g. sandaracæ. Hinc & fumus tabaci inspiratus confert. Præcipuè verò in fluxionibus, quæ chronica & molesta esse satis consueverunt, hæc ipsa profunt.

Anthemintica ipsa, quæ quidem cum dictis coincidunt, ut non opus sit seorsim de iis plura dicere.

Inter hæc ipsa vero notandum: (1) *In affectibus aurium semper magis ad caput, imò & alia viscera, quàm ad aurem ipsam est respiciendum.* Hinc cum tinnitus ipse quoque sit ordinarius præco & antecambulo apoplexiæ, eo potissimum casu absurdum foret, topicis illi mederi, neglecta spirituum debilitate. Hinc semper eo casu, ut obi-

ter hoc addamus, attendendum est, an tinnitus proveniat ab infimo ventre, inquinato sero & spiritibus, inprimis à flatibus; an à spirituum defectu, an ab assidua eorundem rarefactione & agitatione, ex quo etiam curatio moderanda & varianda est. Extat hanc in rem elegantissima de tinnitu aurium epistola apud Scaligerum ep. 66. p. 194. ubi post alia: empiricorum, ait, atque methodicorum olim fuit hoc, affectæ parti illico adhibere *ωvινωδ*. Nos aliter faciendum natura docet, quæ ut certis consensionibus commisit atque aptavit partes animatas, alterius sæpè noxam ex alterius incommodo pendere designat. Quamobrem non neglecto cerebro, ventriculi, jecoris, lienis, matricis prius incunda ratio est. Nec minus ad ea, quæ *προκαταρκτησις* vocant Græci, respiciendum.

2. *Quacunque spiritus vel obtundunt, vel confundunt, cavenda sunt.* Confundunt inprimis sternutatoria, unde & caput turbant, & varie agitant materiam halituosam, ac humorosam ibi contentam. Obtundunt verò frigida, actu vel potentiâ talia, quæ idcirco tutius omittuntur. Hinc

3. *Nec frigida, nec calida, sed tepida debent esse omnia indenda*, quæ blande demulceant, non lædant verò. Vales enim & hic, frigida esse nervis & nervosis partibus adversa; tepidis blandis gaudent aures.

4. *Topica auricularia vel auri ipsi induntur admittuntur, vel pone aures illinuntur.* Illa vias requirunt patulas, unde sordes removendæ prius, quæ sæpè etiam sola, in plebejs præsertim, in causâ sunt, quare auditus sit difficilis, quibus expurgatis hinc empirici sæpè plus efficiunt, quàm medicamentis suis alijs. Hæc vero priorum sunt subsidia, ad discussionem quoque egregie facientia ex spirituosiss, ▽ Anhalt. ol. petrol. ess. castor. volat. &c.

5. *Topica ipsa quoque inter se distinguenda sunt, quæ quibus magis convenient, in qualitate & quantitate.* Suffusus magis exsiccant, vaporosa humida magis demulcent, oleosa & spirituosa magis discutiunt & roborunt. In singulis cavendum est semper: Ne quid nimis. Inprimis aquea facile obruunt & laxam membranulam vaporosa quoque & alia frequentius continuata partem debilitant. Imo nec auris patitur lusum, pars inter omnia sensoria subtilissima & delicatissima. Hinc etiam injectiones aqueæ decocta & alia, ad instar clysterum vulgò commendata, minus locum habent, sed omittere præstat. Quando emolliendum est & demulcendum, immediate quoque instillantur v. g. & amygd. dalg. quando roborandum, cum bombace.

6. *Actuationi topicorum velificandum est & corporis positu*, inprimis si ea immitti profundius ex usu sit. Hinc in aurem oppolitam cubandum eo casu, inprimis in otalgia.

7. *Quacunque meatum obviscant, exulent.* Pertinet huc & pinguedo castorei, cuius potius eligenda est essentia. Essentia fellis perdicis, lucii piscis ob incisoriâ virtutem commendantur in surditate & vermibus aurium, quo casu & urinosa quidam laudant. Item cataplasmata huc non quadrant.

8. *Quacunque partem membranosa & teneram lædunt & erodunt, cavenda sunt.* Hinc olea destillata quædam acriora & calidiora consultius omittuntur, alia bombace excepta, cum hoc modo non immediate feriunt membranulam, tolerantur bene. Optimum verò est oleum amygdalorum amarorum, vel nucleorum persicorum, eligere loco excipientis, cumque eo remiscere & ea carminativa alia, subtripla circiter parte, additis pro re nata & spirituosiss, ut spiritu liliorum convallium, ▽ apoplecticâ, essentiâ castorei factâ concussionem albescentia

9. *Inmissis topicis masticare consultum est.* Videantur de hoc meatu ab aurium regione ad os eunte anatomici, & Heerius obs. 28. p. 315. qui plura inde phænomena explicat & dilucidat. Hinc suavis id utiliter sæpius, ut & magis

penetrare posset medicamentum, & serosum phlegma educi, & caput roborari, in susurris aurium & affectibus alijs. Hinc illud quoque phænomenon addendum venit, quod otalgia vel inflammatio aurium si paulo protundior sit ordinarie quasi solet terminari ad salutem, facta puris successiva ad fauces eructatione, quod vidimus non semel. Sin minus profunde hæreat malum, sed ad exteriora vergat, solet per meatum auditorium exsudare, non negligendum ullo modo, siquidem facile, nisi exsiccantibus sedula cura adhibeatur, alifque & diætâ ipsâ, in longum tempus durare solet fluxus. Imo verò singulare aliud experimentum ex eodem fundamento lucem acquirit, nempe auribus adhibita topica, non solum prodesse in aurium affectibus, verum etiam in partium vicinarum morbis alijs, & speciatim in doloribus dentium. Novimus quendam militem Belgam, qui in curandis illis magnam tibi acquiverat non nisi infuso auribus liquore, quem pro arcano retinebat sibi. Conveſatus vero aliquandiu nobiscum eodem hospitio, sub discessum communicabat id ipsum, nihil aliud esse scilicet, quam aquam simplicem, cui pauca grana piperis in cochleari super ignem intepuissent. Pro divitiis vero recipiebat g. j. moichi. Conferri merentur quæ de hoc applicandi loco etiam Strobelbergerus memorat Tr. de Podagra dentium. Wedelius.

OTICA Medicamenta specifica ex Fascie Medicam. Cnoſſelianorum.

Clariss. D. D. Gabioviski, Ser. piæ defuncti Episcopi, Caroli Ferdin. Princ. Pol. & Suec. Medicus ordinarius, in symptomatâ surditate cum dolore Sac. Reg. Maj. anno 1648, mense Januario, auri sinistrae superveniente, commendabat colocynthidæ pomum, cum calefacto oleo amygdalarum amararum imprægnatum, post fortissime expressum. De expresso hoc oleo colocynthinato cum bombace excepto, ponatur in aurem bis vel ter in die.

2. Ex consilio autem Dom. D. Cnoſſelii observavi, auditum S. Reg. Maj. brevi post restitutum fuisse, ~ tartari calassato, leviter tepescato, & bombace excepto, atque in auremposito, suppositis statim lineaminibus probe calefactis ad extra per diandiam horam.

3. Anno 1649. rediit dolor, cum surditate, strepitu & fluxu excrementoso, ubi Cl. Cnoſſelius denuo præscriptum remedium repetiit, sed absque levamine, inde & balsamum hoc adhibuit, quod

℞. ~ tartari rectificatiss. & calassati, elixir. propriæ. sine ~ Arianæ 3℔. ol. hypericoris, succini ana 5℔. simili dicto modo fuit adhibitum, & S. R. Majestas ex reiterato usu per tres dies iterum convaluit.

4. Juvenis studiosus à septennio aure dextra destituit, & aliquando vix audit. Cura ejus sic fuit instituta. Primo purgatus fuit pilulis anethinis, post scarificationes factæ sunt circa scapulas & cucurbitula admoda. Postea usus est hoc topico, quod

℞. ~ Formicarum, tartari rectif. calassati ana 3℔. extr. castorei 5j. 2o succini, seu spiritus gutt. x. M. Mixturem cum bombace exceptam intudat in aurem, & illibi per diem & noctem servet, applicato semper pressus lineamine intense calefacto, pro imposita Medicina in actum transpirationis intimioris promovenda.

Arcanum in Surditate.

Clarissimo Dn. D. Luberto Erbenio à quodam mercatore Gedanensi communicatum, huc annexere etiam placuit.

℞. Raphanum unum vel plures pro pl. Præscinde capitulum vel taleolum, excavato infunde aq. majoran,

quantum capiet, taleoloque præciso, iterum tege foramen superius ipsius raphani, defodendo illum intraterram, per dies tres vel plures, exempto raphano, aqua majoran. tot diebus detenta, effundatur & servetur pro usu. Hujus nempe liquoris cochlear in dies bis mane scilicet & vesperi, vel capius immitatur in aures.

OVIS,

Et sub eâ Ovium Genus.

Ovis Animal est lanigerum, rostro quam Bos angustiore; cornibus rugosis, recurvis, & in spiras interdum convolutis; papillis binis. Bove magnitudine plus quadruplo minus, timidum & imbellis.

Cæterum lana componitur e plurimis tenuissimis & prælongis filis, huc illuc reflexis, crispis, contortis, varique implexis; quæ quamvis soli (quod sciam) Ovi convenit, non tamen omni: vidimus enim Ovæ ex Africa allatas pilis hirtis Canis fere instat vestitatis.

1. Ovis Domestica, cujus mas Aries dicitur, foetus Agnus. Animal est notissimum, mite & placidum, plurimum in cibo, vestitu & medicina; cujus historiam integram vix unum volumen caperet. Verum cum vix longè celeberrimi Conradus Gesnerus & Ulysses Aldrovandus quæcunque de eo ab alijs scripta sunt, quæque ipsi observarunt, aut ore tenus prolata ab Amicis, Opinionibus & rusticis acceperunt, in unum congesta, amplissimis suis Animalium Pandectis inseruerint, omniem nostram in hac parte industriam omnino supervacuam & inutilem reddiderunt. Liceat duntaxat addere, (quod etiam superius attingimus) glandulas illas utero adnascentes, ex quibus foetus penditur, cotyledones dictas, non ut in Bovino genere gibbas esse & convexas, sed cotylarum seu acetabulorum in modum concavas, ut nomen innuit.

2. Ovis Lanianda, Arabica ~ λανάνηρος, Gesneri Cauda huic generi crassissima est & ponderosissima, triginta interdum librarum. Spectaculi causâ in Angliam illatas aliquoties vidimus; non quales Joann. Caius apud Gesnerum describit, caudâ se leniter in descensu coarctante, quousque tandem desinat in eam figuram, quâ est aliarum ovium cauda; sed simpliciter marispii seu peræ alienus instat lata, ita ut non attenuaretur deorsum, sed e contra à summo ad imum paulatim magis magisque lateſceret: Hoc genus fortasse caudarum est quod Alianus cubitali latitudine esse dicit. In Africa & Egypto, nec non in Syria & in Arabica inveniuntur hoc genus oves. Ravi-volsius circa Halepum eas observavit.

Alterius generis meminit Herodotus cujus caudæ longitudine est insolita & mirabili, ut dimetienti tribus cubitis brevior non sit, quæ si trahatur, omnino ad terram atteritur & exulceratur. At pastores plostella fabricant ad quæ ejusmodi caudæ alligatæ nituntur & sustinentur. Huius iconem ad Gesnerum misit Jo. Caius, cui titulus inscribitur Ovis Arabica altera Græco cognomine ~ λανάνηρος.

3. Ovis Strepsiceros Cretica Bellonii. Arietum genus est in Creta (inquit Bellonius) cujus magni greges, alijs haud minores vulgo conspiciuntur, præsertim in monte Ida, quos pastores Striphoceri nominant, nostris in hoc dissimiles, quod nostri cornua inflexa & contorta gestant, illi verò erecta ut Unicornu, in ambitu canaliculata, & cochleæ in modum contorta.

4. Ovis Africana pro vellere lanoso pilis brevibus vestita. Hoc genus vidimus in vivario Regio Westmonasteriensis & Jacobi dicto; quoad formam corporis externam ovibus vulgaribus persimile, verum pro lana ei pilus fuit. Hujusmodi ovium sit mentio apud varios

varios autores. Specie à nostratibus differre non fidenter affirmaverim. Fortasse quemadmodum homines in Æthiopia & Nigritarum regionibus pro capillis lanam quandam obtinent, ita vice versa pecudes hæ pro lana pilos.

5. *Ovis Guineensis* seu *Angolensis*, *Margrav.* Magnitudine est Arietis nostratis, occipitio magis prominente; auribus pendulis, cauda usque ad sufragines; scroto magno, pene in medio ventte; cornibus parvis, deorsum usque ad oculos incurvatis, & quasi tortis; jubæ ex longis pilis ad collum inferius pendulæ; pro lana pilis brevishircini. Grandiores sunt nostratibus, & paleari pendulo instar Bovis.

Pacos Animal Peruvianum quamvis huic generi ab *Hiitoria Animalium* scriptoribus accenseri solet, ad *Camelinum* tamen pertinere nobis videtur.

Musimon Animal *Sardinie* & *Corfica* peculiare, Veteribus memoratum, an hodie in rerum natura inveniat dubium est. *Ophion* *Plinii* est, ex sententia *Gesneri*. Interiisse quidem suspicari, ut *Plinius* absurdum dixerim (inquit *Gesnerus*) cum Natura rerum genera & species omnes sedulo semper conservet. Ego cum *Gesnero* planè sentio, nullam omnino Animalis (initio creati) speciem penitus interiisse: Verum *Musimo* fortasse (ut voluit *Albertus*) spurium quoddam genus fuit ex capra & ariete natum, quod deficere potuit. Verum *Gesnerus* & effigiem *Musimonis* exhibet à *The. Beza* communicatam: & *Sardum* quendam, visum non illiteratum, sibi affirmasse scribit, *Sardiniam* alere Animal quoddam, quod *Muslonem* vulgo vocant, quod nusquam alibi in *Europa* reperitur, Pelle & pilis cervo simile, cornibus Arieti, non longis, sed retro circa aures reflexis, magnitudinis mediocritas Cervi: herbis tantum vivere, in montibus asperioribus versari, cursu velocissimo. *Tragelaphus* *Bellonii* perparum à *Musimone* differre videtur. *Gesner.* *Raius* in *Synopsi Histor. Quadruped.*

OFFICIN. NAT. ex OVE.

1. *Cerebrum*. 2. *Fel*. 3. *Oesypus*. 4. *Lana succida*. 5. *Sevum*. 6. *Pulmones*. 7. *Omentum*. 8. *Stercus*. 9. *Urina*. 10. *Vesica*. 11. *Caput* & *Pedes*. 12. *Pediculi*.

Vires. 1. *Cerebrum* arietis prodesse aiunt in foras immoderato arcendo in morbis Epidemiis, (fruxant cerebrum cumque pinguedine in placentam redigunt, addenda Cinam. Nucist. & hinc exhibent. *Conradin. de Morb. Ungar.*) Facilitat dentitionem, (illud cum melle.)

2. *Fel* [lanæ susceptum, infantumque umbilico impositum] solvit alvum, carcinoma exterius sanat [illud] auribus putulenti auxilio est, [instillatum cum lacte muliebri.]

3. *Oesypus* (succidarum lanarum pinguedo, vulgo *Isopus* humida dicta) conficitur hac ratione. (Sed non è scabiosis.)

Lana succida è collo, feminibus ac femoribus ovium macerantur aliquot horas (6. 7. 8.) in aqua ferventi, hinc fervescunt iterum, agitanturque bacillo, donec pinguedinem in aquam deposuerint. Aqua hæc, semotis lanis, magno impetu lignea rude agitur, aut ex alio in aliud vas effunditur, ut spumescat, sic sordes spumæ inhærescentes separari poterunt. Reiteretur hæc depuratio, donec nihil spumæ amplius, extet, collecta pinguedo lavetur aquâ purâ, [alii malunt marinam,] manibusque agitur, donec candida evadat, nec aquam amplius inficiat, admotæque linguæ leviter tantum adstringat. Et hæc omnia sub fervido Sole fieri convenit. *Matthiol. & Diosc.*

Vires. Emollit, resolvit, calefacit, dolores sedat, luxatis, contusis, & simil. convenit.

Lana succida, ἰζιον. ζεον, schmutzige Schaafs, Wool. Greasy or Surveary Sheeps Wool, smoutige Schaepts-Wool. Colligitur Æstare è collo feminibusque, eaque mollis & sudore referta.

Vires. Calefacit, emollit, lenit, convenit optime contusis, luxatis, casis, & simil. (cum aceto, oleo, vino imposita.) Cremata vim habet calfac. siccitantem, acrem, mordacem, discutientem: Ea propter, confert humidis, mollibus, tumoribus, ulceribus inveteratis; excrescentias cohibet, ulcera ad circatrices perducit, fistulas auresque suppuratum sanat.

5. *Sevum* datum ex vino rubro, sanguinem fistulæ diarrhæam, dysenteriam, & tormina ventris curat (in clymate.)

6. *Pulmones*, (ut & aliorum animalium carnosæ viscera) capiti impositi dolores & æstum mitigant, ferocesque spiritus sopiunt.

Hinc usus præcipui in phrenitide, vigiliis, &c.

7. *Omentum* calidum colico medetur dolori (impositum.)

[N. Lactis deberet hic fieri mentio, in ulceribus internis proficui, præsertim in dysentericis.]

8. *Stercus* vim habet refrigerandi, exiccandi, aperienti, discutiendi.

Hinc maximi usus in aurigine, (sumptum cum periselinio, &c.)

Extrinsecus convenit in tumore splenis, in thymis, calvis, verruca, tumoribus cutaneis, &c. Maximi item solaminis est in ambustis, (pulverisatum & impositum.)

9. *Urina* (nigræ vel rubræ ovis) sumpta, aquam intercutem abigit; (idem facit & destillata.)

Dosis ʒ v. vi.

10. *Vesica*, (ut & capræ vesica,) cremata & exhibitæ, iis qui urinam inviti reddunt succurrit.

11. *Caput* & *pedes* vervecis in ∇ fluente optime decocta, atrophie & contracturæ subveniunt, (in balneo.)

12. *Pediculi*, mira præstare dicuntur in arthritide vaga curanda. Exhibiti N. 9.

Præparata.

Emplastrum de pelle arietina in Herniis, fracturis ossium usuale. *Schroderus.*

Lana succida infantium collo appensa dentitionem sublevat. *Caput* & *pedes* vervecis in brodio carnis vitulina optime decocta atrophie puerorum subveniunt in infessu.

N. Testiculus Arietis nondum venerem experti sumptus venerem stimulat. *Hoffmannus.*

OFFICIN. NAT. ex AGNO.

1. *Pulmones*, (cum recentes, tum siccati.) 2. *Fel*. 3. *Lana*. 4. *Ossa incinerata*. 5. *Coagulum*.

Vires. 1. *Pulmo* attritus à calceamentis contractus ab inflammationibus tuetur (impositus.) vide *Ovis*.

2. *Fel*, ad morbum comitalem exhibetur.

3. *Lana* (cum corio) anginae, aliisque colli tumoribus leniendis ac molliendis confert, (imposita.)

4. *Ossa incinerata*, consolidationem vulnorum, etiam eorum, quæ difficilioris sunt consolidationis, consolidant.

5. *Coagulum* valet ad venena, ad Lac coagulum, ad morsus venenatos (cum ✕ potum.) *Schroderus.*

Ἀγνός, Ἀγνός. Ein Lamm. Schaf. Officin. sunt 1. *Pulmo*. 2. *Fel*. 3. *Lana*. 4. *Ossa incinerata*. 5. *Coagulum*. Hujus *Pulmones* tum recentes, tum exsiccati in usum veniunt: præferuntur ex agno pingui & robusto. Siccantur exempla a pera arteria in vase sigulino impouta, clibano, & refrigerati reponuntur in.

in loco sicco. Fel non solum ad epilepsiam, sed & cachexiam exhibetur Essentia chelidonii associatum. Lana cum corio Anginae non solum & aliis colli tumouribus, sed etiam dentitioni infantum difficili leniendae collo appensa confert. Ossa incinerata in omni alvi fluxu notabilem præstant effectum. Coagulum contra Aconiti potum in vino & Lac concretum in aceto convenienter adhibetur. Hofmannus.

OVUM, vid. sub titulo Gallina.

OXALIS, vid. Acetosa.

OXYACANTHA, vid. Berberis.

OXYLAPATHUM.

Nomina. Lapathum acutum five oxylapathum L.B. acutum majus Park. folio acuto plano C.B.

Folia huic quam Lapatho folio acuto crispo sunt breviora, inferiora à lato principio in acutum mucronem sensim angustantur, minora quam penultimi alias colore subluteo similia caules in parem altitudinem attolluntur, sunt tamen graciliores & minores, rigidi & interdum tortuosi; rami à cule magis exant, seu obtusiores cum eo angulos efficiunt. Flo- rum verticilli rariotes, seu longius distantes appositi interdum ad singulos foliolo ligulae instar. Flosculi minores cum præcedentibus; semina plus duplo mi- nota, extimo foliolorum quæ semini pro vasculo in- servantur tuberculum seu nervea rubens grandis in- nascitur, cui & similis in præcedente lapato cernitur sed multo minor.

In humidioribus, ad aquarum margines, inter- dum etiam in ipsi aquis, nec minus frequens ad fos- sas & sepes.

Cum hac specie convenire nobis videtur lapathum acutum minimum J.B. C.B. Ger. Park. Siquidem J. Bauhinus omnibus partibus minus oxylapatho vulgato, cætera simillimum scribit; interim (pergit) hoc peculiare habere videtur, quod statim à radice fe- re caulis in alas incipit dividi, in quibus flores ex certis intervallis verticillatim nascuntur, muscoli, lu- teoli, singulis fere verticillis opposito foliolo ligulae instar, quo verticilla tamen extrema carent. Notæ hæ non sufficiunt ad differentiam specificam arguen- dam, nam & lapatho acuto vulgari ubique proveni- unt flores verticillari fere sunt, oppositis foliolis ad singulos verticillos: quod autem caulis statim à radice in alas incipiat dividi, natalibus imputandum censeo.

Vires. Simon Paulus in scabiæ & pruriginis pluri- mum laudat decoctum radicum oxylapathi cum vel sine decocto stercoris galli gallinacei, si pars affecta eo abluatur.

Ad hujusmodi affectus duo sequentia remedia pro- ponit, ut insignia 1. z. succi oxylapathi, rhabbari monachorum, rad. chelidonie maj. ana 3 j. pingud. lactis 3 iv. mista quoque ad succi fere consumptionem adde diapompholigos 3 j. cerussæ 3 ij. aluminis 3 j. thuris 3 β. sulphuris 3 j. mista deinde diu multumque agitentur in mortario pistillo ligneo vel plumbeo. Quod si inter agitandum siccus fiat, addatur semper pinguedo lactis, ut fiat linimentum mollius.

2. Rad. oxylapathi, althææ an. 3 β. helenii 3 ij. herb. aristolochiæ, scabiosæ, nummulariæ, plantag. an. m. β. coque ad purilaginem in s. q. aquæ fluviat. Trajiciantur per setaceum rarius: addatur deinde flor. sulphur. 3 ij. balsami Peruviani parum F. l. a. linimentum ad scabiem.

Backmeisterus mihi & aliis certissimum ad serpigini- nes tollendas remedium communicavit, pulverem radicum oxylapathi plani cum aceto mistum. Simon Paulus.

Sola fricatio radice lapathi (id est lapathi, forte de hac specie intelligit) delet impetiginem expertum à me sæpius. Ex observationibus Marcelli Cumani ab Hieron. Velschio editis excerptis & ad me transmissis D. Barn. Soame.

Lapathi acuti radix cerevisiæ infusa laudatissimum Antiscorbuticum habetur. Willis de Scorbuto.

Oxylapathi radices decoctæ vel seorsim, vel cum aliis specificis mixtæ, in ictero sanando eximii usus sunt. N. B. caro quæcunque quantumvis verus & dura, si cum lapatho cujuscunque generis coquatur, mollis & tenera evadit. Langham. hort. sanitat.

Pulvis seminum lapathi hepato roborat & fluxus al- vi quoscunque sistit. Est medicamentum obvium, & ubicunque parabile, verum tunc non contemnendis ego ei interdum admisceo pulv. rad. tormentillæ, sacch. ros. & pulv. putaminum ovorum D. Bovvie.

OXYMEL.

Est medicamentum ex acidis cum melle vel simpli- ter, vel additis etiam aliis ingredientibus confectum, cujus varias compositiones hic trademus.

Oxymeli simplex Galeni & Mesuæ, è Pharm. August.

℞. Mellis despumati & ad crassam consistentiam debitis oboli ℥ ij. aceti acerrimi 3 x. M.

Magna huic vis est crassa tenuandi, loca incidendi, viscida detergendi, obstructa aperiendi, quo nomi- ne febribus diuturnis & nothis ex crassa bile ac pi- tuita enatis convenit, humidis naturis & frigidis, cru- dam, crassam & pituicofam succorum copiam co- cervantibus aptum; nervos tamen & uterum lade- re, tussim excitare, ac spurum acidum potius siste- re quam provocare creditur, unde hic duo casus occurrunt ejus usum non admittentes, nimirum in morbi principio, cruda existente materia, quod propter aceti acrimoniam tussim provocet: deinde ubi virtus debilis & non sufficiens ad expellendum ex- sistit, ibi frustra virtute decrecente humor irritatur. Vide 3. de ratione victus in morbi acutis, cap. 27. & 28. Componendi rationem docet Galenus 4. Salu- brium.

Oxymel de Calamintha Mesuæ ex Weckero.

℞. Rad. apii, rad. fanic. rad. inrybi ana 3 j. saba- nanthi 3 ij. sem. apii, sem. fanic. sem. anisi ana 3 vj. calaminth. montan. & domestic. spica, asari, cassia, mastice, dauci, petrosel. ana 3 β. caryophyll. ligustici, zingiber. galang. ana 3 ij. aceti ℥ ix. aquæ ℥ vi. coque ad duarum partium consumptionem 3 adde mell. despum. ℥ v. Coque.

Datur ab 3 j. usque ad 3 ij. Calefacit, incidit, ter- get humores crassos, lentos, putres: ob id intem- periem frigidam ventriculi & epatis corrigit, scirrhum lienis & aliorum viscerum dissipat, febres diuturnas juvat.

Oxymeli compositum Mesuæ, è Pharm. August.

℞. Corticum mundat. & incis. rad. apii, petroselin. ruci, fanic. asparagi ana 3 ij. sem. apii, faniculi, petro- selini ana 3 j. aceti ℥ i β. ag. ℥ vj. mellis ℥ iij.

Cortices radicum & semina horis viginti quatuor macerentur in aceto, & aqua: tum coquantur ad ter- tiæ partis consumptionem: colato addatur mel, & len- to igne ex arte percoquatur.

Efficacius est Oxymelite simplici, ac morbis diu- turnis magis opportunum: potentius enim materiam crassitatem incidit & tenuat: facitque ad affectus ex

bile crassâ, ac pituitæ lentore natos; melancholicis malis, quartanæ & splenis duritiei, inclinante potissimum morbo, ut & quotidianis febribus succurrit, urinas & sudores coctâ jam materiâ prolicit.

Oxymeli Diureticum è Pharm. Aug.

℞. Mellis despum. ℥xv. aceti acerrimi, aq. font. an. ℥ij rad. raphani recent. ℥j. fœnic. ℥x. apij, petrosel. genista, asari, levistici an. ℥ij. sem. fœnic. petrosel. asparagi, rusci ana ℥ij. coriandri præpar. cumini ana ℥ss. coquant. f.a.

Potentet impeditam urinam & renum calculos propellit: cujus usus olim D. D. Ambrosio Jungio, aliisque etiam nostris Medicis familiaris fuerat.

Oxymel Diureticum aliud ex Joh. Michaelis

℞. Herbar. hederæ terrestr. parietar. saxifrag. ana m. j. rad. resta bovis, petrosel. fragar. vincetox. urtica an. ℥ix. sem. milii fol. genist. lapp. maj. an. ℥i. granor. alkekengi ℥ij. mell. colati ℥j. aceti ℥ss. aq. font. ℥iv. Stent in infusione, postea cola, & colaturâ infunde flores cyani, calcatrippæ, genista an. p. ij. postea iterum cola, & serva pro usu.

Vel species prius coquantur in aq. & aceto, & sub finem additur mel. Si alvum simul movere velis, adde agaricum.

Oxymeli Elleboratum majus Juliani ex Pharm. Aug.

℞. Fol. ruta, thymi, dictamn. Cretici, hyssopi, pulegii, prasi albi, card. bened. spic. Celtica, cortic. sambuci inter. ana m. j. calaminth. mont. p. ij. sem. anisi, fœnic. ocymi, urtic. Rom. anethi an. ℥ij. rad. angel. alibæ, ari, scilla præparat. turbit. aristol. rot. & long. irid. vulgar. costi, polypod. an. ℥j. ellebori alb. nigri præp. ana ℥ij. esula præp. ℥ij. Infund. triduo in ℥vii. aceti acerr. & sapæ ℥ij. in vase vitreato bene obturato ad solem vel ad torracem; deinde in eodem vase decoquantur ad medias; sub finem decoctionis addendo Agarici electi ℥ij. Coletur & cum mellis rosati citrati & sacch. ana ℥j. fiat syrupus qui sub finem aromatizetur cum atomatibus sequentibus, utpote caryophyllor. croci, zingiberis, galang. macis an. ℥j.

Medicamentum hoc Gesnero maximopere quondam celebratum fuit, de cujus compositione, viribus & usu prolixiorum discursum post auctoris obitum, in lucem edidit Caspar. Wolphius, lib. 3. Epistolæ. Gesnerianarum, Tiguri anno 1577. excusatum adnexum; ubi etiam ejusdem Oxymeli minus Elleboratum descriptum legitur.

Oxymel Julianifans è Pharm. Londin.

℞. Corticum rad. capparum, radicum ireos, fœniculi, petrosel. rusci, cichorii, aspar. cyper. ana ℥ss. herbar. scolopendr. schananthi, tamarisci an. m. ℥ss. sem. fœniculi dulc. ℥ss. Perfundantur poicæ paulo acidioris ℥ij. postea coque ad medias. Ex colaturâ cum mellis & sacch. despumati ana ℥ss. f. f. a. syrupus melleæ consistentiæ.

Oxymel de Ligustrico Mesuæ, ex Weckero.

℞. Rad. apij, fœnic. petrosel. calaminth. dauci ana ℥j. zingiber. semin. ligustici, apij, fœnic. anisi, carvi, eupator. asari, absinth. ana ℥ss. caryophyllor. galang. an. ℥ij. spic. nardi ℥ij. ℥x. Coque ad dimidias; adde mellis ℥v. Coque iterum ad syrupi consistentiam.

Valet ad pituitam crassam, lentam, putrem, obstructions epatis & splenis aperiendas, urinam movendam.

Oxymeli Scilliticum Mesuæ ex Pharm. Aug.

℞. Mell. despum. ℥. iij. aceti scillit. ℥ij. Coq. leni igne ad perfectam consistentiam.

Ad Cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos etiam contumaces utile est. Eo utimur in Epilepticorum insulibus, ipsoque paroxysmo; asthmaticis quoque plurimum confert, venarum obstructions inveteratas reserat, crassosque humores potenter incidit.

Oxymel Scylliticum compositum è Pharm. Londin.

℞. Origani, hyssopi, thymi, ligustici, cardam. mini. stachad. an. ℥v. Coque in tribus aq. ℥ss. ad unam. Colaturâ admisce mell. ℥ij. mellis passulati ℥ss. succi bryon. ℥v. aceti scillitici ℥ss. Percoque despumando.

OXYRHODINUM.

Oxyrhodinum vi nominis significat medicamentum ex aceto & rosâ factum. Communiter vero à praticis usurpatur pro eo, quod capiti, fronti, & collo adhibetur.

Componitur ex oleo ros. & aceto, cum hac proportionem ut ad ℥iv. olei sit ℥i ss.

Usus est

Primo, In febribus, dolore capitis, insigni delirio vel præsentem, vel imminente, lethargo, comate vigili, & similibus, in quibus æstuat cerebrum.

℞. Olei ros. ℥iv. aceti ros. ℥i ss. Fiat oxyrhod. admovend. dextra lincipiti, & fronti cum stupis cannabis tepide bis terque noctuque.

Loco olei rosati sumi possunt oleum violar. de nymph. de pap.

Vel ℞. Olei rosati ℥ij. aquæ ros. & plantag. an. ℥j. aceti ros. ℥i ss. Fiat oxyrhod. &c.

Debet mutari dum incalescit, aut refrigeratur per sex aut septem vices.

Oportet ut præmittantur universalia, non sunt enim admovenda topica repellentia corpore adhuc pleno. Quando adest inflammatio, non est perseverandum ultra principium & augmenti initium, tunc enim miscenda sunt resolventia, ut oleum chamæmeli cum prædictis repellentibus.

2. Adhibetur in diarrhœa, dysenteria, quando adest phlogosis, aut inflammatio, tepide ab umbilico ad pubem, cum stupis cannabis.

OXYSACCHARUM.

Hoc nomine denotatur compositum quid ex aceto & saccharo in syrupi consistentiam redactum cujusque quentes adducimus præparationes.

Oxysaccharum simplex è Pharm. Aug.

℞. Succu granator. acidor. ℥viii. aceti ℥iv. sacchari alb. ℥j. Saccharum clarificetur & cum aceto succoque granatorum in syrupi formam reducatur.

Humori ferventi refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcendæ, siti sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducit.

Oxysaccharum Compositum Nicolai Præpositi è Pharm. August.

℞. Capill. vener. asplenii, seu ceterach. scolopendr. seu lingua cervina, lichenis, seu hepatica, violarum, polytrichi, rad. fœniculi, asparagi, rusci, graminis ana ℥j. succi granatorum acidorum ℥viii. ss.

Omnia in granatorum acidorum succo per triduum macerantur, deinde post modicam ebullitionem exprimantur & colentur: tandem cum sacchari lb. iv. ad formam syrupi s. a. percoquantur.

Febribus tertianis nothis, omnibusque affectibus ex sanguinis ac bilis fervore & crassitie natis subvenit, jecoris, lienisque obstructionibus confert & caliditate viscera juvat.

Oxysaccharum Emeticum Sala vid. sub titulo *Syrupus*.

Oxysaccharum Emeticum Ludovici.

℥. *Croci metall.* ℥ij. *aceti communis* ℥x. Infunde per triduum in loco calido, tunc sæpius interea agitatus liquor filtretur, eique addatur sacchari albi ultra tabellarum consistentiam cocti aa & vitro clauso in calido detinendo sponte solvatur saccharum atque servetur.

Oxysaccharum Emeticum Mynschii.

℥. *Croci metallor. absinthiaci* ℥ss. *castia lignea* ℥ij. *ligni aloes, rad. angelica* aa ℥i. *rosar. rubr.* ℥ss. Mixta infundantur in acet. flor. tunic. ℥xv. stent in infusio-
no in loco calido per 24. horas, postea filtrentur, sacchari alb. cand. tantundem addatur, & ad usum reponatur.

In dolore capitis, melancholiâ, epilepsiâ, qualicumque angina, peste, pleuritide, tussi, asthmate, ventriculi affectibus, præservatione à podagrâ, dysenteria, morbo Hungarico & venereo, coagulatione sanguinis &c. excellens est. Dos. ab ℥ss. ad ℥vi. in vehiculis specificis vel per se exhibit.

OXYTRIPHYLLUM, vid. *Trifolium Acetosum*.

LIBER XV

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

P

PÆONIA

Παῖον ἢ γλυκύσις, quibusdā Πεντόροον, cujus radicem aliqui ἰδαίος δακτύλος vocant, *Pæonia* dicta est à medico *Pæone*, qui ea Plutonem ab Hercule vulneratum, Homero *Odyss.* fingente, curasse perhibetur. *Pæonia* vetustissima inventa est, nomenque auctoris retinet, quam quidam Pentotobon appellant, alii *Glycyiden*. *Plin. l. 25. Cap. 4.* fortè (inquit *Bodæus à Stapel*) à παῖον vel παῖονίζω hymnos cano, quod ob insignes virtutes multum laudaretur; nam *pæonias* omnes herbas veteres pro salutaribus habuerunt. *Pæoniae nota generica* sunt flores rosei maximi, semina majuscula rotunda, per maturitatem nigra, radices crassæ vel tuberosæ; folia composita.

Est autem *Mar.* vel *Fæmina*, quarum illa est flore osco simplici, cui succedit semen rotundum nigrum, durum, Piso majus. Hujus verò flos est plenus.

Vires. In usum medicum veniunt radices & semina.

Usus eorum præcipuus est in affectibus Cephalicis, epilepsia, incubo, &c. uterinis, mensibus obstructis, lochiis purgandis, doloreque post partum mitiganda, hepatis obstructione, extrinsecus suspenduntur grana ac radix de collo pro arcenda epilepsia. *Schrod.*

Vidi (inquit *Galenus*) puellum quahdoque octo rotis mensibus morbo comitiali liberum, ex eo quo gestabat radicem tempore, ubi autem fortè fortuna, quod à collo suspensum erat decidisset, protinus morbo correptus est; rursusque suspensio in illius locum alio inculpate se habuit, visum ergo est mihi, satius esse denuo id certioris experientie gratia, detrahere: id cum fecissem, & puer iterum esset convulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo ejus suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer nec postea convulsus, experimentum hoc *Galenus* confirmant *Montanus, Fernelius, Apollonius Menubenus lib. de Alce, cap. 7.*

Qua hoc qualitate seu proprietate effecit ambigitur, quacunque tandem (inquit *Julius Alexandrinus à Nestla* in suis in *Galenus* de simplicium medicam. fascic. librum notis) successus hujus spe frustratur

hodie, vel igitur tam efficax non est nostra hæc *pæonia* quam aliarum regionum aliquarum, vel leviora erant illius temporis mala hæc quam nostris hujus sunt, ob immutatam in deterius fortè victus rationem: alii in effusione sub certo syderu positu totum negotium consistere asserunt, quæ opinio magica aut supersticiosa vanitate non vacat, an (inquit *Caip. Hofmannus*) *Galenus* radix non fuit natura sua talis, sed quia τετελεσμενον, adjurata, ut sic vertam. Diabolus enim in multis aut juvat naturam, aut impedit. *Sylvius* nihil grandis (inquit) hætenus ab hujus radice & semine sapissime à me usurpatis vidi præstitum *D. Soame. Rajus*.

PALEA CAMELORUM, vid. *Schœnanthum*.

PALIMPIS

Est picis quoddam genus quod in fundo vasis post destillatum terebinthinæ oleum, restitat. Seligi debet nigrum, splendidum, siccum quod facile frangatur. Deterisivum est, resolutivum, suppurativum, digestivum. Adhibetur in emplastris, ceratis, ac unguentis, eoque non pauci utuntur artifices.

PALIURUS

Est *Rhamni* quædam species folio subrotundo, fructu compresso, de qua non opus est ut hic multa dicamus; etiam si ejus folia ac radix facultate adstringente prædita, semen verò acrimonie pectoris mitigandæ, urinæ ciendæ, calculo comminuendo, aptum, &c. reputentur.

PALMA

Palmas inter se conferenti, quibusque in rebus & inter se convenirent & ab aliis arboribus different consideranti occurrit illico, id genus omnibus commune, & solis ferè proprium esse, caudice simplici & individuo seu non ramoso assurgere, & gemmam una vice unicam, eam tamen ingentem, concipere, quocirca hanc proprietatem pro palmæ characteristica, natura ipsa dicente, adhibendam censui.

At inquires, Botanici uno ore *palmas* ramosas esse pronunciant, agnosco: verum eorum auctoritas me non multum mover, tum re non satis perpensa, vera & genuina folia pro ramis ab iis habita fuisse noverim;

Y y ramos

ramos autem illos quos vocant revera folia composita esse, non difficile est demonstrare.

1. Nam primo, deciduum esse folio non ramo convenit. Ramus enim utpote ipsius trunci divisi quædam productio, pars est stabilis & perpetua; rami autem illi dicti, seu ramastri in plerisque saltem si non omnibus palmis statim temporibus decidunt: proinde rami genuini esse non possunt; sed mera folia sunt.

2. Secundò, partem pronam à supina diversam obtinere folii nota est, non trunci. Ramus enim teres & undiq; uniformis est. At in palmarum frondibus Costæ mediæ supinæ canaliculatae sunt aut planæ, pronæ, convexæ.

3. Tertiò, nunquam germinare seu gemmas protrudere folium arguit, non ramum. Ramus enim quotannis semel aut sæpius germinat & surculos producit. At ramastri illi palmarum cum semel expliciti sunt nunquam gemmas edunt, aut partes aliquas aggenerant.

4. Quartò, in folium desinere seu terminari folii compositi proprium est, à rami natura alienum. At ramastros palmarum in folia terminari notum est.

5. Quintò, accedit levitas insignis, quæ ramastros hocce ligneæ naturæ, quæ plerunque solidior est & ponderosior) minime participes esse arguit.

Nec quem ab hac sententia deterreat ingens illa & ramorum æmula magnitudo: nam in palma folia flabelliformi, quæ folia & sunt & ab omnibus vulgo habentur, nihilo minora reperiuntur.

Objicies, palmas nonnullas (id tradente Theophrasto) bifidas exire, ut in Ægypto, staræque ita bifurcatas. Tradunt & Cretensium plures bifidas esse quasdam & trifidas: in Lapæa vero genus quoddam quinqueceps nasci. Observatum etiam est ab Horti Malabarici auctoribus, in palma Japonensi Toddapinna dicta, ex uno trunco quatuor aut quinque vertices interdum nasci.

Respondeo, rarum illud & insolitum esse, & singulis arboribus simplicem plerunque esse verticem: unde non datur genus hujusmodi palmæ bifidæ aut trifidæ, quæ semine sata speciem suam constanti naturæ lege propagat. Sed ut palma multiceps sit, præter ordinem & institutum naturæ accidit, & quodammodo monstrosus est.

Notandum tamen folia decidua obtinere palmis omnibus commune non esse, si Theophrasto & J. Bauhino fides. Nam Dactylifera vulgaris inter αείφυλλα à Theophrasto recensetur, & Jo. Bauhino observante, in nonnullis arboribus in Gallia Narbonensi à se conspectis, folia sponte non decidunt, sed præcidenda ea sunt à cultoribus ut arbor ad scandendum opportuna sit; alioqui si derelinquatur impenetrabili vallo scandentibus aditum intercludunt.

Palmam dictam esse quod ramis sit expansis in modum palmæ hominis tradit Isidorus. l. 17. c. 7. palmæ humili id nominis initio impostum videtur, cujus folia palmæ humanam cum digitis extensis referunt: *φολίνα* Græci & arborem, & fructum simul dixerunt, à colore pomi facto utroque nomine: *φολίνα* enim & *φολίνα* punico colore rubere est, quo maturi in hac arbore fructus videntur. Phœnicie autem regioni à palmarum multitudine & præstantia nomen inditum volunt. Palma apud Latinos sæpe etiam victoriam significat Cicero orat. pro Roscio Amerino, alter plurimarum palmarum vetus ac nobilis gladiator habetur. Causa locutionis est, quod victori certaminis daretur corona ex palma. Rationem ejus moris aperit ex Plutarcho Gellius, lib. 3. c. 6 propterea in certaminibus palmam signum esse placuit victoriæ, quoniam ingenium ejusmodi ligni est, ut urgentibus opprimentibusque non cedat.

Palmæ fructus antiquis Latinis palmulæ dicti sunt, posterior ætas dactylos appellavit, quoniam eorum nonnulli oblonga gracilitate curvati humanis digitis similes essent.

Vagina flores & fructus obvolvens & protegens adversus Cæli injurias *κάρη* & *σπᾶθη* dicitur.

Dioscoridi palmula seu dactylus immaturus, *πῶμα* & *πύμα* dicitur. Marurus recens *φαινισθαλέν*, siccatus

regi ma

Palmæ fructus respectu dividi possent in eas quarum fructus pericarpio seu pulpa molli ossiculū ambiens constitat, & eas quarum fructus materia sicciorē nucem includente componitur. Nos potius foliorum respectu dividimus in eas quæ folio sunt compositæ, eoque vel pinnato, vel ramolo; & eas quæ folio sunt simplici, plicatili & flabelliformi.

Palmarum autem notæ præter caudicem simplicem non ramosum reliquis hujus generis communem, sunt folia habere striata & velut arundinacea, flores tripalatos spathiferas etiam esse omnibus convenit, ni forte Coddæ panna excipias.

Usus & Vires Palma majoris vulgaris.

Palmæ folia, Plinii seculo, cum primum novellas demonstrare gemmas, ad funes vitillumque nexus, & capitū leviam umbracula sinebantur. Ad storearum & sportarum texturā ut alba & idonea fiant viridia adhuc à ramis avellenda sunt, & sub tecto deponenda ad quatrimum & postea rursus rotibus exposita, ad quatrimum complui sinenda, & à Sole resiccari donec alba evadant.

Fiunt & à palmæ foliis scopæ, quæ vero ad nos ex Hispania adferuntur, & in præcipua æstimatione sunt, palmæ humilis non è dactylifera foliis fiunt, quæ tamen forte non minus commoda ad hunc usum forent, si haberi possunt Flabella etiam & sportæ ex iis texuntur, caudicis autem cortice funes pro navibus.

Palmulæ bene maturæ non nimium pingues ventriculo gratæ sunt, plurimum nutriunt & corpus pinguedine, verum concoctu difficiles esse; & capitis dolore inferre medici veteres plerique omnes consentiunt. Ubi cūc Aræus omnia bellaria caput dolore infestare solent præter palmulas, ficus & uvas.

Veteres vinum è palmulis aquæ infusis faciebant, jus præparandi modum vide apud Dioscoridem.

Palmæ fructus, eodem tradente, acribus est atque adstringens & contra alvi profluvia fluxumque muliebri in vino austero bibitur: hæmorrhoides quoque sistit, & nera illitu conglutinat, recentes autem plus siccis aliturgunt, sed capitis dolorem afferunt, & copiosiores in cibum sumptis inebriant. Siccæ autem sanguinē excreantes & machicos ac dysentericos esitæ juvant: necnon & tunc cum cydonio & cerato canantino vesicæ vigis utilis linuntur, maxime vero caryolæ si comedantur fauces asperitas imedentur. Thebaicorum decoctum potū cantharidæ sedat, & cum hydromelite vetusto sumptū vires recedunt, & ipsæ cibo idem præstant. Fit etiam ex iis vinum ejusdem cum fructu facultatis. Decoctum earum potum & gargarisatum vehementer adstringit & cohibet.

Palmarum nuclei cæterorum omnium more in igne novo cremantur, deinde restincti vino lavantur, & rursus spodii vicem supplentes ad ornandas decorandasque pebras conducunt. Vim habent adstringentem, & ipsa la cutis obstruentem, ad oculorum pustulas, staphylinata ciliorumque defluvia addit nardo efficacem, & percrenentem carnem cum vino reprimunt, & ultro ad cicatricem perducunt, &c.

Palmæ spathæ unguentarii in unguentorum spissamentum utuntur. Optima habetur odorata, adstringens, potius rosæ, præclusa, interna parte pinguis. Vis ei adstringens, quæ ulcera depascentia sistit, laxatosque articulos comitatur, si trita malagmaris & cataplasmatibus admisceatur. Prodest & præcordiis, & stomacho imbecilli, necnon & jecoris affectibus convenientibus mita cataplasmatibus.

Ejus decoctum subinde affictum capillos denigrit. Potui vero datum renum, vesicæ, aliorumque viscerum moribus confert; alvi utriusque fluxiones sistit: ipsa vero scabiem sanat, diebus viginti, si adhuc tenera cum resina & cerâ decocta imponatur. Ad eadem etiam valet fructus immixtus Elate & Borassus dictus præterquam quod in unguenta non sit utilis.

Quæ de viribus & usibus palmæ, ejusque partium habent Plinius, Galenus, alique veteres apud ipsos

de , aut etiam apud J. B. hist. lib. 3. cap. 159.

Recentioribus Alpinus fructuum in Medicina apud Egyptios usum enarrat his verbis, ex fructibus tria sunt præcipue quibus sanitatis gratia utuntur, quippe spatha, pulvis spatha contentus, atque dactyli. Spathæ igitur membrana cum pulvis facta utuntur, tum ex ea parato decocto. Pulvis maximum usum habet per os sumpta ad diarrhoeam, Lienteriam atque dysenteriam; nec minus ad omnes alias vel sanguinis vel alterius humoris non naturales rejections sustendas; præcipue verò ad hepaticum fluxum, hæmorrhoidum atque uteri cruentam vacationem, atque ad sputum sanguinis. Hoc pulvere quoque utuntur ad firmanda ulcera depascentia, ad uvæ relaxationem atque ad dentium commotionem. Decocto ad omnia prædicta quoque utuntur sed sæpe cum eo misto prædicto pulvere. Articulos debiles aprosque fluxionibus mirum in modum ipsum juvat, eos firmando & roborando. Pulvere vero albo in involucrio veris tempore invento, quando sc. palmæ florere incipiunt utuntur familiarissime ad faucium raucedinem tussim & ophthalmias cum saccharo misto; estque ipse dulcis subastringens: mulieres eum habent familiarissimum ad firmandos menses retinendumque foetum.

Eundem quoque usum habent Dactyli immaturi, tum in cibum usitati, tum eorum decoctum; ad sputum sanguinis & quamcunque sanguinis vacationem cohibendam, & ad lienterias, diarrhoeas & dysenterias, ad vomitum sanguinis, hæmorrhoidas atque ad ulcera vulneraque simplicia persananda: in frequentissimo usu ad nuper dictos affectus habent Syrupum de Dactylis immaturis confectum. Iisdem dactylis utuntur probe maturis, qui tunc admodum dulces existunt, cum obscura adstrictione; ideoque eas frequentant ad faucium raucedinem, tussim, lypnæam, pleuritidem ac perineumoniam; nec minus ipsorum decoctum frequentant ad adjuvandas variolarum in pueris excretiones. Hactenus Alpinus.

Cæterum palma, officulo seritur, feruntur autem, docente Theophrasto officula plena (Plinio bina juxta se composita & superne toridem) juxta se in eodem foramine deposita, bina superius toridemque inferne colligata, quoniam infirma singulis Planta est. Horum radices multo amplexu connectuntur, & statim primæ germinationes ita coalescunt, ut unus ex omnibus stipites gignatur.

Officulata fata etiam apud nos in Anglia facile germinant foliumque emittunt unicum, nervosum & arundinaceum; quod hyemes etiam nostras non raro tolerat, & sequenti anno alterum vel etiam tertium edunt, non tamen multum proficit, nec diu durat enata Planta, sed post duos, tresve annos tabescit & interit.

Notandum autem quoddam non ex fissura sed ex opposita seu gibba parte ubi Ocellus seu umbilicus cernitur Germen emittat, quodque unico & singulari prodeat folio, cum aliæ pleræque Plantæ (non tamen omnes ut perperam existimavit J. Bodæus à stapel) bina primo ortu folia de semine producant.

Plinius in palmæ foliis olim scriptitatum tradit Verum palmæ vulgaris dactyliferæ folia ob asperitatem, duritiem & nervos crebros huic usui inepta videntur. Hoc ergo vel de palma Indica coccifera, vel de palma Lantor dicta accipienda sunt, in quorum foliis etiam nunc hodie scriptitari testantur rerum Indicarum scriptores.

Annotavit Plinius Elephantēs palmas excelsiores fronte prosternere, ac ita jacentium fructus absumere.

Vires & usus Palma Indica Coccifera.

Ex hac arbore elicitur liquor Suri dictus, qui potus ut vinum inebriandi vim obtinet. Saporis grati, subdulcis, subtilis & subacidi cum primum exceptus est majori dulcedine, cum vetustior acidior, coloris ex

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

albicante subcærulei & pallidi, &c. ex eo destillatur aqua ardens seu spiritus. Acetum etiam & saccharum quod Jagra vocant ex eo fit. Modum educendi hunc liquorem accurate describunt Horti Malabarici auctores: capsæ floriferæ seu fructiferæ, quam mammam arboris vocant, cuspidem incidunt, eique ollam appendunt: atque infra cuspidem intervallo quatuor digitorum corticem Capsæ oblique secant, sectumque versus cuspidem elewant, barbam, ut aiunt, efficientes, ut liquor ex cuspidem inciso per corticem Capsæ dimanans, ex barba in ollam appensam infundatur, cuspidem autem incisum, &c. reliqua quia nimis longa sunt, omitto, apud auctores ipsos requirenda.

Bis de die, mane & vespere, ollas cum Suri detrahunt, interdum etiam meridie. Qui medio die detrahitur in ollis mane appensis dulcis est, qui vespere subacidus, altero die aciescens, tertio autem die liquor acidus redditur, suam dulcedinem prorsus amittens, ut acetum ex hoc liquore conficiatur, ollas in quibus exceptus est in calce per 15. dies imponunt quo ad fermentationem vehementiorem excitatus, multam spumam ebulliendo, ac in fundum ollæ materiam albicantem seu cinereum demittendo, mutatur in acetum.

Saccharum Jagra dictum hoc modo conficiunt: ollis indunt momentum calcis, quantum sufficit ad liquorem instillatum rubedine tingendum, nec plus, nec minus debito ob rationes ab auctoribus dictas: dehinc hunc liquorem coquunt continue cum cochleari movendo donec inspissetur, habeturque tum saccharum rubrum, quod album iterata solutione ac coctione reddunt: modum vide; è villosa materia tegumentum hujus nucis exterioris rudentes & funes navibus necessarii fiunt, auctore Garcia, qui incorrupti manent in aqua marina. Sed ex iis villis fiunt nodosa singula magni usus inter omnes ferè tenuioris fortunæ mulierculas Ulyssiponenses.

Exterior hic cortex circa initia, edulis esse dicitur, & Cinaræ spiniferos respere aculeos, verum dulciorem esse, aptissimumque cohibendis diarrhoeis, satietati curandæ, & ventriculo instaurando.

Ex eadem materia stupæ loco naves obturantur ac stipantur, ipsisque aded stupis præstat quod putredini minus sit obnoxia, & aqua marinâ imbuta infletur denseturque. Offusus Cortex diligenter politus, & argento decoratus apud plurimos hodie speciosi poculi vice in convivia venit, sed vim antiparalyticam ei denegat Garcias.

Liquorem seu vinum Suri phitiscis mirè conferre aiunt & valde opportunum esse urinæ, renumque virtutibus laborantibus è nucleis contusis atque expressis lac extorquetur citra ignis operam, lumbricis enecandis utilissimum ad ʒviii. addito sale, mane potum, præsertim in pueris.

Quin ex ramentis nuclei (additâ aquæ opportuna mensurâ,) fervefactis ac multum agitatibus oleum supereminere solet, dulce, liquidum, splendidum, & oleo Amygdalarum dulcium non dissimile gustu. Quod sex aut octo unciarum mensura potum, additâ aquâ in qua tamarindi aliquandiu maduerint ventriculum intestinaque leviter purgat, humores præcipue melancholicos & pituitosos evacuans, cum tamen nucleus dicatur alvum coercere; at recens extractum sit oportet; vulneribus mirè opitulatur, nam & sanguinem sistit & saniem extergit, coarctetque dolorem, & tandem cicatricem inducit, quin ex frustulis exsiccatis nuclei, quæ in longinquas regiones transferri solent, extrahitur oleum utile lucernis, oryxæ parandæ, nervis contractis laxandis, & necandis lumbricis.

Liquor nucleo contentus siti febribusque extinguendis, calorigue contemperando idoneus est, medendis extergendisque oculis & emundandæ mulierum cuti. Emundat sanguinem, ventriculum

& vias urinæ purgat, medetur pectori, ac pergrato constat gustu, plurimum præbet nutrimenti, & adversus biliosas febres est potio mirabilis. Hernandes.

Multæ præterea vires & usus in medicina aliarum hujus arboris partium habentur in Horto Malabarico, ad quem Lectorem remitto.

At non reticendum quod de medulla hujus arboris habet Jo. Linchotanus, nimirum eam (palmito vocant) magno in pretio loco muneris ad opulentiores, potentioresque mitti. Chartæ autem tenuitate, ac candore formâ plicatili crescit, ut subinde 50. aut 60. plicas habeat togæ muliebris instar, ex hac Indi chartam & libros instaurant, ex ea etenim charta tenuis ducitur. Virentibus inscribunt plicis, quæ tum siccatæ literas indelebiles habent, stilo ferreo ante notatas.

Indis ollam vocari refert supradictam chartam, constantque ex eadem materia omnes gentis annales, libri & volumina, quam & signare norunt in epistolarum usus. Idem tradit & confirmat D. Mandelslo in relatione Peregrinationis suæ in India Orientali.

Maffeus folia tum librariis pro papyro esse ait, (de quo tamen dubito, eumque per errorem folia Lantor pro hujus foliis habuisse suspicor) tum etiam in vestes formæ facili simul ac spisso contextu necti.

Idem unam hanc arborem omnia prorsus ad rem nauticam instrumenta ac materiem præbere scribit: quippe truncum & ramos in malum, assamenta, clavosque: commam in vela; Cuyrum in funes omnium optimos, filaque ad laterum saturas; postremo coccum ipsum, quæque ex eo conficiuntur in onera.

Quibus si addamus, præbere eam & vinum, & lac & oleum, & saccharum & acetum, & cibum solidiorem, & filum, & acus, & lineam, & vestimenta, & pocula, & cochlearia, aliaque vasa, & stercas & sportas, & umbellas, & chartam; omnino fatendum est arborem esse πολύχρηστον, cuique similem, & æquiparandam vix in toto terrarum orbe reperies.

Quod attinet ad specificam qualitatem promovendi partum difficilem, & resistendi insultibus Epilepticis ejus non unam experientiam habent spectatissimi aliquor apud nos Medicinæ Coryphæi, & testari de felicissimis successibus queunt, inquit Gul. Piso: apud quem plura vide in Mantissæ Aromat. c. 19 R A I U S.

PALMA CHRISTI, vid. Ricinus.

imò etiam

ORCHIS, seu Satyrium.

PALUDARIUM, vid. Apium.

PALUMBUS.

Palumbus torquatus Aldrov. The Ring-Dove. *Φάσας Αριστοτέλι*, aliisque Græcis.

Uncias 20. pendet. Longitudo ab apice rostri ad extremam caudam 18. digitorum: alis in contrarium extensis maximæ pennæ 30. digitorum intervallo distabant.

Rostrum subflavum, cutē rubra vel purpurea, in qua nāres, aliquousque obductum. Supra nāres surfures albicantes. Lingua acuta, canaliculata, minime bifida. Irides pallide flavæ.

Pedes nudi, rubicundi, ungues nigri. Digitus extremus medio ad primum usque articulum membrana junctus. Crura ad digitorum exortus fere plumosa.

Colli pars supina semi circulo albo velut torque quodam exornatur tam supra quàm infra torquem colores varii apparent pro vario ad lucem objectu. Caput & dorsum obscure cinerea, collum inferius, pectorisque superior pars purpurea vel ruffa cum cinerei

quadam mixtura. Venter ex albo cinereus. In mare colores hi saturatiores.

Pennæ alarum remiges 24. è quibus secunda longissima, priores seu exteriores decem nigre: secunda & sequentes ad septimam fimbriis seu oris extremis albent. Reliquæ è fusco cinereæ. Ad alæ notæ radicem macula alba deorsum tendens remiges nonam, decimam, undecimam, duodecimam obvestit. Cauda 7 digitos longa 12. pennis integratur, summitate ad 2. digitos nigra, inferius cinerea.

Hepar in duos divisum lobos; Cystis fellea nulla, verum porus biliaris amplus.

Hæ aves hyeme gregatim volant: in arboribus nidificant, nido è paucis viminibus & fustucis compositis glandes avidè devorant, nec non fruges & hederæ atque agrifolij baccas. WIL LUG BEIUS.

Viribus cum Columba convenit, exustæque plumæ ictericos reficere, & calculosis, urinæque difficultatibus subvenire dicuntur SCHRODERUS.

PALUS SANCTI, vid. Guaiacum.

PANACEA.

Hoc nomine denotatur apud Chymicos Medicamentum morbis omnibus debellandis aptum, paratur autem ut credunt è variis mineralibus, metallis, aliisque, ut è vitriolò, aurò, mercuriò, rore aquinodiorum, seu flore cæli, sanguine humano &c. quorum aliquor processus satis curiosos jam subjungeremus, ni longius hoc foret. Hic tantum earum quamvis minus propriè dictarum præparaciones duas è PHARMAC. B. TEANA, & Clariss. JUNGKEN Lexicò Pharmaceuticò adducemus.

Panacea Harthmanni.

℞. Sulphur. antim. combustibil. ℥i. olei vitrioli. sulph. rectific. ℥iii. regul. antim. ℥i. digere calidè ad diem 10. dein destilla per retort. vitr. ex arena ter ad minimum cohobando. Ignem urge sub finem & materiam in fundo per horas 5. reverbera. Tandem exime, lava cum aqua rosar. & sicca. ℞. Hujus pulver. ℥i. sal. corall. ℥ii. m. etc. f. a.

Remedii est instar universalis: habet nimirum vim diaphoreticam ac sanguinem mundificandi, idcirco quibuslibet morbis per sudorem sanabilibus interire potest, præcipuè Luei venereæ cutisque fæditatibus. Dos. a. gr. x. ad xx.

Panacea Anvvaldina Volkameri.

℞. Cinnabar. nat. mercur. dulc. aa ℥ss. magister. corall. margarit. aa ℥iii. croci di. M. Vires sunt in agues Epilepsia, vertigine ac coagulationibus pituitosis. Dos. ii. & iii. ad di.

PANAX.

Panax quasi παναν *ἐκ* omnibus remedium rens. Plin. lib. 25. c. 4. Panaces ipso nomine omnium morborum remedia promittit. Theophrast hist. lib. 9. c. 4. quatuor genera proponit, Syriacum, Chironeum, Elæolapeium & Herculanum: Cæterum Panacis Heraclei & Cti, de quo agimus, notæ sunt folia lara pastinacæ, verum magis composita seu ramosa, flores lutei, radicem gummiifera seu succifera. Hæc Planta Dodonæo aliisque ipsissimum Panes Syriacum veterum habetur.

Nomina. Panax herculeum majus Ger. panax pastinacæ folio, an Syriacum Theophrasti C. B. idem panax colinum ejusdem ex sententia fratris & nostra, Pan. herculeum alterum, sive peregrinum Dodonæi Park. Itemque panax costinum seu pseudocostus Marthioli ejusdem Sphondylia vel potius Pastinacæ Germanicæ affinis Panax vel pseudocostus flore Luteo. J. B.

J. B. Foliis viger interdum sesquicubitalis longitudo, latitudinis cubitalis, asperis hirsutis, arrovirentibus cum nitore quodam, in alas divisas et adven-

adverso fitas, easque rursus pinnatim subdivisas in folia pastinacæ Germanicæ foliis similia serrata, tres, quatuorve uncias longa, binas lata. in obtusum mucronem desinentia, pediculo admodum hirsuto & aspero. Caules aliquot cubitorum brachii: umbellæ inæqualis longitudinis muscatis peucedani in morem constant florum Luteorum. Semina majora quam pastinacæ Germanicæ sphondilii seminibus paria, compressa, lata, simbriam albam habentia cum in medio nigricent, acris & linguam mordicantia.

In Sicilia non longè à Castello Puzallis sponte natam observavimus hanc Plantam.

Ex hujus vulnerato, præsertim circa radicem, caule succus æstivis mensibus manat, Opopanaci similis, (sponte concretescens, odoris quidem exigui, sed gustu exsiccans: idque ætate, fervida etiam in Belgio. Ex semine in Opopanacis grumis reperto hæc primum in Belgio enata stirps est Dod. hinc & recte quidem, colligit Dodonæus Plantam hanc ipsissimum esse panaces Syriacum. Veterum idem confirmat Paulus Boccone his verbis, è Caule hujus Plantæ inciso extillat gummi quoddam flavicans, quod Balsami species est, ad omne genus vulnera & plagas sanandas, experientia teste, longè utilissimum, si forma emplastri parti affectæ applicetur. Gummi autem quod ex hac Planta emanat genuinum antiquorum opopanax censendum est, quandoquidem ex omnibus panacis speciebus in Europa hucusque cognitis nulla observatur quæ similem reddat succum. Quin affirmat idem Paulus Boccone, panax isthoc semine hirsuto Siculum [quamvis non in Sicilia tantum sed etiam circa Monspelium in Gallia Narbonensi oritur] panaci Syriaco è quo Opopanax elicitur, idem prorsus esse, cum utrumque primo tria edat folia, postea in quinque divisa ex adversariis D Tancredi Robinson.

Oritur etiam cum Libanotide Cachryophora in elato colle prope Molendinum dictum juxta fluvium La Maussou. Botan. Monsp.

Vires. Præstant [ut referunt qui important] pseudo-cosli radices ad omnes cerebri & nervorum frigidos affectus, ad pectoris vitia, & ad ventriculi cruciatus, & viscerum omnium obstructions, & ad renum, vesicæ & uteri morbos. Ideoque auxiliantur diutino Capitis dolore affectis, vertiginosis, Comitialibus, Stupidis, veterosis, convulsis, resolutis, asthmaticis, tussientibus, ictericis & hydropicis, eadem flatus pellunt, vermes necant, urinam ducunt, calculos ejiciunt, menses & partus cientes; infunduntur earundem decocta ad coli cruciatus, & coxendicum dolores J.B. è Matth.

Cæterum Opopanax [quem hujus Plantæ succum concretum esse non est cur Dodonæo fidem denegemus] emollit, digerit, flatus discutit, purgat pituitam crassam & lentam à partibus remotis, cerebro nervis, sensoriis, juncturis thorace. Uvulæ delapsæ opitulatur [suffitu intus immisso] Schrod.

Signa bonitatis sunt color extus flavus, intus albus aut subflavus; sapor valde amarus, odor gravis, consistentia pinguis, facile in aqua solubilis, levis, tenera, friabilis, &c. R A T U S.

PANCHYMAGOGUM, vid. *Extractum*.

PANICUM.

Panicum, Græcis *ἔλυμ* & *μελίμη*, etymon Plinius adfert, lib. 18 cap 7. Panicum inquit, à Paniculis dictum. Ac paulo post ait, quoddam panici genus esse à panoparvis racematum paniculis. At panicum non ἀμύσας à panicula dicitur, Α αναλογία enim repugnat, sed à panus cujus diminutivum panicula, ut panicum & paniculae ejusdem sunt originis: panus autem à *παν* pro Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

quo Doras & Aëoles πάντες: à *παν* autem *πνίγη* ἢ *δαίς* καὶ *κόμη* Voss. Etymolog.

Panicum spica laxiore, & velut è racemis composita, granis minoribus à reliquis frumentis spicatis differt.

Vires. Gustu, qualitate & viribus milio respondet, quare in cibo, pane & medicina ut milium usurpari potest; unde magni per universam Germaniam, Ungariam & Bohemiam, perhibente Clusio, usus est: etenim in alimentum cedit ac pulvis ex ejus semine deglutato sunt non ingrati saporis. At inquit C. Bauhinus ex veterum sententia, mali succi est, difficulter in ventre conficitur, flatus parit, alvum astringit, siccaturque refrigerat. Ideoque milium panico ad omnia præstantibus. Lac ei admiscere (in pulve) salutare inventum fuit, tollit enim aut saltem minuit prædicta mala.

Puls cum lacte in capitis doloribus à bile causatis, hæmoptoicis & pollutione nocturna commendatur. Ventris fluxus seu ipsum etiam milium, nonnihil sistit Galeno; in lacte caprino coctum & bis die haustum: Plinio, cui & sic prodest ad tormina foris in cataplasmate illicitum exsiccat & refrigerat.

Apud Italos ad Gallinarum, Columbarumque saginam potius quam ad hominum alimentum seritur. Nos etiam non dico cum C. Bauhino, illud rusticis fossoribus & messoribus, sed jumentis avibus corralibus comedendum relinquamus, & melioribus frugibus Dei gratiâ repertis utamur. R A T U S.

PANIS.

De Pane in genere sic dicto vid. sub titulò TRITICUM. Hic tantum de Panibus duobus compositis ex PHARM. BATEANA.

Panis Diasarfa.

℞. Pulver. sarapar. ℥iij. Chinæ ℥j. sem. carvi integr. 3j flor. tritici puriss. 3xvj vitell. ovor. N. ij. Barmii aliquantulum, cum lactis s. q. f. pasta, ex qua fiant panes in clibanò coquendi pro pane ordinariò in Luc Venerat &c.

Panis de Viperâ.

℞. Carnis viperarum pulver. 3i. Saraparill. 3iii. farin tritici opt. lb. i. vitellum ovi unius, cum flor. cerevis. & lact. s. q. f. panes N. iiii. coquendi in clibanò s. a. pro pane comm. in Luc Vener. scorbutò, leprâ, cachexiâ &c.

PANIS CUCULI, vid. *Trifolium Acerosum*.

PANIS PORCINUS, vid. *Cyclamen*.

PAPAYER.

Papaver dictum censet Vossius à *papo*, quomodo *cadaver* à *cado*. Nomen ex eo fuisse, quod inderetur papæ ad conciliandum somnum. Papa (pro quo vulgò minus rectè pappa scribunt gemino pp) puerorum est cibus, quem & nos hodie *pap* appellamus: unde verbum *pappo* apud Persium, pappare minutum poscis, &c.

Græcis *μήκων* & *μηκον* dicitur, (utroque enim modo scribitur) *μηδὲ τὸ μὴ κοῦν* à non ministrando dicitur. Quod velcentes eo suis muneribus fungi non possunt.

Ex his aliud Rhæas dicitur à *ῥέω* fluo, quod ab eò liquor emanet, ut aliqui volunt. Gaza fluidum vertit, quia flos statim defluit postquam semel explicatus fuerit.

Nota. Papaveris *characteristica* sunt florum petala ampla tenuia, fugacia; succus lacteus aut flavus, acervis narcotica; & in plerisque speciebus calyx bifolius seu bivalvis, caducus.

Papaveris duo sunt genera, alterum conceptaculo seminis brevioris & crassioris in plurimas

Y y 3

cellulas

cellulas diviso, operculo stellato recto; idque vel foliis integris majus; papaver sativum: vel foliis dissectis minus, seu flore minore, & in nonnullis speciebus capitulis hispidis, in Argemonis dictis, seu flore majore, in papavere rhœade.

Alterum siliquosum, papaver corniculatum: cujus revera species est chelidonium majus dictum, siquidem succo flavo acri turgit, calycem habet bivalvem caducum & florum petala tenuia, fugacia.

Vires Papaveris & Opii ex eo educti.

Succus papaveris inspissatus *opium* dicitur: est autem succus ille, qui sponte emansat vulnere in capite facto, nam qui è tuso papavere exprimitur *Meconium* appellatur (cum capita ipsa & folia decoquantur succus Meconium vocatur, multum opio ignavior. Plin.)

Est autem cum aqua papaveris destillata, tum oleum, tum maxime opium narcoticum & anodynum, soporem utrique conciliat, & sensum doloris aufert. Hoc efficit, non frigidity sua, ut nonnulli volunt (siquidem sapor amarus, viscosus odor, inflammabilitas, & vis exulcerandi plane contrarium arguunt) sed qualitate hæcenus incomperta. Usus est eximii in diarrhœa, dysenteria, catarrhis, tussi, &c. verum in eo sumendo summa cautio adhibenda est.

Quæ Bellonius de opio habet merentur legi, ideoque huc transferemus: Opium nunc fit in Turcia, maxime in Achara, Carachara, Spartada, Emerelinda, & aliis urbibus vicinis Paphlagoniæ, Cappadociæ, & Ciliciæ. Conferunt agros papavere albo ut nos tritico. Serendo observant, ut unusquisque rusticus tantum ferat, quantum putat se habiturum homines qui colligant. Ubi papaver capita produxit leniter dissecant, unde effluunt aliquæ lactis guttæ, quas concrefcere sinunt: nullus autem est Turca qui non coemat, etiam pauper, & secum circumferat, tum tempore pacis, tum belli. Mercator quidam Judæus ex Natolia certo nobis affirmavit nullum elabi annum quin efferantur ex Paphlagonia, Cappadocia, Galatia & Cilicia onera quinquaginta Camelorum, ut transferantur in Persiam, Indiam & alias regiones longinquas, atque in universum dominium Magni Turcæ. Dicebat præterea in majori adhuc usu esse apud Persas quam Turcas: demel experiri volumus qua dosi exhiberi posset una vice sine nocumtò, invenimus quendam consuetum, quotidie comedere, qui nobis præsentibus comedit pondus 3ß. sequenti die dedimus ei unâ vice drachmam unam; nec ullum ei detrimentum evenit, nisi quod quasi Ebrius videretur. Turcæ commendant qui sibi persuadent se magis strenuos & minus timidos periculorum belli reddi, ita ut Turca exercitum colligente ita consumatur, ut regio vacua eo remaneat.

Nos opium expertissimus, verum nullum symptoma animadvertimus, nisi quod excalefaceret pectus & nonnihil caput turbaret, & insomnia pareret. Credimus quod si in Europa, ut Gallia, Germania & Italia ea diligentia adhibeatur quam adhibent, posset etiam fieri sicut in Asia. Natoliæ Clima est æque frigidum atque Galliæ.

Optimum opium valde amarum est, gustu calidum, ita ut os inflammet. Coloris est lutei inclinantis in colorem pilorum leonis, simul coacervatum massa velut ex multis parvis granis diversi coloris. Odor gravis est & vehemens.

Quamvis autem verum sit Turcas, Persas aliasque nationes Orientales opio, uti ad spiritus recreandos, ad dandos animos, audaciamque in bellicis conflictibus augendam (inebriat enim non secus ac vinum, alique generosi liquores) potissima tamen causa cur illud assidue ingerunt, est ad appetitus venereos excitandos; ut in secretis colloquiis iis fatentur quibus familiaris utun-

tur. Et D. Sachsius in Ephemer. German. Ann. 2. observ. 69. plurimorum testimonio sibi relatum narrat quod post pugnam in Hungaria ad Levenz oppidum commissum Christiani milites Turcas occisos spoliantes plerisque erecta hastâ & priapismo fœdatis invenerunt; quod ex sumptione opii ante prælium proculdubio contigit. Quod vero Sachsius opium in quibusdam, puta Orientalibus, Venerem stimulare, in aliis vero ut Occidentalibus aut Septentrionalibus, eandem frænare existimet, mihi non probatur: in utrisque enim stimulare minimè dubito.

Ex opio (inquit. Job. Jacob. Saar novennali Indiæ peregrinatione celebris) parant Indi electuarium, quo Chineses utuntur ad excitandam Venerem, cujus usu adeo Veneris cestro irritantur ut per totam noctem elitent, sæpe aufugientibus, nec ulteriorem vim sustinentibus Scortis. Apud Persas & Indos ad eisdem usus crebro adhiberi opium testis est Olearius in itinerar. Persic. l. 5. cap. 15. & 18. & cum Mandelslo apud Cham in urbe Amadabat convivio interesset, variæ oblatæ fuerunt opii præparationes in cista aurea; de qua convivæ ad Venerem irritandam sumpserunt. Papaveris semen olim, ut ex Dioscoride, Plinio, & Apuleio liquet, in sanitatis usum compinfebatur panibus, quod & nos etiam novimus ab aliquibus factitatum (inquit P. Gassendus) scribit Matthiolus Gentes Alpinas quæ Tridentinas valles, Tyriam, superioremque Austriam incolunt, semine papaveris placentalis misto velci, oleoque expresso in cibis continuè uti, nec tamen ob id veterinosos fieri, aut diuturniore somno capi. Et Wagnerus Histor. Natural. Helyetiæ p. 262. in Argovia inquit, papaver uberrime satum provenit, ac oleum è semine ejus exprimitur, cujus usus in lampadibus præcipuè loco olei olivarum: nonnulli etiam id butyri loco in cibis adhibent, cum farina etiam subigunt, laganaque conficiunt, quæ sine noxa comedunt (D. Tancred. Robinson historiolum misit) utcumque usum ejus sine necessitate nemini inassueto consulerem. Sistit enim spirituum motum & in morbis acutis concoctionem impedit: adeoque materiæ peccantis separationem & sanguinis depurationem.

Ad dolorem acerbissimum ophthalmiæ. Emulsion factam ex sem. papaveris cum lacte, aqua lactucæ & decocto fœnugræci: est efficax remedium Sennertus.

Laudanum opiatum eximii usus est in medicina ad dolores leniendos, humorum orgasmos seu motus effrænes & inordinatos sedandos & coercendos.

Vires Papaveris Rhæados.

Hujus flores præcipue officinis in usu sunt, refrigerant validè, somnum conciliant, dolorem sedant; ulus præcip. in febribus, pleurisi (cui specificè præstunt) angina, aliisque morbis (imprimis pectoris) refrigeratione opus habentibus; inordinato mensium fluore (infus. Florum in sp. vini.)

Extrinsecus sunt qui herba hepatis imposita hæmorrhagiam narium sistere conantur: quam vim & radicaliter scribunt, in usu sunt pulvis florum, aqua stillatitia, syrupus & conserva eorundem. Schroder.

Aquam destillatam florum si eorundem colore phæniceo tinctam desideras, cum aqua inter destillandum in vas recipiens incipit defluere, sublato alembici capitulo in ejus rostrum florum manipulum immixtas, quibus humorem roridum rostri lateribus adhærescentes ibidem manebunt. Reponatur deinde capitellum, aqua destillata elegantem rubini colorem contrahet. Hoc modo aliorum quoque florum aquæ destillatæ eorundem coloribus imbuti possunt D. Hulse.

Decoctum corticis median. Sambuci vel ebuli cum syrupo papaveris ad sudores movendos efficacissimum est. N. B. Narcotica addita diaphoreticis vel diureticis, sudores magis promovent, ut patet in Theriaca & mithridatio cum opio D. Boovle. R. A. rus.

PAPYRUS.

Papyrus nisi nomen peculiare sortita esset, ob caulem triquetrum cyperopotuisset accenseri.

Nomina. Ger. *Papyrus* Nilotica *J. B.* Antiquorum Nilotica *Park.* Nilotica sive Ægyptiaca *C. B.* item *papyrus* Syriaca vel Siciliana ejusdem & *Park.* nos enim non distinguimus.

Hanc ita describit eruditiss. *Veslingius*: assurgit ab arundineis fibrosisque radicibus (Cæsalpinus radices lignosas, crassas arundinis modo geniculatas, numerosa sobole in obliquum tendentes, sapore & odore. *Cyperum* æmulantes, sed infirmius, subrufas papyro Siciliæ attribuit) circa Nili stagnantis ripas caule numeroso triquetro, non raro septem cubitorum mensuram speciosa proceritate cum æquante, tum superante. Folia circa utrumque scapi extremum, inferius ampliora *Sparganii* *Cyperive* instar repanda. Superne minora, quæ radiatum veluti calycem innascenti jubæ subjiciunt. Denso staminum ordine stipatum caulis fastigium Cæsariem exprimit, & circa summum hujus prominuli flori apices obligatum complicata hedera thyrsum effingunt. *J. B.* sc. floream comam describit. Floribus est perquam speciosis & luculentam in ambitu Cæsariem effigiantibus, numerosis, gracilibus, thyrfulis; denso & æquabili Comarum stipatu, & apicibus prominentibus, ferulæ in modum collectis, non ut *Cyper*i sparsis: nimis ornate & minus clare. Cæsalpinus comam latam, ex numerosis parvis juncis triangulis constantem in quorum summo flocci ruffi ei ascribit; magis perspicue.

Papyrus, quam Cæsalpinus in horto Pisano aluit, ex Siciliæ palustribus delatam, quam, eodem autore, in Sicilia vulgo piperum vocant; quam *J. Bauhinus* in horto dicto Cæsalpini benevolentia vidit: nobis non aliter differre videntur à papyro nilotica veterum quam magnitudine aliisque accidentibus à loci diversitate ortis: *J. Bauhinus* aut etiam Cæsalpinus ipse distinguunt aliter quam magnitudine.

Vires & usus. Ex papyro olim Chartæ fiebant ad scribendi usum, conficiendi modum vide apud *Plinium* lib. 13. cap. 11. 2. hæc ante repertas fruges Ægyptiis alimentum (omnes enim Ægypti incolæ & crudam & elixam & assam manducabant, & succum devorabant, manducamentum autem expuebant) stragulas, navium contextum, vasorum utililia, florem ad coronandos deos, & calceos horum Sacerdotibus præbebat, radix in usum ligni cedebat. Chirurghi, referente *Alpino*, foliorum medulla utuntur ad ulcerum ora dilatando. Ex scapique combusto cinere recentia ulcera curant, qui etiam maligna augeri (si sæpe aspergatur) non finit. Ex scapis recentibus aquam destillant ad oculorum suffusiones, caligines & obscuritates maxime proficiunt.

Chartæ ex papyro in desuetudinem obierunt; novo chartarum artificio circa annum 1470. (quo tempore ex Gallicia duo viri *Antonius* & *Michael* in Germaniam & Basileam venerunt, & secum attem illam antea Germanis ignotam attulerunt) invento; linthea scilicet usu detrita & flaccida tandiù tundunt machinis aquâ motis donec in succum dissolvantur: hunc optime aqua dissolutum, non sine glutine, & conturbatum, cribris excipiunt, qui succi crassitiem retinentes, paginam reddunt super stramenta ad usum parata, quæ ad prioris imitationem papyrus quoque nominatur, eo quod eundem nobis usum præstet quem olim Ægyptiis papyrus præstabat. *RAIUS*.

PARALYTICA MEDICAMENTA, vid. sub titulo *Cephalica*.

PARALYTICA HERBA, vid. *Primula Veris*.

PARAGORICA, vid. *Anodyna*.

PARIETARIA.

Parietaria dicitur hæc herba quod in parietinis exeat, item muralis: *Helxine* quod asperâ foliorum hirsutie, asperoque semine, tenaci nexu vestibus adhæreat: *perdicium* à perdicibus, quæ eam esitare solent: *Vitariaria* & *urceolaris* quod ob nitrositatem suam tergendis urceolis vitreisque vasis efficax sit.

Calycum & torius Comæ hirsutie aspera & vestium tenaci: seminibus splendentibus quibus flosculi sunt pro vasculis à reliquis dignoscitur hujus familiæ Plantis.

Nomina Parietaria vulgaris.

Parietaria Ger. *Joh. Bauh.* *Vulgaris* *Park.* officinarum & *Dioscorid.* *Cass. Bauh.*

Vires. *Parietaria* abstergit & leviter adstringit, refrigeratque. Usus internus rarior est; sunt tamen qui ad tussim commendant; calculisque & iis qui difficultate urinæ laborant succum ejus utiliter propinari dicunt, multi hodie usus in enematis ad ventris, uteri & renum dolores. Extrinsecus ad tumores, erysipelata, ambusta &c. conducit, *Schröd.* ejusdem leviter tussæ & impostæ vis magna ad recentia vulnera sananda esse dicitur.

Herbæ exsiccatæ pulvis vel melle exceptus, vel cerevisia aut zythogalo potus ad tussim inveteratam & tabem pulmonum mirificè conducit experientia teste. Quin & à veteribus adversus tussim & asthma exhiberi solita est. Idem efficit vel decoctum ejus in vino aut aqua mulsæ, vel aqua destillata: verum pulvis efficacior est.

Salem nitro sulphureum præbet hæc planta non secus quam borago & buglossum. *D. Boyl.* de utilitate Philosoph. Nat. quod sale nitroso abundet. Vis ejus deterforia ostendit: urceolaris siquidem dicta est, quod urceolis vitreisque vasis detergendis & mundandi efficax sit, ut superius monuimus. *RAIUS*.

PARONYCHIA.

De Paronychia herba ejusque in morbo eodem nomine denotato tractatum integrum conscripsit *Clariss. Gordonius*. De hac autem plantâ ambigitur qualinam demum sit *Clariss. Raius*, eam pro Bursæ Pastoris specie quâdam habet, alii verò, ut *Nobiss. Boyle* pro *Sedo Tridactylite* testorum accipiunt, cujus Nomina hæc sunt.

Sedum Tridactylites testorum *Cass. Bauh.* *Tridactylites* testorum flore albô *Joh. Bauh.*

Paronychia rutaceô folio *Gerardi* *Paronychia* foliis incis. *Park.*

Hæc autem plantâ radice tenui, simplici, surculosa nutrimentum haurit. Caule plerunque unicò assurgit tereti, tenui & infirmo, ramoso, rubente, altitudine palmari, aut paulo humiliore, altioreve pro locò in quò nascitur. Folia priora, oblonga, simplicia, alia verò sine pediculis cauli apposita, pinguia, sive succulenta, pallida, hirsuta, tactu glutinosa, in tria segmenta, seu digitos divisa, & interdum in quina: verum quæ in summis caulibus sunt, iterum simplicia & indivisa sunt, alternatim posita. In summis caulibus & ramulis longis pediculis insunt flosculi parvi, albi, pentapetali peralis subrotundis, minimè fissis, è calicibus oblongis, hirsutis, quinque partitis. Vasculum semina in summò bicornè, infra calicem floris in ventrem rotundum turgescens oxyacanthæ fructum refert. Tota plantâ ad tactum viscosa est.

In muris & testis, locis ruderatis & siccioribus copiosè provenire solet. Floret mense majò & brevè semen perficit, inde radicinis exarescit.

Herba infusa in cerevisia tenui seu leptomera, & per aliquot dies pota, absque ulla evacuatione sensibili scrophulis.

phulis medetur, humorem absumendo, dolores mitigando, tumores discutiendo & ulcerosos exsiccando. D. Boyle de utilitate Philos. Nat. ad Medic. p. 203.

Alii etiam *Paronychiam* ad Gramina referunt. Verum satis fuerit ea quæ indicavimus & exscripsimus, indicasse atque exscripsisse, & in utili admodum plantâ ut Nobiliss. creditur *Boyleo* substituisse.

PARUS.

Paros vocamus aviculas quæ circa arbores plerumque versantur, deque insectis quæ ibi inveniunt præcipuè victitant. Turnerus non solum vermibus vesci, sed & cannabino semine & nucibus delectari asserit, easque rostris suis acutioribus perforare. Harum nonnullæ in arborum foraminibus nidificant: aliæ nidos sibi extruunt figuræ ovalis, foramine ad latus per quod ingrediantur relicto. Irrequietæ sunt & certo aliquo loco residere nesciæ, at modò hanc, modò illam arborem petunt. Rostra his brevia, sed majora pro corporum mole quam avicularum superiorum: corpuscula exigua; caudæ longæ. Pleræque Canoræ sunt. Omnes autem plurima ova pariunt. Cæterum pari Aristoteli *Ἀγρίπαι* dicuntur; nostratibus & Germanis mice, i. e. mures, an quia murium instar arborum foramina subeant, an quia (ut Gesnerus scribit) muribus vescantur detracta cute objectis, quod tamen minus verisimile videtur. Horum quinque in Anglia observavimus species, nimirum. 1. Majorem fringillagine dictum. 2. Atrum Gesn. 3. Palustrem Gesn. 4. Cæruleum. 5. Caudatum cristatum & sylvaricum Gesn. nondum invenimus. WILUGHBEEIUS.

Efficax prædicatur *Parus major*, adversus renum calculos & colicos cruciatus, in cibo vel cinere exhibitus. SCHRODERUS.

PASSER.

Granis frumentorum & vermibus vescuntur. Rostra eis brevia, crassa, nonnihil incurva, color testaceus, teresque; admodum salaces, & propterea brevis ævi esse perhibentur.

Passer domesticus Aldrov. The House-sparrow.

Avis hujus notissima & passim obviæ pondus 1½ unc. longitudo ab initio rostri ad finem caudæ 6½ digit.

Rostrum crassiusculum, marî nigrum, ad angulos oris infra, oculos lutescens, fœminæ fuscum, medium vix digitum longum oculorum irides avellaneæ. Pedes ex carneo fusci; ungues nigri. Extimi digiti imum intermedium medio adnascitur.

Caput ex fusco cinereum: mentum nigrum. Supra oculos duæ utrinque maculæ parvæ albæ. Linea lata spadicea ab oculis: aurium tegetes plumulæ cineræ. Gula albo cinerea. Sub auribus magna utrinque macula alba. Venter, pectus alba. Quæ dorsum & collum distinguunt plumæ ex parte scapi exteriori ruffæ, ex interiori nigræ; at fundum versus aliquid alboris ruffum terminat. Reliquum dorsum & uropygium ejusdem cum turdis coloris, ex viridi, fusco & cinereo quodammodo mixti.

Fœmina barba nigra, nec non colli & oculorum maculis albis caret, capite & collo uropygio concoloribus, prona, parte sordide alba, vice lineæ albæ ad alas plumas habet nigras apicibus albo ruffis: in universum colores per totum corpus minus vegeti.

Pennæ remiges in utravis ala 18. fuscæ, marginibus rufescentibus ab ala notha linea lata alba ad articulum proximum porrigitur. Supra hanc lineam alæ vestitrices coloris sunt spadicei: inferius mediis partibus nigræ, marginibus exterioribus ruffæ. Caudæ pennæ omnes ex fusco nigricant, marginibus, præcipuè posterioribus rufescentibus.

Testes grandes; est enim salax admodum. Intestina 9. digitos longa; Appendices brevissimæ. Fœminæ uterus magnus. Ventriculus carnosus, granis, frumento, hordeo, &c. vescitur, fel habet.

An adeo brevis ævi sit ut fertur merito quis ambigat.

Hoc genus avis, ut & aliæ multæ, colore interdum variat: Aldrovandus enim tum album, tum flavum passerem exhibet, quorum icones & descriptione sapud ipsum videri possunt. Ornithologiæ lib. 15 cap. 11. & 12. WILUGHBEEIUS.

Passer Troglotites idem cum regulô Schrodero creditur, aut saltem viribus cum eo convenire.

Vires. *Passer troglotites maximopere commendatur ad calculum atterendum & expellendum, sive integer evulsis pennis sale conditus crudè devoretur, sive incineratus assumatur.*

Passer vulgaris, quia avis salacissima est commendatur ad venerem, comestus, præcipuè cerebella.

Stercoris grana aliquot exhibentur infantulis ad ciedam alvum.

Imò & adultis subducit alvum, in primis collectum ex moro.

Passeris ossa pulverem Epilepticum in Hispania Regi commendatum ingrediuntur. SCHRODERUS.

Passer Troglotites.

Hujus præparatio diversimodè traditur. Alii deplumatum prius abjectis visceribus salis ac pipetis aspergine condiunt, & crudum ægotantibus in totum devorandum exhibent. Ut mumia hæc medicinalis sarta recta conservetur. Ferculum sanè canibus dignum. Alii elegantiori coquinâ palato magis indulgentes passerculum nec deplumem, nec evisceratum adjecto Salis & pipetis modico in vitreatam conjiciunt & addito operculo ad cinesactionem usque torrent, tostum in subtilissimum pulverem in haustulo melicrati drachmatim propinquant. Alii Avem citra minimam sanguinis effusionem occisam, plumis & extimis vacuum, ac petroselino, Sale & baccis juniperi pulverisatis planè refertam decocto Ligni Nephritici ex vino Rhenano facto immergunt, ut liquor duos latos digitos in vase superemineat, maceratione unicæ noctis factâ in diplomate arctissime occluso blandè ac sensim coquunt, summe cavendo, ne minimum vaporis erumpat, coctam sufficienter ab igne procul amoveant, usque dum refrigerat, refrigeratam cum liquore comedendam jejune calculosis exhibent, renovando quotannis Vere & Autumno. HOFMANN.

PASSULÆ, vid. *Uva Passæ*.

PASTÆ VARIÆ.

Pasta regia seu panis martius, è *Pharm. Augst.*

℞. *Amygdalorum dulcium contusorum* ℥ss *Sacchari tenuissime pulverisati* ℥bj. cum aqua rosarum fiat pasta.

Pasta regia composita, ex eadem *Pharmacop.*

℞. *Pinearum mundatarum, pistaciorum præpar.* ℥iij. *Sacchari albiissimi* ℥viii, *quinque lapidum pretiosorum ana* ℥ii *corall. rubr. præpar.* ℥ss *cinnamomi acuti* ℥i *specierum de Gemmis frigidis* ℥ii. *nucis moschata* ℥ss *macis grana quinque, Corticum citri conditorum, conferva borraginis ana* ℥ss. *margaritarum præpar.* ℥ss. cum aqua buglossi, incisæ rassiusculè ircidendis, *Aromaticis reliquis contusis, fiat pasta saccharo & cinnamomo crustanda.*

Plurimum nutrit ac roborat; eâ, qui è diuturnis morbis emerferunt, & macilenti commodè reficiuntur.

Pasta pro placentulis stomachalibus, *Zwelferi.*

℞. *Amygd. dulc. decort.* ℥ii. *pistach. decort.* ℥ss. *cinnam. mundantur probe & minutissime in mortario ad pulvis formantur.*

formam, affundendo paulatim portiunculam aquæ rosarum fragrantiss. vel cinamomi, post adde

Sacch. pulv. albi ℥viii. cort. arantiorum, citri ana cond. ℥i. farina iriicea ℥iii. pulv. cinamomi acuti ℥vi. caryophyllorum, nuc. mosc. ana ℥℔. paperis longi, zingiberis ana ℥iii. Fiat pasta ex qua formetur Placentulæ parvæ ad lubitum, & in fornace, vel sartagine ocellusa, moderato calore pincentur.

Pasta odorata vilior pro mulieribus, ex eodem.

℥. Resina ladani, & styracis calam. ana ℥vi. quibus in mortario calido nonnihil liquatis adde pul. Gum. benzoes, Anima ana ℥℔. pulv. caryophyllor. ℥vi. macis, nuc. mosch. ana ℥℔. ligni aloës opt. odor. cinamomi, rad. ireos flor. ana ℥iii. ol. still. cinamomi, caryoph. ana ℥℔. nuc. mosch. expressi ℥i. misceantur exacte fiatque pasta odorata, bullis replendis.

Pasta odorata Tempore pestis, ex eodem.

℥. Cort. Arantiorum recent. & extim. radulâ comminut. ℥i. cort. citri recent. & extim. radulâ pariter comminut. ℥℔. ruta recentis herba, bacc. juniperi. ligni seu rad. juniperi subtiliter raspat ana ℥i. conscindantur & contundantur minutissime in mortario ad pulvis formam: quibus porro adde.

Resina styracis calam. ladani ana ℥i. Bals. indicis de Peru ℥iii. camphora ℥ii. ol. still. ruta ℥℔. caryoph. ℥iii. ligni Rhodii, succini albi ana ℥℔. nuc. mosch. expressi ℥i℔. pulv. Ase dalis ℥℔. ligni cupressi, aloës, rhodii, sansali citrini ana ℥i. misceantur in mortario calido, & contundendo fiat pasta odoris grati.

Alia vilior, ex eodem.

℥. Camphora ℥℔. solvatur in ol. still. Angelica, ruta, succini, caryoph. ana ℥i. addendo pulv. benzoes, ladani ligni juniperi raspati, cupressi, Rhodii ana ℥iii. salis urinæ volatilis ℥v. misceantur & fiat pasta seu pomum Antipestilentialia odoriferum.

Nota: cum verissimè pestilens contagium ac virus, cum exhalationis fracedine, quæ symbolum continet maligni fermenti ac miasmatis, tum etiam animatis, effluviis ac atomis virulentis, cuilibet naturali corpori (uno exempto sulphure) ipsi proinde moscho & Ambre, cæterisque multum fragrantibus, ac pro pomio Ambre vulgo usitatis, viscositate sua adhærere ac commigrare soleat, adeo, ut, unde sibi panacæas homines compromittant, arcanas insidias ac deleterium virus experiuntur; consultum judico ejusmodi amuleta, non tam genio & odoris illecebris grata deligere, quam securioribus, minus licet arridentibus qualitatibus dotata, certo vitæ adminiculo procurare. Hinc nodulum tornatilem è juniperino ligno, requisitis per circuitum foraminulis affabre paratum gestent, cujus una pars gossipium seu spongiam sale urinæ imbutum capiat, toties renovandam, quoties odorem spirare desierit. Tale quid exhalant cloacæ, quando statis temporibus ad motum aëris, acutissimum salis volatilis urinæ reddunt odorem; altera verò parte recludatur, spongiæ aceto alexiterio imbutæ particula, naribus iterato admovenda, sive domo egredi opus habeas, sive domestica munia obire velis, aded ut, si mane simul assumatur cochlear acetii boni alexipharmaci plus inde subsidii ac præservandi virium præstolari poteris, quam ex moschatis, ambra, delicatioribus inventis, nonnisi speciosos titulos alexipharmacos mentientibus, plus palato, quadris aut bel-lariis, quàm cordi in malignis tuendo, uti cætera antiloinica assolent, dedicatis. Et sanè dispar longè ratio est, odoris fragrantia & rebus balsamicis, vitales spiritus demulcere, aliud verò, pestilens miasma è corpore proscribere, aut arcere. Odor bonus spiritus allicit, atque reficit; pestilens autem contagium & virulenta effluvia, sive,

aporrhœæ, quæ vel in pestiferis corporibus, aut corruptissimis exhalationibus animantur, aded ut instar minimarum atomorum in vitam suscitata, infinito prope modum numero undique oberrent, inspiratione hauriuntur, poros penetrant, nosque inficiunt ac contaminant, licet sub sensus & visum non cadant, sicut olim Platonis ideæ, nisi microscopio utaris, quod objecta centies & ultra auget, tunc in aciem incurrunt millena vermiculorum corpuscula, ac virulentæ atomi; hæc inquam effluvia odoris fragrantia allicere opus non habemus nolentibus ac sponte ingruunt, sed potius appropriatis ac specificis odoribus fugare, ac interimere competit.

PASTILLI, vid. Trochisci.

PASTILI pro FUMO, vid. sub titulò Suffumig.

PASTINACA.

Pastinaca, Σταφυλῖς, à pascendo dicta videtur, nartæ radices ejus cibus sunt vulgaris, quæ corpus abundè alunt saginantque. Turnebus autem in Adversar. lib. 8. c. 23. ex eo dici putat quod referat & quasi habeat pastinum. Quomodo vocatur instrumentum quo vineæ fodiuntur. Voss Etymolog.

Staphylinus (inquit C. Bauhinus) fortè à colore uvæ nigricantis dicitur, ejus coloris unius radix est. Sunt qui à similitudine radices bryoniæ.

Pastinacæ latifoliæ nota generica sunt radices carnosæ esculentæ, flores lutei, folia pinnata potius quam triangulata.

Elaphoboscum dicitur hæc herba, quoniam fama est hoc pabulo cervos resistere serpentibus.

Ex Dioscoridis, Plinii, Galeni & Columellæ de Sisere verbis colligere conatur Columna hanc Plantam antiquorum siser esse absque dubio ullo. Radicem namque pastinacæ sativæ similem forma & sapore, verum amariore atque odoratiore, omnesque pastinacæ generi adscripsisse, atque pastinacam vulgarem sive domesticam appellasse. In hac radice nervum inesse longitudine, qui eximatur postquam elixata fuerit radix. Non solum dulcedinis causa, sed quia tenerior sit pars reliqua exterior, ciboque aptior atque gratior. Hoc & in pastinaca sativa vulgari, & in raphano prospici, præsertim cum radices sint bene adultæ, duriorem enim tum continere nervum, cibo ineptum.

Vires. Radices hujus dulces sunt & palato gratissimæ, multum nutriunt, & corpus pingue faciunt præ rapis aut carotis, unde & venerem excitant: flatulenti quoque aliquid obrinent. Eduntur coctæ cum butyro conditæ, quadragesimali tempore, tunc enim succo per hyemem concocto maximè dulcescunt & tum saporis tum salubritatis gratia præcipuè expetuntur; nec enim adeo commendabiles sunt antequam frigoris insultum senserint.

Refert Cæsalpinus ex his radicibus cum saccharo electuarium confici ad vires recreandas convalescentibus & puerperis, communissimum rusticorum remedium: ppetentiam quoque præstare.

Incidendi, attenuandi, detergendi, obstructions aperienti facultatem inesse sapor odorque demonstrant. J. B.

Dodonæus semen calidius & siccus esse, urinam movere & flatus discutere asserit.

Qui hyeme colligunt radices (inquit J. Bauhinus) caveant à cicuta vel picutaria. Dum eram Montbelgardi vidi duas familias in quibus qui decepti edebant pro pastina capere extincti erant, sed sublevati vomitu. Theriacæ & Saxonice pulvere, itemque purgantibus salvi evaserunt.

At nostrates asserunt pastinacas ipsas vetustiores & annosas delirium & insaniam inducere, unde & eas pastinacas insanas vocant.

PAVO

PAVO.

Pavo The Peacock. Græcis Ταῦς.

Avis hæc passim nota, vel sola caudæ longitudine & gemmantibus oculis ab aliis omnibus abundè distinguitur, adeo ut supervacaneum omnino foret prolixâ verborum serie eam curiosius describere.

Mas (describente Aldrovando) capite, collo & pectoris initio coloris est intensè cærulei: caput pro corporis portione exiguum; at quodammodo (ut annotat Albertus Serpentinum, maculis ornatum duabus, oblongis candidis, quarum una oculos superequitat, altera brevior at longe crassior subjacet; quam dein alia nigra excipit, cætero (ut dixi) cæruleum. & in vertice apicem, non ut in quibusdam aliis avibus integrum, at è nudis quodam modo scapis tenerrimis viridescentibus, in summitate ejusdem coloris veluti liliorum flores ferentibus, conspicuum. De quo pulcherrimo apice loquens Plinius, pavonis apicem, inquit, crinitæ atbusculæ constituunt: & revera non pennæ videntur, sed erumpentia primum Plantarum germina. Rostrum candicat & insigniter hiat in extremo aliquantum recurvum, quale fere est omnibus granivoris; & in eo nares satis parulæ. Collum longiusculum, & pro portione magnitudinis admodum tepæ & exile. Dorsum ex albo cinereum est, maculis quam plurimis atris transversalibus conspersum. Alæ clausæ (apertas videre non datur mihi, qui depictum ad vivum in libris meis describo) superius quâ dorsum spectant nigræ, inferius quâ ventrem, atque intrus pariter ruffæ. Cauda ita disposita est, ut quasi in duas dividatur. Nam quando eam in rotam extendit, minores quædam pennæ, integram veluti per se caudam constituentes, & alterius etiam coloris nempe fusci, non ut longiores rigent, sed ut in reliquis fere avibus extensæ conspiciuntur; adeo ut longiores indubitanter alii musculo inferi necesse sit, cujus beneficio ac operâ ita erigi & extendi queant. Hæc longas Petrus Bellonius ex superiori dorso propè podicem oriri hoc est Uropygio tradit, minoresque alias à natura factas ut longiores sustineant. Uropygium intensè virescit, quod unâ cum cauda longa erigit: cujus pennæ breves sunt atque ita dispositæ ut tanquam Draconis Æthiopici squamas æmulentur, & partem pennarum caudæ longarum obscurant ac conspectum eripiant. Pennæ longiores extensæ omnes castanei sunt coloris, lineis aureis elegantissimis sursum repentibus decoratæ, in extremitate vero intensissimi coloris viridis plumas easque bifurcatas & hirundinum caudam æmulantes desinunt. Orbiculi, vel, ut Plinius vocat, pennarum oculi ex viridi quasi Chrysolithi splendore & Auri & Sapphiri coloribus distinguuntur. Ejusmodi oculi 4. circulis constant, aureo primo; secundo castaneo, tertio viridi, medium locum cæruleus seu Sapphirinus obtinet, figura quodammodo ac magnitudine phaseoli. Coxæ, tibiæ, atque pedes cinerei sunt maculis nigris conspersi, & calcaribus more Gallinæorum armati. Venter prope ventriculum ex cæruleo viridis, prope podicem nigrescit aut saltem fuscescit.

In fœmina pauca admodum colorum conspiciuntur varietas. Alæ totæ, dorsum, venter, coxæ ac pedes coloris sunt fusci ad cinereum vergentis. Capitis vertex & apex ejusdem coloris, in vertice tamen aliquot maculæ exiguæ velut puncta virescentia interfusiuntur. Maculæ illæ candidæ, quas etiam in Mare annotavimus, in fœmina longe sunt majores. Oculorum iris in Mare lutescit, in hac plane plumbea. Mentum totum candidum. Colli pennæ undatim positæ virides, propè pectus in extremitatibus albæ sunt.

Iisdem quibus Gallinæ vescuntur: hordeo autem imprimis delectantur. Albertus serpentes à pavonibus edidit. Unde non mirum serpentes earum voce terreri.

Peregrinas origine aves esse, & in Europam ex India olim invecas verisimile est, nunc dierum ubique frequentes sunt.

Huic avi, & quidem Soli præter Gallo-pavonem convenit caudam in orbem expandere, quasi radiantes ejus oculos spectari gauderet: quod verò laudatus id faciat, quodque eam mox conspecta semel pedum suorum deformitate deponat, & in acervum quendam contrahat, ac si rationis non omnino expertus esset, proculdubio falsum est.

Caro ejus durior, frigidior, siccior, & difficilioris coctionis censetur: coctam non putrescere, sed integram etiam annum aut eo diutius incorruptam servari & vulgo creditum est, & Augustini experimento comprobatur, qui lib. 21. de civ. Dei. c. 2. hæc habet. Quis nisi Deus Creator omnium dedit carni pavonis mortui nè putresceret? quod cū auditu incredibile videretur, evenit ut apud Carthaginem nobis cocta apponeretur, hæc avis: de cuius pectore pulparum quantum visum est, servari iussimus: quod post dierum tantum spatium, quantum alia caro quæcunque cocta putresceret, prolutum atque oblatum nihil nostrum offendit olfactum. Itemque repositum est, post dies amplius quam triginta, idem quod erat inventum est; idemque post annum, nisi quod corpulentia aliquantulum siccioris & contractioris fuit. Verum nobis non adeo mirum videtur carnem pavonis ex se satis duram & solidam, à coctione aridiorem factam, in regione calida diutius incorruptam durare, præferim si caveatur ne humorem aliquem uvidâ tempestate bibat: nec dubito quin & Gallo-pavonis carni atque etiam Gallinacæ coctæ idem accideret. Caveant (inquit Aldrovandus) à pavoninarum carniū esu, qui quiete fruuntur, siquidem conveniunt aut saltem minus nocent multum se exercitibus, iisque tantummodo juniorum pavonum, utpote teneriorum; hepaticis & splenicis omnino noxius est earum usus, & quos hæmorrhoides crebro vexant. Ego vero pavonum saltem juniorum carnem teneram & delicatam, meritoque suo Romanis olim in præcipuo honore & æstimatione fuisse judico, nec Gallinacæ aut perdiciam prætulerim.

Aristoteles pavones duodecim ova parere scribit, apud nos quinque aut sex, rarissime plura antequam incubant edunt.

Maximam horris pestem inferunt, & tegulas tectorumque culmos evertunt. Pavo (inquit Aldrovandus) et si avis visu pulcherrima sit, oculorum tamen voluptas ista plurimo aurium tædio compensatur, quæ sæpe tartareæ vocis suæ horrore fatigantur: unde vulgo (Italorum) dicitur, plumis vestitus Angeli, vocem habere Diaboli, & incessum latronis, vitam ad centum usque annos, (quod facile credimus) producere dicitur. Masculus pavo, inquit Columella Gallinacæ salacitatem habet, atqueideo quinque fœminas desiderat: modo, ni adsit alia quæcum coeat, incubantem fœminam invadit & ova frangit; cuius rei conscia fœmina, nidum quantum potest occultat. Amare munditiem dicitur. Colore albo interdum locis Septentrionalibus præcipuè, variat hæc avis. WILHELMUS BEIUS.

OFFICIN. NAT. ex PAVONE.

1. Integer. 2. Adeps 3. Fel. 4. Stercus. 5. Penna. 6. Ova.

Vires.

1. Jus pavonis pleuriticis specificè fertur prodesse, præcipuè si sit pingue.

2. Adeps, cum succo rutæ & melle colicos affectus optimè sanat.

3. Fel, oculorum hebetudini, fluxionibus, asperis item superciliis medetur.

4. Stercus, proprietate vertiginem & Epilepsiam sanat, in dies multos exhibitum, nimirum exiccatum & pulverisatum (3i.) maceratur per noctem in vino.

vino: Hinc trahendum per linteum exhibetur, continuando à no. ilunio usque ad plenilunium aut amplius, si opus sit. *Crato miscet cum saccharo & exhibet.*

[Ex hoc Syrupus Antiepilepticus paratur]

5. *Penna*, adhibetur in suffitu, adversus uteri ascensum, *Quercetum*, in *Pharm. Rest.* imponuntur etiam in Erysipelate & inflammationibus mammillarum.

6. *Ova*, exhibentur ad curandam arthriticam vagam dictam.

[Ad affectus mammillarum utilia] *SCHRODER.*

Hujus *Stercus* (specificè vertigini medetur, si cum sp. vini s. q. distemperetur, & tribus vicibus matutinis abluatur drachma una pro dosi hujus fimi in dicto sp. vini. Pulverisatum etiam adhiberi potest habitâ sexu ratione. *P. Borellus Centur. 3. observ. 98.*

PECTORALIA

Hæc præ reliquis plura sortita sunt nomina, audiunt enim *bechica* quod tussi medeantur, *pneumonica*, quod pulmoni, *expectorantia*, *arteriaca*, *anocathartica*, & quæ alia sunt nomina.

Respiciunt verò vel *vias*, aëri immittendo & emittendo necessarias, quas expediunt, & bronchia pulmonum ab infarctu liberant, uti sunt tum *incidentia* & *attenuantia*, sale volatili simplici, ut *arum. sir. de erys. Lobelii* vel oleo balsamico pollentia, ut *mel*, quæ conveniunt in humoribus crassis, viscidis, lentis, pituitosis, asthmate, tussi crepâ, tum lenientia & lævigantia, eclegmata, si tui pectorales, &c. quæ in tacedine inprimis ex usu sunt & tussi quoque in genere.

Vel *humores*, sive *crassos*, qualia sunt jam dicta, incidentia & detergentia, sive *tenuis*, *acres*, *falsos distillantes*, uti sunt terrea mucilaginosa, opiata, bolus Armena, mastiche, thus, theriaca, quæ in catarrhis falsis, tenuibus, hæmoptysi &c. conveniunt, seu *ad putrilaginem & ulcus declinantes*, uti sunt putredini resistentia, balsamica, terrea, præcipitantia, nunquam omitti lævigantibus jam recensitis, & pro re natâ traumaticis, consolidantibus, quorum in phthisi usus est.

Vel *expansionem præpeditam*, idque tum aliis casibus, tum inprimis, ubi affluxus irruptioque humorum inflammatione & abscessum intendit, quo casu præter universalia, *diaphoretica*, in ordinem sanguinem redigentia, conveniunt *resolventia*, & *coagulationem dissolventia*, uti sunt antipleuritica pleraque præcipue & iata item in casu ab alto proficua. Hæc ipsa sæpe naturæ aliam monstrant viam, ut, quod ordinariè per tussim expectoratur, per alvum soleat deponi.

In singulis vero his expectoratio nunquam negligenda, sed in omnibus etiam sua laus hanc promoventibus manet.

MATERIAM constituunt, ut diximus, 1. *volatilia*, sale vel pollentia, ut radix ari, scylla marina, sinapi, erysimum, item *amara*, scordium. 2. *Sulphure blando*, volatili vel oleoso constantia, ut radix irid. fœnic. helen. ros. solis, sem. anisi, cassiafras, succinum, benzoe, olea distillata. 3. *dulcia & roseida mucilaginosa*, saccharum cantum, si upi, looch omnis generis, mel, glycyrrh. quæ duæ classes bechica maxime absolvunt, non omitti res solventibus quandoque 4. *resolventia*, & partim leniter exsiccantia partim expectorationem promoventia, ut lapides sperma ceti, dens apri, & diaph. gummi ammon. succinum. 5. *asthmaticæ* chærefolium. 6. *terrea præcipitantia*, absorbentia, consolidantia, ut tussilago, scabiosa, veronica, & diaphor. antihect. Poterii. Pertinent huc & 6. *mucilaginosa temperatiora* alchæa costa, jujubæ, sebesten, gummi Arab. tragac. bol. Armena. Reliqua ut 7. *aquea diluentia*, & 8. *adstringentia* ex dictis parent, & quædam eorum communia sunt, &c. item 9. *opiate*, diacod. &c.

Priora incidentium posteriora incrassantium gen. tui titulo gaudere queunt; media quasi sunt aquea.

APPLICANDI verò *Modus* legitimus probè est observandus, tum intrinsicorum, tum topicorum.

1. *In affectibus pulmonum & thoracicorum* incrassantium & incidentium non est confidendus, nec invertendus, i. e. non danda sunt incrassantia, ubi viscosi, tenaces, pituitosi peccant humores; nec incidentia & attenuantia, sicubi tenues, salii & acres destillant. Sic etiam.

2. *Non confundenda sunt bechica cum solventibus*, misceri tamen pro re natâ commodè queunt, e. gr. in pleuritide & asthmate magis solventia in tussi, phthisi magis bechica conveniunt. Qui verò pleuriticis solis bechicis inprimis linctibus, curare præsumit, ægum interimit: qui astmaticum, periculo magno non minùs exponit.

3. *In affectibus pectoris non adstringendum sine solventibus*, ut nempe i sanguini grumato simul prospiciatur, ut in hæmoptysi id præstant lapides, licet secundariâ solùm dosi receptis; idem utrumque expediunt coralia, bolus Armena, terra sigill. &c. 2. ut tonus pulmonum, qui laxior naturaliter esse debet, h. m. attendatur, neque expansio impediatur.

4. *Nimis quoque exsiccantia in thoracis vel vitæ da, vel cum humectantibus miscenda*, v. gr. & diaphoreticum Poterii, magis exsiccant, ut & tra ipsa commune, flores tris, & ii purum, &c. Hinc etiam plantæ pectorales recentes, quando magis humectandum & abstergendum est, v. gr. in phthisi & aliis, magis profunt, ubi verò consolidandum, ut in hæmoptysi, magis sicca.

5. *Vitanda sunt item nimis laxantia, tum internè tum externè*. Illa enim & tonum debilitant, & ventriculum dejiciunt, ac inappetentiam ipsi conciliant, unde bechicis linctibus in magnâ copiâ & continuo uti non est consilium; hæc verò poros ampliando magis & dilatando ad affluxum recipiendum magis disponunt, unde in unguentis etiam pectoralibus cautio esse debet.

6. *Bechica sensum magis ac pedetentim, quàm unâ vice, deglutienda, pirisando, sorbendo*, ut scilicet pars ad asperam arteriam feratur & deriveretur magis; ejus asperitatem & inæqualitatem corrigere sustinemus. Neque enim in ventriculo hæret malum, sed ipse, ut modò diximus, exinde, si excedatur, noxam sentit. Valet id in pulveribus cum saccharo sampo eduleatis, looch item & electuariis.

7. *Frigida pectori inimica*, unde decocta & infusa magis calidè interiùs profunt; externè verò licet adstringendi intentio adsit, tamen non conveniunt, quia destrunt tonum partis, quæ calido gaudet, & tussim, quæ vel à solâ frigiditate sæpe fieri observatur, excitant. *WEDLIUS.*

Bechica remedia dicuntur quæ spiritum movent, thoracica etiam vocantur & pectoralia à parte evacuanda.

Sunt enim bechica medicamenta quæ pulmoni & cæteris thoracis partibus familiaria existunt, & contento humores in pectore aptos redduntur, ut tussi faciliè excerni possint.

Ut humores in pectore contenti faciliè excludantur, non debent esse nimis crassi, quia eludunt, immoderantem, neque nimis tenues; quia impulsu dissiliunt in partes; sed mediocri consistentiæ, ob id duo genera re-mediis conveniunt.

Primum Est eorum, quæ crassos humores calefaciunt, attenuant, detergent, & incidunt.

Secundum Est eorum, quæ humores calidos, tenues, acres refrigerant, humectant, incrassant, & demulcent.

Forma remedii sub qua utraque adimpleretur intentio, est apozema, julep, emulsio, jusculum, looch.

Apozema præparans crassos humores in omnibus frigidis pectoris affectibus, asthmate, pulmonum infarctu, catarrho pituitoso, & similibus.

℞ Radic. brusci, apii enulæ campanæ ana ʒ. j. fol. tussilag. hyss. scab. hed. terrestris, cichor. totius ana M. j. liquir. rasæ & contusæ ʒ. β. passul. purgat, ʒ. j. semi. alth. melonum ana ʒ. ij. florum cordial. ana p. j. Fiat decoct. ad ʒ. j. β. pro quatuor dosib. Adde cuique syrup. de tussilag. vel oxymel. simpl. ʒ. j.

Vel in forma julepi.

℞. Aquar. scab. tussil. ana. unc. ij. aquæ cinnam. drach. j. oxymelitis simpl. vel syr. capill. ven. ʒ. j. fiat julepus.

Cum remedii forma erit mutanda, parari potest jusculum ex aliquot radicibus, & herbis præcedentis decocti.

In qualibet dosi addi potest aliquod ex chymicis sequentibus.

Oleum anisi arte chymicâ extractum ad gutt. iv.

Tinctura sulphuris ad gutt. vr.

Lac aut magisterium sulphuris ad gr. x.

Flores benjoini ad gr. iv.

Tinctura ex vitriolo antimonii ad gutt. vi.

Possunt eadem sumi cum remedio in alia forma præscripto, nempe cum opiata, tabellis, &c. præmissis tamen sufficienter universalibus.

℞. Flor. benjoin. gr. ij. magist. sulph. gr. vr. Misce & sumat singulo manè per quindecim dies cum ovi vitello, vel cum opiata appropriata.

Nota primò, quòd si febris adsit, vel calor sanguinis & viscerum, abstinendum sit remediis prædictis calidis, conveniunt venæ sectio, purgatio quantum suadet indicatio. Alterantia sunt refrigerantia, lenientia, in forma emulsionis, julepi, decocti ex incrassantibus bechicis, iisque quæ sunt tenuium partium.

Nota secundò, Miscenda semper esse calidioribus ea quæ leniunt, humectant, & modicè refrigerant, ne pituita ab intensiori calore exsiccata contumaciùs adhærescat, ob id addenda sunt cichor. liquiritia, passulæ, semina melon. alth. & similia.

Nota tertio, Dum respicimus pituitam præparandam in pectore, semper habendam esse rationem viscerum, & capitis, & omni judicio assequendum est nùm discrasia calidâ, obstructione, aut imbecillitate laborent, aut reliquæ abdominis partes infarctu, tunc enim pariter iis prospiciendum, quia frustra studemus pectori succurrere, si causis antecedentibus, aut complicatis affectibus non opitulamur.

Nec tẽ decipiat sputum crassum, viscidum in gracilibus & siccis constitutionibus, cæterisque asthmate convulsivo, tussique detentis, quibus inest sanguis fervidus, lymphæ crassa; in quo casu præmissis universalibus evacuantibus, alterantibus prout expedit; semibalneura, cremor hordei, lac & similia ex usu sunt.

Bechicum bilem & tenues humores incrassans, leniens, humectans, & refrigerans sputum quoque tenue ad mediocrem consistentiam deducens in phthisicis, peripneumonicis, & similibus.

℞. Fol. cich. totius, capillor. ven. pimpin.

pulmon. utriusque buglossi, ah. M. j. semin. quârto frig. maj. lact. & papav. albi ana drach. ij. liquir. & passul. purg. ana unc. β. jujub. par. iv. hord. integ. & flor. cord. ana par. Fiat decoct. pro quatuor dos. vespere & manè sumendis. Adde cuique syrupi. jujub. violati, vel capill. ven. unc. j.

In Empyemate ad coctionem, maturationem materiz, & expectoratum, sic præscribitur.

℞. Radic. consol. maj. & alth. ana unc. j. fol. agrim. cichor. cum toto, capill. ven. scab. tussilag. ana M. j. quatuor semin. frig. maj. ana drach. ij. liquir. rasæ & contus. passul. mund. ana unc. j. hord. integ. flor. cord. ana. part. j. Fiat decoct. pro quatuor dos. Adde cuique syr. de tussil. vel. capill. ven. ʒ. j.

Contra sputum sanguinis, & dysenteriam singulare est sequens decoctum.

℞. Rad. pentaph. tormentil. symphyti maj. ana unc. j. fol. cich. sylvestris cum toto, portulac. planrag. tenellæ, hederæ terrestr. millef. an. M. j. semin. lact. portul. papav. albi ana drach. ij. flor. rosar. rubr. p. j. Fiat decoct. Colaturæ ad ʒ. j. β. adhuc ferventi iniice conservam ros. rub. & papav. rhæad. ʒ. a. unc. β. spir. vitr. ʒ. j. infundantur vase coopetto super calidos cineres per tres horas, deinde fiat colatura pro quatuor dosibus. Adde cuique syr. de rosis siccis vel de coralliis drach. vi. capiat manè & vespere Tencke.

PEDICULARIS.

Pedicularem Lobelius scribit vocari hanc herbam, quòd facultatibus sit virosis, pratis infesta, & pediculis hostis. Contra Dodonæus *pedicularem* ab effectu nominat, quod pecori ac jumentis, quæ in pratis ubi hæc provenit pascuntur pediculorum copiam gignat, mihi hujus herbæ folia pediculi tergo rugis suis perquam similia sunt, & inde sortè nomen.

Notæ hujus generis sunt præter flores galeatos & vasculum bicausulare, florum calyces tumidæ & velut inflatæ folliculos seminum occultantes, semina compressa.

Nomina. Pedicularis sive crista galli lutea Park. pratensis lutea vel crista galli C. B. Crista galli Ger. galli femina I. B.

E radice parva, alba simplici, surculos vel adlaterâ emittente, non altè in terram demissa caulis, assurgit plerunque singularis, pedalis, rigidus, lavis, quadratus, rectus, tenuis, inanis nigris non raro maculis & lituris varius, & versus supremam partem purpurascens, in ramos aliquot divisus, quos adverso situ posita binæ semper ambiunt folia, sine pediculis, lata basi, exinde sensim angustata ad apices usque, longitudine digitali, acuta, per margines dentata, cristam galli imitantia, venis insignibus à medio ad singulos dentes hinc inde excurrentibus, è foliorum sinibus ramuli exeunt per paria seu duo adversi: in summis caulibus & ramulis conferti & spicam mentientes flosculi è foliorum pariter sinibus singuli singulis exeunt, brevibus admodum pediculis; Calicibus turgidis, compressis, in quatuor acuta segmenta summo margine incisus, flores monopetali, flavi, cucullati, stylum tenue & quatuor stamina cum suis apicibus occultant, delapso flore calix in majorem longe vesicam intumescit, & vasculum seminale amplum, compressum intus continet, in duo loculamenta per medium divisum. & semina plura, compressa, marginè membranaceo cincta, colore pulvereo continens,

tinens, seminibus maturis illico dehiscunt vascula membranæ, & cum exsiccantur lucida fiunt.

Floret Junio & semen brevi maturat, quod statim effundit, & mox radicibus exarescit ante fructum.

In paucis præsertim sterilibus exit, non raro & in arvis, utrobique inutilis & vitiosa, ut rectè L. Bauhinus. *Rajus*.

Apta creditur hæc planta sistendis hæmorrhagiis omnis generis si in decocto sumatur. Reputatur præterea vulneraria, ac in fistulis sanandis proficua.

PEDICULUS Animal.

De Pediculò animali, seu ejus virtutibus *vid.* sub titulo Homo, nec opus est hic plura addamus.

PENTAPHYLLUM.

Folii venosis, in singulis pediculis quinis, aut interdum septenis, flore pentapetalo, ab aliis omnibus hujus generis, primo statim aspectu facile distinguitur, ut plura addere non sit opus.

Valdè prolifas habet radices, & sæcundo repleti luxuriantes, lignosas, fibras aliquot emittentes, albas, alias rubentes, pluribus fibrillis capillatas (radix in aquosis exterius nigricat, non rubet ut vult Jo. Bauhinus) folia quinâ vel septena pentaphylli vulgaris, sed non eo ordine sita, verum ceu in alam disposita, subtus incana, supremâ parte viridantia vel glabra, vel lanugine vix conspicua hirsuta, profunde per ambitum serrata, pediculis non admodum longis nixa, quorum ima in vaginas amplas caulem amplectantes degenerant. Caules glabri, rubentes, in terram reclinati, foliis per intervalla alternis vestiti: in summis caulibus flores in surculis è foliorum alis egressis consistunt duo tresve simul, pediculis brevibus, satis grandes, è quinque latis mucronatis rubris calicis segmentis & coridem perangustis petalis compositi, pluribus intus apicibus concoloribus, & turbinato capitulo fangi æmulo, tam figura, quam magnitudine.

In palustribus putridis multis in locis occurrit.

Vires. Vulnerarium est & astringens. Sistit fluxus alvi & hæmorrhoidum, nariumque hæmorrhagiam, utile est in spuitione sanguinis, & tussi. Commendatur etiam ad paralytin, phthisin, arthritidem, icterum, prodesse dicitur & in calculo & erosione renum, hernia & febribus, extrinsecus in oculis inflammatis succus instillatus, in oris putredine, laxitate dentium, abstergit etiam ulcera maligna. Schrod. Præcipue notanda est vis ejus adstrictoria, quâ mediante agit quicquid agit.

Pulvis radicis drachmæ unius pondere sumptus paulo antè paroxysmum in febribus intermittentibus insigne febrifugum est. D. Nædham ex relatione D. Ballard. Hujus facultatis mentionem invenio etiam apud Tragum, quin & multis seculis ante Tragum Hippocrates ad febres fugandas hæc planta usus est; (ut nos monuit eruditiss. vir Edv. Hulsius M. D.) qui Lib. de morbis secundo pag. 64. editionis Vanderlinden, hæc habet. Si tertiana febris tenuerit, siquidem non omittis tribus invasionibus quarta corripiat pharmacum deorsum purgans bibendum dato: Si verò pharmaco non opus habere sibi videatur, radicem quinque folii tritarum acetabuli mensura.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

ram ex aqua bibendam dato, in quæ verba D. Spon. Lib. de febribus & febrifugis hæc habet, Pentaphyllum est planta nonnihil amara, & valde adstringens, unde proprietatem obtinet roborandi fibras ventriculi à febre relaxatas & acidum ipsius edulcorandi & figendi: nec dubium est quin in Græcia, ubi Hippocrates vixit, efficacior fuerit quam hic loci, quando quidem pleræque plantæ melius proficiunt viribus in locis calidis quam in frigidis, præcipue illæ quæ aliquantulum aromaticæ sunt, nihilominus novimus nonnullos è plebe Gallica literarum omnino rudes, traditione sola à majoribus accepta edoctos, pentaphylli decoctum ad febres intermittentes sanandas propinare, adeoque minime ejus confici, Hippocratis discipuli sunt. D. Hulse.

Ab experientia commendo decoct. radicis pentaphylli in aphthis, quo Thomas Thomassius mirabili cum successu & artificio oris ulcera sine alia ulla re sanavit. Jac. Cas. Baricellus hort. genial. pag. 148.

Pentaphyllum, tormentilla, argentina, Fragaria ut genere sic viribus convenire videntur. *Rajus*.

PEPLUS, *vid.* sub titulo *Tithymalus*.

PEPO

Peponem dictum volunt ἀπό τῆ περὶ αὐτοῦ μα-
turescere, ed quod maturitate flavescant. C. B.

Pepo à reliquis pomiferis distinguitur totius plantæ foliorum, florum, fructuum, magnitudine, sed præcipue semine rhomboide lineâ circa margines elatâ cincto.

Vires. Est, inquit Dodonæus, omnium peporum natura frigida cum copiosa humiditate; habent autem vim quandam abstergendi, cujus beneficio urinam cient, & deorsum expeditius quam cucurbitæ aut melopones permeant, ut Galenus scriptum reliquit, editur autem caro peporum haud quaquam cruda, sed cocta: descendit autem sic omnino faciliter, alvum facilem & quodammodo lubricum reddens. Alimentum autem confert exiguum, tenue, humidum frigidumque (vitiosum inquit Galenus) idque potissimum cum probè concocta non fuerit: quo casu cholera morbo obnoxios efficere solet.

Nostrates pulpam in frusta concisam vel in juve carnium decoquant, vel in lacte, atque ita vel cum ipso lacte, vel exempta & cum butyro condita seorsim edunt, alii exemptis seminibus & humidâ interiore pulpa, pomis concisis cavum replent, & operculo rectos in furno coquant, adeoque pulpam cum pomis mistam & probè subactam, butyroque conditam libenter comedunt: vulgus etiam in deliciis habet.

Semina sunt è numero quatuor frigidorum majorum; eorumque usus est in emulsionibus ad contemperandum febrilem calorem: urinas promovet & renibus calculo infestatis utilia sunt, videntur autem renibus prodesse non tam absterfione quam lenitione, ex sententia Casp. Hofmanni. quam præstat, inquit unduositas eorum: hæc ipsa faciunt opus suum in tussi calida & acri, in exulcerationibus & inflammationibus internis; quamvis in his suspecta sit oleositas *Rajus*.

PERCA.

Perca minor, quibusdam Cernua, Trago Aurata (quod extra aquam educta, ac suo humore viscido liberata, aureo fulgore in coruleum
Zz abeun-

abeunte insignis sit :) Cajo nostro Aspreto, (quia Asper est pinnis spinosis) ob uberrimum horum piscium proventum, apud nos percelebris fluvius quidam non procul Normico in Norfolcia fluens ; ut à Camdeno nostro in hist. Norfolciae olim notatum. *Charleton.*

Officin. Nat. ex Perca.

Lapides in capite reperti juxta spinæ dorsi initium : Hi viribus conveniunt cum reliquis lapidibus testaceis, adhibenturque in calculo atterendo, renibus abstergendis.

Extrinsecus in dentifriciis, vulneribus exiccandis. *Schroderus.*

Hujus Lapis præparatus in calculo tam puerorum, quam adultorum in aq. petroselini vel in emulsione quâdam propinatus summæ est efficacæ. *Hofmannus.*

P E R D I X.

Perdix cinerea Aldrov. The common partridge.

Mas quatuordecim $\frac{1}{2}$ uncias pendebat ; fœmina tredecim commensurata à summo rostro ad ungues quatuordecim digitos æquabat, ad extremam caudam duodecim & tres ad angulos oris, aliis in contrarium extensis longissimæ pennæ 20. digitorum intervallum relinquebant.

Rostrum in junioribus fuscum, in provectioribus ætate albicat : oculorum irides lutescunt : in mare pectus maculâ ruffa semicirculari vel soleæ equinæ æmula insignitur : sub oculis excrescentiæ quædam rubræ, mentum & capitis latera crocea primo, deinde cæruleo - cinerea lineis transversis nigris velut irrorata, ad lineam modo dictam semicircularem : sub linea idem color in cinereum sordidum seu flavescens degenerat.

Pennæ laterales longiores magnam maculam ruffam transversam obtinent, scapis albis. Supina facies ruffo, cinereo & nigro varia est.

Remiges pennæ in utraque ala 23. è quibus priores fuscæ sunt, maculis ex ruffo seu flavo albis. Tegetes interiores & scapulares pennæ longiores scapos obtinent, ex flavo albos, cauda tres digitos longa duodecim pennis constat, mediis quatuor corpori concoloribus, reliquis utrinque septem sordidè crocescentibus, apicibus cinereis.

Tibiæ infra articulos nudæ, calcaris vestigium nullum, pedes subvirides, ætate provectioribus albi, digiti membrana connectuntur ut in Terraonibus.

Ingluvies magna ; ventriculus musculosus. Cystin felleam habent, carnis sapore & salubritate avibus omnibus merito præferenda est, formicis earumque ovis seu aureliis frumentorum granis atque etiam foliis virentibus vescitur, verum per hyemem, cum tritici, &c. folia depascitur, carnis sapor minus commendabilis est quam æstate & autumno, cum ipsis granis victitat.

Multipara est hæc avis, ova sexdecim etiam aut octodecim ponens : apud nos in Anglia frequentissima, Italiam *Starna* quasi externa dicitur ; (& alicubi etiam *Pernice* ;) apud quos rarior est, & pluries etiam venit quam ruffa.

Perdix (quod de omnibus speciebus dictum intelligatur) ob corporis gravitatem, brevitatemque alarum neque in sublime evolare, neque volarum diu continuare potest : velocem tamen atque etiam impetuosum volatum exercet.

Hyberno tempore gregatim volant, sunt enim istiusmodi naturæ, ut quindecim aut sexdecim pullos uno incubitu exclusos educunt, hiæque tota hyeme cum parentibus unâ degunt, sed vere, cum mas femellæ se jungit, binatim volant, tunc enim pullos à se abigunt, hæc Bellonius ; quæ non modo de reliquis hujus generis avibus, sed etiam de Terraonibus vera sunt ; perdicum cantus certissimum appropinquantis diei signum est (inquit Bellonius) nos vero post occasum solis vespertino crepusculo caccabantes saepius audivimus.

Perdices, cum ad nidum quis accesserit, inquit Aristoteles, & ex parte etiam experientia confirmat, provolvunt se ante pedes venantis quasi jam possint capi, atque ita alliciunt ad se capiendum hominem ; tum ipsæ volant, & postea revocant prolem, quæ matrum voce audita & agnita statim ad eas accurrit.

Perdix ruffa Aldrov. Venetiis & alibi in Italia coturnice seu coturno. *The redleg partridge.*

Mas tredecim uncias pondere superabat. Longitudo ei à summo rostro ad extremos ungues octodecim digitorum. Alæ diductæ ad digitos viginti duo extendebantur ; oculorum irides rubescunt : rostrum digitale ferè, rubrum, pedes quoque rubri, ungues fusci ; digiti ad primum usque articulum membrana connexi : Calcaria parva (aliis nulla, foris hæc juniores fuere) pedum plantæ sordide flavæ.

Caput, collum, dorsum, uropygium cinerea ; ut & femorum exterior pars, collum inferum vinaceo colore tingitur, maxillæ sub oculis & mentum ad medium usque gulæ alba : in ipsa tamen mandibulæ inferioris angulo macula exigua nigra, album hoc spatium torquis nigeræ naribus inchoatus & supra oculos productus cingit, ingluvies infra torquem cinerea, pectus diluè è flavo ruffum. Latetum tegetes pennæ pulcherrimis coloribus pinguntur. Nonnullarum enim apices summi nigricant, nigrori succedente areola transversa, in brevioribus & capiti propioribus plumis albidâ in longioribus & remotioribus flavæ, cui tandem subest alia nigra : aliarum summi apices rubent, succedentibus ordine quos diximus coloribus : fundi omnium cinerei sunt.

Pennæ alarum remiges numero viginti quinque, quarum exteriores fuscæ, interiores ex fusco cinereæ : verum tertiæ & sequentium usque ad decimam quintam margines exteriores superius ex albo rufescunt. Cauda quatuor digitos longa ; mediis duabus pennis cinereis, quinque hinc inde exterioribus superiore medietate ruffis, inferiore cinereis.

Ingluvies ampla, ventriculus musculosus, in quo erucas & limaces invenimus.

Fœminæ dorsum non usque adeo cinereum est, quin potius ad ruffum vergit mediis plumarum partibus nigris. Linea supra oculos excurrens nonnihil ruffa, maxillæ dorso concolores. Cætera non multum differt, hæc species Angliæ nostræ ignota & peregrina est : ajunt tamen eam in insulis Jersey & Guernsey Regi nostro subiectis inveniri, ingenii est mantionis quam cinerea, & facile circuratur.

Avem hanc limacibus vesci Aristoteles tradit & experientia nostra confirmat, nec limacibus tantum sed erucis, granis, frumentorumque seminibus : perdices (ut in genere de iis dicamus) aves salacissime habitæ sunt ; ob masculam venerem, nefariosque & naturales coitus infames, plurima de eis à veteribus fabulosa traduntur, ut v. g. quod mascula

1. Caro. 2. Medulla. 3. Sanguis. 4. Jecur. 5. Fel. 6. Penna.

1. Caro comesta semen atque lac auget, Venerem excitat.

2. Medulla ut & Cerebrum propinatum, ceteros juvare dicitur.

3. Fel, ad affectus oculorum præfertur aliis.

4. Sanguis, oculis cruore suffusus & recentibus eorum vulneribus illinitur.

5. Jecur, siccatum ad ignem & pulverisatum, morbo regio resistit, singularisque fertur antidorus contra febrem, si aliquoties in aqua millefolii assumatur. Crato.

6. Penna, inserviunt suffocationi uterinæ (suffitus naribus admotus) doloribus colicis, aliisque mitigandis, discutiendis, fomentationis formula adhibita, & hinc cum mentha ac abrotano in formâ sacculi infantibus familiare remedium existunt, ad tormina ventris compescenda. Schroderus.

Hujus Fel quotidie temporibus inunctum juvat & promover memoriae usum. Hofmannus.

PERFOLIATA.

Perfoliata L. Bauhini judicio tam Dioscoridi, quam aliis veteribus indicta est. *Perfoliatum* recentiores ex eo appellant, quod caulis ejus singula folia pertranseat, penetret atque dissecet, Διαφύλλον græce dicitur Schvvenckfeldio, quod nomen an aliquis ante ipsum legerit nos latet J. B.

Vires. Inter eas numeratur quibus solidandi ac ferruminandi vis est, datur decoctum herbæ ex vino paratum, aut folia in pulverem trita internis affectionibus, ruptis & ex alto delapsis, ad ramicis intestinorum, præsertim puerorum (imprimis autem umbilici. Schrod) commendatur, sive intrinsecus sumpta, sive extrinsecus cum farina & vino recens tusa & imposita, strumas etiam hoc modo adhibita resolvit, ad fracturas etiam hernias & erysipelata magni usus esse perhibet Schvvenckfeldius.

Exompalon seu umbilici prominentiam usu seq. remedii solide consolidavi (inquit Simon Paullus) ℞. herbæ perfoliatæ cum toto ꝓ. i. Auriculæ muris, herniariæ, plantaginis, musci, Acaciæ nostratis an. ꝓ ss. quæ in sufficienti quantitate vini rubri l. a. costâ loco affecto applicabatur, ex excerptis D. Hulse. Rajus.

PERFORATA, vid. *Hypericum*.

PERIAMMATA, vid. *Amuleta*.

PERIANTHIUM, vid. *Calyx*.

PERICLYMENUM, vid. *Matriflyva*.

PERLÆ, vid. *Margarita*.

PERSICA, vid. *Malus Persica*.

PERSICARIA.

Persicaria Latinis à foliorum forma haud dubiè dicta est, quod folia persicæ mali foliorum æmula obtinet: Hydropiper Græcis à loco & sapore: in aquis enim aut circa aquas oritur, estque valdè calidum & acre instar piperis: quamvis non omnis persicaria acris sit, imò pleræque mites.

Persicaria flosculis tetraphyllis in spicis summos caules terminantibus à reliquis hujus familiæ

z z 2 di

ova, ne foeminae illorum incubatur detentæ ad coitum non sint paratæ, frangant, eamque ob causam foeminae quantum possunt clanculum pariant, quod mares cum femellæ defunt, nempe quando ad incubandum sese subduxerint, inter se non vocibus tantum & pugna procacitatem testentur, sed promiscuè se coitu illo nefario, hominibusque cum internecionis poena interdicto, conspurcent, quæ Plinius scitè admodum & eleganter paucis complexus est, illæ (i. e. foeminae) quidem & maritos suos fallunt, quoniam intemperantiâ libidinis frangunt earum ova, ne incubando detineantur, tunc inter se dimicant mares desiderio foeminarum: viduum ajunt venerem pati.

Quod duo ovorum conceptacula faciant, in quorum altero foemina, altero mas incubat; utraque autem sua excludat & educat; quod foeminae absque maris coitu; si adversæ tantum maribus steterint, ventusque inde afflet, concipiunt ova etiam fecunda; cujus rei rationem, antequam de facto constaret, recentiores quidam ineptè reddere conati sunt: quod foeminae libidinis intemperantiâ, ne incubantes quidem, contra aliarum avium morem, & coitu sibi temperare queant, hæc etiam Plinius breviter & ingeniosè suo more ita edisserit, neque in ullo animali per opus libidinis: si contra mares steterint foeminae, aurâ ab his flante prægnantes fiunt. Hiantes autem exercitâ lingua per id tempus æstuant, concipiuntque supervolantium afflatu, sæpe voce tantum auditâ masculi, adeoque vincit libido etiam fœtus charitatem; ut illa furtim & in occulto incubans, eum sensit foeminam aucupis accedentem ad marem recanat, revocetque & ultro se præbeat libidini, quod mas in pugna devictus nunquam in conspectum amatæ seu conjugis audeat venire: quod perdix ovis suis corruptis aut perditis aliena furetur, iisque incubet & pullos exclusos foveat, qui tamen ubi adoleverint, materna voce commoniti ad eam advolant, alieno parente relicto; quod sæpe se resupinet & glebis aut festucis integat, adeoque aucupes eludat & evadat, his refutandis non opus est, ut immoremur.

Cæterum aves hæ in Principum epulis, inquit Aldrovand. principem locum obtinent, sine quibus ignobiles habentur, vulgares & nullius estimationis: Galli certe perdicum carnes tanti faciunt, ut si hæ defuerint instructissimas etiam mentas & laudatissimos conviviorum apparatus nihili ducant: cumque, inquit Bellogius, perdicis caro delicata admodum sit, pelatoque gratissima, ita pariter maximopere laudatur, quod multum nutriat, facilique admodum negotio digeretur, atque optimum in corpore sanguinem generet: majoris generis caro solidior & durior est, non tamen dura; minoris tenerior, proinde & tenuioris alimenti & resolubilis dissilabilisque citius, simul & coctionis facilioris, cæterum non æque candida ac majoris: qui circa gulam exercitati sunt homines ii potissimum alas in perdicibus prædicant; nam coxæ seu cruscula non æque laudabiles sunt, hinc rhythmus ille Anglicus.

If the partridge had the Woodcocks thigh.
Tmould be the best bird that ever did fly.

Plura de qualitate & temperamento carnis perdicæ qui desiderat Aldrovandum adeat. *Willughbejus*.

distinguitur, speciatim à bistorta radicibus non intortis: forma quoque seminis à reliquis non parum differt, quod non adeò concinnè & exacte triquetrum est; uno latere reliquis duobus fere pari, adeo ut Angulus iis contentus valdè obtusus sit, reliqui duo acuti.

Hujus quinque species nobis cognitæ sunt, nimirum.

1. Persicaria vulgaris acris sive Hydropiper I. B.
2. Vulgaris mitis seu maculosa
3. Pusilla repens Ger. emac.
4. Frutescens maculosa Virginiana Park.
5. Salicis folio, potamogiton angustifolium dicta.

PERSICARIA VULGARIS.

Nomina. Persicaria vulgaris acris sive Hydropiper I. B. vulgaris acris sive minor Park. p. urens, sive hydropiper C. B. Hydropiper Ger.

Radice parva, lignosa, alba, simplici, pluribus fibris capillata alimentum attrahit. Caules plures pedales aut cubitales, solidi, teretes, glabri, pluribus geniculis nodosis intercepti, in apicis rubentes, aliàs luteo virides, ramosi, folia ad genicula singularia, membraneis appendicibus caulem amplexa, pediculis brevibus insident, pallide viridia, non maculosa, glabra, per margines aequalia, persicæ foliis similia, unde & nomen impositum in summis caulibus & ramulis flores in spicas digesti longas, laxas & strigosas, perexigui, è quibus alii inutiles sunt, nullo succedente semine, & in quatuor petala panduntur, alii perpetuo connivent, & semina singula majuscula triquetra, splendentia, & per maturitatem nigricantia, continent, ipsi exterius rubent, sapor plantæ acris & mordax: annua est.

Ad rivulos, fossasque, & in aquosis nascitur.

Ajunt folia huic interdum maculosa esse: quod tamen nobis nondum observatum.

Vires. Facultatem habet evidenter calidam & siccam, usus præcip. extrinsecus, in vulneribus, tumoribus induratis, ulceribus inveteratis &c. *Schrod.* aqua hujus stillatitia efficax est ad minuendum calculum etiam vesicæ, experimento cujusdam nobilis nostratis, qui quotannis in usum pauperum magnam ejus quantitatem destillare solebat. D. *Boyl.* de utilitate philosoph. nat. part. 2. pag. 65.

& Piper aquaticum, indatur de eo in dentis cavum hoc remedio sanavit mulierem I. Heurnius.

Expellendis muscis vix quicquam efficacius reperias: nam quæcunque in pecoribus vulnera vel ulcera succo persicariæ oblita fuerint, ea ab injuriis muscarum tuta manent, etiam ferventissima æstate. *Trag.*

PERSICARIA MACULOSA.

Nomina. Persicaria maculosa Ger. mitis I. B. vulgaris mitis seu maculosa Park. mitis maculosa & non maculosa C. B.

Hæc ab urente persicaria differt, caulibus brevioribus & ramosioribus, intus concavis, ramulis caulem ipsum longitudine excedentibus; foliis latioribus & pro latitudine brevioribus, maculâ nigrâ majusculâ circa mediam partem notatis, obscurius etiam quam illius virentibus: florum spicis brevioribus, densioribus & habitioribus multo; flosculis confertis, colore plerumque purpureonitentibus interdum albidis.

Hujus spicis nullum apponitur folium, verum paulo intra eas flosculi aliquot pediculis earundem adnascuntur, sapor huic non acris, sed adstringens & acerbus.

Ad rivulos, inque aquosis & humidioribus arvis & hortis abundè provenit.

PERSICARIA SALICIS FOLIO

Nomina. Persicaria salicis folio, potamogiton angustifolium dicta, potamogiton angustifolium Ger. 2. sive salicis folio C. B. potamogiton sive Fontalis persicariæ foliis I. B. Fontalis minor longifolia Park.

Folia huic persicariæ maculosæ foliis similia sed majora, venis obliquis & transversis in marginem à nervo, qui unicus secundum longitudinem decurrit, exporrectis; alioquin etiam non ita sunt obtusa, sed in acumen desinentia, & pro loci situ (extra aquas) nonnunquam hirsuta, aquis plurimum innatantia, pediculo fescunciali aut sextantali ex caulium geniculis orto: inter quæ palmo sæpe brevior pediculus exit, in spicam congestos flosculos persicariæ gerens ex albo rubentes, gustu est subacido.

In paludibus, lacubus, stagnis, nec non in rivulis & aquis fluentibus ubique frequens reperitur, cum extra aquas crescit, (quod non raro fit, vel aquis exsiccatis eum deferentibus vel ipsius radicibus in fossarum aggeres ejectis) folia obtinet hirsuta, aspera, & persicariæ in modum maculosa, unde tunc à nonnullis pro nova persicariæ specie à potamogitone angustifolio diversa habita est: quin in eadem individuâ (ut loqui amant) plantâ folia nonnulla, nimirum extra aquas nascentia, observavimus aspera & hirsuta, alia, aquis scilicet innatantia, lævia & lucida.

Hæc ergo planta persicaria acida peculiari Cat. Altdorf. nobis videtur, persicaria hirsuta radice perenni Cat. Lugd. Bat. persicaria longifolia & angustis foliis seu fol. salicinis D. Metzeret, quam pro specie à potamogitone angustifolio distincta errorem habuerunt, quamvis etiam eam persicariis annumerant, nos etiam, (nec pudet fateri) in eodem errore aliquandiu hæsimus, nimirum hanc persicariæ speciem fuisse à potamogitone angustifolio dicto diversam.

PERSICARIA SILIQUOSA.

Nomina. Persicaria siliquosa Ger. Noli me tangere I. B. Mercurialis sylvestris, noli me tangere dicta, sive persicaria siliquosa Park. Balsamina lutea, sive noli me tangere C. B.

Col. J. B.

Summo cæspite radices agit fibrosas, à quibus caulis surrigitur cubitalis, tenerior, dilutissime virens, etsi in imo purpurascit, lævis, inanis, translucentus, copiosum succum insipidum pressa remittens, per intervalla geniculis ad quæ toporum podagricorum æmula sunt tubera, interceptus folia alternatim posita, mercuriali hortensii similia, majore parum, latiora, & circa petiosum longioribus acutioribus dentibus serrata, magisque lunata, basi latiore: ex singulis foliorum alis petioli exeunt longi, tenues, in terram inclinati tribus vel quatuor ramis divisi, ex quibus flores, cum parvi & inexplicati virides, & balsaminæ floribus similiores dependent, per dorsum binis foliolis viridibus colligati, maximam monstrum magno hians ore repræsentantes, parvo corpore, & cauda tenui, brevi, recurva, & acuta, bu-

bubulino cornu simili, ad fumarizæ bulbosæ flores accedentes, quadruplo majores & magis sanguineis guttis respersi cavi, inanes, hiantes, divisuris live barbulis sex distincti, sed inferioribus longioribus I. Bauhino nasturtii Indici floribus affimiles, minores, ex flavo rubentes, punctulis rubris saturationibus guttati, in quorum medio exalbida stamina; his succedunt siliquæ duas uncias longæ, tenues, nodosæ, ex albo virentes, lineis virentibus striatæ, in terram nutantes, quæ cum perfici incipiunt, disrumpuntur, etiam ante maturitatem, vel vento impulsæ, vel manu tactæ, & semina ejaculantur etiam imperfecta, quæ oblonga, compressa virentia primum, deinde cinereo & fusco colore evadunt. Autumnus initio floret & illius fine perficitur: annua est planta.

Umbrosis, humentibus, uliginosis locis oritur: in Anglia varius occurrit, ad ripas lacus Urinander mere dicti propè Ambleside oppidulum in Westmorlandia observavimus, in transmarinis sylvis & umbrosis udis ad latera montium secus Rhenum in Germania sæpius invenimus.

Vires. Miram hujus herbæ vim in cienda urina pluribus experimentis confirmat Gesnerus: aqua destillata in hac parte adeo efficax est, ut si copiosius bibatur diabetem inducat: hanc Uratislaviæ in calculo renum mirifice prædicant: nonnulli herbam hanc per vomitum & secessum purgare ajunt. Cui imposita eam *Phlores*, facultate fertur perniciosa; ac inter deleteria habenda. *Dod. Rajus.*

PERSONATA, vid. *Bardana.*

PERVINCA, vid. *Vinca Pervinca.*

PES CATI, vid. *Gnaphalium.*

PES COLUMBINUS, vid. *Geranium.*

PES CORVINUS, vid. *Ranunculus.*

PES LECTI, vid. *Clynopodium.*

PES LEONIS, vid. *Alc huilla.*

PES LEPORIS, vid. *Lagopus.*

PES LUPI, vid. *Muscus Terrestris Repens.*

PES VITULI, vid. *Arum.*

P E S S A R I U M.

Pessarium est remedium formâ solidum, oblongum & rotundum, ad figuram & molem digiti compositum, quod in vulvam muliebrem immittitur.

Componitur ex variis remediis secundum diversas intentiones, fitque tribus modis.

Primo Vel ex gossypio in prædictam figuram concinnato; oleis vel unguentis convenientibus peruncto.

Secundo ex panno lineo aut sericeo, in quo includitur materia remedii.

Tertio ex ipsis pulveribus, cæterisque in formam solidam compactis. Debet pessario filum appendi, ut extrahi possit.

Numquam virginibus immittendum, ne frangatur virginittatis claustrum; cæteris nusquam, nisi quando maximè necessarium ob pudoris & pollutionis periculum.

Præquam immittatur, alvus subducenda est, & excludenda urina: oportet etiam ut præmissa fuerint universalia.

Ufus est

Primo ad purgandos serosos humores & pituiti.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

tosos, quando his scater uterus; & ad menses movendos.

℞. Hieræ picræ & benedictæ. laxat. ana ℥. i. pul. diacarth. & myrrhæ ana. ℥. β. Terebinth. ℥. iii. succi mercurial. q. f. Excipe cotone moscharo, & panno sericeo, cum filo pendulo fiant duo passaria.

Secundò Ad secundinas expellendas.

℞. Pul. aristoloch. dictamni, & sabinz ana. ℥. i. pul. hieræ picræ ℥. ii. castor. gr. ii. Cum melle cocto fiat pessarium.

In præfocatione ab utero à causa frigida.

℞. Ladani ℥. ii. galliæ mosch. ℥. i. macis & cinam. an. ℥. i. moschi gr. i. terebinth. q. f. Excipe bombace, & fiat pessarium.

Tertio ad exsiccandum & roborandum uterum humidiores, pro faciliiori conceptu.

℞. Ladani & benjoin. an. ℥. ii. styracis calam. & mastich. an. ℥. i. reducantur in pulverem, & cum mucilagine gummi tragacanthi extracta cum aqua flor. arantior. fiat passarium, &c.

In gracilibus, & calidis quæ fluxum menstruum largiorem patiuntur, utendum frigidis exsiccantibus, & roborantibus, ut.

℞. Mastich. rosar. rubr. & gran. kermes an. ℥. i. β. Cum mucilagine gummi tragacanth. extracta cum aqua rosar. fiat pessarium.

Pro utero calido & laxiori cervice superadde prædicto pessario, trochisc. de terra sigillata, boli armen. an. ℥. i.

Pro ulceribus uteri, colli & cervicis ad tergendum.

℞. Unguenti Apostol. ℥. i. mellis ros. q. f. Cum panno sericeo fiat pessarium.

Vel.

℞. Mellis rosati ℥. β. terebinth. ℥. β. pul. rad. ireos Florent. ℥. i. farinæ hordei ℥. i. Cum succo apii, & panno lineo raro fiat pessarium.

Quartò ad exsiccandum, & cicatricem inducendam.

℞. Tuthiæ lotæ ℥. β. cerusæ sarcocoll. lithargyr. auri an. ℥. ii. syrup. de rosis siccis q. f. Fiat pessarium.

Nascale est remedium, quod pro pessario ori vulvæ virginibus admovetur.

Fit ex medicamentis simplicibus, vel compositis, appropriatis, quæ gossypio, vel linteo excipiuntur in plumaceoli modum, & ori vulvæ pro ulceribus, aliisque ipsis affectibus admovetur. *Tencke.*

Pessi varii ex VVeickardo.

Pessus Menstrua movens.

℞. myrrh. elect. ℥. iij. aloes succotrina ℥. ii. sagapenæ ℥. i. castorei ℥. i. baccarum lauri, nigell. rad. dictamn. gentian. aa ℥. β.

Trita in pollinem levissimum cum elect. bened. laxat. q. f. addendo parum succi rutæ excipiantur, fingaturque pessus ad formam digiti majoris, qui syndone rubrâ ac rarâ obductus, filoque duplici appenso, vulvâ quando opus est noctu indatur.

Vel.

℞. myrrh. rubr. ℥. i. β. specier. hieræ picræ compos. bened. laxat. aa ℥. i. Cum melle ad spissitudinem cocto f. Pessarium. Obducatur panno raro, addito pauco bombace, ac noctu subiiciatur.

Alius Pituitam educens.

℞. Specier. bened. laxat. ℥. iij. agarici trochiscati ℥. i. mell. ad spissitudinem cocti ℥. β. succi mercurial. vel abrotani q. f. cui parum tragacanthi infusum ut in uoitatem crassiore coeant, formetur pessarium ad formam suppositorii, quod panno raro involutum cum filo alligato utero immittatur.

Z z 3

Idem

Idem præstat radix rhapontici, vel gentianæ viridis, si à sordibus bene purgata eodem modò in mulieris pudendum ponatur. Efficax quoque est radix betæ simili ratione usurpata.

Pessus emolliens.

℥. Pingued. anser. & gallin. āā ℥j. medull. cervin. ℥ss. butyri non saliti ℥ii. flor. melilot. ℥iv. malva ℥ss. mastiches ℥ii. sem. lini & malva āā ℥j. fenugr. ℥ss. vitell. ovi n. i. unguenti rosat. q. s.

F. l. a. pessus & syndone rubr. contegatur adjectò filò duplici. Si mulier sit adulta & sæpius peperit, ex prædictâ massâ f. unum pessarium; si verò sit juvenula duo conficienda & alternatim intrudenda: Virginibus autem ejusmodi localia, uti & clysteres uterini, non adhibenda, quia virginittatis claustrum lædunt.

Alius Menſes & lochia retenta provocans.

℥. Sabina ℥j. arthem. dictamn. āā ℥ss. ruta vid. p. j. myrrh. rubr. ℥j. baccar. laur. ℥ss. nigell. ℥j. castor. ℥j.

Conquassata misceantur cum electuar. hier. pier. q. s. addendo olei cheyrini parum: fiatque pessus justæ magnitudinis, & syndone munitus adjectò filò geminò applicetur.

Vel.

℥. Folior. merc. virid. nepet. abrotani āā part. equ. Conquassata in mortariò excipiantur pannò linèò raro, si tunc pessarium quod naturalibus imponatur vesperti & dum tempus somni appropinquat, & sex aut septem horis in uterò relinquatur, ac subinde extrahatur, quod & de reliquis pessis præsertim calidioribus intelligendum, quia faciliè uterus hæc inflammatur.

Alius adstringens, ne læsa virginittas animadvertatur.

℥. Gallar. ℥ij. balauſtior. ℥j. rosar. siccar. & acacia āā ℥j. cornu cervi uſti, thuris, sangu. dracon. āā ℥ss. alumin. crudi ℥ss.

Hæc minutim contusis cum olèò cydonior. f. massa, ex quæ formentur tria pessaria quæ lanâ involuta & sindone obducta ut moris est pudendo muliebri indantur, quorum primus si in formâ magnâ, secundus in formâ mediocri, tertius in formâ minimâ, & hæc ratione ita constringitur pudendum ne fraus etiam exercitâtissimo innotescat.

Pessus menses sistens.

℥. Cornu cervi uſti & ppt. ℥ij. sangu. dracon. ℥ss. acat. a. hypoc. ſtid. gland. quern. exſiccat. balauſt. rosar. rubr. rad. torment. āā ℥j.

Talis & cribratis omnibus pulvis ponatur in sacculò oblongò confectò ex pannò sericò rubr. raro, fiatque pessus cum filò duplici ad justam crassitudinem, qui antequam naturalibus intrudatur madefiat in aq. plantag. tepidâ in quâ parum aluminis sit dissolutum.

Vel excipiantur succò plantag. aut prunor. syvestr. & linetolis deligata ſingantur pessi qui genitalibus admoveantur.

Huc & pertinent glomera filorum cerâ albâ vel flavâ obducta, filòque alligatâ; quæ miris modis ad uterî præcipationem faciunt, si noctu diuque gestentur. Annuli etiam ex ebore confecti habentur peculiare, qui licet matrîci subſciantur coitum tamen atque conceptionem non impediunt, qui tamen globuli atque annuli pro amplitudine cervicis uterî formandi, aliâs si justò minores suâ sponte faciliè exeidunt, nec uterum in suò locò retinent.

Hæc de Pessis WEICKARDUS, quibus nos addimus circa eos qui pro uterî prolapsu præpediendo concinantur, commodè ex suberis cortice ad justam magnitudinem ac formam effingi posse, ac cerâ albâ quàm exquisitè vestiri; advertendo semper ut per medium sint tubulati quò scilicet partis evacuationes naturales non cohibeant.

Pessus pro hæmorrhagia uterî sistenda ex Anthonii DE SGOBBIS Theatrò Pharm. Italice conscripò.

℥. Stercoris asinini desiccati & pulver. q. v. involvatur pannò serico raro eoque pessus conficiatur.

Pessus pro hæmorrhagia uterî provocandâ ex eodem.

℥. Succo expressi radic. ciclamini ℥ij. castor. opi. moschi āā gr. ij. trochi. cor. de myrrhâ ℥ij. cum pannò serico conficiatur pessus.

Pessus ad cienda menstrua ex Zvvelferò.

℥. Myrrh. rubr. pulver. & gumm. ammoniaci āā ℥ss. solvantur in q. s. vini alb. ad pulticem, cui add. camph. ℥ss. pulveris rad. hellebori nigri, pyrethi, galangæ, herb. major. sem. caparum. urticae āā ℥j. F. l. a. massa, è qua formentur pessi, zendalò rubrò obducendi.

Vel.

℥. Pulver. hellebori nigri, calam. arom. galang. āā ℥j. pyrethi ℥j. herb. major. ℥j. cantharidum ℥j. camphor. ℥j. f. ex omnibus pulvis, ex quò cum zendalò rubrò fiant pessaria competentis magnitudinis.

Solvunt menstrua mulierum obstructa, extrahendo è matrîce humores ac semen corruptum, & quicquid vapores sursum elevare potest.

Nota. Helleborus niger apud Salam, mirabili præ aliis vegetabilibus trahendi virtute pollet, ad eo ut si linteolò, vel sacculò acuminatò, pessi instar, ejus pulvis imponatur, propendente ad retractionem filò, & locis muliebribus intrudatur, primo quidem miram faciat artuum veluti contrakturam, paulò post verò retentum menstruum, aliasque uterî impuritates, cum alleviatione & conferentiâ præstat.

Pessi varii ex Hadriani à MYNSICHT Armamentario Medico-Chymicò.


Pessus Aperiens contra Menſes suppressos.

℥. Rad. Artemisia rub. Dictam. alb. asari, hellebori alb. rubi tinct. ana ℥j. scammonij, majoranae sabina, croci orient. ana ℥j. b. c. lauri excort. myrrhæ rub. castorei veri, sagapeni, aloes hepat. ana ℥j. sem. staphid. agria, nigelle, nasturtii, ruta ana ℥ss.

Hæc omnia in corporentur cum succo Artemisia rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medi digiti, crassitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam, ad extrahendum; aut pulvis ponatur in sacculo, confectò ex panno raro, addito pauco bombace; fiat ad crassitudinem digiti majoris, indaturque.

Pessus Adstringens contra Uteri hæmorrhagiam.

℥. Farin. volat. molend. ℥. s. rad. tormentilla, biſtorta ana ℥j. ciner. ranarum, croci martis, Gallarum Turc.



*Turc. sang. dracon. boli armeni, corn. cervi usti ana .
hypocistidis, rosarum rub. balanstiarum, acania, olibani
mastichis ana 3℔.*

Misc. & cum succo plantaginis & albumine
ovorum f. l. a. Pessii, qui in mulieris pudendum in-
ferantur.

Pessius contra Suffocationem & præcipitatio-
nem uteri.

℥℥. Rad. Ireos florent. rosarum rub. ana 3iij. sty-
racis cal. benzoin. ana 3i℔. caryophyllorum, spica indi-
ca, gallia moschat. ana ℔i.

Misc. & fiat l. a. Pessius ad formam suppositorii, qui
suo obligatus, noctu subijciatur.

Si Mulier propter Pinguedinem vel humidita-
tem est sterilis, valet sequens pessus.

℥℥. Sem. lolii, quod in frumento vel siligine re-
periri solet, 3℔. coag. leporis, aluminis usti, castorei
styrac. liquid. ana 3iij. myrrha rub. opopanax,
galbani, piperis rot. ana drach. j. moschi & ambra
ana 3℔.

Optimè simul incorporentur & f. pessii, horumque
unum mulier teneat in Vulva à meridie usque ad
vesperam.

ANNOTATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vul-
va, statim submittatur licinium cum ol. Violarum,
quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyl-
li, ne fiat exulceratio.

2. Si sunt fortes, non retineat eos ultra horam, de-
biliore verò, per integram noctem.

3. Pessi communiter post Balneum sunt immitten-
di, quemadmodum licinia per lanam involuta, &
succis madefacta.

PESTIFUGA MEDICAMENTA.

Nimii sane foremus si quæcunque demùm ex-
quisitiora medicamenta à Doctissimis viris hac in
parte excogitata & cum fructu adhibita hic ex-
scriberemus. Satiùs itaque putamus lectorem ad
ipsos fontes remittere, illique Angeli Salæ, Atha-
nassi Kircheri, Isbrandi de Diemerbroech, Tho-
mæ Sydenhæm. &c; tractatus experientiâ multa re-
ferros indicare.

PETASITES.

Vid. Tab. XVIII.

Petasites à foliorum amplitudine & forma petasum
seu galerum referente dicitur.

Nota ejus diagnostica sunt flores folia anreverten-
tes, in eodem caule plures in thyrsum dispositi, nudi,
brevi unâ cum caulibus exarcescentes : folia subro-
tunda Bechli, sed majora.

Nomina. Petasites *Ger.* vulgaris *Park.* major &
vulgaris *C. B.* vulgaris rubens rotundiori folio
C. Bauhin.

I. B.

Gaules primò omnium erumpunt dodranta-
les plus minus, concavi, lanuginosi ; foliis an-
gustis acuminatis vestiti, qui in thyrsum fastigian-
tur florum purpurascensium, nudorum in pappos
tandem evanescentium, quorum delapsui succe-
dunt, evanescente, caule, folia amplissima, Tus-
silaginis figurâ, sed duplo triplove majora, ad pe-
diculum falcata, rotunda ferè & in ambitu dun-
taxat serrata, non angulosa, ut petasitidis albæ,
inferne lanugine incanâ pubescentia, supernè ob-
scure virentia, nec penitus tomenti expertia : ra-

dix crassa amarescit, & reptando se propagat.

In humidis propè fluviorum ripas, juxta lacuum
ac stagnorum margines ac vicinos aggeres libenter
nec raro provenit, ut recte Dodonæus.

Circa calendas Aprilis spica cum floribus vi-
get, sequuntur deinde folia in hyemem usque
permansura, novis subinde subnascensibus. J. B.
in calidioribus regionibus, atque etiam frigidiori-
bus vere blando, & temperato martio mense aut fe-
bruario exit.

Vires. Radix insignitè amara est, sed non pe-
rinde acris. Germanico vulgo pestilentialis radix
dicitur, quia experientia comprobatum est mirifi-
cè eam conducere pestilentialibus febribus, radi-
ces cortice exutas aceto indunt quoad viribus im-
butum fuerit, exque illo cum rutæ succo & The-
riacâ propinant : commendatur etiam in liporhy-
mia uterina, spiritus difficultate, tussi, asthmate,
facit & ad latos ventris lumbricos : urinam etiam &
menses ciet, extrinsecus ad bubones & ulcera mali-
gna prodesse dicitur.

Est locus (inquit C. Hofmannus) non procul op-
pido ex adverso monasterii Gnadenbergici ultra ni-
grum flumen, ubi folia excreverunt in humanam alti-
tudinem, ut quasi inter arbores ambules. *Rajus.*

PETROLOEUM, vid. sub titulo Naphta.

PETROSELINUM.

Nomina. Apium hortense *Ger.* hortense seu petro-
selinum vulgò *C. B.* hortense multis, quod vulgo pe-
troselinum, palato gratum *L. B.* petroselinum vul-
gare *Park.*

Radice albam, simplicem, crassitudine interdum
pollicari, paucis fibris donatam, altè in terram de-
mittit : caules plerumque singulares in solo latiore
plures surrigit, pollicem itidem crassos, teretes, gla-
bros, striatos, bicubitales & altiores geniculatos,
inanes, ab imo statim ramosos, ramulis inferioribus
singulatim è foliorum alis exeuntibus, superioribus
binis oppositis aut etiam pluribus simul ex eodem ge-
niculo, folia ima quæ è radice exeunt longis pedicu-
lis, binis plerumque alarum paribus & impari in ex-
tremo folio composita : folium autem quod costam ter-
minat in tria dividitur, eaque singula in tres lacinias
& ipsas dentatas acutioribus denticulis, in summis
caulibus & ramulis florum umbellæ plurimis radiis
compositæ, pediculis longis insidentes flosculi ipsi
pallidi, quinque petalis ob parvitatem vix conspicuus
constantes quibus succedit semen striatum, breve,
crassiusculum.

Folia in hac planta interdum in lacinias angustas
& longas dividuntur, ut quis meritiò diversam spe-
ciem putet : certè insignis est varietas, sapor plantæ
acriusculus & non ingratus : odor pariter.

Nulla in hac specie neque umbellæ totalis basin
seu radiorum exortum foliola in circulum ambiunt,
neque partialium ex quibus totalis componitur, ad
eam tamen apponitur unum vel alterum folio-
lum.

Folia hujus plantæ interdum rotundiora, fræ-
quentiora, pulchrè crenata & crispa videntur
pulcherrimo aspectu, quæstio est an petroseli-
num crispum sit species à vulgari diversa, an
accidentalis duntaxat varietas, Columna crispum in
Sardania spontè nasci ait, unde semen ejus in alias
regiones dispersum.

Vires. Radix & herba potissimum ad culinas spe-
ctant, utilesq; sunt in omni cibo : nam inflationes stom-
achi deprimunt, urinam & menses ciet ; jecur & lie-

nem ab obstructione liberant, hydropicis & ictericis conducunt: solent nostrates herbam cum omne genus carne in saragine unâ frigere pro condimento; & in cavum corporis inditum cum avibus affare, quin & crudum cum butyro comedere, & acetariis immiscere, & certe quod ad saporem attinet, nullum olus novi palato gratius & delicatius: ajunt tamen oculis esse inimicum & visui nocere; quod nos inviti credimus.

Semina medico usui utiliora extenuant, aperiunt, urinas cient, calculos dissolvunt flatu discutiunt, conveniunt hydropicis, menses promovent, secundas & foetus mortuos expellunt: commendantur & contra veterem tussim eclegmatis permixta aut incocta: venenis etiam adversantur, atque idcirco theriacis admiscuntur. Dod.

Extrinsicus herbæ omnes partes resolvunt tumores calidos, imminuunt lac mammis impositæ, adeoque mulierculis nostratibus in usum sunt in ablatione infantium. Schrod. *Rajus*.

PETROSELINUM MACEDONICUM

Petroselinum Macedonicum, seu *Apium Macedonicum*, planta est petroselino vulgari non multum absimilis, in Macedonia familiaris, cujus semen inde ad nos defertur; est autem illud semine Petroselini vulgaris tenuius, oblongius, ex altero extremo acutius, & saporis magis aromatici. Seligatur recens, bene nutritum, mundum, coloris subobscuri, odoris & saporis grati, ac vere aromatici. Multum continet olei ætherei ac salis volatilis; compositionem theriacæ ingreditur. Aperitivum est, urinas & menstruas mulierum purgationes ciat, veneno resistit ac flatu discutit.

Петум, vid. *Tabacum*.

PEUCEDANUM.

Πευκέδανον ἀπὸ τῆς πύκης, id est, *pino* nomén accepit, quod pino folium simile habeat: quæ de causâ ab Apuleio pinastellum, id est parva pinus vocatur; alii nomen invenisse putant à fatore: amorem enim & fatorem πευκέδαον, vox apud Poëtas significat. Homerus Il. x. πολέμοιο μέγα σῶμα πύκεδαυος, πευκέδαον. Scholiastes exponit πικρὴ, ὀλεθρὴ Helych. πευκέδαον ἐχέπευκὲς πικρὸν Io. Bodio in Theophr. hist. p. 1086.

Peucedani notæ sunt folia tenuiter deffecta lacinis tamen latioribus quam Anethi, tripartito divisa & subdivisa.

A coma quæ supra radicem cernitur *Baarstrang* dicta est, (Germanis) hæc herba, qua appellatione pilorum rectis significatur: à foliis & facultatibus id est tamiculum porcinum vel suarium: à croceo illò succo, seu à sulphureo radicis odore sulphur mort vocant. J. B.

Peucedani radicem herbamve vi purgandi donatam fuisse veteres prodidere, sed propter foetorem utriusque minus in usum deducta.

Expectorat mucilaginem tartaream, bilemque educit: usus præcip. in affectibus pectoris, tussi, inflationibus, in obstructione hepatis, lienis, renum, ciat urinam & calculosis prodesse creditur, extrinsecus in hemicrania aliisque generibus renitentibus, ulceribus inveteratis mundificandis, &c. Schrod. Veteres affectibus omnibus circa nervos consistentibus, ut lethargo, phrenesi, epilepsiâ, vertigini, paralyti convenire ajunt.

Gelatina sive conserva radicum pectorale insigne est & hystericum. *Rajus*.

PHANIEMUS, vid. *Sinapismus*,

PHALANGIUM

Phalangium sic dictum est Galeno 8. de simpl. facult. quod demorsis à phalangiis (Aranei genere) auxiliatur, cui ut & Plinio lib. 27. cap. 12. phalangites.

Ab A(phodelo) radicibus fibrosis differt.

Hujus plures sunt species, nos hic de solo veterum Phalangio verè usuali, cujus

Nomina. Phalangium flore lilii I. B. Allobrogicum *Park.* Allobrogicum majus *Clus.* magno flore C. B. Phal. Antiquorum *Ger. emac.*

Clus. Quina vel sena producebat (Clusio) folia, carinata, satis firma, surrecta, viridia, summa parte mucronata, inferna se se invicem amplectentia instar aliorum phalangiorum: inter quæ prodibat caulis pedalis aut amplior, viridis, teres, firmus, summo fastigio inter singulares appendices denos aut plures gestans flores, prorsus niveos, majores quàm in majore phalangio vulgari, in anteriorem partem propendentes, (ternis interioribus petalis paulò latioribus & crispis, exterioribus vero viridi mucrone præditis) florum parvi lilii formam quodammodo referentes, odoratos, è quorum umbilico tena gracilia prodibant stamina unciam longa, terna tamen aliis paulò longiora, extrema parte curva, & flavis apicibus donata, oblongiore gracili in medio stylo, ut commodius mea opinione comparari possent non videantur quam parvo lilio albo: floribus succedebant trigona capitula, fuscum semen & inæquale continentia: radix in multas, crassas, candidas & longas fibras, aliorum phalangiorum radicibus non dissimiles dividebatur, & adnatis se propagabat.

In Alpibus Allobrogicis prope maximum Carthusianorum cenobium spontè oritur. J. Bauhinus reperit florentem Junio in pratis montis Septimi Burmi Rhætorum prope Kasest: atque etiam, Genevæ cum esset, in monte Thoiri. *Rajus*.

Liliastrum quibusdam dicitur hæc planta, cujus præter virtutes in Phalangiorum moribus à veteribus enarratas, habemus quod radix sit attenuans, & incidens, flatuum discussiva ac urinas ciat, quodque flos sit emolliens & resolutivus.

PHALARIS.

Spica è squamis compactili, culmo tenui, granis lucidis à reliquis frumentis spicatis differt.

Phalaridis nomen accepit ἀπὸ τῆς φαλῆας, quod semen splendidum candidumque reddat; spicam spuma alba obductam esse non semel observavi. Bod. à Stapel. in Theophr. hist. lib. octavo Cap. tertio.

Nomina. Phalaris I. B. Ger. vulgaris *Park.* major semine albo C. B. gramen Canariense, quia ex insulis Canariensibus delatum est, & passeribus canariensibus alendis inservit.

J. B.

Culmo adolescit sesquicubitali, Hordeaceo (C. B. Zeæ non dissimili, graciliore tamen) quatuor aut quinque geniculis nodoso: foliis hordeaceis (parva Arundini aut tritico similibus C. B.) radice habitare (parva, multifida & fibrata C. B.) unicuique culmo (qui ex una radice plures pronascuntur) spicæ singulari insident, sesquiunciam aut unciam longæ, tribinata, foliaceis glumis striatis squamarum scandalarum ritu compactiles, è quarum sinu tremula flosculorum pallidorum filamenta promuntur, iidem.

iisdemque postea loculis semen reconditur lubrico nitore milii, candidum, forma lini, sed magnitudinæ suppar. Spontè oritur non in canariis tantum insulis, fortunatis olim dictis, sed & in Hættia, autore Anguillara, inter segetes, & in Hispania, & in Gallia Narbonensi circa Monspe-
lium.

Vires. Phalaridis semen, & herbæ succum, & folia pota ad vesicæ dolores & cruciatus com-
mendant veteres.

Alimento esse & nonnullos panes ex eo pinsen-
dos curare, esitareque ad calculum farctusque vesti-
cæ perhibet Lobelius. *Rajus.*

PHARMACIA.

Saluberrimum Medicinæ promptuariura est
PHARMACIA, ad quodvis morborum genus arma
ministrans. Hæc, authore *Pergameno Introd. cap. 8.*
nudis medicamentis interiores affectus & exterior-
es sanat; adeoque *ἰατρικὴ* seu medicinæ *καὶ*
ἰσχυρὴ dicta, curatoria scilicet, pars est præci-
pua.

ἰατρικὴ hujus materiale constituit materia
medica; formale intrinsecum, *methodus medendi*;
extrinsecum absolute tale, medicamentorum præ-
paratio, respectivè tale eorundem compositio, quæ ipsa
est uno nomine vocata Pharmacia, singula illa com-
plectens suo ambitu.

Pharmaciam diximus Potius, quam Pharmaceu-
ticam, tum veterum, ut *Galenī loc. cit.* autorita-
te, tum recentiorum. Ita quoque in concreto qua-
si aptius vocatur, quam Pharmaceutica ars. Non
enim tam occupatur circa *ἰατρικὴν* ipsam, sed *ἰατρικῶν*
modum & rationem scientificam. Sic phar-
maciam scripsit *Fernelius*, quæ censum saltem me-
dicamentorum continet, qualia etiam tradunt *lumi-
nare majus & minus, antidotaria, dispensatoria, phar-
macopœa, armamentaria* & quæ vocabula unicui-
que arident alia. Sic Pharmaciam moderno sæculo
applicandam scripsit *Lodovici noster p. m.* cum se-
lectu præparationem, dispensationem & taxationem
medicamentorum comprehendens.

Pharmaciam diximus, ut & Galenicam & Chimi-
cam præparationem unâ fideliâ absolueremus. Quid
aliud enim est Chimia, quam pharmacia selectior,
si finem ejus æstimemus? Chimia nempe non tam
specialis, quæ circa regnum solum minerale occu-
patur, ut separatione factâ metalla habeantur, un-
de metallurgia, fusoria, vel docimastica seu proba-
trix aliâ audit; non *specialissima*, quæ lapidi Philo-
sophorum, ut vocant, seu tincturæ universali, arti-
tingendi metalla reliqua in aurum, invigilat; quam
universalis, ratione objecti, quatenus singula naturæ
regna scrutatur, centra referat, & medicamina ad
usum humanum exinde quærit. Licet enim in contra-
rium potius inclinent alii, invertendo duas postre-
mas classes, nobis tamen ex rei fundamentis hoc po-
tius videtur asserendum.

In artis formam redacta nominari potest, quando
non tam processus tradere animus fuerit, quam eo-
rundem rationes; conceptum scientificum fundamen-
talem artis tradendo, omnibus quasi exhaustis essen-
tialibus requisitis.

Artis forma duplex statui potest, prima, quæ rudi-
menta tractat, ab ovo omnibus requisitis traditis,
ut quis noverit destillare aquam, spiritum, vel
processum alium, exoterica quasi, si Philosophi di-
stinctionem huc applicemus in methodo docendi;
Altera, quæ illa quidem supponit, vel secundariò
tractat, primariò verò genuinos operandi fontes &

principia, ut v.g. aquarum parandarum *ἰατρικῶν* ab-
solvatur præceptis universalibus, quod & de aliis
quibusvis valet. Non primam, sed secundam tra-
dere animus fuit, vel traditam intitulare. Atque
hæc est Pharmacia acroamatica, ut exauriamus sic
operationis cujuscunque fundamenta, & stabilia-
mus inventa, novaque subinde inveniamus, viâ ad
solidiorem cognitionem & scientiam factâ.

Ponamus, architectum dogmaticum & practicum
velle docere alios artis suæ fundamenta. Supposito
ergò, nosse jam vel nosse debere auditorem, do-
mum constare ex cellâ, basi laterali, hypocau-
sto, cameris, fenestris, arêâ, tecto, ut alia mi-
ramus, non opus est his immorari, vel saltim abunde
& prius id scire, sed his positis, quomodo regulari
formâ undique artificiosè extruenda sit, ut omnia
illa ad leges fiant, & struantur, hoc demum artis,
hoc excellentius fuerit.

Ut selectus necessarius est materiæ medicæ, quem
hactenus pro virili institimus, ut distinctione adhi-
bitâ non tam multa, quam probata contra morbo-
rum exercitum infumamus, virtute magis quam mo-
lenisi; sic meritò quoque selectus in formâ dictâ est
omniò, imò magis necessarius; neque enim cruda
vel simplicia per se benè suffecerint, sed præparata &
ad usum aptata, vel etiam inter se mixta nosse & se-
ligere oportet.

Præparatio ergò medicamentorum decet medicum,
non dedecet, saltim quoad artem, ut judicare peni-
tius de iisdem jam factis vel faciendis possit. Qualis
præparatio, talis effectus spectandus est. Quis hinc
vitio verterit medico, quod sciat, vel potius illi non
exprobaverit, quod nesciat parandi modum? Dux bel-
licus non feliciter hostem impetere & vincere hinc
valet, nisi calleat exactè, quæ arma quibus opponen-
da, quomodo apparanda, vel apparata hinc, ut ex vo-
to scopum feriant, non frustra sint. In laude habetur,
si dux belli tormenta explodere, aciem struere, una-
que manu suâ oppugnare hostem noverit; si navar-
chus ad malum sedeat, & ipse quoque, re ita ferente,
remiges adigere, vel vela contrahere, anchoram le-
vare, saltim præceptivè, noverit. Quis itaque vitio
vertat medico, nec potius in parte gloriæ ducat, quod
ipse præparare sciat medicamenta, nec cæco ductu
credete cogatur?

Atat, dica scribitur hodiè non rarò medicis, qui
præparare, & quod confectarium est, dispensare
hinc sustineant medicamenta pharmaceutica, variis
additis hanc in rem rationibus utrinque. Si antiquos
lustremus mores, non puduit medicinæ primos anti-
stites & parentes, *ἰατροὶ* hæc præstare, unde licet
hinc sensim sensimque diversa officia cœperint esse
ministrorum & doctorum, illorum vice chirurgis,
pharmacopœis & aliis fungentibus; idè tamen non
deroganda est libertas hæc ipsa. Neque id indignum
ejus munere fuerit, cum & mignates in eo gloriolam
non rarò hodiè quærant, vel saltim ipsos deceat hoc
ipsum, non dedecet. Idem quoque est necessarium,
præcipue in casibus fortuitis; imparatum offendi me-
dicum turpe est, & emendicare sæpe prius longo
tempore remedium, quando periculum in morâ est,
agro haud rarò moriente, qui servari potuisset. Imò
hodiè, licet non sine abusu, & matres familias sæpe
magis instructæ sunt desidiosius medicis. Convenien-
tissimum ergò hoc videtur, & tutius & citius omniò
est, adde & jucundius.

Sæpe sanè, qui pharmacopœi esse debent, quoad
hoc sunt repositores, ignari remediorum Chimi-
corum parandi modi. Quî verò remedium acti-
vum præscribit vel propinari possit turò alienâ
fide? Dubitandi habet occasionem & timendi, ne
anti-

antimonio diaphoretico, Zio dolci, cinnabari Zii, ut factum est hinc inde, tristibus exemplis, præscriptis, anxietas, cardialgia, hypercatharsis, mors insequatur. Exemplum de Zio diaphoretico habet *Author, in anrilogio*, aliud de mercurio dolci in actis medicis nostris extat, quod Tubingæ contigi, alibi à nobis laudatum, de cinnabari Zii novimus, eandem cum arsenico adulterato mercurio sublimato factam. Sin suâ manu fecerit eadem, optimè constat, elaborata esse veris menstruis, genuino modo, decenti *diagnosi*. Fraudes verò infinitæ sunt, quibus in pharmacopœis vel utuntur, vel uti possunt lucri cupidi, medico persuadentes, aliud, vel imponentes potius, cum risu.

Habet & hoc pacto ipse occasionem erogandi elemosynas, & pauperibus gratis mederi. Medici sunt elemosynarii publici, nemo magis homo occasionem habet benefaciendi, visitandi ægros, dandi medicamenta, juvandi, consulendi & solandi *φιλανθρωπίας*. Contrario verò posito omnis decollat occasio, quin ipsa aliorum vivere gratiâ quasi cogitur, si in propriâ domo vel corpore affligatur morbis.

Quin & hic unus vetus est modus, incrementa medicinæ promovendi, seu inventis novis remediis & arcanis, si ipse centra mixtorum referet, & indies plus ultra tendat quærendo nunquam otiosus naturæ minister. Id verò quàm jucundum, quàm utile & necessarium sit, vix dici potest; seu stabilitis experimentis & observationibus novis, iisque certis, non fucatis, vel farragini receptarum involutis; seu certis cognitis viribus remediorum horum vel illorum. Non prius cœpit novâ superbire facie medicina, quàm, prævio *Paracelsi* aliisque chemicis & medicis, hæc præparatio domestica & dispensatio fieri consuevit.

Nihilominus tamen interest reipublicæ, ut pro salute urbis & vicinorum officinæ publicæ prostent tanquam promptuaria perpetua. Non possunt tot officinæ, quot Medici in urbe, tolerari, sine detrimento vel medicis, vel reliquarum, vel publicæ rei. Distincta sunt officia medici & pharmacopœi.

Non unus sufficere omnibus medicus valet, seu uberior praxis ipsi contingit, seu morbi epidemii & cum primis pestis urbem invaserit. Nec exhausti potest praxeos ambitus solis euphoritis, non carere potest medicus ministerio pharmacopœi, in parandis & adhibendis clysteribus, decoctis, electuariis, emulsionibus, unguentis, aliisque, multò minus in antidotis majoribus, theriacâ, mithridatio, confectioe alkermes. Pharmacopolia naturæ sunt reconditoria perpetua & gazophylacium; unde vasto satis apparatus egent. Verbo, necessariae sunt absolutè officinæ publicæ; si necessariae, conservandæ sunt, si conservandæ, medicus præscribere debet medicamina, deque eo prospicere. Accedit, quod non tam privatæ, quàm publicæ officinæ sæpe sunt & eo nomine, quod à magistratu constitutæ, sumtibus publicis, quod redditus inde in ærarium publicum, urbis, academici alicubi ipsius, ad pias causas impendantur.

Supereft igitur, ut medici & pharmacopœi opera sint mutua. Non debet medico præscindi omnis dispensatio eorum quæ didicit, quæ parata optimè applicare novit, uti nec chirurgis prohibetur emplastra, unguenta, pulveres aliaque domi parare & adhibere, non vendere. Selectiora euphorista quædam, in varios casus, seu in urbe, seu extra urbem, pro pauperibus aliisque, concisâ methodo adhibere & dispensare iustissimum est. Ita sanè nec

ægros sumtuum magnitudo deterrebit, nec medicus damnosam exercere praxin cogetur, nec omne, nec nullum lucrum manebit pharmacopœis.

Tres hi necessariò concurrunt, & medius inter medicum & pharmacopœum est æger, dives, pauper, mediocris fortunæ. Divites pauciores in mediterraneis his locis & medico & pharmacopœo solvere possunt, non semper tamen solvunt præ avaritiâ, sortitæ, ingratitude. Pauperes, quorum maximus est numerus, solvere neutri possunt, pro eâ quidem proportionem ac requirebatur, pro purgante v.g. medico ob præscriptum duos circiter grossos, pharmacopœo pro pulvere parato, cui labor inclusus est, itidem duos circiter, vel ad minimam unum grossum. Quæritur, annon consultius sit conscientiæ & conditioni ægri, si unâ fidelâ duos dealbare possit parietes, aliâ egenus? Mediocris fortunæ inter hos medii ferre quidem sumtus aliquos, non tamen ita multos queunt. Ergo cum pro modulo ægri habeant sua fata & pharmacopœus & medicus, contentum esse oportet unumquemque suâ sorte, nec invidere alteri, nec nocere.

Id verò argumentum est potissimum, quare Serenissimi Saxonici Ducis dispensationem medicis indulgent; ita enim proportio servatur, quæ iusti norma est, ut suum cuique tribuatur, nemo lædatur, non multiplicentur sumtus præter necessitatem, nullus defectus, nullus excessus sit, sed omnia moderata & pacata.

De Formâ Pharmacia & divisione.

Occupatur Pharmacia duobus officiis, circa obiectum suum, præparat & componit. Præparatio est generalior, compositio specialior. Distincta igitur cum sint, distinctè quoque melius, nostrâ opinione, tractantur & traduntur, contra ac in institutionibus communiter, imò & in aliis observatur. Utraque est necessaria, maximè tamen præparatio, neque enim & compositio, tanquam præparatio ut sic, citra illam fieri potest. Necessaria est præparatio, ut fiat selectus particularum utilium ab inutilibus duplex, grossior & subtilior, quorum illud Galenicis, hoc Chemicis tribuitur magis. Præstat & hæc conjungere potius, uni eidemque fini debita. 1. ob modum tractandi diversum. Non omnia æquè subtilius tractari gestiunt, multa etiam grossiori vilo modo. Est & pulveribus vegetabilibus solis, stupis, confervis sua laus, non minus ac extractis vel oleis. Quin sæpe dum nimis curiose separare contra intendimus mixtorum, æmulamur hospitem publicum, qui convivis suis mera bellaria, nullos cibos apponit. Naturam sequi præstat, non omnia extrahere, vel solvere, sed saltem necessaria. Ubi cessat finis, ibi cessant omniò media. 2. Ob selectum diversum & usum hinc instituendum. Non omnia chimica bona sunt, quædam non necessaria, quædam superflua, ut non dicam hyperbolica. Instant sæpe hominum spes & destituunt. Non omnia Galenica mala.

Si consideremus rationem formalem pharmaciae, Galenicæ & Chemicæ, utraque sanè consistit in *συνεσει* & *διασει*, quod vulgò *solutionem* & *coagulationem* vertunt, reverà tamen potius unice separationem utilium ab inutilibus notat. Nulla præparatio est, seu Galenica seu Chimica, quæ non in hæc formali ratione consistat, nisi quod Galenicæ sæpe à scopo aberraverint, vel saltem non sufficienter eundem attigerint. Non confundenda ergo & hæc forma, & finis, quæ maximè differunt. Hinc ut hæc magis pateant, liceat nobis statuere, quod in pharmaciâ, quoad præparationem strictius spectatâ, fiat separatio utilium ab inutilibus ex triplid

la est operatio, nôtrâ quidem opinione, quæ non huc
quadret, WEDELIUS.

nen acceperunt ab effigie & longitudine
factus, qui lintrem lembumque navicu-
læ exprimit, hinc etiam *δολιχόσπελον*
autem à phaselo diversum esse mo-
phaselum enim inquit Lathyrum esse vel

Phaseolorum nota sunt caulis scandere, trifolios esse, semina habere reniformia, filiquas simplices.

Hæc Planta emolliens est & resolutiva 1. feminisq[ue]
farina in cataplasmatibus adhibetur

Phaseolus Zurratensis filiquâ hirsutâ, cujus filiquæ ad nos ex Indiâ adve-
niunt Orientali varia magni-
tudinis, quæ hirsute suâ pruritus confusile excitant.
Non infirmarum sunt vitium in Hydropicis, nem-
pe.

Hujus Plantæ filiquas duodecim & in duobus ce-
 revisiâ sextariis infunde, & infusum propina, ad sextarii
 singulis maturinis: certissimum est hydropis reme-
 dium. Communicavit D. Samuel Husbands Eques au-
 ratus, qui in Insula Barbados aliquot annos vixit, ejus-
 que in servis suis Æthyopibus experimentum fecit.
 RAIUS.

Phasianus à Phaside Colchidis fluvio dictus,
The Pheasant.

Pro obefitate aut macie corporis pondere pluri-
mum variant. Mas quem appendi fecimus alius 50 un-
cias, alius 45. *fœmina* 33 pendebat. Longitudo à ro-
stro ad ultimam caudam 16. erat digitorum, ad imos
pedes 24. spatium inter extremitates alarum expan-
sum 33. rostrum ut in granivoris, ab apice ad An-
gulos oris digitum 1. longum ætate provectoribus
albidum; membranam habet utrinque carnosam tu-
berosamque qua capiti supra conjungitur, sub qua
nares velut occultantur. Oculorum irides flavæ. Co-
lor ruber seu coccineus (punctulis nigris resperfus se-
cundum Aldrovandum) oculos late circumquaque
cingit. In syncope ad basin superioris rostri mandi-
bulæ plumulæ nigrescunt cum purpureo quodam splen-
dore. Vertex & supra pars colli virore obscuro fe-
rici instar splendente imbuuntur, qui color tamen
in vertice dilutior est, (Aldrovandus verticem ele-
ganti colore cinereo ferè micare scribit, ad latera &
prope rostrum viridi, & admodum, vel in Sole,
vel in umbra varii, qui pariter color elegantissimus
totum collum superius occupat. D. Willughby ver-
ticem ex cæruleo splendere cum quadam rufi mix-
tura reliquit, arque tam caput quam collum, su-
perius modò cæruleum, modò viride apparere) ha-
bet præterea ab utraque capitis parte è regione au-
rium pennas elevatas, quas Plinius cornicula voca-
vit.

Auribus adnascuntur in inferiori earum angulo pen-
nae ceteris longiores nigricantes. Colli latera & gula
colore purpureo splendent. N.B quoddam viridis quam
purpureus color marginibus tantum plumarum inest;
reliquum in vertice fulcescit, in collo nigricat. Sub men-
to & ad angulos oris plumae nigricant marginibus sen-
sibiliter viridantibus.

Nec (2.) ratione consistentiæ , vel finis eandem
diligere licet , multò minus (3.) confusaneo ordi-
ne Alphabetico eandem tractare , non præmissâ il-
lâ distinctione , unde ex parte idem in progressu
speciali securi sumus ; vel confundere præparationem
cum compositione consultum est. Reperiri quidem
hæc modo commodè possunt , non item concipi ad
genium naturæ . Meritò itaque illam divisionem pro
omnium habemus optimâ , quæ exhaustit (1.) ipsa omnia
subjecta , seu materiale , ut quodlibet ex his præparatum
sub hæc militet ; (2.) exhaustit omnem modum specia-
lem , quorum unusquisque sub generali contineatur non
minus . Atque hæc ratio est , quare omnem apparatus
Pharmaceuticum ad retrædyn reduxerimus : præparatio-
nem , solutionem , destillationem & calcinationem . Nul-

Infra virorem collum reliquum, pectus, scapulas, dorsum medium, latera sub alis vestiunt pennæ pulcherrimæ fundis nigricantibus. marginibus colore pulcherrimo, qui prout variè luci obijcitur, vel niger, vel purpureus apparet, tinctis. Purpuræ subijciuntur (in singulis pennis)

pennis) area transversa coloris aurei splendidissimi; huic deinde fulvus color subest, qui ad nigrum quem diximus fundum extenditur. Colores tamen hosce (aureum & fulvum) linea angusta splendide purpurascens determinat, in collo supino pennarum extremitates maculâ nigrâ paraboliformi pinguntur. Scapi omnium fulvescunt: pennæ ipsæ circa scapum in infima supini colli parte macula ovali in nigro quem diximus fundo notantur: pennæ scapulares & medii dorsi vestitricis his coloribus variegantur. Primò margines fulvæ; deinde linea angusta purpurascens, tum linea latiuscula nigra, ad margines pennarum extremos parallela, cui includitur linea alia latiuscula albicans: hanc lineam ovalem vocat Aldrovandus: spatium interius comprehensum & reliquum pennæ ad imum usque nigricat, in medio tamen dorso spatium comprehendendum varium est è fusco & nigro, scapi pennarum fulvi luteive: quæ subsequuntur tergoris pennæ totæ ferè ferrugineæ sunt ad rufum vergentes albâ illâ maculâ carent, longiores sunt & velut in exigua filamenta desinunt, hoc tamen cum prædictis commune habent, quod ad lucem in medio sui viridem illum colorem edere videantur cum alioqui non sit, quod caules earum ad aureum accedant, totæque in radicibus fusæ sunt. Cauda si longiores pennarum medium occupantes metiaris, duos dodrantes cum duobus palmis explet; est autem ejus figura ferè organi pneumatici; nam ut in eo cannæ ab utraque parte paulatim magnitudine ascendunt, & majores medium locum occupant, ita quoque in hac cauda evenit; nam binas quas dixi illas longissimas sedecim alæ, octo nimirum utrinque lateribus cingunt; omnes diversæ magnitudinis; sunt autem coloris cineritii, ad latera ferruginei, prope caules nigrescentibus maculis invicem in longissimis oppositis, in minoribus ab uno latere tantummodo, aut minus saltem apparentibus decoratæ. Alæ clausæ dodrantem longæ sunt, expansæ duos dodrantes latæ, harum pennæ ubi corpori annectuntur, coloribus iisdem quibus dorsi principium variegantur: quæ vero has sequuntur posteriora dorsi imitantur: costæ tamen ut in perdice cinereæ, quarum item colorem pennæ remiges ad unguem ferè exprimunt, ex cinereo nimirum fuscescentes, & albicantibus ubique maculis distinctæ; pectus venterque ubi ventriculus est, & quam ejus partem alæ operiunt, iisdem quibus collum coloribus sed obscurius coruscant, pennæque hic multo majores sunt, prope anum & in femoribus ex ferrugineo fuscescit. Tibiæ, pedes & digiti atque ungues coloris cornei, digiti tamen & unguum color magis fuscescit: digitis membrana majuscula, qualis quod sciam in nulla alia pulveratrice reperitur, ad natandum fortè non inepta, intexitur. Tibiæ subalbidæ, calcaria habent quam in gallo breviora quidem, attamen acuta, coloris nigri.

Fœmina mate per omnia deformior est, coturnicis ferè colore.

In sylvis degit, glandibus, baccis, granis, seminibusque vescitur.

Phasianum avem omnium Libri decantant, quem primum ferè in mensis esse judicant propter carnis bonitatem, à qua Medicinæ professores veluti à scopo de temperamentis ciborum judicia auspicantur. Longolius apud Aldrov. Aldrovandus Phasianos in cibo meliores esse quam

gallinaceum genus multis probat, quæ apud ipsum vide, tandemque sic concludit, phasianis itaque cum quia rari sunt, tum quia taporè jucundissimi & tale quale diximus alimentum edentibus præbeant, ditissimorum mensis duntaxat nati videntur: fuerunt enim semper in supremo honoris culmine habiti.

Phasiani, perdices, coturnices & alia quædam aves magno numero capiuntur reti quod expegatorium vulgo vocatur, auxilio catuli ad hoc instructi; qui aves investigat, quas cum viderit subsistit, nec ad eas progreditur ne depellat; sed ad aucupem dominum suum respiciens caudam movet; vel etiam in terram procumbit; unde aucups cognoscit aves esse prope canem, & tunc ipse ac socius rete trahunt, atque aves unâ cum catulo cooperiunt.

Omnes volucres, seorsim vero phasianos, perdices & coturnices, si ab Accipitre fuerint occisæ, longe sapidiores ac delicatesiores esse multi tradunt quàm si laqueis aut alia fraude interceptæ fuerint, & quidem quod earum caro hac ratione tenerior evadat minimè dubium est: nam violentus ille Sanguinis motus & fervor à cursu excitatus, carnem macerat & ad putredinem disponit, quod verò sapidior & delicatesior inde fiat, non omnes nunc dierum consentiunt, verum de gustibus non est disputandum.

Cæterum Aldrovandus Phasiani nomen à Habraeo potius quàm à Phaside fluvio deductum putat.

Boterus Hiberniam phasianis & perdicibus carere prodidit. Willughbejus.

PHILANTHROPOS, vid. *Aparine*.

PHILONIUM, vid. *Electuarium*.

PHLEGMAGOGA. MEDICAMENTA.

Idem propriè sunt ac HYDRAGOGA, de quibus vid. sub titulò *Purgantia*.

PHLOMIS, vid. *Verbascum Salvifolium*.

PHOENIX, vid. *Palma*.

PHOSPHORUS.

Phosphori nomine primò veniebat *Lapis ille Bononiensis* certò artificio preparatus, qui in tenebris lucebat, & de quo abundè edisseruere Philosophi. Jam verò eò intelligitur materia quædam factitia & solida & liquida flammâ caruleo rutilante in obscurò se commendans, ac è variis, ut credant, sanguine nempe, stercore, carnibus, urinâ, imò etiam herbis ipsis fermentatis ac putrefactis parabilis. Processus non paucos in hoc argumento apud varios legere est. v. g. in Musæo Regali Societatis Londin. annò 1681. impress. è Cretâ calcinatâ spiritu nitri solutâ, filtratâ & evaporatâ ad salis consistentiam, & sub tegula fornicata rursus cum debita cinchereâ calcinatâ phosphori exhibetur præparatio, Autore D. D. Fr. Slare Anglò. E Stercore, urinâ, spiritu vini, tartarò & aceto debitò modò præparatis conficitur ex methodò à D. D. Rosino Lettillio in Miscellaneorum Curiosor. German. Decut. ij. Annò v. Tandemque ut alios plures prætermittam.

Nobiliss. D. Boyle de Phosphoro Tractatulum integrum experimentis curiosissimis refertum, conscripserit, unde satis superque innotuit ex qua demum materia & quo artificio tam elegans præparatio commodius confici posse. Nos vero quia forsitan accuratior rem quam hactenus alibi videre licuit hujus encheiridii possidemus, ubi scilicet addito carbonum & ligno pulvere facilius ac certius, ex urina extrahitur; Lectori ingratum minimè fore credimus si brevitatis causa aliis omnibus omisso processum nostrum, seu quem in nostris Adversariis contentum habemus, hic tradamus.

74. Urinæ hominis sani q.v. reponatur in vase clauso per 6. vel 8. septimanas ad putrefactionem, usque dum syrupum violarum viridi colore tingat: Hinc cacabum ferreum grandioris amplitudinis igni vehementiori superimponere. Infunde cacabo urinæ putrefactæ primò cantharum unum; (Gallice *un pot, une pinte*) quo materia ebulliens satis habeat spatii, nec cacabi margines supergrediatur. Quando hæc ad saporem, seu rob ipsissitudinem redacta fuerit, infunde cantharum alium, sic per vices continuando, usque dum urinam omnem ad siccitatem ferè in pissaveris, materiaque sua consistentia fuliginem referat, interea temporis illam diligenter agitando, ne scilicet vasis fundo adhærescat.

74. Hujus materiæ urinosa ℥ij , arenæ ℔b . itidem ij . carbonum ligni grosso modo contusorum ℔ss . indantur retortæ terrea, vel vitrea luto probè munitæ, & ei adapteretur recipiens vastius aqua simplici ita repletum ut retortæ collum illam ferè attingat. Hinc destillatio instituatür ad modum aq. fortis per 24. horas. Vasis refrigeratis decantetur aqua in recipiente contenta ad separationem crassæ mellaginis quæ illi innatat, quæque est ipsa materia quam quæris.

74. Itaque hanc materiam, & inde retortulæ, adaptando ut æneæ recipiens aqua plenum, hinc destilla arenæ igne, principio leniori, ut retorta saltem calseat, & videbis materiam guttatim se retortæ collo applicare. Quo viso ignem paulatim auge, & materiæ quæ primò adhærescebat collo, in recipiens transibit, relicto tantum oleo luteo in prædicto retortæ collo. Refrigeratis rursus vasis materiam inde ollæ minori terrea ut super ignem colliquescat in massam pro lubitu deinde formandam.

In rectificatione præmemorata materia in guttulas abit mastiches lachrymis non absimiles, eaque propter ultima adhibetur fusio ut in massam cogatur, unde formatur ea ratione quæ usui commodior & aptior videbitur. Verum ut in vase terreo fundatur adhibendus venit ignis admodum lenis, seu potius lampadis calor, ne scilicet inter fundendum nimium agitur, ac turgeat.

Hæc materia in massam, eamque variè etiam pro lubitu, formatam sic coacta, phosphorum in forma sicca præbet è cuius frustulis per contritionem lux educitur in tenebris non parum splendens, imò per eundem parietibus afflicto characteres, & variæ figuræ luminosæ effinguntur, quarum cum splendor remittit subinde per reassuetudinem excitari de novo potest, donec rota materia prima oblivione parieti affixa, absumpta fuerit; verum pro tali inunctione multò commodius credimus phosphorum parare liquidum, dissolvendo sc. in oleo caryophyllorum, vel tartari stillat. prædictam materiam, ad absolutam saturationem, eoque figuris luminosis pingendo quodcunque demum corpus libuerit.

Hactenus Phosphori accurata præparatio è propriis Adversariis, subjungimus jam compendiosam ejusdem conficiendi Methodum quæ in Pharmac. exstat Bateana.

Paratur Phosphorus ex residuo post destillationem spirit. urinæ cum salis armoniaci tantillo, destillando per gradus ex retorta vitrea in recipiens aqua semiplenum. Diureticus autem ac Diaphoreticus est. Dose ad ℥ss .

Phu, vid. Valeriana.

PHYLLIRÆA.

Phylliræa est arbuscula ad hominis altitudinem excreta, ramos multos emittens & folia gerens non absimilia illis oleæ; in hortis ad ornamentum satis est familiaris.

PHYLLITIS, vid. Scolopendrium.

PHYLLON, vid. Mercurialis.

PHYTHOLOGIA.

Hoc nomine apud Pharmacologos venit pars illa suæ Artis quæ de plantis agit.

PICA.

Pica varia Caudata. *The Magpie or pianet.*

Octo aut novem uncias pender. Longitudo à summo rostro ad imos pedes duodecim digitorum & dimidii, ad extremam caudam octodecim. Rostrum sesquidigitale, nigrum, crassum, validum; superius mandibulum incurvum, acutum, prominens. Lingua bifida, nigricans, picæ glandariæ linguæ similis. Fissuræ palati latera pilis hirta. Nares rotundæ, setis reflexis obstitæ. Dempso albore & caudæ longitudine monedula similissima est hæc avis. Oculorum irides pallide avellaneæ; in nictitantibus membranis macula lutea cernitur.

Caput, collum, gula, dorsum, uropigium, infimus venter coloris atrii, imò pars dorsi prope uropigium cinerascit. Pectus & latera alba, ut & plumæ quæ primum alæ internodium tegunt. Alæ minores sunt quam pro corporis magnitudine. Cauda & remiges alarum, coloribus pulcherrimis viridi purpureo & cæruleo confusis splendens; sed pinnulis tantum seu talis exterioribus. Numerus remigum 20. Quarum extrema dimidio brevior est secundæ, secunda itidem tertiæ brevior, & tertia quartæ, verum non æquo defectu; quarta & quinta longissimæ. Priores undecim mediis ex parte scapi interfore albescent, exteriores latius, interiores angustius, albore sensim se contrahente, donec in decima penna in maculam majusculam angustetur, cauda 12. pennis composita singularis est structuræ, siquidem mediæ duæ longissimæ sunt, & ad novem digitos accedunt, iis proximæ digito breviores, ut & reliquæ omnes exteriores interioribus ad extimas usque eadem proportionem, maximæ duæ hoc est mediæ caudæ pennæ inferius virescunt, deinde purpurascunt, summitatibus cæruleis.

Pedes & ungues atrii. Imum digiti extremi internodium medio jungitur. Intestina 24. Digiti longa: appendices semidigitales. Cystin felleam habet. Lien oblongus. Ventrisculus non admodum crassis musculis instructus, & echinum habet.

Reperiuntur interdum & picæ albæ sed rarius, in vivario regio S. Jacobi dicto fuscas seu subrufas vidimus.

Sermonem humanum optimè addiscit hæc avis. Nos quoque plures novimus, qui voces articulatas adeò exactè formare didicerint, ut integras etià sententias

Aaa

simul

simul proferrent, tanta sæpe similitudine, ut nisi avem vidisses hominem loquentem jurares.

Nidum in arboribus, magna solertia, construit, cum foris in circuitu intra supraque horridis spinis munitens, unico duntaxat foramine eoque arctissimo sibi pro introitu relicto. Exactam nidi descriptionem qui desiderat Aldrov. consulat: apud nos in Anglia adeo frequentes ubique sunt, ut iis describendis diutius immorari minime necessarium duximus: ova parit una vice quinque vel sex, interdum etiam septem, vix unquam plura, minora pallidiora quam corvini generis, maculis creberrimis picta.

Victus huic idem qui cornici & monedula: passeris aliasque aviculas invadit & devorat: imo vidimus nonnunquam quæ merulam aggrediretur & feriret. Cæterum pica in genere Græcis *Κίττα* seu *Κίττα* dicitur Willughbesius.

Vires. Avis hæc maximè commendatur ad oculorum, obscuritatem, ruborem, dolorem *comesta vel incinerata, oculisque indita, vel quocunque modo apposta.*

Convenit & Maniacis, Epilepticis, Melancholicis, cinis exhibitus.

Preparata.

Aqua Picar. Antepileptica de qua suo loco: Schroderus.

Commendatur etiam hæc *Avis* ad uteri passiones, Hofmannus.

PICATIO, vid. *Dropax.*

PICEA, vid. *Abies.*

PIGER HENRICUS, vid. *Furnus in Instrumentis Pharmaceuticis.*

PILA MARINA.

Quàm incertus sit *Pilarum Marinarum* ortus, nemo Medicorum ignorare potest: aliis è sordibus, nescio quibus, (pumarum marinarum crassescens: aliis à festucis herbæ cujusdam ipsis innominatæ & ignoræ eum derivantibus: quibusdam cum Halcyonis confudentibus &c. Vid. *Museum Calceolar. sect. 1. pag. 25. & Ferrantis Imperati Hist. natur. lib. 27. cap. 8. &c.* Omnium tamen, quas videre hæcenus mihi contigit, optima est conjectura nostri *Georg. Hieron. Welschii Hecatostr. obs. 18. ex Algaum & Arundinum familia easdem prodire statuentis.* In hoc tamen rem neutquam adsecutus, quod lanuginem sive flores papposos esse putaverit, nec qualis sit Alga vel Arundo illa, edicere potuerit. Ast Arundinis esse progeniem, & quidem foliorum ejusdem, allatæ huc Pilæ ejusmodi quamplurima ante triennium fidem mihi fecerunt: quæ nempe intus plantam ipsam tanquam circumvolutionis principium & fundamentum, continuerunt. Talem itaque cum ad amicissimum meum *D. D. Volckamerum*, Botanicum Excellentissimum, transmissem, à se olim in marinis littoribus similes fuisse observatas, atque ad *Dalechampii* Arundinem epigeam sive quartam referri posse, respondit. Et quidem optimè: Quamvis enim magnam undarum vim perpessæ fuerint istæ à me repertæ, ac ita elegantia illa, à tot calamorum vel fuculorum ex aliis multipliciter prodeuntium congerie enata, non adeo conspicua fuerit; qualem nempe in saccis magnis Costo Arabico & Zingibere plenis repertæ, atque veluti raræ à *Dalechampsio lib. 9. Hist. Plant. cap. 5. delineatæ*, in loco fortè non adeo undarum continuo appulsui exposto enatæ, vel etiam, dum in vigore adhuc erant, evulsæ ostenderunt: ipsa nihilo minus descriptio & figura satis cum hisce coincidunt, ita tamen, ut, quod ille corticem fulvum, squamosum

appellat, ego foliola esse ipsius plantæ sibi invicem strictè superimposita existimem. Ipsos verò cauliculos in quibusdam plantis alios multos utrinque emisisse, in quibusdam verò plurimos invicem contortos & varia flexura unitos deprehendi; cæterum non nihil nigricantem magis minusve colorem ostendunt, cavi & fistulosi sunt, aliarum Arundinum modo, fibrillarum tamen ex foliis enatarum congeriem in se recondunt. Ista autem foliola plana & recta, nulla incisura prædita, & in fastigium lunatum sive semitrotundum desinentia, coloreque ad flavum vel spiceum, eumque splendentem accedentia, duplici imprimis substantia sunt instructa; una fibrosa exteriorius ab utraque parte locata; altera interna medullari, quasi papposa & lanuginosa, itidem splendente & spicei coloris, cui tamen obscuriores atomi intermiscuntur; quæ ipsa cultelli acie à reliqua fibrosa faciliè abradi & separari potest; cum è contra prior illa ex meris fibris minutis, eleganti per microscopium spectaculo, invicem coherentibus & recto tramite in longitudinem excurrentibus, inque ipsum dein caulem, non quidem singulis separatim, sed in certos quasi fasciculos collectis, sese immergentibus componatur. Undè continuata fluctuum marinarum allisione, vel etiam aquæ paludosæ à ventis agitatione conquassata foliola, præsertim si ætate provectiora in sui resolutione ipsa propendeant, sensim fatiscere, fibrosam eorum substantiam à medullari paulatim separari, atque ita fibrillarum suarum divulsionem pati autumo; quæ fibrilla dein ulteriori undarum commotione & circumscriptione in corpora illa pilosa, modò rotundiora, modò aliam variè depressam & fastigiatam figuram pro loci varietate, in quo subsistunt, aut etiam allidentis aquæ varia commotione, habentia abeunt. Esse autem hanc veram corporum istorum originem, evincit: 1. fibrosarum in eis invicem connexarum vel confusarum particularum cum fibris foliorum accuratissima similitudo; 2. Ipsius plantæ in illis involutio, & in quibusdam etiam intimior observata conjunctio; 3. foliorum ferè omnium in suprema parte ab undis modò levior, modò altius penetrans in ejusmodi dictas fibrillas jam facta divisio; 4. in aliis quoque Pilis marinis quibusdam interspersarum particularum à medullari substantia, aut etiam foliolorum, observatio, quæ festivarum suspitionem nonnullis præbuisse potuit. Eandem plantam videtur *Plinius* innuisse *lib. 16. hist. nat. cap. 36. scribens: Est & obliqua arundo, non excelsitatem nascent, sed juxta terram fruticis modò spargens, suavissima in teneritate animalibus. Vocatur quibusdam Elegia; fortasse ab ἑλος, palus, & ἑλεος, palustris, quod in locis maritimis paludosis ortum suum inveniat.* Ut ita etiam corpus ex ea productum Pila stagnalis dici posset; qualem *Wormianam* illam fuisse arbitror, quam in stagno prope Soram inventam in *Mus. lib. 2. cap. 2. describit.* Vid. etiam *Casalpini lib. 4. de Suffrut. & herb. cap. 59. & Gesnerus de herb. Germ.* Cæterum de viribus, quæ ad scrophulariarum curam facere creduntur, hoc unicum addo, eas in uestis cum sali marino, verè salso, sive ex acido & alcali misto, in Pilis istis, si linguæ judicium sequamur, inveniendò: tum Alkali sive lixivioso sali, ex uestis nato, atque per effervescentiam imprimis cum acidis facile dignoscendo, tribui debere, quorum iuvata lympham crassiorem incidere, acoremque ejus vitiosum absorbere, & ita liberiores ei per glandulas colli transitum conciliare valent.

Hæc de Pila Marina ex Dom. Schröckii Miscell. Curiosor. Decur. II. Ann. I.

Vires Pilæ Marinx quod spectat, illa creditur lumbicis enecandis ac capillis innutriendis, si extrinsecus applicetur, apta.



E.P.





PILEOLUS, vid. *Cucurpha*.

PILOSELLA.

Pilosella à pilis rigidiusculis quibus folia ejus obfita sunt nomen sortita est, auricula muris à foliorum similitudine dicta.

Flagellis reptatricibus à pulmonaria, (qua cum semine parvo, nigro convenit) reliquisque Hieracii distinguitur, unde definiiri potest, Hieracii genus semine parvo, nigro, flagellis reptatricibus.

Vires. Auricula muris attingit vehementer & siccat, unde & ovium gregibus noxia censetur. Sternutatoria est & vulneraria, unde additur utiliter tum in potionibus vulnerariis, tum in emplastris & unguentis: vi etiam præsentissima esse dicitur ad calculum. Ob adstrictoriam facultatem, dysenteriam, reliquosque alvi & uteri fluxus sistit, biliosas vomitiones compescit, hernias (infantum præcipue) curat: sunt & qui ad iterum incipientem hydropem & lienis tumores eam commendant.

Ex rinsecus medetur ulceribus oris (in Collationibus:) hæmorrhagiam narium sedat (pulvis inditus.)

Succus herbæ inditus herpetem miliarem efficaciter compescit & sanat. *D. Hulse.*

Sæcus decoctumve aciem ferri vel chalybis sæpe merulam indurare creditur. *Rains.*

Pilosella Major Alpina ejus iconem hic Tabula x. x. exhibemus, quæque in montibus excellentioribus nobis vicinis satis familiaris est, eadem quas prior vires possidet, sed in multo nobiliori gradu, & in specie vulneraria est insignis.

PILULÆ.

De Pilulis in genere.

Notissima in foro medico est formula *PILULÆ ANIMÆ*, antiquis quoque jam cognita & usitata, quod *Zacutus Lusitanus M. P. H. L. I. I. p. 8. & 9.* rectè contrà *Mercurialem* affirmat.

Nomen nactæ sunt, ut plurima alia, à consistentia & figura externa, quasi dicas, parvas pilas, pilas enim rotundas esse notum est, unde & reliqua occurrentia quandoque nomina huc referenda, v. g. quando dicuntur granula, coctia, globuli, & à *Q. Sereno c. 55.* glomeramina, à coactione; ast hæc paulò minus sunt usitata nomina, frequentius verò catapotiorum est, desumptum ab assumendi modo, quod deglutiuntur integre. Hinc definiiri possunt, quod sit *medicamentum internum, siccum, solidum, & rotundum, ex coherere aptis efformatum, pro purgandi vel alterandi usu.*

Internum dicitur, utut enim in fonticulis aservandis apertis globulatis hæc & spherica figura usurpetur quoque, illa tamen saltim externa convenit forma, adeoque improprie hoc nomen sustinet.

Siccum, solidum & rotundum est, quo ipso differt maximè à *bolis*, illi enim magis spissæ seu molles sunt consistentiæ, ut in figura variari possint ac elongari. 2. à *trochiscis*, cum quibus in materiali maxima pilulis est convenientia, unde facilis trochiscorum in pilulas, & vice versa, est transitus, nisi quod in trochiscis majorem gratiam oporteat esse, unde & seorsim de iisdem vix tractabimus; differunt verò formali, tum magnitudine, tum planitie & convexitate, quo & stellarem aliasve licet referre figuras iisdem impressas.

De magnitudine nil addimus, variat enim illa pro dosi ingredientium, de quo inferius plura. Sufficit hoc loco alias esse majores, alias minores, alias minimas. De priori classe notabile est, tradi seorsim à *Morello*, & quibusdam aliis, confectionem globulorum seu pilularum majorum instar globuli, v. g. plumbei, quas *hypoglossides* ab usu nominant, siquidem in peste, tuf-

si, phthisi, & similibus eadem præscribunt; hoc verò hæc forma majorum pilularum, ob deglutiendi difficultatem, (cujus tamen facilitandæ gratia pilulæ imprimis inventæ sunt & laudandæ,) minus usitata est, ejusque loco commodius trochisci inserviunt; præterquam usu externo, ad odorem gratum conciliandum, cosmetice, barbam &c. quò & *poma ambræ* spectant. Reliquæ verò usitatæ sunt magis, illa definitæ regulâ generali, ne ad deglutiendum sint ineptiores, quod suo hinc loco prestius explicabimus.

Quod itaque compositionem pilularum, (ut omnia hæc, hoc loco tractamus, sunt composita,) spectat, abolvitur illa itidem *materiali & formali*. *MATERIALE* in genere constituunt *viscida, coherere & in sphericam versari apta figuram*, quò & gummosa, & resinosa, & cum pulveribus compingi prompta referenda, siue ex eis solis efformentur, siue excipienti talismodi alia misceantur, ex iisque combinatis talis massa, fini huic apta, resultet, seu denique pulverum ipsorum mucago intrinseca, alio liquido vel ipso gummoso & mucilaginoso promovenda, eidem inserviat. Hinc in pilulas recipiuntur *primariâ intentione* potissimum duo medicamentorum genera:

1. *Massæ*, seu *magdaleones*, & *pastæ*, jamdum in hunc finem in officinis aservari solitæ. Notabile est, ad quacunq; pilulas temper requiri massam, seu corpus aptum, cui hæc figura rotunda imprimatur, quocunque tandem modo & variatione fingantur pilulæ, adeoque strictè loquendo & altera jam dicenda classis huc spectat; notat verò massa præcipue & proprie combinata jam ad pilulas medicamenta.

Recipiuntur verò excipientis loco ipsæ etiam massæ jam usuales, eâ latitudine & libertate, ut alia adsciscere in earundem consortium integrum sit medicò, v. g. tales massæ pilularum sunt recensitæ usitationes aloëtica, de fumariâ, tartareæ, de succino *Cratonis*, &c.

2. *Extracta spissa*, non liquida, quo & succi inspissati, extractiores, gummata depurata, electuaria; resina liquidæ, vel solidæ, magisteriorum nomine, e. gr. galapii, scammonii, &c. referri debent, qualia in omnes usus & intentiones plurima in officinis itidem prostant, & præsentem in usum aservantur.

Referri huc queunt duo alia, itidem aliquando in usum vocari solita; nam.

3. *Trochisci* quoque reformati cum aliis in pilulas queunt, licet paulò rariùs.

4. Ex eodem fundamento commixti cum mucilaginis e. gr. mell, tragacanthæ, pulveres in utramque figuram pro lobitu effingendi.

Secundariâ intentione, ut nempe oculendo ingratâ, molestiam, vel noxam per se adsumendi vindicemus, in pilulis recipiuntur v. gr.

Amara, vel *acerba* quoque aliasve saporis ingratioris medicamina, illa quippe intimius ipsum gustum afficiunt, unde aloëtica, colocynthiaca, terebinthina, & similia commodè hac forma dantur.

Fætida, ut asa fætida, castoreum, sic enim minus explicata & expansa minus quoque nauseabunda sunt, & molesta.

Resinosa ipsa, quæ quippe pulverum forma inter assumendum, siquidem largiori dosi recipiantur, conglobantur & dentibus adhærent: in pilulis verò hanc molestiam amittunt penitus, quod de terebinthinatis, scammoniatis, &c. valet.

Mercurialis, ut mercurius dulcis, hæc quippe mastigando vel alia forma dentibus, quibus inimica maximè sunt, itidem magis negotium faceiunt; sic verò minus.

Notandæ tamen circa hæc itidem quædam veniunt CAUTELÆ, quandoquidem.

1. In genere in pilulis multa ingredientia non commiscen-

sur, farragine scilicet immodica, quæ facile confusionem patit, & majorem, quam pro formæ hujus ratione, quantitatem massæ fœnerat.

2. *Aloe in pilulis commodè datur, omnium tamen basis frustrata tur.* Fuit hæc hypothesis veterum, quam ipse adhuc Morellus asserit, & ex fundamento natum est, quod massæ pilularum, purgantium inprimis, omnes de aloe plurimum participant, & consequenter effectum infidum post se relinquunt. Quid? quod pilulæ non amaricantes per se quoque gratiores sint, & effectus commodus, cui sæpe aloe ipsa est contraria, ab aliis quoque sperari possit.

3. *Massa exoleta consuetudine omittuntur.* Tales sunt plurimæ, exauctorandæ, & meritò in dispensatoriis obelisco notandæ; etiam illæ, quæ usitiores à Morello & aliis habentur, v. gr. pilulæ lucis, *Licht-Pillen*, ad visum acuendum, sine quibus, assajeret, de quinque myrobalanis, &c. quæ à nobis quoque notatæ sunt ex parte. Siquæ etiam massæ pilularum censum hunc merentur, ut asservantur, præstat easdem esse recentes, non annosas, vetustas, aridas, situ corruptas, uti sanè in officinis tales sæpe reperire licet.

4. *Quò centratior es pilula, eò meliores; quò diffusiores eòst, ma ho molestiores & ingratiore;* unde & hinc inde commendatæ pilulæ plurimæ exolescunt, siquidem partes terrestres, seculentæ, & inutiles simul sunt remixtæ. Hinc etiam præstat, aloem extractam recipere quam crudam, & consequenter in aliis quibuscunque, selectiora saltem & virtuosiora.

5. *Salia in pilulas non recipiuntur, lixiva inprimis,* tum, quod faciliè liquecant, & hinc formam rotundam perdant; tum, quod particulis suis fissis & acuminatis rotunditati harum sint adversa; si tamen, quod quandoque fit, remisceantur, duo sunt notanda, tum, ut minori quantitate recipiantur, tum, ut citò post præparationem assumantur.

Ut itaque hæc vidimus, ita FORMA rotunda expetita materiæ seu massæ divitiæ inducenda est, quæ adeo opus ut, ut præ aliis remediorum formulis de pilulis prædicetur, illas reformari.

Sunt verò quædam etiam hic notanda, v. gr.

1. *Massa nec nimis mollis, nec dura nimis esse debet.* Prius corrigitur, si quidem id per intentionem licet, vel admixtione corporis solidi alterius, vel leni exsiccatione in aere vel loco calido, cavendo empyreuma. Posterius v. rò additione liquidi, vel ad unam ac alteram guttulam, vel quantum sufficit, v. gr. aquæ, etiam simplicis sirupi, essentia, elixirii, tincturæ Tarteri, Citri, &c.

2. *Inprimis forma pilularum rotunda apta est additio olei,* siue destillati pro intentionis variatione, siue etiam expressi, ut olei amygdalorum dulcium, anisi, &c. gaudent enim & hæc particulis rotundis consimilibus, unaque præstant, ne digitis adhæreat massa, unde, si quid aliud, formationem pilularum id maxime promoveret, quin imò hinc resolutionem in ventriculo tantum abest, ut impediatur, ut potius procurret, & quoad purgantia, eadem unà corrigat, ut sine torminibus minori cum molestia operationem suam exequantur.

3. *Attendenda quoque in hoc est earundem quantitas.* Veteres alii ex 3j. faciebant tres, alii sex vel octo, quo pacto singulæ respectivè ʒj. ʒss. vel gr. viij. pendent. Præstat eas dividere in majores, medias, & minimas. Majores definiuntur quantitate ciceris vel pisi usitatis; medix, grani pipetis, vel lentis; minimæ, seminis sinapios, vel lentium circiter, vel minores adhuc compinguntur. Quo fine quoque in officinis instrumenta adhibent, quibus & hanc expetitam molem & simul æquilatrem respectu ad se invicem procurant & metiuntur. Indecens enim est, si altera majora, altera minor visatur efficta. Communiter verò ma-

jor figura solet fieri in purgantibus, minor in lenientibus pilulis aloeticis; media autem in opiatas & alterantibus usitatur. Et notabile porro est, quod diutius debent permanere in ventriculo, eò debent esse gratiores; quò minus, eò minores, unde & pilulæ cephalicæ & stomachicæ, seu pro hisce visceribus ordinatæ, commodius & consilio præscribuntur majores. Si pendere id determinandum fuerit, non faciliè majores pendeant ultra gr. ij. mediæ ultra gr. j. minores gr. ss. Quin id hodie obtinet, ut in parvitate pilulæ inveniant gratiam, seu, quò minores, eò gratiores existant, quia hoc ipso minus negotii facessunt ventriculo; unde non tam spectare debemus quantitatem in hisce vel præparandi tempus, quam adsumendi facilitatem. Exemplo inprimis sint pilulæ illæ benedictæ seu Angelicæ, hodie frequentissimi usus, v. gr. Glassianæ, seu ex extracto aloes gummoso simpliciter exarata, ubi ex gr. j. sæpe pilulæ quatuor vel quinque parantur; quin minori hac ipsa forma effectum sortiuntur efficaciorum, ut hoc pacto gr. ij. vel iij. aloes sic præparatæ plus præstent, quam ʒj.

4. *Quandoque etiam, & satis usitato quidem, deaurantur,* quod faciliè est, modò molliusculæ cum foliis auri in pyxide conquassentur; idque tum ad gratiam, siue ad spectum, siue saporem, ita enim minus sentitur amarities, tum inprimis ad id quoque eximè conducit, quod consistentiam in utrumque extremum facilem & mutabilem sartam testam hoc modo servare liceat, ne confluant scilicet, vel in pulverem fatiscant, hæc duo enim præcipua sunt pilularum symptomata, quibus utriusque optimè satisfacit, præter cætera, deauratio. Neque obstat, illas sic tardius resolvi, si cogitemus, quantum id sit auri foliorum, cujus facilis iterum est secessus; accedente sufficienti vehiculo.

5. Ob aliterutrum horum, ne confluant nempe, usitatum quoque est, *adspargere pulvillo* pilulas, pro habitu, ut purgantes cremore tartari, roborantes cornu cervi usto, lapidibus cancrorum præparatis, vel aliis resperguntur, ne contactu suo vel incubitu coeant.

6. Et hoc ipso etiam illis *colorem* fœneramur, quem quidem alias in pilulis non usque ad ʒ attendimus. Illud solum notari meretur, ex resinosis puris fieri pilulas pellucidas, v. gr. ex resina scammonii vel gualap pii solâ, citra additionem aliorum.

Illustrabimus hæc ipsa paucis aliquot EXEMPLIS.

Pilulæ purgantes: ʒ. Extr. panchym. Croll. g. xv. resin. scammon. g. vj. ol. anis. gr. j. M. c. Tinct. Fri. Fel. a. pil.

ʒ. Extr. cathol. Andern. mag. gualap. ʒ. gr. viij. essent. Citri. aperit. vel elix. propr. parum. M. F. pil.

ʒ. MP. Cathol. M. ʒss. troch. alb. g. iij. ol. citr. g. j. M.

ʒ. MP. ʒear. Qu. vel Schröder. ʒj. extr. hellet. n. g. iv. resin. scammon. g. v. M. F. l. a. pil.

ʒ. Galap. nigr. resin. ppt. resin. scammon. a. g. xii. ol. amygd. d. & anis. parum, Tinctura Citri ʒss. M. F. pil.

Pilulæ anodynæ generales: ʒ. laud. op. g. ij. F. l. a. pil. ij. l. iij. D.

Pilulæ catarrhales. ʒ. MP. de succin. Crat. ʒj. extr. zedoar. g. xv. mag. succ. corall. smaragdi ppt. a. ʒss. extr. op. ambr. g. iij. M. F. pil.

Aphrodisiacæ: ʒ. ambr. mosch. resin. xyloal. a. g. iij. laud. op. g. ij. essent. Sasyr. parum. M. F. pil.

Contra hypercatharsin vel dysenteriam: ʒ. Extr. sheriæ. gr. vj. torment. ʒss. laud. op. gr. ij. M. F. pil.

Emet. ʒ. Coag. asar. MP. aloet. a. g. vj. ʒ. emet. g. ij. M.

Uterinæ: ʒ. extr. zedoar. splen. bov. castor. a. ʒss. ʒ. g. iij. ʒ. g. vj. c. elix. uter. M. F. pil.

Febiles: ʒ. extr. card. ben. cent. min. a. g. x. her. min. g. xii. ol. febrif. gutt. ij. M. f. l. a. pil.

Mercuriales in lue ʒea. ʒ. extr. scorzon. ʒj. ligni sancti. ʒss. ʒ. dulc. ʒss. d. amygd. d. q. l. M. F. pil.

Occurrit

Occurrit verò circa UTENDI MODUM etiam observatio in variis circumstantiis.

1. *Ratione ætatis*, non conveniunt pilulæ *infantibus*, cum enim solidiores sint, requirunt unâ quandam præterea animale, seu opem musculorum, quam infantes ignari & liquidis saltem adiecti adhuc adferre nequeunt: minus etiam *senibus*, utpote siccioribus, id quod præcipue de usu continuato & grandioribus valet. Hinc infantibus si pilulæ aloëticæ sint dandæ, præstat easdem in liquore, potu, cerevisia inprimis, resolvere, eadem verò & senibus non nocent.

2. *Pilulæ facilius operantur*, quoad *habitus corporis*, in *obesis*, *succulentis*, *torosis*, *carneosisque*, quia humidiores. E contrario verò in genere, quicunque habent intestina sicciora, iis pilulæ minus bene cedunt, quia egent resolutione, unde & in his pilulæ aloëticæ parum vel nihil operantur; quin observatum quoque fuit, in cerevisiam bibentibus plus operari has ipsas, quam vinum. Attamen, si de humoribus sit sermo, non solum pituitosis, verum etiam biliosis commodè in usum cedunt, modò alias bene ordinentur.

3. *Posita itaque deglutienti commoditate*, quam inter solida inprimis non vendicant pilulæ, & ubi si uicium vitio ea non est integra, pilulis abstinendum est, adsumuntur eadem integræ, citra dissolutionem, non tamen sine vehiculo subjungendo: unde & sunt, qui diluens hinc subjungunt non ineptè, pro facilitanda resolutione, cæteroquin stomachus in iis surgendis plus sustinere cogitur laboris.

4. *In gravidis sunt*, qui *pilulis quoque dari* prohibent, quod turbent corpus, & aloen recipiant, quæ facile vasa referare queat; verum ut benignissima in se est pilularum forma, ita quoque in his commodè concedi queunt; ast de massis pilularum vulgaris & *degras* quoque id quam maximè verum est, quia eadem & tormina gravidis maximè adversa excitant facile, ipsæ verò aloëticæ benedictæ pilulæ iis tuto exhibentur.

5. *Ratione temporis assumendi*. Ordinariè & in genere, more aliorum medicamentorum, sumuntur matutino tempore, jejuno ventriculo, ut vacare earundem actioni commodè possit ventriculus, & sequuntur in hoc pilulæ alias quoque tempus assumendi illorum medicamentorum, quæ earundem forma veloque præterbuntur, ut mercuriales v. gr. manè, opiatæ circa noctem, hysterica, febrifuga ante paroxysmum in usum vocantur commodè. Nihilominus tamen de *lenientibus* & *purgantibus* duo notanda: *Primum*, quod lenientes pilulæ, & alias quoque lenientia alia, commodius exhibeantur ante cœnam vel prandium, seu cum cibo; ita enim, cum minus molestæ sint, naturæ opus, chylicationem, non interturbant, eandem verò blandè dispòunt & stimulant, ut manè sequenti v. gr. una vel altera sedes sequatur, id quod hodiè in tantum invaluit, ut vix alio tempore hæ ipsæ pilulæ angelicæ, Francofurtenses, & consimiles propinentur. *Alterum* experimentum est, quod ex praxi nobis innotuit. Cum enim observassemus, in pilulis purgantia commodè dari, eas verò infidum sæpè edere effectum, & ut plurimum vel non purgare pehitus, uti sunt tardioris operationis, vel nimis, cum tamen interea totum huic rei demus quasi diem. Hinc strategema excogitavimus, quo huic vitio succurri possit, nempe deprehendimus, consultum esse, *partiri purgantes pilulas*, ut ipsæ sibi quasi viam sternant, unde vesperti sub lecti ingressum, si v. gr. dosis integra sint 3. xiv. vel pilulæ xij. propinamus pilulas 3. 4. vel 5. hinc, prout hæ se gesserint, manè altero de reliquis disponimus. Si enim jam aliquot sedes causatæ fuerint, quod fit in mobilioribus, & quidem sine ulla

molestia, omitti potest reliqua pars; sin minus, omnis adsumi, sin medio modo, facile quoque erit, hanc alteram dosin mutare, & propinare saltem iterum dimidiam partem, qui sanè modus est quam commodissimus & probatissimus.

6. *Quoad modum verò assumendi*, quilibet pro suo genio alium eligit, in quo relinquendus ægris suis mos. Quidam nebulis involvunt singulas, sed id tardiosum admodum est; quidam cum passulis exacnatis deglutire malunt. Præstat verò, opeliquidi alij, vel linguae impositas, vel cochleari exceptas, promovere in ventriculum, vel easdem deglutire per se, & desuper liquidum subungere. Hoc ipsum verò magis facilitabitur, si

7. *Dosi non excedatur*. Non enim hodiè amplius, facile ad 3j. vel amplius adscendimus, ut olim; sed satius est, concentratiora recipere, vel acuentia addere. Quod enim

8. *Numerum concernit*, gaudent quidem pilulæ, nescio quò recepto more, impari numero, verum cum quantitatis quæ talis nulla sit efficacia, & ex 3ss. v. g. pilulæ x. vel xi. parari queant, facile patet, in hoc numeri observationem parum conferre, neque experientia vel ulla ratio momentum addit, nisi aliquid mori innoxio citra superstitionem dare velimus.

Restat, ut de usu quoque quædam dicamus in utramque partem.

1. *Pilulæ siccioribus non tam bene cedunt*, tum sua natura, quod exsiccant magis, tum etiam, quod pro resolutione sui egeant humore; hinc uti in cachecticis, phlegmaticis, hydropicis & laxioribus magis ex usu sunt, ita in omnibus morbis, ubi siccitas prædominatur, & humectatione opus est potius, minus conveniunt, unde tabidis, hecticis, febribus ardentibus, hecticis, melancholicis, maniacis minus commodè propinquantur, respectu aliorum inprimis, & quando huic dantur, id tamen non sine humectantibus fieri par est.

2. *Alterandi sine variis, purgandi verò frequentius usurpantur*, in act. vis potissimum quilitatibus, nam exficcare easdem, & adeò in colluvie serosa prædesse, jam innuimus. Unde, quæ pro alteratione præscribuntur, tamen, fere post principia stant, & interpolantur aliis, non verò iis solis primaria demandatur agenda gloria.

3. *Pilulæ tardius operantur*, hinc ubi citiori ope opus est, liquidis cedunt, v. gr. in lipothymia, anxietatibus, debilitate virium, &c. exceptis opiatas, illæ enim, quod mirum est & peculiare, priusquam è ventriculo egrediantur, sæpè jam placant archeum. Unde inprimis, quod diximus, valet de purgantibus & confortantibus. Cæterum hoc iterum boni habent, ut porro dicemus, quod tarditatem actionis efficacia hinc compensent.

Nam è contrariis: *pilulæ diu manent in ventriculo, & eidem sunt acceptæ*, adeoque intimius ibi vires suas explicant, & hinc in stomachi quoque affectibus quamplurimis præcipue expetuntur. Pilulæ efficacissimè sedant vomitum, neque enim præ aliis omnibus facile rejiciuntur iterum, quo ipso tamen non excluditur, non posse etiam dari pilulas vomitorias, quin optimè etiam hac forma operantur emetica. Sed in singultu, vomitu, cholera, &c. optimè inprimis se gerunt.

2. *Pilulæ capiti sunt proficua*, hinc pro roborando capite apprime inserviunt, tum purgandi, tum alterandi sine, quam in rem pilulæ de ladano Hartmanni inprimis sunt laudandæ, maximè in vertigine &c. usus; hinc & in oculorum affectibus, & inprimis somnum ciendi gratia in pervigiis eximiis habent usum. Quin sæpè vix in ventriculum delatis pilulis opiatas paucis, obrepit suavis somnus, & dolores

conticescunt. Neque etiam opiata præsentius in genere, quam pilulari hac forma, agunt, nisi quod sæpè altero manè vomitum quendam parturiant, quod habent peculiare.

3. *Pilula* è partibus remotioribus trahunt. Assertum hoc est veterum imprimis medicorum, unde in podagra, arthritide, ischiade &c. has commendarunt imprimis, nos eatenus quoque id retinemus, quod diutius & in ventriculo & corpore remanendo, modo non sint irresolubiles nimis, moram concedant, ut fermentatione ipsius massæ sanguineæ segregari & expelli magis queant vitiosa sedimina. *Wedelius*.

Hactenus de Pilulis in genere, sequuntur jam varia earundem compositiones in specie è variis Auctoribus.

Pilulæ de Agarico Mesuæ è Pharm. August.

4. *Agarici* 3j. *iridis*, *marrubii* an. 3j. *Turbith* 3v. *specier. Hieræ picræ Galeni* 3iij. *colocynthidos*, *sarcocollæ* an. 3j. *myrrhæ* 3j. *sapæ quantum satis est.* *Fiat massa.*

Thoracem à pituita putri & crassa purgant, ob id antiquæ Tussi & asthma, aliisque Thoracis vitiis à crassis ac pituitosis humoribus ortis auxiliantur.

Agaricum in compositionibus pilularum à nobis semper sumitur trochiscatum.

Aggregativæ majores Mesuæ, ex eadem Pharm.

4. *Myrobalanorum citrinarum*, *rhæbarbari* an. 3iij. *succor. inspissator. Agerati*, *absinthii* an. 3ij. *dacrydii* 3vi. *myrobalan. chebularum*, *indarum*, *agarici*, *colocynthidos*, *polypodii* an. 3ij. *Turbith. aloes* an. 3vi. *massiches*, *rosarum*, *salis Gemmæ*, *Epithymi*, *anisi*, *zingiberis* an. 3j. *cum syrupo rosato sol. fiat massa.*

Polychresta cataplotia dicuntur, quod ad multos affectus corporis præter naturam sint utilia, ac omnes humores purgant; ad varios enim capitis, ventriculi, Jecorisque morbos, ut & diuturnas ac complicatas febres sunt efficaces.

Quidam dacrydii 3. tantummodo V. legunt, potior tamen Medicorum pars sex drachmas adscripsit. Ubi succus Absinthii in pilulis sumendus est, vulgaris sive nostratis Absinthii succum statuimus intelligendum.

Cæterum hic aliive succi inspissati, si nimium indurati fuerint, pro pilularum massæ conficienda, prius in liquore (uti hic in syrupo ros. sol.) solvendi sunt, antequam reliqua addantur.

Aggregativæ minores Mesuæ, ex eadem Pharm.

4. *Myrobal. citrinarum*, *indarum*, *emblicarum* an. 3ij. *massiches*, *anisi*, *succor. inspissatorum Agerati*, *absinthii*, *rosarum*, an. 3j. *Rhæbarbari* 3v. *specierum Hieræ picræ Galeni* 3xij. *cum succo apii formetur Massa.*

Pituitam & bilem utramque è ventriculo, & capite purgant, obstructions hepatis aperiunt, ipsumque cum ventriculo roborant, febres antiquas, pruritus & ulcera maligna juvant.

Melichius in dispensatorio suo, non aquarum tantum, sed etiam succorum usum in conficienda massa pilulari planè excludit, eorundemque loco mel, aut syrupum aliquem tenuioris consistentiæ substituit: quem tamen vicissim alii rejiciunt. Nos dictorum nullum improbamus, cum rationes in contrarium partim adductæ exigui sint momenti,

Pilulæ Alephanginæ seu Aromaticæ Mesuæ, ex eadem Pharm.

4. *Cinnamomi*, *cubebæ*, *ligni aloës*, *calami aromatici*, *nuçis moschata*, *macis*, *cardamomi*, *caryophyllorum*, *rad. asari*, *massiches*, *schœnantii*, *spice indicæ*, *galangæ* an. 3j. *absinthii sicci*, *rosarum rubrarum* an. 3v.

Dimidia pars horum aromatum crassiusculè coctusa infundantur in aquæ ʒiij. coquantur lento igne ad mediæ partis consumptionem, deinde exprimantur & colentur. In colatura dissolvatur Aloës focotria cum aqua pluviali elotæ, id est, depuratæ ʒij. & ulteriori coctura ad justam consistentiam perducatur, ut cum reliqua aromatum parte subtilissimè trita, nec non pulveris, myrrhæ, massiches an. 3v. croci 3iij. fiat massa.

Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia ab humoribus crassis, putribus, & pituitosis mundificant, ac inde natos dolores tollunt, stomachi robur augent, coctionem promovent, appetitum instaurant, cruditates abolent, ac nutritioni dicatas partes plerasque à noxiorum humorum, frigidorum præferunt, adaccumulatione tuentur.

Medicamentum hoc, quod Mesuæ à Lamponè Pelusiotæ mutuatus esse videtur, uti adparet ex Galeno lib. 8. de comp. med. secund. lot. cap. 2. utpote quod cum Hieræ Lamponis ferè concordet, ab Auctore potius ad corroborandum ventriculum & cerebrum, quam alvum ducendam est institutum. Dicuntur autem hæ pilulæ Aromaticæ, eò quod multis constant aromatibus, itemque pilulæ solis, quod in sole seu insolando, sine ulla tamen necessitate, olim à quibusdam confectæ fuerint.

Pilulæ de Aloe rosata, è Pharm. August.

4. *Aloës optima*, quæ succum rosarum tertia vice imbiberit, atque resicata fuerit, 3j. ex qua cum vino fermentur pilulæ pro lubrico.

Minus quidem purgant, magis tamen reborant; cruditates absumunt, adstrictam alvum solvunt, ac humorum putredinem argent.

Eodem modo cum infusione violarum paratur aloë violata, quæ, plurimum judicio, pilulas sic dictas Francofurtenses constituit.

Pilulæ de Aloe lota incerti Autoris ex eadem Pharm.

4. *Aloës cum succo rosarum lotæ* 3j. *Agarici trochiscati* 3ij. *massiches* 3j. *specierum diamoschi dulcis* 3ß. *cum vino malvatico singatur Massa.*

Ventriculum, cerebrum, uterum, & alia viscera à putridis & pituitosis humoribus expurgant concoctionemque promovent.

Pilulæ de Aloe, & mastiche Nicolai Myrepsi, ex eadem Pharm.

4. *Aloës* 3j. *massiches* 3ß *caryophyllorum*, *rosarum rubrarum* an. 3j. *croci*, *dacrydii* an. 3j. *cum succo absinthii formetur massa.*

Ventriculum sine molestia purgant, ex eoque bilem & pituitam eliciunt, ac nutritioni dicatis partibus robur præstant.

Pilulæ de Aloe violata, Pharm. Norimberg.

4. *Aloës pura* ʒij. *muscharum violar. è flor. integr.* ʒiij. *resina scam.* 3vi. *massichis* 3iij. *F. l. a. Massa.*

Pilulæ Diambæ è Pharm. London.

4. *Gummi guajaci recent.* *Aloës rosata* an. 3iij. *specier. Hieræ simpl. sesquidrachmam*, *massiches* 3j. *Ambræ griseæ* 3ß.

Fiat omnium pulvis subtilis, qui excipiat. f. q. balsami Peruani nigri, ut F. massa pilularis.

Pilulæ de Ammoniaco Quercetani, è Pharm. August.

℞. Balsami Aloëti ʒiij. gummi ammoniaci puri in aceto scillino dissoluti ʒvi. myrrha electa ʒß. mastiches, specierum diatrion sandal. an. ʒiß. croci, salis fraxini, Absinthii ana ʒij. cum syrupo de stachade fiat pilularum massa.

Ad omnem totius corporis faculentæ materiæ abundantiam educendam, cachexiam, febres inveteratas, & diuturnas tollendas, maximè conducunt, citra omnem etiam molestiam & perturbationem exhibentur.

Pilulæ Angelicæ seu de Aloë & rhabarbaro, ex eadem Pharm.

℞. Aloës socotrine ʒij. quam dissolve in succor. depuratorum cichorii, endivia, buglossi, borraginis, lupulorum fumaricæ an. ʒiij. rosarum damascenarum ʒij.

Lento igne ad justam consistentiam deducantur, ut cum sequenti pulvere.

℞. Pulveris Rhabarbari electi ʒj. Agarici trochiscati ʒß. cinnamomi electi ʒij. fiat massa pilularis.

Virtus harum pilularum admiranda & nunquam satis laudanda existit, quoniam ad omnium viscerum nobiliorum corroboracionem commendantur, pravorum insuper humorum correctionem, & blandissimam evacuationem promovent, ut nullum planè sit dubium, quin cità & jucundà suâ operatione omnibus abunde sint satisfacturæ.

Pilulæ Anodynæ Cortesii.

℞. Laudani opiat, seu extracti opii ʒß. piperis Indici in aceto per noctem infusi & siccati ʒij. croci ʒiij. myrrhe ʒij. moschi gr. vj. Cum vino Hispanico F. massa.

Dolores colicos sedant, & somnum provocant. Dos. est à gran. ij. ad gr. viij. massæ autem earum grana tria granum unum opii & paulò amplius continent.

Pilulæ Arabicæ Nicolai ex Pharm. August.

℞. Aloës optima ʒij. radicit bryonia, myrobal. omnium mastiches, dactydia, Asari, rosarum an. ʒß. castorei ʒiß. croci ʒß. succi feniculi quantum satis est. formetur massa.

Omnes humores purgant: auditum amissum reparant, vertigini, hemicranie, ac dolori capitis succurrunt.

Pilulæ Arthriticæ Nicolai ex eadem Pharm.

℞. Hermodactylorum, Turbith. Agarici an. ʒij. castie lignæ vera, spica indise, xylobalsami, carpobalsami, Galanga, caryophyllorum, macis, assæ fetide, Zingiberis, mastiches, sem. feniculi, Anisi, saxifragie, asparagi, rusci, milii solis, rosarum, salis gemma an. gr. xv. dactydia ʒß. Aloës optime ad pondus omnium, idest. ʒxiiiß. succi feniculi quantum sufficit. fiat massa.

Ad Arthricos dolores & podagræ insultus, nec non frigidorum humorum in articulos procubitus aut defluxiones adhibentur.

Notandum, ex asparagi & rusci seminibus pulpam solùm carnosam, abjectis granis in meditullio contentis, sumi debere, cum in iis vix ulla vis huc expectata resideat. Idem iudicium esto de berberibus ac similibus.

Pilulæ Arthriticæ Herbipolenæ.

℞. Rad. Aristoloch. long. ʒß. rotund. ʒij. polipod. q. ʒß. cranii human. præp. ʒij. cum gumm. Tragacant. ʒß. q. ros. solut. & syr. rosar. solut. fiant pil. quæ per an-

num singulo mane ad ʒß. assumtæ, ad podagram curandam à multis pro arcanis habitæ fuerunt, sed infastus successus bonam eis famam ademittit apud plures, intermediari verò debet singulis mensibus post plenilunium purgans aliquod conveniens.

Pilulæ Arthriticæ Norimbergensium.

℞. Pulv. chamapityos, chamædr. ver. an. ʒij. centaureæ minor. rad. Aristol. rot. rhapont. ver. gentian. sem. hypericæ human. spagir. præparat. an. ʒiß. rad. cichor. santalæ rubri an. ʒj. incorporentur cum f. q. succi Chamæpyt. addendo nonnihil Theriæbint. cypr. pro meliori unione, fiant pil. pro lubitu. Vires titulus indicat.

Pilulæ Arthriticæ Schefferi ex Pharm. Schrod.

℞. Resin. Jalapp. ʒß. essent. rhabarb. ʒj. Aristoloch. rot. ʒiv. gentian. Tartar. vitriolat. an. ʒj. Diagrid. rosat. ʒiv. mag. chalyb. ʒj. M.F. cum essent. folior. senn. pilula numero xxx. pro ʒj. & deaurantur.

Hæ pilulæ apprimè conveniunt in catharrois fluxionibus, in primis iis quæ ad artus decumbunt, pituitam & serosos humores blandè educunt, & viscera obstructionibus liberant. Dosis v. vi. vii. vel ix.

Acuuntur interdum Troch. Alhandal. mag. Gutt. Genu. &c.

Pilulæ Affajeret Avicennæ, ex Pharm. August.

℞. Specierum Hiera picæ Galeni ʒß. mastiches, myrobalanorum citrinarum an. ʒij. Aloës optima ʒj. cum syrupo de stachade formentur pilulæ.

Bilem flavam & pituitam leniter purgant, eam præsertim quæ ventriculo insidet, ideoque ventriculi affectibus, quibus Hiera remedio esse solet. Et capitis doloribus à vitiosis stomachi succis obortis, auxiliatur; propinatur in tenuibus & acribus capitis fluxionibus, ut liquidam materiam facile decumbentem sistant. Describuntur ab Avicenna Fen. i. lib. 3. cap. 29.

Pilulæ Aureæ Nicolai, ex Pharm. August.

℞. Aloës, dactydia an. ʒv. rosarum rubrarum, sem. Apii an. ʒiij. sem. Anisi feniculi an. ʒiß. mastiches, pulpa colocynthidos, croci an. ʒj. mellis rosati solutivi quantum satis est. Fiat massa.

Caput expurgant, sensus omnes, præcipuè oculorum aciem exacuunt: flatus ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citra molestiam deliciunt alvum, ad stomachicos, colicos, nephriticos, & inflatos valde probantur.

Pilulæ de Bdellio majores Mesuræ, ex eadem Pharm.

℞. Bdellii ʒxii. myrobal. chebularum, indarum, belitricarum, Emblicarum, concharum venerearum ustarum, charabæ an. ʒiij. Ammeos parum tosti ʒiij. maceretur Bdellium in succo foliorum porri, & formetur massa.

Ad fluxum hæmorrhoidum, & ulcera ex eis provenientia hec non menses immodicos utiliter exhibentur.

Concha venerea describitur à Gesnero de crustatis ordine xv. fol. 254. Tota intus candida est, foris corticelævis, atque varietate colorum & macularum inspersarum insignis.

Pilulæ de benedicta ex Pharm. August.

Fiunt ex speciebus benedictæ solutivæ, incorporatis cum melle rosaceo.

Humores pituitosos potissimum ad Articulos decumbentes eliciunt; à renibus quoque & vesica purgant.

Pilulæ Benedictæ è Pharm. Schrod.

℞. Aloës rosar. ʒß. Gumm. ammoniac. in guttis, & purissimè

purissimi ℥ij. succ. card. benedict. inspissat. ℥j. m. cum vino albo vel aq. card. benedict. rectificata.

N. aloë succotrina purissima subtilissimè teritur, succus rosarum incarnatarum ad pulvis consistentiam permiscetur, siccatur, teritur.

Ufus ante & post pastum, imo ejus initio ac fine. Dosis gran. xv. ℥j. &c.

Hæ pilulæ quatenus recipiunt aloë rosatam, & Gummi ammoniacum; quarum illa est succus, qui ex aloë & succo rosarum vel infusione illarum dilutus sapius, iterumque exsiccatu fuit, & crebrioris est usus, ideoque nec istæ pilulæ sua laude sunt defraudandæ ob simplicem illam præparationem, quæ omnibus aliis compositionibus præripit palmam. Hofmannus.

Pilulæ Cachecticæ D. Charraz.

℥. Trochiscor. alhandal. ℥β. aloës electa, myrrhæ Galbani, ammoniaci an. ℥ij. præcipitati mercurii cum auro præparati ℥j. scammonii, jalappæ, agarici albiss. an. ℥β. olei nucis moschata expressi ℥j. succini, cinnamomi & caryophyllorum an. Gut. vi. extracti juniperi q. s. F. ex ea massa pilularum.

Multum commendantur hæ pilulæ in cachexiis, febre quartana. Hydrope, ictero, & in menstruorum suppressione; sumuntur hora una antequam cubitum eatur. Dos. à gr. iij. ad gr. ix. repetendo earum usum pro exigentia.

Pilulæ de Castoreo Avicennæ, ex Pharm. August.

℥. Castorei, doronici, Zedoaria, nucis moschata an. ℥j. sem. Apii, Anethi, matris perlarum an. ℥ij. hyoscyami gr. iij. formetur massa cum mucilagine Tragacanthi in aqua Artemisia soluta.

Uterinis doloribus conferunt, crassos flatu dissipant, ac impeditas menstruas purgationes eliciunt.

Pilulæ Extracti Catholici è Pharm. Amstelod.

℥. Pulpa colocynthis ℥vi. agarici albi, hellebori nigri, pulveris diarrhodon abbatis an. ℥β.

Ex his extrahatur tinctura per spiritum vini; cui percolatæ adde pulverem Aloës lucidæ ℥j. scammonii præparati ℥β. evaporent in extracti consistentiam.

Pilulæ pro Chlorosi D. Charraz.

℥. Extracti martis cum musto parati ℥j. extracti aloës succotrina cum succo cichorii parati ℥vi. extracti rhabarbari ℥β. extracti croci ℥j. olei stillati cinnamomi gutt. vi. ex simul mistis fiat ex a. massa pilularum ad usum.

Exhibentur hæ pilulæ mane jeuno stomacho, superbibendo vini Absinthitis ℥j. aut iij. statimque per horam dimidiam ambulando. Dos. ℥j. usus debet in plures dies continuari.

Pilulæ Cholagogæ de Centaurio Quercetani è Pharm. Schrod.

℥. Succor. optimè depuratorum centaurii minor. rosar. pallidar. Eupator. Mesue. rad. oxylapathi an. ℥iv. quibus adde aloës præparat. (ad modum Quercet. vide lib. 4.) ℥vi.

Digerantur MB. hor. duodecim, ut fiat perfecta dissolutio & mixtio, dein omnia coagulentur ad mellis consistentiam cui adde pulv. rhabarb. ℥j. xylo Aloës, myrrhæ an. ℥j. croci, cinamomi an. ℥β. spec. Diatr. anat. Trochis. Diarrhod an. ℥j. M.F. massa.

Profunt in omnibus febribus biliosis, arquato morbo, & cachexia. Jecoris iridem cæterarumque partium nutritioni dicatarum, obstructionibus mirificè auxiliantur. Dosis à ℥β. ad ℥j.

Hæ pilulæ virtutem suam satis etiam exserere possent cum succo tantum centaurii minoris sapius

imprægnatæ, & iterum exsiccatæ, licet succus rosarum pallid. eupator. Mes. Radic. oxylapathi & reliquorum, pilularum istarum virtutem antiseibilem potius impredientium, planè proscriberetur; Aloës enim præparatio non melius peragitur, quam cum paucis ejusmodi balsamicorum succis, ut alibi uberius docebimus. Hofmannus.

Pilulæ Cochix Rhasis, ex Pharm. August.

℥. Specierum Hieræ picæ rhasis ℥x. pulpa colocynthis ℥ij. ℥j. dacrydii ℥ij. stachadis, Turbith an. ℥j. Syrupi de stachade quantum satis est. Fiat massa.

Cephalicæ rectè dicuntur, eò quod caput magna efficacia expurgent, ideoque à nervis crassos, pituitosos & frigidos humores evacuent. Describuntur à Rhase 9. ad Almanforem cap. i.

Pilulæ Cochix aliæ.

℥. Aloës lucidæ, scammonii purissimi, pulpa colocynthis an. ℥j.

Trita excipiantur sufficienti quantitate, & æqualibus partibus Syrupi Absinthii, & de spina cervina. F. massa f. a. addendo olei stillat. Caryophyllorum ℥j.

Pilulæ pro Colico morbo D. d'Aquin, è Pharm. D. Charraz.

℥. Aloës succotrina electa in succo rosar. pallidar. diluta & inspissata ℥ij. agar. electi ℥β. extracti rhabarbari ℥j. hepatis lupi præpar. ℥vi. summat. Absinthii ℥β. pulv. diarrhodonis abbatis & salis absinthii, nucis moschata an. ℥β. cum syrupo de cichorio compositum cum rheo F. massa.

Benigne purgant humores biliosos & serosos, quorum etiam præveniunt & impediunt accumulationem & fermentationem, & ea ratione curant morbos colicos præcipuè illum qui Pictonum dicitur. Sumuntur alternis diebus continuato usu pro exigentia & ratione intentionis morbi curandi Dos. ℥j. ad ℥j.

Pilulæ de Colocynthide Mesue è Pharm. August.

℥. Pulpa colocynthis ℥vi. myrobalan. indarum, ciurmarum, sagapeni, bdellii, sarcocolla an. ℥v. alii ℥vii. nigellæ, cumini carmanici orientalis, origani citrici, nasturtii albi sativi, salis Gemma, Absinthii romani an. ℥j. succi porri quantum est. Fiat massa.

Articulorum doloribus profunt, pituitosos quoque & melancholicos affectus profligant, unde etiam alphas curatu difficiles ad sanitatem perducunt. Cautè tamen iis utendum, magna enim colocynthidis quantitas compositionem hanc ingreditur, unde ad alias solum pilulas acuendas quandoque adhibentur.

Lachrymæ seu Gummia ad constitutionem harum pilular. requisita in succo porri seorsim dissolvantur, ac tum demum reliquis speciebus addantur, & in massam cogantur.

Pilulæ Cordiales & Cephalicæ Zuvelfferi.

℥. Ambra gryf. opt. ℥j. solvatur in olei cinamomi & caryophyllor. ℥β. nuc. mosch. expr. ℥j. quibus invicem bene mixtis adde pulv. Cardamomi, nuc. mosch. an. ℥ij. croci Austriac. ℥β. sem. carvi, Anisi an. ℥β. extracti ligni aloës n. refina stor. cal. an. ℥ij.

Misceantur exactè ac cum f. q. mellis nostri citrati vel Anthos. Fiat massa, ex qua pilulæ efformandæ vel in alia aliqua medicamenti forma propinanda caput, cerebrum, sensusque omnes, ventriculum insuper, & totum corpus roborant, Anhelitum putidum & fætidum emendant, spiritusque animales & vitales recreant.

Pilulæ de Cynoglossio Nicol. Præpositi, ex Pharm. August.

℞. Rad. cynoglossi siccarum sem hyoscyami albi, opii depurati an. ʒss. myrrha ʒvi. Thuris ʒv. caryophyllorum, cinnamomi, styracis calamitæ an. ʒij. cum syrupo ex succo violarum, & succo cynoglossi, lege artis formetur massa.

Has Nicolaus à Mesue mutuatus est, qui eas sub titulo pilularum ad omnes morbos catarrhicos hoc modo descripsit

℞. Opii, cynoglossi, hyoscyami an. ʒss. myrrha pura ʒvi. olibani ʒv. croci ʒiʒ. fiat massa.

Nobis etiam alia compositio in usu est, quam castoreum ingreditur, quod singulari vi opii qualitatem noxiam emendandi pollere creditur.

Pilulæ de Cynoglossio cum castoreo ex eadem Pharm.

℞. Opii, radicem cynoglossi, seminum hyoscyami an. ʒss. myrrha pura ʒvi. olibani ʒv. styracis calamitæ ʒij. croci Austriaci, castorei genuini electi an. ʒiʒ. cum succo cynoglossi, & syrupo ex succo violarum partibus aequalibus. Fiat massa.

Catarrhos tenues sistunt, ac tussim inde natam sedant: omnibus quoque defluxionibus, sive in Thoracem, sive in pulmones, dentes, aut aliò ferantur, conferunt, somnum conciliant, ac omnis generis dolores placent.

Pilulis istis Benedictus Faveninus, medicus Bononiensis celeberrimus, in catarrho falso, magno successu cum succo glycyrrhizæ & Aloë lota secundum hanc descriptionem utebatur:

℞. Succo glycyrrhizæ ʒj. Aloës lotæ ʒj. pilul. de cynoglossio ʒss. cum syrupo violato fiat massa.

Pilulæ Diaphoreticæ, è Pharm. Schroder.

℞. Cinnabar. Antimonii rectificat. ʒj. præservativi ex croco, myrrhæ & aloës ʒss. crystall. sulph. ʒj. ol. guajac. q. s. ad corporationem.

F. pil. duæ, exhibeantur superbibendo cochl. i. acidi guajac. mixti cum tribus partibus vini alb.

Cinnabar. Antimonii rectificat. minus dextre in pilularum massa traditur, virtute ejus diaphoretica & antiepileptica specifica à resinosis aliis ingredientibus suppressa, id quod crystalli sulphuris cum oleo guajacino non contrigent. Ideoque commodior harum pilularum fiet præparatio, si cinnabari exclusa, solum ex croco, myrrhæ & aloë cum crystall. sulphuris & ol. d. guajacino. l. a. pilulæ dictæ componantur.

Pilulæ Diureticæ ex eadem Pharm.

℞. Tereb. venet. vitrioli albi, an part. æq. m. in mortario marmoreo terendo diutissime, usque dum simul incorporentur, quod difficultate non caret. Dos. est à ʒj. ad ʒij. Tereb. vitriolo addita vim ejus vomitivam refrenat & diureticam conciliat.

Si vitrioli albi vis emetica cum Terebinthina in diureticam degenerare debet, satius duco, dimidiam partem vitrioli albi sumere, & Terebinthinæ duplum substituere, sic enim hujus vis diuretica illius emeticam vincens & refrenans ambæ in diureticam convertentur, & melius etiam incorporabuntur. Hoffmannus.

Pilulæ ex Duobus, è Pharm. Londin.

℞. Colocynthis, scammonii an. ʒj. olei caryophyll. l. unum q. s.

Ut optime malacissentur, & subigantur unâ; mox cum momento syrupi de sp. n. cervina; si ut massa.

Pilulæ Anti-Epilepticæ S. Clossii, è Pharm. Schroder.

℞. Precipitati solaris per se in matrasio ign. fabrilis

continuo parati ʒj. cinnab. mineralis Div. ol. Antimon. febrifugi (ut d. citur capite de Mercurio) gutt. xx. Extrahit castor. per spir. vin. evaporando facti. Succin. an. ʒj. de pæon. mare cum spir. vini f. lti; pæon. faminis bryon an. ʒiʒ. fol. helleb. nigr. subtiliss. triturat. ʒj. Fiat pulvis & cum succo porri massa pilularum, cui admisce ol. Angelic. sativ. Spiritus vitrioli an gutt. x.

Ufus: cape ante paroxysmos aut post quadrantem lunæ pill. duas ʒj. ponderantes, sumendo postea jusculum carniū acido vitrioli conditum.

Hæ pilulæ tam ob egregiam compositionem, quam summas vires, quas ad virus epilepticum abigendum exercent, non satis dilaudari possunt. Hoffmannus.

Pilulæ de Esula Fernelii è Pharm. Schroder.

℞. Cortic. rad. esulæ minor. macerata hor. 10. in aceto & succo portulacæ ʒij. gr. ricini expurgata & torrefacta numero xl. mirobalanor. citrinor. ʒiʒ. Chamædrys, chamæpitrys, spica nardi, cinnamomi an. ʒj. omnia tenuissime trita excipiantur Tragacanth. aq. rosar. solut. ʒj. F. massa.

N. Esula non sic recens, sed saltem ante menses octo coll. cta.

Vires, Valde turbant, sed sunt efficaces in corporibus robustis.

N. Minus exiccabuntur, sed & minus efficaces erunt, si excipiantur syrupo rosarum solutivo, non mucilagine Tragacanthi. Dosis à ʒj. ad ʒiʒ. &c.

Pilulæ de Eupatorio majores Mesuæ, è Pharm. August.

℞. Myrobalanorum citrinarum, succor. inspissatorum ægerati, Absinthii ana ʒij. rhabarbari ʒiʒ. mastiches ʒj. croci ʒss. Aloës ʒv. succi endivie quantum satis est, fiat massa.

Viscerum obstructionibus, atque ictero medentur febribus periodicis, complexis & diuturnis, percutiles: lienis & jecoris obstructiones reserant; biliosos, tenues ac crassos humores educunt.

Pilulæ de Euphorbio Mesuæ, è Pharm. August.

℞. Euphorbii, colocynthis, Agarici, Bdellii, sagapeni an. ʒij. Aloës ʒv. cum succo porri fiat massa.

Pituitam crassam à partibus remotissimis potenter educunt: nervorum item resolutioni, siderationi, paralyti, articulorum malis à nimia humiditate profectis, ac hydropicis conferunt, lumborum quoque doloribus, ichiadi, & podagræ à frigidis ac pituitosis humoribus ortæ opiculantur; sed non nisi robustis exhibendæ.

Modus componendi hic est: ut euphorbium accuratè tritum cum Agarico trochiscato & Trochiscis Alhandali in pulverem redactis, gummibus vino prius dissolutis jungatur, cum quibus in mortario repesto, pistillo calido tam diu subigatur, donec in massam coeant: cui Aloe unâ cum sufficienti quantitate succi porri addita permisceatur, ac probè si cuncta simul unita pilularis pastæ formam lege artis adipiscantur.

Pilulæ de Euphorbio Quercetani, ex Pharm. Schroder.

℞. Euphorb. præparat. (ad modum Quercet. vidi lib. 4.) ʒj. spic. nardi, mastichei an. ʒvi. opoponac. sagapeni præparat. Bdellii an. ʒss. Agaric. Troch. Troch. alhandal. an. ʒiʒ. syrupi violati aciduli q. s. F. massa.

Vires, mirabiles sunt contra omnis generis febres chronicas, intermittentes atque quartanas, nec non contra omnes cachexias, hydropisim & colicos dolores. Dosis à ʒj. ad ʒj.

Pilulæ Fætidæ majores Mesuæ, ex Pharm. August.

℞. Sagapeni, Ammoniati, opoponacis, Bdellii, colocynthis,

cynthidos, seminis ruta hortensis sicca, Aloes, Epithymi an. ʒi. hermodactyloꝝ, esula preparata an. ʒij. scammoni præp. ʒi. j. cinnamomi, spica indica, croci, castorei an. ʒj. Turbith. ʒiij. Zingiberis ʒß. Euphorbiæ ʒj. succi porri depurati quantum satis est. F. massa.

Pituitam crassam, lentam ac tenacem evacuant, ob id affectibus inde natis: Arthritidi, podag. æ, gonagræ, spinæ quoque ac juncturarum, nec non ventriculi & coli doloribus profunt, alphas, elephantiasin, & cutis vitia emendant, menses movent, ac impurum uteri mucum emungunt. Cum autem sint admodum valentes, consideratè eorum usus ineundus erit, unde in morborum principiis cruda adhuc existente materia vix unquam, nec nisi robustis exhibendæ: purgantium enim vis minimè in iis supressa, non modo suspectas, verùm etiam parùm rutes eas reddit.

Nota: lachrymæ, seu Gummia in succo porri calefacto solvantur, quibus deinde Euphorbium per se tritum unâ cum cæteris addatur, ut lege artis in pastam pilularum abeant.

Pilulæ Febriles S. Antimoniales Hartmanni, ex Pharm. S. broder.

℞. Vitri Antimonii (justo tempore sifleri potest, & diligentissime) preparati, prætereaque cum spiritu vitrioli albisficati & tenuissime pulverisat. ʒß. sacchar. candi ʒij. Farin. tritic. ʒiv croci electi ʒj.

Coque cum Aq. commun. l. igne ad consistentiam pultis, cavendum tamen studiosè, ne in fine massa aduratur, sed ferè panis formam habeat. Asservantur in integritate sua quadriennium: postea tandem scabietatem contrahunt, minus deinde utiles.

Vires. Mirificè febriles mineras, aliaque symptomata exhaustiunt. Exhibentur ante paroxysmi insultum, cum vestigia horroꝝ gliscunt.

Dosis à ʒß. in pueris; ad ʒi. in adultis fortioribus.

Hæ pilulæ ob vim drasticam emeticam, quam vitrum antimonii spiritus vitrioli additione non deponit, admodum suspectæ sunt, inprimis in febribus, in quibus ab Autore ante paroxysmi insultum commendantur. Cum Antiquario Cl. Riverii compositæ pilulæ melius voto respondent, hujus descriptionem infra habebis. Hofmannus.

Pilulæ Febriles aliæ ex eadem Pharm.

℞. Extr. card. bened. ʒß. centaur. min. ʒj. c. c. ñst. preparat. sal. absinth. an. ʒß. cum syrupo de card. bened. F. num. xx. Vfus: Exhibeantur ante paroxysmum expecteturque sudor.

Hæ majoris erunt efficaciz, si loco CC. usui sal CC. volatile cum sale absinth. & cum Extract. Card. bened. & centaur. min. liquid. subordinatum in pilulas subigeretur, omisso syrupo Card. bened. Hofmannus.

Pilulæ aliæ ad Quartanam Sennerti, ex eadem Pharm.

℞. Ol. Antimonii saccharati ʒj. Aloës succotr. ʒß. Ambr. gryf. ʒij. croc. ʒiß. (vel essent. croc. ʒj.) F. massa pilularum.

Vires. Purgat per inferiora, nonnunquam per sudorem. Dosis ʒß. ante paroxysmum, cum conserva vi. g. rosarum &c.

Aliæ Schefferi, ex eadem Pharm.

℞. Sp. hier. picr. resin. ʒalap. an. ʒij. Fecul. Arox. essent. rhabarb. l. gn. colubr. gentian. centaur. min. rosar. rub. diagrid. rosat. tartar. vitriolat. an. ʒj. ol. citri. g. vi. m. F. cum essent. Fol. sen. pilula n. xxx. pro ʒj.

In omnibus febribus intermittentibus admodum utiles sunt, & in ventriculi compressionibus, ejusque cruditatibus à bile & pituita ortis, vermes quoque

expellunt. Dosis ʒij. iv. v. vi. vii.

(Pilulæ Glassii Archiatri Goth. ni, quæ cum angelicis certare putantur, ex Ali. succotrina aq. simpl. extracta & depurata, inque MB. vaporoso coagulata, & succo violarum sæpius nutrita, adjecta inter extrahendum ari non præparati, vel scyllæ, particula, & cum Elixir proprietatis, vel essent. Absinth. alkali. fata, constant sec. Hofm. Dos. 4. 7. 9. ante vel post cænam formatæ instar Angel car.)

Celebrantur in ventriculi cruditatibus, affectibus hypochondriacis, & pro præservatione ab Arthritide.

Pilulæ Francofurtenses, è Collectan. Chymic. Leidenfib.

℞. Aloës succotrina q. p. contunde in pulverem tenuem. Fiatque extractio ex hoc pulvere cum succo violarum depurato, lenique evaporatione ad consistentiam extracti redigito. Hoc bis, terve, repete, ultima vero vice f. extractio cum spir. vini, quam per destillationem ad formam extracti cogito. Formentur ex massa hæc pilulæ ad libitum. Ex ʒi. f. pil. lxxx. Dos. sit pil. viii. xii. ad xv. usque.

Quòd si tantum in depuranda Aloë desumere nolueris, sequenti modo corrigito.

℞. Aloës succotrina, q. p. conterito in pulverem tenuem, eique effundito aq. pluvialem, & simul terito. Aquam, ubi Aloë impregnata observaveris, effundito hocque continuato, quousque Aloë tincturam suam aque communicare ulterius recuset. Tunc adde Aloë dupl. arenæ lotæ, & simul fortiter, conterantur. ita enim successivè tradit Aloë omnem suam tincturam, nihilque in fundo remanebit, nisi facies abiicienda. Aquam vero tinctura Aloës impregnata evaporato ad consistentiam extracti: ita enim obtinebis Aloë verè lotam & correctam blande purgantem absque ulla molestia.

Hoc extractum, si de novo misce e volueris, cum succo violarum vel rosarum, Aloë obtinebis verè violatam, vel rosatam.

Pilulæ de Fumaria Avicennæ, è Pharm. Augst.

℞. Myrobal. citrinarum, chebularum, indarum an. ʒv. Aloës ʒvii. scammoni præp. ʒv. succi fumiteræ quantum satis est.

Omnia in pulverem redacta succo fumiteræ jam dicto comprehendito, siccarique postea finito: dehinc rursus trita novo succo excipito, rursusque siccat, & sic tertium iterato, ac postmodum in Massam formato.

Pituitam fassam, biliosos itidem, acres ac adultos humores, à quibus pruritus & scabies oriuntur, solvunt & sanguinem mundificant. Describuntur ab Avicenna lib. 4. Fen. 7. cap. 7. in cura pruritus & scabiei.

Pilulæ ad sistendam Gonorrhæam D. Charri.

℞. Rad. bistorta, tormentilla, nymphæ, baccar. hedera, sem. lactuca, ruta, agni casti, succini, sanguin. hirci, mastiches, olibani, lachrymarum sanguinis drac. nunciis moschata, an. ʒß. cum terebinthina veneta f. massa.

Debent tantum exhiberi hæc pilulæ cum jam omnis gonorrhææ malignitas victa est. Sumuntur mane & vespere longe à pastu, earum usum per plures dies continuando præcipue si vasa valde debilia facta sint. Dos. à ʒß. ad ʒj.

Pilulæ Gummosæ Clossæ, è Pharm. Schroder.

℞. Gumm. ammon. galban. in aceto scylli. liquat. & per luteum traject. an. ʒi. j. aloës in vesica, myr. b. an. ʒij. massich. croci orient. an. ʒj. Turbith. Agar. trochisc. an. ʒiv. trochisc. Alhandal. ʒj. scammon. præp. in spir.

vini ʒiʒ. Balsam. Peruv. tepidi ʒiij. m. omnia simul, & adde ꝯcum ꝯ precipit. ʒiij.

F. massa pilularum in aluta ol. amygdal. dulc. involvenda; coquenda sunt lento igne. Acet. paulatim evaporato (spatula semper agitando) materia in massam reducatur. Dosis cap. ij. aut iij. instar baccarum juniperi hora prima ante cenam & in ingressu lecti.

Vires. Dupliciter agunt in morbis quattuorariis, hydropē, cachexia, chlorosi, menstruīs provocandis, ictero utroque; primo per vim attenuantem & emoll. materiam præparant cathartici: expellendam; secundo humores liquatos fluxilesque redditos blandè expurgant.

Has pilulas ob compositionem & præparationem corrigere nequimus, monentes saltem, ut medicus in illorum usu sit cautus & circumspectus, ne viribus ægroti jamdum exhaustis adhibeat, si illis uti efflagitet necessitas. Non enim sine colliquatione humorum operationem perficiunt. Hofmannus.

Pilulæ de Gutta Gamandræ, è Pharm. Londin.

ʒ. Aloës opt. ʒiij. Resina gutta Gamandra ʒiʒ. scammonii ʒi. Gum. Ammoniaci ʒiʒ. tartari viriolati ʒiʒ. cum syrupo rosarum solutivo. Fiat massa pilularis.

Pilulæ de Hermodactylis majores Meluæ, è Pharm. August.

ʒ. Hermodactylorum, myrobalarum citrinarum, Aloës, turbit, colocynth. dos, Bdellii puri, sagapeni an. ʒvi. castorii, sarcocolla, Euphorbii, opopanax, sem. rutæ sativæ, Apii an. ʒiij. croci ʒiʒ. succi brassicæ, sive caulium quantum satis est. Formetur massa.

Crassos, frigidos, & viscidos humores ex remotissimis partibus educunt; quo nomine Arthritidi conveniunt.

Modus confectionis est: ut liquores concreti, seu Gummi in succo calefacto brassicæ sive caulium dissolvantur, atque his per seraceum trajectis, euphorbium & castorium simul, trita jungantur: his deinde addantur reliqua & fiat massa.

Hermodactylorum bulbi veri eligendi sunt, qui reficcati ad pes feruntur, albidi, non rugosi, modice duri, qui confusi in candidum pulverem abeant. Cavendum Colchicum strangulatorium, cujus radices seu bulbi siccati rugosi evadunt, & foris intusque nigricant, vel obscure rubescunt.

Quidam simplicius sic componunt.

ʒ. Hermodactylorum benè purgatorum & pulverisatorum, dacrydis an. ʒx. cumini, caryophyllorum, Zingiberis, costi an. ʒv. Aloës hepatica ʒiij. fiat massa cum aqua feniculi.

Pilulæ hæ non minoris sunt efficaciz quam priores, quarum descriptionem clarissimus Vir Dn. D. Georg. Henrichius, Medicus quondam Augustanus, olim dispensatorio inseri curaverat.

Pilulæ de Hiera cum Agarico, è Pharm. August.

ʒ. Specierum hieræ picræ Galeni, Agarici trochiscati an. ʒiʒ. aloës ʒi. mellis rosati quantum satis est, fiat massa.

Stomachicis, asthmaticis, aliisque ventriculi & Thoracis vitis, à crassis & pituitosis humoribus ortis subveniunt.

Pilulæ de Hiera picra Galeni, ex eadem Pharm.

ʒ. Specierum hieræ picræ Galeni ʒiij. mellis rosati quantum satis est. Fiat massa.

Ventriculi noxis, ex humoribus biliosis & pituitosis natis, profunt.

Pilulæ de Hiera compositæ Nicolai Myrepsi, ex eadem Pharm.

ʒ. Cinnamomi, spica indica, croci, schenanti, xylocassia, xylobalsami, carpobalsami, violarum, rad. Asari, Absinthii, Epithymi, Agarici, rosarum, turbit, colocynthidos, mastiches an. ʒiij. Aloës optimæ ad pondus omnium. Fiat massa cum succo endiviæ.

Capitis & nervorum vitis à pituitosis nervorum natis opem ferunt, ac noxios ventriculi humores, frigidos præsertim & tenaces exturbant.

Pilulæ de Hydrargyro, ex Renodæo.

ʒ. Hydrargiri in succo limonum primum extincti, & postea in succo salvia nutriti ʒvi. Aloës optimæ ʒv. rhabbari ʒiij. diagridii ʒiij. agarici ʒi storacis calamitæ, cinnamomi, macis, santali citrini, saraparille, sassafras, mosci an. ʒiʒ. mellis in decocto guajaci despumati, & ad aqueæ humiditatis exolutionem cocti, quant. suff. fiat massa digitis paucis oleo terebinthina delibutis contrahenda: ac ducenda. tum usui reponenda.

Commentarius.

Antidotario nostro quicquam deesse volumus, & medicamenta non solum ex veterum monumentis omnia depromimus, sed etiam ex neotericorum tabernis nonnulla ratione inventa, & eventu felici probata probamus & admittimus: cujusmodi sunt Pilulæ de Hydrargyro, quas recentiores ad recentis morbi expugnationem usurpant. Equum enim est, novo morbo nova dare remedia, ex ratione inventa, & debita arte parata, cum inutilia ea esse multa eventus indicet, quæ ab antiquis in lucem edita sunt.

Novum autem morbum Luem veneream esse incipias nullus: antè siquidem annum 1493. in Europa nunquam visa est: sed primum à Christophoro Colombo, ejusque sociis, vel servis Italis ex India redeuntibus advecta, & Italis communicata mulieribus; quæ cum in obsidione Neapolitana militibus Gallis copiam sui fecissent, sua simul & prudenda, & prudendum morbum communicarunt; quem postea ipsi Galli ex exercitu, urbe scilicet capta redeuntes aliis mulieribus Italis, quas subierant innumeras, dedere. Ad quas postea mariti accedentes, ac debitum matrimonii persolventes, à propriis uxoribus acceperunt, quæ ipsæ à Gallis, u. Galli ab aliis mulieribus Italis, & hæ à commilitonibus Christophori Columbi.

Hinc Itali in Gallos turgidi & irati, suum morbum in victimam, Gallicum vocant: atque ridiculam eorum libri præ se ferunt ultionem, cum maritos ignorantiz, & uxores meretricii notent: illos quod, venereæ luis originem nescierint: has, quod à Gallis iniuri cupierint.

Forſan hujus injuriæ in parentes illatæ memor Braxavolus libellum quendam de suo morbo, quem Gallicum vocat, conscripsit, in quo ejusdem 234. differentias assignavit. Certè si eo loci ineptire non visus est bonus vir, credo tot ejus affines aut vicinas, primo Italici morbi adventu à militibus Gallis compressas: Atque ut harum nuptiarum signum aliquod in æternam memoriam relinqueret, ejusmodi Hieroglyphica posteritati reliquit. Sed hæc obiter dicta sunt, & citra Nationis, quæ Viros percelebres alit, injuriam. Nunc ad propositum redeo, & dico, varias esse de hydrargyro præparationes. Singuli enim ferè Aromatarii, Chirurgi peculiare habent descriptiones, quas velut arcana non revelanda apud se servant: quarum nonnullæ bis tantum iteratæ salivationem movent. Aliæ tantum alvum subducunt, quæ frequentius usurpantur: cujusmodi sunt vulgares de Barbarossa vocatæ. Omnes tamen sæpius iteratæ sputationem creduntur movere, nervos lædere, & strangulationem

gulationem interdum adferre, propterea non tutus est illarum frequens usus, nisi hydrargyrus. optimè præparetur & aliorum medicamentorum admittance castigaretur, ut oleo Terebinthinæ, vel his, quæ in hac nostra descriptione continentur. Cujus parandi modus ex formula satis patet. Aliæ verò sunt hydrargyri præparationes de quibus postea.

Pilulæ de hydrargyro, seu mercurio panchymagogæ sunt, seu catholicæ & simul Alexitericæ: universos siquidem humores una purgant, & qualitatem luis Indicæ malignam evincunt, illiusque vestigium partibus impressum radicitus evellunt.

Pilulæ Hydropicæ Bontii, è Pharm. Schroder.

℞. Aloës opt. ʒiβ. Gummi. gut. gam. subtiliter pulver. & cum m. l. vatico dissoluti & levigati ʒβ. diagryd. eodem modo parat. ʒj. Gummi. Ammoniac. ʒβ. Tart. vitriolat. ʒβ. cum syrup. rosar. solut. Fiat massa.

N. hæ sunt illæ pilulæ, ex quibus una cum Tartareis, infra descriptis, Bontius Principis Auriaci medicus maximam sibi famam acquisivit. Educunt aquas potenter Dos ʒβ. ad ʒj.

Pilulæ Hydroticæ, è Pharm. August.

℞. Aloës electa, Dacrydii, caryophyllorum an. ʒiij. Colocynthidis fol. sene. Gummi Arabici an. ʒj. gr. v. Euphorbii præparati, nucis moschata an. gr. xv. succi cort. mediani sambuci & absinthii an. quantum satis est. Fiat massa.

Hydropicorum aquas, ac tenue serum evacuant, earum descriptio à clarissimo Dn. D. Tobia Cneulino collega quondam nostro communicata fuit,

Pilulæ Hypochondricæ, Pharm. Noriberg.

℞. Gummi Ammoniaci in aceto scyllitico ʒij. Aloës succotrina ʒiij. myrrha, mastichis, Asa dulcis an. ʒj. croci, salis absinthii an. ʒβ. hyperici ʒj. cum syrupo de Absinthio. Fiat massa.

Aliæ Sylvii.

℞. Gummi. galb. aceto scill. solut. ʒij. Oli. ʒ ad albed. calcin. blando igne mastich. el. an. ʒj. castor. opt. myrrh. r. an. gr. xv. croci. or. ʒβ. Troch. alband. ʒj. res. jal. scammon. an. ʒj. ol. cort. citr. gutt. vi. m. fiant pill. numero 30.

Harum pilularum tres, pluresve sumat subinde æger, cubitum iturus, quo sic lente vitiosi humores educantur.

Eadem ingredientia addito succino & olibano constituant mass. pil. de Galbano Sylvii.

Pilulæ Hystericæ Zuelfferi.

℞. Rad. valeriana, imperatoria an. ʒj. herb. recent. Artemisia, matricaria, melissa, mentha crispa, rorismarini, salvia, cort. Arantiorum recent. & extim. an. ʒiβ. opii per exhalationem spiritus narcotici parati ʒvi. croci Austriaci ʒj.

Incisa & contusa crassiusculè, ac cucurbitæ vitreæ immissa; extrahantur cum s. q. spiritus vini, repetitis vicibus affusi, quousque spiritus non amplius tingatur; spiritus tincti omnes in B. M. ad extracti consistentiam abstrahantur; cui extracto residuo spisso adde,

Oleisillat. succini, salvia, rorismarini, mentha crispa, cort. Arantior. ex recent. cort. still. an. ʒβ. coriandri ʒβ. pulv. succini alb. præp. ʒvi. rad. valeriana, daronici veri, cort. Arantiorum ext. recent. siccata, myrrha rubra, nuc. mosch. an. ʒβ. macis ʒβ.

Mixtis omnibus fiat massa pilularum in affusibus hystericis & uterinis, à ʒβ. ad ʒj. potrigenda.

Pilulæ aliæ Hystericæ de Ladano Horstii, è Pharm. Schroder.

℞. Ladani. ʒβ. mastich. ʒj. calefiant in mortario & dissolutis adde Troch. Alband. ʒij. El. de succ. rosar. ʒβ. cum syrup. ros. sol. q. s. Fiat massa.

Vires. Subducunt alvum, mucilaginemque terebram emolliunt & expurgant, ususque sunt insignis in dolore colico. Dosis à ʒj. ad ʒi. Greg. Horst. obl. part. i. l. 4. obl. ii.

Aliæ D. Charraz.

℞. Facularum bryonia, myrrha electa, vitrioli maris, salis arthemisia, an. ʒij. castorei electi, ruta, camphora, an. ʒij. extracti mollioris Aloës cum succo arthemisia parati ʒx. F. S. à massa.

Hæ pilulæ sunt specificæ, non tantum pro supprimendis vaporibus ab utero elevatis, sedandis agitationibus & symptomatibus inde enatis; sed etiam pro repurgando ab impuritatibus utero & provocandis menstruis suppressis; in quem finem debet earum usus in aliquot dies continuari. Sumuntur mane, jejuno stomacho, superbibendo aq. arthemisia ʒiij. aut iiij. & lento passu ambulando per horam integram, atque cibum minime assumendo ante duas, ab ipsis assumtis, elapsas horas. Dos. ʒβ.

Pilulæ Iliacæ Rhafis, è Pharm. Schroder.

℞. Colocynthidos, sagapen. ad. ʒvi. diagryd. ʒij. cum succo porri F. massa.

N. Alii omisso succo porri, solvunt sagapenum in vino, eoque reliqua suscipiunt.

Vires. Solvunt passionem iliacam ac colicam, cephalalgicis, hemicranicis salubres sunt. Verum cum judicio usurpandæ; dantur à ʒβ. ad ʒβ.

Pilulæ Immanuelis è Pharm. August.

℞. Aloës succotrina ʒj. myrrha electa ʒj. croci orientalis, ʒβ. cum mithridatio Damocr. Fiat massa.

Frequentissimi apud nos sunt usus in ventriculo & intestinis à vitiosis humoribus liberandis, quæ uni confortant, flatusque dissipant.

Pilulæ Imperiales incerti Autoris, è Pharm. August.

℞. Cinnamomi, Amomi, Anisi, mastiches, cardamomi minoris, Zingiberis, Zedoaria, macis, nucis moschata, caryophyllorum, croci, cubebatum, ligni aloës, turbit, manna, Agarici, foliorum sene, spica indica, myrrha omnium an. ʒj. rhabarbari ʒj. Aloës ʒij. cum syrupo sacco fiat massa.

Parum admodum purgant, sed plurimum roborant, ventriculum, & omnia viscera, refrigerant calefaciunt, sicque facultatis naturalis robur cunctantur & augent ac sanguinem spiritusque purificant.

Pilulæ Indæ Haly, ex Mesue, Pharm. August.

℞. Myrobalarum indarum, hellebori nigri præparati, polypodii an. ʒv. Epithymi, Stæthadis an. ʒvi. Agarici, lapidis lazuli, colocynthidos, salis indi, aut gemmei an. ʒiij. succi Eupatorii inspissati, spica indica an. ʒij. caryophyllorum ʒj. hiera puri Galeni ʒxij. Fiat massa cum succo Apii.

Utiles sunt ad cancerum, elephantiasim, alphas nigros curatu difficiles, & complura alia vitia ab humore melancholico procreata; unde etiam melancholiam, indeque natum inanem metum, ac mœstiam, propulsant, quartanarum, & ictero nigro fœdatis auxilio sunt, lienis quoque tumorem ac dolorem auferunt.

Pilulæ de Lapide Lazuli Mesuæ, è Pharm. August.

℞. Lapidis lazuli abluti ℥vi. Epithymi, polypodii an. ℥viii. Scammonii preparati, hellebori nigri preparati, salis gemma an. ℥iij. Agarici ℥viii. Caryophyllorum, Anisi an. ℥iij. specierum hiera picra Galeni ℥xv. succi endiviæ quantum satis est. Formetur massa.

Vitia ex melancholico & adusto humore nata, Cancerum nimirum, Elephantiasim, & quartanam profligant, atquato conferunt, lienis obstructions, infarctus, tumoresque resolvunt.

Pilulæ Lucis majores, seu Opticæ Mesuæ, è Pharm. August.

℞. Rosarum, violarum, Absinthii, colocynthidos, turbit, cubebæ, calami Aromatici, nucis moschatæ, spica indicæ, epithymi, carpobalsami, Xytobalsami, sem. seseleis massilioticis, ruta, anisi, feniculi, apii, schœnanthi, mastiches, rad. Asari, Caryophyllorum, cinamomi, cassia lignea vera, croci, macis an. ℥j. myrob. omnium, rhabarbari an. ℥ij. Agarici, sene an. ℥iij. Euphrasie ℥j. Aloës succotrina ad pondus omnium, id est, ℥j. ℥vii. excipe succo feniculi & formetur massa.

Excrementa pituitosa è cerebro & oculis evacuant: visum conservant & firmant, nervos opticos ab obstructione visceri humore liberant, atque ob id oculos aciem intendunt.

Pro carpobalsamo cum aliquo cubebæ substituantur, hæ autem per se compositionem hanc ingrediantur opportune hic cardamomum minus accipi, aut cubebæ pondus duplicatum sumi poterit.

Pilulæ Lunares Boylei.

℞. Argentum ab omni cupro capellatum, alias vitæ creat, solve in puro spiritu nitri. Solutionem calore moderato exhalare sine, donec in cristallum abeat. Tum in arena calore magis moderato adhibito, facit omnis exhaletur, sed cave ne fundatur cristalli; hinc calor lenis sit, & vas subinde moveatur.

Hos cristallum è vase exemptos pondera, & tantundem adde cristallorum nitri puriss. hos separatim dissolve cum aqua pluvia, postea confundentur solutiones, & in vase vitreo in arena exhaletur humidum, ut in fundo maneat pulvis albus. Si enim viridis est, tum signum est lunam ab omni cupro non satis esse depuratam: cave etiam ne pulvis fundatur: hinc leni calore utendum.

Et cum plerumque contingat ut S. ab omni sale laud sit liberum, ac sic spiritus Si. simul imprægnatus spir. Si. qui argentum præcipitat, hinc antea parum argenti spiritui Si. iniicito quod spiritum salis præcipitat, ac sibi jungit, & spiritus Si. depuratur.

Cum mica panis formantur inde pilulæ magnitud. pisi minor. Quæ servantur in vase optimè clausa. Dosis est una aut altera, cum pomo tosto, sunt maximæ efficacæ adversus hydropem & alios morbos à sero nimio exortos & nervos infestantes. Si

verò fortè acciderit ut ex nimio pilularum usu, quid leucophlegmatia simile oriat, usus aliquando citè intermittendus, & croco & extr. juniperi utendum.

Pilulæ Macri, è Pharm. Londin.

℞. Aloës opt. ℥ij. mastiches ℥ij. fol. majoranæ sic. ℥ij. Satis Absinthii ℥j. pulverata omnia excipiantur s. q. succi caulium saccharatorum ut fiat massa.

Pilulæ Marocostinae Mindereri, è Pharm. Schroder.

℞. Mari veri croc. orient. an. ℥j. Agar. trochiscæ cost. veri Indici, myrrha elect. an. ℥iij. Ammoniaci ℥ij. rhabarb. el. ℥vi. ligni Aloës ℥ij. Aloës succotrina. ℥iij.

1. Solvatur ammon. in acet. scillit.
2. Diluatur myrrha lavigata, in acet. rutæ.
3. Diluatur aloë lavigata in succo rosar. ℥vi. defæcetetur coeturque.

Hinc mistis his tribus affunde succ. limon. aut citri, ℥iij. addeque Agricum cum succis Apii, fœnic. & absinth. in pulsculam subactum. Accedente modica irroratione aq. cinamomi, ut & rhabarbarum simili modo cum succis eleborii, pimpinellæ ac fumarie subactum.

Hic ita mixtis terantur crocus, costis & lignum aloës, diluanturque cum aq. rosar. fragr. & succ. citr. ana.

Tandem confunde utrumque & affunde. aq. lupul. borrag. betonicæ an. ℥iv. Card. bened. Agrimon. Ju. Arthetic. centaur. min. rorismarin. ceras. nigr. an. ℥iv.

Digerantur in MB. & 3. dein decantetur, filtratur & abstrahatur in MB. postmodum inspissetur ad consistentiam pilularum.

Ex facibus residuis fiat de novo extractio cum extillata illa & abstracta aq. sic. exprimat leviter, coletur & inspissetur pro pilulis.

Vires. Mucilaginem tartaream in ventriculo, mesenterio, liene, hepate collectam incidunt, paulatim educunt, viscera eadem, ut & caput simul roborant, adeoque morbis quam plurimis inde ortum trahentibus succurrunt, vide & pilulas tartareas Querc.

Dosis à ℥ss. ad ℥j. Extracti prioris, posterius enim dosi exhiberi potest majori.

Hujus massæ pilularis animadversionem vid. in Cl. Zvvelferi animadvers. ad p. A. p. m. 137. & hujus animadversionis examen in Pharmacop. Augustanæ restituta Dn. D. Lucæ Schreckii class. 7. p. 130. Verum quicquid contra Cl. Zvvelferi animadversiones modo laudatis Schreckius excipiat inconcussa tamen illius censura, nam si primo aquas illas destillatas examinamus compositioni huic assignatas, planè nil quæ corrigendo, quæ extrahendo præstant, quam aqua aliqua simplex; si spirituosæ quid habent, in extracti inspissatione penitus exhalat, licet Dominus Schreckius, contradicat & neget omne spirituosum in illis contentum evaporare, cum pars aliqua extracto conjuncta remaneat, tamen sensibus hoc repugnat, ut ipse fateri cogatur, magni momenti haud esse. Deinde negat Schreckius aquas destillatas in hoc extracto recensitas ad rerum resinofarum extractionses simpliciter inhabiles esse, scilicet, si res illæ resinosæ, præter resinam, alias etiam aqueas partes contineant, ubi has tantum ab aquis destillatis extracti, non verò illas concedit. Jam dicit, enumeratæ in extracto isto species resinosæ alias etiam virtute insigni præditas partes habent quas aquæ destillatæ promptè resolvunt, & in se recipiunt.

Et probat ex ipso Zvvelsero, ipsum etiam resinofarum rerum extractionem cum aqua aliquoties molitum fuisse, exemplo Agarici, mechoacannæ albæ, turbethi &c. Verum res resinosæ quatenus resinosæ in se nullas habent aqueas partes, sed juxta se habere possunt; sed transeant hæc. Jam videamus quænam partes maximè ad hoc extractum necessariae appetantur, utrum resinosæ, an aqueæ? certe resinosæ (exceptis illis quæ ex Aloë, rhabbarbo &c. extrahuntur.) Gummi ammoniacum, myrrha, Agaricus, lignum Aloës &c. in totum resinosa sunt, quid igitur aquei ex illis aquæ destillatæ extrahant virtute singulari præditi per simplicem infusionem in loco calente? deinde Zvvelserum ipsum quod attinet, evolvantur quæso paginæ citatæ & videbimus allegata cathartica non infundi, sed coqui in aqua simplici quousque omnes virtutes extractæ sint; quis jam est, qui ignoret differentiam inter infusionem & coctionem; deinde gummi ammoniacum & myrrha, licet aceto nonnihil diluantur, ab adfusus tamen aquis destillatis iterum præcipitantur, & nihil ab illis dissolvitur, quod per chartam bibulam transeat. Ad hoc excipit Schroëkius, sit ita, quod myrrha & ammoniacum aceto diluta per aquas præcipitentur, est propterea non destruuntur quia saltem pars resinosa præcipitatur; aquea autem, quæ non omnis experta est virtutis, ab aquis destillatis solvatur & per chartam emperoricam transibit; verum aquea pars probanda adhuc est, & si adest, manet quæstio an talis sit virtutis, quæ pro his pilulis marocostinis expetitur? de aloë succotrina res certa, illam partem suam aqueam communicare succo rosatum cum succo limonum diluto & sibi invicem permixto absque ulla præcipitatione, relictæ parte resinosa in fundo, quæ in his pilulis non est necessaria. Terio Agaricus trochiscatus ut resinosis, lignum Aloës, & costus verus succis herbarum & aquis destillatis perfecte extrahi nequit. Et quamvis aliqua simplicium istorum pars extrahatur, tamen ab hac dictæ pilulæ suas non mutuatur vires. Unde ipse Miædererus probè scivit, in illa prima extractione non omnes ingredientium partes dissolvi aut extrahi. Hinc aquam à primo extracto abstractam relictis facibus affundere, & quod in ipsis superest, levi per linteam expressione facta, per quam major resinosarum partium pars simul exprimitur, separare jubet. Quod, ne ipsius, jactura fiat, vel cum priori extracto conjungi potest. Hofmannus.

*Pilulæ Martiales ad imitationem Willisii, è Lex.
Pharm. Domini Junken.*

℞. Limatur. ꝑpur. ꝑ crudi subtil. pulv. an. ℥iij. coque in ∇ font. ℔iij. ad dimidias, tunc colatura infunde herb. Card. bened. Absinth. Chamædr. Fl. cent. min. an m j Rhabarb. el. ℥j. curcum. cinam. an. ℥ij. calam. arôm. ℥vi. croci ℥i. coque leniter per horas vi, tunc fiat colatura quæ evaporetur ad consistentiam, unde fiant pilulæ.

Vires Sunt satis Considerabiles in obstructionibus hypochondriorum, hepatis, mensium, ictero &c. Dosis ℔j. ad ℥℔.

*Pilulæ Mastichinæ Conciliatoris, sive Petri Aponens.
è Pharm. August.*

℞. Mastiches ℥iij. Agarici optimi ℥ij. Aloës electæ ℥x. cum sufficienti quantitate mellis rosati lege artis formetur massa.

Ventriculum ab omni morbo frigido & humido præservant ejusque dolorem à frigida causa ortum tollunt, cerebrum quoque oculos, & reliqua viscera à noxiis succis lana præstant, præcipuè verò uterum

à putridis humoribus liberant & tuentur nec non alvum modera è subducunt.

Pilulæ Matricales Schefferi, è Pharm. Schroder.

℞. Spec. hier. picr ℥℔. extr. Asar. gentian. Aristoloch. Helen. myrrh d. Etamn. alb. rub. uncl. croc. an. ℥℔. m. f. pil. cum syr. Artemis. instar pisorum.

Menses cient & puerperia promovent, uterum ab impuritatibus liberant.

Cum præter species hieræ picræ hæc pilulæ maximam partem compositæ fiat ex extractis omni ferè virtute balsamica orbatis, minus etiam adductis viribus respondebunt, melioribus præsertim hodie succenturiatis, careere hisce possumus. Hofmannus.

Pilulæ de Mechoacanna Renodæi.

℞. Mechoacanna ℥℔. turbeth. ℥iij. foliorum thymelæa aceto maceratorum atque siccatorum, seminis ebulli, agarici trochiscati an. ℥ij. radic. esule præparata, mastiches an. ℥℔. macis, cinnamomi, salis gemmei an. ℔j.

Fiat omnium pulvis, qui cum vino albo subigatur in massam ea siccata teratur, & cum succo ireo celestis denuo coagmenteur. Arida rursus teratur, & cum syrupo rosarum pallidarum fiat pasta, usui proponenda.

Commentarius.

Ex singulis Antidot. (vulgus dispensaria vocat) tanquam ex horto fecundissimo remedium omne genus, ad morbos quosvis delendos prædici medici quæritant: maxima tamen illorum pars medicamenta sunt nulla arte & ratione descripta. Quæ paucis morbis conveniunt, & sæpe decem medicamenta iisdem viribus prædita, & diversis nominibus designata traduntur. Nos vero pro morborum & humorum diversitate diversa medicamenta damus, non modo ex dispensariis vulgaribus, sed ex probatissimorum virorum lectione desumpta: præter quæ & alia exhibemus nonnulla, quæ & optima compositionis ratio, experientia & felix eventus salutari esse confirmarunt, cujusmodi sunt pilulæ descriptæ ad hydropem, quæ à mechoacannæ illarum basi cognominantur. Hæc enim singulis aliis simplicibus præpollet, & efficaciter aquas per secessum educit. Hanc addita sunt alia quinque hydragoga, quæ simul unita cum aliquot cardiis, atque etiam stomachicis, sine ventriculi læsione potenter serolos, & aqueos humores non modo ex alvo sed toto corpore ducunt. Semen kervæ, seu ricini, nec soldanellæ non libuit permiscere, cum illa sufficiant, nec parandi modum subungere, cum hic sit perfacilis.

Pilulæ de mechoacanna quod aqueos & serolos humores efficaciter educant, hydropi & omnibus his affectibus sanandis conveniunt, qui à pituita tenui originem sortiuntur.

Pilulæ ad Memoriam, è Pharm. Schroder.

℞. Aloës ℥j. croci, myrrhæ, an. ℥j. rhabbarbari ℥j. agarici ℥j. Zedoaria, gentiana an. ℔j. Theriacæ quant. nuc. jugland. ℥℔. fiant pilulæ magnitudine Præcofurte sum, quarum vii. aut ix. plures pauciores deglutienda. Extractum quoque ex iisdem sive Elimi cum spir. vini præparari potest ad gutt. vii. vel plura exhibendum.

Pilulæ Mercuriales d. Charraz.

℞. Rhabbarbari electi, trochiscor. Alband. diagrid. Mercurii sublimati dulcis an. ℥j. Terebinthina Veneta oleo propria stillatio diluta q. s. F. ex a massa.

Hæ pilulæ præcipuè destinantur curæ morborum venereorum : humores virulentos omnia corporis partium attrahunt & per sedem eiciunt; aliquando tamen salivationem in delicatulis excitant; itaque medici prudentia hic necessaria ut eorum effectus vel retardet vel promoveat pro exigentia morbi naturæ inclinatione, & ægri temperamento. Dos. à ℥j. ad ℥ij. & ℥j. pro validioribus. Sumuntur manè jejuno stomacho.

Pilulæ Mesentericæ Domini d'Acquini, ex D. Charraz.

℥. Extracti aloës cum succo fumarie parati, gummi ammoniaci electi an. ℥j. croci martis aperientis, diacrydii an. ℥ss. myrrha electa, croci salis tamarisci an. ℥ij. salis martis Riverii ℥ii. cum sufficiente quant. syrupi de cichorio cum rheo. F. massa ad usum.

Hæ pilulæ potenter deobstruunt mesenterium ut & viscera omnia alia; materias tartareas fundunt, easque benigne eiciunt, corroborando interiorum partes nutritivas; unde feliciter adhiberi possunt in cachexiis, hydropse, febribus intermittentibus chronicis, virginum chlorosi, menstruum suppressione, Dos. à ℥j. ad ℥j.

Pilulæ de Mezereio Mesuæ, ex Pharm. August.

℥. Foliorum mezerei in aceto per noctem maceratorum & siccatorum ℥v. myrobal. citrinarum, chebularum an. ℥iij. cum manna, & pulpa tamarindorum, aquâ endiviæ dissolutis formetur massa.

Serotum excrementum, seu aquas valenter expurgant, ob id hydropem ascitem, & anasarcam juvant.

Pilulæ de 5. generibus Myrobalanorum, ex Pharm. August.

℥. Quinque generum myrobalanorum, agarici, diacrydii, colocynthidos, sene an. ℥iij. Epithymi, turbiti, anisi, feniculi, mastiches, lapidis lazuli an. ℥j. gr. xi. rhabbarbari ℥iij. aloës ℥iij. cum succo feniculi formetur massa.

Pituitam, & bilem utramque evacuant, podagricos, splenicos, stomachicos, & melancholicos juvant: cerebrum purgant, visionem acuunt, sanguinemque purificant.

Pilulæ Narcoticæ Plateri, ex Pharm. Schroder.

℥. Opii puriss. ℥j. infunde in aqua vite ℥ss. dissolv. lento calore, eodemque exicca. Deinde alia affusa Aq. vinæ mollescat, additis ol. cinam. gr. ij.

Postea.

℥. Cinam. sacchar. cand. ℥j. piper. ℥j. sem. coriandri ℥ij. croci ℥ss. subtilissime pulverizatis adde opium dissolutum sensim opio pulveris miscendo. Postea cum syr. de papav. redigantur in massam pilularem addendo mosch. ℥ss.

Massa hæc diu in mortario agitur, & ne exiccetur, ol. de Beem parum subigatur. Servetur in loco humido.

Vires, Dolores sopiunt, somnum conciliant. Dos. gr. 5. Sennert. in instit.

In his non opus est piperis additione, ut opii corrigentis, (quia opium non est frigidum) nec saccharo indigemus; sed sufficiunt opium cum succo cydoniorum per fermentationem correctum, extract. croci cum ol. d. cinamom. coriandri gutt. aliquot & mosch. gr. aliquot pro pilulis formandis. Hofmann.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I. L.

Pilulæ de Nitro, Alexandro Tralliano diacolocynthidis dictæ, ex Pharm. August.

℥. Aloës, colocynthidos, scammonii preparat. bdellii, hellebori nigri preparati, gummi arabici an. ℥ij. Euphorbiæ preparati, natri an. ℥j. cum succo brassicæ & melle rosato solut. F. massa.

Pilulæ hæc (quas Alexander Trallianus sub nomine pilular. diacolocynthidos lib. 1. cap. 12. de hemiplegia describit) efficaces sunt ad crassos, frigidos, lentos, & glutinosos humores à remotioribus partibus educendos: frigidis nervorum affectionibus succurrunt, quo nomine cerebri & capitis pertinacibus affectionibus, articularum morbis, comitiali ac resolutioni conveniunt; eas Manardus lib. 13. Epistola 6. in Epilepsia mirifice commendat; stomachicis porro & ischiadicis auxiliantur. Hæc vires æquant, vertiginosos juvant, pituitæ lentorem dissipant, utramque bilem deturbant, unde earum usus in humoribus adustis, & morbo gallico qui non nisi vitioforum succorum vehementi purgationi cedit. Vide Fæsi Pharmacopœam fol. 240.

Pilulæ de octo rebus, seu octometæ Nicolai Præpositi, ex Pharm. August.

℥. Aloës, diacrydii an. ℥ij. Epithymi, colocynthidos, Agarici, mastiches, dauci cretici, myrobalanorum chebularum, absinthii an. ℥j. cum succo solani formetur massa.

Crassos humores à capite purgant, visum acuunt, & suffusiones oculorum arcunt.

Aloë in formandis pilulis numerum non tenent, ut neque mel neque saccharum in electuariis; alias ex novem hæc constarent rebus, prout Fæsius & Fuchsius notantur.

Pilulæ Odontalgicæ Zuvelferi.

℥. Opi Thebaici per exhalationem lenem sulphuris narcotici parati ℥ij. solvatur in spiritus n. veneris ℥vi. & per cribrum saltem setaceum cogatur, cui adde.

Pul. rad. pyrethri, mandragoræ an. ℥ss. sem. hyosciami, staph. sagria, urtica minoris, coriandri an. ℥ss. Caryoph. ℥j. resina Abietis ℥iij. gummi animæ ℥ij. camphoræ ℥j.

Misceantur. Fiatque massa, ex qua postea formantur pilulæ oblongæ, alterutra sui parte in acumen nonnihil desinentes, cavernis dentium imponendæ.

Pilulæ de Opopanace Mesuæ, ex Pharm. August.

℥. Opopanacis, hermodactylorum, sagapeni, Bdellii puri, Ammoniaci, colocynthidos an. ℥v. croci, castorei, myrrha, Zingiberis, piperis nigri, longi, cassia lignea, myrobal. citrinarum, emblicarum, Belliicarum an. ℥j. scammonii preparati ℥ii. turbiti ℥ij. Aloës ℥xii. solve lachrymas in aqua caulium, postea addendo pulverem reliquorum, forma in massam.

Pituitam crassam, bilem, & melancholicam à cerebro nervisque partibus evacuant; efficaces sunt in doloribus Articularum à pituita productis: resolutionem nervorum & incontinentiam, spasmodum cynicum, gonagram, podagram articularum dolores, morbosque partium nervosarum frigidus levant.

Pilulæ Panchym gogæ Zuvelferi.

℥. Agarici albillimi, rhabbarbari selecti an. ℥ss. rad. hellebori nigri ℥ij. Ari ℥j. mechnacæ albæ, hermod. an. ℥ss. fol. sene el. sine stipit. ℥iij. pulpa colocynthid. ℥j. sem. ebuli ℥ss.

Bbb 2 Inci

Incisa & contusa coquantur in aq. simplicis s. q. ad totalem dictarum rerum virtutum extractionem, ter quaterque aquam recentem affundendo; decoctiones colatae & expressae album ovorum clarificantur, & ad ℥ij. circiter evaporent, cui adde, & in eo residuo dissolve Aloës hepaticae ℥ij. facta colatura per cribrum setaceum reducantur leni calore cinerum ad extracti spissioris consistentiam, in fine superaddendo magisterii Gialappæ, scammonæ ana, Amygdal. dulcibus probe subactor. 3℔. pulv. mastiches electæ 3vi. ol. nuc. moschi expr. 3℔.

Fiat massa pilularum, è qua pilulae paratae omnes humores purgant; vertigini, Hemicraniae, ac capitis dolori succurrunt; pro universali igitur cathartico merito habendæ, Dosi 3℔. 3j. ad 3℔.

Pilulae Panchymagogæ Quercetani sè Pharmac. August.

℥. Aloës optimè præparat. (modo Quercetan. vide lib. 9.) ℥℔. affunde succum violarum optimè per digestionem depuratum, atque ad mellis consistentiam inspissatum, expose calori solis vel simili, singulis diebus rudicula lignea agitando, sic exacte paucis diebus commiscabuntur mixtioni suo tempore (prout habere recentem potestis,) adde succorum (optimè per digestionem depuratorum & ad mellis consistentiam inspissatorum.) sic

Florum primulae veris, persicae arboris, rosar. pallidar. cichorii, buglossi, Hyperici an. 3ij. his cum aloë perfectè mixtis, (erit massa ℥ij.) adde extract. sennæ, Agarici, rhabarb. an. 3j. cinamomi, pulv. fânsc. Anisi an. 3j. spec. diatr. santali 3iij. fiat massa.

Pilulae Papales.

Pilulae Papales Italici dictæ, conveniunt cum Imperialibus: usurpantur à cœna vel ante, numero 3. 4. 5. 6. 7. 8. ad x. & ultra quotidie vel alternis diebus, continuando dies aliquot summam dosin, hinc quotidie descendendo formantur pondere granorum 2. paulove majores.

Pilulae Pestilenciales Avicennæ seu communes ex Pharm. August.

℥. Aloës electæ 3j. myrrha, croci, an. 3℔. confice cum vino claro odorifero.

Adversus pestiferæ luis contagia populariter grassantia miræ sunt efficaciaz: internas putredines fugant, & humores ventriculo infarctos extergunt, eorundemque corruptionem prohibent.

Aliæ Rufi, ex Pharm. August.

℥. Aloës, Ammoniacy an. 3j. myrrha 3℔. cum succo limonum fiat massa.

Medicamentum hoc, cujus antiquissimus ac famosus Medicus Ruffus inventor existit, petrum est ex Paulo Aeginata lib. 2. cap. 36. fuisse tamen id Ruffi temporibus potionis forma propinatum constat, quod componebatur ex aloës & ammoniaci ana, partibus duabus, & myrrhæ parte una, omnibus in sufficienti quantitate vini albi odoriferi dissolutis; verum quia amara nimis hæc erat potio, ideo ut facilius medicamentum hoc assumeretur, posteritas id in pilularum formam, non minorem effectum habituram, effinxit.

Sunt qui rhabarbarum, Agaricum, bolum, Terram Lemniam, & Theriacam addant, ideoque valentiores putant sed componendorum pharmacorum modus est infinitus.

Aliæ Plateri, ex Pharm. August.

℥. Aloës 3iij. rhabarbari 3℔. Agarici trochiscati 3j. myrrha electa, gummi ammoniaci in aceto dissoluti an. 3iij. croci 3℔. Camphoræ 3i. olei Zedoariae guttae tres. Cum syrupo scordii fiat massa.

Ejusdem cum superioribus sunt efficaciaz, & tempore grassantis pestis felicissime usurpantur.

Aliæ compositæ, è Pharm. Schroder.

℥. Aloës hepatic. puriss. 3j. croci, myrrh. an. 3j. Zedoar. gentian. an. 3j. rhabarb. el. 3iij. Agaric. alb. 3j. Theriaca Andr. nucis jugland. quant. species pulveris sentur seorsim, dein misc. in mortario. Ex massa F. pilulae instar pisorum.

Vires. Memoriam roborant, visum acuiunt, omnia membra confortant, tormina ventris sedant, alvum laxant, cruditates tollunt, putredinem, pestilentialia, que morbos arcent, quin & sudorem cient, adeoque panaceæ instar nonnullis habentur.

Prophylaxeos causa sumitur pil. n. r. singulis diebus curationis vero viii. vel x. cum aq. ægerque bene rectus sudet.

N. sunt qui pilulas Jesu vocant, secretasque habent.

Hofman. Pestilenciales compositæ hæc omnes licet rhabarb. & agaric. tamen viribus suis adsignatis gaudebunt, & laudem retinebunt. Sunt, qui pilulas Jesu vocant, & pro arcano reservant. Vocantur etiam pilulae Emanuelis, si juxta nostras animadvertiones compositæ sint.

Aliæ Diemerbroeckii.

℥. Rad. petastidis, carlina, d. flammæ, angelicæ, helenii an. 3℔. gentiana 3℔. rhabarb. opt. 3℔. agarici albiss. 3℔. herbar. scordii, centaurei minor. ruta an. 3℔. cardui bened. 3vi. flor. Stachados 3℔. sem. cutri. aurantior. Zedoaria an. 3j. ex his omnibus fiat pulvis grossus qui maceretur per biduum vel triiduum in vino albi ℥℔. vel iii. deinde coquatur per hora quadrantiem, fiatque colatura cum fortis expressione in torculari, que colatura colesur rursus per chartam emporeticam seu bibulam rariorem, in hac colatura tunc dissolve, aloës opt. 3iij. myrrhæ clara in guttis 3iij. in sentella porcelana fiat evaporatio humiditatis, usque dum massa pilularis fieri possit, è qua formantur pilulae, que tempore pestis utilissima comperta. Dues tres, quatuorve pisi magnitudine semel aut bis in septimana, vel alternis diebus, mane vel vespere deglutenda exhibentur.

Pilulae Polychrestæ, ex Pharm. Schroder.

℥. Extract. aloës cum cichor. præpar. 3v. colocynth. per aq. fumar. parat. Resin. scammon. subtil. pulverisat. an. 3iij. croci Ang. pulver. satis Tartar. myrrh. troglod. flor. sulph. benzoinat. an. 3j. Fiat massa s. a.

Dosis 3j. jejuno stomacho mane sumenda, at tribus post cœnam horis. Omnis generis humores purgant.

Pilulae de Rhabarbaro Mesuæ, ex Pharm. August.

℥. Rhabarbari 3iij. succi glycyrrhizæ, Absinthii, mastiches an. 3j. myrobalarum curmarum 3iij. sem. ap. feniculi an. 3℔. trochisc. Diarrhodon Rhasis 3iij. specierum hierapicra 3x. succi feniculi & mellis ana quantum satis est. Fiat massa.

Humores educunt crassos, lentos, multum putres, & inde ortas febres diuturnas, ac ex aliis humoribus natas tollunt: jecoris item dolorem, obstru-

tionem, duritiem, ac hydropem incipientem sanant. Manardus his utebatur in tertianarum exitu; Massa in febribus pituitosis. Vide Fœsium.

Pilulæ Rudii è Pharmac. Londin.

℞. Colocynthis 3vi. Agarici, scammonii, rad. Ellebori nigri, turpetis an 3is. aloës succotrina 3j. cinnamomi, macis, caryophyllorum an. 3ii.

Colocynthis à feminibus purgata minutim incidatur; agaricus radula comminatur; Elleborus, turpetum & aromata crassiusculè terantur: affusoque spir. vini opt. q. s. ut digitis sex superemineat, blando calore quatrimum integrum macerentur, tum facta colatura & expressione valida, solvantur in eadem scammonium & aloë, prius ritè mundata. Mox indatur liquor, Alembico vitreo, ut separata (per destillationem) humiditate remaneat materia densa, instar mellis; ex qua F. massa.

Pilulæ de Sagapeno Mesuæ, ex Pharm. August.

℞. Sagapeni, ammoniaci, opopanax, bdellii an. 3iis. sem. Apii, ammeos; Anisi, ruta agrestis an. 3j. calami aromatici, lepidii, calamintha, folii, vel ejus loco spica indica, centaurii minoris, polii, costis, salis gemma an. 3s. colocynthis 3v. aloës 3vi. excipiantur succo porri, marrubii aut matricarie. F. massa.

Ad podagram, ischiadem, & reliquorum articulorum quin imo & uteri dolorem faciunt, menses evocant, viscera emolliunt, eorundemque obstructions referant, ac inveteratas splenis oppilationes tollunt.

Pilulæ de Sagapeno Quercetani, è Pharmac. Schroder.

℞. Sagapen. gummos. depurat. 3vi. Ammoniac. depurat. 3ij. Extract. trochisc. Alhand. 3j. Diagryd. 3is. salis gemm. 3iis. cum syrupo violato acidulo & trito, F. massa, ex qua conscribantur pilula in pist. vel ciceris formam.

Vires. Admirandi sunt effectus in febribus quartanis, dissolvunt nimirum faeces gummosas, & tenaciter corpori nostro adherentes.

Dosis, unica pilula initio paroxysmi, continuando aliquot dies. Sed usum earum præcedat præparatio, v. g. cum decoctis præparantibus melanagogis & similibus.

Pilulæ de Sarcocolla Mesuæ, ex Pharm. August.

℞. Sarcocolla 3ij. turbit 3iij. colocynthis, Zingiberis an. 3iis. salis gemma 3j. syrup. rosarum simplicis quantum satis F. massa.

Pituitam lentam evacuant, atque ob id pituitosis affectibus conducunt.

Pilulæ Sine quibus esse nolo Nicolai, è Pharm. August.

℞. Aloës lotæ 3xiii. quinque generum myrobalanorum rhabarbari, mastiches, absinthii, rosarum, violarum, sennæ agarici, cuscute an. 3j. Dacrydii 3viis. succi faniculi quantum satis pro massa ex arte paranda.

Efficacissimæ sunt hæ pilulæ ad purgandos omnes humores, partium superiorum, quonominie suffusionibus oculorum, caliginibus ac visioni conferunt, aurium dolorem sanant, caputque à pituita, bile flava & atra purgant, iliacos denique juvant.

Pilulæ Spadanenses descriptionis Dni de Maets, in Collect. Chymic. Leydens.

℞. Mart. cum sulphure preparati part. ii. Gum. Ammoniac. scammon. sulphurat. an. part. i. fiant, ut artis est, cum syrupo rosarum solutivo, vel syrupo rosarum cum Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

rheo. pilula Dosis à gr. vi. ad x. vel xii. pro ratione patientis.

Suaviter purgant humores: obstructions tollunt: & specificè exhibentur in morbis chronicis.

Pilulæ Spleneticæ Zuvelferi.

℞. Succorum cichorii sylvestr. endivia, cochlearia, nasturtii, absinthii ana depurat. 3vi. decocti ex recenti scolopendrio 3viii. in his macerentur per biduum, agaric. trochiscati, rhabarb. selecti, rhapont. veri an. 3iis. rad. helleb. nigri, 3iij.

Facta post una atque altera ebullitione, fiat colatura cum expressione, in colato hoc liquore dissolve Aloës succotrina 3viii. qua soluta & per cribrum setaceum colata, leni calore cinerum, aquositates ad consistentiam spissioris extracti evaporent, addendo tamen pulv. gummi ammoniaci in modico vino ad pulvis formam soluti 3j. gutta cammandr 3ß. myrrha translucent. 3vi. vitrioli martis ritè parati cum spiritu vitrioli 3ß. misceantur, fiat leni calore massa pilularum debita consistentia, qua olei stillat. Anisi 3ß. aromatizanda.

Præstans in morbis hypochondriacis, splenicis, obstructionibus, mesenterii ac pancreatis remedium existit, & suppressa menstrua solvit. Dosis ʒj. ad 3ß. in forma pilularum.

Pilulæ Stomachicæ Alkindi, è Pharm. August.

℞. Myrobal. citrinar. indar. chebular. an. 3ij. rosarum, mastiches an 3ij. cardamomi, ligni Aloës, sandali citrini, cubebarum, schananthi, nucis mosch. an. 3j. rhabarb. 3ß. Turbit 3vii. Aloës ad pondus omnium. Fiat massa cum syrupo de absinthio.

Biliofos ac pituitosos humores, eos præsertim qui caput, jecur, & ventriculū firman, coctionem juvant, & adpetentiam excitant.

Pilulæ Stomachicæ cum Gummi, è Pharm. Londin.

℞. Aloës puriss. 3j. fol. sennæ mundat. 3v. gummi ammoniaci in aceto sambucino liquati. 3ß. mastiches, myrrha an. 3ß. croci, salis Absinthii, an. 3ß. cum syrupo spina cervina, fiat massa. s. a.

Pilulæ Stomachicæ Balsamicæ Zuvelferi.

℞. Pulv. succin. alb. præp. 3j. olibani, mastich. myrrh. gummi animæ, ligni aloës pond. nucis mosch. an. ʒij. croci Austr 3ß. rad. doronici veri 3ß. resina storacis calamitæ 3j. Balsami indici de Peru, olei nuc. mosch. expressi an. ʒij. opobalsami veri orient. q. s. pro massa iusta consistentia ef-formanda, addendo ultimo ol. stillat. cinamomi ʒj. fiat massa.

Est saluberrimum medicamentum confortativum cerebri atque ventriculi: in diarrhæa, lienteria, fluxu hepatico, gonorrhæa virulenta, fluore albo muliebri, colica passione, & nephritico dolore, emolumento est. Dosis, ʒ. vel 6. pilulæ iustæ magnitudinis, ad instar pisorum ante vel post cœnam sumendæ.

Pilulæ de Styrace, è Pharm. August.

℞. Styrcis calamit. 3ij. Ladani, olibani, myrrhæ an. 3j. succi glycyrrhizæ 3ß. Ambre griseæ ʒj. Extracti opii, cum aceto destill. parati 3j. croci cum spiritu vini facti 3iij. misceantur cum syrupo de corticibus citri incomple 3ij. & fiat massa.

Sistunt pertinacissimam tussim & catharrum ferinum prægnantibus non sine abortus discrimine tussientibus multoties cum successu datas fuisse, notat Schroderus.

De Styrcæ aliæ Sylvii.

℞. Styrc. calam. succi liquirit. depurat. & inspissat. olibani, myrrhæ, opii, an. 3ß. croci or. ʒj. cum syrupo papav. alb. fiat m. p.

Præ aliis omnibus serum falsum corrigunt, & per-
tinacem tussim sedant, Schroderus notat has vel
similes, etiam prægnantibus cum metu abortus
tussientibus, multoties cum successu datas fuisse.

Pilulæ de Succino Cratonis, è Pharm. August.

℞. Pulv. succini præp. mastiches an. ℥ij. Aloës
succotrina ℥y. Agarici Trochisc. ℥ss. Aristolochia ro-
tunda vera ℥ss. cum syrupo de betonica formentur pi-
lula.

Biliosos & pituitosos humores è capite expellunt,
ad catarrhos, & inde provenientes oculorum, au-
rium, & dentium dolores propulsandos feliciter
usurpantur.

Pilulæ de Succis, è Pharmac. Noriberg.

℞. Foliorum senæ & stip. ℥ss. Turpethi gummosi,
agarici trochiscati an. ℥ss. rad. hellebori nigri præpa-
rat. hermodactylorum an. ℥ij. spica indicæ ℥ss. Zingi-
beris albi ℥j. cubebarum, anisi, fœniculi an. ℥ss. incisa
minutim infundantur in succi camæpitrys, primule
veris, betonica, spiris. vini rectif. an. ℥viii. stem in di-
gestionem per noctem; postea coquantur, exprimantur &
clarificentur.

Deinde, ℞. succi rosarum inspissati ℥ij. chama-
pitrys, Agrimonia, Taraxaci, Betonica an. ℥ij. Bo-
raginis, fumaria, an. ℥ij. Aloës succotrina ℥viii. dis-
solvantur simul, & colata inspissentur ad consisten-
tiam; cui addantur rhabbari electi ℥iiij. fiat
massa.

Pilulæ Sudoriferæ Domini Le Mora.

℞. Gummi. guajaci ℥ij. contrahervæ ℥ss. extracti
croci ℥j. myrrha ℥iiij. camphoræ ℥ij. landani opiani ℥ss.
M. F. Massa.

Febribus malignis conducunt, dolores leniunt,
acrimoniam temperant, venenis resistunt, sudores
movent. Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

Pilulæ de Tartaro Quercetani à Sennerto correctæ.
Pharm. August.

℞. Polypodii querni ℥ij. radicem Asari, seminum
geniste, an. ℥ss. passularum minor. ℥ss. fumariæ, scolo-
pendrii an. m. j. Tartari albi ℥vi. florum buglossi, borrag.
an. m. ss.

Coquantur in aqua pura sufficienti quantitate se-
cundum artem. Decocti clarificati ℥ij. adde succi pomor-
um ℥ij. in his infunde foliorum senæ ℥ij. folliculorum
senæ ℥j. Turbith electi & gummosi, radicem hellebori
nigri, styracis præparati an. ℥ss. macis, caryophyllorum,
cinnamomi Epithymi an. ℥ss.

In vitro clauso macerentur, & digerantur per
quatrimum in B. M., postea colentur, colaturæ
adde cremoris vel crystallorum tartari ℥iiij. Aloës
præp. seu extractæ ℥iiij. myrrha in vino ad ignem disso-
luta & percolata ℥j.

Omnia iterum diebus tribus vel quatuor in B. M.
digerantur, & hinc inspissentur, & coagulentur ad
lentum ignem sub sinem, dum materia ferè refrigerata
est, adde

Specierum diarrhodon Abbatis, latificantis rhæsis,
Trochiscorum de lactea an. ℥j. salis Absinthii, Fraxini
an. ℥ij. essentia croci ℥j. reducantur in massa pilularis
consistentiam. Si libet, & res postulat scammonii, rha-
barbari, Trochiscor. Alhandali extractum, & ammo-
niacum addi possunt.

Utramque bilem purgant, omnes humores cras-
sos, tartareos, salios, & mucilaginosos à partibus
profundissimis eliciunt, totam massam sanguinis

purificant, inde maniacis, & melancholicis affectibus
opitulantur.

Pilular. harum à Quercetano primò descriptar.
postea à D. D. Dan. Sennerto immutatar. præpara-
tionem minore labore qui subire velit, poterit in-
gredientia omnia decoctioni & infusioni primæ desti-
nata, præter styracem, aromata & tartari crystallos
in sufficienti quantitate aquæ & succo pomorum co-
quere & colare, colaturam ad justam consistentiam
inspissare, tandem liquando in ea Aloën, atque ad-
dendo pulverem styracis, myrrhæ, aromatum, spe-
cierum, trochiscor. salium & crystallor. tartari in
massam redigere.

Pilulæ de Tartaro Bontii, è Pharm. Schroder.

℞. Aloës succotr. el. ℥ij. gummi. Ammoniac. (cum
acetosquill.) depur. ℥ss. Tart. vitriolat. ℥ss. E. S. A.
massa.

Vires. Prioribus substitui possunt. Maximi enim
sunt levaminis in morbis tartareis, quales sunt affe-
ctus hypochondriaci, obstructio lienis mesenterii
&c. incident enim tartaream mucilaginem, imprimis
quæ in prima ventris regione collecta est, eamque per
dejectionem expurgant.

Dosis à ℥j. ad ℥j. manè; vel ante cænam. ℥ss.

Pilulæ de Tartaro Schroderi.

℞. Aloës lucid. fragrat. id est, cum succo fragorum
insuccata. ℥j. resin. Ammoniac. ℥iiij. Sal. & subdole.
essent. croci orient. an. ℥j. magister. Tart. purgant. in aq.
buglossæ aliquoties soluti & coagulati. ℥j. Extract. gen-
tian. ℥ss. cum tinctura tart. Fiat massa.

Vires. Saburram tartaream & mucilaginosam ex
infimo ventre inprimis educit lienem, uterum &
Epar infarctu liberat, morbosque inde prognatos fe-
licissimè curat.

Dosis ℥ss. vesperi antè cænam assumpta. Quippe
die subsequenti leniter dejectiones aliquot caulan-
tur.

Pilulæ de Tartaro aliæ, è Pharmac. Londin.

℞. Crystallorum Tartari ℥ij. polypodii quercini ℥ij.
uvarum corinthiacarum ℥ss. flor. buglossi, borraginis
nymphææ ana p. j.

Coque in s. q. Aq. fumariz & scolopendriæ ad di-
midii absumptionem. Recipe hujus decocti ℥ij. succi
pomorum redolentium depurati ℥ij. iisque adde fol. senæ
mund. ℥ij. Turpeti, rad. Ellebori nigri veri an. ℥ss.
myrrha electæ ℥j. macis, caryophyllor. cinnamomi, Epi-
thymi an. ℥ss.

Macerentur in vase vitreo clauso in B. M. qua-
triduum integrum; tum fiat expressio; in qua dis-
solve aloës præp. ℥iiij. & igne lento reducantur ad
debitam spissitudinem; dein ferè refrigeratis adju-
nge spec. latificantis, Dialacæ an. ℥j. salis Absinthii,
fraxini an. ℥ij. Essentia croci ℥ij. olei anisi guttas ali-
quot F. massa pilularis.

Pilulæ de Terebinthina simplices d. Charrax.

℞. Terebinthina veneta in aq. raphani vel buccæ
Alkekengi ad duritiem cocta ℥iiij. liquiritia mundata
subtiliter pulverata ℥j. F. S. a. massa.

Hæ pilulæ maximo sunt in usu in urinæ suppressio-
nibus, quarum causa vel in pituita, vel in calculosa
materia, vel in malignitate quâpiam venerea adhi-
bentur etiam gonorrhæis ineuntibus quo commo-
dius fluant. Sumuntur mane jejuno stomacho. Dosis
à ℥j. ad ℥ij. earumque usus potest continuari in plu-
res dies.

Pilulæ de Terebinthina compositæ contra Gonorrhæam virulentam Zuvelfert.

℞. Pulv. Antimonii diaphoret. ritè ac recenter jam jam parati ℥℔. cinnabaris nativi rubicundi, terræ sigill. Siles. rad. liquir. rasæ, iræos florent. succini albi an. ℥iij. oculor. cancr. præpar. ℥℔. mastich. electæ, olivani, myrrhæ rubra, croci Austr. an. ℥ij. misceantur ad eum sufficient. quant. terebinthinæ claræ efficiatur massa, ex qua pilulæ mediocres efformandæ quarum quatuor, quinque vel plures pro dosi una exhibeantur.

Pilulæ de Tribus, è Pharmac. Londin.

℞. Mastiches ℥ij. Aloës ℥iij. Agarici, sp. Hieræ simpl. an. sesquimanciam, rhabarbari electi ℥ij. cinnamomi ℥ij. cum syrupo è cichorio, F. massa f. a.

Pilulæ Turbith. aureæ Mesuæ, è Pharmac. August.

℞. Turbith. ℥xvi. Aloës ℥xii. myrobalanorum citrinarum ℥x. mastiches, rosarum an. ℥vii. croci ℥iij. cum succo absinthii fiat massa.

Stomachicis, colicis, nephriticis, ac inflatis profunt, valentiores verò sunt propter magnam turbithi copiam.

Pilulæ de Vermibus, Anti ictericæ & Deoppilativæ Domini de Mayerne.

℞. Gum. Ammoniac. in vino Hispan. vel alio generosiss. dissoluti, trajecti & infuss. ℥vj. vermium terrestr. vino albo lotor. & in clybano ficator. rad. chelidon maj. ana ℥℔. radis. enule, gentian. aristoloch. rot. curcumæ ana ℥iij. croci ℥ij. sal. absinth. artemis. cardui bened. tartari alb. ana ℥℔. anima hepatis ℥v. spec. hieræ picræ ℥vj. terantur terenda subtiliss. atque excipiantur f. q. oxymelitis compositi & f. Massa pilularis, cujus dosis sit à ℔j. ad ℥j. gradatim procedendo, alternis diebus augendo quantitat. gr. v. donec perventum erit ad dosin ℥j. in qua persistendum usque ad absolutum decursum, qui minimus erit dierum xxx. sed utilior dierum xl. Superbibatur autem pilulis jusculum, vel haustulus vini absinthitis.

Pilulæ variæ è Pharmac. Bateana.

Pil. Æthiopica.

℞. Æthiop. miner. ℥ij. ceruss. ℥ ℥ij. gum. guajac. ℥℔. extract. Sarsæ comp. q. s. ut f. maf. D. ad ℔j. bis indies per dies 40. vel 50. continuos. In Hydrope. Scorbuto, Luc. Grea. &c.

Pil. de Ammoniaco magistrales.

℞. Gum. Ammon. ✱ scilit. præp. ℥ij. aloës opt. ℥iij. myrrh. mastich. benz. ana. ℥℔. croc. Ois abs. ana. ℥j. Syr. de Abf. q. s. f. maf. Insigniter purgant tartarum, omnemque ferulentam corporis materiam. Magnopere inferunt adversus omnes aefluxiones, cachexias, oppilationes lienis, ejusdemque duritiem & scirrhum. Febres quartanas inveteratas, &c. Dos. ℔j. ℥℔. &c.

Pil. Angelica.

℞. Senæ mund. ℥vi. rhab. myrrh. agar. ana. ℥iij. benz. ℥℔. croc. ℥ij. Fl. Viol. borrag. ana. mi. succor. depurat. cichor. ℥℔. fumar. borrag. ana. ℥iij. macer. in AB ad horas 48. f. expref. adde aloë opt. ℥xij. exhal. ad Pil. consist. addendo Bals. Peruan. ℔j. o. ft. nuc. m. gr. 20. Ois abs. ℥ij. m. Blandissimam evacuationem promouent. eximii usus sunt ad omnium viscerum nobiliorem corroboracionem, & pravorum humorum correctionem. Dos. ℥℔. & ultra.

Pil. Anticolica.

℞. Ris Rutæ, 8æ, ana mel. q. s. ut f. maf. Dos. ℥℔. hora somni & manè per 4. in singulo mense. Probatissimè in Colica curanda.

Pil. Antimoniales.

℞. Vitri ℔ij. (cum Sp. G. præp. & albificati) subtr. 8 at. ℥℔. sacch. cand. ℥iij. Aleuri ℥4. croc. ℔j. coq. in V. ont. ad spissitud. (cavendo tamen ne aduratur) instat Pastæ. ex qua f. Pil. Verum. hoc censetur Febrim curativum Dos. ℔s. ad ℥j. in ipso paroxysmi frigidi initio.

Pil. Antipodagrica.

℞. Castor. opt. ℥℔. succin. alb. chamædr. chamæpit. ana ℥vj. O succini, ceruss. ℔j. Bals. Tolutan. Opanac. ana ℥j. Rad. petasitid. ℥iij. Tereb. Chient. ℥ij. Bals. Anis terebinthinat. q. s. ut f. maf. Pilularis. Dos. ℥℔. bis indies per menses ij. vel iij. bibenda interim pro potu com. Decoct. rad. petasitid. sarsæ, china, cum uvis passis, &c.

Pil. Balsamica.

℞. Extract. Eustachii ℥v. Troch. Alhand. ℔j. croc. ℔j. 8 crud. per alutam transcolati ℥i. Tereb. Ven. q. s. ut f. maf. f. a. In Luc. venerea, Lepra. Podagra, &c.

Pil. Castitatis.

℞. Rad. nymph. ℥℔. Ois Hni ℥ij. off. sepiæ ℥vj. camph. ℥ix. Syr. de Nymph. q. s. ut f. maf. Dos. ℥℔. bis in die per dies aliquot. optime valent in Gonorrhæa, priapismo, &c. curandis, præmissis præmittendis. Dos. ℔j. ℥℔. &c. bis in die.

Pil. Catarrhales.

℞. Extr. Glyc. ℥i. Rhodaloës ℥℔. Pil. de cynogloss. ℥ij. m. Dos. ℔j. ad ℔j. in Catarrhis, Influx. &c. hora somni per dies 4. vel 5.

Pil. Crapularia.

℞. Diagryd. Spec. Hier. simp. ana ℥vi. aloës opt. ℥iij. ol. st. caryoph. ℥℔. Sp. V. q. s. ut f. maf. f. a. D. ℔j. hora somni post crapulas.

Pil. Cretacæ.

℞. Cretæ albis. fantal. alb. nuc. m. ana p. æ. cum Tereb. Chient. q. s. f. maf. Prescriua in Profluvio albo, &c. Dos. ad ℥i bis in die, superbibendo serum cerevisiale foliis consolidæ alteratam.

Pil. de Cretæ Palmarii.

℞. Aloës opt. ℥i. cretæ albis. succin. alb. gentian. myrrh. Rad. fraxinel. ana ℥i. Mithridat. Div. tereb. lotæ ℥ij. Syr. de Alth. q. s. ut f. maf. Sunt, qui addunt calomelan. ℥℔. vel ℥vi. Cum Calomelan. Dantur ad ℔j. vel ℥i. hora somni omni nocte per dies 15. Ad Gonorrhæam curandam nil aequale. Idem præstant in Profluvio albo.

Pil. Hydropica.

℞. Resin. zialap. scammon. rhab. guttæ gamb. calomel. ana ℥℔. Ammoniac. in succo irid. nr. præp. ℥iij. q. O. lat. ℥ij. gum. Lentisc. ℥i. croc. ℔j. Sp. tereb. gt. 40. cum Syr. de Spin. cerv. q. s. f. maf. D. ad ℔j. vel ultra in fortioribus.

Pil. Hysterica.

℞. Sem. Viricis ℥i. rutæ, afæ, foetid. Camph. ana ℥j. castor. ℥℔. 8 succin. gt. 40. Syr. de Artemis. q. s. ut f. maf. Dos. ℔j. ad gr. 15. secunda vel tertia quaque hora

in paroxysmo hysterico; & præterea hora somni singulis noctibus extra paroxysmum.

Pil. Lithontripica.

℥. Sem. genist. bardan. Lap. Judaic. ā ℥j. Tereb. ē Chio ℥iij. m. f. massa Dos. ℥i. ad ℥i. per dies 20. 30. &c.

Pil. Masticatoria.

℥. Sem. sinap. Raphisagr. pyrethr. ā ℥β. mastich. ℥vi. m. f. ℥. addemell. & ceræ ā q. f. ut f. massa v. Masticatoria.

Pil. Matthai, aliàs Starkii.

℥. Opii Thebaic. opt. ā fordibus purgat. ℥ij. ℥ris subtr. glyc. helleb. alb. & nig. ā ℥ij. Sapon. Tartarei (v. suo loco.) ℥vi. m. exactil. addendo 80 Terebinth. q. f. ut f. massa pilularis, quæ toties humectetur 80 Tereb. quoties ficefcit. Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diuretica, diaphoretica, nephritica, lithontripica, hydropica, bechica, anodyna & paregorica habentur insignes. Felici cum successu dantur in Febribus omnibus, præcipue Tertianis, & Quartanis. Catarrhis omnibus, Doloribus ventriculi, Cephalalgia, Odontalgia, Tussi, Crapulis, Aritritidi, Diarrhois, Dysenteris, Ulceribus & Apostematis internis, &c. mirifice subveniunt. Dos. ℥β. ad ℥i. superbibendo haustum alicujus convenientis.

Pil. Melanagoga.

℥. Fibrar. helleb. n. veri ℥ij. pulp. colocynth. ℥iij. coq. in Phlegm. Oli. ℥v. ad consumpt. dimid. f. expressio, quæ coaguletur ad mellagin. l. Δ. Tum adde Resin Scammon. ℥i. ut f. massa Pilularis. Dos. ℥β. ad ℥i. &c.

Pil. Pacifica.

℥. Opii opt. supra laminam ferri exiccat. & ℥it. ℥ij. benz. albis. ℥ij. croc. nuc. m. ā ℥iij. 80. Aneth. & nuc. m. ā ℥i. Sapon. qrei q. f. ut f. massa f. a. Virtutes emulantur Pil. Matthai.

Pil. Pavii.

℥. Spec. Hier. simp. ℥β. galban. in Tinct. Castor. præp. ℥ij. & præp. ℥ij. Diacurcum. (Quidam Diacinnam.) Div. Syr. de stæch. q. f. f. Pil. num. 21. ex sing. ℥i. D. num. 10. aut 20 mane & sero per dies 40. Ad Melanch. Hyp.

Pil. de Pice.

℥. ℥ Glyc. ℥j. Rad. irid. Flor. ℥iij. Pic. liquidæ, & Balf. Peruan. ā ℥β. vel q. f. ut f. massa Pil. Efficacissima habentur in Phthisi, Tussi, purulenta Excreatione, suppuris & pectoris humoribus, qui difficile extussuntur. Dos. ℥β. bis in die, superbibendo haustum Decoct. Pector.

Pil. Restringentes.

℥. AB. corall. r. gum. Lentisc. ā ℥iij. off. sepia ℥β. gum. guajac. ℥β. croc. & tis restringent. ℥iij. Tereb. Cypr. ℥iβ. Syr. de Nymph. q. f. ut f. massa Pil. Dentur ℥β. vel ℥ij. bis indies, ad Gonorrhœam, &c.

Pil. de Sagapeno.

℥. Sagapen. pellucid. ℥β. Troch. Alhand, agaric. ā ℥iij. Diagrid. ℥j. & ℥β. 80 chym. Fœnic. ℥i. Syr. de Eupator. q. f. f. massa Proficua in Iliaca, Colica &c. ad ℥β. Admiranda in Febribus Quartanis. Dos. ℥β. initio paroxysmi, continuando aliquot dies.

Pil. Sinapina.

℥. Sem. sinap. ℥at. ℥iij. glyc. ℥ij. Syr. cap. q. f. ut f. Pil. hypoglossidæ, frequenter in ore tenenda. Magnopere valent in Tussi, Asthmate, &c.

Pil. Styracina.

℥. Styrac. cal. colat. ℥ij. Fl. Δ ℥i. Benz. alb. ℥ij. m. f. massa Efficaciter succurrit Asthmati, Dyspnœa, Catarrho suffocativo, &c. Dos. ℥i. ad ℥i. semel aut bis in die. Prujean.

Pil. Vaticana.

℥. Calam. arom. anis. zz. mastich. cinnam. cardamom. min. zedoar. mac. nuc. m. caryoph. croc. cubeb. lign. al. turpet. mann. senæ, cal. lign. myrob. omn. ā ℥j. Fol. cardui ben. scord. ā ℥β. rhab. opt. ℥ij. ℥ij. aloës opt. ℥ij. Div. Syr. Ros. sol. & Viol. ā q. f. ut f. Massa f. a. Cephalica sunt ac Stomachica, omnia viscera fartu liberant, purgant, roborant, & humores quosvis noxios & obvios educunt: omniumque partium nutritiarum æconomiam juvant. Dos. ℥i. ℥β. &c.

Pil. Vermifuga.

℥. Pil. Ruffi ℥β. 80 chym. Sabinæ, vel Tanacet. gt. 24. m. D. ad ℥β. vel gr. ij. in Pil. x. format. sumenda per 3 dies contin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.

Pil. Vomitoria.

℥. Gillæ Theophrasti ℥at. ℥i. Medullæ lactis insulæ ℥i. vel q. f. contund. opt. in massam Pil. D. Div. vel v.

Pilula variæ à Pharmac. Persicâ.

H A B V A S S E L.

Pilula ad Strumas.

Sic vocatæ, quia ad strumas item ad parotidas, ad apostemata glandulosa profunt.

℥. Spica, cassia lignea, opobalsami, asari, xylo-balsami, mastiches, cinamomi, croci, ana dr. 2. aloes socotora, dr. 16. stæchados, pulpa colocynth. ana dr. 5. turbit. albi, dr. 7. salis Indici, dr. 2. scammonis, dr. 4.

Dispositis medicamentis, addensentur pilulae dosis, dr. 4.

H A B G E H E T A T E S C H E K.

Pilula aliæ ad morbum mahometanum; quem Mahometani Gallicum vocant.

℥. Hiera picra, m. i. turpeti albi, dr. 1. agaric. lapidis lazuli abluti, corticis mirobal. citrin. galangæ, hermodactylorum, an. dr. f. scammonii, dung. 1.

Fiat trituration, cribratio, & ex rosacea cataplasia formentur.

H A B E S T E S Q A.

Pilula ad hydropem.

℥. Turbit albi, rheibarbari, china, dr. f. agaric. ci, aristolochia rotunda, & longa, ana dung. 1. f. tuminis judaici, sem. urtica, ana dung. 2. euphorb. oleo rosato frixi, dung. 1.

Pistis medicamentis & incerniculo lavigatis, fiat massa ad pilulas ex aqua simplici.

H A B R E I A.

Pilula Spei.

Utpote ad obstinatos podagricorum angores semper me infallibile solamen.

℥. Tur-

℥. Turbit dr. 1. sem. agarici, hiera picra, epithymi ana dung. 4. centaurea minoris, seminis pegani, sen harmel. Arabum, vel verbasci. Succo absinthii, ana dung. 2. Pulpa colocynthidis, scammonii, ana grana hordei, 6. Bdellii. Anisi, ana dungum 1.
Fiant Pilulæ ex aqua fœniculi.

HABBER JOUMA.

Pilula ipsa die.

Sic dictæ quod ipsa die artuum dolores compescunt.

℥. Aloës socotora, turpethi fœmina, ana dr. 8. corticis myrob. citrinarum, buzdan. Hermodactylorum, ana dr. 2. anisi, scammonii. ana dr. 1. Bdellii, dr. 1. f.

Ex aqua porrorum fiant pilulæ, dosis dr. 3. ex aqua calida.

HABBEL MELOUK.

Pilulis Regiæ.

Ad colicam, & ad flatuum importunitatem, & pertinaciam.

℥. Aloës socotora, dr. 5. turbit, dr. 10. corticis myrob. citrin. & nigrarum, ana dr. 3. salis Indi, dr. 2. mastiches, zaffarani, folii Indict, costi, cassiæ lignæ, rhei barbari Chinici, spica, zingiberis, anisi, seminis. ap. j bortenensis, caryophyllorum, piperis, Cardamomi minoris, cinamomi, tragacantha, cardamomi majoris, ana dr. f. scammonii, m. 2. moschi, dungum. 1.

Curiosè terantur, & per setaceum purificentur; tum ex rosacea pilulæ fiant. Dosis dr. 3.

Pilula variæ ex Joh. Michaelis.

Pilulæ Catholicæ.

℥. Extr. Cathol. Andernaci panchym. Crollii ana 3ß. scammon. ¶rati gr. v. cum Ess. fum. vel Tinct. ¶rati F. l. a. Pilulæ. S. Blutrœinigende Pillen.

℥. Extract. panchymag Crollii gr. xvi. ¶ dulc. ritè par. gr. x. vel xii. scammon. ¶rati gr. viij. cum essent. fum. F. l. a.

Pilulæ in Morbis Melancholicis.

℥. Extract. cholagog. Quercet. 3i. trochisc. alhand. gr. iij. Cum Elix. Propriet. vel alio liquore appropriato. F. l. a. Pilulæ. S. Pillen auf ein mal, in affectibus pituitosis.

Pilulæ Cephalicæ.

℥. MP. cochiarum 3i. scammon. ¶rat. gr. v. cum Essent. flor. anthos. vel 3o destill. majorana F. l. a. Pilulæ. S. Pillen auf ein mal.

℥. Extract. cathol. 3ß. scammon. ¶rat. resin. jalappa ana gr. v. vel vi. extr. cephal. gr. iv. c. f. q. 3o fœnic. F. l. a. Pil. S. Augenpillen.

Pilulæ Catharrales.

℥. MP. de succino Craton. 3i. scammon. ¶rati gr. v. cum essent. succini vel flor. anthos F. l. a. Pilulæ. S. Pillen auf ein mal.

℥. Extr. Cathol. Andernaci 3ß. Mag. seu resin. succini jalappa ana gr. v. scammon. gr. v. cum 3o majorana. F. l. a. Pilulæ. S. Sonderliche Fluszpillen.

Pilulæ Hepaticæ.

℥. MP. de rhabarb. 3i. scammon. ros. gr. viij. cum essent. hepat. vel agrimon. F. l. a. Pilulæ. S. Pillen.

℥. Extr. Rhabarb. 3ß. rad. cichor. gr. v. scammon. rosati gr. viij. cum Essent. absinth. F. l. a. Pilulæ.

Pilulæ spleneticæ.

℥. MP. de ammon. Quercet. 3i. Extract. helleb. nigri gr. v. scammon. ros. gr. viij. cum essent. splenis bovis vel scolopendr. F. l. a. Pilulæ.

Pilulæ hypochondriacæ.

℥. MP. de ammon. Quercet. 3i. Extr. 3o scammon. ros. ana gr. v. cum Tinctura ¶. F. l. a. Pilulæ.

Egregias pilulas hypochondriacas describit Schröderus.

Hæ pilulæ & antecedentes possunt etiam in scorbutò usurpari, si cum 3o antiscorbutico compos. vel elix. scorbut. vel etiam pro distoribus cum 3o stillat. cochil.

Pilulæ Matricales.

℥. MP. fœtid. 3i. Resin. jalappa scammon. ¶rati ana gr. v. cum Essent. castor. vel elix. uterino cid. F. l. a. Pilulæ. S. Purgierende Mutterpillen.

℥. Extr. cathol. 3i. castor. gr. iij. Facul. bryon. gr. v. Cum Essent. castor. vel Elix. Uterinò Crollii. F. l. a. Pilulæ.

Pilulæ ad Menses ciendos.

℥. MP. ¶ Quercet. de ammon. ana 3ß. extr. 3o gr. v. castor. gr. iij. Cum Elix. uterino Crollii. F. l. a. Pilulæ. S. Sonderliche Pillen.

℥. Extract. helleb. nigri. 3ß. (singulare arcanum hîc 3o gr. viij. troch. alhand. gr. iij. Cum Elix. uterino Crollii F. l. a. Pilulæ, adspargantur Fæcula bryoniæ. S. Sonderliche Pillen auf 1 mal.

℥. MP. de ammon. Quercet. ¶rati ana 3ß. Resin. jalappa gr. v. Cum Essent. arthet. F. l. a. Pilulæ. S. Sonderliche Glieder-Pillen.

Pilulæ in Lue Venereâ.

℥. MP. de fumar. 3i. ¶ dulc. ritè prep. gr. xii Extr. trochisc. alhand. gr. ij. Cum 3o stillat. ligni sancti vel Essent. persic. F. l. a. Pilulæ. S. Sonderliche Blutrœinigende Pillen.

℥. Extract. cathol. Andernaci 3i. arcani corallini gr. iij. trochisc. alhand. gr. ij. c. 3o lign. F. l. a. Pilulæ.

Pilulæ Hydropicæ.

℥. Extr. elaterii gr. viij. mag. gummi de Peru gr. iij. troch. alhand. gr. j. F. l. a. Pil. adsparg. spec. diatrion fantalon.

℥. Extract. elat. gr. viij. Mag. gum. de Peru gr. v. D hydragoga gr. ij. F. l. a. Pilulæ, adsparg. pulv. jalappæ.

Pilulæ contra Gonorrhœam.

℥. Tereb. Cypria cum 3o menth. lota 3ij. ¶ dulcis 3ß. extr. cathol. 3ij. F. l. a. Pilulæ instar Pisi. S. Sonderliche Pillen zu den Nieren auf etlich mal.

℥. Terebinth. Cypria 3i. extr. cathol. 3ij. ¶ virid. precip. gr. v. ij. c. f. q. Terebinth. F. l. a. Pilulæ S. Pillen auf zweymal.

Pilulæ Hystericæ appropriatæ.

℥. Extr. castor. rad. angelic. ana gr. v. bez. 3o Kallè gr. v. Cum elix. uterino Crollii. F. l. a. Pil. instar Pisi. S. Sonderliche Pillen.

Pilulæ in Gonorrhœa, non purgantes, sed consolidantes.

℥. Terebinth. Cyprin. vera 3i. extr. contra Gonorrhœam 3i. mag. ossis sepia (sing. specif.) 3i. Croc. 3i. adstr. 3i. c. f. q. Terebinth. F. l. a. Pil. instar Pisi minoris. S. Pillen 19. oder 21. auf ein mal bis in die.

Pilulæ contra exulcerationem Renum.

℥. Terebinth. Cypria opt. 3ii. Extr. agrimon. flor. hype-

hyperici ana \mathcal{D} ii. croci \mathcal{D} adstr. \mathcal{Z} i. c. bals. Δ . Tereb. F. l. a. Pilulæ. S. Sonderliche heilende Pillen 19. auf einmal.

Pilulæ febriles.

\mathcal{Z} . Extr. febr. \mathcal{D} i flor. Θ * gr. v. F. l. a. Pilulæ Alpergantur pulvere cinamomi. S. Fieberpillen auf einmal.

\mathcal{Z} . Extr. cardui bened. centaur. min. ana gr. vj. flor. Θ * gr. v. F. l. a. Pil. cum Syr. C. B.

Pilulæ Diaphoreticæ in Lue Gallicâ.

\mathcal{Z} . Extr. lign. \mathcal{Z} i. Cinnab. \mathcal{S} \mathcal{D} ii. F. l. a. Pilulæ. S. Schweißpillen.

Quidam pro magno arcano habent.

Pilulæ contra nimiam obesitatem.

Videri possunt apud Mynsicht in Armamentario.

In Dysenteria.

Ex extract. tormentilla \mathcal{S} al-quot granis laudani opiat.

Pilulæ Pectorales in Catharrô à capite ad pectus optimæ:

\mathcal{Z} . MP. hiera cum agar. \mathcal{D} i. scammon. Δ rat. gr. vij. c. \mathcal{S} o still. hyssopi. F. l. a. Pilulæ. S. Purgierende Brustpillen auf 1. mal.

Pilulæ Stomachales.

\mathcal{Z} . MP. Hiera cum agar. \mathcal{D} i. scammon. Δ rat. gr. iij. cum \mathcal{S} o still. menth. vel calam. arom. Pilulæ. S. Magenpillen auf einmal.

Pilulæ articulares.

\mathcal{Z} . MP. Arthet. \mathcal{D} i. Resin. jalappe gr. vi. Mag. gemmi de Peru gr. iv. vel v cum essent. arthet. compos. vel chamadr. aut chamap. F. l. a. Pilulæ. S. Gliederpillen.

Pilulæ antipestilenciales.

\mathcal{Z} . Pil. Pestil. Russi \mathcal{Z} i. Extract. theriac. \mathcal{D} ii. cum \mathcal{S} o pestil. Heinsii. F. l. a. Pilulæ. S. Sonderliche Präservativ-Pillen.

Pilulæ Visum roborantes.

\mathcal{Z} . Aloës succotrina \mathcal{Z} aut 4. succô ros. pallid. imprag. ite. umque exsiccat. \mathcal{Z} i. agarici trochisc. \mathcal{Z} i. rhab. electi \mathcal{Z} i. conf. alkerim. Div. \mathcal{S} o cinam. fenic. ana \mathcal{D} i. vel \mathcal{Z} ss.

Post 2. horas à cœnâ modicè purgant clementerq;.

Ad Gonorrhœam.

\mathcal{Z} . Gummi Arabici, tragacanthi, Carab. mum. boli Armeni Orient. mand. lucii pisc. ana \mathcal{Z} i. c. Syr. de ros. siccis l. myrt. F. l. a. Pil. Dos. \mathcal{D} j.

Ad Hemicraniam.

\mathcal{Z} . Aloës optim. \mathcal{Z} ss. spec. è gemmis, diatrion sant. extr. rosarum ana gr. vi. cum syr. absinth. \mathcal{S} viol. F. Pil. Dos. \mathcal{Z} j. Bis in septimana, horis duabus ante cœnam.

\mathcal{Z} . Pil. de sagapeno Camilli gr. xii. \mathcal{S} o caryophill. g. ii. cum syr. viol. F. Pil. N. vj. involvantur pro rubificatô.

Pilulæ Riverii in Morbis desperatis.

\mathcal{Z} . MP. Russi \mathcal{Z} i. gummi guajaci \mathcal{Z} ss. \mathcal{S} diaphoret. \mathcal{D} i. c. bals Peruviano. F. Pilulæ.

\mathcal{Z} . Gummi gutt. gr. xii. extr. helleb. nigr. gr. ij. \oplus g. ii. \mathcal{S} o cinamom. g. j. c. syr. viol. F. Pilulæ N. vj. Involvantur q. rubificato.

Pilulæ variæ ex Hadriano à Mynsicht.

Pilulæ Aloëphanginæ nostræ.

\mathcal{Z} . Fol. senæ elect. s. stip. \mathcal{Z} iv. rad. polypodii, \mathcal{Z} j. hellebo-

ri nig. \mathcal{Z} j. troch. albandal cort. arantiorum sem. cymini, ana \mathcal{Z} ss. herb. absinthii Pont. card. bened. et chamapycos. veronica, ana m j. flor. cordialium, stechad. arab. cent. min. chamomilla.

Craffiusculè confusa infundantur in vini Malvat. s. q. coquantur igne lento ad remanentiam tertie partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturâ lib. ij. solve.

Aloës succotrina optima \mathcal{S} perlucida. \mathcal{Z} xvj.

Agitentur continuè in loco calido, ulque dum inspissentur; postea adde:

Spec. Diamosch. dulc. diambra, ana \mathcal{Z} ss. mag. myrrha rub. mastichis, croci Oriental. ana \mathcal{Z} ss. ol. Chamomilla Rom. succini alb. rect. ros. smarini, cymini \mathcal{S} carvi, \mathcal{Z} ss.

Misc. & incorporentur, ut fiat justæ consistentiæ Massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis. Ad omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant, Mentis vigorem conservant. Auditum amissum reparant. In Melancholia Hypochondriaca ceterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiasi, Quartana, Ictero nigro, &c. omnes tam Jecoris quam Lienis obstructions referendo, sanguinemque mundificando, quam maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus viciosisque humoribus concoctionem juvando suaviter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præservant. Dosis à Scr. j. ad Drach. j.

Pilulæ Catholicæ.

\mathcal{Z} . Mass pil sine quibus, aurearum, cochia, ana \mathcal{Z} ss. Extr. hellebori nigri, colocynthid. ana \mathcal{Z} ij. tartari vitriolati, Scammoni rosati. ana \mathcal{Z} ij. sp. vitrioli, \mathcal{D} j.

Misc. & cum Ol. Sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æque observandum est.

Vires, Usus, Dosis. Magnificè & citra molestiam alvum deiciunt. Caput, Cerebrum, Ventrículum & Sensoria crassis, putridis, pituitosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosque articulorum dolores, ad catarractam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorumque obscuritati mire conferunt. Dosis à Gran. xij. ad Scr. j.

Pilulæ Benedictæ.

\mathcal{Z} . Troch. albandel cum sp sulphuris prius irrorat. \mathcal{S} iterum exsiccat. ext. pil. aloëphang. nost. scammoni rosati, ana \mathcal{Z} j. sp. vitrioli, scr. i.

Misc. & in mortario lapideo & cum pistillo lapideo & cum aq. Benedict. Serpilli nost. fiat. Massa; Ex qua postea cum ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet Scrupulo formentur pilulæ Nr. v.

Vires, Usus, Dosis. Omnes humores implicatos à Capite, Ventrículo, Hepate, Splene, Visceribus & nervis, sufficienter evacuant, Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

Pilulæ Familiæres.

\mathcal{Z} . Mass. pil aloëphang. nost. \mathcal{Z} ij. rad. jalappæ resin. \mathcal{Z} j. acidi tartar. \mathcal{Z} ss. mag. scammoni, ext. rhabarbar. \mathcal{Z} ss. spir. salis rect. \mathcal{Z} j.

Misc. & cum vino Malvatico f. Massa Pilularum: ex qua postea cum ol. anisi vel alio conveniente formentur Pilulæ parvissimæ in modum Aloëphang. qua deurentur fortiter.

Vires, Usus, Dosis. In Catarrhis exsiccandis, & obstructions referendis, valde illustres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficacia

tes sunt. Cerebrum, Ventriculum, Sensoria omnia, Viscera, pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus crassis, putribus, pituitosis, biliosis, & tartareis liberant. Insuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem juvant, & appetentiam excitant. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. quotidie continuando, donec operationes desideratæ feliciter sequantur.

Pilulæ Proprietatis.

℞. Mass. pil. aloephang. ℥iij. tart. vitr. ℥j. lact. sulph. ℥ss. ext. lig. aloes. ℥j.

Misc. & cum vino Malvatico f. Massa; ex qua cum Ol. Sem. Fœnic. conficiantur pilulæ in modum Aloephang, videlicet, quantitate majores vel minores, & sic quoque numero plures vel pauciores, prout occasio est; postea fortiter deaurentur & ad usum ferventur.

Vires, Usus, Dosis. Caput, Pectus, Hypochondria & Stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radiciter expurgant. Imò humores tartareos & corruptos in ventriculo immixtos evacuant, & omnia membra principalia confortant & putredine præservant. Præterea omnes fluxus seu catarrhos à cerebro ad subjectas partes delabentes exsiccant & consumunt. Concoctionem juvant. Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniant. Sanguinem & Spiritum clarificant. Misticæ advenus peitiferæ suis contagia popularum grassantia pollent; necnon Lumbicos tam in pueris quam adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsia, Apoplexia, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hæctica, Lue Venerea, Convulsione nervorum, Arthritide, Podagra, Schiatica, Venatum, viscerumque obstructionibus summo opere conducunt & à mè ordinatæ sunt, potius ut confortent, quam ut alvum ducant; possunt tamen pro lubricitate alvi ad libitum sive manè, sive serò, sive quavis hora diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus febribus continuis & intermittentibus, ægris felicissimo succellu offeruntur. Non solum enim alvum aliquo modo solvunt, sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloephanginis nostris.

Pilulæ Anodynæ.

℞. Ext. pil. aloephang. nost. ℥iij. tartari vitriolat. laudani Opiat. ana ℥j.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. pill. f. massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis. Ad dolores acutos mitigandum & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in Colica, Nephritide, Arthritide, Pleurisi, cæterisque morbis omnibus solum excellunt; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt. Quia ratione Ext. pil. Aloephang. & Tartari vitriolat. additorum, non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opiat per se exhibiti, ægotantes communiter afficiuntur. Dosis à Gran. xij. ad xv. Scr. j. & à Gran. xxv. ad Drach. s. Harum enim pilularum Gr. xv. Laudani opiat Gr. 3. Scr. j. Laudani Gran. 4. Gr. xxv. Laudani Gr. 5. Drach. s. Laudani Gran. 6. in se continent. Et sumuntur vespere eundò cubitum.

Pilulæ Narcoticæ.

℞. Opii Thebaici Spagyricè præp. atque extract. ℥iij. spec. diambra. ℥j. sal. margar. or. corall. rub. ana ℥ss. ext. syr. papav. errat. orati orient. ana ℥j. lap. bezoar. orient. ess. de corde cervi, ana ℥ss. moschi laudatiss. gr. v. ol. carjophyllorum, cinamomi, majorana, succini alb. carvi, ana Gut. iij.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires, Usus, Dosis. In defectu Laudani opiat, pilulis hinc felicissime utimur; quibus etiam honorem frequentissime consecuti sumus. Dosis à Gran. iij. ad iv. v. vel vj. hora dormitionis.

Pilulæ Cephalicæ.

℞. Scammonii rosat. ℥iij. ext. pil. cochiarum, hellebori nigr. ana ℥ss. tart. vitriolat. spec. diambra, ana ℥ss. ol. succini alb. majorana, ana ℥ss.

Misc. & fiat. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis. Caput, Cerebrum; sensusque omnes, Ventriculum, Uterum & alia viscera & frigidis, crassis, serosis, pituitosis & putridis humoribus misticæ expurgant, & articularum & Colicis doloribus, &c. valde celebres sunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s.

Pilulæ Seneſcutis.

℞. Ext. melissæ. ℥iij. spec. Diamoschi. dulc. ℥ss. succini alb. præp. ℥j. margar. trochiscat. nest. ambra grisea, ana ℥j.

Misc. & cum conf. Alkermes in aq. Lil. Convall. diss. f. Massa pilularum; ex qua postea cum Ol. Caryophyllorum & Majorana ana f. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Usus, Dosis. Vigiliis senum & illorum, qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; necnon ad pelendas curas valde utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 6. sub noctem.

Pilulæ Smaragdina.

℞. Smaragd. præp. ℥ss. sulph. Luna sicc. ℥j. hyacinth. præp. ℥ss. mag. perlar. orient. corallor. rub. ana ℥j.

Misc. & cum Syr. Cort. Citri Moichat. f. Massa pilularum; ex qua postea cum Ol. Anisi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Usus, Dosis. Somnia gravia & terribilia (quæ aliis valde debilitant) arcant & somnum inducunt; Venenis resistunt, & in confortandis spiritibus vitalibus totiusque corporis plurimum valent. Dosis hora somni scr. j.

Pilulæ Odontalgicæ.

℞. Opii Thebaici, ℥j. camphora, sem. staphid. agrici, zingib. is alb. piperis longi, gallar. Turc. creta albi. aluminis usti, ana ℥ss. Rad. perucedani, hyoscyami, urticae min. ana ℥j. sp. salis Nitrici. f. ad perfectam acetositationem.

Misc. diligenter, & cum Balsamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum dicto etiam balsamo formentur pilulæ oblongæ alterutra sui parte in acumen desinentes.

Vires & Usus. In usu quotidiano pro secreto habemus: perforatis enim & concavis dentibus impositæ, acutissimum dolorem confestim & ex tempore solvunt.

Pilulæ de Calce viva.

℞. Calcis vivæ, ℥j. Farin. Siliginis, piperis longi Cort. granator. gallar. turc. ana ℥ss. sem. hyoscyami, caryophyllorum, opii thebaici, aluminis usti, ana ℥j.

Misc. & cum succ. inspiss. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana f. q. fingatur pilulæ oblongæ.

Vires & Usus. Dentibus dolentibus impositæ subito medentur; firmiores eos reddunt; Vermiculos in eorum cavernis delitescentes enedant, necnon fluxiones omnes ad gingivas lapsas extrahunt.

Pilulæ Odoriferæ.

℞. Syracis calamit. ℥j. assa dulcis. ℥j. Rad. kryos.

Ireos. 3ß. Gallie moschat. santali citrin. ana Dj. ol. stil. rosar. veri. 3ß.

Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aqua Cinamomi fact. fiat Massa, de qua formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

Vires, Usus, Dosis. Fœtorem dentium excavatorum relegant; nec non, immixtæ & retentæ, suavissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

Pilulæ de Origano Cretico.

℥. Origani Cretici, Dj. galie moschat. vera, cassia lig. aloes, santali citrin. Ireos flor. ana 3ß. styracis calamit. assa dulcis, caryophyllorum. galang. min. nuc. moschat. cubebæ, macis, ana Dj.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ diss. f. Massa pilularum, ex qua postea cum Ol. Stil. Rosar & Cinamomi ana f. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Usus, Dosis. Facta purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3- vel 4. assumptæ, mirabiliter fœtorem oris & nasi, sive per consensum à Cerebro, sive à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & jucundiorum reddunt. Insuper ventriculum confortant & concoctionem juvant.

Pilulæ Rosatæ.

℥. Scammonii rosar. 3ß. Mag. Jalappa, Turbethi ana Dj. Tartari vitriolat. Dj. Ol. Stil. Rosar. veri. Scr. s.

Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo Num. 9.

Vires, Usus, Dosis. Valentissimè bilem dejiciunt, quam à sanguine exhaustiunt: necnon crassam lentamque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis ac remotioribus artubus educunt. Dosis à scr. j. ad Drach. s. & scr. ij.

Pilulæ Polychrestæ.

℥. Ext. polychrest. nost. scammonii rosar. ana 3ß. tartari vitriolat. 3j.

Misc. & cum spir. Anisi f. l. a. Massa pilularum, ex qua postea cum Ol. Majoranæ fingantur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis. Quod ad quam plurimos totius corporis affectus maximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanas, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque Capitis, Oculorum, Ventriculi, splenis, Jecinorisque morbos valdè probantur: Ex iis enim pituitam & utramque bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagram & Arthritin etiam insigniter profunt. Dosis à scr. j. ad Drach. s. & scr. ij. præsertim in robustioribus.

Pilulæ Melanogogæ.

℥. Mass. pil. Indarum, 3ß. lap. lazuli præp. scammonii rosar. ana 3j. ext. troch. albandel, hellebori nigri, Jalappa, ana 3iß. ess. fol. senæ Alexand. hyperici, ana 3j. croci orient. præp. epithymi, ana 3ß. spica Indica, caryophyllorum. ana 3ß.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissolut. fiat Massa pilularum; ex qua postea cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis. Ut per has pilulas humanus intellectus quasi deperditus restauretur, secretissimè teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Icterus nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem insigniter defæcant, & terosa excrementa ita largiter evacuant, ut omnes hisce utentes semper tam mentis quam corporis sanitatem recipiant. Dosis à Dj. ad 3ß.

Pilulæ Hydragogæ.

℥. Turbith. mineral. veri, 3ß. ext. hellebori nigri, locynthid. ana 3ij. Rhabarbar. elaterii, ana 3j. mag. corallor. rosar. hya. anth. præp. ana 3jß. croc. metallor. absinthiac. gum. de Peru rosar. spir. vitrioli dulc. 3ß.

Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinamomi ana f. q. f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis. In Cachexia, Hydrope, Scabiæ, Serpiginè, Impetiginè, Pruritu, &c. Catharticum est stupendum, imò specificum: Crassos enim & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagra, Icteria, Lue Venerea, cujuscunque etiam speciei gradus atque ætatis, necnon in omnis generis inveteratis & pessimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & hujus ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à 3j. ad Dj. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, si vires ferant.

Pilulæ Spleneticæ.

℥. Gum. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. 3ß. ad justam consistentiam coct. 3j. chabibis cum aceto Tartar. præp. ext. rad. filicis, ana 3ß. tartari vitriolat. aloes non lotæ. ana 3ij. mag. myrrha rub. mast. chis a. 3j. sal. absinthii, scolopendr. centaur. min. ana 3ß. sem. fraxini, croc. orient. ana Dj.

Misc. & cum Sac. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum, quæ conservetur in aluta madefacta Ol. Benzoin, postea tempore usus cum Ol. Rosismariæ ni formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis. In omnibus deploratis Lienis & Jecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant; Splenem enim modestè aperiunt & confortant, necnon (præmissis tamen universalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & alvum subducentibus) ejus duritiem, tumorem & diuturnum scirrhum pedetentim & sine molestia tollunt. Debent etiam ante & post harum pilularum usum clysteres & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dos. à Dj. ad 3ß. mane seu vesperti ratione morbi & complexionis.

Pilulæ Pectorales.

℥. Sac. Glycyrrhiz. in aq. pector. nost. dissol. colat. 3ß. ad justam consistentiam usum coct. 3ß. spec. diasturmi nost. diasulphuris nost. ana 3ß. ext. rad. myrrhidis, sacchari candi alb. ana 3ij. flor. benzoin. sem. cydoneor. ana 3j.

Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum, ex qua postea cum Ol. Anisi & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis. In Catarrhis & morbis pectoralibus, utpote Tussi, Asthmate, Dispnoea, Orthopnoea, Phthisi, Hætica, Pleuritide, &c. commendatæ volumus. Dosis à Dj. ad 3j. manè & vesperti.

Pilulæ Peruvianæ.

℥. Mag. gum. Peruviani opt. ext. panchymag. nost. ana 3vj. acidi tartari, 3iß. spir. vitrioli rect. Dj.

Misc. & fiat f. a. Massa, ex qua postea cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet scrupulo, Num. v.

Vires, Usus, Dosis. Ad humores serosos & crassos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabiæ, Icteria, obstructionibus Hepatis & Lienis, &c. item in Febribus quotidianis & tertianis, hisce quotidie tanquam experta medicina utimur felicissimè. Dos. à Dj. ad 3ß. & 3ij. præsertim in robustioribus.

Pilulæ Terebinthinæ.

℥. Terebinthina Cypria in succo Limonum lota, 3ß. suc. Portulacæ inspiss. 3vj. extr. rad. Glycyrrhiz. rhabbarbari, tartari vitriolati, ana 3ij. spong. in arbut. rosar. 3j.

*Sylvest. nata Off. Mespilor. an. 3 j β. sal. succini alb. nitri
prep. ana drach. j. mag. lap. percar. pisc. oc. cancri ana
drach. β.*

Misc. & f. l. a. Massa pilularum; Ex qua postea cum
Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Mitum in modum ad frangendum Renum cal-
culum & ciendas urinas conveniunt, præcipueque ca-
lidiorebus naturis conferunt; Tartarum enim & are-
nulam ad miraculum utique expellunt. Gonorrhœam
& id genus alia curant, nec non Hepatis Lienisque
obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à drach. β.
ad drach. j.

Pilulæ Stipticæ.

*℞. Suc. glycyrrhiz. ext. unc. β. spec. diplantaginis,
diamartis ana drach. iij. laudani opiat drach. ij. fung.
betulini, coag. leporis, camphoræ ana drach. β. ung. equi
ustæ, sandaracæ, olibani ana ʒj.*

Solvatur succus Glycyrrhiz. in vino granatorum, &
f. l. a. Massa pilularum, Ex qua postea cum Ol. Nuc.
Moschat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in mo-
dum ciccerum, quæ deurentur.

Vires, Usus, Dosis.

Omne alvi profluvium à quacunque causa ortum
cohibent & sanguinem à quacunque parte emanan-
tem coercent; nec non uterinos fluores omnes si-
stunt, placideque compescunt, dolores mitigant, &
somnia inducunt. Dosis à scr. j. ad drach. β. vespri
cundo cubitum.

Cicera Tartari.

*℞. Terebinth. Cypria, in aq. violarum lota & in ea-
dem ad justam consistentiam coct. unc. ij. acidi tartari
unc. j. spec. dia-treos simpl. drach. ij. nitri prep. 3j.*

Misc. & manus immittendo in aquam violarum
frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cice-
rum.

Vires, Usus, Dosis.

Felicissimè utimur in omnibus ægitudinibus tar-
tareis à crassiore materia genitis: Hinc per experien-
tiam cognovisse licuit, quosdam harum pilularum
usu instantes dolores podagricos adeo præcavisse, ut
iisdem aliquot annis non vel tardius tardierint, aut in
quibusdam mitius saltem affligerint, & citius delie-
rint. Commendabiles quoque sunt in omnium visce-
rum & venarum obstructionibus, Hemicrania, Icte-
ria, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensium
retentione, &c. Calculos Renum & Vesicæ (ipsam
Ventriculum & proximè vicina membra non solum
levando, sed & iisdem singulare robur suggerendo)
communiunt atque expellant. In Asthmate, Tussi,
Phisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pi-
lularum usus etiam valde celebris est. Interdum per
sadores & utinas operantur, prout natura ægri in
hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præ-
servatione Dosis singulis Lunæ quadris à 3 β. ad 3 j.
in curatione autem quotidie manè in aurora à 3 j.
ad 3 j β.

Pilulæ de Sandaraca.

*℞. Sandaracæ elect. 3 β. Ext. polypodii tartari albi
ana 3 ij. succini alb. prep. piperis nigri aluminis rocha
sarcocoll. rub. ana 3 β. lacis ablute nitri prep. aristolech.
m. sem. ruta, sylvest. petroselin. ana ʒj.*

Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa
pilularum & ex quolibet scrupulo formentur pilulæ
quæ deurentur.

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

Vires & Usus.

Pingues extenuant, nec non omnem carnositatem
præter naturam corpori humano additam attenuant.
Detur autem omni die pilulatum una, quando surgit
à lecto.

Pilulæ de Sabina.

℞. Sal. herb. sabina p. j. ol. stil. ejusd. p. j.

Mixta hierimeticè sigilla, igni philosophico coque,
donec lapidis duritiem acquirant, postea.

*℞. Mass. Pil. Aloephang. nost. 3 j β. lapidis hujus præ-
parat. 3j. borrac. venet 3 ij. ext. spec. dialaur. nost.
stor. centaur. min. herb. sabina ana drach. β. croci orient.
scrup. j.*

Misc. & cum Ol. Bac. Juniperi f. l. a. Massa pilu-
latum, ex qua postea cum Ol. Cinnamomi & Macis
formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

Adeo feliciter obstructiones uterinas reserant men-
sesque retentos copiose movent, ut merito inter arca-
na medica, muliebria scientia, primas obtineant. Dos-
is mane & vesprià ʒj. ad 3 β.

Pilulæ Uterinæ.

*℞. Mass. pil. Aloephang. 3j. sac. bryonia 3j. sal. jo-
vis Anglici, matris perlar. corallor. rub. ana 3 β. ext. can-
stori veri, callor. equar. ana ʒj. ol. angelica ʒ β.*

Misc. & f. l. a. Massa pilularum, ex qua postea cum
Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deurentur
fortiter.

Vires, Usus, Dosis.

Specificum & peculiare medicamentum ad uteri
strangulatum: Fæminas enim hysterico pathemate
quali suffocatas feliciter excitat. Dosis à ʒj. ad 3 β.
auroris aliquot continuis.

PIMPINELLA.

Pimpinella recens vocabulum est (ut & Bipinella, à
foliorum binis ordinibus pennatum seu plumatum, di-
gestis sumptum, vel à forma ancipitis securisive Bi-
pennis. Sanguisorba dicitur, quod sanguineos fluxus
sistat & sorbeat.

Hujus nota generica sunt folia pinnata, spicæ cras-
siores è seminibus dense stipatis semina tetragona, qui-
bus flosculi insident.

Vires. Quæ de hujus viribus traduntur ad duo ca-
pita reduci possunt. 1. Quodd sit cardiaca & alexi-
pharmaca. Hinc virens vino injicitur ad cor exhila-
randum, eique gratiam conciliat communicato sa-
pore & odore aromatico. Melonis æmulo: præfer-
vat etiam à peste & morbis contagiosis. 2. Quod sit
astringens. Hinc usus ejus in profluvii mensium exi-
mius, in fluxu alvi, hæmorrhagia quacunque, in vul-
neribus & ulceribus siccandis glutinandis & sanan-
dis.

D. Bovvle pulverem herbæ aut radicis exsiccata
cum saccharo rosato exhibere solitus erat in hæmor-
rhagia narium, spuro sanguinis aut tabe pulmonum,
idem inspersus (line saccharo) ulcera cancrofa com-
pescit ne latius serpant.

In mictu sanguinis laudat conservam superbibira
aqua Solenander 3. Consil. 27. Idem non repudiavit
radicem conditam saccharove obductam.

An herba astringens utilis esse possit in arena & cal-
culo, ut nonnulli volunt lectori considerandum pro-
ponimus: item an lieni indurato, an Asciti incipienti
conducatur.

Ccc

Henj

Henrici II. Galliarum Regis venator bona fide asseveravit Pimpinellam ad præcavendam hydrophobiam tantam vim obtinere, ut quicumque eam aliquor diluculis, vel in acetariis, vel alio quovis modo præparatam comederit, nihil inde incommodi sentire possit. Palmar. de morfu canis rabidi.

Panchovius refert Regem Chabam, finito quodam prælio 15000. vulneratos usu Pimpinellæ restituisse.

Pimpinella Saxifraga Hircina.

Nomina. Pimpinella saxifraga Ger. Sax. hircina major Park. Sax. major umbellâ candidâ C.B. Saxifragia hircina major I. B.

Radix alba, simplex, minimi digiti crassitudine, recta in terram descendens, paucis fibris donata, sapore fervido, folia longis intident pediculis, pinnata, tribus aut quatuor pinnarum conjugationibus ad mediam costam annexis: sui odorati umbelliferi similia, atroviuentia, splendens, sapore ignavio multo quam radix, pinnis circa margines dentatis, & nonnunquam altius incis, averfa parte hirsutis, supinâ lævibus. Caules sesquicubitales & altiores teretes, striati, glabri, inanes, ramosi & geniculati, summis caulibus & ramulis intident umbellæ flosculorum albertium.

Minutiorum: quibus succedunt semina pro plantæ magnitudine parva, brevia, striata; nulla ad exortum radiorum umbellæ totalis aut partialium apponuntur foliola.

In Sylvis agro Cantabrigiensi & Bedfordiensi, Cantiano quoque & alibi etiam in Anglia observavimus.

In hoc genere folia interdum in lacinias divisa nos quoque post Clusium observavimus.

Pimpinella saxifraga major umbellâ rubente C. B. Saxifr. maj. flo. rubente Park.

Quomodo à præcedente differat inquirendum, Clusius tantum ejus varietatem facit. *Ramus.*

Hujus plantæ vis ex ipso nomine satis patet, siquidem radix quæ hircum redolet, quæque multæ est acrimoniæ cum degustatur, non patum valet in deturbandis arenis ac materiis pituitosis renes obstruentibus, ut & etiam in pulmonibus ab infarctu crasso liberandis.

PINASTER.

Nomina. Pinus sylvestris C. B. Pynus sylv. vulgaris Genevensis & Tæda I. B. an pinaster Austriacus major, albus & niger ejusdem? Item Pinaster, sive Pinus sylv. Hispanicus major Clus? I. B. id est, Pinus maritima altera C. B. Pinus sylvest. mugo Ger. Ita.

Caudicem habet interdum distortum, sapissime tamen rectum: cortex in inferiore arboris parte plenus est rimarum atque scaber, colore quodammodo cineraceus, in superiore tamen parte plenus squamarum & rubicundus, in ramis tenerioribus lauri modo livescit. Surculos ramorum habet fragiles, qui si franguntur apparent inter corticem & corticem minuti pori, ex quibus resina exsudat. Adultæ arbores ramos minime rectos sed sinuosos. Folia habent tenuia, rigida, multo longiora foliis abietis & piceæ, semper gemina ab uno veluti tubulo exeuntia, in ipso exortu connexa, in inferiore parte, quæ se se conspiciunt, concava, acuta, pungentia, gustu adstringentia, undiquaque ramos vestientia.

Coni ex compactili squamarum acervo sunt turt-

binati, ramulis pediculi brevi, in nonnullis recto, in aliis adunco, ad latera ita firmiter adherent, ut cum novi erumpunt anniculi adhuc in ramis hæreant, quamprimum inaruerint dehiscunt. Squamæ sunt oblongæ, sub quibus semen later nigricans, magnitudine Anisi, alatum, plenum albâ medullâ.

Arbor hæc optimam fundit resinam.

Descriptio hæc in reliquis bene convenit Pini Sylvestris à nobis in Suevia, Bavaria, Aulstia, & alibi in Germania passim observata, sola semini parvitate differt. Nostra folia habet longa, in viriditate nigricantia, conos satis grandes, minores tamen quam pini sativi, oblongos, turbinatos, ramorum alas spectantes & reflexos, nucleis parvis, nec nulli vulg. ris nucleis mugo majoribus, quibus è figura sic accedunt.

Habetur in viridariis nostris frequens in Anglia, & ab hortulanis vulgo Pinus montana, dicitur. Excrecit autem in magnitudinem & proceritatem eximiam, quamvis cum sylvestris & suæ spontis sit, plerumque pumila manet in Germania.

Hæc proculdubio est quam Bellonius libro Coniferarum describit sub piceæ nomine, caudice, cum in arborem excrevit, contorto, rubro cortice vestito, rimis hiulco, sinuosis ramis fragilibus, coma in latum expana, mediocri magnitudine, &c. v. de. Pinaster Austriacus major Clus. Duorum est generum, adeo inter se similia, ut pauci nisi materia cautes discernere queant. Alterum tamen genus læviter cortice, majore cono. Alterum verò crassiore plerumque est caudice, scabiore cortice, foliis paulo crassioribus ac minore cono.

Pinaster sive Pinus sylvest. Hispanica major Clusio, in Aquitania, inque Pyrenæis & pleisque aliis Hispaniæ locis frequentissima, quæ ipso monente, à pinastro I. Austriaco albo patum & folis fortè natalibus differt, in Pini sativi altitudinem excrecit, interdum etiam superat. Nobis observatæ quamvis satis grandes & proceræ, minores tamen erant lativis.

Sunt ergo nostrâ sententiâ Pinus sylvestris vulgaris Genevensis J. B. Pinaster sive Pinus sylvestris Hispanica major ejusdem. Item Pinaster Austriacus major albus, & niger, una eademque Pini species, ut & ipse Joan. Bauhinus suspicatur. Quamvis, ut verum fatear, descriptio Pini Sylvestris Genevensis J. B. huic arbori non bene conveniat: nec enim Coni in hac parvi & breves & non turbinati sunt, sed rotundiores, fragili & breviori pediculo adherentes ramis, verum è contrario magni, & longi, & turbinati ut superius diximus.

Ufus. Ex hujus arboris inferiore parte, radicibus viciniore sunt assulæ illæ pingues ad ignem accendendum, & lumen præbendum idoneæ, magni per multas Germaniæ Provincias usus. Strangulat enim humor ad radices descendens ipsas arbores sic ut in Thædam vertantur, de qua Assulæ. *Ramus.*

Ex hac arbore exudat lachryma illa quæ Resina pini vocatur, quæque per combustionem ligni cui adherescit, quod laminatim & per vices excinditur, in picem nigram convertitur.

DE THÆDA.

Transcunt in Thædam quandoque piceæ & lativæ, sed raro admodum: pini enim sylvestris proprius ac peculiaris morbus est. In Thædam autem arbor convertitur dicitur cum non modo cor ejus, sed & reliqua substantia

tia in pinguedinem mutata est. Hinc inquit J. Bauhinus) Plinius non absque errore Thædam sui generis arborem esse existimavit, & sextum coniferarum genus statuit. Plinium pariter erroris insimulant Mathioli, Bellonius, Casp. Hofmannus, Bodæus à Stapel, aliique. Ego potius cum Delechampio, Clusio, Parkinsono sentio, Thædæ vocabulum *επιστομω* esse, & nunc pini resinofum & pingue lignum (*πλάδα*) significare, quod Lucernæ candelæve loco uratur. Nunc arborem sui generis Theophrasto ignotam.

Quoniam assularum Thædæ ad lucernas usus est, hinc Thæda pro face quacunque, præsertim nuptiali, accipitur.

At tibi ignarus thalamos tadasque parabam.

Ovid. Metamorph. I.

Ex hoc genere in Aquitania, apud Cantabros & alios Hispaniæ locis; indigenas resinam colligere observavit Clusius, & nos etiam nec in Aquitania solum sed etiam in Gallia Narbonensi, ubi arbores vulnerrantur ejus rei causa, singulis annis novo vulnere supra annocinnum infixito, donec ad decem aut duodecim pedum altitudinem perveniente humor ab ea parte manare desierit. Tum demum simili modo ex alia parte, ac deinde alia aperitur.

PINEOLATUM.

Pineolatum seu *Pignolatum* est pastæ gentis, quod patatur ex pineis mundatis in saccharum liquatum immersis, & ad sacchari rosati consistentiam coctis.

Ut autem pinei rancorem omnem deponant, debent prius in aquâ diem integrum, aut saltem dimidium macerari, & saccharum in rosacea liquari: sic enim confectura gustui erit amior, ut & olfactui si moschi aliquot grana commisceantur, ut in multis bellariis interdum fieri videmus, quæ in Principum mensis apponuntur. Usitatio autem conficiendi pineolati formula hæc est.

℞. Sacchari paulo infra consistentiam electuarii solidi in aquâ rosarum cocti ℥ss. Melle pinearum mundatar. & in aquâ subinde mutatâ per XII. horas infusarum ℥ij. dein rudicula agitentur simul ut probe tota massa subigatur, cui antequam planè refrigerit adde moschi ℥j. s. parta.

De ea formentur cylindri super chartâ reponendi, & assiccandi, ut indurescant. Renodius.

Pineolatum album è Pharm. August.

℞. Pinearum mundat. ℥j. Sacchari albiss. in succo limonium dissol. & albuminibus ovorum clarificati tantundem F. ut artis est.

Pineolatum viride ex eadem Pharm.

℞. Pistacior. præpar. ℥j. nucleor. pineor. mundat. ℥ij. cinnam. acuti ℥ss. zinziberis ℥j. caryophyllor. nuciis moschate ana ℥ss. melle ℥ij. sacchar. alb. in succo betonic. dissoluti ℥j. s. f. a.

Hæ compositiones valent in tabidis, consumptis, extenuatis, & corporis refectionem exigentibus; plurimum enim roborant, ac nutriendum.

PINEI NUCLEI, vid. Pinus.

PINGUEDO, vid. Adeps.

PINGUICULA.

Pinguicula Gesnero dicitur quod folia ejus ad tactum pingua sint, ac si oleo aut butyro oblinerentur.

Nomina I. Pinguicula Gesneri L. B. pinguicula sive fanicula Eboracensis Ger. Park. Sanicula montana Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

flore calcari donato C.B.

J. B. Fibris aliquot albis pro plantulæ modulo satis crassis, non admodum altè in terram demissis radicatur. Folia per terræ superficiem sparsa sex aut septem, & interdum plura, pallide ex luteo vitidia, pinguicula & nitida ac si oleo aut butyro oblinerentur, binas uncias longa, unciam circiter lata, per extremum nonnihil obtusa, marginibus aequalibus & minime crematis. (Supina folii superficies brevi admodum lanugine curiose intuenti obducta cernitur.) Inter hæc surgunt pediculi aliquot palmares aut altiores, quorum unicuique in summo fastigio hæret flos unicus purpureo violaceus aut albus, violæ similis, monoperalos tamen, calcari longo donatus, in quinque segmenta divisus. (Nostratis flos fere semper dilute purpureascent aut ex pallida purpura carulescit.)

In palustribus humidis, & montosis udis ubi aquæ scaturiunt sæpius occurrit.

Nomina. 2. Pinguicula flore albo minore, calcari brevissimo.

Hanc in summitatibus montis Juræ locis udis reperimus.

Nomina. 3. Pinguicula flore amplo purpureo, cum calcari longissimo.

Hanc una cum priore iisdem in locis observavimus. Floris colore saturo purpureo, ejusdemque magnitudine & calcari prælongo, tum à præcedente, tum à vulgari nostrate differt.

Nomina. 4. Pinguicula Cornubiensis flore minore carneo.

Folia hujc circa margines reflexa sunt & velut convoluta, pellucida fere, & venis rubentibus striata. Forës quam in vulgari nostrate multo minores pallidiores & ad incarnatum colorem dictum accedentes.

In Cornubia locis palustribus observavi circa Kilhamton & alibi.

Vires. Vulnere recentia & plagas curare dicuntur folia trita & imposita. Succo ejus pingui & butyroso illico tum manus rimas, tum tumores & fissuras in uberibus vaccarum rustici sanant. Hinc & faniculæ Eboracensis ei nomen inditum. Plebs Wallica syrupum ex ea conficit, quo se suosque purgant, quin & herbam jusculis incoquant in eundem usum. Pargari enim pituitam satis stenuet. Præterea unguentum ex ea conficiunt ad obstructions hepatis utilissimum.

Dalechampsius asserit radicem pistam & pro magmate impositam tertio die curare ischiadicos, eandem tritam & impositam locis dolore affectis quosvis dolores sanare, at radix nimis parva est: quam ut pingu possit in hunc usum. Camerarius testatur vulneratiam esse herbam, præsertim ad ramicem puerorum eximiam. S. Paulus.

Tingit crines flavedine, & inservit instar gummi ad contorquendos mulierum capillos. Idem. Raius.

PINUS.

Pinus. Arbor Latinorum quo nomine veteribus Græcis dicta sit non levis est inter eruditos controversia. Plinius veteres Græcos pro pinu usurpasse J. Bauhino dubium non est. Idem videtur Casparo fratri, Carolo Clusio, Bodæo à Stapel. aliisque doctoribus. mihi Turneri nostri sententia probatur, nimirum Theophrastum *ελαιω* appellasse quam Latini pinum: Plinium autem *ελαιω* Græcorum pro pinu accepisse, quod Plinius pityocampas pinorum eticæ vertat, non piceæ, Galeno etiam pityn pinum esse, ait enim pytin maximos ferre conos: verisimile etiam putat Galeni tempore Græcos & qui eum secuti sunt semper pityn pro pinu usurpasse.

Ilrus Theophrasto quæ arbor sit nobis non constat, Joh. Bauhino pinastrum sylvestrem esse verisimile videtur.

Nominum mutationis, & errandi ansam præbuisse videntur Arcades, qui (ut scribit Theophrastus) quod cæteri *πίτρον*, *πίνδλον*, contra quod *πίνδρον* *πίτρον* vocarunt.

Vires & Usus. Pini cujuscunque cortices & folia refrigerant & astringant, unde in dysenteria & fluore mentium profunt. Decoctum aut infusum summitatum pinus in cerevisia aliove idoneo liquore ad calculum renum & vesicæ plurimum valere creditur, nec non ad scorbutum aliosque thoracis affectus, à turionibus pini mille hominum liberatos à scorbuticis affectibus refert Hofmannus in method. medendi.

Nuclei pinei saporis sunt delicatissimi, ipsis etiam amygdalis præferendi: ideoque in Italia mensis secundis adjiciuntur. Caliditate temperati sunt & humidi; maturant, leniunt, impinguant. Usus præcip. in phthisi & tabe, quia nutriunt bene, quamvis non omnino facile concoqui vult Dodonæus; in tussi & diuturnis pectoris vitis per se aut cum melle aliove eclegmate, quoniam exasperata leniunt; in nephriticis affectibus, stranguria, acrimonia urinæ &c. quos mitigant & dolores sedant. Augent item & lac & semen genitale, ideoque venerem languentem excitant & naturam calefaciunt præsertim saccharo conditi. Totus conus seu strobilus cum marrubio recenti decoctus (inquit Galenus) si postea addito melle modico iterum coquatur, donec ipsum decoctum mellis accipiat crassitudinem medicamentum est ad thoracis pulmonisque excreationes conveniens, veteri tussi & tabitudini conferens, ut Dioscorides etiam testatur. Aqua strobilorum astringit, ideoque utilis est ad faciei rugas delendas, mammarum incrementum impediendum, in procidentia matricis, &c.

Notatu dignum est quod observavit Cæsalpinus, & nos etiam ipsi, nucleos hosce non bipartitos esse ut aliis plutimis, sed velut in alveo novellum pinum continere, cujus radix interius spectat. *Raius.*

P I P E R.

Earum quæ ambigæ sunt & incertæ sedis principem locum sibi vendicat famigeratissimum Aromaticum *Piper*, omnibus seculis, omnibus terris ad cibaria condienda experitum. Cum enim qui plantam descriperunt de floribus ejus altum sileant, incerti sumus an eos imperfectos & stamineos, an vero perfectos & petalodes obtineat, adeoque an ad genus earum quæ flore sunt imperfecto, an potius ad earum quæ flore perfecto semine nudo solitario, referenda sit.

Πέπερος vocem *πίνδρον* *πέπερον*, id est, concoquere Etymologus deducit. Verisimilius tamen est *πέπερος* peregrinum & barbarum vocabulum esse, ut *χόμμι* & *κάρφι* & pleraque in *πίνδρον* desinentia: à Persis profectum docet Galenus, qui proculdubio ab Indis hauserunt, quibus (teste Garcia) piper longum pimpilim dicitur.

Quæ de Pipere ejusque speciebus habent veteres Græci & Latini manifestè ostendunt plantas piperiferas iis prorsus incognitas fuisse, eosque rumores incertos & vulgi fidem secutos in ejus descriptione. Ruellius pro piperis specie simulacem asperam proponit, ut existimat J. Bauhinus; Matthiolus Ribes nigrum. Nos incertis & suspectis omisiss descriptionem piperis à Clariss. Carol. Clusii exoticis mutuamur dabitur.

Vires. Piper Dioscoridi vim habet in universum calefaciendi, urinam ciendi, concoquendi, attrahendi, discutiendi, exterendi ea quæ pupillis tenbras offundunt. Commodum etiam est ad rigores per circuitum in febribus repetentes, tum si bibatur, tum si illinatur; & commotis à bestiis venenatis auxiliatur. Educit etiam fœtus, putatur & conceptionem impedire si post coitum apponatur: tussi quoque & omnibus circa thoracem affectibus commodum est, tum si delingatur, tum si in potu accipiat, Anginis item convenit illitum cum melle: tormina quoque dissolvit cum teneris lauri foliis potum. Pituitam à capite detrahit cum uva passa manducatum. Dolores sedat, & in sanorum usu multum est, ac appetentiam movet, & ad intinctus admixtum concoctionem adjuvat. At pice exceptum strumas discutit. Deterget & vitiligines cum nitro.

Piperis radix costo similis est, calefacitque gustum & humores provocat. Eadem si cum aceto bibatur splenem minuit; pituitam verò à capite detrahit cum Staphide agresti commanducata. Hactenus Dioscorides.

Usus ejus præcipuus est in frigidityte & cruditate ventriculi. Magna differentia in eo est, si vel integrum sumatur, vel in pulvere. Pulvis in ventriculo singultum facit, hepar autem & reliqua viscera valde inflamat, qui ergo ventriculo consulere volunt deglutiant integra grana, ut rectè monet C. Hofmannus. Præstat etiam carnes elixas & in furno coctas in artocreis, &c. integro pipere condite quam nitro & comminuto, cum cibis enim coctum & maceratum satis acrimoniæ iis communicat, quod & facit integrum deglutitum, nec tamen ventriculo noxam aliquam aut molestiam: cum pulvis interiori ventriculi tunicæ mucosæ oblitæ adhærescens aut in ejus rugas se insinuans, vel cardialgiam, vel singultum in nonnullis constitutionibus excitet.

Extrinfecus in apophlegmatismis, gargatismis, sternutatoriis usurpatur; sedat odontalgiam, columellam tumidam imminuit, nervorum affectibus frigidis conducit. *Schrod.*

Vis piperis (eodem adnotante, & ante cum Galeno) volatilis valde est. Videntur ergo, inquit, præparationes in quibus volatile evanescit, exempli gratia, extractorum.

Piper ejusque oleum egregiè decantatur in febribus quartanis à Zacut. Luitano, Langio, Kunrad, aliisque.

Oleum piperis extrinfecus in paralyti egregium est medicamentum C. Hofman.

Vulgus piper longum in paroxysmo febrium exhibere solet: id quod non nisi in principio locum habere potest *Schrod.*

Non bacca solum, quod proprie dicitur piper, acrimonia præditæ igneæ sunt, sed & tota etiam planta. Nam ex folia virentia, sarmenta & radix, si masticentur, prorsus linguam faucesque urunt ac salivam, haud secus quam costi pyrethrive radices moriunt.

Piper longum Indi linimentis addunt, quibus adversus dolores artuum à frigore utuntur, & ita ut bali hoc piper sit, corpusque addat santalum rubrum. Utuntur & contra venena, vertigines, catarrhos, oculorumque nebulas, & cum succellu.

Indorum plebs adversus diuturnam stomachi languiditatem bibunt aquam cui intusa est faris bona piperis copia: in eundem usum quoque eliciunt ex pipere recenti spiritum mirè igneum. Utrumque cum adhuc viret, piper longum æque ac rotundum, condiri muria aut aceto solet, & condi in penum ad usum famit.

familiarē mensæque delicias. Ejus usus frequentior mensibus pluviosis & in phlegmatica corporis constitutione.

Piper longum intenta mordacitate præditum est, & subamarum, quoniam immaturum, antidotis item & theriacis medicaminibus opportunum. Dioscorid. nonnulli statim ab initio curationis uvulæ relaxatæ ab inflammatione pulvere piperis longi auxiliari conantur; quod quidem periculo non vacat J. B. Raius.

PIPER INDICUM sive CAPSICUM.

Καψινδὸν Actuarius à καίπτω mordeo, quod semen comestum mordeat, imò adurat. Siliquastrum Plinius esse vel inde constat (inquit Joh. Bauhinus) quod Plinius Castore siliquastrum demonstrat caule rubro & longo, densis geniculis, foliis laurifolium semine albo tenui, gustu piperis: & alio in loco, panax piperis: saporem reddit, & magis etiam siliquastrum, ob id piperitidis nomine accepto. Plantam hanc ad solani genus referendam putamus ob folia & flores similes, quamvis fructus non satis respondeat, nec tamen multum abluat, membranæ enim internæ quibus semina adnascuntur humidæ sunt, & callosæ, adeoque fructus de bacca participat.

Differentia in foliorum latitudine vel angustia: in fructus colore & forma colore qui in initio aliis viridis, aliis niger, in maturitate aut ruber, aut croceus, flavus, vel rarus albus: figura aliis longâ, eaque vel crassa, vel gracili, vel incurvatâ: aliis brevis, eaque latâ cordata, vel rotunda cerasi formâ vel angulosa: & vel erecta, vel dependente: denique & caule piloso, C. B.

Vires & Usus. Est (inquit Gregorius Reg.) piper hoc Americanum tanta acrimonia præditum ut exulceret & pustulas excitet ubicunque applicatur, neque solum id præstat, sed etiam siliquis tantummodo aperiendo & semen eximendo adeo acris exhalat vapor, ut per nares penetrans cerebrum subeat, & ex eo eliciat tantam camque lentam & viscidam materiam, ut admiratione dignum sit, quin & guttur ingrediens tussim excitat, & adeo vehementem tonitum ut omnia viscera rejici debere videantur; siliquis præterea & internas partes constringendo sternotamenta valde excitat, & manibus contractas tractando tantam in iis inflammationem parit, ut aliquot horarum spatio aduri videantur, remediumque petendum sit ab aquæ frigidæ aut vini lotionē. Hæc omnia sum expertus, inquit, dum semen & siliquis eximebam. Quinimo in ignem injectæ siliquæ gravem & tetrum excitant odorem qui nauseam & fastidium adstantibus provocat. Imò si siliquæ particula prunis injiciatur intra triclinium aliudve conclave, fumus naribus exceptus omnibus quotquot in eo adsunt cerebri membranas vellicando immunia & continua sternutamenta movet, quæ non cessant donec vel fumus diffusetur aere externo admissio, vel paulatim evanuerit, fuligine scilicet præcipitata, ut sapius experti sumus.

Brahienses hæc Pimenta, ut vocant Lusitani, conferunt cum sale, & mixturam illam vocant Inquityu, eamque usurpant ad cibos inter manducandum, ut nos salem: eandem quoque miscent cum farina & piscibus coctis exceptis spinis, ac mixturam illam appellant Pira-quy, quam usurpant iter facientes. Bene sapit & durat ad aliquot dies.

Modum præparandi hujus siliquis ad usum docet frater Gregorius. In umbra primo siccant, dein cum eis uri volunt, cum farina in vase ad id apto

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

lento igne exsiccant: exsiccatas & à farina ac pediculis suis liberatas forcipe una cum seminibus suis minutissime incidunt, & ad singulas sic incisarum uncias pollinis farinæ libram addunt & cum fermento panis instar pinunt, massam probe fermentatam clibano coquunt, coctam in taleas scindunt, & denuo coquunt instar biscotti tandem minutissime terunt & per cribrum transmittunt.

Admirabilis, inquit, est hic pulvis ad condiendum omne genus cibi: valenter enim ventriculi, & intestinorum flatus discutit, orexin excitat, cibis præsertim humidis & flatuosis inspersus bonum saporem conciliat, atque etiam vino; concoctionem juvat, urinam & menses evocat, pituitosos humores undecunque, potissimum coxæ adhærescentes articulis discutit & evacuat. Raius.

PIPER AQUATICUM, vid. *Perficaria urens*.

PIPERITIS, vid. *Lepidium*.

PISCIS.

Generalis Aquatiliū divisio.

Omnia animalia aquatica, sive in aquis degentia, sunt, vel sanguinea, vel exsanguia.

Sanguinea, Græcè Νύκτα ἐναυαγία (quod natare sit proprium aquatiliū sanguine præditorum,) Pisces Latine, strictim dicta, varias sortiuntur differentias. Illustriores tamen ex nobis videntur, quæ desumuntur vel à locis, in quibus vivunt, vel à corporis integumento.

Pro aquatum in quibus degunt varietates, Pisces sunt vel (1.) Θαλάσσιοι, marini, qui in aqua marina, seu salsa vivunt; (2.) ποτάμιοι, Fluviales, qui in Fluminibus; (3.) λιμναῖοι, Lacustres, qui in Lacubus; (4.) Marini simul & Fluviales, qui in aquis tum salis, tum dulcibus alternatim versantur (5.) Piscinarii, qui in divitum Piscinis potissimum aluntur (6.) Τημεταῖοι palustres, qui in aquis destitibus, præsertim palustribus reperiuntur.

Tegumentorum ratione, quidam squamosi sunt, quidam cute recti, eaque vel aspera vel lævi.

Præterea Piscium alii sunt ἀγελαιοί, qui gregatim semper incedunt, ut Haleces, (combri &c. alii Σωγελδοί, qui solitarii natant.

Exanguia generalius dispescuntur in (1.) mollia seu molliuscula (2.) crustacea, (3.) Testacea. Charleton.

Atque hæc pauca de Piscibus in genere, quibus non sanè opus est ut alia specialiora impræsentiarum addamus,

PISUM.

Pisum à πῖνον tundere dictum existimatur. Frangere legumina veteribus solenne fuit: aliis à Pisa quæ inter Olfam & Olympum in qua copiose nascitur. Gassend. verum non memini usquam de alia Pisa legisse quam quæ sita erat ad Alpheum amnem in Elide Peloponensi: aliis demum πῖνον τὸ πῖνον quod humi procumbat.

Notæ Pisi genericæ sunt folia glabra, glauca, pinnis amplissimis caulem aded arcte amplectentia, ut ab iis transadigi videatur, è paucioribus & majoribus in hoc genere lobis composita, caulis quàm congeneribus major & fistulosior.

Pisæ Descriptio generalis.

J. B. Generali quadam notione Pisa circumscribeamus, quorum differentias petet studiosus Lector ex synonymis. In genere ergo hoc legumen, sicuti alia brevius durationis, tenui est radice, fibrosa: caules fistulosi, dum adhuc teneti sunt fragiles, longi, alienæ opis indigi, & nisi palis sustententur procidui. Folia genicula adverso situ ita complectuntur, ut ab eo transadigi videantur, quanquam in annatis furculis eorundem sit pinnata dispositio, eo quod furculi superest in capreolos tortiles, quibus proxima quæque arripit, abeunte. Flores ad genicula è foliorum sinibus exeunt duo tresve simul in eodem furculo seu pediculo communi, formâ ad genitæ flores accedentes, sed colore albo, vel purpureo, vel ex albo virescente, vel variegato. Siliquæ succedunt binæ ferè, teriusculæ, peniles, bifores, ex carnosâ pulpâ, minus tamen multo quam in faba, in quibus reclusis ad commissuram annectuntur pisa, alias majora, alias minora; nunc rotunda, nunc quadrata, aut alias inæquali superficie, interdum alba, flava, rubra, fusca, subcærulea aut virescentia; color totius plantæ glaucus aut ex viridi canescens.

Vires & Usus. Pisa cujuscunque generis flatulenta sunt, ideoque Turnerus omnibus quotquot ventriculum habent aut lienem flatibus obnoxium nimium eorum usum quacunque ratione præparatorum fugiendum suadet, nisi addatur anisum, aut cuminum, aut mentha, aut aliud aliquid æquor.

Pisa alba & hortensia, viridia adhuc, antequam plenam maturitatem adepra sunt, in aqua cocta, & deinde butyro condita æstivo tempore delicatissimum nostratibus habentur ferculum, & nobilium mensis præcocia & verna inferuntur; nec valde flatulenta sunt. Dodonæus medium quodammodo locum obtinere ait inter ea quæ boni ac pravi sunt succi; multum ac parum nutriunt; facile ac difficile concoquantur; tarde & cito descendunt, flatulenta sunt & flatu expertia.

Eandem sicca Tempore quadragesimali iusculis incoquantur, & ex iisdem pulres fiunt, vulgo & etiam ditioribus acceptæ. Verum sicca nobis multo flatu lentiora videntur quam viridia & recentia, palato & ventriculo delicatiorum minus grata.

Scholæ Saletnitanae pisa.

Sunt inflativa cum pellibus atque nociva;

Pellibus ablatis sunt bona pisa satia.

Pisa nigricantia cum Avena mixta à nostratibus pro equorum pabulo usurpantur; in frequentissimo etiam usu sunt ad porcos saginandos. Dodonæus totâ substantiâ quandam cum fabis similitudinem habere scribit, duobus ab eisdem differre, tum quod non æquè ac fabæ sunt flatulenta, tum etiam quod detergendi facultatem non habent, ideoque segnius quam illæ per alvum secedunt.

Pisa viridia cruda comesta in scorbuto à piscium & carniū salitorum esu contracto inter navigandum, summopere commendantur.

Mart. Rulandus, referente J. Bauhino, in Balnear. lib. 1. class. 3. cap. 1. ad scabiem, lepram, ulcera, & omnia cutis vitia balneo utitur sæpius experto ex Pis cum foliis quercus in aqua fluviali decoctis. *Ramus.*

PISA ARTIFICIALIA pro Fonticulis

è Pharmat. BATEANA.

Pisa latea.

℥. Ochrae flavae ʒβ. rad. iiris Florent. ʒij. cera ʒij. terebinth. q. s. ut formentur pisa diversæ magnitudinis pro fonticulis apertis servandis.

Pisa rubra.

℥. Vermilii ʒβ. hermodactylor. ʒij. cera ʒvi. terebinth. q. s. ut f. pisa.

Pisa viridia.

℥. Virid. æris, hellebor. alb. ana ʒij. cantharid. ʒj. rad. iiris Florent. ʒiβ. cera ʒvi. terebinth. q. s. vel fieri possunt ex cantharid. & viris æris ana ʒij. auripigm. ʒβ. cera ʒij. terebinth. q. s.

PISSASPHALTUM, vid. sub titulo *Naphtha*.

PISTACIA.

Nomina. Pistacia Ger. 1. B. nux Pistacia Park. Pistacia peregrina fructu racemoso, sive Terebinthus Indica Theophr. C. B.

J. B. Pistaciæ arbor tradente Rauvvolffio truncus est crasso, ramis expansis, cortice obductis cinereo in longa costa è ramis propagata folia conjugatim disposita habet, quanquam non usque adeo exacte semper respondeant singulorum foliorum ortus. Sunt ea verò nunc subrotunda, nunc in mucronem acuminata, nervosa, Terebinthi foliis, nisi iis majora essent similia. Fructus officinis notissimi, Avellanae magnitudine, oblongi, acuminati, una parte in gibbum cristatum eminentiorem protuberantes, altera depressiori, in acutum fastigiati, opposita parte, quâ pediculi adhæserunt vestigium, obtusi, lignoso lento, fractu contumaci, ac propemodum inter osseum & crustaceum medio cortice, sed tenui, lævi, candido tecti, cui rugosus alius, ac fere atridus, coriaceus, tenuis & fragilis supersternitur; colore supremo Amygdalæ putamini similis, in exoletis niger, lignosus cortex nucum modo in duas partes separari solet, interdum sua sponte hians. Nucleum continent ruffâ pelliculâ convestitum in flavo virescentem, dulcedinis suavissimæ, pinguem, halitum etiam masticatu commendantem, præsertim recentiores. Flores ramosi, purpurantes Terebinthi.

Rauvvolffius folia rotunda huic arbori attribuit, & sane iis quæ ex nucum satû nobis ortæ sunt talia fuerunt. Sunt nobis (inquit Joh. Bauhinus, rami pistaciæ in quibus folia acuta; & à Lobelio aliisque folia acuta pinguntur, quæ propter diligentioribus considerandum relinquimus an sit aliqua inter pistacias diversitas.

Plerique Botanici hanc arborem pro Terebintho indica Theophrasti habent. Et sane Terebinthi Indici descriptio apud Theophrastum satis convenit Pistaciæ. Verum cum in ipsa quoque India reperitur arbor correspondens, & quo nomine quoque conveniat, malimus potius eò referre quæ de Terebintho Indica Theophrastus scribit, quam ad pistaciâ, arborem autem illam demonstrat Rauvvolffius, capite de Terebintho à nobis proponendam. Pistacia Syriæ multis in locis reperitur, Rauvvolffius narrat, cum tenderet ex Tripoli in urbem Damand & Halepûm, se vidisse circa urbem Sermin Sylvas arborum pistachiorum, &c. circa Halepûm quoque admodum vulgatam esse arborem.

Vires. Pistacia stomacho grata sunt. Eadem sive edantur, sive trita in vino bibantur, contra reptilium beltiarum morsus opem ferunt Diosc. Plin. alioqui eisdem effectus habere quos pinei nuclei ajunt.

Galenus pistacias tenuioris essentiae esse scribit, subamari quid & odorati habentis: obstructions itaque liberare, maxime jecotis; verumtamen etiam thoracis, pulmonisque, parum nutrire. Verum recentiores plerique apprimè nutrire & venerem stimulare volunt. Quibus de causis Bellariis instaurantibus & reficientibus admiscetur tum ab Hispanis, tum ab Italis & Gallis medicis; imò tantum illis tribuitur, ut vix ullum sit medicamentum Analepticum sine pistacio. C. Hofmannus è contra fidenter affirmat falsam esse opinionem da πολυτεφλα, quinimo æstuosa esse ait calidioribus non minus quam Amygdalas. At venerent augent; & maximus eorum usus est in Italia, teste Brassavolo: quicquid faciunt flatuando faciunt ob excrementitiam humiditatem. Hactenus Hofmannus: cui ut & Galeno & sequacibus oppono quotidianam experientiam & medicorum praxin; quibus plus tribuendum quam Hofmanni auctoritati, aut ipsius etiam Galeni.

Oleum pistaciorum potum internos dolores sedare perhibet Matthiolus, quibus origo sit à pituita viscida & flatibus: idem prodesse contra spasmus & paralyfin, & interno usu facere ad generationem. *Raim.*

PYTHUSA, vid. *Esula.*

P I X.

Pix non tantum ex abietis, sed ex Pinis, & aliarum etiam arborum resiniferarum lignis assulatim cælis & in struem compositis, eo quem supra explicuimus modo, rudi quadam per descensum destillatione, vi ignis excoquitur.

Nonnulli ad usus subitaneos è Pice liquida, sic eam faciunt hoc modo; liquidam in cacabum ferreum insulam supposito igne fervefaciunt eoque ut flammæ concipiendæ apta sit, deinde accensam tandiu deflagrare sinunt, donec absumpto humore secca evadat, cujus cum in parva quantitate experimentum fecerunt, imposito operculo flammam extinguunt.

Joh. Bauhinus Picis aridæ duo genera facit. Vel enim, 1. liquida eoque tantum coquitur dum ad visci crassitudinem coacta sit; atque hæc Βορκαὶς nominatur, fortassis quod in pellibus (τῶν βορκήματων) pecudum videretur ac venderetur: aut quod pecudum scabies sanaret, aut quod illi greges privatim signaret. Officinis Pix navalis, quod hæc naves picantur: hæc ipsa cum pulverisata injicitur aquæ ferventi & trahitur, sive (ut loquuntur) malaxatur manibus sevo inunctis sit sutorum illa quæ fila cannabina inungunt, vel. 2. Igne tam valido & tandiu continuato coquitur, & absumpto prorsus humore (per quem alias tenax est) fragilis ac rasilis fiat; hæc Græcis ξηρὴ πίσσα, Latius Pix sicca & arida, aut rasilis, dicitur.

Πισσέλαον Dioscoridi sit è Pice separato quod in ea aquosum est, quodque idem velut serum lacti supernat. Excipitur porro interea dum Pix coquitur ex partibus supra emundis velleribus, quæ postquam halitu ex ea sublato permaduerint in vas aliquod exprimuntur, traturque illud tantisper dum Pix coquitur. Underet pissellæ nihil esse quam serum picis seu aquatiscis destillatam. Hoc Galenus pissanthos florem vocat, pissellæ autem picem li-

quidam cum Oleo permixtam. Ad eam facit ad quæ Pix liquida.

Zopissa est Pix navalis, ex cera & resina confata, derafa scilicet ex navibus; quæ diu in mari versata essent, ac (ut vult Plinius) velut vitam illuc peregissent; eaque per intentionem Zopissa, quasi efficacior dicta, & quod abjecto salis marini callo stimula sit, Ἀπόροχυσσα appellata fuit; multum digerentis habet facultatis. Dos. in unguentis & emplastris ab ḡss. ad ḡj. & plures.

Picis usum apud veteres duplicem fuisse rei rusticæ scriptores tradunt: unum ad dolia & serias cæteraque vasa ante quadragesimum vindemiæ diem picandas cujus usus erat ad duratricem firmitatem vino præstandam (inquit Plinius) ne corrumpatur, & sicuti rimosum vas sit ne transfluat. Verum cum hic mos dudum apud nos exolevit in vasis saltem majoribus; qui modum scire desiderat quo vasa picabant, hunc ad eosdem R.R. scriptores remitto.

Picis alter usus erat ad condituras, ut vina infirma durare possent. Picis autem odor saporque Romanis olim fuit gratissimus in vinis, quæ ob id picata appellabant. De modo condiendi vina cum pice opportunior erit dicendi locus cum de vinis agemus. At neque ad vina condienda nunc dierum ullus, quod sciam, Picis usus est, unde nec de condituræ modis opus est, ut admodum solliciti sumus.

Pice illita olim pilos avellere solebant è corporis partibus quas natura iis vestitas esse voluit quod πικτήν & κατωπικτήν Græci dicunt; qui mollium & effeminatorum mos erat.

Quin & pice corpora hominum torquebantur: unde κατωπικτήν inter alia cruciatu & supplicio afficere significat.

Vires. Facit pix liquida, tradente Dioscor. ad lethalia medicamenta (venena Lugd) phthificos, putulenta excreantes, tusses, anhelationes, & humores intra pectus contextos ægre excreabiles, si cyathi mensura cum melle delingatur, Peruncta valet ad tonsillarum & uvæ inflammationes, & anginas, itemque ad aures purulentas cum rosaceo (Galeno concoquit duras & crudos tumores omnes cataplasmatibus indita) nec non & ad serpentium morsus cum trito sale adhibitas pari vero ceræ admista scabros detrahit (& impetigines Gal.) vulvæ tubercula sedisque duritias discutit. cum fatina hordeacea urinaque pueri decocta strumas circumquaque rumpit. Cum sulphure, pineo cortice, aut fursuribus illita quæ serpunt ulcera cohibet. Manna Thuris ac cerato permixta sinuosa ulcera agglutinat. Pedum sedivæ rhagadibus commode illinitur, ulcera replet & cum melle purgat. Quin & cum uva passa ac melle carbunculos putrescentiaque ulcera emarginat. Septicis quoque seu erodentibus emplastris utiliter admiscetur.

Calefactoriam vim habet Pix arida, mollit, pus movet, tubercula panosque discutit, ulcera replet, ac utiliter vulnerariis medicamentis admiscetur.

Pix liquida jumentorum & pecudum ulcera scabiemque illita sanat. Nostrates certe ovium & jumentorum ulceribus & vulneribus picem liquidam illinire solent; verum ad ea potissimum contra muscarum injurias tuenda quæ locis crudis & ulcetibus, ubicunque cutis deteritur & caro denudatur perpetuo insidentes admodum molestæ esse solent, ovisque ibi depositis vermiculorum catervam ingenerare.

Norvvegici picem liquidam abiegnam cum cerevisia mixtam in febribus malignis magno successu bibunt; iis etiam pix arida podagrarum præsentaneum habetur remedium. Tho. Bartholin. Act. Med. An. 1675. Obs. 131.

Pulverem insuper & muscum abietis vulneribus periculosis inspergunt. In affectibus scorbuticis medicamenta è pice præparata valde celebrantur à Clau-dero de Balsamandis Corporibus pag. 88. habui à D. T. R.

Oleum Templinum dictum sit ex conis viridibus piceastri per descensum igne leni destillat. Oleum hoc cum olei Rosacei partibus duabus mixtum solamen est in omnibus vulneribus, præcipue capitis cum fractura ossis, impetiginem quinetiam sanat, verrucas consumit, Wagnerus Hist. Nat. Helvet. p. 298. Transmisit D. Husle.

Verum præcipuus picis usus in quem ingens ejus copia quotannis absumitur, est ad naves picandas earumque rimas & commissuras omnes obturandas & communicandas nequa se insinuare possit aqua marina.

Cæterum resina liquida quadruplex. Terebinthinae nomine dicta officinis nostri in usu est.

1. Primò Terebinthina Cypria, Cyprius, Cyprus Turpentine, quæ genuina Terebinthi arboris lachryma seu resina est, quam in capite de Terebintho descripsimus; Terebinthina è Chio ex eadem arbore.

2. Secundò Terebinthina Veneta, quæ laticis arboribus ad medullam terebratæ lata est.

3. Tertio Terebinthina Argentoratensis, quæ ex tuberculis Abietum novellorum colligitur. Vide cap. de Abiete femina. Hæc à multis Terebinthinae Venetæ præferitur nec immerito, certè triplo plaris venit. In quibus à Veneta seu larigna differt Caspar. Hofmannus docet. 1. Abiegna longe pellucidior est larigna; idè quidam (ait Matthiolus) larignam colatam & ad ultimam claritatem perductam vendunt pro Abiegna. 2. Abiegna non tam lenta est & contumax. Sed subito abrupitur si digito immisso attollatur. 3. Abiegna est odorator, non larignâ tantum sed ipsa etiam vera terebinthina; est autem odor Thurris. 4. Abiegna est amarior, & quodammodo refert saporem corticis mali Citrii. 5. Post annum incipit flavescere.

4. Terebinthina communis seu vulgaris. Hæc minus liquida & crassior est reliquis nec pellucida, albicans; consistentia ferè olei frigore nonnihil densa; hanc Pinus montanæ seu sylvestris C. B. liquorem esse existimo; siquidem à Massilia ad nos deferretur; ipse autem observavi non procul ab ea urbe montes hoc genus arborum sylvis vestitos, earumque plurimas deciso non longe à radice cortice vulneratas ut resinam funderent, eique excipiendæ fictilia truncis appensa aut subjecta.

Thus vulgare officin. nostrarum pineam resinam esse affirmat Parkinsonus in terram defluentem & brevi indurescentem cui nos facile assentimur, quia ab eodem loco ad nos adfertur, nec aliæ sint in vicinia arbores resiniferæ.

Picem Burgundicam nostratibus dictam idem Parkinsonus, Picem arboris resinam esse existimat, cum primo effluit liquidam, tempore indurescentem, ut tandem friabilis reddatur. Quod an verum sit nescio, necdum enim certi quicquam de ea comperi.

Suspiciatur Dom. Tancredus Robinson, Thus vulg.

gate officinarum non solum è pinu, sed è piceâ, aliisque arboribus resiniferis effluere in terram, & saxa ibique in micæ indurescere parte magis oleosa evaporata; unde candida illa germina cum resinis sæpe numero mixta, & à Plinio annotata inter mercatorum fraudes. Olibanum pretiosius, & rarius, hoc igitur sit Arabicum, Thus vulgare Europæam. Attamentum illud fuliginosum nostratibus Lampblack dictum, nihil aliud est quam fuligo resinæ vel picis concremata; propter quod officinas ædificant fumum cum non emittentes, olim ad attamentum scriptorium in usu erat, & ad colorandum, adulteratum fornacum, balnearumque fuligine. Vide Plin. lib. 33. cap. 6. Rainus.

PLANTA.

Planta (φυτὸν) definiente Jungio, est corpus vivens, non sentiens, certo loco, aut certæ sedi affixum, quod nutrirî, augeri, se denique propagare potest.

Vita est unio seu conjunctio animæ cum corpore, animam voco principium illud internum, quodcumque tandem sit, sive substantia, sive accidens, à quo operationes vegetabilium propriæ, uti sunt nutritio, augmentatio, seminis productio, fluunt: quantum enim principium illud intus corpori unitum manet, tandiu plantâ vivere dicitur.

Non sentiens in definitione additur ad excludendum animalia, quæ non minus quam plantæ vivunt & vegetant.

Obijciat quispiam, plantas nonnullas æschynomenas seu pudicas veteribus dictas, recentioribus vivas & sensitivas & mimosas, haud obscura sensus indicia prodere: Siquidem folia earum manu aut baculo tacta, & paululum compressa, pleno etiam meridie, splendente sole, illico se contrahunt & veluti marcescunt; quod idem ab aeris frigidioris appulsu patiuntur.

Fatemur equidem quomodo hæc fiant, si sensum omnem & motum spontaneum plantis denegemus, mechanicâ aliquâ ratione explicare perdimis- esse.

Herbarum folia & summitates avulsas aut decerptas brevi, flaccescere & collabi experientia testatur: cujus phænomeni ratio manifesta est, nimirum ob succi eorum vasa & poros replere & distendere soliti fugam & evaporationem, novo non succedente. Quemadmodum enim animalium pulmones aere inspirato repleri extenduntur & attolluntur, sic patiter folia plantarum spiritibus & vaporibus per nervos influentibus, quemadmodum etiam contratio siidem pulmones aere seu expirato seu per poros elapso vacui, concidunt & collabuntur; si itidem folia succo evaporato exsiccata. Cur, inquit, in decerptis expirat succus in matris herentibus non item? Imò in utrisque spirat: plantarum enim omnium partes humidæ in perpetuo fluxu sunt, perque earum poros insinenter evaporant at in matris herentibus novæ agiter in locum defcendentium à radice subministrantur, non item in avulsis aut decerptis, unde nec flaccescunt, illa etiamnum extensa manent. Hæc ergo potest ut tangentis manus nervorum compressu sud vaporosi influxum tantisper impediatur & retardetur, indeo qui nervos & vasa replebat exhalante, folia necessario contrahuntur & collabescant.

Præparata

Præterea plantarum nonnullarum partes, (folia, ramuli, aristæ) siccitate etiam contrahuntur & interdum convolvuntur; humore iterum explicantur, & extenduntur, quod in aristis avenaceis inque planta illa, sola Hierichuntina perpetam dicta evidentissime cernitur. Hæc enim postquam planè exaruit, imò per multos annos sicca reposta in globum coeuntibus ramulis contracta fuerit, si radice tenus in aquam tepidam immitatur, illico se explicat, & ramulos denuò in orbem expandit, humore scilicet in ramulorum poros sese ininuantem eosque extendente. Notandum etiam tam folia, quam ramulos plantarum siccitate suum seu introsum contrahi & curvari: cuius ratio esse videtur, quia partes internæ seu supinæ solaribus radiis expositæ, humore evocato prius & magis siccantur, unde necessario illorum contractio fit, non secus ac in tabulis seu allectibus ligneis aut etiam librorum operimentis membranivæ videmus, quæ si soli aut igni exponantur, in partem soli obversam curvantur & inflectuntur. Verum contractio quæ fit ex siccitate hic, ut puto, locum non habet.

Datur adhuc & alia contractio ex frigore, quod corporum fluidorum præsertim in vaporem resolutum, motum illico sistit, eaque in angustius spatium coarctat: atque ex hoc genere videtur esse contractio illa in foliis plantarum mimosarum, quæ de agitur. Frigus enim seu digiti, seu ambientis, succi in nervis motum expansivum cohibet, ejusque influxum magna ex parte sistit, unde sponte se contrahunt fibræ, & foliorum lobos una adducunt; non secus ac idem frigus corporis nostri cutem condensare & corrugare, uti è contratio calor eandem extendere solet. Lobi autem foliorum introsum ad se mutuo trahuntur, quoniam fortasse fibrillæ in nervis superiores sicciores sunt adeoque promptius & citius contrahuntur, inferiores autem molliores, adeoque facilius cedunt & extenduntur.

Quod contractio hæc foliorum à frigore fit, argumento est leguminosarum fere omnium quæ folia pariter lobata seu pinnata obtinent, similis proflus nocturno tempore contractio & diurno expansio foliorum. Item florum nonnullorum inter noctem se claudientium compressio, ut verbi gratia, calendula, cichorii, convolvuli, &c. etenim Jacobi Cornuti experimento flos anemones, qui ex hoc genere est, decerpitur & loco calidissimo reconditus, velut arcula exigua fideliter obliata, illico præter tempus aperitur, si modo ejus pediculus aquæ repenti immergatur.

Verum in causis hujus phaenomeni assignandis mihi metipsi non satisfacio. Valvulas autem, quas nonnulli comminiscuntur in plantarum vasis dari neutiquam concesserim.

Augeri dicitur planta quæ plus substantiæ sibi restituit quam dissipata est; planta autem non solum secundum omnes non satis adultas partes in omnes dimensiones major redditur, verum etiam novas partes sibi semper aggenerat, folia, flores, fructus; in quo ab animali differt, quod neque amittit ulla partes, neque aggenerat, nisi pilos plumasque pro partibus accipias, quæ quotannis defluunt novis succrescentibus.

Excipiendum tamen hic videtur cervinum genus, in quibus cornua quotannis decidunt & regerminant. Cornua enim æquo si non potiori jure partes animalium quam folia plantarum censerì possunt; nec obstat quod sentiendi facultate careant, cum & ossa pesto denudata sensus expertia sint; nec minus tamen animalium partes ab omnibus habentur. Fructus qui in plantis pro partibus reputari solent, non

minus in animalibus quam in plantis à matre decidunt; an vero novi in animalibus perinde ac in plantis generentur, est cui dubitem.

Cum autem animalium ova plantarum fructibus adeo exacte respondeant, eodemque fere modo ex ovario germinant quo plantarum fructus è gemmis & racemis, cur nomen partis iis denegetur, his concedatur, rationem non video.

Plantæ perennes augmenti respectu, ab animalibus differunt quod partes illæ quæ perennant, quandiu planta vivit augentur; ut in arboribus quantumvis annosis manifeste cernitur, quibus quotannis novus accedit ligni circulus: animalia autem cum justum magnitudinis terminum assecuta sunt augeri desinunt.

Additur in definitione, certo loco, aut certæ sedi affixum, quod tamen nec omnibus in universum plantis, nec solis convenit. Non omnibus; siquidem tritiores veteribus dicta, (Dioscoride teste) aquis supernatans sine radice vivat, quamvis solum habeat Aizoo simile ac majus, quod & prosper Alpinus in parte confirmat, pro radicibus; inquit, exigua quædam & rara lanugo dependet & eruditiss. Veslingius, planta tota sibi balneo incubat, aquis innatans extra radicem; quamvis radicem vicem demissa terram versus tenuissima fibrarum veluti filamenta sustineant. Tenuia autem isthæc filamenta quæ verius terram extendi, non terram attingere scribit, non videntur plantam stabilire posse aut sistere quominus huc illuc fluat & locum mutet. At nec solis plantis convenit terræ aliivæ sedi affigi; verum id animalibus etiam nonnullis commune est, iisque non imperfectis tantum aut æncipitis naturæ quæ Zophyta appellare solemus. Sed etiam perfectioribus, sunt enim ex genere testaceorum certæ sedi affixa, quæ *monopa*, id est, stabilia, Aristoteli ob eam rationem dicuntur; idque non casu aliquo, sed ex ipsius naturæ instituto; vidimus enim ipsi mytilorum speciem funiculo è testa egresso petris adnexum: quin & balnei illi conchæ anatifæræ dici soliti apophysi quædam fistulosâ, coriacea, rugosâ, oblonga navium carinis aliisque lignis vetustis in mari fluitantibus adhærescunt. Verum terræ aliivæ sedi ita adhærere ut aliquid inde attrahat seu exugat, id plantæ proprium est, nec ulli (quod sciam) animali convenit. Nam quæ de Agno Scythico traduntur pro falsis & fabulosis habeo.

De Divisione Plantarum in genere.

Plantarum divisionem instituere, cuius membra seu genera subalterna universas species complectantur, nulla adhuc anomala & sui generis relicta, quæ quæ singula genera notis suis caracteristicis ita circumscribat, ut non communicent in vicem, hoc est, ut nulla possit inveniri species incerti (ut ita dicam) laris & ad plura genera revocabilis, difficillimum esse imò plane impossibile.

Nec enim primò id patitur natura rei. Cum enim natura (ut dici solet) non faciat saltus, nec ab extremo ad extremum transeat nisi per medium, inter superiores & inferiores rerum ordines species nonnullas mediæ & ambiguae conditionis, quæ utrosque velut connectant, producere solet, ut ad utrum pertineant omnino incertum sit, ut v. g. inter plantas & animalia zophyta dicta. Deinde in uno quoque etiam ordine non paucas exhibet species singulares & anomalas sui, ut vocant, generis tanquam exceptiones à regulis generalibus, ad libertatis scilicet suæ nullis legibus obnoxie ostentationem.

At neque secundo, si natura rei id pateretur, humana conditio admitteret. Cum enim plantarum numerus ingens sit, in his ætatis angustiis, memoriæ imbecillitate, intellectus inadvertentia & caligine; quis adeo universalem specierum omnium notitiam, adeoque claram & distinctam singulatum, se unquam assequi posse sperat, ut tali incepto sufficeret, quis adeo circumspectus esse potest, ut ad omnes omnium convenientias & differentias attendat, easque sub uno quasi intuitu comprehendat, quod tamen ad eas inter se conferendas necessarium est.

Nos ergo methodum plantarum omnibus numeris absolutam non pollicemur, cum natura (ut diximus) intra limites methodi cujuscunque coerceri repugnet: at neque quam patitur natura perfectam & elimatam: non enim unius est hominis aut ætatis; sed quam potuimus accuratam pro ingenii nostri tenuitate, & modica harum rerum peritiâ.

Methodos autem illas quæ plantas secundum locos natales, aut florendi tempus, vires & usus disponunt, rejicimus, quoniam omnes illæ cognatas species separant, alienas consociant, eam autem quæ à similitudine & convenientiâ partium præcipuarum, floris scilicet & calycis, seminis eiusque conceptaculi notas characteristicas generum sumit, amplectimur & usurpamus.

De Divisione Plantarum, in arbores, frutices; suffrutices & herbas: & singulorum in genera sua subordinata.

Planta perfecta à Botanicis vulgò dividi solet in arborem, fruticem, suffruticem & herbam.

Arbor, (ἄνδρυν) definiente Joan. Bodæo à Stapel, cujus definitionem probamus, est planta lignosa, crassitudine & altitudine inter omnes maxima, cui caudex pro superficie est, perennis & natura simplex, qui in multos ramulos majores, & deinde ramulos multiplices finditur, ut pyrus, Abies, quercus, &c.

Frutex (θάμνος) eodem definiente, est stirps inter lignosas altitudine & crassitudine medioeris, cui pro superficie stipes perennis naturâ multiplex, quique facile in natura arborum stolonum abscissione transcendit.

Suffrutex (σπύρανον) eidem ex antiquorum sententia sic definitur; stirps minimæ inter lignosas & crassitudinis & altitudinis, caule perenni, interdum simplici, interdum multiplici & sarmentaceo, folio minuto & tenui, ut rosmarinum, lavendula &c. hæc definitio nullas continet notas quibus suffrutex à frutice certo possit distingui; ideoque nos paulo post commodiorem dabimus.

Herba (πῶς) eodem definiente est antiquorum sententia, est stirps cujus superficies est ex foliis tantum, ut phyllitis, &c. vel etiam ex caule, sed illo annuo, carnosio, & qui diutius durare nequit, lignosusque non est nisi cum exaruerit.

Divisio hæc quamvis unicuique è vulgo nota, & populari usu omnibus seculi recepta & frequentata fuit. Non tamen accurata & philosophica censenda est.

Nam primò, plantæ nonnullæ inter duo genera ambiunt, ut ad utrum pertineant difficile sit, judicare, aliis Botanicis uni, aliis alteri eas ascribentibus. Sic verbi gratia, vius Theophrasto arbor est, reliquis Botanicis frutex, ut alias omittam. Natura enim tam in plantarum, quam in animalium genere, inter

superiores & inferiores ordines, species nonnullas mediæ & ambiguae condiciones producere solet, quæ utrosque velut connectant, ut ad utrum pertineant omnino incertum sit.

Secundò, Arbores nonnullæ recisis cymis in frutices; frutices avulsis aut abscissis stolonibus in arbores facile transeunt, sic verbi gratia, lentiscus magnâ stolum ex parte fruticat; multis ab una radice stolonibus & virgulis assurgens; interdum verò quando non caditur, sed negligitur (ut plerisque locis ad Anam fluvium observavi) in arborem justæ magnitudinis excrescit, inquit Clusius. Juniperus quoque apud nos in ericetis frequentissima, cæsa aut à jumentis depasta plerunque fruticat; sin permittatur nec violetur in arborem adolescit; idem dicendum est de buxo, & (ut nonnullis videtur) ilice coccifera, quæ in Galliæ Narbonensi eisdem de causis in fruticum ordine coarcentur. Ex altera parte myrtus nisi sapius purgetur in fruticem transit. Theophrast. Histor. lib. 1. cap. 5. Comarus (Arbutus) suâ naturâ pusilla est, sed ramis expurgata in magnam latitudinem assurgit, quemadmodum etiam malus punica. Bellon. de neglect. stirp. cult. prob. 16.

Tertiò, plantæ nonnullæ in aliquibus regionibus fruticum modum non excedunt, in aliis arborum staturam & magnitudinem assequuntur. Sic Ricinus quæ Lobelio in adversar. annua, nec rediiva planta dicitur. In Creta multos annos, & in tantam excrescit altitudinem, ut nonnisi scalis admotis conscindi possit, quod Bellonius tradit. Clusius quoque in maritimis Batiæ Ricinos crassitudine humana, altitudine trium hominum, multis prægrandibus ramis brachiatos & multos annos durantes observavit, eosque exactissimè congruentes descriptioni Dioscoridis. Schol. in Monard. cap. 4. nos quoque in Sicilia Ricinum arbusculam, sambuci æmulam lignosam & perennem, in sepibus frequentem observavimus. Rhododendri nonnullis Cretæ insulæ locis ad ædicularum trabes conficiendas aptæ, quæ alibi parvæ sunt. Bellon. de neglect. stirp. cult. prob. 17. Idem observ. lib. 1. cap. 43. Rhododendri rubro flore, inquit, in monte Atho in summam celsitudinem attolluntur, earumque caudices crassitudine fucibus non cedunt. Arbuti quoque, quæ in aliis locis plerunque duntaxat fruticant, in gentes illic sunt arbores. Bellon. ibid. Cornus femina, quam Galli Latinos imitati sanguineum fruticem appellant, haud minor in monte Castagne, non procul Philippis Macedoniæ urbe nascitur, quam majores nostri comitantes. Idem observ. lib. 1. cap. 56. multis Austriæ locis nascuntur etiam comi feminae arbores maris non minores. Clus. Annot. ad dictum locum Bellon. suffrutices quoque alicubi in fruticum aut etiam arborum altitudinem excrescunt. Josephus Rute cujusdam Macharunte in ipsa regia plantæ meminit, quæ à nulla ficu vel celsitudine vel magnitudine vinebatur. Nos quoque vidimus baculum virgubitalis ligno satis duro & solido, è caudice Rute cujusdam in Virginia nascentis factum, uti testis generosus quidam ex amicis nostris qui secum illud gestare & circumferre solitus erat.

Quarto denique arbores nonnullæ cum fruticibus frutices & suffrutices inter se & cum herbis generis proximo conveniunt, eisdemque characteres seu notas genericas & essentielles obtinent. Sic in genere Buxi alia reperitur arborea, alia pusilla; in genere Amygdali alia patiter procera, alia nana; nec non in genere Ilicis, ut alias omittam. In sambuco autem, Hyperico, Tithymalo, sempervivo, malva, scabiosa aliisque plurimis res est manifestissima. Ebu-

lus enim quæ herba est, cujusque superficies quotannis emoritur, eadem omnino cum sambuco (quæ arbor Botanicis censetur) notas genericas & essentielles obtinet. Tragium quoque (quod iuxta est lignosus) cum Hypetico: Tixymalus dendroides cum vulgaribus herbaceis; sempervivum arborescens, scabiosa arborea cretica, malva arborea, &c. cum cognominibus plantis notis genericis conveniunt, & primo statim aspectu ad eadem genere pertinere agnoscuntur.

Verum hæc non obstantibus, quoniam divisio hæc passim cognita & recepta, omniumque ferè seculorum usu approbata est, non commodior occurrat, nos quoque jam retinebimus, certiores tamen inter fruticem, suffruticem & herbam distinctionis notas afferemus.

Plantas ergo initio, divisione dichotomâ, partemur in eas quæ caule sunt annuo, vel si perenni non lignoso, & quæ caule perenni lignoso. Quarumcunque caules annui sunt, herbas appellamus, siue radices perennent siue non; nonnullæ etiam caule perenni non lignoso herbis accensendæ videntur, ut verbi gratia, Brassica species nonnullæ, nicotiana cujus caulibus interdum perennat, malva arborea marina &c. quæ caule sunt perenni vel gemmiparæ sunt, & furculos simplices non ramosos annuatim producant, vel non gemmiparæ gemmifera producentes eodem anno in ramos & ramulos interdum divisa. Has suffrutices appellamus; illas adhuc in arbores & frutices subdividimus. Inter quas hactenus certas & stabiles distinctionis notas non invenimus, ideoque superius in earundem definitionibus positæ contenti sumus oportet. Gemmas appello arborum & fruticum factus novellos quos quotannis autumnò, aut interdum etiam æstate, concipiunt, squamosis tegumentis velut secundis obvolutos, in quibus per totam hyemem latent, quâ exactâ, verè novo in furculos explicari incipiunt, ut superius diximus.

Arbores ergo & frutices à suffruticibus distinguo quod illæ gemmiparæ sunt, hæ autem minimè. Est ergo suffrutex nobis definitivus, planta minimæ inter lignosas altitudinis & crassitudinis, non gemmipara, caule perenni, seu planta caule perenni, lignoso, non simplices tantum furculos annuatim producents, sed ramos in ramulos & furculos divisos & subdivisos.

Verum quoniam suffrutices plerique cum herbis notis genericis conveniunt, nec admodum numerosi sunt, eos herbis admiscebimus adeoque tria duntaxat summa plantarum genera constituemus, arborem, fruticem, herbam.

Summis autem generibus constitutis sequitur ut subalterna seu horum unicuique subordinata exquiramus.

Horum autem notæ characteristicæ non tantum à semine ejusque conceptaculo (quanquam ab his præcipuè) sed & à flore ejusque calice desumendæ sunt, non omnino neglecta radice figura & constitutione, aut foliorum situ. Flores enim & perianthia nonnullorum generum certiores & magis conspicuos characteres exhibent quam semina aut eorum involucria. Sic verbi gratia, in genere leguminoso flos papilionaceus character est insignis, quem species omnes leguminum velut fronti impressum intuentibus ostentant, cum ex seminum eorumve conceptaculi numero, figura, situ, aliisve accidentibus difficile esset notam generis indicem sumere.

De arborum & fruticum divisione instituenda,

cum horum genera non admodum numerosa sint, non est cur multum laboremus. Herbarum autem cum numerosissima sint, in iis rite distribuendis præcipua est difficultas. Nobis diu multumque considerantibus non alia prior aut potior differentia videtur quam quæ desumitur à plantula seminali. Plantas ergo primo in loco dividemus in eas quæ plantulam seminalem habent bifoliam aut bivalvem, seu majis, binis cotyledonibus instructam; & eas quæ eandem obtinent altero vel utroque folio cotyledone carentem; in his quæ primo è terra exeunt folia succedentibus familiae sunt.

Posterioris generis omnes, paucis exceptis asparago, prœonia, aro, cyclamino & si qua sunt similia, foliis sunt graminæis; florum respectu dividuntur, in eas quæ floribus sunt seu apetalis seu stamineis & eas quæ floribus petaliferis seu bracteatis. Quæ floribus stamineis sunt dividuntur in culmiferas, hoc est, quæ caulem teretem, geniculatum & plerunque concavum edunt, singulis foliis ad singula genicula cum involventibus: & graminifolias caule, geniculis nodosis non intercepto. Culmifera grano majore quarum semina hominibus in cibum veniunt frumenta & cerealia vocantur, reliquæ grano minore graminæ. Quæ floribus petaliferis sunt, vel conceptaculum seminale interna loculamenta divilum obtinent, seu radice bulbosa proprie dicta sint, hoc est, vel è pluribus squamis invicem incumbenibus, vel è pluribus tunicis exteriori interiore ambiente contexta: seu radice tuberosa, ut crocon, colchicum, asphodelus, &c. seu radice fibrosa, ut phalangium, vel baccifera sunt ut asparagus, arum, Dracontium, &c.

Prioris generis herbarum, quæ scilicet plantulam seminalem bifoliam aut bivalvem obtinent, à floribus conditione commodissime dividi posse videntur in eas quæ florem habent apetalon seu stamineum, hoc est, foliis staminibus cum stylo & calice compositum, foliis illis fugacibus, tenellis, coloratis, petalis nobis cum Columna dictis, quæ vel decidunt vel marcescunt ante seminum maturitatem, carentem: & ea quæ florem obtinent *πεταλωδον* seu bracteatum, foliis illis fugacibus coloratis instructum.

Not. ad petalum constituendum duæ conditiones concurrant oportet; 1. Ut sit tenellum, & colore aliquo præter herbaceum insignis. 2. Ut sit fugax aut caducum, hoc est ut vel defluat, vel marcescat antequam semen mature scat.

Quæ florem habent petalis instructum seu bracteatum, vel sunt eodem composito, vel simplici.

Florem compositum voco qui ex multis flosculis in unum totalem florem coeuntibus constat. Florem hunc unicum compositum voco potius quam flosculorum agmen, quia unico pediculo donatur & unico calice includitur, & id multis speciebus circulum in margine habet foliorum planorum radiatim medium discum ambientium, diversæ à reliquis flosculis figuræ & magnitudinis.

Herbarum flore composito vel lutescent, suntque eodem planifolio plerunque naturâ pleno vel succo limpidi scatent. Hæ autem vel sunt flore discoide, h. e. ex pluribus brevibus, compressis confertis flosculis, in unam quasi apparentem superficiem digestis composito, succedente semine vel pappo innascente alato cujus generis herbarum papposæ dicuntur, vel solido & pappo destituto, in corymbiferis dictis; vel flore fistulari: hoc est, ex pluribus concavis oblongis flosculis, ad margines in longas lacinias dissectis composito.

posito. In hoc genere flosculi etiam marginales fistulosi sunt. Hæ capitatae vulgò dicuntur, quia calyx earum squamosus in ventrem plerumque extumescit.

Quæ florem habent simplicem, hoc est, ex petalis, tantum cum staminibus & stylo constantem. Seminum respectu dividi possunt in duo genera, primum est earum quæ seminibus sunt nudis seu verè, seu apparenter tantum, hoc est, nullo præter perianthium vasculo aut tegmine donatis: Alterum earum quæ seminibus conceptaculo proprio, & apertio distincto tectis.

Quæ seminibus sunt nudis pro numero seminum singulis floribus succedentium dividi possunt, in eas quæ semina ad singulos flores obtinent. 1. Singula, 2. Bina, 3. Terna, 4. Quaterna, 5. Multa incerto numero. Quæ bina ad singulos flores semina obtinent in duplici sunt differentia, aliis flores pentapetalis in umbellas plerumque digesti, & hæ umbelliferae dicuntur: aliis flores monopetali, quadripartiti, folia caules ad singula genicula stellatim ambicunt, multa, & hæ stellatae appellantur.

Quæ itidem quaterna produunt semina post florem unumquemque duorum sunt generum: aliis folia in caulibus ad singulos geniculos ex adverso bina, flores labiati, quæ verticillatae appellantur: aliis folia alterna, seu singularim in caule sita, quæ asperifoliarum titulo innoscunt.

Verum quoniam semina, quæ videntur in nonnullis hujus generis plantis nuda, revera non sint, sed folliculis seu thecis inclusa, ideoque titulum hujus membri divisionis sic emendabimus.

Herbæ flore perfecto seminibus vel nudis, vel in singulis folliculis, à planta matre unà abscedentibus, singulis.

Nos equidem in methodo plantarum non ita pridem edita pro nudis habuimus verticillatarum semina, prout vulgo habentur, quamvis in nonnullis, ut libanotis caryophoræ, dati nucleum, à spongioso cortice discretum non nesciremus, quoniam in plerisque hujus generis cortex nucleò arctè adhæret, & Theophrastus ipse semina hujusmodi nonnulla pro nudis habet, idem de reliquis hoc genus seminibus, ut verbi gratia, stellatarum, asperifoliarum & polyspermum dicendum ea à nobis nudis accenseri quia folliculi quibus includuntur interiori nucleò in multis speciebus adhærent, in omnibus (etiam malvis ipsis) unà cum seminibus inclusis à planta productrice abscedunt, ideoque videntur & vulgò reputantur non conceptacula seu uteri seminum, sed membranae tantum involventes, & secundinis analogi.

Quæ semina ferunt in conceptaculis seu vasculis propriis, à perianthio distinctis, distingui possunt, in eas quæ in pericarpio seu pulpa humida aut molli semina inclusa obtinent: hæ duum generum sunt, nimirum vel 1. Fructu majore, corticoso, cui flos insidet; quæ pomiferae dicuntur: vel 2. Fructu minore membrana tenuiore vestito, quæ bacciferae appellantur: & eas quæ in conceptaculis siccioribus semina continent. Hæ autem in multa adhuc genera subdividuntur. Sunt enim vel conceptaculis pluribus & distinctis eidem flori succedentibus, quas multi siquas dicimus, ut verbi gratia, aconitum, aquilegia, delphinium, &c. vel conceptaculis singulis, aut conjunctis, quas enim nos pro ejusdem vasculi cellulis habemus, Cæsalpinus aliique pro conceptaculis diversis sed conjunctis. Has autem pro numero foliorum in flore & eorundem figura dividimus in 1. Monopetalas, quarum scilicet flos unico & continuo folio constat, eoque vel uniformi, vel difformi. Florem uniformem superius descripsimus, in capite de

floribus plantarum. 2. Tetrapetalas, flore pariter vel uniformi; cui succedit vasculum seminale, seu oblongum, ut in Tetrapetalis siliquosis, seu breve & curvum in Tetrapetalis capsulatis; vel difformi, quales sunt papilionaceae dictæ, quia earum flos papilionem alis expansis quadantenus imitari videtur. 3. Pentapetalas, seu veras quarum flos quinque petalis distinctis constat, live apparentes, quarum flos revera monopetalos est, cum lacinia in quas dividitur ad ungues junctæ sint, sed pentapetalum refertur profundas & ad ungues fere pertinentes scissuras. *Ramus.*

PLANTAGO.

Plantago à latitudine foliorum plantam pedis amulantium dicta existimatur, *Ἀπὸ γλωσσῶν* à linguae agnitione similitudine.

Hujus nota generica sunt flores staminosi in spicas congesti; flosculorum tubi in vascula seminalia elliptica (quæ per maturitatem horizontali sectione in medio dissiliunt) intumescens; semina intus bina puliciformia.

Hujus generis alia caulibus sunt nudis foliis vel latioribus & nervis insignibus plantagine simpliciter dictæ, vel angustis, & in quibusdam speciebus dentatis aut laciniatis, coronopi & holostei nominibus notæ: alia caulibus sunt foliolis, foliis angustis, binis oppositis, florum spicis & foliorum alis egressis, ut psyllia.

Vires. Plantago (ut habet Galenus) aquosum quiddam frigidum obrinet, & quiddam austeri, quod terreum est, & siccum, ut refrigeret simul ac siccet, vulneraria est herba. Usus præcip. in fluxionibus cujuscunque generis, verbi gratia, alvi, expuitione sanguinolenta, gonorrhœa, mictione involuntaria, mensium profluvio &c. extrinsecus in mundandis consolidandisque vulneribus & ulceribus. *Schrod.*

4. Radicum symphyti majoris recentium undas sex, foliorum plantaginis manipulos duodecim, horum succo expresso una cum radicibus prædictis sufficienti quantitate sacchari exceptis, & in mortario lapideo aut ligneo contusis fiat electuarium.

Adversus vomitum aut expuitionem sanguinis nullum certius & præsentius remedium. D. Boyl. de utilitate Philosoph. nat. part. 2. p. 150.

Succus plantaginis vel merus, vel cum succo limonium mixtus insigne est diureticum. Dom. Neriham.

Ipse recorder quendam ex impuro concubitu gonorrhœam cruentam sibi parasse post universalem usum solâ plantaginis essentia in decocto lasæ & lasæ diluæ restitutionem in integrum esse consecutum, cum parum abesset quin nescio cujus partis diminutionem pati coactus fuisset. S. Paul.

Radix lata, recens ex terra extracta tantillum caltore rafa, auris meatui indita observatur instar incantamenti quandoque dolores dentium sistere. *Pauli.*

Heurnius videt in hytpe intumescens crumbus plantaginem aquaticam humorem in vesicas evocasse quæ maximam vim aquarum profundebant. Idem ad febrium chronicarum rigorem.

2. Succus plantaginis q. s. bibatur cum aqua melis est mirabile medicamentum inquit Bayrius.

In hernia & umbilici eminentia cataplasma Jorlis commendatur quod conficitur ex arnogliffa & melle qui supra frutices prunorum sylvestrium nascuntur simul in vino cocta & contrusa instar cataplasmatum imponantur.

Non diffiteor æquè feliciter consolidatam fuisse non solum puerorum, sed etiam natu majorum, imò honestissimarum marionarum umbilicalem herniam à plantagine seu Arnoglossa & musco quercino quàm ab illo qui Acaciam German. seu prunum sylv. investit: sed ille, qui tener & friabilis albicat, & qui non rancio sed frondibus quercus innascitur, qui odor est, nec terram sapit, nec redolet. Simon Paullus. Ex excerptis D. Hulsii, hæc omnia. Mulierculæ Gallicæ toto gestationis tempore ad abortum præcavendum singulis ferè diebus sumunt sem. plantaginis 3ß. in jusclo aut ovo & non sine fructu. River. prax. p. 479.

Quidam cum per mensem gonorrhæa laborasset, in fluxum sanguinis è pene incidit; quapropter petiæ intinctæ in aq. rosarum & aceto applicatæ fuere; à quibus nihil fuit adiutus, tandem iussimus succum plantaginis per syringam immitti. Unguento Comitissæ re-nibus applicato. Cessavitque fluxus. D. Soame ex observ. Hieremiæ Martis.

Ego curò puellas imperigine laborantes butyro loto in aqua violarum. Post hoc butyrum misceo succo plantaginis, eo linatur facies. D. Soame ex observationibus Marcelli Cumani ab Hieronymo Velschio editis. observ. 21. *Rajus*.

PLANTAGO AQUATICA.

Plantago dicitur ob aliqualem foliorum similitudinem loco natali, & flore tripetalò cum Sagitta convenit, foliis plantagineis ab eadem differt.

Vires. Refrigerare & siccare dicitur. Schvvenck felidius ani procidentiam curare, rubentem podagiam, capitis dolorem à causa calida mulcere, cruento spuito urinæque mederi tradit.

Summum secretum & expertissimum quò subito lac in mammillis consumatur esse ait Timotheus Rollin succum hujus plantaginis illis applicatum. *Rajus*.

PLATANVS.

Platanus à *πλατὺς* dicta est, tum quod folia habeat latissima, tum quod ramis sit patulis & latè diffusis.

Nota platani *characteristica* sunt folia latissima, semina in pilulis lanigeris conglobata.

Vires. Tenerrima platani folia (& cortex Plin.) in vino decocta mox illita oculorum fluxiones sistunt, ac cum œdemata tum phlegmonas (viridia tria & illia Galen.) levant.

Cortex in aceto coctus ad dentium dolores colluitur, è vino scorpionum iectus restinguit Plin.

Sunt qui cum cortice combusto medicamentum desiccatorium & absterforium efficiunt, ut cum aqua lepras sanet, per se se autem illitum ob humorem nimium ulcera vetera & sordida.

Pilulæ virides in vino potæ serpentum moribus auxiliantur, exceptæ autem adipe igni ambusta sanant, vel frigore addit Plinius: tulsæ autem cum acetos aceti, magisque scyllite, sanguinem omnem sistunt, & lentiginem & carcinomata, melanias quoque (melandriasque) veteres addito melle emendant. Plin.

Foliorum pilularumque lanugo (in aures & oculos) illapsa auditum visumque labefactat: asperam etiam arteriam inspirata offendit.

Hæc è veteribus Dioscoride, Galeno, Plinio: hoc nullus ejus, quod sciam, in Medecina usus est. *Rajus*.

PLUMBAGO PLANTA.

Molybdæna Plinii nobis dicta videtur à plumbeo foliorum colore; aliis quia manus volam inficit plumbea maculâ radix parum detenta molybdæna Plinii censetur. F. Columna pro Tripolio Dioscoridis habet, quæ rationes apud ipsum vide.

Sui generis planta esse videtur, ideoque non opus est ut assignemus *notas* generis *characteristicas* cum ex descriptione peti possint.

Nomina Plumbago Plinii *Ger.* Dentillaria Rondeletii *L. B.* Lepidium dentillaria dictum *C. B.* Lep. Monspeliacum dentellaria dictum *Park.* Tripolium Dioscoridis *Col.*

Col. Radix fibris longis, crassis, carnosis dividitur, odorata, gustu fervida; folia glasti, atrovirentia, latiora, pinnis caulem complexa, glasti vel Drabæ modo, majora atque obtusiora, semper in caule decrescientia, per ambitum denticulis exiguis aspera. Caules à medio ad summum in alternos ramos crebros diductos habet, purpurascens (L. B. nigricantes striatos), plures ab eadem radice, cubitales & sesquicubitales. Flores cacuminibus hærent, acervatim primo congesti, calycibus viridibus, hirsutis crassa, viscosa obstitis inclusis, cum aperiuntur quintepartiti, colore ex purpuro cæruleo candicantes, deinde magis colore saturantur purpureo, ut variare videantur, ac postremò clausi & marcescentes puniceo, puniceus quoque color est in floribus tubulo oblongo è calyce tantundem exserti: in quo deinde semen oblongum, tritici fere magnitudinis, cortice virescenti, tenui, atque intus libro purpureo-cæruleo chartam inficiente affrictu, quod deinde siccatum in nigrum vertitur, medulla intus albâ & amarâ. Folia acri sapore sunt, ac radix fervida; unde Rondeletius pro pyrethri radice ad dentium cruciatum mulcendum ea uti solitus, Dentellariam appellavit plantam.

Æstatis fine & autumno floret circa Neapolin toto matitimo tractu à Neapoli ad Romam, item circa Syracusas, in Sicilia, & Monspelium in Gallia Narbonensi copiose provenit, locis semper meridici expofitis atque maris afflatu subjectis, quamvis à mari interdum remotioribus, observante. Columna; nunquam Septentrionalem plagam respicientibus, quamvis mari propinquis.

Tripolium dictum est quia ter variat seu vertit floris colorem *Col.*

Molybdæna Plinii nonnullis censetur, quia manus volam inficit plumbea maculâ radix parum detenta.

Usus. Equorum dorsis fellæ compressione ulceratis contusam & appositam efficacissimè mederi plurimos testatos esse scribit F. Columna, qui in propriis equis experti sunt, nec vermes oriri, & quamprimum exficari ulcus atque cicatrifari asseruerunt.

PLUMBUM.

De *Plumbi* Mineris, seu Fodinis ac ejusdem metalli purificatione vid. in genere sub titulo METALLURGIÆ. Hic tantum de variis hujusce præparationibus ac usibus ex *Schrodero* ab *Hofmanno* annotatò.

Præparationes Plumbi sunt

1. Purificatio. 2. Calcinatio 3. Sublimatio. 4. Destillatio. 5. Extractio. quibus addi possunt Mercurificatio, Salificatio & Liguatio.

Plumbum Metallum est vilissimum constans ex Sulphure indigesto, Sale aluminoso ac ideo naturam ideo æmulante.

Dicitur Saturnus, quia tum macrocosmico tum microcosmico Saturno, id est, licni consecratu statuitur.

D d d

Græcè

Græcè Μόλυβδος Germanicè Bley, du Plomb. Lead.
Loor.

(Est veluti sapo ad abstergendas sordes ☉. ☽. & gemmarum.)

Vires. Refrigerat, adstringit, incrassat, &c. libidinem reprimat, ulcera carnibus implet, cicatrices obducit, excrecentiisque liberat, ulceribus cheironis, quæ vocant, malignis, cancris & putredinosis; tum per se tum quibusdam aliis permistum convenit. Schroderus.

Plumbum Metallum est vilissimum, constans ex Sulphure indigesto, Sale aluminoso ac ☿rio, naturam Antimoniali emulante. Verum est, hoc omnium Metallorum esse vilissimum, & excepto Auro ponderosissimum, quia imperfectum ac indigestum adhuc sulphur metallicum, ac ☿rium habet, de quo tamen magis quàm de illo participat, ut supra demonstravimus. Loquimur tamen hic de Mercurio Metallico qui diversus est à Mercurio vulgi, qui ex Antimonio & plumbum non difficulter extrahi potest, & facilius ex ejus mineris. Tere mineram, qualem ex Sabaudia nuper accepi Plumbi in pulverem minutissimum ac stylum aureum in illo move parumper, & statim adhærebunt auro particule quædam ☿riales; sed hæ non ad substantiam Plumbi pertinent, nec radicitus illi immerse sunt. Cum enim mirabilis sit illa & imperceptibilis ☿rii hujus in minima dissipatio, quæ sit in mineris per ignes subterraneos, facile se Metallis insinuat, sed non constitutivè & radicitus. Quædam particule primæ metalli fusione in auras evanescent, quædam tenacius adhærent, ac remanent, & tandem salium resuscitatorum opera eruantur, & à reliquis separant, vid. C. Morhosi Epistol. l.c. Hunc in ☉ facile mutari posse, supra asseruimus. Unde & sæpius laudatus vir Nobiliss. Robertus à Boyle in paradox. inquit: Vir quidam illustris, cujus Nomini peregrinationes Ejus & erudita scripta celebritatem conciliarunt, nuper Mihi asseveravit, se pluries ☿rium Plumbi in perfectum ☉ fixatum vidisse, Quod autem ad Sal Plumbi attinet, de hoc in Natura altum adhuc est silentium. Dicitur Saturnus, quia Macrocosmico comparatur, unde & Microcosmico Saturno Lien prodesse creditur.

Vires. Libidinem reprimat. &c.) Vtrum medicamenta Saturnina totaliter auferant. Libidinem & sterilitatem inducant, an secus, disceptatur inter Doctores. Nos negamus secundum quid, si scilicet hujusmodi Medicamenta Saturnina sæpius usurpentur, cum aliis autem Venetem reprimentibus mixta concedimus. Contra cancrum ulcera & alia maligna felici etiam cum successu Saturnina applicantur remedia.

N. 1. Plumbum ex Carinthia ad nos delatum cæteris Saturni mineris præfertur, cui tamen illa nequaquam cepit, quæ propè Freibergam Villach invenitur, atque hinc Plumbum Villachium dicitur, quod de ☽ participat Hinc etiam crystalli & omnia Medicamenta ex minerâ Saturni confecta in Capitis affectibus conveniunt. Minera Saturni in Vere & Ole etiam existente in Leone ☽ plenâ vel paulò ante effossa præ cæteris nobiliores virtutes possidere dicitur.

N. 2. De Plumbo Scriptorio oder VVasserbley Sciendum, vocari illud Molybdicem Lapidem, de quo eruditè scripsit Cæsalpinus, & primam facit speciem lapidis Plumbarii; Altera enim stibium est Bismuthi speciem vocat in Sarcprâ suâ Iohann. Martesius. Et Georg. Agricola de re metallica Ejus seorsim meminit, ubi de fusione Minerarum Metallicarum Argenti præprimis tractat. Multò levior ac friabilior minera Plumbi nigri parum aut nihil ferè Argenti in se habens. Exteri & in primis Itali hoc crudum à Nobis petunt, illudque expolientes denud iterum ad Nos remittunt pro usu Scriptorio. Si tamen aliàs Ejus Vfus in Medicinâ aliquis est, cum Plumbo & Ejus recrementis maxime

convenit virtute exsiccante, demulcente & discutiente. Unde in erysipelate Ejus usus, itum in gangrænâ ulceribus humidis, phagædenicis non contemnendus, si fons ex illo pareretur. Hofmannus.

I. PURGATIO.

Fundatur ☿, dumque fluit, injice aliquid cereæ vel axungie aurigarum (VVagenschmier) Du vicilong. Coachgreas, VVagensmeer, ut efflagret; hinc affunde in aquam (calidam.)

II. CALCINATIO

1. Incineratoria.

Funditur plumbum, auctoque igne ut olla caudeat, continuâ agitatione reducitur in cinerem, seu calcem cineream.

2. Reverberatoria.

Unde Minium officinarum.

Calx illa ☿ni continuâ agitatione reverberatur ulterius ut rubescat.

N. In reverberatione cave ne iterum fluat, alioquin in Plumbum de novo convertetur.

3. Cementatoria.

Unde Plumbum usum Offic.

Fiat S. S. S. ex ☿i bracteis & Sulphure pulverisato, uraturque hac ratione ☿: post ultionem sæpius abluatur & resiccet. Et hoc est Plumbum usum Officinarum, quod lavari potest, ut Cadmia. Dioscorid.

4. Immersiva.

Eti ☿nus beneficio cujuslibet liquoris acidi calcinari possit, quales sunt: ☿, ☿ Sal. communis, Sal. nitri, Vitrioli, ☿ in officinis contenti rarissimis rebus quis utimur.

Unde

1. Saccharum sive Sal ☿i.

℥. Calcis ☿i, vel minii, q. v. affunde ☿, sicut aliamquamdiu, extrahaturque ☿. a. decantatos liquores filtra humiditatemque abstrahendo coagula; sic habet Sal ☿i, quod iteratis solutionibus ac coagulationibus (primo in ☿, dein quoque in ☽,) purificari & tandem ad crystallandum reponit poterit, rejectis in operatione facibus.

N. Quidam à Sale illo ☿i ☿ aliquoties (3) cobibendo abstrahunt, hinc affundunt Spirit. Vini, cobibantque eisdem vicibus tribus.

N. 2. Simili modo ☿ ex ☿ granulato sal. elici potest, quod præstat priori.

N. 3. Si ☿ acuaveris ☿ Vitrioli, vel Sal. nitri, scilicet negotium perficietur.

N. 4. Sal. ☿i crystallisatum si in cellam reponatur, liquecet paulatim atque hac ratione ☿ ☿i per deliquium acquiri potest.

N. 5. Fit ex hoc Sale ☿ Balsamus ☿i, quem videmus in Lychargyrie.

Aliter.

℥. Laminas aliquot ☿i tenuissimas, suspende partim in cucurbita sopra ☿, partim quoque ipsi ☿i immerge. Hinc destilla cum cohobis: destillatum hoc, cum eo, quod in fundo remansit filtra, addendoque coarctatam, quæ laminis adhæret, digere aliquamdiu: tandem lenissimo calore abstrahere aliquotam ☿ partem esse

residuumque reponere ad crystallifandum (i. a. crystallos collectos purifica solvendo, coagulando. *Kesler, libr.*

1. cap. 17.

2. *Magisterium Hi.*

Solutioni Hi instilla ϕ Tarr. p. d. & præcipitabitur.

Vires. Saccharum & Magisterium (utriusque enim eadem ratio est,) intra corpus sumptum, frigiditate suâ libidinem exstinguit.

Dosis gran. 4. 5. 6.

Extrinsicus, arceat libidinem, fumbilicus & priapus eo inungantur. (N. Si vicissim mederi velis, utere Balneo Laconico, & inunge, umbilico ϕ nucis moschata destillatum.) Mira quoque præstat in ulceribus corrosivis, malignis, cancris, impetiginibus, amputis ac inflammationibus. Dissolvit tumores duos & scirrhusos; applicatur commodè contusionibus, confertque inflammationibus rubedini-que oculorum, in ∇ rosarum & euphrasie vel ciliis quoque impositum. *Croll. Beg. Senn. in Inst.*

N. Sal. Hi cum Sal. nitr. in Crystall. concrevit asthmaticis proficuos, vide cap. 23. sub titulo Sal. nitri Saturnisati.

3. Aliud Magisterium Hi, Lac Hi dictum.

2℥. Solve laminas Hi in \sim Vitrioli rectificat. (vel ∇ , ex Sal. nit. & O ana) decanta: solutioni affunde Spirit. Vini rectificat. vel aquam falsam, (i. e. aquam in qua sal solutum) & præcipitabitur. Huius instar nivi, præcipitatum edulcora & exicca.

4. Liquor lacteus Huius ad ulcera S. Clossi.

Imbibe ζj . salis Huius cum $\mathcal{O} j$. Ol. Sulph. campanarii, per aliquot \circ in frigido, iterumque eadem quantitate ϕ irroretur & sulphurari permittatur in phialâ quam reple ζiv . aqu. comm. & agita ut lactescat.

Vires. Hoc liquore lacteo imbuantur pittacia sive splenia dupl. & applicentur bis aut ter in \circ calide super ulcera dyssepulotica, citòque cicatrice obducen-
tur.

5. Calcinatio Vaporosa: unde Cerusa, Bleyweiß.

Suspendantur lamellæ Hi supra ∇ , ut vapores ab aceto elevati circumstant. Sic adhærescet paulatim Cerusa, quam derade, &c.

N. Sublimationem in Mercurificatione videre licet.

(Vnguentum de Cerusa usuale)

(Oleum cerussæ quidam parant, ex macerata cerussa aceto forti, per \mathcal{O} .)

(Cerussa lutea paratur per \mathcal{Q}) *Schroderus.*

2. *Calcinatio. 1. Incineratoria*) Hæc peragitur, dum Plumbum funditur, & aucto Δ ne continua agitatione in cinerem seu calcem potius cineream reducitur. Nam Metalla in cineres propriè redigi nequeunt, bene autem in calcem. Ex quibus enim Sal educi nequit, illa incinerari etiam non rectè dicuntur.

2. *Reverberatoria.*) Unde Minium officinarum. Ex hac Δ ne operatione reverberatoriâ Acidum quoddam in flammâ esse innoscit, dum Minii pondus superat Huius pondus, ex quo illud emergit. v. g. Huius sumantur 100. lb, exurantur aridis lignis in Minium, & cum illud in minium conversum, repetuntur 100. lb. quaeritur unde minium acquisiverit lb x? Hoc corpus scilicet, quod Plumbum auxit in flammâ, est acidi saporis, idque probat sequens mechanica. Destilla ex retortâ vitreâ aperto Δ ne, de illo ipso ligno cum quo Plumbum exusseris, & extillabit liquor aci-

di saporis, qui extra retortam in flammæ formâ Plumbum lambit, eique commiscetur & fixatur. Refunde Minium in Plumbum & habebis 100. libras, ut prius, & reliquæ 10. ex acido ex ligno expulso. Hoc autem cum non sit de Plumbi Naturâ, cum eo non colliquatur, sed fugit in Gas. Inde decepti fuerunt Auctores statuentes hoc Sal, quod *Dominus Autor* etiam in Plumbo aluminosum pronuntiat, in Plumbo fuisse per putatitiâ incinerationem inde productum, cum tamen ex acido flammæ productum fuerit & in plumb. bo calcinato fixatum.

4. *Immersiva.*) Unde l. Saccharum sive Sal. Huius ni ibid.) Saccharum Saturni præparatur vel ex Minio, vel ex cerussâ, vel ex materia aliqua *Schieferveiss* dicta: sicuti in Hollandia hic præparandi modus viget. Aliâs *Dominus Autor* nostri descriptio proba est modo solutio & coagulatio aliquoties repetantur, ut Sal. comm. illud eò perfectius & melius elaboretur; & purificetur. V. g. Rec crystall. Huius solve in acet. destill. filtra, & rursus abstrahæ, usque dum concretescere velle videantur, tunc affunde sp. vini rectificatissimum, digere & sp. vini ad medietatem abstrahæ, sic sunt crystalli splendentes.

Hic animi diversi sunt Nonnulli modernorum Naturæ interpretum statuentes ex Minii, aliorumque pondere non probari posse ab acido flammæ esse, sed id potius ab ejus alkali dependere; eò quod acidum primò omnium evolet, non Sulphur Δ ne, non Sal. comm. alkali, fixa enim æquæ ac volatilia Δ ne patulo abigi confusa sine ordine. Cur ergo per Deum operationes, quæ sunt alkalicorum tribuuntur acido? Quin post Cl. Helmontium omnes potius in vulneribus, ulceribus, gangræna acorem attendunt, illum alkalinis absorbent & corrigunt. Nunc inverso ordine acidum superabundans id facere creditur. Verum, quid absenti erit statuere aliquid alkalicæ esse energię & tamen ex Acido productum esse, Minium alkalicum exercere effectum notum est, quid autem inde? Ergo non ex Acido flammæ? sed ejus alkali. Neutiquam. Salia alkalia annon & ipsa ex Acido? dum juxta Cl. Helmontium & rei veritatem salia volatilia in vegetabilibus arreptione sui Sulphuris mutantur in alkali, quodnam est illud Sulphur, nonne illud quod in ipsis vegetabilibus existit, ac acidus spiritus, est ut per mechanicam chemicam constat. Sic & acidum flammæ à lignis suppeditatum in Huius corpore peculiari ratione disposito dulcescit & alkaliam induit Naturam. Sed videtur, hanc dulcedinem Huius esse domesticam, non aliunde petendam, nam & ex Huius ipso, cerussâ, lithargyrio educi potest saccharum. Verum scientia non apparentis nulla est. Hæc enim in hac Naturæ scientiâ, ut augustè Eam salutat *Cl. Fevre* Nos demum scire sum persuasus, quæ manuali experientiâ addiscimus, hæc si ostendat dulcedinem Huius esse domesticam, seu ex Huius Sale petendam, subscribemus; aliâs manus nostræ sunt oculatæ, credunt, quod vident. Sal Huius, inquit *Nob. Liss. Anglus Robert. à Boyle* in paradox. chemic. ut & reliquorum metallorum neque unquam vel illud conspiciere Mihi datum, vel ex ullius fide digni autopsæ testimonio coargui, tale quid unquam separatim in Naturâ fuisse. Nam si ex ipso Huius, imò & cerussâ, lithargyrio saccharum educi debet, per corporum salinorum acidorum interventum hoc emergit, sanè dubium homini curioso restabit, emergere Sal. comm. illud ex Huius ipso, an ex corporibus aut spiritibus acidis ad id præparandum adhibitis. Quid enim in Marte, Venere, Jove, imò oculis \mathcal{O} , corall. C. C. usto spiritus acidus edulcorat? forsitan etiam in his peculiare aliquod in scenam producendum erit Sal alkali domesticum? Sed urgent ulterius, id frustra videri ad Δ ne peti; Verum, unde alia? Ecce quæso? Annon Sulphuris

acidi vegetabilis manifestissima cernuntur vestigia in carbonibus, ex quibus per alkalia, antequam in cineres convertantur, aurei coloris separari potest, cujus, (& non alkalium) beneficio flammam evomunt, hoc Sulphure à carbonibus separato non inflammari amplius possunt, sed in cinerem convertentur, ex quo alkali, qui nunquam flammam concipiet, si carbones retortæ indantur, & Æne aperto destillentur in spiritum abeunt acidum. Sed regetur: cur ergo & quomodo hunc tantum sibi acidum per quandam abstractionem metaphysicam applicat, quod primò omnium evolat, non Sulphur Ænis, non Sal comm. alkalinum? quia fixius, quod negant, nam fixa dicunt æquè ac volatilia Æne parulo abigi confusa sine ordine. Verùm hæc abstractio Acidi facta à Saturno ex flamma Ænis non sane metaphysica, nec phantastica, sed realis est, aded ut 100. Libræ plumbi solâ calcinatione 10. libras ex Æne tueantur & Minium constituent, ut supra ostendimus. Cur autem Acidum hoc, instant ulterius, occultum colorem ex Metallo rubrum extrahit, cum notum sit, quam ægrè acida ex metallis ruborem extrahere vel soleant, vel possint, etiam ex ipso Æte, sed potius eundem pervertant. Cur easdem habet virtutes cum Saturno & non alias, cur alkalinas, an cur ille iners? Cur acida adita addita pervertunt hunc colorem & virorem etiam extrahunt, ut in Saccharo Saturni viridi? Verùm, quædam acida ex Marte ruborem vel flavedinem extrahunt, uti patet ex Croci Ætis præparatione cum sp. Sulphuris acido, vel vitrioli facta, nonnulla etiam pervertunt, ut docet præparatio Sacchari Saturni ex Minio cum aceto; quæ autem ratio? Si perpenderis quousque mera texturæ mutatio facta vel ab Arte, vel Naturâ exporrigere se queat in novis qualitatibus in unâ eademque materiæ portione producendis, si, inquam, perpenderis, quodque variatio vel figuræ vel molis, vel motus, vel situs, vel nexus corpusculorum, unde ullum horum corporum componitur, mutare fabricam ejus possit, fortassis unâ mecum induceris ad credendum, non aded necessarium esse, ut Natura semper in promptu habeat elementa, vel principia hypostatica, unde talia corpora, quæ mixta vocamus componat, neque aded esse facile, ut chemici, alique hæcenus imaginati sunt, dignoscere, quænam existimanda sint exclusivè ad omnia reliqua existentia ingredientia elementaria multò minus determinare, quænam primogenia & simplicia corpora coiverint ad eam componendam Non dulcescit, instant ulterius, Minium, nec acidum Ænis dulcescit in Minio, sed acidum extraneum huic additum dulcescit, quia Sal comm. alkalinum cum Sulphure mixtum exhaustit. Verum Minium omninò dulcescit ob acidum scilicet extraneum à flamma Ignis suppeditatum, non ob Sal. comm. alkalium cum Sulphure mixtum, id quod adhuc melius ac evidentius probandum est. Neque acidum Ignis seu flammæ ullum Sal. comm. alkalinum cum Sulphure mixtum ex Saturno exhaustit, si ex Saturno debet Minium elici, quod dulcescit, sed sufficit mera partium in Saturno. figuræ, texturæ, nexus ac situs mutatio ab acido flammæ peracta, unde dulcedo ac rubedo. Quid? si Minium ab alkalinis dulcescit, cur non Minium ex Saturno cum alkalibus pyrotechnæ ope emergit? Sed ulterius dubitant; An à solo acido pondus; annon ex particularum inversione levibus ablati Sulphuribus? Verum & hæc ratio admodum levis est, usque dum per mechanicam inductionem ante oculos ponatur. Et si qua particularum adest inversio, potius ad qualitatem; quam quantitatem erit referenda. Quid enim corallis vulcani acori expositis dat ponderis augmentum? in his nulla levium Sulphurum est ablatio, nulla notabilis particularum inversio.

Si acet. destill. acues Spir. Vitrioli &c.) Hæc ratione conficitur ex Saturno Anti pestiferum dictum; Rec. Saturni calcinati q. v. affunde acet. destill. f. q. animam extrahe, reduc. in crystallos f. a. Hos imbebe cum sp. vitrioli rectific. evapora ad siccatem. Hunc laborem retortâ vel quartâ repetere vice & sic magis magisque corpus Saturni discontinuabitur. Hujus animæ Saturni Sp. Vitrioli turgidæ Rec. 3ij. vel q. v. solve in Ac. destill. pluviali & per evaporationem iterum reduc. in crystallos albißimos Horum dosis est à gr. ij. ad ii. cum sp. Tartari volatilis. 3j. & sp. Theriacal. 3ij. in Ac. Card b. 3j. in febribus ardentibus etiam malignis & pestilentialibus summo semper cum emolumento ægrotis meis observatis circumstantiis certis offero. Mover sudorem, pellit urinam & fermentum figit febrile. Nota. Loco sp. vitrioli f. substitui etiam ex tempore potest sp. vitrioli coagulatus cum crystallo Saturni mixtus. Item Rec. ☉ fulminant. Crystallo. Saturni & Cinnabar. Antimonii rectific. ana M. & philosophicâ putrefactione radicaliter unias. Et sic in desperatissimis acquires remedium, quod Me rarenter destruit. In febribus malignis dos. gr. iij. aut 4. pro pueris. gr. vj. ad 8. pro adultis.

N. 1. Solve liquorem crystallo. Saturni sp. vini probe imprægnatum, & misce cum soluto vitriolo maris, quod etiam sp. vini optimè sit animatum, succellu temporis in digestionem solatio rubescit, qui sp. vini affundendus, circulandus & probe commiscendus, per repetitam cohobationem destillando emergit Tinctura antiphthificalis D. D. Johannis Michaelis, in spuo sanguinis maximis extollenda laudibus.

N. 2. Sciendum hoc Sal sive Saccharum Saturni non esse verum Sal ex cineribus plumbi extractum, sed saltem vitriolum quoddam Plumbi esse, imò ipsum Plumbum solutum, tum quod ex ipso crudo Plumbo nec quicquam calcinato eadem operâ idem eodem aceto destillato confici possit, quod ex Plumbo calcinato, vel ejus scoriis, tum quod etiam in pristinum plumbum sit reducibile.

N. 3. Salis Saturni iteratæ solutiones & coagulationes non sunt rejiciendæ, ut supra præcepimus, sed ejus edulcorationes, quas Nonnulli Authorum commendant, ridiculæ ac ineptæ sunt, dum hoc modo Spiritus acidi eluuntur & in residuo nil nisi pristinum manet metallum. Spiritus enim aceti in Sal duce coagulatur in calce Saturni, manente formali Saturni concreti proprietate, quemadmodum etiam patet ex sp. vitrioli agente in matrem, si enim sp. vitrioli acidus corroserit matrem, acidum vitrioli fixatur in vitriolum, manente matre integro etiam in pondere. Adeoque sunt proprietates singulares spirituum, non autem corporis patientis reactiones: quippe quod in sui substantia, aut pondere, sustinet, nisi meram unicamque sui divisionem: vid. Nobiliss. & Acutissim. Helmont. in tr. ignota Actio. Regiminis §. 11. pag. 265.

N. 4. In Saccharo Saturni unio Salium acidorum cum nonnullis Plumbi partibus aded stricta est, ut sp. Acet. quâ talis videatur destructus cum corpuscula salina penitus amittere eam aciditatem, cujus nomine ille liquor Spiritus aceti vinosi dicebatur. Nec possunt ullæ ejusmodi partes acidæ, quales minio vel calciturni apponebantur, à Saccharo Saturni utriusque libole separari, ut non solum nulla planè aciditas, sed mira dulcedo in concreto gustetur: & si Saccharum Saturni per se destilletur, liquorem valde penetrantem & graveolentem nanciscimur, nullatenus acidum, sed odore & aliis qualitatibus æquè ac sapore à Spiritu Acet. discrepantem. Verum hæc ratio, ut admodum verisimilis, mihi approbatur, quod cum in Acet. partes, vini spirituosæ tantam sint depressæ salinis Acet. partibus.

particulis cum calce plumbi unitis, Spiritus vini adhuc superstites denuo liberantur & sui juris facti à latebris illorum vi caloris urgentur. Quemadmodum idem evenire videmus in destillatione Acer. destill. super Sal. comm. Tartari quando terram foliatam Tartari conficimus.

Aliter. Rec. Laminas aliquot saturni tenuissimas &c.) Etiam succedit; Sed hic modus admodum lubricus est, facile enim accidere potest, ut laminæ decidant, & ita totum laborem irritum reddant.

2. *Magisterium saturni.*) Hoc cum ol. sulph. p. d. statum externe pro cosmetico usurpari potest: item in scabie aliisque affectibus ab humoribus falsis ac serosis, item in ulceribus malignis, cancris, pustulis, ophthalmiâ cum Aq. euphrag. scabios. &c. Alias magisterium etiam albidissimum præparatur elegantissimum internè usurpandum, si solutioni saturni cum acet. destill. factæ ad fractionem sp. Salis vel vitrioli intillitur.

Vires.) Saccharum & magisterium saturni internè adhibitur chyli & massæ sanguinæ, lymphæque acidum misce compescit, fermenta febrilia extinguit & internis inflammationibus viscerum medetur. Externè ardet libidinem priapo inunctum; miræ etiam est virtutis in ulceribus corrosivis acidum rodens absorbendo malignis &c. item in variolis externè cum emplast. de spermate ranarum impositum, illis in vigore jam positis cum cutis inflammatione conjunctis, quæ salibus dependet acerbis, hæc non repellendo, sed mitigando ac edulcorando compescit, prout sæpe sui expertus etiam in illustrissimis Ducalibus subjectis. &c.

N. *Sal. saturni cum Nitr. ana.*) Crystalli saturni cum sp. vitrioli non solum sed & cum sp. Nitr. acui & in crystallos iterum redigi possunt. Commendantur in inextinguibili siti & calore febrili.

3. *Aliud magisterium Hni, Lac Hni dictum.* Hujus rarus est usus, unde & *Domianus Autor* supra innuit de Hurni calcinatione immersivâ, etsi saturnus, inquiens, beneficio cujuslibet liquoris acidi calcinari possit, quales sunt Spiritus Vitrioli, Aq. fort. Sal. comm. & O & c. attamen acet. destill. frequentissimum solvens est, & optimum. Solutio cum reliquis facta & cum Sale statâ mortuam quasi terram excludit, sed calces nullius momenti.

4. *Liquor Lacteus saturni ad ulcera S. Closs.*) Hic liquor chirurgicum suum agnoscens usum in ulceribus dyspuloticis, splenis duplicatis hoc ipso imbutis & applicitis, mira præstat.

5. *Calcinatio Vaporosa: Unde Cerussa.*) Lamellæ plumbi suspendantur supra Acet. ut vapores ab Acet. elevati circumstant. Sic adhærescet cerussa, quam deinde. Bene autem prospiciendum est, ne lamellæ decidant, & vas substratum frangant, & sic totum laborem frustraneum faciant.

N. Ex Cerussâ componitur Emplastrum Norinbergense S. i. vid. thesaur. pharmac. annex. f. x. n. xxv. *Hofmannus.*

III. DESTILLATIO.

Unde

1. Hni ardens.
2. O flavum.
3. O rubrum.

2. *Sacchar. Hni* (vel potius O Hni) per deliq. destilla per retortam vitream lutatam in excipul. cap. juncturis bene clausis, Δ gradatim adhibito, donec rubræ guttæ cadant, nihilque amplius extillet.

N. *Destillatus hic liquor quatuor diversa mensura*
Manger. Bibl. Pharm. Tom. II:

exhibere aptus est. Spirituum scil. ardentem, O flavum phlegma, & O rubrum quorum separatio fit per retortam vitream in NB vel cinere, receptaculis scil. pro diversitate liquoris exillantibus, mutatis.

Cognoscitur autem diversitas liquoris, ardens prodit sine ullis venulis in collo retortæ apparentibus, O flavum, cum venulis obliquis, seu vinum ardens: phlegma cum venulis rectis: relinquitur O rubicundum in fundo: phlegma separatur ab O flavo seorsumque suscipiendum est.

Vires sudorificus est, hinc prodest in Peste, Melancholia Hypoch. Febris ardentibus, Lue Venerea, & simil.

Dosis gutt. 2. 3. Tentzel.

N. 1. *Venerum appetitum infringit.*

N. 2. *O flavum & aliquot digesum rubescit.*

N. 3. *Cum spiritu & phlegmate solvuntur & præpitantur perle ad tincturam inde conficiendam. Vide tincturam Perlarum.*

Cum O flavescere fit solutio O. vide de O.

O rubicundum mundificat ac sanat vulnera, si illinatur.

O mundificat iidem vulnera.

Vide *Beguin. libr. 2. cap. 4. Hartmann. in Croll. Sennert. Institut. Kessler, lib. 4. cap. 57.*

4. O Hni balsamicum.

2. *Balsamicum Hni Terebinthinatum*, destilla per O, igne nudo gradatim adhibito. Primo stillat Terebinthina, tandem O Hni balsamicum suscipe sortum.

Vires *Maximarum* est viriam in cancris, asthiomnis & cæteris malignis ulceribus, Schroderus.

3. *Destillatio. Unde i. Spir. Hni ardens.*) Hic spiritus ardens nihil aliud est, quam vinosus in Acet. delitescens & à partibus acidis depressus, unde si Acet. salia cum calce Hni uniantur, hic spiritus ardens vinosus adhuc superstites denuo liberatur & sui juris fit, unde à quibusdam dicitur regeneratus, ut supra jamdum monuimus. Iste autem spiritus ardens nequaquam à Hno procedit, nam si Δnem vehementiorem adhibeas, calx Hni denuo in Plumbum liquatur. Præter hunc spiritum ardentem *Dnvs Autor* etiam duplicis olei flavi & rubri mentionem injicit. Verum ego hæc nunquam à saccharo Hni obtinui, licet ipsum destillatum sine additamento aliquid olei largiri experientia non refrageretur. Non deerunt, qui hoc ol. non nisi Sulphur Hni volatile redditum velint, hoc argumento, quod destillatione finita Cap. mort. valde nigrum reperitur. Verum, cum saccharum Hni sit genus quoddam magisterii paratum duntaxat calcinando Hnum per se dissolvendo illud id Acet. dist. & solutionem ad crystallos redigendo, examine facto, deprehendes hoc ol. ex Cap. mort. destillatum ex Spir. Acet. dist. productum, ulterius ad distinctas resolvi posse substantias, vel quod quædam partes spiritus unâ cum nonnullis Hni partibus hoc ol. possint constituere, quod proinde, licet videatur homogeneum, corpus valde compositum est, vel saltem, quod Acet. dist. & saturnina calcis in se invicem actione pars liquoris ita alterari possit ut à Spiritu acido in ol. transmutetur.

N. Alias etiam ex crystallis sacchari Hni cum Spiritu Vitrioli elegantissimus liquor destillari potest omnium morborum astralium, qui fixas egere radices & indomitos fomites habent, salutaris Hercules nullum heterogeneum in microcosmo Astrum admittens, sed inimicas & hostiles omnium morborum impressiones sive ideas eliminans. Sequenti autem modo elaboratur.

Recip. Sacchari crystallini Saturni per Acet. dist. parati qu. v. affunde spiritum Vitrioli rectificat. digere per aliquot O & prodibit phlegmatica

Vitrioli substantia, affunde recentem sp. Vitrioli, iterum digere, destilla phlegma iterum, abjice, & hoc aliquoties repete, donec acidus iterum extillet: Ita corpus Hni ferè totaliter destructum est, & ex vinculis suis liberatum, & in multò benigniorem planetam conversum, nempe σ tem, & hæc ultima solutio cum spiritu Vitrioli apprimè est necessaria, nam Acet. ad Hni solutionem admodum insufficiens est, aliunde igitur quoddam Acet. minerale Hno admiscendum. Hanc animam Hni accipe Acet. dist. minerali imprægnatam, misce cum bolo calcinato, & Ω la per retortam ut moris est. Peractâ destillatione Recip. spiritum qui prius prodiit, ut & ol. rubrum, unumquodque seorsim rectifica, prius digerendo; ultimò conjunge ol. rectificatum cum priori spiritu & cohobando sæpius in MB. destilla donec per reiteratas Ω ationes totaliter uniantur. Postremò Δ ne valido ex Aren. aut cineribus iterum destilla.

N. 3. Cum spiritu & phlegmate solvantur, & Δ tantur Perla ad tincturam inde consiciendam.) Plures alii spectabiles chemici docent spiritum Hni ardentem perlas dissolvere, quæ ejusdem concreti spiritu præcipitatæ, eo ipso, ut aiunt, volatiles reddantur. Verùm fides stet penes affirmantem, mihi adeò felicem esse, ut his ipsis meis viderim oculis, nondum licuit. Prout nec hoc, ex ol. flavescente Hni fieri posse \odot solutionem. Interim certum est, tam spiritum, quàm ol. externè applicitum in inflammationibus, combustis membris, vulneribus & ulceribus &c. maximatum esse virium.

4. Ol. Hni balsamicum) Scilicet, sacchari Hni s. q. cum Terebinth. miscetur, ac igne nudo gradatim adhibito per retortam destillantur. Primò procedit Spir. Terebinth. tandem ol. Hni balsamicum. Maxima est energix in ulceribus cancris, æsthiomenis &c. Alià, balsamum Hni (ut vocant) unguentum est ex saccharo Hni in Acet. soluto & ol. rosaceo misto, vocatur alioquin butyrum saturni. Ejus usus etiam in inflammationibus & ambustis satis deprædicari nequit; Hunc balsamum Auctor Noster Libr. 2. describit.

N. Saccharum saturni in ol. Terebinth. solutum & leni calore Ciper. digestum, egregium & ferè divinum præbet in gonorrhœâ remedium, in primis si aliquid addatur camphoræ. Confici etiam potest cum ol. d. juniperi, si sp. vini abstrahatur. Placet nonnullis balsamum saturni appellare; commendatur etiam in pluribus affectibus externis. Hofmannus.

IV. SUBLIMATIO.

Unde

Sal Hni volatile.

\mathcal{L} . Min. Hni. q. v. solve in \times solve quoque sal fustum in ∇ com. Utrumque confunde. Sic extemplo \mp bitur pulvis albiss. qui probè edulcorandus & excitandus.

N. Hoc Sal lamina ferrea candenti impositum liquefcit instar. cera neque effumat.

Ex communicatione Cl. D. Joëlis Langelot.

HOFMAN. 4. Sublimatio. Unde sal saturni volatile. Hæc operatio potius \mp ratio, quàm Δ ratio appellanda venit, minium enim in acet. destill. solum cum ∇ com Sale fuso imprægnatâ in pulverem album \mp ratûr, unde enim Δ ratio? Aliàs certè solutio minii elegantius dat \mp ratum cum sp. Salis rectificato, quàm cum Sale fuso in ∇ com.

N. Sal etiam saturni elegantissimum conficitur ex Spiritu O, qui fit ex O & Sal. comm. anatica parte cum boli sextuplâ parte in spiritum Ω laris, qui Spiritus super laminas Plumbi tenuissimas funditur usque dum non amplius ebulliat, postea \mp ratum cum ∇ â.

V. EXTRACTIO.

Unde

1. Sulphur Hni seu \odot supernatans.

\mathcal{L} . Mannæ Hni, circula aliquandiu cum ∇ rectificatiss. abstrahere ∇ gradatim: sic ascendet tandem & \odot Hni supernatans.

N. Si \odot hoc cum ∇ denudè circules, tandem fragrantissimo imbuetur odore.

Vires. Maximatum est virium in affectibus pulmonum, phibisi, &c. Dn. D. Paulus Kesler.

2. Tinctura.

\mathcal{L} . Crytall. Hni cum \times fact. extrahe cum \odot juniperi, ac rubescet \odot , abstrahere, si placet, & serva, vel digere cum ∇ , iterumque abstrahere.

N. Remanet materia post extractionem sali extrahendi idonea.

3. Alia.

\mathcal{L} . Crytall. Hni (cum \times factor. & edulcorator.) q. v. extrahe ∇ , filtra, digerendo defeca, subside enim fæces, abstrahere tandem ∇ , & remanet Tinctura in fundo rubra. Kesler. lib. 4. c. 70.

Dosis. 2. 3.

4. Alia Tinctura Hni elaboratior.

\mathcal{L} . Sal Hni crystallizat. q. v. affunde ∇ pluvial. sæpius (8.) destillatam, solvéque quoad poteris, & decanta. Decantatos liquores destilla in MB. adhectatam. Hinc affunde \sim mellis, circula per mensem, ac destilla cum cohobis, multoties repetitis. Tandem abstrahere mellis \sim , remanentique Essentiæ adde Sal. com. ex \odot Hni extractum & cum ∇ Tartarizato, per mensem unum ac alterum circula. Hinc ∇ abstrahere remanebitque Magisterium seu Tinctura Hni rubicundissima.

N. Hic inserere placet quæ Etzlerus de Hni habet in Isagoge sua: Ex plumbo, inquit, conficiuntur medicamenta facientia ad longevitatem: Calcinetur plumbum per vappidi attractionem, & per menstruum debitum extrahatur tinctura. Hæc postmodum abstracto menstruo per debitam calcinationem & circulationem convertitur in lapidem rubicundum pellucidum.

Usus. Præstantissima est Medicina in Mania, Melancholia, Quartana, Phibisi, Lienem aperta, in melancholia Hypochondriaca apprimè conveniens est.

5. Alia Tinctura, Manna Hni dicta.

\mathcal{L} . laminat. q. v. extrahe Tincturam cum \sim Hni essentificato, filtra & abstrahere.

6. Cremor Hni S. Gloss. & inde Tinctura.

\mathcal{L} . \times partes \sim Sal. communis part. ij. minera Hni in alcool redact. part. i. Digere per octiduum in ∇ , vel plùs donec dulcescat \times , solum filtra & inter exhalandum sæpius cochleari vitreo subleva cuculam seu Cremorem glaciatum nivis instar splendentem, dum ejus suffic. quant. habeas reliquum crystallizetur & ad alios usus servetur.

7. Lapis & Tinctura.

Cremorem hunc indito vasi fixatorio H.S. in capella ∇ da Δ primo leviss. per 40. σ . cavendo ne fluct materia (ut in sale Hni vulgari accidit inevitabiliter) quibus elapsis proba super laminam candentem, an fluct cum fumo; si sic, continua Δ in eodem gradu, donec fumare desinat, & citrinari incipiat, tùm Δ auge dum crocescat, auge fortius ad rubedinem usque totalem pulveris. è quo Tinctura cum ∇ non difficulter postea habetur.

Vires

Vires. Valet ad morbos Hinos.

8. *Tinctura facilior.*

℞. Minii Hi part. v. silicū calcinat. part. ij. terantur diutissime, fluant in tigillo Δ per gradus adhibito donec in lapidem Rubini æmulum colliqueſcat, qui vitus Tincturam suam in V Tartarifatum deponit. Ex comm. S. Cloſſ.

N. Hoc Rubino Hi vel ſequenti vitro Hni videtur intelligendus Glauberus prima parte furnorum p. 80. ubi calcem politam Hni miſcet cum Sal. com. Tartari & inde deſtillat. Spirituum gradatorium, & liquorem viridem per deliquium ex ☉ excipit. Vel fiat Rubinus ex calce Hni ſive minio, ut eſt in pag. 151. ſecunda partis Glauber.

9. *Tinctura ex Vitro Hni.*

Hnus vi expreſſivā Δ folium ſuper teſtā probatoria redigitur in gummi flavum coloris arantii, transparent, ſutile non vaporans in Δ, eſtque aqua illa viſcoſa mineralis quā Rhodanus ait omnium metallorum colores, odores & ſapores ad ſe trahere, cum conſervatione facultatis vegetativæ (videſis Beguinum tit. de ſpiritu ardente Hni) quod ſic fit. Spiritus metallorum: Miſce calcem cujuſcunque volueris metalli cum hoc Gummate Matix mixturam arte fuſoria redige in Encauſton ſive Smaltum opacum, quod in pulver. redactum, facile Tincturam ſuam, & communicat, ſcil C, & ℞ ſubſlavum colorem, Hnus ex luteo viſcentem, & paraſinum, & ſanguinem, ☉ hyacinthinum impertitur. Solvente verò abſtracto reſtitans inde gummi mittitur in ☉ extillaturque fumus albus, opacus, tactu frigidus quod tandem in Oleum abit naturæ vegetativæ, *Baſil. Vigenerus. Schröderus.*

5. *Extractio. Unde 1. Sulphur Hni, ſeu ol. ſupernatans.* Manna Hni ex cryſtallis Hnicum ſpiritu vini Hni conſicitur per crebā cohobationem & circulationem, donec nil niſi phlegma ſuper alembicum adſcendat; Hæc cum ſpiritu vini de novo aliquandiu circulaſtur, & gradatim abſtrahitur, uſque dum ol. Hni unā eleveſtur. Si hoc ol. cum ſp. vini ſæpius circules, fragantiſſimo tandem imbuetur odore. In affectibus pulmonum, phthiſi & c. ſummæ eſt efficacix, conveniens cum tincturā antiphtifiſcā Dn. D. Johann. Michaelis, cujus etiam ſuprà facta fuit mentio.

2. *Tinctura*) Chryſtalli H cum ol. juniperi extracti per digeſtionem præcedentem tincturam rubram excludunt, quæ cum ſpiritu vini circulari poteſt. In calculo tenum & inflammationibus hæc admirandæ eſt virtutis.

3. *Alia*) Ex cryſtallis Hni titè præparatis ſimiliter rubra prodiit tinctura. Si cum ſp. vini extrahantur, ſilientur, digerantur cum Vitriolo martis poſt digeſtionem deſcendant, aliquā ſp. vini abſtractā parte. Earundem eſt virium cum ſaccharo Saturni.

4. *Alia tinctura, Hni elaboratior.*) Recip. cryſtallos Hni ad ſuprà præſcriptum modum præparatos. ſ. q. affunde ſpiritum mellis pone in circulationem per menſem, poſtea deſtilla cum cohobis ſæpius repetitis, tandem abſtrahe ſp. mellis; reſiduo adde denuò cryſtallos Hni & cum ſp. vini Tartariſato vel arcano Tartari ſoluti per aliquot menſes circula. Hinc ſp. vini abſtrahe, & acquies tincturam Hni rubicundiſſimam. Hæc magni momenti eſt, prout & cremor Hni S. Cloſſi, item Lapis & Tinctura no. 6. 7. & 8. Sub his enim non minimi momenti latitant arcana, in Mania, Melancholia, Quartana, Phthiſi, Melancholia hypochondriaca apprime conducentia.

9. *Tinctura ex viro Hni.*) Hæc nullibi niſi ab Alchemiſtis, ad lapides conſciendos, quos ſæpiſſimè pro pretioſis divendunt, uſurpatur. *Hofmannus.*

V. MERCURIFICATIO.

Unde

1. *Quis Hi.*

℞. Sal. com. Hi, q. v. ☉ *, p. d. ad em̄n. 2. digere in ciner. ☉ 14. Dein deſtilla & tandem auctiori Δ ſublima. Flores tere optimè cum * Saleque com. ac habebis ☉ m currentem Hi, *Kesler. lib. 1. cap. 29.*

2. *Aliter.*

℞. Calc. Hi, (per V ex Vitriolo & Sal. nit.) optimè edulcorat. Cryſtall. Sal. nitr purific. ana ſublima per cucurbitam tabulatam, flores tere cum *

N. Antequam affundatur V, digerenda eſt limatura H ☉ 14) cum lixivio ex * Sal. com. Tart. & Calc. viv. in Δ vel * quo lixivio dein evaporato, H terendus eſt ſupra Porphy. *Kesler. l. 4. cap. 82.*

3. *Aliter.*

Fiat lixivium ex ciner. clavell. ℔ 1. ciner. ſarment. vitis. ℔ iv. Calc. viv. ℔ i. ſilic. uſt. ℔ ij. cum *. In hoc lixivio ſolve H limat. Et quando lixivium laſceſcit, injice Borrac. 3 (ſcil. reſpectu Hi injecti) ut ſolvatur: dein deſtilla gradatim; extillabit tandem in receptaculum ☉ currentem.

4. *Aliter.*

℞. aqu. * ci ſublimati & in cella reſoluti ℥ij. ol. Tart. ſpir. Sal. nitr. ana ℥iſ. M. digere per biduum in lapidem.

℞. hujus lapidis pulveriſ. ℥j. laminatum Hni ℥ij. laminæ ſolvuntur in ℥iv. uſq. Sal. nit. ſolutio projiciatur ſuper lapidem, putrefiat per menſem aut ultra, abſtrahatur uſq. uſque ad liquorem cum cohobio terno tandem detur Δ aſtorius ut calx Hni aſcendat, quā digere cum V fortificato * co & ſale Tart. per diem naturalem, agita inter digitos, & calx ad vitam excitabitur. *Schröderus.*

5. *Mercurificatio, Unde 1. Quis Hni*) Omnes Dñi Authoris deſcriptiones non ſuccedunt; Interim tamen non dubito, quin & proceſſus mercurium ex ☉ nio ſeparandi cujus infra mentio fiet, & experientiæ reſponderet, etiam hîc accommodari poſſit ſi modò hæc tria probè obſerventur. 1. Ut Hnus in aq. fort. ex Nitri p. ij. & Vitrioli p. i. præparata ſolvatur. 2. Ut loco Urinæ ſalibus reſuſcitativis Acet. fortiffimum addatur. 3. Ut digeſtio ad duos continuetur menſes. Hæc ex litteris miſſ. ad me datis *Excell. D. Joelis Langelotti. Hofmannus.*

SALIFICATIO.

Sal Hi verum.

℞. Materiam, quæ remanſit poſt extractionem cum ☉ juniperi peractam, ſicca optimè ut oleoſitas penitus conſumatur: extrahe Sal com. cum * (ſic extrahitur Sal com. quod ante extractionem impediſcatur, quo minus reſolvi poterat) abſtrahe * ac reſpone ad cryſtalliſandum, Chryſtallos clarifica abſtrahendo V ſerva. *Baſilius in Teſt. & hinc Tholdius.*

Vires. Refrigerat vehementer & exiſcat, proinde ſemen exſtinguit.

Dofis g. 4.

Extrinfecus medetur oculorum rubedini, ulceribusque totius corporis.

N. Si Oleum ſeu Liquorem expetas, per deliquium id ex ſale habere poteris. *Schröderus.*

Salifm

Salificatio. Sal Hni verum.) Hoc Sal. com. non ex saturno immediate & per se, sed etiam ex Acet. dist. ortum est, unde & in cellam sive aërem humidum repositum solvitur per deliquium in ol. à saccharo Hni non differens, sed idem cum eo specie est, unde & ejusdem cum saccharo Hni energiae. *Hofmannus.*)

PLUMBUM NIGRUM, vid. *Nigrica Fabrilis*.

PNEUMONICA, vid. *Pectoralia*.

P O L I U M.

Πόλιον sic dicitur propter canicem, quæ in capitulis secundum Dioscoridem, at secundum Plinium in foliis apparet. πολίης namque canicem & canem significat.

Polii ergo nota Characteristica est foliorum & comae Canicis, & tomentosa lanugo qua obducuntur: quinetiam Polium ex humilioribus suffruticibus est, foliis oblongis, & in legitimis seu genuinis speciebus circa margines crenatis.

Vires. Polium cum acro fit & amarum, urinam & menses cit; hydropicos & ictericos juvat; venenatis moribus auxiliatur, Theriacam & nitridatum ingreditur.

Omnis generis Polii ramuli in terram depacti, præcipuè umbroso, sine difficultate radices agunt, ut in aliquot ejus generibus periculum fecit Clusius.

Nos hujus generis ramulum in horto Oxoniensi collectum & in Libellum coniectum per triduum in loculis circumgestavimus, tandem Cantabrigiam reversi in hortulo nostro plantavimus, qui tamen brevi comprehendit & radices egit.

Sylvius inter medicamenta Antepileptica secundum
locum Polio montano tribuit, ut quod volatili sale
abundet. D. Soame. *Rajus.*

POLYGALA.

Polygonum dicitur à copia & ubertate lactis quam vaccis & pecudibus depascentibus facere creditur. Est autem herba planè anomala, vasculo seminali cum *Thlaspi* conveniens, cui idcirco subjicienda, flore singulari & sui generis.

Vires. Si manipulus ejus per noctem in vino mace-
retur, idque bibatur, bilem per alvum mirè deiecit nul-
lo periculo; experientia Gesperi. *Rajm.*

POLYGONATUM.

Πολύριζον τοῦ Dioscoridi Lib. 4. cap. 6. quod radix cre-
bro pinguiculata sic: vulgò sigillum Salomonis haud dubie
à vestigiis pluribus radici sigilli instar impressis. Foliis
nervosis cum Lilio convallium & monophyllo conve-
nit; Magnitudine sua, caule multis foliis vestito flo-
re cylindraceo ab eisdem differt,

Vires. Polygonati vires summatim recenset Schroderus his verbis.

Vulnerarium est & astringens, fluxiones quascunq;
sistit; ossa fracta consolidat. Radix in vino decocta &
pota mira præstat in contusionibus & fracturis ossium,
in herniis, &c. extrinsecus faciei faculas abstergit,
curim dealbat, &c.

Baccæ pituitam mucilaginosam per vomitum ac se-
ssum educunt. Dos. 14. aut 15.

Ad menses albos, ℥ rad sigilli Salomonis saccharo condit. est. experimento probatum remedium sæpius utentibus Matthiolus.

In cerevisia forti coctum optime convenit in Arthritide. D Palmer dictante D. P Hermannno adnotavit.

Sylvius *L. 2. c. 21. §. 131.* inter medicamenta antiepileptica sigilla sexto in loco recenset, cujus acetum & oximel infantibus epilepticis auxilio fuisse se novisse ait, & acrimoniam suam solum volatilem manifestare nemo negavit in arte peritus, inquit *D. Soame. Rajm.*

POLYGONUM, vid. Centinodia.

POLYPODIUM.

Πολυπόρῳδιον Græcis dicitur hæc planta, quia in radice
ejus sunt tubercula, acetabulis iis similia quæ in poly-
porum cirris apparent. ρίζα δὲ ὑπερὶ δασεία πλεονάζουσα
ὑπερὶ πολλῶν ἔχουσα. Dioscor & Plinius radix, inquit,
acetabulis cavernosa seu Polyporum Cirri. Hæc tubercula
sive acetabula sunt vestigia foliorum annuatim
abscedentium ut Cæsalpinus loquitur.

Polypodium Vulgare.

Polypodii radix obliquè sub terræ superficie repat.
altius fibras suas ex tuberculis, quibus plurimis scater,
demittens, ad crassitudinem ferè minimi digiti accedens,
nunc tenuior, Colore foris buxo, intus ferè herbaceo,
sapore dulci, tandem acerbò & adstringente. Folia ex
transversa radice filicea, è foliis seu potius segmentis
multis, gustu adstringentibus, non denticularis, super-
nè virentibus, infernè ad nervi latera utrinque ordine
quodam acervulis quasi pulvisculi rufi punctatis, cù
interim hoc non semper observetur, ad costam unam
media parte foliis viduam annexis, composita.

Hujus femina Microscopio inspecta tum figura sua, tum colore a reliquorum capillarum feminibus discrepareprehenduntur; cœteris enim leucophæis aut rubentibus, hæc lutea sunt, & ad modum Medice seminum reniformia.

Nascitur in muris antiquis & ædium testis, in aggeribus terrenis ad radices aut truncos ad arborum vulturarum, inque capitibus cæduarum quercuum calcumve putrescentibus & carie excisis. Quod quercus innascitur reliquis in medicina præfertur & à nonnullis pro specie distincta perperam habetur.

Hujus radix medicamentis purgantibus accensetur: educit autem bilem adustam ac pituitam lentam. Hinc utilissimum in obstructionibus mesenterii, hepatis ac lienis, & inde natis passionibus hypochondriorum scorbuticis. Raro autem solum datur, sed aliis purgantibus ferè admiscetur, & quia segnitè purgat, plerumque in decoctis vel infusionibus, raro in aliis formulis adhibetur. Schrod.

Dodonæus Polypodium per se haud quamquam
gate scribit, sed ex jure veteris Galli cum beta aut ma-
va aliisque lubricantibus alvum decoctum ad alvi le-
tionem nonnihil tantummodo conferre. Nonnulli ci-
mini sativi seu romani, foeniculi ac anisi semina, cum
radice polypodii & Zingibere in minutas partes con-
scissis, æquali pondere cum vetulo gallo gallinaceo de-
coquunt, posteaque jusculum hoc colica passione le-
borantibus exhibent. Estque decoctio hæc medicamen-
tum certè perquam utilissimum torminibus ventris. Re-
dicis pulvis drachmæ pondere ad minus ex aqua muli
potus, ita tamen ut post tribus aut quatuor horis repe-
nes, iisdem pollet viribus quibus & decoctio jam dicta.
Ita idem per aliquot dies exhibitus, addito, si placeat,
Cremoris tartari & cassiæ lignæ tantillo, ad lienem
tumidum, ieterum & hydropem remedium est pre-
stantissimum D. Boovle.

Aqua destillata ad febrem quartanam, tussim, asthma
& pulmonis affectiones adversus melancholiam & gra-
via ac molestia insomnia aliquot dies continuos bibita
facit.

Trag. Turnerus ad quartanam & melancholiam me-
gis probat decoctum radicum ex vino, Saccharo
ac melle dulcoratum, quàm aquam stillatitiam, nec
sine ratione: imò tam hujus quàm aliarum plantarum
efficacior Turnero videtur succus aut deco-
ctum quàm aqua stillatitia: cui & nos libenter sub-
fragamur.

Decoctum Polypodii in cura Arthritidis universalis
apud

apud Menapios aliisque Rheni & Mosæ accolæ in usu scribit esse Dodonæus, quem consule.

Polypodium Quernum.

Polypodium quernum Dioscorides luxatis efficaciter imponi & adversus timas digitorum, (cubitorum & digitorum in pedibus Plinius) scribit, (radicem nimium tritam.) aridæ radicis farinam naribus inditam polypum consumere scribit Plinius. *Rajus.*

POLYTRICON, vid. *Adiantum.*

POMPHOLIX, vid. *Tubia.*

POMUM in genere, vid. *Malum.*

POMA AMBRÆ

Hæc ita dicuntur, quod ambræ odorem æmulentur, licet ambra non semper illa ingrediatur, & sunt ob odoris suavitatem & fragrantiam inventa. Constant ex fragrante aliqua resina, vel balsamo Indico, styrace liquida, ladano aut aliis speciebus odoriferis cum mucilagine tragacanthi in massam redactis. *Hofmannus.*

Poma ambræ sunt ex odoratis pulveribus, (addi & olea possunt,) qui cera, styrace liquida, balsamo Indico, mucilagine Tragacanthi, cum tantillo Terebinthinæ ad tenacitatem, si opus sit, suscepti, additaque Aq. rosarum vel simili optime incorporati, in globulos, prout visum fuerit, rediguntur.

N. Nomen mutantur ab Ambra, non quod ea necessariò & semper ingrediatur, sed quia odorem suavem spirant, adeoque ambram æmulantur.

Exemplo sint,

1. *Odoriferam Crollianum.*

℞. Macis, Caryophyll. Cinamom. vel cass. lign. odorat. ana ʒij. Moschi ʒss. Zibet. ʒij. Gummi. arab. ʒj. Tragacanthi prius supra fornacem siccati. ʒij.

Hæc duo gummata cum moscho terantur.

Omnibus diligenter tritis, misce Zibettam, & affunde aquam Naphæ. (idest, è floribus aurantiorum,) seu Damascenæ odoriferæ, pro libitu (ex odoratis specificis & Aq. rosarum præparata, in qua prius per 8. dies in digestionem modicum de Paracelsi carbon. vel Zibetta occidentali admixtum sit,) atque incorpora.

N. 1. Carbon seu Zibetta occidentalis, quantum ex Paracelsi archidox. conjecturari potest, nihil est, aliud quam stercus seu Sulph. humanum, in digestionem aliquamdiu positum, & ex foetidissimo illo odore, sponte sua longa digestionem summam suaveolentiam natum. Vide Hartmann. in Croll. ut lib. 5. Class. 1. ut & Agricol. in comm. Popp.

N. 2. Poterit & parari, si pulverisata illa mucilagine Tragacanthi (in Aquâ odorifera soluta) suscipiantur.

Vires ac Vtus. Adhibitum naribus odore suo sanguinem movet, (quod moschum efficere putant) & cor supra modum refocillat, in Apoplexia, Epilepsia, Colica, suffocatione matricis, pestilentiali aura.

N. Misceri potest tantillum cum oleo nucistæ expresso, ut fiat quasi linimentum, & in supradictis morbis debito modo adhiberi. Croll. Schroderus.

Carbon seu Zibetta occidentalis) Hæc mediante digestionem conficitur ex stercore humano, zibettæ orientalis summam referens suaveolentiam. Et si causam hujus inquiras, experies ex scoriis stercoreis dependere, quarum materiale principium felli debetur, prout &

Vrinæ unde fel prævia digestionem destillatum moschi vel Zibettæ æmulatur odorem. Moschus viribus exhaustus hanc ob rationem in locis urinosis novas acquirit vires. Buffalina vulva exsiccata eâ etiam de causa Moschum spirare arbitror, scoriis urinæ hanc imprægnantibus, unde Neapolitani illa in unguentis myropolæ utuntur.

Adhibitum naribus odore suo sanguinem movet) Hic effectus est à Moscho ; si quis accepto vulnere in thorace nullum sanguinem emittere queat, isque pectore detineatur, granum saltem unum moschi sub linguâ detineat, sanguis statim cumulatam fluat, teste experientia.

Suffocatione matricis) Sed partibus tunc genitalibus applicandum est, ne nares odorem percipiant, aliàs symptoma dictum potius exacerbabitur.

Pestilentiali aurâ.) Verum muniale fermentum malignum magis benè fragrantibus fovetur, quàm ut supprimatur, dum venenatum miasma sub benè fragrantium miasmata involucri citius auram penetrat vitalem & ita mortem intendit, idèoque alexiteria specifica illis sunt præferenda. *Hofmannus.*

2. *Aliud Pomum Ambra.*

℞. Styrac. calamit. ʒiʒ. Benzoin. Laudani ana ʒss. Caryophyllor. ʒ. ij. Nucist. Macis ana ʒj. Rad. ireos fl. Cyper. rot. ana ʒiʒ. Fl. Rosar. ʒj. Lavendul. Majoran. ana ʒss. Storac. liquid ʒj. Zibet. ʒss. Mosch. ʒj. Cum Balsamo Indico & Aq. rosar. ana qu. s. F. Massa.

℞. Laudani put. ʒj. Styrac. calam. ʒij. Benzoin. ʒj. Nucis moschat. Fluxus inhibet. Cinamom. Macis ana ʒss. Coriandr. Caryophyllor. ana ʒj. Mastich. Oliban. ana ʒj. Lign. Aloës ʒss. Ambr. gran. v. Mosch. grad. x. F. Massa 4. Aliud.

℞. Styrac. cal. ʒij. Mastich. Thur. masc. Sandarach. ana ʒiʒ. Costi. Spic. ana ʒj. Lign. aloës ping. ʒij. Mosch. Ambr. an. gran. aliquot. Terebinth. parum. F. Pomum.

N. Vide sis & apud August. Pom. Ambra, 1. 2. Schroderus.

Pomum Ambra è Pharm. August.

℞. Styrac. Calamita, Styrac. liquidi, benzoi, galie mosch. vera, alipta moschata, ladani ana ʒss. cinnam. elect. caryophyllor. sandali citrini ana ʒij. rosar. rubr. nucis moschata, macis, ligni aloës, cyperi rotundi, majorana, gummi elemi, rosinarini, ireos Illyrica ana ʒij. gr. v. mucilaginis tragacanthi facta cum aq. rosar. q. s. F. Massa.

Cor ac cerebrum odoris suavitatem ac fragrantiam reficit, spiritus cum vitales tum animales recreat, vertiginosos juvat, ac capiti à frigida & humida intemperie opem præstat.

Pro majori simplicium compositionem hanc constituentium unione, quandoque nonnihil terebinthinæ Cypriæ admiscetur, ac ob odoris gratiam pauillum olei caryophyllorum additur. Divitibus ambra & moschus, vel zibethum pro consulenti Medici judicio, aut expetitò odore adjiciuntur.

Pomum Ambra aliud ex eadem Pharm.

℞. Sandali citrini ʒvi. ʒij. lign. aloës ʒss. rosar. rubr. basilici, lavendule, anthos, majorana, cinnam. nucis moschat. macis, caryophyllor. coriandri, cardamomi ana ʒij. ʒj. corticum citri ʒvi. ladani puri ʒvi. Styracis calamita ʒvi. ʒij. Styracis liquidi ʒij. asa dulcis ʒx. cera citrina ʒss. terebinth. Cypriæ ʒiij. moschi Alexandrini, ambra grisea, ana ʒiij. F. Massa.

Odore

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit. Usui est maxime cum aliqua aëris inquinati suspicio viget, cui tunc temporis Angelica, Zedoaria, Ruta, & præsertim Camphora rectè adjicitur.

Pomum Ambrae pretiosum ex *Zouveserô*.

℥. Resinæ styrac. calam. expressæ, Ladani ana ℥j. Iis parumper in mortario liquidò liquatis admisceambræ griseæ ℥i℥. vel ℥ij. superaddendo moschi orientalis ℥i℥. vel ℥ij. in portiunculâ aq. ros. solut. Zibethi opt. ℥j. olei still. cinnam. caryophyll. ligni rhodii ana ℥℥. pulveris ligni aloës opt. & ligni rhodii ana ℥℥ cinnam. caryophyll. ana ℥v. M. exactè & F. Pomum Ambrae, seu Pasta odorata & fragrantissima, ad bullas replendas pro ditioribus & Magnatibus.

PONDVS, vid. de eo sub titulo *Mensura*.

POPULUS.

Populus à πολὺς ob frondium multitudinem nonnullis dicta putatur. Martinus ingeniosè à πηγάω Tremmo, ob folia tremula deducit, quod tamen Libycæ proprium est.

Semine julis lanigeris incluso cum salice convenit, foliorum forma lata & angulosa ab ea differt. Græcis commune nomen non habet: nam nigra αἰγερὸν privatim dicitur, alba λευκή, tremula κερκίς, ut peritioribus Botanicis videtur.

Vires Populi Nigræ.

Primum illud erumpens germen cujus in medicina usus est, officinæ, oculos populi vocant, alii gemmam populi, Græcorum quidam σπέρμα, unde erroris occasionem acceperunt, qui non prima illa germina resinosa, sed julos in compositione unguenti ex populo accipiendatemerè existimant, in quibus nihil resinosum. J. B.

De temperie Populi nigræ ejusque gemmatum, an scilicet calidæ sint an frigidæ varia est sententia, de quâ vide I. Bauhini hist. L. 7. C. 8. verisimilior eorum sententia videtur qui moderatè calidas faciant: nec obstat quod unguentum populeon frigidum sit. Autores enim in medicamenta acopa nonnulla calida immittere solent, non ad totam compositionem calidam reddendam, sed ad frigidorum vim deducendam aut certè tamen retundendam. I. B.

Valer illud unguentum in omnibus calidis affectibus illitum, naribus inditum, & temporibus pulsantibusq; arteriis somnum conciliat. Ejus quoque usus est ad calidos dolentesque tumores. Quidam & feciliter podagris calidis illinunt. Sed nè inveterescat cautio est, alioqui eas vires perdit.

Oculi seu gemmæ adhiberi solent à sexu muliebri ad capillos exornandos promovendosque: utendi modum vide apud Matthiolum & Jo. Bauhinum. Nostra observatione gemmæ seu surculi extremi post mediam ætatem luteum, odoratum, pinguem & resinosum succum exudant; non gemmæ tantum initio veris antequam in folia explicantur: quantumvis Jo. Bodæus à Stapel nullam ætate resinam in hac arbore reperiri fidenter asserat: & erratum exscribentis esse putat in textu Aetii, ubi in descriptione olei ægirini legitur Σηράζου δὲ ἐν τῷ θέρει, ὅτε πολλὴ ἐστὶ τὸ σπέρμα ἢ βσι ῥήνη.

Usus Populi Nigræ.

Annosæ populi lignum pulchrè crispantè undarum discursu peramænum esse scribit I. Bauhinus; idèque artifices Germanici ex eo varia utensilia, mensas, abacos, Lectorum spondas, Capsellas, ostia, etiamque cochlearia, (quadras, trullas) aliaque plurima pa-

rant. Plinius materiam lentam, adeoque scutis faciendis aptam scribit. Scutorum hodie usus in bello nullus, ex quo sci. Bombardæ inventæ sunt, uti nec arcuum & sagittarum.

Quædam (inquit C. Bauhinus) florēt & fructum non fert, quædam fructum fert ac non florēt; idèque arbor hæc est è sexu distinctis: quod quanvis nobis nondum observatum, verum tamen esse minimè dubitamus. Quoniam in salice arbore congenere id dudum notavimus.

Vires Populi Albæ.

Quod ad medicas vires attinet, has ei Dioscorides attribuit; Cortex unciz unius pondere potus ischiadicis & stranguriæ prodest; traditur & conceptum prohibere si cum mulino remebatur: sed & folia post purgationes cum vino pota idem præstare dicuntur. Tepidus foliorum succus aurium doloribus utiliter instillatur. Pilulæ verò (σφαίρα) quæ primò foliorum germinatu erumpunt tritæ & cum melle illitæ oculorum habetudini medentur, Plinius foliorum succum calidum aurium dolori conferre ait.

Populus alba humo tenus secta usque ad radicem, & aqua calida in qua fermentum dissolutum pessusa fungos copiosos intra quatrimum edet, elui quoque gratissimos. Math. in Dioscor. lib. 1. cap. 39. Dioscorides utriusque Populi cortice in frusta conciso & stercoratis areolis insperso vim fungos edules producendi attribuit.

Usus Populi Tremulæ.

Materies candidissima est & lævissima, tornatoribus expetita, ex eadem propter levitatem calopedia parantur, & in imagines exsculpuntur. Cortex arborum juniorum detrahitur à nonnullis pro facibus nocturnis I. B.

Gemmæ veris tempore digitis contritæ gratissimum odorem expirant. *Rains.*

PORCUS & PORCINUM GENUS.

Sus, seu *Porcus domesticus*: Græcè ὄσ: Mas Anglicè a Boar dicitur, fœmina a Sow. fœtus a Pig. Hæc Speciei nomen est utrique sexui commune.

Animal est notissimum, nec descriptione indiget. Pilis rigidis, setas vocant, vestitur. Rostro est oblongo, in planum rotundum terminato, in quo nares præcipuè notabiles sunt, in maribus maxime, dentes. Καὶ ἐξοχὴν dicti, magni, exerti, acuti, inrus concavi, quibus ad pugnandum utitur. Pinguescit mirum in modum præ alio quocunque animali. Adeps autem, inter cutem & panniculum carnosum colligitur, secus quàm in ruminantibus. Intestinum cæcū & colon amplissima, & in cellulas divisa ligamenti duplicis utrinque per longum ducti ope. Fœmina plurimas habet in ventre mammas duplici ordine ad 12: Porcellos autem viginti usque una vice interdum parit. Quod canis volutabro gaudeat, immundum animal censetur, quàmvis non præter rationem id faciat, ad insecta & animalcula noxia & molesta abigenda & interimenda.

In fœminâ observavit D. Villughby uteri cornu prælonga sinum seu vaginam uteri ad medium usque glabram, dein rugosam, ultra rugas inæqualem & glandulosam, tum satis arctè clausam, sed uno sigillo non 5. ut in Damis. Mense Decembri proximè elapso suis prægnantis circa medium gestationis tempus uterum dissecui, in quo non usquequaque de fœto fœtus ejusque membranarum mihi meritisatisfeci: alium ergo partui viciniorem amicissimi & ingeniosissimi Viri D.

Benjamini Allen Brantiae in vicinia medicinam facientis, beneficio nactus, eodem assistente curiosius omnia rimatus sum Cornua uteri iis in locis ubi foetus jacebant insigniter protuberant, in interstitiis foetuum valde angustabantur, ubi loci cavitates seu canalis internus materia mucilaginosa sordide flava obrutabatur. Chorion seu membrana foetum & liquores membranisque reliquis continens, farciminis figura, erat ventre seu media parte ampla, extremo utroque turbinato, non tamen penitus occluso, sed foramine mediocri pervio, per quod *Allantoidea* egressa in vesicam satis amplam dilatabatur. Vesicae hujus collum seu apertura, quae chorio jungitur, muscularem vim habere videbatur, quae facile crumenam instar contrahi & laxari posset. Liquor Allantoide contentus aërve eidem inflatus absque ulla vi in vesicam egrediebatur, indeque retro repelli potuit. Chorion undique, exceptis partis extremis, substantia quadam carnea, molli, placentae vice obducebatur. Hujus substantiae superficies perexiguus eminentiis granulata erat, granulis in cavitates superficiarias vix visibiles utero insculptas ingredientibus, unde chorion utero leviter adhaerebat; facile tamen absque ulla vi, ruptura aut laceratione vasorum, ullove haemorrhagiae periculo detrahi & separari potuit. Praeter substantiam praedictam, tubercula seu noduli, duri, albicantes compressi, foraminulo pervii, satis crebri, & visui & tactui obvi, per chorion diffeminabantur, quos glandulas esse conjeci, (vasa quippe sanguinem habebant) ad humorem aliquem secerendum, & in cavitatem membranarum derivandum. Versus extrema utrinque, ut dixi, nulla hujusmodi substantia chorio adnascebatur; verum membrana ibi tenuior erat, plurima tamen vasa sanguinea per ejus superficiem, & quod mirum, rectis lineis extensa, ad vesicarum extremarum initium excurrerant. Chorion cavitatem mediam ab uno latere occupabat amnios cum suo liquore & foetu ei innatante; ab altero allantoidea: amnios ergo tunica ab exteriori latere chorio adhaerebat, ab interiori allantoidei, & allantoidea pariter ab interiori latere Amnio adnascebatur, ab exteriori latere chorio. Erat autem allantoidea longissima, siquidem flatu extensa, ulnam nostratam fere aequabat, & in cornua utrinque trans amnion procurrebat, chorio ubique praeterquam à latere amnii adnata.

Chorion totum cum liquoribus intus contentis figura sua arcum oblongum modice tensum cum nervo suo referebat. Vasa quippe umbilicalia à foetu egressa, quamprimum chorio occurrunt aut inferuntur, huc illuc statim reflectuntur, & in longum utrinque canali magno velut arcus nervo ad extrema fere cornua extenduntur, ramulos obiter emittentes; qui versus arcuatam seu curvam chorion partem procurrentes, totam ejus superficiem petreptant & velut itigant. Quis verò usus sit horum vasorum, an ad aërem pro respiratione à matre ad foetum derivandum, an ad alimentum hauriendum non ausim determinare: nam pro utraque sententia argumenta satis valida militant.

Liquor allantoide contentus totius Amnii cum liquore suo & foetu contento molem seu magnitudinem aliquoties superabat. Vix autem credibile est tantillum foetum tam brevi temporis spatio tantum lotii reddere potuisse, quod moleculam corpusculi sui toties excederet. Mihi ergo in praesentiarum verisimile videtur, urinam cum liquore à chorio secreto à natura permisceri, adeoque mixtos per amnion percolari ad foetus usus & forte alimentum; inutilem autem & urinofam partem in vesicam ad extrema Cornua sitas amandari, nam quis alius vesicarum illarum usus esset nisi ad excrementitiam liquoris in Allantoide contenti partem reservandam imaginari nequeo vesicae illae tenues

erant, membranæ & pellucidae, neque ulla visui exposita vasa sanguinea obtinebant, earumque colla seu orificia, in foetu praesertim juniore materia, mucilaginosa qualem foetum & foetum interjacere dixi intus op-
plera seu obstructa fuere.

Observavi insuper rubas Fallopianas, quae extensa dodrantem minimum longae erant; superiore parte versus testiculum ampliores, rubentes & velut carneae huc illuc reflexae inferiore, versus cornua angustiores, albicantes, & nervos seu vasa deferentia in maribus referentes; intus concavae & fistulosae, cornua uteri extrema perforabant, unde à tuba in cornu, & vice versa à cornu in tubam stylus majusculus nullo negotio absque vi adigi potuit. Suprema parte ad testiculum seu potius ovarium tuba in quoddam quasi infundibulum dilatabatur, cujus margo ab una parte testiculo adnascebatur, reliqua soluta & libera.

Sinus seu vagina uteri initio glaber, d. inde rugosus, post corporibus glandulosis obtus. Orificium interioris uteri arcte clausum, & velut sigillatum, ut stylum tenuem agere admittat, verum unico tantum sigillo, non quinque ut in Damis; idque non solum gestationis tempore, sed etiam cum praegnantem non sunt.

2. *Sus agrestis* live *A P E R*. The wild Boar; or wild Swine. Hoc genus coloribus non variat suis domestici in modum, sed eundem semper servat; est autem is è nigro paulum canescens, (grisly or iron grey) Rostro est quam *Sus* domestico multo productior. Auriculis brevioribus & rotundioribus nigris, cujus etiam coloris sunt & cauda & pedes. Pili quibus vestitur duum generum sunt, alii longi, alii breves, secus quam in Porco domestico: ulus pilorum brevium idem qui Fibro & Lutrae. In Italia invenitur, monte Appenino. In thetiotropheo Magni Ducis Etruriae vivum vidimus, in macello Romae carnem venalem saepius.


3. *PORCUS Guineensis* *Marogr.* Figurâ est ut nostrates, & rufi coloris; Differt quod caput habeat non ita elatum; aures autem longas, & acutius planas, & prolongatis acuminibus; caudam longam usque ad talos propendentem, pilorum expertem. Totum corpus tegitur pilis brevibus rufis splendentibus, non scitis, quibus & in dorso caret, sed tantum versus caudam in dorso, & circa collum paulo longiores habet pilos. Planè cicut.

4. *Porcus Indicus* *BABYROUSSA* dictus Magnitudine Cervi ut & formâ corporis; rostro & cauda Apri, pede Hirci. Quo praecipue ab aliis quibuscunque animalibus differt sunt quatuor dentes exerti, longiores & incurvi, cornu Arietino similes, quorum duo è maxilla inferiore prodeunt, duo verò ex superiore, carnem rostri perforantes; Hos ego cum Bartholino pro dentibus potius habeo quam pro cornibus cum *D. Grevv*, quia dentium modo suos habent alveos è quibus enascuntur, & dentium consistentiam non cornuum habere videntur. Reliquam descriptionem vide apud *Bartholinum*, *Pisonem* in Pontium, & *D. Grevv* in *Mus. Soc. Reg.* In insula *Bowro* Indiae Orientalis invenitur. Dentes primores in superiore maxilla obtinet, unde cum non ruminare constat.

T A P A C U seu *Aper Mexicanus* *moschiferus* *D. Tyson*, *Tajacu* & *Tajacu Caaigoara* *Marograv.* *Piso*; *Let. Gomara.* *Quahla coymail* & *Quapizotl* *Hist. Mexic.* *Recchi.* *Zaino Joseph.* *Acosta* & aliorum.

Hoc Animal accuratissime describitur & depingitur à *D. Edw. Tyson*. *M. D. in Atl. Philosoph. Angl. N. 153.* unde aliorum descriptionibus, partim imperfectis, partim erroneis, examinandis & refutandis non est cur immoremur.

Quem vidit & descripsit *D. Tyson.* à *D. D. Goadall;*
Coll.

Coll. Med. Lond. Socio suppeditatus Porco nostrate vulgari multò minor erat: A summo capite (inter aures) ad corpus extremum s. caudæ locum (caudæ enim catebat Animal) 2 pedes, & 2 insuper digitos longus: à summo capite ad rostrum extremum 11. erant. digiti. Ambitus corporis 2. pedum colli 16. digitorum; capitis ubi crassissimum 18. rostri 12: quippe maxilla inferior magis protuberat. rostri figura minus conica & producta erat quàm in porco nostrate; & in scelecto, Babyroutæ rostro persimile videbatur, nisi quod dentibus illis exterioribus careret. Collum breve admodum & crassum: Color corporis è nigro canescens, seu è nigro & incano mixtus (grisy nostrates vocant) corpus autem fetis undique oblitum erat, Porcinis crassioribus; Echini spinulis minoribus, annulis tamen albis & nigris pari modo variegatis: venter propemodum nudus. Setæ in imis lateribus breviores, paulatim longitudine augentur ad medium usque dorsum ubi nonnullæ 5. digitos longæ. Medio capite inter aures  quidam seu crista serosa exoritur, fetis maximam partem nigris composita. Auriculæ erectæ & acuminatæ 2. uncias longæ: Oculi parvi: Rostrum suillum: Pedes & ungulæ ut in Porcis vulgaribus: posteriores tamen, seu exteriores binæ ungulæ præ aliis bisulcis longæ, ut quæ ad sesquidigitum accedebant, cum anteriores quibus insistit mensuram illam non excederent. Cauda, ut diximus, prorsus nulla. Nec mirum in Porcino genere alia caudata esse, alia caudis destituta, cum in similibus idem evenire videamus.

Pergo jam ad partium internarum Anatomen, inter quas de iis, quæ diversæ à congeneribus in Porcis nostratibus structuræ sunt præcipuè agam, quæque in iis singularia observanda occurrunt adnotabo. Divisis ergo Abdominis musculis; primò in loco *Ventriculorum* (tres enim habebat) figuram & conformationem observavimus: in horum medium inferebatur *Oesophagus*, quem idcirco *primum ventriculum* denominabimus. Ex hoc, ab uno latere meatus amplius in secundum, cujus extrema duo cornuum instar inflexa erant, aperiebatur; ab altero in tertium *ventriculum*, qui in *duodenum* se exonerat, aditus patebat. Ut externa horum uniuscujusque figura & connexio facilius concipi & exactius comprehendenti possit, in triplici situ tribus iconismis eos repræsentari curavimus, qui formam eorum externam plenè & perspicuè demonstrant. In *Fig. 3. Tab. 1* flexuræ seu curvaturæ extremitatum primi *ventriculi* distinctius cernuntur. In *2. Fig. Tab. 2*. Tres *Ventriculi* in situ naturali insertione *Oesophagi* in primum seu medium, exhibentur. In *1. Fig. Tab. 2*. *Ventriculi* omnes aperti repræsentantur: in quibus notatu dignum est, quòd venter primus membranâ intus albâ, crassâ, durâ, pelliculæ internæ ventriculi avium, *Gigeria* dicti, propemodum simili, succingebatur: cujusmodi reliquorum neuter. Secundi etenim interior superficies glabra erat & mollis; membranæ tenues, & ad carnivororum Animalium structuram usitatam accedentes: Tertius huic nonnihil similis, plieis intus albis inæqualis.

Porcus noster vulgaris unicam tantum ventriculum habere videtur, eumque *Tajacu* ventriculis longè dissimilem. Ubi Natura plures creat, ob necessarios proculdubio usus id facit.

Quæ tamen pars in *Tajacu* per albam pelliculam Ventris primi in tres ventriculos manifestè, in Porco etiam nostrate vulgari in totidem obscuris distinguitur. D. Grevv duos tantum hisce elargitur; *Ventriculum singularem & insolitam figuram donatum, & in duos sacculos quodammodo divisum agnoscens*: Alter, inquit, & præcipuus Venter magnus appellari potest, carnivororum Quadrupedum ventriculis figura similis, valde

crassus & musculosus, præsertim circa collum suum, seu gula impressum, & ad Pylorum. Sinistro majoris hujus Ventriculi extremo aliter longè minor, distinctus tamen, appenditur: ad eundem ferè modum quo *Reculum* in ovibus ventri primo, aut intestinum cæcum reliquis interaneis: quam ob causam Ventriculus cæcus non ineptè possit denominari, musculari quodam ligamento semivalvulari à majore separatus; ad ingressum ubi ei committitur, diametro est sesquidigitali, inde in longum ad duas uncias extensus in intortum seu aduncum conum desinit; non adeò crassus & musculosus ac Venter major, sed tenuis & membranaceus; interior etiam ejus superficies plana est, nec plieis ullis inæqualis. Posterior hic ut secundo *Tajacu* nostri Ventriculo respondere videtur, ità prior ille, quem ventrem magnum vocat, in duos possit distingui, cum à dextro extremo ad medium usque, varias habeat, ipso observante, plagulas, quò tertio nostri ventriculo respondet, altero extremo plano & æquali, ad primi nostri modum.

Verum quod in Porco nostrate vulgari adnotat nimirum carunculam quandam rotundam, Avellanæ parvæ nuclei magnitudine, velut obturaculi loco Pyloro adscitam esse, quam partem Animalis isti peculiariter existimat: hoc in *Apro* postro *Mexicano* non observavi. Conjectura quam facit de ejus usu satis verisimilis est, nimirum cum Animal valde vorax sit, ad prohibendum nimis celerem & copiosam alimenti in Duodenum irruptionem; cui in *Apro* quo de agimus abunde cavetur eximia pylori coarctatione, & ascensu in sublime quem facere tenetur cibus antequam egredi possit: Hanc etiam fortasse ob causam Natura Ventriculum in tot cellas & loculos divisit, ad meliorem nempe cibi macerationem & digestionem. Cum enim Animal hoc victu promiscuo sit, frugivorum scilicet, granivorum atque etiam carnivororum, ventriculi ità comparati sunt, ut Primus interiore sua pellicula (in hoc nostro) Avium quæ carophaga sunt ventriculum nonnihil referat, reliqui Quadrupedum.

Cur porcus præ aliis Animalibus partibus suis internis hominem maximè referre dicatur, rationem non video. Fortasse clausula quædam in libro *Galeni* adscripto de *Anatome parva* errori huic passivo ortum dederit. Quicumque ea invicem contulerit, non poterit non observare ingentem interesse differentiam in multis nè dicam plerisque partibus, ut ex hæcenus dictis de ventriculo patet.

Falcoburgius qui *Tajacu* Brasilia allatum dissecti cornuum quæ diximus ventriculi meminit, *Ventriculus* (inquiens) duas habet Appendices velut cornu alteram in superiore, alteram in infima ejus parte, nec plura de eo habet. Verum ad intestina progreditur.

Atque hæc non minùs notabilia invenio quàm Ventriculum. *Mirum & singulare* (inquit F. *Grevv*), qui hoc genus Animalia sæpius dissecterat) est, quòd Intestina & Ventris viscera contrario prorsus alio Animalibus situ obinent, renes versus nimirum reposita. Ità, ut quæ in ventris parte inferiore, ac prona esse annexa deberent, superiori eadem potius ac supina, ubi spina excurrit, adhæreant, & quæ spina dorsum tigua esse nata sunt, hac eadem in inferiore parte ventris situentur. Hoc totum (quantum conjicio) nihil aliud sibi vult, quàm quòd intestina tenuia quæ in aliis Animalibus mesenterio latiori adnexa, inferius plerumque dependent, in hoc ob membranæ hujus brevitetem & angustiam arctius & ad spinam propius coacta sint; colon autem quod in aliis magis suspenditur, in hoc, peculiari conformatione, laxius jacet & propendet. Duodenum etenim à Pyloro exortum brevi flexu, unà cum reliquis intestinis tenuibus plurimas convolutiones & gyros effecit, & quamvis

Mesenterii semidiameter ab exortu, qui ad spinam erat, perbrevis esset; nec peripheria quàm pro ejus ratione major videbatur; ejus tamen ambitui viginti septem pedes intestinorum adnectebantur, tantundem enim spatii permeriebantur in longum extensa, à pyloro ad colon mensurâ sumptâ. Colon non ut vulgò margini seu peripheriæ Mesenterii adhærebat, verum à centro seu media ejus parte exortum in lineam spiralem convolvebatur, extremo laxè dependente; volutis autem membranarum interventu sibi invicem arctè unitis. Erat insuper, colon isthoc valdè amplum, reliquorum intestinorum respectu, & 9. pedes longum. Cœcum habuit breve, mediocriter latum, & facibus repletum. Quod D. *Grevv* observat, nimium peculiare esse Porci & Equi *Cœcis* eandem habere structuram cum colo, hujus etiam Animalis cœco cum illis commune est; potestque pro Coli appendice reputari. D. *Grevv* septem Intestina Porco attribuit. Totidem fortasse intestinorum differentias in hoc Animali observare potuissem, si ea curiosius examinare per otium licuisset. Verum partim tempore exclusus, partim quodd cadaver diutius asservatum antequam nobis dissecandum offerretur, talibus inquisitionibus minùs aptum reddebatur, illud omittere coactus sum. Structuram hanc coli pro singulari & extraordinaria habeo. Intestinum quoddam ejusmodi in capra inveni spirales aliquot flexus in medio mesenterii efficiens, deinde circuitu prope marginem cui intestina minora adnectuntur facto, in Rectum tandem definens. Sic in Gallinagine Intestinum spirale pariter invenitur. Verum in *Tajacu* nostro non tantum Ventrìculus, Intestina, & Mesenterium singularia & insolita erant, verum etiam Mesaraica vasa. In Homine enim, Cane, &c. in circuli segmentum prope medium Mesenterium incurvantur, exinde ramos aliquot maguos versùs intestina emittunt qui ut iis appropinquant mutuis anastomosibus arcus minores aliquam multos constituunt, unde ramuli plurimi minimi seu fureculi exeuntes ad intestina excurrunt. Verum in *Apro* hoc *Mexicano* venam & arteriam amplam ad breve & æquale spatium decurrentes observavimus deinde ab iis exortum numerum propemodum infinitum vasorum minorum sed rectorum, ad intestina procedere tam concinno ordine tant què multitudine, ut jucundissimum spectaculum exhiberent.

Lien 10. uncias longus erat, æquali propemodum sesquidigiti per totum latitudine, plumbei coloris nonnihil maculosi. Lien palmas duas æquat transversus vix digiti minimum crassus, membrana adiposa annexus, inquit *Falcoburgius*.

Hepar in 4. lobos amplos dividebatur, colore rubro obscuro. Erat autem manifestè glandulosum. Cystis fellea nulla, quod in primis notabile, cum Porcus noster vulgaris amplam obtineat. Ductum tamen biliarium habuit ab Hepate ad duodenum exeuntem. Hepar (inquit *Falcoburgius*) nullo ligamento suspensorio continetur, per membranam solam vertebriis junctum.

Pancreas, 5. aut 6. dig longum, è pluribus glandulis componebatur. Verum quoniam in partibus hisce nihil insolitum aut ab usitata earundem in aliis Animalibus structura & conformatione abluens occurrebat, ad organa generationis transibimus, in quibus aliquid singulare & notatu dignum sese offeret.

Testes duos digitos longi, superiori extremo quàm inferiori ampliore, circa mediam partem digitum lati, seroto excepti, colore albo, structurâ arcta & compacta, ut vasa eos componentia minùs clarè & distinctè apparent quàm in *Apro* vulgari. Nihilominus quin eorum compages tota vascularis sit minime dubiam est: Quamvis arctius texta & coacta. *Vaudius Dathyrus Bonglarus* vascularem hanc testium structuram decimo ante annos detexit quàm *Regnerus de*

Mang. Bibl. Pharm. Tom. I. I.

Graef, librum suum *De organis virorum* generationi intercurrentibus edidit, eorumque laudabiles iconismos exhibuit. Verum posterior hic plenius & distinctius iis egit. Eorum usus proculdubio est ad semen præparandum, quod exinde per *Vasa deferentia* ad *Vesiculas seminales* derivatur. *Deferentia* autem prope imam testium partem exoriuntur, & ita inferuntur, ut sese propemodum æqualiter possint exonerare, vel in *vesiculas seminales* vel in *Urethram*, in utrum enim non bene memini, ut neque an ullæ *epididymides* testibus incumbere.

Vesiculae seminales sesquidigitum longæ erant, aliquibus in locis $\frac{1}{4}$ dig aliis $\frac{1}{2}$ latæ. Quamvis vesiculæ dicantur, in hoc tamen Animali magis glandulosæ videbantur quàm membranæ, neque interna cavitas magnitudine conspicua erat. Communia iis cum vasis *Deferentibus* orificia interiùs in *Urethra* protuberantiam efficiebant, quàm *Graeffius* *Caput gallinaginis* vocat cui nomini imponendo in hominibus aliisque Animalibus ob similitudinem prætextus prior est. In iis etiam hic loci situm est glandulosum illud corpus, quod *Prostata* vocant, verum in hoc cum vesiculæ adè glandulosæ sint, Prostatarum fortasse officium præstare possint, ni potius earum usum, glandulis duabus ad utrumque *Urethrae* latus sitis, & duobus orificiis propè radicem penis in eam se exonerantibus attributere velimus. Glandulae hæ cylindricæ erant, ochroleucæ, sesquicentiam longæ, diametro, substantia compacta testium instar, nulla intrus cavitate donatæ, exterius in longum secundum ureterem sitæ, à musculis Penis erectilibus ad glandulas vesiculas superius descriptas extensæ.

Joann. Van Horn semen triplici materiâ constare credit, hanc *Testes*, illam *Vesiculas seminales*, tertiam *Prostata* conferre. Huic sententiæ strenuè se opponit *Graeffius*, nec aliam admittit quàm à *Testibus* præparatam, quæ in *Vesiculas seminales* transmittitur, in iis minime generatur. Verum in *Tajacu* nostro, & in aliis etiam nonnullis Animalibus, glandulosæ eam sicut hæ vesiculæ, succum aliquem necessariò secernunt, quem ad generationem utilem esse, si non necessarium, verisimillimum est. Et revera in Porcino genere has partes valde notabiles esse observavi. In *Apro* *Vesiculae seminales* duum sunt generum, aliæ membranosæ, aliæ glandulosæ. In Echino terrestri *Vesicularum seminalium* tria habentur paria, duo in cavitate Abdominis, tertium inter musculos ventris & cutem. In Echino etiam femina, in interiore parte Vaginæ uterî, infra urethrae orificium glandulosum corpus invenio, quod pro magnitudine sua cavitatem intrus hebet satis amplam, & officium manifestum, se in urethram exonerat: de quo plura, cum Anatomem istius Animalis exhibuerò. In præsentiarum de partibus hisce ulterius non disseram, duntaxat adnotabo, Penem *Tajacu* corpus longum tenue fuisse, è musculis variis compositum, quorum duo prælongi erant.

Vesica urinaria rotundior in hoc quàm in aliis nonnullis Animalibus, in quibus plerumque oblongior est. Ureteres ad vesicæ collum inferebantur, non ad ejus latera, ut in aliquibus. *Reines* quales fuerint non recordor, verum nihil singulare & insolitum ostendisse credo, cum in schedis nostris de iis nihil adnotatum inveniam. Ad Thoracem ergo propero, in quo non multa observatu digna occurrebant, præter Arteriæ aortæ trunci descendens structuram; quam præmissis priùs quæ *Falcoburgius* de partibus hisce habet, describam. Cor (inquit ille) à *Diaphragmate* distans palmam transversam unam. Pulmones in septem lobos distributi, quorum in utroque latere tres siti, septimus verò circa cordis mucronem positus, tanquam utrique communis.

Ecc

Verum

Verum quod ut novum & insolitum nos præcipue perculit, in admirationem rapuit, & ab aliis partibus, quæ nihil non vulgare & aliis Animalibus commune habebant, contemplandis avocavit, erat ea quam diximus inusitata & anomala *Aortæ* conformatio: Ejus enim in aliis omnibus Animalibus truncus secundum spinam descendens aquæ propemodum magnitudinis est, deorsum duntaxat nonnihil angustatus; at in hoc Animali inter cor & locum ubi in ramos iliacos divaricatur, duas amplas extuberantias invenimus, quarum maxima erat cordi proxima, quæ post brevem coarctationem in secundam se exoneravit, quæ quamvis priore paulò minor multo tamen major erat tertia, propè divaricationem *Aortæ* in ramos iliacos sita. Ex hisce protuberantiis seu extumescentiis duas aperui, & varias intus velut cellulas inveni: membrana tamen hic loci [quantum observare potui] non minùs crassæ erant, quàm ubi Arteria minimè extendebatur. Hujusmodi Arteriarum extensiones Galeno aliisque omnibus medicinae Autoribus *Aneurysmata* appellantur, quemadmodum venarum, *Varices*, & accidere creduntur, cum interior Arteriæ tunica disrupta, exteriori ut extendatur locum cedit; quod plerumque contingit, cum pro vena arteria caditur aut pertunditur in phlebotomia. Verum in apro nostro quænam ejus causa fuerit difficile est determinare. Cum enim hic solus sit quem hujus generis unquam dissecui, an præternaturalis fuerit, an in aliis congeneribus occurrat me nescire fateor. Si præternaturalis, in Arteria omnium totius corporis crassissima & robustissima & in penetralibus corporis abdita, ut injuriis externis non sit obnoxia, accidisse mirum. Sin *naturalis*, nihil novi cui aptius respondeat, quàm tumoribus illis protuberantibus in *Aortis* Bombycum, aliorumque consimilium Insectorum, quos *D. Malpighius* pro toridem cordibus habet. Quod utique concedendum est, ni eas ullum omnino Cor habere denegare velimus. Quidni autem negemus? In Hirudine enim Arteriæ duæ amplæ habentur absque ullis hujusmodi protuberantiis, ut hoc genus Animalcula vel duo habere corda fatendum sit, vel nullum: nec enim ullam præterea partem in iis hæcenus observare potui, cui nomen illud tribui queat, quamvis neque his propriè.

Quod ad reliquas partes attinet, de iis nihil ferè nobis dicendum suppetit: inopiâ temporis cerebrum inspicere & examinare non vacabat. Apertura oculi ut in Porcino genere parva; pupilla rotunda: Membrana nictitans manifestior quàm in aliis ferè Quadrupedibus; non temere nec præter rationem, sed ut melius scilicet detergat sordes quaslibet ex crebra in cœnâ volutatione oculis adspersas & adhærentes. Nervus Opticus in Axe propemodum oculi constitutus, non ad latus interius, ut in aliis plerumque sit, vallecule illic depressa ceu excavata. Choroidis tunicæ color pallidè violaceus aut fuscus: Musculi minùs distincti, quàm in aliis nonnullis Brutis; hinc oculorum motus non adeò celer & expeditus, minùsque regularis & ordinatus quàm in illis.

Superest jam ut de parte illa agam, quæ huic Animali peculiaris censetur & maximè propria, nec cuiquam præterea alii [quod sciam] communis, quæque omnibus qui de exotico hoc *Apro* scripserunt, non sine maxima admiratione commemoratur: nimirum glanduloso illo corpore dorso innascente. Hoc ni ab aliis notitiam ejus habuissem, cum res sit adeò insolita, & insperata, ego proculdubio inobservatum præterissem: imò fortasse, si unicum tantum Autorem habuissem, [Umbilicum *Tajacu* in dorso situm esse] id neglexissem; verum unanimi consensu id affirmantes animadvertens, quamvis forte in conjecturis suis de ejus usu falsi fuerint, dari tamen nonnihil quod errori ausam præbue-

rit, minimè dubium existimavi: cumque id tandem invenirem & diligenter observaverim, primò descriptionem ejus prout oculis nostris se obrulit exhibebo; dein de aliorum opiniones & conjecturas, quid sit, quemque usum habeat, tradam; tandem & sententiam meam de ejus natura & usu adjiciam.

In descriptione hujus Partis ad figuras quas ejus delineandas curavi, sæpius respicio & Lectorem refero. Cum enim adeò accuratè & ad vivum expressæ sunt, formam ejus ex earum intuitu facilius imaginari & animo concipere possumus, quàm ex delineatione verbali quantumvis elaborata. In figura 1. *Tabul. 1.* locum designat ubi *umbilicum* quem vocant situm est, nimirum in ipso dorsi acumine supra pedes posteriores non longè à caudæ loco. Setis oblongæ ibidem nascentibus adeò obvelatur, ut nisi distantiis illis aut manu amoris discerni nequeat. Quo facto spatium invenies propemodum nudum, paucioribus duntaxat, brevioribus & rarioribus pilis oblectum: in cujus medullio orificium glandulæ protuberat, per quod liquorem intus secretum excernit & evacuat. Orificium hoc s. foramen quod *Tabul. 1. Figur. 1.* magnitudine sua & figura naturali præsentat, labiis erat aliquantulum reflexis, & supra cutis superficiem elatis. Stylum majusculum faciliè admittebat, quem in varias glandis partes circumvertendo adigere potui. Levi compressione digitis facta apparuit liquoris pallidi seu ochroleuci, partim etiam obscurioris, tantillum, jucundo admodum & grato odore, mihimet aliisque aliquamulæ olfactibus moschi aut Ziberthi simili. Glans ipsa intus cutem & membrana carnosa partem sita erat, medietatem enim pars superficiei illius quæ dorsum respicit nuda erat, nec musculo illo recta, marginibus duntaxat eisdem inclusis; adeò ut detracta pelle glans unà detractatur, nec facile possit evadere, quin pellem plerumque sequatur. Nihilominus Panniculus fortasse carnosus viscusculosa ad succum exprimendum glandulæ superius ferat, quemadmodum sphincter musculus folliculis illis odoriferis, quæ ad intestini recti exitum in aliis animalibus collocantur. Glandulæ dimensæ justam magnitudinem exhibet *Tabul. 1. Fig. 4.* Erat ea è conglomeratis dictis, è pluribus scilicet minutis glandulis composita. Nul- lam intus cystim seu cavitatem notabilem habuit, verum Pancreatis aut glandularum salivalium ad instar, ductus plurimos secretorios, in unum tandem truncum seu alveum concurrentes, & per orificium commune *Figur. 3. Tabul. 1.* expressum, succum seu humorem secretum evacuant.

Orificium hoc ob aliqualem cum umbilico similitudinem pleisque omnibus, qui illud superficiei tenus duntaxat lustrarunt absque ulteriore examine, impetuit, ut Umbilicum verum & genuinum esse crederent: quippe à sententia illa deflectabant, nihil feliciores erant in conjecturis quas de eo faciebant non minùs absurdas & ἀλλοτρίους. Has vel rectè se, quod secundo in loco me facturum promissi, et refutasse; Recito autem ob hanc solam rationem ut ostendam, Historiâ Animalium naturali hæcenus traditâ nos minimè contentos esse debere: non quod eos qui tantum præstiterunt, laudem nullam meruisse censcam, quin potius plurimum eis deberi agnosco; sed quod nobis propudiosum foret, si majorum inventis adjuti, totque & tanti præ illis adminiculis gaudentes, nihil promoveremus, nec eorum observata excoleremus, illustraremus & ad majora, certioraque investiganda gradum faceremus.

F. Gregorius, qui ob diuturnam in regionibus *Americanis* peregrinationem & moram, egregiam opportunitatem habuit veritate meruendi, & sibi met hac de re satisfaciendi, nihil tamen novi adfert, verum vulgi opinio-

ni acquiescit, *Umbilicus*, inquit, *exit per spinam circa clunes*. Hieron. Benzonus Hispanos in portu quodam Panama ab indigenis donatos fuisse refert pane, piscibus, fructibus, & suilla carne; *Aprum autem isti Indici seu agrestes suos umbilicum in dorso gerunt*: inque Annotationibus ad hoc Caput, de Porcis sylvestribus Novæ Hispaniæ idem affirmatur, Gomara etiam de Brasiliensis eadem habet. Ovidius de iis quoque quæ in Continente seu Terra firma inveniuntur scribit, quod *Umbilicum in medio dorso gerant*: nec dissentit Iosephus à Costa, Saynos, inquit, *Animalia sunt Apriformia umbilicum in dorso gerentes*. Ex his aliisque omnium quos unquam convenire potuit Joan. Faber Naturalis Indiarum Occidentalium historiarum Autorum testimoniis firmiter concludit proque certa & indubia veritate habet; Sayno esse *Aprum cui Umbilicus non in ventre sed in dorso prominet*; quamvis enim in aliis nonnullis circumstantiis eorum testimonia discrepent, in hoc tamen omnia conveniunt, Umbilicum circa dorsi spinam existere.

In hoc autem nimis liberalis videtur Faber quod funiculum etiam umbilicalem oblongum (ita appellare liceat) ei largiatur. Nard. Anton. Recchi figurâ fortasse deceptus, in qua nonnihil valde prominens apparet; ad locum potius (ut opinor) ubi imaginarius hic umbilicus situs est designandum, quam ad figuram ejus naturalem representandam. In descriptione verba Fabri hæc sunt, *Sed quod maximopere admireris, ac præter naturam seriem conigisse dicere queas, nec ullis aliis in bestiis animadvertas est; quod Animal hoc prominentiam quandam in dorso sortitum fuerit, eminentem apprimè, & detruncati formâ intestini conspiciam: & hanc in dextra quidem sui parte, prope spinam dorsifitam, clunes scilicet versus, perpendiculariter Genitalis masculini potius quam Umbilici regionis, in ventre adesse paucis soliti respondentem*. In Scholiis ad hunc locum de insolito hoc Phænomeno disputando paginas aliquot infumit; nequicquam, cum in τῷ ὄντι seu materia facti ut vocant erraverit. Quocirca & nos illum ulterius non sequemur.

Proximo in loco Falcoburgii Medici Leydensis, qui (ut diximus) Aprum Americanum Brasiliæ allatum dissecur, opinio succedat: Ab Anatomico autem accuratius aliquid expectandum; Et hic quidem partem hanc umbilicum esse negat, mammam credit. In dorso externi medietate [referente Bartholino] sive super spinam dorso prope vertebrae lumbares, mamma est, cujus circumferentiam aureus ducatus metiebatur, quam porcellis lactandis destinatam esse ex glandulis substratis iudicabat; in eas enim vena varia eaque satis magna inferebantur. Papillarum in summe nullum usum credebatur, nulla enim glandula subijciuntur, nec vasa sanguifera comparent pro lacte generando sufficientia. Joannes tamen Lactius quamvis in Porco vivo quem per semestre domi aluit humidis cibis, ut nostros solemus, ex umbilico credito humorem aliquem lacti haud absimilem sæpius exire observavit, cum tamen diligenter inquireret ab illis qui in Brasilia dudum vixerant, an catulos suos illa parte aleret, responsum tulisse, se nunquam illud observare potuisse, quosdam etiam negasse ait, sed sugendas illis præbere papillas quas sub ventre habet.

Tertia opinio est Joan. L. rii & Theveti, qui spiraculum illam faciunt per quod Animal aërem haurit & reddit. Habet [inquit ille] à natura foramen in dorso, quemadmodum in capite Suem marinum habere dixi; quo spiritum emittit admittitque. Gulielmus Piso sententiâ hæc brevî censura perstrictâ, horum officiorum nullum huic parti convenire censet, verum in Francisci Hernandez sententiâ potius propendit, qui Anatome facta eam duntaxat glandulosam quandam & mollem pinguedinem esse nos certiores facit.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

Color, ut opinor, illum induxit ut pinguedinem diceret, nam revera substantia ejus tota prorsus glandulosa est. In illum [inquit Hernandez] se recipit humor quidam aqueus, qui digius expressus fuit. Mirum tamen nobis videtur quod quamvis animalia hæc viderit & dissecuerit, nullam odoris quem fundit mentionem faciat.

Superest jam ut [quod tertio in loco promisi] sententiam seu conjecturam meam de hac parte interponam. Existimo ergo glandulam hanc nulli aliorum Animalium parti aptius respondere quam folliculis illis odoriferis, quorum superius meminimus. Quamvis enim totum corpus perspirabile sit, & odorem undequaque difundat; peculiaris tamen ille fœtor, qui in omnibus gravè-olentibus Animalibus observatur, in unam maximè partem colligi perpetuò animadverti, particulis quibus inhæret, quæque eum producant, à massa sanguinea peculiaribus glandulis secretis, quæ illum vel foras è corpore illico ejiciunt, ut in nonnullis; vel in folliculos seu vesiculas transmittunt, ut ibidem aliquandiu reſervetur, ut in aliis multis Animalibus.

Folliculos hosce in Putorio Animali primùm observavi, ad Recti intestini extremum sitos utrinque unum, liquore crasso albicante repletos: cuius fœtor adeò vehemens erat, ut eum ferre nequiverim; at neque commodè in conclavi ubi cadaver situm erat manere antequam folliculos excidissem & amovissem: quo facto totum corpus reliquum, nullam nobis offensam aut molestiam creavit. Eosdem observavi in plurimis aliis Animalibus v. g. in Mustelini generis omnibus, in Felis vulgari, Leone, Vulpe, Canibus, &c. At neque Folliculi illi Felis zibethici seu Hyenæ odorifera, ab his diversi sunt; vel Animalis Musk-quash dicti, cujus meminit D. Joeselinus in historia rariorum Novæ Angliæ. Non enim Animalis istius testiculi sunt, ut Epistola illa Dublino missa, & in Actis Phil. Soc. N. 127. pag. 653. edita innuere videtur, cum etenim illud exanimavi tum pelles ipsius animalis, tum folliculos quos diximus odoriferos esse deprehendi. Sic Castoreum in Officinis nostris venale, non est Castoris testiculi, ut olim & vulgo creditum, sed ejusdem omnino cum folliculis prædictis naturæ & conditionis.

Nimis longus essem si de folliculis hisce fusiori testera dilatarem: sufficiat dixisse, in plerisque omnibus Animalium speciebus observari posse vel eosdem, vel aliquid iis analogum, quod peculiare singulis seu odores seu fœtores continet & communicat. Sic in Reptilibus, Angue scilicet coralophoro, Vipera, Angue vulgari nostrate seu Natrice torquata, observari duos oblongos folliculos in cauda sitos quæ prope marginem Intestini repleti liquorem suum fœtidum fundunt. Nectamen in omnibus Animalibus glandulæ hæc eundem hunc situm obtinent, verum in nonnullis diversum. In avibus [ut superius memini] ad uropygium glandulæ duæ occurrunt, quarum canales seu ductus secretorii, in summam ejus partem supra cutis superficiem eminent, liquorem fœtidum evacuant. Glandulæ hæc in Anseribus & Anatino genere, quæ aquas frequentant iisque innatant, amplissimas inveni; imò vel ad mensam appositam gustando Anatem, quàm gravis & ferini odoris avis sit quivis facillè potest percipere. In Gallopavone folliculus minùs glandulosus erat, verum ampliorem intus cavitatem habebat. In Struthione uropygio non adhærebat, sed aliquanto superius in dorso situs erat, [ubi duas efficit protuberantias sub cute a cystin inventi concreto flavescente succo repletam] eumque proximè locum occupabat quem glandula in Apro nostro Mexicano odorifera nobis dicta, ab odore quem gratissimum exspiravit, [pro ut mihi aliisque qui unà mecum illum olfaciebant videbatur] unde & animal ipsum Aprum Mexicanum moschiferum denominavi.

Ecc 2

Verum

Verum quamvis *Aper* noster *moschiferus* glandulam suam odoriferam, à plerisque omnibus pro umbilico hætenus perperam habitam, in dorso firmam obtinet. Animal tamen moschiferum à quocunque tandem genere, sive Caprino, sive Cervino sit, folliculum Moschi prægnantem in ventre prope umbilicum gerit, situ plane opposito seu contrario.

Expectet fortasse Lector ut alias adhuc rationes proferam cur huic omnes qui de eo commentati sunt, odorem quem reddit non suavem & jucundum esse prodiderunt, sed è contra foetidissimum & terribilissimum. Ut vel inde patet, quod si quod Animal ejusmodi macetur tam sollicitè cavendum monent, ne pars hæc in corpore relinquatur, quin protinus eam excindi præcipiunt, nè reliquam omnem carnem corrumpat. *Joann. Faber* se multum fatigat, in origine & causis foetoris hujus investigandis; & ut est facilis ab uno errore in alium lapsus, Glandulam hanc pro Umbilico habens, nunc eum ab urina procedere, cujus virulenta effluvia per urachum derivata hinc exitum inveniunt, sibi imaginatur: aliàs se nescire ait an intestinum aliquod hinc loci affixum odorem emitat. Verum eò præcipue inclinatur ut credat, eum ab *Urinaculo*, ut vocat, provenire. Sic urinam Felium ubicunque spargitur terribilissimum odorem efflare animadvertet, diutissime etiam perseverantem. Verum hæc diligenter advertendum, fieri posse ut cum urinam reddunt Feles, folliculos ad *Rectum* sitos unà evacuent, quorum humor urinae admixtus foetorem illum maxima ex parte ei communicet. Idem de muribus deque Vulpe, &c. dictum esto. Quinetiam facile inducor ut credam, quod folliculorum horum amotione potius quam excisione renum *Sargoy* Animal edule factum sit, quod antea eò usque foetebat; ut ab ejus esu Barbari etiam Indigenæ abhorrent, referente *Lerio*. Odor ergo *Tajacu* nostri non aliunde venit, sed hac in parte naturaliter separatur: quemadmodum & *Moschum* & *Zibethum* & *Castoreum*, *Vulpisque* & *Putorii* odores, in propriis suis glandulis & folliculis. Nec quicquam moveor, quod alii foetorem vocent quem nos odorem fragrantem; nec dubito quin eorum æque sagaces fuerint nares ac nostræ: cum noverim præstantissima odoramenta pessime interdum olere. *Zibethum*, imò *Moschum* ipsum dum adhuc recens est & noviter extractum, & in magna quantitate naribus admotum, sensui nostro ingratum admodum & odiosum odorem imprimere à multis observatum, tantum abest ut eum demulceat & titillet. Et quod plus est, ipsa etiam Ambra grisea initio graveolet ut *Gul. Piso* nos certiores facit. Quod equidem mirum, inquiens, cum omnis ante insolationem, molle tantum glutin sit Ambra, inratoque adeò odore nares feriens, ut ab inexpertis plane respiciatur. *Tajacu* ergo nostrum dum adhuc juvenis est, & exigua hujus liquoris quantitas à glandula isthac seceratur, remissum forte vel nullum emittat odorem. Sic Vulpes antequam adoleverint non multum foetent: sed postea cum succus ille copiose excernitur, abunde. Qui tum à copia sua, tum à consistencia tenuiore & fluidiore adeoque magis vaporabili effluvia emittere potest adeò copiosa mobilia & activa, ut sensuum organa iactibus vehementibus & crebris feriendo dolorem creent; cum particularum earundem, ac ratiorem, è corpore minore & concreto effluentium tardior appulsus voluptatem possit causare. Quemadmodum ignis ardentis jacula ferociora sensum dolore afficiunt cum repentinis solis blandiores radii eundem recreent & delecent.

Tajacu ergo noster quo tempore glandula hæc liquorem suum uberrime effundit proculdubio male olere credi potest; foetorem tamen illum paulatim miscere & in odorem gratissimum diuturnitate tem-

poris evadere posse, non minus est credibile. Sic liquor ille foetidus in folliculis Mustelinis contentus super chartam extensus & aliquandiu repositus odorem gratissimum præbuit. Quod ergo nos cum primum glandulam hanc dissecarem nullum omnino foetorem sensimus, quin potius è contra odorem suavem & jucundum, (si in regionibus ubi nascuntur hujusmodi Animalia aliter se res habet) inde fortassis evenit, quod Animal aliquot ante, dies mortuum esset quam ego hanc partem examinarem, quodque liquorem tum in crassatum inibi invenerim & in parva tantum quantitate. Quamvis dissimulandum non sit, mihi narratum esse, quod dum adhuc viveret in domo ubi alebatur à domesticis observatum fuerit, quocunque à vitæ gratum post se odorem reliquisset. Illud certe constat mortuum odorem fragrantem emisisset; ut à me aliisque observatum est. Atque hæc satis idonea & sufficiens ratio videtur cur hoc nominis ei imposuerim.

Superest jam ut Sceleton breviter describam, & finem faciam. Cranium integrum videbatur, absque futuris. A naso ad caput summum 8 digiti erant. Cranium hinc loci angustabatur, sequæ iterum velut triangulariter dilatatur, postica parte qua tergum respiciebat in cavum per amplum depressa; ubi musculi robusti inferebantur, & ligamentum à Dorso porrectum, quorum ope Caput dum Animal vivit adeò sustentum teneretur, ut collum vel nullum vel certe brevissimum habere videatur. Porus auditorius id singulare habebat, ut prope verticem collocaretur, prout in Sceleti icona, litera (b) representatur.

In superiore maxilla incisores erant quatuor: ultra rursus paulò dens exsertus, amplius, compressus, acutus, extrorsum vergens, & pone eum utrinque molares sex. In *Baby-roussa* quinque duntaxat sunt. Excepta a. Dentis exerti in maxilla inferiore magnitudine, & cornibus illis (ut vocat *D. Grey*) quæ superiori maxillæ exterius innascuntur, Offa capitis in hoc Animali & in illo omnia fere congruebant.

Maxilla inferior 6 digitos longa erat, lata ad primum Dentem duplicem seu molarem, quorum sex erant utrinque. Os hoc in loco à molaribus ad incisores spongiosum & carie excisum videbatur, dentesque exerti corrupti & deperditi, ut & incisorum unus vel alter, qui numero quatuor erant.

Colli vertebrae septem, earumque longitudo simul sumptarum 4. digit. Prima sive *Atlas* duos habuit processus transversos latos, spinatum nullum: Secunda spinam latam amplam: Tertia, quarta, & quinta spinis carebant: Sexta, & septima amplas & acutas obtinebant. Dorsi vertebrae 19. erant, quarum tres anteriores spinas tres digitos longas habebant, exinde gradatim diminuebantur spinæ ad caudam usque. Prima ossis coccygis vertebra duos circiter digitos in longum extendebatur quam primitus in plures divisam fuisse existimavi, quamvis nunc unum & simplex os esset: sex circiter præterea vertebrae erant, quæ non ultra ossis ischii extremitatem procurrebant.

Costæ utrinque 15 erant. Os sterni ultra commissuram primarum costarum ad digiti fere spatium procurrebat.

Scapulæ 5 unc. longæ. Os femoris in pede anteriori 5. dig. longitudine æquabat: Os tibiae in eodem æque circiter longitudinis; verum ab articulatione cum ossis femoris ad os metatarsi quatuor duntaxat digiti erant. Nam ab articulatione prædicta ulterius procurrebat, ut in Fig. apparet. Ossa Tarsi 5. Metatarsi tria, duos circiter digitos longa. Digitorum ossa 9. unicuique enim digito tria inerant, & unicuique pedi tres digiti.

Os femoris in pede posteriore 6 propemodum digitos longitudine æquabat, & prope juncturam cum

osse tibiæ os parvum habebat patellæ in genu humano simile. Cruribus singulis duo inerant ossa, *Focile majus & minus*, 2 digitos long. In pede anteriore unicum tantum huic parti os datum est, contra quàm in *Cane, Cercopitheco*, aliisque nonnullis animalibus, in quibus & hæc pariter duplici osse donatur. Os calcis duos prope digitos longum erat, quatuor autem præterea alia talia ossa inerant.

Metatarsus sive *Pes* 4 ossibus componebatur, è quibus interiora duo reliquis longè majora, ut quæ ad 2 digit. extendebantur. Digiti quatuor erant, & in singulis ossicula tria, quorum extremum ungue rectum.

Quod ad locum *Tajacu* attinet, *Hieronymus Benzoni* in *Panama*, inquit *Nova Hispania* cum inveniri tradit: *Gomara* etiam in *Nicaragua*: *Oviedus* in *Terra firma*. *Lerius & Marcgravius* in *Brasilia*. *Gregatim* incedunt; inque montique & sylvis versantur. Porcorum more radicibus, glandibus & fructibus vescuntur: & si *Fr. Gregorio de Bolivar* apud *Joan. Fabricum* notis ad *Animalia Nova Hispania Nardi Anton. Recchi* fides, majore quâ possunt sollicitudine cuiuscunque generis serpentes & bufones venenosos indagant. Atque ubi horum Animal aliquod repertum, prioribus illud pedibus apprehendunt capiti morsum densibus inferunt, & unguibus pellem serpentis aut viperæ, quàm dexterrimè à capite ad caudam usque dilaniando excoriant, cutem detrahunt, carnemque avidè vorant. Postea radicem aut certè arboris corticem sibi notum querunt, quem comedunt nè veneno inficiantur. Penes autorem fides esto: mihi sanè suspectæ sunt hujusmodi narrationes.

Nec facilè fidem apud me inveniunt quæ de prodeberantia in dorso *umbilico* dicto habent tum alii tum etiam *Jos. Costa*; nimirum quod per ipsum graveolens quidam halitus transpiret: unde si quod Animal ejusmodi mactatur, necesse est prorsus ut confectum ipsi umbilicus excindatur; quod nisi mediæ horæ spatio fieret, elui haud amplius aptum Animal foret; tam tetet enim inde fœtor efflatur, qui vix sufferri potest & reliquam carnis massam omnem inficit. Nam *D. Tyson* (ut vidimus) liquorem ex umbilico hoc digitis compresso effluentem, etiam recentem, gratum *Molchi* aut *Zibethi* odorem exhalare expertus est: *RAIUS in Synopsi Historia Quadrupedum*.

Officini. Nat. ex Porco.

1. Fel. 2. Pulmo. 3. Pinguedo. 4. Ossa. 5. Talus. 6. Stercus. 7. Vesica.

Vires.

1. Fel suillum contra aurium ulcera, reliquaque omnia magno successu adhiberi scribit *Diosc. pilor.* proventum impedit, (cum lardo suillo ana ac 1/2 parte + acerrimi & Ol. Amygd. ana digestum & illitum) [exiccatum ad suppositoria usurpatur.]

2. Pulmo mirifice prodest impositus attritui à calcementis contracto.

[Hepar & testiculi porcelli pro arcano venereo habentur.]

3. Pinguedo (*Adeps absolute dictus*) calefacit minus; ideoque in unguenta refrigerantia infertur, inveteratos dolores lumborum & articularum sedat, inuncta cum cinere straminis fabacei aut calce.

Lardum coctum & circumligatum ossium fracturas feliciter conglutinat.

N. 1. Pinguedo quæ sive veteri fuerit, vel quæ sale condita, calidior ac efficacior est illâ quæ tum è porcellis desumpta, tum insulsa fuerit. Sic & vetus axungia acrior est recenti.

N. 2. Sum qui solâ axungia verris, vice Sympathetici argenti utuntur.

4. Ossa, ajunt ossa de collo suspensa quartanâ laborantibus esse auxilio, fides. sit penes expertum.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

5. Tali os (*Astragalus*) commendatur ad fracturas ossium; ut & ad colli capitisque dolores (ustum & exhibitum, [item ad dysenteriam & quamvis hæmorrhagiam.]

6. Stercus (*Juccerda*) emollit, discutit, hinc prodest in prurigine, exanthematibus, clavis pedum, aliisque tuberculis duris, (calidè impositum) Ictibus medetur animalium venenatorum (cum + coctum) Hæmorrhagiam narium sistit, (in Tritum & illitum) [sufficit etiam odor.]

(Vulvæ in hæmorrhagia uteri calidè adhuc, linteo inclusum, appositum expertum est remedium.)

7. Vesica juvat eos, qui inviti lotium reddunt, coctâ vel usta & exhibita] Eadem præstat pubi imposita. Urinam ciere fertur. *Plin.*

[Lapis porcinus sive *Hystrius Malacensis* malignitati resistere, & lapide Bezoar porior censetur, ab apoplexia & epilepsia præservare, materiam calculi dissolvere, & arthritidem curare. Imponitur aquæ, cerevisiæ & vino per horam. hinc bibitur. Ad choleram ex vino datur. Secundinas pellit, ad menses movendos manû gestatur. Prægnantibus non exhibendus, quia abortum facit.]

Præparata.

1. Unguenta ex pinguedine sunt varia.

E. gr.

Rosatum, pomatum, quæ suis locis attingimus.

2. ∇ ad Atrophiam.

Fit è sanguine & fibris repurgato atque cum herbis bechicis refrigerantibus & humectantibus in MB destillato. *Schroderus*.

In usum veniunt Fel, pulmo, pinguedo, ossa, sanguis, talus, stercus, vesica, uterus, Lapis.

N. Suilli seu porcelli sanguinem tanquàm egregium Medicamentum contra phthisin commendant; sed vel spiritus ejus vivificus & virtus nativa specificâ per destillationem statim ab initio ex recenti & adhuc calente sanguine per MB factam colligendus, aut in liquorem & Sal volatile transferendus est, alias per se nihil præstabit.

Pinguedo. Ex potcello etiam pinguedo antiphthisica sequi modo; Rec. porcellam satis pinguem quem mactatum à fetis purga & exentera, pinguedine ab intestinis & visceribus studiosè detracta, ut iterum cum, aliis sequentibus speciebus mixta ventri porcelli eviscerato injici possit. Huic ventri jam intestinis abjectis immitte Cor, hepar & pulmones ejus cum adipe ab intestinis antea separata, item radic. lymph. maj. rec. q. v. herb. scabios. tussil. heder. terr. chærefol. ana cancror. fluviatil. contus. q. s. His omnibus minutissimè incisis & ventri porcelli immixtis, consuatur venter arctissimè, postea in vent. moderato assetur, superposita pro pinguedine excipiendâ sarragine; tandiu donec omnis humiditas & pinguedo exstillarit, quam pinguedinem ab humiditate separa, serva pro usu ad fercula condienda phthysi laborantibus. Sumant hujus pinguedinis agri singulo mane cochl. j. in jusculo

N. Loco porcelli etiam caniculus saginatus sumi potest.

N. Uterus suillus coctus & comestus cum brassicâ capitatâ muria conditâ juvat eos, qui urinam continere nequeunt.

Lapis porcin. Hic valde pretiosus est, singuli veniunt centum, imò ducentorum interdum imperialium, & ultra, ratione magnitudinis. Reperiuntur in vesiculâ fellis aut etiam ventriculi oblongas & acutissimas pinas habentium, & eorum solum altissima scandentium & herbam singularem depascentium. Hunc *Lusitani Piedra de Puerco* vocant. Mollis ac pinguis est

Ecc 3

attra-

artactu, ac si saponem Hispanicum tractares. Exscinditur ex Apro & histrice.

Vires. Calidum Nativum conservat, viscera roborat, humores crudos in toto corpore consumit, nimiam inde pinguedinem prohibet, ab apoplexiâ & epilepsiâ præservat, materiam calculi sine dolore dissolvit, arthritidem curat. Infunditur etiam in vino adversus chole-ram. Prægnantibus tamen hic Lapis non benè datur, nam abortum provocare certum est, ut fœminæ Malicæ, si quando menstrua earum purgatio non benè procedat, dicant, si saltem hunc Lapidem manu gestent, juvenum se inde sentire. Diaphoreticum etiam Medicamentum est, & datur in omnibus Morbis acutis. Hic Lapis scilicet injicitur aquæ vino, cerevisiæ &c. per horulæ spatium & sic infusus liquor bibitur, qui quo amarior, eò etiam potentior erit. *vid. Jacobus Bontius l. cap. in not. ad Garc. ab Ori. Cap. 46. Fragos. Medic. Indor. Cap. X. Tulpus Libr. IV. observ. 51.*

N Pulvis ex hepate & testiculis Porcelli pro arcano habetur in venere stimulandâ HOFMANNUS.

P O R R U M.

Porrum Latinis dictum volunt nonnulli quod porro eat & longè latèque grasseretur. Sed est (inquit Vossius) à πορρον facta secundæ tertixque literæ trajectione & quartæ mutatione in p, quomodo à τῦρος est turris, à νέαν celer.

Porri *Nota* sunt radix angusta, florum Corymbi magni seu flosculi plurimi in Capitulum sphericum grande globati.

Porrum Sectile in nostra graveolentium divisione ad aliud genus pertinet: foliis enim fistulosis cum Cepa convenit.

Vires. Porrum ut gustu sic vitibus cum allio & Cepa convenit, attenuat, aperit, incidit, resolvit. Usus præcipue in serpentum moribus & unctionibus, mucilagine pulmonum. Extrinsecus in aurium tinnitu & suppurationibus: in hæmorrhoidum tumore, &c.

Ad dolorem pleuriticorum. ℞. ex albedine porri minutim iucifi q. s. frige parum in sartagine, & applica supra partem dolentem, multos juvisse testis sum, inquit Chesneau D. Husle.

Ad Polypum, ℞. succi porri non sectilis q. s. cum pauco tartari & Cera viridis. F. ung. de quo aliquid sæpius in nasum intromittatur. Alexis Pedemont.

Prænotius porrum confixum undique radiculis hel- lebōri nigri coctum aliquoties jejunè mensibus instantibus escitatum in eorundem difficultate commendat D. Soame è Dolæo.

N. Frequens porri usus somnos turbulentos inducit, visuique officit.

Nonnulli ad vocis claritatem & splendorem inducendum porri esum commendant. Vitari tamen debet (inquit Jo. Bauhinus) assiduus aut multus ejus usus, quia visus obscuritatem efficit, stomacho adversatur, multaque alia incommoda facit: eapropter non nisi robustis admodum, decoctumque cum melle, vel in pitana erit exhibendum. RAUUS.

P O R T U L A C A.

Portulaca Græcis Α'υδρῆχυν & Α'δρῆχυν Turnebus portulacam etiam portulatam dicendam existimavit, quod foliis portulacas imitetur; sed exempla antiquorum voluminum desunt. Aliorum sententia est, portulacam appellatam esse quasi porculacam nomine à porcis imposito, idque quod à Gallis porcelia, vel porcelina vocetur, (unde & Anglicum Purslane) Apuleius etiam porcastrum appellatam scribit: & Græcis junioribus πορτσάρον (quod portulacam sonat) vocatur. Exemplum vide apud Joan. Bod. à Stapel.

Portulacæ notæ Characteristicæ sunt vasculum simplex, seu non divisum in loculamenta, quod per maturitatem horizontaliter rumpitur, flos flavus. Calyce bivalvi inclusus folia crassa, succulenta, lævia, extremis subrotunda.

Vires & Usus. In ardore & dolore stomachi portulaca ejusque succus & Syrupus aut ipsa Planta recens comesta experta est.

In acetariis frequens usus est portulacæ: stomachi ardorem lenit, & bilis fervorem compescit, & hinc in febribus putridis ac malignis, ardore urinæ & scorbuto prodest: venerem inhibet, venereaque infornia. Dentium stuporem recens commanducata tollit, & mobiles dentes stabilis, verminantibus pueris cum successu exhibetur. Verum ejus esus nimis cavendus est, quoniam ob frigiditatem suam & humiditatem in ventriculo putrescere apta est, ejusque & reliquorum viscerum tonum dissolvere, ut in nobismetipsis non semel experti sumus.

Solet apud nos cum sale, aceto & aromatis condit ad intinctus, eodem modo quo cappares, genitæ flores, lingua avis, Crithmum, &c. condiantur, quomodo parata ventriculo magis grata & amica est quam cruda. RAUUS.

P O T A M O G E T U M.

Potamogeton quasi fluminibus vicina, quod in aquis & palustribus nascatur: floribus est spicatis, quadrifoliis seminibus etiam quaternis nudis simul junctis, foliis simplicibus, integris in ramulis singulatim posit, nisi ubi spicæ exeunt ubi bina adversa. Omnes ejus species aquis innatant, nec extra aquas durant. RAUUS.

Hæc planta refrigerat & humores condensat, adstringens est ac dysenterix conducit intus in decocto sumta. Adhibetur itidem extus in herpetibus & curis pruriginis.

P O T E N T I L L A.

Argentina ab argenteo foliorum splendore dicta est, Germani, genferich, id est *anserinam*, appellant, quod hæc anseres in cibo delectantur. Quo nomine Græci & Latini hanc herbam appellant à nullo proditum est. Recentiores quidam *potentillam* ab eximii viribus quibus pollet, vocant, nonnulli agrimoniam sylvestrem ob formæ affinitatem, Trag.

Nomina. Argentina Ger. potentilla Park. C. B. Potentilla seu Argentina J. B.

A foliorum molli & argentea lanugine nomen accipit hæc planta. Radicem habet nunc simplicem, cortice nigricante rectam, nunc fibrosam gustu adstringentem, unde plurima emergunt folia, in terram resupina, agrimonix foliis similia, majoribus hinc inde pinnulis, obtusis, circa margines profunde dentatis, cum pluribus minusculis intermediis constantia. Flagella undique spargit, quibus insigniter se propagat, fragariæ instar. Ex alis foliorum quæ appendicibus suis flagella amplectuntur, exeunt flores, singulares, pediculis longis hirsutis foliis flavi, quinque foliis subrotundis non crenatis compositi, cum plurimis in medio staminulis & apicibus concoloribus, è calyce hirsuto, quinque segmentis acutis (quæ conniventia florem antequam aperiatur, & semine iterum flore dilapso occultant) composito. Hæc autem folia alia quinque circumstant, nonnunquam segmentata.

Frequens est circa semitas & loca aquosa: amat enim loca uliginosa & ubi per hyemem aquæ stagnant.

Vires. Ut genere sic viribus cum fragaria, pentaphyl-
lo, tot.

Io, tormentilla, convenit: quas summatim recenset Schroderus his verbis.

Refrigerat moderate, astringit fortius, siccatur, constipat, hinc Sanguinis expulsiōni medetur, diarrhæam & reliquos tum alvi, tum uteri fluxus compefcit: hæmoptoicis & hæmorrhoidis subvenit: renum calculum insigniter atterit: vulneribus insuper & ulceribus admodum conducit; externa famosa est in doloribus dentium mitigandis, putredine gingivarum arcenda, æstu febrili sopiendo quem potenter compefcit, cum sale & aceto contusa plantis pedum supponatur, vel carpis applicetur.

Aquum hujus stillatitiam ad lentigines, panos & maculas, fuscumque colorem sole contractum delendum Angliæ mulierculæ adhibent.

Hujus radices, in agro Eboracensi circa Settle oppidum hyberno tempore effossas pueri elisant, sunt enim sapore suavi, nec minus grato quam pastinaca, ut à pharmacopæo quodam fide digno, ibidem degente certior factus sum, postea observavi etiam porcos radices hæc rostro effossas libenter vorare.

Experimento egregio didicit Io. Agricola potentillæ succum unâ cum pulvere Colchici vulgaris mariscis ani mederi. J. B.

Castor Durantes jubet ut dysentericorum indatur calceis: atque hac arte non solum dysenteriam, sed omne genus p. n. fluxiones infimi ventris, ut nimios menses, imò narium hæmorrhagiam dubio procul sistere valebit. S. Paulus. Hartmannus eundem hoc modo usurpatam valuisse ad dysenteriam affirmabat, postquam medicorum opera nil il profuisset.

Hanc etiam pro Arcano celebrat Petr. Borellius cent. I. observ. 12.

Diuretica aliquando cum fructu in febribus exhibentur, inter quæ anserinâ specificè prodest, sic etiam & sal Anserinæ, quod mihi pro specifico est. D. Soame è Dolæi L. 3. C. S. 14. *Rajus*.

POTERIUM LOBELII.

Caulibus cubitalibus densè fruticat, multis in terram procumbentibus ramis: plerique verò omnes stolones statim ex radice rubente saporis sicci & nonnihil amaricantis oriuntur, cortice recti exteriori incano, tenero, cui alius subsit rubens, folia tenella, longiusculis in pediculis ordine ex adverso posita, superna utrimque virentia, inferna cinerea, nostræ pimpinellæ sanguisorbæ similia, flores primo vere conspiciuntur, herbacei coloris, stellati, parvi quibus succedunt baccae exiguæ, albicantes cum pauxillo rubore, ordinè quodam ad ramos sessiles, Ribes nostri baccis haud abssimiles, conspicuo adhuc in uniuscuiusque baccae umbilico flore. Rauvvolcii descriptio est à I. Bauhino latina facta.

Planta hæc in Creta perpetuo viret & multos annos durat, adstringendi vi pollet, vulgariterque in tota Græcia *Στολὴδα* appellatur, in declivi montis Libani parte nasci vidit Rauvvolcius: sub finem æstatis florere; autumno semeni maturefcit, cum folia primū erumpunt, quæ tum in se contracta, videntur, & Asplenii folia quodammodo imitantur, sed longè minora sunt, quæ successū temporis majora apparent, reliquam descriptionem Hon. Belli vide apud ipsum, Ep. 2. ad Clusium, qui plantam hanc legitimam Dioscoridis Sioben esse contendit: argumenta quibus id probare nititur videbis loco citato.

Vires. In sanandis alvi floribus indistinctæ à rusticis Cretensisibus usurpatur: nam ejus in aqua decocto jejuni bibunt, & è morbo ut ajunt liberantur. Bellus. *Rajus*.

POTIO.

Inter classici remediorum formulas non infimum

tenent locum POTIONES. Licet enim sub latitudine suâ omnia liquidorum genera magis diffusa & potulenta contineant, unde & decocta & infusa potiones sunt, neque generali notione vel fine differunt: nihilominus tamen peculiarem ab iisdem quoque classem rectè constituunt, ut mox dicemus.

Nomen à *potu* obtinent, potus quippe hic est medicus, poculo oblato ad sanitatem utili. Et definiri potest, quod sit.

POTIO medicamentum liquidum diffusum, vel ex decoctis cum aliis mixtis, vel potius ex mixturâ aquarum cum appropriatis constans, pro alterandi vel purgandi scopo.

Videtur cum decocto & infuso secundum quid coincidere; attamen, si fateamur, quod res est, & decocta & infusa, sicubi propriè dictarum potionum titulum expetunt, hoc loco quasi ministras magis se gerunt & secundarias, quippe quæ alia adfiscunt in consortiū. Potiones ipsæ ex mixturâ tali liquidorum cum aliis constant.

Quia ut respectu dictorum generale est potionum vocabulum, ita & cetera speciem sub se comprehendit JULAPIA, utpote potionem specialem & sui generis, licet non rarò quoque confundi legantur, & pro synonymis planè haberi; quæ solo nomine, vel ne hoc quidem, nisi ex arbitrio medici, differunt; si tamen requisita julapii, quæ omnium consensu adesse debent, respiciamus, de magis gratis, ut sub formali addemus, prædicantur.

Inventum julapia, quæ & *julabia* & *julepi* audiunt, sunt Arabum, unde recentiores Græci, Actuarius, Sethi & alii id mutuati in linguam suam detorserunt, vocant verò *ζαλαπίον* & *ιολαβιον*, quasi *violarum infusum*, vid. *Bauhin. de C. M. p.* 100. Verum autem etymon & nomen è Persico Arabicum est q. d. *aquam rosarum*, à *rosa* & *aqua*, notat ergo nihil aliud, quam aquam sirupiatam, saccharatam, seu cum sirupo mixtam; ex quo facillè patet, etiam hoc sensu nomen istud latius patere; & omnibus quasi potionum speciebus tribui posse.

Quod itaq; MATERIAM EX QUâ potionum concernit, parantur eadem 1. vel ex decoctionibus, ita tamen, ut liquidum hocce baseos corporalis & dirigentis vice fungatur, (id quod & suo sensu de alterâ classe sequente valer,) nec sibi reliquatur, sed accessu appropriatorum vel purgantium vel alterantium modificetur, unde etiam hic decocta magis diffusa, extemporanea, & minoris apparatus in centum veniunt, seu decocta pro potione parandâ, intentione magis secundariâ, quam primariâ præscribuntur, in subsidium quasi adhibita, v. g. decoctum hordæi cum scorzonera & cornu cervi, decocta aperitiva, decocta florum & fructuum, &c. cum aliis pro scopo vario maritanda.

2. Vel liquorem & corpus huic composito fornent aquæ destillata, quæ & ipsæ quasi suo modo jam coctæ, vel potius per coctionem evaporatæ seu sublimatæ sunt. Et hæc proptie potionem nomine ac *κατ' ἐξοχήν* veniunt; quam in rem exstant seligenda tum calida, in affectibus frigidis, pro restauratione virium, refectione cordis, & similibus; tum frigida, pro domando calore peregrino p. n. & diluendo, utraq; dosi diffusiōri & majori, quo cum laudatis decoctis cōveniūt, differunt verò à cōcentratis, tincturis, essentis, elixiriis &c.

Eadem ratio est juleporum; Si enim primam simplicem eorum originem spectemus, quæque adhuc in julepis rosarum & violarum receptis visenda exstat, consunt communissimè ex aquæ (rosarum, violarum,) p. iii. & sacchari p. ii. coquendo & despumando, ubi non potest non coctione volatile, quod inest, de rosis promptè aufugere, unde parum virtutis & gratiæ, præterquam à saccharo, siquis intimè eos noverit, obtinere facile judicatu est.

Cum verò, ut FORMA potionis absolvatur, aliorum quoq; accessione opus sit, videbimus saltem prius in genere, quib. cū CAUTELIS hæc mixtura fieri debeat.

1. Enim non miscenda contrariis se excipientia fratribus, & vel fermentationem vel effervescientiam excitantia; hinc acida cum alcalinis, tum liquidis tum solidis, v. g. ☞ Bli cum spiritu cornu cervi, sale absinthij, non bene miscentur, præterquam, ubi refractâ dosi alterutrum recipitur, uti potio febrifuga Crollij ex aquâ cardui benedicti. sale absinthij & spiritu vitrioli satis est egregia; Id quod ipsum etiam apprimè est intelligendum de implicitis hisce in compositis latitantibus, uti v. gr. mixtura simplex non bene cum spiritu salis ammoniaci confunditur.

2. *Quæ mixta vel gratiam perdunt, vel e coitu hoc quasi novum ens pariunt, corpori minus proficuum gratumve, vel intentioni adversum, seu, quæ se vel intendunt minis, non miscenda.* Sic notissimum est, & bene tamen observandum exemplum non miscendorum spirituum vitoli & nitri, ex istorum enim coalitu exurgit aqua fortis, id quod itidem in compositis notandum, quæ hæc duo vel alterutrum potius recipiunt, ut essentia carminativa cum mixtura simplici, &c. Sic etiam flores sulphuris cum lixiviosis non bene miscentur, item spiritus salis ammoniaci vel similis cum sirupo violarum purpureo, vertitur enim hic inde in virorem.

3. *Que ingrati sunt saporis, nauseabunda, amara, salina, non debent ingredi, præterquam refracta & correcta, quod de ipsis acidis quoque intelligendum, siquidem immediate & penetrus fauces afficiunt poriones, adeoque, si unquam aliàs, certè in his, aucupanda est gratia, & præter hanc efficacia:*

Illud verò in ipso FORMALI jam obtinetur, siquidem inter se affocientur & misceantur, tum *homogenea*, tum *selecta*, in unum eundemque finem conspirantia. Hinc, hodierno quidem usu, liquida jam dicta, sive decocta, sive aquæ destillatæ, quod frequentius obtinet, (seu baseos. seu dirigentis & excipientis potius, quin vehiculi quoque quasi loco,) primum recipiuntur, sive ad unum præbium præscribere formulam animus sit, sive ad plura, siquidem commiscenda alia sæpè basin ipsam formæ internæ constituunt, v.g. pulvis purgans, sudoriferus. Hinc adjuvantium fit additio. Adduntur verò iisdem in genere, quæ vel *solvi* vel *misceri* possunt: *illa* (solvenda) primariò, potissimum, & aptius; hæc secundario ferè magis, qualibet suâ dosi, ita tamen, ut semper aquæ pondus prævaleat. Sic primi generis sunt tum *liquida* varij generis, spiritus, succi, essentia, tincturæ, quorum omnium doses regulandæ sunt partim pro subiecti ipsius respectu, partim ingredientium aliorum, & qui ultimo ferè loco adduntur, sirupi; tum *mediæ spissæ*, extracta, confectiones, electuaria; & referenda ex alterâ classe huc quoque *salia*, ut sal absinthij, cardui benedicti, dosi tamen refractâ magis, item *gummosa*, gummi ammoniacū, manna &c.

Secundi generis sunt pulveres, species, & magisteria misceri quidem apta nata. Et hæc quidem omnia scopo obtinendo inserviunt, seu virtuti. Gratia verò pro complemento quasi debentur magis, quæ saporis arri- dent, duo: *acidula* & *dulcia*. Norandum verò est de utrisque, minori eadem recipienda esse quantitate, in- primis acidula, quin dulcia sæpè consultius omitti planè possunt, quia bilem & fermentationem humorum au- gent, & ventriculū debilitant, sanguinem lutulen- tum reddunt, obstructions augent, verbo, intentioni sunt contraria, undè potissimum in febribus, cholera, dysentia, hypochondriacis & similibus humoribus acidis & biliosis abundantibus, quin & infantibus ipsis, & epilepticis consultius omittuntur, quòd plus damni quam commodi exhibeant, & dum pa- lato arriident, corpori hinc & finì magis noceant.

Hinc communiter quidem ad ℥iv. aquarum, seu pro
unâ dosi, ℥β. vel j. siruporum addere consueverunt,
quod implicite efferunt sapè, quantum sufficit, pa-
rum, facile tamen excedente magis quàm deficiente
pharmacopœo, id quod ipsum tamen liberum est me-
dico ; unde hæten. in febribus malignis ferè sine ullo
sirupo mixturam absolvimus.

Cum verò de *julepis* dixerimus, eosdem maxime cum potionibus convenire, latius quippe patere, nec ferè nisi nomine differre, in specie de *formali* quoque horum pauca addemus. Usus siquidem obtinuit, ut *julepi* se commendunt magis, & propriè ac ror^{is} *essentia* hinc dicantur potiones, quæ.

1. *Gratiam habent majorem, colore, v.g. tubello, odore, suavi & reficiente, & sapore, dulci, vel ex dulci acidulo.*

2. *Confortandi magis sine in usum vocantur, unde ju-
lepi cordiales, reficientes, sicut sedantes, sunt fre-
quentissimi, in quibus tamen, quod jam monuimus,
magis ad virtutem intrinsecam medicamentorum,
quam extrinsecam, sacchari, & dulcium, quæ confor-
tare ferè sola vulgus, & unicè, putat, respiciamus.*

3. *Magis limpida, quam spissa, crassa, electuariorum vel pulverum accessione commiscenda & turbanda, unde facillè patet, minùs hæc in juleporum compositione locum obtinere.*

Hinc tales possunt his cum cautelis ex jam dictis commodè parari, neque enim ulla est præparandi alia diversitas, tum decoctis, tum aquis; tamen tamen quosdam etiam gratos & usitatos modos, sic ut sunt, fiunt julepi ex aquis destillatis, tinctivis acidulis distillis, rosarum, violarum; quatuor cordium, succis acidulis, citri, &c. & sirupis saccharove.

Sic ex aquarum propriarum vel aliarum, & confervarum mixturâ, factâ colaturâ, & additione, inprimis tincturæ propriæ etiam consurgunt.

Sic sunt, qui siropos acidulos, berberum, ribinum, citri, coralliorum, præscribunt, ut hinc cum manna unâ vel alterâ aquæ simplicis vel destillatæ, (scilicet ad p. iv. aquæ sirup. p. j. recipiendo, &c.) tranivalando misceantur, & in usum cedant.

Sequuntur jam methodo solitâ quædam horum
EXEMPLA. Potio epileptica.

℞. Aq. epil. Lang. ℥ii. fl. til. prim. ver. beton. ℥. p. wto
 epil. Lang. ℥i. elix. cephal. ℥ii. — ⊕ li. striat. gutt. viii.
 sacchar. perl. paum. M.

Potio cordialis in febribus.

Bl. *Aq. scorz.* m. $\frac{3}{4}$ li. cord. *Herb sax.* fr. bez *Rulac.*
endiv. samb. a. $\frac{3}{4}$ li. *tinctur fl.* 4. cord. $\frac{3}{4}$ B. conf. de hyac. $\frac{3}{4}$ li.
pulv. bezoard. a. $\frac{3}{4}$ li. *M. S.* $\frac{3}{4}$ li. *elect. diase.* *Frac.* $\frac{3}{4}$ li. *br.*
min. g. xv. *fir. de scorz.* par M.

Julepus ex decocto.

℞. rad. acetos. ꝑ. cor. 2. ā 3℔. fol. acetos. acetosell. endos.
fl. rosar. rubr. ā. m. ℔. ceras. exsic. s. nucl. ā. 3vi. her.
mundi pini. C. C. rasp. 3i. sand rubri 3iii. pom. citr. ma.
canell. 3i. coq. in s. q. ∇. colat. ℔bi℔. acidul. chys. 3i.
⚞ato, adde sirupi corall. q. s. M.

Potio antipleuritica.

℞. Aq. card. ben. mar. lact. cerefol. ā. ℥ii. *scor.*
 ℥i. ~*ci℥β. ꝑ diaphor. ʒj. laud. op. g. β. M.

Asthmatica.

Rd. ℥i β. elix pect. ℥i. oxym. squill. ℥j. M.

Tales potiunculae frequentissime occurrunt apud
Sylvium, quem sequentes etiam ferè talibus unicè gen-
 dent, ex aquis varii generis, imprimis miscendo.
 Ois *ci, laud. op. & ol. caryoph. quæ ferè in omnibus
 reperire licet; verbo, si materia medica in promptu sit,
 facile est, quæcunque sub hoc sive velo, sive vehiculo
 aptare in usum.

Ratione UTENDI MODI, omnibus quæ ex æquo
possunt propinari potiones, indefinitâ tamen dosi magis
infantibus, quàm definitâ: quod enim hanc concedit

dantur potiones vel quantitate continuâ, vel discretâ, de quo id notandum.

1. *Quacunque definitum edere debent effectum, illa magis & ſæpius, ſimul ac ſemel ſumuntur*, uti potiones purgantes, emeticæ, adſtriſtoricæ, diaphoreticæ, anti-febriles, unâ vice; alterantes, poculo.

2. *In debilibus, ubi ſucceſſivè alterandum, ad confortandum, & aliàs discreta, major tamen vel minor, locum habet quantitas.* Notabile eſt, *Sylvium* omnes ferè potiones alterantes cochleari ſolere præſcribere, quod & ipſius affectu imitantur. Locum id habet in diſtis caſibus, non tamen univerſaliter in omnibus, ſiquidem & morâ eget venterculus ad applicandum ſibi medicamentum, & ipſi ægri non æquè in hoc obſecundant.

3. *Ubi intemius humectandum, repetere commodè licet potiones*, non ſolum in genere, ſed in ſpecie quoque, ubi ſopor inducendus, & ſuaviter ligandum cerebrum. Sic potiones, vel emulſiones quoque hypnoticæ ita commodè dividuntur, ut pars ſub lecti ingreſſum, pars ſub mediâ nocte, non conſequentè effectû, ſumatur.

4. *Nunquam tamen nimis in doſi excedendum, ne lædatur venterculus*, quin inprimis in potionibus non tam moles ingredientium ſpectanda eſt, quàm virtus; hinc, quæ cochlearium ſumuntur, non ulteriori egent cautelâ, ſed quæ poculo, non debent facilè excedere *℥iii.* quantum ſcilicet commodè hauriri unâ vice poteſt, id quod tamen intelligendum eſt præter additamenta. Notandum & id circa uſum & doſin, non diu durare potiones, adeoque non eſſe præſcribendas nimis largo præbio.

Commodæ aliàs & in hoc ſunt potiones, quod & ipſæ non egeant vehiculo, ſed hoc ſecum gerant, & ex tempore in uſum cedere poſſint, & conſtituant commodâ vehicula aliorum, modò ante aſſumptionem leniter conquaſſentur, unde ſolet addi, *S. vorm Brauch vohl umzurutteln.*

Quoad ASSUMENDI MODUM, nihil ferè peculiare ulterius occurrir, præterquam, quod de calidis actu, vel frigidis agitari ſoler. Præſtat ſanè, purgantes potiones calidas aſſumi, ut faciliùs actuentur; aſt, cum quidam nimis nauſeant, in delicatis & nauſeabundis quandoque indulgendum eſt potius, ut frigidas eas recipiant, id quod aliàs in genere de alterantibus etiam valet. Neque enim tanta eſt potius calidi habenda ratio, ut illum quoque ad medicinalem trahere velimus, quippe alia eſt individuorum, regionum, climatum, & conſuetudinis ratio. Memoratu dignum eſt, quod mos ille quorundam, ſive hypotheſis, potum non niſi calidum, tum alimentarem, tum longè magis medicum eſſe hauriendum, tracta videatur à Sinis, qui omnia calidè bibunt, quod ad valetudinem rentur maximè proficuum. Sinae, ait *Trigant. de regn. Sinenſ. l. i. c. 7.* ſemper potu ferventi utuntur, quod ſtomacho non parum prodeſſe videtur, unde & longæviores putant; imò hinc quoque evenire arbitratur, quod Sinarum nemo calculari morbo labore, qui noſtros Europæos ſæpè torquet, ex eo, quod perpetuò frigidam potent; id quod tamen, ſi fides habenda auctori, longè aliis adſcribi poteſt cauſis, quæ hujus non ſunt loci.

Reliqua in his regulantur ab ingredientium ipſorum modulo.

Denique quoad Uſum potionum, obſervandum eſt:

1. *Potiones non ad purgandum ſolum adhibentur.* Ut enim purgantia hæc formâ egregiè dentur, & ſatis conſultò, nihilominus tamen per hodiernam experientiam eas ad ſolam purgationem reſtringere *γερῶς* eſt: ex quo facile patet, quantum in hoc ſit tribuendum *Morello* & aliis veteris ſcholæ ſectatoribus qui tam ſtriſtis cancellis eaſdem includunt, parum chimix gnari.

2. *Potiones minus imbibendi, præcipitandi, adſtringendique ſine adhibendo*, oppoſitas in hoc vires nactæ

pulveribus, de quibus in ſequentibus dicendi erit occaſio. Hinc in vomitu inprimis minùs uſitatæ ſunt potiones, præterquam aromaticæ confortantes. Sed cum vi oppoſitorum hæc faciliùs poſſint judicari, breviores hoc loco de iſdem erimus.

Contra ea verò potiones

1. *Refrigerandi ſine frequentiffimè in uſum cedunt.* Quid enim, quæſo, magis in februm æſtu ſolando proficuum & uſitatum eſt, quàm potiones? quæ quidem ex aquâ endiviæ, acetofæ, lactucæ, acaciæ, &c. non omiſſis acidulis, commodiſſimè præſcribuntur.

2. *Diluunt, humectant, temperant.* Diluunt inprimis bilem, & acrimoniam humorum, eandemque conſequenter refrenant, humoribus præparandis, quin & purgandis, inprimis in ſiccioribus & melancholicis, ſunt apriſſimæ; humectant ſitientia viſcera, & ſitim præſentaneâ ope ſedant, ariduram lymphæ reſtituunt, defectum ſeri corrigunt, unde in melancholiâ, phthiſi, obſtructionibus, potiones ſunt laudatiſſimæ. Temperando quin etiam ipſos alvi fluxus, diarrhæam, dysenteriam moderantur, & mitigant.

3. *Confortant & penetrant*; in quo majorem ſanè præ ſolidis omnibus nactæ ſunt prærogativam, penetrant magis his ipſis, & citiùs evaporando ac in ſuccum & ſanguinem quaſi abeundo ſupperias quoque celeriores ferunt. Hinc ad cor reſciciendum, in lipothymijs, ſyncope, virium debilitate, quid, quæſo, frequentius potionibus? Hinc julepi vel ex hoc ſolo capite celebres ſunt redditi, ipſo communi quaſi conſenſu medicorum & vulgi, quod confortant, in debilitate virium, & ubi alia, ordinariâ quidem methodo proficua, minus locum habent.

Taceamus alios tum univerſales uſus & generales, tum particulares, quos ab ingredientibus variis varios dari, in conſeſſo eſt. *Wedelius.*

De Potionibus ex HOFMANNO & SCHRODERO.

Potiones hoc loco ſunt liquores, in quibus alia Medicamenta craſſiora, ut v.g. electuaria, extracta ſyrupi, pulveres & ſimilia cum aqua d. vel in ſulo aut decocto diluta ſunt, & in primis purgantia. Ubi notandum. in ejuſmodi potionibus fugiendam eſſe plurium ingredientium nauſeabundam mixtionem, quæ inutilis ſæpe, inepta & periculofa eſt. Contra autem uti debemus potionum ſuavium formulis, quales *Domini Schroderi* non ſunt; quibus barbæ ægrotantium propè inviſcari poſſunt.

Sequens potio *D. Managetta Imperatoris Ferdinandi III. Medici Cubicularis* ſit inſtar omnium. *℥.* Mann. el. *℥iv.* fol. ſenn. 1, f. A. *℥j.* radic. polypod. q. Paſſul. min. an. *℥iii.* ſem. coriandr. *℥ii.* fœnicul. cinamom. an. *℥iſ.* cryſtall. Tartari pulveriſ. *℥i.*

Incis. & contuſ. ſuperfunde aq. fontan. calid. *℥xvi* ſtent per noctem, poſteâ colatura cum expreſſione, quæ clarificetur, & denique per chartam emporeticam filtretur. Doſis *℥i.* *℥iii.* ad *℥iv.*

Manna liquida Imperatoris Ferdinandi III. ejuſdem D. Managetta.

℥. Mann. el. *℥ii.* vel *℥iii.* cremor. Tartari *℥j.* vel *℥iſ.* ſolve in calore MB. benè muniti cum Aq. fontanâ acidulâ *℥iv.* vel *℥v.* adde parum ſucci citri rec. vel alicuſ Spiritus mineralis pro grato hauſtu. Tandem cum albumine ovi clarifica & per chartam filtra, denique cum corticibus citri recentibus fiat odor ſuavis aut cum Eſſ. cinamomi. Doſis à *℥iii.* ad *℥iv.* vel *℥v.*

Potio Sudorifera.

℥. Aq. Theriacal. *℥ſ.* Card. b. *℥i.* Tinctur. bezoar. dic. cum Eſſ. theriac. ſpir. Tartari & Vitrioli parat. *℥ſ.* M. f. potio pro unâ doſi. vel *℥.* Aq. juniperi *℥i.* Extract. juniperi *℥i.* cum ol. d. ejus gutt. iii. probè ſuba-

subacti. Sal. Tartari volatil. ℞. Roob juniperi ℥ii. M. pro unâ dosi.

transverforum. Colaturæ exhibeantur ℥iv. mane et totidem post meridiem. Schröderus.

Potio Vulneraria.

℥. Radic. consolid. major. ℥i. ℥ii. h. cherefol. millefol. Sanicul. ana M. j. Ocul. Canc. ℥ß. caricar. ping. dactyl. ana n. v.

Mediocriter incis & pulverisat. affunde vini albi opt. lb. iiii. vel iv. bulliant in diplomate, ebullitione factâ vitrum obtura, pone in locum calidum per 3. 4. postea exprime & filtra. Dosis ℥iii. ad iv. in hæmoptoë, & incipiente phthisi. Hofmannus.

Potulentorum genera in Praxi usitatiora diximus esse Apozemata seu Decocta, aquas, Emulsiones, Infusiones, Potionesque alias. De prioribus alias dictum, de posteriori hic loci agendum.

Est Potio, de qua hic agimus, liquor, in quo alia Medicamenta crassiora diluta sunt, & præcipue purgantia: Quin & solæ infusiones nonnunquam sufficiunt.

Modus ergo parandi, sola fere mixtio est, quam, si res diluenda seu dissolvenda, viscosa, & tenax fuerit, in mortario absolvere convenit.

Liquor adhiberi potest varius, usitatus tamen recipiuntur Decoctiones, Infusiones & maximè Aquæ destillatæ.

Res dissolvendæ sunt Syrupi, Electuaria, Extracta, Manna, pulveres, & similia.

Exemplo sine

1. Potio purgans.

℥. Extr. fol. sen. ℥ß. rhabarb. ℞. cnicopharm. ℥ß. Syri. diaser. ℥ß. rosar. solut. ℥v. aq. cinâ. ℥j. m. f. potio pro una vice. Vires. Educit humores biliosos & pituitosos.

2. Alia.

℥. Fol. sen. ℥i. spithy. ℥ii. rhabarb. el. ℥is. spic. celt. ℥j. Infundantur in decoctione pectorali, q. s. per nocte. Incolatura dissolve Syrup. rosar. sol. ℥is. confect. hamech. ℥ß. f. potio. Purgat humorem melancholicum.

3. Potio sudorifera.

℥. Diacord. Fracastor. ℥iii. aq. sal. nit. sulph. ℥ij. mell. gran. juniper. ℥j. extr. card. bened. ℞. aq. card. bened. ℥ij. m. f. Potus.

Vires. Sudorem movet, viriumque insignium est in febribus malignis.

4. Alia sudorifera.

℥. Liquor. lumbric. ℥iii. theriac. Andromach. ℥j. spir. tart. ℥j. aq. cinam. ℥j. mixtur. simpl. ℥j. aq. veronic. ℥i. m. f. potus.

Vires. Admirandarum virium est in arthritide vaga, si semel ac iterum repetatur.

F. Potio Vulneraria.

℥. Herb. sanicul. veronic. pyrol. an. m. ij. consol. sarac. erichoman. an. m. j. flor. borrag. bulliant in s. q. aq. bord. s. a. bugloss. an. p. j. sem. anis. fœnic. an. ℥ij. cinam. ℥iii. jujub. n. vi. dactyl. n. iiii.

Vires. Convenit in vulneribus præcipue pectoris, ubi & expectoratio necessaria est. Sumantur de die ℥i. cum ℥ii. oculi cancri. Glandorp.

N. Plures vide apud Quercetan. & alios.

6. Alia potio Vulneraria.

℥. Herb. vinc. pervinc. millefol. betonic. ichi mill. an. m. i. rad. zedoar. ℥ii. vincetoxic. ℥j. nuc. vomic. ℥ii. macis ℥ß. nucist. ℥j. galang. ℥ii.

Coq. in aq. & vini ana mens. f. ad casum digitor. 4.

Potiones à Pharmacop. BAT EANA.

Potio Alba.

℥. Terebinth. ℥ß. olei still. nno. m. g. j. vin. alb. ℥iv. ob ell. ovi unius, syr. de alth. ℥j. m. f. a. f. haustus. Purgat bene ἀνω καὶ κάτω ad Gonorrhæam.

Potio Febrifuga.

℥. Θ abs. ℥ii. β. ∆. ℥j. ∇ cichor. ℥iv. m. bibatur ante parox. superludando.

Potio Hydropica.

℥. V. alb. generos. ℥iv. syr. de spin. cerv. ℥ij. sal. prael. ℥j. m. f. potio. Mayhern.

Potio Pleurítica.

℥. Succ. è ∆re animali expres. v. alb. ā. ℥ij. syr. rhoad. ℥j. soliban. ℥s. ∆o. st. nuc. gt. iij. m. f. potio, lumenda ter vel quater in die post phleb.

Potiones ex Idh. MICHAELIS.

Potiones Purgantes cum Pulveribus.

℥. Decoct. fumar. cum serô lactis ℥ij. syr. de fumar. com. pos. ℥vi. pulv. diasenna montagn. vel senn. ℥j. ∇ cinamom. ℥j. elaeacchi. cinamom. gr. v. m.

S. Purgier und bultreinigender Trant auf einmal.

In Affectibus Melancholicis & scorbuticis.

℥. Pulv. panchym. Querc. ℥j. decoct. com. ℥j. syr. de pantagog. Horstii ℥ß.

S. Purgiertranck umzuwuseln auf einmal.

In Affectibus à serosis humoribus præcipue valet.

℥. Pulv. cathol. purg. ℥j. syr. vel julep. ros. ℥ij. ∇ q. propr. q. s.

S. Purgiertranck auf einmal.

℥. Pulv. cathol. purg. ℥j. essent. ophthalm. ℥ß. syr. de beton. q. s.

S. Purgierend Augensafflein auf einmal.

Si humores pelluntur ad oculos hoc confert.

℥. Pulv. cathol. purg. ℥j. essent. arth. ℥j. syr. de beton. q. s.

S. Purgiersafflein auf ein mal in arthritide.

℥. Pulv. cathol. purg. ℥j. ess. contra arthritid. v. gam. ℥j. syr. scelotyrb. foresti q. s.

S. Purgiersafflein auf einmal.

Mirificè prodest in arthritide vaga ad educationem humoris.

℥. Pulvis arthet. Paracels. vel Ang. Sala ℞. vel ℥j. essent. chamad. chamap. ana ℥ß. syrup. de beton. q. s.

S. Sonderlicher. Purgiersaffte. auf einmal.

℥. Pulv. cholalog. Querc. ℥ij. vel ℥j. syr. de cich. cum rhab. ℥ß. ∇ cich. q. s.

Pro potiunculâ.

S. Purgiersafftlein auf einmal.

In Affectibus hepatis biliosis, & febre tertianâ &c.

℥. Scammon. rosat. vel cholag. insuccat. Ang. gr. v. vel xij. julepi rosacei ℥ß. hepat. rubr. gr. vj.

M. S. ut supra.

℥. Pulv. melanagog. Quercet. syr. de pom. lat. ℥ß. Aqua cinam. borrag. q. s. pro aliquâ ditione.

S. Purgiersafftlein auf einmal.

In Affectibus Melancholicis & scorbuticis.

℞. Pulv. specif. phlegmag. Ang. Sala, vel Quercet. ℥ij. vel ℥j. syr. phlegmag. ℥ij. ∇ appropri. parti affecta q. s. Pro potione.

S. Purgiertranck.

In affectibus phlegmaticis ac pituitosis.

℞. Spec. diatalap. ℥℔. vel ℥ij. syr. flor. Persic. ℥iij. ∇ flor. acacia q. s.

S. Purgiertrancklein auf einmal.

In Affectibus serosis convenit, pituitam, bilem, flatus ac reliquas serositates per inferiora sine molestia educit.

℞. Spec. diatal. Myns. ℥℔. ad ℥i. M. cum ∇ & syr.

Fiunt ita :

℞. Rad. jalappa optim. vel resinos. ℥iij. acid. & ℥xi. cinam. ℥i. M. F. Pulvis. Dos. à ℥℔. ad ℥j. vid. Myns. pag. 125. Est elegantissimum, ait ipse, purgans melancholicum, quod unusquisque maxime habeat commendatum. Præcipue confert in sero educendo.

Potiones cum Essentijs.

℞. Essent. cathol. purg. ℥℔. l. ℥i. syr. ros. ℥ij. M. S. Purgiersafft auf einmal, in affectibus serosis.

℞. Essent. elaterij ℥ij. cathol. ℥i. vel ℥℔. syr. de canella rosarum ana q. s. M. F. Potio.

S. Purgiersafft auf einmal vvol umzurutteln.

Conducit quoque in affectibus melancholicis ac pituitosis.

Sic quoque multæ aliæ Portiones cum essentijs fieri possunt proque diversitate humorum peccantium variari.

℞. Essent. jalap. fol. senna ana ℥℔. syr. diasereos cich. cum rhab. ana ℥℔. extract. diacitre ℥ij. ℥ij. aq. agrimon. ℥i. cinamomi ℥i. M. F. Potio.

℞. Syr. de cich. cum rhab. ℥vi. ros. solut. ℥℔. sang. rhab. ℥i. res. jalappa gr. i. crem. & gr. v. aq. jaceæ ℥i. cinamomi cochl. i. M.

Potiones cum Extractis.

℞. Extract. Rhabarb. gr. xii. scammon. ros. gr. v. vel vi. Dissolv. in f. q. ∇ cichor. vel alia quadam appropriata, adde syr. de cich. cum rhab. q. s. M. F. Potio.

S. Purgierend Trancklein vvol umzurutteln auf einmal.

Uterpatur in affectibus biliosis hepaticis.

℞. Extract. cholagog. ℥i. scammon. ros. gr. vi. dissolv. in f. q. ∇ epat. Adde syr. de cich. cum rhab.

S. Gall - ausfuhrendes Trancklein.

Possunt quoque addi Syr. de epat. nob. it. Species diatrion santalon aliaque.

℞. Scammon. ros. gr. xi. sacch. albi vel etiam man. christi perlat. ℥ii. succ. citri rec. expr. q. s.

S. Purgiertrancklein auf einmal.

Possunt quoque addi gr. iv. vel v. elæosacch. citri: Preparationem ejus vid. apud. Myns. p. 40.

℞. Extr. fol. senna ℥i. elleb. nigri gr. viii. scammon. ros. gr. iv. c. s. feri lactis dest. & syr. de pom. F. Potio.

S. Purgiertranck auf einmal in affectibus melancholicis.

℞. Extract. melanagog. ℥i. ad ℥ii. Dissolv. in f. q. ∇ cinam. borrag. & syr. de pom. F. l. a. Potio cui addi possunt gr. ii. vel iii. & per inf. purg.

Prodest in Maniâ, febre quartana &c.

℞. Extr. diacarth. ℥ii. ℥i. dissolv. in ∇ cephal. ad intra & syr. de betonica q. s. S. ut suprâ.

Est phlegmagogum & cephalicum.

In affectibus thoracis seu pectoralibus orum à phlegmate trahentibus dissolvi potest hoc electuarium in ∇ asthmat. Imper. Rudolphi & addi Syrupus de jujubis vel alius appropriatus.

℞. Extract. diacarthami ℥℔. agarici gr. vi. dissolv. in ∇ appropriata & syrup. pro Potiuncula phlegmago; gâ q. s.

S. Tranck auf einmal.

℞. Extr. esula gr. viii. resin. jalappa gr. vi. c. s. q. ∇ flor. acacia & syr. flor. Persic. Fl. l. a. Potio.

S. Purgiertranck. Conducit in affectibus serosis.

℞. Extr. esula ℥℔. elat. gr. vi. mag. gummi de Peru gr. iv. cum syr. flor. Persic. & ∇ appropri. F. l. a. Potio.

S. Wasserfuhrend Trancklein auf einmal.

Similiter prodest in affectibus serosis.

℞. Resin. jalappa scammon. ana gr. vi. magist. gummi goite gr. iv. cum f. q. syr. de acacia F. l. a. Potiuncula.

S. Purgierender Tranck auf einmal.

Potest quoque misceri cum saccharo & addi succus citri recenter expressus.

℞. Syr. de cich. cum rhab. ros. solut. ana ℥vi. aq. veron. nasturtii ana ℥℔. agrimon. ℥vi. extract. diacitri ℥iv. cochl. ℥℔. ∇ cinamom. ℥i. M.

Potiones cum Electuariis.

℞. Cathart. reg. Myns. ℥i. Div. dissolv. cum f. q. ∇ & julepi rosati, F. Potiuncula.

D. S. Lieblich Laviertrancklein auf einmal.

Vid. cathart. Reg. apud Myns. pag. 288. Convenit in affectibus biliosis, caliditate hepatis aliarumque partium, ut & febribus.

℞. Cathart. ros. Myns. ℥ii. dissolve in f. q. ∇ cichor. & syr. conserv. rad. cichor. vel ros. solut. M.

S. Lieblich Purgiertrancklein auf einmal.

Prodest similiter in affectibus hepatis biliosis & præprimis in febre tertianâ, si cum ∇ taraxaci dissolvatur.

℞. Cathart. Casar. Myns. ℥i. dissolve in f. q. ∇ appropri. vel syrup. in affectibus capitis frigidis usitatis, ut ∇ carmin. Dornrellii & syr. de cort. citri. vel ∇ cephal. ad intra & syr. de betonica In affectibus pectoris cum ∇ appropri. vel ∇ asthmat. & syr. pector. q. s.

S. Purgiersafflein.

℞. Cathartic. violat. Myns. ℥ii. dissolv. in ∇ chamedr. vel arto. ad extra & syr. de betonica.

S. Purgiertranck.

In arthritide dolore ischiadicâ & omnibus affectibus nervorum.

℞. Cathart. caryoph. ℥i. ad ℥i℔. dissolv. in f. q. ∇ appropriat. in affectibus frigidis capitis, pectoris, asthmate, affectibus articularum, colica &c.

Potiones quædam Purgantes veteribus usitatæ.

Has potiones præscripserunt vel cum vel sine co-
laturâ :

℞. Decoct. aperit. q. s. In quo dissol. elect. diacathol. ℥i.

S. Purgiertranck.

℞. Conf. Hamech. ℥℔. dissolv. in f. q. ∇ fumaria, adde syr. de fum. compos. unc. i. aqua cinam, borrag. ℥ii.

S. Purgiertranck auf einmal. In Scorbuto.

℞. De-

R. Decoct. pectoral. q. s. dissolv. in eò elect. dia-
caribam. unc. 8. Syrup. diasereos Andernaci unc. 1.
an. 31.

S. Purgiertranck auf einmal.

Pectoralis est hæc potio, ad asthma & alios affe-
ctus conducibilis.

℞. Decoct. pectoral. q. s. dissolve in eò elect. dia-
phœnic. unc. 1. cola & colatura adde syr. viol. flout.
3x. ▽ asthmat. 31.

S. Brusttranck auf einmal.

℞. Aqua taraxaci, cichorei ana unc. 8. dissolv. in
illis electuarium de succo ros. 3vi. coletur. colatura
adde syr. ros. solut. unc. 1. ~ ros. gut. v.

M. D. S. Purgiertrancklein auf einmal.

In affectibus biliosis, etiam in febribus.

℞. Decoct. aperit. unc. iib. dissolv. in eò Elect. lini-
tiv. unc. i. cola, colatura adde syr. ros. solut. unc. 8.
~ ros. gutt. v. syr. de pomis laxat. 3vi. ▽ cina-
mom. 3j. M. F. Haustus. S. ut supra.

℞. Fol. fenæ sine stip. elect. 3iii. macis 3i. passul.
min. unc. 18. Infund. in s. q. vini, manè ebulliant,
colatura adde manna electa unc. 18. ▽ cinnamomi
parum. M. F. Potio.

℞. Infusi laxat. vi unc. iiii. manna electa unc. 1 8.
chrysell. q. 3i. M. F. Haustus.

℞. Rhab. elect. 3ii. ras. CC. ex apice 3i. rad.
peon. zedoar. galang. ana 38. sem. fenic. 3i. anto-
phyll. cinamom. macis ana 38. croci integri 3i. incid.
ad Nodulum in synd. albô.

S. Kindbetter - Sacklein in Wein.

℞. Elect. cathol. 3 v. diaprun. laxat. 3iii. syr.
ros. solut. simpl. unc. 1. Aqua flor. acacia q. s. E.
Potio.

S. Purgiertranck.

℞. Manna liquida unc. scrupul. essent. core. citri
drag. i.

S. Laxier - Wasserlin.

Julepi cum Decoctis Præparati.

℞. Decoct. hordei cum CC. libram 1. Syrup. rubi
id. unc. iiii. ~ Vitrioli vel aceti rub. id. q. s. pro
gratò acore.

M. D. S. Starck - Julep auf einmal.

Prodest in febribus malignis, præservat & ro-
borat.

℞. Decoct. hordei CC. & rad. scorzon. 18. sy-
rup. rub. id. acetosella. succi citri ana unc. 1. ~ 8.
philos. q. s. Pro gratò acore, M. F. Potio.

S. Kuhl-und Starck-Julep in febribus ardentibus
malignis.

℞. Aqua endiv. lactuc. ana unc. iv. decoct. alte-
rant. unc. syr. de succò cerasor. nigr. unc. 1. ~ 8.
q. s.

S. Alterativ - Julep. In affectibus hepatis bi-
liosis.

℞. Aqua flor. Nymph. lactuca semperviv. ana unc.
ii. melonum unc. 18. syr. de nymph. unc. iiii. Tinct.
violar. rosarum ana 3j.

S. Kuhlend Starck - Julep. Conducit in febre he-
ctica.

℞. Decoct. herb. 18. syr. de succo ros. ceras. nigr.
ana 3ii. herb. unc. 1. succi citri recenter expressi, vel
~ 8 q. s. pro grato acore.

S. Kuhl-und Starck-Julep. Ubi alteratione opus est.

℞. Decoct. hord. cum CC. 18. alter. usit. 3iii. syr. de
succo citri 3ii. tinct. viol. rosar. an. 3ii.

M. S. Kuhl-und Starck Julep.

℞. Decoct. hord. cum CC. 18. Syrup. florum aquileg.
3iii. tinct. flor. aquil. 3ii. ~ 8 Philos. ritè præp. q. s.
Pro grato acore.

S. Julep auf. etlichmal. In variolis & morbillis ma-
ximè prodest.

℞. Decoct. alterant. 3vi. ▽ endiv. cichor. rosar. ana
3iii. Syrup. de succo citri berber. ana 3i. ~ 8 q. s.
Pro gratò acore.

S. Kuhl-und Leber-Julep auf. etlichmal.

℞. Decoct. hord. cum CC. lib. 18. in quò decoque rad.
scorzon. 3ii. col. adde syr. de succò ribium, berberum, ci-
tri ana 3i. ~ 8 q. s.

S. Kuhl-und Starck-Julep.

In febribus malignis, quibus maximè medetur ra-
dix Scorzonera secundum Recentiores.

℞. Hord. mundi man. j. Passul. min. 3ii. cog. inf. q. ▽
ad crepaturam hordei, in colaturam calidam infunde
flor. rosarum tunicæ borrag. buglossæ ana p. ii. ~ 8.
Postea filtr. S. ut Suprà.

℞. Decoct. alterant. 3vi. ▽ cichor. endiv. tarax. la-
ctuca ana 3ii. syr. de succò frag. ribium ana 3i.

S. Kuhl-und Starck-Julep.

℞. Ag. Cichor. rosarum ana 3ii. julep. ros. 3j. tinctur.
bell. d. ros. viol. ana 3j.

S. Alteriv-Julep.

℞. Decoct. CC. vel potius priapi C. mensuram 8. syr.
cyd. Ferdinandi sine sacch. 3ii. conf. alkerm. compl. 38.

S. Julep in Dysenteria.

Julepi cum Infusione.

℞. Flor. pap. rhæad. mi. affunde ▽ card. maria be-
ned. flor. acacia ana 3iv. ~ 8 ~ 8 ana 3.

Spiritus sensim ac sensim instillantur, stent in infu-
sione per noctem, vel aliquot saltem horas, coletur,
dein filtratur & edulcoretur, additò Syr. pap. rhæad.

S. Julep gegen das Steitenstechen.

Mirè conducit in Pleuritide & aliis laterum affe-
ctibus.

℞. Flor. ros. miß. borrag. buglossæ tunicæ ana p. ij. in-
funde in s. q. decoct. hordei cum CC. aciduletur cum
~ 8 phil. stent. in infus. postea coletur, edulcoratur
saccharò vel syrupis appropriatis: conducit in febribus
malignis, imò n. ipsa peste.

℞. ▽ scab. card. bened. ana 3ii. syr. flor. aquileg. 3i.
de citrò comp. 3ii. tinct. flor. aquileg. 3ii.

S. Starckend und Treib-Julep.

Convenit in variolis & morbillis; si adest mens
epilepsiæ; possunt addi Syrupus & Tinct. Rham-
Pœnæ.

℞. Syr. viol. acetos. citri ana 3i. ▽ flor. Sambuci ci-
chorei ana 3iii. ~ 8 gutt. 40. fontana limp. lib. ii. F.
Julepus.

℞. Julepi laxat. 3iv. ▽ cinam. 3i.

M. S. Laxier-Julep.

℞. Julepi laxat. 3iv. syr. ros. solut. 3j.

S. Laxiertrancklein.

℞. Tinct. rosar. syr. acetos. citri, rubi idæi ana 3j. in-
fect. alkerm. complet 3j. ▽ font. l. j ~ 8 g. viii. vel 38.
M. F. Julepus.

℞. ▽ flor. papav. errat. cardui maria an. 3ii. syr.
flor. pap. errat. 3ii.

S. Trancklein oft davon zu trincken.

Julepi cum Conservis.

℞. Conserv. flor. tunica rosar. acetos. ana 3j. Affunde
q. ▽ hord. cum CC. vel aliis appropri. Dissolve in marmori
mortariò, vel indantur vitro benè clauso ad unam vel al-
teram ebullitionem cola & filtra.

S. Hertzstarckender Julep.

Est cordialis in febribus aliisque affectibus utu-
pandus.

℞. Conserv. flor. pap. rhæad. 3j. contunde in mort-
ariò marmorò, affunde ▽ antipleuriticam card. maria
ana 3ii. Ebulliant, deinde in vitro benè clauso, co-
la.

la, colatura edulcoretur. syr. flor. papav. ℥ii. vel drach. iij.

S. Julep gegen das Seiten Stechen. maximè conductibilis in pluritudine.

℞. Conf. ros. ℥iij. viol. ℥j. borrag. buglossa rob. ribium ana ℥vi. dissolve vel ebulliant in decocto hordei vel appropriatis aquis, coleur. deinde, col. 4. lib. ij.

S. Hertzstarckender Julep.

In confortatione cordis, aliorumque viscerum.

℞. Decoct. hord. simpl. lib. j. dissolve in eo pulp. tamarind. q. s. ad gratum acorem & justam pelluciditatem.

D. S. Saverlich. Kuhl-Julep.

In affectibus & febribus biliosis. Potest etiam in Tertiana pro potu ordinariò dissolvi pulpa tamarindin. in sero lactis, refrigerat enim & alvum servat apertam.

℞. ∇ Nymph. portulac. ana ℥iij. sperm. ran. ℥iij. syr. de cor. Querc. ℥j. portul. ℥ij. sacch. ʒ gr. vii. M. D. In fictili.

S. Julep gegen das grosse Nasenbluten.

℞. ∇ plantag. portul. sperm. ran. ana ℥iij. syrup. de portul. ℥j. ʒ tabul. ℥vi.

S. Julep gegen das Nasenbluten.

Elegantissimus Julepus pro Ditionibus potest preparari ex ∇ pulp. citri destill. ver. (non ex illa, quæ cum ʒo destillatur) cum syrupo vel succo citri, si addatur quid de elæosacchari citri, vel essentia ex toto citro. Conducit mirabiliter in febribus malignis, ut & in Peste. Suavissimi est saporis.

Potiones Variæ.

℞. ∇ apoplectica ℥iij. lil. convall. ceras nigr. ana ℥ij.

M. S. Wasser alle Stund ein Löffel voll.

℞. Oxytel. pector. ℥j. ʒo feniculi gutt. iv. ʒo anis. ʒo. ∇ flor. acacia ℥j. M.

℞. Balsam. embryonis ∇ vit. mulierum ana ℥iij.

S. Wasser.

℞. ʒo amygd. dulc. rec. expr. ℥iij. syr. pap. erras. ℥j. ocul. ʒo. ∇ scab. ℥ij. camph. gr. ij.

M. D. S. Trancklein auf einmal vvarm zu trincken.

℞. Fol. scabos. card. bened. verb. ana mß. fol. senn. sine spip. ℥iij. rhabarb. ʒij. agar. troch. ℥j. sem. fen. ʒij. ficum dactylorum ana n. iij. coq. in f. q. ∇ card. bened. ad ℥ij. in colatura dissolve manna ℥j.

S. Trancklein auf einmal.

℞. Syr. pap. erras. ℥ij. de liquirit. byss. ana ℥j. ∇ scab. card. bened. vel Mar. ana ℥j.

S. Safft stundlich ein Löffel voll.

℞. Oxytel. pector. ℥ij. syr. de byssop. ℥j. ∇ byssopi ℥ij.

M. S. Brustsafft.

℞. Myu. cyos. arom. ℥j. syr. pap. simpl. ∇ plantag. ana ℥ij.

M. S. Magensafft.

℞. Ciner. absinth. vel artemis. m iij. summit. pin. m iij. geniste alth. ana mß. vin. generos. mens. ʒij.

Fiat lixivium idque trajiciatur quinquies.

S. Laugen taglich zu gebrauchen.

Potiones alix.

℞. ∇ cord. Herc. Sax. ℥iij. diascord. Fracastorii ℥j. confect. de hyacintho ℥j. syr. de citro comp. ℥ij.

M. S. Schveifztranck auf einmal. In Peste & febribus petechialibus conducit.

℞. ∇ cord. Saxon. ℥iij. tinct. bezoard. ℥j. conf. de hyacinth. alkerm. ana ℥j. syr. de citro comp. ℥ij.

D. S. Hertzstarckend Schveifztranck auf 1 mal. Conducit in omnibus affectibus malignis, in Peste & ejusmodi aliis.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

℞. ∇ scordii ℥j. scorzon. galeg. ana ℥ij. CC. sine ∇ ℥ij. ʒ diaphor. ℥j. syr. de succo scord. unc. ʒ.

S. Schveifztreibender Tranck vvol umzurutteln. Pro expulsionem in Peste & febribus malignis.

℞. ∇ cord. Saxon. ℥iij. pulv. bezoard. Sennarii ℥ij. vel ℥ij. bezoard. Oris gr. viij. syr. calend. ℥ij.

S. Schveifztranck vvol umzurutteln auf einmal. Ad promovendum sudorem in febribus malignis.

℞. ∇ cord. Herc. Saxon. ℥j. scorzon. ℥ij. mag. CC. spin. viper. ana ʒij. bez. Oris gr. viij. man. christi perlat. ℥ij.

S. Krafftiger Hertz- und austreibender Tranck auf einmal, pro ditionibus.

In Colica Secretum Cratonis.

℞. ʒo amygd. dulc. ℥iij. vin. malvatici ℥ij. sperm. ceti non rancidi sed electi ʒij. M. Ibidem.

℞. ʒo amygd. dulc. ℥j. cryst. ʒij. ocul. ʒo. ʒo vini ℥iij. F. Haustus tepidus, adde ʒo stillat. macis g. iv.

M. S. Trancklein auf einmal.

℞. Corall. rubr. præp. margar. præp. ana ʒij. bezoard. orient. gr. v. CC. phil. præp. an. ℥j. succin. præp. ʒij. ∇ fumar. scord. card. mar. ana ℥j. man. Christe perlat. ℥j.

S. Wasser alle Stund ein Löffel voll zu nehmen.

℞. ʒ diaphoret. ʒij. syr. rub. idæi ℥ij. ∇ acetos ℥j.

S. Kuhlender Safft auf einmal.

℞. Vini malvat. ∇ cinnamom. ana ℥j. ʒo amygd. dulc. rec. expr. ℥j. syr. papav. simpl. ℥iij. ʒo anethi gutt. v.

M. S. Schmerzensstillendes Trancklein.

℞. ∇ antepilept. Lang. apopl. Ejus i. hirtund. cum castor. ana ℥j. asthmat. ℥ij. syr. acetos. citri ℥ij.

S. Schlagwasser offte. ein Löffel voll.

℞. ∇ flor. aurant ℥ij. cham. comp. ℥ij. calaminth. ℥ij. sacch. albi candisati ℥j. essent. cort. citri ℥ij.

M. S. Wasser vor die Schmerzen drey Löffel voll.

℞. ∇ fragorum, malva ana ʒviij. ʒo. ∇ syr. frid. gor unc. j.

M. S. Wasser.

Potiones Confortantes post nimium sudorem in Febribus Malignis.

℞. Aqua flor. borrag. buglossa pulp. citri an. ℥ij. syr. flor. tunica ℥ij. conf. alkermes ℥j. mag. cord. ʒij. ad ℥j.

M. S. Krafftig Hertzstarckender Tranck auf etlichmal.

℞. Aqua flor. borrag. bugloss. meliss. calendul. an. ℥ij. acetosa acetosella ana ℥j. CC. sine Igne, eboris sine Igne, ana ℥j. syr. de succo citri ℥ij.

M. S. Starcktranck auf einmal.

℞. ∇ fumar. scabios. flor. aquileg ana ℥iij. CC. sine ∇ ℥ij. ʒ diaphor. ʒij. julepi sambucini ʒvi. rosarum ℥ij.

S. Austreibender Tranck auf etlichmal.

Conducit hæc potio in Variolis & Morbillis expellendis.

℞. Aqua cord. Hercul. Saxon. cor dis cervi an. ℥j. off. de corde cervi gr. xv. syr. flor. borrag. buglossa an. ℥ij.

S. Sonderlicher Tranck gegen das Hertz klopfen.

In palpitacione cordis mirificè conducit & magnarum est virium.

℞. Aqua card. Maria bened. flor. papav. rhe ad. ana ℥ij. dent. apri præp. ℥j. mand. lucii piscis ℥ij. syr. de succo pap. rhe ad. ℥j.

S. Starcktrancklein gegen das Seitenstechen vvol umzurutteln auf etlichmal.

Insignis est hujus vis in Pleuritide. Dos. 2. vel ʒj cochlearia.

℞. Aqua card. bened. Maria, flor. acacia pap. rhe ad. ana ℥ij. ʒo antiplour. ℥j. syr. flor. pap. rhe ad. unc. j.

S. Starcktranck gegen das Seiten ste, oben 2. Löffel voll auf einmal.

Ad *Potiones* non immerito referuntur illæ *Potiones*, quæ ex aromaticis constant pro ditioribus æquè ac pauperculis Mulieribus cum vel sine speciebus præparatæ & in quibusdam locis usitatissimæ, quæ imprægnationem veram conservare ac roborare, falsam autem ejicere creduntur, *vid. Schroderus p. 230.* Dicuntur *MORETA* à *Moris* seu diamoro ingrediente. Hisce tamen merito præfertur Tinctura coralliorum, quæ tamen etiam misceri potest cum ejusmodi *Moreto*, & erit illud efficacius.

Ad *Potiones* etiam referuntur *Fermentata*.

24. *Passul. min. lot. 3xvi. ▽ fontan. puriss. canth. ij. q. crudi 3ij.* Digere in locò calido vel MB. per 3. aut plures horas in lenissimò calore: Postea removeantur, indantur vasculo quercino (In his enim vasis optimè fit fermentatio) addatur in linteò fermenti optimi parum, ad magnitudinem nucis castaneæ, postea iterum tepidum; Abhinc per 24. horas ponatur in locum frigidum, sic enim acquirit saporem musti, sique addantur specifica in inflammationibus renum ac hepatis plurimum pollebit, v. g. *In affectibus hepatis* santali rubr. rad. & flor. cichor. hepat. nobilis. *In febribus malignis* rad. scorzonæræ, acetosæ: Flor. rosarum, borrag. buglossæ, tunicæ; calendulæ, qui flores colorem huic vino impertiunt, *In affectibus renum* flores malvæ calcatrippæ. *In hydropè* rad. vince-tox. flor. cichor. sant. rubr. *In Dysenteria* rad. plantag. tormentillæ. Pro acquirendo sapore gratiore possunt admisceri cortices citri recenter ab albedine liberati, & aromata, ut cinamonum, caryophyll. &c.

In Affectibus pectoris Fermentata fieri possunt cum radice Chinæ & Sarsapar. *vid. de hisce Angel. Salam in Saccarellog. part. 1. c. x. & seq.* Sumendæ autem sunt radices tales ut & alia, quæ ingratum saporem non habent.

Ex rubi id. paratur elegantissimum fermentatum in febribus.

Ex lentiscò flor. hypericonis in ulceribus Renum.

In catharris salis ex lignò assafras & rad. Chinæ, caryophyll. Flor. betonicæ, anthos.

25. *Passul. min. lot. 3iv. flor. ros. rub. mj. cichor. p. iv. santal. rub. 3ss. crem. q. albiss. 3iii.* Macerentur cum s. q. ▽ font. vel ▽ Destill. MB. Postea coletur & addatur parum fermenti, Elapsò triduo exhiberi potest.

Fermentata acquirunt Vini colorem, sicut ex passulis potest fieri vinum factitium. *vid. Salam.*

PRÆCIPITARE & PRÆCIPITATIO.

Ut Præcipitatio etiam vulgatâ acceptione dicitur de eo, quod ex alto in fundum deturbatur, & quidem cum quâdam violentiâ; ita & in scholis pharmaceuticis eadem significatione prædicatur de solutionis. Hinc not.

1. *Præcipitatio est separatio soluti prius vel extrahiti.* Est scilicet solutioni utrique contraria, ejusque quod solutum erat, à solvente disjunctio. Quæ solvantur vel extrahuntur, uniuntur, subjugante altero alterum. Hic verò quæ ad sensum prius erant solvendo unita, iterum secessum patiuntur, excusso jugo detinente menstrui, quo infirmato liberantur è possessione pristina particulæ detentæ, & deturbantur, seu fundum petunt. Licet verò & aliis modis fiat hoc modo unitorum separatio, latè, debilitato etiam aliunde menstruo, ut inibi soluta ad fundum eant, eodem seu exhalante, unde essentia v. g. ligni aloës, exhalante sensim Vi, resinam ad fundum mittit; seu evaporato, quod in

extractis fit, & hinc quoque mercurius præcipitatus ruber *καὶ ἐξοχρὸν* ita dicitur; seu nimis saturato, unde non omnia æquè detinere potest, exemplo *Ἀρὶς Ὀτὶ Ὀῖ*, accedente inprimis frigore, loco unientis magis caloris; propriè tamen, & usitatius magis prædicatur de confusis binis liquoribus, magis vel minus contrariis, quorum alter hoc respectu menstruum seu solvens dicitur, alter præcipitans audit.

2. *Præcipitatio fit à contrario, si non soluto, saltem solventi.* Contrarietas adest, non similitudo, quod nonnulli volunt, seu *συμμάχεια* quâ amicabilitate coëant solvens menstruum, & liquor præcipitans, & complexu hoc suo dimittant quod solutum erat. Ubi-
cunque nempe infringit alterum, vel etiam confus-
tus est & pugna manifesta, ibi nulla apparet *συμμά-
χεια*, sed *ἀντιμάχεια* potius. Qui facit, ut alter ca-
dat, seu supplantando ipsum, seu vi deijciendo, sanè non amicum ipsi officium exhibet, vel fa-
voris sui testimonium. Et hinc Germanis etiam præci-
tare dicitur *fallen*, quasi dicas *fallen machen*. Similia inter se miscntur, quæ non miscntur, se præci-
pitant. Ergò ubique mixtio amicabilis & uni-
tio non fit, reverà est contrarietas. Quo ipso etiam patet, hanc separationem non tam esse spontaneam, quod de aliquibus è supra dictis valet, sed violentam; seu spontanea non est nisi respectivè, quando re-
tinere nequit, violenta, quando, ut dimittat, cogitur liquor. Sufficit verò, si liquor liquorì, solventi præci-
pitans, sit contrarius. Quod si verò utrique inimicus sit, tunc eò perfectior fit præcipitatio.

3. *Ut variat contrarietas, ita etiam præcipitatio.* Contrarietas hæc respicitur non tam in solvendo, licet & illa locum habere queat, quodlibet enim appropriato, non contrario, solvi debet; quàm in soluto & præcipitando. Seu omni solvens habet suum præcipitans. Contrarietas verò hæc est duplex, alia oppositiva, seu è diametro & exactè talis, alia disparata, seu remissa. Hinc quæcunque sibi perfectè sunt contraria quantitate & qualitate, ea etiam perfectam præcipitationem præstant; quæ subcontraria, imperfectam. Seu disparia se præcipitant confusè & imperfectè, liquorem saltem immutando & turbando; contraria perfectè. Id quod etiam aliis in regulâ: contraria contrariis curantur, in M. M. observatur. Exemplis etiam idem magis illustrabitur.

4. *Quæcunque solvunt, eadem & præcipitant, sed sibi contraria;* seu quibuscumque fit solutio, iisdem & præcipitatio peragitur, modò liquor liquorì opponatur. Non differunt scilicet liquores præcipitantes & solventes, nisi contrarietate illâ dictâ geminâ, unde subire se amicabilitate nesciunt. Hinc si menstrua consideremus, ostendimus inprimis contrarietatem inter acidum & alcali, aqueum & resinosum. Uti enim sal & aqua præcipuum sunt solvens: ita etiam præcipuum præcipitans. Imò hisce quatuor inprimis absolvitur tota hæc operatio. Hinc

5. *A menstruis acidis soluta præcipitantur per alia liquida; & contrâ.* Exemplum prioris præbent magisteria Hni, Lunæ, Auri & similia alia plura; posterioris Sulphur auratum Antimonii lac Tartari. Speciatim verò hujus præcipitationis notanda est differentia, hinc resultans; Aliquippè præcipitatio est impetuosa & magis violenta, seu cum effervescentiâ; alia blanda, citra illam. Violenta magis est, quando æquitas frontibus concurrunt acidum & alcali, sive rari-

lis effervescentia fiat à priori, vel sub ipsâ solutione, ut quando in Vitrioli Philosophico solvuntur oculi ciner. corallia, &c. tunc enim non ipsum id fit sub præcipitatione, quia acidum jam immutatum & saturatum est; sive à posteriori, ut in Sulphure aurato Antimonii, magist. Solari &c. Singulare exemplum hujus præcipitationis visendum est in Tartaro Vitriolato, si spirit. Vitrioli affundatur sali Tartari deliquato: ibidem primò fit effervescentia, hinc etiam simul consequens præcipitatio.

6. *A spirituosâ soluta resinosa, ab acidis verò saturata terrea, præcipitantur ab aqueis.* Duo igitur imprimis præcipitantur aquea: (1.) ex spirituosâ resinâ solutâ, exemplo resinâ omnium seu purgantium, seu alterantium, resinâ scammonii, gualapæ, ligni sancti, ladani, ligni aloës, &c. simulum. (2.) ex concentratis acidis terrea, exemplo Mercurii vitæ, ex butyro Antimonii affusâ aquâ præcipitanti. Præcipitantur utraque in minutissimas atomos velut contracta, qualis pulvis non expectari potest ab ullâ tritura vel lavigatione. Et nominatim resinosa & terrea ab aquis præcipitata lactescunt, mox verò iterum coeunt, qui lacteus color in priori casu indicium est diffusi & ex ordine moti sulphuris: simulac verò in fundo conglobantur particulae, ille color perit iterum. In altero idem color indicium est sulphuris obfusi ab acido, quo abacto etiam immutatur albedo.

7. *Ab acidis soluta præcipitantur etiam à salibus diversis, ab acidis & ab aqueis.* Fortissima quidem omnium solventia sunt acida, sed levissimè præcipitantur, ut omne violentum, si ad summum devenit, ruinæ est proximum. Quæcunque igitur vel infringunt expressâ contrarietate eadem, ut alcalia, vel disparitate saltim dissociant unitas particulas, illa acidorum faucibus eximunt & præcipitant soluta. Valet & hic cumprimis illud vulgatum: divide & regnabis. Simulac fit divisio viiium menstrui huius, laxantur pori, & liberantur sub flocculorum minutissimorum specie particulae. Imò hæc ipsa intermedia præcipitantia sæpe sunt meliora. Sic magisterium Lunæ longè elegantius fit, si cum multâ præcipitatur, quàm cum sale tartari, quod ipsi colorem nigrescentem ingrati n. infert, & saporem quoque consimilem. Acidum verò ab acido præcipitari videri possit primâ fronte minùs verum, quod simile non agat in simili, (quæ ipsa regula quoque contrarietatem magis illustrat,) sed tenendum est (1.) acida non iidem æquè gaudere poris, hinc si dissimilia sint vel levissimè quasi, statim teneritudo illa tyrannidis, ut sic loquar, laxatur; (2.) acida in solvendo immutata præcipitari ab acidis, aliam nempe sic sortita figuram, aliam conformationem pororum, amisso priori non irem à posteriori, & contraria sunt sibi ipsi per accidens: De aqueis verò jam diximus: dissolvunt nempe & illa vincula salium & in se derivant, unde solutum cadit.

8. *Ab acidis soluta quadam etiam præcipitantur per subintrantiam.* Præcipitationis hujus exemplum præbet in aquâ forti soluta, quæ præcipitatur, præter dicta, etiam lamina cupreâ indurâ. Est hæc quasi supplantatio & deceptio, ut, dum duo petit solvens, ad instar canis Æsopici, perdat priùs jam obtentum. Est præcipitatio mediata, siquidem & hoc modo debilitatur acidum pluribus intentum, & contentum hinc liberatur quoque.

9. *Liquores plicatiles præcipitando minùs inserviunt.*

Tales verò sunt sulphurei. Sal est odli quasi & heterogeneitatis symbolum, sulphur amicitia: Unioni amicæ velificatur, pugna est contrarium, unde & ipsa salia aliàs contraria, alcali & acidum, sub hoc mediato re amicè coeunt, neque pugnam subeunt, quin amicae sunt & socia. Et spirituosâ quidem in specie facillè sociatur cum quovis, cum aqueis, lixivis & acidis, unde etiam si quidam heterogeneitatem inferant, illam tamen facillè componunt, & utique se sociant. Oleosa verò intimè tutantur à se soluta & condita, nec acidis ingressum facillè concedunt, nec lixiva nisi amicè socianda admittunt. Seu soluta ab oleosis ob intimiorem nexum cum excludant aquæ & acidi ingressum, non facillè ab iisdem præcipitantur. Adeoque fortior vis opus est, si id ipsum expectamus, laxius & tenerius sulphur, acidum vero fortius, unde & Oli aliudve oleis distillatis affusum, dum sal volatile figit, ceram exin præcipitat, quo de suo loco. Hinc & camphora oleis soluta non præcipitari commodè potest, vel separatim iterum, præterquam sublimatione.

10. *Inter præcipitans & præcipitandum debet esse proportio.* Cum enim id id instituitur, ut separet & liberet contenta & subjugata, vel superare debet, vel sufficere saltim pro debilitando menstruo, pro privando eodem. Hinc diffusum ut plurimum debet esse magis præcipitans, concentratum, in die enge getrieben, præcipitandum. Hinc ubi arctiori & amicabili magis vinculo menstruum detinetur sibi unita, quod de spirituosâ & resinosis quàm maxime valet, opus est abstractione aliquâ, exemplo resinâ scammonij, gualapæ, ligni aloës, &c. alioqui enim confusio magis fit & imperfecta præcipitatio, non sufficiens. Contra ea si hoc fiat, facillimè peragitur id ipsum. Quin imò eo pacto sæpe partes resinosa quædam conjuncta manent cum liquore, à præcipitatione residuo, quod per evaporationem ad oculum patet.

11. *Ut calor solutioni, ita frigus magis præcipitationi favet.* Et si enim calor quoque, exemplo evaporationis & exhalationis dictæ, ad fundum se dimittat magis, menstruum cogit, partes spirituosas, vel detinendo sufficientes, evocando; attrahendum salia magis acuit, porosque magis laxat, soluti verò particulas attenuat, unit quoque utraque, contentum cum continente, magis, frigus verò constringit & contrarium præstat, quod vel urinæ exemplo & crystallisationis clarum est, adeoque in frigido major fit disgregatio, si Tincturas quælicas exceperimus.

12. *Præcipitatum totuplex est, quonuplex solutum.* Ut enim confusum adhuc, nec dum plenariè separatim participet aliquid de utroque, solvante & præcipitante; edulcatum tamen, adeoque liberatum plenariè naturam suam vel ex toto, vel maximâ ex parte recuperat, prout menstruum ipsum vel solvens solum, vel simul immutans fuerit. Hinc effecta præcipitationis generatim sunt magisteria dicta, vel idèò, quod singularem depurationis seu diducationis exhibeant faciem, atque de artificis testentur excellentiâ, seu peritiâ saltim. Speciatim verò præcipitata sunt resinosa, resinâ, extracti, magisterii communi hinc nomine gaudentiâ; exemplo magist. scam. gual. lign. sancti, lact. Δ ris, Δ is \odot li &c. sunt *alcalina*, exemplo magisterii perlæ, matr. perl. corall. sunt *enixa salia*, exemplo Tartari Vitriolati, quæ singula fundum petunt. Non digrediemur hinc ad virtutem seu effectum specialem, quod sulphurea & fixiora servant speciatim naturam sui simplicis, terrea omnia

exsiccent, plurima sint cosmetica, quippe de quo in parte alterâ speciali dicendum erit.

13. *Pro diverso præcipitantis unum idemque præcipitatum alium atque alium colorem adsciscit.* Quædam præcipitata colorem proprium retinent, quædam perdunt, quædam, quod potissimum thesis infert, alium atque alium reportant. Idque omne pro diversâ modificatione & immutatione sulphuris, velut radice colorum, evenit. Retinent colorem, imò ferè expanduntur magis, quæ soluta à spirituosissimis præcipitantur à minus immutante sulphur liquore, exemplo resinarum; quæ item intimius sulphur habent maritatum, ut immutandi licet vi prædictum, jus tamen inveniat nullum, exemplo magist. gumm. gott. solari & similibus. Perdunt, ubi solventi vel præcipitanti majus imperium in sulphur concessum est, ut ejusdem particulas lucidas variare queat. Solventis exemplum præbet magist. corall., quæ licet rubra sint, ruborem tamen perdunt, à menstruo acido solvente & obtundente unâ sulphur; præcipitantis lac sulphuris, ubi sulphur in se flavum, in solutione cum calce viva, vel sale Tartari rubellum, ab infuso præcipitante aceto alborem induit, unde lac sulphuris audit; utrobique acido sulphur invertente. Alium reportant, ubi præcipitantis diversa est ad poros immutandos, alterandosque vis, quod mirum est illustrari posse solis, vel potissimum alcalibus, similibus licet visis. Exemplo sit præcipitatio mercurij sublimati, cujus solutio in Aquâ simplicis non solum ab alcalibus salibus diversis aliam atque aliam faciem acquirit, uti hoc *Tachenius in Hippocr. Chim.* fusè demonstrat; verum quoque seorsim in alcalia fixa & volatilia inter se comparata præstant. Sic solutioni mercurij sublimati infusum lixivium quodcumque turpethum minerale vulgò dictum exhibet è flavo-croceum, vel rubeum, distinctis gradibus majoris, vel minoris radiationis consimilis. Ast ab alcali volatili, ut spir. sal armoniaci &c. fit præcipitatum non flavescens, vel fuscum, sed niveum, lacteum, seu albicans. *Wedelius.*

*De PRÆCIPITATIONE ulterius
ex Clariss. Joh. BOHNIO.*

Ultimus, ast frequentissimus, Secretionum Chymicarum modus est *Præcipitatio*, quæ ex communi sententia, illa, quæ per solutionem cum menstruo coibant, & unum quasi fiebant, iterum divelluntur, ut soluti particule à solvente, cujus amplexu hætenus detinebantur per adjectionem tertij, recedere, hincque solutionem claram turbare ac tandem ad fundum vasis subsidere cogantur: super quas tamen circumstantias unum vel alterum monere mihi liceat.

Nimirum primò præcipitationis subjectum non corpora tantum solida, à fluidis soluta, existere videntur, multo minus præcipitatum semper sub forma pulveris similive consistentia spissiore concipiendum erit: Sed his combinare forsitan conveniet fluida in partes heterogeneas, pariter fluidas, præcipitanda. Nolo hujus loci facere olea vegetabilium, quæ aquis spirituosissimis hætenus intertexta temporis tractu ab his secedunt: Commodius siquidem exemplum suppeditat *Paracelsus, dum Archidox.* 6. Vinum post aliquot mensium digestionem in phlegma & Essentiam seu Magisterium, mediante congelatione, dirimere docet. De cujus processu veritate quamvis nonnulli, & inter hos *Dominicus Boyle* quoque, dubitent, ipsi tamen fidem,

sub spiritus vini tartarificati præparatione, denuo conciliat, *Viganius in Medulla Chymica*, in dissertationibus his aliquoties allegata, testaturque ejus successum nuper in literis *Amicus αὐτόπτης*, qui vinum Canariense generosissimum per frigus atmospheræ & mixturam frigorificam ita congelaverat, ut circa centrum ejus vix sexta vini spirituosissima & oleosa satis portio collecta fuerit. Quod sane præcipitando contingere videtur, i. e. recedit fluidum hoc oleoso-salinum ab aquoso congelato, utpote non congelabile. Alterum præsentis asserto confirmando aptum phenomenon erit Spiritus vini dephlegmatio, sine destillatione & per alcali perficienda, quam sane, quia liquorem in partes, substantia, colore & loco distinctas, sedere jubet, præcipitationis speciem appellare, fas est. Sc. Spiritui vini mediocriter dephlegmato salis tartari, in crucibulo probè calefacti, proportionata quantitas immittitur, vasque mox obturatur: & post aliquot horarum spacium phlegma cum sale dissoluto in fundo vasis compareret, spiritu supernatante & per decantationem separabili.

Deinde nec ad præcipitationis formalitatem ita confert accessorium præcipitans, quasi absque hoc illa contingere haud posset: cum per remotionem ac evaporationem quoque certarum particularum idem fiat. Ut enim de liquorum subsidentia, quam digestio ipsi præstat, quaque hi in fœculentias crassiores & substantiam tenuiorem secedunt, nihil dicam, idem quod in illa exhalatio materię cujusdam, in vase præprimis clauso, non adeo commodè concipi queat. Refina v. g. scammonii, à Spiritu vini soluta, quemadmodum ab aqua affusa in grumum resinosum præcipitatur, sic idem experitur, aliqua saltem menstrui sui portione volatiliore evaporata. Pariter aquæ aromaticæ & spirituosæ, tam simplices, quam compositæ, quas cum substantia oleosa aliquid salini volatilis involvere, alias constat, sponte sua & temporis tractu, si potissimum negligenter asserventur, pinguedinem suam ita dimittunt, ut hæc sui juris facta superficie liquoris innatet: substantia nempe salino volatili exhalante hinc vinculo adæquato, quod oleum phlegmati combinabat, si non disrupto, certè laxato. Simile quid in salium, præprimis alcalisatorum, solutionibus observamus, quæ lenta aquæ humiditatis exhalatione in ramenta seu squammas quasi salinas præcipitantur, à summitate ad fundum descendentes, sibi que lamellatim incumbentes.

Tandem nec adeo inseparabile præcipitationis requisitum videtur, præcipitata ad imum vasis descendere, sed ad superiora & superficiem liquoris interdum illa evehuntur, aut certè medio ipsius innatant, exacte nihilominus à solvente sequestrata. Evidens hoc est non tantum in oleis ab aquis spirituosissimis recedentibus hisque superatantibus, ut modo indigitatum fuit: sed in resinis quoque, è spiritu vini præcipitatis, quæ instar sublimamenti seu eneoremati in medio hujus aliquandiu fluctuant & quasi suspentur. Cum magisterijs illis vegetabilium, quorum *Zwelferus* ac *Schroderus* meminerunt, eadem ratione res habet, quæ cum lixivio salis tartari aut calce vivæ preparata & cum aqua aluminis præcipitata, non inferiora, sed superiora, petunt: & Camphora, sive in aqua forti, sive spiritu vini soluta, ad contactum aquæ simplicis mox menstrui intimiores recessus deserit & ad summitatem liquoris effertur hincque innatet.

Quibus præmissis, pro formalitate Præcipitationis explicanda, *Nobilissimo Boyle* ante omnia condescendere jubet ratio sana, illam haud à sympathia menstrui &

repercutientis promanare: sed videtur illam modò corporis menstruari seu præcipitandi, modò fluidi seu menstrui, ex cuius amplexu illud deturbari debet, modificatio patrare; quamvis utramque interdum in una eademq; præcipitatione concurrere, negari vix queat.

Præcipitandi modificatio in molis & ponderis augmento præprimis consistit, quod à præcipitante ipsi accrescit: ratione cuius à fluidis solventib; ulterius agitari & sustineri haud poterat. Rem ita se habere, plura loquuntur præcipitata, horumq; pondus post lotionem quoq; reiteratam notabiliter præter propter superant pondus vegetabilis soluti, it. præcipitatorum mineralium ac metallorum, v.g. magisterij Argenti, Auri &c. dñi huius metalli drachma una scrupulos ad minimum 4. auri fulminantis cõstituit. Ita quidẽ, ut non unum tantum scrupulum à salibus extraneis accessisse, augurari conveniat, sed maiorem adhuc auri fulminantis molẽ illa formare, hoc persuadeat, quod in liquore filtrato post aliquot dierum moram ramenta quædã auri conspicua fiant & ad fundum vasis præcipitentur, incautionibus vel hoc nomine imponentia, quod auri nova augmenta credant, cum tamen nihil aliud, quam prioris auri, mēstruo incrimis adhærescētis, reliquæ sint, non, nisi diuturniori solventis ac præcipitantis salis actioni & reactioni, cedentia. Quantũ E. auro decessit, tantum præter quartum scrupulum à præcipi ante sale ipsi de novo accevisse, probabile sit. Evidens magis redditur præcipitantis ac præcipitati connubium in illa phlegmatis à spiritu vini per sal tartari cineresve clavellatos præcipitatione, quã superius innui, utpote sub qua illius aquositas horum substantia n alcalicam imbibisse sibiq; adaptasse præter saporem & Tincturam lixiviosam pondus huius sensibilibiter auctum persuadet.

Atq; hoc quidem mineralium ac metallorum accessorium non tantum à solvente sed præcipitante simul, esse, evincit hoc, quod ejusmodi magisteria seu præcipitata, v.g. Corallorum, lapidum cancrorum, ante præcipitationem adhuc solubilia, postquam eandem perpessã, calcis instar emortuæ se habeant, neque à menstruis corrosivis posthac solvi possint. Quibus accedunt alia variorum præcipitatorum phenomena, pro diversitate præcipitantium diversa, v.g. dum autem cum aqua Regis solum affusione liquoris tartari aut spiritus salis armoniaci scopetandi virtutem induit, quam nec aurum per se, nec alia ejus calx possidet. Quippe, si cum Mercurio, spiritu vini, aqua aluminis &c. magisterium hoc pareretur, aut si solutio salis tartari præcipitanter nimis affundatur, ad detonationem ineptum observatur: quatenus in priore casu alcali, ad fulminationem adeò necessarium, planè deficit, in posteriore autem soluti percussio cum vehementiore impetu ac celerius contingit, antequam sufficiens alcali portio auri croco huicq; profundius immerso acido combinari poterat; quod pariter fit, si punctum saturationis, ut loquuntur, haud accuratè observetur. i.e. plus aut minus liquoris alcalici superaffundatur. Nec minorem lucem his fœneratur butyrum antimonij, diversimode præcipitatum: quatenus quod spiritus Nitri vim experitur pulverem diaphoreticum bezoardicum, ac ab omni cathartica violentia immunem, facessit, quod verò cum aqua communi ejicitur, Mercurium vitæ, *ὄνο καὶ κάρω* cum impetu evacuantem constituit, ut raceam, hunc in vitrum levi igne deliquescere, quod à bezoardico minerali vix expectandũ. Sunt, v.g. *Glauberus*, qui eundẽ liquorem glaciale cum oleo tartari per deliquium præcipitant, diaphoreticum pariter inde sibi promittentes, hinc Panacæ solaris splendido titulo hoc ornantes: quibus quamvis per experientiam omnimodè ad stipulari haud valeam, Virulentiam tamen ejus hoc modo notabiliter fractam experietur quilibet; quod pariter sine accessorio salis lixiviosi haud fieri, ratio suadet, potissimum cum idem pondus sensibilib;

liter in præcipitato hoc auctum evincat.

Imò vix aliter in ejusmodi præcipitationibus fieri poterat, quin particula quædam solventis acidæ, intimius paulo mineralibus cohærescentes, præcipitantis alcalici quædam minima imbibant, sibiq; indissolubili magis nexu jungant: per quem nexum quoq; firmiorem impetus ille explosivus contingit, vix expectandus si laxius saltem sibi implicarentur hæc auri scopetantis ingredientia. Nec improbabile est ab accretione hæc salis, hæcenus ipsis exotici, præcipitatorum quoq; figuras immutari, cum color eorum ut plurimum discrepet à colore & splendore metallico seu minerali pristino: potissimum cum & hic pro præcipitantium disparitate variet, Ita v.g. Mercurij sublimati cum aqua communi, aut currentis cum Aqua forti, facta solutio si cum spiritu salis armoniaci præcipitetur, pulverem album dimittit, si cum calce viva, flavum, quod si verò oleum tartari ipsi instilletur, rubicundum seu mureum exhibet præcipitatum, &c. quod majus, si præcipitato rubeo spiritus salis armoniaci superfundatur, candidum pariter illud evadit; quod sine figuræ particularum Mercurij harumque situs immutatione concipi vix potest.

Et, si nulla pro præcipitantis ac præcipitati concursu & implicatione arctiore adstruenda suppetere experimenta, tali se, per quam & sub qua hoc reliquam massæ substantiam deferat, eam plus quam ad oculum demonstrat encheirisis, Vitriolum à cupro liberandi, dum nimirum ejus solutioni ferrum calens toties immittitur, usq; dum nullam amplius inde rubedinem cupream acquirat, i.e. atomos cupreos omnes evocaverit sibi que illos adaptaverit.

Pergo nunc ad fluidi menstrualis modificationem, per quam menstruata illud deferere jubentur: quæ in horum pororum aut arctitudine, aut laxitate, consistit. Angustia pororum semper ab accessorio seu deturbante dependet, sive hoc eos oppleat, sive constringat.

Prius agunt cuncta, quæ solventis fluidi poris magis quam solum, figuræ præprimis ratione, concordant, ijs idèd facile se insinuant, hincq; illud exterminant ac deturbant: qualem congruitatem salia alcalia & acida potissimum ad se invicem habent, & per eam quoque, quod ab alterutro eorum solum, alterum præcipitat, nunquam sine effervescencia, seu ebullitione, ut plurimum tumultuaria satis. Ita solutionem Oculorum Cancrorum, Coralliorum, Plumbi, Auri, Mercurij &c. per Aceum destillatum, Spiritum Nitri, Aquam Regis similiaq; stigmata acida factum, Sal Tartari, Lixivium Calcis vivæ, Spiritus Salis Armoniaci &c. repercutiunt, cum acidis illorum menstruorum particulis in arctiores congressus ruentia. Et ex eodem principio *Zuvelsferrus* Sirupi Corallorum cum succo Berberum confectionem vulgarem taxat, quasi per coctionem cum saccharo Corallia suum retinaculum, quo, velut compede, erant restricta, mox deserant, & loco Sirupi, Corallina essentia imbuti, gumosum, à Corallis plane desertum succum, saccharina dulcedine delinitum, exhibeant: idèd sc. quod aciditas succi, à dulcedine sacchari, quod velut sal dulce, corallia præcipitans, more aliorum salium superetur. i.e. sal hoc dulce ab acido berberum succo absorbeatur, porosque ejus repleat.

Idem fieri videtur in depiciendis solutionibus lixiviosis per acida, v.g. si Solutioni Sulphuris communis aut Extractioni sulphureæ Antimonij, cum Lixivio Cinerum clavellatorum, Salis Tartari, aut Decocto Calcis vivæ adornatis, it. decocto Scoriarum Reguli Antimonij verum, aut Sulphur auratum extermines. Nulla alia ratione, quam quod liquores alcalici, sulphureas moleculas hæcenus excipientes, aceti particulas salinas, impetuosius vibratas, promptius admittant, hinc illis divortium denuncient.

Spectat huc Salium quorum vis solutorum præcipitatio, à Spiritu vini rectificatissimo expectanda: quatenus

tenus aquæ cum Spiritu vini major, quam cum salibus, intercedere videtur congruitas, per quam, quantum hujus imbibit, tantum salis, (acidi æquæ ac alcalici & salis) dimittit, ad fundum vasis subsidentis, vel lateribus ejus sub forma crystallina adhærescentis. Coquestos recoidor Amicos de infido hujus experimenti successu, ast summa Spiritus Vini rectificatio seu Alcoholisatio veritatem illius propugnabit: unde ex hujus circumstantiæ neglectu fatum suum in posterum metientur.

Pariter hujus generis est exturbatio metallorum è suis menstruis, quæ aliorum metallicorum concretorum, illis magis amicabilem, adjectione perficitur, v. g. dum Argentum in Aqua forti solutum per laminam Cupri, cupri ramenta, eodem menstruo innatantia, per Ferrum, ac hujus demum solutio per Bismuthum præcipitantur. Quamvis enim in hac operatione minima Argenti corrosio Cupro instat squammarum splendendum adhærescant, Cupri atomi rubicundæ ferrum quasi incrustent: nihilominus illius secessus haud contingit, nisi quando Cuprum menstruum colore viridi tingit, i. e. hoc illius metalli tantum recipit, quantum ad prescribendas Argenti particulas necessarium; id quod de reliquorum metallorum mutua expulsiōe pariter observandum.

Denique eodem modo acida corpora, per acidum soluta, ejicere, verosimile est, siue illa simpliciora, v. g. Spiritus Salis, siue composita magis, v. g. Sal marinum, extiterint: quatenus Spiritus Salis Argentum & Cuprum, à Spiritu Nitri vel Aqua forti corrosa, prosternt, Si erga Vitrioli Corallia, cum Aceto destillato soluta, & quæ ac Sal Tartari, & Spiritus Nitri, Butyrum Antimonij præcipitant: Et ex eodem capite Lac à lixivio so pariter, ac aceto oleale in coagulū caseosum & serum abiit. Eo ipso siquidem dum acida diversa per congruitatē salinam sibi magis, quam ejusmodi metallica aut terrea concreta, commiscibilia sunt, Spiritus Salis v. g. Spiritum Nitri ad retinenda ulterius ramenta Argenti ineptum reddit, quod de reliquis acidis simili ratione concipiendum: & calcalia, non aquea tantum, sed per ignem quoque Lactis substantia penetrantia, quas dissolutas fovebat hæc, particulas caseosas pessum ite præcipiunt.

Constringendo & quasi comprimendo poros menstrui præcipitantia nonnulla vim suam exerere, Frigoris quidam effectus testantur, dum v. g. Urina clara ad aeris frigidioris contactum mox turbatur, adeo ut heterogenea ipsius, siue naturalia, siue præternaturalia, contenta, quæ parti illius serosæ hætenus juncta inextiterant, nunc ab eadem recedant; facile tamen illi denuo remisceantur ut urina pristinam pelluciditatem, recuperet, si blando tantum & rarefacienti calore eadem urina exponatur. Similiratione solutiones corporum resinorum à Frigore ingruente notabiliter turbantur, menstruo eorum condensato, sub aere verò tepidiorē primum fluoris & diaphaneitatis culmen reperunt. Nec improbabile est, præcipitantia salina, magis styptica, v. g. Alumen & Spiritum Vitrioli, præter modum nunc explicatum, in solutiones condensando, harumque minima solidiora quasi exprimendo, agere.

Altera menstruorum dispositio, per quam ab his soluta ad secessum disponuntur, pororum nimia Laxitas est, quam præcipitationem notabiliter juvare vel aquarum disparitas docet, dum mollior, v. g. pluvialis aut quævis destillata salinis atomos, sibi conceditis sponte ac facilius dimittit, quam aqua fontana similisq; rigidior. Quæ enim atomos principiorum activorum quorumcumque discontinuatur, horum contiguitatem & viciniam turbant, faciunt, ut quas ulnis arctioribus hætenus compledebantur menstrua, particulas, hæc ijs laxatis, dimittant & in earum subsidentia conniveant. Exempla hujus causandi modi pariter quotidiana sunt, v. g. dum Mercurius vitæ ex Butyro Antimonij, item Cuprum ex Aqua forti, per aquæ simplicis affusionem præcipitatur: quæ moleculas salinas, Antimonij corpus

in minima discriptum sustinentes, detergit, & cum his Spiritum Vitrioli philosophicum constituit, Aquæ fortis autem particulas rodentes diluit, harumque contiguitatem & nervos solvit. Pari ratione in stigmata corrosiva Spiritus vini agit, eorumque vim causticam domat, ut quæ in interaneis suis corrosa derinebant, motu horum tonico fracto evomere cogantur, licet conatu tardiore & vix sensibili, quemadmodum in præcipitatione auri per dictum spiritum sulphureum adornata, liquet. Laxat siquidem ille contiguitatem atomorum corrodentium, earum interstitijs se ingerens, hinc, soluti particulis libertatem pristinam restituit. In resinorum v. g. benzoës, camphoræ & scammonij, à Spiritu vini dissolutorum deturbationibus res eadem recidit; quas aquea quævis humiditas præstat: quatenus illius retinacula sulphureo-salina discontinuat ad retinendas suas prædas inhabiles reddit.

Paucitatem tandem pororum excipientium quod concernit, per hanc menstrui defectum indigito, si mirum hujus aliqua pars evaporetur, hincque solum præcipitetur: quatenus cum partium solventium imminutione vis solvendi solutaque conservandi cessat, proportionē sc. illarum turbata: cujus præcipitationis æriologię exempla §. 15. suppediabit. Paradoxum equidem videri posset, evaporationem ejusmodi, per quam menstruum non ad omnimodam siccitatem, sed quoad dimidium v. g. tantum, absumitur, præcipitationis modum dicere; ast ex illis, quæ superius de natura & formalitate hujus supposui, tertij sc. seu extranei præcipitantis actionem haud semper necessariam esse, hoc meum assertum non omni ratione destitui constabit, aut, si erravero, termini abusum mihi condonabunt sapientiores. Requiritur nempe ad corporum exactam solutionem de terminata menstrui ad hæc proportio: quicquid proin hanc destruit, solutioni contrarium, i. e. menstrui ac soluti secessum, præstat. Si instes, non cum impetuali, quali præcipitationes reliquæ contingunt, hanc subsidentiam fieri: regeo, nec hoc de essentia præcipitationis esse, cum secessus ille magisterii auri lenius, qui spiritus vini contractum sequitur, æque præcipitationis titulo dignus judicetur, ac quem sal Tartari movet. Per terea nec hæc auri præcipitatio tunc consummata dici potest, quando nihil ejus croci amplius descendere & liquor filtratus quam diaphanus cernitur: cum experientia palam faciat, eundem diutius asserturum quotidie denuo turbari & novam calcem, lento satis motu, deponere, ut ut novi alicujus præcipitantis activitatem minimè experiatur. Nec secessus ille resinæ v. g. gummi Peruviani, adeo lentus, & insensibilis, sed interdum satis conspicuus & præceps, est: ubi sc. inrensiore paulo ignis calore fluidi solventis exhalatio maturatur. Imò dum ab hac similive solutione resinosa aliquid spiritus vini, & à salinis porcio aquæ avocatur, quid aliud contingit, quam, dum illis aqua, his Spiritus vini, affunditur: utraq; enim ratione solventis activitas debilitatur ac hebescit, & una alterius torporem, si quis est, corrigere potest, quatenus solutionibus resinosis post aliquam evaporationem aqua communis affunditur.

Quamvis autem recensiti hætenus modi præriologia præcipitationis exhaustiendi sufficere videantur non raro tamen eorum binos, & forsitan plures, in operatione hac concurrere, circumstantiæ cunctæ, accuratius pensitatz, persuadent: ita ut idem præcipitans præcipitatum æquac menstruum afficiat, i. e. illi tendenti huic retinendi ineptitudinem, imprimat, v. g. Sal Tartari in auri fulminantis dejectione, aliud in solvens equidem tantum, dispari tamē ratione, agat, v. g. aqua aluminis & spiritus vitrioli corallia ex aceto destillato, poros hujus replendo ac constringendo, prosternens.

De cætero ex dictis constat, quædam his vel illis præcipitantibus facilius, quædam difficilius, cedere, & quidem non solum per diversa præcipitantia succulsa, v. g. Aurum per Spiritum salis Armoniaci & Spiritum Vi-

Vini, it. Cuprum cum spiritu Salis armoniaci solutum, per aquæ affusionem vix unquā, per spiritum salis brevi, præcipitatur, sed per eadem quoq; commota, v. g. Marcasita & Mercurius, quorum illa ex Spiritu Salis per Spiritum Nitri promptius eliminetur, quam hic. Imò quædam uaius ejusdemq; generis metalli diversæ particule ab eodē solvente per idem repercussione citius, quædam tardius liberantur, v. g. in eodē Auro fulminante, cujus maxima equidem portio mox fundum petit, aliqua tamen post biduum ac triduum conspicua fit. Quæ sane disparitas partim strictiorem & laxiorem, seu superficiale magis, mensuri ac mensurati connexionem sequitur, ab aromorum congruitate & mole diversa, dependentem: partim præcipitantium varietatem p. o. fundamento agnoscit. Prioris exemplum eadem Cupri per spiritum salis armoniaci solutio erit, affusione aquæ copiosioris in immensam molem, absq; turbatione Tincturæ extendenda, hinc summam exilitatem & congruitatem, ramentorum metallicorum ostendente, qualem in solutione cum spiritu quodam acido concipere haud licebat, utpote ab aqua diluente in præcipitem agenda. Nec improbabile est, auri illud sedimentum, quod longius demum post primum præcipitantis impetum observatur subtilioris indolis existere illo, quod præcipitanter magis decidit, cum im palpabile magis hujus alcohol observetur. Præcipitans autem exturbationem maturat ac protrahit, vel quatenus soluti particulis molem ac gravitatem diversam conciliat, v. g. Sal tartari & spiritus salis armoniaci Auro, præ spiritu vini: vel quatenus præ aqua simplici, solutioni cupri urinosæ instillatur. Quibus accedit, quod *Dominus Boyle* annotavit, datæ præcipitantia, quæ alias solventis munere in eodem subjecto funguntur, i. e. quæ, etsi mutua hostilitatem, aut ad minimum summam disparitatem effervescentia notabili testentur suasq; potentias salinas mutuo destruere videantur: eo ipso tamen, dum liquor præcipitans pro solvendo pariter concreto singulari aptitudine gaudet, ebullitionem & confictum illum nullam præcipitationem committi, quatenus solutionem Marcasitæ, per spiritum aliquem urinosum factâ spiritu acido repercutere frustra annis fuerit, & solutionem cupri per spiritum salis potentioris spiritus salis armoniaci aut Urinæ haud præcipitem det, imperuosioris quamvis effervescentiam moveat.

Quod verò præcipitatorum nonnulla imum liquoris haud petant, sed ad summitatem ejus evehantur, aut horum levitati specificæ, quæ eorum massulæ æqualem mensuri molem antecellunt, sive hanc à figura, sive allunde, habeant, aut aeris particulis sub solutionis ac præcipitationis actu intertextis, deferendum erit: quæ tamen quia à *sepius laudato Boyle de Causis mechanicis Præcipit. Chym. c. 4.* prolixius & accuratius sunt exposita, brevitate gratia nunc mitto, unicuique Corrolarii loco de Regulis metallicis annexurus. Videtur nempe mibi horum confectionem non adeò absurde præcipitationi accenseri posse, quatenus, postquam metalla ab igne fusa & in fluorem abrepta fuerunt, ut purior & homogenea magis eorum pars scorias leviores deserunt, ac subsident, à præcipitante, seu, ut vulgo ajunt, fusione juvante, deturbari. Antimonij equidem regulum pariter huc referrem, nisi repetitam cum Nitro ac Tartaro deliquationem hujus totum tandē corpus in scorias convertere, constaret, adeoque, at per destructionem partium essentialium, an segregationem heterogeneitatis, ille produceretur, ambiguum relinqueretur. *Bohnus.*

PRÆCIPITATA, vid. *Magisteria.*

PRÆCIPITATA ex Mercurio, vid. sub titulo *Mercurius.*

PRÆPARANTIA & DIGERENTIA.

Humores evacuandos respiciunt PRÆPARANTIA, ita dicta, quod eosdem ad excretionem aptent & dispo-

nant. Vocantur etiam *digerentia*, quati ad frugē eosdē peccantes reducentia, coquentia quasi & maturantia.

Digerentia itaq; sunt duplicia in usu medico: 1. *interna*, quæ jam recensuimus, quæ non aliter ac digestio chimica ita disponit & corrigit, ut calori hinc subsequa reddantur omnia. 2. *externa*, de quibus supra diximus, quæ in ulceribus & vulneribus ad coalitionem aptos reddunt humores, & conveniunt ferè cum suppurantibus, nisi quod postquam jam sunt aperta eadem, magis locum habent.

Ut verò melius hæc ipsa pateant, præter ea, quæ jam alibi de ipsidem differuimus, notetur:

1. *Non omnes humores aquè facile purgantur*, quatenus vel non omnes fluxiles sunt, sive crassi, viscosi, vel nimis fluxiles seu tenues, vel acres simul, acidique, &c. adeoque licet stimulum addant naturæ purgantia, non obsecundant tamen æque humores, nec ipsa natura illos subigere per se potest: seu

2. *Non promiscuè prosunt purgantia, vel exhibenda sunt.* Empiricorum id est, qui promiscuè exhibent purgantia citra cognitionem vel attentionem humoris peccantis, ejusdemq; qualitatis: vulgi id est & plebejorum, qui, quando appetitus deest, quando febris laborant, continuo purgans petunt, quo sæpe si non moventur, aliud superingerunt. Ut itaq; purgentur oia deo ad dalspe, quæ oportet purgari, medici præstant præparantibus dictis.

3. *Præparantia sunt alterantia* Uti enim omnium medicamentorum in universum duæ sunt classes, alterantium & purgantium: ita etiam præparantia nullo modo differunt ab alterantibus, nisi hæc speciali intentione, quod intuitu evacuationis præstandæ, ut melior & ex voto fiat, purgationibus præmittantur, adeoque duo præstant: 1. alterant, 2. ad excretionem seu evacuationem disponunt.

4. *Evacuantia enim & alterantia se modificant.* Non fieri probe potest alteratio, si copia vitiosorum humorum obstat, qui sui evacuationem, naturâ præeunt, urgent: nec evacuatio præstari potest commodè, si humorum qualitates impedimento sint naturæ. Hinc videtur ipsa experientia suggestisse præparantia, ut v. g. ponamus scabiotum vel melancholicum frustra sumere purgans; si ipsi, per aliquot dies demus digestiva è Tincturâ Opomatâ, & alijs aperitivis, res melius succedat; & hæc ipsa sanguinem purificantia ex voto non operantur, nisi humoribus purgatis.

5. *Modus agendi igitur ut alterantium in genere, ita & præparantium sit per contraria;* humorum qualitates, caloris nativi actioni resistentes mutant, & in ordinem redigunt. Contrariorum enim contraria sunt remedia. Obstacula enim illa, quæ ineptum ad fluendum reddunt humorem, sunt remouenda, & qualitates excessivæ omnes domandæ.

6. *Alia præparantia sunt universalis, alia particularia.* Universalis hoc loco vocamus non strictè & rigorose sensu, quod omnib. omnino humorib. æq; conveniant; sed, quæ sunt polychresta, & quæ c. u. communia & frequentius occurrentia sæpius in usum vocari possunt. Talia verò sunt *aperientia, antiscorbutica, antica, hepatica, & splenetica.* Frequentiores enim causæ, quæ remorantur purgantium vim, ne operentur ex voto, sunt obstructio vasorū, humorū siccitas, vel *ulcerosa* scorbuticum. Adeoque, nec frus. Q. latus, nec cr. mod. & crystalli fri, vel ipsa mistura simplex, alio nomine, quæ hoc universalis digestiva dici m. tentur vel debent, nisi quod insigni gaudeant referendi facultate, & plurib. indicationib. satisfaciant. Particularia verò sunt *alterantia & aperientia, vel incrassantia tenuiter*, ex singulorum remediou. quoad partes digestorum fontib. depromta, modò ex cephalicis, quæ ex usu sunt in affectib. capitis; modò ex uterinis, & sic consequenter; tum calida, tum frigida, variij generis, liquida, media & solida.

7. *Hæc ipsa verò viae vel simul disponunt, vel ita expurgant*

gatis melius operantur. Hinc communi praxi usitatissimum est præmittere totâ die purgantibus vel lenientia vel præparatiâ. *Weichtranklein, lindpille*, ut vijs & humorib. aptitudo & paralceve quasi quædâ addatur.

8. *Respiciunt cacochymiam sive humores vel in vasis adhuc contentos, & massæ sanguineæ confusos, vel extravasatos.* Utroque nomine faciunt officium. Uti enim certum est, in evacuatione per alvum per purgantia accidi quoque partes extremities, terofas in primis & biliosas, hinc & reliquas, ita alterando tonum sanguinis, aperiendoque *εὐγενὲς αἷμα*, omnia per spirabilia & fluxilia, præstant. Imò frequentius ipsamet debentur humoribus cum massâ sanguineâ adhuc confusis, quâdo enim jam extravasati sunt, v. g. bilis restagnans in primis vijs, pituita collecta in intestinis, ut aptiora jam sunt, ita & citra præparantia educi queunt.

9. *Constant magis humidis, aqueis, diluentibus.* Sed hæc ipsa in primis præparant magis, quippe penetrant, subigunt, & siccitatem, quæ multum remoræ sæpe addit, viarum unâ tollunt. Hinc practici eo casu potiones, decocta, infusa, misturas, usitatò præscribunt, non sine successu. Reliqua verò, salina v. g. & in minori dosi magnæ activitatis, hic quoque egent vehiculo, usque gaudent suo. Duplici enim hæc formâ maximè dari solent, vid. *Viridungus tract. 2. c. 11. p. 33.*

10. *Non solis sirupis & aquis absolvitur preparatio* In hoc communiter solent paullo largiores esse, & sirupis ceu basi quasi uti præparantib. Ast uti locum suum habent, & fermentationem humoribus inducendi virtutem possident; ita nisi leviori planè casu præstat ubi vis appropriata simul jungere.

11. *Præparantib. non semper opus est,* propriè enim competût & debentur morbis materialib. id est, humorosis, ubi materia cruda est, & digerenda seu coquenda quasi, juxta 1. aph. 22. *Cocta enim purgare oportet, non cruda.* Hinc affectib. pectoris & febrib. præcipuè debentur intermittentib. Verbo: *Præparantia magis locum habent in morbis chronicis, quàm acutis.* Hinc non conveniunt v. g. in febrib. ardentib. & malignis, non in morbis immaterialibus ita vulgò dictis, qui nempe sola alterantia requirunt, non item evacuantia. Hinc præparantia locum non habent, nec dicuntur nisi ubi evacuandum est; ast locum quoque purgantia quandoque inveniunt citra præparantia.

MODUS APPLICANDI ratione materiæ in liquidis, ratione temporis ante purgantia, ratione indicantis in morbis humoralibus.

Et hæc quasi generalia axiomata sunt: in specie verò jam breviter quoque humores ipsos delibabimus.

1. *Bilis tum excrementitia naturalis, tum præternaturalis, & partes* *ἡ βίλη* *ἡ δὲ σφοδρὰ* acres sanguinis excedentes, uno verbo *cacochymia biliosa*, quatenus caliditate peccat, *aqueis diluentib. acidiusculis*, & alijs temperatis digeritur: si *viscosior* sit, etiâ *incidētib. amaris*, ut in ictero, &c. si tenuior, acidiusculis & mucilaginosiis terreis.

Usus hæc habent in febrib. v. g. tertianarijs præparantia loco commodè dantur M. S. serum lactis caprini, anima rhabarb. Tintur. viol. ros. *Θ-lata*, arcan. *φρι*, *φ* *Θ-latus*, ut jam pluribus alibi diximus. Sic & in ictero, hepatis intemperie calidâ, &c.

II. *Pituita ut serum concretum est ita attenuantia, calefacientia, resolventia, seu fluxilem redditia, cum humectantib. requirit.* Notandum verò, ubi pituita peccat, nimis siccandum non esse, aliàs magis concrevit. Hinc præter aromatica & amaricantia acida, ut *—* *Θ-li*, egregiè quidem conveniunt phlegmati, non tamen omnis calefacientibus & humectantibus,

Locum hæc & usus habent in cachecticis, febribus quotidianis, catarrhis, paralyfi, sterilitate, &c.

III. In *cacochymia melancholicâ* tum serum deficiens humectantib. restituendum, tum blandus ejusdem vigor absorbendo humores acidos austero, calefacientibus

aromaticis restaurandus. *Acida* verò uti biliosis & pituitosis conveniunt, ita *melancholicis nocent*, sulphure enim magis obtundunt.

Atrabilarij verò humores, sive partes sulphureæ sanguinis intensiores cum salibus acidis evectæ & acrimoniâ excedentes, majori dilutione & temperatione egent, unde *nitrosa* & *abstergentia aquæ* inter alia sunt laudatissima, cumque viscera malum hoc maximè foveant depurantia sanguinem, *aperientia* & *absorbentia* in primis insigniter profunt.

Locum hæc habent v. g. in delirijs, melancholiâ hypochondriacâ, item, affectibus cutaneis, scabie, plorâ, leprâ, &c.

IV. *Serum ipsum solâ quantitate peccans* præparatione non eget. *Wedelius.*

PRÆPARATIO & PRÆPARATA.

Præparata Offinarum communiter & in specie sic dicta, nihil aliud sunt, quàm simplicia nonnulla duriuscula in tenuissimum pulverem, accedente aquâ aliquâ cordiali, redacta.

Talia sunt: Terræ, Lapides, Perlæ, Corallia, Ungulæ, Crustacea, (testacea.)

Modus.

7. Rem præparandam læviga super porphyrite, lapide versatili quam minutissimè, inter lævigandum asperge aquam aliquam cordialem, (ut plurimum Aq. rosarum adhibetur, ut fiat instar pulvis, (hanc expons loco tepido vel aëri, ut in umbra exiccetur.

N. *Quæ solidiora & duriora, adeoque minus lævigabilia sunt, ustione antegressâ calcinari friabiliaque reddi solent, ut cornua, ossa, crustacea, & simil.*

Usitatiora sunt.

Præparat. Cinnabaris. Concha, marina. Coralla alba. rubra. Cornu cervi, ustum. Cranium human. Crystalli. Granati. Hamatites. Hyacinthus. Lapis armenus. Jadaicus. Lazuli. Magnes. Mandibula Lucij piscis. Margarita. Mater perlarum. Ocul. Cunc. Ova Struthij. Pericarum, lapides. Rubinus. Saphirus. Smaragdus. Succinum. Tutia. Ungula, alcis. Schroderus.

De Præparatis, Cornu, Cervi, Alcis, Cranij, &c. ex Hadriano à MTN SICHT.

Spagyrica vel sine igne calcinatio & preparatio.

Calcinatio hæc commodè in vesicâ perficitur coctione continua, mediante aqua dulci, per cujus vaporem cornu in collo vesicæ, qua parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, jucundo & miti modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis, vires alias exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua & si inter bulliendum aqua evanescit, affundatur, alia fervida, usque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

Vires, Usus, Dosis. Cornu Cervi ita præparatum, vi sua diaphoretica Unicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper, morbo Regio, Dysentericis, Celiacis, sanguinem excreantibus, Vesicæ doloribus, vulvæ fluxione laborantibus, &c. prædest. Cornu verò Alcis ejusdem ferè efficaciæ est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, alijsque morbis quam pluribus secretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexiæ, Vertigini, &c. singulariter medetur. Dosis à *℥. β.* ad *℥. j.* & *℥. β.* in vehiculo morbum propriè respiciente.

Opii Thebaici Spagyrica & vera præparatio.

Opium Thebaicum verum minutim concisum laminæ ferreæ impone, & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosi & corrosivi halitus sursum evaporando dispareant. Ubi circumspicte cavendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus evaporatis opium super laminas relictum, odorem violarum referens invenies, id quod verum signum omnis jam depulsæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum vel acetum Vini destillato, vel succo citri extrahe, menstruoque tursus evocato, ad usum repone.

Nitri Præparatio.

Recipe Nitri per flor. Sulphuris purificat. Lib. s. solve in Spir. vini & Vitrioli ana s. q. deinde abstrahere Spiritus; donec crustam nanciscatur. pone in loco frigido; tunc infundo Nitrum in strias desiderat: aufer humiditatem & sicca crystallos concretos, & ad usum reserva.

Millepedum sive Asellorum præparatio.

Recipe Millepedum q. v. abluantur Vino Malvatico, & in vitro bene clauso massæ panis circumductæ in clibano exsiccantur; exemplis denuò affundatur tantum Vini Malvatici quantum poterit imbibere, rursusque exsiccantur, tertio repetatur; quarto aq. Nephritica nostra vitriolata imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: postea exsicca; pulverisa & ad usum reserva.

Hellebori albi præparatio.

Recipe Helleborum Album subtiliter pulverisatum, affunde aliquoties acetum à solutione Corallorum rubr. rursus abstrahitum & vitriolatam, in quo tamen prius flor. cordial. & grana chermes maduerint, iterumque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine ullâ formidine, in plurimis morbis intra corpus certa dosi & mixtura tuto exhiberi potest.

Cochlearum Testarum Præparatio.

Recipe cochl. oblongas testas, quæ propè piscinas & lacus reperiuntur, affunde acetum destillatum, stent in infusione per noctem, ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; postea pulverisa, & cum aq. Card. Benedicti in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem alias factus, nullius est pretii nec operationis in usu medico.

Silicium fluviatilium Calciniatio & Præparatio.

Silices fluviales, albicantes & nitentes, adeoque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eosdemque semper, aqua in qua Sal Armoniacum dissolutum, restingue & hos candefactionis & refectionis actus aliquoties repete; sic niveo tandem colore Silices apparebunt, & in pulverem faciliè redigentur. Pulverem hunc deinde aq. Rosacea dulcora, & farinam hanc albißimam ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Pulvis hic, non solum per se, dentifricium est efficax, quod ab omni tartaro corrosivo, aliisque sordibus dentes derepente purgat, & candidos reddit; Verum etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eademque pulchra & nitentia facit; si nempe rubigo antea colligatur & emolliatur oleo Tempkini, & tum demum hoc pulvere defricetur. Hoc modo exposita & suspensa arma, plurimos annos à rubiginis infestis & rosione pura & integra manent. Et hoc sapè tum pro magnorum Principum tum urbium etiam

celebriorum armamentariis medium est non contemnendum.

Lapidis Pumicis Præparatio.

Pumex ignitus extingatur in lacte vaccino dulciter, & quartâ vice relinquatur, quousque infrigidatur absque alia extinctione; postea pulverisetur & pro farina virginea nostra præparatus est.

Terra Vitrioli Dulcis Præparatio.

Recipe vitrioli viridis ad perfectam rubedinem calcinati q. v. pulverisa & aliquoties aq. pluviali destillata edulcora, usque dum terra rubra ab omni salsedine & acrimonia sit libera: postea terram illam dulcem seu inspidam exsicca & ad usum reserva.

Aluminis plumosi calcinatio & præparatio.

℥. Salis communis fusi partes ii.
Aluminis plumosi opt. partem i.

Misc. & ponantur in tigillo & reverberentur l. a. per 12. horas: postea reverberatam materiam exime, & aliquoties aq. calida ad salis admixti resolutionem edulcora, donec pulverem absque omni salsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Junip. affunde & ad suos usus repone.

PRASSIUM, vid. Marrubium.

PRIMULA VERIS.

Primula veris dicitur hæc herba quod primo vere floreat; Paralysis quia Paralyti morbo medendo adhibetur à peritis Medicinæ.

Note ejus generice sunt caules foliis nudi, flores è tubo oblongo in folia seu potius lacinias quinque bifidas expansi, eorumque calyces oblongi, concavi, laxi, striati; folia rugosa texturæ rarioris.

Vires. Radix hujus aquâ aut cerevisia cocta vertiginem sanat, D. Palmer. Paralyti, Vertigini & similibus nervorum affectibus utilem esse hanc herbam vel nomen arguit.

Primularum folia & flores gustu non ingrato in oleo, placentis & acetariis sumuntur, suntque admodum amica & utilia capiti & nervoso generi. Adhibentur & in Apoplexia, Paralyti & articularum doloribus. Florum succus maculas rugasque faciei, & alia cutis vitia mirifice detergit aqua florum & conserva nec minus syrupus anodina sunt & hypnotica. Infusa, decocta & extracta primularum veris cujusque generis, anodyna & hypnotica sunt benigna & innoxia, iis qui tenerioris sunt seu ætatis, seu constitutionis apprimè idonea D. Tancredus Robinson.

Decoctum radicum primulæ veris vulg. in Zythogalo aliòve idoneo vehiculo sumprum singulare est & præstantissimum remedium ad Vertiginem. D. Husle. Succus foliorum & florum expressus cum parâ quantitate lactis è vaccæ rubræ uberibus emulsi frequenter haustus cephalalgiam inveteratam perfecte curavit, cum alia medicamenta nequiquam tentata fuissent. Hujus mentionem & ad hunc effectum leniendum commendationem factam invenio in Horto sanitatis Langhami. Idem.

Acetum radicibus imprægnatum, ac loco cerhini in nares attractum odontalgiam mirabiliter sedat. Schrod.

Paralytin lateris sinistri curavit Tho. Bartholinus spiritu frumenti cui herba Paralysis incocta erat, ut ipse refert, Ephemer. German. An. 2. observ. 2. RAUIS.

PROBA-

PROBATIO METALLORUM, vid *Docima-
stice Metallica.*

PROJECTIO METALLICA, de ea vid. abun-
dè in nostra *Bibliotheca Chemica curiosa.*

PROPOLIS, vid. *Cera*, sub titulò *Apes.*

PRUNA.

Prunus Asiaticæ originis esse videtur. Nam *Prunus* Sylvestris in Asia, auctore Galeno τρέμνι vocatur. Vel à Græco τρέμνι dicitur, quæ vox occurrit apud Theophrastum si modò eadem τρέμνι καὶ κοκκυμυλέα, ut verisimile esse ostendit J. Bauhinus. Κοκκυμυλέα δὲ τὸ κοκκυγ & καὶ πύλη dici persuadet hemistichium illud Nicandri in georgic. μῆλον δὲ κοκκυγ καλέεσσι, quòd cum floret hæc arbor cuculi è latebris suis prodeant: ut errent qui à κοκκυ granum & μῆλον dictum volunt, ita enim κοκκυμυλέα malum granatum esset; quòd naturæ repugnatiadde & κοκκυμυλέαν inde dici repugnare Analogiæ, nam non κοκκυμυλέα sed κοκκομυλέα scribendum esset. *Pruna* Rhodiis & Siculis Βερίβυλα vocantur.

Pruni fructus esculentus est, sed ventriculorum malè afficit, alvumque solvit. Plinius *pruna* Stomacho utilissima esse scribit, sed brevi momento. Alii succi mediocriter boni esse aiunt, facile corrumpi & egeri. Nos quidem *pruna* si præmatura sunt & humida, in ventriculo corrumpi apta putamus, ideoque non sine periculo copiosius ingeri; verum nondum plenè matura, dum acidi & acerbi non nihil retinent, ventriculo grata esse, & sine noxa edi posse, est etiam distinguendum de prunis, nam quòd dulciora sunt eo magis medicamentosa sunt, magisque purgant, si plenè matura sumantur. Hæc autem cum maturefcere incipiunt maximè alimentosa sunt & ventriculo gratiora commodioraque. Distinguendum & de constitutionibus: qui enim frigidior sunt ventriculo statim offenduntur ab usu prunorum; qui calido non item. *Pruna* recentia saccharo condita & asservata, ut moris est apud matronas nostrates, præsertim si ex acidioribus sunt, ventriculo convenire, & ægris vel febricitantibus permitti posse sine ullo nocumento putamus.

Pruna omnia, etiam siccata, alvum solvunt, sed magis recentia ex sententia Galeni & omnium ferè Medicorum; quòd tamen experientia nostra in universum non confirmat. De plenè maturis & mollibus, succo dulci abundantibus id concedimus, non de acidis & acerbis, nec dum plenè maturis. Priora quia abundant multa humiditate, & corrumpunt tonum ventriculi & flatu gignunt: quòd & Damascena siccata faciunt, quòd quivis in se ipso facile experiri potest, si ea copiosius ingerere velit.

Damascena passa aquà decocta donec turgescant, & pulpa eorum tenera evadat modico saccharo aspersa mensis secundis inferuntur. Frigefaciunt & humectant, alvumque leniter solvunt, unde & in febribus conducunt modo parce sumantur, æstum enim febrilem leniunt, & sitim extinguunt.

E Prunis fit electuarium Diaprunum dictum, quòd ad omnes calidas & siccas febres unico facit, quippe cum humectandi & refrigerandi vi polleat.

Pruni folia, Plinio & Diosc. tonsillis, gingivis, vix profunt in vino decocta ut subinde ore colluto: in lacte decoctis cum lacte adpuerorum aphthas colluere præcipit Apollonius apud Galenum.

Ex floribus pruni Sylvestris, (quidni etiam sativæ) per iteratam infusionem, ut in rosis, fit apud nos syrup purgans, quem audaculi quidam substituant etiam syrupo rosarum solutivo simplici.

Gummi prunorum agglutinandi vim habet, & in

vino potum calculum comminuit, auctore Dioscoride, quòd nec Joann. Bauhino, nec nobis probatur. Ex aceto vèro illitum lichenas infantium sanat. Diosc.

Prunilignum vulgò operariis ad tornum, ad sclopetorum thecas, & ad cultorum manubria expetitur: idque pulchello mangonio præparare norunt, vel cum lixivio decoctum, vel cum calce viva & urina aut lixivio effuso maceratum ad elegantem tubedinem, si natura non habeat, redigere.

Vires Prunorum Sylvestrium.

Pruna Sylvestria refrigerantem & adstringentem vim obtinent. Ob immensam acerbicatem edendo non sunt, nisi vel aquà coquantur, vel igne ustulentur: nonnulla tamen gelu tacta miscuntur adeò ut edi possint. Melle condita non tantum comestationibus nocturnis proponenda sunt, sed dysentericis etiam & alvi profluvii laborantibus exhibenda: ad eadem facit decoctum & vinum ex his fructibus confectum, quòd ad Julium & Augustum usque menses diligenter adservare convenit.

Aqua à floribus destillata & data, ad laterum dolorem singulari facit experimento. Ea vero efficacior fuerit, si flores recentes per noctem vino forti & optimo macerati in M.B. destillentur. Trag.

Adversus vini penduli vitia nihil efficacius prunis Sylvestribus reperitur. *Pruna* antequam flavo tinguantur colore leguntur & in mortario tusa, pro magnitudine vasis multa aut pauca vino injiciuntur, cumque probè vino agitatione crebra commixta fuerint, obturatur vas per dies octo vel decem: tum intra paucos dies vinum restituitur. Cæterum possunt *pruna* Syl. tusa & in aëre siccato ad eos usus per totum annum conservari.

Flores cathartica vi pollent, unde ad alvum subducendam in vino macerati, aut in syrupo crebris infusionibus parato, exhibentur.

Fructus ad ea valent ad quæ adstrictione opus est. Consule si placet Matthiolum, qui totam Sylvestris pruni plantam adstringenti facultate præstare scribit, quòd cum etiam consentit Schvvenckfeldius. At flores excipere oportuit; folia, fructus, cortex refrigerant, exsiccant & adstringunt, unde usus eorum in hæmorrhagia narium, in profluvio alvi, uteri, &c. frequens.

Prunellorum succus inspissatus Acaciæ succedaneum hodie habetur qui refrigerat, siccatur, attrahit non secus ac Veterum Acacia.

Germani nobiles & ditiores vinum prunellorum parant, ex prunis Sylvestribus maturis, vel gelu fracidis in fornace coctis, & contritis in multum coniectis, aromatico sapore, quem à gravis contritis acquirit, haud ingratum, in fluxionibus & alvi profluvii ubi non admodum suspectus sit calor aut febris, probatum.

J. B.

Hujus arboris gummi quòd sponte exsudat in aceto solum & illitum herpetas sanat. Vide quæ de se ipso narrat. D. Beale, Philosoph. Transact. n. 43. RA115.

PRUNELLA HERBA.

Prunella vox originis est Germanicæ. Ita nomen dicta est hæc herba, quòd usus maximus ipsius sit in Causo Ungarico (ardore faucium ac gutturis) quem Germani Die Braune vocant spicis brevibus habitioribus cum Betonica convenit, parvitate sua & foliis circum oras æqualibus & non crenatis ab eadem differt. Quin etiam betonica infra spicam

ad aliquam distantiam unicum obtinet florum verticillum, quod in prunella non cernitur.

Vires. Prunella facultatibus cum bugula convenit. Abstergit & consolidat, usus præcipuus in vulneribus imprimis pulmonum, in sanguine coagulato, quod grumos sanguinis dissolvat non credit C. Hofmannus, qui enim hoc facere potest cum adstringat & siccat? at neque viscerum obstructions aperire, concedit, quod Dodonæus asserit ob eandem rationem.

Extrinfecus in vulneribus & creberrimè in angina aliisque affectibus oris & faucium usurpatur; ardorem eorum extinguendo, quem Germani *die Brenne* vocant, si ex illius decocto aut aqua destillata colluantur & gargarizentur; unde nomen Prunellæ adepta est. Valet & in recentibus vulneribus, & in putridis ulceribus sedis & pudendorum.

Observavi rusticum quendam prunellam & veronicam vino incoquere, eoque mictum sanguineum diuturnum persanare, qui antea curari non poterat. Solemner Consult. Med. 27.

Mirum dictu est quàm egregiè causis & heceticis febribus prunella vel cruda, vel cocta prodest, S. Paul. RAIUS.

PRUNELLA FRUCTUS, vid. *Pruna*; item *Acacia Germanica*.

PSEUDOMELANTHIUM.

Nomina. 1. *Lychnis segetum* major C. B. L. sive *Lychnoides segetum* & *nigellastrum* Park. *pseudomelanthium* Ger. J. B.

Simplici & albâ radiculâ nititur. Folia ei in caule opposita, angusta, longa, per margines æqualia, latâ basi caulem amplexa, & in acutum mucronem sensim desinentia, longis albicantibus pilis hirsuta & incana, caules teretes, hirsuti, cubitales & altiores, geniculati, inanes, in ramos aliquot divisi, in summitate gestantes flores pentapetalos petalis bifidis, purpureos, circa umbilicum saturationibus lineis striatis cum punctulis in striis nigricantibus, è calice oblongo, striato, villosa in quinque oblonga segmenta, flore altiore diviso; succedit vasculum seminale oblongum, glandis ferè figura; in quinque partes per maturitatem dehiscens semina magna, angulosa, striata, per maturitatem nigra, sapore amaro in se continens.

Inter segetes passim observatur Maio & Junio mensibus florens, hujus semen microscopio inspectum echinum in se conglobatum non male exprimit.

Vires. Quidam folii seculæres huic herbæ tribuunt, & hinc mirificè eam commendant in sanandis impetiginibus, aliisque scabiei generibus; item vulneribus glutinandis, ac fistulis curandis compescendoque sanguine utilem esse tradunt. Fuchs. quæ ut incerta in medio relinquimus.

Radicem nigellastræ in sistenda hæmorrhagia à D. Sennerto recordor commendatam fuisse discipulis suis, cujus usus est, ut Linguae subdita ægri ori aliquandiu detineatur. Hujus radicis stupendam vim expectus sui in hæmorrhagiis epidemicis per Daniæm sævientibus, adeo ut me magum aut dæmonem nonnulli suspicarentur, S. Paul. quadrip. Botan. Class. 2. pag. 93.

Nomina. 2. *Pseudomelanthium* glabrum Siculum, *lychnis* foliis glabris, calice duriore Boëconi.

Radice ei alba, lignosa, unde plantam annuam esse colligimus, caulis nunc simplex, nunc multiplex, teres, gracilis, levis, pedalis aut cu-

bitatis, ab imo statim ramosus, magis minusve pro ratione soli in quo crescit, nodulus. Folia ad nodos ex adverso bina, longa, angusta, acuminata, graminis leucanthemi foliis nonnihil similia, raris pilis hirsuta. Flores in caulis & ramulorum fastigio pediculis longis insident, ut in *pseudomelanthio*, pentapetali, pallide purpurei, *pseudomelanthii* dicti similes, circa umbilicum vel ut calycem quandam habentes è foliolis seu petalorum appendicibus quinque, surrectis, bifidis compositum, ut in *lychnide coronaria*, calix floris striatus seu cannulatus *pseudomelanthii* instar. Succedit pericarpium oblongum, semine minuto fusco præguans.

In lateribus montium Messanæ imminentiū, inque agris ad promontoriolum *Punto cerciolo* dictum non longe à Puzallu observamus.

Huic eadem nobis videtur.

Lychnis segetum, *nigellastrum* minus glabrum dicta flore eleganter rubello. Moris. Hist.

Nomina. 3. *Lychnis segetum* rubra foliis perfoliata C. B. Lych. Seg. *vaccaria rubra* dicta Park. *vaccaria* J. B. Ger.

Caule surgit singulari, cubitali & altiore, lævi, terete, concavo, glauco quodam polline, qui facilè detergi potest, obducto: qui ab imo statim ramos emittit alternos, circa fastigium in oppositos divaricatur, atque hi in alios, situ semper contrario folia ad caulis genicula bina ex adverso nascuntur, ex glauco pallentia, oblonga, acuminata, lata basi absque pediculis alis suis ita caulem amplectentia, ut ab eodem transadigi videantur. Ex ipsis divaricationum angulis exeunt pediculi prælongi flores sustinentes, qui extremis etiam ramis insident parvi, dilute rubentes, quinque foliolis bifidis compositi, paulum è calice prominentes, qui canaliculatis, glaber, pentagonus angulis viridibus, cæteroqui pallet. Pericarpium eodem obvolvitur turbinatum, semine plenum rotundo, nigro Sinapeos majore. Radix lignosa, candida, recta, fibras è latere spargit.

Junio & Julio florēt, & brevi semen perficit, quo perfectio radicitus exarescit.

Ob coloris, ut puto, similitudinem *Isatidis* species à nonnullis censetur, nam ad tingendum omnino inutilis est. *Vaccaria* dicta est quòd vaccæ eam libenter depascantur. RAIUS.

PSYLLIUM.

Psyllium à figura seminum pulices referentium, magnitudine etiam parium dicta est.

Nomina. *Psyllium* vulgare Park. majus erectum C. B. J. B. *Psyllium* sive pulicaris herba Ger.

Radice alitur simplici, alba, fibris tenuibus capillata. Caulis ab eadem radice exoritur nunc simplex, nunc multiplex, teres, hirsutus, erectus, solidus, ab imo ad summum usque ramosus, pedalis aut altior, foliis vestitus ad intervalla ex adverso binis, angustis, acutis, pilosis, hyssopi aut Draconis herba foliis figurâ suâ non multum dissimilibus, verum angustioribus, nervosis & plantagineis, obiter nonnunquam dentatis. Summi caules & ramuli ad tactum pingues & viscidi sunt. E foliorum alis pediculi exeunt oblongi, tennes, spicas gestantes breves è pluribus flosculis compositas. Flosculi autem in quatuor segmenta acuta totidem folia simulantia divisi, colore pallido; stamina oblonga, apicibus suis insignia ut in plantagine, exserunt. Flosculi cujusque tubus turgescens in vasculum seminale degenerat, semina intus bina, compressa, splendentia, pulici formia, unde herbæ nomen continens, quod per maturitatem in medio horizontaliter rumpitur.

Sapo

Sapor Plantæ amarus; odor nullus manifestus.

Circa Mospelium in agris copiose provenit.

Vires. Evacuat bilem flavam, mucilaginéque sua acrimoniam humorum obtundere aptum est. Hinc commendatur maximopere in dysenteria & corrosione intestinorum.

Semen psyllii hoc peculiare præ cæteris purgantibus habet, quod qualitate refrigerandi sit prædictum.

Verum enim verò non tamen extra reprehensionem positum est, quam incurrit ratione virulentia suæ. Schrod.

Dubitatur C. Hofmannus an sit venenatum necne: interim inquit valde me movent Ægyptii, de quibus scribit Alpinus 4. Medic. 1. uti illos psyllio in febribus ardentibus.

Nimius usus stomachum offendit & animi deliquium inducit, unâ cum mortis periculo.

Ad ophthalmiæ dolorem, ℥. mucilag. sem. psyllii & cydoniorum in aq. ros. & plantag. factæ ana ℥i album. ovi bene conquantur. tantundem camphoræ gr. v. mista in oculos instillantur à causa calidâ affectos Chesneau. Ex collectaneis D. Hulse.

Experientiâ scio in excoriatione palati vel uvulæ & Linguae ex materiâ calida adusta Aq. portulacæ vel psyllii conferre. Ex psyllii tamen semine præstaret fortassis lentum illud & viscidum humorem elicere mucilaginem officinis dictam. Excerptis ex observationibus Marcelli Cumani ab Hieron. Velschio editis, & ad me transmisit D. Barnhamus Soame.

Dolores Capitis maximos ex causa calidâ subortos, quos alia remedia non mitigabant, felici successu curabat Sebastianus medicus Argentinenſis applicito fronti epithemate ex sem. psyllii cum aq. rosarum infus. Extractâ mucilagine & pauculo aceto mixta. Idem D. Soame ex observ. Hieron. Reusneri. R A I U S.

PSILOTRA.

Rationis in præxi sunt usus *Psilothra* seu *Depilatoria*, unde ferè magis eam ob causam cognoscere eadem utile est, ut ab iis cavere, vel læsionem eorum avertere & curare queamus, quam ut in usum vocentur. Solent tamen quandoque consuli medici, ut pillos extirpent, licet ut plurimum successus non sequatur constans. Hoc casu usitatissimum est simplex psilothrum ex calce vivâ & auripigmento, vel unguentum de calce vivâ *Mysicthi*, quod apud ipsum videri potest.

Turcæ suum habent *rufma*, nonnullis, ut *Schweiggero*, quasi *χελόμα* unguentum dictum corrupte, quo se in balneis depilant. Hoc licet sint qui mineralis speciem peculiarem esse velint, scorix ferri perquam similem, vel vitrioli de profapia, vix tamen differre à recepto & noto hoc jam dicto remedio fidem facit *αὐτόπλης* testis *Troilo itinerarii Orientalis* pag. 630. vocans unguentum aurei coloris, (qui auripigmenti est) quod cum calce vivâ confiat, quo pudendas inungant partes, ut depiles, quas volunt, reddant, simul ac desuper sudare incipiant. Nihilominus tamen iterum succrescunt pili abradi, ceu latius id deduci posset.

Sunt verò & hæc ipsa caustica; attamen mitiora, quæ & poros cutis circumfodiunt quasi & destruant, viscidum pilorum nutrimentum fundunt, liquant, suffragantur. Experimentum D. Fausti memoratur, inuncto felle *anguilla* pilorum proventum inhiberi, sed, licet & radicetenus extrahantur pili, difficile fuerit, constans & infallibile, ac in omnibus succedens reperire, quale quidem *Helmontius* sibi notum fuisse scribit, liquorem scilicet, quo leniter tracta manus, &

exsiccat, si mentum viri attingeret, paulò post exciperet pilos barbæ, superciliorum, ac totius capitis l. *Bastier inscripto*. Pertinent ad cosmetica. W E D E L I V S.

Medicamentorum Depilantium aliquot formulae ex VVEICKAR DO.

℥. Calcis vivæ ℥i. auripigmenti ℥i. B. nir. 3℥i. rad. pyrethri, staphisagriae, piperis ana 3℥i. Pulveris sentur singula seorsim, postea cum lixivio forti redigantur in formam linimenti, vel additò sapore nigri incorporentur. Hujus portio si affricetur locis pilosis in balneo ad fornacem, radicitus pilos extirpat; postea pars depilata unguento rosato inungenda.

Aliud *ψιλωθρον*, vel unguentum pilos ex quacunque corporis parte evellens.

℥. Album. ovor. conquantur. Num. iii℥i. calce. vivæ 3℥i. auripigmenti 3℥i. Hisce pulverisatis atque permixtis affunde lixivii fortissimi tantum ut pulvis crassioris formam accipiant. Hanc mixturâ penna vel digito exceptâ pars cutis pilosa foris ex aquâ calidâ premisso inungatur, post quadrantis horæ spatium abluitur aquâ tepidâ; quod si primâ vice non decidant, iterum circa fornacem illinatur, & absque dubio pili defluunt, & licet dolor aliquis inde suboriat, & rubedo, tamen non diu durat.

Aliud remedium Venetis Matronis consuetum quod pilos evellunt.

℥. Resina laricea vulgaris cochlearia quatuor vel circiter, mastiches subtiliss. tria instar. avellana. Dissolvantur ad ignem & parum coquantur continuò agitando; postea effunde in lebetem aquâ frigidissimâ, deinde manibus malaxentur, fiantque magdaleones rotundi & servantur ad usum. Hujus partiumcula supra alutam ducta cuti pilosæ applicetur, & quando adhæserit emplastrum iterum detrahatur, pilus dropace evulsi manebunt.

Hujus generis est *ἡ ἀμπελολεώνη*, hoc est vitis alba, quæ ideo à quibusdam peculiari nomine *ψιλωθρον* vocata fuit, autore Discoride & Pliniò.

PTARMICA MEDICAMENTA, vid. *Erythrina*.

PTARMICA HERBA.

Ptarmica ex re nomen habet, quoniam *Πτερυγία*, id est, Sternutamenta provocat.

Nota ejus sunt flores in umbella, barbulis discoloribus; folia integra, ad margines dumtaxat serrata.

Nomina. Ger. vulgaris *Park*, vulgaris, folio longo serrato, flore albo. J. B. Dracunculus serrato folio pratensis C. B.

J. B.

Est ubi tres superet cubitos, sæpius minor, cubitalis, radice oblique acta, & velut geniculata, subris majusculis & longissimis donata, sapore acri & fervido: caule singulari, tereti, glabro, fistuloso, gracili, satis tamen rigido; cui alterno aut potius nullo ordine posita adnascuntur folia, ab imò ad summum Draconis esculenti, argutis asperiusculisque denticulis circumquaque serrata, atro virore splendens, sapore fervido, pyrethri mitiore. Summus scapus nonnihil angulosus & subhirsutus in furculos aliquot dividitur, qui umbellatim flores gestant candidos (tam discum medium, quam petala eum undique radiatim cingentia) millefolii terrestris, duplo aut triplo majores, odore non dissimili, sed remissiores, discus floris medius à plurimis flosculis arcte stipatis & in quatuor segmenta acuta divisus componitur.

In pratis udis & palustribus Julio mense floret.

Florum calices in hac planta quam millefolii breviores à pluribus squamis coagmentantur. Flores ut multi majores

maiores quam millefolii ita minus crebri & conferti in summis caulibus longioribus pediculis insident, nec adeo exactè simul umbellam efformant. Variat interdum flore pleno seu multiplici, hinc Dracunculus prætenis flore pleno C. B. & aliorum.

Vires. Gustu est acri & fervido, sicæ Pulvis naribus indutus, sternutamenta movet, unde ei nomen.

Radix commansa caput purgat & dentium dolores mulcet pituitam eliciendo. Herba cruda additur acetariis ad frigiditatem eorum temperandam & corrigendam. *Rajus.*

PTISANA.

Quod ab antiquis vocabatur *Pisana*, erat cibus ex hordeo perfectè cocto: apud recentiores *pisana* dicitur illud, quo in morbis utimur pro potu ordinario.

Componitur ex variis secundum intentionem Medici, vulgè non præscribitur Pharmacopœis, sed ægro ministrantibus.

Usus multi sunt.

Primo, Ad refrigerandum, & humectandum in febrientibus biliosis, sanguineis, rufficulosis.

℞. Hordei integ. M. ℞. aquæ fontis ℞. vj. aqua fervefacta abjiciatur, nova addatur & fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem, utatur pro potu ordinario.

Vel

Utatur hydrosaccharo pro potu ordinatio.

Componitur ex duodecim aquæ partibus & duabus sacchari, ut si sit ℞. j. aquæ, debent esse sacchari ℞. ij. plus minus pro ægri voluntate, & morbi exigentia, sæpè à vase in vas debet transfundi. Prodest in febribus ardentibus, tertianis, synochis, cholera morbo, cæterisque putredine comitatis in quibus æstus admodum urget, si succus limonum recenter expressus immisceatur ad gratam aciditatem, & sic fiet potus, qui vulgè dicitur *Limonade*; bilem præcipitat, ipsius coërcet motum, & temperat æstum.

Secundo, Ad refrigerandum & apertendum in calidis affectibus, in quibus adsunt obstructiones.

℞. Hord. integ. M. ℞. parum coque & aquam projice, deinde adde radic. graminis præparati & contriti ℞. j. ℞. aquæ fontis ℞. vij. Fiat decoctio ad tertiæ, partis consumptionem, colatura utatur pro potu.

Addi potest in singula dosi, æstu & siti urgente, sal prunellæ ad ℞. ℞. vel ℞. j. & ubi adest putredo aut malignitas, possunt etiam cum sale prunellæ immisceri iv. aut v. guttæ spiritus sulphuris, & ad majus refrigerium addi syrupus aliquis intentioni aptus, ut syrupus limon. capill. ven. violatus, maxime si adsit æstus pulmonum, ruffis, in quo casu prædicta acida minus competunt, quia ruffim irritant.

In febribus verminosis puerorum cæterisque acutis, aut malignis.

℞. Hord. integ. p. ij. rad. acetosæ & gram. an ℞. j. aquæ fontis ℞. vij. Fiat decoctio, colatura ponatur in phiala vitrea, in qua aliquot frusta acidi limonum misceantur.

Æstivo tempore, & autumnali convenienter nive aut glacie *pisana* refrigeratur in omnibus affectibus calidis, etiam si adsit alvi fluxus à bile. Cave tamen ne obstructiones & infarctus insignes adsint, aut aliqua inflammatio interna hepatis, lienis, mesenterii, pleuræ, pulmonum, uteritunc enim potus glacie refrigeratus est toxico peior; quia magis impingit

materiam, & resolutioni ineptam reddit, unde vè-
rius.

In tertianis, quattanis, continuis, intermittentibus, cæterisque morbis exacerbationes habentibus.

℞. Kinæ Kinæ crasso modo tritæ ℞. ij. summit. centatur. minor. p. j. aquæ fontis ℞. ij. infunde repidè per vi. horas, sæpè agitando vas colaturâ utatur pro potu ordinario.

In quattana & cæteris morbis melancholicis.

℞. Radic. brusci ℞. j. folior. ceterach. M. ℞. Fiat decoctio cum aquâ ℞. vi. Colatura utatur per se vel cum vino tenui, si non repugnet febris.

In affectibus calidis pectoris, paratur ex hordeo integro, passul. mund. jujubis, & aliquot frustis pomæ redol.

Tertio, Ad exsicccandum in morbis frigidis & humidis cerebri, nervorum & similibus.

℞. Radic. schinæ in taleolas sectæ, vel salsaparillæ minutim sectæ ℞. j. aquæ fontis ℞. vi. Infunde repidè per duodecim horas, deinde f. decoctio ad tertiæ partis consumptionem, colaturâ utatur pro potu ordinario.

Quarto, Ad astringendum in dysenteria vel alvi fluxu à causa calida.

℞. Rasuræ eboris & cornu cervi an. ℞. ℞. aquæ fontis ℞. vi. Fiat decoct.

Vel

℞. Rosar. rubr. sicæ ℞. j. aquæ tepidæ ℞. ij. spiritus vitrioli ℞. j. Infunde repidè per sex horas, colaturâ per se utatur, vel addendo sacchari albi ℞. iv. Hoc modo paratâ *Pisana* dicitur tinctura rosarum.

Dissolvi potest in qualibet dosi exhibenda, aliqua quantitas syrupi cydonior. vel granatorum, vel parum conservæ rosar. Genuensium, vel sequentis julepi Alexandrini.

℞. Aquæ rosar. ℞. x. sacchari albi ℞. ij. Coquantur parum, & utatur per se ex cochleari, vel cum aquâ pro potu ordinario.

Vel

℞. Aquæ rosar. succi cydonior. & granat. an ℞. iv. sacchari albi ℞. ij. Coquantur parum ad eundem usum.

Quando adest febris, putredo, & alvi fluxus, ad leniendam ruffim, nauseam, bilis fervorem.

℞. Aquæ rosar. succi granat. & limon. recenter expressi, an. ℞. vi. sacchari albi ℞. ij. Coque parum & eodem modo utere.

Valent prædicta in mensium, & hæmorrhoidum fluxu, hæmoptysi, &c. sequens etiam pro iisdem affectibus decoctum utile est.

℞. Radic. consolidæ maj. ℞. j. ℞. aquæ fontis ℞. ij. Fiat decoctio, colaturâ utatur pro potu ordinario.

Vel

℞. Rasuræ eboris ℞. j. aquæ fontis ℞. ij. Coquantur pauco tempore, colaturâ utatur per se, vel cum succis prædictis, aut cum julepo Alexandrino.

Paratur *pisana* ex sola infusione millefolii & pimpin. estate frigide, hyeme repidè, per 4. horas

Quinto, Ad refrigerandum, apertendum, & aliquatenus nutriendum, cum delinienda est humorum acrimonia, obstructiones referendæ, ulterior macies impedienda, ut in febribus biliosis, lentisque, tabe, gracilibus, quoque, & abhorrentibus juscula.

℞. Hordei integ. M. j. rad. gram. ℞. ij. Fiat decoctio cum pullo gallin in ℞. vi. aquæ fontis ad medias, de colatur. capiat cyathum bis terque diu no-
ctuaque. *Tencke.*

Ggg

PVGIL-

PUGILLVS, vid. sub titulo *Mensura*.

P U L E G I U M.

Pulegium ita dictum creditur, quod ejus flos recens incensus pulices necet odore: Βλήχων Græcis quasi balans herba, quia gustatum à pecore cum floret, acri sapore balatum iis extorquet. Parvitate sua, florum densis verticillis, sapore & odore acriore à mentha differt.

Vires. Pulegium, cum revera menthæ species sit; iisdem etiam viribus quibus & mentha pollere verisimile est. Acrius tamen menthæ est, & proinde efficacius, partium tenuium. Usus præcip. in mensibus ciendis, fluore albo, foetu ejiciendo; Confert hepaticis ac pulmoniacis nauseam & tormina ventris discutit, calculum & urinam pellit, ictero ac hydropi medetur: extrinsecus prodest Capiti, somnum arceat, vertiginem discutit, doloribus arthriticis convenit, dentes abstergit, pruritus cutis curat. Schrod.

Succus hujus herbæ cochlearis unius mensura pueris exhibitus efficacissimum est remedium ad tussim illam clamorantem seu convulsivam quibusdam catarrhum ferinum dictam, quæ teneram ætatem plurimum infestare solet.

Hujus notitiam D. Boyle acceptam refero, qui ad profligandum hoc Syptomata inter alia medicamenta primas ei tribuit. nec immerito, ut experientia nobis compertum est. D. Hulse. Nostrates botulis cruore distentis pulegium concisum immiscere & incoquere solent; unde & vocant.

Ad raucedinem, R. decoct. pulegii dulcorat. Zvi. iturus cubitum, & Sanaberis. Chesneau ex libro Arcanorum. Ex annotatis D. Hulse.

Recens sacculis inclusum, & in lecto positum pulices efficaciter abigit: sed intra spatium septimanæ sacculi sunt renovandi. D. Palmer nobis communicavit. *Rajus*.

PVLICARIA, vid. *Psyllum*.

PVLMO VULPIS, vid. *Vulpes*.

P U L M O N A R I A.

Nomina I. Pulmonaria maculosa *Ger.* latifolia maculosa *Parck.* pulm. Italarum ad buglossum accedens *I. B.* symphytum maculosum sive pulmonaria latifolia. *C. B.*

Radice nititur albâ, fibrosa hellebori, sed fibris rarioribus & quibusdam crassioribus, gustu admodum lento & viscido caulis angulosus, purpurascens, hirsutus, unus interdum surrectus, reliquis primum germinantibus, aliàs plures ut in buglosso. Folia alia statim à radice exorta, conferta, per terram sparsa alia, caulem inæquali situ sine pediculo amplectentia, oblonga, unciam lata; nervo medio per longum donata; in acuminatum mucronem desinentia, lanugine supra infraque & in ambitu molli pubescentia; ac adulto vere folia insignem acquirunt magnitudinem, præsertim infima, quippe quæ latitudine palmum superent, longitudine sesquipalmum teneraque illa lanugine rigescente hispida redduntur summitati caulis (qui brevis est, dodrantali altitudine) insident flosculi ex pediculis semuncialibus & brevioribus multi simul juncti, interdum reflexi caudam Scorpionis æmulantes, ut Echii, & calicibus oblongis, striatis, hirsutis, colore modò purpurante, modò violaceo, aliàs mixto purpuro violaceo, idque in uno eodemque

ramo, in quinque lacinias divisi: in calicis fundo succedunt semina quaternaria buglosii seminibus similia.

Foliis variat (inquit C. Bauhinus) quæ aliquando albis punctis & lituris notantur, aliquando iis carent, & hæc pulmonaria folio non maculoso *Clus.* hanc *Clusius* pro diversa specie describit, à præcedente tamen præcipuè differt foliis minus amplis, nullis albificantibus maculis superne infectis: reliquæ enim notæ conveniunt.

Floribus est communiter ceruleo-rubentibus, rarius albis, pulmonariæ speciem flore albo aliquot annos in horto alui, quæ omnibus suis partibus, sed præcipuè foliis, majoribus erat quam descripta, & maculis pluribus majoribusque notatis

In Sylvis propè Coloniam Agrippinam hanc primò observavimus, postea in omnibus ferè montosis dumetis propè Rhenum & circa Genevam.

Vires. Nostratibus pro oleris in frequenti usu est. Salviam Hierosolymitanam ac Bethlehemiticam appellant. Pneumonica & cardiaca censetur; consolidat & glutinat, symphiti instat.

Usus ejus præcipuus est in ulceribus pulmonum, aliisque eorundem affectibus, phthisi, expuitione sanguinis, &c. extrinsecus in vulneribus.

Nomina 2. Pulmonaria angustifolia 2. *Classi Ger.* (potius 3.) angustifolia Cæruleo flore *I. B.* Symphytum maculosum sive pulmonaria angustifolia cærulea *C. B.*

Clus. huic folia sunt angusta & villis obsita, buglosii sylvestris, Echii, aut Anchusæ foliis non absimilia, molliora tamen, neque tam aspero villis hirsuta, nullo pediculo prædita, sed medium caulem amplectentia, qui paulatim lucescens angulosus & hispidus, interdum nonnihil purpurascens, in pedalem tandem altitudinem excrevit, in cujus fastigio multi pentagoni caliculi, in quinque purpurascens lacinias divisi, & subhirsuti nascuntur, continentes oblongos, concavos flores buglosii hortensis aut pulmonariæ vulgaris floribus forma similes, per ora in quinque orbiculares ferè lacinias divisi, colore antequam aperiatur ex purpura rubente, deinde quando explicati sunt, cæruleo adedè eleganti nitent, ut gentianellæ vernæ floris venustatem si non superent, attamen proximè æmulari videantur, odore autem nullo grati: ii maturi decidunt integri, quemadmodum buglosii hortensis & similibus flores, atque caliculum inanem cum stylo & quatuor seminum rudimento relinquunt, quod maturitate nigrum evadit, Echii aut buglosii vulgaris semini respondens. Adnascuntur deinde secundum caulis pedem alia hirsuta folia, angusta, palmaris aut amplioris longitudinis Echii aut Anchusæ foliis latiora mollioraque: inter quæ (si cet sicca sint) subsequente vere prodit caulis, suis venustis floribus onustus. Radix crassis carnosisque fibris prædita est, ut pulmonaria maculoso folio, interio, candicantibus, deinde vetustate foris nigricantibus, dulci sapore.

Nascitur passim per Pannoniam & Austriam interioriorem in montanis & cædis sylvis, & diutissime floret. Exilit primo vere, florumque congestorum thyrsum ferè ante folia promittit.

P U L M O N A R I A L U T E A.

I. B. Huic radix geniculata, rubra, fibraq, læmanans sapore amarum: à qua caulis surgit unicus (inter duo tresve) lacte similiter prægnans, unico plurimum folio circa mediam altitudinem donatus, cubitalis, tenuis, hirsutus, summa parte in aliquot surculos divisus, quorum extremis flores insident lutei

Iunci Hieracii, qui in pappos maridi facessunt. Folia à radice statim exoriuntur, sinuosa inæqualiter, præcipuè versus pediculum, superne virentia & hirsuta interne densiorè lanugine canescentia, maculis pulchris interdum notata, sapore amaro & nitroso, pediculis subrubentibus, villosis, longis quibusdam, aliis brevioribus. Semina parva nigra.

Nascitur plerunque in Sylvis, muris antiquis & aggeribus umbrosis, floret Junio & Julio *Rajus*.

Morbis pulmonum medetur vi sua vulneraria & consolidante.

PVLMONARIA MEDICAMENTA, vid.
Pectoralia &c.

PULPA.

Est caro seu substantia fructuum succulentorum inter corticem ac nucleum comprehensa, v.g. pomorum cerasorum & similium. Primariò autem significat partem carnosam in corpore animalis. Inter Pulpas in Medicina usuales exemplo sint sequentes.

Pulpa Cassiæ simplex ex *Pharmac. Augst.*

℞. Cannas, seu siliquas cassiæ ponderosas, & quæ concussæ non resonant; aperiri & contentam in eis pulpam, seu medullam cum laminis & seminibus diligenter excava: exenta projice super inversum & angustum cribrum ex setis equinis contextum & paulatim aqua calida irrota, aversòque cochlearis convexo medullam cassiæ hinc inde ducto, ut per cribrum paulatim excernatur. Præstiterit tamen ubi necessitas postulat recentes semper cassiæ flores educere, cum diutius repositi protinus acescant.

Calfacit & humectat primò ordine, sanguinem depurat, ejus acrimoniam temperat, ac sitim coercet; ventriculum, bilem & pituitam educendo, mundificat, pectus & guttur lenit, ejus abscessus resolvens: renum calori cum infuso glycyrrh. confert & calculi generationem prohibet, ac in acutis febribus exhibetur: alvum enim blandè lenit, ac flavam bilem infernè deturbat, atque ex hac natas febres mitigat.

Pulpa Cassiæ composita, seu Cassiæ extracta ex eadem *Pharmac.*

℞. Violariæ, malv. mercur. betæ, parietar. flor. violar. an. m. j. F. omnium decoctio in aq. suff. quo decocto cassiæ extrahatur & caudæ ejus laventur: Deinde ℞. Pulpa cassiæ cum hac decoctione extracta & ad spissitudinem coctæ ℥ij. sacchari Thomæi ℥iij. Coque ad perfectionem, ut est artis.

Hujus usus est potissimum in enematis, non ratò tamen in bolo quoque exhibetur, cum ipso cassiæ flore minùs sit flatulenta, ac magis etholliat & humectet.

Pulpa Prunorum ex eadem *Pharm.*

℞. Prunorum magnorum vinosorum, id est Damascenorum, sive Hungaricorum recentium q.v. & exentis nucleis in fistili vitreato magno percoquito: deinde per cribrum setaceum trajicito; expressam pulpam denuò lento igne ad perfectam & justam spissitudinem coquito, addendo sacchari tertiam circiter partem, vel ad pulpam ℥x. sacch. ℥iij. ita enim melius conservatur; ne si suum corrumpatur.

Ventrem mollit, ac alvum faciliat, calorem febrilem extinguit, sitisque fastidia permulcet.

Cum hac pulpa ferè convenit *Electuarium de Prunis simplex*, ita olim à nobis dictum nisi quod ad pulpæ ℥ij. saccharum in majori quantitate nempe integra ejus libra fuerit adhibita.

Pulpa Tamarindorum ex eadem *Pharm.*

Extrahitur eodem modo quo Pulpa Cassiæ.

Tamarindorum Pulpa refrigerat & liccat ordine se-
Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

cundo, bilem faciliè solvit, ac valdè adustos humores lenit; unde aruaris, lienosis, scabiem, lepram, vitiligines & lichenas patientibus commodè exhibetur; namque cutaneas exulcerationes omnes à sanguinis adustione natas tollit, insaniam insuper ac furorè permulcere creditur.

PULSATILLA.

Pulsatilla nominatur, quod seminum tremuli pappi lenissimo flatu huc atque illuc agitentur, unde & herba venti.

Nomen *Pulsatilla* Italicum est, siquidem inibi ita vulgò dicitur hæc herba.

Est autem *pulsatilla* nihil aliud quam *Anemone* seminibus, cinnatis seu plumula caudatis.

Vires. Ab Empiricis id comparatum habet *Butyroselinus*, quod *pulsatilla* vulneraria sit herba, quod per alembicum destillata aquam vulneribus mundificandis curandisque præstet utilissimam. Quæ & putridam carnem erodat. Cum autem gustu sit acerrimo magis externis quam internis partibus corporis adhiberi debet ut rectè *Tragus*.

Matthiolus radicem subdulcem esse ait, unde non longè abest à temperato, sunt qui eam maxime præferant contra pestilentia contagia & pota venena & virulentorum animalium ictus, si cum vino bibatur drachmarum duarum pondere, quare in antidotis additur. *Tragus* radicem siccata sternutamenta ciere: crudam verò mansu pituitam elicere scribit, quæ attingunt eam procul abesse à temperie. *Rajus*.

PVLVERISARE, & PVLVERISATIO
vid. sub titulo *Comminutio*.

PVLVIS.

Non immeritò *PVLVERES* omnium aliarum formularum quasi basis statuuntur, adeò latè patent, & ex hoc elemento velut simplici innumeræ hinc fieri queunt compositiones.

Ut enim id præmittamus, pulveres vel *primariè intentione*, seu sui ipsius gratiâ præscribuntur, vel *secundariè*, in morculis rotulis, emulsionibus, bolis, potionibus, &c. unde si quis pulverum theoriam & notionem benè calleat, faciliè hinc in omnibus aliis procedere poterit.

Dicitur pulvis communi acceptione, ab analogiâ aliorum pulverum ubivis occurrentium, à comminuendo & contundendo: & definiri potest, quod sit.

Medicamentum siccum ex aliquot homogeneis, in plures minutas particulas redactis, pro eodem usu, alterandi vel purgandi artificiosè mixtum.

Medicamentum est, latè suâ acceptione, seu pro interno seu externo usu præparatum, ut mox dicemus.

Aggregatum verò est ex pluribus, unde, licet cornu cerviustum, corallia & alia pulverisata revelà quodque sint pulveres, attramen illa in officinis ferè alio nomine veniunt, farinæ v.g. & inprimis præparatorum.

Ex *homogeneis* aliquot constare debet pulvis, unde patet, propriè hoc sensu audire & strictius pulveres compositos dispensandos. Utut enim, hodiernâ præsertim praxi, etiam præparata & pulverisata, inprimis selectiora, possint suâ quælibet dosi erogari & propinari sub formâ hæc pulveris, quod etiam omninò liberum est medico; nihilominus tamen, cum id per se quasi pateat, hoc loco saltem de compositis sermo est.

Homogenea hæc in eundem collimant usum, suntque duplicis generis, vel mole & κατ' ὄγκον talia, vel δύναμις & virtute; unde huc & contingentia, & liquida immisceri solita referri debent.

Ggg 2 Ut

Vt verò melius pulverum generalis notio pateat, operæ pretium erit, horum differentias spectare, essentielles quasi. Sunt enim pulveres.

1. Vel *diffusi*, vel *concentrati*. *Diffusorum*, seu majoris molis & in numero ingredientium, & quantitate ipsâ, præter alios, (nam de iis sub materiali quoque dicendum) inprimis duæ quasi species notandæ veniunt, v. g. (α) *Species officinales* scilicet, seu pulveres officinales compositi, ut species diaireos, diatragacanthæ, diamargariton frigidæ, cordiales temperatæ &c. id etiam ita ulu obtinuit, ut hæc commixta species dicantur per synecdochen, quod ex singularibus constent pluribus, uti etiam de infusis constat, materiam infundendam ita dici, S. Species in Bier. (β) *tragemata*, vulgò trageæ dicta, seu bellaria, quod nomen prædicatur de pulveribus aromaticis, diffusis, gratis & confortantibus, quorum usus potissimum & solus quasi est, in affectibus frigidis, Germanicè *Triseneth*, ut tragea stomachalis Birckmanni, trageæ cephalicæ, &c. Illæ ergo species sunt officinales, seu in officinis jam extantes præparatæ; hæ trageæ sunt magistrales magis, in præsentem usum ferè præscribendæ, paucis exceptis.

Diffusiores vero pulveres sunt, tum in se, tum accessione sacchari, quod paulò post magis libabimus, unde & trageæ vel cum, vel sine saccharo præscribuntur;

Concentrati verò his contrarium obtinent statum, minori numero, minori mole conspicui, seu, ut aliter hanc distinctionem efferamus, pulveres alii sunt *Galenici*, alii *chimici*, alii denique *medici*, ex his mixti

2. *Pulveres sunt vel grossiores, vel subtiliores*. Illi multum cum diffusis conveniunt, & coincidunt, unde & trageæ grossæ in usu sunt. Dicuntur verò ita à trituræ ipsius modulo, prout magis vel minus lavigati sunt. Inprimis verò grossiores eliguntur pro affectibus ventriculi, & ubi masticari pulveres simul magis volumus, unde huc pertinent pulveres peptici dicti, est, qui post pastum, roborandi ventriculi, gratia & exhalationes flatulentas præcavendi, præscribuntur ex coriandro, semine anisi, fœniculi, cubebis, pane biscocto, &c. ubi confecta sæpè integra & non contusa simul recipiuntur. Sic etiam id locum habet ad inhibendam acrimoniam & mitius operandum uti pulveres ethini paulò grossiori forma usurpari consueverunt.

Subtiliores verò non tam à mole vel pondere dicuntur, sunt enim & subtilissimi sæpè & levissimi iidem pulveres, ut antheræ, sed ab impalpabili ferè atomorum texturâ & substantiæ modo, ut eo præsentius operentur, id quod de pulveribus purgantibus maximè valet, quicquid etiam nonnulli de colocynthide velint, neque enim colocynthiaca in pulvere propinare fas fuerit. Et talia etiam sunt medicamenta sicca oculis inspergi solita, unde solet addi: Misce F. l. a. pulvis subtilissimus, ut alcohol, id est pulvis impalpabilis.

3. Pulveres alii sunt *externi*, alii *interni*, ab applicandi loco dicti. Et iis quidem jam dicta differentia prima & secunda comperit quoque. *Externi* latius non minus patent, sive *inspersione*, ut in oculos; sive *adspersione*, quos *adspersiones*, Latini, *ἀσπersionες*, *κατασπersionες* & *ἀσπασμα* Græci vocant, v. g. in intertrigine, ulceribus exsiccandis, absumendis & crescentiis, qui *cathartici* audiunt, erisipelate, ut pulvis erysipelatodes Mynsichti; sive *atrabantur*, ut psalmici; sive *affricentur*, ut pulveres dentifricii; sive *immittantur*, ut vulneribus vasorum, v. g. pulveres ischæmi &c.

Notabile hoc loco est vocabulum Arabicum *Sief*, quod trochiscos ophthalmicos officinarum pro collyriis pulverandos notat.

Interni hinc iterum varii, quibus recensendis jam hic non diutius immorabimur.

Quod ergò Materiam pulverum concernit, latissimè illa patet, quippe ex omnibus pulverisari aptis eisdem parare licet, unde ministræ quasi pulverum operationes

sunt, *confusio* & *cribellatio*, materiâ ex singulis regniis & eorum classibus ubertimè suppetente. Parantur enim pulveres vel.

1. Ex ipsis *simplicibus crudioribus*, radicibus, foliis, floribus ex omni vegetabilium genere, quibus pro externo usu sæpenumero & mineralia, e. g. pompholix, cerussa, &c. admiscuntur, ubi vis recipiendo homogenea, & hinc contusa cribellando, ponderando & miscendo in pulverem intentioni aptum, id quod difficile non erit callenti vires & facultates materiae medicæ.

Vel 2. ex *preparatis*, in primis selectioribus, tum purgantibus, tum alterantibus, ex vegetabili, animali & minerali classe petitis, quod plurima pertinent. & in tabulis nostris quasi in synopsi recensita, & aliunde petenda.

Vel 3. quos pulveres chimicis in primis ministrant, ex *salibus*, forma crystallina sicca conspicuis, & pulverisari facillimè aptis.

Vel 4. ex *crocis*, *floribus*, & *magisteriis*, quorum singula suum habent usum & per se exhiberi prompti, & misceri.

Uti verò ex hisce quasi simplicioribus variè inter se commiscendo, quod quàm maximè licet prudenti medico, pulveres parare licet expromptâ mixturâ, v. g. non solum ex præparatis ipsis inter se mixtis, modò sint homogenea, sed & ex præparatis & salibus, ex iisdem & floribus, crocis &c. Sic

5. Non minus in usu est *decompositos reddere pulveres*, & recipere species in officinis jam extantes, miscere has ipsas secum invicem, vel cum præparatis, salibus, floribus & similibus, idque longè commodius & facilius, quod plures in singulos ferè casus & usus species jam in officinis, non obsoletæ illæ quidem, sed selectiores, iidem ad manum habentur.

Si ullibi verò, certè in pulveribus etiam, quoad commiscendas inter se species, & quoad selectum materiae, obveniunt notandæ Cautelæ.

1. Enim *acria*, *amara*, & *ingratiore* non commodè in pulvere dantur, quod ipsum etiam ex parte de fecit valet. Sic aloen in pulvere, sic colocynthidem, sic piper non benè exhibere licet. Et licet sint, qui tartarum aloeticum usurpent & commendent ex crystallis tartari cum extracto aloes pro pulvere lenitivo; licet apud *Platerum*, *Solenandrum* & alios piper pro aphrodisiaco pulvere commendetur, minus tamen rectè & cum requisitâ id fieri gratia potest. Et ob hoc ipsi pulveres ad scrophulas & strumas, qualis v. g. est Helmontii, ingratiore ferè esse consueverunt. Sic etiam rancida & vetusta semina exesse debent, unde observimus species Haly contra phthisin, nisi recenter fuerint dispensatæ, potius nocuisse phthisis, tussim, ut solent rancida, excitando majorem.

2. *Resinosa*, *gummosa*, *viscida*, non benè in pulvere præscribuntur, nisi *refracta*. Sic resina gialapæ & scammonii per se exhibita, & inter assumendum in faucibus conglobatur, & facile tormina insignia excitat, quare resolvi etiam facillè nequit. Sic sperma ceti pulposi reddit pulveres, neque per se ita facillè propinari potest, attamen si immisceatur aliis, v. g. lapidibus cancerum ana, satis egregium præbet pulverem *emmenagogum* ad calculum, casum ab alto, asthma, &c. additis pro nata aliis. Sic extracta v. g. opi, pro pulvere anodynò, confectiones, electuaria, ut theriaca, pro pulvere in pueris sæpe necessario alterante, cum lapidibus cancerum, coralliis, confectio alkermes cum cornu cervi philosophico, pro pulvere confortante cordialibus & similia dilatanda sunt magnâ quantitate respectivè pulverum. Notabile est ergò, formam pulveris esse promptè observandam, ut integra sit, non solum in miscendo & dispensando, ne ægro pro pulvere magna vel massam mediæ consistentiæ offeramus; verum, quoque

in assumendo, quod in primis de resinosis valet. Ut enim sperma ceti hoc commodi habet, quod etiam in pulvere in vehiculo calido facile solvatur instar pinguedinis ita alia magis resinosa ob difficilem cum aqua mixtionem renuunt hac forma assumi, in specie v. g. terebinthina, quorum tamen magnus in affectibus renum est usus.

3. *Liquida quoque parce immiscenda, sive tinctura & spiritus*, quod paulò rarius est, sive *olea destillata*, quod frequentius, & in his quidem maximè observanda proportio, ne ullatenus excedant, alias enim non minus acrimoniam ipsi conciliabunt insignem & faucibus molestant.

4. *Farrago confusanea vitanda, nil temere repetendum, vel duplicandum*. Hinc receptæ trium ulnarum, tum actu, tum potentia tales magis ruditer præscribentis, quam artificium denotant. *Illas* vocamus, quæ omne genus simplicium, seu quicquid est in Pharmacopolio, ut jocatur *Paracelsus*; *has*, quæ multa composita, quæ dia in specie præfixum habent, recipiunt, ut, quid emergat, quæ sint elementa & partes integrantes, ipsi sæpè nesciant medici. Sic etiam huc pertinet unius ejusdemque ingredientis duplicatio, vel additio superflua ejusdem, quod jam in censum venit. Sic speciebus diamargariton non facilè denud perlas; sic pulveri bezoardico Sennerti completo, non facilè lapidem bezoar denud superaddimus. Sic inprimis non equè antimonium diaphoreticum & bezoardicum minerale aliudve simul præscribimus, quia in effectu unum idemque sunt.

5. *Qua se inveniunt contrarietate manifestâ, non miscentur in pulveribus quoque*. Hujus rei in specie exempla præbent duo, in quibus tamen facilis est lapsus. v. g. non vitriolata cum nitrosis, ut in liquida, ita & in solida forma sunt miscenda. Ut enim in priori inde sit aqua fortis; ita in hac idem odor statim emergit, id quod præcipuè in compositis est observandum, ne eodem ex fundamento vitriolum martis cum panacea Holstei-nensi, vel nitro vitriolato miscamus; perinde enim est, sub alia saltim forma. Sic aluminosa quoque cum alcalibus non conjungenda, id quod in pulveribus febrilibus facilè obvenit, unde cavendum est, ne magisterio aluminis ingrediente recipiamus sal absinthii, vel simile aliud. Alia verò longè ratio est eorum, quæ se invicem corrigunt, ut inprimis in purgantibus; imò notabile est, aromatica hæc addita non tantum corrigere *degressum* qualitatem, verum etiam actuare magis eadem, & promovere effectum eorundem.

Ex his jam præsuppositis facilè confurgit Forma pulveris *externa*. Hanc tamen duo inprimis vel exoriant, vel gratia accessoria mañant, in colore & sapore. Primum est *sacchari additio*, sive Canariensis, vel loco hujus rosati tabulati, seu cantii.

Illud in diffusis potissimum, trageis, pulveribus pepticis & aliis vegetabilibus locum habet, ubi vel ana ad pondus omnium, vel tripla, vel dimidiata dosi id recipimus, pro gratia saporis obtinendâ. Pertinent eodem & elæosacchara, parcius tamen recipienda. Hoc in pectoralibus forma inprimis sicca resolvable magis obtinet, ut flores sulphuris etiam simplici anaticâ mixtione sacchari cantii, vel saltim additione olei anisi dispensari à quibusdam consueverunt. Par est ratio magis compositorum similium.

Ut autem hoc ipsum pro pectorali usu facilè concedimus, illud vero in statu magis neutro, vel ad præ-servationem & confortandi sine; ita dulcium hæc accessio in pulveribus quoque non æquè est necessaria, neque licet palato videatur ablandiri, utilis, adeoque sæpius præstat extra dictos casus illa penitus omittere.

Alterum ad formale pulverum aliquid conferens est *aurum foliatum*, sive cullæ scissura subigatur in *Mangest. Bibl. Pharm. Tom. II.*

tenellos flocculos, hinc inde postmodum emicantes, sive tritura in mortario, unâ cum pulvere, id enim facile utrumque succedit. Et consuetudine inductum est id inprimis in pulveribus confortantibus, cordialibus & cephalicis, ita circiter, ut ad 3j. vel ij. folium auri n. j. recipiatur. Est quidem, quod contra hoc opposi solet, frustra aurum sic medicamenti grosso modo immisceri, nisi ut forsan, qui jocus est Scaligeri, de aureâ intestina, quod resolvi à ventriculo nequeat, adeoque eidem potius negotium facessat. Nihilominus tamen, cum nullum exinde penitus damnum timendum sit, nulla est ratio, cur hunc ornatum & gratiam demere pulveribus velimus.

Plurima hanc in rem possent adduci jam exempla; nihilominus tamen paucis erimus contenti.

Pulvis purgans polychrestus: *℞. spec. diagal. Myns. 3ß. D. in chartâ.*

℥. pulv. laxat. veget. 3j. mag. s. ammon. g. iij. Tart. 3l. g. vj. 8 diaph. g. j. M. F. pulvis.

Pulvis sudoriferus in scabie, febris &c. *℥. bez. 3l. 8l. 8ß. c. c. phil. 3j. M.*

Cephalicus in epilepsia: *℥. pulv. epil. Marchion 3j. spec. cephal. 3ß. smaragd. ppt. g. vj. M. F. pulvis.*

In vertigine: *℥. spec. diamb. diamoseb. d. a. 3ß. 8l. rad. doron. a. 3j. mag. 3ß. M. F. pulvis.*

Febrifugus: *℥. pulv. febril. Croll. vel Myns 8 diaph. pauc. Holstein. a. 3j. 8 absinth. card. bened. a. 3ß. ol. antifebr. n. o. gtt. ij. M.*

Bezoardicus in febris malignis: *℥. pulv. bez. Senn. 3ß. bez. miner. g. xv. 8 vol. C. C. fixat. g. vj. M. F. pulvis.*

Anthypochondriacus: *℥. pulv. cachect. 3l. 3j. 8l. mach. ejusd. 3ß. conch. ppt. troch. de eupat. a. 3j. bez. 3l. cachect. g. x. ol. cin. gtt. ij. M. F. pulv.*

In palpitatione cordis: *℥. spec. cord. temperat. 3j. pulv. absorb. 3ß. fragm. lap. s. pret. a. g. iv. M. F. pulv.*

Hepaticus confortans: *℥. spec. diarrhod. Abb. diarr. sand. a. 3j. croc. 8l. aperit. cum 8l. ebor. f. 3l. a. 3j. ol. cinnam. gtt. j. M.*

Partum facilitans: *℥. borrac. ppt. 3j. secund. hum. ppt. 3j. croc. 3ß. troch. de myrrh. g. xv. ol. cin. succin. a. gtt. j. M.*

Et hi ipsi nomen contriuntur vel ab effectu, seu ab affectu, cui debentur, vel à loco affecto, unde præscribimus, M. D. in scarulâ (id quod de diffusis & confortantibus magis valet) S. *Hauptpulver*, *Schreißpulver* vel *Fieberpulverlein*. *Alietiersark.*

Quoad utendi modum, ut basin diximus esse pulveres omnium quasi aliorum, ita sanè illorum usus quàm latissimus & universalis tum quoad omnes partes affectas merito statuitur.

Dosis ergò pulverum generalis quasi assignata jam supra fuit, non enim facilè hodie ultra 3ß. vel 3j. ascendimus, licet diffusiorum dosis, si quidem operari debeant, ex more Veterum ad 3j. vel amplius extendatur.

Sumuntur verò pulveres vel *definitâ* magis vel *indefinitâ* dosi, v. g. illud de activioribus & uni certo fini debitis valet, ut in pulveribus purgantibus, *uffein mahl*, *Fieberpulver uff 3. mahl*, *offend Pulver in 6. glei he Theile zu cheilen*. Quin id etiam sæpè in præscriptione monemus observandum, v. g. M. F. l. a. pulvis *Divid. in 4. partes æquales*, S. *Haupt-Fieber*, *Starrpulver* &c. quæ quatuor partes chartâ hinc generali ferè includi consueverunt.

Hoc seu *indefinitâ* dosis in diffusioribus magis obtinet, v. g. stomachicis pectoralibus, inprimis saccharatis, ut de iis sumatur, quantum cuspidè cullæ capi potest, *ein Messerspizlein voll uff 1. mahl*.

Tenendum verò tum de pulverum, tum de aliorum dosi in genere: Dosis ingredientium regularatur dosi mixti. Prudentiæ verò medici committitur, veline ad

aliquot doses vel unam præscribere; modò caveat, ne mole ægros gravet, sive quantitate continuâ, seu discretâ.

Modus assumendi variat, interdum enim locò vehiculi simul peculiare in eundem usum conspirans præscribimus S. *Vasser zum Pulver*. Frequentius verò vehiculis utimur domesticis, jusclo, cerevisiâ, quæ facillè sunt ad manum, & cuius accepta ac nota. Trageæ cum pane tosto & vino imbuta insperse magis sumuntur, vel saltim sumi possunt. Sunt etiam, qui sumuntur per se, non superbibendo, v.g. pulveres peptici, pulveres pectorales sensim deglutendi, quin alii quodque saccharati & gratiores. Non ineptè etiam quandoque autè & cum cibo sumuntur; licet id in confortantibus magis, neque chylicationem inturbantibus, locum obtineat, aliàs enim vacuo ventriculo mane, vespèri, noctu pro diversitate scopi sumi queunt. In infantibus autem commodè cum lacte, modò non sint salini, vel cum pulve, adhibentur.

Externorum usum jam suprà tetigimus, si enim non inhæreant, cum lintamine applicantur. Tales confortantes & exsiccantes etiam pro capite sunt pulveres Cyprii capillis inspergendi. Reliqui quoad regimen ad ipsius medicamenti formam internam sunt regulandi. Notamus etiam obiter, quod de martialibus notum est, ab assumptione eorum motum imperari, unde medici solent addere quandoque i. D. *sumatur cum regimine*.

Denique, quod usum concernit.

1. *Pulveres minus conveniunt respectivè in deglutione difficili*, ut in angina & faucium tumoribus ac ardoribus aliis, vel saltim eo casu largius sunt diluendi.

2. *Minus etiam conveniunt siccis*, unde id melancholicis, heticis & aliis id ipsum quoque valet; hinc de martialibus rectè monetur, illa in siccioribus hypochondriacis, metu scirrhorum, hepatis calidi & siccioris minus commodè, quàm in laxioribus malis conducere, de quo *Gilbertus l. i. de magnete c. 15. Coringius de Hermet. medic. & alii legendi*. Hinc etiam sunt, qui magis hieme, hoc forsàn respectu quoque, eisdem præscribere jubent.

Contra ea verò pulveres præ reliquis quoque & imprimis liquidis, gaudent quibusdam privilegiis, quorum pauca saltim & potiora tangemus. Pulveres enim

1. *Absorbent, præcipitant, invertunt*. Hinc ubique id intendit medicus indicatum, optimè pulveribus id potest exequi. Hinc in solida, febribus intermittentibus præcipuè, ebullitionibus, fermentationibus, motu efferato humorum & turgescencia, hystericiis, & paroxysmis hypochondriacis aliisque optimè inter alia res expenditur pulveribus.

2. *Pulveres adstringunt & roborant*. Humidis quippe villis frenum injiciunt, motum remorantur, parietes viscerum deliniunt, concentrant & figunt magis. Hinc in vomitu, diarrhœa, dysenteria, fluore albo, hæmorrhagiis internis & externis, laxitatibus ventriculi, intestinorum, hepatis, egregiè, se gerunt, & primipilli sunt. Cum enim vis adstrictiora in terreis consistat particulis, illa hoc pacto quàm optimè obtineatur, neque enim tam facillè humore præternaturali dilui vel vinci queunt. Hinc etiam hæc ipsa formula extrinsecus optimè valet, ubi exsiccandi, exedendi, mundandi, dissipandi, adstringendique sine sunt usitatissimi; sic pulveres ischæmi in usu sunt, pulveres cathæretici, absumentes, erysipelatodes, & alii, ex praxi notè *Vvedelius*.

Hactenus de Pulveribus in genere earumque quibusdam formulis ex *Clariss. Vvedelio*; jam ad aliquid specialibus descendentes, plures eorundem compositiones variis usibus destinata è variis *Autoribus adducimus*.

Pulvis contra Abortum.

℞. Granorum chermes 3j. Sandali rubri 3ß. Caryophyll. ʒj. nucis moschata ʒii. radices Tormenti. 3ß. margarit. præparatarum, corallii nrisque præparati an. ʒj. folia Anri numero tria, sacchari perlati 3ʒj. Fiat Pulvis.

Datur gravidis ad præcavendum abortum ex ovo forbili, vel vino odorifero, idque non unâ tantum vice, sed sæpius pondere Scrupuli dimidii, vel etiam unius; aut admiscetur Trageis, præganibus usui futuris.

Alius Zovelfferi.

℞. Granor. Kermes legitim. 3ß. margaritar. Orient. 3ii. Coralliorum rubr. præpar. lapid. Corneoli præparati 3iii. lign. aloes gum. 3ß. nucis moschata 3vi. Santali rubri, rad. Tormentiille an. 3iii. ireos florent. cyp. peri rotundi, succini albi præpar. an. 3ii. Essentia cum Saccharina, Arancior. sacchar. ana ex recentibus cur. par. 3j. ol. nuc. mosch. express. 3j. Fiat omnium Pulvis.

Datur gravidis sæpius, ubi abortus timendus, in jusclo horis matutinis & vespertinis à 3ß. ad 3i.

Pulvis Absorbens Vvedelii.

℞. ʒ. Diaph. corall. r. ocul. ʒ. conchar. præp. ʒii. nab. nativ. an. ʒß. Oli ʒ. gr. vi. extr. opii gr. i. m. fiat pulv. qui dividatur in 6. part. eq.

Effectum hujus pulveris non satis posse prædicari *Vvedelius* asserit, in affect. hypochondr. & inde natis symptomatibus, hypotimicis palpitatione Cordis &c. sæpè enim inde sequitur vomitus optimo cum levamine, Singulâ dosis debet continere gr. i. ʒ. ʒ.

Pulvis adstringens Galeni, ex Parmac. August.

℞. Aloes, manna, Thuris, corticum pini, Terra lemnia, Boli armene, Lapidis hamatita, succi Hypocistidis, Croci, galla omphacit. ana 3j. Fiat Pulvis.

Pulvis Alexiterius Specificus Salæ, è Pharm. Schroder.

℞. Pulv. viperini 3ii. extr. Bezoardici pretiosissimi, gisterii margarit. an. 3ß. ol. sem. Angel. destill. ʒß. cinam. gutt. vi. m. in mortario vitreo.

Dosis ʒj. ad 3ß. cum vehic. appropriatis singulis quadris Lunæ, iis qui cum veneno infecti sunt danda est 3j.

Extractum Bezoardicum pro Pulvere Bezoardico mox descripto.

℞. Ligni aloes resinof. granor Kermes, santal. alb. odorif. cass. lignea, Zedoar. croci opt. schenamb. rad. carlin. vincetox. Doron. Angel. fol. dictamn. Cret. scord. cret. an. 3ii. spir. vini q. s. F. Extractum S. A. cui add. de 3ii. magisterii lapid. pretiosorum cum sal. nitr. calcinat.

Pulvis alexiterius specificus Angeli Salæ propter extractum Bezoardicum minoris est virtutis; adeoque & vilioris æstimii, ut quod omnibus balsamicis ingredientium virtutibus destitutum. nec dubito majoris fore energię s. m. præparatum.

℞. Pulv. Zedoar. car. in. vincetoxic. doronic. angelic. an. 3j. fol. dictamn. Cretic. Scord. cretic. an. m. Ligni aloes resin. cass. lign. an. 3ß. m. F. pulvis. Cui addend. Sal. volatil. viperar. vel serpent. nostrat. ʒii. ol. d. Angelic. ʒß. d. cinam. gutt. vi. croci pul. eris ʒj. Terr. sigillat. q. v. pro magister. Lapid. pretiosor. cum nitr. calcinat. Hofmannus;

Pulvis Alexiterius D. Barbette.

℞. Rad. contrayerva ℥℥. petasidis, tormentilla, enula campana, an. ℥ij. terra sigillata, boli armena an. ℥iij. rasura c.c. eboris an. ℥j. corall. rubr. preparat. ℥iij. Cinnamomi acuti ℥i. animonii diaphoretici ℥℥. m. F. Pulvis.

Pulvis Altheæ Pharm. Londin.

℞. Rad. siccata. Altheæ ℥v. glycyrrhizæ Hispanicæ, ossium mespilorum an. ℥℥. sem. mili Solis, petroselinii, digitalis an. ℥iij. oculorum cancr. cum succo limon. prepar. ℥vi. gummi Arabici ℥iij. cerasti, pruni an. ℥j. tritura accurate habita F. pulvis subtilis.

Pulvis Diambæ Melux ex Pharm. August.

℞. Cinnamomi, Doronici, caryophyllor. macis, nucis moschata, Folii galangæ an. ℥iij. spica Indica cardamomi majoris, minoris an. ℥j. Zinziberis ℥℥. ligni Aloes, sandali citrini, piperis longi an. ℥i. Fiat pulvis quem completum facimus, addendo Ambra ℥j. moschi ℥℥.

Ad omnem Corporis imbecillitatem & noxam à frigida causa efficax est, viscera omnia calefacit & roborat, vertiginem abolet, cerebri humiditates absumit. Spiritus cum vitales, tum Animales adauget, & concoctionem adjuvat, affectibus item uterinis ex frigida & humida intemperie natis prodest, senibus ob id & mulieribus salubre Medicamentum.

Pulvis Analepticus frigidus, ex Pharmac. August.

℞. Specier. Cordialium temperat. inc. ℥iij. de gemmis frigid. ℥j. Ambra grisea ℥j. spiritus rosarum guttas Lx. folia Auri num. xii. Argenti num. tria, Man. chr. simplic. ℥iij. misce fiat pulvis.

Pulvis hic, ad virium conservationem & reparationem plurimum conducens, celeb. nostrum Mindererum Autorem agnoscit; qui alium etiam rubcum dictum, Aromatica plura recipientem, in usu habuit, cujus tamen apud nos non est usus.

Pulvis Dianis Melux ex Pharmaceut. August.

℞. Semin. Anisi ℥iij. glycyrrhizæ rasa, mastich. an. ℥i. Sem. carvi, feniculi, Galangæ, Macis, Zingiberis, cinnamomi an. ℥v. Trium piperum, cassia lignea vera, pyretri, calamintha an. ℥i. cardamomi, caryophyllorum, cubebarum, spica Indica, croci an. ℥iij.

Ventriculo frigido & humido succurrunt, ac cruditates à pituita lenta natas absumunt, flatūs quoque crassos in ventre collectos dissipant, quin etiam pectus à tenacibus humoribus repurgant, ac ob id diuturnæ Tussi medentur.

Pulvis Anodynus Ludovici.

℞. Laud. opiat. Ludovic. ℥j. corallor. t. prepar. ℥iij. m. Fiat Pulvis.

Qui in compendio & tutius id præstat quod pretiosæ confectiones narcoticæ, vel antiquorum philonia, requies, aut ipsa Athanasia magna promittunt, &c. vid. Ludovici Pharm. p. 537.

Pulvis Anonymus ex Pharm. August.

℞. Sem. papaveris albi ℥iij. portulacæ, cydonior. malvæ, Bombacis ana ℥℥. quatuor. frig. major excoct. an. ℥i. gummi Arabici, Tragacanthi, Amyli an. ℥ij. Hypocistidis, boli armena, Orientalis preparata, Cornu cervi usi, rasura eboris, cicorum rubrorum an. ℥℥. cinnamomi ℥ij. Sacchari penidii ℥℥. Sacchari Canariensis ℥vi. Misce Fiat Pulvis.

Tabidis phthificisque prodest, ulcera enim pulmon.

lenit, abstergit, & glutinat: tenues ac sallos catharrhos sistit, & incrassat, faucium asperitatem mitigat, ac defluxiones acres ad pulmones ferri prohibet.

Nonnulli hic liquiritiam, rosas, semen Altheæ, corallia, Species diatragacanthi frigidi, aut pulmonis vulpis præparati nonnihil addunt, verum hæc pro medicæ prudentis intentione quocumque tempore adici possunt.

Similis ferè Pulvis exstat descriptus apud Valescum, Pulvis Haly dictus, easdem vires cum priore obtinens, cujus descriptio hæc est.

℞. Sem. papaveris albi ℥v. Gummi Arabici, Amyli Tragacanthi, an. ℥℥. sem. portulacæ, gossipii, Altheæ, malvæ an. ℥iij. quatuor. frig. major. excoctator. cydonior. mundatorum an. ℥iij. spodiæ preparatæ, succini, liquiritiæ, vel potius pulveris ejus an. ℥iij. Sacchari penidii ad pondus omnium, m. Fiat Pulvis.

Notandum, Pulverum horum semina frigida continentium, non nimiam una vice quantitatem præparari debere, ne Pulvis diuturniorē mora evadat rancidus.

Pulvis Dianthus, ex Pharm. Londin.

℞. Flor. rosmarini ℥j. rosar. rubr. violar. glycyrrhizæ an. Caryophyllor. spica Indica, nucis mosch. galangæ, cinnamomi, Zingib. Zedoar. macis, ligni Aloes, cardamomi minor. Sem. Anethi, anisi an. ℥iij. Fiat. Pulvis. S. A.

Pulvis Contra Apoplexiam, ex Pharmac. August.

℞. Succini albi ℥℥. margarit. Smaragdi an. ℥ij. ligni Aloes, Cornu cervi prepar. rad. paonia an. ℥j. cort. citri ℥℥. sem. ejusdem ℥j. Tabulari de extracto ligni Aloes sacchari perlati cum ol. cinnam. an. ℥iij. redigantur in pollinem; qui completus à nobis efficitur Ambra vera ℥℥. moschi Alexandrini gr. 5.

Animalis Vitalisque facultatis robur eximie tuentur ac reficiunt, unde diuturnis capitis affectibus, præsertim frigidis opitulantur, spiritus reintegrant, obstructions meatuum cerebri recludunt, vertiginem auferunt, ac paroxysmos tam epilepticos quam apoplepticos anteverrunt senibus ac infirmam ætatem degentibus familiare & consuetum medicamentum.

Pulvis Antapoplecticus Zvelfferi.

℞. Rad. doronici veri recent. coll. & siccata, ℥j. costi dulcis, ligni Aloes ponder. Cardamom. min. an. ℥iij. cubebæ, coriandri, anisi an. ℥ij. nucis mosch. Succini albi an. ℥℥. caryoph. ℥iij. Ambra grisea ℥℥. prius cum sem. citri excoct. ℥j. subacta ol. still. cinnamom. ℥i. Fiat ex omnibus Pulvis.

Mira ejus est in affectibus cerebri & Capitis efficacia, intemperiem enim ejus humidam corrigit, ideoque Apoplepticis, Epilepticis & vertiginosis est emolumentum detur à ℥j. ad ℥℥. & ℥ij.

Pulvis contra Apoplexiam alius ex eodem.

℞. Rad. Doronici veri ℥j. paonia mund. mar. deb. t. coll. ℥vi. cyperi rotundi ℥℥. costi veri ℥iij. Flor. paralyseos, Tilia, Tunica ana recent. (si Tempore verno parentur) ℥vi. piperis longi ℥iij. sem. Erucæ, Sileris montani an. ℥℥. crassiuscule incisa & conquassata coquantur in s. q. aquæ simplicis ad ramanentiam circiter ℥vi. decoctum coletur & alb. ovi probe clarificetur, quo cum solvantur Sacchari Canarii ℥iij.

Iterum ad Consistentiam tabulati leniter coquantur: ac retro fornacem tandem, chartæ inclusum, leni calore penitus hoc saccharum exsiccat, ut in pulverem redigi queat, huic in pulverem redacto adde.

Ambra grisea ℥℔. vel ℥j. prius cum sem. citri ex-cort. ℥℔. probè subacta, pulv. Bezoard. cervini, seu pulv. ex Typhis cervi pag. 469. Animadv. n. edocti ℥vi. ligni aloes opt. ponder. rad. Doronici veri, cardam. minoris, an. ℥℔. sem. Coriandri, paonia excort. an. ℥ij. caryoph. ℥ij. nucum moschatar. succini albi præp. an. ℥℔. ol. still. Cinamomi, ligni rhodii an. ℥j. misceantur exactè, fiatque pulvis subtilissimus in vitro custo-diendus.

Præstans in Apoplexia & Hemiplexia, diuturnis capitis affectibus aliis frigidis opitulatur, spiritus vi-tales & animales reficit, Apoplecticos & epilepticos patoxyismos avertit. Dosis ℥℔. ad ℥j

Alius ejusdem contra Apoplexiam.

℥℔. Rad. Doronici veri ℥℔. paonia mar.d.t. cell. ℥ii. costi veri dulcis, Flor. Anihos seu voris marini, laven-dula an. ℥℔. Sem. Sileris montani, acymi, caryoph. an. ℥j. paonia excort. anisi, coriandri an. ℥℔. carda-momi min. cinamomi acuti, nuc. mosch. an. ℥ij. caryo-phyllor. cubebæ ligni aloës pond. opt. an. ℥℔. succini al-bi præp. ℥ii. ol. still. ligni Rhodii ℥j. Fiat omnium pul-vis subtilis.

Hic cum prioribus speciebus Antapoplecticis in effectu & operationibus coincidit adeoque omnibus cerebri affectibus frigidis opitulatur Dosis ℥℔. ad ℥j.

Pulvis Radicum Ari Compositus, ex Pharmac.
Londin.

℥℔. Pulv. rad. Ari, ℥ij. rad. acori vulgaris, pim-pinella, saxifraga an. ℥j. oculorum cancri ℥℔. cinnamo-mi ℥iii. salis absinthii, & juniperi an. ℥j. misce Fiat Pulvis.

Pulvis Aromaticus Caryophyllatus Mesuæ, ex
Pharm. August.

Caryophyllor. ℥vi. macis Zedoaria, galanga san-dali citrini, Trochiscor. Diarrhodon. cinamomi, ligni Aloes, spica nardi indica, piperis longi, cardamomi an. ℥j. rosar. rubr. ℥iiij. glycyrrhiza ℥ii. Folii indici, cubebæ an. ℥ij.

Fiat Pulvis subtilissimus: cui, si completum quis desideret addatur: Gallie moschatæ ℥ij. Ambre gris. ℥j. moschi ℥i℔.

Cor. Ventrículum, & reliqua nutritioni dicata mem-bra roborat. Nauseam & vomitum reprimat, flatus dis-sipat, putredinem humorum in ventriculo arceat, atque infirmæ coctioni opitulatur.

Notandum, Confectiones has Aromaticas Am-bram, & moschum, ac Galliam, vel etiam Campho-ram recipientes, partim cum, partim sine his odoratis, in usum præcipuè mulierum, quæ uteris suffocationi-bus obnoxie sunt, tum & aliorum, fragrantiam vel odorem similiū qui non ferunt, hætenus paratas, at-que ita compleras & incompletas proflare apud nos debuisse; cum tamen horum meliores & fragrantissi-mæ partes faciliè exhalent, & ita species minus effica-ces relinquunt, ut in posterum illæ, quarum usus non adeò frequens esse solet, incompletæ tantum pro usu nostro conficiantur, decrevimus; odoratorum istorum comubio, à medico consimiles præscribente, rectius quovis tempore imperando

Quod si quis ex his confectionem in forma solida parare voluerit ad singulas drachmas specierum, pro earund. m. conditione, cum aliæ plus, aliæ minus sacchari exigant) sacchari optimi ℥j. vel ℥xii. vel

quantum medico necessarium videbitur, adjiciat, pa-retque ut artis est.

Pulvis Aromaticus Rosatus Gabrielis, ex
Pharm. August.

℥℔. Rosar. rubrarum ℥xv. glycyrrhiza ℥vii. Ligni Aloes, sandali citrini an. ℥ij. cinamomi electi ℥v. ca-ryophyllor. macis, an. ℥i℔. gummi Arabici, Tragacan-thi an. ℥ii. ℥ij. nucis moschata, cardamomi minoris, galange an. ℥j. spica indica, ℥ij. Fiat Pulvis. cui pro completo addantur Ambra gris. ℥ii. moschi ℥j.

Frequentissimus ejus usus in magno humidor. ex-crementor. Ventrículi proventu, coctionem juvat, pu-tredinem cohibet, stomachi molliem corrigit imbe-cillitatem firmat, ventrem anteriorem totum & nutri-tioni inservientia viscera roborat: ventriculum disten-dentes flatus dissipat, adpetentiam excitat, nauseam se-dat, & stomachicis mirum in modum confert, con-valescentes insuper ac è diuturno morbo emergentes plurimum recreat.

Pulvis Arthriticus Paracelsi, è Pharm. Schroder.

℥℔. Hermodactyl. Turpehi opt. diagryd fol. senn. al-rasur. cran. vel ossium human. sacchari, ana.

Vires. Purgat securè & blande omnes defluxiones podogricas Dosis ℥℔. ℥ij. ex aqua Ixæ Arthetice, fra-gariæ &c.

Pulvis Auratus Zwellferi.

℥℔. Rasur. eboris ℥℔. pulv. Marchion. ℥iiij. scobis au-ri in subtilissimum pulv. redacti ℥i℔. Bezoar. Orient. Veri ℥ij. unicornu marin. ℥j. m. F. Pulvis.

Valeat in Affectibus Epilepticis &c.

Pulvis Bezoardicus Nicol. Præpositi, ex
Pharm. August.

℥℔. Boli Armen. cum aceto præparat. ℥iiij. Terra si-gillata, coriandri præparati, specierum diamarg. frig. rad. Tormentilla, Dictamni vulgaris, Angelica, Sco-biosa an. ℥ii. Sem. Acetose, citri mundati, ruta, cardus benedicti, Cornu cervi usti, Doronici, charabe an. ℥iiij. rosarum rubrarum, Coralli utriusque, ligni Aloes, serici crudi, sandalor omnium Margaritar. ossis de Corde cervi an. ℥j. Smaragdorum, Ambra an. ℥ii. moschi ℥iiij. croci gr. xv. camphora gr. x. Fiat Pulvis, vel cum syrupo è ribibus fiat in modum opiata.

Adversus pestiferæ luis insultus efficax, cordis vi-res eximie tuetur, spiritus vitales fulcit, internas pu-tredines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis ad-versatur.

Pulvis Bezoardicus Magistralis, è Pharmaci.
Londin.

℥℔. Sapphiri, rubini, Hyacinthi, granator Smarag-dor. an. ℥j. Terra lemnia, boli vera, corall. rubri præ-parat. Margar. præparatar. an. ℥ij. Zedoaria, cornu unicorn. lapid. Bezoardici Orient. & Occident. mos-chi, Ambra grisea, capbura, junci odorati, croci opti-mi an. ℥℔. sandali citrin. ligni Aloës, Benzoini an. ℥ij. Philonii Magistralis ℥iiij. ossis de Corde cervi cort. citri granor Kermes an. ℥℔. ol. i cinnamomi chym. nu-cis moschata Chym. an. gut. quinque Misce, Fiat Pul-vis subtilissimus. S. A.

Pulvis Bezoardicus alius Zwellferi.

℥℔. Bezoar. Occidental. ℥iiij. Unicornu veri marini, Unicornu fossilis albiss. an. ℥vi. boli armen. seu terra sigill. n. m. par. ℥j. croci Austriaci ℥ij. sem. citri excor-ticati ℥℔. nucis moschata ℥ij.

His omnibus mixtis & in pulverem redactis imprimatur succus oleaginosus quatuor pomorum Limoniorum corticum & denuo per se in aëre exsiccantur: fiatque Pulvis bezoardicus præstans in febribus malignis & pestilentialibus, à ʒss. ad ʒj.

Alius ex eodem.

℞. Croci nostri Solis in mantissa edocti, ʒii. bezoardici mineralis n. m. legitime & recenter parati ʒj. his mixtis & leniter invicem sub tegula (vulgo muffle per horam unam calcinatis & spatula continuo commotis, adde cum refrixerint. ol. still. cinamomi ʒss. levigentur denuo hora una super porphyrite lapide, tandem superadde Boli. armena n. m. parat. ʒvi. croci opt. Anstr. ʒiʒ.

Quibus omnibus probè mixtis imprimatur succus oleaginosus, corticum trium vel quatuor pomorum Limoniorum, & leniter tandem siccata servantur pro usu in vitro probè clauso, Tamque saluberrimum Alexipharmacum & Cordiale medimamentum, cuius Dosis ʒj. ad ʒss. pro sudore eliciendo.

Alius ejusdem.

Primò paretur Bezoardicum solare hoc pacto:

℞. Auri puri per antimonium purgati ʒss. solvatur in spiritus Salis optimi vel aq. regis f. q. porro accipe butyri antimonii ʒss. cui superaffundatur in Alembico parvo spiritus nitri legit. destill. q. s. pro dissolutione, quousque nimirum nulla ebullitio vel strepitus amplius percipitur; quo facto, conjungantur & commisceantur hæc dua solutiones auri & butyri antimonii, ac in arena igne leni abstrahantur spiritus ad siccitatem: materia flava in fundo cucurbitæ relicta excipiat, inque mortuario vitreo teratur, cui porro cucurbita vitrea n. m.

Recent. spir. nitri ʒiii. vel iiij. superaffundantur, factaque aliquanti digestionem, rursus per arenam fortiter abstrahantur: hæc operatio, nimirum recentis spiritus nitri affusio, ejusdemque abstractio bis ter repetatur, materia relicta calcinetur leniter ad horas duas sub tegula, usuique reponatur.

Jam.

℞. Bezoardici hujus aurei, unicornu fossilis albissimi, bezoar. occident. an. ʒss. Fiatque omnium pulvis subtilissimus, cuius dosis ʒss. in peste morbisque Contagiosis.

Pulvis Bezoardicus VVedelii.

℞. Rad. contrayerv. Terr. lemn. unicorni foss. corall. præp. ʒ diaphor. succini albi præp. à ʒj. C. C. philos. ʒij. lap. Bez. occid. ʒss. ol. citri ʒss. misce fiat pulvis.

Alius Ejusdem.

℞. ʒ. diaphor. ocul. ʒss. C. C. Philos. an. ʒi. extr. Scorzoner. mont. ʒss. m. F. Pulvis.

Pulveres hi alterandi & acidum malignum corrigendi sine sunt utilissimi, in febribus malignis, variolis, dysenteria &c. Dos ʒss. ad ʒj. cum cinnab. nativ. ʒe vol. C. C. anodinis &c.

Pulvis Bezoardicus sine Pretiosis, F. F.

℞. Bol. armen. ver. cum aq. Scabios. præparat. Terr. sigillat. Silesiac. rad. dictamn. alb. Tormentill. an. ʒvi. Angelic. gentian. perast. Zedoar. C. C. ust. præparat. off. de C. C. rasur. Eboris, cori. citr. corall. rubr. præp. an. ʒss. M. F. Pulvis subtilissimus. Dosis ad ʒj.

Pulvis Bezoardicus cum Pretiosis, Francofurt.

℞. Pulv. modo præscripti, ʒj. margar. præparat gr. xvi. Hyacinth. præparat. rubin. præparat. granat. præparat. Bezoar. or. an. gr. viii. Fol. Argent. Auri an. num. i. F. Pulvis subtilissimus.

Vires. Cordialis ac diaphoreticus insignis est ususque præcipui in morbis malignis. Dosis à ʒj. ad ʒij.

Pulvis Bezoardicus sine pretiosis F. F. & cum pretiosis laudem merentur quoad Compositionem & præparationem.

Fol. autem Argent. & Auri ad oculorum blanditiem, elegantia conciliandæ pulveri Bezoardico causâ & vulgi ingentem in aurum & argentum fiduciam collocantis applausum adduntur, ut ipsius pulveris efficacia inde etiam augeatur. Confidentia enim ægri in medicamenta, quam multi Medicorum variis conquirunt Technis, abundantem in praxi Fœlici fructum promittit. Si folia illa auri in pulvere rubro Pannonico deessent, hunc certè fex Urbis populus ne ullius assis æstimaturus, & Medicum & Pharmacopœum inscitia, aut doli nomine suspectos erit factururus; Hofmannus.

Bezoardicus Alius D. Charraz.

℞. Rad. Angelica, contrayerva, serpentaria Virginiana an. ʒss. lapid. Bezoar. Orientalis, pulveris viperini, Bezoardici mineralis an. ʒij. unicornu animalis, margaritar. præpar. an. ʒi. F. S. A. Pulvis subtilissimus, permistiisque oleorum stillator. Angelica, corticis citri, cinnamomi an. gutt. iiij. Servetur ad usum.

Hic Pulvis præstans est remedium contra omnia venena; nam corroborando partes nobiles, malignitatem per sudores expellit Datur in vino Hispanico aut aq. aliqua Cordiali. Dosis à ʒj. ad ʒj.

Pulvis Electuarii de Bolo ex Pharmacop. August.

℞. Boli Armen. præp. aqua rosarum ʒss. rad. Tormentilla, Angelica an. ʒij. corallii rubri, rasura eboris, cornu cervi, rosarum rubr. an. ʒiʒ. Sem. melonum, Acetosa, citri mundati, Bombacis mund. juniperi an. ʒj. Anisi, fœniculi, Cinnamomi Xylaloës, macis an. ʒss. Fiat Pulvis.

Alius simplicior ex eadem Pharm.

℞. Boli Armen. ʒss. rad. Tormentilla ʒii. Angelica ʒj. Sacchari ad pondus omnium fiat Pulvis.

Uterque febribus malignis, pestiferis, ac contagiosis potenter resistit, eorumque insultus reprimat, spiritus extingui prohibet, eosdemque evanidos reparat: sudores evocat, pestilentiis suis noxas deicit.

Pulvis Cachecticus Quercetani ex Pharm. August.

℞. Limatura chalybis cum Sulphure calcinata ʒi. facula radicum Ari, Ambre grisea an. ʒiʒ. corallior. margaritar. præparat. an. ʒij. cornu cervi philosophicè præparat. Cinnamomi an. ʒiiij. sacchari ad pondus omnium. Fiat Pulvis.

In curanda omnis generis cachexia, & depravatorum humorum colluvie educenda, præsentaneum est remedium, leucophlegmatiam, & morbum virgineum feliciter curat, pallorem vitiosumque colorem tollit, massam sanguineam utriusque sexus purificat, & à variis corruptionis tutam præstat.

Pulvis hic à Quercetano descriptus, et à n sine Ambra, incompletus ideo dictus, in officinis nostris præstat;

stat, pro illis, quibus tenuiores facultates Ambrae usum denegant; tum & odor ejus adversus est.

Pulvis Cachecticus Ludovici.

℞. Pulv. Antimonii electi ℥vi. limatura martis pura ℥iiij. nitri depurati ℔iij. in crubibulo bene ignito fiat continuam inter agitationem, detonatio; materia exempli, rejectis circa oras crucibuli scorii adherentibus edulcoretur & exsicceetur.

Præstans est medicamentum in Cachexia, ictero, dysenteria maligna, & erisipellate.

Pulvis Diacalaminthes Galeni ex Pharm. August.

℞. Piperis ℥vi. Cardamomi ℥ij. comarum Thymi, sem. Apii. an. ℥ß. seseleos Massiliensis, pulegii montani sem. petroselini Macedonici, Calamintha montana an. ℥ij.

Famosum hoc Galeni medicamentum describitur ab Autore Lib. 4. de tuenda valetudine, quo is utebatur in ulceroso dolore, cum crudorum succorum copia extra venas & in corporis habitum recepta erat: utile est medicamentum ad Thoracis & stomachi vitia, tussim à frigido excitatam, ac præcordiorum & pectoris refrigerationem; senibus & quartanariis confert, difficulter coquentes adjuvat, crassos & lentos humores tenuat, flatus crassos discutit, urinam ac menses movet, qui præcipue ex vasorum à crassis & lentis humoribus oborta obstructione retinentur.

Pulvis Diacalaminthes Mesuæ, ex eadem Pharm.

℞. Cinnamomi tenuis ℥v. Cassia lignea, rad. enula an. ℥ß. galanga ℥vii. caryophyllor. piperis longi, Zingiberis, Cardamomi utriusque, macis, nucis moschata, ligni Aloes an. ℥iiij. Croci ℥j. Sacchari albi ℥v.

Concoctionem juvant, pituitæ putredinem prohibent, ac alimenti in Corpus distributionem promouent.

Pulvis ad Calculum, ex Pharm. August.

℞. Radicum saxifragia alba, petroselini, pimpinella, liquiritia, ononidis an. ℥ij. baccarum Alkekengi ℥ß. juniperi ℥j. semin. milii Solis, fœniculi, eruca, dauci cretici, violar. purpurear. an. ℥j. lactuca, papaveris albi, quatuor frig. major. excorticatorum, hyoscyami albi an. ℥ß. herniariae Hollerii ℥j. gummi cerasor. nigror. ℥ij. Tragacanthi ℥j. Terebinthina ad duritiem in aqua malvæ cocta ℥ij. Magisterii oculor. cancri, Salis succini an. ℥j. Lapid. judæici præp. spongia preparat. nephritici præpar. an. ℥j. Camharidum gr. vi. sacchari cantii ℥ii. m. sce.

Compositionem hanc pulveris ad calculum multa sibi experientia probati, D. D. Marcus Banferus Augustanus, facultatis Medicæ in Illustri Academia VVittebergensi olim professor, Collegii Medici Decanus & Senior, Libro huic inferendam quondam communicaverat.

Ad Calculum alius ex eadem Pharm.

℞. Sem. milii Solis, saxifragia an. ℥j. lactuca, hyoscyami, papaveris, albi an. ℥iiij. glycyrrhizæ ℥iiij. Trochisc. de Halicacabo ℥iij. rad. pimpinella, sem. genista an. ℥ß. Sacchari ℥iiij. fiat pulvis.

Datur nephriticis & calculosis ad renum arenulas exturbandas, & ureterum obstructions levandas ex aqua malvæ aut ononidis.

Pulvis Cardiacus Magistralis, è Pharm. Londin.

℞. Lapid. bezoart. Orientalis, ossis de Corde cervi an. ℥iij. corallii albi, rubr. præparat. succini albi, perlar. præp. cornu cervini præparat. rasura eboris, Boli Orientalis, Terra Germanica, samia, lemnia, ras. an.

gula alcis, rad. Tormentilla an. ℥j. ligni Aloës, cortic. cum citri, rad. Angelica, Zedoaria an. ℥ij. fol. Annum. viginti, Ambra grisea ℥j. moschi grana sex. misce & fiat Pulvis.

Pulvis ad Casum, è Pharm. August.

℞. Terra sigillata, sanguinis Draconis, mumiæ an. ℥ii. spermatis ceti ℥j. Rhabbarbari ℥ß. misce, fiat Pulvis.

Propinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fractis, vino adstringente, vel cui incocta fuerint, quæ stringendi vim habent, ut rosæ, balauustia, cytini, malicorium, myrti & rubri cacumina, Sumach, & id genus alia, hoc in vino intincta lintea & expressa, calida laboranti circumvoluta, omnem ex ictu & præcipitio offensionem curant. Quidam reliqua simplicia ex Avicenna subdupla Rhabbarbaro faciunt, etsi æqualia quæque esse possint.

Alius ad Casum Zvelfferi.

Sanguinis dracon. opt. ℥ß. Hirci modo supra edolli parati. oculor. cancrorum præp. Terra sigillata sen. armena an. ℥vi. myrrha rubra ℥ß. nucis mosch. ℥iiij. fiat Pulvis.

Prodest præcipitatis ab alto, & quibus sanguis in corpore coagulatus hæret; ruptis item contusis, fractis: vel in vino, vel juscule aut aqua cherefolii, vel Card. mariæ propinatus. Dosis ℥ß. ad ℥j.

Pulvis Cathæreticus pro Oribus Cloacæ, è Pharm. Schroder.

℞. Rad. irid. Aristol. rot. Euphorib. an. ℥ß. sabin. sicc. alum. ust. Mercur. præcipitatu an. ℥j. ceruss. myrrh. an. ℥ii. olei garyoph. ℥j. M. F. pulvis quo aspergitur os cariosum carne denudat. & aq. aluminis prius ablutum.

Pulvis Cephalicus Francofurtensium, è Pharm. Schroder.

℞. Cinamom. ℥ii. rad. pœonia, sem. pœon. exc. an. exc. an. ℥x. ℥ii. Zinzib. Cubebar. caryophyllor. an. ℥v. ℥ij. spec. cordial. Arom. garyoph. an. ℥v. diamosch. dulc. spec. diamb. an. ℥iij. gran. vi. musc. num. ij. F. Pulvis.

Vires. Calefacit caput, exiccat catarrhos, spiritus animales & vitales purificat, corroborat, adeoque balsamo nativo insigniter confert. Dosis à ℥ß. ad ℥j. vel ℥j.

Species Cephalicæ F. F. sequenti modo compositæ majoris eruat virtutis. Recip. cinamom. el. ℥ij. rad. pœoniæ ℥iiij. Zinziber. cubebar. an. ℥iij. ol. de caryophyll. macis an. gutt. xx. ol. express. nuc. mosch. ℥j. moschi el. gr. xij. Ambra gryf. gr. xviii. M. F. Pulvis nost. possunt etiam admisceri illorum extracta Hofmannus.

Pulvis Cephalicus Zvelfferi.

℞. Ambra grysea ℥j. subigatur probe cum sem. citri excort. pœoniæ excort. an. ℥ß. moschi opt. Orient. soluti ad pulcritudinem cum aqua flor. Arantior. partient in mortario subigendo, ol. stillat. Cinamom. ℥j. Caryoph. ℥ß. ligni rhodii ℥j. prius cum Sacchari albiiss. pulv. ℥j. commixtorum, pulv. ligni Aloes opt. gum. rad. dionici veri, nuc. moschatarum, Cardamomi min. succ. Albi præp. an. ℥ß. F. Pulvis subtilis in vitro probe clauso custodiendus. In virtute & Dosi cum aliis speciebus apoplecticis & Cephalicis coincidit.

Pulvis è Chelis Cancrorum Compositus, ex Pharm. Londin.

℞. Margarit. præparat. oculor. cancri, corallii rubri

rubr. succini albiſſimi, cornu cervini Philoſophicè præparati, Lapidis Bezoardici orient. an. ℥℞. pulveris ex apicibus nigris chellarum cancror. ad pondus omnium. Fiat Pulvis ſ. a. qui gelatinâ è viperarum noſtratum ſpoliis extracta excipi poterit, vel inde poma parva eſſe formari, cautè ſiccanda & in uſum aſſervanda.

Pulvis hic eſt de pulverum Bezoardicorum familia, ſuper quo vid. rutilus quæ habentur in ſequentibus ſub titulo Pulveris Comitiffæ de Kent.

Pulvis Granorum Chermes compoſitus, è Pharmaci London.

℥. Granor. chermes ℥j. nucis moſch. ℥ij. rad. Tormentilla, ſantal. citrini an. ℥i℞. caryophyll. margaritar. præparat. coralli utriusque præp. an. ℥j. Folia auri n. tria ſacchari Tabulati perlati, uiendi Tempore ad dendi ℥iij. Fiat pulvis.

Pulvis Cholagogus ſimplex, è Pharm. Auguſt.

℥. Scammonii electiſſimi ℥iij. aut quantum vis.

Cratiusculè tere & ſupra chartam bibulam tenuiter ac æqualiter expande, mox ſuperimpone crati, ſub quo carbo ſit vivus, in quem injice ſulphur ſuffumigetur ſcammonium, & charta tandiu teneatur ſupra fumum uſque dum ſcammonium liqueſceret, & chartæ adhærere incipiat: cave ſolum nè comburatur, ideoque à fumo remove, ſicque calcinatum ſerva.

Pulvis Cholagogus inſuccatus ex eadem Pharm.

Hoc ſcammonium modo dicto præparatum infunde in mucharo roſarum bis, & exſicca.

Pulvis Cholagogus Quercetani, è Pharm. Schroder.

℥. Rhabarb. elect. ℥iij. Fl. violar. ℥ij. roſar. pallid. hyperic. an. ℥j. ſpec. diatron. ſantal. maſtiche, cinnamomi an. ℥℞. dyagrid. ℥j. ſacchar. ℥℞. m. F. Pulvis. Doſis ℥j.

Pulvis è Cineribus Avicennæ, ex Parm. Auguſt.

℥. Cinerum vitri, ſcorpionum, rad. bræſſicæ, lepori, putamin. ovorum è quibus pulli fuerint excluſi, Lapidis ſpongia, Sanguinis hirci præparati, Lapid. Iudaici, gummi juglandis, Acori an. ℥j. petroſellini, dauci, pullegii, gummi Arabici, ſem. alibæ, piperis niri an. ℥i℞. Terantur & ſimul miſceantur.

Priore longe validior, utinas magis promovet & calculos potentius educit, nec niſi conſideratè uſurpandus.

Pro Gummi Juglandis, ceraſorum commodiſſimè ſubſtituitur.

Pulvis Diacinnamomu Meſuræ, ex eadem Pharm.

℥. Cinnamomi tenuis ℥xv. Caſſia lignea, rad. enulae an. ℥℞. galanga ℥vij. caryophyllor. piperis longi, Zingiberis, cardamomi utriusque, mactis, nucis moſchata, ligno aloës an. ℥iij. croci ℥j. ſacchari albi ℥v.

Concoctionem juvant, pituitæ putredinem prohibent, ac alimenti in Corpus diſtributionem promoven.

Pulvis Comitiffæ de VVarvvich è Pharmaci Auguſt.

℥. Colagogi ſimplicis ℥ij. ℥i℞. Antimonii præparati, id eſt, diaphoretici ℥℞. cremoris Tartari cryſtallini ℥℞. fat. Pulvis.

Pulvis hic ſumptus etiam ſi mole parvus ſit, virtute tamen maximus exiſtit, citò, tutò, & jucundè operatur, humores peccantes blande educit, vitia ventriculi, nauſeam, anorexiâ corrigi, biliolos affectus curat, febrili inprimis fomiti expurgando per quam idoneus; à Marco Cornacchino Profeſſore Medico Piſano, commentario doctiſſimo in lucem productus eſt.

Pulvis Comitiffæ de Kent, alias Anglicus, Lexic. Pharm. D. Iuncken.

℥. Apicum nigr. chellarum cancrorum, Junio capſarum. & in pollin. redact. rad. contrayerv. an. ℥ii. margarit. corall. r. Alb. oculi. ℞. cum ſucco limon. ſupra marmor ſimul levigatum, & ſiccatur. ſuccini albi, eryſthallorum cum ∇. roſar. ſubtil. eritor. & ſiccatur C. C. opt. calcinat. & cum ſucco citri levigati & ſiccatur an. ℥i. Bezoar. Occident. Terr. lemn. an. ℥℞. ceruſſ. & ℥iij. Ambr. gryſ. ℥i℞. moſchi ℥℞. miſceantur omnia exactè & cum gelatina è ſpoliis viperarum & C. C. cum aquâ cardui facta, & croco leviter tinct. q. s. ſiant globulæ cautè ſiccandi.

D. Charas hanc tradit ejuſdem deſcriptionem in ſua Pharm. Regiâ.

℥. Extremitatum nigrarum pedum majorum cancrorum Marinarum, ℥iij. ocul. ℞. ſtuvia. margaritar. Oriental. Corallorum rubr. præp. an. ℥i. ſuccini albi, rad. contrayervæ Virginianæ an. ℥vi. Lapidis Bezoar. Oriental. ℥ii. offis de corde cervi ℥iij. croci ℥i. omnia ſubtiliter pulveriſata torrentur, ſpiritus mellis ℥℞. deinde excipiantur gelatina viperina, & ſiant Trochiſci in umbra ſiccandi & uſus tempore pulveriſandi.

Pulvis alius Comitiffæ de Kent à D. Digby D de Monconis communicatus in hujus Itinerario Belgico deſcribitur qui cum priori ſerè coincidit, ſcilicet in hoc tantum differt quòd loco margaritar. & corallor. eorundem Sal adhibetur, quòdque extractum croci ipſi croco ſubſtituitur: Omnes autem hæ compoſitiones ſunt Alexiteriæ ac Bezoardicæ, ut jam ſupra in Pulvere è Chelis Cancrorum diximus.

Pulvis ad condienda Cadavera, vid ſub titulo Balaſtatio.

Pulvis, ſeu Species Cordiales temperatæ ex Pharm. Auguſt.

℥. Ligni Aloës, ſpodii ex ebore an. ℥j. cinnamomi caryophyll. offis de corde cervi, doronicæ, Been utriusque an. ℥i℞. margaritar. ℥vi. ſerici crudi toſti, corallorum rubrorum, alborum an. ℥ii. Hyacynthi, ſmaragdi, ſapphiri an. ℥℞. croci ℥j. folior. Auri, argenti an. numero x. miſc. quibus addimus Ambra, moſchi an. ℥℞; ut ſiant ſp. completæ.

Cor roborant, animi deliquio medicantur, nec non in peſtilente lue commendantur.

Species Cordiales Alexandri Benedicti ex eadem Pharmaci.

℥. Margaritarum, granatorum orientalium, ſpodii de Ebore, cinnamomi, Tormentilla, Boli Armen. an. ℥ii. Terra lemnæ ℥viii. ſandalor. omnium, raſura eboris, unicornum an. ℥ii. Hiacynthi, ſapphiri, Coralli utriusque ſuccini albi, Valeriana vera, diſtanni Zedoaria, Ligni aloës an. ℥i. ſerici crudi toſti ℥ii. offis. de corde cervi ℥℞. Been utriusque an. ℥ij. foliorum Auri num. 5. in pulverem redigantur & miſceantur. Completa ſiunt, ſi jungantur Ambra, moſchi an. gr. x.

Febribus peſtilentibus & malignis adverſantur; humores putreſcentes corrigunt, aut eos corrumpi prohibent; Spiritus vitales plurimum reſciunt, ac cordis vires tuentur; unde etiam nomen concoctionis Cordialis obtinuit, ut quæ omnem penè noxam cordi adverſam diſjiciat & expellat.

Pro unicornu duplum hic pondus cornu cervini uſti & præparati ex apicibus deſumpti, pro offe verò de corde cervi ſicut in aliis quoque ejuſmodi compoſitionibus, margaritas præparatas ſubſtituere quondam conſuevimus; utrique tamen cornu cervi ſpagiriæ cè præparatum ſubrogari poteſt.

Pulvis

Pulvis, seu Species Diacubeborum, ex Pharm.
Schroder.

℞. Santal. trium an. ℥℔. Spod. preparat. ras. ebor.
an. ℥iij. Sem. Anomi. cubeb. an. ℥j. F. pulvis.
Vires. Aperit & confortat hepar.

Pulvis Diacuminu Nicolai, ex Pharm. August.

℞. Cumini prius per diem naturalem in aceto infusi,
& rursus exsiccati ℥j. Dj. Cinnamomi, caryophyllor.
an. ℥iij. Dj. galanga, satyria, Calamintha, Zingibe-
ris, nigri an. ℥j. Dj. Ammeos, Ligustici an. ℥j. Dj. gr.
piperis longi ℥j. Spica, nucis moschata, cardamomi
an. ℥iij.

Thoracis præcordiorum, ventriculi, & viscerum
imbecillitati à frigida causa natæ, atque oxiregmia
opitulantur, stomachicis conveniunt, intestinor. fla-
tus dissipant, hypochondrior. distentionem à nimia
cruditate, & flatibus profectam auferunt, viscera ca-
lescunt, & concoctionem mitè juvant, difficultati
itidem spirandi, & Tussi ex frigidis crassisque humo-
ribus ortæ, auxilio sunt, nec non inflatis, colicis, &
quartanariis plurimum prosunt.

Si quis species has præparare voluerit, cuminum
absque infusione ista præparatum, sed in pulverem
tantum contritum ut sumat, præstabit; id quod etiam
in Diospolitico Gal. notandum erit.

Pulvis Diacurcuma Mefuzæ, ex eadem
Pharm.

℞. Croci, Asari, sem. petroselini Macedonici, dan-
si, anisi, apii an. ℥℔. Rhabarb. mei, phu, seu valeriana
majoris, spica indica an. ℥vi. scelopendrii seu cete-
rach ℥iij. costi, mirrha, cassia lignea, schenanthi,
sarpobalsami, rubia, succi Absinthii, Agerati, olei
caryophyllor. an. ℥ij. calami Aromatici, cinnamomi an.
℥iij. scordii veri, succi glycyrrhizæ an. ℥iij. Tragacan-
thi ℥j.

Medicamentum hoc quod nonnullis diæ xpois, aliis
diæ epodærs inscribitur, viscerum interiorum, ven-
triculi nempe, hepatis & lienis morbis frigidis ac
diuturnis subvenit. Usurpatur ad cachexiam, & hypop-
tem, obstructions enim internas referat, colorem
corporis fœdum, & totum ejus habitum frigidiorum
corrigit, frigidam item & humidam stomachi intem-
periem emendat, flatus crassos dissipat, humorum-
que corruptionem prohibet, renum quoque vitiis
ab obstructione crassorum & viscidorum humorum
natis opem fert, urinam prolicit, ac frigidis vesicæ
affectibus medetur.

Pulvis Diaconitem sine speciebus; ἀνδρον, ex
Pharm. Baderoni.

℞. Rosar. rubr. ℥℔. Trium santalor. & coriandi
prep. an. ℥ij. seminum Acetosa, portulacæ, berberis, cor-
tic. granor. sumach, gummi Arabici & Traga-
canthi, an. ℥j. mastiches, sanguinis dracon. in lacry-
mis, succini, vulgo carabe, & spodii Arabum an.
℥℔. caphura gr. iij. Fiat Pulvis ului reponen-
dus.

Pulvis Cyprius pretiosus Zvelfferi.

℞. Musci vel usnea quercina electa, & ab omnibus
impuritatibus lignosis mundata ℥iij.

Immittatur sacculo & per horæ quadrantem bacu-
lo discutiat, ut ab omni pulvere ex sordibus adhæ-
rentibus penitus liberetur; hinc ollæ immittatur, sæpius
aqua simplici superfusa lavetur, per duos dies, donec

aqua limpida & pura, prout effusa fuit, effundatur;
siccet, deinde in Sole supra linteum collocata, ut
eo magis suo colore, odore & sapore, viximum at-
tractrice Solis privetur. Porro hæc eadem usnea suo
colore viridi & omni odore jam privata, ac probe
siccata cum floribus rosarum & jasmini (vel floribus
Arantiorum & citri ubi illorum est proventus) re-
centibus & integris sexies vel octies stratificetur, & jun-
ctim pondera aliquo in cribro comprimatur; singulis
diebus floribus ab usnea separatis, & recentibus sub-
stituitis, donec flagrantissimo imbuatur odore. Post,
leniter exsiccata usnea & in pulverem subtilissimum
reducta, denud, si forte odorem deperdat in leni exsic-
catione, (quæ tamen nunc in Sole fieri non debet, sed
alio in loco tepido) linteo subtili vel sacculo largo
imposita, intra supraque floribus supradictis recentibus
conspersatur, ac pondere aliquo in cribro nonnihil
aggravetur. Huic pulveri tandem fragrantissimo pro
quavis Libra una adde.

℞. Moschi Dj. vel ℥℔. soluti in spir. rosar. fragr.
f. g. ad pulicula formam, Ambra grysea iidem ℥℔. so-
luta in ol. still. rosar. veri Dj; vel in ol. jasmini aut
arantiorum, prout ex Italia affertur, ℥℔. item, si lu-
bet pulv. rad. ireos, flor. Albiss. ℥iij. Cyprii ro-
tund. ℥iij.

Fiat Pulvis fragrantissimus regius, qui quando
capiti inspergitur, odore suo grato insigniter illud ro-
borat, suæque adstrictione, siccitate atque vi attracti-
ce omnes ejus sordes exsiccat: & cum nulla viscositate
polleat nec cuti, neque capillis firmiter adhæreat, fa-
cile à capite & ejus capillis avelli poterit.

Pulvis de Cypeto Odorificus, ex Pharm. Schroder.

℞. Rad. ireos flor. ℥iij. cyprii rotund. Acor. an.
℥ij. lign. santal. cir. ℥℔. rhodii ℥j. Dj. spec. diamb.
℥ij. Troch. gall. mosch. ℥℔. Ambr. gran. xii. Fiat
Pulvis.

Vires. Pulvis est odoriferus, confortans spiritus vi-
tales & animales.

Pulvis contra defluxiones Francofurt. ex Pharm.
Schroder.

℞. Mastich. Alb. succin. in fragm. summ. sabin. ros.
oliban. sem. cann. an. ℥iv. stachad. cir. vii. m. F. Pul-
vis grossus.

Pulvis ad Dentifricia Moschatus, ex Pharm.
August.

℞. Pumicis ℥ij. ossis sepiæ, ℥vi, coralli rubr. pre-
parati ℥j. radices ireos ℥j. Moschi, Zibethi an. ℥℔. ligni
rhodii, nucis moschata destillati an. gutt. iij. ca-
ryophyllor. gutt. iij. misce, lege artis.

Mucosos dentes à sordibus purgat, eosque dealbat
ac mundificat, gingivas quoque stringit, & dentium
radices firmat.

Dentifricius alius ex Pharm. Schroder.

℞. Silic. fluidatil. calcin. ℥iij lap. pumic. preparat.
℥℔. rad. ireos flor. ℥ij. ol. stillat. ros. ℥℔. vel ex lign.
rhod. fiat pulvis subtilissimus.

Vires. Exterget dentes Fœtorem oris emendat.

Dentifricii pulveres fiunt potissimum expulverifi-
cis corallis, calcinatis ossibus, Cornibus, Lapidibus
crustaceis, radicibus ireos, crusta panis tosta, salibus
ustis, cinerib.

Alius ex eadem Pharm.

℞. Farin. laterum rubrorum ℥℔. imbibatur per
vices Spiritus Sulphur. pari quantitate & fiet pulvis
adde Tart. vini alb. ℥ij. panis ad nigredinem
affi

usti ʒij. m. F. pulvis, quo dentes nigrore aut vi-
tore infecti confricentur, & vino calente abluan-
tur.

Pulvis Dysentericus Joani Langii, è
Pharmac. Augusti.

ʒi. Maxillarum lucii cum dentibus, priapi cer-
vi, corticum granatorum, cornu cervi usti, Boli
armena, seminum lapaishi an. unc. j. Fiat pul-
vis.

Ad omnes alvi fluxus, Diarrhœam, Liente-
riam & in primis dysenteriam magnæ est effi-
caciæ.

Dysentericus alius Zuelfferi.

ʒi. Flor. ferri prepar. unc. j. oculorum cancrorum
prepar. nuc. mosch. rad. Tormentill. an. ʒß. flor. ro-
sar. rubr. balaustr. croci Austr. an. ʒij. fiat omnium
pulvis.

Ad omnes alvi fluxus immoderatos, diarrhœam,
lienteriam; præcipuè verò dysenteriam, sistendos,
præsentaneum est remedium atque virtutis efficacissi-
mæ. Dosis ʒß. ad ʒj.

Dysentericus alius Crollii, è Pharmac.
Schröder.

ʒi. Succin. sang. dracon. lapid. hematit. corall.
rubr. semin. portulac. plantag. Anthor. radic. Tor-
mentill. Terr. figillat. an. ʒij. balaustr. ʒj. nucist.
numer. xv. cinamom. ʒß. croc. & adstringent. Talc.
calcinati. matri. perlar. calcinat. ana. ʒi. lapi-
des lavigentur, reliquisque minutissime tritis ad-
dantur.

Vires. Valet in omnibus profluviis alvi, men-
struorum narium &c. Dosis ad drach. j. ad drach. iis.
vel drach. ij.

Pulvis Dysentericus Crollii nihil animadversione
dignum habet; interim tamen sequens Dom. D.
Johannis Michaelis non minoris est ponderis.

ʒi. Pulver. lapid. hematit. lib. i. C. C. Antimonio
usti. croci marris adstrung. an. ʒß. magister. corall.
cum succo citri ʒii. medull. lapid. ʒiii. M. F. pulvis.
Dosis ʒi. ad ʒß.

N. In dysenteria epidemica solius est addere epa-
ta serpentum exsiccata. Hofmannus.

Pulvis ad Dyskiam, vid. Pulvis Partum pro-
vocans.

Species Electuarii Ducis ex Nicolao
Pharmac. Augusti.

ʒi. Sem. Anisi ʒij. gran. xvi. glycyrrhizæ, ma-
stiches an. ʒij. gr. ʒ. chamedrios, cinnamomi, zin-
giberis albi, galangæ, semin. fœniculi, carvi an. ʒj.
gran. xv. cassia lignea, calamintha, pyrethri, pipe-
ris albi, longi, cyperi rotundi, schœnanthi, rad.
ireos, Folii, Asari, sem. dauci, Amomi an. ʒj. spi-
ce indica, croci, gummi Arabici, Tragacanthi, ca-
lami aromatici, cubebar. caryophyllor. carpobalsami
cardamomi, baccar. juniperi, rad. pentaphilli, Aco-
ri, rhubarbari, nucis moschata, Xylaloës, Basilici
caryophyllati, sem. Anethi, ligustici, petroselinii
Macedonici & nostratis, feseleos, Asparagi, citri, Am-
meos, milii solis, saxifragia seu pimpinella, scario-
la, quatuor singulor. majorum, Been utriusque sty-
racis calamita ana. ʒß. gran. ʒ. sacchari penidii
ʒiii. Diss.

Cruditatem, inflationemque ventriculi & inte-
stina corrigit, colicos etiam, ac iliacos cu-
rant; præterea calculos expellunt, & urinam remo-
tantem potenter promovent.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I L

Species Electuarii Justini ex Nicol.
Pharmac. Augusti.

ʒi. Cinnamomi, Folii, costi, spice indica, cassia
lignea, Aristolochia rotunda, longa, Enula, penta-
philli, hyssopi, pulegii, Artemisia, piperis albi, buc-
car. juniperi lauri, sem. orobi vera, petroselinii, le-
vistici, petroselinii Macedonici, urtica, milii solis,
saxifragia, asparagi, sileris montani, apii, Anethi,
ruta, citri, fœniculi, Anisi an. ʒiß.

Ad dolorem renum minuendum haud incom-
modum medicamentum, calculos atterit, ac uri-
næ difficultati succurrit.

Pulvis Antepilepticus de secundina, è
Pharm. Schröder.

ʒi. Secundin. puelli primogeniti exsiccata. ʒß. cra-
niis maris calcinat. ʒi. pulv. pullorum corvi, ʒij.
coagul. lepor. ʒj. rasur. C. C. ʒij. castor. ʒß. succin.
albiss. ʒij. visc. quern. lun. decresc. collecti, ʒß. gra-
nor. & rad. pœonia ante novilunium collect. an. ʒß.
Ambr. gryf. mosch. an. ʒß. spec. Dianth. Diapleres
Archoni. latific. Galen. margarit. præp. corall. præpar.
an. ʒj. F. pulvis subtilissimus.

Hofman. Pulvis Antepilepticus de secundina.)
hic in veneno epileptico domando & extirpando
singularis est virtutis, unde pro arcano quasi refer-
vandum fuisset, multiplici usu illum probatum ex-
pertus fui.

Antepilepticus alius Diaphoreticus, ex
eadem Pharm.

ʒi. Cinnabar. Antimonii purificat. Magist. Coral-
lor. perlar. cran. human. ana. F. pulvis subtilissimus.
Dosis à gr. 10. ad 16. bis in septimana exhiberi potest.
Hartmann. in pract. Sennert. instit.

Antepilepticus alius Weichardi.

ʒi. Rad. pœon. decrescere lun. collect. ʒj. sem. pœon.
masc. excort. ʒß. ung. Alcis ʒiiij. succin. alb. C. C.
ust. præp. an. ʒij. margar. præp. corallor. rub. præp.
an. ʒj. stercor. pavoni ʒij. Lap. Bezoar. or. ʒj. uni-
corn. veri ʒij. limatur. ☉ ungar ʒi. croc. ʒj. manus
chr. perlat. ʒß. Fiat pulvis subtilissimus addendo ol. still.
macis ʒß. Dosis à ʒß. ad ʒß.

Pulvis Epilepticus Weichardi, ob (pacifica an-
tepileptica ingredientia crebriori usu experta non
potest non summam mereri laudem, cujus virtu-
tem etiam cardiacam exaltat limatura ☉ Ungari-
ci, quæ etiam pulverem de Pozis ingreditur, &
describit Zuelfferus in Pharmacop. reg. pag. 317.
magno extollens ob ☉ limaturam præconio, eo
quod vires exerat præstantissimas. Hofmannus.

Antepilepticus alius D. Charraz.

ʒi. Secundina mulieris sanguinei temperamentii
marem primipara, sicca & membranis purgata ʒi.
rad. pœonia flore albo & seminis ejusdem an. ʒß.
rasura crani hominis morte violenta perempti, ra-
sura unicornis, & ungula alces, visci quercini, ra-
dicis valeriana sylvestris & vincetoxici an. ʒiiij. mar-
garitar. & corallu rubri præp. lapidis contrayerva
succini albi, sem. galega an. ʒii. moschi Orientalis, Am-
bra grisea an. ʒj. m. & Fiat pulvis ad usum.

Hic pulvis optimos producit effectus in paroxys-
mis ut & in ipsa curatione Epilepsiæ. Datur in
aquis cephalicis à ʒß. ad ʒß. admiscetur, etiam ele-
ctuariis solidis & liquidis ut & compositionibus aliis,
usum pro exigentia continuando.

H h h

Pulvis

Pulvis Epilepticus minus pretiosus.
e Pharm. Noriberg.

℞ Rad. pœonia justo tempore effoss. ʒij. dictamni alb. Div. vsci querni ʒss. cubebar. coriandri præparati an. ʒss. nucis moschatæ ʒj. Fiat pulvis.

Epilepticus alius rubeus, ex eadem
Pharmacop.

℞ Cinnabaris nativæ præp ʒij. Ferula radicum pœonia, ʒj. magisterii perlæ corall. or. rubrorum, cornu cervi, rasura Eboris, crani humani an. ʒss. lapidis Bezoar. Orientalis, ʒss. moschi gran. ix. Fol. Auri num. xii. Misce fiat pulvis.

Præparatur etiam sine molcho.

Epilepticus alius Zuelfferi.

℞ Pulv. ex Typhis cervis rube juxta n. descripte. in Animadv. pag. 467. 468. parati ʒss. u. cornu veri marini, crani hominis suspensæ raspati, Bezoar. Occidental. lapid. carphon. subtili. supra eorum oculos repetibil. an ʒj. vermicul. in spongiis cynosbat. inventorum ʒss. ol. still. cinamom. ʒj. caryoph. ʒss. magist. solub. matris perlar. ʒss. fiat omnium pulvis subtilis.

Prodest Epilepticis & Apoplecticis. Dosis ʒj. ad drach. ʒ.

Alius ex eodem.

℞ Nucl. ceras. nigror. ʒss. sem. pœonia excort. ʒij. citri excort. bardana an. ʒss.

Coniundantur subtilissimè in mortario addita semper particula. Aquæ flor. Arantiorum, ad pulvis formam, ut per setaceum transmitti possit: cui adde parum etiam conquassata sequentia: nempe.

℞ Rad. pœonia d. t. collect. doron. veri an. ʒij. visci quercini, nuc. moschat. cardumom. min. croci Austr. an. ʒj. succini alb. præp ʒij. magist. solub. corall. rub. ʒj. crani humani raspati ʒij. ol. stillat. cinamom. ʒj. ligni rhodii, ʒj. Fiat omnium pulvis subtilis.

Efficax in epilepsia & aliis cerebri affectibus Datur à ʒss. ad ʒj.

Alius ex Eodem.

℞ Croci Auri cum Tinctura Antimonii fermentati drach. ij. u. icornu fossilis albissimi, unicornu marini scil. quod pro vero unicornu habitum fuit, nunc vero levi pretio venale præstat tanquam magis soboles, an. ʒss. crani hominis strangulati raspati ʒj. pulv. ex Typhis vel saltem junioribus lanuginosis & mollibus adhuc cervorum cornubus, u. m. edocto parati ʒss. magist. solub. perlarum Oriental. matris perlar. corall. rub. an. ʒss. nuc. mosch. ʒss. ol. cinamomi stillat. ʒj. vel ʒss. Fiat omnium pulvis subtilis.

Remedium contra insultus Epilepticos præstans est, resistit enim malignitati, & cor insigniter roborat. Dosis ʒj. ad ʒss. & ʒj.

Species Antepilepticæ Zuelfferi.

℞ Sem. pœonia excort. ʒss. Bardana ʒij. contundantur minutissimè in mortario ad pulvis formam, addita s. q. aqua florum & radicum pœonia sine addit. stillatæ, ac per cribrum setaceum cogantur: huic pulpa adde Bezoard. n. descr. ʒss. rad. pœonia d. t. coll. doronici veri, nucum moschat. an. drach. ij. crani humani subtiliter raspati, succini alb. præp. ana ʒij. margarit. præp. ʒss. visci quercini, cardamomi an. ʒj.

Quæ omnia leni calore denuo exsiccentur, & in pulverem tandem subtilem redigantur: qui ad insultus Epilepticos inhibendos efficax est. à drach. ad drach. ʒ.

Species aliæ Epilepticæ ex Eodem.

℞ Bezoard. cervini simpl. seu pulv. ex Typhis cervi pag. 467. Animadv. n. descripti ʒvi. crani humani subtiliter raspati ʒss. rasura ungula Alcis ʒij. rad. pœonia mat. d. t. coll. doronici veri an. ʒss. sem. pœonia excort. bardana, nuc. moschat. an. ʒij. mag. sol. margarit. Orient. corall. rub. an. ʒj. Fiat ex omnibus pulvis subtilis.

Ad supra dictos insultus Epilepticos inhibendos efficax, Dosis ʒj. ad ʒss.

Nota: quod huic intentioni, aut contra hunc affectum, diversæ compositiones, vel pulveres Antepileptici, ex rebus quas auctores passim commendant, concinnari possent; utpotè, ex cinnabari nativæ, vel antimonii; magisterio & bezoardico lunari; jecinoribus ranarum viridium palustrium secundinis exsiccatis mulieris primiparæ filium enixæ; item ex mercurio dulci, si verum suspicio subesset: verum hæc sunt penes arbitrium cujusque medici practici. Si quem verò amicitia rerum & naturæ unitas alliciat, ut solam quampiam ex appropriatis, ac jam recensitis compositis rebus delgat; hujus conatum probo & suffragabor.

Pulvis, seu Species pro Epithemate cordis, ex
Pharmac. August.

℞ Flor. buglossi, borag. melissa an. m. ss. sandal. omnium rosar. rubr. an. ʒij. corticum citri, sem. Acaste, ligni aloës, caryophyllor. an. ʒss. Doronici, Buxi utriusque succini an. ʒv. Trita omnia probe usui reserventur.

Mira est ejus efficacia in affectibus cordis, ejusque palpitatione, syncope, & dejectis prope modum virilibus facultatibus: nobilissimum enim viscus sopitum excitat, melancholicis, splenicis, tristibus & desperantibus succurrit, in pestilentiæ spiritus r. focillat.

Si Camphora gr. 6. & moschi gr. iij. addantur, dicitur completus.

Pulvis pro Epithemate cordis alius Zuelfferi.

℞ Herb. recent. rosmarini, majorana, basilici, melissa citrata an ʒj. flor. recent. Arantiorum, rosar. pallid. an. ʒss. cheiri, Tunica an. ʒj. Lavendulæ ʒss. cort. recent. Arantiorum, citri ana extim flav. ʒss. macis, nuc. mosch. an. ʒss. ligni rhodii, Aloës an. ʒj.

Omnia ac singula probe commixta, tam herbae recentes, flores ac cortices, quam desiccata Atamata & ligna (quæ tamen prius incidi separatim suaserim) minutim incisa, exsiccentur in umbra cuiusdæ cautela & charta desuper operta: ex quibus sic paratis speciebus sacculi poterunt formari, forma & magnitudine competenti, ac serico filo interfusus: postmodum cordis regioni ac pulvis superligatur, prius tamen aqua Cordiali, quæ ariserit illi humectandi: idque toties repetendum, quoties etiam calor exæstans eos exsicaverit, perelegans faciatque efficax modus hic est curæ tuendi, & spiritus vitales instaurandi. Namque dum speciebus sic cisis, flores recentes, & fragrantissimos addimus. Spinosis quasi ac latentes fliccorum spiritus excitamus, accessione novæ fragrantia intendimus, & multo efficacius temperamentum ac compositum suscitamus, cum alioquin pronum esset; levissima excitatione etiam solutas hæc Atomos spiritu & odor

turgidas exhalare. Ulterius sacculi ex zendalo con-
fuit; grolionibus hisce speciebus oppleri ac cordia-
li quodam liquore imbuti insigne robur Cardiacum
addere possunt, cum hinc virtus unita fortior, spe-
cies etiam proximius cordi adstant, viresque earum
diutius perdurent, neque protinus, uti alias pulve-
res vel species cordiales aqua aliqua diluta solent,
diffuant & dissipentur, sed diutius, viribus colle-
ctis conserventur, & integris sæpius etiam, si defici-
centur, madefactis sacculis, unde demittere satis
non possum Amethodum eorum, qui regioni cor-
dis & pulmonicis partibus, lapides & gemmas, coral-
lia & margaritas, ut ab his naturæ subsidium fera-
tur, ridiculè applicant; an ignorent, quod ejusmo-
di ad cordis & corporis penetralia & abdita nequa-
quam admittantur, nisi ab acidulo nostrate fermen-
to actuantur & veluti solvantur: quid de foris amabo
præstabunt, dura & cruda, inodora, & omnibus
ossibus aridiora.

Pulvis pro Epithemate hepatis, ex
Pharmac. August.

℥. Sandali rubri, albi, citrini an. ℥ss. rosarum ℥ij.
camphoræ ℥j.

Hepatis inflammationi confert, ejusque exastua-
tionem temperat. Adhibetur cum aqua endiviæ, ro-
sarum, Acetosæ, & aceti parte aliqua.

Pulvis Febrilis, D. Charraz.

℥. Cinnabar. antimon. ℥j. salis communis testæ ℥ij.
simul pulveratis, & cucurbita vitrea exceptis su-
perfundantur olei sulphur. ℥ij. digerantur per biduum
calore moderato in balneo cinerum, autoque deinde
igne evaporetur humiditas, residuaque massa lota, sic-
cata & in pulverem redacta cum floribus sulphuris
℥iij. permisceatur, lanceique fictili super carbonem ar-
dentes committatur; ubi accensus & assidue virga
ferrea movendo combustis floribus, super affusaque
ad trium digitorum transversor. altitudinem, &
super consumpto vini spiritu, pulverata massa superstes
ad usum servetur.

Commendatur hic pulvis in omnigenis febribus
intermittentibus; datur hora dimidia ante paroxys-
mum, à gr. x. aut xij. ad gr. xv. aut xx. in syrupo quo-
piam aut aqua Cordiali.

Pulvis Febrilis ex Pharmac. Schröder.

℥. Rad. dictamn. petasit. zedoar. Fol. scord. an.
℥ij. semin. cardiac. bened. C. C. uslion. prepar. an.
℥j. Antimonii diaphoret. ℥ij. Fiat pulvis subtilis-
simus.

Vires. Est contra omnis generis febres, quas
per diaphoresin expellit. Dosis ℥j. Grunlingius.

Pulveri huic febrili si nuc. mosch. ℥j. & lumin. ℥ss
superaddantur, majoris erit efficaciam; Dosis est ℥j. vel
℥j. in aceto horâ unâ & circiter ante paroxysmum in-
juncto sudore per horulæ spatium. Hofmannus.

Pulvis Febrilis Riverii ex Rolsincio.

℥. Auri ℥ss. solve in aq. reg. vitri antimonii ℥ss
solve in aq. forti, mercurii vivi ℥ij. solve in aq.
forti. Solutiones jungantur & duodecies per Alem-
bicum extillentur, iterata cohobatione. Pulveri in
fundo relicto adfunde spir. vini rectificatum, abstra-
he sexies à pulvere, ut intimius figatur, calcinetur ad
ignitionem fere in crucib. Hassiaco, igne rota, vel
sub tegula fornicata.

Hæc descriptio secundum Rolsincium videtur
optime competere enigmati adumbratim propo-
sito, à D. D. Riverio in Appendice Centuriæ Ter-
tiæ observationum. Non exhibetur per se, sed cum
scammonio mistus hac proportionem, & ultra, pro
Mangesi Bibl. Pharm. Tom. II.

ratione ætatis, ℥. Scammonii gr. xij. Febrifugi
gr. vi.

Pulvis Febrilis Riverii ex D. Charraz.

℥. Mercurii dulc. duodecies sublimati ℥ss. pulveris
emetici vulgar. pro robustis, correcti pro delicatiori-
bus, ℥ss. simul misceantur, & Fiat pulvis Fe-
brilis.

Datur longè à pastu ea die quæ paroxysmum
febrilem præcedit. Dosis gr. vi. pro puerulis in
pomò cocto, deveniendo pro ætatis ratione ad gr.
xx. ut & xxiv. in robustioribus.

Febrilis alius Crollii.

℥. Cochlear. long. test. affunde Acetum, stet per
noct. tunc extrahitur mucus, qui scopis aneis qui-
bus aurifabri utuntur, abraditur; postea hæc testæ cal-
cinantur ad albedinem & pulv. vel quod melius absque
calcinat. pulverisuntur, & ad usum servatur pul-
vis.

Vires. Præcipitat fermentum Febrile. Dos. ℥ss
Crollius exhibet ad ℥j.

Diaglanga Mesuæ ex Pharmac. August.

℥. Galangæ, ligni Aloës, an. ℥vi caryophyllor.
macis, ligustici an. ℥ij. zingiberis, piperis longi, al-
bi, Cinnamomi, calami Aromatici an. ℥ss calamin-
tha sicca, Cardamomi majoris, spica indica; sem. apiti,
anisi, feniculi carvi an. ℥j.

Ventriculi & jecoris intemperiem frigidam sa-
nant; ob id coctionem juvant, ructus acidos com-
pescunt, flatus crassos, atque ab eis natas in-
flationes dissipant; orisque halitum commen-
dant.

Pro ligustico cardamomum minus odoris gratia
hic substitui potest.

Species de Gemmis frigida, ex Pharmac.
August.

℥. Margaritar. prepar. ℥ij. spodi de Ebore, rad.
sur. eboris, coralli utriusque ana. ℥ij. Flor. rosar.
rubr. ℥ss. hyacinthi, Smaragdi, sapphiri, Sardæ, gra-
nati, sandali albi, rubri, citrini; Flor. borraginis,
baglossi, sem. Acetosæ, Basilici, Been utriusque an.
℥j. ossis de corde cervi ℥ss. folior. Auri, Argenti an.
numero xv.

In magno febrium æstu, ut & jecinorosis pro-
sunt; insuper adpetentiæ dejectæ; syncopi, cor-
dis palpitationi, tussiculosis, & Asthmaticis au-
xiliantur.

Species de Gemmis calida Mesuæ, ex
eadem Pharmac.

℥. Trochiscor. Diarrhod. ligni aloës an. ℥v. zedoar.
ria ℥ij. margarit. albar. Doronici, corall. citri, macis,
sem. ocimi caryophyllati, Ambra vera an. ℥j. coralli
rubri, succini albi, rasura eboris an. ℥v. Sapphiri, hya-
cintih, sardæ, granatorum, smaragdi, Cinnamomi,
galangæ an. ℥ss. Been utriusque, caryophyllor. zin-
giberis, piperis longi, spica indica, Folii, croci, Car-
damomi majoris an. ℥j. folior. auri numero xx. argenti
num. x. moschi ℥ss. Misc.

Ad frigidos affectus cerebri, cordis, ventriculi, he-
patis, & uteri efficacissimum medicamentum, melan-
cholicos, tristes, sine causa manifesta timidos, solitarios
juvat & exhilarat, lypothymias, cordis tremorem &
syncopem emendat, ventriculum à frigida intemperie
imbecillum roborat, & coctione cum ejusdem, tum
hepatis meliore reddita, corpus luxuriosius præstat, uni-
versi habitus refrigerationem corrigat, imbecillita-
tem reficit, uteri præfociones sanat.

H h h 2

Pulvis

Pulvis Griseus contra Pestem, ex Pharm. August.

℞. Rad. pimpinella, gentiana, tormentilla, serpentaria. folior. ruta, absinthii, nucum juglandum, granor. juniperi, aceti rosati, theriaca andromachi an. ℥i. misceantur omnia.

In præservatione & curatione pestis plurimum valet. Quidam addunt castorei ℥b. aceti rosati ℥j. omitti potest.

Pulvis de Gutteta Antepilepticus ex D. Lemery.

℞. Rad. paonia maris visci quercini aa ℥b. cranii humani nusquam inhumati, ungula alicæ a ℥ij. sem. ocymi & paonia a ℥ij. flor. beton. & tilia a Div. ruiv. diambra sine moscho ℥j. sacch. rosati ad pondus omnium, aut ℥ij. ℥vj. fol. auri num. x. F. l. a. pulvis.

Hic pulvis variè in Pharmacopæis describitur, & descriptio hæc nostra è Pharmacopæa Lugdunensi mutuata fuit. Inservit autem affectibus epilepticis & hoc denotat nomen Gutteta quod apud Occitanos Epilepsiam significat. Dos à ℥b. ad ℥b. in aq. betonica aut mentha.

Pulvis contra Hæmorrhagiam Zuvelferi.

℞. Rad. Tormentilla ℥vi. papav. errat. Terra sigill. seu boli Armen. lapid. atit. nuclei interioris, hamatit. prepar. corneoli preparati, magist. solub. coralliorum, nuc. moschat. an. ℥ij. sang. draconis, olibani in granis, an. ℥ij. nitri purissimi crystall. ℥vi. Fiat pulvis.

Valet ad sputum cruentum & fluxus sanguinis narium sistendos, & ad menstruum mulierum superfluum, fluxum, dysenteriam, diarrhœam, alvi ac uteri profluvia alba & cruenta curanda singularis est efficacia.

Contra Hæmorrhagiam alius. D. Doct. Hertod.

℞. Aluminis crudi quantum libuerit, lacce pistorum donec pulvis incarnato colore saturetur. Insufflatur hic pulvis in nares pro hæmorrhagia sistenda; ejus usu ab orci fancibus, Deo benedicente, multi liberati sunt.

Pulvis Hæmorrhoidalis ex D. Lemery.

℞. Farina volat. ℥j. croci mart. ℥b. boli Orient. ppti, radic. verbasci a ℥ij. hermodactylor. albor. per noctem in sp. vini infusor. & iterum exsiccatorum, flor. papaver. errat. sacch. candi alb. sanguin. dracon. olibani aa ℥ib. M. f. omnium pulvis subtiliss.

Fluxus hæmorrhoidalis sistit hic pulvis, ac earundem hæmorrhoidum tumores discutit, si modò albumine ovorum exceptus, sicque in stupis extensus parati affectu applicetur.

Pulvis Hepaticus rubeus, Zuvelferi.

℞. Cremoris Tartari ℥ij. Tartari vitriolati sed crystallisati, ne in humido liqueat ℥ib. facula seu salis essentialis Acetosella ℥j.

Hæc mixta & in pulverem redacta humectentur ter quaterve cum Tinctura ex rosis siccis rubris & santalo parbro, beneficio aquæ rosarum & spiritus vitrioli parata, & toties leni in calore exsiccantur. Quibus tandem in pulverem denuò conversis superadde sacchar. n. citrati ℥ib. F. pulvis: servetur in vitro bene clauso.

Hepaticus alius ex eodem.

℞. Cremoris Tartari ℥ii. Tartari vitriolati crystallisati ℥b. facula seu salis essentialis acetosella ℥j. pulv. rosarum rubr. ℥b. santali rubri ℥ij. sacchari citrati n. ℥j. M. F. Pulvis.

In calida hepatis intemperie, ejusdemque obstructione, & labefactione perutile est remedium,

Species hepaticæ, ex Eodem.

℞. Succ. concret. seu inspissat. agrim. cichor. sylv. ex toto, hepatica nobil. absinth. nostri a. ℥ij. his succis concretis imprægnentur, & commisceantur. pulv. rosarum rub. ℥ib. croci Austr. ℥ij. rad. pimpinella ℥b. calami Aromat. Doronici veri, galange an. ℥ii. ligni aloes optim. santali citrini, santali rubri an. ℥ib. nuc. moschat. cinamomi an. ℥b. exsiccantur leni calore chartæ inclusa, ac denuò in pulverem subtilem conterendis redigantur, quibus adde facula Acetosella, seu salis essentialis, prout appellare malueris, ℥ij. cremoris tartari ℥b. Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, assini asservandus.

Hepar, & ventriculorum roborat: proinde in cachexia, hydrope, icteritia salutariter exhibetur, a ℥j. ℥is. ad ℥j.

Species Hepaticæ Quercetani, è Pharm. Schröder.

℞. Corall. rub. preparat. spod. spec. diatrag. an. ℥ij. flor. hepatic. sem. Acetosa, portulac. an. ℥j. croc. & optime preparati, ℥iss. (cum aq. simpl. vel cum sulphure) croc. & ex ol. sulphur. parat. ℥ij. (vid. l. 3) sacchar. rosat. prohibit. F. pulvis.

Vires. Pulvis est admirabilis contra omnes obstructions, imbecillitates, ac intemperies hepatis, cui pristinum robur reparat: singularis porro adversus omnes fluxus hepaticos cachexias, hydropites, icterum &c.

Species hepaticæ Quercetani contra omnes affectus quos Dominus Auctor allegat, maximæ virtutis sunt: loco croci & citis etiam vit. citis substitui commode potest. Sequens etiam pulv. hepatic. ruber excellit.

℞. Cryst. tart. ℥ss. corall. r. ppt. succini alb. ppt. a ℥ss. gr. xij. crystall. spur. vitr. coag. gr. xxxiv. macis gr. v. ambra opt. ℥ij. gr. iv. Hunc illustr. Dux Saxonie I. Joannes Georgius p. m. in frequenti habuit usu tempore matutino. Pulvis in 24. Doses dividi potest. Hofmannus.

Pulvis contra Hernias Quercetani, è Pharm. Schröder.

℞. Rad. consolida major. ℥ss. herniaria pulverata ℥j. spongiar. stipitibus rosa canine adnascentium, pulveratur. ℥ij. magist. corallor. margaritar. an. ℥iss. magist. rii lapid. hamatites Div. spodii, terra sigillata, an. ℥ij. cinnamomi, sem. fœniculi dulc. an. ℥j. sacchari rosati q. s. ad pulverem gratum efficiendum.

Hic pulvis mane per plures dies exhibetur iis qui herniam patiuntur. Interim ligaturis convenientibus utantur.

Species de Hyacintho, ex Pharm. August.

℞. Hyacinthi præp. corallii rubri, Boli Armen. Oriental. terra sigillata Silesiaca an. ℥iss. granor. chermes, rad. tormentill. dictamni albi, sem. citri mundati, Acetosa, portulaca, croci, myrrha, rosar. rubr. sandalor. omnium, ossis de corde cervi, cornu cervi nati, rasura eboris an. Div. sapphiri, smaragdi, Topazii margaritarum, serici crudi Tosti aa. ℥ij. folior. auri numero viginti. Argenti, numero x. P. pulvis qui completus redditur per Ambra vera, moschi an. ℥j. camphora gr. s.

Opitulatur Cardiacis & lipothymias patientibus, viribus exolutos restituunt, syncopas Arcent. pestiferes morbos præcavent, eosdemque jam factos expellunt, putredinem humorum corrigunt, ac in malignis febribus, cor è tetraurum, fuliginum & pravorum vaporum insultu tuentur.

Pulvis Hydragogus Zuvelferi.

℞. Cremoris Tartari ℥j. Mechoaca alba, gialapp. an. ℥vi sem. Ebui ℥ss. gummi gamandre, ℥ss. nucis moschat. ℥ij. Fiat omnium pulvis.

Hydro.

Hydropicis ac veteri iætero fœdatis opitulatur; namque pituitam, bilem & aquolas educit humiditates à ʒss. ad ʒj.

Hydragogus alius, ex Eodem.

ʒ. Rad. Afari, mechoacæ alba, gialappa, hermodactyl. calami aromat. an. ʒij. herb. gratiola, soldanella, an. ʒiiss. sem. ebuli ʒss. elaterii ʒij. Diagridii rosati sem. scammon. rosati ʒiiss. millepedum n. m. preparat. ʒiss. gummi gamandra drach. j. caryophyllorum Macis an. ʒiiss.

Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus cujus dosis ʒss. ad ʒj. singulis quaternis diebus in hydropo exhibendus.

Species Diahyssopa Nicolai ex Pharm. August.

ʒ. Hyssopi, ireos, Thymi, piperis an. ʒxv. pulegii, satureia, ruta, cumini, an. ʒx. dactylor. enucleator. Tragacanthi, glycyrrhizæ, caricar. passular. major. enucleatar. feniculi, an. ʒv. zingiberis, anisi, carvi, ligustici an. ʒiiss.

Capitis frigidis vitiis conducunt, Columellam à frigido humore prolapsam vel tumefactam exsiccant, arteriam asperam expurgant, omnia frigida Thoracis & stomachi vitia emendant, & coctionem promonent.

Pulvis hystericus ex Pharm. August.

ʒ. Rad. dictamni albi ʒiij. zedoaria ʒj. cort. citrifici, sem. ejusdem an. ʒii. fragmentor. lapidum pretiosor. omnium an. gr. xij. specier. diamarg. calidi ʒij. sacchari albi ʒj. Fiat pulvis.

Uterinos dolores placat, ejusque expurgat illuviem menses quoque & secundinas moram trahentes propellit, animi defectiones ab utero ortas arcet, ac ejus suffocationem abigit.

Pulverem hunc multæ utilitatis, & in mulieribus prædictis morbis longo tempore expertum. D. D. Joan. Udalricus Rumlerus collega quondam noster tradidit.

Hystericus. Alius Zuelfferi.

ʒ. Rad. pœonia, lun. decr. collecta ʒss. doronici veri, zedoaria an. ʒij. cardopatiæ ʒss. Anthophyllor. croc. Austr. vel Oriental. cort. arantior. citri ana extim. recent. sem. citri excortic. an. ʒij. salis jovis seu stanni Anglici ʒss. Magist. solub. corallior. matris perlar. an. ʒij. ol. stillat. cinamomi, melissæ ana ʒss. Fiat pulvis.

Placat hic pulvis dolores uterinos, atque vapores ab utero ascendentes reprimat, imo matris suffocationem abigit. Dos ʒss. ad ʒij.

Hystericus alius Quercetani, ex Ph Schröder.

ʒ. Cassiæ lignæ, calam. aromat. sem. agni casti, pastinac. ruta, pœon. anis. sacchar. anthosati ad pondus omnium. m. fiat pulvis.

Vires. Prodest albo mulierum fluori & uteri suffocationi Dos ʒiss.

Pulvis hystericus Quercetani in uteri suffocatione cum albo mulierum profluvio conjuncta maxime commendatur. Saccharum Anthosatum ut utero hostile. Omitti, & ejus loco Bezoardicum joviale addi potest. Hofmannus.

Hystericus alius D. Charraz.

ʒ. Verrucar. ad genua equorum adnascentium, verno tempore avulsar. vel sponte procidentium ʒj. asse fatide, cornu & ungula hirci an. ʒj. F. omnium pulvis, cujus ʒj. pondus prunis imponatur pro suffragio, quod per infundibulum in vulvam introducatur.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Hystericus jovialis, è Pharmac. Schröder.

ʒ. Magisterii Jovis Anglici aut bezoartici ejusdem, matris perlar. coralli rub. preparat. an. ʒj. olei stillatini, succini rectificati ʒj. m. & fiat pulvis subtilissimus ad usum.

Hic pulvis medetur desperatissimis iæteri suffocationibus earumque regressum impedit. Dos. ʒj. in aqua quapiam hystérica, vigente paroxysmo, datur verò tribus diebus continuus, mane jejuno stomacho præpariendo ejusdem regressu.

Species Imperatoris, ex Pharmac. August.

ʒ. Cinnamomi opt. ʒx. zingiberis ʒj. caryophyll. ʒss. galanga, macis, nucis moschat. an. ʒij. Misce completa sumat per moschi optimi ʒss.

Species hæc induntur potissimum Tragematibus, cor & ventriculum frigidum, humidum ac flatulentum confortantibus; aut addito saccharo in morsellos aptantur, qui ad stomachi segniter cibum concoquentis vires augendas concinnantur.

Species Diaiteos simplices è Pharm. August.

ʒ. Ireos ʒss. sacchari canthi albi, specier. Diatrægacanthi frigidi an. ʒij.

Ad omnem in fauces destillationem, idque initio, nondum invalescente impetu; feliciter adhibentur.

Species Diaiteos Salomonis ex Nicolao Myrepso, ex eadem Pharmacopœa.

ʒ. Ireos ʒj. pulegii, hyssopi, glycyrrhizæ an. ʒvi. Tragacanthi, amyli, cinnamomi, zingiberis, piperis, amygdalor. amar. nucum pinearum an. ʒij. caricar. passular. major. enucleat. an. ʒiiss. styracis calamitæ ʒii. ʒj.

Faucibus exasperatis, & columellæ fluxione tentatæ profunt, dispnoicis item, arteriacis, & tussiculosis auxillio sunt, necnon frigida capitis intemperiei & destillationi in fauces irruenti conducunt, ac vocis jacturam frigore contractam resarciunt.

Species Diaiteos usitata, ex eadem Pharm.

ʒ. Specier. Diatrægacanthi frigidi ʒj. radicum ireos ʒij. gummi Arabici, Tragacanthi an. ʒss.

Harum in destillationibus ad fauces ac asperam arteriam ruentibus usus est, guttur probe leniunt, expectorationem faciunt, necnon acres destillationes contemperant.

Pulvis Dialacca major Mesuæ ex eadem Pharm.

ʒ. Laccæ lotæ, rhabarbari an. ʒiij. spica indica, florum & stipitum schenanti, mastiches, myrrha, costi, cinnamomi, croci, cassiæ lignæ veræ, Bdellij, hyssopi, sabina, amygdalor. amarorum, Aristolochia rotunda veræ, gentianæ, afari, sem. ammeos, apii, feniculi, anisi, an. ʒiss. piperis nigri, zingiberis an. ʒj.

Usurpatur ad ventriculi & jecoris frigidam intemperiem, hepatis obstructions, inflationes & durities aquæ intercuti medetur, menses ciet, scirrhum dissolvit, cachexiam depellit, urinam promover, renum ac vesicæ duritiem dissipat, & calculos arterit.

Pulvis pro Lacte generando Zuelfferi.

ʒ. Carnis uberis vaccæ juvenutæ ʒvi. rad. recent. rapuncolor. cardui lactei, barba hirci ana. ʒj. ireos flor. ʒss. liquiritiæ ʒvi. sem. lactucæ, pœonia excorticat. an. ʒvi. lapid. lactei preparati, (est lapis mollis instar saponis tactu,) ʒss. corallior. alb. prepar. oculor. cancror. prepar. an. ʒvi. magist. solub. matris perlarum ʒss.

Caro mamillar. ad. etiam recentes conscindantur tessellatim ac cum reliquis, pulveribus & præparatis conspersa, immittantur alembico vitreo quibus superaffundantur succi cydoniorum recenter expressi ℥iv. ac illico in M.B. totaliter exsiccentur, (baculo quandoque illa in Alemb. commovendo, ut in pulverem subtiliorem redigi possint, cui pulveri adde pulv. sem. cruce, feniculi an. ℥vi. cardamomi, min. macis an. ℥ß. piperis longi ℥j. Misceantur exacte, fiatque pulvis subtilissimus; hujus detur pro dosi ℥j. vel ℥ij, in iusculo Gallinæ, sæpius in die.

Species lætificantis Galeni, ex Pharm. August.

℥. Seminis ocimi caryophyllati, aut florum ejusdem, croci, Zedoariae Xylobalsami, Caryophyllorum, Corticum citri, galange, macis, nucis moschatae, Syracis calamitæ an. ℥i. rasura eboris sem. Anisi, thymi cretici, epythymi an. ℥j. cornu cervini, margaritar. an. ℥ß. foliorum auri numero quinquaginta, argenti numero xxv. misc. completa sunt addendo camphora, moschi an. ℥ß.

Hæc compositio Galeni quidem falsè adscripta, sed magis ex Nicolai præpositi Antidoratio excerpta; plurimum valet ad cordis affectus ejusque palpitacionem; ventriculi & hepatis intemperiem frigidam & humidam corrigit, coctionem adjuvat, & corporis malum habitum emendat, colori gratiam reddens, oris quoque odorem ac halitum gratum efficit: Vires debiles instaurat, melancholiam sanat, ac involuntarios flatus compescit.

Species lætificantes Rhasis, ex eadem Pharm.

℥. Melissa, corticum citri, caryophyllor. mastiches, croci, cinnamomi, nucis moschatae, cardamomi majoris, sem. paoniae, been albi, rubri, zedoariae, doronici, sem. ocimi caryophyllati an. ℥ß. foliorum auri numero 10. argenti num. xxv. misc. completa sunt si addatur Galia moschata ℥ß. moschi ℥j.

Describuntur à Rhase 9. ad Almanforem cap. 13. de melancholia. Plurimum verò faciunt ad affectus cordis, ventriculi & jecoris, quas partes etiam roborant, palpitacionem cordis abigunt, valenter exhilarant, infirmæ concoctioni opem adferunt, coloremque corporis vividum efficiunt.

Pulvis Lenitivus Pharm. Noriberg.

℥. Rad. zedoariae, ℥ij. galange, calami aromatici, pimpinella, valeriana, nucis moschatae an. ℥ß. Fol. salvia, ruta an. p. ij. sem. ejusdem ℥j. carvi, petroselini, anethi an. ℥ß. anisi ℥j. sene electæ ℥ij. sacchari ad pondus omnium F. pulvis.

Species liberantes, ex Pharm. August.

℥. Radicum tormentilla, sem. acetosa, endivia, coriandri, citri an. ℥ß. sandalor. omnium, dictamni albi an. ℥j. boli armen. preparata, terra lemnia an. ℥ij. margaritarum corallii utriusque, succini albi, rasura eboris, spodii ex ebone, seu eboris, usti, ossis de corde cervi, Been utriusque, doronici, cardamomi, cinnamomi, macis, ligni aloes, cassia lignea, croci, zedoaria an. ℥ß. sacchari cantii, penidii, serici crudi rosti pulverisati, smaragdi, hyacinthi, granati an. ℥j. florum nymphaeae, buglossi, rosarum an. ℥j. misc. completa sunt, additis camphora granis vii. moschi, ambra an. gr. 3.

Harum usus multiplex est in febribus malignis, ipsaque peste, cor namque à veneni labe tuentur, præterea sudores movent, & à pestilentis luis contagio præservant atque etiam liberant. Cordiale planè medicamentum, omni ferè naturæ, ætati ac sexui accommodatum,

Species Lithontripticæ Nicolai ex eadem Pharm.

℥. Spica indica, zingiberis, xylobalsami, acori, cinnamomi, rad. peucedani, mei, trium piperum, saxifragia an. ℥i. opobalsami, aut olei juniperini ex granis parati, caryophyllor. costi, rhapontici, glycyrrhizæ, cyperi rotundi, tragacanthi, chamedrios, sem. olusatri, apii, ammeos, asparagi, ocimi, urtica, citri an. ℥j. grana xv. amomi, ligustici, militi solis, petroselini Macedonici, seseleos, danci cretici, anethi, cardamomi, folii, croci, schenanthi, cassia lignea, Bdellii, mastiches, ireos, Euphorbii præp. lapidis lycii, olei nardini compositi Mesua, moschelini ana scrup. gran. 4.

Nephriticis, necnon stranguriæ & dysuriæ succurrunt, iliorum, lumborum & renum gravitates ac obstructions, à frigidis & crassis succis ortas expediunt, vesicæ & renum calculos potentissimè expellunt, miram calculosis utilitatem exhibentes.

Pulvis Mantuanus, Pharm. Noriberg.

℥. Lapid. Bezoar. Orientalis, Occidentalis, terra sigillata cinerea an. ℥ij. rad. contrayerva, anthra. scorzœra an. ℥i. lapid. pretiosorum preparator. Boli Armena preparata, cornu Rhinocerotis, corallior. rubri, præp. margaritar. preparatar. an. ℥j. Misce pro pulvere.

Pulvis Marchionis seu epilepticus, ex Pharm. August.

℥. Radis. paonia maris, desrescente luna, effossarum, ℥ß. visci quercini, rasura eboris, ungula Alces, spodu. cornu cervi ex apicibus desumpti, corallior. rubror. albor. margar. preparatarum an. ℥j. Foliorum auri puri num. xx. Fiat pulvis.

Prodest hic pulvis apoplecticis, epilepticis, ac incubo laborantibus, intemperiem cerebri humidam corrigit & nocturnos terrores fugat.

Species Diamargariti calidi Avicennæ ex Pharm. August.

℥. Margaritar. Orientalium, pyrethri an. ℥j. zingiberis, mastiches an. ℥iv. doronici, zedoariae, sem. Apii, cardamomi utriusque, nucis moschatae, macis, Been utriusque, piperis nigri, longi an. ℥ij. cinnamomi ℥v.

Medicamentum ad universi corporis refrigerationem perutile, cardiacos, animo deficientes, mulieres uterum ferentes, præfocaciones uteri, cordisque syncopem patientes juvat, omnium virium imbecillitatem firmat; Tristitiam ac omnium vitalium partium noxam discutit, asthmaticis, tussientibus, tabidisque subvenit, ventriculi fastidia & imbecillitatem tollit, ejusque coctionem juvat, uterinos menses aperit: longo morbo dejectos & debilitate languentes recreat, atque ad pristinum robur reducit.

Species Diamargariti frigidi, ex eadem Pharm.

℥. Seminum quatuor frigidior. major. excorticatar. portulacæ, papaveris albi, rosar. rubr. Florum nymphaeae alba, Borraginis, Baccarum Myrthi, sandali albi, citrini, ligni aloes an. ℥j. corallii albi, rubri an. ℥ß. margaritarum or. ℥ij.

Omnem virium imbecillitatem firmant, syncopem juvant, & asthmaticos, tabidos, Tussientes, longo morbo extenuatos ac imbecillitate languentes reiciunt, & pristino recuperando robori conducunt.

Pulvis Melanagogus Quercetani, è Ph. Schröder.

℥. Fol. sen. ℥j. sem. anisi fenic. an. ℥j. cinnamom. ℥ij. crystall. Tart. ℥vi. sacchari ℥i. m. dosi à ℥j. ad ℥ij. Pulvis

Pulvis ad morsum canis rapidi, ex Pharmac. Norib.

℞. Fol. ruta, verbenæ, salvie minoris, plantaginis, polyodii, Absinthii vulgaris, menthe, artemisia, melissophylli, betonica, hyperici, centaurii minoris ana. Omnia aequale pondus in chartis inclusum in umbra exsiccat, & pulverisetur.

Idem paulò accuratior ad methodum Palmarii ex Pharm. Londinensi.

℞. Fol. ruta, verbenæ, salvie tenui folia, plantag. polyodii, Absinthii vulgaris, menthe, artemisia, melissophylli, betonica, hyperici, centaurii minoris ana. p. aq. Legantur singula, quo tempore viribus pollent maximis, quod ad Junii ferè plenilunium assequuntur. In sole fervido brevi siccentur, siccata ad usus reserventur, ea lege, ut quotannis renoventur.

Quum utendi necessitas incidet, singulor. æquale pondus in pulverem tenuissimum redigito.

Species diamoschi dulcis Mesuræ ex Pharm. August.

℞. Croci, dromedarii, Zedoaria, ligni aloës, macis an. ʒij. margar. albarum, serici crudissimi, charabe, coralior. rubr. an. ʒiij. sem. ocimi caryophyllati, Zingiberis, cubebar. piperis longi an. ʒiij. Been albi rubri, Folii spicae indicæ, caryophyllor. an. ʒi. misc. completa sunt, immiscendo galie moschata ʒiij. moschi ʒij.

Commendantur ad cerebri affectus frigidos, vertiginem epilepsiam, melancholiam, cordis palpitacionem, inquiete infomnia, paralytin, convulsionem, pulmonis noxas, & spirandi difficultatem, sopitum calorem nativum recreant, cachexiam emendant; lientosis jecinerosis & stomachicis succurrunt.

Species Diamoschi amari, ex Pharm. Londin.

Parantur, addendo prædictis Absinthii, rosar. siccatur. an. ʒij. Aloës opt. lota ʒij. cinnamomi ʒiij. castorei, ligustici an. ʒi. Fiat pulvis.

Pulvis ad nasalia seu Errhinus, ex Pharmac. August.

℞. Calamitha, majorana, rad. ireos, castorei, sem. nigellæ, staphidis agriæ an. ʒij. Hellebori albi, pyrethri, nucis moschata, myrrha rubra, Euphorbii an. ʒij. misc. ex hisce cum ladani ʒvi. & melle modico formari possunt nasalia.

Sternutationem potentissimè cient ac crassa per hares phlegmata evocant, lethargo ac epilepsia profunt, catalepticos & attonitos juvant; sed cautè iis utendum, præsertim in corporibus nondum purgatis, nec subita humorum per irritationem tam fortem præcipitatio suffocationis repentinae periculum inferat.

Pulvis nephriticus, ex Pharmac. Amstædædam.

℞. Ligni nephritici veri, rad. glycyrrhizæ rasæ, nuc. persicorum, an. ʒij. sem. milii solis, saxifragiæ, an. ʒij. Apii, cardui, dauci, feniculi, geniste, lappa majoris, levistici, petroselinæ macedonici, silenis montani, urtica romana, rad. Asari, Zingiberis an. ʒij. spicae indicæ, ligni sassafras, schenanthi, succini, oculorum cancri an. ʒiij. lapidis prunelle, tartari vitriolati an. ʒiij. Fiat pulvis.

Nephriticus alius Quercetani, ex Pharm. Schroder.

℞. Tunica interior ventriculi gallinae, stercoris albi gallinæ an. ʒij. pulvis pelliculae interioris, quæ in putaminibus ovorum reperitur. ʒiij. Herniaria, cinnamomi an. ʒiij. nucleor. mespilor. ʒij. sem. feniculi, Anisi an. ʒi. F. pulvis subtilissimus.

Uires. Effectus pulveris hujus efficacissimi sunt in alterando & expellendo calculo. Valet idem ad colicam passionem, Dosis ʒij. ad ʒij.

Pulvis nephriticus Quercetani si contra calculum in usum ducitur, addi potest magist. lapid. per ear. crystall. tartari & sal succini volatile. Si contra colicam tunicae interiores nucum juglandium pulveris latæ admisceri debent. Hofmannus.

Nephriticus alius D. Charras.

℞. Oculor. cancror. fluvial. ossium petreorum pericarum & asellor. minor. millepedar. siccat. sanguin. hirid. præp. sem. milii sol. an. ʒij. F. omnium ex arte pulvis. Dosis à ʒij. ad ʒij. datur in vino albo ejusque usus iterari & continuari potest pro exigentia, tum pro præpediendâ calculi generatione, tum pro eodem si fieri possit dissolvendo, atque per vias commodas eiciendo.

Species Deoppilativæ spleneticae Zuvelseri.

℞. Gum. ammoniaci in granis, myrrha rubra translucida, rad. pimpinellæ, enulæ, galangæ, cinnamomi acuti, nuc. moschatar. an. ʒij. sem. Apii feniculi, nasturtii, petroselinæ, urtica an. ʒiij. crem. tartari, tartari vitriol. crystallisati, salis, essentialis nasturtii ex succo riæ parati, magist. n. solut. ocul. cancrorum an. ʒiij. fiant species, sem pulvis subtilis.

Valent ad lienis affectiones morbosas & in hypochondriaca igitur affectione diuturna, obstructionibus hypochondriorum & mezentarii emolumento sunt, mensesque mulierum retentos promovent, Dosis ʒij. ad ʒij.

Pulvis partum provocans, ex Pharm. August.

℞. Cinnamomi ʒij. croci ʒij. cassia lignea vera ʒiij. succini albi preparati ʒij. F. pulvis.

Ad partus labores facilitandos utiliter exhibetur eisdem namque accelerat, & fetus exclusionem promovet. Datur ex aqua liliorum alborum consolidæ regalis aut alterius confimilis.

Alius ad idem, ex eadem Pharmac.

℞. Pulvis cinnamomi ʒij. succini albi preparati ʒij. Boracis Hipposarcheos an. ʒij. croci ʒiij. omnia in pollinem tenuem redacta misceantur.

Pulverem hunc ad partum facilitandum, & secundin. expellendas experientia & multiplex usus nobis commendant.

Alius ad idem ex Pharm. Noriberg.

℞. Cinnamomi optimi ʒvi. cassia lignea vera ʒij. succini albi ʒiij. croci ʒij. F. pulvis.

Ad partum Helidei de Paduanis, ex Pharm. August.

℞. Cinnamomi, croci an. ʒij. Boracis ʒiij. detur ex aqua Artemisia.

Utilitissimus ac expertissimus quondam erat hic pulvis Helideo de Paduanis, Medico Bononiensi eximio, qui eundem secretum sibi adeo habebat, ut non nisi fidissimis amicis aut prædilectis discipulis eum communicaret.

Augetur horum pulverum efficacia, si eis testiculorum equinorum aridorum, aut julorum nucum juglandium pulvis admisceatur, quod pro prudentis medici arbitrio & exigentis necessitatis occasione fieri poterit.

Ad partum & sedanda tormina post eum è Pharm. Schroderiana.

℞. Rad. menatamantici, consolida majoris an. ʒij. succini preparati, nucleor. persicor. mundator. an. ʒiij. cinnamomi, macis, croci an. ʒiij. m. & F. pulvis ad usum servandus.

In pretio est hic pulvis pro sedandis torminibus quæ patiuntur puerperæ. Datur in jusculo à ʒij. ad ʒij.

Pulvis Passavanticus, ex eadem Pharmac.

℞. Flor. borraginis, violar. an. ℥ii. Zinziber. spic. nard. an. ℥j. glycyrrhizæ, sem. Anisi an. ℥ii. diagryd. ℥iii. rhabarb. el. ℥vi. turbit gummi. ℥j. fene ℥ii. m. F. pulvis.

Purgat humores noxios maximè bilem.

Species Diapenidion Nicolai ex Pharm. August.

℞. Sacchari penidii ℥ii. nucum pinear. Amygdalor. dulcium, sem. papaveris albi an. ℥iii. Dj. cinnamomi, caryophyllor. succi glycyrrhizæ, tragacanthi, Zingiberis, gummi arabici, Amyli candidiss. sem. excorticat. quadrupor frigid. major. an. ℥ib. misc. completa dicuntur quibus jungatur camphora gr. vii.

Tussiculosis, pleuriticis, perineumoniosis conferunt, omnem thoracis noxam, faucium asperitatem, vocis raucedinem & jacturam ex frigido & sicco contrahant emendant, tabidis & putulenta reiciendis opem ferunt, crassos humores attenuant, eosdemque expulsionem aptos reddunt.

Species contra pestem, ex eadem Pharmac.

℞. Boli armenaprap. ℥℥. cornu cervi prap. sem. citri, aurantiorum, limonum an. ℥iii. coriandri, perforata an. ℥ib. anisi, perfoliata an. ℥℥. dictamni albi, cinnamomi electi, an. ℥ii. caryophyllor. rosar. rubr. rasura eboris an. ℥ib. Xylaloes, nucis moschate, majorana, granor. juniperi, ossis de corde cervi, rad. tormentilla, scabiosa, buglossi, sandal. omnium an. ℥℥. sapphiri, hyacinthi, smaragdi, rubini, granati prap. an. ℥i.

Adversus pestilentis luis malignarumque febrium contagia remedium præstans ac efficax, cordis vires tuetur & auget, veneni malitiam sudoris provocatione difficit, ac tam in curatione, quam in præservatione pestis morborumque contagiosorum plurimum valere creditur.

Pulvis Antipestilentialis. Zuvelseri.

℞. Rad. contrayerva ℥vi. Zedoaria ℥j. doronici veri ℥vi. sem. citri excorti. ruta, aquilegia an. ℥ii. cort. arantiorum, citri ana extim. & recenter siccant. ℥℥. myrrha translucida, succini albi an. ℥ii. croci Austr. ℥ii. maceis ℥ib.

Fiat omnium pulvis subtilis: adversus pestiferæ luis insultus efficax, & contagiosis quibilibet morbis adversatur. Dosis ℥℥. ad ℥j.

Alius ejusdem ad idem.

℞. Sulphuris crudi seu puri ℥j. nitri cum succo scor. dii soluti, & denuò crystallisati ℥ib. terra sigill. vel boli armenæ, n. m. parata ℥℥. myrrha rubr. translucida, succini albi prap. an. ℥℥. croci Austr. ℥ii. nuc. mosch. ℥℥. misceantur, fiatque pulvis omnium subtilis.

In febribus malignis & peste ipsa validus; à ℥℥. ad ℥j. pro sudore eliciendo.

Alius ejusdem ad idem.

℞. Rad. Angelica, imperatoria, contrayerva, Zedoar. an. ℥℥. sem. citri excorticat. aquilegia an. ℥ii. myrrha rubr. ℥iii. terra sigill. n. m. parata, nitri cum succo scor. dii soluti ac denuò crystallisati an. ℥℥. croci opt. ℥℥. nucis moschate ℥ii.

Fiat ex omnibus pulvis subtilis, cui imprimatur succus oleaginosus corticum trium pomor. limonior. servetur usui: Non minoribus cæteris hic pulvis pollet virtutibus Alexipharmacis; febribus enim malignis, pestiferis & contagiosis resistit, earumque insultus reprimat.

Species Antipestilentiales Zuvelseri.

℞. Succiscordi recenter expressi, depurati & ad consistentiam mellis inspissati ℥vi. decocti ex partibus

equal. rad. Angelica, morsus diaboli, scorzonera, imperatoria, parati, atque ad extracti spissitudinem leniter exhalando abstracti ℥vi. his mixtis impregnentur sequentes pulveres, nimirum, pulv. boli Armenæ cum succo scordi parata ℥j. ex typhis cervi rutæ parati, rad. contrayerva, Zedoaria an. ℥℥. Bezoar. occidentalis, croci Austr. vel orient. sem. citri excorticat. ruta horr. an. ℥ii. cort. citri recenter siccator. & ext. nucum moschatar. myrrha rub. translucida an. ℥℥. & lenissimo calore charta inclusa, exsiccantur, ut in pulverem subtilissimum denuò conteri queant; qui asservetur.

Præstant hæc species in febribus malignis, contagiosis, ipsaque peste, & à pestilentis luis contagione præservant Dof. ℥℥. ad ℥j.

Pulvis, seu Sal Philosophorum, ex Pharm. Schroder.

℞. Sal. com. fusi. sal. gemm. an. ℥j. galang. macis, cubeb. an. ℥j. F. pulvis.

Vires. Juvat concoctionem ventriculi, cruditates, que consumit. Dosis gran. 4. mane jeuno stomacho.

Pulvis phlegmagogus Quercetani & Salæ, ex eadem Pharm.

℞. Specier. diacartham. ℥j. Agaric. trochisc. ℥℥. turbit. hermodactyl. an. ℥j. m. Dosis ℥j.

℞. Cryst. tart. hermodactyl. mund. an. ℥j. Turbit. albi ℥vi. resn. scammon. ℥j. & caryophyll. cum sacchar. mist. ℥℥. misc. purgat serofos ac phlegmaticos humores sine molestia, dosis ℥℥. ad ℥j.

Pulvis Diatrion pipereon Galeni ex Pharm. August.

℞. Trium piperum an. ℥vi. grana xv. Anisi, Thymi, Zingiberis, an. ℥j.

Describitur hoc medicamentum à Galeno 4. de tuenda valetudine, commendat id autem in crudorum succorum & flatuum copia à cruditate, dandum iis qui malè concoquunt, & succum plurimum pituitosum in primis venis coacervarunt; stomachi refrigerationes, ructus accidos & jecinerosos juvat, nec non inflationes discutit.

Diatrion pipereon Mesuz, ex eadem Pharmac.

℞. Trium piperum an. ℥v. Zingiberis, thymi, Anisi an. ℥j. spice indica, amomi an. ℥j. cassia lignea, radicum Asari, enula, sem. Apii, feseleos an. ℥℥.

Ventriculi refrigerationibus, acido ructui, quantariis, jecinorosis, & inflationibus auxiliantur, ac fluxionibus quæ à capite ad thoracem descendunt, conducunt.

Pleres Arconticon Nicolai, ex eadem Pharm.

℞. Cinnamomi, caryophyll. ligni aloës galanga, spice indica, nucis mosch. Zingiberis, spodi, schenanthi, cyperi, rosarum, violar. an. ℥j. grana xv. Folii masiches. styracis calamita, majorana, balsamita, seu mentha aquatica, ocimi, cardamomi, piperis longi, baccar. myrtili, corticis citri, an. ℥i. gr. s. margaritarum orientalium, Boli albi, rubri, coralli rubri, serici tosti an. ℥j. gr. iiii. misc. species hæc completa dicuntur, si porro ingrediantur camphora gr. vii. camphora gr. v.

Cardiacis, tristibus, melancholicis, cibum vomitibus, pulmonariis, ac epilepticis succurrit, cerebri sensus interceptos liberat, ejusque debilitatem auctam imbecillo ventriculo & animi deliquio à corde non confert; prætereos qui ex diuturno morbo extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat, asthmaticis prodest.

Pulvis pleuriticus ex Pharm. August.

℞. Mandibularum lucii preparatar. dentis Asini prap. an. ℥j. lapidum percarum, calorum leporum, oculorum cancri preparator. lucii piscis preparator. semina

seminum cardui benedicti, Artemisia rubra an. ʒj. misce fiat pulvis.

Contra omnes laterum puncturas in pleuritide tam spuria, quam exquisita, etiam in epidemia illa, qua doloris vehementia multi jugulantur, ad dolores mitigandos, inflammationes resolvendas, sudoresque eliciendos singulare est remedium.

Pleuriticus alius Ludovici.

℞. Off. capitis lucci, ʒj. sanguinis hirci, sulfur. citr. an. ʒss. m. Dosis à ʒj. ad ʒss. vel ʒj. cum vel sine tantillo opii, bis vel ter datus omnem expectationem explebit, modo si pleuritis ferocior & maligna sit, mixtura simplex. Ceu efficax hic resolvens præmittatur, & in majori nisu expectorans, quoddam in forma liquida interponatur: in ventibus verò & cancrinis atque corallinis, vel parum vel non opiatum cura claudatur.

Species Diaprasii Nicolai, ex Pharm. August.

℞. Prasii ʒvss. pinear. repurgatar. Amygdalor. dulcium, pistacioc. carniū dactylor. caricar. pinguinū, passular. major. Tragacanthi an. ʒiiss. cinnamomi, caryophyllor. nucis mosch. macis, ligni aloës, galanga, spica indica, zingiber. Zedoaria, glycyrrhizæ, rhapontici, Anacardii, styracis calamite, galbani, Terebinthina, mastiches, myrrha rubr. rad. ireos, Aristoloch. rotunda, gentiana, cort. rad. capparis, piperis nigri, sem. Anisi faniculi, Anethi, apii, petroselinæ macedon. saxatragia an. ʒiij. hermodactylor. origani, pencedani, schenanth. cardamomi, piperis albi, carvi, ligustici, vincetoxici an. ʒiiss. gr. ʒj. balsamita, pulegii, dictamni cretici, costi, pyrethri, thimbræ, sem. basilici, pœonia, amomi, seseleos cretici, orobi vera, piperis longi an. ʒj. gr. 2 Xylbalsami, cassia lignea, coralli rubr. rasura eboris, carpobalsami, dauci cretici an. ʒss. offis de corde cervi, misc. completa sunt per Ambra moschi an. gr. xij.

Conferunt tabidis, tussientibus, & iis qui defluationibus destillationibusque frigidis è capite obnoxii sunt, item hebetudini oculorum, & palati noxis, oris putredinibus, ac in universum omnibus affectibus frigidis tussim afferentibus opitulantur, calculos atterunt, ac iis qui difficulter mingunt, commodè exhibentur, ventriculi quoque & hepatis dolorem, ventrisque inflationes & torsiones sedant, menses educunt, ac pallidum corporis colorem crebro usu vividum reddunt, insuper etiam paroxysmos quotidianarios & quartanarios reprimunt.

Rosata novella Nicolai ex eadem Pharmac.

℞. Sacchari rosati, Tabulati, rosar. glycyrrhizæ an. ʒj. ʒiiss. cinnamomi ʒij. gr. xxii. caryophyllor. spica indica, zingiberis, galanga, nucis mosch. Zedoaria, styracis calamite, cardamomi, sem. Apii an. gr. xxviii.

Ad ventriculi & cordis imbecillitatem efficax est, his præsertim, qui diuturno morbo conflantur, usu familiaris, vomitum & nauseas compescit, cardiacis quoque & pulmonariis subvenit, ventriculi vires restituit, ac longa ægitudine extenuatos plurimum reficit.

Species Diarhodon. Abbatis Nicol. ex Pharm. August.

℞. Sandali albi, rubri an. ʒiiss. tragacanthi, Gummi arabici, spodiū an. ʒiij. succi glycyrrhizæ, Asari, mastiches, spica indica, cardamomi, croci, ligni aloës, caryophyllorum, cinnamomi, rhabarbari electi, sem. berberum, quatuor frigidior. major. Anisi faniculi, basilici, papaveris albi, myrtili, portulacæ, lactucæ an. ʒj. margar. offis de corde cervi an. ʒss. rosar. sacchari cantii an. ʒj. ʒiij. misc. completa fieri possunt per galia moschata ʒj. camphoræ gr. vii. moschi gr. iv.

Hepaticis, ictericis, cardiacis, pharicis & caliacis, profunt, defectibus item animi è corde natis succurrunt, ventriculum humidum desiccant, à cerebro robur addunt. Dan. ur salubriter iis, qui è morbis diuturnis ac febribus emergunt.

Pulvis Rubeus Pannonicus, ex Pharm. August.

℞. Boli Armen. cum aqua rosarum & Acetosa præpar. ʒiij. terra lemnia vera præp. ʒij. corallior. rubr. præpar. ʒss. alborum præparat. ʒvi. lapidum pretiosor. scilicet smaragdi Rubini, sapphiri, hyacinthi ana præparat. ʒiv. margarit præpar. ʒv. cinnamomi electi ʒij. caryophyll. ʒj. seminis Acetosa ʒij. corticum citri, sandali albi an. ʒiij. rubri ʒij. spodiū præpar. ʒv. rasura eboris ʒiij. croci orientalis ʒj. cornu cervi philosophicè præparat. ʒiv. Folior. Auri purissimi numero quinquaginta. Fiat omnium pulvis.

Adversus pestilentium febrium noxas, & contagiosorum ac venenatorum morborum invasiones, maximè potens est. Datur puerulis & infantibus, ubi variolarum aut morbillorum suspicio adest, eos namque efficaciter expellit, ac cor à putridi vaporis aut humoris contaminatione tutum reddit. Medicamentum planè regum, unicuique ætali ac sexui adcommodum, præberetur cum syrupo limonum, & aqua cardui, Acetosa vel borraginis.

Rubeus Pannonicus alius, ex eadem Pharmac.

℞. Boli Armen. orient. præpar. ʒij. terra sigill. vera ʒvi. lapidum pretiosor. scilicet hyacinthi, sapphiri, Rubini, smaragdi ana præp. ʒj. margaritar. præp. ʒx. spodiū præpar. Rasura eboris an. ʒv. corallior. rubr. præpar. ʒviii. alborum præpar. ʒiij. rad. tormentillæ, dictamni an. ʒiij. cornu cervi philos. præp. ʒvi. sandali alb. ʒj. rad. Doronici ʒvi. sem. Acetosa ʒij. corticum citri ʒiij. camphoræ ʒij.

Pulveriscentur singula per se, & misceantur, addendo foliorum Auri numero 50. & fiat Pulvis.

Eadem quas prior vires obtinet.

Rubeus contra Pestem, ex Pharm. August.

℞. Myrrha electa, croci an. ʒj. offis de corde cervi ʒj. cornu cervi ʒij. dictamni cretici, tormentilla, pimpinella, gentiana an. ʒij. ʒij. Zedoaria, zingiberis an. ʒiij. sulphuris vivi, boli armen. vera an. ʒiv. Camphoræ Div. theriaca Andromachi, mithridatii optimi an. ʒvi. fiat omnium pulvis.

Hic Anno Christi 1572. quo pestis invaluit, apud nos frequentissimè fuit adhibitus, & D. Achilli Gafsero nostro p. m. familiaris.

Pulvis Sabaudicus ex Pharm. August.

℞. Cinnamomi electi ʒij. caryophyll ʒj. mastiches electæ, myrrha electæ, radicū tormentilla ana ʒj. Zedoaria, Anthora, contrayerva, storzonera, corallior. rub. præparat. margaritar. præparat. sapphiri præparat. rubini præp. smaragdi præp. hyacinthi præp. lapidis bezoar. orient. unicorni veri an. ʒvi. Boli Armen. præp. terra sigill. vera an. ʒj. corticum citri ʒss. Foliorum Auri n. x. Antimonii diaphoretici ad pondus omnium fiat omnium pulvis.

Vires. Ejus sunt Alexipharmacæ; unde in febribus malignis, expellendis variolis &c. magnopere laudatur.

Moschi & Ambra an. ʒss. alias addi solitum, omisimus, à medico, si expetat, usus tempore rectius supplendum.

Pulvis seu sal Sacerdotale duplex, ex Pharm. Schroder.

℞. Sal. commun. torref ʒij. piper ʒj. cinnamom. ʒss. Zedoar. zingiber. an. ʒss. sem. cumini, carvi an. ʒj. Fiat pulvis subtilissimus.

Vires.

Vires. Dolori capitis mēdetur; ventriculū calefacit, cruditatesque & flatus consumit, concoctionem juvat, colicum dolorem profligat. Dosis gr. viii. ad gr. xv. &c.

Idem aliter.

℞. Sal. commun. ℥j. cinnamom. cumin. an. ℥iij. Zinzib. amom. siler. mont. piper. satureia, hyssop. origan. puleg. an. ℥j. Fiat pulvis subtilissimus.

Vires. Easdem cum priori obtinet.

N. Dicitur sal sacerdotale, quia sacerdotibus olim (tempore Eliæ) ad dolorem capitis & oculorum caliginem in usu fuisse statuitur.

Species diatrion fantalon Nicol. Myreps. ex Pharmac. August.

℞. Trium sandalor. an. ℥ij. ℥ij. rhabarbari, spodii ex ebore, succi glycyrrhizæ, sem. portulacæ an. ℥ij. Amyli, gummi Arabici, tragacanthi, sem. quatuor frigid. major. an. ℥iij. violæ. ℥β. rosar. quantum reliqua omnia pendent, id est, ℥iij. ℥ij. misc. si camphoræ ℥j. jungatur, completa dicuntur.

Februm biliosarum ardoribus, & viscerum fervoribus hepaticis, cardiacis, ictericis, phthificis auxiliantur, & intemperiem omnem calidam emendant. Præcipuus earum usus est in februm declinationibus, materia jam evacuata, ad residuum calorem extinguendum, & viscerum tonum conservandum.

Pulvis Sarcoticus d. Charraz.

℞. Olibani, sarcocollæ, mastiches, myrrha, aloës, mumie, Aristolochia, longa, rotunda, an. ℥j. F. omnium pulvis ad usum servandus.

Hic pulvis mundificat vulnera, carnesque regenerat solus adpersus, aut unguentis liquoribusve idoneis admissus.

Pulvis Saxifragiæ compositus, ex Pharm. Londin.

℞. Pimpinella saxifraga ℥β. sem. saxifragiæ, genistæ, mili solis an. ℥j. lactucæ, hyoscyami, papaveris albi, quatuor frig. major. an. ℥ij. troch. Alkekengi ℥β. glycyrrhizæ ℥iij. sacchari crystallini, quando usus postulat addendi ℥ij. F. pulvis.

Pulvis Saxonicus, ex Pharm. August.

℞. Rad. valeriana ℥β. vincetoxici, urtica an. ℥j. polypodii querni, Althææ, Angelica sylvestris an. ℥ij. Angelica sativa recentis ℥iij. cort. rad. laureolæ sive mezerei ℥j.

Pulvis hic in Saxonia primū usurpari captus, pesti ac venenis quoque assumtis egregiè adversatur. Et deleteriorum vires frangit.

Quamvis has radices, eo tempore, quod xv. Augusti & xij. Septembris dies intercedit, effossas, & incisas, in olla vitreata cum aceto acerrimo coquendas, & postea, aceto abjecto, exsiccandas esse, quondam statutum fuerit; cum tamen maceratione & coctione illa aliquas earum utiles particulas disperdi, haud sit negandum, laureolæ quidem radices aceto imprægnari, & sic earum acrimoniam corrigi posse, arbitramur, reliquis simpliciter in pulverem tritas admiscendo, & Acetum usus tempore, si medico ita visum fuerit, una propinando. Licet aceto utpote liquore alexipharmaco, & has imbueri si cui placeat, liberum per nos esse queat; qui pulverem hunc jam dudum in obseletorum ordinem reposuimus.

Pulvis senæ præpar. Montagnanæ, ex Pharm. August.

℞. Folior. senæ ℥β. Zingiberis, macis an. ℥iij. Cinnamomi, tartari an. ℥β. Fiat pulvis.

Adustos humores, melancholicumque succum hoc pulvere purgamus, serosam aquarum colluviem

exaurimus, pituitam salsam & putrilaginem jam conceptam deturbamus, eoque nomine cutis scabietatem, scabiem, lepram, cæterasque ejus generisordes eluimus.

Quidam Anisum addunt ℥j. pondere, alii catarum augment. prudenti cuique suum sit hac de re judicium. Nos huic formulæ aduerti felix medicamentum experti sumus.

Pulvis Senæ compositus major. Pharm. Londin.

℞. Sem. Anisi, carvi, feniculi, cymini, spica nardi, cinnam. galangæ an. ℥β. glycyrrhizæ, mili solis an. ℥j. senæ ad pondus omnium fiat pulvis.

Pulvis Solutivus de tribus, ex Pharm. August.

℞. Folior. senæ ℥vi. Turbith ℥iij. rhabarbari ℥ij. glycyrrhizæ, sem. Anisi, feniculi an. ℥j. spica indica ℥β. Fiat pulvis.

Inscribitur hic pulvis de tribus, ob tria simplicia purgantia, quæ ejus compositionem ingrediuntur. Rhabarbarum nempe turbith & folia senæ. Confer autem hepatis & venarum meseraicarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus, crudorum quoque humorum frigidorum maximè, collectionem è ventriculo & mesenterio eiicit.

Solutivus Magistralis, ex eadem Pharmac.

℞. Folior. senæ Alexand. dacrydii, hermodactylorum, Turbith. cardamomi, galangæ, mastiches an. ℥β. sacchari ℥iij. Fiat pulvis.

Hydropicis ac veteri ictero sædatis opitulatur, pituitam namque & bilem purgat, descriptionem ejus vide in Valefco.

Pulvis Sperniolæ Pharm. Noriberg.

℞. Myrrha selecta, Thuris masculi an. ℥ij. camphoræ ℥iij. croci triti ℥β. cerantur omnia & misceantur.

Pulvis hic aqua ex spermate ranarum per saccum resoluta imbibatur vigesies, vel trigesies, ita tamen, ut semper prius spontè exiccetur: Tandem demum camphora ne exhalet, addatur & usui asservetur.

Species diaspoliticon Galeni ex Pharm. August.

℞. Cumini aceto macerati & tosti, piperis longi vel nigri, folior. ruta siccat. an. ℥j. nitri ℥β. vel æquale cum reliquis pondus, si movere ventrem velis.

Medicamentum hoc à Diopoli Egypti oppido denominationem sortitum, describitur à Galeno ὁ ὑγιεινὸς εἶ. Flatus potenter dissipat, & ventriculo infarctam pituitam efficaciter detergit.

Pulvis Stegnoticus Caspari Gutmanni, ex eadem Pharmac.

℞. Lapidis citris ℥j. hæmatite præpar. carneoli præparati, cornu cervi usi præp. terra sigill. veræ an. ℥β. corallior. rubr. resolutor. ℥j. omnia in tenuissimum pulverem redacta misceantur.

Ad omnes fluxus sanguineos narium & hepatis sistendos, imprimis menstruum mulierum purgationem superfluum, dysenteriam, diarrhæam, alvi & nasi profluvia alba, curanda, singularis efficaciz existit, & chirurgis etiam nostris in supprimendo vulnere sanguine plurimum commendatur.

Pulvis Sternutatorius ex Pharm. August.

℞. Majorana ℥β. betonica, pyrethri an. ℥β. hellebori utriusque an. ℥j. pulegi ℥j. Fiat pulvis.

Lentam pituitam ac phlegma crassum, naribus insufflatus, vel iisdem adstrictus provocat: cerebrum à rebus

tenacibus humoribus purgat, & ossis ethmoidis obstructions referat.

Sternutatorius alius ex Pharm. Noriberg.

℞. He b. pulegii, majorana, rorismarini, salviae an. ʒi. nicotiana, rad. Ellebori alb. selecti, sem. nigella an. ʒj. moschi gr. v. misce pro pulvere.

Sternutatorius Zuelferi.

℞. Rad. doronici veri, pyrethri, hellebori alb. an. ʒj. herb. majorana, thymi, rorismarini, Flor. lilior. convallium an. ʒi. sem. Anisi, coriandri, nigella, cardamomi, macis, an. ʒi. caryoph. ʒj. Ambra grysea, ʒss. moschi orient. gr. viiij. ol. ligni rhodii ʒj. Fiat ex omnibus pulvis subtilis.

Sternutatorius Mart. Rolandi, ex Ph. Schroderiana.

℞. Sem. nigella, hellebori alb. an. ʒj. majoran. rorismar. salvia an. ʒss. mosch. gr. ij. m. caput roborat, pituitam elicit.

℞. F. Anthos, lavendula, saliv. betonic. fol. majorana an. ʒj. macis, glycyrrhiza, hellebor. alb. præp. an. ʒj. Tabac. opt. ʒj.

Omnibus pulverisatis & probe mixtis, adde ʒss. still. Anis. caryoph. macis, majorana. gr. iv. m.

Alius Johann. Nicol. Baumann, ex eadem Pharm.

℞. F. Tabac. Indic. ʒi. ʒj. rad. ireos Flor. ʒi. ʒj. lap. pum. moschi gr. ij. fiat pulvis.

Moschus omittendus erit, si mulieri adhiberi debeat.

Pulvis Stomachicus Birckmanni, ex Pharm. August.

℞. Pulv. rad. Ari. preparatar. ʒj. Acori vulgaris, pimpinella, an. ʒj. sacch. rosati ad pondus omnium, conficiatur pulvis gustui gratus.

Hic pulvis ad varia stomachi vitia & dolores conducit, cardialgiae sive oris ventriculi à succis mordentibus afflicti, & cardiacæ, à virulentis & venenosis humoribus productæ medetur, & quia os ventriculi acutissimo sensu præditum, cum corde, cerebro, & primariis corporis partibus conspirat, earundem etiam partium per consensum læsionibus prodest.

Stomachicus Zuelferi.

℞. Rad. calami Aromatici, galanga, pimpinella, liquiritia, Zingiberis, piperis longi, caryoph. an. ʒi. rad. doronici veri ʒj. an. m. s. hatar. cardamom. min. an. ʒvi. macis ʒij. sem. anisi, carvi, feniculi an. ʒi. cori. Arantiorum, citri ana extum. ʒss. recent. siccis. ʒiij. ol. cinamomi still. ʒi. sacch. can. albi ad pondus omnium. m. F. pulvis.

Præstans ad varia stomachi & cerebri vitia emendanda, vomitum, nauseam, cardialgiam & concoctionem læsam; ventriculo item refrigerato cum emolumento exhibetur.

Pulvis ad Strumam Arnoldi de Villanova, ex Pharm. August.

℞. Spongia combusta, pila marina tosta, ossis sepia, piperis longi, nigri, Zingiberis, cinnamomi, salis gemma, pyrethri, gallarum, lapidis spongia an. ʒj. pulveriscentur & misceantur.

Ad strumas abolendas, reiterata sæpius ejus assumptione, feliciter exhibetur.

Ad Strumam alius, ex Pharm. Noriberg.

℞. Spongia combusta, pila marina tosta, ossis sepia, piperis longi, nigri Zingiberis cinnamomi, salis gemma, pyrethri, gallarum, lapidis spongia an. ʒj. pulveriscentur & misceantur.

Ad Strumam Donzelli.

℞. Spongia marina, spongia stipitibus rosa canina adnascens an. ʒij. ex his incineratis fiat pulvis, cujus ʒj. cineris chartæ bibule ʒij. cinnamomi ʒi. corall. rub. pulver. ʒi. m. F. pulvis.

Hic pulvis remedium est singulare pro bronchocele: ejus autem usus hic est. ʒj. pulver. ʒj. aut ii. infund. in vase vino albo pleno, macer. dies iij. dein tempore plenilunii, fumantur omni mane hujus liquoris ʒij. donec incipiat luna crescere, quo tempore eo abstinendum, plenilunio vero subsequente reasumatur liquor ut prius.

Pulvis Sudoriferus, D. Le Moré.

℞. Fol. card. bened. ʒij. rad. Angelic. imperat. valerian. an. ʒi. contrayerva ʒv. ʒss. ancr præp. conchar præp. an. ʒj. camphor. ʒj. croci ʒiij. opii rite præp. ʒi. m. F. pulvis.

Diaphoresin egregiè mover, alexipharmacus est, febris intercurrentibus & contagiosis medetur, dolores è quacunque causa ortos sedat. Dosis à ʒss. ad ʒj.

Pulvis ad suppositoria Pharm. August.

℞. Specierum hiera picra ʒi. colocythidos pulv. ʒvi. hellebori albi pulver. ʒj. salis communis ʒij. Farina frumenti ʒx. ʒss. viij. cum vitellis ovorum, & melle despumato quantum sufficit, fiant suppositoria.

Notandum, tametsi suppositoria hæc alvum sollicitent, ac sedes remorantes evocent, ea tamen mulieribus gravidis haudquaquam tuto existere, prout nec iis quibus hæmorrhoides molestæ esse solent, his enim vel levissima ex solo melle, vitello ovi, ac modico sale confecta sufficiunt: quibus acuendis nonnulli musceridam pauca quantitate indunt.

Ad suppositoria communia ex eadem Pharm.

℞. Aloës ʒij. cumini, ruta, salis gemma, an. ʒj. Fiat pulvis, qui subgatur cum sufficiente quantitate mellis, & redigatur in glandes.

Ad suppositoria alius acutior, ex eadem Pharm.

℞. Aloës ʒi. hellebori albi, granor. colocythidos, centaurii, cumini, ruta an. ʒj. Fiat pulvis, qui melle subactus effingatur in glandes seu suppositoria.

Ad suppositoria alius Zuelferi.

℞. Trochiscor. Alhandal ʒi. Aloës hepatica ʒiij. salis gemma ʒi. vel ʒvi. ol. cera stillat. ʒi. misce F. pulvis.

Pulvis Tartari crystallini solutivus, ex Pharm. August.

℞. Crystallor. tartari, Folior. sena selectissima an. ʒj. cholagogi simplicis ʒij. seminis Anisi electi, cinnamomi acuti, galanga minoris an. ʒj. caryophyllorum ʒi. Fiat pulvis.

Puritatam & bilem, succumque melancholicum, & adustos humores purgat.

Species diathamaron Nicolai, è Pharm. August.

℞. Anthophyllor. Zingiberis an. ʒv. gr. 36. cinnamomi, caryophyll. carniurn dactylor. an. ʒiij. gr. 36 galange, spica indica, Zedoaria, costi albi aromatici, pyrethri, coralli rubri, tragacanthi, rhapontici, spica celtica, Anacardi. ossium dactylor. carpobalsami, Anisi, baccarum juniperi, trium piperum an. ʒj. gr. 48. margar. tar. ʒiij. Blatia Bizantia, i. e. unguis odorata, ʒij. folior. Auri 125. Argenti 75. ossis de corde cævi legimi ʒi. rasura eboris gr. 27. misce si completa desiderentur, addenda Ambra gr. 27. moschi grana tria.

Tabidis,

Tabidis, tussientibus, stomachicis, difficulter spirantibus, & asthmaticis profunt, ac ad omnem corporis imbecillitatem levandam faciunt; renum præterea impotentia & debilitati succurrunt.

Pulvis Thuraloes ex Pharm. Londin.

℞. Thuris ℥j. Aloës ℥ss. Fiat pulvis.

Utendi tempore, tantum hujus cum ovi Albumine subigatur, quantum mellis reddat crassitudinem: hoc leporis mollissimis pilis excipitur; deinde cum vasi profluente, tum vulneri toti liberaliter imponatur, adhibita ligatura convenienti.

Diatrageacanthum frigidum Nicolai, ex Pharm.

August.

℞. Tragacanthi candidi ℥ij. gummi Arabici ℥j. ℥ij. Amyli ℥ss. glycyrrhizæ sem. quatuor frigidior. major. an. ℥ij. papaveris albi ℥ij. sacchari penidij ℥ij. misc. camphora si cui arrideat, is ℥ss. immisceat. nos eam expunctam volumus.

Uius ejus frequens est in omnibus pectoris & pulmonum coxis à calida & sicca causa ortum trahentibus, thoracis gravitatem allevat, & tussiculosis ab intemperie calida opem fert; pleuriticis, peripneumoniacis, tabidis & macie confectis, linguæ itidem & faucium asperitati succurrit, ac siti immodicæ, quam pulmonum calor innoxia, confert.

Diatrageacanthum calidum Nicolai, ex eadem Pharm.

℞. Tragacanthi ℥ij. hyssopi ℥ss. pinearum, Amygdalorum utrumque sem. lini an. ℥ij. fenugreci. cinnamomi an. ℥ij. glycyrrhizæ rasæ, succi glycyrrhizæ, Zingiberis an. ℥j.

Confert pectoris affectibus frigidis, ægrè tussientes asthmaticos & suspensivos relevat.

Tragea grossa, seu species incisæ, ex Pharm. August.

℞. Confect. sem. Anisi ℥ij. feniculi, carvi, coriandri, Zingib. albi an. ℥viii. cinnamomi electi ℥ij. calami Aromatici, ℥ij. nucis moschatae ℥ss. concidantur crasso modo & misceantur.

Speciebus his incisis adduntur quandoque tabulata species. Aromatici, diambrae, de extracto ligni aloës, saccharum perlatum cum oleo cinnamomi, in frustula confracta, pro varia prudentis medici intentione. Manduntur præsertim manè ad cerebrum & ventriculum roborandum, aut etiam post cibum ad ventriculi flatum dissipandos, & oris halitum commendandum.

Tragea grossa cum Tabulatis, ex eadem Pharm.

℞. Confect. sem. Anisi feniculi, coriandri, carvi an. ℥vi. Aquilegia, eruca an. ℥v. cubebar. ℥ij. tabul. Aromatici rosati ℥vi. contra apoplexiam ℥v. de extracto ligni Aloës ℥ss. ex ol. cinnamomi ℥vi. caryophyllorum ℥ij. anisi, feniculi an. ℥iiss. cort. citr. condit. siccorum ℥j. nucis moschatae Lusit. majoris condit. sicca specierum Imperatoris an. ℥ss. crassiusculè concissa misceantur.

Tragea grossa, seu species incisæ saccharo obductæ, ex eadem Pharm.

℞. Cinnamomi electi ℥vi. zingiberis ℥v. ℥j. calami Aromatici ℥ss. macis, nucis moschatae an. ℥ij. di. galanga, caryophyllor. an. ℥ij. cubebar. ℥iij. sem. Anisi ℥iv. carvi, feniculi, coriandri an. ℥ij. conficiantur omnia cum saccharo, ut est artis.

Tragea grossa Aromatica usitata, ex eadem Pharm.

℞. Cinnamomi acutissimi ℥i. nucis moschatae ℥j. macis ℥ss. galanga, caryophyll. an. ℥ss. zingiberis albi ℥iij. sem. coriandri ℥ss. Flor. rosar. rubr. ℥ij. sacchari albi ℥vi. misce Fiat tragea tenuis.

Pulvis Trithemii, ex Pharm. Schroder.

℞. Calam. Arom. gentian. cymin. siler. montan. Anisi, carvi, levisti petroselin. spic. nard. an. ℥ss. Zinzib. albi, Chamæpyt. Fol. senæ el. cryst. tart. an. ℥vi. macis, cubebar. an. ℥ij. caryophyll. ℥vii. misce Fiat pulvis subtilissimus.

Vires. Sunt qui hujus laudes summè commendant, ad memoriam confortandam. Videlicet, post purgationem convenientem. ℞. Hujus pulveris ℥ij. aq. magnanimitatis gutt. xii. & vini nonnulli, lumbumque mane & vesperi per totum mensem; altero mense, mane solum; tertio bis vel ter singulis septimanis, idque mane, quarto mense bis qualibet sept. & postea ad dies vitæ singulis mensibus semel, crescente luna, sed crapulam vitare monent, ebrietatemque.

Pulvis Trithemii ad memoriam confortandam maxime celebratur ad D. autoris nostri præscriptum adhibitus: sed qui illo utuntur, subducere se videri & baccho debent. Hofmannus.

Pulvis diaturbith cum rhabbaro Pharm. Noriberg.

℞. Turpethi optimi hermodactylor. an. ℥j. rhabbari ℥x. diagrydi ℥ss. santali albi, rubri, violar. Zingib. an. ℥iiss. mastiches, Anisi, cinnamomi, croci an. ℥ss. ms.

Idem Pulvis ex reformatione D. Lemery.

℞. Turbith gummosi ℥ij. rhei electi ℥x hermodactylor. ℥j. diagrydi, cristall. tart. & sem. violar. ana ℥ss. Fiat pulvis s. a. cujus dol. à gr. xviii. ad ℥j.

Purgatam cerebri, bilem & melancholiam purgat, menstruum fluxum provocat, ac præterea ventriculum, ut credunt, ipsumque etiam hepar corroborat.

Pulvis contra Tussim Pharm. Noriberg.

℞. Sacchari albissimi ℥iij. spec. Diatreos ℥j. val. peonia ℥ij. pulv. liquiritiæ ℥j. lactis sulphuris, croci orient. tal. an. ℥ij. crani humani sagyrice preparati, succi albi præp. an. ℥j. ms. F. pulvis sub.

Alius contra Tussim Zuelferi.

℞. Sem. papaveris albi ℥j. melonum excort. ℥ss. peonia excort. ℥j. pinear. mundatar. decort. an. ℥ss. Benzoes pulv. ℥ss. contundantur probe in mortario ad pulvis formam, cum s. q. aquæ rosar. hinc pulpa add. Pulv. Ireos Flor. ℥ss. peonia ℥ss. croci orient. an. Anstriaci ℥ij. Flor. sulphuris ℥iiss. sacchari penidij ℥vi.

Exsiccentur in leni calore, fiatque omnium denique pulvis subtiliss. adde olei stili. anisi ℥i. vel ℥ss.

Præstans in tussi & deflexionibus à capite ad pedes tenulioribus incrassandis & maturandis remedium, sæpius lambendo usitatum.

Pulvis ad vermes, seu lumbricos ex Pharm. August.

℞. Sem. sancti ℥iij. Foliorum senæ ℥j. coriandri par. cornu cervi an. ℥ss. Fiat pulvis.

Vires. Ex nomine patent, in enecandis & expellendis lumbricis longo usu comprobata.

Semen sanctum qualem plantam pro matre agnoscat, nondum certo constat, si tamen non ad abortivum saltem Absinthia referri posset: prout etiam Absinthii Seriphii, quod alias san tonicum dicitur, semen est plurimis creditur. Officinæ semen hoc passim vocat semen lumbricorum, quod ipsum vulgus Vurmlant adpellat, eò quod id vermes & lumbricos expellere aptum.

Alii duo Zuvelferi.

℞. Sem. sancti seu cyna. ℥i. corallina, mechoaca alba an. ℥ii. mercurii dulcis rite & dextre parati ℥. ℞. magisterii gialappa Amygdalis probe subacti ℥i. sem. A. si ℥i. sacchari albi ℥i. ℞. Fiat ex omnibus pulvis.

In vermibus & lumbricis expellendis tum puero- rum tum adultorum. efficax, mediante dosi. ℞. ad ℥i. in lacte vel mulso exhibendus.

℞. Sem. cyna ℥i. corallina ℥. myrrha rubra ℥i. mercurii dulcis legitime parati ℥. rasura cornu cervi, Turbith albi an. ℥ii. sacchari albi ℥i. macis ℥i. Fiat pulvis.

Cujus dosi ℥. ad ℥i. in vermibus expellendis.

Alius d. Charraz.

℞. Sem. contra vermes, citri mundati, geniste, portu- lace, cantium rhei electi, scordii, centaurii minor. rad. gentiane, rasura c. c. an. ℥i. Fiat omnium pulvis tenuissi- mus, ad usum servandus.

Cui, usus tempore, mercurii dulcis grana aliquot admisceri poterunt.

Datur a ℞. in vino, aq. scordii, portulacæ, flor. Aurantiorum pōmo cocto, syrupo quopiam, aut condito: admisceri etiam potest opiat. & potioni- bus, advertendo, cum in liquidis exhibetur, mer- curium non esse admiscendum. Potest etiam pro exi- gentia addi huic pulveri aliquid resinæ scammonii aut gialappæ.

Pulvis Violarum odoratus, ex Pharm. August.

℞. Ireos Florentina ℥vi. rosar. rubr. ℥iii. cyperi ℥. majorana, caryophyll. styracis an. ℥i. Benzoi, sandali citrini, an. ℥s. violarum dr. iii. moschi dr. j. Fiat pulvis.

Pulvis hic tametsi ad odoramenta potissimum ex- petatur, caput tamen extrinsecus adhibitus eximie roborat, necnon cordis palpitationi medetur.

Paratus etiam prostat sine moscho.

Pulvis pro Ulceribus Gutturis, ex Pharm. August.

℞. Sulphuris vivi ℥iii. myrrha rubra, Aluminis saccharini an. ℥i. mastiches, Thuris an. ℥i. pyrethri ℥vi. Fiat pulvis.

℞. Hujus pulveris ℥i. vini sublimati ℥i. misce.

Pulvere hoc, in noloocomio Gallico ad gutturis an- tiqua & fæda ulcera sananda, utebantur quondam D. D. Adolphi Occones, August. medici, ac subse- quentes illustrium ac generosorum D. D. comitum Fuggerorum Xenodochii præfecti, quibus in locis, ex pia & munifica prædicti stemmatis fundatione, plurimi lue ista laborantes usque ad planam sanatio- nem sustentantur.

Pulvis vulnerarius Zuvelferi.

℞. Mastichis electa, myrrha, olibani, sangu. draconis, oculor. cancr. præp. nucis mosch an. ℥i. Boli Armena n. m. parat. rad. tormentilla, an. ℥is. croci Austr. ℥s. Fiat omnium pulvis.

In vulneribus internis & externis, nervorum, præ- cipue, ubi meliceria (vulgo das Bliedmasser) de vulne- ribus stillati, opem præstat, a ℥. ad ℥i.

Species diaxilaloës Mesux, ex Pharm. August.

℞. Ligni Aloës electi, rosarum ana ℥i. caryophyll. spica indica, macis, nucis moschata, cubebar, carda- momi utriusque, cinnamomi, mastiches, cyperi rotundi, schenanthi, Zedoarie, Been utriusque, Folii, serici crudi tosti, margar. corallii rubri, charabe, foliorum citri, corticum citri, ocimi caryophyllati, balsamita, menthe sic- cæ, majorana, piperis longi Zingiberis an. ℥i. misce. comple- tassunt per galie moschata ℥. Ambra ℥i. moschi dr.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Ventriculi, cordis, & jecinoris malis frigidis, ani- mæ defectiōni, concoctiorique anxietatibus, oris fætores abigunt, lætitiā pariunt, & spiritus pleu- rum exhilarant.

Diazingiber Nicolao adscriptum, ex eadem Pharm.

℞. Zingiberis, galange, caryophyll. cinnam. nucis moschata, cardamomi utriusque, piperis longi, macis, sp. ca Indica, rhabarb. rosar. rubr. an. gr. xvi. sem. Anisi, fœniculi, glycyrrhizæ, croci an. ℥. pistacior. ℥i. pincar. mun- dat. ℥. ℞.

Ventriculum frigidum roborat, & confirmat, nec- non crassos in eo flatus dissolvit.

Pulveres varii, ex Caldasare Timæo.

Pulvis Solutivus.

℞. Resin. gialapp. ℥i. sem. melon. excort. ℥iii. misceantur exactissime in mortario lapideo, add. cre- mor. Fri ℥. confect. Alkerm. ℥i. misce. denno Fiat pulvis.

Pulvis Cholagogus.

℞. Resin. scammon. ℥i. sem. citrull. excort. ℥iii. misce. in mortario marmoreo, add. rhabarb. elect. Acidi Fri an. ℥. m. iterum Fiat pulvis.

Pulvis Phlegmagogus.

℞. Magister. Agarici, ℥i. resin. turpethi ℥. Fri & lat. ℥i. ol. cinam. gutt. vii. m. F. pulvis.

Pulvis Hydragogus.

℞. Magister. gummi de Goa ℥i. facul. bryon. ℥i. me- choacan. albi ℥vi. ol. macer. gutt. vii. m. F. pulvis.

Pulvis Melanagogus.

℞. Resin. Gialapp ℥i. extract. ellebor. n. ℥i. fol. senæ s. f. ℥i. cremoris tartari ℥. ol. citri gutt. vii. m. F. pulvis.

Pulvis Panchymagogus.

℞. Fol. sen. s. f. ℥i. mechoacan. albi ℥vi. hermodactyl. elect. Turpethi gummos. an. ℥. rad. gialapp. ℥i. rhabarb. ℥. Agarici Trochiscat. ℥v. resin. scammon. ℥. tartari & lat. Du. ol. cinnamom. citri an. gutt. ix. caryophyll. gutt. v. m. F. pulvis.

Pulvis Cephalicus.

℞. Succin. alb. præp. ℥i. magister. lun. ℥iii. corallior. rubr. ℥i. facul. pœonia ℥. Ambra grysea ℥iii. sacchar. rosar. Tabul. ℥vi. m. F. pulvis.

Pulvis Epilepticus magistralis.

℞. Magister. lun. ℥iii. perlar. oriental. corallior. rubr. oculor. cancr. succin. alb. matris perlar. an. ℥i. cran. human. ℥iii. corn. Alcis phil. calcin. ℥i. cerv. absque Δ calc. ℥i. facul. pœonia ℥v. m. Fiat pulvis, Affund. spirit. cerasor. nigr q. sat fiat quasi pasta.

Teratur in marmore, postea iterum exsicce- tur, laborem hunc ter repetendo ut fiat pulvis subtilissi- mus. Efficacior redditur, si addatur aliquid cas- storei.

Pulvis contra Somnia horribilia.

℞. Magister. smaragd. hyacinthi, perlar. oriental. coral. rubr. an. ℥i. laudan. opiat. ℥i. misce. in mortario lapide exactissime F. pulvis.

Pulvis Cordialis pretiosus.

℞. Magister. perlar. corallior. rubr. an. ℥ii. hya- cinthi, ℥i. Apices corn. cerv. absque Δ calc. ℥i. eff.

off. de corde cervi \mathfrak{D} iiii. unicornu veri, lapid. Bezoar. an. \mathfrak{Z} i. veller. aurei Weidneri \mathfrak{D} iiii. mixta terantur in marmore affusis spiritibus rubi idai & rosarum an. \mathfrak{g} . s. ut fiat quasi pasta, qua iterum exsicceatur & in pulverem redigatur.

Pulvis Aureus ex Taleolis.

\mathfrak{Z} . Taleol. lepor. \mathfrak{Z} i. capreol. \mathfrak{Z} vi. c. cerv. philosoph. calc. \mathfrak{Z} ß. oculor. cancer. præp. \mathfrak{Z} iii. corall. rub. præp. margarit. præp. an. \mathfrak{Z} i. spec. de hyacintho, de Gemm. frigid. an. \mathfrak{Z} ii. m. F. pulvis subtilissimus.

Pulvis Bezoardicus.

\mathfrak{Z} . Scordii veri \mathfrak{Z} vi. rad. dictamni, Scorzon. contra-ieru. an. \mathfrak{Z} ß. Zedoar. \mathfrak{Z} ii. sem. citri, card. bened. acetosa an. \mathfrak{Z} iß. corn. cerv. phil. calc. \mathfrak{Z} ß. off. de corde cervi \mathfrak{Z} iß. magister. oculor. cancer. \mathfrak{Z} ii. succin. alb. \mathfrak{Z} iß.

M. F. pulvis subtilissimus, cui pro conditione ægri addi potest lapis Bezoar.

Pulvis Pleuriticus.

\mathfrak{Z} . Rasur. dent. apri \mathfrak{Z} ß. mandib. lucii præpar. oculor. cancer. præpar. Taleol. lepor. pr. lapid. percar. præp. corn. cerv. absque Δ calc. an. \mathfrak{Z} ii. m. F. pulvis.

Pulvis Stomachalis.

\mathfrak{Z} . Ol. cinnamom. gutt. xv. caryophyll. gutt. ix. citri rosar. an. gutt. v. Ambra gr. iii. mosch. gr. i. Sacch. cand. alb. \mathfrak{Z} iiij. m. F. pulvis.

Alius.

\mathfrak{Z} . Acid. \mathfrak{F} ri \mathfrak{Z} i. tartari \mathfrak{Q} -lat \mathfrak{Z} i. facul. rad. Aron. \mathfrak{Z} ii. sal. Absinth. crystall. \mathfrak{D} ii. m. F. pulvis.

Pulvis Hepaticus.

\mathfrak{Z} . Crem. tartari \mathfrak{Z} i. croci martis aperitiv. \mathfrak{Z} ß. magister. coral. rubr. \mathfrak{Z} ii. Santal. rub. \mathfrak{Z} iß. sal. cichor. crystall. \mathfrak{Z} i. m. F. pulvis.

Pulvis Spleneticus.

\mathfrak{Z} . Limatur. chalybis in subtilissimum pollinem redacta \mathfrak{Z} iß. spec. trochisc. de capparib. facul. rad. Aron. \mathfrak{Z} ii. cassia lignea acutiss. \mathfrak{Z} iiß. ol. cinam. gutt. vii. m. F. pulvis.

Pulvis Carminativus.

\mathfrak{Z} . Ol. stillat. carvi, anisi, feniculi, an. gutt. xi. ol. stillat. cort. aurant. citri an. gutt. ix. cinamom. gutt. vi. caryophyll. nucis moschat. an. gutt. v. sacch. cand. alb. \mathfrak{Z} vi. m. F. pulvis.

Pulvis Nephriticus.

\mathfrak{Z} . Magister. ocul. cancer. \mathfrak{Z} i. succin. alb. præpar. sang. hirci præpar. an. \mathfrak{Z} ß. sal. succin. volatil. \mathfrak{D} iiii. m. F. pulvis.

Pulvis Hystericus.

\mathfrak{Z} . Facul. bryonia \mathfrak{Z} i. magister. succin. matris perlar. an. \mathfrak{Z} ii. castorei \mathfrak{D} iiii. m. F. pulvis.

Pulvis Menstrua provocans.

\mathfrak{Z} . Apic. flav. lil. albor. Flor. cheiri, calendula, croci orient. an. \mathfrak{Z} i. spec. Trochisc. de myrrh. \mathfrak{Z} ii. succin. alb. præp. \mathfrak{D} iiii. castorei, sabina, facula bryonia an. \mathfrak{Z} i. ol. stillat. succin. gutt. xv. m. F. pulvis.

Pulvis Menstrua sistens.

\mathfrak{Z} . Rad. urtica mortua, cort. rad. mori, Acin. granator. an. \mathfrak{Z} ii. lapid. hematit. \mathfrak{Z} iiß. landan. opiat. \mathfrak{D} j. m. F. pulvis.

Pulvis contra Fluorem album.

\mathfrak{Z} . Magister. osteocoll. \mathfrak{Z} ß. carneol. \mathfrak{Z} ii. coral. albor.

\mathfrak{Z} ii. smaragd. \mathfrak{Z} i. m. F. pulvis.

Pulvis contra Dysenteriam.

\mathfrak{Z} . C. cervi usti, tormentill. an. \mathfrak{Z} ß. Terr. sigill. Sirig. \mathfrak{Z} ii. Boli Armen. lapid. Hematit. præp. corall. rubr. præp. cort. granatorum, Balaustr. rosar. rubr. an. \mathfrak{Z} i. mastich. tragacanth. albissim. m. F. pulvis.

Pulvis contra Lumbricos.

\mathfrak{Z} . Sem. sancti \mathfrak{Z} i. hyperici \mathfrak{Z} ii. citri \mathfrak{Z} iß. rad. Filic. Flor. Tanacet. an. \mathfrak{Z} ii. \mathfrak{Q} -li calcinat. \mathfrak{Z} ii. m. F. pulvis.

Pulvis Antifebricitus perlatus.

\mathfrak{Z} . \mathfrak{Z} ii Diaphoret. \mathfrak{Z} ß. margarit. præpar. \mathfrak{D} iiii. oculor. cancer. præpar. corn. cerv. ust. præpar. an. \mathfrak{Z} i. m. F. pulvis.

Pulvis contra Variolas & Morbillos.

\mathfrak{Z} . Sem. aquilegia, nasturtii, ana \mathfrak{Z} ii. Can. bened. napi an. \mathfrak{Z} i. rad. Scorzon. Dictamni an. \mathfrak{Z} i. Terr. sigillat. c. cerv. absque Δ calc. \mathfrak{Z} ii. m. F. pulvis.

Pulveres varii ex Pharmac. Bateana.

Pulvis Ethiopicus.

\mathfrak{Z} . Bufones viventes n. 30. vel 40. comburantur in olla nova ad cineres nigros. f. \mathfrak{Q} subt. D. \mathfrak{Z} ß. ultra in Variolis, &c. Vel in moribundis auxilio utilis fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in Hydrope curando.

Pulvis Albus.

\mathfrak{Z} . Bezoar. Animal. succin. alb. corall. r. margarit. ana \mathfrak{Z} i. ocul. & chel. 69. ana \mathfrak{Z} ii. m. f. \mathfrak{Q} subt. Pulv. emulatur Pulv. \mathfrak{e} Chelis comp.

Pulv. Anticardialgicus.

\mathfrak{Z} . Cretæ albis. \mathfrak{Z} vi. ocul. & chel. 69. ana \mathfrak{Z} ii. facch. albis. \mathfrak{Z} ß. \mathfrak{Q} chym. nuc. m. gr. vi. m. f. addi pt. AB. \mathfrak{Z} vi. Dos. \mathfrak{Z} i. in haustu frigido largo.

Pulv. Anticolicus.

\mathfrak{Z} . Cretæ albis. subt. \mathfrak{Q} at. \mathfrak{I} bi. humecta cum succo Fol. rutæ & chamæmel, ut f. instar pulmenti exicca lento calore & f. \mathfrak{Q} . Repet. hoc opus cum succis rec. ad quartam vicem. ultimò f. \mathfrak{Q} subt. \mathfrak{D} ii. ad \mathfrak{Z} i. quarta quaque hora.

Pulv. Antipyreticus.

\mathfrak{Z} . Lap. Manat. \mathfrak{Z} ii. Draconthæmat. \mathfrak{Z} i. m. f. \mathfrak{Q} subt. Terrianam vernalem curare rarissimè fallit. Dos. \mathfrak{Z} i. ante paroxysmum, superbibendo Ros. rub. \mathfrak{Z} ii. aurant. \mathfrak{Z} vi. cum sacch. alb. \mathfrak{Z} ß. ad \mathfrak{Z} . vices.

Pulv. Arthriticus Turneri.

\mathfrak{Z} . Turpet. hermod. senæ, scammon. sem. ebül. an. p. æ. m. f. \mathfrak{Q} . Dos. \mathfrak{D} i. ad \mathfrak{Z} i. &c.

Pulv. Asthmaticus.

\mathfrak{Z} . Chartam. Rad. ari. Fol. card. ben. senæ, ana anis. \mathfrak{Z} ß. piper. l. \mathfrak{Z} i. Diagryd. \mathfrak{D} ß. m. f. \mathfrak{Q} . Dos. \mathfrak{Z} i. die per dies vi. contin.

Pulv. Basilicus.

\mathfrak{Z} . Diagryd. ceruf. \mathfrak{Z} ii. crem. tartari, \mathfrak{Q} d. anam. \mathfrak{Q} . Easdem vires obtinet quas Pulv. Cornachini Dos. \mathfrak{Z} i. ad \mathfrak{Z} i.

Pulv. ad Calculum.

\mathfrak{Z} . Fl. Cardui stellati \mathfrak{Z} i. Rad. & sem. petrosel. an. \mathfrak{Z} ii. separatim siccantur ac \mathfrak{Q} entur: dein m. D. \mathfrak{D} ii. m. alb. aut Jussulo. Maybern.

Pulv. Cantianus.

(sus.) cerebrum insuper, & memoriæ recreat, confortat-
que.

Pulv. Cucuphalis.

℥. Macropiper, majoran. succin. ana ℥iij. nuc. mac. ana ℥i. m. f. ℥ pro cucupha, Qui gossypio susceptus
insuatur pileolo serico, interpassando. Insignis ad dolores
capitis frigidos diuturnos, Catarrhos absumendos, &c.

Pulv. Epidemic. aureus.

℥. Sacch. cand. alb. ℥iv. Balsam. Anis ℥ss. croc. gr. vi. m. f. ℥ Dos. ℥i manè, & hora somni in haustu posset
vinosi. Glisson.

Pulv. Epilepticus.

℥. Rad. Fraxinel. visc. querc. contrayerv. serpen-
tat. Virgin. pæon. mar. Magist. c. c. Magist. ungul. Alcis,
ana ℥ii. Rad. Valerian. sylv. ℥i. corall. rub. cran. human.
ana ℥iij. Lap. Hy. crith. ℥i. B. z. occid. ℥i. orient. ℥i. m.
f. ℥ subtr. t. a. adde moich. gr. v. Fol. Auri n. 30. m.

Pulv. Febrifugus Certus.

℥. Rad. Serpent. Vug. ℥ij. contrayerv. gentian.
zed. iem. citri, card. b. bez. occid. ana ℥i. Specific. vege-
tabil. ℥iv. m. f. ℥ Dos. ℥i. quarta quaque hora spatii in-
intermediis paroxyfmi cum Vino, &c.

Pulv. Griseus.

℥. Ocul. cancer. sal. ana ℥ii. cretæ alb. ℥i. nuc.
m. ℥i. f. ℥ Insignis in Diarrhœa. Palpitatione cordis,
Aciditate sanguinis, calculo, &c. Dos. ℥i. ad ℥i.

Pulv. Hemoptoicus.

℥. AB. ℥ss. amyl. ℥iii. Rhodolacch. ℥ss. Anis.
gt. ii. m. f. ℥ D. ℥i. ser in die vel sepius. In Hemopyssi
nil aequale.

Pulv. Hermodactyl. comp.

℥. Off. human. calcinat. hermodact. scammon.
turpeth. lenæ, sacch. alb. ana p. æ. m. f. ℥ Lentam pi-
tuitam, ac alios humores viscidos, etiam ab articulis,
efficaciter trahit. Podagra, Chiragra, ac omnibus jun-
cturarum doloribus ab iisdem humoribus natis conda-
cit Dos ℥i.

Pulv. Hystericus.

℥. Pellic. interior. ventrici capon. ℥iv. flaved. cort.
aurant. ℥i. m. f. ℥ D. ℥i. in paroxysmo, & 4ta quaque
hora opt. Remed.

Pulv. Ictericus.

℥. Chenocopri verno tempore collecti. in ☉
seccat. & ℥ at. ℥ii. croc. opt. ℥i. sacch. cand. alb. ℥ii. m.
f. ℥ D. ℥i. bis indies in V. Rheem. per dies vi. Aliter.
℥. Rad. curcum. q. alb. & præp. ana ℥ss. lumbric. terr.
elect. ana ℥ii. m. f. ℥ Dos. ℥i. in haustulo vini albi.

Pulv. Lateralis.

℥. Gland. quercin. decort. ℥vi. nuc. m. ℥i. sacch.
alb. ℥ii. m. f. ℥ Vocatur & Pulv. Iliacus, & Colicus.
Dos. ℥i. pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica,
Lateris dolore, Flatu, Podagra, &c.

Pulv. Liliaceus.

℥. Rad. lilior. alb. seccat. ℥iij. cerus. ℥ij. nuc.
m. tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, ana ℥ii. Rhodo-
sacch. ℥i. f. ℥ a. D. ad ℥i. bis in die cum Syr. de
Nymph. ad ☉ ac redinem in Luc. Ven. &c.

Pulv. Martialis comp.

℥ & præp. ℥vi. xylocas. nuc. m. a ℥ss. caryoph. mac. a ℥iij.
lii 2 sacch.

℥. Apic. nigr. chelar. 69. Junio captor, in pollinem
redact. Rad. contrayerv. ana ℥ii. margarit. corall. rub.
alb. ocul. 69. (cum succo limon. supra marmor
simul lavigator, & seccator.) ana ℥i. succin. alb. &
crystall. cum Ros. subtritorum & seccat. ana ℥i. c. c.
ad summam albed. calcinat. & lavigati cum succo
citr. Spru ☉ li probè acutato, & seccati, ℥i Bezoar.
occid. Terra Lemn. ana ℥ss. Ceruss. & fixi ℥ii. Ambr.
grif. ℥iij. mosch. 86. misceantur omnia exactil. &
cum Gelatinæ è spolis viperar. & c. c. in aqua cardui
fadæ, & croco leviter tinctæ q. s. f. Globuli diversæ
magnitudinis, cantè seccandi. Si prædictis addas
coccinell. è Mexico ℥ss. dicitur Pulv. Cantian. ruber:
si vero cinerum Physalor. ℥iij. vocatur Niger. Usus est
egregiè in omnibus morbis contagiosis, Peste, Variolis, &c.
Dos. ℥ss. ad ℥ss.

Pulv. Cardiac. Corallatus.

℥. Coral. rub. præp. sacch. opt. ana ℥iii. ☉ cinnam.
gt. vi. m.

Pulv. Cardiac. Eboratus.

℥. Magist. ebor. cinnam. ana ℥ii. sacch. opt. ℥ii.
m. f. ℥ f. a.

Pulv. Cardiac. Perlatus.

℥. ℥ Rad. chinæ ℥iii. margarit. præp. ℥ii. Aleuri pu-
til. ℥viij. sacch. opt. ℥vi. coq. in clibano vate terreos; dein
de novo f. ℥ Insuperendus omnibus cibis, iusculis, pana-
tulis, &c. Magnum restaurativum habetur in Tabæ.

Pulv. Cardiacus rubens.

℥. Cretæ albi, ℥viiij. Ocul. 69. ℥ij. AB. ℥i. nuc. m.
℥ss. m. f. ℥ Dos. ℥i. pro vice in Cardialgia, &c.

Pulvis ad Casum.

℥. Terra sigil. sang. dracon. Mutiæ, ana ℥i. Sperm.
ceti ℥ss. Rhubarb. ℥iii. m. f. ℥ D. ℥i. pro vice post Phleb.

Pulv. Cibarius.

℥. Summit. euphrag. ℥iij. sem. fœnic. cinnam.
mac. ana ℥i. f. ℥ adde ☉ alb. ℥viii. m. sumatur cum
omni cibo. Ad usum aperiendum ac præservandum ap-
primè utilis. Oculorum suffusiones, caliginem, memoriæ
debilitatam, &c. juvat.

Pulv. Cinnabaris comp.

℥. ☉ nativ. ℥ij. succin. alb. ℥i. Rad. pæon. mar.
corall. r. ana ℥x. m. f. ℥ f. a. D. ℥ss. quotidie manè. Ad
Epilepsiam. Dos. ℥i ad ℥ss. &c.

Pulv. Cornachini.

℥. Diagryd. ☉ rac. ℥x. ☉ di. phor. ℥vi. crem. 87i
℥iij. m. f. ℥ Ad omnes ferè morbos (qui purgatione
opus habent) curandos commendatur. Dos. ℥ss. ℥ii.
&c.

Pulv. Coronatus.

℥. Epythym. ℥ss. agar. Lap. Lazul. præp. ana ℥ii.
scammon. ℥i. caryoph. n. 20. m. f. ℥ D. ad Div.
Mirè laudatur in Melancholia ad dementiam usque cu-
randa.

Pulv. Crinalis.

℥. Rad. Cyper. long. calam. arom. ros. rub. ana
℥iij. benz. ℥i. xyloal. ℥vi. coral. r. succin. ana ℥ss.
sarin. fabar. 34. Rad. irid. Fl. ℥viiij. m. f. ℥ subtr. adde
mosch. zibeth. ana gr. v. Usus præcipuè ad pilos rena-
scendo, & radices eorum confirmandas (capiti insper-
Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

facch. alb. ℥ii. m. f. ℥ Ad Cachexias tam Virginum, Mulierum, quam virorum juvenum, ac senum, Remedium præstantissimum. Dos ℥j ad ℥ii.

Pulvis Odoratus.

℥. Rad. irid. Fl. ℥xiv. Lign. Rhodii ℥ii. Fol. majoran. ℥iii. caryoph. arom. ℥i. cort. limon. ℥. Rad. cyperi ℥i. calam. arom. ℥vi. Fl. rot. Dam. ℥4. ros. rub. ℥ii. benz. sty. ac. cal. ā. ℥i. labdan. ℥s. m. f. Pulv. crassus, Vestimentis inspergendus, ut à tinea præserventur. Si prædicta omnia cum cerv. fortiss. in organis Rosac. distillaveris, (suspendendo in Recipiens mosch. gr. vi. in sindone ligata) hebebis Aquam Odoratissimam, Funeralibus applinè inservientem.

Pulv. Ophthalmicus.

℥. Summit. Euphrag. ℥iii. sem. fœnic. com. ℥ii. sem. rutæ ℥s. mac. ℥ii. facch. opt. ℥vi. f. ℥. a. D. coch. inter in die. v. Vires Pulveris Cibarii.

Pul. Oxytocus.

℥. Croc. cal. lign. myrrh. leucelectri ā ℥ii. chrysol. coll. ℥i. m. f. ℥ subit. D. ad Div. cum Aq. Artemis. vel Sabin. Præstantissimus est ℥ ad partum accelerandum, menses provocandos, &c.

Pulv. Pannonicus rubens.

℥. AB. cum Ros. & acer. præp. ℥iii. Terra Lemn. ℥ii. Lapid. Smaragd. Rubin. Sapphir. Hyacinth. off. de corde cerv. corall. ā ℥β. corall. alb. ℥vi. spodi margarit. ā ℥v. cinnam. fant. rub. sem. acetos. ā ℥ii. caryoph. croci, ā ℥. cort. citri, fantal. alb. ā ℥iβ. ebor. ℥iii. m. f. ℥ subit. f. a. cui adde Fol. ☉ n. 50. m. Febribus pestilentialibus, contagiosis, ac venenatis optime conducit. Dos ℥i. ad ℥i.

Pulv. Pectoralis.

℥. Partium albar. benz. ℥iβ. viv. ℥iii. sem. anis. ℥i. Rodofacch. ℥ii. m. f. ℥ D. ad ℥iβ. bis in die cum ovo tremulo.

Pulv. Pepticus.

℥. Flav. ed. cort. extern. aurant. candefact. & minutific. inc. ℥iv. Confectionum sem. coriand. ℥iv. anis. carvi, fœnic. ā ℥ii. Aromat. Rosar. ℥β. Sabl. ℥i. menth. ℥ ar. ℥ii. facch. cand. ad pond. omnium. f. ℥ gtoffus. Dos ℥i. post singulos pastus.

Pulv. Pleuriticus.

℥. Fl. ☐ ℥ii. Dent. Apri, mandib. Lucii pisc. ā ℥i. Flor. papav. rhœad. ℥β. m. f. ℥. Dos ℥i. Stupendum habetur Antipleuriticum cum Rhodofaccharo.

Pulv. Purpureus.

℥. C. c. c. succin. alb. corall. r. perl. præp. ā ℥i. ocul. & chel. 69. ana ℥i. croc. ℥β. coccinel. ℥ii. m. f. ℥ adde Gelatin. ex c. c. & r. ebor. in aq. Anis. factæ q. s. Globuli f. a. D. ℥i. ad ℥i. in Variolis, morbillis, &c.

Pulv. ad Rachitidem.

℥. ℥ Rad. Osmund. Regal. ℥v. facch. ℥ii. m. Insperge huius aliquantum pulvi, cibisque omnibus liquidis, ut ad minimum ℥ii. vel iii. in dies absumentur.

Pulv. sine Pari.

℥. Auripig. ☐ ā ℥ii. O ust. ℥i. colcothar. ℥β. m. f. ℥ Insperge huius parum super loca ulcerata, applica de super Ung. de Minio super linteam, & ibi circumcirca maneat donec sponte eschara decidat, vel separari potest. Bibatur interim Decoct. guajac cum glyc. & uviv. rassis. pro potu communi.

Pulv. Solaris.

℥. Cumin. ℥iii. caryoph. ℥i. ☐ decrepit. ℥4. m. f. ℥.

Pro soccis interbastandis Podagricorum semper ad planitas gestandis.

Pulv. Sternutatorius.

℥. Majoran. roris. m. beton. Fl. lilii conval. ana ℥iii. nuc. m. ℥i. * volat. ℥i. m. f. ℥ subit. Valet in omnibus capitis doloribus; in Lethargo, Podagra, &c.

Pulv. Stomachicus.

℥. Pellic. interior. ventricul. capon. ℥4. nuc. m. mac. sem. coriand. anis. fœnic. ana ℥iii. menth. ℥i. glyca. ℥i. Rhodofacch. ℥ii. m. f. ℥. ad Tormina Ventricul. &c. Dos ā ℥i. ad ℥i.

Pulv. ad Strumas.

℥. Lap. spong. ℥iii. & ℥ii. tri. ☐ lat. ℥i. m. f. ℥. Dos ℥ii. bis in die per dies xii.

Pulv. Sympatheticus.

℥. Fit calcinando ☐ Roman. radiis Oaribus per Vitrum cauterizans, & ℥ando. v. Vires Ung. Sympather.

Pulv. Vermifugus.

℥. C. C. rhab. corall. sem. fanton. ana p. a. m. f. ℥. Dos ℥i. ad ℥β. per dies 3 continuos circa novilunium, & plenilunium.

Pulv. Uvularis.

℥. Balauft. Rad. bistort. tormentil. ana ℥β. O ℥ii. m. f. ℥. Quo uvula cum palato tangatur digito, vel limbo excepto, sape in die.

Pulveres varii ex Hofmanni Thesauro Pharmac.

Pulvis ant-Epilepticus D. G. M.

℥. Cinnabar. ℥nii optim. rectific. Nativ. ungar. vel Armen. ana ℥β. smaragd. Or. ppt. CC. f. igne Cornu Alcis f. igne Visci corylin. ana ℥i. M. dos ā ℥i. ad ℥i.

Alius Epilepticus D. F. H.

℥. Pulv. Marchion. ℥ii. Off. de corde cervi ℥iβ. unicornu veri ℥i. cinnabar. ℥nii rectif. Nativ. ana ℥i. M. f. Pulvis. Dos ā ℥i. ad ℥i.

Alius Epilepticus I. R.

℥. Cinnabar. nativ. ℥j. unicornu veri ℥j. CC. ppt. & ppt. ℥ii. visci quern. in ℔ decerpti ℥ii. Terra sigillat. ver. ℥iii. Magister. perlar. Corall. ana ℥β. Cinamom. ℥j. M. dos ā ℥β. ad ℥β.

Alius Epilepticus P. H. D.

℥. Cranii humani f. igne calcin. Cornu alcis f. igne Crystall. ppt. smaragd. Or. ppt. ana gr. vi. ℥nii diapbor. ℥j. Magister. CC. succini. Corall. r. perlar. Or. ana ℥β. Sal. succin. volatil. cranii human. volatil. ana gr. ii. fecul. radic. pœon. ℥β. M. Dos ā ℥β. ad ℥β.

Pulvis Antiptifiscus D. G. R.

℥. rad. ireos. Fl. Scorzoner. ana ℥j. Sem. q. fr. major. excortic. papav. alb. ana ℥iβ. Portulac. Malv. alb. Chri cydon. ana ℥i. Amyli gummi A. Tragacanth ana ℥ii. Terr. sigillat. ℥ii. Bol. Armen. Succ. hypocyf. ana ℥j. Pulmon. vulp. ppt. ℥β. Pulverisat. adde Sacchar. alb. ℥ii. candi ℥j. ol. d. anisi ℥j. Spec. diarrhod. Abb. ℥j. M.

Alius Antiptifiscus D. D. E.

℥. Visci pyrorum. fol. Salvia. ana ℥j. pulmonar. v. ronic. fl. farfar. ana ℥β. Pulmon. Lupi ppt. enula. ana dr. ii. Sacchar.

Or.ppt.Corall.r. ppt. ana ʒj. Off. de Cord. Cervi ʒss.
Smaragd.Or.ppt.Sapphir.ppt.Lapid.Bezoär. Or. ana
ʒj.M.f.Pulvis. Dos. ʒj.vel ʒʒ.

24. CC.f. Δ ppt. 3iβ. Ocul. 5. ppt. Terr. sigill. Suc-
 cin. alb. ppt. Margarit. Off. de Cordē cervi. smaragd.
 Or. ppt. hyacinth. ppt. sapphir. ppt. ana ʒβ. lapid. be-
 zoar. Or. ʒj. Corall. r. ppt. ana ʒj. M. f. Pulvis.

℞. pulver.prædicti ℥j. Unicorn. fossil. rasur.dent.
Iii equi

equi marin. ana ʒij. bezoardic. Martial. ʒiij. ʒ nī cal-
cinat. cum rasur. CC. ʒiij. cruoris leporis in Martio per
canes venaticos interempri ʒij. Cord. & Epat. fer-
pentum. num. iij. rad. rubr. fanicul. alpin. ʒiʒ. M. f.
Pulvis cujus Dos. est à ʒʒ. ad ʒj. vel ʒʒ. ad ʒj.

Alius Dysentericus.

ʒ. Summitat. tenell. quercus ʒiij. Terræ sigillat.
ʒr. boli Armen. radic. bistort. ana ʒj. Nuc. Moschat.
rasur. dent. equi marin. Corall. r. ppt. Lapid. hæmatit.
ana ʒʒ. M. f. Pulvis, Dos. à ʒj. ad ʒʒs. vel ʒj.

Pulvis Carminativus seu Anti-Colicus.

ʒ. Castorei el. ʒij. Semin. cymin. Cortic. aurant.
ana. ʒʒ. M. f. Pulvis, Dos. ʒj. in vino.

Alius Carminativus D. S.

ʒ. Cortic. aurant. ʒiʒ. dent. infer. aurata. ocul. lucii.
piscis. ʒ succini alb. ppt. talor. leporis zedoar. ana ʒii.
M. f. Pulvis, dos. à ʒʒ. ad ʒj.

Pulvis Cachecticus D. D. S.

ʒ. Limatur. ʒtis q. v. irrota aq. absynth. vel fra-
xin. in qua earundem salia dissoluta; relinq. tamdiu
donec rubiginem contrahat.

ʒ. hujus croci ʒiij. CC. ppt. ʒʒs. Magist. perlat.
Or. Corall. r. ana ʒiʒs. Cinamom. ʒʒs. Crytall. tartar.
ʒj. M. f. Pulvis, dos. ana ʒʒs. ad ʒj.

Alius Cachecticus P. H. D.

ʒ. Croci ʒ is cum sp. ʒ-ol. parat. ʒij. Santal. r. ʒj.
rhabarb. opt. ʒiʒs. M. f. Pulvis subtiliss. Dos. à ʒj. ʒʒs.
ad ʒj.

Pulvis Epaticus Ruber. Dresd.

ʒ. Crytall. tartar. albiss. ʒʒj. imbuantur in mar-
more sp. ʒ-oli rectificat. ʒiv. continuè miscendo,
donec omnis spiritus absumptus fuerit; deindè ʒ.
fantali rubr. el. subtiliss. in marmore pulverisat. ʒiv.
imbuatur sp. vini optim. ʒviiiij. per vices immiscen-
do, ut fiat instar pastæ, & ad aërem siccando, iterum
miscendo, & exsiccando, donec omnem spiritum
absumpserit. Postea Crytall. tartar. cum sp. ʒ-oli &
fantal. cum sp. vini f. q. imbutum misce super mar-
more exquisitissimè, exsicca & ad usum reserva.

Pulvis Aperitivus Spleneticus D. D. K. R. P. M.

ʒ. Crytall. tartar. tartar. ʒ-lat. ana ʒʒs. solut. co-
rall. r. ocul. ʒ ana ʒʒs. fecul. aron. bryon. ana ʒj. ʒoli
diaphor. ʒij. Myrrh. rubr. ʒj. ol. d. Ligni Rhod. gutt. v.
M. Dos. à ʒj. ad ʒʒs.

Pulvis Anti-Nephriticus Eiusd.

ʒ. acidi tartari ʒiij. ocul. ʒ ppt. ʒij. Lapid. percar.
Lyncis judaic. Santal. r. Spirit. ʒ-ol. coagulat. cum ʒ
le proprio ana ʒj. M. Dos. à ʒʒs. in liquore appro-
priato.

Pulvis Hystericus.

ʒ. radic. pœon. debito tempore collectæ ʒj. ah-
tophyllor. ʒiij. Croci A. Castor. ana ʒij. Succin. alb.
ppt. Magist. matris perlat. M. f. Pulvis dos. à ʒj. ad ʒʒs.
vel ʒj. Corall. r. ppt. salis Jovis ana ʒʒs. ol. d. succin.
alb. ʒj.

Pulvis Laxativus vegetabilis D. G. R.

ʒ. gialapp. resinof. ʒij. pulv. polychrest. ʒʒs. Lapid.
bezoar. Or. ʒj. M. f. Pulvis, dos. ʒj. ad ʒʒs. N. Pulvis po-
lychrestus seu rubinus vegetabilis constat ex resina
scammon. tincta cum fantal. rubr.

Pulvis Laxativus completus D. V. S.

ʒ. Cremor. tartari ʒx. pulv. gialapp. ʒʒs. resin. Scam-

mon. fecul. aronis ana ʒiʒs. sp. ʒ-ol. coagulat. ʒʒs. ol. d.
Citri gutt. xxx. M. f. Pulvis. Dos. ʒj. ad ʒʒs. vel ʒij.

Pulvis Hydragogus D. D. I. M.

ʒ. Crytall. tartari ʒj. pulv. epatic. rubr. ʒʒs. Ma-
gister. gummi de Peru gr. viiiij. Sal. genist. gr. vi. ol. d.
anisi gutt. ii. M. f. pulvis. Dos. à ʒʒs. ad ʒij. vel ʒj.

Pulveres varii è Pharmacop. PERSICA.

SEFOUF MOUGOULIATSA.

Pulvis de Nasturtio.

Turgentes hæmorrhoides sanat, & cæliacos do-
lores; diarrhæam veterem, & tenasmm eliminat ab
omni quoque infirmitate ventriculi liberat.

ʒ. Sem. Nasturtii, dr. 20. Cumini caraman. aceto
correcti, siccati, frixi, m. ʒ. Semin. lini, Semin. por-
rorum. Myrobal. nigrarum, Oleo olivarum fricarum,
ana m. 2. Mastiches, m. i.

Omnia comminuantur in pulverem, excepto na-
sturtio; dosi dr. 2. cum aqua frigida.

SEFOUF JOUHOUDI.

Pulvis Judaicus.

Probatum ad ophthalmiam.

ʒ. Sem. Nasturtii frixi, Sem. Psyllii frixi, Sabine
frixæ, ana dr. 2. Cumini caraman. Semin. porrorum,
Semin. anethi, Papaveris, Anisi, Sem. Petrosf. Maci-
don. Sem. hyoscyami an. dr. 2.

Ex his pulvis fiat pollinis lævorem æmulans.

SEFOUF.

Pulvis

Proficiens ad sputum cruentum.

ʒ. Spodii, Boli Armena, Terra lemnia, Lapidis
hematit, Figura lenticularum, loti, Semin. poru-
laca, an. dr. ʒ. Corallii, Succini, Margarit. imperfor.
Papaveris albi, Succ. liquiritia, Acacia, Succ. hy-
pocistidos, ana dr. 3. Sem. Psyllii, dr. 20. Opii, dr. 2.

Paretur pulvis cum aqua pluviali, aut cum succo
portulacæ sumendus; nisi autem nimius æstus obstat,
addantur mixtioni, thuris, dr. 3.

SEFOUF SARTOUN.

Pulvis de Cancris.

Ad Phthim efficacissimus est.

ʒ. Cancrorum marinor. adustor. dr. 2. Vitrioli Ro-
mani, Gummi Arabici, Papaveris albi & nigri, Ma-
dul. sem. peponis, ana dr. ʒ.

Terantur, & fiat pulvis: dosi m. i. ex sapa granato-
rum dulcium, aut aqua papaverum; sic enim calcu-
lum è vesica, & è renibus pellet.

SEFOUF BOULELDEM.

Pulvis ad cruentam Vrinam.

Hæc mixtio est diuretica, & lithontriptica; & ad
suum peculiarem effectum probata.

ʒ. Lapidis hematit, Sanguinis draconis, Corallii,
Succini, Aluminis Arab. seu rocha, Balanstorum, Sem.
portulacæ, Boli Armena, Cyparosa, ana q. u.

Pista, & comminuta trajiciantur cribro setaceo; do-
sis dr. 2. cum aqua fumaci, seu Rhois.

SEFOUF LOULOVI.

Pulvis de Margaritis.

Confert in fluoribus hepaticis; ventriculo, cordiac
hepai

hepati consentaneus; æstum, ac sitim sedat.

℞. Margaritarum imperfor. dr. iv. Corallij usti, balauſtorum; spodi, siliqua nabathea, vel ceratonie, boli armenie, cuparose, sive vitrioli cyprii, seminis rosarum, santali, sem. torrefacti lapathi sylvestris, sive boni Henri, Baccarum Myrti, fructus loti arboris cum nucleo, farine xizipharum albar. persidis, coriandri fici, & frixi, gummi Arab. frixi, sem. psyllii, sumaci, berberis, corallij, juglandium frixar. an. dr. iij. terra sigillata, mastiches, ana dr. iij. succini, acacia lota, an. ʒij.

Omnibus ritè contusis, præter semen lapathi, ac psyllij, fiat pulvis ad usum.

SEFOUF DIABENT.

Pulvis ad Diabetem.

Est institutus nempe ad fluorem urinæ, quo æger semper sitiens, subindeque bibens, statim etiam reddit quod biberit à qualitate sua non mutatum.

℞. Gummi Arabici, boli armenie, balauſtorum, sumaci, glandis, ana ʒv. amyli, gummi tragacanthæ, seminis lactuca. Semin. portulacæ, aa ʒiij. Santali albi, ʒi.

Fiat pulvis; dosis ʒiij. cum succo granatorum acidorum.

SEFOUF.

Pulvis.

Corpus enormiter impinguatum extenuat; gracileque, & macilentum reddit.

℞. Cancami loti, ammeos, seminis ruta, cumini caramam. aa ʒiv. majoranæ, nitri Armenia, aa. drach. i.

Fiat pulveratio technica, & magistralis. Fiat autem quotidianus haustus mesc. i.

SEFOUF.

Pulvis.

Præcedenti substituendus; ad extenuandos pinguedinis sarcinâ incrassatos ventres.

℞. Lacca lota, sandaraca mineralis aa. ʒiv. majoranæ, ʒb. aluminis, aristolochia rotunda, gentiana, ana dung. i. f.

Contritio cauta, & discreta fiat: tum pollinario traducta pharmaca seruentur ad usum in forma pulveris: dosis dung. 2.

Pulveres varii ex Joh. Michaelis.

℞. Lapid. ceramii. ʒiij. spol. serpent. drach. ʒ. Pulverisata simul accuratè dividantur in 4. Doses. S. Pulver.

NB. Hic pulvis est Specificum in Icteriò D. D. Mich.

℞. Absinth. ☐ sum. genista, corall. plantag. a ʒi. M. D. in 4. Doses. S. Saltz.

℞. Sem. aquileg. urtica. aa ʒi. sterc. anserin. ʒiij. spec. diarrhod. A. ʒi. M. F. Pulvis. S. Alle morgen 3. Messerspitzen voll.

℞. Fol. senna sine stip. el. ʒij. Crystall. ʒi. M. S. Pulver.

℞. Flor. ☐ comp. ʒb. sacch. ros. tabul. ʒi. h ʒi. M. F. Pulvis.

D. Ad scatulam. Dos. ʒb. in phthisi.

℞. Pulv. Haly retent. ʒiij. spec. diatr. diatr. ana ʒi. sacch. ros. tabul. ʒx. M. F. Pulvis.

NB. Pulvis Pectoralis reſectivus Mynsich:

℞. Pulv. Pannon. ʒi. ʒ diaphor. gr. iv. bez. Orient. gr. iij. S. Bezoar-Pulver auf einmal.

℞. Pulv. antifebr. Crolli ʒi. Absinth. cent. min. C. B. ana. gr. vij. ☐ g. iij. S. Fieber-Pulverlein in vvarmen Bier einzunehmen.

℞. Ocul. ☐ ʒb. sang. hirci ʒi. camp. gr. iij. opii gr. f.

M. F. Pulvis propinandus in sequenti aquâ.

℞. Aq. card. bened. ʒb. flor. pap. errat. ʒb. S. Wasser zum Pulver.

℞. Corall. rubr. in subtiliss. alcohol. redactorum ras. eb. eodem modo alcoolis aa ʒij. cryst. Tartarum ʒj. Absinth. ʒi. fol. ☐ N. viij. cum saccharo benè trito ☐ conf. alkerm. exsiccat. ʒi. F. Pulv. S. Sonderlich Pulver.

℞. Lap. hemat. præp. ʒi. sang. dracon. ʒfs. M. S. Pulver auf einmal.

℞. Lap. bezoar. gr. vij. unicornum veri gr. ij. S. Herizsterkend Pulver. D. in seq. aq.

℞. ☐ Terra sigill. aq. card. bened. aa ʒi. S. Wasser zum Pulver.

℞. Gummi gotte gr. ix. Tartarum rub. gr. x. ☐ g. i. ☐ cinamom. gutt. j. M. F. Pulvis.

℞. Panis saccharati ʒiij. coriandri ☐ præp. ʒiij. ventric. gallin. leniter exsic. ʒij. garyophil. ʒj. cinamom. fol. ros. rubr. santal. albi rad. angel. aa. ʒb. salvia cruc. ʒb. ambra, moschiana gr. iij. ☐ cinamom. ʒb. sacchari candi ʒiij. F. Pulv.

Pulveres Digestivi.

℞. Croc. ☐ aperit. cum ☐bus ʒi. facul. bryon. gr. viij. S. Pulver auf einmal.

D. in duplo, in obstructione mensium.

℞. Croc. ☐ sacch. gr. xii. facul. bryon. gr. vj.

D. in duplo. S. in obstructione mentium.

℞. Pulv. cachect. Quercet. ʒj. ☐ fraxini, genista ana gr. v.

D. In obstructione Lienis.

℞. Crystalli Tartarum albiss. ʒj. epat. rub. ʒb. ☐ cichor. gr. v.

D. in duplo. Valet in obstructione hepatis & lienis.

℞. Tartarum ☐lati ʒi. Absinth. fumar. aa. gr. vj.

D. In duplo. S. ut ante. Prodest in hepatis & lienis obstructione.

℞. Pulv. cryst. Tart. albiss. ʒj. facul. Aronis gr. viij. Absinth. crystall. gr. v.

D. In Duplo. In affectibus ventriculi.

℞. Succini præp. ʒiij. facul. aronis ʒb. cryst. min. h gr. viij.

Divide in 2. p. æ. D. In affectibus capitis.

℞. Fac. Aron. ireos aa. ʒj. spec. diatr. ʒb.

Divid. in 2. p. æ. D. in affectibus Pectoris.

Pulveres Purgantes.

℞. Pulv. Melanagog. Quercet. ʒj. scammon. ☐ gr. v. ☐ per infer. purg gr. iij. vel iv.

℞. Pulv. Cathol. purg ʒi. ☐ per inf. p. gr. iij. M. S. Purgierpulver auf einmal.

℞. Pulv. Cathol. purg. ʒi. cryst. min. h gr. iij. S. Purgierpulv. das Haupt zu reinigen.

℞. Pulv. cathol. purg. ʒi. gummi de Peru gr. iv. facul. ireos nostr. gr. iv. D. in Hydrope.

℞. Pulv. hydragog. Quercet. vel Ang. Sal. ʒi. mag. gummi de Peru gr. v. ☐ still. anisi g. ij. S. Purgierpulver auf einmal.

℞. Pulv. senna Montagnana ʒi. scammon. ☐ rati g. vj. ☐ still. caryoph. g. ii. D. in Lienis affectibus.

℞. Pulv. rhubarb. ʒi. cryst. tart. albiss. gr. xij. scammon. ☐ rati g. vj. ☐ still. caryoph. g. ij.

D. In affectibus hepatis.

℞. Pulv. rhab. electi ʒj. epat. rub. ʒb. ☐ cichor. crystall. gr. vj. S. Purgierend Leberpulver.

℞. Pulv. he. modact. jalapp. aa ʒj. off. microcosmi sine aq. præp. ʒj. scammon. ☐ rat. gr. xij. ☐ still. macis g. ij.

M. Div. in 3. partes æquales.

℞. Pulv. phlegmagog. Quercet. ʒi. scammon. ☐ rati g. vi.

oleo stillat. anisi gutt. ij. S. Purgierpulver auf einmal.
 4. Crystall. tart. albiss. 3ß. resin. jalap. gr. viij. 80
 stillat. anisi 1j. vel Caryoph. S. Purgierpulver auf einmal.
 4. Cephal. purg. Trithemi 3ß. cryst. min. 5 gr. iv.
 D. in affectibus capitis.

Pulveres Confortantes & Specifici.

4. Specif. cephal. 3ij. succini cathar. 3iij. D. Haupt-
 sterckend Pulver gegen die Flüz. Dos. 3ß. ad 3j
 4. Pulv. apopl. Aug. 3ij. specif. cephal. 3iij. succini
 prap. 3j. 80 still. salvia majorana aa g. vj. S. Präserva-
 tiv. und Curativ. Pulver in apoplexia.
 4. Specif. cephal. 3ij. Pulv. Marchion. 3iss. S. Prä-
 servativ. und Curativ. Pulver in Epilepsia.
 Datur instante mutatione in 7 appropriata.
 4. Pulv. rad. Doren. 3ij. specif. cephal. D. S.
 Schwindelpulver. Dos. 3ß. ad 3ij.
 Pulverem nigrum seu de secunda primi fetus
 malculi quidam valde in epilepsia commendant.

Pulvis Sternutatorius.

4. Spec. diatraci Myrs. 3ij. pulv. flor. lil. convall.
 3i. Nicot. 3ss. essent. ambra g. vj. D. S. per se.

Pulvis pro fumo in Catharris.

4. Pulv. succini 3iss. Gummi junp. 3iij. thuris,
 mastich. aa 3i. D. S. Rauchpulver gegen die Flüsse.

Pulvis externus pro insperione in
Catharris.

4. Succini 3ii. thuris, mastichis ana 3ss. pulv. ros.
 rubr. 3i. ras. ligni rhod. 3iss. D. S. Eusserlich aufzu-
 streuen.

Caput prius irrorari debet S. V. vel, quod melius
 est vel 7 ufa appropriata in vertice; vel ubi est
 futura coronalis.

Pulvis Ophthalmicus externus.

4. Tut. prap. 3i. marg. prap. 3ii. farinar. fabar.
 sacch. albiss. ana 3iss. S. Eusserlich Augenpulver ein-
 zublasen.

Pulvis Dentifricius.

4. Silic. fluviatil. calcin. 3ss. lap. pum. prap. 3ij.
 CC. ussi rad. ireos florentina ana 3i. 80 stillat. ligni
 Rhod. gr. iv.

Potest tingi sanguine Draconis vel fantalo rubro.

4. Rad. c. bistort. tormentill. ana 3ii. nuc. mosch. 3iss.
 pulv. rad. 12. florent. 3ii. O ussi 3ß.

M. D. In vacillatione Dentium.

4. Pulv. flor. aquileg. 3iij. fol. salvia 3ß. adsparg.
 antiscorb. D. S.

Pulvis Pectoralis.

4. Pulv. Haly contra Phthisin 3iij. elaeosacch. bals.
 Peruv. veri 3iij.

4. Flor. 4 3ii. M. mag. benz. 3i. croci Orient. ve-
 ri 3i. D. S. Lufftpulver in asthma.

4. Ras. dentis apri mandib. lucti piscis ana 3i. sem.
 cardui lacti 3ß. flor. pap. rhoad. 3j. M. D. In pleu-
 ritide.

4. Sem. papav. albi 3ij. hyoscyami albi 3ß. croci 7
 adstring. 3ij. lapid. hamat. prap. 3j. pulv. anodyn. gr. viij.
 M. F. Pulv. in Hæmoptysi. Dos. 3ß.

4. Lapid. hamat. prap. 3j. usnea cran. hum. gr. viij.
 pulv. anod. gr. xij

M. Divid. in 2. partes æqual. D.

4. Sem. feniculi, card. lactei ana 3ß. crystall. prap.
 lact. 3 ana 3i. D. S. Sonderliche-Milch ad generatio-
 nem lactis.

4. Pulv. stomach. Quercet. 3iij. facul. aron. 3i. panac.
 Holsat. 3ij. D.

4. Pulv. stom. Quercet. 3iij. stomachi Galli prap. 3ß.

80 still. calami arom. g. iv. D.

4. Panis saccharati 3i. conf. sem. coriand 3ß. calami
 arom 3vi. d. acydon. tessulatum incis. 3ß. spec. pro mors.
 Imp. 3ß. F. l. a. Tragæa grossa post cibum sumendum.

4. Crete albiss. cum 7 portul. prap. 3iij. ocul. 80 prap.
 eboris sine 7 nucis mosch. ana 3i. S. Sonderlich Pulver
 gegen den Sood.

4. Eboris sine 7 spec. diatr. sant. facul. aronis, hpi
 rubri ana 3i. S. Leber und Magenpulver. Dos. 3ß. 3j.

4. Ebor sine 7 facul. aron. a. 3i. croci 7 aperit. chin
 80 libus 3iij. M. D. vid. in 4. part. æq.

4. Pulv. cachect. Quercet. q. v. D. S. Eröffnend
 pulver in cachexia & affectibus hepatis.

4. Lapid. cerannii prap. 3i. pulv. cachect. Querc. 3ii.
 M. Divid. in 3. p. æ. D. in desperatis ictericis in 7
 appropriatis. Catissimū remediū est lapis cerannius.

4. Croci 7 adstring. 3ii. lap. hamat. prap. 3ii. sem.
 plantag. 3i. M. Divid. in 4. p. æ. S. Anhaltend Pulver in
 Dysenteria.

4. Sem. viol. lappæ maj. milii 80 ana 3iij. lap. me-
 phr. t. prap. 3ß. pulv. glomorum cynosbatu 3i.

M. F. Pulvis subtilissimus. Dos. 3ß. ad 3ij. in calculo.

4. Pulv. stipticus Crollii 3ii. anod. 3i. Divid. in 3. p. æ.
 D. S. Anhaltend pulver, qui prodest in Dyenteria.

Pulvis ad Partum.

4. Glaciei Paradisi, borracis, cassie lignæ vere
 ana 3i. Div. in 3. p. æ. S. Pulver auf den Nothfall.

in hysterica Passione.

4. Facul. bryon. 3i. mag. matris perlarum 3ij. bi-
 zoard. 4. 3i. Dol. 2. Messerspitzen voll.

Pulvis Manualis.

4. Magmat. amygd. dulc. 3iv. farin. fabarum in-
 pini, oryza aa 3i. flor. ros. alb. 3ß. benz. 3iij. 80 tart.
 albiss. 3ii. S. Sonderlich Handpulver.

4. Specier. diacumin. 3iij. 80 depur. 3i. D. S. In
 Colica.

Pulvis Ophthalmicus internus.

4. Flores euphras. Mj. sem. fen. 3ii. Valeriana 3iij.
 M. F. Pulvis subtilissimus. Adspargatur 80 still. co-
 niculi.

4. Cinnab. 8 3ii. redig. in alcohol. 80 irroretur 80
 fenic. angel. chamom. an. gr. x. adde CC. ussi 3i. mag.
 perlar. 3ß. corall. 3i. succini prap. 3ij. cran. hum. prap.
 visci querni prap. ana 3ß. 80 stercoris pavonis gr. xvi.

M. D. Ad Scatulam in Epilepsia, Apoplexia aliis-
 que affectibus frigidis.

Ad Gonorrhæam.

4. Menth. sicca 3iij. sem. viticis rad. irid. ana 3i
 sem. ruta 3ii. lactuca 3ß. sacchari 3i.

F. Pulvis. Dosis cochl. j. ante prandium.

4. Tart. rubificati 3i. resin. jalappe gr. xi. conf. al-
 kerm. gr. v. 80 cinamom. g. ij. M. S. Purgierpulver.

4. Cryst. Tart. 3ß. facul. aronis, bryonia ana 3i.
 80 absinth. 3j. M. D. ad Scatulam. S. Pulver alle Mor-
 gen ein gute Messerspitze einzunehmen.

4. Dentis aprugni prap. unicornu foss. ocul. 80 prap.
 CC. phyllos. calcin. ana 3i. M. F. Pulvis. Divid. in 3
 partes æq. S. Pulver auf 3 mal.

4. Pulv. bez. Sennerti, March. an. 3i. S. Pulver alle
 alle 6. Stund eine gute Messerspitze.

In Dysenteria, Diarrhœa aliisque fluxibus.

4. Pulv. nuc. mosch. macis an. 3i. rad. consolida
 maj. 3ii. corall. rubr. prap. 3i. sacch. 3iij. M. S. In Bier
 kalte Schale zu thun.

4. Cryst. Tart. 3iij. croci 7 aperit. fac. aron. 14
 bif. M. F. Pulv. S. Leberpulver.

4. Margarit. prap. unicornu ana 3ß. M. S. Her-
 sterckend pulver auf 1 mal.

4. Sem. fenic. rad. liquirit. valerian. pulv. a. 3i.
 M. F. Pulvis oculis insufflandus.

Pulveres varii ex Collectione Theoph. Bierlingii.

Pulvis in angina laudatissimus

Augerii Clusii.

℞. Flor. borrag. bugloss. violar. rosar. ā ℥i. matr. cori. citri. aurant. ā. ℥j. rad. bugloss. margarit. non perforat. smaragd. hyacinth. rubin. saphir. granat. oss. de cord. cerv. ā. ℥ss. fol. ☉. n. iv. f. pulv. subtiliss.

Pulvis Bezoarticus albus Rolfincii.

℞. C. C. ust. ℥ij. oss. de cord. cerv. n. ij. bezoard. miner. ℥ss. chrysol. ppt. hyacinth. ppt. smaragd. ppt. rubin. ppt. ā. ℥i. ocul. ☉. ppt. corall. rubr. ppt. perlar. ppt. āā. ℥ss. succ. ppt. ℥j. terr. sigill. S. lesias. rot. n. ij. lapid. bezoard. Orient. ℥ss. fol. ☉. n. v. f. l. a. pulvis.

Pulvis confortans Muffatii.

℞. Eleosachar. citr. rosar. cinamom. ā. ℥ij. magist. dentis Hippotam. perlar. corall. oss. eord. cervi. monocerot. ā. ℥ss. essent. ambr. ℥ss. f. l. a. pulvis.

Pulvis suaveolens.

℞. Mosch. gr. ij. ambr. gr. iiss. zibeth. gr. iiss. fum. Hispanc. gr. iv. ☉. rosar. cinam. ā. gutt. j. sacch. cand. ℥ij. Omnia contundantur in massam, & exsiccentur, iterum terantur in mortario marmoreo & in vitro servetur pro usu. Si granum unum in mensuram vini injiciatur, totum vinum exinde contrahit saporem.

Pulvis causticus D. Casseri.

℞. Pulv. isatid. ℥ss. calc. viv. ℥ss. ag. pluvial. mensur. x. f. luxivium adde salis ust. M. j. f. l. a. lapis.

Pulvis pepticus.

℞. Panis sacchar. morsulor. imperial. ana ℥ij. corall. rubr. ppt. ℥j. aromat. rosar. tabulat. ℥ij. sem. coriandar. ppt. ℥ss. anis. ℥j. cinamom. elect. ℥j. mastich select. ℥ss. pellicul. stomach. gallin. ℥j. sacch. cand. q. s. f. Pulvis.

Pulvis Buxtehudenfis.

℞. Fol. sena. ℥ij. cumin. zedoar. petroselin. citri, anthos ā. ℥j. zingiber. ℥ss. caryophyll. nuc. moschat. calam. aromat. galang. pimpinell. salu. rut. valerian. anis ana ℥ij. sacchar. ℥ij. l. iv. M. F. pulvis.

Dosis ℥j. in omnibus affectibus ventriculi a causa frigida ortis.

Pulvis pro stomacho.

℞. Sem. cumin. carv. utriusque aceto ppt. an. ℥iiss. zingib. albiss. ℥j. croc. optim. ℥j. M. F. l. a. pulv. subtilis. detur in scatula S. Suppen-pulver.

Pulvis stomachi Bertoldi.

℞. Pulv. cinamom. ℥ss. zingiber. piper. long. galang. an. ℥j. cardam. macis. caryophyll. nucista. ā. ℥ss. Sacchar. ℥ss. zingiber. ℥ij. sem. eruc. cand. stinc ā. ℥ss. sem. urtic. been utriusque an. ℥ss. piper. long. ℥j. spec. diamb. diamosch. dulc. ana ℥j. M. F. Pulvis.

Alius.

℞. Sem. eruc. ℥iiss. snap. nasturt. rad. pyrethr. cinamom. zingiber. p. per. ana. ℥ss. croc. ℥ss. borac. ℥ij. stinc. ppt. ℥ss. mosch. gr. iv. canthar. nij. abscess. capit. ☉. alis. M. F. Pulvis Dos. ℥ss.

Pulvis stomachalis.

Rec. Rad. aaron. ppt. ℥ij. panac. holsteinens. ℥ij. sal. absinth. ℥ss. rad. calam. aromat. ℥ij. cinamom. ℥ss.

caryophyll. macis. piper. long. zingiber. canthar. cardamom. granon. paradisi. zedoar. coriandr. ā. ℥j. M. F. l. a. Pulv.

Pulvis contra Fluxum mensium D. Agricolæ.

℞. Sangu. dracon. corall. rubr. ppt. sem. portulac. an. ℥ij. balauft. Div. hol. armen. ppt. ℥ss. M. F. l. a. Pulv.

Pulvis præservativus gravidarum D. Pleisneri.

℞. Spod. ℥j. ras. ebor. ℥ij. sem. fenic. zedoar. cardo pat. an. ℥ij. marg. ppt. ℥j. corall. ppt. ℥ss. fol. ☉. n. i. addi etiam potest oss. de cord. cerv. ℥ss.

Pulvis contra Cancrum felici usu sæpè probatus Dn. Andrigethi.

℞. Auripigment. 3vj. arsenic. alb. ℥ij. rubr. ℥ss. ℥iij. Temperentur cum succo appropriato & exsiccentur in furno, ut fiat pulvis. Postea addantur cantharides torrefactæ sed minimè nigrae, & fiat pulvis, qui adhibeatur loc. petiis madefactis saliva & chartis. ex M. SS. Burseri.

Pulvis antidyntericus.

℞. Ebor. f. a. ℥ij. magist. terra sigillat. ℥ss. alumin. pulver. ℥j. M. F. Pulvis.

Pulvis contra pleuritidem.

℞. Therebinth. pulv. pulv. Haly recent. dispens. ā. ℥ss. flor. papav. errat. russilag. enul. ā. p. j. herb. beder. ter rest. pulmon. an. p. ij. sem. card. benedict. card. mar. pastina. an. ℥j. spec. de prass. diapenid. de liquir. de traga. canth. an. ℥ij. flor. ☉. r. ℥j. benzoes ℥ss. scob. dentis apr. ℥ss. priap. taur. ℥ij. ocul. ☉. ℥ss. maxill. luc. pisc. ℥ij. fragul. lepor. ℥ij. sem. 4. frigid. major. ℥j. M. F. Pulvis.

Alius D. Schalleri.

℞. Ocul. lucii recent. exempt. & torrefact. cancer. ppt. an. ℥j. mandib. lucii piscis. rasur. dentis aprugn. an. ℥ij. lapid. percar. ppt. talor. lepor. sem. card. bened. maria. artemis. rubr. an. ℥j. M. F. l. a. Pulvis.

Alius.

℞. Ras. dent. apr. ℥iiss. visc. quercin. rad. bardan. an. ℥ss. M. F. Pulvis.

Alius D. Belzeri.

℞. Crystall. salis nitri Div. flor. papav. errat. ℥ij. violar. croc. an. ℥j. myrrh. rubr. ℥j. M. F. Pulvis.

Alius D. Banzeri.

℞. Ras. dent. apr. ℥ss. rad. bardan. sem. card. Maria. lign. visc. quercin. an. ℥ij. flor. pap. errat. ℥ss. bur. elect. ℥j. ocul. ☉. ppt. ℥ss. lap. percar. ℥ij. croc. ℥ss. sal. card. bened. ℥j. M. F. pulvis.

Pulvis in lienis & Epatis schirro D. Fabritii.

℞. Pulv. tamarisc. rad. cappar. aaron. ppt. oterach. fumi terra. an. ℥iiss. sem. acetos. cichor. an. ℥ij. galang. cumin. salis fraxin. an. drach. ss. redacta in pulverem misc. cum pari pondere sacchari pro tragea.

Pulvis laxativus completus D. Schneideri.

℞. Cremor. tartar. dr. x. gialap. ℥ss. resin. scammon. fec. rad. aaron. an. dr. iss. spir. ☉. l. coagulat. dr. ss. ☉. citr. gutt. xxj. fol. ☉. sin. n. iv. M. F. Pulvis.

Pulvis Polychrestus Ejusdem.

℞. Scammon. pur. ℥ij. santal. rubr. ℥j. cum spir. vin. solv. ita ut emineat digiti altitudinem, evaporet spir. in pulvis in fundo relictus servetur usui.

Pulvis Polychrestus nobilis Ejusdem.

℞. Pulv. polychrest. ℥ss. ☉. cinam. ℥ss. mosch. Ambr.

ambr. \bar{a} . gr. ij. fol. \odot . optim. l. pur. an. num. ij. M. T. Pulvis.

Pulvis Osvaldi pulveri Weinlini haud abfimilis.

\mathcal{Z} . $\bar{\delta}$ $\bar{\text{H}}$. $\bar{\delta}$. $\bar{\text{H}}$ s. destilla. \mathcal{Z} . ∇ . adde \odot gemm. dest illi donec. spir. prodeant, $\bar{\text{S}}$ cand. u. ut sal in cucurbita fluat, ∇ . fortis erit impense rubra. Inde \odot . huius ∇ . ac destilla per retort. tunc tubulus retort. totus erit floribus \odot repletus, exime hos, $\bar{\text{S}}$ precipita, erit rubeo viridescens pulvis, inde phiole, ac digeratur per dies nonnullos, donec mutetur in rubicundissimo purpureum pulverem, quod erit diaphoreticam & medicina insignis. Ex M. SS. L. Bilgeri.

Cremor. Tartar. purgans Arnisai.

\mathcal{Z} . Cremor. Tart. \mathcal{Z} i. rad. mechoacan. alb. $\bar{\delta}$ j. nigr. gumm. gotte, resin. scammon. ana gr. viij. specier. diamosch. dulcedin. diambr. aromat. rosat. ana $\bar{\text{H}}$ s. Pulverisa omnia & miscendo exacte dividuntur in 4 part. equal.

Pulvis purgans Scott. Manchreni.

\mathcal{Z} . Fol. senæ Alexandr. s. stipit. gr. xx. rad. turpeth. gummos. gr. xxv. scammon. gr. xvj. ambr. gryf. gr. v. $\bar{\text{S}}$ o. anisi $\bar{\text{H}}$. M. F. Pulvis.

Purgans ex Sulphure.

\mathcal{Z} . $\bar{\Delta}$ r. viv. g. v. affunde lixivium sapon. fortissimum, pelle per retort. lixivium ignis forti, postea guttur in lixivium instilla $\bar{\text{X}}$. $\bar{\text{S}}$ pulvis quidam albus fundum petet, purgat per secessum, Dos. gr. \bar{a} . ad ij. Ex. M. SS. A. G.

Pulvis purgans ex $\bar{\delta}$. per secessum.

\mathcal{Z} . Spir. $\bar{\text{H}}$. optim. $\bar{\text{H}}$ j. dieses thue in einen grosse recipienten, denn treibe einen spir. \odot , de tribus libris \odot . communis, so lange bisz keine spir. mehr gehen, denn laßz die Vorlage erkalten. $\bar{\text{R}}$. Die beyden spir. & cohobire sie drey oder mehrmal, dasz sie sich recht mit einander vereinigen, dasz phlegma separire alsdenn davon. $\bar{\text{R}}$. Flou. $\bar{\delta}$. libon. vel $\bar{\text{X}}$. $\bar{\delta}$. die solvre in d. esen spiritibus, zeng dann das phlegma per retortam davon, bisz es beginnet sauer zu vverden, denn geusz frischen spiritum darauff, zeng ihn aber davon, d. sz thue so oft, bisz er so sauer dauor gehet, als er aufgegessen, denn so lege ein \mathcal{Z} . vor, so gehet ein $\bar{\text{S}}$ o herüber, wie das butyrum $\bar{\delta}$. so mit $\bar{\delta}$ $\bar{\text{H}}$ gemacht vviird, dieses $\bar{\text{S}}$ o rectificare noch einmahl, so vviird es schon rein. Denn schlage es cum $\bar{\text{S}}$ o Tart. nieder, und jasse es vuohl aus, so bleib: ein vveisz Pulver in fundo, das purgiret per secessum gar gelinde, Dos. 3. 4. gran. Sie müssen aber noch einmahl cum $\bar{\text{H}}$. l. prepariret vverden.

Pulvis ad foetorem anhelitus.

\mathcal{Z} . Menth. crisp. pulv. \mathcal{Z} i. fol. salu. \mathcal{Z} s. m. Dos. $\bar{\text{H}}$ s. vel $\bar{\text{H}}$ j. cum patte in vino madefacto jejuno stomacho.

Pulvis Laxativus mineralis simplex G. H.

Rec. Vtri $\bar{\delta}$. \mathcal{Z} i. pulv. $\bar{\text{S}}$ affunde spir. $\bar{\text{H}}$. l. dr. digeratur $\bar{\text{S}}$ siccetur levi calore, reiteretur affuso sepius postea ter cum spir. v. n. humectetur $\bar{\text{S}}$ vicissim exsiccetur. Dos. \bar{a} gr. ij. ad x.

Pulvis Electoris Saxonie.

Rec. Crystall. Tart. \mathcal{Z} s. spir. $\bar{\text{H}}$. l. $\bar{\text{H}}$ i. gr. iv. succin. ppt. dr. \bar{a} . mac. gr. vi. m. Divid. in 24. part. equal. S. Starck Pulver.

Pulvis diaphoreticus ad morbum Gallicum

Rec. Argent. viv. \mathcal{Z} ij. ∇ . \mathcal{Z} viij. thue es zusammen in gläserne Kolben, setze es in eine Sand Capellen ziehet das Wasser ab, den findet ihr in fundo eine gelbe præcidat, vwie auripigment. n. j. $\bar{\text{R}}$. $\bar{\text{H}}$. l. Roman. alumin. \bar{a} . \mathcal{Z} iv. $\bar{\text{X}}$. destillat. vini albi \bar{a} . q. t. davon destillire ein Maßz aq. n. 2. Resp. denn das aq. n. ij. thue es

zu der Materie in Kolben n. j. destill. aber geusz vviider darauff, destillire vviider, das reitere so lange, bisz mater n. j. das Wasser n. 2. alles verzehret hat, dann höret auff n. ij. Denn gießet über die materiam num. 1. 2. 3. spir. vin. opt. so viel dasz es nur bloßz die materiam bedecken kan, und ziehet es abe, das thut zum 9. mahl, allewege nehmet andern spir. vini n. 4. Wennes nun 9. mahl mit dem spir. vini abgezogen, so muß es auch 9. mahl mit dem aq. rosar. geschehen, n. 5. Darnach maceriret man die materiam unter \mathcal{Z} ij. vel \mathcal{Z} v. \odot . so hat man das rechte diaphoretische Pulver, das soll man eingeben Abends. vven er vwill schlaffen gehen, 2. Stunden nach dem Essen.

\mathcal{Z} . Pulv. diaph. gr. v. elect. de succ. ros. $\bar{\text{H}}$ i. $\bar{\text{S}}$ o $\bar{\Delta}$. gut. $\bar{\text{H}}$ j. Des Morgens vviider in electuario de succ. rosar. gr. viij. pulv. gr. vj. den andern Tag. gr. ix. den 3. 4. 5. 6. auch 11. gr. Wenn er es zum andernmahl hat eingenommen, muß es einen vvarmen gargarismum brauchen, so oft er vwill, so zeucht es ihm den Schleim gewaltig aus. Wann er vviider gesund ist, mache man ihm zu vveymahl ein trucken Schweißz Bad, und gibt ihm ehe er sich drein setzet, $\bar{\text{S}}$ o $\bar{\Delta}$ r. gutt. vj.

Pulvis contra calculum. D. Rosa.

\mathcal{Z} . Rad. enul. eryng. petros. \bar{a} . \mathcal{Z} ij. squirit. \mathcal{Z} ij. $\bar{\text{H}}$ i. sem. saxifrag. milii solis. apis. petroselin. \bar{a} . Div. malv. \mathcal{Z} ij. $\bar{\text{H}}$ i. anis. foenicul. sacch. pulveris. \mathcal{Z} vj. spec. lythontript. \mathcal{Z} ij. M. F. Pulvis.

Pulvis contra calculum P. H. D.

\mathcal{Z} . Pulv. rad. omnid. pimpinell. eryng. filipendul. \bar{a} . \mathcal{Z} ij. sem. alkekeng. m. lii solis, raphan. urtio. petroselin. \bar{a} . \mathcal{Z} B. lapid. percar. ppt. ocul. $\bar{\text{S}}$. ppt. succin. albiss. ppt. lapid. nephrit. indic. ppt. \bar{a} $\bar{\text{H}}$ j.

Asperge omnia minutissime pulverisata spir. \odot , ut madefiant, & iterum lento calore exsiccantur, postea redigantur iterum in pulverem subtilissimū, addi. \odot . Ononid. saxifrag. cort. fabar. pimpinell. juniper. \bar{a} . $\bar{\text{H}}$ j. spir. vitriol. coagul. $\bar{\text{H}}$ j. $\bar{\text{R}}$. vitriolat. \mathcal{Z} B. M. F. Pulvis.

Alius.

\mathcal{Z} . Crystall. Tart. q. v. centere, irroraque spir. Tart. theob. m. b. $\bar{\text{S}}$ mellis, ita ut sepius arefiat, $\bar{\text{S}}$ denuo hisce spiritibus humectetur (non inconveniens esset etiam spir. \odot .) post $\bar{\text{S}}$ o Tart. $\bar{\text{S}}$ mellis \bar{a} . \mathcal{Z} ij. inde cucurbita, & leni cinerum ignis commute vase optime clauso, brevi sic tempore materia indurescet, fracto vitro eximenda & pulverisanda. De hoc pulvere quotidie \mathcal{Z} B. in vino exhibeatur, maximarum est virium, in calculo $\bar{\text{S}}$ potissimum re. um.

Pulvis contra calculum Plateri ex Experimentia D. Arnisai.

\mathcal{Z} . Rad. liquirit. laur. \bar{a} . \mathcal{Z} j. ononid. $\bar{\text{H}}$ B. sem. alkekeng. palur. milii solis \bar{a} . \mathcal{Z} B. apis. petroselin. foenicul. nasturt. \bar{a} . $\bar{\text{H}}$ j. gumm. cerasor. succ. \bar{a} . $\bar{\text{H}}$ j. resin. laur. cort. \mathcal{Z} ij. ciner. fabar. $\bar{\text{H}}$ j. ocul. $\bar{\text{S}}$. gr. xv. cinamom. $\bar{\text{H}}$ j. sacchar. \mathcal{Z} v. M. F. Pulvis.

Mitior Ejusdem pro Rege Dania.

\mathcal{Z} . Rad. Ononid. laur. liquirit. apis \bar{a} . \mathcal{Z} B. sem. alkekeng. palur. milii solis \bar{a} . \mathcal{Z} ij. apis. petroselin. foenicul. nasturt. \bar{a} . \mathcal{Z} j. nucleor. cerasor. persic. \bar{a} . \mathcal{Z} B. avic. lanar. \mathcal{Z} j. sem. 4. frigid. major. \mathcal{Z} ij. cinamom. cort. fabar. \bar{a} . \mathcal{Z} j. ocul. $\bar{\text{S}}$. ppt. \mathcal{Z} B. terebinth. coct. \mathcal{Z} j. santal. rubr. \mathcal{Z} j. spec. lythontript. \mathcal{Z} ij. M. F. Pulvis.

Fortior Ejusdem.

\mathcal{Z} . Pulv. milleped. \mathcal{Z} B. ciner. pass. triglar. testar. ovor. lumbric. \bar{a} . \mathcal{Z} B. cremor. Tart. \mathcal{Z} j. sal. succ. \mathcal{Z} j. offic. mespil. cynosbat. an. \mathcal{Z} ij. lap. judaic. spong. an. \mathcal{Z} ij. vitri. n. 1. \mathcal{Z} ij. sem. milii \odot . \mathcal{Z} B. dauc. \mathcal{Z} j. althae \mathcal{Z} ij. flor. chamom. rom. m. b. M. F. Pulv.

Pulvis contra Colicam D. Arnisai in arc.
itiner. R. Dan.

℞. Rad. pyrethr. ʒij. calam. aromat. ʒß. zedoar.
angelic. ā. ʒij. cort. aurant. ʒj. bacc. laur. ʒv. sem. anis.
ʒij. cum. n. carv. ʒi. sejeleos, fœnio. ā. ʒj. spec. dia-
cinam. dianis. an. ʒij. diatrion. piper. ʒi. intestinor. lup.
ʒij. zingiber. ʒij. caryophyll. ʒj. M. F. Pulv.

Alius.

℞. Cort. citri, aurant. ā. ʒi. calam. aromat. ʒß.
sem. card. bened. rad. diptamn. C. C. usti an. ʒij. gly-
cyrrh. ʒß. ocul. lucti piscis ʒj. lap. ʒi. ʒi. ʒi. anis. gutt. v.
Pulverisata misceantur. Dos. ʒj. cum cerevisia aut
vino.

Alius D. Schalleri.

℞. Succ. alb. ocul. vel mandib. luc. pisc. lapill. ʒi. ta-
lor. lepor. postfer. dentium inferior. truta, zedoar. optim. ā.
part. equal.

Pulverisatis & mistis adde cort. aurant. ab omni pul-
pa liberat. & pulveris. ad pondus omnium. F. Pulvis
tenuissimus.

Pulvis Pulmoniacus Altenburg.

℞. Flor. ʒr. ʒij. oliban. mastich. an. ʒi. hyssop. ʒß.
sacchar. ʒi. ʒi. M. F. Pulv.

Pulvis Antipodagricus D. Andersoni Angli.

℞. Turbith. gammos. prastant. hermodactyl. recent.
à cortic. super. mandat fol. sene Alexandr. mund. Da-
grid. laudatis. ā. ʒß. C. C. ppt. off. de cord. cerv. ā. ʒi.
F. pulv. subtilissim. & probatiss.

Dos. ʒj. in vino vel juscule carnis non salito, sin-
gulo mense, (excepto cane torrido) vel sæpius utat-
ur, ratione tamen ægri habita, tam ad præcaven-
dam, quam ad curandam podagram.

Pulvis sternutatorius Ejusdem.

℞. Lolii, semin. nigell. helleb. alb. an. ʒj. rorismar.
majoran. salv. an. ʒß. mosch. gr. ij. M. F. Pulv. sub-
tiliss.

Pulvis Cephalicus D. Arnisai Reg. Dan.
præscriptus.

℞. Succ. ppt. ʒj. ungu. alcis ppt. ʒj. cran. human.
ppt. ʒij. granor. paon. ʒß. spod. semin. major. rut. ā. ʒj.
M. F. Pulv.

Pulvis Capitalis D. Agricola.

℞. Pulv. sene ppt. Montagn. ʒß. agar. trochiscat.
ʒß. spec. elect. de succ. rosar. an. ʒj. dagrid. gr. iv. m.
prouna dosi.

Pulvis ad restaurandam Memoriam deperditam
D. Andersoni Angli.

℞. Calam. aromat. gentian. cymin. syler. montan.
amei, carvi, sem. petroselin. macis an. ʒi. corall. rubr.
perlar. non perforat. an. ʒii. zingib. alb. chamæpyth.
fol. sene. mundat. crystal. tart. an. ʒi. ʒi. caryophyll. ʒij.

Ex his omnibus fiat pulvis subtilissimus, de quo
sumat ʒij. manè jejunos in juscule carnis, & tan-
tundem per horas 2. ante cœnam, id faciat per men-
sem primum. Secundo mense manè tantum capiat.
Tertio mense ter in hebdomade manè sumatur. Quarto
mense bis in mense sumat manè. Singulis quatuor
diebus utatur sternutatorio jam prius descripto. De-
crescente Luna caput lavetur sequenti lixivio:

℞. Chamomill. salvia, origan. majoran fol. sene ā. m. j.
M. confcindantur crassiuscule F. lixivium pro capite.

Alius D. Rollincii.

℞. Tinct. ʒ. succ. ʒj. magist. perlar. corall. ā. ʒß. C. C.
usti ʒij. ʒi. ruta, cinamom. rorismar. ā. gutt. vii. M. F.
Pulvis.

℞. Spir. lil. convall. ʒii. aq. flor. tilia ʒi. tinct. rosar.
jucundiss. ʒi. S. Wasser zum Pulver.

Pulvis Epilepticus Pencori.

℞. Marg. ppt. corall. rubr. ppt. C. C. usti ppt. spec.
diapl. archontic. ā. ʒj. ungu. alcis ʒß. fol. ʒi. finiss. n.
xxxvij. M. F. Pulvis.

Pulvis Puerorum.

℞. Rad. torment. zedoar. C. C. usti ppt. ā. ʒß. C. C. f.
Δ. ʒi. mag. cran. human. ʒij. fol. ʒi. no. xxxij. M. F.
Pulvis.

Pulvis Epilepticus Regis Danie.

℞. Rad. paon. ʒij. pyrethr. ʒi. calam. aromat. dip-
tamn. ā. ʒij. sal. volat. cran. human. C. C. hirund. an.
ʒi. costar. percar. minor. ustar. ʒ pulveris. ʒß. mag. co-
rall. ʒi. perlar. ʒi. succ. alb. ʒii. ungu. alc. ppt. ʒi.
pulu. priap. cervi, castor. an. Div. cinabar. sublimat. vi-
triol. vener. an. ʒii. sem. paon. ʒi. ocym. ʒi. ruta ʒij.
coriandr. ppt. ʒii. flor. paon. lilior. convall. anthos, la-
vendul. an. p. j. summ. major. si hænanth. stoechad. an. p. j.
spec. diamosch. dule. ʒii. pleris archont. ʒi. M. F. P. lub-
tilissimus.

Alius:

℞. Pulv. Marchion. ʒi. rasur. ungu. alcis. cranid
human. ppt. succ. alb. ppt. an. ʒi. smaragd. ppt. ʒi. la-
pid. bezoard. gr. xv. sacchar. cand. albiss. ʒß. M. F.
Pulv.

Pulvis Antepilepticus P. H. D.

℞. Cran. human. f. Δ. ungu. alcis ppt. crystall ppt.
smaragd. ppt. an. gr. vi. antimon. diaphor. ʒi. mag. C. C.
succin corall. perlar. an. ʒß. sal. volat. succin. cran. human.
an. gr. ii. fœc. rad. paon. ʒi. fol. ʒi. n. xii. M. F. P. Dos. ʒj.

Alius Timei.

℞. Mag. luna à Senn. in inst. descript. ʒß. mag. cran
human. corall. perlar. an. ʒij. fœc. paon. ung. alc. ppt. corn.
alc. ppt. lapid. carphon. ppt. an. ʒi. ʒi. visc. quercin. ʒij.
M. F. Pulv.

Pulvis Carminativus.

℞. Rad. pimpinell. zingib. zedoar. acori, sem. co-
riandr. ppt. anis. carvi, cinam. cori. aurant. caryophyll.
an. ʒj. M. F. Pulvis.

Pulvis Uterinus.

℞. Fœc. bryon. antihæc. Poter. an. ʒij. bezoard.
ʒal. ʒi. mag. matr. perlar. ʒß. M. F. Pulvis.

Dos. ʒi. in ʒ. artemis.

Pulvis Cordialis usitatus in offic. aul. Sax. & Brand.

℞. Hyacinth. ppt. margarit. ppt. corall. rubr. ppt.
C. C. terre sigillate an. ʒvi. sapphyr. ppt. ʒii. smaragd. ppt.
succ. alb. unicorn. ver. an. ʒi. off. de cord. cerv. ras. un-
gu. alc. an. ʒi. lap. percar. ocul. ʒi. lucior. calcan. le-
por. an. ʒi. zedoar. si placet ʒi. fol. ʒi. puriss. n. xv. M.
F. Pulv. subtiliss. ex MSS. Burseri.

Pulvis Cordialis D. Nymmanni.

℞. Rad. contrayerv. scorzonæ. hispid. ana. ʒi. ʒi.
paon. ʒi. gran. kerm. terr. sigill. Strig. corall. rubr. ppt.
an. ʒi. ʒi. C. C. usti ppt. margar. ppt. hyacinth. ppt. sma-
ragd. ppt. an. ʒj. lap. bezoard. Orient. ʒij. succ. alb.
ppt. ʒi. fol. ʒi. puriss. n. v. M. F. Pulvis.

Pulvis antidotalis.

℞. Colubrum sive serpentem, venenum aufer & ex-
coria, ut anguille excoriantur, tolle splenem & cor,
hinc cape novem primas costas à capite inchoando &
spina dors, post adde carnem hujus serpentis ad lati-
tudinem 4. digitorum à capite semper incipiendo, ebul-
liant, quo spina melius separari possint. Ad has spinas
& costas pulverisatas adde ventriculi ciconia pulver,
quantum duobus cultri mucronibus capi potest, unicor-
nu q. f. & gratum conciliando saporem varia adde, F.
Pulv.

Pulv. subtiliss. cæjus pars minima cum cochlear. vino generos. sumatur.

Pulvis Dentifricius. D. J. M.

℥. Pulv. silic. optim. calcin. ℥iii. lapid. pumic. 4. vicib. ignit. & in lacte extinet. postea subtil. pulver. ℥ss. rad. ireos florent. ℥iii. lign. rhod. ℥ss. gall. moschat. ver. ℥j. corall. albor. C. C. ust. an. Div. & stillat. lign. rhod. gtt. ii. m. exactissime.

Pulvis contra vacillationem Dentium

C. V. Schneideri.

℥. Rad. bistort. nuc. moschat. an. ℥i. cort. cass. lign. recent. Div. flor. rosar. rubr. balauft. exv. sarcocoll. ibur. aristol. rot. mastich. sumach. alum. usti, myrrb. rubr. an. ℥ss. lap. hemat. ppt. ℥j. M. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricius.

℥. Silic. calcin. & subtil. pulv. cum spir. O. l. ter imb. bit. & exiccatur. ℥j. pulv. rad. ireos ℥v. crystall. Tart. C. C. ust. ppt. an. ℥ss. alum. ℥ij. corall. rubr. ppt. ℥ss. M. F. Pulv. subtil.

Pulvis Dyſentericus J. A. mitior.

℥. Rad. tormentill. sanguisorb. serpent. plantag. nymph. consol. an. ℥ii. herb. trifol. herniar. millefol. graphal. an. p. ii. sumach. ℥ss. offic. sorb. mespilor. cynosbat. corniger. an. ℥i. rhabarb. tost. ℥ss. flor. rosar. rubr. m. B. balauft. ℥i. carn. cydon. siccatur. ℥ss. mastich. ℥v. castan. n. ij. glanduk. n. iii. nuc. cupress. n. v. m. & contund.

Fortior Eiusdem,

℥. Alumin. ℥ss. vitriol. alb. ℥ij. bol. ℥ss. terr. strig. ℥i. acac. succ. sanguin. dracon. an. ℥i. lapid. prunell. troch. de sacchar. ℥ij. cynosbat. ℥ii. gallor. n. v. cinam. ℥ss. corall. ppt. ℥ii. M. F. Pulvis.

Pulvis contra Vermes Eiusdem.

℥. Rad. dictamn. peon. an. ℥iii. ras. ebor. cran. human. C. C. an. ℥ss. corall. ℥ii. semin. sanct. ℥i. portulac. ℥i. cnici ℥ii. flor. tanacet. p. ij. ℥r. ℥j. rhabarb. ℥vi. cinamom. ℥ss. sacchar. ℥iv. lumbr. terrestr. ℥ss. M. F. Pulvis.

Pulvis contra Febrem Sennetti.

℥. C. C. f. ustion. ppt. ℥ss. off. d. cerv. ℥ss. terra sigillat. boli armen. an. ℥i. rad. angelic. zedoar. an. ℥ii. tormentill. pentaphyll. herb. acetos. scord. card. bened. an. ℥ss. sem. citri excort. acetos. aquileg. an. ℥i. ocul. & ppt. santal. citrin. an. ℥ss.

Radices per 24. horas macerentur in ✕ scordii, postea exsiccentur & pulverisentur singulæ scorſim. M. F. Pulvis.

Alius probatus.

℥. Calam. aromat. ℥i. rad. gentian. aristol. rot. zingiber. an. ℥ss. salis centaur. minor. card. benedict. absinth. an. ℥iii. C. C. f. Δ. ppt. sem. calendul. camphor. an. ℥i. sacchar. cand. albi, ℥ss. M. F. Pulv. Dos. ℥ss. ad ℥j.

Alius D. 7. Arnisei.

℥. C. C. ppt. ℥i. bezoart. miner. ℥ss. spec. diatr. piper. ℥ii. sal. volat. cran. human. ℥i. zingiber. ℥iii. rad. pyrethr. ℥ii. camph. ℥ss. caryophyll. ℥i. cord. lepor. ust. & pulv. ℥ss. M. F. Pulv.

Pulvis Jesuitarum Memoriz consecratissimus.

℥. Major. salu. beton. meliss. an. ℥i. bacc. laur. sem. peon. excort. meliss. an. ℥ss. ozym. sesel. an. ℥ss. zedoar. cimin. ppt. an. ℥i. cubeb. nucist. macis, caryophyll.

piper. alb. long. nigr. rad. liquir. ras. zingib. alb. ana ℥ij. myrobalan. citrin. indic. an. dr. iss. ibur. mastich. an. ℥ss. sacchar. albiss. ℥ss. M. F. Pulv. subtiliss.

Pulvis pro Fumo.

℥. Benzoin. ℥xxiv. styrac. calamit. ℥vi. ℥iv. santal. citrin. lign. rhod. an. ℥v. laudan. pur. ℥bj. thur. mastich. caryophyll. an. ℥viii. cinamom. ℥vi. flor. rosar. ℥j. M. F. Pulv. grossus.

Alius.

℥. Santal. citrin. ℥j. lign. aloes ℥ss. gummi benzoin. styrac. calamit. a. ℥ij. sandarach. ℥ss. mastich. ibur. a. ℥j. laudan. ℥j. flor. rosar. lavend. spic. indic. anibos. squinanth. a. p. j. bals. Indic. ℥i. M. F. Pulvis.

Pulvis Ptarmicus Reinesii.

℥. Rad. pyrethr. acor. cyclam. a. ℥ss. nicot. dr. ij. agaric. trochisc. ℥ss. major. ℥j. caryophyll. spec. diamb. diamosch. ana ℥ss. castor. mac. ana gr. xv. & anis. dr. j. M. F. Pulv.

Pulvis Diaphoreticus Eiusdem.

℥. Sal. fraxin. dr. ij. spec. confect. de hyacinth. off. de cord. cerv. smaragd. ppt. ana ℥ss. Divid. in 4. part. eq.

Pulvis ad Strumas.

℥. Rad. scrophul. ℥ij. lap. pumic. spong. off. sepie an. ℥ss. agaric. albiss. ℥ss. C. C. usti ℥ij. panacea Holstein. ℥ii. mag. spin. viperar. ℥j. M. F. Pulv.

Pulv. Dentifricius D. J. M.

℥. Rad. ireos florent. ℥ss. sang. dracon. ℥ss. olei lign. rhod. ℥ij. pumic. calcin. & lact. ablut. ℥bj. silic. opt. calcin. ℥vii. M. F. Pulvis.

Pulvis Manualis ejusdem.

℥. Salis Tart. oryz. rad. ireos a. ℥bj. creta ℥ss. benzoin. ℥iv.

Adde residuum amygdalar. misce optimè.

Pulver zu vergulden.

Nimm ein ∇. und solvire so viel ○ darin, als es solviren kan, vwan es kein ○ mehr solviret, als denn schütte auch so viel sal ○ daran als es solviren kan, solche solution giesse klar abe, nimm ein sauber leinen Tuch, stecke das in die solution, dasz es sich einzeucht, hebe es auff, dasz es trocke v wird, jedoch setzet man was drunter, v wenn was abtreißt, das es nicht umkomme, vven solches Tuch trucken, runcke es vvieder ein, und lasz es vvieder trucken v werden, dieses so oft vviederholt, bisz keine solution mehr vorhanden, sondern alle in das Tuch gezogen, v wann das Tuch nun trucken, so brenne es zu Pulver. Mit diesem Pulver kan man alsbald ein Silber vergulden, vvelches beständig bleibet, und die Probe halt.

Pulvis solaris & acidulæ D. Dietrici.

℥. S. O. a. ℥bj. ℥r. ℥j. ℥ii. m. huic mixtura ad de terram sigillatam, vel bolum Armenam, vel silicetufos vel arenam optime siccaturam, vel quod melius existimo, limaturam & vel R. materia mixt. part. j. limaturam & p. ij. inde retorta terrea, & igne aperto vel per arenam, secundum gradus destilla, si vis, irroretur hacta mixtura cum phlegmate O. l. ex O. l. crudo per se per alembicum destillato. In vas recipiens præsappone ∇. frigidam fontanam ad ℥bj. circiter, cui immisce dimidium vel quartam partem phlegmatis O. l. sicque destilla ut non sit. Liquorem exstillantem per M. B. rectifica, quod in fundo manet filtra. Potest iterum materia prior per tubulum in retortam injici & ∇. candenti exturbari.

℞. Butyr. ♂ clarum, huic affunde spir. ☉, & ab-
strahe per XX Cum hoc spiritu abstracto solv. ☉. q. v.

R. Postea solut. hanc Crem. v. gr. ℥ij. & affunde
illi butyri ♂. rectificat. (seorsim in cucurbita aperta in
loco aperto collocata) ℥ij. vel ℥iv. hoc facto, etiam
affunde guttatim spir. ☉. rectif. tantum; ut emineat
ad 2. vel 3. digitos, postea digere per aliquot dies,
deinde in ☉. per alembicum abstrahere, sed non ad om-
nimodam siccitatem; saltem ut materia instar pulvis
flavæ quodammodo siccata remaneat. Huic quod
exstillavit redde, addito novo spiritu nitri ad ℥ij. cir-
citer digere & misce prius cum pistillo parvo ligneo,
post digestionem iterum destilla, hunc laborem re-
pete decies & quater, sic ☉. perfectissimè unitur cum
sua massa, & fit pulvis fixus, à quo spir. vin. rectific.
combur. potes, si vis vel absque hoc calcina in cruci-
bulo, ut residui spir. nitrosi prorsus exhalent, probetur
calcinatio sub tegula. Usus est in omni morbo repen-
tino.

Pulvis antepilepticus Rudolphi II. Imperatoris.

℞. Ambr. ℥j. unicolor. ver. ℥ij. unguis. alc. lapid.
percar. an. ℥i β. corall. albor. subr. an. ℥ij. margar.
pellucid. visc. quercin. an. ℥j. sang. turtur. ℥i β. cord.
ranar. num. iij. unguis. sciur. ℥i β. cornuum scarab. ℥j.
C. C. ℥ij.

Pulveriscentur omnia minutissimè, exhibeatur pro
dosi tantum quantum duabus vicibus cuspidi cultri
capi potest in aq. ceras. nigr. fl. tilia, lilior. convall.
vel fl. betonic. propinetur bis vel ter, sapissimè pro-
batus dicitur.

Alius multoties probatus in Gallia Narbonensi.

℞. Sem. & rad. pæon. dictam. alb. visc. quercin.
an. ℥ij. ras. ebor. marg. præp. an. ℥vi. mosch. optim.
gr. xii. fol. ☉ num. x.

Fiat ex omnibus pulvis subtilis. Dos. est à ℥β. ad ℥j.
cum liquore appropriato.

Alius Dn. Heidleri.

℞. Cinabar. nativ. ℥j. C. C. ust. ℥ij. crud. ℥j. ter-
re sigillat. ℥ij. unicolor. ver. ℥j. sal. perlar. corall. corn.
rhinocer. visc. quercin. an. ℥j. cinamom. acut. croci
Anglic. an. ℥β.

Sacchar. albiss. pro lubitu. M. Fiat pulvis subtilis-
simus, exhibeantur infanti gr. iv. v. hominis profectio-
nis ætatis ad summum gr. xii. in aq. fl. pæoniæ.

Alius illustr. Baron. à Wallenstein.

℞. Talp. mascul. combure,

℞. Hujus pulveris vel salis talpæ ℥j. adde æris so-
laris rubri ℥ij. visc. quercin. ℥i β. mag. corall. ℥β. C.
C. ust. ℥v. M. F. l. a. pulv.

Pulvis Cyprius Comitæ à Solms.

℞. Rad. ireos Florent. ℥vi. cyper. rot. acor. ana
℥j. fant. citre. ℥j. spec. diamb. ℥i β. lign. rhod. ℥i β.
gal. moschat. ℥β. masch. gr. iij. ambr. gr. iv.
M. F. Pulv. subtilissimus.

Alius violato-rosatus.

℞. Rad. ireos florent. ℥iv. flor. violar. recent. ex-
sic. ℥j. rad. cyper. rot. ℥ij. ☉. stillat. rosar. ℥i β.
M. F. Pulvis subtiliss.

Alius moschatus.

℞. Styrac. calamit. ℥v. rad. ireos florent. ℥ij.
flor. rosar. rubr. opt. anthos. an. ℥ij. benzoin. cass.
lign. an. ℥j. ladan. pur. calam. aromat. caryophyll.
sem. coriandr. an. ℥vi. lign. aloes ponderos. fantal.
Citrin. rhodii an. ℥β. cort. aurant. citri. cyper. rot. an.
℥ij. organ. cretic. majoran. an. ℥ij. fol. laur. nu. iij.
flor. lavend. violar. an. ℥i β. mosch. ℥β. ambr. gryf.
℥j. M. F. pulv.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II,

Pulvis cachecticus.

℞. Limat. chalybis puriss. q. v. superaffunde aq.
pluvial. q. s. ut chalybs imbuatur instar pulmenti, ex-
siccari denique finito, iterumque cum nova aqua im-
buc. & hunc laborem toties repete, donec chalybs sit
impalpabilis.

℞. Hujus chalyb. ℥j. cassia lignea ℥ij. sacchar.
alb. ℥ij. M. F. Pulvis.

Pulvis pro collyrio Dn. Andrea.

℞. Tutia præp. sacchar. cand. alb. an. ℥ij. saccor.
coll. marg. præp. an. ℥β. M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis phlegmagogus.

℞. Tartar. ☉ lat. scammon. ☉ an. ℥j. hermo-
dactyl. non carios. turbeth. an. ℥β. clæofacchar. c.
nam. caryophyll. an. ℥ij. M. P. pulv. subtiliss.

Pulvis contra calculum Patr. Capurini
Würzburg.

℞. Rad. apii ℥j. sem. violar. milii ☉. an. ℥ij.
ocul. ☉. ℥j.

M. F. Pulv. quem propinabis in sequent. decocti ℥ij.
℥ij.

℞. Sem. card. bened. ℥ij. & vin. boni mens. j. id-
que ad med. part. consumptioq. Hic pulvis manè ca-
nè capiatur in prædicto decocto, post horam unam,
de hoc decocto iterum haustus sumatur sine pulveris
additione, jejunium servetur usque ad meridiem, Dos.
an. ℥j. ad ℥i β.

Pulvis antepilepticus D. Luje.

℞. Cran. human. præp. ℥i β. pulv. Marchion. rad.
pæon. an. ℥j. cinabar. ℥ij. Stercor. leon. ℥β. unguis.
alc. spod. unicolor. ver. an. ℥j. C. C. igne. ℥ij. fol. ☉.
nu. iv. M. F. Pulv.

℞. Aq. ceras. nigr. ℥ij. flor. tilia, antepilept. Lang.
℥ij. tyr. flor. pæon. ☉ de resc. collect. ℥ij. mixtur.
simpl. ℥j. M. F. aq. cum Pulver.

Pulvis pestilentialis Imperatoris Ferdinandi II.

℞. ☉ cum ☉ r. præp. ℥ij. zingiber. ℥ij. cina-
mom. ℥j. M. F. pulvis. Dos. à ℥ij. ad ℥j. in aq. con-
venienti.

Pulvis ☉. metalla tingens.

℞. Farin. later. ℥iv. sal. usti ℥ij. ☉. calcin. ℥j.
M. cum ☉. puer. q. s. f. massa, quæ exiccetur & gros-
so modo pulverisetur. Cum hoc pulvere camentetur
autum Ungaricum optimum prius in ☉. aliquoties
extinctum, per 9. horas; igne primum moderato, po-
stea fortiori, ita tamen, ne ☉. fluat, postea exim. ☉.
& ablue, deinde

℞. ☉. ita purificat. ℥ij. ☉. marin. purif. ℥β. in-
de in XX. affunde de spiritu balsamico optimè in M. B.
rectificato ℥xx. stent per aliquot horas in calore le-
vi usque dum totum ☉. solutum sit; solutionem inde
in vitrum capax, instilla pedetentim liquorem tartar.
per deliquium ex ☉. tartar. in cella factum, donec nul-
lum fervorem amplius sentieris, postea adde adhuc li-
quoris tartar. purissimi ℥iv. M. optimè, stent ita per
aliquot horas, postea affunde menstruum, & pulve-
rem nigrum in fundo residentem aliquoties cum aqua
pura calida ad consumptionem omnis salsedinis edula-
cora.

Pulvis in expulsionem fetus mortui D. Kraufens.

℞. Borrac. ℥i β. trochisc. de myrrh. ℥j. M. præ-
duabus dosibus.

℞. Aq. puleg. artemis. an. ℥i β. lilior. albor. bor-
ragin. an. ℥j. cinamom. ℥j. M. S. aq. Zum. pulver.

Pulvis alexipharmacus Caroli Ducis Mantua.

℞. Mag. perlar. corall. an. ℥ij. C. C. philos. præp. ℥β.
K k k Rad.

Rad. contrayer. 3v. sem. card. bened. off. de cord. cerv. an. 3. lap. bezoard. 3ß. rasur. corn. rhinoceros. 3ij. fol. ☉. 3ß. M. F. pulvis.

Species pro Epithemate Capitis calidæ D. Salicæ,
Physci Gratiensis in Syria.

4. Aloes epatic. 3j. lign. rhod. cubebæ. myrrh. spec. diamoschi. dulc. an. 3j. croc. 3j. M. Species frigida.

4. Aloesepatic. 3j. spec. diarth. Abbat. lign. rhod. an. 3ß. myrrh. 3j. camph. 3ß. M. F. pulv.

Pulvis Perfumatorius.

4. Mosch. 3ß. ambr. gr. iij. zibeth. gr. x. benzoi. 3ij. styrac. calamith. 3j. lign. aloes. juniper. an. 3iv. iud. florent. 3iv. flor. rosar. spic. lavend. major. an. p. ij. stachad. arabic. 3j. corn. citr. 3iß. M. F. pulv.

Pulvis ad Gonorrhœam ex Anglia.

4. Succin. 3j. rasur. ebor. 3ß. corall. rubr. margarit. an. 3j. lapid. dactyl. 3ß. mastich. 3ß. bol. veræ. terræ sigillat. an. 3j. f. n. tal. rub. cinam. 3ß. terebinth. coct. 3j. M. F. pulv. dos. 3j. ad os.

Pulvis Epilepticus viridis.

4. Fol. beton. hyssop. quinquifol. herb. paral. an. 3j. rad. pæon. bryon. eling. gentian. an. 3j. lign. visc. quercin. corylin. coriand. præp. sem. pæon. excort. an. 3v. 3j. C. C. præp. 3iß. ungu. alc. 3ß. ras. C. C. 3vi. flor. pæon. lil. convall. violar. purpur. tilia. an. 3ß. fol. ☉. num. xii. corall. albor. rubor. margarit. præp. an. 3ij. chamædr. 3ß. Unguim anteriorum pedum mediorum leporis 3j. off. de cord. cerv. nu. viii. ungu. alinia. præp. 3ß. 3ij. 3ij. rasur. cran. human. 3j. M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis vitæ Comitæ de Salburg.

4. Fol. fenn. elect. 3vi. herb. sal. domest. ruta. valerian. an. 3ß. pulmonar. card. bened. agrimon. an. 3j. rad. zedoariæ 3ij. zingiber. 3j. calam. aromat. galang. pimpinell. an. 3ß. liquirit. valerian. an. 3j. sem. carv. petroselin. aneth. an. 3ij. anis. 3ß. fœnic. 3j. eruc. coriandr. præp. rut. an. 3j. nuc. moschat. 3ß. oliban. elect. cubebæ. cinamom. granor. paradisi. macis an. 3j. sacchar. cand. alb. 3iv. 3iß. M. F. pulv. subtiliss.

Alius.

4. Fol. fenn. elect. 3iß. zedoar. sem. carv. petroselin. aneth. an. 3ß. zingiber. caryophyll. nuc. moschat. calam. arom. galang. rad. aron. pimpinell. valerian. herb. sal. hort. ruta. hort. sem. anis. an. 3j. sacchar. albiss. 3iv. M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis Pectoralis.

4. Herb. card. bened. veronic. pimpinell. meliss. sal. pulmonar. an. 3j. rad. liquir. 3ij. enul. 3iß. ieros. florent. 3j. calam. zingiber. an. 3iß. fol. sen. l. st. 3vi. rhabarb. opt. 3ij. cinamom. mac. nuc. moschat. an. 3j. cubeb. cardamom. maj. an. 3ß. pulm. vulp. præp. 3ij. confect. anis. fœnic. an. 3iß. sacch. cand. rubr. 3j. M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis Sternutatorius seu Tabacæ.

4. Tabac. opt. 3ij. major. 3iij. fol. rosar. 3ij. sem. nigell. flor. lavend. lilior. convall. an. 3iß. rad. pyrethr. ellebor. alb. an. 3i. Olei caryophyll. cinamom. an. gut. x. lign. rhod. gut. xx. citr. gut. viii. mosch. ambr. an. gr. vi. cum spir. ros. diss. M. F. pulv. subtiliss.

Alius.

4. Sem. nigell. 3iß. scfel. 3vi. lign. aloes 3iij.

Cass. lign. 3ij. caryophyll. cubebæ. cardamom. sem. carv. anis. fœnic. coriandr. an. 3j. herb. major. 3ij. 3ß. stillat. menth. major. anthos. anis. fœnic. an. gut. vi. mosch. ambr. an. 3ij. Tabac. per se pulveris. ad p. o. vel 3j.

M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis Alexicacus D. Laurentii.

4. Ran. Angelic. ver. serpent. zedoar. succis. pimpinell. gentian. scabios. olsnit. scorzon. imperator. an. 3ij. carlin. diptamn. alb. tormentill. an. 3iij. ostrut. phu. veri. petasitide. vincetoxic. doronic. Roman. enul. campan. galang. pæon. zingib. alb. calam. aromat. an. 3j. fol. ruta. verben. scord. ver. meliss. diptam. cretic. card. bened. sal. menth. chamædr. flor. rosar. rubr. calendul. sambuc. hyperic. an. 3ß. bacc. juniper. laur. cubebæ. nuc. moschat. cortic. citr. an. 3ß. mac. cinam. 3ij. sem. fanton. aurant. citr. ocym. acetos. card. bened. coriandr. præp. an. 3ß. boli armen. præp. 3iij. croci orient. myrrh. elect. an. 3ij. C. C. ust. & præp. succ. albiss. Terr. sigillat. santal. alb. citrin. rubr. unicorn. ver. Been. attritue. Off. de cord. cerv. Fragment. pretios. omnium. corall. rubr. præp. ebor. ust. marg. præp. an. gr. xv. fol. ☉. num. vii. F. l. a. pulv. subtiliss.

Irroretur gutt. aliquot acet. vin. & scord. Nota Radices in ✕ per biduum macerentur & rursus excidentur.

Pulvis Bezoardicus Eiusdem.

4. Ras. dent. elephant. C. C. sine ust. præp. Corall. rubr. præp. hyacinth. præp. margarit. præp. ana 3iij. off. de cord. cerv. rasur. ung. aleis ana 3j. sem. acetos. citri an. 3j. saphir. præp. smatag. præp. an. 3j. carab. albiss. præp. unicorn. ver. lap. bezoart. an. 3ß. ocul. 3ß. præp. 3ß. fol. ☉. num. ix. Manus Christi c. perlis 3j.

M. F. pulvis.

Alius D. Landgraviæ.

4. Rad. Valerian. tormentill. an. 3vi. ostrut. petasitid. an. 3iij. boli armen. ver. terr. sigillat. filic. C. C. præp. an. 3ß. santal. rubr. corall. rubr. rad. pimpinell. diptamn. alb. an. 3ij. fragment. pretios. præp. an. 3j. cort. citr. zedoar. an. 3iß. margarit. præp. matris perlar. præp. an. 3j. fol. aur. argent. an. num. vi.

M. F. pulvis.

Pulvis aureus pretiosus D. Doreri.

4. Margar. præp. 3j. corall. rubr. præp. 3ij. rad. pæon. 3j. visc. quercin. ungu. aleis an. 3j. C. C. ust. præp. 3ß. ras. C. C. 3ij. croc. 3iij. sacchar. cand. 3j. fol. ☉. num. xxiv.

M. F. pulvis subtiliss.

Pulvis contra Calculum Eiusdem.

4. Saxifrag. sem. apii. milii. mandib. lucii pilicis. nucl. mepil. an. 3ß. sem. petroselin. cicer. rubr. an. 3vi. liquirit. 3j. cinamom. 3vi. ocul. 3ß. 3ij. sacchar. 3viii.

M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis contra Colicam Eiusdem.

4. Spec. diacymin. 3ij. diagalang. 3j. pulv. co. stor. 3ij. cort. aurant. 3iij.

M. F. pulvis.

Pulvis contra Dysenteriam Eiusdem.

4. Pulv. cydon. drach. vi. corall. rubr. terr. sigillat. bol. armen. sem. plantag. coriandr. C. C. ust. & præp.

præp. chalyb. spodii, mac. an. 3 ij. sem. apii, carab. cymin. torrefact. an. 3 β. menth. 3 iij.
M. F. pulv. subtil.

Pulvis contra Epilepsiam Eiusdem.

℞. Fol. betonic. hyssop. quinquefol. primul. ver. an. 3 iij. rad. bryon. pæon. eryng. gentian. an. 3 ij. ling. vic. quercin. corylin. sem. coriand. præp. pæon. excort. an. 3 j. 3 ij. 3 iij. C. C. ust. præp. 3 ivβ. unguis. alcis 3 j. ratur. C. C. 3 i β. flor. pæon. lilior. convall. viol. tiliæ an. 3 j fol. ① num. xxiv. corall. albor. rubr. margarit. an. 3 β. chamædr. 3 ij. genic. lepor. 3 β. coagul. hæd. 3 i β. off. de cord. cervi. num. xv. sanguin. agni alb. præp. 3 j. unguis. an. 3 v. 3 j. ratur. cran. human. 3 i β.
M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis partum provocans Eiusdem.

℞. Myrrh gr. iv. fabia. 3 β. borrac. gr. v. cinamom. 3 j. castor. gr. ij.
M. F. pulv. subtiliss.

Pulvis Dentifricius rubeus D. Belzeri.

℞. Pulv. lap. silic. calcinat. & cum acet. vin. ablut. lapid. p. rcar. an. 3 β. cor. ll. albor. 3 ij. rubror. 3 iij. margarit. 3 β. rad. iræos 3 β. q. mastich. 3 i β. flor. ros. alb. 3 ij. molch. Alexandr. ver. gr. vii.
Irrorantur cum infus. santal. rubr. & exsic.

Pulvis pro fumo tempore Pestis Dom. Leuschneri.

℞. Summit. absinth. M. v. fol. quercin. M. vi. dip-tamin. Cretic. M. iβ. rutæ M. ij. meliss. 3 j. bacc. laur. juniper. an. 3 j. succia. 3 ij. cort. citr. 3 i β. ros. rubr. M. j. thur. 3 j. camphor. 3 j.
Incis. crassiusc. servetur pro usu.

Pulvis pro fumo ædium infectatum Dom. Moehringi.

℞. Bacc. juniper. M. iv. corn. hirc. raspat. pilor. de cor. hi ci, cort. exte. betul. baccar. laur. an. M. ij. rut. scord. ranacet. rosar. rubr. absinth. fol. quercus. an. Man. iβ. rad. angelic. valerian. aristoloch. long. ostrur. an. 3 j.
Concidantur crasso modo.

Pulvis pro fumo cum vitriolo tempore pestis.

℞. Myrrh 3 iij. bacc. juniper. 3 j. laur. ① l. commun. 3 xvi. alui. crud. 3 i β. fol. rut. M. vi.
F. Pulv. gros. modo.

Pulvis Pretiosus D. Brenneri.

℞. Margarit. præp. 3 iij. C. C. præp. 3 ij. off. de cord. cerv. num. iv. santal. citrin. 3 j. fol. ①. nu. iv.
M. F. pulvis.

Pulvis Resumptivus. L. Beieri.

℞. Pinear. 3 ij. amygd. dulc. pistac. an. 3 j. semina. 4. fr. g. major. excort. an. 3 i β. cydon. malv. lactuc. portulac. endiv. an. 3 i β. papav. alb. an. 3 i β. tra-gacanth. gum. arabic. an. 3 j. ipod. præp. 3 iv. mar-garit. præp. 3 j. C. C. ust. præp. corall. rubr. præp. an. 3 β. limat. ch. lyb. præp. 3 β. liquirit. 3 iv. pulmon. vulp. præp. spec. diatr. gac. frig. diatrion. santal. dia-rhoid. elect. resumpt. an. 3 v. diamarg. frigid. diatr-rhod. Abbat. an. 3 j. sacchar. cand. albi. penid. ana 3 vi. fol. ①. num. vi.
M. F. Pulv.

Pulvis contra Vertiginem viridis.

℞. Sem. coriandr. præp. fœnic. anis. nigell. herb. menth. serpill. nuc. moschat. cubebat. cinamom. ze-
vlianger. Bibl. Pharm. Tom. LI.

doar. galang. macer. liquit. granor. paradisi. maj. ca-ryophyll. an. 3 j. sacchar. alb. 3 ix.
M. F. Pulv.

Pulveres varii, seu species ex Hadriano à MYNSICHT.

Pulvis Bezoardicus.

℞. Corn. cervi & Alcis Spagyricè calcinator. terra sigillata an. 3 i β. lap. bezoar. or. di-phoret. mineral. be-zoart. jovial. an. 3 ij. mag. perlurum or. corallor. rub. succini alb. præp. an. 3 β. unicorn. solaris animalis off. de corde cervi ana 3 j. galla moschat. vera gr. xi. ol. cina-momi citri ana 3 β.

Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

In omnibus Epidemicis & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis, nec no. in Asthmate vel periculosissimis Pectoris angustis, arcanum est: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia nexia per sudorem expellunt, ejusque vitis mirè opitulantur. Dosis à 3 β. ad 3 j. in aq. Card. Bened. ict. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

Pulvis Bezoarticus Imperialis.

℞. Corn. alci & cervi spagyricè calcinatorum ana 3 ij. boli rub. or. præp. bezoart. jovial. an. 3 ij. lap. be-zoart. jovial. an. 3 ij. lap. bezoar. or. terra sigillat. an. 3 i β. flor. sulphur. comp. unicorn. animal. an. 3 j. mag. perlur. or. corallor. rub. ana 3 β. cinnab. nativ. præp. off. de corde cervi, succini alb. præp. ana 3 j.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

In omnibus morbis peracutis. Febribus ardentibus, malignis & Epidemicis, &c. Diaphoreticum insignis est. Omnes enim venenosos & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egre-gie pellit. Dosis à 3 β. ad 3 j. in appropriatis sudori-ficis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu cervi.

Spec. Dialungæ.

℞. Rad. & Sem. Pæonia debito tempore collect. corn. alci spagyricè calcinat. mag. crani ana 3 β. anima Luna vera in form. pulv. bezoart. lunaris ana 3 iv. cir. nab. nativ. præp. visci quercini squilla præp. ana 3 ij. secundina exsic. mulieris primipara filium enixe, stercorei pavo. is præp. ana 3 i β. sal. perlurum orient. corallorum rub. ana 3 j. castorei veri piperis longi cubebat. ana 3 j. moschi laudatiss. ambre gris. an. 3 β.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde:
Ol. cornu cervi rectif. succini albi, nuc. moschat. ruta, ana 3 β.

Denuò misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Miraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, congelatis, ma-lisque cerebri frigidis conferunt, & illis quibus tu-multuosa insomnia obversantur & incertis timoribus corripuntur, succurrunt. Dosis in curatione à 3 j. ad 3 β. in aq. Epileptica seu Apoplectica nostra vel alia conveniente, in ipso paroxysmo. In præservatione autem datur in omnibus lunæ quadratibus & in humida & minus constanti aëris tempestate à 3 β. ad 3 j. in aquis supra dictis.

Pulvis Epilepticus Mirabilis.

℞. Cranei hominis strangulati & sine igne calcinat. 3 j. visci quercini, cinnabaris factis. ung. alci. an. 3 β.

K k k 2 Misc

Misce & fiat Pulvis, cujus \mathfrak{D} β . pueris statim post paroxysmum datur, adultis verò \mathfrak{D} j. iteretur, certissime liberat.

Pulvis Ophthalmicus.

\mathfrak{L} . Sacchari cand. alb. tutia præp. an. \mathfrak{Z} ij. margarita præp. sarcocolla an. \mathfrak{Z} β . fabarum marin. præp. \mathfrak{D} j. Misc. & fiat pulvis ocularis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mihi valde secretus est: Imprimis autem habetibus oculis & eorum maculis medetur, nubeculas detergit, nec non aquam ed defluentem absorbit. Visum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conservat. Tempore autem usus, exigua pars hujus pulveris ex canaliculo penne in oculos manè & vesperi instillatur, vel collyriis admiscetur.

Spec. Diamartis.

\mathfrak{L} . Rad. Tormentilla nuc. moschata, gallar. Turc. ana \mathfrak{Z} β . mag. corallorum, rub. berberisac. nost. croci hamatis. croci martis per calcinat. fact. ana \mathfrak{Z} ij. zedoaria electa, calami aromatici, succini alb. præp. quinque folii radic. caryophyllorum ana \mathfrak{Z} ij. ciner. spongia, boli rub. or. præp. terra sigillata acacia ana \mathfrak{Z} i β . sem. plantaginis, anthera, rosarum ana \mathfrak{D} ij. corn. cervi, & off. microcosmi hermetice calcinator. ana \mathfrak{Z} j. aluminis plumosi calcinat. anima vitrioli ana \mathfrak{Z} β .

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Stomachi molliem corrigunt; & Dysentericis, Cœliacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhææ, Hæmorrhoidibus, urinæ incontinentiæ lotioque cruento medentur. Fœminarum menstruam purgationem perfectissime morantur & inhibent. Hæmorrhagiam variam & sanguinem denique undecunque emanantem, sistunt & supprimunt. Dosis à \mathfrak{D} j. à \mathfrak{Z} β . ad \mathfrak{Z} j. in convenienti liquore.

Spec. Diamercurii.

\mathfrak{L} . Sem. cina opt. \mathfrak{Z} xlii. mercurii dulcis \mathfrak{Z} v. rhabarb. elect. rad. turbit. gum. corallina ana \mathfrak{Z} ij. ras. cornu cervi, myrrha rub. ana \mathfrak{Z} j. sum. centaurii min. tanacetii camphora vera ana \mathfrak{D} j. ol. lig. avellan. per descensum distillat. sp. vitrioli opt. an. \mathfrak{D} β .

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Exhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus lumbis decremente à \mathfrak{D} j. ad \mathfrak{Z} β . & \mathfrak{Z} j. pro ætatis ratione in lacte, quod unà cum pulvere sume, tum illis, non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maxime pestis est: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, adversus omne genus Vermium. Offeritur etiam in aq. Absinthii, Centaurii min. Tanacetii, Urticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citti, Hydromelle, aut in alia quavis materia, qua pueri magis delectantur.

Spec. Diajovis.

\mathfrak{L} . Fecul. rad. bryonia \mathfrak{Z} β . sal. jovis, Anglici, matris perlar. corallor. rubi ana \mathfrak{Z} ij. rad. dictamn. alb. pœonia ana \mathfrak{Z} ij. succini albi præp. croci orientalis visci quercini antophyllor. an. \mathfrak{Z} j. castorei veri \mathfrak{D} j.

Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

In vehementissima & desperatissima suffocatione & strangulatione Uteri medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cœlitus demis-

sam: Non enim sine admiratione hunc atroceissimum affectum tollit. Pro quo divino auxilio nomen Domini fit benedictum. Dosis à \mathfrak{D} j. ad \mathfrak{Z} β . tribus aut quatuor auroris continuis vel tempore necessitatis in aq. Hysterica nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

Spec. Diaveneris.

\mathfrak{L} . Sulph. vitrioli Veneris sublimati & spagyricæ præparat. \mathfrak{Z} β . boracis venet. \mathfrak{Z} ij. sem. lingua avis eruce ana \mathfrak{Z} ij. Pastinacæ, urtica, Porri ana \mathfrak{Z} i β . rad. pyrethri Piperis albi, boleti cervini ana \mathfrak{D} iv. galangæ min. zingiberis alb. cinamomi ana \mathfrak{Z} j. Scinc. marin. præp. mag. perlarum or. croci orient. ana \mathfrak{Z} β . cantharid. abscessis gelis & aliis tenuioribus ambra grisea ana \mathfrak{D} j. moschi optimi ol. mæcis ana \mathfrak{D} β .

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, cui Sacchari candi albi \mathfrak{Z} j. immisce, & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Contra actus veneri defectum efficacissimum, immò omnium validissimum & extremum experimentum est: Propterea qui amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cenam, vel si statim effectum querit, cundo cubitum, aut si successive operari debet, manè à \mathfrak{D} j. ad \mathfrak{D} ij. & \mathfrak{Z} j. in lacte tepido vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

Spec. Diasaturni.

\mathfrak{L} . Mag. saturni \mathfrak{Z} j. suc. glycyrrhiz. purgat. lact. sulphuris comp. rad. china elect. ana \mathfrak{Z} ij. sal. margar. orient. corallorum rubeorum panis triticeus ana \mathfrak{Z} ij. boli rub. orient. præp. benzoin. sublimati, olibani ana \mathfrak{Z} j. croci orientalis, cassia lignea ana \mathfrak{Z} β .

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde Sacchari candi albi \mathfrak{Z} ij. & pulverem & bene mixtum ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Nescio, quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam! Phthisis enim, quæ alias humana manu curari non potest, curatur, sæpe hac Medicina. Dosis manè, & vesperi à \mathfrak{Z} β . ad \mathfrak{Z} j. in aq. nostra specificâ contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

Spec. Diasulphuris.

\mathfrak{L} . Lact. & flor. sulphuris comp. ana \mathfrak{Z} i β . suc. glycyrrhiz. purgat. cardamomi min. terra sigillat. ana \mathfrak{Z} j. sem. urtica rom. cydoneorum, cinamomi acut. zingiberis albi, nuc. moschata, croci orientalis. piperis longi. macis ana \mathfrak{Z} ij. tragacanth. alb. rad. treos florent. flor. papav. errat. mastichis electi, crem. tartari an. \mathfrak{Z} i β .

Misc. & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fenniculi, Salviz, Anisi, Chamomillæ Rom. ana \mathfrak{D} j. & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

Tussi diuturnæ, difficultati Spirit. & Asthmatis chronico succurrunt. Humores in pectore diversos & crassos incidunt & extenuant. Præservant & curant ab omni alia Medicina Phthisin, Atiduram, Pleuritidem, omnesque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque jacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exticcant fluxus capitis, & parvos humores in corpore existentes, & equivoce Podagra, Ischiada, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsia, Apoplexia, Lepa, & Venerea, Convulsione nervorum, Colica Hydropice. Dosis à \mathfrak{D} j. & \mathfrak{Z} β . ad \mathfrak{Z} j. manè & vesperi in vehiculis convenienti. In Hydropice autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore prius evacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis utimur in forma

Tragacanthæ

Trageæ, addito Saccharo cando albo, vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in forma Electuarii seu Lambicivi.

Pulvis Refectivus.

℞. Sacchari candi in syr. violar. concreti ℥j. lact. sulphuris ℥ss. flor. sulphuris comp. conf. alhermes an. ℥ij. mag. perlar. orient. corallor. rub. saturni an. ℥j. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exsiccat. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma, Phthisin & Tabem curat. Dosis ℥j. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel alia specifica. Vel miscetur tantum pulveris, ut vehiculum quod si albicante colore tingatur; de quo liquore mixto, Dosis manet & vesperi cochl. j. vel duo.

Pulvis excellens contra Tussim infantum.

℞. Sacchari penidii ℥ij. spec. diatrageant. frig. diareos simpl. an. ℥ss. rad. peonia ℥ij. suc. glycyrrhiz. ext. ℥j. lact. sulphuris, croci orient. an. ℥ij. cranii humani s. igne calc. sem. papaveris alb. an. ℥j.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Spec. Diavitrioli.

℞. Galange min. ℥j. mag. vitrioli, rad. acori aquat. an. ℥ss. piperis longi, sem. ameos, zedoaria an. ℥ij. cinamomi acut. calami aromat. macis an. ℥j. cardamomi min. zingiberis, albi caryophyllorum an. ℥j. croci orient. spice indic. lig. aloes an. ℥ss. moschi laudatiss. ambra gris. an. ℥ss.

Misc. & f. pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Est Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus ejus: Ob id phlegma digerunt. Digestionem & concoctionem juvant. Nauseam & vomitum sedant. Calorem naturalem conservant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidus ructus compescunt. Exsolutis & Jecinerosis auxiliantur. Convalescentibus ac è diuturno morbo emergentibus profunt. Fœtorem oris & nasi, qui per consensum à Stomacho oritur, emendant & gigni prohibent. Dosis à ℥j. & ℥ss. vel addito Saccharo fiat Tragea. Nota: Hæ & aliæ compositiones, Moschum in nimia quantitate recipientes, possunt etiam sine eodem parari.

Spec. Diacinnabaris.

℞. Cinnabaris nativ. præp. ℥ss. lap. stellaris præp. corn. albis, spagyricè calc. an. ℥ij. ras. cranii partis ant. visci quercini an. dr. ij. rad. & sem. peonia an. dr. i. ss. spec. diamoschi dulc. diambra an. dr. j. mag. perlarum orient. corallorum rub. ana dr. ss. croci orientalis, ol. succin. albi ana ℥j. fol. auri num. xiii.

Misc. & fiat omnium pulvis.

Vires, Usus, Dosis.

Miram vim & efficaciam habent in Epilepsia & omnibus morborum capitis periculorum generibus, suntque tam certissimum, quam secretissimum experimentum, quò Deo aspirante innumeros ceterorum Medicinæ incurabiles hætenus quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. immò 18. pluresque annos tali abominabili affectu laborantes, puerinæ sanitati perfectè feliciterque restitimus. Dosis in curatione à ℥j. ad dr. ss. & ℥ij. plus minusve pro ætatis & vitium patientis discrimine in vehiculis appropriatis & specificis omnique manet reiterandis, usque dum integram consequatur sanitatem.

Spec. Dianitri.

℞. Cryst. Nitri cum sp. vini & vitrioli præp. ℥j. sal. lap. percarum pisc. oculor. cancri, succini alb. dr. ij. rad. filipendula. glycyrrhiz. an. dr. i. ss. sem. urtica min. lappa major. saxifragia, milii solis genista an. dr. j. bac. lauri extort. juniperi an. dr. iv. cinamomi acut. zingib. albi, croci orient.

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

piperis long. macis an. ℥ij. leporis combusti sang. hircini præp. pul. ceterach. santali rub. an. ℥ss. millepedum. præp. ℥j. sacchari albiss. ℥ij.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

In frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dosis à ℥j. ad ℥ss. summo manet in vehiculis specificis.

Spec. Diarattari.

℞. Tartari vitriolati mag. scammonii an. ℥ij. turbit. albi & gum. hermodact. albor. an. ℥ss. ol. caryophyllorum cinamomi an. ℥ss.

Misc. & f. pulvis, quam ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

In universo corpore tartarum coagulatum decenter resolvunt, resolutumque cum omnibus defluxionibus podagricis, securè & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flavam bilem & pituitam copiosè deturbant. Aqua intereunte laborantibus masticè conferunt. Cutis etiam fœditatem Scabiem, Leporam, ceterasque ejus generis sordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & juncturarum dolores mitigant. Dosis à ℥ss. ad ℥j. præsertim in robustioribus.

Spec. Diacrystalli.

℞. Carnis mammillarum vacca pinguis ruffa, juvenentula, in vino cocta & in furno exsiccata, ℥j. piperis longi ℥j. crystallorum præp. ℥ss. margaritar. præp. ℥ij. sem. borraginis, fœniculi, lactuca, nigella an. ℥j. rad. hirci barbula, carni lactei, rapunculi, an. ℥ss. sacchari albissimi ℥ij.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Matrum & nutricum lactantium medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò augent ac emendant, ut omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Propterea ad lactis ubertatem præstandum secretum est. Dosis à ℥j. manet, meridie & vesperi, in cibo, jusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis convenientibus vehiculis.

Spec. Diasuccini.

℞. Succini albi præp. ℥ss. mag. corallorum rub. rosat. nuc. moschat. tost. boli rub. oriental. sinaragd. præp. an. ℥ij. croci martis per reverberationem fact. sang. draconis an. ℥ss. styracis calamita, cornu cervi ust. præp. laudani opiat. an. ℥j. anthera, rosarum sem. plantaginis flor. papav. errat. ana ℥ss. caryophyllorum croci orient. cinamomi macis an. ℥j.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Viscosos & tartareos Sales, intestina erodentes, & alvi fluorem sollicitantes, compescunt & obtundunt. Hinc omnibus Dysenterii sanguinisque profluvii maxime medentur. Dosis à ℥j. ad ℥j. in vehiculis appropriatis.

Spec. Diacretæ.

℞. Creta alba cum aq. rosat. præp. ℥ij. nuc. moschat. ℥j. rad. glycyrrhiz. sem. cydoneorum an. ℥j. boli rub. orient. præp. an. ℥ss. lap. carpinis cum aq. plantag. præp. macis parum tosti, mastichis electi. croci orient. an. ℥j. sacchari albiss. ℥ij.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Catholicon est in ore seu ardore ventriculi: Hæ enim species hanc dynamin habent, ut adversentur ebullitioni flavæ bilis & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resolvunt & præcipitant. Dosis à ℥ss. ad ℥j. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunque orexis urit, tamdiu donec cesset.

Kkk 3 Spec

Spec. Diaborracis.

℞. Borracis Veret. ʒ℞. cassie lignea, croci orient. ana ʒj. ras. lig. sabina, succini alb. præp. an. ʒ℞. off. de corde cervi, visci quercini, flor. cheiri an. ʒj.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Mulieribus quæ nequeunt parere; seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offeruntur: Ad partum enim faciendum, secundinas tetentas & foetum mortuum ejiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à ʒj. ad ʒij. & ʒj. in aq. Cinamomi, vel flor. Cheiri, vel Artemisæ, seu in vino albo generoso.

Spec. Diaterebinthinæ.

℞. Terebinthina in aq. citri bis tota ʒij. mag. scammonii ʒj. turbit. alb. ʒ gum. ʒvj. tartari vitriolati, hermodact. alb. an. ʒij. spec. lithontript. ʒij. croci orient. macis an. ʒj. sacchari violat. tabulat. ʒiv.

Misc. & fiat omnium pulvis, cui adde Ol. Anisi, Aurantior. Caryophyllor. Cinamomi, Fœniculi, ana ʒ℞. Denuo misce, & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

In Arthritide, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum & Vesicæ calculo, aliisque meatuum urinæ vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à ʒ℞. ad ʒij. in jure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisia, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Juniperi.

Spec. Diamuniæ.

℞. Mumia transmarina, mag. lap. percar. an. ʒij. sang. hircini præp. caryophyllorum, spermat. ceti ana ʒij. rad. rubie tinct. birundinaria, tormentilla ana ʒj. succini albi præp. sal. corallor. rub. boli rub. or. an. ʒ℞.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Hæ species valdè mirabiles sunt ad casum: Sanguinem enim coagulatum dissolvunt. Præcipitatos ruptos, contusos & fractos juvant; vulneraque interna glutinant, & prohibent apostemata ex casu ab alto. Dosis à ʒj. ad ʒj. in aq. Chærefolii, vino generoso, vel in aceto vini.

Pulvis Stipticus, ejusdem ferè efficaciz.

℞. Rad. birundinaria ʒj. rhabarburi electi, mumia transm. an. ʒ℞. lacca rub. spec. ceti an. ʒij. boli armen. præp. terra sigillat. an. ʒj.

Misc. & fiat pulvis. Dosis eadem.

Alius Pulvis Stipticus valde efficax.

Sper. ceti ʒj. terra sigillat. ʒ℞. bol. armen. sang. dracon. lap. hamatit. an. ʒij. Oc. canceri præp. ʒj. rad. angelica odorat. rhaponic. rhabar. elect. an. ʒ℞.

Misc. & f. pulvis. Cujus Dosis est ʒ℞. in vino calido, expectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

Spec. Diaolibani.

℞. Rad. paonia debite collect. ireos florent. an. ʒij. olibani optimi ʒij. corn. alcis f. igne calc. mag. crani microcosmi, croci orient. visci quercini, an. ʒj. sacchari pendii ʒij.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

In metu Epileptæ. Apoplexiæ, Catarrhi suffocativi; Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo & periculoso aliquo accidente, infantibus & pueris offeruntur. Cerebrum enim & Cor confortant, ab illisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à ʒ℞. ad ʒj. per se vel in lacte materno, aut alio conveniente liquore.

Spec. Diatabaci.

℞. Tabac. Ind. cum ol. anisi præp. ʒ℞. rad. hellebori alb. lilior. convall. pyrethri an. ʒ℞. gran. paonia mar. flor. lavendula, rorismarini, majorana, origani ana ʒj. piperis longi gum. Peruviani, agarici trochisc. gallia mosch. an. ʒ℞.

Vires, Usus, Dosis.

De his speciebus parum per nares attrahitur; tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsia, narium exitura & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa quam putrida copiosè educunt, cerebroque robur reddunt. Dosis manè Stomacho jejunio quantitas unius ciceris, quæ naribus attrahatur.

Spec. Diamajoranæ.

℞. Flor. liliorum convall. ʒ℞. herb. majorana cum proprio oleo prius irrorat. ʒij. lig. aloes ponderos. ʒj. cubebarum opt. ʒj. ambra grisea ʒ℞.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

In omnibus morbis & affectibus, ubi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè utimur: Supra modum enim rotum Caput à crassis & pituitosis humoribus liberant, cerebrumque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurora Pili magnitudo naribus attrahenda.

Spec. Diabalaustia.

℞. Balaustiarum ʒvj. rad. caryophyllata, cyperi rotund. mastichis elect. terra sigillat. caryophyllorum, sandaraca, cort. citri, rorismarini ʒ℞. corallorum præp. succini albi, flor. paonia, rosarum rub. olibani ana ʒij. nuc. moschata sem. myrsinor. coriand. præp. santali citrin. lig. saffras. cubebarum an. ʒij.

Misc. & fiat pulvis, futuræ coronali inspergendus.

Vires, Usus, Dosis.

In Phibisi, Hæctica, Febribus aridis & dolore capitis, purgato alvo, ad sistendum, exsiccandum catarrhos & confortandum cerebrum, turæ capitis summo vertici, vel in loco suturæ coronalis noctu ante somnum insperguntur. In causa autem frigida & humida caput prius inunge opt. Spir. Vini salviatæ, & postea insperge pulverem, & mira videbis: Quia impediunt descensum aquositate à cerebro ad nares, oculos & subjectas partes.

Spec. Diabuglossæ.

℞. Corn. rad. buglossæ ʒj. eleosach. citri ʒ℞. rosarum rub. exsic. santali citrin. lign. aloes ana ʒij. mag. Periarum or. corallorum rub. an. ʒj. off. de corde cervi, croci or. præp. an. ʒ℞. gallia moschat. vera, auri porab. nost. spica indic. an. ʒj. ol. rosarum veri, cinamomi an. ʒ℞. man. Christi simpl. ʒij.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Summa est medicina, ubi aliquis quasi ad desperationem ex nimia tristitia venit: Propterea valdè efficax est contra affectus melancholicos, cardiacos &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant confortant nec non Cordis tremorem & syncopen emendant. Malas cogitationes compefcunt. Solitarios juvant. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Dosis à ʒj. ad ʒ℞. & ʒj.

Spec. Diaplanginis.

℞. Suc. glycyrrhiz. ext. terra sigillata an. ʒj. rad. plantaginis serpentariae tormentill. an. ʒvj. mag. croci maris per reverberationem fact. corn. cervi ussi & præp. cort. granator. an. ʒ℞. lap. hamatit. nuc. moschata, star. cort. aurant. caryophyllorum an. ʒij. fol. salvia acut. visci quercini, balaustior. an. ʒij. mag. corall. berberisati nost. sem. plantaginis, priapi cervi an. ʒij. pellic. inter. ventriculor. galli-

nar. præp. sang. draconis, hypocist.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus & exsuentibus, nec non mulierculis urinæ incontinentia post partum correptis miraculosè auxiliantur. Dysentericis, Celiacis, Menstruis superfluis, Intestinorum, Renum, Vesicæ fistulæque urinariæ exulcerationibus mirè subveniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt. Dosis à ʒss. ad ʒj. manè stomacho jejuno, vel ante prandium & cenam, cum uncis duabus vel tribus liq. Stil. plantaginis.

Pulvis Polychrestus Imperialis.

℞. Sacchari candi alb. ʒvj. croci maris cum aceto tamariindor. præp. ʒiβ. sem. feniculi, ros. boru, ca. i. leporin. oc. luciorum, cardamom. min. zingiber. alb. nuc. moschat. rad. glycyrrhiz. an. ʒj. cinamomi acut. cubebæ, cassia lignea, spica nardi, rad. & sem. pæonia, visci quercin. acidi tartari. ʒiβ. mag. lap. carphonum, oc. cancror. lap. percar. pisc. croci orient. sem. petroselin. apii, castorei veri, caryophyllorum, myrrha rub. lig. aloes, herb. hyssopi, ol. anisi an. ʒij. mag. perlar. or. corallor. rub. macis elect. an. ʒj. fol. auri Ung. num. xxxij.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Ex Stomacho & intestinis flatu, ventositates omnesque peccantes humores expellit, illumque confortat, & à putredine præservat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepsia Tremore & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asthmate, &c. multum præstat. Mœrores mulcet. Tristes exhilarat. Timidos animat, Hepati & Lienis obstructiones referat. Tympanitem, à causa frigida ortam, & multos alios morbos longos & obstrictos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Vividum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Uteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Vesicam purgat. Calculos, arenulas & saburram efficit. Meatus aperit, & Stranguariæ auxiliatur. Dosis omni manè, Castaneæ quantitas per se, vel in liquore appropriato motum propriè respiciente.

Pulvis Dysentericus.

℞. Corn. cervi spagyricæ calc. ʒiβ. sem. sanguinaria, plantaginis an. ʒj. creta alb. præp. nuc. moschat. visci quercin. niri præp. an. ʒβ.

Misce & fiat pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valdè efficax est. Dosis ʒj. in vehiculis appropriatis & specificis.

Spec. Dialauri.

℞. Bac. lauri, massâ panis circumducti & in libano debite excoct. exsiccat. & pulverisat. ʒj. flor. centaur. min. ʒij. rubia tinctor. myrrha rub. croci or. aristoloch. rot. cardamom. min. an. ʒj. sal. cinamomi, sabina an. ʒβ.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Obstructiones in utero egregiè apertiant, nec non suppressos menses mirificè cient ac largiter movent. Dosis à ʒss. ad ʒj. in decoct. Sabinæ cum croco or. aut vino vel cerevisia bis de die, manè jejuno ventriculo, vel vespere ante ingressum lecti, hocque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

Spec. Dialappæ.

℞. Rad. jalappæ ops. & resinosa ʒijβ. acidi tartari ʒxj. ol. cinamomi ʒj.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Pet inferiora sine molestia purgant, & sanguinem mundificant. Pituitam ipsam atramque bilem, flatus

ceterasque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt. Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prosunt. Dosis à ʒss. ad ʒij. & ʒj. præsertim in robustioribus.

Spec. Diaculæ.

℞. Rad. esulæ min. præp. rot. diarrhod. abb. an. ʒiβ. hellebori alb. præp. an. ʒij. suc. glycyrrhiz. ext. santali rub. an. ʒj. cinamomi acut. ireos florent. zingib. alb. an. ʒij. mag. perlarum orient. corallor. rub. an. ʒj. elæosach. caryophyllor. nuc. moschat. mastichis an. ʒβ.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Valent in omnibus Febris quotidianis, tertianis ardentibus, omnisque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus salis, lumbricis, doloribus doli, Synovia, Peste, morbis epidemicis, Venenorum haustorum symptomatibus, per alvum enim & superiora noxia quæque, sine molestia, expurgant. Dosis à ʒss. ad ʒj.

Spec. Stomachicæ.

℞. Acidi tartari ʒij. galang. min. zingiberis alb. pipæris long. an. ʒiβ. cardamom. min. nucis moschat. caryophyllorum, zedoaria an. ʒj. rad. glycyrrhiz. ras. fol. salvia acut. sem. ruta, carvi, olibani an. ʒβ. ol. cinamomi ʒj. menta crisp. aurantior. anisi an. ʒβ. sacchari candi alb. ʒviij.

Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Collapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones & singultus sanant. Asthmaticos juvant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculorum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè & vespere à ʒss. ad ʒj. ex vino malvatico vel alio generoso.

Pulvis Stomachicus nobilis.

℞. Cremoris tartari albiss. & spir. virioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati ʒij. corn. cervi, spagyricæ calc. ʒβ. sal. lap. percar. pisc. oculor. cancri an. ʒij. mag. perlar. orient. corallor. rub. an. ʒj. ol. caryophyllorum cinamomi an. ʒβ. sacchari candi alb. ʒviij.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Uti nobilis est, ita quoque Cor, ventriculorum & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem & molliem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis cibumque vomitibus summo pere succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Dosis à ʒss. ad ʒj. in vehiculo appropriato.

Spec. Pleuriticæ.

℞. Sulphuris sublimati ʒij. sem. card. maria, bac. lauri excort. visci quercin. rad. zedoaria, olibani an. ʒiβ. ras. dentis verris aprugni dent. lucii acut. flor. papav. errat. ana ʒj.

Misce, & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Magnum secretum est contra dolores pleuriticos, sive puncturas laterum, ubi præ vehementia ægotantes ferè examinantur. Dosis à ʒss. ad ʒj. in aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. papav. errat. manè, meridie & vespere, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ &c. Deo favente, certissimè liberant.

Pulvis Pleuriticus secretissimus.

℞. Flor. sulphuris comp. ʒss. ras. dentis. Verris aprugni, mand. luciorum an. ʒij. flor. papaveris rhad. ʒj.

Misc. & f. pulvis subtilissimus. qui usui reponendus.

K k k 4 Vires

Vires, Usus, Dosis.

Curat, non sine adstantium stupore, pleuritidem, omnes putrefactiones, Apostemata, &c. Dosis à 3ß. ad 3j. cum aq. è flor. chamom. & Papav. errat. ana f. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic solus hautus saccharo cand. alb. parum edulcoratus & aliquot vicibus exhibitus admirabile prædium est; quo sapissimè ipse sum usus, & semper post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus.

Spec. Febrifugæ.

℥. Cochlear. long. restar. præp. corn. alcis. f. igne calc. ana 3j. sal. centaurii min. card. benedict. absinthii an. 3ß. tartari vitriolati. mag. vitrioli ana 3ij. calami aromar. nuc. moschat. an. 3iß. sem. hyperici, caryophyllorum, piperis longi, camphora ana 3j. rad. tormentilla, aristoloch. rot. zedoaria, ostrucii ana 3ß.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Abigunt ferè omnes Febres, præcipuè autem quotidianam, tertianam, & sæpe quartanam curant. Dantur instante paroxysmo vel paulò ante in aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in haustu cerevitiæ calidæ: Sed patiens in lecto se contineat & sudet. Dosis à 3j. ad 3j. habità ratione virium sumentis.

Pulvis Febrilis probatus.

℥. Calami aromar. 3j. rad. gentiana, aristoloch. rot. zingib. alb. an. 3ß. sal. centaur. min. card. bened. absinthii ana 3ij. corn. cervi f. ign. calc. sem. calendula, camphora ana 3j. sacchari cand. alb. 3iß.

Misc. & f. pulvis subtilissimus, dosis à 3ß. ad 3j. in vehiculis appropriatis & specificis.

Spec. Nephriticæ.

℥. Cryst. tartari 3j. mag. lap. percar. pisc. ocul. cancri an. 3ß. sal. succini alb 3j. ol. anisi 3j. sacchari cand. alb. 3iv.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Nephriticos oculariter juvant, tartarum enim & lapid m Renum & Vesicæ, cæterorumque membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt Ischuriam, Dysuriam, atque Stranguriam citra molestiam solvunt: Propterea pro secreto magno, contra omnia calculorum genera habeantur & metitò existimentur. Dosis in præervatione 3j. singulis Lunæ quadris in aq. Nephritica nost. vel alia convenienti. In curatione autem dosis à 3ß. ad 3j. in aq. jam dictâ, vel in aq. Ononidis, Petroselinii, Hedéræ ter. &c.

Spec. Cholagogæ.

℥. Mag. scammonii 3j. spec. diarrhod. abb. 3ß. acidi tartari 3ij. rosar. rub. vitriolat. flor. centaur. min. an. 3j.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Flavam bilem citra molestiam educunt, ut simul obstructions liberent. Præterea calori, dolori & siccitati Stomachi, Cordis, Hepatis, Pulmonum, articularum & viscerum conferunt, ipsorumque robur augent & conservant. Cardiacis, Tabidis, morboque Regio correptis maximè subveniunt. Propinquantur etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis &c. Dosis à 3ß. ad 3j.

Pulvis Carminativus.

℥. Sem. cymini cum. aceto præp. carvi, anisi ana 3ij. zingib. albi 3vj. macis 3ij. croci orient. 3j.

Misc. & f. pulvis &c.

Vires, Usus, Dosis.

Flatus intestina distendentes, & acrimonia sua tormenta concitantes, egregiè discutit quotidie, vel tem-

pore necessitatis, per aliquot dies continuando, & in prima mensa, cum jure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminativa nostra calidè sumptus. Dosis à 3j. ad 3iß. Ist ein gut Suppen pulver.

Farina Virginea nobilis.

℥. Silicum fluviat. calcinat. & pulverisat. 3vj. lap. pumicis præp. 3j. rad. ireos flor. 3ß. galie, moschat. vera 3j. ol. sil. rosarum 3j.

Misc. & f. omnium pulvis instar farinæ, quem ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis.

Ad dentes in una quasi hora dealbandos, & à tartaro corrosivo purgandos medicina nulla excellentior est, si quotidie hoc pulvere sæpè hinc inde cum laeiniâ lanea diligenter fricentur atque terantur: Propterea tam gynæceis, quam reliquis omnibus, hunc de silicibus suavissimum & venustissimum pulverem commendare volui.

Pulvis Hæmorrhoidalis.

℥. Farin. volatilis 3j. croci martis 3ß. boli or. præp. rad. verbasci an. 3ij. hermodact. alb. per noctem in sp. vini infusi & iterum exsic. flor. papav. errat. sacchari cand. alb. sang. draconis olibani an. 3iß.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires & Usus.

Sanguinem hæmorrhoidalem superfluum emanantem citò restringit, vehementemque dolorem mirè sedat: Tempore autem usus, ex albumine ovi & stupæ cannabina, vel ex lana typharum & butyri veteris sale, f. cataplasma, cui de hoc pulvere parum inspergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

Pulvis de Verbasco.

℥. Herb. Verbasci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit, ad summum usque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene muni, igne impone, ut nigrescat eo, non verò in cineres abeat, cumque videbitur satis esse, crucibulum fac refrigerare, atram illam materiam exime, & in subtilem pulverem redige. Postea

℥. Hujus pulveris nigri 3j. rhubarbari elect. 3ij.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

Vires & Usus.

Certum hic pulvis est experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cujus usus est, ut ægrotus de indusio viri trito sumat particulam, eamque in uno latere paululum propria sua saliva humectet, de pulvere hoc aspergat, & ita superimponat toties repetendo quoties opus donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ dispareant, quod brevi tempore evenit.

Pulvis probatus,

Ad exsiccandum: consolidandum, & sanandum variolas.

Farin. lentium, fabarum, orobi, ana 3ß. lithargyri cerussæ lotæ, tutiæ præp. nihil. alb. an. dr. ij. conch. maris præp. rad. arundinis croci metallor. an. 3j.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

Vires, Usus, Dosis.

Variolæ quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aureâ seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur, deinde aspergantur prædicto pulvere, qui etiam spargetur in lectum patientis.

Pulvis

Pulvis Cyprius, Violato-Rosatus.

℞. Rad. ireos florent. ℥ iv. flor. violar. recenter. exsic. ℥ j. rad. cyperi rotund. ℥ ij. ol. stil. rosar. veri ℥ i ss. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, Usus, Dosis.

Ex hoc suavissimo & valde d.lectabili pulvere replentur pulvilli, quibus variè utuntur in gynæc. is. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis, &c. Insperisus, longe lateque jucundissimum suum odorem, cerebrum & omnes spiritus recreando, eructabit. Invenimus pro iis, qui à Moscho, Ambra, Zibetha, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

Pulvis Cyprius Moschatus.

℞. Syrac. calamit. ℥ v. rad. ireos florent. ℥ ix. rosarum rub. opt. anthos ana ℥ ij. benzoini, cass. lignea an. ℥ j. laudani puri, calami aromar. caryophyllorum, sem. corian. an. ℥ vi. Lign. aloes, ponderos. santal. citrin. rhodini an. ℥ ss. corn. aurantior. & citri, cyperi rotund. an. ℥ iij. origani cret. majorana an. ℥ ij. flor. lauri numer. iij. flor. lavendula, violarum ana ℥ ss. moschi, laudat. ℥ ss. ambræ griseæ ℥ j. Misc. & fiat pulvis vestimentalis; cujus usus jam dictus.

Pulvis Manualis Odoratus.

℞. Magmat. exp. amygdal. dulc. & amarar. an. ℥ iij. farin. subarum ℥ ij. oryzae albiss. lupinor. an. ℥ i ss. rad. ireos florent. ℥ j. rosarum alb. exsic. benzoin. an. ℥ vi. sal. tartari alb. creta alb. præp. spodi præp. sper. ceti rec. an. ℥ ss. ob. lig. rhodini ℥ j. caryophyllorum lavendula an. ℥ ss. Misc. & f. omnium pulvis seu mixtura.

Vires & Usus.

Hic pulvis manus albas ac nitidas, cutimque mollem reddit, si frequenter eo laventur & fricentur.

Pulvis Erysipelatodes.

℞. Farina volat. ℥ vj. plumbiusti, boli rub. ana ℥ iij. mastichis elect. olivani, cerussæ an. ℥ j. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Vires & Usus.

Hic pulvis chartæ, caruleæ inspersus. & in Erysipelate, sive igne sacro, per se, loco affecto applicatus, vix dici potest quàm huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen universalibus, nec non venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus.

PULVIS PYRIUS.

Pulvis Pyrius est compositum quid ex sale nitro, sulphure & carbone saligno aut alio levi ligno confectum, certo modo præparatis, cum aceto in certa proportionem mixtis, per cribrorum variè foraminatorum trajectionem in grana variæ magnitudinis efformatum. Hoc artificium jam anno 1280. Rogero Baconi celeberrimo illi Monacho Anglo notum fuisse credibile est, dum in suo de Secretis Operibus Artis & Naturæ, ac de Nullitate Magi tractatu sic habet; Soni velut tonitrus & coruscationes possunt fieri; immò majore horrore quàm illa quæ fiunt per naturam. Nam modica materia adaptata, scilicet ad quantitatem unius pollicis, sonum facit horribilem, & coruscationem ostendit vehementem, quibus civitas aut exercitus destruitur. Mica sent hæc, si quis sciret uti ad plenum in debita quantitate & materia. Quis etenim cum Joh. Deo Londinensi Doctissimo Rogerii Baconis Tractatus Commentatore, non videt hinc hujus verbis pulverem pyrium ejusque in variis tubulis conclusi, & inde per flammam conceptam explosi, effectus designari, quem tamen ideo homines celaverit quòd illis multa exinde mala ominaretur. Verùm cum forsitan penes monachos

ejusmodi confectio per traditionem quandam secretius traducta fuisset ad annum usque 1354. hoc tandem tempore Bertholdus Schwartzius Germanus, Goslarientis Monachus, Ordinis Sancti Benedicti, illam abundè vulgavit, utendique methodum verè perniciosam edocuit, ut apud Athanasium Kircherum Mundi Subterranei Tom. 2. pag. 487. videre est.

Pulvere pyrio quidam in Medicinâ utuntur dum scilicet illum aliis admixtum carpis pro febribus profligandis applicant, militare præterea est medicamentum quod in vino aut alio in liquore largiori dissolutum dosi intus in febribus etiam malignis milites adhibent. De effectibus in variis pyrotechnicis præparationibus celebratis hic tacemus dum toti in Medicis, aut Medicæ saltè Arti affinis versamur.

PUMEX, vid. sub titulo Lapis.

PURGANTIA MEDICAMENTA.

Ut ut purgantium nomen latissimè tribui possit non solum evacuantibus per alvum, sed & omnibus iis, quæ quocunque modo & ratione excrementa educunt, ita ut & particulariter evacuantia, crithina, apophlegmatismata, bechica, diuretica, menses moventia & alia hujus generis purgantia dici queant; Usus tamen obtinuit, ut specialiter & pro eo solum *καὶ ἐξοχῇ* medicamento accipiat, quod latè per vomitum & alvum, & strictè per alvum solum purgat.

Definitur purgatio à Galen. 2. aph. 1. & 2. aph. comm. 27. quod sit humorum suâ qualitate molestantium evacuatio. Ut vetò eò magis pateat ratio purgandi à medicamentis in corpore, operæ pretium est considerare 1. ipsa medicamenta, quæ id præstant, 2. phænomena potiora ab assumptione evenientia; adde 3. partium, quas evacuant, rationem & dispositionem.

Quoad illa notabile est, i. magnam esse purgantium latitudinem, maximam differentiam. Sic (1.) ab effectu, leniori vel molestiori, alia sunt *benigna*, benedicta aliàs vocata, quæ tuta sunt, blandè & leniter purgant, nihilque maligni in se continent, ut cassia, manna, tamarindi, de quibus Galenus scribit l. 3. simpl. c. 24. si operatione suâ frustrentur, ea concoqui & in alimentum converti. Ex propriè dictis purgantibus talia sunt sena & rhabarbarum, laudatissima medicamenta. Alia *mediâ* sunt, ut gualapa & scammonium. Alia *fortiora*, maligna, seu potius *degenerata*, quæ violenter purgant, v.g. colocynthis, helleborus, lauroleola. Unde eodem Galeno auctore l. 6. in substantiam veneno finitimam mutantur, si nihil purgent; id quod tamen & rationi & experientiæ est contrarium. Si enim non præstant minus, stimulum, irritationem, quomodo præstabunt majus?

(2.) Alia à modo actionis, seu gradu, primas duntaxat vias expurgant, *lenientia*, hætenus exposita, alia ultra primam corporis regionem penetrant, & penitiores remotioresque partes evacuant, quæ propriè *purgantia* & *solutiva* nuncupantur.

(3.) Ab humore, quem educunt, audiunt & divisa communiter sunt in *phlegmagoga*, *cholagoga*, *melanagoga*, *hydragoga*, imò juxta quosdam etiam *hæmagoga*.

(4.) A viâ, per quam purgant, alia *ævo* purgant, *emetica* dicta; alia *recta*, *purgantia*, dejectoria.

(5.) A partibus, quibus appropriata statuuntur, alia v.g. *ventriculorum*, ut aloë, alia *secur*, ut rhabarbarum, alia *renes*, ut cassia & terebinthina, alia *nervos & articulos*, ut hermodactyli, alia *thoracem*, ut agaricum, purgant; quod quomodo locum habere possit, suo loco, ubi de specificis diximus, discutimus.

(6.) A sapore, alia sunt *amara*, ut aloë, colocynthis, alia *acria*, ut euphorbium & mezereum, alia *dulcia*, ut polypodium, manna, alia *insipida* ferè, ut mechoacan-na, antimoniatâ.

(7.) Ab accidentibus aliis, ut ab odore, colore, corpore.

corpulentia, textura, quibus mirum quantum variant; singula verò resinosis & salinis, paucioribus vel maioribus particulis constare deprehenduntur, variis terreis, aqueis, remixtis.

(8. A rebus unde petuntur: alia ex *animalium* genere, ut serum caprinum, hepaticum, quod in aulis quibusdam tanquam jocosum purgans habetur; alia ex *vegetabilibus*, alia ex fossilibus seu *minerali* regno, ut speciatim, radices, flores, fructus non recenscamus.

(9.) A modo applicationis, alia sunt *interna*, quæ ore assumuntur: alia *externa*, quæ ventri applicantur; vis enim horum subtilis transmittitur, ut purgetur corpus à transumptis particulis, stimulum intus vibrantibus.

Præter hæc verò 2. notabile est phænomenon, purgantia omnia esse sternutatoria, id quod experimur non solum, si hoc sine applicantur, ut helleborus albus inde nomen obtinuit, & unice fere hodie hoc usu celebratur; sed & in pulverificatione gualapæ, & aliorum. Hæc verò stimulant membranam teneram narium, eliquant glandulas, fundunt humores, & omnium optime, factâ comparatione effectus, purgantium agendi modum explicant.

3. Purgantia pleraque acrimoniam pungentem & fundentem serum sensui manifestare, si vel masticationi subjiciantur, vel aliis modis examinentur; omnis verò acrimonia est à sale.

4. In iisdem resinosis seu sulphureis vim visî & deprehendi, quâ ablata vis purgandi abest omnis. Resinosa verbi gratia, est gualapa, unde & ardet, resinosis scammonium, euphorbium, gummi guttæ, & alia, unde cum spiritu vini extrahuntur commode. Inprimis verò duo hæc elementa deprehendi in antimonio, quod hinc pro diversâ immutatione purgat, sudorem citius præcipitat, imò antimonium crudum loco pulveris epileptici quidam secreto propinant. Et legi de hoc potest locus insignis apud *Gordonium in philonio c. de epil. pag. 99.* ubi ex opoponace, castoreo, sanguine draconis & antimonio crudo pulvis describitur, idque ex Varignanæ secretis & libro secretorum Tubingenfi commentator illustrat.

5. Acida obrundere purgantia quatenus acrimonia salina & sulphurea hoc pacto infringitur.

6. Quoad corpus, observamus assumpto purgante medicamento pulsum, siquidem operaturum sit, immutari, lassari aliquo modo corpus somnolentum reddi & incallescere paulò, nauseam aliquam oboriri, (quod tamen non perpetuum est,) *ποσσωπυμὸς* excitari, à *δεξιμὸς* paulò, imò & mediis tormina fieri, hinc feces alvi excerni aquosas primò, liquidas saltem, hinc mucosas, idque aliquot vicibus; post vero, quam operationem suam finiunt, alvum per aliquot dies obstrui, quæ singula functionem humorum & agendi rationem explicant ac innuunt.

7. Non minus verò, præter hanc purgationem artem inductam, motu proprio naturæ diarrhoeas fieri sæpius, præsertim verno vel autumnali tempore, seu salutariter & cum *ἀφοδία*, quod criticè fieri dicitur, seu cum vitium debilitate, quod symptomaticè contingit, idque inprimis, si à causâ occasionali, in aëre motu, cibo & potu quidam stimulus accesserit.

8. Bilem esse clysterem naturalem, seu stimulare tum in statu naturali, ut alvus expediatur, tum præternaturali, si acrior reddita intestina laceſcat. Gaudet enim acrimoniâ salinâ, absterſivâ & sulphureâ & in cholera, dysenteria & similibus fluxibus manifestè peccare deprehenditur, imò & rejici frequenter *αἷμα* & *νεύρα*, non tamen id fieri nisi simul fluxilis sit, unde natura & ob hanc causam videtur succum pancreaticum occiſſe bili, ut dilueretur & fluxilis aliquo modo red-

dita promptius fermentaret & stimuleret ad exitum scybala.

9. Ventriculum & intestina plurimis præcipuè polere fibris nerveis, glandulis miliaribus infusitis; Confluxu item perpetuo humoris pancreatici biliosi & incrementorum ordinariorum. Fibræ nervæ sensus inercitudinem, glandulæ & ductus patentes dicti humorum largiuntur & foenerant, qui evacuat.

Cum itaque in alvi fluxu seu à naturâ, seu ab arte facta, observetur humorum quædam liquefactio, motus fermentativus & stimulus ad expellendum; cumque totius quasi corporis cloaca sint intestina, facile patere potest & universale esse præcipuum medicamentum eadem, & quomodo purgatio fiat, tum in genere, tum inprimis à selectioribus purgantibus medicamentis. Id verò ut distinctius eluceat, tres notamus potissimum esse hypotheses autorum, quibus ad explicandam actionem purgantium utuntur, innixas sympathiæ, antipathiæ, & fermentationi.

Prima hypothesis est: purgantia agere ob magnetismum, similitudinem totius substantiæ, seu, quod idem est, ob occultam aliquam specificamque virtutem à formâ substantiali, tanquam principio nobiliori, proficiscentem, non aliter ac plantæ convenientem succum ex terrâ fugant; ut singulæ corporis partes familiare alimentum ex malsâ sanguineâ prolecent; ut magnes ad se ferrum moveat, ut succinum paleas adducat. Eodem modo purgantia humores naturæ suæ congruos trahere. Adeoque agere eadem *ἐλκτῇ*, *attractione* quam eximè juvet calor tractionis comes, non minus ac alias quoque dolor hunc censum subit, *Gal. l. 5. simpl. c. 17.* addit.

Per similitudinem substantiæ intelligunt non identitatem, simile enim non est idem, seu simile & idem differunt; ut non ferrum à ferro, sed à magnete trahitur, non similitudinem in accidentibus, ut in colore, crassitie, densitate, tenuitate aut raritate, quandoquidem in aliis, ubi eadem accidentia reperiuntur, non æque vis purgandi visitur inesse, neque talis convenientia in purgantibus compareat; sed similitudinem idealem, specificam, seu, si mavis, incognitam; unde alii in genere trahendo agere volunt similia, alii specialius exprimunt illam substantiæ similitudinem, quod debetur quibusdam spiritibus.

Hinc ex hac hypothesi assumptum pharmacum à calore corporis nostri in actum deducitur, ejusque vapores & spiritus in totum corpus disperguntur, qui, cum purgatrice facultate sint præditi, humores sibi familiares deinde ad se alliciunt, atque à malsâ sanguineâ reliquisque humoribus utilibus separant; quod ubi fit, natura tertio loco insurgit, & quia tum à pharmaco, tum à noxiis humoribus stimulat; expultricis facultatis ope utrumque stimulum tandem exturbat.

Contra hanc sympathiam seu magnetismum diximus, eum non probari posse, nec dari revera: Quæcunque enim inter se nec substantiâ nec qualitatibus conveniunt, illa inter se sympathiâ vel magnetismo non gaudent. Non in substantiâ, humores evacuandi summam vel biliosum sunt serosi, & cum his affines alii, quomodo vero similitudo substantiæ concipi potest v. g. ut alia taceamus, in vitro antimonii, in scammonio, in aliis? Et posito hoc, non tamen concessio, verissimum est contradictoria esse nec simul stare posse: attrahere & propellere. Neque distinctio valet nonnullorum attrahere per se, propellere per accidens quatenus naturam unâ irritant. Non in accidentibus, nisi merè per accidens; neque enim rhabarbarum vel aloë bilem expurgat, quod amara sint, vel flava, cum absinthium, cum crocus & alia id non præstent, quod ipsi afferentes concedunt.

Tolerari aliquo modo & mollius explicari potest hæc hypothesis, si purgantia concipiamus esse velut fel artifi-

artificiale, quod junctum bili naturali ad excretionem citet archeum intestinorum.

Altera hypothesis est, purgantia agere ob antipathiam, *ωρίν, propulsionem*, ab abhorrescentiâ & contrarietate inductam. Contrarietatem hanc duplicem statuunt & explicant, alii respectu naturæ seu archei, quorum illi spectant, qui venena esse purgantia criminantur, ut natura assumpto purgante velut contrahicam turbam insurgat, & nolens volens exturbet tali impetu non tam humores, quam medicamentum, quocumque passundati humores exitum inveniunt.

Pares his sunt, qui cum Asclepiade apud *Galenum l. de purg. med. fac. c. 1.* ita tuunt humores per purgantia educos non fuisse in corpore tales, quales post evacuationem conspiciuntur, verum alterius generis à cathartico autem mutatos & in naturam sibi similem convertitos, i. e. corruptos, bilem v. g. à cholagogo excreta non fuisse bilem, sed humorem in bilem mutatum. Hinc tria juxta Asclepiadem in purgatione humorum accidentia concurrunt: generatio humoris, stimulatio naturæ, & generati humoris assumptique expulsiō. Præter ea verò, quæ *Galenus l. c.* & alibi rectè huic sententiæ opponit, nullitas ejusdem monstrari potest, si tum medicamentum, tum humores educendos consideremus. Medicamenta purgantia diversa sunt, inter se differentia, unum tamen præbentia effectum. Hi ergo non unus idemque à diversis & distinctis inter se omnino expectari potest. Neque humores eidem item auscultarent promiscue.

Alii verò eandem antipathiam agnoscunt in purgantibus versus humorem excernendum. Ita *Laur. Juberius* loco citato catharticum è corporibus nostris minime attrahere vult, sed potius fugare & expellere, atque antipathiam verius, quam sympathiam opus tuum perficere, ejusdemque cum alexipharmacis conditionis esse. Ut enim hæc venenis inimica sunt, eaque non *ελγεί*, sed *ωρεί* è corporibus eliminant, ita, *inquit*, purgantia visiosis humoribus adversari & naturali quadam antipathia eosdem expellere. Sed alia omnino ratio est alexipharmacorum & purgantium, ac consequentia nulla est; si bezoardica relictunt veneno, ergo & purgantia agunt eodem pacto ab antipathiam. Differunt quàm maxime inter se purgantia & alexipharmaca; quomodo ergo sub eodem genere & conditione locari queunt? Referenda hinc & ipsa hæc antipathia est ad ignorantiam asylum, ad occultam qualitatem. Non pellunt purgantia ob antipathiam, unde rectè asseritur purgantia non esse venena, vel quasi venena, ab effectu hoc ipso suo, multò minus è medicinâ exturbanda. Effectus enim hic salutaris est; cuiuscunque verò effectus est talis illud pro medicamento non veneno æstimandum est, à sine enim actio æstimanda. Quo loco obiter repetimus, distinctionem simplicium inter alimenta, medicamenta & venena non tam strictam esse, sed generalem & latiore, quæ mediam agnoscit subdivisionem & classem in omnibus. Hinc ut dantur alimenta medicamentosa & venenosa, ita & inter medicamenta & venena datur medium, quod de purgantibus fortioribus dici potest.

Tertia hypothesis est, purgantia agere vi fermentationis, adeoque eorum actionem fermentatione absolvi. Solent hinc, qui de fermentatione scripsere, in solenne exemplum laudare fermentationem, unde purgantia vocant, quæ quocumque modo adhibita à calore corporis nostri in actum deducuntur, resolvuntur, occultâ vi humores sibi cognatos turbant, agitant, fermentant; quâ turbatione natura irritata inutiles humores segregat & expellit.

Ut clarius pateat, & quomodo fermentatio concurrat, & vim causâ habeat in excrenda purgatione, liceat ex metaphysicis inter alta distinctionem huc mutuari inter causam, uti communiter dicitur, quæ, & quâ. Fermentatio non est causa, quæ, cui agendi provincia prin-

cipalis & sola adscribi queat, illa enim est irritatio, de quâ mox; sed est causa quâ, requisitum secundarium seu necessaria conditio ex parte causæ, ut tamen genuina causa, salvâ veritate, censeri non possit.

Ut ergo adsit in omni purgatione fermentatio; illa tamen non ita concurrat, vel insinuat, ut cognitâ hæc & admittâ satiari intellectus & omnia phenomena, omnis agendi modus clarescere possint. Seu, ut alias dicitur, fermentatio est causa sine quâ non, unde hæc non eveniente frustra est irritatio, frustranea medicamenti assumptio, quia potentia illa non traducitur in actum. Adeoque purgantia non solâ fermentatione absolvuntur vel explicari possunt, seu per se sola adsumatur, seu occultâ vi comprehensâ.

Reliquum est, ut dicamus, quomodo agant, quæ quarta est hypothesis, irritatione. Conveniunt singuli ferè in hoc, fieri in purgatione irritationem, illud tamen paulò latius est. Alii inde in irritatione generali acquiescunt, ut *Thom. Etastus l. de purg. med. facult.* docet, cathartica non peculiarem aliquem humorem prolicere, sed naturam saltem stimulare & laceffere, quæ irritata sponte visiosos humores exturbet. Idem ferè sentit *Jac. Schekeerus*, qui similiter non *ελγεί*, sed *ωρίν* purgationis causam statuit; medicamentum enim & noxios humores expultricem facultatem acrimoniam suâ stimulare ait, quæ stimulatâ utrumque postea expellat. Hæc ipsa verò generalis irritatio non sariat omnium sciendi avidum, id enim & vulgus novit. Hinc etiam qui electivam agendi vim in purgantibus agnoscunt, irritationem in genere rejiciunt, quòd illa sola non possit noxios humores ab inutilibus secernere & extrudere; quod positò irritante promiscue quilibet humor expurgari queat; quod idem expectandum foret ab omnibus calidis & acerbis, utpote quæ non minus naturam stimulare apta nata sint.

Agunt itaque purgantia irritatione, seu nulla purgatio fit sine stimulo; omnis enim irritatio supponit acrimoniam quæ à priori sensu, à posteriori effectu satis conspicua est. Hinc dependet illa actio principaliter ab *ερεθισμῷ stimulatione archei intestinorum*, quando tunica eorundem membranacea & glandosa acriorem characterem sentit, & magis quàm ordinariè contrahitur ac sollicitatur.

Acrimonia hæc ipsa in aliis magis explicata & pansa est, unde, quod diximus, purgantia illa similia sunt sternutatoria, & corrosiva alia venenosa, *βέντος. ΟΟ*, cum immanibus torminibus potentissime sæpe purgant; in aliis magis latens est, ut in acrimoniatibus, non prius se exerens, quàm in ventriculo, cujus hinc delicatior longè æstimandus est sensus. Unde & acida illud sal figunt, & stimulum illum obtundunt.

Acrimonia illa principaliter debetur principio salino activiori, humores ad *όργασμὸν*, naturam ad excretionem citans. Quicquid acre est, sali adscribitur non immerito.

Ista potè acrimonia salina modificata principio sulphureo, quod perinde est, an resinam, an saponem, vel aliter vocemus, cum matrice acidâ consociato, unde & facilior fermentatio & stimulatio consurgit. Acor ille manifestè visitur in destillatione gyalapæ, hellebōi aliorumque, cum copioso oleo, seu sulphure, quo de in *differt. de gyalapâ* egimus. Neq; tamen purgandi actio acido tribuenda est, quin potius notum est ex analysi & consideratione similium, illa ipsa simplicia, quæ acidum cum sulphure condunt, vel ipsius sulphuris communis exemplo, alcalinos magis amulâri effectus. Suffecerit nobis cognoscere in purgantibus principia hæc diversa, ut sic prudentissime à creatore mixta, quæ liquationi & fusioni humorum indeque consequente irritatione effectum purgantem edant, aptissima ad fermentationem seu *όργασμὸν* citandum.

Pateat id ulterius, si cogitemus, non solam acrimoniam salinam, adeoque nec irritationem sufficere, qualis

qualis in torminibus verbi gratia, in colicâ sine alvi fluxu, satis insignis est; sed biliosam quasi, seu sulphuream, cuius idea in dysenteria & diarrhœis aliis visitur. Neque enim in dysenteria est nisi hypercatharsis spontanea, seu à principio intrinseco facta, ut alias à purgantibus fortioribus, colocynthiacis cumprimis, dysenteria non raro evenit & producit.

Purgantium igitur vis omnis ab acrimoniâ salino-sulphureâ videtur unicè arcessenda, seu agunt irritatione ob acrimoniam salino-sulphuream, unde sale & sulphure ablato, vel non vel debilissimè purgant.

Actimonia denique illa salino-sulphurea magis vel minus volatilis est. Fixior & minus volatilis si fuerit, natura purgatur magis natura inde admonita, ut à senâ, rhabbarbaro, colocynthide. Sin volatilis magis ævo, quod de vomitoriis valet & dicitur infra latius; in quibus verò medius status mixturæ est ævo & natura, ut in gummi guttæ & aliis. Ordinarie, puta & medicamento sibi relicto, extraordinarie enim, prout ipsa hæc dicta fixitas vel volatilitas in humoribus prædominatur, etiam vomitoria fiunt natura, & purgantia ævo, per accidens & extraordinarie.

Positâ verò acrimoniâ, eaque irritativâ & fermentativâ, liquantur & funduntur humores, natura verò stimulat, ut collecti & adducti excerpantur. Liquantur, spiculis salinis se ingentibus & serum concretum fundentibus, non aliter, ac suo modo ptarmica & errina papillas natium eliquant, unde humor aquosus exit copiosè. Unde si hoc sensu attractionis vox sumatur, habet omnino locum. Fit in purgatione & tractio & pulsio, modò rite res intelligatur. Liquatur è glandulis intestinalibus, proleto humore seroso. Hinc non tantum ab irritatione continuatâ sequitur quandoque ipse sanguis, sed & spasmus extremorum. Verum id est, elogio Hippocrati, non saltem de helleboro, nominatum albo, sed & aliis quibusvis purgantibus. Quid benignius gyalapâ? Ab illa tamen talismodi spasmum observavimus, consignatò exemplo Ann. 10. Ephem. Germ. obs. 75. p. 204.

Ordine hinc se consequuntur ἐργασμός, turgescencia seu fermentatio; ἐρεθισμός irritatio, & ἐκκρίσις excretio humorum irritantium & fermentantium, singula acrimoniæ salino-sulphureæ aptissime quadrantia. Irritatio verò & antecedens est & consequens adeoque omne absolvit punctum, quandoquidem purgantia obvios humores extimulant, scybala, bilem, succum pancreaticum & glandosum intestinale, indeque consecutione quadam totum corpus evacuunt, sortita differentiam & à præsentia illorum & copiâ, ac à diversâ modificatione texturæ.

Quæ cum ita sint, irritatio hæc non est determinata ad unum solum, hunc illum humorem; sed determinata secundum quid, ad partem quam evacuunt, intestinalia, limitata quoad humores ibi contentos & excernenda. Hinc est, quod Celsus scribit s. 4. aph. 2 purgantium medicamentorum usu talia è corpore educenda, qualia sponte etiam prodeuntia juvant, contrario vero modo exeuntia, sistuntia. Sponte enim prodeuntium titulo intelligenda non alia, quam quæ diximus. Hinc abundantes hi & præsentés tolluntur accurate à purgantibus, quæ indicant. Sanis verò corporibus, ubi dictæ hæc ordinariæ quiescentiæ non excedunt, non peccant, nocent purgantia, argumento 4. aph. 16. Helleborus periculosus sanas carnes habentibus, convulsionem enim inducit.

Hæc cum objectum sint purgantium, omnia æquè purgant omnes humores obvios promiscuè, sed diverso effectū. Non uno eodemque modulo peccant humores, non uno eodemque modulo agunt purgantia, modificata diverso modo utraque. Perpetua enim inter agens & patiens est proportio. Cumque evacuanda potissimum sint bilis, serum & scybala, non tamen unius-

modi, meritò ex hoc fundamento distinctio omnis pertenda.

Argumentum universale esse potest hoc: Si differunt inter se humores evacuandi, differunt & medicamenta evacuantia, meritò sequitur, non omnia agere uno eodemque modo, sed alia magis hunc, alia illum magis respiciunt, non omnes omnia tam bene, generali nihilominus fermentationis & fusionis, præcipuè verò irritationis regulâ promiscuè evacuatis quibusvis.

Cumque in his ipsis recensitis minera & nidus morborum variorum resideat unicè, meritò purgantia judicantur tollere causam morbosicam, idque potissimum in principio, prius, quam fermentum morbosum collutulare reliquum sanguinem magis sustineat, prius, quam vires deiciantur.

Coronidis loco dicendum aliquid adhuc venit de distinctione essentiali & electivâ illâ purgantium v. D. differunt ergo etiam purgantia specialiter, operandi genus, alia sunt mitia, alia medioeria, alia fortiora. Sunt qui extraordinarie difficillime, sunt contra ea qui facillime moventur, difficillime, in quibus irritatio seu stimulus salinus vim fermentativam comitem non consequitur, qui dicuntur sicciore; quibus item mucus intestinorum viscosior est & spissior; facillimè verò, quibus & fluxiles acresque humores & membrana intestinalium ac ventriculi nudior est, & tantum non papillacea. Medium tenere beati, hinc doses ipsorum purgantium hinc inde communiter annotatæ ad uniuscujusque subiecti conditionem sunt limitandæ.

2. Differunt secundum texturam specialem partium salinarum & sulphurearum, ut pro & majori vel minori resolvendi potentia. Hinc alia sunt, respectu humorum, magis seriduca, cholagoga & melanagoga, à diversis humoribus peccantibus & diversâ materiâ. Cum verò similitum eadem sit ratio, brevius & concinnius nolumus rem omnem, si dicamus cholagoga & melanagoga minus differre, in melancholiâ enim omni bilem peccare, vel nomen innuit. Non differunt hi humores, bilis flava & atra, radice, seu substantiâ, sed differunt qualitatibus. Unde cum melancholia sit duplex, una quæ sero debetur acido, altera quæ bili; de his potissimum dicimus, quod quæ bilem evacuent, illa quoque melancholiam, uti priori illi speciei convenit cum hydragogis. Hinc commodum utrorumque est coniunctum.

Conveniunt etiam quæ pituitam liquant, & hydragoga. Eadem enim horum est ratio, unde affinitas purgantium & hinc elucet.

Inmixta verò singula hæc præsidia esse debent suis indicationibus, etiam in quantitate & qualitate, ut selectus instituat inter purgantia, selectus pro praxi Clinica necessarius, ut dosi non excedamus, alias quippe non tam id quod quantitate & qualitate excedit, adeoque morbiferum est, evacuabitur, sed & humores boni, cum manifesto corporis detrimento, licet vulgus aliter cogitet, numero sedes æstimans potius, quam dos. Hinc ex methodo medendi supponimus & hic, in omni instituendâ purgatione respiciendum esse & morbum, qui lædit ac purgationem indicat, & subiectum quod læsum est, & medicamentum quod prodesse debet.

De Purgantibus non usitatis.

Ut igitur selectus instituat, operæ pretium est conferre inter se purgantia, & quæ in praxi horum titulum mereantur, quæ minus, dispicere; præstat enim paucis selectis aduiscere ingenium, quam confusis pluribus inerrare. Qui bene distinguit, bene docet, & difficit, & medicatur. Qui verò bene cognoscit medicamenta, bene curat.

Sermo vero est inprimis de purgantibus primariis & balneis

bileos vicem sustinentibus, adeoque omnia & singula non in exilium mittuntur reliqua, satis est, non demandandam hinc primam purgandi provinciam, idque paulo rigorosius, ut tanto magis ad selectum invitentur discentes

Sic *Terebinthina* non tam Venera, quam *Cypria* vera vires quidem habet purgantes, ad ʒb. dosi ab autoribus protracta, qui tamen usus & dosi paulo est rarior, imò instituta in praxi select & purgandi fine. Adhibetur verò, abstergendi & sanandi usu, utiliter in affectibus renum & genitalium, ut calculo, gonorrhœa, &c. vel in bolo cum cassia, vel in colostrum cum ovi vitello redacta. Audit *ναυσόμαχον*, unde tenerioribus minus convenit. Consultabamus aliquando tres medici de calculo Serenissimæ personæ, unà ventriculi debilitate conjuncta insigni. Medico uno suadente terebinthinam, illo cum symptomate, dissensimus, præsertim in substantiâ, & delicati palati ægrâ. Aliàs etiam MP. de terebinthinâ commodè usurpantur.

Polypodium, ab electione quernum, leniens quidem est melancholico humori dicatum, unde decocta & infusa aperientia melanagoga ad ʒii iii. ʒb. ingreditur, inprimis in affectibus pectoris, tussis, melancholiâ hypochondriacâ & scabie, magis tamen est secundarium & alterans, quam purgans.

Semen Psylli mucilaginum basis, ad linimenta pro linguâ fissâ & aridâ, ad ulcera & dolorem, à lacte esulæ oriundum, constituit antidotum, de quo vid. *Rosinc. lide purg.* Interno pro usu, inprimis purgante, exultat hodiè.

Viola quoque relata inter purgantia, procul dubio à primoribus artis inventoribus ad temperandam purgantium caliditatem & acrimoniam addita, unde & si cord. commodè infusa ingrediuntur purgantia, inde in classem ipsam purgantium irrepit. Præparata exin sirupus vel mel violæ in clysteribus conveniunt. Trochisci diaion, seu è violis solutivi exoleti sunt, vim purgandi mutantes à turpetho, scammon. & manna. Semen in emulsione quidem purgat, attamen magis pro remedio efficacissimo ad ischuriam commendatur.

Florum acacia & persicorum eadem ferè est ratio. *Sambucinis* tuciores primo vere germinantes acetarium constituunt purgans, sed rusticum, & ut plurimum emeticum simul, quam vim variatè quidem volunt pro decerpenti modo, prout *ἀνα* vel *νάνα* id fiat, magis tamen ascribendum id omne dispositioni humorum. Reliqua etiam memorata, ut & ʒo sambuci viridescens, quod in philetis commendat pro emetico, consultius omittuntur, & pro usu alterante, traumatico &c adhibentur. De vehementiâ succi radice sambuci vid. *Minder. med. milit. cap 6 p. 25 seq.* De sambuco in genere *Bloch-vv. Anat. sambuci.*

Afarum potens est medicamentum purgans & emeticum, quo posteriori sine locum adhuc obtinet. Ante aliquot annos civis hujus loci, vir quadratus difficulter mobilis, sumit suavis aniculæ pulverem asari sol. & ad ad integrum cochlear, inde verò hypercatharsin patiebatur lethalem.

Myrobalani, prunorum peregrinorum species, ab Arabibus in scholam medicam introductæ, quarum quinque genera sunt, *chebula*, omnium maximæ; *citrina*, à colore dictæ; *bellirica* gallam vel nucem moschatam æmulantes figurâ & colore; *Emblica* subnigricantes exollatæ & concisæ; & *Inda*, nigre, nucleorum corni æmulæ, ossæ carentes. Constituunt purgans lenes, ut citrinæ bilem, Indæ melancholiam, non tam ob colorem quam dulcedinem, reliquæ pituitam purgare statuntur. Hæc tamen vis lenitiva seu purgandi adeo exigua est, ut dubitetur ferè, num inter laxantia vel adstringentia potius sint referendæ, præcipuè cum, *Fragoso teste. med. Ind. Tr. 3. cap. 22. p. 54.* Indi

ipsi iis non utantur ad purgandum, sed ad retinendum fluxum sanguinis & seminis. Temperant & alterant potius humores peccantes, bilem obtundunt, ejus motum refrænant & leniter educunt, & post se adstrictionem relinquunt

Euphorbium, succus arboris seu plantæ potius ferulaceæ, C & S. quarto gradu, ob vires causticas vesicatoria & rubefacientia ingreditur. Purgat quidem vehementer humores pituitosos & frigidos aquosos, unde olim in apoplexiâ & aliis affectibus frigidis, ut & hydrope inprimis, commendabatur. Sed cum acerrimum sit, ut & fœtum abigat & ventriculum erodat, quò nomine, rectè an injuriâ, Helmontium empirici nomine culpant. *Heerius obs 25. p. 287.* & tormina immania cieat unde virginem, à pharmacopœo eodem propinato, ad mortem ferè laborasse novimus, consultius eodem hodiè, purgandi quidem fine, abstinemus, licet vel acidis, ut succo citri, vel frigidis aliis, ut succo portulacæ, vel oleosis, ut ol. amygd. d. corrigere id vulgò laborent, & ad gr. vii. vel ʒb. saltem dare jubeatur.

Opopanax, sagape um, bdellium, gummi ammoniacum, quæ singula in pilulis de opopanace reperiuntur, gaudent quidem insigni vi deterisivâ & humores fundendi, unde & à Sylvio in pilulas præscriptæ commendantur, verum notavimus ab illis ipsis facillimè tenuissimum hæmorrhoidalem oboriri, quòd rodant quasi intestina, inprimis cum colocynthide mixta. Præstat eadem ad emplastra seligere, vel internè alterandi & incidendi fine, unde & ingrediuntur theriacam; vel, si purgantibus ea addere placeat, minori dosi, in obstructionibus tenacibus pituitosis.

Lapis Armenus, à patriâ dictus, licet in Bohemiæ & aliis argenti & auri fodinis reperiatur copiose, tam rarus est in officinis, ut vix decima quæque illum ostendere possit. Ut lapis Lazuli cœruleo, ita hic viridi magis colore, seu ex cœruleo viridi constat, unde cum chrysocollâ nativâ affinitatem habet. Relatus ob acrimoniam veneream, quam secum gerit, inter purgantia & melanagoga olim fuit, lotus & propinatus; verum à recentiorum nemine amplius hoc nomine in praxi æstimatur.

Lapis Lazuli coloris veneti, stris & maculis solaribus interstinctus micans, cum lapide armeno judicatur convenire & de ære participare, quo de pluribus legi potest *Exc. Pechlinus noster leg. de purg. p. 186.* Hinc etiam multos experitur adversarios, qui ipsum diffamant, & pravas nocentes ac exulcerantes, lotionem non corrigibiles, ejusdem facultates inculant, unde etiam ex confectioe alkermes expungere eundem gestiunt, quam & hoc nomine aliquando purgare asserunt, quòd tamen per accidens sæpe fit, quam in rem vid. *Dodon. observ. med. c. 54 p. 90.* Ast reverà innoxius est lapis, & vires, quas habet purgantes, leves possidet, unaque massam sanguineam purificantes egregias. Si enim corrigatur lotionem acrimonia metallica, quam levem habet, rudò cum purgantibus melanagogis dari potest, unde ipsum ad ʒi. cum ana gialapæ dedimus sæpius, interdum etiam in robustioribus citra effectum purgationis ullum. Sunt etiam, qui huic lapidi plus fidentum rentur, quam helleboro, in affectibus melancholicis, & in desperatissimâ elephantiasi illum experimentis suis nobilitatum commendat *Scaliger exerc. 272.* Pilulæ de lapide Lazuli, in pharmacopœis descriptæ itidem sunt exolete.

Helleborus duplex est, differentiâ à radice desumptâ, non à floribus, albus & niger. *Albus* inter purgantia exolevit, ob vehementiam, unde inter *μoxδν* & primum locum tenet & varia quidem educit, sed potentissimè & summâ cum violentiâ. Hic tempore *Hippocratis* potissimum fuit in usu, unde ubi cunq; hellebori mentionem facit idem simpliciter, sine additamento,

ibi album intelligit, teste *Galeno 5. aph. comm. 1.* Helleborus albus hic potentior longè nigro, unde & à *Paracelso* dicitur junior, quòd juniores, i. e. valdè ferocientes, vires possideat. Et vomitus quoque potenter ciet, minus sedes, de quo experimentum consignavit *Smet. miscell. p. 565.* ubi refert quendam pulverem hellebori albi, in sacculis coriaceis passim etiam hodie venalem, ad pondus 3ß. (tantum enim pulveris singuli continent,) idque ex modico aquæ hausisse, à quo vomitus proruperunt, aquosi primùm, hinc aliquid flavi continentes, infra dejecit semel. Hodie igitur cum sacculis suis pro sternutatorio solum adhibetur.

Non æque hinc patet, quare helleborus ferulaceus dicatur helleborus Hippocratis, siquidem admodum segnis est, undè ad 3j. illum dedit *Rosscius*. Si dicere volumus quod res est, experimenta ferè circa helleborum fieri hodie desière, prostantibus melioribus.

Iris nostras non minùs, ac alia exoletæ, ob acrimoniam calidiorem minus frequentatur, novimus tamen cochlearis quantitate cum successu hydropicis propinatum succum; prostant potentiora, & simul mitiora. *Florentina* verò mitissima pro infantibus vulgò usitata est, seu sola, seu cum aliis miscenda.

Mezereum utur frutex sit, primo vere in sylvis florem, & quoad corticem cumprimis commendatus, corrigendum cum aceto; minus tamen in usu selecto est. Medicina enim rustica est, & sæpe febres symptomáticas inducit, unde tanti non æstimatur, ut aliis præponatur. Sin in usum vocanda fuerit, magis in extracto vel infuso id fieri potest. Empirica quædam nobilis pro hydropo curando exhibebat in substantiâ pulverem corticum laureolæ cum successu felici. Par ratio est pil. de mezereo.

Sic & *rob ebuli* ex baccis prolectum laudatissimum quidem est *ἰπεργωγόν*, vel diureticum & diaphoreticum, cortex verò & semen ventriculo inimica adeoque exauctoranda sunt. Radix decocta cum vino hydropicorum aquas expurgat.

Bryonia quidem non immeritò in hydropo commendatur ab *Helmontio in hydrop. ignot. §. 40.* tum quia aperit, tum quia serum hydropicorum evacuat; convenit & in aliis seri actis vitiis, sed purgandi scopo ipsa quoque stat post principia.

Rhamnus solutivus, seu spina cervina, vix nomen retinuit, seu usum spectemus, succo viridi nauseabundus & minus frequentatus, vel fundamentum in re habens.

Grana tilli & semen ricini unius ejusdemque quidem sunt prosapiæ, illa siquidem nihil aliud sunt quàm semina ricini, pro diversis tamen assignantur, quòd grana tilli sint semina ricini ex Indiâ allata, & forsan alius specie; semen verò ricini apud nos quoque haberi queat. Sive pro uno eodemque, sive pro diversis habeantur, perinde est, neque enim in usu sunt seu in praxi adhibentur à medicis, ob vehementiam & acrimoniam, quod uredinem molestissimam habeant, quæ in pelliculâ intimiori medio loco residente imprimis conspicua est. Adhibent ea adhuc empirici & balneatores, & memini civem quendam numero tria adsumsisse, indeque fortiter purgatum. Qui verò vim agendi nosse velit, gustet saltim particulam, inde enim fauces accenduntur quasi summo ardore & intolerabili. Par ratio quoque est *nucis cathartica*, quæ cum dictis convenit effectu, differt magnitudine, est enim major, de quo præter *Clusium* aliosque legi potest *Sim. Pauli quadrip. botan. p. 548. & 552.* ubi & de granis tilli plura habentur.

Epithymum cuscutæ est species, siquidem quod apud nos in lupulo, urticâ & aliis plantis est cuscuta,

id in thymo est epithymum, licet & odore, qui thymum refert, & nodis ac filamentis à cuscutâ differat, Creticum & Narbonense eligendum. Fatentur autores omnes corrigendam esse ejusdem tarditatem & siccitatem, unde reverà si examinentur singula, purgantibus sociatum hinc in classem ipsorummet relatum fuit. Præstat corrigentis & alterantis loco in affectibus melancholicis ad 3ij. iij. 3ß. infusis & decoctis addere, siquidem spiritus blandè reficit, aco rem infringit, serum corrigit, subtilitate suâ penetrat & aperit.

Cortex frangula in balneis & unguentis euporistis contra scabiem etiam vulgò usitatus magis. Eadem ratio est *cort. sambuc. sem. & cort. ebuli*, item *rhabbari monachorum*, quod debilius longè evacuationem præstat, unde in duplâ dosi præscribendum censent; in clysteribus habere locum potest.

Patet ex dictis, esse & in his minus usitatis quandam differentiam, nec tam negatam purgandi vim & efficaciam, quàm selectum, & quod iis primariò purgandi fine non facillè utamur.

De Purgantibus rarius Usitatis.

RARIUS & DETERMINATE USITATA vocamus, quæ in praxi quidem locum habent, sed itidem non quotidianum, primarium & catholicum, sed magis in his vel illius casibus & circumstantiis, si quidem selectum attendamus.

Cassia, ad differentiam lignæ, *solutiva* dicta seu fistularis, à formâ, in cannis enim videnda est filiqua, ex Ægypto & Indiâ afferri solita, unde *Alexandrina* audit. In usu est non tota, sed quoad pulpam recens extractam, quæ & *flos Cassia*, item *extractum* audit, semen verò & cortex, & interstitium membræneum non sunt purgantia seu usualia, quin adstringunt potius.

Temperatæ est naturæ, & blandâ, subdulci, mucilaginosa vi humorum acridinem mitigat, acridinem sanguinis, seri & feminis: & siccitatem corrigit. Hinc *pectoralis* est, in tussî infantum & adultorum, pleuritide; *nephritica*, in calculo & renum ardore, ciens urinam & vias leniens; in gonorrhœâ item simplici & virulentâ, ut & pollutione nocturnâ conveniens. Benigna est, unde Italici maximè frequentata, & gravidis ipsis concessa, sed lenior, flatulenta & ventriculi, fermentatione humorum, flatibus, ut in colicâ, hypochondriacis.

Pollet verò in recessu insigni stimulo, unde eâ & ob hoc non abutendum est, vel promiscuè in calculo utendum: siquidem observarunt autores inde sæpe ardorem urinæ ejusdemque copiosum profluvium subsequutum. Videri de hoc præter *Zacut. Lusitanus* meretur *Hildanus l. de Lithotomiâ vesic. p. 759.* Hinc in mixtu cruento & quibus calculus secus fuit, in diabete & similibus urinæ vitiis non æquè prodest, sed cavenda est. Datur ad 3ß. 3vj 3j. & amplius.

Tamarindorum pulpa cum Cassiâ convenit quoad laxandi effectum, differt, quòd acidula sit, & non tam laxitatem quàm adstrictionem post se relinquat; separata itidem à villis seu filamentis & nucleis. Frequenter cum Cassia miscetur, eadem gaudens dosi, ut alteram quasi corrigit.

Acidulâ suâ qualitate simul fermentativâ laxat quidem, sed simul acrimoniam biliolam mitigat, unde in febribus, hæmorrhoidibus fluentibus, gonorrhœâ, ictero, hydropo &c. convenit, sitim sedat, quin & Tincturam 3is extrahit, quod *Mynsichtus* imprimis commendat, vim aperitivam & roborantem adaugens.

Manna, cum epitheto *Calabrina*, à patriâ, vel electa, id est, candida, duriuscula, dulcis, facillè liquefens mali-

masticatione, dicitur, licet etiam inter *foliosam* seu *granulatam*, & *ramosam* seu *mannâ corporis*, & *masticinam* distinguant, respectu partium arboris, ex quibus colecta est, & bonitatis. Non tamen est lachryma arboris, v.g. fraxini, quod *Donatus ab Alto mari* & *Clusius* contendunt; sed mel arboreum concretum, ex iisdem principiis ac mel compositum, cum quo maxime convenit, à coagulatione salinâ firmiorem consistentiam sortita; participans de rore & arbore. *Magnenus l. de Manna c. 12. p. 66.* ejus principia ponit: ceram primigeniam, mel primigenium, halitum rotidum, ☉ & ☽ *cum. More dulcium condit sal acidum, hinc fermentativum & absterisivum.

Prodest laxandi virtute in infantibus, ira tamen, ne adfit dispositio epileptica, in aliis quoque per se data ab unc. ℥. ad unc. j. ij. Prodest scilicet, ubi dulcibus locus est; nocet, ubi eadem non profunt. Hinc pituitam liquat, & ad alvum blandè divertit fluidiorem redditam, demulcet acrimoniam, levit & abstergit inprimis pectus & bronchica & arteriaca; unde in tussi, raucedine & aliis asperæ arteriæ vitis prodest.

Convenit & in obstructâ alvo à siccitate, unde & conserva rosarum mannata commendatur, descripta à *Sennerto in Instit.* item in morsulis datur, tabulata seu in morsulos redacta, de quo vid. *Schroderus*.

Minus prodest in febribus acutis & ardentibus, ut & peripneumoniâ & pleuritide; minus etiam ventriculo debili & picrocholis, nec variolis, morbillis, diabet. &c.

Turbith, seu turpethum, iridem ex Arabum invento clarum, cortex est albus, lignosus & resinosus seu gummatosus, radice exoticâ, juxta nonnullos Thapsia, cum pro unâ eademque exhibetur, plantæ latifolientis sui generis. Esse nucleum interiorem radice scamoneæ, vel saltem ipsi simillimâ tradit *Strapel. comm. in Teophr. p. 1054.* qui latius de eò videri meretur.

Communiter in electionis signum album præscribitur, magis tamen gummositas prævalet; calidum est & acre, unde humores pituitosos validè purgat, neque etiam nisi in humidioribus & fortioribus, ubi humores liquandi fuerint, æquè locum habet, præprimis in pulvere, unde cum zingibere in Indiâ condit, in scrophulis commendat *Sculter. obs. 31. p. 90.* Per se raro vel nunquam datur, species verò disturbith eum rhabarb. more aliarum confusæ sunt, & licet stomachicis, zingibere, mastiche, cinamomo, aniso corrigantur, ventriculo tamen inimicum est medicamentum & tormina faciliè excitans. Alii cum aceto corrigunt, & sic in usum vocant, quod commodius, vel etiam extractum parari inde potest. Verbo, vel in infuso, vel in extracto, mitiori & retusâ sic reddita acrimoniam, tutius usurpari potest. Ad vermes dilaudat *Heerius obs. p. 293.* qui lumbricis ejiciendis aptissimum semper invenit.

Cnicus seu *Carthamus*, crocus sylvestris, *Safflor* ad differentiam croci genuini dictus. Dicitur *Carthamus* ab Arabico... non verò, nisi abusive, ἀπὸ τοῦ καὶ καθαίρειν, à purgando.

Eliguntur purgandi sine sola semina eaque recentia, albicantia, succulenta, medullâ candidâ & pingui referta. Mite est medicamentum, cum levi amaritie in oleosis partibus acrimoniam leuem salinam condens, unde humoribus serosis coagulatis incidendis aptatur. Speciatim in affectibus pectoris, asthma, tussi, hinc & anasarçâ, colicâ, quartanâ convenit.

De *matalizâ*, minus notâ aliâ radice, latius egimus & sententiam nostram tulimus *diff. de Gialapâ*, quod nempe sit *gialapæ* species tertia, quàm *matalizæ* Indi nuncupant, ex quo faciliè *Europæus matalizæ* vocem formaverit. Primus ejus meminit *Joh. Bauhinus hist. plant. l. 15. c. 26.* qui Duci *Wirtenbergensi* *Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.*

nomine radice purgativæ *Indicæ inattalitzæ* missam scribit, procul dubio à seplasiario, advecta ex Americâ, successivè innotescente mechoacanâ, *gialapâ* & hâc ipsâ, sed quod *gialapâ* palmam præriperet, minus hinc curata. Nonnulli putant, esse hanc eandem cum radice *Quimb. ya* Hispanis dictâ, descriptâ ab iisdem, & nominatim *Fragoso sin. cap. de rhabarb.*

Emulatur radix formâ bryoniam aut mechoacanâ albam, quâ tamen villosa seu fibrosa & consistentiâ magis dura est, fibris quasi ligneis constans. Gustu quoque convenientiam aliquam cum mechoacanâ demonstrat, extracta cum Vi essentiam flavescientem præbet, mediæ virtutis inter *gialapam* & mechoacanâ, eadem dosi danda.

Hermodactyli licet à *Foresto* rejiciantur *L. l. p. 797.* nec iis utendum putetur nisi in valdè robustis corporibus; tamen inter *degestivâ* à nemine, quod sciam, referuntur, quin mitiores potius sunt & legiores. Radix ex Colchici non venenati, cordis figurâ ferè conspicua, non acris, mordax, sed farinaceum pulverem largiens. Determinantur verò communiter ad affectus arthriticos, item luem Veneream adstrictione inde consequente ob partes terreas. Sero debitum est medicamentum, uti radices ferè bulbosæ omnes eidem vel denulcendo vel acuendo faciunt, præterea etiam omnes ferè tales radices mauscam cient. Præstat eandem vel in pulvere dare cum aliis, cum tardè operetur, & nauseam ventriculo creet, vel in infuso pro vino ad ℥ij. vel ℥ss. Pil. de hermodact. crudiores sunt. Pulvis hermodactylorum compositus describitur in *pharmac. Londinens. p. 177.* sociatus pulvere ossium human. calcin. qui ipsi communiter eodem fine commendantur in podagrâ, alcalinâ scilicet vi, non aliâ.

Infamium medicaminum, seu fortiorum & violentorum potius exemplum præcipuum præbet *colocynthis*, fructus seu pomum excorticatum cucurbitæ sylvestris, alio contra amara, unde etiam contractu & affricu saporem hunc cum cultris, orbibus & manibus communicat.

Noxæ, quæ inde producuntur, inprimis sunt cum reliquis *degestivis* communes, rasio intestinorum, tormina imminia, sanguinis prolectio seu dysenteria ipsa. Quem in finem antiquitus antidota & correctoria opposuit viscida & glutinosa, unde trochisci alhandal. i. e. de colocynthide enati sunt, quod ipsum quoque non penitus contemnendum est, cum impediatur ac obtundatur paulò acrimoniam. Oleosa verò commodum eo casu esse remedium, observatione insigni probat *Tulpius l. 4. obs. 26. p. 318.* referens bibisse quendam trium pomorum colocynthidis decoctum, inde tormina & sanguinis profluvium vehemens passum periculum vitæ subisse, evasisse tamen epoto multo oleo eodemque infra copiosius infuso, unde dictum factum refrænata fuit effera medicamenti orodentis vis.

Neque tamen ob hoc ipsum vel *colocynthis* vel alia in genere similia violenta penitus sunt rejicienda, quin & de iis in universum valet: ubi virus, ibi virtus. Duro nodo durus querendus sæpe cuneus. Non minus rebelles & indomiti dantur morbi, nec minus & humores viscidii, glutinosi, vix mobiles, qui levioribus non auscultant; morbis igitur talisimodi chronicis ac rebellibus, humoribus crassis & immorigeris merito opponuntur & inter alia *colocynthiaca*. Hinc convenit in hydrope, colicâ, à pituitâ vitreâ, asthma, maniâ, melancholiâ, leprâ, scabie, apoplexiâ & affectibus aliis soporosis. Unde & ipse *Helmontius l. dispens. mod. t. 48.* colocynthidem vocat chronicorum curatricem egregiam, ob vim resolutivam extraversam, si sale circulato corrigatur.

Ut itaque inter agens & patiens requiritur proportio, LII 2 tio,

tio, ita tum in his casibus, tum etiam corporibus robustioribus & integris viribus, quin ubi vires quasi accidendæ sunt, in mania, habet locum; in debilibus verò, hæmoptycis, phthificis & rarioris texturæ aliis, item pueris, senibus, puerperis, prægnantibus, inadæquatum fuerit & inconueniens remedium.

Factâ etiam correctione & accisâ vehementiâ tuta sunt *degsimâ* hæc magis. Correctio fit plenior quidem in extracto, cum acidis quoque ipsis; tutius ergo præcipue est extractum, reuolutor item vis est in infusis, in clysteribus, neque enim in substantiâ dare consultum est. Spectat huc confectio Hamech. de quo videatur *Solenander in consil.* ubi pluribus contra colocynthidem inuehitur, ut & *vitæ aureus Rul.* factâ extractione troch. cum *Vi*, sed ingratiior. Mitiora quoque singula oportet reddantur, dosi accisâ & minori, ut contra ea si trochisci quoque ipsi dentur in formâ pulveris, majori præbio, exinde sæpius convulsiones secutæ fuere. Hinc *degsimâ* ipsa hæc si non per se, tamen cum aliis & imprimis in extractis panchymagogis locum habent eximium. Imò & ipsâ quoque partium diversitate variat in vi colocynthis; Semina enim ipsa pulpâ mitiora sunt. Memini chirurgum quendam egregie purgasse plurimos lue venericâ laborantes solo infuso seminum colocynthis cum cereviliâ factâ. Bibitum infusum colocynthidis à studio scabioso multos humores adustos evacuabat.

Fortiora mediæ hujus classis stimuli loco commodè & magis inserviunt reliquorum, ut mitiora lenientium, & imprimis in pilulis. Hinc si indicatio sit, præter alia dicta, menses citare, vermes necare, commodè purgantibus pilulis addere licet trochiscos & extractum troch. alhandal. Observavi aliquando g. v. trochisc. horum cum gialapæ gr. xv. loco stimuli data nil exfecisse tamen. Inter epomphalia exterius adhibenda *degsimâ* mitiora quoque sunt, unde *o* diacolocynth. inter illa locum habet.

Helleborus niger inter purgantia olim communissimus fuit, unde & in proverbium abiit, helleborum capere, ire ad Anticyras; radix fibrosa, quo ipso ab albo etiam commodè distinguitur. Licet verò ex observatione *Manardi l. c.* & aliorum non tam vehementis sit sine dubio, & noxæ exinde ortæ communes videantur cum aliis omnibus; cum tamen mitiora in usum introducta, sensim eviluit, & morbis gravioribus capitis, epilepsiæ, apoplexiæ, melancholiæ, manie, vertigini & atrabiliariis aliis, lepræ, scabiei &c. destinatus magis fuit. Legi meretur de eodem *Timæus l. 7. cas. 6. p. 312.* ubi tamen Andreæ Knophelio minus favere videtur, odiosè recensens, à præscriptâ potiunculâ cum extracto hellebori nigri mixtâ intra septem horis mortem secutam.

Valent de eo quoque plurima jam sub colocynthide dicta, adeoque certum est & usitatum in praxi, præscribere fibras hellebori nigri in nodulis ad *3ij.* vel *3ß.* quoque innoxie. Extractum quoque commodè miscetur pilulis. In libello Germanico empirico recensetur remedium curandæ manie, si extractum hellebori nigri per decoctum cum Aqua simpl. factum & despumatione depuratum quotidie ad g. j. vel alterum detur. Nempe helleborus acuit non solum purgantia reliqua, verum & alterantia. Exempli loco sit oxymel helleboratum, quod plenis buccis dilaudat *Hoffmannus l. de med. offic.* ingreditur verò in id uterque helleborus, fibræ integræ nigri ad *3j.* & cort. albi radicis ad *3ß.* ut taceam dauram Paracelsi, qui heroem vocat ad quatuor morbos cardinales, & pulverem fol. helleb. nigr. cum sacch. contra vertiginem.

Efulam maximè *Rulandus* celebravit usu suo. In usu est cyparissias, succo lacteo acri, verrucas delente &

exuleerant, acrimoniam suam probans, & quidem magis quoad cortices *ἐξερτες* *ῥομένη*, minus in substantiâ. Licet enim quidam conservam ex floribus parent purgantem, alii verò pulverem corticis commendent, tum solum, tum cum aceto correctum; est tamen id omnino rariùs, unde & spec. diaesulæ *Myns.* minus receptæ sunt in usum, quas in febribus intermittentibus & infirmitate ventriculi commendat. Frequentius præ reliquis est extractum esulæ, seu ex succo paratum, seu ex cortice. Est velut Europæorum scammonium, neque enim dubito, si quis succum lacteum resinofum extrahere & depurare hoc pacto cum *Vi* velit, habiturum illum remedium scammonio par, & stimuli loco commodè inserviens, præcipue in morbis à serosa colluvie oriundis, ut hydropo &c.

Elaterium, aliàs pro omni vehementi agitatorio seu purgante sumptum, strictius paulò & *καὶ ἐξοχρὸν* notat succum cucumeris asinini, hodierno usu non tam crudior & sponte effluens colligitur, quam coctione cum aquâ, unde extracti formam magis æmulatur. Seridicum est excellentissimum, humores tenues serosos etiam extravasatos & subsistentes purgat, præcipue si ab errore externo vel acidulis id ortum traxerit. Datur itidem loco stimuli & in pilulis magis; extractum quidem spissum an gr. iij. iv. v. liquidum verò ad *ʒss.*

Gratiola, hyssopo affinis magis quam centauro, quod *Bauh nus* vult, amaricante suâ & laxante virtute in morbis itidem chronicis, tertianâ, quartanâ, cachexiâ, maximè verò in hydropo usitata est, item in vermibus; magis tamen in infuso, extracto, & cum aliis.

Soldanella seu brassica marina, licet nihil præter nomen cum brassicâ habeat commune, foliis asari, similis species, seu convolvuli, aperit, abstergit & purgat humores serosos violenter, quod pleraque alia *ὀρεγ-γωγὰ* faciunt, etiam soli ferè hydropi hodiè debeatur, præscribenda in infuso vel decocto ad unam vel alteram drachmam.


Elegans verò locus de soldanellâ alpinâ extat apud *Ruland. jun. apol. contra Obernd. p. 67.* ubi ad hydropem & istericos summè laudat, contra Oberndorferum, qui scripto suo contrario latè etiam de eâ agit, sed illam rejicit. Grates omninò debentur *Rulando*, qui experimentis nobilitatas vires primus detexit publicè; & meritò soldanellæ marinæ subit ruit. Ipsam verò plantam describit *Camerar. in Epit. Mathioli.*

De *Gummi Gutta* integrum librum scripsit Lotich us. nihl tamen peculiare quoad experimenta chymica disquirat, contentus curiosè nota de eodem colligere, item *Rosenberg. rhodolog. p. 2. c. 22. & Reuden. cit. à Jonstano & Hochstettero dec. 3. cas. 1. p. 180. seq.*

Pluribus gaudet nominibus, singulis tamen serè cum guttæ & gummi additamento. Frequentissimum nomen est gummi guttæ, vel g. g. laxativum, quod ad podagram, barbaris gutta dictam, profit, exprimat commendatione; item gutta Cambodia. Innouit itidem sub hujus seculi initium circiter ex utraq; Indiâ, ut communiter statuitur, advehi solitum, unde alii ex Sinâ asportari adfirmant, alii ex Peru, unde gummi de Peru seu Chrysopus Peruanus audit, id quod constanter sed frustra forsitan negat *Hochstetter. l. 1. p. 183.* Cum verò in aquâ & *Vi* solvatur, meritò est gummi-resina, succus seu lac citrinum ex flavo rubens, vel subaureum & ultra sulphureum adscendens, unde & ad pigmenta adhibetur.

Sed cui vegetabili debeat, (falsò enim de animalis participare scribitur,) incertum quidem, vix tamen ex ricino Indico, quod *Bauhinnus* vult, neque enim color vel sapor respondit. Rectius è thymali specie arcessitur, quod *Bontius* scriptor Indicus egregius asserit, lacteo colore per crocum Indi-

cum vel curcumam verso. Sunt qui è Beidelar Arabum parari afferunt. Artificiale talismodi esse, etiam figura ostendit.

Notabile est de hoc, (1.) quod, licet colorem saturum possideat tingentem, inde tamen feces non tam tinctæ, quàm serosæ excernantur. (2.) quod ~~alio~~ & ~~noto~~ purget, quod, mediam inter fixam & volatilem habeat acrimoniam salino-sulphuream, inprimis crudum, vel non correctum, vitriolarum enim & magisterium præcipuè in pilulis minus id facit. Hæc enim, ut & sandalinum, rosatum, supinare ventriculū minus solent. (3.) quod  li quidem habeatur corrigens genuinum, additus verò eidem virorem ingratum conciliet, ut taceamus, alios quosdam cum vino malvatico vel præparare, vel exhibere; hinc in potionibus minus commodè, nisi in sirupis solis, unâ præscribitur.

Exhiberi quidem potest g. g. etiam per se, seu dosi primariae, ad g. vi. viii. x. in primis in magisterio, tanquam correctiori, neq; enim ulterius nisi robustissimis facile ascendimus, id tamen magis determinatè, in morbis à serosa colluvie oriundis, nominatim in hydrope, arthritide, ictero, febrib., asthma & primis viis pituita obsessis, item in scabie humidà, leprà, pruritu &c. experimentis hanc in rem dudum factis & receptis hæctenus, quod autores primi, *Bauhinus*, *Lotichius*, *Hochstetterus* alij; et *Simon Pauli*, qui ancillam hydropicam hoc pacto curavit, assatim demonstrant. Frequentius verò in & extra illos casus datur secundario fine, stimulandi scilicet, cum gialapà, scammonio, in extracto panchymagogo & aliis.

Quando *mercurius dulcis* inter purgantia memoratur, probè curandum est, ut nomini suo sit conveniens, i. e. acrimoniâ corrosivâ omni exutus, unde genuinus præparandî modus nisi observetur, necare potest hominem, vel tristissima excitare symptomata. Triste hujus rei exemplum annò 1669. contigit propè Tubingam Sueviæ. Consultitur medicus celebris pro valetudine filioli Pastoris cujusdam nondum bimuli, qui per aliquot hebdomadas malè habuerat, cum calore p. n. & epilepsia uno alteroque insultu; inde restituitur, præter phlegma pectori impactum, & ut videbatur, nidum verminosum. Educendis his præscribitur sequens medicamentum: ℞. ḡd. sexies sublimati gr. xii. g. g. mag. gialap. ana g. iii. M. F. pulv. Assumendo hoc cochlear argenteum statim nigrore affectum intus & exus, os verò infantis albidum & exulceratum seu pusulofum redditum; inde anxius statim sudor, vomitus pituitosus & hinc cruore mixtus secutus, cum roncho & rucedine, morte eâdem die circa vesperam secutâ. Post mortem, factâ sectione, erosus ferè sinistrâ superiori parte ventriculus, præter alia, repertus fuit. Inquisitione factâ Pharmacopœus, doctus & pius habitus, juxta sequentem descriptionem medicamentum præparatum edicit: ℞. ḡ purif. ⊕ l. ex'cc. ⊖ torref. ana: ꝑꝑentur. ℞. hujus ꝑꝑti ꝑꝑb. ⊖ torrefacti unc. vi. Vitriol. ad rub. calcin. unc. ii. sublimetur secundâ vice. Tertio cum ⊖ torref. ꝑꝑvj. tritum sublimetur. Hinc sublimatum hoc modo per se ter vel quater rectificatur. Consulta super hoc Facultas nostra à Senatu Academico Tubingensi respondit meritò, ḡium hunc non fuisse dulcem, (oblato etiam simul specimine,) sed potius ḡium ꝑꝑmatum simpliciter, adeoque venenatum. Tanti est nôsse sinceram præparationem! Nullus scilicet ḡ dulcis hunc titulum meretur, nisi qui ex ḡ ꝑꝑto cum ḡ vivo ana fuit evectus, intermortuis hoc pacto particulis acuminatis salinis.

Determinatur & dulcis, his positis conditionibus, ad *scorpi* feri quæcumque, ejusque acrimoniam & ichoreſcentiam, tum in hydrope, quo titulo etiam à *Paracelſo* fuit commendatus, & feliciter adhibitus

Mangei Bibl. Pharm. Tom. II.

non rarè; tum in scabie, lue & aliis, sive salivandi sine perfectò, sive laxandi & dirigendi solum, unde & in gonorrhœâ & vermibus abigendis infumitur. Præstat verò eundem minori paulò dosi exhibere, neque enim vel fortis est aded, quin legnis & à reliquis extimulandus; vel soli purgationi debitus, siquidem tunc salivandi potius scopo prodesse potest, reperitâ per aliquot dies dosi, gr. v. vi. vii. cum extract. scorzon. lign. sanct. &c. in pil. redactus. Præstat verò in infantibus tenellis vel abstinere omninò ab eodem, quòd tenerius sit ipsorum serum, vel dosi non excedere, nec temere ipsum propinare.

De Purgantibus Usitatioribus & selectis.

Decantatissima est inter Lenientia *Aloe*, succus
herbæ cognominis, sed non Americanæ, quæ amara
non est, sed Indiæ orientalis, quam & Græcam vocant,
cujus succus & flavescens & amaricans etiam in no-
stris aliquando hortis visitur.

Differentia *ὁπός, χυλός & δακρύς* differentiam etiam præparationis & consequenter ejus velut specierum patefacit. Lacryma enim est sponte exsudans & concrescens gummi, resina, vel gummi-resina, *χυλός*, succus, qui incisione exstillans concrescit; *ὁπός*, qui exprimitur, participans de purioribus & impuris paulò particulis. Hinc *socoterina* aloë optima est, magis de *χυλῶ* participans, succus depurator, subtilior & quasi flos ejusdem succi, dicta ab insulâ Indiæ orientalis, Socotera, è Geographicis tabulis benè nota, non quasi succocitrina, juxta *Fuchsum*, vel succocedria, quod utrumque *Salomon Albertus* opinatur, *orat. de anat*; uti à patria quoque dicitur opium Thebaicum, manna Calabrina, myrrha Orontea.

Post hanc altera quoque *hepatica*, à colore & figura, quibus hepar æmulatur, dicta in usum vocatur; *Caballina* verò tanquam recrementum ultimum pro caballis meritiò veterinariis relinquitur, neque in officinis extat.

Cum ergo purgans sit eximium, & fel quasi eternum, quod fellis defectum optimè refarcit, juxta has suas qualitates etiam modificatur. Ratione etiam partium amarificantium ventriculo est amica, vermibus, lumbricis & putredini omninimica, tantoque magis putredini resistit, quo magis una est emplaistica & balsamica. Vulpes verò, lupos & canes necare scribitur, forsan quòd, cum sicciora sint hæc animalia, vis irritativa magis cum nervis communicetur & archeum exturbet. Experimentum cum vulpecula fecit *Scaliger. exerc. 278. §. 12.* qui vidit illam aloë cum canibus devorata extinctam.

Ob partes resinofas emplasticas dictas exterius adstringit, siccat, consolidat, in vulnere atteriarum à Galeno ipso commendata.

Ob partes acres resolubiles gummeas ita dispositas stimulat, aperit, purgat, detergit, adeoque feces ad exitum disponit, unaque bilem & pituitosas partes educit. Prodest ergo ubicunque sanguinis particulæ balsamicæ sunt restaurandæ, & volatiles in motum citandæ, in cruditatibus cumprimis acidis & pituitosis à crapula & aliunde ortis, cachexia, chlorosi, mensium & hæmorrhoidum suppressis laborans duobus curabatur remediis, pulvere cachectico, & elixirio propriet. Prodest humidioribus tum quoad totum, tum quoad intestina, siccos verò, nisi teneriori textura villorum & sensu polleant, vix mover. Prodest in nausea, ipsarum quoque prægnantium, & vomitu.

Nocet vero siccioribus & senibus, nisi praesentia humorum in primis viis stabulans id urgeat, ventriculo calido & sicco, hecticis, tabidis. Nocet.

ubi acrimonia sanguinis exitum affectat, in hæmophysi, mensum & hæmorrhoidum fluxu, & similibus.

Refert *Beza in vitâ Calvinî*, ipsum ex crebro ejus usu in hæmorrhoides ulcerosas & sanguinis excreationem incidisse, Et ab usu adulto pilularum Francofurtensium quarta ferè pars eorum, qui ijs uti sunt, observata fuit hæmorrhoidibus correpta. Experiri id quivis potest, si continuare usum ejusdem per aliquot dies sustineat, tenebunt saltem hæmorrhoidalem excitari. Unde frustra est *Euchsius l. 1. parad. c. 1.* ubi id negat, confundens externum usum cum interno. Facit id (1.) ob acrimoniam cum purgantibus alijs communem; (2.) quia pituitam detergit, adeoque nudat magis vasa; (3.) quia bilem unâ promovet, & ad partes inferiores derivat, quæ ibi subsistens stimulat. Observatumque à nobis est alibi, hæmorrhoidum immodicum fluxum à copia bilis obortum, dato quippe purgante ex gialapa, eadem manifestò excretâ id ad oculum paruit, cessante hinc fluxu.

Aloë etiam somnum citat, non solum mediâtè ex ventriculo educendo quicquid turbare illum crudorum humorum posset sed etiam alia ratione, quatenus partibus sulphureis resolubilibus gaudet,

In usum vocatur non tam cruda, nec in pulvere, quam præparata & in pilulis; ita enim amarities occultatur, quam *Musa l. de herb. beton. in præf.* averfatur, unde aloës & absinthii, aut non est tantum sentire auxilium, quam ut amaritudinem sentias. Lotam verò, propriè sumta voce, jamdudum *Galenus* notavit *l. 3. simpl. c. 15.* aut debilitat aut planè non ventrem subducere. Optimè verò mensuris aqueis extracta, quorsum & succus rosarum vel violarum pertinet, vel melius adhuc cum martialibus aliisque confermentata, unde doctes ejus optimè venari & quasi clave quadam licet eruere.

Minus aloëticis favent *Scaliger & Hoffmannus*. Ille Ebnisiam & Mesuen secutus, loco supra citato, plurimos se exemisse scribit à perniciè manifestâ, in quam conjecti erant aloës usu à medicis & empiricis. Hic verò *l. 1. de med. offic. c. 3. p. 8.* negat ante cibum vel cum cibo adsumenda aloëtica, & vidisse se addit, in ijs, qui de nocte capiebant, obortas cacochymias degenerasse in febres malignas, quatum finis mors. Abusus reverà nunquam tollere debet usum.

Æmulatur aloë bilem sapore, qualitatibus & effectis; balsamum est bilis corporis, balsamum naturæ aloë. Unde æmulari rectè jubet *Simon Pauli quadrip. p. 246.* chirurgorum solertiam, qui cavendum suadent, ne nimis extergantur vulnera, aliàs cambium quasi tollitur; ita aloëticis non extergamus mucum intestinorum plus quam par est. Tantum abest, ut lædatur hepat commodo usu, & lymphæ non destitutum, ut aloëtica cum cibis data noxas dictas excitent; ut potius contrarium toto die experiamur. Facit hunc, quod olim majori dosi eandem dabant, à 3ß. ad ʒj. quam dosin & *Jonstonus in syntagm.* retinet, unde facilior læsio, hodiè verò observatum est, minori quantitate assumptas pilulas, pro resolutionis modulo, efficacius operari, quam majori dosi, minus resolubili. Est igitur lenientium apex, indemonis & innoxia, ipsis quoque & inprimis utilis infantibus, in febribus, & aliàs; unde hodie pilulæ Francof., Glassianæ & aliæ magni nominis sunt, hypochondriacis ipsis utilissimæ, modò non viscera arefiant & caleant salina acrimonia. Ubi bilis abundat, minus prodest, contra vulgatam hypothèsin, citra humorem nempe ferolum, unde hecticis, hæmoptycis &c. minus convenit.

Ex sangis medicis nobilissimum est *agaricum*, à

patria prima, ut putant, *Agaria Sarmatiæ regione*, Asiæ confini, dictum, licet à quibusdam radicis nomine veniat. Dicitur *agaricum* sine additione alia, præterquam albi epitheto, qui electionis character est, uti ad umilitudinem hujus lac Lunæ audit *agaricum petrarum*. Fungus verò est laricis, quæ & *Terebinthina* Venetam seu resinam lariceam fundit, quando in cariola arbore sal volatile fatiscit, deviat ex archæi ordinario jugo, & occasione humoris extranei cum particulis terreis efflorescit, ex Alpibus, & vicinis locis alijs adferri consuevit.

Optimum hinc *album*, quod, communi contradistinctum, hinc electum dicitur, sapore est γλυκύπικρο à dulcedine subamaricans. (quod utrumque acrimonia salina resolubilis signum est,) leve, raro ac friabili corpore; noxium nigrum lignolum.

In substantia quidem non datur, præterquam trochiscatum partim ob segnitiem, unde & nausea recundi & acui debet, tum purgantibus, tum aromaticis. Reverà enim aromatica, calore excitato, mensuræ ventriculi obedientiora reddunt medicamenta purgantia.

Vi texturæ laudatæ serum in coagulum abiturus fluxile reddit, & in motum citatum excretioni aptat, morborum catarrhalium remedium; hinc in coryza, defluxionibus catarrhalibus, asthmate, tussi, febribus quotidianis & lentis, à cruditate foci prodest; item in hydrope cachexia, fluore albo, mensum suppressione; ut taceamus communem cum purgantibus alijs vim anthelminticam, & attributam vim alexipharmacam, unde theriacam ingreditur, quam & *Galenus* ipse confirmat *l. 6. de simpl. c. 6.*

In usu habemus præscribere *agaricum trochiscatum*, vel sibi relictum in nodulis ad ʒj. ʒj. ij. in decoctis quoque & clysteribus, in quibus in peria, recepto usu, ligari solet, tum propter levitatem, tum, quæ ratio videtur præcipua, ut exprimi hoc modo possit & vis purgans tanto magis cum decocto communicari. In extracto quoque datur commodè cum purgantibus miscendum; ut in extractis panchymagogis. Electuarium hieracum *agar.* in clysteribus, pro dicto scopo usitatis, quoque locum habet.

Mechoacanina, seu sola sine epitheto nominata, καὶ ἔγχυον, seu ad differentiam gialapæ, quam nigram vocant, *Mechoacanina alba*, dicta est à patria, provincia Americæ, item thabarbatum album à virtute. Præter scriptores Indos videri de ea potest *Oeverndorff. contra Ruland. p. 58.* ubi radicem hanc anno 1524. primum celebrem factam esse & longo tempore post ad nos alatam ait. Scripsit etiam ante centum ferè hocce annos de eadem cum alijs *Joh. Vl. trich. p. 113.* ubi refert ex Indicis relationibus inventionem ejusdem adscribendam medico Indo, qui ægrotanti monachorum provinciali, ut vocant, propinâtâ hanc radicem sanitatem restituerit, unde famâ ad alios perlata, Hispanis, Lusitanis, indeque reliquis Europæis innotuit.

Consentiant plerique radicem hanc tessellatim sectam, interius & exterius albescen. em, inspidam, inodoram, [respective] cortice cinereo, esse convolvulis speciem, unde à *Bauhino* refertur ad bryoniam, cujus tamen radix multum differt à radice *Mechoacaninæ*.

Ob benignitatem applausum merita est insignem, diu ante inventam gialapam, in solum quasi evecta, attestante usum experientiâ, præcipuè in delicatis, infantibus ipsis, hinc & in hydrope scorpi, ictero, colicâ, asthmate & catarrhis: idque tantò magis, quod adstrictionem post se relinquat, vel potius nullâ heterogeneâ inimicâ qualitate sit sigillatâ.

Dari potest tum in substantiâ, minori tamen potius dosi à ʒj. ad ʒij. præstat enim acutere alijs; tum etiam frequentius quasi in infusis & decoctis, ad ʒij. ʒj. ij. præscribi solita.

Rhabarbarum laudatissimum pluribus seculis fuit in scholis medicis, adhuc parum notum quoad plantam, indicio manifesto distinctissimæ patriæ. Ut ait *Kircherus in Sina illustrata* plantam depingat, quam vulgo & botanici in hortis colunt; rhabarbari veri nomine, non tamen vel qualitates vel vires respondent, ut bonus ille Pater, qui asseveravit *Kircherus* genuinum id esse, procul dubio minus in hoc certus fuerit, nisi velimus dicere alio sub sole calentem herbam differentem producere radicem, contra ac alia faciunt, quæ apud nos jam indigenatum accepere.

Notare hinc operæ pretium est nomenclaturam. Rha vel Rhei vox *Dioscoridi* & *Galenonora* est, additâ hinc, ad differentiam rha pontici, barbari voce.

Communiter creditum fuit, dici rha à fluvio cognomine, qui hodiè Volga dicitur in Tartariâ. Ita *Ammianus Marcellinus* l. 2. p. 232. *Tanaïscribit*, rha vicinus est amnis, in cujus superciliis quædam vegetabilis ejusdem nominis gignitur radix, proficiens ad usus multiplices medelarum. Hodiè verò innouit, omne rhabarbarum ex Sinis ferri, sive maritimo itinere per Belgas, Hispanos aliosve eò navigantes, sive pedestri itinere per Tartariam & Muscoviam. Adeoque constat rheum Barbaricum dici, non quod in Barbariâ crescat, sed quod à Sinenfibus in Indiam, inde per Barbaricum finem aliasque regiones ad nos adferatur, ut ait *Seapell. comment. in Theophr.* l. 9. p. 1018. Videatur idem *latius l. c. & Bellerophon* aliique omnes id confirmant. Alexandrinum verò dicitur, ut & sena Alexandrina, præcipue ab emporio commerciis celebri Alexandriâ, unde olim afferebatur solum, hodiè verò etiam ad differentiam rhabarbarismo monachorum dicti, quæ radix est lapathi palustris majoris.

Afferitur rhabarbari electi radix magna & crassa, funis vestigia præferens, ad exiccandum usurpata, cortice exterius nigricante derafo stilis ubentibus flavedini intertexta, odore sui generis, sapore subamaricante, cum leni adstrictione, masticata ori offerens quasi particulas glutinolas, cum terreis confringibilibus remixtas, quod etiam *Seppalius* jam notavit l. 9. *animarum*. 125. ubi confecto eodem folis radijs exposito aliquid gummosum & splendescens se vidisse ait; cæteroquin non lignosa, non verminosa, sed ponderosa tamen & minus compacta.

Ex his, seu textura particularum & effectu, constat, acrimoniam salino-sulphuream condere rhabarbarum sub amaritie terrenæ & viscedine lentâ, adeoque ob diversitatem partium geminum edere effectum, laxantem quidem seu purgantem benignum, ratione partium acrium salinarum, & adstringentem ob commixtas partes terreas & austeriusculas, illas modificantes.

Prodest hinc ut purgans selectum benignum & catholicum generatim, ubi laxandum fuerit, etiam per se masticatum vel in pulvere adsumptum, neque enim correctione eget, nisi aromatica, schœnanthum, spicam & alia ad meliorem actuationem jungeret placeat. Ipsi etiam infantibus ad expurgandum meconium, puerperis ad promovenda lochia & purgandum uterum, imò gravidis innoxium & convenientissimum.

Speciatim verò est hepaticum & bilis correctorium egregium, unde & anima hepatis audit, q. d. fel externum, quod de aloë diximus, commodissimum, bilis enim est anima hepatis; modò, quod cum aliis commune habet, & seorsum ob siccitatem desiderat, humorem sufficientem offendat, ad resolutionem, nam aliàs præsertim in substantiâ minus prodest, unde sunt qui, eo casu puta, mortem potius hepatis vocent. Prodest in ictero, quod explicatâ acrimonia sua sensim & suaviter cunctantes bilis particulas proluciat ad intestina, unaque amaritie suæ roborer, fel, ut tartareis liberetur. In omni enim ictero cœnosus sulphureus im-

purus tartarus in urina visitur. Laborabat ictero persona quædam illustrissima, quam curavimus brevi singulo mane ʒj. rhabarbari solius, vespere martialia, intermedio tempore Tincturam aperitivam propinantes. Idem in aliis quoque feliciter experti sumus. In siccioribus in infuso cum alijs specificis prodest.

In hydropè rhabarbarum proficuum est *Th. Erast.* ep. 9. comprobatur, si rhabarbarum, ait, sumere queat, & ab eò strenuè exerceri solitus sit, hoc solo sæpius repetito, curabitur. Etenim, addit, non se solum, sed & alios solo rhabarbaro hydropicos percurasse. Contrarium verò defendit *Sancorius communis* l. 4. 22. quæst. 75. p. 213. Galeni illud secutus, medicamentum cholagogum in morbo pituitoso esse, tanquam venenum, & Ebnsinæ, rhabarbarum, quod evacuet bilem in hydropico, esse tanquam venenum, quia in hydropè bilis desideretur, & *Septanius* l. 7. caus. 54. quod talia non evacuet, quæ evacuari debebant.

Notabile verò est (1.) in genere, non omnem hydropem fieri à bilis defectu, quin non raro ab ejusdem acrimonia, unde vasa lymphatica erodit. In cadavere studiosi hydropici invenimus bilem copiosam, rufescentem & quasi oleosam, cum hepate omni sanguine carente, vacuis quasi vasibus. (2.) convenire in hydropè rhabarbarum multis nominibus, modò ejus & ægri temperamentum observemus. Hinc legi meretur quoad hoc *Baccius* l. 3. c. 3. de thermis, qui aliquot hydropicos curavit solo poculo urinae puerilis 10. ann. per 30. dies continuos manè, & rhabarbaro pro purgante adhibito, hinc & per interval-la fabæ magnitudinè commanso, quod pluribus exemplis confirmat.

In febribus tertianis utimur non solum anima rhabarbari, quæ ipsa & in ictero prodest, verum & infusis alijsque. Genuina enim methodus curandi febres consistit in amurca, bilis & obstructionibus expediendis, hæc quippe fermentum febrile unice vel fabricat vel fovet. Sic & in hypochondriacis, scorbuticis, impuritatibus sanguinis, scabiosis, prodest, unâ urinam colore croceo tingens ob sulphur resolutum & in serum diffusum; adeoque est simul diureticum & nephriticis salutare.

Deinde & speciatim prodest roborandi intentione, quando temperatius purgare & postea adstrictionem scenerari intentio est, ut in diarrhoeis, dysenteris, fluxu hepatico. Quin adstringendi sine hoc tostum rhabarbarum in usu practico est, reclusis sic magis sulphureis & aqueis ablatis, unde adstrictoria prævalet, purgans verò aboletur ex parte.

Denique & resolvendi virtute in grumescentiâ, casu ab alto, lochiis restrictis, & amaricante anthelmintica eximium est. Vacuat igitur irritando, roborat adstringendo, tonicum laudatissimum, minori dosi verò alterat. Unde usi sumus eodem cum successu in vomitu cruento, alvo adstrictâ, item in hæmoptysi, ob indicationes puta convenientes. Integrum de eo librum scripsit *Tillingius*; aliàs verò plura legi etiam possunt apud *Wurich. l. c. Rhodium in analectis*, & alios.

Dosis quidem ordinaria est ʒj. quæ si ob diffusorem molem minus arideat, minor dari potest, & stimulanis addi, inprimis etiam ʒea, cremor vel crystalli ʒri, & alcalia. Hæc enim sunt genuina clavis ad centra ejus referenda, unaque experimenti loco ad elementa dignoscenda, alcalina enim sunt menstruum sulphureorum & aqueorum genuinum. Imò exinde etiam patet, quare *Rollius Basilic. Chim.* p. m. 308. scribat, levi elixatione vim purgandi amittere quod & in luminari majori confirmatur p. 162. 1. ubi *Suor-dus* commentator scribit, rhabarbarum parum sustinere de decoctione, adeoque in sirupo de citro debere addi, quando sirupus jam mediocriter fuerit coctus. De-

cepti fuerunt exinde, quod putaverint, avolasse virtutem catharticam exinde, quod segnius decoctum esset, cum tamen vis purgans non in volatili parte consistat, ceteroqui extractum rhabarb. planè esset iners, quin ne exprompta quidem fuerit menstruo solo aqueo.

Quod de lapathio unctuosum dicitur, illam totam bonam esse, illud potiori jure tum de selectis purgantibus omnibus, tum in specie de *Sena* dici potest: Tota bona est. *Sena* recentioribus seculis celebrata est, disquirente in epistolis *Mundella*, an veteribus fuerit agnita nec ne.

Dicitur itidem *Alexandrina*, quod *Alexandria* ad Europæos vehatur, licet illuc ex Persiâ & aliis locis afferatur, censente *Stapelio comm. in Theophr. p. 1818. r.* ad differentiam nempe (1.) *Italicæ*, quæ minus est efficax; unde signum pathognomonicum *Senæ Alexandrinæ* præbent folia acuminata. (2.) ad differentiam quoque *colutheæ vesicariæ*, fructibus vel scorpioidis, vel sylvestris, apud nos quoque crescentis. Licet enim succedanea hæc statuatur, & esse possint, uti in defectu *Alexandrinæ* folia *colutheæ vesicariæ* Danis suis suavit, & felicem successum expertus est *Bartholinus cent. 5. obs. 60. p. 130.* citans etiam *M. Zaldum*, qui de *Sena* scripserit tractatum, *senæ* tamen non æquipollent.

Dicitur etiam alio epitheto *senæ electa*, seu *sine stipitibus*, *ausgelesene Senet Blatter*, s. s. & folliculis. Hæ ipsæ enim partes magis flatulentæ sunt, & molem augent, non amarificant, minus purgant, adeoque ventriculo negotium præbent. Neque enim aliàs adeò flatulenta deprehenditur *Sena*, quod vitium ab omnibus quasi tribuitur.

Nomen ipsum *Hippocrati*, *Galeno*, *Panlo* aliisque ignotum sine dubio Mauritanis debetur, quod *Ruelinus l. 1. de nat. stirp. c. 70. p. 147.* asserit, *colutheam* eodem notari asserens, quam in hortensem & sylvestrem dividit, quod & *Mesue* facit loco jam dicendo. Ut ut verò non unum idemque esse *colutheam* omnino & *senam* statuamus, revera tamen non levis est, sed intimior convenientia; (1.) enim purgat utraque, (2.) folliculos habet utraque, quis enim nescit folliculos *Senæ*, quos ipsos *Mesue l. 2. c. 15.* foliis efficaciores constituit, forsitan quoad semen. (3.) folio conveniunt, solo excepto acumine, ut ita *Coluthea* sit quasi *senæ* arborefcens, *senæ colutheæ* folio obtuso, & herba. Neque absolum est, plantam herbosam efficaciorē arborefcēte, exemplo *sedii minoris*, respectu arborefcētis, *buxi* & aliorum.

Amaritiæ gratiâ & tonicâ ventriculo amica est, prugat vero universaliter, leniter & tardè quidem, sed efficaciter humores omnigenos, præcipuè tamen, juxta communem hypothēsī, idque non ineptè, melancholicos, adustos & pituitosos, idque sine ullâ excessivâ qualitate noxiâ. De flatulentiâ cum omnibus purgantibus communi jam diximus. Benignam hanc *Senam* quibusdam caput offendere scribit *Hochstetter. obs. med. dec. 3. p. 185.* id quod sine dubio factum fuit per accidens.

Prodest quinimò universali usu in morbis quibusvis, post à indicatione laxandi, interpret est quasi generalis omnium purgantium & omnium morborum, adde & individuorum, sicubi purgatio fuerit necessaria. Purgantium quidem, quatenus sæpe ipsis fortioribus operatur feliciter, quam in rem non tam *Walai* observatio notabilis est, prædicum quandam melancholico tervè quaterve purgans exhibuisse, nec tamen alvum vel minimum movisse; accessisse verò vetulam & suavisse, ut folia *senæ*, cum prunis decoctâ, adsumen- tur, idque quod non addit, cum successu; quàm experientia domestica, in vulgus nota, multò magis verò medicis notanda. Quo magis enim est resolubilis *senæ*, tanto magis purgandi scopo apta. Notandum hoc lo-

co obiter, & *senam* dici rectè præeunte *Sylvio*, inter præte & commentatore *Mesue*, & *Walao* & aliis; & *senam* juxta alios, exigua differentia.

Morborum verò itidem, Quicumque enim purgante indigent, si nullum admittant aliud, ubi quidem id indicatur & licet, *senam* admittunt; acuti, chronici & medii. Individuorum denique omnium, siquidem cunctis est eadem, benigna scilicet & indemnis, semper juvenis, nunquam nocens, si rite adhibeatur.

Speciatim morbis illis prodest, ubi serum acetosius, vel bilis eadem qualitate peregrina sigillata est, ut in incubo, melancholia, mania, lepra, scabie, quartana aliisque morbis ab atræ bilis & impurius sanguinis profapia oriundis, in ipsis quoque febribus ardentibus, in quibus toto die eandem cum successu usurpavimus, in gravidis & puerperis quoque, in quibus ordinariè alvus ob prægressum opus per aliquot dies obstructa est.

Eandem quovis modo usurpatam visum & auditum firmare asserit *Mesue l. c. p. 102.* ex quo etiam *Platerus* oculis appropriatam judicat, Ast in genere purgantia in membrorum horum affectibus prodesse in praxi selectiori innouit, quoniam serum vitiosum alterant & educunt.

Datur (1.) quod satis commodum est, à *3j.* ad *3j.* in pulvere, seu per se, seu in intrito cum pane, (2.) in pulvere composito, ex quo usus confirmatur frequentior. Datur (3.) in decoctis & infusis ad *3ij.* *ij.* *3ß.* *3vj.* *3j.* unde species laxativæ polychrestæ esse queunt nobis usitatæ ex rad. acetos. scorz. cich. a *3j.* summit. fumar. cent. min. ana. mss. fl. 4. cord. a. p. j. fol. sen. l. f. 3ss. rhab. el. 3iis. colt. ver. *3j.* crem. fri *3iv.* M. pro nodulo; cujus ingredientia variari possunt facilè, additis appropriatis, ut in mensibus movendis aliisque. Constituit (4.) egregium vinum purgans, si cum musto confermentetur, quod experimento anonymi confirmat *Mesue l. c.* Sociari amat (5.) cum prunis, passulis, aliisque emollientibus, quod uti in vulgus innouit, ita à *Mesue* dudum memoratum fuit. Sunt, inquit, qui decocto ejus cum prunis & spica facilius purgant. Tacemus extractum in pilulas sociandum & sirupum egregium.

Inter reliqua inventa nova Indica celeberrima sine dubio est *Gialapa*, à *Gelapo* Americæ provinciæ dicta, variantibus quidem in scriptione autoribus, omnibus tamen liberè & in eundem finem procedentibus. Aliàs *mechoacanna nigra* audit, ad differentiam albæ, cui sub hujus seculi initium successit, & ita quidem ut ejus laudes ferè obscuraverit, & prærem vix inveniat.

Affertur & in usu est sola radix, tessellatim, seu in taleolos rotundos, seu circulares instar calculi ferè aleatorii incisa, ut eo longius ætatem ferre possit, tum majores, qui ferè albescent magis, tum minores, qui magis nigricant. Electionis juxta ac bonitatis, nota est *ingredo & resinofitas*. Nigra præscribitur, intensivè talis, ad differentiam albicantis, quo major enim albedo inest, eo minor resinofitas & consequenter vis purgans.

Nigricat aliàs inprimis cortex, ipsi tamen resine id quoque tribuitur, laxiori significatione, aliis rufescens, scilicet ex nigro, color dicitur. Resinofitas, vero ob particulas & miculas rosidas sulphureas, quarum ratione etiam ardet seu flammam concipit. Interfusa est resina, & tum circularibus striis, cum, si confringatur, splendore micante conspicua; ladescente sine dubio radice recentis. Ceteroqui etiam non cariosa esse debet, (quod humiditatis est consequens) odore subacidulo levi, sapore acri prædita, saltem in recessu.

Afferitur ex Americâ non minus ac mechoacanna, contra ac quibusdâ placet, illam ex Indiâ Orientali, hanc Occidentali afferri, neque, quod *Clossius* apud *Horstium* vult, floris admirabilis de Peru radix est, neque enim cum illa viribus vel aliis convenit.

Quoad usum generalem reverâ catholicum & pan-chymagogum purgans est gialapa, omnibus iis in morbis, ubi purgatione electivâ, ut vocant, seu perfectâ opus est, officium faciens, inprimis verò, cum calida & sicca sit secundo gradu, magis in subjectis frigidis & serosis, quàm calidis & siccis, vel saltem non febribus acutis æque detentis; seu ubi simul in motum citantur humores, aperiendum, incidendum, discutiendum. In siccioribus enim more aliorum purgantium non operatur æque. Speciatim etiam convenire judicatur in hydropse, ab aliis in colicâ, ictero à colicâ oriundo, de quo vid. *Rolfin dissert. de Pro*, item in cachexiâ; sed reverâ est catholicum, omnibus morbis, nisi quid obstat, satisfaciens, ut hoc obvento remedio divino non diffusam abhortere debeamus amplius dosin, non effectus timere sinistros. Catholicum etiam est, quod ipsa sibi sufficiat. Sin stimulo resinoso alio opus fuerit, præstid est scammonium, quam in rem examinanda sunt corpora, prout sunt serosa, vel prout biliosa, acido, viscido humore sciantia.

Et quoad hæc accessoria, correctione quidem non eget ob benignam & mitem suam naturam, in omnibus quippe si non mitis, tamen mediocris est; duo tamen circa ejus usum sunt attendenda, ut unum eundemque *Evpo-* plus finem collimantia, [1.] ut ne excitet tormina, quod faciunt *pasinoré* & alia, & ab eâ quoque aliquando observatum est factum, tensione illâ suâ & irritatione, [2.] ut resolvatur & actuetur in corpore.

Hanc in rem consultum est, justam attendere dosin, eamque ex subjectis metiendam. Non audiendi sunt, qui ad ℥i. ℥i. vel ℥iv. ascendunt, unde cum ad scrupulos duos assumisset illam *Fonseca*, inde mirum non est tormina sensisse colicâ; & præfectus copiarum apud *Barthol. cent. obs. p. 140.* ferè ad mortem purgatus fuit, hausta à Chirurgo ministrante ℥i. Non patiuntur lulum purgantia. Ordinariè scilicet in adultis datur à ℥i. ad gr. xxv, xxvi. 3℔. vel sola, vel cum alio stimulo acuata.

Extraordinariè verò dosin majorem aliquando efflagitat corpus quadratum, deses, unde podagricus talismodi nodosâ arthritide captivatus à ℥ii. vix movebatur. Par ratio est militum, nautarum, gregariorum, quibus ad 3℔ cum ℥ii vitæ vel Δ emet. g. j. cum successu datur. Minorem autem corpora tenerioris texturæ & serosiora, quæ sæpe à 3℔. imò leviori præbiis hypercatharsin patiuntur. Exemplum utriusque extraordinarii hujus effectus præbent hypochondriaci, unde facilis error est. Quicumque nempe intestina habent sicciora, acido figente fœta, ii majorem dosin requirunt, vel illâ ne moventur quidem, quicumque verò humidiora & fluida simul salia, illi facillimè moventur & hypercatharsin patiuntur, quibus, ut loqui solemus, papyraceus unâ est ventriculus, quod pluribus exemplis probare possemus, si id opus foret.

In his igitur qui stimulum jamdum habent in corpore, vel quorum fibræ nervæ facilius irritantur, facilis etiam sit purgatio, & contra. Hinc ut reliqua purgantia quædam sola quidem dari possint, ut rhabarbarum, sena; consultò tamen à veteribus jam constitutum & expertum est, melius operari eadem si dentur cum aliis, quæ activitatem illam explicant. Adeoque id ipsum etiam valet & loco exempli generalis quasi de gialapa. Non sola propinatur, non quod non sit benigna, quod violenta, sed quia resinosa est & ipsa, adeoque indigens apprime adjuvantibus, illam ipsam scilicet resolutionem, & calorem temperantibus pro re natâ. Optimâ hinc ex salinis sunt tartarea, tartarus sanè ejusque cremor &

crystalli claves gerit genuinas ad recludenda centra purgantium in corpore, ut cum tartareis data in genere & benignius, & minori dosi agant purgantia. Adjuvat fermentationem, sub caloris & menstrui ventriculi catholici moderamine, & sic resolutionem, quam & ipsâ dissociatione suâ perficit. Ut enim pulvis gialapæ v. g. quod minor ob expansas salinas dissociatas terreas particulas, ed efficacior; ita tartarea huic rei velificantur eximie. Hinc solitus sum sæpe gialapam ad ℥i. ana cum crem. tartri propinare cum successu. Faciunt etiam huc Φ sa, ut Φ iatum, arcan. duplic. Φ ium diaph non edulcatum, tart. Φ l. quæ ipsa absterivâ suâ naturâ blandè stimulant, & resolutionem promovent, ast minori dosi præ tartaro addita, ad gr. iii. iv. v. Tacemus salia alcalia ipsa, absinthii, cent. min. fumar. aptissima huic scopo, item Φ ium diaph. ipsum quod carminativum est simul, & temperans humores non minus quàm fluxiles red-dens, de quo sub scammonio dicemus plura.

Omnium frequentissimè & optimè adduntur tartarea, ut pulvis laxativus. vegetabilis dici & propinari optimus possit, toto die à nobis ita dispensatus, qui è ℥i. gr. xxv. &c gialapæ cum 3℔. gr. xii. cremoris vel crystallorum tartari confit.

Adduntur verò non minus aliquando etiam olea Ω ta, vel elæosacchara, anisi, citri, macis, eodem fine. Notum enim est ab oleis resinosa reddi fluxiliora, seu ad motum aptiora notum, ipsum quoque calorem inde roborari unaquaque disploti torminificos simul flatus, unde optimo consilio adduntur, ne quid tamen nimis, sufficit una guttula.

Neque enim perpetua & necessaria æque est oleorum additio, sed illud quoque eget cautel & limitatione. Observavimus quippe multos ægros eligere potius, inodora ac insipida purgantia; ab oleosorum verò additione nauseam concepisse, illaque hinc averfatos. Deinde & hoc notabile est, olea quædam, inprimis cinamomi, virtute suâ exuperante aromaticâ & obundante salinas particulas facillè evertere vel imminuere, unde cavendum in his utrumque est, & ne nauseabunda fiant, nec actio inde impediatur. Exemplum hujus mixturæ præbent insigne spec. diagalapæ *Mys.* ex gialapa, cr. tar. & ol. cinam. constantes.

Hoc modo datum benignissimum est medicamentum gialapa, nec nisi per accidens noxam ullam creans. Per accidens, inquam, ob stimulum urgentiorem in corpore, ob externa accidentia; siquidem à gialapâ inprimis, nisi corpus teneatur calidum & transpiratio sit unâ expedita, tormina oboriri possunt. In mentem venit h. l. observatio à *Reinsio* notata *Chimiatricæ seu orat. de Chimia* p. 42. puerperæ aliquando propinatam à medico rationali & lege artis mannam lethalem hypercatharsin induxisse.

In infantibus & aliis miscuimus quoque commodè gialapam cum cinnabari nativâ, quod fundendi humores vi gaudeat, unaque invertendi & corrigendi acidum bili adjunctum irritativum, ut lapidem lazuli jam adductum non memoremus denuò.

Habet verò gialapa hoc peculiare in infantibus, [1.] quod respectivè dosin majorem optimè ferant. Propinavimus h. m. infantibus trium dierum gr. ii. iii. optimo cum successu, quæ dosis comparata ad adultum per regulam proportionalem est omninò major; (2.) quod ab illo assumpto, etiam prius, quàm ullum effectum purgantem ediderit, indormiant ut plurimum suavissimè, non aliter ac si assumpsissent anodynum. Illud fit ob copiosum humidum diluens; hoc ob ipsum blandè resolvens. Quin in adultis quoque tum ab hoc, tum ab aliis purgantibus somnolentia seu ad somnum capeffendum inclinatio accidit, quod ipsum phænomenon ad sulphur expansum & resolutum referendum est, quatenus spiritus inprimis occupati quoad inferiorem corporis illam regionem, à sero, vehiculo suo, sulphur illud in se recipientes

piante, blandè irreciuntur & obvolvuntur; unde facilis fit somnus.

Sed cum hac occasione ad se nos vocet resina, alia quædam præter dicta non minus memoratu digna occurrunt, inprimis 1. axioma illud nobilissimum, resinas non agere nisi solutas. Valet id ipsum generaliter quasi de quovis medicamento, exceptis forsan, quæ irradiatione luminari agere debent, valet de salibus, quod *Tachenius* hinc inculcat; inprimis verò de resinis seu purgantibus, seu ut exemplum alterum demus, opiaris. Cum enim serum sit menstruum universale, unde ipsam salivam hinc natura ori indidit, quicquid ab eodem non solvitur, accedente calore & hujus quoque (seri) producto fermento ventriculi, illud didi & virtutem exercere suam non potest. Hinc nec opiara majori dosi eo casu somnum cient, neque enim solvantur, sed irresolubilia manent, nullum vel alium effectum sortita, nec purgantia resinosa. Hinc gialapa in bolos, pilulas, morsulos &c. formati potest non verò æque in decoctis & infusis locum invenit, nisi addatur clavis, neque enim obsecundat mensuris aqueis, cerevisiæ ac vino, nisi segniter, insufficienter, quem in finem si addere placeat eandem nihilominus iidem, irrotanda prius fuerit & per noctem. Hinc quæcunque resinæ solutionem quovis dicto modo adjuvant & promovent, cum gialapâ purgandi fine, seu genuina adjuvantia, miscentur, imò hinc resinæ ipsæ non benè dantur in pulvere, solæ scilicet, non dissociatæ, aliàs calore juseculi conglobantur, & ne deglutiri quidem satis benè possunt. Hinc rectè *Zuvelferus* scribit *animadv. in Pharm. Aug. cap. p. m 138.* Si, intellige non factâ solutione, vel integram drachmam aut plus etiam resinæ, liquidæ nimirum, seu scammonæ seu gialapæ cuidam propines, nil ferè operatur, quod tot experimenta jam testatum fecère. Hinc optimam cautelam addit, ut ad facilitandam resolutionum: seu solidâ seu liquidâ formâ præscribantur resinæ, eadem prius cum amygd. d. vel semine melonum nonnihil contundantur vel subigantur, monendis de eo *Pharmacopœis*, secus enim parum aut nihil operabuntur.

2. Scorsim verò gialapa purgat vel in substantiâ, resinâ dispersâ forâ, vel in resinâ. Resina novum quasi ens constituit, novum ex priori purgans, idque concentratum, non minus ac scammonii resina, quâ cum exactissimè convenit, in pulvere & liquidâ formâ propinanda. Licet enim sint, qui extracta & resinas non efficaciores sed pigiores esse statuunt, id tamen non nisi cum grano salis seu ipsâ hac præviâ cautelâ intelligendum est, siquidem fieri potest omnino, ut di. gialapæ plus purget, quod particulæ resinosæ sint dispersæ, adeoque magis subjugabiles, quàm Æb. resinæ, non resolutæ.

3. Resinam quidem, quâ talem, non purgandi vim sustinere solam, necessariò tamen inter elementa seu particulas purgantes recenseri debet, purgantium vis omnis, per supra dicta, residet in acrimoniâ salino sulphureâ. Commodus hic locus est laudare *L. de arist. g. i. facultatis purgatricis Nob. D. Hannemanni*, quâ ostendit, contra *Villifum*, si resinosis particulis non esse collocandam catharsin. Statuit, ut breviter delibemus, quæ ad scopum nostrum faciunt; (1.) ex figurarum modificatione catharsin derivandam esse §. 3. quod in specie ad irregulares figuras aculeatas refert §. 10. (2.) Non solum purgationis, sed omnium aded corporum unicum esse principium, videlicet nitrum; unde & fermentationis §. 3. & chylicationis, §. 6. quod fermentum stomachi sit nitrosolum scilicet, phænomena deducenda censet. §. 4. quod juxta diversarum particularum, particularumque pororum modificatas figuras omnem medicamentorum efficaciam & energiam exerat; inprimis verò (3.) particulas resinosas non sustinere purgandi provinciam, quod illæ in se spectatæ sint particulæ viscidæ, pingues seu unguinosæ, quæ ob viscidam

glutinositatem arctissimè sibi invicem cohæreant, & licet inflammabiles sint, revera tamen ab ipso vero sulphure esse distinctas. Dari verò purgantia, v.g. mineralia, in quibus resinosa particulæ vel nullæ omnino vel admodum paucæ reperiantur §. 5. ut alia plura non laudemus. Sufficit verò nobis 1. figurarum modificationem extrinsecam effectum hunc nullo modo præstare posse. 2. Non tam speciem individualement salis, seu Nitrum, quàm sal esse principium rerum materiale, aliàs enim eodem jure vitriolum, vel alumen, vel sal commune pro principio unico haberi posset. 3. quicquid ardet, sulphur esse, nec ob stare, quin & particulæ viscidæ unctuosæ possint esse fermentativo charactere salino scæ; neque sulphur commune cum Æc, uti est chimicorum principium, esse confundendum; adeoque ut sit mixtas & dispositas seu à salinis particulis modificatas huic rei aptissimas esse. Quocunque enim posito sit purgatio, & quocunque remoto, non sit eadem, illud sine dubio vel principaliter, vel minus principaliter purgandi vim confert. Illud verò de resinâ verum est. Tolle resinam de scammonio, gialapâ, turpetho, inerts & inefficax reliquum erit remedium, non purgans. Par ratio est Æis metallici, ut in §. 10.

Tandem & ad *Scammonium* devolvimur, exolum quibusdam medicamentum, qui scammoniata inter *oposita* & vehementiora promiscuè referunt, cum tamen circuratum sit benignissimum. Est verò succus densatus & resinosis scammonæ, quæ ex convolvulorum est genere, non minus ac de mechoacantâ diximus. Dicitur *dacrydium*, vulgò *diagrydium*, q. d. lacryma, scilicet scammonæ, & purgans. Lacryma enim est resina sponte exudans. Hodie verò usu inoluit, ut *dacrydium* dicatur scammonium in pomo cydonio coctum, qui modus à *Galeno* memoratus optimus omnino est locum etiamnum habens, si purum fuerit scammonium. Optime de ejusdem præparandi modis, & partiâ, & visibus agit *Mesue l. 2. de med. simpl. purg. cap. 1.* Ad modum opii parandi, & aliarum plantarum lactescentium, vel sponte exudat, vel incisâ radice, lacteus succus, vel exprimitur. A partiâ etiam dicitur *sæpe pulvis syrius*, nascitur enim & sit circa Antiochiam, unde & Antiochenum seu Syriacum præstantissimum olim habitum fuit, hinc & in Armeniâ, & Arabiâ, & aliis Asiæ locis.

Nostrum sine dubio per expressionem paratum est, id quod per *ἀποψία* patet, si resina paretur; quod si noverimus, ut & dictum præparandi modum, omnino facile est colligere, quare *Di. scorides* signum bonitatis lactescens habetur optimum. Nimirum textus *Dioscoridis* agit de scammonio optimo, per exudationem seu *ἔκκρισιν* & extrillationem incisione factâ collecto. Hinc probat succum hunc pellucidum staurino glutini similem; à coagulato quippe lacte. Lactescens verò, ad contactum salivæ vel aquæ, quæ in optimo illo erat quidem, sed pelluciditati postponenda, in nostro probatur, quod sit signum resinositatis. Optimum nempe est hodie resinolum, cum splendore quodam subnigris, præsertim si frangitur, ex albo v.g. gryseum, si pulverisetur, ad salivæ contactum lactescens, putum & *φωγισδόν*. Substantiâ est gummea & resinosa, unde in mensuris spirituosus & aqueis, in quibus lactescit, solvitur.

Hæc quasi clavi patet, quare crudum non æquè conveniat, & officinales pilulæ aliæque plurimæ minus sint commodæ, neque enim est facta separatio puri ab impuro; quare item lactescat. Solutio verò cum aqueis mensuris v.g. *Veichor. fumar. &c.* in lac scammonii dictum, & quibusdam commendatum, non est genuina, neque lactescens illa aliunde fit, quàm ob levi præcipitationem partium resinolarum, dispersarum cum terreis.

Calidum & siccum est secundo gradu, licet quidam

ad tertium usque adscendant, & inprimis *Mesue* igneam caliditatem in eo agnoscat. Odorem habet sui generis cum gialapâ multum convenientem, qui & in resinâ sepe est, acidulum. Purgat bilem & pituitam satis validè, sed revera innoxie in febribus intermittentibus, cruditatibus & ubi uno verbo purgante opus est. Non deterius, nec vehementius est gialapâ, sed maximè conveniens, si non planè idem. Datur verò magis in robustis & ætate consistente, minus in infantibus, puerperis, gravidis, febribus ardentibus & aliis calidis morbis, stomachi & intestinorum debilitate, hæmorrhoidum fluxu vel dolore & erosione vasorum, ut hæmoptysi laborantibus. Hæc quidem vera sunt, attamen ea omnia quoque cum purgantibus aliis sunt communia.

Tormina excitat duplici ratione speciali, tum ob viscedinem, quando non benè resolvitur, sed intestinorum plicis se agglutinat; tum inprimis ob impuritates terreas, quæ ad oculum in extractione & copiosè quidem visuntur; quibus duobus ablatis vel correctis benignissimum est medicamentum, heroicum, & planè divinum.

Solum igitur non exhibendum, ob hanc ipsam rationem, nec in pulvere, nisi dicto modo. Datur enim vel ut basis, vel ut adjuvans, seu stimulant. Ut stimulant, refracta dosi præcipuè solet commendari & frequentari, ad gr. iiii. & plura cum gialapâ & aliis. Neque verò solâ stimulandi vi adhibendum, metu majoris acrimoniæ & fulminis *Mesues*, *Galenii*, *Fernelii* aliorumque, sed laudatissimum quoque est per se, dosi primariâ datum, sed benè præparatum. De præparatione cum pomo cotoneo jam diximus, ea verò licet etiamnum hodiè retineatur, non est genuina, præterquam stimuli loco, vix à nobis adhibita. Eadem ratio est scammonii sulphurati, quæ ratio præparandi per suffumigationem cum Δ e observatur vulgò in pulvere Comitidis de Warvvick, seu cerbero recipite, horrendo nomine, rectè verò rejicitur ab *Helmontio*. Quamvis enim acida castrent purgantium vim, quia acrimoniæ salinam infringunt & sulphur obrundunt, attamen hoc ipso parum corrigitur vel depuratur, quin, quod *Helmontius* rectè ait, tantum virtutis amittunt, quantum aciditatis admittunt. Est igitur præparatio partim superficialia, partim castrens virtutem, impuritates verò relinquens. Scripsit de dicto pulvere integrum tractatum *Marchus Cornachinus*, & aliquando Romæ ejus dispensatio est prohibita, teste *Velsch. in obs.* imò variæ satyricæ invectivæ contra eundem hinc inde reperiuntur legendæ; sed revera est probatissimus, & instar panacæ in febribus, modò ritè præparetur. Noxæ exinde ortæ omnes non nisi eruditori præparationi scammonii & \S ii sunt adscribendæ. Dedimus olim eundem cum scammonio sulphurato ægris, robustis quidem cum successu, cum verò tormina inde immania quidam ægri experientur, exesse iussimus, & resinam scammonii cum \S d. & cr. tartari adhibemus toto die felicissimè, imò gialapâ contra hic pulvis suavissimè purgat.

Genuina enim præparatio est per \mathbb{V} i, parando inde resinam, quam & extractum & magisterium vocant, siquidem \mathbb{V} i est verum omnium resinarum menstruum, quâ ipsâ $\epsilon\nu\chi\epsilon\iota\sigma\iota\varsigma$ corrigitur optimè, ut aded & hic non aliâ correctione, quam verâ præparatione sit opus. Memorari & h. l. meretur locus alter *Zawelfferi Pharm. Reg. cl. 4. p. m. 536.* qui cum elegantissimus sit, dignus est qui legatur & cordi habeatur; jubet nimirum resinam scammonii æque ac alias omnes cum amygd. dulcibus subigere & in pulverem redigere, ita enim disponi optimè ad resolutionem, nec tormina vel hypercatharsin ullam ciere, hanc etenim solam tenacitatem resinofam, præcipuè si frigida superbibatur, esse causarum dictarum & aliarum omnium nozarum, quæ sanè longè sunt verissima.

Præter pulveris hanc formam è scammonio optimè

parantur 2. pilulæ, quæ nunquam nos destituerunt etiam desperatis casibus in ilco v. g. sæpius & aliàs, idque tum purgandum alvum saltim laxandi sine. Laborabat serenissima Princeps fortissimâ obstructione alvi, non cedente decoctis, non clysteribus, nam hi certas ob causas applicari non poterant. Proposuimus benedictas illas pilulas, ut resina scammonii cum gialapâ ana ad gr. v. daretur in hanc formam redacta; brevi post aperta feliciter alvo magnum id famæ addit incrementum.

3. Etiam in liquidâ formâ resina scammonii & gialapæ datur commodè in \mathbb{V} i: \mathbb{Z} resin. scam. q. v. v. g. gr. \mathbb{D} ss. \mathbb{V} , anis. cochl. sambuc. sextuplum & amplius, v. g. \mathbb{Z} j. vel q. ad solutionem, additur julepus ros. q. s. vel sirup. de cichor. c. rhabarb. ros. solut. de sena & c. \mathbb{Z} ss. vel q. s. remedium inde fit efficacissimum & gratissimum. Pertinet etiam huc cautela ex superioribus fluens, tum pilulas scammoniatas, inprimis solas, tum speciatim resinam in \mathbb{V} i solutam in corporibus calidioribus & sicciorebus minus prodesse, magis in serosis & frigidioribus.

Ex memoratis hætenus usualibus & selectioribus facile jam est composita varia parare, quorum farraginem per omnia formularum genera *Rolfincius O. & M. comment.* exhibet. Sunt tamen etiam velut classica quædam & recepta ex compositis, ut sp. diagal. *Mys.* nisi quod loco olei cinam. vel alia quoque substitui, vel ea omninò omitti queant. Hoc pacto est instar omnium aliorum pulvis laxativus vegetabilis *Rolf.* Olim quidem accessione parlarum aliquâ gavilus est, revera autem nomen hoc est gialapæ, quæcunque demum addantur; Item pulvis catholicus *Michaelis*, & mechoac. & gialap. p. j. scam. Δ rat. p. s. addito ol. cinamom. & caryoph. Pulvis Comitidis de Warvvik jam laudatus est, ritè præparatus. Reliqui verò, ut & spec. diaturb. cholag. phlegmag. melanag. Quercet. & similia plura minus sunt recepta. Imò ex his quoque patet, sufficienter cognito selectu, ad leges præscribendi formulas composita fieri posse infinita; tum quoque cognitâ hanc materiâ medicâ, quæcunque venditur arcana hujus vel illius, posse judicari, vel saltem à medico exprimi. Exemplo sint pilulæ Francofurtenses, toti Germaniæ cognitissimæ, quarum descriptio habetur pro arcano, non quod tanti sit, sed quod lucrosa sit venditoribus. Medicus verò naturalis eandem exprimit aloë rosatâ violatâ, extracto aloës solutivo cum scammonio aliisque pro re nata mixtis. Tacemus alias consimiles. Pro pilulis extracta catholica, panchymagoga, cholagoga variorum autorum recepta & vulgata sunt. Nos etiam hic à simplicibus ad composita, à notis ad ignota faciem dedimus viam. Valent tamen & profunt etiam composita talia, quatenus intellectum diffusum ad certum remedium dirigunt, quæ verò distinctius commendatur, nescuntur & usurpantur, ea etiam certius hinc juvant.

De Purgantibus aliis.

Quò autem magis pateat hæc ipsa purgantium agentia di vis & electionis doctrina, quæ à quibus purgantur, id regalis paucis complexi sumus.

1. *Resolubilia purgantia magis $\sigma\pi\alpha\rho\gamma\omega\gamma\alpha$ seu seriduca;* illa experimento, quod hoc pacto & seri coagulum magis liquetur, & aqueis ipsis menstruis hæc sulphurata magis pandantur, promptè admissa. Par ratio est melanagogorum quorundam, hellebori ipsius & c. Ponamus igitur corpus esse serosius, commodius agent hæc ipsa, quia promptè solvuntur, solutæ verò optimè agunt resina.

2. *Magis resinosa magis cholagoga;* itidem per mechanicam. Ut enim per vitellum ovi v. g. vel alia ejusmodi unctuosa resinam scammonii optimè liquabilem reddimus, uti & terebinthinam h. m. in colostrum abire diximus; ita bilis in corpore tale vitellinum corpus amittitur;

latur, cujus concursu magis cum sero combinatur resoluta resina, adeoque in actum deducitur. Serum verò in omni purgatione actuandâ, tanquam menstruum universale, requiritur; Posito ergò corpus esse biliosum, non deficiente omni sero, hæc ipsa optimè bilem educunt.

3. *Quæ resinam habent diffusam, vel partibus gummeis implexam, magis sunt catholica*, in utrumque enim humorem ingressum inveniunt.

4. *Lenientia verò nec serum, nec bilem aquæ eduxunt, sed alvi salutem scybalâ promouent ad exitum*. Hoc illi notare debent ægri, qui pilulis aloëticis adfusi purant iis jam sufficienter se defungi posse, nec opus habere purgante medicamento electivo. Uti se ajunt pilulis Francosæ &c. à quibus moveantur. Ubi igitur in sero vel bile vitium hæret, hæc ipsa primis viis saltem debita longè sunt debiliora, quàm ut rem omnem absoluant, præterquam in tenerioribus quibusdam, qui aliis læduntur.

Pertinent etiam huc alia, quæ effectu cum purgantibus conveniunt, tum univoco, & semper vel ut plurimum tali, tum æquivoco, seu per accidens tali. Illorum exempla præbent *acidulæ & Therma*, remedia catholica, siquidem & omnes quasi purgant humores, & per omnes excretionum vias, non saltem per alvum, sed urinam ac sudores quoque; remedia verò empirica quoque sæpe, ad quæ mittuntur ægri non semper consultâ operâ, sed conjecturali quandoque, in primis non examinatis per medicum circumstantiis, si proprio ausu & fortunâ ægri ad ea concedant.

Habent omninò acidulæ & thermæ suos insignes usus tum medicos absolutè, tum medico-politicos. Medicos quidem, quatenus aquæ sunt medicatæ, principiis activis factæ. De thermis superius egimus & earundem elementa ad unguem quasi redensuimus, unde hæc vice saltem dicimus, purgare easdem, & quicquid agunt, agere ob sal alcalicum, seu nativum seu ignis subterranei calcinatione in terrâ productum, cum aqueis particulis dilutum, unde abstergendo purgant & in morbis acidis profunt, eorumque sunt remedium; alcalinis nocent. Sit v. g. æger scorbutico frigido laborans, incipiente cachexiâ laxitate viscerum *σάρον* humorum, acore prædominante, nervis ab humore frigido, ab acido contractis & malè habentibus, præstò sunt exiccandi & alterandi, quin & purgandi virtute thermæ. Ast uti laxis humidis, ichoreiscentibus malis & subjectis similibus profunt; ita siccioribus & scorbutico calido laborantibus nocent, quin sæpe impingunt hinc magis partibus materiam tartaream, & ex hospite incolam faciunt. Hæc ut summam de thermis asserimus; ita certum est de acidulis, per experimenta varia nota, odore, sapore & effectibus aliis, in primis quòd cum gallis pulveratis mixtæ in momento quasi atramentum exhibeant, & feces nigricantes redant, quicquid agunt, agere in primis ob sal acidum, vitriolicum, martiale, copioso aqueo dilutum. Hinc acidulæ sunt remedium morborum alcalinorum, scorbuti calidi v. g. in laxitate & *φλεγμώνες* viscerum, in siccioribus, ita ut, quibus nocent thermæ, iis profint acidulæ hoc sensu, & vice versâ. Peccant tamen facile in utrisque ægri & excessus hinc etiam in effectu sentiunt, sic ut thermis usi violento illo calore & sale deterfivo exiccantur nimis, indeque pejus potius habeant. Sero blando diluente absumpto, contracturis vel factis vel auctis, quàm auxilium speratum reportent, quod sæpius vidimus. Adeoque serum nimis absumunt ferè thermæ, & contra ea serum nimis adaugent acidulæ, facile inde intumescitibus pedibus & ventre, unde medium tenere beati, sique ita usurpentur utraque, ut non excedatur, moderamine medico optimè sanitati profuerint. In utrisque purgandi vis eminet, & ob heterogeneitatem & sal deterfivum ac fermentativum, diverso licet

Medico-politico verò usu non minus commendandæ sunt aquæ hæc medicæ, quatenus sæpe immorigeri ægri in adhibendis medicamentis, in observandâ diætâ, hoc

ipso strategemate rediguntur ad frugem, quatenus diætâ tenuis & strictior, receptâ universali observantiâ locorum istorum, quo multi magni morbi curantur, his ipsis imperatur & impetratur ægris; quatenus copioso diluente salia efferata temperantur & educuntur è corpore, nauseantibus aliàs ad ampullas & poriones largiores, sæpe tamen necessarias ægris; quatenus mutatio aëris, vitæ, loci multum ad sanitatem confert, unde in epilepsia & aliis morbis chronicis ac rebellibus hæc à Coo præcipiuntur.

Novimus hujus rei aliquot exempla, v. g. epilepsiam tum in aliis, tum in nobili virgine aliàs minus perfectè curabilem, mutatione loci conquievissè magis. Ut ita ceam, animum à seriis abstractum novitate loci, conversatione variorum peregrinorum aliisque componi & demulceri, quod ipsum quoque ad sanitatem non minimum confert; nec dicam, aliquid etiam consuetudinem & communem omnium quasi hominum hypothesein confectæ, cum domi aliàs balneum fornicarum & nervinum exterius, interius verò alcalia idem sæpe præstare queant ac thermæ; cum acidulæ artificiales Tincturæ & -us spirituales, modò cætera sint paria, æquare acidulas possint. Quo ipso tamen laudem suam non defraudabimus divina hæc remedia.

Et acidulas quidem artificiales vitriolum vel sulphur resolutum in stigma acidum & forte alteratum præbent, ut *⊕ li cum ⊕ lo* spiritus alteratus, factâ solutione facile hinc diluendus, ut alia non memoremus. Sic & clystus *⊕ ii* spiritus eas optimè exprimit, modò non sulphur minus bonæ notæ subamaricantem & nauseabundam ipsi affricuerit qualitatem unde consaltius est *⊕ lil* acitium purius, vel crystallinum, statim suum, arenatum ad *⊕ ium* & *⊕* recipere. Laxant hæc alvum, unaque vias sudoris & urinæ expediunt; neque absurdum est, acida hæc irritativâ virtute gaudere & purgare alvum. Laxant & *⊕ o* quælibet sicca, inæqualibus suis salinis particulis, licet sensui potius æquales offerant.

Horum verò quæ effectu æquivoco; saltem respectivè, purgantia æmulantur, itidem nonnulla in praxi occurrunt. Sic purgat quandoque cinnabaris nativa, non minus ac salivationem etiam citat aliquando. Hanc efficit, si continuetur ejus usus in tenerioribus, ratione partium mercurialium, serum potenter fundentium. Purgat verò ratione itidem salis mercurialis sulphurei, humoribus ad motum citatis ob *ιδιόσυγγεσία*, à fermento ventriculi resolutione factâ.

Adeoque acidum sal concurret ad purgantium vim, quod exemplo galapæ & aliorum supra diximus, at tamen acidum, quâ tale, non purgat, nec effectus hic acido adscribi meretur, cum cinnabaris & sulph. commune habeant v. g. in se sal acidum, effectus tamen edant acido contrarios, in tussi v. g. ulceribus &c.

Purgatio etiam fit à solventibus, stimulum inde nanciscente naturâ, quæ ætuvat medicamentapro humorum dispositione & suo modulo. Pulvis absorbens ordinariè vomitus non movet, neque enim *gr i. ⊕ l. spiritus* ad vomendum sufficit, sed quando lipothymia præcordiales ob acidum vel biliosum *δυσσώμην* patiens instat, cum pallore & frigore extremorum, vidimus inde secutum vomitum nonnunquam summo cum successu. Feminæ pallens hoc modo & vertiginem patiens subitaneam, datâ unicâ dosi pulveris absorbentis, vomitu sequente curabatur; ordinariè verò citra ullum vomitum lipothymias certissimè curat. Mistebamur aliquando hunc ipsum pulverem pro matronâ aulicâ, ad *ἐμλυσας* præcordiales pronissimâ; medicus metui eundem nominatum ipsi quid esset dare, quod vomitum citare possit. Malo verò non cessante ipsi accedentes statim propinavimus illum ipsum, brevi sequenti effectu meliori. Potest verò & fieri aliquando citra *⊕ lum* spiritus quoque. A pulveribus pleuriticis & quasi talibus alvi fluxus sicut potest quando ab alcalinis consistentes & quieti humores in

motum citantur, & natura, quâ visum fuerit commo-
dius, viâ expurgat eosdem.

Quod autem à pulveribus bezoardicis quandoque alvi
fluxus secutus est, id omne per accidens fit, sunt enim hi
pulveres adstringentes ferè simul, vel roborantes; siquæ
illa diarrhœa potius à fervore & uredine acri biliosi exu-
perantis humoris, futura etiam magis citra bezoardica.
Adeoquæ & hîc attendendum est, an dato tali casu à me-
dicamento, an merè per accidens id evenerit, idque in
bonum & malum.

Neque de venenis corrosivis opus est plura addere, il-
la quippe sunt deleteria. Tale verò exemplum ante ali-
quot annos evenisse novimus, ubi per errorem ministri
medici loco purgantis ☿-tus propinatus fuerat, brevi
sequente morte cum summa diarrhœa & torminibus.

Illud coronidis loco addendum est, ab opiatis, maxime
pillulari formâ & dosi integrâ majori datis, tum vomitum
sequi sæpe mane sequente, tum in quibusdam alvi
fluxum seu diarrhœam. Visum id fuit nonnunquam in
phthisicis quorum intestina teneriora erant, & glandulæ
intestinales obstructæ, unde ut nec chylus invenit ad-
itum, ita nec medicamenta promptè; consequente hinc
facili fibrarum nervearum irritatione, bile inprimis, ut
fit, quâ concurrente & fermentante.

Quod purgantia alterantibus interdum addita ipsorum
vim & efficaciam augeant, alibi jam dictum abunde est.
Ipsa etiam ut & vomitoria, exuta illâ suâ vi cathartica
optima evadunt tum alterantia, tum diaphoretica. W E-
DELIVS.

PURPURA.

Purpura, Græcis πορφύρα, Politiano *Concha Herculeæ*
(quod tinctu grauctor *Hercules* credatur) the *Purple-fish*.
Cujus *Concha*, parte turbinata pluribus mucronibus seu
extuberantiis horrida est, superficie exteriore modo candi-
cans, modo flavescent, interiore modo violacei, modo
rubicundi coloris; in anfractus in mucronem desinentes
contorta. Animal cornua duo Limacum modo attollit,
atque eodem ritu serpit, iisdemq; cornibus viam prætenat.
Aquam marinam hauritam asservat, qua pluribus diebus
fovetur & sustentatur. Hepar habet viscidum tenaci len-
tore præditum quod *Arist.* *Papaver* vocat, alii *Cor*; ad cu-
jus latus existit *mucus Purpureus*, in recentibus *Purpuris*
illico extorquendus cum totus in demortuis pereat. Hoc
succo olim tingebantur lanæ. *Differunt* *Purpuræ* magni-
tudine & aliis circumstantiis. Præcipuæ autè species sunt.

1. *Magna*, quæ ad *Sigæum* & *Loctum Ida* promonto-
ria gignuntur.
2. *Parva*, quas *Euripus* fert & *Caria*.
3. *Pelagia*, quæ magnæ, & scabræ sunt, quarumq; *Flos*
magna ex parte niger, sed nonnullis pusillum rubidus.
4. *Litorales*, quæ parvæ & colore rubro sunt
5. *Echinata*, quæ vel pluribus spinis maxime in postica
parte horrent, vel rarioribus, minoribus & brevioribus.
6. *Rubra*, ut in Austrinis parvis.
7. *Nigra*, in Aquiloniis.
8. *Livida*, in Occidentalibus & Orientalibus.
9. *Marmorea*, quæ longis undique tuberibus, at mi-
nimè acutis, sed obtusis plenæ.

10. *Pentadactyla*, qualem *Gesnerus* descripsit, ex *Adria-
tico* mari acceptam. C. H. A. R. L. E. T. O. N.

Purpura Offic. violacea *Lol.* Violacea *Fab.* Colūna *Liit.*
H. Conch. lib. 4. Sect. 15. c. 1. Ex Tarentino sinu allata, *Bo-
nann.* The *Purple Fish*. In mari Mediterraneo frequens.
Ufu. In Officinis testa valida, rugosa, striata, tuberculis
brevibus inæqualis, inter Mechanicos Sanies *Purpurea*
adtingendum olim in usu fuit; *Vires* Alkali est, & cum
reliquis testis viribus convenit.

In *Purpura* describenda aded breves & obscuri fuere
Veteres, ut quodnam *Conchylum* sit Recentioribus liti-
gandi occasionem dederint, à quibus variæ producuntur
species purpureæ sanie gignentis. Verum *Fab. Columna*
liem determinavit, veram *Purpuram* demonstrando.
Quamvis autem hodie *purpura* genuina Officinis nostris
vix cognita sit, purpurei tamen succi cognitio adnotante

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

ingeniosissimo illo & eruditissimo viro jam antea lauda-
to, *D. Martino Lister*, ab antiquis usq; temporibus ad se-
culum nostrum traditione saltem transmissa & derivata
est. In hisce etiam Insulis; inter Arcana tamen habita &
studiosè celata; donec *D. Guil. Cole* eam attripuit, & publi-
co exhibuit, *Actis Philos. N. 178 p. 1276.* quo Lectorem
reseo. Quinetiam *D. Robertus Sulhvvell*, E. A. Regiæ
Societatis nunc Præses dignissimus, multos ante annos
D. Listero retulit, Matrem suam in *Hibernia* celebrem
esse sudarii piscis cujusdam succo indelebilibus no-
tis, quæque elui nequirent, signandis. *Quin & Beda*
temporibus *Ars purpuræ* tingendi in *Anglia* usitata
summoque in pretio erat habita. *Variis Conchyliorum*
generibus (inquit *Hist. Eccles. Gentis Angliæ, lib. 1. c. 1.*)
exceptis; in quibus sunt & Musculæ, quibus inclusam sapè
Margaritam omnis quidem coloris optimam inveniunt,
idest, & rubicundi, & purpurei, & hyacinthini & prasinæ
sed maxime candidi. Sunt & *Cochleæ* satis superq; abun-
dantes, quibus *Tinctura coccinei* coloris conficitur; ejus
rubore pulcherrimus nullo unquam solis ardore, nulla
valet pluviarum injuria pallescere; sed quo vetustior, eo
solet esse venustior. D. A. L. E.

Duo littoralia *buccina*, exeunte Martio, dissecui.

Ipsa tota clavicula in utroque buccino ex viridi fla-
vescit.

Alia autem viscera in præsentiarum omitto, in iis ve-
rò illud peculiare animadverti, nempe in media mem-
brana dorsali, à latere intestini recti, ductum quendam an-
gustum ac rugosum, ex flavo viridescentem, sulphuris
instar aut citrini coloris. Hic autem ductus vel eodem
exitu, cum ano gaudet, vel valde propè suum succum ef-
fundit.

Is verò succus in hoc ductu contentus, crassius tenax-
que, & ad mellis ferè consistentiam se habet. *Charta* verò
illius illico ex flavo pulchrè viridescit. Hinc intelligitur
illud *Plinianum*, ac *Tyrius* color *Pelagio* primum latia-
tur, immatura viridique; cortina; mox permutatur in *Bucci-
num*.

Purpuræ (inquit *Plinius*) alio nomine *Pelagiæ* vocan-
tur. Et alibi. *Buccinum* per se damnatur, quia succum re-
mittit. *Pelagio* admodum adligatur. Horum autem ver-
borum hic sensus esse videtur, nempe in cortina ubi sa-
nies *Buccini viridis* excoquitur, primum immergitur
vellus; tandem in aliam cortinam, ubi alia sanies *purpu-
rea* [*Purpuræ*, puta, *Pelagiæ*] porretur; idemque adeo vel-
lus, jam ex viridi sanie semel infectum, altera immer-
sione in *Coccum* perficitur. Atque hæc ratio *Dibaphi* Ve-
stimenti *Purpurei* fuisse videtur. *Conchyliata* autem Ve-
stis, eodem teste *Plinio*, sine *Buccino* fiebat, ex duplicato
purpura succo, in *Urina* humana excocto.

Succi verò *Buccini* libra nummo veniebat; *Pelagii* si-
ve *Purpuræ* quinque nummis. Sic *Buccinum* fuit longè
purpuræ vilius.

At *Conchyliatam absolutam* melius in *Tyriam* transi-
re putant. Sic, ut opifitor, intelligendum est. *Conchyli-
tam purpuram absolutam*, id est, ex *Urina* coctam sanie
viridem purpurascere, & sic *Buccino* perfici, iterum im-
mersam uno eodemque buccini succo.

Atque hæc de interpretatione *Plinianâ*.

At ille succus è *Buccino* nostro altero, ore dentato,
alteiò longè pulchrior esse videbatur.

De ipsius verò ductus venæ loco sic rectè olim *A-
ristoteles* perhibuit. *Purpuræ Florem* suam inter meco-
nium & cervicem continent (quem locum malè vertit
Plinius ipsis faucibus) textu spissiore, aspectu veluti mem-
branæ candicantis, quam detrahunt: tingit hæc expressa,
& inficit manum, distenditur autem ut vena, atque in
hâc quidem est flos *purpuræ*; reliquum animal ex succum
(sterile vertit *Plinius*) *purpuræ* est.

Equidem verò nondum observavi nostra *buccina* suc-
cum hunc suum, vel laceffita effudisse. At iste succus nulli
(centumque de industria diffregi) defuit.

Aliiter autem *Fabius Columna* de sua *Purpura* innuere
M m m vide

videtur, illa nempe quaestione, cur non omnes purpuram fundant ejusdem generis, & eodem tempore captae, inter quamplurimas, quae toto anno capiuntur, & semper aliquae colorem habent, huc usque se ignorare dicit.

Insuper ex his Buccinis alia diu coxi ex aqua communi, quo color ipseque ductus ferè disparuit, ut vix amplius discerni potuerit talia verò fortè mürta frigida, cõduvi, eaque post quos menses dissecui; venamq; purpuram secundum eodem ferè modo, ac in vivis se habuisse reperi, ipsamque illum antiquis tantopere expertum humorem, & fluidum, ac in aere ex illa viridescens expertum sum.

Buccinus (tamen cujus generis si non ipsissima cum Antiquorum buccinis species, nostra animalia sint, quod *rotunditate oris* ad marginem incisa, & non *rostrata* sunt, item quod nostris, quantum scio, aculei sive Promulcides (an Syphoplicatilis) non sunt, quod denique petris adheret, circaque scopulos leguntur; quae omnes ex Plinio Buccini notae sunt) per se damnatur, quoniam ficum remittit.

Item illud apud eundem, ibid. scriptum non praetereundum est; Purpuras, cum satificavere, fluxos habere succos, hoc est, liquidiores & tenuiores, tincturaeque adeo minus aptos.

Illud verò clarè liquet ex nostris dissectionibus, Buccinorum nostrorum ductum peculiarem, ut & purpurarum antiquorum; cum, eodem ductu in Sepia convenire, id est, cum *Buccino pedato nudo*.

At hic humor ut peculiaris est, ita unus ex excretis (sive naturaliter ejectis humoribus est, adeoque sanguinem aut succo istorum Animalium vitali male à Plinio comparatur.

Imo de nostris certè Buccinis illud alterum Plinianum, nempe Purpuras cum vita sua succum evomere minus verum est.

Si quaeras, cur aestimata est Purpura apud Antiquos; respondet, id non fuisse ob raritatem, nec ob tincturae artificium: sed propter *durationem*, & non *delebilem* qualitatem, ut Lucretius olim scitè innuit. lib. 6.

*Purpureusque colos Conchylii iungitur una
Corporè cum lana, dirimi, qua non queat unquam;
Non, si Neptuni fluctu renovare operam des.
Non, mare si totum velis eluere omnibus undis.*

Idem attestant Beda nosser, Hist. Eccles. Gentis Angl. l. c. i. Sunt & Cochleae satis superque abundantes, quibus tinctura coecinei coloris conficitur, cujus robur pulcherrimum, nulla valet pluviarum injuria pallefcere, seque vetustior, eo solet esse venustior. Atque haec à Beda dicta sunt de bonitate Tincturae Purpureae apud Anglos confecta, post mille annos à Lucretio.

Durationis autem purpureae, praeter herbarum quarumlibet tincturam, ratio in illo consistere videtur, quod hic animalis, falso mali orti, succus infectioris est, ac in vasis suis excretoris putredinosa quadam coctione in suam perfectionem digestus; neque enim alia ulla concoctionis animalis, extra venas habitumque corporis, notitia est. Ex concoctione autè putredinosa sal *urinofus* conficitur, illoque *naturaliter* & multum intenditur succus baphicus, imò verò ad fidem huic rei amplius conciliandam, omne infectorum Artificium hodiernum in eo versatur, ut herbae tinctoriae vel putrescant vel ex urina coquantur, neque tamen illam permanentiam acquirunt, qualem in purpura buccinisque naturaliter fuisse ab antiquis proditum est.

Item ad purpuras propter eandem rationem proximè accedunt *Cochineae*, hoc est, *Scarabaei Indici* infectorii, item coccon baphicon Antiquorum; quod id quoque, alicujus infecti artificium est, à me olim ostensum.

Cur itaque non amplius in usu sunt, quaeratur; audiendus est Fabius Columna. Purpurarum, inquit ille, usum, sicuti Buccinorum non tantum propter incitiam, ac magnum impensum, ac molestiam, neglectum putamus, sed ob maximam fuci *Rocella* dicti copiam, quò nunc Infectores pulcherrimam purpuram conficiunt. LISTER.

PUTREFICARE ET PUTREFACTIO.

§. 1. Eam mixtorum dissolutionis & immutationis specie, à tendentia molecularum intrinseca emergentem, Putrefactionem sc. nunc evolvere convenit, Fermentationi quoad nonnullas circumstantias analogam, multum quoque ab hac recedentem. Extiterunt siquidem non pauci Philosophi, qui aut fermentationem (quam coctionis termino inuebat) putrefactionis notione exprimebant, dū v.g. *Empedocles*. Vinum aquam in vite putrefactam definivit, *Plutarchus* idem putrescentem sub cortice lympham pronunciavit, aut qui putredinem fermenti insinulant, fermentumque per putrefactionis modum agere suspicantur, v.g. *Mercurialis* ac *Fernelius*; aut qui tandem Putrefactionem & Fermentationem notionibus distinxerunt, re ipsa verò fundunt ejusdemque naturae & unam plane operationem Chymicarum utramque autumant, v. g. *Sennertus*,

Duncan. Bornettus & Davisonius: Sed hos omnes egregie cœcutivisse, ex insequentibus constabit.

§. 2. Errorum hunc vulgarem *Billichius* jamdum, acutum satis videns, in *Anatome Fermentationis Platonicae*, detegere conatus fuit: an verò differentiam inter fermentationem & Putrefactionem vesam & adaequatam evicerit, aliis judicandum relinquo, his tantum rationes dubitandi in praesentiarum expositorum, Quippe *primò* essentiam putredinis cum Zabarella aliisque Aristotelis inceptibus separationem humidi & siccum supponens, in fermento seu fermentatione ejusmodi secretionem non tantum haud observari, sed instar glutinis ambo illa cohaerere & intimius coire, ait: Cū nihilominus in fermentatione ac putrefactione inchoata partes humidae siccioribusque dein aliquantum evolvantur, haud tamen plane recedant in utraque verò consummata fluidarum quaedam in aquam abeant, quaedam remaneant, rarius cuncta, nisi longiore temporis mora & calore intensiore, perdantur, *Deinde* sicut proprii naturalisque caloris destructionem in putrefactione ipsam Peripatheticis Noster concedit, contra illum in fermentatione potius exacuiri ac intensior putat: haud animadvertens, putrescentia sensibilibiter latet & ad deflagrationem usque excandescere, imò forsan substantias per putrefactionem secretas, spiritum scilicet urinosum & oleum vegetabilem, cum Aristotele non minus calidas & igneas, quam spiritum sulphureum, interveniente fermentatione productum, dixisset, si de illorum confectione ipsi constitisset. *Tertio* quamvis *Billichius* largiri debeat, per fermentationem non raro novellam mixti speciem exoriri, v.g. ex succo terrae uvaram succum, ex musto vinum, ex frumento & aqua panem: Observantur tamen (1.) fermentationes mixto interitum inferentes, v.g. pharmaceuticae illae, spirituum inflammabilium aut acidorum confectione litantes; imò (2.) frumentum in panem aut cerevisiam abiens re vera sui interitum patitur, i.e. formam perdit; ut (3.) taceam, salia volatilia & olea per putrefactionem educenda, secundum Peripatheticorum patiter ac Modernorum hypothesein, haud elementa & corpora simplicia, sed elementata & satis composita esse; miror verò denique (4.) *Billichium* sui oblitum axioma illud Scholarum, *unius corruptio est alterius generatio*, ac vermes, ut novam mixti speciem per putrefactionem genitam, non attendisse. *Quarto* haud constat, quo jure soli putredinem, fermentationi neutiquam, calorem ambientem favere referat: quatenus utramque illarum actionum à tepore externo notabiliter jurari, tyronibus etiam innotescit; quoniam fermentationis specimina à Calcis viva, alcalium & acidum, aquarum stygiarum & metallorum exaltatione commemorat ad effervescentiarum potius classè erant referenda. Qua *quinto* inter illas ratione subjecti idem *Billichius* concipit, disparitas, quasi scilicet nihil putrescibile, nisi quod humidum, fermentationem autem humor non quaerit, sed qua partibus terrenis abundat, concipiat, verborum fluidorum potius lusui, quàm experientiae firmam, inniti videtur, dum non, nisi humidiora, utramque hanc mutationem experiuntur, ad fermentescendum plus fluoris quam ad putrescendum exigitur, fluida verò, v.g. mustum, eodem jure fermentant ac urina & sanguis putrescere, dici possunt. *Quando sexto* pergit, putredinem ad sola mixta praecise alligari, fermentationem verò liberè tam ad miscibilia, quam ad mixta, excurrere, i.e. dū in ipsam isticione elementa cõgrediuntur ac in se mutud agunt, fermentari: facile ipsi concedi posset, modò idem concederet, miscibilibus non separatis, sed combinatis demum aliquomodo, talem actionem ac reactionem contingere: quae mixtum inchoatum & imperfectius, simili ratione ac corpus putrescens mixtum declinans, talemque imperfectum, appellare liceret. Quae verò *septimo* atque *octavo* loco ponit, argumenta, quae minimè quaedam concreta ad fermentescendum potius, quam ad putrescendum, & vice versa, prona sint, itè, quod ne differant haec corporum mutationes, applausum utique merentur quavis prioris asserti exempla, ab eodè producta, incognita videantur, effervescentias, omnis, quam fermentationis evincunt, ratione posterioris autem nemo Chymicorum nostri temporis ipsi largietur, putredinis finem seu effectum, praeter fimum, terram, sordes &c. nullum esse, multò minus fermentationem semper vel formam recentem vel nobiliorem tantum qualitatem, introducere, quatenus hujus contrarium dissertatio antecedens monstravit, illius verò praesentis contextus declarabit.

§. 3. Re vera autem diversisque phaenomenis putrefactionem ac fermentationem inter se differe, ipsa nostra historia, minus oscitanter applicata, & primò quidem Nasae ac Linguae, nobis persuadent: quatenus vegetabilia sive fermentationi, sive putredini subiciantur, quoniam in principio utrumque odorem & saporem aliquandū sibi specificum servant, successivè cum peregrino quodam immutantur, tamen ut ille sub putredine frigidus, nauseabundus & unguosus,

urinofus, sub fermentatione acidulus magis minusque ingratus percipitur, odoremque alium spiret absinthium, mentha & chelidonium fermentatum, ac putrefactum; Animalia verò horumque partes, quia fermentationi nunquam, sed soli putrefactioni, auscultant, putrescentibus etiam vegetabilibus modò similem, modò peculiarem, fracedinem olent.

§.4. Ex communi equidem præjudicio graveolentia atque sapor abominandus individuus putredinis comes pronuntiantur, quasi de essentia hujus sit, ut ipsi exposita illa assumant, imò vulgus sub putrefactione dictarum qualitarum, odoris præprimis, depravationem enormem sibi concipiens, per hanc illam è fermentatione distinguit. Verùm quoniam pro diversa sensoriorum nostrorum textura & habitudine, præconceptarum opinionum & consuetudinis varietate, concreta modò bonè, modò malè, olentia, item saporis modo suavissimi, modo plus minus abominandi, esculenta nobis comparent, dum v.g. caseus & caro ferina ad putrilaginem corrupta, verminantia & graveolentia, quæq; ideo tam à vulgo, quàm à philosophis pro putridis habentur, illis nihilominus, quorum palato arident, delicata, gratissima & ad bonitatem ac perfectionem majorem evecta creduntur difficile erit, putredinem per odorem atq; saporum mutationem determinare. De cætero quam mutationem illam, quæ carnes & cruorem animalium corrumpit, quæq; maxima alimentorum solidiorum, ab his assumptorū, porrio in scybala stercorea facessit, putredinem dicamus, illa tamen, quæ in Moschiferi capreoli carnibus contusis sub Moschi generatione & in Martis stercoribus contingit, alteratio haud ingrati sed fragrantissimum odorem post se trahit, ut taceam ejusdem Moschi activitatem & suaveolentiam per lotii & latrinatum exhalationes, si his per tempus ille exponatur, aut putrescente urinâ frequentius irroretur, augeri. & emarcidâ restaurari. Imò quamvis pleraq; vegetabilia putrescendo fœteant, eorum tamen quædam, aromatica magis, v.g. mentha, salvia, lógiori quamvis putrefactioni hujusq; intensiori gradui concessa, vix aliquid fracedinis, sed odorem satis aromaticum adhuc, inter fermentescendum nihilominus aliquid olidi sui generis, spirant: quod de graveolentibus pariter *Dominus Cox* annotavit, v.g. A triplici olida, quod per putredinem aut inodora magis, aut minus graveolentia, evadant, cum contrà magis inodora cadaverosum plane fœtorem induant, ut clapsa ætate in chelidonio similibusque expertus sum.

§.5. Manus si putrescentibus vegetalibus admoveas, præprimis humidioribus arctiusq; compressis aut densius cumulatis, sine calore sensibili illa vix deprehendes, qui interdum in urentem & luculentum ignem, ut in fœno humidior contingit, degenerat: aut si fortan manibus palpare illum haud liceat, quod lenta nimis sit putredo, obstetricante thermometro (in fermentescentibus vix) enim experiri licebit, evincitque insuper modus ille, scilicet vegetabilium sine igne educendi, quem *Celeberrimus Wedelius* in peculiari libello descripsit, ubi sanè ignis calorque intrinsecus, per motum minimorum putrefactorum concitatus, simile quid præstat, particulas urinofas elevando & propellendo, quod ab igne fornacis aliàs expectamus.

§.6. Præterea & hoc putredo sibi peculiare facit, quod sine ulla molis expansione & rarefactione fiat: Fermentatio contrà cum turgescencia notabili & receptacula frangente. Aliud quidem persuadere videntur animalia, quarum interanea & ventres non tantum, sed artus quoq; sub principium suæ putredinis, interdum mirum in modum & ad crepaturam usque, intumescunt; ast inflatio & intumescencia hæc non à putredinis formalitate, sed ab exhalationibus per illam secretis ac agitatis, dependet, quæ commotæ per densiora & crassiora animalis, integumenta evolare nequeunt, hincq; eorum fibras distendunt, usque dum per remotarum illarum rupturas liberior exitus iis concedatur, hincque, putredine quamvis increcente, cadavera hæc subsideant & turgescere cessent. Ac-

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

cedit & peculiare quid in nonnullis animalibus præstat summus humorum lentor ac visciditas, v.g. in Lumbricis, ut pote qui eadem fere ratione in putredine, ac plantæ in fermentatione, turgescunt, ut aut oras vasis transcedant, aut huic occluso rupturam minentur, nulla alia de causa, quàm quod præter integumenta densiora interiorius viscidum mobiliorum particularum secessum moreretur.

§.7. Imò quemadmodum fermentanda frequentius fermento indigent, quod eorum particulas torpidiores aut firmiore nexu sibi implicatas exagitet ac divellat: ita sine ejusmodi motore externo putredinem perfectam concipere potest quodvis mixtum ad putrescendum aliàs aptum. Quamvis & hoc largiri deceat, actu putridum corpus aliis integris ac recentibus admotum & vicinum hæc facilius in putredinem abripere: sine dubio, quod miasmata putrilaginosâ in motu existentia compactiora & nexu firmiore adhuc combinata integrorum concretorum minima impulsu suo exagitent & in motum similem vindicent.

§.8. Tandem si effectus Putredinis intueamur, sane nec vulgus latet, è rebus hanc expertis vermes varii generis exurgere seu prodire: secus ex fermentescentibus, si illa excipias, quæ de progenie verminosa in acetis nonnullis conspicua in fine dissertationis superioris adjecta. Magis autem paradoxum ejus productum est, quod olim nemo, nostraque demum ætate d. prehenderunt quidam singularis experientiæ Chymici, scilicet volatilia & olea crassa ad quæ, blandiore furni calore fundenda, per putrefactionem vegetabilia æque ac animalia horumque partes disponuntur, dum fermentatio moderata ad spiritus ardentis, destillatione pariter eliciendos, vegetabilia tantum præparat, nimia verò horum succos acetosos reddit.

§.9. Contra quorundam phenomenorum in fermentatione ac putredine identitas notabilem satis utriusque convenientiam & affinitatem arguit. Quippe primò quid notius est, quàm neutram illarum sine aeris appulsu cōtingere, sed hoc excluso utriusq; potentiam mixta, etiam alioquin facile alterabili, illudere. Deinde tam per fermentationem, quàm putrefactionem corporum odor, sapor aliq; facultates specificæ magis pereunt, ita ut absinthium amaritiam, saccharum dulcedinem, rosæ fragrantiam deponant, vis purgans in rhabarbario monachorum lactescens & caustica in thymalo, tinctura aurea in chelidonio pereat: hinc inter spiritus urinofos & sulphureos diversorum vegetabilium, sufficienter fermentatorum aut putrefactorum & posteriorum olea nulla observetur sensibilis differentia, prout *Cox Trans Philos. Anglor. No. 101. & 108.*

§.10. Quoniam E. quædam communia, quædam propria fermentationem & putrefactionem sibi habere, per recensita fateri cogimur, maxime Chymicum Philosophum sollicitum esse decet de utriusque convenientiæ & discrepantiæ ratione. Ubi quoad priorem probabile sit, ambas has corporum immutationes sub uno genere, motus sc. partium constituentium, stare, quatenus eo ipso, dum per putredinem æq; ac fermentationem, successive qualitates non modò sensibiles, sed, ut Peripathetici loqui amant, forma quoque intrinseca, ita destruitur, ut concretum texturam naturalem & speciem pristinam tandem totaliter deponat, hoc sine minimorum translocatione, seu sitis mutatione, fieri nequit, accedente præprimis putrescentium calore, interdum satis intenso, quem sine motu partium velocissimo atq; impetuosissimo concipere haud licet. Quoad differentiam autem formalem, quæ fermentationem atq; putredinem intercedit, hanc determinare, res ardua magis videtur, & Scriptores, qui negotium hoc in se susceperunt discrepantes pleriq; tamen in eo concordantes, repertiuntur graduale saltem illas intercedere discrimen: i. e. Fermentationem ejusmodi particularum integrantium motum esse, quo hæc in se agendu compagē totius laxiorem reddunt, volatilibus tamen

tamen non exhalantibus; per putrefactionem autem ille partium motus eousq; intendatur, quò volatilibus recedentibus fixiores aciditatem contrahant, vel ab illis nò amplius temperatæ aciditatem s. acrimoniam naturalem exerant. Quod alii fermentationis perfectivæ ac destructivæ notionibus indigere contendunt: ita ut per priorem mustum in vinum exalteretur, per posteriorem in acetum degeneret interveniente illâ fructus acerbi & austeri dulcedinem suavem induant, eadem autem protractâ ac diutius continuatâ putrescendo acefcant.

§. 11. Verùm gradualis hæc differētia vix sufficit pro formalitate utriusq; intrinseca exhaurienda, quatenus primò non semper temporis ratione discrepant, ita ut fermentatio quædam quasi via ad putrefactionem, seu huiusmodi inchoamentum sit, sed quæ putredinem experiuntur iis hæc sine illius intervenitu contingit, & idem vegetabile intra paucos æquæ dies, imò pauciores non raro, putrescit, ac fermentescit, imò in animalibus tempus & statum fermentationis putredini præcedaneum, nunquam concipere licet. *Deinde* quæ vegetabilium fructus & succi ultra maturitatem ordinariam & palato nostro gratam exehuntur, hincque molitiem putrilaginosam induunt, acefcunt, & haud putrescere dici valent; sed ulterius tantum fermentantur, quatenus ad putredinem propriè dict. ut inferius cõstabit, inhabiles sunt. Potissimum cum *tertio* putrefactio vera & absoluta in aciditatem minimè terminetur, sed hanc potius corrigat ac immuet: ita ut minus sufficēter putrefacta herba præter sal volatile urinofum multû simul phlegmatis acidi fundat, quod in omnimodè putrida non observatur. Quibus *Deniq;* accedit quod, quævis sub putrefactionis initio aliqua substantiæ volatilis portio, sub naturali & totius concreti odore specifico, postmodum sub urinoso, exhalet: nunquam tamè omnis, nisi forsan in cõsummata plane, pereat, adeoq; non tantum privatio, sed modificatio simul particularum volatilium putredo videtur, quatenus anno ante sæpius à me laudato & vix satis laudandò *Dn. Boyle of. Mens great Ignorante*, non saltem aqua ex Thamesi hausta & ad Climata fervidiora traducta ac putrescens, post aliquam vel in his, calidioribus etiam locis, moram, in iisdem vasis, putredinem deponit, ut mittam, quæ in *dissert. nona ex Trans. Phil. Angl.* §. 8. de eadem Thamesi aqua adduxi. Imò per putrefactionem substantiam concreti volatilem seu activam vix omnem consumi & in auras propelli, spiritus ac sal urinofum cum oleo crasso copiosiore restantur, ad quorum comparitionem & egressum vegetabilia per putrefactionem disponuntur, simili circiter ratione, ac per fermentationem sub spiritus sulphurei forma illa prodit. De alia proin differentia utriusq; huius commutationis intestinæ formali erit cogitandum.

§. 12. Quod ut commodius fiat, attendendæ prius erunt circumstantiæ putredinè juvantes & sufflamantes, hinc phænomena & effectus sub eadem observabiles. Ubi ratione illius, ante omnia supponendum, tam vegetabilia, quam animalia putredinis semina in sinu suo fovere, ita tamen, ut cum vegetabilia simul fermentescendi aptitudine polleant, animalia horumq; partes putredo tantum afficiat, vixq; ulla arte ad fermentandum, i. e. eousq; disponi queant, ut succum acetosum forment aut spiritum sulphureum seu inflammabilem suppedirent, quamvis sæpius & à multis chymicis edecumata dexteritatis atq; experientia hoc tentatum fuerit. Sine dubio huius rei causa est nimia animalium texturæ laxitas, qua fluidiores & volatiliores horum particule solidioribus minus arte implicantur, sed superficialiter tantum adhærescunt paucioresque fixas, à quibus inviscari & detineri queant, inveniunt, hinc per pyrotechniam facilius à se invicem divelluntur, minusque violentiæ & apparatus requiritur phlegma, oleum & sal volatile animalis proliciendi ac eadem substantias ex vegetabilibus educendi.

§. 13. Quam ipsam laxitatem densitatemve diversam disparitatis pariter istius matrem augurari licebit, quæ quædam vegetabilia præ aliis, itemque nonnullæ eorum

partes, magis minusve putredinis vim eludunt, illique se submittunt, dū humidiora præ siccioribus, gramen mollius præ quercus foliis solidioribus, aquola præ oleosis, resinosis & aromaticis, cunctorum substantia mollior præ eorum staminibus ligneis, putrescunt. Quod autem pinguedines animalium, butyrum & olea minus aromatica expressa temporis tractu rancefcant: id à particulis aqueis habent, hinc adipēs per deliquationem, olea per coctionem, i. e. ambo per aqueæ substantiæ aliqualem exhalationem, à corruptione hac præservantur. Pariter acida & austera, utpote quorum moleculæ salinæ & fluidiores terreis minimis artius involutæ, ad fermentescendum potius, quam putrescendum, concreta disponunt. Composita quoque, v. g. vegetabilium decocta, quia ratione multifariæ heterogeneitatis minus intime cohærent, præ simplicioribus, quorum particule sibi magis congruæ & congruæ, facilius putrescunt. Imò ipsorum animalium partes diversæ, prout atomos laxius aut artius combinatas fovēt, v. g. urina præ sanguine, ambo & cerebrum præ carnibus musculosis, putrescunt, ligamenta vero, cartilagine & ossa vix aut non, nisi succulenta admodum, destructionem hanc experiuntur. Propter eandem compactiorem firmioremq; texturam in mineralia putredini nullum conceditur jus, nisi in aquas simpliciores flagnantes: quarum nulli adeo simplicem & elementarem naturam decernere possumus, quin ratione heterogeneitatis laxius cohærentiū putredinem frequentius concipiat, rariùs fermentescat. Et qui metallorum per rubiginem corrosionem putredinem vocant, aut in notionibus imponendis valde luxuriant, aut crassiorē Philosophiam colunt. Succum interim herbarum & florū quia præter aqueam substantiam tantillumq; terre parum admodum salinarum ac sulphurearum, utpote magis activarum, partium secum vehunt, vappescunt potius aut superficialiter tantum putrescunt: quemadmodum in succo graminis ac chelidoni majoris expertus sum, qui ex partibus horum sex vel octo expressus & putredini expositus vix drachmas duas spiritus leviter urinofus exhibebat, quorum nihilominus concretorum pars una unciam ferè spiritus ejusdem volatilioris fundebat.

§. 14. Cuiusmodi herbæ ac flores succulenti per se conquassatæ promptius putrescant, copiosiore affusa humiditate aquea à putredine aliquantum vindicentur, contra sine humiditate ejusmodi satis diluente non fermentescant, problema satis intricatum videtur, cuius nihilominus resolutionem hac ratione tentabo. Copiosior nempe aqua non tantum aëris uberiorem ac intimiorem accessum excludit, quem tamen ad putredinem magis, quam ad fermentationem, necessarium ex sequentibus augurari convenit, sed eadem aqua circumflua particularum sulphurearum evolutionem, sine qua nulla putredo contingit, simul inhibet: cuius utriusque habitudinis intuitu, probabile fit, ligna similiaque sub aquis tardius, quam sub aëre liberiore & intra terram, poris latioribus instructam putrescere. Fermentationem autem aqua faciliat, concreti texturam laxando, imò, quia herbæ & flores sine fermento externo vix fermentescunt, huiusque particule non nisi sufficienter discontinuatæ ac attenuatæ, penitiores illorum recessus subire nequeunt, aqua diluente, tanquam vehiculo, erat opus.

§. 15. Quia interim nobis de putredine potissimum artificiali, seu quam mechanicus moderatur, sermo est, quoad modum operandi, & in specie vegetabilia reponendi, observandum, tempore verno aut æstivo, quò scilicet herbæ floresve ad perfectionem adæquatam pertigerunt, hac à stipitibus lignosis majoribus liberantur, si solidiora, aliquantum conquassantur, sin secus, mot in vase firmo, patulo tamen, probè comprimantur, hinc in locum calidum reponuntur, donec incalescant & per trilagine in pulveream maximè substantiam, odoris urinosi & graveolentis abeant.

§. 16. Sunt equidem nonnulli, qui ex abinthi similibulque plantis præter spiritum urinofum oleum viride & specin-

specificum concreti odorem spirans, it. ex floribus lili-
rum convallium, anthos &c. spiritum urinosum pene-
trantissimum simulque fragrantissimum sibi promittunt,
si in cella, adeoque sub atmosphæra frigidiore, aliquot sep-
timanarum aut mensium digestionem ac putrefactionē
illa sustinuerint. Ast notari meretur, (1) tardius lōge hanc
contingere in loco subterraneo & frigido, quam in aëre
repidiore, (2) minus centalem, sed superficiariam tan-
tum, eam esse, qua sub maceratione hac, ad quam humi-
ditas subterranea non parum confert, quædam particulæ
concretorum oleosæ essentielles integræ minuscq; immu-
tata sal quasi volatile oleosum cum salinis, per putrefa-
ctionem resolutis, seu urinosi, constituunt. i. e. his odo-
rem & fragrantiam specificam affricant, simili modo, ac
spiritum mere urinosum, v. g. salis armoniaci, Cornu
Cervi &c. fœtorem & empyreuma per olea aromatica
aliquantulum subigere & frangere tyrones quoque no-
runt, ac vegetabilia eadem in loco calido leviter tantum
minuscq; totaliter putrefacta spiritus urinosos, de speci-
fico odore adhuc participantes, exhibent.

§. 17. Animalium horumque partium reponendarum
eadem ratio est, imo & hoc his cum vegetabilibus com-
mune manet, ut sine aëris concursu neutrumque putrescât,
quem sanè efficienter in negotio hoc concurrere, vel ex-
inde inviti concedere cogimur, quod cuncta illa, quæ aëris
affluxui obicem ponunt, putredinem quoq; arceant, nec
in vacuo vase aëre exhausto eadem fiat, ut in *Diff. 4. ad-
doxi. Mariette* equidem *de la nature de l'air* hoc negat &
aërem liberum passivè, i. e. ideo, putredini maturandæ in-
servire ait, quod exhalationibus putrescentium aptū exi-
stat receptaculum. Cui tamen præter illa, quæ loco alleg.
contra ipsius assertum fuerunt prolata, regei poterit, ex il-
lius hypothese in Vacuo putredini potior locum esse,
utpote quod pluribus exhalationibus excipiendis capax,
itaq; idem ut, nisi hæc quotidie, aut aliquoties de die, per
machinam pneumaticam exanthlentur, odore se proden-
tes, aërem novum & artificialem quasi forment, qui Mer-
curium intra barometrum, ejusdem machinæ Recipienti
inclusum, simili modo comprimit & per tubum assurgere
facit, ac si aër ab extra fuerit immixtus: cum nihilominus
contrarium experientia confirmet, quatenus, quo inane
magis machinæ recipiens vas, eò tardius & segnius putre-
dine afficiatur putrescibile non tantum planè integrū ad-
huc, sed quod jam dum illius inchoamētum sensit, ab ul-
teriore corruptione satum tectumq; manet. Uno verbo
quemadmodum animalia sine aëre & in vacuo haud subsi-
stunt, sed mox suffocantur, nec plantæ quæ aliàs intra vas
aquâ repletum sub libero aëre vegetantur, in eodē vacuo
nulla amplius incrementa capiunt: si mili modo utraq; aëre
destituta non adeò facile corrumpuntur, sed fixata magis
hac ratione eorum particulæ corruptionem morantur.

§. 18. Imò quod de aëre ambiente externo observamus
idem de artificiali illo, quem intra recipiens, evacuatam
generari modò dixi, asserendum, nam & hic proprii cor-
poris & ejus pars integralis modò extiterat, devastator
evadit, hoc est, in putredinem illud abripit, ut secundum
manuductionem *D. Boilli* in finis experimentis evincere
licet. Sc. particulæ fluidiores seu aër concreti, vacuo in-
clusi, quamdiu intrinsecus huic est & intra spissiora cor-
poris repagula concentratus hæret, sine aëris externi au-
xilii ad vibrationes illas corruptivas præstandas minùs
aptus existit, hinc nihil putrilaginis suo receptaculo &
corpori inspirare valet: statim ac vero sub exhalationum
involucro emanat & ab æthere ambiente novam elasticita-
tem atq; impetum recipit, nisi mox extrahatur concreti
ejusdem poros denuo subiens hujus minima divellit, dis-
locat, expellit, i. e. ad putredinem disponit. Unde etiā con-
tingit, ut à piscibus in vacuo asservatis putredo vix arceri
queat, quatenus hi laxioris, ac aliorum animalium car-
nes, texturæ, extra medium suum crassius, aquam nempe,
constituti, ac tenuiori multo, sc. ætheri seu aëri rarefacto
illari, copiosiores mox exhalationes spargunt, adeoque
celeriter & luxuriose admodum vacuum aëre novo &

crassiore replent & sui corruptorem sibi pariunt.

§. 19. Phænomenorum in putrefactione notabiliorum
bina sunt, quorum prius calor est, quem vegetabilia sub
principium statim illius exerunt, animalia secùs, aut certe
non adeò sensibiliter, & quidem forsitan triplici de causa.
Nam primò illorum compages firmior motum particu-
larum sulphurearum seu calorificarū ad extra variis mo-
dis reflectit ut tam inter se, quam cum aliis, collisione ca-
lorem sensibilem concitent, ita quidem, ut quo arctius il-
la compressa densiusque congesta fuerint, hic intensior &
flammigerus evadat: dum laxior animalium textura ejus-
modi remoras percussivas minimè præstat, sed minima
volatiliora & activa liberius à centro ad & ultra periphæ-
riam dimittit. Deinde quemadmodum in vegetabilibus
nonnullis copiosior humiditas aqueam putrescendi
impetum non leviter obtundere, §. 14 dict. sic in anima-
libus, utpote quib. uberius phlegma contigit, particulas
sulphureas diluvio ejusmodi intrinseco extingui aut nota-
biliter resingi, non improbabile est. Nec tertio in vege-
tabilium putrefactione omnis effervescentia excludi po-
terit, utpote quæ, sibi relicta, acido abundans, in quod per
putredinem sensim evolutæ particulæ urinosæ impin-
gentes luctam ejusmodi, ætus productricem concitant,
qualem in animalibus acido potentiore destitutis expe-
ctare haud licet.

§. 20. Altera sensus incurrens putrescentium mutatio in
eo consistit, quod prout superius annotatum, omnes qua-
litates tum sensibiles, tum specificas, illa deponat, præpri-
mis tamen fœtida maximè evadant, quamvis eorū etiam
quædam, v. g. aromatica, odorem suum vix mutent, imò
nonnullorum graveolentiam naturalem per putredinem
temperari ac corrigi, eodem loco monuerim. Atq; hujus
rei ratio ut felicius pateat, suppono: omnem odorem,
sive gratum, sive ingratum, à sulphure, cōcreto sale aqua-
to seu exaltato, emanare, ita quidem ut salia volatilia gra-
veolentia maximè, quibus vulgò elementarem simplici-
tatem nuncupant nullo modo educi aut educta concipi
queant, nisi sulphur copiosum secum vehentia, utpote in
quod, ipsis obvium, nunquam non agere possunt, sed ejus
particulas semper delibant secumq; abripiunt. Nihilomi-
nus quo sulphur subtilius ac parcius, eò suaveolentiora,
quo crassius impurius & copiosius, eò graveolentia ma-
gis, concreta reddit, quatenus v. g. sulphuris communis
cum oleo communi, facta solutio per se, aut cum lixivio
adornata ab instillato aceto, gravissimū spargit odorem,
olea sanguinis humani tartari, Cornu Cervi &c. sulphure
crassiore turgida, insigniter fœrent, imò Ziberhū & mos-
chus, haud discontinuata, quod sulphur qs. coadensatum
gerant, paribus eorumq; spiritibus minus grata existunt,
econtra aliis discontinuata & attenuata, item olea aro-
matū essentialia, utpote sulphure magis digesto æthereo
ac diluto gaudentia, iisdem suaviora contingunt fercula.
Quoniam E. per putrefactionem tota concreti cōpages
dissolvitur, hinc cum sale sulphur copiosū & crassum, &
quidem cōfertim valde, eructatur, sine fœtore rara adm o-
dum avis illa er: dum autem in aromaticis attenuatū &
digestum magis idem sulphur est, ac lento magis gradu
eorum succedit corruptio, illa vix aliquid graveolentiæ
spirat; imò quia attritione illa quam sub putrefactionis
motu particulæ sulphuris crassioris experientur, has ali-
quantum dissolvit æthereasque magis fieri non omni pro-
babilitate caret, nonnullorum mixtorum graveolentiam
per putredinem aliquantum mitescere, non impossibile
est. Quod idem confirmare videntur flores præ herbis
inter putrescendum minimè fœrentes, imo sal non adeò
graveolens exhalantes quatenus, ut pars vegetabilis
subtilior, hinc odorifera magis, sulphur subtilius & exal-
tatum magis fovent.

§. 21. Effectus putrefactionis distinguere conveniet in
mere Physicum & in Chymico Physicos illam dicendo
varia vermium genera, quæ ex diversorum putredine
emergunt; hos vero sal volatile & oleum crassum atque
fœtidum, distillatione demum à mediocriter, sufficienter

tamen, putrefactis discernenda. Ratione priorum (à quibus illi, qui nullum sal volatile vegetabilibus educi posse supponunt, posteriorum alterum, nempe sal urinolum; prodire augurantur) Philosophi semper magno cum strepitu altercati fuerunt, an ex materia putri, ut tali, seu per generationem æquivocam, an ex semine potius in illo recondito, nascantur: & priorem sententiam potissimi ex Peripateticis, paucis forsitan exceptis, amplexi fuerunt, posterior vero non tantum hoc nostro, sed antecessoribus quoque jamdum seculis, suas observavit assedas, maxime tamen pariter inter se dissentientes. Cum eorum nonnulli semina hæc à fœmellis insectorum imprægnatis in terram aliaque corpora profunda, ajunt, in quibus eo usque sopita latitarent, donec vel à calore solis vel putrefactione in actum promoverent ac remotis impedimentis corpus sibi congruum fabricarent: alii verò v.g. Platonici, hæc viventium semina in spiritu universali sparsa per elementa volutari opinabantur, donec in adæquata, hinc putrescente quoque, materia pro ea, quæ ab Omnipotente ipsis impressa, idæa, species has vel illas formarent.

§. 22. Quibus quantisq; cunctæ hæc opiniones præmanant difficultatibus, referre, per instituti rationem mihi haud integrum relinquitur cū speculationibus ejusmodi dissolvendis sufficiant experimenta *Franc. Redi* satis probabiliter evincunt, vermes, quos ex plantis ac animalium partibus putrescentibus quotidie prodire observamus ex semine similium insectorum generari: illarum verò hoc in negotio non alias esse partes, quàm ut locum vel nidum commodum simulq; pabulum subministrant ovulis, cuicunque vermium semini, aut horum proli, ita ut, nisi à matribus eorum illa hac delata fuerint, nullum ibi insectum simile nascatur. Sc. Vasis vitreis carnes, fructus, imò ipsum caseum, ita inclusa, ut nullum insectorum circumvolitantium aut, externorum subintrare & illa semine suo conspurcare potuerit aer nihilominus penetrarit, putrescendo nunquam verminare aut mulcas proferre, observavit, iidem speciebus in vasis minus obturatis in verminosam putrilaginem abeuntibus. Quibus accedit, quod causæ externæ seu æquivocæ solitariae aut vis quædam plasticæ per universum agitata, animæ & vitæ carentes tam congruè & accuratè concurrere & convenire nequeant, ut animalium vitalia fabricent organa atque machinas, quorum structuram nulla mentis acies comprehendere hætenus potuit: unde animalia etiam vilissima & minima cuncta ab aliis ejusdem generis animatis procreari verosimilius fit.

§. 23. Chymico-physicos vero effectus quod concernit, salis volatilis prolixius examen alteri cuidam occasione reservandum erit indigendo sal. em hoc loco, illam ipsam substantiam salinam, quæ post incinerationem vegetabilium sub alcali fixi nomine extrahitur, in putrefactione volatilis speciem induere: dum quæ vegetabilia incinerata plus salis lixiviosi habent, putrefacta sal quoque volatile copiosum promunt, horumque caput mortuum, quod exilissimæ molis, vix tantillum salis alcalisati suppeditat. Et quamvis ex eadem planta putrefacta copiosius semper sal volatile, quam ex simpliciter incinerata alcali fixi, educatur, haud tamen dispar ideo erit utriusque substantia: quatenus quod ejus sub fuliginis regimine in incineratione avolat, hic detinetur, imò volatile aliquid sibi combinatum gerens etiam hoc modo molem majorem nascitur. Cujus vero generis, sc. an acidæ an alterius & cujus, naturæ hoc sal urinolum in cœcero integro fuerit, nondum determinare mihi præsumo, ut ut mihi probabile videatur, sub hac, quæ prodit, formâ, illud haud inexistisse: quoniam nulla arte, nisi quam aut putrefactio, aut ignis, moderatur, tale educi valet, quorum tamen utrumq; corpora non tantum in partes distinguere, sed has quoq; variis modis combinare, hinc diversa decomposita formare, præter illa, quæ aliàs adduxi, vel solum oleum crassum, quod ignis æque comburens ac putrefactio cū moderatione calore, promunt, credere jubet.

§. 24. Hoc enim tanquam alter putredinis effectus Chymico-Physicus, post spiritum & sal volatile urinolum, nigricans, ter idem, ac balsami spissitudinem æquans, ætate paulo ignis arenæ gradu propellitur, copiosius longè quàm quod, essentialiale dictum ex plantis non putrefactis & cum aqua ex vesica aut cucurbita destillatum sub hac nihilominus conditione, ut, quod abundantius hoc illis inexistit, eò in majore quantitate etiam crassius hoc prodeat, & si putredo non omnes æque vegetabiles partes penetrarit, sub fluiditate, diaphaneitate, sapore & odore, essentiali oleo magis simile compareat.

§. 25. Quibus cunctis ita se habentibus de Fermentationis & Putrefactionis disparitate, hujusq; formalitatis & essentia, ita suspicor. Nempe (1) per putrefactionem omne sulphur ac sal à mixto separatur, ita ut post destillationem aut diuturniorem sub aura libera putredinem nihil horum in capite mortuo reperiatur: in fermentatione verò moderata aliquid tantum salis plus verò sulphuris ad secessum disponitur, in nimia & ad acorem vergente sal omne repagula frangit, & olei maxima pars huic involuta figitur. Unde etiam fit, ut ex fermentatis semper adhuc aliquid salis fixi elici queat, ex sufficienter putrefactis granulum quidem. (2) In fermentatione sulphurea sub ita tertia attenuatur, & quæ antea sub olei essentialis consistencia apparebat, nunc in ætheream & subtiliorem magis in spiritu evehitur: quæ in putrefactione crassescit, e. partes terrestriores sibi adaptat (3) Per hanc sal à sulphure maximam partem separatur, aut utriusque cohesio debiliter laxatur; fermentationis verò motu ambo sibi adhuc implicantur, sive in spiritum ardentem, sive in succum acerosum, ille terminetur (4) In putrefactione plus particularum volatilium exhalat ut odor præprimis testatur, & ex hoc colligere licet, quod salis volatilis aliquid eliciendi quantitas, illà diutius continuatâ, imminuat, cum per fermentationem nihil, aut parum exhalet, i. e. non particularum secessus, sed nix tantum quidam, contingat. Deniq; (5) sal in putrefactione potius volatiliscatur in fermentatione in fluorem abit, qui in spiritu sulphureo insensibilis valde, in aceto manifestus magis. *Bohnus.*

P Y R A C E U M.

Est vinum confectum è succo pyrorum fermentatione, *Pomaceum* præparatur è succo pomorum idem fermentatò. Pyraceum etiam vocatur succus pyrorum, & pomaceum succus pomorum ad extracti seu sapæ consistentiam per evaporationem seu lentâ coctionem deductus.

P Y R E T H U M.

Pyrethrum ab igne nomen habet ob radicis ejus fervorem igneum C.B.

Ab anthemide seu chamæmelo flore majore & radicis acris fervidoque sapore differt.

Nomina. Pyrethrum flore bellidis C.B. vulgate officinarum *Park.* officinarum *Ger.*

Dod.

Pyrethro folia sunt multipliciter dissecta divisaque similitudine ferè foliorum sceniculi, sed tamen minora, dauci Sylvestris & carotæ æmula: cauliculi dodrantales aut paulò latiores; in quorum fastigiis flos amplus, latus, Anthemidis similis, sed tamen major, medio orbe subluteus; angustis oblongisque circum ambientibus foliolis, supina parte albicantibus, pronâ vero nonnulli purpurascensibus. Semen inter disci sive orbis staminum gignitur, tenue & longum. Radix digitalis ferè est crassitudinis, longa, subrufo colore nigricans, gustu acris & admodum fervido.

Ex Orientis partibus infertur. Nasci in quibusdam Italianæ montibus, sed minùs acre, scribit Matthiolus.

Optimum remedium habetur in Paralyfi Linguae cum vocis amissione. Ad dentium dolorem radix masti-cata in usu est. *RAIVS*

Pyrethrum Italicum est Pyrethri umbelliferi B.P. radix oblonga, digitorum crassa, foris ferruginea, intus candida, sapore acris ferventissimo, unde etiam nomen obtinet, videlicet à *pyg.* ignis.



pyrola minor

pyrola major

E & P





Nota generica est esse plantam umbellatam.

Eisdem facultates obtinet ac exteræ plantæ umbellatæ, sed omnes omnino ferventi sapore excedit, ideoque valdopere incidit, aperit, in quantum nempe constat particulis tenuissimis in remotissima loca penetrantibus. Hoc peculiare habet quod salivationem promoveat, & quod non tantum ut manducatorium in catarrhis frigidis, sed etiam specificum sternutatorium vasa cerebri obstructa aperiens. Optimè convenit in Paralyfi linguæ, ubi quis obstrictis linguæ nervis obmutescit; scilicet si exiguâ ejus quantitas linguâ inpergatur, statim ab illa nervorum ligatione, eam liberat. Eâ etiam in odontalgia à frigiditate orta circumforanei utuntur. Datur in decoctis aperientibus. Apoplecticis hæc decocta inclytis dantur.

Pyrethrum Germanicum est Pyrethri bellidis foliis B.P. radix oblonga, Italicò tenuior, foris fusca, intus albicans, saporis pyrethri Italicò ferventioris. *Nota generica est esse plantam corymbosam, seminibus solidis.* Eâdem vires habet ac Pyrethrum italicum. HERMANNUS in *Materia Medica manuscripta*.

PYRITES, vid. sub titulo *Lapis*.

P Y R O L A.

A foliorum cum pyri foliis similitudine nomen sumpsit.

Florum spica & semine pulvisculi instar minutissimo cum hoc genere convenit, radicibus fibrosis & foliis semper virentibus à reliquis speciebus differt.

Nomina. I. *Pyrola Ger. I. B.* nostras vulgaris *Park.* rotund folia major *C. B.*

I. B. Quinq; aut sex folia humi spargit, subrotunda, pyracæis paria, crassa, atrovirentia, glabra, nitidaque facie superna, pediculis palmaribus ferè adhærentia; inter quæ caulis nascitur dodrantalis, angulosus, parvis & acutis foliis aliquot donatus, nullam ramorum divisionem agnoscens, thyrsum gerens amœnorum florum pentapetalorum, albidorum, orchidum fermè modo, (superioris duob. (petalis) galeam, imò verò labellum bifidum referentium, multis umbilicis obsidentibus apicibus croceis, ex quibus pistillus recurvus prodit, & imò versus reflexus, & quandam veluti proboscidem referens, flores capitula sequuntur angulosa, pulvisculo minuto plena, sapor totius plantæ amarus, non sine insigni astrictione.

Hæc observante Clusio, flore est vel ampliore molliorque, vel minore & duriore, nos etiam in flore differentiam observavimus in Septentrionalibus Angliæ variis in locis invenitur, prope Halifax oppidum copiosè oritur.

In montosis prope Genevæ collegimus; inq; sylvis montosis, plurimis Germaniæ in locis, apud nos in ericetis muscosis inter Ericas sæpius occurrit quam in sylvis.

Vulneraria est usu interno & externo celeberrima, Vide chirurgiæ Scriptores.

Nomina. 2. *Pyrola* folio ferrato *I. B.* folio mucronato ferrato *C. B.* tenerior *Park.* secunda tenerior Clusij *Ger.*

I. B. Tenerior est altera, radice repente, caule brevior, insigniore foliis circa imum ornato, dimidio minoribus, tenuioribus, oblongis, acuminatis, tantillum in ambitu crenatis, flores per caulem tyrsoides, præcedenti similes, minores, capitula relinquunt angulosa, stylum ex umbilico proferentia.

In montibus Genevæ vicinis, inque sylvis montosis non longè à Constantia urbe Schaphusiam versus nobis inventa & observata est.

Hanc esse suspicor quam in sylva Haselwood in Comitatu Eboracensi nascentem observavit nobisque ostendit D. Witham, nam & folia minora erant quam in pyrola vulgari & mucronata & circum oras leviter crenata, & in umbrosis oriebarur. *Rajus*

De virtutibus. *Pyrolæ* utriusq; majoris & minoris, seu

folio rotundiori, aut oblongiori, plura vide sub titulo VULNERARIA, ubi scilicet de Plantis nostris vulnerariis seu Traumaticis quedam dicimus. Hic earundem icones Tabulâ xx. expressas tantum edicimus.

PYROTICA, seu CAUTERIA.

Utur cauteria potentialia, quæ non actuali igne, sed potentiali escharonâ vi agentia, de quibus etiam quoad materiam hanc alibi diximus, singula sua obtineant nomina; attamen juxta methodum vulgarem, cum calcinata, cineres & lapides sub eodem titulo communiter à scriptoribus venire soleant, nos quoque eam sequemur.

(1.) *Cauteria potentialia debentur salibus, suntq; vel alcalina, vel acida.* Corrosio nempe fit à sale & hujus effectus est. Hinc duæ classes sunt eorundem. Ex primo ordine vulgatissimus est lapis corrosivus, qui nempe fit ex lixivio saponatorum, coagulato in vase ferreo vel figulino, adeoque nihil aliud est quam sal, cujus materia vel $\epsilon\lambda\chi\alpha\nu$ est sal fraxini & quercus. Hoc seu simplici elemento cognito, facile est de additamentis aliis judicare, quæ sunt v.g. calx viva, stercus lupi, & quæ alia ut plurimum citra rationem vel usum jungi à nonnullis consueverunt, adeoque salia alcalia fortiora coagulata cauterium potentiale evadunt. Alterius exemplum est tum butyrum $\delta\iota$, promptissimum & potentissimum cauterium, quod ex $\delta\iota$ & mercurio sublimato paratur, sed cum liquidius sit, cum pennæ anserinæ parte solet applicari, & cerato defendi, ne longius quam par est diffuset; tum crystalli $\delta\alpha$, quod quidam cauterium indolens vocant, si v.g. imperialis Philippius in aquâ forti solvatur & solum ex parte evaporet, hinc in cellâ emergentes crystalli magnitudine sufficienti applicantur, ubi id opus est. Ex quo seu potissima iterum notari potest.

(2.) *Quò magis actuum est cauterium, eo magis indolens.* Tollit enim statim sensum ipsum destructione partis, non aliter ac ignis ipse si sensum tollat certæ partis, eatenus sine dolore fingi potest agere. Utraque verò hæc dicta classis sufficit, si jam ∇ , spiritum nitri, vel vitrioli philosophicum loco butyri $\delta\iota$ recipiamus, siue globulos his imbutos applicemus, res eodem recidit, butyrum enim $\delta\iota$ nihil aliud est, quam spiritus corrosivus saturatior & concentratior propulsus, nam mercurius cum his ipsis \odot , \oplus & \ominus sublimatur, unde etiam butyrum hoc ipsum $\delta\iota$ sine additione mercurii cum his ipsis salibus parari potest. Hinc & illud notamus: quò concentratiora sunt salia & spiritus acidi, eò activiora & magis corrosiva, unde oleum salis, ol. vitrioli (impropiè dictum) longè potentius est quam spiritus.

(3.) *Cauteria ad erodendum separandum, consumendum faciunt.* Spiculis suis salinis ipsam pellem invadunt aggrediunturque, donec systasin ejus demoliantur, fundant, liquant; siue enim sicca applicantur, uti in lapide corrosivo fit, à substantifico succo solvuntur & cum eo mista perveniunt particulas, siue humida, effectum suum sortiuntur, & quidem liquida potentius, sicca remissius agunt. Hinc erodunt, & pervadendo cutim ulcus pariunt, quod, quia apertum hinc servatur, fonticulus audit. Abscessus quoque rumpunt, adeoque eâ proportionem ponderis & temporis applicanda, ne altius quam par est & ad ipsum carnium clima pertingant, & malè corpus habeant. Separant in primis acida, unde nobilis usus est butyri $\delta\iota$ ad partes sphacelo correptas, ut vivum à mortuo separetur, de quo vide *Hartmanni in praxi chymiarum*. Consumunt excrecentias p.n. ubi id tutò licet, v.g. verrucas & similia, quæ tamen omnia cum grano salis sunt applicanda, quia maxime sunt activa, & consequenter facile damnum inferre apta.

(4.) *Cauteria actualia escharam inducunt nigricantem, acida albicantem.* Tacta quidem hæc thesis jam alibi

est, hinc verò loci specialius de eâ dicendum venit. Licet enim facile hoc ex nostris hypothefibus deducere; prius scilicet contingit, eschara puta nigra, quia sal adfociatur sulphuri sanguinis, jam extra sphaeram activitatis per cauterium posito, uti notum est, lixivis salibus lubenter admodum maritari & occultari sulphura. Acida verò albicantem inducunt, tum per accidens, tum per se. Per accidens, quatenus atomos stiales secum absorpsit butyrum stij, quæ appulsu alius liquoris cujuscunque diversi, maximè verò aquæ simplicis præcipitantur & visendas se offerunt. Per se, quia communi nobis axiomate acidum obtundit sulphur. *Wedelius.*

Cauterium Potentiale ex *Pharm. Augst.*

¶. Cineris clavellati, calcis vivæ añ q. v. cum aq. font. aliquandiu macerata filtrentur, & coctione inspissentur; postea in vitrò optimè clauso ab aere, ne in eò liquecat, sal hoc servetur.

P Y R U S.

Pyrus à πυρ, id est ignis dicitur, quod fructus ejus flammæ instar è lato in oblongum fastigietur, & in transit, ut à πυρ est fio, verum quomodo scribendum sit pyrusne cum y, an pirus cum i. inter eruditos non convenit: optima Plinij exemplaria ubique pirum habent cum i. alij pirum à græco πυριος deducunt, truncato capite, ut in multis alijs, & inserto r. quomodo è πυριον est coriandrum, à πυριον flagro, πυριον putreo, sed unde πυριος an ab Apia regione, id est, Peloponneso, an hæc ab πυριος, quod verisimilius videtur.

Ut mali ita pyri unam duntaxat speciem agnosco ob rationes in Capite de Malo dictas.

Est autem pyrus sativa, (describente I. Bauhino) crasso eoque recto & simplici caudice, altius quam malus assurgit, sed minus sit patula, ramis, iisq; plurimis, surrectis potius quam laterorsum extensis, Corrice quam mali scabriore est, materie firma satiq; tractabili, præsertim ad typos & sculpturas apta, item ad tornum & alia, ex pallida rufescente, quæ siccata magis etiam rutila fit. Folia circinata ferè, vel ex circinato oblonga, marginibus æqualibus seu minime incisus aut crenatis, eorum figura pro specierum diversitate variante, longiusculo pediculo hærentia, supernè lævia, splendens, internè asperiuscula, albicantia, alternatim posita: flores ferè quales malo, pentaphylli, albicantes, apices purpurei, fructus, hoc est, pyra pœne omnia, turbinata, circa pythmenæ crassiora, & velut in pyramidem fastigiata, in qua tamen figura multum variant, (imo non omnes eam observant) carne quam malorum densiore, satis succosa, sed plerunque acerosa, præsertim circa media, ubi semina foris nigra, intrus alba, qualia mali, cellulis coriaceis distincta continentur; pediculo ferè quam pomorum longiori. Colore multum variant, quemadmodum & sapore; in genere non tam vividus his color quam malo; neq; cute tam lævi contexta, sed aliàs virenti, aliàs araneosâ, aliàs sufflava, rarius rufescente, ut plurimum obsoleta, & leviter scabra, sapor vel dulcis, vel acidus, vel austerus, vel acerbus, arbor caret spinis, radicem habet profunde actam (ut scribit Theoph.)

Pyrus in senectute fecundior, autore Theophr. & experientia teste. Παιγελασινη dicta est h. e. è radice emittens pullum: huic enim longè etiam subter terram productis radicibus stolones enascuntur. Salsis offendi ajunt.

Pulpa in hoc alijsq; frutib. esculentis quib. data est, non tantum ut animalib. in cibum cedat à natura concessa est; sed etiam ad seminum præsidium: quæ etsi coriaceo amictu donata sint, melius tamen & felicius intra pulpam, vel putridam etiam, totâ conservantur hyeme quam exempta.

Pyra pleraquæ calculosa sunt, ideoque à nonnullis calculo in humano corpore generando idonea putantur & ob id in cibis damnanda.

Pyrorum non minus quam pomorum genera, seu differentia numerosissima sunt, aut verius, novis quotannis productis & æternum producendis infinite; nec tamen omnes quæ etiam nunc erant varietates enumerare cuiquam facile nè dicam possibile fuerit, cum unusquisque ferè pagus quædam genera peculiaria habeat, sunt quædam fateor in unaquaque regione aliis celebriora & passim cognita, in Gallia scilicet Hispania, Germania, Italia, Anglia quæ recensuere Curtius, Dalechampius, Ruellius, Mathiolus, Casalpini, Aug. Gallus, Cordus, I. B. Parkinsonus, Hortulani gallici auctor, alique ad quos lectorem qui cascire desiderat remitto. Duo autem genera insigniora non apud Anglos duntaxat, sed & Gallos, & Italos & Germanos dudum celebrata, nec minore in pretio & honore hodie etiam habita, indicta præterire nequeo: ea sunt.

1. Bergomatia, a Bergamo Italiæ urbe denominata, succo saporeq; egregia, rotundiore formâ, colore herbaceo, qui nec dotem referat, Autumno appetente maturescunt, verum non diu durant, nisi paulo ante plenam maturitatem colligantur, & commodè reponantur, sive cocta sive cruda edantur utriq; esui jucundissima sunt, inquit Curtius, verum inutilem operam navant, qui ea coquunt, siquidem crudorum succus omnium non dico pyrorum, sed fructuum in Anglia nascentium, palato nostro lapidissimus est, & ut ita dicam, ditissimus.

2. Boni christiani dicta, ferotina hæc, uti in autumnum durent, amplissima, eucurbitæ figura, herbaceo colore, subnigro, succo dulcissimo, ut etiam cum tenuerint crudæ per orbiculos, in latum tenuiter dissecta, additâ aquâ rosacea & saccharo edantur, per summos enim colores refrigerare perhibentur, ut ægris etiam contra ardotes præbeantur. Curtius.

Pyrus loca temperata amat, in calidioribus, ut Agypto referente Theophrasto, pauca oritur: lato solo gaudet, nec tamen glareosum aspernatur, ubi mali non proficiunt, nihil frequentius Germaniæ, Galliæ, sed præsertim Septentrionis plagis, Belgio, Northmanniæ, Angliæ.

Pyrus, ut rectè Tragus, ante malum plerunque cum ceraso florem edit, Aprilis mense aut tempestate frigidiore etiam Maij initio, æstate & autumno fructus maturescit.

Pyrorum vires ex saporum generibus metiendæ sunt, dulcia emollunt potius quam astringunt acida & acerbiora astringunt.

Vires. Pyra esu stomacho grata sunt, & sitim extinguunt, etiam cruda, utiliora, autore Matth. olo, si postrema in pastu comedantur, unanimi tamen consensu medicorum cocta crudis præstant, decocta mixtè salubria sunt & grata. Plin. crudis semper cocta utiliora, & ad corporis nutritionem meliora. Matth.

Cruda gravant stomachum, relevant pyra cocta gravatum. Schol. Salern.

Nos pyra cruda bene matura, boni succi & melioris notæ, non in alubria putamus: ejusmodi enim multoties copiosè ad satietatem usque ingessimus, nec tamen unquam vel levissimum inde nocumentum aut incommodum sentimus; non tamen receptæ sententiæ adversamur, nec cocta crudis salubriora esse negamus, ad coquendum tamen aptiora sunt nonnihil acerba & austera; & à coctione sapidiora & palato gratiora evadunt, quam dulcia & mitiora: arida & resicata pyra ventris fluxus sedant, & sanguinis quoque fluorescunt, cum fungis cocta eorum malignitatem corrigere dicuntur.

E Pyris non secus ac pomis fit vini quoddam genus. Apitres veteris us dictum, Latinis pyraceum, costratibus Perrp. dulce admodum est, & palato mixtè blanditur, verum apud vulgus nostrum malè audit quod

quod affidue eo utentes pro potu ordinario scabiosos efficere solere credatur; quod an, verum sit nec ne nobis incompertum: non diu durat, sed prima æstate acescit.

PYRASTRUM, seu PYRUM SYLTESTRE.

Pyrus Sylvestris (describente I. Bauhino) minus pro-cera ferè est arbor quàm sativa: verùm furculosa admodum, & ramorum extremis spinosis, caudice rimoso, & huius cortice, materie rutila & quam sativa duriore, idèdque discos & tabellas ex eo conficiunt: primum emergunt flores instat umbellæ, ex eodem furculo seu nodulo multi, lanuginosis pediculis insidentes, pentapetali, petalis albis, rotundis, cochlearis modo concavis, inter quorum singula intercedit subiecti hirsuti umbilici radius, in viridi canescens: apices in medio multi purpurei: folia florente arbore subtus & in ambitu cana lanugine obsita, foliorum coronei instar, superne virentia, splendida, aliàs utrinque glabra, lucida, subrotunda, crassiuscula, fructus non uniformes, sed alias rotundi & modice compressi, alias ex rotundo leviter turbinati & longiusculi, austeri & acerbi valde, nec edules donec fracescant, quod ferè sit Octobri, semen intus continentia pomorum seminibus simillimum, extima aliòqui facie pyri (speciem facile repræsentat, à radice numerosos emitte stolonos, valde spinosos, cortice rubicundo vestitos: copia & rigiditate spinarum facile discernuntur à stolonibus malorum sylvestrium.

An pyrus sylvestris cultu mutari possit in mitem seu hortensem quæstio est. Theophrastus disertis

verbis id negat. Scaliger affirmat pyrum feris translatam locis adhibito cultu deponere agrestem illum habitum simul cum aculeis quos adulta tulisset, simulque & laxatur illa densitas quæ videtur in ejus popularibus, unde transportata fuit ad naturam meliorem, quod an verum sit nec ne vix ipsum Scaligerum expertum credo.

Pyrorum sylvestrium non minus quàm sativarum plurimæ sunt differentie; passim occurrunt in sylvis & sepibus, locis præferim montosis: loca calidiora refugiunt, unde in Ægypto nullum prorsus sylvestris pyri genus; mitis etiam rara.

Florent simul cum sativis, sed fructus tardius perficiunt, viz. non ante Octobrem mensem.

Vires. Pyrum sylvestre (*Ægæg*) siccat & astringit validè: longeque efficacius quàm sativum: conciditur (inquit Plinius) suspensumque siccat ad sistendum alvum, quod & decoctum ejus potum præstat, decoquatur & folia cum pomo ad eisdem usus.

Veteres & recentiores nonnulli pyrastri fructum adversus fungorum venenum commendant, vel simul cum fungis coctum, vel à fungis comestis confestim sumptum, his refragatur. I. Bauhinus, & eruditis considerandum proponit an tutus sit usus pyrorum sylvestrium cum fungis: cum pyra valide astringant vomitumque & alvi fluxum compescant, adeòque impediunt, ne fungi per vomitum reliciantur aut per alvum promptè descendant, fungi autem, cujuscunque tandem generis sunt, quò citius à natura desiciuntur & extra corpus pelluntur eò salubrius, cum ventriculorum gravent, aut lancinent vexentve, reliqua apud ipsum vide. *Rajus.*

LIBER XVI.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

Q

QUERCULA, vid. *Chamadrys*.

QUERCUS.

Apus Græcis generale nomen est, omnes arbores glandiferas complectens, quas una voce comprehendere posse latino sermone negat Plinius, quercus enim inter *δρῦδες* differentias ab eodem recensetur, Verum quoniam quercus nomen à vulgo extenditur ad omnes glandiferarum species significandas; nos non inviti, cum I. Bauhino, (nè quid novi sapere velle videamur) quercum loco genericæ vocis usurpabimus. Quercus Jovi sacra erat, quòd vitæ causa in hac primum arbore mortalibus fuit, qui primum glande vescerentur.

Et quæ deciderant patula Jovis arbore glandes.
Ovid.

Hujus èhim fructu suos populos primum aluisse dicitur ante fruges inventas:

Civica corona, militum apud Romanos virtutis insignis clarissimum, è querna fronde fiebat, de qua differenter legem Plinium, civica dicta est quoniam dabatur ob civem servatum.

Quercus vox vel primitiva est, vel ignotæ originis. Vossius fortè à *κεραλεύος*, quod valet durus, asper, dictam putat; est enim ligni duri & corticis asperi: quod non verisimile nobis.

Vires & Usus. *Δρῦος* materies, autore Theophrasto,

spissa, dura, adeoque flexum nullum recipit tam navibus quàm domibus commoda; nec non in terra obruta durat.

Hujus foliis præ reliquis omnibus conservatum debemus melleum liquorem roremve ex aere descendentem, ex quo apes mella conficiunt, Butler. Tract. de apibus, cap. 6. n. 40. & Theophr. lib. de melle. Plinius etiam lib. 16. C. 8. constat, inquit, rores melleos è cælo cadentes non aliis magis insidere frondibus.

Aliquando idem præstant acer minus & corylus, sed parè, idem Butler. ibidem mirum sanè melleum rorem harum tantum arborum non aliarum foliis insidere, an quòd harum folia densiora sunt, adeòque rorem facilius reflectunt & condensant, qui in aliarum arborum folia, (quæ rariora & spongiora sunt) facile penetrat & se insinuat? adde quòd superficies horum foliorum glabra & velut polita est, adeoque conducit ad humorem incidentem sistendum & congelandum: quemadmodum videmus speculi superficiem afflantis habitum illico densare, & guttulas brevi cogere, an forte similitudo quædam & quasi cognatio intercedat inter particulas foliorum hujus arboris, eorumve poros & roris mellei, quo hic iis facilius & promptius adhærescat.

Mirum etiam nobis videtur quòd apud Cordum legitur constare omnibus, qui usque ad extremam senectutem apum naturam scrutati sunt rusticis, apes ipsas mellificaturas tantum è floribus collectum liquorem in

in favis reponere, rorem verò melleum cum decidit haud quaquam ad favos convehere; quod ipsi quoque (inquit) verum esse deprehendimus: hinc quamvis mellito rore delapso ad eum frequentes convolant apes, minimè tamen ut eum in alvearia convehant, sed tanquam ad cibum & pastum, quo adeò se replent, ut prorsus inerres & ignavæ reddantur, multæque moriantur, itaque rustici dicere solent, mellitos rores bonum quidem pastum apibus præbere, sed ad mellificandum minimè conducere: hæc Gordus, nobis ramen plane contrarium videtur, iisque qui apum naturam, rationes, totamque œconomiam diligenter & curiose observarunt ingeniosis & eruditis, quibus plus fidendum quam rusticorum vulgo, qui receptas majorum traditiones sine examine sequi & amplecti, iisque mordicus adhærescere solent. Observavimus enim rore melleo delapso integra ferè apum examina, paucissimis domi relictis, evolare, miræque industria & maxima festinatione sese melle onerare, & ad alvearia convehere, multoties evado redeundoque donec calor soloris rorem vel dissipaverat vel condensaverat.

Folia quercuum nascentium circa ripam rivuli percelebris ad oppidum Smolnicium in provincia Hungariæ Zepusienfi, non procul à monte Carpatho siti, autumnî tempore delabuntur in rivum, & sic metamorphosi quadam in æs mutantur, sicut ferrum in hac aqua infusum in cuprum transmutatur, ex observatione Wolfangi Wedelii Ephem. German. ann. 6. & 7. & itinerar. D. Brövv. communicavit D. T. R.

Quod ad vires attinet, quercus omnis (possis & dicere omnibus suis partibus) autore Dioscoride, adstrictoriam vim habet: maxime verò astringit membranaea tunica quæ corticem & caudicem ipsum interiora, similiter & ea quæ circa glandem est sub putamine; harum autem decoctum datur cœliacis, dysentericis & sanguinem excreantibus. Eadem trita fluxione laborantibus fœminis in pessis subduntur, sed & glandes eisdem effectus habent, urinam quoque cient (miratur Io. Bauhinus qua id facultate præstant. Respondeo adstrictoriâ, quâ sanguinem velut coagulando serum ab eo separant, adeoque illud copiosius per nares excernitur, non alia fere ratione quam alumen aliave adstringentia pituitam ex ore eliciunt, nam partes solidiores constringendo & comprimendo humorem in iis contentum exprimunt.

Si comedantur capitis dolorem inducunt, & flatus gignunt, difficilis sunt concoctionis, tardius descendunt, & crudos humores gignunt: propterea eas porcis saginandis relinquimus, hoc enim pecus diffusum & grandissimum faciunt, ut Varro scribit, & testatur experientia.

Glandium & corticis decoctum contra toxica prodest ex lacte vaccino potum, non probat hoc I. Bauhinus contra toxica assumpta, potissimum in principio: si tamen vomitus vel alvi fluxus multum vexent, reiecto toxico per vomitum vel alvum, prodesse tunc posse existimat, crudæ ac intritæ inflammationes illitu leniunt; vulneribus etiam recentibus utiliter imponuntur Galeni experimento.

Aqua è foliis quercus juvenis destillata præscribitur ad album mulierum profluvium, ad dysenteriam pestilentem, &c.

Quidam glandes aridas adversus calculum exhibent, nescio quo successu, inquit I. Bauhinus.

Bartholinus de Medicin. Danorum domestit, refert Norvvegos aliosq; septentrionales in inopia frumenti conficere panem è glandibus quercinis.

Folia tenera & rubicunda, vino decocta, colluta ac gargarisata dentium dolorem sedant à fluxionibus ortam, sed sæpe hoc decocto calido os colluendum; quo experimento nos sæpe felicissimè usos fuisse te-

stanti, etiam in inveteratis dentium doloribus. I. B.

Ut verbo dicam, quercus partes omnes, cortex, folia, cupulæ, glandes, ac etiam lignum ipsum ad fluxum omnem alvi, uteri, seminis sanguinis sistendum utiles sunt, & ad omnia quibuscunq; adstrictione opus est.

Lithotomi ad vulnus urethræ inflatum sanandum & consolidandum utuntur balneo è cortice quercus in aqua decocto.

Corticis in scobem commoliti insignis & frequentissimus usus est coriariis ad coria præparanda: & ad hunc usum aliis omnibus adstringentibus antecellere nobis videtur. Coria enim Anglica, quæ eo densantur, reliquis Europæis soliditatis & durationis respectu palmam præripiunt.

Carbones optimos è quercu tanquam materia spississima fieri, auctor Theophrastus, solidissimos etiam esse ait & firmiores cæteris.

Ligni usum nemo facile declaraverit, vix enim aliud habeas in hoc nostro orbe perennius, quoq; ad plures usus necessarios accommodari possit ac soleat, ut ad ædificia, naves & instrumenta tam ea quæ in terra, quam aquis usui esse possunt, fiunt ex eo dolia vinaria cæteris omnibus præstantiora, & sola ferè bona, hætenus I. Bauhinus.

In ædificiis immensum durat, modo ab humore nimio defendatur, imò vetustate ita indurefcit, ut Chalybis aciem retundat, imò ipsius propemodum ferri soliditatem & renitentiam acquirat, at nec aliud lignum adversus vicissitudines humoris & siccitatis magis firma & pertinax, & ab iisdem difficilior corruptibilis.

Navigiis extruendis præ alia quacunq; materie idonea est, quod tenax & flexuræ patiens, quod firma nec tamen nimis ponderosa, quod aquam difficulter admittat, quod percussa aut globis tormentariis trajecta non facile findatur aut rimas agat.

Quercus autem Anglica ad naves fabricandas præcipuæ æstimationis est, aliisque omnibus prælatæ censetur.

Quamvis autem alia nonnulla ligna, ut v. g. buxus cornus, Ebenus, Lignum Brasilianum, aliaque Indica, duriora, solidiora & ponderosiora sint, pleraque tamen fragiliora, nec ponderibus incumbentibus sustinendis adeo apta & commoda observantur.

Nulla est arbor quæ præter genuinum tot spurios & excrementitios producit fructus ac quercus.

Hi à Theophrasto enumerantur, hist. plant. lib. 9. cap. 8. item à Plinio. vide Verulamii nat. hist. cent. 7. cap. 63. Hi fructus arboris non sunt, sed excrecentiæ quædam & tumores præter naturam insectorum moribus, lincinationibus aut afflatibus venenatis originem suam debentes, insecta enim hujus arboris gemmas, folia, furculos teneriores pungentes, humorem aliquem venenosum per vulnus instillant, qui tumorem præter naturam excitat, fortè etiam ova duntaxat venenato & fermentativo humore delibuta, nullo vulnere inflato ibidem deponunt, qui sufficit contagio solo succo nutritio alterando & in motus irregulares compellendo. Hi autem tumores & excrecentiæ quamvis arboris respectu præternaturales sunt; à natura tamen destinantur, ut sint veluti matrices & uteri, insectorum eorundem ovis excipiendis, tuendis, fovendis, fœtibus excludendis, editisque alendis inservientes.

Horum autem excrementorum notissima & utilissima sunt gallæ, græcis *κνίδες* dictæ, harum multæ sunt species, magnitudine, colore, lævitate aut asperitate superficiei, pondere, figura, differentes de quibus prolixius agere magis curiosum esset quam utile, placet tamen gallæ officinarum descriptionem è I. Bauhini historia petitam subiungere.

Gallæ officinarum vulgarissimæ rotundæ sunt laves, foraminulis pertusæ, læves, paucis interdum ruberen-

sis asperatæ, interdum multis & angulosæ, magnitudine variæ, unciam amplæ, quamvis magna ex parte infra subsistant; sunt etiam majores, rotundæ, interdum turbinatæ ac pyriiformes, colore ruffo, levi mallei ictu fragiles; intus ungue friabiles, cavernosæ, fungosæ, gustu adstringente & acerbis.

C. Bauhinus has species recenset. 1. Gallam maximam orbiculatam, quæ duplex orientalis quæ fortasse galla maxima exotica J. B. ovi gallinacei magnitudine, & Provincialis aut Illyrica. 2. Gallam oblongam, 3. Gallam minorem, 4. Gal. galericulatam, 5. Gal. angulosam, 6. Gal. Brasilianam quinquangulam: alias adhuc varietates habet I. Bauhinus, quas apud ipsum videntur variant enim hoc genus excrescentiæ pro natura arborum è quibus oriuntur, insectorum quorum matrices sunt, & forte etiam locorum in quibus inveniuntur: quod Theophastrus & Plinius scribunt gallam confertam & subito oriri, unaque die augeri nobis non videtur verisimile.

Quæ glandem ferunt (inquit Plinius) omnes & gallam, alij Robori duntaxat proprium esse volunt, Gallam proferre, nos potius Plinio assentimur quercum nimirum omnem gallam producere, at non omnibus in locis: in Anglia enim nullus unquam auditus est gallarum proventus: quod in secta illa quibus ortum debent in Anglia non inveniuntur, ut nobis quidem videtur, Gallas enim quercui latifoliæ nostrati simili, & specie (ut putamus) eidem in exteris regionibus adnascentes vidimus.

Gallæ tinctoribus magni usus sunt ad pannos atro colore inficiendos: ex his etiam cum calchantho, gummi, & vino atramentum scriptorium optimum paratur hoc modo.

℞. Gallarum ℥iv. calcanthi ℥ij. gummi arabici ℥j.

Gallas crassiusculè contritas in vini gallici rubri, (quod Claretum nostrates vocant) sextarijs duobus (a quart) infundas per novem dies, vas prope ignem collocando & liquorem quotidie rudiculâ agitando aut commovendo, deinde calcanthum & gummi immitas; & cum unum amplius diu steterit, usui idoneum erit atramentum, literæ hoc atramento exaratae in charta diuturnitate temporis colorem non mutantur.

Gallæ vehementer adstringunt: tritæ, autore Dioscoride, gingivarum & columellæ fluxiones insuperque oris ulcuscula cohibent, quod verò in earum medio est, dentium cavernis inditum dolores sedat, cæliaci & dysenterici in aqua aut vino tritæ, seu illitæ, seu bibitæ, conveniunt, nec non obfoniis additæ; item crematæ & in vino aut aceto extinctæ, quomodo & menses sistunt & vulvæ procidentiam, in summa, ubi quid adstringere, sistere aut siccare opus est, usurpandæ sunt;

Tritarum pulvis intus assumptus in vino austero aloye conveniente vehiculo certo experimento diarrhæam sistit.

Ad bubonocelen, epiplocelen & enterocelen quidam pharmacopæus utebatur liquore stillato ex gallis orientalibus, & multos licet ætate provectos sanabat: liquor non est oleum, sed aqua cum qua sal quoddam volatile ascendit. D. Hulse è Chesneau præter gallas alia etiam multa excrementa seu tumores præter naturam in quercubus observantur, ut v. g.

1. Pilulæ foliorum quercus J. B. aquosæ C. B. quæ averse seu terram spectanti foliorum parti plerumque adnascuntur, læves, fungosæ, pallidæ aut parte soli opposita rubentes sapore subacido & adstringente molles, exquisitè plurimum rotundæ, piso non multo majores, & exiguum gallam tardè æquant, vetustateque corrugantur, vermiculum intus alunt, qui in muscam figuratur, de quo consulendus D. Malpighius: hæc in foliis quercuum frequentissimè inveniuntur in Anglia

ex adstrictionis argumento iidem viribus quibus gallæ præditas esse non malè quis dixerit I. B.

2. Excrementum quercuum fungosum I. B.

Quercuum vulgarium frondibus verno tempore etiam sine pediculo adnascuntur excrementa fungosa, rara, laxa, succulenta, acida, insigniter adstringentia, magnitudo nucis juglandis aut circiter, superficie inæquali, tuberosa, pulcherrimo rubore plurimum ornata, reliqua parte albida, aut pomorum instar luteola, in quibus vermiculi hospitantur, qui in iis multas cellulas callosas sibi pro domiciliis effingunt.

Inveniuntur Majo in quercubus glandes cum longis pediculis ferentibus: in Anglia frequentissima sunt & nemini è vulgo non nota, nec minus copiosa in arboribus nonnullis quam fructus ipsi: Botanicis tamen nostratibus, ut Parkinsono, ignota fuisse videntur, adeò confusè de illis scribunt, & cum pilulis foliorum confundunt; quod & C. Bauhinus etiam facit. An pilulæ in alis ramorum natæ Plinio?

3. Uva quercina, quam J. Bauhinus sic describit.

Radicum quercus fibris sub terra adnascitur, & circumnascitur, juglandis magnitudine, ex pluribus velut acinis racematim coherentibus (unde & uvæ nomen) compacta, substantiâ durâ, intus rubentis seu ferruginei coloris meditullio nonnihil albo, sapore insigniter acerbis & adstringente.

Hujus pulvere nullum præsentius remedium in dysenteria & in omni alvi fluxu.

Præter has à nobis observatas, & à quoquam facile observabiles quercuum excrescentias aliæ adhuc enumerantur à J. Bauhino & Casparo fratre, v. g. coccus quercuum Diosc. 2. nucula facie album quercus excrementum J. Bauhino observatum & descriptam, 3. excrementum lanatum quercuum J. B. pilulæ lanatæ C. B. 4. quercuum capitula squamosa J. B. pilulæ è foliis convolutis C. B. 5. quercuum squamæ candidæ, caducæ ejusdem, 6. excrementum quercus tuberosum ejusdem 7. foliorum quercus gemmæ foraminulentæ J. B. C. B. 8. nodi seu verrucæ quercuum J. B. C. B. 9. quercus albumen eorundem, excrementum Tauri caput referens C. B. Joannes frater gallis annuerat, his adde è C. B. Pinacè, 1. excrementum moro simile, sed durum admodum, & fractu difficile, è Theoph. & Plin. 2. excrementum pudendi virilis effigie è Theoph. 3. pilulæ capillatæ ex iisdem: 4. pumex quercinus, ex iisdem: hoc etiam in loco agunt de musco quercuum & aliarum arborum, quem quercus excrementum villosum appellat C. B. de quo nos libro secundo inter alios muscos egimus: hic etiam de agarico quercuum aliisque fungis tractant; de quibus nos inter reliquos congeneres: hic denique de visco quercus & aliarum arborum, de quo nos inter bacciferas. *Rajus.*

QUINQUINA.

Arbor febrifuga Peruviana china china & quinquina & gannanaperide dicta, Hispanis palos de Calentura, cortex arboris, cortex Peruvianus vulgo dicitur, inque pulverem redactus pulvis Patrum (scil. Jesuitarum) & pulvis Cardinalis de Lugo.

Hujus arboris ramuli iconem ex Italia ad regiam Soc. Lond. missam nobis communicavit Cl. Vir. D. Goodall. M. D. quæ vera & genuina videtur; maximè quod conveniat cum descriptione D. Badi, qui se iconem arboris exactam Romæ, è collegio Romano Jesuitarum natam refert; videtur (inquit) hæc arbor aliquam habere similitudinem cum nostratibus, nam folia ejus videntur similia cum his quæ sunt prunorum rubeorum, scil. nec nimium parulis, nec acuminatis, præterea filamentis intertextuntur ambo, & per lineas finduntur, in floribus videtur mihi convenire cum floribus malorum puniceorum, qui caliculum coronarum referunt, hanc aliquando unâ cum aliis

alus in æs incitum, deo volente, publico exhibere cogitamus,

Antonius Bollus Mercator celebris, honestus vir, qui multos annos in Peruvia commoratus est, & historiam arboris Italice conscriptam publicavit, referente Bollo, nasci eam ait in regno Quitoensi, peculiari quodam loco, qui patrio Indorum sermone dicitur Loxa seu Lofa, distatque 60. leucas ab urbe Quito: locumque obtinere inter montium coronam.

Vires. Corticis pulvis debita dosi exhibitus adversus febres omnes intermittentes tutum, certum & minime fallax est remedium, etiam experientia nostra. Egregius vir D. Thomas Sydenham M. D. Summum ad febres inter mittentes specificum vocat. Cujus ope nos nunc temporis tum humores illos in quorum redundantia febrium essentiam collocabant medici priores, tum etiam diætam & regimen quodcumque susque deque habentes, ac nihil nisi methodum pulveri exhibendo debitam observantes, scopum rectè attingimus, vix ab illo aberrantes unquam nisi ægrum lecto nulla necessitate addicimus dum in ejus usu est: tanta tamen hujus remedii vis est, ut non obstante eo incommodi, quòd sci. febris à lecti calore plus quam erat opus intendatur, ægrum nihilominus ad sanitatem ut plurimum reducat.

Pulverem hunc ante tringinta annos, cum primò in Angliam inventus esset, ad febrium intermittentium curationem, in magna existimatione & frequenti usu fuisse memini, verum animadverso eum, quòd sc. nimis parca dosi exhiberetur, paroxysmum tantum unum vel alterum aut fortè plures avertere, nec febrem penitus expugnare, verum ægrotum plerunque recidivam pati; ob suspensiones nescio quas in crimen adduci cepit, & paulatim in desuetudinem abire: donec nuperis annis D. Robertus Tabor, dosi ejus valde aucta, non minus felici successu quam incepto audaci, febribus omnibus profligatis, usum resuscitavit, hinc enim non intra serupulos subsistebat, sed ad drachmas & uncias ascendebat, indeque voti compos factus, magnam & sibi & pulveri famam conciliabat.

Vinum Gallicum à cortice Peruano intra breve tempus rubore pellucido tingitur, ut & pluvialis aqua, sed diluto magis rectificatus autem vini spiritus multo intensiore; hinc ut pateat hunc spiritum corticis Peruanae tincturæ extrahendæ genuinum menstruum esse, notatu dignum tincturam ad febres sedandas æque efficacem esse ac corticem, qui extracta tincturâ viribus destitutus reperitur. Antonius de Heide in centuria observationum Obs. 70. verùm quicquid dicat hic auctor, ego (D. Hulse) aliqui medici quibuscum consuetudinem habui corticis pulverem in substantia exhibitum efficacissimum esse semper comperimus, etiam adversus contumacissimas febres & quæ infusi ejus minime cedebant, quin & insignissimus vir D. Martinus Lister M. D. mihi asseruit infusum nihil valere, totamque ejus operationem subtilioribus pulveris partibus in liquore adhuc à defæcatione residuis deberi.

Ab eodem etiam edoctus sum pulverem corticis vetustioris experientia propriâ non minus efficacem esse ad profligandas febres quàm recentis, aliquo etiam respectu commodiorem, siquidem diuturnitate temporis vis illa cathartica quæ in recenti observatur, & aquæ ut verisimile est parti inhæret, paulatim evanescit.

D. Spon in libro observationum sur les fievrës & febrifuges se accurata & diligenti inquisitione habita comperisse ait corticem Peruvianum dictum non trunci aut ramorum arboris esse, sed radicem; illorum enim, ut in particulis quibusdam ad se missis expertus

est, minime amarum esse, quæ observatio alicujus usus esse potest iis qui in nostro orbe hujus corticis succedaneum quærunt, ego (inquit) nonnullarum periculum feci, radicem persicæ cortex asperitatis multum obtinet, parum amaroris; unde apparet conducere eum ad diarrhæam: radicem fraxini pariter asperitatis plurimum & acredinis pungentis ob copiam salium quam continet, quæ febrifugam suam vim ei confert: denique cerasi nigrae radicem cortices & asperitatis & amaroris participes sunt; earum itaq; pulvis in febre quartana exhibitus illam quidem diminuit, non tamen plane sustulit; ut non dubitem eum debito modo usurpatum, & iusta dosi exhibitum ad febres sanandas utilissimum fore, qui plura de hoc cortice velint, consulant medicos qui de eo ex professo scripserunt.

Nos commonefecit D. Tancredus Robinson M. D. iconem folii arboris febrifugæ in musæo cl. viri D. G. Courtine asservatam non benè quadrare figuræ D. Goodall, & D. Redi, quia folium non usque ad acuminatum, sed acutius & subrotundum esse videtur, quale ferè cernitur in Ponnâ & Thierou Ponnâ Hort. malab. quæ in India appellatur, Kina ab indigenis ex observatione ejusdem amici, sunt qui dicunt eandem semini arboris (quod Hispani patrio sermone pipitas de Quina vocant) fugandarum febrium vim inesse; estque simile (ut ajunt) semini cucurbitæ: alii dicunt pipitas fructum esse illius arboris; addunt etiam resinam quoque inesse arbori, nescio an ejusdem virtutis cum cortice, sed nulla amaritæ aut viribus donantur: observavit Bollus arbores febrifugas Peruvianas plerunque omni cortice sine noxa (spoliatas cerni, quod & suberi commune est quod sic potius juvatur exuta, ut scribit Plinius. *Rajus*).

Hactenus de Quinquina Clariss. RAJVS, Nos quædam rursus de eadem Arbore ejusque Cortice, & Febrifugis Medicamentis inde parandis huc adducemus.

Arbor unde cortex febrifugus, Ganna-napelside Ditionis Peruviana Incolis dicitur, & ut scribit Clar. Morton, nec non Clariss. Joh. Rajus in sua historia Plantarum magnam habet similitudinem cum quibusdam nostratibus, scilicet ejus folia non parum accedunt ad folia arboris pruna rubea ferentis. Illorum iconem exhibet Nobiliss. ac Curiosissimus Rhedi in suis Experimentis circa res diversas naturales, illasque speciatim quæ ex Indiis adferuntur: verùm adnotante D. Tancredo Robinson apud præcitatum D. Rajum hæc non bene quadrat cum iconè quæ in musæo Clariss. Viri D. G. Courtine asservatur. Hactenus creditum fuit corticem qui vulgò in officinis prostat è ramis ipsius arboris detrahi; verùm Clariss. D. Carolus Spon in tractatu de Febribus ac Febrifugis Gallicè conscripto, se accuratâ & diligenti inquisitione habitâ comperisse ait, Corticem Peruvianum dictum non trunci aut ramorum arboris esse, sed radicem; illorum enim, ut in particulis quibusdam ad se missis expertus est, minime amarum esse. Quæ observatio, ut habet Clariss. Rajus, alicujus usus esse potest iis qui in nostro orbe hujus Corticis succedaneum quærunt. Quò autem jure id asseratur à Clariss. Viro hactenus non satis perspectum est, dum alii omnes, tum in quorum manibus frequens est admodum ejusmodi Cortex, aut ii etiam qui in Regno Peruviano, (in quo ipsius natales) per annos commorati sunt, nihil simile asserunt, ac potius unò ore pronunciant, è ramis eximi. Cortices autem isti sunt crassitie mediocri, forti scabri, paululum

lulam canescentes, saepe musco obducti; intus laevēs, colore ferrugineo, seu cinnamomio; saporis acris & amari. Hisce patet quomodo differant ab alio Cortice, qui etiam nomine Kinkinae, ac Corticis Peruviani nobilitatur, est enim hic tenuior, foris cinereus ac canescens; intus ex fusco aut obscuro ferrugineus, saporis acris, amaricantis, subpinguis, odoris fragrantis. Ipsi arbore sua sponte nascitur in Regno Peruviano. Cortex hic à plurimis praefertur Kinkinae verae, quia major vis aromatica ei inest, & etiam à Clariss. Morton videtur praeter alio seligi, dum in China Chinae praeter alios characteres odorem aromaticum exquirat, quo alius cortex omnino destituitur. Proejus vi febrifuga quidam acriter militarunt, dum alii nobile hoc medicamentum totis impugnavit viribus, donec tandem ultimis hisce annis ab omnibus prope Medicinæ Cultoribus; Aegrorum suorum solatium verè expetentibus, non tantum amice excipitur, sed etiam, ut videre est apud Clariss. Morton & alios, pro panacea quadam quasi specie non immerito salutaris. De methodo illum exhibendi in Notulis ad Tractatum de Febribus Clariss. Dom. Piens hæc scripseram. Ego sæpius Corticem Peruvianum in febribus profligandis sic usurpavi.

℞. Cortic. Peruvian. subtiliss. triti ℥j. Salis Tartar. Armoniaci fixo adjuncti ℥ij. pulveris viperini, antimon. diaphoretic. ana ℥v. cum rob. juniperi, vel syrup. granorum Kermes q. s. F. Electuarium de quo tres bolus ter de die, temporibus à paroxysmo liberis, & longè à pastu, sumat febricitans, donec totum fuerit absumptum, ac etiam post aliquot dies iteretur. Usurpavi etiam in aliis vinum febrifugum sequens.

℞. Cortic. Peruvian. subtiliter triti ℥j. irroretur spirit. vini rectificatiss. ℥iv. ac olei sulph. per campan. ℥ij. Digerantur in vase bene clauso per horas aliquot; post adde vini bene maturi ac tenuis pinas duas. Digere rursus per dies aliquot, ac cola. Sumat mane & vespere ℥v. corpore prius expurgato. Quandoquidem verò hæc ut & aliæ omnes hæcenus descriptæ Corticis Peruviani præparationes, minùs erant tutæ, ac dum in aliquibus bene cedebant, in plurimis aliis intentum non explebant, nisi ad tempus, aliam ipsius exhibendi rationem excogitavi, & per experimenta repetita ita confirmavi, ut de ea asserere possim; primò febrem intermittentem qualemcumque, sine ullo recidivæ metu suppressere. Secundò, die prima qua exhibetur corpus satis bene expurgare, subsequenter alvum ut plurimum liberam facere, utinas in largissima quantitate pellere, transpirationem promovere, ciborum appetentiam ac digestionem, etiam in vetriculis debilissimis, & cibos maximè averfantibus, restituere; vultui colorem, toti corpori vires, redde. Tertiò, symptomata plurima febribus aliquando adjuncta profligare; quod inter alia testari possum de Tussi sicca, Hæmoptisi & totius tumefactione in juvene annos 22. nato, & febre tertiana duplici afflito; de doloribus infimi ventris & delirio in puerpera, tertiana laborante; de doloribus gravatavis & lancinantibus orificii ventriculi superioris; de vomitu perpetuo & totali inappetentia; de doloribus etiam arthriticis paroxysmos exquisitè concomitantibus; de morositate, taciturnitate, catalepticis affectibus, cephalgiis, aliisque symptomatibus penè innumeris febres quartanas, itemque alias intermittentes, consequentibus. De quartana in specie, non cum Clariss. Franc. Piens 12. tantum ægros, aut cum Celeberr. Riverio 30. sed plures etiam centenos, cu-

juscunque demum ætatis & sexus, tum hic locorum, tum alibi, scilicet, tum me præsentem, tum absente etiam, per deportatum medicamentum cum præscriptionibus necessariis, citò curatos adferre quàm facillimum foret. Illic rursus addidi alia quædam de febrifugis quæ hic adicere non pigebit. Hæc autem sunt. Clariss. Viri, Johan. Petr. Faber, Christianus Langius, Michaël Ettmullerus aliique, in febribus intermittentibus quibuscunque maximè commendant remedia emetica, tanquam curationis veras radices, eaque iteratis vicibus in febribus rebellioribus, aliquot ante paroxysmum horis, exhibent. De sale cichorii, ut & centaurei minoris ejusque extracto, de radice plantaginis, Zedoariae, Chelidoni, majori, imperator, gentian. angelic. valerian. garyophyll. violarum, asari, item de tormentilla, vermiculari, de myrrha, alumine, sulphure, imò febrifugo illo militari pulvere pyrio, aliisque innumertis, quæ Autores multi celebrant, quibusque vim specificam pro febrium curatione insidere asseruerunt, nihil hic addimus. Non etiam moramur varia medicamenta composita tantopere à suis decantata Inventoribus; aquam v. g. febrifugam Poterii, ut & duplicem aquam, calidam unam, temperatam alteram Doctissim. Dom. de Mayerne, quarum parandi methodus à Clariss. Carolo Sponio in suo de febribus & febrifugis tractatu, aperitur. Pericardiaci item non adducimus, quæ ex allio, sabina, ranunculo ardente, theriaca terebinthina & mercurio adjuncta, camphora, araneis, imò etiam ovi pellicula; ut neq. composita ad eundem usum varia, apud Joh. Michaëlis, Schröderum, aliisque passim reperibilia; quia scilicet illis, tanquam ex parte admodum futilibus, minùs fidendum credimus, quicquid demum de ipsorum viribus garriant aliqui; unde etiam Artis nostræ quidam Mystra, inter quos Celeberrimi Willisus, atque Jones, occasionem sumpti, operandi rationem, & exquirere, & quod arbitrati sunt, manifestum facere. Hæc in Notulis ad Clariss. Piens. Jam de febrifugis hæc à me ipso non semel experta adicio, cortices fraxini, mali persicæ, cerasi, ac illius præcipuè quæ nigrum profert fructum, berberis, sive in substantia, sive in extracto, sive in decocto, aut tinctura aliterque ea exhibuerim, parum opis attulere; Radices gentianæ, succisæ, violariæ, caryophyllatæ, ac præcipuè viperinæ aut serpentariæ Virginianæ, in substantia, aut tinctura convenienter extracta, propria quæque dosi, propinata; magno fuere auxilio, non tamen semper pro voto cesserunt, ut nec etiam mercurius præcipitatus albus per digestionem longam in spiritu vini rectificatissimo edulcoratus, cujus vires quantumvis eximiae, non semel interim me fefellerunt: nunquam verò Arboris Chinae Chinae cortex probè selectus ac secreto hæcenus modò à me præparatus. Antequam autem de hac præparatione explicatius eloquar non inutile fuerit si quædam ex iis quæ ab aliquot Autoribus, iisque sane Celeberrimis ac mihi non parum suspiciendis, de modo & ratione operandi hujus corticis, asseruntur pro modulo expendam. Quidam totam vim Chinae Chinae in parte hujus corticis volatili reposuere: Verum non semel totam tincturam atque etiam amaritiam corticis, per iteratas, easque longas tum coctiones, tum macerationes, in ipso spiritu vini, aut aqua sale Tartari, vel Absinthii, centaurei, minoris, aliisque acuata, extraxi, non sic tamen minus quod restabat corporis illius corticis, insipidum prorsus, ac tanquam caput mortuum febres restin-

N p n

guebat,

guabat, dum illud larga exhibebam dosi, imò minus molestiæ sapius creabat stomacho quàm si crudum corticem obtulissem, quia scilicet, coctione, ac digestionem solutus succis ventriculi facilius obedi-
bat. Tincturæ autem omnes quas sive per coctionem longissimam, in aqua salis Tartari acuata, sive per digestionem in vino spiritu vitrioli, aut sulphuris animato, sive per ipsum vini spiritum sale armoniaco imprægnatum, aliæque plures quas elicui, effectum suum ad tempus tantum præbuere. Quidam in amaritie illam collocant: Verùm, ut jam diximus, capite mortuo hujus corticis, omni prorsus amaritie spoliato, febres exulasse sapius æquè cerò vidimus, ac si corticem integrum vorandum dedissemus. Quidam tandem dum pro parte corticis terrestriori ac fixiori militanti omnem volatilium miscelam non parum extimescunt: Verùm sanctè asserere possum me in millenis ægris exhibitionem corticis nunquam satis tutam observasse omnique prorsus recidivæ antevertendæ aptam, ni volatilia, etiam in largissima dosi admiscuerim. Quæ praxis non malè respondet Ideæ quam plures Viri Celeberrimi, sibi de febribus faciunt, dum scilicet eas generi nervoso insidere non immeritò credunt: nam quis nescit spiritus volatiles nervis esse quàm maximè amicos, spiritibusque animalibus ac succo nerveo excitandis non parum aptos, sicque fermentis febrilibus iisdem innidulantibus, impugnandis verè comparatos; idque cum exagitatione sanguinis satis modesta ut nihil inde turbatum in ipso cieatur. Credimus itaque partem fixiorē ac terrestriorem corticis in febribus profligandis primas omnino tenere, non tamen alias qualitates, amaritiem scilicet, aut aliud quodcumque quod per spiritus aut alios liquores affusos, imò per coctiones præmemoratas elicitur, flocci faciendas volumus, dum toti suo cohærent; Sed ab eodem separatas parum admodum virtutis possidere experti asserimus. Corticem autem ipsum quod attinet præterquàm quòd, vix genuinum illum reperias, cujusque propterea dosis ad minimum duplicari non debeat, unde non parum gravatur stomachus; ni vel per coctionem longam vel alia ratione aperiatur, ut particularum ipsius poris succis ventriculi excipendis magis pateant; quandoque per vomitum, quandoque per secessum, ejicitur, imò iners quandoque in ipsis ventriculi rugis, vel intestinorum cellulis restitat, aut saltem si aliquid virium exerat, illæ infirmiores sunt quàm quæ ad longum tempus febrem arcere valeant, ac propterea tor recidivæ de quibus v. g. Clariss. Morton in majori suarum historiarum parte, ac etiam de quibus querelæ apud omnes propè Medicos. & præcipuè apud ipsum vulgus increbuerunt, unde multum de Nobilissimi, nunquamque satis laudandi corticis fama derogatum est; non unicuique enim datum est ægros ita faciles invenire quales illos habuit Empiricus ille Talbot, sive Tabor, qui nescio qua fortuna dum febrifugum suum ex Anglia ad Gallos deportavit, eò auctoritatis devenit, ut Chinam Chinam tum in substantia, si ita rebellior febris cogeret, tum præcipuè in infuso, quod ordinarium ipsi erat, ad libras integras per iteratas vices hauriendam dare potuerit. Vidi tamen ego aliquot qui ipsius remedio febrifugo tantopere decantato, usi fuerant qui recidivam passi sunt, inter quos recensebo fortem quendam Capitaneum Cohorti Helveticæ in Galliis Præfectum, qui absumpto toto medicamento quod ipsi magno cum fastu præbuit prædictus Empiricus, per tres menses omni febre liber quidem vixit, verùm illa post hoc intervallum revirescens per tres alios

mensēs ipsum afflixit, quibus elapsis rursus per alios tres disparuit, sicque per duos annos inter-
gros, & redebat & recrudescere statim per-
dis ac intervallis, donec tandem Virum Fortem, nihil proficientibus novis remedii dosibus, ad in-
scitis redigeret. Quo tempore curam ipsius tan-
to cum successu habui, ut brevi vires recupera-
verit, ministeriisque suis gnaviter absolvendis,
aovisque magno suo merito adipiscendis, omni-
no par fuerit. Præparationem jam ipsam quæ
attinet eam hic, bono publico, ut credo ex-
plicabo.

4. Corticis Peruviani probè selecti ℥vj. Vi-
perinæ, seu Serpentariæ Virginianæ ℥j. Dia-
phoretic. martial. albiss. ℥ij. destilla desuper spi-
ritus vini sale armoniaco acuati q. s. ad eminen-
tiam trium circiter digitorum, post infusionem 30
dierum decantetur liquor, ac seorsim asservetur,
massa verò Corticis Peruviani spiritu prædicto im-
buta, partim cum rob. juniperi, addito paucò ejus-
dem oleo stillatio, in formam electuarii rediga-
tur; partim in umbra siccetur in pulverem, qui
in vasis probè clausis postea asservetur, quo sci-
licet pro exigentia, vel forma pulveris cum sac-
charo, vel forma pilularum cum mucilagine gum-
mi tragacanthi confecturam, vel alia etiam for-
ma exhiberi queat. Dosis remedii varia est pro
ratione febrium; pro Quartanis rebellioribus eam
ingredi debent tres Corticis uncia, pro Tertia-
nis autumnalibus, aut quæ post solstitium asti-
vum accedunt, uncia una cum dimidia; pro Tertia-
niis vernis uncia una sufficit. In Febribus
horrificis quales sunt Hemitritæ, dummodò cum
inflammatione visceris alicujus principis illæ non
fuerint complicatæ, quod aliquando accidit; imò in
omni lentarum genere quòd cum exacerbationibus
ac remissionibus, durisque symptomatis, divexa-
tutum prorsus est hoc remedium, sed ipsius dosim,
ut in Quartanis, Corticis uncia tres ingredi debent.
Exhibetur autem ter de die temporibus à paroxysmo,
aut febris exacerbatione vacuis, longe à pastu ab-
sumendo una quaque vice corticis drachmam ad
minimum integram. In maximè rebellibus febrili-
bus, liquoris spirituosi per decantationem ut not
innuebamus separati, seorsim asservati, ac oleorum
menthæ crispæ, caryophyll. & cinnamomi particula
aromatizati, aliquot guttulæ post devoratum medi-
camentum, in vino semper propinantur. Cum verò
integræ dosi cuique febrī necessariæ dimidia circi-
ter pars absumpta est, à medicamento reliquis ad
dies 8. 10. aut 12. supersedendum, iisque tantum
elapsis ad remedium redeundum, continuando tum
sine interruptione bis de die ad totalem absumptionem.
Nec expectandum unquam pro absumenda ult-
tima dimidia parte, (quæ ad dies præscriptos post
primam absumptam differtur) donec febris de novo
caput exeruerit, sic enim renovanda ventra
tota medicamento dosi, quasi de eo nihil hæc-
nus voratum fuisset. Antequam febrifugum exhibeatur,
& venæsectiones necessariae, & purgatio
viribus febricitantium accommodata, sunt ad-
ministranda, nam in eo vix cum Clariss. Mor-
ton convenimus, quòd fermento febrili venenato,
antidotum suam, Corticem scilicet, sine
ulla præliminari præparatione, ut plurimum op-
ponat: Hoc siquidem nobis feliciter non cessat,
indeque recidivas non infrequentes atque per-
niciosissimas enatas vidimus, cujus ratio est sine
nè in propatulo, scilicet fermentum febrile
quantumvis subtile ac spirituosum, ex humoribus
labat.

faburra ac colluvie facile ascendit ac perpetuatur, unde etiam si ipsius vis per exhibitum corticem pro tempore dometur, exsuscitatur facile de novo febris, imò tandem cortici omnino furda fit. Præstiterit itaque, tum in febribus plurimis, sanguinis missionem celebrare pro totius massæ exagitatione, fermentisque profundiori, & ut ita dicam, secretiori loco, innidulantibus, in propatulum quasi profereendis, ut sic medicamento expugnanda facilius se offerant; tum purgantia medicamenta propinare, quò & humorum effusantium abundantia aliquid subtrahatur, ac antidoto aptæ via aperiatur ac expeditior fiat. Itaque in primis bolis, pilulis, &c. purgantia accommodata admiscemus. Hic non mihi regebat aliquis spiritum vini sale armoniaco acuatam parum præcipue profuturum in eo cortice qui postea exsiccat, ut sub forma vel pulveris, vel pilularum exhibeatur; per mille enim experimenta edoctus assero vim ipsius aliam prorsus esse postquam hoc spiritum saturatus fuerit, imò etiam majorem fieri quò pluries iterabuntur affusiones ac desiccationes, si modò in secundis nihil liquoris decantetur, seu potius si spiritus ad materiarum saturationem, non verò ad supereminentiam aliquam destilletur. Sic etiam Bolus Armena, sulphur, variaque alia mineralia per ejusdem spiritus affusiones facultatibus multò nobilioribus donantur, quàm quibus antea insigniebantur, sive quòd sic referatis mineralium horumce poris commodius in se fermenta morbifica recipiant, sive quòd ab incarcerationis particulis salinis ac volatilibus motus promptiores acquirant, quibus particulis heterogeneis sanguinem de tono suo disturbantibus, obviam eant, ipsasque efficacius impugnent. Quæ cum ita sint quis in Medicina tam hospes fuerit qui non videat, dum in omnibus prorsus febribus tam bene cedit hoc medicamentum, per viperinam Virginianam (remedio verè antispasmodico) volatiliaque, quibus saturatur, maxime nervinum, febrium fomitem in nervis exquirendum, sive demum eò è sanguine humoribus inquinato, ut cum Veteribus loquar, ascendat, sive in ipso succo nerveo degere formetur. Atque hæc satis de febrifugis in genere, nostroque, hætenus secreto, in specie. Unde abundè satisfactum credimus iis qui ipsius præparationem nosce avidè exoptarunt, inter quos recensere possem beatæ jam memoriæ, Celebrerrimum Dominum Carolum Sponium Medicum Lugdunensem, aliosque, sed inter eos unicum feligam Nobilissimum ac Amplissimum Virum D. Joh. Christianum Tralles S. C. M. Medicum Aulicum qui me suis literis Freistadii Silesiorum die 23. Decembr. Anno 1689. datis

super hoc me non parum honorificè compellavit propriis hisce verbis. Mentionem fecisti in illis tuis aditamentis ad tractatum de febribus D. Piens, de febrifugo quodam, tantum non infallibili in febribus quibuscumque intermittentibus debellandis, cujus tu unicè existas pater & possessor. Fateor ingenuè, Me perlecto hoc temperare Mihi haud potuisse, quin in effusissima diffuserim gaudia, dati scilicet Herculem, qui sit Hydræ isti Lernææ detruncandæ. Nec potui coërcere intra Præcordiorum angusta hanc ipsam lætitiā, sed statim arripui calamum, gratulaturus tibi de tam nobili invento, & tibi, alterius instar Æsculapii Hecatomben oblaturus. Cum verò te haud fugiat omne bonum esse communicativum tui, hinc à te summo opere peto, per istam quidem necessitudinem, quæ invicem Medicos probos atque integros animi ardè conglutinat, digneris Mihi hanc gratiam exhibere, & non saltem pretium unius alteriusve uncie significare, verum etiam methodum utendi illo desideratissimo remedio candidè prescribere. Sic tua pace faxo, ut copiam tam egregii medicamini obtrideam, cum religioni ducam ejus descriptionem integram precibus millenis emendicate. Quem enim tibi vel levissimi favoris indicem exhibui, ut in immeritum, tantum beneficium, veluti redhostimenti loco derives? Ni tibi græye, responde quantocius, num tibi arriserit, mihi votisque meis assurgendi. Oro te quàm qui maxime, digneris servulo tuo id paucillum amicitia dare, tibi que de Me reciproce officia quævis polliceri. Et rursus in aliis 8. Januar. 1690. Nuper audaciòr justo literas ad te dedi, Num advolarint nec ne anceps hæreo. Utinam expertæ sint Deos viales propitios! Vir equidem cui tradidi illas Berolini, sanctissimè juravit se omnem operam daturum, ut salvæ ad te perveniant. Hinc ad illas in dies summo cum desiderio responsoriam tuam gratissimam expecto, quàm tantò promptiorem Mihi polliceor, quanto facilius è scriptis tuis solidissimis colligere potui, in te humanitatem cum eruditione pari ambulare passu. Quòd si præter spem Mea prior Epistola fuserit deperdita, hæc te edocet bitillius contenta. Scilicet cum in primis in nuper editis tuis notis ad Piens tract. de febrib. pag. 674. legi, te possidere febrifugum fidum & infallibile per has ipsas literas denuò rogatum te venio, digneris Mihi prescribere num possim copiam tam egregii illius remedii habere? Adde si placet pretium & simul modum & dosim utendi sufficienti explicatione amice mihi trades. Rem facies Mihi gratissimam, nullo non tempore præconis debitis à me mactandam, &c.

LIBER XVII.

Continens ea quæ incipiunt à Litera

R

RADICULA SYLVESTRIS.

Radix crassa, furculosa, repens, sapore fervidissimo, Caules singulares, bicubitales, concavi, striati, recti & rigidi, folia inferiora antequam caulem proferat ampla, lapathi, rugosa; ubi autem caulem profert, in eo folia palmum longa unciali latitudine aut paulo majore, in ambitu profundè satis serrata gustu minus fervido quam radix, ex

quorum alis furculi tenues prodeuntès flores suffraginant positu & forma nasturtii palustris cum apicibus luteis. Succedunt siliculæ parvæ, breves pro plantæ magnitudine.

Gaudet solo humido. Copiosum observavimus sponte natum in fossis & ad rivulos in Northumbria circa Alnevicum & alibi. D. Martinus Lister ad ripas rivuli Skiptonensis & alibi in Bolland in ea Eboracensis Comitatus parte quæ Craven dicitur.

Nnn 2 *Vina*

Vres. Easdem cum raphano sativo facultates obtinet, sed fortiores. In condimentis appetitum facit, ac caput lædit. Urinam & arenulas violenter pellit. Commendatur & ad tussim & phthisin. Specificè scorbüticis prodest. Ciet vomitum si succus vel infusio in aceto cum melle tepida assumatur & aqua superbibatur. *Schröd.*

Hujusce radices in aqua prius maceratas ad acrimoniam tollendum Lemovicensis plebs oleo conditas elicit, tum fressas, tum elixas, tum aliis modis præparatas. Le Jardinier François.

Raphani rusticani vires in calculo ab experimentis deprædicat Tho. Bartholinus, Ad. Med. An. 1676. observ. 38. 39. affirmat succum raphani resolvisse calculosam substantiam è corpore humano exemptam E collectan: D. Tancr. Robinson.

Radix armoraciæ merito commendatur à Gabelcofero centur. 1. cap. 14. ad anorexiam. D. Hulse ex Ettmulleri Praxi. *Ramus.*

R A D I X.

Radix (definiente Jungio) est pars plantæ inferior, quæ intra corpus solidius, quod plantæ sedem præbet (sive illud terra sit, ut plerunq; sive saxum; sive calx, sive arenâ, sive lignum, sive quodcunque aliud) abdita, & alimento attrahendo destinata est.

Radices dividi possunt in fibrosas & crassiores, fibrosas voco quæ plurimis fibris seu filamentis è plantæ fundo separatim exeuntibus constan.

Crassiores quæ corpore pro plantæ modo crassiore sunt vel in furculos diviso, vel fibras emittente. Hæ vel carnosæ sunt, & in latum extrumescentes, vel in longum extensæ; plerunque strictiores & lignosiores.

Carnosæ & in latum extrumescentes sunt vel bulbosæ, vel Tuberosæ.

Bulbosas voco quæ unico constant Tubere seu capite, eoque vel squamato vel tunicato, fibras plurimas ex ima sede seu basi emittente.

Bulbosæ ergo strictè dictæ sunt vel tunicatæ, hoc est ex pluribus corticibus in orbem se amplexantibus compositæ, cujusmodi sunt cepa, allium, Hyacinth. Tulipa, &c. vel squamosæ, h. e. è pluribus squamis imbricatim sese dispositis coagmentatæ, ut liliû & Martagô.

Notandum autem bulbosas strictè dictas fibrosis rectius accenseri, fibræ enim è bulbi fundo exeuntes proprie duntaxat radices sunt; Bulbus ipse nihil aliud esse videtur quam gemma grandior subterranea, ut rectè eruditissimus & ingeniosissimus Vir, D. Nehemias Grev. M. D. ob præclarâ suâ inventâ & observatâ, in Anatomie plantarum, reliquaque earundem Historia meritò Celeberrimus.

Tuberosæ sunt quæ carne solida continua constant, suntque vel simplici tubere ut in rapa, crocô, &c. vel multiplici, ut in Asphodelo, pronia, &c.

Not. plantæ nonnullæ duum generum radicibus donantur tuberosis & fibrosis, ut orchis.

Radices in longum extensæ quæ plerunque strictiores sunt & lignosiores, vel sarmentosæ sunt & transversim progredientes seu reptantes, ut glycyrrhizæ, cardui viarum, Acetosæ ovillæ, &c. vel cauliformes & in altum descendentes.

Notandum autem, in plurimis reptatricibus propages sub terra reptantes, geniculatæ cum sint, & è geniculis fibras emittant, ut in gramine canino offic. mentha, pilosella aurea, ptarmica, &c. Caules potius subterraneos videri quam radices.

Radices cauliformes & in altum descendentes sunt vel simpliciores, fibras tantum è lateribus emittentes, vel ramosæ: hæ autem ad modum caulium vel ab exortu statim ramosæ sunt, vel simplici scapô aliquotusque descendunt, deinde in ramos; rami in furculos & fibras sparguntur: nonnullæ etiam plantæ plures è

fundo emittunt radicum truncos.

Possent & aliæ radicum differentiz, à coloribus, sapore, odore, facultatibus sumi, quas hoc in loco prosequi nostri non est instituti; alibi fortasse earum Catalogos daturi sumus.

Radices nonnullas bulbosas ut v. g. tuliparum annuatim in terram descendere à Botanicis dudum observatum est: idem nuper in aliis plurimis & quidem diversorum generum radicibus observavit D. Grev. ut v. g. Ari, Valerianæ, scrophulariæ, hellebori nigri, Tanacet. Lychnidis, crithmi, primulæ, caryophyllatæ, Acetose. læ, Iridis, &c. quarum omnium, eodè observante, radix quotannis ex trunco seu caule ipso renovatur; aut potius particulatim reparatur. Basis sci. seu ima pars caulis, sensim infra superficiem terræ descendens, sequen ea occultans in naturam genuinæ radices transmutatur, ejusque locum occupat, & officium præstat. Ad motum autem Caulis radix etiam una descendit, & pro durabilitate substantiæ suæ brevior aut longior evadit, vetustiore & inferiore ejus portione eidem gradibus putrescente quibus superior è caule descendente, & transmutato augetur. Sic in Scrophularia v. g. sed præcipuè succisa, quæ ab radice præmorfa apparet, ima pars Caulis gradatim subsidens donec terra immergatur superior radices pars officitur, & descensu continuato, sequenti anno, inferior ejusdem pars evadit, proximo deinde anno corrumpitur & evanescit; nova scilicet quotannis è Caule accessione facta, prout inferiores & vetustiores partes putrescunt & absumuntur. Ita pariter in dracontio, crocô, gladiolo, &c. Ubi bulbus geminus est superior & inferior, basis caulis anno sequenti fit superior radix, proximo inferior, tertio interit & absumitur.

Hujusmodi descensus Caulis & transformatio in radicem in nonnullis plantis evidentius cernitur & clarius demonstratur quam in aliis, ut in transversis & tuberculosis radicibus primulæ & acetosellæ. Harum enim plantarum foliis successivè marcescentibus & abscedentibus bases eorundem copiofore succo nutritæ in totidem nodulos crassiores turgescunt. Idem in aliis nonnullis colligi potest ex simili vasorum & partium lignosarum situ in trunco & in radice, ut v. g. Helleborastro, sed præcipuè Iride tuberosa, in quamvis folia proxime juxta Caulis superficiem decidunt, postquam tamen Caulis descendit & in radicem intravit foliorum delapsorum sedes seu vestigia una cum vasorum iis inservientium extremitatibus non obscure apparent, radice sci. annulis quibusdam, & lineis punctatis variegata, annulis foliorum sedes, punctis vasorum orificia demonstrantibus.

Descensus hujusce causa proxima & visibilis seu manifesta sunt radices fibrosæ, quas ejusmodi Caules emittunt: hæ enim in terram rectè descendentes, vel in totidem funiculi truncum post se rapiunt: hinc radices nonnullarum figura veluti invertitur. Nam cum pleræque inferius in ramos aliquot ceu totidem crura divaricantur, nonnulla supernè in plures veluti cervices seu cornua (capita vocant Botanici) dividuntur ut in dentes Leonis aliisque nonnullis cernitur, hæ enim radices è summo capite plures protrudunt gemmas, quæ in totidem Caules abeunt. Gemmæ hæ seu gemma nova successivè folia emittentia, vetera abijciunt, adeoque paulatim continuo descendunt, in totidem tandem cervices, 3. 4. 5. aut etiam plures uncias longas, abeunt.

Hinc intelligitur quomodo radices nonnullæ præmorfæ videntur ut in succisa, perennesque evadunt, nimirum successiva aggenetatione novarum portionum in locum earum quæ quotannis corrumpuntur & intereunt, ut in plantis de quibus egimus, ex parte trunci quotannis descendente annua sua damna reparantibus, inque Orchide, Bactata, Nepeto.

pello, chelidonia minore aliisque tuberosis in quibus, vetustioribus radicibus seu tuberibus marcescentibus, nova earum loco aggenerantur. Cum his consentiunt Tulipæ aliæque radices bulbosæ: tunica enim ex quibus præcipue bulbi constant quotannis exarescunt, & in tenues membranas seu cuticulas exsiccantur, novis assidue in medio succrescentibus foliis & corticibus. Ad eundem modum fibrosæ earum radices aliæ aliis annuatim succedunt; unde post aliquot annos bulbos, quamvis idem perseverare videtur, alia omnino revera res est, nulla ejus particula primitiva residua.

Partes radicis uti & caulis sunt cortex, lignum aut in herbaceis pars ligno respondens, & medulla.

Cortex componitur ex cuticula & substantia interiore.

Cuticula à cortice originem habere videtur, & nihil aliud esse quam corticem veterem exarescentem & contractum, novo quotannis subnato; quemadmodum spoliū serpentis quod quotannis exuit ejusdem cutis exarescens est. Cuticula in radice iisdem partibus componi videtur quibus & in caule, nimirum utriculis seu vasculis velut parenchymate, ligneis aliquot vasis seu fibris fistulosis intermixtis, quæ quamvis etiam Microscopio agere visibiles sunt, adesse tamen colligit D. Grevius ex eo quod cuticula multo difficilius finditur aut dilaceratur transversim quam secundum longitudinem, aliisque argumentis, quæ apud ipsum vide.

Corticis substantia interior crassitudine plurimum variat, in nonnullis enim radicibus ut flore solis pyramidalis, Tragopogone, & arboribus plerisque prætennis est, in aliis crassa admodum, longè maximam radicis partem constituens, ut in fibris asparagi; quin cortex radicis in plurimis plantis multo majorem obtinet proportionem ad lignum, quam caulis; atque hac in re radix à caule insigniter differt, corticis nimirum crassitie.

Cortex in radice iisdem ferè partibus componitur quibus & in caule, nimirum, I. Utriculis seu vesiculis seu parenchymate sphericis plerumque, interdum tamen oblongis, minimè perviis seu in se mutuo hiantibus, sed undique clausis, & aquæ bullarum instar pellucidis, adeo ut corticis parenchyma, quoad compositionem suam, spumam cerevisiæ aut ovorum conqassatorum proximè referat, aut panis probe fermentati medullam. Vesiculæ hæc adeo parvæ sunt ut absque Microscopio agere sint visibiles; magnitudine tamen differunt, tum in eadem, tum præcipue in diversis generis radicibus. In rectis lineas seriatim non raro disponuntur tam secundum longitudinem quam secundum latitudinem radicis. Liquore limido seu pellucido semper turgidæ sunt, qui per earundem membranarum poros se insinuat. Nec enim datur patentior janua qua intret. D. Malpighius Utriculos in se mutuo hiantes & pervios facit.

Utriculos hosce in nonnullis plantis duum generum esse observavit D. Grevius: præter descriptos enim alii dantur albidiores & transparentes, sicciores etiam nec liquore turgidi, unde verè repletos esse opinatur. Pleniorum horum descriptionem videtis apud laudatum autorem in Libro de Anatome radicis.

2. Præter, Utriculos fibræ etiam ligneæ seu vasa succifera, plura pauciorave: corticis compositionem ingrediuntur, ut ex faciliore dilaceratione corticis secundum longitudinem quam transversaliter, ex ductu earundem fibrarum secundum longitudinem visibili, tenuem filamentorum specie; & ex ascensu succi cortice transversim secto, iis in locis ubi filamenta isthac terminantur, patet.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Reticulares plexus eodem modo componunt fibræ hæc quo in cortice caulum. Quamvis tamen ad se invicem accedant, & iterum reflectantur nullæ omnino (observante Grevio) dantur inter eas Anastomoses, sed unumquodque filamentum unicum & simplex vas est ab imo ad summum continuum, non ramosum, cavitate ab imo ad summum æquali. At neque alia aliis circumvolvuntur, aliterve implicantur. Sed sibi mutuo duntaxat contigua sunt. Plexus hi in variis plantis numero & figura variant, in aliis rariores, in aliis crebriores. Notandum autem singula filamenta, non singula vasa esse, sed vasorum parallelorum fasciculum seu congeriem, quæ tamen nec in se mutuo pervia sunt, nec sibi invicem in fasciculo suo convolvuntur aliterve implicantur, ut de filamentis diximus. Eadem de tracheis seu vasis aerem deferentibus quæ in lignea parte occurrunt dicta sunt. Est tamen cur suspicemur dari in hujusmodi vasis Anastomoses, nec Dom. Grevii sententiæ penitus acquiescamus, præcipue quod ad fibras ligneas attinet, partim ab Analogia venarum & artiarum in animalibus quarum propagines manifestè in se mutuo perviæ sunt & reticulariter inosculatæ, partim à foliorum, quæ sunt ligneæ expansiones, structura, in quibus fibræ sibi mutuo occurrentes inosculatæ & reticulariter implexæ videntur: partim denique ab experimento de succi motu deorsum in sectione transversa inferius proponendo.

Color radicum in plerisque plantis albus est, in nonnullis flavus, in paucis ruber aut atro rubens, ut Anchusa, erythodano, pastinaca tenuifolia.

Vasa hæc diversorum generum esse ex diversitate liquorum quos continent colligit D. Grevius, quem consule: alia enim lympham continent, alia lacteum succum, alia in plantis nonnullis rorem seu vaporem. Verum vasa hæc iis quæ in caulium corticibus observantur Analoga esse, & succos congeneres deferre opinamur, atque idcirco plura de iis dicere superfluum sedemus.

Ligneæ radicis pars eisdem ferè partibus constat, eodemque modo contextis quo in caule nimirum, I. Parenchymate seu Utriculis in radios diametricales à circumferentiâ ad centrum tendentes dispositis, ut in transversa sectione patet.

2. Fibris ligneis seu vasis succiferis, quæ etiam ut in cortice duum generum sunt nimirum vel lympham deferentia, vel succum lacteum, aliumve plantæ peculiarem, seu ut vocant specificum.

3. Fistulis aeri excipiendo & derivando destinatis seu tracheis de quarum textura seu compositione infra dicemus. De earum magnitudine, numero, situ, quæ in variis plantarum generibus variant, vide Grevii lib. de Anatome radicis, cap. 4. Hæc autem in radicibus majores plerumque esse & magis patentiores quam in truncis ac ramis annotat Malpighius.

Medulla plantarum omnium radicibus communis non est; nonnullæ enim ut v. g. Nicotianæ, Stramonii, &c. ea carent. Aliæ quamvis parte inferiore nullam habeant, supernè tamen satis conspicuam obtinent, ex Utriculis componitur ut in caule, iisque etiam magnitudine & figura diversis, quibus vasa aliquot succifera interdum admiscuntur.

Notandum autem Utriculos seu vesiculas hæc ex quibus medulla componitur, non meras & rydes membranas esse, sed ex plurimis ordinibus seu seriebus tenuissimarum fibrarum seu filamentorum ab imo ad summum vesicularum, & à vesicula ad vesiculam transversim (ut in subtegmine à staminis filulo ad filum) decurrentium compositas; adeo ut medulla nihil aliud sit quam recte quoddam mirabile, seu infinitis fibrarum minutissimarum mirabili ordine complicatarum numerus. Quinetiam fibræ

hæ non simplices sunt, sed ex pluribus simul conjunctis compositæ, fibrillis etiam transversis (quæ simplices esse videntur) contextæ.

Quæ ratione alimentum radices subingrediatur meos adhuc sensus fallit (inquit Malpighius) ut probabiliter tamen conjectari licet; aqueæ particulæ solutos sales, & reliqua mineralia per terram dispersa sibi associant ac fluida reddunt, appellantque hujusmodi heterogeneous corpus ad plantarum radices, veluti per cribrum tractum, in ligneas fistulas exprimitur; seu per pilorum, qui circa tenellas radices copiose luxuriant, orificia intrat; seu per exteriorem ambientem cuticulam percolatur, adeoque vel sensim utriculis communicetur & ab his in contiguas fistulas derivetur, vel per extrema fistularum ora intro excipietur, & ab iisdem transversalibus utriculis ministratur; ut in minimis radiculis quæ fibræ appellantur probabiliter accidit, in quibus ad extrema usque fistulæ deducuntur, transversalibus utriculis parum luxuriantibus. *Rains.*

Radix est pars ima vegetabilium, quasi primæ concoctionis officina. Eapropter cum concoctio sit nutrimenti fixioris volatilificatio & spiritus (ωδματωσις) radixque nutriatur nutrimento minùs elaborato, quàm partes reliquæ, sequitur substantiam radicem esse naturæ præ reliquis fixioris.

Usitatior Radices Officinales sunt.

Radix Acerosæ (excoctata) *Saurampffwurrtz.*
 Acori vulgaris, Pseudo-acori, *Schwertelwurrtz.*
 A. veri, calami aromatici: *Calmus.*
 Allii, *Knoblauch.*
 Althææ, abissi, *Eibischwurrtzel.*
 Angelicæ, *Angelickvv.*
 Anchoræ veræ, *Heilgiff, Gifftheilwurrtz.*
 Apii (vulgaris), *Eppichvv.*
 Ari, *Aaronwurrtzel, Teutsch Ingver.*
 Arisari, *klein Aaronvv.*
 Aristolochiæ longæ, *lang vvelfch Osterlutey.*
 Aristoloch. veræ rotundæ, *vvelfch rund Osterlutey.*
 Aristoloch. vulgaris, *gemein lang Osterlutey.*
 Aristoloch. fabacæ, *rund gemeine Osterlutey.*
 Aromaticæ, raphani sylvestris, *vvüll Merretig.*
 Asari, *Haselwurrtz.*
 Asparagi, *Spargenvv.*
 Bardanæ, *grosse Klettenvv.*
 Bistortæ, Serpentariæ, *Nattervv.*
 Borraginis, *Borresvv.*
 Bryoniæ, *Suckvv. Zannrüben.*
 Buglossæ, *Ochsenzungenvv.*
 Cardopatii, Carlinæ nigræ, *Ebervv.*
 Cariophyllatæ, *Benedickvv.*
 Centaurei majoris, Rhapontici Offic.
 Chelidoni majoris, *Schöllvv.*
 Ch. minoris, *Schorbocksvv.*
 Chinæ, *Chinevv.*
 Cichorei, *Wegvvartvv.*
 Consol. majoris, Symphyti, *Beinvvelle Wallvvurtz.*
 Cucumeris, asinini, *Eselkürbisvv.*
 Curcumæ, *Beelsuchvv.*
 Cyclaminis, Arthanitæ, *Schvvainbrodvv.*
 Cynoglossæ, *Hundszungenvv.*
 Cyperti longi, *langer vvilder Galgan.*
 Cyperti rotundi, *rund vvild Galgangervv.*
 Dictamnialbi, Fraxinellæ, *vvieffer Diptamvv.*
 Doronici, *Gemsenvv.*
 Ebuli, *Amchvv.*
 Elebori albi, *vvieffz Nieszv.*
 E. nigri veri Siliaci, *schvvartz Nieszvurtz.*
 præp.
 E. nigri vulgaris, *gemein Christvv.*

Endiviæ, *Endivienvv.*
 Enulæ Campanæ, Helenii, *Alantvvurtz.*
 Eryagii, *Mannstren.*
 Esulæ minoris, *klein Wolffsmilchsvvurtz.*
 Filicis, *Farenvv.*
 Filipendulæ, Saxifragiæ rubæ, *roth Steinbrechvv.*
 Fœniculi, *Fenchelvv.*
 Gentianæ, *Entzianvv.*
 Glycyrrhizæ, Liquiritiæ, *Süßholtz.*
 Graminis, *Queckengrasvv.*
 Hermodactyli, *vvieffe Zeitlosen.*
 Hirundinariæ, Vincetoxici, *Schvvvalbenvv.*
 Hyosciami (excoctati), *Bilsamvvurtz.*
 Imperatoriæ, Ostrutii, *Meistervvurtz.*
 Iris Florentinæ, *vvolriechend Violvvurtz.*
 I. Nostratis, *Schvvvertelvv.*
 Juniperi, *Wacholdervv.*
 Lapathi acuti, Oxylap. *Mengelvv.*
 Levistici, *Liebstockvv.*
 Liliorum alborum, *vvieffz Lilienzvibel.*
 Malvæ, *Pappelvvurtz.*
 Mandragoræ, *Albraunvv.*
 Mechoacannæ, Mechoacæ albæ, *vvieffe Rhabarbar.*
 M. nigræ, Gelapæ, Chelapæ, Chiolappa, *schvvartz*
 Rhabarb.

Meu, *Behrvvurtz.*
 Mezerei, Laureolæ. *Seidelbaß, Kellershals.*
 Morfus Diaboli, Succisæ, *Abbisvvurts.*
 Nymphææ albæ, Nenupharis, *vvieffz Seeblumenvv.*
 N. luteæ, *gelbe Seeblumenvv.*
 Ononidis seu Anonidis, *Heuhechelvvurtz.*
 Pastinacæ sylv. *Pastinackvv. Vogelneßvvurtz.*
 Pentaphylli, quinquifolii, *Fünfffingerkrautvv.*
 Petasitis, *Pestilentzvurtz, Neunkrafftvvurtz.*
 Petroselinii, *Petersilienvv.*
 Peucedani, *Haarstrangvv. fœm. masc.*
 Pœoniæ, *Pœnienvv.*
 Pimpinellæ Germanicæ, *Bibenelvvurtz.*
 P. Italicæ, sanguisorbæ, *Blutkrautvvurtz, vvelfch*
 Bibenell.
 Plantaginis, *Wegbreitvv. Wegerichvvurtz.*
 Polypodii quercini, *Engelsüßz.*
 Pyrethri, *Bertramvv.*
 Rapa, *Rüben.*
 Raphani domestici, s. vulgar. *Retlich.*
 R. Marini, *Meerrettich.*
 Rhabarbari veri, *Rhabarbar.*
 R. Monachorum, *Münch Rhabarbar.*
 Rhapontici veri, *Rhapontick.*
 Rhodiæ, *Rosenvvurtz.*
 Rubiæ tinctorum, *Ferberiöthe.*
 Kusci, Busci, *Manszdornvv.*
 Sarsæ parigliæ, Salsaparillæ, *Sarsaparill.*
 Satyrii, *Stendelvvurtz, Knabenkrautvv.*
 Saxifragæ, semen saxifragiæ, *Steinbrechvv.*
 Scabiolæ, *Apostemvv.*
 Scyllæ crudæ & præparat. *Meerzvibel.*
 Scorzonæ, *Giffvvurtz.*
 Scrofulariæ, Scrophulariæ, *Braunvvurtz.*
 Sigilli Salomonis, Polygonati, *Weißvvurtz.*
 Siferis, Secacul, *Zuckermohren, Zuckervvurtz.*
 Taraxaci, *Pfaffenröhrleinvv.*
 Tormentillæ, *Tormentillvv.*
 Turpethi albi, *Turbith.*
 Tussilaginis, Farfaræ, *Brandlattich, Hufflattichvv.*
 Valerianæ majoris, *groß Baldrianvvurtz.*
 V. minoris, *klein Baldrianvv.*
 Verbasci, *Wollkrautvv.*
 Urticæ, *Nesselvv.*
 Yerva, *Giffvvurtz.*
 N. Ex his usu crebriori famosiores sunt.
 5. Radices aperientes majores: apii, fœniculi, al-

peragi, petroselinî rusci, s...minores, graminis, rubiæ, eryngii, capparis, Ononidis.

Preparata: Quod de herbis diximus & similibus nativis, idem de radicibus dicendum: promptuarium nimirum radices esse, unde ad omnia generis medicamenta, tam interna quàm externa depromi possunt. Hoc tamen de radicibus notare expedit: Patres fixiores præ reliquis in radicibus contineri, aptiores itaque eas esse ad exhibenda medicamenta parte fixiori celebrius, veluti sunt; Extracta, Salia, Decocta, &c. *Schroderus*.

RADIX BRASILIENSIS, vid. *Ipecacuanha*.

RADIX DULCIS, vid. *Liquiritia*.

RADIX YERVÆ, vid. *Contrayerva*:

R A N A.

Rana dividuntur in aquaticas & terrestres.

Rana aquatica, Græcis Βάτραχος, Angl. a *Frog* or *Forsh*, Animal est amphibium, cute nuda tectum, cujus pars prior seu anterior carnosâ latitudine caret, natura portionem carnosam posteriori parti in qua posteriora, crassa & oblonga, validis musculis ad saltum comparata, addente. Digtos habet quinos oblongos, membrana interveniente connexos, ut commodius natâre possit.

Ranæ pulmones nihil aliud sunt quàm membranae quædam vesicæ, hinc indè una, figura sua & extimis protuberantiis conum pineum æmulantes, intus inanes in cellulas favorum ferè cellulis similes divisæ. Hi non ut in cæteris Animalibus illico flaccescunt, sed tensi ad Animalis libitum perdurant.

Rana Animal est vivacissimum, & sub aquis diu durare potest absque aëris usu, ut olim expertus est celeberrimus Vir *Domine Thomas Brown* M. D. Norwicensis, Rana funiculo pedi alligato sub aquis defenta per aliquot dies: unde patet frigida hujusmodi Animalia non multo aëre ad vitam indigere.

Aperto abdomine & thorace, & visceribus omnibus unâ cum corde exemptis, Animal nihilominus per aliquod tempus saltat, nec quicquam de motibus solitis remittit, ac si nihil prorsus mali passum esset. Quod si nervus ad pedem quemvis descendens disseccetur, motum illius membri illic amittit.

Hoc genus Animalis singulare & anomalum, generationis præcipuè respectu: quo quamvis cum piscibus oviparis convenire videatur, in nonnullis tamen ab iisdem differt. Ovum Ranæ puncti seu globuli nigri forma apparet, liquore quodam albicante mucilaginoso & viscido, membrana valdè tenui vestito, circumfusi. *Jacobus* pro ovo Ranæ habet aggregatum, ex liquore circumfuso, & globulo prædicto, qui centrum ejus occupat: globulum autem nihil aliud esse quàm foetum raninum, cui liquor pro alimento inservit existimat.

Verùm quicquid sit de nomine Ovi, ego cum perspicacissimo *Svammerdamio* globulum illum nigrum pro ovo habeo, eique foetum raninum inclusum esse suppono; qui ovo illo aperto seu disrupto Gyrini forma exit. Gyrinus autem recens exclusus liquore illo viscido globulo circumfuso aliquandiu fortasse nutritur, totum tamen non absument. Brevi enim, partibus ejus aquæ paulatim se se insinuantis interveniu à se invicem separatis; nubeculæ formam induit, & in summis aquis fluitat, nec gyrino alendo amplius idoneus est, sed secessus aut diverticuli tantum usum ei præstat, quò cum na-

tando lassus est se recipiat & ad quietem componat; observante *Svammerdamio*.

Globulus ergo niger piscis spinosi ovo respondet aut potius Insecti alicujus; Foetus enim raninus è globulo non exit Ranæ forma, sed Gyrini, & postea ranæ figuram paulatim acquirit, ad morem erucarum aut vermiculorum. Piscis autem (ut puto) ex ovo primitus pisculi forma exit, nec postea speciem externam mutat. Verùm ovum isthoc raninum tum à Piscis tum ab Insecti ovo differt, quòd gelatinæ quam diximus viscosæ undique illud ambienti, quæ pro primo alimento foetui edito inservit, includatur.

Aliquandiu post quàm hæc scripseram incidi in observationes de spermate Ranarum seu ovis Raninis ab eruditissimo simul & ingeniosiss. Viro *Dom. Richardo Waller* Armigero factas & in Actis Philosophicis Londinensibus N. 193. editas, in quibus præter alia curiosa invenio. 1. Globulum illum rotundum nigrum de quo diximus duplici liquore circumfusum fuisse, interiore globulum proximè, claro & pellucido, exteriori membrana undique cincto & contento; exteriori magis turbido & mucoso. Liquor ille pellucidus interior gyrino pro alimento aliquandiu inservit, & albumini in Avium ovis respondere videtur. 2. Gyrinos exclusos seu ovis suis egressos (è quibus rodendo exitum sibi fecisse opinatur) exteriori eorum superficiei arcuè adhæsisse ea parte quam os esse postea comperit, solutos autem ad aquæ fundum illico subsidisse, nec potuisse iterum in summas aquas ascendere.

Præterea Rana cum Piscibus spinosis in eo convenit, quod mas cum fæmina coitu non misceatur, nec semen genitale in uterum ejus injiciat, ex sententia Autoris modò laudati, sed piscium more lac suum seu sperma ovis jam editis inspergat. Nam *Jacobus* nulum in maribus penis vestigium reperit.

Obicies, cur ergo mas fæminam inscendit, eamque verno tempore per 40. dies pedibus utrisque arcuissimè amplectitur & retinet. Respondet, ut semper præsto sit, ut quamprimum ova peperit genituram in ea effundat, quæ aliàs fortasse non fecundarentur. Ego tamen non de nihilo esse suspicor, quòd mas fæminæ tandiu infideat, quin ovorum color in utero de albo in nigrum mutatus (ut observavit sagacissimus noster *Needhamus*) suspicionem mihi injicit, foetum jam tum in ovo formatum per testam tralucere, ut in Erucarum ovis videmus, quæ maris semine fecundata colorem mutant, Erucula nimirum per testam transparente: quod cuius facile observatu est in Bombycum ovis, siquidem subventanea & irrita, sine maris congressu edita, alba sunt; à coitu fecundata cœrulescunt, eruculæ nigræ colore per testem aliquatenus pellucidam apparente: quòd exinde etiam confirmatur, quòd postquam erucula ovo egressa est, testula alba remaneat.

Clarissimi Viri *D. Georgii Entii* opinio, quòd scilicet Ranæ ore coeant & pariant, mihi neutiquam probatur: quamvis me nondum ejus rei experimentum fecisse in Ranis fateor, ille autem ad experientiam provocat.

Clariss. *Needhami* verba, quoniam Ranarum generationem valdè illustrant, non pigebit huc transferre. Cornua uteri longissimi sunt sub diaphragmate orta, quæ indè multis plicis convoluta, ovisque hætenus albicantibus terga ad inferiorem abdominis partem pergunt. Primò marsupium quoddam grisei coloris attingunt, ubi prima coloris mutatio apparet, indè ad corpus nigrum tendunt, ubi testæ jam saturata nigredine tinguntur, simulque tenaci glutine obducuntur. Hinc tandem per duplicem vaginam continuato funiculo exeunt, eos invicem conjungente glutine præ-

dicto, quod perperam à vulgo sperma ranarum nuncupatur. Ego non raro Rana parturienti obstetricavi, funiculum illum jam prodeuntem manu trahendo in plusquam Unæ longitudinem. Sic elapsa ova in unum acervum colliguatur, & quasi nido ex hoc muco constructo, Solis incubantis beneficio paulatim emergunt gyri.

Præcipuus Ranæ cibus sunt muscæ, aselli aliaque insecta, sed & cochleas terrestres minores ingerunt, ut eorum ventriculos dissecando observavimus.

RANA arborea seu *Ranunculus viridis*. *The small Tree-Frog or Green Frog*. Parvitate sua, colore viridi quo undique perfusa est, quodque arborum foliis infideat, ab aliis facile distinguitur. In Germania & Helvetia frequentes observavimus Arborum & Fruticum foliis insidentes & vespertino tempore coaxantes seu potius cantillantes, ut aviculas esse crederemus.

Chirurgus quidam Uratislavienſis per integrum ferè octennium huiusmodi Ranulam aluit intra vitrum cylindricum reticulo testum; cui tempore æstivo graminis recentis, hyberno verò scæni madefacti nonnihil immittebat, muscis per vices injectis, quas ore hiantes, venari peritissima erat. Hyeme, qua spatio quadridui vix una alterave musca sollicitè quaesita sustentabatur, macrescebat, valdeque attenuabatur. Æstate vero cum muscæ culicesque uberius suppetebant, habitior rursus erat corpore. Totas verò hyemes viva & ad captandam prædam alacris perstabat, eò quod intra hypocaustum detenta frigoris inclementiam minimè perſentisceret. Tandem 8va hyeme cum muscæ penitus deficerent ipsa contabescens interiit.

Hinc patet, satis vivax esse hoc Animalculum, diutius fortasse superfuturum, si alimonia necessaria suppetisset; nec hoc tantum, sed huius generis reliqua frigida, ut *Testudines*, & *Serpentes*.

2. Ranas, si non alia omnia animalia, quæ mortuorum instar sine vita & sensu in cavernis deliteſcunt, non quadam naturæ suæ necessitate, sed potius ob alimonia defectum frigorisque vehementiam sese condere; quod confirmant etiam relationes eorum, qui in calentium aquarum fontibus media etiam hyeme viventes ranas se vidisse perhibuerunt. *Miscellan. Curios. Germ. An. 16. Observ. 157.*

Inter Animalia venenata & noxia hæc Ranæ species recensetur. *Raius in Synopsi Histor. Quadrupedum.*

OFFICIN. NAT. ex RANA.

1. *Ipsa Rana*. 2. *Cor*. 3. *Epar*. 4. *Fel*. 5. *Pinguedo*. 6. *Sperma Ranarum*.

Vires. 1. *Dioscoridi Rana ipsa* contra omnium serpentium venena pro antidoto sunt, si ex sale & oleo, vel butyro edantur, jusque earum itidem sorbeatur. Valent & adversus inveteratos tendinum rigores.

Inducit etiam vini fastidium, si vinum in quo viva rana viridis suffocata est, propinquetur: Viva Anthraci pestilenti imposita, donec moriatur, venenum elicit. Viva integra alligatur ad caussos æstus articulo. & juncturarum dolores mitigat, ignesque sacros restinguit, (viva scilicet vel contusa imposita) Odontalgiam sedat, (cocta & in gargarismo adhibita.)

N. Si ventri torminoso adhibeatur, in ipsam vitium transire confestim feritur.

2. *Cor Ranarum* (maximè fluviatilium) [Antiepilepticum] febricitantium spinæ alligatum, febriles algores minuit. Sunt qui cordis regioni admoveant ad mitigandos caussos æstus & incendia, *Mizald.*

3. *Epar* exiccatum & pulverisatum in febrium quartanarum (& aliarum) accessione cum successu assumi, ajunt. *Crato exhibet in 7 millefolii.*

N. *Epar ranarum viridum in paludibus degentium, cum*

peculiare specificum ad Epilepsiam commendant.

Exhiberi jubent sub conjunctione Luminarium, & in existente. *Petrus Nosolog.*

4. *Fel* peculiariter oculis convenit, quartanamque curare dicitur incineratum & ad 38. exhibitum.

5. *Pinguedo* auribus indita doloribus medetur.

6. *Sperma ranarum*, (sperniola) *Froschleisch*. *Frog-Spawm*, or *Frogs reddars*, *Her Saet of Slyn van de Vorscheen*, refrigerat, constipat, incrassat, dolores mitigat, manuum scabiem curat, (si mense Martio in eo laventur); paronychia & herpes interficit, erysipelati & ambustis, aliisque inflammationibus succurrit, (impositum.) Faciei ruborem curat, fluxum mensium & hæmorrhoidum medetur (vulvæ vel ano inditum.)

N. *Linteum* hoc spermate aliquoties madefactum & exiccatum pro usu servant. Alii idem sperma in sicco recondunt in terram, loco scilicet aprico, quo in 7 cum tempore convertitur.

P R Æ P A R A T A.

1. Cinis inspersus sanguinem profluentem, (e.g. vulnerum, nariumque) sistit. Uteri hæmorrhagias suffluit, reprimit, alopecis ex liquida pice illinitur.

Internè gonorrhœam cohibet (assumptus 3j.)

2. *Aqua stillantia è Ranis.*

Fit è Ranis vivis sub finem Martii, vel initio Aprilis captis, per XX.

3. *Stillat. ex spermate.*

4. Fit per XX. è spermate collecto Martio.

N. Sal addere solent.

Vires. Ex præcedentibus parent; præter quas Vires ab humorum acrimonia exulcerata egregia medela est. Facit & ad repellendum & sistendum sanguinis profluvium & faciei ruborem, impetigines curat, erysipelati ac gangranis succurrit.

4. *Oleum.*

Fit coquendo ranas cum 300 communi vel Rosæ.

Vires. (Commendatur in vehementissimis articulo- rum doloribus.)

(Paratur Unguentum ad atrophiam ex Ranis butyro infarctis igne circuli.)

5. *Pulvis sperniola compositus.*

Vide lib. 2. in Pulveribus.

N. 1. Ubi rana, spermaque earundem aut limacum, lumbricorum, cancri & similia animalia veniunt sando, includenda esse linteolo mundo & in medio cucurbitula pendenda, ut velut per vaporem stilent, alias aqua putrescent erunt participes. In linteis autem remanebit pulvis animalium istorum opt. preparatus, cui majoris correctionis ergo 7 guttulas aliquot instillabis & rursus exiccabis, vel cum eodem 7 tincturam elicies.

N. 2. *Fabricius de Gangr. pulv.* laudat ad Ulcerum maligna & inflammationes omnes compeſcendas.

6. *Emplastrum à ramis cum & sine 8. Vigoni.* *Schroderus.*

Prima ranæ materia à *Th. Paracelso* sub ænigmatè glutinis de aquatico descripta in cancri medela plurimum valere dicitur teste *CL. Helmontio de Formarum ortu*, §. 56. Et accidit, quando rana sub plenilunio, atrocissimo hyemis borea effoditur, abluitur & butyro alligatur, in agro sequenti mane reperitur alba quadam ac transparens mucilago, liquatam tragacanthum referens & ranæ figuram.

N. *Sperma Ranarum* in Novilunio collectum semper feret, etiam vicies destillatum. Et ex spermate ranarum cum mercurio recto aquam destillatam ad pustulas faciei Gallicas, vide in *Thesaurio meo Pharmac.* *Hofmannus.*

OFFICIN. NAT. ex RANUNCULO VIRIDI.

1. Ipse Ranunculus. 2. Sanguis.

Vires. 1. Ranunculus sylvestris convenit viribus cum rana aquatica, ejusque cinis vulneribus inspersus mirifice sanguinem cohibere dicitur, Clariss. Dn. D. Arn. Weickard. in Thesauro.

2. Sanguis peculiariter pro Philtro commendatur. Schröderus.

Hic totus exsiccat in clibano & in lacte materno quantum cuspidi cultelli sumi potest, exhibitus infantibus recens natis, antequam alium sumant cibum, ab epilepsia præservat.

Sciuri hic etiam mentis facienda est, quia usui inservit Medicinali.

Est autem animal pusillum, quercuum amantissimum, caudaque præditum totum corpus obtegente & pedibus agilibus.

N. Ex hoc Animalculo funambulus quidam pro singulari areano pulverem habuit contra vertiginem, quem pretio & precibus vix ab eo extorquere potuit D. D. Johann. Michaelis p.m.

N. Funambulus quidam Smalcaldicus vertiginem etiam fortissimam ac inveteratam curavit cerebro Sciuri quocunque modo comesto, protinus enim juvat & vix redire permittit. Ac non solum cerebrum, sed carnes etiam Sciuri venatores in Alpibus Penninis Uxoribus gravidis edendas apponere, ut mares, si quos uteri tulerunt, rupicapris per avia & jugamontium sectandis alacriores, minusque vertigini obnoxios evitantur. Hofmannus.

RANUNCULUS Planta.

Ranunculus βαρεγγιον à radis dicitur, vel quod ranarum more humidis limitibus, opacisque marginibus lætetur, vel quod ranæ inter ejus frutices frequenter inveniuntur.

Floribus plerunque pentapetalis unâ cum calice caducis; seminibus succedentibus unicuique flori plorimis in globulum aut spicam & plerunque asperum seu echinatum congestis, ab aliis congeneribus plantis distinguitur.

Vires Ranunculi in genere.

Ranunculi plerique (non tamen omnes) vim habent exulcerandi & crustam cum dolore inducendi; unde & scabros ungues & scabiem remouent, & stigmata & puncta delent; fornicarias item ac peniles verrucas & alopecias ad breve tempus imposita tollunt. Radix arida trita naribus admota sternutamentum movet.

Vires Ranunculi Bulbosi in Specie.

Tragus hanc speciem Ranunculum sceleratissimum vocat; & c. Hofmannus mendicis hac plantâ eum exulcerare ait, ut miserabiles videantur.

Aquam radicum hujus destillatam, aut infusionem cum spiritu vini factam contra pestem extollunt herbilegæ Noricæ, Cat. Aldt.

Radix hujus herbæ omnium consensu adurit & exulcerat efficacissimè, pustulas excitat, unde non nisi extrinsecus corporis partibus adhiberi debet: quare, inquit, Tragus, erodendis & exsiccandis duris tumoribus mirifice conducit, verrucas peniles seu fornicantes & id genus vitia tollit.

Monet Camerarius radicem, si recens sit causticam esse ac admodum urete, exsiccatam autem post unum mensem dulcem effici.

Nicolaus Chesnean Massiliensis M. D. in cephalalgia succum Ranunculi (bulbosi ut puto) com-

mendat; qui (inquit) cum dolor parvum locum occupat, ad miraculum eum tollit. Eligitur species quæ foliis Anemone assimilatur, & linguam mordet quàm maximè masticata, ejus folia contunduntur in mortario ligneo aut marmoreo, factoque emplastro perforato ut in applicatione pyrorici solet fieri, & loco dolenti imposito, applicantur supra foramen folia ranunculi contusa, & multo succo madentia, non tamen ut diffinat, emplastroque non perforato superimposito, duarum horarum spatio eum aperit in teneri loco & depilato, præcipuè si colligatur herba in loco soli exposito, in capite vero ubi pili nascuntur non facile aperit; sed parte in tumorem elevata dolorem sedat. Hic unum advertendum, ut circa oculos ponatur in parva quantitate propter palpebrarum & partium circumjacentium inflammationes quas gignit stupendas, nullius tamen periculi. Multa adducit exempla cephalalgia hoc medicamento curata. Eodem etiam cum successu utitur in Anthrindesacerdos, inquit, quidam cum ex reliquiis podagræ per tres annos integros detineatur in lecto, incedere non valens, loco magis dolenti imposuit Ranunculum eo modo quo doloribus capitis diximus, & sanatus est: quod est species quædam curæ quam ex Paracelso apertam vocavimus, qua crassus humor cutem penetrare non valens hoc modo educitur.

Quidam peste correptus & in magno periculo constitutus servatus est duobus fomiculis factis in inguine bubonem habente. Applicavit sci. folia ranunculi contusa in parte interna carnosa coxæ, vesicasque & ulcera excitavit, quæ tantam materiæ venenatæ quantitatem emisissent, ut servatus fuerit.

Alius in axilla bubonem habens applicavit in medio muscoli bicipitis brachii ejusdem lateris fol. ranunculi contusa ad nucis magnitudinem, circum inungendo nutrito, & more vesicatorii ulcera aperta servando. Qui hæc exempla retulit fuit testis ocularis. Eruditiss. vir D. Edv. Hulse excerptis, & inter alia multa ad nos transmisit.

Vires Ranunculi Aquatici.

4. Summitatum seu turionum alni, fol. ranunculi aquat. hederacel. salviæ, ana mj. infundantur per noctem in vino albo, & infusum propinetur. Ad hydrophem & scorbutum mirifice conferre dicitur. Habui à D. Mapletoff. Rain.

RAPA, vid. Raphanus.

RAPHANUS.

ῥάφανος, ῥὰν τὸ ῥὰν i. e. ῥαδὶς φανερὰ, auctore Athenæo, i. e. quod facile appareat, sibi nomen ascrivit: nam tertio à satù die profilit, & revera nullam hactenus plantam novimus, quæ citius à semine germinat.

Radicis nomen, ut auctor est Varro, à Græcia venit in latinum, cum veteres Græci radicem dixerint, quam nunc raphanum, à radice autem nomen Anglicum deducitur, non à calore hujus radicis rubro, ut nonnulli perperam imaginantur, quoniam corruptè pronunciat & scribitur, quasi rubida aut subrubra.

Hujus notæ sunt filiquæ crassæ, fungosæ, membranæ non interceptæ, at neque manifestè bivalves, in nonnullis speciebus articulatæ seu nodosæ.

Vires. Raphani radix culinaria potissimum est, rarioris in medicina usus: ex iis quibus assidue vescimur (inquit Galenus) & obsonium potius quàm medicamentum. Acrem & calidam esse sapor evincit: unde nos iis potius assentimur qui vim roborandi ventriculi concoctionemque promovendi ei attribunt, quam Galeno aliisque contrarium asserentibus, ob eam maximè (ut puto) rationem quia rufus movet, unde

unde cibus illiberalis Plinio dictus est.

Utilis esse putatur ad calculos atterendos, urinal-que & menses ciendos: ad tussim prodest cum melle. Salutaris esse traditur adversus fungorum, & Hyocyami venena: elixa si sumatur valet ad eos qui tussi diuturna infestantur, quique crassiores succos in pectore cumulant (auctore Dioscoride:) cui libenter assentior, nam raphani cocti (ut recte Plinius) dulcescunt & in raporum vicem transeunt. In tussi & asthma re infans um succum raphani cum saccharo paratum per vices exhibendum præscribit Dolæus, lib. 5. c. 4. §. 18.

Raphanus domesticus esculentus (ait Fernelius) sine offensione ulla vomitione purgat, atque ventriculum blande exinanit. nulli ætati, neque prægnantibus insensus, teruntur autem radices ejus concisæ uncia duæ, affusaque mulla succus exprimitur tepidus offerendus. Seminis (quod efficacius est) semuncia vel ʒij. similiter teruntur, addita mulla aut sero lactis, aut aqua hordei.

Radicem cum sale tritam in malignis febribus sub pedibus ligari testatur Schvvenckleidius.

Aqua raphani per triginta dies manè ac vesperi pota singulis vicibus tribus aut quatuor uncias medetur calculo, facitque ad aquam intercutem.

Non temendus est raphani usus adversus pedum clavos, quippe qui decrescens luna post pedum lotionem eo usque rasi ut dolent quidem sed non cruententur, plerunque evanescent si cubitum iturorum clavis corticis raphani id latus aut ea parte applicetur quæ à raphano refecatur saucia.

Qui plura de raphani viribus velit I. Bauhini historiam adeat.

Ad calculum, ʒ. succ. radic. raphani ʒiv. mel. ʒss. F. posio, tribus vel quatuor matutinis iteranda valde probatum remedium. Liber arcanorum: vel ʒ. radic. raphani in taleolas incisæ q.s. mellis quantum necesse est ut lento igne coquantur. Effluet inde aqua, quæ ad ʒiv. data mirabilem præstat effectum. Chesneau. has duas formulas inter alias multas à se ex variis autoribus collectas ad me transmisit ingeniosissimus & eruditiss. vir D. Edv. Hulsius, M. D. vetus amicus noster: item sequentem ad nephriticos affectus.

ʒ. Cortic. acerr. raphani ʒi. osium mespilorum ʒij. blandè conquassat. infund. horas octo in vini albi ʒiv. & modice calens propinetur. Est secretum quod vocant raphaninum ex Corbei pharmaciam, auctore Antonio Mizaldo multis probatum experimentis. *Ramus.*

RAPHANUS RUSTICANUS, vid. *Radicula Sylvestris.*

RAPISTRUM.

Hujus radix simplex est, alba, lignosa (digitali crassitudine, longitudine palmari & sesquipalmari, multas, longas è lateribus fibras obliquas emittens. I. B.) caulis cubitalis aut sesquicubitalis & altior interdum ramosus, hirsutus, inanis (I. Bauhino duos aut tres cubitos altus crassitudine pollicari: verum in nostris agris eam staturam & magnitudinem non assequitur sæpius infra cubitum subsistit) folia rapæ, profunde sinuata seu laciniata, præsertim inferiora, pilis spinulifve supra infraque donata flores lutei, rapistrum vulgare præterquam quod longioribus pediculis insideant, suaveolentes quibus succedunt siliquæ à caule extantes hirsutæ, & seminibus protuberantibus quodammodo nodosæ, in latum tenuem, & oblongum mucronem desinentes, qui excidentibus duabus siliquæ partibus remanet appensus cum interjecta membrana lucida semina separante tria vel quatuor hinc inde, quam rapistrum majora, alba, ro-

tunda, quam sinapeos minus acris.

Quod in agris nostris abundat, & frumentorum vitium est, semen habet tussim & plena maturitate fuscum, aliter non differre videretur à descritto. *Ramus.*

RAPUM.

Rapum. Græcis Ρογγύλη, Ρογγύλης item Ράπος & Ράπος rapa quod ex terra rueret, quasi Ruapa, Varione teste, dicta est. Alii quod passim rapiatur nomen indium esse putant à Græcis tamen traxisse id nomen facile videri potest, qui Raphin & Rapyn, auctore Athenæo dicunt I. B. à reliquis hujus generis radice carnosa, dulci in grandissimum tuber excrecente facile à congeneribus distinguitur.

Vires, Radix culinaria est, modicum nutrit, inflationem parit, humentem ac laxam carnem generat.

Quamobrem (inquit Bauhinus) ut id vitium emendetur, solent nonnulli eam cum lacte decoquere, ut palato magis arrideat, & efficacius nutriat. Nostrates decoctæ succi aquei partem exprimere, deinde butyro & pipere condire solent; urinam ciet, & genitale semper auget: ventrem nec sistit, nec movet.

Seminis usus præcip. est in antidotis. Venerem excitat, variolasque & morbillos expellit semidrachma pondere potum Matth.

Raporum succus & jusculum in quo decoquantur commendantur ad febrem quartanam abigendam.

Raporum crudorum comestorum in scorbuto sanando efficaciam experti sunt nostrates. Qui primi in terra nova dicta Americæ insula sedes fixerunt.

Raporum longorum assatorum succus cum saccharo ad tussim infantium ulus est non contemnendus. Schvvenck.

Rapi orbiculati, sub cinere calente assi infimus orbiculus calidissimus, post aures applicitus magna efficacia revellit, capitisque & dentium dolores citissime sedat, magno secreto. Idem.

Rapum extrinsecus adhibetur in ulceribus crurum &c. optimo successu, ut in mammarum tumoribus, alibi in tumoribus scrophulosis & scorbuticis. D. Needham.

Desperata tussis orta ab assiduo usu succi limonium tandem curata erat ab usu decocti raporum Tulpii observ. p. 3ii.

In aphthis plebs nostra (de Hollandis loquitur) usu & medicorum præceptis edocta, posthabitis omnibus operosioribus & sumptuosioribus medicamentis, tutissime utitur vel solo raporum jusculo saccharo edulcorato, vel si tempestas anni id negat, sola cerevisia tenui saccharata. Quæ duo ubi intemperuerunt, omnes oris partes alluendo, & in imas fauces descendendo, non modo aphtharum acrimoniam, si quæ sit, placant, sed omnes etiam qualitates excessivas mitigant, atque hoc pacto maturationem perficiunt. Kerelaer in commentario medico de Aphthis. Habui inter alia multa à Cl. viro D. Edv. Hulsio M. D.

Raparum decoctum, tam crudarum quam prius assatarum copiosius haustum est laudatum in Ileco: item juscula decoctionis raparum quæ & leniunt, & blande simul abstergunt ab eodem ex Etmulleri præcap. de Ileco. *Ramus.*

RAPUNCULUS ESCULENTUS.

Rapunculo vulgari radix alba est nunc simplex, nunc furculosa: caulis sesquicubitalis, gracilis, hirsutus, angulosus & striatus, nunc unus, nunc plures, foliis cinctus, nullo ordine positus, angustis, acutis, pediculorum expertibus, cauli adnatis basi latiuscula, sensim angustioribus ad apices usque, per margines

crenâs vix conspicuus leviter incisâs, in summo ramosis, ramulis è foliorum sinibus exeuntibus.

In summis caulibus & ramulis longis pediculis insident flores campanulati, in quinque laciniâs acutâs profundè divisi: singulæ autem laciniæ tribus striis purpureis insignes sunt. Stylus in medio flore trifidus in tria cornua reflexa; quem stamina quinque tenuia breviora circumstant. Floris color ex cæruleo purpurascens: calix ex quinque angustis acutis foliolis componitur. Infra florem ad imum calicem vasculum est seminale tribus loculentis distinctum, Semine repleta copioso, exiguo, lucido. Tota planta lacteo succo turget aliarum campanularum instar.

Ufus. Vernis acetarâs (inquit I. Bauhinus) expetitur hujus radix minimi digiti fere crassitudine, napi parvi similitudine alba, dulcis, cum longo pipere devorata, lactis ubertatem facere perhibetur.

Estur non cocta tantum, sed & cruda in acetariis, quod maximè gustui placeat, & appetentiam excitet; longe quam rapi aut raphani delicatior. Lob.

In aggeribus fossarum, inque arvis non cultis nascitur; in hortis etiam ad acetariorum usum seritur & colitur, ut grandior evadat, æstate floret. *Raius.*

In hoc genere est Rapunculus Alopecuros, à spica caudam vulpinam aliquatenus referente sic dictus. Est autem folio maculato vel non maculato, ac uterque radicem habet dimidium digitum crassam, saporis non parum grati, ac facultatis aperientis.

REALGAL, vid. *Auripigmentum.*

RECTIFICARE ET RECTIFICATIO.

Ut in depuratione quacunque mechanica, si, separatis ex parte impuris, adhuc plus ultra videatur procedendum, non cessatur, donec finem assequamur desideratum, & v. g. frumentum, lana carpta, sinum præparatum, desiderato niteat splendore; ita etiam in pharmacia longè magis se res habet. Valet & in hac illud gladiatoribus olim adclamari solitum: *repete, repete.* Hinc nota.

1. *Rectificatio est destillatio vel sublimatio iterata & repetita jam evektorum seu propulsorum.* Non differunt nempe à priori: operatio est eadem, & γειγνηται non alia; sed à posteriori, seu fine & effectu. Modus etiam & ordo idem est, non diversus. Competit rectificatio primariò humidis; secundariò & adæquate siccis, sublimatis. Utraque constituunt hujus subjectum. Posteriora tamen respectivè parcius paulo hanc subeunt torturam, vel eadem opus habent. Communis est omnibus per ignem evectis, liquidis, ut aquis, spiritibus & oleis; mollibus, ut butyro antimonii, oleo ceræ; & siccis, ut floribus sulphuris, mercurio dulci, cinnabari antimonii. Singula jamdum propulsa, pro renata, denuò igni subjiciuntur, idque semel, vel bis, quousque finem assequamur ultimum, ex arte præfixum & debitum. Hinc destillatio vel sublimatio quoad hoc constituit actum primum, rectificatio actum secundum.

2. *Rectificatio debetur heterogeneis separandis.* Prima destillatio est magis confusa adhuc, vel revera, & ad sensum quoque, vel in recessu saltem. Rectificatio est magis distincta. Hinc instar regulæ & fundamenti principalis hoc est, hic instat terminus, quare, & quando, & quousque, & quoties rectificatio sit instituenda: quacunque nempe destillata vel sublimata adhuc sunt heterogenea, secundum quid, illa egeat rectificatione. Sic spiritus vini primus confusè procedit cum aqua simul, ergò ut separetur & distinctum habeatur, opus est rectificatione. Adeoque separat (1.) rectificatio spirituosa & aquosa. Sic confusus, vel qualitalis, procedit spiritus cornu cervi,

eboris & similium, cum sale volatili. Rectificatione verò, si id lubeat, separantur quoque, licet consubstanti in liquido asserventur, soluta. Adeoque separat quoque (2.) rectificatio salina ab aquosis. Sic & spiritus acidi rectificantur, ut à phlegmate liberentur, unde separat quoque (3.) aquea ab acidis. Sic & partes (4.) oleosæ huc quadrant & aliæ separandæ. In destillatione enim evehuntur partes humidæ vel siccæ evaporabiles colligunturque in unum. In rectificatione verò, seu destillatione hac iterata, evectæ unâ terreæ, grossiores, minus subtiles utilesque remonentur, aqueæ, terreæ, oleosæ impuræ. Sic & unus Q-li philosophi rectificatus non emericus est.

3. *Rectificatione exaltantur destillata vel sublimata.* Duos hosce habet fines primarios & generales; unum primarium separandi jam expositum, alterum confectarium, quatenus exaltantur hoc ipso singula illa. Seu destillatio ad solutionem spectat, & separationem genericam, rectificatio depurationem & exaltationem pro fine habet. Exaltantur partim, quando separatio illa facta est, unde Vi rectificatus, dephlegmatus, exaltatus & alcoholisatus sunt synonyma; partim quatenus subtilius sic alterantur, quando v. g. olea subtilisantur, & empyreumate exuuntur, ut odorata magis & aptiora reddantur. Utroque modo concentrantur vires magis. Facit huc commodè distinctio oleorum destillatorum in crassiora & subtilia, cuius rei exemplum egregium præbet oleum succini. Hoc per retortam destillatum, hinc rectificatum per alembicum, mole quidem paucius, ast purius longè & subtilius fit, ut quod ex lbj. v. g. ad 3ix. & 3vij. seu 3x. completè perfecta destillatione prodierat, hinc ad 3 ij. circiter saltem rectificando redigatur. Non enim tam quod multum est, quàm quod melius intendimus. Adeoque rectificatio pro scopo habet partes magis activas, relatis & separatis spissis & passivis.

4. *Rectificatio gaudet suis gradibus & terminis.* Non una sæpe vice potest perfici, sed iteratis quandoque opus est, ut rectificati fiat rectificatio, atque sic tandem rectificatissimus v. g. obtineatur spiritus. Ita tamen, ut non negligatur dictum fundamentum præcipuum, & supponatur depuratio vel exaltatio ulterior. Unde duo fluunt axiomata alia indubitata veritatis: primum, quacunque jam per se & una sola destillatione homogenea & subtilia satis prodeunt, non opus habent secunda, multò minus tertia. Actum agere hoc est, si præter necessitatem illa exquiramus. Non opus habent rectificatione aquæ destillatæ jamdum activiores, modò in ipso destillando distinctio probè fiat quoad recipiens vas mutandum; non olea per alembicum destillata ætherea quacunque, non spiritus urinosi, eodem modo & iisdem legibus propulsi. Destillandum & hoc loco, non quod opus, sed quod necesse est. Non item spiritus quicunque cum Vi parati, modò ipse jamdum bonæ notæ fuerit. Alterum: Quacunque rectificatione tantum abest, ut exaltari & meliorari, ut imminui potius viribus soleant, rectificatione non omninò egeat. Videndum quid quodvis ferat, vel intendat; quæ enim depurari & exaltari amplius non possunt, etiam si apparenter solum quandoque, sed viribus potius acciduntur, minus rectificari postulant. Ex solidis exemplo sint flor. sulphuris, mercurius dulcis, cinnabaris 3ii. Hæc licet vulgò sæpius jubeantur & vel decies sublimari, frustra tamen id fit; imò diuturniori illo & vehementiori igne cinnabaris tandem comburitur magis, & viribus privatur. Quod fieri per paucæ potest, non opus habet, ut fiat per plura. Terminus igitur est unicè ex dictis ponendus.

5. *Rectificatio sequitur leges destillationis, magis tamen per alembicum peragenda.* Sequitur leges destillationis. tum in iis, quæ non addimus, sed ex dictis supponimus

& huc referri volumus; tum inprimis quoad ordinem exeundi, ut id, quod est melius & expeditur, modò primo loco, modò medio, modò ultimo prodeat. Id ipsum quoque de ipsis vasis & ignis regimine intelligendum est. Per retortam rarior est rectificatio, imò plerumque per retortam destillari solita; quæ quidem rectificatione indigent, rectificantur per alembicum. Valet verò id inprimis de butyro Olii, si quidem id intendamus. Nam licet & id possit provida & perfecta destillatione una prima haberi purum & ad sensum homogeneum, clarum, pellucidum & quasi crystallinum, ac butyrosus; aliquando tamen, præsertim pro usu interno, si majori copia id paretur, & aliis circumstantiis, potest parari commodè, si retorta loco recipientis subdatur alteri, quæ hinc ipsa reposta in arenam rectificationi subicitur brevi manu. Per alembicum peragitur, quo complectimur, quæcunque huc referri possunt, & sub uno hoc pileo velut tegi; inprimis verò triplicis generis, (1.) ex cucurbita, pro Oleo Ois, oleo succini cum Vi rectific. Oleo C. C. & aliis; (2.) ex vesica, pro oleis destillatis, ut succini, rectificandis, quatenus majori eget quantitate aquæ, ut adiciatur, quod in cucurbita fieri non potest: eget etiam majori ignis gradu, quod ex arena obtineri itidem non potest. (3.) ex phiola, quæ duplici nomine rectificationi faver, partim altitudine, spiritus enim altius præ aqueis particulis ascendere norunt, unde pro subtilioribus spiritibus parandis his utimur; licet aliquando sint, qui phiolæ nomen pro cucurbita capiant; partim ob tenuitatem, unde non tam confusè fieri potest respectivè propulsio, sed pars post partem magis evoluitur.

6. *Additis vel separantibus, vel exaltantibus aliis, rectificatio fit melior.* Peragitur destillatio hæc repetita tum solo igne, & ordine exeundi monstrato, quo volatile præ fixo, subtilius præ crasso, spirituosum præ aquoso & sic porro evoluitur; tum juvantibus aliis. Juvant verò, quæ v.g. detinent partes aquosas, & liberant acuntque spirituosas. Idque præstant cumprimis alcalium quæ sunt de profapia. Singula hæc imbibunt tum aquosa, tum oleosa, atque hoc ipso liberant ab his reliqua spirituosas & subtilia. Aquosa quidem, quatenus, lixiva solvuntur ab aqua, & sic secessum statim, etiam extra ignem ullum, præstant, quod ad oculum demonstrat Vi non rectificatus alcali cuicunque, ut tali tartari, cineribus clavellatis & similibus affusus, unde statim fieri potest rectificatio sine igne, prævia scilicet separatione alia, paulò tamen improprie sic dicta; ubi pars ima petit, aquosa, pars superiorem, spirituosam. Multò magis id fit cum igne & separato sic & exaltato Vi, quod sapore manifestum est. Et sanè Vi-rectificatissimus, cujus nota est, si pulverem pyrium deflagrans eundem accendat, unico hoc maxime medio haberi potest beneficio scilicet, seu alcalium, seu aliorum quoque. Ita paravimus aliquando talem, abstrahendo aliquoties, ter vel quater, Vi à sale ammoniaco. Ratio hujus rei est, quod pars aquosa conjuncta ignem fugiens insinuet se pulveri pyrio, deflagrante solum spirituosam. Ille verò aquosus redditus, seu aquea illa parte imbibitus, non accenditur, aqua enim igni & consequenter etiam accensioni & rarefactioni sulphureæ sicæ contraria est. Tacemus commodè etiam in rectificatione Vi affundi aquam, ut partes feculentas empyreumaticas imbibat, quod & de oleosis suo modo verum est. Oleosa verò, quatenus dissociat eadem, unde partes viscidæ, lentæ, grossiores implicantur protinus, & non nisi subtilibus datur particulis transitus, unde & additione alcalium, v.g. cinerum, parata olea rectificatione ut plurimum non egent.

7. *In rectificatione spectandus uniuscujusque medicamenti genius.* Necessarium est id ipsum in omnibus

operationibus pharmaceuticis, ne neglecto hoc frustanea ludatur opera. Spectandus genius quoad particulas activas & expeditas, ut illas acquiramus vel exaltemus. Hinc si sulphur sublimatione noxiam adificat qualitatem, non id operatio in se infons facit, sed genius vel additorum, vel domesticus factus, per accidens. Spectandus quoad odorem, ne dum separare volumus & tollere v.g. à spiritu tri fortorem, qui tamen tantus non est, illum privemus vicibus, reddito medicamento magis inefficaci, sive illum cohobemus à capite mortuo proprio, sive à pane biscocto, seu sola rectificatione simplici particulas oleosas separemus. Vis enim ejusdem consistit in acido leni & partibus oleosis quibusdam expansis; his verò ablatis vel inversis per alcalina, non potest non vis, quoque alterari. Spectandus quoad vires, ne illas exacuamus magis, quam ferre possit corpus; quod exemplo visus nitri & acidorum aliorum verum est. Est etiam hic modus in rebus habendus. Sæpe igitur tum imminuunt magis rectificationes repetitæ virtutem, quam intendunt; sæpe ultra quam par est acunt, adeoque non nisi necessaria instituenda. *Wedelini.*

REGINA PRATI, vid. *Ulmaria.*

RELAXANTIA, vid. *Chalastica.*

REPELLENTIA & REPERCUTIENTIA, vid. *Apocroastica.*

RESINA in specie sic dicta.

Resina liquor est pinguis ac oleaginosus ex arbore sæpius sponte, interdum eâ vulneratâ defluens.

Resina propriè dicta in oleo promptè solvitur, in liquoribus aqueis nullo modo.

Resina respectu consistentiæ vel liquida est, subalbida & odorata è pinorum sylvestrium præcipue generibus, vel spontè vel vulneratis effluens: vel arida è corticis rimis, vel circa abscissos ramos, & quidem piceæ vel abjectis exiens.

Strobilina resina nomen accepit, quæ circa cotus seu strobilos concreta reperitur.

E Resina liquida colo prius defæcata ut fordes scernantur in duplo aquæ decocta, quousque, omni lentore consumpto odorem amittat & friabilis reddatur, tamque arida ut tundi, teri, cribrarique possit, sit candidissima ac fere nivea etiam si antea oleosa aut mellei coloris fuerit. I. B. è Dioscor.

Spissatur etiam resina cocta sine aqua in corinis æneis subjecto primum lento igne, deinde ubi coire cæpit, carbonibus liberalius aggestis, & audio igne, ut quicquid serosi est exhalet: quod requiritur dierum & noctium continuam cocturam. Idem.

Haud ab similibus est coquendi modus chymisti usitatus, oleum è Terebinthina elicientibus. Phialam ingentem luto oblitam, & resina ad dimidium usque repletam furno imponunt, & vâs recipiens adaptant. Dein ea cautione qua dictum est ignem accendunt. Fluit primum liquidus sudor, resinae aquam vocant, pissellæ veterum respondens, quæ tanquam inutilis abicitur, tamen ad ea valet ad quæ pissellæum commendatur. Sequitur oleosus liquor, qui cum totus extillaverit arida & friabilis in phialæ fundo resina superest, colophoniam hodie nominant, magni, ut olim, in medicina usus. Idem.

Cæterum Colophoniam variæ significationis est: vel enim resinam crudam ex picea pinove siccam, denotabat, Chiaz mastiche persimilem, è colophoniam advehi solitam, vel resinam liquidam ex iisdem arboribus ab eodem loco missam I. B. è Galeno pice Burgon seu Burgundiaca videtur esse resina piceæ licundum Parkinsonum.

Resina

Resina omnis confert præcipue tussi, aliisque pulmonum affectibus (cum melle) urinæ ac alvo ciente. Calculum pellit, arthriticos affectus juvat, gonorrhæam sistit.

Extrinsecus Chirurgis usitatissima est in emplastris, mover enim pus, maturat & scabiei medetur.

Sunt qui Terebinthinam vulgarem (est autem ea lactici resina) in cerevisia infundunt, atque simul deferre sinunt pro potu ordinario in præservatione calculi, viscerumque obstructionibus. *Schrod.*

Resina Abietina calefacit & humectat, consumit & separat, articulos roborat, tumores duros dissolvit, dolores podagricos & ischiadicos sedat, emplastris juncta pus promover: mundificat & incarnat renes, eosque à calculo purgat: specificum est in vulneribus capitis; in primis emplastri modo clavis pedum aut manuum applicata dolores lenit, & partim ejusmodi tumores eradicat *Wagnerus. p. 297. 298. D. Hulse, Rams.*

RESOLVENTIA.

Ut in morborum & symptomatum classe quidam primarii sunt affectus, quidam symptomatici & comitati; ita quoque in remediis se res habet, ut alia sint principalia, alia comitata. Exemplum hujus rei præbent imprimis Resolventia. Pro sunt hæc conjunctim visenda in diureticis, nephriticis, diaphoreticis aliisque pluribus, imò ipsis quoque purgantibus; quæ hinc congruè *Schenkius tractatu de humoribus* optima ait esse præcipitantiæ, quippe quæ unâ sint præcipitati expellentia, *cap. 25. p. 163.* Sunt tamen & seorsim quoque, si ve principaliter, in quibusdam casibus necessaria, unde operæ pretium est, eadem peculiari capite scrutari.

Quod enim exterius sunt dissipantia, id interius sunt resolventia; illa dissipant humorem congestum, & consistentem hic illic in extremis partibus, hæc interius.

Hæc ut pateant melius & tum ad sanguinem seu crassos sanguinis, tanquam exemplum illustre, tum ad seri quoque simultaneam vel separatam coagulationem applicari queant, norabimus.

(1.) Humores in corpore in perpetuo esse motu, (2.) vehi eisdem tum propriis canalibus, tum communibus poris, tum etiam cavitatibus, ut corde, utero; (3.) simulac verò motus hic quocunque modo non producat, nec unda velut undam trudit, eosdem coire & coagulari, quod in dicto exemplo grumorum nomine speciatim venit. (4.) coagulatos extra archei jagum, ipharum & imperium ire, ichorescere, putrescere. (5.) adeoque symptomata horrenda, febres, anxietates, dolores, excitare, v.g. subsistentem sanguinem, ut verbis utamur *Langii, l. 2. epist. 3. p. 695.* intra cranium & cerebri panniculos epilepsiam; in pectoris cavitate aut pulmonis arteriis, (bronchiis) tabem; in ventriculo cardialgiam & lipothymiam, in matrice hystericam-uteri suffocationem, in vesicâ verò urinæ obstructionem & dysuriam, imò plura alia, de quibus ibidem legi potest.

(6.) Speciatim verò grumescentiam esse duplicem, aliam *in facto*, actu talem, de quâ testantur inter alia, exterius præsertim, livores, sugillationes & vexationes, quæ dant intellectum; aliam *in fieri*, quod in palpitatione cordis & aliis patet, adeoque differre gradu, aliam minorem, aliam majorem esse.

(7.) Fieri vel à causâ externâ, vel internâ; Externâ vel violentâ, ut in contusionibus, casu ab alto, vel coagulante, uti v.g. in puerperis sapientissime grumescit sanguis vel lochia in utero à solo admissio acre frigidi.

(8.) Non fieri grumescentiam à solo acido figente & coagulante à priori, sed etiam à disgregatione & dissolutione fibrarum ex ordine, uti videmus id ipsum

quoque, factâ per V. S. extravasatione.

Hinc 1. *Quæcunque sanguinem & serum in vasis suis vel poris, internis vel externis, subsistentem in motum ciente, & coagulum fiens respiciunt, sunt resolventia.* Cum enim in motu vacillent, cum sæpius patiantur, merito citanda sunt in motum.

2. *Quæcunque sanguinem & serum in cavitatibus his illis perfecte extravasatum & contentum disjiciunt, & in motum ciente, sunt resolventia.*

Resolvunt hoc pacto universaltier & utilisque communia, (1.) *Diaphoretica*, tanquam communia & optima præsidia in omni vicio sanguinis extra circulum suum mori, eaque vel fixa, vel media, vel volatilia, v.g. tinctura bezoardica, mus cornu cervi, mixtura simplex, theriaca & similia, item Sium diaphoreticum, opiata omnia, licet secundario ferè magis & cum aliis, quod *Sylvius* maxime probavit & asserit.

Resolvunt (2.) *Diuretica nephritica* seu lithontripica & purgantia eatenus, quatenus liquant, fundunt & disjiciunt, aliunde huc mutuanda. Resolvunt speciatim, quæcunque sulphureo vel salino activo principio polleant. Utroque putredini resistunt, vel saltem defendunt hoc ipso sanguinis tonum, & archeum, ne tam facile eadem afficiatur, vel detrimentum capiat.

Resolvunt (3.) *sulphurea*, quatenus balsamum sanguinis vigorant, siye ipsa sint balsamica, siye sale volatili, acido, mercuriali immutata, verbi gratia, myrrha, mumia, sperma ceti, sanguis draconis, radix zedoariæ, thaponticum, sanguis hirci, cinnabaris, flores sulphuris, mel ipsum & alia.

Resolvunt (4.) *salino* stimulo facta, incidentia & attenuantia, ut *acida*, acetum, spiritus salis, vitrioli, mixtura simplex, oxymel; *alkalina*, ut oculi cancrorum laudatissimi, siye præparati, simplice, siye in magisterio, corallia, sigillum Salomonis, exterius in sugillatione specificum & plantæ traumaticæ variae, ut bellis, summi usus in coagulo humorum & lymphæ, inprimis ab haustu frigido exstuant corpore facto, commendata hoc nomine à *Minderero*, comprobante id experientiâ; item cerefolium, ejusque aqua in pleuritide, repletis lochiis, casu ab alto utilissima; millefolium, eorumque succus & alia. Huc etiam spectat, quod Chirurghi carbonem tillæ eo casu quoque adhibent, licet meliora prostant, item terra sigillata, medulla saxorum siye lithomarga, bolus armena.

Resolvunt (5.) *mixta*, v.g. acetum cum pulvere contra casum, vel sanguine hirci, oxymel, quod *Galenus* expertus est, per se, absque adjuncto haustum, sanguinem concretum dissecare, expectorare vel per lotium prolicere; inprimis etiam vinum calidum, summum contusionum præsidium, & huc spectantes, cum eodem coquendi, sacculi capitales in contusione & vulneribus capiti summi & unici usus. Ex compositis huc spectant pulvis contra casum *Langii*, item pulvis ad casum Augustanorum, ex terrâ sigillatâ, sanguine draconis, mumia an. 3ij. spermate ceti 3j. thabarbaro 36. misce spec. diamum. *Myns.* item ex zedoariâ, sanguine draconis & floribus sulphuris, descriptus à *Ludovico tractatu von Feld-Krankheiten.*

Uno verbo sal coagulationis & resolutionis est principium, unde maxime attendendum. Coagulationis, si combinetur cum terreis, gravibus, ad motum ineptis, unde tartarus nascitur chymicorum; si deficiat quandoque, unde pituita plurima; si vinculum cesserit esse inter sulphur & aquam, utrobique concurrente archeo motore universalis; vel si excedat in genere & improprietate sit. Ut verò sal est principium coagulationis inter activa principia; ita passiva aqua & terra, quippe desidia in se, & motui minus apta. Hinc ex aqua & terrâ symbolisatione, juxta quosdam, fit calculus non ineptè. Est verò etiam principium resolutionis ex dictis rationibus, quia attenuat, incidit, fun-

dit, vegetat & in motum ciet inertes humores mediantes quidem sero & sanguine, tanquam menstruis corporis universalibus; ut, caractere hoc recepto, fluxilior sanguis redditus secum abripiat cessantes hic illic & tardantes particulas, coagulo proximas.

Cum ergo partim dubium sit de quibusdam, an talia sint, partim usu differant, de iis quoque seorsim dicemus quædam, idque repetitis thelibus.

1. *Sperma ceti est resolvens.* Negat id quidem *Langius* & rejicit *l. c.* (qui optime de his affectibus egit & latius) p. 696. sed citra additam rationem, nisi quod vulgus chirurgorum imperitum id adhibere soleat, quæ insufficientis est, nam & à plebejis sæpe vel *Coo* teste & experientiâ selectissima discas remedia. Quin ipse *Langius* dilaudat alibi *l. 3. epist. 3. p. 979.* Sperma ceti & præscribit ad *Œij.* unde colligimus laudatissimum esse id ipsum, uti revera in asthma, in calculo, in respiratione difficilis phthisi, pleuritide, tussi graviori est utilissimum blandâ sub pinguedine condens sal, unde etiam durabile magis redditur.

2. *Mumia est resolvens traumaticum;* itidem contra *Langium l. c.* & alios qui vilipendunt, imò planè exesse jubent; est enim balsamica, non tam quod ex aloe, croco & myrrha constet, quàm quod asphaltro debeatur vis illa, quod, immutatum unâ ipsum, resolvit. Sunt qui longè præferant elixir proprietatis, quod elementa genuina contineat, & verum est, resolvens esse ad grumos sanguinis dissolvendos laudatissimum, quo nomine in putrilagine corrigendâ, v. g. foetu mortuo, lochiis retentis optime se gerit, nam & aloe inter purgantia resolutiva optima est. Notanter verò diximus resolvens traumaticum, unde & in essentiam nostram traumaticam recipitur.

3. *Acetum est resolvens.* Videtur hoc ipsum primo intuitu minùs cum veritate congruere, quia acetum coagulat. Verùm ratio ex regulâ dictâ de salibus facile patet. Ut salia, sic & acetum in specie coagulat & resolvit, pro diverso statu suo, & imprimis subjectæ, cui debetur, materiæ. Hinc acetum non per accidens hisce in casibus convenit, sed maximè per se, quatenus est remedium insigne resolutivum. Distinguendum verò est inter tempora & acida ipsa. Non tam conveniunt in coagulatione sanguinis in fieri, quàm ubi pars jam incipit secedere ex ordine, & hoc ipso coagulari. Visitur hoc in experimento domestico & culinari, quando sanguis asperinus vel leporinus cum aceto miscetur, ne grumescat, quatenus particulas magis unit, quæ alias promptè concreverunt, & à putredine præservat. Deinde acida alia sunt sibi relicta, alia refracta, & cum aliis data, ubi magis mitescunt, minus coagulant, optime resolvunt.

Conveniunt verò hæc ipsa externè quidem in contusionibus, fugillationibus, aliisque casibus, ubi sanguis ad quietem invitatur vel cogitur magis; internè verò in casu ab alto, qui affectus quasi primarius eadem indicans, alias verò satis frequens & comitatus est, contusionis species, item in vulneribus recentibus quibusvis. Internè in pleuritide & inflammationibus aliis asthma, tussi, palpitatione cordis, abscessibus internis, anginâ, affectu hypochondriaco, hysterico, à sanguinis in utero grumescentiâ, coagulatione lactis in mammis, & similibus. Taceo usum secundarium non minus laudatum in vomitu & sputo cruento, aliisque.

Restat, ut de cautelis adeoque usu speciali & limitato dicamus quoque. Hinc notandum i. *Alia resolutiva sunt generalia, alia specialia, adeoque inter se non confundenda.* Generalia dici possunt quæ sanguinem & serum simul respiciunt; ut alcalina, lapides &c. Specialia, quæ magis alterutrum, ut sulphurea & acida. Illa enim velut serum magis respiciunt, hæc sanguinem. Hæc *sperma ceti* verbi gratia, magis in viuis

seri prodest, respectivè, ut in tussi, grumescentiâ lactis in mammis, unde externè quoque specificum eo casu est. Hinc acetum iisdem casibus noxiū potius fuerit, ubi serum coagulum patitur, nisi secundario, & cum aliis maritetur, vel per accidens quoque. Sic verbi gratia, spiritus salis in pleuritide datur, non tam primario sine, ut inflammationem disjiciat, quàm ut febrem conjunctam mitiget, & cumprimis tussim absolūtè necessariam vel excitet, vel conserve, adeoque expectorationem promoveat. Et hæc ratio quoque est, cur non solum acetum in casu ab alio, sed cum pulvere contra casum mixtum propinetur; & vice versâ, quare acetum cum semine carvi decoctum prosit in tumore mammarum; cur item calidum assumatur magis. Alcalinâ verò cum fluxile faciant serum, & acorem avertant, præcipuè quasi sunt talia, quædam ob sal volatile latens eximia, ut oculi cancerorum, qui non minus ac chelæ cancerorum destillant spiritum urinosum fundunt.

2. *Hinc eadem quoque distinguenda ratione affecluum;* facile enim patet ex dictis, non convenire omnia omnibus. Sic nitrosa licet resolvant, non tamen in tussi, adde & pleuritide æque conveniunt. Sic ipsi flores sulphuris licet sint pectorales, pleuriticis tamen non adeò solatium afferunt, quia siccant magis, ut alia taceamus. Adeoque pro diversitate affectuum diversa quoque resolutiva seligenda, unde alia sunt resolutiva cephalica, alia resolutiva pectoralia, quæ inter flores papaveris rhæados, tantopere deprædicati, stant post principia, si in pulveris formâ eligantur, & pro primario medicamento; alia resolutiva nephritica, alia traumatica, & sic porro.

3. *In resolutivis medicamentis distinguenda quoque sunt tempora morbi.* Alia scilicet conveniunt in principio læsionis, ne colligatur sanguis in suppurationem iturus; Alia in progressu, & facto grumo perfecto, idque de internis & externis valet, illo enim casu intentio est, ut anteverratur, hoc ut avertatur grumefactio. Videmus hinc in ambustis & fugillationibus, quomodo vel ab adhibito medicamento resolvente, vel etiam aliquando per se, hinc inde à loco uno ad alterum livor vel rubedo provehatur, & colorem quoque diversum sanguis induat.

4. *Resolutiva stypticorum & traumaticorum adiones moderantur, adeoque medio casu cum iisdem jungenda;* verbi gratia, in sputo cruento & vomitu cruento intentio est gemina (i.) sanguinis fluxum sistere, (2.) eum qui effluxit dissipare, seuolvere. Neque enim satis fuerit consolidare unitatem solutam, nisi simul prospiciatur humori extravasato. Ergo & tunc resolutiva habent locum, licet secundarium, ut traumaticum & disjiciens, imò curationem absolvunt, unde factâ adstrictione in utroque illo affectu, sub finem decocta & essentia traumatica, pulveres ex lapidibus cancerorum, coralliis, &c. optimi sunt, quæ methodo adhibitâ plurimos feliciter curavimus, imprimis non omisâ simul venæsectione in pede, & aliis.

5. *Resolutivis interius succinturiantur universalia, ut diaphoretica, emetica & purgantia, &c. externis emollientia & paregorica.* De diaphoreticis res clara est, eaque optima sunt resolutiva in inflammationibus omnibus internis & externis incipientibus. Emetica verò & purgantia, ubi ipsa indicantur, quod utrumque exemplo illustrabimus: Aneilla ab alto lapsa sentit anxietatem circa præcordia, instantem lipothymiam, respirationem difficilem; advocatus Medicus, non attendens casum præscribit cordialia & resectoria, potiones, pulveres, unguenta & nihil non, sed frustra, in horas deterioratis symptomatibus. Advocatus alius, pensitans accuratius circumstantias, propi-

nat emeticum, quo eductus è ventriculo grumatus sanguis, agri in momento adjut.

Imò cum aliquando pleuritica desperatè quasi succumberet; nec propter viscedinem materia & copiam ejus possit expectorantibus, desperatà quasi re, ausus propina: e sperma ceti cum tantillo tartari emetici, gr. ß. circiter vel ʒ. unde unico vomitu allevata adeo est, ut hinc valetudinem recuperaret. Ut non repetamus, ipsum sperma ceti datum infantibus pro resolvendâ pituitâ in pectore, ut plurimum vomitum ciere, idque felici cum successu. De purgantibus verò hoc notavimus. Faber ferrarius in pago Schloben ante aliquot annos laborabat abscessu interno infra diaphragma, quod à posteriori confirmatum est, adauctâ difficultatè respirandi & tumore pedum pedum accedente. Dato purgante, materiâ purulentâ copiosè per alvum eductâ, integerrime convaluit. Notavimus quoque alibi, à datis solventibus pulveribus abscessum in pectore, per alvum rejecto pure, curatum. Nimirum archæus omne extraneum & peregrinum exturbare gessit, vel leviculè adjutus. Illo vero gravatus non potest id commodè exequi unde si copia sanguinis major sit, quàm ut resolvi possit, educenda est, sive sit in capite, unde trepanum inventum, sive in ventriculo, sive alibi. *Wedelius.*

RESTA BOVIS, vid. *Ononis.*

RESUMPTIVA, vid. *Analeptica.*

REVERBERARE & REVERBERATIO.

Calcinationem obsignat Reverberatio, dicta à modo tractandi, seu occurrentis ac admissi ignis. Cum enim extra dubium esset, ignem aliter aggredi mixta conclusum, aliter apertum, aliter subtus, aliter subter admissum, inventus est etiam reverberii ignis, cujus notionem exhibent sequentia axiomata.

1. Reverberatio est calcinatio apertæ & lambente igne facta. Improperie quidem & latius paulò prædicatur quoque eadem aliquando de igne concluso, qualis est arctior, immediatè igni commissa, ubi undique patet igni aditus, ut non tam subtus propellat, sed latera quoque & totum globosum corpus ambiat, arcto complexu & pressione sic extorquens intus locata, verbi gratia, in destillatione spiritus vitrioli, qui, utpote fixior, longiori & majori eget igne. Propriè verò & strictius, quando contactu perpetuo flamma obviâ calcinandum corpus verberat, *vvenn die Lohe dran schlagt*; Uti hunc in finem reverberantur objecta in furnis calcinatorum, vitrariorum, qui *zwei Etagen* tales sunt, fugulinorum, vel, quando destillatur spiritus vitrioli, laminæ martis transversim locatæ, ut undique lambi & calcinari ab igne possint. Strictissime verò reverberatio dicitur, quando compendioso spatio, in furno reverberii, hinc inde descripto, ignis ita arctatur, ut in viâ quasi suâ continuò feriat objectum calcinandum. Fundamenta hujus calcinationis reverberatoriæ sunt nota, verbi gratia, (1.) quò magis immediata flamma est, eò fortior. (2.) Fortior est superior inferiori. (3.) Fortior est tenuata, concentrata & percussione æquali. Est quidem & in nostratibus furnis domesticis reverberatio, sed magis elongata, magis æqualis, spatio majori dato, ut morari intus majus, quàm calcinare queat. Reverberatio verò hæc chymica etiam dicit contactum intimiorem, ut flamma flammam tradat & flammando in objectum derivetur. Visi hujus rei exemplum potest, quando per siphonem afflatus aer continuo dirigit ignem in obvium corpus, qui sanè potentissimus sic redditur. Apertum autem quando ignem dicimus, intelligimus non ratione aeris, qualis est in furno anemio, sed ratione aditus apertæ & liberi, ut ferite, verberare, percutere

queat corpora, adeoque apertus, sed lambens esse debet. Hinc duobus modis potissimum talis redditur, vel furnis oblongis, cameratis, ut à tergo velut irruens ignis, qua data porta, obviet corpori calcinando, qualis est fornus reverberii dictus, vel furnis fornicatis, qualis pro pinsendis panibus pistorum est, qualis vitrariorum & aliorum mechanicorum, nominatim ad cineres clavellatos parandos. Rotunda enim figura circulando, circulara verò flamma ad reverberandum aptissima.

2. Reverberatio est calcinatio fixiorum & in igne subsistentium; sive jam prius calcinatorum, sive minus. Talia sunt mineralia quædam fixiora, metalla, mars, ☉, salia, & terræ ipsæ, velut aliud agendo, sive intentione secundaria. Notum enim est in praxi præsertim domesticâ, lutum fornacum, crebriori reverberii istius igne calcinatum ad ruborem, usurpari non tantum à vulgo in dysenteria adstringendi sine, sed etiam ab ipso *Knösli* utiliter ad hunc usum impensum est. Quod experimentum sanè non est de nihilo, siquidem in luto non saltem partes terræ sunt, conimiles suo modo bolo armenæ, terræ lemnæ, sigillatæ, verum quoque partes martiales, ochreæ, quod tum color testatur rubellus, qualis & in lateribus observatur, tum experimentum *Becheri*, qui exinde cum oleo lini ferum producere docet. Unde hoc ipsum lutum fornacum inter euporista antidysenterica optimo jure referri potest. Cumque fixiora hæc sint, ob hoc ipsum ignis ductus lambens opus est, flamma lambens foras accensis lignis, quorum acidum etiam in transitu continuato symbolum suum confert. Sunt, qui distinguunt etiam inter reverberationem clausam & apertam, clausam vocando, quam nos improprie & laxius talem diximus. Tribui tamen etiam potest igni suppressionis, quando *duo* & *træ* administratus ignis sibi obviat, atque sic percussione intimius & fortius agit.

3. Reverberatio fit pro majori immutatione & alteratione particularum. Hinc si speciatim hos usus visimus, diversi inde resultant effectus particulares verbi gratia reverberatio (1.) *depurat*, cujus exemplum præbet sal lignorum, vulgò cinerum clavellatorum nomine veniens. Revera autem sal est è lignorum cineribus elixivatum & reverberatum peculiari eleganti furno, unde color albicans & cærulescens emergit, una quoque sal ipsum magis sic acuitur. Reverberatio (2.) *subtilizat*, unde crocus martis, reverberii ignem passus, longè porosior & subtilior redditur hoc ipso; calx auri quoque per reverberationem magis subtilisatur, ut taceam jam dictum sal lignorum. Reverberatio (3.) *refert*, centrâ martis ita magis panduntur. Hinc quod *Paracelsus* de antimonio scribit, illud reverberando in tincturam aptari, id in sulphure antimonii per sal ammoniacum everso alii experiri maluerunt, panno sic magis sulphure; quam in rem quoque nonnulli scorias reguli reverberant prius, quàm tincturam extrahant, licet satis elegans jamdum parari exiit queat. Reverberatio (4.) *invertit* quoque & *confringit* magis acida, separando magis corrosivitatem, unde etiam hæc ratio est genuina, quare ex croco martis aperiente igne reverberii reddatur adstringens, quia nempe acidæ viriolicæ particulæ sic propelluntur fortius, vel cum terreis ochreis maritantur intimius, unde ochreis prædominantibus hoc pacto alteratis adstrictio major est. Vis illa diversa itaque pro subjectorum non uno modulo observatur. *Wedelius.*

RHABARBARUM.

Veris initis cum germinare incipit, caput grande, rotundum, fuscum protrudit è radice crassa, fungosa, lutea, quod in folia aliquot successive se apertien-

cia paulatim explicatur. Sunt autem folia initio cum primum apparent valde corrugata & complicata. postea sensim dilatata & extensa, rugis & plicis coæquatis lævia sunt, perampla & subrotunda, pediculis atrovirentibus pollicem crassis, & in latiore solo binos pedes longis infidentia, longitudine bipedali, nec minori latitudine, obscure viridia, & cum juniora sunt subglauca, consistentia crassiore quam Hippolapathi rotundi folii vulg. sapore acido; lujulæ aut acetosæ hortensis gravior. In medio foliorum (non tamen singulis annis) exurgit caulis crassus, robustus, humilior tamen quam rhabarbari monachorum, foliis ejusmodi rotundis sed minoribus ad nodos amictus, ad summum usque etiam inter flores, qui in hac planta, secus quam in alia quacunque lapathi specie, albi, hexapetali, cum multis intus staminibus albis. Flosculis, ut in aliis lapathis, succedunt semina triquetra, maxima coloris Bæici seu castanei, aut rufi pulchre splendens. Radix processu temporis in magnam crassitudinem excrevit & multos ramos seu brachia emittit, colore foris obscuro seu atrovirente. Cortici exteriori subest membrana tenuis, sublutea, pulpam seu substantiam radicis interiorem proxime investiens: quâ detracta apparet radix nuda, colore adeo vivido cum venis carnis eam permeantibus & distinguentibus ut præstantissimum etiam rhabarbarum quod ad nos ex Indiis & China advehitur eam vix possit superare. Hæc si curiose & diligenter exsiccentur blando hypocausti calore, cavendo ne inter siccandum frusta se mutuo contingant, colorem suum retineri non secus ac si recens esset, & salivam masticata calore flavo tingit.

Rhabarbarum, nullibi nisi in China provenire Garcias, Acoſta, Linſchotanus consentiunt, unde per Tartariam Ormuz & Alepum deferitur, inde in Alexandriam, & tandem Venetias, vel per Usbeken in Turciam, & hinc Venetias. Scribit Acoſta Rhabarbarum in interiore Chinatum regione ductat provenire, unde in urbem Canton (illius Provinciæ portum & emporium ubi Lusitani habitant) exportatur, & inde navibus in Indiam advehitur, quod citius corrumpitur: vel alia viâ per Tartariam Camelis, quod non adeo cariosum.

Nunc dierum Navibus ad nos deferitur ex India Orientali, non ut olim ex Alexandria Egypti, aut Venetiis: in Indiam è Sinis (ubi sponte oritur ut diximus) advehitur.

An rhaponticum antiquorum & rhabarbarum modernorum sit una & eadem specie planta à Botanicis controversatur, aliis eandem esse affirmantibus, aliis negantibus: nonnulli etiam sibi non constant, & nunc eandem, nunc diversam affirmant, quorum sententias & rationes vide apud J. B. in Appendice Tomi II. Hist. Plant. nec enim opus est ut iis immoremur; nunc enim Rhabarbarum verum Sinenſe (quod à Rhapontico Thracico toto genere diversum est) in hortis Lugd. Bat. & Groning. colitur & ad Abrahamo Muntingio accuratè describitur. J. Le Brun in libello de materia Medica hæc habet: Radix hæc Dioscoridi & Galeno ignota fuit, unde male quidam Rhaponticum eorum cum nostro rhabarb. confundunt: nam Rheum Diosc. non habet vim purgatricem, & notis veri Rhabarbari caret, rhabarb. enim substantiâ compactum est, ponderosum & aridum, sapore amarum, odore acre, colore exterius subnigro ac rufescente intus ex rufo flavescente, & ad nucis moschatæ colorem internum & accedente, ac maceratum vel manducatum tingens croceo colore. Rhaponticum non est compactum, sed ratum, non ponderosum, sed leve; non aridum, sed lentum; non amarum, sed subacre; non odoratum nec colore simile Rhabarbaro.

Vires. Rhabarbarum purgat bilem flavam, pitui-

tamque viscosam ac tattaream in ventriculo primæque regione stabulantem, hepati specificè confert, adeo ut cor epatis dicatur: curat icterum, & quia vim quoque astrictoriam obinet in omnibus morbis dissolutis, Dysenteria verbi gratia, & diatrhea, præ aliis commendatur. Exhibetur in vino albo aut sereno &is.

Sunt qui rhabarbari usum pueris & prægnantibus interdiciunt ob vehementiam: verum sine causâ efficiente: nam Joh. Bauhinus aliique se prægnantes multas eo feliciter sine ullo damno purgasse referunt, infusionem præferunt substantiæ, quæ enim citius violentia medicamentum purgans evacuat, eò gratius. J. B.

Partem cum purgantem, tum adstringentem obinere creditur, quarum prior facilius elicitur, posterior difficilior; hinc pro diversa intentione diversimodo quoque tractatur. Nonnulli levi tostione vim purgantem minui, & adstringentem augeri sibi imaginantur, quod alii ita probant, nec immerito: etenim cum purgans drior sit, quam ut levi tostione in auribus nesciat, tostio illa vix satisfaciet, præstat itaque si astrictoriam vim auctam velimus, rejectâ primâ coctione id coquere, & fortissima expressione exprimere. Schrod. alii quoque in dysenteria improbant totâ etiam Rhabarbarum; tum quia nimia corrosio vim purgatoriam penitus amittit; tum quia moderatè vix evitari possit, quin acrimoniam contrahat, unde intestina rodit, & novam materiam ad locum affectum attrahit. Nos tamen in dysenteria Rhabarbarum totum bono cum successu usi sumus etiam in nostro corpore.

Non approbo (inquit J. Bauhinus) eorum morem, qui in dysenteria à principio adstringentia exhibent: si augent morbum dum per ea retinent educenda, nempe acres, malignos & putridos humores quo natura vergit educere oportet, si per convenientia fiat loca: igitur statim à principio educantur convenientibus purgantibus, citò sublevantur, & postea tuto adstringentibus uti licet.

Cum substantia frigida & terrea ad totum permeat, ignea autem in superficie sit; ideo per infusionem preparantur partes calidæ & purgantes; manent frigida terrestres & adstringentes. Hinc in infuso plus purgantis quam in substantia. Verum quia hoc modò, si pertranissimum timeretur in iis præcipue qui alias ardore & difficultate urinæ laborant, ut Fallopius observat. Diureticum enim cum sit, agit & pellit eò humores, ut ardor urinæ sit molestus, quamdiu actio ipsius durat in corpore Hofman.

Ad febres & obstructions diuturnas, R. 3 j. rhabarbari vel 3 j. pro infantibus: in taleolas confectæ linteo raro includantur, & in aq. cichorii ʒi. fundantur. D. 3 iv. nodolo quolibet mane exprimitur. Has omnes febres se curasse hoc remedio testatur Montanus. Hoc etiam ego usus sum in quibusdam affectibus longis cum febre, parte affecta non bene cognita, & semper mihi bene cessit. Chesneau communicavit D. Husle. Rains.

RHABARBARUM MONACHORUM, vid. R. polapathum.

RHAMNUS CATHARTICUS.

Quamvis arbuscula hæc in singulis acinis plura quatuor grana non contineat, quia tamen granorum numerus nobis nondum exploratus est hac eam recensimus.

Nomina. Rhamnus catharticus Joh. B. C. B. solutivus Ger. emac. solutivus, sive spina insectoria vulgaris Park.

Joh. B. Celebravit rhamnum catharticum usum in pur-

purgando multus & felix, atbulculam sepibus alicubi familiarem, cortice externo nigro vestitam, cui duo alii subsunt, alter viridis, alter luteus, materia pallida, dura, ramis satis crebris, iisque fere ex aduerso sitis brachiatam, duris rigidisque ut longis spinis foliosis minacem, aculeis præterea aliis minoribus horrentem. Folia ad pruni folia accedunt, acuminata atrovirentia, ctenata, nervosa, adstringenti sapore. Flores herbacei coloris, parvos proferit, quatuor apicibus constantes, multos simul junctos. Succedunt baccae frequentes ad radicem spinatum ex longiusculis pediculis, frangulæ parces, per maturitatem nigæ, succo virentæ plenæ, in quibus grana terna vel quaterna, pyrorum granis parve similia, figura fere triangulari, cortice nigricante, medulla albâ non ingrati saporis, quæ facile ungue premente franguntur: Sapor baccarum amarus, & attringens, & qui facile gustanti nauseam moveat, habet & succus earum neleo quem sibi peculiarem odorem.

Locis seniculis, sepibus & sylvis non raro occurrunt in Anglia, Germania, Pannonia, &c.

Ulus baccae hujus fruticis tria colorum genera præbent. 1. mellis tempore lectæ, atefactæ & tuscæ, inque aqua & alumine maserata luteum seu croceum potius reddunt colorem ad chartas luforias & coriâ tingenda etiamnum in usu. 2. autumnâ cum maturitatem assecuta nigæ evaserint collectæ, tuscæ & in vase vitreo aservatæ pulchre viridem exhibent colorem quem vocant pictoribus accommodatissimum, & in magno ulu. 3. Circa festum S. Martini in arboribus adhuc hærentes si legantur puniceum colorem reddunt (ut perhibet Tragus) iis qui coriâ inficiunt, & chartas pictas coloribus illustrent utilem.

Vires. Baccae purgantes sunt atque crassam pituitam & biliosos quoque humores per alvum educunt, ut nonnulli volunt: rectius earum vires æstimant qui ad pituitam tenuem & serosos humores educendos utuntur. Nos (inquit I. B.) peculiarem earum vim in sero & aquosis humoribus educendis experti sumus quapropter non raro earum syrupus ad uncias tres hydropicis præscriptus notabili cum succellu datur, atque etiam exhibetur atridatum pulvis a ʒj. ad ʒiʒ. nonnulli baccas numero exhibent a ʒj. ad ʒo. verum ob vehementiam mollibus & debilibus in substantia non sunt exhibenda. In syrupo verò (pergit idem) quo quotidie & frequente utimur, etiam in delicatissimis natoris nullam molestiam effatu dignam unquam deprehendimus, & solvendo corpori accommodatissimum à multis jam annis cognovimus, etiam in nobis ipsis. Syrupum parandi modus in pharmacopæis vulgaribus extrat. J. Bauhinus sic fieri jubet. Succus baccarum maturatum extracti & rite depurati lib. v. coquantur cum mellis optimi & sacchari ʒss. ad syrupi consistentiam. Adde pro unaquaque libra syrupi, cinnam. & seminum anili conquassatorum an. ʒiʒ. in pecia ligata immergantur. De hoc tuto ab ʒj. ad ʒij. sumi potest. R. ius.

E succo præterea baccarum Rhamni Cathartici in vesica concluso ac de ea in aere ad desiccationem suspensio conficitur color viridis pictoribus familiaris ac non inelegans.

RHAPONTICUM VERUM.

Rhaponticum verum est Lapathi Thracici, seu Rhapontici folio Lapathi maj. glabro B. P. radix oblonga, crassâ, ramosa, & brachiata rhabarbaro gravior, comparior, foras fusca, seu ferruginea, rugosa, intus crocea, & per transversum secta spiras ostendens, saporis subadstringentis, lentis, viscidis, subacris, subdole, cum quadam amaritie, odoris pontici, sed debilioris.

Nota generica est eadem cum rhabarbaro, sc. quod planta sit spicata, tripetala, & quasi muscosa, seminibusque trigonis, lucidis, tribus foliolis inclusis gaudeat.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II,

Rhaponticum & Rhabarbarum ex unâ eademque radice provenire possunt: Semen rhapontici à semine rhabarbari nihil differt, nam quæ in Thracia feruntur producant radices brachiatas, quæ in Chinâ tuberosas maximâ ex parte; eæque radices quæ in Chinâ nascuntur potentiores Thracicis sunt. Illa pars radices quæ tuberosa est, vel quasi truncus seu caput dicitur Rhabarbarum; Rami ex illo capite provenientes dicuntur Rhaponticum. Nascentur hæc radix suâ sponte in India aliisque regionibus Orientalibus: species etiam ejus una ex Molcovia transfertur, sed propter iniguem amaritatem vix adhibetur.

Non habet particulas adeo acres ac Rhabarbarum, ideoque non tam valde purgat, sed etiam magis adstringit, utpote plures particulas terrestres in se continens: Ex sapore tamen subacri colligimus vires habere aliquo modo calefacientes, incidentes, attenuantes, laxantes: Ex sapore lento, esse vulnerarium & anodynum. In affectibus dysentericis præferunt hanc radicem nostrates Medici rhabarbaro. Usurpatur in obstructionibus hepatis & lienis, ac in obstructione vasorum mesenterii. Dos. in substantia ad ʒij. in infuso ad ʒiʒ. sed sæpius in decoctis præscribitur vulnerariis.

Præparata officinalia sunt ex rhabarbaro non rhapontico confecta, destillatione parum præbent: Spiritus vini ope removeri potest omnis vis purgans ut in rhabarbaro; residuum in fundo eo magis habebit vim adstrictoriam. Hermannus in Materia Medica manuscripta,

RHAPONTICUM VULGARE, vid. Centaurium majus.

RHEUM, vid. Rhabarbarum.

RHINOCEROS.

Rhinoceros magnitudine Elephantis æmula, cruribus tamen brevioribus, ut minus conspicuum sit Animal; uno in nate cornu, ab aliis omnibus Quadrupedibus abundè distinguitur.

Bontio describente, Cutis è nigro est cinericea instar Elephantinæ, rugosa admodum, cum profundis plicis: toris circa latera ac in dorso; crassa admodum, pelle: rostro Porcino sed acutiore, in cujus extremitate cornu illud, unde nomen sortita est bellua, modò nigrum, modò cinericeum, modò album.

Cornu solidum absque ulla intus cavitate, ulnam i. e. tres pedes nostræ mensuræ, longum, diametro ad basin semipedali, aliquantulum recurvum; Oculi non procul ab extremo rostro, parvi Porcinatorum instar. Auriculæ porcinae, molli & tenui cute vestitæ; reliquum corpus durâ admodum & crassâ, velut squamis quibuldam crustaceis rotundis asperâ. Pili nigri, breves, tenues, rari, ut squamas quas diximus multitudine vix excedant, & quarum etiam centris plerumque exoriantur. Integræ descriptionem vide apud D. Grevi in Musæo Soc. Reg.

An ruminet, nec ne ambigitur. Mihi sanè verissimilius videtur quod non ruminet. Quamvis enim ungulæ sit bifida, aut potius quadrifida & cornigera; Cornu tamen sit, soliditate & duratione simul sumptis à reliquis omnibus cornigeris, tam quæ cornibus sunt perpetuis, quam quæ deciduis differt. Nec refert quod carnivororum non sit, sed gramine aliisque herbis & frugibus vescatur: Nam & equus qui non ruminat eodem victu utitur. Magnus ille qui ann. 1684. & 1685. in Angliâ spectandus circumferebatur, feno, raparum summitatibus & frumento (cujus modicum & semissem mensuræ nostræ unâ die vorabat) pascebat. Custodes interrogati negarunt se ruminantem unquam conspexisse. Præterea cum non tantum capite & rostro, & voce potum referat; sed & in cæno, autore Bontio, se pariter voluerit, quidni & hæc non ruminandi proprietate cum porco conveniat?

Invenitur in Africa desertis & Abassia, inque regno Bengalæ & Patane Asia.

Quamvis statura & fortè etiam magnitudine Elephantis

phantum cedat viribus tamen nihilo inferior est. Siquidem Romæ in Amphitheatro spectaculo exhibitus, Taurum animal satis grande & ponderosum veluti pilam quandam in sublime jactabat: hæc enim comparatione Martialis Poeta utitur. *Raius in Synopsi Anim. Quadrip.*

RHODIA RADIX.

Nomina. Rhodia radix I. B. C. B. Ger. *Park.*

J. B. Tuberosa radice nritur, quam ob rosarum con- simili odore saporeq; Rhodiam appellant, foris in fusco splendente, intus alba, fragili, roseum odorem halante, gustu rosæ simili, non ignaviter adstringente. Virgæ ab una radice plures oriuntur, tenues, numerofo foliorum agmine dense stipati, substantiâ & positu Telephii vulgo dicti, angustorum oblongorum, acuminatorum, & cit- cumquaque ferratorum, colore glauco excepto mucro- ne purpurascens, sapore adstringente, flores in umbella purpurascens, quibus succedunt siliquæ oblongæ, extra reflexæ, corniculorum, Aquilegiæ aut Aconiti instar, ru- bentes in quibus semen minimum oblongum & palea- ceum.

In excelsis montibus Cambriæ, Eboracensis Com. Westmorlandiæ &c. v.g. Spovvdon, Caderidris, Inle- borough, Hardknot, &c. ex ipsis rupium fissuris, præ- ruptisque in locis exit.

Vires. Modernis practiciis vix in usu est, nisi quod in- terdum ad renum, calculos decoctis incoquatur.

Nos cum J. Bauhino judicamus eam non procul ab- esse à rosæ aut crassulæ temperamento, qua cum facie externa adeo convenit, ut nulla ratio sit cur diverso no- mine insigniatur. *Raius.*

RHODIUM LIGNUM, vid. *Lignum rhodium.*

RHODODAPHNE, vid. *Oleander.*

RHODOMEL, vid. *Mel rosatum.*

RHODOSACCHARUM, vid. *Saccharum rosatum.*

RHUS OBSONIORUM, vid. *Sumach.*

RIBES.

Nomina. I. Ribes vulgaris fructu Rubro Ger. vulga- ris acidus ruber I. B. fructu rubro, *Park.* grossularia mul- tiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive ribes officinarum C. B.

Multis stolonibus, parum crassis, bicubitalibus & tri- cubitalibus aut etiam altioribus exurgit cortice spadiceo aut cinereo, materia infirma virente, cum ampla matri- ce seu medulla. Folia uvæ crispæ foliis similia, sed multo labiora, sinuata, mollia, superne virentia, glabra, inferne molli lanugine canescentia, sapore subastringente, acido & nonnihil acerbo. Flores racematim cohererent pluri- mi, ex pediculo tenui, unciali & sesquiunciali aciduli, quinque foliis pallide virentibus, oris extorsum reflexis constantes (rectius unico folio in quinque lacinias pro- funde diviso, nudi, h. e. nullo calyce excepti) staminulis sex sessilibus, exiguis umbilicum medium, qui colore obsoleto est, & stylo virenti minuto bifido lacunam aperit, ambientibus succedunt fructus parvi rotundi, grossulariis minores, initio virentes, per maturitatem rubri succo acidulo grato turgidi, pluribus seminulis foeti, florem in vertice gestantes.

Passim in hortis colitur, Aprili mense aut serius pro Veris constitutione florens, Julio semen maturans: ubi sponte provenit nondum didicimus: humidis tamen delectari videtur.

Ribes Arabum esse non potest; siquidem neque ca- preolos profert, neque folia obtinet rotunda, quæ Sera- pio Ribis notas facit. Veteribus Græcis incognita & indicta videtur.

Vires. Hujus fructus omnium consensu utiliter exhi- bentur iis qui ardentibus febribus laborant, neque non his qui calidas alvi fluxiones patiuntur autore Trago. Namque hi acini, sicut & serapia, & eclogmata, atque Rob (ut vocant) de Ribes (h. e. succus inspissatus ad mellis consistentiam, vel scorsim, vel cum saccharo) si- tum immensam restinguunt, vomitiones sistunt, cibi ap-

petentiam invitant, choleram morbum reprimunt, dy- sentericis ex causa calida profunt. Quidam saccharo ha- baccas condiunt sicut & cerasa; baccas etiam in Sole siccant & asservant ad easdem affectiones. Reliquæ cum oxyacantha easdem vires obtinent.

Ribes grata sua aciditate ardores febriles restinguunt, bilem temperat, & sitim sedat. Adstrictoria vi ad chole- ram morbum aliasque biliosas alvi fluxiones, ad hæmorrhoides, uvulæ tumorem, &c. usui esse potest.

Matronæ nostrates Ribium baccas in ollam inditæ in balneo mariæ (ut vocant) coquunt, donec succus copiose exeat. Succum cum sacchari q. l. decoquunt ad gelatinæ consistentiam: (gelatinam ribium vocant) & pro dulciario ad mensas secundas instituendas refer- vant. Est ea palato gratissima & ad omnes usus supra- dictos commodissima.

Ex iisdem cum saccharo vinum parant, eadem me- thodo qua vinum ex uvis crispis, post fermentationem & ætatem debitam, generosum satis, & palato, nec mi- nus ventriculo gratum: folia vehementer astringere te- stis est Fuchsius.

Nomina. 2. Ribes vulgaris acidus albas baccas ferens I. B. vulg. fructu albo Ger. fructu albo *Park.* grossularia hortensis fructu Margaritæ simili C. B.

Baccis albis, pellucidis; Margaritas panè referentibus sapore vinolo jucundiore, stolonibus (Parkinson) elatioribus, rectioribus, crassioribus, à præcedente dif- fert. Ego pro præcedentis potius varietate quam spe- cie distincta habeo. *Raius.*

RICINUS PLANTA.

Ricinus. Dioscoridi, *κλιν* & *Κεράν* à similitudine Cro- tonis vel Ricini animalis, quod semen ejus refert, dicunt. *Klin* autem vox est Hebræa vel Orientalis, quæ legitur in Prophetia Jonæ, cujus significatio incerta.

Ricini notæ genericæ sunt caudex lignosus, fructus tricocchi muricati, in surculo peculiari racematim sepe dispositi: semen Ricino animalculo simile.

Nomina. I. Ricinus vulgaris I. B. C. B. Ric. sive Cataputia major vulgaris *Park.* Ricinus sive palma Christi, vel Kiki Ger. palma Christi.

J. B. Insigni auctu celeriter adolescit, caule crasso, striato, glauco geniculato, inani, trium, quatuor & plu- rimum cubitorum, superius ramoso, ex obscura purpura nitente & glabro; candido videlicet deterso tenui inla- farinæ pulvere, quo veluti conspersus subinde apparet. Folia ampla, Cordo, Platano & Aceri similia, digitata, in septem, octo aut novem acuminata, serrataq; segmenta, in quorum singula nervus è folii centro exporrigitur, dividuntur, atro virentia, splendida, & interdum acetabuli instar concava, potissimum loco quo segmentorum nervi coeunt, unde & pediculus averso folio oritur do- drantalibus, purpurascens, concavus: quanto autem supe- riora fuerint, folia tanto ampliora existunt, sic ut ex his petalum æquantia sit reperire, nullum è vulnere la- manantia. Flores longâ serie tyrsoides surculo peculiari racemati insident, è sanguineis, crispisque staminibus, quæ terna è fructus rudimento emicant, conflati: quibus muricata triquetra vascula succedunt, quæ semina clau- dunt oblonga, Ricini animalculi æmula Dod. foris li- vida & maculosa, interiore medulla candida, quæ ca- pitulis per maturitatem fissis ac rimas agentibus, cum impetu exiliunt. Ac præter flores dictos videre est in eor- dem thyrsos muscosa glomerata nucamenta coloris her- bacei, quæ nullo relicto fructu tandem marcescunt. Ra- dix subest simplex, longa, crassa, dura, candida, crebris circumcirca fibras emittens.

Seritur apud Germanos & Gallos (inquit J. B.) non modo ad spectaculum sed etiam tutelam adversus talpa- rum injuriam, quas ferunt ricinum fugere. Annua verò in Germania stirps est, atque etiam in Anglia. Verum in Creta multos perdurat annos, & in tantam excrevit al- titudinem ut non nisi scalis admodum possit conscendi, quod

quod Bellonius tradit observ. lib. 1. c. 18.

Clusius quoque Ricinos crassitudine humana, altitudine trium hominum, multis prægrandibus ramis brachiatis, & multos annos durantes in maritimis Baticæ observavit, easque exactissime congruentes descriptioni Dioscoridis. Nos quoque in Sicilia Ricinum arbutulam sambuci æmulam, lignosam & satis longævam, in sepibus frequentem observavimus.

Nomina 2. Ricinus Americanus *Ger. Park.* Americus, Curcas incolis, Clus. Not. in Monard. Ric. Americanus major semine nigro C. B. Ric. major. American. Curcas dictus & Faba purgatrix Indiæ occidentis I. B. Munduy guacu Brasiliensib. Marggrav. & Pisonis. Pinhones Lusitanis, Ricinus Americanus folio staphisagtiæ C. B. app.

Marggr. Arbor est in ficus magnitudinem & figuram exerecens, ligno molli & fragili. Folia habet circa ramos inordinate posita, quodlibet suo pediculo semperdem longo insistentis: suntque viridia, ad tactum mollia, foliis ficus aliquo modo similia, sed non ita profunde secta, verum subrotunda, & antierius in tres angulos desinentia, (C. Bauhino folia pallide virentia, pediculis oblongis & hirsuti asperis donata, inferiora ad foliorum ficus formam nonnihil accedentia, & in lacinias quinque divisa, superiora verò quæ staphidis agriæ foliis similiora, in ternas lacinias secta sunt, omnia verò per circumferentiam crenis acutis exasperantur, & nonnihil pubescent, ita ut tactu mollia sint): lignum & folia fundunt è lacteo aquosum succum. Flosculos fert copiosos rædematim, parvos, pentapetalos, petalis antierius viridibus, deorsum incurvatis, in medio flavis staminulis, quæ decangularem stellam referunt, subdulcis odoris. Sequitur hos fructus turbinatæ figuræ, seu instar juglandis medioctis, & ejusdem magnitudinis, primo viridis mox flavus, ubi plene maturuit fuscus sive niger qui sponte finditur in tres partes: quamvis sex constare videatur. In quolibet fructu sunt tres nuclei, magnitudine & figurâ pineis similes, in tribus concamerationibus distincti, cortice nigro corticis castaneæ crassitie recti, & in extremitate sunt maculæ albæ (harum alii non meminerunt) nucleis albus, instar cuticulæ ovi exterius etiam pellicula alba obductus.

Validè purgant tres aut quatuor nuclei comesti, & quidem nimis si pellicula interior non superetur, ideo semper adimenda.

Arbor facile transplantatur nam ramus decisus, & terræ infixus aliam arborem progenerat, ideo ad sepes vivas faciendas circum hortos usurpatur.

Arborem hanc pro Ricino Americo Clusii Curcas dicto habet Piso & rectè quamvis in descriptione fructus non meminit operimentum illius tuberculis asperis non esse oblitum, ut in vulgari Ricino, sed læve & cinerei coloris. Huic etiam eandem omnino plantam esse minime dubito quam C. Bauhinus in appendice ad pinacem sub titulo Ricini Americani folio staphisagtiæ describit, cujus ramum duntaxat siccum vidit. Ideoque eandem plantam bis ponit, pro duabus distinctis.

Hæc arbor videtur esse quæ Quahayohuatli 3. nomine Fr. Hernandez describit, quamvis icon non conveniat.

Ex his quæ de nucleis hisce tradunt auctores liquido constat (inquit Joan de Laet) cum summa cautione exhibendum esse hoc medicamentum purgans, & summam esse habendam rationem ætatis & virium illorum quibus datur. *Raius.*

RICINUS ANIMAL.

Ricinus *κυνόραυ* forte quia Ricini planæ semina æmittantur, licet aliis videatur, potius Ricinum fruticem, vulgo palmam Christi, ab hoc animalculo nomen sortiri, cujus grana illis similia sunt, Aristor. *κυνόραυς* (quod canes mordendo lancinant) Cæsar Scaliger, Lancinista. Animalculum est lividum, & sædum, bobus, suibus, capris, viverris, canibus insensissimum, æstivo tempore aculeo totoque capite infixio adhæret, nec prius decedit,

quam sanguine saturatus. Oritur ex animæ excrementis, non è suo genere. Nam ubi ricinus sanguine satur est, quod exitum non habeat, tumpendo moritur, & nihil procreat; venatoribus observatum est, quod canes cum domo egrederentur, prorsus ricinis carerent; redeuntes vero ex agris, ubi frequentior, spissior & altior filix erat, iis infecti essent. *Charleton.*

RISAGALLUM, vid. *Auripigmentum.*

R O B.

Videnda verò sunt etiam aliâ facie succi, inspissati scilicet & variis formis tum pro gulâ, tum usu medico formati. Sed quis omnes illecebras illas enumerare possit? Satis sit, minus officinis usitatos, vel verbo tangere. Hinc not. de Rob:

1. *Rob sunt succi fructuum pulposi, spissi, seu pulvisformes.* Rob ad instar aliarum vocum plurimum ex Arabicâ scholâ in medicinam illatum est. Cum verò non solum ex Lexicis scriptorum, sæpe ignotorum artis, sed ex genio linguæ & rei substratæ consideratione de nominibus talibus judicandum sit, Rob vocant Arabes latius succos fructuum densatos, seu inspissatos, quod Latini strictius paulò de succo uvarum sic præparato efferunt, sapam dicendo, seu destutum & calcæum, mustum ad tertias coctum. Mirandum non est, ab Arabibus medicos retinuisse nomina, tanquam inventoribus seu excultoribus, cum plura talia etiam in aliis linguis supersint, v.g. *magazin*, i.e. armamentarium &c. Germani commodè id vocant *Muesz*, à consistentiâ. Utut verò succi etiam alii inspissentur coctione pro usu officinarum, per dicta; illi tamen rob non audiunt, sed vel succi nomen retinent, imprimis qui denantur, ad solidam usque formam, uti v.g. succus glycyrrhizæ apud nos in pastillos cogitur, vel glutinis instar purior paratur, succus item acaciæ, succus viridis &c. solidâ formâ veniunt. Reliqui etiam succi inspissati herbarum, ut absinthii, fumar. agrimon. scordii, verben. &c. extractiformia quasi idem nomen retinent, ad electuaria & pilulas impendendi. Quæ verò magis succulenta sunt, ut fructus arborum & plantarum, quæ pulpam habent in recessu, illa propriè præbent, rob, succos spissos, pulposos. Sic elaterium rob æmulatur & dici commodè potest, ex cucumeris asinini fructu & succo paratû. Sic rob cynosbati & alkekengi nephritica sunt. Fructus enim hoc faciunt vel succulenti per se, exemplo laudatorum, vel in recessu, tales, ut baccæ juniperi.

2. *Rob coctione, expressione & inspissatione sunt, cum vel sine additamentis.* Nouissima vulgò hæc sunt, illam verò rationem *εγχεσθρεος* habent (1) quod menstrua aqueæ sulphuri reolubili, pulposo, mucilagineo debeantur, quatenus partes etiam balsamicæ mediantibus tectis & coctione, igni auscultant, exemplo baccarum juniperis (2) quod pulposa fixiora sint, & virtutem coquendo non solum non amittant, sed & concentratam acquirant. Hinc coctio colligit & unit aquæ partes substantificas roscidas; coctio densat, partes aqueas abigendo, factâ interim probè agitatione, ne empyreuma contrahat, vel inæqualiter spissetur. Expressio separat acinos, partesque grotiores alias non minus ac succulentas ipsas. Quæ ergo succum, non habent secum, sufficienti quantitate affusione aquæ pulpam dimitunt. Adduntur verò vel aromata, vel purgantia quoque, ut in diacydon. laxativo. Vinum verò cum coctione vires amittat, rectè omittitur, ejusque in locum mustum recipitur.

3. *Rob & affinia, miva ac gelatina, sacchari vel mellis additione gratiam, usum & consistentiam diversam sortiuntur.* Sacchari additione rob modò ad syrups accedunt, exemplo rob mucum ex succo corticum nucum immaturarum, diamoron &c. modò gelatinas & panes præstant. Miva prædicatur ferè solum de cydoniis, simplex & composita. Miva iudem succum notat ad mellis crassiusculi consistentiam coctum. Cumque gelatinosum tale quid quædam pulpæ præseferant, & magis *γλυκερ*, ut ribelia, mora, ex succis

hiſce puris & claris, cum ſaccharo coctis & inſpiſſatis conſurgit miva, vel gelatina, quas in ſcatulas ligneas, vel thecas etiam ſtanneas adhuc calidas effundunt, ut frigore congelſcant æqualiter. Tacemus latere in quibudam aliis quoq; talem gelatinam, qualem in deſtillatione ſpiritus ſambuci citrati ex cucurbitâ vitreâ obſervavimus elegantiffimam. Hinc miva utrumq; notat, ſuccum, ut diximus, denſatum, ſitupiformem, & inprimis gelatinam. Ex quo obiter etiam inferre licet, quid de præparato cum ſucco cydoniorum opio, aliſque ſit ſentiendum. Reverâ fermentatione illâ ſua inſigniter recludit centra opii & extrahit, unde fermentum opii, ſi dicimus; attamen ſuccus ipſe in ſe ſpiſſior eſt, & gelatinâſcit facilè. Unde plurimum debetur ipſi huic gelatinæ, ita ut eſſentia anodyna laudatiſſima ſit, hoc modo parata, extracta hinc cum ſpiritu vini, aſt extractum opii ſive laudanum retinet illam *γλῡξῆς τιμή*, ut reſpectu cum aquâ ſimplici parati, ſolâ coctione, nec pilulas tam facilè formati, minus verò cum pulveribus miſceri, ut conſultum eſt in praxi, poſſit. Uti verò factâ colaturâ ex ſucco cydoniorum & ſaccharo ſit miva; & gelatina cydoniorum; ſic quando citrâ colaturam partis tenuioris, tam clarum ſive tenue illud quàm craſſum ſubſtantiſcum cernitur ſimul, & cum ſaccharo percoquitur, ad juſtam ſpiſſitudinem, & hinc exiccatur, preloque ſubjicitur, ſit cydoniatum ſive panis cydoniatus, *Quintenbrodt*, gratiam etiam ab additis caryophyllis acquirens, alimentum medicamentolum egregium.

4. Rob & ſucci inſpiſſati medici vires temperatas obtinent proprias & adſcivitas, eſſentia diſſuſis, bolis, electuariis & pilulis infervientes. Tacemus alimentoſas vires ſeu nutritibiles, quas obtinent plurimas. Sulphur enim alibile temperatum plurimum habet *γλῡξῆς*, plurimum nutrit. Pro medico uſu parata rob & ſucci inſpiſſati alii vires temperatas vel ideò obtinent, quod partibus volatilibus per coctionem abigi ſolitis careant, quod viſcedini ſulphuris inſcitæ ſint ſalinæ, uti videmus alias in opio v. g. deſtillato ſalis volatilis plurimum emergere, ut gelatinam cornu cervi non laudemus. Hinc commodè adhibentur & per ſe & cum aliis, pro variis uſibus ſpecificis. Rob ſambuci ſudoriferum eſt euporiſton, ſerum fluatile & halituoſum reddens, & ſpecificum in eryſipelate ſummi uſus. Rob ebulli in hydrope expetitur, cum bezoardico oli. Rob cornorum & myrtilorum roborat & adſtringit; rob diamoron, dianucum anginoſis faucibus medentur; ribium & berberum refrigerant, modò alvi fluor nò obſtet, quod etiam de aliis valet. Rob enim ob lubricandi vim præſente fermentatione humorum minus proſunt. Hinc etiam purgantes pulveres cum rob ſambuci aliſque commodè ſumuntur, felici ſic conſequentè effectū. Rob cynoſbati nephriticum eſt, & temperans ardorem renum. Sic & diacydonium laxativum, ſeu gelatina cydoniorum laxativa lucida in officinis uſitata eſt, pro delicatioribus. Præbent etiam eſſentias, exemplo malvatici juniperini, ſambucini & aliorum. Sic rob alkekengi & per ſe prodeſt in calculo iſchuriâ & aliis ſimilibus, & cum ſpiritu nephritico in eſſentiam reductum. Sic pulpa caſſiæ, tamarindorum rob eſt, ad bolos formandos aptiſſima. Sic in electuariis & rob & ſucci inſpiſſati inſumuntur, ut & in pilulis ipſis, ſed minus diſſuſa. Ut uſum externum deſenſivum refrigerantem aliſque non laudemus.

Rob itaque ſunt ſucci fructuum pulpoſi, cocti, expreſſi, purgati & inſpiſſati ad juſtam conſiſtentiam, pro uſu alimentoſo & medicamentolo vario. *Wedelius.*

Rob varie præparationes ex variis.

Rob de Agreſta è *Pharm. Auguſt.*

℞. *Omphacii, ſeu Agreſta depurata ℥ ij. ſacchari optimi ℥ j. coque ad ſpiſſitudinem mellis.*

Reſtigerat & adſtringit, unde fluxus malignos ac colliquantes coërcet, ſitum ſedat, bilioſoſque ructus com-

peſcit, & contagioſis morbis opitulatur.

Rob hocce cum ſyrupo de agreſta magnam equidem habet adſiniratem, majori tamen ſucci quantitate & craſſitie ab eodem differens, ut ita facilè unum alterius uſum explere valeat; quia tamen utrumque expeti à quibudâ ſolet, neutrum delere volumus.

Rob de Berberibus, ex eadē *Pharmac.*

℞. *Succi Berberum depurati, quantum volueris, coquantur per ſe ad ſpiſſitudinem mellis.*

Valenter reſtigerat, ac præter adſtictionem nonnihil incidentis facultatis habet, bilem ventriculo inſtam reſtigit, inde enata ventris profluvia ſtitit, & ſtim inexpleram ſedat: & febribus ob id bilioſis, actertianis opportundum.

Rob de Berberibus, quod compoſitum olim dicebatur, ad differentiam hujus, ſimplicis nomine inſigniti, cum ſyrupo idem eſt, niſi quod Rob ſacchari tantum ℥ j. recipere conſueverit.

Rob Ceraſorum ſimplex, ex *Pharm. Auguſt.*

Paratur eodem modo, quo Rob de Berberibus ſimplex, Fervores internos extinguit, ſitum ſedat, cor roborat, ejuſdemque calores præternaturales temperat.

Ceraſorum Purgans *Zwelferi.*

℞. *Rob ceraſorum cum ſ. q. ſacchari parati ℥ j. cui adhuc calenti adde magiſt. gialapp. vel ſcamm. 3 vj. ſolati in ſpir. vini rectiſicatiſſimi ℥ ij. vel tribus.*

Et factâ adhuc vix unicâ ebullitione pro ſpiritu vini ſaltem exhalatione, qui protinus leni calore aëra petit, fiat electuarium ſive Rob. quod nulla aromatizari indiget. Cum ceraſa per ſe grati ſunt ſaporis, ſi nuclei eorum ante expreſſionem ſucci probè fuerint conquaſſati cum proprio itaque ſapore grato contenti, libotes ideò, aliaque impenſa ulteriora ad alios reſervare volumus uſus.

Nota. Eandem ob rationem ſaporis nimirum gratitudinem, in præparatione præcedentis Rob ribium purgantis, ceraſorum Rob ſimplex illo Ribium ſurgari commodè poteſt. Quod autem reſinam quam in antea dicta Rob ribium compoſitione Mechoacarna, Gialappa, Turbith, copioſe præbent extrahendo illa cum ſpiritu vini à reliquo extracto ſeparare, exiccate, atque in pulverem redigere, ac tandem amygdalis dulcibus ſubigere juſſetim, ideò factum eſt, quia amygd. utpote oleaginoſæ omnes reſinas cum illis ſubactas qualiſſolvant, earumque acrimoniam contemperent, ut eò facilius poſtea in liquoribus aquoſis diſſui poſſint, ne denuò, prout alias ſolent, in ſuam reſinoſam ſubſtantiâ redeant, ac intra corpus ſumptæ vel parum aut nihil operentur. Verum (quod peſſimum) ventriculo ipſis quoque inteſtiniſ tenacitate ſua reſinoſa præſertim ſi parum frigida ſuperbibantur, præcipitatæ adhæreant, atque inde tormina, paſſiones colicas, ipſam etiam diarrhæam, imò lethalem quandoque hypercatariſm cauſent atque inducant. Etenim nullam hucusque ſide digniorem cauſam invenire potui, quæ ſimiles immoderatos alvi fluxus Tormina atque lethales hypercatariſes aliaque incommoda poſt ſumpta purgantia, ſi frigida præcipue ſuperbibantur, induxerit, quàm ſcammoneata iſta medicamenta, vel reſinas ſimiles, ſive ſcammoneæ, ſive galappæ turbith, aut alterius purgantis ſint, cum, prout ſæpe dictum, ſi non legitime & dextre diſſolutæ & veluti unctuoſitate amygdalarum contemperatæ ſint, intra corpus ſumptæ, facile contingere poſſit ut ſi frigida & aquoſa ſuperbibantur, intra ventriculum & inteſtina veluti coagulentur, & præcipitentur, illiſque tenacitate ſua reſinoſa poſt adhærentes acrimoniaque ac venenata qualitate ſua, ea lancinantes, totum nervoſum genus in conſenſum trahere, ac intincta mala inducere valeant. Non enim memini unquam, ab alio quàm ſcammonea

moneato, aut simili resinoso medicamento si frigida aqua superbibita fuerit similes immoderato fluxus fuisse excitatos; sint igitur hæc experimenta de medicamentis resinosis purgantibus pro cautela in posterum, quæ lubenti animo Lectori benevolo communicare volui.

Rob de Cornis, è Pharm. August.

℞. Pulpa cornorum ℥ij. sacchari ℥j. coquantur ad debitam consistentiam.

Potenter adstringit; unde in fluxibus ventris, dysenteria lenteria, & cæliaca utiliter exhibetur.

Rob Cydoniorum ex eadem Pharm.

℞. Succus cydoniorum depuratus quantumlibet. Coque ad mellis spissitudinem.

Ejus multiplex usus solet in diarrhæa biliosa dysenteria, ac alvi profluvio à calidis & acerbis humoribus concitatis vomitiones & stomachi subversiones emendat: cholera morbo medetur, intestinorum hæmorrhagiam cohibet, venenatis morbis adversatur, & sudores potissimum tamen in adultis ac ætate proventus, promovet.

Rob. Cynosbati ex Pharm. August.

Fit, ut Rob de cornis, ex fructu cynosbati, vel rosarum sylvestrium, qui post florum de fluxum circa finem Autumni, vel medio Autumno, pulcherrimo rubore maturefcunt.

Usurpantur ad renum calculos atterendos, & arenulis eorundem expurgandas, hæmorrhagias etiam uteri, renum, ac vesicæ cohibendas: dysentericis quoque auxilio est.

Rob Ebulinum, ex Pharm. August.

℞. Succus granorum ebuli ℥j. inspissetur lento igne addita libra semis sacchari.

Bilem, pituitam, & serum detrahit, sudores movet, ac ob prædicta hydropicos adjuvat: leucophlegmatia, & podagra procurato ab ejus sumptione sudore, medetur.

Rob Glycyrrhizæ simplex ex Pharm. London.

℞. Radicum glycyrrhizæ optima q. v. mundatas, leviterque confusas toto triduo in aqua fontana macera; ea scilicet copia ut tres circiter digitos supereminet, tum demum fervefiat parum & exprimendo colentur, quodque expressum est, mitiori igne, in debitam succi formam condensetur.

Rob Glycyrrhizæ compositus ex eadem Pharm.

℞. Glycyrrhizæ mundatæ & confusæ libram; decocti violarum scabiosæ, passulorum, ℥iv. infunde triduum, dein bulliant ad dimidias. Colatura iterum ebulliat in B. M. ad consistentiam syrupi; cui addantur sacchari crystallini ℥vj. gummi tragacanthæ ℥ij. olei anisi chym. guttula aliquot: & semota ab igne agitentur aliquantisper, ut probe commisceantur.

Rob Juniperinum è Pharm. August.

Eodem modo quo priora parari consuevit. Frigidis ventriculi, uteri ac intestinorum malis magnopere prodest; urinas, menses, calculos ejicit; renes & vesicam à mucositate repurgat, flatu ventris discutit, peccus à crasso & tenacius infarcto phlegmate expurgat, venena pellit; ob id plebi adversus aeris infectionem, & contagiosos antidotus familiaris existit.

Rob Mororum, vid. Diamoron.

Rob Nucum, vid. Dianucum

Rob prunorum acidorum, è Pharm. London.

℞. Prunorum Sylvestrium vixdum maturorum q. v. exprimatur succus, & in balneo s. a. inspissetur.

Sic potius fiunt succi inspissati ex absinthio, Eupatorio, Fumaria &c. confusis, sc. & expressis herbis etiam num tenellis. Quorum succus ad ebullitionem usque fervere censendus est in B. M. & post colaturam, ibidem in justam spissitudinem paulatim evaporare.

Rob Ribium, ex Pharm. August.

Paratur ex succo ad spissitudinem mellis inspissato. Ad refrigerandum, adstringendum, & ventriculum, cæteraque viscera febris intemperie dissoluta re-

creanda, & confirmanda, proficuum est ebrietati resistit, sitim retinguit, tum eam quæ ex ventriculo calefacto, tum quæ ex cordis omniumque partium intemperie sicca & calida orta est, calorem febrilem mitigat; ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimat, felleas alvi excretiones sistit, cholera medetur, hæmorrhagiam curat, cardiacis succurrit, in pestilente constitutione efficax.

Rob hoc simplicis cognomine olim notabatur compositum verò est quod cum saccharo, ut rob de berberibus paratur.

Rob Ribium purgans Zuvelseri.

℞. Rad. gialapp, mechoacanna an. ℥vj. turbit. gummi ℥iv. asari ℥ij. sol. sena elect. ℥vj.

Ex omnibus incisus atque confusus extrahatur cum s. q. spirit. vini rectificati repetitis vicibus affusi, omnis tinctura & efficacia, quousque spirit. vini tingatur; colaturæ aut depletiones omnes in M. B. ad libras duas circiter abstrahantur, (qui spiritus abstractus ad alios similes usus asservandus est) residuo vero liquori in alembico seu extracto liquido resina innabit, quæ studiose separanda & in scutella vitrea leni calore exsiccanda ut in pulverem redigi possit. Extractum verò residuum liquidum adhuc extracti spissitudinem leniter in diplomate evaporet.

Quod extractum inspissatum (ut cò melius Rob ribium post addendo uniti possit) cum particula anisi spiritus diluatur & per colatorium lineum cogatur, ac Rob ribium cum s. q. sacch. ad durabilem consistentiam parati ℥ij. in leni calore unjatur, quibus bene unitis jungatur etiam resina supra dicta exsiccata & in pulverem redacta prius cum amygd. dulc. excort. ℥j. vel ℥iβ. probe subacta, item addantur eleosacch. anisi, vel cinamomi ℥j. vel ℥iβ.

Fiat electuarium justæ consistentiæ.

Egregium atque præstans hoc electuarium catharticum est, quod non solum omnes humores superfluos pituitosos, melancholicos & putridos educit; verum & febribus compositis & chronicis conducibile. Dosis ℥ij. ad ℥β.

Rob Sambucinum ex Pharm. August.

Fit ut Ebulinum.

Ebulino viribus affine est; etenim ictericos & hydropicos juvat, sudoresque potenter prolicit, ac serum acre, necnon biliosi ichoris abundantiam, & erysipes lata ejicit.

Rob Vetonice ex Pharm. August.

℞. Succus veronica ℥ij. sacchari ℥j. Fiat rob.

Utiliter peripneumoniacis ac phthisicis lingendum porrigitur, urinarios meatus repurgat, renumque calculos atterit, sanguinem mundificat, sudores prolicit, & malignis pestilentibusque febribus adversatur; datur sanguinem screantibus & ab alto lapsis, qui valis alijus interni rupturam passi sunt.

Rob Uvarum Sapa dictum ex Pharm. Norimberg.

℞. Uvarum recenter decerptarum & expressarum q. v. coquantur ad convenientem consistentiam.

ROBERTI HERBA, vid. Geranium.

ROBUR, vid. Quercus.

ROCOU, vid. Urucu.

ROR ELLA

Folia è radice fibrosa tenui plura exserit, pediculis longis supernè hirsutis nixa, circumata ferè rotunditatis, auriscalpii figurâ, modice concava, pallide viridia, tenuium, rubescentiumque staminum velut cilio circumquaque sibiata; aspergine torrida guttularum, etiam per ferventissimos ætus pilis adhærescentium madida. Ejusmodi stamina sed breviora medium quoque folii partem supinam obsident: prona namque superficies omnino glabra est & pilis destituta. E medio foliorum exurgunt caules duo aut tres teretes, graciles, rubentes, foliis nudi palmares aut semipalmarij

mipedales flores sustinentes longa serie, versus unam partem spectantes, brevibus pediculis fultos, candidulos, è calice oblongo in quinque segmenta divisio exeuntes. Floribus succedunt valcula seminalia oblonga figurâ & magnitudine fere granorum tritici, seminibus repleta.

Ros pilis seu setis adhærescens tenax est & viscidus, inque filamenta ductilis digitorum actu.

Floret mense Julio & in humidis palustribus oritur, non raro inter muscos aquaticos. *Rains.*

R O S A.

Rosa à Græco ῥόδον fit, δ. in σ. mutato, ῥόδον autem. si Etymologum audimus, nomen habet ab ῥίζω, quasi ῥόδον, & κατὰ πρῶτον ῥόδον. Ita autem dici καὶ ἀντιφρασίῃ, quia ῥοσμον, quasi ῥίζω non dicatur etiam de bono ac grato odore. Plutarchus melius, lib. 2. Σύντομος, cap. ult. ubi scribit ita vocari, quia ῥοσμον πολλὴ τῆς ὑδωδὸς αἰφύνησι. Censet ergo Plutarchus fieri à ῥέω & ὀδμῇ quia fuit ab ea odor gratus. Vossius putat integrum esse Ῥόδον, quomodo Æoles pro ῥόδον dicunt. Ῥόδον vero dici censet καὶ μετέθεσιν pro Ῥόρον seu Βόρον, idque à Chaldaico ܪܪܝ hoc est *Rosa*. Voss. Etymolog.

Rosam omnem initio candidam fuisse fabulantur Poetæ & Turcæ, illi ex sanguine Dei alicujus, seu Veneris seu Cupidinis, tinctam, erubuisse; hi ex sudore Mahometis rubedinem contraxisse sibi persuadent, ac propterea ejus folia humi jacere non patientur.

Ceterum rosa, ob tum venustatem tum amplitudinem floris, tum ob ejusdem fragrantiam, omnibus seculis, omnibus terris summo in honore & pretio habita est, omnibusque floribus & odoribus prælata.

Rosam pomiferis accensuimus; quoniam fructus in nonnullis pomi magnitudinem assequitur, in omnibus figura potius ad pomum accedit, quam ad Baccam.

Rosam in genere sic describit J. Bauhinus, est (inquit) frutex infirmus Cæs. & cito senescens nisi recidatur, ut cum suffruticibus ambigere videatur, ramis aut potius virgis duris, lignosis, & uplarimum hispidis mordacibusque aculeis horrentibus, non rectis sed modice recurvis, frequentibus, foliis subrotundis, asperis per ambitum serratis, quinque & septem ex uno nervo sive pediculo coherentibus, sibi invicem apposis, supremo singulari floribus primum herbaceo inclusis calyce, qui tumescentes in viides alabastris fastigiantur, quibus dehiscensibus flores panduntur (vel simplices, vel multiplices) in calycis sui medio stamina quædam capillacea luteis apicibus donata complexi: semine in oblongis capitulis, quæ calycibus & floribus subsunt, per maturitatem rubentibus, & in quibusdam nigricantibus, duro lanugine involuto: radicibus duris lignosis in diversa tendentibus, stolones crebros emittentibus.

Porro rosæ partes Medici numerant octo. 1. Capitulum illud solidum, lanugine quadam refertum, floribus substratum, seu basin totam Rosam sustinens, calyx vocatum, quo nomine tamen globus rosæ totus nondum apertus sed adhuc connivens dicitur. 2. Cortex, (rectius calyx) apertâ rosâ in quinque pinnulas seu lacinias divisus Alabastris quibusdam dictus; harum duæ barbatae sunt, duæ imberbes, quinta ab uno latere barbata, ab altero minimè. 3. Floris medium illud croceum, quod capillamentis insidet, Anthera offic. (apices) 4. Capillamenta Anthera seu apices sustentantia, 5. Folium πτερόν, cuius 6. ima pars candida unguis appellatur. 7. Lana in capite contenta. 8. Semen lanugine inclusum, cortex cum lan. & seminibus inclusis fructus rectè dicitur, quarum maturitas tum ex Ruffo colore, tum ex mollietate æstimatur.

Virg. De rosarum temperamento, calidæne sint an

frigida non levis est inter medicos controversia: quæ mihi nos earum vires & utilitates quas humano corpori præstant breviter indicasse contenti erimus. In usu sunt rubræ præcipue & incarnatæ, vulgo Damascenæ dictæ.

In rubris plus est terræ substantiæ, & resiccantis adstringentisque facultatis, non tamen absque humido quodam permixto, quod quidem ipsis adhuc virentibus inest, in resiccatis vero deperditum est.

Succus ergo hac de causa & dilutum earum ad alvum subducendam quoque facit, minus tamen quam Damascenarum. Resiccata autem hæ rosæ humiditate jam assumptæ, adstringunt & resiccant. Dod. quo cum peritiores Medici consentiunt. Nam (ut recte Langius) virtus rosarum laxativa & odorifera in supernis ejus partibus consistit (unde & facile evaporat) at adstrictoria & roborisatrix in internis delitescit: hæc de rosis rubris intelligenda sunt, nam Damascenarum folia etiam resiccata cathartica vim retinent, ut & ipsi experti sumus. Pergit Dodonæus, robur cordi conciliant, ac tremori & palpitationi ejus succurrunt, hepar, renes & alia viscera debilia confortanti ventriculum, flaccidum, debilem & humidum siccant & corroborant: fluorem muliebrem, & superfluum menstruum purgationem compescunt, sanguinis unde quaque eruptiones sistunt: sudores reprimunt, alvum nimio fluore laxam constriungunt. Antidotis omnibus utiliter admiscuntur, & aliis quoque medicamentis, sive foris adhibendis, sive intra corpus assumendis, quibus adstringens ac corroborans aliquid inde accedit.

Ipse expertus sum (inquit Simon Paulus) pulverem rosarum ex attritentium 3 ij. pondere singulis vicibus bis quotidie in aqua plantaginis propinatum, ex sententia contumacissimam dysenteriam persanasse quadripart. Botan. Claf. 2. p. 181.

Apices croci, officin. Anthera dicti, resiccant similiter & astringunt, & potentius quidem quam ipsarum rosarum folia: exsiccati immiscuntur. Dentificiis ad gingivarum adstrictionem fluxionumque exsiccationem: cum aqua cydoniorum destillata dantur utiliter nimio mensium fluxu.

Calyces quinetiam & alabastris iisdem viribus polent, unde ad dentes à corruptione servandos, & gingivas roborandas sumitur aceti scyllit. & aquæ è calicibus rosarum destillatæ aqua porrio, & eo sæpe os coluitur, annotante Monardo Hispal. sed (inquit Dodonæus) cum his odor desit, minus utilia sunt, humanæque naturæ minus amica.

N. Rosæ, præsertim recentes, adnotante Mesue, coctionem nullam sustinent; facultas enim earum tergens & purgatoria mox igni resolvitur, remanet adstringens manifestior; unde etiam patet vim cathartica in superflua & facile resolubili ac separabili parte consistere.

Notatu dignum est, quod quamvis rosæ decerpæcellerimè exsiccentur, atque inter siccandum suavissimum odorem expirent, tamen in horto sentibus adhuc hærentes, nullum ad aliquam notabilem distantiam de se fundum odorem, quemadmodum caprifolii & caryophyllorum nonnullorum flores, adeo ut in rosario floribus explicitis pleno deambulans fragrantiam nullam nobis percipies, ut si oculis eo introductus esses, te in rosario versari planè nescires: quod argumento est odorem Rosæ in vapore aqueo facile resolubili & dissipabili consistere.

Folia rosarum renibus substrata copiam seminis imminuere scribit Galenus: seque in nocturnis veneris imaginationibus euidam suasisse rosas experiri, qui ex his substratis levamen sentit, citra ullam renum noxam. Ex foliis etiam aridis & expressis (referente Plinio) diapasmata olim fiebant ad sudores coercendos, ut à balneo inarecerent corpora, dein frigida abluerentur.

Ex rosis multa parantur medicamenta, ut v. g.

1. Aqua destillata. Matthiolus vasis vitreis in MB. elicitam præcipue commendat, eique quæ in valis metallicis destillatur longissimè præfert: nec immerito. Nam & empyreuma omne hoc modo cavetur, nec aqua pravam aliquam aut noxiam qualitatem à valis contrahet, ut in metallicis destillata solet.

Refrigerans est & cardiaca, spiritus languentes recreat & confortat, vel odore suo, nariibus admota, vel in cibis & jusculis usurpata; vel temporibus ea fotis, vel in suffumigiis: valet etiam ad ruborem & inflammationes oculorum exterius applicata, nec non ad capitis dolorem.

Damascenarum aqua multo odoratiores est, purgat etiam larga dosi, ad 3x. exhibita. Costæo teste.

Tragematis, placentis, condimentis & aliis, quæ voluptatis excitandi gratia conficiuntur multis admixta, saporis gratiam conciliat, adeoque frequentis usus est in Culina ut vix ullum sibi locum in Medicina reliquerit.

2. Conserva rosarum, quæ fit tundendo rosarum exunguium partem unam cum duplo sacchari solidi in mortario marmoreo pistillo ligneo, adstrictoria est & cardiaca, post biennium prævalet, vix cardiaca, recentior magis adstrictoria est, unde cum mithridatio mixta destillationes in nares & defluxiones humorum in oculos cohibet: utilis etiam est ad alvi fluxus sistendos. Conserva vetustior cum Diarrhodo Abbatis mixta ad lipothymias, deliquia & tremores seu palpitationes cordis utilis est.

Ventriculum etiam languentem & infirmum excitat & roborat, concoctionem promovet, vomitum compescit, & antidotus censetur adversus morbos contagiosos.

3. Conserva sicca, saccharum rosarum dicta iisdem viribus pollet quibus conserva humida vetus.

4. Syrupus ex rosis siccis paratus ad eadem valet, atque insuper sanguinis fervorem temperat, & febricitantibus utiliter exhibetur.

5. Mel rosarum, quod fit ex succo rosarum expresso & foliis contusis cum melle mixtis, fervefactis, & expressis, & deinde colatis, colatura decocta ad consistentiam mellis. Hujus usus insignis & frequens est in gargarismis & collutionibus, ad ulcera oris, faucium, gutturis aliarum partium mundanda & sananda, & ad humores coequentes inhihendos, qui eorum consolidationem impedire solent; usurpatur etiam in clysteribus ad refrigerandum & detergendum.

6. Diarrhodon Abbatis ut & aromaticum rosarum in obstructionibus viscerum calidis locum habet, estque cardiaca insignis, & ad eadem valet ad quæ prædictæ præparationes.

7. Acetum rosarum inflammationes omnes sedat, incidit, purgat, roborat. Multe etiam usus est ad somnum inducendum, vel aquâ rosaceâ mixtum, & nariibus admotum vel cum aliis hypnoticis temporibus applicatum.

8. Oleum rosarum calores omnes sedat, inflammationes mitigat aut prohibet: membra debilia confortat, digestivam facultatem & calorem naturalem excitat & corroborat, aliis etiam tinguentis & medicamentis admiscetur quæ refrigerando & adstringendo inserviunt. Fit autem ex rosis recentibus contusis in oleo olivarum coctis in MB. & expressis.

9. Unguentum rosaceum iisdem ferè usibus inservit quibus oleum. Plurimum valet in principio apostematum repercutit enim materiam, sedat dolores eorum, & capitis febricitantes & inquietudinem; refrigerat febres ardentes, hepar & stomachum calefacit, cum unguento populeo mixtum, & fronti ac temporibus illitum somnum provocat. Papulas, nesciusculi, & eruptiones quascunque calidas refrigerat & compescit.

10. Syrupus rosarum solutivus fit ex rosarum foliis viridibus modo per infusionem, modo decoctionem. Per infusionem iteratam multoties, hoc est, ex infuso in quo pluries rosarum virentium folia multa macerata sunt, nobile & secutum purgatorium medicamentum paratur (inquit Amatus) quod & pueris tuto exhiberi potest, utilissimum quando expurgatione alia potentiori aut opus non est, aut uti non expedit. Humectat porro & refrigerat, ideo etiam febrium attenuum calores nimios sedat, & viscerum inflammationes mitigat & sistim extinguit, ut ait Dodonæus & experientia confirmat. Est sane medicamentum lenè, benignum, tutum, multi usus, & magni in morbis calidis præcipue folaminis, quodque ob vim adstrictoriam in dysenteria & aliis alvi fluxibus non secus ac Rhabarbarum cum ægrorum juvamento usurpatur.

Parantur etiam ex rosis damascenis conserva & mel rosarum earundem cum syrupo virium.

Utuntur etiam (inquit C. Hofman.) succo rosarum incarnatarum ad Electuat. ros. & de succo ros. utrumque recipit & succum rosarum & scammonium eadem quantitate. (at Parkinsonus Electuarium Rosarum è succo ros. rubrarum fieri ait) exploratum est (inquit Joh. B. Hist.) contra guttam calidam, & malos tumores calidos & fistulosos; fortiter purgat; sanat tertianas simplices & duplas, & reliquias malorum humorum in convalescentibus exquisite evacuat, potenter solvit, & est calcar aliarum medicinarum. Alia adhuc medicamenta è rosis parantur, quorum vires ex dictis æstimari possunt.

Folia rosarum damascenarum exsiccata in odoramenti non postremum locum obtinent, à matronis nostris valde expetita ad pulvetes cyprios quos vocant & ad sacculos cum aliis suaveolentibus inferiendos, quos in arcis inter vestes & lintamina recondunt, ad ea odore suo imbuenda. Eadem vel in infuso vel in pulvere exhibita satis feliciter purgant (Costæus in fero lactis caprini bibenda præscribit) unde constat vim cathartica, saltem in hoc genere, parti tenui & volatili quæ inter siccandum exhalat & evanescit non inhaerere: at neque in parte illa quæ tincturam & colorem communicat, cum rosarum damascenarum color, quancunque curam adhibeas, magna ex parte siccando evanescit.

Rosæ autem, præcipiente Sylvio, mediocriter aperte sereno celo mane lectæ, eodem die ut sunt siccantur sole, si potes, sæpe vertendo. Nam vix umbra sic caveit, quanquam id esset optatius; siccatas avellæ, & vase terreo recondit.

Rosas proprietate quadam testés lædere scribit Fuchsius.

Rosæ albæ non minus refrigerant & exsiccant quam rubræ aut incarnatæ; non alium tamen in Medicina usum habent quam ut ex se aquam stillent, quæ specifica proprietate oculis prodesse, eorumque ruborem & inflammationem lenire & sanare creditur. Albæ damascenas cæteris in purgando excellere scribit Martius.

Semina dura quæ capitibus rosarum insunt in pulverem redacta, ac è vino pota calculum pellere (Trago teste) tradunt. Eandem facultatem nonnulli spongiolis quæ sylvestribus adnascuntur rosis, si in pulverem redactæ aut in vino decoctæ calidæ sumantur, tribuunt. Verum cum Dodonæo consentit Joh. Bauhinus nec semina, nec spongiolas, ob eorum adstrictionem & siccitatem ad calculum & urinæ difficultatem quicquam valere; nisi per accidens, renes corroborando, & refrigerando. Cum enim nonnulli calidi renes gignant calculos, & vero illi diureticis validioribus valde debilitentur; mirum non est roborari inde renes ut pellendo calculo aptiores sint. Reliqua vide apud Dod.

Succus

Succus è fructu rubro maturo totaque suâ substantia tulo expressus, posteaque siccatus, demumque in pulverem redactus gonorrhææ, & tam rubris, quam albis mulierum profluvii singulari experimento medetur.

In genere medicamenta è rosis præparata multum celebrantur in curatione Phthysicorum, tabidorum & pulmonarium affectuum à Riverio, Sennetto, Rosenbergio aliisque.

Egregias vires & efficaciam medicamentorum è rosis præparatorum in phthisi, podagra, calculo, canum rabidorum morfu, capitis doloribus, aliisque morbis, in fluxibus alvi aliarumque partium; in febribus, hæmorrhagiis, vulneribus, inflammationibus, insectorum puncturis, Scorbuto, mobilitate dentium, vide apud Carolum Rosenbergium in Rhodologia sua.

Cæterum odorem rosarum visui nocivum esse ab exemplo probatur in Ephem. German. An. 12. Observ. 140. quod sane nollem, cum nihil odore illo naribus nostris gratus & acceptus sit.

Pro medicamentis è rosis Persicis, seu Alexandrinis, aliisque. Vide Monardum apud Car. Clus.

Vires rose sylvestris. Cynosbati flores qualitatibus convenire videntur cum rosis sarivis, sed majorem vim adstringendi habent, proinde in profluvio uteri rubro & albo summæ sunt extimationis.

Fructus vi lithonriptica maxime commendantur, in qua tamen excellunt exempli arilli. Schrad.

Pulvis iste in Antheris Cynosbati reperibilis, crocei coloris & summè volatilis, est genuinum sulphur vegetabile ab Archæo sublimatum, egregiis dotatum potestatibus: cui consanguinei sunt pulveres, viz. Alcohol ex Julis Coryli summitatibus pini, musco terrestri clavato, & in Antheris liliorum alborum. Habent egregiam vim anodynam, sporiferam, cardiacam. Hagendoraius Cynosbatolog. p. 48. Idem tradit Wedelius de sulphure plantarum: ego in phthisicis & convulsis affectibus, in phrenesi, & doloribus leniendis utiles esse existimo D. Tancred. Robinson.

In acinis seu seminibus cynosbati reperitur oleosa & balsamica substantia, egregiæ efficacæ in lithiasi; flammam cito concipit & continet ipsam essentiam plantæ. Hagendor. Cynosbatolog. p. 70. duo hydropici pro desperatis habiti ad integram valetudinem restituti sunt à diuturno usu decoct. fructuum cynosbati integris cum arillis in vino. Hagendor. Cynosbatol. p. 154. idem affirmatur de his floribus à Wedelio.

Hujus poma cum maturuerunt pulpam continent saporis cum aciditate grati, ad appetitum excitandum, & æstum febilem compescendum perutilem.

Ex hac pulpa cum saccharo officinæ nostræ conservam parant, non modo ad febriles ætus, sed & ad scorbuticos affectus calidiores utilissimam: ventrem etiam leniter astringit, & defluxiones sistit, ut taceam palato admodum gratam esse, ventriculo acceptam & concoctionem promovere.

Ex hac etiam pulpa bellaria & scitamenta multa, parare norunt, cocci & Matronæ honestæ ad mensas secundas instruendas.

Insanabilis ad hosce annos (inquit Plinius) fuit rabidi canis morfus, pavorem aquæ potusque omnis asferens odium. Nuper cujusdam militantis in prætorio mater vidit in quiete, ut radicem sylvestris rosæ blanditam sibi aspectu pridie in fructu mitteret filio bibendam. In Lusitania res gerebatur, proxima Hispaniæ parte: casuque accidit, ut milite à morfu canis incipiente aquas expavescere superveniret Epistola orantis ut pareceret religioni, servatusque est ex imperato, & postea quisquis simile auxilium tentavit.

In hujus ramis, fractis præcipuè aliterve læsis, vel ab insecto aliquo compunctis per æstatem muscosum quoddam corpus herbacei & rubescentis coloris sæpe

excrefcit, quod Bedeguar Lobelius, spongiosam alii appellant. Vulgus (Germanicum scilicet circa Norimbergam) quod suppositum somnum incumbenti, bus provocet, cujus cineres ad dysuriam, tinea ac vermes expellendos Camer. laudat. Spongiolam hanc si incidetis, vermiculis exiguis albis intus refertam invenies, quæ per totam hyemem in cellulis suis latitantes, mense demum Maio insequentis anni muscarum formâ prodeunt: quarum nonnullæ aculeo seu spiculo è cauda semper prominente armantur, & ad Mouffeti sericaudas referri possunt; aliæ eâ omnino destituntur; & in hoc forte sexuum differentia descriptionem muscarum vide in Cat. Cantab.

Vires rose mosch. Cæterum rosæ moschatæ odore caput tentant, & potentissime alvum subducunt, non minus, autore Manardo, quam scammonium, ita ut si sex vel octo folia acetario miscearis, totum purgatorium reddas. Idem confirmat Amatus, Historiam recitans mulieris, quæ ex gustato condito harum Rosarum faucium & linguæ excoriationem cum stomachi rosione contraxerit. Quapropter ab ea tanquam à pernicioso medicamento abstinendum suadent. Raim.

ROSMARINUS.

Ros dic putatur quia roscidæ sit naturæ, vel quia toris instar aspergatur, vel quia ejus usus in aspergillis, quod nobis veritimilius videtur: marinus autem vel quia in marinis locis feliciter proveniat, vel quia saporis marini, locis feliciter proveniat, vel quia saporis marini hoc est amari. Voss. Etymolog. Græcis libanotis *σεφαινομαρην* i. e. coronaria, ab odore thuris, & quod ad corollas texendas adhiberi solebat.

Magnitudine sua & statura insigni, floribus ad caulium nodos foliis intermixtis, foliis oblongis angustis prona parte candidis, supina obscurius viridentibus à congeneribus differt.

Nomina. Rosmarinus coronarius fruticibus L. B. hortensis angustiore folio C. B. Coronarius Ger. Libanotis coronaria sive rosmarinum vulgare Park.

I. B. Rosmarinus, suffrutex jucundissimi odoris Thus redolentis (unde & nomen ipsi libanotis inditum), vel imprimis utilitatis commendatione notissimus, & quia corollis petitis coronarii nomen adeptus, bicubitalis est & altior, virgulis tenuibus, cinereo colore præditis, in quibus folia aliquot simul ex intervallis oriuntur (imo bina ex adverso & alia ex eorum sinibus conferta) rigidula, lavendulæ angustiora, breviora, prona parte candida, supina saturatius viridia, flores ex alis foliorum exeunt; è cæruleo albicantes salviæ florum effigie, minores, cotylæ instar concavo guttato: fibræ incurvæ, longæ ex ritu sub supremo folio promicant.

Vere primo & per totam ferè æstatem floret, in hortis feritur, verum non semine sed furculo. An differat specie à spontaneo latiore folio dubito: quod si differat ubi sponte proveniat proditum non invenio. Qui feritur & latiora & rugosiora habet folia, nec facile per hyemem.

Hujus varietas in hortis alitur foliis aureo colore variis, quæ Parkinsono rosmarinum striatum sive aureum dicitur. Habetur etiam flore duplici Park.

Vires, in usu sunt folia, flores (Anthos officinis dicti) & semen, cephalica sunt è præcipuis nervina, & etiam uterina, usus præcip. in affectibus capitis ac nervorum in apoplexia, epilepsia, paralyti vertigine, &c. Visum acuiunt, lenius ac memoriam juvant, fetorem halitus emendant, Epatis lienis ac uteri obstructions resolvunt, ictero ac fluxu albo multum medentur, corque confortant.

Herba ipsa suffitu & vapore suo pestis tempore ætatem emendat & salubrem reddit.

Dioscorides morbum regium sanare tradit hanc herbam, si quis ipsam in aqua coctam ante exercitationem exhibeat bibendam, deinde exercitatum lauet, & vinum ipsi bibendum det. Semen cum vino haustum ad icterum commendat Myzaldus.

Ad paralyfin aliosque nervorum affectus conducit vino aut cerevisia in qua rosmarini summitates infusa fuerint in potu assidue uti.

Ad visum acuendum conducit flores recentes quotidie jejuno ventriculo cum pane & sale comedere.

Exsiccati & incisi fumus ore haustus peti in modum utilis censetur adversus tussim, phthisin, & tabem pulmonum.

Solo usui olei rosmarini Chymici propinati in decoctis idoneis ante paroxysmum multas febres tertianas exquisitè curatas esse in nosocomio Parisiensi dicto *la Charité* vidit & observavit M. Jacques, Dof. iv, vel vi. gutt. Sim. Paulus quadrip. Botan. class. 2. p. 133. habui ex excerptis D. Hulse.

Ex rosmarini fruticantis truncis caudicibusve crassioribus pectines in Galliis sibi parant, quibus quotidie caput pectunt quia vertigine aliisque hujus generis morbis præservari gestiunt: sed fraus simul inventa apparet, dum è salice, pyrotilia, &c. affabre pectines isthic loci exsculpunt & perpolitos conspergunt leviter cum gut. olei rosmarini vel spicæ, & sic impostores arguti imponunt minus sagacibus ex adversar. D. Tancr. Robinson.

Diarrhæam trimestrem desperatam vino rosmarini curatam refert Vellchius Hecatost. D. Hulse ex Etmull. prax.

Aqua Regina Hungaricæ destillatur & præparatur è floribus rosmarini in infusis (p. vini in cephalicis & nervinis affectibus celebratur. *Rains*.

Pro vera Aqua Regina Hungariæ conficienda Abbas ille Rousseau (de quo in præparatione Nappelli, sub titulo *Aconitum*, ut & in præparatione Manna aliquid jam diximus) nullo utitur spiritu vini, sed tantum roremarino in hydromelite fermentato posteaque destillato. Scilicet Aquæ font. assumit quatuor partes & mellis partem unam, miscellamque hanc in laconico cujus calor commodè ab iis qui illud subintrant tolerari queat, reponit, unde intra dies duos aut tres sine ullo alio fermento extraneo, dissolutio mellis per se commovetur, & ad fermentationem perfectam post diem unum à prima commotione devenit, quo tempore rosmarinus minutatim confectus ac contritus in eam immittitur, (una scilicet mensura rosmarini sic præparati super duabus mensuris dissolutionis fermentantis) omniaque probe commista fermentationi ulteriori committuntur, quoniamque nempe rosmarinus fundum petat, nec amplius, etiamsi commoveatur, in superiora redeat, liquorque postea spirituosus inde destillatur qui est vera Regina Hungariæ aqua. Eadem ratione alia vitidem plantæ fermentari possunt, atque ex iis spiritus verè ardentes educi.

Ros SOLIS, vid. *Rorella*.

ROSTRUM, GRUIS, vid. *Geranium*.

ROTULÆ, seu MORSELLI.

Rotula, Morfelli, (Morfuli, Tabulæ,) ex omnibus Medicamentorum generibus fieri possunt, quæ non respuunt cum saccharo soluto commisceri, inque placentas indurari. Talia sunt Pulveres, Semina, (minujora) condita, Conservæ, Olea, Extracta: Imprimis tamen ad morsellorum compositionem *Mangesi Bibl. Pharm. Tom. I L*

cooptantur pulveres, de quibus tamen notandum, quod non opus sit æque subtiles eos recipi, ac in rotulis.

Modus fendi.

℞. Sacchari q. s. solve in liquore debito super ignem: hinc coque ad consistentiam, ut frigidatum induretur, (probare id poteris tactillo in orbiculum statneum vel lapidem effuso:) Hinc immisce sensim pulveres, optime agita, effundeque dum adhuc calore liquidum est, supra tabulam cupream lapideamve, ut refrigeret & induretur, demum scinde in tabulas.

N. 1. In purgantibus loco sacchari recipi potest *Manna*, cujus proportio uti & sacchari pro Medicis voluntate adhibetur: ut plurimum recipitur sacchari sextuplum, octuplum, &c. prout res immiscenda fortiores vel ingratiore fuerint, exempli gratia, ad *Extra-cta* & Olea destillata major sacchari quantitas expetit.

N. 2. Nuclei ac semina emulsi apti, si ad morsellorum constitutionem concurrant, pro libitu in emulsionem redigi possunt, quo saccharum dissolvatur.

N. 3. Condita duplici modo morsellos subeunt. 1. Conquassata. 2. In frustula incisa.

N. 4. Olea destillata si occurrerint in fine ea instillare oportet, vel paratis morsellis illinere. Idem judicium sit de Moscho ac ambra, quæ in aqua rosar. dissolvuntur, atque paratis tabulis illinuntur.

Ufitiores sunt alterantes.

Morfuli. Bezoardici è pulv. bezoardic. Cephalicè è speciebus cephal. è succo & corticibus citri. s. de citro, vide infra N. 1. è Confectione *Alchermes. Imperatoris*, è spec. Imper. Pectorales, 2. Post pastum, A. Saccharum rosatum tabulatum. Saponæa, A. ad Vermes, A. Zinziberis cocti, A.

Purgantes ufitiores.

Morfuli. Diacarthami, A. Diaphanico. A. Diacathartic. cum rhabarb. è speciebus de Diagrydio, s. laxativi è Cremore Tartari, vid. infr. 3. de Manna Tartarizat. vide libr. 4. de Mechoaca, 4. è succo rosarum.

1. Morfelli de Citro.

℞. Carn. citr. Cort. citr. condit. concis. ana ℥j. Ol. citr. gran. xij. Succ. citri puriss. q. s. Sacchar. in aq. citri. sol. ℥xvi. F. s. a Morfuli.

Sunt Cordiales, ut citrum.

N. Fiant & simplices è succo, corticibus sacchar.

2. Morfuli pectorales.

℞. Pinear. rec. in aq. rosar. parat. ℥℔. Amygd. d. excort. ℥v. Sem. Melon. rec. Cucum. Cucurb. ana ℥ij. Spec. Diarrhod. abb. Div. Mag. perlar. Div. Sacchar. alb. in aq. rosar. & scabios sol. ℥xvi. F. s. a Morfuli.

Sunt nutritivi, refrigerantes, acrimoniam mitigantes, adeoque conveniunt in hæticis.

3. Morfuli de Diagryd. s. laxat.

℞. Crem. Tart. ℥ij. Resin. scammon. ℥℔. Sacchar. in aq. rosar. sol. libi. F. Morfelli.

Purgant bilem, Dosis adulto ℥℔.

4. Morfuli de Mechoaca, F. F.

℞. Conserv. violar ℥j. Spec. Diatragac. fr. ℥ij. Turbith. gum. Mechoac. a. ℥℔. Diagryd. præpar. ℥ij. Ol. cinam. still. gran. vi. anis. gran. iv.

P p p Sacchar

Sacchar. in aq. fœnic. fol. ℥xv. F. f. a. confectio in morful.

Purgant bilem ac phlegma.

Dosis ab ℥℔. ad ℥i. Vide par. i. l. 4. observat. Cl. Gregor. Horstii.

De Rotulis.

Rotularum parandarum modus idem est, nisi quod Rotulæ, quia formulas Morfulis minores expetunt, medicamenta requirant, quæ rotularum formationem non impediant. Pulveres itaque subtiles esse oportet, dosique minori.

Proportio sacchari vulgatissima est octupla, (1) plus minus. In purgantibus vero quadrupla, (4) pulver.

In oleis stillatitiis major.

sacch.

scil. sacchar. ℥j. ol. gran. iv. &c.

N. Fiunt & rotulæ de succo & saccharo, si scilicet hoc in illo solutum ad consistentiam justam coquatur & rotuletur. Veruntamen notatu hic dignum, Rotulas, quæ ex succis acidulis fiunt, v. gr. de succo citri non admittere coctionem, sed sola parari mixtione. Videlicet, ℥. Sacchari pulverisat. ℔i. calefeat ad ignem lentum, hinc effunde succi, v. gr. Berber. ℥iii. misce & effunde in rotulas.

Rotulæ usitatiores sunt.

Rotulæ de Berber. Manus Christi simpl. perlar. Diatragacanth. Sulphuris pectoral. Laxativa infantiles.

1. Rotulæ pectorales.

℥. Sacch. albiss. ℥j. Florum Sulph. benzoinat. (ut cap. de Sulph. dicitur) ℥ii. Ambr. gris. gr. vi. Mosch. Orient. gr. ii. Ol. fœnic. gut. iii. Gum. tragac. in aq. scabios. infus. q. f. massa.

2. Rotulæ infantiles laxativæ.

℥. Cranii humani prepar. ℥ij. Mercurii per sextam unem dulcificat. Rad. Jalap. an. ℥j. Margar. præp. ℥ij. Ol. cinnam. gut. vi. Sacch. in aq. scord. solut. ℥iii. F. Rotula.

Vermes necant, & inde genitam Epilepsiam arcant.

Quinimo ex singulis pulveribus & ipeciebus, tam alterantibus, quam purgantibus, addito saccharo in conveniente Aq. soluto Rotulæ pro rei exigentia fieri possunt, Schroderus.

Rotulæ sive Morfelli variæ compositionis ex variis.

Morfelli Cephalici Zuvelseri.

℥. Sacch. can. albi ℔℔. vel ℥viii. solvatur in portinacula aqua cinnamomi vel arantiorum florum, & ad consistentiam tabulati coquatur, in quo ab igne remoto liquefac Ambra grysea ℔℔. vel pro ditioribus ℥j. prius tamen cum sem. citri excort. ℔℔. probe subacta: superaddendo statim moschi orientalis opt. ℥j. cum aqua florum Arantiorum exigua port. in pulv. redacti, nucum indicar. condit. & crassiuscule incisarum ℥j. conf. flor. Arantiorum, tunica an. ℥vi. pistach. decort. & concisorum ℥i. elaeosacchari cinnamomi ℥vi. sumendo ℔℔. olei pro ℥i. sacchari, essentia rosata sacch. antea edocta ℥j.

Fiant morfelli confortantes & cephalici, caput, cerebrum, ac universum nervosum genus insigniter roborantes.

Cinnamomum coctum duplex Zuvelseri.

℥. Amygd. dulc. decort. ℥iiij. pistach. decort. ℥℔. contundantur minutissime in mortario ad pulvis formam, addita paulatim s. q. aqua cinnamomi opt.

quibus adde sacch. can. albi pulver. ℥viii. pulv. cinnamomi acuti ℥ij. boli armena orient. preparat. ℥vi. vel ℥j. cardamomi, piperis longi, zingiberis an. ℥j. ol. still. cinnamomi ℥j. vel ℔℔. cum suffic. quant. mucilag. tragacanthi, aqua cinnamomi extracti, fiat massa, ex qua formentur cannulæ instar cinnamomi, siccantur leniter.

Aliud ex Eodem.

℥. Pulv. cinnamomi acuti ℥ij. zingiberis albi ℔℔. caryophyllorum nuc. mosch. an. ℥iij. Boli armena ℥vi. ol. cinnamomi still. ℥j. vel ℔℔. sacch. can. albi ℔℔. e quibus mixtis, inque pulverem redactis, addita s. q. mucilaginis tragacanthi, aqua cinnamomi extracti, fiat pasta e qua formentur cannulæ instar cinnamomi convincta.

* Roborant ventriculū & cerebrum, facultatem concoctricem labefactam confortant, & anhelitum gratum efficiunt.

Rotulæ confortantes virides ex Zuvelsero.

℥. Sacch. can. alb. ℔℔. solvatur in s. q. Aquæ cinnamomi, in qua radices satyrionis aliquandū maceratae fuerint, & denuo ad tabulati consistentiam percogatur, in quo ab igne remoto dissolvatur Ambra grysea ℔℔. vel ℔℔. plus minusve pro fortuna & conditione patientis: addendo statim rad. satyrionis condit. & conf. ℥j. nuc. indic. cond. ℥vi. zingiberis indic. cond. ℥j. cort. arantiorum cond. ℔℔. carnis scinci marini, ventri cervi rasi an. ℥iij. pisth. decort. pinearum mund. ana incis. ℥vi. cardamomi min. sem. cruce. lingua avis, macis piperis longi an. ℥iij. ol. cinnamomi opt. still. ℥j. caryoph. ℔℔. prius cum essentia citri saccharine ℥j. permixtorum.

Fiant morfelli egregie confortantes, ac semen insuper augentes.

Morfelli Hepatici ex Eodem.

℥. Rad. cichorii sylv. recent. ℥ij. flor. rosarum rub. recent. ℥j. ligni santali rubri ℥ij. fiat cum suffic. quant. aqua simplicis decoctio ad ℥x. circiter: cum decocto hoc colato & probe clarificato dissolve sacch. can. albi ℔℔. ac denuo coquendo ad consistentiam tabulati redigatur, cui ab igne remoto adde conf. rosarum rub. ex anatica quantitate rosarum & sacch. parata ℥j. Hepat. nobil. idem ex anatica quant. florum & sacch. facta ℥℔. Flor. tunica n. uti supra ℥i. cort. Arantiorum, citri ana recent. & radula subtiliss. comminut. ℔℔. nuc. mosch. conf. ℥j. magist. n. solub. corall. rub. ℥iij. Fiant morfelli s. a.

Valent ad hepar roborandum, ejusdemque obstruktionibus referendis, cachecticis, & hydropicis succurrunt.

Morfuli Imperatoris ex Pharm. August.

℥. Pinearum mundatarum, pistaciorum decort. Amygdalorum dulc. an. ℔℔. specierum imperatorum parum incisar. & contus. ℥iij. Aromatici rosati Gabrielis, cinnamomi incisi & contusi an. ℥j. conf. rosarum damascenar. ℔℔. sacchari in aqua rosar. dissoluti ℥vi. Fiant morfelli.

Morfelli Diaireos cum extracto liquiritiæ ex Pharm. August.

℥. Specierum diaireos simp. ℥ij. extracti liquiritiæ ℥j. sacchari albi in aqua violarum soluti ℥xvi. Fiant secundum artem Rotulæ.

In tussi atque raucedine, & viribus, & jucundo opere se commendant.

Morf.

Morsuli Laxativi ex Pharm. Norimbergensi.

℞ Cortidum citri ℥j. zingiberis ℥ss. spec. de traga-
cantha ℥ij. pulveris jalappa ℥ij. sacchari albi ℥ij. Fiant
morsuli.

Morsuli adversus Lumbricos Zuvelferi.

℞ Sacch. canarii albi in aq. rosar. soluti, ac denno
ad consistentiam tabulati cotti ℥ij. cui ab igne remoto
adde pulv. semin. cyna ℥ij. turbuh albi ℥ss. corallina
℥ij. cinamomi optimi ℥ss. mercurii dulcis rite parati ℥ij.
Fiant morselli vel rotula.

Efficacissimæ ad vermes enecandos & expellen-
dos, tum infantibus, tum adultis exhibendæ, Dosis ℥ij.
ad ℥ss.

Manus Christi simplex & cum margaritis ex
Pharm. August.

℞ Sacchari albiss. ℥ij. aqua rosar. quantum satis
est pro sacchari solutione. Coquantur, ut artis est;
quod si margaritas addere volueris, injiciatur sub
finem margaritarum preparatarum ℥ss. Fiant ro-
tula.

Viribus dejectis, febribus ardentibus, & delictis
medetur.

Paratur etiam manus Christi perlata, adjectis
sub finem coctionis guttulis aliquot olei cinnamomi,
jucundissimum sanè ad omnem virium lapsum medi-
camen, si modo febris aut calor aliquis præternatura-
lis non subit.

Rotula ex Mercurio vitæ correcto Zuvelferi.

℞ Mercurii vitæ rite & dextrè parati ℥j. salis
communis ℥j. nitri purissimi ℥vi.

M. xta hæc conterantur & levigentur diu, multum-
que (horis circiter quatuor) super porphyrite lapide;
post aqua calida abluantur salia, ut mercurius vitæ
liber ab illis tandem remaneat; & tali pacto demitur
ipsi vis violenta emetica, mitiorque evadit ut potius
per inferiora operetur. Jam verò

℞ Sacchari albissimi ℥ij. solvatur in s. q. aqua
rosarum, ac ad consistentiam tabulati coquantur, cui ab
igne remoto ac nonnihil refrigerato, adde mercurii vitæ
correcti ℥ss.

Fiant s. a. Rotula purgantes per inferiora, & non-
nihil per superiora omnes humores excrementitios.
Dosis ℥j. ad ℥ij.

Morselli Pectorales Zuvelferi.

℞ Sacchari albi can. ℥ij. solvatur vel in succi sem-
pervivi major. depur. ℥ss. in quo prius Rad. enula incisa
℥ss. ireos florent. ℥ij. parum ebullierint; vel etiam in aq.
rosarum fragrant. sine ad. still. ℥ss. in qua prius radices
enula ℥ss. ireos florent. ℥ij. aliquandiu tantum infusæ &
macerata fuerint, coquantur ad consistentiam tabulati,
cui ab igne remoto initice.

Resina storacis calam. ℥ij. specier. diaireos n. superius
paulo descriptarum ℥ss. pulv. Rad. enula ℥ij. & si lubet
pulv. croci opt. ℥j. essentia rosata saccharina, elao sacchari,
Anisi an. ℥ss.

Fiant s. a. Rotula vel morselli in affectibus pecto-
ris catarrhosis, tussi diuturna, pleuritide & phthisi
ipsa peritiles.

Rotula Purgantes & emeticæ Zuvelferi.

℞ Sacchar. albiss. in aq. rosar. soluti ac denno ad
consistentiam tabulati cotti ℥ij. cui ab igne remoto &
nonnihil refrigerato adde mercurii vitæ rite ac dextrè
parati & probe edulcorati ℥j. pulv. mechoaca alba ℥ij.
Ireos florent. rad. ℥j. Fiant s. a. Rotula alba boni saporis
bonique odoris.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Qui per superiora crassorum ac vitiorum humo-
rum saburram exturbare nititur in corporibus ro-
bustis, præstans hic habet remedium, modo in dosi
non nimium excedat, in morbis diuturnis, chro-
nicis, febre quartana, melancholia hypochondria-
ca, præsens sunt remedium. Dosis a ℥i. ad ℥li. ad
summum.

Rotula de Rhabarbato Pharm. Norimberg.

℞ Rhabarbati selecti, ℥ij. Aqua endivia ℥ij. co-
quantur & solvantur in eo decocto sacchari ℥ij. Fiant
Rotula.

Morselli Stomachici Zuvelferi.

℞ Rad. acori, calami aromati. galanga an. ℥iiij
zingiberis ℥ss. incisa coquantur parum in s. q. aqua
simplicis ad ℥ss. circiter: cum colatura solvatur sacch.
albi can. ℥ij. ac denno ad consistentiam tabulati co-
quendo redigatur, cui remoto ab igne adde.

Nucis Indic. condita & consciss. ℥ss. zingiberis Indicæ
condit. & consciss. ℥i. calami aromatici condit. cort.
arantiorum, citri ana condit. & consciss. ℥ss. amygd.
dulc. decorticat. pistach. decort. ana incisorum ℥ss. nuc.
mosch. conquass. ℥ss. cardamomi minoris ℥ij. matis,
piperis longi, caryophyll. an. ℥ss. cinamomi acuti incisi
℥ss. Fiant s. a. morselli qui stomachum & reliqua visce-
ra infrigidata confortant, appetitumque excitant, &
flatus comprimunt.

Morsuli Varij ac Rotula ex Timæo.

Morsuli Imperatoris purgantes.

℞ Sem. melon. excort. ℥ss. aqua rosarum optim. ℥iiij
m. F. emulso in qua dissolv. sacchar. albiss. ℥ij. Resina
gialapp. ℥v. adde spec. pro morsul. Imperat. ℥vi. m. F. s. a.
morsuli.

Morsuli Hydragogi.

℞ Magister. gumm. de Goa. ℥j. levigetur in mar-
more cum ol. stillat. macer. postea adde resin. gialapp. s. a.
solut. ℥ij. cinamomi atutissimi ℥iiij. caryophyll. ℥ij. mace-
ris ℥j. aromata grosso modo incidantur, & c. sacchar. in
aq. cinam. solut. F. morsuli.

Morsuli Cephalici.

℞ Specier. diamb. diamosch. dulc. an. ℥ij. cubebar.
℥ij. cardamom. ℥i. nucis Indic. condit. ℥j. cort. aurant.
condit. ℥vi. medull. nuc. indic. condit. ℥ij. materis ℥j.
sacchar. albiss. in aq. lavend. solut. ℥ij. F. s. a. morsuli
oleo nucis moschat. stillatitio conspergendi.

Morsuli Cordiales.

℞ Confect. alkerm. de hyacinth. an. ℥ss. pulv. nostr.
cordial ℥ij. condit. cort. citri ℥ss. flor. citri ℥vi. spirit.
rosar. rub. Idæi an. ℥i. sacchar. albiss. in succo citri solut.
℥ij. m. f. s. a. morsuli.

Morsuli Pectorales

℞ Spec. diaireos ℥ss. looch. san. & expert. ℥j. flor. Ben-
zoes ℥ss. condit. rad. enula ℥ss. corticis citri ℥i. condita
incidant grosso modo & c. sacchar. albiss. in aq. fenicula
solut. ℥ij. F. s. a. morsuli.

Morsuli Stomachales:

℞ Gran. paradisi ℥ij. Assund. aq. cinamom. ℥iiij
stent in infusione per noctem, mane colentur. In colatura
dissolv. sacchar. albiss. ℥ix. add. specier. aromatic. rosat.
℥ij. cardamom. minor. ℥ij. cubebar. ℥ij. condit. cort. au-
rant.

rant. citri, carnis cyoniorum an. ʒvi. zingiber. Chinens. ʒj. condita & aromata incid. grosso modo f. s. a. morsuli parvi, aspergendi spiritu rosarum in quo ambra gr. vi. dissoluta sint.

Morsuli præserves à peste & morbis epidemicis.

ʒ. Spec. liberant. sine aloe ʒb. de hyacintho ʒij. bol. Armen. terr. sigillat. ligni aloës an. ʒib. rad. zedaira, contra-terva an. ʒiib. condit. rad. Angelic. scerzoner. pimpinell. enula an. ʒvi. cort. citri ʒib. confect. alkerim. ʒb. sacchar. in aqua nostr. be-zardica solut. ʒij. m. f. s. a. morsuli.

Rotula Manus Christi purgantes.

ʒ. Resin. gialapp. f. a. solut. ʒiij. gr. xij. magister. perlar. ʒj. sacchar. albiss. in aq. rosar. solut. ʒij. m. exactissime F. rotula.

Rotula contra Vertiginem & Apoplexiam.

ʒ. Magister. succin. alb. ʒb. ol. stillat. carvi gutt. ix. nuc. moschat. gutt. ix. macer. gutt. vii. sacchar. albiss. in aq. enphraf. solut. ʒb. misc. Fiat s. a. rotula.

Rotula Cordiales.

ʒ. Magister. perlar. coralior. an. ʒij. hyacinth. ʒj. confect. alkerim. ʒb. ol. stillat. cinamom. gutt. vii. citri gutt. v. sacchar. albiss. in aq. carbunc. solut. ʒiij. m. F. rotula.

Rotula Pectorales.

ʒ. Spec. diatreos simpl. ʒb. looch. san. & expert. ʒj. flor. Benzoes gr. xi. sacchar. albiss. in aq. fanic. solut. ʒb. m. F. rotula.

Alia cum floribus sulphuris.

ʒ. Flor. ʒister sublimat. ʒij. looch. de pulmon. vulpis ʒj. gummi. ammoniac. ʒiij. extract. enula ʒj. sacchar. in aq. iussilag. solut. ʒvi. m. f. rotula.

Rotula Stomachales.

ʒ. Rotul. manus Christi. simpl. ʒb. ol. stillat. cinam. gutt. xi. caryophyll. nuc. mosch. an. gutt. ix. citri gutt. vii. misc. F. rotula.

Rotula contra Vermes.

ʒ. Sem. sanct. ʒb. turpeth. elect. ʒij. rhabarb. opt. ʒiij. resin. gialapp. f. a. solut. ʒj. coralline ʒj. ol. citri gutt. vii. sacchar. albiss. in aq. flor. persic. solut. ʒb. m. f. rotula.

Rotula, seu Morsuli ex Hofmanno.

Morsuli Caput confortantes.

ʒ. Cardamom. cubeb. cinamom. el. caryophyll. an. ʒiij. macis ʒj. Nuc. Moschat. num. j. cortic. citri condit. incis ʒj. fl. anthos. betonic. lavendul. borragin. tunic. ana p. ij. pinear. pistac. ana incis ʒiij. nuc. indic. condit. incis. num. j. confect. alkerim. cum sacchar. f. q. solut. in aq. lil. convall. f. q. f. s. a. morsuli.

Morsuli Anti-Phthifici D. D. C.

ʒ. Amygdal. dulc. mundat. ʒj. sem. q. fr. major. excorticat. ʒvi. papav. alb. ʒj. utic. R. bombac. ana ʒiv. terantur in mortario lapideo, affunde aqua Pulmonar. f. q. f. emulsio, cum qua dissolve sacchari albi ʒvi. rosar. tabul. ʒv. violat. tabul. ʒij. spec. elect. resumptiv. rec. ʒiv. diatrag. fr. ʒij. diarrhod. abb. diar. santal. ana ʒb. solut. margarit. Or. corall. ana gutt. xx. ex-

tract. liquirit. ʒj. lact. ʒris ʒj. Pulmon. vulpis ʒj.

Incisa misce ad ignem blandum, instilla in fine extra ignem ol. d. anisi cinamom. ana gutt. v. f. confectio in Morsulis ponderantibus ʒij.

N. Pro divitibus addi potest ambra Moschi ana ʒb.

Morsuli de Citro.

ʒ. Solut. perlar. or. ʒij. dissolve cum f. q. succi citri recent. ad formam pulicula. cortic. citri condit. incis ʒij. & supra ignem in patella solve sacchari albi ʒiv. cum succo citri f. morsuli ponderantes ʒij.

Morsuli Confortantes.

ʒ. Carnis citri condit. nuc. Indic. condit. pyror. moschatell. condit. cinosbat. condit. ana ʒij. cinamom. incis ʒij. Amygdal. dulc. excortic. pinear. excortic. pistac. excorticat. ana ʒb. sacchar. canar. in aq. cinamom. & rosar. solut. ʒvi. f. s. a. morsuli. pro divitibus addi potest confect. alkerim. ʒj.

Morsuli Quærem Stimulantes.

ʒ. Electuar. diasatyr. ʒj. radic. eryng. condit. incis ʒvi. pinear. excorticat. incis. amygdal. dulc. excortic. & incis. ana ʒiij. spec. aromatic. rosar. diarrhod. A. ana ʒb. ambra gryf. zibeth. opt. ana gr. iv. sacchar. in aq. cinamom. solut. ʒvi. f. s. a. morsuli.

Rotula Caput confortantes. D. F. H.

ʒ. Extract. calam. aromatic. ruta ana ʒj. ol. d. rula. succin. ana ʒb. sacchar. alb. solut. in aq. rut. f. q. ʒiv. f. rotula.

In præservatione apoplexiæ, epilepsiæ, vertiginis &c.

Rotula in præservatione & ipso paroxysmo etiam Melancholicæ hypochondriacæ.

ʒ. Spec. diambr. rosar. novell. ana ʒj. margarit. ppt. ʒb. smarag. or. ppt. ʒj. ambra gryf. gr. iij. ol. d. carvi gutt. in sacchari solut. in aqua card. b. ʒiij. f. confectio in rotula.

Rotula in tussi inveterata ex causa frigida.

ʒ. Fl. ʒris f. terebinthin. coct. ut pulverisari queat. ana ʒb. pulv. myrrh. el. sem. angelic. ana ʒb. succ. liquirit. ʒb. sacchar. opt. penid. ana ʒij. cum infus. gummi. tragac. fact. ex aq. iussilag. f. trochisci irrorat. ol. d. anisi gutt. xiiij. S. Huste-Kuchlein.

Rotula, seu Morsuli ex collectione Theoph. Bierling.

Morsuli purgantes.

ʒ. Mechoacann. nigr. ʒii. resin. jalapp. scammon. ʒb. cremor. ʒr. ʒj. sacchar. in aq. ros. dissol. ʒiij. m. f. confectio in morsulis n. x. Dosis mediat.

Morsulatum vitrum ʒij.

ʒ. Vit. ʒij. gummi. tragacanth. ana ʒb. ʒo. anis. f. nicul. a. gutt. iij. sacchar. ʒb. f. l. a. morsuli, addunt plerique croci gr. ix. Dosis horum morsulorum ʒj.

Morsuli de ʒro D. Borbonii quibus renum sehtiam feliciter eluere solitus fuit.

ʒ. Crystall. ʒr. puriss ʒij. sacchar. in decocto brodia cerorum rubrorum dissoluti ʒv. f. l. a. morsuli.

Morsuli contra Catarrhos.

ʒ. Extract. lign. aloës ʒj. nuc. moschat. sic. ʒb. mastich. elect. cubeb. ana ʒj. semin. coriand. ppt. ʒj. sacchari in aq. rosar. solut. ʒiij. f. conf. in morsul.

Noctu ante cubitum sumat partem dimidiam morsuli alicujus.

Morsuli confortantes J. A.

℞. Amygd. dulc. recent. ℥i℥. pistac. pinear. ana ℥℥. sal. margarit. corallior. ana ℥i. confect. alkerm. ℥ii. ʒo. cinamom. ℥℥. sacchar. opt. aq. ros. c. tragac. solut. q. s. F. Morsuli.

Morsuli purgantes M. Lehmanni.

℞. Gummi gott. ℥℥. rad. ireos, ℥℥. croc. orient. ʒ℥. sacchar. alb. in ∇. ros. dissol. ℥ii. F. Morsul. a. ponderent singuli ℥i D. in scatula.

Morsuli nutritivi & refrigerantes in hætica.

℞. Pinear. rec. in ∇. ros. purat. ℥℥. amygd. dulc. ex-cort. ʒv. sem. melon. rec. cucum. cucurb. ana ℥ii. spec. diarrhod. Abbat. ʒv. mag. perlar. ʒi. sacchari albi in ∇. ros. ʒ scabios. dissolut. ℥xvi f. l. a. morsuli.

Morsuli purgantes.

℞. Pulv. jalapp. ℥ii. cremor. ʒr. ʒi. dagryd. gumm. gott. ppt. ana ℥℥. specier. aromat. rosat. diarrhod. Abbat. ana ʒi. Pulv. croc. gr. vj. sacchar. albiss. aq. cichor. ʒ cinam. parum dissol. ℥iiij f. l. a. morsuli.

Morsuli contra ardorem Gulæ.

℞. Lapid. percar. ℥iiij ocul. ʒo. ʒi. creta. macis ana ʒi. terra sigillat. ℥i℥. mastich. corall. rubr. ana ʒi. corn. cerv. ℥i℥. sacchar. in ∇. rosar. dissol. ʒi. f. l. a. morsuli.

Morsuli contra Pestem D. Steinmetzens.

℞. Rad. valerian. angelic. torment. bistort. alb. scord. card. benedict. ana ℥℥. sem. citri. acetos. coriandr. ppt. ana ʒi. flor. borragin. rosar. rubr. macis. cinamom. bacc. laur. ana ʒ℥. bol. armen. ver. ʒii. c. c. ppt. spodi ppt. ana ʒi. santal. alb. citrin. Xyloaloes ana ʒ℥. corall. rubr. ppt. margarit. ppt. smaragd. hyacynth. saphir. granat. ana ʒi. trochisc. de camphor. ʒi. fol. ʒ. n. viij. sacchar. albiss. dissol. in ∇. rosar. ʒ acetos. q. s. f. l. a. morsuli.

Morsuli laxativi D. Doreri.

℞. Agar. ʒi. turbit. ℥℥. dagryd. cinamom. mastich. caryophyll. anisi ana ʒi. sacchar. alb. in ∇. ros. dissol. ʒi. f. l. a. morsuli ℥℥. pro dosi.

Alii.

℞. Turbit. alb. gummof. ʒv. hermodact. ʒii. dagryd. ℥℥. zingiber. ʒi. calam. aromat. mastich. anisi ana ʒi. cinamom. ℥℥. mac ʒ℥. sacchar. alb. ʒvi f. l. a. morsul. cum ∇. menth. Dos. ℥℥.

Alii.

℞. Dagryd. ʒi. ʒ℥. cinamom. elect. ʒi. mac. gr. vj. sacchar. alb. ∇. rosar. diss. ʒiiij. aq. cinam. ℥℥. f. l. a. morsuli. Dos. ʒi℥.

Morsuli Diacitri solutivi Dresdensium.

℞. Cort. citri condit. ʒi. conserv. borrag. violar. ana ʒi. Pulv. turbit. opt. ʒii. dagryd. ʒi. spec. diatragac. frigid. ʒi. sacchar. ʒii. diss. ∇. scabios. f. l. a. morsul. Dos. ʒv.

Morsuli ad caput D. Doreri.

℞. Cinamom. zingiber. Ireos. macis. nuc. moschat. cardamom. cubeb. caryophyll. ana ana ʒi. Fol. euphras. ℥℥. amygd. dulc. mund. ʒi. sacchar. albiss. ʒxvi. solut. in aq. euphras. f. l. a. morsuli.

Morsuli laxativi Ejsdem.

℞. Conserv. violar. borragin. cortic. citri. rad. bugloss. condit. ana ʒii. zingiber. albiss. ʒii. specier. diatrag. frigid. ʒi. dagryd. ʒi. turbit. ℥℥. senna ʒi. sacchar. opt. in ∇. rosar. (dissol. ʒi. f. l. a. morsuli.

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

Morsuli purgantes D. Sultzbergert.

℞. Resin. scammon. ʒiiij. Pulv. rad. mechoacan. ʒviij. flor. rosar. ʒi. parum irrorentur spir. ʒ. l. sacchar. albiss. succ. berber. solut. ʒi. moschi in spir. rosar. solut. gr. ii. f. l. a. morsuli.

Morsuli de rhubarbaro D. Landgravi.

℞. Carnis citri condit. cortic. citri condit. rad. eryng. condit. cichor. condit. ana ℥℥. cinamom. acut. macis ana ʒ℥. rhubarb. elect. crassiuscul. incis. ℥℥. cort. citr. recent. ʒi. succ. citr. q. s. sacchar. alb. in ∇. rosar. ʒ cinam. dissol. ʒviij. f. l. a. morsul. confortantes.

Morsuli præservativi Ejsdem.

℞. Carnis citr. condit. cort. citr. condit. flor. citr. cond. ana ʒ℥. cort. citr. recent. minut. incis. ʒiiij. ʒo. citr. destill. gut. vj. succ. citr. puriss. q. s. sacchar. canar. aq. citri ʒ rosar. dissolut. ʒi. f. l. a. morsuli.

Morsuli contra ardorem stomachi D. Doreri.

℞. Nuc. moschat. ʒi. caryophyll. aromat. ʒi. coriand. oryz. ana ʒi. contus. macerentur per XII. horas in X. acerrim. postea resiccat. ʒ pulveris. adde farin. pisor. ʒvi. lentium ʒi. mac. parum tost. Ligni aloes santal. rubr. coral. rubr. ppt. ana ʒi. cydon. sicc. ana ʒi. persic. sicc. ana ʒi. spod. ex ebore ʒi. Lapid. cancr. ppt. Bol. Armeni ppt. ana ʒi. conserv. rosar. veter. ʒi. rob. berber. cydon. a. ʒ℥. sacchar. canar. albiss. ∇. rosar. dissol. ʒxvi. f. l. a. confect. in morsulos.

Morsuli stimulantès venerem.

℞. Semin. eruc. urtic. anis. fœnic. pastinac. ana ʒ℥. Pulv. priapi tauri, cervi iusto tempore collect. ana ʒi. nuc. pinear. amygdal. dulc. pistac. minut. concis. ana ʒi. nuc. moschat. cubeb. cardamom. ana ʒi. zingiber. ʒ℥. piper. long. ʒi. stincor. Egypt. nō. vj. spec. diamosch. Diamb. ana ʒi. sacchar. albiss. in ∇. cinamom. solut. ʒviij. f. l. a. morsuli adde ʒo. cinamom. gt. viij. fœnic. gt. vj.

Rotulæ Venerem stimulantès.

℞. Pinear. pistac. amygd. dulc. excort. ana ʒii. piper. long. zingib. gran. parad. ana ʒ℥. bolet. cervin. rad. Aaron. ppt. cand. stinc. marin. borrag. Venet. ana ʒi. cantharid. abscess. alis ʒ capitis. nō. vj. extract. diascyrtion. ʒi. sacchar. optim. c. aq. rosar. dissol. q. s. f. l. a. rotula.

Rotulæ laxativæ.

℞. Vitri ʒi ʒi gumm. tragac. ʒ℥. m. ʒo. anis. ʒ℥. sacchar. alb. ʒiiij. f. l. a. rotul. Dos. ʒi.

Rotulæ ambratæ D. Osvalds.

℞. Ambra odorat. ʒi. hanc irrorando spir. rosac. diu tuis contere ut pasta fiat, inde phiala hermetice clausa ut servetur fragrantia atque terra per mensem commenda. postmodum exime ʒ adde: magist. perl. sp. ʒ. l. fact. ʒi. Pulv. rad. ireos. spec. diamb. compl. diatreos ana ʒi. amyl. ʒi. sacchar. cand. alb. ʒviij. penid. ʒi. cum mucia lag. tragac. f. l. a. rotula.

Rotulæ ad aerem in benignum D. Andersoni Angli.

℞. Cort. citr. ʒi. off. de cōrd. cerv. margar. ppt. ana ʒ℥. saphyr. ppt. gr. iij. ʒo. macis gt. ii. cinamom. gt. v. spec. liberant. ʒ℥. diarrhod. Abbat. ʒi. sacchar. alb. clarif. ʒ℥. aq. scord. card. benedict. ana ʒi. cinamom. ʒ℥. coq. ad consumptionem aq. fermentur rotula f. a. quarum unaquaque ponderet ʒi.

Rotulæ purgantes.

℞. ʒr. ʒ. l. ʒi. Zingiber. alb. ʒi. Caryophyll. Gal. ʒ℥. Ppp 3 Nuc.

Nuc. moschat. Mac. ana gr. vj. Pulv. lign. aloes 3B. Cardamom. Spic. ana gr. vj. Scammon. ppt. 3iij. Sacchar. in V. cinam. dissol. 3ii. F. confect. in rotulas dos. 3i.

Rotulæ præservativæ D. Laurentii.

℞. Pulv. Bezoard 3ii. Spec. liberant. f. aloes 3B. diarrhod. Abbar. Confect. de hyacinth. ana 3ii. Magist. perlar. corallior. Corn. cervi. ana 3j. Extract. zedoar. gr. xv. Sacchar. in aq. rosar. solut. 3j. extra ignem adde 3o. de cort. citri 3B. spir. rosar. 3j. f. l. a. Rotula.

Rotulæ contra vermes.

℞. 3o. rut. laurin. ana 3j. Aloes. Semin. sancti ana 3iB. Corall. ppt. 3B. C. Eust. ppt. 3B. Sacchar. fin. 3iii. Dissol. in Aq. menth. q. s. f. l. a. rotula.

Alia.

℞. Sem. sancti 3B. Galang. Zedoar. ana 3B. Fol. sena 3iii. Mercur. dulc. 3B. gr. vi. Sacchar. in Aq. gram. sol. 3iiB. F. l. a. rotula. Dos. 3j. vel 3iB. singulis matutinis.

Trochisci sublinguales.

℞. Zedoar. 3ii. Angelic. Confect. alkerme. ana 3iB. 3o. macis. citri. angelic. ana 3B. e mucilag. tragac. f. l. a. Trochisci.

Trochisci vomitorii.

℞. Flor. 3. debis. ppt. 3B. Gummi. tragacanth. Sacchar. finiss. ana 3vj. 3o. anis. 3B. F. cum diligentia confectio in trochisc. quorum unaquæque iusto ponderar. 3j.

Trochisci moschardini optimi.

℞. Sacchar. alb. 3viij. Pulv. rad. ireos alb. 3B. Mosch. opt. in V. rosar. diss. gr. xii. Cum. mucilag. tragac. albiss. aq. rosar. fact. f. l. a. Trochisci.

Trochisci sublinguales de confectioe alkermes.

℞. Confect. alkerme 3iB. Sacchar. alb. 3xvj. Moschi. Ambra gryf. ana 3B. Mucilag. Tragac. c. aq. rosar. fact. q. s. f. l. a. Trochisci.

Alia descriptio.

℞. Confect. Alkerme. compl. 3i. Succ. kermes 3ii. Mosch. gr. viij. Ambr. gr. vj. Sacchar. Taberzeth. Penid. ana 3ix. Cum mucilag. tragac. aq. rosar. fact. q. s. f. l. a. trochisci.

Rotula & Morsuli ex Hadriano à Mynsicht.

Rotulæ Smaragdinae.

℞. Smaragdi ppt. 3ij. corn. alc. spagyricè calcin. 3iB. Sem. pæon. mar. decrefcente luna collecti. sem. citri de cortic. ana 3j. galang. min. rad. dictamn. alb. gran. Croci rient. præp. Cabeburum Visci quercin. ana 3B. Mag. Perlar. or. Corallor. rub. Hyacinth. præp. ana 3j. Ol. Succini alb. rectif. Nuc. Moschat. Macis Cinamomi ana 3B. Roris marin. Lavendula ana Gut. iij. Sacchari. albiss. in aqua Apoplect. & Epileptica nos. ana absolut. 3xvj. Misc. & fiant l. a. Rotula.

Vires, Usus, Dosis. Miraculosè ab Apoplexia, Epilepsia, Paralyti, &c. præservant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & sensus acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes meditationibus continuis cuiusque variis facultates animales, periculosè debilitantes, maximè juvant atque liberaliter sustentant.

Rotulæ Hyacinthinæ.

℞. Spec. Diarrhod. Abbat. Diamargar. frig. ana 3B. Hyacinthi præp. 3ij. Flor. Nitri 3j. Mag. Corallor. rub. 3j. Ol. Stil. Rosar. 3B. Sacchari. albiss. in aqua flor. Nymphae. 3q. dissoluit. 3xvj. Misc. & fiant l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis. Ad universi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnemque vitium imbecillitatem firman. Syncopen juvant, atque longo morbo dejectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Astmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Dosis à 1. 3. ad 4. & 5. sæpius in die.

Rotulæ Cordiales.

℞. Spec. Diarrhod. Abb. 3B. Conf. Alkerme 3ij. Mar-

garit. Trochiscat. Mag. Corallor. rub. ana 3j. Ol. Cary. phyllor. Macis an. Gut. iij. Sacchari. albiss. in aq. Cinamom. dissolut. 3viij. Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis. Cor insigniter confortant, illud que ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facile à maligno aëre depravetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4. pro una vice.

Rotulæ Pectorales.

℞. Spec. Diarragacanth. frigid. Dia-Ireos simpl. ana 3B. Lact. Sulphur. 3ij. Pulv. Benzoin. 3j. Ol. Fœniculi 3j. Sacchari. albiss. in lact. sem. Papav. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut. 3xvj.

Vires, Usus, Dosis. Ad omnem faucium & lingue asperitatem valent. Pectoris & thoracis gravitatem à causa calida & sicca allevant. Tussientes, Phthilicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus à capite obnoxii sunt, juvant. Dosis quavis hora 1. 2. vel 3. pro una vice.

Rotulæ Pectorales Citrinæ.

℞. Lob. sani & experti Spec. Diarrhod. Abb. ana 3B. Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris ana 3j. Pulv. Benzoin. Rad. Ireos flor. ana 3j. Ext. Croci oriental. Bal. Sulphuris anisat. ana 3j. Sacchari. albiss. in aq. Fœniculi dissolut. 3xvj. Misc. & fiant l. a. Rotula.

Vires, Usus, Dosis. Pulmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum faciunt. Ideoque tussiculosis, Pleuriticis & difficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel pro una vice.

Rotulæ Pectorales Rubræ.

℞. Spec. Diarrhodin. Abb. 3i. Lob. Sani & exp. 3B. Conf. Alkerme 3ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris ana 3j. Pulv. Benzoin. Rad. Ireos flor. ana 3B. Ol. Anis. 3j. Sacchari. albiss. in aq. Hyssopi cum santal. rub. præp. dissolut. 3xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis. Thoracem & Pulmonem expurgant, eosque ad expectorandam crassam & lentam materiam roborant. Hinc Tussi diuturnæ, Asthmatis & Pleuritidi auxiliantur. Dosis à 1. 2. 3. & 4. pro una vice.

Rotulæ Lac Provocantes.

℞. Crystallorum præp. 3B. Corallor. rub. præp. 3j. Margarit. præp. Piperis longi ana 3B. Ol. sem. fœniculi 3j. Sacchari. albiss. in aq. Nuc. Moschat. dissolut. 3ij. Misc. & fiant l. a. confectio in rotulis.

Vires, Usus, Dosis. In provocatione lactis secretum est: dantur Nutricibus singulis diebus manè, meridiè & vespèri 4 aut 5. pro una vice.

Rotulæ Refectivæ.

℞. Margarit. trochiscat. 3j. Mag. corallor. rub. Ambra grisea ana 3j. Sacchari. albiss. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. Ext. dissolut. 3iiij. Misc. & fiant l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Usus, Dosis. In morbis chronicis vires reiciunt, alunt & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt totamque naturam corroborando conservant & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, ut, necessitatis usu ita deposcente, duas vel tres assumantur, & sensim lingua confricentur, & deinde deglutiantur.

Rotulæ Stimulantes.

℞. Borraxis Venet. 3ij. sem. lingua avis 3j. Bole. cervini, carnis scincor. ana 3B. piperis long. 3j. cantharid. corp. ol. cinamomi ana 3B. sacchari. albiss. in aq. rad. styrii & anthos diss. 3vj. Misc. & fiant l. a. Rotula.

Vires, Usus, Dosis. Mirabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læsam virilitatem quam maxime valent. Dosis eundo cubitum à 3. 4. ad 6. plus minusve pro ratione puelli. Sumi etiam possunt post primam coctionem à media scilicet nocte.

Rotulæ Aromaticæ.

℞. Galanga min. ℥ss. calami aromat. gran. paradiſi, zingib. alb. ana ℥j. caryophyllor. caſſ. lignea, zedoaria, pimpinella, piperis longi, ſem. carvi. ana ℥℥. Cubebarum, nuc. moſchat. croci Orient. maceris, ana ℥j. ol. cinamomi, menta criſp. aurantior. roſiſmarini, ana ℥℥. ſacchari albiſſ. in aq. Stomachal. noſt. diſſolut. ℥xvj. Miſc. & fiat l. a. conſectio in rotulis.

Vires, Uſus, Doſis. Omnia membra principalia; utpote: Caput, cerebrum, ſtomachum, cor, hepar, lienem, inteſtina, &c. refrigerata, egregiè caleſcunt, corroborant, atque à doloribus præſervant. Colicam impediunt. Vomitus phlegmaticum ſiſtunt. Appetentiam excitant. Nec non flatus ventriculæ, diſtendentes probè diſcutiunt, omnemque totius corporis noxam à cauſa frigida proficiſcentem curant. Doſis quovis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

Rotulæ Refrigerantes.

℞. Spec. diarrhod. abbat. ℥j. elæſacchari citri, flor. niri. ana ℥ij. cryſtallor. puap. ℥i. tinct. corall. rub. granor. chermes, ſem. alorum. ana ℥℥. mag. ſaturni, ℥j. ol. ſil. roſarum, gr. iv. ſacchari albiſſ. in ſuc. berber. & ribes ana diſſolut. ℥xvj.

Miſc. & fiat l. a. conſectio in rotulis.

Vires, Uſus, Doſis. Inſigniter refrigerant, & ad extinguendam ſum in morbis quaſi ignitis febribusque acutis ſunt admodum convenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum, Cor & Hepar ſupercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quam externas modeſtè delent, ſuaviterque ſiſtunt. Doſis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro una vice.

Rotulæ Carminativæ.

℞. Ol. Carminativi noſt. ℥iſſ. cinamomi, caryophyll. ana ℥℥. ſacch. albiſſ. in aq. carminativ. noſt. diſſol. ℥xvi. Miſc. & fiat l. a. conſectio in rotulis.

Vires, Uſus, Doſis. Diſſipant flatus & ventofitates in Ventriculo & Inteſtinis lateantes. Concoctionem juvant. Acido ruſtui medentur. Nephriticos dolores utinam provocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur neceſſitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro una vice.

Rotulæ Diacymini.

℞. Spec. diacymini, dianiſi, an. ℥℥. diamoſchi dulc. diambra, an. ℥i. balſ. ſulphuris aniſat. ol. ſeniculi, an. ℥j. aurantiorum, macis, an. ℥℥. ſacchari albiſſ. in aq. benedict. ſerpilli noſt. diſſolut. ℥xvj.

Miſc. & fiat l. a. Conſectio in Rotulis.

Vires, Uſus, Doſis. Inteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant, & proſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginofis, Stomachicis, Arteriicis, Tuſſientibus, Aſthmaticis, Cardiacis, Jecinerofis, Lienofis, Inſlaris, Colicis, Quartanaricis & Senibus mirificè ſuccurrunt. Concoctionem juvant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum diſtentionem ſaluberrimè liberant. De quibus ſumat æger unam atque alteram ad libitum.

Rotulæ contra Vermes.

℞. Sec. diacina noſt. ℥ij. ſacchari albiſſ. in aq. rad. graminis & Tanacet. an. ſ. q. diſſ. ℥xvj.

Miſc. & fiat conſectio in rotulis, ut eſt artis.

Vires, Uſus, Doſis. Vermes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque plus minuste, pro una vice.

Rotulæ Mithridaticæ, præſervantes.

℞. Extract. mithridatii cum aceto deſtill. parat. ℥iſſ. corn. cervi ſpagyricè calc. ſem. citri. excort. flor. ſulph. comp.

ſmaragd. præp. boli rub. or. præp. an. ℥ij. rad. tormentilla, zedoaria, an. ℥ſſ. margaritæ trochiſcat. mag. corall. rub. camphora, an. ℥j. ol. ſuccini alb. rectif. angelica, a ℥ſſ. Caryophyllor. ruta, an. gr. iv. ſacchar. cryſtallini in aq. oxalidis & roſar. diſſolut. ℥xvj.

Miſc. & fiat l. a. conſectio in rotulis.

Rotulæ Theriacales liberantes.

℞. Extr. theriaca Androm. cum aceto deſtillat. parat. ℥iſſ. corn. alciſi ſpagyricè calc. terra ſigillata, ſem. acetofa. tinct. ſulph. hyacinth. præp. an. ℥j. rad. enula camp. angelica, an. ℥ſſ.

℞. Lign. aloës ponderoſi. off. de corde cervi, ſuccini alb. præp. an. ℥j. ol. camphora veri, myrrha rub. an. ℥ſſ. caſſia lignea, zedoaria, an. gr. iv. ſacchari albiſſimi. ℥xvi.

Miſc. & fiat Saccharo diſſoluto in aq. Card. Bened. & Scabioſæ, conſectio in Rotulis.

Rotulæ Anglicæ præſervativæ pro gravidis.

℞. Extr. rad. angelica cum aceto diſtillat. fact. ℥iſſ. corn. cervi ſpagyricè calc. terra ſigillata, boli arm. præp. rad. paonia ſem. ſem. acetofa. an. ℥j. margaritæ trochiſc. mag. corall. rub. hyacinth. præp. an. ℥ſſ. macis in aceto macerat & exſic. caſſia lignea, croci or. an. ℥j. ol. ſuccini alb. rectif. zedoaria, an. ℥ſſ. caryoph. citri. an. gr. iv. ſacchari cryſtallini in aq. tormentilla & Veronica diſſolut. ℥xvi.

Miſc. & ſiant l. a. placentulæ.

Rotulæ Zedoartica, Salvificantes pro Pueris.

℞. Extr. zedoaria cum aceto diſtill. fact. ℥iſſ. corn. alciſi ſpagyricè calc. ſuccini alb. præp. terre ſigillata, boli rub. or. præp. an. ℥j. rad. paonia maris, diptam. alb. tormentilla, a. Diſ. ſmaragd. præp. hyacinth. præp. ſem. citri. excort. acetofa, cina. an. ℥ſſ. mag. corall. rub. perlar. or. oc. cancri, off. de corde cervi, balſ. ſulph. an. ſ. an. ℥j. ol. cinamomi, macis, citri, an. gut. iv. ſacchari albiſſ. ℥xvi.

Miſc. & Saccharo ſoluto in aq. flor. Nymphææ & Roſarum ana ſ. q. f. conſectio in placentulis.

Vires, Uſus, Doſis. Contra Peſtis contagionem quam maximè valent: ab illa enim liberant, totumque corpus à corruptione præſervant; & ne à maligno & peſtifero aëre lædatur, tutantur. Doſis tempore neceſſitatis, 2. vel 3. pro una vice.

Rotulæ Catarrhales calidæ.

℞. Spec. diamoſch. dulc. diambra, an. ℥j. arom. roſ. dia. ireos ſimpl. an. ℥ſſ. thuris elect. maſtichis, corn. cervi, præp. an. ℥j. ſacch. albiſſ. in aq. betonica diſſolut. ℥j.

Fiant Rotulæ, quæ ol. Caryophyllorum leniter inungantur.

Vires, Uſus, Doſis. Quando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur, vel ſi ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in ea continetur, functionibus ejus partis læſis, qualitativibus atque excrementis à naturali ſtatu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ per celebres ſunt: omnes enim Catarrhos frigidos ſiſtunt, caput, pectusque confortant. Doſis à tribus ad quatuor pro una vice.

Rotulæ Catarrhales frigidæ.

℞. Semen. papav. alb. contuſ. ℥iv. ſiliquarum craſſiſſimè incifar. ℥ij.

Infundantur per aliquot dies in aq. Scabioſæ & Tuſſiſilag. ana ſ. q. Poſtea deſtillantur, & in hujus ſtillatitii liquoris ſ. q. diſſolve Gran. Maſtichis ℥j. coquantur parum & ſiltrentur, & additis Sacchari albiſſ. ℥vii. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Uſus, Doſis. Quando Catarrhus eſt tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes, per quas deſluit, exaſperantur, & exulcerantur, amaritudo & ſalsedo percipitur. Febris adeſt, hæ Rotulæ valde commendabiles ſunt. Doſis à tribus ad quatuor pro una vice.

Morsuli Cephali.

℞. Conf. flor. pœonia, anthos. an. ℥ss. spec. diamosch. dulc. diambra, crani humani spagyricè calc. cornu alcis eodem modo calc. an. ℥j. rad. & sem. pœonia debita collect. visci quercini, an. ℥ss. ol. succini alb. rect. ℥j. lavendula, nuc. mosch. carvi, an. gr. iv. sacch. albiss. in aq. apoplect. & epilept. nost. an. f. q. dissol. ℥xvi.

Misc. & fiat ut est artis, Confectio in Morsulis.

Vires, Usus, Dosis. A tota substantia tam in curando quam præservando Epilepsia, Apoplexia, Palsy, caro, &c. cæterisque periculosis capitis, cerebri & nervorum adfectibus conferunt. In præservatione Dosis à ℥ss. ad ℥j. In omnibus Lunæ quadris malaque aeris constitutione. In curatione autem datur à ℥j. ad ℥ij. & iij. in ipso paroxysmo Epileptico vel paulò post, per se vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor dosis sufficit.

Morsuli Regii.

℞. Pistat. virid. ℥ij. pinearum mund. amygd. dulc. an. ℥i. margar. trochisc. mag. corallor. rub. an. ℥j. flor. cordial. minutim incise an. p. j. ol. macis, ℥j. sacchari albiss. in aq. rosar. diss. ℥xvi.

Misc. & fiat Confectio in morsulis, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis. Saporis sunt grati & supra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthificos, tabidos, longoque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facile errari potest; Quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægotantis sumi concedenter possunt.

Morsuli Rosati.

℞. Conf. rosarum rub. opt. ℥ij. spec. diarrhod. abbat. ℥ss. de gemmis frig. diamarg. frig. an. ℥ij. conf. alkermes, troch. de berberis flor. nitri, an. ℥i. mag. perlar. or. corall. rub. an. ℥ss. elæosach. rosarum, citri, an. ℥j. cinamomi, macis, an. ℥ss. sacchari albiss. in aq. rosar. & fragor. an. f. q. dissol. ℥xvi.

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis. Ad Capitis, cordis, ventriculi, Jecinoris, Uteri, Renum, &c. intemperiem calidam; Item, ad febres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles longoque morbo dejectos recreant, & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ ac concoctioni auxiliantur; nec non illos, quibus forma corrumpitur, maximè juvant. Dosis à ℥ij. ad ℥is.

Morsuli Pectorales.

℞. Lohoch. sani & experti, ℥ii. spec. diarrhod. abbat. ℥i. flor. sulphur. comp. suc. glycyrrhiz. ext. an. ℥ij. pul. rad. areos flor. alipte mosch. a ℥i. bals. sulphuris anisat. ol. feniculi, an. ℥ss. sacch. alb. in aq. prassii & tussil. an. f. q. diss. ℥xvi.

Misc. & f. ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis. Tussi diuturnæ, vocis asperitati, & Asthmatis strenuè succurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone crassos incidunt, attenuant & inde natum dolorem levant. Dosis quavis hora ad libitum patientis à ℥ss. ad j. & ℥ij.

Morsuli Refectivi de Cancris.

℞. Carn. cancerorum fluviatil. in aquis pectoralib. coct. ℥i. conf. rosar. damasc. ℥ss. pinearum mundat. pistat. virid. amygdal. dulc. a. de nocte in aq. scabios. macerat. ℥i. sacchari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissoluit. ℥v.

Misc. & in fide adde:

Syrup. mastichin. ℥i. laet. sulphuris, ℥ii. margarita trochiscat. ol. nuc. moschat. exp. a. ℥j. bals. sulph. anis. ℥j.

Misc. & fiat, ut est artis, singulari diligentia confectio in Morsulis.

Vires, Usus, Dosis. Arcanum est contra Phthisin & consumptionem corporis, quod multis aliis remediis merito præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conserveat, quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt, & membra principalia confortant. Dosis, sæpius in die à Drach. ij. ad Unc. ss. plus minusve pro ratione complexionis & sexus.

Morsuli Stomachici.

℞. Diacydonii simpl. ℥ii. zingib. de china cond. ℥i. calamit. aromat. virid. condit. ℥ss. nuc. moschat. cassia lignea vera, galanga min. macis, a. ℥i. sem. coriand. præp. ameos, a. ℥ss. ol. caryophyllor. cinamomi, a. ℥j. sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissol. ℥xvi.

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis. Stomachum infrigidatum summopere confortant cibumque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, debilia, corroborant & stipificant. Appetitum & gustum potenter excitant. Flatus discutiunt & ventositates resolvunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Præternaturali calorem restituunt. Fœtorèm corporis remouent, illisque, qui frigida viscera habent, mitem conferunt. Dosis a Drach. j. ad Drach. ij.

Morsuli Hepatici.

℞. Rad. Scorzonera condit. cichorei condit. an. ℥i. spec. diarrhod. abbat. conf. rosar. rub. uvarum pass. an. ℥ss. flor. citri condit. ℥ij. mag. corallorum rub. chalybis cum aceto tamarind. præp. spodi præp. hepatis lupi exp. an. ℥i. sem. acetosa, portulaca, an. ℥ss. flor. hepatica alb. ℥j. sacch. alb. in aq. hepat. frig. & calid. nost. diss. ℥xvi.

Misc. & fiant l. a. Tabulæ auro cooperatæ.

Vires, Usus, Dosis. Ad debilitatem seu imbecillitatem Hepatis valent, ac ejusdem obstructions auferunt, roburque adjiciunt. Morbo Regio, nec non aquæ intercuti, maloque corporis habitui succurrunt. Dosis à Drach. i. ad Drach. ii. & Unc. ss.

Morsuli Martiales.

℞. Limatura martis cum aceto tamarindor. præp. ℥i. cassia lignea vera, galanga minor. caryophyll. an. ℥i. macis, croci or. an. ℥i. ol. cinamomi, ℥ss. sacch. albiss. in aq. absinthii & Centaur. min. dissol. ℥viii.

Misc. & fiat, ut est artis, Confectio in Morsulis.

Vires, Usus, Dosis. Valent ad omnes obstructions, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, Cordis, Capitis. Pallorem faciei, menses morosos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absinthiaci. Utitur etiam post assumptos singulos morsulos, moderato exercitio post horam. Dosis à ℥i. ad iij. pro una vice.

Morsuli Viriles.

℞. Conf. de Succulata Inda nost. ℥j. pistat. virid. amygd. dulc. pinear. mund. an. ℥ss. nuc. mosch. condit. ℥ii. borrac. Venet. galang. min. piperis longi, cardam. min. an. ℥j. verat. tauri, cervi, an. ℥ss. gallia moschat. sem. ling. avis, urtica, carn. stincorum, croci or. an. ℥i. ol. caryophyllor. macis exp. cinamomi, an. ℥ss. sacchari albiss. in aq. rad. satyrii & anthos, an. f. q. diss. unc. xvi.

Misc. & fiat, ut est artis, Confectio in morsulis.

Vires, Usus, Dosis. Ad maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præstant operam: Quos proinde singulariter commendatos velim iis, qui in officio suo tutiores segnioresque facti, ita ut si deferantur ad judicem, causa cadant. Dosis pro prælio feliciter vespere inchoando continuandoque à Drach. i. ad Drach. ij. ad Unc. ss. superbibendo parum vini Malvatici vel alius generosi.

Morsuli Diacretæ.

7. *Cretæ ter. quateruè aq. violar. abluta, 3ß. oc. can-
eri præp. 3ii. nuc. moschat. boli armen. an. 3i. corallor.
præp. 3ß. margarit. præp. cinamomi incis. an. 3i. lap.
carpion. præp. macis torrefact. croci Or. an. 3ij.*

Sacchari alb. in aq. Rosar. dissol. 3viii. t. l. a. Morsuli.

Vires, Usus, Dosis. Valent contra ardorem Sto-
machi, qui alias non periculosus, sed valde mo-
lestus, & aliquando etiam sanis sæpè familiaris est,
cum cibo sumpto, cum jejunis; & imprimis cum
eructare volunt, intercluso quasi flatu igneo, &
erumpere non valente: Hunc ebullientem dolo-
rem sistunt, & causam hujus mali tollunt. Dosis à
Drach. j. ad Drach. ij.

RUBEFACIENTIA, vid. sub titulò, *Attrahentia.*

RUBETA, vid. *Rana.*

RUBIA TINCTORUM.

Rubia Latinis, Græcis ἐρυθρὰ ῥίζα à rubro radicis
colore dicta est. Quæcunque ergo in hoc genere ru-
bro radicis colore sunt Rubias appellandas duximus.

Nom. Rubia tinctorum *Ger.* Sativa *I. B.* Major sati-
va sive Hortensis *Park.* tinctorum Sativa *C. B.*

J. B. Sarmenta longa producit, quadrata, uncinu-
lis crebris hamata, geniculata; ad quorum singulos
nodos folia rotatim radiata circumponuntur, Apari-
nes modo, sed multis numeris majora, consimiliter
aspera, hispida crenulis per ambitum incisa, vestibus
tenaciter hærentia; ex quorum alis pediculi exeunt
flores sustinentes ex luteo herbidos, stellatos, ætrape-
tales (pentapetalos J. B. q.) apiculis luteis: quibus semi-
na succedunt rotunda. Per maturitatem nigra radices
subiungunt numerosæ, reptantes, succulentæ, ruffæ, minja-
teve, dura, lignosa, matrice farctæ, sapore mixto dul-
ci, acerbis & subamaro.

In Hortis colitur magna copia ad lanas tingendas.

Vires, Usus. Rubia tinctorum vulnerum potioni-
bus admiscetur. An verò abstergat & aperiat, an potius
adstringat controvertitur. Quæ adstrictionem ei attri-
buunt adversus fluxum mentium, hæmorrhoidas &
dysenterias propinant. Qui aperiendi facultatem in
ictero, hydrope, urina obstructa & sanguine coagulato
exhibent. Et fortasse utriusque qualitatis particeps est,
primo aperiens, postea adstringens, quemadmodum
rhabarbarum. Quæcunque enim tingendo idonea sunt,
tenulum partium meritò capiuntur, adeoque facile
penetrant & obstructions referant: & pleraque ejus-
modi menses & urinam cient, & ictero conducunt.
Ex altera verò parte sapor acerbis facultatem ad-
stringentiam indicat.

Atinctoribus adhibetur hujus radix ad coloris ru-
bri præparationem.

Expetuntur folia Senensibus mulieribus ad stannæ
vasa detergenda: siquidem mirum dictum quàm pul-
cherrimè nitecant quæ rubiam fuerint experta. *Rains.*

RUBINUS, vid. sub titulò, *Lapis.*

RUBIOLA, vid. *Aparino.*

RUBRICA, vid. sub titulò, *Terra.*

RUBRIFICATORIA, vid. *Sinapismus.*

RUBUS.

Rubus Græcis βάτος, vel quòd virgulta ejus rubeant
dicta putatur, vel quòd mora ejus compressa sangui-
neum succum reddant. Fructu è pluribus acinis arcte
stipatis composito uni & simplici flori succedente, foli-
is in plura segmenta partitis, necnon parvitate &

imbecillitate sua à reliquis fruticibus bacciferis di-
stinguitur.

Vires Rubi vulgaris, seu Sylvestris.

Omnibus propemodum hujus plantæ partibus
multas vires attribuunt veteres, de quibus Plinius &
Dioscorides contulendi. Galeno rubi folia, germi-
na, flos, fructus & radix qualitate adstringente par-
ticipant, eaque non obitura. Fructus immaturus
astringit potenter, maturus temperatior est, & sub-
astringit: hinc in quibuscunque profluviis, vomitu,
fluxu alvi, uteri, narium, &c. utilis est: extrinsecus
in aphthis aliisque ulceribus oris inque Vulneribus
adstringendi. Commendantur à nonnullis, nec præ-
ter rationem, ad scorbutum; siquidem nec facie, nec
qualitatibus multum differre videtur à fructu Chamæ-
mori Alpina, qui ad hunc morbum specificum est.
Quo circa non est cur eorum usus tam severè pue-
ris interdicitur. Dices Galenum affirmare dolo-
rem capitis inducere copiose iis vescentibus. At
Tragus se id necdum expertum esse scribit. Ve-
rùm (inquires) testatur ipse Tragus mora illa ve-
hementer refrigerare, ita quidem ut si quis aquam
superbibat eum horrores febriles continuo obrue-
re posse. E contra J. Bauhinus se sæpius comedisse
copiose, nec nocumentum sensit: ait, quamvis
frigidum & humidum ac pituitosum haberet ven-
triculum, apud nostros infames sunt quòd Acho-
res & tinnam capitis causare credantur, unde &c.
dicuntur & hoc nomine ab eorum usu pueri de-
terrentur. Hoc ego pro populari errore habeo:
nec puto eorum utrum hoc respectu magis nocivum
esse quam aliorum fructuum horariorum, qui si co-
piose nimis ingerantur in ventriculo putrescere apti
sunt, & hujusmodi fortè affectus inducere.

E succo mororum Rubi vulgaris expresso & fer-
mentato cum tantillo sacchari parari potest vini quod-
dam genus satis generosum & gustui gratum.

Flores iisdem viribus pollent quibus fructus im-
maturi.

Foliorum decoctum in gargarismis & collutioni-
bus ad aphthas & ulcera oris utilissimum censetur.

Rubi vulgaris baccæ succum exhibent, qui in
forma syrupi exhibitus maximæ efficaciz est in dy-
suria. D. Needham.

Vires Rubi Idæi.

Hujus baccæ easdem vires obtinent quas rubi vul-
garis mora, magis tamen cordiales sunt & gustui gra-
tiores.

Aqua è moris rubi idæi destillata, vel eorundem
conserva & gelatina, vel syrupus è succo paratus, ad
febres ardentes conducunt, tum propter odorem sua-
vissimum violaceum quem exspirant, saporemque
gratissimum inter dulcem & acidum, quibus & nari-
bus & palato se commendant, corque roborant &
exhilarant. Gesnerus syrupum vel Sapphyrinis vel
Smaragdinis anteferre non dubitavit, idque expertus
in seipso & aliis.

Ex moris rubi idæi exprimi potest vinum ad usus
multos, nimirum ventriculum imbecillum, alvi flu-
xus, variosque gingivarum, dentium, uvulæ, palati
aliarumque partium affectus.

Qui cibos in ventriculo continere nequeunt, &
frequentibus vomitionibus infestantur, his fructus
rubi idæi devoratus, & folia recentia rufa ac foris
stomacho imposita mirè profunt. Trag. tum folio-
rum tenellorum decoctum, tum folia ipsa trita & im-
posita, tum aqua destillata pota & illita, inflamma-
tiones quascunque sedant & restringunt, ut Tragus,
& alii volunt.

Folia

Folia rubi lixivio decocta, si illo caput aliquoties abluas capillos denigrant.

Vino cui infusa sunt rubi idæi mora saporem & odorem gratum communicant. Ex earum etiam pulpa cum saccharo laudatissima bellaria fiunt.

RUMEX, vid. *Lapathum*.

RUPICAPRA. De ejus descriptione, vid. sub titulo, *Capra*. Hic tantum de Partibus ejus, ut & Capri cervæ Officinalibus.

OFFICIN. NAT. EX RUPICAPRA.

1. Sanguis. 2. Serum. 3. Fecur. 4. Fel. 5. Stercus. 6. Lapis.

1. Sanguis recens vertiginis est medela (*bibitus*.)
2. Serum Phthisi exulcerationique pulmonum succurrit, (*cum lacte assumptum*.)

3. Fecur alvi fluxum sistit, (*pulvis assumptus*.) (ad Vertiginem etiam eo utiatur.)

4. Fel oculorum nubeculæ, nyctalopiæque auxilio est.

5. Stercus calamum atterit & expellit.

6. Lapis [seu pila potius] in capsula supra ventriculum nonnullarum rupicaprarum (masculorum imprimis, circa Autumni finem ex radicibus Doronici comestis) reperiri solet, (*ut Bezoar reperitur*), magnitudine variantē, & maxima ad juglandis magnitudinem ascendente, colore nigro, odore dum frangitur gratissimo.

Hujus Vires experientia docuit insignes ad febres malignas, venena, pestem, & sim. Unde alii Bezoar Germanicum vocant. (quidam Agagropilam.)

Dosis gr. xv. ad xx. ad præcavendum gr. iv. vel v. *Cass. Bauh. de Lap. Bez. c. 13*

De Damarum Pilis seu Agagropilis.

Pila Damarum, seu Agagropila pulchrè, & fusè explicatur à D. Welschio singulari tractatu doctissimo. Oriuntur in ventriculi primo, aut secundo loculo, quem venatores capsam, aut bursulam dicunt. Cornigeris enim & ruminantibus animalibus quadrifidus ventriculus est, vel ipso teste Aristotele l. 3. part. anim. c. 14. quem dispecit Severinus p. 303. part. 4. Zootom. Democr. in peram, ollulam, conclave cellularum, & ventriculum proprie sic dictum. Non autem in omnibus rupicapris pilæ reperiuntur, sed saltem in nonnullis, ubi vis coagulans exuperat. Orum trahere putant quidam has pilas à comesto Doronico, cui addit Welschius Scabiosam montanam, Asterem montanum luteum, radicem odoratarum, Chamædrin marem, Veronicam alpinam, Teucrium alpinum, Lotus odoratam, Pimpinellam majorem, Dancum montanum, Carlinam, Imperatoriam, Sedum alpinum, Vitemque Idæam &c. Agagropili, aut Agagropilæ calidæ sunt & siccæ, aperiunt, rarefaciunt, leviter adstringunt, attenuant, & extergunt, ac proinde sunt Diuræticæ, Hydropicæ, Sudoriferæ, Fecundantes, Alexipharmacæ. Usus illarum est in febribus simplicibus, & malignis, capitis defectu & doloribus, affectibusque aliis comatosiis, quæ omnia fusiùs exposita lege apud Welschium. Schröderus.

Capra Alpina seu Rupicapra.) Illarum cruor recens haustus vertigini medetur. Serum pulmonum exulcerationi confert. Epatis pulvis assumptus diarrhæam sistit. Lapis circa Novembrem in masculorum ventriculis reperitur forma oblonga & compressa trium transversorum digitorum longitudinem vix superans, aliquando cute coriacea nigra splendens, rugosa obducta, quædam castaneæ colore, aliæ subcineritiæ, odore grato, aromatico, dum frangitur, quia ex herbis odoratissimis depastis conflata, constantes massa ex herbarum depastarum fi-

bris pilos referentibus, pondere leves. Pila potius sunt quàm Lapides, vide de his Georg. Hieronym. Welsch. de Agagrophilis & Bauhinum de Lapide Bezoar. cap. 13.

Hujus vires experientia docuit &c. Vi pollent calefaciendi, siccandi & cerebrum roborandi, quocirca contra vertiginem utuntur, quem tradunt ex elu Doronici ventriculis Rupicaprarum ingenerari, sed specificam hanc virtutem contra vertiginem potius ab ipsis Rupicapris, quàm Doronico haberi. Animi etiam alacritatem miram & spirituum promptitudinem conferre volunt cum vino sumptum. In partus difficultate internè etiam cum juvamine offertur. Ad secundinas pellendas, suffocationem uteri, menses promovendos, dysentericum fluxum, colicos dolores facit. Ad febres malignas quindecim grana aut viginti in aqua aliqua cordiali dantur. Eodem modo adversus venena propinantur, contra pestem præservationis loco gr. iv. vel v. cum tantillo vini jejuno stomacho manè exhibentur. Si amulei loco de collo gestetur, carnemque tangat vertigini resistere volunt.

N. Capra Alpina: ex quibus dicti Lapides desumuntur, in præcellis Rhætorum & Valesianorum rupibus & albis Episcopatus Salisburgensis vivunt. Hofmannus.

OFFICIN. NAT. EX CAPRI-CERVA ORIENT.

Lapis Bezoar Orientalis, qui est lapis in dicto animali repertus (ac potissimum in proventriculo, hinc & in ventriculo aliisque cavitatibus internis,) figura scilicet variante, ovali, rotunda, sessili & intus cavata, (meditullio paleam, pilos vel simile continens) superficie levi & splendens: substantia è laminis instar caprarum sese invicem incumbentibus compacta: Variante item colore (plerumque atro virente, hinc dilutius virente, palliescente, cineritio, fulvescente, melleo, &c. odore nullo: variante magnitudine & pondere) plerisque scilicet infra juglandis magnitudinem constitutis, nonnunquam & paulo majoribus.

N. Dantur & adulterati seu falsi confecti scilicet ex lapidum fragmentis & pice artificio è coagmentatis: Item ex creta, cineribus testarum sanguine sicco & lapidibus Bezoar minoribus pulverisatis, & cum liquore incorporatis: Item ex & ignis artificiose compactis, titulis, &c. Qui sane non modò cetera utilitatem, sed & cum detrimento in usum accersuntur.

Nota ergo bonitatis ab Authoribus passim notata sunt.

1. Forma à forma renum aut ovi columbini exteriorius levigati diversa utpote quæ signum lapidis adulterati.

2. Structura laminis multis instar caprarum sese invicem incumbentibus, iisque singulis glabris, levibus, splendore coruscantibus: quod tamen alii improbant.

3. Cavitas (meditullium) expers rei heterogeneæ præter pulverem, quidam malunt inclusam paleam, strucam, grana &c. sim.

4. Pondus aliis levius, nonnullis gravius.

5. Commissio cum calce, id est, si lapis humectatus, & calci vel muro affricatus, calcem colore viriditatem: si lapis calce viva (cui admixta aqua) immectus, paulo post flavescat: si lapis charta creta oblita affricatus viridem inducat lineam, si pulvis cum calce viva mixtus colorem ex pallido virentem referat, (quod tamen non de omnibus verum esse prætest.)

6. Friabilitas & dissolutio in ∇ , quæ tamen interdum & falsi lap. propria esse non nequit.

7. Liguatio, id est, si acus candens intrudi possit.

8. Dispa-

8. *Diffinitio fragmentorum cum gypso aut terra cocta (in duritie scilicet.)*

9. *Experimentum.*

Verum enimvero summa in dijudicatione lapidis cautio adhuc bēda est, neque absque notarum syndrome de bonitate quid certi statuere expedit. Præstantissimus tamen inter ceteros habetur Persicus (quoniam in Persia Contrajerva copiose crescit quam depascit capra.)

Vires. Corroborat, sudores citet, Alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, Epilepsia, Lipothymia, Palpitatione cordis, Ictero, Colica, Dysenteria, Vermicatione, Calculo, Mensibus obstructis, partu difficili, Melancholia. Præcipue autem in peste febribusque malignis, venenis assumptis. Quin & extrinsecus adhiberi poterit in scrophulis apertis, cancro ulcerato & similibus.

Dosis à gr. iij. ad xij. Schröderus.

Capri. Cerva Orientalis, è qua Lapis Bezoar Orientalis. Capræ istæ non absimiles valde sunt Capris nostris Europæis, nisi quod habeant erecta ac longiora cornua, ac quædam ex iis versicolore iunt pelle, ut tygrides, hæ capræ prout magnum aut parvum gerunt Lapidem, unamque aut plures, eò tardius vel citius incedunt, id quod Armenis ac Persis perbene notum est. In horum animalculorum ventriculis continetur folliculus pilosa carne contans spiritus longitudine, in quo Lapides ordine instar parvorum nodulorum in tunica tessellatim comprehenduntur.

Officin. Lapis Bezoar Orientalis) Hunc Persæ vocant Pa Zahar, ex Pa & Zahar, quorum prius significat contra, & alterum denotat venenum, quasi Latino etymo antidoton dixeris. Hoc autem modo nascitur, ut Jacobus Bontius ab Armenis ac Persis Mercatoribus fide dignis certo accepit. Est locus in Persia Stabanon dictus, trium dierum itinere supra Larām civitatem celebre in Persia emporium, in cuius campis nascitur herba quædam croco ac hermodactylis admodum similis, in cuius campis caproium copia pascitur, in quorum ventriculis ex huius herbulæ esu hi Lapides in ventriculis caprarum concreverunt. Non desunt, qui radicem ex India ad Nos delatam contrajervam appellatam statuunt in esu huic animali esse frequentiore, vid. Lazarus River. in Praxi Medica Lib. 17. Cap. 1. Hæc licet sint vera, nihil tamen derogant veritatis sententiæ à Jacobo Bontio de Stabanon allatæ, cum verisimile sit non una sed pluribus delectari herbis hoc Animal, unde & Monardes non herba vesci dicit salutaris, sed herbis salutaribus. Hi apud Reges Persiæ in tanto pretio sunt supra reliquos, qui in aliis locis gignuntur, ut Magnus Xaabas Imperatorum Persarum ultimus mortuus Anno 1628. inibi vigiles locaverit, ut omnes istos Lapides Pa Zahar, qui certum pondus excederent, sibi vendicarent. In Not. ad Garc. ab Orta. p. 44.

N. Nascentur & Lapides Bezoar in ventriculis simiarum, qui teretes sunt & digiti longitudinem excedunt, quorum præstantissimi censentur. Idem Bontius l.c.

Meditullio paleam, pilos vel simile continente &c.) Lapis Bezoar semper paleam vel aliud aliquid intus habet, quod nunquam fallit, nisi in adulterinis & si superficiali tunica abraisa non succedat alter orbis comparum modo, donec ad paleam istam deventum sit, fictitius est Lapis.

N. De genuino Lapide scribit Nicolaus Monardes, illum cavitatem quandam in meditullio habere plenam pulvere quodam ejusdem cum Lapide substantiæ, qui maxime commendatur, atque etiam ipsi Lapidi præfertur, & hunc legitimi etiam indicium esse. Adulteratos autem gramen aliquod aut semen habere supra quod Indi illum efformant, vid. Garc.

ab Orta p. m. 168.

Ejus adulterium Nonnulli sequenti modo probare volunt.

Si Lapis fricetur pauca calces, & in loco fricato puniceus appareat color, dicunt verum esse & genuinum. Deinde si ponderatum accuratè Lapidem conjicias in pelvim aqua repletam & post duas aut tres horas eundem eximas ac rursus ponderes, ac nihil de priori pondere aut perdidit, aut eo gravior factus fuerit verus est Lapis Bezoar. Verum si calce fricatus rimam ducat, aut si aquæ exemptus de pondere amiserit, vel eo auctus fuerit, adulterinum esse audacter dicas.

Vires. Corroborat, sudores citet, alexipharmacus est &c.) Nullum dubium est, hunc Lapidem ad varios effectus adhibitum, in primis febres malignas, venena adsumpta &c. summæ esse efficaciam, si verus & non adulterinus haberi queat. Unde & Diomedes Cornarius in libr. cons. & observ. histor. 22. refert. matronam quandam honestam octavo imprægnationis mense febre maligna correptam cum gr. v. Lapidis bezahar sumpsisset in aq. fl. borraginis ab hac febre curatam fuisse. Claudius Richardus in descriptione huius Lapidis memorat D. Staphylum sedecim diebus acuta febre maligna laborantem, tandem exhibitis granis septem huius Lapidis integrè restitutum fuisse. Refertur à Ludovico Gyone Dominum Vicecomitem N. Lutetiæ pestilentia febre correptum & à Medicis desertum, cum focii sui consilio Lapidem Bezoar usus fuisset per aliquot dies patvo temporis intervallo integrè convalescere. De huius usu in aliis etiam affectibus vid. Zacut. Lusitan. de Medic. Princip. histor. lib. 1. qu. 25. seq. Verum si hic Lapis adulterinus, ut ipsi quoque Indici scriptores fatentur, dictos effectus edere nequit. Unde Vir Clarissimus Nardus Antonius Rech. libr. 9. cap. 4. Rerum Medicar. Novæ Hispan. p. 326. inquit. Non omnes hi Lapides, scilicet Bezoar salubres sunt tuenda sanitati, aut morbis profligandis apti, sed soli illi, qui depastis herbis saluberrimis producuntur, unde non solum difficile sit censere, an illæ facultates mirabiles, quæ de eo Lapide nostra tempestate jactantur, narratique & prædicari cœperunt veræ, sed etiam quinam sint eligendi, aut qui utiles aut inutiles offendantur, quibus de rebus certo quid affirmari nequit. Et Jacobus Bontius l. a. hoc confirmat, dicens quantum ad hyperbolicas huius Lapidis virtutes & facultates portentosas non tantas in eo mille experientis edoctus inveni, alias Natura non pronus superstitiosas medicamentorum facultates facillè admittere nisi experientia id verum invenerim. Quomodo Lapis Bezoar adulterari possit vid. Cl. Zuvelfer. in Pharm. restit. Appendice ad animadv. p. 65. Franc. Valles. lib. 4. Meth. med. cap. 2. Hentel. Saxon. de Plica cap. 59. Tractat. meus de Meth. Med. lib. 1. cap. de Alterat.

Dosis à gr. iij. ad xij. Zacut. Lusitan. lib. 1. de Medic. Princip. histor. obs. 34. in diuturnis, inquit, & aliis non ita acutis & periculosis morbis, septem aut octo grana exhibere salubrius est. Si verò sua acutie & malitiæ urgeat affectus, multò majorem quantitatem porrigere non dubitamus. Et observ. seq. 35. nec non lib. 3. de prax. Medic. admir. unam alteramque ad drachmam integram feliciter exhibiti Lapidis huius observatorem adducit. Jacobus Primerosius lib. 4. de vulgi in Medicina erroribus cap. 37. firmiter credit, posse ad 3ja innoxie adsumi, tam benignum atque innocens esse remedium. Quosdam ad grana triginta propinare ex Casalpino Bauhinus refert De Lapide Bezoar. cap. 34. Indifferenter tamen huius dosis adaugeri nequit, sed diligens morbi, ægri &c. habenda est ratio. Ideoque dosis huius Lapidis diligenti perpendenda est examine. Multos enim inquit Petrus à Castro de febre maligna petechial. sect. 8. §. 13. p. 185. vidimus, qui huius sine ullo delectu ingentem granorum copiam exhi-

exhibentes, tantum abest, ut quicquam profuerint, quin potius in ruinam inemendabilem egerint miseros languentes, auxilium infamantes, quod aliis fuisset salutis. *Hofmannus.*

OFFICIN. NAT. E CAPRI CERRA OCCIDENTALI.

Lapis Bezoar Occidentalis, qui est lapis locis iisdem animalis, ut de priori dictum, circa rem heterogeneam in cavitate media contentam, tunicatim concretus, Orientalibus ut plurimum major, superficie scabra, colore cinericeo, albo, nigro, obscurè virente, (qui optimus.)

N. *Præstantiores habentur (uti & Orientales) ex animalibus montanis exempti.*

Vires. Iisdem viribus celebris est cum Orientalibus, cujus tamen bonitati non parum cedit. Hinc utilis compertus est in affectibus cordis, venenis, febribus pestil. quartana, (cujus symptomata mitigat) [Melancholia, morbis diuturnis, Lumbricis, Epilepsia & simil. Nec minus & extrinsecus convenit in vulneribus venenatis] (inspersus.) Monard.

Dosis major quam Orientalis, scilicet à gran. vi. ad xx.

N. 1. *Peculiare habet, quod alvum quoque nonnihil moveat.*

N. 2. *Affertur & Lapis Bezoar ex nova Hispania, sed Peruano aliquantulum vilior, & debilior. Schröderus.*

Capri Cerræ Occidentalis] Ex hoc Animalis Lapis Bezoar Occidentalis desumitur, Orientalibus ut plurimum major, Thom. Bartholinus ad eam ingentem vidit, caput humanum æquantem, rotundum, coloris subfusci, glabrum ac nitidum. Diameter ejus fuit 23. pollicum transversorem, pondere autem 6½ libras mercatorias superavit. Cardinalem Infantem Gubernatorem olim Burgundiæ 6000. Imperialibus à primo venditore eum redimere non potuisse ferunt. *vid. Ejus Epistol. c. 2. Epistol. 79. Hofmannus.*

RUSCUS:

Hæc planta genere cum hypoglossæ & Lauro Alexandrina convenit, ab iisdem differt foliis minoribus, myrti æmulis, mucrone acuto & spinoso, unde & oxymyr sine dicitur.

Nomina. Ruscus I. B. C. B. Park. Ruscus sive Bruscus. Ger. Oxymyr sine.

Duorum dodrantum, nonnunquam etiam duum cubitorum altitudine, densis viminibus, lentis, frætuque contumacibus & striatis fruticat, usque in multos ramulos diductis, in quibus confertissima folia, myrtinis paria, rigidula, nervosa, mucrone infesto pungentia, nullo pediculo ramis hærentia, parte pro-na ad latus inflexa, ut non sursum & deorsum, sed dextrorsum & sinistrorsum spectare videantur, dura & robusta, sapore amara, & adstrictoris vi efficacique pollentia; ad quorum medium flos minimus, per brevi pediculo hærens, enascitur, qui ubi primum oritur, aciculæ nodulum figura sua exprimit: expansus verò tria latiuscula foliola, inferiore quidem sui averseque parte folium, cui quasi stragulo incumbunt, respicientia, linteris in modum excavata, sinuataque ostentat omnia, reliquis interim tribus, quæ ternorum instar radio-rum sunt efformata in angustum apicem desinentibus. Florem deinde fructus sequitur rotundus, Asparago-rum baccis major, rubescens, subdulcis, sub cujus bina pellicula latent semina magna, fulva, altera parte gib-bosa, altera plana, insignis durities. Succrescit quotan-nis nova Asparagorum simillima propago aromatica aliquantulum, amara, ut annotat Lobelius. Radices crassæ, obliquæ, implexæ, fibras demittunt crebras, As-paragorum fibris similes, albas, longas.

Vires. Radix recensetur inter quinque communes aperitivas. Ad tunc & obstructions tollendas non parum conferre ipsi (inquit J. Bauhinus) multoties ex-perti sumus. Usus ejus præcip. in obstructione hepatis [ictero] urinæ [stranguria] mensium, alii de his quali-tatibus dubitant: Alii ut Dodonæus, in ipsis hydropi-cis obstructionibus magna utilitate præscribi posse & solere ajunt.

Jo. Bauhinus textorem quendam sexagenarium, cui pedes & abdomen totum in immensum propemodum tumebant, ipsumque adeo Scrotum capitis pueri ampli-tudinem æquabat; radicis hujus & iridis atque fæniculi decocto ex aqua usu [exhibitis interim etiam eradicati-vè purgantibus aliquoties, administratisque cæteris ad rem pertinentibus, potissimum omni præter jam dicto interdito potu] unius tantum Mensis spatio, D. G. tanta se felicitate persanasse refert, ut ipsemet (textor) sub mensis finem pedes ad se, & sæpius postea gratias habiturus & relaturus profectus sit. Reliqua vide apud J. B. lib. 5. cap. 40. In ossibus fractis consolidandis non minus efficacem esse ajunt hanc radicem polygonato aut symphyto majore.

In Italia ipsum fruticem passim in scopas consue-ni vidimus, inquit Cherlerus, Rustica plebs in carnario suspendit, rueturque eo à murium injuria pernas, & casei sui fiscellas: neque enim acuminata in cuspidem foliorum ejus cacumina penetrare illa animalia au-dent. Marcel.

Barthol. Cabrolus non ignobilis Chirurgus Mon-peliensis, referente J. Bauhino, Rusci radice copiose infusa in aqua, potaque mane & sero per se, & in pas-tu vino permixta, aliisque cibis, ut jusculis, ipsique adeo panî, unius mensis aut quinque septimanarum spatio duas puellas ascite laborantes curavit, ut altera vigin-ti annos sana & incolumis supervixit. J. Bauhinus ex vacationis modo ac impetu (nam ex vulva magno impetu profluxerunt libræ octaginta aquæ sine ulla intermissione) potius hydropem matricis putat fuisse, cum vix credibile videatur tantam aquæ vim ex abdo-minis capacitate sine immensa virium, ac forte etiam vitæ, jactura tam impetuosa & continuo fluxu eva-cuari potuisse.

Exemplum mendici hydropici, in quo decoctum radicis rusci mira perfecit, vide apud Riverium observ. cent. 3. obs. 52. *Raius.*

RUTA.

Ruta, Πήγανον, haud dubiè Græcæ originis est, si-quidem *ῥυτή* apud Athenæum legitur, & Nicandri the-riacorum interpretis & Iolas Græcorum scriptor antiquis-simus & cujus nomen vel olim tantum audiebatur, in Peloponnesiacis suis scribunt, quam tota Græcia *πή-ganon* vocant in Peloponneso *ῥυτή* appellari; & He-tychius *ῥυτή τὸ σέμψυλον, ἢ πηγανὸν λεγὸν* interpretatur. Varro denique lib. 4. de l. l. quæ in hortis nascun-tur aliæ peregrinis vocabulis ut Græcis, ocimum, Men-tha, Ruta quam nunc *πήγανον* appellant &c.

Est autem *ῥυτή* à *ῥύω* seruo, quia (ut Dioscorides docet) volatundinem conservat Voss. Erymolog. *ῥυτὴ δὲ ἢ τὸ πηγανὸν ὁπὸ τῆς διωάμεως ὀνομάσθαι πηγανὸν ἢ ζηγανὸν διὰ θερμότητος τὸ σπέρμα ἢ ὅπως ποτὶ μὲν τῆς πύξης κρύσεως.* Ajunt facultate sua *πήγανον* dictum quod siccitate sua & calore condenset & coagulet semina. Hinc uterum gerentibus inimicum est, *Plutarch.*

Rutæ Characteristicæ sunt, vasculum seminale in quaterna loculamenta partitum, quæ superiore parte aliquotque disjuncta sunt & in angulos elata; fo-lia in plures lobos seu segmenta divisa, glabra, gla-bra, odore vehementi.

Vires. Tota planta gravissimi odoris est, tantæque acrimonie ut per triplices chirothecas ad legētis manus penetrare non semel expertus sum: & si quis quædam

eam decerpit manu faciem demulceat, ilico vehementem inflammationem excitat, quemadmodum rectissime scripsit Dioscorides. Clus.

Ruta (inquirit J. Bauhinus) experientia testis est, ferculis abdicatur, nec culinæ servit, propter injucundum quem habent odorem, & saporem quem obinet ferventem, quo homines graviter efficit, quia tamen omni veneno resistit, ideo peculiaris fit pauperum theriaca. Est enim tantarum virium, ut eas neminem satis describere posse arbitratur. Tragus.

Ruta omnis digerit & incidit viscidos & crassos humores, flatus discutit, à peste aliisque affectibus malignis præservat, visum acuit, somnia venerea arceat & lasciviam reprimat, pleuritidi medetur, imbecillitatem ventriculi corrigit, colicam discutit, morbum canis rabidi curat, menses & urinam movet.

Extrinsecus ejus usus est in ictibus serpentum, carbunculis, febrium paroxysmis arcendis (inunct. dors.) cephalalgia ex crapula, hemicrania, in febribus malignis (pro epithemate pulsum cum sale & aceto) in dolore capitis, febrium ardentium ac malignorum, (similiter pedum plantis adhibita.)

Ob tria autem præcipua celebratur Ruta, 1. Ob castitatem præservandam, & libidinem reprimendam, secundum illud Scholæ Salernitanæ; Ruta facit castum. Cur autem ruta viris coitum minueret, mulieribus augeret, ratio est quod viri calido sunt temperamento, mulieres frigido; interim tamen an revera res ita sese habeat merito ambigitur.

2. Ob visum acuendum; quod & Scholæ Salernitana docet.

*Nobilis est Ruta quia lumina reddit acuta
Auxilio ruta vir Lippe videbit acutè.*

Et alibi,

*Feniculum, verberna, rosa, chelidonia, Ruta;
Ex his fiet aqua quæ lumina reddit acuta.*

3. Ad pestem aliisque morbos malignos & contagiosos præservandos & curandos, vel vino indita, juxta illud ejusdem Scholæ Salern.

Salvia cum ruta faciunt tibi pocula tuta;

Vel alio quovis modo usurpata.

Rutæ præparationes quasdam è J. Bauhini historia proponemus.

1. Rutæ conserva hoc modo fit. 2. Comarum rutæ recentis & foliorum 3j. Sacchari albissimi 3iij. Comarum cum foliis in mortario lapideo tundantur cum pistillo ligneo. Deinde iis optimè tuis saccharum in pulverem tritum adjicitur, rursus omnia simul tantisper tunduntur, donec in unum corpus redigantur, & deinde pyxide vitrea insolentur per mensem.

De hoc sume jejunus contra pestem 3ss.

2. Acetum ita conficies, 2. Comas cum foliis; pone super linteum 24. horas, ut aliquo modo flaccescant: postmodum conscinde, phialam imple, superaffunde vini acetum optimum, obtura & insola; post duos menses cola & serva ad usum.

3. Ut oleum conficias, 2. Rutæ recentis incisæ & contusæ 3iv. olei veteris 7vj. macera ad solem aut in loco aliquo calido diebus quindecim, deinde in duplici vase coquito, & abjecta ruta priori recentem injicito, & iterum quindecim diebus macerato, postea simili modo coquito, & tertio demum idem repete, & colaro.

Si vel oleum rutæ vel defectu illius expressum ex recenti ruta succum capias, & instilles aliquot guttulas in aquam graminis, rutæ, scordii, &c. & pueris propinaveris, feruntur certo experimento lumbrici ad unum omnes emori. Sim. Paulus ad Epilepsiam, 2. Succi rutæ 3j. mel. Scillit. 3ss. m. est præsens remedium epilepticis. Valeriola.

Sylvius prax. l. 1. c. 46, 5. 80. inter medicamenta antepileptica, quæ ibi ordine recenset, primum locum tribuit rutæ tam hortensi quam sylvestri, quarum utraque sale volatili, acri & mordicante, adeoque convenienti spiritus acidi correctorio turget. D. Soame.

Dolzus etiam l. 2. c. 1. §. 19. consulit ut in epilepsia ruta digitis teratur & naso indatur quomodo applicandum Polium Montanum; aliaque salia volatilia naribus admoveantur, quæ inserviunt abbreviando paroxysmos. Idem.

Et Fabric. Hildantis observ. Centur. IV. Succum rutæ in epilepsia sibi in frequenti usu fuisse scribit, ejusque efficaciam & successum senon raro invenisse.

D. Boovle syrupum è succo rutæ paratum in omnibus Capitis & nervorum affectibus summo opere commendat in observationibus ad nos transmissis.

In mensem difficultate Anton. Mizaldus rutam cum vino biffopi coctam & haustam commendat. D. Soame è Dolzæ l. 1. c. 14. §. 14.

Ad matricis suffocationem, 2. fol. rutæ minutim incis. cum albo & luteo ovi agitentur & coquantur in sartagine in formam Aumelette, & calide super umbilicum applicentur. Experimentum erat cujusdam qui etiam ovorum testas imponebat.

Calculo arenulisque pellendis efficacissimam deprehendi dec. rutæ sylvestris quam lapideam vulgo vocant. Achilles Gasserus obs. 70. D. Soame. Rains.

RUTA CAPRARIA, vid. Galega.

RUTA MURARIA, vid. Salvia Vita.

LIBER XVIII.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

S

SABINA

Nomina. S Abina vulgaris Park Sterilis Ger. baccifera & sterilis 7. B. folio tamarisci Dioscoridis C. B.

Sabina Latinis dicta à Sabinorum regione in qua multum nasceretur, Græcis Begdus, perpetua fronde viret, arbuscula humilis est, in latum magis quam in altum proficiens, odore gravi & ingrato, foliis myricæ

Margeri Bibl. Pharm. Tom. II.

Germanicæ pungentibus, sapore acri. Baccas fert junctas perinis pares, per maturitatem atro-cæruleas: has baccas nulli præcedunt flores, sed duntaxat baccarum rudimenta, incurvis pediculis insidentia, ex tribus, quatuor aut quinque viridantibus tuberculis instans Myrmecia verrucæ parvæ composita.

Hæc planta sexu differte videtur: est enim duplex, 1. mas seu sterilis, quæ flores duntaxat profert, non fructus; cujusmodi se Montbelg. vidisse narrat J. Bauhinus

sapius florentem, verum nullas unquam baccas in ea observasse; sterilem etiam mansisse variis in locis à se plantatam.

2. *Fœmina seu fertilis*, quæ baccas profert non flores.

Botanici plerique Sabinam vulgarem omnino sterilem faciunt; verum id naturæ analogiæ repugnat, & J. Bauhinus diserte affirmat eam baccas proferre. In nostro solo & cælo raro, fortè nunquam fructum edit. At in loco natali, Amani & Olympi Ph. ygiæ cacuminibus proculdubio ferax est.

Vires. Sabinæ folia siccant & calefaciunt strenuè, in pulverem redacta & cum melle illita fluentibus ulceribus medentur, nigra & sordida expurgant, nomas sistunt & collectiones mitigant. Cum flore lactis temperata scabiei capitis puerorum unicè presunt. Porro essentia tenuitate mentes quoque provocant, ut si quid aliud, & sanguinem per urinas movent. Partum quoque viventem interficit sabina, & fœtum mortuum ejicit; certè hoc nomine nimis nota est ejusque usus frequentatus fœminis inhonestis & meretricibus.

Aqua è foliis sabinæ destillata Maculas faciei absterget, & ut quidam, vertigini conducit.

Oleum sabinæ ventri inunctum, aut frondes ejus tuse & umbilico impostæ vermes puerorum enecant. Decoctum intro assumptum idem præstat: verum usum ejus interitum minus tutum putat Parkinsonus. Nostamen novimus succi expressi cum lacte mixti cochlear unum saccharo edulcoratum maximo cum successu pueris verminantibus exhibitum. Estque sane medicamentum efficacissimum & minimè periculosum, quod post alia multa incassum usurpata optatum sæpenumero, ne dicam semper fortitur effectum etiam in deploratis penè. Equis etiam & bobus in eundem usum frequenter exhibetur. *Rains.*

SACCHARUM.

De eò vid. sub titulò ARUNDO, in ARUNDINE SACCHARIFERA Hic tantum de quibusdam ejus præparationibus uno verbo ex Schrôdero & Hofmanno.

Præparata ex Saccharo.

1. *Saccharum Penidium.* Hoc fit, ℥. Saccharum q. v. dissolve & clarifica per alb. ovi. Hinc cola ac inspisse lentè, donec bullæ magnæ apparuerint. Hinc retrahere ab igne, ut bullæ resideant, effundeque in tabulam oleo amygd. [vel Butyr. insulf.] illitam, atque ubi nonnihil induruerit, de unco suspende, manibus celeribus [amylo conspersis] distrahe in formam debitam ac repone.

2. *Saccharum rosatum.* Fit ex sacchar. in succ. ros. soluto.

3. *Saccharum Violatum.* Fit eodem modo cum succo violar.

4. *Aqua seu spiritus acidulus* ℥. Sacchari (℥ij.) destilla ex cucurbita vitrea sat alta & ampla (quippe facile in altum attolitur.) igne arenæ per gradus (NB. vel Retortam adhibere poteris,) sic extillat aqua acidula, cum oleo supernatante: Rectifica VB. si placer, oleumque à spiritu separato.

Vires. Spiritum hunc in dissolutione lapidum aliorumque crustaceorum adhibere licet, & est instar spiritus Guajaci.

5. *Olenm.* Ex prioribus pater.

6. *Sal.* Ex relicto capite mortuo, ulterius incinerato elixiviat.

7. *Liquor seu Syrupus.* ℥. Sacchar. cand. q. v. affunde sp. vini ad eminen. digit. i. accendatur, efflagretque ad consistentiam syrupi.

Vires. Prodest in tussi, aliisque affectibus pulmonum, incisione, ac levigatione opus habentibus.

N. *Liquor hic apud vulgus usitatissimus est, magna astimationis.*

8. *Liquor alius.* Inde Saccharum candidum albumi ovi cocti ad duritiem, repone ad liqueendum.

Vires. Exhibetur ad tussim & asperitatem gutturis infantum. Extrinsecus confert oculorum rubedini.

9. *Essentia & crystalli Sacchari.*

Essentiam & crystallos Sacchari paravi, ut repries publicatum centur. 3. artic. 20. Kesleri. Addo autem pastæ ex sacch. & Acet. destill. factæ cochleare unum ac alterum ol. Tartari, materiam relinquo in digestionem cinerum per 24. horas, postea pro ℥ij. sacch. affundo V non rectif. mens. ss. digeratur denovo, habebis Tincturam corroborantem.

Dof. schl. ij. Sam. Closs. Schrôderus,

Præparata 1. Saccharum Penidium.] Hoc quodammodo à Saccharo communi albo differt non solummodo substantiæ, & ratione coctionis & singularis modi efformandi in manuali operatione consistentis, unde singularem acquirit texturam, sed & ratione puritatis, & quod partes alienas, quales oleum amygdalarum dulcium & amyllum, habeat admixtas.

Aqua seu Spiritus acidulus.) Rec. Sacchari soluti ℥. q. candefac lateres & superfunde illis usque dum nihil amplius attrahant, tunc pelle per retortam spiritum, qui gemmas solvit & summum est areanum in calculo.

N. Omne Saccharum acidum in se continet, & quod Scorbuticis & febricitantibus nocet, quo variæ vitiosas effervescentias suscitât & ventriculi vitale fermentum corrumpit.

N. Nonnulli præparant ex Saccharo & O calcinato menstruum, ad solutionem perlarum, corall. & c. incomparabile.

Præterea conficitur etiam ex saccharo Syrupus: Essentia & crystalli sacchari ad tussim & asperitatem gutturis egregiæ virtutis. Sed Sal. ex relicto cap. mort. melius momenti est, quod D. Autor. allegat. Hofmannus,

SACCHARUM TABULATUM, vid. Tabella.

SACCHARUM SATURNI, vid. sub titulò Plumbum.

SACCULUS.

Sacculus fomentarius fieri potest ex vegetabilibus quibuscunque incisis, sc. crassiusculè contusis, sacculoque insutis.

Applicantur tepidè sive siccum sacculum velis, sive humidum, id est, in liquore aliquo coctum & compressum.

Exemplo sint.

Sacculus stomachalis.

℥. Herb. menth. crisp. calam. origan. betula. absinth. an. m. j. majoran. fl. rosar. rubr. an. m. ss. com. mell. odora. p. i. rad. calam. arom. Zij. nucis moschat. num. i. baccar. laur. Zjss. sem. anis. carv. cym. an. j.

Ex conquassatis & incisis F. Sacculus stomachalis cancellatim intersutus.

Vires. Confortat Ventriculum. Crato.

Sacculus cordialis.

℥. Fol. meliss. m. j. basilic. card. bened. an. m. ss. tal. citrin. Zij. cort. citri. arantior. an. Zjss. flor. laur. cinamom. galang. nucis mosch. nucist. macis an. Zij. aloës Zjss. sem. citri. meliss. an. Zjss. fl. borrag. bugloss. thos. meliss. an. p. i. rosar. p. ss.

Ex his crassiusculè contusis, F. Sacc. intercepto serico.

Vires. Consert in palpitatione. Crato.

Sacculus Nephriticus, seu Paregoricus.

℞. Herb. matr. heder. ter. bisulv. ceresfol. parietar. an. m. s. rad. alth. lil. alb. an. ℥i. sem. fœnugr. ℥vi. fl. camomill. melilot. saxifrag. an. p. i. contusis & incisis, F. sac.

Incoctus aquæ pluviae, lactivè applicetur renibus in dolore nephritico.

Huc pertinet & Cucupha, cujus Exemplum sunt, Species pro Cucupha, F. F.

℞. Rad. ireos fl. ℥ss. cyper. rot. ℥iii. fl. lavendal. an. mos. an. ℥iii. fol. menth. majoran. ocym. an. ℥ij. storac. cal. benzoin. an. ℥i. sem. nigell. coriandr. prep. summ. thymi. stœch. arab. an. ℥j. mosch. gr. iii. ambr. gryf. gr. ij. F. Pulvis grossus, qui in gossypio susceptus inluatur pileolo serico, interpassando. Schröderus.

Sacculi Cordiales pretiosi, Zuvelseri.

℞. Styracis calam. Asa dulcis an. ℥vi. Ladani opt. ℥ss. ligni aloës opt. Rhodii, cupressi an. ℥v. cort. arantior. recent. citri recent. extim. an. ℥i. flor. arantiorum recent. Rosarum pallidarum recent. Lavendule, Tunisæ rub. an. recent. ℥j. caryoph. ℥vi. cinamomi opt. ℥i. nucis mosch. ℥i. croci Austr. ℥vi. moschi Orient. Si lubet, ℥j. vel ℥ss.

Incidentur & contundantur minutim, fiantque species grossæ, quibus repleantur sacculi cordis figura, ex zendalo rubro, & nonnihil interpassentur, quippe qui vel collo suspendi ad regionem cordis, vel cum aqua aliqua cordiali, aut cum aceto Alexipharmaco sæpius humectari, cordi ad moveri possunt, ut & pulsibus, vitales spiritus egregie roborantes. Convenit pariter easdem species grossas nodulis includere ad magnitudinem nucis juglandis, qui aceto rosarum aut alio madefacti, navibus infirmorum in Lipothymiis, aliisque cordis defectionibus ad movendi; verum pro epilepticis, Apoplecticis & hytericis nonnihil de castoreo, dempto moscho, admisceatur.

Nota: quod recentes Arantiorum & citri cortices, flores item recentes, facillimè cum reliquis speciebus si cioribus commixti, exsiccentur, & mutuo fragrantiam suam sibi invicem communicent, ut adeo peculiari exsiccatione opus non sit, qua fragrantia eorum spiritusque subtilis & sulphurei magis exhalarent. Huc pariter referantur species seu pulvis grossus pro roborando corde, simili forma sacculis pro corde & pulsibus includendus, & in classe præcedenti de pulveribus præscriptus.

Species grossæ pro sacculis contra pestem. Zuvelseri.

℞. Rad. Levistici, angelica, zedoaria an. ℥i. herb. Basilicon majorana, melissa, rorismarini, ruta an. ℥vi. cort. arantiorum, citri an. recent. extim. ℥i. myrrhe rubra, caryophyllorum, nuc. moschatar. gravorum juniperi an. ℥vi. camphora ℥ss. ol. still. ligni Rhodii ℥i. ruta ℥j. & si lubet salis volatilis urina ℥ss. incidentur contundanturque crassiusculè, fiant sacculi de zendalo rubro, collo appendendi.

Numerantur inter externa medicamenta & pesti uterini: ut ergo formulæ quædam ad sint, sequentes subdo.

Sacculorum aliorum aliquot Formula
Ioan. Michaelis.

Sacculus in Dolorè Capitis.

Rec. Milii Hb. s. vulg. ℥iv. herb. verben. flor. chamom. rom. summit. anethi an. m. i. rad. rhod. ℥ss. mi-
Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

lium & s. primum torresiant in sartagine & protinus sacculo calido induntur, additis dehinc reliquis: Ita capiti calidè applicantur. Fiunt 2. Sacculi: Milium, sal & arena, in omnibus affectibus, ubi discutendum, satis sunt commoda.

Sacculus ad Ventriculam.

℞. Herb. menth. sum. absint. flor. ros. rub. chamom. rom. an. m. i. rad. cal. arom. ℥ss. zedoar. galang. a. ℥i. nuc. mosch. n. 2. caryoph. macis a. ℥ss. mestichis ℥ii. f. l. a. Sacculi n. 2. Cum syndone, interpassentur. Adspersi possunt cum m. methæ, vel m. stom. cōposito, vel q. aliis appropriatis.

Sacculus in Pleuritide Notha.

℞. Aven. milii s. commun. an. m. i. flor. cham. melilot. an. m. s. sem. cumini ℥ss. lin. fœnugraci an. ℥ii. f. l. a. Sacculi interpassati n. 2.

Sacculi ad Cori

℞. Herb. meliss. m. s. flor. ros. rub. cord. a. p. 2. cal. p. i. croci ℥i. flaved. cortic. citri rec. ℥ss. sem. meliss. ocymi an. spec. cord. temper. ℥i.

F. l. a. Cum syndone sacculus interpassatus in forma usitata. Pro Ditiorebus potest addi aliquid de moscho & ambra & adspersi m. ros. vel v. carbunculi aut melissæ cum vino, vel q. stillatit. carbunculi.

Tempore pestis preparantur ejusmodi sacculi ad cor ex cordialibus, additis alexipharm. cordialibus.

℞. Flor. borrag. bugloss. meliss. calend. an. p. ij. tunice p. j. spec. pro episth. cord. ℥ii.

F. Sacculi interpassati cordiales.

Sacculus contra Colicam.

℞. Milii, avena, s. com. an. m. j. flor. chamom. m. j. fol. lauri m. s. baccar. lauri ℥ii.

F. l. a. Sacculi interpassati N. ij.

In affectibus uteri & post partum ejusmodi Sacculi conveniant: Additis uterinis.

Sacculus ad Pulsum.

℞. Flor. cordial. an. p. i. spec. cord. temper. ℥ii.

F. l. a. Sacculi N. ij.

℞. Saccul. ad puls. usit. N. ij.

S. Ut supra & applicentur cum v. carfuniculi.

Sacculus refrigerans in dolore capitis.

℞. Flor. violar. rosar. nymph. an. p. j. sem. lactus endiv. papay. errat. albi an. ℥i.

F. Sacculus oblongus.

℞. Panni scarlati minutissimè in lanam tuss q. v. caryophill. nucis mosch. baccar. lauri an. ℥i. rorismarini flor. lavend. an. p. j. sem. carvi, cumini an. ℥ss. flor. stœch. Arab. succini albi an. ℥i.

F. Cum syndone rubra sacculus quadratus, impone per noctem in vino Malvatico & iterum exsicca.

SAGPIA, vid. Sepia.

SAGAPENUM.

Serapinum offic. à Sagapeno corruptum est. Sagapenum Plinius à Sagapeno aperte distinguit lib. 20. cap. 18.

Est autem Sagapenum Dioscoridi succus herbæ ferulaceæ in Media nascentis. Schröderus lachrymam seu gummi arboris cujusdam ferulaceæ describit ejusdem nominis ex qua sauciata educitur. Galenus stirpem ipsam Sagapenum primariò vocari ait, succum abusive, cum rectius Sagapeni succus diceretur.

Quemadmodum autem olim incognita erat plantæ quæ succum hunc dabat, ita & hodie quoque Casp. Hofman.

Sagapenum ita describit J. B. guttis constat magnis velut thuris mammosi aut masouli (interdum in glebas magnas coactū, opopanacis modo rufescentibus, intus corneo quodā colore præditis sub dente vel etiā digito lentescētib; albescentibusq; mordaci acris sapore,

Qq q 2 odore

odore viroso, candelæ admotis flammam concipientibus; assulæ rarius in massa inventæ, substantia fungosa, alba, foris purpurascens, rarius adhuc caulibus ipsius portiones justæ, digitalis crassitudinis, striatæ, fibris longis contextæ, quarum spatia opplet fungosa laxaque substantia: semen quoque gemellum, ferulaceo par, semuncia longius, semunciam fere latum, impuriore sunt glebræ quarum vix grumos internoscas, ita omnes sunt concretæ veluti fuscæ, colore sordido, sapore & odore simili.

Notæ bonitatis Dioscoridi sunt pellucidum esse, extrinsecus fulvum esse, intus album, odorem inter Silphii succum & galbanum medium habere, acrem saporem. Mesue colore, medium esse inter subrubrum & subalbum, odore porri in aqua resolvi facile (quod nec Assæ, nec Galbano contigit.)

Sed quo sensu (inquit Casp. Hofmannus) accipere oportet illa in Galbano *δρακονίδος ἢ κνέβου ἔσθ*, non esse amplius Galbanum, sed transire in Sagapenum modo in aqua dissolvi? hoc, norim illam facile in aqua dissolvi non esse propriam Sagapeno, sed convenire etiam deteriori Galbano. Unde & ab odoris convenientia valde adjuvatur sententia Lob. & Penæ Adv. p. 349. Tria hæc gummata Sagapenum, Assam, Galbanum esse cognatarum plantarum ferulacearum natalibus differentium succos.

Vires. Sagapenum potentissimè aperit, discutit & attenuat, non leviter etiam abstergit, facit (autore Dioscoride quocum & Plinius consentit) ad thoracis & laterum dolorem rupta, convulsa, & tusses venteres. Crassa in pulmone hærentia repurgat. Datur & Comitialibus, opisthotonicis, splenicis, paralyticis perfrigeratis, in febribus per circuitum repentibus, sed & in unguentis commodè adhibetur. Ducit & menses & foetus corrumpit cum aqua nulla potam. Auxiliatur commotis à bestiis venenatis cum vino sumptum. Excitat eas quæ ab utero strangulantur, si cum aceto ipsum olfaciant. Deterit Cicatrices oculorum, & quæ pupillis tenebras offundunt, & suffusiones.

Inter purgantia validiora habetur. Mesue ait nocere ventriculo & hepati, corrigit adstringentibus, & tonum conservantibus ut spica, mastice, &c.

Vires. Summatim recenset Schröderus. Tanta extrahendi vi pollere dicitur, ut quoque spicula è carne eliciat. Purgat lentos & crassos, imo & serosos humores ex ventriculo, intestinis, Utero, renibus, cerebro, nervis, juncturis, pectore. Hinc prodest in hydropè, tussi inveterata, asthmate, cephalalgia, spasmo, epilepsia, paralyti, tremore artuum, in obstructione & tumore splenis, febribus intermittentibus, dolore colico, menses ciet, (sed foetum enecat) urinam movet. Convenit extrinsecus in pleurisi aliisque tumoribus ac doloribus mitigatione & resolutione opus habentibus. Fumus excitat epilepticos, hordeola ciliorum sanat. Dosis à 3℔. ad 3j.

SAGITTA in Genere.

Est superior pars surculi seu flagelli alicujus plantæ.

Sagitta planta in specie.

Sagitta dicitur hæc herba, quod ejus folia alata sagittæ cuspidem proxime referant.

Nomina. Sagitta minor J. B. Aquatica minor latifolia C. B. minor latifolia Park.

J. B. Sagittæ radices sunt multæ, albæ, crassiusculæ, fungosæ, non sine capillaribus fibris, à quibus propagines nascuntur longissimæ, interdum bicubitales, junceæ tenuitatis, subter aquam serpentes, similes radicibus Lysimachia luteæ. Folia aquis innatant raræ formæ, alata sagittæ mucronem æmulantia, fuscis hinc inde in superna parte maculis notata, quædam ex primis in acumen non desinunt sed re-

tundantur. In eorum porro singulas alas longi, terni aut quini nervi porriguntur, obliquis à nervo in nervum venulis intercurrentibus, lævore plantaginis aquaticæ, pediculo minimi digiti crassitudine, fungoso, striato, pænè triangulo, duos aut tres cubitos longo pro aquæ profunditate in qua vivit. Folia sapore nonnihil subdolei & viscido cum vestigio obsecuro acrimoniæ: caules rectos duos aut tres emittit, non multo foliis altiores, rotundos, fere, striatos, crassos, fungosos, in quorum parte superiore plures flores exoriuntur, plerunque terni, caulem amplectentes, ex pediculis sive ramulis, modo longiusculis modo brevioribus, pulcherrimi, mediocriter magni, tribus foliolis albis constantes, ungue purpurascens notatis, florum Amygdalarum foliolis paulo minoribus, in medio apices multi rubentes; sub flore tria foliola viridia. Flores excipiunt echinata capitula, subpurpurea, magnitudine pænè fructuum arbuti vel fragorum, ex aculeis velut constantia, qui nihil aliud sunt quam semina lata compressa in acumen desinentia unguibus avium similia.

In aquis leniter decurrentibus frequens est.

Sagittæ tres species seu varietates constituunt Botanici.

1. Sagittam majorem J. B. Ger. quæ aquatica major C. B. major latifolia Park. minori angustifolia jam descriptæ, excepta magnitudine, per omnia similia, verum folia non usque adeo acuminata habentur.

2. Sagittam latifoliam minorem, superius descriptam.

3. Sagittam minorem angustifoliam J. B. quæ aquatica minor angustifolia C. B. Sagittaria minor angustifolia Park. Hæc minori descriptæ per omnia similia, sed omnia minora sunt ei, foliaque angustiora multo, magisque acuminata.

Hæ tres varietates non videntur nobis inter se specie differre; siquidem promiscue in iisdem aquis pæpe oriuntur, unde & eidem semine ortum suum debere videntur. *Raius.*

Refrigerans est hæc planta, adstringens ac condensans.

S A L.

Ac primò de Salibus in Genere.

Sole & sale nihil in mundo utilius homini esse, vulgatum est assertum. Sali inter reliqua principii nomen attributum est, adeò latè quippe patet, ut omnia sale constant, nulla salis sint expertia. Merito igitur de hoc velut crure Pharmaciæ dicendum venit. Ob vastissimum verò ambitum salium, ut conceptum genuinum de iisdem formemus, operæ pretium est, eisdem lustrare curatius paulo. Hinc not.

1. *Salia sunt vel nativa, vel arte facta; explicita separata, vel implicita.* Nativa quæ sint, facile clarescunt, quæ per se scilicet absque artis ope nascuntur, & producta se exhibent, seu immersa vehantur hospitio amicissimo aquæ, exemplo maris & saluginum variorum, seu effodiantur è terræ criptis, ut sal gemme fossile, crystallinum, seu efflorescant è petris cellisque &c. Nativa porro dici possunt alia absolute talia, alia secundum quid, naturæ obstericantæ arte. Et hæc distinctio salium generalissima & summa videtur, cui reliqua omnia substant, tanquam summo generi. Hinc etiã prædicari idem potest de omnibus speciebus salinis, quæ simul, quantum hæc illustrare possunt, attendemus. Sic sal falsum aliud est nativum, aliud arte factum. Sic nitrum nativum, aphronitrum, datur, & vulgare factitium. Sic vitriolum aliud est nativum, aliud arte factum. Ole, Gum &c. Sic \odot cum nativum habet, tenus quidem in officinis reperiri desit, reverà tamen datur, & copiosissimè quidem prope Puteolos, & mon.

montis Vesuvii confinia, eadem omnia exhibens, nostra experientia, quæ factitium. Idem quoque de alumine asserere integrum est. Et factitia quidem hæc adeo celebrata sunt, & communia, & pro natiuis vel quasi talibus habeantur, unde si artis & naturæ conjungamus operas, tanto expromptius singula patebunt. Eadem verò simul nosse expedit & separata, prout vel natura, vel arte à reliquis principiis sejuncta sunt & per se extant; alia implicita, ut, si non formaliter, tamen materialiter mixtis insint, & separari possint, quod necessarium est, velut medium inter naturæ & artis opera. Quæ non patent natura, ars in aprium producit, *dianction* & *oxyneion* decantata mediante.

2. *Salia sunt vel simplicia vel composita, concreta vel fluida.* Non possumus composita nosse, nisi simplicia noverimus. Hinc sal, ut principium, concipiendum est tanquam simplicissimum, ex quo videlicet omnia reliqua fluunt. Alia verò iterum sunt simplicia exquirere, reverà, & sensu rigoroso, alia secundum quid. Hinc, si rigorose examinemus salia extrantia & producta omnia, sensu accuratiori, dicenda sunt non absolute simplicia, & consequenter principia, quin principiata potius, quod urgent hodiernum quidam, ut subruant principiorum Chimicorum dignitatem. Satis tamen est, illa esse simplicia quoad maximam partem, & à potiori, reliqua in subdominio, iisdem non tam juncta, quam subdita; quin Deus O. M. studio illa mixta voluit, ut ex mixtura simplicitatem nosceremus. Nullum enim dici compositum potest, nisi quod ex simplicibus constet. Satis quoque est, ut hoc etiam addamus, metiri nos posse magis composita ex magis simplicibus, & combinationem hinc salium simplicium varia composita largiri. Hæc ipsa verò singula vel concreta sunt, salis genuino titulo venientia, corporatura solida gaudentia, vel fluida & liquida sunt, sub vehiculo alieno aquæ. Quod simplex erat absolute, sensibus incurrere minus poterat, hinc salibus corporaturam & consistentiam largiuntur duo communia illa, terra quidem solidam, aqua verò fluidam. Sed cum terræ particula magis sint abscondita, minusque respectivè separabiles quam aquæ, usui obtinuit magis, ut salia *καλ' ἐξοχῶν* dicantur concreta, quæ sunt & sibi sic magis relicta.

3. *Salia sunt vel alcalia, vel acida: vegetabilia, animalia, mineralia.* Ut salia maxime sunt activa, ut maxime diffusa, sic non unum solum seu uniforme deprehendere & statuere licet, sed geminum, idque diversum, imò invicem contrarium sibi, ex quibus hinc mixtum non unum conficitur. Noscuntur eadem sensu, sapore scilicet, noscuntur effectibus aliis. Manifestius sensum ferunt acida, magis obvia, utpote magis fixa & sibi hinc relicta; minus alcalia, præterquam volatilia, utraque pro immutationibus sulphuris & mixtorum ipsorum variè combinata. Sal vulgo constantiæ & stabilitatis lemma est, quod de statu quietis & proprio est verissimum; immutationem verò præstat unicè sulphuris vitalis, prout vel concentrat idem, vel explicat. Sal mixtis mixtionem quasi præbet, ejusdemque termino anima est materialis. Alkali dicitur recepto termino, ut innuatur, tale intelligi, quale ex incineratione herbæ kali, tanquam exemplo universali, emergit, alias lixivum seu lixiviosum, ut innuatur parandi modus, qui tamen communis cum acidis est per analogiam. Descriptiones alcali & acidi variæ possunt dari, prout comparatione ad se invicem, vel ad alia principia considerantur. Cum enim duo hæc sint simpliciora genera salium, quibus acquisitis intellectus cogitur subsistere, sal acidum dicitur communiter, quod effervesceit cum alcali, alcali

quod effervesceit cum acido, puta non interveniente alio medio implicantis sulphuris. Hujus verò respectu alcali dici potest, quod sulphur rarefacit, acidum, quod obrundit. Alkali mercurium seu partes evaporabiles liberat magis, acidum figit. Vi verò principia chimica in genere ex minerali regno primitus orta videntur, unde & nomen retinere: sic merito mineralia primum obtinent locum. Gaudent & salia suis mineris, velut seminariis & capfulis, è quibus deprimi possunt & erui; hinc minera aluminis, minera vitrioli in usu est & obvia. Mineralia magis acido gaudent sale, vegetabilia acido & alcali, animalia alcali, ut vel hinc pateat, acida durationem, alcalia fluxilitatem moderari.

4. *Salia sunt vel fixa, vel volatilia, vel media, separata vel combinata.* Actus fixitatis vel volatilitatis salium itidem considerari potest absolute vel respectivè, prout se habent in se, & in combinatione mutua. Sic acidum aliud est fixum, ut succus citri, acetosa, crystalli Tartari; aliud volatile, ut acidum formicarum, aliorumque animalium, & us \oplus crystallini, prout immersum est particulis terreis, quicquid vel in motum aptatum, fluidum vel concretum. Generaliter enim acida fluida vel fluorem adeptasunt subtiliora & volatiliora præ concretis. Aliud medium, ut acetum, spiritus tartari, lignorum &c. Imò in uno eodemque subiecto sæpe id visitur, v.g. us \oplus li vel volatilis est, sulphureus ille, & cephalicus, qui primo loco evoluitur; vel fixus, qui dicitur oleum \oplus li, remanens in fundo; vel medius, communis ille. Idem valet de aceto & aliis. Fixum dicemus h. l. quod minus est evaporabile; volatile, quod magis, unde odoratum maxime ferit: medium, quod medio se habet modo. Idem verò valet quoque de alcali. Alcalia fixa sunt salia plantarum, mediante incineratione parata; alcali volatile, salia plantarum cum sulphure subtilissimo meteorisata; media, ut tartarum, item salia essentialia, seu tartarus plantarum, per expressionem & evaporationem succorum è vegetabilibus parata. Idem in animalibus valet, mirò lusu & pluribus gradibus: v.g. menstruum ventriculi est acidum volatile, nativum & sibi debitum, acidum fixum in scorbuticis sæpe, cruditate acida &c. medium in aliis. Media verò salia duplici modo dici possunt, vel media respectu volatilitatis & fixitatis, quoad gradus laudatos, vel media respectu ipsius combinationis, quæ vel nativa est itidem, vel arte facta, unde enixa dicuntur salia, tanquam ex coitu acidi & alcali nata. Exemplo sit \oplus *cum, vel urina, quæ constant ex sale acido & urinoso, quæ si unita sint sal medium, salsum, constituunt, separata alcali urinosum & acidum salinum. Variat tamen hoc ipsum pro varia miscela & proportionem acidi & alcali, ut & principiorum reliquorum & accessoriorum aliorum. Hinc.

5. *Salia media acida sunt vel falsa, vel ammoniacalia, vel vitriolica, vel nitrosa, vel aluminosa.* Salia falsa ex acido & alcali volatili strictiori magis & intimiori combinatione coalitis constant. Patet id tum aliis experimentis, tum quod sal commune in distillatione spiritus perfecte facta retortæ collo affigit sal ammoniacale elegans, florum vel sublimati forma. Sic & ex \oplus u \oplus * i & \oplus is rectificato sal communi æmulum prævia fixatione confurgit. Salia verò ammoniacalia ex acido & alcali laxiori compage unitis constant. Patet hoc & per dicta, & us \oplus is * ci exemplo. Simulac enim alcali quodcumque sali ammoniaco commiscetur, confestim urinositas se prodit: ut taceamus idem docere \oplus is * ci artificiosam præparationem & urinæ elementa ipsa, quæ natura est ammoniacalis. Unà quoque statim occurrit differentia inter sal commune & *cale. In sale communi

acidum præpoller alcali volatili, & fixatio est perfectior, majorque; in ammoniaco alcali volatile præpoller acido, & fixatio est laxior, minorque. Hinc \ominus us \ominus *ci urinosus frequentior est & usitator præ acido, quippe qui ex sale communi consuetus ipso paratur. Utrobique terræ, aquæ & sulphuris concussus etiam modificat structuram. Sic & ulterius salia vitriolica ex acido aqueo terreo metallico constant. Aqueum demonstrat phlegma copiosum insipidum & corruptibile; acidum spiritus & oleum, terreum ochra copiosa, quæ & metallicum principium æum vel \ominus isale simul condit. Aquæ & sulphur immersum substat. Aluminosa ex acido, aqueo, austero, urinoso constantur, citra metallicum characterem, unde convenientia Onis & \ominus li, eorundemque vicissim disparitas elucet. Illud tinctura caret, hoc gaudet, mutuans eandem a metallicis particulis. Et licet vitriolum quoque album detur, illud tamen in recessu condit, quamvis pauciores, easdem. Nitrofa denique ex acido sulphureo alcalino principio constituuntur, quæ omnia per mechanicam & præparationes usitatas clarent. Referri ad hæc etiam meretur borax, sal minerale egregium, quod inter aluminosa & alcalia ferè ambigit. Ut se habet \ominus *cum ad \ominus salsum, ita se habere videtur borax ad alumen, ita ut austero acidum in alumine vincat & figat sal volatile: in borace contrarium observetur. Hæc autem salium notio, ut omnibus communis est, ita speciatim jam ad se nos vocant alcalia. Hæc enim $\mu\alpha\lambda\acute{\iota}\nu\epsilon\gamma\chi\omicron\nu$ in scholis pharmaceuticis audiunt salia, siquidem reliqua omnia in maxima copia, seorsim, extra pharmaciam, parantur, & sic simplicium ferè loco habentur. Hinc de iis jam præcipuè agendum restat, de reliquis secundariis.

6. *Salia sunt corpora sapida & solubilia.* Valet id de omnibus & singulis, siquidem explicita sint, nec impedita à reliquis prædominantibus, siue conjuncta adhuc, siue actu separata. Corpora sunt, ad sensum enim fisti possunt solida consistentia, porosa verò illa simul. Liceat statuere sal & hujus matrem terram pororum principium intrinsecum, quod sal & terra omnium sint porosissima. Sulphur poros oblinat, sal aperit & findit. Illud stricturam pororum, hoc laxitatem largitur. Hinc terra quo magis est exusta, eo porosior est, his verò poris oppletis à sulphure, æqualiter igne fortissimo fuso, fit vitrum. Pori hi diversitatem etiam largiuntur affectionum. Sulphuris pori non nisi igni parent & salibus alcalinis, hisque similibus, sensumque hinc alium efficiunt, odoratum & tactum. Salia sunt corpora sapida, seu gustui oblata manifestum saporem exhibent, licet admodum diversum. Sapida sunt, quia solubilia, hinc primum menstruum hominis salivam esse voluit summum Numen, ut statim se exereret sapor, soluto sale & masticando excusso magis. Sapida, quia variis hamis, aculeis, hastulis prædita, quæ membranam linguæ gustatoriam, seu fibras nerveas in eadem expansas diversimodè tangunt. Solubilia verò sunt, quia porosa, quam quæ maximè, unde statim disfluunt ad contactum aquei liquoris. Hinc omne sapidum est de natura salis, & ob sal est sapidum; hinc omne sapidum est solubile, non verò omne solubile est sapidum, exemplo gummatum, mucilaginum & similibus. Solubilia sunt in corpore, solubilia extra corpus, unde ob porositatem faciliè etiam ex aëre imbibunt & ceu magneticè ad se trahunt humidum, deliquium sic patiendo. Judex ergo salium primarius est gustus, secundarius tactus: gustus ob solutionem & receptionem distinctam & plenariam, tactus ob rigiditatem, quam disproportionatam offendit.

7. *Salia alcalia volatilia propulsione vel putrefactio-*

ne consurgunt. Alcalia volatilia latissimè patent, in singulis regnis deprehendenda. Plurima & copiosissima sunt in animalibus; pauca in mineralibus, neque tamen illdem deneganda, exemplo \ominus *ci nativi, & \ominus *ci ex \ominus : communi eruti; non pauca in vegetabilibus. Ubicunque tamen elici possunt, gemina hæc via habentur. Propulsionem dicimus, quando ignis tortura in apicum prodeunt, siquidem id $\sigma\upsilon\sigma\tau\omicron\rho\epsilon\omega\varsigma$ ratio permittat. Ubicunque nempe liberum est vel quasi tale sal volatile, seu propelli potest, sola ignis ope extrusum in sensus incurrit, uti quidem absolute id fit in distillatione seminum aromaticorum & acrium, in quibus sal volatile copiosissimum extat, imò & foliorum & herbarum consimilium, fuliginis quoque & aliorum. Fasta disjunctione particularum, compage latiori putata, propellitur vel solum, vel sub vehiculo aquæ, vel socio sulphure sal volatile, ut ex semine nuxæ id impetravimus & aliis. Oleum nempe est salis volatilis tenaculum, à quo lubentissimè recipitur, invitum verò discedit iterum. Quandocunque igitur sulphur destrui ab ignis vi potest, seu expelli ac separari, sal in apicum procedit, antea vix conspicuum futurum. Putrefactione verò sulphur idem destrui & supra probavimus, & quotidiana experientia est quam verissimam, siue illa sit perfecta, & remota, quod potissimum experimus, siue imperfecta & secundum quid talis, sufficiens saltim pro dimittendo & extricando sale volatili. Sic cochleariæ folia, quæ via sicca idem fundunt, sola putrefactione foliorum recentium, in retorta inclusorum, sic flores liliorum convallium, sic glastum, (quod Hispanico idiomate anil audit, sicque non paucos decepit, pro diversa planta id habentes,) & alia plura tale quid de se largiuntur. Ad propulsionem verò vel ignis solus sufficit, isque hoc loco conclusus, si ligans sulphur solum in mora sit, uti quoque ex C.C. ebore, lumbricis sal volatile haberi potest hoc pacto; vel sal excutens ligaturam & fixationem ab acido præstet sit, quod in spiritu salis ammoniaci, nativi & arte facti, & imprimis urina ipsa valet, quibus si calx viva, vel cineres, simplices vel clavellati, admisceantur, spiritus expirat volatilis.

8. *Alcalia fixa calcinatione ignea, maximè aperta, producuntur.* Cum ignis salia hæc primitus in apicum sistat, inquirere non inconsumtum est, unde illa oriantur. Videmus verò ignis actualis vim esse duplicem potissimum in ea, quæ dominio ejus patent, ut vel destruat, vel propellat. Destruit particulas inflammabiles sulphureas unctuosas, quæ in ejus pabulum cedunt; propellit evaporabiles, salinas volatiles, aquosas, & ipsas sub alis distillarum ex parte terreas, quibus se sulphureæ quædam occultantes ac aufugientes sociant; relinquit verò intactas reliquas, attramen immutatas, terreas & salinas fixas. De ortu eorum igitur non una est opinio. Aristotelici fieri salia asserunt generatione secundi & tertii modi, ubi non tam ex non substantia fit substantia, quæ dicitur primi modi, sed nobilior salina substantia, vel ex insensibili & minus manifesta sensibilibus & apparens consurgit substantia, inque eo ferè acquiescunt. Videntur tamen simul concedere vel tacite $\sigma\upsilon\gamma\chi\epsilon\iota\sigma\iota$ & $\delta\iota\gamma\chi\epsilon\iota\sigma\iota$ hæc contingere, licet contendat reve à fieri, nec actu & formaliter, sed saltim potentia inesse. Hinc ab oleis per incinerationem immutatis ac combustis salia hæc alcalia consurgere *Polemennus* arguit, ab acidi & alcali volatilis consensu & coagulo *Tachenius*. Cum verò olea vel delibrent, vel actu separentur, exemplo $\omega\upsilon\varsigma$ Tart. ubi seorsim oleum, seorsim sal habetur, prior ratio sufficere nequit. Cumque salia hæc cum acido maximè effervescent, nec inde saturata sint, cum concluso, ut dicitur

mus, igne singula illa, quæ cateroqui avolant, seorsim, & nominatim spiritus acidulus q̄ri, exhibeantur, nec altera hypothesis absolute concedi potest. Utraque tamen hæc asserta aniam præbent, ulterius cogitandi. Sarius videtur statuere, quod impetuosa illa deflagratione, cum non æqualiter pateant igni particule unduotæ inflammabiles, cum reluctantes terreis conflunt particule salinæ, ipsæque quædam sulphureæ, licet paucæ, una figantur & concorporeantur. Sulphur enim in salibus alcalibus latet, in fixis implicitum, in volatilibus explicitum magis, quod tum spirituosius, tum acidis demonstrari potest. Pro salibus ergo alcalibus parandis opus est incineratione, seu ut plantæ accensæ humidiusculæ vel sicca redigantur in cineres. Humidiusculæ sed recentes plus præbent salis, quia ob humidum præstant sal volatile minus avolare potest, magisque & sal & sulphur sic concentrantur. Aperto vero igne, ut sulphur deflagret perfecte, nec colore suo inficiat eadem.

9. *Alia mixta alcalia fixa, alia volatilia, alia utraque largiuntur.* Subiectum, ex quo parantur salia, constituunt omnia incinerabilia pro alcalibus fixis, seu in genere, quæ separationi salis à sulphure non repugnant. Si tria regna lustremus, ex animalibus plurimum & unum ferè sal volatile solum produciuntur, eò quod paucò acido & plurimò sulphure abundant, eoque à salibus expanso, unde liberius sal expelli & à sulphure partim liberari potest, partim ab eodem recipi. Paucò vero vel nullo ad sensum sale fixo pollent animalium partes, quod tenuatum & liberatum sal vel avolet, vel occultetur non tam in sulphure, quam in terra ipsa quoque, unde alcalina omnia, oculi cancerorum, C. C. ustum, corallia &c. vel occultum implicitum in se gerunt, quod ex oculis & demonstrari etiam potest, vel saltem cum poris alcalium & textura multum conveniunt non minus ac effecta quoque. Occultationis hujus manifestissimum exemplum est in calce viva, seu lapidibus combustis. Inesse huic sal effecta clarissima probant, vel solius *Salis* *S* *s* *xi* exemplo. Illud vero si ex elicere via ordinaria velis, non nisi terreum emergit magma. In metallis vero sal sulphuri subjugatum est, unde ductilia & malleabilia sunt, sal vero elici non potest, præterquam vitriolatum, eò quod non nisi acido auscultent sali, quod coiens cum particulis terreis & sulphureis corpore fit iterum, exemplo *Li* *o*, *D* *o*, *Q* *is* &c. vel quasi tale, exemplo sacchari *H* *ni*. ob conformationem & dispositionem sulphuris diversam. Ex vegetabilibus singula haberi possunt salia, ob ténitūdinem mixturæ & separationem faciliorem. Sic & ex q̄ro sal volatile & fixum haberi potest. Ratio diversitatis effectus hujus consistit in duobus, (1.) in subiecti ipsius miscela, prout vel laxius vel strictius, vel copiosius vel parcius salino principio gaudent, ita etiam diversa eliciuntur salia. (2.) In præparationis varietate, quod ex dictis patet, alium enim effectum sortiri oportet sulphur accensum, alium putrefactione resolutum, unde sal centrale liberatur. Ex quo ipso etiam de salis alcali natura pluribus licet philosophari, quomodo nempe alcali fixum à volatili differat, non essentialiter scilicet, sed accidentaliter.

10. *Quæcunque sapore & pondere aliis præcellunt, non prædominante sulphure rescido, præcipue fundunt salia.* *Salium* salium differt respectu subiectorum diversorum, & affectionum horum. Sal ut primum est sapidum, ita ex sapore quoque salium præsentia præcipue colligitur. Hinc quæcunque salia magis libera, eminentia & activa obtinent, ut antiscorbutica & acris, minus fundunt alcalia fixa, magis volatilia. In iis vero teporacris volatilissimum sapore se prodit maxime. Et iterum: quæcunque plurimo pollent sale volatili,

minus pollent fixo, ut non solum dicta antiscorbutica, verum etiam animalia omnia, & mineralibus succinum &c. Contra ea, quæ salinum & terreum principium sapore amaricante magis præ se ferunt, copiosius fundunt sal alcali fixum, ut absinthium, carduus benedictus, centaureum minus, scordium, artemisia &c. Quæ vero aquea, terrea, minusque sapida, ut hyoscyamus, malva &c. magis sunt inertia, & sal etiam terreum minus deliquabile largiuntur. Ad sapida etiam spectant ipsa acida, exemplo q̄ri, & gualapæ, quoad odorem &c. unde oleum & sal copiosum largiuntur. Quæcunque sapore & odore simul pollent, salis volatilissimum oleosum indicio, olea aromatica & salia volatilia magis fundunt. Præter saporem sal etiam pondus largitur, unde & ex pondere æstimari potest salium copia & proventus. Quæcunque graviora, compactiora & acidula sunt, præ levioribus vel resinosis aliisque sal præbent. Exemplum sit lignum quernum & fraxini, aliaque, si comparantur cum lignis aliis, cum plantis ipsis. Hinc ex subere & stramine paucissimum sal elicitur, quia prius non inerat. Ipse quoque odor acidulus oleum non ita prædominari arguit. Quæcunque enim multum olei fundunt, parcius sal fixum exhibent, exemplo ligni aloes, sancti, succini & similibus. Quæ vero terreis tenaculis præpollentibus illud detinent magis, ut tartarus, oleum & sal præbent copiosum. Atque hinc est, quod, si vitale fermentum putredine resolutum sit in lignis, pondere sic ablato, & sulphure extra se verso, aqua etiam deficiente, cadaverascit etiam, juxta *Helmontium*, *Tachenium* & alios communiter, sal, & in terram fatiscit, unde nullum vel paucum admodum sal emergit, licet recentiores quidam contrarium asserant quod experiri ulterius non erit difficile.

11. *Salia è cineribus probe calcinatis separat aqua, separata unit ignis.* Quicquid in fundo remanet post calcinationem, sal est, inquit *Paracelsus*. Sal est in gremio terræ latitans, & quo expromendum est. Cineres ipsi jam salinum præ se ferunt, unde & cinerum vires unice sali debentur, ast non purum, non separatum. Vincula mixti destructa sunt in cineribus, destructo sulphure, mixerum calido innato & ligamine. Separat ergo salia aqua, affusione facta, qui actus uno verbo dicitur elixivatio. Quales vero cineres, tale sal. Facta rite deflagratione cineres albi vel grysei lixivium largiuntur bonæ notæ, & consequenter sal. Quando vero calcinatio vel deficit, vel excedit, operatio ipsa minus succedit. Quando deficit, non deflagrat rite sulphur, & consequenter lixivium fit flavescens, coloratum, separat enim tunc, ex iisdem cum sale etiam, sulphur residuum. Separat sal, quia poros ejus ingreditur intime, & vicissim salis pori aquæ poros, qui dum se subeunt, promptissima fit solutio. Separat sulphur, sub vehiculo salis, unde salia illa sunt magis unduosa, faciliè deliquenda. Est vero cavendum, ne in separando quoque fiat defectus, quam in rem notandum est, repetita calcinatione & etiam sal in majori quantitate consurgere. Neque enim una æquè calcinatione sal omne exhauritur, quin repeti eadem cum successu possit. Ut melius deflagret hoc sulphur plantarum, solent addere inter calcinandum sulphur commune, de quo elibi. Separata vero jam à cineribus salis & fluida elemento alieno reddita, unit ignis, abigendo aquam & distillando. Quando vero excedit calcinatio, hastulæ salinæ iterum infringuntur, & sulphur adhuc junctum magis expanditur. Obtinimus sic ex cineribus absinthii fortius calcinatis lixivium planè cæruleum. Probe igitur calcinatis cineribus, sulphurea parte tingente abacta, purius emergit sal, & contra:

12. *Salia successivè & ex parte evaporata, sal crystallinum pariturunt; addequæ rari salius, simul ac semel & ex toto, ἀπορροῦν.* Prius longè optimum est, quia & puriora sic salia, & asservationi magis convenientia acquiruntur. Puriora: fit enim separatio commodior à partibus terreis, feculentis, ad fundum sic derubandis, quæ, si simultanea fiat concretio, confunduntur magis: fit separatio à partibus sulphureis feculentis. Quando crystallisatio fit, in sine relinquatur tale crama sulphureum, ipsissimum, minus coagulabile, quod, si relinquatur, deliquii causa est simul, continet enim sal unctuosum, minus exiccari aptum, unde pori redduntur laxiores. Sin auferatur, melius res habet, atque asservari possunt per plures annos salia, ob sulphur & terram conjunctam æqualiter panfa, & poros sic oblitos quali. Terra enim sali præbet corporaturam & consistentiam, unde & crebriori solutione & coagulatione sic in tota in terram tandem redigi queunt. Ex quo patet, modum tenendum esse iis, qui hoc pacto salia elegantiora aucupantur. Addimus ad crystallisationem etiam requiri salis s.q. quò majori enim copia lixivium præsto fit, quò magis saturatum, eò elegantius crystallisari salia quævis solent. Sin præcipitemus evaporationem, contrarium fit, & obtinetur magma ἀπορροῦν, non hastulis elegantibus ludens & figuris variis, uti solent crystallisata. Exemplo fit Θ ζρι; hoc lentè evaporatum, vel etiam solutum per deliquium, & hanc crystallisatum, vel sponte, ut vidimus, vel prævia exhalatione aliqua elegantissimum redditur. Ast in cacabo quocunque vel vase commodo evaporatum & colorem & consistentiam habet minus elegantem. Notari tamen & illud meretur, crystallisationem hanc vix expeti, præterquam in salibus plantarum pro usu interno, in Θ ζρι verò, cum polychrestum sit & ad variis operationes expetitur, non facile.

13. *Salia acida non spontanea & statim sua calcinatione aërea producuntur.* Plerisque si non omnibus salibus acidis communis est elixivatio, quatenus aqua solvuntur & sic congregantur, ac evaporatio, qua consistentiam & corporaturam debitam acquirunt. Ut verò à posteriori hoc conveniunt in præparatione; ita differunt à priori. Exemplo sit minera Θ β & Onis. Minera vitrioli Η α β γ δ, exposita aeri libero efflorescit, ut tincturam Θ ς ζ ο η m putatam exhibeat, revera, ut vitriolum è centro & sinu suo expromat. Tinctura illa Θ ς ζ ο η nil aliud est, nisi solutio vitrioli, quatenus in pulverem fatiscens minera solvitur aqua toris majalis destillata, vel alia, perinde enim est. Hæc si relinquatur sibi, ut sensim vel in vèrè evaporet aqua, relinquatur in fundo ipsissimum vitriolum, & ex eodem hoc fonte, seu consimili minera, vitriolum Anglicum conficitur. Nobis h.l. sufficit, enasci vitriolum dicta calcinatione aërea, & collabi, miro naturæ lusu. Aër vitriolum gignit, aër perimit. Gignit, quatenus mineram, duram & elegantem, aër ambi liberè, unde verberat sensim sensimque poros ejusdem, quibus sic laxatis, successivè ingerit atomos aqueas, quæ hoc magnete captæ insurgunt promptius, unde sal efflorescens rurgescit, ampliandoque poros collabi facit corpus, prius compactum, ut in pulverem abeat totum, majusque occupet & requirat spatium. Præter humidum aër etiam calidum suggerit, quatenus solis radii congestis cumulis magis aptant poros, ut promptius hinc admittatur humor. Contrarietas illa apparens, quod gignat & perimat vitriolum, facile elucidari potest, si pensitemus aerem humidum advehere & dissipare, advehendo tenuatum communicat, dissilando siccatur & absumit. Hinc vitriolum aeri expositum concidit, & calcinatur, ob absumptam humiditatem, qua radicaliter reddita idem vitriolum habetut. Idem valet de alumine, cujus minera lapidem fissilem ex parte æmulatur, quæ eruta ex terra cumulatim aeri & soli exponitur, ad longum

fatissimum tempus, sex v.g. menses. Calcinatio hæc adjuvatur, affundendo partem aquæ per vices, quod ipsum comprobatur dicta magis. Hinc ubi satis effluerit, elixivatur & more salum proceditur, nisi quod bona quantitas urinæ affunditur, unde præcipitatio fit & multo novajidque secunda & tertia vice, breviori tamen mora, ad menses circiter tres repetitur, exponendo denudè iterumque aeri ad plenariam calcinationem. Idem etiam possumus de nitro iuo modo asserere, quod in cellis videmus & aliis locis aptis; ut raceamus flores. Θ Μυσf. per ollam non vitreatam sublimatos. Quæ verò statim sua sunt, spontanea, hunc censum non subeunt, quamvis idem aeris vis & humidi concurrat.

14. *Tartarus herbarum via humida factus salino terreo debetur coagulo.* Tartarum herbarum dicimus, quæ alii salia essentialia, imò volatilia & succulenta nominare amant, eò quod ex succo sint concreta. Tartarum ad analogiam tartari vini, cujus γένεσις multum lucis dare potest huic ipsi tartaro vegetabili. Tartarus vini ex succo uvarum fit, seu vino, quando jam pacatus degit à fermentatione peracta, quatenus sensim sensimque partes acidæ & terreæ coeunt, unaque reliquas sulphureas secum abiciunt, ut unum novum ens inque consurgat. Eodem pacto se habet tartarus plantarum, nisi quod tardius & lentius paulo ille coaguletur. Monstrat hæc ipsa γένεσις, principium salis internum esse, externum ignem. Via humida factus dicitur, quod expressione vel decoctione & evaporatione sufficienti factus. Præcipue verò tartarus hic seu cremor ex acetosis parabilis est, in quibus principium coagulabile est copiosius; in aliis majori quantitate opus est, ut tale coagulum tartareum emergat. Simile quid sponte quasi evenit in prunis Hungaricis exiccatis, quæ exiccata convenienter successu temporis saccharinum coagulum seu florem nectareum extrudunt. Imò licet referre huc ipsum saccharum, quod nihil aliud est quàm ejusmodi crama salinum tartareum, e cannæ saccharinæ succo prolectum & coagulatum, dulcedine ab ipso sulphure blando acidum temperate orta. Et quo patet, tartarum hunc, seu sal essentialis sui generis, diversum esse, non unius generis, & hoc sensu, si virtutem seminalem æstimemus & artificium, si sulphureas partes non abolitas ferè palmam præterpere salibus cineritiis, seu alcalibus certum est. Et frequentius sanè tales crystalli seu tartarus occurreret in præparationibus quoque aliis, nisi extractis vel rob magis studeremus. Imò in rob sambuci v.g. alii quoque non raro, absumpta per ætatem humiditate granula sapida & egregia occurrunt lingæ, non aliunde accessenda, quàm à salino & tartareo tali coagulo. Utque tartarus sal vini non dici potest, nisi ἀνίψας & latè; ita commodè hoc nomen retinere licet, ut demonstramus sal medium itidem ex acido, superabundante vel obtuso per sulphur, & alcali, variis miscelæ gradibus, diversum effectum & saporem edens; quæ omnia in tartaro vini ad oculum patent. Unde superioribus salibus mediis acidis §. 5. addere possumus tartarum hæc, imò & saccharina, exemplo sacchari & sacchari hni, quæ nempe ex acido, alcali & oleoso constant. Illustrare rem potest, quod acidum in plantis alio modo etiam demonstrari possit, nempe aceto, quod ut ex fructibus alimentosis, secali, hordeo, tritico per fermentationem resultare notum est; ita ex herbis parandum describitur à Cl. Deodato l. 2. Pant. Hygiast. p. 15. v.g. veronica, vel angelica, q. f. & per philosophicas digestionem purum ab impuro separa, mox ad succi ita depurati lbj. Vi rectificati adde ʒj. Tandem vitreo vase benè obturato inclusa soli expone, & brevi aceti minimum acetum habebis, præsertim si aliquid fermenti & zingiberis addideris.

15. *Salia quæcunque principium seminale multiplicativum destructum habent, imprimis verò alcalia.* Chimici

ei principia sua admirantes delicatius eò processere, ut omnia ex omnibus fieri posse arguant, & v. g. seminali vim salis adscribunt, adeò, ut & post incinerationem resuscitari è plantis combustis, eorumque cineribus & sale plantam statuunt. Inde etiam ad resurrectionis humanæ è mortuis demonstrationem, (eò procedunt, cum ipsi, tum, quod mirandum est, quidam etiam aliter fori) id applicarunt. Si audiamus, quæ pro stabilienda hac hypothese allegari possint & soleant, ratio dari potest, sal esse principium fecunditatis, & consequenter seminale. Cum ergò in cinere sal, in sale tanquam in centro lateat cujuscunque rei vegetabilis virtus seminalis, integram illam asserere oportet, qui prius admisit. Et cum una experientia plus valeat, quam centum rationes, adducuntur experimenta varia *Quercetani*, & imprimis *Kircheri Mund. subterr. l. 2. §. 4. p. 414.* ubi latè de hac palingenesi differit, pluribus videndus. Exhibuisse se scribit plantam (quam verò non addit) in phialâ hermeticè clausâ, è cineribus suis resuscitatam. Imò cineres fœniculi fœniculum dedisse genuinum, decocta plantarum congelata sui picturam exhibuisse, alii huc allegant, ut *Fabri* theoriam nò laudemus, qui seminata salia prolifera esse velut certum & indubitatum adducit. Prius verò, quàm ulterius progrediamur, præmonendum est, salia variis ludere figuris, prout diversa aqua & aliorum miscela ignisque regimen accesserit, adeò ut & ex animalibus destillata aqua, v. g. spermatis ranarum, imò & humidum aëris fenestris affixum tempore hyberno, tales ramificationes & lusus exhibeat. Hinc sal omninò admittimus tanquam figurationis principium, quod & in animali & minerali ipso regno plures & admirandas figuras exhibet, testibus lapidibus, qui dissecti arbutula depicta à naturâ exhibent, quales & apud nos reperiuntur. Simile verò non esse idem, noto est notius. Quod itaque attinet vim seminificam, in genere certum est, nullum genuinum esse semen, quod non simul gaudeat fermento, ut immutando se multiplicet. Qui verò palingenesiam illam monstrant, phantasticam plantam plerique ostentant, qui veram producere tentant, frustra sunt. Deinde falsum est, semen in salis centro latere, cū id potius in sulphure sit ponendum. Sulphur esse principium commune seminum ex eo patet, quod lucis est matrix, quod calidi innati sedes. Satiùs quin fuerit, semina in luculâ consistere, à divino Numine singulis dispensatâ creatis, quæ sustentata salis & sulphuris involutris aptum nacta hospitium propagari & multiplicari possit. Atque hinc ratio patet quare ignis sit destructor seminum. Expellit enim illam luculam & destruit, destruit sulphur & pessundat actualis ignis penitus, sulphur seminale, etiam aqua immerfus, & simplici coctione. Hinc semina plantarum & nuclei ab animalibus devorata seminifica manent exemplo ceasarum, ab homine devoratis nucleis, sambuci & aliorum ab avibus, carduorum à suis. Animalis enim ignis vivificus est & blandus, elementaris ille destructivus. Adde luculam illam in semine velut ovulo recubare, unde si contundatur semen & comminatur, destructâ debitâ partium texturâ & positi necessario & ordinatissimo planta ex ipso semine produci nequit, nedum si comburatur penitus in cineres. Ut mirari subeat quomodo regenerationem plantæ ex semine confuso & rore inebriato fieri posse credant & præcipiant. Vid *Kircher. l. c.* Quod ergò experientiam attinet, illa ramificationem & lusus exhibuit, qui si aliquam similitudinem magis appositam plantæ præ se ferat, ex quâ cinis paratus fuit, id inter contingentia penitus numerandum est, neque, si examen fiat penitus, id concordabit examissim, non aliter ac plantæ in lapidibus repertæ non certam aliquam speciem signant. Satiùs ergò est in hisce ac aliis ultra vulgus sapere, & mirari naturâ, non tamen contrâ eam aliquid tentare.

Neque quicquam huc contulerit terra, v. g. Cineres plantarum terræ virgini insiros intra breve tempus ejusdem speciei plantam, quæ in cineres resoluta fuerat, exhibituros, idem instat omnium *Kircherus l. c. p. 416.* promittit, quod sæpè sæpius in sale absinthii se experitum addit. Quod enim quid non habet, alteri dare nequit. Nulla generatio fit sine semine, semen verò igne destructum est. Unde frustra sunt, qui id inter arcana habent, merito pro talibus habenda, simul enim propalaverint, fucum prodere & turpiter se dare coguntur. Unde experientiæ illi particulari & præteritæ opponimus publicam & universalem semina, plantas & omnia vegetabilia ab igne destitui in individuo, & specie illâ quam expromere possent vel debebant, idque de salibus omnibus affirmavimus. Sal commune est principium, simul ac ergò productum fuerit è plantis, resoluta esse principia hypostatica certum est, unde nec de volatilibus id sperandum est, nec de mediis, quibus potiori jure id adscribendum fuerat, quippe plus de plantâ participant & principia componentia magis habent integra. Frustrâ ergò sunt, qui principium internum semen quarunt in uno sale, communi & externo. Imò idem etiam valet de sulphure. Resuscitationem talem formarum laudant quoque representari posse sequenti experimento. *7.* Terebinthinæ communis lb iv. impone in cucurbitam vitreâ & elice lento igne spiritum & oleum æthereum. Continua ignem, quousque accesserit oleum flavum, deinde rubrum. Si proleatæ fuerint olei flavi & rubri ana circiter uncia duæ, aufer gradatim ignem, & refrigescat leviter vas ad tres dies & noctes, aufer ab igne, & videbis circa parietes vasis formas multarum abietum, cum radicibus, truncis ramis & foliis mirabiliter representatis. Adscribitur id *Davissonio Scoto*, quod citat & vidisse se scribit *Digby de plant. veg. p. 84.*

16. Salia alcalia volatilia differunt à fixis diversitate particularum, fixitate & effectu. Non differunt essentiali, unde & æquè ex plantis confiunt, neque solum in plantis scorbuticis & cephalicis existunt, ex iisque elici possunt, sed ex reliquis quoque omnibus, ut alibi probavimus, separatione debitâ secernendo, ut, dissipatione coactâ, fixa. Diversitas est ergò quoad accidentia, & (1) quoad diversitatem particularum. In fixis sulphur & terra intimius nexa consistentiam fixam largiuntur; in volatilibus explicatissimum sulphur, terra verò pauca & subtilior. Hinc promptissimè avolant, & post se liquorem rubellum relinquit sal cornu cervi. Hinc hisce duobus mediis figuntur quoque ex parte, v. g. sal cornu cervi cum spiritu vini abstractum fert ætatem, & ab aëre defensum magis adservari potest. Sic & cum cornu cervi usto idem, tanquam partibus terreis fœto, itidem vel quasi figitur, ut corporeitate fortis fiat firmiorem, & dispensari solidâ formâ possit, modò simul obtureretur cum cerâ & vesicâ. Et hæc ipsa etiam ratio est (2) fixitatis. Sub calcinatione, apertâ impetuose ignis colligat & velut ferruminat illas partes, sub putrefactione, vel aliis sal volatile parandi modis, paulatim fit resolutio, unde liberius vagantur particulae, & capiuntur quidem volatiles, in libertatem tamen facili se vindicantes ulteriorem. Cum itaque à priori mixtione diversâ differant, siquidem in fixis vinculum terreum intimius eminet, differunt (3) effectu, non univoco quidem, seu homogeneo & generali, siquidem in multis conveniunt quoque, sed graduâli & æquivoco, ac speciali. Ita, præter alia dicenda, tineturam cœruleam violarum & fixa & alcalia salia exemplo reddunt viridem, unde & in gramine læta vigere colligere lice. Norabilis differentia & velut mechanica occurrit in præparatione turpethi albi, si enim solutioni & si instilletur sal alcali fixum, liquidum puta, statim derubantur ochreæ particulae, turpethum vocatur communiter; si spiritus \odot & \star ci, albidissimum coagula-

coagulum emergit. Pertinet hoc illud Helmontianum, sal volatile res fixari in suo alcali fixato.

De Viribus Salium.

Speciatim attendi merentur vires salium, de quibus not.

1. *Salia alcalia omnia acidum absorbent, & sanguinem rarefaciunt: ominentius volatilia, minori gradu fixa.* Quemadmodum per mechanicam id visitur extra corpus, ita in corpore effectus hic est generalis, communisque alcalium, quod acidum destruant, sive in primis viis, ipsoque ventriculo resideat, sive in massam sanguineam intimius receptum hic illic fixantem edat effectum. Absorbent acidum, non tamen aquæ cum effervescentiâ notabili semper & sensui manifestâ, ut extra corpus, siquidem sub sulphuris & caloris vitalis concursu id fieri nec spiritus \ominus ci vinosus ab ullo acido præcipitatur, sed amicè coit edulcatque. Ex hoc ipso verò effectu communi plura alia phenomena explicari possunt. Inprimis verò alcalia rarefaciunt sanguinem, uti opposita illis acida coagulant. Rarefaciunt, quatenus roborant sal volatile sanguinis, & quatenus expandunt sulphur, serumque reddunt fluxile, unde & spiritus \ominus ci urinosus sanguini è vena educto confusus illius colorem non deturpat, sed exaltat magis, ejusque consistentiam firmam respectivè reddit, fibras æquali mixtura sustinendo, non dimovendo. Rarefaciunt positivè volatilia, ob sal & sulphur volatile promptè in venas latum; rarefaciunt privativè fixa & volatilia, quatenus freum rarefactionis acidum excutiant. Sin oleositas accedat manifesta, exemplo salis volatilis oleosi aromatici ejusvis, longè efficacius & evidentius id contingit. Idem hinc præstant suo modo alcalina. Ob id verò, quod serum reddunt fluxile salia, quod cum nitrosis alcalia habent commune, minus locum habent, ubi motu & fluxilitate jam delinquit, ut in catarrhis, præsertim tenuibus, tussi, diarrhoea, dysenteria, etiam si peccet acidum, tamen non conveniunt. Adde, quod idè quoque salia alcalia inter calefacientia sunt locanda.

2. *Salia urinosa diaphoretica, excitativa, bezoardica, cephalica, cordialia sunt volatilia.* Sive ea consideremus solida, sive fluida, perinde est, sive in concreto, prout subjectis, è quibus parantur, adhuc immerita sunt, sive in abstracto, separata ab iisdem. Diaphoretica sunt volatilia, ubi vis nomini suo confortata, unde sudorem potenter cient, & in expellendis variolis, bubonibus, petechiis, scabie &c. naturam summè juvant, ubi stimulo opus habet, non item ubi freno. Excitativa sunt, tum in hoc, tum in genere archei, præcipuè in iis affectibus, ubi impellendus & citandus est in motum, in affectibus soporosis, paralyti, syncope, lipothymia, apoplexia, intus & extus, solo etiam odoratu. Excitant potenter, unaque poros obstructos referant. Bezoardica sunt, tum per se, ut spiritus cornu cervi, serpentum, viperarum, eboris, eorundemque salia volatilia; tum cum aliis. Sunt instar \mathfrak{z} ii, semper activa, cum quibus ergò junguntur, illa quoque reddunt talia, ut tinctura bezoardica, rhabarbari, \mathfrak{z} ii &c. volatilis ita redditur. Sunt cephalica & cordialia volatilia, sunt & antiscorbutica, posito indicante laudato, quiete humorum, sâden, torpore, acore. Quo absente etiam nociva evadunt, non sua, sed utentis culpa. In scorbutico v. g. calido $\phi\lambda\omicron\gamma\mu\alpha\tau\epsilon\varsigma$, ebullitiones, anxietates cient, & symptomata omnia potius excitant, quam ut mitigent, unde eo casu cedunt acidis, aqueis, & temperatis aliis præcipitantibus. Ufu verò obtinuit, ut spiritus \ominus ci respectivè magis exta febrilem statum, spiritus eboris, cornu cervi magis præsentem eodem adhibeatur, liget exigua sit differentia, potissimum ob teneritudi-

nem & oleositatem, quàm constantem quasi secum servant illi spiritus, illa salia volatilia.

3. *Salia alcalia fixa viribus specificis & doctibus mixti carent, non tamen ejusdem per omnia sunt indolui.* Quando suis indulgent & delectantur foetibus Chimi, plus etiam virtutibus salium adscribunt, quàm revera præstare possunt. Alii mitius rem exponunt, & aliquid servari de virtute pristina concedunt. Sensus verò ipse testatur, $\kappa\epsilon\gamma\iota\omega$ mixti per ignem destrui, destrui seminale vim, quæ & viribus talem se exerit, destrui texturam particularum, ut ex amaro, acido, insipido, odoso, nil amplius restet, hujusmodi vel umbram referens, unde omnino frustra quæras pristinam formam. Unde & plantis cephalicis, cordialibus, purgantibus, stomachicis, non licet sal cephalicum, cordiale, purgans, expectare, & quod præstant in hoc salia, id faciunt suo modulo, citrà pristinam texturam. Hæc ut sunt verissima, ita nihilominus faciendum est, non minus differre quoque salia alcalia fixa à posteriori, quemadmodum differunt à priori. Non una omnium est textura plantarum, sed particulis diversis, aliter atque aliter positis, gaudent, unde consequens est, non unum idemque sal in calcinando emergere, atque sic aliud præ alio quoque secundum quid eligi debere, ad hæc vel illa viscera alteranda, ad hunc illumque effectum specialem & determinatum, quem intendimus. Hinc varii velut gradus & species salis alcali fixi concedendi sunt, quæ differentia per mechanicam etiam demonstrari potest, teste *Tachenio Hippocr. Chim. c. 7. p. 30. seqq.* quatenus solutio \mathfrak{z} ii cum aqua simplici facta, aliter ab hoc, aliter ab alio sale, itidem in aqua soluto, præcipitatur, cum tamen volatilia salia albicantem sistant. Hæc ipsa verò volatilia alcalia majori gaudent privilegio, hæc quippe essentiam mixtorum unitam possident, ob salis & sulphuris conjunctionem. Hinc sal volatile liquidum cochleariæ, sal volatile liquidum liliorum convallium vestigia manifesta saporis odorisque obtinent.

4. *Salia alcalia fixa vires habent communes plerimas, específicas originarias nullas, secundarias plures.* Si in laudes salium excurrere velimus, amplissimus hac se offerre campus. Poriores salim videbitur virtutes, Salia v. g. (1.) *aperiunt* & resolvunt Saponaria seu absterfiva sunt, venarum amurcam abstergunt. Hinc, ut verbis utamur *Higbini lib. de affect. hypochondr. p. 129.* succos figendo & præcipitando acidos fermentationem tollunt, atque sic sine tumore & turbatione cibi in ventriculo dissolvuntur, & sanguis per totum pacatius circulatur microcosmum. (2.) *Leniunt* & stimulant: non purgant quod nonnullis visum est ad iostar purgantium aliorum, sed leniunt, tamen, fluxilem reddunt pituitam, extricant humores & expultricem admonent officii, virtute, absterfiva. In tenerioribus verò, & ubi magis $\kappa\alpha\iota\sigma\mu\alpha$ est ventriculus, visuntur sæpe etiam purgate, quod alias de nitrosis valet $\kappa\alpha\iota$ $\epsilon\gamma\chi\eta\tau\iota$, unde vidimus ab arena duplicato ad \mathfrak{z} j. per tres dies continuos assumptam purgatam quotidie sceminam. Hinc purgantibus infusis & pulveribus commodè adduntur stimuli loco. Hinc tinctura \ominus lii in alvo pigriori, qualis est in senibus, commendatur cum fructu (3.) *Urinam & sudorem movent.* Diuretica & diaphoretica sunt omnia alcalia, quatenus serum, utriusque materiam, in motum cient & resolvunt unâ, unde etiam sunt nephritica, calculum, sabulum & arenulas expellunt. Si verò inter se comparentur, alcalia fixa magis urinam, volatilia sudorem magis pellunt, & hoc sine elliguntur consultius, quia nempe ad solutionem halitusositas feri major requiritur, ad urinam reddendam fluxilitas sufficit. (4.) *Febris*

sunt; seu ebullitiones in corpore febriles exortas compescunt; Volatilia magis in continuis, ad dispellendum *μιασμα* peregrinum, & roborandum vitale sulphur sanguinis: Fixa in intermittentibus, (licet *νους* *Θις* **ci* ejusque sal volatile in quartanâ eligatur magis,) ut sal cardui benedicti, centaurii minoris, absinthii eo nomine celebria sunt, sive sola, sive quod melius, simul mixta & coalita cum nitrosis. (5.) *Corrosiva* sunt; si id expetatur. Vistur id in salibus alcalibus volatilibus quoque aliquando, si magis sint unita & acuata, uti *νους* *Θις* **ci*, si degustetur recens & fortior, excoriat sæpè linguam; & in fixis roboratis calce viva. Minori gradu corrosivonis sunt cathartica saltem; majori caustica. Quæ omnia etiam suo modo, exigua differentia, de salibus omnibus in genere prædicari possunt. Hinc patet etiam faciliè, quid sentiendum sit de salibus compositis, quæ à nonnullis deprædicantur, ut apud *Mynsicht. in Armament.* Pluribus etiam de salium hac virtute legi meretur *Helm. l. potest. medicaminum*, item *Laur. Hoffmann. de usu & abusu medicamentor. chimicor. p. 106.* ubi qualitates illas specificas latius rejicit, & pleraque è vegetabilibus parata salia unius ejusdemque virtutis & efficaciz affirmat.

5. *Salia alcalia media & nitrosa ventriculo minus grata, magis acida sibi relicta.* Variè à salibus afficitur ventriculus, unde in ipsorum adhibitione meritò hujus semper ratio habenda, prout vel acido abundat, vel caret; prout item magis vel minus sensibilis, prout strictura vel laxitate villorum gaudet. Cum enim alcalia omnia acidum destruant, ventriculi verò menstruum ad acidulum inclinet, ab eorundem usu frequentiori sensim sensimque appetitus emori observatur. Valet id non solum de salibus fixis, sed & volatilibus, quod damno suo experiuntur, qui *νους* *Θις* **ci* volatili utuntur largius, quatenus lassari corpus & appetitum indies imminui observant; imò & de alcalinis ipsis, oculis cancerorum, creta, conchis. Hinc ad voracitatem corrigendam *Θ pri* deliquatum & similia porriguntur in praxi. Quo loco notandum venit, non quodvis acidum ventriculo esse gratum vel domesticum, familiare. Toto enim die videmus acido abundante in ventriculo appetitum nullum esse, ob fixitatem majorem scilicet. Quam dum moderantur, corriguntque alcalia, & ejus generis alia alcalina, stomachicorum classi accensentur non immeritò, modò respectus habeatur ad dictam humorum qualitatem. Idem de arcano *pri*, de *pri* *Glato* & aliis valet. Licet enim hæc non aquè absorbeant acidum, laxant tamen villos & sic tonum ejusdem. Nitrosa verò id inprimis præstant: laxant villos & stimulant, unde cautè eo casu porrigenda, etiam in febribus, quando ventriculus non responderet, & alvus laxior est. Magis amica sunt acida, quod præter alias rationes, mucum, seu pituitam, & bilem, quæ ipsi ventriculo maximè sunt damno, incidunt & domant. Modò itidem sint proportionata. Ferre potest sanè ventriculus longè majorem acrimoniam, quàm lingua & fauces; patitur tamen suos manes & corrosionem ab acidis excedentibus, unde succus citri quoque immoderatus haustus escharam inducit. Acida verò sibi relicta dicuntur ad differentiam aliorum, quæ accessione & miscela sua eadem modificant, ut particule minerales, metallica, austeræ, stringentes fortius, aliaque.

6. *Salia non agunt nisi soluta, seu soluta agunt efficacius.* Receptum hoc assertum est in scholis medicis, & in praxi usitatum. Non agunt nisi soluta interne, hinc quando salia febrifuga aliaque propinantur, commodè prius in vehiculo distemperantur, ut sic promptiorem inveniant in vasa aditum. Hinc acidulæ, thermæ, efficaciam suam maxima ex parte

fortiuntur, quod nil aliud quàm soluta sunt salia. Hinc etiam in corporibus (qualidis & siccis, cum non inveniant aquè sufficientem quantitatem lymphæ solventis, minus operantur. Ipsaque fluida sic cum salibus, quibus conjunguntur, quasi dividunt vires, ut eo promptius utraque juncta agant. Sic nitrosa etiam interius & exterius idem verificant, ut *Θ* *Glato* liquidum pro gargarismatibus, pro epithemate ad frontem &c. Non agunt enim nisi soluta etiam externe, v. gr. in fonticulis excitandis; hinc leviter imbutur saliva lapis corrosivus, neque applicatus siccus quoque prius corrodit, quàm è poris glandosis sortiatur solutionem. Aded proprium est salium, solvi amicabiliter, & solutione prævia agere. Idem quoque de sulphure & aliis valet. Quæcunque à menstruo universali ventriculi non solvuntur, opiata, purgantia, emetica, aliaque, non acquirunt vim suam & actionem. Solutionem hinc sal quoque largitur sulphuri & aliis. Licet verò non solvantur integre alia medicamenta, ut salia, imprægnant tamen lympham suo charactere, ut sic agant. Non agunt nisi soluta, inprimis centraliter, (sitorem adeptæ esse vocant medici,) in operationibus chemicis, exemplo nitri, vitrioli, sibi relictorum & in aquam fortem destillatorum.

7. *Salia lixiva ab acidis correctæ magis grata, nec inefficacia, quin polychresta.* Enixa salia virtutem cum aliis habent communem, quam diximus, variis verò de causis eorundam præparatio inventa est & commendanda. Ita enim aliam texturam nata vires quoque alias, sæpè nobiliores & polychrestas, indispiciuntur. Deinde vitia, si quæ habent salia, sic corriguntur. Acida faciliè stupefaciunt dentes, si liquida fuerint, nec solidari aquè; quæ talia, norunt, hoc pacto verò consistentiam solidam acquirunt & gratiam; ipsa verò lixiva quoque inprimis revera ob lixiviosum saporem nauseabunda sunt, & à delicatis minus assumuntur. Hinc correctionem inveniunt & gratiam. Exemplo sit *Θ pri*, indeque enata *pri* *Glatus* & arcanum *pri*. Tartarus vitriolatus & inter magisteria referri meretur, ratione præcipitationis, & salia enixa, ratione immutationis. Cumque eo coincidit spiritus vitrioli vel salis coagulatus, quando sali tartari, absinthii cardui benedicti &c. affunditur successivè spiritus vitrioli, vel salis. Idque commodius ferè via humida, ut sal tartari bonæ notæ & albicans solvatur, & soluto affuso fiat eò usque, donec effervescente invicem desinant, de quo supra jam dictum. Arcanum verò tartari seorsim, alias terræ foliatæ, salis vini essentialis, aliisque pluribus nominibus veniens, è *Θ* tartari & aceti coitione nascitur, nilque aliud est, quàm *Θ* tartari, acido vini puro, seu aceto destillato saturatum, liquidum & solidum, licet hoc rarius, illud frequentius in usu sit. Exemplum hoc est methodi chemicorum, qui separare partes ab invicem & separatas conjungere satagunt. Duo verò sic eveniunt notabilia: unum primaria intentione, sal medium, quando alcali tartari sic saturatur, sali sicco affundendo toties acetum destillatum per vices moderanda effervescencia, donec hoc abstractum successiva affusione reddatur sibi simile, odore & sapore. Liqueor enim à miscela hac primum fit planè insipidus & dulcis. Quem in finem fit evaporatio vase aperto vel clauso, phlegmatis insipidi, ad *3j* salis, aceti destillati *℥ij*. circiter ad *℥j*. requisita. Obtenito saturationis termino, Vi rectificatus, vel tartarisatus, ab eodem sale abstrahitur, & hinc phlegmate proprio vel aqua roris majalis solutum servatur ad usum. Ita habetur enixum medium sal, virtutibus insignissimis conspiciendum, verbi gratia diureticum, nephriticum, hypochondriacum, febrile, ad laxanda seri & bilis, in infimo

infimo cum primis ventre, coagula, & temperandum fervorem. Unde in affectibus hypochondriacis, calculo, hydropo, febribus intermittentibus, tum per se, tum cum tincturis martialibus, quas ipsas etiam variis modis exhibet, egregium est. Alterum intentione secundaria, & per accidens, sulphur cœnoscum & terreum tingens. Quando enim commiscetur acetum destillatum & Tartari, dicta *tyxephora*, licet acetum destillatum sit purissimum, cui etiam id adscribi nequit, & Tartari albidissimum; tamen sulphur emergit impurum ejusmodi, unde tingitur liquor, ipsumque in filtro remanet.

Salia ergo sunt corpora sapida & solubilia, & mixtis, volatilia propulsione & putrefactione, fixa elixivatione & evaporatione parata, viribus quælibet diversis præditæ. *Wedelius.*

DE SALIBUS NATIVIS in SPECIE eorumque præparationibus ex SCHRODERO & HOFMANNO.

Salia nihil aliud esse quam corpora mineralia & solubilia ac denuò in salinam crystallinamque formam coagulabilia, libro primo dictum est: hoc loco ulteriorem eorum enodationem aggredientes, quatenus ea medicam provinciam subeant, referemus.

Salia quæ medico usui inserviunt, adeoque præparatis inde parandis materiam suppeditare apta sunt, triplicis quidem sunt generis, pro triplici scilicet mundi regno, minerali, vegetabili, animali; attamen hoc loco primariò non nisi de mineralibus agere convenit, hisque nativis solis, ad quorum normam tamen & artificialia; sive è mineralibus, sive vegetabilibus, sive animalibus elixiviata illa fuerint, faciliè dirigi poterunt.

De horum Salium origine sic sentio: Macrocosmus non minus ac reliqua duo mundi regna sua sustentatur vivitque nutritione. In hac redundat peritoma salinum, respondens saluginosis excrementis, in animalium urina, sudore, catharro, & simili deprehensis. Dictum peritoma macrocosmicum salinum, in globo hoc inferiore congregatum, variam pro varietate matricum induit speciem, non secus ac excrementum illud salinum in animalibus differens evadit.

Hinc

Sal { Commune,
Gemma,
Nitri,
Alumen,
Ammoniacum,
Vitriolum,

Quibus & arsenicum addere licet, quod tamen inter Salia & Sulphura ambigit.

Eligenda sunt Salia hæc in genere loco natali celebriora, tum puriora, nitidiora, & si natura ferat crystallina. *Schroderus.*

De Salibus in genere.) Hic Dominus Autor iterum more solito ex præconcepta opinione De Macrocosmi Nutritione, ejusque redundante perittomate differit. Sed præterquam quod huic paradoxæ opinioni suprâ in Libro I. à me jamdum fuerit satisfactum, repetimus tamen ex parte & asserimus, quemadmodum quælibet corpora ex aqua materia compositionis seu constitutionis desumpserunt, ita & salia Nativa ex aquæ propensione spontanea originem duxisse à seminali dispositione cuius specifica immutata. Et quæ salia arte ex concretis fluunt, non formaliter, sed materialiter & effectivè in ipsis fuisse, & in forma fixationis alkali arreptione sui sulphuris sal volatile inde cum oleo ad formaliter esse transisse. Quod autem Vitriola spectat, licet non sint vera me-

tallorum salia, hæc in salia converti queant, sed in pristina metalla, tamen negari nequit, ex salibus nativis esurinis sive acetosis fieri ad omnia metalla accommodabilibus, quæ tamen illorum essentiam non ingrediuntur, licet illorum beneficio miras in corporibus metallicis Natura faciat vicissitudines, quæ subterranea pyrophylacia per metallorum venas & fodinas dispergunt. Inde variæ inter se salium & sulphurum particule in mineris deprehenduntur, quæ tamen metallorum non ingrediuntur constitutionem. Semina salium cuncta in aquis sita sunt, sed nondum saporem induerunt, nisi dum corporum principia consentanea, uterosque terræ debitos repeterint, tunc in qualibet terra specifica ac peculiaris quadam substantia salina vel singulari vel aliis mixta emergit. *Cl. Helmont. in Paradox. Tercio §.9. Et Nobil. Morbif. l. c. Hofmannus.*

PRÆPARATIONES.

Præparationes, quibus Salia subjiciuntur, sunt, 1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio. 5. Fixatio. 6. Liquefactio.

I. PURIFICATIO.

Salia, quia plerumque heterogeneis scatent, mixtaque syncera existunt, depurari opus habent. Depurationis hujus modus pro varietate salium varius quoque institui potest. Potissima tamen ratio salium purificandorum consistit in solutione, soluti filtratione, filtrati exhalatione, adeoque salis concretionem vel crystallationem.

Solvuntur Salia non nisi in liquore aqueo, (non sulphureo aut pingui, & proin nec in V rectificatissimo) Liquor hic, nisi specialis accesserit admonitio, adhibetur vulgariter V fontana, in qua sal quodlibet, maxime si tepescit, dissolvitur; dissolutum per chartam trajicitur, ut facibus in charta relictis syncerum transeat; Hoc postmodum, humiditate, ad siccitatem usque abstracto, condensatur, vel scilicet cum aliquota liquoris portione crystallifatur.

II. CALCINATIO.

Calciantur Salia per ignitionem, idque vel sine vel cum fusione: & interdum accedente subindè materia terribili, de quibus speciatim in singulis.

III. DESTILLATIO.

Salium Destillatio, quia ut plurimum unifixiora graviora sunt, per Vm peragitur, eamque vel simplicem, vel tubulatam, vitream, vel terream; idque ignem arenæ, tum nudo, pro fixitate scilicet majore vel minore liquoris eliciendi adhibito.

Per Vm tubulatam destillatio hoc modo peragitur.

Ad manus habere decet Vm terream fortem, quæ in superiore ventris sui medietate tubulum habeat foramine pervium, quo materia per vices injici, quodque post injectam materiam obruari firmius possit. Vm hanc (si lubet loricatam) luto in fornace destillatoria obfirma, ut tubulus emineat, fumaris tamen uno ac altero relictis. Hinc rostrum appone receptaculum capacissimum, (quia cum impetu irruentes amplum requirunt spatium,) juncturis firmiter luto firmatis. Luto lentè exiccato accende primò leatium ignem, hinc fortiozem, ut Vm incandescat. Tunc injice materiam paulatim per tubulum, foramenque vel luto, vel bacillo stupha humida circumdato obtura, donec illi impetuosius coagulati (aque in receptaculo immixti) sint, receptaculumque clarescat. Hinc iterum injice, obturaque ut dictum. Et sic paratur Clyffus.

Vide de his Figuram appositam.



N. 1. Commodum erit aliquotam aqua partem receptaculo infundere, cui scilicet impetuosus illi immisceri, adeoque condensari possint.

N. 2. Salia simpliciora citra fluxum seu fasionem destillari volunt, quare ne inter destillandum vi caloris fundantur, duplum, triplum, &c. vel arenâ, vel farinâ, laterum, vel argilla sicca, humidâque commisceri solet, quorum beneficio fusio illa præcaveatur.

IV. SUBLIMATIO.

Sublimatio non nisi sali ammoniaco peculiariter ac præcipuè competit, ut & arsenico. Flores enim salis communis uno & eodem destillationis actu acquiuntur.

V. FIXATIO.

Fixantur salia diversimodè, de quo speciatim suis locis.

VI. LIQUATIO.

Liquari possunt salia, si vel aëri humido exponantur, vel liquore aqueo aspergantur.

Forma Medioamentorum seu

PRÆPARATA,

Salina sunt,

1. Crystalli seu sal purificatum.

N. Crystalli salis, si simpliciter præscribantur, nihil aliud denotant, quàm sal crystallisatione purificatum, sic consuevit Crystalli salis nrr. &c.

Excipe Crystallum salis comm. dulces, de quibus in salis cap. sequenti.

2. Sal calcinatum.

3. De- } Phlegma:
stillatum, } Spiritus,
unde } Oleum.

4. Sublimatum. Flores.

5. Fixatum.

6. Liquor - Balsamus.

DE SALE COMMUNI.

Sal commune nihil aliud est quàm salugo Væ salis, (marinæ scilicet vel fontanæ,) quæ salugo humiditatis aqueæ evaporatione inspissata remanet.

Dicitur, Basilio Monacho, nobilissimum ac optimum aroma. Græcè ἀλας. Arabicè Melich, Melha, Germanicè Saltz. Ruchen. saliz. sel, sel de Cuisine. salt. Kit. chin-saltz. font.

Duplex salis hujus genus occurrit, marinum scil. & fontanum, utriusque diversæ sunt species.

Primas autem sal marinum sibi vendicat, ac præcipuè Hispanicum, in cujus tamen defectu satius est sal fontanum, quod ad manus est, in præparationibus nostris recipere, quam aliud salis genus cum sumptu acquirere.

Inter fontana tamen maxima quoque diversitas est, reliquisque laudem præcipere videntur Hallense ac Luneburgense, quibus tamen haud multum cedit quod in Patriâ mea Uffeniæ Westphalorum paratur.

Vires. Calefacit, exiccac, abstergit, dissolvit, purgat, adstringit leniter, consumit superfluitates, penetrat, digerit, aperit, incidit, Venerem stimulat, putredini, venisque resistit.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Hinc conveni, Internè in cruditatibus ventriculi, appetitu prostrato, obstructionibus alvi & urinæ, & colicis doloribus, &c.

Externè, in ulceribus putridis ac serpentibus mundificandis, in tumoribus simplicibus & pestilentialibus dissentiendis, in combustionum exuvias extrahendo, in pruritu & scabie exiccanda, in suggillationibus, sanguineque extravasato resolvendo ac discutendo, in dolore dentium, colico, cephalico, arthritico, & simili. mitigando, in oculorum pterygio absumendo.

N. Ad Salis hujus communis naturam accedunt salia artificialia, ex vegetabilibus ac animalibus incineratis scilicet elicita, unde & iisdem ferè præparationibus subijci quent. Schroderus.

De sale communi.] Hoc ex numero est salium purè acidorum fixorum, quia purè salis seu alkalibus non solum est contrarium, sed & ex illo spiritus acidus destillatur. Hoc in crystallos redactum constanti naturæ ritu cubicam efformat figuram, quam etiam in minimis effingit.

Duplex salis hujus genus occurrit.] Et est Marinum, vel Fontanum. Marinum omnibus præfertur, quia multum de sale centrali seu universali participat: unde & ad præparationem spirituum fortiorum adhibetur, magisque arcet putredinem, in primis Hispanicum. Huic Fontanum succedit, in quo ratione virtutis & substantiæ magna etiam est diversitas, in his excellit Nostrum Hallense, hoc sequitur Luneburgense, &c.

Vires.] Si esculentus Mortalibus à mundi Conditor concessus est tanquam necessarium sanitatis & vitæ sustentaculum. Calefacit, exiccac, abstergit, purgat, digerit, aperit, incidit, venerem stimulat, putredini & venenis resistit, unde in Peste maximopere commendatur Elixir proprietatis Juniperinum cum spiritus salis. Externè in clysteribus ad obstructiones alvi convenit, in colicis doloribus fit sacculus ex fl. chamæmel. n. vel milio pulverisato cum sale tosto &c.

N. Hic quaeritur, An sal esculentus calculosis nocivus sit, dum videtur sali urinario materiam suppeditare; & quia vis coagulandi etiam à sale dependet? Verùm examen salis pyrotechniæ medio institutum aliud docet, cum enim sal esculentus, ut chemia docet in urinâ detentus, non sit de ejus compositione, sed prorsus extraneus in Nobis saltem supervacaneum sal in se combibens & transmutans, servet inpermutant & immutatam sui Naturam, quemadmodum si tartari si addideris spiritum salis, tunc post coagulationem fitritidem & manet sal commune, quod fuit, priusquam in spiritum fuit conversum. Certum est, quod nequicquam etiam sibi sit negotii cum calculo: unde nec in compositione hujus vel minimum salis esculenti reperitur unquam, cum magis calculum destruat, quàm promoveat. Sexagenarium mihi à destillationibus inquit Cl. Helmontius immunem à Renum calculo servavi annos sedecim, cui aliàs obnoxius fuit, largo salis esculenti esu. Notum est, inquit Cl. Tachenius in Hipp. Chemic. quod carnes conserventur sale communi à corruptione, qui paucis diebus in liquorem salis sanguineum defluit, hunc coque ac despuma, inde retortæ vitreæ & blando igne omne humidum evoca, ultimò retortam obrue arena & ignem auge, tunc elevabitur in ejus collum sal volatile urinæ sali volatili urinoso simile quod sal ex carne absorbitur. Eodem modo sal esculentus quotidie absuntit superfluum salum in cavitatibus in corpore collectum, ex urina enim facili negotio sublimatur sal volatile salinum & sal esculentus manet in fundo. Assertionem nostram confirmat vice versa defectus salis esculenti nonnunquam in belli calamitatibus, temporum injuria, obsidionibus &c. occurrens, ubi insalutis carnibus homines

Rrr

vesci

verci coguntur, unde massa sanguinea cum latice ob accumulata salia sylvestria salta, quæ alias à sale esculento imbibuntur & præcipitantur, malignam ac venenatam induit qualitatem, ex qua scorbutus, febres malignæ pestilentes &c. progerminant, quemadmodum Anno 1673. in obsidione Grœningiana à Gallis & Moguntinis facta experti sumus.

N. Ad Salis hujus communis Naturam accedunt salia artificialia &c. Sed & hæc ignoscant quæso manes Schrœderiani; Si salia vegetabilia in purum alkali per artem sint transmutata, neque ex animalibus calcinatis (impropriè incineratis) ullum sal fixum alkali elici possit, ut ars pyrotechnica manifestat, iisdem sanè præparationibus, quibus sal commune, subjici nequeunt. Ex salibus enim alkaliis nulli spiritus, nec flores elevari possunt, ut nec destillatio nec sublimatio habent locum, nedum ut ex animalibus aliquid salis fixi obtineri possit, nam ex re aliqua ultra cujusdam naturalem inhesionem quidquam velle extrahere, repugnat naturalibus principiis. Hofmannus.

PRÆPARATIONES.

Præcipua sunt.

1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio.

I. PURIFICATIO.

Purificatio Salis com. M. fit modo vulgari solvendo in ∇ ac crystallizando.

N. Si solutio hæc ac crystallisatio aliquoties aliquo modo repetatur, tandem sal com. dulcescit, sal sapiens.

II. CALCINATIO.

1. Decrepitoria.

Sal calore irritatum crepitare solet. Quare ac crepitando vas destillatorium dirumpat, operæ pretium erit idem decrepitare, id est, ad Ignem calcinare, donec amplius non crepet.

2. Fusoria.

Funditur sal in crucibulo, sine aliquo artificio, Igne saltem satis forti adhibito.

Aliter cum Calc. viv.

\mathcal{L} . Sal. Com. Calc. viv. an. misce ac in anemio calcina igne violento, ut concreseat. Hinc extrahæ sal cum Aqua commun. ac coagula.

Vires. Basilus sal. com. hac ratione cum Calc. viv. ter calcinatum; (singulis vicibus cum nova Calc. viv. anaticè mixtum) adhibet in Tinctura (conficienda. Vide de do C).

III. DESTILLATIO.

Destillatio Salis exhibet acidam ∇ , phlegma, sal volatile & spiritum.

Nimirum.

\mathcal{L} . Sal Com. destilla per se ex \odot , primò prodibit Aqua acida seu \odot -lata; secundo phlegma, cum quo sal quoque armoniacus, seu volatilis sublimatur. Cessat à destillat. ac repone \odot in loco humido ad trahendam ∇ m (vel aliquota Aquæ parte irriga,) deinde destilla rursus, sic exhibit \sim acidus. Hoc repete tones, donec totum sal Com. in \sim conversum sit, quem in MB rectifica.

1. Spiritus salis, sive oleum sal. Com. vulgare.

\mathcal{L} . Salis commun. $\mathfrak{t}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. impasta vel malaxa cum argillæ figulinæ, bolivæ armen. $\mathfrak{t}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad v. & ultra, inde forma orbiculos, quos ad duritiem exiccatos, impone \odot æ terreæ, luto obductæ, vix ad medietatem implendæ: jungatur, Recip. satis capax & servatis Δ

gradibus donec phlegma egressum sit, ultimo pelle forti Δ continuando eundem, donec \sim albi prodierint, \sim hunc rectifica, phlegma, vel in MB abstrahendo, vel si mavis evaporando.

N. Si terram sigillatam loco argillæ sumpseris, præstantiorem elicies spiritum: Quinimo sal cum triplo arena vel farinæ laterum, vice argillæ misceri potest.

N. 2. Quandoquidem in prima destillatione Salis portio minima in \sim resolvitur, nonnulli \odot in ∇ communi coquant, & sal. Com. inde extractum, ut prius destillent.

Alii Sal extractum cum \sim illo priori miscerent, aliquamdiu digerunt, & deinde cum bolo & sim. Qando, totam salis substantiam in \sim transire faciunt. Croll. Senn. in inst. l. 5. p. 3. c. 5. Beguin. Agricola.

N. 3. Impastatur sal ne fluat, quippe si fluxerit \sim ascendet.

N. 4. Alii.

\mathcal{L} . Oust. part. ij. sal. Com. p. iij. Qantque verum \sim sal. Com. purum hac ratione acquiri non videtur verisimile, imò in examine constat, eulmodi vim suam ab Oporthu obtinere, quam à Sal. Com.

Vires. D. uraticus est & Lithonripticus, tartaream quæ mucilaginem potenter resolvit, unde utiliter adhiberi solet in obstructionibus Epatis, Lienis, &c. in Hydrope, lètero. Extinguit suum mirabiliter, absunt corrodendo & si ac dolore quicquid in vulneribus aut affectionibus aliis putredine corruptum est.

Mixtum cum \odot Terebinth. Cera. Camomil. Verbas. & sim. dolores podagricos sedat, raphos discutit, &c. sanat quoque membrorum contracturam ac ariditatem.

N. Ad eundem modum eliciuntur & ex salibus artificialibus vegetabilium, quorum vires licet ex plantis suis aliquo modo conjecturari possint, (e. gr. ex sale ab synthu elicitur \pm stomachicum, &c.) Attamen vegetabilium in genere omnes sunt acidi, instar \sim sal. Com. incidunt, resolvunt, &c.

2. \sim salis compositus.

\mathcal{L} . Sal. Nitr. puriss. & sal. Com. decrepit. (vel si) à. M. cum dupla vel tripla quantitate, (alii quadrupla,) argillæ sicca, & exinde more solito Δ nudo \sim provoca.

\mathcal{R} . Hujus \sim $\mathfrak{t}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. sal. Com. fus. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. digere aliquamdiu, ut nimirum Sal Com. adjectum solvi possit, & protinus per \odot m destilla. Augebis hac ratione \sim & fortiorem reddes; quem eodem plane modo, cum novo Sal. Com. fuso, eadem quantitate sumptis, pro libitu toties augebis, quoties placuerit. Abstrahæ ab hoc \sim u phlegma, & deinceps eundem rectifica per \odot m. Untzer. Agricola.

Vires. Maximarum est virium in Hydrope, intrinsecus & extrinsecus adhibitis, confert itidem in fistulis vulneribus.

(Spiritum salis rosatum vid. supra Spiritum regium.)

3. Spiritus sal. Com. viridis.

\mathcal{L} . Fragmenta laterum, indantur ollæ ighianturque in fornace calcaria; ollæ huic alia superposita sit olla, sale aliquatenus adimpleta, quod ubi vi caloris ut sal fufum in ignita defluat laterum fragmenta, cumque iisdem misceatur. Ex his igitur detur \sim ut moris.

N. Idem perfici potest, si sale in cella liquefacto fragmenta laterum ignita imbuantur.

4. Spiritus sal. com. corallinus.

\mathcal{L} . Sal. Comm. $\mathfrak{t}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. vel iv.

Corallor. tenuiss. citior, $\mathfrak{t}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. j. M. lavigando super porphyr. postea igne destilla vehementissimo in expulsum

pulum capaciff. & ~m falis accipies unâ cum ~u corallorum.

N. Addere potes & sabulum, ut fuso impediatur.

Vires. In affectibus cordis, palpitatione scil. & sim. maximarum est virium.

Dosis ʒß.

5. Spiritus Salis dulcis.

7. Sal. Com. optimè dephlegmati ʒ. opt. ā. M. ʒlenur ter vel quater, sic unientur inseparabilit̃ & dulcescent.

(N. 1. Dulcis dicitur, quia mitior, rodente aciditate habetâ à ʒ.)

N. 2. Eandem dulcedinem consequi poteris, si vel ʒ, vel ʒo Tartari, vel faces vini ab initio ʒlationis cum Sal. com. commiscueris.

N. 3. Exuitur quoque ~ Sal. com. vi corrodente ac velut maturefcit, dulcescitve si dephlegmatus vase firmissimè clauso trimestri spatio in Cineribus continuo atque equali calore tepentibus (qualis est ʒlis æstivus) digeritur.

Vires. Egregium preservativum est in peste; arcet enim omnem putredinem. Ventrículum cum visceribus reliquis in optima conservat dispositione.

Solvit corallia, &c. quin imo & solis tincturam extrahit. Vide ʒ temperatam Basilii in ʒ l. 4. class. 2.

Ufus. Cum saccharo candido in formam Elecluarii misceri, singulisque diebus jejuno ventriculo assumi poterit. Harim. in pract. loc. de pest. Senn. in hist. Tentz. Gluckrath, &c.

6. Aliter.

7. Sal. fufum, solve in Aqua pluvia destillata, filtra, inspissa, ac repone ad crystallifandum: Crystallōs hos exemptos vicibusque aliquot, (10) uridū, solutos & crystallifatos, (sic dulcescent) imbebe cum ʒ formaque globulos cum argilla, destillaque ut moris est.

Vires. Præter virtutes jam descriptas, insigne exhibet menstruum ex reb. ferè omnibus tincturas extrahere idoneum: Insuper Herniam carnosam consumit, si quotidie ter illinatur, manequ ac vesp̃ri ejus gutt. sex assumantur. Agricola.

7. ~ Sal. com. dulcis compositus.

7. ~ Sal. com. compositi ac Alcohol Vini ā. M. ac uni circulando, cohobandoque.

Vires. Adeo resistit siti, ut Hydropici usu illius aliquamdiu a siti liberi reddantur, prodest etiam Ictericis, Lumbricos potenter expellit, extrinsecus lenit podagram, si caute illinatur, imo quicquid de Ol. spiritu de Sal. Com. apud Paracelsum, aliosque modernos Authores legitur, idipsum huic potissimum adscribendum est.

Dosis gr. 6. ad ʒß. in vino vel alio Liquore. Hartmann. in Croll. Tentzel. Uutzer.

8. Spiritus Sal. Com. ʒlati diureticus.

Fit ex leviter calcinati ʒli & Sal. Com. tosti partibus æqualibus cum bolo vel Terra figulinâ globulis confectis, (meo damno expertus ʒlum his non sufficere ad cohibendum fluxum, fixitatemque materiæ) mote vero communi ~us evocatur, qui postea per rectificationem à phlegmate liberatur.

Dosis gutt. vi. matutino tempore cum brodio decoctionis petrosel. Ex communicatione G. Horstij habuit S. Gloss.

9. Spiritus Essentialis.

7. Salis Hallensis ad albedinem calcinati (qui hâc in operâ reliquis præfertur) ʒij. Imbibatur ʒo Sal. Com. mar. vel montan. ad consistentiam pultis liquidioris, fiat clauso vase digestio, quousque ~us cum Sale Comm. calcinato unitus siccatusque sit, affunde alium

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

imbibendo desiccandoque toties, dum sal ulteriorem proprii sui ~us in incorporationem recuset, & ex colore aureo odoreque suavi dignoscans, ʒationis tempus instare, quam si per ʒ instituas, exhibetur fumi albißimi, qui in aquam convertuntur & rectificatione opus habent.

Vires. Dicitur ex ʒ tincturam absque corp. dilaceratione allicere. Est insuper remedium sistendis in momento vomitibus dicatum & certum, idque indifferenter & in omnibus morbis.

Dosis gutt. 3. in Syrupo, in sculo vel vino.

Ex commun. S. Glossai.

10. Spiritus Salis Comm. dulcis ʒem solvens.

Extinguantur fragmenta laterum 5. aut 6. vicibus in ʒo Sal. Com. postea destillantur, prodibit ~us subacidus, qui in volâ ʒlis folia & margaritas solvere creditur. 2. Flos Salis sive crystalli Sal. Com. dulces collo ʒ post destillationem affixi, longoque tempore cum ʒ digesti idem efficiunt. 3. Solus ~us sal. com. vi circulationis diutinae caudam suam devorat, id est, acedinem suam innato suo balsamo dulcificat. 4. Idem cum ~tu ardente ʒni mixtus aliud menstruum dulcer pæbet ʒis solutivum. 5. Ex spiritu Roris Majalis & sole calcinato fit alia aqua solutiva, dulcificata longâ digestionum & irrorationum serie, quæ ʒem in liquorem volatilem potabilemque evehit.

Ex Communicatione ejusdem.

11. Crystalli Sal. Com. dulce, seu spiritus Sal. Com. coagulatus.

F. ʒ terrea, ampla & fortis, quæ in superiore ventris capacitate fistulam habeat, in medium ʒæ corpus pone desinentem. Huic ʒæ impone Sal. commun. vel quod melius Hispan. seu marini ʒb. iij. vel iv. Recepraculumque adapta capacitàssimum, cui si libet Aquam infundere licet; adde Ignis per gradus, donec Sal. Com. fluat, tunc per fistulam guttula una vel altera Aquæ frigida immittatur, ut (fistulæ orificio statim obstructo,) in ʒ spiritu, copia mediante humiditate eleveetur, inque recepraculum propellatur. Continua hoc ipsum, donec Sal. Com. in ~m ferè sit redactum. Dephlegmetur dein ʒatum, evaporetque humiditas reliquum exponatur ad crystallifandum, s. a. sic crystalli colligi possunt Sacchari dulcedinem referentes, solabilesque per deliquium.

Vires. Sudorificum est, Hydropicorumque sitim non minus ac ~ ille salis dulcis compositus arcet; quippe nihil aliud est, quam ~ Salis coagulatus, unde quoque essentialē humiditatem, quæ multum in Hydropicis exhauritur, maximopere adjuvat, ventriculūque ac viscera reliqua confortat, malignitatem in peste pestilentialibusque febribus potenter discutit.

Dosis gr. 5. 6. 7. ad 20.

N. 1. Si ad Sal. Com. exccat. ʒij. addideris carbonum pulverisat. ʒij. optimeque miscueris, ex ʒij. sal. Com. accipies spiritus ʒb. f. Hartman. in Croll. Kest. 4. cent. 79. Agricola.

N. 2. Crystalli hi cum ʒ impregnari nobilissimum exhibent confortativum. Fitque si Crystallorum p. 6. cum ʒ foliat. p. 1. aliquot Horas in ʒ sub tegula reverberantur. Agricola.

N. 3. Kesslerus docet & follem adhibere, cujus rei gratia ʒm habere duplicem tubulum oportet, alterum frigida immittende, alterum folli intromittendo infervientum.

12. Flores Sal. Com.

Quemadmodum in succici destillatione flores, salis volatilī titulo elewantur, parietibusque ac collo ʒæ adhærescunt, ita & ʒatione ~ oleivæ salis, tandem Ignis vehementiâ flores ascendunt, quos collige.

usus horum varius est, ad crassum phlegma incidendum, corruptosque humores a putredine vindicandos.

N. 1. Sunt qui cum *sublimant, verum decipiuntur, si flores salis simpliciter inde sibi imaginantur.

N. 2. Funt etiam flores salis, si in rectificatione ac olei salis id, quod residuum fuerit, fortiori Δ sublimet.

N. 3. Si Qlatio facta sit cum O. Qm aëri aliquamdiu expositum, ac iterum Qlationi subiectum, plus olei ac storum suppeditabit; potest hoc aliquoties repeti.

13. Alius Spiritus seu O Sal. Com. unde Cry-
stalli dulces.

℥. Sal. Com: marini crebris solutionibus (in ∇ pluvial. vel fontis destillata) filtrationibus & coagulationibus optimè purificati, lb vi. adjice dissolventis Qlati & mell. flui ex vegetabili & animali parati, (id est, crucibuli ex melle facti.) q. s. præmissa digestionem destilla gradatim ac cautè, ex O terrea vel vitrea, luto probè munita in receptaculum capacissimum. Sic elicis Sp. aqueos sulphureos ac Qlatos, dulces acidosque, qui firmissime sali reconditi inhaerent, (gradatim ac cautè Qlatio hæc peragenda est. Oportet enim ut vas incandescat, purpureo tamen non claro colore, ne scil. sal. com. fluat, & in hoc gradu immorari decet O 8. (post Sp. nebulosos, (in quibus primum ens metallorum resolutum est,) exhaustos, tandem ad collum recipientis sublimabitur terra foliata instar nivis albissima, vel etiam flava, (qui Q aut sulphur philosophorum nuncupatur.) Spiritum destillatum, ut & terram conjunge, astraheque phlegma solummodo insipidum VB calore lentiss. reliquum repone ad crystallisandum s. a. Et hoc repete, donec nulli amplius crystalli concrecant, & id quod extillat aciditatem sapiat. Tunc ab opere desistendum, & in fundo cucurbitæ quarendum verum Sal. Com. O vitriolatum.

Vires. Crystalli hi, etsi sapore dulces, admirande tamen sunt virtutis, adeo ut vel per se seorsim, vel cum oleo suo debita proportionem permixti, verum sint Solis menstruum dissolvens, quod proprietates ejus ob virtutes vitales, vegetantesque locupletat & exacuit.

14. O Sal. Com. rubrum.

℥. Sal. fufum crucibulo sufficienter imprægnatum, misce cum silicibus grossè contusis & destilla ex O per Aren. prodibit primo sp. flavus, postea O rubrum.

N. Imprægnatio illa fit ut moris, Nimirum:

Sal. Com. fuso superfunde Acet. destill. & abstrahere per Aren. iterum superfunde novum Acet. destill. & rursus abstrahere, hoc toties repetendo, donec materia optimè sit putrefacta & nigra. Schroderus.

3. Destillatio.) Sal. comm. ita per se destillationi ex retorta subijci nequit, nisi duplum, triplum &c. argillæ, vel boli commun. &c. addideris, aliàs vi caloris fufum retortam fragilem reddunt, additorum beneficio fuso illa præcaveretur.

1. Spiritus salis, sive oleum sal. comm. vulgare.) Præfens descriptio cum præparatione ex asse convenit; Et quoad notas additas sciendum, hisce omnibus Nos supersedere posse, si spiritus salis prius destillatus aliquot cohobis super Cap. mort. destilletur, & demum per MB rectificetur. Qua occasione scias velim, non sufficere, ut Dominus Autor annotat, phlegmatis ex MB abstractionem, quippe latent in nonnullis liquoribus corpuscula quædam terrestri naturæ, quæ salinis implicata eorundem vires obtundunt, ideoque quo istiusmodi liquores rectè depurentur, per MB. destil-

lentur, necesse est, & lento quidem ignis gradu. Id quod sapienti sat non citrà rationem monere volui.

N. Cum O part. ii, & sal. com. part. iii. compositum acquires spiritum ad magisteria conficienda non rejiciendum.

Vires.) Diureticus est & Lithontripticus, tartareamque mucilaginem resolvit, inquit Autor. l. c. quâ virtute spiritus salis officinarum vulgaris ut plurimum crudus adhuc & partib. terrestrib. & sulphureis scoriis imprægnatus non gaudet, sed qui summum puritatis ac subtilitatis gradum ex Arte attingit penetrantissimus, fragrantissimus ac minus corrosivus est, non sibi par habens remedium in extinguendis urinæ ardoribus, renum stranguriis, calculo renum, fermentum ventriculi juxta corrigendo & corroborando, ut in malo hypochondriaco, scorbuto, hydrope, ictero, febrib. intermitt. &c. aliquid singulare spondeat. Hic autem non leve suboritur dubium; quâ fiat, cur spiritus salis aliq. acidi minerales tam egregias præstent virtutes, cum tamen Cl. Helmontius primum quasi Tartari principium in corpore humano adscripserit defectui fermenti bilis, eò quod hoc ipsum stomachi acidum chylum in salem falsum volatilem commutare nequeat in Tr. de Lithias. C. 4. Verum hic probè attendendum est, magnam esse diversitatem inter acetositatem ventriculi fermentalem p. n. constitutam, crassam, crudam, fixam ac terrefactam, magisq. corruptivam, quæ in salem altum volatilem converti nequit, & inter spiritus salis aut aliorum spirituum mineralium aciditatem, quæ volatilis, subtilis, corruptioni non obnoxia, sed potius illam ventriculi cruditatem acidam corrigit, præcipitat & in volatile stomachi fermentum simpliciter est acidum, sed est acido, falsum volatile, cujus finis est cibum transmutare in chylum humanæ digestionis, siquidem plura adsumuntur fixiora, acida, &c. cum cibis, quæ tamen cum volatilib. succis parem subire debent conditionem, si penitus ad vitæ radicem migrare & nostri inquilini fieri volunt. Deinde notandum est, unum acidum sæpè præcipitare alterum posse, uti ex mechanicis constat chemicis. Præterea spiritus acidus ex earum rerum numero esse quibus diversæ insunt facultates. Hi enim immodicas hæmorrhagias, & evacuationes alias, quæ præternaturam eveniunt, sistunt. Quævis etiam dura dissolvunt corpora, & sic per consequens potius humores viscidos, tartareos & qualvis cruditates præcipitissimè digerunt, incidunt, absumunt. Tandem & dosis horum spirituum venit consideranda, dum in latius etiam largo exhibentur vehiculo, ut illorum ita diffundatur aciditas, ut velexquisito gustus sensorio vi præsentiantur.

N. Ad eundem eliciuntur & spir. ex salibus artificialibus vegetabilium &c.) Verum quod quis non habet, alteri dare nequit, ut supra jamdum percepimus; Ex salibus vegetabilium arte paratis in æternum non elicies acidum spiritum, utpotè alkalibus, quæ ab igne etiam non repatiuntur violentissimo, & instar salamandra intensum flammæ reverberium diu sustinent, citrà virium jacturam, nec tamen atomus ex illis sublimatur.

2. Spiritus salis compositus.) Si hunc spiritum salis compositum denud cum Sale fuso digeras & absque argillâ siccâ protinus per retortam destilles, citrà fusionem vel fluxum non perages, satius igitur erit priori Cap. mort. spiritum cum sale fuso acuatam denud affundere ac destillationem instituere, postmodum autem rectificare. Maximæ est energię in hydrope; Externè confert in fistulosis ulceribus. In Mechanicis chemicis O & D in calcem corrodit, quam spiritus Sal. com. simplex & verus contra iterum præcipitat.

3. Spiritus salis viridis) Omnis spiritus salis peritè ac debitè paratus colorem plerumque obtinere debet sub-

subviridem, & odorem non injucundum, id quod acquies, si spiritum salis non solum probè rectificaveris, sed & prius sal, ex quo spiritus erit, destillandus; vulcani beneficio per fusionem à solidibus purificaveris. Quemadmodum Dominus Autor hîc tibi modum ostendit.

4. *Spiritus Sal.com.corallatus.*) Parum elicies spiritus acidi, quia corallia acidum combibunt, atque adeò nil nisi phlegma loco spiritus acidi acquies, ne gry quidem ex corallis supra alembicum elevato. Si tamen corallia spiritu acido probè prius imprægnata fuerint, ut nullum amplius imbibere queant acidum, tunc acidulum super retortam dimitunt spiritum. Sed non video cui usui.

5. *Spiritus Salis dulcis.*) Dulcis dicitur, non quod planè in dulcedinem degeneret, sed quod mitiorem saporem, & meliorem acquirat odorem, dum acidum spiritus vini volatile rodentem spiritus salis aciditatem ita hebetat, ut summâ cum jucunditate sumi queat. Vide infra De vitriolo.

N. 1. *Eandem dulcedinem consequi poteris, si vel spiritum vini vel ol. tartari vel feces vini &c.*) Si aliquid salis tartari p.d. spiritui Salis s. admisceas, ac denuò Cap. mort. adsum destilles, per strias quidem super alembic. elevabitur, sed in tantâ copiâ non acquies spiritum & minoris aciditatis erit.

6. *Aliter.*) Hic modus etiam succedit, non differens à Priori. Ad eundem Modum & Spiritus Regius conficitur seq. modo: Rec. Spirit. salis rectificat. ℥iij. sp. rosar. rectific. ℥ix. Inde hos spiritus cucurbitæ vitæ, appone alembicum, cui ambra ℥ss. Moschi ℥j. probè invicem mista cum panno lineo puro inserta & destilla per MB. durante & latione ambra & Moschus in gelatinam resolventur: Et finitâ hâc ipsâ adde residuum in alembico panniculum & Confectionem Alkermes spiritui destillato, ac resolvet istam gelatinam in liquorem, fietq; inde Essentia Ambra & Moschi elegantissima Cerebri & Cordis confortans non in postremis habenda, vel per se guttatim in accommodato vehiculo, vel cum aliis admista exhibita.

Vires. Egregiam præservativum est in Peste.) Tunc loco sp. vini s. substitui debet Spiritus Theriacalis, item Elixir Propr. P. loco sp. sulphuris admisceatur. Ex quo etiam Meum Elixir vitæ balsamicum est compositum.

7. *Spiritus Sal.com. dulcis compositus.*) Per aliquot menses circulatio ac digestio continuanda est, & tunc demum egregius fit Spiritus in Laudatis ab Autore affectibus.

N. Spiritus Salis cum Spiritu *urinoso mixtus egregium etiam præbet aperitivum & anti-hydropicum Sal, absumptâ prius per ignem lenem humiditate.

8. *Spiritus salis vitriolati diureticus.*) terra figulina est addenda ad fluxum prohibendum. Ex Cap. mort. hujus sp. salis duplicatâ Sal Mirabile Glauberi conficitur.

9. *Spiritus Essentialis.*) Etiam ad fluxum cohibendum argilla est admiscenda, ex quâ globuli cum Sale isto imprægnato sunt formandi, nisi fractâ retortâ oleum ac operam perdere velis.

10. *Spiritus salis dulcis Solvens.*) Spiritus salis probè rectificatus aliâs Solvit, inprimis si diutinam digestionem fuerit perpessus, caudam suam devorat, id est acridinem suam innato suo balsamo dulcificat.

11. *CrySTALLI salis dulces, seu spiritus salis coagulatur.*) Hæc descriptio elaboratu admodum dubia est; Si tamen ad salis exsiccat. lib. j. addideris carbonum pulveris lib. ij. felicius succedet. Unde ad bonam spiritus salis copiam acquirendam dicere solebat D.D. Ioannes Langius p. m. Vulcanum utrumque accedere debere. Quem ego hariolor ignem & carbones fuisse; nec dubito succedere, modò carbones prius à sylvestri

aciditate sua probè liberati sint, ne compositus exinde oriatur spiritus salis.

12. *Flores salis.*) Hi in fine destillationis frequenter una cum spiritu sublimantur in collum retortæ; Sunt, qui eum *sublimant, hi licet non sint flores simplices salis, sed *, optimum tamen sunt Medicamentum in febribus, quotidiana, terniana, quartana &c. & ubi vi aperitiva opus habemus.

N. *Si destillatio facta sit cum O &c.*) O si calcinatum sit, saporis expers est, & nullum de se spargit spiritum, libero autem expositum jovi, de Sale aëris multum attrahit, in quo Spiritus Universi residet.

13. *Alius spiritus seu ol. Sal. com. unde crySTALLI dulces.*) De hujus descriptionis & præparationis veritate constat, modò encheirises in omnibus debite observentur; Digestio ad multos dies continuanda cum Vitriolo soluto & menstruo illo, quod est ex Acet. dista & melle cum boli additione elaboratum. Deindè gradatim ac cautè destillatio est dirigenda ac peragenda. Tertiò Vas ita incandescat, ne Sal ad fluorum perducatur. Spiritibus sulphureis ac vitriolæ acidis elicitis demum, qui sali residuo inhærent, sublimandi sunt instar terræ foliatæ coloris nivei. Hic processus inter arcanâ refertur. Vide de his crySTALLIS Rhumelium in thesaur. Secretorum.

14. *Ol. salis rubrum.*) Ex Sale fuso Acet. imprægnato & cum filicibus grossè contusis mixto spiritus salis ex retortâ per Aren. qlatur, quidem non purus simplex spiritus salis, sed sale Acet. adulteratus est; attamen egregium menstruum solvens præbet ad Magisteria conficienda. Hofmannus.

IV. EXTRACTIO.

Unde

℥. Salis calcinati q. v. solve in ∇ still. & coagula; idque repete tantisper, donec Sal purum sine facibus dulce reddatur.

Hinc

℥. Hujus p. ij. O usti part. i. destilla Δe nudo paulatim, donec omnes propulsi sint, hunc rectifica vicibus aliquot. (4.) Dein ex ∇ Sal cum ∇ destillata elicto, idque optimè solutionibus ac coagulationibus purificatum calcina in phiala ad rubedinem, (fit spatio Mensis) Huic demum superfunde m priorem, digere, & elicies Tincturam rubicundam, quæ nec recusat per Om propelli.

Vires. Sudorificum ac diureticum est insigne, tartareas mucilagines incidit, putredini omnigena resistit, corroborat itaque Balsamum nativum, adeoque usus præcipui est in peste, febribus, hydrope, calculo, (atteritè nimirum:) obstructione Epatis, Lienis, &c. Quinimo & sanguinem mundificat; unde maxime prodest, in cutis pruritu, doloribus arthriticis. & simil.

Dosis à ℥j. ad 3j. Schroderus.

IV. *Exeractio Unde Tinctura Salis.*) Hæc descriptio & elaboratio laborantem fustantur, ex sale enim residuo extracto & calcinato ad rubedinem nemo cum spiritu priore Tincturam eliciet. Interim cum alia prostent magis parabilia, hæc etiam facile carere possumus. Hofmannus.

De Sale fossili seu Sale Gemma & Indo.

Sal Gemma salis communis genus est, quod in fodinis lapidum frangitur, specieque CrySTALLORUM splendens eruitur, unde gemmeum, à gemmis ob colore nuncupatur, dicitur aliâs Sal fossile. Germ. Steinsatz. Sal Gem. Sal Gemme, of Steensont.

Vires. Hoc etsi easdem vires cum sale communi obtineat, substituique eidem queat, rationis tamen usus est in praxi Medica; crebrioris in Chymica; ubi in solutionibus Metallorum Sali communi antecellit. Com-

mendatur tamen peculiariter Foresti experientia ad stercora dura eliquanda, adeoque ad colica tormina arceda intus & extus. l. 21. 5. Schroderus.

De Sale Fossili, seu Sale Gemma & Indo.) Sal Gemma, quo utimur, ex Polonia maxima ex parte affertur, quamvis in Calabria & alibi etiam effodiatur. In his tamen quoad figuram externam & saporem nulla ferè est differentia; nisi quod Calabrinus purior ac nitidior sit. In Minori Polonia instar ingentium saxorum hoc Sal aded lapidea duritie solidum ferro excinditur, ut non solum mola teratur ad hominum usum, sed ex illo etiam ædificia extruantur. Easdem vires cum Sale communi obtinet, nisi quod in solutionibus metallorum Sali nostrati antecellat.

Rarioris tamen usus est in Praxi Medicâ.) Ex hoc Cl. Zzzelfernus in appendic. ad animadvers. p. m. 54. 55. cum nitro aqua reg. non solum ad solvendum componit, sed etiam cum sp. vitrioli ad Medicinam transfert; Et spiritum vitrioli Essentificatum exinde elaborat. Aliàs hoc Sal stimuli loco clysteribus adjicitur, ut & suppositoris vel solvendum in aqua & clysteris loco applicandum non sine laudabili effectu ad fæces alvi induratas eliquandas & vacuandas. Hofmannus.

Præparationes.

Omnes præparationes subire aptum est, quas Sal Com. Attamen præcipua quæ ex illo in usum veniunt.

Sunt

1. Spiritus Salis gemma, Spiritus & fusibilis &ialis.

Fit eodem modo, quo Sal. Com. Nimirum, & miscetur cum triplo argillæ vel sabuli, &c. Saturque per Om igne nudo.

2. Balsamus Salis gemma seu Liquor.

7. & 16 j. fluat ad Δ, & postea solvatur in ∇ pluv. destill. Filtretur coaguleturque. Has operationes liquefactionis, scilicet solutionis, filtrationis & coagulationis tantisper repete, donec & ad summam subtilitatem fuerit perductum, quod inde cognoscitur, quando ejus particula ad candelam admota, statim liquefcit.

Vires. Arcanum summum est in rupturis, intus & extus adhibeum.

Intra corpus dantur quotidie gutta aliquot (3. 4. 5.) cum Extract. consolidæ,

Extus fiat illitus, Hartm. in pract.

N. Mentio quoque apud Veteres fit Salis Indi, de quo ambigunt, quid propriè sit. Sunt nimirum, qui contendunt non Salis esse genus, sed Saccharum, salis nomine insignitum (ob similitudinem quam cum sale habeat.) Verum enim verò rectius sentire videntur, qui id peculiare genus salis fossilis faciunt, ejusque loco, cum raro vel nunquam in nostras regiones transportetur, Sal gemmeum recipiunt, Exempli gratia in Pilulis de Lapide Lazuli, & simil. Schroderus.

Mentio quoque apud Veteres fit Salis Indi.) Nullum dubium, quin Indi legitimum Salem etiam non habeant; juxta Plinium enim Lib. XXI. Cap. VII. in Oromeno Indiæ monte Lapidinarum modo ingentibus foditur glebis. vid. Matthiolus Lib. V. in Dioscor. Cap. 88. Hujus loco Sal Gemma substituitur. Hofmannus.

De Sale Nitri.

Sal Nitrum est Sal Sulphureum, seu φλόγιον, salso-amarum ex terra pingui excoctum.

N. Etsi præter Nitrum Antiquorum quod planè nobis incognitum est, triplex dari possit. Nimirum 1. Quod ex terra attrahitur. 2. Quod muris lapideis adhaerescit. Et 3. Quod scopulis seu rupibus adnascitur:

Attamen Officinis nostris, non nisi unicum usatum est. Primum videlicet, idque excoquitur ex terra defertis ac pinguibus, siue pinguedo illa è terra Archaes immissa, siue aliunde introducta. Introducitur enim exempli gratia, urinis atque excrementis animalium columbarum.

(N. Nitrum loci natalis ratione sæpè multum de natura * participat.)

(Nitrum nativum Alexandrinum rosei coloris, ejusdem Neapolitanum, flavescens Puteolanum.)

Chymicis dicitur Cerberus Chymicus, Sal infernalis, Sal Sulphuris, Hermes, Baurach, Algali, Sal Adronæ, Anatron, Cabalatar, &c. Basilio, Serpens terrenus, Germ. Salpeter, Salniter. Salpêtre, Sal de Nitre. Sale-peter, or Sale of Niter. Sout-peter, Sout van Niter.

Eligendum nitrum est crystallinum, purum. Tanto autem purius censetur, quanto minus salis communis particeps fuerit, participationem hanc experiri licet φλόγιον.

Nimirum.

Mitte sal nitr. in carbonem ignitum, si omne avolaverit, purum judicatur, & è contra, si aliquid remanserit, purum judicatur, & è contra, si aliquid remanserit, quantum remansit, tantum de sale communi participare æstimatur.

Vires. De Nitri qualitatibus primis haud parum controversatur: Sunt enim qui solidum, sunt & qui frigidum id æstimant.

Ceteras Nitri vires quod attinet, vim habet putredini resistendi, sitim ac æstum compefcendi. Tartarum saburram incidendi, coagulatos sanguinis grumos resolvendi, dolores mitigandi, (id quod præcipue lapidi Prunella adscribitur.)

Hinc.

Usus ejus tam internus, quam externus vulgarissimus est.

Interne solvitur in potulentis ac præcipue in ∇ fontibus (3i. vel 3ss. in mensur. 1.) exhibeturque in febribus ardentibus putridis, præcipue in febr. illa Ungarica distilla, in pleurisi, peripneumonia, in calculo renum & vesicae, in obstructionibus epatis ac mesarai.

N. Ubi alvus nimis laxa fuerit, vel ventriculus debilis, ejus usus non ita proficiuus erit.

Externè communissimus ejus usus est in inflammatione faucium & angina (ubi in gargarismis solvi solet.) in topicis anodynis ac refrigerantibus, ubi præcipue solvitur in liquore appropriato & imponitur cum linteo: in combustionibus, ubi simili modo applicatur.

Dosis eadem qua lapidis Prunellæ.

(N. Nil magis arsenico contrarium est quam Nitrum.) Schroderus.

De Sale Nitri.) Hoc sal sulphureum est seu φλόγιον, unde facile ardet, Sal amarum ex terra pingui excoctum, præprimis ubi jumenta stabulantur. Constat ex sale volatili acidis particulis abundante, seu spiritu acido & sale falso fixo. Destillato enim Nitro tum volatilis liquor acidus, qui est genus aceti mineralis, prodit, tum Sal fixum ad naturam alkali proximè accedens & salis lixiviosi indolem exprimens in Cap. mort. relinquitur. Adeoque Nitrum peculiare quoddam salis genus est, & suis sibi proprietatibus internoscitur, tum à salibus aciditate singulari præditis, cujusmodi Q. vitriolum, & &c. tum ab iis, qui reverà alkalifantur, ut sale tartari, & cinerib. clavellatis. Quinimò facile advertere possumus summam differentiam inter effectus & operationes horum. Ita Metallina concreta pleraque, quæ aqua fort. per corrosionem dissolvit, Ea per solutionem nitri fixi præcipitantur. Et pleraque corpora sulphurea ac oleosa, quæ solutione nitri fixi dissolvuntur, illa ipsa affuso spiritui

ritu acido nitri præcipitantur. Sic etiam si quis infuso ligno Brasiliensi aquam puram coccineo imbuerit colore, eandem affuso modico sp. nitri & concussa phiolâ rursus adventitio rubore ita privare poterit, ut lente flavescat. Eadem aqua, ubi solutionem exiguam Nitri fixi admiscueris, iterum puniceabit, & colorem pristino magis saturum & sanguinis haud abfimilem induet. Constat igitur, Nitrum ipsum partim esse fixum, partim volatile, quæ in ipsius compositionem veniant & acida sunt, eadem esse prorsus volatilia, quæ alkalica sunt, ea quoque esse fixa. Hoc in crystallos redactum pyramidalis gaudet figurâ, quam etiam in minimis obtinet resolutum.

N. *Et si præter Nitrum antiquorum, quod planè Nobis incognitum est, triplex dari possit.* Nitri verissimi proventu non ulli etiam Terrarum Nova cedit Hispania. Verrunt illud ex terrâ arefcente, lacu aut è muris deradunt, aut antris, roseum ac candidum plerumque leve, fistulosum, fragile & percolatum formam & splendorem Nostratis repræsentans. Quo fit, ut mirari subeat illorum (*Nostrique Autoris*) sententiam, inquit *Rerum Medicarum Nova Hispania Nord. Ant. Recch. lib. 10. cap. 26.* qui vulgare nitrum ab antiquorum differre enixius contendunt, aut spumam Nitri nesciunt ab aphronitro Aphronitrum diversum esse contententes. Novæ ergò Hispaniæ ex Lacubus æstate arefactis veritur scopis & colligitur manibus Nitri verissimi & candidissimi Aphronitri copia non mediocri & in usus reconditur. Abundat. Eo totus Mexicanus lacus.

2. *Quod muris Lapideis adhærescit.* Ob locorum diversitatem, in quibus provenit, Nitrum non semper æquales obtinet virtutes. Quod sponte ex terrâ erumpit & citrà artificis opem habetur, de Naturâ Salis Armoniaci participat, & copiosè colligitur, attestante *P. Posterior in P.S. Lib. 2. cap. 7.* in pluribus locis agri Bononiensis & maxime in montibus ad meridiem expositis, quo loco marcasita alba & citrina copiosè reperitur. Qui artificiosè ex terra educitur, atque ex muris & antiquis ruderibus colligitur, nihil quicquam de * natura participat. vid. & l.c. cap. 15. Aphronitrum quod vulgo spumam Nitri interpretantur, Jenense genere convenit cum hoc Bononiensi hodierno & Romano, cum Veteri & Pliniano nequaquam. Cæterum discrepant tum ratione coloris, tum saporis, tum denique gravitate & levitate, quæ omnia proveniunt partim culpâ seu mavis virtute Aquarum, quarum exhalationes in imbres & pluyias desinunt, dum vel nitrosæ simpliciter, vel simul aluminosæ, vitriolicæ &c. partim naturâ petrarum, Lapidum, terrarumque quas allabuntur & transmeant, hæ enim vel aluminosæ, vitriolæ, armoniacæ, molles, duræ, pingues, argillosæ, sabulosæ, & arenaceæ, album tum colorem, tum pondus aliud addendo, partim verò Solis, prout Calor intensior fuerit, vel remissior. Ita videmus cocturâ ignis dulcescere amara & vice versâ adstringere, acerba reddi, laxare pro texturæ & figuræ immutatione. Videas etiam si Nitrum coctum & purificatum ulterius coquatur in aluminis devertere Naturam. Sic Paravii & in tractu Puteolano observata fuit aphronitri hujus & in sapore, flore, levitate, candore & colore non una vicissitudo. Quemadmodum, ubi Sulphur excoquitur, imò ad latera elegantissimè sublimatur, ejus non parvam copiam nullius saporis notabilis, nisi leniter saliduli, deprehendimus. Sed cur Vitriolum sapiat Jenense, causa est, quod montes Jenenses æris alant mineras, & lapides pyritides, qui erosi & imbribus tacti florem suum reddunt & in superficiem effundunt. Nullum est dubium, quin Sal Aëris centrale suum etiam hic conferat *Παλαιον μέγεθος*. Id quod præter alia etiam confirmant ova illa philosophica seu Minera Martialis Casseliana aëri exposita, cujus supra meminimus. Resolve Nitrum in aëre humido in liquorem, ac destilla ad pristinam ejus siccitatem, hoc iterum aëri expone

humido, & iterum exsiccâ. Hunc laborem quo sapius repetieris, eò majorem Nitrum acquireret volatiliteratem ex Sale in aëre hospitante, ut demum etiam si Naturæ pondus æquet, planè fiat volatile. Residere autem Sal ejusmodi in aëris hemisphærio docet incrementum illud & ponderis auctio in rebus quibusdam fortiter calcinatis, si scilicet Cap. mort. Tartari aut Vitrioli aëri exponas, verè illa augentur & incrementum sumunt à dicto sale, quod in Vitriolo salem mirabilem nitrosum exhibet, qui in Cap. mort. Vitrioli, antequam exponeretur, non inerat.

Primum videlicet, idque excoquitur ex terris desertis ac pinguibus. Quomodo Nitrum conficiendum sit, *Lazarus Ercker de Metallis, Angelus Sala, Glauberus &c.* describunt. Nitrum conficiendi rationem & modum qui novit, totum terrarum orbem exiguis peragere potest sumptibus, modò terræ communis portionem sumat, eamque imprægnat suo artificiali fermento Nitrico, imprægnatam postea excoquat, depuret, & nitrum ex eâ extrahat, aërique iterum exponat. Fermentum constat ex sale communi, urinâ, jumentorum stercore, & scoriiis ætialibus &c.

Eligendum Nitrum est crystallinum. Probitatem Nitri Nonnulli etiam inde experiri volunt, quando scilicet in manu detentum citò incalescit & tandem dissilit. Aliàs Domini Autoris notæ sunt probatæ.

Vires. Nullus in rerum Naturâ Sal magis catholicus est, atque Nitrum, quod per universam Naturam adeò diffusum & in concretionibus satûque mistorum actuosum est, ut quasi spiritus Mundi sit retinaculum, sine quo Nemo vivere potest, dum omnibus vitam & crescentiam largitur. vid. *Ol. V. formis in Musæo c. 8. p. m. 22. De Nitri viribus.* HOFMANNVS.

PREPARATIONES

Præcipue sunt.

1. Purificatio. 2. Calcinatio ac Fixatio. 3. Destillatio. 4. Extractio.

PURIFICATIO.

Unde.

Nitrum crystallisatum, seu crystalli nitri.

Nitrum crystallisatum quando simpliciter præferitur, nihil aliud intelligi solet, quàm Nitrum sine calcinatione, solâ solutione ac crystallisatione purificatum. Solvitur autem in ∇ communi, crystallisaturque s. a. ut moris.

Depuratio Salis Nitri.

Præter eam, quæ à Keslero art. 61. centur. 1. describitur, sit quoque, si thxv . Sal nitri in mensur. unâ aq. comm. solvas in cacabo æneo super Δ lignorum per dimidiam horam, si probè solutum est, remove ab Δ , & sensim per vices instilla ziv . aut circiter f . tege cacabum pluribus linteis, & sine concrefcere in diem alteram.

Ex S. Closs.

II. CALCINATIO.

Unde.

10. *Lapis prunella Nitrum tabulatum seu præparatum, fixum, anodynum seu crystallum minerale.*

℥. Sal. nit. puri q. v. fundatur f bulo, superinijce aliquid Sulph. puri (melius est flor. Pulph.) quod ubi deflagaverit iterum aliquid Sulphur immitte, idque repete, donec super Sal nit. Zi . injeceris ZB . ad Zi . & Sal nit. planè purum fiat, tum effunde; & hic est lapis prunellæ vulgaris.

Nitrum hoc modo præparatum, si quas impuritates contraxit, purificari potest solutione & crySTALLIFICATIONE, ut supradictum.

N. Præstat ∇ m rosarum pro solvente adhibere.

Vires. Vires ac Dosis eadem qua Nitri, imo qua supra de Nitro dicta sunt, de lapide hoc prunella potissimum intelligi debent.

N. Dosis Hartman. in præct. miscet huius Sal. nit. præparati \mathfrak{z} i. cum mensur. i. Liqueoris seu ∇ a pro potu febricitantium. Ego vix \mathfrak{d} iv. transcendendo, nimirum aliquantulum debilitat ventriculum, unde & alvi fluxus concitari nonnunquam solet, aliàs à \mathfrak{z} ß. ad \mathfrak{z} j propinari, sine noxa potest, præcipue autem cum Saccharo, quo amaror mitigatur, vide Sennert. Instit. Beguin, lib. 2. cap. 11. Quercetian. in Pharmacop. restit. & Alexiac. & c.

2. Nitrum fixum, aliud.

\mathcal{L} . Sal nit. pur. \mathfrak{t} bi. \mathfrak{iv} . Calc. viv. \mathfrak{t} ß. \mathfrak{iv} . M. & cementa \mathfrak{g} 5. vel 6. dein extrahe Sal. nit. affundendo ∇ m calidam, filtrando & filtraturam inspissando.

N. Prima CrySTALLISATIO Sal. nit. optima censenda est, continet enim nitrum purius & magis inflammabile, secunda qua fit per evaporationem ejusdem aqua usque ad medietas, minus sincera est, & Sal. comm. fixi particeps.

3. Aliter.

\mathcal{L} . Sal nit. q. v. affunde spiritum \square æ, destillaque sensim, tandem adde \triangle m at \mathfrak{t} orem ut fluat; Labores repete aliquoties. [5.] ad minimum, semper novam spiritum affundendo.

N. 1. Alii pro spiritu \square æ substitunt spiritum Sulph.

N. 2. Nonnulli Nitrum lavigatum impastant cum albumine ovi, exciccantque ad \triangle m, tandem augent \triangle m ut Nitrum fiat: hinc effundunt.

Vires. Metalla reddit malleabilia.

4. CrySTALLUM minerale saccharatum.

Fit, si CrySTALLO minerali in ∇ rosarum soluto Sacchari ana miscetur; idq; fit propterea ne scilicet urinosus sapor molestiam pariat. Fel. Wirtzius. 4. Chirurg. c. 4. pro arcano habet in humorrhagia vulnerum.

5. Nitrum perlatum.

\mathcal{L} . Sal. nit. \mathfrak{x} . solut. part. iii. vel iv, Sal. perlar. idem in \mathfrak{x} . solut. p. ii. vel ana conjuge, coagulaque evaporando, ac repone in frigido loco ad crySTALLIFCANDUM.

Ulus. Egregium est cordiale & mitigat simul æstum febrilem.

6. Nitrum corallatum.

Fit eodem modo ex sale scilicet corallorum & Sal. nit. an.

Vires. Usus idem est cum priori in febribus & virium restauratione.

7. Nitrum saturnisatum.

Fit eodem modo, nimirum ex Saccharo \mathfrak{h} ni & Sal. nit. puro, seu lapide prunellæ.

Vires. Confert asthmaticis. [Cardialgiâ, & ventriculi fervore affectis.]

Dosis gr. 6. vel 7. in ∇ aliqua convenienti.

N. Si cupiam lubet nitrum vel lapidem Prunella tingere, solvat tincturam rosarum, violarum, santali, st. Tunica & sim. in appropriata aqua, in qua nitrum sit solutum, reponaturque ad crySTALLIFICATIONEM: Eodem modo & Saccharum crySTALLINUM tingi potest.

CrySTALLI Sal. nit. siue Draco fortificatus.

Digere nitrum depuratissimum in ∇ u Sal. nit. ut illius solvat quantum poterit, abstrahere, egredietur phlegma, alium ∇ u m suffunde, digere, & a, donec tam acer exeat,

uti affusus sit, tum satis Draconem imprægnasti, liquorem in \bigcirc residem pone in cella ut lapillescat, hos lapillos in aqua solve & deinde in CrySTALLOS coage.

Ex commun. S. Closs.

Vires. Tart. materias expellunt hi crySTALLI, sudores, st. des & Urinas movent. Dosis \mathfrak{d} i. in aq. appropri.

[CrySTALLI Nitri acido-dulces Spir. Nitri. cum ∇ per MB destillato in fundo remanentes calorem febrilem extinguunt potui injecti.]

Terra foliata Sal. nit. S. Closs.

Candefac Sal. nit. in \mathfrak{t} & per vices injice carbonem vivum, ut Sal. nit. inardescat, continua donec flagrare desinat, quod restat solvatur in \mathfrak{x} , filtretur, coaguletur, idque ter cum novo \mathfrak{x} repetatur. Tandem solvatur in ∇ , qui postmodum ætur. In fundo erit Terra Talcosa nitri fusilis instar ceræ.

Vires. Obstructum Mesenterium & lienem liberat, suaviterque repurgat, extrahit Rhabarb. & sena commoda additur ad virtutes eorum augendas.

Dosis \mathfrak{z} ß. in dicto radic. aperitiivarum usu.

[Nitrum Antimoniatum.]

[Commendatur in febribus ardentibus, pro stimulo purgantium, & clysterum etiam inservit.]

Nitrum \bigcirc -ium seu Sal Ducis Holsatiae, Panacea duplicata, Arcanum duplicatum.

Nihil est aliud quàm Sal ex \bigcirc & ∇ (ex Sal. nit. & \bigcirc -an.) extractum, crebrisque solutionibus & coagulationibus ita depuratum, ut candidissimum existat. Hoc subtilissime pulverisatum, & cucurbitæ lutatæ impositum, calcinatur ita ut liqueat. Melioris liquefactionis ergo aliquota pars Sal. nitri. additur.

N. 1. Laborem hunc interdum 2. & 3. vice repetere, convenit.

N. 2. Si vice tertia resolutio iteranda sit, expedit primam materiam solutione ac coagulatione à facibus depurare.

N. 3. Alii liquefactionis ergo \mathcal{L} . Lap. prunella p. 1. ad Sal. illius p. 2.

Communicata mihi fuit hæc descriptio diversis è locis & præ aliis ex illustr. Aula Holsatiae Goutorp. unde & nomen illis in locis obtinuit.

Vires. De viribus ita ad me Cl. D. D. Joel Langelet scribit: Nulle experimentis salis huius efficaciam Aula nostra comprobavit in Melancholicis affectibus, febribus quibuscunque continuis & intermittentibus, calculo, scorbuto, & c. Quam & somnum conciliasse, præsertim in Melancholicis non semel notavimus.

Dos. à \mathfrak{d} i. ad \mathfrak{z} ii. Constitit Illustr. nostro descriptio quingentis imperialibus. Libras aliquot quotannis absumimus. Mynsichius hic accepit, qui illud sub nomine Arcani duplicati vendidit.

Ad salis illius part. 7. Calcis \bigcirc ritè preparata p. 1. addimus.

Sal Cachecticum Chalybeatum.

\mathcal{L} . Sal. com. illius puri, (ex \bigcirc & ∇) p. ii. Sal. prunellæ p. i.

1. Fluat Sal. prunellæ in \mathfrak{t} bullo hinc superinijce antimam \mathfrak{o} is [sive illa liquida, sive in forma pulveris] sic rubescet. Si satis imprægnatum ac rubeum videatur, conterendo admisce Sal. illud \bigcirc i, fiatque pulvis subtilissimus. Hunc inde cucurbitæ vires, da \triangle ac ne gradatim, tandemque fluat instar aquæ [quod diutius eò melius.] Denique fracto vitro exime lapidem rubicundum.

Vires ac Usus. Summè conducit (ut & Sal. Holsatiae) in appetitum prostrato, cachexia, febribus, nephritide, catarrhis, scorbuto, lue gall. contractura, pruriali, & ubicunque sanguinis emendatione opus est, Sennert.

num inducit, & alia præstat quamplurima, idque ut plurimum insensibili transpiratione, nonnunquam sudore sine molestia, aliis blandum movet vomitum, sed raro, aliis leniter alvum ciet.

Dos. à g. 6. ad ʒi. in liquore appropri. Ex comm. Amici Hamburg. SCHRÖDERVS.

2. Calcinatio Unde 1. Lapis prunella.) Nitrum tabulatum, seu præparatum, fixum, anodynum minerale &c. Lapis Prunellæ dicitur propterea, quod maximè in anginae speciebus (vulgò die Braune) adhibeatur, quæ Prunum vel Prunella dicitur. Gl. Tachenius in suo Hipp. chemico nitrum cum sulphure combustum, & prout Autor describit in angina magis nocere, quàm prodesse scribit, quia hoc est nimis acidum, ideoque nocivum. Unde Nitrum coquit in lixivio alkalifato, donec gutta in frigido ferro, ut serum constet, & denique ad crystallandum exponit. Verùm Tachenius scire debet, in anginâ & febribus nonnullis ardentibus non semper causam occasionalem esse acidam, sed sæpè etiam acrem & alkalifatam, quam sitis prodit intensa, sudores salii, cruditas nidorosa &c. quæ symptomata à spiritibus volatilibus urinosis exasperantur, ab acidis autem sp. vitrioli, sulphuris, nitri &c. mitigantur. Hisce etiam non obstantibus, notum tamen est, non omnia acida esse unius ejusdemque generis, unumque acidum posse mitigare præcipitando & figendo alterum, ut videmus in magisteriorum præparationibus, v. g. quæ spir. vitrioli, dissolvit, hæc sp. Nitri vel Sal comm. præcipitat & sic porro.

Nitrum fixum aliud. 3. Aliter &c.) Hæc omnia cum notis additis nulla indigent animadversione. Sequentes tamen nostræ annotationes nec in postremis sunt habendæ.

N. 1. Nitrum fluat in Crucibulo, injice in Vam bullientem, coagula, hoc quinquies repete, usque dum Nitrum fiat insipidum. Hoc magnes est, omnem calorem p. n. in corpore exortum attrahens, indignatum sedans archeum, urinamque retentam ad miraculum provocans.

N. 2. Nitrum adhibetur vel antimoniatum, quod purgantibus & clysteribus, illis ratione correctionis quoad illorum caliditatem, his ratione stimuli cum fructu adhibetur, vel cum aliis mistum & incorporatum porrigitur v. g. Rec. crystall. Nitri ʒi v. funde in Crucibulo, adde fl. sulphuris ʒi. Iterum deflagrent, quo finito adde ʒss. Iterum deflagret, postea effunde in mortarium stanneum. Est insigne anti-istericum, anti-febrile, & lithonripticum. Dos. est ʒss. ʒi ad ʒss. vel ʒi.

4. Crystallum minerale Saccharatum.) Hoc non adeò ingratum est.

5. Nitrum Perlatum.) Præstat hoc absque Acet. dist. conficere, cui substituatut aqua aliqua fragrantissima v. g. rosar. rub. id. &c. in hac solvatur nitrum & magisterium solubile perlatum, ac in alembico ad siccitatem abstrahatur. Eodem modo & (6. ac 7.) Nitrum corollatum ac Saturniatum præparati possunt, quod ultimum magnoperè in calore ac siti inextinguibili commendatur.

N. Si cupiamus habere Nitrum vel Lapidem Prunellæ tingere.] Sic Nitrum fit rosatum, violatum, papavere extracto insuccatum, additòque succo acetosellæ, Scordii, aliorumque alexipharmacorum aut catharticozum fit alexipharmacum & catharticum Nitrum. vid. Cl. Zuvelfer. in Maniſſ. Spagyric. part. 2. c. 12 p. m. 404.

Crystalli Nitri, sive Draconis fortificatum.) Sic vice versâ & duplicatus fit spiritus nitri, quando aliquoties à novo nitro abstrahitur & Δ fortissimo destillatur.

Terra foliata nitri S. Closs.) toties hoc fiat donec Acet. dist. in eâ, quâ fuit assusum, aciditate destillando evcha-

tur. Hoc si cum terra foliata tartari conjungatur, majores acquirit vires diureticas & aperitivas.

Nitrum violatum, seu Sal Holsaticum. Panacea duplicata. Arcanum duplicatum.) Hanc compositionem plurimis obnoxiam reddit difficultatibus Cl. Zuvelfer in Maniſſ. Spagyric. parte secunda, capite undecimo. Nam cum ex æqualibus nitri & vitrioli partibus constet, aqu. fort. ingredientibus, tam violento Δnis gradu hæc non urgeri statuit, quin aliquid Spirituum corrosivorum in Cap. mort. non remaneat, sequitur, quod postmodum corpori humano inferat noxam, dum emeticâ potius, quàm diaphoreticâ & diureticâ virtute dives erit. Unde Arcanum hoc sequenti modo elaborat. Ex Cap. mort. Vitrioli extremè calcinato, omnique vitrioli sapore ac qualitatibus destituto, aëri verò & altis aliquot septimanis exposito elicit Sal aëreum, dulcem ac nitrosum, Vitrioli sapore expertem. Hoc Sal asservato porro ex Cap. mort. à destill. sp. nitri relicto Sal pariter elixiviando aquâ commun. prolucit, & crebris solutionibus & filtrationibus probe purificat. Hos duos sales miscet, salis Vitrioli aërei ʒii. nitri extracti ʒiii. immittit. alembic. & in arenâ diu unâ vel alterâ leniter calcinat, postmodum Sal eximit & pro usu recondit. Verùm hæc tanti momenti non sunt, ut Nos ab hujus usu receptâ præparatione & experientiâ diutinâ probata usurpatione deterreant, surrogata alia nondum probata descriptione. Nam longè alia operatio est salium Vitrioli & Nitri in fluore constitutorum, alia fixorum, aliam v. g. habet operationem spir. Vitrioli, aliam Sal vitrioli, aliam sp. nitri & aliam sal Nitri fixum, ratio est, quia diversam habent texturam & figuram; Sic aqua fort. veneni æmulator naturam, quod non præstat separatim constitutum sal Vitrioli & sal fixum Nitri, licet etiam ita fixa & non destillata ambo conjuncta & in legitima dosi exhibita. Destillata autem utraque commista Vitriolum scilicet & Nitrum malignum & deleterium Gas producant veneni naturam æmulans. Deinde si hoc Nitrum Vitriolatum compendiosius elaborare velis, ita tamen, ut egregiam etiam habere debeat operationem, sumas Nitri part. iii. vel iv. Vitrioli autem Ungarici part. j. fundas in Crucibulo, sensim fl. sulphuris ad depurationem addi- cendo; demum solvas, filtres & iterum coagules, atque sic compendiosiori via & meliori modo parabis Nitrum Vitriolatum albiſſimum, elegantissimum & probatissimum. Ex quo fonte etiam promanat Dn. D. Meibii sal anti-febrile album & rubrum, ut & Emeto diaphoreticum.

Vires.) In febribus intermittentibus exhibetur hora una vel circiter ante paroxysmum, vel etiam in ipso paroxysmo, dum materia febrilis est in motu. In menſum obstructionibus hoc etiam probatum est, ubi cum Va appropriata v. g. meliss. artemis. &c. exhiberi potest.

N. Omnes metallorum calces cum hoc arcano misceri possunt v. g. ☉. ☿. &c. pro diversitate affectus.

Sal cachecticum chalybeatum.) Hoc suam etiam meretur laudem tum ob veram descriptionem, tum a genuinam ejus præparationem. Melioris tamen informacionis gratia nec sequens postponendum. Recip. Salis prunellæ ʒiſſ. ʒii. Arcani duplicati ʒi. ʒii. Vitrioli optis ʒi. terantur subtilissimè & immittantur cucurbitæ vitreæ, hinc in Aren. calore per gradus aucto aliquandiu ad rubedinem calcinentur, dando Δnem ultimum paulò fortiozem, ut liquentur in massam, fracto denique vitrioli eximatur, cum refrigerint omnia, lapis rubicundus, & pro usu asservetur. HOFMANNVS.

III. SUBLIMATIO.

Unde

Flores Sal. nit.

℥. Sal. nit. Sal. com. an. ℔i. fluant. Hinc superinijce carbones ignitos ac superimponere fictile invertum rite adaptabile. Sic exurgunt flores in fictile superius panno madido obducendum. Candidos illos flores pennula absterge & serva.

Vires. Efficax est medicina in febris tertiana aliisque febribus. *Job. Langel.*

N. 1. Butyrum candidum purgativum ex liquore Sal. nit. & salis. Vide in *Myrothec. Fabri* p. 330.

N. 2. Arcanum Sal. nit. per calcin. & cum Tart. & solutionem cum V additis spiritibus cinamomi &c. Vide in *Deodato* p. 177. 178. SCHRODERUS.

3. Sublimatio Unde Flores Nitri) Adrian. Minficht. In armamentario sect. 1. de Medicam. Chemicis hoc modo conficit, dum solvit Nitrum in aq. aliquo destill. postea indit ollæ non vitreæ & ponit in locum frigidum per aliquot dies, tunc flores elegantes Nitri pertranseunt & parietibus ollæ externis adhærent. Sed non video quid singularitatis ratione virium præ reliquis Nitri præparatis spondeant. *HOFMANNVS.*

IV. DESTILLATIO.

Unde

1. Spiritus Nitri.

Sal. nit. eodem modo rectissime paratur, quo Sal. com. nimirum Sal. com. cum triplo aut quadruplo boli, argillæve sicca, cum vel sine formatione globulorum miscetur, perque retortam destillatur.

N. Loco argillæ recipi potest arena.

2. Modus alius.

℥. Omni in superiore ventris capacitæ tubulatam, (præstat habere ferream.) pone in fornacem ut tubulus emineat receptaculo adaptato capacissimo exactè & annexo. Hinc candefac Om ac injice Sal. com. per vires, tubulumque statim obtura. Sic in receptaculum irruet, ac subsidebit.

N. 1. Subsidentia hæc feliciter ac celerius fiet, si receptaculo Δ infundatur, vel lineum frigida humectatum imponatur.

2. Si quis flores in destillatione elevatos seorsim calligere velit, habere creditur quo figere possit.

[Spiritus Sal. Nit. dulcis in Pleuritide, Peripneumonia, Paraphrenitide utilis.]

Vide & Crystallo Sal. com. dulces.

Vires. Reprimit ac sedat effervescentiam Salis microcosmici, discutiendo ac resolvendo malignos, crudos, nitrosos, tartareosque vapores: viscera reserat, calorem p. minfringit, movet insuper & sudorem, unde usus ejus insignis in colica, pleurisi, prunella, febribus aliis, præcipue malignis.

Dosis ℥i. ad ℥ii. &c.

Usus ejus tum internus, tum externus esse potest, v. g. in gargarismis & simil. In colica miscetur cum an. V ut fiat mixtura ℥ii. ad ℥i. quæ in haustu Væ fontanæ exhibetur: Illini quoque potest umbilico cum o. Nucistæ ac tantillo Zibetæ.

3. Alius modus Kesleri.

℥. Aluminis usi & Sal. nit. ana M. ac destillata per Om. i. cent. 56.

4. Alius ejusdem cum Sulph.

℥. Sal. nit. puri q. pl. impone Omæ tabulatæ cum receptaculo capaciss. aliquota parte Væ adimplero, da Δm ut fluat Sal. nit. postea fluenti superinijce per tubulum parum Sulph. puri, claudeque orificium, &c. hanc

injectionem Sulph. repete, donec Sal. nit. consumptum sit, sic prodibit liquor seu Sal. nit. instar butyri. Hunc Sal. nit. dephlegma ac rectifica, &c. Materia in O relicta suppeditat. Sal. nit. fixum.

5. Spiritus nitri Bezordici.

Est Sal. nit. in præparatione Bezordici mineralis butyro affusus, ac iterum destillatione in arena abstractus.

N. Hic si celeriter urgeatur, extillat rubicundus modumque menstruum præbet O solvendo ac volatilisando. Vide de O.

6. Aqua caustica, seu aqua fortes.

Aquarum fortium ut & regiarum (quas dicunt) magna passim est varietas. Fiunt pro diversitate scoporum, & salibus mineralibus, ad scopum facientibus. Sal. nit. * Sal. com. & simul Nos brevioris studio unica ac altera descriptione contenti remittimus tyrones ad Autores fusi de his tractantes, ut sunt *Beguin. l. cap. 3. Sennert. Inst. lib. 5. par. 3. sect. 2. c. 6. Libav. l. 2. Alchym. trad. 2. cap. 27. &c.*

7. Aqua fortis communis.

℥. Oxi exicati. ℔ii.

Sal. nit. ℔i.

Tere simul & misce.

Destilla per Om loricatam, Δ e aperto per gradus est operatio hor. 12.

N. *Geber. Lib. Invent. c. ultimo, addit. & ℔ss. O. destillatque: in destiliata hæc V solvit ℔ss. ** ad R acquiendam.

Vires. Solvit C & S.

8. Aqua Regia, Syrgia Chrysulca Basilii.

℥. Sal. nit. part. ii.

* part. ii.

Silic. contus. p. iii. citriter.

Destilla per Om ignitam tubulatam, Vide in O destillationem Δ a stim. Q. rea.

Vires. Solvit O eunque per XX secum transportat Basil. in Clavibus Tenizel.

N. Ususatissimus facillimusque modus destillandi modernis est per cacabum seu ollam ferream, cui ceu alembico terreum imponunt capitellum cum rostro, destillantque igne aperto in receptaculum capacissimum.

9. Eadem R. alio modo destillata:

℥. Sal. nit. per se q. v. & cum tribus partibus silicis contusorum misce, destillaque igne libero per Om. Sic habes Vm nitri: postea habes F e quibus per aquam calidam extractum sit sal, ut omnis acido lixivii auferatur, hos F misce cum *, sit autem * tantum quantum antea erat Sal. nit. destillaque Δ libero per Om, sic habebis R.

N. Si velis rursus ex B. vel Fibus per alembicum nem destillare, sit clarior & lucidior. Tenizel.

SCHRODERUS.

4. Destillatio Unde 1. Spiritus Nitri.) Argillam albam præstat recipere, quàm bolum, quia in hunc plus vires suas exferit Spiritus acidus Nitri, atque in illam, quod ille ut plurimum vel minera Martia vel Olari gravidus sit, & ita minus spiritus nancisceris. De quo uti & aliis salium mineralium spiritibus notandum, si hos nihil aliud esse quàm salia concretorum à calore in fluorem redacta, id quod inde patet, si spiritum Nitri mutuo spiritui vini connubio per MB destilles, finitæ destillatione crystallos Nitri acidos reperies jucundo spectaculo.

2. Modus alius.) Nisi cum argillâ vel carbonibus pulverisatis Nitrum miscueris, ob salis fluorem retorta tubulata diffiliet, & ita sine tuo frustraberis.

Vires.) Omne venenum pestilens arsenicalis nature esse experientiâ constat. Jam nihil magis arsenico contrariatur atque Nitrum, non tamen communi, sed philosopho-

lophico præparatum modo, dum in terram convertitur albiſſimam, omne venenum inſtar magnetis in corpore humano attrahit & expellit. Hujus ſpiritus in febribus etiam malignis cum julepis ſummo cum emolumento præſcribitur. In Pleuriſi ac colica non minorem habet energiam, unde & ingreditur D.D. Joh. Michaelis ſpiri- tum anti-pleuriticum & ejuſdem anti-colicum.

N. Dn. D. Johann Michaelis p. m. duas habet ſpi- ritus anti-colici compoſitiones. Una conſtat ex part. iii. ſpiritus carminativi & part. i. ſp. nitri. Diſpellit flatuſ & ſedat dolores Doſ à ʒi. ad ʒß Altera fit ex ſale Tartari & nitro.

N. Spiritus Anti pleuritici præparatio fit ex tribus partibus ſpiritus anti-pleuritici vegetabilis & unâ par- te ſp. nitri. Hic ſiſtit dolore & inflammationem.

3. *Alius modus Keſleri.* Verum hoc modo ſpi- ritus nitri non erit purus. Ejuſdem cenſuræ etiam eſt ſe- quens 4. cum Sulphure. Neque enim ſic purum nan- ciſceris nitri ſpiritus: Et niſi argillam etiam vel carbo- nes pulveriſatos nitro addideris, non ſuccedet ejus ela- boratio.

5. *Spiritus nitri bezoardicus.* Hic etiam non pu- rus ſp. nitri eſt, ſed conſtat partim ex ſpiritu Vitrioli phi- loſophico, qui niſi ſpiritus ſalis ſubtiliſſimus eſt, par- tim etiam ex ſp. nitri, reliquiis ſalibus in reſiduo ma- nentibus.

6. *Aqua cauſtica ſeu aqua fortes.* Harum ma- gna eſt varietas pro intentionis ratione uſurpantium, & ingredientium (Vitrioli, Nitri, * Sal comm. &c.) di- verſitate. Nonnullis placent inſtrumenta ferrea ad ha- rum aquarum præparationem, ut proinde retortis ſicti- libus terreis carere poſſint, ſed agendo in ferrum debili- tantur.

IV. EXTRACTIO.

Unde

Tinctura Nitri.

Tinctura Sal. nit. ad eundem fieri poteſt modum quo Sal. comm.

Vires. Inſigne eſt corroborativum diaphoreticum.

HOEMAN-*Extractione.* Unde tinctura Nitri.] Hæc etiam nihil aliud eſt, quam Nitrum liquidum, quod in cella p. d. ſolvitur. Diureticum eſt & lithonripticum.

[Baſamus ſpiritus Nit. cum oleo comm Roſarum. vel Hypericonis, in phiala calore forti paratur, ad ulcera utilis]

DE ALUMINE.

Aluminis genera uſtatiora Officinæ, quinque nobis exhibent.

1. Rupeum (Gallis *Alun de Roche.*) 2. Plumeum ſeu plumoſum; videatur Amianthus. 3. Sciſſile, (quod gleba- rum inſtar eſt & plumoſum oblongum vocatur) 4. Zuc- carinum ſive Saccharinum (ex Oruſeo, albumine ovo- rum & aqua roſacea.) 5. Alumen catinum.

Verum ut in omnibus locis ubi Aluminis ſimpliciter mentio fit, ita & in his noſtris præparationibus, rupeum recipere fas eſt: quod nihil aliud ſcilicet eſt, quam ſalu- go terræ mineralis naturæ ſaturinæ, conſtans ex ſpiritu acido ac ſale terreſtri cauſtico

Triplicis autem id originis eſt; vel enim 1. per ſe in venis ſuis invenitur, vel 2. ex Δ is mineralibus excoqui- tur, vel 3. ex terra & lapidibus aliſve mineralibus extra- hitur.

Dicitur autem Rupeum, quia ex Rupe ſeu ſaxis con- ſici ſolet. Item Glaciale, quia glaciæ conforme eſt. Græ- cè *συνήκης*. Arabicè Sceb. ſ. Seb. German. *Alaun*. Alum. *Alume*, *Rock-Alume*. *Aluyn*, *Rofz-Aluyn*.

N. 1. *Mentio apud Dioſcorid. fit quoque Alumi- nis rotundi & liquidi, verum cum noſtratibus minimè ea uſitata ſint, omiſimus: nec audiendi ſunt, qui liqui- dum Alumen faciunt materiam aluminis rupei. Vide Maſthiol.*

[*Alumen Mexicanum coctum præter vim adſtrin- gendi, ulcera ab excreſcente carne mundificat; ad coccinea pigmenta adhibetur.*]

N. *Alumen catinum, propriè aluminis genus non eſt. Sed Sal ex Fibus lignorum quorundam extractum, opri- mèque reſerberatum, Germanicè Verd-Aſche, des cen- dres de Saulz. Sal out of Wood-Aſhes. Sont van hout- aſſche. Huc reſerri poteſt & Alumen ſacum, quod paratur è ſecibus vini uſtis & alveſactis.*

N. 3. *Modum alumen rupeum conſciendi, ſi quis ſcire cupit, conſulat Maſthiol. Libav. in Alchym. &c.*

Vires. Exſiccatur, adſtringit, incraſſat, &c.

Uſus O crudi præcipuus externus eſt, (quamvis ab Empiricis & interne pro febrifugo, imò univerſali exhiberi ſoleat,) ac imprimis in angina & columella la- xata, putreſcente gingivarum, tumoribus pedum ædemato- ſis &c.

N. Sunt, qui in dysenteria O exhibent. SCHODE- RVS.

De Alumine. de Rupeo ſcilicet intelligendum volu- mus, quod ſaluſgo terræ eſt, naturæ ſaturinæ, conſtans ex acido ſpiritu & ſale terreſtri. Dicitur autem *Rupeum*, quia ex rupibus ſeu ſaxis eruitur & conſicitur. Alumen, quamvis corpus videatur valde homogeneum, tamen inter verorum ſalium cenſum reſerri non meretur, ſed habetur, ut vitriolum etiam nativum, pro quodam ma- giſteri genere, quod ſubſtantiam continet ſalinam & quoddam genus materiæ lapideæ; atque hoc ita ſe habe- re inde patet, capè ſolutionem aluminis, & affundendo ſufficientem quantitatem olei Tartari p. d. illico videbis mixturam in genus quoddam albi coaguli converſam, quod exſiccatum calcem quandam lapideam reſert, mi- neralis proſapiæ, quod ignis violentiæ expoſitum nec li- quatur nec ſublimatur.

N. *Alumen in figuras octo hedrias efformatur, quas etiam retinet in reſolutione.*

Triplicis autem id originis eſt, &c. In Novâ Hiſpa- niâ etiam Aluminis venis non deſtituta ſumunt terram aluminofam, terunt & in ſictilia profundunt, mox aquâ effuſâ liquant, quod ſtillat, utile eſt. Coquant hoc, quan- tum expedire videtur, ſed priuſquam in debitam duri- tiem percoquantur, in fruſta parva dividitur, & diſcindi- tur, & exquſitè coctum venundatur, in emporiis can- dens, lucidum, diaphanum & acris adſtringentiſque ſa- poris veluti noſtrum. Ad quod Aluminis genus hoc Me- xicanum debeat reſerri, ex hoc præparandi modo patet, liquidum ſcilicet ac ſtillatitium. Temperant illo pigmenta ſua artiſices & coccineis adjiciunt coloribus. Adſtringit, ſiccatur, & abſtergit ulcera & excreſcentem exedit carnem, ac rotidem uſibus, quot Noſtrum, accommodari poteſt. *Franciſc. Hernandez, in Rer. Medic. Novæ Hiſpan. The- ſaur. lib. 10. c. 24. p. m. 342.*

Item Glaciale, quia glaciæ conforme eſt. Præter dictas ſpecies ſunt & Naturales aliæ, cruſtoſi ſcilicet & cruſtoſi botryoidis, quod in acinorum extuberantium modum tumidum apparet. *Ferdinandus Imperat. in ſua naturali hiſtoriâ lib. 13. cap. 10. 20. & 21. Rupeum, vul- gò de Rocâ, ex Lapidibus & terra aluminofa non ſolum fit, ſed & ex iſtis aluminis naturalis ſpeciebus infuſione & coctione.*

Vires. Singulare febrifugum latitat in O, de quo vide O tinctum *Minschew*. Item Cl. *Hartmanni febrifugum*. Ego ex O cum alkali quodam combi- nato egregium novi conſicere ſal cryſtalliſatum ab- ſterſivum purgans tuſſimè in febribus & aliis affe- ctibus, ubi curatio aliàs per alia colliquativa purgan- tia non

tia non facile expedienda est, usurpandum. Dosis est à ʒi. ad ʒii. vel ultra in brodio calido, habet vim saponariam, juxta absterivam ac diureticam.

N. Ex alumine etiam pulvis paratur cum f. q. lacce pictorum ad hæmorrhagiam narium convenientissimus. vid. Ephemerid. Medico physic. anno 1. observ. 24. p 90.

Adstringit.] Hinc in dysenteria aliisque affectibus, ubi adstrictione opus est commendatur, magis enim adstringit, quam sperniola Crollii, quæ aliàs in hæmorrhagiis & gonorrhæa summæ est efficaciz.

Usus O cruda præcipuus externus est.] Non desunt, qui cum O balneum quoddam adstringens præparant; quo virginibus, quibus veneris castellum fuit dilatatum & expugnatum, restitutionem in integrum promittunt; sed hæc sophistication non deprædicatorem meretur. Aliàs in sudore diaphoretico summâ cum circumspeditione externus aluminis usus etiam non rejiciendus est, si indusum in aluminis solutione immersum iterum exsiccat & induatur, sed non nisi in morbi declinatione commendo.

N. Prodest itidem in excresecntia vulnerum caruosa, & in fonticulis promovet fluxionem. vid. Aquas corrosivas ex O paratas in thesaur. pharmaceut. annexo sect. 2. num. xl. xli. xlii. &c. HOFMANNVS.

PRÆPARATIONES & PRÆPARATA.

1. Crystallisatio seu Purificatio, 2. Calcinatio seu Ustio, 3. Salificatio, 4. Destillatio, 5. Subtilisatio.

I. PURIFICATIO seu CRYSTALLISATIO.

Aluminis purificatio fit more vulgari, scilicet solvendo, in ∇ plur. calida, evaporandoque, donec cuticula in superficie appareat; hinc reponitur ad crystallisandum.

N. 1. Hanc purificationem sibi terve reperiveris, mihi rescit acerbitas O.

N. 2. Libavins solvit in \square proceditque dicto modo, verum hæc qui hac ratione O purum nancisci sperat, fallitur, quippe Sal \square a Omini sese immiscuit.

II. CALCINATIO seu USTIO.

Ustio aluminis quoque consoribus notissima est.

Nimirum.

O coquitur ad Δ m. ut phlegma & exhalent, terraque mollis porosa remaneat.

N. Hac terra idem est cum \square ex \square lione residuo.

Vires. Usitatissimum est Alumen ustum in vulnerum excresecntis carnosus consumendis, in putredine arcenda, &c.

III. SALIFICATIO.

\mathcal{L} . O ustum, (vel \square aluminis) coque in ∇ , trajice per chartam; filtratura evaporet & habebis Sal fixum Ominis.

IV. DESTILLATIO.

Unde

I. Phlegma ac spiritus.

\mathcal{L} . O puri q. v. destillata per \bigcirc m in Δ , ac elicies initio l. Δ phlegma.

Ignem postea fortiori, \sim prodibit albusissimus.

[Spiritus O Sulphureus volatilis & acidus, inhibet febrium intermittentium accessus per sudorem & fermentationis inhibitionem.]

(Alumen Olo prædictum styptico spiritum O li coagulare putatur.

2. \sim dulcis O.

\mathcal{L} . \sim O, rectifica aliquoties cum ∇ & dulcis atque jucundus evadit.

Vires. Usus ejus internus diureticus est, pellit calculum, obstructions Lienis aperit, assus in febribus compescit.

Externus ejus usus admodum proficiuus est, in vitii oris, inflammationibus nimirum, (etiam oculorum) Aphthis, & sim. curandis.

Dosis g. 4. vel 5. in vino vel alto liquore conveniente.

Phlegma adhibetur ad vulnera mundificanda, adstringenda, inprimis ad gingivas, &c.

3. Magisterium, seu \sim Ois Magisteriatum.

O puri q. v. impone in vitrum, asperge aquam & repone ut dissolvatur.

Liquorem filtratura depuratum destilla in Fibus, ex cucurbita humili ad siccitatem: solve denuò, modo quo dictum, in liquorem, & destilla. Eousque solutionem & rationem repete, donec tota O substantia per \times transierit.

Usus. Stypticum est nobile, vix cedit Essentia ferribilis, sperniola, &c.

4. Saccharum O.

\mathcal{L} . O purificati q. v. destilla ut eliciatur phlegma, quod affunde iterum \square , & postquam 8 24 steterint, denuò abstrahere, idque vicibus aliquot (5. vel 6.) tandem phlegmate reservato solve \square per d. Liquor digeratur \square [12.] coaguleturque in Δ , ad siccitatem: sic præparatum Saccharum O.

Vires. Celebratur in pectoris morbis, præsertim ex minerarum halitu contractis, qualibus Metallurgi frequenter affliguntur, Odontalgiam sedat, gingiva impositum.

Dosis à gr. 5. ad 8.

(Parant ex O Mannam, primum Ens O quod dicunt, videri osi, & que Hæctica remedium.)

V. EXTRACTIO.

Unde

Extractum Aluminis,

alias,

Magisterium.

\mathcal{L} . O crud. lb. [vi.] coquatur in fictili amplo, ut evaporet phlegma, tandem calcina ut penitus candescat. Hinc injiciatur in \times O illud candens; Sic extrahet \times Essentiam seu Magisterium residente terra albâ [quæ aquæ ferventi abluenda & servanda] \times illud imprægnatum filtra, & abstrahere in MB ad mellis consistentiam. Tunc exponatur frigido ad crystallisandum. Crystallus erunt & sicca.

N. Crystalli tingi possunt rob. sambuci pro libitu.

Vires. Sudorem movent, conveniuntque in febribus [singulis septimanis semel ac iterum pro sudore exhibiti] in febribus tertianis [aut paroxysmum aliquot vicibus iterato assumpti.]

Dosis à g. 8. ad 20.

Ex communicatione Amici Hamburg. SCHROEDERS.

Extractio.) Hujus medio, prout Dominus Autor communicavit, O vitriolo suo styptico non privatur, nisi sequenti procedamus modo. Primum fiat depuratio; Recip. O rupei q. v. solve in aqua pluviali coque in alembico, donec spumam exhibeat, spuma cum cochleari ligneo separanda, rursus coque. & inter coctionem adde Acet. dist. tunc O deponit Vitriolum suum in superficiem instar spumæ cæruleæ, quæ rejicienda, filtra solum & despumatum O, infunde in vas ligneum, ut crystallifcet. Rec. purificati hujus O lb. destilla in Alemb. phlegma leni igne ad siccitatem, cavendo, ne spiritus ascendat, sed ut O saltem terra alba fiat, quam imprægna proprio phlegmate & cohoba; Inde sumatur Cap. mort. Tartari, ex quo oritur Sal com. Tartari fuit extractum, hoc in crucibulo reverbera apert.

bera aperto igne per mediam horam, ut fiat terra porosa absque omni salino sapore. Hanc terram Tartaream philosophicam inde filtro chartaceo, rursus supra terram aliam pone chartam bibulam, in quam aluminosam terram proprio phlegmate solutam filtra, sic acida terra Ostrabitur ab ignea terra filteri, & saltem dulcis terra transfilterum cum proprio phlegmate, quam rursus coagula per Ostrationem abstrahendo phlegma, repete solutionem hujus cum proprio phlegmate & filtrationem per terram Tartari rursus elotam & tertia vice reverberatam. Sic Odeponit per præcipitationem à phlegmate omnem terram adstringentem & crystallisatur. Primum Ens Aluminis in frigore instar sacchari, & summum celebratur anti-hecticum à P. Poterio in sua P. S. Cap. 7. p. m. 26. Hofmannus.

[Alumen laccatum Epaticum, & ad Hemorrhagias proficuum parant.]

[Balsamum Aluminis aequè ac Bals. Nitri parare licet, sed non aequè coloratum.]

De Sale Ammoniaco.

Sal* nativum à majoribus descriptum sub arenis Libyis concreviscebat. Verum nostratibus non nisi artificiale cognitum est. Quod nihil aliud est, quam sal amatum factitium compositum, volatile, coctum ex 3. sale fuliginis, Sal com. vel 8, & simil. Vide si placet modos conficiendi, apud Libanum in Alchym. & hinc apud Unzer. in de Sale.

[Parant etiam ex urina sanorum p. v. Ovis communis p. j. fuliginis part. dimid. coctis & sublimatis.]

Dicitur & Sal armoniacum, Sal solare, Aquila celestis, alba &ialis fuligo, Sal &ialis Philosophorum, Lapis Adit. Andix. Anacab. Alacab. Aliocab. Allocaph. Alcob. Alfol. Alfaride Alinziadir. Alistiles. Alumonodig. Amizadir. Anoxedic. Azanec. Butrum. Hifazium Lixandram. Misatis. Nestudar. Nusiadal. Nysæ. Obac. Raal. Salmar. Turfies. German. Salmar. Sel ammoniac. Salt Armoniak. Sout-Armoniac.

[Dicitur etiam Sal mirabile, & clavis metallorum, quæ fluere facit.]

Eligatur candidum ac purum, vel nisi satis nitidum fuerit, purificari potest. Præstantius habetur * Venetianum ac Antverpianum, ex quibus tamen posterius priori cedit.

Vites. Internè vim habet diaphoreticam præcipuè in febribus, maximè in febris quartana, resistit putredini, &c.

Dosis ad ʒss.

Externè adhibetur in Gangrena carne putrida absuenda, in Angina curanda [in Gargarismis,] Quinimo Barbitiones aquam suam cæruleam inde conficiunt in vase ad albuginem oculorum tollendam.

Nimirum.

* in pelvi ænea ∇m affundunt additoque modico Cale. viv. simul optimè agitant. Vide lib. 2. cap. 49. Schroderus.

De Sale Ammoniaco. Ammoniacy nomen non aliunde, nisi ab ἀμμῶν arenâ derivatur, sub qua in laminas concretus in Cyrenaica regione invenitur. Unde ex errore dicitur Armoniacum, cum sit dicendum Ammoniacum. Cyrenaici tractus hoc nobilitantur sale sub arenis invento, teste Plinio Lib. 31. cap. 7. Cum autem hoc ad Nos convelli desit, utimur ejus loco non nisi factitio. Nonnullis quoque sal mirabile audit, aquila, clavis metallorum &c. Hoc componitur ex quintuplo crudæ urinæ humanæ ex sanis desumptæ, una parte salis communis, & dimidia parte fuliginis, hæc tria in massam prius coctione rediguntur, & tandem * sublimantur. Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

mantur. Venetiis in copia conficitur, & Antverpia, ex quibus prius Venetianum posteriori Ant. Verpiano antepositum. Hic non desunt, qui statuunt ad illud Venetianum sumi ex publico Urinæ transitorio tam sanorum quam ægrotorum, Leprosoforum scilicet elephantiasicorum gallicorum, febricitantium &c. Urinam. Verum fallunt hi & falluntur; Nam ad hoc non nisi à sanis collecta urina eligitur, & cum reliquis ingredientibus coctione in unam coagmentatur massam & postmodum sublimatur, quomodo igitur Urina putrida, ut communis aëri diu exposita solet, cum reliquis incoqui posset, quia statim suo sale volatili priveretur, secius atque cum urina recenti sit. Præterea parum salis volatilis Urinæ ægotantium præbet, plurimum a salis fixi deficiente fermentorum naturalium actione. N. Sal Ammoniacum in hexagona efformatur.

Vires.] Ex hoc optima præparantur Medicamenta, ut infra videbimus. Externe in gangræna est agyrtatum arcanum, item in angina succo sol. semperviv. pro gargarismo permistum maximè commendatur; Recip. sol. semperviv. rec lib. iv. sal ammoniac. depurat. ʒiſs. conquassata ponantur in cucurbita vitrea in cellam subterraneam, donec salia liquecant, destilla ex Alemb. ad siccitatem: fiat gargarismus. Ad albuginem oculorum tollendam infunditur in mortarium aurichalceum & tingitur colore cæruleo quod Chirurghi das blanc VVasser vocant. Hofmannus.

PRÆPARATIONES.

1. Purificatio, unde * Crystallisatum.
2. Calcinatio.
3. Sublimatio, unde Flores.
4. Destillatio.
5. Liquatio.

I. CRYSTALLISATIO.

* Crystallisatum, nihil aliud est, quam * modo vulgari purificatum, id est, in ∇ solutum, & post evaporationem aliquotam crystallisatum, ideoque usus ejus cum priori idem est.

II. SUBLIMATIO.

Flores *.

ʒiſs. * trit. Limaturæ chalyb. ana q. v. mixta diligenter ex cucurbita in Arena sublima; sic relicta in fundo facibus ascendit * purum aliquotâ portiuncula & is impregnatum.

ʒiſs. * hujus, Sal. Com. fusi ana M. sublima que denuo, sublimationem de novo septies repete, semper ∇ rejiciendo & parum Sal. Com. fusi quantitatem singulis vicibus admiscendo.

Nonnulli contenti sunt posterioribus saltem sublimationibus (scil. cum Sal. Comm. citra & peractis) * depurasse. Verum quia & per vim aperitivam * insigniter acuit, operæ pretium erit, nec priorem illam sublimationem intermittere.

Vires. Flores hi ut operosiores, ita & effectum præstantiores censentur, quam * solâ crystallisatione purificatum, ideoque felicius illorum loco adhiberi possunt in quartana. Tollunt quoque perfectè cruditates ventriculi, si in vino absynthiaco vel decocto sassafras per aliquos & continuos propinentur sudor que à sumpto Medicamento procuretur.

Dosis ʒiſs. 3. vel 4. imo ad ʒss. & ultra. Sennert. in Instit. Harmann. in præctica, loco de crudis ventriculi. Tentzel. in Exeg.

N. Si cum limatura & fiat sublimatio, tunc arroditur & à sale parumque admodum sese sublimat, si verò cum bariurâ ferri non trita, tunc fere sal omne ascendit colore ex flavo rubescens. Schroderus.

2. Sublimatio. Flores *) Si flores * simplices absque additione extranei concreti desideramus, satis est sublimatio * solum cū Sale fuso peracta. Sin autem compositos magisq; aperientes appetimus, cum limaturâ & is non

SS

trica

trita instituamus Δ tionem. De his vid *Cl. Zorvelferus in Maniff. Spagy. part. 1. cap. 3. p. 338.* Eodem modo etiam cum * & lapide hæmatite *Aroph. Paracelsi* seu Aroma Philosophorum conficit *l. c. p. 337.* Et *Hadrian. à Min-sicht* in suo armamentat. Tincturam Martis cum * & Limatura Δ ris *Secl. 2. 43 p. 43.* Flores * sequenti modo Δ ti etiam non sunt rejiciendi.

Recip. * $\frac{3}{4}$ vij. Sal. com. Tartari $\frac{3}{4}$ j pulverisata misce, & Δ ma. Primò ascendit Sal. com. volatile urinosum, quod exime, tum porro Δ tionem per totum Δ continua & evehentur in alembicum flores elegantissimi; in boccia etiam dura & compacta accrescit materia, quam floribus adde & serva pro usu. Dosis est à gr. iv. vii. ad Δ ß. cum cremore Tartari Δ j addito grano uno Sulphuris Δ nii. Specificum est in quartana. Datur bis antè paroxysmum, prima dosi tribus horis ante paroxysmum: Secunda ingruente paroxysmo. Præmissis vomitoriis specificis in quibus radix evellendæ quartanæ consistit.

N. Ex Cap. mort. sal. anti-hypochondriacum aperitivum ac diureticum subflavi coloris conficitur. Dosis à gr. iij. ad Δ ß vel Δ j.

Vires.] Flores * sunt bonum stomachicum & elegantissimum febrifugum; cruditates ventriculi tollunt, unde non desint, qui hos flores stomachicum & febrifugum P. Poterii esse autumant. Verum ego statuo hoc ex Nitr. confici. *HOFMANNUS.*

III. Calcinatio & Fixatio.

Figitur cum Calc. viv. si anaticè cum eadem mixtum ∇ e fortissimo subito adhibito, addito quoque folle fundatur, Postmodumque aqua eluatur.

Usus ejus precipuus est, pro liquore inde conficiendo. *SCHRODERVS.*

Calcinatio & Fixatio, figitur cum calc. viv. &c.) Scilicet * miscetur cum calc. viv. anatica proportione & Δ matatur illud, quod ascendit, Δ mati nomine insignitur Ex cap. mort. cum aqua loto oritur Sal. com. fixum ad Δ solvendam aptum. *HOFMANNVS.*

IV. DESTILLATIO.

Unde

Spiritus *.

$\frac{1}{4}$ * p. i. Etum p. iv. M. atque destilla ex Arena per \times . sic prodit Sp. * quem rectifica è cucurbita altiori,

2. *Aliter.*

Solve * in ∇ calida, eaque potato lateres ignitos, ut ∇ m illam * co imprægnatam penitus imbibant. Hinc destilla per Δ m igne arenæ, vel igne aperto.

3. *Aliter.*

$\frac{1}{4}$ * sublimati q v. asperge ∇ rectificat. ut humectetur, hinc digere vase clauso in MB ut resolvatur. Solutiones decanta, è cucurbita oblonga in MB Δ a ad dimidium; ∇ Δ tam rursus affunde & Δ a: tandem Δ auctiore omnes spiritus per \times propelle & rectifica.

Vires. Est Diaphoreticus, incisivus, diureticus.

Dosis gr. 3.

Job. Rhenan. Chymiotéchn. l. i.

$\frac{1}{4}$ * q v. misce cum argilla, aut hæmatite, ac exinde fac globulos, Δ aque per Δ m ut moris est.

Clar. Dn. D. Helvic. Dieterich.

*Vires. Hic * i Spiritus affusus solutionibus Metallcis cum ∇ factis; indeque per \times abstractus secum alias corrosivas aquas transportat Itemque Δ tana & obstruccionibus felicissimo cum successu exhiberi poterit, solvit itidem calculum.*

Dosis à gr. 3. ad 6. vel 10.

Extrinsecus anaticè cum ∇ mixtus & plumacellæ eo dolenti podagrico aliquoties illitus, dolores ad modum restinguit, præcipue si in eo tantillum Camphæ fuerit solum Sennert. Instit. Hartman. prax. loc. de thrit. Tentzel. in Exeg.

Spiritus * i urinosus.

In * co duplex Spiritus reperibilis est, scilicet Spiritus Urinæ & Sal. Com. Ille facile elicitur vel additis neribus anaticâ proportionem, aut Calc. viv. Sal. Nit. in sale Tart. Modum vide pag 159. secundæ partis Glau. Quem verò describit idem author pag 158. cum Lapide Calaminis non ita feliciter cessit, forte propter impuritatem Calaminæ, est enim una alterâ longè melior: Spiritus aureus ejusdem naturæ cum Sal. Com. sic producur.

Spiritus acidus * ci.
S. Closs.

Solve * in aqu. comm. ita ut aliquid insolutum restet, hæc solutione imbibere folia plura chartæ Emporeticæ in globulos sive pilas molles conformata, quas cucurb. conjice, & ex Δ . vel reverberio clauso propellatur spiritum coloris aurei summè acidum, qui per sectionem albescet.

Vires. Spiritus hic est penetrans, admodum & subtile à commixtione salis Volatilis Δ unde summè Diaphoreticus est & Colicam sedat.

Dosis gutt. 6. 8. in vino.

N. 2. Cave ne vehementiori Δ charta comburatur, lias denigrabitur Δ us extillans, cum pulvere ustionis ergo Δ gradualis:

2. Cave ne Δ tum addas, ut facit Querc. in Tetra titulo de Panacea Δ i, sic enim prodit una cum Spiritu salium fuligo quedam Δ alis, à qua (si deur hoc Spiritus intra corpus) gula constringitur cum signis instantis Cæcæ vulsionis, post absolutam autem destillationem si deur Δ tionis, tunc combusta papyro nancisceris Δ tum Δ cem.

Spiritus alius fugaciss. * ci.

$\frac{1}{4}$. Calc. viv. q. v. inde Cucurbitæ in MB impositæ Hinc affunde * cum in ∇ dissolutum, idque paulatim & per vices, alembicum semper reaprando. Quando omne superfusum fuerit, Receptaculo & Juncturis probe munitis destilla lentissimo Δ . Sic prodit quidem Spiritus aliquali phlegmate dilutus, sed qui unicâ rectificatione dein fugacissimus redditur.

Usus ejus est in variis morbis. Viimur tamen præcipue in morbis capitis: Epilepsia, Apoplexia, gravitate autus, &c. In morbis uteri: Retentione mensium, difficultate conceptionis, singulari quodam instrumento cum applicando, cui si vola manus calens admoveatur, statim operatur Joel. Langel. instrumentum illud est vitrum strictiori mœccii, quod inruditur in vulvam.

[Dosis à Δ ß. ad Δ i]

[Viuntur quidam Spiritus * anisato, caryophyllat.]

[Item crystallis è Spiritu *.] *SCHRODERVS.*

Destillatio. Unde Spiritus *) * cum lapide hæmatite, minio, cineribus clavellatis, Sal. comm. Tartari, &c. misceri potest, aqua imprægnatum. Δ latione statim mixturam insequente, Primò spiritum * salum urinosum volatilem, & ex cap. mort. sal fixum in omnibus obstruccionibus non satis deprædicandum in primis in quantâ acquiris.

N. Si Cap. mort. spiritus * urinosi cum sale alkali parato novum addas sal alkali Tartari &c. & denuò destilles, novum acquies sal volatile.

(Sal fixum ex * & Sale Tartari.) Recip. Salis Tartari $\frac{3}{4}$ iv. * $\frac{3}{4}$ vii. misce & solve ita, ut * prius in ∇ solutur, & superinfundatur Sali Tartari & illic Δ latio fiat.

DE VITRIOLO.

fiat, tunc ascenſit, ut aſſolet, ſpiritus volatilis ſaluſ urinoſus, reſiduum autem in fundo uſque ad ſiccitatem deſtillatur, quod cum tripla aut quadrupla argillæ portione in globulo formatum Δne forti Ωla, tunc accipies ſp. ſalis & nitr. Utrumque rectifica, poſtmodum etiam invicem miſce. Primum Ω larum ſpiritum ſaluſum conjunge cum ſp. acido fixo vaſe clauſo & ſucceſſivè, & ſpiritus volatilis tantundem affunde, dum nihil amplius ebulliat, & ſic pondus Naturæ eſt impletum. Deinde leni Δne phlegma in MB abſtrahe. & nil niſi Δa Ω labit, eo quod uterque ſpiritus ſaluſus & acidus in forma ſalis citrini ad fundum ſe præcipitavit.

N. Hæc ſalia cum priori ſale fixo Cap mort. ſunt conjungenda & p. d. ſolvenda; ☉ compagem referant.

2. *Aliiter.*) Hæc ut & ſequens cum ſp. vini minus neceſſaria eſt, imò fructra. melioribus deſcriptionibus proſtantibus, niſi Cicer. clavellati vel Sal com. Tartari admisceantur, non ſuccedunt.

Aliiter.] Parum accipies ſpiritus ſaliſ volatilis urinoſi, ſed ſorum copia compenſabit.

N. Elegantiore deſcriptionem ſp. * ſaliſ ac urinoſi non habebis, atque illa eſt *Cl. Zvelfer.* in appendice ad animadv. p. 53.

Vires.) Totam maſſam ſanguineam incorruptam à putredine præſervat, fermenta acida præcipitat, ſuffocationi uterinæ, hypochondriacæ, apoplexiæ, epilepiæ, ſpſmo internæ guttatim exhibitus, imò odore tenuis etiam medetur: Etipſius Peſtis ſummum eſt remedium cum Eſſentiâ ſpecierum theriacalium nuptus. Maximam præterea vim obtinet aperitivam tum per ſe, tum cum ſp. ſaliſ vel arcano Tartari ſoluto maritatus in tartareis morbis, item cum ſcorbuto complicatis. In arthritide vāgā & fixā non habet compar. In Quartanā item ſingularis eſt ejus uſus, in menſium ſuppreſſione in uterum per Glauberianum inſtrumentum ſublimari poteſt, quod vocatur balneum ſiccum. Doſis eſt à gutt. x ad ℥j. vel ultra in convenienti vehiculo. Extrinſecus anaticè cum ſp. lil. convall. ſit ſp. arthritico mixtus ſp. * ſaluſ urinoſus addito parum camphoræ turè extrahit dolores podagricos, non repellendo eodem, ſed materiam morbiſicam reſolvendo & diſcutiendo. Cum enim Podagræ primordia ſint ab aciditate hoſtili ad corporis ambitum delatā & artus moleſtante, in quibus Podagræ character Archeon digeſtionum præſidem afficit, hic ſpiritus autem cum ſit ſaluſ volatilis & omne ſaluſum extinguat aridum ſit, ut podagrici inde notabilem levaminis ſentiant effectum. Cum plumaceolo loco dolenti podagrigo aliquoties illinendus eſt.

In * duplex ſpiritus reperibilis.] * conſtat ex ſale duplici acido ſcilicet, quod ſal commune eſt & ſalſo & quidem urinoſo, ex urinā & fuliginæ dependente, unde ſit ut duplex etiam in * reperiat ſpiritus Ω latione eliciendus ſaluſus & acidus.

Spiritus acidus * *S. Cloſſ.*) Hic non purus acidus * eſt, cum multum ſalis volatilis urin. adhuc ſit admixtum. Mihi autem maximè ille probatur, licet ōtrialis ſit, qui ex Cap. mort. à quo flores * martiales ſunt -ati, deſtillatione elicitur.

Spiritus alius fugaciſſimus. *] Spiritum etiam acquiri ſummè volatilem; Ex ☉ liquor nephriticus ſa. conſici poteſt. Uſus autem & vires hujus jure ſpiritui * urinoſo ſuprà edocto accommodari poſſunt. H O F M A N - p. V S.

V. LIQUATIO.

Unde

Liquor ſen olemm *, per deliquium.

2. * purif. q. v. impone albuminibus ovorum coctum, ac repone ut ſolvatur per deliquium. *Kesler.* 1. cap. 19.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

Vitriolum eſt Sal minerale metallis pt. ximūm, æ præcipuè Cuprō, & c. Græcè χαλκων, Arabicè Calcantum, Calcant, Alcalcadis. Latine, Arramentum ſutorium; Vitriolum German. *Vuriol Kupffer vvaſſer.* Jū Vitriol: Eau Vitriolée. *Vuriol. Vuriol.*

Varia ſunt ejus genera, pro natūrā mineræ, quā in ſe continent, differentia. Præcipua autem quorum hoc tempore eſt exiſtimatio ſunt 1. Cæruleum; Sapphyri inſtar, compactum, ut Saccharum candum, tactu ſiccum, Hungaricum vocant, vel Cyprium, [Gallicum ex agro Lugdunenſi cæruleum Poterius commendat] 2. Subviride; herbacei coloris, magis granulatū, grumolumque inſtar Sal Com. paulū unctuoſum; manique tangentis adhærens, quale Goſlarienſe, Suecicum, & c. 3. Album, in formam parvulorum panum effectum tactu ſiccum.

Ex his itaque generibus, (niſi peculiariter monitiſ ſis) ſecundum elige, & ex hoc, quod plus de Ω quam de ☉ participat, nimirum quod cultro affricatum rubedine colore inſicit, cavendo tamen Vitriolum miſutū ſubcæruleum, pallidulum & aquoſum, manuſque tangentis madefaciens, quod paſſim venale proſtat.

Vires. *Vurioli uſus tantopere ſiſtuoſus exiſtit, ut Paracelſo [in naturalibus] ac Phadroni tertia pars Medicinæ habeatur, imò totam Officinam in eo latitare perhibet. Quercetanus in Tetrad. Galeno calſcit; ſiccit; adſtringit vehementer conſtipat, vomitum ciet, lumbricos fugat. Extrinſecus Errhinum exhibet naribus inditum.* SCHRODERUS.

De Vitriolo.) Vitriolum derivare volunt à vitro, vel quod colore vitri reſpondeat, vel quod vitri inſtar clari gratā oculis pelluciditate ſuperbiat. Latine Arramentum appellatur, quod eo ſutores coria negredine inſiciant, & liquor ſcriptorius niſi inde conſiciatur. Græcè χαλκων, quaſi æris ſeu ferri florem aut efferveſcentiam diceret. Germanicè *Vuriol, Kupffer vvaſſer.*

Eſt ſal minerale metallis prominum.] *Theophr.* 2. *Paracelſus Lib. de rer. Natural. ori.* Vitriolum Sal com. eſſe confirmat, ſed ſui generis, & ab aliis ſalibus diſtinctum. Id quod etiam repetit *Lib. 2. de morbis mineral. tract. 3. cap. 1. Joh. Quercetanus, in tetrad. Capit. affeſt.* Salis genus eſſe exponit. *C. Sennertus Lib. 5. cap. 11 Phyſic.* Vitriolum ſalis genus appellat mirabilis Naturæ. Idem ſtatuit *P. Poterius in Pharmac. Spagyric. p. 71. Billichius in obſervat. & paradox. Chemic. Lib. 1. cap. 13. p. m. 78.* Neque ſalis inquit, Vitriolum eſt, neque metallum, ſed mediæ inter utrumque Naturæ, utriuſque particeps. Nihilominus à potiori parte denominationem caprantibus multo rectius pergit, dicetur ſal, quā metallum. Contra verò *Angelus Sala, Joh. Papius, Cl. Zvelferus & alii* negant; vitriolum ſal eſſe verum, ſed eſſe metallum ſolutum cum totā ſuā ſubſtantiā quodque denud vi ignis in priſtinum metallum converti poſſit, Cui ſententiæ & ego ſubſcribo ut veriſſimæ; Cum enim vitriolum niſi niſi Sulphuræ ſalſuginis acidæ æratæ aut ferratæ coagulū ſit, hoc eſt, cum vitriolum nihil aliud ſit, quā corpus minerale ſolutum ex ſpiritu Sulphuris acido, corpore ōtriali aut ☉ nereo metallino, aqua elementari & terra quadam minerati compoſitum, non video quomodo inter ſalia propriè ſic dicta locum invenire queat, aded ut omne Vitriolum nihil aliud, quā proles ipſius Sulphuris videtur. Cujus modus generationis talis eſt. In regione ſubterranea ex actione ignis ſubterranei in ſulphur oritur exhalatio, ſeu ſpiritus Sulphuris acidus, quem excipit aqua ſubterranea, & inde acidula redditur; hanc poſtmodum æris ac ferri mineræ efficaciter imbibunt & abſorbent, ac inde Vitriolum emergit. Id quod *Mechanica chemica & Vitrioli analyſis* probat. Vitriolum artificiale paratur ſume ſp. ſulphuris aqua diluam, affunde ☉ vel ☉ raſuræ, & rem tibi dabit expediam. Sulphur

ſſſ 2 inſeſſe

inesse vitriolo non tam ratione, quam sensu percipitur. A Sulphure igitur est initium, à quo etiam artificialis Vitrioli compositio suum habet fundamentum; Et de ejus præsentia certos nos reddit fidele sensus testimonium, si enim vitriolum ufferis, siue destillaveris, idem tibi odor sulphureus feriet nares; qui à sulphure oritur accenso, & sine dubio etiam Matthioli afflavir, dum scripsit, chalcantli venam dum foditur, foetidum & graveolentem instar sulphuris eructare halitum. *Comment. in Lib. V. Dioscorid. cap. 114.* Misce sp. vitrioli rectificatum cum æquali vel duplâ quantitate olei Terebinthinæ, & ex parvâ retorta vitreâ destilla, notabilem sanè veri sulphuris copiam circa retortæ collum acquies, ut inde etiam pateat, spiritum vitrioli, licet liquor sit destillatus, & habeatur pro principio salino, esse tamen corpus compositum, ut præter salinam ejus partem sulphur contineat vulgari sulphuri simile, quod vix ipsum simplex & incompositum corpus fuerit. Præterea nec metalli expers est vitriolum, aded, ut quamvis ex spiritu sulphuris acido sit corpus constatum, denudè tamen in pristinum metallum, Vulcani violentia transferri potest. Quomodo autem metallum à vitriolo sit separandum, vid. *Billichium* l.c.

Varia sunt ejus genera pro Natura mineræ. Vitriolum vel nativum seu stillatitium est, vel Factitium. Illud dicitur, quod in cavernis siue fodinisterre est concretum aut ex illis destillat, cujus species etiam est in metalliferis Rammeli montis Goslariensis fodinis, quod divinas & non satis deprædicandas obtinet vires, dum adhuc gaudet sale suo centrali ac spiritu nativo, quod vel in venis, fibris & commissuris saxorum vel dum ex iisdem guttatim destillat, stirarum modo de eorum pender cameris & deciduum ex stiris in solum delapsum ita colligitur: reperitur etiam in fodinis Brunsvicensibus, Anglicis, Hungaricis &c. Factitium est, quod ex Lapidibus illis chalcantiosis ex terra illa æruginosa aut cinerea maculis viridibus ac rubris interstincta coquitur. Utrique huic una est Natura, sola consistentia & crescendi figura differunt.

Sunt 1. Cæruleum. Ratione coloris, vel est cæruleum de venere participans, vel viride, de matris prolapia, subviride, herbacei coloris vel album &c. quod maxime ad Sal. com. naturam accedit.

2. *Cyprium.* Locorum ratione, Cyprium est, quod reperitur in Insula Maris Aëgi Cypri, olim ob insignem fertilitatem Macaria dicta. Ad hanc Insulam ipse Galenus olim navigavit, ut ipsi de conficiendi modo & ratione hujus vitrioli constaret. vid. *Lib. 9. de Medicament. facult.* Hoc Clarissime naturæ Mazoria de triplie. philosoph. Lib. 2. testatur Vel Romanum, non quod in Romano oriatur agro, sed in Romæ saltem honorem ita dicitur, ut hic Roma sumatur pro Italia, reperitur enim hoc in Campania, Monteranâ, &c. Vel Hispanicum, Hungaricum, Anglicum, Gallicum, Goslariense &c. Cyprium admodum pretiosum est, nec minus Romanum dictum; Hungaricum carius venditur Goslariensi, præstantius tamen est, quia propè aurifodinas eruitur. Anglicum huic succedit & Hispanicum. Goslariense plus de Otis, quam Quæris natura participans propter exiguum pretium destillationi est convenientissimum.

Vires. Licet vix centesimo millesimus artificum potatur arcanis ex ☉, ☿ & ☿rioparatis, sunt tamen præterea quatuor metalla, quæ facilius ductui & operatui artificum parent, aded ut non frustra Th. Paracellus gloriatur, solo sarum fortè ducentas morborum classes superari posse. Nihilque æquè victoriosè in humidum radicalè agere, atque primum Ens cupri, vel ad Vitam longam sulphure vitrioli esse benignius. Mars demum, quanquam pretio vilissimus, & numerosa prole speratus, non postremus tamen pugnaci natura à Paracello reputatur. Cujus genuinus filius est vitriolum martis, cui

propter eximium ejus usum tanta elogia à Th. Paracello ipsi assignata competunt. *Helmont. in iv. B. ler.*

N. In Peste & febribus intermittentibus vitriolum cyprium à Roderico à Fonseca in *consult. Medic. T. 2. commendatur*, & P. Borellus *Centur. 4. obs. 77.* in febribus præscribit. Vitrioli scilicet Cyprii frustum in aquæ infundere docet per horæ quadrantem, & proponendas suadet hujus aquæ sex uncias manè per 6. diebus duabus horis ante cibum. *HOFMANNVS.*

PRÆPARATI.

Sunt.

1. Purificatio. 2. Calcinatio. 3. Destillatio. 4. Sublimatio. 5. Præcipitatio. 6. Salificatio. 7. Extractio.

1. PURIFICATIO.

Purificatio ☉m à facibus, tum superficialibus, tum exactius inhaerentibus: Illud fit solâ solutione, filtratione ac crystallisatione: Hoc interveniente insuper digestionem.

Hinc.

1. Vitriolum album vomitivum.

Solve ☉m album in ∇, filtra & evapora, donec quasi crusta supernatans appareat, postea ponas in locum frigidum, & concreverint crystalli, quos postea vitis facibus, quæ subsident, exime: ∇m iterum evaporare fines, reponesque ut antea. Hic labor penitus terro reiteretur, coagulando scilicet & dissolvendo, ultimo ter eodem modo procedatur cum ∇ rosarum. Crystallum tandem supra calorem lenem exiccari, redigantur in rem album.

Vires. Est lenis vomitivum operaturque feliciter, febribus, affectibus ventriculi, catarrhis, lumbricis, pesti, & epilepsia, &c.

Dosis à ʒj. ad ʒj. in Vino, Jusculo, vel alio liquore.

N. 1. ∇ centaurii, vim ejus emeticam maxime promovet Croll, Beguin.

N. 2. Quatuor sunt ☉la vomitiva apud Chymicos seu Gilla. Primum fit ex ☉lo cæruleo dissoluto & præcipitato cum Ol. Tart. separato Sulphur. filtratur solutio & cogitur in crystallos. Hac Gilla est omnium vehementissima & atris valde. Altera fit ex ☉lo modo jam dicto, quæ ad tantam malitiam non accedit. 3. est Vitriolum ☿ is aut ☿ paratum ad mentem Crolli, illi inest dulcedo styptica, præsertim si bis aut ter in phlegmate Oresolvatur & rursus coaguletur, huic non violentia in est. 4. Gilla est omnium innocentissima purialis vomitu indigentibus dicata, quæ fit ex ☉ Vitrioli post exillationem spirituum & olei, diciturque Sal Vitrioli vide infra. Omnia hac Vitriola intra quadrantem horæ vomitus excitant.

2. Vitriolum Hæmetico-purgans.

4. Vitriolum Roman. [vel quodvis aliud ex tribus illis supra commemoratis.] q. v. pulverisatum in loco calido, radiisvè solaribus in ferem album exicca. Postea solve in ∇ centaur. min. filtra & in loco frigido ad crystallandum reponere: Crystallum exiccato [servato tamen colore cæruleo] serva in vitro probe occluso.

Vires. Purgat per vomitum, & secessum, eximiam existens in febribus pestilentibus Medicamentum.

Dosis à gr. 20. ad 31. & plur. in liquore vel Aqua appropriata, ala de Vitriol. Gluckrath in Beguin.

Purgatio defecatoria.

Solve Vitriolum in ∇ vel rore majali (filtrato, vel quod melius, destil.) solutum cola, colatum colloca in digestionem, (per mensem) sic ad superficiem & fundum rejiciet fæces, quas, separa. Iterum ponatur in digestionem tamdiu, donec nullas fæces amplius Sjeciat. *Inservit multis preparationibus.*

Coagulum & S. Closs.

\mathcal{Z} . Salis Vitrioli in aq. solut. filtraque, Tart. calcinati itidem in aq. resolut. part. æq. Conjunge ambas solutiones & coagula in hac.

Vires. Desiccatum purgans præbet, non ita vomitivum
Dos. à 3℔. ad 9j. & 3j. in febribus Intermitt. & ad educendam Melancholiam.

Sal. Vitrioli nitratum S. Closs.

\mathcal{Z} . Vitriol. & sal. nit. perpurcati an. \mathcal{H} j. M. colloca in ollâ Δ ustinente, operculo suo munita, inter prunas ardentès per 7. aut 8. horas. Quod restat materiæ bulliat in aq. communi ad dissolutionem usque; filtretur, evaporet ad cuticulam, tum in frigido crystallos expecta vomitorios, quorum.

Dosis erit à ʒj. ad ʒij. & 3j. in Cachexia, hydrope, catulo, suffocatione matricis, mensium retardatione.

(*Purificatur etiam Vitriolum ita: Vitriolum solvitur ∇ calida, dum adhuc calet injectur \ominus comm. Mj. ita precipitatur impuritas, hinc filtr. evapor. ad tertias, & crystallifatur.*) Schroderus.

1. *Purificatio.*) Hæc digerendo quàm optimè perficitur, Sic v. g. Recip. vitrioli cujusvis q. v. solve in ∇ pluviali, postmodum cola per linteum, coque ad consumptionem dimidij, hoc spatula lignea agita, & inde ad digestionem pone, residet materia terrestris lutea, supereminentem liquorem in crystallos redige.

Hinc 1. *Vitriolum album vomitivum.*) Hoc quoad exactam elaborationem & felicem operationem suam meretur laudem, dum vim suam exierit emeticam absque ulla malignitatis suspitione colligativæ. Sequens tamen etiam non rejiciendum est. Recip. vitrioli alb. q. v. solve in aqua fontana & ebulliant, postea Recip. Nitri præparati q. v. solve etiam in aqua fontana, & guttatim vitrioli soluto asperge, & omnis impuritas petet fundum, tunc clarum filtratum ad medietatem evapora, donec quasi lactescat, quod infra horæ spatium in crystallos abit.

2. *Vitriolum Emetico-purgans.*) Hoc ob violentiam valdè suspectum est, ut jam non amplius sit in usu.

Coagulum Vitrioli S. Closs.) Si loco Tartari calcinati sal Tartari substituatur & in solutionem vitrioli infundas, \mathcal{F} rantur flores vitrioli, qui contra lumbricos summo cum emolumento adhibentur.

Sal. vitrioli Nitratum S. Closs.) Hujus descriptio & præparatio nullâ indiget animadversione; Nec ullus sibi imaginetur, hæc salia operatione imitari aq. fort. operationes ita elaborata, sed in cachexiâ, hydrope, mensium suppressione, matricis suffocatione notabilis sunt energiæ. Si alio modo conficias & sumas nitri elect. part. iij. vitrioli el. part. j. & fundas in crucibulo, fufum solvas, filtrares & iterum coagules, nancisceris Dn. D. Mæbii sal anti-febrile album. Si autem accipias vitrioli Ungaric. part. iij. & nitri part. j. expulso prius per retortam Gas sylvestri nocivo, residuum solvas, filtrares & iterum coagules, habebis sal ejus emetico-diaphoreticum, *Hofmann.*

II. CALCINATIO.

1. *Vitrioli Calcinatio aperta, unde Colchotar.*

\mathcal{Z} . Vitriolum calcina, id est, coque & combure in *Mangeri Bibl. Pham. Tom. II.*

vase terreo, donec, omni humiditate privata, rubescat.

N. *Vitriolum Calcinatione hac ultra dimidiam partem pondere immittitur.*

(N. *Immiscetur Theriaca, adstringit, sistit hamorrhagias.*)

2. *Calcinatio Vitrioli clausa.*

Vitriolum crebris solutionibus & coagulationibus optimè depuratum, lenique calore exiccatum, pone in Matracium firmum sigillo Herm. munitum. Matracium hoc in Cineres calidas colloca, qui solis æstivi calorem non superent: stet ita donec per flavedinem in rubedinem instar sanguinis convertatur. Labor est 20. ϕ circiter. *Beguin.*

N. *Vitriolum rarâ stratificatione sternendum est, ne stratum illud crassitie cultelli in dorso densius sit, (nicht dichter als ein Messerruck dicke) plura ergo Matracia, nisi incassum laborare volueris, habere expedit. Inservit variis preparationibus. Schroderus.*

2. *Calcinatio.*) Vitrioli calcinatio diversos habet gradus, vel enim calcinatur illud in hypocausto ad fornacem, vel saltem in sole, vel in peculiari fornace dispergitur, ut vitrioli phlegma simul colligatur, vel in ollâ mox super igne per se liquatur, & coquendo à nimia humiditate liberatur & ad siccitatem reducitur, vel vitriolum crebris solutionibus & coagulationibus depuratum leni calore in matracio, prout *Dnus Autor* describit, calcinatur, in his levioribus calcinationibus retinet vitriolum suos spiritus acidus. *Hofmannus.*

III. DESTILLATIO.

Unde

Destillata aquosiora.

1. *Ros Vitrioli.*

\mathcal{Z} . Vitriolum crudum, elice rorem calore MB feræ ventis cucurbita non adeo alta adhibita.

Vires. Valet ad arduos capitis dolores, mitigantur guinem adustum, corroborat viscera. Sala.

Dosis 3ij. continuatim, ad aliquot dies.

(*Scorbuticis oris ulceribus proficuum.*)

2. *Aqua Vitrioli secunda.*

Post extillationem roris transfer cucurbitam cum restante Vitriolo ad arenam, & destilla, quoad sati potest.

Vires. Conducit ad purgandos renes, lenit correfiones internas, Urinam & sudorem proritac. Inflammationem plagarum corrodentium aliquantulum calescit sedat, lenit & mitigat dolorem, & ad consolidationem confert; (infusa guttâ unâ ac alterâ Ol. Tart. ut mordacior fiat,) scabiem siccam mundificat, & carnem solidiorem efficit. Sala.

3. *Phlegma Vitrioli acidum.*

\mathcal{Z} . Vitriol. crudul. q. v. destilla ex Cineribus per \mathcal{X} cohobaque aliquoties, (7.) supra \mathcal{Q} ultimâ vice fortius urgendo.

N. *∇ a illa suavem acquirit odorem, si post ultimam fractionem aliquamdiu calore moderato circuletur.*

Vires. Est arcanum ad capitis dolorem & epilepsiam. Hartm. in Croll. (convenit aphthis.)

[*Phlegma inspidum ophthalmie conveniens.*]

4. *Spiritus Vitrioli volatilis.*

\mathcal{Z} . Vitrioli defæcat. & exiccati q. v. destilla gradatim per \mathcal{O} Δ nudo, ut simul post phlegma subsequantur Spir., quantum fieri potest omnes. Liquori egresso adde part. j. ∇ æ pluvialis destillat. & in MB nova destillatio instituat; tunc subtilissimus Spir.

Sff 3 Vi-

Vitrioli cum Aqua elevatus, relicto acidissimo oleo in fundo.

N. 1. Si volupe sit Spiritum Vitrioli volatilem purum obtineri, aufer Excipulum dum instrumenta adhuc calent, statimque in MB aqua ferventis, probè adaptato alembico & recipiente parvo, cautè colloca. Videbis statim volatilem Spir. in Excipulum transire, quem seorsum collectum, diligenter serva Ex. 6. vel 8. \mathfrak{H} . Vitrioli \mathfrak{H} III. ad summum \mathfrak{H} B. acquiri potest.

N. 2. Hac est illa volatilitas Vitr. quam Theophrastus partim, præcipuè autem par. 3. ad morb. ament. rr. 2. commendat ad Epilepsia curationem. Hartm. in Croll.

Vires. \mathfrak{H} ille ∇ a pluviæ immixtus summe penetrans est in febris Ungarica, alijsque ardentibus febribus efficacissimè operari solet.

(Si \ominus lum \ominus defæcatum, Spiritum de \ominus is natura participat.)

Alij Nationem hanc ex cucurbita loricata perficiunt, octies plus minus cohobando.

Alij ad nonum usque Alembicum fortissimo Δ pellunt: scilicet alembico altero exactè imposito, ut in sublimatione flor. \mathfrak{H} i fieri solet, qua ratione penetrantissimus elicitur Spir. \ominus i, ad fugandam epilepsiam præstantissimus. Hartm. in Croll. Sennert. Insti-Tentzel.

Alii addunt \ominus o optimè purificato \mathfrak{V} m, ut fiat pasta; eliciuntque per \ominus m 1. \mathfrak{V} 2. \ominus i phlegma. 3. \ominus i Spiritum. Tandem separant \mathfrak{V} m in MB à \ominus i phlegmate; & \ominus i Spiritum per Cineres dephlegmant: vel phlegma cum spiritu ab oleo fixiori per arenam proliciunt: postea in Cineres dephlegmant. Senn. Inst. Tentzel, vide & seq.

5. Spiritus volatilis \ominus i.

Solutum \ominus lum in aq. purâ coque in lebeo ferreo 2. aut 3. horas, adjecta \mathfrak{H} j. aut alterâ limat. \mathfrak{O} ris ad libras singulas soluti \ominus li. Remove ab Δ & ochra limaturæ sese implicabit post refrigerationem, id tẽr repete cum novâ limat. singulis vicibus tẽr ochream separando. Crystallos vero \ominus li restantes impone \mathfrak{O} lutatæ, dando Δ per gradus, usque dum vapores albi recipiens oppleant, tunc cessa, phlegma à spiritu acidulo per rectificationem in MB separa & serva. Sed parum habetur hac viâ. Quare Glauberum sequor secundâ parte furnorum p. 95. verum cum vasa illius sive terrea sive ferrea, sint porosa, neq; per ea tota spirituum & olei quantitas exhauriatur, ego post absolutam impetuosi phlegm. & spirituum alborum Nationem subsistere soleo post 12. horas & quod Colchotariorum superest conjicio in \mathfrak{O} vitream optimo luto instructam, admotoque eodem Recipiente phlegma & spiritus 1. exceptos continente, hoc opus Nationis redintegro, aperto Δ cum carbone terræ subtus & supra administrato, idque per 8. & minus continuo, imò si ad XII. & extendi posset, melius foret, præsertim si vitriolum optimæ notæ fuerit, quale est Ungaticum, tunc enim, (nec ferè prius,) spiritibus suis volatilibus, ac dulcedine sua totaliter privatur. Tandem separatio spir. Volatilis ab Oleo dulci instituatur, ut vult Glauberus in secunda parte p. 10.

Vires. Spiritus volatilis ibidem videre est. Olei dulcis virtutes plures quoque sunt: fecur & lienem egregiè deobstruit, valet in febribus ardentibus, dosi majore qua ad \mathfrak{H} j. extenditur (propter dulcedinem) in haustu cerevis. figit quoque \mathfrak{H} m in pulv. album firmè fixum.

N. 1. Si ritè operatus fueris, tunc ex \mathfrak{H} XII. \ominus Hungar. \mathfrak{H} v. olei nancisceris.

N. 2. Sal Vitrioli ex hoc \mathfrak{H} beneficio phlegmatis elicitum pro vero ac genuino habendum est, reliqua salia, qua post triduanam Nationem emunguntur, nil aliud sunt quam Vitriolum resolutum nondum satis spiritibus

acidis orbem ac privum. Potest tamen inde haberi. Sincerum, si \mathfrak{O} ad albedinem reverberetur, & postea more communi extrahatur.

N. 3. Habes aliam Spiritus volatilis methodum: Helmontio sub titulo Ignis \mathfrak{H} is, unde Diaphor. Paratur.

6. Spiritus Vitrioli, vulgari modo destillatus.

\mathfrak{H} . \ominus i ad rubedinem calcinati, (vel ex Natione roris & ∇ a secundæ residui) \mathfrak{H} vi. vel q. v. destilla \mathfrak{O} nudo ex \mathfrak{O} benè lutata, in Recipiens capacissimum commissuris exactè clausis, adhibitoque Δ gradatim. Post tres ferè Gas phlegma stillare incipit, quod tandem, paulatim aucto Δ circiter 8 6. vel 7. Spir. aënebulosique subsequuntur. His apparentibus continuandus erit Ignis, paulatimque augendus, donec nulli amplius Spir. egrediantur, quod cognoscet, Recepatulum pellucidum appareat. Spiritum de phlegma in MB, donec guttæ acidæ extillare incipiant, postea rectifica eundem per \mathfrak{O} n vitream & Cinere, sic exhibet Spir. clarus, in \mathfrak{O} vero manet rubicundum & acre.

N. Si citra jacturam aliquam spirituum (in calcinatione forte evanescentium) ut & citra corrosivi olei admixtionem, (quo alias vix Spir. plane liberari poterit,) destillationem expetas, procedere monet Dn. D. Brendelius (in Chymia sua, ubi & rationibus id inculcare conatur,) modo qui sequitur.

\mathfrak{H} . \ominus li opt. crud. q. v. (\mathfrak{H} xii.) inde \mathfrak{O} r, Excipulo capacissimo firmiter connexæ, (ita tamen ut foramen in commissura relictum sit, spiritibus volatilibus ac impetuosis exitum concedens,) destilla ut moris, lentè, donec impetuosius illi Spir. fuerint egressi, (id quod cognoscet, si collum refrigeret,) dein obtura firmiter foramen illud, ac auge Δ m, pelleque horas 12. (non ultra, alias Spiritum inquinabis oleo corrosivo graviori) Hinc dephlegma ac rectifica, & habes Spiritum Vitrioli optimum.

N. Spiritus in calcinatione evanescentes, vix ac ne vix opera dicto modo adhibita æquivalent. Ideoque nihil Spiritum quoque volatilem expetas, vulgaris modus satisfacere potest. In quò nota tamen ne nimium initio calcines, nec nimium Δ m in destillatione urgeas. Etenim in omni fere Natione ita in hac paulatim crassius, & propellitur.

Alij addunt Sal. nit. aliquid, sed Ratum hoc potius ∇ , quam Spir. Vitrioli nomen mereatur.

Vires. Spir. Vitrioli est diureticus, diaphoreticus, incidens, attenuans, putredini resistens, &c. Hinc utilis in febribus ardentibus, obstruè. Epatis. Lienis, & Mesenterij, appetitu prostrato, &c. Quinimo cum liquore vel vino mistus lenit Odontalgiam, (gingivis impressus) prodest & ejus illitus in tinea capitis, alijsque generibus scabiei & pruritus, cum Aqua chelidon. mixtus.

Dosis à g. 3. ad \mathfrak{H} B. vel ad \mathfrak{H} j. in liquore, vel adh. vini in potibus quant. suff. ad aciditatem gratam.

7. Spiritus Vitrioli dulcis, seu \ominus o Vitrioli dulce.

\mathfrak{H} . Vitrioli benè calcin. \mathfrak{H} iij. superfunde \mathfrak{H} , ut benè supernatet; digere decantaque & affunde novum \mathfrak{H} . idque quinquies vel sexies, temper, & aliquot digerendo. Acera illa imprægnata destilla, donec Spiritum Vitrioli tetigerit tandi ordo. Tunc inde in \mathfrak{O} m adjectis sabuli puri manipulis duobus & liquor Vitrioli emanans dulcem referet saporem. Tentzel. Kesler. 3. cent. 27.

Vires. Prodest in calculo, tartareis morbis, catarrhis, &c.

Dosis \mathfrak{H} j. in liquore conveniente.

8. Aliter.

\mathfrak{H} . Spirit. Vitrioli vulgar. (rectificat.) \mathfrak{H} i. \mathfrak{O} n

Vitrioli (ex quo Sal. sit extractum) ℥iv.

Destilla per \odot in vitream in arena in receptac. fatis capax; sic prodit Spir. subdulcis, & quem si dulciorem cupias, circula cum \vee & 4. au. 5. dein abstrahere \vee , sic habes Spiritum Vitrioli dulcem.

N. Dulcescit etiam solâ circulatione cum suo phlegmate, vel si aliquoties à scoris \odot (semper novas scorias sumendo,) detur.

9. Spiritus Vitrioli Philosophicus, vulgò Cohob. § II.

℥. \vee , quia ϕ vitâ edulcoratus est, evaporet leniter MB, donec apparere incipiat liquor flavus & acidus. Liquor hic est Spir. Vitrioli philosophicus, qui per \odot à terrestri materia rectificari potest.

Vires. Potioris est virtutis, quam qui vulgari modo conficitur. Medetur Febribus, Luem ϕ mitigat, Lienem & Meseraicam solvit, ventriculum debilitatum, & à phlegmate crasso infarctum confortat. In Melancholia, hypochondriaca, Epilepsia, omnibusque affectibus capitis mirè prodest. Extrahuntur & ejus ministerio Tinctura mineralium, corallia & perla dissolvuntur, (Idem acutus Spiritu Sal. com. solvit \odot .)

Dosis gr. 3. 4. ad 8. in haustulo vini vel liquore convenienti. Hartman. in Croll. Kessl. l. 1. cap. 26.

10. Spiritus Vitrioli Tartarizatus, alias Liquor Diana.

℥. Vitrioli Ungarici ad albed. calcin. p. ij, Tart. ad nigred. calcin. p. i.

Pulverisata invicem misce & \vee paulisper conspersa, destilla per cucurbitam (XX imposito) forti Δ e, cohobaque: deinde rectifica liquorem egressum in arena, seorsum capiendo, & \vee m & liquorem reliquum.

Vires. Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus; in sanguine grumoso, contra scabiem, ad mundificandam & levigandam cutim.

Dosis à \mathcal{D} j. ad \mathcal{D} j. cum brodio, aut cum pauxillo vini Hispanici. Daturque per 3. auroras continuas si libet. Temzel.

11. Spiritus vel ∇ aperiens Penoti.

℥. ϕ Ung. ad rub calc. ℥. iv.

Silicium è fluviis collect. & optim. calcin. ℥. j.

Tart. ad albed. calcin. ℥. j.

Mixta inque tenuissimum \mathcal{E} erem tusa liquecant in cella aliquantum in liquorem, quem destilla ex arena per XX, cohobaque ter, datum liquorem singulis vicibus \vee in \mathcal{E} erem redacto, affundendo. Extremo per \odot Δ e aperto pelle, sic initio lento Δ e primum phlegma extillat, postea vero \sim acidus auctiori Δ e elicitur. Ex \vee o calcinato Sal. Com. extrahe, & cum eo (ablato prius phlegmate per B) \sim acidum digere. Tandem cum argilla in pastillos redige, atque ex \odot Δ e nudo, gradibus tamen observatis, \sim alcalitatum provoca.

Vires. Usus ejus insignis est in obstruct. Epatis, Lienis, Mesenterii.

Dosis à \mathcal{D} j. ad \mathcal{D} j. vel iij. in vino vel alio liquore convenienti. Hartmann. in pract. loc. de obstruct. loc. de obstruct. Epatis. Sennert. Institut.

N. Dicitur Antihydricum Mussetti, summeque celebratur in Hydrope, cujus fomitem per alvum ac urinam, spiritus etiam nondum alcalisatus educit. Datur cochlear unum jejunantibus singulis vel alternis horis aqua appropriata injectum. Horning. in Csta med. Ep. 122.

12. Spiritus Vitrioli mellisatus.

℥. ϕ Sole albificati ℥. ii. mellis cum favo; ℥. i. Misc. exactè ac destilla ut moris.

Vires. Lenit dolores Podagricos: si adsit inflammatio misceatur cum aceto, alias cum vino. Med. dest.

13. Spiritus Vitrioli diaphoreticus.

℥. ϕ i vulg. ℥. vi. Sal. Com. Tart. C. C. ust. ana ℥. ij. M. in mortario vitreo digerantur aliquantulum: dein destilla ex \odot in recep. capaciss. donec omnis humiditas extillarit. \mathcal{D} to liquori adde \vee an. reserva- que in vase benè obturato.

Vires. Purificat sanguinem, abigitque scabiem ac pruritus, aperit obstructiones; sudorem provocat in peste, venenis, hyrope, icteritia, & contracturis, &c.

Dosis à \mathcal{D} j. ad \mathcal{D} ss. continuari potest ejus usus ad libitum sine periculo. Sala in Anat. Vitrioli. Schroderus.

3. Destillatio, unde Destillata aquosora, 1. Ros vitrioli. Valèr ad cephalalgiam, ophthalmiam, &c. In chirurgia putredini & inflammationi resistit, item in scorbuto oris & ulceribus putridis. Facit etiam ad tinguas extrahendas est fl. violar. rosar. bellid. borragin. bugloss. papav. rh. sed aliquoties rectificandum est.

3 Phlegma vitrioli acidum.) Vitriolum destilla ex cucurbita fistili per Aren. usque ad siccitatem, destillatum liquorem cohoba multoties supra Cap. mortâ in fine fortius urgendo; intermediata digestionem ac circulationem, sæpius destilla à Cap. mort. tandem suavem violaceum acquirat odorem. Eodem modo & ∇ mineralis vitriolata Ambram redolens conficitur seq. modo: Recip. vitriol. Ungaric. ℥. j. * per Sal Com. \mathcal{E} mat. ℥. iv. omnia probè mista, Alemb. indita colloca in MB. igne lento \mathcal{Q} la humiditatem; aqua hæc ultra modum fragrantem reddit odorem, cohoba sæpius à Cap. mort. ita ex propria vitrioli tinctura odor instar rosæ elici potest. Sed necesse est, ut vitriolum sit defæcatissimum.

Vires.) Hoc internè & externè in cephalalgia à causâ calidâ subortâ usurpatur, item in ophthalmia, &c.

4. Spiritus vitrioli volatilis) Quemadmodum Dnus Auror describit, non multum sanè spiritus vitrioli volatilis hoc modo nancisceris, ideoque seq. modo procede; Recip. spir. vitriol. Ungaric. ℥. iij. Cap. mort. illius vitrioli lib. i β . dum spiritus vitrioli Cap. mort. superfunditur, ebullire incipit, tunc celeri manu alembicum impone, adaptato recipiente, quod in hac ebullitione elevatur & destillatur; spiritus volatilis est. Remanentiam inde retortæ vitreæ & destilla, tunc destillatum illud iterum affunde dimidiæ parti Cap. mort. vitrioli, quod tunc per alembicum prodit; affunde priori destillato. Remanentiam iterum per retortam \mathcal{Q} la, affunde recenti Cap. mort. vitrioli, & hoc toties affundendo & iterum abstrahendo repete, donec nihil amplius per alembicum prodeat. Remanentiam \mathcal{Q} la per retortam. Hunc spiritum verum Th. Paracelsi statuunt in Caduco esse. Qui, si apertus stet, evaporat, cum admodum sit volatilis.

Alii spiritum vitrioli seq. modo volatilem componunt.

Recip. vitriolum viride crudum, solutione ac coagulatione depuratum, destilla per alembicum ex Aren. ad siccitatem decies cohobando, digerunt postea aliquandiu sub alembico cæco, distillationem, cohobationem, digestionem toties iterant, donec striæ in alembico appareant, exinde spiritus prodit striatus instar sp. vini. Cujus tamen vires in profliganda epilepsia elogio minime respondent, longèque ei præstantia.

Spiritus Alius vitrioli volatilis vitra, quibus inclusus est, deaurans. Cl. Tackii, ex D.D. I. M. comm.

Recip. Vitriol. Ungaric. coarv. lib. iv. vel v. (poteris addere Romani unam alteramve libram, ita tamen ut

Ungaricum verum bis præponderet) solve illud aliquoties & coagula, sine coloris tamen amissione, deinde pulverisa, & expone aëri, extra solem tamen stet aliquandiu, sic enim per longam aëris actionem vivum ejus aurum, quod adeo arctis detinetur claustris, recluditur. Postmodum novo labore per proprium scilicet phlegma sequenti modo recludi debet. Pone vitriolum illud in cucurbitam & leniter phlegma abstrahere, fractâ cucurbitâ exime massam & contunde; eiq; phlegma redde, repone in balneum & lento igne denuò phlegma abstrahere, sic enim reclusio altera facta erit: Rejeto deniq; phlegmate, secum vitriolum ex retorta communi modo in spiritum & oleum destilla; affunde denuò Cap. mort. spiritum & per gradus procede fortissimo igne urgendo in fine, ut in metallum ferè ex parte coagmentatum remaneat Cap. mort. & habebis spiritum incomparabilem (N. Tertiâ vice adhuc denuò affundi potest ille spiritus Cap. mort.) Sicq; paratus erit spiritus ille, quem, cum infundes vitro, id torum inaurabit, & retortam vitream undique inauratam & permanentem relinquet, ac si vitrificantium artificio ei inustum esset, rectificatur per alembicum & subtilior spiritus ab unctuosiori abstrahitur.

N. Hic est verus spiritus vitrioli, inquit Excell. Tackius Archiater & Professor Hassio - Darmbstatinus meritissimus, & qualem Philosophi adepti requirunt. Alterius hic longè est Naturæ, quam commune illud stigma venale. Est enim in hoc vis insignis resolvendi & penetrandi, non constringendi, ut innumeris corporis humani vitis emendandis aptus sit.

Alii addunt vitriolo optimè purificato spir. vini, ut fiat pasta &c.) Vel spiritum quendam epilepticum, lil. convall. st. tilia &c. vel apoplecticum, &c. prout Tycho de Brahe composuit, scilicet: Recip. vitrioli Ungaric. q.v. exsicceetur, depuretur, donec maximam secum terrestrium partem deposuerit. Postmodum indatur cucurbitæ terreæ lutatæ, quæ ignem sustineat, lib. iv. vel v. pro cucurbitæ capacitate & appposito receptaculo magno propellantur successivè spiritus non solum humidi, sed etiam sicci, dum nulli amplius exhalent. Tunc cohobentur iidem spiritus super idem colcotar prius contusum, inque nova cucurbita fiat & latio ter aut quater eandem repetendo. Postea liquor in recipiente infundatur vitro oblongo, eiq; affundatur tantundem (alii duas partes, alii supereminentiam trium digitorum) sp. vini alkoholisati, fiat digestio alembico clauso mēsis spatio, quo liquor vitriolatus interiores deponat scorias spiritumq; vini imbibat, fecibus per filtrum separatis, & letur inde in MB. sp. vini, manet in fundo essentia vitrioli præstans, quæ quo sapius de novo sp. vini affunditur, post digestionem faeces per filtrum separantur, postmodum & lantur, iterumque atque iterum de novo sp. vini procedendo, eò præstantior evadet essentia vitrioli. Nam ipse sp. vini suam amittit virtutem & phlegmaticus redditur, tribuendo eam essentia vitrioli, eamq; corrigendo, purgando ac maturando. Hic exigua dosi in conveniente liquore sumptus sanat insultus epilepticos, spasmus, &c. confortat stomachum & principalia reliqua membra, morbisq; mulierum medetur, sive in palpitatione sive suffocatione hypochondriacâ &c.

5. Spiritus volatilis vitrioli.) Solutum vitriolum coq; cum aquâ in lebere ferreo per 2. aut 3. horas, & ad libras singulas soluti vitrioli adde limaturæ & rtis dj. & ita porro procede, ut Dominus Autor præscribit. Si igitur crystallos vitrioli optimè depuratos & defæcatos in bonâ quantitate habueris, impone retortæ lutatæ, destilla, ut moris est, phlegma, spiritum & unctuosum liquorem; destillatum super Cap. mort. cohoba in novâ retorta, ac destillationem, ac cohobationem roties itera, donec elegantissimum ac penetrantissimum na-

tus fueris spiritum, qui, si calorem moderato digeratur, suavem acquirit odorem.

6. Spiritus vitrioli, modo destillatus.) Hic spiritus adeo rudè ac crassè præparatus non subterfugere potest Cl. Helmontii & acutissimi Conringii censuram, dum admodum impurus, fixus, corrosivus & crudus adhuc est, non vacat noxâ ob occultam realgaris sæpè infectionem sibi non raro ab origine immistam. Unde non mirum, hunc non paucos Medicos rejecisse ob caliditatem summopere desiccantem, adstringentem, crustas in ventriculo inducentem, stomachum exurentem & erodentem. Si verò mediante rectificatione ad summum maturitatis ac volatilitatis gradum deductus fuerit, summum non solum corroborationis spiritus vitalis & animalis arcanum obtinebis, sed & in capitis affectibus, ac febribus ardentibus ad sulphureo-salina acria effluvia, ex quorum minimâ ebullitione calor oritur febrilis, restinguenda non suppar habebis remedium. Attamen in internis inflammationibus, ut pleuritide seu pleuripneumoniâ, anginâ, hæmoptoë, phthisi, cæterisque Pulmonum affectibus, ventriculi inflammatione, dysenteria, sanguinis mictu, renum & vesicæ ulceribus ab ejus usu abstinendum est.

7. Spiritus vitrioli dulcis, seu ol. vitrioli dulce.)

Hic non simpliciter dulcis emergit, sed dulc-acidus, ex sale fixo aceti & vitrioli compositus, quasi ex his tertium quid resultans. Nihilominus tamen, si omnino spiritum vitrioli dulcem desideres, profecto ex nullo alio subiecto meliorem, quam ex vitriolo & tis nancisceris; Hic enim spiritus additâ sp. vini particulâ aliquot cohobis super Cap. mort. destillatus & in digestionem positus, nescio quid singularitatis non promittat. Licet sp. vini ipse etiam volatile quoddam acidum, ut supra Lib. 2. ostendimus, possideat, rodentem tamen sp. vitrioli aciditatem habeat, ut turdus usurpari queat; minus enim acidum corrigit majus, eadem ratio est sp. Salis, cum sp. vini dulcificatio.

8. Aliter.) Non destilla per retortam vitream ex arenâ, sed auge pondus Cap. mort. vitrioli, & fume hujus tantum, quantum spiritus vitrioli imbibere potest, addito tantillo sp. vini & destilla ex retorta igne aperto servatis ignis gradibus bis cohobando; demum rectifica ex cucurbitâ vitreâ aliquoties cohobando etiam usque dum spiritus acidus elevatus fuerit. Et sic acquies spiritum Cephalicum vitrioli.

9. Spiritus vitrioli Philosophicus, vulgò Cohob. 8 nit.) Hic spiritus non vitrioli, sed spiritus salis est; & autem adhuc semel per MB destilletur, melioris erit virtutis. Medetur febribus malignis, variolis, morbillis, capitis affectibus vel per se, vel in formâ Tincturæ ex fl. violar. bellid. r. ros. & fl. borrag. &c. cum hoc & aq. acetos. extractæ. Ventriculorum debilem confortat, unde & ingreditur Dn. D. Johannis Michaelis Elixir stomachale. Hujus etiam adminiculo extrahuntur tincturæ mineralium ex marte &c.

10. Spiritus Vitrioli Tartarificatus, aliàs liquor Diana.) Recip. vitrioli calcinati part. iij. & Sal. comm. Tartari part. j. misce exactissime in mortario lapideo, destilla per retortam lutatam igne aperto appposito receptaculo capacissimo. Alias, prout Autor describit, non succedet. Alias convenit hic spiritus cum sequenti aperitivo Penoti, nisi quod filices excludantur; Ex Cap. mort. parari potest Tartarus Vitriolatus.

N. Qui ex Tartaro vitriolato elicitur, parum spiritus acidi suppeditat.

11. Spiritus vel ∇ aperiens Penoti.) Non opus est, ut mix-

ut mixta per d. solvantur, & postea solutio ex Aren. destillat per Almb. Nō certam necessaria est extractio Salis ex Cap. mort. cum spiritu acido iterum iugēdi, sed meliori & compendiosiori modo hic conficitur spiritus, si ingredientia hunc spiritum statim ex retorta igne aperto, servatis ejus gradibus destillantur, & bin s vel tribus vicibus super Cap. mort. destillando cohēbentur; & loco vitrioli Ungarici substituatur vitriolum martis. Cum verò vitriolum martis in tantā non possit haberi cop.ā, coquendum est vitriolum vulgare cum ac. & purificandum, ut fit a. tiale.

Vires. Usus ejus insignis est &c.) Hic spiritus ubique utilis est, & in primis in malo hypochondriaco, scorbuto, hydropē usurpatur. Item in arthritide vagā scorbuticā cum sp. cochleariā, sp. Lumbricor. &c. In hydropē cum essentiā vincetoxici. Quod autem in hydropē adeò sit utilis, sit ob partem silicū & salis Tartari volatilem, silices enim, quod in hydropē valeant vid. in Lazar. River. observ. communic. p. m. 390.

12. *Spiritus vitrioli mellisatus.*) Hic inter externa saltem medicamina refertur, & cum præcipuē ad leniendos dolores podagricos commendatur, notandum, quod magis profit. anti-podagricum Cl. Hartmann.

13. *Spiritus vitrioli diaphoreticus.*) Hæc compositio nullas habere potest virtutes, dum Sal Com. Tartari & CC. ustum imbibunt acidum vitrioli & sic ejus impediunt destillationem, neque etiam a CC. ustio facile volatili destituto aliquid huic spiritui impedire potest. Si quis verò tum CC. crudo præparare vellet, fortissimum sanē accipiet spiritum. Satius erit, si spiritui vitrioli acido in convenienti dosi salis CC. volatilis aliquid addideris, ad vires expediendas ab Autore adsignatas. Hofmannus.

SPIRITUS VITRIOLI ANTEPILEPTICI

14. *Spiritus vitrioli Antepilepticus puerorum, Hartmann.*

℞. Vitrioli Ungaric. deputatiss. ℥ iv. adde ☐ re puerorum sanorum recenter collecti. ℔ iv. i. Digere vase clauso aliquamdiu in MB, postea ex eodem vase destilla ad siccitatem duplex phlegma, quorum primum insigne est paregericam ad dolores podagricos, aliosque suaviter demulcendos, alterum est insigne ophthalmicum, ad quævis oculorum vitia utilissimum, ☐ pulverisat. ex ☐ valida terrea, Δenudo, sed tamen ab initio valde lento, in excipulum capax urge, prodeuntibus confestim spiritibus liquor promanat pretiosissimus sulphurei odoris & austeriusculi saporis, qui per ☐ semel atque iterum rectificatur atque reservatur.

Vires. Omnem puerorum Epilepsiam radicitus tollit.

Nimirum.

℞. Hujus ℔j. ▽ radie. Pæon. & flor. Til. an. ʒj. M. de hac mixtione exhibe in paroxysmo (prius membris contractis & revulsis, reductis,) cochl. β. & paulo post recolletis sensibus denuo aliquid exhibe, atque ita etiam tertio id repete; non omissis interea quæ cerebrum confortant, sc. magist. perlar. corall. cranii humani & simil. Hartman. in Croll. Sennert. in Instit.

N. En quoque ☐ efficax contra Epilepsiam.

Si Sal ☐ in Sp. Vitrioli dissolutum per arenam ☐.

15. *Spiritus Antepilepticus Basilii.*

℞. Virid. æris, q. v. superfuso ✕ calido extrahe, & decanta: Liquorem per ✕ abstrahē, reliquum in ▽ pluviali solve, filtra, coagula ad tertiæ partis remanentiam; repone in loco frigido ad crystallisandum, Crystall. toties collige, quoniam Aqua ulterius coagulata & reposita illos dabit.

neutiam; repone in loco frigido ad crystallisandum, Crystall. toties collige, quoniam Aqua ulterius coagulata & reposita illos dabit.

℞. Hos crystall. destilla ex ☐ fortiter & prodibit Aqua subviridis, quando incipit subnigra apparere, cessa, Aquamque illam subviridem dein per ☐ destilla & extillabit clarissima.

Usus ejus non modo in Epilepsia, sed & in calculo valde nobilis perhibetur.

Dosis ℔j. in Aqua appropriata. Pæon. Fenic. &c. Tentzel. in Exeges. I.

16. *Spiritus Vitrioli antepilepticus Quercetani.*

Spiritus Vitrioli viridis dictus, in Tetrade.

1. 74. Vitriolum. destilla ut habeas seorsim phlegma a ☐, idque in quantitate sufficienti.

In phlegmate macerentur (n MB ☐ 4. vel 5.) semina Hyperic. & Pæon. flor. Lil. Conyall. Tilia, Galend. Rosimar. Hyperic. Rosar. aliquid Ebor. C. Ci, Cranii humani, visci querni pro libitu, fiatque expressio quæ ☐etur. ☐to eo imbue vitrioli recent. ℔ j. vel ij. ☐aque in MB ac. cohoba quater vel quinquies: tandem adjice ☐m vitrioli servatum, ☐aque ex cucurbita per serpentina in MB fervente.

Si bene operatus fueris (inquit Quercet.) solus ☐ cum virore elicietur penetrantissimus.

Dosis gutt. 15. vel 16.

17. *Spiritus Vitrioli antepilepticus Paracelsi.*

℞. ☐m Ungaric. vel Roman. elice phlegma cohobaque toties super ☐, donec eo pennus imbuetur. Tunc admisce ☐ opt. recte sic, digere ☐m unum ac alterum vase clauso, hinc destilla, Δnulo gradatim aucto, donec ☐ prodierint omnes: Extillato Liquori (a facibus segregato) adde 1/4 ▽ atheriac. Camphorata, deanoque bis vel ter destilla.

Vires. Exhibetur in paroxysmo & ante paroxysmum.

Dosis ℔β. cum liquore convenienti. Vide Querc. in Teir.

18. *Spiritus Vitrioli Antepilepticus compositus.*

Videatur l. 2. c. 52. Elyx. Crollii.

19. *Spiritus Vitrioli coagulatus.*

℞. Terram sigillatam Strigent. affunde Sp. vitrioli, stent in loco calido, ubi refrigerint, simul coagulantur, inque calido iterum solventur, &c. Hunc ☐m coagulatum, si placet, inde ☐a vitreæ & destilla ex arena, prodibit liquor minus acidus quam ☐ vitrioli: cohoba vice tertia, & nil nisi phlegma extillabit, adeoque ☐ vitrioli in ☐ manebit conjunctus cum terra sigillata, qui in loco humido iterum liquefit.

N. Alij ☐m vitriolicum Sal. com. proprio digerunt, & hac ratione coagulationem conantur.

20. *Aliter cum Crystall. Sal. nitr.*

℞. Sal. nit. Crystall. phlegm. vitrioli an. ʒvi. solve, ac filtra, abstrahē ☐ando ad siccitatem: dein affunde abstractum hoc phlegma ☐o adjungendo Sp. vitrioli ℔β. abstrahēque in arena, tum phlegma, tum ☐m nitri in forma vaporum rubicundorum egredientem, donec rubedo cesser; postea repone ☐atorium cum restitente Spir. vitrioli loco frigido & coagulabitur.

N. Quia Sal. nit. & vitriolum nexu non adeo amiceabili ununtur, hujus usum nulli suadeo. Schroderus.

Spiritus Vitrioli Antepileptici. 14. Spiritus Vitrioli Antepilepticus puerorum Hartmanni.) Tycho de Brahe Mathematicorum ocellus hunc spiritum antepilepticū tangit.

tanquam summum arcanum Nemini revelare voluit, ipsumque insuper à cranio humano destillavit. Hunc spiritum etiam tota Gallia ac Dania adhuc inter arcana sua reservat. Vitriolum Ungaricum sumitur depuratissimum calcinatum ad flavedinem, & ubi adhuc fervet infunde urinam puerorum sanorum vinum bibendum digere per 8. horas in MB. leni calore, in duplo adde contusarum ollarum non vitrearum fragmenta pulverisata & non ex MB. sed per retortam statim igne aperto destilla. Destillatam iterum super Cap. mort. semel cohoba, & demum per retortam vitream rectifica. Admodum tamen compendiosâ viâ hic spiritus confici potest, si sp. vitrioli acidus volatilis falsi ac urinosi justâ quantitate misceatur ac destilletur, Phlegma hujus spiritus dolores podagricos mirè compescit. Et internè mirabiles hujus virtutes & effectus in caduci miasmate expugnando, aliisque capitis affectibus, ipsaq; maniâ propriâ meâ experientiâ non satis deprædicare possum.

15. *Spiritus antepilepticus Basilij.* Hic spiritus nihil aliud est, quàm sp. Vir. ær. seu magisteriorum menstruû *El. Zuvelferi*; Viridis autem non fit. Commendatur etiam in asthma humido ab obstructione bronchiarum pulmonum ex pituitâ viscidâ; ex Vir. ær. cum gummi ammoniaco *Dn. D. Johannes Mishaelis* suum spiritum asthmaticum etiam præparavit. In epilepsiâ hunc antepilepticum dictum Basilij nondum expertus fui.

16. *Spiritus vitrioli antepilepticus Quercetani. Spiritus vitrioli viridis dictus in Terrade.* Verum hic spiritus præ vulgari nihil obtinet peculiaris, & ista infusio suprà denominata vegetabilia, ridicula & frustranea est, dum per destillationem vires amittunt & invertuntur.

17. *Spiritus Vitrioli antepilepticus Paracelsi.* Hic suam meretur laudem vid. suprà ubi hunc accuratè descriptum invenies. Loco aque theriacalis camphorata, substitui potest spiritus lil. conval. fl. tilia &c.

N. Ego elegantem spiritum antepilepticum habeo admirandæ virtutis in expugnando caduco, qui conficitur ex spiritu vitrioli & spiritu sanguinis humani invicem destillatis, quo multos cum benedictione divinâ in integrum restitui.

18. *Spiritus Vitrioli antepilepticus compositus.* Hujus animadversionem vide suprà *Lib. 2.*

19. *Spiritus vitrioli coagulatus.* Verum hic spiritus vitrioli coagulatus cum ter sigillatâ admodum ponticus & austerus est; De cætero variis alioquin conficitur modis, & cum diversis salibus spiritus vitrioli coagulari potest, omnium tamen optimè cum sale vitrioli, quod ex vitriolo summè calcinato in aëre relicto & astris imprægnato extrahitur. Similiter etiam cum crystallis Nitr. succedit, ut Autor etiam adducit. Adeoque totum coagulationis artificium in hoc consistit, ut spiritui vitrioli corpus aliquod, quod ipsi non contrarietur, adjungatur, tale autem est sal Vitrioli & Nitri tanquam salia acidâ cum spiritus Vitrioli à dimidio Nitri abstractione. Nec est, quod quis cum *Domino Autore* nexum in 29. p. 492. vitrioli ac. Nitri metuat, ejus enim noxa est, ut suprà etiam monitum fuit, non tam ex mutua corporum horum mixturâ, quàm ex illorum unitorum destillatione, quæ nocivum Gas excludit; Si autem ad alios affectus adhibere velis, ut v. g. febres intermittentes, obstructions tollendas &c. similiter cum alkali quodam v. g. sale absynthii, &c. non eminenter saturatum coagulare poteris. *Hofmannus.*

DE OLEIS.

Olea hic aqueos, non pingues liquores dehotant, adeoque à spiritibus nisi crassitie differunt.

Sunt.

1. $\phi\phi$ dulce.

2. Vitriolum purificatum, solve in $\phi\phi$ Tart. p. di. ac abstrahæ. Materiam relictam solve cum ω Sal. Com. atque redige in massam cum cremone Tart. (vel cum Saccharo cando, aliòvè Sacchari genere.) Hinc pellatur per Retortam.

Vires. *Diaphoreticum est insigne, polletque vi leniter adstringendi.*

Dosis à gut. 1. ad 3.

N. 1. Parum Olei suppeditat.

N. 2. *Metallis seu crudis, seu in calcem redactis eadem ratione per ω Sal. com. ac cremorem Tart. Olea elici possunt. Ex commun. Experient. Dn. D. Dieteric.*

2. $\phi\phi$ Vitrioli rubicundi.

3. Vitriol. ad flaved. calcin. p. 1. Silic. grossè contusor. p. ij. V. q. f. ut f. pulvis instar.

Destilla per Retortam, sic rubicundum Oleum prodit, *Gluckrayb.*

Usus ejus potius est in Metallurgia, quam in Medicina. Poterit tamen & intrinsecus exhiberi. vide supra Spirit. Penoti.

3. Aliud rubicundum.

4. Colchotar. par. iv. Vini alb. generos. p. ij.

Fac ebullire ad siccitatem usque, postea tere & ex Resorta Ignis aperto destilla primo phlegma, postea applica receptac. capaciss. ac juncturis benè munitis propelle forti Ignis Oleum, instar sanguinis, rubicundissimum, *Gluckray*

4. Aliiter.

Vitrioli Calc. destilla cum Lythargyr. & prodit $\phi\phi$ vitrioli rubicundum quod Podagricis prodest.

5. Aliud ex Terra Vitrioli.

6. Fæces seu Terram subflavam Vitrioli siccata, (vide infra) destilla per ϕ m Δ reverberii, $\phi\phi$ dabit rubicundum, penetrantissimum.

Vires. Dosis gutt. 6. ad plerosque affectus capitis perutile est.

6. Aliud $\phi\phi$, ex Sulphure Vitrioli.

7. Sulph. Vitrioli (dulc.) misce cum dimidia parte Sal. Tart. Destilla per ϕ m, Δ que ultimo adde suppressionis & prodibit $\phi\phi$ rubrum.

N. 1. Huic $\phi\phi$ si instillaris \times præcipitabitur $\frac{1}{2}$ frigidæ coloris, quem edulcora ∇ frigida, hinc siccâ & serva.

N. 2. Præstantius erit, si flores ex Sulph. Vitrioli eluvatos receperis.

Vires. Prodest, sed efficacius, in iisdem affectibus, in quibus Sulph. Vitrioli. Vide suo loco.

Ex hoc Præcipitato fit Essentia seu Tinctura. *Schrederus.*

De Oleis sunt 1. Ol. dulce. Spiritus vitrioli & ejus oleum, specie igitur non differunt, sed substantiæ modo, dum ex ol. vitrioli præstantissimus per ϕ lationem spiritus vitrioli confici potest. Præfens ol. dulce suam potissimum Tartaro debet originem. Cap. mort. solum suppeditat Tartarum vitriolatum. Hujus locum supplere potest extemporanea ac proportionata sp. Tartari & vitrioli mixtura s. aut ipsa recentium vitrioli & Tartari crudi destillatio.

N. Ex Metallis seu crudis, seu in calcem redactis, etiam ex coralliis r. & a. oculis Cancr. &c. eadem ratione per spiritum Sal. Com. ac cremorem Tartari olea elici possunt. Imò succedit etiam cum \times absque

succedit etiam cum * absque cremore Tartari, sed per retortam, vel in crucibulo Δ ne reverberii elaboratio absolvi debet.

2. *Ol. vitrioli rubicundum.*) Si liquor rubicundus aucto Δ ne in fine prodire debet, recipiendæ sunt part. ij. vitrioli calcinati & pars j. silicum contusorum, aliàs non succedet. Usus hujus est potissimus in metallurgia.

3. *Aliud rubicundum.*) Hoc à communi improprie sic dicto oleo parum differt, quod per aliquot super Cap. mort. cohobationes facile iterum in sp. vitrioli transfertur, quemadmodum hoc loco per lentas in vase altiori evaporationes in oleum rubrum.

4. *Aliter.*) Vitriol. Calcinat. cum lythargyrio destillatam compositum oleum suppeditat ex Hno & Δ ne vel Φ nere, quod podagricis prodest; succedit etiam destillatio vitrioli Calcin. cum saccharo Hni facta.

5. *Aliud ex terrâ vitrioli.*) Præstat ex hac terra elicere tincturam sulphuris vitrioli. Terra vitrioli nihil aliud est, quàm Cap. mort. ex quo sal vitrioli extractum est, unde ex hac nullum ol. destillari potest rubicundum, sed tinctura exinde conficitur.

6. *Aliud ol. ex sulphure vitrioli.*) Cum sale tartari non succedit, sed cum * si Sulphur vitrioli misceatur & Δ metur, flores acquirit elegantissimos, qui Δ ni humido expositi p. d. solvuntur, ex quibus essentia seu tinctura præparatur. *Hofmannus.*

IV. SUBLIMATIO.

Unde

1. Flores ex Terra Vitrioli, Substantia cuprea Vitrioli.

7. Terræ vitrioli nigrae (ex qua Sal. Com. extractum,) vel Terræ vitrioli ochreae q. v. misce cum * part. æq. sublima initio Δ lento, dein majori, donec nullum amplius fumum ascendere videas. Sublimato affunde ∇ in com. collocaque in MB tepido hora 24. unde subtilis Φ in fundo subidet, iteratis ablutionibus edulcorandus.

N. 1. Hic Φ igni fusionis subjectus, comburitur partim, partim in bonum cuprum funditur. Vide Basil. in repet. Lap. Ph. p. 153.

N. 2. Eodem modo Φ Terra Φ i. Φ tractatur, unde Sulph. combustibile Φ is. Kest. l. i. c. 44. Eodem modo fit ex Φ . Ita ex Sulph. Φ i. fit narcot. *Mannagetta.*

Virtus substantia hujus cuprea est, mundare plagas putidas, incarnare & cicatrices inducere, Sals de vitriolo.

2. Flores ex Sulphure Vitrioli.

7. Sulph. vitrioli (dulce) sublima sine additamento ex sublimatorio humili, paulatim id injiciendo alembico scilicet ablato & rursus reposito.

3. Flores ex Vitriolo crudo.

Fiunt eodem modo, cum *. *Schroderus.*

4. *Sublimatio unde Flores ex terrâ vitrioli, Substantia cuprea vitrioli.*) Suprà animadvertimus ex terra vitrioli per se nec ol. nec Sulphur elici posse, dum terra ista vitrioli nihil aliud, quàm Cap. mort. ex quo Sal com. fuit extractum, acidis autem nupra liquoribus, egregias tincturas, aliaque suppeditat medicamenta. Qui verò Cap. mort. vitrioli denuò cum Sulphure calcinate non fastidit, novum acquireret vitriolum. Cum * si Cap. mort. misceatur & Δ metur flores inde etiam acquiruntur, qui ∇ a communi Δ tantur, & per fusionem in metallum, ex quo constant, iterum reduci possunt. Flores ex vitriolo crudo cum * eodem modo conficiuntur. *Hofmannus.*

V. PRÆCIPITATIO.

Unde

1. Terra Vitrioli ochrea.

7. Vitrioli pur. q. v. solve in Aqua font. sterque aliquandiu, sic vel sponte sua subsidebit Terra Vitrioli instar ochreae.

[Terra Vitrioli dulcis in excoctis utilis.]

2. Sulph. Vitrioli dulce.

7. Vitrioli puri q. v. solve in Aqua calida, solutioni affunde guttatim Φ Tart. (alii lixivium ex Cineribus Clavell.) & præcipitabitur Sulph. vitrioli, quod edulcoratum exicca.

Vires. *Conferat affectibus pulmonum, mundificat plagas putidas, cicatricesque inducit. Hartm. in Croll. Sala in Vitriol. Tentzel. Kest. 4. c. 69. 3. c. 10.*

[Loco Vitrioli sumi potest Vitriolum Φ , quod solum Φ præcipitatum Sal viride dabit ad vermes singulare.]

3. Sulph. Vitrioli purgans.

7. Vitriol. opt. q. v. affunde phlegma vitrioli, vel Aqua destillat. ad eminent. digit. 4. stent in digestionem & subsidebit Terra, filtra in filtraturam instilla Φ Tart. p. d. & præcipitabitur Sulph. vitrioli; decanta Li- quorem & edulcora Sulph. ∇ tepida, atq; exicca. *Kest.*

Dosis à g. 5. ad 10.

Eodem modo fit & Sulph. vitrioli Φ purgans; illud sic solvendo in phlegmate vitrioli, defacando & præcipitando cum Ol. Tart. *Kest. l. c. 38.*

4. Sulph. Vitrioli fixum seu Martiale.

7. Limatur. Φ puriss. sine omni Φ ere, p. i. Vitrioli Ungaric. Cærul. aut vitrioli Φ is, p. ii.

Trita, misce & imbebe indendo in vitrum cum * ut supernatet digit. 2. Coque & coagula ad siccitatem Ignis Φ in fine ad candescentiam usq; urgeatur. Huic Φ eri affunde aliud * ad eminent. 4. digit. ac extrahe colorem f. a. In hoc tincto * delitescit Sulph. vitrioli combustibile, (quod evaporatione & dulcoratione experiri poteris.) Instilla Φ Tart. p. d. sic Sulph. vitrioli illico præcipitabitur & figetur. Edulcora Aqua com. *Hartman. in Croll. Tentzel.*

Ex hoc Sulphur vitrioli fiunt Anodyna, Laudani nomine insignita.

Præcipitatur & Φ (spadicei coloris, si Φ ex Sulph. vitrioli dulci destillato * instillaris. Vide Φ ex Sulph. vitrioli. *Schroderus.*

5. *Præcipitatio unde 1. Terra vitrioli ochrea.* Hæc paratur, quando flava materia à Vitriolo soluto & in digestionem posito calida ab aqua Δ tatur, & fundum petit.

2. *Sulphur vitrioli dulce.*) Melius erit si loco vitrioli com. sumatur vitrioli Φ is pulvis, solvatur in Aqua f. & solutioni ol. Tartari guttatim affundatur, tunc Δ tabitur sal viride ad pellendos & enecandos vermes singulare. Eiusdem compositionis & effectus etiam est sequens. 3. Sulphur vitrioli purgans *Kest. l. c. 44.* Et specifi- cum purgans seq. Recip. Cap. mort. vitrioli extrahe cum aqua calida, filtra, & affunde solutioni ol. tartari donec Δ retur, adde etiam aliquantulum sp. vitrioli ad aliqualem aciditatem. Postea iterum filtretur & abstrahere ad part. dimid. tunc Sal. com. in fundo crystallinum apparebit. Dosis à gr. vi. ad xvi.

4. *Sulphur vitrioli fixum seu martiale.*) Præsens Dni Autoris descriptio ex ælle convenit cū n. Cl. Zuvelferi descriptione Sulphuris vitrioli anodynī, quam tradidit in mantiss. spagyric. part. 2. Cap. 9. p. 394. Verum nec hoc Sulphur genuinum vitrioli anodynum est, cū pulvis iste Φ is ol. tartari Δ tatus nihil aliud sit,

fit. Ejusdemque ferè etiam fortis illud est, quod *Zovelferus* l. c. part. 1. c. 3. p. 339. describit. Unde & *Angelus Sala* sect. 1. *synops. aphor. chymiatrici.* 45. calculum suum addit, scribens: Pulvis iste, quem chemici quidam mediante præcipitatione vel attractione per laminas ferri facta separant, non est Sulphur, sed pars mineralis & fixa vitrioli, cui nomen sulphuris vitrioli anodynæ nequaquam debetur. Unde non immeritò quæritur; An verum detur vitrioli anodynum, laudandi nomine insignitum? Dari illud multi quidem asserunt, sed pauci demonstrant, paucissimi hodie etiam credunt. Nos asserimus cum *Cl. Helmontio*, omninò dari sulphur vitrioli virtutis anodynæ, longè tamen aliùs operationis, quàm opiatorum vulgatum, hujusque elaborandi modum paucis cognitum, ac à chemicorum vulgo hætenus inentatum esse, cujus etiam *Tb. Paracelsus* meminit, qui quamvis ex professio non tractet ejus præparationem, tacitè tamen eam quasi insinuare videtur, dum illud embryonatum vocat, quo verbo inculcat, non in vitrioli corpore perfectò & excocto illud quærendum esse, sed in ejus embryone. Unde colligimus, gravem eos committere errorem, qui vitriolum aqua solutum Sale tartari præcipitant, sperantes hoc pacto se ejusdem Sulphure anodyno potituros. Ne tamen lectorem benevolum sine munulculo dimittamus, scias Te verum ac genuinum Archei sedativum etiam acquiraturum, si Sulphur illud vitrioli materiale, quod *Cl. Zovelferus* l. c. part. 1. C. 3. p. 339. describit, depuratissimum sumas & porro ad summam maturitatem beneficio Alcoholis vini excoquas, hocque sufficere pro archeo sedando. *Hofmannus.*

VI. SALIFICATIO.

Unde

Sal Vitrioli.

Vitriolum Ungar. cærul. in +bulo calcina, donec in Ærem obscurè purpureum abeat. Huic ita calcinato, affunde Aquam com. sensim agitando, ne in fundo conglobetur, donec Aquæ [quæ calida evadit, ac si calici vivæ superfusa fuisset,] refrigerescat. Stent ita 24. horis postea filtra per chartam, fiatq; exhalatio super Ignem lentum, donec sal in fundo reperiatur siccum & coloris quodammodo incarnati. Hoc pulverisando in albedinem vertitur.

Idem Sal potest extrahi ex ☉o vitrioli in Æat. residuo.

N. 1. Si ☉m calcinatum non fuerit nigro-purpureum, sed tantum instar *Boli Armeni*, nihil extrahes præter ☉m ejusdem coloris ut fuit antea. (nec habebis Sal album: Nimià è contrà calcinatione omnibus acidis spoliatum spiritibus non multum salis, quod vomitum conteret, dabit.)

N. 2. Terra residua (corpus exanime vulgò) maxima est virtutis in *Darrhea* & *Dysenteria*.

Vires. Sala vomitorium hoc ad Cælum usque evehit, in *Epilepsia* aliisque cerebri Symptomatibus ex corruptis & acerbis è ventriculo sarsum actis vaporibus ortis. Item in *Pleuresi*, *Febribus pestilentialibus*, *Lypothimia* à repletionem humorum corruptorum, & effervescencia bilis circa orificium ventriculi; in *Epate*, *Liene*, & *Renibus* obstructis.

Idem Sal naribus inspiratum sternutationem egregiè ciet, citra vim cerebrum serosis suis excrementis expediens.

Dosis à ʒss. ad ʒß. vel ʒij.

Sala in Tern. *Kætolog.* Querc. in *Tetrad* & in *Pharm.* rest. cap. de vomitivis Senn. Inst. *Bequin.*

N. Sal Vitrioli ex solo ☉o ex quo flores Sulph. elevati sunt à ʒß. ad ʒij. exhibitus [in ☉o fœnic. vel vino,] conciliat facillime vomitum interdum & sedes, & sudores. *Hartman.* in *Croll.* *Schroderus.*

6. *Salificatio. Unde sal vitrioli.*) Hoc nihil aliud est, quàm ipsa vitrioli substantia, saltem ab impuritatibus & metallina substantia depurata. Loco vitrioli Ungar. substitui potest vitriolum ortis, à cujus Cap. mort. si (p. vitrioli ortis prius destillatus fuerit, sal elici debet. Hoc Sal Com. obscurè fit purpureum, seu incarnatum, si aliquoties solvatur & rursus calcinetur.

N. Terra residua maximè est virtutis in *diarrhœa* & *dysenteria*; in primis, quæ ex Cap. mort. vitrioli ortis desumpta est, purior enim hæc est, nec alterius exortici admixti particeps. In omnibus etiam hæmorrhagiis, hæmoptoë &c. tam internè quàm externè valde utilis. Terra residua ex Cap. mort. vitrioli in emplastris vulnerariis, v.g. Empl. Opeteldoch. D. D. *Mindereri.* *Magnetico Angeli Sala* &c. non tantum exsiccat, sed etiam egregiè consolidat.

Vires, in *Epilepsia* &c.) In primis per consensum ex ventriculo suborta, item in apoplexia, præmissio spiritus apoplectici usu, in aqua apoplectica in ipso paroxysmo propinatum. In *Pleuresi* dico summa cum circumspectione statim in principio esse offerendum. Item in febribus malignis etiam ab initio, si febricitantes in ore amaritudinem persentiunt, præsertim in morbo Ungarico &c. *Hofmannus.*

VII. EXTRACTIO.

Unde

Tinctura seu Essentiæ Simples & Extracta.

1. Extractum Vitrioli Narcoticum, anodynum,

2. Vitrioli pulverisat. ac lento calore ad albedinem usque exsiccat. ʒß. affunde V optimi & distillati ʒxxx.

[N. Nulla humiditas præter V accedat vasque sit siccissimum, alioque incassum laborabis.] Sepelito in finura equinum per mentem. Decanta postea à facibus absque perturbatione, & destilla in MB ad residuum usque li quoris flavi ☉o ☉aio non abtimilis. Tunc cessa, & quod prol. æum est serva. Liquorem restitantes benè occlusum quoque in usum repones, qui pretiosum Extractum est.

Vires. Extracti illius usus est narcoticus & anodynus, nec potentià opio cedit, sine periculo tamen reprimi & coagulat vapores subtiles venenosos, *Epilepsiam* eam santes, idque specificè.

Dosis à gut. 6. ad 8. & 12. cum liquore conven. Sala in ☉.

2. Essentia Sulph Vitrioli.

2. ʒerem spadicei coloris (vide ☉o ex Sulph. Vitrioli) digere cum V in loco calido. (vase clauso) ☉. 8. sic dulcissima Essentia Sulph. vitrioli tandem supernabit in forma ☉oi, quam à V separa per tritorium & serva.

Vires. Hac dulcissima Sulph. Vitrioli Essentia equipollet viribus suis Tinctura ʒij, & mirabiles effectus facit in ☉o Melissa, noxios humores totius corporis expellit per insensilem transpirationem, venerem stimulat, uterum roborat, ejusque motus inordinatos sistit, & in utroque sexu prolificam vim seminis ad liberorum generationem operatur. In ☉o Petroselinæ idem benè præstat, sed insuper Hydropem curat.

[Ad hæmopt. diarrhœas, dysenteriam, uteri hæmorrhagiam, fluxum album aquè commendatur.]

Usus autem istius Essentia aliquandiu continuandus est.

Dosis g. 1. usque ad 4. Hartm. in præct. loco de Lepra. Tenizel. de Sulph. Vitrioli Kest. 4. c. 69.

3. Alia Tinctura, Manna Vitrioli dicta:

2. Vitrioli purificati q. v, extrahe Tincturam, dige

digerendo cum \sim u Vitrioli subtilissimo Essentificato, id est, proprio Sale alcoholato, filtra, coagula & habebis Mannam seu Tincturam vitrioli flavam.

N. Hanc Tincturam, si cum spir. vini circulaveris, Oleum supernasabit, quod per Alembicum Destillatum, ac iterum cum Spiritu. Vini circulatum fragrantissimum evadit.

Vires. Nec minores vires habet, nec minorem laudem meretur, quam Essentia Sulphuris præcedens.

4. Tinctura.

7. Vitrioli viridiusc. quant. satis magnam, educ phlegma ac \sim m per Cidres cum educto Liquore, ex Capite mortuo extrahe s. a. (etiam in loco frigido, sæpè tamen commovendo,) Tincturam viridissimam, quam cautè decantatam destilla ad mellis consistentiam atque aëri frig. ut in Crystall. concreseat, expone.

N. Si *neastrum* ad extractionem requisitum deficiat, Ratione id abstrahere ad extractionem continuandam.

7. Crystall. proximè præcedentium ss iij vel iv. &c. circula cum Spir. Vini opt. rectific. vase H. C. Deinde destilla per Alembicum ex Arena, Hinc cohoba. Insuper affundendo \sim m Vitrioli destillaque per Retortam gradatim Dies 4, ut extillet post \sim & Oleum rubicundum Spir. Vini abstrahere in Baln. Mariæ; \sim m Vitrioli, in Cinere, & restat Oleum seu Tinctura rubicundissima.

Vires. Admirandum est virium adversus omnes egitudines in crassiore materia sedem habentes. Quercetan. in Tetrad.

5. Tinctura Magisteriata seu Magisterium Vitrioli.

7. Tincturam præcedentem, conjunge cum proprio suo \sim u Vitrioli, (qui inde abstractus,) digere aliquandiu. sic dulcescet. Quercet.

Vires. Remedium est nunquam satis laudandum, idque præcipuè, si Aurum philosophice solutum adjectum fuerit: prodest enim adversus Epilepsias, astralesque omnes affectus, Apoplexiam, Paralyin, Vertiginem, Mantam, Ecstasin, Syncopen, Cachexiam, Hydropem, Catulium.

Dosis gutt. una ac altera. Quercet. in Tetrad.

6. Eadem Tinctura, Aliiter.

7. Sal. com. Vitrioli (ex Capite Mortuo illo reverbato extractum ac) opt. depuratum, q. v. affunde \sim m Vitrioli (in præparatione Tincturæ reservatum,) ad eminent. 2. digit. digere ac destilla, hinc novum \sim m affunde, digere, destilla, idque repetere donec pars volatilis superet fixam, secum evehat atque Sal. com. fixum volatilifer. Hoc Sal. com. Vitrioli sublim. imbebe ac incorpora cum Oleo seu Tinctura illa, digereque in Athanore per gradus ut uniantur, & per colores ad purpureum tandem deveniant. Est opus aliquot mensium.

Vires. Est Elixir seu Medicina universalis, summe penetrans ac fixa, ad curationem deploratissimorum morborum sufficiens.

Dosis g. i. ac altera. Quercetan. in Tetrad.

Mediante hoc Vitrioli lapide reducitur Aurum in suam primam substantiam, unde tandem exurgit Medicina universalissima. Vide ibidem in Tetrad.

7. Magisterium Vitrioli.

7. Vitrioli opt. q. v. & tunc more usitato, \sim cum Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

800 per O m simul rect. fiat. Cum phlegmate (vel ∇ & at.) Sal. com. ex Capite mortuo extrahitur, phlegma quando à Sal. com. separatur, cum aliquot cohobis & digestionibus.

Hinc.

7. Sal. com. p. ii. \sim vel 80 Vitrioli p. i. Ponantur in phiala in Baln. mariæ, ut aquositas exhalet, idque tantisper repetere, donec Sal. tantum Olei imbibit, quanti ponderis primo fuit. Hinc in phiala hermetice clausa 8. o digeratur, tandemque in Cinere collocetur 14. o ad coagulandum. Sennert. Instit.

8. Magisterium ex Tinctura & Spiritu Vitrioli.

7. O m in te calcinatum; extrahere tincturam affundendo \times optimum: \times tinctum decanta, & aque ad siccitatem, & manebit in fundo Pulvis rubicundus, quem pone in O m adhibito receptaculo grandi; dando Ignis per grad. decentes, egredietur \sim flavus, postea rubicundus; continuetur Ignis eodem gradu, donec appareant \sim albi, tunc cessandum. His spiritibus imbue Terr. in O resitantem, (potius Sal. Com. ex Terr.) digerendo, imbuendo, donec \sim & anima proprio corpori restituantur. Hæc tandem in vase H. clauso digere quadragint. o , donec figantur.

9. Tinctura Vitrioli Cyprii sive Magisterium Q is.

1. Digeratur vitro clauso per duos menses Δ gradatim aucto, donec varij colores appareant, postea flavedo supremaque rubedo, hac enim viâ viriditatem Leonis custodies & ad exteriora vertes. 2. Tincturam ab hoc Leone cum spir. vini extrahe. Divide eam in partes secundas. Una desiccetur & sanguis restans in formâ pulv. figatur per gradus in Terram rubram. 4. Partem alteram Tincturæ liquidæ, putrefac. per 3. hebdom. abstrahere per cohobationem, cum reliquo spir. vini tincto eundem processum servando. 5. Liquorem remanentem urge per O , donec Oleum benedictum exeat, quod aliquoties rectifica. 6. capè Terræ superioris fixatæ. p. ij. Ol. benedicti Vitrioli part. i. figilla vas. H. S. digere in cineribus, donec animam suam corpus receperit coagularitque, tunc novum Ol. suffunde, coagula ut prius per 10. o Tandem fige ad quartum usque gradum Vulcani, & per 3. o in fluore detine. Habebis Lapidem rubrum, fixum absque fumo, tingentemque summam medicinam.

Ex commun. S. Closs. Schroderus

7. Extractio, unde Tinctura seu Essentia simplices & Extracta. 1. Extractum Vitrioli Narcoticum anodyn. Extractum vitrioli narcoticum hæc ab Autore descriptum, suâ sanè non caret laude in vitioforum humorum orgasmo compescendo. In cujus præparatione hæc cautela opus est, ut primò sp. vini alcoholisatus sumatur; deinde in digestionem per aliquot menses ponatur; ac tandem è fecibus decantatus liquor ex MB. destilletur ad liquorem unctuosum flavum, Hoc nisi fiat, plus emeticæ, quam sedativæ & anodynæ virtutis obtinebit.

2. Essentia sulphuris vitrioli. Optima fit ex terrâ vitrioli dulci beneficio spiritus Salis compositi, quo abstracto iterum extrahitur postea cum sp. vini essentia. Hæc maximè commendatur in hæmorrhagiis, hæmopteæ, pulmonum rupturâ, diarrhœâ, dysenteria &c.

3. Alia tinctura, manna vitrioli dicta. Spiritus essentificatus seq. modo componitur: Recip. sp. vitrioli summe dephlegmati zvj , salis 8 ziv . sal 8 prius confusum

Ttt

indi-

inditur retortæ vitreæ, cui superaffundatur spiritus dictus & mixta per Aren. in receptaculum amplius per retortam destillantur ad siccitatem salis; Hic spiritus usui reponatur. Cum hoc extrahe ex vitriolo purificato essentiam, filtra, & cum sp. vini rectificatissimo circula, & pone in digestionem per aliquot menses, abstrahere postea per MB. sp. vini & liquorem destillatum iterum cum sp. vini circula, donec suavissimum & fragantissimum evadat medicamentum.

4. *Tinctura*.) Hæc & quæ sequuntur *Tinctura* & *Magisteria* radiosa admodum & frustranea sunt quoad præparationem, ac assignatæ illorum virtutes hyperbolice, ostentationem potius, quam realem præferentes effectum. Ideoque partim contenti sumus in præcedentibus adductis essentijs, & tincturis, partim *Dominum Lectorem* remittimus ad *Cl. Zovelferi mantiss. spagyric. part. 2. cap. 9 p. 363.* ubi quædam essentias Vitrioli describit, quæ harum locum supplere possunt. *Hofmannus.*

*De SALIBUS ARTIFICIALIBUS eorumque
variis Præparationibus ex SCHRODERO,
HOEMANNO & Aliis.*

Salia tum nativa in Officinis extant, tum artificialia: de nativis alibi, de artificialibus hic loci agere fas est.

Artificialia salia, vel sunt simplicia, vel composita, seu mixta.

Simplicia, (proprie sic dicta) totuplicia sunt quotuplices res. naturales, quippe res nulla est, quæ salis prorsus experta sit, imò constitutio rerum naturalium primitus ex sale dependet. *Schroderus.*

Res nulla est, qua salis prorsus experta sit, imò constitutio rerum naturalium primitus ex sale dependet. Verum multa concreta naturalia salis sunt expertia, quis ex lactuca, endiviâ, cucurbitâ, &c. producat? quis ex Auro, Argento, Talco, margaritis &c. eruat? Et omnium rerum productionem primitus ex sale esse; hoc tanquam falsum paradoxon supra refutatum fuit. *Hofmannus.*

Medium, quo salia eliciuntur, liquor quilibet aqueus est; in quo salia ut solvuntur, ita & eidem sese immiscunt. Quia tamen res naturales pleræque valide compactæ sunt, præmissumque requirunt apparatus, quo compedes, quibus sal impeditum est, aperiantur pro diversitate compactionis, diversi quoque apparatus inventi sunt.

Creberrima tamen præ reliquis est incineratio, qua partes mixtæ disgregantur, salque fixum in cinere remanente aptum redditur in aq. liquefcere, mutiamque constituere; maximè si maceratio, transcolatioque repetita interveniat.

Exempli gratia.

2. Cinerem (absinthij à carbonibus purificato, & eoque cum aq. in lixivium, vel transcola aquam fervidam aliquoties; sic imprægnabitur Sal. nomenque sortietur lixivij. Hoc purifica filtrando, inspissaque lentâ evaporatione, aut crystallisatione. *Schroderus.*

Creberrima præ reliquis est incineratio, quâ partes mixtæ disgregantur.) Verum Salia rebus naturalibus, ex quibus eliciuntur, insunt, an verò ex illis fiant, in controversiâ positum videmus: Beatus *SENNERTUS* priorem cum Che-

micis defendit sententiam, qui reverà Salem rebus inesse formaliter eumque arte chemicâ tantum separari statuunt. Verum suprâ satis jamdum demonstravimus, Salia alkalia neque ante corporum compositionem existere, nec ad missionem faciendam confluere, neque tandem naturalem corporum resolutionem unquam in Naturâ apparere, sed tantum per artem ignis ope educi & quidem effectivè inde procedere, adeò ut materialiter quidem & potentiâ passivâ Salia ista alkalia in concreto ante conflagrationem, non verò formaliter in formâ alkali præexistere. Unde subtilissimè & acutissimè *CL. HELMONT.* in *tr. Blas humanum*, alkali, inquit, non generatur in cinere ab igne efficienter, quanquam effectivè inde procedat; nam officium ignis est quidem accendere consumere & separare, non tamen quippiam producere. Cum non sit dives semine ipsè destructor seminum ignis. Dum ergò alkali fixum sit ex sale antea volatili, non est productio rei novæ, sed rei alteratio saltem. Alkali enim materialiter quidem erat in concreto ante cremationem, veruntamen dum ignis tollit mercurium & sulfur, sal tanquam principium magis subsistens in liquatione cremationis arripit sibi viciniam sulfuris, sive pinguedinis partem, eamque, dum ab ignis torrens non sat valet tueri, partim sub latvâ Gas simul evolat, atque empyreumatis odorem acquirit, partimque apprehenso sulfuri colliquando incorporatur, ut verus carbo fiat. Quapropter sulfur conjugio salis jam fixus non celeriter à carbone in fuliginem tendit, sed sensim ac non nisi apertò vase, adeoque cum sulfure priore (nam hic sulfur rei plerumque acutum salis volatilis saporem retinet) ac tandem cum sulfure carbonitio fixum sui salis volatilis pondus evolat. Et §. 40. Didici nempe, quod omne corpus cremabile in se habeat sal volatile, quod arreptione sui sulfuris fixatur in alkali. Et §. 41. Huc quadrat, quod ligna cariola atque putrida vix salem in suis cineribus relinquunt. Quippe sal volatile abscessit cum sulfure per fermentum putredinis. Hæc *HELMONTIUS*. Idem reperit. *CL. TACKENIUS* ex dicto *Helmontio* in suo *Hyp. chemic. Cap. XXI.* Nullum vegetabile habere sal fixum, cuiuscunque sit generis, nisi comburatur actuali igne, ita ut acidum ustulando in alkali, vicissim alkali in acidum, agere & apprehendere queat &c. Verum, quamvis hoc *κενώμενον*, Nullum scilicet vegetabile actu in se habere alkali minus vixit repugnet. Attamen in hoc modo quo *CL. HELMONTIUS* cum *TACKENIO* explicat per Vulcani artem in hanc mundanam solum producat, offerunt se adversa dubitationum procellæ; Enimverò nullum sal volatile, sive fixum alkali fuerit actu & formaliter vegetabilibus inest concretis, sed in nonnullis, non in omnibus, (ut *Autor* vult) nisi potentiâ & materialiter alijs principijs Sulphureis & spiritibus congenitis adhuc immersum; Jam si ignis violentiam suam in ejusmodi capax subjectum eraceat, illico ut sibi symbolicas aggreditur partes oleosas sulphureas, in quibus materialiter & potentiâ latet sal volatile falsum, & occultum, tum hoc sibi fugâ volens consulere, partim in fuliginem abit, partim à spiritu acido, non sine partium terrestrium adhæsu grato connubio absorbitur, & alkali naturam adsumit. Adferri hujus fundamentum ex ipsâ naturâ petitur & mechanice chemicæ. Ligna putrida, summo licet studio in cineres redegeris, quocunque ignis gradu sal exierit

non elicies, ratio, quia ligna putrida sine violentâ combustionem per corruptionem internam à sale in aëre existerentem sunt resoluta, antequam violenta resolutio per ignem fuit instituta per principiorum separationem: Sicque antequam sal, qui potentiâ inest vegetabilibus, in actum fuerit redactus, aliis principiis Sulphureis & spirituosus nativis adhuc maritatus unâ etiam cum iis evanescit, adeoque etiam unâ cum aliis dictis principiis naturali lege & necessitate volatilifatus in Gas transit. In vegetabilibus spiritum acidum manifestat illorum per retortam destillatio, nunquam non oleis Sale volatili turgidis ac acido volatili stipatum empyreumaticum, utrex Tartari, ligni guajaci, & aliorum destillatione manifestum est. Fuliginis destillatio quantum salis volatilis & olei foetidi crassi cum summâ phlegmatis acidi copiâ conjuncti suppedit, encherisi chymicâ habeo competum. Cum autem Animalia calcinata nullum alkalifati salis vestigium in se habeant, dum animalium Salia omnia volatilia urinosa sunt, nullo acido manifesto prædita, hinc fit, ut in animalibus salium illa colliquatio fieri nequeat. Hofmannus.

N. 1. *Salia, hæc ratione calcinata, quia lixivium spiritum, nec satis albicant, calcinantur, id est, combustionem, funtuntur communiter ad ignem, ut albedinem acquirant. Verum potior videtur ratio albedinis per iteratas solutiones, filtrationes ac inspersiones; hæc tamen admonitio, ut majori desit hæc salia esse exhibenda: Saperem luteolum quod attinet, optimè is aboletur, si cum Sulph. ana circiter mixti, accenso Sulph. calcinantur, atque hinc elixivationi submittantur. Schroderus.*

Hoc purifica filtrando, inspissaque lentâ evaporatione, aut crystallisatione.) Salia in crystallos redacta figuras suæ naturæ proprias ostendunt; Sic Nitrum in pyramidas, Sal marinus in cubos, Q in figuras octohedrias, * in hexagona, salinaque alia in alias figuras suâ sponte constanti ritu efformantur. Hofmannus.

N. 2. *Salia hæc fundunt spiritum penetrantissimum si ad modum, quo Sal commune, destillantur. Schroderus.*

Sic cineres cum Sulphuris ana circiter mixti.) Verum hæc ratione vis alkalium destruitur diaphoretica & magis diuretica emergit, si tamen hanc expectas, suavis sum, non ut anaricam Sulphuris portionem, sed aliqualem saltem cineribus admisceas, sic acidum Sulphuris figitur in cineribus & transit in sal diureticæ virtutis. Hofmannus.

Salia volatilia, essentialia nonnullis dicta, nihil aliud esse videntur, quam portio salis aliquantulum elaborata humori nutritivo immixta, necdum substantiæ cretæ insinuata. Schroderus.

Salia hæc fundunt spiritum penetrantissimum.) Verum ultra rer cujusdam inhærentias naturales quidquam ex aliquâ re extrahere naturalibus repugnat principiis. Ex salibus alkalibus ut alkalibus in æternum non Spiritus acidi penetrantissimi destillatione elici possunt.

N. Nonnulli Chemicorum Alkalibus ex plantis extrahunt virtutes etiam specificas istarum plantarum, & rationes diversas adscribere solent; Sic sal ab operibus ventriculi cachexijs plurimum commendatur, Euphrasie pro visus imbecillitate, guajaci in motibus; sed satis inconsulto & præter experientiam vid. Nobiliss. Robert. à Boyle in paradox. chemic. p. 154. Hofmannus.

Modus fiendi ex plantis.

4. Plantam convenientem coque cum magna quantitate aqua, hinc exprime succum, eumque optimè purificatum inspissa aliquantulum, reponere ad crystallandum, f. a.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

N. Si succum purificatum recenti herba affuderis, interveniente digestionem, coctione ac expressione, ut prius, majorem salis copiam nancisceris.

Exhibent iidem ligna, ossa, cornua, sanguis, &c. salia volatilia, sed non nisi interveniente destillatione, qua parietibus vasorum destillatoriorum ea adhaerescunt. Vide in oleis destillatis. Schroderus.

Salia volatilia (essentialia Nonnullis dicta) nihil aliud esse videntur. Hic Dnus AUTOR salia essentialia vulgò dicta, quæ ex succis vegetabilium parari consueverunt, salia vocat volatilia, quæ tamen non sunt salia volatilia, sed Tartarus, quemadmodum igitur tartarum nomine salis volatilis non possum appellare, ita nec hæc salia essentialia nomen salis volatilis merentur, licet multum salis alkali prius incinerata suppeditent; Et ut Tartarus est corpus vini, ita ista volatilia ejusmodi etiam sunt substantiæ, quæ uti ille etiam ex diversis ac heterogeneis rebus, ut oleo foetido, spiritu aquoso, sale fixo ac volatili & terrâ mortuâ constant; ita & hæc ex iisdem constant concretis. Elegantiorum modum salia volatilia ex plantis si non omnibus, pluribus tamen sine ullo solis vel elementari, mediato vel immediato igne sine additamento etiam, neque destructâ plantæ texturâ, reverâ eliciendi promittit. D. D. Georgius Wolfgang Wedelius P. P. Jenensis. Ipsum hoc experimentum, ne testibus careret, & demonstravit & sermone exposuit, scripto autem cum quopiam communicare hæcenus dubitavit, non quod tam tenax esset arcani, sed quod experimentis pluribus opus esse videret. Frustra proinde etiam est cochlearia curiosa cum suo sale volatili Sal Essentiale cochleariæ pro sale volatili habens, si enim hoc Sal Essentiale foret volatile coctione etiam factâ vel levissimâ & minus diutinâ abiret in auras, quæ causa etiam quod ipsa tum coctionem Cap. VI. & VIII. tum etiam pro Spiritu fermentationem prohibeat. Hofmannus.

Salia improprie sic dicta, parantur ex lapidibus, metallis, cornibus, ossibus, crustaceis, quæ beneficio acidi cujusdam spiritus solvuntur, (communiter recipitur Acer. destil. vide Magisterium,) filtrantur, & evaporatione in pulverem rediguntur, quem sal vocant.

Hunc salem abluunt aliquoties, ne acidum sapiat, & servant pro usu, vel edulcoratum in liquorem per deliquium in cella resolvunt. Vide liquor.

Salia simplicia usitiora.

Sal Absynthii fixum, Essentiale, Acetosella, Agrimonie, Aluminis, Saccharum, O. Angelica, Artemisia, Borraginis, Cancrorum, Cardui benedicti fixum, Essentiale, Centauri minoris, Cerefolij, Chamemeli, Cichorei, Cinamomi, C. C. volatile, Cranij humani volatile, Euphrasia, Fabarum è stramine & corticibus, Fœniculi, Fragaria, Fraxini è ligno, Fumaria, Genista, Guajaci volatile, Hedera terrestris, Hyperici, Hyssopi, Juniperi è bacis, ex ligno, Lavendula, Majorana, Matricaria, Melissa, Mentha, Nitri crystallini, fixi. Lapis prunella, Ononidis, Persicaria, Pimpinella, Plantaginis, Ruta, Salvia, Sanguinis humani, Scordij, Succini volatile, Tamarisci, Tartari, Virioli vomitivum, Urina, Urtica, Zedoaria.

Salia improprie sic dicta, rectius Calces diceres, usitiora sunt.

Sal Jovis, Saturni, Corallorum, Perlarum, &c.

Salia composita.

1. Sal. Alkali.

℥. Calcis vivæ ℥ i. Ciner. Isatidis, ℔ β. Tart. Sal. nit. ana unc. i.

Coque in ∇. ut fiat lixivium, filtra ac inspissa ad ficitatem.

N. 1. Theophrastus. ℞. Cinerum clavell. Calcis vivæ & cinerum fabarum, extrahit lixivium, coagulatque.

N. 2. Venetiani. ℞. Calcis vivæ ℥ i. cineris fagi, vel quercus. ℥ ii. Fellis vitri. Qui calcinati. Tart. an. ℥ ii. Fac lixivium, atque exinde Sal.

N. 3. Alkali equivocationem vide libr. i. Schroderus.

Exhibent itidem ligna, ossa, cornua, sanguis &c.) Hæc CL. TACKENIUS in Hipp. chemie. Cap. XI. etiam alkalia vocat; sed minus rectè, dum insigniter differunt à Salibus alkalibus non solum volatilitate, sed & præparatione, virtutibus ac ratione subjectorum ex quibus eliciuntur. vid. apolog. contra Tacken. part. 3. Cap. XI. p. 8. Sed hisce iterum sese opponit. Dnus D. Luc. Schræckius l. c. in Mantiss. Hermetico. p. 524. seq. Et putat lusum saltem in terminis existere; Alkali quidem appellationem, si primam ejus originem consideremus, propriè non nisi salis ex herbâ kali incineratâ elixiviato competere, quæ deinde salibus reliquis lixiviosis, ex cineribus vegetabilium, ob horum cum illo similitudinem quoque tribuitur. Attamen, excipit Schræckius, cum alkaliium horum proprium sit, ut salibus acidis contrariantur &c. Salia autem illa volatilia urinosa idem facere deprehendantur &c. non incontinne nomen alkali ipsi imponitur. Verùm remittimus hoc Dni Schræckij justæ indignationi, qua ulciscitur injuriam Augustanis à Zuvelfero illatam, & dicimus hac ratione etiam Corallia, ocul. &c. C. C. ustum & omnia quæ acidis contrariantur alkalia esse, id quod inconueniens. Deinde instat, quod autem Zuvelferus salibus animalium volatilibus ideo minimè competere alkali nomen putat, quia licet acida, tanquam contraria immutent, eadem tamen non totaliter destruant; cum econtrâ salia lixivialia sive alkalia fixa acida totaliter destruant, inque aliud ens ambo degenerent, à quo arte revocabilia nunquam longe fallitur, inquit: Posito enim salia volatilia ab acidis quodammodo tantum immutari, fixa autem alkalia ab hisdem totaliter destrui, hoc sanè nondum evincit ista alkalia dici non posse, quia & dicta immutatio & destructio contrarietatem involvunt, & in utrâque salia, in aliud ens degenerant. Verùm hæc ratio secunda Zuvelferi omnino evincit salia volatilia alkalia dici non posse, eò quod alkalia spiritus acidos destruant & in aliud esse tertium convertant, quod quasi ipsorum proprium est; volatilia autem licet ab acidis quodammodo immutata, tamen iterum ab his separari possunt. Deinde immutatio & destructio non contraria, sed subordinata sunt. Tertio quod de spiritu vitrioli affert, quem iterum ex Tartaro Vitriolato revocabilem esse probat p. 521. ambigua mechanicæ est, ego sæpius frustraneo effectu tentavi, tantis autoritatibus non refragans facillè me submittam, donec contrarium crebrioribus laboribus evincam. Interim inconcussum manet optimo jure alkalia vocari posse, quæ ex cineribus puris extracta lixiviosa sunt & acida destruant; salia autem volatilia salia urinosa minus rectè alkalia dici, interim, quia etiam acidis resistunt, alkalica vel alcalifata dici posse. Hæc salia dicta volatilia non solum regnum animale, sed & vegetabile supeditat, sic v.g. sal datur volatile ex ipso tartaro & Cap. mortfecum vini, à quibus Spir. vini abstractus, dantur salia volatilia ex oleis vegetabilium tra, &c.

N. Utrum sal aliquod in liquore aliquo aut alio corpore in quo solutus est, prædominans, ad salium acidorum classem, an alkaliium pertineat, probatur, si corpus ejusmodi mutet syrupum violarum in rubrum vel subrubro purpureum colorem, plerumque arguit corpus sale acido abundare: Et si syrupus fiat viridis, arguit prædominans sal esse ex numero salium alkaliium, repugnantis Naturæ classis acidorum. Sic v.g. spiritus salis, vel Vitrioli, vel Aquæ fortis, vel Acer. dist. vel succus citri &c. mutant syrupum violarum in rubrum colorem; Et salia non solum volatilia CC. Urin. &c. sed etiam alkalia Tartari &c. statim syrupum violarum in viridem mutant. Et sic tum mutationes, quæ Natura & tempus producant in magis salinis partibus quorundam corporum, possunt detegere, tum etiam, quomodo ejusmodi chimicè præparata corpora, quæ vel non pertinent ad regnum animale vel alkalia, possunt ad eorum naturam explorandam, examini felicitè subijci. Verùm, ex allatis in genere tantum scire possumus, hæc aut illa salia ad Acidorum classem non pertinere; attamen determinare hinc non possumus, pertineantne ad tribum salium urinosorum, qualia omnia animalium aut aliarum substantiarum volatilia, vel ad numerum alkaliium; æquè tamen unum ac alterum horum salium volatilium colorem cœruleum tineturæ ligni nephritici restituet, atque colorem syrupi violarum in viridem mutabit. Quare ut horum discrimen cognoscas; Si alkalia fuerint sublimarum in aquâ solum instillata reddent coloris ex aurantio fusci, cum è contra, si naturæ fuerint urinosæ, albi & lævi. Hofmannus.

Usus hujus salis solus Chymicum est, inservitque separationi Ois à &c. si influxu injicitur. 2. Facit ad siccationem & facilitandum.

2. Sal Alembrot.

℥. Sal. com. præparat. 8. salis alkali, an. ℥i. F. lixivium cum succi menthæ ac caryophyllat. ana ℥i. aquæ fontan. ℥ ii. Filtra & coagula.

N. 1. Dicitur & sal Ellebrot, sal Taberi, sal Alembrot.

N. 2. Est & sal Alembrot, nativum, quod in Cypro, ex certa terra, in monte Olympo extrahitur, formamque & colorem sanguinis concreti habet, sed nostratibus incognitum. Schroderus.

Alkali equivocationem &c.) Vocabulum alkali, ut supra ostendimus ex rei naturâ & propriè solis cineribus ex herbâ kali (cujus magna pars Venetiis prostat, ex Ægypto translata ad saponem & vitra conficienda) competit, postea verò impropriè & analogicè lixivialia salia extensum. Præsupponit autem omne alkali combustionem aut incinerationem rei, ex qua extrahitur, & multum differt à salibus acidis acido-salis & volatilibus. Hofmannus.

3. Sal Anatron.

℥. Calcis viv. ℥ iv. Alumina. ℥ ii. Vitriol. ℥ ii. Salis commun. ℥ iii.

F. Lixivium cum vino albo, digere per dies aliquot (9.)

Postea.

℞. Stiriar. salis petræ. ℔ x. affundè lixivium, ut operiatur sal in aheno. Misce benè ac solve, atque ad medias, cola ac repone ad concrendum.

Vires. Metallici hoc sale utuntur ad purgationem sanguinis & Metallorum.

Sumitur & Anatron. 1. pro felle vitri, id est, summa materia, ex qua vitrum fit, cinerum arena, &c. exhibent in hydropse ascite ana 3℔ ad ℥ii. ut & in calculo. 2. pro terra sarracenicâ, cujus sunt species, nigra, rubra, & cœrulea. 3. pro excrescentia alba ac lapidea, quæ in petris crescit, in modum usneæ albe, à quibusdam sal nitrum vocata. Vide Untzer. de Sale.



Mich. Phil. del. et fecit



4. Borrax.

℞. Sal. ammoniac. Nitri tartari calcinat. G. arabic. sal. commun. ana unc. j. mastich. alumin. roch. ana unc. β.

Pulverisatis affunde Urinam, filtra ac coque, donec materia in salem concresecat.

N. Alii conficiunt ex sal. nit. & urina puerorum invicem commistis & coagulatis. Alij Borracem nostratam ex peculiari lapide (Bortacis nomine,) eoque calcinato extrahi volunt, monente Tholdio in Halographia.

Vires. In medico usu facit ad menstrua, ac partum provocandum, foetum mortuum pellendum, veneremque stimulam. Schroderus.

Sal. Alembro.) Hujus crebrior etiam usus est in metallorum solutionibus. Clysteribus tamen etiam ad dura emollienda scybalis accommodari potest.

Borax.) Nullius usus est Domini Autoris compositio, sed vera Borrax, qualem habemus, ex quadam minerâ conficitur, cujus præparandi modus Nobis adhuc est incognitus. Nos Venetiis solum, sed & Hamburgi præparata jam venalis prostat, indeque ad Nos transfertur. Ab igne & spiritibus acidis etiam salibus alkalibus indomitus flammâ Ignis in adamantinam degenerat duritiem, ut limæ resistens eam fragilem reddat; Aurifabri ad Auri & Argenti glutinum adhibent. In Auro agglutinando viridem instar saphiri induit colorem. In fino argento per se adhibetur, in mixto cum cupro, additur ei fel vitri & albi manet coloris.

In usu Medico partum promover, menses suppressionem restituit. Dosis à ββ. ad ββ. in aq. cinamomi vel vino. Hofmannus.

Sal cachecticum chalybeatum ex D.

CHARRAZ.

℞. Vitrioli martis ℥j. sal. prunella ℥ii. sal. ex aq. fortis capite mortuo extracti ℥iii. simul pulverentur, deinde cucurbitula vitrea excepta, igni arena gradatim aucto committantur ad materiarum rubedinem, donec instar aquæ fluant, & tandem in durum & rubrum lapidem convertantur; qui ad usus servetur. Commendatur hoc sal in cachectis & morbis scorbuticis, pro depurando sanguine, appetitus excitando, reserandis urina viis, abigendis fluxionibus, quiete concilianda, expellendis humoribus peccantibus per sedem, urinas, sudores, aut insensibilem transpirationem, aliquando, sed admodum infrequenter, per vomitum. Pulveratur & datur in liquore appropriato, à gr. vii. vii. ad gr. xii. xv. aut xx.

Sal Diureticum ex eodem.

℞. Urinam sani hominis, in qua dilue Vitrioli Hungarici pulverati quantum dissolvere poterit; dissolutio fiat in vase amplo, ut ebullitioni locus sit sufficiens; qua finita, liquor cucurbita vitrea, suo capitello munita, excipiat, & igne arena primum lento, deinde gradatim aucto fiat ex a. phlegmatis & spiritus distillatis, salisque volatilis sub finem sublimatio. Datur in vino albo, aut aquis vel decoctionibus diureticis à ℥j. ad ℥j. Phlegma in hac præparatione extractum podagra impositum dolores sedat; ut & etiam oculorum inflammationem resinguit.

Sal Navigantium ex D.D. DONZELLO.

℞. Sal. prunella, sal. comm. fusi, sal. gemma ana ℥β. galange, macis, cubebæ. ana ℥j. M. F. Pulvis. Dos. à gr. iv. ad gr. viii. manè jejuno stomacho. Ventriculorum corroborat digestionem faciliat putredinem arceat & efficit ut navigantes minimè vomant.

Mangeti B. bl. Pharm. Tom. II.

Salia varia ex Chymia D. LE MORT.

Oleum & Sal volatile Cornu Cervi.

℞. Cornu Cervi in exigua frustula redacti median- te terra q. v.

Imponatur retortæ terrea, & in igne nudo sensim propellantur partes fluidæ, sic prodit aqua cum levissimo Oleo; secundo Spiritus Salinus cum Sale volatili, undique recipientis lateribus adhærentes; ultimò Oleum rubrum crassum. Omnibus refrigeratis seorsim excipiantur sal volatile, & Oleum. Sal volatile Spiritui permixtum lenissimo gradu ignis ab ipso sublimetur; sublimatum Sal denuo cum propria calce depuretur per iteratam sublimationem. Oleum super propriam calcem vel super sal aliquod alcali rectificetur. Spiritus per se in arena iterato propellitur, ut limpidus evadat,

NOTÆ.

1. Hæc mixtura Olei, spiritus & salis volatilis si per aliquot mentes in loco frigido reponatur, crystallas præbet diaphanas. An hoc autem acido debeat in Oleo & spiritu residenti, uti aliquibus videtur, dubium est præcipue ob tres rationes. Primo, quoniam lentissime illa concresecientia procedit, quæ in muriaticis salibus, vel à quocunque acido alcali affuso & mixto citissime procedit, secundo, quoniam ne minima unquam effervescientia nota cernitur, quæ & vitri ardentissime clausi ruinam minaretur per suam ventiformem expansionem. Tertio, quoniam aque fugax & alcalinus volatilis permanet, cum omni acido effervescens. Nec experimenta de coralliorum solutione, & de metallorum liquatione hic aliquid confirmant de Oleorum acido interno: nam Corallia non solvuntur, sed colorem superficiale mutant integris permanentibus coralliorum ramulis, nec metallâ calcinantur in Oleis præcipue destillatis, sed funduntur tantum ab intensiori igne Oleis communicato; utrumque autem contrarium esse deberet, si acidum ibidem præpolleret. Corrodunt enim acida, & fusiones metallorum impediunt, ut & extractions tales rubras putatitias coralliorum. Credibile igitur est, illa salia, crystallulos oblongas & acutas ramos & cornua in sua prima adhærentia repræsentantes, in spiritui suo diluta sensim ac sensim juxta & super se invicem disponi, ubi per longam illam moram à ferocia sui motus remiserint, &c.

2. Oleum si subtilius expetatur, cum spiritu vini rectificetur subtiliori.

3. Sal hoc est fugacissimum, ideoque præstat illud vel in proprio spiritu, vel in spiritu vini rectificato, asservale.

4. Si plane candidum expetatur Sal, & perma- nens in albedine, ter vel quater ad minimum cum recenti calce propria est sublimandum, ut Oleo omni superfluo spoliatur, quoniam facile flavedinem ab illius societate contrahit.

Vires. Sudoriferum est & alexipharmacum, urinas pellit, & in omnibus morbis per sudorem curabilibus convenit. Dosis Olei ad guttas viii. salis volatilis à gran. iii. ad scrupul. i. spiritus à scrupul. j. ad drach. i.

Eodem modo destillantur ungula equorum, alcis, & similia.

De Urina analysi hic acturus, non possum non aliqua refutare, quæ à Medicis fastuosis, majoris scilicet autoritatis Viris, ut illis placet, Celeberrimis (forsan solo nitore muliebri, & arrogante supercilio mirum in modum elato) in Illius signa Tyronibus Medicinæ obtrudunt, &

Ttt 3 incul

inculcantur, ut illos nempe deterreant ab ejus inspectione. Si Urina signa, nempe secundum illorum sententiam, sunt incerta, agedum tradantur aliqua in Medicina per externum tactum & visum infallibilia: Pulsus enim & lingua seorsim & simul considerata, nunquam fere Medico satisfaciunt, nisi & mendicium se præstiterit, ut historiam & symptomata morbi ab astantibus obtineat, posteaque, incertus adhuc quid agat, præscriptionem medicamenti consuât, è cuius bono vel infido successu postmodum judicet sapientior factus Medicus, vel, ne famæ suæ defuit, indifferentia propinet, quæ simul dolorem sedant, ut aquas simplices, antimonium diaphoreticum, laudanum opiatum, & syrupos, ut, etiam palato consulat: egregiæ enim hæc mixtura politice doctum, imo divinum inficiæ plebi reddunt Medicum, præsertim muliebri, blandiloquo accedente verborum lenocinio. Vah, quantum est hoc modo sapere! Pulsus & lingua signis in plurima morborum caterva fallacibus, quid restat vere docto, omniaque sedulo perscrutanti Medico ulterius agendum? profecto, si Doctissimi Antiqui & Neoterici Medici illustres signa ex pituita, menstruo sanguine &c. petenda dicant & proponant, imo si Serenissimum illum Legatum Medicum non puduerit confiteri pro tota facultate Medica, Stercus & Urina nobis sunt signa, nulla mihi ratio amplius restare videtur, cur tantum in illius inspectionis urina odium vehantur. Incerta ejus, confiteor, sæpius sunt signa, sed idem de aliis infinitis historiis & experimentis, dicere & demonstrare possum. Mutatur continuo; sic & pulsus & lingua in ægrotantibus, sed profecto alia est urina cruoris, alia seri. Agyræ & Empyrici, omnesque doctrinæ Medicæ experies illam tractant, ergo à Medicis supra vulgus constitutis rejicienda: sed Vetula & Empyrici pulsam & linguam etiam observant, ergo & illa signa è nobilissima facultate Medica eliminanda; Utinam & per eadem argumenta magis abstemii plerique evaderent, & à calumniis post tergum desisterent, quoniam talium abusus est maximus apud vilissimæ conditionis homines. Urina autem color & consistentia diversa arguunt motum & præcipitationem humorum & sanguinis variam, quorum colamen existit, verum exacta requiritur Artis Tinctoria, & Chymia cognitio, antequam rationaliter, & non empiricè de hisce judicium ferre possit Medicus acutus, nec opus illi Agyratarum more inquirere antea de statu ægri, è qua relatione postea, tanquam ex tripode, sententiam suam de Urina sit laturus. Signa autem inter se collata melius & firmitus vaticinium, Medico exhibent, ut non temere aliquid tentet, vel effutiat, quamvis, prout diximus, plurimæ circumstantiæ & observationes non rite perspectæ nos decipere possint. Concludimus igitur, Urina inspectionem esse maxime necessarium signum, imò, si unum ex lingua & pulsu signum peti possit, audacter & millies expertus assero, duo ad minimum signa ex Urina, cum judicio & arte examinata, posse obtineri: Non mirum igitur est, de Urinis integros tractatus etiam vetustissimos conscriptos extare; ipsi etiam contentores Urina ab ejus inspectione non desistunt, quod in ipsorum dedecus redundare debet, quoniam tale quid inutiliter inspiciunt, forsitan ut aliis & sibi imponant, cujus notio ad illos nunquam pervenit. Labor assiduus, experimenta indefessa, & studia non intermissa requiruntur, ut quis recte Medicinam excolat, quæ non in sola partium humani corporis mortua structura investiganda consistit, sed multo magis in fluctuantium procellarum vivido statu rite perscrutando: alias enim eodem modo ageremus ac illi, qui, ut motus & contentorum in flumine notitiam obtinerent, ripas, aggeres & fundum tantummodò diffoderent & inspicerent, exic-

catov vel depleto in æstate fluvio; Uade non immerito à Celebris Medico frigida dicitur sapientia, quæ reversus suos habet usus in Chirurgia & Medicina, sed non tam divinos, ut quibusdam dissectoribus placet. Sed ad viam propero, Urinae analysin Chymicam exhibiturus non ad ejus inspectionem, quæ hujus loci non est, facilitandam, sed ad ejus Anatomiam mortuam proponendam, id est talem, de qua asserere non audeam, nullas, nequam alias extitisse, nec posse existere particulas, nisi eas, quas ego per Chymiam diverso modo extrahere propono: quoniam situm & figuram innumeris modis variant illa fluida corpora in diversa mixtione & motu variorum partium, in eo tamen coincidunt, ut oleum, sal volatile & phlegma, ut sequentes operationes edocent, fundant.

Spiritus Urinae, & ejus Sal volatile.

4. Urinae Juvenis q.v. Evaporetur ad mellis consistentiam, dein cucurbitæ immitte, & reliquum quod superest aquæ, evoca, sic sublequitur Sal volatile, una cum pauca quantitate olei, partim in capitulo harenis, partim in phlegma decidens, Sal illud depuretur à suo oleo, mediante iterata sublimatione cum cineribus ossium, & ad usum reservetur; si verò Spiritum salinum volatilem exoptas, sequenti modo procede:

4. Urinae Hominis Sani quantitatem sat magnam, reponatur in maceratione per quinque vel sex septimanas, donec integro motu mediante subsidentia & separatio particularum crassiorum promoveatur: particulae volatiles ubi sui juris factæ fuerint, destillentur per vesicam, omnem exceptum liquorem spirituosum super salia alcalia rectifica ad debitam sublimationem & dephlegmationem absolvendam.

NOTÆ.

1. Ridicula est observatio plurimorum, Urinam debere esse Vini potaris; quasi Aquapotoribus spiritus & salia volatilissima magis deficerent, quam Bacchi affectis, imò plurimam experientiam satis constat, majorem salis volatilis quantitatem erui ex Urina illorum, qui Vinum ferè nunquam biberunt, quam è diversorioris & è Bacchi sentine prolatis Urinis: eisdem quoque firmiori, magis robusto & longevo corpore esse quotidie observatur, cum alii liberius Vinum haurientes spiritus & salia potius fugent: ultimò constat, è plurimorum animalium Urinis plus Salis volatilis obtineri, quam ex Urina hominis; si autem tantus sit animus spirituosum aliquod Sal volatile obtinere, illud facilius post confectum Sal volatile cum spiritus vini debita quantitate oleo, quamvis non omnem Vini haustum pro Urina esse denegandum statuamus, sed potius parum admittendum, ut alimentis assumptis fermentatio eò melius in ventriculis debilibus succedat; Nam, ut hoc obiter notemus, Sal volatile non dependet à liquoribus negativis potentibus, qui fermentationi & dilutioni potius inserviunt corporum duriorum, sed ab alimentis ingrossis fluidis, salia illa prementibus, & in minutias reducendis. Liqueores enim spirituosos potius transpirationem promoveant particularum subtilium, quam quod illas in Urina deponerent; serum enim diluendis & recipiendis salibus dicatum est, non spiritus. Urinas Vinum non bibentium esse aciores à sale fixo, contrariatur omni experientiæ: acidum enim figens inest Vino, quod non tantum inest Aqua; etsi vero Cerevisia aciditas quædam insit, attamen illa fugax est, nec persistit calore, ut patet in acetis exinde paratis, quod plane contrarium est in aceto vini. Aqua, dissolutionem partium quoad totam substantiam maxime promovens, nullibi salia sistit, sed potius decarcerata propellit, unde nec fixa nec acida illa reddere potest; ideoque Vinum modice sumtum pro concoctione & aliquali acedine, ratione tartari, sed non pro copia majoris salis ob-

tinenda admittimus, id est, non rejicimus illam *Urinam*, si alia obtineri n. queat. Quod de *offa Helmon-*
niana traditur ē spiritu salis ammoniaci & vini utrius-
que subtilissimis recenter paratis, illud ad hanc de-
monstrationem nullus est valoris, nisi prius monstra-
verint, tales etiam dari *dephlegmatis spiritus*, mutuum
in amplexum in Corpore nostro ruentes.

2. Si spiritum in majori copia obtinere sit aminus,
adde *Urinam fermentatam* & jam destillanda manipulos
aliquot calcis vel salis alicujus alcali, sic tantò majori
copia exsurgit, & subtilior evadit, ut & fugacior.

3. Fœtidus hujus salis odor mediante spiritu salis
communis facillè tollitur; quoniam autem in minimis
particulis ramosis terrestribus essentia Salis volatilis
confistit, quæ hoc modo separatur Sal illud volatile ple-
risque essentialibus & ab aliis salibus differentibus viri-
bus privatum derelinquunt, ideo hanc odoris separatio-
nem non facillè admittimus, nisi ubi in sal ammoniacum
illud reducendum venit.

Vires. *Urinam* pellit, passionibus hysterice subvenit,
apoplexia, paralyti, epilepsia, & similibus succurrit; men-
struum insuper existit sat famosum in Chymia ad extra-
ctiones corporum, ut & metallorum & mineralium. Do-
sis à grano uno ad scrup. unum. Dosis Spiritus rectificati
à gutta una ad guttas XII.

Spiritus Urine subtilior.

4. Urinæ Sanorum ℥xxx. sp. Vini opt. ℥ij. M.
Fermententur simul per sex septimanas, dein adde
Sal Tart. ℥j. Destillentur ut ante, & rectificetur ser-
vandus ad usum Spiritus.

NOTÆ.

1. Spiritus vini oleosus magna sui parte *urinoso salis*
volatili mediante fermentatione permiscetur, quæ
duo postea unum Spiritum constituunt in destilla-
tione.

2. Sal Tartari acidum in Urina latens, quod tamen
haud facile fecernitur, infringit, & salia volatiliora libe-
rat, unde major illorum copia exsurgit.

Vires. Hic posterior Spiritus eisdem, sed tenuiores &
subtiliores vires obtinet, quam præcedens, utpote ma-
gis subtilis.

Eodem modo omnium animalium Urinæ destillari
queunt.

Spiritus Salis Ammoniaci.

4. Salis Ammoniaci ℔. j. Salis Tartari ℔. j. fs.
Aque communis pintam j. Infundantur omnia re-
tortæ, & destillentur per arenam, sic procedit Sal vo-
latile, quod à subsequente phlegmate diluitur, hic
Spiritus in vitro arctissimè clauso reservetur.

NOTÆ.

1. Rectificatione vix opus habet, nisi quis super no-
vum sal fixum illud Sal volatile subtilius reddere fata-
gat; per se enim non nisi in Sal volatile siccum abit.

2. Cum calce viva in subtilissimum abit liquorem,
compositum ē sale acido tenui calcis igneo, & alcali
proprio, unde acrior & fluidior existit, nunquam autem
in Sal volatile; quoniam verò est fugacissimus, optimè
reservari debet.

3. Cum aliis etiam salibus fixis idem Spiritus fieri
potest, & cum lapide calaminari, hematite, & simili-
bus acido-muriatici & salis volatilioris urina, quæ in Spi-
ritum reducit salinum volatilem mediante sale fixo,

vel corpore aliquo terrestri minerali muriatici illius
salis loculos replente, cæterasque inibi contentas
particulas expellente, unde nullis vinculis am-
plius impeditæ, accedente motu libere quaquaver-
sum fugam tentant, exinde spiritus; fuliginem au-
tem debere accedere, experimentis hucusque à me
factis contrarium hanc in talem abire Spiritum fu-
gacem, sed etiam ipsa salia muriatica illum posse
præbere, quamvis non in tanta copia, neque tam
subtilem, si rite tractentur, Ob has rationes sit ite-
rata Salis volatilioris destillatio cum fecibus hisce post
destillationem residuis, additione salis fixi recen-
tis.

Vires. Spiritus est valde penetrans, acidum infrin-
gens, sudores movens, febribus resistens, & omnibus præ-
ternaturalibus effervescentiis, ex austero & acido oriun-
dis, ut in epilepsia, passionibus hysterice, paralyti, apo-
plexia & similibus. Dosis à gutta j. ad gut. viij.

Sal volatile Oleosum.

2. Olei Menthæ. Corricum Arantiorum ana gut-
tas xx. Caryophyllorum guttas xvi. Macis stillati-
tij guttas xij. Rosimarini guttas viij. Spiritus Vi-
ni unc. xx, Spiritus Nitri unc. ij. Destillentur per
cucurbitam vitream in arena positam ad mediæ fe-
re partis abstractionem; hisce uncis octo adde
Spiritus Salis Ammoniaci unc. iv. digerantur simul
per 24. horas, dein denuo destillentur leni igne cir-
citer ad 3x. sic acquiritur Sal volatile non ingrati
odoris, & magnarum virium.

Extemporaneum autem Sal volatile fieri potest se-
quenti modo:

4. Oleorum cujuscunque generis 3j. Salis Tartari
purissimi 3ij. Misceantur exactè, pulvis hic infunda-
tur spiritus vini rectificati cum sale tart. 3x. Spiritus
Salis Ammoniaci 3iv. Agitentur simul per quadrantem
unius horæ, dein reponantur, sic spatio semi- horæ
liquor clarus & limpidus supernatans obtineatur usui
extempore inserviens. Hic liquor per digestionem in
fimo equino, aut MB. penetrantissimus evadit in
odore & colore.

NOTÆ.

1. Primi generis sal. oleaginosum requirit acidum
volatile Nitri, in destillatione spiritus vini vulga-
ris ascendens, ut urinosus tollatur ex parte odor, &
mixtura evadat quasi temperata; cui verò volupe
illud absque spiritu Nitri conficere, oportet ut sequen-
ti procedat modo:

4. Olea præscripta, hisce adde Spiritus Vini opti-
me rectificati 3viij. Spiritus Salis Ammoniaci 3iv.
Mixta destillentur f. a.

2. Sunt, qui & idem efficere satagunt mediante so-
la digestionem spiritus salis ammoniaci, & spiritus vini su-
per herbas, semina & aromata, verum non tanto cum
fructu, quoniam olea cum phlegmate sæpius delitescunt
in claustris suis terrestribus, & subsequuntur post
abstractionem spiritus procedentibus solis levioribus
illis particulis, unde potius spiritus salinus volatilior
est dicendus; olea autem cum spiritu vini destillata
essentiam suam, & vires integras ei communicant.

3. Secundum intentionem, Medici variari po-
terunt olea, hac tamen cum cautela, ut tantum
recipiatur oleorum, quantum sufficiat dissolutioni in
spiritu vini.

4. Si autem volupe fuerit illud ex solis herbis præ-
parare, idem facillè assequitur artifex, si bina vel ter-
na cohobatione super proprias faces, vel rectifica-
tione super recentes herbas sæpius reiterata fiat impræ-
gnatio & exaltatio spirituum.

Vires. *Ventriculum* roborat, *status* discutit, *febris* medetur, *putredini* resistit, *morbis* è frigida intemperie ortis adversatur, *spiritus* recreat, *acidum* temperat. Dosis à guttis iij. & xx. in vehiculo.

Sal volatile Sudoriferum.

℞. Aq. Theriacalis compositæ ℥v.

Sp. Vitrioli volatilis sulphur. rect. ℥iij.

Tartar. subtilior.

Sal. Ammoniac. an. ℥ij. s.

Camph. ℥ij.

M

Digerantur simul per 3. dies in MB. dein destillentur fere ad siccitatem, spiritus arctissime in vitro clauso servetur.

NOTÆ:

1. Omnes liquores optime dephlegmati esse debent, alias destillatio citius absolvenda, ut phlegma remaneat.

2. Qui spiritum volatilem vitrioli obtinere nequit, saltem ejus genuinum subacidum, è vitriolo Veneris destillatum, recipiat, non autem illum, qui ex oleo & aqua mixtis fit.

3. Quibus camphora displicet, illam omittere queunt, sed vires insigniter sudoriferas auget.

4. Hoc spiritus salino volatili alia sudorifera extrahi possunt ad Tincturam besardicam conficiendam, ut crocus, contrayerva, opium &c.

Vires. In omnibus morbis & obstructionibus per sudorem curandis prodest, ut in peste, variolis, cachexia &c. Dosis à gutt. v. ad xx. in vehiculo.

De Salibus fixis.

Salia in genere cum mira metamorphosi inter se ludant, nil aliud videntur esse, nisi productum aliquod materia subtilis, exceptum in aëre, communicatum aquæ, cujus auxilio mediante terra ad ulteriorem alterationem sustinendam objicitur. Hoc adminiculo in majorem motum, ædactæ particule terrestres, alteriori expansioni & dilatationi aptæ facti suo producendo redduntur. Hæ etenim particule, crassiora illa corpora imminuendo, facile in iisdem irretiuntur, ibidemque ag gravata pondere, & resistentia irregulari situ partium & pororum, in magna satis quantitate illic accumulantiur, interstitia illa occupando & replendo, quæ postea, ex parte denuo liberata suis vinctulis, salinam recipiunt naturam, id est, puncta sua, antehac obducta, magis exerunt, terreno corpore, superficiem antehac occupante, detruso. Hæc facile demonstrant salinum principium, summæ necessitatis esse in generatione seu vegetatione plantarum, & omnium vegetabilium: revera enim vix ulla daretur imminutio, expansio, vel aliqua corporum mutatio absque illo. Sal enim perfringit omnes carceres & claustra, quæ alias pertinacius satresisterent omni motui, ideoque illud rite tractatum vegetationem mirum in modum auget & promovet: verum, quoniam de vegetatione multa dicere animus non est, obiter tantum notabimus, mixturam salis, olei expressi, & fini debito modo per fermentationem, unitam, miranda in vegetabilibus efficere circa eorum incrementum. Hæc salia non solum diversitate variant, pro differenti natura regnorum, animalium, nempe, mineralium & vegetabilium, sed sæpius vario modo tractata eadem corpora, diversa producere solent salia: ita ut non unum idemque sit, qua methodo, quibus ad itamentis, quibusve instrumentis fiat operatio. In genere autem salium sequentem statuimus differentiam: salia per se considerata sunt particule scindentes, pungentes & acutæ, quarum acies differt pro ratione cohesionis, & juxtapositionis illorum, minorum punctulorum, & pro soliditate vel figura illius terre, cum qua consortium inivit, ut in acidis latius. Hic autem salia fixiora perscrutari animus est, quæ præcipue ab acido muriatico succo ortum suum mutuantiur, retinaculis terrestribus fixata, & in

salinam lixiviosam, vel tartaream substantiam redacta. Hinc duplicem methodum salis illius artificialis è vegetabilibus eliciendi proponere intendimus, essentialis nempe & alcalici. Naturaliter autem hæc salia an contineantur, an arte producantur, è subjectis utrumque esse verum, ratio & experientia innuunt. Ut enim diximus, è materia subtili ortum suum ducere salia, sic statuimus, illa vehiculi loco ibidem in corporibus ipsis contineri, quæ aliàs necessario subsiderent: hæc ibidem agglonerata, in motum vehementiorem corporibus etassioribus reductis, specimina præbens spiritus contenti, qui, ut diximus, nihil aliud est, nisi congeries particularum fluidarum subtiliorum cum ramosis & aquosis. Hæ particule subtiliores, filii solis vel materia subtilis vocari possunt, & spiritus nuncupantur, suntque primordia omnium salinum. Hæc nunquam in corpore naturali vegetante, in propria substantia alcalina seorsim existunt, sed vel per motum vehementissimum, fugatis omnibus aliis volatilibus particulis, illæsa perstant in consortio, & retinaculis terrestribus: vel ubi liquida sola partes, succi herbarum dictæ, per subsidentiam, deprimuntur, omnes hæ particule salina, consortium fluidi & meræ terrestris, fecum derelinquentes, motu interno illorum corporum, propulsæ per materiam subtilem tenuioribus fluidis innatantibus salibus, sensim majora salinum puncta in crystallulos coalescunt, ut duæ sequentes operationes demonstrabunt.

Concludimus ergo, materiam adfuisse ex qua in statu naturali productum autem corpus suam figuram ab arte tenere.

Sal Essentiale Cardui Benedicti.

℞. Card. benedict. recentis q. v.

Concindatur & contundatur, donec succum suum emittat. Hunc succum, prælo expressum, clarifica albumine ovi, colaturam inspissa ad quartæ vel quintæ partis remanentiam, dein reponatur in cella per tres quatuorve septimanas, sic crystalluli concresecunt ad fundum & latera vasis, quas exime, & in aqua calida denuo dissolvunt, & fœcibus separentur, & iterato in crystallos secundum aciem reduc, hæc ad usum reserva.

NOTÆ.

1. Si magis albicantes requirantur crystalli, sæpius reiterari poterit solutio in aqua propria.

2. Hæc salia dicuntur Essentialia, quoniam ex integra substantia, nullâ ignis torturâ, producta sunt, & plurimas ramosas, terrestres & aquosas in se admittunt particulas, ex integro vegetabili desumptas, quæ in sequenti sale non reperiuntur, itaque ad nitro-tartaream accedunt naturam.

Quoniam ex hisce particulis composita sunt hæc salia, facile etiam sequenti methodo præparantur.

Sal Essentiale magis Chymicum.

℞. Spiritus Herbarum & Stripitum empyreumatici rectificati q. v. ei adde sufficientem quantitatem Salis alcali proprii, donec effervescencia omnimodè cesset, sal hoc mixtum evaporatur, & obtinebis idem Sal Essentiale.

NOTÆ.

1. In defectu salis proprii alcali, etiam sal alcali quodvis substitui potest; præcipuè si in sale hoc alcali oleum empyreumaticum leviter calcinata fuerint, ut taliter qualiter illis particulis etiam ante imbuatur: dein soluto in salis in aqua propria affunde spiritum acidum, & sic in illius naturæ degenerabunt, quoniam ab acido ad naturam suam trahuntur alcalia salia.

2. Hæcce salia non solum à succo naturali producuntur, sed & ab eadem, mediante fermentatione interna alterato, immutato, & in acorem redacto: unde spatium tantum requiritur ad eas confessionem, nisi in valde salis, amaris & acidis vegetabilibus.

Vires. Attenuat, incidit, sudores movet, & vires aliquales integras à propria sua substantia reservat, ita ut ex febrifugis & stomachicis oriantur febrifuga & stomachica salia, quod de alcalicis sequentibus affirmari nequit. Dosis à granis v. ad ʒi.

Eodem modo ex omnibus ferè succis herbarum elici possunt salia: ut & ex illis spiritibus acidis alcali associatis.

Sal mixtum.

℞. Stipitum Absinth.

Fabar. an. ℥. x.

Lign. Guajac.

Juiper. an. ℥. v.

Mixta destillentur in cacabo ferreo, ut in oleis empyreumaticis dictum. Spiritum rectifica per se. Carbones residiui una cum oleo fetido misceantur cum quarta parte Nitri scilicet ad singulam libram carbonum ʒxii. Nitri ʒiii. calcinentur, donec albedinem acquirant. Calcinatam materiam elixivia s. a. & eapora. Huic salii adde spiritum præcedentem, & coagula denuo, sic obtinebis sal optime notæ.

NOTÆ.

1. Carbones & oleum inserviunt figendo nitro quod platimis particulis exinde imprægnatur.

2. Ad albidinem prima vice calcinatio est instituenta, alias iterata calcinationes & solutiones expetuntur.

Vires. Diuresin & diaphoresin promouet, febribus aduersatur, vermes necat, ventriculum roborat, acidum infringit. Dosis ad ʒj.

Sal Scordii.

℞. Herb. Scord. magnam satis quantitatem, incendantur, donec in cineres abeat albicantes, hocce aqua superfusâ elixivia, lixivium filtra per chartam emporeticam, filtratum evapora ad siccitatem, sic obtinebis sal alcali, quod, si purius expetatur, iterata levi calcinatione & solutione candidum reddi potest.

NOTÆ.

1. Cineres, quo albicantiores, eo plus salis deponunt: & carbonibus nigrantibus enim nullum sal unquam sperandum.

2. Sunt, qui addunt post deflagrationem vel nitrum, vel sulphur commune, ut maiorem stabilitatem inducant salibus, & maiorem copiam obtineant, inficii forsau, salia acida alium naturam plane permutare, & ad nutum suum trahere, unde potius secundum acida salia admixta naturaliorum salium expendenda est, quæ potius composita & muratica, sunt, quam simplicia alcalia.

3. Herbe virides furno inclusæ ubi exsiccantur, dein concremantur, inde copiosius & efficacius sal obtinetur.

Vires. Omnia in genere alcalia earundem ferè sunt virium, eademq; potestate & agendi qualitate prædita, pro-vocant enim urinam, acidum infringunt, & mediante illa actione sudores movent, & particulas spirituosas volatilifant, ut Chymicis operationibus plurimi sunt usui, ut postea latius Dosis à gr. v. ad ʒj.

Eodem modo omnia vegetabilia Salem exhibentia tractantur.

Salia ex Pharmacop. BATEANA.

Sal Absinthii crystallinum, fit solvendo Sal Commune Abs. in Aqua filtrando, crystallizando, siccandoque, s. a.

Sal Aceti essentielle. coq. Caput Mortuum Aceti destillati in Aqua filtra ac crystallisa s. a. Sudorificum est, & putredini resistit. Dos. gran. ʒ. ad ʒi. in vehiculo aliquo idoneo.

Sal Aceti fixum. Calcina Caput mortuum, Aceti destillati, solve Aqua, filtra & coagula s. a. Idem facit ut supra.

Sal Alkali. ℞. ʒ. lb. Cineris isatid. ℥. ʒ. Tartari Nitri, ana ʒi. coq. in Aqua, filtra & coagula ad siccit.

Sal. Aluminis. coq. Alumen ustum in ∇, filtra & coagula s. a. Sudorificum, & Febrifugum. Dos. gran. ʒ. ad ʒi.

Sal Armoniacum fixatum. Misce Sal Armoniacum cum Calcis vivæ dimid. quant. & igne fortif. subito adhibito, additoque folle funde, ac postea Aquâ elue s. a. Insuper præcipue liquor inde conficiendo. Sudorificum est, & putredini resistit, aperit obstructions. Dos. gr. ʒ. ad x. & c.

Sal Armoniacum Volatile, f. ex Salis Armoniaci, & Salis Tartari ana. Sublimatis s. a. potest & sublimari (jubente Medico) cum tertia parte Castor. vel Succini. Tollit ventriculi cruditates. Dos. gran. ʒi. ad x. Specificum est in Arthritide & Sudorificum.

Sal Armoniacum Volatil. Oleosum. ℞. Caryoph. ʒii. Spec. V. ʒvii. Sp. Sal Ammoniaci ʒiv. Digere simul ad uniendum s. a. Dos. gran. x. ad ʒi. in morbis capitis, ventriculi, lienis uteri, & c. in Colica & Tremore cordis Præstantiss. Remed.

Sal. Chalibis. ℞. Croc. martis per Aquam Regiam fact. q. v. extrahe Scum Aqua, filtra & crystallisa s. a. Vin. habet incidendi, ac aperienti obstructions, tum viscerum, tum uteri. Dos. à gr. i. ad ʒ. & ultra.

Sal. Cibarius. v. Pulv. Cibar.

Sal Coralliorum. Elicitur ex Cineribus more comm. Vel, solve corallia in Aceto destillato, filtra ac exhala s. a. Sic fieri potest Sal Ocul. canceror. Margaritar, & c. Dos. ʒ. ad ʒi. & c.

Sal. C. C. Succinatum, f. Sublimando c. c. cum dimid. quant. succini s. a. Dos. gran. x. ad ʒi. & c.

* Sal Decrepitatum, fit calcinando (cruce cibulloreto) donec non amplius crepet Sal Commune.

Sal Diureticum Solve Caput Mortuum Salis Armoniaci volatilidis in ∇ calida; filtra & coagula s. a. Proficuum in Febribus intermittentibus. Dos. ʒ. ad ʒi. In Ictero, Scorbuto, Hydrote, & omnibus obstructions valde conducit.

Sal Duplex. v. Arcan. Duplex.

* Sal Febrifugum, Elicitur ex testis ostreorum opt. mundatis, & ad summum albed. calcinatis, solvendo in Aqua, filtrando ac coagulando s. a. D. ad ʒi. ante parox.

Sal Jovis, f. Solvendo Magistr. Jovis per digest. in Acetum Destillatum, filtrando & coagulando. Præsentaneum remedium in uteri suffocationibus quas ad miraculum compefcit, tam intrinsecus, quam extrinsecus adhibendum. Dos. gr. 2. 3. 4. & c. repetitis vicibus.

Sal Lithargyrites, Elicitur cum Aceto Destillato non secus ac sacchar. Saturni. Decantetur solutio, filtra & coagula s. a. Si solutio præcipitetur cum

cum ol. Tartari, vocatur *Magisterium*. Interne datur in Diarrhois, Dysenteris. Reliquisque morbis resolutis. Intestina laesa ac ulcerata sanat & consolidat: sanguinem astuantem refrigerat. Dos. ʒʒ. cum Theriaca aliqua sudorifica, sive anodyna.

Sal Martis. (i.e.) *Sal Chalybis*.

Sal Martis Catharticus. Solve Caput mortuum Florum Sal. Armoniaci martiatorum in Aqua calida, filtra & coagula. Dos. ad gr. xii. leniter purgat, & Diureticum est.

Sal Perlarum, fit omnino ut coralliorum.

Sal Phosphorum. Recipe Sal commune decrepit. Sal Gemmae, ana ʒʒ. galang. mac. cubeb. ana ʒʒ. m. f. Pulvis f. a. Concoctionem juvat ventriculi, cruditatesque consumit. Dos. gr. iv. ad xii. mane, jeuno ventriculo.

Sal Polychrestum, f. ex Fl. Sulphur. & Sal. petrae ana, exacte mixtis detonatisque, solvendo Aquâ filtrando ac coagulando f. a. Humores purgat serofos per sedem, & nonnunquam per urinas. Dos. ʒi. ad ʒiii. in Aqua fontis tibi. solut. ut fiat instar Acidularum.

Sal Saturni. (i.e.) *Sacch. Saturni*.

Sal Spongia Volatile, f. Destillando per Retortam, & Sal Commune rectificando f. a. ex Capite mortuo in Aqua calida soluto elixivatur *Sal fixum*. Utile ad calculos renum vesicaeque frangendos. Valet etiam ad strumas discutendas. Dos. gran. ʒ. ad 12. vel ultra.

Sal Sulphuris. Solve Caput Mortuum Spiritus Sulphuris Aquâ filtra & coagula f. a. Efficax remedium adversus verminationem. Dos. a gran. ʒ. ad 10.

Sal Tartari, fit ex Tartaro calcinato, non secus ac ex aliis Cineribus sal extrahi solet. potest & elixivari ex Capite Mortuo post Destillationem Spiritus Tartari relicto, si ulterius comburatur. Vel, fieri potest ex Tartaro crud. & Nitro ana Pulverisatis & calcinatis in crucibulo f. a. Optimum est remedium in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea, Scabie, &c. tam interne, quam externe administratum.

Sal Tartari Volatilis. ℞. Sal Tartari purific. ʒiv. Alcoh. V. ʒviii. Destilla ex Arena, ter cohobando; & adhærescet Sal lateribus Alembici Diureticum & Aperitivum insignissimum est. Sanguinem purificat. & malignitati resistit. Dos. gran. decem, ad viginti, & ultra.

Sal. Viper. Volatile, f. ex viper. siccis per Retortam, ut cornu cervi, ex Capite mortuo elicitur more comm. Sal fixum. Medicamentum summe penetrans, Putredinem arcens, obstructions reseruat, febres omnes resolvit. In melancholia, podagra, renum calculo & vesica, mira praestat. Dos. gr. 6. ad ʒʒ.

Sal. Veneris. [i.e.] *Flor. Viridis* seris.

Sal Urinae Volatilis, f. ex Urina fermentatâ per Retortam Destillatâ f. a. Fixum elicitur ex Capite Mortuo more comm. Insigne anodynum est in doloribus sedandis, mixtura cum liquore conveniente, & supra loca affricatum. Interne datum reserat tartareas obstructions viscerum ac mesenterii, unde insignis ejus usus esse poterit in Scorbulo, Cachexia, Icteria flava ac nigra, &c. atterit calculum renum ac vesicae, doloresque inde ortos sopit. Dos. gran. quindecim ad triginta.

Hic rursus in majorem Tractatus de Sale per f. Elionem, Experimentum Chemicum novum de Sale Volatili Plantarum, ex Clarissimo W. DELIO,

PRÆFATIO AD BENEVOLUM LECTOREM.

Æ Quissima vox est, redde quod debes. Memini me promisso dudum debitoris nomen subisse & exsolvere jam debere, quod plurimi à me hætenus sollicitantur.

Liberare fidem addecet, licet dilatatam, neque enim frustra saepe differre licet, quæ omnium iudicio exponere velis, maturè interim in iudicium testes exceptione majores mihi comparavi. Exponere rem eruditis decreveram, ne sine teste relinquerer, ore quidem non lueris, quid enim scripto aliud reportassem, quam iudicia sinistra, aut vilipendium, aut, quanao à amicis hac timenda non erant, alia.

Inter istos nomino potissimum Excellentissimos viros, [tacebo autem jam domesticos, & familiares plures] D.D. Tackium, Meibomium, Barnerum, & quantum nominal

Vix eloqui possum, quam benevolè exceperit conatus meos ipse tunc nobis presens celeberrimus D.D. Tackius, quam ingenue mentem suam exposuerit, & quāto uniù de me sentire apud Serenissimum meum Principem iussu meriti.

Non persuadere opus fuit, nec differre, in his enim saepe.

Nec locus ingenio est, oculi, Te iudice, vincant.

Id unum scrupulum movebat, quod accidit saepe, ut quæ audientes mirabamur, eadem legentes rideamus, seu, quæ Cyri apud Xenophontem est oratio, *μειζονα, οὐδὲν ἔτι μείζονα ἰδὲν*, arbitratos maiora minora videre, & quod in proverbio fereur, *αὐδὲν ἔτι οὐδὲν ἔτι*. Verbo, non ad palatum omnium fore, minus ad votum eruditiorum, alteri foetidum, alteri difficile, aliis vile.

At noveram, quam levis scintilla in altis lucis pyramidem exurgere possit, unde licet imperfecta hæc videri possent, malui tamen rudia hæc, & incunabilis suis, si ita loquis, exhibere, quibus ultra seculum absconditum latuerat, quāto diuini premere.

Εἰς ἀνὴρ ὁ πῶνδ' ὀρεῖ, ait Græcus Poëta, mihi satis est, multa nescire, pauca nolle. Aliis quoque relinquenda est pars gloriae, in medio palmarum omnibus posita. Gaudebam hinc produsse hæc occasione quadam alia, ad rem facientia.

Noveram enim, quam solerti disputationum vinitate alter alteri praripere saepe conetur inventio nis laudem, & quāto immerito literariis altercationibus conspurcentur saepe, quæ nitore suo clariora præstare gestiebant. Discrecam, si hoc non est supplicium de studiis sumere.

Non arrogo mihi laudes tuas, Lector Benevole, ne ambio vana molimina, liberum penes te esto iudicium.

Q. D. B. V.

CAPUT I.

Salia volatilia plantarum dari, extra dubium est.

Dies diem docet, non unâ vice inexhaustus fons acanorum naturæ æque & penitus diffundit, restant indies novi propullulantes rivi, ne dicam maria; hinc saepe frustra negantur dari, quæ solers cura in apicium proferte gestit, imò saepe quasi aliud agendo invenit.

Vide

Videri posset ἀπορον, τὸ διότι quærere, si τὸ ὄν non-
dum fuerit dilucidatum, sed cum non solum ignora fue-
rit chemicis Θλίον volatilium ē plantis productio, sed
& produci posse iisdem impossibile visum, & negatum,
operæ pretium æstimandum est, de his quædam præmit-
tere.

Negant alii penitus, ea dari in vegetabilibus. Vege-
tabilia, ait Zwelfferus classe 15. pharmac. reg. p. m. 608.
paucis, aut nullo, sale volatili constant; ac per conse-
quens nec in illum resolvi possunt. Ac, licet credi pos-
set, illum tantum de terrestrioribus loqui, non aromati-
cis, balsamicis & scorbuticis; verò tamen verius, com-
probatum asserit, nullum substantiale existens sal volatile
ex vegetabilibus, uti ex animalibus in dies acidit, arte
elici posse, nisi Θem fixum, & hunc ipsum non, nisi præ-
viâ incineratione.

Lima hæc subire non immerito, tum DD. Schroe-
ckii nostri animadu. in Zwelff pag. 525. & 526. tum DD.
Booni, qui exercit. physiol. 7. de sanguis in coroll. rectè
hæc mechanice contrariari affirmat, cum ex frumentis
Θ volatile copiosissimum proliciatur, & ex pipere ipso
sal volatile penetrantissimum acceperit, quod non sine
causâ egregium febrifugum constituere suspicatur.

Alii eadem quidem negantur itidem; sed, cum nota-
bilem copiam salis volatilis vidissent in urina, quin in
cervo, quoad hanc ipsam, & in primis sanguinem & cor-
nuâ, credidit eadem nec cibo, nec potui, plantisve in-
existisse, nisi in formâ spiritus acidi, quem ventriculi sal
fermentale in sal volatile commutet. Videri hanc in rem
potest B. Meibius fundam. Medicin. Physiol. c. 10. p. 109.
ubi, plantæ, inquit, omnes non facile Θ volatile præbe-
bunt; sed solum modò spiritum acidum.

Involutas esse aliis particulis volatiles has salinas, &
nominatim ab acidis quasi subjugatas, certum est; ve-
rùm, ut facile fuerit excutere hoc jugum, & annihilare
imperium, sub quo degebant, sic promptè eadem menstruo
stomachico auscultant, sui sunt juris, & sanguinis partes
conformes vegetant & restaurant. Altioris verò indagi-
nis est, quomodo acida volatilia, exemplo formicarum,
penetrantissima illa & subtilissima, reddi possint urinosa,
& quo medio ipsa hanc naturam & efficaciam obri-
neant.

Neque obstant, quæ loco citato Zwelfferus ob-
ijcit, necesse esse, ut sal volatile sapore, odore, de-
stillatarum aquarum, prout in aromaticis, balsamicis
& scorbuticis aquis, percipiatur: neque sola ele-
mentatis, insipida, ac inodora aqua prodeat; si enim
id sufficeret, pari ratione concludere licebit, nec in scor-
buticis plantis sal esse volatile, cum v. g. ∇Ω lara se-
di minoris, ast acerrimi, per se facta planè insipida pro-
deat.

Ludit nimirum sal volatile instar Ξrii, modò hæc,
modò illâ facie apparens; prout particularum in-
versio, & immutatio ipsi accidit. Quin ipse, cum à
posteriori argumentum ducat, arte elici eadem
non posse, quod alembicum non ascendat, seu me-
diante ὀρίῳne vulgari aquarum se non exhibeant;
cogitare debuisset, latius patere præparandi mo-
dum, neque firmiter ex hoc ipso concludi posse, ne-
que sal volatile in plantis dari, neque arte elici ex illis
posse.

Mitius si quis ea explicare velit, respexisse dici possent
ad ea, quæ communiter prostant, nondum in libellis
chemicis de his existisse processum, modò ipsius contex-
tus consequentia id permittat.

Alii sub nomine essentialium, ita communiter dicto-
rum, salium volatilia venditant, ut Unzerus; Mülle-
rus, & alii plures; sed, ut ut mediæ quasi naturæ & con-
stitutionis sint hæc ipsa inter fixa alcalia & volatilia; at-
tamen κατὰ χημικὸν saltim ac improprie nomen hoc
merentur, quæ præsertim terrea magis sunt, neque requi-
sitæ ac conditiones salis volatilis obtinent.

Ex his ergò efficitur, experientiam chemicam h'c in
parte alius promotam, contra quævis sive rationes, si-
ve hypotheses, malè fundatas, sive denique auctorum con-
trarias opiniones, locare posse in apricum facili negotio
salia volatilia, quo uno omnia corruunt argumenta, quæ-
cunque in contrarium adducta sunt, neque, cum res tam
clara sit, eadem vel adduci, vel discutiri pluribus opus
fuerit.

Hoc loco meminisse lubet, tenerum admodum esse
plantarum Θ volatile, ac delicatum, ut in hoc meri-
tò animali regnò, cui major hujus erat necessitas, pal-
ma cedat; non tam & tot ramosis plicis & frustulis alem-
bicum pingit vegetabile tenerum sal, quàm animale.
Quin sæpe ne crystallulis quidem se videndum offert;
sed solum liquori immersum gustui & olfactui se offert,
& cum acidis effervescit: qui tamen sentus adesse ni-
hilominus id sufficienter & nemine reclamante pro-
bant, ut aded sal volatile, ab asservandi modo & in qui-
busdam necessitate, possit duplici sub formâ concipi &
statui: liquidum & solidum: & sicut sal volatile C. C. vi-
perarum, lumbricorum, &c. marri suæ seu vehiculo im-
mersum totâ die dispensatur; sic id longè magis in vege-
tabilibus concedendum est. v. g. Θ is Ξ volatilii, &c.

Quòd enim succini sal volatile magis præ reliquis per
se adervari potest, Δ copiosius facit, ejusdem porulos
quasi incrustans, ne annihilari ab ambiente, & resolvi
tam facile possit.

Nullum verò tam promptissimè, quàm cervinum, a-
volat, hinc & viperinum & eboraceum, inde eadem im-
mersa servare, & dispensare essentificata patet, medio
modo se habent Θ volatile Ξrii & Ξci, ut aded Θia hæc
volatilia merito audiant, quòd & ignem minimè susti-
nent, & æris solius admittu facilissimè in auras avo-
lant, contra ac fixa facere consueverunt alcalia.

Idem & vegetabilibus contingere certum est, nisi li-
quori juncta & dispersa annihilari tam promptè respue-
rent. Hinc & in sequentibus, cum de salibus volatilibus
loquemur, eadem non tam abstractivè, quàm concretivè,
seu non sine subjecto ac vehiculo intelligenda potis-
simum volumus, ceu id in scholis Medicis, modò pro-
priè quis non solum nomen sæpe, sed rem ipsam atten-
dat, in aprico est, ut Ξus Θ Ξci nihil aliud est, quàm sal
volatile in liquore aqueo subsistens: Ξus Θ is Ξrii vola-
tilis eundem censum cum aliis meretur.

Modi parandi Salia volatilia ex seminibus, extractis, & oleis & latis.

CAPUT II.

EX seminibus plantarum Θ volatile mediante igne
elici posse, quæ acrimoniam cum odore, vel alteru-
trum horum junctum habent, tam verum est; quàm
quod verissimum, neque de reliquis, quæ minùs lapidas
offerunt particulas, penitus dubitare licet, nisi quòd par-
cissimum & diffusissimum ea exhibitura sunt, respectu
priorum, Θ volatile.

In semina ductu naturali, & extraneo calore vegetan-
te solari, vis & anima quasi omnis abit, recumbit in his;
ceu in centro & puncto ultimo Θ volatile, unde efferta
tunc eò magis redditur planta, quòd maturescit; magis se-
men. Colligitur in his, ceu in receptaculo, ex plantæ
cadavere quasi emigrans & novum germen expectans
vegetans forma, quæ prius sparsa erat in toto her-
bæ corpore, unde in his Θ volatile concentratum vi-
dere est, quòd in reliquis partibus diffusum prius pala-
bat.

Patet hinc, quàm promptè ex his educi possit Θ vola-
tile, sive seorsim, sive sub sulphuris pallio occultatum;
& ceu ex herbis oleum longè difficilius elicere da-
tur potestas, quòd ex semine promptè efficitur: sic par-
ratio est salis volatilis, ut mirari subeat, luisse multos

ea ipsa, & visum effugisse, donec emunctiorum Chemicorum naribus ea videnda se exhibuere.

Inspidorum seminum exemplum sint frumentacea, quæ copiosissimum in se continent volatile sal, idque prolici de se lubenter patiuntur. Magis id amicum naturæ esse conveniebat, magis pati, quam agere in corpore, ob nutriendi, quâ pollet, facultatem: hinc minus saporis obvium, temperatæ oleosæ emulsiōi mersum, hinc volatile sal minus percipitur à priori. Ast, quam belle reficit analepticus panis spiritus, in Tinct. coraliorum hinc non sine causâ experitus: quàm confortat non dicam odor, quod *Democriti* prædicatur exemplo, quàm ipsa substantia, ut frustra hinc neget *Helmontius*, panem reliquorum omnium ciborum esse fundamentum.

Neque obstat *Æus acidulus*, quem fundit, quod minus occultetur unâ \ominus volatile. Tacemus alia similia, quæ posteris temporibus diligentia vulcano vel subicit, vel committere ulterius. Ut enim in bonâ causâ vel tria verba sufficere scribit *Pindarus*, ita etiam sæpe in exemplis id abunde valet.

Tetigimus jam hæc priori capite, ubi & \ominus is volatilis piperis mentio facta est. Dudum jam nobis *sal volatile fraxini* elegantissimum ex semine, quod avis linguam vocitant, prolectum commendavit & ostendit *Dn. Ludovici* noster.

Illustrabimus exempli loco eadem ulterius semine rutæ, sophiæ Chirurgorum, aliorum similium.

Æ. Sem. dictorum, rutæ, cochleariæ, soph. Chirurg. &c. bene mundat. & sic. q. v. v. g. tbb. vel tbbj.

Inde \ominus vitreæ, Ω la lento igne primò phlegma, hinc \ominus volatile spiritui nuptum, & seorsim quoque pulcherrimis rhombis recipientis se affigens parietibus longè elegantissimum, & oleum penetrans, ad *καθηβαίαν* usque copiosissimum. Paucis horis re feliciter peractâ, separaretur mediante filtro vel tritorio minorio cum à liquore volatili urinoso, conquassato prius leniter vase, ut \ominus volatile solvatur, & liquori immergatur, quo sine etiam Ψ rectificati modicum pro ablutione majori infundi vasi potest. & servetur ad usum. Est verò primum cephalicum, & speciatim antepilepticum, alexipharmacum & penetrans, hystericum etiam medicamentum, non contemnendum, quod per se dari potest ad gutt. x. xx. vel cum *lil. convall.* aliisque accommodis permisceri. Reliqua matris suæ indolem sequuntur.

Oleum seorsim rectificatur cum aquâ copiosâ, vel aliis artificiis sordes ex oleis ad se trahentibus alcalinis, quæ hujus non sunt loci, ad internum & externum usum aptetur.

Notabile est, quodd impetuosâ vi secessum faciente sale volatili ab oleo, sub finem, vel in medio Ω lationis facile rumpi soleat retortæ corpus, præsertim, si paulò major fuerit destillationi commissâ quantitas, licet ignis subditus non ita fortiter urgeat egressum.

Tactis his nobilioribus, non opus est, aliis pluribus diutius immorari.

Extracta plantarum item fundere \ominus volatile, exemplo est *opium*, quod & volatile, & \ominus um \square nosum de se fundere, uti certum est, ita id in *opiol. nostra l. i. f. 1. c. 9. p. 33.* pluribus fuit tactum. Sic latere assuevit & immersum esse particulis resinosis & roscidis, ut etiam, nisi secedere hæ ab invicem cogantur, & dimittere, quod secum absorpsere, vix in conspectum prodeat. Si enim *opium* destillationi subjungatur, non per se, sed addito menstruo vel aqueo vel \ominus uoso, tantum abest, ut dimittat de se \square nosum volatile \ominus , ut potius & anodynam serve secum vim, & liquor destillatus parum vel nihil inde participet, cum de resinosa parte nihil secum evertit.

Extracta aliorum vegetabilium, non penitus gummosa, itidem fovere secum sal volatile, credibile est, si

v. g. *extractum scorzonæ pelafidis*, imò vel ipsius *herbori* Ω lationi eodem modo factæ subijciatur, neque enim æquè calor, ad eorundem præparationem antegressam necessarius, propellere eadem est sufficiens, cum iterita vis osis & fixioribus particulis magis sint. Hinc verò fortiori extruduntur vecte. Et in genere salia volatilia odore urinoso non eruantur nisi vel propellantur fortius, vel liberâ gaudeant avolandi licentiâ, alias enim sensim exhalant, ut sub aliorum velò latent.

Ex *Oleis aromaticis & latis*, separare \ominus volatile, uti artificiosum est, ita, cum ex *Helmontio* jam supra de eo disseruimus, & latius hæc tradiderit *Excell. D. Ludovici tract. de \ominus le Pri volatil.* supervacaneum ducimus, longius id hoc loco repetere.

Duplex hic est modus, uterque ab *Helmontio* insinuat in *specimine seu parte primâ c. 5. p. 41.* facile à callenti ad olea applicandas, alter per *alcalia*: uterque magni momenti.

Sunt, qui ex eodem fundamento *alcahest* venantur, & panaceam, quibus sualiquida est speculario, quidem contra mentem auctoris manifestò est, qui tantum vicem *alcahest* obire posse eodem carentibus, scribit. Fieri potest processus cum quovis \ominus fixo & oleo aromatico. Minorum sumtum & parabilis est, si \ominus is Ψ ri part. iij. cum *Æus verebinth. ætherei* parte j. miscantur; stent in digestionem usque ad coagulationem, (lapidem vocant,) quò diutius steterit, eò melius evadit sal; abstractione lentâ factâ, si opus sit, Ω latio fit per \ominus ascendente in sublime sale volatili, virtutum admirabilium.

CAPUT III.

Per fermentationem & semiputrefactionem ex plantis, floribus & foliis, \ominus ia volatilia purari possunt.

Uti verò per deflagrationem igne aperto ex ipsis quoque plantis siccis in incineratione, licet minori quantitate, æquè, ut ex seminibus largiori copiâ, \ominus volatile colligere licet, (ubi, si nempe per \ominus Ω leatur herbæ, olea mutari posse in sal volatile, sunt, qui asserant;) quod tamen obiter hoc loco saltem tangere sibi, uti ex absinthio sal volatile amaricans separatim novimus; sic ex recentibus jamdudum id tentarunt, per fermentationem & semiputrefactionem cum successu plures.

Dictum jam aliàs à nobis fuit, non perdi tam facile sal volatile per fermentationem, ut communiter creditum fuit; sed immersum aqueis & aliis particulis saltem absconditur, & cæterâ compage sensim hoc modo resolutâ, præcedente leni fermentatione & incallescenciâ, si præsertim externus ambiens aer id non prohibeat, spiritus urinosus inde prolicitur. Aliis enim calidus, vel saltem temperatus, & sibi relictus convenit, aliis frigidus magis aptus habetur, v. g. in cellâ; vel, qui nonnullorum est modus, indita materia vasi apto aque committitur, quæ digestio est frigida. Sic *Æ. florum liliorum convallium* recentium, rore majali imbutorum, vel etiam *anthos*, &c. f. q. inditi vitro apto, seu cucurbitæ reponantur in cellam, & decursu aliquot mensium resolvantur in liquorem, qui acutissimi & fragrantissimi odoris erit; hinc Ω tioni subiectus urinosum volatilem spiritum fundet.

Ipse hic modus callentioribus Chemicis aliis plurimis dudum celebratus fuit, quos nominare supervacaneum foret.

Si plantæ ipsæ hoc modo resolvantur, minus participans de odore \ominus volatile eruitur; sin flores odoratiores, ubi partes \triangle æ exsuperant cum salinis, magis id respectu illarum acquiritur.

Problema curiolum est, \ominus ia obtinere volatilia, quæ retineant odorem, seu quæ teneantur de odore plantæ, ex quâ parata fuerunt. Hæc tamen analysi, quæ majoris apparatus est, ut in plerisque quoque aliis, odorum radicale principium, Δ , vel separatim se prodit, si id expetatur, vel prædominantibus aqueis & urinosi partibus confunditur, (ut ita loquat) & odorem urinosum præpollentem exhibet.

Per se facta ita se habeant, ceu innuimus, & curiosi $\epsilon\chi\gamma\epsilon\eta\theta\epsilon\iota$ acquiri possunt; per artem verò salia volatilia reddere oleosa, & finem hunc assequi, uti curiosum & passim hodie decantatum; ita facillimum est, prout inferius de eodem dabitur differendi occasio.

Processum ipsum, quo modo ex plantis hac via elici possit sal volatile, cum in transactionibus Philosophicis Anglicanis d. 25. Mart. 1674. posuerit & recensuerit D. D. Cox. huc excerpemus.

4. Ætatis medio, seu calidiori tempore, bonam quantitatem plantæ, quàm volueris, separa inde folia omnia, & seorsim caules stipitesque abjicias. Hinc indas eadem vasi firmo & clauso donec omnimodè fermententur, putrescant, atque in pulvis formam redigantur, quod in quibusdam tardius, in aliis ocyùs fit. Deinde Ω la hanc massam igne primùm mediocri, & habebis aquam qualis ex aliis plantis ordinariè elicitur; hinc ω us & \ominus volatile succedat, & circa finem oleum crassum, nigrum atque fœtidum, quod cum \ominus e volatili jungendum, sæpiusque rectificandum est, & olei maxima pars in \ominus adhuc facesset, unde \ominus volatile \square nosum instar \ominus is \square nae, C. C. sanguinis humani, vel \ominus lis *ci emerget.

Ubi notandum.

1. Per fermentationem, dum illa inchoatur, hæc herba valdè incalescet, præsertim circa medietatem seu centrum, hicque calor adèd fortis erit, ut, igni contrà, manum impositam lædere soleat.

Posthæc incipit corruptio, putrefactioque omnes plantarum naturales qualitates immutat, & quidem non solum sensibiles, sed & specificas; adèd, ut

Planta bonum gratumque exhalans odorem, fœtida corruptaque evadat, æquè ac alia, cui hæc qualitates non insunt, adeoque fœtet, ut odor æquè intolerabilis vix alius detur. At hic fœtor non multum durat, sed omninò disparet, simul ac planta Ω lationi subjicitur.

4. Plantæ humiditate & pinguedine pollentes duplo citiùs, quàm magis siccæ, & aromaticæ & tenacæ putrescunt.

5. Durante putrefactione interdum in medio vasis, licet nullus eò paruerit, ab extra aditus magna vermium, muscarum, aliorumque insectorum quantitas fuit reperta, quæ verè ex putrefactione orta sunt.

6. Vermes hi \ominus volatile non largiebantur; verùm alium ab hoc multò diversum liquorem exhibebant, mediante scilicet Ω latione.

7. In hac plantarum destillatione 1. aqua apparet ascendens, sub guttarum satis grossarum formâ; congregaturque, & in recipiens cadit, 2. Spiritibus ascendentibus, illos sub nubium seu nubecularum specie evehi cernes, quæ difficiliùs collquantur, & stras habent diversificatas atque intortas, quemadmodum in destillatione ω us C. C. accidit. Denique oleum apparet, quod non, nisi violentissimo, & ad summum aucto igne exit, idque omnium fœtidissimum.

8. Nunquam aliud, præter hoc, obrinui oleum, post putrefactionem, quæ si perfecta non sit, exit hoc

Margen Bibl. Pharm. Tom. II.

oleum essentiale, odorem plantæ referens.

Plantæ, quæ oleum essentiale communiter non præbent, multum olei fœtidi largiuntur; verùm, quæ multum olei essentialis dant, plus olei fœtidi emittunt, quàm aliæ.

10. Inter ω us & ω ea hæc quædam sæpius, (3. 4. 5.) rectificari amant.

11. Hoc \ominus volatili rectificatum omnes \ominus is \square nosæ qualitates habet, adèd, ut ipsum inter, & sal volatile sanguinis humani, C. C. \square nae, aut *ci nulla intersit differentia. Omnes etiam producit effectus, quos hoc, diureticum & diaphoreticum est, acidum destruit, cum illo se jungit, & inde \ominus compositum resultat armo-niaco simile.

12. Quod magis est. hæc \ominus ia volatilia à se invicem, neque quoad qualitates sensibiles, neque quoad effectus differunt.

13. Nullam plantam Ω lavi, (quamvis diversas destillaverim,) quæ omnes has partes, de quibus modò diximus, non reddiderit.

14. Post Ω lationem in vase offert se odor moschum ferè redolens, qui nullo modo tolli potest, licet per aliquot annos aëri expositum fuerit.

15. Vas in quo planta fermentatur, sæpius apertum reliqui, & veniente anno paucissimum in eo restabat \ominus volatile.

16. ω nullum \ominus fixum largitur.

Et hoc quidem modo ex animalibus quoque quibusdam destillari potest \ominus volatile, ceu ex lumbricis per putrefactionem fit, quibus in vas vitreum seu terreum positis, accedente ambientis calore ferè eadem observantur, ac in plantis à dicta præparatione, ut & oras vasis transcendere, & nisi porta detur, vesicam distumpere soleat intestinus motus. Postmodum destillatione subjecti fundunt liquorem, \ominus e \square nosum cum Δ re fœtido refertum, & rectificatione prævia depurabilem magis & gratiorem reddendum, de quo jam in specimine nostro diximus.

Si quis verò addere plantis hunc in finem velit curiosius sal fixum, seu proprium, seu usuale aliud obvium, v.g. \ominus Tart. vel calcem vivam quoque, aut saltem cineres illi id ipsum liberum est, sufficit, absque additamento simplici via id succedere.

Adeoque hæc præparatio in vulgus jam innouit, & possibilitatem sufficienter quoque demonstravit, proceditque non tantum in antiscorbuticis, ut co-chlearia, nasturtio; sed etiam in aliis, ipsique floribus, præcipuè odoriferis, nec adèd siccis, ceu ex floribus filiorum convallium, uti modò dicebamus, elegans \ominus volatile hæc via & methodo consurgit.

Sine igne & sine additamento, Spontaneâ destillatione, ex ritè preparatis plantis prodit \ominus volatile.

Videbatur jam evulgatus processus, quo de in specimine scripsimus, adeoque crambe retroqui. Verùm, uti cuilibet suam concedimus lubenter gloriam, ita in eo quoque non sine effectu latuit hæcenus experimentum nostrum, ut seu inventionis similis in publicum producerentur specimina, seu de nostro hoc doctorum judicia. Licetum sanè fuisset nobis, quæ gravissimis viris & Chimiatriis dudum ore tenus & oculis tenus demonstraveramus, & commode cum illis feceramus, statim evulgare, & in eo inventionis famam aucupari, cum, verbis Dn. Lic. Garmani nostri, multi è Philosophis chemicis de \ominus is volatilibus plantarum existentia, dubitarent, nullus autem, nisi forsan incidenter & superficialiter, ante nos tractaverit hoc thema.

V u u

Modeste

Modeste verò in hoc malimus aliis iudicium relinquare, ubi scripsimus verbis *Mirandule*; nec inventum à nobis id esse, nec quæsitum. Nunc verò abeat in lucem, ut quæ vel à nobis scripta primum, vel occasione hujus ab aliis publicata, lucem acquirant maiorem.

Quoad ipsam rem, ne quis impudè gloriari de inventionem possit, vel litem uti in rebus nauci sæpe sit, in hoc movere nobis, quum omnibus modis averſamur, nosse æquum est, ultra seculum, seu ultra centum hosce annos, ne ampliùs progrediamur, evolutionem hanc *Ælis volatilis* millerestibus, notam fuisse, sed non observatam: visam, sed neglectam; publice apertam, sed nec agnitam, nec curatam. Qui probationem hujus desiderat, cogitet quæso, quamdiu in Thuringia nostra glasti præparatio nota & in usu fuerit in universa ferè Europæ usum expetita. Eandem originem etiam sibi vindicat experimentum nostrum, ut ex sequentibus patebit.

Liceat modò nobis mirari hoc loco naturæ abscondita, latent sæpe, quæ obvia sunt, conclusa, quæ nates ferunt, occulta, quæ in oculos occurrunt, quid sensibus ipsis certius esse queat? Ludit in hoc mortaliū stuporem, qui, quod habent, habere sæpenumero se credunt, quod habent, & ante pedes est, negligunt. Neque tamen culpanda antecessorum nostrorum ignavia vel incuria, infelicitas hæc fuit, non socordia, posteris quoque plura relinquentur. Non unâ vice pandit arcana sua, sed paritit; quæ uno momento pos delectant, facile negligimus; quæ distinctis vicibus, gratiora sunt & intimius afficiunt. In hoc tantum delinquitur, si in libris solum & penes eruditos quæritur sapientiæ. Latet hæc & sordido pallio, neque, quod *Hippocrates* noster jubet in præception. cap. 2. v. 24. pigeat ex plebetis sciscitari, si quid ad curandi opportunitatem conferre visum fuerit. Multa apud mechanicos arcana latent, multa apud operarios: habitat sub ingrato sæpe & invisio hospitio naturæ splendor.

Sed, ne gratis hæc dixisse videar, à posteriori quasi præsupponimus pauca hæc axiomata.

Planta omnes pollent Æle volatili, alia quidem magis, alia minus: alia obvium magis & explicitum alia immersum, & in sinu implicitum, magis fovent.

2. *Planta sibi invicem superimposita incalescunt, quò majori quantitate & densitate, eò fortius, & vice versa. Videri id potest in quibusvis herbis, absinthio, carduo benedicto, in fasciculos majores & densiores collectis, lupulo, imò ipsi etiam farinæ tempore æstivo idem accidit, & fœni exemplo notissimum est. Memorat id ipsum de seminibus quoque & stercoribus, etiam ficcis, Galenus libro de causis morbor. cap. 2. & accensum etiam ipsum stercus columbinum hoc modò se vidisse addit. Illustrare hæc licet elogio accuratissimo divini senis, qui, quasi hæc intimius pervidisset, & ipsum processum velut digito innuisset, ita l. de natur. pueri c. 26. scribit: καὶ γὰρ ἡ φύσις ἡ νεώτερος μὲν εὐθερμότερη ἐστίν, ἢ ἡ ἀραιὴ ἔσται καὶ ἁπλῆς, καὶ μὲν ἰσχυρὰ καὶ πεποιημένη πρὸς τὸ αὐτῶν ἐνθερμαίνειν, καὶ ἐν ταύτῃ καὶ πρὸς τὸ θερμαίνειν τὴν γυναικὶν ὁπότε ἔστι γὰρ διεστὶ τὸ πνεῦμα δι' αὐτῶν, ἅτε πυρρὸν ἐόντων. Nam & finum densius accumulatum, intus calidius est, quàm quod rarum existit: & alias humecta accompressa, & seipsis concalescunt, & brevi à calore valde exusta putrescunt. Neque enim permeat spiritus per ipsa, nimirum cum densa existunt.*

3. *Planta certo modo prius preparata, & sibi invicem superimposita de se mutantur Æ volatile.*

4. *Posito ipso colore, & intrinseco, sponte facto, non extraneo, posita aptitudine, & latio fieri po-*

test. *Ælis volatilis sine igne, per se, sine addimento.*

5. *Humiditas nimia superaddita, seu conjuncta, calorem quidem habet succedaneum, & hinc Æ volatile, quod secum immersum gestat, igne mediante de se prodere potest: ipsum verò Æ volatile minus, quippe prædium & detentum, citra torturam hanc se offert.*

6. *Hinc exhalare prius lentier.*

7. *Proportionata tamen esse, unde, si siccitas nimia accedat, & consequenter proruptio Æ volatilis moram trahat, affundere licet aquam.*

Quid multa? fatemur glasti præparationem mechanicam obtulisse nobis sal volatile ejusdem: cum enim & curiosè hanc lustraremus, & in parandi modum inquireremus, fumantes acervos vidimus, utinofasque particulas exhalantes percipimus, toto eo, quo continebatur, loco, ne dicam tota domo, nates vellicantes. Mirati artificium, cogitavimus, quomodo in auras abiens, à nemine curatus, nec in usus alios cedens urinosus liquor, vel sal volatile posset excipi, & imposito instrumento hic depicto obtinuius, quod volebamus. Ita scilicet sine sumptibus, sine curâ, & quod maximum est, sine igne colligere licuit notabilem, quantitatem *Ælis volatilis*, in liquore hoc spontè prolecto, odore non minus, quàm sapore se sistens, quod hinc rectificare facile, & Relatione leni Xcum magis apte licet si pars circiter dimidia vel tertia saltem abstrahatur.

Explicatio Figurarum, N. I. & II.

A. *Globuli glasti, prius in hunc usum preparati, & jam accumulati in tabulato, ab interno calore sal volatile assumentes, circa ullum externi ignis accessum.*

B. *Instrumentum figulinum illis superimpositum, siue uno, siue pluribus locis, ut colligi & excipi possit, nec vacuas evolare in auras sal volatile: siue rotundius illud fuerit & capax, ut N. 1. siue quadratum & oblongam, pauloque altius, ut N. 2. ita globulis aptandum, ne admissu aëris tibi transfugerè possit exhalatio, vel musca etiam copiosa simul possint ingredi.*


C. *In collum abiens ejusdem pars instar cucurbitæ, ut magis jam adscendere possit & colligi sal volatile.*

D. *Alembicus vitreus paulo sapacior, collo hinc impositus, qualem in Relatione Xii adhibere consuevit. In hoc rosida & aquea particula, vellicula Ælis volatilis, ad receptionem cohibentur & mutantur.*

E. *Recipiens seu cucurbita itidem capacior, in quam destillat liquor Ænosus volatilis.*

do prius præparatorum & reclusorum, jam enim hoc præcipue exemplum sumptimus.

Digreditur in glasti descriptionem, & præparationem.



Sal volatile ex hoc modo præparatis plantis, facta jam sponteâ distillatione, igne mediante acquiri potest.

Aded jam pansa & reclusa sunt hoc pacto omnia, ut & sponte abutum parare \ominus volatile possit, & citra ullum alius coloris accessum colligi, novo & iusurato destillationis genere, ubi, cum alias sine igne Chيميци edēn αζιόλογον τῶν χρησίμων κατὰ σκοδάζον, nihil quod opera pretium sit, utiliū parare possint, spirare cernitur naturæ vesta æthereos fumos, & sine furno ipsa sibi sufficere, quem ex ipsâ materia sortitur.

Ast ne sic quidem inexhaustæ sunt omnes dotes, ipsa partem ministrat adjuncta tam commodè natura, & quantum interiora possint, sponte destillando manifestare; partem verò, & quidem non levem, quam absconderat in globulis quasi intimius, ignis artificis reservat, ut præeuntem ipsam si sequatur, absolvere opus possit, & \ominus volatile residuum, copiosum, neque enim omne avolat, igne extorquendo in gloriæ se partem vocare.

Facilis res est, & ex passim obvio, ac venali glasto, præparato scilicet, siccoque, pro tinctorum usu unice accommodato, parabilis.

℞. Glasti præparari q. v. v. gr. lbij.

Indito \ominus vitreæ in arenâ, facta probè lutura, pel-latur primò phlegma; hinc nebularum forma spiritus, sale volatili potissimum ebrius, cui tandem oleum flavescens fœtidum, instar olei lumbricorum ferè minori quantitate succeder. Filtratur liquor volatilis urinosus & ab oleo separatus, addito etiam, quod cum \vee ex recipiente elutriatur, rectificetur sive per se, sive additione cæterum puriorum cribellatorum, & sic habebis spiritum, seu \ominus volatile liquidum πολύχρηστον, antiscorbuticum, diaphoreticum, antipodagricum &c.

Fixationem salis volatilis hujus \sim \ominus Oli & aliis acidis machinari licet, quamvis longè melius volatili forma in usum cedat. Par ratio est similium eodem modo.

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

In Scholis Medicis glasti nulla vel parca admodum hodie occurrit mentio, ut locum & hic habere videatur. *Helmontiana* querela, à *Dioscorido*, usque tempore paucam vel nullam accessionem factam in hoc usque seculum, aded videas pleraque herbaria tantum gaudere transcriptione virtutum, ut, quoad harum vim, si unum legeris, omnes legeris, in vastam nihilominus molem excrescunt, & præter icones, eoque falsos sæpè & imperfectos, parum solidi tradere, & quod non dictum sit prius assolent.

Cum *sativa* sit alias isatis, alia *stvestris*, ex *Dioscorido* textu patet, antiquissimum esse usum prioris ad tinctorum usum, *sativam* ait, $\eta \mu \sigma \nu \beta \alpha \phi \epsilon \iota \varsigma \chi \epsilon \omega \nu$, quâ lanarum insectores utuntur. Ex quo colligere non ineptum foret, & præviam ad usum hunc præparationem, dudum & cognitam, & exercitam fuisse.

Tertium ex eâ accedit Thuringiæ nostræ vestigal, cum aliàs & vino & frumento abundet vid. *Cornarius Comm. in Dioscoridem lib. 2. cap. 169. pag. 210.* Hinc vulgatum est proverbium: *Tria fundere Thuringiam cognomina: VVein, VVeiken, VVald*; quibus & *quarum, VVolle*, non immeritò licet addere.

Proventus isatidis instar zizanæ cujusdam, ceti vulgò eam vocant, facilis est, modò in solum pinguius incidat.

Inprimis optimè crescit illis in arvis, quibus prius linum satum fuerat; sin minùs antecessore hoc gaudeat stercoreari eadem probè postulant.

Alterutro horum facto sive lini præcesserit fœratio, sive stercoreatio proba aut foditur terra ad sationem, aut aratro ad id aptato, quadrijugali, *grosser VVaidpfug*, profundius aratur. Sin communi aratro præstare id libuerit lentè festinandum est, mora enim eget; nec tam alienis, quàm domini oculis, cujus præsentia, elogio *Palladii lib. 1. de re rust. l. 6.* profectus est agri, id gerendum.

Quod autumno aratro præparatum est arvum, hyemalibus feriis ad purificationis Mariæ festum relinquitur uberi irrigationi.

Semen ipsum, perinde est, recens ne an vetustum sit, modò non fumi accessione, quod notabile est, corruptum fuerit.

Post festum purificationis, molliori cœlo, seritur, & ex voto quidem magis, modica nive posita, & eâ quidem cautione, ne dense nimis satio fiat.

Elapso uno alteroque die, quæ mora non de nihilo est, studiosè mediante occatione, terra obtegatur.

Post Pentecosten diligenter repurganda ab aliis herbis.

Post festum S. Johannis ad primam messem maturascit, cum extrema folia flavedinem præ se ferunt, vel metus est, flores ipsum meditari, ferro ad id parato, *Stoßseisen*, in terra herba detrunctatur, in cumulum hinc colligitur, & ad loturam fertur.

Facta lotione pabone ad locum aptum mittitur, sparsim dispergitur, & vertendo siccatur; marcor hic, die *VVelche*, seu colono, si minor fiat & superficiali, seu emptori, si justus, lucrum fœnerat; illi quidem, aucto globulorum numero, huic meliori præparatione. Sin inconstans tempestas minùs faveat, ut modò siccetur, modò imbris irrigetur, quæ liberari ab extraneo humore debebat, periculum subit corruptionis, & testis hujus, nigredinis, quod sæpè unicâ nocte contingit.

Absumpra superflua humiditate, congeritur, & truf. cilibus molis inferitur, quarum plures videas in Thuringia, tum usui huic accommodatas adhuc, tum vestigia saltem exhibentes pristinae copiae & culturae, solos lapides.

A conquassatione seu comminutione, & tritura hac, qualis quidem succulentis adhuc convenit, in acervum obtusum seu rotundum compingitur, superna parte tecta pro arcenda pluvia, circa latera vero ventilabra fabricantur, ut herbacea sanies residua per noctem excludatur. Modum hunc tangit & describit paucis *Ryffius Comment. in Dioscor. lib. 2. cap. 177. p. 193.*

Abacto liquore digeritur in magnos globos, *virde geballet*, & tecto patulo ad id facto, *Hordeu*, ad machinam illam vecta imponitur, ut sicceretur, aded omni studio superflua humiditas abigitur, ne in putrilaginem fatiscat; tum intentioni primariae, quam colonus habet, tum secundariae, quae nostra jam est, ☉ scilicet volatile acquirendi, contrariam. Relinqui hic loci potest, quamdiu id fert occasio, aut globuli jam leniter exsiccati, propriae inferri domui, vel ad ulteriorem praeparationem mercatoribus vendi possunt.

Globuli enim hi, quos sexagenos *Schoellweife*, vendi videas, tabulatis ingesti & accumulati sensim incallescunt; & urinosum ☉ volatile de se exhalant, eo citius, quod calor ambientis, aestivo tempore, & ipsorum copia major, illud vero non solum, quo continentur, spatium, sed totam saepe domum, & vicinas, odore suo replet. Adhaerent tignis, parietibus, & tectis guttulae rosidae, & in auras expirat, nisi excipiat, ☉ volatile. Tandem aqua etiam affusa magis intenditur calor, donec non in cineres, ut quidam volunt, sed pulverem grossum, tinctorum usibus aptum fatiscat, quod hinc glastum *κατ' ἐξοχήν*, seu praeparatum, audit.

Sed absolvemus, quod restat circa isatidis culturam. Secunda vice propullans non, uti prius, sollicitus ungiculis, ab immixtis aliis herbis repurgatur, sed oves in agrum mittuntur, ut pasti interfecto hoc gramine repurgent isatidem, neque enim illi vel esu, nisi ☉ vascantur, nocent, vel conculcando in terram, nisi pastoris negligentia diutius, ac par est, inhareant agro.

Exactis sed septimanis à prima messe, denud, ut superiori tempore detruncatur, & iterum elapsis, totidem hebdomadibus, si caelum autumnale favet, nec gelu tam citò ingruit, tertia vice, licet haec minori bonitatis nota, ad utrumque opus polleat, tum ob caloris solaris digerentis insufficientiam, atque aded tincturae paupertatem consequentem, tum ob tempus loturae minus aptum, frigidiore existente aqua, & marcorem operi minus parem, ut taceam exhaustas jam ferè vires, ☉ is volatilis penuriam.

Patet & hinc, qui tardius, & quadragesimali demum tempore arva ad isatidis sationem arant, binis tantum gaudere messibus, quarum prima cum secalis & tritici plerumque coincidit, & solent hujus generis glastum vocare *iung VVaid*.

Sequenti anno iisdem arvis, quae prius isatidem tulerant, hordeum inferitur.

Sin semina desiderantur, tertia messe pars intacta relinquitur, unde vertente anno in semen exit, cujus pretium cum avenae coincidit.

Sunt, qui à tertia messe, aut alterius speciei, *an dem Jung VVaid*, secunda, seu, ut uberiori foenore poriantur, seu praepediti tempestatis & frigoris obstaculis; respectivè tertium aut secundum metere nequeant, non ad hordei novam sationem agrum scindunt, sed hiemate herbam in hospitio suo permittunt, donec commodiori tempore circa quadragesimam demum, prius, quam hordeum seratur, in detruncationem

cedat quod vocant *glastum secundarium*, *Rompe VVaid*. Ast & minus bonum id est, & arva nimis exsugit, ut ipsum hoc postmodum in hordei proventum redundet minorem.

Ad usum Glasti digressio.

Quantus tinctis colore glasti lanis honor sit etiamnum, norunt Mercatores, & experiuntur, qui panis hoc modo paratis utuntur. Colorem quidem propriè caeruleum, ob ☉ volatile eminens, reliquis vero constans fundamentum praebet, unde cultura sua et in Thuringiae nostrae tum aliis pluribus regionibus infinita attulit commoda; ast postquam Indicum pigmentum adveni coepit copiosius, utut ob exedentem & corrosivam naturam minus commodè his usibus serviens, licet colore, & quoad extrinseca alia ad speciem ejusdem notae & durationis tincti eodem panni videantur, Hanc ob rem jamdum praeterito seculo, anno 1577. Francofurti, communi Imperii nomine decreto ejusmodi fraudibus & noxis prospectum fuit, & hocce nostro, anno 1654. Ratisbonae d. 2. Aprilis *D. FERDINANDO III.* sub poena confiscationis cautum fuit, ne Indigo, ob copiam tingendi usui vulgò inserviens, amplius adhibeatur, in detrimentum Thuringiae, Germaniae, & emptorum. Ed tamen jam res devenit ut ad paucos tederit glasto solo utentium tinctorum, arque aded molarum trusellium, hinc inde apud nos vestigia pristini mercimorum floris exhibentium, numerus.

Non nostrum jam est, latius disquirere, qui floridi colores, extractum, ex isatide consurgere possint & adhibeantur quoque à quibusdam, neque in tinctoria ipsa arte occupari ad notitiam simplicium, & nostrum huic in finem medicum, nosse sufficit, quod indigo & glastum ex eadem propullulent prolapsa, neque nisi praeparatione differant, unde tum alii, tum imprimis *Amatus Lusitanus*, *Comment. in lib. 5. Dioscor. enarrat. 67. pag. 509.* Indicum, scribit, esse succum defecatissimum isatidis herbae, concretum inspissatum.

Placet in communem notitiam praeparationis hystoriam huc transferre ex auctore anonymo de *l'histoire des joyaux*, qui creditur *Dn. de Chapuzeau cap. 6. p. 92.* Indigo, ait, quo ad floridiore vidioreque colores utimur, ab arbore, (*rectius planta*), delumitur, quam post pluviarum excessum plantant, & quando ad altitudinem duorum triumve circiter pedum excrevit, rescindunt dimidii pedis à terra distantia. Partem rescissam sumunt, in repositoio cum calce reponunt, quae aded indurescit, ut haec repositoia matmorea videantur. Haec stagna seu repositoia in circuitu communiter 80. pedes habent; ad medietatem, (vel paulò plus,) aqua replentur, dein ad summum usque virentibus arboris hujus frondibus complentur quotidie omne hoc movendo, donec immergatur penitus & evadat instar limi aggesti, seu, ut terra pinguis aqua diluta. Hinc postquam haec omnia per dies aliquot quicta relicta sunt aquam emittunt & elabi sinunt, qua educta penitus, massam hanc limosam manibus, prius oleo imbutis, prehendunt, & ex eadem frustra magna vel parva pro lubitu conficiunt, quae Solis radiis exsiccanda exponunt. Ad fallendos Mercatores eadem aliquando arenae pro exsiccatione committunt, tunc enim facile arena ipsis adhaeret; majusque inde pondus acquirunt. Sed nequitiam hanc multà launt, si id resciscat praefectus. Ceterum haec arbor ter rescindatur; sed quoties id reperitur, minus inde resultat indigo; & inter centum partes, viginti ad minimum de pretio pereunt, cum tantum coloris non praebet, ac prima species. Optimum Indigo

ex Biana, Indova & Corsâ, tribus pagis uno vel altero die ab Agra distantibus provenit, & hoc est, quod in frustra redactum globulorum ad instar cernimus. Octavo à Surat die, duobus ab Amadabat milliaribus pagus est, Sarquesse dictus, unde indigo plantam ad nos fertur. Eiusdem ferè naturæ, pretiique vix dissimilis indigo crescit etiam in Regno Colconda. Tandem idem ex Occidente, præsertim ex Antillis, ubi eodem ferè, ac in Oriente, modo sit, huc affertur.

Colligere ex his facile est, & unde color exalteretur, & profurgat cæruleus, ob explicatum magis Δ ur in Ole volatili refidens, & quam ob rem indigo hoc tindeat lanæ in recessu minus bonæ sint, ob calcis scilicet accessionem, quæ ipsa quoque causa est: cur exaltatus hic color & in apricum deductus minus constanter tingat, quàm sibi relictum & ritè præparatum glastum, quod citra talem communionem, mediante artificum tiagentium industria, adhibetur: neque enim pars salina & terrena calcis vivæ, quæ dubio procul & pondus simul adauget, eandem adulteravit.

Neque desperandum esset de eodem artificio parandi indicio, si huic operi manum quis & solertiam impendere velit, observata calcis & isatidis proportionem, & quæ aliæ minoris momenti se suggerunt circa id, circumstantiis.

Certum interim est, quintam quasi essentiam ad colores magis floridos & fulgidos exinde parari, & in usum venire posse.

Causa incallescens & evolutionis Salis volatilis.

Dux sunt operationes Chemicæ præcipue circa mixtionem corporum potissimum evenientes, fermentatio & effervescens, quæ calorem producant, tum ad expansionem & explicationem partium volatilium & aëreas, tum ad alios usus ubere proveniunt facientes.

In illa quidem blandius, & sæpè vix ad sensum; in hac verò fortius omnia incallescunt, quia utrobique motus partium elementalium mixti occurrit, licet diversus ratione mediorum, & finis, aliarumque circumstantiarum.

Nostra hæc operatio ad quamnam speciem referenda sit, dubium est non leve. Sicca quippe est, & citra turgescens vel intumescens, quale quid in fermentatione visitur; neque tamen duo diversa sive similia, sive contraria apparentia, adversis occurrunt frontibus; sed, nullo extraneo interveniente, spontaneo motu exsurgunt partes volatiles.

Participat tamen de utriusque, cum & motus sit particularum à se invicem secedentium & avolantium, & cum insigni calore eructet Θ volatile, non aliter, ac si Δ us ex salis \ast ci & Tartari combinatione evolatur, unde commodè vel fermentatio sicca, vel effervescens implicita, quæ citra pugnam & tumultum evenit, dici posset; licet prius ferè malim.

Quantum aliàs inter se commissa corpora ob diversitatem pororum effervescant, in operationibus non solum Chemicis, sed & vulgarissimis occupatis sæpe numero occurrit.

Sic v.g. calor & effervescens occurrit 1. in præparatione Tartari Θ -lati, ubi Δ -us Θ -li cum Θ -le Tartari sicco vel deliquato conjungitur. 2. in præparatione arseni Tartari, \ast ro idem Θ Tartari saturatur, in fixationem Θ -ium volatilium, cum Θ -nosa ligantur cum acidis. 4. in præparatione Θ -li Θ , cum v.g. limaturæ ortis Zij , artificiosè & per vices affunduntur Δ -us Θ -li Zvj , & aquæ fontanæ Ziv . Acida enim, quæ porosiora sunt, solvunt & aggrediuntur cum effervescens modo calida, modo frigida. 5. in præparatione Δ -us

\ast ci cum Θ -ibus fixis, \ast co additis vinculum ipsius, seu acidum absorbetur, & volatile sui juris factum propellitur. 6. cum præparatur Δ -us Θ -lis Tartari Oustio vel crudo. 7. cum præparatur Δ -us Θ -næ cum calce viva. 8. cum Θ -terebinthinæ jungitur Δ -ui Θ -li, vel Θ . 9. cum Θ -li Θ -o anisi. 10. cum Δ -us Θ & V uterque rectificatus, accedente motu vel calore. 11. cum miscetur Θ cum Θ -lo ad præparationem V . 12. cum calci vivæ affunditur V . 13. cum rectificatur V . gr. Δ -us Zij , & phlegma iterum jungitur acido in fundo remanenti, ubi calor & effervescens confurgit, cum tamen priùs se invicem tolerassent &c. Plura hæc in rem videantur apud D. D. Elzholzi in *Elaboratione curiosa*, pag. 62.

Sed horum alia ratio est, unde & longius ad eadem digredi, extra oleas esset vagari. Arcessenda paulò altius est hæc nostra incallescens.

Præsupponemus iterum,

1. Adesse in plantis partes volatiles aëreas & Θ -linas, saltem materialiter, quod nemo negaverit: idque modo majori, modo minori quantitate; magis verò & minus non variant speciem.

2. Θ hoc volatile esse substantiam tenuem, ad motum maximè habilem & agilem.

3. Non tam generari ergo propriè, prævia præparatione supra exposita, Θ volatile, sed:

4. Evolvi impeditas, & libertas à compedibus avolare, unde explicatione egent & liberatione, si capere eandem velis.

5. Partes volatiles spirituosæ mediante fermentatione propriè dicta eruantur, unde rectè Hamelius scribit lib. 2. cap. ult. de consensu vet. & nov. philos. pag. 412. ante fermentationem aut destillationem aut alia arte prolici vix posse spiritus, non, quod ibi non essent, sed, quasi victi & aliis elementis oppressi jacebant; adeoque thesis firma est, non inesse spiritus plantis, nisi per fermentationem deducantur in actum. Uti enim Δ materiale ipsorummet, & potentia inesse non negatur, ità minus rectè de formali quis id accipiat, nisi velimus confundere Δ -us Φ logyses, & partes aqueas parum de oleis tecum habentes, unde spirituosæ videntur aquæ, ob oleosas & volatiles particulas in iisdem dispersas. Equivocatio est in nomine spirituum. Adscendant partes quædam volatiles; sed non in formam spiritus, neque enim striatim procedunt, etiam si post rectificentur, adeoque fermentatione opus est ad propriè dictos spiritus, qualisqualis demum illa fuerit. Vel, nisi velimus confundere Θ -ia cum spiritibus, neque enim, qui acris est, spiritus nomine (Φ logyses) appellandus liquor.

6. Partes volatiles salinæ mediante incallescens simplici, & resolutione citra turgescens & motum talem intestinum, qualis in prioribus occurrit, se capientes offerunt.

7. Ubi spirituum & salis volatilis copia est, brevè exagitantur & in motum cidentur.

8. Sulphuræ herbæ magis spiritum, actes, salæ, seu salinæ magis sal volatile; utraq; tamen pro diverso præparandi modo & spiritum & sal volatile fundunt.

9. In austis verò & acerbis partes volatiles non solum subjugatæ; sed etiam fixatæ quasi sunt, unde ex iisdem sal volatile non ita passum, nec nisi sub prædominio aliarum evolvitur, ceu in foliis quercus, aliis; que prædicto modo paratis, videre est.

10. Hinc ubi jam laxatis compagibus & vinculis protuunt partes volatiles, uti per putrefactionem ingrato & foetido; sic per artificialem hanc præparationem Θ -noso gravi odore nares feriunt, & spiculis suis membranarum narium, odoratui interventem, vellicant & lancinant.

In salibus enim volatilibus explicatissimum est sulphur, unde & citius voto avolant, sibi relicta, & si acidis hoc dometur & obrundatur, odor etiam abito omnis, ex quo adhuc patet, cur sulphuri odor à Chemicis magis ascribatur, quàm sali. Sulphur enim est primum odorabile; sed hoc debet esse explicatum sale volatili: inde videmus, illa maximè esse odorabilia, quæ sale volatili oleoso seu remixto cum sulphure, ejusque exhalationem adjuvante, abundant. Unde etiam plerique auctores recentiores concedunt, quod salia volatilissima simul sint oleosa, seu, quod ex Oleo lixivio fixo & spiritu volatili consent, adeoque sulphur est principium radicale colorum & odorum; explicativum verò illorum \ominus , tum fixum, tum volatile, seu Mercurius.

Quod si humidum copiosum adhuc adsit, motum & fluxum \ominus is & Δ is obtundens prorumpunt quidem eadem simul in propriè dicta fermentatione, & aucupio apta se sistant, vel cum fœtore, & conjuncta putredine mixta resolvuntur.

Sin neutra horum abundant, neque explicata sint spiritus & salis volatilis tenacula, citra hæc ipsa fœtorem & putredinem, exarent, marcescunt & faciunt.

Ed magis verò & celerius moventur, quod à carceribus magis liberantur, unde cum exhalant jam partes aquæ superflue; ipse verò succus & sanguis, ut ita loquar, conjuncta adhuc sint, inde facilius jam evolvant, expedita vehementius agitantur, & sui juris evadunt in nostra hac præparatione partes volatiles salinæ, cum liberum jam motum, & solutiorem naturam sunt, affusione aquæ magis congregantur, hinc & fugam unà meditantur.

Ut aded, vi caloris interni, inde concitati, minus humido gaudens hæc compages, secundum artem jam præparata, à se dimittat sal volatile, seu plusculum humidi alias effugiat fermentatio, & spirituosas partes turgentes cohibet; opus tamen est in hoc opere nostro aliquali & proportionato residuo humido, ut cum eodem seu accelerante ob calorem abitum vehiculo jam liberatæ partes aufugiant. Olim, instrumento commodo jam delineato exceptæ alta petant, colligantur in \times co. & in receptaculum destillent.

Modus hic collectionis facillimus est, atque in aliis plerisque prima statim vice, sine prævia rectificatione, odore, sapore, effervescencia cum acidis, aliisque documentis, \ominus is volatilis probat præsentiam, in aliis verò magis post separationem ab a quosiori vehiculo, quod itidem facile obtinetur, si pars quarta vel tertia abstrahatur reliquo insipido rejecto.

Exhibebam ante quinque hos annos \ominus hoc volatile Serenissimo E R N E S T O, Duci Sac. I. Cl. & M. pientissimo memoriæ, qui, uti gnarus erat horum quam maximè, ita mirè delectabatur, cum & odoratu urinositatem perciperet, & sapor idem confirmaret, & affuso spiritu \ominus li effervescenciam perspiceret, ut aded rei sua jam constet veritas, antiquitas, & ratio quàm uberrimè.

Aliorum mentio, & Salium volatilium usus.

Si nullo alio, quàm isatidis exemplo, probare liceat salis volatilis experimentum; id ipsum tamen jam sufficeret. Neque enim in eo objicere licet, à particulari ad universale non valere consequentiam. Si enim ex suprâ abundè dictis concedamus, dari ex hypothesi Chemicorum ita dicta principia, non tam extrinseca, & producta, uti id solent vulgo sæpe confundere, quàm intrinseca: si demonstravero \ominus volatile à priori, ab ejusdem affectionibus, vegetatione,

& quæ in specimine ipso de his differimus latius, & vel in unico à posteriori, firmiter concludi posse reor, in omnibus idem inexistere, licet majori vel minori proportionem.

Abundat verò & prædominatur in viridibus plantis, v. gr. in gramine & aliis herbaceis foliis, & seu \ominus volatile præ Δ re, unde & eadem crescunt, & vegetantur, & viridia magis nutriunt bruta, quam arida hinc & virides herbarum fumant magis, non tam ob phlegma solum, (aquæ enim fumus & phlegmatis oculos con mordicat;) sed potissimum ob \ominus volatile. In pallidis verò jam seu flavescensibus Δ præpoller, seu aquiliter se, ut in seminibus patet, gerit; unde facilius comburantur.

Si ergo quærat, an idem ex aliis fieri possit prædicto modo, ultro id affirmamus; quin ex volatilibus & terreis, v. g. cochlearia, absinthio, carduo benedicto, tabaco, ipsoque gramine, & foliis quercus tres procedit, utur diversis oda particularum mixtio non possit non variantem etiam gradibus liquorem fundere.

Recipiantur modò herbarum recentes, separatis caulibus, qui impediunt conglobationem, & mutata proportionem contusionis, exsiccationis, aliarumque circumstantiarum in albis, prout humidior siccior est planta, procedatur non faller experimentum, licet in quibusdam, seu diximus, fixioribus, obtineatur quasi \ominus volatile, ob conjunctas partes austriusculas, &c.

Fidem rei facere nobiscum potest Excellentissima Dn. Ludovici, quomodo tum alia tum ipsa folia quercus se gesserint, effundendo itidem liquorem, sed minus urinofum; & in tabaco res exploranda fuisset, serenissimi E R N E S T I beatissimæ recordationis mandato, nisi & absentia nostra, & gloriosissimi Principis morbus, ac alia obstitissent. Erit tamen hæc ubi explicandi locus.

Ex Cardui benedicti resolutione vel aliud agente confirmari in eodem sumus, offerente se post incalcementiam liquore urinoso volatili, cui tum alia vegetabilia addi possunt, tum imprimis etiam hepatica nobilis, foliis pinguibus, recens, quam inter antiscorbuticas refert plantam, ob copiosissimum, quod gerit, \ominus volatile, nulli dubitamus, præcipuè cum & per se ipsa destillatione recentissimæ plantæ, addita aqua, obtulerit nobis liquorem acerrimum instar, radicis quæ linguam ferientem, ut hinc debitor modo præparati aqua vix unciis præscribenda sit. Ut in usum ceder familiarem, consuevimus eodem extrahere animam barbari, si v. gr. \mathfrak{zj} . radicis affundatur \mathfrak{zxx} . circiter aqua ob lentorem, quem in recessu gerit rhabbarum, additis \ominus Tartari \mathfrak{zij} . vel $\mathfrak{z\beta}$. quo pacto miscetur totius & medicamentum longè nobilissimum constituit ut verè polychrestum. In \ominus li affundatur, statim volatilis illa acrimonia figitur & miscetur.

Utut verò hæc methodo, tuto sine igne, tum cum eodem ex quavis herba & ex quovis ligno, liceat incalcere, fieri possit & ius; ut tamen omnibus lampibus res careat, & in posterum in officinarum usum cedere possit \ominus volatile instar omnium sit \ominus volatile itididis, benè rectificatum, quod ad gr. xx. xxv. dari potest in omnes illos usus, qui expectantur ab hoc remedii genere.

Occasio vel Gothæ, vel Erfurti, vel in vicinis locis aliis haberi potest quàm uberrima, ut & hoc pacto toti Germaniæ; non dicam Europæ prospicere eodem possit nostra Thuringia, citra defectum, si sint, qui expectant. Ad minimum cuivis jam copia datur, ex hoc oris exportatum glastum propriis manibus collatum in usus, cum fœtore, sollicitare.

Uti enim in genere conveniunt \ominus ia volatilia

¶ Osa viribus generalibus; ita perinde fuerit, utrum ex vegetabilibus seligas.

Præcipue vero hoc ipsum isatidis. \ominus volatile, ceu jam cap. 5. idetigimus, egregium constitui antiscorbuticum, anginae & aliis inflammationibus medetur & eadem præstat, quæ in vigorando sanguine alia similia celebrantur facere. Quin & ipsius præparati glasti magna, vel vulgi experimento, anginae medetur, & faucium quibusvis inflammationibus præsentaneum est remedium; si gargarisatio cum infuso liquore instituat. Imo ipsum liquorem volatilem mitiorem gargarismatis huiusmodi non raro miscuimus, ceu alias \oplus *cale nostrum, vel \oplus statum, (quod pro diverso tractandi modo & sexangulare & cubicum exhibere facillimum est, neque enim adeo propriæ \ominus ibus sunt figuræ, uti vulgò statuunt, quin unum idemque aliam eudere possit,) proficua esse notum est.

Taceamus hoc loco, quæ de colore caruleo & viridi ex \ominus is volatilis experimentis deduci ulterius possent, quò & cineres v. c. abstrahii paulò intensius & diutius calcinatæ, & \oplus ci, lixivium cœrulescens præbentes, referre possemus, cum albi intensio sit de his ipsis disputare. Sufficiat hoc loco textus Paracelsicum, ex l. 3. philosoph. tract. 3. c. 3. p. 46. colores provenire ex \triangle ce, quod, licet hosce in se non habeat, eosdem tamen possidet ratione proprii sui \ominus is & \oplus ii, qui hisce pollent, idemque mutant, ex quo superius circa hoc asserta lucem sibi mutant.

Nec tacebimus, in asserti huius fidem, præter \ominus volatile, quod præsens adesse ex superioribus concessum est, \triangle is præsentiam demonstrari posse non solum ex \triangle geo quod idem per supra dicta claret & concessum non minus est; sed etiam, si fidem deroges, experimento alio, eoquæ poyo, & quod pluribus dignum esset excutere.

Affundas quæso; \oplus à \triangle latione glasti residuo, seu perfecte \triangle to, seu amplius calcinato ubi flammâ id combûritur & ardet, aquam calidam, & hinc lixivio inde facto, (ita id vocabimus, licet non effervescat cum acidis) misceas acidâ, v. g. \oplus , \oplus li, vel alia, & manifestè se idem odor naribus offeret qui in præparatione \triangle aurati \oplus ii apparet & liquor ipse \triangle colore exhibebit, quod his mediis \oplus ium in fundo subsidet flavescens, ulterius filtratione prægressa, exiccandum. En sulphur vegetabile! colorum originem ac fundamentum, quod adeò latuerat! Si auratum id mecum vocare lubido sit, non erraveris.

Non dicemus jam pluribus, plantas quasdam tam decoctione, quam destillatione salum acquirere saporem à \triangle le volatili, ceu ex foliis cardui benedicti. \oplus us efficacissimus aurei coloris, soporemque lixivii ferè habens à sale volatili, describitur à Sennerto in institutionibus l. 5. part. 3. sect. 3. cap. 5 pag. 135. & decoctum ex chamamelo Romano triplicatum ad calculum saporem salum acquirit, à sale suo volatili, ut jurare quis augeat, pugillos aliquot salis culinarii in eo esse liquefactos, teste Simone Pauli in quadripert. botan. class. ser. p. 155. Quin idem fit in nonnullis mineralibus & metallicis, uti in præparatione Tinduræ \oplus tis cum Tartaro liquor manifestò fit \ominus inus; qui modus, uti in Germania dudum vel publicis scriptis plurimorum innouit, & eodem modo rob \triangle le nostrum fit; ita frustra sunt, qui involucris hoc arcanum tegere, & inventionis gloriam sibi attribuerè satagunt.

De Salibus volatilibus oleosis reddendis.

Saturare magis & miscere \ominus ia volatilium cum oleis, inter alia Chemicorum inventa non minimi pretii est

εὐχένης seu, ut ingratiior sapor odorque velo hoc occultetur, seu ut in vulgus nota medicamenta pro magis arcanis & non imitandis habeantur, pro ut cuiusvis scopus in hoc variat, seu, qui optimus est finis, ut hoc artificio promptius agant, & stomacho minus negotii creent.

¶ Duo enim imprimis incommoda à \ominus ibus volatilibus indiscriminatim usurpatis observantur ab accuratioribus practicis, alterum, quod continuatâ usurpatione appetitum deficiunt, & lassitudine hinc torpidâ membra mactent magis, cum acidulum in recessu menstruum stomachicum absorbeant & invertant, ceu id à fixioribus quibusdam lapidibus \oplus & pulveribus nephreticis secretioribus non raro quoque obtingit; alterum quod in hypochondriacis & scorbuticis, quorum sanguis magis rarefactus est, & facilius ebullit, sape, quæ quæta sunt, excitant & procidunt symptomata. Observavimus id ipsum in \oplus u cochleariæ sapius, etiam, qui ad extractionem v. gr. \oplus ilium aliorumque tantum erat adhibitus. Adeo facilis est error, si specifica hæc vel illa credamus occultâ magis, quàm certâ & definita ratione morbum oppugnare.

¶ Magis scilicet conveniunt hæc omnia ubi vel fixiores & torpidiores sunt humores; & acidi, austeri pontici delinquant; vel ubi \triangle sanguinis consortio feri proportionato eget, ceu in mania, melancholia, affectibus soporosis, hysteriis, fixioribus hypochondriacis, item præcordialibus anxietatibus, paralyti; obstructione nervorum, epilepsiâ etiam, non effrenis ebullitionis impetus in causâ est, & similibus aliis nervosi & venosi generis vitiis, quæ liberum pororum meatum, & suaviter demulceri efflagitant.

Licet autem combinatio \ominus is volatilium & \oplus orum \triangle latorum aromaticorum, ut & \oplus , & \oplus us \oplus is \oplus ci videatur, & hinc inde scribatur perdifficilis; attamen utrorumque, imò singulorum longè facillima est, si quis naturam rerum exploratam habeat neque tam assertis auctorum, vel terminorum lussibus nimis inhæreat.

Si enim recipias v. gr. \oplus um \oplus ci per se coagulatum, seu crystallos ejusdem, in fundo nitri sensim subsidentes, vel quoque ipsum \oplus um seu \ominus volatile aqua non solum, (quid enim aliud est hic \oplus us, quàm aqua \triangle le volatili inebriata?) v. g. p. ij. \oplus aromatici, anisi, caryophyllorum &c. p. ss vel j. & ubi mista per pauillum temporis spatium steterint, addas \oplus rectificati q. s. v. gr. p. iij. vel vj leni digestionem statim miscentur, ut vel per se dispensari eadem possint; vel quod melius, in \oplus us longè nobilissimos per \oplus cum \triangle lata hæc omnia asserventur.

Hoc modo intra semihoram ferè hæc conjuncta exhibere licet, & perspicere thescos vim, quod \oplus \oplus ci coagulet \oplus , id quod uti apparet quidem in rei veritate, ita facillimum judicatu est, unde hæc fiat coagulatio, & quantum illi sit tribuendum.

Quin, ut faciliiori operâ & sumptibus hæc constiant, ipsum \oplus um \oplus is \oplus ci avifarum, aromaticum, hypochondriacum, utcumque expectatur, reddere jam facillimum erit, simplicium ipsorum accessione, modo non peicellaris prædicto coagulationis fulmine.

Ex vegetabili \triangle le volatili id obtinetur quàm facillimè, si posteriori, hoc modo aromatica addantur \oplus osa, & una cum \oplus juncta \triangle lentur; neque priori omnino reserit frustranea, præcipue, si diligentia abstractione concentratum fuerit \ominus volatile; minus tamen potestatis in olea \triangle lata habet idem, tene- rum ac delicatum quod diximus, quàm \oplus us \oplus is \oplus ci.

Misceri hinc idem potest \ominus volatile \oplus osum cum
V u u 4 essen-

essentis, & Tincturis aromaticis ac balsamicis, magno cum effectu, inde enim medicamenta emergunt longè utilissima, & si qua alia, feliciter se in morborum speciebus gerentia.

Conferri hic possunt, quæ in eandem rem commentatus est personatus ille, sed doctissimus *Leoniceus*, *metamorphos. Apollin. & Esculap. pag. 20. & seqq.*

Memoriam hic subit, quod *excellentissimus D. D. Takus* ante aliquot annos, cum de experimento nostro sermones invicem caderemus, nobis retulit, quendam parare ex herbis nitrum inflammabile, ut commune, exstare etiam *Θια volatilia* ex plantis. Quidam enim apud *Fernelium libro de abditis rerum causis*, quem ipse fecerit aliquoties. Describitur modus hic sub titulo *quinta essentia*, in qua maxima sit proprietatis efficacitas, loco citato *cap. 18. pag. 267.* Primum, scribit, è re subjecta aquam lento vaporatio proleatant, hic deinde fæces respergunt, ut secundo humorem eliciant, sicque septena resperione & expiratione fæces torreti non sinunt, & ex his vim facultatemque omnem exhaustiunt, aquæ maximeque assidenti oleo innixam, quæ ad multa utilis accommodataque sit. Quin etiam exceptas aquas vase pelicani effigie multa agitatione anfractuque longo circulant, quod hæ vires sortitæ efficacissimas in quinta illius essentia naturam vix ulli corruptelæ obnoxiam facessant.

Referri etiam huc meretur primum ens plantarum, quod describitur à *Febvre, vol. 1. pag. 303.* aliaque hinc inde sparsim tradita, inprimis, quod *Arragosius* ad *Craonem* scribit *epist. 55. p. 73. ex lib. V.* quantumvis res si ari vix 36. spirituum concretorum, seu *Θilis* volatilis extrahi, reliquum vero aquam inspidam esse, ex quo lucem acquirere possunt, quæ *part. 1. cap. 5. p. 41.* scripsimus sed tempus jam est, ut colophonem hinc imponamus.

Finimus verbis *Polybii lib. 12. histor. ἡ πολυχρηματώδης πικρὴ καὶ πορδαῖα ἑλαιοειδής, καὶ δαπανὴς, μέγα δὲ π συμβάλλει, καὶ μέγιστον ἐστὶ μέγος ἡ ἰατρικὴς.* Illa rerum curiosam inquisitionem, quam suo pte Marte facere aliquis instituit, magnis constat laboribus, magno sumptu; ceteram ad medicinam multum confert, atque adeo pars illius est potissima.

SAL POLYCHRESTUM.

Præparatur ex Nitri & Sulphuris partibus æqualibus simul mixtis & detonatis, de quo vide in Salibus ex Pharmac. *Bateana* mox adductis, observando tantum quod dosis sit ibi parior & quod ad 3vj. in robustioribus ascendi possit.

SAL VITRI.

Nihil aliud est quam spuma illa quæ fuso vitro supernatat, quæque ex cineribus quibus vitratum in vitro conficiendo uruntur provenit.

Sale autem hoc seligatur album extus & intus, ponderosum ac marmoris quam simillimum, rejiciendo immundum subnigrum ac humidum, cujusque frustra miantiora fuerint.

Hoc Sale uruntur figuli illi qui vasa Faventina dicta conficiunt, pro plumbagine iis inducenda, seu potius pro iisdem ad elegantiam extus vitrificandis.

SALAMANDRA.

Super ejus animalis descriptione vide sub titulo *Lacertus*. Erodit autem & exulcerat, unde incinerata felicissime medetur seropulis exulceratis.

SALICARIA, vid. *Lysimachia*.

SALIVANTIA, vid. *Masticatoria*.

SALIVARIS HERBA, vid. *Pyrethrum*.

SALIX.

Salix, Latinis à Saliendo dicta putatur, quod cæteritate crescat ut salire videatur. Græcis pariter *ἡ ἁλὴ τοῦ ἵλας* quod cito in altum abeat.

Salix iulis seu nucamentis è multis vasculis seminalibus compositis quæ semen continent pappo involutum, cum Populo convenit foliis longis aut saltem circumscriptione æqualibus & minimè angulosis ab eadem differt.

Vires & Usus. Salicis cortex, folia, iuli refrigerant & astringunt: exsiccant etiam circa mordacitatem tum flores, tum succus expressus, quem medicamentis exsiccatioris reservant. Haud enim invenias quid ad plures res utilis medicamento circa mordacitatem exsiccante, quod paulum etiam adstringat. Gal. hinc sanguinem expuentibus profunt. Corticis e ramis primis cinis clavum & callum aceto maceratus sanat; vitia cutis in facie emendat, magis admisto succo suo.

Succus è Plaga manans cum floret ad expurganda valet quæ obstant oculis; item ad spissanda quæ opus sunt, ciendamque urinam, & ad omnes collectiones intus extrahendas.

Plura habent veteres de viribus Salicis, ejusque partium, quæ vide apud *I. Bauhinum*.

Folia cum ramis in cubiculis strata aerem infrigunt & febricitantium ardores mitigant. In quem usum haud infeliciter etiam in Italia & Gallia quibusdam locis adhiberi observavimus. Folia cum aliis refrigerantibus aquæ introcta ad lotiones pedum febricitantibus conducunt. Ex ejusdem ligno & bacilli ratorii parantur ad abradendam linguam caulo & febris ardentibus laborantium, notante Camerario hæc omnia è *I. Bauhini Historia*.

Salicis arboreæ ramorum usus est ad periticas pro lupulis & ad stipites pro sepiibus; ligni etiam olim ad scuta; nam cum lentissimum sit, plaga ei inflata contrahit se penitus, eluditque suum valvæ, & ob id contumacius transmittit ferrum, & quod levissimum sit, utilitatem eandem ingeminat. *Plin.*

D. Evelynus lignum hoc ad cultros mensarios exacuentes & poliendos alii cuicunque non ligno tantum, sed & coti præfert.

Præcipuus autem est usus viminum ad Corbes, sportas, qualos, canistra, fiscinas, clatros, vannos, cathedras, cunas, anacinteria, aliaque utensilia innumera texenda, in omni vita adeo necessarius, ut non immerito Cato tertium Salici locum dedisse videatur, ut superius diximus. *Rajus*.

SALSAPARILLA.

Nomina. Smilax aspera Peruviana sive Salsaparilla *C. B.* aspera Peruana *Park.* Smilaci affinis Salsaparilla *I. B.* Smilax Peruviana, Salsaparilla *Ger.*

I. B. Qualis reliqua sit plantæ facies vix cerè quicquam asserere possum; radices vero notissimæ sunt ad desudationes eorum quibus vagus concubitus lucem afficit: sunt autem flagella longissima, plurimarum ulnarum, junci majoris crassitie, obsequiosa funiculorum flexibilitate, striis per longum decurrentibus. colore exterius fusco, qui substantia fæcinacea alba subest, crassiuscula, mollis, & digitorum attritu in pulvisculum solubilis, agaticum ferè referens sapore glutinoso, amaricante, non ingrato tamen medullarum verò lignosum, vitidum, lentum, fractuque contumax. Pendent porro flagella hæc ex pollicaris crassitudinis radice rursus versa, squammata, quæ sarmenta crebra, sordida

nutrit, vitigineis non absimilia, parique crassitudine, veluti geniculis quibusdam intercepta, striata, aduncis spinis minacia, coloris buxi, substantia intus palmæ instar fibrosa, albicante, sapore nullo evidente.

Quæstio est an Salsaparilla dicta sit ipsissima Smilax ratio e Cœli & Soli duntaxat differens an planta eadem affinis. Nobis affinis potius videtur quam eadem.

Salsaparillam Marggravius sic describit.

Caule sarmentoso, lignoso, lentò, viridi serpit, aculeos seu spinas hinc inde habente acutas. Folia solitaria, quinque vel sex, vel etiam duodecim dig. longa exterius acuminata, & tres, quatuor, aut quinque digitos lata ubi latissima; in quibus tres nervi insigniter conspicui secundum longitudinem tendunt transversim autem multas venulas minutas habent, vario flexu discurrentes; exterius dilutè, interius virent saturatè; ad quemlibet cujuslibet folii pediculum (qui brevior) duæ Claviculæ prodeunt, lentæ, longæ, quibus aliis plantis se firmiter annectit. Flores fert racematim. sequuntur dein baccae, primò virides, mox cinnabrie, ubi autem maturuere nigrae, rotundæ, magnitudine mediocrium cerasorum; quælibet in umbella consistit, seu proprio breviori pediculo, quorum pediculorum decem aut duodecim, uni longiori insident; baccae autem rugosæ ut cerasa siccata intus continent unum aut duos lapides albo flavos, duos, in quibus durus, albicans nucleus.

Fr. Hernandez quatuor species Zarzaparillæ distinguit.

Prima Mecapatli Mexicensibus dicta eadem est (inquit) quæ apud Hispanos, ac præcipue apud Hispanenses in vallibus aggeribusque passim nascitur referturque ab herbariis peritis in Smilacem Dioscoridis asperam; quam quoniam affabre descripsit Dioscorides. de forma ejus nihil dicam.

Secunda species Quauhmeapatli dicta radicibus surculosis innisitur, unde profert caules volubiles & spinis horridos, capreolos multos ac semen nullum; folia verò ocyami acuminata, & nonnullis secta crenis, nervis vero discursibus secundum longitudinem excurrentibus.

Tertiam speciem invenit in radicibus Aetnæ, non longè ab oppido Arattaco, per omnia Quauhmeacorchil similem, sed radicibus tenuibus, nec fibris crassioribus.

Quarta Quauhmeapatli dicta illa species est Zarzaparillæ cujus radices in nostrum orbem deferuntur, foliis magnis, cordis figura, caulibus volubilibus & spinosis, radice surculosa fructu nullo, (in hoc proculdubio erravit Hernandez,) & capreolis hinc inde exorientibus.

Ex hac etiam descriptione patet Zarzaparillam congenerem quidem Smilacis asperæ plantam esse, non tamen planè eandem.

Vires. Salsaparilla patrum est tenuium & sudorifera Specificum est ad luem veneream, omnes ejus species, inquit Hernandez placandis doloribus articulorum, aliisque à lue Gallica profectis utiles sunt: sudoribus item evocandis, curandisque mali moris ulceribus, morbisque inveteratis & insanabilibus, & qui è crassis lentisque humoribus habent ortum, aut ad nervos pertinent, & tumoribus præter naturam qui rebelles sunt discutiendis, curandis ulceribus, &c. nam jure decocti per aliquot dies propinquo, eâ mensura quæ à multis jamdù præscripta est cum nota quoque victus institutione, cæterumque rerum quas non naturales vocant; aut pulvere radicum duarum drachmarum pondere ex vino aut aqua devora-

to, aut evocato sudore, aut insensibili quodam perspiratu ægrotantes restituantur.

Zarzaparilla à similitudine quam cum Smilace aspera habet, nomen accepit, quæ Hispanis Zarzaparilla, qui rubus viticula dicitur. Zarza siquidem Hispanis, Lacuna teste, rubum; parra autem Matthiolo interprete vilem, & parilla parvâ vitem, sive viticulam significant: hinc aliqui Salsam parillam Smilacis asperæ Hispanicæ radicem conferunt: cum tamen Peruviana, Cœli temperati occasione & ipsius Soli ingenio, longè efficacior sit quam in Hispaniis, aut etiam Africa, nata: cujus usum primi Hispani ex Peru & novi orbis sive Americæ Provinciis ante quinquaginta annos in Europam invexerunt C. B. qui ante sexaginta annos hæc scripsit.

Prosper Alpinus Smilacem asperam quam in Zacyntho Insula invenit Salsaparillam veram, quæ Medici utuntur ad luem veneream curandam esse contendit. Habebat enim illa radices longas, crassas, asportatis Hispania radicibus Salsæ parillæ omnino similes, reliqua apud ipsum, lib. de plantis Aegypti cap. 43. Rarum.

SALVIA.

Salvia à salvere i. e. Salvum esse dicitur, quod ad multa, præsertim ad fecunditatem salutaris sit; cum steriles hujus usu frequenti gravidæ reddantur, quare Agrippa sacram herbam vocavit, Actio Autore, *ἡλελίσθη* Dioscoridi l. 3. c. 40. quasi in tabernaculum reducta, cum herba ipsa semper retorrida & exsucca videatur, id enim *σφακελ* & *σφακελ* significat, folia enim attritis vestibus comparantur C. B.

Notæ Salviæ genericæ sunt flores magni, hiantes in spicis laxis, è verticillis aliquantulum distantibus compositis, folia lata, obtusa, rugosa, odor valibus & vehementior.

Vires. Salvia nostratibus saluberrima herba existimatur, idèquè verno tempore, Maio præcipue mense, folia ejus & turiones cum butyro comedere solent ad sanguinem depurandum & salutem tuendam, quoniam bufones sub ea libenter stabulantur non nisi diligenter lota & mundata in cibis usurpanda est: ad arcendos bufones & alia Animalia venenata rutam salviæ proximam aut eidem intermixtam plantare solent Itali: secundum vulgatum illum versiculum.

Salvia cum ruta faciunt tibi pocula, ruta

Salvia diuretica est; menses ob crassitiem remotos ciet, & tamen nimios emendat. Parod. est in capitis affectibus, paralyti, vertigine, tremore, Catarrhis. Extrinsecus aphthas oris abstergit (in gargarismis.)

Puncturæ vesparum & araneorum curantur, repetita applicatione foliorum recentium salviæ. Ephemer. germ. An 8. 9. 10: aciditas enim fermenti venenosus obunditur ab Alcali vegetabili. hæc planta nigrescit cum vitriolo ut Gallæ. Communicavit D. Tancr. Robinson.

Ad menses albos ʒi. Salviæ, sars. paril. & balaust. ana Cape ʒj. manè in jussculo per aliquot dies, est remedium Aulicarum Chesneau.

Tremulæ manus auspiciatissime lavantur in vino decoctionis vel macerationis Salviæ. S. Pauli.

Quod si quis ex manipulo Salviæ & Tabaci Virginiæ concilio ʒij. & p. l. arque altero tritæ polentæ decoctum ex aceto cerevisiæ sibi parat, ut os eo proluat, aut dentes foveat dum dolent, is ab usu ingens levamen persentiet, ut aliquoties in iis comperi quibus

bus ex vulgo id commendavi. Simon Paulus. ex excerptis D. Edv. Hulsi.

Vim adstringendi & sanguinem sistendi Salviae infuse cum aliis experimentis demonstrabat illustris Vessingius in Horto Patavino plantarum vires spectantibus exponens, cum maximè hoc suo, quo sputum sanguinis eadem herba cum melle exhibita sanarum testabatur, remedio ex Aëtio desumpto, apud quem Terrabib. I. Sermon. I. Orpheus. dato inquit sanguinem expuentibus succi Salviae Cyathos duos jejunis cum melle bibendos, & sanguis illico cohibetur. Communicavit D. Soame ex observ. Georgii Hieron. Velschii 4. collectam.

Paralysis partium deglutioni inservientium curatur per decoctum Salviae in Vino, & continendo in ore Spiritus Vini infusionis thymi. D. Hulse ex Ettmulleri praxi.

Vinum in quo decoquitur Salvia commendatur admodum à Deckero in praxi ad dolorem acrem ventriculi, (cardialgiam) *Rajm.*

SALVIA VITAE vid. *Adiantum Album* sub titulo *Adiantum*.

SAMBUCUS.

Sambucus Anst. Græcis à Sambuca musico instrumento, quod alii pectida, alii magadin vocant, dicta putatur. alii ab Autore cui nomen Sambix denominatam malunt. Nobis vox incertæ Originis esse videtur.

Sambucus flore & fructu in umbellas aut racemos composito foliis alatis, ramis medulla plurima factis pauculo ligno ab aliis arboribus facillè distinguitur.

Vires. Cortex sambuci interior (medianus offic.) educit serofos humores unde & hydropicos juvat. turationes seu folia tenera in vino decocta, aut in acetariis sumpta non perinde sunt efficacia, & imbecillioribus magis conveniunt iidem in pulverem redacti, & ex jure pisorum potiùs duram alvum emolliunt. Cortex interior ambustis impositus ad ardorem igneum extinguendum utilis esse perhibetur: Dioscorides folia recentia molliaque illita ex polenta ad ambusta commendat. Aëtiarius etiam ad recens ambustum sambucum imprimis laudat.

Flores discutiunt, emolliunt & resolvunt, sudoriferi ac Anodymi sunt. Usus præcip. intrinsecus in erysipellate præcavendo & abigendo, quartana curanda, extrinsecus in colico dolore in Erysipellate combusti, &c. (impositi) Schrod.

Florum umbellam (inquit I. Bauhinus) domestici nostri potentia, immergunt, frigunt gratumque inde parant edulium ac salubre. Possunt etiam cibo aliquo permisceri, vel cum ovis frigi; nam blande dejectionem molliuntur, resiccati vero flores simul cum humiditate purgandi potentiam amittunt, digerendi & attenuandi retinent. I. B.

Acetum in quo flores macerati sunt in cibis ventriculo gratum appetentiam excitat, crassos crudosque humores incidit & attenuat.

Baccæ itidem sambuci alexipharmacæ sunt & sudorifera spiritus è baccis elicitus inter præcipua est diaphoretica; itemque antifebrile nobilissimum vinum ex eorundem succo vel mero, vel cum vino albo aut Rhenano composito mira præstat in hydrope D. Needham. scribit Camerarius succum acinorum admixtum jusculo Gallinæ, in quo multum radices petroselinæ decoxerit, & expressum plurimum conferte hydropicis.

Nuclei sive sambucina absterguunt ac per alvum & vomitum purgant vehementer.

Decoctum corticis mediani Sambuci vel ebulli cum syrupo papaveris ad sudores movendos valet. N. narcotica diureticis vel diaphoreticis addita sudores magis promonent, ut patet in theriaca & mithridatio cum opio. D. Boovle ad pedum inflationes 2℥. Folior. Sambuci q. v. coque in oleo cum Sale & fove.

Ad arthritin, 2℥. Folia sambuci, immittantur in ollam vitreatam adcoct sine plicaturis ollam impleant, optimè sæpe premendo: tege operculo; per annum sub terra recondet in superiori parte crusta deprehendetur, in inferiore oleum, quo nihil efficacius sæpe probatum. Flores saccharo conditi ad idem valent D. Hulse è MSS. nondum edito.

Sambucus ventriculo minùs nocua est quam ebullus. Folia etiam non ita fatent, baccæque non tantam evacuandi vim habent.

Succo inspissato è baccis Germani crebro utuntur ad movendos sudores; & pueris etiam præbent cum pane: quo ei quidam non infeliciter usi sunt in iis qui ad hydropem proclives fuere; coquantur baccæ ex aqua, & cribro transmittuntur, denique coquantur ad sapæ consistentiam.

Prunus in sambucum insita (si Camerario credimus, qui se expertum ait) quamvis non facile comprehendat, fructus fert purgantes. Nobis neutrum verisimile, neque prunam in sambucum insitam comprehendere; neque si comprehendat fructum purgantem ferre.

Contra Erysipelas apud nostrates in frequenti usu est fons ex aq. Sambuci part. ij. & Sp. vini part. i. ratione & experientia ejusmodi p. axis nititur; quippe Sp. vini aptus est in naturalem ordinem reducere subtilitate sua & particulatum motu distortos cutis tubulos & fibras. Porro Erysipelate affectæ partes hoc medicamento sæpius levamen notabile sentiunt Antonius de Heyde observ. 16. vulgare est hoc medicamentum Londini. Ego sæpius usus sum. aq. flor. sambuci cum oleo Sambuci mixta & conquassata, bono cum successu; interdu addidi Sp. è baccis Sambuci: non raro etiam oleo sambucino & vino Canatino mixtis & conquassatis Erysipelate affectos curavi. Communicavit D. Hulse, sæpe in hac opere dictus, sæpe dicendus.

Ad febrem quotidianam 2℥. Cortic. rad. sambuci 3j. Asari 3ij. Cinnamomi 3iss. coq. in lacte & propinetur paroxysmo incipiente, mover simul & lemel vomitum & secessum Chesneau è Quercetano Idem.

Ad combustionem 2℥. cortic. median. sambuci, quæ viridis est q. v. decoque in oleo quousque conturbescat, add. ceræ parum, itaut unguentum maneat lucidum; quod pluries sum expertus. Chesneau Idem.

Hortus Edimburg. Sutherland. habet sambucum humiliorem frutescentem foliis eleganter variegatis *Rajm.*

SAMPSUCVS, vid. *Majorana*.

SANDALVM, vid. *Santalum*.

SANDARACA.

Hoc nomine duplex denotatur materia, & i. quædam Arsenici nativi quædam species de qua vid. sub titulo *Arsenicum* 2. Gummi è junipero stillans, de qua sub titulo *Juniperus*.

SANGVINALIS, vid. *Centinodia*.

SANGVINEM SISTENTIA, vid. *Ischia*.

SANGUIS.

De variis animalium Sanguinibus eorumque usibus vid. sub titulis specialibus animalium unde\pantur.

Sanguis Draconis.

Nomina. Draco arbor Clus. Ger. I. B. C. B. *Park.*

Clus. Procera est arbor, pinum procul intuentibus referens, adeoque æquales semperque virentes sunt rami. Hujus truncus crassus, octo aut novem cubitales ramos, æqualiter nascentes ac nudos, sustinet, qui in summo fissi in alios ternos aut quaternos ramos, cubitales aut pauciores brachialisque crassitudinis desinunt, nudos item & sine foliis, in summo gestantes capita plena cubitalium foliorum, unciali latitudine paulatim in mucronem desinentium, media costa densiore & eminentiore, ut in iridis foliis, tenuium & rubentium in lateribus: mucronem planè repræsentant ea folia, semperque virent, & Aloes vel Iridis modo invicem amplexando nascuntur. Truncus perquam scaber multis rimis dehiscit, humoremque fundit per Caniculæ ætus, qui in rubram lachrymam densatus Sanguis Draconis appellatur, ob quam sane causam arborem hanc Draconem nuncupavit Clusius. Materia trunci firma est, ferrumque difficulter admittit, quod veluti fibris transversim & oblique excurrentibus constet: at rami cum multo succo prægnantes sint, satis facile cedi possunt.

Olyssippone primum vidit Clusius post monasterium S. Virginis à gratia.

Ramus fructifera ab hac arbore avulsus, & ad Clusium ab amico quodam missus, pedali amplioreve longitudine erat, cui inhærebant alii ramuli multo fructu racematim compacto onusti: fructui color flavescens, sapor aliquantulum acidus, magnitudo exigui cerasi. eum in summis capitibus nasci verisimile est, ut in palma dactyli nascuntur, spathâ tamen ut illa includi non intellexi, inquit Clusius. Hujus porro arboris recentia capita tenella sunt, & humilium palmarum sive chamæthiphes, modò cujus cerebrum in deliciis est, edi possent, nisi amaritudo prohiberet.

In insula Portus Sancti (è Canariis una est) prope Maderam provenire auctor est Aloysius Cadamustus: in insula Madera Thevetus: in colore baccharum differunt. Nam hic flavum dicit, cui subscribit Clusius; ille Venerum, id est, cæruleum; quæ quomodo conciliari possunt, inquirant alii. Cæterum Sanguis Draconis officinarum Gummi est seu resina obscure rubra, igni admota facile liquefces, inque eum injecta flammam concipiens, non tamen luculentam; compressu aut attritu colorem rubrum sanguineum, seu Creme sinum vegetum; reddens; ægrè tamen & difficulter liquore quovis seu aqueo seu oleoso, solvitur sive permiscetur.

Vires. Adstringendi vi pollet, ejusque usus non infelix est ad muliebres & dysentericas fluxiones, eruentas excreationes, firmandos commotos dentes & roborandas gingivas. J. Bauhinus se nullam insignem vim animadvertisse scribit in legitima ad reprimendos fluores Sanguinis. Aurifabris & gemmariis usum ejus esse scribit Parkinsonus ad encausa, & suppositi pro folio (ut vocant) ad gemmas & lapides pretiosos illustriores & nitidiores repræsentandos: vitriariis etiam ad vitra colore cremesino tingenda, pro fenestris, &c.

Sanguinem Draconis Recentiorum Cinnabarin Dioscoridis esse docti plerique existimant. Cinnabaris Recentiorum antiquorum est minium.

Plinius & Solinus, qui Cinnabarin Indicam sanguinem seu saniem esse Draconis elisi Elephantorum morientium pondere, permixto Animalis utriusque sanguine tradunt, mercatorum Fabulis decepti ita credidisse videntur. I. B.

Aliorum erroribus refutandis non opus est immorari, cum veritate detecta sponte sua coincidunt.

Tacori folia Draconis arboris similia describit Clusius, cubitalis vel etiam bicubitalis longitudinis, uncialis verò latitudinis infima parte, deinde paulatim in mucronem gracilescantia. Incolas (Kayana & Vayapok ubi nascebantur) aqua macerare dicebant, contundere, & in tenuia stamina diducere lini aut serici instar, quin & funes ex illis torquere ad tigna in suis fabricis colliganda idoneos.

Arborisne an alicujus alterius plantæ folia essent non adscriptum.

Pro fabula habeo cum Parkinsono & Lugdunensi quod tradit Monardes de Dracunculi figura hujus arboris fructui à natura insculpta. Fructus Draconis arboris Olyssippone ad Clusium missus cerasi erat magnitudine aut oxymyrhines rotundus, tenui pelle contextus; quâ sublata osseus nucleus conspiciebatur, qualis est in fructu Rusci, sed is nullam animalis, nedum Dracunculi tanto artificio fabrefacti figuram referebat. Verum rotundus erat, & lævis, & totus osseus utri dictum. *Raj.*

Sanguis Draconis succus est instar sanguinis exsiccati ex arbore Peruviana &c. stillans, sive ille sit purissimus, foliis arboreis involutus, in forma granorum pyramidalium (qui sanguis Draconis in lachryma dicitur) sive aliâ grandiori, in panes seu massas majores coactus. Hic succus omnis saporis & odoris expertus, contritus in pulverem, colorem præbet eleganter rubentem, instar cinnabaris; non dissolvitur in aquâ, neque in oleo, sed in spiritu vini. Adulteratus è contra in aquâ liquefit, saporem habet adstringentem pulveris formam difficulter admittit. Quæ omnia fraudem facile detegunt. *Pharm. August.*

SANGVISORBA, vid. *Pimpinella*.

SANGVISUGA, vid. *Hirudo*.

SANICULA MAS.

Nomina. Sanicula sive Diapensia Ger. vulgaris; sive Diapensia *Park* San. officinarum C. B. San. mas Fuchsi sive Diapensia I. B.

J. B. Concinna sunt saniculæ folia, quæ à radice adstringente, amara & fervida, foris nigra, intus alba, fibrosa exeunt; cum splendore virentia, rigidula, ferè rotunda, quinque partita, singulis segmentis subdivisis, quorum omnium pulchra creta. Caulis cubitalis, enodis, levis, uno tamen interdum vel altero folio cinctus, in fastigio flores velut in umbellam dispositos sustinet: è summo namque caule quatuor vel quinque vel etiam plures radii exeunt, quorum qui medius est non amplius dividitur, reliqui qui eum circumstant tripartiti sunt, gestantque plures flosculos in globulum congestos. Flosculi autem singuli quinque folii sunt albi aut dilute admodum rubentes, singulos flores binæ excipiunt semina lappulata, simul juncta ut in umbellatis.

In Sylvis & sepibus passim, floret sub finem Maii.

Vires. Sanicula à mira sanandi vi nomen traxit. Vulneraria enim est è præcipuis; unde gallis in adagium venit vulgo jactatum, eos non indigere Chirurgis qui Saniculam & bugulum habuerint.

*Qui à du Bugle & du Sanicle
Fait aux Chirurgiens la Nicle*

Gustu id indicante astringit simul & amara est. Vulnerariis potionibus incoquitur. Internis & externis vulneribus, sanguis eruptionibus, ulceribus, dysenteris, ruptis & vulgus auxiliatur decocta, pota & imposita, ut breviter Lobelius, summam vires ejus & usus recensens.

Umbilici eminentia & crassities in pueris innumere ferè curata est, cataplasma ex sanicula in vino cocta, umbilico apposita cum ligatura strictiore: Rad. consolidæ majoris contusa dorso è regione umbilici admotâ.

SANICULA FÆMINA.

Ad eam pertinet Tabula XXI. hic adjecta, quamvis descriptio & vires videri debeant sub titulo *Astrantia Nigra*, ut & sub titulo generali *Vulneraria* inter quæ hæc planta primas meritò tenet, cujusque præterea radix de valerianarum radicibus aliquatenus participans ad Contrayervam non parum sane viribus accedit, ut multiplici experientia edocti asserere possumus.

Sanicula Guttata Alpina.

Nomina. Sanicula montana rotundi folia major C. B. San. Alpina guttata I. B. Sanicula guttata Ger. Park.

Clus. Multa habet folia circinata ferè rotunditatis, laxifragæ auræ foliorum æmula longis pediculis inhaerentia, altis per ambitum incisuris serrata, sic ut minima folia tanquam digitata videantur, pinguis, hirsuta, supernè viridia, inferne aliquantulum exalbida, & valde hirsuta, astringentis gustus; caules deinde promit pedales, aut interdum ampliores, virides, hirsutos & nonnihil tortuosos, & in his folia superioribus respondentia. Summi caules in plures alas dividuntur; & singulis ramis insident terni aut quaterni flores. Oxyacanthæ odorem referentes, quinque foliolis albis, sanguineis punctis inferiore parte notatis constantes. Bifida vascula cum decem staminibus medium florem occupant, quæ matura exile & minutum admodum nigrumque semen continent. Radix quodammodo squamata supernè, & crassiuscula, multis candicantibus fibris prædita est, & à lateribus propagines agit.

In Alpibus Helveticis, inque montibus Jura & Saleva propè Genevam: crescit etiam Autore Clusio, in omnibus Austriæ & Stiria Alpibus, umbroso loco, &c. Floret Junio, in hortis etiam maturius. *Rajus.*

SANTALUM.

Apud antiquiores Græcos nullam santalorum mentionem invenimus; sed apud Arabes, qui ea nobis ostenderunt, & tria genera fecerunt, album, rubrum & citrinum.

SANTALUM CITRINUM.

Nomina. Santalum citrinum Park. I. B. pallidum Ger. C. B.

Decorricata Santali citrini quæ adferuntur fragmenta truncum arguunt satis crassum. Est autem lignum solidum ponderosum, pectinibus rectis, quo fit ut haud difficulter in rectas assulas findatur: colore ex pallido resulcente, aut verius flavescente, ac nonnihil in citrinum vergente, unde nomen; sapore aromatico, amaricante, cum acrimonia totum os im-

plente, & ad caput usque penetrante, suavi, odore fragranti, moschum nonnihil æmulante, aut sane eo ad rosarum odorem nonnihil vergente.

SANTALUM ALBUM.

Nomina. Santalum Album I. B. C. B. Ger. Park.

Parum colore differt à citrino, magis pallescit, p. r. ligno quod pallidum sit colore satis simile: alioquin eadem substantia, eadem textura, & pectines iidem, sed odore inferius, quippe qui debilis vix percipitur, uti nec sapor.

Scribit Garcias inter utriusque Santali (albi & pallidi) arbores tantam esse affinitatem, ut pallidum à candido discerni non possit, nisi forte ab ipsis incolis qui eas mercatoribus vendunt.

Cæterum (inquit) Santalum in nucis juglandis magnitudinem attollitur; foliis admodum virentibus, lentis æmulis: flos ex caruleo nigricat: fructus cerasi magnitudine, primum viridis, deinde niger, insipidus & admodum caducus. Inodoram ferunt esse arbores nisi detracto jam cortice exsiccata.

Nascuntur hæc genera in India ultra Gangem, plurimum verò in Timor insula quæ undique portuosa est: inveniuntur etiam in verbalii portu Java, vehementer quidem odoratum, sed brevi senescens. *Garc.*

Quantum ex hac Sandali descriptione colligere licet, inquit Clusius, valde erit dubitandum, an legitimum sandalum pallidum habeamus; quandoquidem scribit vix in Lusitaniam deferri, quum ejus pretium majus sit apud ipsos Indos quàm apud Lusitanos: fieri igitur poterit, ut aliquod aliud odoratum lignum nobis pro santalo legitimo obtrudatur.

Vires. Ligna hæc epatica sunt ac cardiaca: usus præcipuus in lipothymia, palpitatione cordis, obstructione epatis. Extrinsecus in catarrhis, cephalalgia, vomitu, epatis intemperie calida (in Epithem.)

Arabes eosque securi plerique Medici recentiores santala frigida esse statuunt: Verum I. Bauhinus alius, & quidem rectius ex gustu & effectis ea calida esse discernunt. Electuarium Diatrion Santalon, quod ab his nomen accepit, præscribi solet à Medicis adversus calidam hepatis intemperiem, ejusque obstructionem & icterum, nec non ad ventriculi & viscerum debilitatem.

Garcias magnam santali albi & citrini quantitatem per universam Indiam absumi scribit, quia omnes ferè ejus incolæ, sive Mauritani, sive gentiles illo in mortariis lapideis contuso & aqua macerato sibi universum Corpus inungunt; deinde siccari sinunt ad æstus corporis tollendos, & odoris conciliandi causa. Indi enim plurimum odoribus delectantur.

Invenitur (inquit idem) & in Malabar odorati ligni genus. Santalo albo persimile, quo se in febribus indigenæ inungunt, lingua Malabarica Sambarace appellatum. Commendatur ad Erysipelata & inflammationes, atque santali rubri modo eo utuntur.

Parkinsonus santalum album in pulverem redactum & vel in ovo sorbili sumptum, vel in vino rubro super cineres calidos per noctem infusum & haustum ad spermatis fluxum in utrovis sexu commendat.

SANTALUM RUBRUM.

Nomina. Santalum rubrum I. B. C. B. Ger. Park.

Lapideæ ferè duritiei & ponderis sunt è santali rubri truncis frusta, quæ deliberata importantur, colore intensius rubente quàm lignum Brasiliæ, ut ferè nigrescant, pectinibus rectis densissimis, interdum præ ipis tuber aut nodosarum vestigia imitantibus odorem nullum evidentem spirant, sapore ferè sauro, cum

levi adstriatione. Commansum vix modicum salivam rubeo colore tingit, at linteo affricum tingit.

Garcias santalum rubrum & lignum brasiliun eo inter se differre scribit, quod santalum rubrum neque dulce sit, neque inficit; at lignum brasiliun utrumque at vero santalum rubrum quod ad nos adfertur rubro colore inficere Botanici plerique testantur & experientia confirmat, quamvis aliud magis, aliud minus.

Porro rubrum santalum non nascitur in Timor, sed loco valde distante, vizi in India intra Gangem fluvium, in Tanasarium & maritimis quibusdam Coromandel. Ex his locis omne Santalum rubrum adferri pro certo asserit Garcias.

Vires. Hoc genus Santali refrigerat & astringit: unde quicquid virium Arabes alique adversus ardores alioque morbos calidos Santalis attribunt, huic potissimum conveniunt. Rubri Santali (inquit Garcias) apud Indos exiguus est usus ætarius. Utuntur tamen contra fervidas febres eo tempora, frontem & arterias inungentes. Raius.

Santalum Chirinum eligendum suaviter fragrans, magnam habens medullam, utpote odoris præcipuâ gratia nobilitatam, grave & nodosam, nec ligno cedrino odoratiore adulteratum. Santalum Rubrum Brasiliensi ligno permixto contumitur; focus autem ex hoc patet, quod santalum rubrum nec dulce sit, nec ita inficiat; quæ notæ in Brasiliensi deprehenduntur. Pharm. August.

SANTONICUM & SANTONICA.

Nomina. Absinthium Santonicum Alexandrinum C. B. Santonicum Alexandrinum, five sementina & semen sanctum Park. sementina Ger. Lumbricorum semen vulgare & Matthioli K. B.

J. B. Quod in officinis prostat lumbricorum semen vulgo dictum, ex variis minutissimisque surculis, foliis & semine ipso coacervatum est. Semen parvum est, oblongum (majora tamen inter se milio supparia, ex quarrosis tuniculis compactæ) pullum vel flavescens at quæ minutula inter ea sunt foliola striata sunt. Quædam etiam observantur trifida, angustiora, acuminata, videntur etiam adesse portiones tenuissimorum cauliculorum. Omnia facile digitis atteruntur amara sunt cum acrimoniâ & colore gravisculo.

Matthioli planta est admodum fruticosa, caulibus & ramis numerosis referta, semine minuto oblongoque racematim prodeunte, amarissimo gustu, odoreque non insuavi.

Varias auctorum sententias de hoc semine vide apud J. Bauhinum: qui cum Pena concludit semen contra vermes trium Absinthiorum nullum videri. Nam tamen nonnulla amaritudinis & figuræ similitudo illis interit cunctis, tamen non adeo plene sunt adulta horum semina aut horride amara, inquit Lobelius.

Quanam planta sit quæ lumbricorum semen producat nobis non certo constat. Autor Scholli ad observationem primam Ann. 3. Decadis 2. Ephem. German. præ aliis nobis verisimilia scribere videtur. Figura, inquit, Matthioli vitiose delineata est, non tantum quod seminulorum figura potius foliola quædam repræsentet, sed & seminula ipsa bina forte semper è diametro sibi apposita cauliculis adhæreant, cum tamen alternatim ubique è lateribus prodire cauliculi seminibus, prout ad nos deferuntur, permixti edoceant. Cæterum hanc à Cortuso transmissam plantam fuisse genuinam seminis nostri Helminthici Matrem arbitror: cum illius à Matthiolo datam descriptionem satis huic quadrate *ovifolia* commonstret. Lobelius etiam in Hist. Plant. fruticulum surculosum esse, undique seminibus gliscentem pluribus ferme quam foliis testatur.

Manger, Bibl. Pharm. Tom. II.

Unde si non sui generis planta fuerit, ad Abrotanâ referre mallem; præsertim cum & hoc vegetabile vim antelminticam possideat, & aliqua ejus species etiam apud nos non plane ab illo peregrino diversæ, quoad foliola, seminum copiam, colorem, odorem, &c. compareant.

Semen, quod microscopio subjectum teres, flavumque est candelas cereas conjunctas elegantissime representat, observante Elholzio. Id quod in taneceti semine non compareret, quod itaque pro sementina vix habendum est.

De olei possibili è sementina destillatione quæ habet, videtis loco citato. Raius.

Valet hoc semen contra vermes, & contra morsus animalium venenatorum; putredini præterea resistit, & nervos corroborat. Stomachicum sanè medicamentum est insignè, sed parca manu exhibitum.

S A P A.

Est succus uvarum inspissatus, de quo vid. sub titulo Rob.

SAPHYRUS, de eo vid. sub titulo Lapis.

SAPO ODORATUS.

Sapo odoratus, Smegma odoratum odoramentum formula est, constatque ex sapone, (potissimum Veneto,) cui res *Odoris* subtilissime pulverisatæ immiscetur, adhibitâ ∇ fragrantæ, v. g. rosarum.

Formule sint, ex D. D. Weickhardo.

Sapo Moschatus.

℞. Sapon. Venet. ℥ ij. styrac. calam. ℥ ij. rad. ireos flor. ℥ j. nuc. moschat. cinamom. ana ℥ ss. santal. alb. ℥ j. as. dulc. ℥ ij. caryophyll. ℥ j. moschi gran. xv.

Incorporantur in mortario cum ∇ rosarum.

Vires. Habet vim abstergendi & conciliandi gratum odorem, simulque confortandi nervos.

1. Alius:

℞. Caryophyllor. macis ana ℥ j. benz. rad. ireos flor. ana ℥ ss. mosch. gran. x. ambr. zibett. ana gran. v. sapon. Venet. ℥ ij.

Distemperentur cum ∇ rosarum, adjiciendo Olei stillat. cinam.

3. Sapo ad impetigines.

℞. Terra calcinat. ℥ ss. O. calcinat. ℥ j. flor. sulph. ℥ ij. g. g. v. asa dulc. storac. liquid. an. ℥ j. calami. li. rhargyr. an. ℥ ss. rad. lapathi. acut. ℥ j. ol. caryophyll. g. iij. saponis Veneti q. s. F. Globuli. Schroderus.

Sapo Cosmeticus, Levis, ex Lexico Pharm.

D. Junken.

℞. Saponis Veneti albiss. vel alterius pulchrioris, ℥ j. subtilissima rasum exsiccata, ut possit pulverisari, tunc affunde Saponis pulverisato ∇. rosar. ℥ j. in vase vitreato capaci, ac leni igne sensim incalasciat, & coquantur lente continue interea movendo pistillo ligneo per dimidiam horam, donec rarefcere incipit, tunc affunde olei tartari per deliquit. xx. vel xxx. & plus rarefcet, hoc viso admisce ol. ligni Rhod. ℥ j. cum moschi gr. vj. sacchari modico trita & mixta, & cum à vase separarise patitur, nec adhærescit, tunc infunde forma lignea quadrata ad id aptata, ut se jungi ab invicem queat. Sit verò munita linteo mundo, deuper quod effundatur sapo, & ita stet & quiescat per 5. vel 6. dies, ut siccat, tunc eximitur sapo & ulterius ficcatur, ac pro lubitu in partes siccantur mediante filo.

Sapo Moschatus, ex Pharm. August.

℞. Saponis Veneti ℥ iv. incidantur minutissime atque addantur pulveris caryophyllorum, sandali albi an. ℥ j.

℞ x x

Benzoe

Benzoi ℥ j. *moschi* ℥ j. *Fiat ex arte cum aqua rosacea.*

*Moschatu*s Venetus, ex eadem *Pharmac.*

℥. *Pulveris radicum ireos florentina* ℥ ℔. *styracis calamita*, *asa dulcis* an. ℥ i. *caryophyllorum*, *ladani*, an. ℥ ℔. *sandali albi*, *ligni alai* an. ℥ j. *Tenuissime pulverisata miscantur secundum artem in mortario calido cum Saponis Veneti* ℥ j. *olei tartari per deliquium facti* ℥ i. *ligni rhodii* ℥ j. *moschi* ℥ ℔. *f. Globuli.*

*Moschatu*s alius albi coloris, ex eadem *Pharmac.*

℥. *Saponis Veneti* ℥ x. *pulveris radic. ireos florentina odorata* ℥ v. *miscantur optime in mortario calido, addendo porro olei tartari per deliquium facti* ℥ x. *& in fine olei ligni rhodii* ℥ j. *formentur globuli.*

Sapo Odoratus Zuvelferi.

℥. *Saponis Veneti* ℥ ij. *℔. confindatur aut radatur subtiliter, solique exponatur, sepius tamen illum aqua rosarum vel florum arantiorum humectando, donec albescat, ultimo autem bene exsiccat. Huic saponi albicanti adde*

Amyd. dulc. decor. & ad pulv. sub. formam additâ f. q. aquæ flor. arantior. contus. & per seraceum transmissarum ℥ vj. *pulv. gum. asa dulcis, benzoes* ℥ vj. *magist. marcassita per aquam fortem & præcipitationem parati* ℥ ij. *contundantur junctim diu multumque in mortario, donec per intima & minima commixta sint, addendo*

Pulv. rad. ireos flor. ℥ ij. moschi orient. ℔. zibethi opt. ℔. ol. ligni rhodii ℥ ij. *olei seu liquoris tartari per deliq. facti* ℥ i. *vel ejus loco salis tartari* ℥ j.

Miscantur exactè, formenturque globuli fragrantess, qui præter odorem & fragrantiam, hoc virtutis habent, ut asperitatem cutis leniant, glabram, subilem, & albicantem illam reddant.

Sapo Tartareus ex Pharm. Bateana.

℥. *Salis tart. & tart. & nitr. ana fact. s. a. ℥ iv. olei terebinth. ℥ vii. stent. simul vase amplo in loco frigido & humido ad menses aliquot, tandem sol. (sape interim quotidie agitando, & plus olei, quoties opus fuerit, adjungendo) usque dum sal planè triplum absorberit, atque omnia in unam massam, saponis instar, spissam conspiraverint homogeneam, nullatenus separandam.*

Intervit parandis pilulis pacificis & pilulis Matthæi.

SAPONARIA.

Saponaria recentioribus ab extergendi facultate dicta est hæc herba, quod Saponis ritu pannos eluat purgetque: Struthium veterum nonnullis creditur, quod à verbo *σπυλίζω*, id est, lanas purgare & candidas facere nomen accepit.

Nomina. Saponaria Ger. vulgaris Park. J. B.

Radibus tenuibus geniculatis cortice rubentibus, etis sub terra repit. Caulibus sesquicubitalibus & altiores, teretes, glabri, (J. B. hirsuti) subtubentes, vix se sustinentes, crebris geniculis intercepti, medulla farcti, folia ad genicula ex adverso bina plantagineis similes (J. Bauhino gentianæ cruciatæ) tribus nervis insignioribus secundum longitudinem decurrentibus, glabra, sapore nitroso, brevibus aut nullis pediculis. Flores in summis caulibus velut in umbellis digesti singuli brevissimis pediculis nixi, è calice tenui, unciam longo, glabro (J. Bauhino hirsuto) non striato, qui marcescente flore in ventrem turgescit, pallide rubentes seu carnei, odorati, patulis quinque compositi nec laciniatis neque bisidis. Succedunt semina in vasculo oblongo circa medium crassiore, parva, penè rotunda, compressa, spadicea.

Juxta torrentes, fluvios & stagna locis apricis & arenosis sponte nascitur, florens, Junio, Julio, Augusto, & Septembri ut rectè J. Bauhinus.

Vires, in usum Medicum veniunt folia, sed raro & radix. Saponaria radix attenuat, aperit, sudorifica est. Usus in asthma, utero & mensibus cendis. Decoctum ejus in luc venerea commendat Septalius, emetisecus prarmica est, tumores ac præcipue panos diluit. Schrod. Rains.

Hæc planta præterea purgans est si in decocto paulo saturatori assumatur.

SAPOR.

Medici vetustiores novem saporum differentias species constituunt indices temperamentorum, calidiores, tres frigidi, & medii seu temperati totidem, quibus versiculis complectitur schola Salernitana.

Hi fervore vigent tres, salsus, amarus, acutus, Alger acetosus, &c.

Jo. Fernelius autor imprimis exudit & elegans styptico acerbum substituit, pro pontico sapore aulterum Saporum autem differentias seu species sic describit.

Sapor Acer est, qui linguam & os acrimonia feriat atque compungit, simulque calfacit & interdum quæ exurit: is maxime conspicuus est in pipere, pyrethra & euphorbio.

Acidus Sapor gustum quoque penetrat & tenuiter ferit, sed citra ulum sensum caloris. Tale maxime in aceto deprehenditur, deinde etiam in succo malicortii, limonum, &c.

Pinguis Sapor nec calore nec acrimonia gustum sollicitat, sed linguam omisque partes lentore quodam oblinat, is præcipue animadvertitur in oleo, butyro, adipe, &c.

Salsus Sapor linguam non admodum calfacit, sed acriter siccando corradit. Hic imprimis elucet in sale communi.

Austerus Sapor os & linguam moderate constringit & quadam asperitate coarctat: hinc quadantenus licet & refrigerat. Hic proprie crudus appellatur, atque immaturis fructibus peculiaris ut in succo uvæ acerbe, pomorum pyrorum, mespilorum immaturorum.

Dulcis Sapor gustu suavis atque jucundus oblectat, nullaque qualitate exuperante molestus est. Ejusmodi conspicuus est in saccharo, melle, glycyrrhiza, &c.

Amarus Sapor dulci ex adverso oppositus inlatur ac tristis, sensum ipsum veluti corradit aut dividit. Est insignis est Aloe, deinde absinthium, centaureum minus & colocynthis.

Acerbus Sapor austero finitimus, eo tamen gravius molestiorque est, ac magis linguam omnemque gustum constringit & exasperat, & proinde magis tum siccatur, tum refrigeratur. Is luculenter in malicorio, in galla, in rhoe & nucibus cupressi conspicitur.

In piscibus, ærores dictus, qui proprie Sapor non est, sed saporis privatio, nulla qualitate manifesta gustum ferit. Talis esse videtur Farris universum genus cucurbita & citrulus.

SARCOCOLLA.

Nominis ratio obvia est: ita enim dicta est quod carnes agglutinet: vim, inquit Dioscorides habet glutinandi vulnera. Lachryma est arboris in Pentide centis, thuri tenui similis Diosc. Galen.

Sarcocolla, (inquit J. Bauhinus) gummi albicans sunt, aut ex albo subruffi, spongiosi, micis luculentibus subinde mistis; globosarum lachrymarum fragmenta aut parvæ Avellanæ magnitudine; tanta est enim fragilitas ut in pulverem crassiusculum vel concussilevi frietur, saporis amari cum quadam dulcedine obscura, ingrata. Sub dente lentescit, & candela immixta primum bullit, postmodum in claram flammam exurit.

exardet: admitta reperiuntur aliquando folia ex candido flavescentia, Tithymali myrsinitis folia sicca egregie referentia. (Granula papaverinis seminibus non multo majora esse Parkinsonus ait.)

Eligenda recens, calore ad pillorem vergens (vestita enim rubescit) saporis amari, substantiæ porosæ & quasi spumosæ, facileque in aqua solubilis. *Schrod.*

In Sarcocollæ notis non conveniunt Plinius & Dioscorides; hic enim subflavum seu flavescentem dicit: ille eo meliorem quo candidiorem. Dioscorides laudat gustu amarissimam, Plinius cum acrimonia dulcem, in quo ab omnibus deseritur.

Vires. *Schrod.* Calf. & sic. adstringit, consolidat, glutinat, coquit, maturat. Usus præcipui in vulneribus consolidandis, cicatrice obducendis, unde & nomen adepta est. Mitissime præstat & in oculorum fluxionibus, albugine, nubeculis (maceratur in lacte asinino, vel humano, 3 v. postea cum aqua rosarum mixta ciliis imponitur, addito si liber tantillo sacchari. In hæmorrhagiis narium anacollematis admiscetur.

Serapio multum perforativam esse scribit, comedere carnes ulcerum, exulcerare intestina, inducere calvitiem & alia:at quomodo quod causticum est glutinabit vulnera? scribunt purgare pituitam crassam à remotis partibus veluti oculis, cum quibus tantam habet affinitatem, ut purgandi gratia in illis data exulceret. Misera affinitas! quam hostibus optem. Mesue dat in substantia à 3 j. ad ij, quod ego ne in pilulis quidem audeam. Quantumvis bene correctæ videantur. Costæius suo more multa excusat: ego dico, abeat Sarcocolla cum pil. suis in maximam malam rem. *Calp. Hofm.*

Veteres Sarcocolla foris tantum usi sunt: de vi purgatrice nihil dicunt. *Rains.*

SARCOTICA MEDICAMENTA.

Σαρκοτικόν, seu *carnem generans* illud est, quod deficientem carnem in ulcere vel vulnere cavo progignit, ipsamque cavum carne implet, idque solum mediatè & per accidens, quatenus impedimenta, quæ naturam in producendâ carne retardare possunt, tollunt. Cum enim carnem generare solius naturæ opus sit, propriè loquendo nullum medicamentum sarcoticum dici posset, dicitur tamen ita respectu inde adjunctæ naturæ.

Etenim materia carnis sanguis est, isque bonus laudabilis, efficiens natura subjectorum corporum, quibus superinduci caro debet, id est, naturalis eorum temperies, quæ sanguinem apponit, agglutinat, tandemque planè assimilât. Adjuvans ea medicamentum est, quod detergendo, modiceque siccando remover ea, quæ naturam in opere suo remorantur.

Quod si contingeret, autore *Galeno lib. 3. m. m. c. 3.* affluentem sanguinem nullum neque in quantitate vitium habere, partem quoque, cui in generandâ carne succurrimus, bonâ temperaturâ esse præditam, nil est, quod obstat, quod minus carnis generatio & nullius externi medicamenti ope prospere succedat, ambabus quippe causis efficiente & materiali præsentibus. Id vero cum ob læsionem gravioiorem fieri minus possit, & in carnis productione hinc duplex perpetuò generetur excrementum: unum tenue, ichor nempe seu sanguis, unde ulcus redditur humidum; alterum crassum, sordes scilicet, unde sordidum redditur, perinde dupliciter etiam medicamento opus est, humidum excrementum siccando & sordidum detergendo, licet uni eidemque medicamento eadem facultas inesse queat.

Ubi igitur profundior hiatus & cavum explendum occurrit, speciatim conveniunt sarcotica, moderatè calefacientia & siccantia, citra morsum, acrimoniam & adstrictionem, nec colliquantia sc. nec cogentia, sed intemperiem tollentia & vitale *γλῆξεν* roborantia.

Hinc instar regulæ notandum est, ut omne excessi-

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

vum humidum, ulcerum & vulnereum consolidationi advertum est; ita quæcunque blandè illud moderantur, sunt sarcotica, idque tantò magis, quò pars ipsa vel humidior natura ac temperie sua est, vel siccitate gaudet. Nisi enim id fiat, promptissimè caro luxuriat, & in cerebro fungos, in aliis excrecentias alias producit.

Sic in vulneribus cerebri v. g. omnia humida, præterquam dissipantia, nocent, oleosa, pingua, quin in genere ferè, nisi sint balsamica, omnibus adeò nocent, & minus conveniunt.

Par ratio est vulnereum capitis, & citra frontem, & similia, ubi unguento digestivo nullus est locus, si quidem feliciter mederi est animus.

Sic si ungues sint vulnerati, sola siccantia rem omnem absolunt. Adeoque in hoc non rarò errant chirurgi, quod oleosis unguentis vel emplastris continuando sordidum reddunt vulnus & producunt. Id quod & in ulceribus serpentibus cumprimis valet; siquidem in singulis ejusmodi casibus glandulæ cutaneæ labefactatæ ichorem stillant, omni modo compescendum.

Hinc merito & in his externis celebrantur tum alcalina, ex pompholyge, lithargyrio, cerussâ, aliisque, qualis etiam est pulvis foliorum aristolochiæ longæ, imò & vitriolata & aluminosa constrictiva eundem in finem laudantur non immerito; tum balsamica, quæ & balsamum vitale, & sustinentes idem & suscipientes partes observant.

Quod ergò olea cocta & pigriora ulceribus non conveniunt, non æque idèò fit, quod acida sint, sed quod laxum reddunt, quod strictum esse debebat, pro consolidatione præstandâ, id quod & de emplastris valet.

Referenda huc etiam est abstergio; ita scilicet semper ichor est tollendus, ne *γλῆξεν*, glutinosum negligamus. Blandè & mediocriter detergere convenit, ut sordes, quæ in carnis generatione proveniunt, amoveant, citra tamen mordacitatem, ne si valentiora sint, non sordes modò abstergant, verum etiam sanguinem concrecentem, & in carnem coire non sinant propululantes miculas & stamina carnea prima.

Non nimis ergò adstringere vel siccare debent sarcotica, alioqui facile fit, ut partis defœderetur conformatio. Patere sarcoticorum natura potest è contrariis jam supra dictis cathæreticis, quæ superfluum illud humidum & excessivum luxurians demunt & domant *Wedelius.*

SARDA.

Sarda seu *Sardina*, & cum nondum adolevit, *Sardella*, (à Sardinia) unde olim in alias regiones magna copia evehebantur: seu, ad conjecturam Marhodæi in dactylotheca.

Sardinus à Sardis est, à quibus ante repertus)

Rondeletius *τελχιδας & τελχίαν* Aristotelis pro eodem pisce accipit, qui *Sardina* vulgo dicitur, nisi magnitudine & ætate differant; quæ differentia duplex nobis nomen peperit, ut *Sarda* dicatur, quæ major sit; *Sardina* quæ minor. Pisciculus est (inquit) marinus, *Aphyæ phalericæ* omnino similis, nisi paulo major & spissior esset, à parva *Alosa* ore, branchiis, oculis pinnarum numero, situ, squamis, cauda minime discrepans, excepto tantum quod *Alosa* sit latior; *Sardina* igitur squamas magnas, sed tenues habet; colore est vario, nimirum capite aureo, ventre albo, dorso cum viridi cæruleo, utroque splendido rutilanteque, dum viva è Mari extrahitur, unâ cum vita viridis evanescit, cæruleo manente, intestina habet parva & recta, *Alosarum* intestinis similia, felle caret; ideoque non exenterata in craticula vel Sartagine coquitur. Sale conditæ *Sardina* in

Xxx 2 annos

annos duos servantur, sitque ex his Garum, sed minus laudandum ob squamarum copiam *Charleton.*

SARDONIX, vid. sub titulo *Lapis*.

SASSAFRAS.

Nomina. Sassafras *Ger. Park.* Sassafras sive lignum Pavanum *L.B.* Saff. Arbor ex Florida ficulneo folio *C.B.* Anhuiba seu Sassafras major. *Pison.*

Maximæ hujus generis Pini sunt magnitudine & forma: nam præterquam quod sunt trunco unico & palma instar non ramoso valido & recto; ramos in cacumine habent coronæ instar ornate expansos ad instar pinus repurgatæ. Cortice sunt tenui, glabro ex gilvo nigricante (crasso fulvi coloris, alio tenuiore cinerico recto) veluti odore, ita & sapore admodum aromatico accedente ad fœniculaceum. Ramis hærent folia viridia, tenuia, ficulneorum aut vitis alba æmula, odorata, multoque magis exsiccata: tenera adhuc pyri foliis similia sunt. Vixque ullum angulum ostendunt, inquit *Monard.* quod confirmat *Thom. Johnsonus* in Gerardo suo emaculato: qui sassafras arbutulæ à se visæ in horto D. Guliel. Coys Staffordiæ prope Londinum Ramulum describit & depingit foliis infimis integris & propemodum pyriformibus, summis in tres cuspides divisis; in eodem utique ramulo.

Perpetua fronde est, floribus & fructibus *Monardi* & *Pisoni* incognitis. At *J. Bauhinus* fructum oblongum, rugosum, longissimis pediculis donatum ei attribuit. *Parkinsonus* ex relatione *Jo. Frandescantii*. Flores parvos, luteos, stamineos corni maris floribus persimiles esse tradit, quibus succedant pro fructu bacca parva, nigricantes, calycibus parvæ exceptæ, multæ simul racematim congestæ, pediculis longis insidentes. Radices nunc crassæ, nunc tenues, ad terræ superficiem expansæ, unde arbor extirpatu facilis, quæram cortices arborum corticibus ut odoratiores ita & in Medicina præstantiores, fœniculum recipientes, *Clusius* *Draconis* herbæ gustui assimilat.

G. Piso *Monardis* descriptioni circa lignum Sassafras non acquiescendum esse ait, siquidem asseruit Sassafras Floridæ lignum decorticatum ullius dignitatis esse, cum Brasiliense eximie dignitatis & virtutis habeatur, atque à cortice liberatum in aliquot annos immuneservatur: duas adhuc alias hujus arboris species describit *Gu. Piso*: 1. prior albicante & flavescente est ligno, ac proinde Lusitanis Cedro Branco vel canella ob odorem dicitur, Brasilienses Anhuipitanga vocant, foliis est parvis, angustis & tenuibus.

2. Altera seu tertia species, Anhuibamiri, quantum duabus prioribus magnitudine inferior, tantum virtutibus superior, omnibus pariter Brasiliensibus in quotidianos usus reposta. Folio est lauri, seu minori, fructu odorifero & nigro ubi maturuerit, eoq; simul cum cortice, ligno, foliis & radice intense calidis.

J. Bauhinus lignum Sassafras sic describit, cortice tegitur interioris fungoso nonnihil molli: materies subjacet alba, vel ex albo rufescens, aliqua interdum etiam ex parte ad cinereum vergens, mollitie & pectinibus filiaceis, odore & sapore suavi, aromatico, actiusculo & subdulci quodammodo Anisi.

Nascitur in maritimis locisque temperatis (in vastissimis & diffitis saltibus *Pisoa*.) Non tantum in Florida, sed in aliis Americæ regionibus, etiam Brasilia ipsa.

Folia contritis imponunt Indi, sicca etiam in Medicis usus assumunt.

Vires. Ligni decoctum, sed maxime radicis ejusque corticis, multi usus est, quod vel meracius, vel saturatius pro ægri viribus ætate aut temperamento sumendum est. *J. Bauhinus* cum *Monspeli* ageret ligni cum suo cortice derafi ʒi β. in tribus tantum aquæ

fontanæ libris à medicis *Monspeliensibus* infundi solere ait per horas 12. deinde ad ʒiij. consumptionem decoqui & de colatura ʒi. manè sumi calide. Meliusque censemus (inquit) cum celeberrimis ejus loci Medicis in duas tantum doses sic parari quam in plures, tum quia asservatum gratiam odoris amittit, tum quod facultas illius facile evanescit. Est enim tenuissimarum partium.

Residentiam prædicti decocti infundebant per tres horas in ʒi v. aq. font. decoquebant ad ʒiij. consumpti. calatoque per manicam *Hippocrat.* saccharo, *Boscheri* titulo, aut sine eo, pro potu ordinario utebantur, liberaliori adhibito victu, quam in decocto guajacino, quo, nomine frequens ejus usus in corporibus macilentis. Hac ratione magno successu præscribebant ad podagras, ischiadas, veteres fluxiones, obstructions confirmatas, febres nothas & antiquas, & singulari propemodum experimento ad fœdos virginum colores. In lue venerea idem præstat quod guajacum, China, sarsaparilla, simili usu & utilitate valere & ad membra resoluta. Ventrem solvit cyathus inanè calide sumptus. Passionem calicam diurnam sanat, flatus uteri & credidates consumit. Certo experimento; menses misce provocat, sterilitatem etiam emendat. Macilentis confert & carnem auget: multi etiam ad pestis & morborum contagiosorum præcautionem aqua vel decocto ejus utuntur.

Monardes ad frigidos ventriculi affectus & flatus commendat, nec non ad concoctionem promovendam & vomitum compescendum in morbis thoracis frigidis efficax est: quinque capitis doloribus tam novis quam inveteratis. Calculosis utiliter datur sique quibus arenulæ gignuntur in renibus: adversa est iis qui urinæ ardore laborant. Halitum denique oris emendat. Hæc *Monardes* ad quem *Lectorem* qui plura velit remitto.

Notat *Schroderus* instar panacæ in catarrhis haberi.

Ligno Sassafras dicto subjungit *Joh. B.* lignum Anisi.

A *Thom. Platero Medico* communicatum, odore anisi & quam Sassafras suaviore, mitioreque, materie solidâ, subfusca, rectos pectines, maculis transversis ac splendidantibus intercipientibus, quales fere in Egipto ligno videri solent facile finditur. Flammæ admodum facile adolescit, & luculentam præbet flammam: sed odorem gratum non reddit sicuti Sassafras, *Raim.*


SATUREIA.

Satureia aliis à saturando dicta est, quod cibis loco condimenti addatur: alii à satyris nomen traxisse putant, quia coitus marcescentes stimulat. Græcis Tymbra dicta est forte ʒd̄ r̄ ʒd̄ v̄ ob fragrantiam *C. B.* tamen Columella distinguit Tymbram à Satureia.

Et salureia Thymi referens Tymbræque sapor.

Nomina. Satureia hortensis *Park.* æstiva hortensis *Ger.* Sativa *I. B.* hortensis, sive cunila sativa *Plin.* *C. B.*

J. B. Lignosa nititur radice & simplici, fibras minutulas emittente, ex qua virgultim surgunt pediculi aut cubitu alta, teretia, tubescencia, subhirsuta, geniculis certis distincta, ad quorum singula folia nascuntur hyssopi vulgaris, nonnihil hirsuta, crebris foraminibus non tamen perviis erosa, odore suavi vehementi (*J. Bauhinus* Thymi vulgaris mitiore) Sapore acriter caules ramosi sunt ramulis ex adverso binis, è foliorum alis exeuntibus, & ipsis etiam caules longitudinibus excedentibus, è foliorum alis exeunt flosculi plures





simul, pediculis brevibus, & calicibus in quinque acuta & angusta segmenta divisus, ipsi in quatuor laciniis partiti, ex albo purpurascens, semina parva, fulca quam Thymi tamen majora.

Planta est æstiva nec per hyemem durare potest; unde quotannis feri debet.

In agris circa Castelnœuf non longe à Monspelio copiose & sponte ortam observavimus.

Vires. Est inter herbas calidas & acres, quæ urinam & menses movent: facultatibus cum Thymo & Serpyllō convenire aiunt. Nobis potius ut facie sic viribus ad hyssopum accedere videtur.

Ufus est (inquit Schroderus) in affectibus ventriculi, cruditate, anorexia, &c. (proindeque condimentum pauperum esse scribit Tragus: nam omnibus edulis tam carniū quam piscium concoqui, &c.) pectoris Asthmate; uteri mensibus obstructis: visum acuit. Extrinsecus discutit tumores, doloresque aurium sedat.

Ufus ejus frequens est in culina inter alia olera. Cum phaseolis & aliis flatuosis utiliter incoquitur & editur, fabis cum selino incita & infixa edulium gratum, Belgis frequens habetur, Lob.

Pauperes in Germania brassicas capitatas hac herba condiunt, qui sit ut illæ jucundissimum odorem ac saporem gratissimum inde accipiant I. B.

Plantam hanc quamvis annua sit & herbaceam ob convenientiam in foliis, odore reliquisque notis cum saureia duriore seu hyemali ab ea non separandam putavimus. *Raius.*

SATURNUS, vid. *Plumbum.*

SATYRIUM, vid. *Orchis.*

SAXIFRAGA MEDICAMENTA, vid. *Lithontripica.*

SAXIFRAGA HERBA.

Et primò

SAXIFRAGA ALBA.

Nomina. Saxifraga alba altera bulbifera *Park.* Sax. bulbosa altera bulbifera montana *Col.* Saxifraga ad folia bulbos gerens *C. B.*

Col. hujus radici adnascuntur non acini ut præcedentis, sed veluti squamosi bulbuli, lilii modo se propaganti, duplo superioris grumis seu granulis majores, foris rubescens, intrinsecus albidus, sapore primum adstringente, postea amaro & ingrato, paucis in imo fibrillis terram amplexantibus. Folia hæc minora, rotundiora, brevioribus purpurascens petiolis, pilosa, per ambitum rotundis crenis divisa, tacta gummosa sicuti caulis, florum calyces, & tota planta. Caulis edit crassior, parum hirsutus, purpurascens, cui densa alternatim folia, absque petiolo; per ambitum cristata, veluti Euphrasie folia acutis crenis divisa, in quatuor sinibus bulbuli oriuntur quibus propagatur; seminis vicem supplentes, citius enim saturantur, atque nedum in foliorum sinibus, sed in florum petiolis, atque juxta flores ipsos, qui in summo caulis veluti corymbi uno ortu & caulis summe prodeuntes, ramosi petiolis insidentes, Aprili mense atque Maio in quinque foliola candida dehiscunt, calyces veluti cyrinos hirsutos habentes, in quibus fructus bicornes, staminibus oris divisos, qui perfecti per cornicula dissecantur, copiosa, arenæ instar minutissima semina extendentes, supervacua.

Pratensibus montium gaudet, & saxosis herbidis umbrosis Campocleri & Aequicolis.

SAXIFRAGA AUREA.

Saxifraga aurea ob similitudinem quandam in foliis *Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.*

cum Saxifraga alba hoc nomen obtinuit. Flores autem & semina genere diversam esse arguunt. Nè quid de viribus dicam. Flore flavicante tetrapetalo: vasculo seminali bicorni plurimis minutissimis seminibus repleto à reliquis hujus familiae genetibus differt. *Raius.*

Saxifraga utraque, ut ex vi nominis patet, commendatur in calculo; obstructionibus ac utinarum difficultatibus. Decoctum præterea hujus plantæ mulieribus in mensibus provocandis propinatur.

SAXIFRAGA, vid. *Pimpinella Saxifragia.*

HIRCINA, sub titulo *Pimpinella.*

SCABIOSA.

Scabiosa recens vocabulum est: quidam à scabra herbae habitu nomen deducunt, est enim herba pilulosa; alii, & rectius, à scabie cui medetur unde Actii *ψαγία* esse creditur.

Nomina. Scabiosa major communior hirsuta folio lacinato I. B. major vulgaris *Ger.* vulgaris pratensis *Park.* pratensis hirsuta; quæ officinarum *C. B.*

J. B. Radicem habet, rectam, longam: Caules sesquicubitum, & duos cubitos altos, teretes, hirsutos, inanes, foliis cinctos per intervalla longiora ex adverso binis, cana lanugine pubescentibus, formâ valerianæ majoris, profundius subinde laciniatis, sapore subacri. Caules & ramuli in florum capitul terminantur. Flores autem aggregati sunt è plurimis flosculis quadripartitis purpureo cæruleis, quorum singuli singulis insident feminibus, suosque habent calices, staminula & stylos. Flosculi marginales mediis productiores sunt, laciniis longioribus. Floris totalis calix è plurimis foliolis acutis basin ejus in circulum ambientibus componitur, flores explicati planam ferè aut non admodum gibbosam superficiem efficiunt. Flosculis dilapsis semina in globum aut capitulum oblongius attolluntur. Quæ primò è radice exeunt folia integra fere sunt, & non omnino laciniata.

In pascuis frequens est, nec minus inter segetes Junio & Julio mensibus floret.

Hæc Scabiosa (inquit Joh. Bauhinus) aut mirabiliter ludit, aut differentias, aliquas habet: quædam valde laciniata, ut descripta, quædam non laciniata, vel minus profunde & rarius, versus superiora tantum.

Vires. Herba vino decocta ejusque succus aut aqua in M. B. destillata apostematibus, pleuriti, Tussi, aliisque pectoris vitiis medetur. Nec minus Asthmati, Anginæ, pesti. Pollere autem hanc (inquit Joh. Bauhinus) inprimis adversus scabie nomen illi inditum per se manifestat.

Scabiosæ vires S. Urbanus his versibus complexus esse dicitur.

Urbanus pro se nescit pretium scabiosa:

Nam purgat pectus quod comprimit ægra senectus:

Lenit pulmonem, purgat laterum regionem:

Abscessus frangit si locum bibita tangit:

Tribus uncta foris anthracem liberat horis:

In plurimis expertus est D. Willebrochius Archiducis Ferdinandi Medicus celebris, ad rhagades seu scissuras & serpignes ex lue oriundas. Etiam in illis in quibus dec. ligni parum profuit, certiss. remedium pulv. Rad. hujus per hebdom. 3. quotidie assumptum. *Raius.*

Dantur præterea aliæ plures scabiosarum species quas hic enumerare forsan inutile prorsus fuerit, unam tantum itaque tradimus Tabulâ xxii. proxime adjectâ

Xxx 3 depictam

depictam, Scabiosam nimirum Alpinam maximam fruticosam ad ebuli folium non parum accedentem, ejus vires inter aliàs Scabiosæ sunt sanè prænobiles.

SCAMMONIUM.

Nomina. Scammonia Syriaca C. B. Syriaca legitima Park. Syriaca flore majore convolvuli J. B. Scammonium Syriacam Ger.

J. B. è radice longa, crassa, (brachiali crassitudine foris obscure cinerea, intus albâ, fibrosâ) lacteo succo prægnante, multas aliquot cubitorum viticulas profert, proximis radicis sese convolventes scandentesque: folia triangula, ceu hastilis barbatus mucro, similacis lavis æmula, sed minora, glabra, tenuia pulchrè viridia, pediculis brevibus insidentia. Ex aliis foliorum prope summos caules exeunt flores pulchri, calathoides, purpurascentes, Helkines cissampeli floribus proximi; quibus succedunt capsulæ seminales rotundæ seu globosæ, seminibus intus nigris angulosis.

Radicis fissâ torulus sive cor medium exemptum (inquit Jo. Bodæus à Stapel) planè idem est radici communis & probatoris Turbith officinarum: verum aliquanto facilius frangitur hæc, tametsi perinde gummosa succoque lacteo prægnat atque Turbith.

In calidis pingui exit solo, velut in Asiæ Mysia, Syria aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula, Belloonio teste.

Vires. Scammonium purgat valide humores biliosos acres, serosos, è partibus remotis, adeoque creberrimi usus est non modo per se, sed cum aliis admixtum.

Verum cum magnæ sit acrimoniæ (inquit Schroderus) intensæ caliditatis & siccitatis, intensæ malignitatis, mordacis flatulentis, excessivæ attractionis, ideoque aptum natum quod erodat intestina, viscera, cor, hepar, &c. conturbet, ventriculum flatibus mordacibus laceßat. Vi sua calefactoria & exsiccatoria inflammet & consequenter febres inducat; vi attractoria hypercatharthes causet, correctione opus habet.

Quinque vitia habere aiunt, quibus nisi occurras Luet æger tutus.

1. Est, quod flatus quosdam mordaces gignat, usque adeò ventriculum laceßentes, ut sumentibus nauseam commoveant, noxa hæc tollitur, si in excavato cydonio malo clibano aut prunis inassetur, pastâ undique circumlitâ, præsertim additis aut dauci, aut fœniculi, aut apii semine, aut galangæ.

2. Quod inflammet acredinis exuperantiâ corporis spiritus, quo fit ut facile febres excitet, iis præcipue qui obstructionibus viscerum & humoribus putrescentibus obnoxii sunt; sed id nocuenti aufertur admixtis inter coquendum quæ refrigerant & fervorem extinguunt, cujusmodi sunt mucilago psyllii, decoctum & pulpa prunorum, succus aut aquæ rosar, violar, &c.

3. Quod eadem acredine sua recludat ora venarum, ut sequantur evacuationes nimis hypercatharthes dictæ; hæc noxa tollitur adstringentibus, mastiche, myrob. pomo cyd. præcipuè Aloye, quæ inter purgantia ventriculo valde grata est.

4. Est quod acrimonia abradat intestina, & exulceret reliqua viscera, quod ex crebris punctationibus innotescit. Hic damus partim ea quæ lubricant & lentore suo obstant, ut secundo loco dictum est, partim adstringentia, tum viz. cum jam incipit agere.

5. Est, quod malignitate quadam indicibili principibus partibus bellum indicit. Hinc addimus cordialia, hepatica, stomach. &c.

Scammonium sive succus Scammoneæ densatus per coctionem aut etiam per macerationem paratus Diagridiam appellatur. Confectio autem ejus per coctionem hæc est.

Accipitur Cotoneum, extrahiturque durior ejus illa pars media quæ semina continet (recisa tamen superiori laminâ) cujus loco in excavatam partem Scammonium inciditur: mox laminâ quæ prius fuerat recisa, pro cooperculo additâ cooperitur, triticeaque pasta circumquaque malo Cotoneo obducitur ac itaque coquitur in clibano. Pomo refrigerato Scammonium eximitur & usui reservatur.

Per macerationem paratur accipiendo Scammonii partes duas, succi cydoniorum partem unam, & miscendo probe, deinde ponendo in locum calidum & quotidie movendo, donec ejus massa mediocriter induretur; è qua fiunt pastilli qui quantum satis est excidentur.

Vera autem (inquit Le Brun) Scammoneæ præparatio fit cum succo limonum depurato, in quo dissolvitur B. M. & fervens adhuc per linteum transmittitur, quo pacto crassa & impura ejus substantia, quæ non nisi noxam parit, seccatur.

Quod ad electionem Scammonii attinet, optimum est quod ex Antiochia advahitur, niidum, splendidum, (instar glutinis taurini) citò liquefcens, friabile, colore cum frangitur fulvo, non valde ponderosum, tactu linguæ lactescens, nec vehementer calefaciens (nempe hoc Tithymali admixti argumentum est)

At vulgare nostrum squalidum est & cinericeo colore & aspectu tristiore, quia non est liquor manans aut lachryma Scammoneæ, sed succus vi expressus, non ex radice tantum, sed ex tota planta.

Dosis Scammonii præparati à gr. vi. ad gr. xii. aut ðj. Dioscorides & Ruffus usque ad ʒj. exhibent Paulus & Aetius usque ad ʒij. quicquid sit Græcorum Scammonium forte mitius erat, nec ut hoc tempore succo Tithymali adulteratum: standum itaque potius in Dosi Melue.

Scribit J. Bodæus à Stapel se sæpissime gr. xx. etiam xxv. cum violaceo syrupo, non sine felicissimo successu exhibuisse; pueris vii. x. xii. annorum grana x. xii. xv. non minori cum successu quinquennibus gr. vi. septemve.

Consulo (inquit Fallopius) ut semper exhibeatis paucam quantitatem quæ quantitas sit potius pro calcar: vocatur autem calcar paucæ Scammonii quantitas addita medicamentis purgantibus pro rusticis, vel pro aliis robustioribus & cervicosis hominibus, aut etiam Monachis.

Denique cum nulla providentia sit satis, moneo de novo (verba sunt Casp. Hofmanni in fine capitis de Scammonio) 1. ne Scammoneata dentur illis, quibus ventriculus (comprehendo intestina) est debilis, quales fere sunt hypochondriaci. 2. Ne calidioribus & qui ad febres proni sunt. Valde enim turbant corpora, 3. ne in specie iis qui faciles sunt ad lipothymias. 4. Ne substantia detur in jusculis.

Verum quicquid hi contra Scammonium & Scammoneata declamant, si modo Scammonium recte præparetur, & debita dozi exhibeatur, non est aliud præstantius remedium quod certius & etiam tutius operetur, præsertim aliis medicamentis admixtum. Neque qui hujus usum reprehendant, ullum aliud medicamentum invenire possunt. Quod ejus loco substituant in tantilla quantitate adeò utile & proficuum, tantæ efficacis & tantarum vitium. Audi vi praticos nonnullos adhærentes, se plus huic medicamento fidere quam aliis cuicunque cathartico; nec securos esse posse de operatione aliorum purgantium, nisi Scammonia tantillum iis admisceatur; hæc autem fere nunquam frustra medicum, unde non immeritò aliorum medicamentorum calcar appellatur: quæ diximus confirmat Clarissimus vir Franciscus de le Boc Sylvius (ut nos monuit D. Soame) Scammonium, inquit, blandè purgat, quicquid ganniant imperiti; testatur ubique medico-

rum peritorum experientia quotidiana. Ego certè post alios multos, aliquot millenis vicibus eo sum usus, sed semper cum successu optimo & operatione blanda.

Cæterum Scammonium quadam latente totius substantiæ proprietate operari creditur. Nam gustu quidem nullus in eo caloris vehementia deprehenditur. Cuiusmodi siquidem liquori aut rei permisceatur, nullam ei vel amaritudinem vel acrimoniam aut alium ingratum saporem communicat.

Novi civem Ulmensem, qui toties recidivam hæmorrhoidum passus est, quoties medicamentum ore assumpsit quod ingrederetur vel Scammonium, vel folia fenæ. Horum usu interdicto ab acerbo hæmorrhoidum dolore per multos annos immunis saluberrime vixit. Sculteti Armamentar. Chirg. Obs. 760. D. Tanc. Robins. Raius.

Scammonium est succus plantæ cognominis Scammonæ, ex Convolvulorum genere, lactariæ; laudatur optimum Antiochium & Armenium. Expeditur nitidum, splendidum, clarum, spongiosum, tenuissimis fistulis excavatum, citò liquefcens, friabile, non valde ponderosum, salivâ vel aquâ madefactum lactescens, linguam non exurens, nec tetra odore infectum. Adulteratur Tithymali lacte, sed tunc linguam valenter nimis adicit. Pharm. August.

Præparata, ex Scammonio.

1. Scammonium correctum per Cydonium, id est, Diagridium.

℞. Scammonium tritum, coque in malo Cydonio excavato pastâ circumdato, exemptum dein diagrydium serva pro usu.

N. 1. Hæc elaboratio est Gal. l. i. c. i. de aliment. facult. ubi interna mali coronii acetabula semini destinata excavat, eaque Scammonio replet ac coquit.

N. 2. Antiquum imbecillum est ideoque flatulentum, bi-
mum est optimum.

N. 3. Dicitur Diagridium, Diagrydium, Diacrydium.

2. Scammonium defecatum per succum Citonior.

Solve Scammonium (vel diagrydium) in succo ca-
lido Citonior. Rosarumve pallidarum aut Damafce-
natum f. a. decanta à facibus ac coagula.

N. 1. Quercetanus veram Scammonii præparationem fieri cum succo Limoniorum ait, cum quo procedit ut di-
ctum. Vide Pharmacop. c. 15. Alii cum succo Citri.

N. 2. Crollius imbibit Diagridium puriss. succo cla-
rificato Ros. pallidar. vel Sylvestrium, (forte Damasce-
nat. seu Provincialium) addit spir. & li guttam unam
vel alteram, atque exsiccat calore solis vel retro fornacem,
idque repetit multoties (20. vel 30.)

Dosis à gr. vi. ad xii.

N. 3. Brendelius dissolvit Scammonium in ∇ destilla-
ta actu frigida. Sic subsidet picea quadam substantia, à
qua decantat liquorem supernatantem: idque repetit,
novam scilicet ∇ affundendo, quoties ∇ albicantem colo-
rem contraxerit. Coagulat dein decantatas ∇s leni calore
ad siccitatem.

Dosis ad gr. xii. &c. Brædel. in Chym.

3. Extractum per spiritum Vini, Magisterium f. Regina
Scammonii, Pulvis Syrius.

℞. Scammonii purissimi grossè triti ℥ij. V opt.
℥xii. (vel ad eminent. dig. 4.) Digerantur in MB hora
una ac alterâ, sæpius agitando, ut solvatur: dein filtra
calidè per chartam, filtraturæ affunde ∇ frigidam Ro-
sar. (vel aliam aliquam aquam) & lactescet liquor.
Abstrahito spir. vin. reponè reliquum & residebit Re-
gina quam (à supernatante lacteo liquore decantatio-
nis beneficio separatam,) ter quaterve aq. rosacea
lava.

N. 1. Si Scammonium parum fuerit, vix pars tertia

decedit. Sala de Vegetab. Kest. 1. cap. 90. Tentzel. in
Exeg.

Dosis à ℥β. ad gr. xv.

Fit quoque Extractum Scammonii per Acetum de-
still.

Dosis gr. 8. vel 12. Hartm. in Croll.

4. Extractum Diagridii aromatizatum F. F.

℞. Cinam. zinzib. caryophyll. macis, nucist. cardamom.
cal. arom. anis. cortic. arant. an. ℥i β.

F. Extractum cum V ℥β.

2. 4. Diagrid. ℥ij. Extrahe itidem cum V f. a.

Utrumque Extractum conjunctim digere. V abstrahè
ad consistentiam Extracti.

Dosis gr. xv. ad ℥j.

5. Extractum Scammonii Glycyrrhizatum.

Verum Scammonii cotredivum est succus liquiri-
tiæ. Infundantur radic. glycyrrh. bona quantitas in aq.
per 24. horas, eaque infusio nova semper glycyrrh.
additione ter repetatur, coctione levi præmissâ. In
hoc decocto Scammon. pulverisatum resolvatur, fil-
tretur, exhalet aqua sub finem lenissimo ∆ (ne adura-
tur) usque dum Extractum in fundo resideat. Est S.
Clossii.

6. Elyxir Scammonii Crollianum f. Pilula
Scammonii.

Ex Scammonio crebris imbibitionibus succi Rosar.
(ut supra) imprægnato, extrahe Tincturam f. a. dige-
rendo cum V opt. (in quo sem. anisi. fenic. cinam.
spica nardi macerata, decanta & abstrahè V ad consi-
stentiam duriusculam, vel quod melius, præcipita cum
V Rosar. & lava.

℞. Hujus extract. ℥j. succi citonior. depurati ℥iv.
ros. rub. depurat. ℥j. M. & coagula ad consistentiam pilulæ
Dosis à gr. 10. ad 20.

7. Alia correctio Hartmanni: Scammonium
Glatum.

℞. Scammon. minutiss. triti q. v. imbebe cum paucilla
spir. & i vel ol. Sulphuris p. c. adfundendo guttas aliquot.
ol. anis. vel fenic. contere diligenter ne fiat massa instar
picis viscida, quam serva.

Vires. Purgat leniter sine omni molestia.

Dosis à gr. xv. ad xxv. Hartm. in Croll.

N. 1. Eodem modo mitigatur & vehementia ononum
succor. purgantium, Aloës, Elaterii, Gummi de Pern. Hartm.
in Croll.

N. 2. Quercetanus in Pharmas. Restit. cap. 15. Chymi-
ci, inquit, qui elegantes illas & singulares & i proprietates
occulte in eo delitescences eruere norunt, haud verebun-
tur Scamnoneam, Myrrham & ipsa etiam Gummi præ-
parare & dissolvere cum phlegmate & i, toto suo spiritu
imprægnato. In hoc solo enim spiritu latet vera illorum
simplicium præparatio, qua cum exuperante calefacien-
di qualitate insignita sunt, & hac viâ exquisitè & perfe-
ctè corriguntur.

N. 1. Saus & li & Tartari comburant Scammon. &
in picem vertunt, ac proinde multum virtutis cataractica
deperdunt. Satiùs igitur erit Scammon. resolvere in Tin-
cturâ ros. cum & li paratâ ut moris est, resolutumque
ad Extracti consistentiam reducere.

8. Scammonium Sulphuratum.

℞. Scamm. minutiss. triti, q. v. Exempli gratia, ℥ij
vel ℥ij. Extendatur supra chartam bibulam, detinea-
turque supra carbonibus vivis sulphure superinjecto fu-
mantibus, donec Scammonium, (quod continuè mo-
vendum) liquefcere incipiat vel albescat. Scammonium
hac ratione optime correctum exhiberi potest à gran. vi
ad vii.

9. Scammonium Rosatum.

℞. Scammon. vel Diagrid. q. v. Extrahæ cum spiritu Citonior. f. a. decanta, filtra & inspissa ad consistentiam mellis Dein adde Scammon. ad 3 j. succi Ros. Rub. recenter express. 3 ij. coagulentur simul ad si citatem.

N. Si spirituum Citoniorum, infusione Santali tinctum, loco Menstrui extractioni huic adhibueris, non modo Scammonium colore elegantius, sed & Epati minus noxium acquies. Et hoc modo paratum Scammonium rosatum extat in officina Salz-vvedeliana, jucunda suâ rubedine visum oblectans.

Dosis à gr. vi. ad xv.

10. Infusum Scammonii seu spiritus purgans.

℞. Scammon. el. p. iv. Succu Cydon. p. ij. mixta pone in locum calidum quotidie movendo, donec induretur. Tunc affunde V Malvatici, q. stentque aliquandiu in digestionem. Et sic spiritus purgans seu solutivus.

Vires. Purgat sine ullo fastidio ac molestia.

Dosis variat pro Scammonii ingredientis quantitate.

N. Hæc infusio ad annum circiter servata, rejicit ad superficiem guttulas olei rubei, instar picis liquida, in quo ferocia seu malignitas scammonii residere judicatur. Tentzel. in Exeg.

11. Diacydonium Lucidum Scammoneatum seu Laxativum.

℞. Gelat. Diacydon. lucide ℥ j. Extract. Diagrid 3vj. loquente igne, (N. B.) optime miscendo, ad justam consistentiam.

Vel

℞. Scammon 3iv. extrahæ Tincturam cum V postea fiat f. a. Cydoniarum ex succi Cydonior. ℥ ij. Sacchar. ℥ j. Tincturam paulatim succo affunde, misce exactè ac affunde in scatulas.

Dosis à 3 j. ad 3 ij. & 3 ij β.

N. Nisi mixtio exactè fiat, fieri potest, ut diagrydium in uno loco parcius, in alio copiosius concreascet, inde purgatio justo lenior, hinc copiosior adeoque hypercatharsis nonnunquam subsequitur.

12. Gelatina Cydoniorum laxativa cum Turbith.

℞. Scammon. 3ij. turbith. 3iv. extrahæ cum V, postea

℞. Decoct. cydon. ℥ v β. sacchar. 3 xviii.

Coq. f. a. & F. Gelatina, cui sub finem affunde Tincturam Diagridii & Turbith, spatulaque agitentur, donec V evanescat. Tandem reponere pro usu.

N. Communiora præparata, quæ diagrydium ceu basis ingreditur, ipsemet Tyro observare poterit.

Præcipua ex his sunt.

Confectio Anisi Laxativi. Elect. Benedict. Laxativ. de citro solutivum, Diacydonites Laxativ. El. Episcopi f. Elef-coph. Confect. Hamech. Indum majus, Diapruni solutivum. Rosatum, De succo Rosarum, Zingiber Laxativum, Pilula Aggregativa majores, Aureæ, de Fumaria, de Hermo-daelyli, Extractum Catholicum, &c. Schroderus.

Scammoneata illis non sunt exhibenda, quibus ventriculus est debilis, quales sunt hypochondriaci. Nec illis qui *κατὰ* viscerum laborant & ad febres proni sunt; Nec illis, qui cardialgia laborant.

Præparata. 1. Scammonium correctum per cydonium, id est, Diagrydium.) verum quocunque modo præparatum & correctum sit Scammonium, attamen summâ semper cum cautelâ & circumspeditione uti debemus. Ego nunquam in praxi meâ in usu habui, nec in posterum habebō, me semper ab istiusmodi venenis colliquativis abstinens, contra autem stu-

dens salis meīs purgantis absterivi saponariam vim habentis saluberrimæ usurpationi, vid. suprà Libr. 2. Cap. 73.

N. Nisi mixtio exactè fiat.] Ideoque extractum Scammonii non solum probè prius est exsiccandum & in pulverem redigendum, verum etiam cum amygdalis dulcibus subigendum, ut eò facilius postea cum succo cydoniorum dilui possit, ut denuò, prout alias solet, in suam redeat resinofam substantiam, ac intra corpus sumptum vel parum operetur, aut frigida superbibita ventriculo ac intestinis molestias subsequutâ hypercatharsi creet. Hofmannus.

SCANDIX.

Scandicem veterum pectinem Veneris non fuisse probat Joh. Bodæus à Stapel; pecten autem Veneris à seminum nostris confertis, pectinis dentium amulis, dicta est hæc herba, seminibus in rostrum productis geranii moschati rostra proxima similitudine referentibus ab omnibus aliis umbelliferis distinguitur, ut plures notas conquirere non sit opus.

Vires. Venerem mirum in modum excitat & adjuvat. Bellus.

Semen pro scandicis Creticæ missum à me satum plantam produxit scandici vulgari simillimam, imo planè eandem. Idem fere accidit Joh. Bauhino: unde quicquid intercedit discriminis exco aut solo debet suspicor: nisi detur in plantis transmutatio specierum.

Inveniuntur circa Monspelium in sterilibus, à la Colombiere, & in colle Ferran odore suavi Anisi, imò & sapore. Botan. Monsp. Rainus.

SCARABEUS.

Scarabeus (à Græco *Κάβηρος*, addito *σ*) *Κάβηρος* (vel quasi *καβαρὸς* quod valde sit impurus & torridus: vel *καβαρὸς* *καβαρὸς* qui asinus est, & *καβαρὸς* vel *καβαρὸς*, quod est sperma; quia hoc animalculum est core asinino nascatur, & vivat; unde & *καβαρὸς* appellat Hippocrates.) The Beetle (forte ab Anglo Saxo. *Bizet*, à verbero. *Tobeat*; quia Scarabæi vespere præ cæcitæ involantes facies nostras percutiunt instat mallei) or Bugg, insecti genus teneras habens pennas, ob id crusta superveniente rectas. Plinius, Scarabæi nomine, omne genus insectorum complecti videtur, quod crusta tegitur, quod vaginipenne est, Scarabæi sunt hermaphroditi. Horum variae sunt species. De quibus non est hic instituti nostri agere. *Charleton*.

Scarabæi commendantur ad dolores & contracturas nervorum; ad febrem quartanam amuleti loco impositi. Cornua suspensa de collo infantum urinam cohibere dicuntur. *Schroderus*.

Scarabeus unduosus in specie, seu *Proscarabeus* Catharidum naturam imitatur, urinam pellit & sanguinem, canis rabidi morsum egregie expugnat, viros dictos id est Arthritidem vagam, Autore Wierro, curat pulvis vel conditura exhibita. Extinctus expetitur à quibusdam ejus liquor ad vulnera. Adicitur & emplastris in bubone & carbunculo pestilentiali; permiscetur & antidotis, fitque inde oleum ex infuso animalium vivorum in oleo communi, quod loco olei Scorpionum nonnulli adhibent. *Schroderus*.

SCARLEA & SCLAREA, vid. *Horminum*.

SCHÆNANTHUM.

Nomina. Schænanthus five juncus odoratus J. B. Schænanthus Ger. Juncus odoratus aromaticus C. B. Juncus odoratus tenuior Park.

Radi-

Radicibus nigris albicantibus, parvis, lentis, duris, lignosis, multis fibris exilibus summo cespite spartitis (interdum adfunt radices paulo crassiores, densæ, geniculatæ gustu valentioris reliquis) foliis est palmum excedentibus, triniceis, robustis, crassis, ad radicem latis convolutis, & squamatis interstitis, quæ in tenuem rotunditatem, mucronatam firmamque desinunt, colore ad radicem albidior vel subflavo, prope verticem viridi, aut purpurascens, quæ culmos ut in Arundine multis veluti tunicis arcte cingunt. Culmi multi ex uno radicum cespite, rotundi, nodis longe ab invicem distantibus distincti, aliquando lignosi, non cavi intus, sed medulla fungosa juncea farcti, & in summo graciles assurgunt; quibus secundum caulem gemina serie loliis modo flores spicatis hærent, decidui, in quorum glumis aut caliculis foris rubellis pappi tenuisque floiculi odore & sapore eodem cum foliis insident. His semina (e quibus sæpe apud Germanos planta excrevit) succedunt;

Ubi recens est hæc planta, manibus conficata, jucundi est odoris & saporis non ingrati, licet videatur aliqua adesse amaritudo cum acrimonia, luculepter linguam mordicante; quæ tamen solet efficacior esse in qua buldam foliis remotis gramineis, valde tenuibus & carinatis. Joh. Bauhinus, Parkinsonus etiam observavit folia illa tenuia, juncea, quæ in officinis nunc passim habentur, multo actiora esse magisque aromatica, quam caules, flores, aut radices; proinde cum in desuetudinem abierunt hæc apud practicos, à mercatoribus rarius adferri.

Qui apud nos ex semine succrevit multos protulit velut cespites seu capira e longis junceis foliis dense stipatis, se mutuo ima parte amplectentibus, composita, exterioribus majoribus & crassioribus, interioribus pedalis, tenuibus rotundis, duris, rigidis, paulo supra radicem quovis apud nos nascente junco gracilioribus, sapore acris & aromatico non injucundo, odore fluavi, leni & delicato. Park.

Nascitur, (Autore Dioscoride,) in Libya & Arabia laudatissimus ex Nabathæa, proximus Arabibus adfertur & ex Ægypto. In Campania & Apulia reperiri aiunt.

In Arabia Provinciis, referente Garzia, Mascate & Calayate tanta copia nascitur, quanta in Hispania graminis vulgare quo Animalia nascuntur. Sic ij qui terræ Sanctæ visendi gratia in Orientem proficiscuntur restantur negotiatores ex Syria Alexandriam ducere camelorum greges, quos Catavannas vocant, merces impositas ferentes: cum autem in solitudines inter Syriam & Ægyptum ad Arabiam sitas pervenerint, neque pabuli, neque aquæ copiam invenire: attamen secus vias ubique aridas veluti stipulas, easque numerosas, densas & stipatas, ex uno Radicum cespice admodum odoratas nasci, quas inter eundem aut alias quiescendum, Cameli depascant: eo etiam pabulo camelos onerare, ne in steriliotibus locis jumenta deficiant: quod vero superfit Alexandria & Alcairi villi admodum vendere. Apud incolas licet in nullo sit pretio, cum gens sit rudis & sylvestris, quam ut eo & se & sua jumenta lavent, attamen à navis in Indiam deferretur: hi enim aliquot fasciculos secum devehentes ibi in usum Medicum vendunt, cum eo Medici Arabes & Persæ qui in India degunt utuntur, Adacher vocantes. Sic & mercatores Equarii maxima copia in fasciculos colligunt, & in naves assumunt, ut equis subternant, ne stercoreis urinæ foetore ostendantur: nam simul atque maduerit in Mare abijciunt, & receptem subternunt.

Monachi in Mesuem & Anguillara Squinanthum officinarum non esse veterum Schænanthum seu juncum odoratum contendunt: quorum rationibus respondent quoniam Joannes, tum Caspar Bauhini: quos adi.

Vires. Tenuium est partium: calcacit, subastringit, discutit, usus præcip. in obstructis menibus, hepate, liene; in ventriculi inflatione; vomitu ac singultu; in urinæ difficultate, renum, vesicæ, ac uteri dolore. Extrinsecus corrigit foetorem oris, roborat caput (lotione) discutit uvulæ tumorem, roborat ventriculum &c. Schrod. exhibetur autem vel pulverisatus ʒj. pondere in vino calido; vel in aqua decoctus aut jure gallinaceo. Vini squinanthini ad prædicta utilis; duplicem præparationem vide apud C. Bauhinum in Historia: ibidem & aquæ stillatiæ.

Memini (inquit Sim. Paul. in quadrip. Bot) Henricum Meibomium, cui specificum ad vesicæ ulcera, Schænanthum herbam & cyperi radices adhibere; à quorum usus topus nucis juglandis fere magnitudine ex honestissimæ Matronæ naturalibus locis per urinas fuit excretus, qui diu satis ægram ulcere vesicæ vicinarumque partium confectam lecto affixerat. *Ramus.*

SCILLA.

Notum est discrimen, *Scylla* marini monstri & *scilla* dicti, & *Scilla* plantæ, de qua agimus quamvis Græci nonnulli & ipsam plantam *σκύλλαν* scribant minus recte.

Nomen accepit quod inter hanc & testaceum Pifcem à tunica squamarum compactili serie maxima similitudo intercedit, vel *σκύλλης* nomen obtinuit *σκύλλης* i. e. viriditate quod in Sabuletis marinis sole retortidis oritur, cujusmodi sunt in Hispania, & prope aridæ Lusitanie resqua maritima. Latina Scillam dicunt & squillam etiam antiquissimi. Jo. Bod. & Stapel.

Cepaceo generi tantopere est compar (inquit Lobelius) ut multi eam cepam maritimam vocent. At nos hyacinthis, ut puto rectius, eam adjudicamus.

Notandum Scillam Græcis veteribus etiam *χλὼν* dictum fuisse nomine cum lentisco communi.

Idem veterestria Scilla genera tradunt; duo Medica, masculum albis foliis, feminam nigris, & tertium genus, & tertium cibus gratum Epimenidium vocatum. Plin. lib. 19. c. 5. C. Hofmannus Epimeniam corrigit.

Vires. De Scilla & præparatione multa habet Plinius, Dioscorid. Galenus, quæ apud ipsos vide. Incidendi, aperiendi, discutiendi vi prædictam esse recentiores consentiunt: unde usus ejus est in obstructionibus hepatis, meatus biliarii, Lienis, mensium retentione, urinæ, & in mucilagine pulmonum & tussi.

Maximus hujus usus est (inquit C. Hofmannus) pro trochiscis Scilliticis qui theriacam ingrediuntur.

Habemus in officinis duplex oxymel Scylliticum, simplex & compositum, utrumque Mesue, ad affectus præcipue pectoris ex pituita crassa, &c. habemus & Loch ejusdem duplex, simplex & compositum, utrumque ad crassos & frigidos in pectore humores, Hofm. *Ramus.*

SCINCUS.

Super ejus descriptione vid. quæ sub titulo *Lacertæ*. De Scinci vero partibus officinalibus & præparatis sic Schrodernus.

Alexipharmacus est Scincus Veneremque accendit ejus pinguedo simili virtute pollet.

Dos ʒj. Matthiolus commendat rostrum & pedes, eosque cum vino propinat, hinc & carnes laterum commendat.

Ingreditur Antidota, & præcipue Theriacam Antidrom. & Antidotum Matthioli.

SCOLOPENDRA ANIMAL.

Scolopendra (quod *σκολοπα*, aculeum habeat in *ἔδω*, cauda)

cauda) porcus lutosus, Nicandro *ὀφιομαχὴς*, biceps (quod pari facilitate prorsum capite, retrorsumque ducente cauda incedat) *The Scolopendra* vermiculus est longiusculus, planus, gracilis, trium aut 4. digitorum longitudine, coloris sublutei, pedibus innumeris utrinque refertus; & antennis binis longiusculis, caudaque bimoda ornatus. Contactus se contrahit. Invenitur in truncis arborum, aut in lignis supra terram locatis, aut palis terræ infixis. Ad morsum puncturamve ejus locus undique livescit, putrescit, & vini rubri facibus similis videtur. *Charleton.*

Scolopendrium verum, vid. *Ceterach*.

Scolopendrium Officinarium.

Quæ Græcè *φύλλιν*, quasi foliosum dicas, cum nihil nisi foliosus cespes appareat, Latinis pariter Græcum nomen retinentibus phyllitis dicitur. Officinis lingua cervina à similitudine foliorum appellatur C. B.

Nomina. Phyllitis Ger. Phyl. sive lingua cervina vulgi J. B. Phyl. sive lingua cervina vulgaris Park. Phyllidis, lingua cervina officinarum C. B.

J. B. e capillaribus radicibus, nigricantibus, numerois Trago, Cordo masculæ filici (id est, vulgari) similibus, implicitis, cum foliorum vestigiis connexis, foris nigr. cantibus, intus in pallido viridibus folia fundit longa, senu, octona, vel dena (inquit Lobelius) interdum etiam plura incerto numero, dodrantalia, aut pedalia, duarum unciarum plerunque latitudine, Cordo acuto rumici similia, Trago & Cæsalpino spleni, vel linguæ cervinæ, ima parte falcata Lunæ modo corniculata, læto virore splendentia supernè, infernè verò obliquis, pulverulentis areolis, seu lumbricis rufis (Cordo flavis aut rubentibus, Trago subluteis) virgata; sapore acerbo, odore Dod. graveolente. Color linearum in foliis averfis variat pro ætate; nam cum primò erumpunt albidæ sunt, deinde cærulescunt, postea paulatim ad ferrugineum tendunt.

Vascula hujus seminali, prout à D. Grevio microscopio præstanti examinata describebantur, hujusmodi fuere. Unaquæque capsula seu vasculum seminale pediculo à semuncia ad unciam & amplius longo infidebat, crassitudine ad basin (ut apparuit) setæ equinæ duplâ, ad cacumen paulo crassiore. Capsula ipsa coloris erat argentei, magnitudine circiter oculi cerasini, figuræ sphaericæ valido tendine coloris aurei circumcincta. Tendinis hujusce superficies cochleam delicatam, seu vasa ligni aerea referebat. Quamprimum autem seu aeris inclusivi, seu aliter, tendo hic satis rigidus evadit dissiliens, capsulam illico bifariam in duos scyphulos distrahit & semina disjicit, capsulae hæ in obliquis sulcis averso folio exaratis nascuntur, à semuncia ad unciam longis, & circiter uncia partem latis. Singulis sulcis unciam longis plures 300. capsularum prædictarum innascuntur, ideoque si decem tantum semina singulis capsulis attribuiamus, plus 3000. semina, quo numero in summam sulcorum ducto, & producto iterum in numerum foliorum quæ una radix plerunque emittit, exurger summa 1000000. seminum, pro annuo proventu unius plantæ.

In umbrosis, uliginosis & saxosis, præsertim montanis, in omnibus fere Angliæ Provinciis oritur; in ipsis etiam puteis & specibus inter lapidum aut laterum commissuras non raro exit.

Hæc herba in petrarum cavernis antrosisque cautibus enascens pusilla, tenera & mollicella evadit ob ventilationis defectum, unde nonnulli magni etiam nominis Botanici eam pro distincta specie, nimirum Hemionitide vera Dioscoridis habuerunt, & Londinum, Mechliniam, &c. eo nomine in hortis plantandam mi-

serunt. Hæc autem non ita multo post, libero acri exposta, non mirabili aliqua metamorphosi, ut illi imaginati sunt, in phyllitidem abiit, sed quod antea erat veram phyllitidem se esse prodidit. Vide Lobel. Obs. pag. 469.

Phyllitidem, polyschidem sive multifidam, aliis folio laciniato aut digitato distam, à vulgari phyllitide specie diversam esse non libenter concesserim; quin potius lusus quidam naturæ aut accidentalis varietas esse videtur.

Ejusdem commatis esse puto & phyllitidem crispam: utramque pingit & describit Joh. Bauhinus, utramque & nos vidimus Lutetiæ Patissorum in Horto regio, elegantia & raritate spectabilem. Sive tamen specte, sive accidentibus tantum differant, tituli soli ad eas cum à vulgari phyllitide, cum à se mutuo distinguendas sufficiunt, nec descriptione alia eis opus est.

Vires & Usus. Usus hujus plantæ præcipuus est in liene tumido, fluxu alvi, expuitione sanguinis. Extrinsecus mundificat vulnera & ulcera. *Schrod.*

Pulvis herbae exsiccatæ in palpitatione cordis, in suffocatione uterina; in motibus convulsivis mira præstat, si in cerevisia tenui aut zythogalo seu liquore posseti nostratibus dicto, modica ejus quantitas propinetur, ut plurimis experimentis nobis constat: potest & è foliis viventibus. Conserva ad hos usus parari: folia in vino pota serpentum moribus adversantur, auctore Dioscoride.

In catalogo Horti regii Parisiensis præter superscriptas multas adhuc alias phyllitidis varietates invenio quas à reliquis specie differre non puto. *Raim.*

SCOLYMUS, vid. *Cynara*.

SCORDIUM.

Scordium dicitur hæc herba, quod ejus folia trita odore allii acri nares feriant.

Odore Allii, foliis & facie chamædries, loco palustri & reptatu ab aliis hujus generis abunde distinguitur.

Vires. Scordium alexipharmacum ac sudoriferum est; usus præcipi in peste pestilentialibusque morbis, febribus malignis (tam præservando quam curando) in obstructionibus epatis ac lienis, in pulmonibus putulentis ac mucilagine refertis; extrinsecus mundificat vulnera & ulcera, lenit dolores podagricos. *Schrod.*

Sunt qui in mensium profluvio cum successu exhiberi velint.

Succus ejus seu pulvis valet ad lumbricos intestinorum, verum præcipua vis est in veneno expellendo, & adversus pettem aliosque morbos contagiosos.

Ex hoc herba paratur electuatum inde Diascordium denominatum; eximii usus ad omnes prædictos affectus. Cardiacum est insigne & usurpatur in iis individuis in quibus theriaca & alia calida locum non habent. Nutrices nostræ parva dosi etiam infantibus exhibent ad tormina intestinorum.

Gasp. Guitmannus Med. Augustan. plurimos bubones pestilentes ruptos & ulcera maligna curavit feliciter solo pulvere Scordii, & nondum ruptos aperiebat. D. Soame ex Observat. Reusneri. *Raim.*

Scorodonia sive Salvia agrestis.

Scorodonia ab odore Allii quem exhalat, salvia à foliorum similitudine dicitur, sylvestris potius quam agrestis dicenda quoniam raro extra sylvas & dumeta seu fruteta invenitur.

His autem duabus notis, nimirum odore Allii & salviae foliis à reliquis hujus generis cum flore galea carente differt, quibus adde flores ex singulis foliorum alis

singulos qua nota convenit cum Iysimachiis galericulatis.

Nomina. Scorodonia sive salvia agrestis *Ger.* Scordium alterum sive salvia agrestis *C. B.* Scorodonia sive Scordium alterum quibusdam, & salvia agrestis *Park.* Scordis sive Scordium folio salviae *L. B.*

J. B. Radicē nititur flexuosa, dura, repente fibras tenues interdum longas demittente; ex qua caules eriguntur plures, cubitales & bicubitales quadrati, hirsuti purpurascens vel nigricantes, albā medullā facti, ad quorum genicula folia exeunt ex intervallis gemina opposita Salviae vel Betonicae nisi acutiora essent, ad utricam quodammodo accedentia, rugosa, atrovi-
rentia, scabra squalidaque, pilosa, per ambitum serrata, sapore amaro. Summus caulis in furculos aliquot dividitur, in quibus spicatum digeruntur flores in unam partem vergentes, ex singulis foliorum adverforum alis singuli adeoque biniflori, brevibus pediculis, colore herbaceo, vel candido pallido, ex quorum rictu loco Galeae stamina exeunt purpurascens; e calice cujus segmentum superius integrum est, & sursum reflexum inferius in quatuor denticellos seu spinulas dividitur. Semina fusca, ocymigranis similia.

In Sylvis & dumetis reperitur.

Vires. Hujus decoctum urinam & menses ciet; in lue venerea utiliter exhibetur. Vulneraria est e præcipuis, sive interius sumpta in potionibus, sive exterius applicata.

Viribus cum Scordio convenit & Gesneri iudicio ad remedia Scordio præferenda fuerit. Hildanus hanc miris laudibus in ulceribus gangranosis celebravit, & duplicata dosi Scordio substituit.

Sunt qui hujus decoctum lue venerea infectis non infelicitè propinant. *Dod. Rain.*

SCORPIO.

Scorpio, Σκorpion (vel πρὸς τὸ σκορπίον τὸ ὄφιον, quod venenum jaculetur: vel πρὸς τὸ σκορπίον ἔρπον, quod flexuose serpat.) Ciceroni & aliis Hepa, Pandetario Satocollus, the Scorpion Charlton.

Σκorpion, Scorpium. Scorpion. The Scorpion, à venemous Worm. Een Scorpionen.

Animal est formā cancris æmulans, iis tamen minus.

Vires. Urinam ciet, calculo renum aut vesicae impediam, (vivi incinerati & exhibiti.)

ictibus propriis subveniens, (triti & impositi.)

Præparata.

1. Oleum Scorpion. simplex infusione Scorpion, in Ol. Amygd. amar. *vid. August.*

N. Sunt qui propinant in colicis & calculosis doloribus.

2. Ol. Scorpion. compos. Mes. quod recipit infuse Aristoloch. Gentian. Cyper. & rad. capp. *vid. August.*

Vires. Ustissimus est in Renum doloribus, urinæque obstructa (illinitur dorso vel pubi) medetur ictibus venenatorum animalium, febrium paroxysmos arceat, (pulsibus vel dorso inunctum) aurium dolores mulcet.

3. Ol. Scorpionum magnum, *Matth. vid. August.*

Vires. Majorum est virium quam præcedentia, Ususque eximius in morbis contagiosis præservandis & curandis, in venenati moribus & simil. (inunctum cordi, arteriisque temporum, manuum, pedum, dolores demulcet colicos & uetri, &c.)

Ol. Scorpionum Sanguineum.

℞. Sem. hyperic. ʒvj. infunde in vino malvat. per ʒij. [3] tum adda Terebinth. Venet. ʒij. Ol. centum

andor. [id est, vetustiss.] ʒvj. Croci ʒj. flor. hyperic. M. iv.

Omnia tumultentur in arena in boccia benè clausa per triduum: deinde liquor in aliam bocciam fortiter exprimatur, liquor per inclinationem decantetur, usque ad apparitionem olei. Oleo apparente vas elevabis, in eo videbis ol. rubrum sanguinis instar. In hoc oleo reponantur pro unaquaque libra scorpiones N. L. in MB eoque relinquantur, donec fiat perfecta fermentatio. Hinc per pannum exprimantur omnia, oleumque reservandum.

Vires. Summè nephriticos dolores lenit, extrinsecus applicatum.

N. Hoc est illud oleum nephrit. sanguineum magni Ducis, quod Pona describit, sed desin non addit.

Ex communic. Dn. D. Joh. Kieferi. Schroderus.

Est animal forma cancris æmulans. N. Hic quaeritur utrum possibilis sit Scorpionum ex Cancris generatio, & an ex ocymo generari ac produci possint. *vid. supra lib. 4. de ocymo & sepius laudatum D. Sachsum & Leuwenheim in sua gammaolog. p. 283.*

Vires. Hi etiam per se pulverisati & adhibiti urinam & calculum pellunt. *vid. Cistern. Medicam. p. 97.*

Præparata. Oleum Scorpionum (.) Hoc tam internè propinatum, quàm externè dorso ac pubi inunctum mira præstat in calculo, colica &c. teste experientia.

2. Oleum Scorpion. compos. Mes. Ejus usus sæpe noxius est, dum potis cutis ita inviscatis insensibilis impeditur transpiratio, & veneni exitu intercluso plus noxæ, quàm commodi febricitanti infertur. *Hofmannus.*

Artificialem Scorpionum productionem sic describit

R. P. Athan. Kircherus Mund. Subterr.

Vol. II. p. 387.

Scorpionum corpora contrita intra vterum conde, quibus si aquam Ocymo maceratam super affuderis, & solè astivo per diem exposueris, quod si sagaci, & armato oculo inspexeris, totum hoc mixtum in innumerabilem Scorpionum foeturam degenerasse reperies, quod idem tam in vivo, quàm mortuo non contrito evenire reperies, siquidem à corpore excrementum quoddam rejicitur, quod totum in similes sibi Scorpiones convertitur, quod Lectorem experiri velim, veritatem enim reperiet.

Cur verè ex Ocymo potissimum Scorpium oriri dicatur, merito quispiam querere posset, cum is nescio, quam sympathiam cum Ocymo habere deprehendatur. Scorpium in cerebro hominis Itali repertum, & ex nimio Ocymi usu odoræque inibi natum Hollerius tradit, & Ambrosius Pareus cum exactè depinxit. Dicunt quoque, Ocymum contritum, & inter duos lateres positum, ubi 24. horarum spatium soli fuerit expositum, Scorpiones generare, quod & Plinius verum esse testatur, cerè vel ipse Aristoteles in mirabilium narrationum congerie Scorpiones è Sisymbriis putrefactis enasci asserit: Est autem Sisymbrium species quadam Ocymi. Iterum Plinius hujusmodi proponit experimentum; Si velis in unum locum convocare omnes quicubi latitantes Scorpiones, id perficies hoc modo: Manipulum Ocymi decem cancris fluviatilibus compactum, ea in loco reponis, & habebis intentum. Scribit Avicenna, amicum se habuisse, qui cum vellet Scorpiones ex quibusdam putrefactis lignis (quod ego nil aliud quàm putrefactos Ocymi caules fuisse existimo) produxisse; quin & Ocymum in pulverem redactum unà cum Scorpionum cinere subactum percussis mederi tradit; Quæ omnia manifesta sunt mutua amicitia Ocymum inter & Scorpionem indicia. Quomodo vero ex Ocymo sine sensitiva natura seminio generari istiusmodi animal possit, non video; unde cum sollicitius hanc rem apud Franciscum Corvinum nobilem omnino Botanicum, & solertissimum rerum naturalium exploratorem inquirerem, respondit, id mirum non esse; habere enim radicem sibi familiarem vermenem quem

quemdam Scorpioni haud abfimilem quem Theophrastus Spadylum vocat; hic enim seminio suo plantam postquam inferit, ex eo tandem Scorpiones nasci, partim ex se, & sue natura, partim arte, ex applicatione activorum cum passivis; atque hac est vera & genuina ratio genesis Scorpionum ex Olymo. Quod verò subinde ex Cancris quoque fluvialibus nascantur, ratio est similitudo cancri seu paguri cum Scorpione, quâ ille facile in hunc convertitur & transformatur: qua arte autem id institui debeat, Ovidius sequentibus versibus docet.

Concava littoreo si demas brachia cancro
Cetera suppones terræ, de parte sepulta
Scorpius exibat, caudaque minabitur unga.

SCORZONERA.

Scorzonera nomen est Hispanicum, huic herbæ inditum, quod animalis Escoreu Catalaunico sermone appellari morsus cutet. Formam huius animalis vide apud Monardum, qui integrum libellum de hac herba & lapide Bezoar scripsit. Ad serpentinum autem genus pertinet hoc animal, unde Scorzonera idem fere est ac serpentaria, quod contra serpentum venena efficax sit.

Sunt qui ad Chondrillam Dioscoridis referunt, sed magis ad Tragopogonis genus reducenda est C. B.

Clusius Scorzoneras à Tragopogis in eo solum differere putat, quod illarum radix vivax sit, Tragopogi autem minime.

Nos potius ex floribus ejusque calycis formâ Scorzoneram à Tragopogone distinguimus, ut Scorzonera sit cujus flos à calycis radii non superatur, verum floris orbis calycis oras excedit potius: Tragopogon autem cujus florem ambiunt & continent calycis radii floris ipsius petalis multo longiores. Flos quoque in Scorzonere plerumque major est & plenior quam in Tragopogis, calix quoque in illis squamosus; in his simplici radiorum longitudine fere æqualium, stellatim flore aperto expansarum, serie constat.

Vires. Scorzonera radix sapore est non ingrato sed subdulci, unde & cruda & cocta & condita, non secus ac pastinaca nostra, editur: imo mensis etiam Magnatum inferitur, & cuius pastinacæ aut sisaro præfertur. Contra morsum non solum serpentis Escurzo, sed & quorumlibet aliorum valet: contra febres pestilentes, contra quoscunque cordis affectus, melancholiam, palpitationem, syncopen, epilepsiam, vertiginem, contra viscerum obstructions, uteri mala, quid dico autem; omnia ita enim nova remedia celebrari solent. De vi ejus adversus serpentes Escuerzos mira & prorsus incredibilia narrat Monardus. Qui singularem de hac planta edidit libellum, quem cum aliis venit Clusius.

Amagria insulæ Scorzonera amarulentior est Hispanica, & nobis hortensi, & in hydrope incipiente & ictero contumaci plurimum valet. Ratum sit illud Hofmanni apud Medicos. Si medicamentum vis hepaticum in bile crassa & adusta idem amarissimum fuerit opportunum. Sim. Paulus.

Scorzonera montanæ vis Alexipharmaca deprædicator in Ephemer. Germ. An. II. Obs. 81. Raius.

SCRIPTULUS, vid. sub titulo *Mensura & pondera.*

SCROFULARIA.

Scrophularia à radice nodosa & ab affectu nomen accepit, quod ad scrophulas prodesse credatur C. B. sunt autem scrophulæ sive strumæ & charades glandularum induratarum tumores in cervice, alis & inguinibus. Volunt ita dici quod porcis sunt familiares; aut quod numerosæ sunt sobolis & prolifica veluti scrofa.

Est autem scrofa suis quæ fortis causa alitur.

Scrophularia notæ sunt flos auriculatus, vasculum bivalve, subrotundum, acuminatum; folia in caulibus contrariis inter se pediculis bina, semina parva, fusca.

Vires. Ex re nomen habet; siquidem radix ejus tumores & hæmorrhoidas sanat. Utilis insuper est in cancriosis ac similibus serpentibus ulceribus malignaque scabie. Si quis hæmorrhoidum cæcærum infans dolore torqueatur, minimum quid scrophulariæ vel radicis, vel foliorum cum cibo aut potu capiendi statim dolore liberatur; si ipsam plantam substantiam siccam aut viridem, si decoctum ejus assumat. Hæc ab Heers in Observ. qui se hoc sæpius expertum ait.

Siccæ radicis pulvis impositus hæmorrhoidas siccæ Idem drachmæ potidete potus lumbricos ventris pellit.

A qua è radicibus destillata faciei ruborem tollit.

Ex hac herba unguentum conficitur ad omnis generis scabiem utilissimum: quo ipse (inquit Tragus) scabies lepta simillimas curatas vidi. Ejus autem compositio sic se habet, Maio mense sumatur herba cum radice, sordibus diligenter expurgata ac lota, eaque contundatur, post succum inde expressum in angusto vitro probe obturato per annum asservetur. Cumque unguentum parare volueris, tum expressi succi, ceræ & olei æquis portionibus tantum accipe quantum unguenti parandum erit, quod ubi feceris conjunctim ea super carbones decoquantur & eoque temperentur donec unguentum fiat, Trag.

Ad Scrophulas sequens emplastrum præscribit D. Sibbaldi Prod. Histor. natural. Scotiæ 74. Axung. porcin. ʒj. solvatur moderato ignis calore tunc

74. Folior. Scrophular. cynoglossæ. Lamii flor. alb. digitalis an. p. æ q. 5. in minutas partes concindantur & in axungia coquantur igne temperato, repetendo coctionem ter aut quater, usque dum unguentum saturati viroris sit. Tunc appendatur in libra unguentum, sumendo dimidium ejus ceræ & resinæ tantundem, terebinth. ʒij. viridis æris ʒj. dissolvantur simul omnia tunc per linteum colentur, & fiat massa, super alutam q. 3. extendatur, & parti applicetur. Raius.

SCRAPULUS, vid. sub titulo *Mensura & pondera.*

SCUTUM.

Hoc nomine denotatur medicamentum quoddam ventriculo peculiare, quod scuti formam habet, illiusque calorem suscitatur, robur adauget, & coctionem juvat admotum.

Concinuatur interdum ex emplastro quodam stomachico super alutâ extenso & admoto eâ parte quâ carnem proximè contingit raro syndone involuto.

Sæpius tamen fit ex aridâ materiâ, quæ ventriculo confert roborando, crassiusculè trita bombace excepta, & duplici linteo ad scuti formam conflata.

Materiam illam copiosissimam nobis suggerit calefacientium & roborantium uberrima seges, inter quæ ea potius eligenda quæ speciali dote ventriculum respiciunt; ut nux moschata, macis, caryophylli, calamus aromaticus, schænanthum, rosæ, menthæ, absinthii & alia multa quæ suavi odore spiritum recreant, & amico calore juvant concoctionem. Sic autem parari potest scutum, viribus ad dictos usus efficacissimum.

74. Cyperi, lign. aloes, calami arom. ana ʒj. schænanth. cinnam. caryoph. nuc. mosch. ana ʒss. macis ʒj. res. rubr. major. absinth. menth. an. ʒij. salu. ʒj. f. omnia pulvis qui cotone moschato exceptus & intersutus geminis linteis in scuti formam concinetur.

Minori sumptu confici poterit, quod sic describitur.

74. Galang. ireos, piper. ana ʒj. baccar. laur. camir. ana.

an. 3ß. absinth. utriusque, ment. salv. & rosmarin. an. m. 3. f. omn. pulv. excipiat. carpo gossipio & f. scutum regioni ventriculi admoventum. Renodæus.

Scutum Emplasticum ex D. Lemery.

℞. Theriac. veter. opiat. Salomon. Syrac. liquid. ana 3j. gummi. tatarum, pulv. aromatic. rosati ana 3j. olei nucis mosch. per expressionem extracti 3j. olei caryophyll. cinnam. ana gutt. ʒj. f. scutum regioni stomachi admoventum.

SEBESTEN.

Nomina. Myxa sive Sebesten I. B. Myxos sive Sebesten Park. Sebestena, myxa, sive myxata Ger. Sebestena domestica, an ὑμῶν ἄρτος Athenæo C. B.

Myxos dictam volunt hanc arborem dñi nris pñis in est, humore lento è naribus destillante: nam & hunc fructum simili mucosa lentore refertum esse. Sebesten Arabibus & officinis dicta est, vel à Σεβαστε Augustus, in cuius honorem ita denominata est: vel à Sebastia Samariæ Metropoli, ubi olim crescebat: nam è Syria in Ægyptum translata refert Alpinus.

Sebestena, describente J. Bauhino sunt fructus parvis feroninis prunis pares, nigricantes, turbinati, in acumem delincentes, (in rugis contracti quæ in officinis habentur) calyci insidentes facile recedenti, qualem in dactylis videmus, sed longe majori & acerbuli instar concavo, cinerei fere coloris. Horum pulpa atra est, viscida, dulci sapore prædita, pertinaciter, officulo adhærescens, quod alias tribus/collis donatur, alias compressum pruni nostratis officulorum imitatur; in cuius utrolibet sine foraminulum apparet, atque ex inferiore quoque qui vel in gminos, vel ternos mucrones acutos finditur, Germinis veluti rudimentum exilit. Nuclei tribus loculis septim tres continentur, oblongi, triangulares, albi, melonum vulgari magnitudine & sapore, quique eodem modo vetustate rancescunt, qui non insuaves in recentibus: alias unicus nucleus officulo clauditur. Eligenda plena, majora, pinguis, carnosa, quæque situm non redolent, calyci adhærentia, teredine non atrola.

Arboris ipsius duo (inquit Alpinus) sunt genera: alterum sylvestre, pruno simile: alterum domesticum, foliis latioribus ac crassioribus à sylvestri differens: utroque arbor flores fert albos, parvos, geranii proximios. Sylvestris fructus fert minores, tardius maturiscentes, imperfectiores iis quos Sebesten domestica profert.

Folia Sebesten, adnotante Veslingio, extremis suis ovalem magis rotunditatem quam angulosum acumem præ se ferunt, superiore ambitu per spatia inæqualia variis incisuris dentata, & nonnunquam segmento veluti subducto mutilata. Fructus brevis insidet calyculo, rotundus tenui spinosoque umbilico leviter adstrictus, maturaque jam ætate pellucidus, non insuavi glaucescine inclusa semina manifestat.

Vere floret, Autumno semen maturat, in Ægypto & Asia.

Vires. Myxa prunis minus frigida censet J. B. in pulmonum affectibus, inquit, pluris facimus myxa quam ptuna. Usus eorum familiarissimus est ad tussim (cum & siccitate junctam dyspnæam, pleuritim, peripneumoniam & ad vocis raucedinem parato ex ipsis decocto, unde & multas compositiones præsertim thoracem & pulmones respicientes ingrediuntur. Veslingius succum expressum excellens præbere remedium catarrhis ad fauces labentibus sistendis tradit.

Ex pulpa ipsorum optimum viscum conficiunt E-Manger. Bibl. Pharm. Tom. II,

gyptii: quippe Sebesten maturos contundentes atque lavantes. Sunt aliqui qui masticando pulpam ab osse expuentes viscum parant; quantitatem horum fructuum in vase collectam, parum quoad aqua humiditas absumentur bullientes. Visco utuntur omnes emplastri modo ad omnes scirrhosos tumores, resolvit enim eos & emollit omnem duritiem: aliqui ad tussim ex eo paratos bolos cum saccharo cando & radicis liquiritiæ pulvere multis diebus sumunt.

Pollent fructus (teste Matthiolo) dejectoria facultate non secus ac pruna, tam Græcorum quam Arabum testimonio, id quod etiam comptobatur quotidiana experientiâ. Eorum pulpa drach. 10. pondere devorata ad summum 12. eisdem fere præbet effectus quos cassia vocata. Utiliter datur ex bile febricitantibus. Eadem confirmat Amatus. Rain.

SECALIS vel SECALE.

Secale à secando dicitur. Nam cum duo sint genera frugum, frumentum & legumen; legumina quidem manu leguntur vellunturque: Secale ac frumenta alia secantur. Voss. Etymolog. Sacale à tritico differt grano strigiosiore, tenuiore & nigriore glumis non aperto sed nudo; culmo elatiore.

Nomina. Secale Ger. J. B. vulgatus Park. hybericum Maius C. B.

C. B. Radicibus est multis, tenuibus, fibrosis; foliis cum primum prodeunt rubescentibus, dein ut reliquorum frumentorum virentibus; tritici tenuioribus, longioribus; culmis numerosis, senis, septenis, etiam pluribus (si enim ante hyemem à pluvioia tempestate illasum radices egerit, & in cespitem quasi evaserit, magni proventus spem facere solet: quæ plerumque adeo non fallit ut ex uno grano duodeni & plures quandoque spicati culmi exeant) qui Triticeis graciliores, & firmiores, longiores, & ex vagina aspera graminea, arundinaceæ; quaternis ut plurimum, nonnunquam quinis internodiis distincti prodeunt spicis inversus digestis, aristis brevibus, nequaquam innocentibus cinctis, & aliquot quasi hamulis latis (caveat ergo quis ne ori spicam indat) quod & in reliquorum frugum aristis notavimus. Flore est luteola, qualis in plerisque frumentis observatur; & diu floret, adeo ut quadragesimo tantum die à flore maturescat, postquam enim desloruit septimanis quinque maturatur. At spica cum floret erecta est, quare rubigini cum imbre retinuerit opportuna: semine verò prægnans procumbit & deorsum propendit quia longior. Granum est oblongum, strigiosius, tenuius & nigrius Tritico. Glumis non opertum sed nudum, ideo caducum & sæpe numero sponte exiliens.

Duas hujus species constituit C. Bauhinus hybericum scil. seu Maius, & vernum seu æstivum & minus; quas sationis duntaxat tempore, & accidentibus inde ortis differre putamus.

In Germania, Gallia, Anglia, aliisque regionibus, potissimum Septentrioni subjectis nascitur qualicunque solo, etiam gracili, maero & arido (arenoso sabuloso & levi) in fecundiorum tamen & latiore melius & præstantius.

Apud Anglos feritur Autumno, nunquam (quod sciam) vere etiam ante æquinoctium; quo maturius eo melius & uberius evadit.

Vires & Usus. Proximum inter frumenta à Tritico locum sibi vendicat. Panis ex eo factus ater & ponderosus est, lentoris atque obstruentis naturæ nonnihil habens, concoctu difficilis & ventriculo gravis, præsertim si fursurum expertus fuerit; quin iis qui non assue sunt alvum plerumque movet non sine torminibus. Agricolis persuasum est hujus panis corpora val

Yyy dione

diora fieri. Bruyerinus asserit in Lugdunensi tractu & vicinia mulieres quæ pane secalino utuntur validas, & bene curatas, formaque egregias conspici, qui tamen admodum spernendum alimentum hominibus præstare censet.

Panis secalinus ob humiditatem suam à nonnullis præfertur ei qui vel ex Tritico vel ex Zea conficitur, cum non ita facile & subito ab aere exsuccus & aridus reddatur.

Solent nostri tantundem Triticeæ vel ex Zea confectæ farinæ admiscere, ut panis ténacitatem suam diutius retineat, leiorque & gravior evadat: sicque peritus etiam medicorum consilio ad alvum emolliendam etiam Mignatibus in usu est, maxime ætate C. B.

Apud nos in Angliâ, & ut Ruellius refert, apud Gallos etiam, secale non tantum simplex & simplex seclitur, sed cum Tritico mixtum, æquis fere partibus. Miscellaneam hanc segetem Latino nomine Miscellane appellamus.

Quæ de secalis ejusque partium viribus & usibus in Medicina traduntur vide apud C. Bauhinum, Theat. Botan. lib. 1. Sect. 4. cap. 17. quibus adde è Simon Pauli quadr. partit. 1. Illud verum & experientia confirmatum, quod farina secalina confusæ diuturniores capitis dolores leniat, in linteo capiti circumligata, quæ etiam delirantibus profuisse observatum est, præsertim si ei remissi fuerint absinthii corymbi Sim. Paullus.

Vulgus doctum est ubi erysipelite infestatur siccam farinam secalinam indere mundo linteo, ac loco affecto applicare, idque successu satis felici discurrere. Idem. Hiberni ex excerptis D. Husle.

Per frequentes pluvias grana spicarum inferiora in secali per maturitatem in grana atro-purpurea excrescunt (C. Bauhin. semina quædam longius ex utriculis suis seu glutinis protruduntur, ac in mediocre etiam crassitiem excrescunt, quorum quædam in corniculi modum curvantur, quæ omnia nigrum colorem foris contrahunt, intus vero candida farina densioris materię continent,) quæ substantiæ farinaceæ, Saporis Malti, Noricis i. e. secalis mater dicuntur, & singulare præsidium ad compescendam lochiorum fluxum habentur. Secale hoc modo degenerans secale luxurians C. Bauhino appellatur, Clavi Siliginis Lonicero. Annon insecti alicujus puncturæ originem debeant hujusmodi excrescentiæ inquirendum. Rainus.

SECTIO, de ea vid. sub titulo Limatio.

SECUNDINA MULIERIS.

Ex eâ paratur pulvis epilepticis, & ab utero strangulatis non parum proficiuus.

SECURIDACA.

Securidaca Græcis *σεκεριδος*, à forma seminis in utraque lingua dicitur Securem ancipitem æmulante, quæ & hujus generis nota esto: nullius enim plantæ semen Clusii judicio, veterum securim aptius refert quam hujus.

Nomina. Securidaca lutea major C. B. Maius five securidaca major vera Park. Securidaca flore luteo, siliqua latâ oblongâ I. B. Hedysarum Majus Ger.

J. B. ex radice multos statim emittit caules, cubito longiores, ramosos procumbentes: folia lævia, lentis majoris, senim lætescentia, sex, octove conjugationibus ad costam annexis, uno in summa alâ imparitatem facientes; indidemque aded unde foliorum pediculus appendix peculiaris in fastigio umbellatim flores sustinens meliloti nobilis Tragi, luteos, quibus

succedunt siliquæ, palmo longiores, nonnihil sulcatæ, rostro recurvo, compressæ; valde brevi pediculo hærentes, duobus hinc & inde aggeribus veluti fossam interceptentes, seminum receptaculum, rustiorum, quadrangulorum membranis distinctorum.

Nullius plantæ semen Clusii judicio aptius veterum securim refert, quam hujus, quam aliquot locis inter segetes in Hispania observavit. Nam infra Matritium secures videre meminit quæ essent huic semini simillimæ, nempe in medio quâ immanibus trahitur & adaptatur crassiores & utrinque in planam aciem desinentes.

SEDUM.

Αιζων Græcis *ἄγρον ἀειθαλὲς τῶν φύλων*. Italis sedum vel à sedere quia folia habet ad radices cæles sessilia, ut vult Martinus, vel fortè à sedandis doloribus nomen impositum.

Nota autem Sedi genericæ sunt folia crassa, angustâ non serrata aut densata, vascula seminalia bicornia.

N. B. Sedum latissimo sensu accipi pro planta quacunque pentapetala aut polypetala vasculo bicorni, imo plantas etiam succulentas multiliquas complexi; à nobis autem hoc in loco tum à succulentis multiliquis, tum à plantis vasculo bicorni foliis minus succulentis, quales sunt coryledon, sanicula guttata, & saxifraga alba dicta, distingui.

Notatu dignissimum est plantas plerasque crassas & succulentas in petrosis & siccoribus provenire, ibidemque sine humore diu durare, cujus ratio esse videtur, quod folia cuticula dentiore minimeque porosa, quæ humorem evaporare non sinit, investiantur.

Vires. Vermicularis herbæ stupendas vires in Scotbulo castrensi expertus est cum incredibili successu D. Belovv, interne in decocto, & etiam externe applicat in contracturis membrorum, in ulceribus & gingivis corruptis. Ephem. German. Ann. 6. & 7. Obs. 22. Dom. Tancred. Robinson nobis suggessit. Eandem observationem habui à D. Palmer ex dictatis D. Hermanni.

Vires Sedi Tridactylis flore albo.

Herba infusa in cerevisia tenui seu leptomera, & per aliquot dies pota, absque ulla evacuatione sensibili scrophulis medetur, humorem absumendo, dolores mitigando, tumores discutiendo, & ulcerosos exciccando. D. Boyle de utilitate Philosophi. nat. ad Medic. p. 203. Rainus.

SEDUM MAIUS VULGARE, vid. *Sempervivum*.

SEMEN.

Semen in Officinis minutiores plantarum fructus denotat ex quibus simile nasci potest.

Semina autem Officinalia sunt.

Semen Acetosæ, *Saurampfer* semen.
Agni casti, viticis, *Schaffmullen* korner.
Altheæ, *Elbsch* semen.
Ammeos veri cratici, *Ammeys*.
Vulgaris, *gemein Ammeys*.
Amomi.
Anethi, *Dillsamen*.
Anisi, *Anissamen*.
Apii, *Appich* semen.
Aquilegiæ, *Agleysamen*.
Alparagi, *Spargensamen*.
Atriplicis, *Moltensamen*.

Aurantiorum, Pomeranzenkern.

Bardana, Großklettensamen.

Basilici, ocymi, Basilienfamen.

Bombacis, Gossypii, Cotti, Xyli, Baumvullenfamen.

Excorticatum.

Bursa pastoris, Tschelkraut.

Calendularum, Ringelblum.

Cannabis, Hanffamen.

Cardui benedicti, Cardobenedict.

C. Mariæ, Mariendistel.

Canthami vel Cnici, Feldsaffranf. Florisamen.

Carvi, Carveos, Wiesenkümmel, Feldkümmel.

Cataputia majoris, Ricinum, groß Treibkörner.

C. minoris, Eselg vulpinæ, Treibspringkörner.

Cerefolii, Korbelsamen.

Cicera alba, weiß Kichern, weiß Ziesererbse.

C. rubra, rothe Kichern.

Cichorii, Wegwarisf. Wegweiss.

Cinæ, Santonici, sanctum, Wurmsamen.

Citri, citrei, mali, Citronenkern.

Excorticatum.

Coccognidii, klein Kellerhassf.

Colocynthis, Colloquinf.

Coriandri, Coriander.

Præparatum.

Cucumeris, Cucumern.

Excorticatum.

Cucurbitæ, Kurbesamen.

Excorticat.

Cydoniorum, Quittenkern.

Cymini, Cumini, Römisches Kümmel.

Dactylorum, Ossa dactylorum, Dattelnkern.

Dauci communis, Wildmöhrenf. Vogelneßf.

Cretici.

Ebuli, acini ebuli, Artichfamen.

Endivia, scaricola, Endivierf.

Eruca, weißer Senff, gelber Senff.

Fabrum, Fabæ, Bonen.

Fœniculi, Fenchel.

Fœnigræci, Bockhornf.

Fraxini linguæ avis, Eschbaumsf.

Fumaria, Erdrauchfamen.

Genistæ, Pfrimmensamen.

Granatorum, Granatkorn.

Halicacabi, Alkekengi, Judenkirsamen.

Hordei electi, Gersten.

Excorticatum.

Hyoscyami albi, Bilsenf.

Hypetici, Johanniskraut.

Hyssopi, Ysopsamen.

Lactuca, Lattichfamen.

Lapathi acuti, Mengelwurtzf.

Lentium, Lenten, Linsen.

Levistici, Liebstockf.

Limonium, Limonienkern.

Excorticatum.

Lini, Leinsamen.

Lotiflavæ, Siebengezeisf.

Lupinorum, Lupini, Fegbonen.

Majoranæ, Majoranf.

Malyæ, Pappelf.

Melissæ, Melissenf.

Melonum, Melonenkern.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

Excortic.

Mili, Hirsche.

M. Solis, lithospermon, Meerhisch.

Myrti, Myrtenf.

Napi, Buniadis, Gierkrubenf.

Nasturtii (hortensis), Gartenkresf.

Nigellæ, Melanthii, Nigellæ Romanæ, schwarzf.

Kummel, schwarzf. Coriander.

Præparat.

Nuclei cerasorum excortic. Kirschenkern.

N. Mespilorum, Mispelk.

N. Morellorum seu Perlicorum Armeniacor, Morellenkern.

N. Perlicorum, Pfersingkern.

Orobi, Erva, Ervenf.

Oryzæ, Neiss.

Pœoniæ, Peoninkern. fœminæ ac masculæ.

Excorticatum.

Papaveris albi, weißer Magsf.

P. nigri, schwarzf. Magsf.

Pastinacæ sativæ, Pastinacf.

P. sylvestris, Vogelneßf.

Petfoliatæ, Durchwachs.

Petroselini Macedonici, Massiliensis, Macedonisch Peterlein.

P. vulgaris, apii veri, Petersilienf.

Pimpinellæ, Bibenellf.

P. Italica sanguisorbæ, weißf. Pimpinellf.

Pisorum, Pise, Erbsen.

Plantaginis, Wegerichfamen.

Porti, Lauchfamen, Schüttlauchf.

Portulacæ, Burtzelkrautfamen.

Pseudo-melanthii, Kornrathel.

Psyllii, Flohsamen.

Raparium, Rubensamen.

Raphani, Rettrichfamen.

Rosmarini, Rosmarienf.

Rusci, Rußenkürner, Mausdornf.

Rutæ, Weinrautenf.

Sambuci, i. acini.

Saturciæ, Sodaneisf.

Saxifragæ albæ, weißf. Steinbrechf.

Sesami vulgaris, Flachsdotter.

Sesaleos Cretici, Massiliensis, Cretischer Seselsamen.

S. Vulgaris Sileris montani, Silermanesamen.

Sinapis, Senff. rother Senff.

Spicæ nostratis, Spicanardf.

Staphidis agriæ, Lausfarnen.

Sumach. Vide Fructus.

Thlaspi, Baurenseff. Wegkresf.

Thymi, weißf. Quendelsamen.

Trifolii odorati, Edelkleesamen.

Violarum martiarum, blau Violf.

Urticæ majoris, Nesselsamen.

U. Romanæ, Römisch Nesselsamen.

N. Ex his sunt nonnulla in praxi famosiore, adeoque peculiariter calida vel frigida dicta. Sic sunt

Semina 4. calida majora; anisi, fœniculi, carvi, cumini.

Minora; ammeos, amomi, apii, dauci.

Semina 4. frigida majora; Cucumeris, cucurbitæ, citrulli, melonum.

Minora Endivia, scaricola, lactucæ, portulacæ.

Præparata ex seminibus pro re nata fiunt, infusiones, decoctiones, emulsiones, &c. Schroderus.

SEMEN GENERANTIA, vid. Aphrodisiaca. Tom. I. pag. 155.

SEMEN EXTINGUENTIA, vid. Antivenerea, seu Antiprodisiaca.

Yyy 2

SEMEN

SEMENTINA, seu SEMENTINA, vid. *Santonium*.

SEMICUPIUM, vid. *Balneum &c.*

SEMPERVIVUM.

Hujus nota sunt folia in globulos oculi bovini æmulos congesta, lata & succulenta, flores in syculis reflexis in summis caulibus stellati.

SEDUM MAIUS ARBOREUM seu FRUTESCENS.

Nomina. Sedum Maius arboreum I. B. Ger. *emac.* Maius arboreum flosculis candidis C. B. Maius legitimum Clus. *Park.*

Clus. frutex est potius quam herba, duorum cubitorum nonnunquam altitudine, brachiali vero crassitudine, multos ferens ramos pollicaris crassitudinis, aut majores, qui in multas alas dividuntur digitalis crassitudinis, summo fastigio velut in orbem deinentes, multis foliis confertim & imbricatis sibi mutuo incumbenibus constantem, perinde ac in sedo vulgari majore, carnosa sunt autem ea folia, succi plena, & linguæ instar efformata, hoc est, ab infima fede paulatim in latum sese dilarantia; in ambitu crebris & minutis veluti denticulis adeo leviter serrata ut vix appareant, gustu paululum adstringente: cortice denso, carnoso, succulento toto frutex cinctus est, cujus membrana exterior subfusca, maculisque seu potius sedis foliorum vestigiis respersa, ut in Tithymalo Characia. Interdum summis majoribus ramis emergit crassus & veluti foliosus quidam pediculus, tanquam thyrsus gerens multarum, quæ successu temporis in flores sese explicant, ex flavo pallescentes, stellarum instar in aliquot folia divisos cum suis staminibus. Jam maturefcere incipientibus floribus. Et ad seminis efformationem properantibus gracilefcit hic pediculus. Semen exile est & nigrum. Semper viret hæc planta, nam antequam vetera folia abiciat, nova semper producit, & facile ramulis pangitur.

Sponte nascentem observavit hanc plantam Clusius prærupto & scopuloso colle, non procul à Scynti arce regia, quinto ab Ulyssipone milliari. In Italia frequentem in siccilibus enutritam observavimus.

Legitimum id esse Sedum aut Sempervivum Majus, Dioscoridi ἀνέμων τὸ μέγας neminem in stirpium cognitione mediocriter versatum inficias ire posse affirmat Clusius. Nam quod hætenus pro sempervivo majore habitum est, nihil aliud est quam coryledon altera Dioscoridis.

SEDUM MAIUS VULGARE Tabulâ XXIII. proximè adjectâ depictum.

Nomina. Sedum Majus vulgare C. B. I. B. *Park.* Sempervivum Maius Ger.

Folia edit terræ ac radicibus proxima, crassa, pingua, lenti succi plena, acuminata, densa, per margines aequalia, & in orbem ad effigiem oculi disposita, atque hujusmodi orbiculos complures proferens, late atque in amplitudine sese diffundit, non raro & tenues fibras emittit, quibus latius serpat. Atque novos orbiculos progignat. Assurgit quandoque in medio horum caulibus pedem plus minus altus, erectus, crassiusculus, similibus sed angustioribus & acutiorebus foliis veluti squamis obiectus, superius in ramos diductus, reflexos. Flores scaniles, serie quadam succedentes gerit, stellatos, rubentes aut obscure purpurascens, polypetalos, quos excipiunt silicu-

la plurimæ seu cornicula semine minutissimo repleta in orbem dispositæ.

Inter petras in montibus sponte oritur, & ad macerias & muros, in Anglia spontaneum non vidi, ubi que tamen in domorum tectis, muris & maceris vetustis & imbricamentis feritur, caulis floriferus est polifolium æstivum; cum semen autumnis perfectum exarefcit.

Vires. Refrigerat validè & astringit. Usus præcipue intrinsecus in febribus biliosis, sedat scilicet sitim & compescit ardorem. Vulgare est plebi nostrati (quit Schroderus) expressum succum cum saccharo in febribus morbisque calidis propinare: Botanici nostrates præscribunt succum Zythogalo aut liquori posseti infusum; seque cum bono cum successu hoc modo propinatum novisse ait Dom. Tancredus Robinsonus, tum in aliis febribus, tum præcipue in Erysipelatide & hæctica: abundat enim hæc planta, sale alcali medicamentofo.

Tragus succum aut aquam destillatam, linteolisque madefactis ac impositis in inflammationibus quibusvis corporis, imprimis vero phrenetico morbo apprime conducere scribit, in inflammatione ac tuberculo oculorum, jecoris item & renum. Articulorum in super morbo medentur, & ambustis auxiliantur, succus solatri succo admixtus, & cum oculis populeis decoctus in axungia suilla, ac percolatus ut fiat unguentum, mirè efficax est, omnibusque populeis unguentis Tragi judicio præferendus.

Galenus cum Dioscoride Epirhematis loco succum cum aceto erysipelatis foris imponunt, quod hodie, inquit Casp. Hofmannus.

Succus verrucis & pedum clavis illitus ut eo probè madefiant, deinde foliorum cuticulâ superimposita, eos tollit & sanat.

Ad cornua pedum, ʒ. Folia sempervivi majoris q. s. contunde & superpone sex diebus continuè, Chesneau.

Ad matricis & urethræ ulcera ʒ. Succus sempervivi majoris ʒ. iv. litharg. ʒ. j. vitell. ovorum num. ii. diu agitatur in mortario plumbeo, utere. Remedium ex Chirurgi cujusdam Parisiensis.

Idem habui ex collectaneis D. Edv. Hulse Medicæ Londinensis.

In febribus linguam molestè aridam, vel etiam effusam lenient folia sempervivi majoris, membranulâ externa denudata. Aquæ puræ aut rosacæ induuntur, hinc subinde linguæ imponuntur atque identidem renovantur. Dom. Soame è Sylvii lib. i. cap. 23. S. 64. *Ramus.*

SENA.

Quamvis Sena revera herba sit, non arbor aut frutex, quia tamen à Botanicis fruticibus annumerari solet, & à nobis in Historia herbarum per oblivionem omissa est. Hoc in loco ejus historiam trademus.

Sena nomen ab Arabibus fluxit, siquidem Sena veteribus Græcis & Latinis incognita & indita.


Senæ notas características facit Paulus Hermannus stamina falcata è flore exserta & semina in siliculis bivalvibus unicapfularibus, quasi per articulos junctis.

Nomina. I. Sena Alexandrina sive foliis acutis C. B. Sena I. B. Ger. Sena Alexandrina. *Park.*

Joh. B. Sena quam ex Oriente infitores important primæ est notæ: caulibus cubitalibus aut paulo altioribus, lignescens, ex quibus alternatim exunt pediculi tenues pulmo longiores, ad quos ex mediocribus intervallis adnexæ sunt foliorum quatuor aut sex conjugationes, nullo impari alam claudente, quod ant-



E P





animadverterimus adhuc. Singulatia autem folia ex viridi in flavum declinant, proximeque costæ adhaerescunt, glycyrrhizæ foliis similia sed acutiora, gustus nonnihil viscidus & amarus, non sine nausea aliqua. Siliquæ falcatæ, compressæ, nigricant, semen continentes parvum, gigantis simile, sed compressum album vel nigricans.

Cordus flores luteos & pallescentes, quinque foliis in cavitatem aliquam reflexis constantes Senæ attribuit; Matthiolus pariter flores luteos, pentapetalos, brassicæ similes.

Sena Græcis & Latinis antiquis nusquam descripta invenitur: nam ex Averrhoes novam herbam esse adfruit, & priscis ignotam.

Camerarius Senam Alexandrinam, ne quidem in Italia, ultra annum durare, idcirco pro frutice haberi non posse ait. Nec scio an in loco natali longioris ævi sit.

A nat calidis regiones frigoris impatientissima est; in septentrionalibus Provinciis lata provenit quidem, verum ad frugem non pervenit, imo tantum abest ut nec siliquas, nec flores promat. Seri aiunt in Syria, Persia, Arabia, inde in Ægyptum deportari, ad Alexandriam, unde ad nos deferuntur.

Vires. Purgat Sena non tantum bilem utramque, sed & pituitam: imo in melancholia & atra bile creditur habere prærogativam quandam. Vim eius cathartica ad stuporem usque extollunt plerumque. Ego vero expertus sum, & ante me alii, esse insigniter flatiosum, inquit C. Hofman. & Lobelius Matthiolum reprehendens, folia si per se, pulvere, infuso aut decocto dentur turbatum multum eiere, & intestina stomachumque torquere asse it. Ut vel plebecula conqueritur. Hoc ratio etiam dicitur: Viscosum enim illud quod in lingua relinquit plane adtipulatur experientia: attipulatur etiam viscosus ille odor, cynoglossi aut punice fere similis; qualem quidem etiam in infuso quam in decocto sentitur C. Hofman.

Quia calida & sicca est, corrigitur flor. viol. borrag. prun. & quia flatulenta, quod minus ventriculo obesse potest. cinnamo. ro., galanga, zingibere.

Quocumque autem modo datur, in decocto quidem minus flatulenta est sed debilior; in infuso autem flatulentior, sed fortior, debet autem decoctio esse mediocris, ut Mesue præcipit: nam cum facultas purgatoria sit, in superficie diutina coctione evanescit.

Datur in substantia ab ʒss. ad ʒiʒ. in intus an. ʒij. ad ʒv. vel ad ʒj.

Exhiberi potest (inquit Schröderus) omni ætati & vel ipsi prægnantibus, debito modo correctæ.

Inignes ei vires adscribunt Medici tum veteres, tum recentiores mirifice prodest capitis doloribus, delirio, amentia, epilepsia, resolutioni nervorum, scissuris totius corporis, phthiriali, scabiei, pustulis, pruritu, &c. cor exhilarat, visum acuit & auditum firmat quoquo modo sumpta, viscerum obstructions aperit, auget juventutem, seniumque retardat. Folia in capitis perturbationibus utiliter decoquuntur præsertim addita Anthemide, foli exhibentur à stipitibus seu pediculis avulsa, rejectis stipitibus.

Ad Senæ præparationem purgantem sine igne.

ʒi. Folior. sen. mund. q. s. ponatur in lagena vitrea satis capaci affundendo aquam vitæ, tinctura cinnamom. imprægnat. ita ut quatuor, vel quinque digitis excedat, dein vase bene clauso sinatur per biduura, & postea utere. Dosis coch. ij. cum jusculo. D. Husle & Chesneau.

Nomina. 2. Sena Italica Park. Italica foliis obtusis C. B. Florentina L. B.

Cæs. Caule constat cubitali; foliis similiter dispositis. *Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.*

is ac in Sena Orientali, sed multo majoribus, nervosioribus, non acuminatis, sed per extremum latis ac pæne cordatis, gustu glutinoso, flores fert luteos, siliquas compressas & falcatas, angustiores Orientali, lineâ utrinque per medium inæqualiter extuberante, Seminibus nigris compressis, figurâ cordis.

Untur hac Medici loco Senæ Orientalis ad purgandos acres humores, sed longe inefficacior est ad eum usum.

Nomina. 3. Sena Orientalis hexaphylla, Tala Zeylonensis Hermann. *Hort. Lugd. Bat.*

Herman. Radicem fert albam, tenuem, fibrosam, annuam: cauliculos dodrantes, herbaceos; primum erectos, postmodum reclinatos; folia in qualibet costa sex, bina sibi apposita, subrotunda, unguem lata, pingua, saporis subactis, ingrati, costæ vero oleacei haud ingrati. Flores congeneribus similes, ast minores, pentapetalos, staminibus in medio concoloribus, & stylo falcato, longiori: siliquas compressas, angustas, recurvas, unicapulares, bivalves, quasi articulatas, seu isthmis interceptas; in quibus Semina oblonga, tetetia lucida, fusca.

Senæ speciebus tum ob stamina falcata quæ ex flore exeruntur, tum etiam ob Semina in silicibus biv. lvi. bus, unicapularibus, quasi per articulos junctis, annumerat D. Hermannus.

1. Paomiriobæ primam speciem Pisonis; quam Sennam Occidentalem, odore opii viscoso, orobi Panonici foliis mucronatis, glabrum cujus descriptionem vide in lib. 18. p. 911. Hist. nostræ.

2. Paomiriobæ secundam speciem Pisonis: quam Sennam Occidentalem, odore opii minus viscoso, foliis glabris obtusis appellat: cujus descriptio Hist. nostræ loco citato habetur.

3. Loto affinem Ægyptiam C. B. quam Sennam Orientalem terraphillum Abfus dictam nuncupat. Describitur Hist. nost. lib. 18. p. 912.

4. Galegæ affinem Sopheram dictam C. B. quam Sennam Orientalem fruticosam Sophera dictam inscribit, & Ponnam Tagera Hort. mal. Tom. 2. p. 101. facit descriptionem vide Hist. nost. lib. 18.

5. Chamæ cristam pavonis Americanam siliqua multiplici Breyn. cui Senæ Occidentalis aliqua multiplici foliis herbæ mimosæ titulum facit.

6. Chamæ cristam pavonis Brasilianam siliqua singulari Breyn. Cent. 1. p. 64. quarum duarum descriptiones habentur Hist. nostræ p. 982. 983. *Ramus.*

Sena duplex haberi solet, tum Orientalis id est Syriaca & Ægyptiaca, tum Europæa, Italica nempe & Gallica. Illa acuminata, hæc obtusiora magis habet folia. Præfertur Orientalis, modò reliquas præstantiæ notas possideat. Eligatur itaque viridis; probè ficta; integra, non nimium contrita, non maculosa, nec terdine attrita, vel stipitum folliculorum, ne nimia admixtione, aut etiam Colutæ foliis fraudata, *Gharin. Augst.*

OFFICIN. NAT. ex SENNA.

Folia, tum quoque *folliculi*, sed raro.

N. *Folia præscribuntur ut plurimum s. st. i. e. sine stipitibus, à quibus eligendo seligendoque separantur.*

Vires. Senna inter purgantia usitatissima est, adustos ac serosos humores, & hinc flavam bilem pituitamque ex Capite, Epate, Liene, continuatoque usu juncturis, sine noxa sat benignè educens. Excitat tamen nonnunquam tormina, id quod ex abundantia pituitæ vitree, seu mucilaginis, acris evenire nonnulli volunt. Verùm rectius sentire videntur; qui id crudiori ac magis terrestri senæ particula, fortis expressione prolecta, adscribunt. Quia autem calida

ac sicca (1.) corrigitur flor. viol. Borrage. Prun. & quo minus ventriculo obesse possit, additur Cinam. Galang. Zingib. &c.

Exhiberi potest omni ætati & vel ipsis prægnantibus.

Dosis in subst. à ʒβ. ad ʒiβ. in infus. à ʒiβ. ad ʒβ. vel ad plures vices ʒj. ij.

N. Adhibetur & extrinsecus ad melancholicam capitis arcendam (in lotionibus capitis.)

Præparata.

1. Pulvis sennæ Montag. Vid. Dispens.

2. Syrupus folior. sennæ. V. D.

3. Syrupus de pomis Reg. Sab. Vid. Dispens.

N. Potest Syrupus sennæ parari cum fructu, ut est in Pharm. Poterii p. 122. Acui potest ap. extrahens aliquot gutt. Mas O-li aut Tartari.

4. Electuar. Diabetsemer. l. Sennatum Renod.

5. Passula laxativa Vid Disp.

6. Extractum.

7. Fol. Sennæ Alexand. ʒj. affunde ∇ simpl. ferventem (acutatam si libet aliquot guttis ol. Tart. per d.) ʒ viii. Extrahe exprimeque leniter, clarifica, inspissa ad consistentiam justam.

N. 1. Alii extrahunt macerando cum ∇ stillat. pomor. redol. Beguin. Quercet. Alii cum ∇ Lupuli, Scolopend. Borrage. Fumar. addita portione alia Caryophyll. Zinzib. sem. fenic. August.

Dosis à ʒiβ. ad ʒj. & ultra.

N. Extractionem ex iisdem foliis secundo ne repetas: gravia nimirum tormina excitare solet.

7. Tinctura Sen. aut Rhabarb. ex communicatione S. Cloff.

8. Fol. Orient. vel Rhabarb. ʒβ. Sal. nit. tantundem, reduc. in pulv. qui accensus cum carbone ignito detonet in ∇ lo, cinerem solve in Acet. destill. aut ∇, solum filtra & evapora, solvatur denuo in aq. ros. filtreturque addendo ʒij. rhei aut fol. Sen. in pulv. redact. digere per 4. aut 5. horas.

Dos. hujus tinctura sint cochl. ij. in jussulo. Ita reliqua purgantia in Tinctura adducuntur. Schroderus.

Senna.) Vel Alexandrina est seu foliis acutis, quæ præstantissima, vel Italica, quæ illi substituitur. Planta est siliquosa magnitudinem habens unius cubiti è regionibus Orientalibus ad Nos primum advecta, colutheæ ut vesicariæ admodum similis, cujus folia ad liquiritiæ vel scænuigræci effigiem accedunt.

Flores ex alarum sinu erumpunt lutei, tenuibus pediculis appensi, quibus succedunt folliculi oblongi, plani, compressi, incurvi, seminibus parvis, fuscis, compressis gravidi.

Colitur in Ægypto, Apuliâ & Hispaniâ.

N. Veteribus Græcis indicta &c.) Antiquis fuit ignota, sed à junioribus Græcis & Arabibus solum cognita, attestante Serapione cap. 58. vid. Mizaldus in singulari de senna opusculo.

Vires. Senna inter purgantia usitatissima est &c.) Hæc medicina securitatis est, pueris & cujuscunque ætatis hominibus benigna, adustos, crassos & salios humores à cerebro, Pulmone, jecore, Liene, ventriculo & Mesenterio blandè subducit, ac Morborum ex ejusmodi humoribus provenientium Medela est. Errant igitur, qui illam perturbare Ventriculum & imbecillum reddere dicunt; cum amaritudinis nonnihil & levis adstrictionis habeat, patet, eam prædesse ventriculo. Quod verò muliebria & pituitosa corpora epoto Sennæ infuso torminibus vexentur, id humorum pituitosorum vitio quidam tribuunt. Est aliquid; Verum, cur non etiam alia purgantia, quæ adustos æquè ac mucilaginosos acres humores educunt, idem dant effectum? Rectius illi statuunt, qui id crudiori ac

magis fixæ terrestri Sennæ particula forti expressione proleatæ adscribunt. Hinc videmus ejus extractum ab ejusmodi effectu immune.

Dosis hujus in substantia est à ʒβ. ad ʒiβ. In infuso à ʒij. ad ʒβ. vel plures vices ʒj. ij.

Ex Sennâ præparantur Pulvis Sennæ &c. Hoc loco, Lector Benevole, communico Tibi Crystallinos foliorum Sennæ A. purgantes à Clar. Dom. Joh. Ferdinando Herodi S. R. I. Acad. Nat. Curios. Colleg. Reg. Civit. Brunensis Physico, mihi aliquot ante annos communicatos.

Rec. Spiritus rosæ majalis q. v. in hoc infunde per noctem Fol. Senn. A. l. f. q. v. ut spiritus 4. emineat digitos. Tinctura multoties per chartam bibulam filtratur, hoc facto, lenissimo vapore superfluous exhalat spiritus, reliquus in frigido & sicco loco locetur & crystalli concrecent, qui in vase eburneo servandi.

Dosis à gr. v. ad ʒj. Hofmannus.

SENECIO.

Senecio *Ἠερίεον* Græcis, quasi vernus Senex, quia vere canescit, inquit Plinius, floribus in lanuginem abeuntibus; nec vere tantum, sed per totum annum germinat, floris productione, semper enim alterum alteri succedit, & tempora omnia occupat. Theophr.

Nobis Senecio censetur herba flore composito, paposo, nudo, foliis laciniatis. Foliis laciniatis cum Jacobæa convenit, à reliquis congeneribus differt: foliis nudis seu non radiatis à Jacobæa discernitur.

Nomina. Senecio vulgaris Park. minor vulgaris C. B. vulgaris five Erigeron J. B. Erigeron Ger.

Radix oblique interdum producta plurimis fibris albis in terram demissis alimentum attrahit; ex qua caulis sæpe simplex, interdum bini ternive atoluntur, teretes, striati, concavi, in apricis hirsuti, pedem aut dodrantem alti, ab imo statim ramosi, foliis vestiti duas tresve uncias longis, alterno situ absque pediculis cauli adnatis, utrinque in lacinias divisis, & dentatis, mucrone obtuso, obscure virentibus. Caulis & ramulorum fastigiis flores plures simul juncti insident, pediculis tenuibus, brevibus, lanuginosis appensi; flores autem quos vocant è plurimis flosculis luteis arcte stipatis compositi absque ullo in margine barbularum circulo, calyce longo, cylindraceo ferè, ex simplici foliolorum oblongorum ordine constante ceu vallo quodam, coercentur. Floribus delapsis semina cum pappo innascenti explicata, globulum seu sphericam figuram efformant. Calicis foliola, ut in dentis Leonis flore deorsum reflexuntur. Semina parva sunt, tenuia, oblonga, diluta purpurea tincta videntur. Odor huic nullus insignis.

Non est cui locus huic assignetur, adeo ubique in arvis, hortis, arvis nimis quam frequens omni anni tempore occurrit.

Vires. Herbarum succus in cerevisia sumptus, ejusdemve decoctum cum uvis corinthiacis aut melle, leniter purgat per vomitum ut quotidiana docet experientia. Tragus raro intus sumi scribit: alii intus sumptum ad multa utilem faciunt, cholera verbi gratia, icterum, intemperiem hepatis calidam, lumbricos, vomitum & expuitionis sanguinis, ischiadicum dolorem, fluxum muliebrem. Extrinsecus utilis esse dicitur in mammis inflammatis, scabie (capitis) struma, dolore ventriculi, urinæ remorata, arthritide & vulneribus. Schroder.

Ad lumbricos utilem esse verissimum existimamus; siquidem veterinarii nostri & Hippocrati succum ejus expressum equis præbent adversus ventriculi & intestino-

quæ vermes, Botes nostratibus dictos, quorum præsentissima pestis est *Raius*.

SENECTA ANGIUM, vid. *Serpens*.

SEPIA.

Sepia (quod atramento, veluti putrida quadam sanie, quam Græci *Σηπιδόνα* vocant, abundet) cui hoc proprium est, præter fistulam inter caput & alvum prominentem, quod atramenti copia luxuriat, & vel ideo quum in cæteris repetiatur majori, quod vitam littoralem traducat, & nihil aliud quod sibi auxilietur habeat; cum polypis & brachia, & mutatio coloris inserviat: unde fit, ut atramentum illud, sive cruorem suum atrum per aquam effundat, cum se per animadvertit, & piscatoribus iter velut præcipiat. Habet & *Σηπίον* in dorso, robustum & latum, inter spinam & os mediam præ se ferens naturam, spongiosam inter se complectens corpulentiam: quod Aurifabri nostrates, qui eo præcipue utuntur, Cuttlebone vocant; pharmacopolis vero os sepia dicitur. Apud Rondeletium reperias, & minorem speciem, quam sepiolam vocat. *Charleton*.

Os Sepia seu potius Sepia testa, substantia est testacea, candida & levis, utrinque tumida, parte superiora, duriuscula, lævis & glabra, inferna, fungosa, mollicula, leviter aspera, & friabilis, in dorso piscis nata, sepotis aliquantulum subactis.

Exsiccat, abstergit, maculis, navis, scabiei humidæ medetur, oculis convenit, gingivis tumidis confert, asthmaticis auxilio est, gonorrhæam sistit, calculos pellit, urinas mover. *Schroderus*.

SERAPINUM, vid. *Sagapenum*.

SERICUM, vid. *Sagapenum*.

SERICUM, vid. *Bombyx*.

SERPENS & SERPENTINUM GENUS.

Serpens est animal pulmone respirans, unico in corde ventriculo, corpore longo, terete, gracili, squamis munito, pedibus carente, temperie frigida, inedia diuturnæ patiens.

Serpentes plerique noxii & venenati sunt. Morstu autem (ut scitè Poeta) *virus habent*, & fatum in dente minantur liquore venenoso in vulnus dentibus inflictum instillato, & sanguini commixto. Pocula imò & Fercula morte carent. Impune enim licet carnes, sanguinem, Hepar, Fel, caput, imò liquorem ipsum venenosum Viperæ aut alius cuiusvis Serpentis degustare, comedere, sorbere aut deglutire, ut *Dom. Franciscus Redi*, & *Dom. Charas* nos certiores faciunt.

Serpentes quamvis pulmonibus respirant, non tamen indefinenti & reciproco motu brevibus intervallis & contractis aerem hauriunt & reddunt, sed semel inspiratum aliquandiu retinent. Cum enim natura frigidi sint, & calor eorum naturalis languidus, aut si mavis dicere blandus: aereo pabulo ad vitam continuandam non multo indigent: cumque per dimidium ferè annum apud nos torbidi & semimortui jaceant, calor prædictus viscoso forte vehiculo interitus, velut ignis sub cineribus obrutus non multum aeris absorbit, quin penitus in pulmonum ventriculis reconditus expensis hybernis fortasse sufficiat.

Serpentes veneni respectu dividi possunt in *τοξόγες* seu *venenatos*, qui dentes exertos habent, longos, incurvos, acutos, in superiore mandibula, quibus mordendo vulnus infligunt & venenosum liquorem instil-

lant; & *innoxios* qui dentibus illis & veneno carent.

Generationis etiam respectu dividi possunt in *Viviparos* qui vivos foetus in lucem edunt, & *Oviparos* qui ovorum catenam. Nec tamen magna est hoc respectu inter serpentes differentia. Utrumque etenim genus revera oviparum est; Hoc tantum ova quæ intus concepit ovorum formâ parit, & in sinerum aliumve locum calidum deponit, ubi calore vel soli vel solis fota foetum paulatim perficiunt & excludunt; illud ovum intus in utero fovet, & foetum excludit: quemadmodum Pisces Cartilaginei *Σελάχη* Aristoteli dicti, quæ *ἔσω μὲν ὠστὴνα* esse ait *ἔξω δὲ ζωοτόκα*.

Viperæ, *A Viper* or *Alder*. Mas Græcis *Ἐχίς*, Fæmina *Ἐχιδνα* dicitur. Longitudine est plerunque cubitali, interdum majore. Color supinae partis ex flavo rubescens; in foeminis plerunque albicans. In medio dorso linea nigricans utrinque dentata, seu catena macularum rhomboïdæ nigricantium à capite ad caudam extremam per totam longitudinem extenditur. Paulò inferius in lateribus ordo macularum nigricantium. In lateribus imis utrinque 1. Linea è maculis parvis albicantibus composita; alia deinde è nigris majoribus, tandem tertia albicantibus. Venter squamis transversis longis nigris tegitur. Verum colores hi non sunt perpetui in omnibus Viperis; vidimus enim supina parte tota nigricantem absque ullis diversis coloris maculis. Quantum tamen hæcenus observavi, venter, omnibus totus niger est. Cauda ultra excrementorum exitum ad quintam longitudinis partem non producit, verum brevi in acutissimum mucronem tenuatur. Unde Aetius rectè eam describit multis notis instar rotarum exornatam, magnitudine cubitali, caudâ acervatim in tenuitatem delinente.

Wormius herbis vesci ait; at certè non solis; nos enim è dissecti ventriculo tres mures adultos exemimus, quos, quod mirum, integros deglutiverat, cum collum vix minimum digitum ambitu aquaret.

Dom. Franc. Redi *Aretinus nobilis* in observationibus de Viperis affirmat, *Viperam humorem, excrementum aut partem nullam habere qua bibita aut comesta interficere valeat; in cauda non habere quo pungat. Dentes caninos tam masculorum quàm foeminarum non plures esse duobus, eosque cavos à radice ad apicem; nec licet feriant esse venenosos, sed tantummodo aperire viam veneno viperino, quod tum demum revera tale est si sanguinem attingat: Venenum aliud dari nisi liquorem illum qui palatum humectat, & in vaginis dentes operientibus restagnat, non ex vesicula fellea eò translaturum, sed generatum in universo capite, & derivatum fortasse ad vaginas per quosdam ductus salivales, quo forte caput illis communicat.* Potius glandularum ad id destinatarum ope à sanguine secretus, quas infra fundum vesicularum distatrum semper invenit *D. Redi*.

De visceribus & Anatomie Viperæ nihil addam, sed Lectorem ad Anatomicam descriptionem Anguis crocotalophori seu Viperæ caudifonæ inferius traditam ablego: in plerisque enim conveniunt hæc Animalia.

Ammodytes ita dictus quod arenam subeat. Viperæ permissimè esse aiunt, cubitali longitudine, colore arenaceo, capite viperino ampliore, maxillaris latioribus, in superiore parte rostri eminentiam quandam acutæ verrucæ similem gerens, unde serpens cornutus vulgo dicitur. In Libya, inque Illyrico & Italia, comitatu imprimis Gosiensi invenitur.

Cerastes, à duabus eminentiis, quas in fronte cochlearum instar sed solidiores habet, nomen sortitus est. Bina tubercula instar hordei granorum supra oculos habere gemina minuta cornua imitantia.

scribit *Bellonius*, Dentes Viperinis similes, similique ordine dispositos. Ritu Viperarum fœtus vivos edit, & inter omnia Serpentum genera diutissime sitim tolerat, eodem teste. Invenitur in Lybia, inque Arabia circa Oppidum Suez. *Bellon.*

Hæmorrhous, quoddam ad ejusdem sanguis ex omnibus humani corporis meatibus effluat, Corpore est pusillo, pedem longo; oculis igneo quodam fulgore micantibus; cute splendidissima; dorso multis albis & nigris notis maculato; cervice angusta; cauda prærenui, cum corniculis supra oculos. Invenitur in Ægypto & iis locis quibus Thonis imperavit. *Hæmorrhous Indicus* Nierenbergii, *Abucyalli* dictus Viperæ caudifonæ similis nisi quod sonalibus caret, major est hæmorrhoo Antiqui Mundi sed ejusdem veneni.

Kokob ejusdem ad hoc genus pertinet, 4. do-drantes longus, fusco colore, sed cyaneis & rubescens maculis consperso. In agris Jucatanensibus.

Seps & *Sepedon*, *Σῆς* & *σῆπεν* dictus, quod ab hoc vulneratorum caro statim putredinem concipiat, Serpens est parvus, in ejus descriptione Auctores variant. Nos nihil certi habemus quod adferamus. Vide *Lacertam Chalcidicam*,

Aspis. Rationem nominis probabilem non invenio, at neque descriptionem accuratam quamvis Serpens de nomine notissimus sit. Africam & ripas Nili potissimum incolit. *Bellonius* in Italia apud Bruttios serpentem callum in fronte tuberculi instar gestantem vidit, quem Aspidem veterum esse putavit.

Seyale à longa & terete figura, quâ baculum seu lorum coriaceum imitatur & exæquat, denominatur. Forma est tereti & ita æquali, ut ubi caput vel cauda sit discerni vix possit. Magnitudine & longitudine cam ligonis ligno comparat *Nicander*.

Amphisbana. Nominis ratio patet. Dari etiam Serpentis genus gemino incessu antrosum & retrorsum non negaverim, multa enim Insecta hoc modo incedunt. At vero bicipitem Serpentem, seu utraque extremitate capitatum in rerum natura inveniri nimis impudens est qui affirmat, & nimis stolidus qui credit. Fortè ob caudæ extremæ crassitiem minus curiosè, & negligenter spectanti biceps videatur, Serpens est exiguus: Color illi terreus seu pullus. Reperitur in Libya & in Lemno insula.

Huc pertinet *Ihijara* Brasiliensibus, *Botry* Tapuyis, *Cega* Luitanis *Marig*, *Gobre Vega* vel *Cobra de os Cabecas* Lusit. Pisoni. Vulgò fertur duo habere capita, sed falso: inde a. error promanavit, quia tam cauda quam ore feri & inficere suo veneno, nec faile cauda à capite discerni potest quia eundem sunt signæ & magnitudinis. Minimi digiti crassitiem æquat, & longitudine unum pedem & duos circiter digitos. Color est albus, splendens instar vitri, & annulis & elegantibus lineis notatur; coloris brunni aut ærei. Oculos habet minimos & vix conspicuos. Herent in cute instar punctuli acuti. Sub terra vivit & illam fodiendo eruitur. Vivit in formicis. Venenum exitiale contra quod nullum dari remedium Lusitani affirmant.

Cæcilia Typhlinus Græcis, *The Blind-worm* or *slow-worm*. *Cæcilia* dicitur non quoddam oculis careat, sed quoddam eos parvos habeat. Parvitate sua, & cauda in longum infra anum producta inque obtusum deficiente à reliquis Serpentibus nostratibus facillè distinguitur. In famina quam ætate observavi dorsum unicolor erat, nimirum è flavicante cinereum, latera lineis nigris & albicantibus varia, imus venter ni-

ger. Verùm colores (ut puto) sexum variant, forte etiam in eodem sexu. Fœtus vivos more Viperarum enititur.

Cenbrus seu *Cenbrû* à Milio nomen accepit, quod notis quibusdam Milii similibus exornetur, quem admodum *Herpetis* quædam species ob eandem rationem *Miliaris* dicitur. Longitudine est bicubitali, figurâ crassâ in tenuem abeunte, & colore viridi ad luteum tendente, qui maxime juxta alvum apparet. Invenitur in Lemno & Samo ubi mons *Moilylas*.

Aconias Juculum, ita dictus quod Jaculi instar sonat. Hujus generis Serpentem in insula Rhodi invenit *Bellonius*, quem sic describit. Trium palmorum longitudinem habet, & minoris digiti crassitudinem non superat. Color ejus cinereus ad lacteum tendens; venter prorsus candidus, parvus maculis oculorum instar in dorso variis. A cervice nigra viridæ alba lineæ per dorsum longitudinem usque ad caudam excurrunt. Maculae quibus aspersa est lenticula majores non sunt, coloris nigri albo orbe cinctæ. In Ægypto & Lybia inveniuntur, & insulis nonnullis maris Mediterranei. Diversæ eorum species habentur de quibus consule *Johnstoni* Historiam naturalem de Serpentibus.

Dryinus, quoddam in quercubus lateat appellatur. *Bellonius* nullum alium Serpentem in majorem molem excrecere, & sibilum majorem emittere ex libi cognitis scribit: tam magnum aliquando invenit, ut succo impositum rusticus per duo milliaria fesse nequiverit, quin quiescendum illi fuerit: illius exuvium fœno repletum crassi alicujus viri cras magnitudine æquabat: nec plura de eo habet. At neque aliam descriptionem ejus consentiunt, ut nihil certi habeamus quod de eo dicamus.

Elops seu *Elaps*, *Elaphis* quorundam. *Bellonius* Serpentis ejusdem in insula Lemno meminit, quam *Laphia* vocant, eundemque cum eo qui Veteribus *Elaphis* arbitrat in museo Aldrovandi invenit. *Ambrasinus* coloratam iconem Serpentis, longitudinis trium pedum circiter, cujus venter lutei erat coloris, tergus leu. ophæi cum tribus lineis nigris à capite ad caudam usque percurrentibus.

Anguis Æsculapii, *Πάσις* Græcis. Serpens est innocuus in Italia tam familiariter cum hominibus vivit ut etiam in lectis invenitur: quamvis tamen adeo mitis & placidus sit irritus interdum mordet. Oblongus est, sublutei aut potius porracei coloris oblectioris, sed magis circa tergum nigricantis. Maxillæ dentibus utrinque multis valde acutis armantur. In cervice duæ parvæ eminentiæ conspicuntur, inter quas locus vacuus. In Hispania, Italia aliisque temperatis & calidioribus regionibus inveniuntur.

Vipera Caudifona Americana Dom. Tylson, *Boi-ninga* & *Boiquira* Brasiliensibus *Marig*. Tenet *Zauhqui*, id est, *Domina Serpentum*, Hernand. Luitanis *Casca vela*, *The Rattle-snake*, id est *Anguis crotolaphotus* nostratibus. Per saxa fertur celeriter cursu, per terrestria & plana tardiore, unde Mexicanorum quidam à ventro nomen indere, *Ecacoal* vocant. Ab omnibus Serpentibus dignoscitur tintinnabulo seu crepitaculo in cauda extremâ è multis squamis hujus composito. Singulis annis singulas squamas hujus tintinnabulo accedere aiunt, ut ex squamarum numero quot annos Serpens natus sit, certo possit cognosci. Ommissis aliorum Descriptionibus minus perfectis, accuratissimam Dom. Edvv. Tylson M.D. Anatomia celebrat.

celeberrimi; in *Actis Philosoph. Londinensibus*, Num. 144. evulgatam subijciam. Hujus (inquit) ad *Dom. Henricum Lodes* Mercatorem Londinensem à *Virginia* transmissi, & à me cultro Anatomico subjecti, longitudo 4. erat pedum, & 5. insuper digitorum: [unde è maximis fuisse patet, cum *Francisc. Hernandez* quatuor tantum longitudinis pedes ei attribuat, *Marcgravius* non ultra 4. pedes & 3. digitos, *Piso* 5. ad summum pedes.] Corporis ubi crassissimum, hoc est circa mediam longitudinem, ambitus 6½ unciam erat; collitrium. Caput depressum & supernè planum, ut in *Vipera*; ob maxillarum protuberantiam sagittæ alatæ barbatam cuspidem nonnihil referens; in cuius extremo nares; interque has & oculos, inferius paulo, orificia duo aperiantur, quæ initio pro aurium meatibus habui; verum postea, eorum ductum sequendo, in cavitatem mediocrem ossi cuidam insculptam absque exitu definire animadverti. *Viperæ* orificia isthac in capite desunt. Oculi rotundi, ¼ digiti diametro; colore, pupillæ forma, aliisque accidentibus, *Viperinis* similes; quin & Animal ipsum totâ figurâ & specie externa, excepto crepitaculo, cum *Vipera* convenit. Squama ampla velut suggrundium supra oculum [utrumque] prominēbat, cui palpebræ usum præstare, ad prohibendum ne quid fortè incideret videbatur; non tamen ad oculos claudendos contegendosve; quamvis introsum membrana nistitante, pulvisculo siquis fortè adhæresceret detergendo inserviente, instructi essent. [Membrana nistitantis seu *Periophthalmii*, quod in *Bruti* plerisque observatur, alius præterea usus est; nimirum ad oculos liquoris ope quem supra eos effundit, & motu suo ferè continuo per totam superficiem extendit, humectandos lubricandosque, ne opaci aut minus pellucidi per siccitatem redderentur.]

Squamæ in capite omnium minimæ sunt, exinde in dorso ordine majores ad maximam corporis crassitiem, postquam sensim minuuntur ad crepitaculi usque exortum, figurâ omnes *Pastinacæ* latifoliæ semina quadantenus referentes. Colore variant: In nobis descripta capiti innascentes *Chloridis* avis pennas dorsales colore referebant, maculis nigris parvis, (è quibus quatuor majores & insigniores) notatæ: quæ dorsum vestiebant obscuro tolii mortui [Fenille morte] nigro, & flavo subobscurò coloribus variæ erant, atque etiam punctatæ; hac colorum diversitate & mixturâ pulchrè tessellatam velut tabulæ schaccariæ speciem exhibente. Quo caudæ propinquiore ad nigriores erant squamæ, & tandem propemodum nè dicam penitus nigræ. Squamæ dorsi, ut in *Crocodilo*, media parte in eminentiam acuminatam assurgebant, è minus quo lateribus propiores, ubi prorsus planæ & æquales sunt. Venter plantis videbatur, squamis longis, transversis, velut parallelogrammis rectus, colore flavicante, punctis nigris interstincto. A collo ad anum 168 squamas numeravimus: ultra anum duæ dimidiatæ erant, exinde 19. integræ sequebantur, colore plumbeo nigricante, fimbriis luteis, post quas ad crepitaculum sex squamarum minorum ejusdem coloris ordines extendebantur.

Squamæ ventrales musculis distinctis sibi mutuo connectebantur: inferior uniuscujusque tendo in superiore marginem proximè succedentis squamæ inferebatur, ejusdemque musculi tendo alter mediæ circiter antecedentis. Musculi hi versus mediam squamæ partem carnosiores erant: fibræ autem exinde oblique ascendebant. Uniuscujusque squamæ extremo utrinque costæ apex adnectebatur: quæ res magnum iis [squamis] momentum confert ad usum cui à natura destinatæ videntur, robur addendo ad mo-

ius reptiles peragendos. Squamæ etenim veluti totidem pedes sunt, quæ liberæ cum sint, & inferiora versus apertæ, terram faciliè apprehendunt, adeoque corpus contrahunt seu antorsum adducunt: deinde musculorum truncum coarctantium opè animalia isthac illum protrudunt se in anteriora extendunt, motumque progressivum hoc modo continuant. Unde non est cur *Franciscus Hernandez* miraretur, quod fieret ut *Serpens* hic per saxa celeriori cursu ferretur quàm per terrestria planaue, cum ibi firmiora habeat vestigia. Hinc etiam in terra molliore cum incedit, ventrem quamvis planus sit, in ellipsin seu angulum acutum contrahere novit, ut terram altius penetraret, adeoque corpus stabiliat & promoveat, prout & in *Vipera* observavi.

Cum huic Animalium generi necessarium sit in terra semper provolutum jacere, magnâ Naturæ providentiâ, hujusmodi armatura eorum tutelæ & incolumitati prospectum est; adeo ingeniosè excogitata, & affabrè facta, ut quamvis totum corpus undique integat, frequentibus tamen juncturis motus omnes admittat, in quem etiam sinem spinæ dorsi vertebræ mirabiliter conformitæ videntur; pilâ quadam seu globulo in inferiore extremo vertebræ cujusque superioris detornato cavitatem ei excipiendo in superiore parte inferioris vertebræ paratam ingrediente, quemadmodum caput ossis femoris ossis *Ichii* acetabulum, quo fit ut quaquaversum in omnem partem flecti & circumvolvi possit.

In dorsum resupinatum & fixum aperui, & observavi tendines musculorum abdominalium lineam in medio squamarum ventris efficere, ubi similiter vas sanguineum amplum decurrebat, à vena cava exortum versus imam hepatis partem. Verum nè minutias sectari videar, ad viscera examinanda progredior.

Aspera Arteria singularis structuræ & ab aliorum Animalium diversæ erat. Cum enim in illis cartilaginee annulares vel integri circuli sint, vel saltem membranæ juncti, adeoque fistulam efformant aeri in brachias derivando, unde in minutas pulmonum vesiculas transmittitur; in hoc (quod ei cum *Viperino* genere commune est) Trachea quàmprimum thoracem ingreditur, pulmonibus occurrens, è cartilaginibus semiannularibus duntaxat constat, utraq; extremitate pulmonum membranæ annexis, interna parte aperta aerem in pulmonum vesiculas absque bronchiarum interventu transmittens, ut ex figura subnexa clarius apparet. Siquidem Arteriam dividendo in latitudinem sesqui-digitalem eam faciliè extendi observabam, cum antequam pulmonibus occurreret cartilaginee annulares essent; in longum viginti digitos extendebatur, propè cor & hepatis initium definens; & ad eam usque pulmonum partem, quæ vesicam magnam constituit, pertingens. Tracheæ cartilaginee prope ejus initium 3. digiti erant, versus finem 4.; per totam longitudinem depressæ & ad planum inclinantes, non perinde discretæ, & à se invicem divisæ, ut in aliis Animalibus, sed ramulis emissis in mutuo incurrentes & conjunctæ.

Tracheæ usus evidens est, nimirum ad aerem in pulmones derivandum. Pulmones autem quanti usus & pretii organum sint, Natura ex mirabili eorum conformatione & amplitudine ostendere velle videtur. A gutture incipiunt, & ad tres pedes in longum descendunt. Superior eorum pars in anteriore corporis regione, per pedis unius longitudinem ad cor usque extensa, ad modum pulmonis *Ranini* è vesiculis seu cellulis exiguis in hoc Animali composita erat, ubi ob frequentes & velut reticularas vasorum sanguineorum ramificationes colore subro florido tincta apparebat, ab initio pro corporis modo augefcens; ejusque modicè inflatæ

infimæ

infima pars propè cor 5¹ digit. in ambitu habuit. Paulò inferius post 4¹ digitorum spatium cellulæ sensim evanescabant, ut tandem reticularem tantum compagem valvularum conniventium, ad membranæ pulmones succingentis interiorem superficiem efformare viderentur. Hujus partis ubi maxima crassities, ambitus 6¹ circiter digitorum erat. Succedit vesica simplex, ampla, ab^que ullis intus cellulis, in quam pulmones terminantur, tenui pellucidâ, validâ tamen, membranâ constans, cujus modicè inflatæ ambitus 8¹ erat digitorum.

Salamandræ aquaticæ, aliorumque nonnullorum Animalium Pulmones duæ tantum amplæ vesicæ sunt: in Rana, Crocodilo, &c. lobi gemini grandes, vesiculis seu cellulis membranaceis repleti. Verùm Anguis noster crotalophorus, & congeneres omnes Pulmonem habent simplicem, nec in lobos divisum, qui tamen prædictas duas differentias complectitur, siquidem anterior ejus pars numerosas vesiculas continet, posterior unicâ simplici peramplâ vesicâ constat.

In Testudine terrestri Pulmo in duos dividitur lobos, hinc inde unum, verùm hi in alios plures subdividuntur secundum interstitia costarum testæ affixarum, & in ventre seu inferiore potissimum corporis regione siti sunt. Sed quod præcipuè animadversum velim, ubi bronchiæ subdivisiones has primò ingrediuntur, pulmo reticularis est, dein ampla cavitas seu vesicâ efformatur [in singulis.] Ut in his Animalibus, in quibus respirationis nixus minus frequens est, Natura huic tam necessario vitæ pabulo recondendo satis capacem paraverit apothecam in hisce amplis vesicis, unde prout res exigit, pro usibus Animalis depromi & dispensari possit. Testudo enim, Vipera aliæque Serpentes, Rana, Bufones, &c. quæ magnam anni partem dormiunt, antequam ad quietem se componunt, uti cibi quantum sufficiat ad expensas hybernas ingerunt, ita & aeris fortasse, cujus ad vitam continuandam magis constans & assiduus usus est, thesaurum in pulmonum cellulis & vesicis reponunt. Cum etenim profundo s. pore oppressi, torpidi & velut mortui jacent, merito dubitatur an partium aeri inspirando destinatarum ullum omnino usum habeant, cumque motus vitales adeò languidi sint ut vix possint percipi, minimumque sit quod absorbunt, quidni penus ille in hunc mem sufficiat? Sic Salamandra aquatica, quæ sub aquis degit, pro pulmonibus, ut diximus, duas habet amplas vesicas, ob hanc, ut videtur rationem, nè ad aerem inspirandum in summas aquas sæpius ascendere cogatur.

In Vipera à me nuper dissecta, quæ aliquot dies postquam pelvis detracta, & pleraque viscera exempta fuere, supervixit, pulmones per totum hoc tempus, non ut in inspiratione & expiratione vicissim crebro intumescere & detumescere observavi, verum perpetuo aere æqualiter extendi: sed quamprimum Animal moriebatur aere exspirato concidebant & detumescabant illico: Ventrículus tamen tunc temporis omnino vacuus & exhaustus erat, prout & aliquandiu antea fuisse minimè dubito; quemadmodum & Vipera qua de agimus, quæ per 4. minimum menses nihil prorsus comederat: adeò ut quamvis sine cibo tamdiu vivere possint hæc Animalia; Natura tamen summo opere provida, nè pabuli aerei jugiter necessarii supplementum desit, ei excipiendò & reservando peramplâ repositoria paravit. Sic Ephemerum insectum Bombyx aliæque nonnullæ Papiliones, quamvis quandiu in eo statu sunt, cibum non capiunt, bronchis tamen seu Pulmonum vesiculas satis amplas & numerosas obtinent, ac si solæ ad vitam sustentandam sufficerent, quibus oleo aliave materia pingui

obstructis & oclusis, illico suffocantur & convulsi moriuntur.

Pergo jam ad partes cibo excipiendò & concoquendo destinatas: Et primò occurrit Oesophagus seu Gula, ei in ventriculum derivando inserviens: & revera in plerisque aliis Animalibus hic solus hujus partis usus esse videtur; verum in hoc genere Naturam ad aliud insuper eum designasse suspicor; nimirum Ventrículi vel Ventriculorum, si opus sit, usum præstet. Nam cum partem hanc statu extenderem, duos tam amplos tumores ceu bulgas in eo observavi, ut ventriculus genuinus extensionis tantæ non esset capax. Tota Oesophagi longitudo duorum pedum & 3¹ digitorum erat: Ventrículi propriè dicti 5. unc. Hi in eadem recta cum Oesophago situs, eo crassior erat interna parte tunica notabili propria, substantia, colore & plicis à reliquis discretu facili, ultra interiori gulæ superficiem extrante ut in Vipetis, donata. A Pyloro ductus ad 1¹ digit. angustabatur, dein in Intestinum amplum dilatatus, ob rugas interioris tunicæ inter se contextas pulchram speciem exhibuit. Intestinum hocce post paucas revolutiones in Rectum tandem reliqua parte angustius desinebat. In ventriculo & Intestinis lumbricos teretes numerosos observavi, cui morbo Vipera etiam obnoxia sunt. Tota longitudo canalisi à gutture ad anum usque unus & continuus ductus est, quamvis in variis Animalium speciebus pro diverso Naturæ scopo differat: in nullo magis simplicem & uniformem observavi quam in pisce *Acu Marina* dicto, ubi Oesophagi & Ventrículi distinctio nulla; verum ab ore ad anum angustus & simplex meatus, at neque valvulis ullis interceptus, producit, versus anum duntaxat paulò angustior redditus: in reliquis piscibus Oesophagus vel nullus, vel perbrevis cernitur. In aliis Animalibus non longus tantum est, sed in nonnullis ob tumores seu extuberantias variis in locis varia fortasse nomina, verbi gratia, in Avibus *Ingluvini*, in Quadripedibus ruminantibus *μεγάλης κοιλίας*, &c. quæ quem usum iis Animalibus præstent, eundem aut similem extumescencias prædictas Serpentibus præbere autumo, nimirum ad cibum quem ventriculus ob angustiam nondum commodè admittere aut capere potest, aliquantisper continendum & reservandum, quæ hoc genus Animalibus eò magis necessaria videntur, quod una tantum Anni tempestate vescantur.

Quandoequidem autem in cibo illo promiscuo quo utuntur, quem integrum semper absque masticatione ulla aut comminutione deglutiunt, partes nonnullæ concoctioni ineptæ inveniantur, ideoque iterum rejiciendæ, gula autem prælonga sit, eaque ratione actioni huic minus idonea, extumescencias hæc ingeniosa excogitavit natura, ut evacuanda quo uno impetu difficulter egredi possunt inibi sistant aliquandiu & moram trahant, donec redintegrandæ viribus vomitiva facultas insurgens, altero tertio conatu ea prorsus ejiciat & foras eliminet. Quin & verum sit quod à nonnullis fidenter asseritur, nimirum quod Serpentes plerique fortis periclitantes os excipiant, diverticula hæc commodum iis hospitium seu Asylum præbent. Ignoscat mihi ingeniosus & eruditissimus Descriptionis Auctor si in seculo quem assignat harum cavitatum usui ei non consentiat nec enim mihi verisimile videtur, quod Serpens aut aliud quodvis Animal, à natura ita factum sit, ut cibi deglutit partem aliquam vomitu semper aut etiam frequenter rejicere debeat. Est enim vomitus motus extraordinarius & convulsivus, à morbo aliquo aut affectu præter naturam excitatus, eidemque sublevando aut prostrigendo destinatus, nec in statu sanitate unquam contingens.

Cibus-antequam in alimentum cedat comminuetur, & in minutissimas particulas conterendus; quod quomodo perfici possit in Ventriculis hisce membranaceis absque corrosione non video. [In ventriculis piscium cibum deglutitum corrodere libenter concedo, & res ad oculum patet: verum serpentes suum nutritum ex rebus deglutitis alia ratione elicere cum Parisiensibus Academicis sentio, inviolato folliculo qui eum continet, nimirum quemadmodum liquores quidam medicamentorum vires quæ eis infunduntur imbibunt & exhaustunt; aut vinum & cerevisia ex uvis quibus affunduntur, imò ex carne ipsa suum omnem alimentarium & spirituosum exsugunt relicta massâ exsuccâ & insipidâ.]

Præcipuum quo hoc peragatur menstruum, ut cum Chymicis loquar, liquorem illum esse existimo qui glandularum salivarium ope à sanguine secerantur. Hæc, vel ad gutturis initium sita sunt, vel ad ostium ventriculi ut in Avibus, vel in ipso ventriculo, tunicam glandulosam dictam efficientes, cuiusmodi Serpentis huius interior ventriculi tunica esse videtur.

Cibus in ventriculo maceratus & comminutus in intestina exoneratur, quæ ne chylus una cum fecibus descendat & ejiciatur, plerumque reflexa, intorta aut convoluta sunt, ut in hoc Animali, præpropere descensu hoc modo vel etiam valvularum ope impedito, ut hæc mora separatio felicius procedat, fecesque tandem ad nutriendum inutiles per Rectum seu commodissimam sentinam egerantur: quæ [feces] cum duriores sunt, ut in hoc Serpente viperinis, intestinum ad actionem suam facilitandam musculo validiore innititur, ut & hic videtur.

Hinc totus ductus alimentalis in 4. plerumque partes officiorum r. sp. u. dividi potest. Prima est, quæ cibum devehit, *Oesophagus*: Secunda quæ eundem concoquit aut corrodit, *Ventriculus*: Tertia, quæ chylum seu succum nutritum perficit & distribuit, *Intestina*: Quarta quæ feces evacuat, *Rectum*. Venter *Hirudo* tota ventriculus est, & quod una vice devorat totius Animalculi pondus aliquoties superat. Ventriculus sanguine repletus & distentus integri corporis mole longe major est, imò aliquot vicibus eam excedit. Ventriculum dixi in numero erravi: non enim unus & simplex ventriculus est, sed plures; cavitare interna membranis transversis seu diaphragmatis in plura velut conclavia seu cellas divisis, quibus foramine in medio pertulis cellulae cum se invicem communicant. Quinetiam unaquæque cella utrinque protuberans in duos sacculos seu ventriculos dividitur; ut omnium numerus (sunt enim 10. vel 11. cellæ præter duas illas longas ad caudam usque excurrentes) ad 22. saltem si non 24. ascendat. Rectum inter divaricationes duorum extremorum sacculorum angustum est & breve totius respectu.

Proximo in loco de *Corde* agemus, quod prope imam *Trachea* partem, ad dextrum ejus latus situm erat, & Pericardio cinctum: Longitudo ejus 1. digiti, figura compressa & plana potius quam rotunda: unicuique tantum habuit ventriculum, valvulis parvis & carnosissimis donatum, interna parte 4. aut 5. sulcis transversis distinctum. Auricula corde ipso major erat. Cur *Dom. Charas* cordi Viperino duos tribueret ventriculos rationem non video: nam proculdubio in ventriculorum numero Serpentes omnes conveniunt. Ego nullo libentius duplicem auriculam admitterem; unam ad ingressum *Vena Cava*, cujus duo sunt rami ascendens unus, alter descendens; alterum ad exitum *Aorta* seu *Arteriæ* magnæ, quæ in tres ramos dividitur, duos descendentes, unum ascendentes.

Paulo infra Cor situm est *Hepar*; latissima parte unciam circiter latum: ex altero latere in lobos duos inæqualis longitudinis à *Vena Cava* dividi videbatur; sinister duos plus minus digitos longus erat, dexter pedem integrum. Color totius ex brunneo ruber: utius ad bilem à sanguine separandum. Cystis a. fellea, ut in aliis Serpentibus, poro bilario appendita, & ad aliquam ab Hepate distantiam sita, nullam aliam cum eo connexionem aut communionem habuit; quo *Sylvii* opinio de motu bilis refutatur. Erat a. cystis duos digitos longa, felle intus obscure viridi; quod per tunicas transsudans partes adjacentes colore infecerat. Fellis Viperini sapor gustanti primò salus, deinde *γλυκύπικρος*.

Ductus per quem cystis in intestinum se exonerat à summa ejus parte exoritur, indeque leniter descendens vicius illud permeat; quod *Dom. Charas* pro Pancreate habet, Veteres Lien m. faciunt; adeoque initium intestini jam dilatati ingreditur. In Viperis quidem color huius partis, & situs intestino proximus *Charassi* conjecturæ (ut eam modeste vocat) favent: verum in hoc Serpente color intensius ruber, quali in nullo hætenus Animali Pancreas tinctum observavi, quin & figura non in latitudinem fusa sed contractior Veterum opinioni assipulantur. Magnitudo ei *Fabæ* majoris: Intestino a. circa initium ejus adhærebat, eamque mediam (ut diximus) porus bilarius perforabat.

Pinguedine huius Serpentis, quam copiosam obtinet, ad dolorem ischiadicum sedandum lumbos perungunt *Mexicenses* medici, aliasque corporis partes dolores infestatas, at discutiant præter naturam tumores; referent *Francisco Hernandez* in *Hist. Nat. Mexic.* Membranam cui pinguedo adhæret in hoc & aliis Serpentibus pro Omento habeo, quod partes omnes inferiore ventris contentas ambit, costis utrinque adnexa, ad Rectum usque descendens, & sacculum efformans qui partes hoc loco sitas involvebat; verum inferius ventrem versus libera erat, lateribus non commissis. Ventrem inferiorem voco ad eum à reliquo trunco distinguendum; tota enim interior corporis cavitas continua est, nec ullo diaphragmate seu membrana transversa intercepta.

Renes ad spinam dorsii utrinque siti, non tamen eodem firmiter adnexi 7. circiter unciarum erant: dexter sinistro nonnihil longior, alterutrum circa mediam unciam latus. Hi quamvis continuum corpus esse videntur, in plures tamen minores renes seu renulos manifestè possunt distingui [in altero n. malè meminì 15. numeravi] idè affabre & curiose exstructos, eaque pulchritudine oculis adblandientes, ut descripturum verba destituant, quæ penecillus delineando assequi nequivit, tantum abest ut sculpturâ exprimi possint. Cum primum è corpore exempti essent non aliud quam elegantissima vasorum compages esse videbantur, sanguiferis cum albis seu secretoriis variis intertextis. Quæ sequuntur cum ad iconas referantur absque earum intuitu intelligi nequeunt. Verum quod ad renum structuram & ex renulis compositionem attinet non est ea huic Animali peculiaris, sed *Urso* aliisque nonnullis Quadrupedibus *Phocæ*, *Struthioni*, &c. communis; in quibus quot renuli sunt, tot observari possunt Emulgentes, Ureteres, Pelves, partes corticales seu glandulosæ, corpora papillaria & tubulis urinariis utinam in pelvem devehentibus composita. Notatu tamen dignum est, in Avibus, Piscibus & Reptilibus renes plerumque longas esse, in aliis Animalibus contractiores, glandulosos illis corporibus ex quibus componuntur conglomeratis, seu propius sibi invicem admotis & arctius junctis. Sic Ren humanus quamvis uniusmodi individua & simplex

plex substantia esse videtur, revera tamen ex totidem partibus, & velut renulis componitur quot sunt in eo corpora papillaria. Renum usus est ad lixiviale & superfluum serum à sanguine secernendum & amandandum: quod ut separetur quantum Animalis interfit, vel inde patet, quod iis etiam quæ raro aut unquam bibant, Natura renes contulit. Humor à renibus seceretur si copiosus sit per ureteres in vesicam defluit, ut ibi aliquandiu reservetur, nè nimis frequens & importuna ejus evacuatio Animali molestiam crearet: quod minori quantitate separetur, in cloacam juxta anum sitam deponitur, ut una cum excrementis solidioribus evacuetur.

Ureteres in Serpente quem præ manibus habemus per totam partem Renum longitudinem extendebantur, minoresque ramos ad singulas glandulas tendentes obiter emittebant, seu potius ab iisdem reversas accipiebant, sibi que mutuo proximi in cloacam terminabantur, protuberantiam ibidem efficientes. Serpens enim crotalophorus Avium instar cloacam habet, quæ in Vipera sæmina tum ureteris, tum uteri utriusque officia admittit; aliquo modo etiam Intestini recti, quod tamen commodam quæ obtegatur valvam obtinet.

Propè Cloacæ marginem alia duo officia observavimus, quæ cutis plicaturâ contegi videbantur: hæc autem ad folliculos, quos nobis *Odoriferos* appellare liceat, ducebant. *D. Charas* longè extra scopum jaculatur, cum vasa hæc Parastatas aut spermatis repositoria esse contendit, nec minùs illi quos refutat, qui Testiculos secundarios seu succenturiatos ea esse statuunt, cum in Viperis etiam sæminis reperiuntur; quod ab utrumque errorem convincendum sufficit, ut alijs argumentis non sit opus. Horum alterum unciam circiter longum erat, pennæ Anserinæ crassitudine, extremum versùs acuminatum, à colore liquoris quem continebat obscurum; alterum paulò minus: liquor utriusque inclusus crassiusculus, odoris vehementis & valdè ingrati; cujusmodi sed remissiorem Animal ipsum ante dissectionem emittebat.

Martialis Poeta hujus meminit, inque foetidorum catalogo penultimum ei locum tribuit, cum ait

*Quod Vulpis fuga, Vipera cubile
Mallem quam quod oles olere, Bassa.*

Joannes etiam *Laetius* Serpentum quorundam in India Occidentali meminit qui quovis vulpe aut Putorio ret. ius olent.

Fœtores omnium graveolentium Animalium in folliculos hosce colligi, seu liquoris iis contento inherere dudum observavi, [& nos etiam unâ cum *Dom. Whughby* olim] qua de re plura in præsentiarum non addam, duntaxat adnotabo Angues nostrates vulgares multò gravius olere quàm Viperas: Crocodillos etiam nonnullos validum, non tamen ingratum odorem de se spargere à quibusdam peregrinationibus nobis narratum est. Quod, siquidem verum sit, quin eandem causam habeat minimè dubito. Quamvis a. liquor hic dum adhuc recens est, aut in magna quantitate naribus admotus ingrati & odiosi odoris sit, exsiccatus tamen & in minore proportionè adhibitus gratior & jucundior fortasse evadet. Sic liquor verbi gratia, Mustelinis folliculis exemptus, ad exsiccandum in charta extensus & aliquandiu repositus nobis olfacientibus non injucundum, sed potius è contrario gratum exspiravit odorem in Leone à me dissecto liquor folliculis contentus unanimi omnium qui illum odorabantur consensu Oleum Anisi aut Fœniculi dulcis plurimum referebat, quæ præci-

pua & ferè sola erat differentia quam inter Leonem & Felem observare potui: in Fele etenim liquor hic pessime olet.

Pergo jam ad Organa generationi inservientia, & ab iis in quibus semen elaboratur, nimirum Testibus, initium sumam. Hi longitudine admodum inæquales sunt: Dexter enim 2½ digi. longus erat, sinister 1½ unc. non excedebat, ambitu seu crassitie pennæ Anserinæ. De longitudinis proportionem idem in Viperis observavi *Dom. Charas*, in quibus etiam nobis observantibus sæminæ ovaria longitudine tantundem differunt, hoc illo duplo majore Testium color ut in aliis Animalibus, eorumque substantia interior alba. In vasis *preparantibus* nihil singulare occurrebat; verum *Deferentia* dicta insigni differentia ab aliorum norma abludebant; quamvis enim à testibus ad penem rectâ propemodum lineâ decurrerent, nec corpus valdè amplum efficerent, ductus tamen ipse seu canalis qui sperma devehebat toties revolutus & huc illuc reflexus erat, ut si explicaretur & in rectum extenderetur plus duplo longior esset; unde corpus illud à teste ad penem productum nihil aliud esse quàm *Epididymidem* quandam aut *Epididymi* analogum mihi subit imaginari. Testis enim congeries quædam esse videtur vasorum curiose convolutorum, quæ in *Epididymidem* terminantur; *Epididymis* a. in vas *deferens* delinit; nec aliter inter se differunt Vas *deferens* & *Epididymis*, quàm quod hæc sit Ductus spermaticus supra corpus ipsius testis multipliciter reflexus & convolutus, illud idem ductus simplex & rectâ extensus absque ulla reflexione. In hoc a. Animali aliisque Serpentibus, in quibus ductus seu canalis spermaticus supra testem ipsum, in tot gyros & mæandros non reflectitur, ut *Epididymidem* notabilem constituat, per totum decursum à teste ad penem usque ubique intortus & veluti crispus, & circa medios renes sæpiùs convolutus videtur.

Vasa *deferentia* in Vipera à me postea dissecta (nam in hoc Serpente clarè ob partium exsiccationem discernere non potui) simplicia & indivisa secundum penem procedere quoad is simplex esset comperi, deinde ad ejus divisionem dividi, & ad utriusque rami seu penis divisi finem extendi; neque ullæ vesiculæ seminales aut prostates quæ ea exciperent comparabant. Penes hi valdè notabiles erant non tantum ob structuram suam, sed etiam ob numerum. Quatuor enim in universum, hinc inde duo intra corpus reducti, & velut in vaginas reconditi latitabant, ut primo aspectu non facile possent discerni, sed ampla duntaxat Officia per quæ retracti erant musculorum ope, quemadmodum Chirothecæ digiti filo extremitati ejus adnexo. Verum stylo immisso protrusi eâ figurâ quam in Schemate apposito representavimus apparabant. Observavi insuper quod propè basin, seu radicem simplices utrinque essent, & spinulis crebris acutissimis mucronibus rectorum spectantibus obsiti; substantia, præsertim cum exsiccarentur echinorum aculeis simili. Hinc divaricati duo corpora teretia pennæ Anserinæ minoris magnitudine efformabant; circiter digiti partem longa, colore rubente; totum autem cum jam protruderentur digitum longitudine superabant. Protrusos facile retrahi posse observavi ope musculorum majorum iis affixorum, sub caudâ decurrentium tandemque ejus extremitati insertorum ad primam Crepiraculi squamam. Horum usus experimento facto adeò evidens erat, ut dubitandi locus non esset reliquis; atque idcirco Retractores penum eos appellabimus. *Dom. Charas* musculos hosce promentulis habere videtur, minùs rectè, ab *Angelo Abbatio*, *Ulyssè Aldrovando*, aliisque qui in eodem errore versant.

versantur, fortè seductos. Nec rectius sentiunt qui ex altera parte penes simplices & individuos faciunt, spinulis crebris pellis Erinacei instar undequè obritos, cum pars hæc in Vipera tam vulgari quàm caudifera in ramos dividatur; & bina satis crassa & rotunda corpora, seu binos distinctos penes constituat: quod & *Balio*, seu potius *Cumentio*, qui pro eo dissectionem administravit, suboluisse videtur; cum dicat, *Quando turgidi sunt, aut extra violenter emittuntur, uti sæpe apud Paulum videmus, Penes hanc formam referre. Aspectu asperum ut Erinaceum*: Nam in Viperis ad extremum usque hispidi sunt, non tamen in hoc Serpente, ut ex utriusque iconibus clare apparet.

Multa Animalium genera penes omnino nullos habent, sed vasa deferentia tantum ut Pisces plerique: Quadrupeda, quantum noverim, omnia unicum & simplicem obtinent, ut & Aves nonnullæ: aliæ siquos habere dici possunt, binos, at perbreves: *Cancris, Astaci, Locustæ* binos, eosque longos, utrinque unum. *Lumbrici terrestres, Hirundines, Cochleæ terrestres* Hermaphroditi sunt, & perfectis utriusque sexus organis donantur. Ex omnibus in quibus sexus subjectus seu individuis discreti sunt, mihi saltem hæcenus cognitis, Viperarum familia hæc generationis Organa numerosissima habet. At cur mas in hoc genere 4. obtineret penes, cum femina iis excipiendis duos tantum uteros sortita sit, non ita facile est divinari. Præ aliis conjecturis, quæ cogitanti plurimæ occurrebant, ea potissimum attulit, quæ penem utrinque duplicem seu bifurcum iis à natura indultum supponit, ut post uteri ingressum penes se divaricando in Y Pythagoricæ formam, & firmius ibidem hæreant usque dum officium suum præstiterint. Atque hic etiam inter alios præcipuus esse videtur setarum seu aculeorum quos diximus ad penem radicem retrorsum spectantium usus, ad prohibendum sci. ne Penes uterum semel ingressi iterum elabi aut expelli possint, donec semine evacuato partes longa contentione delassatæ flaccescant & concidant, adeoque exitum facilem inveniant. In Animalibus enim quæ vesiculis seminalibus carent coitus longus sit oportet, ut spermæ cum copiosè nequeat subministrari à testibus, sensim deriveretur, & in uterum paulatim distillet. At in iis quibus in vesiculis seminalibus jam antè reconditum, semper præsto est, coitus citò absolvitur. Cum enim (ut dixi) vel spermatis præparatio expectanda est, vel saltem tardus ejus in penem descensus moram potestular, coitui donec perficiatur producendo sollicita prospexit Natura. Sic in Canibus quæ vesiculas seminales non habent, prope radicem ossei penis corpus amplum creavit, & cellulis & vasculis plurimis compositum, quod sanguine & spiritibus, coitus tempore, cum impetu copiosè intrantibus adeò extenditur & intumescit, ut penem firmer & detineat, nec elabi permittat, donec impetu languente & spermate evacuato pars illa subsidat & contrahatur. Sic *Lumpus* piscis dictus corpus quoddam pectori adnascens obtinet, latum & subrotundum, affabrè effectum, Hirundinis caudæ aut Polypi acerabulo simile, cujus ope fæminæ adhærere potis est, & quamvis penis admodum brevis sit, coitum hoc modo perficere, *Pars hæc nihil aliud est quàm pinna ventrales in unum coalescentes: ejusque usus nobis esse videtur, ut Piscis, Saxatilis cum sit, rupibus & saxis se affigat, ne aestu maris & fluctuum agitatione is vehementius allidatur & violetur: At nec huius speciei proprius est hujusmodi pinnarum ventralium in unum velut infundibulum coactus, sed gobionibus marinis communis, quos Cornubienses Rock fish, vocant, quia sci. hujus pinna ope rupibus marinis firmiter adhærescunt.*

Mangeri Bibl. Paarm. Tom. II.

Feles, Leones, &c. cum eorum penes perbreves sint, ut fæminas inter coeundum retineant dentibus & ungibus uti coguntur. Hinc querelæ illæ, clamores, & horrendæ quas edunt ejulationes, à morsuum & scalpturarum se, dolore oriuntur; non ut falsò creditum est à seminis immixti fervore.

Quocirca in Serpente pariter nostro (in quo, ut observavimus, vesiculæ seminales nullæ, vas a. deferens per totam longitudinem intortus & anfractuosus, & ob utramque hanc causam coitus longior esse debet) hujusmodi structura & conformatio partium necessariò requiritur. Quamvis enim in hac actione bestię corpora sibi mutuo circumvolvunt & implent, quod ad hunc finem nonnihil confert; nexus tamen hic solus non sufficit: partes enim nihilominus ob brevitatem suam & parvitatem levissima de causa vi nulla ferè adhibita elaberentur aut dissilirent, quod nè fiat, divaricatio penum bifurca, & aculei seu setæ reflexo situ veluti tot unci dispositi efficaciter prohibent. Quinetiam vasa deferentia penes comitantia pariterque divaricata, & ad extremos omnium fines producta hunc eorum usum esse arguunt. Ut ad fæminæ à spinarum injuriis indemnis sit, natura eam uteri partem quàm ingrediuntur robustam & cartilagineam effecit, ut in Vipera observavimus. Nè mas etiam ab immoderata & nimia harum partium extensione injuriæ aliquam patiatur, musculi illi robusti qui genitalibus retrahendis inserviunt, eadem corroborando prohibet. Considerandum insuper, Annon cum Animalia hæc natura adeo frigida & ad Venærem tarda sint, aculei hi veluti totidem calcaria iis incitandis & irritandis aliquid conferant.

Transeamus jam à partibus hisce quibus sibi met profunt Serpentes, genus unum multiplicando, ad eas quibus aliis Animalibus nocent, eorum numerum minuendo, nimirum Dentes venenosos.

Primum tamen de reliquis oris partibus, nimirum *Lingua, Larynx, & Dentibus* minoribus nonnulla adnotabo. In genere autem liceat mihi præmittere, Caput valde parvum fuisse, rictum tamen amplissimum; cujus rei postea rationem reddam cum de ossibus verba faciam.

Lingua Viperinæ adeò per omnia similis erat, ut hujus descriptio pro illius sufficiat. E duobus longis & rotundis corporibus componebatur, sibi mutuo contiguis & conjunctis à radice ad duas tertias longitudinis partes, quæ Serpentes magna velocitate evibrare iterumque retrahere possunt. Pars illa quæ foras apparuit nigro colore tincta fuit, quæ intus reducta & tanquam in vagina recondita latebat; rubro. Erat enim infra guttur fixa, & abinde ad locum usque ubi exit prope finem laryngis vagina tectæ; & ad facilitatem expeditioremque ejus ejaculationem inferior etiam maxilla hic divisa erat, spatio intermedio notabili relicto. Si enim ut in aliis Animalibus maxillæ crura conjuncta essent, & dentibus confiti, hi linguam inter evibrandum ledere & vulnerare apti forent; aut saltem ipsa usui illi cui à natura designatur minus idonea redderetur, quem ego cum *D. Charas* esse suspicor ad muscas, aliæque animalcula, quibus vesci amant Serpentes, capiendæ.

Supra linguam Larynx sita, non tanta Cartilagineum varietate constructa est quanta aliorum fere Animalium esse solent; sed quæ sufficiant ad rimam aeris admittendo seu derivando idoneam efficiendam. *Epiglottis* ad impediendum nè fortè aliena corpora in tracheam illabantur, nulla; cum huic incommodum arcta rimæ laterum commissura satis cautum esset. Aer autem per rimam transiens absque aliis partibus ei modulando aptatis ejusmodi sono seu voci, quem ab iis editum sentimus, sibilo nimirum, creando sufficit.

Z z z

Dentes

Dentes duum erant generum: 1. *Minores*, in utraque maxilla dispositi, qui cibo corripiendo retinendoque interserviunt. 2. *Majores* seu longiores, noxii & venenosi, qui caput occidunt; in superiore tantum maxilla sunt. Omnes a. canini, seu apprehensores sunt. Cum enim cibum non manducant aut comminuant Serpentes, sed integrum deglutiant, molaribus e. s. non erat opus.

Prioris generis Dentium ordines in inferiore maxilla utrinque duo, & in utroque, ut in universum 2. sunt, posteriores a. exterioribus minores. In superiore maxilla 16. tantum habentur, s. utrinque retio, & sex ante. Hi nullam inferunt noxam, quod Agyrtis (ut notat Cæsalpinus alisque) olim cognitum qui ut Antidotorum suorum vim experimento comprobarent, se à Viperis morderi permittere solebant, quibus tamen dentes caninos & nocivos prius eximur assent.

Dentes noxii extra mandibulas superiores sibi sunt, versus anteriorem oris partem, non maxillis infixi ut reliqui. Duo extremi & amplissimi ossi cuidam affixi erant, quod (si detur ejusmodi in hoc Animal) Os petrosum seu Auris censeretur possit. Reliquos hujus generis dentes ossi alicui affixos esse observari non potui, sed musculis seu tendinibus ibidem dispositis. Dentes hi ore quamvis aperto non potuerunt discerni, cum sub membrana valida seu vagina reclinati latitarent, non ita tamen ut protuberantiam quandam insignem ad exterius latus minorum maxillarum dentium efficerent. Verum Serpens cum adhuc in vivis esset, eosdem pro libitu ad vulnerandum erigere potuit, non secus ac Felis aut Leo ungues. Dentes hi adunci erant, & B. biroussæ dentium modo infixi seu arcuati. Nonnulla enim notitia ad rectos angulos inflectebantur. Omnium figura & magnitudo ex iconibus quas eorum exhibuimus optime intelligi possunt. In omnibus hisce dentibus, præsertim majoribus, foramen satis amplum prope radicem observavimus, & prope mucronem fissuram longiusculam clare conspicuam, calami Scriptorii crebæ instar sectam. Pars autem Dentis à fissura ad radicem manifestè concava erat; quod gingivam digito leniter premendo primum comperimus, tum enim venenum per cavum dentis promptè ascendere & à fissura effluere conspeximus. Hoc multis vicibus experti sumus; experimentisque reperendis, & dentium hujus generis omnium inquisitioni diutius immorati tantum temporis consumpsimus, ut folliculos venenosum liquorem continentes, & glandulas eum separantes antequam exsiccarentur inquirere & examinare non potuimus. Verum noster hac in re defectus ex iis quæ D. Redi & D. Charas de partibus hisce in Vipera scripserunt facile suppleri potest: nec enim hoc respectu differentiam quæ alicujus sit momenti inter has duas species intercedere existimo. Liqueorem venenosum aquei coloris esse observavi, si v. leviter tincti (in nonnullis Serpentibus fortè saturatius) quod puto ineptæ illi opinioni imaginantium eum à cysti fellea medianibus quibusdam minui fissuris ductibus ad dentes derivari ansam aut de Populæ ministravit. Revera nulla ferè res in Philosophia pluribus controversiis vexata est quam Viperarum venenum, in quo consistat, quid sit, quomodo operetur & diros suos effectus producat. Severinus in Vipera Pythia satis amplam earum enumerationem & prolixum Catalogum exhibet, ad quem curiosum Lectorem remitto. Imprimis a. celebris est controversia, quæ non ita pridem inter D. Redi nobilem Italum, & D. Charas. G. illum agitata est. D. Redi affirmat Venenum aliud in Viperis non dari quam liquorem illum flavum, qui palatum humectat, & in vaginis dentes operientibus restagnet. Quod liquor iste ore tenus assumptus, & in Ventriculum degluti-

tus venenosus non est: verum vulneribus à Vipera dum adhuc vivit factis, isque quæ vel multis postquam mortua est diebus infligere cogitur; instillatus diutius tragedias excitat, & furens Symptomata inducit. Quod idem met liquor tam à Vipera mortua quam à viva exemptus si vulnere Animali infligto immittatur & sanguini commisceatur, semper venenosus & noxius est, etiam exsiccatus & in pulverem redactus. Quod omnis generis Animalia, quorum vulneribus instillatus fuerit enecat & exanimet.

D. Charas huic opinioni se strenuè opponit, & asserit Venenum Viperinum solis spiritibus irritatis & excandescentibus inhærere; liquorem a. seu succum illum flavum tam Vipera vivæ atque etiam irritatæ, quam recens aut etiam pridem mortuæ nihil omnino in se veneni aut noxii continere: siquidem gustu exploratus & deglutitus nec homini; nec Animalibus ullum inferat damnum, imò quod nec Serpentis ipsius morsu, nec incisionibus in carnem factis instillatus, isque optime affricatus, adeoque sanguini immixtus, ullam omnino noxam exhibet, nec Animal ullum perimit aut lædit, sed mera & innocens est saliva.

Pro confirmatione opinionis suæ uterque ad experimenta se facta provocat, quæ cum satis nota sunt hinc non repetam, neque controversiæ me immiscebo. Duntaxit addam, Quod cum D. Charas liquorem hunc meram salivam faciat, asserit quæ quod interserviat non tantum ligamenti humectandis ut facilius dentes moveant & inflectant, verum etiam ad dentes ipsos alendos & instaurandos, minus rectè sentire, & à scopo aberrare videtur; siquidem alius saliva in Animalibus usus est, aliud in corporis œconomia officium; nec dentibus nutriendis ullatenus idonea videtur: imò ipsorum dentium in hoc Animali structura D. Redi opinioni favet & patrocinatur. Cui enim (ut diximus) concavi sint, & prope extremum fissuram amplam obtineant, eosque succus hic adeo promptè & q. naturaliter permeet, hæc mihi arguere videntur, naturam ad alios eum usus quam nutritionem destinasse, aliàs enim tam expeditum transitum & largum ei quæ effluat orificium parando sine suo excideret & frustraretur. His addè, cum Dentes adeo acuti sint, ac prope mucrones firmi & solidi, fissura etiam externa seu convexa parte non interna exarata, quid convenientius potuit excogitari tum ad vulnus infligendum, tum ad venenum infundendum? Si enim fissura interiori sita fuisset, Animalis commossi se subducentis lucta obtuari & occludi periclitaretur, & veneni descensus & influxus impediri: verum hujusmodi conformatio ejus infusioni plurimum conducit. Sic Scorpius, Apis, Formica imò Urtica aculeus cum cutem compungunt, liquoris virulenti guttulam in vulnere relinquunt, quæ horrenda illa symptomata inducit, absque qua si esset, vulnus nullius momenti foret. Nam Francisc. Hernandez caninis hujus Serpentis in usus medicos servatis Mexicanos medicos collum cervicemque doloris capitis placandi causâ compungere scribit. Verum, ut credere fas est, prius diligenter emundatis, & à veneno probè repurgatis; quod aliàs, ut conjicio, multo potius quam spirituum excandescentia, nè dolores illos horrendos excitaret, periculum esset. At neque in Urtica ulla omnino spirituum irritatio aut furor concedi aut intelligi potest, quæ tamen non impunè tractatur, verum tangentis manû pungens tumores excitat, & dolores creat, quævis non adeo fatales & periculosos ac alia venena. Ignoscatur a. mihi D. Charas, si de innocentia hujus liquoris nondum planè persuasus ab ejus sententia abhorream. Ego sanè in corpore meo, ejus sanguini infusi vim & effectum nollem experiri, nec aliis ut experiantur Autor esse velim. Non leve momentum ad me in contraria sententia confirmandum contulit, quod

quod mihi nuper ab Amico quodam homine intelligente & multiscio narratum est. Nimirum cum in Indis esset Indigenam quendam, ad se & familiares aliquot qui una erant ingressum varia Serpentum genera secum attulisse, ut experimenta aliqua de eorundem differentiis, veneni respectu, presentibus ostenderet (quæ apud Indos vulgaris praxis est) Primum ergo Serpente grandiore prolato illum innocuum esse asseruit, & ut dictis fidem faceret, ligaturâ injectâ ut vocant brachio proprio constricto, quemadmodum in Venæsectione fieri solet, nudam cutem Serpenti, prius flagellato ut ad mordendum irritaretur, objecit: Sanguinem è vulneribus dentibus factis emanantem digitis collegit, & femori nudo imposuit, donec dimidium circiter cochlearis nactus esset. Deinde alium exemit minorem, *Cobras di Capelo* dictum, deque veneni ejus vehementia pluribus egit, & ut experimento rem comprobaret: cervice Serpentis artè constrictâ, liquoris in folliculis maxillariibus contenti circa dimidium (quantum conjectabatur spectatores) granum expressit, & sanguini coagulato supra femur imposuit, cui quamprimum admisceretur miram illico ebullitionem & effervescentiam excitavit fermenti modo agens, illumque in liquorem flavum immutavit; quod ab aliis etiam observatum novimus, quodque ad modum quo venenum isthoc operatur discernendum lucem aliquam fœnetatur; & celebrem illam observationem confirmat, nimirum Vipera morsum iterum inferre. Antidotum hujus veneni & remedium præsentaneum censetur lapis ille Serpentinus *la Pierre de Cobras di Capelo* Lusitanis dictus, & per totam Indiam famosissimus, *Garcia ab Horto*, *Kircher*, aliisque descriptus, speciatim a. & diligentissime *D. Redi* qui Relationes illas quas habemus, de insigni illius virtute & efficacia valde suspensus reddit. Nam in multis quæ cum eo fecit experimentis nullum unquam prosperum successum sortitus est; & quamvis *Kircher* in cane experienti, & *Carolo Magnini* Romæ in homine, aliter evenit, ambo enim evaserunt: D. tamen *Redi* successus hosce naturæ potius quam lapidis viribus imputat, quæ debili veneni vi strenuè obniti eamque vincere potuit. Et revera *Hippocr.* illud effatum, *Ἡ δὲ ὄψις φανερά*. Verissimum esse fatendum est; nec quicquam frequentius accidit quam ut Elencho non causæ pro causâ nobismet ipsis imponamus. Quod semper succedat non minùs denegandum puto quam quod semper fallat. Nam quod aliquando effectum promissum sortitur, exempla nonnulla ægrotorum hîc in Angliâ qui ex ejus usu levamen senserunt fidem nobis faciunt. Narratum est mihi à celebri medico *Londinensi*, quod hominis cujusdam prope istam urbem à Vipera commorssi manus & brachium subitè intumuerint cum ingenti dolore; quodque lapide applicito unius noctis spatio remitterit dolor, & resederit tumor, ægerque se valere existimans lapidem amovit firmiter adhuc adherentem; verum non ita multo post prioribus symptomatis cum ferocia redeuntibus & dolore recrudescente, ad Antidotum tanquam sacram Anchoram iterum confugere coactus est, lapidemque tandiu loco affecto adherere permisit donec sponte decideret, adeoque integrè sanatus est. Alterum commemorabo experimentum quod egomet ipse feci, in ægra quadam dolore podagrica medicamento laborante. Materia enim morbifica medicamento ope inde amota, digitum pedis invasit, cumque ægra doloris esset impatiens, nè nihil agere videret, & ad impediendum, nè multitudine medicamento- rum, quæ invistentium turba assidue suggererat, uteretur, adeoque humorem iterum ad ventriculum repelleret, Lapis hic commodum in mentem venit. Eum ergo in manu tenens, absque eo quod quicquam

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

ægræ dicerem, articulo illi ubi dolor maximè sæviebat propius admovi; cumque loco proximûs esset, sensum è manu mea elabi, & parti laboranti promptè adherere. Brevi famina mihi confessa est, se clarè sensisse attractionem quandam validam & veluti defluxum secundum crus & femur totum, doloremque illico mitigatum agnovit. In tumoribus pestilentialibus utilem esse posse verisimile est. *Ceterum Lapis hic res est factitia.*

Verum nimis longè ab argumento, nimirum *An-guis crotalophori* Anatome digressus sum; progrediôr jam ad *Sceleti* descriptionem, quam ut præcedentem prolixitatem brevitate sequenti compensem paucis absolvam.

Et primum, quod ad capitis ossa attinet, *Cranium* hîc integrum esse observavi absque suturis, ut in iconibus representatur; excepto duntaxat, quod alia quædam ossa ei adjuncta seu commissa essent, quemadmodum antrorsum supra nares officula duo, quibus affixæ fuere Cartilagine seu potius officula nares dividentia. Ossa capitis reliqua pro ingenti extensione & diductione maxillarum mirabiliter conformata videbantur, magna Naturæ solertia. Cum enim omnia quæ ei in alimentum cedunt integra deglutienda sint, ut antea diximus; caput a. parvum sit, absque artificiosissimo hoc mechanismo illud ut fieret omnino impossibile esset. Maxilla superior interius ossi illi adnectebatur quod dentem venenosum excipit, quodque amplam in se cavitatem habet foras apertam, quam initio ut dixi, pro Auris foramine habui, verum interius nullam nervo admittendo perforationem invenire potui, nisi fortè sub ossè quod illud cranio connectit aliqua delituerit. Articulatio hæc cum Canini dentis, qui nunc erigitur, nunc deprimitur, tum maxillæ ipsius motui comparata videtur. Verum quod præcipuè conducit, & maximum Animalis momentum confert ad corpora magna deglutienda, curiosa illa est maxillarum retrorsum cum cranio articulatio duorum ossium interveni- tur, quæ ob usum hunc (cum non aliud quo distinguantur nomen novimus) *maxillarum dilatatores* dicemus. Horum figura, magnitudo, & ad motum hunc obeundum, aptitudo ex figuræ intuitu ad oculum patecet, & facillè concipi poterit. Inferioris enim maxillæ ossa seu crura cum ad mentum conjuncta non sint, sed notabili intervallo à se mutuo distent, cum corpus seu ossa magna deglutienda venit, quemadmodum membrana cui affixa sunt facillè extenditur, ita (musculi Capitis) ossa duo prædicta elevando, & inter rectum ferè dirigendo rictum oris insigniter dilatant necesse est. Hac etiam de causa bina facta sunt, non unicum & simplex os, ad motum scilicet hunc facillè peragendum. Articulatio isthæ *Dilatatorum* dictorum cum superiore & inferiore maxilla perquam artificiosa protuberantias illas efficit, ob quas caput barbata sagittæ cuspidi assimilavimus; ut & Poeta ob eandem fortè rationem non minùs quam ob motus velocitatem.

*Rumpat & Serpens ita institutum,
Si per obliquum similis sagitta
Terruit mannos.*

Maxilla inferior utrinque è duobus ossibus componebatur, ut in iconè apparet, verum firmiter connexis. Os anterius dentibus minoribus excipiendis inservit, posterius versùs articulationem dilatatur, ut & superioris maxillæ pars ei hoc in loco opposita. Verum superior maxilla prope dentem exertum venenosum in duo ossa dividebatur, altero ossi illi cui dens caninus inseritur affixo; altero, quod dentes minores excipit, eidem interius commisso.

Zzz a Vertebrae

Vertebrae, pro corporis totius figura, versùs utrumque ejus extremum minores erant, media parte maxima. A cervice ad anum tot numerabantur quot in ventre squamæ, nimirum 168. Ab ano ad Crepitaculi insertionem squamas numero novendenario excedebant. Anteriores vertebrae spinam erectam compressam versùs dorsum habebant; gracilem, teretem, oblique descendente interius ad ventrem. Unicuique vertebrae præter spinas prædictas alii inerant processus ad costas articulandas.

Verùm præcipuè observabilis (ut antea innuimus) erat globulus ille seu tuberculum rotundum, & velut caput inferioris cujusque vertebrae, quod cavitatem ei excipiendo in inferiore parte proximè superioris paratam ingreditur, quemadmodum ossis femoris caput acetabulum ossis ichii; quo artificio, ut & articulatione mutua facultatem illam corporis pro libitù quaquaversum flexendi & circumvolvendi obtinent.

Costæ in collo breves, versùs medium corpus sensim longiores, ubi duos circiter digitos æquabant; versùs caudam iterum paulatim minuebantur, omnesque ad initium squamarum ventris terminabantur. In caudæ vertebra introrsum duæ erant spinæ, cum in reliquis una tantum esset. Ex iisdem etiam hoc in loco exhibant processus tenues costis analogæ.

Ultimæ caudæ vertebrae adnascbatur *Crepitaculum* è multis officulis compositum, quorum caudæ proximum plumbei coloris erat, reliqua cinerei. Officula hæc, describente *D. Grevio*, concava sunt, tenuia, dura, arida, adeoque valdè fragilia vitri ferè instar, & perquam sonora; omnia ejusdem proximè magnitudinis, figuræ autem prorsus similis, offi sacro humano simillimæ. Quamvis eorum ultimum tantum caudam rigidam seu epiphyisin adjunctam habere videatur, unumquodque tamen reverà parem obtinet, sed rectam, ita ut præcedentis cujusque cauda duorum proxime subsequenti cavum subeat; atque hoc artificio non solum mobiliter coherant, sed & sonum magis multiplicem reddunt, unoquoque officulo alia duo eodem tempore pulsante.

Usus hujus *Crepitaculi*, cum alium nesciam, quem assignat *Gulielmus Piso* ipsius verbis debo. Huic (inquit ille) tam pernicioso colubro, benigna Natura cautionis quasi gratiâ, *Crepitaculum* addidisse videtur, ut illius sonitu admonitus quilibet homo non solum, sed & quaecunque pecus vel jumentum tempestivè sibi caveat à vicino hoste. Verùm cur hujus extremitas in anum hominis immissa adeò funesta esset prout ille dicit, & vel Dentium veneno perniciosior rationem non video. Tum *Piso*, tum *Nierembergius* alique affirmant unum quotannis officulum *Crepitaculo* accrescere, ut ex numero articulorum numerus annorum Serpentis colligi possit. Nec quicquam nostra sententia huic assertioni adversatur, quod exinde sequeretur Serpentem hunc ad 16. vel etiam 20. annos vitam producere, cum observari fuerint nonnulli cum totidem hoc in *Crepitaculo* articulis. Quod etenim tot vel etiam plures annos durare possint frigida hæc Animalia nobis verisimillimum videtur, cum Testudines qui Serpentibus affines sunt 80. etiam annos supervixisse testes fide dignos habemus. *Crepitacula* hæc latitudine sua ad corpus perpendicularia sunt, non horizontaliter sita. Primum eorum officulum ultimæ caudæ vertebrae muscoli crassi eidem subjacentis, & membranarum illud cuti connectentium ope affixum est.

Descriptionem hanc Anatomicam partium hujus Serpentis internarum longè accuratissimam, & Auctore suo dignam, quæque plurima continet scitu jucundissima nil simagme, quamvis satis longam si modò longum dici debeat cui nihil est quod demere possis, Latinam facere non gravatus sum, partim ut extraneis Anglicè nescientibus gratificarer, partim quoniam reliquis hu-

jus generis i. e. *Viviparis Serpentibus*, paucis immutatis, accommodari possit, adeoque pro generali omnium descriptione inservire. Verùm cum coluber descriptus non fuerit, desideratur adhuc generationis processus partium, quæ ei in faminis ministrantium descriptio, quam ut eruditissimus Auctor ad complendam ejus historiam Anatomicam adicere dignetur exorandus est.

Antequam Serpentem *crotalophorum* dimittam, libet adducere memorabile imprimis experimentum à *D. Andrea Cleyero* relatum *Ephemer. German. Ann. 12.* Obierv. 7. quod praxin medicorum Mexicanorum superius memoratum, qui scilicet Caninis hujus Serpentis collum cervicemque doloris capitis placandi causâ compungere solent, satis periculosum esse arguit; *D. Charassi* etiam & *D. Redi* assertionibus & experimentis diametro repugnat.

Quod Serpentis (de ingenti illo *Urobubalum* integrum interdum deglutiente loquitur) vel ipsi dentes non penitus veneno careant, sequens casus confirmare mihi videtur. Cum ex tali Serpente eripio Sceletum conficere mihi animus esset, meique famuli carnes Serpentis aqua cum calce viva mixta in magno aheno excoquerent, accidit ut ministrantium quidam, caput Serpentis à carnibus coctione liberatum mundificare studens, fortè digitum aliquem ad mandibulam Serpentis, & ejus dentes majores acutos faucium redderet. Hinc tumor in ista manu ingens, cum inflammatione, febre continua, delirio, amentiaque paulò post subsequebatur, nec prius cessabant symptomata, quam Serpentinus lapis (quem Patres Jesuitæ hic componunt) vulneri adaptatus omne venenum extraheret, & reliqua Symptomata convenientibus Antidotis essent profligata. Ita ex sola dente Serpentis, & non vesicula quadam ejus hæc maligna accidere Symptomata, quoniam omnis mandibulæ caro decocto calcis vivæ erat eluta & à vesiculis liberata.

Cum experimentum hoc singulare sit, *D. autem Redii* sæpius repetita, quamvis Sententiam ejus paululum labefactet, non tamen planè convellit & refutat. Potuit fortasse particula aliqua liquoris venenosi vel digito compuncto vel denti Serpentinio adherere & vulneri inflicto se insinuare; vel alia aliqua subesse horum symptomatum causa nos adhuc latens.

BOIGUACU *Brasilianis* *Marcgr. Boignacii* sive *Jiboya Pison. Cobra de veado* Lusitanis. Serpentium omnium maximus est. Habuit *Marcgravius* unum 7½, alterum 8½ pedes *Rhylandicos* longum; *Piso* ex hoc genere quosdam 18. vel etiam 24. pedes longos reperiri scribit. Vidit *Marcgravius* qui integrum capream deglutiverat, unde *Boignacii* i. e. *Magnus Brasilianis* dicitur. Et *Piso Cobra de veado* Lusitanis dictum ait, quod *Dorcadæ* integras devoret, idque sugendo potius quàm masticando. Medio corpore crassissimus est, versùs caput & caudam sensim tenuior seu angustior. Tota pellis elegantissimè variegata est, nempe per medium dorsum secundum longitudinem catenâ quadam macularum nigrarum: Ad latera utrinque palmarum inter se distantes maculæ nigrae rotundæ ferè, in quarum centro alba macula itidem rotunda. Magnitudo macularum major Imperiali nummo. Inter hæc, attamen extra illarum ordinem, versùs ventrem iterum utrinque duæ series minorum macularum nigrarum discurrebant. Duplicem habet ordinem dentium acutissimorum in utraque maxilla, coloris splendide albi instar matris perlarum politæ. Caput latum & supra oculos in duo tubera elatum. Hujus generis quidam citra anum non procul ab extremitate caudæ duos breves unguis habebat quasi avium.

Famelicus hic Anguis (inquit *Piso*) vel ex dumentis profilit, caudæque suæ nitens, horrendè se erigit, & strenuè cum feris & hominibus luctatur, & libilatus, vel ex arbore infidicè in viatorem desilit, eumque validissimis cingit amplexibus, ut etiam interminat. Nec minùs validi atque feroces existunt duo ingentes illi *Arabo* & *Curucacu*, hominibus æque ac Capreis insidiantes.

Ictus horum vix censetur venenatus; carne autem, quæ albissima est tum Indigenæ & Nigritæ, tum nostrates vescuntur.

Hujusmodi *Serpens* etiam in India Orientali habetur, qui integrum *Urobubalum* deglutire dicitur, de quo postea ex *Ephem. German. An. 12. Observ. 7.* plura producemus.

CUCURUCU seu *CURUCUCU* *Marcgr. Pison.* Octo aut 9. (9. & interdum 12. *Pis.*) Pedes longus est, *Boicuringa* crassior; squamis quidem ut ille figuratus, sed flavescens, ac per dorsum maculis nigris grandibus variè variegatus; nimirum in toto flavo macula nigra est grandis, in nigro duæ flavæ, in quibus nigris etiam unica flava, & sic continuè. Maxime est venenatus & plurimum metuentus (inquit *Piso*) licet caro ejus præparata à Barbaris comedatur. Venenum ejus *Hæmorrhoi* modo operari dicitur; *Acubhyati Nierembergii* esse videtur.

IBIBOBOCA Brasiliens. *Cobra de Coral* Lusitanis, *Marcgr. Piso.* Duos pedes longus & pollicem ferè crassus est; versus posteriorem partem teres & acutus instar subulæ. Totus venter albus est & splendens. Caput squamulas habet albas, cubicas, ad oras nigras. Hinc cinnabria sequitur macula, cujus squamæ per oras nigra, & ita semper rubra macula est, hinc sequitur nigra, hinc alba, iterum nigra, hinc rubra & sic deinceps. Rubra macula plus uno digito est longa, duæ albæ & tres nigrae simul sumptæ sesquidigitum longæ, æquales inter se. Albarum maculatum oræ nigrae sunt. Morsus ejus venenatissimus est, tardè se promovet.

BOITJ APO Brasil. Lusitanis *Cobra de cipo*, *Marcgr. Piso.* 7. aut 8. pedes longus, vix brachium crassus: teres ac postica parte instar subulæ acuminatus, coloris olivacei, in ventre flavescens, squamulis elegantibus quasi triangulis vestitus; ranis victitans: maxime venenatus, veneno *Hæmorrhoi* modo pperante.

BOIOBI Brasil. *Cobra verde* Lusitanis *Piso* *Marcgr.* Ulnæ est longitudine & pollicis crassitie, coloris porracei & pulchrè micantis. Amplum his Os, & nigra lingua, ædificiis gaudet, neque ulli nocet, nisi irritanti: Morsus tamen illius venenatus est & exitialis. Summopere prodest radix nodosa herbæ *Caa-apia* confusa & ex aqua pota.

JARARACA *Pison.* Brevis est, raroque semicubiti longitudinem excedit, venis quibusdam in capite prominentibus instar viperarum, & haud aliter quàm illæ stridens: rubris & nigris maculis insignis, cæterum terreo coloris. Morsus ejus venenatus est. Ei præ cæteris convenit *Caasia*, quæ merito *Hervæ de Cobras* dicitur, quod foris & intus exhibita hujus aliorumque serpentum morsus faciliè restituat. *Jararacæ* autem quatuor species recenset & describit *Joan. de Laet.*

CANINANA *Pison.* Venter est flavo, dorso autem viridi, 8. circiter palmos longus: inter minùs venenatos habetur: ovis victitat & volucris: Capite & cauda refectis ab Afris & Americanis comeditur.

IBIRACO Brasiliens. *Pison.* *Serpens* est variegati coloris, albis, nigris, rubrisque maculis insignis. Ejus morsus est admodum venenosus, & pessima symptomata infert.

TAREIBOYA, & *CACABOYA*. Hi duo amphibii *Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.*

orum more modo in lacubus, modo in sicco degentes conspiciuntur, ac proinde *Hydri* vel *natrices* jure dici possunt, tametsi non æquè perniciosi ac nostri *Europæi* esse perhibeantur. Attri sunt prorsus, nec valde magni: Irritati nocent vulnusque facile curabile infligunt. Posterior lutei, est coloris (at utrosque attros esse jam dixit) 6. palmos longus, ruricolis potiùs extimescendus quòd gallinæ devotè, quàm quod homini lethale venenum inferat.

Præter descriptos quæ in habitato *Parnambuco* tractu frequentiores erant ædes & sylvas perreptantes, aliorum ad 10. usque numero nomina recenset *Piso*, nimirum, *Arabo*, *Boicupecanga*, *Boipeba*, *Curucacutunga*, *Gniupajaguara*, *Jacapecoaja*, *Manima*, *Vona*, *Amorepinima* cui inter pisces locum dedimus.

Alios insuper Serpentes Brasilianos ex Autore quodam Lusitano, *Lerio*, aliisque breviter describit *Joan. De Laet*, *Descript. Ind. Occident. lib. 15. cap. 6.* Iisunt

GIRAVPIAGARA, quasi dicas ovorum helluones, qui nigri sunt, oblongi, subflavo pectore, tam velociter supra arborum fastigia feruntur quasi in aquis natarent, & ibidem volucrum nidos depolantur.

GATTIE PVA, in regione *Rarim* tantummodo reperitur, ingenti mole & tam graviter olens: ut fætor illius nullatenus ab hominibus possit tolerari.

BOYNA, i. e. niger anguis, gracilis & oblongus, gravemque de se odorem spargens instar vulpecularum.

ROM, magnæ molis, à strepitu quem edit, ita dictus, cætera innocuus neque cuiquam infestus.

BOICUPECANGA, i. e. Anguis in tergo notulis quibusdam distinctus, multo est crassior, ejusque notæ supra modum virulentæ judicantur.

JARARACVCV, 10. interdum palmos longi: his Dentes sunt grandiusculi, quos morsuri digitum instar protrudunt, alioqui buccis tectos. (Hoc non est huic generi peculiare & proprium, sed Serpentibus omnibus commune.) Præcipuum in his vitus, humor crocei coloris, adeò potens, ut 24. horarum spatio hominem de medio tollat. Plures simul enituntur fœtus, nam & qui 13. utero servare exenteratum ferunt.

JARARA COATPITIVA, i. e. Anguis cujus cauda magis alba est quàm fusca tam venenatus quàm *Vipera Hispanica*, nec formâ multum differt aut color.

JARARA EPEBA, cui linea rubri coloris caetula instar supra dorsum & sub ventre discurret, cætera fuscus aut cinereus.

His ultimo in loco adicere libet Catalogum Serpentum Indicorum à Doctissimo & amicissimo Viro *D. Tanchredo Robinson*, M. D. acceptum quem ille in nostram gratiam & operis hujus supplementum & Museo *Leydensi* descripsit.

1. *Serpens Indicus Coronatus*, Diademate seu conispicillo insignitus, Lusitanis *COBRAS DE CAPELO* dictus *Garcia ab Horto*. Naia *Zeylan*. *Vipera Indica vittata gesticularia Catal. Mus. Ind.* *Vipera pileata quibusdam*: Animal ipsum postea vidit Amicus noster prædictus apud *D. Charleton*. Erat autem duos plus pedes longum, rostro oblongo, capite plano seu depresso, latissimo, cum ocularibus seu conspiciillis in summo, cujus oculi ad imam capitis partem se extendebant.

De *Quil* & *Quirpele* Animali huic Serpenti inimicissimo superius egimus sub *Viverra*:

De Lapide *Pierre de Cobra de Capello* dicto, qui veneni hujus Serpētis Antidotum est & remedium præsentaneū, in descriptione Anatomica *Anguis Crotalophoris* *D. Thevenot* peregrinator ille insignis lapides hosce artificiales esse ait, non desumptos è capite hujus Serpētis.

2. *Vipera Indica tricolor major*, *PALA PARIA Zeylonensis*, i. e. Serpens Amaranti tricoloris facie, sub terra degens.

3. *Vipera Zeylanica minor maculis fuscis holosericeis eleganter variegata*, *TUNUPOLO N Zeylonensis*, id est, arcuum & sagittarum more variegata.

4. *Serpens Indicus albis & luridis floribus inscriptus*, *MALKARABÆLA Zeylonensis*.

5. *Serpens Indicus gracilis viridis*, in arboretis & fruticibus degens, *ÆHETULLA Zeylonensis*, i. e. Oculis infectus. Idem ex viridi & albo variegatus, capite mucronato.

6. *Serpens Zeylanicus elegantissimis minatis stellulis decussatus*, *MALPOLON Zeylonensis*.

7. *Serpens Putorius*, D. yrius Gæfner Jonston.

8. *Serpens Indicus Bubalensis*, *ANACANDALA Zeylonensis*, id est Bubalorum aliorumque jumentorum membra conterens.

9. *Serpens Indicus Saxatilis*, lineis per transversum albicantibus inscriptus, *GHALGHULOWA Zeylonensis*.

10. *Serpens Indicus caninus spadiceus* cum maculis albicantibus, *MANBALLA Zeylonensis*, id est, Canum more prætereuntes invadens.

11. *Serpens Indicus ex fusco nigricans cum maculis albicantibus*, *NINTIPO LONGA Zeylonensis*, i. e. Somnum lethalem morfu inducens, *Serpens hypnoticus*.

12. *Serpens Indicus Arundinaceus*, *WEPOLON Zeylonensis*, i. e. faciem Arundinis Indicæ Rotæque dictæ præ se ferens.

13. *Serpens fluviatilis Surinamensis*, variis characteribus Orientalibus inscriptus.

14. *Serpens Indicus spadiceus sagittatus*, ad cervicem & dorsum maculis sagittiformibus inscriptus.

15. *Serpens Indicus Putorius gryseo luteus*, *HOTAMBÆLA Zeylonensis*. Hæc D. Tancredus Robinson è Museo Egregii Viri P. Hermanni.

Fortè horum nonnulli cum Brasiliensium aliquibus specie conveniunt: quod nisi Animalia ipsa inter se, vel descriptiones eorum accuratas conferendo nequit determinari.

De octavo genere merentur legi quæ D. Cleyerus in *Ephemer. German.* Anno 12. Observ. 7. cui Titulus *De Serpente magno India Orientalis Urobæalum deglutiente* narrat, cui longitudo plusquam 25. pedum. Hoc genus Serpentes quamvis ob apparentem faucium angustiam minime videantur Animalia deglutire posse, id tamen verum esse experientia confirmat. E cujusdam dissecti ventriculo extractum vidit (Cleyerus ipse) Cervum mediæ ætatis integrum cum omnibus partibus: ex alterius sylvestrem caprum magnis præditum cornibus pariter integrum; è tertii Hystricem cum aculeis. In Ambona Moluccarum insula (inquit) quondam mulier integra gravida à Serpente infecta fuit. Fame utique maceratus Serpens, quibuscunque animalibus, quæ saltu petere & morfu apprehendere valet insidiatur. Captum hoc modo Animal à Serpente cauda & reliquo corpore circumligatur, atque adeò stricte vincitur, ut vel ipsa in corpore Animalis ossa frangantur & comminantur. Quod si Animal quoddam robustius renitatur, ut spiritus sanguinis enecari non possit, serpens crebris cum Animalis convolutionibus, cauda sua proximam arborem in auxilium & robur corporis arripit, eumque circumdat, quod eò fortius & valentius gyris suis Animal comprimere, suffocare & demum enecare possit. Ad hoc facinus morfu simul prehendit Animalis nares, quod spiritum non tantum intercludat, sed & Sanguinem ex iis ad internecionem usque eliciat. Sequitur deinde Historia Urobæ-

bali hoc modo deglutiti, in quo præcipuè notabile quod fragor ossium comminutorum ad distantiam jactus tormenti belliei majoris exaudiretur. Tum deglutitionis modum enarrat. Serpens (inquit) qui gulam & fauces contractas quidem, sed ultra modum extensibiles habet, cum animal præfato modo occidit, atque ossa ejus minutissimè confregit, adeo ut cadaver tanquam rude Chaos jaceat, linguam ad prius extendit, deinde spuito suo virulento illud ad deglutendum aptum fingit disponit & secundum pilos lambendo lævigat, ut cadaver è longinquo glutine obductum resplendeat, & sic aptum ad forbendum videatur. Quo facto incipit Serpens ritu suo cadaveris caput apprehendere, & suctu fortiore quasi absorbere, donec animal interemptum cum omnibus suis partibus paulatim in ventrem secesserit. Hac actone juxta cadaveris molem Serpens quandoque ultra biduum insumit. Postquam cadaver igitur tali insuctu in Serpentis ingluviem secessit, inibique tanquam sepultum est, Serpens tali crapula insigniter turgidus, adeò invalidus redditur, ut nec pugnare amplius nec aufugere, nec movere se de loco suo valeat. Hinc fit ut à rusticis sive ejus loci venatoribus, solo recte circa collum adstricto Serpens tuto stranguletur, & non raro fustibus occidatur. Interemptus ita Serpens in frustra & partes secatur, caroque ejus pro cibo gratissimo venditur.

NATRIX torquata, *The common Snake*. Descriptio quæ apud Ambrosinum occurrit ad iconem ad vivum delineatam facta vulgari nostro angui satis bene convenit. Circa caput & collum tenuis est, crassior circa ventrem, postea in caudam admodum exilem finit. Color tergi nigricat, (aut ferreus est) circa alvum inter luteum & viridem medius, lineis nigris virgatus. Hujus autem nota insignis est in collo; nam maculæ candicantes è pallido instat torquis, circulum tamen non absolventis apparent. Inter utrasque maculas in summo cervicis angustum est interstitium, duarum forma squamularum, ubi maculæ utrinque quasi triangulari figura in acutum desinunt. Deinde maculæ nigræ splendide utrinque etiam post torquem singulæ conspiciuntur. Adde multò longiorem esse Vipera, & in duplo nonnunquam majorem calitatem excrecere. Ova in utero minime fovet & excludit, aut vivos foetus in lucem edit, Vipera modo, sed ovorum elenchum in Sterquilinio seu fimo deponit, ubi calore fimi solis incubantis radiis tepescit foetus perficiunt & excludunt.

Frequens est in dumetis & locis uliginosis; & per hyemem in foraminibus ad radices arborum veulatarum, vel in aggeribus sepium torpidus ferè laritat. Vix veneni aliquid habere deprehenditur, siquidem manibus tractant, & in sinu gestant multi sine incommodo, ut rectè *Wormius*.

Wormius graminibus, insectis, & obviis quibusvis vesci ait: mures etiam prædatur, non minùs quam vipera.

Mensis Octobris Anni 1692. initio hujus generis Serpentem nactus eum plenius descripsi, Dorsum coloris erat nigricantis seu terrei: Venter seu pars prona varia ex albo cœrulescente & nigro, prope caput tota fere alba, paucis duntaxat ad latera maculis nigris adjectis, inferius sensim maculæ & lineæ nigræ plures majoresque ad anum usque & ultimam caudam, ubi totæ ferè squamæ ventrales nigræ sunt, utraque tantum extremitate albo cœrulea. Ventrem totum transversæ squamæ simplices longæ velut parallelogrammæ obtegunt; unde squamarum harum cum squamis parvis commissuram pro communi limite dorsum & ventrem determinante habeo: & in his tantum colores quos diximus inherant. Dorsum, hoc est, partis supinæ, quous-

que squamæ parvæ extenduntur, color sordide terreus aut nigricans, verum nigris lineolis, varius, è quibus insigniores sunt in utroque latere transversæ à commissura ventris & dorsi, seu à squamis illis quibus venter integitur extremis utrinque inchoatæ, & versus medium dorsum ascendentes, longitudine semunciali aut majore, distantia duarum triumve squamarum minorum. Numerus harum linearum in utrolibet latere 80. excedit. Præter has lineas majores & longiusculas, duæ insuper minorum macularum nigrarum linearium ordines in quolibet latere superius prope medium dorsum à capite ad caudam decurrebant, non tamen valde conspicui. Caput summum squamis amplis reliquo corpore obscurioribus tangebatur. Maxilla superior ad latera utrinque albicabat, quinque aut sex lineis nigris perpendicularibus distincta. Maculam utrinque ad cervicis latera seu maxillarum angulos habuit pro torque albo-luteato: cui basi sua infidebat macula hinc inde triangularis nigra ampla, vertice caudam respiciente.

In maxillis dentes caninos seu longos incurvos acutos qui venenem morfu vulnere inflicto instillant, nullos habuit, sed, duotaxat duos dentium minorum ferratorum ordines in utraque; unde Serpentem hunc innoxium esse, & impune tractari posse minime dubito.

Rictus oris ut & Oesophagus amplissimus est, ut mures integros & fortè etiam majora animalia ab eo deglutiiri posse mirum non sit.

Viscera omnia & intestina eodem fere modo se habent quo in Angue Crotalophoro superius descripto. *Ramus in Mantissa ad Synopsin Histor. Quadrupedum.*

OFFICIN. ex SERPENTE in specie sic dicto.

1. *Integri combusti*, Caro, Cor, Ossa. 2. *Pinguedo*. 3. *Exuvia*. 4. *Fel*.

Vires. 1. *Integri combusti*, (pulvis serpentum.) siliet caro, cor, ossa ac epar, vim habent alexiteriam, sudoriferam, (non venenatam.)

Ususq; præcipui sunt intrinsecus in omnibus morbis venenatis ac malignis, quales sunt: pestis, febris petechialis, lepra & similes: Quinimò & phthysicos & lue Venerea laborantes, viperarum præcipuè usu juvari, seu secretum venditat Cædanius. Si scilicet caro cocta comedatur, jus bibatur, pinguedoque spinæ & juncturis illinatur. Nec est, quod usum serpentum internum adeo formides, exenteratam enim ac decoratam carnem, abjectis tamen felle, cauda & interaneis, loco cibi assumere licet.

N. 1. *Caput abjicitur*, quia maximè venenosum est, adeo ut dentibus solis vim suam malignam exerant. Cauda negligitur non quod venenata sit, sed quia ex ossibus tantummodo constet. Vesica fellea rejicitur, quia proxima est lacuna materia venenata, quæ inde duobus meatibus ad dentium vesicæ, seu gingivæ defertur, in quibus scilicet spirituosior ac efficacior illa fit, adeo ut si quis dentibus vipera etiam jam dudum interemta pungatur, veneno inficiatur, secus ac de felle constat, quod recentia canes moriuntur, siccat sine noxa vescuntur. Interanea non adhibemus ob stercora vel ova adherentia, aliàs tamen his rejectis, sine noxa usui esse possunt.

N. 2. Si placuerit corda ac Epata seorsim servare, secundum nonnullis *Thesaurum Medicum* obtines preiosissimum. Verum me hercle, si quicquam peculiare à carne & ossibus, quantum vires attinet, tibi inde persuasum habeas falleris. Falleris itidem, si (quod communis fert opinio,) deglutatione pulveris serpentis, (vel & cordium recenter extractorum atque adhuc sese moventium) ab ictibus serpentum tutum te imagineris. Experto crede.

2. *Pinguedo emollic* strumas, oculorum rubedini & maculis medetur, vitum acuit, podagricos dolores mitigat.

3. *Exuvia partum* facilitare creduntur; (*ventri vel lumbis alligata*,) odontalgiamque (ingargaritis) mitigare, impetigines curant; (*pulverisata vel incinerata & imposita*;) alopecis medentur, ac pilos nasci faciunt (*illita*.)

4. *Fel* ictibus serpentum impositum, venenositatem in se allicit, idem & de capite imposito affirmant.

[Jecur exiccatum cum aqua cinamomi ad partus difficultatem propinatur.]

Preparata.

[Sal volatile [vertebrarum spinæ præcipuè] ad arthritidem vagam utile: Parari etiam potest oleum s. liquor.]

1. *Pulvis.*

Pulveres serpentum tot compositionum circumferuntur, ut Agyria ferè quisque peculiare sibi quippiam imaginetur. At quid opus est compositione, nec enim corrigi serpentes exenterati opus habent, nec stimulari, sat est fortis eorum vis, sat tuta carnosa ac ossea substantia, (Cor, Epar, Lingua, Caro, Ossa, nupote qua minime venenata) integer itidem si comburatur, venenatam exhalat naturam, (mallem tamen carum rejectis), nihilominus tamen adscribam unum atque alterum.

Bezoarticum animale simplex.

1. *¶ Serpentem* excoriatum, (rejectis interaneis; cauda ac capite) lava & exicca, hinc pulverisa, unà cum spinæ vertebriis, pulverem serva pro usu.

Dosis à ʒss. ad ʒj.

N. *Exiccatio vel per se in aëre peragi potest, vel in MB.*

2. *¶ Serpentes vivos*, non exenteratos aut excoriatos, conjice in ollam ac tege operculo, torrequè ad ignem lentum, ut omnis pinguedo & humiditas consumatur, (*absque combustione tamen*) postea redigantur in pulverem.

N. *Præfero priorem, quippe metus ne venenosa partes sufficienter exhalarint.*

Ex hoc fit

Bezoarticum animale compositum.

¶ Pulv. serpentum ʒij. Rad. Valerian. Angelicæ Pimpin. Herb. Rutæ ana ʒj. M. F. Pulvis.

Dosis à ʒj. ad ʒij. vel ultra.

N. 1. *Solus pulvis colubrinus valet adversus araneas vivas & Auripigmentum, non verò ad pestem curandam experimento Pintzeri lib. de peste p. 195.*

N. 2. *Ex carne sicca extrahitur Tinctura ad V. aut quidem melius cum Juniperi. Vide Quercetani & Fab. Myrothec. Schröderus.*

Serpens.) Præstant collecti initio Veris, cum senectate deponunt; Non desunt, qui hoc ab interno principio oriri negant, statuentes sordes potius, quam pellem detrahi, teste Grevino de venen. libr. 1. cap. 3. Vossius de idolol. libr. 4. cap. 53. Verum hos tedarguit ipsa autoptica experientia, vera enim datur in his novæ cutis genitura, dum serpentes sese inter duos lapides aut aliud simile sese exuere solent, & ab oculis primùm detrahete exuvias intra 24. hora absolvi cure nova subitus renascente Locatelli Mediolanens. in theat. arcan. p. 277. Olavius Wormius in Museo. Causa est alimentum balsamicum, quod veris tempore elevatum ad se trahunt, quo satis refecti & instaurati non solum vim acquirunt & facultatem spolia sua stato tempore exuendi, seque renovandi, sed ob exuberans illud balsamum instar Medicinæ universalis ad corpus quavis ex parte vitiosum

tiosum emundandum & alexiteria vi balsami hujus copia præsentissima debellandi venena. Inde ex mente *Grembs Arbor hominis. Libr. 1. cap. 7. thes. 8. §. 52. Helmont.* Serpens continet remedium pro balsamo mortis & putat Diabolura; ut lateret Adamum remedium in Serpente aperuisse; ut sicut Mors per serpentem intrarit, per serpentem vindicaretur. Ob hoc balsamum etiam serpentes innoxie comeduntur, ut frustra illis energiam salutiferam adimat *Julius Caesar Benedictus lib. 10. Ep. 7. Præter Plinium Libr. 6. cap. 29. Celsum Libr. V. Cap. 36. Et Jul. Caesar. Scaliger. exerc. 189. sect. 4. refert Borellus Libr. 2. obs. 37.* Locum à Castro in Gallis quatuor Leucis distantem esse Bastida vocatum propè Sanctum Amanitium; in quo rustici Serpentes innoxie comedant, eosque viatoribus comedendos sub anguillarum terrestrium nomine apponere, caudam saltem & caput amputantes; reliquum comedentes, quod mirè sapiat palato, nec ex eo pabulo ullum ægrotare. Ob hanc balsamicam vim Serpentes & vipera à Magnatibus ad usum expetuntur. Modum saginandi gallinas cum serpentibus vel viperis *vid. in Cl. Zvelfer. Pharmacop. reform.*

Vulgare Serpentis genus intelligimus, à Ceciliis, viperis &c. distinctum &c. Inter Serpentes & vipers ratione virtutis & modi operationis nulla est differentia. *Nostri enim Serpentes* roborant æquè Naturam ac veneri & impotentibus subsidio sunt, turgentis & luxuriantes in corpore humores compescunt; malignos corrigunt. Leprosos mundant, ac virtutem alexiteriam sibi vendicant, unde & ex illis eadem depromi possunt medicamenta, quæ ex viperis. Et licet morsus viperarum reliquis perniciosior sit serpentibus, tamen hoc non fit ratione aut qualitate veneni, quod viulento fomite transplantatur, sed sola ira imagine, ex qua venenum, non tamen sine materiali liquore, cui ceu vehiculo idea impressa quem dentibus longioribus tricuspidibus, quam in reliquis serpentibus, sigillant ac imprimunt, consistit.

Non statim ab egressu è latebris Hybernis. initio scilicet Veris, ut supra monuimus, nec refert, utrum masculi sumantur, an fæminæ, modò ex montanis & locis salubrioribus, non verò paludosis insalubribus fuerint.

N. Serpentes in Provincia Sinensi Quamsi, uti *Atlas Sinicus* dicit, adè ingentis longitudinis reptantur, ut nonnulli eorum decem perticas æquent, id est, triginta pedes Geometricos, quibus si grossities respondeat, vix majores dari, existimare quis posset. Idem testatur *Flora Sinensis.* Gentò, inquit, hoc enim Serpentis nomen est; Serpentum omnium in Quamsi in Haynan insula, in Quantus facillè maximus reperitur, cervos integros exsugendo & diminuendo devorat, non adè venenosus, colore cineritio variegatus, longum 18. aut etiam 24. pedum, famelicus ex dumeris proflit, caudæ innixus in altum se erigit, & cum feris æquè atque hominibus acriter luctatur, subinde ex arbore insidiosè in hominem insilit, & complexu interimit. Felillius contra oculorum affectus Sinis est pretiosum. Idem testatur *Marcus Paulus Venetus de Provincia Caralam Magno Tartarorum Chamò subiecta.* it. Philippus Pigafetta in Regni Congi descriptione Autore Johanne Fabro Linceo in expositione novæ Hispaniæ animalium Nardi Antonii Recchi. Verùm relatu & auditu hæc jucunda quidem, sed creditu difficilia: nisi in regno Congi minores sint cervi nostris Europæis, ut videmus in gallis gallinaceis Indiæ Orientalis, longè minoribus nostris.

Officina. 1. Integri combusti Caro, Cor, ossa. 2. Pinguedo. 3. Exuvie. 4. Fel.

1. *Integri combusti.* Hi parum habent virium; omni virtute Medicinali per vulcani inclementiam spoliati. Vide infra de præparat.

Scul. Caro, Cor, Ossa, ac Epar. &c. In dysenteria maligna nihil præstantius est pulvere cordis & epatis serpentum adjectis saniculæ rubræ alpinæ radicibus.

N. *Caput abjicitur &c.* Verùm si serpentes aut viperæ integre in vino extincto leprosos restituunt, *iste Galeno, & fæminæ quædam Nobiliores Anglica* de vino tali viperino, quasi interno cosmetico ad corporis pulchritudinem & formositatem comparandam absque ullo damno & sanitatis detrimento bibunt, corrueat etiam assertio de nonnullis viperarum partibus abjiciendis id quod experiri etiam possumus, si canibus & felibus caput & fel devoranda pro jecerimus, sique ea absque ullo vitæ discrimine consumpserint, adè ut in Mortu non excluso liquore imagine iræ veneno mortifero imbuto illarum venenum consistat juxta *Cl. Helmontium.*

Vesica fellea rejicitur, quia proxima est lacuna materiæ venenata. Verùm hoc non est probabile; Fel enim non solum est alexipharmacum, sed & contra partus difficultatem notabili cum effectu propinari certò constat. Inprimis si jejur exsiccatum addatur, in aqua cinamomi mirè erit efficacia.

Thesaurum Medicum obtines. Multi viri Principes & Magnates Corda vitæ ex serpentibus recentè occisis excerpta devorant, ut ætatis progressu venenorum sint certa antidota, philtorum etiam & incantamenti expertissimum remedium, id quod & ipse *Zvelfer* approbat, dum Aquas pretiosas, quæ ex vivis animalibus destillationis beneficio eliciuntur, secum perpendit in *Pharmacop. Regia.* Alia ratio est de pulvere Serpentum intus sumpto tanquam prophylactico, cujus effectus experientia non satisfacit. *vid. in Animadvers. ad P. A. p. 273.*

Pinguedo. oculorum exulcerationibus medetur, item ad scabies pertinaciores, luem veneream & Leporam facit, *P. Borellus centur. 2. observ. 37.*

N. Serpens si filo suspendatur & suffocetur, funiculus ille in angina & apostematibus faucium valet.

N. Theriaca à serpente deglutita ipsi non nocet, sed vegetiorem facit, Tabacum autem ei adversatur.

N. Nec hoc loco silentio prætereamus Lapidem illum serpentinum, quem Lusitani *La Piedra della Cobra* vocant; Hic à Brachmanibus inventus est, & est partim naturalis in serpente concretus, quem Lusitani *Cobra de Capelo*, id est, serpentem seu colubrum pilosum vocant partim artificiales, ex variis venenosorum animalium potissimum hujus Colubri pilosi portionibus confectus, qui Lapis solis intoxicatis antidotum præstat tempestivè adhibitum, remedium ferè toti Chinæ, nec non Indiæ usitatum. Et sanè non credidissem, inquit *Antor China Illustrata* p. 80. nisi, dum hæc scribo, experimentum Lapidis fecissem in cane à vipera morso; hic enim Lapis vulnere à vipera cani inflictò mox appositus, protinus ita agglutinabatur, ut vix amplius distrahì posset, manitque tamdiu affixus vulnere, donec exsucto omni veneno hircudinis ad instar jam satur sponte sua decideret; quo peracto canis paulatim jam liber à veneno, etsi aliquando tempore torpidus, ad seipsum tandem rediit, pristinae sanitati propediem restitutus. Hoc eodem tempore eximius Physiologus Carolus Magnus Romanus in homine quoque à vipera morso hujus rei summa effectus felicitate experimentum ad veritatem explorandam sumsit. Lapis verò intra lac conjectus, omni mox veneno deposito, suo nitore, non dicam victoris attractivæ robore diminutus, sed & eo auctus redditur, lacte in flavo viridem colorem ob veneni vim degenerante.

N. Cobra de Capelo, id est, Serpens capillatus vocatur, non quod pilis capilli que instructus sit, sed quod in superiori capitis parte habeat veluti tegmen quoddam ad instar pilei plani, quod & prout concitatur, surgit versatile. Refert P. Sebastianus d'Almeida ex India Romam advēna, hujusmodi Serpentes per totam Indiam passim reperiri, qui verò Lapidēs *Cobra de Caprelos ditos* intra se generant, non nisi in Dienſi territorio reperiri. *Hac Flora Sinensis p. 204.*

Preparata.

i. Pulvis &c.) Rec. serpentes exenteratos abstrahē per MB humiditatem, quæ tamen non ut inutilis rejicienda, dum in oculorum affectibus mira præstat, & scabie. Hujus pulveris cape partem unam, adde parum fl. Sulphuris & myrrhæ, item ol. d. angelicæ. & rut. partem unam cum ol. d. Cinamom. & Ligni Rhodii. q. f.

N. Magisterium spinarum serpentum vel viperarum in arthritide vaga maximè commendatur.

N. Ex serpentibus æquè ac ex aliis animalibus Sal volatile, item liquor & oleum per destill. acquiruntur vid. infra de Viperis plura. *Hofmannus.*

SERPENTARIA, vid. *Dracontium.*

SERPENTARIA VIRGINIANA, vid. *Viperiana Virginiana.*

SERPILLUM.

Serpillum ἀπὸ τῆς ἔρπειν à serpendo dictum est, quia aliqua ejus particula terram tangente radices ab ea dimittuntur, ut autem Serpo à Græco ἔρπω, ita serpillum ab ἔρπουλον spiritu aspero in S. mutato, ut in aliis multis v. g. ἔξ. sex, ἑπτὰ septem, ἑδ. sedes, ἰδρὸς sudor, ὑπὸ sub, ὑπὲρ super, ὕλη sylvā, ὅς sus, ὅμις semi, ὅλκος sulcus, ἔ. se, ἄλς sal, ἄλμου salio, &c.

Serpillum à Thymo differt quòd humilius sit & minus fruticosum, & ut nomen indicat ramulis procumbentibus serpat.

Nomina. Serpillum vulgare *ger. I. B.* vulgare minus *Park I. B.*

J. B. Tam Græco, quàm Latino hujus nomini originem dederunt serpentes ramuli, duri, lignosi, quadrati, subrubentes, modicè hirsuti, qui ubi terram attingunt novas subinde radices agunt: primæ autem lignosæ sunt, satis crassæ & frequentes, fuscæ, plurimis fibris capillatæ. Ad ramulorum nodos folia Thymi vulgaris latiora, subrotunda, nervosa, sapore acri & aromatico. Flores in capitulis Thymi, interdum candidi, plerumque tamen purpurascētes.

Ejus duplex habetur genus. Primò flos est media parte minor, apice in mediò interdum bifido, colore ut plurimum purpurascēte: folia ut sequentis, odore nonnihil ad melissam accedente. Secundo flos major duplo, in mediò quinque apices, color remissior & minus purpurascēns: in foliis non differt à præcedente, nisi odore, qui nobis suavior videtur. Utraque hæc varietas apud nos passim habetur.

Est nobis præterea genus aliquod foliis & caulibus præcedentibus simile, sed hirsutum valde.

Serpilli summitates non raro degenerant in capitula tomentacea, candicantia, quæ (inquit J. Bauhinus) florum loco sunt; imò insectorum matrices sunt. Summitates enim hujus herbæ ab insectis quibusdam compunctæ hoc modo degenerant, & vermiculis domicilia & esca fiunt. De his plantarum excrescentiis seu fructibus ut vocant spuris & excrementitiis Consule Excellentiss. Marcelli Malpighii anatomes plantarum partem alteram.

In Montosis & pascuis ficcioribus, inque formicarum tumulis ubique ferè terrarum abundat hæc planta.

Serpillum aureum sive Versicolor Parkinsoni non alia in re à vulgari serpillò differt quàm foliorum colore ex aureo & viridi mixto seu variegato; qui arte inducitur, ut in hyssopo, rosmarino, aliis.

Serpillum ut facie sic viribus cum Thymo convenire videtur: estque inter calidas siccatque herbas quæ urinam & menses movent. Cephalica est (inquit Schroderus) uterina & stomachica. Usus præcip. in menses ac urina ciendis, in expunctione sanguinis, spasmò, &c. extrinsecus arcet vigilias, cephalalgias, Vertigines. Ciet menses (balneo.)

Vulgus decoctum serpylli dum Erysipelate infestatur, bibit calidum, unde sudor proriteretur, quo epoto sæpe valetudo meliorescere solet. S. Paulus.

Balsamo serpylli auspiciato vertiginosos à vertigine præservamus, Idem.

Paracello in catarrhis palmarium remedium est, aqua serpylli cum sp. vini chymice elicito, D. Soame è Dol. l. i. c. 10. S. 8.

Loquelam Apoplectico postliminio restitutam serpylli spiritu vidimus. Idem ex eodem. *Ramus.*

SERRATULA.

Nomina. Serratula *I. B. C. B.* purpurea *Ger.* Vulgaris flore purpureo *Park.*

J. B. Caule recto, rigido, striato, glabro, rubente ad cubitos duos attollitur, qui eis immoitatē in ramos multos finditur. Folia albis integra, Betonica paria, alias scabiosæ instar laciniata, utraque atroviorentia, glabra, arguto spinulatum mirum agmine serrata. Capitula crebra extremis furculis insident, oblonga, squarrosa, atro-rubentia, è quibus flores emicant Jaceæ nigrae, purpurei aut carnei coloris. Cæterum flores è plurimis flosculis aggregatis componuntur; quorum unusquisque suo insidet semini: suntque omnes, tam marginales quàm mediæ, ejusdem magnitudinis & figuræ. Radicum fibræ majusculæ, sapore sub-amaro, tandem & eo quem Cyanus manu exhibet.

Julio Mense floret, estque in sylvis & ratis frequens.

Datur utiliter potanda ex albo meraco ruptis & ab alto devolutis. Idem præstat radix pulverisata & ʒj. pondere in vino calidè pota: in vino decocta, ac deinde illita ulcera mirifice mundat, carne replet, & cicatrice obducit; hæmorrhoidum quoque dolores mulcet foru adhibita. Folia & radix simul contusa & imposita vulnèra & enterocelas sanare creduntur, Matth.

Serratula à foliis minutim circumquaque incisis & serratis nomen obtinuit. Parvitate sua præcipuè à centaurio majore differt, cum quo foliorum ambitu serrato convenit.

Serratulæ affinis capitulo Baccharidis, flore Traachelii, Hort. Lugd. Bat. *Ramus.*

SERUM LACTIS.

De eo vid. abundè sub titulo LAC: Hic tantum aliquæ ejus præparationes, seu exinde confectæ compositiones ex Pharm. *Bateana.*

Serum Aluminatum.

ʒj. O ʒiij. lact. *Hiv. coq. parum, ut f. Serum. adde sacch. ʒiv. clarific. cum album. ovorum, f. a. Si velis Emeticum, coq. O ʒiij. in lactis ʒviij. ut f. Serum, ante parox. febrilem sumendum.*

Serum

Serum Hepaticum.

℞. Fol. fumar. cichor. endiv. ā. mīj. hepatic. mīj. agrimon. acetos. ling. cerv. borrag. buglos ā. mī. sem. carvi ʒi. contusis affunde seri lactis ℥iij. f. expres. adde sacch. alb. ʒiij. clarific. f. a. D. ℥i. bis indies.

Serum Scorbaticum.

℞. Fol. cichor. acetos. ā. mīj. abiet. mvi. cochlear. nasturt. aquat. ā. mīv. sem. coriandr. ʒij. contusis adde succ. aurant. ʒiv. Seri lactis ℥v. sacch. alb. ʒij. clarific. f. a. D. ℥i. bis indies.

Serum de Sedo.

℞. Succ. sedi major. ℥i. lactis ℥iij. coq. ut f. Serum f. a. D. ℥i. vel ℥iij. indies. Usus præcip. in febribus biliosis; sedat firim, compescit ardorem, &c.

Serum Sinapinum.

℞. Lactis ℥iij. calefact. adde Mustard. rec. fact. cochl. ij. ut f. Serum clarum; quod coietur prout vice. Remedium singulare in Tussi, Asthmate &c. Bibatur hora somni & mane in lecto calidè per dies 3. vel 4.

S E S A M U M.

Sesami nomen inditum videtur *Σάμη* τὸ ὀνόμα. quod quandoque *σάμω* denotat; concutio, impello & ἀπὸ αὐτοῦ meto, quod subito & quasi impetu ad messem propelleretur. Potius nomen exoticum est, ab Ægyptiis sumptum, quibus *Sempsem* dicitur, J. Bod.

Nomina. *Sesamum* I. B. C. B. Park. & aliorum Lusitanis *girgelim*, an *gangila* sive *Sesamum Africanum* Pisoni & Marcegrav.

J. B. Vesling. Per caulem cubitalem, rectum, firmum, crassum & pinguem folia habet semuncialibus pediculis hærentia, crassiuscula ex atro-virore nonnihil rubentia, oblonga, acuminata (inferiora latiora & profundioribus inciluris serrata, superiora integris oris angustius patentia Vesling.) è quorum alis flores emicant Calathi forma, oblongi, magnitudine eximia, Monopetali, reflexis labellis, intus albi, exterius violæ colorem induti, tenuique respersi lanugine: Siliquæ rectæ secundum caulem ascendentes non quaternis tantum, sed etiam quinis senisque lateribus angulolæ, stellatum occupant calicem, oblongum illud: compressum, pingue, flavescensque semen inclusum custodientes.

Vires. Ægyptiis tum in cibo, tum in medicamentis usitatisimum est, quod cum reliquis frugibus, postquam arentes campos, suis scatebris temperavit Nilus, celeri proventu surgens siliqua minime fallaci cultorem suum locupletat. Parkinsonus, nescio quo autore, *Sesamum* in India Orientali sponte nasci ait, in Ægypto, Syria, Græcia, Creta, Sicilia, in agris duntaxat, feri & coli.

Oleum seminibus expressum, *زيت السمسم* *Zeidtaib*, i.e. oleum bonum Arabes nuncupant, quod ad cibos in frequentissimo usu est, majorique pretio quam olivarum oleum in Ægypto venditur.

Marggravius radicem teneram, rectam, multis filamentis præditam, exterius ruffam, interius albam huic plantæ attribuit, si modo eandem plantam describit.

Plantam hanc non esse verum antiquorum *Sesamum* nobis cum J. Bauhino & Stapelio videtur, ideoque an vires à Dioscorid. *Sesamo* adscriptæ ei convenient dubium est. Iis ergo omisiss, quas proponit in libro de plantis Ægyptiacis Prosper Alpinus, adferemus. Plantæ (inquit ille) decocto utuntur in foru ad ophthalmias, ad tussis an-

halitusque difficultatem, pleuritidem, peripneumoniam, & tumores duros scirrhusos: Mulieres pro uteri duritie inflexiones faciunt, & utuntur ad capitis furfures livoresque faciei: planta & seminibus coctis cum melle ad exsiccatos nervos, ad combustas partes, ad colidis inflammationes: decocto in clysteribus, ad colicos dolores & ad emolliendam alvum, ad movendas menstruas purgationes. Oleum faciemque ejus bibere ut impinguent mulieres in balneis familiarissimum habent. Oleo etiam ad multa alii Ægyptii uti consueverunt, viz. ad cutis pustulas, asperitatem, atque omnem defædationem ex humore melancholico tum epoto, tum in cibis frequentato, vel ipsis partibus affectis inunctis. Secretum apud quosdam ad cutis pruritus, ejus quatuor uncias multis diebus bibendis exhiberi, ad anhelitus difficultatem, pleuritim desperatam, peripneumoniam, ad movendos menses, atque ad vehementes stomachi, intestinorum, uterique dolorum cruciatus demulcendos intus & extra. *Rains.*

S E S E L I.

Seseli unde dictum sit me quidem latet, nec enim satisfacit *Harnari* etymon *Σέλι* τὸ σαύσαι τὸν ὄλον, quod salutare sit hinculo, siquidem veteres cervas post partum purgari herba quadam quæ *Seselis* vocatur prodiderunt. Ego potius vocem origine exoticam seu barbaram fuisse existimaverim quemadmodum & alia in terminat: *χόμμη*, *ωωωαί*, &c.

Seselios pratensis moræ sunt foliorum segmenta angusta, acuta, flores ex luteo pallidi, semina rufo-fescentia.

Nomina 1. *Saxifraga Anglica* facie *Seseli* pratensis Ger. *Seseli* pratense nostras Park. *Saxifraga* Anglorum foliis feniculi latioribus, radice nigra, flore candido, similis filao I. B.

E radice vivaci, longa, rugosa, foris nigra, intus alba, gustu dulci aromatico & nonnihil acri, caules quotannis surgit plures, sesquicubiales & bicubiales, digiti minimi ferè crassitudine, teretes, striatos, medulla farctos, prope terram rubentes, ab imo statim ramosos, ramulis per longa intervalla è foliorum alis exeuntibus. Folia tam quæ è radice exeunt quam quæ caules vestiunt, glabra obscure viridia, in segmenta longiuscula, angusta, acuta, rigida dividuntur. Summi caules & ramuli in florum umbellas terminantur, non admodum grandes nec coactas, sed laxas & raras. Flosculi singuli exiguè quinque peralis è luteo albidis componuntur, quibus succedunt semina striata, brevía, apicibus rubentibus, per maturitatem castanea.

Nomina 2. *Seseli Ethiopicum* frutex Ger. Park. *Ethiopicum* salicis folio C. B. *Ethiopicum* fruticosum folio periclymeni I. B.

J. B. Ramis aliquot cubitalibus & altioribus fruticat, rigidis lignosis, nigricante cortice intectis, in multos ramulos diductis, folia per ramos sublonga periclymeni, angustiora, leviter acuminata, breviora quam lauteolæ, glabra, sapore & odore juglandis, sed multo rariore gratioreque. Umbellæ pulchræ faniculææ, semen delapsis flavescens floribus gerunt oblongum, Canaliculatum, magnitudine seminum feniculi.

In rupibus oppido S. Chamas in Gallo-Provincia vicinis observavimus. Lobelus ad Ceti montis radices, quæ in lacum vergit uberi proventu fruticare scribit, quod & D. Magnol. confirmat. Augusto mense floret.

Semen Massiliensi *Seseli* multo acrius est & odoratus, unde Lobelius eximiarum virium esse credit, ideoque ad Theriacam efficacius.

Nomina. 3. Sefeli Massiliense Ger. Mas. ferulæ folio C. B. Massiliense alterum Park. Massiliense nuperorum folio aliquatenus simili Vinnagæ. Joan. Bauhin.

Hujus folium dodrantali circiter longitudine & latitudine tenuiter dissectum, cæsuris Vinnagæ, utcumque latioribus, vidit J. Bauhinus; florentem aut semen ferentem non observavit. Semen Camerario longius & latius est quam fœniculum, odoris vehementis. Lobelius Sefeli suum Massiliense ferulæ folio describit; majoribus, crassioribus, latioribus, latiusque sparsis fœniculi foliis: Caule cubitali & proceriore: Semine in Umbellis mei, compresso, carnosiore; gustu Sefeli Æthiopici aut Peloponnesis, valde aromatico. J. Bauhinus dubitat an Lobelius eandem secum intelligat plantam.

Nomina. 4. Tordylium sive Sefeli Creticum minus Park. Sefeli Creticum minus. C. B. Ger. Caulis minor pulchro semine: sive Belloni J. B.

J. B. Tenuem lignescentem, albam radicem demittit & simplicem caulem habet pedalem aut majorem, striatum, hirsutum: folia per conjugationes longo pediculo adnexa, subrotunda, serrata, aspera & pilosa, minora quam caucalidis majoris, semine minus pulchro hirsuto; quibus penitus similia etiam sunt ea quæ ramorum divaricationi adnascuntur utcumque minora nihilque cum superioribus caucalidis majoris foliis habent simile; flores in umbellam digesti similes, candidi, quorum etiam flosculi exteriores majora habent bipartita folia: peltata semina, pulchriora, non ita hirsuta, fimbria candida crispa vel granulata ambiente sapor planæ feræ qui staphylii. C. Bauhino flores & semina odorata, ac nonnihil acria Myrsinidis gustu.

J. Bauhinus Monspelii sponte provenientem vidit, ubi eam copiose origi in vinearum marginibus, præcipue circa pontem castris novi, testatur etiam D. Magnol in Botan. Monsp. nos eam in Sicilia circa Mellanem observavimus.

Nomina. 5. Tordylium minimum Apulum Col. Sefeli Creticum minimum C. B. Sefeli Apulum Creticum minimum Park.

Coli hujus radix tenuis admodum, albicans, dura, dulcis, aromatica & calefaciens est. Folia coriandrina, majora quæ radici proxima, hirsuta, mollia, quorum primum oblongum, rotundis crenis per ambitum incisum, sesquiuunciam longum, latitudine verò unciam parum superans; alterum verò duas æquat; nam veluti laciniis & incipientes lobos habet: tertium caulis imo hærens longiore petiolo binos lobos habet distinctos, parvos, rotundos, semunciali diametro, & in cacumine folium majus & oblongum, primis angustis. Quartum circa tertiam caulis partem hærens, tertio simile est sed minus. Quintum vero tantundem ab inferiore distans, minus omnibus est, & acutius folium quod imminet. Ex illius & caulis finu & geniculo ramulus exit. Caulis nudus est supra folium tertia parte, hirsutus, striatus, durus, tenuis, umbellam habens sylvestris pastinacæ modo cum basi foliacea, longis foliolis hirsutis constructa, ipsamque planam & expansam, brevibus intus petiolis, in quibus flores albi, densi, minuti, luteis intus staminibus: hujus semina adeo sunt similia vulgari, ut nonnisi magnitudine differant. Duplo enim sunt minora, & umbilico nigriore. Majo adhuc virescentia purpurascunt, deinde albicant, & folia decidunt e caule, ut planta cognosci nequeat. Sapore aromatico, odorato, amariusculo. *Ramus.*

Seseleos omnis semen est incisivum, discussivum, aperiens, cephalicū, venenis præterea resistit, epilepsiæ ac convulsionibus. Radix itidē iisdem inservit usibus.

SEVUM, vid. *Axungia.*

SEXTARIUS, vid. *Mensura.*

SICLA, vid. *Beta.*

SIDERITES, vid. *Magnes.*

SIDERITIS.

Sideritis sordē rē *sidēps* i. e. ferro dicitur, ob vim vulnera glutinantem. Sideritis eam vim habet ut quamvis recenti gladiatoris vulnere alligata sanguinem claudat. *Plin. lib. 12. cap. 9.*

Odore gravi & fœtido cum lamio convenit, foliorum figura differt; nos sub hoc nomine complectimur omnes verticillatarum species reliquis generibus floribus non spicatis non comprehensas, sed eas præcipue quæ odore cum lamio conveniunt, sed folia urtica non habent.

Sideritis vulgaris hirsuta erecta in specie, ut & *Sideritis hirsuta procumbens*, *Herba Judaica* dicta, exsiccant vehementer & adstringunt, hæmorrhagias fistunt, catarrhos & destillationes à capite compescunt, vulneraria sunt intus & extus applicari aptæ, præcipue in herniis & enterocelis; alba itidem mulierum profluvia cohibent. *Ramus.*

SIEF, vid. *Collyrium.*

SIGILLUM BEATÆ Mariæ, vid. *Brionia nigra.*

SILER MONTANUM.

Siler nomen à *Sile* deductum est, quia pro Sefeli semine utuntur: At Veteres ipsum Sefeli etiam *Sili* ac *Seli* vocabant.

Haud scio (inquit Bodæus à Stapel) an vox *Sili* rejicienda, nam apud Festum legere est, *Silatium* Antiqui dicebant quod nunc jentaculum dicimus, eo quod tum jejuni vinum *Sili* herba conditum absorbebant.

Bodæus Semen *Sileris* majoris acridinis esse scribit quàm nunc *Sefeli*, eoque menstruis ciendis perquam commendatum.

Nomina. 1. *Siler montanum Officinatum* Lob. Ger. *Sefeli sive Siler montanum vulgare* J. B. *Siler montanum vulgo Sefelos* Park. *Ligusticum quod Sefeli Officin.* C. B.

J. B. Humanam superat altitudinem *Sileris montani caulis*. Caulem ramosque ceu vaginâ laxiore amplectuntur foliorum pediculi palmares aut sesqui palmares: ipsa verò folia in alas oppositas dividuntur. Segmenta extrematena ferè sunt, Cytisi Tragifolii similia, oblonga; latiuscula, mucrone leviter obtuso. Umbellæ latæ, amplæ: Semen magnum cum fimbria foliacea, striatum, oblongum, sapore acri & subamaro, veluti corticis aurantii, tandem ad Cymini saporem accedente. *Ramus* magna coma infimum caulem ornat, rugosa, digitali crassitudine, albida, odorata, in altum descendens.

In Jura & Saleva montibus propè Genevam, inque Alpibus propè Pontiebam observavimus: Alibi etiam in Alpibus frequens reperitur.

C. Bauhinus Ligusticum Matthioli idem esse statuit cum *Silere montano*. Johannes frater hoc non audet asserere, tum quia Matthiolus Sefeli hoc Officinatum cimum fœtorem representare ait; Ligustici verò semen incolas Liguriæ passim in ciborum condimentis adhibere, tum quia Lobelius separat, tum denique quod semen quod apponitur iconi *Camer.* Differt.

Nomina. 2. *Siler montanum angustifolium* Park. *Ligusticum sive Siler montanum angustifolium* C. B.

C. B. *Prod.* Caule est tenui, cubitali in alas brachiato, quæ umbellam albam, parvam sustinent; foliis paucis in segmenta angusta, oblonga (Peucedani

cedani instar) sed longè breviora divisis, quæ in alis ferè capillacea.

Propè oppidum *Strain* Austriæ. *Raius*.

Hæc planta est aperiens & aleximorphaca, cujus radix & semina electuarium Orvietanum ingrediuntur, valentque præcipuè in Bouis morbis. Semen præterea masticatorum, spiritusque eo sic impregnatus in oculos per fluxionem cataractam minitanti debiliores emissas, non parum confert.

SILIX, vid. sub titulò. *Lapis*.

SILQUA DULCIS.

Nomina. *Siliqua arbor sive Ceratia* J. B. *Siliqua edulis* C. B. *dulcis sive vulgarior*. Park. *Ceratia siliqua sive Ceratonia* Ger. *Caroba* Offic. *Panis S. Johannis* Germanis & Belgis. *The Carob-tree*.

J. B. Arbor (inquit J. Bauhinus) cui fructus cornu modo intortus siliquæ & *negatis* nomen fecit [siliqua modicè admodum intorta & propemodum recta plerumque est] calidioris solis amantior, crasso ut tradunt, caudice in magnam excrevit altitudinem, latè ramos spargens, longos, firmos. *Folia* in alam disposita [Clus. Alata ut Terebinthi aut Pistaciæ, majora] quorum singularia brevi pediculo ad costam annexa, subrotunda; tres uncias plus minus lata, paulo longiora, crassa, rigida, nervosa, crebris obliquis venulis in margines excurrentibus, superius atro virore splendent, inferius pallidiori. Novemb. & Decemb. Julum instar juglandis ferè in flores ex rubro purpurascens, sese aperiens emittunt: deinde siliquæ, non tantum digito indici æquales, sed & altero tanto interdum longiores, satiores, modicè intortæ, compressæ, callo dulci, eduli, semina claudunt membranis distincta, seminibus Cassiæ solutivæ ferè æqualia, minora tamen, colore spadiceo obscuriore, compressa modicè, altero sine in acumen leviter desinentia, altero latiusculo, pulpâ buxæâ, durâ, & leguminosi quid n. sapiente.

Quin hæc arbor sit siliqua Plinii, *negatis* & *negativæ* Græcorum, minimè dubium est.

In Sicilia circa oppidum *Puzalla* frequentem, & spontaneam seu sylvestrem observavimus.

In Apulia & regno Neapolitano vel sponte oritur, vel saltem frequens colitur. Itinere à Neapoli ad Romanam observavit D. *Tancredus Robinson*.

Veslingius paucas harum arborum in Ægypto vidit, frequentiores in Palestina, plurimas in Judææ montibus, & circa sacram ibidem Urbem.

Siliquarum (ut rectè Plinius) cortex ipse manditur, estque melleo ac dulci sapore. Vides tumpæ, au' hor est Dioscorides & post eum Plinius, stomacho incommoda sunt & alvum solvunt. Eadem siccatæ alvum sistunt & stomacho commodiores sunt, urinamque cient. Quamvis omnes, qui de his fructibus scripserunt, siccatos alvum sistere affirmant, nobis tamen contrarium evenit, siquidem quotquot Venetiis (ubi magna còpia venales sunt) de iis comedimus, non solum nauseam moverunt, sed & alvum subdolerant non secus ac pulpa Cassiæ, ita ut ventriculus postea ab iis abhorreret. Non tamen negaverim posse impè iis vesci qui assueverunt.

Ægyptii, tradente Alpino, mel ex siliquis extrahunt dulcissimum, quo Arabes sacchari loco Cassiæ solutivas recentes ac parvas, zingiber, Myrobalanos, Tamarindos atque alios multos fructus condiunt. Hujus quoque mellis usus est frequentissimus ad clysteres, & aliqui etiam per os sumendum concedunt ad subducendam alvum: ipso etiam alvus non minùs quam pulpa Cassiæ ibi ad excretionem movetur. Utuntur etiam in renum inflammationibus intus extraque apposito.

Ad ruffientes, asthmaticos ipsum non secus quam Cassiam exhibent, valdeque ipsos juvat: nec minùs decoctum ex siliquis eadem præstat.

In ardore & dolore stomachi siliqua Ceratia commista est egregia: item syrupus ex summitatè. Quercus. *Etmuller. Prax.* *Raius*.

SILQUA ÆGYPTIACA, vid. *Cassia Fistula*.

SILPHIUM, vid. *Laserpitium*.

SIMIA.

Simia, *Cercopitheci*, *Cepi* & *Cynocephali*.

Simia tam prona quam supina corporis parte prolata est, pilo crassiore. Convenit cum homine facie, ut quæ nares, aures, dentes hominis more habeat: Cilium pariter in utraque palpebra, quoaquam prætenne & prolixius in inferiore; cum cæteræ Quadrupedes inferioribus Ciliis careant. Hanc Aristotelis observationem confirmant Parisienses.

In pectore binas habet mammularum papillas; & brachia hominis modo, sed hirsutiuscula, quæ & ipsa & pedes ut homo inflat. Adhæc manus, digitos, ungues homini similes, verum omnia rudiora effertioraque. Pedes sui generis habet, sunt enim velut manus majusculæ, & digitis ut manus constant, medio longiore. Hæc etiam confirmant Parisienses. Pedes (inquit) nobis descriptarum humanas magis manus quam suas, aut quam hominis pedes referebant, ob longitudinem digitorum & ob conformationem digiti anterioris qui pollicem imitabatur, ut qui longus esset, gracilis, & à digito indice longius remotus: cum in manu seu pede anteriore aded brevis esset, & digito indici proximè admodum, ut propemodum inutilis videretur.

Vestigium etiam manni simile est, nisi quod in longum se porrigat, & volam referens tendat ad postremum. Callosus hoc altera sui parte extrema est, & calcem ineptè atque exilièr imitatur. Pedes officium duplex, tum manuum scil. tum pedum, præstant.

Simiæ dividuntur in cauda carentes quæ *Simiæ* simpliciter dicuntur, & caudatas quæ *Cercopitheci* appellantur. Quæ prioris generis sunt Anglicè *Apes* dicuntur, quæ posterioris *Monkeys*. In his quæ rostro suæ productiore caninum referente *Cynocephali* appellantur. Atque vel caudis longis sunt, vel caudis brevibus Papiones dicti, Anglicè *Baboons*, magnitudine etiam insignes.

Simiæ Parisiensibus Academicis descriptæ è genere *Cercopithecorum* erant; parvæ, siquidem à vertice ad initium caudæ 20. tantum digitos longæ: cauda 20 erat digitorum. Brachium 4. digitos longitudinis habebat: à cubito ad extremos digitos 6. uncia erat. Femur 4½ digiti. Crus 5; Pes 4. à calcaneo ad extremum longissimi digiti mensura sumpta.

Omnes 1. in inferiore maxilla utrinque loculum seu sacculum habebant, in quem cibum asservandum recondabant; 2. Dentes albißimos, humanis similes, exceptis caninis, qui prælongi erant in superiore maxilla, in inferiore strictiores & longioras incisivos, alias similes, nec acuminati. 3. Omnibus pedes posteriores anterioribus propemodum similes erant, illorum scil. digiti, horum digitis longitudine ferè æquales, secus quam in homine. 4. Scrotum vel nulum vel admodum contractum, quo etiam ab homine differebant. 5. Cutis in clunibus carni arcte adhærebat.

Cercopitheci, i. e. Simiæ caudatæ, nam *Κερα* Græci cauda est, *Πιθηκος* Simia, unicolores, *Cercopitheci* simpliciter appellantur, diversicolores, *Cepi* q. Horti ob colorum, seu florum, varietatē quibus distinguuntur.

Quod ad partes internas attinet, observant Parisienses Simias in externis partibus magis quam in internis hominem referre. Omentum in multis ab humano

humano differt. 1. Quod lævæ coli parti non connectatur. 2. Quod musculis Abdominis mediante peritonæo (quod ligamentum efformabat) alligetur, 3. Quod vasa nonnulla non à vena portæ sola, ut in homine, sed interdum etiam à cava accipiat. 4. Quod totum Epiploon magnitudine humanum in tantum excedat, ut hoc illi minimè conferendum sit. Nam non tantum intestina tota integebat, (in nobis descriptis) quod in homine rariùs cernitur, quicquid contradicat *Galenus*, sed ea etiam subtilius involvebat & continebat, ut in aliis multis Brutis, præsertim cursu velocibus & saltatricibus; ad ea una cum aliis visceribus defendenda adversus rudes illos subsultus & concussionibus quibus inter currendum obnoxia sunt.

In eo tamen cum humano convenit, quod una & continua membrana sit, non ut in plerisque tetis in modum perforata.

Hepar ab humano plurimum distabat, Canini instar in 5. lobos tributum. Præter meatum cysticum tres ductus bilarios habuit, non ut in homine unicum, Hepaticum dictum, qui omnes cum meatu cystico in unum communem ductum confluebant.

Orificium Ventriculi inferius dictum majus erat superiore, & revera, inferius, secus quam in homine, in quo in æquam cum superiore altitudinem elevatur.

Intestina humanis proportionem breviora, pariter ferè magnitudinis omnia: ileon pro quantitate Animalium multò quam in homine majus. Cæcum appendice vermiformi caruit, valde amplum, & valvulis conniventibus multis præditum. Colon in cellulas divisum, non tamen ut in homine in formam literæ S. inflexum, sed prorsus rectum.

Renes figura & situ ab humanis diverfi; erant enim rotundi & compressi, & dexter sinistro multò inferior. Muræ dextrum sede superiore positum observavit.

Descriptionem partium generationi inservientium apud Autores nostros vide. Not. quod exterius uteri orificium rotundum erat & angustum ut in Cane illiusque Brutis, nec hymphas aut carunculas habuit. Foramen cervicis veficæ magis introrsum reductum versus mediam partem vaginæ uteri.

Tubæ uterinæ foeminis proportionem longiores, & variis reflexionibus magis erant reduplicatæ, ut in aliis Brutis.

Corpus uteri, ejusque membranæ, orificium interius, ligamenta tam teretia quam lata, ejusque vasa omnia, & testiculî per omnia exactè conformia erant muliebribus.

Mammæ etiam & papillæ tum structura, tum situ humanas referebant.

Thymus peramplus: Pulmones in 7. lobos divisi, tres in dextro latere, totidem in sinistro, septimus in cavitate Mediastini, ut in plerisque Brutis.

Cor quam in Homine acutius, ut & in reliquis Brutis.

Uvula, quæ alia Bruta carent, omnino humanam referens.

Cranium humano conforme, subrotundum & ad latera compressum, osse triangulari, cerebrum à cerebello separante in plerisque Brutis caret. Cerebrum proportionem amplum. Processus mamillares non ut in homine molles, sed duræ & membranaceæ. Rete mirabile nullum.

Reliqua quæ de musculis habent, apud Autores requirenda omitto nè nimius & odiosus sim. Observationem tamen quam addunt memorabilem de organis vocis articulata & loquelæ præterire nequeo.

Musculi (inquiunt) Ossis Hyoidis, linguæ, laryngis & pharyngis, quæ præcipue voci articulandæ inserviunt, humanis protius similes sunt, & multo certè

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

magis quam manuum musculi; quibus tamen Simia, quæ loquela destituitur, ad omnia ferè quæ homo æqua propemodum perfectione utitur. Unde patet loquelam actionem homini peculiarem esse, quibus à Brutis magis distinguitur quam manus usu: At neque necessariò infertur, agentia naturalia has vel illas actiones præstare; quia ad earum exercitium idoneis organis instructa sunt: aliàs Simiæ sermonis usu non carent, cum ad literas & voces formandas instrumenta omnia necessaria obtineant. Ità ut nè tribus illis exiguis musculis careant, quæ ab Apophysi styloide exoriuntur.

Hoc genus Animalium tum caudatorum, tum cauda carentium species valde numerosæ sunt: Non tamen multæ apud Autores fide dignos descriptæ occurrunt; nec ego in iis quas diversis in locis, variis temporibus bene multas vidi, describendis curiosus fui, ut qui de historia Quadrupedum condenda nè per somnum quidem cogitaverim. Cercopithecorum tantum à Clusio, Marcgravio & Parisiensibus traditorum Historias subjungam.

G U A R I B A Brasiliensibus *Marcgr.* Magnitudo vulpis; facies elata; oculi nigri splendentes; Auriculæ breves subrotundæ; Cauda longa, versus extremum nuda; qua intorta firmiter adhæret rei quam apprehendit. Pili totius corporis (excep s. pedibus & dimidia cauda exteriore, quæ brunnea sunt) nigri, longi, splendentes; ità tamen compositi, ut Animal læve appareat: sub mento & gutture longiores in barbam caprinam & rotundam definiunt. Maximo numero in Sylvis inveniuntur, ibique horribilem clamorem edunt, ut longe audiri possint. Unus a. interdum solus clamat, reliqui magno numero circumfident, & quasi concionem audiunt.

Mirus a. est eorum mos ordinarius, quem se sæpius observasse scribit *Marcgravius*. Singulis diebus ante & post meridiem semel atque iterum conveniunt; unus eorum minor in medio & altiori loco residet, reliqui paulò inferius circumfident, tunc præcinit superior alta voce & signo manu dato, reliqui omnes acciunt, tandiu cantiones prorogantes, donec superior iterum manu signum dedit, tunc omnes uno momento silent, & superior grandi voce cantionem finit.

Catulos suos in dorso gestant, in ramis arborum discurrentes: catuli ambiunt (amplectuntur) corpus eorum posterius, ubi tenuius, pedibus suis. Mordax est Animal nec domari potest.

Dantur & alii nigri ingentes, barba longa villosa nigra, qui Nigritam mulierem solam offendentes vi stuprate solent. Vera dico & exempla scio.

C A G U I Brasiliensibus; Congenibus *Pongi*; duplex est, major & minor. Major magnitudinem obtrinet Cercopitheci *Cay* cui & aliquo modo est similis (At *Cay* non describit nisi sit *Caitia*) Pilos habet cinerascens coloris cum paucò tamen nigro mixtos, & longiores paulò quam minor species. Facies ei subrotunda, leonina, ut & os. Aures ferè rotundæ nigre, & pilis nudæ: Oculi nigri. Os nigrum; Pili frontis itidem nigri cum cinereo mixti. Cauda pedem & 4. dig. longa, pilis ruffis vestita.

Cagui minor, tenerum est Animalculum & parvum, facie pariter Leonina. Corpus 6. circiter digitos longum, cauda 10. Caput parvulum vix pomum minus æquat: nasus exiguus elatus, oculi teneri: Os parvum cum dentibus acutissimis. Aures subrotundæ, quas circumstant pili albi, ordine & cum usatim positi, & quasi eleganter pexi. Pili autem totius corporis interius & in exortu rufescunt, exterius sunt ex albo & fusco mixti. Cauda quasi ex albo

& fusco annulata est. Acutissimam edit vocem, in saliendo velocissimum est, frigoris impatientissimum.

Hæc eadem esse videtur cum specie illa quam nomine *Sagonin* Clusius ex *Lerio* describit, Sciuro non majorem, & ejusdem fere coloris; habereque formam, (quantum ad collum, rostrum, anterioremque corporis partem attinet) Leoninæ non absimilem; superbam, & injuriarum impatientem, valde etiam teneram & delicatam esse tradit.

CAT Brasilianis Tououpinamboutiis dictus, *Lerio* describente, pusillus est, sed nigri coloris, maxima ex parte in Sylvis versatur, & possimum arboribus quibusdam insidere solet filiquas ferentibus Fabacearum magnitudine, quarum fructu vescitur.

CAITAI Brasilensibus, Pilo longiore est, ex albido flavescens. Caput habet subrotundum, frontem haud elatam, aut penè nullam: nasum parvum & compressum; Caudam arcuatam. Redolet moschum, Hæc unica ipsi inest gratia. Mæ tractari debet, aliàs altissima voce clamat; & facile ad iram provocari potest.

Hæc est, ut puto, quam describit Clusius *Austario ad Exoticorum libros*, ex *Fernambuco* Brasilianorum advecta, non magna corporis mole prædita, satis prolixis villis tecta, gilvi coloris, suavem quandam moschi quodammodo instar odorem spirans. Hanc aut sequentem Speciem in Belgio vidisse memini. Unde Simiam glandulas seu folliculos illos odoriferos ad anum sitos habere suspicor.

Alius ejusdem generis sed major, & pilo magis fusco instar Zibellinorum, moschum etiam redolet.

CERCOPITHECUS ANGOLENSIS major, Congenibus *Macaquo* *Marcgr.* Color pilorum totius corporis ut Lupi: Nares bifidæ elatæ. Caput urfino simile: nares calvæ quibus insidet. Caudam semper gestat arcuatam. Longitudo corporis à capite ad caudam pedalis & major; capitis 6. digit. caudæ pedalis, crura æqualia, 10. digitorum singula. In anterioribus cruribus manus 3½ digit. longæ, in posterioribus quinque. Crassities corporis maxima 1. pedis & 9. digit. Dentes habet albissimos, penem humano similem. Clamat *Hib, Hib*; Mirè gesticulatur. *Angolensis* alius, Magnitudo præcedenti par. Totus niger, at insperso cano nigredini per totum corpus. Cauda 2. pedum & 4. digitorum. Figura ut sequens, sed fronte non capillata.

CERCOPITHECUS BARBATUS Guineensis, Congenibus *Exquima*. Pilos habet fuscos, sed per totum dorsum quasi adustos seu ferrugineos; fascis autem punctulatis inspersus color albus. Venter albicat & mentum inferius. Barbam quoque egregiè albam habet, constantem capillis 2. & amplius digitos longis, passis quasi ordinatim pexa fuisse.

Quando hæc species irascitur, os amplè diducendo & mandibulas celeriter movendo, hominem exagitat. Egregiè saltat. Varios fructus huius omnes comedunt, extremè tamen *Paco* delectantur.

Alia *Guineensis* priori magnitudine par. Color pilorum maxima parte corporis nigricans cui umbra admixta; in ventre autem subcærulescens è cinereo: Caudæ medietas ulterior ex-ruffo flavescens. Os cærulescit. In gena utraque magnam copiam tenet pilorum longiorum ex albo flavescens, instar magnæ barbæ hircinæ uti & ad utramque autem. Crura & pedes nigra. Ludit & clamat ut alter.

Guineensis tertius *Marcgrav.* Minor est priori, pilo ex umbra griseo, fusco & flavo admixto, ferè ut in dorso leporino, Caput huic parvum, cauda longa. caret barbâ.

Cercopitheci quatuor Parisiensibus descripti è minorum genere erant. Magnitudine conveniebant & plerisque aliis notis. Eorumque tres, qui mar.s. solo pilorum colore differebant.

Primus ruber erat ad viridem inclinans, in dorso paulò obscurior, in pectore & ventre dilutior.

Secundus è *Ceporum* genere. Nam præter colorem rubrum viridescens in dorso; pectus, venter, & crurum pars interior cinereo tingebantur.

Tertius in pectore, ventre, armorum & crurum parte interna, atq; etiam clunibus albus erat. Dorsum ab omoplatis ad caudam obscurè rubrum. Femora & armorum superficies exterior nigra, ut & vertex capitis. Unusquisque a pilis niger rubris & albis maculis varius erat, quibus maculis rubris verus summû partem notatus, inferiore medietate alba. In mento barba alba acuminata, digitum longa. Pili in dorso digitum longi, circa collum sesqui-digitales, erectiores & collare simulantes. Supra oculum margo quædam alba, in qua ordo pilorum nigrorum supercilij instar elatus. Ius oculi è rubro flavicans, pupilla perampla. Caput rotundum, facies plana, humanam referens, naso brevi & simo.

Quartus fœmina erat, rostro oblongo ad cynocephalos accedente. Pilorum color triplex. Pectus & venter rubro & cinereo mixtis tegebantur. Arma & crura Bœtico seu castaneo obscuro colore erant. Dorsum rubro & castaneo varium, alicubi rubro, alibi castaneo prævalente, & maculas amplas efficiente, propemodum ut in *Catis*. Neque colorem album in fronte, neque barbam habuit ut præcedens.

Hæ duæ posteriores species *Sapaious* Gallis dicuntur.

Cercopithecus Indicus Bugæe dictus: Castorem capite, pilo, magnitudine proximè referebat: Cauda & pedes diversi. Rarum esse Animal etiam in India, custodes ejus *D. T. Robinsono* affirmabant, à quo Londini in platea vulgo *the Strand* dicta visum fuit superiore anno.

Simia alba seu incanis pilis, barba nigra promissæ *Zeylona: ELAWANDUM* *Zeylanensibus*. *D. Robinson* è museo *Leydensi*. *Cercopithecus niger, barba in ana promissa. WANDURU* *Zeylanensibus* *Ejusdem musei*.

Papio, i. e. Baboon Gesnero descriptus & depictus è *Cynocephalorum* genere est. Gesnerus Hyænam Veterum esse concludit, multis hætenus seculis re, nomine, & figura doctissimis etiam viris ignotam. Verùm Veteres de Hyæna multa fabulantur, ut quod sexum quotannis mutet; quod collum in vertebra non dividatur, sed simplici recto & continuo osse rigeat; quod oculi in mille colores subinde transseant; Quæ cum nulli Animali conveniant, non dari in rerum natura ejusmodi Animal meritò quis suspicetur. Nos tamen Taxum seu Melem Hyænam Veterum fuisse opinamur.

Lapidès Bezoartici, & quidem omnium præstantissimi ex Simiis desumuntur majoribus sive *Bavianis* & *Borneæ*, referente *D. Grimmio*, *D. Tavernier* ex Simiis talibus desumit, quæ per insulam *Mascassar* vagantur; tantæ a virtutis esse ut gr. ʒ. superent 6. gr. lapidis è capris desumpti. De præstantia etiam consentit *Bontius*. At *Philippus Baldani* pretio longè viliori venire in sua *Malabaricæ* & *Cormandelii* regionis descriptione refert, cap. 16.

Bontius in ventriculis Simiarum nasci rectè assertit in capite oriri, ut *Banda* incolæ *Baldæ* affirmarunt, nimium facilis est qui credit. Rotundæ figuræ hos esse tradit *D. Tavernier*, dum qui ex capris exempti sunt variis se prodant formis: Autores reliqui de figura non consentiunt. Vide *Ephem. German. An. 12. Observ. 189. p. 420.*

CERCOPITHECUS barbatus 1. Clus.

quem Guineensi barbato *Marcgr. Exquima* Congenibus dicto eundem puto. Magnitudo Cercopithecorum vulgarium majorum; supina corporis pars tota nigris villis tecta, quibus fuscus color admixtus; prona longioribus villis, iisque albis obsita. E mento propendebat dodrantalis longitudinis barba in mucronem definens, alba sive incana. Aures non magnæ, nares simæ; Cauda valdè longa, & satis crassa, cujus extrema pars in longiorum villorum floccum definebat, perinde ac leonis cauda; quæ nota insignis est, & paucissimis communis. Pedes in 5. longiores digitos fissi, anteriores præsertim, quibus tanquam manibus utitur: ungues ferè humanis similes.

CERCOPITHECUS barbatus 2. Clus. Elegantior erat, & magis politus quàm superior: nam valdè terfis & nitidis pilis totum ejus corpus erat tectum, illisque multò brevioribus: pectus etiam album habebat, & anteriorem ventris partem: cana etiam barba mentum ejus ornat, minus tamen, proluxa quàm superioris, & palmaris duntaxat longitudinis, eaque mucronata. Hujus cauda in floccum non definebat ut præcedentis, sed similis erat formæ cum Cercopithecorum vulgarium caudis.

CERCOPITHECUS non barbatus 1. Clus. Pili mediocris longitudinis, fusci ex flavo coloris: guttur tamen & totum pectus albicantibus villis erat obsitum. Cauda non valdè hirsuta, sed lævis quodammodo, tanquam avulsi fuissent pili; extrema autem ejus pars in longiorum villorum floccum definebat, veluti prioris barbati cauda.

CERCOPITHECUS non barbatus 2. Clus. Majore corporis mole præditus fuisse videbatur, rostrumque prorsus fuscum habuisse, caput canescentibus villis tectum, & collum cum pectore longis villis, Leoninæ jubæ instar etiam canescentibus obsitum, alioqui forma superiori non erat valdè dissimilis.

Cercopithecus SAGOUIN Clus. Sciuro minor erat, & adeò delicatulus, ut molli villosaque pelle fovendus esset ob aeris frigidioris asperitatem. Rostrum & capitis pars anterior Leoninam quodammodo formam referebant, fuscoque colore, cui rubedo quædam admixta, erant prædita: Aures albescentibus villis hirsutæ, quibus ruber color etiam admixtus: guttur & pectus longioribus villis partim fuscis, partim albis tecta habebat: reliqui pili per corpus sparsi albi & nigri, radiatim à dorso ad ventrem erant dispositi: cauda etiam, quæ longa erat, similis coloris pilis alternatim erat tecta: venter nigris pilis vestitus: Crura breviores albi pili quadam rubedine infecti tegebant. Pedes in 5. digitos non valdè longos fissi albis unguibus erant præditi. E ceporum genere.

Hic idem esse videtur cum *Cagnei*, seu *Pongi* secundæ speciei *Marcgræ*, potius quàm *Sagouin* *Lerij*, si modo *Sagouin* *Lerij* à *Sagouin* *Clusii* diversa species sit.

D. Tancred. Robinson observavit elegantissimum animal in Museo clarissimi & generosissimi viri *D. Charleton*. Inter Simiam & cynocephalum ambigere videtur, ei cauda nulla vel brevis, rostrum productius, pili sericei, instar sciuti Norvegici, auriculæ rotundæ; in uno digito pedum posteriorum unguiculi acuti sunt, reliquis omnibus lati. Ex insula Ceylona advectum erat animalculum hoc rarum & elegans.

Rains in Synopsi Histor. Animal. Quadrup.

Caro Simiarum adstringens reputatur, creduntque præterea quòd cor hujus animalis rostum & comestum memoriam juvet. Adeps est resolvens ac nervis seu nervosis partibus confert.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

SINAPI.

Σινάπι dictum putatur *ἵνα τὸ σινεθῶς τὰς ὁσμὰς αὐτῆς ὀσμῇ*, quod olfactu oculos lædat, vel quasi *σινονάτω*, Atticis enim idem est, *σινῶν* cum *σινῶνα*. Nos potius exoricum esse putamus hoc vocabulum, cujusmodi sunt *χόμυς* & *αἰνῶτες* & alia nonnulla similiter terminata. Quòd verò Gallis *Mustarde* vocatur, ex eo factum videtur, quòd Musto Sinapi ad intinctus conteri soleat. Camerario Mustarda dicta placet quasi mustum ardens, quòd ignea vi semen nares & cerebrum apprehendat, lachrymas excutiendo, nullo asperitimi saporis odore prævio. J. B.

Rapistrum dicitur ob similitudinem herbæ cum rapo.

Notæ Sinapeos genericæ sunt sapor foliorum, sed præcipuè seminum, fervidus & acerrimus; folia tam quæ in caulibus, quàm quæ ad radicem aspera.

In hoc genere species illa elatior, siliquis quadratis, brevibus cauli appressis, semine minore & acriore propriè Sinapi dicitur: humiliores siliquis teretiusculis majoribus à Caule extantibus, semine majore, at minus acri, rapistra appellantur.

Nomina. Sinapi sativum 2. *Ger. emac. descrip.* Sinapi siliqua glabra latiuscula, semine ruffo sive vulgare I. B.

J. B. Ad cubitos aliquot excrescit, caule ima parte hirsuto, superiore glabro, frequentibus ramis brachiato (mo omnium hujus generis nobis cognitorum altissimo & ramosissimo) eoquè tereti & fungosa medulla pleno. Folia inferiora quidem lata, dissecta tamen, capitulis similia, hirsuta, superiora vero tenuiora & glabra (odore si terantur eodem qui in semine percipi solet, Flores erucæ minores, & rapistri lutei, ex quatuor foliolis apicibusque medium occupantibus compositi, quos quatuor foliola, pallido herbaceo colore prædita obvallant, odore suavi. Hos excipiunt siliquæ glabræ, satis breves, erucæ Majoris similes, sed minores, ex brevi pediculo, quæ commissuræ ratione, ut in illa, dehiscunt, semina claudentes plus minus octo, cū in eruca multò sint plura, colore minus obscuro, & paulo majora, in hoc à rapistri seminibus differentia quòd ruffa sint, nec lucida, cum illa nigri sint & nitida. Radix candida, lignosa, fragilis, fibrata.

Sinapi rapi folio C. B. Sativum *Ger.* Sativum *Rapifolio* *Park.* Pro Sinapi vulgari accipitur, verum male ab autoribus describitur, ut descriptiones eorum cum nostra conferenti patebit.

Annotat J. Bauhin. ad hanc plantam, nullum, quòd noverit, Botanicum bonam iconem exhibuisse Sinapeos de quo hic agitur, vixque ab aliquo ritè descriptam videri. Et revera mira est inter botanicos confusio & obscuritas in historia hujus generis.

Thomas Johnsonus omnium optimè, quamvis breviter & succinctè Sinapi hoc vulgare nostratibus Mustard dictum descripsit, in suo Gerardo emaculato. Sinapi nostrum vulgare (inquit) folia habet rapacea: caulem teretem, superius glabrum, tres, quatuor, vel quinque cubitos altum, in multos ramos divisum, foliis angustis, oblongis, deorsum dependentibus, superiore præsertim parte vestitos, siliquæ breves sunt, cauli appressæ & ferè quadrangulæ: semen ruffum, aut ex ruffo nigricans.

Siliquas quadrangulas esse & cauli appressas, miror J. Bauhinum in descriptione omisisse: cum in rapistri vulg. arborum illius meminerit.

Aaaa 2

C. Bau-

C. Bauhinus, annotante fratre, hic omnia turbare videtur & entia præter necessitatem multiplicare.

In hortis & arvis, inque fossarum aggeribus, & terra recens effossa spontè & copiosissimè exit.

Seminis sinapeos pro condimento usus est frequentissimus. Nostri (inquit J. Bauhinus) musteum semen nocte macerant aquâ; deinde manibus expressum adjecto aceto pilâ terunt. In variis modis condimentum hoc præparant. Quidam semen Sinapeos ad ignem exsiccant, deinde in mortario tundunt, tulum per setaceum trajiciunt; & farinam cum aceto probe permiscunt ad Electuarii propemodum consistentiam. Alii in mola ad id parata cum agresta unâ conterunt: hæc confectio mustarda tam Anglis quam Gallis dicitur, quod cum multo Sinapi ad intinctus conteritur solet. Camerario mustarda dicta placet quasi mustum ardens, quod ignea vi semen nares & cerebrum apprehendat, lachrymas excutiendo, nullo asperitimi saporis odore prævio, ut superius monuimus.

Nihil hodie mustarda ad intinctus ubique, hyeme præsertim frequentius: nihil magis epulas commendare videtur, quod si vel assidua consuetudine, vel elu gratia ciborum exolefcit, hujus acrimonia fastidiosus gustum revocant, & hoc velut irritamento elanguescentem appetentiam invitant, quo velut igniculo morosius palatum titillante, vorandi moliantur aviditatem J. B. Sed hujus vis confestim in sublime fertur, nec aliud magis in cerebrum & nares penetrat, unde Sternutamenta ciet, & sensum vellicans lachrymas elicit. Hinc comitialibus auxiliatur, & uteri strangularum oppressos excitat, quin & lethargicis somnolentiam excutit, & omnibus in genere morbis cephalicis auxiliatur, paralyticis & apoplecticis, vel naribus inditum, vel in Sinapismis adhibitum.

Multas præterea vires Sinapi tribuunt Medici & Botanici tum veteres, tum recentiores, menses & urinam ciendi, venerem irritandi, accessus febiles arcendi, catarrhos minuendi, raucedinem curandi, pituitam expectorandi, alvum molliendi, tumores discutiendi.

Inter hæc est vis rubificandi, hoc est, cutim in ruborem attollendi, quod fit per phænigmos aut Sinapismos, inde dictos quod materia eorum sit Sinapi. Hoc fit ideo ut humores in profundo habitus latentes ad superficiem trahantur; quod vocabant methodici *μετασυσχεῖν*, & medicamenta inde *μετασυσχευητικά* C. Hofman.

Sinapi insigniter conducit iis quibus ventriculus ac intestina multis viscidis lentisque humoribus scatent, qui liquefacit, fundit, atque abstergit, qua ratione quoque Scorbuticis commendandum, cujus quidem nimia acrimonia aceto temperanda, ne nimis nares feriat. Qui edulcorant Saccharo valetudini minus consulunt, quippe saccharum figit ejus acrimoniam, quâ scorbutico resistit. Simon Paullus.

Semen Sinapeos in mortario tritum & cum vino albo mixtum multas centurias scorbuticorum & languentium hominum in obsidione Rupellenfi sanitati restituit. Plerique enim obsessorum & urbe inclusorum fame & inedia pressi, multa sordida & quæ natura abhorret escitare coacti, respirandi difficultatem, gingivarum putredinem, dentium nigritiem & vacillationem, aliaque scorbuti symptomata contraxerant, unde multi moriebantur, donec tandem Sinapi in fossis circa urbem copiosè inventum & quo dictum est modo adhibitum omnes liberavit. Ex relatione D. Mervault, qui toto obsidionis tempore in urbe

manebat communicavit D. Tancredus Robinson.

Sinapi cum vino calido magna quantitate potum curat febrem quartanam si exhibeatur duabus horis ante paroxysmum D. Palmer ex relatione D. Hermann.

Dantiscatus quidam valdè pronus ad vertiginem & apoplexiam consilio medicorum solebat semen Sinapeos ad præservationem masticare. Cum vero propter senium ulterius id facere non posset, in polinem redactum assumebat ore volutando, tandem cum ne hoc quidem modo eodem frui posset, in linteo ligatum olfaciebat. Hoc autem efficiebat, ut diutissime vivens ab his malis omnino immunis degeret. D. Soame ex observat. Hieron. Reusneri à Velschio editis. Raim.

SINAPISMUS.

Sinapismus species est cataplasmatum quæ in Lethargicis, Catoche atque in stupidis ac seignoribus naturis eò adhibetur ut sensus partis hebes exciteur, facultas affulgeat, calor exciteur, humor discutiatur.

Conficiendi Sinapismi modus ex Oribasio & Aetio est hujusmodi. *Caricas in aqua tepida pridie macerare oportet, postridie vehementer expressas contundere, dein acerrimum sinapi per se terere, caricarum cremorem inter terendum paulatim affundendo, quò facilius teri possit, non tamen fiat aquosum. Tum in massas leves redigito, alteram ex caricis, ex sinapi alteram. Et cum vehementem Sinapismum volueris, duas Sinapi partes uni caricarum addito; si mediocre, utrinque partes æquas; si imbecillam, tertiam tantum Sinapi partem duabus caricarum.*

Si ex aceto paratur Sinapismus, inefficacior est ac imbecillior, quia Sinapi virtutem discutit acetum.

Linteo autem excipi debet Sinapismus, ut parti adhibeatur, quàm sæpe intueri oportet, utrum ex illius admotione satis ruboris contraxerit, alii enim citius, alii serius ejus sensum percipiunt. Quod si longò temporis spatio Sinapismus cuiuspiam parti admotus non agat, nec cutis colorem immutet, spongiis aquâ calidâ imbutis fovenda est, ut facilius intro facultas illius queat subire. Ut enim Sinapismus excrementa ad cutem evocare queat, hanc si non ulcerare, saltem rubrificare debet; unde & Phænigmus hoc est rubrificans medicamentum solet appellari.

Post sufficientem Sinapismi usum, in balneum ducendus est æger, à quò pars rosaceò illinenda. Renodans.

SIRUPUS.

(1.) *Saccharum cum liquore inspissatum sirupum constituit.* Ut forma hæc externa pateat, elementa videnda sunt siruporum, quæ duo sunt, saccharum, vel mel, & liquor aqueus. Hæc duo inspissatione legitima per se constituunt sirupi formam. Hinc saccharum fluidum, seu liquidum impurius sirupus audit, *Sirup.* Mel verò ipsum paulò rarius eligitur, & magis terè pro usu externo, unde mel rosatum colatum, mercuriale, anthosatum clysteribus usitatus induntur, exceptis compositis, oxymel enim simplex, scylliticum, helleboratum ad affectus pectoris pituitosos interius usitatum est. Internam verò formam ipsa simplicia largiuntur, adeoque sirupi essentialis est, ut saccharum inspissatum sit, virtutem mutuatur à quocunq; vegetabili. Inspissatio hæc fit leni coctione seu ebullitione, ubi unâ impuritates auferuntur, & saccharum clarificatur, addito albumine ovi. Inspissatio porro hæc vel solitaria est, vel conjuncta cum ipso

ipso vegetabilis succo; hinc si saccharo sirupifato addatur extractum vel essentia v. g. papaveris rhæados, extemplo habetur sirupus, & sic porro. Hinc ipsa quoque consistentiam importat, ut sirupus non sit simplex liquor aqueus, dilutus penitus, aliàs situm contrahit, sed liquidum quidem corpus, est paulò spissius, instar mellis colati, utut sirupi alii aliis magis diluti, aliis magis crassiores sint.

(2.) *Sirupi succos, decocta, infusa, extracta amulantur & comprehendunt.* Cum enim necessum sit vegetabilium vires, à quibus denominantur, contineant, succum & sanguinem quasi eorundem elicere oportet, eundemque cum saccharo inspissare & jungere. Hinc vel ex ipso succo recenter expressio succulentarum plantarum confiunt, vel per accessum liquoris extraneum electo. Sic ex succo depurato acetosæ, rosarum, violarum, scabiosæ, cardui benedicti, portulacæ, sirupi eorundem parantur. Notabile est inprimis, è succis parari sirupos fructuum succulentorum, ex uvis immaturis, qui de omphacio seu agresta dicitur, ribibus, berberibus, tubo Idæo &c. Cum verò non omnia succulenta sint, ut possint commodè exprimi, vel penitus succus & virtus omnis expressione sola exhaustiri, infusio & decoctio succedit, ejusque vicem implet. Sic præter alia sit sirupus rosarum & violarum ex infusione simplici vel multiplici, qui solutivus audit, affundendo floribus ipsis aquam ferventem, ut imbibatur liquor hic virtute & colore eorundem. Imò studiosè nonnunquam ex siccis fit sirupus, ut vis solutiva auferatur, & roborandi adstringendique potius se exferat, uti v. g. sirupus de rosis siccis in usu est. Hinc bene addendum, quem sirupum intelligamus, variant enim virtutibus, an ex rosis simpliciter, an ex succo, an de rosis siccis, an rosarum solutivum seu compositum. Hinc adeoque res eò redit omnis, ut *sirupi nihil aliud sint, quam extracta vegetabilium liquida saccharata.* Extracta, inquam, sunt, nam & ipsi succi decoctione mivam seu sirupi formam induunt, & extractum fiunt, & infusione simili eademque penitus parantur.

(3.) *Sirupi ad gratiam & durationem parantur.* Gratiam largitur saccharum vel mel, durationem justa consistentia. Hinc utut pondus ac proportio ipsius sacchari pro varietate ejusdem & ingredientium variet, & arbitrio ferè Pharmacopœi id committi soleat. attamen vel anaticè recipitur, vel, quod usitatius, ad part. j. liquoris, part. ij. circiter sacchari, quæ ipsa accessio sacchari palato gratius reddit medicamentum, ut facilius assumi possit. Ut verò durer, non sufficit sal hoc Pharmacopœorum, saccharum solum, verùm etiam consistentia justa requiritur, aliàs mucescit & situm contrahit, ac corrumpitur. Hinc decoctio ad tertiam vel quartam nonnunquam partis consumptionem fieri circiter debet, ut reverà sit saccharum cum liquore non mixtum, sed inspissatum, ac concorporatum intimè, adeoque hinc fluidum quidem existere, attamen, ob aqueas partes corruptibiles absumptas, asservationi longiori aptum.

(4.) *Volatilia sirupifari inepta.* Ut in omnibus medicamentorum generibus parandis videndum & considerandum est, quæ ex quibus elici & confieri possint; ita etiam id valet in siruporum confectio. Volatilia intelligimus illa, quæ in se continent sal volatile copiosum, sive per se eminens, ut in plantis antiscorbuticis, sive sulphure simul volatili foetis, ut de rosmarino, majorana, melissa & similibus cephalicis notum est. Ratio est, quia coctione avolant, licet media inveniri queant, quò minus abitus hic fiat, si cum saccharo sirupifato misceantur, inconvenientiora tamen paulò hæc pro sirupificatione sunt; unde ex hisce talibus rarissimi vel nulli prostant sirupi, &

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

qui iceletrybicus audit Foresti, solum inter hos numeratur, temperatus, fit verò ex cochlearia & becabunga, nihilominus & hic volatile sal cochleariæ avolat. Contra ea ex dulcibus, acetosis, amaris, frequentiores sunt & rectius parantur, illa quippe minus evaporatione aufugere norunt, quin non tantum alterantes, verùm etiam purgantes ex talismodi jam dictis, non nimis resinosis, apertè parantur.

(5.) *Sirupi acidi non bene adservantur in vasis stanneis.* Valet id in genere quoque, acida in metallinis vasis non bene adservari, & quò magis quidem acida sunt, eò minus; evocant enim illa ipsa brevi tempore sal Delicum, unde saporem consimilem corpori noxium acquirunt, in specie verò de sirupis, unde sirupi acetositatis citri, berberum, ribium, & similes aliter veniunt in usum servandi, si usum, non noxam inde haurire volumus, ut taceamus hoc loco, acida faciliè consistentiam sacchari destruere, adeoque liquidiores ferè reddi sirupos acidos.

(6.) *Sirupi medicamentorum aliorum condimenta.* Quod alimentis sunt bellaria, quæ tamen coctioni non ita favent, id medicamentorum generi sunt sirupi. Hinc sirupi per se rarius soli adhibentur, neque enim ad ℥j. iis. ij. adsumuntur, uti quidam libri transcribendo, alii more seculi illius, quo editi sunt, id ponere solent. Hinc nec medicamentis aliis, nisi ad gratum saporem adduntur, id quod tamen non ad nauseam intelligendum est. Hinc etiam plurimis sirupis carere possumus, quippe magis edulcandi sine ferè, adeoque secundario, non primario, magis expetuntur. Hinc etiam in acetosis & aliis in ipsis gratia quoque tuenda est, addendo saccharum legitimæ quantitate. *Wedelius.*

Hæc de Syrupis in genere, jam de eorundem variis Compositionibus in specie & I. De Syrupis Alterantibus.

Sirupus de Absinthio ex Pharm. August.

℥. Absinthii pontici, seu Romani ℥ss. rosarum rubr. ℥ij. spica indica ℥ij. succi cydoniorum ℥ij. & ℥ij. macerentur in vase fictili horis 24. deinde decoquantur, exprimantur, & colatura addantur sacchari lbj. Fiat, ut est artis, sirupus.

Ventriculi, hepatis, & viscerum aliorum imbecillitati etiam dolorifica, & cachexiæ præsertim à causa frigida succurrit: adpetentiam dejectam excitat; intestinorum & viscerum retentricem vim confirmat: flatus discutit; auriginosos juvat: humoresque per urinas propellit: datur etiam in albo & pituitoso mensium fluore.

Quamvis subtiliorum partium magna ex parte jacturam in coctione hujus sirupi contingere, nemo diffiteri queat, easdem tamen, utpote intentioni nostræ necessarias, haud ægrè ferre possumus, eorum defectum, si necessitas postulat, ex tempore, aliarum scopo satisfaciendum admixtione, faciliè supplentes; si quis tamen aliquod earum connubium in hoc sirupo expetatum aliis modis, tum sequenti etiam, præparationem instituere posset: Absinthium scilicet, Rosas & spicam in aliquot vini uncias aliquandiu macerando, & exprimendo, remanentiam verò cum succo cydoniorum coquendo, exprimendo, & colaturam saccharo additam clarificando, atque ad crassiorem consistentiam per coctionem deducendo, ut dein cum superiori infusione, prius depurata, sirupus fieri queat, nativo vini &c. sapore & odore magis pollens quam si per distillationem separata tenuiores partes ei

A a a a 3 acce-

acceserint. Litem tamen haud movebimus, si quis alibi, per destillationem partes dictas separando, eisdem syrupo suo jungere ex arte voluerit; nos interea vinum quondam addi solitum omisimus; cum cydoniorum succus sic satis extractioni necessarius sufficiat.

De Absinthio compositus paulò aliter ex Pharm. Londin.

℞. Absinthii vulgaris, mediocriter sicci, ℥ss. rosarum rubrar. ℥ij. spica indica ℥j. vini albi veteris generosi, succi Cydoniorum an. ℥ss.

Macerentur calidè integrum diem, in vase fictili; tum leviter coquantur in B. M. & colentur; additisque sacchar. ℥j. Fiat syrupus secundum artem.

De Absinthio stomachalis & hepaticus. Zvvelferi.

℞. Herb. recent. Absinthii ℥vi. mentha. crisp. ℥iv. rosar. recentium ℥ij. spica indica ℥ss. Rad. calami aromatici recent. ℥ij. quæ minutim incisa & confusa immittantur cucurbita vitrea, superaffundendo vini opt. generosi vel Hispanici ℥vi.

Stent in digestionem loco calido die unâ, postea, apposito capitulo juncturisque benè clausis, fiat destillatio & abstractio libræ unius circiter & unciarum decem: Residua in cucurbita species unâ cum vappa vini (quæ exantlata spirituosa parte tota est nauseosi saporis, odorisque ingrati, ventriculo, uti vidi, insignem labefactionem afferens) abjiciantur. Abstractæ verò aquæ odoriferæ & spirituosæ de novo immergantur sequenti minutim incisa.

Herb. recent. Absinthii ℥iv. mentha ℥ij. caryophyll. ℥ij. vel ℥iij. nucum moschatar. ℥ss. masticis electi conquass. ℥ij. factaque digestionem per diem unum vel alterum in Alembico vitreo benè clauso, fiat colatura & expressio, liquor colatus & per residentiam depuratus filtretur, interimque asservetur. Tum.

℞. Residuas ab infusione præcedenti secus, additis, herb. recent. Absinthii ℥iv. mentha crisp. ℥ij. rad. calami aromat. recent. ℥i. galanga ℥ss. rosarum rub. ℥j. santali rubri ℥ss. incisa, coquantur cum aqua simplicis ℥viij. ad remanentiam lib. unius cum dimidia, colatura post expressa ac probè clarificata, additis sacchari albi. ℥viij. porro ad consistentiam ferè Tabulatæ coquatur, tum demùm jungatur Aqua spirituosæ superius asservata, ac recentibus speciebus imprægnata, ℥. scil. x.

Ac sola dissolutione fiat syrupus præstantissimus: qui ventriculi, hepatis, & lienis imbecillitati, à causa frigida obortæ succurrit, appetentiam excitat, flatum discutit, facultatem retentricem confirmat, adeoque in cachexia & Diarrhœa à debilitate & frigida ventriculi ac hepatis intemperie suborta præstans est remedium; sumptus quotidie in vini potu, vel alio vehiculo, morbo conveniente: utpote vino Cydoniorum aut alterante jusculo ab ℥ss. ad ℥j.

Nota: Libuit præparationem hujus syrupi, à priori in Pharmacopœia regia præscripta, non abs re immutare, præsertim in abstractione specierum à destillatione relictarum propter vappam vini illis adhærentem; & ab iisdem minimè separabilem, additis tamen harum loco recentibus herbis & speciebus, quippe præcium syrupi tantopere non augent tanquam levi are comparabilia; cum interim syrupus, ademptâ vapposâ nauseâ evadat palato & stomacho gravior, acceptabiliorque naturæ. Notetur præterea: quod præfatus syrupus de Absinthio, pro abstemiis, omisso vino totaliter, substituto loco hujus vino Cydoniorum, non minus

dextrè parari possit, vel etiam in modum sequentem confici, utpote.

℞. Succi Absinthii nostrat. probè depurati ℥ss. succi seu vini Cydoniorum recentis ℥viij. quibus immerge sequentia, incisa prius & confusa, nimirum: Absinthii recentis unc. iv. mentha crisp. recentis unc. iij. calami aromatici, galanga an. ℥j. rosarum rubr. unc. iss. & facta digestionem, duabus circiter diebus, coquantur ad remanentiam libræ unius semis, coletur, exprimanturque species, colatura expressæ, ac albumin. ovi probè clarificata adde sacchari albi canarii ℥viij. & denuo ad syrupi consistentiam percoque, cui pro aromatizatione adde Eleosacch. cinamomi ℥vi. caryophyll. ℥ss. Fiat syrupus stomachalis præstans cujus usus & dosis ex superioribus patet.

Syrupus de succo Acetosæ Mesuæ, ex Pharm. August.

℞. Succi Acetosæ depurati ℥viij. sacchari clarificati ℥ss. coquantur ad syrupi consistentiam.

Febribus biliosis admodum gratus est, & pestilentibus salubris, viscerum igneum calorem moderatur, ipsaque roborat.

Si quis exiguum partium subtiliorum portionem perdere nimis scrupulosè vereatur, easdem, destillationem coctioni subrogando, conservare, aliisque usibus adaptare; vel etiam, si tales, quamvis tanti momenti hic non futuras, syrupo junctas expectat, justam aquæ destillatæ quantitatem cum saccharo & remanente succo ad crassam consistentiam coctis jungere poterit. Nobis tamen, dum minima illa non curamus & laboris rædiorum Pharmacopœos nostros, tot syruporum destillationibus, tot inter aliâs magis necessariis operas, vix sufficientes, sublevamus, nemo jure succensere poterit, syrupum cæteroquin satis efficacem, & scopo nostro parem coctione præscripta obtinentibus. Id quod etiam de sequenti, aliisque nonnullis observari itidem volumus, scimus quidem posse & alia ratione, succi nempe acetosæ depurati sufficientem quantitatem cum sacchari clarificati ad crassissimam consistentiam cocti libra una semis simpliciter miscendo, præparationem non ineleganter institui; ast cum hac ratione minor longè succi, cujus vires tamen unice hic expetuntur, quantitas cum saccharo combinetur, in nostro autem antiquo modo largior & concentratus is accedat, ut illum alterum amplectamur, nullam causam habemus.

Syrupus de Succo Acetosellæ ex eadem Pharm.

℞. Succi Acetosellæ depurati ℥j. sacchari clarificati ℥ss. coquantur in syrupum.

Viscerum inflammationibus, nec non malignis, ac pestilentibus febribus confert, earundem fervorem reprimat, putredinem emendat, sitim, ac sanguinis ebullitiones compescit, & cor eximè roborat; aphthis etiam auxiliatur.

Acetosus simplex Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Sacchari clarificati ℥ss. Aceti ℥viij. coquantur ad justam consistentiam.

Humorum crassitiam incidit, attenuat & abstergit, obstructions aperit; saluberrimus in affectibus calidis, ac biliosis, & ex materia mixta natis, dum bilis impetum reprimat, æstumque extinguit, urinas movet, sudores elicit, ac pestilentie putredinique resistit.

Acetosus compositus Mesuæ, ex eadem Pharm.

℞. Rad. fœniculi, Apii, endivia an. ℥iij. sem. Anisi, Fœnic.

Feniculi, Apii an. ℥i. endivia ℥ss. coquantur lento igne in libris sex aquæ ad dimidias: colatura cum sacchari albi ℔iij. Aceti acerrimi ℔ij. coquatur s. a. in syrupum.

Obstructiones viscerum, jecoris, lienis, rehum, &c. referat, humorum crassitiem tenuat, urinas promouet, febres compositas & nothas, prout & ventriculū bile ac pituita crassa refertum corrigit.

Acetosus Diarrhodon Mesuæ ex eadem Pharmac.

℥. Rad. apii, feniculi, endivia an. ℥ij. rosarum ℥j. glycyrrhizæ ℥ss. spica ℥iij. sem. Anisi, feniculi, Apii an. ℥vii. succi endivia, Apii an. ℔iij. Aceti ℔ij. sacchari ℔iij. coquantur lege artis in syrupum.

Uſus ejus est ad febres complicatas: hepatis & splenis obstructiones aperit & viscera corroborat.

Sirupus Adianthinus Fernelii ex Pharmac. August.

℥. Adianthi albi, id est, ruta muraria m. iij. nigri seu capilli veneris, vulgaris, id est, polytrichi aurei, saxifragia, betonica, pimpinella, Asplenii an. m. ij. coquantur ex aqua ℔viiij. usque dum ad v. redeant. in expresso solvantur sacchari albi ℔iij. mellis optimi despumati ℔ss. Fiat ex arte syrupus.

Omnes in quacunque corporis parte humores incidit, atque detergit, cuius morbo incipienti, omni itidem naturæ, ætati, regioni conducens.

Sirupus de Agno casto ex Pharm. Londin.

℥. Sem. ruta, cannabis, an. ℥ss. endivia, lactuca, portulaca, cucurbita, melonum an. ℥ij. psyllii ℥ss. Agni casti ℥iij. florum nenupharis, foliorum menthae an. mss. Decocti, ex lentum & semina. Coriandri an. ℥ss. ℔iij. simul coque lento igne ad exhalationem ℔ij. & colato residuo adde succi limonum ℥ij. sacchari albi ℔ss. Fiat syrupus secundum artem.

Sirupus de Agresta Mesuæ ex Pharmac. August.

℥. Omphacii depurati seu Agresta ℔v. sacchari clarificati ℔iij. coquantur in syrupum.

Potenter adstringit, refrigerat, & siccatur, ideoque à putredine vindicat: pestilentia quam maxime resistit: ventriculū roborat: prægnantium malaciam emendat, intemperiem calidam stomachi, hepatis, sitimque vehementem restinguit: venenis, febribusque biliosis adversatur: cholerae morbo, ac dysenteria, purgato prius corpore, medetur. Post cibum sumtus, vomitum immoderatum, ab æstuante bile, aut inflammatione, persanatur.

Agresta, succus est ex uvis immaturis expressus, paulo antequam maturuerint; is Græcis omphacium dicitur. Hoc autem loco Agresta sumi debet nondum coctione densata, sed expressa tantum & depurata.

Sirupus de Albuminibus ovorum.

℥. Album. ovorum n. viij. flagellentur & dissolvantur in aqua comm. ℔iij. tum adde sacchari albi ℔ij. coq. & Syrupus s. a.

Valer hic sirupus pro humectando ac refrigerando pectore, ut & pro acrimoniis quæ illuc ex cerebro descendunt obrundendis, item pro excreatione faciunda. Dos. est ab ℥ss. ad ℥ss.

Sirupus de Althæa Fernelii ex Pharm. August.

℥. Radicis Althææ ℥ij. graminis, Asparagi, glycyrrhizæ, uvarum passarum mundatarum an. ℥ss. cicerum rubrorum ℥j. cymarum Althææ, malva, Helxines, pimpinella, plantaginis, adianti albi & nigri an. m. j. sem. quatuor frig. major. & minor. an. ℥ij. incisa coquantur ex aqua ℔viiij. usque dum quatuor superfint: deinde cum sacchari albi ℔iij. Fiat ex arte syrupus.

Ardorem urinæ demulcet, ac citra manifestum calorem, crassam, obstruentemque pituitam, nec non viscidam purulentamque renū saniem, & arenulas blandè expurgat.

Sirupus de Ammoniaco ex Pharmac. Londin.

℥. Agerati, cætherac, an. m. iij. Absinthii vulgaris ℥j. Rad. cichorii, Asparagi, cort. Rad. capparum an. ℥ij. Fiat omnium post debitam præparationem, infusio per horas 24. in vini albi ℥ij. aqua Raphani simplicis, fumarie an. ℔ij. dein ebulliant ad ℔j. & ℥viiij. & clarificetur colatura per subsidentiam: in cuius adhuc tepentis ℥iij. solve seorsim gummi Ammoniaco, prius in aceto vini albi acerrimo soluti, ℥ij. reliquum coquatur cum sacchari albißimi sesquialbra in syrupum, injecta ex gummi mixtura sub finem.

Sirupus Anagallidis ex Pharmac. August.

℥. Succ. ex herba Anagallidis flore phæniceo, expressi & depurati ℔iij. sacchari clarificati ℔ij. coquantur in syrupum.

Vires ejus sunt cephalicæ, maniacis præsertim commendatæ; potissimum adhibetur in torminibus infantum.

Sirupus Anisi cum vino Quercetani, ex Pharm. Schroder.

℥. Anisiconquassati ℥iij. macerentur in vini generosi, ℔ij. per tres dies, coletur: colatura adde sacchari ℔ij. & coque ad syrupum.

N. eodem modo concinnari possunt syrapi, & ex aliis seminibus, veluti ex semine fænicali, pæonia, ex baccis lauri, juniperi, & simil.

Sirupus Anticaufodicus ex Pharm. August.

℥. Mellis clarificati ℥xvi. succi sempervivi majoris ℥iij. cancerorum fluviatiliū, phlegmatis vitrioli an. ℥ss. Aceti rosati ℥ij. coquantur s. a. ad justam consistentiam.

In caſo ſive febre ardente ejus uſus eſſe poteſt, linguam enim ſiccā humectat, aſperam lenit, & æſtuantem refrigerat.

Sirupus Aperiens magistralis ex Pharm. August.

℥. Succ. depuratorum: Rad. cichorii, pimpinella an. ℔ij. fumarie, lupuli an. ℥vi. petroselinii, feniculi an. ℥ij. Rad. apii, enula, asparagi, eryngii, vince-toxici an. ℥j. herbarum Agrimonia, s. Kunegundis seu eupatorii Avicenna, agerati an. m. j. Foliorum euscute, ceterach, adianthi utriusque, cardui benedicti, comarum Absinthii pontici, florum centaurei minoris an. mss. gr. Alkekengi ℥j. Aqua fontana ℔iij. Aceti scillitici ℔ij. sacch. albi ℔iij. Fiat s. a. syrupus iusta consistentia.

Omnibus jecoris, mesenterii, hepatis, ac venarum meseraicarum obstructionibus; nec non diuturnis febribus, & ex eis natis cachexiis, ac hydropi prodest. Acui ejus vis potest spiritu chalcanti.

Sirupus Aperiens spleneticus & hepaticus
Zuelferi.

℞. Succor. depuratorum ex totis, quibusdam, vegetabil. utpote pimpinella, apio, cichorio sylv. petroselinio, feniculo, an. ex toto scilicet rad. & herbis, cymis lupuli, nasturtio hortensi an. ℥ss. quibus succis immergantur incisarum & contusarum (si fieri poterit) recentium omnium, Rad. apii, enula, cichorii sylv. vincetoxici an. ℥ss. cymarum Asparagi, herb. nasturtii hort. cochlearia, agrimonia, epatica nobil. s. Agerati seu eupat. Mes scolopendrii, matrifylos an. ℥ss. granor. Alkekengi, juniperi an. ℥j. fatiague digestionem duobus circiter diebus, fiat colatura & expressio specierum, succi, expressi ac opt. clarificati interim asserventur, species vero à colatura & expressione relictæ, affusa s. q. aqua simpl. coquantur leviter ad remanentiam ℥j. decoctum colatum & albumin. ovorum probe clarificatum, additis sacchari can. albi ℥iiij. coquatur ad consistentiam fere tabulati, cui tandem junguntur succi superius asservati & essentificati, ac paucis ebullitionibus fiat syrupus iusta consistentia.

In obstructionibus hepatis, lienis, mesenterii & pancreatis, atque inde exortis morbis quamplurimis, scorbuto præsertim efficacissimus, qui ipse in exhibitionibus cum spiritu salis simpl. vel spiritu salis Armoniaci acido chalybeato permisceri poterit & in vehiculis appropriatis, ab ℥ss. ad ℥j. vel ℥ij. propinari.

Sirupus de Artemisia ex Pharmac. August.

℞. Herb. Artemisia m. ij. pulegii, melissophylli, dictamni cretici, sabina, an. m. j. Flor. Hyperici mss. Rad. rubra, rusci an. ℥ij. sem. nigella ℥ss. cassia lignea ℥j. sacchari albi ℥iij. coquantur cum aqua font. ℥v. secundum artem in syrupum.

Mensum obstructionibus, uteri suffocationibus, & partui difficili medetur.

De Artemisia compositus ex Pharmac.
Londin.

℞. Artemisia m. ij. pulegii, calamintha, origani, melissa, persicaria non maculata, dictamni cretici, sabina, majorana, chamadryos, Hyperici, chamapityos, matricaria cum flore, centaurii minor. Ruta, betonica, buglossi sylvestris, sive echii, an. m. j. Rad. feniculi, Apii, petroselinii, Asparagi, rusci, saxifragia, enula, cyperi, rubia tinctorum, Ireos, paonia, ana ℥j. baccarum juniperi, semina levistici, petroselinii, Apii, anisi, nigella, carpobalsami sive cubebæ, costi veri, cassia lignea, cardamomi, calami aromatici, Rad. Asari, pyrethri, phu, ana semunciam.

Mundata, concisa, & trita macerentur 24. horas, in aqua limpida ℥xii. F. destillatio in B. M. ut eliciantur aqua ℥viii. exprimantur facies prelo, & in colaturæ cum albumine ovi clarificatæ q. s. coquantur sacchari albißimi ℥vi. ad tabulati consistentiam, dein addatur aqua prius destillata; & in B. M. F. syrupus s. a. aromatizandus cinnamomi spicæ nardi an. ℥ij.

Syrupus Asthmaticus Zuelferi.

℞. Rad. recent. enula camp. ℥ij. calami aromat. ℥ss. ceparum recent. ℥iiij. Herb. recent. hyssopi, anethi, melissa, nasturtii hort. satureia an. ℥iiij. Florum recent. Tunica ℥j. cort. Aurantiorum recent. extim. ℥ss. cinamomi acuti, granorum juniperi an. ℥i. macis ℥ss. sem. Anisi, feniculi an. ℥ss. omnia incisa & contusa im-

mittantur in cucurbitam vitream quibus superaffunde vini generosi seu malvat ℥iiij. factæ digestionem una alterave die fiat destillatio & abstractio ℥ij. cui aqua spirituosæ proleptæ (abjectis speciebus à destillatione relictis cum residua vini vappa) de novo immerge sequentia saltem incisa, ut pote

Scilla preparata & siccata ℥ss. ceparum recentium ℥vi. Rad. recent. enula camp. ℥i. Ireos Florent. liquiriti. rasa an. ℥vi. calami aromat. ℥ss. herb. recent. hyssopi, Anethi, melissa, nasturtii hort. charesfolii ana ℥i. croci orientalis ℥j. digerantur per biduum, fiat post colatura & expressio, essentiam interim prius purificatam asservando. Tum ℥. species ab ultima infusione vel extractione relictas, quas cum s. q. aqua simpl. coque ad remanentiam circiter ℥ij. colatura opt. clarificata adde sacchari albi canarij ℥iiij. coquantur ad consistentiam fere tabulati, cui junge aquam superius destillatam & essentificatam, fiatque sola dissolutione sacchari, debite consistentie syrupus, qui

In Asthmate, orthopnæa, dyspnæa & similibus pectoris affectibus catharrois, & tussi antiqua, proficue adhibendus. Per se sumptus ad instar lambitivi efficacior existit, quam liquoribus aliis admixtus & potus; cochlear plenum sapius de die paulatim deglutiendo & lambendo, quo magis asperæ arteriæ sese insinuare, & vel odoretenus bronchia pulmonum obstructa permeare, eorumque infarctos viscidosque humores incidere, attenuare, & ad rejiciendum aptos reddere possit.

Sirupus de corticibus Aurantiorum ex Pharm.
August.

℞. Corticum Aurantior. recentium & extimor. ℥vi. vini albi Neccarici fortissimi ℥ij. macerentur per 24. horas, in loco calido, bene obturato vase, postea vinum decantetur, filtretur, cum sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate permiscendo, fiat syrupus.

Ventriculum frigidum roborat, coctionem adjuvat, flatu dispellit, ac cordis vires adauget.

De Floribus Aurantiorum ex eadem Pharmac.

℞. Florum Aurantior. recent. ℥ss. infundantur in aqua fontana calentis ℥ij. horis 24. tum rejectis prioribus floribus, cum totidem novis infusis reuertentur, idque trina vice fiat. Tandem colatura depurata cum sacchari albißimi clarificati & ultra Tabellarum consistentiam cocti sufficiente quantitate redigatur in syrupum.

Cor ac cerebrum recreat, spiritus instaurat, sudoresque movet, pestilentibus ideo febribus clataris, infectos namque humores à centro ad circumferentiam propellit, & exanthemata eiicit.

Sirupus de succo Aurantiorum ex Pharm. August.

℞. Succo Aurantiorum depurati ℥iiij. sacchari albißimi ℥ss. coquantur secundum artem in syrupum.

Dupliciter hic syrupus preparari potest, è succo nimirum Aurantiorum dulcium, & acidorum quorum hic nauseam, sitim, & cordis radia pellit; ille calidis faucium ac pectoris malis opitulatur.

Sirupus Florum Bellidis ex Pharm. August.

℞. Florum Bellidis hortensis flore rubro ℥ss. macerentur in aqua fontana ℥ij. per 24. horas, postea exprimantur & cum sacchari albi ℥ij. coquendo, & albumini ovi clarificando fiat syrupus.

In aperiendis obstructionibus, hepatis præsertim, effica; in pectoris vulneribus curandis, & sanguine coagulato resolvendo utilis existit.

Syrupus de Berberibus ex Pharm. August.

℞. Succ. Berberum depurati ℥ij. sacchari lbjss. Fiat ex arte syrupus.

Refrigerat & modicè attenuat: febribus malignis confert, bilem reprimat, febrium æstus delet, ac immoderatam sitim compescit, biliosis ventris profluviiis salutaris.

Syrupus de Betonica simplex ex eadem Pharmas.

℞. Succ. Betonica depurati lbij. sacchari clarificati lbjss. coquendo Fiat syrupus.

Ad capitis & uteri vitia effica: leniter aperit, concoquit & abstergit, ac menses moderate provocat.

De Betonica compositus ex Pharm. Londin.

℞. Betonica m. iij. majorana mss. thymi, rosar. rubrar. an. m. j. violarum, stechados, salvia an. mss. seminis feniculi, Anisi, ammeos, an. ℥jss. Rad. paonia, polypodii feniculi an. ℥v.

Digestione tepida in aquæ fontanæ lbvi. & succi Betonica, depurati lbjss. 24. horarum spatio prius peracta, destillentur in B. M. donec educantur aquæ lbv. tum facta valida sacum expressione, colatura, cum albumine ovi clarificata, incoquantur sacchari albi ssimi ℥iiijss. ad consistentiam tabulati: & demum addita aqua destillata. F. levissima ebullitione syrupus.

Alius Zuvelferi.

℞. Rad. cyperi rotund. paonia recent. an. ℥i. herb. recent. Betonica floresc. ℥iiij. salvia ℥ij. majorana, rorismarini, thymi an. ℥jss. Flor. recent. lavend. ℥i. paonia ℥ij. cheiri, paralyseos, tunica, rosar. an. ℥jss. cardamomi, cubebarum an. ℥jss. nucum moschatar. cinamomi opt. sem. Anisi, feniculi ana ℥i.

Omnia successivè, & tempore opportuno collecta, quædam confecta & confusa, nonnulla verò integra, utpotè, flor. cheiri, paralyseos & paonia, immergantur in vini albi generosi vel malvatici lbij. vel v. facta maceratione quoad omnia unita sint, fiat destillatio & abstractio ad dimidias, vel duas libras cum dimidia: aquæ huic destillatione prolectæ, fragrantis, & spirituosæ, denuò immergantur, (abjectis speciebus in fundo Alembici cum vappa vini relictis.)

Rad. doronici veri ℥vi. paonia recentis ℥jss. herb. recentis betonica floresc. ℥jss. rorismarini florecentis, flor. recent. cheiri an. ℥j. salvia ℥ij. tunica ℥j. ligni aloës ponderosi, nucum moschatar. cardamomi minor. cubebar. an. ℥iiij. cinamomi ℥jss. peracta extractione suffic. loco calido ac vitro.

Benè clauso, liquor spirituosus à speciebus infusus, colatura & expressione separetur, perque filtrum probè clarificetur quò interim asservato, accipe porrò species ab infusione superiori & expressione relictas, quas cum aquæ simplicis s. q. coque, ad remanentiam lbij. decoctum colatum, & alb. ovorum debite clarificatum, additis sacchari albi can. lbijss. coquatur ad consistentiam quasi tabulati, cui tandem jungè aquam superius asservatam, spirituosam & essentiatam in s. q. (lbij. circiter.)

Ac sola ejusdem dissolutione, vel unica saltem ebullitione fiat syrupus præstantissimus, qui in morbis capitis & cerebri frigidis saluberrimus, adeo-

que apoplecticis, epilepticis, catharrois & soporosis affectibus propulsiandis effica est: propinandus cum aquis destillatis cephalicis, vel cum vino, aut alio vehiculo grato, ab ℥j. ad ℥jss.

Alius ejusdem.

℞. Aquar. lilior. convall. sine additione aq. simplicis ex baln. n. vaporoso stillata lbj. ceras. sine addit. still. ℥vi. Flor. cheiri, paralyseos, ana sine additione aquæ simplicis still. ℥iiij. his aquis commixtis immergantur successu temporis Rad. recent. paonia ℥j. herb. recent. betonica florecent. ℥vi. rorismarini ℥j. Flor. recent. paonia, cheiri, paralyseos, tunica, tilia, rosar. pallidar. an. ℥iiij. nuc. moschatar. ℥jss.

Maceratione verò peracta, quando nimirum omnia collecta sunt, destillentur ex baln. n. vaporoso ad omnimodam humiditatis prolectionem; Aquæ verò huic destillatæ fragrantis lb. circiter ij. denuò immergantur sequentia minutim incisa *Rad. doronici veri ℥vi. paonia recent. ℥jss. herb. recent. betonica ℥ij. rorismarini florecentis. Florum recent. cheiri, paonia, tunica, tilia, rosarum rubrarum ana ℥jss. ligni aloës ponder. ℥ij. nuc. moschatar. ℥jss.*

Et cum die una atque altera indigestione steterint, fiat colatura cum expressione, liquor expressus clarificetur per filtrum, interimque asservetur; species verò expressæ cum s. q. aquæ simpl. coquantur ad lbij. cum decocto hoc colato & alb. ovorum debite clarificato, solvantur sacchari canarii albi lbijss. & ad liquoris ferè totalem exhalationem coquantur, cui demum adde superioris aquæ essentiatæ lbij.

Ac unica saltem ebullitione fiat syrupus justæ consistentiæ; qui in affectibus capitis & cerebri, utpotè in epilepsia, vertigine, hemicrania, cephalæa, & cephalalgia salutaris existit, in aquis destillatis & appropriatis exhibendus ad ℥jss. ad ℥j.

Syrupus Bezoarticus Donzelli.

℞. Sem. milii integri lbj. infunde in aq. still. ruta caprar. & cardui bened. ana lbjss. macer. hor. 24. dein bulliat milium ad crepaturam, tunc adde cardui bened. ℥ij. ruta caprar. recent. mss. vel siccata m. post bulliant leviter & ab igne retrahantur: liquor refrigeratus coletur, colatura unicuique libra adde sacchari albiss. ℥iiij. bulliant de novo & clarificentur igne lento.

Assumitur hic syrupus tantum calidus, quantum perferri potest; Dos. ℥vi. additis vini albi generosi ℥ij. mirandum in modum sudores movet, & propterea medicamentum est multum utile in omnibus febribus intermittentibus si detur ipsis declinantibus; sitim extinguit ut experientia est comprobatum.

Syrupus de Borragine ex Pharm. August.

℞. Flor. borraginis recent. lbvi. aquæ font. puræ valentis quantum sufficit, Fiat infusio per hor. 24. postea exprimantur, & colatura lbv. cum sacchari lbjss. coquantur s. a. ad formam syrupi.

Prodest hic syrupus maniacis ac melancholicis, lætitiâ enim augeat, pectus quoque humectat & lenit, nec non syncopen & animi defectiones e corde natas arcet, cuius etiam tremori palpitati & imbecillitati eximie succurrit.

Syrupus

Sirapus Botryos ex Pharm. Londin.

℞. Herbar. Botryos, erysimi, urtica an. m.ij. tussilaginis m. j. cum β.

Coctione in aqua font. q. s. in B. M. peracta, colatura clara ℥ij. adde succi ē pisīs, demptis corticibus, in aqua fontana semel, iterumve mutata, ad mollitiem coctis, leniter expressi ac defidentia paulatim facta à crassamento liberati, ℥ij. sacchari crystallini ℥iij. percoque ulterius in B. M. in syrupum; parandum, quando usus postula-verit.

Sirapus De Buglossio ex Pharm. August.

Paratur eodem modo, quo syrupus de Boragine. Quoad vires etiam cum eodem convenit.

Sirapus Byzantinus simplex Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Succ. endivia, Apii an. ℥ij. lupuli, buglossi an. ℥ij. Ferveant simul ac depurentur. Postea eorum ℥iij. cum sacchari clarificati ℥iij. lento igne in syrupum percoquantur.

Febres putridas mixtas ex humore bilioso & pituitoso, solutu contumaces juvat: obstructions viscerum aperit, humores tenaces & lentos incidit, ac tenuat, morbo regio succurrit, splenis duritiem, & infarctus ab humoris melancholici crassitie dissipa-

Byzantinus compositus Mesuæ ex eadem Pharm.

℞. Succ. endivia, Apii an. ℥ij. lupuli, buglossi an. ℥ij. in his succis decoquantur, rosar. rubrar. ℥ij. glycyrrh. z. a ℥β. spica indica ℥ij. sem. an. si. f. aniculi, Apii an. ℥ij. colatura addendo aceti ℥ij. sacchari albissimi ℥iij. coquantur, ut est artis, in syrupum.

Ad prædicta omnia valentior: ictero adversatur, hepatis, & splenis pertinaces obstructions reser-
rat, ventris inflationi, ac hydropi incipienti medetur.

Sirapus de Calamintha Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Calamintha montana, & nepeta, domestica an. ℥ij. sem. ligustici, danci, schenanthi an. ℥v. uvarum passar. ℥β. Aqua ℥vi. primo coquantur uva passa cum reliquis ad medias, in fine addatur schenanthos. Expressum cum mellis despumati ℥ij. s. a. fiat syrupus.

Viscerum obstructions levat: incidit, attenuat, tergit, & appetit, interna calefacit, contumaces materias expulsionī preparat ac menses mover, tussi inveteratæ, Asthmatis, intemperiei viscerum frigida convenit, humores viscidos ac crassos, bronchia pulmonum obsidentes expurgat, senibus familiares affectus levat, nec non lienis tumorem duritiemque discutit.

Sirapus de Capillis veneris simplex ex Pharm. August.

℞. Capillor. veneris ℥vi. macerentur in ℥vi. aqua, horis 24. deinde coquantur ad medietatis consumptionem: colatura addendo sacchari ℥iij. Fiat, ut artis est, syrupus.

Ad thoracis affectiones calidas ac destillationes tenues præstans est: pleuritidi proinde incipienti idoneus, cum materia calida, aut mixta ob tenuitatem promptè elici nequit: obstructions præterea vasorum leniter aperit.

De Capillis veneris compositus ex eadem Pharm.

℞. Capillor. veneris ℥v. glycyrrhiza ℥ij. Aspleni, seu ceterach. m. j. macerentur in ℥vi. aqua, horis

24. deinde coquantur ad medietatis consumptionem: colatura addendo sacchari clarificati, penidiorum, aqua capillor. veneris an. ℥vii. Fiat syrupus s. a.

Venarum meatus leniter expurgat, obstructions aperit, è renibus item & vesica mucosores ac arenulas expellit: quem in finem Dodonæus radicem rusci & asparagi an. ℥j. ac seminis insuper malvæ ℥ij. addendas censet. Nunc syrupus Adiantinus Fernelii ejus vicem supplet.

Sirapus Cardiacus, vel Julepum Cardiacum ex Pharm. Londin.

℞. Vini Rhenani generosi ℥j. aqua rosar. ℥iij. caryoph. ℥j. cinnamomi ℥β. Zingiberis ℥ij.

Infunde horis 24. dein coque leniter in B. M. mox colatura clara adde sacchari albiss. ℥ij. Tum F. julepum, liquando saccharum in B. M. postea addantur Ambra grisea gr. iij. moschi gr. j.

Alius Francofurtensium ex Pharm. Schroder.

℞. Vini albi generosi ℥ij. Aq. rosarum ℥iij. cinnam. ℥β. Zinziber. caryophyll. an. ℥ij. ligentur omnia in petra, addaturque sacchar. ℥iv. coque ad consistentiam syrupi, postea adde Ambra grisea gr. iij. moschi gr. j. in syndone.

Vires. Convenit in lipothymia, aliisque cordis affectibus.

N. Præstat sola infusione, vel in MB parare.

Sirapus de sacco Cardui benedicti ex Pharm. August.

℞. Succ. cardui benedicti depurati ℥iij. sacchari clarificati ℥ij. Fiat coctione syrupus.

Febribus malignis ac pestilentibus confert, humorum putredinem arcet; sudores prolicit, vermes enecat, & pleuritidi auxiliatur.

Sirapus Carminativus ex Pharm. D. Le Moir.

℞. Ligni sassafras ℥iij. macis, nucis mosch. an. ℥ij. sem. Anisi, Feniculi, carvi an. ℥iij. herb. mentha m. ij. corticum arantiorum ℥ij. sem. levistici ℥iij.

Contundantur omnia grosso modo, & infundantur in s. q. aq. f. aniculi, mentha, æqualibus partibus, macerentur simul per aliquot horas, dein leviter ebulliant in M. B. fiat colatura, quæ sacchari clarificati & ad consistentiam tabellati peracti ℥v. permisceatur absque coctione: syrupo confecto adde ol. cort. Arantior. menth. carv. f. anicul. Anis. caryophyll. an. gutt. ij. in saccharo prius excepta & pulverisata.

Vires Flatus discutit, ventriculum roborat, affectibus frigidis convenit, quibus major olei copia placet, eam addere pro lubitu poterunt.

Sirapus Caryophyllorum aromaticorum ex Marcgravio.

℞. Aq. caryophyllor. aromaticorum instar lactis alba ℥iij. in ea dissolve sacchari tabellati q. s. ut consistentiam syrupi acquirat sine igne.

Vires. Calefac. siccit. attenuat, incidit, cardiacus, stomachicus, cephalicus est.

Sirapus Florum caryophyllorum ex Pharm. Londin.

℞. Flor. caryophyll. præcis ungibus, ℥ij. totam noctem perfundantur aqua fontana ℥j. dein cum sacchari albissimi clarificati, & in colatura, ad balnei calorem liquati ℥iij. fiat absque coctione syrupus s. a.

Sirapus

Sirupus Catarrhalis cum herba Thee ex Pharm.
Schroder.

℞. Rad. chin. orient. ℥j. fenic. pœon. ireos florentin.
an. ℥ss. herb. thee ℥j. flor. beton. Trinitat. ana m. j.
gran. chermes ℥ss. infunde in f. q. ▽. betonic. hor.
xij. & col. hinc coq. addit. sacchar. lbjss. in formam
sirupi.

Sirupus de Centauro minori Antifebrilis
Zuelferi.

℞. Succ. centaurii min. recent. expressi & de-
purati lbij. cui immergantur summit. seu florum cen-
taurii min. recentium ℥x. minutim incisorum, dige-
rantur duabus vel tribus diebus, in loco bene calente,
exprimantur dein flores, succusque expressus debite
iterum clarificetur, cui addantur sacchari albi canar.
libra dua coquantur ad consistentiam syrupi, servetur.
Est præstans ad febres tertianas & quartanas abi-
gendas, roborat ventriculum, & viscerum obstru-
ctiones refert, Dosis ℥ss. ad ℥j. in vehiculo con-
venienti.

Sirupus cerasorum Acidorum ex Pharmas.
August.

℞. Succ. cerasorum acidorum per residentiam de-
faciati lbvi. sacchari clarificati lbij. Fiat sy-
rus.

Ad internos æstus efficax: sitim extinguit, adperi-
tum instaurat, febrium incendia rep. imit, bilis fero-
ciam domat, mulierum malaciæ prodest, cordis deni-
que vires tuetur.

Sumenda hic sunt cerasa illa acida, aliquibus du-
racina dicta, quæ nos vulgari idiomate Beirein no-
minamus atque ex eorum succo, ubi probè maturue-
rint, sirupus hic conficiendus.

Sirupus Chalybeatus pro Mulieribus & cachecticis
Zuelferi.

℞. Rad. recent. Apii, pimpinella, valeriana,
pœonia ana ℥ss. Herb. recent. melissa, pulegii, nastur-
tii bore. rorismar. sabina ana ℥ij. bacar. juniperi,
lauri ana ℥ss. seminis Feniculi, Apii ana ℥j. cina-
momi acuti ℥ij. maceris ℥vi. Antophyllor. ℥ss. croci opt.
℥ij. quibus omnibus confectis & contusis, necnon ca-
nabita vitrea immixtis, superaffundantur vini albi ge-
nerosi lbvi.

Facta maceratione per unum atque alterum diem,
appositoque capitello fiat in M. B. abstractio ad
lbij. huic liquori prolecto, abjectis speciebus in
alembico relictis, una cum residua vini vappa,
immergantur sequentia incisa saltem, ut potè:

Rad. recent. Apii, pimpinella, cichorii sylv. petroseli-
ni, feniculi ana ℥ss. herb. recent. melissa rorismarini,
pulegii, sabina ana ℥ss. cassia lignea vera, cina-
momi opt. ana ℥j. bacar. lauri ℥ss. macis ℥ij. chalybis
cum sulphure liquati, & insuper aliquoties cum sul-
phure calcinati secundum Crollium, inque petia
ligati, ℥viij. vel ℥x. crem. tartari vel saltem
tartari albi veneti subtiliter triti & chalybi per-
mixti ℥j.

Macerentur loco calido per biduum, quotidie
aliquoties agitando, & petiam vel sacculum cum
chalybe & tartaro exprimendo, factaque post co-
latura cum expressione, colatus & expressus liquor
per filtrum clarificetur, interimque afferve-
tur.

Per d.

℞. Species ab infusione ex expressione relictas, unâ
cum chalybe & tartaro in sacculo ligatis, quas cum

aqua fontana, spiritu sulphuris ad gratam aciditatem
acuata lbij. coque ad remanentiam lb. (sed quod
bene observetur in patella ferrea) decoctum coletur &
perquam optime clarificetur, quod cum sacchari albiss.
lbij. denud coquantur ad consistentiam fere tabulati,
cui tandem jungatur Aqua superius destillata & re-
centibus speciebus essentificata in quantitate competente
(lb. circiter.)

Ut sola dissolutione, vel unica saltem ebulli-
tione syrupus justæ consistentiæ emergat. Qui in
referendis mensibus obstructis, egregiam non so-
lum præstabit operam, verum etiam cachecticis &
hypochondriacis auxilio erit. Commodè dabitur in
jusculis alterantibus, vel etiam in vino, ab ℥j. ad
℥ij. plus minusc, juxta subjecti ac ægotantis consti-
tutionem.

Alius facilior ex Eodem.

℞. Chalybis cum sulphure liquati, ac sæpius post
(ter quaterve ad minimum) cum eo calcinati, secun-
dum Crollium ℥viii. cremoris tartari ℥ij. his mixtis
& subtiliter pulverisatis, ac vitro largo immixtis,
superaffunde vini albi generosi lbij. macerentur loco
calido, vitro probè cluso, sæpius de die agitando,
per triduum, facta post colaturâ ac clarificatione,
vinum hoc chalybeatum interim asservetur; tunc
verò

℞. Rad. recentium cum toto, Apii, feniculi, ci-
chorii sylv. pimpinella, petroselin. an. ℥ij. herb. re-
cent. scolopendrii, cherefolii, ceterach ana ℥ij. chama-
dryos, nasturtii hortiensis ana ℥ij. rorismarini ℥j.
cassia lignea ℥ss. bacar. lauri ℥vi. item: chalybem
cum tartaro superius ab infusione relictum, sacculo im-
clusum.

Coquantur incisa quæ incidenda sunt in f. q.
aquæ simpl. cum spiritu sulphuris prius ad gratam
aciditatem acuata (in sartagine ferrea, caveas igitur
à cuprea vel ænea) ad remanentiam lb. co-
letur, exprimanturque species, decoctum album, ovo-
rum probè clarificatum, additis sacchari albiss. lbij.
porro coquantur ad consistentiam fere tabulati, cui
adde vini superius chalibeati & affervati q. s. ut sola
sacchari dissolutione, aut unica saltem ebullitio-
ne syrupi consistentia acquiratur, superaddendo
sub finem elæotacchari cinamomi ℥ss. servetur
usui.

Ad menses mulierum referandos præcedente haud
inferior, cachecticis præterea & hypochondriacis
opitulatur. Propinari potest ab ℥j. ad ℥ij. in jusculis
alterantibus aut laxantibus, vel in aliis vehiculis ap-
propriatis.

Nota, si cupiam medico volupè fuerit, vino sub-
stituere aquam cinamomi, vel etiam aliam aquam
stillatitiam pro Extractione chalybis, non aberrat-
bit; verum necesse est, ut eam spiritus sulphuris
prius acidulam nonnihil reddat, secus enim inef-
ficax foret in extrahendo chalybe, posset forte
non nemo etiam hærare circa præparationem chaly-
bis secundum Crollium, en! addendo ejus præpara-
tionem veram.

Accipe chalybis frustulum oblongum, quod
igne fortissimo, sufflante folle candefac, quoad scin-
tillas uberrimè de se spargat, cui ab igne remoto
cito admoveatur sulphur, sic guttatim voluti solutus
aut liquefactus in vas suppositum, aqua frigida
repletum stillat: chalibe verò parum refrigerato,
eundem denud candefac, ut antea; sulphurque ipse
admove, donec totus chalybs sulphure liquatus
fuerit, qui ab aqua separatus siccandus & in pulve-
rem redigendus, inque patella ferrea vel terrea, super
ignem

ignem carbonum, in loco patulo, vel sub camino collocata, calcinandus porro est, spatula ferrea, continuo agitando, ad omnimodam sulphuris conflagrationem; chalybs relictus denuò in pulverem redigendus, & pro ejus una libra, sulphuris triti uncia una admiscenda, iterumque uti antea calcinandus, super igne carbonum, spatula continuo agitando ad conflagrationem sulphuris; & hæc calcinatio sive conflagratio cum sulphure, ter quaterve aut sæpius reperatur, sic ad prædictos usus chalybs legitime erit præparatus.

Syrupus Chamædryos Bauderoni.

℞. Chamædryos cum floribus ℥viii. scolopendrii, id est, Asplenij ℥ij. corticum radic. capparum ℥ij. Acori veri (calami aromat. falso in officinis nuncupati) schænantii seu junci odorati nardi indica, seminum petroselinii, & anisi an. ℥vi.

Contusa biduo, in aquæ & vini albi utriusque ℔ij. super cineres calidos macerentur. Deinde parum coquantur, & exprimantur. Secundo maceratione iterata parum coque. Expressum clarificetur, & cum sacchari albi, vel mellis despumati ℔ij. coque in syrupum condiendum cinnamomi ℥j.

Syrupus de Chamælo ex Pharmac. August.

Præparatur ex florum intusione, colatura & saccharo, uti syrupus de borragine.

Usus ejus est in colica & iliaca, itemque affectibus uterinis à frigore natis. Additur potissimum in enematis ubi crassos flatus evocare necesse est.

Syrupus de Cichorio simplex ex eadem Pharm.

℞. Succu cichorii depurati ℔ij. sacchari clarificati ℔i. coquantur in syrupum.

Hepatis ac renum in temperiem calidam emendat: febribus auxiliatur, bilis acrimoniam frangit, refrigerat, humectat, & obstructions expedit.

Syrupus de Cinnamomo ex Pharm. August.

℞. Cinnamomi optimi, crassiusculè pulverisati ℥v. ponantur in cucurbitam vitream, addanturque aqua cinnamomi optima cum vino destillate ℔ij. aquæ rosarum odoratissima ℥ij. stent in loco calido, bene obturato vase, ne quid expiret horis 24. deinde filtrentur, atque cum sacchari albi clarificati & ultra consistentiam tabellarum cocti sufficiente quantitate fiat syrupus.

Vitales spiritus plurimum recreat, cor ac ventriculum à frigore languidum reficit, oris halitum commendat coctionem juvat, nec non universas corporis vires, fulcit.

Syrupus Acetositis Citri ex Pharmac. London.

℞. Succu malorum citriorum colati, & per subsidentiam depurati ℔j. sacchari albi clarificati & ad consistentiam tabellati cocti, ℔ij. Fiat una vel altera ebullitione syrupus.

Syrupus de Corticibus Citri ex Pharm. August.

℞. Corticum citri recentium & extimorum ℥vi. granorum tinctorum, seu chermes ℥ij. vini albi necessarii fortissimi ℔j. macerentur loco calido, vase bene obiecto, per 24. horas; postea v. num decantentur, & filtrentur, atque cum sacchari clarificati ultra consistentiam

tiam tabellarum cocti sufficiente quantitate permisceatur, addendo moschi or. grana sex in particula vini hujus citr. soluti & filtrati. Fiat syrupus.

Cor & ventriculum roborat: corruptos stomachi humores obtundit, anhelitus graveolentiam abigit, pestilentibus venenatisque morbis resistit: cordis palitationi medetur, mæstitiamque discutit.

Incompletus etiam, i. e. sine moscho apud nos in usu est.

Syrupus Cochleariæ, ex Pharm. Amstelod.

℞. Sacchari clarificati, & ad consistentiam tabellati cocti, ℔ij. Aqua stillaritia cochlearia q. s. ut sine coctione agitando s. a. redigantur in syrupum.

Syrupus Coralliorum Quercetani ex Pharmac. August.

℞. Corallia rubicundissima & elegantissima ℔i. succi berberum perfecta maturitatis depurati, in materiam quatuor digitos supereminet, digerantur in calore balnei vaporosi vel alio moderato per tri-duum, vel quousque corallia bullulas emittunt, dein quod dissolutum est, per inclinationem separentur, & recentem corallus relictis succum depuratum rursus affundendo, tantisper id reteretur, usque dum tota soluta videantur. Pro hujus succi, corallina essentia impragnati ℔ij. sumatur sacchari cantii albi ℔i. lenta in M. B. evaporatione redigantur in formam syrupi.

Hic syrupus facit ad omnes affectus ab hepatis vitio scaturientes; confert omnibus fluxionibus hepaticis, dysenteris, & hentericis.

Quamvis sint, qui syrupum hunc, permiscendo berberum succo corallia in aceto destillato soluta, & in salinam formam coagulata, parare soleant, in nostris tamen officinis modum à Quercetano traditum, ut elegantem satis & paratu maxime possibilem, observari volumus.

Coralliorum compositus ex Pharm. London.

℞. Corallii rubicundissimi ℥vi. subtilissime pulverato, super porphyriem, cum paucâ aqua rosarum, adde succi depurati limonum, in B. M. à phlegmate liberati ℥xvi. succi depurati Berberorum ℥viii. Aceti vini albi acerrimi, succi limp diss. lujula an. ℥vi.

Mista conciantur in phialam vitream, subere & vesica bubula claudendam, indiesque agitando, donec octo dierum digestio in balneo vel fumo equino peracta sit; tum fiat per chartam emporeticam colatura de qua cape ℔i. succi puriss. cydoniorum ℔i. sacchari rolati ℥xij.

Misce; fiat syrupus s. a. in Balneo; additisque syrupi florum veronicæ rubræ ℥xvi. fervetur in ulum, omisso nodulo ex Ambra griseæ ℥i. moschi orientalis gr. iij. donec medicus imperaverit.

Syrupus Cordialis gemmatus calidus Zuelferi.

℞. Cert. recent. citri vel limon. extim. ℥ij. Arantior. extim. ℥ij. flor. recent. rosarum damascen. ℥ij. tunice ℥ij. quibus minutim concisis & cucurbita vitrea immissis superaffundantur vini veteris albi vel malv. ℔ij. factaque brevi digestionem, abstrahantur destillando per arenam, vel baln. n. vaporosum ℔ij. Aqua verò huic prolecta s. agranti porro immerge.

Cort. Arant. recent. & extim. ℥j. citri recentior. ext. ℥i. flor. recent. tunice rubr. ℥j. & si in promptu sint, aut haberi possint, florum recentiorum Arantiorum ℥vi. sem sen granorum Kermes legitimorum & integrorum ℥ij. macerentur una alterave die, tunc fiat colatura; nunc accipe hujus aqua

aqua odorifera rubra & essentificata ℥ij, ac in ea dissol-
ve, mag. st. n. solubiliū, utpote coralliōrum rub. ℥i. per-
larum oriental. ℥℞. matris perlarum ℥j. his solutis su-
peradde sacchari canar. albiss. ℔ij.

Ac solâ ejus dissolutione, sine ulla ebullitione sy-
rupus conficiatur, cor, vitales spiritus ac animales in-
signiter roborans ac recreans.

Cordialis Frigidus Eiusdem.

℥. Succi granator. acidor. recenter expressi, suc-
ci pomorum redolent. recenter quoque expressi, suc-
ci citri seu limonior. jam jam etiam expressi an. ℥viii.
in his succis digerantur cort. citri seu limon. recent.
ext. ℥ij. Arant. recent. & ext. ℥i. flor. tunica recent.
rub. ℥i℞. buglossi recent. ℥℞. gran. Kermes legitim.
integ. non confusor. ℥ii. & facta digestionē die una
vel altera in calore leni, vitro opt. clauso, coletur,
in colatis & bene clarificatis succis dissolve magist.
n. solubēt. corall. ℥i. his solutis superadde sacchari
Canar. albi ℔ij.

Ac solâ sacchari dissolutione sine coctione fiat
syrupus cordialis efficacissimus, qui in febribus
ardentibus, malignis, pestilentialibus, imò in
peste ipsa summè salutaris est, cordisque palpi-
tationi resistit, exhibendus per se ob gratiam
sui saporis, sive in vehiculis appropriatis, ab
℥℞. ad ℥j.

Syrupus Cydoniorum ex Pharmac.
August.

℥. Succi cydonior. acidorum depurati ℔iiij. sac-
chari albi clarificat. ℔℞. Fiat syrupus.

Languidas ventriculi vires recreat, nauseam &
vomitum sistit, nutritionis instrumenta roborat,
coctricem facultatem juvat, ac viscerum om-
nium vires instaurat: Lieniteriam & alvi proflu-
vium biliosum, aut dysenteriam hepaticam ex hu-
morum arimonia obortam sedat: cibi adpetentiam
excitat, malos succos, biliosos præsertim, concoquit,
atque ad expulsionem præparat.

Syrupus Contra Dysenteriam Zuelfferi.

℥. Rad. bistorta, tormentilla an. ℥i. Cichorii sylv.
℥i℞. pimpinella, scorzonera, sanicula, iros flor. li-
quiritia an. ℥i. galanga ℥vi. herb. recent. Consol.
saracénica, mille folis, sanguisorba, pyrola, hederæ
terrestis an. ℥ii. flor. rosar. rub. sicc. ℥i℞. balast. pa-
paver. errat. an. ℥i. fruct. Acacia ℥i℞. capit. papar. al-
bi cum semin. num. vi. baccar. myrti ℥i. santali rubri
℥vi. cort. Arantiorum, citri, an. ℥i. nuc. moschat. ex-
pressarum, ab oleo relictarum ℥vi.

Incisa & contusa coquantur in s. q. aquæ simpl.
repetitis vicibus affusæ, quousque tota specierum
virtus extracta sit, colaturæ omnes alb. ovorum
probè clarificatæ ad remanentiam circiter ℔ii eva-
porent, quibus additis succi seu vini cydon. ℔i℞.
sacchari canarii albi ℔ij.

Coquantur denuò ad consistentiam syrupi, ab-
stergit & adstringit leniter, intestina exulcerata
conglutinat, malignitati, quæ ut plurimum dy-
senteria conjuncta est, resistit: roborat ventri-
culum & hepar: in omnibus porro vulneribus
internis & profundis, tanquam vulnerarium
medicamentum præstat, propinatus cum cre-
more hordei, sero lactis caprini, aut aquis coctis
appropriatis, ad unam vel alteram unciam, bis,
terve de die.

Syrupus de Endivia Simplex ex Pharm.
August.

℥. Succi endivia depurati ℔viii. sacchari ℔iv. co-
quantur ut est artis in syrupum.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Ad hepatis, & viscerum omnium intempe-
riem calidam est utilis, sitis enim ardores com-
pescit, ac morbi lateralis initis præcipuè con-
venit.

**De Endivia Compositus ex eadem
Pharm.**

℥. Endivia recentis, borraginis, scariola, hepa-
tica, buglossi, melissa, eupatorii, lactuca an. m. j.
sem. quatuor frig. major. an. ℥i. florum cordialium
an. ℥ij. sandali albi, rubri an. ℥i. Coquantur in
aquæ fontane ℔vi. s. a. ad medias: deinde Colatu-
re addendo succi endivia depurati ℔v. granato-
rum ℥iij sacchari albi ℔iv. Fiat syrupus ut
est artis.

Potens est in magno præcordiorum incendio,
nec non ventriculi & hepatis intemperie calida, fe-
bribus pariter biliosis & ardentibus: obstructions
referat, ac urinas promover.

**Syrupus Antepilepticus Quercetani, ex
Pharm. Schroder.**

℥. Rad. pæonia, visci querni, an. ℥℞. Cina-
momi opt. ℥ij. flor. Calendula, lilii Convul. tilia,
lavendul. an. p. j. Rosar. Rub. p. i. i. Fiat extractio
cum spiritu Juniperi vel vini ad eminentiam dig. 4.
decantetur.

℥. Tinctura ℥x. sacchari Candi pulveris. ℥ij. aut
iv. m. & accendantur, flagrentque Continuo agi-
tando, donec syrupus satis coctus, aut plus minusve
fortis videatur, tum enim extinguendum erit in-
cendium,

Vires. Præstantissimus est syrupus, tam præcau-
tioni quam curationi inserviens. Dosis cochlear ss.

Antepilepticus Witzelii ex eadem Pharm.

℥. Rad. scorzonæ. ℥i℞. fraxinelle ℥ii. herb. galeg.
m. i. thee p. ii. visc. Corylin. ℥℞. fl. Cheiri m. j.
gran. Chermes ℥℞. Di. stercoris pavonis ℥℞. Coque
leviter in ∇. flor. Cheiri s. q. hinc col. & cum sac-
chari ℔i. redig. in syrupum.

(Vires. Proficuius admodum in Epilepsia infan-
tum compertus.)

Syrupus de Erysmo Lobelii ex Pharm.
August.

℥. Erysmi totius recentis m. vi. radicum helenii,
tussilag. an. ℥ii. herb. borraginis. Cichorii, Capillor,
veneris an. m. i℞. flor. Cordialium, Anthos, stæcha-
dis an. m. ℞. sem. Anisi ℥vi. passular. mundatarum
℥ii. incisa & Contusa Coquantur in aquæ hordei, hy-
dromelitis an. ℔iv. succi irionis ℥vi. ad remanen-
tiam ℔iiij. in expresso liquore dissolvantur sacchari albi
℔ii. Fiat. lege artis syrupus.

Vires ejus sunt pectorales, & magnoperè inprimis
in raucedine commendantur.

Syrupus de Eupatorio Mesuæ ex Pharm.
August.

℥. Rad. apii, fœniculi, endivia an. ℥ii. glycyrr-
rhizæ, schœnanti, Cuscuta, absinthii, Rosarum an.
℥vi. Capillor. veneris, Cardui benedicti, eryngii,
flor. buglossi, sem. Anisi, fœniculi, eupatorii Mes. sem
Agerati an. ℥v. Rhabarbari. mastiches an. ℥ii. spica
indica, Asari, foli vel ejus loto spica Romana an.
℥ii. Aqua fontane ℔viii. Coquantur ad tertiæ partis
Consumtionem; expressioni addendo succi apii ℔ii.
endivia ℔i. sacchari ℔iv. Coquantur s. a. in syrupum.

Prodest in febribus diuturnis ac tertianis no-
this, ex bile aut pituita Crassa, quæ jecoris aut lienis
obstructions parit, partesque nutritorias & conco-
ctrices vires labefactat, ortum ducentibus; aperit,
incidit, tenuat, tergit, & digerit: adpetentiam
B b b b exci-

excitat; coctionem firmat; robur ventriculi succitat, hydropi succurrit, cacochimiam & cachexiam emendat: vitiosos succos per urinas educit, intemperiem frigidam delet, flatus ventriculo aut jecori innatos dissipat, hypochondriorum dolorem, ac tensionem levat, atque adeo totius corporis corruptionem, quæ male affectum ventriculum, & hepar sequitur corrigit.

Sirupus Exhilarans D. Laurent. apud Renodanum.

℞. Succorum buglossi & borraginis ℥ i β. succi pomor. redolent. ℥ j. succi melissæ ℥ β. granor. Kermes ℥ iiii. croci ℥ β. pulveris diamargaris frigidi ℥ β. diambrae ℥ iv. sacchari tabaræi ℥ l. fiat ex arte sirupus.

Hujus sirupî descriptionem dat clarissimus Vir Dn. Doctor Laurentius, Gallorum & Navarorum Regis medicus primarius, in quodam opere doctissimo, quod de visu conservando, de morbis melancholicis, catarrho, & senio in lucem edidit, illius autem authorem agnoscit affinem suum Dom. Castellanum, Gallia quoque Regis Archiatrum, à quo se habuisse confitetur, sic verò debet confici.

In succis depuratis grana Kermes noctem integram super cineres calidos infundentur; in forti expressione saccharum diluetur: deinde coquentur omnia in sirupum: in cujus medio suspenditur nodulus, qui suo sinu pulveres, & crocum continebit. Dosis erit ab ℥ i. ad ℥ iiii. idque mane jejuno stomacho, & vesperi hora somni.

Cognominatur exhilarans, quia vim habet eximiam ad cor & spiritus vitales exhilarandos, facultates erigendas, mœrorem abigendum, & qualitatem humoris melancholici malignam comtemperandam.

Sirupus de Farsara ex Pharm. August.

℞. Succu Farsara depurati ℥ iiii. sacchari clarificati ℥ iiii. decoquantur in sirupum.

Refrigerat, lenit, & humectat: Calidis ob id pectoris vitiis adprimè confert, Tussi, pleuritidi, peripneumonix, ac phthisi salutaris, nec non Catarrhis salis, acribus, & in pectus faucesque delabentibus perquam idoneus.

Sirupus de Fragis ex Pharm. August.

℞. Succu Fragorum depurati libras tres, sacchari clarificati ℥ iiii. Fiat lege artis sirupus.

Astuosis febribus, ac internis incendiis convenit. Calculos itidem atterit, urinas movet, & renum are-nulas expurgat.

Sirupus de Fumaria simplex ex eadem Pharm.

℞. Succu Fumiterre depurati ℥ i v. sacchari clarificati ℥ iiii. Fiat sirupus.

Aduſtos, salſos, ac retorridos humores concoquit, sanguinem mundificat, obſtuctiones reſerat, ventriculum & jecur roborat, iſterum tollit, ventrem lubricat, urinas proſicit, cutis vitia, pruritus & ſcabiem auferit, demum ex viſcerum inſarctu natas febres præſertim bilioſas Curat.

Sirupus de Glycyrrhiza Meſuæ ex Phar. August.

℞. Glycyrrhizæ ℥ iiii. capillor. veneris ℥ i. hyſſopi ℥ β. Aquæ ℥ iiii. ſpecies prædictæ in aqua prius fervefacta horis 24. macerentur, deinde decoquantur ad dimidias: colaturæ addendo mellis deſpumati ℥ vii. sacchari albi ℥ xvi. Aquæ roſar. ℥ vi. Fiat ſirupus ſ. a.

Thoracem, & pulmones expurgat: diſturbat, itemque ſiccæ tuffi, ac pleuritidi opem fert, aperit, tergit, aſperam arteriam & partes ſpirituales lenit, eaſque ad materiam expectorandam confirmat: incipientibus Thoracis affectibus frigidis & pituitosis ſaluber eſt; calefacit enim, incidit, tenuat, expurgat, lenit & moderatè ſiccatur.

Quamvis ſaccharum penidium ab alio ſaccharo, manum pharmaceuticam non experto, hand parum differat, quia tamen ſyrupos paulò herbidioreſ reddere ſolet, nec tamen virtuti eorum, ſi omittatur, multum detrahat, ejus loco ſacchar. album ſubſtituere in hoc ſyrupo aliſque nonnullis ſubſequentibus volumus.

Sirupus Granatorum Dulcium ex Pharm. August.

℞. Succu Granator. dulcium depurati ℥ iiii. sacchari albiſſimi ℥ iiii. coquantur in ſirupum.

Tuffim ſedat, exſecrationes promovet, humectando ſitim mitigat ac pectus lenit.

Granatorum Acido-dulcium ex eadem Pharm.

Paratur eodem modo, quo ſirupus granatorum dulcium.

Refrigerat & humectat: nauſeam ac vomitum bilioſum reſupprimat, febribusque bilioſis plurimum auxilii adfert.

Sirupus Antihecticus Riverij, ex Pharm. Schrod.

℞. Teſtud. lacuſtr. aut fluviat. in fruſta diſſect. ℥ iiii. cancor. fluviat. vivorum conſract. ℥ iiii. ſem. quat. frig. major. ℥ iiii. limacum per medium ſectorum m. ij. ſucci voron. mar. melon. an. ℥ i. vini albi ℥ vi. ſucci nicot. ℥ iiii. uvarum corinth. paſſul. an. q. ſ.

Ponantur omnia in magno matraccio bene obturato & ſinaptur digeri per 2. poſtea deſtillantur ex cineribus, & ex liquore deſtillato & ſacch. Cand. ℥ iiii. F. Syrupus. Cap. ℥ j. pro doſi paulò ante paſtum bis aut ter in die, adde ulus tempore lactis ſulph. perlarum an. gutt. vii. m. & exhibè.

Lac perlarum ſit terendo eaſ ſuper marmor in Alcohol irrorando aq. roſarum paulatim, deinde iterum terendo in mortar. marm. cum ſucco limonum ſtatim perlæ diſſolventur, filtra, Colatura fervetur.

Sirupus de Succo Hederæ Terreſtris ex Pharm. August.

℞. Succu hederæ terreſtris depurati ℥ iiii. sacchari albiſſ. ℥ iiii. coquantur, ut eſt artis, in ſirupum.

Ad internos abſceſſus, cruenta, & ſaniola ſputa ſalubris, phthiſi medetur, vaſa rupta glutinat, apoſtemata purulenta mundificat & ſanat: urinas, menſes ac ſudores promovet.

Sirupus Hydragogus Zuſſelſeri.

℞. Succu rad. iridis noſtr. carul. depurati ℥ iiii. radicum ſambuci, vel decocti ejus radicis fortis ℥ iiii. quibus mixtis immerge ſequentia incifa & conuſa, nimirum rad. recent. ebuli ℥ iiii. Enule ℥ iiii. calami arom. ℥ iiii. cort. medii ſambuci recent. ℥ j. medulle ſambuci ℥ i. baccar. juniperi ℥ iiii. Alkekengi, ſem. bardana major. naſurtii, urtica an. ℥ i.

Facta digeſtione brevi, coquantur ad ramanetiam ℥ iiii. coletur & exprimantur ſpecies, calatura clarificata adde ſacchari albiſſ. ℥ iiii.

Et denuò coquendo ad juſtam Conſiſtentiam ſirupus efficiatur, qui præſtans eſt in hydropica diſpoſitione & cachexia, educit teroſam humiditatem per urinam, ut & quandoque per alvum, ſumpſus ab ℥ i. ad ℥ iiii.

Hydragogus alius Hepaticus Ejusdem.

℞. *Succi Absinthij nostrat. ℥j. Epatica nobilis, Agrimonia an. unc. x. Iridis nostr. carul. ℥j. quibus succis commixtis immerge sequentia, incisa & confusa ut potè rad. recent. Ebuli unc. vi. calami aromatici unc. i. galangæ unc. j. medulla sambuci ℥vi. rosarum rub. recent. unc. i. i. i. santali rubri unc. β. bacc. juniperi unc. i. factaque maceratione die una, coquantur ad consumptionem ℥iβ. colatura expresse & alb. ovorum clarificata adde sacchari albi can. ℥i. i. & denuo ad syrupi consistentiam decoquantur, addendo ultimo pro aromatizatione Elaeosacchari cinamomi, caryophyll. an. ℥β. Fiat syrupus.*

Cacheeticis & hydropicis emolumento est, hepar roborat insigniter, ut & lienem, uncia una vel altera pro dosi frequenter exhibita.

Sirupus Florum Hyperici ex Pharmac. August.

Paratur ut syrupus de boragine.

Calculosis, ac renum dolores patientibus auxilio est, urinas movet, vermes enecat, nec non cordis cerebrique vires adauget.

Sirupus de Hyssopo Mesue ex Pharm. August.

℞. *Hyssopi, Rad. Apij, feniculi, petroselinj, glycyrrhizæ an. ℥x. hordei mundi ℥β. Tragacanthi, sem. malvæ, cydonior, an. ℥iij. capillor. veneris ℥vi. jujubarum, sebesten an. numero xxx. uvar. passer. major, ab arillis liberatar. ℥iβ. caricarum, dactylor. pinguium an. num. x. aquæ ℥viij. coquantur ad ℥v. consumptionem, expressum cum sacchari albi ℥iij. in syrupum ex arte percoquantur.*

Ultimus eo in morbis Thoracis invalescentibus, ex frigida, crassa, & lenta materia natis, ubi attenuatione, deterfione, ac expurgatione majore opus est: asthmaticos & tussiculosos juvat, obstructions aperit, hypochondriorum dolori, ac renum calculis utilis.

Sirupus Ivæ Arthriticæ, five chamæpityos ex Pharm. Londin.

℞. *Herb. chamæpityos m. ij. majorana, salvia, rosmarin. polij montani, origani, calamentha, mentastri; pulegij, hyssopi, Thymi, Ruta sativa & sylvestris, Betonica, serpylli an. m. j. Rad. Acori, Aristolochia longa, rotunda, Bryonia, dictamni albi, gentiana, pen-cedani, phu an. semunciam, Apj, Asparagi, feniculi, petroselinj, Rusci an. ℥j. pyrethri ℥β. stachados, sem. Anisi, Ammeos, carvi, feniculi, ligustici, seseleos an. ℥iij. uvar. passerum exacin. ℥v.*

Præviâ digestionem 24. horarum spatio in aquæ font. tepidæ ℥x. peractâ, destillantur in B. M. donec aquæ libræ quinque educæ fuerint. Tum factâ validâ fœcum expressione, colaturæ claræ q. s. Coquantur cum mellis optimi, & sacchari candidi, an. ℥i. i. ad Tabulati consistentiam; additaque aquâ prius destillatâ conficiatur syrupus in B. M. aromatizandus ol. cinnamomi nucis moschatæ an. ℥ss.

Sirupus de Jujubis Mesue ex Pharmac. August.

℞. *Jujubar. numero sexaginta, violar. sem. malvæ an. ℥v. capillor. veneris, hordei mundi, glycyrrhizæ an. unc. j. sem. papaveris albi, melonum, lactuca, cydoniorum, Tragacanthi an. ℥iij. aquæ font. ℥ix. coquantur ad Tercias, colatura addendo sacchari ℥iij. F. s. a. syrupus.*

Mangeti. Bibl. Pharm. Tom. II.

Ad tussim siccam, arteriæ asperitatem, omnesque thoracis & spiritalium partium affectus à fluxionibus calidis ortum habentes adcommodatus, sputum tenue suo lentore maturat, incrassat, glutinat, & expectorat: cum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci, frigido, & mucoso ideoque leniente opus est.

Simplex fit ex ziziphis centum in aquæ cœlestis ℥iv. ad dimidias coctis, cum sacchari ℥j. unils ad tenues in pectus destillationes, & sputum liquidius modicè incrassandum.

Sirupus Lienteticus D Daquin.

℞. *Summit. Absinthij major, rosar. rubr. exungular, an. m. i. j. limatura chalybis nodulo inclusa ℥ij. rhei electi, & cortic. myrobolanor. citrinor. an. ℥iβ. tartari pulverati ℥j. santali rub. confusi ℥β. in vase fictili vitreato collocentur, cum succor. plantag. & rosar. rub. an. ℥i. i. & cineribus cal dis hor. 24. committantur; deinde lento igne per horæ quadrantem bulliant, colentur & exprimantur, liquor verò ovi albumine cum sacchari optimi ℥v. Clarificetur & coquantur in syrupum.*

Admodum efficax est hic syrupus in sistendis lenterijs, stomachum, hepar, lienem & intestina omnia corroborat, acrimoniam humorum obtundit, & hæmorrhagias interiores sistit, datur ab ℥β. ad ℥iβ. mane jeuno stomacho solus aut liquori appropriato admixtus.

Sirupus de Limonibus eu Pharm. August.

℞. *Succi limonum maturor. depurati ℥iβ. sacchari albiss. clarificati, ultra tabellarum consistentiam cocti ℥iij. Fiat secundum artem Sirupus.*

Refrigerat & actimoniz suæ vi penetrat; internis incendiis summopere conducit, putredinem arcet, ac lumbricos enecat: cor & stomachum reficit, eorumdemque vires tuetur.

Sirupus de Lupulo, ex eadem Pharm.

℞. *Succi depurati lupuli ℥iv. Fumariæ ℥j. sacchari clarificati ℥iv. Fiat syrupus.*

Ad jecoris intemperiem calidam, & bilis effervescentis impetum retundendum utilis: sanguinem purgat, ejusque ebullitionem temperato calore compescit; biliosis insuper febribus, synochis, cephalagiæ calidæ, internisque fericoribus confert, ictero perquam idoneus.

Paratur quoque hic syrupus ex solo lupuli succo, prout Mesue cap. de volubili docet.

In hujus syrupi confectioe studendum, ut succus è primis emergentis lupuli turionibus, seu asparagis, ante enata folia, exprimatur, non autem cum jam planta provectior in caules adolevit.

Sirupus Mastichinus è Pharm. Norimberg.

℞. *Aquæ mastichinæ ℥j. sacchari ad consistentiam Tabulati inspissati ℥j. misceantur & fiat syrupus, ut artis est.*

Mastichinus alius stomachalis Zuveifferi.

℞. *Aquæ mastichinæ stomachicæ nostr. in classe xv. descripta ℥j. cui adde sacchari albi can. ℥xxx. ac solâ ejusdem dissolutione, lenissimo in calore fiat syrupus gratissimus, ventriculo ut & cerebro roborando in affectibus eorum frigidis efficax. Dosis unc. β. ad unc. iβ.*

Sirupus de succo Melissophylli ex Pharm. August.

℞. *Succi melissophylli, seu citrariæ veræ ℥iij. abstrahantur leni arena calore ejusdem ℥vi. in remanentia solvatur sacchari albi ℥iβ. clarificetur cum*

Bbbb 2 abba

albumine ovi, & ad debitam consistentiam cocta, addicta aqua per distillationem abstracta Fiat syrupus.

Ad cordis vires reparandas efficax: lipothymias sanat, spiritus auget, ac pestilentium febrium malignitati adversatur: uteri insuper affectibus summopere prodest, immunditiam enim expurgat, & menses moram trahentes ejicit.

Cum huic syrupo partes subtiliores, coctione alias exhalantes, conservare præstet, distillatione eadem a fuga retractas, ut pharmacopæi nostri, ceu jam dudum observare prudentiores consueverunt, porro conjungant, non prohibemus.

De Succo Melissæ Compositus ex Pharm. Londin.

℞. Corcicum radicem buglossi ℥ij. Rad. dictamni albi, pentaphylli, scorzonera an. ℥ss. fol. melissophylli, scabiosæ, succisæ, flor. buglossi utriusque, rosmarini an. m. j. sem. oxalidis, citrij mali, fœniculi, cardui benedicti, citri an. ℥iij.

His diem integrum macerandis affunde aquæ fontanæ, tepentis ℥iv. coque in B. M. dein liquoris valde expressi & clarificati ℥iij. adde succi mellissæ depurati, aquæ rosar. rubrarum an. ℥ss. sacchari crystallini ℥iv. Fiat syrupus in B. M.

Sirupus de Succo Menthæ ex Pharm. August.

Fit ad modum. Sirupi de succo Melissophylli.

Ufus ejus præcipuus est stomachicus, quem roborat, calefacit, coctionem juvat, cruditates emendat, singultum & vomitum inhibet, ac flatus dissipat;

De Mentha minor Mefuæ ex Pharm. August.

℞. Succu mentha depurati, granator, dulc. acidorum sacchari an. ℥ij. coquantur secundum artem.

Commendatur in ventriculi interperie frigida, ideoque vomitum, nauseam & singultum sedat, ac alij fluorem, Retentricis facultatis imbecillitate subortum sistit, stomachum quoque, & ventrem inferiorem totum blando suo calore, lenique adstrictione confortat.

De Mentha major Mefuæ ex eadem Pharm.

℞. Succu cydonior. acido-dulcium, & dulcium; granatorum acido-dulcium, dulcium, & acidorum, an. ℥iij. in succis his, horis 24. macera mentha sicca ℥iij. rosarum rubr. ℥ij. coquantur lento igne ad dimidias; & postea colentur, addendo sacchari ℥ij. ad perfectionem, in fine autem aromatizando galie moschata vera, vicia & in sindone ligata ℥iij.

Priore longè præstantior, sed multum quoque pretiosior; in quo parando mentha parum sicca sumenda est, quæ supervacaneam humiditatem, suis flatibus ventriculum turbantem, deposuerit.

Sirupus de Succo Mercurialis ex Pharm. August.

℞. Succu mercurialis depurati ℥iij. sacchari ℥iij. coquantur in syrupum.

Ejus usus ad onemata paranda commendatur: alvum enim leniter subducit, biliosos & aqueos humores evacuans: uterum quoque impurum mundificat, & conceptioni habilem efficit.

Sirupus de Moris Compositus ex Renodæd.

℞. Succu mororum domesticor, non omnino maturorum ℥ss. succu mororum rubi sylvestris, mellis albi despumati an. ℥i. sapa ℥iv. coquantur, ut artis est, in syrupum.

Ut diacodij loco, quod olim opiæ forma parabatur, nunc syrupum de papavere simplicem habemus, sic pro diamoro, syrupum de moris: ad cuius confectionem multi adjecerunt succum fructus rubi idæi & fragorum: sicque ex tribus mororum generibus conficiunt, alij utrumque relinquunt, atque sapam: fit autem succorum simul cum melle coctio ad consistentiam tantum syrupi, qui dilutior est diamoro, seu rob de moris, quod nunc vix paratum reperitur, sed ejus loco syrupus mororum compositus capite superiore descriptus.

Multum quoque probarem syrupum de moris simplicem, ex eorum nempe succo & saccharo paratum: cui si portio aquæ rosacæ adiceretur, & gratiorem, & ad multa efficaciorẽ præsertim ad roborandum, & fluxiones sistendas judicarem.

Syrupus de moris compositus valet contra depascentia oris ulcera: ad dentium quoque & gingivarum affectus. Ad columellam, seu uvulæ relaxationem, & ad omnia oris vitia, & per se sumptus ex cochleari, & dilutus in decocto convenienti in formam gargarismatis.

Sirupus de Mucilagibus ex Pharm. Londin.

℞. Sem. Althææ, malvarum, cydonior. an. ℥ij. gummi Tragacantha, in sedulo inclusi ℥iij. horum perfusioni sex hora concedantur in decocto tepido Malvarum, sem. papaver. albi, & granorum Alkekengi.

Tum exprimatur mucilago ad sesquiunciam; ex qua, cum decocti prædicti ℥iij. sacchari albi ℥iij. F. Syrupus s. a.

Sirupus Myrthius Compositus Mefuæ ex Pharm. Londin.

℞. Baccarum myrti ℥xxx. Rosar. sandali albi, rub. & rubri, sumach, balauftior, berberum an. ℥xx. melleol. ℥xxx. succu pomorum agrestium, cydoniorum an. ℥ss. omnia cum aqua fontis ℥viii. coquantur ad medietatem & cum sacchari ℥iij. Fiat secundum artem syrupus.

Efficax ad Thoracis & pectoris affectus, ut hæmorrhagiam pulmonum tenuem, & calidam tussim: hæmorrhagiam omnem, utpote pectoris, uteri, renum, ac abundantia menstrua cohibet, diabetem reprimat, & omnem immodicam vacuationem, uti ventris profluvium, vomitum sistit; quia refrigerat, siccant, & adstringit.

Commodissimè paratur hic syrupus autumnali tempore, quando mespila matura quidem, sed durissima adhuc, nec temporis morâ vel diuturniore sua emollita prostant.

Sirupus Nephrocatharticus Jouberti ex Pharm. August.

℞. Quinque radicem aperient, an. ℥ix. Rad. raphani, sylvestris, ononidis, bardana, Erica, rubi, Eryngij, levistici, rubea majoris an. ℥i. macerentur confusa, in aceto per diem naturalem: postea accipe. Rad. calami aromac, cyperi, Asari, valeriana, althææ, cort. rad. capparis, citri sicci an. unc. ss. saxifragia cum rad. plantaginis cum radicibus an. m. ij. summitatum malva, parietaria, urtica, asparagi, Betonica, pimpinella, quinque herbar. capillarum, nasturij, sifimbrij aquatici, berbe, id est, sij, seu laveris, crithmi marini, fragaria an. m. j. pulpa passular, minor, junubarum, sebesten, glycyrrhiza rasa an. unc. i. j. caricarum pinguum numero triginta, granorum. Halicacabi, Juniperi numero viginti, quatuor sem. frig. m. j. ram.

rum, minorum, sem. milij solis, urtica, ocymi an. unc. ℥. carvi, dauci, seseleos an. drach. 11. florum cordialium, genista, hyperici, Matrisylvæ seu caprifolij German. an. pari. 1. coquantur in sufficienti quantitate decocti hordei, addito aceto infusionis radicem. ℥i. colatura adde succi limonum ℥i. sacchari & mellis despumati an. ℥11. Fiat Syrupus qui aromatizetur cinnamomum. j. nucis moschatae ℥℥. reponatur in usum.

Laboriosa hujus syrupi confectio, ejus tamen usus quondam apud nos increbuerat, ob vires, quibus in clenda urina, renibusque à sabulo liberandis pollet: calculos enim atterit, arenulas expurgat, urinarios meatus aperit, & mundificat, datur commodissimè cum decocto Herniarie aut cicerum rubrorum.

Sirupus Nephriticus primus Zuelferi.

℥. Rad. recent. Apij unc. j. petrosel. unc. 111. ononidis, pimpinel. an. unc. 13. calami arom. liquoris, an. unc. j. bulb. asparagi recent. unc. iv. herb. recent. nasturij hortens, petroselini, Ruta muraria. an. unc. 111. bacc. juniperi unc. 1℔. Alkekengi unc. 1. sem. nasturij, urtica an. unc. ℥. saxifragia, dauci, Thlaspios. carvi an. 3vi. incisa & contusa coquantur in s. q. aqua simplicis, (vel in aqua betule, si haberi possit, scil. qua tempore veris ex arbore betula sancta sponte effluxit) ad remanentiam ℥ii. colatura cum expressione facta probe clarificetur, cui adde succi raphani hortensis radula comminuti recentier expr. & depurati libr. j. sacchari canarij albi libras 11j.

Et ad consistentiam debitam syrupi denuo coquantur. Vires habet eximias in clenda urina, exturbando calculo & sabulo, cum renum, tum vesicæ, renes, meatus urinarius etiam vesicam mundificat, calculi propagines, ipsas arenulas exturbando, velut in herba seminum præcidit, supposito quod ejus usus continuato vigrat, exhibendo pro dosi unc. j. ad unc. 1℔. in decocto cicerum & petroselini.

Secundus ex Eodem.

℥. Limon. pomorum recent, succulentior, minimè confisorum cum toto, exceptis seminibus num. xij. raphanorum hort. & hyemal. grand. ad instar raphanum radula comminutor. ℥ij. ceparum recent. contusarum ℥j. ex his omnibus mixtis & contusis in mortario lapideo, ac per biduum maceratis, exprimitur tandem succus, qui probe depurandus & quocunque modo clarificandus sine violenta coctura, hujus succi accipe circiter ℥ij. cui adde sacchari albi can. ℥ij.

Ac unica saltem ebullitione confice syrupum debitæ consistentiæ, qui eadem cum priori syrupo, imo potentiores in remorante urina cienda, ac pellendo sabulo virtutes obtinet; conterit proprietate substantiæ suæ calculos in venibus, eosque extrudit, si ejus usus frequens sit, eodem quoque modo: quo prior syrupus in decoctis cicerum & petroselini, eorum jusculis, & aquis sequentibus destillatis nephriticis commodè propinandus ab ℥℥. ad 3j.

Tertius ex Eodem.

℥. Succo charesfolij recentier expressi & depurati ℥i. raphani hortensis mai. hyemalis recentier expr. & purificati ℥℥. vini albi rhenani ℥℥. in quo autem prius Bacc. juniperi conquassat. 31. macerata fuerint, in his succis & vino unitis solvatur, magist. n. solubilis oculor, cancrorum cum spir. veneris par. 3℥. omnibus porro probe filtratis adde sacchari albi can. q. s. Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

nimirum ad ℥j. liquoris 3. circiter xx. sacchari, ut sola ejus dissolutione leni calore, & in vase ferreo, syrupi durabilis consistentia emergat, qui aromatizandus Elaeosacchari cinamomi 3j. vel 3ij. Fiat Syrupus.

Cujus virtutes ex superioribus elucefcunt: hydropleis Ascite & anasarca laborantibus salutaris est, pro dosi 3℥. ad 3j. sumptus.

Sirupus Nephriticus D. Daquin.

℥. Rad. althææ, ononid. fragar. bardana & s. aperientium an. 3℥. fructuum alkekengi & cinosbati an. unc. 11j. seminis bardana, milij solis sileris mont. 4. frigidior. major. mundat, nucleor. mespilor. & persicor. an. 3j. folior, saxifragæ, pimpinellæ, charesfolij, virgæ aureæ, hyperici, capilli veneris Monsp. an. m. j. Tartari albi pulverati 3j. coquantur ex a. in aq. parietaria ℥x. colatura cum sacchari optimi ℥v. clarificetur & coquatur in syrup. Elaeosaccharo anisi aromatizandum. Dosis ab 3j. ad 3j. in emulsionibus aut liquoribus alijs appropriatis.

Sirupus Nicotianæ ex Pharm. Schroder.

℥. Succo peti ℥iv. hydromelut. simpl. ℥j. oxymelit. simpl. 3iv. omnibus simul mixtis, fiat digestio in MB. & 2. vel 3. ut defecetur; hinc decanta, ac digere iterum ut supra, donec materia ab omni feculentia depurata fuerit, adde postea sacchari ℥j. & coque in syrupum.

N. Saccus peti opus habet perexquisita & ingeniosâ digestionem, qua vis vomitiva, ac dejectiva corrigitur, atque in syrupum abit præstantissimum adversus omnes affectus asthmaticos, in quibus pulmonum bronchia puritâ crassâ & viscosâ infarciuntur, ut interceptâ respiratione suffocationis periculum imminet, in quo casu hic syrupus ritè preparatus & administratus mira præstat, cerebrum insuper à catarrhis, live fluxionibus serosis & frigidis liberat, simulque per inferiora educit.

Dosis cochlear. 5. ubi tamen à principio summa opus est circumspectione, postea verò dosi augenda erit.

Alius ex eadem Pharm.

℥. Succo peti (nicotiana) depurati (ut supra) ℥i. ℥. hydromelutis simpl. ℥j. in quibus macera per & 2. vel 3. MB. fol. hyssop. polirrh. Adiant. Flor. tussilaginis stachad. violar. buglossi an. p. 1j. sem. bombac. urtit. card. bened. an. 3j. Follicul. sene 3ij. Agaric. rec. trochisc. 3j. cinamom. macis, caryophyllor. an. 3j. deinde fortiter exprimantur, digerantur denuo ad perfectam Fæcum depurationem colaturæ ℥i. ℥. adde tantundem sacchari, coquantur in syrupum.

Vires. Ad anhelosos & asthmaticos aliosque affectus omnes pulmonum à frigidis & crassis humoribus subortos, qui pulmonum bronchiis inherentes, vel tussim antiquam, vel ipsam dyspnœam pariunt excellentissimum est remedium, alvum leniter solvendo, dosi unc. 1℔. vel unc. 1j. ad summam.

Sirupus Nymphaeæ simplex Nicolai ex Pharm.

August.

Fit ex florum nymphaeæ alba infusione, prout Syrupus rosatus.

Insigniter refrigerat, somnum conciliat, viscerum ætus mitigat, veneris infommia cohibet, semen immodicè fluxus restringit, sitim temperat, ac febrium ardores compescit.

Sirupus Nymphææ compositus Franc. Pedemontani ex eadem Pharmacop.

℞. Flor. nymphææ alba ℥ii. citrina, psyllij integri, sem. acetosa an. ℥j. quatuor frigid. major. an. ℥ß. minor. an. ℥ii. rad. feniculi ℥j. coquantur in aqua hordei ℥iv. ad medias: Colatura addantur sacchari ℥vj. succi granatorum acidior. Aceti an. ℥i. Fiat lege artis sirupus qui aromatizetur cum sandali citrini, spica indica an; ℥iß.

Valeat ad biliosarum vehementiumque febrium æstus, dolores à bile procreatos, & capitis fervores, insomnium levat, sitim extinguit, ac potenter refrigerat & humectat.

Describitur hic sirupus à Pedemontano in cap. de calida intemperie hepatis simplici & composita additurque ei spica, ne suâ frigiditate obstructions pariat.

Sirupus de Olibano Rhasis ex Weckerô.

℞. Aceti veteris ℥iii. succi mal. granat. acet. Acetosatis citri, Agrestis Acidula, mororum, in quo sumach fuerit decoct. berberis an ℥bj. lactuca, Endivia sylvest. an ℥iii. decoctionis jujubarum. infusionis lentium an ℥iß. sacchari ℥iii. Fiat sirupus, deinde ℞. spodij ℥ß. capphura ℥j.

Terantur in mortario, & incorporentur cum syrupo, donec fiat unum corpus, & conspergatur ter cum frusto cucumeris, oblatus ante originem variarum & morbillorum abscondit eorum emersionem: quod si forte apparuerint 20. non perficienter decem refrigerando calorem & putrefactionem prohibendo, nisi quod videatur vehemens materia expulso, quæ tunc juvatur, idem datus cum calida, confert omnibus ægritudinibus sang. cholerae, bubonibus, anthraci, anginae, & consimilibus.

Sirupus de Pœonia ex Pharm. August.

℞. Paratur hic sirupus, ex florum infusione; quamvis aliqui itidem ex ipso florum succo eundem conficiant.

Epilepsiæ, convulsionibus, ac spasmo auxiliatur: comitialis morbi insultus frangit, menses ducit, uterinis quoque alijs affectibus opitulatur.

Sirupus de Pœonia Compositus ex Pharm. Londin.

℞. Rad. recentis utriusque pœonia plenilunio extracta; & post dissectionem in Taleolas, in vino albo odorifero, spatio integri diei, infusæ, an ℥iß. contrayerva ℥ß. sideris montani ℥vi. ungula Alcis ℥i. herb. rois marini cum floribus mj. betonica, hyssopi, origani, Iva arthritica, Ruta, an. ℥iii. liquor Aloës, caryophyl. aromaticorum sem. cardamomi minor. an. ℥ii. zingiberis, spica nardi an ℥i. stœchados, mucis moschath an ℥ii. ß.

Post unius diei tepidam digestionem, in aquæ destillatæ radicum pœoniæ ℥vi. coque in B. M. ad ℥. iv. in colaturam, mediante manicâ factam, iniice sacchari albißimi ℥. iv. ß. & percoque in syrupum, in B. M.

Sirupus de Papavere Simplex Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Caput papaveris albi & nigri recentium & seminibus, an ℥viiiß. Aqua pluvialis ℥viii. decoquantur ad remanentiam ℥iß. cui addantur sacchari albiß. ℥viii. Fiat sirupus, ut est artis.

Uso creber, arcendis defluxionibus calidis, tenuibus & acribus in Thoracem ruentibus, quæ asperam arteriam faucesque exasperant, & vigilare cogunt, proinde tussim ex defluxionibus ijs enatam pellit: leniore autem suo gutturi asperitatem lenit, caloris incendium mitigat, sitim sedat, somnum conciliat,

refrigerando nimirum & humectando, tum ex accidenti, sedatâ videlicet tussi, quæ vigilias parit.

Sirupus de Papavere Compositus Mesuæ ex eadem Pharmac.

℞. Caput papaveris albi & nigri cum suis seminibus an ℥vi. & ℥ii. capillorum veneris ℥xv. glycyrrhiza ℥v. jujubarum numero triginta, seminis lactuce ℥v. malva, cydoniorum an ℥vi. coquantur in ℥viii. aq. ultra medietatis consumptionem: postmodum accipiendo colatura ℥iii. sacchari albi, penidij an ℥i. Fiat sirupus.

Somnum conciliat, & refrigerat, catarrhum, Tussim siccam, phthisim sedat; alvi etiam profluvio, ac dissenteria, quam materia acris & biliosa effluxus excitat, medicatur, intemperiem calidam & siccam intestinorum emendat.

Sirupus de Papavere erratico ex Pharm. August.

Fit ex florum infusione, ut sirupus de boragine: quamvis ex succo quoque parari queat.

Ad ardentium febrium vehementes æstus adhibetur, quos potenter extinguit, vigiliasque arcet; calidis præsertim pectoris malis, ut pote peripneumonia, acribus destillationibus, faucium inflammationibus, ac pleuritidi, cui à proprietate quam maximè prodesse creditur, salutaris existit.

Sirupus Florum Paralyseos ex Pharm. August.

Paratur ex florum infusione, ut sirupus de boragine.

Frigidos nervorum ac cerebri morbos egregiè curat, datur convulsis, tremulis & paralyticis: cordis etiam vires tuetur, ac oris ulcera perfanat, atque in eundem usum, mel quoque simili modo paratum olim prostabat.

Sirupus de Pede cati ex Pharm. Norimberg.

℞. Dactylorum mundat. Ficum recens, passularem enucleat. Jujubarum, sebesten an ℥iv. ungula caball. pulmonaria maculosa cum floribus an m. ij. Pedis cati, ceterach, an m. i. liquiritia rasa ℥i. Fiat decoctio in s. q. aqua fontana hujus ℥ii. cum pari pondere sacchari, in syrupi formam redigantur.

Vires. Pectoralis est ac nutritivus, undè his qui phthisi laborant, solamini magno esse poterit.

Sirupus Antiphthicus Vulnerarius Zuverseri.

℞. Aqua oculor. populi arboris, aqua summitat. Abietis seu laricis arboris an. tempore veris sine additione ullius rei, ex balneo n. vapor. destillat. ℥ii. in his mixtis aquis macerentur sequentia saltem incisa, utpote rad. recent. Enule camp. sanicula an ℥iß. Tormentilla ℥i. cichorii sylv. ℥ii. pimpinella ℥i. symphyti majoris ℥vi. herb. recent. veronica ℥iii. hederæ terrestr. millefolij, consolid. sarac. flor. recent. papav. errat. rosar. rub. ana ℥ii.

Maceratione sufficienti peractâ in vase bene clauso, & moderato calore, fiat colatura, cum forti expressione, expressum alb. ovorum in alembico vitreo, suo capitello munito, protie clarificetur, interimque asservatur, jam verò.

℞. Species ab infusione relictas, quibus porro adde, rad. recent. Enule camp. ℥iß. sanicula, cichorii sylvest. an ℥ii. pimpinella, symphyti major. Tormentilla an ℥i. herb. recent. veronica, hederæ terrestr. millefolij, pulmonar. maculosa, consol. seracen. flor. recent. papav. errat. rosarum rub. an ℥iii. incisa coquantur in s. q. aq. simpl. repetitis vicibus, quousque omnis virtus extracta sit, colatura omnes junctim clarificate, additis sacchari can. albi ℥vi. ad consistentiam quasi Tabulari demum

coquantur, addendo tandem Aquam superius asservatam & essentificatam in tanta quantitate.

Ut una vel altera ebullitione syrupi consistentia emergat. Fiatque syrupus, qui in omnibus exulcerationibus internis phthisi, vomica, pulmonum, Empiematibus, vulneribus profundis, præsertim pectoris salutariter exhibendus, sive per se, sive in vehiculis appropriatis, utpote aquis vulnerarijs, sero lactis caprini, imo in lacte caprino ipso ab ℥j. ad ℥ij.

Nota: summo vere destillantur supradictæ aquæ ex oculis populi, & summit. Abietis, asserventurque donec reliquæ herbæ, flores & radices recentes iis infundendæ erumpant. Sic minus difficilis syrupi hujus erit præparatio.

Syrupus de Pilosella seu Hispidula Renodei
ex Ph. Aug.

℥j. Summit. floridarum & recentium pilosella ℥ij. infundantur per horas xii. in ℥v. aquæ calentis, deinde lento igne bulliant, abhinc colatura libris addendo sacchari lbiii. coquantur ex arte in syrupum.

Ad plurimos pulmonis affectus depellendos maxime idoneus; ejus enim vulnera sanat, & ulcera retardat, exhibetur potissimum iis, quibus à capite aut alijs partibus in thoracem fit defluxio, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur: siquidem humoris irruentis impetum cohibet, influxum coquit, partem affectam roborat, ac expectorationem promovet.

Syrupus de Pilosellâ Compositus ex Pharm.
Londin.

℥j. Pilosellæ m. iii. rad. Alchimilla ℥i. & β. consol. majoris, rubiæ, dictamni albi, Tormentilla, bistortæ an ℥i. herb. pyrolæ, cande equine, hedera terrestris, plantag. ophioglossi, fragariæ, hypericonis cum floribus, virgæ aureæ, agrimonie, betonicæ, pimpinellæ, caryophyllatæ, quinque folij majoris, cantium rubr. balaustrorum rub. an m. i. coque in aquæ plantaginis ℥vi. paulatim ad medias, deinde fiat cum forti expressione colatura; cui clarificata per subsidentiam adde mucilaginis gummi. Tragacanthæ. sem. psyllij, Althææ, cydoniorum, jecursum in aqua fragariæ, & betonicæ, extracta, an ℥iii. sacchari albi ssimi ℥i. simul coque ad mellæam consistentiam.

Syrupus de succo Plantaginis ex Pharm.
August.

℥j. Succo plantag. defecati ℥iii. sacchari albi ℥ij. coquantur, ut est artis, in syrupum.

Utiliter internis vasorum disruptionibus adhibetur: proinde cruentis spuiis, ac renibus sanguinem fundentibus auxilio est, dysenteriam quoque, hæmorrhoidas, & menses nimium fluentes reprimat, internosque sinus glutinat.

Syrupus de Pomis Simplex Mesuæ ex Pharm.
August.

℥j. Succo pomorum dulc. Acidorum an. defecatorum ℥v. cum sacchari ℥iii. Fiat syrupus.

Cor imbecillum roborat, syncopi, cordis palpitationi, ac omnibus cordis affectibus ab atra bile natis succurrit: ventriculum firmat, sitim sedat, febribusque biliosis auxiliatur, cor, & facultates ejus omnes sopitas excitat, ac latitiam inducit.

Syrupus de Portulacâ Mesuæ ex eadem Pharm.

℥j. Sem. portulacæ lb. succi Endivia costi & depurati. ℥ii. sacchari ℥i. succi granator, acidorum ℥ix. Tritum semen in succo endivia macera 24. horis, postea lento igne coque ad dimidias: deinde cum saccharo s. a. percoque in syrupum.

Potenter refrigerat, sitim inexhaustam sedat, tebrum ardores, ventriculi, & jecoris calidam intemperiem moderatur, eo efficaciter utuntur ad lumbricos, & interaneorum animalia expellenda, cortice citri indito.

Syrupus de Prasio Mesuæ ex Pharm. August.

℥j. Prasij, seu marrubij albi non admodum sicc. ℥ii. glycyrrhizæ ℥j. capillor. veneris, hyssopi an ℥v. i. calamintha, anisi. rad. Apij, feniculi an ℥v. Iridis, sem. malvæ, Fœnugraci an ℥iii. lini, cydonior. an ℥ii. passulorum major. ab arillis liberatæ. ℥v. caricar. pinguium num. xvi. coquantur in aqua pure ℥ix. ad dimidias: expressioni addantur sacchari albi, mellis despumati an. lbii. Fiat lege artis syrupus.

Ad longos & diuturnos thoracis affectus, tussim anhelam, senibus & frigidis naturis familiarem, ex crassa, frigida, viscida & lenta materia, perquam salutaris, Asthmaticis prodest, suppuratorum pus egregie dissolvit, incidit, tergit, atque educit.

De Prasio alius ex Pharm. Londin.

℥j. Fol. prasij albi recent. ℥ii. rad. glycyrrhizæ, polypodij quercini, Apij, feniculi, an ℥β. fol. Adianti albi, origani, hyssopi. calamintha, Thymi, scabiosæ, saureiæ, Tussilag. an. ℥vi. sem. Anisi, Cydonior. in nodulo inclus: an ℥iii. uvarum passur. exacinator. ℥ii. caricas pingues n. x.

Digestione diem integrum in hydromelitis diluti calentis ℥viii. peractâ, coque in B. M. factaque validâ expressione, colaturæ claræ lbv. addantur mellis despumati & sacchari albi clarificati an lbii. Fiat syrupus in B. M. condiendus. rad. Iridis Florentinæ ℥i.

Syrupus Prunorum sylvestrium ex Pharm.
August.

℥j. Succo prunor. sylvestr. depurati ℥iii. sacchari clarific. lbii. coquendo Fiat syrupus.

Vim habet exsiccandi, adstringendi, & incrassandi; unde in profluv. alvinis, & sanguineis utilis censetur.

Syrupus de Duabus Radicibus ex Pharm.
August.

℥j. Rad. petroselinî, feniculi an ℥iv. Aquæ ℥v. coque ad medias: colatura adde sacchari albi ss. ℥ii. Fiat ex arte syrupus.

Obstructionem viscerum aperit, humorum crassitatem extergit, purgat & tenuat: urinas promovet: in febribus compositis & nothis prodest, ventriculum bile ac pituitâ refertum allevat. renum, lienis & jecoris infarctus penetrat.

De Quinque Radicibus Mesuæ ex eadem Pharm.

℥j. Rad. Apij, Fœniculi, petroselinî, Asparagi, Rucici an ℥i. Aquæ font. ℥vi. coquantur ad tertiam partem consumptionem: expressum coquatur denuo s. a. cum sacchari lbiii. addendo ad finem Aceti albi ℥viii.

Humorum lentorem incidit, & præparat, obstruetaque potenter aperit.

Syrupus Raphani compositus ex Pharm.
Londin.

℥j. Rad. raphani domestici, sylvestr. an ℥i. saxifragæ albæ, rusci, levisstici, Eryngij, ononidis, petroselinî, feniculi, an ℥β. fol. betonicæ, pimpinellæ saxifragæ, pulegij, cymanuræ urticæ urentis, nasturtij aquatici, criethmi, callitrichi, sive capillor. veneris an. m. j. Fructuum Halicacabi, jujubarum an. p. x. sem. ocimi, bardanæ major. petroselinî Macedon. seseleos, carvi, dauci cretici, lithospermî, cort. rad. capparis an. ℥ii. uvarum passurum, demptis vinaceis, glycyrrhizæ an. ℥vi.

Macerentur diem integrum in aquæ font. Calentis lbx. tum destillentur in balneo Mariæ. Educendo aquæ lbvi quibus immergantur, Cinnamomi ʒj. nucis moschatæ ʒß deinde magna valide exprimatur, & colaturæ claræ q. l. Tabulati consistentiam æquantur; demum addendo aquam prius destillatam, F. Syrupus in B. M. f. a.

Syrupus Regius, aliàs Julapium Alexandrinum ex Pharm. Londin.

℞. Aquæ rosarum rubrarum lbiiij. sacchari albissimi lbj. Fiat ex arte Julapium.

Syrupus de Ribibus ex Pharm. August.

℞. Succo Ribium depurati lbiiij. sacchari lbß. Fiat ex arte syrupus.

Incendio febrili salubris existit, excalefacta viscera acoris sui jucunditate plurimum recreat, sitim sedat, nec non cholera, Cardiacisque succurrit.

Syrupus Rosatus simplex ex Phar. August.

℞. Rosar. rubr. recentium lbxij. Aqua pura calentis q. s. Rosa contusa stent in infusione per horas 24. tum colentur, & colatura addantur sacchari lbiiij. Fiat s. a. syrupus.

Abstergit, aperit, lenit, ac concoquit: bilem crudam & humores pituitosos, febrium fomitem præbentes expulsioui præparat, alvumque molliorem reddit.

Syrupus de Rosis siccis ex eadem Pharm.

℞. Rosar. rubr. exsiccatar. lbj. infundantur in Aqua calentis pure sufficiens quantitate, horis 24. postea in expressione diluatur sacchari albiss. lbj. & coquantur ex arte in syrupum.

Ad omnem alvi fluxum sistendum commendatur: cæliacos, lientericos; ac dysentericos juvat: partes internas roborat, ulcera detergit, ac glutinat, vomitum compescit, nec non uteri rheumatismum cohibet.

Syrupus de Rubeo Idæo ex eadem Pharm.

℞. Succo bacchar. Rubi Idæi depurati lbiiij. sacchari albi lbß. coque s. a. in syrupum.

Febrium æstus mitigat, cordis defectiones arect, Lipothymias fugat, alvum blandè adstringit, ob id diarrhoeæ & dysentericæ, biliolisque alvi fluxionibus opituitur: Cordis insuper vires supra gemmas ac uniones tutatur & auget.

Syrupus de Scabiosa ex Pharm. August.

℞. Succo scabiosæ defecati lbiiij. sacchari lbj. semis, coque ex arte in syrupum.

Pectoris noxis plurimum prodest, & anhelam senum ruffim subleuat, pleuritidi confert, malignis febribus resistit ac apostemata dissolvit, & repurgat.

De Scabiosa alius ex Phar. Londin.

℞. Rad. Enula camp. polypodii querc. an. ʒij. passular. major. enucleatarum ʒi. sebesten n. xx. fol. Tussilag. pulmonaria, Satureia, calamint. ana m.ß. glycyrrh. mundata ʒß. Tabaci Hispanici optimi, sem. urticae urentis an. ʒiiij.

Coquantur omnia in B. M. (radicibus duobus primis vino albo pridie immersis) in q. l. aquæ mulæ dilutæ; deinde lbiiij. valide expressis & clarificatis. Adde succo scabiosæ depurati ʒiiij.ß. sacchari albi lbj. F. Syrupus f. a. in B. M. alterandus spir. Sulphuris per campanam guttis xx.

Syrupus Sceletorbicus ex Pharm. August.

℞. Succo nasturtii aquatici, Beccabunga ana lbß. sumaria, lupuli an. ʒiiij. lento igne destillando abstrahantur ejus ʒiiij.ß. Residuum cum sacchari ʒviij. clarificetur, &

ultra Tabulati consistentiam coctum, cum aqua destillata permisceatur ad debitam syrupi consistentiam.

Scorbuto in primis medetur, ejusdemque symptomata varia mitigat; lienis, & venarum meftricarum obstructions aperit, erosioni oris, & gingivarum minime prodest.

Sceletorbicus alius ex Pharm. Norimberg.

℞. Passular. Corinhiacar. succo Acetose inebriatarum ʒi.ß. radicum polyp. quercini ʒß. bistorta ʒij. Asari, liquoritiae, oxylapathi, an. ʒij. corticum radic. capparum. Tamarisci, Sem. Anisi, feniculi an. ʒi.ß. urticae ʒiiij. Agni casti ʒj. herb. cuscute, Acetose, capillor. veneris, lichenis petrai, ceterach, lingua cervina an. m.ß. Thymi, Epithymi an. p. ij. flor. boraginis, buglosse, violarum, an. p. cinamomi ʒi.ß. præmissa destillatione, F. decoctio in aqua purissima f. q. ad ramenentiam lbj. in colatura clarificata dissolve sacchari albissimi lbj. iterum coque ad spissam consistentiam & affusa destillati f. q. Fiat Syrupus.

Sceletorbicus alius Zuvelfferi.

℞. Herb. recent. Beccabunga, cochlearia, nasturtii hort. nasturtii aquat. an. q. s. ex his mixtis herbis concisus destilletur sine alia additione ex baln. n. vaporosæ aqua præstans. Hujus aqua destillata lbj. immergantur sequentia minutim incisa, nimirum herb. recent. cochlearia nasturtii aqua. Nasturtii hortens. an. ʒi. peratâ aliquali digestionem in vitro bene clauso, fiat colatura cum expressione leni, quâ interim asseruatâ aquâ, accipe porrò. Succor. recent. expressorum & depurat. super cochlearia, nasturtii hortens. Nasturtii aquat. an. lbj. & additis sacchari albi can. lbiiij.ß. coquantur ad omnem ferè humiditatis succorum exhalationem, & Tabulati quasi consistentiam, cui tandem jungantur aqua superius destillata & imprægnata lbj. circiter.

Ac una & altera ebullitione in terreo vase fiat Syrupus præstans in scorbuto, lienis & mefenterii obstructions aperit, ac erosionibus oris & gingivarum, sanguinem continuo fundentibus, admixto modico cremoris Tartari mirifice prodest; in aquis appropriatis ab ʒß. ad ʒj. porrigendus.

Sceletorbicus alius D. D' Aquin.

℞. Rad. filicis maris, Angelica, Eryngii, raphani rusticani an. ʒiiij. cortic. citri, arantior. an. ʒij. folior. melissæ, sumaria, scolopendrii, cochlearia, beccabunga, nasturtii aq. nummularia, mentha an. m. ij. sem. nasturtii hort. cardui bened. citri an. ʒj. flor. Turica, genista an. m. j. Tartari albi contusi ʒij. decoquantur omnia ex a. aqu. chalybeata lb. ix. colentur & exprimantur, liquor vero ori albumine cum sacchari opt. lb. vj. Clarificatus, coquantur igne lento in syrupum, oleorum cinamoni & caryophyll. an. gut. iiij. saccharo pulverato exceptis, aromatizandum.

Hic Syrupus depurat massam sanguinis ejusque circulationem faciliat; spiritus languidos suscitatur, eosque deperditos reparat, debet autem ejus usus aliquandiu continuari. Dosis cochleare j. aut ij. mane & vespere ut & iidem inter prandium & cænam.

Syrupus de Scolopendrio Fernelii ex Pharm. August.

℞. Polypodii querni, rad. buglosse, contrad. capparum. Tamarisci an. ʒij. scolopendrii veri, seu ceterach m. ij. lupuli, capillor. veneris, cuscute, melissophylli an. m. ij. coquantur in aqua lb. ix. ad remanentiam lb. v. colatura adde sacchari albi lb. iv. percoquantur lege artis in syrupum.

Crassum melancholicum succum attenuant, fluxilemque reddit; lienem ab obstructione liberat, tumoremque

temque solvit: melancholiam, quartanis, diaturnis que febribus adprimè utilis.

Syrupus de Scordio simplex ex Pharm. August.

℞. Succi scordii depurati ℥ij, sacchari ℥iij. Fiat ex arie syrupus.

Ejus usus præcipuus est in pestilentibus & malignis febribus: interz namque putredini maximè adv. iatur atque humorum corruptiones emendat, lumbricos enecat, menses ciet, Venenis reluctatur, vasa rupta glutinat nec non sudores prolicit.

Notandum, in succi hujus defectu substitui posse decoctum scordii, ex copiosa plantæ hujus quantitate paratum quod multam herbæ vim imbiberit ita ut suo valore succum æquet.

De Scordio compositus Hieron. Mercurialis ex eadem Pharm.

℞. Flor. nymphææ, rosarum, boraginis, citri, folior. sonchi, borag. Acetose, pimpinella an. p. V. sem. Acetosa, citri a. ʒv. decoq; in aq. bord. ℥iij. ad tertias. Deinde recipe dicti decocti ℥ij. succi scordii depurati ℥iij. sacchari fini ℥iij. decoque s. a. in fine addendo camphoræ, moschi an. ʒß. Fiat syrupus.

Describitur hic syrupus ob Octaviano Roberoto in Tractatu de febre punctulari, cui præcipuè convenit, prout morbis omnibus ab humorum corruptela seu putredine natis.

Syrupus de Sempervivo simplex ex Pharm. August.

℞. Succi sempervivi depurati ℥iij, sacchari albi ℥iij. coque s. a. in syrupum.

Februm ætus potenter exstinguit, ac internis incendiis auxiliatur, ob id Linguae inflammationem ejusque ariditatem a. fert.

De Sempervivo compositus ex eadem Pharm.

℞. Folior. sempervivi recent. ℥xii, contundantur in pila lapidea, adspargendo iisdem, Salis Ammoniaci munda ʒx. stent probe recta in vase fictili vitreato, per dies tres, vel quatuor & quotidie agitentur. Postea exprimatursuccus, qui cum sacchari ℥vi, in vase itidem fictili, aut lapideo, coquatur lege artis in syrupum justæ consistentiæ.

Eadem cum Syrupo de sempervivo simplici vires habet, efficacior tamen ad restringendum februm calorem supra modum adauctum: faucium ac Linguae ariditatem & inflammationem tollit, anginae opitulatur.

Syrupus de Siliquis, vid. Diacodium.

Syrupus Spleneticus Zuelfferi.

℞. Oculor. cancrorum in pulverem saltem redactorum ʒiij. cremoris Tartari subtiliter triti ʒij. his mixtis superaffundantur in alembico vitreo vini albi rhenani ℥iij. Spiritus salis veri ʒij. bulliant parum in alembico vitreo, suo capitello munito juncturis que bene clausis, ut id quod bulliendo transit, excipi, & residuo, cum refrigerit, reaffundi possit, fiat post omnibus refrigeratis colatura, quæ interim asservata porro accipe.

Rad. recent. Apii, cichorii sylv. feniculi, pimpinellæ, petroselinæ an. ʒij. calami aromat. galanga an. ʒvj. herb. recent. scolopendrii, chærefolii, cochleariæ, nasturtii hortens. Asplenii, Matrisylvæ an. ʒit. sem. artice, nasturtii an. ʒi. Apii ʒß baccar. juniperi ʒvj. incisa & conquassata coquantur in s. q. aquæ simplicis, ad remanentiam circiter ℥ij, colatura expressa & probe prius clarificata adde sacchari canariæ albi ℥iij. ac porro ad humiditatis superflue exhalationem, seu tabulati ferè consistentiam coquantur, addendo tandem vini superius parati & asservati suffic. quantitatem, seu ℥i circiter.

Et una vel altera ebullitione, in terreo vase vitreato, fiat Syrupus, qui ad obstructions lienis & mesenterii

referendas ac menstrua mulierum pellenda efficaciter concurrit. Dosis ʒj. ad ʒiij.

Nota: Quod oculi cancrorum residui, nondum quæritaliter dissoluti, aliis usibus adaptari possint.

Syrupus de Stachade Fernellii, ex Pharm. August.

℞. Florum stachad. ʒiij. Thymi, calaminthæ, origani an. ʒß salvia, betonica flor. forismarini an. ʒß. sem. uia, peonia, feniculi an. ʒiij. incisa & confusa macerentur per 24. hoc in aquæ fontis ℥x. & destillando inde leni arenæ calore separentur liquoris ʒ. circiter. xiiij. in quibus iterum per 24. hor. infundantur: cinnamomi, Zingiberis, calami aromatici an. ʒiij. postea remanentia prind exprimitur, & quod expressum est, cum sacchari ℥iij. clarificetur, ac ultra tabulati consistentiam coquatur, additæque aromatum infusione filtrata, fiat Syrupus.

Vires hujus Syrupi cephalicæ prædicantur cerebri ac nervorum affectibus frigidis & pituitosis dicatus; unde in epilepsia, convulsionibus, paralyti, similibusque morbis adhibetur.

De Stachade minor ex Pharm. August.

℞. Flor. stachadis ʒiij. & ʒvi. Thymi, calaminthæ, origani an. ʒx. Anisi ʒvi. passularum major. ab arillis liberatar. ʒiv. Aquæ ℥vii. sacchari aut mellis ℥iij. Fiat ad modum syrupi de stacade Fernellii, & condatur cum calami aromat. cinnamomi, zingiberis an. ʒiij.

Ventriculum, cor. cerebrum ac hepar obstr. at: cer. f. sos humores & tenacem lentamque pituitam incidit, obstructions à viscidis humoribus obortas reseriat, crudosque à frigore succos concoquit.

De Stacade major Meluzæ ex eadem Pharm.

℞. Flor. Stachad. ʒiij. & ʒvi. Thymi, calaminthæ, origani an. ʒx. Anisi, pyrethr. an. ʒvi. piperis longi ʒiij. zingiberis ʒij. passularum major. ab arillis liberatarum ʒiij. Aquæ ℥vii. sacchari aut mellis ℥v. eandem, cum cinnamomi, calami Aromatici spica indica, croci, zingiberis, piperis nigri, longæ an. ʒiij.

Affectibus cerebri frigidioribus & pituitosis convenientior, ubi calore majore, incidentibus & tenuantibus magis utendum est; cerebri ac nervorum frigidis noxis remedio est, horum causam pituitam scilicet crassam & viscidam, potenter incidens, digerens, ac tenuans: paralyti, spasmo cynico convulsioni, nec non epilepsiæ medicatur, destillationes frigidas consumit & siccatur, faciem ad pectus anhelosum à destillatione, ac ventriculolum confortat.

Syrupus Stomachalis Donzelli.

℞. Caryophyll. cinnam. opt. an. ʒiij. oculor. cancrorum macis, an. ʒj. calami aromat. cortic. citri sic. an. ʒij. pulveriscentur omnia subtiliss. atque includantur vase vitreo super affusa spir. vini opt. ℥iij. clausum vas ponatur in digestionem donec spir. vini fuerit tinctus Tum ℞. sacchari albi ʒiij. clarificetur & coquatur ad consistentiam Tabulati, retrahatur ab igne & cum refrigerari ceperit, admisce illi aq. cortic. citri stillat. odorifera ʒiij. ultimoque adde ʒvi. Tincturæ pradiæ, ut per simplicem dissolutionem s. admissionem sine igne fiat Syrupus.

Hic Syrupus mane jejuno stomacho ad quant. ʒij. sumptus digerit & solvit omnem visciditatem, quæ ventriculitunicis impacta fuerit, eamque per urinas ejicit.

Syrupus de Symphlō Fernellii ex Pharm. August.

℞. Radicum & cymarum symphlō majoris m. vi. rosarum rubr. betonica, plantaginis, pimpinella, polygoni, scabiosæ, Tussilaginis ana m. ij. ex iustis omnibus recentibus exprimatursuccus, coquanturque ad

ad ℥iij. addendo sacchari albi ℥iij. Fiat ex arte Syrupus.

Tabidorum & ulceratorum pulmonum saniem & pus blandè, ac leniter sine sanguinis erupturi metu extergit, pulmonesque pariter confirmat.

Sirupus De Testudinibus sive Resumtivus Renodæi.
ex Pharm. Schroderianâ.

℥. Carnis Testudinum ℥iij. [abjectis cauda, collo & pedibus] bordei mundati ℥ij. carnis dactylor. ℥j. passulorum damascenar. glycyrrhiz. rasæ ℥vj. sebesten. jujub. an. num. xij. sem. bombac. melonum, cucum. citrull. ana ℥ß. sem. lactuca, papav. albi an. ℥ij. herb. unguil. caballin. pulmonaria ana m. j. Flor. violar. nenuphar. ana ℥ß. F. decoctio. in colatura clarific. ac ℥iij. adde sacchar. albi ℥iij. sacchar. rosati & diatragacanth. frig. an. ℥v. F. Syrupus.

Vires. Confert his qui à morbo chronico resurgunt, macie confectis, tabidis, phthisicis & similibus.

Sirupus de Terebinthina Donzelli.

℥. Alii folis, herniaria seu polygoni minimi, sem. genista, ligni visci querni a. ℥j. coquantur in aq. capill. Veneris q. s. a. in colatura dissolv. Terebinthina veneta ℥ij. primum in ovi vitello incorporatas: cum sacchar. albiss. ℥iij. F. at Syrupus igne lento.

Confert in omnibus renum affectibus, sed præcipuè in calculo & gonorrhæa.

Sirupus Florum Tunicæ, vid. Syrupus Caryophyll.
Hortiens.

Sirupus de Succo Veronicæ ex Pharm. August.

℥. Succo Veronica depravari ℥iij. sacchari albi ℥iij. coquantur s. a. in Syrupum.

Renum calculos & arenulas expurgat, eosque purulentos mundificat & sanat; pulmonum præterea exulcerationibus eximie convenit, quocum sanguinem abstergit, ulcera glutinat, nec non sanguinis spuitionem prohibet, pestilentibus etiam febribus quàm maximè salutaris.

Sirupus Violatus ex succo Florum ex eadem Phar.

℥. Flor. violarum martialium ℥j. eos diligenter à caliculis excerptos, & à viridi caule repurgatos, in ℥iij. aqua per 14. horas infunde, postea cola & exprime; expressum cum sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum coctili sufficienti quantitate. Fiat lege artis Syrupus.

Efficacissimus est in pectoris ac faucium morbis calidis: acres defluxiones demulcet ac temperat. Sitim relevat, gutturis asperitatem mitigat, raucedinem adimit, refrigerat & humectat: delicatis naturis, ideoque puerulis & infantibus à tenui destillatione tussientibus auxilio est somnumque inducit.

Elegans est modus, quem docet Quercetanus, quo dicti violarum flores in mortario marmoreo, pi illo ligneo, fortiter confunduntur, & cum triplo sacchari ultra Syrupi consistentiam cocti permiscuntur & exprimuntur.

Sirupus Violarum simplex ex Pharm. August.

Fiteodem modo, quo Syrupus rosatus simplex.

In febrium æstibus, biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac siti inexplibili commendatur, rosato potentius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis, gutturis asperitatem lenit, Thoracis ac pectoris, totiusque ventris infer oris affectibus calidis succurrit, & siccam tussim, partes spiritales suo lentore obliniens, demulcet, ac alvum nonnihil emolliendo bilis acrimoniam retundit.

Sirupus Violarum compositus Mesuæ ex eadem Phar.

℥. Violarum recent. ℥ij. sem. cydoniorum, malva an. ℥j.

jubarum, sebesten, an. Num. xx. aqua cucurbita ℥i. coquantur ad tertias: addendo sacchari ℥iij. Fiat Syrupus s. a.

Pleuritidi & tussi ex causa calida medetur: non solum enim leniendo, refrigerando & humectando, ad gutturis asperitatem utilis existit, sed etiam ardentem urinam, ac nephriticum cruciatum demulcet.

Cucurbitula destillanda est, dum adhuc tenera exsistit, & antequam indurescere incipiat.

Hactenus de SYRUPIS ALTERANTIBUS sequuntur jam SIRUPI varii PURGANTES.

Sirupus Florum Acaciæ.

Paratur ex infusione Florum, ad normam Syrupi rosati laxativi simplicis, Syrupi rosati vites æmulatur; ichores enim sanguini admixtos tenuèque serum leniter expurgat.

Sirupus de Bryonia simplex Mesuæ ex VVeckerô.

℥. Succo crudi rad. bryonia, mellis Hispanici, vini generoso despumati an. partes æquales.

Coquantur leniter in vase terreo vitreato, donec fluxilis syrupi consistentiam habeat, continenter despumando exprimat autem succus tempore Maii, Cœli constitutione sicca: serius enim expresso, in luxuriantem herbam transfusa fuerit succositas radicis.

Sirupus De Bryonia compositus Mesuæ ex eodem.

℥. Succo bryonia ℥v. aqua decoctionis origani, hyssopi sicci, libystici, seseleos, cardamomi, stachados an. ℥j. sapa, uvarum passarum an. ℥ß. mellis ℥iij.

Syrupus de bryonia idem valet, quod medicamentum dantur ℥ij. Mesuæ.

Syrupus de Carthamo ex Pharm. August.

℥. Adianti albi, hyssopi, Thymi, origani, charadryos, chamapityos, scolopendri, buglossi an. m. ß. cuscute, balicacabi an. ℥ß. rad. Angelica, glycyrrhizæ, feniculi, Asparagi an. ℥j. polypodii querni ℥ß. corticum Tamarisci ℥ß. sem. Anisi, feniculi, cummeos, dauci an. ℥j. carthami linter confusi ℥iij. uvarum passar. enucleatarum ℥j. Folior. senna ℥ß. Agaric Trochiscati ℥ß, Rhabbarbari electi ℥vj. zingiberis ℥j. sacchari albiss. ℥j. coquantur s. a. ad istam consistentiam, & addantur Syrupi violati soluti: rosati soluti, Acetosi simplicis an. ℥j.

Febribus inveteratis, quotidianis, quartanis & obstructionibus viscerum ex humoribus crassis, ac pituita crassius opitulatur: incidit, attenuat, aperit, nec non pituitolos & serosos humores leniter per alvum educit, ac extergit, vid. de eo Joh. Guintherius Andernacus Comment. 2. de vet. & nov. Medicina dial. 7.

Sirupus Catholicus è Pharm. Norimberg.

℥. Croci metallorum absumptiati ℥ij. vini albi opti. ℥iij. Aqu. florum rosarum ℥ij. cinamomi optimi ℥iij. infunde, horis 24. hinc addendo sacchari albi ℥viij. Fiat Syrupus.

Sirupus Chalibeatus Aperiens Catharticus
D. D' Aquin.

℥. Limatura chalybis in nodulo laxo & suspensi ligata ℥vi. rad. feniculi, cichor. rubia tindor. an. ℥ij. tartari albi confusi ℥ij. in vase fictili vitreato positis superfundantur ℥ix. aqu. ferventis in qua chalybis frustum candens septies extinctum fuerit, vaseque cooperto horis xii. super cineres calidos maceantur, deinde per boram lenio igne bulliant, additisque folior. ruta, rumicis, lupuli, agrimonii, capilli vener. An. oniseli an. m. iii bulliant iterum ad tertia partis consumptionem, colentur & exprimantur & colatura servetur. Interim

℥. Folior. senna orient. mundat. ℥vi. sem. carthami cor

contusi ℥iij. rareari vitriol. ℥j. macerentur seorsim super cineres calidos horas xii. in ejusdem aqua chalybeata ℥iij. postea leviter bulliant, colentur & exprimantur, colatura ovi albumine cum sacchari opt. ℥ss. clarificetur & servetur. Tunc prioris decocti colatura ovi albumine cum sacch. ℥v. c. a. clarificetur, & lento igne coquantur fore ad electuarii solidi consist. ntiam, quo tempore liquor clarus posterioris decocti priori permisceatur, & lenso igne ad syrupi consistentiam coquantur; qui refrigeratus, oleū cinnamomi stillatitii gutt. vi. sacchar. pulverato exceptis aromatizandus erit.

Excellit hic Syrupus in referendis obstructionibus hepat's lienis, mesenterii & pancreatis imo uteri; benigne purgat materias viscidas & tartareas quæ dictas obstructiones efficiunt. Potest itidem feliciter adhiberi pro sanandis cachexiis, hydropē, menstruum suppressione & ictero; potest assumi solus ex cochleari, aut admisceri liquoribus idoneis, Dos. ab ℥ss. ad ℥ij.

Sirupus de Cichorio cum Rhabarbato Nicolai Florentini, ex Pharm. August.

℥l. Endivia domestica, Sylvestr. an. m. iij. cichorii, Taraxaci, an. m. ij. cicerbita, seu sonchi lavis, hepatica, seu lichenis, lactuca domestica, Fumiterria, lupulor. an. m. i. bordei integri ℥ij. capillor. veneris ℥ij. & ℥ij. vesicaria s. u. haliacabi, ceterach, cuscuta an. ℥vi. Adiantis vulgaris seu ruta muraria, Rad. feniculi, Apii, asparagi an. ℥ij. glycyrrhiza ℥vi. decoquantur in aqua suff. quant. ad medietatis consumptionem: postea colentur, exprimantur, & cum album. Ovor. clarificantur: in cujus decocti ℥iij. infundantur hor. 24. Rhubarbari optimi ℥vi. s. ℥ca ℥ij. Diij. & post lenem ebullitionem atque expressionem clarificantur: residuum verò decoctum cum sacchari albi clarificati ℥ss. ad justam consistentiam coquantur, ut cum dicta infusione in syrupum abeat.

Ursupatur ad jecoris intemperiem calidam & obstructionem, icterum, cachexiam, & viscerum impuritatem: nutritioni inservientia instrumenta sumat, humoresque vitiosos per urinam & feces educit: splenicis & melancholicis, peculiariter verò epilepticis subvenit, maximè pueris; quem in hoc casu mirificè commendabat Montanus. Imo adserēbat, Nicolaum eundem ad epilepsiam propulsandam composuisse.

Syrupus hic à Nicolao Florentino Serm. 5. de obstruct. hepat. describitur; libertate tamen, qua alii usi fuerunt, fretis, nonnulla in ejus compositione mutata antecessoribus nostris libuit, quos porro hac in parte sequi, salutatis hujus, quem præstat, usus nobis persuadet.

Sirupus Diascoreos Andernaci ex Pharm. August.

℥l. Intybi latifolia, seu endivia, cichorii an. m. iij. Adiantis albi, nigri, agrimonie, ceterach, lupuli, Fumaria an. m. ss. granor. Haliacabi, cuscuta an. ℥iij. rad. Apii, feniculi, Asparagi ℥ss. polypodii querni ℥i. glycyrrhiza ℥vi. sem. enici ℥ss. quatuor frig. major. an. ℥iij. bordei non excocti. at p. ij. sem. endivia, cichorii an. ℥ss. uvarum pass. Si prunorum damascenorum. num. xx. Flor. boraginis, buglossi violar. an. p. j. myrobalanorum citrinar. chebular. ana ℥ss. Rhubarbari electi ℥i. s. Agarici Trochiscati ℥i. folior. sem. ℥ss. zingiberis, cinnamomi an. ℥j. coquantur s. a. in suff. sciente quantitate aqua ad tertias colentur & exprimantur colatura, addendo sacchari optimi ℥ij. clarificetur, atque ad justam Syrupi consistentiam coquantur, cui permiscantur Syrupi rosati solutivi ℥iij.

Ad viscerum obstructiones, febres & alia inde provenientia mala efficax, auriginosos, cachecticos, hydropticosque plurimum adjuvat: renes etiam expurgat.

Com seris medicamenti hujus basis existat, nimis autem parca nobis visa fuerit intybi & cichorii quantitas, idcirco earundem herbarum portionem triplicandam censuimus, ut Syrupus evaderet efficacior: describi-

tur ab Andernaco Comment. 2. Dialogo 7. de veteri & nova Medecina.

Sirupus Domesticus, seu de spinâ infectoriâ ex Pharm. August.

℥l. Baccar. fruticis illius, quem spinam cervinam vocant, circa finem Septembris aut Octobris initio collectarum quantitatē sufficientem: prius calefacte confundantur in pila lapidea, deinde exprimendo colentur: succus expressus coquantur lenio igne, donec quarta pars absintur. In hujus colati ℥iij. sacchari ℥xvi solvantur, clarificantur & coquantur donec Syrupi bene cocti consistentiam adquirant, adjiciendo in fine Anisi, mastiches an. ℥iij. zingiberis, cinnamomi, caryophyllor. an. ℥ss. Fiat Syrupus.

Syrupus domesticus sic dictus, quod familiariter eo uti possimus. bilem, pituitam & serosos maxime humores purgat, unde ejus præcipuus in cachexia, hydropē ac arthritide. Confule de eo Reinerium Solenandrum in consiliis, ut & Matthiolum Comm. in Dioscorid. Lib. 1. 102. de Ramnis.

Caveant Pharmacopæi, ne pro cervi spinæ baccis, siq. multitudine forsitan decepti, Alaterni baccas accipiant.

Sirupus Emeticus Angeli Salæ ex Pharm. August.

℥l. Viri Antimonii subtilissimè pulverisati ℥j. cinnamomi electi, zedoaria, sem. Angelica an. ℥ij. sandali rubri ℥ss. croci Orientalis ℥ss. Aceti rosati ℥xx. infundantur omnia in B. M. per 24. horas, postea filtrantur per chartam bibulam: & cum sacchar clarificati, ultra consistentiam tabularum cocti sufficiente quantitate miscendo, Fiat Syrupus.

Vomitorium hoc medicamentum non tantum vitiosos humores ventriculi evacuat, sed & ejusdem tunicis impactos educit, ex aliis etiam partibus peccantem materiam revellit, hinc non solum ipsis ventriculi vitiis prodest, sed etiam febribus intermittētibz, aliisque morbis chronicis conducit.

Emeticus alius, sive Oxysaccharum ex eadem Pharm.

℥l. Croci metallorum edulcorati ℥iij. Aceti ℥xx. Fiat in loco calido per triduum infuso, sapis agitando, postea liquor impragnatus filtratur, & in eo sacchari clarificati ultra tabellarum consistentiam cocti ℥xx. solvantur.

Vires ejus nomini respondent. vid. de eo Exc. D. Daniel. Ludovici Pharmaciam. Mod. Sec. applic.

Emeticus Correctus Zuelfferi.

℥l. Pulv. n. Antimonii correcti in mantissa edocti ℥j. extrahatur ejus essentia seu vis emetica cum vini albi boni ferventis ℥ss. nam aqua simplex, sive etiam destillata per se vim emeticam ex hoc pulvere nequaquam elicit, filtratione post, aut residencia potius vino à pulvere separato, adde sacchari albi ℥ij. & in Syrupum liquidiorie consistentia decoque, cui, pro odore & sapore grato ipsi conciliando, porro adde Elaeosacchari cinnamomi ℥ij. Fiat Syrupus.

Dosis ℥i. vel ℥ii adultis hominibus, at junioribus, pueris, & infantibus ℥ss. ℥j. ad ℥iij. pro ratione ætatis securè propinati possunt.

Nota: Si qui pulvere hoc Antimonii correcto destituti flores Antimonii albos ritè paratos substituere velint, ii conficiant Syrupum hunc Emeticum ad modum sequentem.

Alius ex Eodem.

℥l. Vini malvatici ℥ij. cui immergantur florum Antimonii ritè parat. aut etiam Mercurii vitæ dextre parati ℥ij. (vel etiam loco horum viri Antimonii dextre sine additione parati & subtiliter triti ℥j. accipiantur) cremori-

cremoris tartari ℥vj factâ maceratione loco bene calente per iridium circiter, factâ post colaturâ, vino colato adde sacchari albißimi ℥iij. & sola ejus dissolutione fiat Syrupus; addendo pro grato sapore & odore conciliando Eleosacchari, cinamomi, essent. Citri sacchar. an. ℥j. Fiat Syrupus gratus.

Medicamentum efficax est in suis operationibus, proinde non nisi fortioribus naturâ hominibus propinandum, ad expellendos biliosos, atros, melancholicos, & quoscunque abundantes humores excrementitios, profundè radicatos & impactos; igitur in febribus quattanis aliisque diuturnis & chronicis auxilio est. Dosis ℥ij. ℥b ad ℥j.

Nota: pro abstemiis qui vinum abhorrent, Syrupus dictus ex succo vel vino cydoniorum, quod æquè ac vinum vim emeticam ex pulveribus dictis Antimoniatibus elicit, parari poterit, qui gustui magis gratus, licet vel nullis Eleosaccharis aromatizetur.

Alius ex eodem.

℥. Rad. Asari recent. ℥ij. Esula cortic. ℥ij. hel-lebori nigri ℥iij. conscindantur & confundantur parum, quibus super affundatur Aceti destillati & rosati ℥b. ac iterum in vase vitreo exsiccantur, post coquantur in vase etiam terreo, vel saltem sartagine ferreâ, cum aquæ simplicis s. q. repetitis vicibus affusa, quousque tota virtus extrahatur. Colatura omnes alb. ovorum probè clarificata, addita sacchari albißimi ℥iij. denuò coquendo ad syrupi consistentiam redigantur, cui pro sapore & odore grato conciliando Eleosacchari cinamomi ℥b. vel ℥j. admisceri potest.

Syrupus Emeticus, seu Extractum Emeticum Glauberi.

℥. Florum Antimonii unciam unam; Tartari purgati uncias duas, sacchari Candi uncias sex, aquæ pluvialis lib. 2. mixta colloca in phiola vitrea fortissima in B. coctio-nis gratiâ, & fac bullire strenuè 10. vel 12. hor. spatio, Postea balneo refrigerato, exime vitrum & effunde decoctionem, illamque filtra per chartam bibulam in fundibulo impositam, aqua filtrata erit rubella, saccharata, subacida, quam accipe [abjectis fecibus in filtro] ex cucurbita vitrea parvula ignis calore lento in B. omnem abstrahes humiditatem, usque ad remanentiam melleam fusci coloris: cui denuò affunde libram unam spiritus vini, effunde in phiola colli oblongi, & colloca in B. moderati coloris 8. vel 10. hor. spatio, & vini spiritus denuò separabit extrahetque essentiam puriorem & nobiliorem, relictis fecibus infundo, quæ postquam omnia refrixerint, filtrationis beneficio separando per chartam bibulam, nimirum duplicatam. Postea accipe tinduram rubram filtratam, & ex cucurbita vitrea in B. leni omnem ferè abstrahes vini spiritum usque; ad remanentiam syrupi dulcis & suavissimi; quem exemptum serva tanquam excellentissimum vomitivum, in multis morbis utilissimum, ubi reliqua cathartica nihil prestare possunt: hac enim medicina lenissime operatur; quare puerulis etiam, anni absque periculo administrari potest, nec non senibus. Purgat hac medicina cunctos humores, è genere nervoso & venoso attrahit omnes humores vitiosos, reserat obstructions hepatis, lienis, pulmonum & renum: qua ratione varii gravissimi curantur morbi.

Nondum reperi vomitivum huic comparabile, tutò & citissime operanti. Dosis ejus est à gutt. 1. 2. 3. 4. usque ad 10. & 30. habita ratione ætatis & ægitudinis; ita per se, vel cum vino, cervisia &c. & quidem infra, horæ operari incipit, finitque operationem intra duas. Quandoque non vomitus excitat sed solummodò sedes, ubi adjuvat clyster statim ante administrationem medicinæ prædictæ administratus, factus è 2. vel 3 cochlearibus olei olivarum & aqua salsa; clyster enim inferne præparat viam, ita ut rarè vomitivum supernè operari possit: ubi etiam poterit æger statim ab assumptione medicinæ ori & naribus admove re panem tostum calidum, qui vomitiones rohibet, & infernam operationem promovet. Sed mco

quidem judicio melius, medicinam non impedire quærentem operationis viam spontaneam, non coactam: multis vomitus magis convenit quàm purgatio illa per secessum.

Egregium sanè est hoc medicamentum & cò commo-dè quotidie utimur, tum quia dosis quæ minima est, omni ætati & constitutioni potest propinari, tum quia sapor non est injucundus, imò quia tale medicamentum aliis omnibus aptis facillè admiscetur. Verùm sæpius in cò præparandò extractione secundâ cum spiritu vini non indigemus & primam syrupificationem sine ulteriori operatione cum fructu adhibemus. Dosis autem quod atinet, quando effectus emeticos exoptamus, præcipuè in Soporosis affectibus non tantum ad gr xxx sed etiam ad ℥j. imò ad ℥iij. si morbi natura ita exigat, ascendimus.

Syrupus de Epithymo Mesuæ ex Pharm. August.

℥. Epithymi ℥iij. myrobalanor. citrinar. Indarum a, 3xx. cuscute, Fumiterre an. 3x. Thymi, buglossi, calamithæ, myrobalanor. Emblicarum, belliricarum, glycyrrhizæ, polypodii, Agarici, stachad. an. ℥vj. rosarum, feniculi, Anisi an. ℥iij. prunor. num. xx. passular. majorum ab arillis liberatarum ℥iv. Tamarindor. ℥iij. Aquæ ℥b. sacchari ℥bi. sapa ℥ij. coquantur s. a. in syrupum.

Eo utimur in humoribus & affectibus pituitosis, ac melancholicis à bile adusta & atra. Ulcera fistulosa & sinuosa curat: sædam corporis scabiem & nigram, capitis areas & impetiginem emendat, psoram, lepram, cancrum, elephantiam, morbum item Gallicum depellit.

Syrupus de Fumaria Compositus Mesuæ ex Pharm. August.

℥. Myrobalanor. citrinar. chebular. an. 3xx. Flor. boraginis, buglossi, violar. absinthii, cuscute, an. ℥j. glycyrrhizæ, rosarum an. ℥iv. Epithymi, polypodii an. ℥vi. prunor. num. centum, passular. major. ab arillis liberatarum ℥b. Tamarindor. pulpa cassia an. ℥ij. aqua font. ℥b. omnia lento igne s. a. additis in fine Tamarindis & cassiâ, coquantur, & colentur: deinde verò addantur succi fumiterre depurati, sacchari albi an. ℥iij. clarificentur cum album. ovi & coquantur in formam syrupi.

Educit pituitam salsam, & bilem utramque adustam, nec non liberatis obstructionibus, febres putridas ab his humoribus enatas curat, ventriculū & hepat. roborat, psoram, lepram, scabiem, impetiginem, ac exanthemata delet, icterum utrumque propulsat; utuntur eo quidam in morbo Gallico.

Syrupus Helleboratus Quercetani ex Pharm. Schroderianâ.

℥. Fibrarum hellebori nigri ℥ij. Agarici rec. trochisc. ℥ij. fol. sen. mund. ℥ij. Turbith. hermodactylor. an. ℥j. sem. Anisi, feniculi, cort. citri an. ℥b. caryophyll. macis cinamomi an. ℥ij. macerentur in oxymelitis simplicis, vini malvatici, & aquarum melissa ac fumariæ an. q. s. vase vitreo clauso, hinc leviter bulliant ac exprimantur, depurati per digestionem, colatura addantur. Syrupi de pomis redolentibus solutivi, de succo rosarum pallidar. sacchari rosati & violati an. ℥iv. F. Syrupus.

Vires. Omnibus morbis à materia tartarea, crassa & tenace à phlegmate austo, bile aut melancholia dependentibus, in capite, Thoracè, ventriculo, hepate, utero, ipsisque articulis mirum in modum confert.

Syrupus de Hermodactylis Nicolai ex VVeckerò.

℥. Quinque radicum an. ℥j. sem. 4 frig. majorum an. ℥iij. hyssopi. Capillor. veneris, Aspleni an. m. b. violarum. m. b. flor. roris marini, borraginis an. m. b. cyprip. chamomilla ℥ij. passular. ℥j. senæ ℥ij. [an potius ℥ij.] hermodactyl. cuscute an. ℥b. Anisi, feniculi, carni, an. ℥iij. polypodii ℥ij. Agarici ℥ij. coquantur in aqua ℥bi. & colatura adde sacchari ℥bi. rosarum ℥j. Rhabarbari ℥iij. Turbith ℥ij. hæc tenuissime erisa, inque panno ligata s. s. pendes in syrupo cocto s. a. Nicolaus.

Syrupus Holagogus Francofurt. ex Pharm. Schroder.

℥. Rad. polypod. Querc. rec. cappar. an. ℥j. fol. scolopend. cicutæ

ceterach, meliss, betonic. Ruta murar. an. m. j. flor. trium. cordial. cuscus. an. m. s. sem. limon. fenicul. Anise an. 3ij. carthami contus. 3j. fiat decoctio in s. q. aqua, ad remanentiam quantitatis, cui species infra scripta infundi queant. Decoctio hac ita stet horis 24. tum fiat colatura & in hac infundantur. Fol. senn. mundat. 3iv. Agaric. albiss. 3ij. hermodactyl. alb. 3vj. Rad. bellebori nigri in aceto præparati 3j. Epithymi, Zinzib. alb. an. 3ij. an. 3ij. caryophyllor. 3ij. macis 3j. bulliant parum & stent in infusione horis 24. hinc exprimantur. 4. expressionem integram ad 1b j. & 3iij. succi rosar. incarnatar. 3ix. sacchari albiss. 1b ij. coque ad 1biv. circiter.

Vires. Convenit omnibus humoribus expurgandis, præcipue atræ bili, ac exinde morbis oriundis.

Sirupus Hydragogus Zuelfferi.

4. Rad. levistici rec. 3iij. mechoaca alba, jalappa, Ebuli recentis an 3ij. Turbith albi, hermodact. an. 3j. cort. med. sambuci 3j. medulla sambuci 3B. Gummi gamandra pulveris. & in petia ligati 3j. cremoris tartari 3B. Tartari vitriolati 3iij. ol. Tartari per deliq. 3ij. incisis & conquassatis crassiuscule superaffundantur vini, ad dimidias, ex generoso destillati, 1b iij. s. (sumendo nimirum vini albi generosi 1b vij. & 1b iij. ab illo destillatione abstrahendo, nappâ vini residuâ abjectâ) locentur in digestionem loco calido, & vase probe clauso, per quadriiduum, post fiat colatura cum forti expressione, quâ colaturâ probè clarificatâ, & interim asservatâ, accipe species ab infusione relictas, quibus porro adde, rad. rec. levistici 3iij. cichorii sylv. apii, vincetoxici, petroselini an. rec. 3iij. cimarum aspuragi rec. 3iv. herb. hepatic. nobilis, scolopendrii, cichorii sylv. agrimonie, naturii hort. ana rec. 3ij. sem. nasturtii, urticæ an. 3vi. Ebuli 3iij. incisa coquantur cum s. q. aqua simplicis repetitis vicibus, quousque virtus omnis extracta sit, colaturâ omnes cum expressione factâ junctim clarificentur, & ad 1b j. circiter evaporent, addendo tandem superiorem asservatam infusionem cathartica & sacchari can. albi 1biv. ac leni unâ vel alterâ ebullitione factâ fiat syrupus debite consistentiæ, qui aromatizandus Elaosacchari cinamomi, caryophyllor. an 3B.

Ejus usus præcipue est in affectibus cachecticis & hydropicis cum non solum serosam humiditatem in corpore fluctuantem per alvum & urinam evacuet, verum etiam per sudorem & insensibilem transpirationem: obstructiones præterea viscerum naturalium reserat, illaque roborat. Dosis 3j. ad 3iij. & 3ij.

Alius D. D' Aquin.

4. Rad. mechoacan. ireos nostr. ebuli rec. medulla sem. carthami, folliculor. senn. Orient. folior. soldenella sic. an. 3iij. turbith. Gummosi, hermodactylor. jalapp. rhei electi an. 3vi. rad. valeriane mai. Eryngii, enula campana, asori, cortic. rad. capparis, Tamariscis, santali citrini. sem. ebuli, baccar. juniperi an. 3B. folior. ceterach. agrimonii, chamaedryos. flor. genista an. m. j. limatura chalybis nodulo inclusâ, tartari albi contusi Monsp. an 3ij. confusa aut incisa omnia in aq. cichorii 1b j. & succor. rad. sambuci & folior. cherefolii depurat. an. 1b ij. super cineres calidos horis 24. infundantur deinde per sesquihoram lento igne bulliant colentur & fortiter exprimantur, liquor verò cum sacch. optim. 1biv. clarificetur & coquatur in syrupum, sub finem addendo tartari vitriolati & sal. polychrest. an. 3ij. refrigeratus syrupus olei cinnam. gurr. iv. sacchar. pulver. exceptis aromatizari poterit. Datur solus ex cochleari aut admixtus liquoris appropriato. Dos. ab 3j. ad ij.

Sirupus Laxativus de Lignis Witzelii ex Pharm. Schroder.

4. Limatur. lign. sanct. 1b j. salsa pariglia 3iij. & cortic. l. sanct. 3iij. infund. hor. 24. loco calido in s. q. Aq. hinc coque & cola, in colatura q. s. infunde per noctem rad. polypod. qu. 3vj. fol. senn. s. stip. 3x. sem. carthami conquass. 3iij. Epithym 3iij. passul. minor. select. 3iv. sem. fenic. 3ij. & B. Mang. Bibl. Pharm. Tom. I.

ligni santal. citr. 3j. manè coque, denuò ad consumptionem medicatis, adde colatur. sacchari 3xij. F. s. a. syrupus.

Laxativus de Manna ex Pharm. August.

4. Specier. decocti flor. & fructuum 3ij. flor. 4. cordialium an. p. ij. folior. senn. elect. 3iv. passular. minorum, radic. polypodii an 3ij. sem. Anisi, feniculi an. 3ij. galange, macis, Zingiberis an. 3j. coquantur in aq. fontana s. q. in colatura solvantur manna calabrina 3vj. sacchari albi 3xvij. Fiat s. a. syrupus.

Ulus ejus frequens est ad alvum in puerulis laxandam.

Sirupus Magistralis primus. Zuelfferi.

4. Folior. senn. elect. 3iij. rhabarbari opt. 3iij. Rhapontici veri 3j. mechoaca alba 3ij. hermodactylor. 3j. Agarici trochiscati 3iij. cremoris tartari 3vi. Tartari vitriolati 3iij. ol. Tartari per deliq. 3j. incisis incidendis superaffundantur aqua ferventis 1b iij. s. vel si medico cupiam placuerit, simpl. aqua vinum album substituat. Et factâ maceratione per biduum vel triduum circiter fiat colatura cum forti expressione, quâ interim clarificatâ essentia & asservata, accipe species ab expressione residuas, quæ additis sequentibus, nupote rad. recent. cichorii sylv. pimpinelle, petroselini, feniculi, Asparagi an. 3ij. herb. rec. hepaticæ nobilis, scolopendrii, agrimonie, Endivie, cichorii sylv. nasturtii an. 3iij. sem. nasturtii, urticæ an. 3vj. ebuli 3j. cremoris Tartari 3iij.

Coquantur, incisa prius, cum s. q. aq. simplicis repetitis vicibus, quousque tota virtus, extracta sit, colaturâ omnes cum expressione factâ, probè prius clarificatâ leniter evaporent ad remanentiam 1b j. circiter, vel 3viij. & additis ulterius superiore essentiâ cathartica asservatâ & sacchari can. albi 1b iij. s. denuò per paucis ebullitionibus redigantur ad consistentiam syrupi durabilis, qui aromatizandus essentiâ n. liquidæ citri 3iij.

Utrique sexui in educendis humoribus biliosis, viscosis, puitosis, ut & hypochondriacis, conducibilis est, quapropter in morbis chronicis, hypochondrior. obstructionibus, mensium suppressionibus cum successu adhibetur ab 3j. ad 3ij. & 3iij.

Magistralis Secundus ex eodem.

4. Rhabarbari opt. 3iij. Rhapontici veri 3ij. myrob. chebul. belliric. an. 3j. cremoris tartari 3ij. incisi saltem superfundantur 1b ij. aqua ferventis, & relinquuntur in digestionem per biduum, factâ post colaturâ cum expressione, essentia colata clarificetur, interimque asservetur.

4. Jam verò accipe species ab infusione & expressione relictas, & his adde rad. cichorii sylv. recent. fenic. recent. rubie tinctor. an. 3ij. ireos Flor. liquiritia an. 3B. herb. cichorii, endivie, hepaticæ nobilis an. 3iij. mastichis electa 3iij. coquantur incisa cum s. q. aq. simplicis repetitis vicibus, nova semper affusâ aquâ, quousque omnis color & virtus extracta sit, colaturâ postea omnes cum expressione factâ, junctim clarificentur, & ad remanentiam circiter 1b j. leniter evaporent, cui addantur superior asservata essentia qualiscunque cathartica, & sacchari albi 1b iij. qua leni ebullitione ad consistentiam syrupi debitam redigantur.

Præstat in morbis biliosis, & ut aliqui volunt in dysenteris & diarrhæis immoderatis, ubi cum virtute cathartica & absteriva vim adstrictivam secum trahere sibi persuasum habent: cæterò quin roborat hepar, & reliqua viscera naturalia, intestina ab humoribus acrioribus liberat, eorumque dolores mitigat. Dosis 3j. ad 3ij. 3iij.

Magistralis Tertius Eiusdem.

4. Rhabarbari opt. 3iij. rad. Apii, graminis, vin. Cccc cetero

coxi ana recent. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. cardopatia $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. liquirit. $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$. fol. sena sine stipit. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. vel $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. herba abrotani, centaurii minor. Tanacetii ana recent. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. corallina vera $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. sem. cyna $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. urtica, Thlaspios an. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. incisa & conguassata coquantur in s. q. aqua simplicis repetitis vicibus, nova super affusa aqua quousque tota virtus extracta sit, quod ex colore & sapore decocti ultimo percipitur, colatura omnes albumin. ovorum clarificate ad $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. circiter evaporent, tunc demum adde sacchari albi $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. & ad syrupi debitam consistentiam. Denuo coquantur, addendo sub finem manna el. Calabr. $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}\mathfrak{j}$. soluta cum Aq. cinamomi, cerasor. nigr. rosarum opt. fragr. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Servetur ad usus puerorum & infantium, enecat enim vermes eorumve sentinam atque alios etiam vitiosos humores extrudit, juxta ætatem dari potest; à $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

Magistralis Quartus Eiusdem.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Rad. Rhabarbari selecti $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. Asari $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. hermodactylorum mechoaca alb $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. fol. sena electa $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. cremoris tartari $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$. Tartari vitriolati $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ his incisis saltem, quæ incidenda sunt superfundantur, vini alb. boni $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. relinquuntur in digestionem per triduum, facta post colatura cum expressione clarificetur essentia cathartica, interimque aservetur. Jam verò accipe species ab infusione & expressione residuas, quibus adde rad. Asparagi, Apii, cichorii sylv. petroselini, pimpinella an. rec. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. liquiritia $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$. herb. Arthemisie, charesfolii, melisse, nasturtii hort. rorismar. an. recent. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. sem. urtica, nasturtii, Thlaspios an. $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$. cremoris tartari $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

Incisa quæ incidenda sunt, seminibus conguassatis coquantur in s. q. aqua simpl. chalybeata, repetitis vicibus, quousque omnis virtus & efficacia extracta sit, colatura omnes, & junctim album. Ovorum probè clarificentur, cui clarificatio decocto adde spir. vitrioli q. s. pro bona aciditate, quo facto in hoc ipso decocto acidulo extingatur, chalybis integri in frustula saltem contracti & candefacti $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$ quatuor vicibus circiter, post leniter ad $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. coquendo, decoctum hoc evaporet, cui tandem addantur superior aservata essentia cathartica cum vino facta, & sacchari albi can. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. quæ juncta, paucis ebullitionibus ad consistentiam syrupi competentem reducantur, qui aromatizandus Elaofacch. cinamomi $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. vel. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$.

Efficax est in morbis chronicis, cachexia, obstructionibus mensium muliebr. pellit insuper urinam, & viscera naturalia roborat. Dosis $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. & $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Sirupus Mercurialis purgans Zauvelferi.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Succus herba Mercurialis recenter expressi & depurati $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. cui immerge sequentia crassiuscule incisa & contrusa, utpote fol. sena sine stipit. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. rad. Asari $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. peracta maceratione sufficit. Coquantur ad dimidias, colatura dein clarificata adde sacchari can. albi $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. & ad syrupi consistentiam redigantur, cui pro aromatizatione adde Elaofacch. cinamomi vel caryophyll. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. Fiat syrupus.

Alius ex Eodem.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Succus herb. Mercurialis recenter expressi & depurati $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. cui immergantur rad. Asari rec. consciss. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. hellebori nigri praparati. aceto rosaceo $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. facta brevi maceratione coquantur ad dimidias, colatura dein clarificata adde sacchari can. albi $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. & ad syrupi consistentiam coquendo redigantur; cui odoris & saporis gratia addatur Elaofacch. caryophyll. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. Fiat syrupus gratus.

Purgat leniter sumptus ab $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. clysteribus pariter haud ineptè admiscetur, propterea non inconsumtum etiam foret, si saccharo mel simplex & purum substitueretur.

Sirupus de Floribus Persicorum ex Pharm. August.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Florum persicorum recentium $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. contundantur & macerentur horis xij in $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. aqua calentis, postea exprimantur, & in colatura depurata solvendo sacchari albi clarificati & ultra consistentiam tabellarum cocti sufficientem quantitatem Fiat. syrupus.

Serum & bilem educit, vermes enecat, ac mesenterium infarctum liberans serenos humores per alvum excurbat.

Sirupus de Polypodio ex Pharm. August.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Polypodii querni $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{j}$. passul. minor. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. myrobolan. citrinar. chebular. indar. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. fol. sena Orient. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}$. coquantur in aqua fontana $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{x}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ad remanentiam $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. infusione addendo calami aromat $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ sem. feniculi $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. infusionis rosar. solutiva $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ succi boraginis, sumaria, lupuli an. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}$ in colatura solvantur sacchari $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. clarificentur & coquantur in syrupum.

Attrabiliolos humores potissimum evocat, ac lienis vitis opitulatur, unde splenicis & arquato correptis auxilio est, sanguinem depurat, cutemque à scabie foedam purgat.

De Polypodio Compositus ex Pharm. Norimberg.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Radicum polypodii select. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. cichorii $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. bugloss. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$ liquirit. rec. rase, iridis illyrica, lapathi acuti, cori. cum citri rec. exiccatorum an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. herb. sumaria, cuscutha, cererach, lingua cervi, besonica, acetosella, Trifolii, auri, Sonchi levis, capillor. veneris an. m. j. Endivia, jacea, dicta Trinitatis, cum floribus an. m. ij. passular. minorum $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. pulpa Tamarindor. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. omnium minutim incisorum & contrusorum fiat infusio & decoctio in s. q. feri lactis caprini ad tertia partis consumptionem. Deinde.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Fol. sena Alexandrina s. stip. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. rad. polyp. quere. mundati, Turpethi selecti an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{b}$. rhabarbari opt. Agarici albißimi, hellebori nigri praparati an. $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}$. Epithymi selecti, sem. Anisi, feniculi an. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. urtica $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. hac omnia conguassata iidem in sero lactis caprini immergantur, atque bene lecta coquantur, colentur, superiorique decoctioni adjungantur. Tandem omnia sine albumine ovi clarificando per decidentiam, decantentur sacchari albi $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. addantur, lentoque igne, ad consistentiam syrupi, coquantur, affusa ad extremum Aqua cinamomi una $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. & \mathfrak{b} .

Sirupus de Pomis Regis Saporis Mesue ex Pharm. August.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Succus pomor. dulcium, boraginis, buglossi an. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. folliculor. sena $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. croci $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. sena contrita horis 24. in succis maceretur, ac semel aut bis fervefiat, & coletur, expressum cum sacchari $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. addito circa finem croco, coquantur s. in Syrupum.

Hic Syrupus Medorum Regi Saponi, à quo caprus est Valerianus Imperator, attribuitur, & à Mesue describitur. Eo utimur, ad omnes affectus melancholicos, maniam, melancholiam, cordis etiam robur plurimum augeat.

De Pomis Magistralis paulò aliter ex Pharm. Londin.

$\mathfrak{z}\mathfrak{l}$. Succus & aqua pomorum odoriferum, an. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. succi & aqua boraginis, & buglossi, an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{x}$. folior. sena Orientalis mundata $\mathfrak{t}\mathfrak{b}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. sem. Anisi, feniculi dulcis an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. Epithymi Cretensis $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$. Agarici albißimi, rhabarbari opt. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. zingiberis, macis, an. $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{v}$. cinnamomi $\mathfrak{d}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. croci $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$. Rhabarbarum cum cinnamomo seorsum perinde, vini albi succi pomorum an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Reliquis, præter crocum, in suprà memoratis aquis, ut decet, maceratis, postmodò affunde succos: hisque simul

mol lento igne despumatis, colatisque per manicam infuse sacchari albi lbiv. Tunc coque in Syrupum: facta subinde croci in panno lineo ligati expressione; additoque tandem Rhei infuso, & subsequenti levi ebullitione ut Syrupi modus conservetur.

Syrupus de Rhabarbaro solutivus ex Pharm. August.

℞. Rhabarbari opt. folior. sena an. ℥ij. flor. violarum. m. j. cinamomi ℥ij. zingiberis ℥b. Aquar. betonica, cichorii, buglossi an. lbj. Fiat omnium per noctem: mane ebullitione & expressione facta, colatura s. a. coquatur in Syrupum cum sacch. albi ℥xvj. cui addantur Syrupi rosati solutivi simplicis ℥iv.

Citra molestiam in pueris & delicatulis alvum subducit, utramque bilem deherbens, ac pituitam quoque leniter evacuans.

Syrupus de Rhapontico ex Pharm. August.

Succi rhapontici depurati lbij. sacchari clarificati lbij. coquantur in Syrupum.

Vires ejus aperiendi ac roborandi celebrantur, quæ ratione hepatis medetur, & obstructionibus lienis atque valor. Meseraicorum utiliter opponitur.

Syrupus Rosatus solutivus simplex sive Mucharum ex Pharm. August.

℞. Flor. rosar. Damascenar. recent. quantumlibet ex. gr. lbxij. contundantur & macerentur horis 24. in totidem aqua claræ ferventissima lbj. postea exprimantur, additisque sacchari albi lbij. in Syrupum s. a. coquantur.

In usu creberrimus est ad ventriculi incendium, & igneum calorem febrilem, sitimque inexpletam sedandam, febribus pestilentibus præstantissimus, quod putredini venenis & aëris vitio, subamarâ & aromaticâ suâ qualitate resistat; viscera nimio calore dissoluta refrigerando roborat, & ad temperiem reducit, febrium vigilias levat, ac modicè alvum subducit.

Quamvis olim multiplici infusione parare hunc Syrupum, nostris placuerit, cum tamen majoris laboris compendio, hic frui liceat, unicam ei substituere volumus, non minus efficacem Syrupum daturam.

Cæterum infusum hoc pharmacopœi nostri ut plurimum absque saccharo etiam pro usu reponere solent.

Quibuscot odoriferas rosarum particulas cocturâ perdere displicet, vel etiam parcior rosarum proventus eadem servare suadet, illi auctâ aquæ quantitate, loco macerationis destillationem per aliquot horas instituerent, ac ita odoratiore aqua in M. B. abstracta, reliquum pro dicto usu possunt exprimere & adhibere.

Rosatus solutivus Aureus ex eadem Pharm.

℞. Flor. rosar. incarnat. nondum penitus apertarum, & manè sereno cœlo collectarum lbiv.

Infundantur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ calide per 24. horas, postea colentur & exprimantur. In colatura denuo rosarum eadem quantitas infundatur, idque tertia vice repetatur; Tandem cum sacchari albi lbiv. coquantur s. a. in Syrupum.

Vires sunt eadem cum præcedenti; hic tamen magis colore & sapore palato blanditur.

Rosatus Laxativus compositus Helleboratus Montani, ex eadem Pharm.

℞. Myrobalanor. omnium enucleator. an. ℥iv. radicem hellebori nigri veri ℥vj. polipodii ℥vj. glycyrrhizæ seminum citri an. ℥iv. folior. sena, Epithymi an. ℥vj. crasse conusa & incisa macerentur per 24. horas in lbxij. infusionis rosarum supra descriptæ, postea coquantur ad quartam partis consumptionem. In cujus colati & expressi

& cum album. Ovorum clarificati lbj. infundantur rhabarbari electi ℥ij. caryophyll. ℥j. reliquum vero cum sacchari clarificati lbv. aa debitam consistentiam coquatur, ut cum rhabarbari infusione filtra Fia: Syrupus.

Utebatur eo Montanus, Medicus Patavinus clarissimus, in affectibus melancholicis, luc Gallica, pfora, lepra, impetigine lichenibus, cancro, Elephantiasi & aliis.

Rosatus Compositus sine helleboro, ex eadem Pharm.

℞. Myrobalanor. omnium an. ℥ij. rad. polypodii ℥ij. sem. carthami ℥is Anisi, feniculi an. ℥vi. fol. & folliculorum sena, Epithymi an. ℥b. corticum citri ℥j. caryophyllor. ℥b. nucis moschata ℥ij. macerentur horis 24. in lbxvj. infusionis rosar. postea fortissima fiat expressio; & addatur ad liquoris singulas lbj. sacchari lbj. Fia: lege artis Syrupus.

Lenius quidem quàm prior purgat, nihilominus tamen bilem utramque, ac pituitam educit, visceribusque robur addit.

Paratur & alius quidam Syrupus rosatus cum additione radicis cichorii, & folior. fumariz qui hoc modo paratur & dicitur.

Rosatus Laxativus cum ambubeia ex eadem Pharm.

℞. Rad. cichorii sylv. recentium & mundat. lbj. herb. fumariz recentis m. vj. infundantur horis xij. in lbvj. infusionis rosar. laxativæ: postea colentur & exprimantur: Colatura posthinc cum sacchari lbij. coquatur in Syrupum, cui ad justam consistentiam fere percollo, in linteo immittantur, ac post perfectam coctionem in eo pendula permaneant sequentia; utpote specierum diatrion Sandal. ℥j. diarrhodon abbatis ℥b. Fia: Syrupus, ut artis est.

Utramque bilem ac serosos humores blandè evacuat, sallos. itidem ichores leniter educit, ac putres emendat, unde adustum sanguinem corrigit, ac jecori obstructo opiculatur, icterum ac Tertianas sanat, & venarum meseraicarum oppilationes expedit, D. Raymundo Mindero, collegæ nostro quondam, præ cæteris usu familiaris.

Rosatus solutivus Quercetani ex eadem Pharm.

℞. Succi rosar. pallid. recent. expressi lbvj. in quibus infunde rosarum pallid. mediocriter confusar. lbij. Siens in balneo Mariæ tepido per 24. horas, deinde exprimantur, & sic reiterentur infusiones, cum lbij. rosarum novar. novem vicibus vel pluries: quibus absolutis, ultima expressio reponatur in uno vel plurimis vitris ab digerendum in B. M. 24. horis usque dum in fundo vasis adpareat sedimentum, quod tamdiu clarescat, donec nulla amplius feces conspiciantur.

R. huius succi summè depurati, à quo humiditas Mercurialis sive aqua rosar. odoratissima sit abstracta ℥xvi. sacchari albissimi ℥iv. Fia: s. a. Syrupus.

Ejusdem cum communi Syrupo rosat. solutivo facultatis, in hoc ferè tantum differens, quod purpurearum loco, pallidas rosas recipiat, & majori cum labore præparetur; qui cæteroquin ad modum alterius illius confici potest.

Rosatus Lenitivus de Tribus ex Pharm. August.

℞. Folior. sena Oriental. mundator. ℥vi. spirit. vitrioli optime rectificati ℥j. muchari rosar. ferventis lbj. indantur in cucurbitam vitream, adposito cæco alembico, & circumlinitis ritè commissuris, maneat infusa in rorido balnei calore, horis 24. factâ levi ebullitione & fortasse expressione, in colatura denuo infunde, ut prius, folior. sena mundatorum ℥vj. iterumque factâ levi ebullitione, & forti expressione infunde tertium minutissimè incisorum, folior. sena mundat. ℥vj. rhabarbari selectissimi, Agarici albiss.

an. Zij. Zingiberis acuti, caryophyll. an. Zij. cinnamomi electi an. iij. Spica Indica Zij. ubi iterum sic steterint infusa, ebullierint leviter, & expressa fortiter fuerint, colentur diligenter ad usum. Postea.

℞. Remanentias folior. senæ ex infusione superiori, radicis polypodii querni, glycyrrhizæ an. Zij. adianti urinsque m. j. passul. major. ab arillis liberatarum, minor. mundatarum an. Zij. prunor. Damascenorum dulc. num. xxx. aquæ fontanæ ℞iij. coquantur s. a. ad remanentiam ℞iij. in ultimam ebullitionem injiciendo flor. quatuor cordial. an. p. iij. corticem citri rec. Zij. expressis & colatis add. sacchari finissimi ℞xvj. & ubi jam ad consistentiam cocta fuerint, infusionis ex mûcharo sacchari ℞i. Fiat, lege artis, Syrupus.

Omnes æqualiter humores, pituitam & utramque bilem blande evacuat, adeoque omnibus viscerum naturalium obstructionibus, ac inde natis febribus, tertianæ & quartanæ pellendis, admodum salutaris existit; qui jucundior & commodior futurus est, si tres vel quatuor unciaz mannae lege artis dissolutæ, eidem addantur.

Rosatus aureus D. Donzelli.

℞. Ros. Damasc. q. v. illis in vâ viireum immisiss superaffunde aq. rosis q. s. post unius diei infusionem destill. prolesta aqua novis rosis denuo affundatur & infusione peracta rursus destill. operatioque eadem duodecies repetatur, dein ex hac aqua fragrantissima cum sacchar. albis. q. s. Fiat Syrupus, cujus dosis ad summum ℞x. debet autem refrigerari priusquam assumatur.

Syrupus Splenicus D. Davidis Verbezi ex Phar. August.

℞. Succ. pomor. redolentium ℞j. melissæ Zij. limonum. Zij. Spiritus vitrioli ab omni ph egmate depurati ℞iij. folior. senæ electorum Zij. polypodii quern. Zij. hellebori nigri preparati ℞iij. corticem cappari Tamarisci an. ℞. folior. citrariæ, ceterach an. m. flor. borraginis, buglossi, rosar. an. p. ij. violarum m. j. seminum viticis, ocimi caryophyllati, citri an. Zij. croci Austriaci ℞j. cinnamomi acuti ℞. aq. fontanæ q. s. macerentur in B. M. tepido per biduum, coquantur postea parum, & fortiter exprimantur: colatura addatur sacchari albi ℞i. Fiat Syrupus, circa finem inspergendo seorsim cremoris Tartari in tenuissimum pollinem redacti ℞iij. servetur usui.

In omnibus melancholiæ speciebus salutaris existit, dum humores atrabilarios lieni & venis melaericis impactos incidit & educit.

Loco sacchari cantii violacei olim huic syrupo destinati, non tamen usque adeo strictè necessarii, album vulgare tantum sumere, & ideo violarum tamen pondus augere placuit; licet cæteroquin violaceum illud saccharum & sponte in Syropo violaceo sæpius concrefcere soleat, & facile parari queat.

Syrupus Violatus solutivus ex Phar. August.

Fiat Syrupus Rosatus solutivus, ex violarum recentium infusione.

℞. Hujus infusionis depurata ℞iij. sacchari clarificati ℞ij. coquantur lento igne ad Syrupi consistentiam.

In febrium æstibus, biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac fiti inexplibili commendatur. Rosato validius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis existit, gutturis asperitates lenit, thoracis & pectoris totiusque ventris inferioris affectibus calidis succurrit, siccæ tussi medetur, ac alvum emolliendo bilis acrimoniam refundit.

Syrupus Zibebatum ex Pharm. August.

℞. Folior. senæ electorum Zij. Zibebatum Zij. Zingiberis Zij. aquæ font. quantum satis, infundantur horis 24. dein ebulliant, & exprimantur & cum sacchari ℞ij. coquantur s. a. ad consistentiam Syrupi, qui aromatizetur cinnamomi Zij.

Syrupus hic nomine brodii zibebatum apud nos notissimus, alvum blande subducit, puerisque ac delicatulis commode adhibetur.

Sequuntur Syrupi alii ex variis Auctoribus & I. ex Baldassare TIMÆ

Syrupus Aperitivus.

℞. Rad. polypod. quern. Zij. fenicul. apii, cichor. scorz. ner. rubia Tinct. asparagi an. ℞. herb. fumaria m. j. Empatorii, Agrim. Capill. vener. cuscute, card. bened. betonic. chemadr. charæpyth. an. m. ℞. summit. lupuli m. j. comar. absinth. m. B. cort. Tamaris. fraxin. rad. cappar. an. ℞. iij. centaur. minor. m. B. borag. buglossi an. p. j. sem. Anisi ℞iij. niculi, citri, petros. an. ℞. passul. minor. ℞iij. incisi & coquasatis affund. aq. Tartar. ℞iij. Accer. squill. ℞. coque ad remanentiam ℞iij. colat. add. sacch. albis. q. s. F. Syrupus.

Syrupus Panchymagogus.

℞. Fri albis. ℞iij. coq. in f. q. aq. simpl. ad perfect. solutionem, in colatura adhuc calente infund. fol. sen. f. ℞. Ag. ric. albis. ℞iij. rhabarb. elect. gualapp. gummos. an. ℞. borrag. bugloss. rosar. an. p. j. sem. Anisi ℞iij. fenicul. estr. an. ℞. cinamom. acutiss. ℞iij. Zingiberis albis. ℞. macer. ℞iij. caryophyll. ℞j. stent in infusione loco calido per horas vi. postea ebulliant semel atque iterum & exprimantur fortissime colat. add. sacch. albis. q. s. F. s. a. Syrupus tenuis.

Syrupus Rosarum solutivus Compositus.

℞. Rad. cichorii, fenicul. polypod. quern. an. ℞. sem. melonum, endivia an. ℞. iij. flor. borrag. buglossi. an. p. B. violar. j. caul. lactus, recent. ℞iij. coquantur in f. q. infusum. molli. plis. rosar. exprimantur fortissime, in colatura infundantur fol. sen. f. ℞. rhabarb. elect. Agaris. albis. m. B. coque ad alb. an. ℞. iij.

Ebulliant semel atque iterum, postea exprimantur fortissime, & c. sacchar. albis. f. q. coquantur ad consist. tiam Syrupi.

Syrupus Sambucius Laxativus.

Succ. baccar. samb. matur. ℞ij. Aqua fumaria ℞iij. infund. fol. sen. f. ℞. r. a. l. gualap. Agaris. albis. macer. can. elect. an. ℞. soldanell. ℞. Turpethi elect. ℞. rosar. cinamomi acutiss. ℞. Zingiber. albi ℞. caryoph. ℞. coquantur & exprimantur fortissime. Colatur. add. sacch. albis. q. s. F. s. a. Syrupus Tenuis.

Syrupus Solutivus Aureus.

℞. Ros. malalis ℞x. rosar. recent. q. s. infundantur per horas x. postea colentur sine expressione, add. de rosar. rec. q. s. stent iterum in infusione per horas x. labor. hic tertium repetatur. Colatur. add. sacch. clarificat. q. s. f. a. Syrupus.

Syrupus Ophthalmicus.

℞. succ. euphras. rec. Zij. rosar. pallid. Zij. chelidone. ruta, verbena an. ℞. feniculi ℞iij. depurentur s. a. postea cum sacch. albis. f. q. redigantur in formam Syrupi, qui aromatizetur cinamomo & ambra.

Syrupus Pectoralis.

℞. Succ. sympt. mai. ℞ij. sanguis. forba, veronica, res. rubr. salvia minor. heder. terrestr. sarsara, porulaca, an. Zij. depurentur & c. f. q. sacch. albis. redigantur in Syrupum spissioris consistentie ad formam lobooc.

Syrupus Antiscorbuticus.

℞. Succ. rec. express. cochlearia, nasturt. aqua. bekal. cich. rii, fumaria, acetosa an. ℞. iij. mixta precipitentur cum succ. citri ℞ij. colatur. add. Flav. cor. tri ℞. sacch. albis. ℞iij. immittantur cucurbita vitæ c. alembico caco. digerantur in B. M. per diem & noctem colatura servetur in vitro.

Syrupus Chalybeatus.

℞. Chalyb. prepar. Zij. affund. Acet. vin. acerrimis Eminentiam 4. digitor. transvers. stent in loco calido donec extrahatur tinctura, cum inclinato vase separantur quor. Cui adde sacch. albis. q. s. coquantur lento igne ad consistentiam Syrupi.

Alius Purgans.

℞. Chalybis prepar. ℞ij. passul. minor. ℞. affund. fumar. absinth. an. ℞. iij. stent bene recta in loco medietate calido per triduum, postea add. rad. polypod. quern. Empath. cort. rad. cappar. an. ℞. ceterach, cuscute, an. m. sem. aquilegia, Genista an. ℞. cinam. acutiss. ℞. fol. sen. f. ℞. iij.

Syr. rad. gialapp. 3vj. Ebulliant semel aq. iterum, colatura adde Syrupi nostr. panchym. 3iij. sacch. albiss. q. f. Syrup.

Syrupus Antifebriciticus.

℥. Succ. rec. express. card. bened. cenaur. minor. an. 3v. potentilla 3iv. cicborii fumaria a. 3j. absinthii 3iv. sacch. albiss. q. f. f. a. Syrupus.

Syrupus Cordialis perlarus.

℥. Magister. perlarum 3j. solv. in succ. citri acid. q. f. solutioni add. succi rec. express. depurat. borrag. bugloss. rosar. acetosella an. 3iv. ribium. fragorum. rubi idai, granator. dulc. acid. an. 1lb. sacch. albiss. q. f. M. F. f. a. Syrupus.

Syrupus Nicotianæ ad Asthma.

℥. Nicotiana sicca. 3ij. hyssopi. veronic. scabiosa, mar. rubii. calamint. capill. 2 is. satureia an. 3b. rad. Angeli. ca. Enula an. 3b. ireos 3vj. sem. Anisi. faniculi an. 3iij. Agarici Trochiscat. 3j. incis. & conquassatis affund. oxy. mel. simpl. 3viij. squill. 3iij. Aq. simpl. q. f. macerentur per biduum postea, coquantur ad remanentiam 1lb. colatura clarif. cum sacch. albiss. q. coq. ad consistentiam Syrupi tenuis.

Syrupus de Pomis Solutivus.

℥. Succ. pomor. borsdorf. 3xvj. fol. sen. f. 3b. meshoacan. alb. gialapp. gummos. an. 3b. sem. anisi. fanicul. un. 3b. cinam. acutiss. 3ij. zinziber. alb. 3j. flor. borrag. bugloss. rosar. an. p. j. stent in infusione loco tepido per diem & noctem postea coq. in diplomate igne lenio. Ex colatura clarific. addit. sacch. f. q. f. a. Syrupus

Syrupus Coralliorum

℥. Magist. Coral 3j. solv. in succ. berber. q. f. solut. add. sacch. albiss. q. f. f. a. Syrupus cui immisc. Tinct. coral. 3b.

Syrupus Maltichinus.

℥. Mastich. elect. 3ij. coq. ex f. q. aq. mentha crisp. add. aq. rosar. cinam. an. 3iij. sacch. albiss. q. f. M. F. f. a. Syrupus.

Syrupus Antipleuriticus.

℥. Flor. papav. errat. m. iij. bellidis cum toto, violar. purpur. an. m. j. fol. scabiosa. card. bened. Taraxac. card. maria an. m. j. incis. & conquassatis affund. Aq. flor. papav. rhead. scabiosa. card. bened. card. maria ad eminent. 4 digitor. spirit. 4. q. f. ad aliqualem aciditatem stent in digestionem B. M. per biduum, postea ebulliant leniter colatur. add. succi sanguisorbe 3iv. sacch. albiss. q. f. M. F. f. a. Syrupus.

Syrupus Anti-epilepticus.

℥. Flor. peon. m. iij. rilia. tunica. lavend. lil. convall. an. thos. primul. veris an. m. j. affund. aq. nostr. cephal. ex florib. ad eminentiam 4 digitor. spirit. 4 li q. f. ad aliqualem aciditatem stent in digestionem B. M. per biduum, ebulliant leniter colatura add. succi ceras. nigr. 1lb. sacch. q. f. f. a. Syrupus.

Syrupus Nephriticus.

℥. Succ. rec. expressi ex secal. viridi mense maio ante exortum solis collect. 3iv. potentill. 1lb. j. precipitentur cum succ. citri acid 1lb. filrentur per chartam emporeticā & cum sacch. albiss. q. coq. ad consistentiam Syrupi tenuis.

Syrupi varii ex Pharm. BATEANA.

Syr. Alleluja. ℥. Succ. Lujul. 1lb. Ros. rub. 1lb. sacch. opt. 1lb. Digere in MB. dū fæces subsiderint toties quoties.

Syr. Ambrosianus. v. Decoct. Ambros.

Syr. Antiscorbuticus. ℥. Fol. Pini rec. cochl. marin. nasturt. aquat. becabung. a. p. x. contusa exprime succos. 4. horum 1lb. succ. Aurant. 3vj. clarifica exactil. cum alb. ovor. adda sacch. opt. 1lb. coq. ad consist. Syr. f. a. cui refrigerato addi possunt Sp. cochlear. 3ij.

Syr. Balsamicus. ℥. Balsam de Tolu 3ij. Flor. ruffil. 3xij. coq. in vitro circulatorio exactil. lutato in 3. posito per 33. colat frigidæ admisce sacch. albiss. 3xx. ut f. Syr. si ne ope caloris. Eodem modo parati pt Syr. Benzoin. de Syrace. &c.

Syr. Benedictus. ℥. Infus. Bened. 3xij. sacch. alb. 3iv. ex. hals in MB ad Syr. consist. f. a. Dos. coch. 1. 2. & c. pro Infant.

Syr. Cardiacus auratus. ℥. Aq. chelidon. comp. 1lb. sacch. opt. 1lb. dissolv. ad lentum B. calorem, & adde succ. chermes. Syr. de Corall. comp. an. 3ij. Fol. Auri. nu. 20. m. f. a.

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

Syr. Chalyb. ℥. 3. Otis 3ij. solve in 7 Geotian camp. 3j. adde Syr. de pomis alter. 3xi. m. f. a. Dos. 3b. ad 3b. &c.

Syr. Chalybeatus Alius. ℥. vin. Chalybeat nr. comp. opt. filtrat. 1lb. j. sacch. opt. 1lb. j. sacch. opt. 1lb. j. ex. hals. Δ. ad Syr. consist. Dos. ut sup. 1.

Syr. Chalyb. Corallatus. ℥. Ras. santal. r. 3iv. sant. alb. cinam. corall. rub. a. 3j. macer. (obsignato vase) in V. rubelli. opt. 1lb. ad 1lb. 4. f. colar clara. cui adde sacch. opt. 1lb. f. Syr. f. a. Tum adde 3. Otis ad rubed calcin. (in 7 cydon. solut.) 3b. m. Valde adstringit & robor. In fluxibus omnib. (presertim hepaticis) usus est insignis. Dos. 3b. ad 3j. &c.

Syr. de Croco. ℥. Croc. Anglic. opt. 3ij. Lachrym. stil. lantium ex capitibus Papav. exotici supra laminam ferri sicca. & pul. 3b. Sp. 3. li gr. 30. 7 citritotius 3viij. Digere in MB. ut extrahatur Tinct. quæ filtratur exactil. Tum 4. Sacch. opt. 3xviij. 7 citritotius 3vj. coq. despumando ad Syr. crassioris consist. cui adde Tinct. ut prædict. ut f. Syr. consist. debita sine coctione. Dos. 3j. ad 3iij. & ultra.

Syr. ad Effusuras. ℥. Gum. arabic. 3ij. sacch. crystall. 33. Ros. r. 3ij. coq. in Syr. liquidiorum Remed. optatiss. in fissuris mammarum.

Syr. Hemoptioicus. ℥. Succ. heder. terr. plantag. agrim. sedi major. portul. depurat. ad 1lb. Sacch. Rosat. duplum. f. Syr. f. a. Dos. 3ij. cum 7 Lactis 3vj. singulis auroris, & eadem quantitate hora somni cum 7 Rhoad. 3iv.

Syrup. Fovialis. ℥. Limac. 4. is 3vi. Otis 3ij. infund. in 7 Ront. 1lb. j. 848. Tum adde Tamar. mij. cort. rad. cappar. 3b. uv. passar. 3iv. anil. 3j. coq. donec libræ 4. consumptæ fuerint f. col. adde sacch. 1lb. 1lb. clarifica & coque ad Syr. consist. Dos. 3j. quotidie mane cum 7 Lumbric. magist. 3ij. Optimè valet ad Melancholiam hypochond. cachexiam, chlorosin, iterum &c.

Syr. Limacum. ℥. Limac hort. ante ortum 3 is collect. è testis suis exempt. & concis. 1lb. j. sacchar. cand. subtr. pulv. 1lb. 3. m. & conjiciantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syr. Fieri & pt. ex Limac perforatis cum testis, & sacch. cando. Dos. coch. i. sing. horis, in Phthisi. Tabes. &c.

Syr. Lumbric. ℥. Lumbric. terr. rec. opt. mundat. 1lb. Inde vitro orificii angustioris (bene operculo munito) & obvolvatur vitrum totum pastâ ex Fl. tritici & 7 a. factâ, coq. in clib. cum panibus Pistoris. Postea coletur liq. cui adde sacch. opt. q. f. ut f. Syr. Dos. 3j. cum chalyb. &c.

Syr. de Myrrha. ℥. Myrrh opt. 3v. croc. 3iv. hyssop. tussilag. am. iij. cap. 2 mi. sem. bombac. 3j. uv. pass. exacin. 3iij. coq. in V. alb. 1lb. ad med. colat. adde sacchar. opt. 3viij. coq. in Syrup. consist. f. a. Pectoralis est, asthmaticus, aperitivus, emmenagogus, &c. Dos. 3j. ad 3ij. &c.

Syr. Pepon. ℥. Carn Pepon. matur. & rec. 1lb. j. incis. minutiss. adde sacch. opt. pulv. 1lb. f. S. S. S. in olla vitreata: stet desuper peponis carnem pondus 1. vel 2. libratum (8 aliquor) ut f. Syr. in loco frigido f. a. Dos. coch. 3. bis in die cum Pulv. Haly 3j. in Phthisi. Tabes. &c.

Syr. de Peto. ℥. Succ. Peti Anglic. 1lb. 4. oxym. simpl. 34. Hydrom 1lb. m. & Digere dies 4 ut opt. defæcet. Hinc decantâ, iterumq; digere ut supra, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit: adde postea sacch. 1lb. j. & coq. in Syr. f. a. Dos. coch. 3. ad 3j. per plures dies, mira præstat in epilepsia, tussi, asthmate, catarrho suffocativo, phthisi, ventriculi dolore, visu recuperando, &c.

Syr. de Rapis. ℥. Rapar. excort. in lamidas ten. incis. 1lb. j. sacch. opt. 1lb. j. f. S. S. S. in vase fictil. stent. in frigido simul cum pondere superposito per 8 12. f. colat. Lent acrimoniam bilis ac asperitatem bronchiorum, asperaque arterie.

Syr. Sambuc. comp. ℥. Bacc. sambuc. matur. a stipit. liberat. 1lb. j. uvar. corinth. mundat. incis. 1lb. f. l. sicca. Borrag. Bugloss. viol. Ros. r. an. 3b. V. Rubelli 1lb. j. coq. in clibano: colat. claræ adde sacch. opt. an. & coq. in Syr. f. a. Miel. kleibv. Alexipharmacus, Cardiacus, & uterinus est. Sanguinem movet, &c.

Syr. de Scamm. ℥. Diag. 3vi uv. passar. exacin sacch. alb. a. 3viij. Sp. V. 1lb. j. coq. l. Δ. adustulando ad consumpt. d. mid. f. colat. pro Syr. athartico. Dos. 3b. ad 3b.

Syr. Siderens. ℥. Tincturæ Ferri (quam videt suo loco)

Cccc 3 (co)

co) Jexa. filtrat, lbj. sacch. opt. lbj. exhalain MB. ad consist. Syr. f. a. Longè efficacior est quàm Syr. Chalybeat. in obstructionibus, &c. Dos. ʒij. ad ʒvj. &c.

Syr. de Sulphure. ʒ. Hepat. ʒ. Cris ʒij. V. Hisp. lbj. Digere dies 3. & V. tinctum filtra. Tum ʒ. sacch. opt. lbj. ʒ. Toffil lbj. coq. despumando ad consist. crassiore. Postea [Tincturâ prædictâ additâ] f. Syr. debitæ consist. f. a. Insigniter confert ad Asthma, Tussē, Phthisin, Pestē, &c. Dos. ʒʒ. ad ʒj. &c.

Syr. Toluianus magistralis. ʒ. Bals. de Tolu. de Mecha, vel ejus defectu Capivi, styrac. calamit. Benz. opt. oliban. Mastich. Myrrh. Ammon. granulati, Taccamahac. gum. Elemi, Tereb. Chio, Rad. irid. Flor. ʒ. ʒʒ. Aq. Bechicæ lbj. coq. in vase circulatorio (opt. clauso) in ʒ. calidâ posito 8 aliquæ colat. adde sacch. albif. q. s. ut f. Syr. albissimus f. a. Pectoralis est, Asthmaticus, Phthisicus, &c. Dos. ʒʒ. ad ʒj. &c.

Syr. Vermifugus. ʒ. Fol. Hellebor. rec. ʒij. Hagiosp. ʒij. Rad. bryon. rec. ʒʒ. Absint. Rom. mii. coq. in Hydr. q. s. ad ʒ. colat. adde sacch. opt. lbj. & coq. f. a. Dos. coch. i bis indies.

Syrupi varii à Frederico Hofmanno.

Syrupus Cardiacus D. V. S.

Rec. succi borragin. bugloss. an. lbʒ. pomor. dulc. lbj. Meliss. ʒʒ. gran. cherm. ʒ ij.

Infunde in his succis & exprime, deinde Rec. Croci Or. ʒʒ.

Sacch. albif. lbj. f. Syr. cui admisce spec. diamagr. fr. ʒij. diamosc. dulc. ʒ. v. f. Syrupus Cordialis cum speciebus, qui & sine speciebus parari potest.

Syr. de P. pavere plurimum infusionum Altenburg.

Rec. cap. papav. alb. & nigr. n. xx. contus. infunde horis 24. in aq. pluv. destill. lbvj. coq. ad 3. part. casum. Colaturæ infunde iterum cap. papav. alb. & nigr. n. xx. & procede ut prius, hocq; ter repete, tū adde sacch. lbʒ. Penid. ʒiv. f. Syr.

Syrupus Pectoralis Altenburg.

Rec. rad. lymph. farfar. alth. an. ʒvj. Enul. ʒʒ. ligni Sani. ʒij. Scyll. pp. santal. r. a. ʒij. sem. cym. urtic. a. ʒij. anisi cardam. an. ʒj. fl. ros. r. M. ij. f. beton. plantag. pimpin. pilos. Polyg. Marrub. an. M. j. Salv. pulm. an. M. ʒ. jujub. n. v.

Incis. & contus. coq. in diplom. cum aq. scabios. rosar. an. q. s.

Rec. Colatur. & cum sacch. f. q. f. Syrupus.

Syrupus de Testudinibus D. R.

Rec. testud. vivar. n. x. laventur in ʒ. subservidâ, coq. ad extimæ crustæ separationem, quib. abjectis sordes à carinibus purga, deinde in mortario contendantur, iterumque add. sequentia; succ. liquir. Tragac. Sem. papav. alb. Lact. portul. bombac. 4. fr. maj. cydonior. an. ʒvj.

Passul. minor. ʒv. Sebesten. jujub. Berber. an. ʒʒ. fl. 4. Cordial. adianth. an. M. ij.

Coq. in f. q. ʒ. ad tertias, adde sacch. lbij. f. Syrupus.

Syrupus Chalibeatus D. V. S.

ʒ. Aq. fumar. centaur. min. card. b. cuscut. veronic. beccabung. an. lbj. acetosifac. parum adde & in eis extingue chalybis ignit. ʒvii. & extinctio quater repetatur, facta colatura adde limatur. chalyb. cum sp. sulphuris calcinat. pp. ʒvii. cortic. radic. Cappar. ʒʒ. tamari. fraxin. an. ʒiii. Citri ʒiii. passul. f. arillis ʒii. spic. celtio, ʒiʒ. squinanth. ʒiii. h. absinth. eupator. capill. ʒ. cuscut. chamadr. scolopendr. epithymi an. m. ʒ. cochlear. m. j. rad. c. cichor. scorzoner. polypod. q. an. ʒʒ. sem. fenicul. carvi. an. ʒiʒ. fl. bugloss. sambuci. Meliss. genista. cichor. an. p. j. incis. & contus. macera per biduum in vase vitreo in MB. Colatur. express. adde sen. A. f. s. ʒiv. radic. ellebor. nigr. ppt. ʒiʒ. Gialapp. ʒj. turbit. alb. ʒʒ. rhabarb. ʒii. rasur. ligni rhod. saffrastr. an. ʒii. Cinamom. el. ʒʒ. Caryophyll. ʒii.

Iterum stent per noctem in infusione in leni calore, manē ebulliant & cum Sacchar. alb. f. q. f. Syrupus.

Syrupus Antiscorbuticus P. H. D.

ʒ. Rad. ireos fl. polypod. q. helenit. raphani. asari. saxaparil. an. ʒiii. liquirit. ʒvi. h. Cochlear. nasturt. aquatic. sedi minor. fumar. Persicar. Meliss. agrimon. veronic. Chelidon. min. absinth. Card. b. scolopendr.

Centaur. min. an. p. ii. fl. sambuc. bugloss. an. m. ʒ. sem. anisi. fenicul. eruca. an. ʒiii. fol. senn. A. ʒj. hel. lebor. nigri ʒii. agaric. turbit. an. ʒiii. Cinamom. el. zinziber. an. ʒii. passul. Corinth. ʒj. coq. in f. q. ʒ. ʒ. Col. ʒii. adde sacch. ʒiv. coq. ad syr. consistentiam.

Syrupus Violatum Solutivus. D. G.

ʒ. Fl. violar. rec. ʒii. Cremor. tartari. ʒiʒ. sem. fenicul. ʒiv. Cinamom. el. zinziber. alb. an. ʒvi. Caryophyll. galang. radic. ireos an. ʒiʒ. senn. A. f. s. ʒiʒ. ʒvi. coq. in aq. violar. ʒ. Col. ʒ. xii. sacch. ʒvi. f. syr.

Syrupus de Gialappa D. C.

ʒ. Radic. gialapp. contus. ʒiv. Cichor. asparag. petroselin. an. ʒj. semin. anisi. fenicul. an. ʒ. vj. tartar. ʒ. lat. ʒiv. incis. & contus. infunde in vini optim. aq. Cichor. acetos. an. ʒij. stent in loco calido per 4. d. Deinde adde tri crudi ʒi. coq. ad dimidium. Colatur. adde sacch. ʒii. ʒviii. f. syr. aromat. ʒ. Cinam. ʒiv.

Syrupus Purgans Polychrestus.

ʒ. Ponē ad ʒ. nem. syrup. rosar. solutiv. ʒii. huic jam calenti injice sacch. rubr. depur. ʒiʒ. quo soluto adde crem. ʒ. rari ʒiii. zinziber. ʒj. semin. anisi ʒʒ. f. senn. A. f. s. ʒiʒ.

M. cum spatulâ lignea, removendo ab igne ulque frigescat, huic postea iterum aliquid Syrupi rolar. solutiv. injice.

Dos. est coch. j. vel ij.

Syrupi varii ex Collectione Theophili

BIERLINGII.

Syrupus contra Oris Fœtorem,

ʒ. Suco. pyrot. lbj. sacch. q. s. f. l. a. Syrupus. Adde ambr. ʒii. Castor. ʒi. zibeth. mosch. aa. ʒj. M. ad lentum ignem. Sumitur Coclear 1. & per triduum continuatur. Torum corrigit oris halitum. Phlegma etiam capitis corrigit.

Syrupus Purgans Mineralis. D. Krausens.

ʒ. Croci metall. justo ppti. ʒiʒ. Cinnam. lacini ʒii. nodulo inclus. infundantur horas 30. in vin. Rhenan opt. ʒ. rosar. prest. a. ʒii. Cord. nostr. ʒj. reservetur in vase vitreo probe clauso in loco satis calido, postea nodulo leniter expresso filarentur per chartam, addendo juleb. ros. ʒ. sacchar. alb. q. s. coq. ad justam syrupi consistentiam.

Syrupus Gemmatus P. tavinus Ducalis.

ʒ. Elect. de gemmis, Confect. de hyacinth. ʒʒ. alkerm. ʒij. margar. ppt. ʒʒ. Cort. Citr. rosar. rub. lign. aloes, rad. dracon. a. ʒii. Aq. flor. Citr. ʒix. scorzoner. ʒii. succ. Citri ʒiʒ. infund. per. 24. horas colentur & exprimantur, adde sacch. fini ʒviii. moschi, ambr. a. gr. 10.

Syrupus Generalis, seu laxativus purgans Catholicus.

ʒ. Fol. senn. ʒiʒ. rad. mechoac. rhabarb. turpeth. ʒʒ. spec. diamosc. dulc. diamb. a. ʒi. agar. trochisc. ʒij. fibrar. hellebor. nig. ʒʒ. sem. anisi. fenic. Cinamom. a. ʒj. gressu modo pulverisat. affunde in vase idoneo spir. vin. ʒxxx. ʒ. apoplech. ʒiʒ. Cinamom. ʒʒ. digere omnia per 4. dies, refrigerata exprime fortiter & adde rhabarb. elect. ʒiʒ. pulv. rorismar. flor. cordial. a. p. i. trochiscor. alipt. moschat. ʒʒ. Croc. gr. vii. flor. Cartham. di. dagryd. ʒii. digere iterum per 4. dies, postea fortiter exprime, expressum cola per pannum, ut substantia crassa permaneat, hinc abstrahatur humiditas superflua ad mellis. Consistentiam adatur sacchari. f. q. ad syrupi formam. dos. ʒʒ. ad ʒi. ʒiʒ.

Syrupus de Folis Sennæ Laxativus D. Penieri.

ʒ. Rad. Cichor. polypod. a. ʒʒ. passular. mundat ʒj. prunor. n. iv. decoq. in f. q. ʒ. ad consumptionem illius, post fortiter exprime ʒxxxx. post infund. decocto adhuc ferventi fol. sennæ ʒiʒ. & cum reliquis in vase bene obturato serva per noctem in infusione in loco calido. Manē coletur, express. infund. iterum ʒ. fol. sennæ. ʒiʒ. & post hor. xii. iterum exprimatur & coletur infusio; tertio infund. sennæ ʒiʒ. ut ante, adde Agaric. optim. incis. rhabarb. elect. a. ʒi. spic. indic. di. cinamom. zingiber. Alb. caryophyll. ii. di. flor. borrag. bugloss. rosar. violar. a. m. ʒ. iterum exprime & adde colatur. sacchar. optim. lbʒ. & cum album. ovi clarificando f. f. a. Syrupus.

Syrupus Catholicus.

ʒ. Ran. Apis, petroselin. fenic. a. ʒi. herb. endiv. capill. ʒ.

Qr. Agrimonia, cuscutha, ceterach, betonica, salvia, ajowan, stæchad, Arab. a. m. j. flor. cordial, epithym, cretic. a. m. f. de-
coct. i. f. q. v. pur. ad reman. vj. in colatur. infunde per no-
ctem. fol. sene elect. zii. Agar. alb. zii. turb. th. optim. zß.
zingib. alb. zii. manè iterum bulliant & fortiter expri-
mantur. express. R. zxy. adde in petia ligat. rhabarb. elect.
zß. cinamom. optim. zß. Syrup de sumar. ziii. sacchar. alb.
zviij. coq. ad syr. consistentiam sapis nodulū exprimendo.

Syrupus Melanagogus D. Rindfleischs.

℞. Rad. bellebor. nig. zß. laventur & incidantur.
Deinde assume v. anis. q. s. digere in B. deinf. fortis ex-
pressio. ℞. huius lib. fol. sene elect. zß. sem. anis. fenic. flor.
nymph. a. ziii. prunor. dulc. caricar. a. mß. deano bulliant
ad syrupi consistentiam, adde sacchari zii. f. l. a. syr.

Syrupus Rosarum Compositus.

℞. Rosar. mediocr. color. q. s. contund. minutiss. & in va-
se vitreo recondantur s. a. per 6. dies in cella vinaria, deinde
exprime succum ℞. huius succ. vj. stent per noctem ut
subsidi. post ℞. fol. sene. f. st. ziii. Agaric. alb. zj. Aq. rosar.
huius anni opt. vj. i. f. infus. a. per horas 24. facta quoque
ebullitione exprimatur fortissime, & in hac expressione
dissolve sacchar. alb. lib. v. vel q. s. clarific. simul cum al-
bum. ovi. Post adde succ. & coq. omnia simul pro syrupo.

Syrupus Exhilarans D. Schillingii.

℞. Succ. borrag. bugloss. a. vj. pom. redol. lib. j. meliss. vj. B.
gran. kerm. zii. lign. Aloes zj. sant. citr. Diu. spec. diamarg.
frigid. zß. diamb. Diu. sacch. albiss. vj. m. f. l. a. syr.

Syrupus Laxativus à Succis D. Landgravi.

℞. Fol. sennæ. f. st. ziv. rhabarb. elect. zvj. cinamom.
zingiber. a. zii. vini rhenan. q. s. f. a. infusio in loco calido
horas XII. Hinc colentur, nec cocta, nec expressa per incli-
nationem simplicem colatur, puris s. adde succ. endiv. co-
chlear. beccabung. borrag. pomor. depurat. a. vj. B. syr. è succ.
viol. purp. sacchar. albiss. a. vj. f. a. lenta coctura syrupo.

Syrupus Melanagogus cum Tartaro D. Laurend.

℞. Rad. liquirit. enul. polypod. querc. cichor. a. zß. pas-
sul. enucl. zß. prunor. dulc. n. xii. decoq. in f. q. v. vel vj. ad
tertias. deinde cum adhuc fervent, injiciantur fol. sennæ
opt. mund. zß. stent in infusione per noctem bene cooperta,
manè ebulliant, colatur, iterum ferventi infund. fol. sennæ
mund. zß. stent in infusione per horas XII. post ebulli-
ant & colentur ut primo. Tertiæ. rursus infunde fol.
sennæ mund. zß. Cremor. tr. alb. zii. agar. rhabarb. a. zj.
spic. Diij. flor. Cordial. a. Mß. hac bene cooperta stent in
infusione horas XII. post bulliant parum, colentur, expri-
mantur, colatur. express. adde sacchar. vj. B. f. l. a. syrupo.

Syrupus de Polypodio Purgans D. Doreri

℞. Polypod. querc. purgat. & recent. exsic. zß. fol. bu-
gloss. meliss. endiv. a. zii. sem. endiv. lactuc. scarol. a. zvi.
Calam. aromat. rad. acor. vulgar. a. zj. asar. optim. &
mund. Cyper. opt. a. zj. epithym. Cretic. mund. fol. sennæ f.
st. a. zj. Cortic. rad. Cappar. zii. incis. & Coatus. affund. f. q.
v. stent per horas IX. in loco calido, ebulliant, deinde ad
lentum ignem bis, terve, post cola, adde syr. è succ. pomor.
zj. cort. Citr. zj. rosac. solut. ex infusione multiplici zviij.
sacch. vj. decoct. & infus. purg. lib. xiv. f. a. syrupo.

Syrupus variū ex Hadriano à MYNSICHT.

Syrupus Perlaram Orientalium.

℞. Aq. rosarum fragrant. borraginis, buglossæ an. z. vj.
sal. perlarum orient. z. B.

Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat opti-
 ma emulsio : cui postea immisce sacchari albiss. lib. Et
 coquead justam consistentiam syrupi.

Vires, Usus, Dosis. Cerebrum, & membra, corroborat. Corpus sanum conservat. Tabem, Ariduram & Marcorem senilem mitigat. Pravos humores exsiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriusque sexus amplificat. Insuper certissimum præservativum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralytin, aliquoties in septimana exhibitus. Dosis ab zß. ad 3. v. j. per se vel aliis specificis.

Syrupus Corallorum Rubeorum.

℞. Tinct. rosar. rubrar. cum aq. è succ. Cichorei cum to-

ta planta destil. & rubini instar, extrah. z. x. sal. Coral-
lor. rub. zß. Mixtis, solutis, & filtratis adde : sacchari
albiss. vj. f. suc. exp. berberum ribinum an. ziv.

Denuò misc. & f. l. a. justæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Usus, Dosis. Imbecillum cor confortat, ejusque robur plurimum auget, Jecoris, Lienis, & Renum intemperient calidam mitigat, illorumque obstruccionibus mire succurrit. Hemorrhagiam variam curat. Sanguinem in universo corpore mundificat. Cholerae medetur. Vomitus biliosus reprimat. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum & adstringendum Venterculum, cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta, recreanda & confirmanda proficiunt. Unde in Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, Cœliaca passione, fluxu hepatico, Gonorrhœa, fluore uterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in utero fortificat, conservat, & ab abortu prohibet, gestationis tempore ejus Cochli. s. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab zß. ad 3j. per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

Syrupus Vitriolato - Rosatus.

In præparatione Magisterii Corallorum Vitriolatorum Rosati nostri remanet & in separatione liquor rubicundissimus, cui si f. q. sacchari albiss. addatur, & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilissimum & efficacissimum syrupum in peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteria, fluxu hepatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Jecoris & Lienis obstruccionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quam plurimis &c. maxime utilem. Cujus Dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab 3j. ad 3 i.

Syrupus Cephalicus.

℞. Suc. depurat. card. bened. & millefolii an. vj. Aq.
lavendula, betonica an. vj. B. rad. Caryophyllata, pœonia an.
zj. Cassia lignea nuc. moschat. Cubæarum an. zj. B. herb.
majorana, verbenæ, rorismarin, origani an. zj. j. flor. lilio-
rum convall. tilia, primula veris, anibos, rosar. rub. an. zj.
sem. feniculi, lavendula, salvia pœonia, an. zis. lig. Aloes
visci quercin. Croci orient. an. zj.

Coq. ad tertiam partis consumptionem; postea cole-
 tur, clarificetur & addita sacchari albiss. f. q. fiat justæ
 consistentiæ Syrupus, qui aromatizetur ipec. Diamon-
 tchi dulc. & Diambrae an. 3j. ut est artis.

Vires, Usus, Dosis. In omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus Cephalæa, Hemisrania, Epilepsia Apoplexia, Paralyti, &c. mirabilis est juvamenti. Caput, Cerebrum, & Venterculum corroborat, & iis, qui capite & corde tremunt, convenit. Dosis ab zß. ad 3j. per se, vel cum aliis appropriatis.

Syrupus Pectoralis.

℞. Rad. glycyrrhizæ rasæ, tussilaginis an. zj. enula
camp. ireos flor. Angelica ana z. j. herb. pulmonaria
utriusque Capil. veneris. salvia acut. marrubii sca-
biose an. zß. flor. Chamomilla, violarum, farsara, jacea,
an. z. ii. Incidantur, contundantur & infundantur in
aquarum. Card. benedict. feniculi an. vj. iij. malva min.
veronica, rad. Altheæ an. vj. Coquantur ad tertiam par-
tis consumptionem. R. Colaturæ vj. & in iis infun-
de Passular. min. ziv. sem. Card. Maria, myrtillorum,
Anis, urtica rom. Cydoneor. an. zß. dactylorum, jujuben.
sebesten. sicum ping. an. n. xxi.

Iterum coquantur ad quartam partis consumptionem
 postea fortiter exprimantur & colentur.

℞. Colatura vj. sacchari albiss. lib. ii. Denuò coq.
& inter coquendum aromatizetur cum Croci oriental.
Cardamom. min. macis. Cinamomi an. z. ij.

Ligentur in pauno raro & una bulliant, donec fiat
 secundum artem justæ consistentiæ syrupus; cui deni-
 que immisce Aq. Cinom. z. ij. & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis. Mirabilis est potentia ad omnes thoracis & spiritalium partium affectus, destilla-
 tiones & obstrucciones: Humores enim crassos inci-
 dit ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos
 & ulcera pulmonum. Astmaticis & tussiculosis mi-

rè confert. Hypochondriorum doloribus utilis, & pleuritidis initio convenit. Suppuratorum pus egregiè dissolvit, dissecat, tergit, educit & in apertum promovet. In omni raucedine & ablatione vocis secretum est. Dosis ab ʒs. ad ʒvi. per se vel cum vehiculis appropriatis.

Syrupus Asthmaticus.

ʒ. Sacchari candi alb. ʒij. aq. lech. sani ʒviii. syr. de prassio, de glycyrrh. an. ʒiii. capillor. veneris, de jujubis an. ʒiii. de hyssopo, de suc. violar. an. ʒii.

Invicem bene mixta coquantur ad justam Syrupi consistentiam.

Vires, Usus, Dosis. Asthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones saluberrime expurgat, aperit, dilatat, terget, lenit & obstructions referat. Tussi anhelæ, diuturnæ & siccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo salutaris; nec non senibus & naturâ frigidis valde familiaris. Dosis per se vel cum aq. pectoralibus, ab ʒß. ad ʒj.

Syrupus Cordialis.

ʒ. Cinamomi acut. ʒij. rad. Buglossæ, ʒj. flor. rosar. rub. borraginis, Melissa, violarum an. ʒß. cardamomi min. nuc. moschat. lig. aloes an. ʒij. croci orient. macis ʒj.

Incisa & contusa macerentur in vini boni & odoriferi Lib. iij. donec vinum sapore & virtute ejus bene imbuatur; postea in duplici vase coque ad unius libræ consumptionem.

ʒ. Colatura ʒij. sacchari albiss. ʒß. Coquantur & circa finem immisce: Aq. Cordial. nost. utriusque an. ʒiv.

Et fiat l. a. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis. Exhilarat, animique magnanimitatem indies auget, & est ferè in omnibus morbis melancholicis medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem mœstis seu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab ʒs. ad ʒi. per se, vel in vehiculis convenientibus.

Syrupus de Cassia Lignea.

ʒ. Miva Cotoneorum ʒj.

Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; postea immisce Tin& de Cassia Lig. nost. q. s. ut mediocrem Syrupi consistentiam acquirat, addendo Eleos. Cassiæ lig. ʒj. Denuò misce & ad usum repone.

Vires, Usus, Dosis. Senibus debilibus, & frigidis convenit, & quibus humor nativus & calor naturalis imminuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitus, & Singultum sedat. Anhelitus fœtorem abigit, ejusque suavitatem inducit. Dosis ab ʒs. ad ʒj. per se, vel cum vehiculis specificis.

Syrupus Diacitri Rosatus.

ʒ. Suc. Citri & limonum per pannum aut filtrum, sine ulla vi, aut expressione destillat. & cum pulv. rosar. rub. prius, rubin. instar, tinct. an. ʒij. rob. de Berberis de rib. an. ʒ viij. syr. de Agresta oxysacchari rubi Idai opt. fragorum an. ʒ iv. aq. cinamomi buglossat. in qua spec. Diarrhod. abbat, infusa fuerint. ʒij. nitri preparat. an. ʒß.

Mixta decoq. ut est artis, & f. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis. Potentissimè refrigerat, penetrat, siccatur, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbisque contagiosis plurimum confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentiae saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sium extinguit. Renum ætus emendat. Urinas & sudores movet. Vomitus biliosum reprimat. Cholerae medetur. Cardiacis, Dysentericis, & Cœliacis, purgato

pius corpore, succurrit. Dosis ab ʒß. ad ʒj. & duas, per se, vel in vehiculis specificis affecum propriè respicientibus.

Syrupus Antiscorbuticus.

ʒ. Suc. chamarubi Norvegiæ. ʒij. nasturt. aquat. becabungæ, acetosæ, cochleariæ; an. lib. 8.

Mixtis adde: Sacchari albiss. ʒi s. & f. justæ consistentiæ syrupus.

Vires, Usus, Dosis. Adversus Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium, Dosis ab ʒj. ad ʒij. ʒij. per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. lq.

Syrupus de Pyrethro.

ʒ. Agarici alb. & leviss. ʒis. Rad. pyrethri ʒi. pavonis maris, acori, pimpinellæ an. ʒs. sem. feniculi p. aonia bac. niperi an. ʒij. herb. matricariæ, Agrimonie hyssopi primul. veris, majoranæ, mentastri, nepetæ an. ʒij. flor. Lilior. convall. verbasci cuglossæ anthos an. ʒi s. cinamomi acut. nuc. moschat. cubebarum. an. ʒj.

Incisa & contusa infundantur in aq. Salviæ & Rosmarini ana ʒij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem.

ʒ. Colatura ʒiv. sacchari albiss. ʒij.

Misc. & coq. ad justam consistentiam syrupi.

Vires, Usus, Dosis. Valde salubris est in passionibus nervorum, Paralyti, Spasmo, Epilepsiâ, Ischiade, &c. Potenter enim materiam peccantem resolvit & dolorem mitigat. Dosis ab ʒß. ad ʒi. per se, vel in vehiculis convenientibus.

Syrupus Nephriticus.

ʒ. Aq. Antinephritic. nost. Lithontripcio. an. ʒa. sal. lep. percar. pisc. oc. Cancræ an. unc. s. Mixtis & solutis adde: Flor. malvæ arb. Rub. Rec. exsiccat. p. s.

Digerantur aliquot dies, usque dum pe. sectæ tinguantur; postea cum sacchari albiss. lib. ij. coq. ad Syrupi crassamentum.

Vires, Usus, Dosis. Calculoso ab ʒj. ad ʒis. per se, vel cum appropriato vehiculo manè propinab. Nam calculos quamvis magnos exedit, corroditque; quotidiana etiam experientia in urina aterulas & exilia lapidis fragmenta videbis.

Syrupus Sipticus.

ʒ. Prunor. sylvest. maturor. & exsiccat. ʒij. Rad. Acorn. aquat. tormentillæ, serpentariæ, zedoariæ an. ʒj. cort. granatorum cydoniorum exsic. an. ʒß. gallarum ture. Rosarum Rub. balaustior. an. ʒij. sem. lapathi acut. sanguinariæ, plantaginis an. ʒi s.

Coq. l. a. in vini alb. f. q. ad perfectam tincturam.

ʒ. Colatura lib. iv. sacchari albiss. lib. ij.

Denuò coq. dum Syrupi crassamentum adfiscat, & aromatizetur cum Cinamomi acut. caryophyllorum macis nuc. moschat. croci orient. zingib. albi, galang. min. an. ʒj. flor. papav. errat. tunica an. ʒß.

Ligentur in panno raro, & bulliant in Syrupose cundum artem.

Vires, Usus, Dosis. Dysenteriam Hepaticam ex humorum acrimonia subortam sedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimat. Præcipue autem longis & trahentibus alvi profluviis, ab humore aquoso, pituitoso tam frigido quam calido convenit. Vomitus Hæmorrhagiam omnem & abundantia menstrua cohibet. Dosis ab ʒj. ad ʒij. præmissis tamen universatilib.

Syrupus Dysentericus Laxativus.

ʒ. Rad. Polypodi querc. ʒi. glycyrrhiz. Rasa. pimpinell. ital. an. ʒj. tormentillæ, cich. rei an. ʒvi. herb. scolopendrij, Agrimonie, veronica, polygoni, an. ʒß.

Fiat decoctio in Aq. Rad. Consolid. Plantaginis & fol. Querc. ana f. q. ad tertias, & colentur.

ʒ. Colatura ʒij. Rhabarb. opt. ʒi s. mechocanna myrob. citrin. fol. sene an. ʒi. agarici troch. sc. ʒß. flor. Rosar. Rub. lilior. alb. sambuci, chamomilla verbasci an. ʒij. sem. cydoneorum, anisi, anetæ an. ʒi s. cassia lignea caryophyllor. nuc. moschat. an. ʒj.

Stent infusa in loco calido per noctem, matè leviter ebulliant & expressa colentur; Colaturæ adde: Sacchari

chamædrys. *lib. i.* & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis. In Dysentericis citra molestiam & leniter alvum subducit, Humores acres & biliōses, à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere administrationem post se relinquit, alvumque, quam solvit, iterum sistit. Dosis in junioribus ab \mathfrak{zj} . ad $\mathfrak{z}\text{ss}$. In adultis verò ab $\mathfrak{z}\text{ij}$. ad $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

Sirupus Pantagogus.

℞. Rad. polypodii quercin. hermodact. Rub. an. ℥iv. turbit. alb. & gum. mechoacan. an. ℥ii. Rhabarb. opt. ℥js. Hellebori nigri præp. jalappe Resinos. an. ℥j. agarici trochiscati myrob. omnium an. ℥ss.

Incisa contusa infundantur in vini albi. ℥. l. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundum artem coquantur, & in Colaturæ ℥iv. iterum infunde sequentia:

℞. Fol. senæ elect. ℥i i. passularum min. ℥iii. crem. tartari ℥i. herb. capill. veneris, veronica, fumaria an. ℥ss. sem. feniculi anisi an. ℥ij. flor. persicorum, violarum, Rosarum, acacia, epithymi an. ℥j.

Stent in infusione per noctem; postea denud coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albi. ℥. l. i. fiat justæ consistentiæ syrupus, & sequentia.

℞. Cardamomi min. caryophyllorum, galang. min. macis, zingib. alb. cinamomi acut. spica indic. an. ℥ss.

Pulverisata & panno ligata lineo, inter coquendum infricentur, ut bulliant una cum syrupo & ei facultatem tradant.

Vires, Usus, Dosis. Blandè, promptè, innoxie & æqualiter, omnes morbosos & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit; & venarum vitæque obstructions liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis; Immo etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se vel in aquis, quæ locum affectum propie respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus, pro diversitate morbi semper Dosis ab $\mathfrak{z}\text{i}$. ad $\mathfrak{z}\text{iii}$. & tres.

Sirupus Hydragogus.

℞. Rad. Ireos nostrat. mundenitur à cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residuum faciat: & recipe hujus succi clari. ℥xvi. ag. cinamomi ℥iv. mag. gum. de Peru ℥i.

Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor; postea transcola miscendo sacchari albi. $\mathfrak{z}\text{xvi}$.

℞. Spec. diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt. an. ℥ss. sandali rub. Rad. Anchuse an. ℥ii.

Mixta in nodulo ligentur & decoquantur in diplomate ad perfectionem: & syrupus summâ diligentia ita paratus cum

℞. Caryophyllorum, cinamomi acut. macis an. ℥i. gallia moschat. ls. i. Aromatizetur, ut est artis.

Vires, Usus, Dosis. In Cachexia omniq. Hydropis specie gloriosum est catharticum & divinum adjuvamentum, si ab $\mathfrak{z}\text{ss}$. ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. plus minusve, prout fuerit constipatus, bis vel ter in septimanâ sumatur: Hydrops enim, qui alias humana manu curari non potest, curatur hoc syrupo.

SISARUM sive SISER.

Sisarum à *Pastinaca* latifolia sativa (cui foliis & sapore radicis satis similis est) differt semine, quod non ut in illa latum & foliaceum, sed oblongum, angustum & striatum est, item radice, quæ non ut in ea unica, sed ex uno capite plures.

Vires. Cordus omnium radicum quæ vescendo sunt saluberrimas hæc affirmat; Dodonæus moderatè cali-

das esse ac humidas, facile concoqui, nec tardè descendere, nutrire mediocriter, nec parvi esse succi, flatulentum tamen quiddam etiam obtinere, unde Venerem promovet. *Rajus.*

SISYMBRIUM, vid. Nasturtium Aquaticum.

Sium, vid. Nasturtium Aquaticum.

SMARAGDUS, vid. sub titulò Lapis.

S M I L A X.

Nomen. Smilax aspera fructu rubro. *Park.* asperâ fructu rubante *C.B.* Smilax aspera *Ger. 7. B.*

J. B. Longis, rigidis, striatis, contortis, valde implicatis, lentis, sarmentosis viticulis excrefcit, nunc in hanc, modo in alteram partem (inquit *Clusius*) certâ quadam serie servatâ inflexis, ex geniculis capreolos proferens, quorum ope vicinis arboribus aliisve advolvitur, & ab imis ad summa repit. Horret autem spinis duris rigidisque, non tantum per sarmentâ surgentibus, sed etiam per pediculos unciales plus minus, quibus folia ex intervallis singularia appenduntur. Cæterum folia figilli *B. Mariæ* dicti possidet, sed longe crassiora, rigida, nervosa, spinis non tantum per margines horrentia, sed & in dorso secundum nervos, nunc ampla & viridia, modo angustiora & albis maculis conspersa, autore *Clusio*. Flores è singulis extremorum ramulorum geniculatis tuberculis racematim coherentes crebri erumpunt, parvi, albi, odorati, hexapetali, exiguis in medio apiculis hosce excipiunt fructus rotundi seu ovæ, per maturitatem rubræ, vel ut *Clusius*, rutilæ, in quorum singulis semina duo vel tria vel unicum, lubrica, magnitudine, colore, & figurâ seminum paliuri vulg. sed duriora, pulpa albicante, nauseosa cujusdam dulcedinis particeps. *Clusius* nucleos vocat duos, osseos velut asparagi, foris nigros, addens radicem longè lateq. serpentes sub terra fibras habere, enues, candidas, & germina summâ tellure spargere, minimi interdum digiti crassitudine, nodosa seu articulata, albicantia.

In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi in sepib. passim.

Vires. Succedaneum est sarsaparillæ in curanda lue venerea, inq. articulorum & nervorum doloribus: noxios humores per sudorem & transpirationem evacuat, cutis vitia expurgat, datur vel in pulverem redacta, vel in aqua aliove liquore cocta.

Fallopious cum in monte Juliani Pisis vidisset smilacem asperam, ea usus est loco sarsaparillæ per biennium quo ibi fuit, felici cum successu plurimos à lue venerea liberans. *Rajus.*

SMYRIS, vid. sub titulò Lapis.

S M Y R N I U M.

Smyrnius inde dictum est, quod radix lachrymam emittat myrrhæ similem, ut *Theophrastus* hist. lib. 7. C. 6. & l. 9. C. 1. docet, qualem hippofelinum fundere docet experientia, inquit *Bodæus* à *Stapel.*

Semine majore tumido, per maturitatem nigro à congeatibus distinguitur. *Smyrniium* autem *Creticum* foliis duum generum inferioribus apii in modum incis, superioribus quæ caulem vestiunt integris & indivisis caulem amplexantibus ab omnibus cujuscunque generis umbelliferis differt.

Vires. Alit bene, & præstat eadem quæ Apium, sed efficacius, venit in cibum cruda & cocta tum radix concisa, tum folia tenella & caulis, frequentibus apud nos in jusculis verno tempore ad sanguinem depurandum, rarius in intinctibus ex aceto & oleo in officinis nostris olus atrum dicitur, in transmarinis vulgò sed falsò petroselinum Macedonicum. *Rajus.*

SODA, vid. Kali.

SOL, vid. Aurum:

SOLANUM.

Solanum Ἐρπύριος Græcis, quasi Sulanum, quod suis confert adversus febres ardentes, autore Trago, Martin.

Solani notæ genericæ sunt flores monopétali, quinque partiti aut stellati, apicibus in umbilico oblongis, erectis & coitu suo umbonem quandam componentibus, semina parva compressa. Est autem duplex vel fructu minore, v. g. solanum vulgare lignosum, &c. vel fructu majore, quod genus pomiferum dicitur ut pomum amoris, mala insana &c.

Vires Solani Lignosi Dulcamara dicti.

Sebizius viridem dulcamaram contusam & cataplasmatiss formâ applicatam ait mitigare mammarum dolores, ac emollire earum duritiem, dissolvereque in iis grumescens lac.

Urinam ciere dicitur, & contra hydropem cum fructu exhiberi, accipe, præceptore Trago, lignum de hac planta libræ pondere ac minutim in frustula tali ludicri instar concisa cum mensura vini albi in novam ollam, eamque operculo (per quod tamen foramen in medio exiguum transfigito) probe contectam, ita quidem ut cum farina ex aqua undique oblinatur, reponas superque carbonem lento igne decoquitò supra tertias, demumque his utare. Hæc potio mane una hora antequam surgas, & vesperi cum lecto te committere velis, cyathi vulgaris mensura sumpta morbum regiam, præsertim inveteratum leniter per alvum & urinam exigit. Fertur ruptis & ex alto præcipitatis aut etiam cæsis succum utiliter bibi, creditur siquidem concretum alicubi in visceribus sanguinem dissolvere & partium lesarum sanitatem procurare, efficax etiam censeatur ad aperiendas obstructions hepatis & lienis: ac Parkinsonus scribit quoties ex medicorum præscripto illum exhibuit se comperisse satis violenter purgare, & Prævotius ligno dulcamaræ decocto inter bilem benignè evacuantia principem locum tribuit. lib. de Medicina pauperum.

R. Foliorum manip. quatuor concisos cum ꝑiv. semin. lini subtiliter pulverisat, decoq. in vino molchato Cretico, aut larido porcino ad consistentiam cataplasmatiss, calidum applicetur, unius noctis spatio tumorem capitis humani magnitudine resolvit, & confusiones deploratas musculorum sanavit. D. Hulse communicavit.

Vires Solani Hortensis.

Solanum hortense erat olim edule, refrigerat cum adstrictione: rufus apud Dioscoridem est in Erysipelate foris, hoc Dodonæus vehementer improbat, quod repellat, adhibetur etiam in dolore capitis & in parotidibus externè.

Remedium est præstantissimum in penis inflammatione ex lue venerea orta curanda cum albumine ovi, succus carpis applicatus febrem tollit, ut & in gargarismis; inter hæc non suadeo, communicavit D. Palmer, ex dictatis D. Hermanni Botanices professoris & Hortelii medici Leydensis præfati.

Tumorib. mamillarum frigidis linimentum ex succo sempervivi, solani & albumine ovi tepidū sæpius inunctum mirifice prodest, ex observationibus Marcelli Cumanii ab Hier. Velschio editis excerptit & misit D. Barn. Soame.

Vires Solani Pomiferi.

Succus herbæ valde opportunus est incipienti epiphoræ fluxionibusque oculorum fervidis, glaucoma facturis, si per initia admoveatur, non enim modo irruentis humoris impetū sistit, sed etiam calorem moderatur

æpius periculo à recentioribus facto, quin etiam erysipelatis ignibusque sacris vehementer oblectatur.

Italidis nonnullis esitantur poma cum pipere, sale & oleo præparata, non secus atque cucumeres, sed eduntur & cocta; nescio quo commodo; nam teter quam halat tota planta spiritus, ea parum tuto in cibos venire satis proderet, succo aqueo abundant nobis gustantibus parum grato, & certe alimentum quod corpori præstant perexiguum est & vitiosum.

In oleo cocta ad scabiem sunt efficacia, eadem arte chymica oleum subministrant ad ambusta percommodum. J. B.

Vires Solani Tuberosi.

Indi, Acoffa referente, radicibus panis loco utuntur, quem Chunno vocant: quin & aliud edulium, eodem chunno nomine nuncupatum, admodum diu durans, ex ejusmodi radicibus sole siccatis, inque partes dissectis conficiunt: sed & viridem vel coctam, vel assatam manducant, nostrates (inquit C. Bauhinus) aliquando tuberum modo sub cineribus assant, & cuticula ablata cum pipere comedunt, ad venerem excitandam, semper augendum alij & tabibis utiles volunt, cum bonum alimentum præbeant.

Non minus quam castaneæ & castanæ alunt, & flululentæ sunt, relatū mihi nunc apud Burgundos hæc radicū usum interdum persuasis earum esum lepram causare, hæc tenus C. B. qui & Burgundos ramis reclinatīs terræque testis hanc plantam propagare scribit.

Nos in Anglia radices hæc eisdem modis præparamus quibus Battatas Hispanicas.

Ebrodunensis historiæ aurores Casparum Bauhinum immerito carpunt, quod plantam hanc solanis annumeraverit, qui sane (quicquid illi ogganium, non contemnendis, imo validissimis rationib. permotus id fecit. *Solanum* (inquit) appellavimus propter formam aliquam foliorum cum malis aureis, florum cum malis infans; fructuum cum baccis solani vulgaris; seminum cum solanis panis omnib. denique propter totius plantæ odorem quem cum solanis communem habet, nec enim à viribus, sed à similitudine & convenientia in partibus præcipuis notæ generum characteristice desumendæ sunt.

Batata recens contusa, affusâ pauculâ aquâ, atque macerata, fermentando fit potus, quo indigenæ utuntur, imo subinde abutuntur ad inebriandum, hic potus nominatur Mobby & Jetici.

Solanum Lethale dictum Bella Donna.

A præcedentib. solanis non specie tantum sed & genere differre nobis videtur, quamvis nomen commune habeat, flores habet campaniformes concavos, & tubulosos, reliquæ notæ ex descriptione peri possunt.

Nomina. *Solanum Lethale Park Ger.* Melanocerales. C. B. sol. Maniacum multis sive Bella donna. J. B.

Totum pulvillum opacat perniciosa Solani Bella Donnæ dicti luxuries: namque ex radice crassa tribus cubitis altiores caules erigit, pollice crassiores hirsutos, qui in tuber crassescunt, in multos ramos indidem ferre exortos brachiantur: folia solani hortensis formâ, non sinuata, & plusquam duplo triploque majora utring; pilosa, supernè atrovirentia, infernè vero herbida, flores striati, ex foliorum alis concavi, campanularum instar, in quinque lacinias divisi, colore intus quidem lurido, purpureo; fundo luteo versicolore, extra vero tantillum ex herbido rubescunt sub hirsuto; occultant autem fibras quinas, ad exortum hirsutas, qualis & fundus est, apicibus albidis: stylus vero productior extra floris oras promittitur capitulo viridante, decedentibus floribus insident hirsuto quinque; partito calyci Baccæ nidiæ herbæ Paridis.

Juxta parietes sepimenta; agrorum, ad vias publicas, locis ruderatis & parum cultis reperitur; sed rarius

rius in Angliā, prope Cantabrigiam circa Fulborn vicum copiose provenit.

Vires. Solanum lethale dictum sive Bella donna formosum est & malignum: nota sunt historiae de pueris ex estri baccarum ejus extinctis tum V Visblei in Anglia nostra, referente Gerardo, tum in partibus transmarinis, narrante Fuchsio, quin & nupero per quam tristi experimento confirmata est vis ejus lethifera.

In calidis inflammationibus sine periculo adhiberi possunt ejus tum radices, tum etiam baccæ & folia.

Bella donna Veneris aliisque Italis dicitur, quia ex ejus succo vel aqua destillata faciem conficiunt mulieres quod faciem oblinunt, & ex rubicunda pallidam efficiunt furore vehementia, hujus herbæ folia recentia mammis imposita earum durities & tumores etiam cancerosos emolliunt & discutunt: ut sæpius expertus est generosus vir, D. Percivallus Willughby, quod à nemine hactenus, quod scimus proditum publicæ utilitatis causa sine invidia communicamus.

Horum & ipse non ita pridem eff. Cum vidi oppido mirabilem, nobilis Domina mihi nota ulcusculo cuidam paulo infra oculum, dextrumve an sinistram oblitus sum, nec multum refert quod cancerosum esse suspicabatur, folii recentis partem am imposuit; quæ noctis unius spatio uveam oculi tunicam adeo relaxavit, ut omnem explicandi sese & pupillam comprehendi facultatem ei adimeret: siquidem pupilla clarissimo lumine obversa vehementer dilatata persistit, socio & pari suo plus quadruplo amplior; donec amoto folio uvea musculosam vim suam & tonum paulatim recuperaret, atque hoc ne quis casui imputet, tribus distinctis vicibus in se ipsa experta est eadem nobilis Domina, me quoque tunc temporis fortuna præsentem & spectante.

An Solanum hoc efficiat frigiditate, an potius vi quadam narcotica, considerandum. Chirurgus qui cancerum eradicaerat & ulcus sanaverat folii partem loco imposuit ad humores repellendos, ne eodem rursus confluerent: verum ob symptoma prædictum eandem remove coactus fuit.

Pastor quidam in Chersoneso Cimbrica adversus dysenteriam morbum eo loci contumaciissimum & contagiosissimum summo cum fructu & successu decumbentibus propinavit vinum cui infusæ sunt baccæ solani, non solum enormem fluxum sistunt & dolorem demulcent; verum malignitatem in sudorem resolvunt, Ephem. Germ. An. 17. observ. b. 4.

Si per baccas solani sylvestris illius furiosi, quod puto, intelligantur [i. q. Luc. Sch. & Schol. in hanc observationem] quadrabit hic quod non Gesnerus, syrupum ex eis paratum pro magno arcano commendans, ad Achill. Gasserum perscriptum: succum ex ejus fructibus expressam, & ad syrupi consistentiam cum paucis saccharo d. coctum, ita efficacem esse, ut vel lingulæ aut cochlearij parvi mensura somnum inferat, fluxiones sistat, dolores tollat, dysenteriam curet: gratus est palato, sed cavendum ne amplius detur; ego cum laude usus sum, utantur quibus videretur; ego ab ejus usu abstinendum censeo, nisi in turiorum medicamentorum extremâ inopiâ.

Accidit, ni fallor, tempore Pontificis Maximi Urbani ultimi, ut quidam de famulitio Cardinalis magni nominis (ut mihi hic Augustæ retulit ejus hortulanus) infunderet in vino malvatico herbam illam quam Bellam donnâ vocant, daturam alias, per noctem, ut ejus herbæ effectus discerent; infusum hoc propinarunt cuidam fratri mendicanti ex conventu S. Hieronymi qui Paravij fratrum ignorantia dicitur; à primo breve delirium, cachinni, gestulationes variae; dein insaniam vera, post stupor mentis, qualis est ebriorum vigilantium. Cardinalis pro ebrio in carcere includit; deinde à medico qui rem subolfecerat innocens pronuntiatur, qui aceticyatho propinato à dementia quam,

Bella Donna causavit eam liberat. Hæchsterferus Dec. d. 7. o. rv. Observationem transmittit eruditissimus & amicissimus vir D. Edv. Halle. *Rajus.*

SOLDANELLA.

Nomina Soldanella marina Ger. maritima minor C. B. vulgaris sive solabilis Marina P. & Brassica marina sive soldanella L. B.

J. B. Per terram suas spargit viticulas, à quibus folia prodeunt subrotunda, retusis alis prætita. Lætiora quàm longiora, chelid. n. minoris siliis, crassa cula, li. puere lacteo manantia, pediculis longis munia, flos magnis purpureus, qui bracteis ferè, campanulatus, non absimilis multum floribus herbæ quæ pro Nil Avicennæ exhibetur, aut similacis lævis, indivisus. Emen in localis rotundis non tantum nigrum, sed & album, angulosum albo se nit. quæ si nos nondum vidimus, gustu est salso, subamro.

In litto-ibus maris arenosis frequens oritur, tum in Angliâ tum in exteris regionibus.

Vires. Herba in totum ventriculo inimica, actis, vehementissimè ne alvum ciet. Coquitur propter actimoniam cum pingui carne. Valide aquas ducit, præcipuè rærogativæ in ascite; utilis etiam scorbutu utendi modus varius, siquidem folia ejus ex sale, aceto & saccharo acerarum modo ad quinque aut sex buccellas coacta, mirabiliter aquas per alvum educunt, eadem in jure carniū cocta adjecto dein sacchar aut melle propinantur; possunt & sicca in pulverem in pulverem redacti, ad 3j aut ij ex jure pulli bibi.

Fallopium asparagos hujus in hydropo commendat. Altomarius autem de ascitis curatione agens, quidam ait ex rumoribus succum marinæ brassicæ cum sapia seu aqua lactis approbant, cujus usum non valde admittit, namque ventriculo mitissimè adversatur, & ipse pluries experientiâ vidi noxam potius inferre quàm auxilium aliquod hydropicis præstare, imò quosdam citius periisse observavi.

Corrigitur stomachicis Zingib. mac. cinnam. Sem. Anisi &c. Dosis in subitan. à 3ss ad 3j. Schrod. *Rajus.*

Soldanellam habemus in nostris montibus quæ Soldanella Alpina minor dicitur, cujusque icon Tab. xxiv fig. 1. exhibetur, ejus autem flos, qui hic omissus est quia eò tempore quo pictor noster eam ad vivum delineabat non amplius reperiebatur, est admodum elegans, coloris cærulei primo vere, statim scilicet ac nives funduntur magnâ copiâ erumpens. Hujusce plantæ vires hactenus non sumus experti, quamvis eam quidam vulnerariam reputent.

SOLIDAGO, vid. *Symphirum.*

SOLIDAGO SARRACENICA, vid. *Virga Auræa.*

SOLUTIO.

Solutionem hic nolo illam, quam cum combinatione Finem Chymicæ internum in *Dissert.* 2. constitueredixi, i. e. dum concreta in minima rediguntur nulla habita vel fluiditatis, vel firmitatis seu soliditatis ratione, sed ex Chymicis operationibus quibus ad finem hunc duplicem tendimus, illam, qua corpora solida in fluidam aut molliorem substantiam facessunt, dum eorum minima fluidis aptis ac determinatis combinantur: acat his in fluore pro lubitu artificis conservantur Communiter equidem Extractionem à Solutione distinguunt, quamvis præter hanc illa nihil involvat, hac tantum restrictio: ne quod solutio totum mixturam, aut maximam ejus substantiæ portionem pro subiecto agnoscat, v. g. dom. sal ab aqua resina scammonij à vitello ovorum, dissolvitur per Extractionem verò fluidum in certas solum ejus particulas solidiores agar sibi. has adapet, v. g. dum ex jappa substantia resinosa evocatur, unde in finitiorum Infusorij, essentiarum, Tincturarum ac Elixirum præcises enegunt.

§. 2. Sicut autem corpus sol dum illud rectè pronuntiatur, quod contactui manuum nostrarum resistit, ac non-

nisi

nisi difficulter, in partes minores dirimitur; & Fluidum, quod haud resistit, sed divisionem sui in minima facile admittit: infero, Solida illa esse, quorum partes insensiles ita inter se coherent, ut quietæ maneant, i. e. earum connectio à nulla materia mobili interrumpatur; contra fluida, quorum minima haud aded invicem contigua sunt, quin per materiam quandam, semper in motu existentem, eorumque spatiolis interjectionem, continuo agitentur, prout ab *Incomparabili Anglia Philosopho in hist. Fluid & Firmitat*, non minus prolixè, quàm accuratè, declaratum fuit.

§. 3. Proximum E, & potissimum Solutionis instrumentum fluidum extraneum est, solida in partes insensiles non tantum discerpens, sed perpetim simul agitans, & quidem triplicis generis, Ignis nempe, Aër & menstruum: ita tamen ut solutiones quædam corporum, per fluores quoque his proprios & per aquosiratem intrinsecam fiant, præprimis si digestio commoda aut fermentatio seu putrefactio accedat. Prioris exemplum tepetere licebit ex *dissertatione præcedente* de vitriolo, in Maria Balneo per se & sine ulla humiditate accessoria, sed à sola illa, quam in crystallisatione sibi combinaverat, deliquescente: Posterioris autem phenomenon erit solutio liliorum convallium, asellorum, lumbricorum terrestrium &c. per fermentationem aut putrefactionem adornata, qua mixta hæc maximam partem per se in liquamen, abeunt, relictis exuviis tantum & folliculis tenuissimis, illi innatantibus.

§. 4. Minima illa, in quæ concretum, dum fluiditatem induit, resolvitur, modò simpliciora sunt modo magis composita & de totius natura participantia; ita tamen ut vix ullum corpus per operationem hanc in corpuscula simplicissima & homogenea magis abeat, aut per extractionem talia ex illo provocentur: Quatenus miscibilia hæc aded arctè sibi intertexta sunt, ut unum sine alterius consortio, nec solutum, existere queat, quocunque demum solvente, hætenus quidem triviali, utaris.

§. 5. Ita quæ igne funduntur à solidis non simplicitate, sed solo fluore, differunt, cujuscunque generis fuerint: Quæ aër solvit, salina equidem tantum, hincque aliis mixtis minus composita, sunt, haud tamen differunt liquor salis ab hujus granis, nisi consistentia; nec quicquid salini mediante ejusmodi deliquatione ex compositis magis exudat, de elementaris homogeneitatis titulo gloriari poterit, quod idem per menstrua ad fluiditatem solutorum factum est.

§. 6. Aquea enim menstrua quamvis primariò quidem salinas mixtorum atomos absorbeant seu fundant, vix tamen sal aliquod aded purum, ulla arte, à concreto ullo, separari potest, aut à natura productum existit, quin alias simul heterogeneitates, terreas sc. aut sulphureas, intermixtas foveat; imò concreto inexistens sal cæterarum partium amplexibus arctioribus ita irretitur, ut sine harum inosulationibus vix educi queat. Dum volatile sal vix sine oleosi connubio concipere licet, nec fixiora, multifaria quamvis arte depurata & ad sensum homogenea reddita, omnis planè terreitatis aut alterius heterogeneitatis expertia sunt, cum alcalisata quoque per reperitas calcinationes & cum aquâ solutiones lustrata, si per deliquium fluunt, multum terræ, ab aqua in posterum haud dissolubilis, deponant, ita quidem ut liquor eorum colorem saturatiorem seu Tincturam lixiviosam, quàm à terræ commiscela habebat, plane exuat & aqueam limpiditatem nanciscatur. Pariter decocta, seu infusa, vegetabilium, cum aqua simplici adornata, non tantum salinam & mucilaginosam vegetabilis substantiam imbibunt, sed cum hac aliquid terreitratum quoque: unde si ad siccitatem usque solvens evaporetur, remanens calcinatum præter alcali fixum terram quandam exhibet.

§. 7. Cum fluoribus, per menstrua salina introductis

eodem res recidit, imò evidens magis est, quatenus his soluta mineralia, quæ propter concretionem atque texturam firmiorem magisq; compactam non, nisi in partes homogeneas, se frangi patiuntur, facili negotio ab igne proprias & pristina recipiunt formas, i. e. eorum solutiones seu extractiones nihil aliud, quam metalli seu mineralis, integri in ramenta minutissima fracti, molecule menstruo intertextæ, existât. Nec exquisitiore selectu untur menstrua sulphurea, ut potest quæ raro sulphur sincerum, sed sale ut plurimum adulteratum è concretis evocant, dum v. g. spiritus terebinthinæ ex floribus sulphuris præter, substantiam bituminosam seu deflagrabilem salinam quoque complectitur, sine multo apparatu ab illa denuo separabilem, uno verbo, totum sulphur, sale acido & vitriolico turgidum, dissolvit.

§. 8. Quibus suppositis *Willisio* condonandum haud est, quando de *Fermentat. cap. 9.* scribit, Camphoram per Aquam fortem in Liquorem oleagineum deliquescente, quatenus hæc partes illius concreti salinas, à quibus concretio ejus dependebat, absorberet, sulphureis intactis. hinc superficiei solutionis innatantibus. Autopsia siquidem triviali satis constat, oleum hoc ipsam totam ac homogeneam camphoræ substantiam esse: quatenus cum aliis acidis v. g. oleo Vitrioli, eadem camphoræ soluta per intima oleo huic successive connubio, quod ex hypothesei *Willisiana* vix sperandum; aqua verò utrique solutioni infusa camphoram integram resuscitat.

§. 9. Operationis E. hujus species, pro solventium varietate contemplaturus, observo, per ignem fundi seu liquari [qui enim inter fusionem & liquationem distinguat, haud plus gratiæ merentur, quàm terminorum vana multiplicatio ipsis decernit] omnia pingua & resinosa: atque hoc quidem aut pro heterogeneitatibus, tam aqueis quam terreis, separandis, aut, quo alijs corporibus commodius & per minima magis commisceri queant. Idem experientur salia quævis fixiora cum vitriolis, omnium tamen difficillimè alcalia: quibus accedunt mineralia plura & metalla, excepto Hydrargyro, cuncta, quorum tamen pariter alia vehementiorem ignem postulant, v. g. ferrum, alia à mitiore emolliuntur, v. g. plumbum, antimonium &c. ita quidem ut interdum opus habeant, borace, similique materia fusionem maturante. Sc. ignis minima, ratione suæ substantiæ, sensorijs nostris non, nisi calore & luce, obvia, corpora illa subeunt, horum particulas exagitant, divellunt & in motum vindicant: ita tamen ut eadem hunc & cum hoc fluorum inductum protinus iterum deponant, si ignis æstus & vibratio adæquata remittat.

§. 10. Quam Aër præstat, solutio Deliquium communiter audit, alijs ad differentiam descensionis calidæ, seu distillationis per descensum, descensio frigida appellatur, utpote per quam concreta solidiora ab aere frigido & humido fluorem recipiunt. Forfan non incommode solutiois vaporosæ nomen mereretur, quod non aër per se, sed ratione vaporum aqueorum, hic agat, hos in corpora potentius vibrando, qui in illis cumulatæ & gravitate naturali descendere annitentes particulas eorum, ab aqua aliàs dissolubiles, secum abripiunt & cum ijs liquores seu olea per deliquia constituunt. Sc. objecta hujus deliquationis salia fere tantum sunt, imprimis alcalia & quidem duplici de causa. Siquidem cum reliqua salia per crystallisationem texturæ compactionis longè, ac hæc, existant, humiditatem aëris ambientis non aded facile admittunt; ita quidem ut alcalia quoque, si in crystallallos redacta, difficilior in deliquium abeant: sic ut alcalisatorum utpote ordinariè non crystallatorum, hinc texturæ laxioris, poros aër mox subeat, & ratione particularum, aquearum, quas secum vehit, illa deliquet. Deinde sicut terram & metalla salibus reliquis ac vitriolis consistentiam dare, ex *Dissertatione decima tertia* repe-

to, & quidem ut pro diversa horum ad salinam portionem habitudine eorum quædam facilius, quædam difficilius, aut nunquam, per deliquium fluant: pariter alcalifata, terreis cements destituta aut parcius instructa, ab æris humidioris contractu citius reliquis deliquescunt, potissimum si per repetitas solutiones ac calcinationes à terra sua maximam partem liberata fuerint, & contra cineres minimè, aut difficulter, ideo quod terræ horum massulæ, salinas adhuc obvolentes, æri aditum intercludant.

§.11. Nec tamen acida ac acido-salsa æris vim menstrualement omnimode eludunt, sc. illa, quæ terreo illo munimento minus firmata sunt: dum v.g. sal gemmæ, marinum, nitrum &c. utut sibi relicta non adeò facile diffuant, aliquot tamen fusionibus, calcinationibus & dissolutionibus eò adigi valent, ut ab æris humidioris contractu in liquorem faceant, unde etiam sal illud, seu ∇ Salis, quam Paracelsus pro Primo Ente vegetabilium secernendo commendat. Pariter Terra foliata Tartari ac Nitri, nisi ab ære probè arceantur, vix à deliquio defendi possunt; ex salibus purioribus minusq; terreis coagmentatæ. Idem fatum experitur \times um per calcinationem cum calce viva præparatum, quod alcalifatam equidè ratione saporis ignei videtur, haud tamen purum, alcali, sed compositum magis illud mihi præter rationem experientia demonstravit: Dum 1. aliquid adstrictorii linguæ simul imprimit. 2. non ab acido, sed ab alcali ejus solutio præcipitatur: 3. in strias nitrosas similes hæc concrevit; ita ut quod per deliquium fluat, albuminis ovorum indurati præprimis interventu, à summa præprimis sua puritate videatur petere.

§.12. Facili quoq; negotio in liquorem abit saccharum, salis naturam æmulans: item corpora minus salina i. e. ab ∇ haud dissolubilia, modo cum salibus calcinentur, deliquio se submittunt, v.g. Margaritæ ac Corallia cum nitro calcinata aut cum Aceto soluta, Lapis Lyncis, Indajus, Crytalli, Cancrorum &c. aut post calcinationem in igne, aut sine hac cum menstruis acidis corrosa, Talcum cum Nitro tostum, Calculus humanus cum Carbonibus ustus. \bigcirc cum Nitro ac Tartaro calcinatum. Plumbum cum Aceto in saccharum formatum, lapis hæmatites cum sale ammoniaco sublimatus & \otimes sublimatus, ita tamen ut hæc similiaque, quæ non purè salina, multum terræ haud solubilis, postquam eorum quædam pars in fluorem abiit, post se relinquant. Sc. cuncta hæc corpora, per se minus deliquabilia, dum salibus hoc vel illo, modo combinantur, mineralium & metallorum particulas sibi hæc adeo arctè adaptant, ut ab atmosphæræ undositate dissoluta illas, sibi intertextas, non facile dimittant, pari modo ac eadem salia una cum corporibus, quibus intimè cohærescunt, per affusam aquam dissolvuntur: unde, an hi liquores mineralium similiumve concretorum, an salium adjectorum, dici mereantur, Lectoris judicio relinquo.

§.13. Denique deliquationis æreæ effectus quoq; observatur oleum myrrhæ, quatenus per illam tora hujus substantia Gummi resinosa, (nisi forsitan aliis adulterata fuerit) in liquorem homogeneum abit: quod quidem eo minus mirari subit, dum in ore eadem brevi deliquescit, i. e. ut ut concretum hoc Gummi resinis non ineptè annumeretur, pariter ac Camphora, benzoe, Styrax &c. tantillum tamen est resinosa substantiæ quodque à gummosa valdè discontinuatam probeque subactum, cum hac aqueæ humiditatis, ritè applicatæ fluori cedit, simili modo ac mastix gummi magis resinosum & inflammabile ab aqueis liquoribus, sine ullo labore solvitur, ut taceam illius præminentia, quam humiditas æreæ præ aqua communi in corpora nonnulla habet, utpote de qua aliàs actum.

§.14. Apparatus deliquii varius deprehenditur, quatenus materia solvenda interdum super marmore aut tabula vitrea explicatur, quo sc. æris vibrationes non tantum directè in illà incident, sed ab horum substantia minus porosa reflexæ etiam in eandem potentius agant:

imò nec absolum erit asserere, intra instrumenta hæc concentratum quasi frigus vapores rei solvendæ impactos condensare & in liquorem cogere. Interdum sacculo lineo pyramidalis, Manica Hippocratis dicto, eadem immittitur sicq; super vas latius, quod liquorem destillantem, accipiat, suspenditur: ita enim satis facile quoq; deliquescit, æris appulsus undiq; excipiens. Nonnunquam vesicæ bubulæ eadem materia includitur; hæcque aut in cryptam subterraneam pariter collocatur, aut aquæ immergitur, aut balneo vaporoso admovetur usq; dum illa intra membranæ hoc receptaculū ab humiditate ambiète sufficienter fluat, quatenus hæc in particulas summa exilitatis attenuata poros vesicæ penetrat, intra hujus verò cavitatem cum substantia salina denuo condensata eodè meatu adgressum minus proportionatos offendit.

§.15. Nec infrequens est, mixta delinquenda cum albumine ovorum ad duritiem cocto locis ejusmodi subterraneis committere, adeoque horum æque ac loci humiditate eorum, v.g. sacchari, myrrhæ &c. solutionem moliri, imò albuminis contractu aeris potentiam notabiliter juvari, ipsa experientia loquitur, dummodo dicta myrrha per se in cella non adeo fluxilis, huic encheirisi nihilominus auscultat. Nempe fluidum albuminis elixatione inspissatum ab ære ambiente humidior adeò sensibilibiter attenuatur, ut exterior ejus superficies brevi deliquescat & in mucum quasi quendam convertatur, interior verò, & quæ corpus deliquendum immediate magis tangit, quasi flaccescit & rugas contrahit, consumpto nempe ac absorpto liquamine, in quod substantia albuminis sensim deliquescit.

§.16. Semper tamen & quacunque ratione negotium adornetur, tam pro solvendorum diversa textura, quam diversa atmosphæræ habitudine, tardius, aut citius, succedit deliquium: i. e. quæ ad salis alcali aut alterius purioris naturam propius accedunt promptius deliquescunt, aerq; humidior, qui frigidus insimul brevius agit, quam temperatior: forsitan quatenus ille vapores, semel adaptatos & concentratos, non adeò facile denuo rarefacit, sed magis condensat; calidior autem, nisi excessive humidus fuerit, v.g. in Balneo vaporoso, tantillum humiditatis, salis impactæ iterum abstergit.

§.17. Quæ menstruis demum peragitur, Solutio Infusionis seu immersionis nomine venit, ita tamen, ut infusum, tanquam hujus productum, non illa tantum Galenica medicaminum forma dicatur, quæ in liquore aqueo, vino, sero lactis similique minus spirituosos res infundunt & postquam digestionem aut ebullitionem quandam (unde etiam Decocta audiunt) sustinuerunt, liquorem despumatam, decantatum ac colatum, vel pro portione, vel alium in finem, exhibent: sed præter salium cum aqua factas solutiones illa potissimum Chymicorum producta hujus loci erunt, quæ Tincturarum, Essentiarum, Extractorum aut elixirium nomine notantur, & activis magis menstruis salinis æquæ ac sulphureis, ut ut interdum satis dilutis, adornantur, vel aquea humiditate maximam partem abstracta demum pro consummatis habentur, v.g. gelatinæ.

§.18. Salium & \bigoplus lorum solutiones, eorum depurationis & Crytallisationis gratia, tamen fiunt, & quidem absque singulari encheirisi, nisi ut solventis observetur quantitas proportionata: i. e. ad minimum salis pondus duplo superet illud, interdum tamen, si per subsidentiæ terræ heterogeneitates separandæ fuerint, largiore paulo manu aqua affundatur; ne verò nimia ejus moles evaporationem moretur ac protrahat, conveniet parcius eam adhibere, dum quicquid salis minus soluti restat, à liquore denuo super affuso solvi queat. Hujus loci est Tinctura seu Liquor Terræ seu mineræ Martis Hassiacæ, solaris vulgo dictæ, quæ postquam per aliquot annos ad \bigoplus li sufficientem productionem aeri exposita fuit, cum ∇ roris majalis aliaq; destillata calidè infunditur, ejus solutum filtratur, filtratum novæ iterum mineræ affunditur, donec hujus nihil amplius solvere queat.

§.19. Multo minus pro reliquis infusionibus seu ex-

tractionibus menstrui quantitas adeo accuratè determinari valet, & quæ vulgo per supereminentiam hujus duorum vel trium digitorum super materiam infusam circumscribitur, vel ideo minus acurata videtur, quod diversa vasis capacitas etiam hanc necessariò variat. Ut plurimum tamen quadruplum ejus concreto dissolvendo sufficit, nisi forsan digestio & coctio longior ac vehementior, partem liquoris absorbens, sextuplum aut octuplum postulet. Evocare per destillationem aut evaporationem portionem menstrui exuperantem, adeoque solutionem aliquantulum inspissare, interdum convenit: quod si tamen cum menstruo volatili solutio facta, hancq; sub consistentia liquida asservandi mens fuerit, talis separatio haud semper congrua est; quatenus, sublimis solventis partibus volatilibus, minima concreti soluti, quæ menstruum, hac ratione aquosius redditum, detinere amplius non poterat, recedunt, & sub resinæ, aut cujusvis præcipitati, forma fundum perunt.

§. 20. Quod si verò ad spissitudinem extracti crassioris menstruum abstrahere placeat, cavendum maxime erit, ne cum adustione particularum extracti hoc fiat, ideoq; evaporatio seu destillatio hæc in Mariæ potiùs Balneo instituitur, ubi empyreuma non adeo facile contrahitur: vel postquam super ignem nudum aut arenæ maxima liquoris portio fuerit sublata, leniore & humido calore interveniente, ac frequentiore agitatione inspissatio absolvatur. Imo nec ad consistentiæ illius, quàm intendimus, gradum ultimum semper extractum super ignem redigi, necesse est, quatenus quod fluidioris mellis spissitudinem, dum adhuc calet, tantum præ se fert, refrigeratum soliditatem potiorem mox contrahit. Nec omnium rerum extracta faciliè ad formam spissiore redigi debent. aromatum sc. vel aliàs fugacium admodum corporum v. g. antiscorbuticorum: eò quod cum menstruo, quaecunque demum hoc fuerit, volatiliores ac nobiliores horum partes exhalent, remanente magmate crassiore ac effuso. Præprimis autem Vi, quo extracta hæc frequentius parantur, maximam olei essentialis partem (à qua nihilominus omnis illorum vis emergit) secum in sublime rapit: cujus etiam restituendæ gratia extractis aliquot olei proprii guttulas Zwelferus, addere jubet.

§. 21. In genere solutio hoc modo peragitur, sc. materia dissolvenda aut extrahenda quàm maxime incidendo, radendo aut contrundenido comminuta menstruo suo infunditur, clausoque exactius, vase præprimis si hoc, aut illa, volatiliores existant, per aliquot horas vel dies in digestionem ponitur, donec concretum dissolutum aut liquor solvens satis tinctus compareat. Qui per inclinationem decantatur, & si residuum non planè dissolutum videatur, aut ex hujus colore, odore atque sapore particulas activas & solubiles adhuc subesse, innotescat, cum nova menstrui portione digestio reperitur, usque dum hoc non ulterius tingatur, aut concretum plenariè dissolutum fuerit. Quo facto depletiones junctæ, si opus fuerit, colantur, & si congruè videatur, ad desideratam consistentiam, sub circumstantiis monitis, aliquid menstrui inde avocatur.

§. 22. Peculiaris solutionis per menstrua modus videtur per destillationem contingit, dum v. g. in buriro antimonii à salibus & rii sublimati corrosivis substantia antimonii solvitur & fluiditati exponitur, & is communis aliqua portio per additamentum Salis armoniaci & Calcis vivæ ex Retorta sub Tincturæ aureæ forma propellitur, ac ex Oleo & ris cum eodem Sale armoniaco, post levem præparationem, Tinctura, cœrulea destillatione prolicitur; quam Vaporosam pariter solutionem appellare fas est: quatenus substantia salina, vi ignis rarefacta & in vapores resoluta compagem sulphuris Antimonii ac cupi solidiorem invadit, hancque cum imperu penetrans quadam ejus minima decedit secumque in vas recipiens deferret & cum his præstius unita solutiones ejusmodi format, pari circiter ratione,

ac Vi, si simileq; volatiles, dum ab aromaticis speciebus cohobantur, horum particulas magis oleosas imbibunt, hisq; imprægnatæ Xcum consceadunt.

§. 23. An & quomodo Tincturæ, Essentia, Extracta & Elixiria differant, determinare vix licet, cum v. g. eodem jure illud infusum, quod cum Vi tartarifato ex myrrha paratur, essentiam atq; tincturam appellare nihil prohibeat, & non videam, quominus Tincturæ v. g. rosarum, Martis &c. essentia horum dici queat. Observamus equidem, Tincturas ut plurimum vocari, quæ concreti colorem specificum præ se ferunt: est meritis dubitatur, (1.) an omnium Tincturarum colores, quibus pollent, concreto, unde denominantur, inextiterint, aut revera per menstrua iis educti fuerint, v. g. Tincturæ Tartari, Coralliorum &c. (2.) an non in essentis atq; ac Tincturis particule concretorum deorsum lateant, quæ, quamvis haud semper colorem naturalem, ut in essentia menthæ, ruræ &c. retineant, similes tamen his sint, à menstruo ratione coloris externi leviter saltem immutata? Ac quid (3.) judicare conveniet de Tinctura illi Matris quam ex liquore terræ & licæ, cujus superius mentio facta fuit, per affusionem aliquot guttularum liquoris retræ foliatæ Tartari, in momento ac ex tempore producere licet? Sc an, antequam ultimus hic liquor instillabatur, ille Essentia, an Tincturæ, encomium mereatur? Pariter quoad Elixiria eademque Tincturas & Essentias nulla comparet genuina ac firmadifferentiæ ratio: quatenus Elixir proprietatis sine acido paratum sine omni scandalo *Timæus* Essentiam aloëticam, alii Tincturam Tartari compositam, ajunt, Tinctura & Essentia florum hyperici idem Pharmacopœis denotant; & quod hi Essentiam, Mynsicht Tincturam, baccarum juniperi & Cassiæ lignæ appellat. Infusum Martis cum Succo pomorum sunt, qui Extractum, sunt qui essentiam vocant, nec illi à quopiam erroris accusantur, qui Tincturam hujus metalli volunt. Sunt E. Tincturæ, Extracta, Elixiria & Essentia revera unum idemque ac diversam tantum denominationem ab inventorum phantasia receperunt: ita tamen ut, si ad crassitiem mellagineam avocetur menstruum, Extracta Pharmacopœis nosi εἶδος ἡν audiant.

§. 24. Ex animalibus eorumq; partibus pauciores observantur Essentia seu Tincturæ, v. g. Castorei, mumia, cranii humani, splenis bovis, viperarum, oculorum cancrorum lumbricorum terrestrium Extractum fellis tauri & Splenis bovis &c. plura ejusmodi solutionum concedunt vegetabilia ac mineralia.

§. 25. Vegetabilium sc. Tincturæ seu extracta conficiuntur primo ex floribus, v. g. rosarum, violarum, tunicæ, bellidis, borraginis, hyperici &c. ita quidem ut eorum potissimi, i. e. enartati, si hypericum excipias, cuncti, cum phlegmate & li, aqua communi aut quadam destillata, semper tamen cum u & is & li &c. acidulata, infundantur; ad Tincturæ usq; saturationis extractionem. Quarum similiumq; Tinct. occasione annotare conveniet phenomenorum & ris gas & us egregiam disparitatem: quatenus Gas seu fumus sulphuris ex recensitis similibusque floribus colorem purpureum non tantum evocat, & in momento quasi hos dealbat, sed decoctum quoque eorum omnis rubedinis expertus reddit, & verò u & ris acidulata & cum rosis decocta tincturam egregiam promittit, quod pariter contingit, si hujus stigmati una vel altera guttula decocto priori instilleretur, aut decoctum sulphure fumigatum aeri libero aliquandiu exponatur.

§. 26. Deinde Essentia parantur ex foliis seu herbis infinitis, it. ex radicibus, lignis corticibus, baccis, fructibus, gummaris ac resinis &c. & quidem vel cum Va aut u proprio, v. g. elixir juniperinum, vel frequentissime cum Vi aliove, quem appropriatum censemus: ita tamen, ut menstrua hæc quoque facilioris extractionis gratia interdum acidulentur, aut cum sale quodam lixivioso acuantur.

§. 27. Notetur interim, Tincturas florum, quæ cum menstruis salinis aut particulis salinis imbutis eliciuntur, non semper genuinas esse, sed ab his diversimode immutari: dum v. g. color florum borraginis, violarum &c. cæruleus equidem observatur prodit nihilominus ex his cum menstruo acido Tinctura rubicunda, imò ad levissimum statim ejus contactum cæruleitatem suam cum rubedine mox immutant, quos, si cum alcalico infudisses, viridem vidisses Tincturam. Præterea nec Tincturæ ejusmodi in medicina insignis adeo efficaciarum videntur, & quod agunt, ratione menstrui forsitan potius agunt. Exilissimum quippe substantiæ est, quod de concretis his in Tincturam facessit, & ponderis imminutio in floribus, quamvis omnis color educus fuerit vix deprehendi potest: ita ut in guttulis v. g. triginta, quibus tales Tincturæ ordinariè propinari solent, ne equidem dimidium granuli substantiæ rosarum adstrictioris, refrigeratioris &c. lateat; unde menstruo evaporato parum extracti spissioris post se relinquunt, idque omnis pristinae rubedinis expers.

§. 28. Pariter & non sine ratione de Tinctura Tartari, aut hujus salis color intrinsecus & specificus existat, potissimum si, ut fieri decet, ex sale tartari ad cæruleitatem calcinato cum spiritu vini hæc pareatur; cum per repetitas ac diuturnas calcinationes, si qua inextirpisset, tollatur. Vi E. potius pinguedo videtur quæ à particulis salis tartari alcalicis exaltata colorem ejusmodi induit quatenus v. g. Nitrum cum carbonibus fixatum quævis alcalifata, si cum spiritu vini digerantur eandem Tincturam huic imprimunt, quam tamen horum concretis intrinsecam nemo concipere poterat.

§. 29. Quod autem essentiarum vegetabilium ut plurimum per Vi similesque inflammabiles conficiantur, ratio duplex videtur, nempe vel quod eorum vis medicamentosa, quam extrahere annitimur, maximam partem in oleoso essentiali concentrata sit, quod, menstruis non, nisi sulphureis, cedit; vel quod cum menstruis aqueis productæ diu asservari nequeant, sed mox muces evadant & corrumpantur. Interdum tamen activitas Vi intenditur aut ad certa subiecta magis determinatur, illum vel aliquoties super sal Tartari rectificando, cum eodem sale cum digerendo, aut sale per deliquium soluto species prius macerando, vel in ipsa digestionem siccum adjiciendo: quatenus v. g. Tinctura seu Essentia opii, myrrhæ, castorei &c. Tartari potius Tinctura, quam Vi simplici, etsi summè rectificato, evocatur: ut taceam; eorum quædam prævia demum cum aliis menstruis maceratione v. g. gummi ammoniacum cum Alcahest Glauberi, ad dimittendam Tincturam disponi, quod de animalibus quibusdam pariter observandum, dum v. g. serpentes per Spiritum viridis æris prius dissolvere convenit, antequam spiritui vini pateant. Imò si diversæ texturæ species extractum ejusmodi subeant, non simplex, sed duplicis generis, menstruum adhibetur, v. g. in Elixir proprietatis vulgari præter Vi Spiritus sulphuris aut alius quidam acidus, ita ut Vi aloë & crocum, liquor acidus myrrham dissolvat.

§. 30. Imò ex dictis satis sufficienterque constat, multas vegetabilium & animalium essentias & tincturas non nisi illorum solutiones esse, v. g. myrrhæ gummi ammoniaci, aloës, castorei & opii, quatenus horum tota substantia, recrementis & fibrositatibus tantum quibusdam intactis, in menstruis allegatis diffluit: pari modo, ac superius dictum fuit oleum illud camphoræ commune non hujus pinguedinem concentratam, sed totam camphoræ substantiam, sub fluoris statu, esse.

§. 31. Magis experuntur à Curiosioribus Tincturæ mineralium, quamvis paucissimas earum, hætenus visas, veras existere, examen accuratius doceat, aut certe de earum ingenuitate diversæ circumstantiæ dubitare jubeant siquidem primò quoad gemmarum Tin-

cturas, illas equidem pro entibus merè rationis & meris solutionibus habere, haud convenit, quatenus has ab earum substantia separabiles esse, inde colligitur dum harum plures, si igne vehementiore torceantur, colorem sibi congenitum partim alterant, partim planè perdunt. Cui accedit, quod *Experientissimus Boyle de Gem.* duobus menstruis, uno blandiore, altero corrosivo magis, ex granatis haud calcinatis, imò integris, Tincturam se extraxisse, perhibeat, per diversas circumstantias pro vera habendam. Verum sicut Colores suos intrinsecos gemmas à metallis horumque fumis recipere, omnes in confesso est, nova denuo emergit ambiguitas, an Tincturarum harum efficacia præ metallorum, quibus suam scaturiginem debent, solutionibus aliquid peculiare habeant, seu nonne Tincturæ gemmarum cum solutionibus metallicis determinatis ejusdem generis sint prout iisdem Boylii observatio docet, Tincturam granatorum cum Aqua regis confectam, & gallarum infuso instillatam hoc nigrum reddidisse, ac de præsentia particularum Martialis testimonium exhibuisse.

§. 32. Tincturam corallorum veram *Zwingerius* semel tantum; *Crollius* nunquam, se vidisse, perhibent, imò de ejusdem existentia *A. Sala* f. 1. aphor. 42. plane dubitat, alii contra, v. g. *Gansf. hist. corall.* *Agricol. de corall.* it. in *Ghirurg parva*; *Laurenberg. in Aphor.* *A. Sala & Arnold. Schroder, in defens. Laurenb.* eam adstruunt: quibus ex recentioribus accedunt *Borrich.* *Apol. contra Conring. p. 329.* *Langelotti in Epist. ad Curios. ac Vigan. Medull.* corallia in liquamen rubicundum dissolventes: quia nihilominus de horum operandi modis dubium manet, an per illos tinctura tantum eliciatur: an potius quædam horum partes integrantes & minima de totius natura participantia solvantur, negotium hoc in suspenso relinquere quàm intempestivè decidere, prudentius videtur.

§. 33. Eadem fide destituuntur Tincturæ metallorum & mineralium, quales venditantur ex Auro, Argento &c. Siquidem quoad Tincturam auri, ut ut metalli hujus plexus & textura externa variis modis, v. g. per menstrua, item tritum, ita disturbari possit, ut in sensibiles particulas redigatur, quia nihilominus, ejus compages adeo firma est, & Δ auri juxta *A. Salam. de sept. Planet. terr.* reliquis ejus partibus ita alligatum & inseparabiliter unitum, ut sine illius reliqua substantia à menstruo nullo imbibiri valeat, hinc quicquid auro deraditur integri hujus mixti formam retinet: solutionis potius, quam Tincturæ, nomen merentur nobis hætenus obtrusa hoc titulo medicamina; quod de sua quoque auri trituratione ac destillatione innuere videtur *Langelot.* dum hujus residuum pondere equidem imminutum, in corpus tamen auri verum beneficio boracis deliquari posse, fatetur. Cui accedit, quod non raro ejusmodi Tincturæ, auri corpore intacto, à menstruis solis cum particulis cementorum similiumque additamentorum exaltatis emergant; ut variis experimentis evinci posset: potissimum, cum cujus generis ille color auri intrinsecus sit, nondum demonstratum fuerit, dum v. g. *Nobilissimus Borrichius* viridem se extraxisse perhibet, qualem Tincturam me olim quoque apud *Polmannum* vidisse, recorder. Nec sufficit, quo communiter suas auri tincturas defendunt, residuum nihilominus ab extractione album minusque malleabile conspici, E. Δ re hoc, à quo tincturam & visciditatem petit esse, orbatum: Satisfecit siquidem huic *Sala* jamdum loco modo allegato, quando per fusionem cum antimonio similique concreto pristinum nitorem ac tenacitatem ipsi facile restitui, scribit, cum salibus, quæ metallorum illam texturam externam turbant, sicque colorem, malleabilitatem ac similes ejus individuos comites alterant, per ignem expulsi priorem formam hæc recuperent.

§. 34. Tinctura lunæ pariter nihil incertius, cum sibi

D d d d 2 relicta

relicta luna, i. e. à cupro non adulterata ac post habitis menstruis suspectis, nihil coloris possideat, sed in solutionem limpidam & aqueam plane abeat. Reliquorum verò metallorum Tincturæ præter meras solutiones, quarum colores pro diversitate menstrui variant, nihil aliud videntur. De tincturis Antimonii idem manet dubium. sc. an non potius solutiones totius substantiæ, aut à menstruis per digestionem immutatis, aut à sulphure tantum ejus externo & superficialiter adhærescente sint? Succini denique & sulphuris Tincturas meras solutiones esse, autopsia & mechanica docet.

§. 35. Restant ex infusorum classe Gelatinæ, quæ nihil aliud quam extracta spissiora, è fructibus succulentis, v. g. Pomis, cydoneis, ribibus, ac cornubus atque ossibus animalium parata, sunt, nomen autem Gelatinæ susceperunt, quod instar glaciæ pellucidæ, post aliqualem liquoris aquei evaporationem, sponte congelascant, quia tamen ratio eas conficiendi nec mulierculas later, ejus prolixiore explicatione in præsentiarum supersedere, ac *Inspissationis* naturam evolvere, conveniet.

§. 36. Solutioni hæc quia contraria, contingit, si una vel plures fluidi conditiones tollantur, i. e. vel discontinuata combinentur, vel eorum figura immutetur, vel mobile, spariolis eorum interjectum, exturbetur, quod detrahendo ac addendo artifex præstare solet. Subtrahendo fluidum soliditatem concretis induci, evincunt decocta solutiones salium &c. à quibus si aquea humiditas evaporetur sub mellis aut spissiore consistentia, aut salis rigidi forma remanentia conspicitur, quod pariter solutiones seu extractions resinorum testantur, à quibus provocatur *Vi*, massam resinosa & piceam in fundo relinquitur, utpote qua ratione fluidum illud agitante demitur hoc verò sublato pristina particulis divisis contiguitas restituitur. Quo etiam spectat inspissatio per præcipitationem contingens ac fluidum, hæcenus solvens, exturbans: v. g. dum camphora per aquam fortem ad fluiditatem resinosa redacta ac resina quævis à *Vi* soluta, aquæ simplicis affusione pristinam soliditatem reperunt, solvete sc. illo nimis diluto, hinc ad solutionem diuturniorem inepto.

§. 37. Quæ verò fluidis acrescendo soliditatem inducunt, cunctas illorum conditiones non raro simul destrunt: ut in Coagulo spiritus urinæ & *Vi*, & rior sublimato, Cinabari &c. observamus. In priore siquidem coagulo oleosa *Vi* substantia dum cum salina spiritus urinæ coit, particularum utriusque figuræ imitantur, pororum intercapedo minor, hinc contiguitas inter illas ætior redditur simulq; fluidi ætherei major portio excluditur. Simili modo & rii hæcenus currentis globuli vaporibus salinis ac sulphureis implicantur, & mediantribus his conferruminantur, sicque ille in compactum sublimati aut Cinabaris massam abit. *Bohm.*

SOMNIFERA. vid. *Hypnotica*.

SONCHUS.

Sonchus, Συγγή; aliis corruptum videtur à σμυδός rarus, quia Scil. rarus & cavum caulem habet, aliis ἀνὰ τὴν σάρον χέειν dictum, quia salubrem succum de se fundit ad ætuosas stomachi lacerationes & biliosas hepatis obstructions utilissimum.

Sonchus à lactuca (quacum in multis convenit) distinguitur Capitulis grandioribus; caulibusque tenerioribus & fistulosioribus quibus etiam ab Hieracio differt, à quo & semine compresso distinguitur.

Sonchus duplex est lævis & asper; utriusque plures sunt varietates, quas ego specie differre non libenter concesserim.

Vires. *Sonchus* viridis & tener (inquit Galenus) estur ut olus præsertim ejus radices. *Matth.* apud nostratibus in usu non est, sed pro cuniculorum tantum & lepo-

rum esca usurpatur, unde & lactuca leporina dicta est. succus stomachi rosiones sorbitione mitigat. Caulis decoctus facit lactis abundantiam nutritibus, coloratque meliorem infantium. *Plin.* ex vino potus suspensiosos & astmaticos juvat, & stranguriam sanat. Succus auribus instillatus eorum dolores mulcere dicitur: quæ præterea habent veteres, apud *I. Bauhinum* vide: non iisdem lactuca viribus pollere existimamus: juniorem scilicet & tenerum refrigerare, adultum & caulescentem potius excalfacere, ut sapor amarus arguit. *Rajus.*

SOPHIA.

Nomina. *Sophia* Chirurgorum *Ger. Park.* *Nasturium Sylvestre* tenuissime divisum *C. B.* *Scriphium Germanicum* sive *Sophia* quibusdam *I. B.*

I. B. Alta est cubitum aut sesquicubitum, compluribus ramis fruticans, duris, lignosis, in multas alas divisis, teretibus, subhirsutis; folia tenuiter incisla *Ab-sinthii pontici* officinis dicti, sapore oletaceo, levi acrimonia prædita; flosculi crebri, parvi, luteoli: quibus succedunt siliquæ unciam circiter longæ, sili instar ternues, seminum loculos foris, ostentantes: ipsum vero semen minutum, rufum, Radix alba.

In veteribus maceris, locis ruderatis, lapidiosis, ac non raro arenosis, ac aliis incultis exit, ubi semel nata singulis facile recurrit annis, ut rectè *I. Bauhinus*, à Junio in Autumnum usq; & quidem particulatim floret.

Vires. Præstans habetur remedium ad *Diarrhæas* & semin. *Sophiæ Chirurgorum*. Nec semen tantum, verum etiam herba ventris fluores sistit, adversus dysenterias commendatur, & sanguinis profluvia reprimat ad vulnera & ulcera sordida ac maligna valere dicitur (in emplastris.)

In agro *Eboracensi* semen hujus plantæ exhibetur in affectibus *Nephriticis* & calculosis, nec sine successe *D. Trancredus Robinson* *Rajus.*

SORBUS.

Sorbus, Latinis à *Sorbendo* nonnullis dicta putatur, quod caro matura sorbetur: & sane fracidiorum illa pulpa vix commodius quàm sorbendo, assumitur, ne simul cum & si quid intrus seminum aut calculosus, de glutias *I. B.* Græcis *ἄν* & *ἄν* dicitur. Merito à *I. Bauhino* proxime post pyrum collocatur ob fructuum similitudinem in facie externa.

Sorbus fructu acerbo cum mespilo convenit; foliis pinnatis, fraxinearum æmulis, & floribus eoque frequentibus fructibus.

Umbellatim congestis ab eadem rectè distinguitur, à *C. B.* quem nos sequuti duas tantum sorbi species facimus, nimirum sativam, & aucupariam seu fructuum bubulam dictam.

Vires. *Sorba* præsertim immatura astringunt validè & fluxus quoscunque alvi, uteri, &c. sistunt ad hos usus ante maturitatem collecta vel in clibano, vel in acre ad solem suspensa siccant, & in pulverem redigunt, vel aqua calida molliunt, vel vino decoquunt. Nonnulli melle condunt. Condita aliorum fructuum modo hæc cortice & ossibus mundata & in aqua cum sufficienti quantitate saccharo decocta confortant stomachum appetitum excitant, & frequenter compescunt fluxum & vomitum.

Sorba matura seu fracidia minus astringunt, & alimenti loco edii possunt iis quibus alvus laxior.

Amatus adeo parum astringere ait, ut merito non constringere aut constipare sint dicenda minus constringere quam mespila concedimus, non tamen protius non constringere.

Extrinscus vulnera constringit pulvis exsiccatum. Ligni materies solidissima est ac compacta, ideoque mentas parandas lignariis fabris expetitur, quemadmodum & virgæ à bubulcis ad stimulos parandos. *Matth.*

Vires Sorbi Sylvestris.

D. Needhamus Medicus insignis & vetus amicus noster Baccas succum acidum hydragogum egregium præbere ait, itemque scorbutico sanando aptum, VValis in frequenti usu, ubi vice diætæ purgantis quotannis exhibetur.

Liquor ille qui verno tempore è vulnere indicto exillat assidue potus ad scorbuticos & spleneticos affectus à nonnullis commendatur, verum ex conjectura potius opinor quam experientia.

Nobis enim arbor vulnerata lachrymam nunquam fudit, forte non adeo hæcenus felices fuimus ut eam hora opportuna feriremus *Rajus*.

SOTIRELLA PARVA, vid. *Electuarium*.

SPARADRAPUM.

Tela utrinque emplastica in multis prostat officinis, quam recentiores modo *Sparadrappum* modo *Telam Galterii*, primi forsan illius inventoris, vel potius infectoris, nominant. In emplastrum enim idoneum, jam paratum, sed liquefactum, tela vetustate quodam modo attrita demergitur, & inculcatur sæpe, dum planè infecta & inquinata fuerit, ac undequaque velut incrustata. Tum extrahitur, & exponitur aëri, ut refrigerata obdurescat, ac postea ad rerum exigentiam servetur.

Ejus autem varietates inveniuntur multæ, quæ non à telæ, sed ab emplastrorum, in qua immergitur, diversitate sumuntur. Aliæ enim catagmaticæ sunt, quæ fractis ossis solidandis, & roborandis partibus conveniunt, quæ scilicet ex emplasticis adstringentibus & roborantibus parantur: ut

℞. Olei cydonior. & rosæ. sevi ariet. ana ℥iiij. thuris, mastich. piois, boli armena, farin. volat. ana ℥ij. cera alb. q. s. f. Emplastrum in quod liquatum tela immergatur.

Aliæ vim habent exsiccantem & epuloticam, & ulceribus ad cicatricem perducendis commendantur, cuiusmodi est quæ sic describitur.

℞. Olei rosati ℔i. cera citr. ℔ss. ceruss. Veneta, tuthia ana ℥ij. lithargyr. auri ℥iij. f. Emplastrum & cum telâ vetustate quodammodo jam attritâ, f. Sparadrap.

RENODÆVS.

Sparadrappum pro Fomiculis ex *Pharmacop.*
Londin.

℞. Cera flava ℔ss. terebinth. ana ℥iiij. cinnabar. rad. irid. Florent. ana ℥j. moschi gr. iiij. liquecant simul cera & terebinth. tum adjiciantur pulveres olei comm. momento subacti, quo felicius misceantur; inter quos cinnabaris & minium subtilissimè terantur. Diu validèque agita. Demum adde moschum aquâ rosacea solutum. Dum adhuc fervent immerge telam lineam parum attritam, ut f. Sparadrapum.

Sparadrappum, seu Tela Galteri, ex eadem
Pharmacop.

℞. Olei rosac. ℔ss. sevi arietin. ℥iiij. cera ℥x. lithargyri, resin. pini, thuris, mastich. ana ℥ij. boli armen. farin. volat. ana ℥j. Liquecant simul oleum, se-vum & cera; liquatis lithargyrus subtiliss. tritus commisceatur, nutriatur, & inter coquendum spatha assidue agitetur. Tum addantur reliqui pulveres, aded-que subigantur, ut fiat Emplastrum; in quod adhuc liquatum & calidum tela vetustior immergatur.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Ceratum Sparadrappum Vigonis ex *Pharmacop.*
Angl.

℞. Hordei, myrtillor. pingued. vituli & vaccæ ana ℔ss. axung. porci ℥v. folior. plantag. solatri, marisylva ana mij. vini granator. ℥viij. Probè permixta macerentur aliquandiu, deinde bulliant ad consumptionem vini; postremum colentur. Colaturæ adde sequent. Lithargyri auri, & argenti ana ℥iij. minii ℥x. boli Armena, terra sigill. ana ℥vj. Bulliant iterum, & cum cera alba q. s. f. Sparadrappum addendo in fine cocturæ, camphor. ℥ij. terebinth. ℥j. olei rosati ℥ij. unguenti Populei ℥iij. M. Fluxiones quacunque corporis parte irruentes intercipit, & ad locum affectum deferri vetat.

Sparadrappum nostrum usuale pro Mammis post partum obdurescentibus.

℞. Sevi cervini, olei rosacii, spermat. ceti ana ℥ss. cera alba ℥j. fundantur simul e. a. & iis imbuan-tur tela tenuiores ac attrita, quæ baculo, aqua rosarum humectato, super eas sæpius volutato, levigata mammis affectis applicentur; imò ante partum ad lac & affe-ctus ex eo indurato pronascentes, præveniendos ad-moveantur.

SPARTUM.

Quoniam horum pleraque spicam habent secalinæ similem, ideoque proximum secalinis graminibus illis locum dedimus.

Spartum à verbo *σπέρπει* dicitur, quod non tantum terræ semen mandare, sed & texere aliquid vel inter senectere significat. *Σπάρτα* & *σπάρτα* funiculi vel lineæ sunt, sic dicta non quod ex herbis sativis ne-ctantur, sed quod ad vincendum idonea sunt à *σπέρ-πει* neectere, complicare. Hinc herbas quæ funiculis, retibus, storeis, aliisque rebus texendis aliquem usum exhibent, inter quas principem locum obtinet de qua nunc agimus, hoc nomine donarunt veteres.

Nomina. Gramen Sparteum Plinii, sive sportula-rum ficuum *L. B.* Sparteum primum paniculâ como-sa *C. B.* Spartum herba Plinii *Clus.* Spartum Plinii *Clusio Ger.* Spartum Plinii, sive Juncus Hispanicus *Park.*

Clus. Numerosa, tenuia, viridia, junceaque habet folia, cubitalis longitudinis, ex eadem radice prode-untia, quæ dum novella sunt latiuscula conspiciuntur, & interiore parte canescentia, successu vero temporis contrahuntur & convolvuntur, suntque juncea, du-ra, flexibilia tamen, & marginibus ita conjunctis, ut vix rima appareat, nisi diligentius observes: inter hæc culmi exiliunt, ipsis foliis paullo longiores, qui vere & æstate parvam, arundinaceam paniculam ferunt, simili propemodum cum illa ratione florentem; dein-de oblongum semen, ut nonnulla graminis genera. Radicibus nitosis & perennibus, à quibus multæ si-mul enascuntur plantæ contingunt, Junci modo, ut interdum una planta, sive multarum simul congestarum cumulus, duorum pedum spatium, vel illo etiam am-plius, in ambitu occupet.

Frequens nascitur collibus arenosis inter Vacna & Alcala-real, atque aliis Bæticæ locis, sed omnium abundantissime ab initio Granatensis Regni sive Bæticæ limitibus usque ad Murgin urbem, vulgo Murcia di-ctam, ut non sine causa totus ille tractus veteribus appellatus sit Spartarius campus; quo etiam nova Car-thago, vulgo Cartagena, Urbs maritima continetur: hæc etiam à nonnullis Spartaria cognominata est, ob sparti (ut credibile est) eo agro nascentis abundan-

D d d d 3 tiam

tiam. Nascitur & Valentino regno, atque illud quidem superiore longè uberius & lætius.

Usus. Est vero Spartum hoc, quod Hispanis, apud quos nascitur, etiam nunc *Sparto* dicitur, illud ipsum quod Plinius Lib. 19. Cap. 15. describit, eodem enim in usu nunc est apud Hispanos, quo fuit Plinii tempore, nam ex crudo & exsiccatō tapetes seu aulæa, Corbes, Corbes, rudentes aliosque funes conficiunt: Corbes etiam illi in quibus ficus & uvæ passæ advehuntur, ex sparto contexti sunt. Sed ex illo aqua instar lini macerato, deinde siccato & tuso calceamenti genus, quod ipsi *Alpergates* appellant, paratur, funes etiam & alia subtiliora opera; præfertur autem id quod Valentino regno crescit. *Rajm.*

Dicunt præterea quod Sparti teneræ summitates per superiora ac inferiora non minùs quàm Ellebóri nigri radices expurgant, si in decocto assumantur.

SPATVLA FÆTIDA, vid. *Xyris*.

SPECIES OFFICINALES, vid. *Pulveres*.

SPERMA CETI, vid. *Cetus*.

SPERMA GENERANTIA, vid. *Aphrodisiaca*.

SPERNIO-LA, vid. *Pulvis Sperniola*.

SPHONDILIVM, vid. *Spondilium*.

SPICA, in Genere, vid. *Lavendula*.

SPICA INDICA.

Nomina. Nardus indica *Ger.* indica vulgaris *L. B.* Indica sive spica nardi *Park.* indica, quæ spica, spica nardi, & spica indica offic. *C. B.*

Nardus Diosc. l. 1. fortè à Naardo, Urbe Syriaca Euphrati contermina aliis *Ναρδοσάχχο*. Genera multa recenset Dioscorides cap. 6. quæ varietates porius loco natali solum differentes, quam species distinctæ videntur. Nardi indicæ nomen (inquit *L. Bauhinus*) particula duntaxat plantæ hodie obtinet, quæ & spica ob figuram dici meruit. Est autem nihil aliud quam comarum radice caput, ex marcidorum foliorum nervosis filamentis convolutis congestum colore rufescente, sapore amaro, acrique & aromatico, odore spicæ celticæ, validiori. Adhæret hæc coma radici digitalis crassitudinis, saturatius ruffæ, solidæ sed fragili: est ubi folia quoque nondum in nervos divulsa, albicantia inveniuntur: cauliculi etiam concavi, striati, pluresque ex eadem radice capillatæ spicæ enatæ, subinde conspiciuntur.

Miror autem quendam huic plantæ caules potuisse negare, cum eorum partes infimæ filamentis nervosis obvolatæ se cuivis examinanti facile conspiciendas præbeant.

Quicquid autem repugnet Anguillara alique, ego cum *L. B. Garcia* aliisque peritioribus Botanicis existimo nostram spicam nardi officinarum veram esse & genuinam antiquorum nardum indicam.

Porro non esse diversa nardi Genera, sed unicum duntaxat sibi notum testatur *Garcias*; id sc. quod in monte quodam juxta Gangem fluvium proyenit, qui altera quidem parte orientem spectat, altera occidentem, ad quem occidentem sita est Syria; multis regionibus ab India discreta: neque una præstantior est altera, spicamve habet alia altera multò longiorem. Nec est quod quis ex ingenti pretio quo antiquitus teste Plinio Lib. 12. cap. emebatur, inferre studeat nostram nardum non esse legitimam: nam Indiæ nunc magis aperta & cognitæ sunt quàm tempore Plinii fuerunt, & ipsa aromata majori copia, minusque adulterata quam Plinii tempore ad nos adferuntur,

proinde & viliori pretio emuntur, ex quo in Indiis circum Africam navigari caprum est.

Magna est inter eruditos quæstio, quæ pars Nardi *σάχχο* sit, quidam radicem esse affirmant, quidam negant, prioribus suffragatur Galenus, 1. Antid. 14. δ' *Ανδρομαχ* & *Ινδικὸν νάρδον καλεῖται βαλεῖν*, ἢ *νάρδα* ἢ *σάχχον* ὀνομαζόμεν νάρδον, καὶ τοὶ βίβαν εἶπαν ἀπὸ τοῦ *νάρδος* τῆς *ἀσάχου* ὁμοιοτήτι κατὰ τὴν μορφὴν. Posterioriores Dioscoridis auctoritatem opponunt, dicentibus, plures habet spicas ab eadem radice, tum comas, tum sibi invicem convolutas. Dicendum spicæ cauliculos multis capillaceis foliis obritos, qui quàmvis radices videantur, revera non sunt, subsunt enim radicula seu fibræ quibus alimentum attrahit planta, atque has vocat radices Dioscorides & à caulibus distinguit. Interim tamen hanc plantam caules emittente summa parte spicis, aut paniculis onustos, ad modum graminum aut iis affinium plantarum minime dubium est.

Vires. Nardi Dioscoridi vim habent calefaciendi, exsiccandi, urinasque ciendi. Quamobrem & alvum eporâ sistere, & appositas ex utero fluxiones sanare, que compescere, ex frigida verò porâ nausæ & stomachi resolutionibus auxiliari: itemque iis qui à flaribus exagitantur, hepaticis, ictericis atque nephriticis, coctas vero in aqua & pro fomento infestibus adhibitas vulvæ inflammationibus adhiberi. Facere & ad superfluos humores redundantes oculorum palpebras, dum ipsa cilia adstringunt & condensant, quibus & siccis ad summovendam graveolentiam humentibus corporibus utiliter inspergi: misceri etiam antidotis. Porro ad ocularia quoque medicamenta usque ad summum lavorem tritas & cum vino in pastillos conformatas vase novo in picato recondi.

Nardi folium Plinio principale est unguentis. Variè autem præparabatur nardinum unguentum ab Antiquis: V. Dioscoridem. Vis autem ejus attentius est, acris, extensoria & rarefactoria humorum, & calefactoria.

SPICA SPURIA NARBONENSIS.

Nomina. Nardus Gangitis spuria Narbonensis *Park.* Spuria Narbonensis *C. B.* Narbonensis *Ger.*

In montis amænissimi & celsi, herbarum lætissimum feracissimi, cui idcirco nomen Horti Dei impositum, septem plus minus mill. à Gange urbecula distat. clivo qua ad meridiem mareve mediterraneum vergit, hæc uberi proventus erumpit, muscidis & uulsi tractibus; infima radix pusilla, exilibus fibris duris & raris, quæ subsunt spicatis comosisque torulis, minimum digitum crassis, colore pallecentibus ex fusco, fere palmum altis, non valdè mucronatis, sed quadantenus per extrema recisis. Folio est viridi, rigido, junceo, vix pedem alto, numeroso, quod ab ima radice ortum trans spicæ comam inum caulem ambientem sese exserit: multæque plantæ quasi uno conspitis ambitu amplexæ unius effigiem præ se ferunt, tota inodora est præterquam capillamenta spicæ, quæ multo crassiora quàm indicæ sunt, odora musci quæni vel terrestris, cui semimerla humo inseruntur comosa capillamenta: è quibus gracilis ac nitidus subceus culmus Elphæ vocatæ non dissimilis, cubitum altus exit, à medio cujus ad summum alternatim sunt admodum exiles herbaceæ siliquæ apiculis è calyculis aliquantum Schænantii flori, aut deflorescenti geranio aut coryledoni similibus.

Adversariorum Auctoribus Nardo Gangitidi Dioscoridis prorsum quadrare videtur. *Rajm.*

De Selezione NARDI INDICÆ ex Pharmacop.
August.

Nardus, seu *Spica Indica* in Orientali India natales habens, odorata sit, haudquaquam cariola vel pulverulenta, (etenim ei stibium cum aqua aut palmeo vino ponderis causa à fraudulentis inspiratur) cujus spicæ fibrillis longiusculis præditæ; sapore sit subamara, & nonnihil subacris ac aromatica, colore autem fulva & ad purpureum vergens. Alterum Spicæ genus *Celticum*, in Liguriæ Alpibus montibus Tirolensibus, aliisque locis natum, sit leve, longam comam & constantem odoris fragrantiam habens. Herbâ quâdam simili, quæ ob odoris gravitatem *Hirculus* dicitur, permixta adulteratur, verum herba hæc minoribus foliolis magis candicat, atque insuper nec amara est, ut *Nardus* vera, nec adeo odorata.

SPICA CELTICA, vid. sub titulo *Valeriana*.

SPINACHIA.

Spinachia, tam celebre & usitatum nunc dierum olus, veteribus indicta & incognita videtur.

Spinachia autem recentioribus à semine spinoso dicta est, quamvis reperiatur etiam semine lævi & spinis destituta. C. Bauhinus *Σπινάχια* à raritate in usu medico Græcis recentioribus dictam scribit, Hujus an dentur species diversæ nobis non certo constat. Duas tamen seu species, seu varietates novimus, nimirum.

1. *Spinachiam* semine spinoso *C. B.*
2. *Spinachiam* semine non spinoso ejusdem.

Spinachia semine non pungente, folio majore & rotundiore *L. B.* Si à præcedente differat nobis incognita est: *C. B.* præcedentis Synonymam facit. *Spinachia* fœmina seu sterilis perperam pro specie diversa à *C. B.* ponitur. Cum ex eodem fertili semine proveniat.

Nomina. *Spinachia* *Ger. Park.* *Spin. mas* & *fœmina* *L. B.* *lapathum* hortense seu *Spinachia* semine spinoso *C. B.*

E radice tenui, alba, simplici, paucissimis fibris donata, caules surrigit pedales, fistulosos, teretes, striatos, in alas divisos. Folia attriplicis ferè, longis pediculis nixa inferiora ad basin suam interdum utrinque lacinata, mucronibus acutis; quæ autem in summo caule existunt, duos tantum processus velut aurículas ad basin obtinent, tenui quadam polline, attriplicis in modum, aspersa. Flores in caulibus à medio ferè usque ad fastigium in mare herbaceis aut purpurantibus apiculis è calice quadri folio exeuntibus constant, in oblongis circulis seu racemis è foliorum alis ortis, ut in mercuriali. In fœmina flores nulli cernuntur, sed tantum apiculi quatuor albi in summo semine. Semina autem ipsa foliorum alis arctè adnascuntur, conferta, aliàs (ut nomen docet) spinosa; aliàs lævia, in globulos seu racemulos congesta, majuscula, nonnihil compressa, orbiculata.

Spinachia ubi sponte oritur nobis non constat. Hispanicæ autem originem suam debere argumento est nomen quo à quibusdam vocatur, nimirum olus Hispanicum passim in hortis feritur, nullum solum aut Cæsum respuens, tum Martio & reliquo vere, tum Septembri, non hortens hyemis frigora, quæ si iniqua nimis, Juglandis foliis conservatur, ut verè cibum suppediter, quo tempore semen profert. Martio verò sata intra duos menses perficitur. Autumno sata foliis magis luxuriat, nam quæ vere feri-

tur, caulescit illico; unde ad pulcras autumnopotius ferenda.

Ufus. In Culinis per totam ferè Europam, (teste Trago & experientia) vix quicquam frequentioris est usus pultibus ex *Spinachia* confectis, quas oleo aut butyro condiant & inungunt, herba minutim concisa; nonnulli uvas Corinthiacas eis admiscunt; citra aquam coquitur hoc olus, quod magnam vim humoris inter coquendum remittat, & velut proprio contentum jure alienum aspernetur.

Inter omnia olera culinaria meo judicio *Spinachia* est, laudatissima & gratissima. Trag. unde & in omni penè agritudine cibo deligi potest.

Febricitantibus & senious adstrictioris alvi maximo commendanda est opere; illis imo vel hecticis, ut febrilem æstum temperet, his ut alvum lubrifer quod longe melius est quam ut suppositariis & catharticis semper extimuletur. S. Paulus.

Refrigerat & humectat, nitrosa sua qualitate, alvum emollit, gutturis asperitati medetur & aridæ ruffi confert; nauseam facile parit nisi Zinzibere aut alio consimile cordiatur.

Succus & aqua destillata stomachi ardorem & resolutiones mitigare, & lac elicere dicitur.

Extrinsecus ventriculo & hepati imposita cataplasmatibus instar, eorum inflammationes doloremque tollere creditur. *Rajm.*

SPIRITUS.

Inter chimica inventa palmam facile sibi præcipiunt *SPIRITVS*, sive subtilitatem æstimemus eorundem, seu usum, sive parandi artificium & ambitum latissimum, ipsis oleis subtiliores & virtutibus cum iis certantes. Hinc not.

1. *Spiritus sunt liquores destillati activi.* *Spiritus* dicuntur, ut alias quoque in medicis scholis, à convenientia & analogia cum spiritibus *πνεύματις* sic dictis, quod convenient nempè volatilitate, penetrabilitate, subtilitate & potestate agendi: spiritus scilicet arte parati, & ex mixtis prolekti. Quorsum illud ex Physiologicis huc facit, quod calidum innatum corporum dicatur spiritus vitalis; detque esse rei, vivere & moveri, instrumentum animæ. Quando ergo spiritum dicimus, ipsam quasi essentiam, ipsum calidum innatum mixti separatim & extractum obtinemus. Liquores sunt; licet enim & sicci spiritus exhaleant & butyrosi, ut in sequentibus videbimus, corporaturam tamen liquidam propriè habent & affectant, quæ sine non æquè in usum cedunt, vel spirituum nomine veniunt. Emulantur hinc aquas, crassius & sola consistentia estimati, summè tamen ab iis discrepantes, si noverimus eosdem intimius. Cumque liquores etiam alii natura vel arte parati prostent, ut vinum, cerevisia, acerum, decocta infusa &c. addidimus esse liquores destillatos, i. e. vi ignis rarefactus & è centrissimis propulso via generali, per *διήκेशन* & *συγκेशन*. Quo ipso sensu etiam generalius dici queunt volatiles, fixum enim propelli nequit; quæ volatilitas tamen variat. Activi sunt, ob subtilitatem particularum, unde & extrà corpus variis operationibus destinantur, & in corpore quàm citissimè expediunt, quod debent. Activi sunt respectu aquarum, quæ minus tales, magis inertes sunt, unde & à putredine se defendere nequeunt, nisi sub spirituum tutamine, nec frigori resistere, quin congelantur, quod spiritus non patiuntur, quin suo commercio aquam hanc affectione eximunt. Cum tamen liquores sunt medii inter aquam & olea, ab hisce ulterius distinguendi.

2. *Spiritus sunt liquores vinosi, acidi, urinosi.* Ita enim

enim tribus verbis & ab aliis & à se invicem discriminantur, & differentiam sortiuntur specificam. Ab aliis, neque enim aquei liquores, seu aquæ quæcunque, his qualitatibus gaudent, vel si gaudeant, non nisi per communicationem, ut hinc aquæ sint spirituosæ, & è censu aquarum nobilioris characteris conjuncti titulo eximendæ, ut aquæ destillatæ cum vino, vel cerevisiâ. Aquas enim si nominamus, licet destillatas, concipimus necessario aquæ similes, quoad consistentiam & quoad saporem quoque ut habeant odorem mixto congenerem, sed rursus, debiliorem, ob particulas quasdam oleosas, vel spirituosas, non tamen evolutas, commixtas, sed prædominante tamen maxima parte phlegmatis aquosi. Par ratio est reliquorum. Simul enim salinum characterem per destillationem recipit, imò etiam extra eandem sola infusione, solutione, decoctione, mixtione, aquæ nomen exiit, & instat Protei vel Mercurii ejus naturam & nomen adsciscit sibi, quo cum miscetur. Ad se invicem; ita enim uno intuitu distinctissimum conceptum offerunt, si nominemus spiritum vinosum, si acidum, si urinosum. Hinc & quicumque liquor vinosus, spirituosus est, & inebriat, ex eoque spiritus vinosus destillari potest, exemplo cerevisiæ, vini, mellis & similibus. Hinc omnes cum spiritu vini destillati spiritus sunt vinosi, etiam salini, ut spiritus salis ammoniaci vinosus, ad differentiam alterius, qui cum aquâ sit. Acidi verò & urinosi intelliguntur itidem super alembicum cum primis vel *O*vecti. Singuli à priori jam apparatus sunt, ut destillari possint, licet alii magis, alii minus.

3. *Spiritus vinosi à sulphure fluorem adepti exurgunt inflammabiles.* De sulphureitate testantur varia phenomena, cum primis inflammabilitas. Ardent rapidissima flamma non solum spiritus vinosi quovis, verum & ipsum vinum, si coquatur, & aeris concedatur accessio. Hinc & ipsa subjecta, è quibus producti fuere, fructus cereales, triticum, secale, baccæ juniperi, sulphure plurimo pollent. In uvis roscidum sulphur testantur satis uvæ passæ. Testantur idem à posteriori effectus, de quibus seorsim. Cum itaque certum sit, sulphureos hos esse, & sulphur in vinosis hisce prædominari, non possumus hoc melius explicare & concipere, quam si dicamus, in iisdem liquoribus sulphur esse fluorem adeptum. Fluorem adipiscit dicitur sulphur (1.) distinctum à concreto, ut noveretur sulphur fluidum. (2.) Distinctum à ramoso sive oleoso, ut noveretur aliud quam oleum. Fluor hic est (3.) centralis attenuatio & extraversio; ut penitus subtilitatem fluorem adipiscatur æqualem (4.) cum aquâ; sic ut ipsum in aquam, & aqua in sulphur, ita mixta, combinata & versa sint, ut confundi intime queant; ita tamen ut ramosæ fluidæ particule strias exhibeant, etiam solâ confusione aquæ cum Vi. Cumque sal sit interpretes amicitie inter aquam & sulphur, fluorem hunc comitatur etiam & perficit (5.) sal volatile. Unde inflammabiles sunt spiritus & lapidi inflammabiles ab oleo attenuato, & fluorem adepti, lapidi à sale volatili. Hinc spiritus ambigunt inter aquam & olea, medium locum obtinentes; non misciles tamen amplius, nisi sale roborentur. Omnia hinc huc faciunt, quæcunque sulphur fluori apte possunt. Ignis verò id solus nequit præstare, qui si destruere nequeat aperto Marte sulphur, separat & liquidum fluidumve reddit, in oleis destillatis, vel aquæ sub vehiculo, vel solitarius. Id ergo videndum est.

4. *Sulphur fluorem adipiscitur fermentatione.* Hæc clavis est tum aliorum plurium, tum seorsim pro sulphure, ita ut miranda plurima exhibeat, quæ ceteroqui sepulta jacebant. Unde ut fermentum est principium immutandi, sic fermentatio ipsum immutatio-

nis actum notat. Sulphur rerum omnium vitale calidum constituit, sulphur balsamum est universale. Spiritus vinosi balsamum & sulphur diductum, expansum; & quidem mediante fermentatione. Hæc ipsa sulphur diversas subit mutationes prius, quam spiritualecat. (1.) *Comminuitur*; Ipsa quidem comminutio opus est ad fermentationem externam, compage sic laxatâ, seu succo expresso, seu impastatâ v. g. farinâ; seu imbibitis granis frumentaceis aliisque. Eâ verò comminutio quoque fit speciatim sulphuris, ut sic aqua & salia intime pervadere, per minima comminuere queant. (2.) *Extrahitur*; disperso ejusdem robore plicas & tricas suas opponere minus potest, unde debilitatur, resolvitur, ut aliam aliamque texturam assumat. Videri hoc manifestò potest, si fermentatione mediante v. g. scammonium; quod totum resinofum est, planè immutatur, ut sibi ipsi amplius non sit simile, sed diversum quasi videatur. (3.) *Turgescit*, seu amplius occupat spatium, bullulasque & spumam concitat; quæ omnia restantur fluorem imminuentem sulphuris, ut per gradus eundem subit & obtinet. Ita enim, (quæ *εργασμῶ* seu turgescentiæ hujus requisita sunt,) *inealescit*; calorem, quem fovet tanquam elementum ignis, è centro suo per motum illum intestinum dimittit: *renascitur*, & velut frictione expanditur: *aërescit*, ut sonus seu undulatio illa sensu percipi queat, & amplius sic occupat spatium, non contentum prioribus alveis. (4.) *Diffunditur*, seu fluorem dictum patitur. Diffunditur in aquam laxiori ambitu & spatio, è qua hinc repetitur aliâ *εὐχρηστος*. Ex quibus vel tacentibus nobis elucescit, fluorem & fermentationem hanc innuere illa ipsa, quæ concurrunt, & modum. Exagitant nempe sulphur partes salinæ acidæ & alcalinæ, sub quarum incude & collisione sulphur vincitur & patitur, quod in utilissimâ doctrina de fermentatione latius digestimus. Emergunt ergo spiritus vinosi & nascuntur ex sulphure nec nimis volatili, nec nimis fixo, sed medio roscidoque, per fermentationem panko, explicato & attenuato, unâ cum sale volatili, quorum fermentationis requisita, maceratio, germinatio, expressio &c. huc repetendâ faciunt. Patet hinc.

5. *Spiritus vinosus non nisi fermentatione propriè elâ erui.* Finis enim obtineri nequit, nisi per media legitima, tanquam instrumenta, quibus non datis effectus omnino cessat, nec sperandus est. Pater id per inductionem omnium exemplorum; & manifestissimo musti, id enim destillatum prius, quam fermentationem subierit recens, adhuc sibi relictum dulce, nulum spiritum fundit, sed, vel muliercularim experimento, in sapam coquitur, partibus aqueis per ignem abactis, sulphureis roscidis in spissum rob fatiscensibus. Ex nullo succo, vel liquido prius non fermentato haberi potest spiritus vinosus. Hinc quod *Scaliger* scribit ex 87. p. 322. Tartaros lactis tenuissimas partes ignis vi sublatas, atque à crassioribus exemptas, quod sublimare dicitur, in usu habere præsentissima facultate ad inebriandum, vel aliter se habet, cum Barbari isti de destillandi arte parum norint, vel prævia fermentatione fieri intelligendum est. Non est itaque, cur spiritus dicamus aquas, vel spirituosas, saltem quoad sulphur diffusum non fluidum, cum sale volatili in iisdem dispersum, uti aquam majoranæ; neque enim vel inflammabiles sunt, vel inebriant, vel striatim procedunt, ipso quin sensu teste differunt à spiritibus. Prævia autem fermentatione ex cerevisiâ, vino, quin & horum fecibus spiritus vinosus obtinetur. Ex quo etiam patet, quare feces sint fermenti fixæ, habent enim in se sulphur h. m. fluorem adeptum & quasi concentratum, velut in extracto & compendio, unde minima mole aliis aptis rebus mixtæ vim illam immutandi diffundunt & communicant. Ad illustra-

nem huius rei facit, ex fecibus liquidis, sive cum aqua diffusis, spiritum vini ex iisdem siccatis sal volatile destillari posse, unde sulphuris fluorem adepti & salis volatilis præsentia ad oculum patet, sale acido sub sulphuris & reliquarum particularum involucri quoque præsentia. Hinc & cerevisia feculentâ facile alvum turbat. Hinc spiritus vinosi sunt revera partes oleosæ volatiles fermentatione mediante expansæ, & in phlegma diditæ.

6. *Spiritus vinosi è vegetabilibus magis sulphureis parantur.* Subjectum generale seu adæquatum spirituum constituunt vegetabilia. Neque enim vel ex mineralibus, vel animalium genere spiritus φλογιστὸν obtinentur. Non ex mineralibus, multò minus metallis ipsis, quia sulphur illorum fixius est, quam ut possit extricari & mediante fermentatione subire illum fluore. Obijci quidem solet spiritus saturni, seu ex saccharo saturni destillabilis. 4. sacchari saturni q.v. v g. ʒiv. Ex retorta vitrea per arenam successivis ignis gradibus fiat destillatio spiritus & olei. Spiritus hic vinosus est, & ardet accensus instar spiritus vini, unde quoad vinositatem hanc negari & inter non entia numerari nequit. Est verò revera spiritus vini regeneratus, quatenus sulphur illud fluorem adeptum, acido fluorem item adepto cesserat in aceto, hoc verò per minium saturato & immutato, illud liberatum per ignem persistit. Neque ulla ratione probari potest, deberi spiritum hunc ardentem magis Saturno, quam aceto cum eodem concreto & dulcescens, quæ ipsa dulcedo vel sola argumento est latentis spiritus, uti supra innuimus. Cui ergo competit dulcedo principaliter, illi etiam spiritus vinosus, cujuscunque ʒri competit fluor, illi itidem spiritus vinosus. Jam verò aceto id omne competit, licet variè immutato, & concurrentibus simul alcalinis sulphureis particulis. Ergo propter quod unum quodque est tale, illud etiam hoc loco magis est tale. Ex animalium classe spiritus sulphurei itidem non obtinentur, quamvis ex urinâ φλογιστὸν spiritum acquiri posse communiter asserant. Neque negari potest in urinâ sulphur, cum & matrem lucis esse hodie certissimum sit, & phosphorus ex urina inspissata, & lege artis destillata obineatur. Cedit tamen sulphur sali volatili, cujus eminentia sulphur obscurat quasi respectivè parcius longè id sit. Neque obstat, potum vini vel cerevisiæ plurimum spiritus vinosi corpori suggestisse, illud enim in sulphur sanguinis cedit, & spirituum lucem ac vigorem, & vegetabili nihilominus debetur origini. Cum igitur animalia quoad ipsam suam corporaturam fermentationem solum subeant putredinosam, unde sal volatile in apricum prodit emihens magis, spiritus vinosi sunt incapacia. De melle verò ab animalibus parato mox. Restant ergo vegetabilia, quantum quidem per hodiernam experientiam & inventa constat & assecuti sumus. At magna etiam hic occurrit differentia. Præstant spiritum principaliter illæ vegetabilium partes & foetus, quæ sulphure ad fluorem apto magis præditæ sunt; adæquatè vegetabilia ipsa, plantæ magis sulphureæ, quæ sulphure roscido & sale volatili oleoso pollent; ut (1.) *succi vinosi liquidi*, modò in sufficienti quantitate exprimantur ac fermententur, & in ipsis non præpolleat acidum, quod de uvis, pyris pomis & aliis valet, adeoq; probè sulphur sit maturatum & digestum, cujus dulcedo index est. Id enim nisi fiat facile ab acido superatur & in acetum sic degenerat, seu potius jugo ejusdem assimilatur spiritus vinosus. Hinc quo dulcius mustum, quo dulcius & πολυφύρον est vinum, eo spirituosius, & contra. Talis succus vinosus cum in fecibus quoque adhuc extet, ex iis quoque Vi separari potest. (2.) *Succi vinosi concreti*, exemplo sacchari & mellis, ex quibus fermentationem, ad fluorem sic redacto sulphure roscido, spiritus vino-

sus consurgit, vel nullæ solius exemplo. Mel nempe ab apibus colligitur ex floribus & herbis, quàm ut pro succo animali haberi possit propriè. Est enim balsamicum plantatum magisterium, est sulphur roscidum, seu succus vinosus concretus, singulari naturæ providentia, qui si evolvatur, vinum & spiritus vinosus præo est. (3.) *Semina, bacca, grana, acini ipsi.* His enim cum καὶ ἐξ ὧν competat sal volatile oleosum, ex illis quoque præcipue fiunt spiritus. Hæc sulphur subtilius & copiosius offerunt tum oleosum, ex primendum ob copiam, tum concretum, & medium quod fermentatione aprari potest. Sic ex omnibus frumentaceis id parare licet, oryza ipsa. Sic ex acinis uvæ, sive vinaceis potius, mediante fermentatione fit spiritus vinosus. Hinc ex seminibus & balsamicis magis parantur, seu quæ oleum fundunt, eadem & spiritum, exemplo spiritus & olei juniperi, quæ una consurgunt fidelia, adæquatè ex reliquis herbis, foliis, floribus, radicibus & aliis.

7. *Spiritus vinosi sunt vel simplices, vel comitari, vel compositi, vel regenerati.* Simples voco, qui solâ fermentatione fiunt, velut à priori ut Vi verus, & frumentaceus. Simples, qui præter φλογιστὸν qualitatem & propriam vinosam nullam aliam secum habent. Noti fuere hi longo tempore sub aquæ vitæ nomine, & temporibus primis inventionis magna æstimatione, quin & per se satis sunt activi, & exemplum præbet quoque spiritus juniperi. Comitatos voco, qui aliorum connubio juncti, vires eorundem transsumere, & vehunt, sive comitantur, qui fiunt ferè magis à posteriori, per affusionem vini vel Vi, ut Aus absinthii quamvis etiam sub fermentatione ipsa talis conjunctio fieri possit. Res enim eodem recidit, impetratur spiritus vinosus ex fecibus junctis, qui excitat spirituofam partem plantæ, cum eadem unitur, Talis v g quoque est spiritus cochleariæ, cum multo prius facta fermentatione & hinc vino cochleariæ destillatione, spiritus rosatum item & aliorum Compositi sunt ad unum Vi pluribus æqualium virium combinatis & condestillatis, uti id aquæ apoplectica, catfunc, aur. embryonum, Aus uterinus, mältich. composit. &c. demonstrant. Regeneratum voco, qui sub fluore prædominante aceti prius sepultus, iterum spiritus vellem assumit, ut Aus Huius exemplo citato clarum est. Quin & odor vinosus in abstractione ʒti cum ʒe Tartari saturati se exerit, quantumvis per hæcenus nota Vi plenariè sic non regeneretur.

8. *Spiritus vini partes aromaticas, salinas volatiles, & æideas secum super alen. bi. um vehit.* Non solum transsumit hæc omnia in se, & cum iisdem miscetur, verum quoque vector est eorundem, unde spiritus vinosi latissime patent præ aliis. & hoc sensu tanquam menstruum universale se gerit Vi. Assumit partes aromaticas, sive sale volatili oleoso pollentes, ut, præter laudatam jam, ex menthâ, meliss. rosmarin. corticibus citri, aurant. rad. angel. helen. ex theriaca ipsa &c. unde spiritus cognomines consurgunt varii. Ex theriaca sanè pars aromatica oleosa ad oculum monstrari potest, non minus ac ex dictis aliisque ejusdem comatis. Ubi notabile est (1.) spiritus aromaticos cum aquis commixtos albesceere, ut si spiritus theriacalis confundatur aquæ destillatæ cuicunque, ut ipsi quoque aquæ cinnamomi, quæ sub præcipitatione partes aromaticas solutæ in apricum prodeunt. (2.) Quas particulas oleosas devorare in se nequivit Vi illæ seorsim collectæ visuntur: unde ol. theriacale, ol. apoplect. simul sub finem evolvitur. (3.) In compositis hinc, ut aqua apopl. v g primo loco prodire spiritum vinosum, subsequi dehinc partem aromaticam, ultimo loco phlegma. Salinas verò volatiles, tum specificas, tum communes particulas, recipit itidem.

ut \ominus cochlearia simplex & compositus optimè fit, si à foliis recentibus cochlearia abstrahatur Vi ; & \ominus *ci vinosus laudatissimus est, quando nempe Vi *ci, calcis vivæ ana q.v. v. g. Ziv . vj. viij. Vi rectif. q. l. Misce destillentur lege artis in spiritum urinoso vinosum summè penetrantem, quo vel solo experimento omnia illa corrumpunt, quæ adduci solent pro coagulatione Vi à \ominus *ci, quod nempe \ominus *ci cum aquâ paratus; si cum Vi misceatur, concrementum ejusmodi sensibus offert quatenus nempe excutitur sic è suis oculis sal volatile & manifestum evadit, alio accedente liquore, qui ambit ejusdem solutionem ex quo velut certamine singula coeunt in offam, ∇ sal volatile & Vi cum tamen seorsim & ∇ & Vi , si cum \ominus *co dicto modo destillentur vel Vi etiam à \ominus *co abstrahatur, nullo modo ulla fiat coagulatione. Simile tamen quid contingit, si simultaneo aquæ & Vi connubio \ominus *ci parare intendamus. Curiosius experimentum & longè optimum est, si loco Vi simplicis recipiatur alcalifatus laudatus, seu super cineres clavellatos solâ infusione dephlegmatus. Recipit denique Vi acidus quoque partes occultatas sic secum & dulcificatas, idque quavis forma; sicca vel humida. A salibus quibuscumque etiam acidis abstractus dephlegmatur insigniter, imò à fixioribus hisce etiam alcalibus aliquid subtilisatum abripit, exemplo Vi Tartarificati, vel à \ominus le Tartari, vel cineribus clavellatis facta destillatione. Revera odore & sapore præ se fert salinas qualitates simul evertas aliquas, licet pauciores. Sic in aquâ magnanimitatis dicta acidum formicarum volatile sibi intimè copulat, unde \ominus formicarum acidulo vinosus est. Sic \ominus cephalicus fit, si Vi abstrahatur vel à Olo ipso Cyprio, vel Olo vulgari, ne Oli epilepticum laudemus. Sic \ominus *lis dulcis, Oli dulcis &c. fiunt, vel simplici commixtione & digestionem, vel abstractione simultanea. Fiunt ergo & sic \ominus compositi, sive mixti, vinosi utriusque, vinosi acidi.

9. *Spiritus vinosi striatim in alembico prodeunt; ob oleositatem resolutam conjunctam. Striæ distinguunt spiritus vinosos ab aqueis, ut & hoc signo possit separari pars spirituosior ab aquosiori. Omnium volatillissimus est Vi , facillimè omnium ab igne sublimabilis, unde primo ferè ubivis loco ascendit, Principaliter verò strias exhibent spiritus vinosi omnes, testimonio oleositatis resolutæ. Striæ cohortes notant particularum unctuosarum, ab aquosis secessum facientium, & invicem coherentium, unde strias quoque videas in oleis tenerioribus quibusdam, per alembicum vitreum destillatis, exemplo sceniculi, terebinth. &c. Notabile verò est, strias comparere non in ascensu, qui æqualis magis est, attenuatis & rarefactis particulis æqualis, citra nebulas, vel fumum, vel aliam speciem sed in descensu. Quando nempe aufugere nequeunt, è centro regentis alembici, (uti quoque suo modo in margine vitri facit vinum generosius,) unitæ particulæ undulant, & serie finita destillant conspicuo longo tramite. Curiosum & illud est, variare has strias pro destillationis tempore & diversitate volatilitatis. Primò impetu ignis sæpe occultunt sese, quod ob copiam confusè magis progredi necessum habeant, circa finem verò non attingunt ipsum cælum alembici, sed horizontem velut lambunt, prope infimam vel mediam regionem saltem conspicuæ. Adequatè etiam strias exhibet \ominus *lis, quando nempe ritè propulsus rectificatur è cucurbitâ. Postquam enim phlegma roridum ascendit; strias elegantes itidem pingit primus ascendens spiritus, volatiliior, reliquis succedens non item, indicio manifestò, partes quasdam oleosas ramosas implicatas eidem adhuc esse. Quod verò idem prædica-*

tur de \ominus Oli philosophico notandum est, eundem illum magis participare de \ominus *lis, quàm Oli , quod sapor, effecta & ingredientia quoque testantur.

10. *Spiritus vinosi alcalini imbibunt olea destillata subtiliora aromatica, nec effervescent cum acidis. Maxime decantatum hæcenus fuit sal volatile oleosum, à Sylvio hinc inde celebratum, remq; inter arcana habuit autor, unde, quod fit, plures descriptiones hinc inde fuere propositæ. Res tamen omnis eò redit, quod Vi non recipit olea, nisi interveniente sale alcali, sive fixo sive volatili, quod quod accessum sive intrantiam ipsi conciliet. Hinc tres potissimum modos laudabimus. Primus modus nominatus est à Leonico metamorph. Apoll. & Esculap. p. 33. per Vi Tartarificatum, si Vi Rhenan. rectif. sibi abstrahantur à \ominus *lis Tartari purissimi Ziv atque hinc addatur olei aromatici, quantum haurire potest, jungendo itidem hinc \ominus *ci. Alter omnium optimus est, si \ominus *ci vinoso instillantur olea aromatica, i. e. sale volatili oleoso foeta; ut anis. majoran. caryophyll. cinnam. macis, ligni sassafras &c. ad tolerantiam. Ita possumus extemplo egregia componere medicamenta, eademque variare multis modis. Quæ verò spissiora sive tenaciora sunt paulo olea, non æquè feliciter sic solvuntur commodius aërea. Tercius modus, satis itidem elegans, est per alcali fixum, citra destillationem. & Tincturæ Tartari probè paratæ, simpl. vel compositæ, v. g. Tinctura Zii utamur ad scabiem & impuritates similes sanguinis. huic verò scopo etiam oleum & lignum ipsum sassafras inserviat, junctis hisce egregiam consurgit medicamentum: sic enim hoc pacto \ominus vinosus alcalinus oleosus. Quo ipso etiam evincitur, tincturas laudatas non esse salis expertes, vel solum V . coloratum: ita enim miculæ salinæ quoque ad oculum patent. \ominus vero \ominus *ci vulgaris id non præstat, quod vinculum sal & aquæ sit laxius longè & debilius, quàm ut combinare sibi oleum queat. Sic hoc ipso modo fit \ominus *lis, si anisatus, sceniculatus, sassafratus, citra destillationem vel abstractionem laboriosam. Alterum verò non minus curiosum est, acidum quodcumque non effervescent cum sale alcali volatili vel fixo, sub illâ Vi copulâ, unde \ominus *ci vinosus, etsi urinosissimus, misceri potest cum \ominus *lis, Oli , Ori , & vicissim \ominus horum dulcis, v. g. Ori , cum \ominus *lis. Sulphur enim expansum in Vi mediatoris vicem subit, obrundit spicula salina acida, ut non nisi levissimus fumus inde emergat, nulla effervescencia.*

11. *Spiritus vini est menstruum resinarum & quasi talium, sulphurum subtiliorum: est medicamentum sulphureum volatile, variis viribus transumptis modificandum. Menstruum est, solvens & extrahens tum absolute & principaliter, exemplo Vi camphorati, resinae scammon. gualap. benzoës &c. tum adæquatè aliorum cum sulphure & sale volatili connexorum exemplo essentiarum, tincturarum; elixiviorum, extractorum, quibus omnibus velificatur. Menstruum est tum sibi relictus, tum cum urinosus vel acidus copulatus, ubi aquæ temperatæ nomen subit. Id quod cum notissimum sit, non opus est; ut hoc loco dilquatur latius. Est verò & medicamentum. Sunt qui aquas vitæ aquas mortis vocant, & Vi quocumque modo transformatum; si spiritus maneat, calori nostro nativo improporcionatum, urentem & noxium, unde vel ore detentus calorem illum suum exerat, & ejus potiores faciliè phthisin vel hydropem reportent. Ast innoxius & indemnus est omnino, modo cætera sint paria. Confortat calorem innatum, & facile, ut loquitur Helmontius, in spiritum vitalem assumitur, i. e. *Spir. vita* t. 17, p. 159. unaque acidum & pi-*

& pituitam obtrahit, mitigat, incidit. Acidum enim non esse Vi contra illos evictum est, qui ad unicum principium, sal, omnia redigentes, omne sulphur acidum esse contendunt. Est medicamentum sulphureum volatile, unde & aquæ apoplecticæ, balsama vitæ & omnia spirituosa in virium debilitate, modo non à rarefactione nimia, sed deficiente potius oriatur, & ipse solus Vi, promptissime succurrunt labanti archæo. Hinc reliquis omnibus medicamentis largitur penetrationem. Abusus verò non tollit usum. Tacemus perabsurdè literatis non medicis vulgò appellari Vi vinum crematum, ustum, vel adustum, per Germanismum nempe, cum Germani distillationem aquarum & spirituum vocent cremare, adeoque per *Brandwein* vinum distillatum, sive Vi intelligant. Spiritus vini verò cum instar omnium aliorum sit, seu verus, sive succedaneus frumentaceus, vires habet communes calefaciendi & rarefaciendi sanguinem. Cumque reliquorum vires speciales, teste odore & sapore, in sinum suum recipere aptus natus sit, proprias etiam obtinet vires antiscorbuticas, alexipharmacas, apoplecticas &c. pro variantibus mixtis, cum quibus abstractus fuit. Ufu quin imò externo etiam gaudet dissipante eximio & roborante, unde gargarisma ex Vi in angina commendatur, Vi camphoratus in gangrænâ, in perniciosis aliisque variis malis.

De Spiritibus acidis.

A spiritibus vinosis sulphureis ad salinos, & quidem ACIDOS, progredimur, qui non minorum sunt virtutum: facienda & hic, ut conjunctim de omnibus valet, distinctione inter spiritum & phlegma, ut phlegma sibi relictum spiritus expers, spiritus à phlegmate contradistinctus à potiori & virtute audiat. Hinc not.

1. *Spiritus acidi à sale acido fluorem adepto distillando exurgunt.* Distillatio singulis est communis, quâ sine liquores solùm vinosi, acidi, urinosi audiunt, hac verò itidem in spirituum afferuntur numerum. Aliud ergo est acidum fluorem adeptum, tanquam latius, aliud est spiritus acidus. Fluorem hinc alium possumus dicere spontaneum, nativum, alium arte modificatum. Acida verò vel fluorem patiuntur simultaneum, vel seorsim. Simultaneum voco, cum sulphure quale evenit in vino, quod constituunt sulphur & acidum, tanquam elementa, prædominante tamen in statu vini sulphure. Seorsim idem fit in aliis. Quo loco illud notabile simul occurrit, dulcia utrumque secum condere, sulphureum & acidum, unde ex vino & Vi & acetum distillari potest; ex melle, saccharo, mulla pariter spiritus vinosus & acidus, pro diversa præparatione. Dumque fluorem nominamus, præcipue idem intelligendus est quoad phlegma, quod ceteroqui iners & vacuum concorporat sibi hoc loco acidum, & ita quidem unit, ut in spiritum certa proportionem abeat penitus, & nomen proprium amittat, non minus ac sortem. Intelligendus quoad centralem extraversionem, ut prius salsum, nitrosum, resinosum, dulce, vel insipidum, quod exemplis patebit, acidum deprehendatur, sive evadat; concreto prius sub alia textura acido, jam vero excusso & sibi reddito. Unde duo concurrunt, sal ipsum ejusque fluor; cui differentiam specificam simul largitur distillatio.

2. *Spiritus fluorem jam adepti sub aliis liquoribus solâ separatione egent per distillationem.* Distillantur spiritus acidi vel ex liquoribus via humida, vel è corporibus siccis. In illis fluor jam factus est acidi, in his fieri debet adhuc. Commune verò prius illud est

spiritibus æquè vinosis acidis. Hinc ex vino, è fecibus, quod diximus, solâ separatio per distillationem sufficit, ignis generali potentia, qua omnis humor calefactus tenuior fit, juxta *Hippocratem*, vel rarefit. Sic X, seu spiritus aceti & ejus separationem tantoperè aiebat *Galenus*, solâ simplici distillatione paratur. In eo enim pars salina tartarea resoluta & fluorem adepta, intimeque phlegmati jam sociata, prædominatur. Ut igitur partes acidæ salinæ à conjunctis tartareis & sulphureis separentur, neque in evaporatione v. g. cohæreant, solvendis, sed purum sit acidum menstruum, purum X, id præstat distillatio ex vesica imprimis cupreâ, cum alembico vitreo, sine refrigerio, cujus rei plures dari possunt rationes. Acida nempe præ vinosis fixiora sunt & urinosis, unde fortiori ad distillandum egent igne, qualis est vesicæ, ut sic plures mensuræ uno die aceti distillati haberi possint, quod ex cucurbitâ vitrea igne mediato arctius minus licet. Atque sic, imprimis lardo prius inuncta vesica ad defensionem majorem nil timendum est ascendere de atomis venereis, quod fieret, si alembicus non vitreus sit, vel per canalem cupreum refrigeratorii dolii transfluat. Cavendum etiam est empyreuma, quod fit, si ac siccitatem vel quasi distillationem prorogemus. Idem verò valet de rectificandis etiam seu denuò distillandis spiritibus acidis, exemplo mus salis. Facto enim & ibi jam fluore, solâ opus est hinc separatione confusi largitoris phlegmatis. Quin imò regula hæc locum habet non minus in spiritibus urinosis. Sunt enim in singulis illis seu via humida spiritus confusi, redistillando separandi, unde *Leutern* Germanis & rectificare id vocatur. X illud polychrestum est ad solutiones, quas tamen simplices præstat aceto simplici, non distillato, perficere, (X enim purius quidem, non tamen æquè fortius est, ob partes tartareas sic separatas magis;) ad extractions, tincturas, gelatinas, arcanum tartari, acetum bezoardicum extracta opii, hellebori, saccharum Fi &c. Ex cerevisiâ verò X minus quadrat, quod sal in eo acidum sit mitius longè & aquosius.

3. *Sal acidum in fluorem cogit principaliter ignis, adequatè salia ipsa & terra.* Ignis in quibusdam subiectis solam *διάνοιαν* præstat, exemplo spirituum acidorum in via humida parandorum; in aliis immutat & cogit variè texturam, ut aliis figuris positæ particule alium etiam atque alium præbeant saporem & effectum. Hinc alia distillat sibi relictâ, alia cum additamentis. Quin quædam adedò intus sibi cohærent vincula, ut non nisi solo igne possint recludi. Hinc curiosum est illud de sulphure communi, quod possit igne recto sublimari, & varias in formas mutari, & propinari citra vel minimum acidi effectum, quod tamen inesse demonstrat ignis liber, si accendatur. Sunt in sulphure duæ substantiæ, salina acida, & sulphurea resinosa, bituminosa, inflammabilis. Suntque tam arctè ligata, ut oleum sulphuris genuinum *Φλογισον* inter postulata pharmaceutica referri mereatur. Nisi enim sulphur manifesto & libero igne in gas solvatur, non exurgit liberatus spiritus, sed iterum in forma sicca idem concrevit & sublimatur, id quod cum aliis similibus habet commune. Ita verò tractatum eructatur idem. Nullum enim imperium habet ignis in acidum, quod dominium ejus eludit & aufugit propulsum, sicuti pars oleosa inflammabilis ipsi in pabulum cedit. Ut itaque vinculum acidi sulphurei arctissimum solvatur, igne opus est propellente, & excipienti vehiculo aqueo. Duplici hinc modo paratur spiritus sulphuris & spiritus sulphurei alii, vel accensione aperta & completa, unde ab instrumento excipiente fumum Δ is, campana vitreâ aliave, dicitur mus Δ is campanatus, vel accensione clausâ, ut quæ

in apertam flammam erumpere nequeunt, rarefiant tamen & in fumum abeant, quod fit, si clavis addatur sulphuri, nitrum, aliudve inflammabile, quo de vid. *Kesslerus*, idemque in clyffis nominatis obtinet. Salia nempe dissociant sulphur adeoque rarefactioni aptantur, ut sic non accendatur solum, sed & detonet, fulminetque nisi coerceatur. Idem verò & terra facit, quæ omnia latius sunt dilucidanda.

4. *Spiritus acidi non prodeunt, nisi excusso, destructo vel infusato sulphure; facto verò hoc, facile.* Hoc ipsum assertum lucem scenerat & clavem porrigit pro omnibus spiritibus acidis parandis & dilucidandis, insistent aliis non minus firmis & concussis fundamentis, v. g. ignem esse destructorem sulphuris, adeoque sulphur refugere ignem aliis implicatum, neque obsequi æquè; tutari se sulphur sub salium inprimis acidorum velo, sulphur esse rarefactionis principium; sulphur & acidum sibi esse contraria adeoque & ignem & acidum dissentire. Patet dictum per inductionem omnium exemplorum, quandoquidem spiritus acidi non prodeunt v. g. ex vino, nisi domito penitus sulphure, adeoque sale fluorem adepto super Δ re; non ex Δ re ipso, per dicta. Idem ad oculum patet in Δ u Tartari, ubi, mirabili concursu, acidum, oleosum, alcalinum & terreum cohabitant. Idque cum laxius fiat ob dissociationem Δ ris; hinc in Tartaro partes evaporabiles per distillationem sunt duplicis generis, aquos-acidulæ, oleosæ, quæ ipsæ cum non minimâ quantitate adsint impetuositate largiuntur & rarefactionem maximam. Has igitur distillatione expelli commodum est, tum per se, tum ad obtinendum partes salinas alcalicas, in Δ u resistentes. Atque hinc ad refrænandum Δ ris impetum consultius est destillare Δ um Tartari ex retorta vitrea per ignem arenæ, in recipiens vas capacius, neque nisi Δ biij. vel iv. circiter pro unâ vice retortæ indere, non neglectis ignis successivis gradibus. Quærit enim auris ob dictas rationes. Atque hinc facile patet, non opus esse, ut addatur Vi, vel ut soli crystalli eligantur, præstare etiam hanc Δ ychéon, quàm si ex retorta terrea igne immediato spiritum propellere velimus, utpote improportionato. Fit igitur in Δ u Tartari manifestus discessus acidi à Δ re; quod nisi contingeret, spiritus acidulus haberi non posset, reverà polychrestus pro usu sudorifero, aperitivo & purificante sanguinem, unde in febribus, hypochondriacis, hydrope, scabie, ictero, arthritide &c. prodest egregiè, præcipuè cum aliis mixtis, ut in mixtura simplici, quæ dicitur Δ us Tartari compositus, cum Tincturâ Δ ris, potionibus &c. Facto verò hoc Δ us Tartari impetuosus esse desinit & in rectificatione placidè decurrit, citra ullam vehementiam ulteriorem, excusso quippe sulphure, quod & in aliis obtinet. Idem verò valet quoque de liquidis aliisque grossioribus, ubi ipsa textura nativa particulis reliquis ita innexum est sulphur, ut igni ausculter, sive aperto, sive suppresso. Exemplum sint spiritus lignorum corylini, querni, sassafras, guajaci & aliorum. Ex hisce ad Δ biij. iv. rasura vel concisione aptatis ad ingressum vasis, per retortam vitream ex Arena, quod, ob eandem rationes, ac de Spiritu Tartari diximus, melius est, stillat, liquor sive spiritus acidus medius, simplex sive compositus, prout unum vel plura liqua combinata sunt, ab oleo temperante sive edulcante separatus. Unde vires cum spiritu Tartari communes obtinet, per se vel cum aliis sumendus ad purificandum sanguinem, viribus diaphoreticis & diureticis, seorsim verò ad tincturam coralliorum parandam inde habetur menstruum.

5. *Ubiunque sulphur non dissociatum est texture propria, additis terreis vel salino-terreis ap-*

tarum dimittit spiritum acidum. Nexus hic sulphuris cum acidis visitur cumprimis in salibus mineralibus, eminenter verò in dulcibus. Salia, quæ talia distillationi non apta sunt per se, quia licet sint acida in centro suo, obliuiscunt tamen eadem sulphur, hæcque se invicem tutantur ab igne ut vel crepitem hinc si igni exponantur, exemplo salis communis, indicio, non vim exercere posse suam ignem, nisi in partes aqueas, quæ & ipsæ sic impetuosè dispenduntur, vel fluunt & funduntur, exemplo Δ i, Onis, imò & Vitrioli, ob æquabilem nexum, ut amplèxa sese non possint dissolvere vel *drachmæ* pati, sibi relicta, unde simul liquantur & torturam sustinent, itidem dimisso phlegmate, quoad licet. Hinc & alumine oblita ligna non ardent, sed flammam aversantur & retundunt, quo de exemplum legi potest apud *Gellium in Noct. Attic.* Ut ergò destillari hæc possint in spiritum acidum, opus est dissociatione, absoluta quidem in spiritu sal. communis, nitri & similium, secundum quid in One & vitriolo. Cum igitur salia pura ad evaporationem, & consequenter acidum, ad fluorem sint redigenda, confuetum est & usitatissimum id præstare tripla boli communis additione; sive globuli inde fiant cum aqua & exiccati destillentur, quod in spiritu salis communis aliquando fit, sive simpliciter mixtum, sal communis vel sal petreæ, vel conjunctum in spiritu sal. Communis composito dicto, administratis ignis gradibus lege artis. Utrobique sulphur dissociatum & excussum demonstrari potest. In spiritu sal. Communis quidem id patet in phlegmate, quod impetuosius est, & hinc libero vase alio, vitreo v. gr. excipiendum. Si enim statim recipiens vitreum adaptes, ordinariè funditur, à sulphure sylvestri rarefacto. Patet in spiritu, qui albus quidem prodit ordinariè, sed si urgeatur ignis, viridescens, vel crocei coloris, quod in oleo salis præcipuè visitur &c. In Δ u Vi verò nebulae rubellæ, totum recipiens ita quasi tingentes, cum tamen spiritus reverà albus sit, indices sunt sulphuris attenuati excussi & expansi, unde præ aliis spiritus Δ i sulphureus est, & flammam dissipam concipere potest. Nisi verò tripla terræ addatur proportio, vas rumpitur & nil acidi spiritus acquiritur. Impetuositatem in singulis largitur sulphur, quin & odorem sulphureum in spiritu Vitrioli volatili. Pro Vitriolo verò destillando non opus est absolute additione terræ, siquidem ochram plurimam, sive terram metallicam, sibi jam junctam habet; opus tamen est dephlegmatione seu calcinatione, ut partes aqueæ ambigantur, terræ verò cum salinis coeant, & sic vinci hæc ab igne & in fluorem cogi queant. Quâ ratione etiam caput mortuum Vitrioli, seu Vitriolum calcinatum cum nitro mixtum, per ignis gradus, aquam fortem largitur, seu spiritum nitri modificatum; & sunt qui alumen quoque ita per se destillant, retortæ extremo alius locato, ne ebulliens transcendere possit, id quod si fiat, luditur itidem opera, & recipiens rupturam subit. Cum vero & in Alumine viscedo manifesta exuperet, & in Vitriolo quoque ex arctiori cohæsione partium terreatum cum salinis appareat, præstat & in his dissociationem adhibere, quæ facta copiosior spiritus obtinetur, & citius. Alias enim notum est, spiritum Vitrioli præ omnibus aliis esse fixiorem, & mora egere, ut vel per tres Δ p urgendus sit, neque tamen acidum fluorem perfecte nanciscatur, quin resuscitati, ut aiunt, seu potius expositione in aerem liberum laxari ille nexus sulphuris possit, & denud spiritus obtineri acidus. De modo hoc destillandi egimus in *Progress. Acad. Nat. Curios.*

6. *Salino terrea dissociant sulphur promptius & spiritus acidi fluorem faciunt, in ipsis imprimis dulcibus.* Salino-terrea vocamus, quando sal commune cum terrâ miscetur, vel mixtum est, uti vulgo \sim us mellis parandus præcipitur cum silicibus calcinatis & sale communi. Optimum omnium hoc sine deprehendimus \oplus \sim us \ominus is, alioqui rejiculum, aptissimum tamen huic scopo, ut exemplis patebit. Cum enim omnia dulcia ob unguositate roscidam spumascenscens calore attenuata facillimè ebulliant & ascendant, intentio verò sit partem acidam ijs immerfam destillando propellere, impetrari id non potest, nisi frænum ponamus bullulascenscens illi sulphuri. Experimentum ut faceremus, mannâ subiecimus destillationi in cucurbitâ vitreâ cum alembico. Exurgebat ab sublimè usque in ipsum alembicum, in spumam & bullulas attenuata, frustraneâ operâ. Idem de melle & saccharo sperandum. Adeò verissimè est non distillari posse ex hisce spiritum per se, per dicta, quia nempe sulphur illud obicem ponit, neque evolvi patitur partes salinas acidas, quæ cum sic quoque urgeantur, invicem ascendunt & rarefiunt infinitis bullulis. Cogitatum itaque est de medio. Nil confert gradus ignis, etiam si leniorem adhibeas, nil impetrabis, uti aliàs in oleis, ut anisi, & aquis hoc moderamine opus est, aliàs transitoris per alembicum confusum ipso semine seu corpore destillando cum aquâ. Nec terra ipsa æquè sufficit, quia dissociationem, ut in salibus destillandis, non tam præstare potest sufficientem. Hinc nec experimentum *Finckij* succedit, quando *enchirid. dogm. hermet. cap. 4. p. 21.* jubet injicere sacculos arenâ repletos pugni magnitudine in mel destillandum, ne nimia ebullitione illud alembicum transcendat, indeque ex cineribus prolicere spiritum; quod frustra dudum tentavimus. Ut paucis rem complectar, facillimum est destillare ex melle, saccharo, mannâ spiritum acidum, addito anaticâ proportionè \oplus \sim us \ominus is. Partes enim terreæ & salinæ sulphureas illas bullulascenscens compefcunt & dissociando enervant, ut sic spiritus habeatur acidulus medius, pro tincturâ coralliorum, imò & aut ipsius extrahendâ. Excipitur verò saccharum \ominus oi, quod dulce quidem est, & ob consimilem ebullitionem sunt qui bolum addunt. Verum sine suo frustrantur, neque sic spiritum ardentem æquè acquirunt, cum sulphur illud sit paucius, sit non tam acido, quàm austerò obseptum, unde & dulc-astringens est, cum alia dulcia potius lubricent, quippe in quibus acidum magis extat. Per se ergò potius destillatur, citra ullum tale dissocians. Nihilominus si nitrum & ignis accedat, fulminare potest. Sic & cum salinoterreum sit \oplus crystallinum, destillatur per se successivis ignis gradibus in spiritum penetrantissimum, (\otimes concentratum) primò albicantem, deinde viridescenscens, tertio album nebulosum, pro menstruo convenienti ad tincturam \ominus is adstringentem. Ex \oplus vulgari verò id non succedit, ex quo cum sulphure & gummi ammoniaco compositus anta isthmaticus sit.

7. *Quæ ignis & salium copulâ acidum spiritum igne concluso per vices ingesta dimittunt, clyssi audiunt.* Inter nomina recentiora, in scholis chemicis enata, non ignobile est clyssus, incertum quo autore. Primus quidem ferè *Paracelsus, lib. 4. Philos. T. III. oper. p. m. 30.* clyssum nominare videtur vacuum, seu spatium aereum, noctu, inquiens, humiditatem densari magis, appetente sole evocari in altum, sive clyssum. Post hunc describit & nominat clyssum *Thurnbeuserus hist. plant. p. 90.* ubi præmittit, clyssum vocari unamquamque virtutem, unâ quidem velut è radice ortam, varia in loca distributam, tandem tamen iterum uno loco collectam & unitam. Ut hoc sensu arguatur per ignem attenuatus vapor in amplum spatium, hinc iterum in

unum concentratû spiritum. Pingit verò ad $\epsilon\gamma\chi\epsilon\iota\sigma\iota\varsigma$ demonstrationem tres cucurbitas, uno alembico exceptas, quarum uni oleum, alteri sal, terræ liquorem indere jubet, & æquabili igni tria hæc evoluta in alembicum combinare; quod ipsum $\kappa\alpha\tau\alpha\ \rho\eta\tau\omicron\nu$ intelledum vel tyroni pharmacîæ notum igne tria distinctæ naturæ possunt æquabiliter propelli. Quicquid verò horum sit, ad analogiam horum clyssi hodiè dicuntur, acida vel quasi talia deflagrabilia sive detonabilia, successivè rarefacta, seu spiritus aciduli per successivam evaporationem, quæ detonando sit, evoluti, & humido excepti. Duo enim, quod ex dictis patere potest, sunt modi spiritus acidulos volatiles siccos propellendi, (1.) sine fusione, per dissociationem terrearum particularum conjunctarum, ut ignis non tam fluidum, quàm evaporabile reddere possit acidum. (2.) cum fusione deflagrabili, tum solitariâ, exemplo spiritus sulphuris, tum acceleratâ per sulphurei & salini combinationem, qui ipsissimi sunt clyssi.

8. *Clyssi sunt vel simplices, vel compositi, minoris vel majoris apparatus.* Sic tales clyssi sunt ex \oplus & Δ e, item \oplus & \ominus *co cujus exempla concipi possunt in lapidis prunellæ & \oplus *calis confectioe. Ubi, accensione factâ manifestâ, sensui etiam occurrat spiritus acidus, qui si excipiat, habetur clyssus, sive \sim us \oplus sulphureus, \sim us \oplus salinus. Funt ex \oplus & \propto ro, excepto per \vee \sim u, adeoque ex omnibus, ubi panum per sal & ignem sulphur excutitur, & ad deflagrandum $\alpha\delta\epsilon\gamma\epsilon\omega\varsigma$ sollicitatur, detonare vocant medici. In omnibus hisce curiosum & notabile est, fieri concursum nitri & sulphuris, seu inflammabilis, unde, præter hosce enumeratos velut simplices clyssos, tres compositi, eodem tamen recedentes, in officinis clarissimam indepti sunt auctoritatem, $\kappa\alpha\iota\ \epsilon\chi\omicron\chi\eta\nu$ tamen primus. Ut nempe tres simplices imprimis sunt, sic & tres compositi, nempe (1.) clyssus sive spiritus nitro-sulphureus $\delta\iota\alpha\tau\epsilon$, ex \propto ro, $\delta\iota\omicron$ & sulphure, sulphuratus uno verbo commodè dictus. (2.) Nitro-tartareo- $\delta\iota\alpha\tau\epsilon$, ex \propto o, $\delta\iota\omicron$ & \propto ro, quem tartareum ad differentiam vocamus, quia sulphur mutuatur à \propto ro præcipue, & hinc $\delta\iota\omicron$. (3.) Nitro-tartaro-*calis, addito etiam sale *co ad \oplus , \propto rum & $\delta\iota\omicron$ um, pro lubitu, quibus tanquam corpus jungere etiam solent silices calcinatos, & sic majoris apparatus reddere, ut priores minoris esse constet. Cum itaque hoc concursu, vel sensu teste, sulphur excutiat, statim, & in motum, in flammam erumpat, unaque sal acidum liberatum gas suum eructet, tota processus ratio & cautela in duobus consistunt potissimum, (1.) in accensione, licet suppressâ, idem enim contingit ac si aperte accenderentur. Hæc nisi fiat, non evolvi potest spiritus, uti par est. Hinc retorta tubulata probè prius debet esse candefacta, & ipsa ingredientia siccata, ut nihil sit in morâ. Hinc sulphur minori ad reliqua proportionè addendum est, ad moderandum impetum, unde *Glauberus Farn. Phil. part. 2. cap. 41. & 42. & 43.* \oplus \propto u. Δ \propto u. Hinc detotaro summo studio in hac præparatione debet observari. Hinc non nisi partitim, \propto o, circiter, injicitur, aliàs enim rumperet vasa. Hinc tubus retortæ glubulis ex luto, (hi enim optimi sunt,) mox obturandus, quod & ad alterum scopum pertinet. Consistit enim (2.) in fumâ sulphurei acidi exceptione, qui cum copiosus sit, hinc satis capax recipiens continuatâ serie collo retortæ, intermedio pro re natâ tubo alio elongato, adhærere debet, probè itidem latatis commissuris. Hinc recipienti aquam indimus, ut corpus inveniat spiritus exhalans, quod sub finem admodum promptè subire visitur. Hinc tamdiu expectamus aliquantulum, donec vacuum sit retortæ venter, & successivè omnia fiant, Quin eadem ratio est pulveris pyrii, cujus dis-

platione factâ spiritus consimilis in auras abit, qui exceptus clyssum largiretur itidem.

9. *Ex salibus citra deflagrationem prunis candentibus successivè injectis spiritus acidi exurgunt.* Memorandus est & ille modus singularis parandi spiritum v.g. *olis Glanberi*, in quem finem furnum invenit aptum huic rei, & descriptum *part. i. Furn. Philos. p. 6. seq.* Fundamentum processus idem est, quod diximus, excussio & infirmatio sulphuris conjuncti, quatenus igni immediatè commissis sal acidum sic liberatur & evolat; captum verò spir. largitur. Hinc affinis est hæc operatio clyssis, eâ tamen differentia, quod in clyssis vasi clauso, hic prunis ipsis ingeratur materia destillanda, mox ostijs laterali & superiori clausis, ut per tubum ad latus furni spir. transire in recipientia, seu aludel potius, possint, subtus excipiendi, quod ex figurâ depictâ & *avto. 1. 12.* melius potest intelligi. Laudat hunc modum autor, & reliquis præfert ob commoditatem, quod breviori tempore, minoribus sumptibus, in copia, destillari sic possint spiritus. Restrigit tamen hoc ad unum ferè *olis*. Cumque sal commune solum prunis injectum crepiter & dissiliat, duobus modis id coercet, vel miscendo *olis* vel alumen, atq; sic ingerendo mixta hæc & pulverisata: vel carbonibus in sale cum aquâ soluto seu muria extinctis, iisque si subdantur carbones alij, consequente accensione impetrari desideratum spiritus. Verum licet satis curiosum sit hocce inventum, non tamen assensu & applausum plenarium invenit, quin inconveniëntia quædam circa hunc modum deprehendantur, (1.) quod sic non obtineatur spir. purus, sed partim mixtus gas carbonum, partim spir. alum. vel *olis*, quicquid etiam contradicat *Glanberus*, ut puritatem hanc defendat. Atq; sic longè commodius communis retinetur modus, cui etiam addi potest, quod ex muria ipsâ quoque destillari separando possit *olis*, de quo vid. *Ludovici*, item quod cum alumine usto idem obtineri queat commodè. (2.) denegato aeris accessu, & materia non inflammabili super prunas ingestâ, necessum est ignem ipsum suffocari, vel debilitari saltem, ut propelli spiritus minus possit. Quicquid horum sit, & sic succedit commodè spiritus, impendendus usibus varijs.

10. *Spir. acid. siccis, nebul. hospitium & corporaturam largitur aqua.* Fluorem suum acidum unice communicare gestit cum aqua, pro cujus modulo & accessione variat consistentia spirituum. Spir. acidi humidî, solâ separatione ascendentes, v.g. ex *se* sequuntur modum destillandi aquarum. Ast è carceribus suis sulphur. & terreis missi, nebularum & fumi, modò albicantis, ut è *Tart. ole* & *olis*, modò rufescentis, ut è *Dro*, specie expelluntur. Hinc si nullum penitus humidum excipiens admittatur, spiritus consurgunt crassi, vel butyrosi, vel solidâ velut formâ ipsâ, exemplo butyri *olis*. quando vel *olis* *ut*, qui *olis* acidus siccos & concretos continet secum, vel *olis* decrepit. & *olis* calcin. miscentur & propelluntur ex retorta cum *olis*, ejusve regulo. Ad eundem modum etiam *olis* *olis* ipse, & alij butyrosi haberi possunt. Hinc butyrum *olis*. nil aliud est, quàm *olis* *olis* gumm. ob defectum partium aquearum concorporatarum, & præsentiam sive commixtionem intimam partium terrearum, seu regularum, quod ad oculum patet, si affusione aquæ simpl. inde præcipitetur *olis* vitæ. Adeoq; spir. acidi sine humido propulsi tali figurâ exhibentur, & sunt fumosi, seu ad aeris accessum fumant, & ab eo mutantes humidum liquefcunt magis, imò adaugentur. Hinc differentia patet spir. acid. quod alij sint aciduli, alij acidi, alij acidissimi, alij nebulosi, alij fumosi, alij butyrosi, alij liquidi. Hinc suo sensu tantum acquiritur *olis*, *olis*, *olis*, *Tart.*, *olis*, quantum suppetebat, vel concessum est aquæ seu humidî. Nominatim verò in

olis parando recipienti inditur aqua simplex largiori quantitate, non sufficit enim extillans phlegma, unde in copiâ majori acquiritur. In *olis* verò *olis* & nitri vulgò acquiescere solent in domestico adhuc inharerentè vel sali vel bolo humido, quamvis in *olis* *olis* etiam consultum sit phlegma proprium indere. Sic & *olis* *Tart.* habetur majori copiâ, si jam destillatus v.g. è *olis*. *Tart.* spiritus indatur, vel relinquatur in recipiente, ut reliquus sic capi & immergi possit promptius. Idem in clyssis laudato & similibus acidis vaporosis omnibus valet.

11. *Spir. acidi concentrati dicuntur olea, licet improprie dicta.* Solent quidem & abusive spir. hi acidi aliquando olea appellari, non factâ inter olea & spir. distinctione, uti hinc inde legas in portionibus & *julep. ol.* *olis*, *olis*. *olis*, in primis apud *foelem*, & paulò superioribus annis qui scripsere, receptum. Accuratus tamen loquendo olea audiunt concentrati spir. v.g. quando rectificatur *olis* *olis*, post phlegm. & spir. propulsione in fundo cucurbitæ remanens liquor flavescens, aurei coloris, dicitur oleum salis. Sic & idem in *olis* obtinet, prodeunte & distinguendo phlegmate aqueo, (licet & hoc quandoq; confundatur & pro spir. acid. capiatur,) spir. acid. & oleo, quod spissius est, saturatius & longè ponderosius, ob sal fluorem adeptum summe concentratum, & in via coagulationis adhuc gravius. Hinc butyrum *olis*. spontanea mora & aeris accessu deliquium passum, optimè sic depuratum, ut nullâ alia rectificatione egeat, communissime dicitur oleum *olis*. Et mirandum est, quomodo tam intimè solum contineat mercurium vitæ occultatum, & quomodo deduci hæc olea possint, ut *olis*. vitæ. contentum vitæ, successu temporis, labentibus mensibus vel annis, eo spatio contineri amplius non possit, velut multiplicatum. Ut vel inde probari possit, sal esse magnetem humidî, & alcali & acidum, mediumq; ipsum, nisi alia interveniant obstacula, quæ poros oblinant & alterent.

12. *Salia acida invicem mixta sese acunt.* Acunt sese mitia & fortiora, exemplo spiritus *Tart.* & *olis*, si destillantur simul ana, vel *olis* subquaduplo, in spiritum aperitivum, qui geminus, si non melior, est spiritui aperitivo *Penotj*. Habet hic sanè suum usum, quandoquidem sal *Tart.* ochram vitrioli magis præcipitat, silices verò calcinati dissociant magis implicans acidum sulphur, unde, accedente per deliquium necessarium humido, destillari potest spiritus. Idem verò facilius dicto modo confieri potest, vel misceri etiam spiritus uterque. Solent verò fraudatores illi, qui spiritus venundant, ordinariè quasi *olis* *Tart.* sic acuire, ut in copia parent, à quo cavendum est, quod vires sic aliæ acquirantur. Acunt sese fortiora ipsa, quin immutant quædam. Si spiritui *olis*, quod itidem faciunt dicti homines, sal proprium addatur, fortior sic redditur, præter morem suum. Idem de spiritu nitri, sale proprio saturato, valet. Notabile est, ex nitro & vitriolo fieri aquam fortem, quæ hinc de utrisque participat, in medium quid, acidum tamen, sic immutatis. Melius quidem esse scribit *Polem. de sulphure philosophor. pag. 61.* si spiritus nitri & vitrioli seorsim destillati misceantur, & rectificentur, nam spiritum vitrioli retardare spiritum nitri. Alii hoc modo infringere se spiritus contendunt. Sed satius esse, ut via sicca, quàm humida pareretur *olis*, sensus demonstrat: simul enim miscentur in mortario vitriolica & nitrosa quævis, (ided in compositis non miscenda vel liquida vel solida,) statim odor aquæ fortis emergit, & nares ferit. Atque sic ex *olis* nitri, p. ij. *olis* prius calcinati paratur per retortam, per gradus igne adhibito, & quantum decessit vitriolo inter calcinandum circiter aquæ, in recipiens indito. Compositæ aquæ fortes cum amiantho, cutiâ, & alijs audiunt gradatoria, de quo vid.

vid. *Kester*. Ut verò nitro additum vitriolum aquam fortem efficit; sic Θ^* cum, vel sal gemmæ, nitrum ipsum, subquaduplâ vel suboctupla parte additum aquæ forti, illam acuit, & in aquam regiam commutat & exaltat, tum via humida, simplici solutione, quamvis quidam destillare denuò malint: tum via sicca, nitro & sale gemmæ simul destillatis cum bolo, quo sine etiam aliquando adhiberi potest spirit. salis compositus. Qui verò nitrum & sal ammoniac. pulverisata ana destillare volunt, vix videntur finem optatum obtinere posse, ob gas elasticum potentissimum, quod facile fulminat. Observavimus, pro destillatione Σ us nitri, bolum & nitrum ana recepta in Θ cum fragore disrupisse retortam; multò magis id timendum est in solâ talium horum mixtione, quæ se invicem evocant, unde sunt, qui, ad ductum *Tenzelii*, per retortam tubulatam id peragere sustinent.

13. *Salia acida metallis infringuntur*. Non tam mens est asserti, in solvendo intrinsece virtutem spirituum acidorum, cum effervescent cum hisdem inter solvendum, quam pro destillatione præstanda. Notus est spiritus vitrioli martis, spiritus vitrioli veneris, quos etiam citra mentionem vitrioli effervunt, spiritum martis, spiritum veneris, quorum hic acrum esurinum hinc audit. Modus parandi non differt à posteriori, vitriolum martis, vitriolum veneris eodem modo destillantur in spiritum, ac vitriolum vulgare. Differre verò volunt vires, & non solum subtiliores sic evadere, sed & virtutes quasdam accipere. Hinc *Faber*, per hyperbolen chemicam, ad miraculum & stuporem scribit spiritum vitrioli veneris opem ferre omnibus illis, quibus deest facultas retentrix seminis, & qui perpétua gonorrhœa laborant, cum aqua quercus sumptum, quæ ipsa etiam hac vi polleat. *L. 3. secret. chemic. c. 4. p. 424*. Verum si penitus paulo intueamur $\epsilon\gamma\chi\epsilon\pi\sigma\sigma\iota\sigma$, seu destillandi modum, sanè actum agnoscit, qui ex vitriolo martis, vel veneris, spiritum destillant & aucupantur subtiliorem ac meliorem. (1.) enim omne vitriolum jam dum de natura martis vel veneris participat, unde hermaphroditicum audit. (2.) Actum agitur, si primò spiritus vitrioli ex vitriolo communi paratur, cū hoc vitriolum ex marte vel venere, ubi acidum iterum corporefit, ochram terream tanquam corpus assumendo, & ex hoc denuò id, quod prius jam obtinebam. Sin acere illum velimus, præstat vitriolum martis parte suboctupla, 3j. 3i. spiritus solvere, inque usus aperitivos roborantes impendere. Unde (3.) spiritus hi vitrioli martis, vitrioli veneris, à spiritus vitr. vulgari non differunt, imò ferè debiliores sunt, vel saltem pretiosiores, non virtute nobiliores.

14. *Spiritus acidi constituunt menstrua corrosiva, & medicamenta*. Menstrua præbent omnium potentissima; menstrua ad extrahendum spiritus acidi mitiores, diffusiores & medii, ut acetum destillatum, (succos consimiles non attinet hoc loco laudare pluribus,) spiritus mellis, mannæ, viridis æris &c. tum per se, tum adjumento comitante vel subsequente Ψ , quod ex aliis capitibus & oculis abundè notum est. Menstrua ad solvendum spiritus quidem mitiores quoque, magis tamen fortiores. Solvit aqua fortis metalla omnia, excepto auro, solvit aqua regia aurum, non alia metalla, saltem recepto solvendi usu. Solvunt spiritus hi acidi fortissimi metalla, destruendo compagem mixti, quæ in sulphure residet. Sulphur est vinculum & compages universalis, unde omnia menstrua tantum solvunt ex mixtis, quantum juris habent in sulphur, quæ regula generalis esse potest omnium solventium. Cum verò acida in sulphur, quæ tale & cohesivum est, minus virtutem suam exercere

queant, unde aqua fortis, quæ solvit argentum, aqua regia, quæ solvit aurum, fixissimum corpus, non solvere novit sulphur commune, fixitate nullo modo cum dictis comparandum; solvunt hæc ipsa metalla, ob junctam terram. Hæc cum abundet in metallis, neque porò sulphuris aditum omnem in terram excludant, ut in sulphure vulgari, fit, ut hac median-te jus in sulphur obtineant, idque devorent partim in quibusdam, argento, auro, cupro, plumbo &c. partim immutentur ipsa magis, ut spir. vitr. & omnis acidus in ferro, acetum destillatum in minio &c. Constituunt in his menstrua primaria, uti in aliis secundaria, cum spiritibus vinosis juncta, sub aquæ temperata nomine, ut in elixirio proprietatis, juncta cum aquâ simpli in tincturâ rosarum, violarum &c. Constituunt verò & corrosiva, pro excitandis fonticulis, absumendis excrescentiis, extinguendo caractere peregrino seminali in nævis maternis, sed cum cautelis debitis adhibita, ut juvent, non noceant. Præbent corrosivum, & causticum in carbunculis pestilentibus &c. Dissolvunt & sic sulphur vitale & mixti, seu partis, cui applicantur, unde inducunt $\epsilon\epsilon\pi\sigma\sigma\iota\sigma$, quæ agendi ratio corrosivorum est genuina. Atque hinc etiam interno usu ita moderandus eorum usus, ne noceant, ardoremque vel escharam inducant ventriculo. Præbent verò & catharticum, & desiccant, absumuntque ulcera mitigata. Sic in ulceribus labiorum spiritus salis leviter contactus sanat promptissimè. Sic *Jachimus* aquam fortem cum aquâ plantaginis commendat in ulceribus nasi, *comm. in Rhafen. p. 226*. Denique largiuntur medicamenta, polychresta & potentissima. Quicquid ab acidis expectandum est ullis; id poterit & $\nu\alpha\lambda'$ $\epsilon\gamma\chi\epsilon\pi\sigma\sigma\iota\sigma$ præstant spiritus acidi, usu stomachico spir. salis & vitrioli, carminativo spirit. nitris incisorio, resolvente, diuretico, aperitivo, hypochondriaco, nephritico, antifebrili, refrigerante & alterante singuli: sudorifero, diuretico & laxante alvum, clystus antimonii sulphuratus. Tacemus alios speciales usus in singulis, hinc inde annotatos; qui tamen ex hisce generalibus omnes fluunt, unde spiritus vitrioli cephalicus acidum vitrioli subtile & volatile, magis tenuatum & separatum, exhibet, spiritus viridis æris cum Δ e factus antiasthmaticus &c.

De Spiritibus urinosi.

Restat, ut dicamus quoque de SPIRITIBUS URINOSIS, qui & ipsi summè activi sunt, ut tribus hisce heroibus ad omne morborum genus uti liceat. Certare verò urinosi cum reliquis possunt tum subtilitate, omnium maximè enim sunt volatiles; tum viribus, absolute & respectivè consideratis. De his ergò not.

1. *Spiritus urinosi à sale volatili liberato & fluorem indepto consunt*. Urinosi dicuntur ad differentiam vinosorum & acidorum, qui saporem consimilem & odorem de se præbent, hi verò urinosum, sensibus inter se admodum affinis, qualis nempe exurina resoluta in stabulis equorum, in cloacis &c. spirat; quod cum communissimum, & nemini non notum sit, ad hujus instar omnes consimiles hinc dicuntur urinosi, seu sale volatili facti, quo ipso essentialis differentia simul elucet, quomodo à reliquis ad extra & intra distinguantur. Cumque præ reliquis volatilis hujus seu salis seu spiritus esset natura, & in quibus eminet, nec ligatum est, promptè se subducit & aufugiat in auras, immersum quoque & ligatum, vel sociatum saltem deprehenditur alijs, ita, ut in quibusdam nullo se probat à priori sensu, ut in cornu cervi, in alijs odor acidus potius se exerat, ut in formicis & pane, in alijs sulphur volatile varîe specificatum, ut in floribus, & herbis. Totum igitur artificium

acquirendi spiritum urinosum consistit in libertate salis volatilis, quâ præsente se satis manifestat, ut è contrario occultatum est, vel in totum, vel in tantum, cedens aliis potentioribus. Hinc nosse vincula oportet, quibus illigetur & innexum velut captivetur, ut sic è carcere liberari queat. Ita verò fluorem adipiscitur idem & prædominatur, reliquis subjugatis; fluorem tum potentialem, qui in salis liberati consistit evolutione, tum actualem, cum promptissime liquori immergatur, atque sic spiritum exhibeat, liquida forma.

2. *Spiritus urinosi ex omnibus regnis, vegetabili, animali, & minerali sunt parabiles.* Hactenus quidem id minus notum fuit, & spiritus φλογισοι ex vegetabilibus magis, acidi ex mineralibus, urinosi ex animalibus ferè parati, in quibus omnibus abundantissime reperiuntur, id quod etiam καλ' ἐξοχῶν valet, & verum est. De vegetabilibus id negarunt communiter, nominatim Zovelfferus & Moëbius noster, alibi laudati, quamvis sal volatile in plantis antilcorbuticis agnoscerent, & idem in cephalicis deprædicasset *Helmontius*. Hodie verò, vel nostra levidenti opera accedente, in apertam lucem posita sunt salia volatilia, seu spir. urin. plantarum, ut ad αὐτοψίαν, ad sensus provocandum sit, si quis amplius negare id sustineat, unde & ex fuligine dudum notus spiritus urinosus, spiritus cochleariæ, lil. convall. urinosus, exemplo esse possunt, de quo l. 2. de sale volatili plant. egimus latius. Ex mineralibus verò difficulter quidem id videtur impetrari posse, ob prædominans acidum; prodeunt tamen spiritus urinosi ex his quoque, tum per se, particulis salinis volatilibus sub jugo aliorum incarcerationis liberatis, exemplo vel solus spir. sal. ammoniaci nativi, tum in quibusdam per κοινωσίαν, ut ex alumine, ad cuius præparationem prius urina accesserat. Ubi & illa differentia est notabilis, spir. vinosos odorem & saporem retinere magis, unde & audiunt vinosi, acidos minus, medio modo se habere urinosos, uti manifestè in dictis exemplis videre est.

3. *Vincula sal volatile detinentia & implicantia duo sunt, sulphur & acidum.* Cum non offerat se sensibus æquè, vel tamen non solum & præcipuè, noscenda sunt illa vincula, ut ex illorum sinu seu carcere liberari queat spiritus volatilis urinosus. Distingui possunt hæc ipsa in principalia & adæquata, licet iterum & in his differentia deprehendatur. Principale illigans & domans est acidum, hostis Varinianus omnis alcali, maximè verò volatilis. Hinc difficillimè omnium acquirere licet sal volatile ex abundanter & purè acidis, ita ut vel jures nullum adesse penitus. Principale illigans & obvolvens est sulphur, cuius visco glutinoso irretitum quasi captivum detinetur, ægrè dimittendum, id quod exemplo ossium, cornuum & cranii humani illustrari potest. Liquoribus ac oleis animalium terra absumtis & exesis, verba sunt. *Quercetani in terræ ad. affect. cap. p. m. 228.* ossa salium domicilia, ipsaque propè tota sales, licet exiccata tumulo, fixa tamen firmaque tota perstant, nulla temporis serie expugnabilia nec vincenda. Quo ipso tamen loco non nosse videtur sal volatile ossium, cum incinerare eadem jubeat, ut virtutem suam exerant. Satis nobis sit, etiam ex ossibus & calvariis è cœmeteriis depromptis posse propelli & separari sal & spiritus volatiles. Adæquatum illigans & dissocians constituunt reliqua: aqua & terra. Curiosum est, ob teneritudinem ipsum sal volatile ita obscurari posse in aqua, ut ne vestigium sui relinquat. Si v.g. sedum minus, satis acre & sale volatili fœrum, è cucurbita recens destillatur, liquor prodiit aqueus, non acris, ob liquatum sic sal in aquam magis, quod prius videbatur magis se exerere, id quod & exemplo succorum patet, qui ex proportionem vel respectivè æstimati minus sæpe sunt acres ipsi integris mixtis.

4. *Liberant spiritus & sal volatile tria: ignis, alcali & putrefactio.* Dissolutis vinculis dictis, necessum & confectarium est, liberari spiritum & sal volatile. Notanter dicimus spiritum & sal volatile, cum unum quidem sint re, distinctum verò modo, fluore, uno verbo, igni & aquæ debito. Ignis in destillatione spirituum urinosorum se gerit ut analyta communis & proprius: Communis, quia propellit omne volatile & evaporabile, atque adedò quoque ipsum sal volatile. Proprius, quia est principium destructivum sulphuris, tanquam vinculi, quo destructo idem liberat. Alcali est contrarium è diametro acido, ergò dum infringit ejusdem vires, libertate sua potitur sal volatile. Non verò omni acido & alcali commisis sal volatile emergit, licet gas subtile elasticum eructetur, exemplo præparationis Tart. St. Li, martis, arcani Tart. & similium, sed eo saltim casu vel potissimum, ubi substat acido alcali & subjugatum est, qualia sunt ammoniacalia omnia. Facit id alcali modò extraneum, de quo in sequentibus, modò domesticum, juvando & promovendo, libertatem, uti notum est in destillatione: us salis, igne fortiori circa finem adhibito flores ammoniacales, etiam rubros, emergere. Liberat putrefactio, ubi sulphur vitale nexibus suis exutum destruitur, atque sic centraliter illo reserato salia se in libertatem vendicant, & abitu moluntur beneficio humidi, cui se associant, unde si ignis propulsor accedat, potest haberi spiritus urinosus imò & per se exhalat sæpe, narefque & oculos fecit. De his speciatim dicendum est ulterius.

5. *Quandocumq; innexum sulphuri & terra solis est sal volat. propelluntur spir. urin. igne concluso.* In quibuldâ sola ignis tortura sufficit, ad viscum sulphur. gelatinosum tollendum. Exemplo sit spir. cornu cervi, eboris, aleis, cranii humani, viperarum, serpentum, fuliginis &c. Omnia ossa, & his similia solida ex animalium genere, ut dentes, chelæ & oculi cancrorum, polent. (1.) plurimo sal. vol. gelat. seu sulphuri viscido immerito, quod hinc inter destillandum facefit in oleum. Gelatina ossium nota est, notum sulphur unctuosum fuliginis, nota mucilago in ludo, & in ipsis lapidibus cancrorum. (2.) partibus terreis fixis, quibus aqueæ ministrant, & mixturam singulorum promovet. Cum ergò ignis liquat roscidum illud gelatinosum, fitque διακρίσις manifesta, liberatur hoc ipso humidum, & huic immersum & per se quoque parens sal volat. v.g. cornu cervig. m. concis. rasuræ eboris cornari, vel aliorum, ex dictis, v.g. l. iij. vel iij. q. v. Indita retortæ vitreæ destillantur l. a. igne arenæ, cum debito receptaculo, per gradus. Procedit primo loco spiritus, (neq; enim phlegmatis hic attenditur differentia,) succedit oleum empyreumaticum, fœtidum, & ipsum sal. volat. refertissimum, & denique sal volatile copiosum, pro uniuscujusque modulo, parietibus recipientis varijs hastulis & figuris se affigens, quæ ipse hinc non attenduntur æquè, licet curiosiores etiam diversitatem hanc mirentur, uti sal volatile. Cornu cerv. parallelipedi figuram æmulari scribitur. Aboluto propulsionis opere oleum separatur à spiritu, beneficio tritorii vel filtri, spiritus verò cum sale vol. conjungitur, quod cum ob copiam non solvere vel recipere omne queat, eluitur (si quidem spirituosus liquida expetatur forma,) aqua simplici, quæ præ vi ferè potior est, ob promptiorem solutionem & homogeneitatem, quantum ad solutionem sufficit. Hinc vel per subsidentiam solam, vel per destillationem à cineribus vel calce vivâ, rectificatur, separatis sic particulis ramosis oleosis, unde ferè ordinariè etiam rectificatus flavescens, seu non adedò pellucidum colorè recipit, nisi alia artificia accedant. Reliquum verò caput mortuum, si igne aperto utatur ad albedinem, sit respectivè cornu cervi ustum, ebur ustum seu spodium &c. Quod si per retortam terream igne immediato sit

destillatio, sal volatile terreum magis confurgit, unde consultius ferè, nisi majori quantitate intendatur spiritus, ex arena idem paratur. Sic etiam ex sanguine humano, cervino aliove copiosissimum sal volat. seu spirit. urin. paratur, per solum ignem propellendo. Imò & sanguis hirci, vel alius exiccatus, si destillationi subiciatur, idem demonstrat, unde modus agendi sanguinis asini in melancholia, hirci in casu ab alto & pleuritide patere potest. Idem fit ex pipere per se, ex demine rutæ, cochleariâ siccâ &c. Nec aliter se res habet in mineralibus, consimili lege gaudentibus. Ita enim paratur spiritus calcis vivæ, quem frustra hinc ex calce quæras, (vel saltem non nisi minimam partem,) urinosus, volatilis, insignium virtutum, ex lib. vii. per retortam destillando lapidum istorum fragmenta.

6. *Ubiunque sal volatile ab acido ligatum est, alcali additis spiritus urinosus propellitur.* Liberatur enim sic ligatum volatile, ut sui juris esse & prodire queat. Ratio hujus in contrarietate perpetua alcali & acidi consistit. Exemplo sit spiritus Tart. urin. Langelotti, quando tartarus sale proprio recluditur, atque sic spiritum volatilem dimittit, neque idem sal volatile sub oleo tam latitare potest. Inprimis verò exemplum præbet spiritus *Sis* *ci, qui inter omnes urinosos facile principem tenet locum. Exuperant in *Se* *co, tum nativo, tum arte facto, duo elementa: partes urinosæ volatiles ligatæ, & quasi fixatæ, & acidum ligans, idquæ sub panno admodum sulphure. Hinc quamvis geminus sic haberi ex illo possit spiritus, urinosus, respectu priorum, & acidus, intuitu salis acidi, de quo legi meretur *Polemanus*: nam destillatus cum seccli huic potius quam sali ammoniaco debetur; usutamen recepto magis spiritus volatilis expetitur, & καὶ ἐξοχὴν dicitur spiritus *Sis* *ci, acidus verò seorsim potius ex sale communi petitur. Hinc per se, si igni subiciatur, vel non additis alcalibus, nullum præbet spirit. urin. nullum sal volatile, sed flores varios, æquabili textura salium remanente, quamvis sal volatile ferè potiores in floribus affectet partes. Spiritum verò urinosum promptissimè largitur, addito humido excipiente, aquâ vel *Vi*, & alcali propellente quocunque, v. g. cineribus vulgaribus, cineribus clavellatis, sale Tart. calce vivâ, nitro fixato, Tart. cum nitro calcin. &c. ita enim statim evolvitur. Idem quoque valet de salibus ipsis fixatis ex parte & sic quasi revivificatis. Eadem verò ratio est urinæ, quæ salis ammoniaci cum sale communi vel marino basis est. Cum enim & hæc constet ex sale acido, nitroso, & subjugato ab eo volatili urinoso, seu, uno verbo, sit ammoniacalis naturæ, hinc spiritus urinosus quidem ex urinâ ipsâ rarius ferè paulo hodiè paratur, supplente commodissimè ejus locum spiritu *Sis* *ci dicto, liberari verò itidem extemplò potest & propell. si urina, inprimis, pro phlegmate superfluo abigendo, ad tertias circiter evaporatione factâ, additione eorundem alcalium destilletur. Quibus ipsis moneamur, ut de spirituum urinosorum naturâ dicamus.

7. *Spiritus urinosi excusso acido, subtilisato & panfissimo sulphure, igne obstericante sunt.* Nullus spiritus urinosus fieri potest, nisi absit acidum, ligans perpetuum: absit privativè, ut in cornu cervi; absit positivè, infractum & annihilatum quasi per alcalia addita. Ast si meminerimus, idem acidum obtundere sulphur, sulphur verò explicatum & pansum esse principium odorum, spiritus urinosos esse odoratissimos, seu odore gaudere penetrantissimo omnium; sulphur optime pandi & recludi ab alcalibus, facile in spiritibus hisce urinosi omnibus panfissimum & subtilissimum mirabimur sulphur. Spiritus nempe urinosi non simplicia sunt salia, sed composita ex sale volatili & sulphure subtilissimo. Patet id, quod cum spiritu *Sis*

*ci urinoso ne mica procedat olei, etiam si cum fuligine paratum fuerit, absorpto omni sulphure, omni oleo, à salibus. Patet, quod urinâ quoque destillata nullum largiatur oleum eodem modo, & tamen aliâ ἐξοχῆσθαι, per evaporationem & putrefactionem v. gr. præviam largiatur per hodierna iuventa phosphorum, odore & luce sulphur panfissimum ad oculum fixentem. Idem quoque de omnibus aliis spiritibus urinosi valet. Imò varietatem unicè & differentiam velut specificam nanciscuntur à differente sulphure, unde & spiritus fuliginis nauseabundus est præ alijs. Neque obstat, inter destillandum & hunc ipsam non minus ac alios quosdam comitari simul propulsum oleum. Quid enim recipere nequit junctum sal volatile, seorsim relinquitur & existit sic idem quoque à virtute horum spirituum probari sufficienter potest.

8. *Arctius innexum acido sulphuri, & reliquis sal volatile, in quibusdam igne aperto laxatur.* Curiosum est, quamvis cuivis obvium, experimentum lignorum & fuliginis. Ligna omnia, quercus v. g. pini, sanctum, betulæ aliæque combustibilia, & foco toto die intere videntia, igne clauso subiecta retortæ, spiritum acidum præbent, cum oleo & tale fixo in capite mortuo. Nullum ibi deprehendas sal volat. nulum spiritum urinosum. Aperto verò igne cremata idem largiuntur, teste fuligine, quæ non al unde, quàm ab his melior emergit. Ratio est hujus phænomeni, quod acidum exuperet & ligat sal volatile: quod ipsum excuti nequeat igne concluso ita; ut in apicum prodeat sal volat. Cedit enim alterum alteri perpetuò, spir. urinoso stillante nullus acidus, acido stillante, nullus urinosus exit simul. Quæras igitur, ubi latitaverit sal volat. an in spir. acido, an in oleo, an in sale fixo & terrâ? In oleo putaverim, quod hinc vires suas, fornicatur, exemplo olei ligni sancti, corylini, seu heraclini Rulandi. Hinc etiam spiritus Tart. spir. cornu cervi alio modo parari possunt ex oleo eorundem, si affusus sp. vin. abstrahatur, licet transmutat partes oleosas simul, sicq; occultet sal volatile nihilominus. Quando ergo in pabulum cedunt igni ligna, acido excusso deflagrat sulphur maximam partem, pars verò sub rapido illo flammæ impetu adhæret fornaci, sicque successivè magma unctuosum colligitur, unde sal volatile lignorum, aliàs minus acquirendum, pelli potest.

9. *Ubiunque particula humida abundat cum laxiori texturâ mixti, spiritus urinosus putrefactione acquiritur.* Putrefactio, quod diximus, præcipuè quoque extricat sulph. viscidum vinculum, modò laxius fit illud, & humido macerante instructum. Putredo enim fit in humido, in sicco nullum jus habet. Simul verò committit sal acid. & urinos., ut vel propellant se invicem ipsa, vel igne extrudi queant & separari promptè. Patet id exemplo spir. urinæ, qui præter primum modum, additionem alcali etiam paratur per putrefactionem, seu resolutionem sulphuris, quantum secum condit & possidet, cujus comes & index est. Recipiat urina bona quantitas, stet eo usque in vase terreo aliove, donec fœtere incipiat & urinositas se prodere. Hinc destilletur cum suo phlegmate, & rectificetur. Hæc ratio succedit, licet hodiè præ altera illâ minus frequenterur: neque opus est, ut urinam eligamus impolluti, vel vinum bibentis, satis est, ut nō post cibum statim sumptum aquosa recipiatur. Quod enim communiter referunt quidam chimici, urinis sanorum & juvenum plus salis volatilis inesse, quàm infirmorum & senum, idemq; à vini potoribus quàm cerevisiæ vel aquæ magis expectandum, id cum grano salis intelligendum, neque absolutè verum est. Non enim tam ex potu, quàm ex cibis emergit sal volatile, testibus brutis, quæ putâ bibunt aquam, exemplo equorum, felium, cervorum &c. & tamen sal volatile copiosissimum in sanguine & urinâ ipsâ possident.

Exemplo quoque fit spiritus lumbricorum volatilis. V. lumbricatus ignavior est, nisi aliquoties de novis abstrahatur, neque tamen urinositatem sic recipit, cum sal volatile itidem viscido-glutinoso sit immersum. Urinosus vero fit tum per putrefactionem, si lumbrici vivi in olla vel vitro stent, donec resolvantur in tabum, & hinc destillantur, qui tamen spiritus est foetentissimus; vel statim è retorta vitrea, superingesta bona quantitate cinerum, propellantur, qui spiritus efficacior est, laxiori enim compage sulphureum gluten dimittit sal volatile, inprimis dissociatum cineribus. Exemplo sint spiritus urinosi plantarum, per putrefactionem itidem parati. Recipit folia cochleariæ recentia, vel flores liliorum convallium recentes, indantur retortæ vitreæ, obturato leviter orificio; stent per unam alteramque hebdomadem, donec facessant in tabum, seu putrilaginem. Hinc ex arena destilletur spiritus urinosus, pro lubitu rectificandus à parte phlegmatica aquosiori. Sin minus abundet humiditas, affusione aquæ id præstatur etiam in siccis. Sic eodem modo ac ex lumbricis etiam ex cornu cervi & ebore aliisque spiritus urinosus albus paratur, separato oleo empyreumatico, si aqua gelatinosa per coctionem emergens, sub præparatione Philosophica, putrefiat & hinc destilletur.

10. *Prævia putrefactione sicca, & apparatu decenti facto, (ablato excedente humido,) imposita sibi planta, calore interno concepta, propellant sine igne spiritum urinosum.* Id vero exemplo glasti invenimus & exposuimus latius l. de sale volatili plantarum. Dicimus putrefactionem, plantæ enim contunduntur & sic laxatur compages, succi que proprius subit corruptionem. Dicimus siccam, aëre enim siccata in globulos formatur, qui itidem exiccantur, & hinc demum sibi impositi spiritum urinosum spirant, tempore præsertim æstivo, aëre ambiente calido evocante. Ex quo ipso phænomena plura curiosissima patere queunt & confirmari, v. g. sulphur tenaculum esse salis urinosi volatilis; sulphur in putrefactione & fermentatione palmam seu principalem locum tueri; sulphur agitarum in motum calorem citare; plantas acido & alcali salibus pollere; sub nexu sulphuris amicæ prius composita hæc secum pugnare, & sulphur ipsum tenuatum cum sale volatili sic propelli, ut taceamus sulphur quoque sic haberi posse, aurati instar, & quæ alia inaudita olim exinde possunt elici. Hæc ipsa verò in præparatione glasti ad oculum se exerunt, à nobis demum curiosius observata, simulque destillari spiritum urinosum ex plantis per se, sine additamento, & sine igne, quod problema primâ fronte videbatur impossibile, est tamen per *autoψαν* longè omninò verissimum. Tanti est observare etiam ubivis obvia & mechanicorum vilissimorumque sæpe hominum opera, his arcanis maximè foeta.

11. *Sal volatile abscondito sub oleis & spiritibus liberando obstetricantur acida fortiora.* Notabile est primum in hoc ipso asserto, olea esse receptacula salis volatilis. Sulphur libenter hospitatur in sale, sal in sulphure. Sulphur absconditur in salibus fixis, facta incineratione plantæ. Salia volatilia absconduntur in oleo. Hinc tantum potest oleum, quantum pollet sale volatili, & illa olea sunt destillabilia magis, quæ sale volatili pollent, reliqua pigra sunt. Quis crederet sal ammoniaco inesse sulphur, nisi & per se sublimatum, cum bolo præsertim, colore id se proderet, & in spiritu urinoso odore? Hinc oleum cornu cervi foetidum hystericis gratum est, ob sal volatile junctum. Hæc verò thesis ut certa est, ita pro impetrando eodem artificio opus est, sive id fiat cum Vi destillando v. g. ex oleo cornu cervi, sive per acida. Sic è Vi concentrari & haberi posse sal volatile, dilucidavimus alibi latius, ut huc illud repetere non opus sit. Uti

verò spiritus urinosi panfissimum habent sulphur, & subtilissimum, licet mole paucum: sic spiritus vinosi panfissimum & subtilissimum habent quoque sal volatile, quod sapore se prodit quoque, licet prædominetur ipse spiritus vinosus, unde *Helmontius* ex lib. Vi salis volatilis 33. haberi posse scribit, si imbatur in sale tartari siccat. l. aur. vit. p. 576. Idem sal volatile demonstrari potest ex oleis destillatis, hinc enim est, quod oleum v. g. cinamomi sæpe crystallisetur promptè, quod oleum anisi, rosarum verum aliaque concrescant, & virtutes suas exerant varias. His si affundatur oleum vitrioli, effervescunt, quatenus aggreditur acidum hoc penetrantius sal volatile, ipsaque sic invicem separat. Quod si hinc per alcali iterum excutitur acidum, haberi potest sal volatile, seu spiritus urinosus, licet parcius pro renata, quam in rem jam supra de oleis sumus plura commentati.

12. *Spiritus urinosi è salibus fixis non dantur absolute.* Liceat nobis hoc ipsum asserere paradoxon, notissimum enim est, quantum decanterur sal tri volatile, quod succedaneum ipsius alcahest statuit *Helmontius*, quod omnem venarum amurcam abstergat, unde strenuè in parandi ejus modum inquisitum est, & ipsum exempli loco inservire potest, instar omnium aliorum. Si modos parandi lustremus, in quantum quidem innotuere communiter, pro volatilificandis & destillandis salibus alcalibus fixis impenderunt alii primò terrea corpora, qui processus est *Angelæ Sala* & *Deodati* quorum ille cum bolo vulgari, arenæ jam immersæ, permiscet, in globulos format, & ad instar spiritus salis aperto igne destillare jubet, hic cum silicibus contusis & sabulo puro idem tentat ex sale v. g. absinthii. Verùm hi scripsisse videantur magis ex ingenio & theorica speculatione, quam ex praxi, uti plura ejusmodi alia superioribus illis annis exarata & conscripta sunt, sine experimentis, sine ratione, non minus, ac de lapide Philosophico ipso idem asserere licet. Quod in salibus acidis succedit, non item in alcalibus expectandum est; unde qui liquor prodit, debetur phlegmati seu humido bolari, & salis, citra fluorè. Idem quoque prædicandum est de spiritu aperitivo Penoti, qui vitriolicus est, acidulus magis, non urinosus. Alter modus est eorum, qui aquæ aëreæ adminiculo idem tentant, quod secretum est *Zovelferi*, qui *pharm. Regia class.* 15. p. 719. jubet oleum tri p. d. abstrahere per alembicum igne arenæ, eo usque repetendo deliquationem & abstractionem, donec à volatili illo attracto universali sale aëris omnis sal tri volatile transeat per alembic. quæ sanè conditionalis ponit inesse nihil. Phlegma manet plegma, sal manet sal, patum vel nihil ad volatilisationem genuinam conferre aere vel igne. Tertius modus adscito in subsidium Vi fit in Vi tartarifati exemplo, ubi salinum quid ascendere fidem facit odor & sapor, viresque salinæ eminentiores. Sed ut non negatur, ignem etiam fixiora paulo sic abripere & evahere; ita urinosum illum non esse in confesso est. Quartus modus est *Helmontianus*, quando l. de tri. princip. *Chim. uti sunt causa morborum*, p. m. 334. s. 84. ad exemplum salis volatilis cinamomi, oleum suo salu alcali miscetur, circulando per aliquot menses, & postmodum sal volatile inde destillando. Sed hæc ipsa *εγγειφον*, è salis & olei connubio, succedit quidem verum quæstio est, an oleum ex sale, an sal ex oleo eliciat conditum sal volatile. Longè certius est satis testantur, quia odor, volatilitas & effectus id satis testantur. Unde sæpius dictum, propter quod unumquodque est tale, illud magis tale & hoc loco putandum est. Adeoque sic potius cum & mediante sale alcali fit spiritus urinosus, quam ex sale ipso, licet & sic modificetur ex parte spiritus urinosus, & alius à spiritu *Dis* *ci vel urinæ appareat. Quintus processus fit ex sale tartari, vel tartaro ipso crudo, cum alumine pulverisato vel uto, quo

quo de legi meretur latius *B. Ludovici noster*, qui id unice æstimat. Verum qui novit processum in parando alumine usitatum, facile concedet, urinosum illum spiritum esse urinæ simul additæ, fixatum hæcenus ab acido austero aluminis. Sextus modus addi potest per acidum, exemplo arcani Tart. per distillationem; verum ne sic quidem urinosus spiritus expectari potest ullo modo. Septimus est, si destillentur per retortam feces vini exsiccatæ, qui spiritus urinosus sit, & sal volatile sic obtinetur. Verum, quis negaverit, in illis quoque oleum esse, quod laxatum est in compage per fermentationem, unde sal volatile è centro secum, non item salis fixi prodit. Neque enim tam negatur sal Tart. volatile, seu spiritus urinosus volatilis Tart. quam spiritus urinosus ex sale tartari. Octavus denique septimo & quarto est affinis, nempe per fermentationem, quando tartarus crudus sale tartari incôquiritur, unde acidum & oleum attenuantur & infringuntur, ut sal volatile non ab illo figi, ab hoc non condi possit equè, qui modus est *Langelotti*, optimus cum aliis illis, ubi major resolutio salium & reclusio visitur. Ratio vero, quare minus è sale alcali fixo possit expectari spiritus urinosus, est (1.) quia non potest fluorem acquirere debitum, per ignem & aquam, ita ut expandatur & alas acquirat. (2.) quia jam excussum & abactum per ignem evaporabile, & ipsum sal volatile. Quidquid verò non est evaporabile, nec est destillabile. (3.) quia nullum adest ligans, quod excuti possit, eoque excusso sal volatile liberari, vel alcali addito, vel igne ipso, vel putrefactione, quæ propria est sulphuri. Neque obstat, igne continuato & repetito, calcinata salia sulphur magis ostendere, sal enim in terram mutatur & abit. Ratum itaque maneat assertum, è sale alcali fixo, quâ tali, non posse facile acquiri spiritum urinosum.

13. *Quod spiritus urinosus est in liquido, id sal volatile est in sicco, ob teneritudinem tamen priori forma facilius saepe dispensandum.* Corporaturam mixtis largiuntur aqua & terra, cuius symbolis nullibi magis, quàm in salibus occurrit. Hinc ut reliqui spiritus, ita & urinosi inde mutantur suam consistentiam. Hinc tantum solvit v. g. spiritus cornu cervi, quantum capere potest liquor. Seu spiritus urinosi nihil aliud sunt, quàm salia volatilia liquida, liquore aqueo vecta; illâ tamen differentia, quod aqua simul evecta per distillationem & jungat intimius sibi sal volatile, & ipsa subtilisetur quoque magis. Hinc si sal *cum cum alcali quovis destilletur, sine additione aquæ, non spiritus, sed sal volatile habetur: quod si solvatur hinc s. q. aquæ, in spiritum facessit. Adde, quod affusa aqua poros undique pervadat magis, & excutiat alcali acidum sic magis. Quod si verò sali *co, v. g. p. j. & alcali, seu ciner. clavell. pij. destillandis jungatur & Vi & aqua simul, sublimatur simul seorsim egregium sal volatile, medium quasi, non adeò urinosum, sed correctum, porosum & elegans, quo ipso coagulatum illud ex spiritu S. *ci & Vi proveniens, quod volunt communiter, demonstratur, in quo consistat. Dum enim certant de solutione aqua & Vi, quod illa hoc promptius solvat, medium tale quid confurgit nisi tamen probe munias, facile in auras evolans. Hinc ratio patet, quare liquida forma salis sit asservare spiritus urinosos, quàm solida, quia sic coerceri possunt, & detineri, secus abitura salia volatilia, quamvis sal volatile cornu cervi, ut in pulverum formam distribui possit, quæ unica est ratio, siccâ formâ, cum spiritu vini semifixatum, cum operculo cereo munitum, commodè serveretur. Per acidum enim spiritus fixatio si fiat, de quo alibi diximus, sit sal commune inde, scopis illis impar, quos intendimus. Valet id speciatim ut de aliis, ut spiritu salis tartari aluminoso, sic de sale volatili plantarum, quod ob teneritu-

dinem non facile hanc solidam corporaturam vel assumit, vel exhibet, unde satius est, relinquere sibi & probe rectificare, quàm in fixando occupari.

14. *Spiritus urinosi excutiendo fixanti acido, rarefaciendo & exaltando sanguini ac spiritibus, & roborandis nervis, unice profunt.* Vires hæ sunt communes spirituum urinosorum, quod in motum cieant quietos & torpidos humores, adeoque archeum exulcent & partes mobiles vigorent, ut excusso torpore cieantur in motum. Speciatim constituunt volatilia cephalica, unde spiritus cornu cervi, S. *ci, liquor cephalicus, ex spir. sal. *ci & aqua liliorum convallium c. v. ana, in epilepsia, apoplexia, paralyti sunt probatissimi. Sunt volatilia cordialia, referant & pandunt poros, tum cerebri, tum sanguinis, sulphur sanguinis expandunt, ut purpuram suam reinduat, in præcipiti virium lapsu, & spirituum decollatione, unice proficua, interius & exterius, modò non id ipsum à rarefactione nimia contingat, ibi enim acida potius exterius profunt, quæ coagulant, & retinent spiritus resolutos, ut sint specifica, & adæquata ipsis causis morbis. Sunt volatilia hysterica, in suffocationibus uterinis & spasmodicis insignissima. Nec reliquis visceribus succurrunt minus, modò cum aliis appropriatis sociantur, ut spiritus S. *ci anisatus, elixir pectorale cum eodem mixtum, eximie profunt in tussi, asthma, te & catarrhis suffocativis. Volatilia sunt bezoardica, in primis spiritus cornu cervi, & eboris, & exinde parata, liquor cornu cervi succinatus, tinctura bezoardica volatilis, cum spiritu cornu cervi, liquor bezoardicus ex spiritu cornu cervi & tri mixtis & filtratis, in peste, variolis & morbillis, febribus malignis, putridis, potentissime dispellunt *placida peregrinum* quodvis. Acido etiam fixanti in aliis affectibus profunt, unde elixir antiquarium cum S. *ci fit, & ipse spiritus antiquarius audit. Tacemus usum anthelminticum, menses citantem, intus & extus, ad methodum *Glauberi*, usum errhinum &c. Sic spiritus salis Tart. aluminosus refringit spiritum salis pro tincturâ aperitivâ, & ipse diureticum est egregium. Exterius speciatim in doloribus articulorum & nervosis aliis, ubi spiritus cornu cervi, lumbricorum, S. *ci, eboris, & per se & cum spiritu formicarum optimè dissipant *saliv lymphæ*.

Spiritus ergo sunt liquores destillati, vinosi, acidi, urinosi, à sulphure vel sale, acido vel urinoso, fluorem adepti, quilibet in suo genere summè activi *Wedelius*.

Hactenus de Spiritus in genere iisque præcipue simplicibus è variis vegetabilibus, animalibus & mineralibus proliciendis ex Clarissimo Wedelio abundè satis, jam de variis spirituum preparationibus in Medicinâ usitatis particularius.

SPIRITUS SIMPLICES

Spiritus Absinthii, ex Pharm. August.

24. *Absinthii vulgaris quantum placeat, superinfundatur Spir. vini tantundem, ut digiti unius latitudine supernatet: macerentur per octiduum, deinde in B. M. spiritus lego artis vocetur; remanentia verò filtrata præ extracto parando inserviat.*

Quamvis spiritus Absinthii (quod etiam de proxime sequentibus tenendum,) non minus ex herba per fermentationem reclusa, absque spiritus vini accessu, parari queat, hunc tamen modum, seu paratum faciliorem, & nihilominus Absinthii partibus volatilibus sufficienter instructum, ut propterea abrogemus, nullam causam habemus. Eidem verò nomen spiritus Absinthii denegare, & potius spir. vini absinthiacum esse dicendum, urgere, nimis rigorosa est animadver-

fic; cum & vires Absinthii in eo prævaleant, & uni-
ce expetantur, & ipse quoque censorius calamus, v. g.
oleo, quod ex Absinthio & olivarum oleo coctione
conficitur, nomen olei Absinthii simpliciter impo-
suerit, spiritumque substitutum, qui per fermenta-
tionem præcedentem paratur, à fermenti, saccharive
accedentibus particulis non purum, sed itidem com-
positum parare edocuerit.

Hoc etiam modo parantur:

*Spiritus cochlearia, lavendula, liliorum convallium,
melissa.*

Spiritus Anisi.

*℞. Sem. Anisi contusi ℔ss. spiritus vini mensu-
ram unam. Macerentur per octiduum, & per B.
M. spiritus eliciatur. Ita etiam fiunt: Spiritus car-
vi, fœniculi.*

Spiritus Ceraforum Nigrorum.

*℞. Ceraforum nigrorum quantumvis, contun-
dantur, & in vase quærno reponantur, usque dum
fermentando odorem vinosum & nonnihil acidiuscu-
lum adquisiverint, deinde per vesicam lent igne de-
stillentur in Spiritum, qui, si opus fuerit, rectifi-
cetur.*

Hac ratione destillantur etiam, Spiritus Cydo-
niorum, Ebuli ex baccis, Fragorum, sambuci ex
baccis.

Spiritus Baccarum Juniperi.

*Bacca juniperi probe contundantur, & cum aqua
tepidâ in qua portio aliqua fermenti, vel sacchari
ess. Saluta fuerit, diluantur, hinc ad fermenta-
tandum reponantur, quâ peractâ, destillatio insti-
tuatur.*

Spiritus Rosarum.

*℞. Flor. rosarum fragrant. quantum libet, ad-
fusa sufficiente quantitate aque fontane, & addito
fermento, fiat destillatio per vesicam, destillatum
spiritum novis rosis fermentatis toties affundendo &
destillando, donec satis fortem spiritum habue-
ris.*

Omnes & singuli modò dicti spiritus simplicium
sive vegetabilium destillati fuere.

SPIRITUS COMPOSITI.

Spiritus Anhaltinus ex Pharm. Augst.

*℞. Pulveris Xylaloes ℥j. mastiches, cubebar. ga-
langa caryophyllor. an. ℥ij. cinnam. Baccar. Lauri,
sem. fœniculi an. Div. croci ℥ij. Thuris Drjij. Te-
rebinthina Veneta ℥ij. infundantur per octiduum
in spiritus vini ℥xxxvi. postea s. a. in B. destil-
lentur.*

In capite, corde, ac stomacho confortando, catar-
rhis, paralyfi, epilepsia, apoplexia, vertigine &c. cu-
randis prædicatur.

Convulsivus Geilfusii.

*℞. Fol. rosmarini, majorana, origani, sal-
via, bethon. sabina, ruta, scordii, cochlearia, na-
sturtii aquat. summit. pini resinof. juniperi an. m. j.
flor. spica, lilior. convall. hyperici an. m. ss. castorei
℥vi. lumbricor. terrest. ℥j. cubebarum, cardamomi
an. ℥iij. nucis mosch. ℥iij. mastichis ℥ij. Theriaca ℥j.
incisa ac contusa infundantur in vini generosi ℔v.
& V ℔ij. deinde destilla & serva, ac tempore usus in
eo dissolve camphorâ q. s.*

Spiritus hic efficacissimus est ad omnes affectus
spasmodicos, paralyfin, contracturas &c. interne
& externe.

Spiritus Diapente ex Pharm. Augst.

*℞. Elixir. proprietatis Paracelsi ℥j. spir. Theriacalis
camphorati ℥ss. spir. vitrioli rectificati ℥j. Tart. rectificati
℥ij. salis rectificati ℥j. omnia misceantur & digerantur
per xiv. dies, ac servantur usui.*

In affectibus ventriculi & capitis multum valet,
humores ventriculi vitiosos corrigit, sudoremque
& urinam provocat.

*Spiritus Diatrion seu mistura simplex ex
Pharmac. Augst.*

*℞. Spiritus Theriacalis camphorati ℥v. spir. tart.
rectificati ℥ij. spir. vitrioli boni ℥j. misceantur & dige-
rantur aliquandiu in vitro bene clauso.*

Nobilissimum Medicamentum ad plurimos mor-
bos, uti obstructions viscerum referandas, pleuri-
tidem, uterum calefaciendum, venena, & malignam
materiam in febribus per sudorem discutiendam ex-
sistit.

Spiritus Ant-Epilepticus ex Pharm. Norimberg.

*℞. Vitrioli Hungarici depurati ℔iv. urina puero-
rum sanorum, rec. collecta, ℔viij. Digere vase
clauso aliquandiu in B. M. postea in eodem destil-
la ad siccitatem duplex phlegma, duplici usui re-
servandum. Caput mortuum ex retorta terrea, for-
ti igne nudo, intenso paulatim calore, urge: prodem-
tibus confertim spiritibus, liquor emanat pressissi-
mus, sulphurei odoris, & saporis austeriusculi, qui
per retortam semel atque iterum rectificari ac probe in
vitro clauso asservari potest.*

*Spiritus Euphrasie Mindereri ex
Pharmac. Augst.*

*℞. Spiritus Ceraforum nigr. ℔j. Aqua hirundin.
composita majoris ℥vi. Doronici veri, cassia lignea
vera, Amomi veri, rad. valeriana, chelidoni an. ℥iij.
mari veri, fol. ruta an. ℥j. flor. Euphrasia selectissi-
mor. siccorum unc. ss. vel receptium unc. iij. infun-
dantur per noctem in liquoribus his, vase bene clau-
so, manè per Balneum Mariae destillantur lenigne in
spiritum.*

Visui confert hic spiritus, dum spiritus visivos &
animales reliquos reficit, cerebrique frigiditatem
corrigit; in scotomia etiam & vertigine utilis.

*Spiritus Salis Compositus Hartmanni ex
Pharmac. Augst.*

*℞. Salis nitri puri, communis preparati an. quan-
tumlibet. Misce cum dupla vel tripla quantitate argil-
le sicca, atque è globulis inde factis exsiccatisque per
retortam igne reverberii spiritum propelle; huius spi-
ritus, à quo prius phlegma in Balneo abstraxeris, &
deinceps per retortam vel cucurbitam in arena rectifi-
caveris, ℔j. permisce cum eadem quantitate spiritus
vini, circula aliquandiu ad perfectiorem unionem, &
serva ad usum.*

Huius spiritus salis compositi usus in ictericis,
hydropicis, aliisque morbis, in quibus spiritus
salis simplici locus est, inprimis commenda-
tur.

*Spiritus Radicum Satyrii Aphrodisiacus
ex Rolsink.*

*℞. Rad. satyrii succulentarum, abjectis flaccidis
℔j. mica panis similag. m. iij. spiritus vini, ad emi-
nentiam spithama. Contundantur radices ligneo pi-
stillo, cum micâ, adfusa spiritus vini parte. Subacta
mixtura*

mixtura locetur in cucurbitâ ferreâ vel vitreâ. Post affunde V. Clauso vase digestio instituatur in lento calore, spacio .xx. ex me deinde ex vitro, & benè exprime omnem succum per linteum.

℞. Hunc succam macis, Cardam. sem. eruca, nasturt. an. ℥iij. nucis mosch. Caryophyll. cubebar. an. ℥j. in cucurbita cum alembico caco, stent bene contusa, superfufo vino generoso, ad cantb. vi. digere per aliquot dies. Hinc mutato alembico, rostratum sustine. Fiat destillatio in cineribus. In liquore prolato suspendantur nodulo inclusa. Moschi ℥j. Ambra ʒss.

Vires, Purificato corpore & rursus benè nutritio cibis boni succi, & facilis coctionis, caponibus, perdicibus, ovis tremulis, vino dulci Hispanico, aliquoties de die, etiam circa tempus concubitus, sumtus spiritus hic facit officium. Dosis cochl. j. ij. Utendi modus. Per se sumi potest, aut cum vino aliquo generoso.

Spiritus Theriacalis Camphoratus ex Pharm. August.

℞. Spiritus vini optimè rectificati ℥x. Theriaca Andromachi veteris ℥v. Myrrha rubra ℥ss. croci Austriaci ʒss. post per altam obliuianam digestionem fiat in B. M. spiritus destillatio, imponendo alembici rostro camphora ℥j.

Egredie ad sudores eliciendos in peste, ictero, quartana & similibus confert; corpus penetrat, & quidquid noxium reperit, corrigit atque expellit.

Spiritus Vitrioli Cordialis Angeli Salæ ex Pharm. August.

℞. Cornu cervini albisimè calcinati ℥vi. spiritus vitrioli acidi ℥viij. Mixta per retortam destillantur; & liquor elicuitur servetur.

Cordiale præstantissimum, febribus item omnibus conveniens medicamentum, contra putredines inprimis, salutare creditum; à vulgari tamen spiritu vitrioli vix quidquam differt.

Sequuntur Spiritus varii tum simplices tum compositi, tum vegetabiles, tum minerales ex Chymia Jacobi Le Mort.

Spiritus Antapoplecticus S. Closs. ex Schrodero.

℞. Sang. cervini ℔ss.

Infusionis florum lavend. in aq. pæon. fact. ℥iv. M. & destilla ad medias per MB. spiritui extrillato adde infusionis novæ florum lavend. eandem quantitat, destilla denuò, idque tertium repete, tandem adde huic V rectificat. ℥ij.

Dosis à gutt. vj. ad xij. & xx. in jusculo aut aq. approp. juvat Paralyticos, Apoplecticos, Pleuriticos, Asthmaticos, omnes eos quorum pectus sanie aut pure occupatur, anacatharsin enim promoves egregie.

Spiritus Ant-Apoplecticus S. Clossii.) Commodior fier hujus elaboratio, si liquori sanguinis cervini sale volatili turbido ol. destillat. lavendul. addatur in f. q. & per MB. destillatio fiat. Hofmannus.

Spiritus Carminativus D. D. Franc. De le Boë Sylvii.

℞. Rad. Angelica, ℥j. imperator. galanga ana ʒss. folior. rorismar. major. ruta hortens. basilicon. summitatum centaurii min. ana ℔ss. bassar. lauri ℥iij. sem. angelica, levistici, anisi ana ʒss. Zinziberis, nucis moschate, materis ana ʒss. cinnamomi ʒvj. caryophyllor.

corticis arantior. an. ℥j. Concisus & crasse confusus adde. Spiritus vini malvatici vel Hispanici ℥xl. Digerantur per biduum in MB. hinc ad siccitatem destillantur. Quicquid ascenderit magmati iterum affundatur, per biduum digeratur, mox tres partes quarta destillantur. Servetur spiritus destillatus ad usum. Qui valet affundat residuo spir. vini vulgar. sed rectificati ℥xx. atque post bidui digestionem iterum destillet, quandoque prodibit satis potens spiritus, qui seorsim servetur, tanquam imbecillior priore, magnarum tamen ad discutiedos status virium, si convenientibus misturis jungatur, aut addito saccharo in aq. rosea vel feniculi dissoluto edulcoretur ad gratiâ, usurpeturque purior & potentior.

Spiritus Cordialis Balsamicus ex D. D. Rolfincio.

℞. Terebinthina Veneta ℔ss. thuris, mastiches, caryophyllor. nucis mosc. cubebar. cinam. cardam. ana ℥j. rad. Zedoaria, tormentilla, vinetoxici, angelica an. ℥ij. sem. anisi, feniculi, bassar. lauri ana ℥j. Concis. confus. affundantur spir. vini cantb. vj. Digestione quatrduana peracta; bene clauso vase, destilletur spiritus. Primus seorsim servetur, inque eodem suspendatur nodulus in quo moschi alex. ℥j. ambra ʒj. Exceptis gutt. x. xij. in cochleari vini lactescit liquor. Vires sunt cordiales & alexipharmace. Dosis ʒss. & ultra inhaustus vel cochleari vini vel jusculo.

Spiritus Cordis Cervi compositus ex Eodem.

℞. Cord. cervi vel aprugni sylvestr. nem. ij. Abluantur vino bono & incidantur in portiones parvas. Adde folior. cardui benedicti, melisse, roris solis, majorana ana m. j. rad. scorzonera, angelica ana ℥iij. cortic. citri, aurantior. ana ℥j. sem. citri, ocymi ana ℥ij. caryophyll. cinnam. nucis mosc. santali citrini an. ℥ij. ligni aloës ʒj. rhod. j ℥iij. Incis. confus. adde vini malvatici vel alterius generosi q. s. Destillantur in vesica. Cordialis est ad quantitatem cochlearis exhibitus per se.

Spiritus dulcis Mercurij ex D. D. Donzelli.

℞. Mercurij sublimati crystall. (non mercurii dulcis) q. v. pulveretur in alcohol & reponatur in alembico vitreo non multum alto superinfuso spir. vini optimi q. s. distilla in calore cinerum, cohob. donec spir. vini per collum vasis ascendens albescat, ad instar olei albid, tunc mutetur recipiens, & excipiat mercurii spiritus dulcis. Reaffunde facibus novum vini spir. & procede ut in prima operatione, donec omnis materia in oleum abeat. Hic spiritus efficacissimè operatur in ulcere renum & vesica, Dosis gutt. ij. iij. bis aut ter in die, in aq. radic. nenuphar. cauda equina, plantaginis. Arthmannus asserit, hoc modo etiam inveteratissimas exulcerationes tolli feliciter scilicet.

℞. Conserva ros. rub. sine additione liquor. acidi ℥j. sem. hyperici ʒss. M. & sume per aliquot dies quant. nuc. jugland.

2. Spiritus Nephriticus ex Schröd.

℞. Ovum struthionis, pulver. affunde S. Sal. com. & in digestionem relinque, donec probe soluta appareat corticum ovorum substantia, atque tum per chartam filtretur, serveturque.

Vires. Est & οὐδὲν nulli fere secundum à Cesareis Medicis S. Clossæo communicatum.

Dosis gutt. vj. viij. ex vino opt. vel aq. florum fabar. florum acac. malv. veron. addito syr. dialib. Fernel. Insigniter aperit, incidit & commovet arenulas, calculum, urinam, nonnunquam etiam menses & sedes atque etiam serum in hydropicis.

N. Fit & insignis spiritus nephriticus & spiritum à eo destillando. Vid. I. Agricol. in Popp. p. 1. p. 585. Löffelium in Scrutinio Remim. Confer cum Querc. in Querc. Rediv. t. 3. p. 704.

Spiritus

Spiritus Nephriticus. Hic liquor potius quàm spiritus est. Præstat aliquid in calculo expellendo. Fit & insignis spiritus nephriticus cum notabili effectu suam operationem exercens sp. urin. à Vitriolo destillando, de quo infra Libro III. plura vid. thesaur. pharmaceu. l. c. n. VIII. Hoffmann.

Spiritus panis similaginei analepticus ex D. D. Rolancio.

℞. Pan. è furno recenter extract. ℥iij. v. nuc. mosc. num. x. macis ℥ij. caryophyll. ℥j. Zinziber. galange an. ℥iij. vini boni spir. frumenti an. q. s. ad eminentiam sex digitorum. Concis. contus. stent in digestionem; post destillatio ex arena instituat. Destillatum bis vel ter cohobari potest super panem novum, vel primum servari. Reficit spiritus deperditos. Dos. ℥j. ij. iij. per se, vel cum alio liquore.

Spiritus seu aqua polychresta, scorbutica, cachectica ex Eodem.

℞. Cortic. rad. cappar. tamarisci, fraxini, rad. cichorii, bryonia, polypod. vincetoxici, asparagi, petroselini, scorzonera an. ℥iij. china, sarsaparilla, eryng. an. ℥iij. folior. agrimonii, absinthii pontici, centaurii min. chamadr. cochlearia, cuscuta, folior. eupatorii mesue, fumaria, hyssopi, melisse, nasturtii aq. salvia an. mij. ligni guajaci raspati ℥b. scobis ligni sassafras, santali rubri an. ℥iij. sem. apii, petroselini, anisi, citri, nasturtii ana ℥ij. flor. sambuci, genista, nymphae, lupuli ana mij. Exsiccata omnia, concisa, contusa macerentur per dies iij. in vin. bon. odorif. q. s. Destillentur per vesicam & alembicum cum refrigeratorio. Spiritus prima & secunda destillationis seorsim servantur, vel ex omnibus bene digestis per dies & noctes vj. & per linteum cum forti expressione colatis, ex cucurbita terrea destillatur spiritus, seorsim servandus, post aqua ad melluginem usque. Signetur spir. prima & secunda destillationis. Extractum ulterius evaporandum seorsim servetur.

Spiritus Uterinus ex D. Charraz.

℞. Rad. Aristoloch. longa & rotunda, paeonia, valeriana min. an. ℥ij. castorei ℥j. summitatum siccat. absinthii, arthemisia, tanacetum, matricaria, flor. sambuci, chamomilla ana mij. Macerentur per triduum contusa vel incisa omnia in spiritui vini rectificati ℥v. deinde ex a. destillentur & servetur spiritus.

Hic spiritus praesens est remedium pro reprimendis vaporibus ab utero elevatis, & referendis obstructionibus. Dos. ℥j. ij. iij. in aq. aut decoctionibus hysterici, potest itidem, naribus, temporibus & umbilico applicari.

Spiritus ardens Frumenti.

℞. Farina Hord. germin. ℥xxx. Farina Siliginis ℥xxx. Mixtis superfunde aquam ferè ferventem q. s. ut in pastam mollem reducantur optimè agitando; cooperitū relinquatur vas per duas tresve horas, donec aqua omnes partes farinae optimè madefecerit, dein adijce majorem quantitatem, indefesse materiam agitando, ne in glebas concreascit. Tamdiu perseveretur in affusione aquae & agitatione materiae, donec ad supereminentiam debitam aqua superaverit massam farinaceam; ultimò adde fermentum, sive è fœcibus cerevisiae, sive è pasta panis subacida: fermententur simul, donec massa farinae in altum elevata in principio fermentationis sensim detumescat, & subsideat, supernatante postmodum limpido liquore, acidiusculum halitum spirante. Destillationi dein committe, quæ tamdiu continuari debet, donec aqua excepta flammæ injecta, amplius ardere nolit, quod signum est omnimodæ abstractionis: liquor exceptus rectificationi committatur cum manipulis aliquot calcis. Signum

boni spiritus est, si vitro immixtus & aliquantulum commotus, bullas in superficie admittat diutius persistentes. Hic spiritus, si ulteriori rectificationi committatur, ad spiritum rectificatum & alcohol vini potest reduci.

NOTÆ.

1. Caveatur in prima affusione aqua, ne illa fervens affundatur: facile enim aduritur farina; contrahuntur enim particulae ramosae à fervente liquore, ut corium supra ignem: unde exaltatio & ingressus impediuntur & sic spiritus deperditur. Maceratio autem illa cum parva quantitate aquae est perficienda: primo, ut aequaliter humectetur: Secundo, ut arctissime partes commisceantur: Tertio, ut particulae agitationem internam aliqualem primo sulciant, quæ in humido externo natantes, pressæ undique, ab angusta & irregulari viscosa vicinia corporum terrestrium exacuuntur, expansionem postea accelerant, & motum intestinum adjuvant, abolvendum postea majori affusione aqua, & Fermenti, mobilibus particulis graviori.

2. Miscetur hæc duæ farinae, ut Hordeum germinatum levitate sua farinam siliginis ponderosorem & graviolem facilius in altum elevet, & fermentationem facilius.

3. Signum bonæ fermentationis est, si omnis farina in altum elevetur, & halitus tenuissimus ascendens nares vellicet; absoluta autem fermentationis signum est plenaria subsidencia hujus frumenti Elevatio enim farinae primum constituit fermentationis signum, prout spuma &c. in aliis fermentantibus liquoribus; quamdiu enim sphaerica jam in bullas dilatata crassior figura persistat, tamdiu inflata, tumidaque persistat agitatio partium; ventiformi inflatione enim leviores factæ altum citissime petunt: eodem modo, ut bullæ apparent in aqua sapone infecta, per fistulam inflata, itidemque omnibus liquoribus mucilaginosi. Cessat verò illa intumescencia statim, ubi textura illarum vesicularum læsa, halitus illos retinere diutius nequit, & magis rectus pororum & meatuum fuerit situs, expulsi etiam omnibus rarioribus corpusculis solino sulphureis, antehac in claustris durioribus & inutrioribus hospitantibus, nullibi jam coercito, neque excepto moto in majoribus terræ gravioris tubulis, subsidencia fit spontanea illorum corporum, instar limi fundum vasis postea occupantium. Eodem modo, ut videmus, corallia, perlas, oculos cancrorum &c. ab acido illic sese insinuante, in altum elevari, quo satiato omnis motus graviorum corporum tollitur: sic & in igne tamdiu persistere flammam videmus, quamdiu integra tubulorum & meatuum atherem excipientium extat figura, qua læsa chaos suum petit æther, axes minores non obtinens, circa quas sese exercent.

4. Quo major affunditur aquae copia, quæ ad minimum tepida esse debet, eò citius tempus fermentationis absolvitur.

5. Calx admiscetur in rectificatione, ut odor empyreumaticus subacidus tollatur, nec metus est, quod ullo modo spiritum depauperet, cum è contra salia alcalia magis pingues & oleosas reddant partes: ut alibi latius.

Vires. Convenit viribus cum spiritu vini, nisi, quod magis sit anodynum & ingratiore odoris & saporis.

Spiritus ardens nobilior & gravior, tam in sapore quàm odore, colligitur secretiori modo sequenti.

Spiritus Frumenti gravior.

℞. Farina cujuscunque Frumenti, debito modo preparati ℥xxx.

Factum Vini expressarum, Belgice, Droge wei. moer ℥xx.

Præparentur ut superius, hæc tamen cum cautela, ut fæces in aqua tepida prius diluantur, antequam farine humectatæ adjiciantur: fermentetur dein s. a. liquor simplicidum, à subsidentia farine factum, destillationi per se committe, & rectifica, ut superius: sic nancisceris spiritum, in omnibus spiritum è vino destillatum æmulantem. Fæces iterato addito liquore, leviter fermententur: sic de novo spiritum præbent. Residuum crassum pulpamentum, addita cerevisia vel aqua etiam extrahi potest per destillationem, sic omnis spiritus obtinetur: ultimus autem ingrator existit.

Fructus vel magis succulenti sunt, qui, ut cerasa, ribesia &c. expresso & fermentato succo, spiritum præbent: vel minus succulenti, ut poma, pyra &c. è quibus etiam liquor extorqueri potest, sed cum jactura partium: hæc ergo ut conserventur, seq: modo procedendum est:

Spiritus Pomorum.

℞. Aq. Communis q. s.

Ei immergantur Poma, ut innatare queant; coquantur simul, donec mollia evaserint, quibus exemplis alia injiciantur, & coquantur, ut ante, posteaque eximantur, eodem modo tamdiu procedendo, donec sufficiens adsit quantitas Pomorum coctorum. Adimpleatur iis dolium, & leviter contundantur: superfusa dein præcedenti aqua & cochleari uno vel altero fecum cerevisiæ, fiat fermentatio s. a., qua absoluta destillationi subjiciantur in vesica cum serpentina instructa: sic prodit spiritus fragrans, spiritui è vino parato vix cedens.

NOTÆ.

1. *Coctio hæc est præmittenda, ut facilius & promptior fiat fermentatio, & partes molliores factæ fere omnes in liquorem vertantur.*

2. *Liquor fermentatus, colatus à facibus, etiam destillari potest, ut gratiorem & magis fragrantem edat spiritum.*

3. *Et facibus acetum fieri potest, si cum aqua saccharata diluta iterato fermententur, addito fermento acido.*

4. *Liquor fermentatus vinum æmulatur, si rite præparatus existat, ita ut non opus sit dicere separationem jam factam esse salium tenuiorum à crassiori face terrestri, quæ in fructibus, saccharo, musto &c. mollem & obtusum saporem dulcem efficit, jam in acidum gratiorem redactum.*

Vires. Cum sp. vini unæ eademque sunt.

Eodem modo omnes *Fructus*, &c. tritici & omnium aliarum *farinarum* genera destillari possunt. Differunt autem hi spiritus tam in gustu, quam in odore.

Spiritus ardens Mellis.

℞. Mellis lb. xxx.

Aquæ pintas C. vel ℥b. CXXXV. circiter. Ebulliant simul, vel saltem aqua. fervefacta Melli superfundatur, ut optimè dilui possit; huic adde fecum cerevisiæ cochlearia 3. vel 4. fermententur simul per tres quatuorve septimanas, dein destillentur, ut artis est.

NOTÆ.

1. *Signum perfecta fermentationis est, ubi bullulae cessant, odorem & saporem valde spirituosum liquor edat, & gustum dulcem pro maxima sui parte deposuerit, ubi liquor supernatans plane clarus evaserit.*

2. *Primus egrediens spiritus pro vino adusto vulgari conficiendo tam diu seorsim excipitur, quam diu bullas in superficie admittit; reliquus verò liquor subalbicans phlegmaticus, eodem modo ulterius abstrahitur, ut supra dictum, qui ulteriori rectificatione postea indiget.*

3. *Effervescencia & fermentationis diversitatem demonstrant fermenta & ipsa fermentantia: prout enim effervescencia ex mutuo concursu alcali & acidi se mutuo involventium oritur, sic fermentatio ab illo coitu, vesiculas & cellulas illas replente, & angustante, tollitur, ad fundum deturbatis limosis particulis gravioribus factis, in quas antea inflatas & leves Aetheris mobilis influxus patebat, fortiter de loco sylvestri illo vento propulso. Ideoque nulla alcalia fermentanti liquori sola addi debent, saltem non in principio, nec in tanta copia, ut poros & meatus salium expansorum replere aliquo modo possint; statim enim actio illa intestina tollitur. Non uno tamen eodemque modo illarum motus sublationes fiunt, sed pro diversitate alcali diversimode procedunt, quæ experimentis illustrare hic nimis longum foret. Egregia etiam ratiocinia & experimenta de Morbis & Febris, eorundemque curatione per alcalia, hic applicari possent, An nempe, nulla in sanguine bene constituto adsit fermentatio, nisi tali nomine omnes motus magistri hujus artis velint indigitare, quod ego tamen cum aliis (ut aliquis olim protulit: fermentatio est motus, cessatio est quies) plurimis doctioribus Viris nego; tunc enim omnia alcalia essent lethifera, utpote quæ extinguerent illud fermentum vivificum: An febres & morbi ab acido provenire possent sine præcedenti fermentatione, quod etiam penes me in negativa staret sententia ob plurimas rationes partim in fermentationis historia allatas, partim ob alias nimis longas: item, quid ipsa substantia medicamentorum contribuat, & an ab illis corporibus, vel ab halitibus dependeat medela? &c. Sed ad rem. Acidia fermentativum motum inceptum neutiquam sedant, nisi respectu occurfus salis alcali, divortium à sua terra parantis; è contra sæpius instigatur ille motus ab iisdem: hinc facile patet, quare in dolis quernis fermentatio exactior fiat, quam in terreis, vireis, vel ex alio ligno fabricatis, quoniâ nepe acido vitriolo vegetabili scater.*

Vires. Valde commodus est Spiritus oleis dissolvendis & tincturis extrahendis, quamvis idem etiam assequi possis spiritum vini bene rectificatum.

Eodem modo succi condensati, saccharum & similia præparari possunt.

Spiritus Vini rectificatus:

℞. Vini adusti q. v.

Impone vesicæ, & lenissimo igne per serpentinam stanneam destilla ad mediam ferè partem. Hic spiritus, si denuo rectificetur, alcohol vini evadit, id est spiritus vini, omni phlegmate superfluo liberatus, qui ad usum servandus in vitro optimè clauso.

NOTÆ.

1. *Quò fortius vinum adustum, eò majorem spiritus rectificati copiam præbet.*

2. *Si prima vice rectificatissimum expetas spiritum, per alembicum tubulatum ad pedis unius vel alterius altitudinem fiat destillatio per AB.*

3. *Per additionem salium etiam phlegma retineri potest, ut non tam facilis sit ascensionis, v. g. si ad singulas libras quinque vini adusti, manipuli duo vel tres salis assumantur. Spiritum inde aliquo modo immutari, & compositum evadere demonstrant salium diversæ naturæ, illi in mixtione occurrentium, experimenta. Sic huic spiritui cum sale communi rectificato si alcali fortissimum instillaveris, levem subit effervescenciam; è contra, si super alcali rectificatus sit spiritus, cum acido eandem subit &c. Itaque unusquisque salia illa adhibeat, quæ operationibus inde ulterius faciendis non contrariantur.*

4. *Additione autem salium etiam prima vi per retortam vitream alcohol fieri potest. Spiritus vini rectificatissimus, quamvis videatur omni phlegmate carere,*

atta-

attamen illo non facile plenariè orbat, ut demonstrant repetitæ rectificationes super salia alcalia, quæ tantum recipiunt terræ & aquæ, quantum spiritus subtiliores, in rarefactione auras petentes, graviora sua corpora deferunt, ut in plerisque fit nimis repetitis rectificationibus: unde sensim totaliter spiritum percunte aqua elementaris relinquatur.

5. Signum boni Alcohol vini est, si pulverem pyrium incendat deflagrans Spiritus vini, & si gutta una vel altera effusa, pavimentum non attingat, sed in aëre dispereat ob subtilitatem & tenuitatem partium, quamvis facile credam, idem posse contingere in guttula aquæ, ad turris altitudinem projecta ardente sole. Gossypium etiam non totaliter dephlegmato Spiritu vini incenditur, ubi hic illic in extremitatibus, per calorem expulsa & rarefacta aqua, illud siccum flamma devorandum patet. Perfectissimum autem signum est, si cum alcali sale recentè optime siccato, & calcinato misceatur, & comburatur perstante pristina salis siccitate.

Vires. Menstrui loco famosissimi ad exaltanda & extrahenda corpora existit, ventriculo debili convenit. Dosis ad ℥j.

Menstrua Chymici plurimâ excogitarunt, corporum solidiorum dissolutionibus & extractionibus idonea: Quoniam vero plurima eorundem partes pertinacius resistunt liquoribus, vel ob solidam compagem, vel ob texturam irregularem, adeo, ut divortium non facile ineant, præcipue ubi acies fluidorum minor, & penetrandi vis debilior existit. Ideo calcaris loco salia diversa in usum traxerunt, tam fixa quam volatilia, quibus armata menstrua vi sibi viam parare possint, & ad abstrusos aditus pervenire; ut inde thesaurum nobis communicent suarum virium: quod in duabus sequentibus operationibus circa hosce Spiritus arduus patet: sic & absque destillatione phlegma suo Spiritu privari potest seq. modo:

℥i. Vini Adusti ℥xx. Sal. Tartar. opt. calcinati ℥iv. M.

Agitentur simul, sic sensim phlegma diluit illa salia, quibus dein oneratum propria gravitate ad fundum abscedit, supernatante Spiritu limpidio leviter flavescente: Spiritum hunc per decantationem separatim iteratò cum sale alcali permisce, & agita, donec sal nulli phlegmati occurreas, siccum in fundo remaneat.

NOTÆ.

1. In hac operatione primo color Sp. vini intenditur, dein phlegmate secedente remittit, phlegma autem rubrum induit colorem, signo, præcipationem aliqualem inde fieri ab occurssu salis cum spiritu.

2. Rectificatus per destillationem Spiritus & aqua vitæ si denuo cum sale alcali agitentur, flavescens evadit, phlegma autem limpidum manet ob leviter præcipitatas sulphureas terrestres particulas.

3. Hic Spiritus ab odore & sapore salis lixiviosi liberari potest, ita ut gratissimus evadat, exaltato nempe sulphure vini, & depresso acido ejus superfluo, unde fragrantia.

4. Idem etiam omni colore privari potest, ut fit instar Sp. vini per destillationem rectificati.

Vires. Multo præstantior est in extrahendis quibuscunque simplicibus, Spiritus per destillationem rectificato: acuat enim est particulis, quæ facilem ingressum præbent. Interne sudores & urinam movet. &c.

Spiritus Vini rectificatus compositus, Tartarificatus dictus.

℥i. Tartari crudi ℥viii. salis tartari ℥iv. Spiritus Vini vulgaris ℥b. viii.

Digerantur per diem unum, dein destillantur ad mediæ partis abstractionem: destillatum Spiritum super-

funde salis Tartari ℥ii. & Tartari crudi ℥iv. denuo destillantur ad mediæ partis abstractionem, sic Spiritus vini prodit, Tartari subtilioribus particulis imbutus.

NOTÆ.

1. Digestio, cum vulgari Spiritu vini præcedens, requiritur, ad majorem exaltationem particularum Tartari, quæ mediante phlegmate alcali Tartari imbutis dissolvuntur, & quasi fermentantur, vel potius blandè effervescent, Spiritumque tenuiorem hoc modo fundunt.

2. Salium reseratio, unio, & exaltatio cum spiritibus, commodissimè fit per mixturam salis muriatici & fixi, quoniam salia fixa clavium instar sunt, & fermenti loco, quibus mediantibus volatiles particule, & muriaticis existentes salibus, sui juris fiunt, & facile aliis volatilibus associantur, consortio terrestrium particularum liberatæ. Quod facile apparet in omni effervescencia, spiritum fumosum in copia exhibente, qui Marcurij Philosophici nomine à Basilio Valentino nobilitatur, & revera intermedium constituit Spiritum alcalino-acidum tennem. Sic omnia salia hoc modo modo acuari & exaltari queunt cum Spiritu vini.

3. Alcalia sulphureas partes depauperare, nunquam expertus sum; contrarium etenim omnis experientia demonstrat, ubi partes ille, cum aqua altius sese innuante, simul mixtæ pinguem suam consistentiam retervant: imo in plurimis ipsa figura hanc immutata præstat in ipso consortio, prout & in dissolutionibus per acida factis. Olea stillantia non magis in Spiritu ardente sacchari dissolvuntur, quam in Spiritu vini generoso id est, non ex nimis acidis facibus confecto; nam gradus aciditatis plurimi sunt, antequam Spiritus arduus totaliter figantur. Harum autem maxima copia, in præcedenti Spiritu rectificatissimo per præcipationem facto, absorbentur; unde & in resinosis extractionibus faciendis omnibus alijs prævalet; postmodum hic subsequitur tenuiori & fugaciori consistentia. Tartarus autem solus si Spiritum præberet in destillatione, tanquam acidus, macrum redderet Spiritum pro oleis dissolvendis, quoniam acida oleorum & resinarum consortium respuunt, vel cum illis in offam duram coalescunt relicto menstruo fluidiori; si oleum præberet saturatior jam Spiritus vini, ulterius oleum admittere vix posset: ideoque intermedium requiritur sal potius alcalinum quam acidum, quod macrum reddit Spiritum pro vegetabilibus & animalium partibus oleosis extrahendis: pro mineralibus autem densioribus aciditas relinquatur.

4. Spiritum hunc aliquas à Tartaro partes recepisse, & quidem salinas volatiles, argumentum infallibile præbet effervescencia cum acido, ut & leviuscula post motum illum subsidencia, è particulis salinis orta. Rarius enim præcipitatio motum subsequitur, nisi ab occurssu fluidi cum solido, in mutuum amplexum ruerit, & corpora cætera in interstitiis latitantia, vel in quibus hoc vel illud innatabat, deferentium.

Vires. Diuresin promovet, menstruum sat famosum extrahendis Vegetabilibus & Animalibus aliquando item pro mineralibus. Dosis internè ad ℥b.

Flores & Folia particulis ramosis volatilibus imbuta, Spiritum etiam ardentem præbent, sed in minori copia; ut vero major eliciatur quantitas, & fermentatio melius procedat, addito saccharo, melle, syrupo & similibus, quantitas ejusdem Spiritus augetur. Quamvis autem hic Spiritus compositus edoctus, hinc spiritum aequalibus viribus cum simpliciori spiritu dotatum esse, novi ob varias rationes, è quibus præcipue hæc tres sunt:

1. Ob rationem cohesionem partium, quæ facile lædatur à fermentatione, dissolutionemque continui admittit, unde

unde putredinem fere concipiunt ante absolutam fermentationem sine saccharo &c. peractam.

2. Ob facilem fugam partium tenuium è meris floribus & folijs fermentantibus, quæ retinentur à particulis viscoso-ramosis sacchari &c.

3. Ob fermentationem diuturniorem, qua mediante partes magis attenuantur, & exaltantur cum saccharo.

Nunquam autem quis credat, eundem Spiritum posse obtineri è simplicibus, cum Spiritu vini maceratis: cum ille nil aliud, nisi minimam copiam magis volatiliū & tenuium particularum secum eleuet, ubi in hac operatione multo copiosius & quasi tota essentia simplicis prodit; multo minus cum fœcibus cerevisiæ generosa, nec cum ipsa cerevisiâ etiam generosissima, quoniam præter additas rationes ingrato sapore & odore Spiritum gratissimum florum inquinant. Quod additione facum cerevisiæ extempore fiat aliquis Spiritus ardens, illud non arguit, sine fermentatione talem spiritum posse elici, cum jam fermentata sint ipsæ fœces: nisi quis crederet, se sine fermentatione vinum posse parare, ubi ex fœcibus vini turbidis, mustum forsan æmulantibus, liquorem limpidum & vinum ipsum per manicam Hippocraticam transcolare videret, non advertens, è musto jam fermentato illas fœces liquidiores depositas fuisse.

Spiritus Ardens Rosarum.

℞. Rosar. pallid. magnam satis quantitatem unâ cum earum flavedine, impleatur hisce media pars cadi vinacei, superfunde aquam calentem, cum cochlearibus tribus vel quatuor fœcum cerevisiæ, sacchari ℥b. j. ex gr. ad Rosar. ℥b. xvi.

Fermentetur simul per datas vel tres septimanas, donec vinosum & fragrantissimum redoleant odorem, dein distillationi committe in velica, liquorem abstractum rectifica ad abstractionem duodecimæ circiter partis; quod reliquum est, id. nomine aquæ reservari potest: Spiritus hic de novo ulteriori rectificationi super Rosas recentes committi potest ad plenariam dephlegmationem, dein reservetur.

NOTÆ.

1. In hac operatione etiam oleum ascendit crassius, quod optimè Spiritu proprio dephlegmato dissolvi potest.

2. Quibus saccharum invisum fuerit, absque additione eundem Spiritum assequuntur, at non in tanta copia, primò, quia non tam bene fermentantur Rosæ; secundo, ob Spiritum sacchari, eidem sese immiscenem. Hic Spiritus vehiculi loco esse solet, & intimè Rosarum fragrantiam & odorem recipit.

3. Quarta pars liquoris primo progredientis seorsim affervetur; in hac enim Spiritus later; signum autem ejus quarta partis abstracta est, ubi aqua planè limpidâ, & non albicans est; reliquæ autem tres partes subsequentes retineantur sub titulo aqua Rosarum, quæ adhuc satis fragrans esse solet.

4. Flavedo ramosis particulis scatet, unde hæc necessariò ad spirituositatem augendam, & oleum acquirendum addenda est.

5. In loco paululum calido reponantur, ut fermentationem facilem ineant; absque fermentatione enim nullus Spiritus ardens obtinetur, idem de præcedentibus esto judicium.

Vires. Cardiacus est, & temperata natura, & odoris sui fragrantia præcipuè, ubi per septimanas aliquot immotus steterit, spiritus & cerebrum recreat. Dosis à guttis iij. ad xx.

Eodem modo omnium florum Spiritus parati queunt. Spiritus compositi è diversis simplicibus, variæ figuræ & texturæ existentibus, fermentationis tempus varium expetunt. Prout enim fugax est sal internum, durioris-
Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

que vel mollioris cohesionis, inde tempus illius intestinali motui protrahitur, vel abbreviatur: ut autem omni suis integris viribus donata, in mutua mixtura uniantur, sequenti modo procedendum: 1. Ligna; Cortices & Radices grosso modo pulverifata fermentationi committantur; adjiciantur 2. post decem vel duodecim dies duriora folia, 3. flores post decimum quartum diem addantur, nisi sint firmiores, tunc una cum foliis injiciantur; 4. antiscorbutica, sale volatili & acri prædita, fermentatione jam fere absoluta adjungantur. Sequentia duo exempla pro demonstratione sufficient:

Spiritus Cephalicus.

℞. Rad. contrayerv. ℥ii. peonia ℥viii. sacchar. ℥b. vi. aqua cois calentis ℥xxxx, fermenti cerevisiæ q. s. stent in fermentatione per 8. dies, dein adde herb. Majorana, Melissa. an. M. iiii. lavendula, Mx. rorismarin. M. vi. salvia, M. ii. ulterius pergant in suo motu per 5. aut 6. dies, tunc adjice, Flor. anthos, ℥iv. lavendula, ℥vi. ferè perfectæ fermentatione, rasura ligni sassafras ℥iij. im-misce, postmodum lege artis, ut dictum, destilla.

1. Quantitas sacchari & aquæ fermentationis tempus accelerat, aut retardat, unde, quo citius absolutus expetitur fermentationis finis, eo major copia requiritur aquæ.

2. Tempus prolongari vel decurtari potest injiciendorum simplicium pro intentione Artificis, & soliditate simplicium.

Vires. Excellit in nervorum affectibus, mensura promouet, somnum pellit, vertigini medetur ut & paralyti, epilepsia, apoplexia &c. Dosis à ℥ss. ad ℥ii.

Spiritus Antiscorbuticus.

℞. Cort. Ligni guajaci ℥vii. aurantiorum ℥v. bad-car. juniperi ℥j. sem. dauci vulg. ℥i sacchar. ℥b. i. aq. communis ℥b. l. facum cerevisiæ q. s. fermentetur. simul per 12. dies, postmodum adde sem. 3. cal. d. major. an. ℥i. dein fere paractæ fermentationi adjice herb. cochlearie, M. xii. beccabung. M. iiii. nasturtij aquat. indic. an. M. iv. rad. raphan. rustic. ℥ii. lign. sassafras ℥iij. postea destillantur, & rectificentur, ut moris.

NOTÆ.

1. Quamvis cortices Guajaci non multum odoris spargant, attamen per fermentationem multa ejus resinosa partes attenuantur & volatilantur: major autem copia elicitur è durioribus, minus odoris, si pulverisati aqua humectentur, & per dies duos vel tres ita humidi referventur, præcipue addita parva quantitate Sp. vini ad majorem resina dissolutionem: sic molliores factæ illæ particulæ motui intestino magis parent.

2. Clausum, quantum possibile est, vas retineri debet post additionem antiscorbuticorum, ne salis volatilis iactura fiat.

Vires. In scorbuto & affectibus frigidis convenit, acidum infringit, flatum discutit &c. Dosis à Dr. ad ℥i.

Hæc classis etiam inferendus venit Ros, qui habitum quasi vegetabilem constituit, radij solaribus imprægnatum, è superficie terra, & ipsis vegetabilibus, ibidem existentibus, expulsum, ut latius explicatum in præcedentibus, ubi de Aëre locuti sumus: ad majorem vero explicationem sequentia annexus.

Aër tanquam magnam recipiens hujus Macrocosmi considerari potest, in quo omnis generis seminia & spiritus mundi, tanquàm in proprio domicilio, hospitantur. Exigua igitur particula fere omnes, interno vel externo fluido adjunget, illud chaos petunt, tanto magis, quoniam
Ffff radij

radii solares impetū in terra superficiem faciētes, illinc, fluidas & cumis tennes solidas in altū de loco suo pel-lunt, unde *Aër humidum subtile expansum* esse vide-tur, præcipue circumcirca hanc mundi sphaeram. Hæ fluida particula cum non unius sint existentiae; sed pro ratione loci, regionis & temporis variantes, diversas læ-pius effervescentias in summa *Aëris* nostri regione ef-ficiunt: unde *varij motus* dependent, & non raro no-bis communicantur. *Salia*, quæ in regionibus mariti-mis circa littora & stagna reperiuntur, hoc modo cum alijs elevata & subtiliata, iis sese uniunt (nam per se nullibi subsistere potest sal volatilifatum) imo planta-rum, animalium sudores salini hisce conjuncti, mixtu-ram efficiunt fluidam, quæ in plenario motu & expan-sione tamdiu conservatur, quamdiu materia subtili gravida, & quasi repleta existit: illa autem in minori copia ibidem existente, propria gravitate hæ particulae subsidere coguntur, quæ subsidentia humida Ros dici-tur, refocillationi corporum dicatus. Ex his præceden-ribus colligere est, Rorem nil aliud esse, nisi sudorem veluti spirituosum salinum hujus mundi, materia subtili imbutum: Quemadmodum vero omnia corpora suis po-ris & spiritu interno instructa sunt, quæ agerrime vel nunquam consortium exacte ineunt, nisi mediante fer-mentatone, facile concludimus motum fermentativum continuum inesse *Aëri*, unde idem, ingressum obtinens in aliqua corpora liquida, promovetur. Sin autem hæ fermentatio major sit, accedente cohesione & pressione aliqua solidiorum particularum, inde venti, fulgura, tonitrua &c. in *Aëre* oriuntur, ut patet in experimen-tis chymicis ex sp. nitri & vini summe dephlegmatis sp. nitri & limatura Martis, oleo vitrioli & terebin-thinæ. Hæc *Aërea fermentatio* promoveretur percussio-ne & exceptione radiorum solarium in sale, aqua, & ter-ra, quæ cum illis miscetur in sua rarefactione, uti di-ximus, unde illa materia subtilis, durioribus & rigidis illis præcedentibus expulsi corpusculis adjuncta, tanto magis in omnes partes impingens, illas expandit & volatiliores reddit: necesse est ego æstivo tempore ma-jorem adesse rarefactionem, quam alijs anni tempesta-tibus. Verno tempore hæc quasi renata agitatio lu-culentior nobis videtur obvenire, & alacris cellularum explicatio in *Aërem* germina sua protrudentium ma-nifeste observatur, unde omnia vegetiori succo fluido imbuta profluunt; ratio est præcedentis tempestatis rigor: unde salia rigidiora & graviora facta, in *Aë-re* crasso suspensa & volitantia, nullibi sese ingressum obtinentia, jam vero magis attenuata ubique in po-ris magis apertis corporum sese ingerunt, ibidem-que actum suum producant. Prout omnis fermentatio ad exaltationem partium tendit, vel ad acredi-nem, vel ad dissolutionem continui migrat; sic etiam in hoc motu *Aëreo intestino* idem observa ut; quan-do enim unio exacta est partium aqueo salino-terre-strum, ita ut simul fluidum *Aëreum* constituent, nulla malignitas adest: ubi vero salina prædominan-tur extra vaginas suas terrestres (quibus acies, illarum coercebatur) vagabundæ, tunc Acredo oritur, mor-borum & febrium origines fiunt. Plenario autem seces-su à stagnatione nimia facto, particulae salinae sui ju-ris factæ cum impetu ruunt, corrosivæ & malignæ fiunt, unde pestilens & contagiosus *Aër* redditur, qui fermenti instar putridi corpora obvia, quibus se insinuare po-dest, inquinat, & fere ad putredinem reducit, unde de-novo exhalationes fiunt malæ: E præcedentibus liquet, *Aëris*, & in eo præcipue Roris bonitatem vel malignita-tem à motu illo intestino dependere, ut & à regionibus & anni tempestatibus, colligendus ergo, ubi sale volatili fermentante turgit *Aëris* regio, ut & ad usum chymicum ulterius exalteretur, & è celesti alembico exceptus per vitrea organa purum ab impuro deponat, ut sequitur:

Spiritus Roris Majalis.

℞. Roris Majalis, tempore sereno collecti, lb. xix. Manne liquida ℥viii, nitri purissimi ℥iv.

Mixta reponantur per sex septimanas, donec om-nia fermentata fuerint, & putridum odorem ferè con-cipiant, sic ejus spiritus salinus volatilis internus, in apricum productus, destillatione statim separandus venit in cucurbitis vitreis in arena positis: primo lar-ga quantitas liquoris recipiatur, quæ iterata destilla-tione in spirituofam reducitur substantiam abstractio-ne duodecimæ partis; spiritum rectifica bis vel ter, donec omni phlegmate orbetur.

NOTÆ.

1. Manna & nitrum adduntur, quoniam fermentatio major iisdem mediantibus perficitur, deinde, quoniam manna est ros condensatus in substantiam firmam redactus; nitrum verò aëreis est imprægnatum particulis, unde vi unita particulas constituere videntur magis fortes & subtiles, sale volatili nitro-aëreo & spirituoso gravidas.

2. Salia muriatica imo & acida, phlegmati aquolo intime posse uniri, cuivis constabit, qui oleum vitrioli cum majori aqua quantitate destillaverit, ut & sal commune, alumen &c. Imo acidissima, & maximam ignis vim requirunt ad suam elevationem, sicut tractu temporis pereunt dilutione *Aëris* & *Aquæ*; con-mirum igitur, si vires suas per intestinum motum & mixturam exactiorem communicent. Hic sollicitus sum de cupro, quoniam, ubi mere salini spiritus expe-tuntur, ibi metalla solubilia obsunt, non vero idem con-tingit in salino-sulphureis ardentibus Spiritibus elicien-dis, qui sine rosione libera transeunt. Salia enim ratio-ne terre agunt, cum qua mixta sunt, quod in Chymicis & Medicis satis superque notum est, ideoque circum-stantia pro illa necessitate variant.

3. Cucurbita requiritur vitrea, ne vesicam cupream arrodât, & sic partim immutetur & debilitetur: rectifi-catio autem fiat in M. B. ut tanto levior ascendat spiri-tus, phlegmate in fundo remanente.

4. Spiritus hic procedit nebulosus albicans instar omnium spirituum salinorum.

5. Ros colligitur linteis in campo dispersis vespertina hora, summo dein mane linteæ madida exprimuntur, & liquor roridus, gramine &c. guttatim superja-cens, ulterius illis linteis excipitur ad usum. Cum alijs etiam concavis oblongis instrumentis ligneis excipi potest sine ulla mixtura, quod melius est.

Vires. Menstruum est pro vegetabilibus extrahendis sat celebre, in super diuresin promovet, & in plurimis mor-bis tartareis convenire solet.

Eodem modo aqua diverſi generis destillari potest, ut aqua nivis & è tonitru collecta, sed non in tanta copia præbent spiritum, neque tam subtilem.

De Oleis & Spiritibus Empyreumaticis Vegetabilium.

Vegetabilium & Animalium textura admodum mollis & tenera sit originis, aëreo & aqueo succo primordia sua debent: hic, in debitis poris & interstitijs corporum terrestrium exceptus, ita ut rite in iisdem circulum suum absolvere possit, vitam & motum illis communicat. Hæc vita cito & facile ab ætheris rapido motu læderetur, nisi sepimenta & tegumenta, ejus in-jurijs resistentia, adessent, sub quibus quasi sub scuto liberum & proprium motum obtineret. Receptacula hæc sunt particula terrestres, quæ vesicularum & capsularum instar humorem continent & conservant. Hæ triplices in statu corporum vegeto conspiciuntur, 1. quæ plurima aqua & aëre turgidæ gummosæ vel viscosæ dici queunt; hæ inserviunt incremento & expansioni cor-porū, ut alibi latius; 2. illæ, superflua aqua copia private,

per

per pressionem & exhalationem magis ad se invicem accedentes, & spiritu interno plurimo cum pauciori aqua prædita, *ramosa vel sulphurea* fiunt, quæ pro varia consistencia & motu illius spiritus interni varias denominationes obtinent: hæc particula præcipua sunt, quæ ob irregularitatem & densitatem partium & meatuum externo aeris motui resistunt. 3. *Crassiores* vapida, id est, spiritu salino interno privata, adeoque non immutata, sed leviter tantum imminuta partes terrestres dantur, quæ interstitia occupant, pondus addunt, meatusque minores claudunt, ne humores diffuant, & celerior motus impediatur. Ex hæc tribus particulis *leviora & crassiora* prodeunt *Olera*.

De *Aquis & Spiritibus* jam egimus, ut & de subtilioribus *Salino-Spirituoso-Ramosis*: restat, ut ad magis intricatas hæc *crassas & ponderosas* partes procedamus. Hæc, prout jam explicavimus, sat *fixæ & stabiles* esse debent, ut functiones suas obeant; unde tardius etiam in motum reducuntur, & quidem non nisi summa ignis violentia avelli se patiuntur, integra cum destructione corporis. Ex omnibus animalibus eliciuntur hæc *Olea*, rarius ex mineralium familia prodeunt, nisi è paucis bituminosis.

Olea hæc dicuntur *foetida & empyreumatica* ob tres causas. 1. quoniam *lucida salia interna* jam ab involucribus suis liberata, copia sua nobis ingrata sunt, & nervos nostros vellicant. 2. ob *materia subtilis effluvia plurima*, iis particulis communicata ex igne immediate adhibito. 3. quoniam in violenta illa agitatione, duplicis generis *salia & terra*, quæ antea diximus residere in omnibus vegetabilibus, in se invicem agendo, & se mutuo exaltando & præcipitando, *irregulares valde figuras* efficiunt, & *salia acutiora facta* per illas pressionem, ingrato odore & sapore nos eodem modo afficiunt, ut *effluvia & pulveres & scoris antimonii & lixivio sulphuris* &c. solent.

Cum præcedentibus una ascendit liquor *aqueo-salinus*, qui in animalibus est *aliati salis volatilis*, in vegetabilibus plerumque *acido-salis volatilis*.

Observatur autem circa *Vegetabilia* Primò, ea plurimum illius *Olei & Spiritus* fundere, quæ maxime sunt *dura & valde lignosa*, ut & *ponderosa*; minus vero, *levia & meatibus laxis prædita*, ut & *fungosa*. Secundo variat *Spiritus* etiam pro hac præcedenti diversitate: quo enim *leviora*, eo magis *aquosus*, & ad salum volatilem inclinans est liquor; quo vero *densiora*, eo *Spiritus* obtinent magis *austerum & acidum*: densitas enim *ligni*, quod obiter notamus, in *resinosa & acida* ejus *substantia* consistit; *levitas* autem in *aque & aeris* plurima admixtione, & per consequens in viscositate, resistentiâ suam obtinet.

Idem etiam in *Animalibus* esto judicium, nempe, quo *textura carniû magis densa & rubra*, eo plus *Olei* &c. fundit.

Oleum & Spiritus Ligni Guajaci.

R. Lign. Guaj. rasæ q. vi

Eo impleatur ad tertias partes retorta terrea, & apposito recipiente sat amplo fiat destillatio igne aperto adhibitis ignis gradibus, sic primò procedit liquor *aquosus*, secundo liquor *subacidus* cum oleo volatiliore; tertio vapores ascendunt valde albi, cum Oleo empyreumatico crassiori, omnia excepta finita destillatione separentur; sic obtinebis *Oleum duplex*, supernatans nempe spiritui phlegmatico oleum gravius, picem redolens, crassum. Spiritus hic per se rectificetur, sic primò procedit spiritus volatilis, secundo phlegma, tertio spiritus subacidus. Oleum super proprios cineres ad albedinem calcinatorum cohobetur; sic primò produci oleum limpidum flavescens, secundo oleum subrubrum, quæ vel seorsim vel mixta asserventur.

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

1. Nulla indiget interpositione particularum ob propriam terrestritatem.

2. *Fæces* post destillationem, instar carbonum, nigricantes, pertinacissimè ignem retinere solent, si incendantur, ita ut carbonum vice in usum rehi queant, & cineres inde remanentes interserviunt rectificando oleo.

3. *Spiritus volatilis*, in rectificatione primò egrediens, diligenter, & iterato per se rectificatus, spiritu acido fixiori adjungatur, quem quasi vivificare solet, & viribus majoribus instruere.

4. *Oleum* hoc si subtilius expetatur, addi o vehiculò aquosò denuo destillationi subijce, sic, quidquid ascendit cum aquâ, penetrans esse solet & subtile, atque hoc modò ad *Oleorum essentialium* naturam pertingit.

5. *Olea nigerrima*, aliquis vult, nulla per se dantur; sed, prout intensa flavedo croci & ictericorum urina rubedinem mentitur, sic & oleorum summa rubedo, nigredinem rudioris sentus hominibus obtruncate videtur. Siquis enim de coloribus rite judicare velit, non de maximo corporum acervo statim sententiâ faciat, sed de minimis eorum guttis, si liquida sint; vel gravis, si solida existant, seorsim bene perscrutatis super corpus aliquod album, judicet. A copia enim elevata terra conglobata, inordinatus per salum liquidum & ascensum dispositæ obscurè rubra evadunt *Olea*, quæ magis perspicua post rectificationem, id est post iteratam terre depositionem, se offeunt. Idem judicium esto de spiritu volatili, & fixiori acido, qui per rectificationem à terra & aquâ superflua liberati penetratiores & limpidiores evadunt.

Vires: *Oleum* hoc est valde sudoriferum, resolvens & emolliens, unde convenit in lue venerea, tophis & bubonibus ejus curandis, duritiem artuum & tartaream saburram resolvit in podagra, arthritide, nervorum frigidis morbis & similibus.

Notandum autem, externè sufficere destillatum crassum *Oleum* in emplastris & unguentis, in linimentis autem tenuioribus semel rectificatum *Oleum*; internè vero summe proficuum *Oleum* cum aqua rectificatum; spiritus ejus eadem efficit operationes, verum debiliores; interno plerumque usui destinatur, externè autem ulceribus lavandis proficuum est liquor *Guajaci*, Dosis *Olei* à gutta una ad guttas 8. Dosis *Spiritus* à ℥j. ad ℥ij.

Omnia etiam *Vegetabilia* cujuscunque notæ, è quibus *Olea essentialia* elicitur sunt, *Oleum & Spiritum* fundunt empyreumaticum, si per se destillentur, quamvis non in tanta copia, ut caryoph. nux. mactata, cæteraque semina & aromata.

Si vero hoc oleum minus foetidum expetatur, sequenti modo procede:

Oleum Ligni Juniperini.

R. Ligni juniperi rasæ ℥vj. salis communis ℥ij.

Impleantur duæ tertie partes retortæ, & igne nudo fluidum contentum propellatur in recipiens capacissimum observato ignis regimine. *Oleum & Spiritus* seorsim rectificentur super proprios cineres, sic multo gratius *Oleum* obtinetur.

N O T Æ.

1. *Aciditas salis Cois* compescit, & retinet salium volatilem ferociorem motum, & corpuscula terrestria aliquo modo figit, unde *Odor benignior* existit.

2. *Cineres* hi, è sale & ligni carbonibus confecti, optime depurationi interserviunt *Oleorum & Spirituum*, quoniam fluida salis particula hac mixtura, & calcinatione pereunt, unde fere ad fixitatem pervenire, sic non nimis volatilifant, ut mera alcalia, nec figunt, ut acida.

3. Si gratius odore, sapore, & colore expetatur,

Ffff 2 super

super sal mirabile Glauberi, vel spiritum salis cois, iterata fiat rectificatio; tunc enim pro maxima sui parte fatore spoliabitur.

Vires. Antisphriticum est & antipedagricum, nervorum affectibus frigidis succurrit. Dosis a gutt. ii. ad xii. in vehiculo convenienti.

Oleum Tartari foetidum, cum Spiritu Volatili.

℞. Tartari crudi ℥. iv. salis tartari ℥. j.

Mixta indantur retortæ vitreæ, & per arenam in recipiens capacissimum destillantur igne gradatim aucto ad summum usque, donec vapores albi cessent; refrigeratis omnibus Spiritus & Oleum separentur: Oleum super proprium sal reficetur, Spiritus in B. M. ad tertiæ partis abstractionem depuretur, in fundo cucurbitæ vel retortæ restat phlegma subacidum pauci valoris.

NOTÆ.

1. Sal Tartari, suo crudo Tartaro additur, ut interne volantes particule libentius in altum evolare queant vinculis suis acidis & terrestribus partim liberatæ, partim tenuissimis acidis balatibus imprægnatæ. Plurima insuper salia alcalia mediante vehiculo acido in sal volatile blandum aliqua ex parte muriaticum meteorizantur, ut apparet in plurimis experimentis, postea proponendis.

2. Sal Tartari fixum cum acido Tartari levem effervescentiam producens, duas ob causas hic requiritur: primo, ut fixum & stabilem in meatibus illis locum occupet, expulsi ibidem contentis fluidioribus particulis; secundo, ut illa fluida salia, mediante celerissima illa actione, in terrestria sulphurea corpuscula impetum facientia, plurimas secum rapere & liberare possint partes illorum poris convenientes. Hæc corpora sæpius in ipsa agitatione figurantur, per collisiones & concussiones mutuas proportionatam acquirunt, quam a solo propulsivo motu externo non assequerentur. Hinc spiritus subtilior producit, quoniam in omni actione effervescente vapores tenuissimi spirituosi producuntur ab interno motu exacuati.

3. Si Olea empyreumatica cum spiritu acido rectificentur, benigno odore & sapore valent, sed non absque virium jactura illud perferuat, nisi quis mitiora illa velit.

4. Eodem modo spiritus ille super proprium sal rectificandus venit, si subtilior expetatur. Restat autem phlegma subacidum, ubi per se rectificatur, ob causas superius allatas, & quidem præcipue, quoniam per effervescentiam plurimi spiritus illasi ascendere solent leviores acidi.

5. Inter omnia naturalia vel muriatica salia nullum datur, quod efficacius gustu & activitate sua, acidorum naturam referat, quam Tartarus: alia enim corpora aggreditur, metalla corrodit, salia volatilia figit &c. Destillationi autem Tartarus commissus multum de aciditate sua remittit contra aliorum muriaticorum salinum naturam, quæ potius in sua aciditate crescit, imo postea demum acidi naturam induunt, ut alumen, sulphur &c. Quanti igitur æstimanda sit Chymicorum aliquorum sententia dicentium: illud per destillationem eruitur, ergo nil aliud unquam adsuit in sua productione, omnes veræ Physicæ experimentales indagatores judicare poterunt. Salia enim ratione suæ permixta terra diversimode figurata agentia, iis particulis sese in principio accommodare debere, in poris nampe & meatibus earundem, ut unam referrent mixturam & corpus solidum. Hæc mixtio quoniam non ubique in omnibus corporibus exacta est, sed quædam corpuscula sua adhuc pristina figura dotata in majoribus interstitiis & meatibus latitantia

conspiciantur, ideo plane alium situm in collisione priori referunt, quem in posteriori, id est, ubi partes illæ per motum intestinum collisionum & præcipitationum fuerint intimius unitæ, nunquam aliquis reperiet. Experimenta insuper, a illud demonstrant, in omnibus Naturæ & Artis phænomenis per mutuum particularum concursum, figuram & situm partium mutantium, ut non opus sit illa hic latius proferre. Idem in Tartaro nostro contingit, cujus particula sulphurea hic illic dispersæ spatiola majora relinquit, id est, acida; verum, ubi motu vehementiori ejus partes rarefactæ mutuos poros & meatus subeunt, cuspidēs illorum salium a terrestri & salina Olei ibidem delicescentis figura hebetantur per intricacionem illarum particularum, quæ se mutuo involvunt & replent, unde minori aciditate instructus prodit spiritus. Augustioribus enim visuminiuntur illa salia, & terra onerantur, ut postea latius in sale volatili; hinc pro ratione mixturæ motus & terre salia fixa & volatilia è Tartaro eruantur, quod ut commodius demonstraretur sequentia duo de Tartaro experimenta trademus:

Vires. Articulorum doloribus, arthritidi & nervis frigore lasi summaspere conducit, sudores movet, obstructions tollit. Dosis Spiritus a ℥j. ad ℥j. Dosis Olei a gutta una ad guttas vi.

Spiritus Tartari Subtilior compositus.

℞. Tartari crudi Rhenani ℥ij. fecum vini express. ℥iv. sal. tartar ℥ss. calc. viv. ℥iv. alcohol vin. ℥ij. M.
Digerantur simul in retortæ vitreæ, in fimo equico posita per 8. dies, dein per arenam destilla spiritum & oleum: spiritum super fæces ad albedinem calcinatas rectificabis, sic subtilissimus evadit; siquid salis volatilis ascendat, cum spiritu misceri debet.

NOTÆ.

1. In fœcibus delitescit Tartarus fluidus, quod hoc modo volatilisatur, & vires spiritus maximopere auge.

2. Lente procedas memento in destillatione; velox enim est spiritus, facile vitra distrumpens.

3. Calx viva additur, ut motus intestinus promoveatur, & aciditas plenarie tollatur, dein (quod obiter notandum) ut illa salia alcalia & subacida, intervenerint particularum terrestrium calcis, ab omnibus involucriis & impedimentis, tam acidis, quam ramosis &c. liberata, multo majori cum efficacia altum petant, & subtiliora evadant, ut in spiritu sal: ammon: & similibus cum calce destillatis patet.

4. Digestionum varietas h'c & ubique observanda venit: prout enim in omni fere motu exhalationis dantur partium tenuium, sic non minima alteratio ab hisce effluviis dependet, sese insinuantibus in ipsa corpora, digestivo calori objecta, unde hic, ubi salis volatilitas expetitur, finum equinum præponimus sale volatili gravidum, quod in motum redactum, & exceptum ceteras particulas exaltare potest.

Vires. Egregium est deoppilans, omnibus obstructionibus uteri &c. inserviens, sudores movet, promouet extractions metallicas: Dosis a gutt. x. ad xxx. in vehiculo.

Sal volatile Tartari.

℞. Tartari Rhenani ℥v.

Pulverisetur grosso modo, humedetur aqua communi, & in umbra humidæ reservetur, donec putrescere incipiat nigricans factus Tartarus. Hunc mediante digestionem vase clauso in fimo equino ulterius exalta, addita parva quantitate Spiritus Vini per præcipitationem rectificati, donec spirituosum salinum redolet odorem. Limosum postea Tartarum destilla, primo leni igne, quam.

quamdiu phlegma altum petit, dein fortiori, ultimo fortissimo. Spiritum ab oleo per tritorium separatum misce cum proprio sale volatili, lateribus recipientis adherente, & sale fixo in fundo residuo, & destilla more, in salibus volatilibus describendo, sic acquies sal volatile penetrantissimum *Tartari*, usui in vitro optimè clauso reservandum.

NOTÆ

1. *Putrefactione* corpuscula salino-sulphurea magis referantur, ut impetum aeris recipiant, ejusque particulis adjuncta salia, terra ille leviori, tortuosa & conglobata figurâ præditæ, altius infixæ & in minutias summas redacta, volatilem & tenuem figuram acquirant: quæ postea levissimo igne, ubi à vinculis suis crassioribus liberata sunt, secernuntur.

2. Ut major salis volatilis copia obtrineatur, adde sensim in ipsa putrefactione & digestionem, Olei fetidi *Tartari* trigessimam, vel circiter partem. Sic copia angustiorum tubulorum salia magis imminuet, & intricabit.

Vires. Inter omnia salia volatilia palmam meretur, easdem tamen vires, sed paulo potentiores cum reliquis obtinet, nisi quod ratione sui sulphuris variet. Dosis à gr. v. ad xij.

Spiritus Aceti, seu Acetum Destillatum

℥. Aceti vini acerrimi q. v.

Destilletur per cucurbitam stanneam serpentinae ejusdem notæ annexam; primus, qui procedit, liquor cum sit phlegmaticus, seorsim excipiat, secundum liquorem reserva, cavendo tamen, ne ad siccitatem usque proliciatur; sic enim empyreumatico odore inficeretur; quantitas autem residua in cucurbita, debet esse circiter octava pars.

NOTÆ

1. Si minor copia liquoris abstrahatur, tantò minor metus adustionis; reliquus autem liquor per retortam vitream in arena positam ulterius evocari debet.

2. Cui deest cucurbita stannea, idem efficere potest per cucurbitam vitream alembico munitâ, cui serpentina stannea fuerit annexa; brevissimè enim hac methodo operatio perficitur. Vanus est metus de corrosione stanni; nam vix ac ne vix quidem aliquid deradit. Exemplum nuperrimi Scriptoris de vesica cuprea & serpentina, plane per unicam distillationem Aceti proforatis, phlegma merum fundentibus, inter miracula hodierna, aut nugæ aniles referri debet; quod facile norunt ii, qui crystallos viridis æris in magna copia conficiunt, Acetum hoc modo, ut sumtibus & labori parcat, sibi comparantes. Verum nullis suadeo, ut per instrumenta cuprea hæc agant, cum Venus sit meretrix & mari orta, omnibusque salibus sese facile copulans.

3. Liquor primus phlegmaticus est, quarta circiter pars liquoris primò egredientis; quoniam verò acido volatili scater, non planè inutilis est, sed & aliis operationibus inservire potest, ut saccharo Saturni conficiendo, & aquis sudoriferis inde destillandis.

4. Spiritus & fecibus residuis per retortam prolectus, est multo fortior, ideoque facilius dissolvit metalla, mineralia & similia.

5. Acetum illud destillatum salibus al. is imprægnari potest, & acuari, si super eadem cohobetur.

6. Residuum magna post omnem distillationem crystallulos præbet tartareas, quoniam Acetum ipsum non aliunde conflatur, nisi è particulis tartari, antea ramosis capsulis incarcerationis.

7. Hoc acore mortificato, spiritus denuo in lucem prodeunt inflammabiles, vinculis suis exuti & liberati, ut in sp. Saturni ardente &c. postea patebit.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Vires. Operationibus plerumq; Chymicis inservit, inasper sudores movet, & cum aliis mixtum liquorem præbet alexipharmacum, in febribus malignis magni usus. Insuper inservit mixturis ad faciliorem dissolutionem pulverum additorum. Dosis à ʒj. ad ʒss.

Acetum Philosophorum.

℥. Crystallorum Veneris ex arug. pp. ℥i. sulphur. vivi ʒvi. alum. ust. ʒiv. Alcohol. vin subtiliss. ʒiij.

Mixta digere in MB. per 2. dies, dein destilla lente ex arena; sic præcedit sp. Vini, subsequente spiritu Aceti fortissimo.

NOTÆ

1. Hic liquor est sp. Aceti, salibus acidis sulphuris & aluminis auctus.

2. Iterata distillatione à floribus sulphuris, in prima operatione ascendentibus, liberari debet.

3. Sp. Vini subtilissimus additur ad volatilisationem promovendam, qui removeri potest ante distillationem sp. acidi mediante MB., sic enim ascendit relicto acido fixiore.

4. Spiritus hic valde sulphureo odore nares afficit ob sulphuris halitum admixtum.

Vires. Menstruum hoc magni apud Chymicos estimatur in solutionibus & tincturis mineralium & metallorum.

Spiritus Nitri.

℥. Nitri purissimi ℥iv. Argille opt. exsiccata & pulverisata ℥i. viij.

Mixta infundantur cacabo ferreo, alembico terreo vitreato instructo, destillentur igne nudo in recipiente capacissimo, sic primò prodibit Spiritus volatilis intense ruber, secundò Spiritus albicans phlegmaticus, tertio Spiritus rubicundus instar sanguinis, cruor salamandrae dictus: Spiritus hosce, si lubet, seorsim excipe, vel destillatos rectifica.

NOTÆ

1. Loco argillæ bolus, alumen ustum, & caput mortuum vitrioli recipi possunt.

2. Sunt qui primò, non lutato recipiente, omnem avocant liquorem phlegmaticum, postea juncturis firmiter annexis, distillationem absolvunt: verum, quoniam hoc modo facilè quantitas aliqua spiritus perit, & liquores præcedentes volatiles & phlegmatici non planè sunt inutiles, ideo illam methodum rejicimus.

3. Eadem operatio per retortam fieri potest, verum cum fiat jactura retortæ, & sæpius illa frangatur, antequam distillatio fuerit peracta, substituiamus ferream ollam, quæ majorem Nitri destillandi copiam recipit; cui vero quantitas illa nimis magna est, in minoribus vasibus minori cum emolumento idem facere poterit. Mediante aqua omnis materia residua elixivari potest distillatione peracta.

4. Unde Nitris Spiritus rubicundo procedat vapore, plurima inter Authores est disceptatio; nos illius originem à moleculis per aerem dispersis in corpore salino exceptis, ibidemque retentis, ortum ducere autumamus. Moleculas autem illas ramosas esse naturæ, vel saltem ad ramosam accedentes naturam, plurima arguunt experimenta tam in productione naturalium, eorumque cohesionem, quam congerie earundem in nubibus excepta per fulgura & tonitrua dispendente. Negamus autem, particulas Nitrosas in aëre substantialiter contineri, sed illas tantum inter ra produci ab aliis salibus sequenti modo; Salis communis particulæ interventu aliorum corporum terrestrium à se invicem divisa, & quasi aperto ore hiantes, aërem circumfluum, plurima materia subtili radiorum solarium in moleculis illis latitantium, imprægnant.

Ffff 3

tuna

tum in maxima copia admittunt: unde sensim humido proprio adjuvante quasi intestinam expansionem & agitationem ineunt, sensimque illis particulis insufficienti quantitate assumptis, magis extensam & mobilem naturam adsciscunt, unde postea Nitrum. Hinc facile ratio patet diversitatis Nitri: quo enim subtiliores, & in majori copia moleculæ illæ ibidem in sale excipiuntur, ut motum & expansionem majorem illi præbere possint, eò subtilius, & purius Nitrum evadit. Non mitum igitur, quod in locis frigidioribus ob crassitatem illarum molecularum, & radiorum solarium debilem exceptionem vilius Nitrum prodit, quam in regionibus calidis; imò sæpius observatur, mediam tantum partem salis conversam in Nitrum. Nihil autem ad nos facit objectio, quod Nitroso quasi sale integri campi conspersi videantur maturinis horis, ut illud admitteremus, è solo aëre profectum superficiem terræ obduxisse, quoniam, ut in rare diximus, plurimæ insunt particulæ saline illis moleculis, ut & in genere omnibus corporibus ramosis; hæc facile inite possunt cum effluentibus particulis salinis terræ ibidem jam præexistentibus, consortium, ut Nitrosa exinde mixtura assurgat. Illud patet è productione illius; ea enim loca, quæ sale fixo vel volatili imprægnata sunt, tractu temporis aëreo mediante salino motu Nitrum in copia producant, ut latrinæ, animalium stabula &c. sic & è sale communi cum calce & urina calcinato & mixto, prodit sal Nitrum &c.

5. Spiritus hic, etiam particulis ramosis subtilissimis imbutus non deflagrat, nec, si junctus sit sulphurebus densioribus mineralium. Primo, ob tenuitatem suarum partium facile avolantium. Secundo, ob aquosas plurimas particulas, quæ quamvis conspiciantur in omni igne, præcipue è corporibus densioribus conflato, ubi tubulos illorum dilatat, ut recipiant aëris circumflui materiam subtilem, & sic rarefacta flammam evomant, quæ cessante aqua etiam desinit: ut patet in carbonibus fossilibus &c. attamen in salibus flammam evomant, quæ cessante aqua etiam desinit: ut patet in carbonibus fossilibus &c. attamen in salibus fluidis in majori copia existentes maxime sunt noxiæ; nam illorum salium aciem nimis diluunt & inflectunt, aut unionem & coactionem corporum, sibi invicem occurrentium, impediunt, Inflammabilitas autem ejus redit per salem fixum, quo mediante fluiditas ejus infringitur, & aqua, tanquam in capsulis illis rigidis reclusa, ventiformi valida explosione eliditur disjunctis earum particulis; ubi è contra in fluido spiritui particulæ aquosæ unitæ quasi vi sal sulphureum ambientes, illud suffocant & à flammâ cohibent.

Vires. Refrigerat, sitim lenit, bilis effervescentiam tollit, urinam & calculum promouet, febribus ardentibus medetur. Desis à gutta j. ad guttas iv. in super menstruum est sal famosum in Chymicis operationibus.

Spiritus Salis communis mediante Oleo Vitrioli.

℞. Salis communis ℥b. i. dissolvatur in ℥xx. Aqua, dein adde olei vitrioli rectificati ℥v.

Destillantur simul per arenam ad siccitatem usque spiritus exceptus dephlegmetur, vel iterato super recens sal commune destilletur, sic efficacior, & in majori quantitate prodit, quasi essentificatus.

NOTÆ.

1. Hic spiritus continuò augeri potest iteratis destillationibus super Sal commune solum mediante aqua communi.

2. Eodem etiam modo Spiritus Nitri, & Spiritus Salis, destillari potest: verum paucissimam spiritus flavescens copiam præbet.

3. Si sal commune decrepitatum misceatur cum

duabus vel tribus partibus colcotharis vitrioli spiritum edit continuò fumantem. Causam hujus effectus aliquis assignat anime nitri & salis communis, quam ego fateor me ignorare, ut pote salibus tale quid assignare non edoctus sum: pernotum autem mihi est, salia, tunc terra graviore & aqua potiori liberata, motus atheris facillime parere, & fugam tentare, qui motus retardatur, vel tollitur accessu aquæ; eodem modo ut ignis extinguatur per nimiam affusionem aquæ.

4. Oleum vitrioli particulis se insinuat terrestribus Salis communis, & effervescentiam blandam inde unde cæteræ fluida leviores salina particulæ sui juris factæ per expulsionem illam facile consortium ineunt cum aquoso vehiculo. Ab hoc nullo modo separari potest, nisi interventu corporum graviorum & terrestrium, quibus particulas in altum avolare sinant: unde restans corpus siccum terrestre salinum, motus vehementissimo objectum, salibus liberum egressum permittit sequenti methodo:

Spiritus Salis concentratus.

℞. Spiritus salis communis q. v.

Supersunde Lapidis Calaminari, coquantur leviter, ut calore mediante tanto citius particulæ saline saturantur; solutionem per sublimium clarificationem evapora ad siccitatem: pulverem hunc inde retorta, dein secundum artem destilla igne nudo, eodem nempe, qui pro oleo vitrioli requiritur, sic obtinebis spiritum fortissimum ob unctuositatem, seu potius ob proximitatem salium & terræ, non multum separatum à se invicem per aquam, oleum Salis dictum.

NOTÆ.

1. Sal commune facile princeps est salum; ex eo enim, tanquam ex fonte, cætera derivantur. Nam prout salia terram recipiunt & dimittunt, ut idem sæpius sal diversissima corpora successive admittat, coloremque, saporem, & odorem mutet, sic hoc Sal omnibus fere sufficit alterationibus, quod experimentis demonstrare facile esset, nempe, quomodo per mixturas & motus diversos, nitri, sulphuris vulgaris, salis volatilis, & fixi naturam induat; ita ut hoc modo ratione, summi usus generale Sal dici possit. Originem suam videtur assumpsisse è duplici materiâ salina, fixata nempe, concentrata, & irremota arenosæ vel rupes poris & meatibus, & è materia fluida sui adhuc juris existente, quæ duæ sibi invicem occurrentes, in mutuam amplexum ruunt, posteaque rentæ firmæ & rigide permanent. Materiam dari fixiorem, austriam & concentratam in terra, evincunt plurima experimenta, ut argilla variæ speciei, quæ præbent sal volatile mediante destillatione, arena masticata, quæ salsum aliquem blandum gustum lingue communicant &c. Materiam autem fluidam intelligo præcipuè halitus esse subterraneos acidos, qui ad exteriorem terram superficiem, ubi plurima salia fixata hærent, protrusi, illis uniuntur, ad externam vero faciem terra expulsa salia ulterius, mediante aëris motu, vario modo alterantur, ut in nitro dictum. Particulæ terrestres, quæ intermedia salibus hisce jaccere solent, plerumque sunt arenosæ vel lapideæ: Arenosæ replere videntur sal commune dictum, lapideæ particulas sal gemma subintrare probabile est.

2. Ab additamentis, in destillatione salium quorumcunque adhibitis, variant eorundem spiritum: sic non easdem vires obtinebit spiritus ille cum belæ, terra sigilla, argilla, colcothate & similibus destillatus, neque in eadem quantitate eructur. Sic & spiritus recentior destillati alias sæpius edent operationes interne assumpti, vel in operationibus Chymicis adhibiti, quam illi, qui per tempus aliquod non effuerint. Motus enim velocior recentibus spiritibus à mate-

NOTÆ.

materia subtili communicatus. illas partes *obmeritis* impingere facit in alia quavis *obvia* corpora, imo *abr. se* per illum *motum* tenuiores particulae, *temporis* tractu fugam tentantes evanescent, sale minus igni- uoso derelicto.

3. Eodem modo omnia acida concentrari possunt, si in *convenienti* terra minerali absorbeantur, postea- que evaporata destillentur, velum sæpius fugacissima evadunt.

Vires. Spiritus Salis vulgaris refrigerat, sitim extin- guit, urinam pellit, bilem compestat, & ardores mitigat. Dosis à guttis ij. ad guttas viij. Spiritus concentratus metallis solvendis inservit, aliisque usibus Chymicis.

Aqua Fortis.

℞. Nitri partem unam, vitrioli Goslarieusis partem unam semis.

Mixta infundantur ollæ ferreæ, alembicò terreò instructæ, cui rostrum latissimum adsit, recipiens terreum satis amplum ei annectatur, oblinantur omnia firmissimò lutò ex argillâ, arenâ & calce invicem optimè mixtis, fiat destillatio secundum artem, auctò sensim ignis gradu ad summum usque; recipiens au- tem continuo humedetur aqua frigida, ut eo magis vapores condensentur. Refrigeratis omnibus liquo- rem exceptum usui asserva.

NOTÆ.

1. Ut periculum præcaveatur nimis impetuosè pro- cedentis spiritus volatilis, rima in orificio recipientis circa connexionem rostri alembici permittatur, donec impetus maximus cesset, qua deinde obducta detur ignis vehementior tamdiu continuandus, donec reci- piens vas frigeat sponte, quod signum est deficienti- um vaporum.

2. Tantum spiritus obtinetur, quantum nitrum an- tea ponderavit; evehit nempe particulis suis aquosis nitrosa salia vitriolum, & mediante acido suo fixiori vincula salium fluidorum refert, præcipue, ubi cor- puscula graviora terrestria illorum salium mutuos meatus occludentia fluidis illis antea contentis lo- tum ulterius detegant, postea in altum vehementissi- mo illo motu liberata ascendant; eodem fere modo, ut salia fixa à compedibus suis liberare solent salia volatilia, tam alcalia quam acida.

3. Eadem Aqua Fortis, sed fortior, cum vitriolo calcinato obtineri potest, at in minori quantitate pro- licitur ob defectum phlegmatis vitrioli jam evapo- rati: sic & addito alumine ustò, non alumine crudo, obtineri potest. Differentia autem plurima inter has Aquas conspicitur, hisce additamentis diversis, præ- cipue circa colores & alia phenomena, quæ illis me- diantibus mensuris producuntur.

Vires. Menstruum sat famosum in Chymia existit præcipue in Metallurgia & Arte Tinctoria; insuper spi- ritus nitri vices supplere potest, cum parva inter hanc & illum sit differentia.

Ex hac Aqua Forti, Aqua Regia confici potest se- quenti methodo.

Aqua Regia cum & sine destillatione.

℞. Aqua fortis ℥i. sal. communis ℔b. ammoniaci unc. β.

Mixta destillentur in retorta vitrea per arenam, ad siccitatem usque. Sic prodit Aqua Regia, ali- quo modo semper fumans, ideoque rite in clauso vase reservari debet. Sine destillatione fit segg. modo.

℞. Aquæ fortis ℥iv. sal. ammoniac. ℥j.

Mixta solvantur invicem, & liquor flavescens à fœcibus decantatus usui reponatur.

1. Hæ præparationes & additamenta variant Aquam, ejusque actio, & ut plurimum qualitas im- mutata conspicitur; ita ut non extempore quis cre- dat, se eadem posse perficere mediante hac vel illa preparata Aqua; nam ab admixtis salibus & methoda procedendi, aliam qualitatem, & vim agendi illas Aquas suscepisse ubique operationes demonstrant. Ut brevi illud experimento demonstramus, sufficiat nobis Aquam destillatam Regiam examinasse, quæ cum sale communi è retorta propulsa fœces salinas nitrosas, imo nitrum inflammabile relinquit, signo verissimo, quod Aqua fortis nitrosa, sed non vitrio- lica, ut aliquis garrit, gaudens salibus adhæserit sa- lis communis particulis, easque totaliter fere immuta- rit, unde in altum elevata particula in spirituosam sa- lis communis naturam degeneravit.

2. Cum sale communi solo etiam destillatio fieri potest; additur autem salis ammoniaci parva quan- titas, ut eo magis imprægnetur & acutatur. Si vero destillatio sæpius repetatur ejusdem Aquæ super sal commune, sic planè in spiritum salis communis abit, fixato & non volatilizzato sulphure nitri, ut supra me- moratus vult. Hinc non mirum, quod sæpius Ty- rones & alii ad has rationes & circumstantias non at- tendentes, infelicem obtineant experimentorum suc- cessum circa varias operationes, ut in auro fulmi- nante & similibus, cum à defectu nitrosi salis jam im- mutati, ille oriri soleat, veluti postea demonstra- bimus.

3. Destillari etiam poterit fortissima Aqua Regia segg. modo:

℞. Vitrioli ad albed. calcinati ℥v. nitri salis com- muni an. ℥i. ammoniaci ℥b. aluminisusti ℥iij. M.

Destillentur igne nudo per cacabum ferreum, vel per retortam terream, accuratissime observatis ignis gradibus: nam in principio valde lente est proceden- dum, fugacissimus cum sit spiritus.

Vires. Dicitur Aqua Regia, & lavacrum minerale solis, quoniam præcipue pro sulphureis mineralibus, & auro solvendo inservit.

Quare autem Aqua Regia aurum, Aqua Fortis ar- gentum dissolvat, hæc mihi videtur esse ratio; quo- niam aurum poris angustioribus, irregularibus, & ma- gis intricatis, & superficie sat lævi constat, in cujus texturam non adeo facilis patet ingressus, unde instar juncorum inflectuntur particulae fluidæ. Compositæ autem particulae salinae mediante sua majori rigidi- tate unita quasi vi, fortiori cum impetu superficiem ledunt, & viciniam particularum deturbant. In ar- gento verò videtur esse alia dispositio pororum & meatuum, quæ salium longiorum & rigidiorum natu- ram respuunt; credibile est autem, in menstruo re- gio meatuum & interstitiorum esse majorem penuriam, ita, ut vix sufficiant particulis oblongis & planis ar- genti recipiendis & retinendis. Non minime etiam ponderis ratio est particularum terrestrium in diver- sis salibus varia textura & figura, quæ cum propor- tione non sint meatibus & tubulis corporis solvendi, ingressum ibidem nullum obtinere possunt salia terræ suæ artius unita. Ex hac mixtura enim salium diver- sitas inquirenda est, ut ubique fere in hoc Tracta- tu inculcavimus, & præcipue in differentia Aquæ hujus Regia. Ubi igitur immutata vel depressa sunt hæc aut illa corpuscula terrestria, experimentum successu fido infidove in campum prodit. Prout Aqua Regia sulphureis & ramosæ texturæ mineralibus & metallis convenit; sic Aqua Fortis nulla unctiosa vel ramosa attingit, sed illaesa in ea perstant, imo sæpius duriora evadunt ibidem detenta corpora, quam-

quamvis & præparari queat, ut illa ramosa discor-
pat & lædat.

Oleum Vitrioli.

7. *Vitrioli Anglici vel cujuscumque alijs Martia-
lis* Hviii.

Evaporetur ad siccitatem usque, donec levem fla-
vedinem acquirat, dein pulverisatum indatur retor-
tæ latissimi orificii superius descriptæ. Destilletur
per furnum reverberii, adhibito recipiente valde
capaci, sic spatio octo horarum obtinebis Olei Vi-
trioli uncias xxx. quod, si libet, rectificari po-
terit.

NOTÆ.

1. Si vitriolum non bene fuerit evaporatum, lente
procedas memento, quoniam facile disrumpuntur
vasa à phlegmate & spiritu volatili primò prodeuntib-
us; augetur etiam quantitas liquoris vel minuitur,
prout nimirum calx Vitrioli ritè fuerit præparata ex
halatione minori vel majori adhibita.

2. Orificium retortæ sit capax, & venter inferior
non minis altus; aliàs enim ob gravitatem & pondero-
sitate illius salis fluidi, multò longius requiritur tem-
pus ad destillationem peragendam.

3. Vitriolum Veneris multò minorem copiam olei
fundit, majorem spiritus, quod contrarium in Vitriolo
Martiali est. Quale autem sit illud Vitriolum, quod
ex lacte eburiato, aceto, muria, pomis, pyri que
construitur in Anglia, prout in sua vita Chymicus Ob-
servator, sibi & suis tantum sapiens, conscribavit,
me later. Forſan poma confissa, similibus acidiusculis
liquoribus conſperſa, in aère postea flavescentia, pro
Vitriolo alijs obtrudere conatus fuit.

4. Olea salinum sunt salia fluida concentrata, id est
maxima parte phlegmatis sui orbata, unde par-
ticulæ saline sibi invicem incumbentes, ponderosam,
& quasi unctuosam constituunt materiam. Hæc Olea
in spiritum facili modo reducuntur, si vehiculum aquo-
sum ipsis admisceatur mediante destillatione sequenti
methodo:

℞. Olei vitriol. ℥i. Aqua communis ℥iv.

Destillentur in arena per retortam vitream, sic
primò prodibit phlegma, secundò sp. in fundo sub-
sistebit Oleum grave, tertia vel quarta sui parte dimi-
nutum, sic repetitis destillationibus & affusionibus
eiusdem phlegmatis abstracti, omne Oleum in spiri-
tum converti poterit.

5. Oleum hoc plerumque flavum prodit, si verò
leviter rectificetur, rubrum evadit, omni verò abstra-
cto phlegmate & spiritu, limpidum relinquitur valde
ponderosum.

6. In rectificatione primò procedit spiritus volati-
lis valde sulphureus, qui exceptus & conjunctus salu vol-
atili, egregium præbet antepilepticum. E Vitriolo
Veneris gratior procedit spiritus, quam è Vitriolo
Martis.

7. Signum bene destillati Vitrioli est, si materia
remanens sit levissima & planè insipida, nullumque
sal in elixivatione dimittat.

8. Falsum est, quod plurimi ventilant, Vitriolum:
omni oleo & sale orbatum, denuo ab aère revivificari,
si enim hoc contingat, sit ratione salis residui in collo-
thare, quod aëris humido diluitur, atque foras propel-
litur: sic manifestum sal Vitriolicum antea latitans se-
se conspiciendum exhibet, alias, nil nisi sal leve nitro-
sum aëreum obtinetur.

Vires. Oleum hoc est causticum, dissolvendis metal-
lis, usque in Vitriolum reducendis aptum, ut & ad sul-
phura mineralium, quorum fluidum est specificum,
extrahenda & producenda, ut postea in sulphure anti-
monii apparebit. Spiritus ejus refrigerat, bilis effe-
-

vescentiam compeſcit, urinam promovee. Dosis Spir-
tus à gutta una ad guttas v. Dosis Olei interea ad
guttam unam vel alteram in vehiculis.

Oleum Sulphuris per Campanam.

℥. Sulph. communis q. v.

Liquefiat in olla terrea vitreata, donec sponte
flammam concipiat, liquefactum suppone campanæ
vitreæ non nimis latæ secundum artem dispositæ,
cum recipiente vitreo, vel terreo vitreato: Ardeat,
donec totum deflagaverit Sulphur, interea aliquan-
do spatulâ ligneâ agitetur materia, ne crusta obdu-
cta flammam deneger, & in locum deflagati Sul-
phuris recens semper substituatur pulverisatum li-
quefactum, hoc tamdiu continuando, donec suffi-
ciens quantitas Olei vel Spiritus adsit.

NOTÆ.

1. Si bene fuerit disposita olla, & campana bona no-
ta obtinebis unciam semis, vel drachmas sex Olei
Sulphuris è libra una.

2. Pro diversa Sulphuris qualitate, differet etiam
quantitas Olei; sic è Suecico, quam ex alijs, majus
elicietur pondus ob vitriolicam ejus naturam, magis
salibus fluidis imprægnatam.

3. Si aëris ventilatio libera reliquatur, magis ar-
debit Sulphur; negato enim aëre suffocatur, & extin-
guitur flamma, ideoque eo modo campana colloce-
tur, ut aër libere ingrediatur, ita tamen, ut nullum
dispendium nimium procreetur halituum, unde in
loco quieto operatio fiat; alias enim cito pereunt
vapores, aëreo motu rapti, & non condensantur.

4. Pro diversitate campanæ quantitas & qualitas
Olei; sic è campana magna paucum, sed fortissimum
nigricans prodit Oleum; è vitris minoribus, in cam-
panæ modum inferius dissectis, in majori prodit
quantitate leviter flavescens; in campana nostra, An-
bo & roſtro prædita, prodit flavum, & in maxima
quantitate.

5. Nebulosa & pluviosa cæli temperies huic ope-
rationi conducit, & condensationem majorem hili-
rium efficit: sed Aërem illum humidum ad multò
majorem quantitatem Olei recipendam conferre,
experimentis non est consentaneum; quamvis salta
fluidæ particulæ plurimum phlegmæ ex aëre admittant,
nullum, vero, vel paucissimum sal. Itaque spiritum,
non Oleum, majori quantitate recipit Artifex, ut in
Oleo vitrioli in spiritum convertendo demonstra-
vimus.

6. Oleum hoc rectificari poterit eodem modo, ut
oleum vitrioli, in aquam, spiritum & oleum, & quod
etiam in vitrioli oleo observabile, cum proprio spi-
ritu oleum calorem summum concipit, sibi invicem si
denſo permisceantur, ut calx viva aqua affusione in
calorem redigitur: cujus ratio videtur dependere è
condensatione, vel reſeratione pororum & meatuum;
aëream materiam admittentium vel propellentium.
In plerisque suis viribus & actionibus videtur cum
oleo vitrioli convenire, ita ut vocari possit Oleum
vitrioli simplicius, quod particularum metallicarum
est expers, qua ratione tantum à se invicem dif-
ferunt.

7. Oleum illud acidum ibidem actu inclusum fuisse
particulis, seu capsulis ramosis, non verò produ-
ctum esse ab alia quacunque materia, demonstrant
ſequentia: Primo Sulphuris ipsius naturales actiones
circa metalla, & similia, quibus si pulvis inſperga-
tur, æruginem inducit, & circa colores varios in Arte
Tinctoria, ubi acidi vices sapius ſupplere ſolet; Se-
cundò idem demonstrat omne Sulphur artiſicioſum,
è mineralibus, vel alijs quibuſcunque ramosis con-
fectum; ſic ſit ex oleo vitrioli & antimonio Sulphur
inſtar Sulphuris communis, ut & ex oleo terebinthinae
& oleo

& oleo vitrioli, mutuo amplexu junctis. Idem & plurima alia experientia demonstrant; imò in omni inflammatione solido quoddam existeret acidum, modo, levius, modo, gravius, plurima, si non dicam, omnia experientia evincunt. Particulæ enim hæc fluida scindenti & acuta sua acie, tubulos irregulares, & meatus densiores ramosorum corporum dividunt, ut aëri ingressus ibidem pateat, expansionemque admittant in igne. Multum autem variant hæc acida, ideoque non in omnibus idem phenomenon conspicitur: quod igitur fixius & gravius est acidum, eo maior penetratio & copiosior deurbatio salium, antea contentorum; quo levius & volatilius, eo minor actio ejusdem, & tota sæpius intricatio observatur, deservita, corrugataque per præcipitationem parte potiori ramosa, ut in animalium & vegetabilium sulphureis cum acido jungendis particulis constabit.

Vires. Refrigerat, bilem compefcit, febribus ardentibus & siti convenit, urinas promovet. Dosis à gutta una ad guttas iv.

Ut magis fermento ventriculi nostri assimilentur acida, alias nimiam præcipitationem & coagulationem efficiant, menstrua temperata sibi excogitarunt Medici Chymici, quæ nec volatili nimis sulphure, nec acido corrosivo fixiori abundarent. Eodem modo igitur, ut salia ex acidis alcalia volatilia solida fiunt per continuam collisionem, & imminutionem suorum punctulorum in ramosis levioris textura particulis; sic, hæc acida ut reddantur fluida volatilia, fermentatum ardentem requirunt spiritum ramosum, ut leviozem subeat in particulis magis dilatatis, jam levissimo volatili acido instructis, immutationem. Nullus mirabitur luctam in hisce confusis liquoribus, nec statim recurrat ad acidi & alcali insufficienziam demonstrationem, si spirituum acidorum mutuas agitationes, & sudoriferas pugnas viderit, & æquæ lance perpenderit. Siquis autem terra porositatem, infinitis modis variegatam, tanquam causam proximam respexerit, in cujus angustiis materia ætherea vario modo sese exercet, per secessum vel ingressum aliorum homogeneorum vel heterogeneorum corpusculorum, illum non extra veritatis oleam spatium credo. Exempla autem sequentia duo sufficient:

Spiritus Nitri dulcis.

℞. Spiritus Nitri summè depurati ℥iv.

Alcohol Vini ℥viij.

Digerantur simul per sex dies, dein destillentur ad siccitatem, destillatus Spiritus ad usum reservetur.

NOTÆ.

1. Binis vel ternis destillationibus repetitis idem absoluitur breviori tempore, sed mediante hac maceratione exactior & blandior unio particularum fit, quæ postea levi destillatione facillè ulterius coalescunt & maturantur.

2. Quo subtiliores, & magis dephlegmati existunt spiritus, eo melior dulcificatio eorundem, quæ aquoso consorcio impeditur: eodem enim modo; ut ramosa nimia aqua perfusa ardere nequeunt, sic & menstruis vis agendi tollitur, ubi aqua debilitata sunt. Signum optimæ unionis spirituum est, si in primo concursu effervescentiam ineant sat calidam.

3. Hæc dulcificatio nihil aliud est, nisi exaltatio id est, attenuatio & subtilisatio acidi salis mediante spiritu vini, qui simul suis ramosis particulis aciem acidi salis infringere & involvere solet.

Vires. Liquor est temperatus, in febribus malignis summi usus ad ardores extinguendos, & fermentum ventriculi adjuvandum. Dosis à guttiij. ad gutt. viij.

Spiritus Salis Ammoniaci acidus dulcificatus.

℞. Salis Ammoniaci ℥iv.

Ol. Vitrioli ℥ib.

Sp. Vini rectific. ℥viij.

Mixta digerantur simul in fimo equino per 8. dies, dein destilla trinis cohobis: sic spiritus prodit penetrantissimus usui reservandus.

NOTÆ.

1. Digestio in fimo equino fit ad intimam unionem & exaltationem partium promovendam.

2. Sp. Vini rectificatum tantum recipias, ut phlegmate aliquali eo facilius ascendat, quoniam vehiculi loco inservit.

3. Eodem modo & sp. sal. dulcificari potest cum oleo vitrioli & sale communi.

4. Fit & Spiritus Salis Ammoniaci acidus: residua fœce post sublimationem florum lapidis hematitis, qui cum alcohol Vini misceatur ad edulcorandum.

Vires. Menstruum est egregium in extrahendis mineralibus &c. insuper penetrantior est, & majorum virium sp. salis communis.

Eodem modo omnia acida dulcificari queunt, imò & oleum vitrioli, quod hoc modo præparatum egregium existit refrigerans sat grati gustus.

Spiritus varii ex Pharmac. Bateana.

Spiritus Alkermes. ℞. Sp. Cinnam. Citri, Ceraf. n. Anthûs, an ℥iv. succ. chermesin ℥ij. m. per optimè, dein agantur per chart. empor. adde cum sacch. opt. ℥ij. Fol. Auri num. x. m. l. a. Sunt, qui addunt Sp. Ambra ℥ij. pro diutioribus. Vapores tetros discutit. Spiritus naturales, vitales, animales recreat. parturientibus subvenit, &c.

Spir. Aluminis. Qatur ex Oulfo per Omnid. ut 00 0-li. Dos. gut. 4. 5. 6. &c.

Spir. Alum. Dulcis. f. Sptum Ois aliquoties rectificando cum Sp. V. ut dulcis evadat. Diureticum est, calculum pellit, obstructions aperit, astus in febribus compefcit. Dos. gut. 4. 5. &c. pro vice.

Spir. Ambra. ℞. Ambra grisea ℥b. mosch. gr. xv. sacchar. cand. ℥j. m. f. Pulvis: cui affunde 4. ris cœlestis ℥iv. Digere (vase hermericè obturato) in fimo equino ad dies 20. aut 30. Dein filtra ad usum. D. gr. vi in Animi deliquio, &c.

Spir. Benzoini. ℞. Partium albar Benz opt. ℥j. Pyrceni ℥xvi. maneat simul in frig. sæpe agitando ad solutionem. Benz filtra ac serva. Si 7. lactis 4. es, & sicces, erit Magister. Benzoini. Bos. Spiritus a ℥j. ad iij. Magisterii à gr. ad 20. vires obinet Benzoini.

Spir. Camphora, fit Solvendo Camph. ℥j. in Pyrceni ℥viij. f. a. Dos. ℥b. ante parox. Teriaria Diaphoreticum in igne in febribus malignis. Anodynum est egregium, odontalgiam sedat, &c.

Spir. Ceraforum, f. ex Cerafis nig. cum nucleis opt. contus. & fermentatis f. a. Qando per Alembicum, & rectificando in MB. Cephalicus, & diureticus. hysterics & epilepticis prodest. flatibus & convulsionibus subvenit. Dos. ℥ij. ad ℥i. &c.

Spir. Cochlearia, f. ex Cochlear. hort. floresc. fermentata, vel non ferm. Qando per Alemb. cum suo refrigeratorio. Quod primò prodit serva per se pro Sptu Fierâ etiam potest ad hunc modum. ℞. Sp. V. legitime probat: tbbxru. cochlear. hort. rec. & floresc. qu. infarciri potest. Infunde per ℥xij. ac. 4. a ad medietatem. In hoc Sptu 4. ato macera de novo cochlear. rec. ut supra, iterumque 4. a ad medias. Ex hoc Sptu, & Resin. Scammon. vel zia. lap. (extrahendo Tincturam ac filtrando) parari potest Sp. Cochlear. purgans. Spleneticus ac diaphoreticus, fixos ac crudos humores, volatiles reddit, putredinque resistit. Hinc prof. usus in hypochondriacis & tartareis morbis, ac præcipue scorbuto. Dos. gut. 20. 30. vel ultra in liquore idoneo.

Spir. Coralliorum, fit Sem Corall. opt. purificat. Qando 4. & rectificando, Scorbuiticus est & lichenrip-ticus. Dos. gr. 5. ad 20. &c.

Spir.

Spir. Corn. Cervi succinatus. Qatur ex c.c. cum dimid. quant. Succini. Dos. gut. 5. ad 15. & c. Sudorificus est, diureticus, hystericus, Epilepticus, & c.

Spir. Dracunculi. ℞ Sp. Vini cong. i. Fol. dracunculi recent. quant. infarciri potest Digere per Dies iij & Quia la. Aquæ Glacæ adde sacc. opt. q.s. Dos. ℞iv. pro vice; miranda præstat in ignotis affectibus, sudorem provocando.

Spir. Embryonum. ℞. Capones num. 3. exemptâ pinguedine contrunde & incide: adde dactyl. ℥ij. uv. passar. ℥iij. melis. miv. angelic. majoran. chæ. fol. an. m. iij. sem. ocimi ℥ij. fœnic. angel. cort. limon. ana ℥iij. cort. citri, Rad. p. con. borrag. ana ℥iv. angel. ℥iij. croc. ℥v. Conf. flo. Borrag. caryoph. majoran. ana ℥iv. V. Hispan. ℥xxxij. Quia ad hiccitem cum hâc Quia. & Sp. Hormin. ℥ij. Quia Ceraf. n. Melis. ana. ℥iij. Borrag. ℥iv. & amygd. decort. ℥iij. f. Emulsio: cui adde Conf. flo. Pæon. ℥vj. Borrag. & Cuyoph. ana ℥iv. Florum violat. paralyf. tunica. ros. r. anth. calend. ana miv. Xyloal. ℥iij. Sant. citr. ℥iij. cinnam. ℥vij. Aromat. Rosat. ℥ij. Quia la. Fœminis datur quæ sapient. Abortum posse sunt magno emolumento, itemque gravidis ubi à subito errore, aut aliqua occasione extrinseca languescant, lipothymias & animi defectiones, ventrisque inflationes in his persanet: infirmum fortum roborat, uteri ligamenta firmat. Epilepsiam arceat, sanguificationi proficit, & c. Dos. coch. 2. 3. & c. pro re natâ.

Spir. Hormini comp. v. Aq. Horm. comp.

Spir. Hyssopi Verus. ℞. Hyssop. rec. floresc. q. v. contunde opt. & in vase quern. include, addendo Quia ont. repidiusculæ q. f. relinque sic ad fermentandum (Flor. cerevisiæ tantillo addito) Dies 10. vel 12. Deinde adde plus Quia ac Quia per Quia. Postea rectificata sæpe in MB. la. Eodem modo Quia potest Sp. Herb. aliar. Flor. & c. Pectoralis est insigniter.

Spir. Juniperi Verus. Qatur ex Baccis fermentat ut supra. Carminativus, diureticus, & stomachicus insignis est. Flatibus, renumque arenulis pellendis, mensibus morvendis, & sterilitati auferenda egregie proficiens.

Spir. Manna. Si Mannam Quia. Δ ex cucurbita habebis Spiritum insipidum sudorificum. Sudorificum insignie habetur in febribus tum pestilentibus, tum communibus, sudorem propellens admodum fetidum. Dos. ad coch. i.

Sir. Milipedum. Qatur omnino ut c. c. servando Sem Urinam potenter ciet. Omnes obstructions reserat. confert oculorum morbis, nec non Rachitidi. Specificus in surditate auribus inditus.

Spir. Niri. ℞. Quia p. ij. Quia p. i. m. ac Quia per Quia, donec cessant fumi apparere Diureticum præstantius vix inuenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in colica, pleurisi, febribus omnibus, præcipue malignis. Dos. ℞ij. ad ℞ij. & c.

Spir. Niri Bezoarticus. Qatur ex Sp. Quia rectif. & Butyr. ℞ij. ana ex Quia la. Inservire pr. Quia Bezoartico Minerali parando.

Spir. Niri dulcis. ℞. Sp. Quia rectif. p. i. Alco. V. p. ij. Digere ad unionem, ac Quia in Quia. bis cohobando f. a. Dos. ad ℞ij. in liquor. conven. Sudorem ciet, tollit obstructions colica, renum, pectoris, & c.

Spir. Regina Hungaria. v. Aq. Hungarica.

Spir. Rheados crapularius. ℞. ℥ij. papav. thæad. rec. ℥ij. sem. carvi ℥ij. nuc. m. ℥ij. Ambr. gr. f. gr. 4. Sp. V. ℥iv. macer. la. f. cola. Dos. ℞iv. hora sonni, vel mane post crapulam. Specificè Pleuritidi subvenit.

Spir. Salis Armoniaci. ℞. * p. i. Calcis vivæ p. ij. Quia. iij. Quia in Quia. la. Diureticus, diaphoreticus, incisivus, resistit putredini, optime valet in febribus. Dos. à gut. vi. ad xij. & c.

Spir. Sal. Arm. Tartarificatus. ℞. Quia Tartari, *, ana cum triplo Quia Quia la. Vires obinet omnes cum priori.

Sp. Sal. Arm. Succinatus. f. rectificando S. * ci supra Pulverem succini f. a.

Spir. Sal. Arm. Chalybeatus. f. ex Quia o Florum * ci. Quia tiator. Aëii exposito, Qando per Quia la. Dos. gut. 5. ad 15. & c. omnes obstructions tollit, menses & urinam provocat: Sudorificus etiam censetur.

Spir. Salis coagulatus. Misce Quia is Absinth. depurati. ℞i. cum Sp. Quia rectif. ℞iij. & coagula f. a. Diureticum est Mexicanamentum, & Specificum hydropicis, omnes aquosas humiditates & flatus, omnemque tartaream & viscosam materiam, unde calculus præcreatur, per urinam potenter expellens in Iliaca, Colica, febribus, ictericia, dysenteria, apoplexia, Podagra, & c. presentaneum est auxilium. Dos. gut. vi. ad xij. & c. v. Mynsicht.

Spir. Salis Martialis. Destillatur per Quia ex Sale gemmæ p. i. Quia p. ij. la. Dos. gut. 5. ad 25. Diureticus & la. de aperitivus.

Spir. Sambuci. Destillatur è Baccis ferment. uti Hyssopi, & c. Alexipharmacus, cardiacus, suavis, & uerinus Dos. coch. 1. 2. & c.

Spir. Sanguinis. Destilla Sang. juvenis sani putref. Quia in Arena & rectifica f. a. Maxime commendatur ad Epilepsiam radicatus tollendam, ad paralysem, apoplexiam, pulmonem ulceratum, & c. Dos. à gut. x. ad xxx. Quia tra per Quia sem integrum.

Spir. Saturni. Destillatur per Quia è sacchar. Saturni opt. purificato, rectificando f. a. Sudorificus est in Peste, melancholia hypoch. febribus ardentibus, Luc. Quia rec. & simil. Dos. gut. 2. 3.

Spir. pongiarum. Quia è Spongiis per Quia, & rectifica f. a. Lithonripticus est insignis.

Spir. Tabacca. Qatur ut succini ex Foliis siccis. Dos. ℞ij. ad ℞iij. & c. pro vomitorio

Spir. Theriacalis camphoratus. ℞. Theriac. Androm. ℞v. myrrh. opt. ℞x. ci oc. Anglic. ℞ij. camph. ℞ij. Al. coh. V. ℞x. Digere, ac Quia in MB. ter cohobando f. a. Quia gi. usus in morbis malignis ciet sudorem, & sputum vom. no. Dos. ℞ij. ad ℞ij. & c.

Spir. Veneris. Destillatur per Quia ex Quia Quia f. a. Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat ventriculum, cruditates emendat, uterum frigidum ca. facit, ejusque suffocationem sanat, menses movet, renum morbis succurrit. Dos. gut. 5. ad 10.

Spir. Vini Succinatus. ℞. Pulveris Succini ℞iv. Alcoh. V. ℞xii. Quia in MB. la. Cephalicus, & c.

Spir. Vini Tartarificatus. ℞. Quia Tartarum ℞iv. Quia cum Alc. V. ℥ij. in MB. Scorbaticus, & c.

Spir. Viperarum. Quia ex Viperis siccis, uti c. c. servando Sem. Summe est penetrans, putredinem arcens, in toto corpore obstructions reserat, febres omnes resolvit, etiam Quartan. Dos. gut. iv. ad x.

Spir. Virioli. Quia Quia calcinatum ex Quia. & separa Sp. à phlegmate f. a.

Spir. Virioli coagulatus. ℞. Quia is Acetosa ℞ij. Sp. Quia ℞iij. m. & coagula f. a. In roborando ventriculo, febribus, sili. inflammationibus, & c. Secretum est. Dos. quantum ferri potest, ut dentes stupidi non reddantur, in liquor. conven. v. Mynsicht.

Spir. Virioli Diaphoreticus. ℞. Quia is Tartaric. c. c. à ℞ij. Sp. Quia ℞vi. Quia per Quia ad siccit. Liquori Qato adde Sp. V. à & serva ad usum. Purificat sanguinem, abigitque scabiem ac pruritus, aperit obstructions, sudorem provocat in Peste, venenis, hydropse, ictericia, contractura, & c. Efficax quoque est in mundificandis pulmonibus. Dos. à ℞ij. ad ℞ij.

Spir. Virioli Martis. Qatur in Quia. ex Quia Quia calcinato. In obstructionsibus, chlorosi, Rachitide, & c. Dos. gut. 5. ad 15.

Spir. Virioli Philosophicus. Fit ex Aquâ in quam Butyr. ℞ij. projectum fuit, exhalando ad tertias, & rectificando

ficando f. a. *Cephalicus est, febrifugus & Ecphrasticus.*
Dof. gut. 5. ad 15.

Sp. Vitrioli Tartarifatus. ℥. & ad albed. calcinat.
p. ij. Tartari ad nigred. calcinat. p. i. m. & confperfa
Sptu V. Destilla ex Retorta, & rectificata f. a. Egregias
vires exhibet ad sudandum in omnibus internis ob-
structionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem,
ad mundificandam & lavigandam cutim. Dof. à ʒj. ad
ʒss. cum brodio, aut vino, per tres auras continuas, si
libet.

Spiritus varii ex Hadriano à MYNSICHT.

Spiritus Vini Cephalicus.

℥. Sem. fœniculi ʒij. rad. paonia debite collect. visci
quercini anacardi an. ʒj. bac. juniperi ʒvj. herb. ma-
gorana, melisse, origani, hyssopi, salvia an. m. j. flor.
stachad. Arab. lior. convall. rorismarini, primula veris,
lavendula an. p. ij.

Crassiuscule incisa & contusa infundantur in Spir.
Vini simpl. Lib. viij. & post debitam digestionem in Bal-
neo Mariæ destillentur, & in liquore destillato denuò in
funde :

Sem. coriand. prepar. sileris mont. paonia, carvi an.
ʒss. spec. diamosch. dulc. diambra an. ʒij. cardamom.
min. nuc. moschat. galang. min. caryophyllor. an. ʒij.
calami aramat. cubebæ macis an. ʒj. succini alb. prep.
lig. Aloës. flor. tunica rosar. an. ʒss.

Stent in infusione per 8. dies ; postea B. M. de-
stillat. & Spiritus ad usum reservetur, qui ad placitum
sacchari cand. albo edulcorari, & vel Ess. flor. Pæoniæ,
vel Tunicæ, vel Violatum vel Rosarum rub. vel
gran. chermes, aut aliis quam plurimis &c. variè tin-
gi potest.

Vires, Usus, Dosis. Magni est usus ad omnes fri-
 gidos capitis affectus, intra & extra adhibitus ; Item,
 ad tristes & timidos, & eos, qui de nocte loquun-
 tur : Non solum enim caput calefacit, siccit, con-
 fortat atque catarrhos frigidos absorbet ; verum etiam
 reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epi-
 lepsiam, Apoplexiam, Patalysin, convulsionem & tre-
 morem singulariter, tanquam insignem Medicinam com-
 mendare volui. *Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.*

Spiritus Vini Aromaticus.

℥. Alkermes. ʒj. rad. Ireos flor. rosarum rub. an.
ʒss. cassia lignea, core. citri, ligni Aloës, caryophyllor.
an. ʒij. cardamom. min. nuc. moschat. cubebæ, ma-
cis, zedoaria an. ʒj.

Pulverisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl.
Lib. vj. per octiduum ; aliquoties in die movendo ; postea
per alembicum destil. & Spiritus destillatus sacch. cand.
alb. f. q. edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis. In naturis frigidioribus & adultis
 COR confortat ; nec non pectus, Stomachum, Hepar &
 Splenem roborat. Renibus enim frigidis in expellendâ
 stesitate vires addit. *Dosis manè & serò ante somnum à*
Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

Spiritus Vini Odontalgicus.

℥. Ras. lig. guajaci ʒiv. rad. pyrethri ʒij. sem. fla-
phid. agria. Hyoscyami, core. granator. Gallar. Turc.
an. ʒiv. caryophyllorum, Zingiberis albi, piperis longi,
oliban. an. ʒss. flor. papaver. errat. opii thebaici, cam-
phora an. ʒij. herb. tabac. Indic. salvia acut. persicaria,
mentastri an. ʒj.

Contusa & mixta infundantur in Spiritus Vini simpl.
Lib. vj. stent per 14. dies in digestionem, postea B. M. di-
stillentur.

Vires, Usus, Dosis. Teneatur in ore ; deinde iterum
 expuatur, & reiteretur, si opus, præsentissimum est
 remedium : Omnes enim dentium dolores effica-
 cissimè sopit. Interdum etiam propter majorem delecta-
 tionem cum flor. papav. errat. prius tingere, & postea co-
 loratum Spiritum adusum reponere solemus.

Spiritus Vini Otagicus.

℥. Ovorum formicar. Nr. 100. amygdal. amar. ʒj.
rad. hellebori nigri raphani min. cyclaminis, cyperi rot.
an. ʒj. core. mali punici ʒvj. bac. lauri excori. juniperi
an. ʒss. sem. fœniculi, cymini, Anisi, carvi an. ʒij. pulp.
colocynthid. castorei veri an. ʒss. majorana, absinthii, sa-
bina, ruta an. ʒj.

Contusa & mixta infund. in Spiritus Vini opt. recti-
ficat. Lib. iv. & post debitam digestionem è B. M. inge-
niosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur ; Deinde
Spiritu abstracto adde millepedum vivorum q. f. & di-
gerantur adhuc randiu, donec aliquo modo spiritus tin-
gatur, postea filtra & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis. De hoc spiritu aliquot guttæ ma-
 nè vesperti. instillantur in aures, claudendo cotone mo-
 schato : sic surditatem & gravitatem Auditus tollit ; nec
 non contra tinnitum, sonitum, strepitum & sibilum,
 item obauditionem & fluctuationem, præstantissimum
 est medicamentum. Sed in his affectibus multum
 etiam præstat panis recens coctus minor, statim ex cli-
 bano sumptus, & crusta inferiore ablata, immissoque
 spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (interjecto circulo
 lineo crassiore ad evitandum partis exustionem) ut va-
 por ille intro recipi possit. Continuetur autem curatio
 hæc, donec malum cedat.

Spiritus Vini Acousticus.

℥. Ovorum formicarum, millepedum vivorum
an. xxxj. amygd. amar. ʒss. bac. lauri excori. juniperi,
sabina, an. ʒj. sem. cymini rad. cyperi rot. an. ʒj. lum-
bricor. ter. exsic. nicotiana, absinthii, an. ʒss. succi-
ni alb. prepar. castorei veri an. scr. j. croci Oriental.
scrup. ss.

Crassiuscule contusa infundantur Sp. Vini ʒxvi. dige-
rantur per octiduum, sæpè in die mov. postea filtrentur,
& spiritus tinctus usui servetur.

Vires, Usus, Dosis. Hic spiritus in gravi auditu &
 surditate ; nec non in tinnitu aurium etiam inveterato,
 secretus est. Usus ejus, ut guttæ aliquot auri instillantur
 mane Stomacho Jejuno, & vesperti ante cœnam, & dein-
 de bombace moschato auris obturetur.

Spiritus Vini Pectoralis.

℥. Passular. min. sem. Anisi an. ʒiv. loch. sani &
exp. de pino an. ʒij. suc. glycyrrhiz. ext. ʒss. conf. flor.
hyssopi, violarum, symphyti an. ʒj. cinamoni acut. ʒvj
spec. diarragacanth. frig. diatreos simpl. diarrhod. Abb.
ana ʒss. cardamomi min. croci Orient. macis ana ʒss.
herb. capil. Veneris, marrubii an ʒj. flor. malva arbor. rub.
farfara, salvia an ʒss

Contusa & mixta infundantur in Spiritus Vini simpl.
Lib. viij. Digerantur diebus octo ; postea in B. M. destil-
lentur, & spiritus abstractus sacchar. cand alb edulcore-
tur.

Vires, Usus, Dosis. Ad Catarrhos, Pectorisque
 ægitudines, Tussim Asthma antiquum & Anhelitum
 malum expertissimum, *Dosis à Cochl. j. ad Cochl.*
i j. Pectus enim ab humoribus crassis & Viscidis pur-
gar ; mundificat ; omnesque in eo opilationes aperit.

Spiritus Vini Juniperinus.

℥. Sp. Vini juniperi lib. ij. sacch. candi contus. lib. ss.

Misc

Misce in vase commodo; spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporentur, flammamque liquor subinde agitetur cultro vel spatula; donec saccharum sit solutum, coletur & appende in nodulo Croci Orient. Scr. ij. & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis. In Asthmate, difficili respiratione, Pectoris vitiis, Tussi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris, &c. bonum est medicamentum. Insuper urinam mover & calculo medetur; nec non ruptis; convulsis, & vulvæ strangulatui subvenit. Dosis à Coch. j. ad Coch. ij. pro una vice.

Spiritus Vini Stomachicus.

℞. Cinamomi elect. ℥iv. Galangæ min. sem. Anisi an. ℥ij Caryophyllorum Nuc. Moschat. an. ℥ij. Menta crispæ Rorismarini an. ℥ss. Calami aromat. Zinzib. alb. Rosar. rubr. an. ℥ij.

Crassiuscule contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Lib. viij. & post debitam digestionem B. M. destillentur; postea Spiritus evocatus, vel sacch. cand. alb. vel myvâ Cydoneorum edulcoretur.

Vires, Usus, Dosis. Valet propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digestionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad singultum, Nauseam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Erustationem acetosam, angustiam Anhelitus, frigidamq; complexionem cum humiditatibus superfluis, senibus etiam imprimis convenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conservat. Insuper visum & mentem in iis acuit. Oblivionem delet, & canitiem retardat. Dosis Coch. j. atque alterum.

Spiritus vini Nephriticus.

℞. Rad. Ononidis, alibæ an. ℥iij. cucumeris ℥ij. glycyrrhizæ rase, Asari an. ℥ss. sem. milii solis ℥iij. saxifrag. a. b. urtica rom. petroselin. raphani, Anisi, Rhabarb. elect. aristoloch. rot. galangæ min. cinamomi acut. macis, zingib. albi herb. equiseti an. ℥j. Cap. percar. pisc. judaici, spongie lyncis, test. limac. min. prap. an. ℥vj. cassia fistula, gran. alkekengi Bac. juniperi, Theriaca Venet. Sang. hircin. Oc. cancr. cristalli leporini an. ℥ss.

Pulverisata & mixta infundantur in Spir. Vini simpl. Mens. vj. vel s. q. stent in digestionem per 14. dies; postea in B. M. destillentur.

Vires, Usus, Dosis. Frangit lapidem & ad minuta scernit, quousque Renes & Vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet, & clarum mingat: Et quod plus est, ita curat & sabulosas hypostasas per urinam expellit, ut non amplius regeneretur. Insuper in Colica & suffocatione Matricis non est remedium ei simile. Humores enim diversos laxat & ventositates dissolvit. Dosis à Coch. ad ij. vel Coch. iij.

Spiritus Vini Lithonripticus.

℞. Rad. enula camp. pimpinella, petroselin. an. ℥j. lap. percar. pisc. Oc. cancri fluvi. sang. Hircini an. ℥vj. sem. dauci aquat. saxifragia alb. feniculi, Anisi, milii solis, urtica rom. genista, bac. juniperi, gran. alkekengi. an. ℥ss. spec. lithonript. diathamar. erion. Piper. an. ℥ij.

Contusa & mixta infundantur in Spir. Vini simpl. lib. iv. stent in digestionem per 14. dies; postea in B. M. destillentur pro usu.

Vires, Usus, Dosis. Calculos Renum & Vesicæ non solum confringit & comminuit; sed & lapides per urinam expellit. Dosis tum præservationis, tum curationis ratione, à Coch. j. ad Coch. ij. per se, vel cum aliis mixis.

Spiritus Vini Paralyticus.

℞. Lumbricor. terrest. exsic. Bac. juniperi, sem. erica an. ℥ij. rad. Angelica, pyretri, aronis an. ℥j. flor. lavendula, rorismarini, salvia acut. piperis long. alii rec. ana. ℥ss. mastichis elect. myrrha rub. succini citrin. euphorbi. castorei veri an. ℥iij.

Vires, Usus, Dosis. Cum hoc Spiritu tincto innungantur membra paralytica & arida [præmissis tamen universalibus] in coque panni lintei madefiant, & supponantur membris affectis, & brevi miram videbis operationem & felicem restitutionem.

Spiritus Vini Theriacalis.

℞. Theriac. Venetæ ℥iv. rad. Angel. enula camp. b. rundin. dictamn. alb. morsus Diaboli, Serpeniar. pimpinell. tormentill. valerian. zedoaria, sem. citri an. ℥j. ill. & somnium pulvis grossus, cui affunde sp. vini simpl. lib. viij. Digerantur per 14. dies: postea B. M. destilla & ad usum serva.

Vires, Usus, & Dosis. Ad præservandum à peste hic spiritus eximius est: appellatur etiam catholicus, quod ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eo capi cochlear, j. vel ij. in aurora per tres aut quatuor horas ante prandium: vel antequam quis à domo exeat & reiteratur ejus acceptio omni mane. Aërem corruptum in homine alterat, & spiritum vivificat. In evacuatione datur à Cochlear. ij ad iij. cum aq. cardui bened. vel de C. nostra &c. & per sudorem venenum copiosissime expellit.

S P L E N E T I C A.

Prius, quam progrediamur ulterius, dicendum est aliquid de magneticis remediis imprimis hepaticis & splenicis. In mentem venit, quod ad ardorem venticuli; seu sodam curandam in aulis quibusdam solemne est uti carlinâ scandente, post flores perfectum in semen fatilcente, quæ solo obtutu eandem curat.

Novimus nobilem eruditissimum, qui malo isto mirum quantum vexatus unâ hac vietus antidoto, cum insigni successu, nulla forsitan aliâ de causâ, quàm quod aspectu illo archæus moveatur fortius ad resistendum effervescentiæ illæ humorum acidiorum & biliosorum constringentium; unde & nobis audit die Sood. Dissol.

Sic etiam tinca & hepatis & splenis medendi communes laudes obtinet; in ictero quidem ista sine dubio agendi ratione, quod [1.] actuali frigidityte ardorem visceris temperet, à confluentibus humoribus ibidem pronatum; [2.] domito frigore & calore corporis jam excitato, poris magis laxatis ab humido conjuncto, facilius invicari humores subcutaneos biliosos, ut in aliud, quoque hoc corpus migrent; idque hinc cum successu non invalido, qualia exempla vidimus ipsi. Pertinent hæc de splene memorata à Cl. Deodato panib. lygiat. lib. prima, capite undecimo. part. 109. qui scribit Patavile observasse, tincam piscem, lienis tumori vivum alligatum, tumorem abstulisse, & eadem vehementia, ut citra ægrotantis periculum ob nimium, [ita loquitur portus] attractionem diutius detineri non potuerit. Sic & Martiol. præf. comm. in Diosc. scribit: hemionitidis contactu spleneticos sanatos scimus.

Ut symbolica viscera sunt quoad depurationem sanguinis hepar & lien; ita & symbolica & affinis remedia sunt hepatica & splenitica, non solum his visceribus, sed & pancreati, mesenterio, aliisque con-

τὸν χόλον contentis medentia. Cum verò splen maximè dispendet in corpore serum & ejus qualitates. hinc medicamenta splenetica dicta respiciunt impedimenta illa ipsa, quæ hic loci se offerunt, seu salia sylvestria, impura, & tartarea sanguinis

SPLENETICA ergo i. sunt, quæcumque motum sanguinis & ejus in solatorio hoc suo retardatum, tollunt; quatenus vincula extranea laxant & annihilant, seu humores acidos, ponticos, austeros excessivos, & sanguinis partes volatiles figentes corrigunt.

Faciunt id v. g. [1.] Aqueæ diluentia & temperantia, aqua fumaricæ, aperit. polychr. Rolf. decoct. aperit. Mel. fl. & fr. Ex simpl. becabunga, fl. bugl. borag. item serum lactis caprini, succi herbarum antiscorbuticarum modò his non abutamur, sir. de pomis, thermæ, acidulæ, unicum sæpè splenetorum remedium; hæc quidem, si interius adhuc mali consistat sævies, & æge. sit siccioris temperamenti, illæ quando ad exteriora, articulos, pedes, cutem magis impuritas vergit & æger est serosior paulò & habitior, modò cætera onsentiant.

Diluentia verò hæc ipsa, singulis quasi communia, maximè locum habent, quando simul humores serosi deficiunt, unde in deliriis & vigiliis melancholicorum eximie profunt.

(2.) Lenia aromatica & amara, ut, præter dicta sub hepaticis, rad. aspar. filic. ebulus, fumarica, cicutaria, fol. buxi, sem. fraxin. fl. genist. summit. & essent. pin. elix. propr. simpl. & antisc. Olé. MP. fear. extr. splen. bov. pulv. stom. Quercet. absinthiacæ, pulv. lactificans, ex aromatibus maximam partem & temperatis constans, tum aliis utilis hypochondriacis, tum in palpitatione cordis eorundem.

(3.) Alcalina fixa & volatilia; hæc quippe cum acido morbofo confidunt, idque domant & extingunt, fluxilitatem humoribus deficientem restituentia; ut plantæ antiscorbuticæ omnes, ipsam quoque alarum, & ex his parata, aqua hepar. nob. nostro mote parata, anima thibarbati vera, spir. cochleariæ cum spir. vini, & urinosus, Salis Tartari volat. spir. & ci. s. vinosus & oleosus varius, hic in cruditatibus & flatibus conjunctis, ille in deliriis summè proficiuus; vel ipsi potui largiter inditus, ut nescii quasi eundem hauriant, imò & exterius odoratus spiritus fixatos unice reñcit. Adolescents melancholicus, summo capitis dolore & anxietate laborans, ita, ut ad incantamentum malum referretur, levamen subiade sensit à sale ammoniacolixivio indito, excepto natibus odore Sic & ipse in palpitatione cordis, inprimis caryophyllatus, & syncope hypochondriacæ, præcipue verò in quartana, in iene ut plurimum radicans, summè prodest. Sic Tinctura Tartari eximia quoque est, & salia absinth. cent. min. junip non solum in febribus, sed & aliis calibus convenient.

4. Alcalina, terrea & resolventia, ex simplicibus lapid. corall. conch. præpar. lap. lazuli è plantis asplen. spicantha, scolopendr. Lapid. corall. cum vino bullitos tum alibi, tum in pleur. fur. Helmontius dilaudat, ubi dolori lienis statim se obvenisse scribit potu vini bulliti cum lapid. Cancer, unde intra paucos dies omnis dolor & ponderis moles evanuerint, pag. 323. Lapid. lazuli naturæ solaris, frustra vulgò incusatus summæ acrimoniæ & venenositatis, cum pulveribus purgantibus mixtus & per se in magisterio melancholicis egregiè subvenit. Unde instar regulæ esse potest, hypochondriacos & scorbuticos à præcipitantibus summum accipere remedium. Faciunt hæc cinnabarina, pulv. cachecticus major & minor, pulv. absorbens noster simplex & cum vitriolo martis, quocum spleneticiis sæpius subvenimus Imò si dicere volumus, quod res est tam decantata materia perlata nihil aliud esse vel agere videtur, quàm ejusmodi pulvis præcipitans ex lapid. Cancer.

Manger. Biblioth. Tom. II.

matre perl. & io diaph. factus. Sic & Tincturam corall. cum succ. citr. spir. lignor. mannat. ad confortandos hypochondriacos prodest.

(4.) Martialia meritò hypochondriacorum & scorbuticorum panacea sunt & dicuntur, [de quorum agendi modo jam diximus satis sub aperientibus,] inprimis solidâ formâ gaudentia, ut eroc. & Aatus, saccharinus, cum salinus &c. pulv. cach. Querc. simpl. & cinnabarinus, item Vitriolum Martis & tinct. Martis Oris vulgò dicta, quæ nihil aliud est, quàm essentia vitrioli ex misy in aère calcinato, & per se in pulverem fatiscente, cum aquâ ros. maj. extracta, sive sibi relicta, seu cum arc. tri in momento tincta. Laudari hæc potest quodque essentia vitriolata antiscorbutica, ex & i. & fl. & his * ci. & lium a. p. j. v. g. & & us cochl. 3vj. vel viii. extrahenda l. a.

Hæc verò unâ etiam serum exuperans corrigunt, unde profunt in obstructionibus viscerum, hypochondriorum; hydropis initio, cachexiâ, palpitatione cordis, scorbuto, melancholiâ hypochondriacâ, doloribus & tumoribus hypochondriorum, imò cum hypochondria sint fomes quasi omnium morborum, hæc ipsa quoque ad effectus capitis, nervorum aliosque externos ambitu suo latius patent & spectant, in paralyi scorbuticâ v. g. & aliis.

II. Splenetica feri statum volatiliorem seu acrimoniam & laxiviositatem respiciunt & tollunt, unde & loyus, ebullitio & rarefactio sanguinis major, dolores arthritici scorbutici vagi, sudores colligativi scorbutici, nocturni, vigilæ, inquietudines, pavores aliaque oriuntur. Singulis his frenum injiciunt tum communia, diluentia aquea, tum [1.] acidula, ut cremor & crystalli tartari, hep. rubr. spir. aper. Penot. rad. & herb. acetos. Tinctura aperitiva item mala citria. Uri enim qui diutius in navi vehunt in Indiam, ob maris effluvia uliginosa plerumque scorbutici fiunt; ita testatur experientia illos ipsos nautas, si accipiant mala citria, iterum convalescere, quatenus resistunt putredini, & salia morbosa terretia M. S. præcipitant.

Tum [2.] austerin/cula styptica, quæ fluorum sunt remedia. Ut enim in priori statu strictura adest humorum, fixitas spirituum, corpida omnia; ita hic laxitas, fluxilitas, mobilitas. Ille stimulo, hic freno indiget; felix, qui moderati singula ut decet, potest. Hinc & opiata optimè profunt spleneticiis, modò cum humectantibus, præcipitantibus, temperantibus dentur. Exemplo esse præter alia possunt mentes immodici, frequenter in scorbuticis occurrentes, nonnunquam quidem simul, quod de aliis quoque hæmo. thagis valet, ab obstructione viscerum, quatenus coangustatus sanguis denegato sufficienti spatio, exitum quasi necessarium, sæpius verò ob saltum rodentium lixiviosorum, vel cum acido mixerum copiam, item ob tonum viscerum, & hoc loco uteri, læsum, ubi, præter V. S. temperantia & & hæc ipsa profunt unice.

Facit hæc & spiritus & is. sive ex & lo & is destillatus, quod pretiosum est & minus utile, seu confectus solum per mixtionem & solutionem & li. Sic etiam hæc pertinet tinctura corall. cum tinct. & adit. Zvölff. mixta, roborans egregium. Læco von nitum cruentum, scorbuticis & spleneticiis sim. liarem.

(3.) Terrea quoque jam dicta hæc conferunt, & inter hæc Galeop is quoque. Saturnina planta, urtica ista, inquit Solenander consil. med. l. i. cons. 13. quæ in foliis maculam habet albicantem, à Plinio laminam vocata, à Bononiensibus milzadella dicitur; cuius virtus in obstructionibus & affectibus splenis probata est. Memini, mus la. limoderatorem hypochondriacum pulvere florum horum feliciter usum.

III. Splenetica respiciunt & tollunt recrementa pituitosa, tacta, ea, limosa, sero im. nersa, & facile in sabu-

lum coenofura, arenulas ac calculum ipsum fufcentia; quod ipsum præstant aperientia generosiora, & (1.) quidem *acida*, potentissima tartari concreti & coagulabilis remedia. Inprimis verò laudatissimus est hoc nomen *usalis*, & ex eo parata tinctura aperitiva *Mæbii*, quæ nihil aliud est, quàm spiritus salis refractus & tinctus. Refractus sale tartari, spiritu salis φ ri vol. vitri pulveri, vel quocunque alio alcalino; tinctus tornâ solis; vel fl. viol. horumque tincturâ. Hæc famosissima erat & vivente B. *Mæbio*, & post fata illius, ut lucium, & famam auctori conciliaverit.

Operæ pretium est, ejus encomia ex literis ejusdem in concione funebri expresse, huc excerpta dare: in tinctura aperitiva est panacea hypochondriaca confortat fermentum stomachale, excitat appetitum, discutit flatum, aperit venas mesenterii & lacteas, pellit tartarum hypochondriorum, aperit lienem & obstructions hepatis, sistit sitim & calorem internum præternaturalem, pellit urinam, calculum, præservat à putredine, fovet calorem naturalem, (corrigeno cruditates;) cum fructu adhibetur contra hydropem cæchexiam, pallorem, icterum, colicam, febres &c. Quæ, si prudenter applicentur, longè sunt vetissima.

(2.) *Alcalina & enixa*, seu salia varia, inprimis etiam sal ammoniacum ejusque flores, & cum eodem paratus liquor martialis, è floribus martialibus nigrioribus viriolicis in fundo cucurbitæ post perfectam sublimationem reperiundis, per deliquium solutis, commodissime cum efflabunt, eff. lign. aloës in Tinct. φ ris absinthiacam & balsamicam, cum elix. propr. addito ol. caryophyllorum, cum M.S. antiscorbuticâ ex spiritu cochleariæ, φ ri & \ominus is striato, additis essentia anodynæ aliquot guttulis, aliisque miscendus.

Spectat huc etiam arcanum φ ri ritè elaboratum, & ex his parata, ut Tinct. φ ris, cum eodem liquore martiali extemplò in id providè instillato consurgens, imò aquæ quoque martiales. Hinc pro more seculi *Lang. l. 1. ep. 48.* præsentissimum indurati splenis remedium dicit aquam, in quâ ferrum candens extinctum.

(3.) *Aromatica*; ut enim spleneticici sunt sputatores & flatulenti, ita stomachica aromatica iis egregiè subveniunt, v.g. spir. menthæ, elix. \ominus li Myof. eff. carmin. & alia.

(4.) *Abstergentia, diuretica & nephritica* non solum calculo futuro contrahentia & arthritidi, ischiadi aliisque doloribus scorbuticis; verum etiam copiosos serosos humores & restagnantes avertentia, ut in hydrope, cæchexiâ.

Resolventia hæc & externè eximie conveniunt, v.g. ol. carm. Myof. φ ri fœt cappar. laterin. empl. de cicur. cerat. de ammoniaco Foresti, empl. ad quartanam ex odoriferis Helmont. empl. magneticum &c.

Et hæc ipsa non solum causam unam affectus hypochondriaci, nempe *degeneratio* chyli impeditam respiciunt, piquitatem ventriculi abundantem nimis expediunt, *μολυσμα*, seu interrem chyli massam corrigunt: Verum etiam alteram, depurationem sanguinis lætam restituunt, & ab urisq; deductos affectus tollunt, nominatim palpirationem cordis, syncopen, quartanam &c. Hinc & in arthriticis & nephriticis curandis hypochondria semper respicienda; optimaque sunt eo casu medicamenta salina, utrique convenientia, ut spir. \ominus tinct. φ ri, arc φ ri.

Egent verò & hæc suis cautelis, facile ex dictis fluentibus. 1. In genere *variani splenetica* pro vario & averso splenicorum statu. Non uno eodemque se habent spleneticici modo; ita enim generali & latiori vocis usu hypochondriaci & scorbutici audiunt. Pertinet huc communis & simplicissima scorbuti divisio, quod vel calidus sit vel frigidus; diversis uterque stiparus symptomatibus. Multum ergo intereet qui quibus urantur, & quæ medicamenta magis polychresta sunt, & singulis magis convenientia præ reliquis quoque esse splenetica constat.

Fluunt ex hoc generali asserto plura specialia, & quidem 2. *volatilia, iun salina*, iun *spirituosa* & a *maioribus* scorbutio frigido profunt, calido nocent. Nocent, quibus humores serosi sunt efferati, mobiles & exacerbati, unde vigilæ, inquietudines, *φλογώσεις*, anxietates motus spirituum turbatus omnia sursum deorsum moventur, & læssa essentia archæum. Plurimum interest, non irritare quietem hostem, nec crabrones irritare.

3. *Acida splenicorum remedia*. Non negamus acidum morbosum sæpè in his peccare, negamus verò in morbis ab acido oriundis acida non esse remedia. Conveniunt in eis fortia virtute in fixitate humorum, cum aromaticis inprimis. Profunt frigente, temperante & præcipitante naturâ, in rarefactione nimia, & inprimis in leni scorbuticorum hæmorrhagiâ, quo de egimus *Ann. III. Ephem. Germ. obs. 106.* Profunt in coagulo humorum tartareo corrigendo & resolvendo; idque omnia præstant cum insigni efficaciâ.

4. *Diluentia ut aperientia, ita & splenicorum inprimis actioni unice velifantur*. Eo nempe statu, ubi serum non abundat, vel restagnat, nam alioqui noxia potius fuerint, habita tamen ratione ventriculi, ne facile noxam & labem contrahat. Frigida quin imò sæpè præ calidis sunt convenientiora hinc maximè temperamenta sunt distinguenda & conjunctæ intemperies.

5. *Ut fixitate magis lien præ hepate peccare solet, sic & maiori volatilitate & altivitate medicamentorum gaudet*. Communia enim quidem & symbolica sunt utrorumque remedia, respectivè tamen lien major gradus aperiendi debetur, quàm hepati, quod bilis respectivè minus fixior sit naturâ suâ.

6. *Dulcia spleni minus amica*; neque enim quæ reliqua præstant, ipsa cum aliis habent communia, non fixitatem humorum corrigunt non volatilitatem & lixiviositatem, non limositatem & coagulum; quin omnibus potius cooperantur & producendis inserviunt, quàm avertendis. Hinc quæcunque dulcia sunt splenetica vel spleneticis gratiam conciliare debent, speciatim sunt notanda. Notabilis est radix polypodii, splenetica omnium concessione dulcis, sed temp. rata, præcipitans, terrea simul, unde mobilibus reddendis & extergendis fixis terreis humoribus inservit.

Alia verò saccharata & mellita minus hoc privilegio gaudent, unde tot sirupi aperitivi meritò castrandi sunt & imminuendi. Hinc egregio strategemate sirupi acetosi inter splenetica recensentur; ut abstergendi promptius exequantur munus acida verò mitigentur.

Hinc sit. de pomis, & sit. scelety. bicus Foresti habere quidem eximie locum, magis tamen secundariâ medendi provinciâ, quàm primariâ. Constat verò hic ex cochleariâ & becabungâ, illo quoque commodo, si secundum intentionem auctoris judicemus, ut volatile fixo temperetur. Hinc confectio alkermes licet splenetica vel maxime judicetur ob lapidem lazuli aliaque non tamen promiscuè inter lætificantia memoranda. Nocent verò præ reliquis, *φ* *deum*, quod fermentativâ vi non componant, sed potius exsuscitent fervidos, salios, acres humores, ad auctâ simul bile, quæ in omnibus melancholicis simul peccat; unde hysterica, epileptica, & similia symptomata inducuntur &c. *W E D E L I V S.*

Splenetica Specifica Andrea NOFFELII.

Essentia Martis Composita.

℞. Essent. φ ris præcedent. \mathfrak{z} ss. I R e nosl. corallior. \mathfrak{z} ij. essent. mosch. ambrat. \mathfrak{z} iv.

(Not. pro fœminis omittenda est essent. odorif. & in locum hujus essent. castorei substituenda) Misce. In melancholia epilepsia ureri, aliisque morbis chronicis hujus essentia virtutes sunt admirabiles. Dosis à \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} ss. & ultra, in vino vel aliquo liquore conducibili & appropriato.

Tinctum

Tinctura Tartari.

℞. *Cremoris Tartari albiss. & opt. pulver. 80 Tartari per deliquium fact. an. ℥ss.*

Misceantur ac leni calore in vitro vase iterum coagulentur. Ex hac massa, quæ prius super porphyrite læviganda est, extrahitur TRa. rubicundissima, beneficio aquæ temperat. q. l. quod tinctum est auferatur, & nova temperata affundatur, digestionem levi peracta, iterum quod tinctum defundatur, liquores tincti, per chartam emporeticam filtrantur, & abstrahantur ad tertiam partem usque; reliqua TRa Tartari asservetur in usum necessarium.

Præstans est in melancholia & affectione hypochondriaca, arthritide calculo, & retentione urinæ, omnes enim crassos & tartareos humores expellit, & in morbis chronicis & diuturnis febribus intermittentibus utilissima est medicina, in vino vel aqua destillata appropriata. Dosis est à ʒj. ad ʒss & ʒij.

Hanc TRa meriam Clar. Dn. D. Cnæssel extrahebat cum phlegmate Oli non solum pro usu interno, sed & externo, ad membra podagrica & dolentia illinenda, topicum ab auctore sæpius adhibitum & probatum.

Mistura Splenetica.

℞. TRa Tartari ʒij. mistur de tribus nost. ʒvj. cochlear. ʒ. v. conf. alkerin. ʒj.

Digerantur clauso vase per 24. horas. Colatura per chartam filtrata servetur usui. Dosis à ʒss. ad ʒj & ʒij. in liquore competente.

Mistura Splenetica alia D. D. C.

℞. Tartari, per lignum sassafras correct. ʒij. mixtur. de tribus ʒij. cochlear. ʒ. v. conf. alkerin. ʒj. essent. meliss. citri ana ʒij.

Mista omnia filtrantur, & in vitro cæâ optimè obturato servantur ad usum. Arcanum est in hydropse. Dos à ʒss. ad ʒj. in liquore idoneo.

Alia mistura Splenetica D D C.

pro Illustr. Dn. Subcamerario Regni Dn. Rilski.

℞. Tartari sassafr ʒij. ʒlis ʒij. ʒis ʒj. fraxini, cochlear. an. ʒij. conf. alkerin. ʒj. TRa sandal. q. s.

Misce omnia exactè digestionem per diem & noctem præmissa: Mistura per chartam filtrata servetur usui. Melancholicis mirificè subvenit: Dosis à ʒss. ad ʒj in vino vel aliis medicamentis & liquoribus destillatis.

Spiritus Tartari compositus.

℞. Tartari (per infus. ligni sassafras correcti) ʒj. TRa ʒtus aperit. nost. desc. ʒss. conf. alkerin. ʒj.

Mista stent per noctem [vitro bene clauso] in digestionem, postea filtrantur, & ad usum servantur.

Vires sunt incidendi, attenuandi, resolvendi. Hinc in arthritide, melancholia hypochondriaca, scorbuto, hydropse, aliisque lienis & menterij morbis & obstructionibus, convenit, sudorem & urinam promovet, & ab omni tartarea obstructione liberat.

Dosis à gutt. x. ad xv. & ʒj.

Balsamum Splenicum externum Dn. D. C.

℞. ʒo Tartari destillatione (& super lign. sassafras rectificat.) balsami ʒris, per ʒo juniperi fact. ana ʒij. ʒo cappar. express. (cun rad. anchusa tinctor.) ʒss. cum cerato sandalino q. s. Fiat balsam. consistentiæ consuet. cui adhuc admisceantur ʒo ligni sassafr. gutt. xvj. Duritiem & tumorem splenis à fluviosis humoribus & tartareis impuritatibus resolvit, si regio splenis bis in die inungatur.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. I L.

Hæmorrhoidalia.

Esi fluxus hæmorrhoidum multoties salutaris esse & multis gravissimis morbis hominem liberare & præservare soleat, ob eamque utilitatem non cohiberi debet, aliter tamen se res habet, ubi fluxus iste nimia frequentia & copia peccat. Quo malè cum S. Reg. Maj. Joh. CASIMIRVS, ob copiam & acrimoniam feculentæ sanguinis non raro, & aliquando sex vel septem septimanis, omni die vexata fuerit, fluxu vulgaris Medicorum remedia spernente; nih.ominus tandem adhibitis Cl. Dn. D. Cnæssel. lii. medicamentis S. M. sæpius curata fuit, qualia sunt sequentia.

Emulsio corallia Cl. D. D. C.

In fluxu immodico hæmorrhoidum, pro S. R. Maj.

℞. Decocti hordei, ʒj. spermatis ranar. destill. ana ʒij. sem. melonum & cucumer. ana ʒij. amygdal. dulc. excori. n. ʒij.

F. lartis emulsio simplex. Adde manus Christi coralliat. ʒss. corall. rub. cum sperniola in uccator. ʒij. ocul. ʒ. præpar. ʒj. M. F. Emulsio corallia.

Hanc Emulsionem S. Reg. Maj. per 10. dies continuavit, & ex solo usu hujus medicamenti convaleuit.

Emulsio styptica S. R. Maj.

In fluxu magno hæmorrhoidum, & menstruorum, cum metu dysentericiæ, ex præscriptione Cl. Dn. D. And. Cnæsselii.

℞. Decoct. hordei cum rad. serpent. si q. parati, ʒj. stil. spermatis ranarum ana ʒij. sem. papaveris albi & nigri ana ʒij. gland. imbutur num. j. amygd. dulc. excori. num. vj. F. Emulsio. Cui adhuc adde gelatinæ. C. C. ʒss. mix. cydoniæ ʒvj. magist. corall. buys. ʒj. cornu mineral. fossil. gran. xv. exir. nost. sedativi gr j. Misce. Semel hanc emulsionem S. R. Majestas eundo cubitum b. bit, unde fluxus uterque cessavit, ut Medico amplius auxilio non indigerit.

Oleum Hæmorrhoidale.

℞. Rad. scrophularia ʒij. chelidon ʒj. herb. linearia c. floribus m. ij. foli. hyoscyami flor. verbasci ana m. j. spongi. cynorrhod. num. iv. f. araborum pilular. num. xij. ʒo spermatis ranar. ʒss. lini in ʒe albificati ʒss. factâ maceratione adde succi cancerorum ʒij. Bulliant lento igne, ad consumptionem humiditatis, fiatque fortis expressio, insolentur adhuc per aliquot dies. Mirum in modum lenit pertinacem tumidum hæmorrhoidum dolore, si calidè applicetur.

Unguentum Hæmorrhoidale Dn. D. C.

℞. ʒo sperm. ranarum, hyoscyami, in quo rad. scrophularia lini cocta. lini, [in quo prius scarabei & procellones bullierim.] ana ʒvj.

Quibus infundantur usnea in ossibus humanis collecta, v. loco hujus musci in tegulis domorum invente. ʒss. ʒij.

Insolentur per mensem in vitro bene clauso, postea coquantur per mediam horam, oleum fortissima expressione separatim interim asservetur. Jam.

℞. Aceri anodyn. [ex ʒo flor. hyoscyami & verbasci, per infus. more consueti confecti] ʒss. lubargyri opt. pulverisati ʒss.

Stent in vase terreo vitreato, per octiduum, quotidie bis vel ter, spatula lignea agitando. Hoc facto:

℞. Hujus infusionis lubargyri q. s. & cum olei super asservati ana p. æqu.

Fiat unguentum, sub continua agitatione, nempe donec ambo concrecant in butyrum quasi viridissimum.

Ad hujus unguenti jam parati ʒij. adde axung. ursi Gggg 2 ʒj. pulv.

3j. pulv. sperniol. nost. 3ij. opii gr. ij. Misceantur pro S.R. Maj. in doloribus & tumoribus hæmorrhoidum.

thor est *Jonston. de quadruped. hist. nat. pag. 117.* Laudatur etiam.

Unguentum hæmorrhoidale aliud S.R. Maj. à Cl. Dn. D. Cnæffelio præscriptum.

℞. Butyri hæmorrhoid. præced. absque axungia usi & opio parati 3ij. rebis suilla seu porci 3vj. croci ʒiis nost. styptici, sacch. ʒni, sperm. ranar. nost. coagul. an. M. F. Unguentum. Memini etiam S.R. Maj. à gravissimo hæmorrhoidum fluxu quondam in Italia curatam fuisse, beneficio frustul. spongiæ in atramento (ex O. lo & galla parato) intinctæ, & in orificium consuetum intrusæ. Pro interno remedio præscripta fuit & infusio ligni lentisci, de qua ter in die bibit, scil. mane, à meridie & vespere, aliquando & in prandio, loco potus ordinarii. Ex relatione ipsius Reg. Majestatis Domini mei tunc temporis Clementissimi.

Mirabile remedium est illud, de quo *Francisc. Ossev. Grembs M. Doct. (in lib. 2. c. 1. § 5. n. 74. Arbor. scil. integr. & ruïnosa)* scribit, quod sudor morientium intra lintecolum collectus, & hæmorrhoidibus applicitus, fluxum sistat, quod remedium Archeum timidum reddit, qui ex natura sua mortem timet, ut propterea à furore remittat.

Pulvis externus hæmorrhoidalis niger.

℞. Spertiola simpl. nost. (ex oculis nigris præp.) cornu fossilis an. 3ʒ. 3ij. Onis crudi, ʒi ad rubed. calc. an. 3ij. gallar. immatur. pulver. ʒvj. M. F. pulvis. Usus ejus externus est, non solum in fluxu nimio hæmorrhoidum, sed & in quavis hæmorrhagia, maximè vulnere, si gossypio exceptus, osculis venarum stillentium imponatur.

Pulvis alius hæmorrhoidalis ruber.

℞. Cornu mineral. fossilis, & labiis adhaerescens. lacc. rub. globulos. pictorum, musci crustacei ossium human. ana 3ʒ. aluminis crudi spertiola sicca nost. ex ipsis ranis cum propr. sperm. parat. ana 3ij.

M. F. Pulvis. Eandem habet virtutem & usum cum præcedenti, nempe externum, etiam in desperatissimis hæmorrhagiis, cæteris remediis nihil juvantibus.

Pulvis hæmorrhoidalis internus, pro Illustr. Principe Raziivil.

℞. Corall. rub. præpar. unicornu mineralis seu fossilis, sperniol. sic. simpl. n. descript. ana 3ij. sedativi nost. citrati simpl. gr. iij. essent. ros. ver. odorif. gr. vj.

Misceantur in mortario lapideo, post dividantur in 6. æquales partes ad 6. chartas, in Emulsionem specifica seu aq. sperm. ranarum sumendas. Omnem hæmorrhagiam sistunt.

Amuleta in fluxu hæmorrhoidum.

Omnia illa amuleta quæ in hæmorrhagia narium & fluxu nimio menstruorum recensita sunt, & collo appenduntur, atque manibus tractantur, & hic locum habent.

Præ aliis à proprietate valet cingulum ex linteo urtica cruda (seu loco hujus cannabini) spermate ranarum insuccato. Item cingulum ex herba bursæ pastoris recent. collecta. Muliercula in Russia, ad hoc negotium muscum terrestrem clavatum C. B. [quem & ibi plicariam vocant] sibi eligunt. *Hermannus in prax. chim.* vult cingulum, ex foliis hellebori nigri conquassatis recentibus, nudo corpori circumdatum, quo ipsemet feliciter usus est. Pelle leonis, si ei infideatur, hæmorrhoidum dolores efficaciter leniri, au-

Annulus stellarus Helmontii.

Quem Clariss. Dn. D. Christianus à Paulitz. S. R. Majest. p. m. Medicus, amicus & collega meus clarissimus, ab Illustrissim. Principe van Eggenberg dono acceperat, & S. R. Maj. Johann. Casimiro p. m. (me præsentente) iterum obtulit, quæ R. Maj. annulum, exterius auro, absque igne ornari jussit, & per multos annos digito manus sinistrae gestavit. Annulus stellarus describitur ab *Helm. in libro de Lithiasi capite 2. & in tract. super verba, in herbis, verbis & lapidibus magna est virtus.*

Quod cæteris nihil juvantibus (inquit Author) figetur annulus, subito & in ipso spatio orationis Dominicæ omnes hæmorrhoides, tam cæcas, quam apertas, & illarum dolores, uti etiam matricis affectus sistere solet. Meminit & hujus annuli *Unzerus de epilepsia lib. 2. c. 13.*

Hæmorrhoides sunt (ut multi volunt) nonnullis hæreditariæ, præsertim apud Judæos, qui graviter iis infestantur; & si hoc, fortasse non male ad maledictionem divinam referunt, quippe qui clamaverunt, sanguis ejus super nos & filios nostros. Quod probare videtur *Psaltes*, dicens, quod percussit DEUS eos in posterioribus dorsii, opprobriumque illis dedit æternum.

SEPLENIVM, vid. *Scolopendrium.*

SPODIUM, vid. *Ebur*, sub titulo *Elephas.*

Spondylium.

Spondylium, Σφονδύλιον, dictum fortasse ob odoris gravitatem à sphondyle insecti genere odoris gravis. *Senna.* Marcellus Sphondylium à Spondylium in Spina dorsi, & phalangii ejusdem nominis forma dictum existimat: siquidem rotunditate, duo hæc inter se similia sunt, & ambo perviam cavitatem habent, qua muliebrium furorum verticillis similia sunt. Ego nullam hic similitudinem video.

Notæ hujus caracteristicæ sunt folia in hoc genere latissima, flores albi, cordati.

Nomina. Sphondylium *Ger.* vulgare *Park.* vulgare hirsutum C. B. Sphondylium quibusdam sive branca usina Germanica *ʒ. B.*

Radice nititur alba, simplicis, altè in terram descendente, Sapore dulci & nonnihil acri, medulla seu nervo inus grandi, lento & tenaci. *Jo. Bauhinus* Saporem fervidum & subamarum Linguam vellicantem ei attribuit. Folia à radice orta longis pediculis hirsutis insident, duabus pinnarum conjugationibus, composita, cum impari in extremo in tres lacinias profunde diviso: singulæ etiam alæ latæ sunt, laciniatæ, & per margines crevæ: folia autem brevi utrinque lanugine pubescunt, quæque in caule sunt, iis quæ à radice non multum dissimilia, origine latâ turgidâ caulem & ramulum è sinu suo egressum amplectuntur. Caulis simplex bicubitalis, teres, striatus, striis minus eminentibus quam in pastinaca, iatus concavus, villis rigidiusculis hirsutus, ab imo statim ramotus, foliis per intervalla longiora quam in pastinaca cinctus, è quorum pariter sinibus ramuli exeunt. Caulis ad internodia nonnihil reflectitur, secus quam in pastinaca latifolia. Flores in Umbellæ summos caules & ramulos terminantes digesti, albi, quam pastinacæ majores pentapetali peralis bifidis & velut cornutis. Nulla in hac exortum umbellæ totalis aut partialium circumstant foliola; semen foliaceum, palidius quam pastinacæ.

In hu-

In humidioribus pratis, pascuis & agrorum marginibus, & propè rivulos abunde oritur.

Quas Dioscorides & Plinius spondyllo vires ascribunt, non videntur huic plantæ convenire, unde merito ambigitur, an hæc sit verum & genuinum Antiquorum Spondilium, quamvis descriptio Spondilij apud Dioscoridem ei non ineptè quadret.

Radix, autore Trago, valet ad emolliendos & depressendos tumores, præsertim vero matricis, hepatis, & lienis, succum herbæ expressum unguentis emollientibus chirurgi admiscunt.

Fuchsius hujus radicem eandem habere cum Acanthi veri radice facultatem vult, nimirum exsiccatoriam & leviter incisoriā, ab Acanthi veri viribus longissimè distare placet Gesnerò : suffragatur. C. Hofmannus.

Schroderus quinque herbis emollientibus spondylum accenset, & usum præcipuum externum esse scribit clysteribus aliisque paregoricis quarumcunque formularum, & ut plurimum in cataplasmatibus.

Poloni & Lituani ex spondylii folijs & semine cum aqua addito fermento, potionem coquere feruntur, *Parst* dictam, quæ pauperibus sit loco cerevisiæ, si Dodonæus vera recenset semen hujus plantæ, ni fallor, quam pastinacæ sylvestris appellatione insigniunt, egregium est in hysterico paroxysmo D. Willis è Io. Anglico.

Gratus cibus sunt spondylii folia Cuniculis. *Rajus.*

S P O N G I A.

Quæ Latinis *Spongia* Græcis Σπώγγη dicitur: Etymologus autem sit appellari scribit *παρὰ τὸ πᾶν τὴν ὑγρὰν*, quod humorem attrahat & combibat : quæ veteres, Aristoteles & Plinius de vita, sensu, motu & contractione spontanea, esca & alimento spongiarum tradunt partim pro incertis & suspectis, partim pro falsis habeo. Quis enim credere potest eas conchis ac pisce alis? eo scilicet argumento, quod conchæ minutæ in eis reperiantur, quasi vero hæc animalcula non ultro irreperant in earum poros & foramina, seu ob tutelam sive ob escam; facile enim credimus conchas marinas spongas depasce, tantum abest ut spongiæ conchas. Quis intellectum etiam inesse putet, quia nimirum ubi avulsores sensere contractæ multo difficilius abstrahuntur, ego nullam ejusmodi vim eis inesse concesserim, confictam suspicor, quoniam spongiæ compressæ & in angustum coactæ ultro resiliunt & se dilatant vi quadam elastica, quâ multa præterea inanimata pollent.

Est ergo: ut rectè Imperatus) spongiarum natura fungis proxima, de vegetabilium marinorum natura fungis proxima, de vegetabilium marinorum genere, quarum substantia velut & lana compacta, fistulosa seu foraminata, & undique mucagine quadam membranea vestita, vivunt spongiæ, scopulis, testaceis & arenæ radice sua affixæ, avulsæ à sua radice repullulant & ut aliæ plantæ recrescunt, earum proprium est, facile constringi, & in pristinam amplitudinem dilatari: ad hæc humoris esse sitibundas, quem facile imbibant, & compresse remittant. *Rajus.*

E Spongia usta fit deterfivum pro dentibus mundificandis; imò pro bronchocele, seu struma curandâ si hîc cinis in vino propinetur, vel aliis admixtus sub formâ pulveris exhibeatur.

SPUMA MARIS,

Sive Alcyonum Officinarum.

J. B. Hujus frustum à se adservatum ita describit J. B. Duos pugnos crassitudine amplitudineque facile æquat, substantia, quâ superficie te-
Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

nus veluti cortice obtectum est, albicat, aliâ cinerea est, nonnunquam pulla, pro temporis (ut arbitror) ratione, crustosa, tota punctis cavis notata; cavernis pluribus inæqualis, interior facies spongiæ similis est, sed firmior, colore pullo, tota porosa; nam acicula vel modicæ pressi facile penetrat, pondus pumicis lapidis non adæquat; odor & sapor saluginosus.

Ex quo hæc scripsi invenio in Ephemerid. Germanicar. An. undecimo, observatio. xiv. novam sententiam D. Lucæ Schrockij de his corporibus, nimirum arundinis esse progeniem, & quidem foliorum ejusdem. Cujus rei fidem ei fecerunt pilæ ejusmodi quamplurimæ, ad eum allatæ, quæ intus plantam ipsam tanquam circumvolutionis principium & fundamentum continuerunt: reliqua vide loco citato. *Rajus.*

SPUMA ARGENTI, vid. *Lithargyrium.*

SPUMA NITRI, vid. *Aphronitrum.*

SPUTUM MOVENTIA, vid. *Pectoralia.*

SQUAMA METALLORUM, vid. *Metallica.*

S T A C H Y S.

Στάχys, Id est, Spica Græcis: ita dicta videtur quod flores in spicas dispositos profert: quod tamen plantæ hoc nomine insignitæ non convenit.

Differt à marrubio, cum quo verticillis densis & canitie sua convenit, magnitudine & statura: est enim elatior & erectior, foliis longioribus & acutioribus: primam speciem intellige, nam reliquæ ob analogiam & similitudinem quandam huc referuntur.

Plantam hanc verticillatis non spicatis annueramus, non obstante nominis significatione, quia nec verticilli proximè admoti sunt, nec folia iis supposita diversæ à reliquis figuræ. *Rajus.*

Creditur urinam ciere, imo menses in mulieribus movere, ac secundinam retentam pellere, hæc planta.

STACTE, vid. *Myrrha.*

S T A N N U M.

De ejus Minera vide capite de METALLIS. Hic de hîc metallò, variisque inde conficiendis præparationibus è Schrodero ab Hofmanno annotatò.

Stannum est Metallum molle, album, splendens cum livore quodam, constans ex ære puriore (in genere ignobiliorum,) molliore fugaciorque quam Metalla duriora, fixiore vero quam plumbum, & Sulphure albo minus maturo.

Dicitur Hermeticis Jupiter, quod Jovi macrocosmico sympathicè conveniat, & proinde Jovi microcosmico, id est, Epatis: nonnullis, plumbum. Germ. *Zin*, *Weißzey*, Etain, Plomb blanc. *Tim.*

Vires. Præterquam quod Epatis convenit, uteri morbis peculiariter quoque dicitur. Schroderus.

De Stanno. Hic Dnus Autor comparationem instituit cum mercurio hujus metalli & reliquorum duriorum mercuriis. Non tamen mihi persuaserim, illum mercurium vulgi voluisse intellectum, talem enim currentem scilicet reliqua duriora ac fixiora metalla non habent. Hoc verum est ex hîc ut & ex Jove mercurium currentem elici posse, adeò, ut quidam sint experti, nudâ coctione mercurium vivum ex jove prolicitum fuisse. Verùm radicitus ei non adhæsit, nec ad ipsius substantiam pertinuit, ut supra

humido liquefeat, filtra, coagula, solve, iterum erit coloris Smaragdini cum quadam dulcedine.

Vires. Oleum numeratur inter solventia metallorum, Sulph. & sal externis tantum usibus inserviunt, spiritus verò \mathcal{L} quem idè semper fumosum vocavi, quod in nullo vase abique effumatione sensibili possit contineri.) Gangrenas actu curat.

6. Crystalli \mathcal{L} ejusdem.

R. Superioris — *us fumantis ex \mathcal{L} instar aquæ claræ proliciti quantum videbitur, affunde per vices parum \mathcal{V} tincturæ salis Tartari impragnati, elevabuntur bulla cum strepitu & fumo, perge instillando, donec cesset tumultuatio, pone vas inter calidos Cineres, & fiet coagulum nigrum pitis instar, da ignem Δ ationis & surgent Crystalli albi fusiles veluti cera.*

Qui Ulcera scrophulosa cancrasq; curant inurendo profundam Escharam, quâ sublatâ, balsamo Sulphuris ad cicatricem produciuntur. Schröderus.

3. Destillatio. Hinc 1. Jupiter Diaphoreticus Beguini. Prout Dnus Autor ex Beguino tradidit, etiam optime succedit. Commodius tamen fit ex amalgamate Jovis Anglici & \mathcal{G} rij vivi ana pulverisatis & cum ana \mathcal{G} rij sublimati probè mixtis, & aëri humido ad tempus expositis, per retortam Δ ni Aren. mediocri destilletur, & indito in recipiens ∇ a. f. subquadruplo. Liqueorem cum gummiolâ quâdam particulâ residuo in retortâ affunde: totumque calefactum & probè agitatum simplicissimè tantum per chartam emporeticam duplicatam madidam filtra. Quod charta absorpsit, unâ. alterâve aquæ f. unicâ transcolata elue, & novæ retortæ hanc filtraturam inde, adjectâ pro singulis primitivorum ingredientium (\mathcal{G} rij vivi scilicet, sublimati & jovis) Nitri crudi semiunciâ, & omnem liquorem spiritui Nitri composito conformem ad extremam guttulam & totalem Nitri exhaustionem per Aren. Δ ne in fine forti destilla. Pulverem edulcorandum in fundo habebis. Dosis est à gr. viii. vel \mathcal{D} ß. Ex hoc præparatur etiam Sudorificum maximum P. J. Fabri volum. 3. Panchym. pag. m. 481. & 741.

Hujus etiam vires sunt mirificæ, bezoardicæ scilicet antifebriles, antipleuriticæ, anti-hystericæ &c. Ex eodem fonte promanat & antihecticum P. Poterij, quod conficitur ex \mathcal{G} rij & jovis ana agitatione in scorias redactis & cum Nitri triplo in candenti crucibulo detonatione. Hoc maximoperè etiam conducit in nimîâ hæmorrhagiâ, vomitu cruoris à mensibus restagnantibus & alijs uteri affectibus. Nitrum etiam illud cum jove fixatum egregiè refrigerat, dum sanguinis compefcit ebullitionem potui admixtum urgente calore febrili.

N. 2. Pulveris hujus origo potius \mathcal{G} rio adscribenda, quàm jovis. (Non desunt, qui ostendant, se observasse, licet reverà nullo modo fieri queat) \mathcal{G} rium vivum in auctiori pondere recuperatum fuisse in aliquibus præparationibus, cum primum uncia sex \mathcal{G} rij vivi præsto fuerint, postea in quantitate duplâ repertiisse. Verum multa sæpè pro autoritate mendacia finguntur. Sed quid lucri istis accedit? ut eis, cum vera etiam postea dicunt, fides non habeatur. Prædictus Jupiter diaphoreticus purus putus pulvis jovialis est, beneficio spirituum salinorum & Vitriolorum \mathcal{G} rij sublimati per retortam traductus & in aquâ præcipitatus, cum per fusionem iterum in Jovem abeat. Sicuti \mathcal{G} rij vitæ nihil de mercurio participat, sed etiam pars \mathcal{G} rij subtilior est: ita & hoc nil quicquam mercurialis partis sapit, sed puriores etiam partes ipsius Jovis sunt, ipsâ substantiâ mercuriali penitus exclusâ. Eò quod mercurius sublimatus suis corrosivis in ipsâ destillatione cum stanno privetur, ipsiq; hi spiritus stanno cõmunicentur, ut vivus iterum & currens factus mercurius in destillatione denuò se prodat ac conspiciatur.

N. Antecedentibus Bezoardicis Jovialibus & affine est seq. D. Bartholeni.

R. Regul. \mathcal{G} rij \mathcal{Z} iii. funde cum \mathcal{Z} ii Jovis Anglic. pulver. & misce cum duplici quantitate mercurii sublimati, inde in retortâ, & ex furno clauso elice butyrum s. a quod sæpius est rectificandum & postea cum sp. sal. com. figendum, qui tandem paulatim destillatione evocandus est ad materiam siccitatem. Hæc in acet. reverberari debet, quousque subcœrulea evadat, Δ nisque vim sustineat.

N. 3. Aqua residua spiritui vitrioli philosophico imprægnata.) Hic spiritus dictus Vitrioli philos. nihil Vitriolici obtinet, sed ex spiritus salis est prolapa, nil de \mathcal{G} rio participans, ut infra pluribus deducemus.

3. Gummi Joviale sublimatum & Oleum S. Cloff.) Hoc gummi gryleum ac prædurum salinus & vitriolicus etiam scetus est cum particulis tenerimis Jovialibus imprægnatus. Interim tamen non elevatur tota Jovis substantia, sed multum ejus in Cap. mort. residuum est, ex quo cum mercurio sublimato denuò addito idem repeti debet labor. Est medicamentum hystericum nobilissimum. Dosis est à gr. iii. ad \mathcal{D} ß. Prout & sequentia

4. Sulphur Jovis, s. sal Jovis altioris sunt indaginis. Unde apparet, quomodo una res diversimodè pro variâ partium exturâ arte factâ salium beneficio colorem & substantiam mutare possit. Notum est, solutionem Jovis calcinati sali Tartari deliquato commissam hoc est, si stannum calcinaveris, eique saltem Tartari liquefactum commiscueris, acquirere colorem cœruleum.

6 Crystalli Jovis.) Eodem modo & conficiuntur crystalli elegantissimi ex Jovis minera, Zinngrauen, pulver. \mathcal{H} rafful. sp. Vitrioli re&ific. \mathcal{H} ra. digere aliquandiu in MB Postea ∇ am comm. affunde, filtra, dum adhuc calent, & conciescent crystalli, humiditate aliquali abstractâ. Dos. gr. i. ad ii. in hydropè & affectibus scorbuticis. Item in fistulis desperatis internè & cum melle rosac. externè applicati maximè prosunt. Hofmannus.

IV. SUBLIMATIO.

\mathcal{L} . Calc. \mathcal{L} . (exempli gratia, per ∇) sublima per ollas cucurbita tubulata impositas, ad modum quo flores \mathcal{G} ij parantur. Namrum calx illa per vices injicitur, tubulique foramen ab injectione obturatur.

N. 1. Parum interest, an calcem vel limaturam \mathcal{L} is receperis.

N. 2. Flores hi nihil aliud sunt, quam \mathcal{L} depuratum.

V. EXTRACTIO.

Unde.

Tinctura Basiliana.

\mathcal{L} Laminas \mathcal{L} is, cementa cum punice (terna calcinatione restinctoria in Vino,) calcinato, subtilissimeque pulverisato, in Crucibulo bene lutato & clauso, & \mathcal{D} (s.) per gradus Δ . Deinde de radè pulverem de laminis, eique extrahe s. a. Tincturam cum \mathcal{X} . Postmodum abstrahe \mathcal{X} . & habes Tincturam \mathcal{L} is Tholdius. Schröderus.

Hic quæritur; unde Sulphur illud laminis adhærens. Utrum ex Jove, an aliunde? Nos dicimus ex flamma Δ nis, in quâ acidum quoddam ex carbonibus aut lignis delituit, quod Jovis laminis ejusmodi supposititum Sulphur apposuit, illud emeruisse. Hofmannus.

VI. SALIFICATIO.

Unde.

Sal Verum;

\mathcal{L} . Residuum ex quo beneficio \mathcal{X} Tinctura prior Basil. extracta est, affunde ∇ m mellis, stentque per aliquot \mathcal{D} Sic elicitur sal, quod abstracta postmodum Aquâ mellis, fit conspicuum. Tholdius.

Vires. Conducit ad Epilepsiam, Melancholiam;

Gggg 4 Ver.

Vertiginem: Catarrhos exiccat, præcipue qui ad oculos destillant.

Deſis ad Dj. vel Dii. Schroderus.

6. *Salificatio Unde ſal verum.*) Verum Jupiter per ſe ne micam quidem Salis obtinet, inde nec hoc Sal. com. verum Jovis eſt, ſed Acet. diſt. ſoboles jure dicitur. *Hofmannus.*

VII. MERCURIFICATIO.

Miſſa eſt mihi ξ ii ζ . Mompelio pro certiffimâ, quam in Cent. 1. Keſſeri artic. 22. poſtmodum reperi, ideoque eam non adſcripſi. Si quid ξ iis metallicis tribuendum eſt, hæc certè non erit momenti minimi, cum in ea Sulph. impurum comburatur cum Sal. nit. deinde pars ξ alis aſcendat per π ationem, quæ tandem putrefactione & ebullitione in gum currentem reducitur *S. Cloſſ. Schroderus.*

7. *Mercurificatio.*) Non ſuccedit hæc Mompelienſis deſcriptio à Keſſero Centur. 1. artic. 23. tradita, Vulcani examini expoſita: ſed quemadmodum ſuprà de Furno, & infrà de δ nio procedendum eſſe diximus in mercurii ſeparatione, ita & hoc loco in jovis mercurificatione ſimiliter faciendum eſſe ſtatuiſimus. Nec conſilium carebit ſucceſſu.

N. Modò laudatus Keſſerus ſingularem ∇ am inſipidam ex Jove olim præparavit contra vermes in primis. Scilicet calefactum Jovem aliquoties extinxit in ∇ â aliquâ ſpecificâ v. g. hyperici, ſcordii &c. ter vel quater, & ita pueris propinavit. Hancque virtutem puto à mercurio vulgi provenire, qui copioſus latet in Jove. *Hofmannus.*

STAPHISAGRIA:

$\Sigma\tau\alpha\phi\iota\varsigma\ \alpha\gamma\epsilon\iota\alpha$ à foliorum cum virigineis ſimilitudine nomen accepit, foliis & ſiliquis atque etiam viribus cum Aconitis convenit, flore cum Delphinio, ad quod etiam ſemine magis accedit quàm ad Aconitum. Latinis Pedicularis dicitur ab effectu.

Nomina. Staphis agria *I. B. C. B. Ger. Park.*

J. B. Park.

Hirtutum habet caulem, cubito altiore, in multos ramos diductum; in his folia longis hærentia pediculis, ampla, vitiginea, unde toti plantæ nomen comparatum, vel ricini magnitudine & diviſurâ digitata, piloſa, flores pediculis frequentibus, tum è foliorum ſinu, tum ex caulis ſtigio, tum ex ramis exeuntibus inſident, cœrulei è quinque foliolis hirtutis compoſiti, apicibus & ſtaminibus foliaceis medium tenentibus, Parkinsonus exactius flores conſolidæ regalis ſimiles ſcribit cum calcari pariter retroſum extenſo, ſed multo ampliores, colore obſcurè cœruleo, quibus ſuccedunt ſiliquæ tres quatuorve corniculatæ, ut in Aconitis, ſed majores in quibus ſemina magna, rugoſa, nigra, triangula, uvidæ facultatis vi guſtatu os incendunt, radix longa, lignoſa, annua.

Nāſcitur in opacis: in Iſtria (inquit Matthiolus) Dalmatia, Apulia & Calabria frequentiffimo proventu.

Vires. Vehementer calidam, acrem, & causticam habet facultatem: hinc pro maſticatorio habetur: purgat etiam, ſed cum metu ſtrangulationis, ideo deſiit ejus uſus. Pulvis capiti inſperſus pediculos enecat, aut cum oleo tritus & inunctus: quæ de ejus viribus habent veteres apud ipſos vide.

Semen ſtaphidis agriæ exhibitum à Gr. xij. ad Dj. ſuſum & deorſum purgat, ptyaliſmum excitat, unde egregiè juvat in lue venerea. Franc. de le Boe Sylvius Cap. de purgant, & ſalivant.

Idem lib. 1. C. 5. \S . 25. Staphidis agriæ ſemina quindecim ajunt, ſi trita cum hydromelite aſſumantur, potenter humores pituitoſos, glutinoſos per vomitum cum ſuffocationis periculo expellere. (Dod. Herb. Belg. lib. 12. Cap. 10. pag. 595.) ab illis nam-

que inflammantur fauces, ardorque ſummus in eis accenditur, eadem ſemina docent manſa pituitam ex capite allicere in os, unde facile patet eadem ſemina, ſi ex aqua multa decoquantur, & illo decocto os colluatur, poſſe levem ſic excitari ſalivationem, quæ forſan felicius ſit, ſi non ſimul & ſemel quindecim ſemina, ſed unum vel duo diebus pluribus exhiberentur, ſicque paulatim ſalivatio levis excitaretur. D. Soame excerptit & miſit. *Rajus.*

STERNUTATORIA, vid. *Pyramica* & *Errhina*.

STIBIUM, vid. *Antimonium*.

STOECHAS.

Stœchas (Arabiam intellige) ab Inſulis ejusdem nominis, ubi copioſe nāſcitur, cognomen accepit, teſte Dioſcoride l. 3. C. 32. & Plin. l. 28. C. 18. non tamen in iis duntaxat inſulis nāſcitur, ut ſcribit Plinius, ſed alibi etiam multis in locis.

Herbam quæ ſtœchas cirtina hodie vulgo dicitur, veterum Helichryſon eſſe Botanici peritiores exiſtimant, variè autem ſcribitur hæc vox, nimirum vel Helichryſus vel Heliochryſus, vel $\epsilon\lambda\epsilon\iota\chi\rho\upsilon\varsigma$ & vel Helejochryſus. Heliochryſus Plinio probari videtur, cum ſcribat, ſorem ad ſolis repercuſſum auræ lucis in modum dependere, quid autem paludi cum auro? inquit, C. Hofmannus.

Aliis chryſocome veterum putatur, quæ à comantibus auri fulgore corymbis (ut Plinius loqui amat) nomen accepit.

Notæ ejus characteriſticæ ſunt flores foliis marginalibus aridioribus & exſuccis, quæque coloris gratiam diu retineat ſiccata, cincti; folia oblonga, anguſta, caneſcentia, aut etiam tomentofa & incana.

STOECHAS ARABICA.

Stœchas ab inſulis ejusdem nominis è regione Maſſiliæ ubi nāſcitur cognomen accepit, teſte Dioſcoride l. 3. C. 23. Plin. l. 28. C. 12. verum Lobelius in Adv. Nobiles illas & rareſſimarum ſtirpium alumnas Stœchades inſulas huic cognomines, non ex adverto Maſſileæ, ut perperam ex Dioſcoride perſuaſum eſt (bidui namque itinere & litore indidem abſunt) ſed è regione Olbiæ, vulgo Hyeres, urbiculâ olim tam lauta quàm nobiliâ, qua etiamnum hodie inſulæ Stœchades nomen retinent non Maſſileæ; dicuntur namque Hyeres inſulæ.

Spicis habitioribus pilofiſ ſquamulis imbricatis, cum foliolis in earundem cacumine à lavendula differt.

Vires. Stœchas abſtergit, attenuat & aperit. Uſus præcipuus in affectibus capitis & nervorum, ſcil. in vertigine, apoplexia, paralyſi, lethargo, in morbis pectoris idem præſtat quod hyſſopus, inſuper urinam & menſes ciet, venenis reſiſtit, affectibus hypochondriacis ſuccurrit, extrinſecus in lotionibus capitis, ſuffitu, &c. Schrod.

In ejus virtutibus deſcribendis prolixuſ eſt Meſue, vide J. Bauhinum alioſque Botanicos. Syrupus ejus triplex in uſu eſt, ſimplex, compoſitus, & Fernelij: omnes cephalici habentur, & in nervoſarum partium frigidiſ affectibus felici cum ſucceſſu uſurpantur.

Meſue pituitam & atram bilem hanc herbam purgare ſcribit, ſed quia tardius & imbecillius operatur, ipſi addere jubet partem ſextam ſalis communis aut ſalis gemmæ, aut myrobalanum nigrum aut cepulam. Jubet inſuper biliſoſ ab ea abſtinere: ob quam ſonè cauſam inquit Caſp. Hofmannus deſiit eſſe in uſu.

Vires Stœchadis Germanicæ.

Hujus flores vino decocti & poti lumbricos ventris expellunt, quod Tragus experientia certum eſſe dicit; eodem modo ſumpti ſudores eliciunt.

Hujus

Hujus varietatem florum squamulis eleganter in modum prunæ ex aureo tutilantibus, in Cassubiæ sterilibus arëosis & apricis locis præsertim sublimioribus Julio & Angusto florentem, Septembri & Octobri semina perficientem, cætera præcedenti similem Chrysocomes Germanicæ, flore ignescente sive ex aureo tutilante proponit. Jac. Brey-nius.

Aliam insuper varietatem, flosculis longioribus & squamulis sanguinei coloris imbricatis, valdè raram ex iisdem montibus allatam addit.

Amaranti (sic enim appellat hanc herbam) flores, autore Trago, calidæ sunt naturæ, id quod & sapor & odor arguunt. Vino quidem decocti & poti lumbricos ventris expellunt, quod Tragus experientia certum esse didicit: eodem modo sumpti sudores eliciunt, quare hanc herbam obstructionibus hepatis, lienis, renum & vesicæ conferre existimat, in lixivio decocti si cum illo caput abluatur Capitis & porriginem expellit, pediculosque enecat. Vestibus appositi à tineis illas fuentur, aquâ decocti vaporantibus & fomentis induratum ac tumen-tem matricem emolliunt, flores nonnulli felici successu adversus morbum regium usurpantur. Brey-n.

Vires Stachadis Narbonensis.

Stœcadis hujus flores, ut & Italicæ iisdem viri- bus pollent quibus stœcadis Germanicæ. Attendamus Schroderum. Calf. & sic. Diuretici sunt & vulne- rarii. Usus præcipuus in obstructione urinæ, hepatis, lienis, mensium; Coagulum Sanguinem resolvunt, Catarrhos exsiccant, menses nimios sistunt, Lum- bricos fugant (vino decocti aut mâcerati & poti) Commendantur & in primis ad exiccandas defluxio- nes acres pulmonum, &c. extrinsecus faciunt ad emolliendam uteri duritiem (in balneo) Capitis de- fluxiones siccant & discutunt (suffitu) Matthiolus herbam totam cerebri morbis à frigido provenientibus, nempe pituitosis fluxionibus, diuturnis dolo- ribus, comitialibus, resolutis, & id genus alijs me- deri asserit, sive ejus decoctum in potu sumatur, sive in pulverem trita ex rhodomelle bibatur aut oxymelite, penes autorem fides esto: morbi illi ni- mis contumaces nobis videntur, quàm ut tam im- belli medicamento expugnentur. *Rujm.*

S T O M A C H I C A.

Ut ventriculi actio mediante calore nativo, & vitali fermento subacidulo, volatili & vitali, & his inserviente villorum robore imprimis perficitur; ita S T O M A C H I C A sunt in genere, quæ his velifi- cantur. Seu principaliter illa sunt & dicuntur stoma- chica, quæ evaporationem chyli promovent, & impedimenta quæcunque ejusdem tollunt. Res enim omnis eò redit, ut actio ventriculi adjuvetur, in hoc solo consistens principaliter, ut & *διὰ πύλιν* *εὐχρηστία*, evaporatio chyli probe fiat.

Cum ergò in officinâ hâc microcosmicâ opus sit (1.) calore, qui evocet & propellat, (2.) men- struo, quod si non solvat, solutionem tamen adju- vet; 3. robore villorum & fibrarum nervearum; hinc juxta hæc quasi capita etiam stomachicorum clas- ses diversæ sunt, licet symbolicæ.

Visque horum eximè probatur exinde, quod im- mediâtè huc ferantur medicamenta, atque hoc loco juvantia & nocentia primam explicant occasionem, unde & animam in ventriculo locat *Helmonius* sen- sitivam.

Stomachica ergò dum dicimus calorem restaura- re, omnia ea complectimur, quæ effecta caloris præ-

dicari possunt; nempe (1.) *tam necessariam évadu- plariv promovent*, ut partes alibiles utiles à recre- mentitiis colcocharinis separentur, adeoque.

(2.) *Motum chyli & chimi promovent*, ne in ven- triculo plus justè moretur, & gravitate suâ ac disten- sione molestias creet, & *μολυσσiv* patiatur, instar mas- sæ panis non fermentantis, ac aëralcentis.

(3.) *Cruditates expediunt & tollunt*, tum acidum, tum pituitosam cumprimis, ac nidorosam, tanquam effectus vitiatæ coctionis.

(4.) *Placant irritatos nerveos villos*, sive retine- re nequeat ventriculus præ debilitate cibos ingestos, sive ut extrudat tum ipsos, tum alia etiam utilia; tum dolentem partem ipsam in cardialgiâ.

(5.) *Evaporationem vitiosam avertunt, & probi- bent*, ne vel aquosa sola, vel alijs characteribus notata in flatus & fluxiones citentur, ut in ructibus, singultibus, salivatione præternaturali, &c.

Denique [6.] *omnia impedimenta remonent*, quæ- cunque turbare coctionem ex his fundamentis, quæcun- que affectus consurgant varij.

Utquè sulphur est matrix caloris, ita *ventriculâ calorem* unicè & principaliter principio hoc facta, balsamica, sulphurea, *promovent* & conservant; quatenus particulis suis volatilibus ignem vitalem adjuvant, ut focus splendidior coruscet, sanguine at- terioso & spiritibus roboratis.

Talia igitur cum latè pateant, sunt, [1.] *aroma- tica*. Aromata omnia sunt stomachica, seu ipsa *νόστιμα* talia, seu ad horum classem referenda vege- tabilia varia, & exin præparata, ut cinamomum, caryophylli, nux moschata, macis, lignum aloes; radices acori veri, galangæ, pimpinellæ, zedoariæ, caryophyllatæ, mentha omnis, cortices aurant. ci- tri, pulvis stomach. Quercetani, species aromati- zatæ, caryophyllat. ros. novell. diagalangæ, diaxy- loal. trageæ stomach. aqua menth. cinam. cum vino & cydoniata, essentia lign. aloes, elixir. propr. Hel- mont. extr. acori veri.

[2.] *Oleosa balsamica suavia, & resinosa blan- da*, ut ex nativis mastiche, ambra, balsamum de Peru, ladanum, unde ceratum de ledano Craton. & racamahaca externè profunt, & destillata, oleum macis, caryophyllorum, menthæ, cinamomi, nucis moschatæ expressum & destillatum.

[3.] *Spirituosa*, quæ sunt laudatissima stomachi- ca & cruditarum correctoria; hæc quippe evapora- bilia sunt quàm maxime, unde in momento sæpè gra- vitationem & anxietatem ventriculi tollunt. Hinc vinum, inter potus genera optimum, ventriculo admodum gratum est, & vix alia ratione melius lac senum au- dit, quàm quod debilem eorundem ventriculum ro- borat, & calidum innatum confortat. Hinc pro bru- torum genere aquam, pro humano vinum magis or- dinavit divinum numen, licet & ipsa sit nutritrix illis. Hinc in regionibus septentrionalibus, utpote frigi- dioribus, non solum cerevisiæ usus, quasi vini se- cundarij, verùm & spiritus vini frumentaceus & mul- sum inventum est, ad solandum & juvandum ca- lorem.

Pertinent huc vinorum varia genera, & spirituum ex hâc radice vel frumentis quoque tractorum, v. g. spiritus cochleariæ, menthæ, corticum citri, essentia menthæ. Hinc quod de spiritu vini in genere prædi- catur, quod nullum medicamentum nobile dici me- reatur, nisi quod cum spiritu vini optimo arctiori ne- xu sit nuptum, ut ad penitiores vasorum recessus pene- tret: id imprimis valet de stomachicis.

Notabileverò est, quod restauret Spirit. Vini quidem, ut & vinum ipsum, optimè calorem ventriculi & corporis totius, sed moderatè & proportionatè. Un- de tutior ejus usus frigida temperie præditis, iisque qui

qui flatibus & cruditatibus laborant, morbisque frigidis tentantur. In his cruda colluvies objicit pabulum, in quò accerima ac urens vis se frangit atque hebetat, abs quâ si esset, deprædaret vitale humidum, viscera accenderet, & nimia consuetudine exequias iret suæ virtutis admiratori ante mortem, verba sunt *Rolfincii Chim.* p. 186. longè verissima. Pertinet huc elixir stomach. Rolfinc. Mynsicht. Michael. & aliorum, elixir vitrioli.

(4.) *Carminativa*, ut præter dicta, semen coriandri, semina 4. carminat. Hæc enim omnia reverà talia sunt, quæ evaporationem vitiosam tollunt, unde flatus fiunt, & nativam promoveant. Inprimis verò ipsorum olea, ut oleum anisi, carvi, anethi, corticum aurantiorum, carminativ. in cardialgiâ, singultu, ructu optima.

(5.) *Nervina & cephalica* etiam sunt stomachica, ut rosamarinus, salvia, majorana, batonica, melissa, &c. inprimis verò castoreum, quod in cardialgiâ divinum est remedium, item in singultu ac ructibus. In viro laborante febrî singultuosâ cinnabarina, castorina, & opiata unice proderant: Pertinent huc etiam externa balsamica, suaviter archæum demulcentia & roborantia.

Ut verò flatus fiunt à calore debili, seu per se rali, seu respectu objectorum; Ita etiam carminativa & aromatica & spirituosâ aliæque roborant eundem duplici hoc respectu, seu debilis fuerit in se, in frigidioribus sensibus, seu per accidens, mediatè, in cruditatibus, vel respectu ciborum duriorum, piscium, pinguium.

(6.) Speciatim etiam ventriculi calorem tuentur leniter *adstringentia*, quatenus villos constringendo uniunt etiam magis spiritus & sanguinem, unde quæcunque ex laudatis simul sunt styptica seu adstrictorijis particulis cum alijs junctis gaudent, *καὶ ἐξ ὧν* sunt stomachica, ut inter externa emplastrum de crustâ panis, de baccis lauri, diaphanici.

Secundariò verò & adæquatè calorem restaurant, & suscitant salina, cum alterâ sequenti classi communi, v. g. (7.) *aëria*, volatili sale foeta, incidentia & detergentia pituitam, unaque rarefacientia, ut radix ari, pimpinellæ, piper, sinapi, zingiber, tum per se, tum refractè in zingibere in Indiâ condit.

(8.) *Amara*, ut summitates cent. min. abs. elixir propr. Paracell. unde tinctura proprietatis Mynsichti nata est essentia abs. simpl. & composita, qualis hæc esse potest, polychresta in ventriculi affectibus, cruditæ acidâ, pituitosâ & biliosâ, febribus item intermittentibus, flatibus & affectu hychondriaco: ꝯ. rad. galang. zedoar. summit. absinth. (per immersionem levem in aquam calidam correctarum,) a. ꝯi. acor. ver. ꝯvi. fl. centaur. min. ꝯß. cass. caryophyllat. lign. colubrin. amar. chin. de chin. a. ꝯiii. cort. aurant. citr. rhab. Alex. a. ꝯiii. macis, n. m. caryoph. a. ꝯi. ß. costi ver. schœnanth. a. ꝯi. M. Extrah. cum V rectif. vel appropriato acidulato ~u Olis; facile cum liquore ~li in Tincturam ~ absinthiacam redigenda, variato sic colore, virtute & sapore, danda ad gr. xx. xxx.

Calorem verò *excessivum* ventriculi, seu humores acres, salios, biliosos *deprimunt* communia magis rûm *aquea*, diluentia, emulsiones, tum *precipitantia* & absorbentia terrea, acida, austeriuscula, & ex parte nitrola, acido-salsa, non omisiss roborantibus, quæ ipsa verò partim communia sunt cum alterantibus universalibus, siquidem ventriculus per consensum calidiorem intemperiem præternaturaliter habeat, ut in febribus, partim etiam fermentum

tum corrigentibus specialius, de quò mox.

Profunt verò potissimum in siti, sedâ seu ardore ventriculi, & cardialgiâ cum aromatibus mixta.

Ita nempe semper sitis sedanda est, ne laxemus tonum ventriculi; ita præcipitandum, ne biliosum rosum sal negligamus. Hinc vidimus in cardialgiâ dysentericâ sæpius oil profuisse, quàm pulverem conch. præparat. cum oleo caryophyll. remixtum, quo ipso aliquos restituiamus ex vomo.

Non minus verò & *fermenti* seu *menstrui* potius ventriculi ratio habenda est, seu *iners* fuerit, & acuedum, seu *acrius* & obtundendum.

Acuunt menstruum iners deficiens *principaliter salina*, quæ ut (L.) *acris volatilia*, ut rad. ari, esjque fecula, pimpinellæ, raphan. rusticanus, sinapi, cochlearia & plantæ antiscorbuticæ aliæ, item zingiber, flores salis ammoniaci.

(2.) *Amara & aromatica*, mentha, absinthiaca, & reliqua jam dicta. (3. *Acida* liquida & solida, ut acetum, conserv. ros. ~lata, acerosæ, ~olis, ~li, ~is, ~is, hepaticum rubr. cremor & crystalli tartari, ~us ~li coagulatus, ~us ~lis vel ~li dulcis, elixir vitrioli.

Exterius & interius prodest fermentum panificum. Sanè & panis ipse, acidulâ & analepticâ suâ qualitate nutritive est eximium, & ita roborando fermentum, tum internè, tum externè officium facit, inprimis cum aromaticis, ac aceto ipso mixtus.

Fermenti hujus intuitu sine dubio factum est, quod pelliculæ seu tunicæ ventriculi quorundam volatilium etiam magni fiant à quamplurimis. Si tamen consideremus, minus esse evaporabiles illas ipsas, sed crassioris & frigidioris texturæ, tantam vim ipsis adscribere non addeceret, ad chylificationem læsam. Quicquid faciunt, magis præstant in demulcendâ acrimoniâ, præcipitando, absorbendo & roborando, unde novimus, à quibusdam pro specifico dysenterico, idque non sine causâ, haberi eadem, præcipuè ob concurrentem viscedinem, obtundentem lancinantes acres, acidos, biliosos, & his similes corrosivos humores; unâ verò tueri parietes membraneos apta nata sunt, unde & in vomitu sunt egregium remedium.

Ut verò perpetua est inter calorem & menstruum ventriculi symbolisatio; ita optimum est maritare hæc duo, ut indicationibus undique fiat satis. Et singulari providentiâ naturæ videtur factum, quod ab utrisque conjunctim ei satisfiat, quod ab alterutro expectari non poterat. Cum enim sulphurea calefaciant quidem, unâ verò appetitum obrundant; salia verò licet appetitum creant, tamen calorem non respiciant, sed disgregent potius, optimum est conjungere utraque, vel interpolare saltem, id quod ap primè faciunt absinthiaca &c.

Cum verò hinc inde etiam legatur scriptum ab autoribus, Absinth. v. g. aliaque id commatis facere quoque ad appetitum excitandum, seu stomachica esse, unde & lap. ~. & ~ absinth. acjuni; ingrediuntur pulverem stomach. Quercet. notandum est, id fieri mediatè magis & per accidens, quatenus alcalina hæc precipitantia, quæ alias in modicè utrapara destruunt appetitum, fixitatem acidam excedentem fermenti tollunt, unaque superfluitatem humorum corrigunt, quando fermentum aquosis humoribus magis est dilutum. Hinc conchæ præparata & cinnabarina quoque egregia stomachica sunt; & in humorum abundantia & acore corrupto appetitum aliquando cient.

Neque enim abundante in ventriculo acido vel appetitus æquâ stimulat, vel coctio probe perficitur, siquidem tunc obrunditur calor, & evolutio, evapora-

tio impeditur, quando nempe est fixius debito, unde gravitas potius ventriculi & cruditates fiunt.

Ut itaque dicamus de obtundentibus fermentum acrius, biliosum vel salinum, ut in lodâ, siti, erosione, fame caninâ & ubi humores acidi magis peccant, tenendum est ingenere, principaliter omnia illa id præstare, quæcunque salino-acidulis sunt contraria; adæquare, quæ calori, vel tono debilitando apta deprehenduntur.

Obtundunt pinguis, mucilaginea & oleosa; notum enim est ex chemicis, nullum esse jus acidis in pinguis, adeoque cum hæc minus subigantur ab iisdem, cum minus sint evaporabilia, cum multum nutrant & saturent, commendantur ab autoribus non immerito in bulimo & appetentiâ caninâ, ut butyrum, ol. oliv. lini &c.

Diluant aquea communia, serum lactis caprini, potus largior, inprimis aquarum nitrosarum, potiones, emulsiones, in siti unice expetita.

Invertunt lixiva, alcalia & alcalina, ut lap. \odot . creta, corallia; in cholera humidâ & siccâ optima. Cum verò præter hæc & alia id præstent, cautione tamen egeant, seorsim sub pervertentium & figentium titulo ea fuere tradita.

Nimirum tum per se in horum usu cautione opus est, tum quando adhibentur pro fermenti correctione, ut duæ exurgant hinc regulæ: *Quæcunque medicamenta, aliàs etiam bonâ vel optima, adhibeantur videndum est, quomodo se habeant erga ventriculum*, ne continuato usu actioni ejus naturalissimæ noceant ullo modo. Aliàs enim officiosè nocet medicus, hæc non attendens, vel penitius non noscens quid in recessu gerant. Sic dulcia optimè nutrant, & ventriculo sunt amicissima; Si tamen excedas eorum usu, v. g., ne de alimentis dicamus, portionibus dulcibus, sirupis, electuariis, loob, certius emoriatur vel insigniter lædatur appetitus.

Sic salina media, ut η \odot -tus, arcan. η ri, \sim \odot -l. coag. remedia sunt polychresta, aperitiva, diuretica, nephritica; frequentiori tamen usu ventriculo faciunt negotium, vel insensibiliter, ut ne id credas quidem, vel ipsi ægri primo intuitu.

Sic. speciatim nitrosa, lap. prunell. \odot η iat, arc. dupl. &c. ad sitim extinguendam, ad febres sunt generosissimum remedium, sunt etiam acido sale foeta, nihilominus cum tono non amica sint nec particulis adstrictoriis polleant, facile ventriculum exolvunt, ut & appetitus abeat & laxetur alvus, debilitato utrobique stomacho.

Sic Saturnina vel in ipsâ hæticâ commendantur quam maximè, inde tamen ventriculus noxam sentit, seu quod nimis adstringant, ut sacch. η ni, (nam & nimis adstringentibus læditur, lætâ evaporatione,) seu quod præcipitent nimis fermentum, seu quod ob metallicam suam naturam superent ejus virtutem, ut subigi nequeant. Imò & martialia, inprimis grossiora, ut croc. \odot c. Δ per fusionem paratus, eundem censum nonnunquam subeunt, ructus nidorulentos unâ excitando plurimos, ut Jovialium, lunarium non mentionem faciamus, licet singula optima sint medicamenta. Id verò observare magis in ijs licet, qui aliàs sunt quoad ventriculum & reliquum corpus sani, exceptâ unâ aliquâ parte, v. g. in pollutione nocturnâ vel gonorrhœâ simplici, vel virulentâ.

Sic spiritus salis ammoniaci ipse laudatissimum est medicamentum, est, quod de alijs urinosi volatilibus itidem valet, & superius jam tactum est, continuata usurpatione appetitum dejiciunt, & lassitudine torpida membra mactant magis, cum acidulum in recessu menstruum stomachicum absorbeant, & invertant, id quod & à fixioribus ipsis, lap. Cancrorum & pulveribus nephriticis continuatis, non raro ob-

tingit, uti l. 2. de sale vol. plant. pag. 88. seq. diximus.

Adeò & hic concludere licet, juxta Galenum, nullum esse tam generosum medicamentum, quod tam magnificè profit, quin aliquâ ex parte noceat, & semper attendendum esse ventriculum seorsim in morbis, & optimum sæpè esse medicamentum, juxta Hippocratem, medicamento non uti.

Altera regula est: *ita semper corrigendum esse fermentum seu menstruum, ne calorem vel tonum negligamus, ipsive noxam inferamus*; quod dictorum exemplo clarum fit, & de acidis & nitrosis inferius sub anaphrodisiacis dicitur latius. Et vice versâ, *ita semper calor alterandus & roborandus, ne ligemus fermentum*.

Utriusque exemplum præbent tum spirituosâ & sulphure vaporoso pollentia quævis, tum inprimis opiata. In genere enim arguere licet: *quæcunque sulphure magis fixa sunt, obtundunt appetitum*, quatenus ligant fermentum, ligant calorem, & vaporositatem suâ defectum suppleant.

Sic à croci usu appetitus minuitur, ob vaporem sulphuream vaporosam, unde vel ex hoc capite solenni conclusione publicandum esset, quod nos facimus, ne anaticâ proportionem in elixir propriet. Parac. recipiatur, quod ipsum tamen tantoperè etiam à vulgo ad appetitum cîendum laudatur, neque id de nihilo, cum piritam optimè extergat & domet facile oïle reddendum cum liquore \odot is, & roborandum guttullâ unâ vel alterâ olei caryophyllorum.

Sic fumus tabaci obtundit appetitum; Sic spiritus vini ipse id facit, unde non videas facile tabacibibulum multum comedere, vel qui manè & vespere spiritum vini frumentaceum, juniperinum &c. ordinariè haurit, appetitu solidorum ciborum decenti gaudere. Imò par ratio est absinthiacorum, quæ ipsa quoque incauto usu sopiunt appetitum, unde & ad apoplexiam inducendam aptum esse eorum abusum nonnulli rectè statuunt. In specie verò id competit opiatum, unde natura ipsa id innuit, quando his sollicitatur, vomitum excitans nonnunquam.

Laxitatem denique & tonum debilem villorum corrigunt tum nervina, roborantia v. gr. in singultu; tum *adstringentia* terrea, firmantia & orificium & parietes, seu fibras, unde in vomitu, cholera, diarrhœis proficua; imò & *acida*, modo citra excretionem urgentem talem flacciditas corrigenda sit, egregiè enim ventriculum corrugant.

Licet ergò seorsim horum non fiat recensio passim; reverà tamen, saltim in reliquis jam recensitis conjunctim, attendenda sunt, quin etiam seorsim in praxi, ubi laxitas præcipuè corrigenda fuerit. Sic ex dictis id præstant præcipuè tum *amara*, ut mentha, tum *aromatica*, ut cinam. nux moschata, tum *terrea*, ut corallia, unde præcipuè merentur laudem.

Valerit quoque de externo topico, usu, unde de his diximus, quænam huc quadrent magis, nempe acida, & aromatica, utraque ob penetrandi, roborandi & constringendi virtutem; Quæcunque verò topica, unguenta, emplastra, cataplasmata, sacculi ex talibus non constant, minus sunt æstimanda.

Hinc quoad rectum adhibendi modum i. in omnibus ad ventriculi robur attendendum est, quatenus semper adstrictio villorum tutanda est, nec ea admittenda solum, quæ ullo titulo roborant, parietes verò ventriculi & villos laxant; ut ex hoc fundamento, quænam sint potiora stomachica, unice sit decidendum.

2. Stomachicis calidis, minus ex toto resolabilibus, minus fidendum est; Quia nempe inæqualis fit & damnosa evaporatio, exemplo raphani rusticani, sinag.

finapios. Inde enim vel remaneat grossiores particulae & ventriculū gravant, vel irritant ventriculū ad vomitum; ex quo ipso etiam evaporationis chylousæ dogma magis stabiliri potest.

3. *Refrigerantia ventriculo & per se & respectivè nocent.* Per se, nisi indicentur, ac nimia quantitate; respectivè, relata ad calida: unde si præsumitur in ventriculo intemperies calida, cautè refrigerandum est, & quidem ita, ut tonus ejusdem non exolvatur.

4. *Ventriculus humectari desiderat, non laxari.* Humectant aquea in sitis ac humidi deficientis indicationibus quibuscunque; Laxant verò tepida, nauseam & vomitum cientia. Laxant pingua & oleosa omnia, meritò hinc moderanda. Hinc & cum oleo olivarum præparata acetaria longius ventriculo immorantur, tardius evaporant.

5. *In siccitate majori, cum acrimoniâ non, nisi demulcentia, vel saltem acriora & temperata conveniunt.* Quin & in reliquis spiritibus fortioribus cautè mercandum est. Observatum liquidem, eosdem & gravitate & corrosivitate nocuisse. Par ratio est succi citri, si quis dispositus in eo excedat: longè magis, verò mercurialium minùs benè præparatorum. Observabatur tale foramen in ventriculo nobilis juvenis, à solo intempestivo & inconstituto usu mercurialium, minùs etiam forsitan benè præparatorum.

6. *Topica stomachica quidem magis anticâ parte profunt & conveniunt; Posticâ tamen aliquando non rejicienda.* Priori loco magis patet accessus & penetratio; posteriori minus. In ipsdem verò nec deficientium, nec luxuriandum.

7. *Ita alterandus est ventriculus, ne contrarium p. n. status inducatur.* Modò enim noverimus alterandi intentionem, ejusdemque gradum & proportionem, faciliè in medio erit consistere.

8. *In adhibitione stomachicorum ita procedendum, ut juvemus sine latione consequente tum ipsius, tum aliorum.* Videndum ergò, an per se, an per consensum laboret; non calefaciendo nimis, & semper attendendo unâ hepar, ac bilem, ne dum acidum ventriculi juvare est intentio, bilem nimis infringamus, & inertem reddamus; vel vice versâ, ne dum acuere & roborare calorem est animus, bilem nimis acuamus, adeoque *ἀνίσταται* quandam inducamus.

9. *Absorbentia vacuo magis ventriculo danda, non repleto; Spirituosa verò & consimilia, à repletionē gravata, moderatè data concedi possunt.* Hinc alimenta medicamentosa non alio fine apponuntur mensis, quàm ut sint ciborum duriorum correctoria. Correctivum verò & h. l. semper minor esse debet dosis. Ita vidimus ab usu sinapios largiori, cum piscibus seu carpine assumpto, stomachum male habuisse, & longo tempore remansisse averlacionem piscium.

10. *Ita ventriculus medicamentis tractandus, ne coquere alimenta intermitat.* Crebrior usus medicamentorum ipsum lædit, alimentorum juvat, illa quippe diversa sunt, hæc similia. Plus caloris & menstrui impenditur sæpè in medicamento actuando, quàm alimento. Imò & à juvantibus ipsis nimia quantitate assumtis læssio in eundem redundat, & cordialibus, *Wedelius.*

STORAX, vid. *Styrax.*

STRAMONIUM.

Stramonij nota generica sunt flores ex oblongo tubo Calathoides; Conceptaculum seminis grande, in quatuor Loculamenta divisum, in plerisque speciebus spinosum, facultas virota.

Vires. Fructus ipse ac etiam tota planta soporiferæ sunt facultatis, nucem methel esse affirmant *Pharma-*

copœi & Phyci orientales, quia facultatibus præditus hujus sit fructus, quas nucis Methel Avicenna tribuit, eosdem effectus habere experientiâ comprobari testatur Dalechampius.

Stramonij semen in pulverem redactum & in potu exhibitum mentem turbat & alienat, insaniam quandam 24. horas durantem inducens, unde à furibus inditur in cibos eorum quos deprædari volunt, referente Gareto; Acofta autem impudicas mulieres illum 38. Pondere amassis suis ex vino aut alia qua magis aridæ materia præbere ait. Miser qui eum hausit diu velut mente alienatus remanet, aut videns aut ejulans aut dormiens, plerumque etiam alteri colloquens & respondens, ut interdum etiam sana mente esse credas, tamen si mentis non sit compos, neque eum agnoscat cum quo sermones confert, & colloquij habiti plane sit immemor postquam ad se redit: sunt vero nonnullæ adeo exercitatae in hoc medicamento exhibendo, idque sic temperare norunt, ut ad certas, easque quot velint horas, quibus id propinant mentem adimant, nonnulli tamen ad provocandas urinas ex medicis gentilibus utuntur. Horum prima cura est medicamenta vomitum cientia exhibere; deinde acres Clysteres injicere, fortisque ligaturas & fricationes brachij cruribusque; adhibere interdum etiam Cucurbitulas applicare; quæ si non juvant venam secare in majore pedis articulo necesse est.

Gentiles verò Medici & Christiani indigens cum Curcubitulis & venæ sectione abhorreant, nihil aliud quam vomitum provocant, fortisque Ligaturas & fricationes adhibent, quæ si non sufficiant, balnea ex aqua calida præscribunt ad eliciendum sudorem; porro à vomitu vinum propinant, cui piper & cinamomum admiscetur.

Radicis drachma ex vino pota somnum profundum inducit, in quo varia insomnia & mixta rerum facies obversantur.

Semina per noctem in aceto macerata, deinde extracta trita utiliter illinuntur herpeti miliari & Erythipatis serpentibus.

Unguentum ex succo foliorum cum adipe porcino paratum ad partem aliquam aut membrum corporis igne vel aqua fervente ustulatum sanandum efficacissimum esse remedium multorum experientia comprobatum est. *Rajus.*

STRATIOTES, vid. *Millefolium.*

STRUTTIUM seu STRUTIOCAMELUS.

Quæ de Ave hac à veteribus & neotericis traduntur videlicet apud Gelsærum & Aldrovandum.

Avium omnium maximus est; si unum fore Emen excipias, qui quamvis proceritate ei cedat, Corporis tamen mole ferè æqualis est. Certe D. Willughbi vel æquale vel majorem esse scribit, erecto collo ad alutudinem duarum ulnarum accedit, Plinius equis equo insidentis etiam altitudinem excedere scribit, quod sane intelligendum est, dum collum quantum potest erigat. Caput parvum, depressum seu platum, & (ut Aldrovandus rectè) anserinum rostrum quoque compressum est, & si corpori adæquas valde exiguum; figura triangularis, Coloris cornei, extremo nigricante, cutis ejus ad nares in semicirculum desinit, oris scissura ampla eo usque pertingit ut ejus anguli seu extrema oculis ipsis subjaceant oculi magni, tridibus avellaneis, Palpebras utrinque alutū solus ut homo obrinet, teste Plinio; quod an verum sit alijs examinandum relinquimus. Caput & collum ad pectus ferè nuda, ut & pedes ad genua (alijs hanc crurum partem femora appellant.) Caput & collum lanugine quadam seu pilis rarioribus platum vice obsita, partes subalares & pedes prius nudi, infima pars colli ubi plumæ incipiunt alba, alæ parvæ & ad volandum propius inutiles, in id à natura destinatae, ut currentem ex-

panis adjuvent, dorsi pennæ in mare nigerinae, in femina fune tantum sunt, ut lanæ quandam substantiam suâ molliæ efficiant. Alarum pennæ ejusdem Coloris, sed in superiori parte Candidissima. Cauda conferta, rotunda, non ut in aliis avibus in latum expansa, pennæ in mare subalbidis, in femina subfulcis, extremis albis, quæ ad cassides maximopere experuntur.

Collum & crura ei longissima sunt; postico digito & anticorum intimo prius caret, extimus 5. digitos longus est, alter octo; totius pedis ab extremo calcaneo Longitudo undecim erit digitorum longiorem digitorum squamæ magnæ disjunctæ num. 24. operiunt unguis ei magnus, validus, nigricans; extimus digitus unguis caret digiti autem ad primum usque articulum membrana crassa valida connectuntur, ferum, corium, gramen, panem, pilos aliaque quæcunque offeruntur promissuè devorat: ferrum tamen aliaque dura non concoquit, sed integra per Anum reddit, quem vidimus Bruxellis pane pilis mixto plerumque vesceretur. Africa nobis hanc Avem generat, tanta vero eorum copia in desertis quandoque conspicitur, ut procul intuentibus velut equitum quædam acies appareant. Reperiuntur etiam in Arabia, & in America quoque copiosissimi, verum diversi generis, ut paulo post patebit, ova parit maxima, ut pote capitis infantis magnitudine plus minus, 15. etiam libras pendentia, durissima & quasi lapideâ crustâ munita, quæ in arena condita, solis duntaxat calore foveantur, donec tandem ex his pulli educuntur, nam matrem ova deferere rei naturalis scriptores consentiunt.

Pennarum Struthionum plurimum usum ad conos & galeas Pileosque adornandos tum apud veteres olim fuisse, Plinio teste constat, tum apud nos etiamnum esse notissimum est: quin & ex iisdem non in Italia duntaxat, verum etiam in Anglia fieri solent ventralabra, quibus nobiliores matronæ æstivo tempore ventulum sibi parant. WILLUGHBEJUS. in Ornithologia.

OFFICIN. NAT. ex STRUTHIO. CAMELO.

1. Tunica ventriculi. 2. Adeps, 3. Ova.

Vires. 1. Tunica interior ventriculi, ventriculum corroborat, calculosque dissolvit mitè.

2. Adeps nervosis partibus convenit, duritiem Lienis mollit, dolores nephriticos mitigat, (innatus.)

3. Ova calculosis conducunt. Hinc Spiritus Salis cum Ovis Struthionis rectificatus usurpatur. Schrodernus.

Struthio.) Plinius Lib. 10. cap. 1. miram huic avibus tribuit Naturam concoquendi sine delectu devorata, ut Jul. Caesar. Scaliger Exerc. 230. ferrum concoquere prædicet. Verum jam olim Alexander Aphrodisiensis in præfat. problemat. hoc ipsum in dubium vocavit, & proabsurdo habuit. Unde & Ulyss. Aldrovandus Ornitholog. l. b. 9. cap. 2. testatur, se observasse Tridenti ferri frustula à Struthione deglutita, quæ incocta rursus excreverit. Cui subscribit Heinrichus ab Heer, dum dicit, sese Patavij & Venetiis Struthionibus experiundi gratia dedisse obulos, quos illi nec semigranulo leviores cum excrementis totidem numero reddiderint. Imò Th. Jordanum cum Tridenti & Romæ Struthionibus æreas monetas objiceret, aviarii præfetti scuticam vix effugisse, qui asserunt ex earum deglutitione graves eos incurrere morbos. Interim nullum dubium est, hanc Avem præ aliis admodum esurino præditam esse ventriculi fermento, ad quod demulcendum ferro, lapidibus, & aliis rebus duris opus sit pro diverso sanitatis gradu. Hofmannus.

STUPEFACIENTIA, vid. Narcotica.

STURIO.

Sturio (quasi *Στερεῖον*, quod rostro suo proræ puppis rostratæ speciem gerat.) Acipenser, Germanis S. oer; Angl. the Surgeon. Sturio nomen Gothicum esse asserit Jul. Cæs. Scaliger; & ab ea gente in reliquam Europam translatum; quod facile sibi persuasit Olaus Wormius, quia stur vel steer magnum vocat in Lingua Danica: at de nominis hujus origine, recentiores haud minus inter se pugnant critici, quam veteres de natalitio Homeri; adeoque variant eorum conjecturæ, ut nonnulli non solum cæteris censeantur, verum sibi met etiam ipsis, repugnare, Exemplo enim præsto est ipse Salmasius, Criticorum facile princeps. Hic enim (Pliniaz Exercit. pag. 1316.) nondum istum solvere, simulque insignem Plinii errorem detegere aggressus; animo nunc huc, nunc fluctuat illic. Primo Sturionis nomen existimat à Thursione *διεφθαρμένως* deductum; his verbis: nomen hoc ipsum videtur corruptum ex Thursione: Licet aliud sit Thursio (frustum scilicet salium caniculae piscis, quam Græci *καρχαεῖον* vocant) Paulo post tamen ab ista sua sententia ultro recedens, aliam, eamque ipsam quamdiu ante protulerat Jul. Scaliger amplexatur; sed melius sturionem inquiens, ex Gothico esse stur, quod equidem hic *ἐν παλαιῶν* adnotandum duxi, non ut tantum, & sine termino eruditum virum inconstantiam insimularem, (absit, à me procul absit tam stolidæ calami procacitas:) ast ut illustri quodam exemplo subinnuerem, quanta sit caligine vetustatis obducta nominum quorundam, olim animantibus inter se discriminandis accommodatorum, primordia, sed unde digressus sum, eo revertor, Ova piscis hujus sale condita & in massam coacta, Caveare vocant Itali, saponem nostrum viridem plane colore & substantia referentia, à quamplurimis in delictis habentur: sed in his nihil ego, quod delicate sapiat, deprehendi. Piscis est Anadromus, Cartilagineus; solitarius, ex galeorum genere, tegumento asperum armatus, Delphino non multum dissimilis, demta integumentis asperitate; Teres est, trianguli seu prismatis ferè figura, coloris obscuri *μακροσφυχρότες*, rostro longo; branchiis utrinque quaternis, operculo osseo scabro contextis; oculi parvi, os in prona parte rotundum, semper hians, absque dentibus, magis ad sugendum, quam masticandum accommodatum; ante quod propendent appendices Carnosæ quatuor, Venter planus ventriculus ei crassior, ut Avum, hepar magnum, dulce, cor ut ovis. Pinnae subalbidæ; quarum binæ ad branchias, totidem ad ventrem sitæ sunt; unica dorso non procul à cauda, inest, à Capite per dorsum ad caudam usque, instar medullæ, funis seu nervus, digiti Crassitudine, excurrit, integrum piscem roborans & firmans. Coqui, dum mactare volunt, eum extrahere solent, in mari degit, ubi parit, & educatur: tandem aquæ dulcedine alectus in flumina excurrit & capitur, Aere & vento puro eum nutrirî asserunt: quidam limo & arena, alii pisciculis. Verum quoties secus, in ejus ventriculo nihil præter spumam & mucum deprehendi. Piscis imprimis nobilis, pinguedine flava abundans, palato Apiciorum gratissimus. Apud veteres Romanos piscis fuit maximæ pretij & summa nobilitatis; adeo ut eum à coronatis ministris, cum tibiis, quasi quædam non deliciarum sed numinis pompa, Convivium inferri consueverit, unde Martialis Lib. 13.

Ad Palatinas Acipensera mittito mensas,

Ambrosias ornent munera rara dapes,

Plura qui cupit, Schvvenckfeldum consulat & Rondeletium, Charleton.

H h h h

Ossa

*Offa Sturionis dicti piscis commendantur in Archi-
side vaga, (exhibita) Forest. lib. 20. observ. 12. in Epi-
stola D. D. de Bräbe.*

Ut & in colicis doloribus discutiendis. *Schro-
derus.*

STURNUS.

Pondus maris 3. unciarum; fœminæ 3. Lon-
gitudò a rostro ad imos pedes 9. digitorum, ad
extremam caudam 8. Latitudo alis expansis 16. di-
git. magnitudine est & figurâ merulæ vulgaris
rostrum, ab apice ad angulos oris mensurâ sum-
ptâ, 1. digit. Longum, in mare dilute flavum,
in fœminâ fuscum, latius & magis depressum
quam in turdis aut merulis, quâ præcipuè notâ
ab ijs differt, mandibulum superius inferiori
æquale. Lingua dura, cornea, bifida oculorum
iides avellanæ, superna parte albidiores, mem-
brana nictitante donatur, pedes crocescunt (vel
carnei sunt coloris) ungues nigricant, exteriores
digiti antici hinc inde æquales: extremus autem
medio imo sui internodio iungitur, tibix ad articu-
los usque plumosæ.

Apices plumarum in collo & dorso flave-
scunt, sub cauda cinerascunt, alias ubique nigri-
cant cum cœruleo quodam seu purpureo Splen-
dore qui pro vario ad lucem objectu variatur,
in fœminâ ad gulam usque pennarum apices al-
bent: in mare dorsum purpurei plus obinet;
uropygium ad viridem magis accedit; infimus tan-
tum venter magis maculosus est.

Remiges alarum pennæ fuscæ omnes: verum
margines tertix & sequentium ad decimam &
à decima quinta ad ultimam obscuriores sunt. Te-
getes alarum splendent; minorum etiam Apices
fl. vi; alas subtus regentes fuscæ marginibus dilu-
tè flavis.

Cauda 3. digitos longa; 12. pennis constat, fu-
scis, marginibus flavescentibus, ova dilute ad mo-
dum ex viridi cærulea, 4. aut 5. parit.

Appendices intestinorum ut in alijs hujus ge-
neris brevissimæ & perexiguæ, ano propiores
quàm in alijs. Ventrículus non admodum Carno-
sus; intestina 13. digitos longa, felleam vesicu-
lam obtinet. Scarabæis, vermiculi, &c. vesci-
tur.

Sturni gregatim degunt, volant & cantant
unâ cum turdis pilaribus & Iliacis, non tamen
unâ avolant, sed per totum annum nobiscum
manent & nidulantur in foraminibus tectorum,
arborum &c.

Hoc genus interdum colore variat. Vidimus
enim in Cambria duos sturnos albos, alterum
capite atro, reliquo corpore albo, ad Aberda-
ren viculum in agro Carnaruenensi. Caro ejus
apud nos in cibum non venit ob amarorem: apud
Italos aliosque transmarinos mensis adhibetur, hu-
manas voces articulate loquendo egregiè exprimi;
si modo ad id instituitur. WILLUGHBEJUS in
Ornithologia.

STYPTICA, vid. *Adstringentia* &c.

STYRAX.

Nomina. Styra arbor *Ger. J. B.* Styr. arbor vul-
garis *Park.* Styra folio mali *Cotonei. C. B.*

Cæs. J. B.

Caudice est malo Cotoneo simili, candidiori
cortice *Cæsalp.* folio est etiam mali cydoniæ, mi-
nore, subrotundo, vel in obtusum mucronem de-

finente, subtus cana Lanugine pubescente, supe-
rius glabro & viridi. Flores fert in novellis sur-
culis Arantii, Candidos, plures & simul junctos,
pluribus foliolis constantes, odoratos: fructum
magnitudine Avellanæ æqualem, incanum, callo
fusco, amaricante, qui in duas, tres, quatuorve
carinas dehiscens exhibet lignosum officulum,
buxei coloris, nucleum claudens aliquando uni-
cum, quatuor Lineis fulcatum, aliquando gemi-
num angulosum, interdum & tertium: hoc acci-
dentarium esse puto, non natura unicum officu-
lum, unicum tantum nucleum includit; Medullâ
internâ insuavis.

In agro Romano & circa Tusculum in sepibus
& sylvis copiosè oritur; ubi & eam ante nos *Cæ-
salpinus* observavit.

Cordus fructum ut reperitur cum styrace ex-
actius describit his verbis, Nax styracina globosæ
figuræ fructus est, mediocris avellanæ magnitudi-
ne, duplici cortice nucleoque constans: exterior
cortex carnosâ substantiâ, & in viridi casio co-
lore, supremum Amygdalæ putamen refert, is in ma-
turity tribus rimis in tres partes dehiscit alterum
lignosum, durum, flavum aut subruffum Corticem
ostendens, quo contineatur nucleus pinguis, oleo-
sus, gustu acris, odoratus, & resinosa styracis qua-
litate respondens, sed multo acrior & fauces
scarificans, quæ descriptio ad amissim congruit sty-
racis fructui à nobis circa Tusculum collecto.

Styrax resina duplicis generis in officinis prostat
ficcus & liquidus.

Siccus, officinis storax calamita à cannarum
calamis sic dicta, in quibus olim, (autore Ga-
leno) è Pamphylia apportabatur est arboris de-
scriptæ gummeus resinofusque succus concretus,
aridus, odoris suavissimi.

Non sine caula in calamorum internodijs oc-
clusus advehebatur Styrax, siquidem Parkinsonus
noster observatione & experientiâ propria styracis
gummi syncerum, arte & prælo solo à se depura-
tum & fluidum effectum, non solum commissuras
& articulationes doliorum verum lignum etiam
ipsum æstivo tempore penetrare, & effluere effir-
mat, adeo ut vitreo vase probe obturato illud re-
servare necesse habuit. Cannarum autem internodia
nullas habent rimas, nullas commissuras, ideoque
ad gummi tam odoratum & subtile continendum
commodiora sunt.

N. Styracis arbor in Italia lachrymam paucam
fert, ut aliæ multæ quæ in fervida regione multo
succo abundant.

Vires. Cæterum cum styracis simpliciter mentio
fit, ea vox de calamita accipienda est, vim ha-
bet, teste Dioscoride, calefaciendi, exiccandi,
emolliendi, concoquendi, facit ad tusses, destilla-
tiones, gravedines & raucedines. Convenit etiam
ad uteri præclusiones & duritias: menses potius
& appositus ducit, alvum quoque leniter molli-
t, si modicum ex ipso cum resina Terebinthina de-
voretur. Miscetur etiam utiliter malagmatis discuti-
entibus & acopis. Uritur autem & assatur & tor-
retur, & fuligo ex ipso fit vel ex Thure, quod ve-
ro ex ipso præparatur in Syria styracinum cale-
facit & emolliit fortiter, capitis tamen dolorem in-
ducit, & gravitatem ac soporem efficit.

Invenio, inquit Plinius, potu modico (styracis)
tristitiam animi resolvi, largiore contrahi, magni
usus est in odoramentis & suffumigijs.

Præfertur styrax pinguis, lentus, fragmentis
albicantibus rufescens, vel flavo colore perleve-

ranti, qui dum molitur melleum liquorem reddit: improbatum fufurosus, niger ac inodorus; Schrod.

Storax rubra officinarum, C. Bauhino Cortex est arboris, quem Thus Judæorum & Thimiama vocant, quo Judæi in suffumigiis frequenter utuntur: an *καδοναφθον* seu *καδναφθον* Dioscoridi L. 1. 22. quod ex India defertur corticosum, mori libro simile quod jucundi odoris gratiâ suffitur.

Styrax liquidus est liquor pinguis, instar balsami crassus, graveolens: Schrod. J. Bauhino melleæ & tenacis substantiæ est, coloris fusci, aut ex fusco rubentis, aut ex cinereo fusci, odore valido, atque ob vehementiam fere ingrato, in quo tamen videtur apparere remissus ille styracis calamitæ odor, multo tamen magis si linguæ admoveatur conspicuus, dum in nares inde pauca quantitate anathymiasis ascendit, sapore autem acriusculo.

De styrace liquida magna inter autores dissensio est: aliis, viz, nihil aliud est quam stacte, i. e. Myrrhæ colamen, quod falsum esse inde constat, quod myrrhæ lachrymæ ob substantiæ similitudinem in quovis aquoso liquore dissolvatur, Styrax autem liquidus minimè, sed in oleoso & pingui, aut aliæ resinæ, alijs, ut Cordo, factitium quid ex styrace calamita in vino ac oleo soluta, admistæque resinâ laricea excocta, quæ decoctio ubi refluxerit, styrax liquidus ad fundum secedere dicitur, ad superficiem mittens oleosam substantiam liquidiorè, ali expressu idem moluntur. Serapioni styrax liquidus est oleum ex nucleis arboris storacifluæ expressum; at cortex fructus ex quo oleum expressum est, styrax sicca eidem dicitur. Avicennæ styrax humidus fit per decoctionem Corticis, estque colore nigro.

Fæx remanens eidem Styrax sicca dicitur, l. 6. cap. 32.

Facultates styracis liquidi eadem sunt quas Dioscorides oleo Styracino attribuit, de quo supra.

STYRAX LIQUIDA.

Nomina. Styrax liquida C. B. Styrax Aceris folio C. B.

Ex radice rotunda, nigricante, rugoso, striato & quasi articulado cortice tecto, folia terna etiam quina, oblongis, tenuibus, nigricantibus pediculis donata ex uno veluti tuberculo prodeunt quæ virginea sunt, foliorum Aceris vel platani instar, in laciniâ ternas, etiam quinas divisa, nervosa, per circumferentiam crenata & mucronato cuspidate.

Ab Honorio Belli habuit. C. B.

In horto instructissimo Reverendissimi Episcopi Londinensis D. H. Compton, culta est hæc planta ab honestissimo viro & ingeniosissimo Hortulano D. Georgio London; transmissa fuit è Virginia à D. J. Banister. Q. an sit acer odoratum Virginianum Herman? fructum hujus styracis Virginianæ, conglobatæ & echinatæ figuræ esse qualem in pilulis Platani & Sparganii videmus, mihi affirmavit D. Tancredus Robinson qui eum observavit in celeberrimo museo Clarissimi D. W. C. medij templi; ideoque quærit an sit platano Occidentali affinis, vel lanuginem seu pappum ferat? *Rajus.*

S U B E R.

Suber Vossius à suo dictum putat, quod calceamentis insueretur; fœminæ enim non tantum hyberno tempore valetudinis causâ eo utebantur, sed etiam ætivo, ut viderentur grandiores.

Nomina. Suber latifolium I. B. *Ger. Park.* Latifolium perpetuo virens C. B.

Mang. Bibl. Pharm. Tom. II.

Suber quod in Hispaniis nascitur, perpetuo viret, ut ilex, cui adeo simile est, ut primo aspectu plerumque fallat, nisi cortex crassus & distrumpi solitus errorem detegeret; majus est Ilice plerumque & caudice ubi adolevit longe crassiore, cortice item densio, carnosio, scabro & rimoso, qui nisi suo tempore detrahatur dehiscit, alioque subnascente expellitur: eo detracto qui subest novellus ira rubet, ut procul aspicientibus arbores rubricâ aut minio pictæ videantur. Suberis rami illignis firmiores sunt; folia majora, longiora, molliora, & supernè magis virentia, interdum nonnulla dentata, aliquando minimè, ut in Ilice, glans magna, ubi maturuit nigricans, Iligna longior & obtusiorè cuspidate, calyce etiam majore, magis hispido, & per oras molliter echinato; glans admodum adstringentis & exsiccantis gustus, Iligna multo ingravior: magna ex parte conjunctim nascitur ut pontica nux, sed crasso brevique petiolo, & firmiore quàm Iligna, ramulis nonnunquam adnascuntur dura & lignosa quædam cinerei coloris, subercula, adeo firmiter inhærentia, ut nisi fracto ramo eximi non possit.

Clusius suber in extrema Aquitania Pyrenæis proxima nascens folia non retinere, sed hyeme abijcere observavit; ut mense Aprili folijs prorsus viduatæ erant quatuor suberis arbores, circa Bayonam, quare (inquit) Theophrastus non immerito tribuit suberi deciduum folium.

Matthioli suber alterum oblongis angustisque folijs, quod Pisanæ agro nasci tradit, sibi nunquam visum fatur. Idem Clusius, at quis alius præter Matthiolum fide dignus illud conspexit?

Plerisque Castellæ novæ Bæticæque locis, & totâ Lusitaniâ nasci Clusius tradit, circa Tundos & viam Appiam copiosè nascentem simul cum siliquâ arbore seu ceratia observavit. D. Tancredus Robinson, qui affirmat folia suberum rarè esse decidua, uberrime etiam in Olbiensi orâ provenire auctor est Quinquernus in libello de laudibus Provinciæ, quæ de triplici cortice habet Quinquerni nobis non probantur: detrahendis corticibus hæc est ratio, quâ stipites fissuræ committitur circumscinditur ad lignosam usque materiam, pariterque in summis humeris antequam in brachia dividat sese, mox à summo ad imum finditur, detrahatur triplex cortex: non explanantur aqua sed igni, nec demuntur nisi tertio mox anno, quod si paucis diebus à tonsura longi imbres supervenerint, arbor interiit; quod raro accidit, nimirum regione calida & sicca, & temporum observatione raro fallente, Clus. è Quinquerni.

Alii ut Lobelius, & quidem rectius: Cortex geminus stipitem amittit; alter interior, qui perpetuo hæret; alter crassior ad duos pollices, rugosus, perquam levis, qui deglubitur & quolibet gentium defertur.

Vires. Cortex tritus ex aqua calida porus sanguinis fluxum sistit; ejusdem cinis ad idem valere dicitur. Usus ejus est ad Anchoralia navium, piscantium fragulas, cadorum aliorumque vasorum angustis oris, ampullarum vitrearum obturamenta, fœminarum Calceatum hybernium, alvearia, & in Extremadura Hispaniæ ad turguriorum tecta, referente Clusio. *Rajus.*

Pulvis hujus corticis post adhibita detergentia efficacissimus est medicamentum in sistendâ Gonorrhæa.

S U B L I M A T I O.

Sicut in Digestione, Fermentatione ac Putrefactione, aliquatenus tantum commovebantur, i. e. ad secessum disponebantur, concretorum particula, vix harum ullis, nisi volatilibus maximè, ultra illorum compagem tendentibus: ita dum hæc iterum &

extra eorum ambitum vi Ignis feruntur; generaliore conceptu *Sublimationem* hoc dicere liceat. Quoniam verò per operationem hanc illæ modò in auras spatioſas ſub ſumi aut vaporis formâ exhalant, nullo-ue vaſe excipiuntur. *Exhalationis ſeu Evaporationis*, ac interdum ab effectu *Exſiccationis*, termino illa magis ſpecificatur; modò ab ambiente frigido intra vaſa appropriata denuo condenſantur, & quidem ſumi utplurimum in maſſam ſpſſiorem, *Sublimatio κατ' ἐξοχὴν*, vapores in liquorem ſeu ſtagma, *Deſtillatio* mechanicis audit: hinc vix adeò abſurdè, ac *Beguinus* ſibi concipit, aquæ & ſpiritus deſtillati etiam ſublimati appellantur.

§. 2. Cauſa interim efficiens ſeu commovens communis ignis eſt; utpote in motu vehementiore conſtitutus, hinc partes à partibus magis divellens ac propellens: atque hic quidem utplurimum externus, cum præter calorem internum illum, qui ſub vegetabilium putrefactione excitatur quemque tandem ſalium horum volatilium ſecreſum, abſque ignis ambientis adminiculo, præſtare, ex *Difſertat. præced.* ſuppono, nullum alium forſan obſervamus. Huc equidem referri poſſet illa ſpiritus urinæ ſine igne lucente præparatio, qua recens urina ad duas tertias evaporata, calci vivæ intra cucurbitam affunditur, vaſique mox congruus imponitur alembicus cum excipulo adaptato, ſicque ſubtiliſſimus atque volatilis urinæ ſpiritus exiguo temporis ſpatio ab igne Calcis interno ac cœco, per aquoſitatem urinæ actuato, in vapores reſolvitur & elevatur. Verùm eo ipſo, dum ignis hic non urinæ, ſed Calcis vivæ, eſt, externus potius, i. e. liquori deſtillando minimè intrinſecus, erit dicendus.

§. 3. *Evaporatio* haud magno apparatu opus habet, ſed in vaſe patulo, ſuper charta, tabula lignea laminave metallica, calori balnei, arenæ, aut, ſi feſtinanda fuerit operatio, igni etiam nudo, expoſita, interdum ſub radiis ſolaribus hinc *Inſolationis* nomine venit, peragitur: eaque utplurimum modò humiditas aquea ac ignobilior à materia ſolidiore ac deſiderata ſeparatur, v. g. pro ſalium, aqua diſſolutorum, coagulatione & cryſtalliſatione, item corporum humidorum aut humectatorum exſiccatione &c. modò partes fuliginosæ & ſiccioris naturæ à certis concretis proſcribuntur v. g. dum ab Antimonio ſulphur immaturum & volatile nimis per calcinationem abigitur. Huius ſpecies *Torrefactio* eſt, qualem rhabarbarum & myrobalani in officinis frequentius experiuntur, quaque horum pulvis ſuper laminam ferream & ignem tamdiu detinetur ac agitur, donec eorum particula aqueæ cum ſalino-ſulphureis, ſuperſicialibus magis, exhalent, & pulvis, obſcurioris paulatim coloris, adſtrictioris, porius quàm purgans, evadat. Interdum tamen pro humiditatibus aqueis ſecernendis ac expellendis, ſi negotium moram ferat, ſolus aër ſiccior & patulus ſufficit, imò præ calidior expetitur, in vegetabilibus v. g. ita exſiccandis, ut aqueis eorum particulis exhalantibus oleoſarum maxima pars remaneat, aëri tēperatori minimè, aſt calori facile, cedens; hinc illa non radiis ſolaribus, ſed aëri umbroſo potius, exſiccationis gratiâ exponuntur, & hac ratione odorem aromaticum, quem habebant, retinent, à calore quovis perdendum.

§. 4. *Sublimatio* verò κατ' ἐξοχὴν ſic dicta operatio magis philoſophica videtur, rarefactoria ſc. qua mixtum in moleculas minores, fuliginum & vaporum nomine venientes, diſcerpitur, harum vicinia aliquantum mutatur, & ſub fluoris formâ ab imo ad ſummum vaſis occluſi delatæ, ad ſtatum ſoliditatis priſtinum aut ſimilem reducuntur & in flores &

ſublimata condenſatur: ſub hac nihilominus diſparitate, ut corpora ſublimationi expoſita modò in minima homogenea, modò heterogenea, redigantur, modò corporum diverſorum partes in unum decompoſitum conjungantur.

§. 5. Prioris phaenomeni intuitu Sublimationes optimo jure piſtilla chymicorum fuerunt appellatæ, earumque effectus in camphoræ, ſulphuris arſenici &c. iſ. ſalium volatiliū ſublimatione experimur, in quibus tota horum corporum moles, ſi terreſtreitates quaſdam excipias, ita ut qualitates ſenſiles, hinc texturam intrinſecam, maximam partem retineant, interdum tantum laxiorem contingitatem ſuſcipiant, v. g. flores ſulphuris. Quoad alterum, per ſublimationem ſæpius mobiliſſores particula fixioribus evolvuntur, v. g. in ſalium volatiliū conſeſſione: dum hæc à compediſſimis modò terreis, modò oleoſis, modò aqueis, modo acidis, liberantur & ad puritatis & ſimplicitatis majoris culmen evehuntur. Tandem nec combinationis uſus in ſublimatione obſcurus eſt, v. g. in Cinabaris, Mercurii ſublimati ac dulcis, Salis armoniaci, florum hæmatitis & primi Entis Veneris productione utpote in quibus cunctis corpora bina, imò plura, in unum concreſcunt.

§. 6. In homogeneas partes illa tantum concreta per ſublimationem ſecedunt, quorum moleculæ ratione ſuæ lævitatæ laxius coherant, hinc à motore ſubtiliore, leviter tantum ſuccuſſæ, diſtrahuntur, qualia ex mineralibus ſunt Sulphur, Mercurius, Arſenicum & Antimonium. Reliqua mineralia & metalla per ſe ſublimationi haud parent, niſi horum mollius & volatilius, ſe plumbum, excipere velis, cujus aliquam partem igne fuſionis ſuſum urgeri, fumigatoria Mercurii per hoc calcinatio & metallorum per plumbum depuratio ſuadet. Multo minus hoc erit expectandum à lapidibus, aut horum analogis, v. g. Coralliis, margaritis &c. & per conſequens ſibi & agris imponunt, qui ſulphuris flores corallatos antiptheſicos magis pollicentur. Interim negari haud debet, metallica quoque aliaque mineralia, ſi eorum arctior connexio prius diſſolvatur, aut gravioribus particulis alæ mutuatitiæ adaptentur, ab igne proportionato in ſublime rapi, v. g. Biſmuthum, Ferrum & Cuprum à Sale armoniaco, Stannum ab eodem & Nitro: Imo aurum quoque fulminans, intra cucurbitam argenteam tubulatam ſi deronetur, in flores purpureos elevatur, aucto paululum igne in aurum verum deliqueſcentes; ut *Nobiliſſimæ Boyle* taceam, qui exigua ſalinæ cujuſdam ſubſtantiæ portione aurum facile in rubicundorum cryſtallorum formam ſe ſublimare poſſe in *Chym. Sæpt.* aſſerit. Ex vegetabilibus forſan ſola camphora, animalia nulla, ſe ſublimari patiuntur; ideò ſc. quod horum reliquorumque vegetabilium partes ſolidæ humido gluænoſo conferruminatæ ſimul non, niſi per ignem deſtrudivum magis, commoveantur, neque hoc ſine ſui colluſione atque alteratione. Unde quàm ineptè illi agant, qui Sulphuri ſublimando thus, maſſichen, aloen, myrrham, crocum, ſaccharum commiſcent, nobiliores & efficaciſſimas inde flores ſibi promittentes, facile colligi poſſe, quatenus dicta concreta igni, quem ſulphuris florum ſublimatio exigit, ferendo impatia ſunt, hinc facile comburantur ac deſtruuntur, floribus verò præter colorem ingratum & fuliginem empyreumaticam, nihil affricant; accedit, quod ſaccharum acidum equidem ſpiritum ſub hac tortura eruſcet, floribus tamen dictis haud commiſcibilem aut eorum virtutem exaltantem. Myrrha ſola ſi ſulphuri addatur, & quidem in minore proportionem, particulas ſui

quasdam homogeneas floribus hujus sine empyreumate sensibili videtur concedere, quatenus hi saporem myrrhæ exactissime referunt, fuligine nihilominus quadam tincti cernuntur: a t opus erit igne temperato, aliàs myrrha in fumum acidum & acrem resolveretur. Par judicium de floribus benzoëis erit, & non sine ratione *Baltham* chymicos pro floribus fumos vendere ait, dum benzoëum hac ratione ustulant, adeoq; fuliginem albicantem, à propitia & balsamica Aë dulcis clementia remotissimam atq; acerrimam, i.e. benzoëum defloratum, asthmaticis quidem pro pituita viscida incidenda satis accommodatum, aliis vero pulmoniacis minus congruum, propinant.

§. 7. Imo nec omnis dubitandi materia deficit, an non ex illis, quæ sublimationi aptiora creduntur, quæ jam ab hac rarefactione mechanica aliquid mutationis, & texture naturalis depravationis patiantur? De Sulphure si quidem consentientes offendimus diversos Artistas, per experientiam asserentes, frequenter repetitas sublimationes hujus florum activitatem haud leviter enervare, ita quidem ut *Zuvelserus* etudum aut vivum Sulphur purius præ illis aliquoties sublimatis amplecti haud vereatur: nec sine ratione, quatenus singulis illis exhalationibus aliquid salis sulphuris centralis sub phlegmatis acidi formâ exhalat; quo nihilominus sublato nec hujus textura, nec vires integræ erunt dicendæ. Pariter Antimonium si veperse, si ve cum addito vitri o, sublimetur flores haud ejusdem coloris exhibet, albos scilicet flavos & rubicundos: quod sine texture illius alteratione fieri nequit. Denique nec benzoëis flores, quos vulgus puriorem concreti substantiam ait, ab hoc parum differre, modò innui, quatenus eorum puriores, quos in officinis seligimus, bituminosa illius pinguedine destituuntur, hinc manifestam acrimoniam, ratione cujus phthysicis haud semper aded grati existunt, ac candorem crystallinum præ se ferunt.

§. 8. Quemadmodum autem pro materie sublimandæ mobilitate & fixitate diversa ignis gradus variant, & pro florum benzoëis mitior, quàm pro sulphuris, sublimatione, potentior adhuc pro cinabaris antimonii confectione, requiritur, minimus verò salium volatilium rectificationi sufficit: ita per se ascendunt, aliis elevationis facilitandæ gratiâ quædam commiscetur, quæ duplici præprimis ratione hoc præstant. Se vel materiam compactiorem & ponderosiorē discontinuando ac elevando, v. g. dum Antimonio, Ferro, Lapidi hæmatiti, Stanno, Bismutho &c. Sal armoniacum additur: vel hoc, quod particularum volatilium ascensum sufflammat, per præcipitationis quendam modum, separando & retinendo: cujus generis salia fixa terrea & metallica sunt, v. g. dum Sali armoniaco alcali tartari aut cinerum clavellarum & Calx viva, pro urinosa ejus portione sublimanda, vel limatura Martis pro floribus illius parandis admiscetur, item quando Cinabari, pro Mercurio revificando, aut eadem limatura Martis, aut Calx viva additur. Faciunt huc corpora terrea, quæ ut sublimandâ magis discontinuuntur, eorumque deliquatio & fluxus inhibeatur, adjiciuntur, v. g. farina laterum vitrumque pulverisatum, antimonio admiscenda

§. 9. De cætero concreta quædam ad sublimationem commodius subeundam antecedentis præparationibus prædisponuntur, & quidem non tantum per digestionem, qualem v. g. Antimoniam cum oleo vitrioli affuso per menstruum ad minimum spatium sustinet, antequam sulphur desideratum sublimari concedat, & salia fixa volatili suo comparari faciliùs connubunt, ac cum hoc in sublime feruntur, si prius in blando calore aliquandiu destineantur: sed per solutiones etiam atq; præcipitationes, quatenus v. g. Mercurius non currens, sed per spiritum nitri demum corrosus atque coagulatus, salia inter sublimandum sibi adaptat; nec Aurum purum sibiq; relictum, sed per corrosionem & præcipitationem in calcem fulminantem redactum, in flores elevari contingit.

Manger. Biblioth. Phar. Tom. II.

§. 10. Quod verò diversa insuper mixta pro variis sublimatis officinalibus constituendis, combinantur non iam ipsius operationis, quàm sublimandi, immutandi & corrigendi gratia fit, v. g. quando spicula salina spiritus nitri, vitrioli & salis marini Mercurio fluido maritantur, & cum hoc in corpus solidum & crystallinum, sublimari Mercurii nomine venies, cœunt; aut quando sublimato huic cetera adhuc Mercurii vivi portio additur, salium illorum & austeritatis magnæ hujus corrosivæ attemperandæ causa, hincque nova sublimatione Mercurius dulcis seu Draco mitigatus evolat. Pariter dum idem Mercurius vivus cum sulphure communi, aut Antimonii in Cinabari sublimatur, volatilitatis illius aliquantulum figendæ causâ aliove ob fines illud fit: & dum salia volatilia Cornu cervi, serpentum &c. cum oleis aromaticis elevantur, empyreumaticis illorum tantum corrigendis ac demulcendis virtutibus medicæ magis determinandæ hoc inservit, cum æque facile etiam sine horum connubio sublimari illa poterant.

§. 11. Instrumenta ab sublimationem necessaria usitata sunt cucurbita & alembicus, utraque vel vitrea, vel terrea ac ferrea. Alembici modò adhibentur cœci & rostris destituti, si totum sublimandum in massam solidam coaguletur, modò rostrati requiruntur, si illius quædam pars sub fluidi, seu liquoris forma veniat excipienda, v. g. si spiritus salis armoniaci cum sale hujus volatili sublimetur. Eisdem interdum substituuntur cuculi pyramidales ex charta crassiore confati, v. g. pro floribus benzoëis colligendis. Sublimatorium interim totum, pro subjectorum diversa volatilitate, nunc altius, v. g. phiala pro rectificandis ac depurandis salibus volatilibus; nunc humilior, est, imò interdum cucurbita exilior & sine alembico pro Mercurio dulci & Cinabaris depuratione sufficit: Econtra plures sæpè interdum Alembici, seu ollæ, quas alupel vocant, ita sibi adaptantur, ut purior & volatilior substantia in earum superiore, impurior verò in inferiore ac intermediis excipiat, v. g. dum Antimonium una sublimatione in flores albos, flavos & rubros elevatur. Atque hæc ollæ tam cucurbitæ, quàm sibi invicem, arte combinantur & luto conveniente firmantur, ne exhalationum potior pars in auras abeat: quamvis interdum aliquali etiam apertura opus habeant, quo liberiore vaporum seu fuliginum contingat ascensus, ut in florum sulphuris confectioneprehendimus; quod tamen ostiolum in superiore & remotiore demum olla sit, & quidem exile, ne sulphur à copioso aëris impulsu flammam cum dispendio florum concipiat. Imò si facile liquecat materia sublimata, v. g. iidem sulphuris flores, ab igne diutius continuando & intensiore, ita & absque ullo luto sibi imponuntur Aludel, ut successive rolli, sublimatum tempestivè extrahi, illisque denuo adaptatis sine turba operatio continuari queat. Tandem sublimatio nonnunquam ad latus & per Retortam fit, v. g. in Cinabaris, florum Antimonii rubicundorum, Salis volatilis viperarum, succini &c. confectione, si nimirum materia sublimanda ponderosior extiterit, aut ignis moderandi causâ aut propter alias circumstantias Retorta cum excipulo ampliore commodior videatur, v. g. si cum salibus volatilibus, alembici rostrum angustius facile obturantibus, oleum ponderosius & spiritus elici debeant: cujus tamen sublimationis dispar observatur successus, dum fuligines elevati modò mox in Retortæ collo, v. g. Cinabaris similiaque ponderosiora, modò in excipulo demum huic appposito, condensantur, v. g. salia volatilia leviora.

§. 12. Tertia sublimationis species restat, quam humidâ aliàs ideo quod vapor, illam commotus in humorem seu liquorem condensetur, seu *Destillationem*, vocant, atque naturæ rotæ ac circulo in Macrocosmo conformis operationum chymicarum omnium frequentissima est, ita

quidem ut Chymiae Artis Destillatoriae & Chymicis Destillatorum nomen conciliavit, quæque aut heterogeneorum æque ac homogeneorum secretioni, aut heterogeneorum combinationi, inservit, quatenus aquam ab aqua & spiritum ac oleum à phlegmate separat, & spiritum v. g. sulphureum acido aut urinoso &c. combinat.

§. 13. Ejus tria apud mechanicos observantur genera pro diverso, [quæ communia cum sublimatione habet] apparatu & positu distincta: quorum prius per cucurbitam & Vescicam cum Alembico contingens destillatio Recta seu per ascensum audit, cum vapores rerum destillandarum perpendiculariter ascendunt, & in supremo vasis in liquorem coeunt. Hujus modus peculiaris ille est, quem destillationem per campanam vocant, vix tamen, nisi in destillatione olei seu spiritus sulphuris locum habet; quamvis nonnulli simili ratione per spiritum vini super auro fulminante accensum ex hoc sulphur auri elevare conati fuerint. Altera obliqua & ad latum nuncupatur, dum iidem vapores seu fumi per retortam & lateralem hujus aperturam seu collum urgentur, idque idèd præprimis, vel quod graviores illi sint, quàm qui ad illam altitudinem perpendiculariter ascendere queant, v. g. stigmata mineralium acida & olea crassiora, vel quod cum particulis fluidis spissiores ascendant rostrum alembici obrutantes, hic fluidorum descensum turbantes v. g. in Cornu Cervi, Viperarum &c. destillationibus.

§. 14. Quibus denique accedit destillatio per descensum, quando vas destillatorium superiorem, recipiens inferiorem, locum occupat, quo vapores & fluores vi ignis expressi deorsum urgentur, illo modo, quem Geber summ. perfect. parte quarit, capite 29. & 50. Rheum. Chymiothecha lib. §. 23. & 141 alique describunt, quique satis inusitatus nunc observatur, nisi in metallurgorum similiumque operatorum officinis, v. g. si Mercurium ex Cinabari nativa eliciant, picem ex rædis resinosis parant, vel mulierculæ aquam ex rosis propellunt. Sed olla, inferiore sui parte foraminulenta ac pervia materiam semper solidiorem continet, aut materia immixta lamina seu diaphragmate cribroso tegitur, quod inverso vase illam elabi haud sinat. Quo facto olla hæc sub aceti & terræ immerisæ aut alia quadam ratione commodè collocato vasi recipienti, ita adaptatur, ut per ipsius fundum aut operculum pervium particulae fluidiores ab igne, desuper & circa vas continens accenso vel aqua fervente, interveniente commodò lebetæ admota, expressæ in hoc decendant. Geber descensorium pyramidale cum coopertorio hunc in finem commendat, cui immittitur destillandum; in summitate ejus ignis accenditur, ut descendat liquor per vasis partem angustioris perviam in concham substratam. Sed egregia hujus descensoriæ destillationis encheirisis est, quam Charas & Lemery pro oleo caryophyllorum albo & penetrantissimo comparando describunt, scilicet infundibulum vitreum vasi recipienti impositum, aut calicem saltem vitream, lineum laxè expandunt & firmant, huic pulverem caryophyllorum ac denique operculum, ita super insternunt, ut hujus fundus convexus illum immediatè contingat: quo facto cineres calidos cum prunis exilioribus huic immittunt, sicque paucis intervallis oleum ad inferiora urgent, candidum si ignis blandior administratus, aut rubicundum, si ille paulo intendatur.

§. 15. Cujuscunque verò generis fuerit destillatio, à sublimatione nihilominus in hoc differt, (1.) quod fluida æque ac solida pro objecto agnoscat, cum solida tantum sublimationem ferant: (2.) quod destillationis productum semper substantia liquorosa sit, qualiscunque etiam ejus materia extiterit. Inter fluida mixta vix equidem aliquod reperire contingeret, quod per destillationem non commoveatur, nisi succos vegetabilium naturaliter acidos & austeros, v. g. citri & cydoniorum,

excipere placeat, præter insipidum phlegma nihil exhalantes; i. e. cuncta reliqua in vapores resolvuntur, in liquorem denuò coagulabiles, atque hoc ut plurimum cum crassiore in fundo vasis remanentia, nunc copiosiore nunc parciore, ita ut hujus circumstantiæ intuitu Geber. l. a. c. 50. causam, quare inventa sit destillatio, purificationem liquorosâ facie sua turbulentiâ non inconcinne pronuntiaverint: est solidiora non æquè omnia per destillationem in fluorem abeunt. Ita quemcunque ignis gradum experiantur, metalla, utpote compactiora & magis homogenea nunquam tamen, nisi intervenientibus menstruis salinis, illa non tam deliquantibus, quàm corrodentibus, particulas suas divelli & evelli patientur: pariter nec lapides, corallia, perlæ similiaque mineralia, nec alcalia fixa, ob eandem rationem. Vegetabilia etsi semper liquores sub destillatione fundant, an tamen cum his omnes eorum particulae integræ & sub textura hæc specificæ, qua eorundem nonnulla has vel illas virtutes, v. g. adstringentem & purgantem, habere dicuntur, prodeant, nonnulli dubitarunt.

§. 16. Quoad adstringentia res manifesta est, utpote quorum potentia, dum in terrestreitate ponitur, seu in acore particulis terreis determinata ratione combinato, constitit: mitiori igni haud cedit, fortiori verò ejusmodi vegetabilia commissa plane immutantur & cum textura sibi specificâ stypticitatem quoque perdunt. De posteriore nullum ambigere observo prius verò confirmant Aquæ officinarum, v. g. bursæ pastoris, plantaginis, equiseti, tormentillæ, pro adstringentibus venditæ, quæ nihil odoris specifici natis, multo minus saporis adstringentis linguæ, imprimunt aut si illius quicquam referant, à particulis aromaticis paucioribus combinatis hoc est, illis, à quibus nihil stypticitatis expectandum, id habent. Recordor equidem quosdam aquis, si non alcensoiâ, certè descensoriâ, destillatione paratis facultatem adstringentem vindicare: Verùm eo ipso dum hæc in ardore ac certa acidi cum terrea substantia combinatione radicatur, nihil autem particularum terrearum, sed phlegma merum, destillatio per descensum exprimit, nec pariter, ac de succis acidis & austeris vegetabilium dixi, quod alembicum haud conscendant, acoreorum destillatione descendit, quatenus fructuum acidorum, per descensum si urgeantur, aquæ nihil aciditatis secum abripiunt, nisi ad ebullitionem & crepaturam usque illi exagitati aliquid succi essentialis dimittant; nec aquis superius recensitis aliisque ejusdem generis adstringendi munus concedi valet.

§. 17. De Vegetabilibus purgantibus eadem est nonnullorum censura, primo intuitu non omni quidem ratione destituta, quasi nimirum nec illa per destillationem in vapores resolvantur, in liquorem purgantem coagulabiles. quod nihilominus assertum universalius justo, adeoque per omnia vix admittendum, videtur, ideo quod aliorum cathartecorum v. g. hellebori vis in substantia magis salina & volatili, aliorum v. g. mechoacannæ, in gummatice seu mucilaginosæ, aliorum denique, & quidem plurimum, in resinosa hæreat. Quamvis E. concedatur, ex mucilaginosæ ac merè resinosis nullas particulas laxantes cum eorum aquis provocari posse: quin tamen cum salinis hoc interdum fieri queat, adeo simpliciter vix assererem. Quippe (1) annotavit jamdum Zuvelfrus Pharm. Reg p 35 & 76 helleborum nigrum aquam stillare, acrimonia manifestâ in butam & residui vim cathartecam notabiliter imminuentem, quam partem hujus secum abrupisse, probabile foret: quod idem N. bilissinus Borri hius. Apol. contra Conring p. 341. confirmat, dum ex ejusdem hellebori nigri substantiâ corâ se per Balneum aquam copiosam eliciisse, perhibet, cujus oppidè acris cochlearia octo adolefcenti propinata huic tormina insignia, virtutis laxativæ prodromos & comites, duodecim verò cani infusa quatuor vomitus & duos feces movērunt. Præterea & (2.) de aqua nicotiana, ex succo destil-

lata, notum est, quod ejus uncia una, vel duæ, vomitus ci-
eant. (3 *Quercianum in Pharmas. rest. gener. c. 12.* aquam
purgantem simplicem ex semine sambuci & ebuli, ma-
gisque compositam, similemque; *Zuvelferus* l. a. p. 205. de-
scribunt & per experientiam commendant, digestionem ac
cohabitationem præcipue earum virtutes attribuentes, &
Lebavius alchem. l. 2. tract. 2. c. 30. aquam ex rosas pallidis
primò prodeuntem, it. ex flor. persic. pruni, herba & flori-
bus ebuli, corticibus & floribus sambuci, radice esulæ &
similibus odoris penetratioris, destillatas purgantem vim
retinere, asserit, in hoc consentientem offendens modò
laudatum *Dominum Borrichium*, sub hac tamen cautela,
ut prima & molliora potius florum ac foliorum germina
præ provectoribus & solidioribus eligantur. Imò quam-
vis, aquis ut talibus, virtus purgatrix denegetur, olea ni-
hilominus quædam destillata ejus quid fovere, oleum
nicotianæ restatur, cujus aliquot guttæ (licet cum sum-
ma violentia & peticulo) *άνω η κάτω* evacuant; quod idè
de plurib. purgantib. resinosis suspicari liceret, cū olea de-
stillata nihil aliud, quā resinæ colliquatæ & dissolutæ sint.

§ 18. Huc potius referenda, & ex destillandorum nu-
mero eliminanda sunt animalia horumque partes, aquis
officinalibus diversis admixta, quib. etiam confortantib.
alium vitium conciliare conabantur veteres, v. g. Capo,
picæ, hirundines, cerebrum humanum, pulmones vituli
&c. it. lapis percarum, ossa de corde cervi, prout *Zuvel-
ferus Ph. Aug. p. 287. & 309. ac Phar. Reg. p. 200.* satis pro-
lixè ac philosophicè differt; ex quorum tamen nonnullis,
v. g. osse de Corde Cervi, ebore, Cornu Cervi aliquid ge-
latinosa substantiæ elevari, non improbabile est. Ast fru-
stra plane aquis destillandis adduntur saccharum, mel cū
his parata electuaria & conservæ, sumptus & remanentiæ
molem, neutiquam destillati vires, intendunt; nisi forsan
aliquot dierum fermentatio aliquid spiritus ostatis impr-
mat. Multò pauciores particulas activas recipient aquæ
per destillationem à cerussa, borrace, alumine plumoso,
albumine ovi, gūmi Arabico, olibano, tragacantha &c.
qualia v. g. aquam Cosmericam preciosam, à Schrodero
descriptam, ingrediuntur; nec aliquid iisdem promitti po-
terit de margaritis, auro foliato &c. pro aquæ carbunculi
similiumque confectioe commendatis; quibus demum
addere licabit fructus diversos horumque pulpas, v. g.
amygdalas, ficus, passulas, pruna, pulpam cassiæ atque ta-
marindorum, aquæ fumaricæ compositæ destillationi
mancipatos, ut *Zuvelferus* passim annotavit.

§ 19. Sicut enim diversis ignis gradibus modoque calore
balnei, modò arenæ, modò igne aperto, destillationes pe-
ragi, tyconibus artis innoscit, quantum quidem volatilitas
ac fixitas particularum propellendarum variat, ita ut v. g.
vegetabilium nonnulla substantiam suam volatiliorem
mitiori ignis gradui & balnei, v. g. flores rosarum relin-
quant, alia, v. g. aromata, potentiorē, arenæ scil. exigant,
alia denique ab igne demum aperto subjugentur, v. g. Ligna;
mineralia, animalia &c. Itaratione vasorum adhuc note-
tur, rebus volatilibus per destillationem à terrestritatibus
aliisq; heterogeneitatibus sequestrandis vasa, quò al-
tiora, eò commodiora existere, sic enim particulae maxi-
mè volatiles tantum, v. g. spirituum urinosorum & sulphu-
reorum, eorum fastigium conscendunt, fixioribus qualia
phlegma, oleum & acidum, in fundo remanentib. aut ali-
quantum quamvis simul elevatis, nunquam tamen cum
illis culminantibus, sed ab atmosphæra frigidiore mox
denuò depressis ac præcipitatis. Imò Spir. sulphureorum,
potissimum Spiritus vini, ad subtilitatem summam eve-
hendorum gratiâ tubos interdum serpentinos vesicæ aut
cucubitæ adaptamus, quo nimium horum pars aquosa
intra illius angustias ac flexuras, quas æq; facili, ac spiri-
tuosior, transcendere nequit, commodius secedat & in ve-
sicam relabatur, ut alembicorum in summitate tubulato-
rum seu rostratorum taceam, subtiliandis ejusmodi li-
quoribus inservientium, quales *le Mort* delineat.

§ 20. De cætero eidem destillationi juvandæ ac facili-
tandæ duo adhuc inserviunt, scil. eorum per digestionem,

fermentationem ac putrefactionem præparatio & corpo-
rum certorum admixtio. Quid operationes illæ adjuventi
destillationi præstent, ex dissertationib. superioribus pera-
tur, cū in præsentiarum notasse sufficiat, has repagula
crassiora, quæ particulis activis magis moram necestant;
diffingere, adeoque has in libertatem vindicare. Nunc de
additamentis observandum, illa modò evehendorum vo-
latilitatem intendere, hisq; quasi alas addere, v. g. spiritum
vini particulas aromatum oleolas imbibentem secumq;
per alembicum sub spiritus anisi, sceni, uli, liliorum conval-
lium &c. nomine abripientem; modò remoras enervare;
v. g. cineres clavellatos & Calcem vivam in spiritus salis
armoniaci destillatione; utriusque verò specimen exhibet
Tinctura sulphuris volatilis, per destillationem cum sale
armoniaci & Calce viva parata; quatenus hujus alcali
salis armoniaci portionem acidam absorbet ac retinet, ut
urinosus spiritus commodius secedat & sulphuri parti-
culas quasdam ringentes deradat. Quò etiam illa referen-
da, quæ pro concretorum ebullitione cohibenda, simul-
que eorum particulis discontinuandis & commodius in
vapores redigendis, v. g. arena, cineres lateresve confusi,
iis admiscuntur aut prunæ similiaque corpora candentia
in iis extinguuntur, usque dum hæc omnem materiam
absorplerint, & mediantibus his demum illa destilla-
ntur v. g. salia, mel, cera, oleum & pinguedo humana.

§ 21. Gradibus ignis in destillatione itè observatis par-
ticulae concreti separatim, earumque aliæ citius, aliæ tar-
dius pro diversa nimirum sua mobilitate, exhalant, dum
spiritus sulphurei & urinosi ante phlegma (nisi aliis con-
cretorum partibus ad huc involuti, ubi v. g. in destillatio-
ne Cornu cervi aut viperarum, phlegma sal volatile an-
tecedit) phlegma ante spiritus acidus & olea &c. prode-
unt; verò non observatis, sed igne mox violentiore ad-
hibito, confuse simul omnes evehuntur, & sæpe vasa
rumpunt. Imò quædam mixta igne paulo festinante in
liquamen homogeneum abeunt, nihilq; heterogeneita-
tum à se dimittunt, ut v. g. in succino deprehendere con-
tingit, quod igni statim potentiori expositum nihil (spiri-
tus aut salis volatilis expirat, blando tamen stimulum
languet & partes suas successive exhalat. Par exemplum
Vitriolum sistit, si hoc minus calcinatum calore paulo in-
tensiore urgeatur: mox enim per aquositate sibi intrin-
secum commotum hoc in massam compactiorem deli-
quescit, retortam frangentem & artificis expectationem
eludendum.

§ 22. Licet autem sine omni dubio ignis sit, qui res de-
stillandas exagitat, harum particulas hætenus solidas in
fluorem abripit seu in vapores redigit, simili plane modo,
ac motu suo metalla, salia, ceram &c. concreta deliquat;
nilhilominus cum hæc ab igne remota fluorem illum
mutuatium mox denuò amittant & cum pristina firmi-
tate commutent; alia ratio fluiditatis illius erit; quam
corpora solida, destillationem passa, extincto licet omni
igne, per longum & totum suæ subsistentiæ tempus reti-
nent, v. g. Spiritus Cornu Cervi, Salis Nitri, & Vitrioli;
itè olea destillata cuncta, petenda sc. in spiritibus illis
salinis à phlegmate intrinseco, in oleis ab eorum fluore
naturalis, ex quo vel à particulis terreis intermixtis, vel
per sal coagulans hætenus erant deturbata & in resnam
solidiorem compacta.

§ 23. Pro quibus declarandis, ratione phænomeni prio-
ris, supponendum, liquores seu spiritus ejusmodi salinos
tàm urinosos, quàm acidos, ex minutis & discontinuatis
moleculis salinis constare, terrestritatibus suis evolutis
& ab aquositate superveniente dilutis. Si epim salicui-
dam volatili aquæ proportionatam quantitatem affun-
das, hæcque aliquoties destillando combines, in spiritum
faceffer fluidum sal hoc solidum: & si in destillatione
Cornu cervi, serpentum &c. phlegmaris illam partem,
quæ ad moderatam ignis administrationem primò elici-
tur, demas, plus salis volatilis postmodum comparebit;
minore longè ejus quantitate, ac in destillatione ordina-
ria fieri solet, cum phlegmate residuo pauciore in spiri-

rum deliquescente. Acida verò mineralium stigmata nihil aliud, quàm substantiam aqueam salinis illorum minimis saturatam & acuatam esse, inde verosimile fit, quod spiritus salis v.g. circa vasis, in quo aliquandiu aservatur, orificium & operculum exhalante aqua, in verum sal denuo congeletur; & spiritus seu sal urinæ cum spiritu salis & nitri æque, ac cum Sale marino atque Nitro, sal quoddam armoniacum format.

§. 24. Utrique autem corpori, sc. illi pariter, quod spiritum urinosum, ac quod spiritum acidum stillat, menstruum hoc aqueum intrinsecum esse, ut ut mollitie & humiditate extrinseca se non prodant, hinc elucescit quod ex recentiore v.g. Cornu cervi plus phlegmatis & spiritus, minus salis volatilil. ac ex aridore & vetusto, per destillationem exprimitur; ideo sine dubio, quod porior salinarum exhalationum copia ab uberiore menstruo aqueo, spiritus nomine, imbibatur. Pariter cum ad salium mineralium quorumvis crystallisationem multum aquæ requiratur, hanc postmodum cum iisdem salinis minimis, per ignem commotis, in fluidum corpus abire ratio suadet: ita quidem ut Vitriolum ad rubedinem saturationem calcinatum, majoreque phlegmatis parte exutum, intensiore ignis torturâ in fumum equidem seu nebulam elevetur, quæ tamen intra excipulum in massam salinam solidiorem, compingitur, in liquorem verò seu spiritum Vitrioli solvitur, si vasi recipienti aliquid pluvialis aquæ infusum fuerit.

§. 26. Porro olea destillata vegetabilium suâ naturâ substantiam fluidam esse, vel hoc credere jubet, quod simplici expressione sub hoc statu ex plerisque concretis oleosis & aromaticis prorumpant, ejusdem odoris & saporis, si acrimoniam demas, cum oleis destillatis: Quominus verò ex omnibus æque exprimi queant, vel concretorum lignea & solidior textura, vel olei fluidi ab acido combinante in resinofam substantiam condensatio impedit. Quibus vinculis sub destillatione dissolutis, fluorem pristinum recuperat succus oleosus, ita ut aliquid salis vegetabilis acidi, per ignem simul commoti, semper in sinu suo gerat, ratione cujus temporis diurnitate sponse non raro in resinam facessit, pariter ac ab acido extrinsecus affuso.

§. 26. Ad Sublimationem atque Destillationem refertur, seu sub his comprehenditur primò Rectificatio seu sublimationis & destillationis repetitio, quâ corpora puriora ac subtiliora redduntur, i.e. à particulis crassioribus & heterogeneitatibus quibusvis magis liberantur, v.g. Spiritus à phlegmate & terreis reitibus, salia volatilia ab oleosa substantia, aliaque generis sublimata à variiscrementis. Adeoque illi errare videntur, qui, postquam à Spiritibus acidis aquositate per destillationem separarunt, i.e. eosdem dephlegmarunt, se absque spiritus magis concentrati reperitâ destillatione subtilitatem ac puritatem desideratam attigisse putant: latent quippe in iisdem liquoribus adhuc terreis reitibus quædam, quæ salinatum aromorum vires obtundunt iilve austeritatem conciliant; hinc proportionato ignis gradu illi toti, ad remanentiam fecum aridarum, satis copiosarum, evocandi sunt.

§. 27. Deinde iisdem operationibus accensetur Cohobatio quâ liquores & salia volatilia aut materiæ pristinae, aut simili, reafunduntur seu commiscuntur, & ab eadem denuo proliciuntur, repetendo hoc pro rei exigentia, bis, ter aut pluries. Idque vel pro evocandis materiæ particulis penitioribus, v.g. dum oleum Vitrioli ab antimonio, pro extrahendo hujus sulphure, aliquoties abstrahitur, spiritus cochleariæ super novam cochleariam destillatur: vel pro communicandis ac imprimendis residuo particulis substantiæ cohobatæ. Sive hæ activæ fuerint, & saturationi seu exaltationi residui inserviant, v.g. dum Accutum destillatum à sale tartari, pro terræ foliatæ confectioe, pluries, idque semper novum, aut spiritus Nitri à butyro antimonii, bezoardici mineralis conficiendi gra-

tiâ, destillatur: Sive eadem excrementitia & heterogenea materiæ cohobandæ exiterint, adeoque ab hac separandæ, v.g. dum Spiritus tartari oleum fortidum atque aciditas, hunc super alcali proprium aut quodvis alius, cohobando, secernitur Spectat huc Spiritus Vini super Tartarum calcinatum aut sal tartari repetita destillatio, hinc Spiritus vini tartarifati productio: quæ an tantum in phlegmatis depositione, an particularum alcalicarum simul imbibitione, consistat, nunc determinare, angustia paginarum inhihet. JOHNIUS.

S U C C U S.

Vidimus Succos investitos in sirupis, videbimus etiam sibi relictos & majori ambitu. Quod sanguis est in animalibus, id succi in vegetabilibus. Prima hinc rudimenta pharmacie posuisse videntur succi, facile parandi, unde intellectus ulterius de viribus concludere potuit facile. Hinc not.

1. *Succi sunt liquores aquei, vel sibi relictis, vel concretis.* Liquores sunt, vel ipsius succi nomine audito conformi, non unius tamen generis. Liquores, ratione consistentiæ, in plantis sunt vel aquei, adeo ut nonnulli ipsissimam aquam æmulentur, exemplo aquæ sive succi vitis, & betulæ; quales etiam sunt plantarum reliqua: um plerarumque. Vel balsamici, ut succus hyperici, oculorum populi; vel medii lactescentes, ut elulæ, scorzonæræ; ac quasi tales, uti succus chelidonii majoris; in his enim partes aquæ cum sulphureis commixtæ & temperatæ sunt. Aquei verò dicuntur non ex hoc, non tam quod aquei sint, absolute & simpliciter, sed à consistentia prædominante, quia succi sunt liquores contradiſtincti oleosis. Olea enim expressa quid aliud sunt, quàm succi pingues oleosi, inflammabiles plantarum? Valet id de sibi relictis & concretis: quicumque nempe succi etiam sicci & concreti inflammabiles sunt quâ tales, ad sulphureos resinasque pertinent magis, licet quidam sint mixti, exemplo opii. Ratione saporis mirum quantum etiam variant; alii quippe insipidi, exemplo aqueorum; alii acidi, ut succus citri, alii dulces &c. congeneres quilibet origini suæ. Liquores sunt sibi relictis, ipsâ illâ fluidâ formâ retentâ, sive illi simpliciores spectentur, minus heterogenei, sive saturiores contentis, prout variat præparatio unde vel limpidi sunt, vel densiores, & ad fundum facile dimittentes contenta. Menstruum enim cum nullum aliud adsit, quàm proprius domesticus succus sub vehiculo illo aquæ salinæ sulphuræ & terræ partes, laxius vel intimius solutæ, continentur. Concreti verò succi, seu evaporatione particularum aquearum densati, quamvis solidi, nomen suum retinent, unde succus viridis, opopanax, opium ipsum, succus acariæ, hypocystidis & alii reverâ solidi sunt, & densati, concreti, succi tamen audiunt. Imò cum frequentiori usu celebrentur, hoc loco non tam de his propositum est agere, quod inter simplicia qualifnumarentur, & facta jam magis vendantur, quàm qui Pharmacopei manu præparantur. Ipsaque illa concretio modò à naturâ ipsâ, modò ab arte fit.

2. *Succi è partibus vegetabilium magis succulentis precipue parantur.* Subiectum succorum sive materiæ ex quâ constituunt principaliter plantæ, generali notione, ut & arbores sic & frutices complectamur. Facile tamen patet, non æquè ex totâ plantâ succum elici, cum differant partibus integrantibus, cum differant essentiali humido aliæque partes aridæ, aliæ humidæ magis observentur, succo vitali vegetabili non æqualiter dispensato. Sunt quædam exuccæ seu sicciore, quæ hinc nullo modo hunc censum subeunt, saltem respectivè, ut gnaphalium, conyza, quæ hinc Germanicè etiam *Durrwurrtz* audit, & aliæ. Vel tacentibus verò nobis jam intelligitur, plantas indigitarî non aridas, sed recentes. Quæcunque verò aridiores sunt per naturam, illæ ad succum fundendum minus aptæ vel utilis-

tatæ, tum quoad partes, tum quoad totum. Est tamen & hic distinguendum inter succulentiam patentem & latentem. Sunt enim quædam primo intuitu minus succulentæ, quæ tamen in recessu abundantem succum occultunt. Exemplo sit capillus veneris, de quo laudabimus experimentum Scaligeri, l. 1. de plantis. p. m. 187. Notis, inquit, eam trichomanis speciem, quam vocant capillum veneris, ut ea sit arida, si tangatur; ut proflus exucta videatur: & nomen ipsum adianchi faver opinioni. Ex ejus herbæ sibi parum abest, quin tantundem prematur succi. Hinc verò modò ex radice elicitur succus, ut ex cepis, & imprimis ex radice iridis nostratis, pro hydragogo; modò frequenter etiam ex foliis, ut acetosâ, hyoscyamo, tabaco &c. modò ex floribus, ut rosis, violis, buglossâ; modò ex corticibus, ut succus ex corticibus citri viridibus, medius ille & suavissimus, acido-aromaticus; modò ex fructibus, ut uvis, cydoniis, pomis. Quin & partes alioquin aridæ certo & statuto tempore fundunt succum magis.

3. *Succi vel incisione, vel contusione, & expressione parantur.* Tacemus succos sponte suâ enatos, & concretos, & liquidos. Utrosque, concretos tamen magis, uno verbo Græci dicunt δάκρυον, lacrymam. Solent enim stillare quædam vegetabilia motu proprio succum, etiam non vulnerata, ubi memoranda quoque venit salix, quæ certo tempore talem velut salivam expumat, salivæ humanæ perquam similem, simul destillante guttatim liquore copioso. Tale quid in gummi ceraforum, prunorum aliisque observatur quoque, quæ primò sunt liquida, hinc densantur è poris exudantia, testimonio evidenti, arbores illas magis roscidum & resinolum fovere succum, unde gummata magis stillant, ut aliæ fungos magis, aliæ viscum quoque, aliæ utrumque: quæ singula si non principium internum solum habent, uti videtur ab arbore arcessendum, tamen comitatum obtinent. Ut verò animalia utcumque vulnerata sanguinem stillant, sic vegetabilia succum & sanguinem suum, illâ sola differentiâ, quod magis limitatos habeant terminos, poris sensim ab intra occlusis. Qui incisione parantur & obtinentur succi, ὅτῃ nomine veniunt, quamvis ejus nominis autores vix novisse videntur succum betulæ & vitis planè aqueum, vel complexi potius aqueos simul, unde quod plorare quasi videantur, lacrymæ nomen ortum. Hoc loco notare lubet succum plantarum maximam partem verno tempore ὀργασµὸν pati, turgere, & item luxuriari, ut eo solum tempore, non alio per totum ferè annum crescant, quod in arboribus ad oculum patet, exceptis, quæ ob archeum particularem diversum tempus hoc variant, & vel sub ipsâ nive florent, exemplo acorniti hyemalis, hellebori nigri. De succo betulæ præ aliis legi meretur Helmontius l. de lithiâ capite octavo, tit. 24. 25. pag. 708. Ordinariè verò magis contusione & expressione confunt. Ad contusionem spectat quoque tritus, uti poma cydonia contrita largiter fundunt succum, quem aliàs non exhibitura forent, comminutis sic intimius particulis, ut liquor vinosus hinc exprimi possit. Expressio verò fit vel manu cum lintamine, ut sic caput mortuum sive feces terreæ separentur, vel cum prelo, vel, quod majus instrumentum majori copiæ debetur, torculari, unde & Germani. *Presse*, à premendo audit. Si enim æstimemus hinc succos ab origine prima, nil aliud sunt, quam menstruum universale, aqua, ventre, ut ita loquar, plantæ cujusvis immutatas unde ex aquâ v.g. in vite sit vinum, solâ immutatione illâ, cui præter archeum, exterius calor solaris rarefaciens & coquens plurimum faver & adjumento est.

4. *Succi vel pro usu extemporaneo vel duraturo sciuntur.* Extemporaneum voco, qui ad usum præ-

sentem conficit & impenditur statim, quâcunque demum miscelâ vel adhibitione speciali. Duraturum, qui ætatem fert. Cum enim succi naturâ suâ sint corruptibiles, neque se tutari à corruptione, à putrilagine queant, ob heterogeneitatem particularum, multò minus alia; nihilominus tamen materiam utilis remediis constituent, etiam tempore, ubi virides plantæ & consequenter succus haberi non possunt, cogitatum merito fuit, quomodo servare in futuros quoque usus ipsos liceret. Hinc quoque essentia croci cum aquâ vitis præparata, quam ad melancholiam depradicant, brevi corrumpitur, nisi inspissetur. Nota verò principium corruptionis esse geminum: (1.) aquam, (2.) ipsi immensè atomos alias, licet primo intuitu minus obvias, sive heterogeneitatem particularum. Cui tertium addi potest externum, ær liber dissipativus spirituum; unde sulphur balsamationis principium invertitur, laxatur & sic corrumpitur, putrilaginemque subit, neque sal tutari ipsum potest, sub illâ miscelâ prædominantis aquæ. Esse verò hæc duo in causâ, patet experimentis variis, v. g. quod aqua pluvia, mense Martio collecta, aliaque simplicior non faciliè corrumpitur; quod liquores tales succulenti turbentur, vel fermentescant, neque pristinum suum statum in odore, sapore, consistentiâ servant. Ut itaque ad manus sit succus hic ille, cogitatum est de remediis aptis.

5. *Succi vel superfuso oleo, vel inspissatione, vel condimentis aliis in futuros usus adservantur.* Non solum utile est, succos vinosos comprimis adservare integros ultra tempus ordinariæ durationis, ut sic mustum v. g. vel tempore hyberno & æstivo haberi possit, pro gulæ illecebris rarioribus; quæ enim rara, cara sunt, sed quoque in usus medicos plures. Præstat id oleum olivarum recens, si liquori in vase vitreo alioque angustî orificiî superfundatur, ad digitum v. g. crassitiem, sive sufficienti quantitate, & pto renata renovetur. Solet enim ipsum potius corrumpi suo modo, spissescere, & aliam texturam acquirere. Imò non absurdum fuerit oleum destillatum substituere, v. g. terebinthinæ. Ratio agendi est, quia abarceatur sic ær, unde secum habitant, nec concentrata divelli possunt principia, & tenaculum sulphuris balsamici. Ær quippe corruptor est, & partium volatilium destructor. Oleum occludit omnes poros, omnem aditum, quod non æquè fieri potest aliâ occlusionem, licet & illa in statu suo aliquandiu servet, exemplo musti, non fermenti, *verhâliene Wein*. Pertinet huc & frigus condensans, & sulphur tutans ac concentrans. Utroque modo cavetur, ne calor natus, [sulphur balsamicum,] exhalet vel destruat, ac externus corruptor irrepit. Inspissatione verò id fit, quatenus particulæ aqueæ, corruptionis magnes quidam, abstrahuntur & propelluntur, beneficio caloris, unde reliquæ sub sulphuris tutamine factæ tectæ servantur contra omnem corruptionem. Sed aliam sic acquiruntur ut texturam, sic etiam ex parte usum. Idem quoque tentatum est condimentis aliis, v. g. melle & saccharo, sale pharmacopœorum universali, de quo mox sub rob, item cum sale, speciatim in succo uvarum immaturarum, sive omphacio, cui parum salis inspergi pro adervatione solet. Curiosus est modus Helmontianus, duplici loco insinuat, l. *Natura contrarior. nescia* p. m. 141. §. 45. Discant, inquit, herbarum succos, itemque jura carniū, absque sale, aceto, melle, saccharo & igne condire, atque à putredine per annos vindicare &c. verò *Pharmacopol. ac disp. modern.* §. 21. p. m. 370. patefacit. Succus, inquit, rerum, prælo expressus, solo odore cujusdam ignis sulphurei, manet deinceps absque saccharo vel alio additamento incorruptus: cujus favore acquirit balsamicum aliquid, haustusque æthereos sibi incorporatos transfert ad magnam entelechiam.

Fumum

Vinum sulphuris intelligit, qui & cadum vini à corruptione præservat. *l. asthma. & tuss. §. 77. p. 301.*

6. *Succi interius hausti vires suas dotales corpori inferunt; cruditate verò facile nocent.* Simplissima est præparatio succorum ad usum corporis, quandoquidem particula activæ proprio vehiculo sic assumuntur. Non attingemus latius illud assertum notum, succos mediante fermentatione vinum, acetum & plura largiri, quod hoc ad fermentationem magis spectet. Fermentationem verò subire possunt magis succi vinosi, dulces, ubi sulphuris & acidi nexus est, hæc arte excutiendus & liberandus. Sufficiat de succis sibi relictis impræsentiarum agere. Plura talia experimenta prostant, ut succum rutæ, senecionis, sedis majoris in epilepsiâ adhibent. Sic succus plantaginis in febribus intermittentibus proficius est. Succum raphani in tussi & respiratione læsam hauriunt, quo etiam medici olim usi fuere ad ciendum vomitum. Frequentissime omnium in usum cedunt hodiernum succi plantarum antiscorbuticarum, nasturtii, cochleariæ, becabungæ, fumaris, absinth. tum per se adhibiti recens expressi per aliquot plures dies, tum cum sero caprino; adeo, ut non pauci hunc modum pro polychresto & tantum non universali & annuo commendent, ad instar acidularum quasi. Et negandum sanè non est, in scorbutico calido & frigido, pro re nata, hæc diluentia & humectantia simul actionem suam egregie exercere; id ipsum tamen cum grano salis capiendum, neque eo abutendum est. Succi omnes ob particulas aqueas & heterogeneas crudiores sunt & flatulenti, si præsertim largiori hauriantur quantitate. Maxima ergo ratio habenda in horum usu ventriculi, ne illum gravemus onere crudiorum, laxemus humore nimio minus evaporabili, atque sic fermentum, calorem & tonum pessundemus; præcipue cum jam dum flatibus gaudeant & cruditatibus satis hypochondriaci & scorbutici isti; multum verò in robore ventriculi situm sit ad superandum vel tolerandum saltem morbum. Ut itaque non improbamus usum, concinnum & debitum sic institutum; ita abusum culpamus & damnamus, præsertim cum experientia testata fuerit non semel, inde malum auctum, inde appetitum dejectum, (quo quid gravius accidere potest miscellæ?) & naturam in oppugnando morbo potius læsam, quam adjutam. Unde satius sæpè fuerit, emhammatibus ex istis succis, cochleariæ, raphani rusticani, nasturtii, bonâ cum pace ventriculi, archei, & sanitatis hinc uti. aliisque diluentibus, quam crudis & puris putis succis. Habent sanè succi aliquod privilegium etiam præ aliis formis & præparationibus, unde succus iridis nostratis in hydropse laudatissimus est, ad cochlear j. vel ij haustus, quod à decocto, infuso, aquâ non expectaveris, sed probe omnia considerata; ne excedamus, vel lædamus naturam, cujus ministri sumus.

7. *Succi & externis usibus non paucis corpori, & præparationibus aliis medicis inseruiunt.* More aliorum medicamentorum usu gaudent primario & secundario, tum solitario, tum comitato & ministrante. Elucebit topicus hic usus exemplis quibusdam concinnis. Sic succus majoranæ, betæ, pulegerrinum, sunt egregium. Succus anagallidis præbet errhinum & collirium; Succus uricæ hæmorrhagiam narium sistit exterius & interius, quocum imbibitum stercus asininum quibusdam experimentum satis probatum est ad hæmorrhagias tantum non qualvis. Succus fumaris est ἀνδερμικόν eximium, instillatus in oculos, quem in finem etiam succus expressione profluens ex corticibus citri recentibus non raro in oculos projicitur. Succus ceparum barbami augeat, auditui & ambustis medetur. Succus esulæ & chelidonii majoris verrucas delet, oxylapathi lichenes & scabiem Succi inserviunt epithematibus, ut verbenæ, sedis majoris, ad frontem & dolorem capitis: unguentis

& linimentis, exemplo unguenti de apio, de linariâ, de acetosâ, cujus succus expressus cum butyro frigus est rubefaciens & dissipans. Faciunt ad unguenta & emplastrâ, exemplo succi hyoscyami, solani, nicotianæ, cicutæ; ad destillationes aquarum, exemplo aquæ becabungæ, betulæ, aquæ cinamomi cydoniæ, aquæ cordialis H. S. frigida, quæ de vid *Deodat.* & aliarum. Ad tinturas, v. g. martiales extrahendas, exemplo succi pomorum, acetosæ, cydoniorum, qui & ad extractum opii, ad fermentum § ij. & c. usum habet. Ad siropos, exemplo violarum, rolarum, scabiosæ, portulacæ & c. Ad rob. mivas, lapas, gelatinas.

8. *Liquores animalium spontanei succos amulantur, expressi minus usitati.* Tales liquores sunt sanguis, fel, urina. Sanguinem humanum haurire non minus crudele videretur, quam profundere, quocunque demum usu fiat, sive epilepsiæ profligandæ, seu adstringendi sanguinem fluentem, seu alio. Nullum ferè medicamentum crudelius & ignorantia rerum majus indicium laudari potest. Ut absurdissimum hinc sit *Ficini* commentum, ad vitam longam commendantis sanguinem humanum, crasso admodum errore. Sanguinis verò animalium exiccati & in clibano tosti alia paulò est ratio, ut sanguinis hirci in casu ab alto, pleuritide & calculo; asini in melancholiâ, leporis in dysenteriâ, & sic porro; isto enim pacto sanguis alium assumit characterem, & in aliud ens degeneravit, sive sanguis esse desit, licet, ut verum fateamur, illis etiam catere possimus in medicinâ *WEDÉLIUS.*

Succi ex vegetabilibus potissimum depromuntur, raro ex animalibus, E vegetabilibus puta non omnibus.

Inidonea enim sunt, i. nuclei, semina, & reliqua oleosa, qualia sunt amygdalæ, pistacia, semina lini, [de quibus egimus in oleis expressis.]

2. Minus apta sunt aridiora, ut fruges, nisi decocta harum succos appellare libuerit.

Modus fiendi.

1. Vegetabilia succulenta, [minus succulenta, macerari, intolari, elixari vè antea volunt ∇] conquala & exprime, hinc clarifica, [cum albumine ovi, filtrationeque vel digestionem quod melius,] si opus est ∇, inspissa, atque ne empyreuma contrahat, continuò agitata; sic fiunt succi.

I. *Ex floribus.* 1. Flores virides imple XX, premendo, collocenturque ad digerendum, s. putrescendum in MB. satis profunde, donec in mucilaginem abiisse videantur: Hinc exprime succum, clarifica. c. alb. ovi, & inspissa lentè ad consistentiam mellis; sic fiunt succi, [Essentiæ dictæ] borag. bugloss. pæon. verbasc. violat. & simil.

N. 1. Si flores minus succulenti fuerint, affundatur parum ∇, sic fit extractum, s. succus inspissat. flor. tunicae calendula, Keyri, Cyani, rorisim. papav. rhaad salu. & simil.

N. 2. Præstant flores primum erumpentes.

N. 3. Expressum succum si recentibus floribus affuderis, majorem succi copiam colliges.

II. *Ex fructibus.* 1. Succulentos, exprime, vel coque antea; hinc exprime trajiceque per setaceum, liquidioresque ad mellis consistentiam inspissa.

N. Succi è fructibus alio ferè nomine gaudent, mellis scilicet si dulce sapiant, ut mel juniperinum, passularum, & simil. alias Roob. Sape; ut rob. de berberis, de ribib.

III. *Ex radicibus & lignis,* interveniente coctine (in ∇,) & expressione succi eliciuntur, adsciscuntque nomen Extractorum, vide supra c. 57.

Succi officinales, tum liquidi prostant, tum inspissati.

Liquidi qui per se conservantur pauci sunt, quippe præter succos, acidulos & fermentatos illos potulentos, (qualis vinum, vinum pomorum, pyrorum, & simil.) nulli ad tempus durabiles sunt: hinc fit ut ad-

dito saccharo, melleve, in syrupum coquantur : vide de Sytopis, c. 48.

Quin imo vel ipsis succis acidulis nonnihil sacchari fere additur, cujus vi tum parum fermentantur, tum ab injuria corruptionis conservantur.

N. Dantur & succi e vegetabilibus tum per se ruptis, tum incisis sponte stillantes, [lacrymas vocare expedit] Verum hi partim nativis accensentur, partim non usuales sunt.

Talis est succus betulae, qui in Suecia & Finlandia, mensibus Martio & Aprili collectus & formentatus, mulierculis nobilibus potui suppetit; succus juglandis arboris, liquor sc. qui in quercuum stipitibus coacervatur, lacryma vitis amputata. Huc opium & simil. Succi Officinales Liquidi, qui & Vina dicuntur, sunt.

Succus berberum, citri, cydoniorum, granorum acidorum, limonum. Myrtillorum, ribium, rubi Idæi.

N. Succi recentes tot ex tempore parari queunt, quot vegetabilia viridia succulenta exhibentur, Verum quia gramineum sapiunt saporem, minus in usum veniunt, licet sapor ille saccharo corrigi queat.

Succi Inspissati.

Succus Absinthii communis.

Acacie nostratis.

N. Verus Officinis habetur inter nativa.

Agrimonia, Aloë, cardui benedicti, chermes granorum, centaurei minoris, chicorii, cydoniorum. Enula. Fumaria, Gentiana, glycyrrhia, gratiola, Hyperici, hyoscyami, ireos nostratis cerulea, liquiritia, mercurialis, myrtillorum Germanicorum. Heidelbergi safft. Nicotiana, papaveris domestici ferratic, plantaginis, portulacæ, rosarum incarnatarum rubrarum, scrophularia, solatri.

Huc Pertinent.

Rob de Berberis simplex. de Ribb. [Mel Ebulinum, sambucinum, juniperinum passularum,] consistentiam, electuarii fere obtinent. SCHRODERVS.

SVCCVS CYRENAICVS, vid. Lasepitiun.

SVBORIFICA, vid. Hydrotica.

SUFFITUS.

Suffitus est medicamentum formâ siccum, vel humidum, quod ignis vel caloris vi expirat odores variis affectibus convenientes.

Alius est siccus, alius humidus.

Siccus componitur ex pulveribus aromaticis, quibus si addantur gummata, concinnantur in trochiscos.

Ulus est

Primò, Ad roborandum, & alterandum in frigida & humida intemperie, catharro, &c.

℞. Ladan. ℥ij. styrac. calam. aromat. an. ℥ss. benj. thuris, ligni aloës an. ℥ij. ambre & moschi an. gran. ij. Fiat omnium pulvis, quo super carbone injecto sufficiantur tegmenta capitis, & de quo vapores naribus & ore hauriat in lecti ingressu. Si ex hoc pulvere trochiscos efficere velis, adde gummi tragacanthi in aqua rosar. soluti q. s. Fiat trochisci, quorum ulus idem est ac pulveris.

Detrahe moschum & ambaram, si pro mulieribus desideratur suffimentum.

Secundò, Ad exsiccaanda maligna ulcera, venerea, oris & faucium.

℞. Styrac. myrrh. thur. mascul. an. ℥ij. benjo. ℥iv. cin-

nab. ℥j. Cum mucilag. gummi tragaci fiant trochisci, quorum unus injiciatur carbonibus ignitis, fumum suscipiat æger ore hiante.

Tertio, Ad excitandos sudores in prædicto instrumento ligneo, ad luis venereæ curationem.

℞. Cinnab. ℥ss. styrac. myrrh. calam. an. ℥j. resm. pini ℥ij. cerebinth. q. s. Fiant troch. ad suffitum.

Fiunt suffitus ex castoreo, plumis perdicum, papyro, alsâ fœtidâ, solis vel mixtis, naribus tantum amovendis pro hysteriis.

Suffitus humidus vapor est, ex liquore nempe, acetô, vinô, aqua rosar. naphæ &c ex ollâ vi caloris expirans.

Excipitur in uteri affectibus per cellam perforatam, aut infundibulum: in aurium morbis per tubulum ad figuram infundibuli conjunctum.

Ulus est in mensibus sistendis, aut movendis, ex calasticis, in dysenteria, ex adstringentibus, in ani proci-dentia hæmorrhoidibus sistendis, pro quo ultima prodest sequens formula.

℞. fol. verbasc. & rad porri an. m. j. sem. lini ℥j. coq. in aq. s. q. cujus tepidus vapor ano ex perforatô sedili exci-piatur. TENCKE.

Candelæ pro suffitu Primæ ex Pharmac.

August.

℞. Benjoi, styracis calamita ana ℥iv. Thymiamatis, olibani an. ℥xij. ladan. ℥x. & viij. caryophyllor. ℥ss. sem. nigella ℥j. coriandri, granor. juniperi an. ℥ss. styracis liquid. ℥vj. cerebinthina ℥ss. carbonum tilia vel salicis ℥xxx. cum infusione tragacanthi, facta in aq. rosar. fiant candelæ.

Candelæ pro suffitu Secundæ ex eadem Phar.

℞. Styracis calamita, carbonum salicis an. ℥ij. benjoi ℥j. caryophyllor. ℥ss. ladan. ℥vj. cum cerebinthina cypria & mulilagine tragacanthi in aqua rosar. facta q. s. fiant candelæ quibus pro delicatioribus galiam moschatam addere licebit.

Candelæ pro suffitu pretiosæ. Zvelferi.

℞. Resina storacis calamita expressa ℥ij. cui imprimantur & addantur, pulver. benzoës ℥v. olibani ℥ij. ladan. opt. ℥j. carbonum tilia ℥ss. vel ℥j. quind. & addita porro s. q. mucilag. tragacanthi cum aq. rosar. facta.

Fiat massa, ex qua formentur candelæ, notetur: qui has candelas fragrantiores desiderat, præfata compositioni admisceat Ambre gryscæ vel etiam nigræ ℥j. & gummi rosarum noviter ex India allati q. pl. verum saltem in Magnatum gratiam.

Candelæ Viliores ex eodem.

℞. Pulver. asa dulcis seu benjoi, styracis calamita, an. ℥iv. olibani albi ℥x. ladan. opt. ℥vj. ligni juniperi ex rad. subtiliter raspati ℥v. carbonum tilia ℥ss.

Ex his pulveribus mixtis, addita suffic. quant. mucilaginis Tragacanthi, fiat contundendo in mortario massa seu pasta, ex qua formentur candelæ, quæ omni tempore & loco suffitus vice fragrantis, ut & contra morbos cum contagio grassantes fructuosè accenduntur.

Suffitus Cephalicus ex Phar. August.

℞. Benzoi ℥i. styracis calamita, succini citrini, mastiches ana ℥j. olibani, myrrha ana ℥vj. ligni Aloes, caryophyllor ana ℥j. flor. rosarum rubr. ℥vj. lavendula, coricis citri sicci an. ℥ij. contundantur crassiusculè & misceantur.

Alius

Suffitus Alius Zvelferi.

℞. Ase dulcis seu benzoës, styracis calam. pure, olibani an. ℥ij. gummi anime ℥j. ligni juniperi odorati & radicibus crass. raspati ℥ss. misceantur, fiat pulvis grossus.

Alius ex Eodem.

℞. Olibani ℥vj. mastichis, styracis calam. an. ℥ij. ladanii optimi ℥ij. ligni juniperi odorati ex radicibus ℥v. fiat ex omnibus pulvis grossus.

Suffitus Antipestilentialis Zvelferi.

℞. Succini citrini ℥iv. styracis calamita, olibani ana ℥ij. myrrha rubra ℥ij. ligni juniperini odorati ex radicibus subcil. tornati ℥iv.

Misceantur fiat pulvis grossus. Qui verò sulphur huic pulveri addere voluerit, illi liberum est: conducibilis tamen videtur solo sulphure sæpius accenso loca suspecta suffumigare.

Suffitus Communis ex Phar. August.

℞. Baccharum juniperi, rasura succini citrini an. ℥ij. flor. rosar. rubrarum ℥ss. ℥ij. styracis calamita ℥ss. ligni juniperi ℥xj. mastichis & sandaraca an. ℥x. olibani ℥vij. misce, fiat pulvis crassiusculus.

Suffitus Delicatus ex eadem Phar.

℞. Benzoi electi ℥ss. styracis calamita ℥vj. ligni aloës ℥ij. fiat pulvis crassiusculus.

Suffitus Menfes provocans ex Nicol.

Lemery.

℞. Rad. ireos, bryonis, sambuci an. ℥ss. fol. salvia, sabine, majorana, matricaria, arthemisia an. m. ss. gagatis, bacchar. juniperi, lauri an. ℥ij. fiat omnium pulvis pro Suffitu.

Pastilli pro fumo Usitati ex Phar. August.

℞. Benzoi electi ℥ss. styracis calam. ℥x. ligni aloës ℥iii. caryophyll. ℥vj. cinnamomi electi ℥ij. ligni cupressi ℥ss. sacchari albi ℥xiv. cum infusione Tragacanthi aqua rosarum facta, fiant pastilli.

Pastilli ad suffitum pretiosi ex Zvelferò.

℞. Resina styracis calamita expressa ℥ij. qua imprægnentur sequentia: pulver. benzoës seu ase dulcis ℥ss. gummi rosar. ℥i. Ambra grysea ℥j. soluta prius cum ol. cinamomi, caryophyll. ligni rhodii ana stillatit. ss vel gran. xv. item moschi Orient. ℥ij. solut. ad pulvis formam cum port. aqua rosarum, pulver. carbonum Tiliæ q. s. pro massa in calido mortario efformanda, ut si refrigeraverit, durissima fiat, ad instar cera Hispanica. Circa eorum usum tamen hoc observandum, quod igni seu prunis immediate non injiciendi sint, sed supra laminam argenteam, ferream aut cupream, vel ipsum vitrum, substratis vivis carbonibus, collocari oportet.

Teda Aromatica ex Phar. August.

℞. Benzoi, styracis calamita, mastichis, olibani, ladanii an. ℥i. caryophyllor. cinnamomi, sandali citrini, succini albi an. ℥ij. cera tss. fiat teda ad crassitiem unius digiti.

Illiusmodi Tedis Medici Lamedochiales nostri quondam utebantur, pro dissipando venenato aëre, & corrigendo conclavium infectorum fetore, in magna illi peste, quæ anno millesimo sexcentesimo vigesimo septimo, ut & octavo urbem nostram depopulabatur.

Suffitus ad Uterum Procidendum ex Weickardò

℞. Bituminis, colophonia, an. ℥j. lapidis gagatis, usnea an. ℥ss. rad. bistort. cupul. glandium, balaustior. n. ℥ij. castorei ℥j.

Terantur omnia crassiusculè, fiatque pulvis, de quo urgente necessitate p. i. supra carbonem ignitos conjiciatur, ac fumus per infundibulum recipiatur.

Suffitus ex JOH. MICHAELIS.

Rec Suffiment. Angel. Myns. ℥j. D. S. Kästlich. vvol. riechend Pulver.

℞. Suffiment. Imperial. ℥j;
S. Ut supra.

NB. Malè carbonibus injicitur, sed potius cum papyro supra Δ fit fumus.

℞. Baculor. pro fumo. ℥ss. Illinantur ss. caryoph. & lign. rhod. vel affric. Essentia ambra M.

℞. Pulv. suffimig. Angel. Myns. ℥ss.
Formetur cum Balsamo Peruviano vel ambra liquida Myns. trochisci.

D. S. VVolriechende Kuchlein.

℞. Pulv. pro suffiment. Imper. ℥ss. carbon. salic. q. s. f. q. Gummi tragac. vel ambra liq.

F. l. a. Aviculæ.

S. VVolriechende Kerslein.

Baculi pro fumo Regis Hispaniæ.

℞. Myrrh. Benzoi ana ℥iv. styr. calam. ℥j. Moschi optimi ℥ij. ambra ss. zibetbi ℥j. ol. stillat. cinamomi q. vj. caryoph. ss

F. l. a. Pastilli odoriferi.

Ex hisce baculis etiam formari potest pomum ambra & illiniri Balsamo apoplectico nostro.

Pulvis pro suffimigio ad Catharos.

℞. Gummi junip. ℥ij. racamah. succini ana ℥j. shurtii. mastich ana ss. styrac. calam. benz. an. ss

M. S. Rauch-Pulver gegen die Flässe.

℞. Suffiment de succino Myns. ℥ss.

℞. Pulv. pro fumo tempore pestis ℥j.

℞. Suffiment de ss. ℥iv. D.

Huic affunditur l. q. optimi. De hoc & postmodum affunditur silicibus ignitis & fumus excipitur.

℞. Suffiment. de cornu capra Myns. ℥ss. D.

℞. Flor. sulphur ℥ij. Myrrha ℥ij. benzoi, styrac. an. ss. f. q. mucilag. tragac. cum ∇ preserv. præp. F. l. a. Trochisci pro fumo.

℞. Suffiment de Sabina ℥j.

M. S. Rauch Pulver aufsetlichmal, in obstruktionem huius.

℞. Suffiment. de Tacamah. Myns. ℥j.

S. Käuher-Pulver, in suffocatione uteri.

*℞. Troch. de verbasco Myns. ℥ij.

S. Käuher-Pulver, ad hæmorrhoides cæcas & condylomate.

Suffimigium in Luc Venereâ.

℞. Cinnab. factit. ℥ij. gummi benzoi. styr. calam. ana ℥j.

Suffitus humidus.

℞. ∇ res optim. lil. convall. cum vino melissæ cum vino an. ℥ss. Mag. benz. styrac. an. ss.

Bulliant

Bulliant super prunas leniter in vase stricti orificii.

℞. ∇ optim. angel. ℥iv. S. Wolriechend Wasser.

℞. Angel. optim. ℥iij. flor. lavend. cordial. Norimb.

ana ℥j. — lavend. sambuc. cort. citri melisse ana ℥j M.S.
℞. ∇ serpill. cum vino, lil. convall. c. vino, melissa cum
vino, lavend. ana ℥j.

M. S. Wolriechend Hauptwasser.

℞. Pulv. alipt. mosch. gall. mosch. ana ℥j. rad. ireos
flor. ℥j. ambræ, moschi ana gr. vj. sacch. candi optimi c.
gummi tragac. in — ros. dissolut.

F. l. Globuli.

S. Köstliche vvolriechende Mundkuchlein.

℞. Rad. ireos Florent. ℥j. pulv. diatomat. pretios. ℥ij.
cumf. q. sacchari candi & gummi tragac. in — rosar.
dissolut. F. l. Globuli.

S. Köstliche vvolriechende Mundkuchlein.

Pulvis ad vestimenta odoriferus.

℞. Flor. lavend. rosar. rub. m. S. rad. ireos. Florent.
℥j. ras. ligni Rhodii ℥℥. styr. calamit. benz. an. ℥ij.

M. S. Wolriechendes pulver zum Kleiden.

Pulvis Manualis odoratus.

℞. Magmat. amygd. express. ℥j. farin. fabar. lupin.
ana ℥ij. rad. ireos florent. ℥j. creta albiss. ℥℥. calci sub-
tilissime pulverisati ℥vj. — tartari ℥ij. styracis, benz.
ana ℥ij. S. still. Rhod. ℥℥.

M. S. Wolriechend. Pulver.

Pilæ ad Manus.

℞. Sapon. Hispan. ℥iij. Axung. cervin. ℥℥. balsami,
Peruviani ℥j. ol. stillat. ligni rhod. ℥℥.

F. l. a. Pilæ.

S. Handballen.

℞. Sapon. Veneti ℥iv. pulv. rad. ireos Flor. ℥℥. rosar.
alb. ℥ij. styrac. benz. ana ℥℥. ambræ, moschi, zibethi an.
gr. iij. cum ∇ ros. & lavend.

F. l. a. Sapo odoratus. S.

Sapo in Scabie & impetigine.

℞. Sapon. Venet. ℥iij. flor. — ℥ij. — tartari ℥℥.
extr. lapathi acuti ℥j. helenii cumf. q. styrac. liquid.

F. l. a. Sapo.

Balsamus Saponis Cosmeticus.

℞. Sapon. Veneti in succo limonum dissoluti ℥j. mellis
virgin. albæ ℥iij. cosmet. Clavii ℥ij. pulv. rad. ireos flo-
rent. ℥℥. — tartari ℥ij.

F. l. a. Balsamus.

S. Handbalsam.

Balsamus Cosmeticus.

℞. S. tartari per del. amygd. dulc. ana p. ij. jasmim.
part. j. M.

Agitando pro linimento. Omnes impuritates & ma-
culas tollit.

Globuli pro barbâ usitati pretiosi.

℞. Myrrh. Benz. styrac. calamit. gummi anim. ana
℥ij. cera citrin. ℥℥. moschi, ambr. zibethi ana gr. vj.

F. l. a. Globuli.

S. Köstliche Kugeln zum Barth.

Globuli ad barbam communes.

℞. Gran. thur. mastich. ass. dulc. gum. anim. ana ℥iij.
cera citrine ℥vj. S. stillat. ligni Rhod. ℥j.

F. l. a. Globuli.

S. Barthkugeln.

Pro Ditionibus fieri possunt globuli ex fumo His-
panico.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

Suffitus ex Hadriano à MYNSTICHT.

Suffimentum Angelicum.

℞. Gum. styracis calamit. benzoini ana p. &.

Solvantur in aq. Rosarum op. & fortiter sine mora
exprimatur; Postea exsiccantur, pulveriscentur & ad
usum servantur.

℞. Hujus pulveris ita præp. ℥i. lig. aloes, ponderos.
℥ij. rosar. rub. exsic. ambræ griseæ ana ℥j. zibetta non
falsar. moschi ana ℥℥. bals. Peruviani odorif. ole. lig. rho-
dini ana ℥j. eboris ad nigredinem calc. q. s.

Misc. ritè cum aq. fragrantiss. Rosarum, & expa-
stâ subactâ formentur pastilli nigri, qui involvantur fo-
lis Rosarum, siccenturque in umbra, & vale vitreo
reponantur.

Vires & Usus.

Cæsares, Reges, Principes, alique Magnates & di-
vites hisce ad lussumigandum magnificè utuntur, unus
enim vel duo super prunas ignitas positi, vel tempo-
re hyemis fornaci calido admoti, aut etiam in aq. Ro-
sarum infusi & cocti, suavissimum, desideratissimum
& quasi Angelicum & coelestem odorem halant, &
non solum cerebrum & vitales spiritus jucundissime
recreant; verum etiam maligni aeris contagia irrita
reddunt.

Suffimentum Imperiale.

℞. Styrac. calamet. depurat. benzoini ana ℥℥. lig.
aloes elect. ℥ij. zibetta non falsar. ℥j. Galie moschat. ve-
ra ℥j. ol. charyophyllorum, rosar. veri an. ℥℥.

Mixta l. a. cum aq. Rosacea pastillicentur, & ad
usum conserventur.

Vires & Usus.

Carbonibus ignitis injecti, gratissimum odorem
excitant, qui non duntaxat venenosum, foetidum, pu-
tridum & corrosivum aerem corrigit; verum etiam
jucundè & suaviter internos Spiritus, animos homi-
num insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum
in orificium uteri immixtus, mulieres suffocatas
mirè revocat & omnes matricis motus inordinatos fi-
sit. Cavendum tamen hic tegumentis necessariis, ne
odor ille suavis ad nates ægræ peringat.

Suffimentum Epilepticum.

℞. Succini alb. ℥xj. myrrhæ rub. mastichis elect. gum.
anime, galbani, elemi ana ℥ij. visci quercin. sem. pæonia,
exc. bac. juniperi, ras. corn. alcis ana ℥j. absinthii, ma-
jorana. flor. lavendula, lilior. convall. ros. rub. ana ℥℥.

Misc. & cum infusione tragacanthæ facta in aq. Epilep-
tica nost. f. l. a. Trochisci pro suffitu.

Vires & Usus.

Fumus hic supra carbonēs natis Epileptici ad-
motus, patoxygium ipsi sedat, & valde prodest iis, qui
periculosos capitis morbos, qualis est apoplexia & pa-
ralysis, timent, contra strangulationes etiam & uteri
procidentiam recipitur.

Suffimentum de Sandaraca.

℞. Sandaracæ opt. ℥iv. succini albi. ℥ij. mastichis elect.
Sem. nigel. rom. coriand. præp. an. ℥j. rosar. rub. exsic.
gum. anime, olibani, styrac. calamit. benzoini ana ℥ij.
flor. papav. errat. lig. aloes an. ℥j.

Misc. & fiat pulvis grossus pro suffitu.

Vires & Usus.

Carbonibus vivis inspergitur & fumus ad nates, ca-
put, totumque corpus decenter suscipiatur & attraha-
tur: Qua in listendis, & exsiccandis, catharrhis omni-
bus

bus, tam frigidis quam calidis, saluberrimus est.

Suffimentum de Succino albo.

℞. Succini albi ℥ iv. sandaracæ ℥ ij. mastichis elect. Olibani ana ℥ j. gum. animæ rub. myrrha rub. rosar. rub. ana ℥ ss. tacamahacæ, styrac. calamit. ladani puri an. ℥ ij. Origani Cret. thymi exsiccat. serpilli an. ℥ j.

Misc. & f. pulvis grossus pro suffitu.

Vires & Usus.

Est pulvis valde illustis, quo supra carbones imposito, suffumigentur tam caput, quam operimenta ejus: Est enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab iisdem præservandis præstantissimus & famosissimus.

Suffimentum de Tacamahacæ.

℞. Verrucar. equarum tibis adnascentium. ℥ j. gum. tacamahacæ, galbani ana ℥ ss. cornuum ung. capræ, succini citrini ana ℥ ij. blattæ bizantie, castorei veri ana ℥ j.

Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires & Usus.

Furnus hic per tritorium ad retortam detruncatam, utero supra sedem clausam, instante paroxysmo immixtus vel etiam naribus admotus, quali momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes. Sed mirum est, Uterum hunc sustinere factorem, cum alias ejus sit impatientissimus.

Suffimentum de Sabina.

℞. Herb. Sabina recent. exsic. ℥ ss. styrac. calamit. myrrha rub. opopanax, sagapeni ana ℥ ij. cinamomi acut. pulgii utriusque sic. bac. lauri, sem. cymini ana ℥ j. trochisc. albandal. ireos florent. asari ana ℥ ss. galliæ moschatae vera, alipte moschat. ana ℥ j.

Misc. & cum terebinth. alb. f. Trochisci magni pro suffitu.

Vires & Usus.

Ponatur unus ex his super prunas vivas & recipiatur fumus per infundibulum, [nisi sint puellæ non devirginatæ, quibus etiam nec suppositoria seu pessaria possunt immittere.] Est enim ad scienda muliebria probatissimus. Si mulier est paupercula, omittantur Ambra & Moschus.

Suffimentum de Hypocistide.

℞. Hypocistid. ℥ j. succini alb. cort. thuris ana ℥ ss. usineæ quercin. exsic galbani opt. colophonæ, asphalti an. ℥ ij. cupul. glandium, Bistortæ, balanstior. ana ℥ j. rosar. rub. caryophyllorum, castorei ana ℥ ss.

Misc. & excipiantur terebinthina alb. & fiant Trochisci magni pro fumo.

Vires & Usus.

Experimentum est contra Uteri procidentiam, videlicet, quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & vesperi fumum hunc recipiat, & propter gravem odorem brevi liberatur.

Suffimentum de Cornu caprino.

℞. Ras. de cornu caprino. ℥ ij. succini citrini, myrrha, rub. lig. juniperi, stor. sulphuris ana ℥ vj. rad. enulæ, camp. Angelicæ, hort. caryophyllatæ ana ℥ ss. olibani, benzoin. laudani, styrac. calc. ana ℥ ij. rosar. rubr. absinthii, ruta, hort. scordii, fol. lauri, caryophyllor. camphoræ ana ℥ j.

Misc. & cum terebinth. cypriæ formentur Trochisci pro fumo.

Vires & Usus.

Facere ex his suffumigia tempore pestis in cameris aliisque partibus domus valde utile est: Quia hic fumus corruptum & pestiferum aerem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat atque præservat. Non autem aer ille artificialis tota die necessario teneatur occlusus; sed tam in æstate quam hyeme [vento tamen Septentrionali, & aere claro & non turbido stante] fenestræ interdum aperiuntur & permittantur intrare radii solares, maxime manè per horam duas post solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem & siccitatem judicantur meliores resistere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

Suffimentum de Vitriolo.

℞. Vitrioli virid. ℥ viij. nitri purgati, myrrha rub. ana ℥ iv. stor. sulphuris simpl. succini citrini ana ℥ ij. bac. lauri rec. juniperi ana ℥ i ss. ras. cornu cervi, olibani ana ℥ j. fol. scordii, ruta, rosar. rubr. ana ℥ ss.

Misc. & f. pulvis pro fumo.

Vires & Usus.

Infundantur pulverisata in Aceti vini f. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam aut in locis & domibus infectis consumit, vestesque, quibus adhæret, a veneno liberat facit.

Suffimentum de Verbasco.

℞. Rad. herb. verbasco ana ℥ j.

Pulverientur, misceantur & cum Terebinthina fiant 1. a. Trochisci.

Vires & Usus.

De his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in tenesmo, & aliis alvi profluvii singulari sunt experimentum; sede tamen undique circumsecta, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, imò sæpius in die repetendum, & brevi incolumis evadet.

SULPHUR in Genere.

Principem locum inter principia chimica tenet Sulphur, calidi quippe foris, in quo vita consistit, unde animam quasi materialem præbet omnium mixtorum & viventium, ut sulphur vitale sit, quod motu gaudet, quod lucem internam exerit motu proprio & intrinseco animæ. Sunt verò & Sulphura in censu medicamentorum pharmaceuticorum, de quibus not.

1. Sulphura sunt pulveres inflammabiles, vel quasi tales, & colorati. Sulphura audiunt ob analogiam generalem, quæ conveniunt cum sulphure nativo minerali, quod sulphuri nomen largitur, seu ut principio chimico constitutivo considerato, seu ut medicamento, unde quod Paracelsus de sulphure prædicat, quicquid ardet, sulphur est, illud etiam his sulphuribus pharmaceuticis imprimis convenit. Ita verò audiunt sulphura solida, seu pulveris formæ, ut sic contradistinguantur sulphuri liquido, seu spiritoso, ut in spiritibus vinosis, seu oleosis, quod in oleis & pinguedinibus visitur, seu viscido, ut in pice, bitumine, & sulphure communi ipso. Pulveres sunt, ut vel sic dissociatum inquitur sulphur, & cum terreis particulis affine. Strictius nempe sic sulphura accipiuntur, cum alias latissime pateant, restricta solum ad pulveres. Differentiam vero specificam largitur pulveribus his, seu generi, (1.) inflammabilitas, sive illa sit pura, libera, & ex toto saltim ad sensum, & à potiori, seu ex parte. Sunt enim sulphura immersa quoque aliis, quæ corporaturam su-

stinent

stinent. Satis est, sulphura hæc esse inflammabilia vel quasi. Hinc patet, quædam etiam dici paulo *ἀκρίως* & latius, ut sulphur opii fixum, quando calcinatur idem impastatum cum spiritu vitrioli in crucibulo, vase clauso, ne sulphur deflagrare tam libere & omne possit. (2.) color flavescent, auratus, citrinus, ruber, eminentis sulphuris indicium. Id verò cum in crocis quoque visatur, martis & *ῤῥῖ*, neque tamen inflammabilitate gaudeant, distinctam à sulphuribus classem constituunt. In quibusdam inflammabilitas saltem est in recessu. Tacemus odorem & lucem. Sulphur igitur tum purum & per se inflammabile, tum aliis particulis immersum, acidis, terreis, fixis, in omnibus regnis dari & elici posse inflammabilitas, odor, lux, calor & color demonstrant.

S. *Sulphura sunt alia spontanea, alia separata & in apricum deducta ex aliis.* Spontanea καὶ ἑξ ὧν sunt mineralia; exemplo sulphuris communis statim sui, crystallini, stillatitii, vivi, adæquatè verò in aliis quoque regnis. Hinc de metallis universale assertum, omnia constare ex sulphure & mercurio. In vegetabilibus eminent sulphura in resinis, ut eminenter in camphora, ardet quoque opium, seorsim verò in antheris arborum, fruticum & florum. Cum enim sulphur vitale prolificum in flores & semina concedat, hujus prodromum & exemplar præbent antheræ, pulvillus tenuissimas impalpabilis, qui etiam circa loca sylvestria aquas pluvias in crustas & ad oculum apparet, unde varias sæpe pluvias sibi finxere monstrosas, antheræ per æra late debitas. In animalibus spontaneum sulphur tale præbet sanguis, qui si exiccatus fuerit, ut & bilis, ardet. Separata verò dum dicimus, hoc ipsum supponit fuisse prius implicitum. Separantur ergò sulphura ex quovis regno, licet ex aliis difficilior, omnium difficillimè verò ex metallis, tanquam fixioribus, neque idèò tamen neganda, quod nonnullis visum est. Varius enim sulphuris est nexus, separandi nonnunquam à terrâ, ab aquâ, à salibus, acido, volatilibus, quibus implicatur; & ipso nexu suo & diversitate variè ferruminat alia & cum aliis seipsum, ita ut in quibusdam sit minus panis & inseparabile ferè magis. Est enim omnium vinculum, inque ejus reclusionem, quod diximus, tota solvendi consistit ratio in universum.

3. *Sulphura separantur vel igne, vel menstruis, formâ sicâ vel humidâ.* Ignis principium est destructivum sulphuris, ergo contra perpetuo & potenter agit, ejus vincula laxat & excutit, modò aditus pateat, ut si non immediate sulphur sic emineat & conjungat, seu separetur actu, tamen mediâtè & potentiâ. Exemplum talis separationis concipi potest in cinnabari. Firmior hæc apparet, quam ut deflagrare & consequenter deflagrando separari possit sulphur exinde. Verùm ad oculum ardere hoc inter alia experimento patet; si enim cinnabaris nativa sublimetur, ex cucurbitulâ minori, igne fortius administrato & orificio aperto, manifesta eructatur flamma. Sic etiam in sublimatione antimonii flores terreæ-sulphurei eleantur. Sic ex glasto sulphur paratur auratum, si caput mortuum à destillatione levius calcinetur, imò ex ipsis carbonibus lignorum, bituminosis, & aliis idem suis artificiis separare licet, igne prævio. Sic etiam mediâtè ignis aptat sulphura, ut extrahi possint cum alias, tum in metallis quoque. In his quamdiu sulphur non excussum ob id ipsum sunt fusibilia, ductilia & malleabilia; ab igne verò, excepto auro cumprimis, viscedo illa destruitur, ut calx emergat, ex calce verò hinc partes sulphureæ ramosæ, saltem cum aliis particulis, educi possunt, exemplo præcipuè saturni quando è minio, vel cerussâ, calce ejus, per acetum destillatum extrahi videmus manifestè ramosas particulas, unde & in saccharo saturni sulphur hoc occultatum est, sapore dulci,

Magnet. Bibl. Pharm. Tom. II.

sulphuri proprio, & colore rubello se exerens, ut spiritum ardentem denuò non laudemus. Idem verò separatur quoque à menstruis, scû interveniente ac committante igne, seu seorsim, non uno modo. Exemplum etiam separati sulphuris per ignem & putrefactionem præbent phosphori ex urina, & alii.

4. *Sulphura separantur menstruis sulphureis & salinis, principaliter alcalibus.* Sulphurea quidem rarius hæc fine impenduntur, sed frequentius pro sulphure liquido obtinendo, in essentis, tincturis, vel balsamis parandis, uti balsamum sulphuris sic paratur, & tinctura quoque. Unde ferè statim post principia, & juvantur quoque salinis, neque enim sine his ingressum obtinet æquè facilem Vi, exemplo essentia *ῤῥῖ* tartarifata, & sulphur hoc pacto subtilisatur magis, quam ut in formâ solidâ hinc præcipitari, saltem in decente quantitate, possit. Exemplum tamen hujus præstat sulphur tartari fixum *Zobeli*, quod parat ex tinctura tartari, è sale tartari, prius fortissimo igne per *ῤῥῖ* calcinato, paratâ, & hinc ad siccitatem abstractâ, quamvis hoc ipsum sulphur non sit purum, sed cum particulis salinis remixtum. Frequentius verò salia huic rei inferiunt, & principaliter quidem alcalia. Exemplo sit sulphur auratum antimonii, hoc siquidem minerale sulphure est refertissimum, & constat, tanquam basis, elementis geminis, partibus metallicis regulinis, quas & mercuriales appellare licebit, & maximè sulphureis; quibus illigatæ acidæ, ad instar sulphuris vulgaris, & aqueæ ac terreæ reliquæ substant. Quorum mentione occurrat, naturam velut digito opus suum in metallorum generatione monstrare, & ratio alia, quare antimonium vocetur primum ens metallorum, quia nempe laxius sulphur & mercurium coherentia monstrat & exhibet in antimonio, quæ in reliquis magis magisque sunt coagulata invicem, & sic minus respectivè separabilia. Sulphur igitur auratum antimonii impurum quidem hinc magis existit, quod cum terreis & acidis coaluit penitus, unde non ex toto est inflammabile, licet & illud variet, aliudque præ altero sit nobilius. Elicitur nempe hoc ipsum duobus modis, quorum primus & frequentior sit per alcalia, quæ sulphur primario, & hoc cum partes terreas solvant. Sic sit conjunctim cum regulo antimonii, ex *ῤῥῖ*, tartaro & *ῤῥῖ* ana sumptis, & successive igne fusionis in crucibulo detonatis, ubi pars quidem deflagrat; pars tamen non minima capitur sub scoris. Duo enim inde emergunt, regulus, seu pars metallica, & scorix, quæ in se sulphur cum partibus alcalinis & terreis condunt, unde factâ elixivatione transit per filtrum cum amico sale implicitum, terreæ partes, sub nomine croci metallorum debilioris, remanent in filtro; illud verò præcipitatur per acetum simpl. vel destillatum. Sic idem sit seorsim, si cum calce vivâ & sale tartari, vel hoc solo aliove calcinetur, aut potius compendiosius & viâ brevi, quæ eodem recidit, si coquatur antimonium pulver. cum s. q. lixivii saponariorum, & procedatur eodem modo, filtrando hinc & præcipitando. Lixivium enim hoc constat ex alcalibus cinerum & calcis vivæ. Ita sulphur auratum sit in majori copiâ, eo quod nullum sic deprædetur ignis, ut in priori casu, sed integrum maneat, & possit semel iterumque caput mortuum coqui eodem modo, repetendo processum.

5. *Sulphura, v. gr. *ῤῥῖ*, separantur, adæquatè etiam per menstrua acida, viâ humidâ & sicâ.* Mirari quis posset, quomodo unum idemque solvi possit per contraria menstrua. Verùm quare id fiat facile patebit, si rem consideremus penitus, non minus ac quibusdam aliis idem accedit, ut tartaro. Alcalia menstrua solvant & extrahunt sulphur per *σύνεσιν*, per symbolismum, collectivè, ob affinitatem pororum, quibus se invicem subeunt & ingrediuntur, unde & sulphur pro lacte sulphuris parando, si cum lixivio coquatur, elegantem

liii 2 exprom

expromit colorem suum. Acida separant idem & exhibent per *ἄγνευσιν*, per separationem à terrâ. Acida enim cum in sulphur ipsum nullum habeant jus, quâ tale inveniunt & nanciscuntur idem mediante terrâ quâ cum sulphur intimius unicum est. Solvunt igitur & ag-grediuntur primario terram ac partes regulinas me-diantè hâc sulphur, quod sic ex hospitio suo destructo extrahitur. Duplici modo hoc ipsum paratur, sine igne, viâ humidâ, & cum igne, viâ siccâ. Illud fit, si anti-monium solvatur affusione successivâ aquæ fortis, sale comm. roboratæ. *F.* & factâ solutione quasi præci-pitetur adusâ aquâ simplicî sulphur *φλογισόν*. Hoc, si antimonio pulverisato affundatur oleum vitrioli, vel so-lum, vel cum spiritu salis ana, & tumultu composito de-stilletur per retortam, unde sulphur citrinum commu-nis æmulum in collo retortæ sublimatur, de quo vid. *Boyl. chim. sept. p. m. 25. seq.* qui & spiritu nitri fecit, *Willis. lib. de ferm. p. m. 74. & 95.* ipseque cumprimis *Helmontius I. H. V. L.* Sunt qui hoc ipsum sulphur em-bryonatum *Helmontii* vocant & apprimè commen-dant. Uti verò dictis modis sulphur auratum antimonii haberi potest; ita etiam modus alius notandus est per su-blimationem cum sale ammoniaco, quod ipsum si cum antimonio pulverisato ana sublimetur ex cucurbitâ, igne arenæ gradibus debitis, ev. hitur idem sulphur auratum in alembicum ab hâc aquilâ, à salitudine per affusionem aquæ liberandum facili, quævis vulgò vocent eos flo-res antimonii compositos. Sic etiam hinc ex terrâ vi-trioli dulci cum sale ammoniaco sublimari potest sul-phur vitrioli egregium.

6. *Sulphur coagulat mercurium, nominatim in cinnaba-ri, ab eo verò liberatur per alcali, purius sic & fixius.* Di-vilimus sulphur in purum & imputum, item in fixum & volatile, quod ex affectionibus propriis laudatis elucet, & effectus. Valet id in genere de sulphure quo-vis, unde digesti, indigesti, maturi, immaturi, narco-tici acquirunt nomina. Eâ verò occasione duo insinua-mus: (1.) Sulphur coagulare mercurium, quæ regu-la in doctrinâ de metallis, & ipsâ alchimia, magni est momenti, unde & qui cinnabarin invenere primitus, inquisivere sic eandem coagulationem in aurum. Est verò non una hæc coagulatio, sed variat respectu sul-phuris ipsius, & respectu mercurii, quæ prout in puri-tate & additamentis, volatilitate, fixitate variant; ita etiam effecta in metallis non una visuntur. Sufficiat hinc nobis, aliam esse laxiorem coagulationem, aliam stri-ctiorem & reverâ metallicam. Hinc etiam divisio sul-phuris, verbi gratia, metallici, alia est notabilis in externum & internum. Illud est separabile, hoc minus, illud *φλογισόν* magis, hoc viscedo metalli-ca, de quo vid. *Helmont. lib. de lithias. cap. 8. t. 6.* Hinc qui mercurium transmutare in aurum volunt, id sine sulphure speragere tentent, frustra sunt. Duo hæc indubiè sunt artis fundamenta, & inconcussa qui-dem, cum mercurius primâ metallorum materia, abs-que sulphure nunquam in metallum coagulari possit; licet & ipse suum internum habeat sulphur. Sed hæc obiter. Alio itaque modo elementum hoc ignis seu sul-phur haberi potest, non quidem diversum quoad mo-dum præparandi, diversum tamen quoad seipsum. Cum enim in coagulatione illâ laxiori nobis dictâ acidum & viscidum sulphuris implicatum sit ita cum mercurio, qui viscidum metallicum in se habet & acidum subtilius, vincula illa diruit alcali, si v. g. cinnabaris nati-va, artificialis simplex vel antimonii cum anatica pro-portionem salis tartari misceatur, & ex retortâ terrea igne immediato propellatur, per gradus administrato, indita in recipiens aquâ frigida. Sic enim mercurius li-beratur à viscedine & acido sulphuris, quo cum coalue-rat, & propellitur in recipiens. Ex capite mortuo verò coctione cum aquâ separatur sulphur, cum *×* præci-pitandum, quod ipsum est purius & fixius, genuina pul-

monum medicina. Ad eundem modum *Quercetanus in-ter. p. 449.* ad separandum mercurium ex cinnabari, quæ ejus mineta est, utitur calce vivâ. Quomodo verò sulphur metallorum extrahi possit, ut v. g. ex venere, corpore reliquo albo relicto, de quo latè passim agit *Helmontius*, adhuc inter arcana reservatur adeptor-um.

7. *Sulphura sibi relicta anodyna, confortativa, & reno-vativa; mixta & impura minus & remissius id obtinent.* Vires possunt in generales & speciales dividi. Genera-les imprimis sunt, quod acrimoniæ salinæ sunt antido-tum, Sulphur acido est contrarium, ut acidum sulphu-ri, implicat viscedine suâ & obtundit hastata & spicu-lata salia, absorbet & invertit acidum. Adeoque est ano-dinum sulphur partim positive, quatenus illigat spiritus & poros obstruit, si mage roscidum fuerit, & resolvable; partim privativè, quatenus causam dolorum salinam corrigit, unde *Δ* *Ἰ*ii purum & cinnabaris ipsa strenuè hoc exequitur. Sulphura tamen hæc mineralia, utpote minus vaporosa, potius anodynâ titulum, quàm narco-tici merentur, unde mitigant humorum acrimoniam acetosam. Sunt confortativa, quatenus cum sulphure vi-tali puritate suâ conveniunt, unde luce suâ illud refi-ciunt, serenant & foveant, ac naturæ amica sunt, unde sunt cephalica & cordialia. Et scorsim cinnabaris in omnibus doloribus & debilitatibus visce-rum vitalium strenue se gerit. In quibusvis doloribus & membranarum partium irritatione ac rosione fa-ciunt officium. Sunt renovativa & immutativa, in sca-bie, elephantia, lue venereâ proficua. Cumque id ipe-ciatim in phthisi & affectibus pulmonum visatur neces-sarium, *Δ* *Ο*ium *Ἰ*ii nobilissimum strenue id exequitur, unde tinctura *Ἰ*ii sicca *Gramanni* inclari solet. Exemplo etiam sit epilepsia & motus spasmodici, in quibus sulphura hæc optimè se gerunt, imò ipsum sulphur auratum, præci-puè *Ο*re, ad gr. j. cum aliis datum epilepticum est ge-nerosum, quod non semel deprehendimus proficuum. Imò panaceæ etiam, communiter dictæ non aliunde quàm ex sulphurum hæc classe petendæ sunt. Sic etiam in febribus intermittentibus sulphur embryonatum *Ἰ*ii proficuum est. Mixta verò & impura id præstant remissius, ob gradum minorem, respectu sulphuris vitalis, ob admixtas particulas alias, unde sulphur auratum majori dosi adhuc movere solet vomitum, accessione auri aliorumq; metallorum etiam roborandum. Idem quo-que valet suo sensu de sulphure vitrioli, cui cum adha-reat, indivulso quasi nexu, ochra vitriolica venerea, vis emetica sæpe magis competit. Præcipitatur ex solutione ejus, vel quoque *Ἰ*ii, cum Marte vel alcali alio. Sublimatum verò cum *Θ*e *×*co confortativum & ape-riens est insigne. Tacemus vires speciales alias.

Sulphura igitur sunt pulveres inflammabiles, vel qua-si, & colorati, vel spontanei, vel igne & menstruis se-parati, viribus anodynis, confortantibus, immutativis conspicui. *Wedelius.*

SULPHUR MINERALE in Specie.

Sulphur est Resina sive pinguedo terræ, chalcantolâ aciditate grava.

Dicitur, Arabicè Cibut vel Chybur, Cribrit, Rabryc. Albusao: Chymicis, Axiboth, Ahyal. An. Anerit. A-nerick. Alnerick. Kibrith. Kaprili, Lamare, Tifalum, Tin. Ulsur. Græcè *Θείον* Germ. *Schwefel* Soufre, *Brimstone*, Sulphur. *Schurwevel*, Solfer.

Sulphur tum nativum, tum factitium Officinis in usu est.

Nativum ex terra effoditur purum solidum, interdum scissile, venitque nomine Sulphuris vivi, seu *αἰωπύς*, id est, *Δ*m non experti. Huc spectant stiria nativæ arifodin.

[Sulphur *Ο*lare Americanum ex Peruviana pro-vincia pellucidum mittitur.]

Factitium vel ex vivo Sulphure impuriore; pyritivè vi Δ educitur, vel ex aquis Sulphureis excoquitur.

Sulphur caballinum, quod in Officinis dicitur, factes sunt è coctione sulphuris vivi impuriore relictae & in urceos admixtis nonnunquam squamis & transfusa.

N. 1. Adhaerescunt quoque interdum q. stria Sulphurea camino, ubi vitriolum ex sua vena coquitur, quæ nihil aliud sunt, quam Sulphuris flores ex Vitriolo dum excoquitur, elevati. Horum copiam exhibet Suecia sat magnam.

N. 2. Exhibet Chymia & Artificialia Sulphuris genera ex Φ , Ψ , &c. Hæc quidem longè reliquis præstant, verum quia rara & chara sunt rarissime Chymicis præparationibus vulgaribus subijci solent.

Delectus.

Eligatur Sulphur purissimum colore virefcens, facile inflammabile, luculenter ardens, fumumque magis cæruleum halans.

Vires. Calidum & siccum est pectori dicatum; aperit, incidit; putredini, veneno, venenatorumque animalium moribus resistit, provocat sudorem, &c. Hinc conducit in [catarrhis] Phthisi, Tussi, Asthmate, Peste, pestentialibusque febribus (colica, mensium obstructione.) Extrinsecus discutit tumores duros, sanat lichenes duros, pruritus, &c. Fumus epilept. excitat. hist. Schröderus.

De Sulphure.) Sulphur est resina, sive pinguedo terrea, sive est succus mineralis unctuosus pinguis constans copiâ puris Sulphuris ingenti, modicâ salis acidi quantitate, & tantillo spiritus, aquæ & terræ. Cum enim ab oleo destillato Terebinth. vel juniperi &c. Sulphur commune dissolvitur, pars Sulphurea tinctura valdè saturata menstruum impregnat, salina concrevit in crystallos, aut quando sub campana accenditur, Sulphur penitus deflagrat, interim sal resolutus acidus circa vasis latera defigitur.

Græcis $\Sigma\epsilon\omicron\nu$ dicitur, eo quod in expiationibus & sacris ritibus vetustatis olim ejus usus existit.

Sulphur tum Nativum, tum Factitium Officinis in usu est. Nativum ex terrâ effoditur &c.) Ex fodinis Brunsvicensibus & ex Goslaria ac Lubecensibus effoditur. Prostat etiam Sulphur nativum ex India allatum, quod instat succini elegantissimum repræsentat colorem citrinum, qualem etiam in Anglia reperitur. Hoc Nativum triplex est, impurum, quod ex Islandiâ adfertur, & demum depuratur. Purum ex Goslaria, ut dictum est, fodinis. & fixum ex monte Vesuvio, hoc in ignem injectum non flagrat, nec flammam concipit. Huic affine est Sulphur Puteolanum &c. Sulphur fixum arte etiam fieri potest seq. m.

Rec. crucibulum calc. viv. plenum, fac foveam, inde * pulverisatum, rege iterum cum calce viva & deluta crucibulum, cimenta per 4. hor. post excoquatur per bihorium, exime & cum aq. fort. mixtum fiat aq. reg. In hac solve Sulphur, abstrahere aq. reg. in fundo remanebit massa dura, terere, lava, exsicca, & habebis Sulphur fixum.

Factitium vel ex vivo Sulphure impuriore, aut pyritivè vi Δ educitur, vel ex aquis Sulphureis excoquitur.) Variis confici solet modis. Quibusdam in locis ex aquis decoquitur, ut ad Budam Pannoniæ. Alibi ex effossa gleba & in vasis cocta perficitur igne, ut in multis Italiae tractibus, Senensi, Puteolano, ac Volaterrapo. Præparatur autem h. m. effoditur impurum, terræ & lapidi commistum, in urinis fæcilibus coquitur, ignem in fundo tantum sentientibus. Sic æmatur purior substantia, quæ cum adscenderit ad superioris vasis regionem, per rostrum descendit in aliud vas liquatum olei modo inde egressum, in loco frigido varia coit figura.

Alantet. Bibl. Pharm. Tom. II.

ra, Aut pyrites eo stillat, & in ollis coquitur, ut cerne re licet in Saxoniæ Brambecco & Hadzkeredo, didone Principum Anhaltinorum vid. Musæum Ol. Wormiæ cap. 11. & Athanas. Kircher. in suo mundo subterr. Lib. 9. Sect. 3. & lib. 2. Sect. 2. p. 252.

N. Exhibet Chymia & Artificialia Sulphuris genera, sic verbi gratia, Φ nii, Ψ ntis, Φ netis, Jovis, sic cinnabar. Φ nii, nihil aliud est, quam Sulphur Φ nii cum Φ rio ligatum.

Vires.) Putredini resistit; Est enim in Sulphure teste Cl. Helmontio, vis ardens putredinem, quam in nonnullis subjectis ad oculum deprehendimus, Excell. Tackius scribit: Si enim stagma Sulphuris, quod per campanam paratur, quotidie detur ad duas aut tres guttas in jure carnis aut cerevisia illis, qui ex venæ sectione putrescere sanguinem suum compertum habent, illi post exiguum temporis spatium deprehendent, ex usu illius stigmati omnem putredinem à sanguine recessisse, totumque liquorem vitalem primæ puritati ac sinceritati restitutum. Quæ causa etiam, quod omnia medicamina ex sulphure præparata pestis tempore proficiunt, unde & Elixir Proprietatis in hoc casu cum spiritu sulphuris præparandum est. Aperit etiam, incidit &c. Unde medicamenta ex sulphure confecta, quæ flor. sulphuris, menses cient, quare gravidis præprimis illis, quæ ad abortiendum sunt proclives, non frequenter propinari debent. In Menstruis retentis fl. sulphuris cum fecula bryoniæ exhibentur. Imò & crudum sulphur in Colica passione rusticis est auxilio. Interne etiam crudum pulverisatum in brodio calido propinatum, quantum cuspide sumi potest, tempore matutino in scabie sicca senum teste experientia valde utile est. Extetne in balneis & Linimentis ad scabiem, pruritus, lichenes duros &c. tanquam principale Medicamentum præscribitur.

N. Illud mirum est ab usu sulphuris excrementa alvina Moschi odorem referre.

Præparationes.

1. Sublimatio. 2. Præcipitatio. 3. Destillatio. 4. Infusio & Extractio. 5. Liguatio.

1. SUBLIMATIO.

Unde Flores Sulphuris.

Flores Sulphuris nihil aliud sunt, quam Sulphur à terrestribus excrementis per sublimationem purificatum.

N. Nonnunquam tamen & aliis impregnatur.

Sublimatio Sulphuris in arena calore mediocri gradatim adhibito, ex cucurbita terrea, cui Ψ vitreus sine luto imponitur, ut auferri scilicet ac post exemptos flores iterum reponi possit.

N. 1. Orificium cucurbitæ interea temporis, quo flores eximuntur, probe tegatur, ne aëris irruptione Sulphur. (quod facile accidit) intendatur. Cujus rei gratia non abs re foret, duos in promptu habere alembicos, quorum alter alterius vicem sine mora subire possit.

N. 2. Alembicus ante impositionem ad Δ m calefcat, quippe secus facile dissiliet.

N. 3. Rostrum Ψ i recipiens apponi potest, ad liquorem acidum qui primo egreditur excipiendus, liquore egresso rostrum chartâ obstruere licet.

1. Flores Sulphur. simplices.

Ψ . Sulphur. grossè (si libet) contusi q. v. impone cucurbitæ terrea, vel vice una, vel per vices, ac paulatim. Sublimaque in Arena, ut dictum, igne moderato. Primo exit aciditas, quam Excipulo excipe ac serva (de qua infra,) secundo, sublimantur flores flavi, &c.

N. 1. Alii admiscunt Sulphuris Ψ j. farina laterum Ψ ss. Alii à terra sigillata sublimationem instituunt, vel à bolo.

liii 3

N. 2. Sig

N. 2. Si Sulphur fortuito accenderetur, farina vel cinere injecto extingui flamma poterit.

N. 3. Cavendum ne ∇ nimium incendatur, adeoque non excedat calorem, qui alembico manum imponere permittit.

Flores Sulphur. Θ -lati.

\mathcal{L} . Sulphur. flaviss. \mathcal{H} i. Sal. Com. fusi & Θ -i calcinati en. $\mathcal{H}\beta$. pulveriscentur. F. Sublimatio ut dictum, dando initio ignem lentum, post aliquot horas (3. vel 4.) phlegma incipiet stillare & durabit per horas 4. vel 5.

N. 1. Δ augendum est sensim magnis carbonibus, ut tandem Catinus, in quo arena continetur, rubeat.

N. 2. Calor si sit nimis excessivus, non flavo, sed nigro colore Sulphur ascendit.

N. 3. Alii.

\mathcal{L} . Sulphuris Vitrioli calcinati & Sal. Com. ana. quæ ponderam diversitas neminem turbet. modo Δ mrite adhibeat. Additamenta enim quo pauciora fuerint, eo Δ sufficit mitior.

Quercetanus non nisi colchotar anaticæ addit, omisso Sale Nit.

N. 4. Flores cum novo additamento Θ -i & Sal. Com. ut ante sublimari possunt, idque vel vice tertia, quippe quo sapius flores elewantur eo plus tenuitatis acquirunt purioresque evadunt, non tamen sine imminutione quantitatis.

Vires. Resistant putredini, cient sudorem, exiccant, &c. Hinc prosunt in peste, pestilentialibusque febribus, si-ve curandi, si-ve preservandi gratia adhibere libeat. Exhibentur quoque utiliter catarrhosis, pulmoniacis, tussientibus, & similibus.

Dosis robusto \mathcal{Z} i. juveni \mathcal{Z} ss. in preservatione autem non excedimus \mathcal{D} ss. Exhibemusque commode cum Extracto Enula campane.

3. Flores Sulphur. gummati seu myrrhati.

\mathcal{L} . Flor. Sulph. compositæ ut ante $\mathcal{H}\beta$. colchotar. \mathcal{Z} vj. Sal. Com. fusi \mathcal{Z} v. mirrh. Alexandr. thur. an. \mathcal{Z} iij. aloës succotr. \mathcal{Z} iv. mastich. \mathcal{Z} iij. croc. \mathcal{Z} ss.

Omnia trita simul atque bene mixta sublima l. Δ . post horas aliquot, exime flores, rursus alembicum impone, Δ m continuando per hor. aliquot (12.)

N. 1. Alii \mathcal{L} . mox initio Sulphur. pulv. \mathcal{H} i. Θ -i calc. & ana \mathcal{Z} v. Aloës, Thur. Myrrh. ana \mathcal{Z} iij. Floresque cum novis speciebus 2. vel 3. vicibus sublimant. Sennert. Inst. Paracels. volum. I. p. 1046.

N. 2. Felicius procedunt, qui floribus Sulphuris jam factis, species solummodo admiscunt. Vix enim quicquam citra combustionem ex gummatibus una cum Sulphure ascendit.

N. 3. Imponenda est materia per vices, si enim nimium imposueris, comburitur materia sufficitque 3. vel 4. digitorum crassitie, singulis vicibus imposuisse.

Vires. Efficaces sunt quam simplices, tum exiccando, tum putredini resistendo.

4. Flores Sulphur. Saccharati.

\mathcal{L} . Fl. Sulphur. misc. atque sublima cum Saccharo candido.

Vires. Maius auxilium conferunt ad asthma, aliasque affectiones pulmonum, quam vulgares. Quercet. in Pharmac. rest.

Flores Sulphur. albi.

\mathcal{L} . Sal. nit. purificat. q. v. liquefcat in \dagger , postea injice per vices Sulphur pulveris. ut in Lapidis prunelle præparatione) idque tamdiu, donec Sal. Nit. in ipso igne coaguletur. Ignem postea auge, operculatoque \dagger bulo etiam Δ supra accende, idque continua horis duabus.

\mathcal{L} . Ergo hujus Sal. nit. fixi, p. i. Sulph. Elect. p. ij. Misce optime & sublim. Δ Arenæ.

Vires. Lacti Sulphuris, viribus ac potestate æquivalent. Sennert. Inst. Tentzel.

F. Flores Sulphur. Corallati.

\mathcal{L} . Corall. \mathcal{H} j. Fl. Sulphur. \mathcal{Z} iv. tere minutissime & misce; sublimaque ut dictum, ∇ m profuenter scorsim primo collige, dein flores.

N. Sulphur sic secum trahere dicitur subtilissimam Coralliorum substantiam.

Vires. Habentur præstantiores quam vulgares Sulphuris flores, & si ex his Balsamus fiat Sulphuris, optimus pulsamus perhibetur.

7. Flores Sulphur Benzoinati.

Fiunt duobus modis: vel sublevando \times omni hora interea dum sublimantur flores Sulphur. & in cucurbit. \mathcal{Z} j pulv. benzoini projiciendo vel collocando flores jam factos in patinam terream vitream, in cujus medio scutella terrea promineat, cui induitur ferrum incensum igne, moxque injiciuntur particule benzoini, contegiuntur patella, ut fumus flores reverberet, sicque iteratur ferri accensio, & benzoini projectio, donec sit satis, quo facto teruntur flores Sulph. cum floribus benzoini exaggeratis, servanturque tanquam odoris jucundi, majorumque vitium. Schroderus.

Præparationes. 1. Sublimatio. 2. Precipitatio. 3. Destillatio. 4. Infusio, & Extractio. 5. Liguatio. 1. Sublimatio: Unde Flores Sulphuris.) Cum additione variè sublimantur, vel cum terra sigillata, vel cum Cap. mort. vitrioli, vel cum Aren. vel cum sale. Omnium optimè tamen præparantur, vel quando sulphur per se absque ulla additione sublimatus, vel si sulphur purum habeatur, illud per se in usum trahendum, omni posthabita sublimatione. Cujusmodi sulphuris mentionem facit Franciscus Calceolarius in Museo sect. 2. quod è Peruana Provinciæ fodinis aureis erutum in dictum Musæum fuit transportatum, colore fulvo aurum æquans, ac vitri instar pellucidum. Eiusdem meminit & Nicolaus Monardus in histor. Medicam. simplic. cap. 56. Quito Provincia, scribit, Peruana mittit Nobis Sulphur vivum præstantissimum, ut vitrum translucidum, colore auri purissimi, cujus fragmentum pusillum lucernæ admodum, odorem maximum sulphuris ejaculatur, fumo viridi permixtum, sed antequam incendatur, nullum sulphuris præbet odorem. Eruitur isthic è venis proximis aurifodinis. Hæc historia de sulphure confirmat Hamelii sententiam de Fossilibus lib. 2. cap. 9. p. 246. quam habet, qui sulphur glare ejusdem naturæ cum vulgari statuit, nisi quod illud longa alteratione in fixum purum & incorruptibile evaserit. Meminit inquit Excell. Dom. Morhofius in Epistol. l. c. p. 67. Me in chemicorum scriptis, ni fallor, in Richardi Anglici correctorio legisse, quod in interiori vulgaris sulphuris natura reconditum lateat incombusibile sulphur illud, ac posse Auro, cui sulphur suum extractum est, ex ejus quasi visceribus restitui. Hæc Morhofius vid. l. c. Ubi unâ histotia mentionem injicit de Auro sulphuris vulgaris beneficio è cupro extracto, vel potius in cupro ad maturitatem redacto.

Flores sulphuris viriolati.) Hæc sublimatio florum sulphuris suspecta est ob sulphuris jacturam, quam patitur, dum Spiritus acidus ejus in vitriolum calc. operatur, & ita destruitur, ut inde non in altum elevari & sublimari possit.

N. Flores sulphuris salis fusi commistione noxios & quasi corrosivos reddi annotavit Zacharias Brendel. Chem. in Ars. form. redact. sect. 2. cap. 4. Verum noxios & quasi corrosivos reddi, durum est credere, cum salia ista acida Sal. Com. scilicet & sulphuris acidi sibi non

non sunt contraria, nec eorum spiritus seu salia in fluorem redacta. Quemadmodum enim mixtura spiritus salis & vitrioli nemini noxia corrosiva erit in convenienti vehiculo diluta; Ita nec hæc sibi invicem contraria, nec ulli noxia erunt. Ego potius dixerim majorem vim aperitivam acquirere.

N. Flores sulphuris febrem tertianam perfecte curant, si bis vel ter ante paroxysmum offerantur in aq. Centaur. min. vel vino, cum sudoris elicio.

3. Flores sulphuris gummati seu myrrhati.) Felicius procedunt, inquit *Dnus Autor*, qui floribus sulphuris jam factis, species solummodo admiscant: vix enim quicquam citra combustionem ex gummatibus una cum sulphure adscendet. Cui & *Cl. Zuvelferus* subscribit, præparationem, inquit in *animadvers. ad P. A.* hanc esse vanam, cum species istæ vi ignis comburantur, crocus scilicet, aloës, Mastix &c. atque sic nil nisi empyreumaticum de istis elevabitur. Ideoque convenientius esse, si fl. sulphuris misceantur vel cum granis vel cum Magisterio Myrrhæ, aliisque speciebus, atque sic pro usu referantur, qui pulvis, ut ut amarus ad modum habeat saporem, in Peste tamen præstantissimus est, præprimis præservationis gratia, imo & majorem habebit efficaciam, quam ipsæ pilulæ pestilenciales ex aloe, croco. & myrrha. Pulvis jam laudatus præstantior adhuc evadet, si aliquid camphoræ addatur. Verum hic fatetur quidem cogimur, dictos fl. sulphuris Myrrhatos à foetido empyreumatis odore se vix tueri posse: Interim tamen hoc simpliciter de omnibus dici posse *Nobiliss. Rolsinkius* contradicit; Unde in *Dissert. chem. 2. De Sulphur. cap. 12.* scribit. Censuram hanc de empyreumate gummatum, quam faciunt, nimis videri rigidam. Crocum sive combustionem per se sublimari non posse, neque etiam cum aliis, concedit, nec ex aloe, myrrha, thure, aliquid sine combustionem per se elevari potest. Potest autem cum aliis, ut sulphure, sale vel Cap. mort. ita ut nihil amburatur, Gummatum nomine dum contradicentes utuntur, licentiosa id faciunt potestate. Gummata nullam admittunt sublimationem, sed thus & maniche sunt resinae. Myrrha est anomala gummi resina, & potius lachryma. Aloe est succus. Benzoi etiam est resina, quæ vel sola justo ignis exposita regimini sublimatur in chartacea pyramide in flores Sulphuri cum colcothar misto si idem benzoin pulverisatum addatur, citra combustionem simul elevatur, ignis regimini expositum & sunt, flores sulphuris benzoini. A justo ignis regimine, & iusta ingredientium proportionem, omnis faustus successus est expectandus. Interim placet Th. *Paracelsi* exemplum & fructuosum judicium floribus cum colcothar sublimatis addere aloën, myrrham & crocum, quod & *Cl. Zuvelferus* sequitur. Interim tamen ad empyreumatis præcautionem seq. modo sublimat. in *chem. ad Art. form. redact. lib. 5. sect. 4. cap. 5.* Rec. sulphuris magdaleon. viridiuscul. $\frac{1}{2}$ lb. iv. aloës epatic. myrrhæ, thuris ana $\frac{3}{4}$ lb. Sal. comm. $\frac{1}{2}$ lb. ij. Pulveris. Hujus Pulveris $\frac{3}{4}$ lb. ij. vel iv. inde in vas sublimatorium, impone capitellum terreo, huic alterum & plura, demum vitreum in apice perforatum & observatis ignis gradibus flores per intervalla colligantur. In superiori alembico flores pauciores, in inferiori plures reperiuntur. Sequentie die sublimatio reiteretur, donec ad umbilicum sublimatio perducta. His floribus tandem & Crocus additur.

Vires. Efficaciores sunt quam simplices.) Sunt excellens præservativum in Peste, pleuritide, & omnibus internis abscessibus. Difficiles partus accelerat, suppressionem mensium restituit.

4. Flores sulphur. saccharati.) Saccharum æquæ, ac gummata alia vi igni, corrumpitur & comburitur, si sublimatur; Melius igitur erit, si saccharum cum speciebus diaiteos, flor. sulphuris ac aliis peccoralibus appropriatis misceatur & pro usu reponatur.

5. Flores Sulphur. albi.) Nihil refert, utrum sint albi, vel flavi.

6. Flores sulphuri corallati.) Magisterium corallo- rum præstat admiscere, quam ut flor. sulphuris cum ipsi corallis sublimemus, quia parum de corallo- rum substantia elevari potest, majori horum parte in residuo manente.

7. Flores sulphuris benzoinati.) Si benzoin pulverisatum sulphuri colcothar misto jungatur, ignis actioni expositum citra empyreuma flores producit Sulphuris benzoinatos. vid. supra. *Hofmannus*.

II. PRÆCIPITATIO.

Unde Lac Sulphuris.

Lac Sulphuris, Magisterium Sulph. est, seu præcipitatum.

N. Aliis dicitur cremor Sulphuris, aliis Butyrum.

Paratur autem 1.

℞. Fl. Sulphuris, p. i. Salis Tartari, p. iij.

Pone in vitro oris capaciss. (sive in olla fictili) in arenam collocato, affunde ∇ ad eminent. sex digitorum, ita tamen, ut quarta pars vitri sit vacua, hinc bulliant, ut Sulphur solvatur, (quod 5. vel 6. horis fiet,) spatula lignea continuò agitando, donec ferè omne Sulphur solutum sit, liquorque rubeus appareat. Hinc filtra calidè per chartam Emporeticam, ac effunde confestim vinum austeriusculum, (alii \times .) lentè, celeriter tamen lapsu, tamdiu donec colorem lacteum acquirat, qui ad fundum paulatim secedit, nomine lactis: Lac hoc ad fundum præcipitatum; affuso, liquore collige, abluè ∇ a & exicca, vel si placet, antequam plane exsicceatur, misceatur cum ∇ cinam. vel alia appropriata, ut fiat instar pulvis lactis, &c.

N. Si ∇ bulliendo evanescat, affundatur alia, sed fervida.

2. Modus compendiosior.

℞. Sulph. & Sal. Tart. liquecant in \times o per d. simul liquefactis affunde aliquid aquæ calidæ, mox affunde in patinam aq. calidâ plenam & statim filrentur, adundaturque paulatim vinum: sic totus liquor albesceat atque l. c. ad fundum præcipitabitur.

N. *Quercetanus* dissolvit flores Sulphur. in oleo Tart. dissolutionique affundit \times præcipitatque, &c.

Vires. Balsamum est pulmonum ac veluti Δ consumens & exiccans. Exhibetur igitur utiliter his qui molestantur Catharris, fluxu Capitis, Asthmate, Phthisi, Tussi, Colica, &c. Promovet expectorationem, intercipit defluxiones ad articulos, venositates ventriculi ac intestinorum præcavet ac discurit.

Dosis. Tantum pulveris misceatur, ut vehiculum albicantæ calore tingatur, daturque mane & vespere coch. i. Vehiculum sit appropriatus liquor, Aqua scilicet Cinamomi, Melissa, V &c.

N. *Quercetanus* exhibet $\frac{3}{4}$ j. pro cathartico.

3. Lac Sulphur. S. Closs.

Coque in Cacabo ferreo Calc. viv. part i. Sulphur. pulver. part. j. cum maxima quantitate aq. donec partes 3. aq. sint consumptæ, ruboremque contraxerit instar sang. ex Sulphure dissoluto, coletur calidè per manicam, refrigerari permittatur, denique præcipitetur \square calente, & decantato lixivio Lac. 10. aut 12. aq. calidâ dulcoretur.

Vires. Eadem quæ lactis Crolliani, verum quia interdum fallit, parumve præcipitatur, hic modus infallibilis ad inveniendum fuit. *Schroderus*.

2. Præcipitatio. Unde Lac sulphuris.) Quid de hoc Lacte sulphuris ejusque præparationibus sentiat *Cl. Zuvelferus*, constat ex ejus *animadvers. in P. A. & Mantiss. Spagyric.* part. 2. cap. 10. Nam in *animadvers.* dicit, hoc

ipsum parum ab aliorum Magisteriorum præparationibus differre p. m. 450. Nam, in Mantissa l.c. rationem reddit, quamvis sulphur per appropriata sibi homogenea veluti menstrua, salem tartari aut calc. viv. beneficio aquæ simplicis, legitime solvatur, & sic solum sulphur haud exiguos effectus medicinales edere possit: contrario tamen liquore id ipsum denuò præcipitatum, pro maxima etiam sui parte destruitur, ut vix tertia ejus pars viribus salva constet, ac virtutes & operationes sulphuris proprias edere possit, reliquæ verò duæ Lactis sulphuris partes calx sint emortua & inutilis, in igne constans, indissolubilis omni proprietate sulphuris orbata. Verum huic sese opponit D. Lucas Schræckius Luc. Filius l. c. p. 516. & falsum esse scribit, calcem emortuam & inutilem esse Lac sulphuris, cum crebra Practicorum suggerat experientia contrarium. Sic P. Poterius Centur. 1. curat. & observat. cap. 98. Pulmones assidua fluxione vexatos, decocto alexiterio & exsiccante cum Lacte sulphuris in pristinum se reduxisse: Et centur. 2. cap. 54. Asthma eodem restituisse. Sed Cl. Zuvelerus l. c. non ita loquitur, ac si omnes omnino virtutes huic Lacti derogare velit, sed hoc saltem dicit, quod vel crudum sulphur vel ipsius flores sublimati longè majoribus virtutibus polleant, quam hoc ipsum Lac sulphuris tanto labore comparatum. Id quod & ipse negare non possum, & quilibet periculum facere potest, & in momento veritatem videbit, si hoc Lac sulphuris sublimationi exponat, vix tertiam ejus partem sulphuream esse, & reliquas duas calcem emortuam ac inutilem. Pro exigua igitur illa sulphuris indestructi parte residua Lac sulphuris aliquid virtutis obtinet, quod à Practicis commendatur, pro maximâ autem sui parte inefficax est. Ut igitur Lac sulphuris non destruat & sulphurea ejus pars servetur integra, præstat sulphur quidem per homogenea sibi menstrua, quæ Dnus Autor allegat, Sal. comm. Tartari scilicet, lixivium calcis vivæ &c. legitime solvere, contrario tamen liquore Acet. dist. vel alio præcipitare. Quapropter modius erit, sulphur sæpius cum ∇ calc. viv. tritum coquere, & despumare, separata aliquoties calc. viv. aqua, aliâque superaffusa ad tantam puritatem, liquabilitatem ac albedinem, ut omni fœtore expers instar ceræ super igne liqueatur, & quousque rubedo in decoctione appareat. Omisiss omnibus liquoribus præcipitantibus. Hisce statuminatis, omnes sequentes Domini Autoris processus de Lactis sulphuris præparatione corripunt. Hofmannus.

3. DESTILLATIO.

Unde,

1. Spiritus Sulphur. S. Clossii.

Eligatur Sulphur Leodiense coloris viridiscentis minoris tubi sive magnitudinis [Galli vocant *du Soupre verd à petit canon*] tale enim per se luculenter ardet, locetur per magdaleones in scutellâ intus & extus vitreata, accendatur ad candelam, ut guttula liquati Sulphur & ardentes alios magdaleones incendat, huic scutellæ Campana ex arte appendatur, ita ut verticem illius flamma non attingat, nec etiam nimium distet, (gignitur enim hoc oleum ex reverberio flammæ subvolantis contra aliorum opinionem) alias flores acidus habebis, perge in substituendis scutellis, donec satis ω us campanarii habeas. Ex $\frac{1}{2}$ j. Sulphur. nancisceris ω us $\frac{3}{4}$ j.

Spiritus s. Oleum Sulphuris, per C.

Habendum est vas vitreum latum paropsidis vel patinæ instar, è cujus medio surgat meta, (tripus vel aliud aliquid metæ vices supplens) supra metam concha vel \times bulum statuatur Sulphure repletum. Desuper campana suspendatur vitrea, ea distantia ne flamma illam attingat, sic fumus ex Sulphure accenso ascendens in

campana condensabitur, condensatusque ex campanæ oris in suppositam patinam uccidet.

N. 1. Si conclave fuerit clausum, locusquæ ac tempus humidum, major olei quantitas colligitur. [hinc & major hyeme.]

N. 2. Utile est campanam initia madefacere.

Alius modus.

Idem Oleum per retortam tubulatam destillari potest.

Nimirum.

Retorta tabulata, vel quæ in postica parte tubulum habeat in fornacem collocetur eique recipiens aquæ mensura adimpletum, ut in Clisso, sine luto adaptetur. Postea ubi incaluit Retorta, frustula Sulphuris partitis vicibus injiciantur, & post singula frustula injecta tubulus claudatur: Spiritus postea seu Oleum in MB ab aq. separetur & rectificetur.

N. Si prorsus aerem denegaveris sine frustraberis, id quod mihi accidisse scias, qui lactescentem liquorem loco Spiritus obtinui, omnis aciditatis expertem.

Vires. Spiritus Sulphur. ut fere nihil aliud est, quam Spiritus Virioli, ita & easdem cum ipso vires obtinet. Insuper est & contra Pestem, Asthma, &c. utilissimeque extrinsecus adhibetur in procidentia ani si illius paucillum cum aq. v. g. plantaginis miscetur, & spongia hoc liquore madefacta locus affectus tangitur.

Vide Sennert. Inst. Beguin. Gluckrath. Tentzel.

N. Ex residuis facibus si in copia collecta fuerint, Sal elixivari poterit.

3. Spiritus Campanarius S. Closs.

4. Sulphur. viridis ex alterius pulveris. $\frac{3}{4}$ iv. ω us Sal. nit. vel ω us ex Sal. Com. & Vitriol. compositi (Vide supra cap. 21.) ad supereminentiam 4. digitorum transversorum, destilla ex \bigcirc in — subtus & supra positis ad ultimam usque guttulam. Cohobetur 6. aut 7. [quo plus, eò melius] Reperies in \bigcirc ultra $\frac{3}{4}$ ij. ω us ejusdem amaroris, naturæ, facultatisque cum Campanario, viribus ω nitrarii haud imminutis.

N. Etsi ad siccitatem videatur secresum fuisse menstruum, nihilominus Sulphuri inhaeret Sal causticum, quod dio expositum in ω um Sulphuris resolvitur, novo quotidie succrescente, nec à Campanario ullatenus differente.

4. Aqua acida seu aciditas, vel Phlegma Sulphuris.

Aqua acida Sulphuris appellari potest liquor ille acidus, qui in sublimatione florum, initio (parcè tamen) extillat.

Vires easdem cum spiritu precedente obtinet, verum quia minus efficax, raro in usum.

5. Aqua seu Ens Balsami sulphuris.

6. Aquam acidam, quæ extillavit in sublimatione flor. Sulph. \bigcirc tor. rectifica & conjunge in MB bullienti, cum ∇ acida, quæ extillavit in sublimat. flor. Sulphur. resinatorum.

N. Hac aq. (quæ lactei coloris) seorsim colligenda est, ne misceatur cum oleo subnigro, quod subsequi solet.

Ufus idem qui florum, in peste, febribus, colica, obstructionibus ac aliis affectibus pulmonum. Croll.

6. Ol. Sulph. Balsameum.

Balsamo Sulphuris Sal rostum adde atque per Retortam destilla. Sennert. Inst.

7. Ol. Sulphur. Linatum.

8. Sulphur. citr. ($\frac{1}{2}$ j.) maceretur & solvatur in Ol. Lini, ($\frac{1}{2}$ i β .) & fiet massa concreti sanguinis instar. Refrigerata materia destilletur per Retortam & prodibit Oleum rubicundissimum.

N. Att

N. Alii addunt Vitrioli calcinat. ℥ ij. Mil-
Vires. Prodest ad ulcera ac bubones pestilenciales matu-
randos.

8. Ol. Sulphuris aureum.

℥. Sulphur aliquoties liquefact. & in ∇ effusi ℥ j.
pumic. ℥ β. misc. ut fiat massa ac destilla lento Δ.
(N. ne des ignem inferius, sed supra & ad latus,) sub fine
auge ignem, & extillat oleum instar ∅.

Vires. Exhibetur utilissime in Cachexiis obstructioni-
busque viscerum, præservat à peste. Clar. D. D. Johan.
Tileman. P. Profess. Marburg.

9. Ol. Sulphuris rubeum.

℥. Sulphur. ℥ j. Calc. viv. ℥ ij. per Retortam
pelle.

Vires. Idem maxima est utilitatis in bubonibus pesti-
lentialibus maturandis.

10. Oleum Sulphur. verum S. Closs.

Resolve ℥ ij. Sulphur. tusi in ℥ β. spiritus thereb. clati, id
quod fiet intra & super cineres, solutionem rubentem
decanta, alium affunde, digere, separa per inclinationem,
fæces (quæ erunt perpaucæ) abijce. Tincturas de-
stillata Δ Arenæ lentissimo ex magna ∅, donec
ferè omnem ∞um thereb. recuperaveris. Guttulis
autem rubris appatentibus mutetur recipiens & Δ
paulatim augeatur, egredietur Oleum coccineum
cum fœtore intolerabili, qualis est latinarum, ultimò
∅ ferè incandescente, spillum & obscure nigricans.
Hoc rectifica & separa à ∞u therebinth. superflite.
Oleum autem vase clauso digere per mensem in MB,
ubi fœtorem deponet, evadetque verus Pulmonum
balsamus.

Vires. Est egregium Vulnerarium intro sumptum, cu-
rat ulcera interna, resistit suffocationi matricis, pesti,
colica, catarrhis fluentibus, asthmatis, empyemati, urinam
provocat. Dosis gut. 3. in syr. conven. vel ovi vitello.
Schoderus.

3. Destillatio Unde 1. Spiritus Sulphuris S. Clossai) Hæ
præsentēs descriptiones, quas Dominus Autor ex S. Clos-
sai, Beguino, Sennerto & aliis communicavit, non
sunt rejiciendæ, sed debitâ præparationis observatâ en-
chirisi voto respondent. Hunc spiritum nonnulli se-
quenti modo conficere sibi præsumunt; Scilicet do-
lium accipiunt ∇ plenum, & aliquot librarum sul-
phuris fumo imprægnant, & postmodum hanc aquam
sulphuratam per alembic. dephlegmant. Aliam hujus
sp. sulphuris multiplicationem tradidit P. Poterius in P.
S. lib. 2. cap. 11. & Philippus Grulingius in Florileg. P.
m. 375.

N. Utrum spiritus Sulphuris & Vitrioli realiter dif-
ferant an secus, hic sequitur? Videtur hosce spiritus
unam eandemque essentiam habere, cum eandem ha-
beant materiam ex qua & eandem causam efficientem.
Nihilominus tamen viribus & effectu differre videntur.
Cum quædam Medicamenta cum sp. sulphuris præpa-
rata meliores obtineant virtutes, quàm quæ cum sp. vi-
trioli v. g. ætialia cum sp. vitrioli præparata sunt auste-
riusculi & adstringentis saporis, vomitum non raro
cientiâ, quæ verò cum sp. sulphuris, laudabili sunt do-
tata dulcedine. Deinde addit Cl. Tachenius in Hipp. Chemic.
sp. sulphuris acidus, si roserit naturale corpus v. g. are-
nam ignem nondum expertam, tunc ex eo naturale su-
blimiatur sulphur, id quod cum sp. vitrioli non succedit.
Verùm dicimus Nos spiritum vitrioli à sp. sulphuris, non
essentiâ, sed ac. identibus differre, illum esse impurio-
rem magisque terrestribus constare partibus, hunc au-
tem puriorem magisque liberum.

Vires spiritus sulphuris (S. C.) Hic spiritus sulphuris po-
tius militat à pestis putredine præservat, non secus atque
eiusdem sulphuris fumus cadum vini à corruptione li-

berat & præservat. Unde circumspicte ac curioso om-
nes potus cum spiritu sulphuris misceri possunt: atque
hinc etiam ad Vitam Longam Cl. Helmontius in Tr. Arbor.
vita commendat Præterea contra asthma exhibetur; ve-
rùm hic distinguendum est inter asthma idiopathicum,
quo sp. sulphuris non habet introitum, & inter symp-
theticum, n. nidum circa hypochondria habens, quorum
auxiliatori sulphuri suus quoque est introitus. Majoris
erit virtutis hic spiritus sulphuris, si cum vir. æt. seorsim,
vel conjunctim etiam cum gummi ammoniaco destil-
letur. Extrinsecus adhibetur in procidentia ani, sed hoc
non facile saaserim, acida enim partibus membranosis
& nervosis admodum sunt inimica. Emplastrum ex
opopanace ego mallem substituere.

3. Spiritus Campanarius facillimus S. Closs.) Verùm
hic spiritus non simplex est sulphuris, sed compositus
ex nitro, vel ex sale & nitro simul.

4. Aqua acida vel phlegma sulphuris. Item 5. Aqua seu
Eps Balsami sulphuris.) Hoc sulphuris phlegma proles
sulphuris genuina est, ex ejus sale acido orta; Unde ead-
em cum spiritu præcedente vires obtinet.

6. Oleum sulphuris Balsameum.) Sed hoc etiam fit
compositum.

7. Oleum sulphuris linatum.) Hujus elaboratio admo-
dum periculosa existit, quia oleum citò vitra penetrans
facile accenditur, nullis liquidis, sed solâ arenâ extingui-
bile D. D. Knæselius hoc oleo in Peste & vulneribus fœ-
lici cum successu usurpavit. Hæc massa concreti san-
guinis instar ex Sulphur. & oleo lini conscindatur &
per retortam destilletur. Nonnulli addunt vitriolum
calcinatum.

8. Oleum sulphuris aureum.) Hujus elaboratio à D.
D. Johanne Michaelis p. m. & à Me sæpius tentata fuit,
sed semper frustraneo cum effectu, oleum & operam
perdidimus.

9. Ol. sulphuris rubrum.) Post olei distillationem ex
hujus Cap. mort. Lac. sulphuris demum præparari po-
test.

10. Ol. sulphuris verum S. Closs.) Hoc laudem mere-
tur, cujus vera conficiendi ratio in digestionem olei illius
fœtidi & optimè rectificati consistit. Hofmannus.

4. Infusio. Unde

1. Balsamus Sulphuris Therebinthinatus, seu
Rubinus Sulphuris.

℥. Fl. Sulphuris ∅. t. ℥ ij. Spirit. Terebinthin. ℥ vii.
vii. Digerantur in vase vitreo, donec solvatur Sulphur
& spiritus Terebinthinæ rubicundus reddatur. Hinc
decanta ac serva.

N. Quod si hunc Balsamum à suo solvente, seu spiritu
separare volueris, affunde ∇ & destilla, sic spiritus una
cum ∇ extillabit, relicto Balsamo in fundo.

Vires. Excellentissimam Medicinam contra Phthisin,
quippe valet ad ulcera pulmonum consolidanda, præservat
à peste, aliisque morbis contagiosis: inservit quoque Tinctura
Sulphuris, vide infra.

Dosis à gr. 4. ad 7. scilicet si à suo solvente separatus
sit, vel ad g. 20. cum suo solvente. Quercet. in Pharm.
restit. Hartmann. in Pract. Sennert. Institut. Beg. & c.

2. Balsamus Sulphuris compositus, Balsa-
mus vita.

℥. Flor. Sulph. ℥ j. Myrrh. ℥ ij. Aloës succotr.
℥ ij. croc. ℥ ij. pulveris ac digere cum ∞u Terebinth.
ad eminent. digit. 2. affuso decanta.

Vires. Efficacius operatur quam simplex.

3. Balsamus Sulphuris ad externa qui Rulandæ
adscribitur.

℥. Fl. Sulphur. vel Sulphur. pur. ℥ j. Ol. rapar. ex-
press. vel nucum ℥ β. Vini generosi ℥ ij.

Maceren-

Maçerentur & 8. Δ lento, aliquoties agitando. Postea coquantur lentè ad vini consumptionem. Tandem cola & serva usui.

Vires. In variis morbis à Rulando Balsamus hic adhibitus est. Vide ejus 11. Cent. 92.

N. Balsamum Rulandi aliter describit Untzerus tract. de Tart. Vide & Balsamum Sulphuris & latum in Angel. Sala tract. de & lo.

4. Tinctura Sulphuris.

Postquam à Balsamo ~ Terebinth. separatus fuerit (modum separandi habes in Balsamo) attunde V & extrahe V in NB. & habebis Tincturam; digere atque à facibus subidentibus decanta.

Vires. Præstantiores effectus habet quam Balsamus.

Dosis gutt. 3 4. &c.

N. Extrahit quoque ex sulphure crudo Tincturam citrinam V optime rectificatus.

5. Tinctura Sulphuris S. Closs.

Infer in candens tigillum per cochlearia mixturam ex Sal. Nit. lb j. Sulphur. pulver. 3 iv. comburantur Δ forti, donec strepitus cesset, & in massam rubram mixtura detonata compingatur, cui in pulv. redactæ Spiritus Vini Tartarificatus affundatur, extrahaturque Tinctura.

Vires. In peste, febribus, scorbuto, obstructionibus hepatis, pulmonumque morbis utilis.

Dosis gutt. 8.

6. Alia Tinctura.

Fac Capitellum ex Sal. Nit. in aqu. soluto, in cuius tt vi. bulliat per 24. horas Sulphur. pulv. tt j. filtretur liquor rubens, & præcipitetur cum aceto, in quo decoctum fuerit & ex & lo. In fundo relidebit pulvis scarlatinus, è quo tinctura, modo superius tradito, vel per ~um thereb. extrahenda venit.

Est S. Closs.

7. Crystalli ex Tinctura.

Postquam per ~um Terebinth. & V tinctura fuerit prolecta, ut dicitur artic. 4. p. 166. abstrahendus est V, dum restitet tantum pars tertia illius quæ in cellâ collocatur, ubi nascuntur crystalli, in quibus residet Q. Essentia sulphuris, dissolvantur iterum in alio V, & denuo coagulentur, quod magis ac magis ab odore gravi immunes reddantur.

Dosis g. 4. in liquor. appropri. tabellis electuar.

8. Sal Sulphuris.

Vel fit ex & ~us Campanarii, de quo vide Keslerum artic. 54. Centur. 1. vel ex carbone nigro levi & foliato Sulphure post extillationem Olei xeri (vide præcedentem pag.) residuo, hoc Δ miti reverberandum est ad albedinem.

Uterque modus parum Sal. præbet, sed efficax adversus verminationem remedium.

9. Essentia Sulphuris.

℞. Miner. Sulphuris q. v. affunde V (ex & & Sal. nit.) solve, quoad poteris. Hinc abstrahere solum ad siccitatem, edulcoratumque reverbera ad rubedinem saturatam. Hinc extrahe Tinct. cum V, digereque donec Ess. Sulphuris à V separatur instar olei, fundumque petat.

Vires. Magnarum est virium ad arcendam putredinem.

Dosis gutt. 6.

N. In hac Sulphuris Essentia si Myrrha, Aloë, aromaticè infundantur, atque Tinctura NB extrahatur, dicitur Balsamus mortuorum.

Basil. in repet. Lap. Ph. Schroderus,

4. Infusio: Unde 1. Balsamus Sulphuris Terebinthina. (seu Rubinus Sulphuris.) cum ol. Terebinth. promptius quam cum spiritu ejus succedit; Sic v. g. Rec. fl. sulphuris per se parat. q. v. ol. rectific. Terebinth. q. f. digere vel coque donec tinctura appareat.

N. Melius succedet operatio, si sulphur elect. cum sale Tartari misceas, vel super ignem lenissimum in crucibulo torreas in massam rubicundam, sed non sine foetore erit, & postea olea destill. vel juniperi, vel anisi, vel quod volueris s. q. superinfundas.

N. 2. Quod si hunc Balsamum à suo spiritu separare volueris &c.) Rec. fl. sulphuris 3 ij. affunde ol. d juniperi vel Tereb. q. f. ad solutionem cum ebullitione in Aren. peragenda, solum effunde; filtra per chartam bibulam, colaturæ adde sp. vini rectific. q. f. dest. Rec. extracti residui sulphurati 3 j. ol. dest. anisi 3 iv. balsami de Peru 3 β. fl. benzoin. 3 ij. pone in digestionem per aliquot &.

N. Si loco ol. d anisi substituatur ol. d. Citri, fit Balsamum pestilentielle.

N. 2. Balsamum vitæ conficitur, si fl. sulphuris q. affundas ol. d. Cinamomi, caryophyll. Macis, Cortic. Citri, aurantior. zedoar. ana s. q. & digerantur in loco tepido.

Vires. Excellentissimam Medicinam præbet contra phthisin ad ulcera pulmonum consolidanda &c.) Hic quaeritur, Utrum Balsamus sulphuris, & alia oleosa balsamica ex sulphure cum oleis destillatis præparata in phthisi aut exulceratione pulmonum aut aliorum viscerum ex hum. ribus salis hæmoptysin causantibus orta tunc in usum trahi possint. ansecus? Dnus Aretor cum aliis affirmat, nec forsan deerunt ipsis rationes: Quia primò istiusmodi balsamica remedia, humidum seu balsamum radicale cum calido innato augent; Deinde spiritus vitales reficiunt. Tertiò, quia salia acida in lymphæ & massa sanguinea contemperant, à quibus putredines; Uti ex mechanicâ chemicâ constat, dum ejusmodi oleis destillatis aquæ fortis vis corrosiva acida corrigi potest; Quartò quia sunt interna vulneraria putredini resistunt, eo quod etiam externè brodiis carnis calidis instillata & ad tempus aëri exposita, quo attingunt ea non putrescere aut foetorem contrahere sinant, secus, ubi non attigerint, foetere.

Verum si & hoc loco communem illam medendi regulam non insuper habere volumus, contraria contrariis esse curanda, dictitantem, certè non sine edet tunc, si phthisin seu pulmonum exulcerationem istiusmodi balsamo sulphuris aut aliis oleosis balsamicis ex fl. sulphuris cum oleis destillatis præparato curare velimus. Notum enim est in phthisi seu exulceratione pulmonum aut aliorum internorum viscerum semper vel præviâ adfuisse, vel adhuc conjunctam adesse inflammationem, eamque adeò non sine acido inflammante & dolorifico. Olea destillata & alia, ex quibus dicta balsamica conficiuntur, etiam calida esse inflammabilia ac resinosa omnibus, me etiam tacente licet, notissimum est, ac verò hoc particulis eorum acidis acceptum esse ferendum perpauci sentiunt, inquit D. David von der Vecke in Experiment. & Meditat. circa Rerum naturat. princip. Patet tamen ex salium volatilium beneficio alkalies oleis destillatis præparatione. Olea destillata & alia pingua illa cranii & ossium affectibus nocent, & affectibus erysipelatosi ob acidum eorum occultum gangrænam afferunt. Quomodo igitur hæc sanâ ratione & in Phthisi seu pulmonum exulceratione convenire queant? Præterea, cum tunc etiam firmenta digestiva admodum debilia sint, & hæc balsamica oleosa fermentis eorum ob unctuosum acidum salibus volatilibus immersum potius reluctentur, uti ex ratiis post eorum usum constat, in actum deduci, & in salia volatilium Naturæ convenientia converti nequeunt, unde

unde toti Naturæ sic cruda relicta negotium facessunt ac damnum irreparabile inferunt. Hæc accedit, quod in ejusmodi affectibus aliàs tota massa sanguinea una cum lymphâ tunc quasi vappescat, ita ut in hæc absumptis seu resolutis partibus volatilibus salis oleosis ac balsamicis Naturæ congruis spiritus vitæ debiliior suum lumen amittat, imò paucissimus fiat, adhibitis jam istiusmodi sulphureis sylvestribus oleis calidissimis, quid aliud eveniet? quàm ut flamma major extinguit minorem, sic hæc etiam calida in excellenti gradu reliquum flammulæ vitalis penitus penitusque hinc extinctura, vel loco vitalis caloris heceticum sint inductura. Unde *Casparus Hoffmannus in præfat. in Lib. de Medicament. Officin.* Olea, inquit, stillatiua, quæ ferè essentias vocant, tam apertè ventriculo membranaceo inimica sunt absumendo humi- tum illius radicale, hepatis autem aliisve visceribus sanguineis inflammando, aut *φλόγω- σιν* seu rectius *καύσιν* excitando, ut quidam ubi sitim perpetuam adsciverint, quidam cachexiam biliosam, quidam hydropem calidum, addo ego cruentum alvi fluxum, scabiem siccam, febres heceticas &c. Quorum omnium pervelim, inquit Excell. D. D. *Simon Pauli in Quadripartit. Botan. Class. tert. p. m. 256.* Novellos Præcicos subindè meminisse, nec se moveri ab empiricis patia- tur, cum illi casu, sæpe per empiriam levare quidem Morbis ægros, sæpius verò frequentius in præsentissimum vitæ discrimen, alios atque alios ejusmodi calidis, validis chemicis medicamentis præcipitasse visi sunt, Methodi medendi ignorantissimi. Nec obstat, istiusmodi balsamica balsamum radicale confortare, falsum hoc est, longa enim est differentia inter sulphura vi peregrinâ ac virulentâ nondum spoliata, & istâ adhuc constantia, ad quæ ultima Nos balsamum sulphuris & alia adhuc cruda olea destillata referimus. Tirones, inquit *Clar. Helmont. in tract. V. H. L. M. V. p. 577.* addiscant sulphura spoliare vi suâ peregrinâ ac virulentâ, (hoc est, sub acido) sub cujus nimirum custodiâ abditur ignis vitalis Archeum in scopos desideratos placidissime ducens. At de quibus hic agimus, talis genii non sunt.

Nec sufficit Spiritum vitalem suavissimis Sulphurum popismatis demulcere, sed & horum vi specifica causam morbiticam consumere, & vias oppilatas ac obstructas referare & termenta viscerum confortare opo- tet.

Olea destillata vel sp. vini ab ∇ fort. abstracta hujus vim corrosivam demulcere, dum acidum minus corrigi majus, notum quidem est, sed quid hoc facit ad internum eorum usum? Quod autem ista olea balsamica carnis juscula, si hisce infundantur, à fectore & corruptione præservent, sit hoc, quod ab aëris injuriâ defendant, quemadmodum etiam videmus ol. amygdal. dulc. express. vel ol. olivarum vinum in doliis incorruptum servare; sed quid hoc præsens negotium? Nihil probat. Longe enim alia est istorum balsamorum operatio in corpore humano, & alia in aliis rebus extra corpus constitutis. Illic calor viget fermentalis, & vitalis; hic putredinalis elementaris, &c.

3. *Balsamus Sulphuris ad Externa, qui Rulando adscribitur.* Verum hæc non est vera Balsami Rulandi descriptio, Ea autem, quæ sequitur, videtur genuina. Rec. flor. Sulphuris ter sublimat. \mathfrak{z} iij. ol. rosac. complet. \mathfrak{t} ss. vini rubri opt. \mathfrak{z} iv. Macera per octiduum leni Ane & aliquot agitentur, tunc coque per lento Ane & semper movendo ad vini consumptionem. In colatura dissolve Terebinthin. clar. \mathfrak{z} ij. & serva ad usus.

N. Hunc balsamum ad tophos articularum emolliendos, leniendos & discutiendos *Rulandus Centur. 2. cap. 92.* mirè commendat. Cui agyrtæ jam substituunt resinam Pini pretio equidem inferiorem, neutiquam virtute. Balsami sulphuris utilitatem in arthriticis *Tulpius expertus est lib. 4. observ. cap. 56.*

4. *Tinctura Sulphuris.* Hæc suo stat talo, prout & 5. 8. *Cloff.* quæ cum sp. vini Tartarificato extrahitur, adhibetur in scorbuto, referat obstructions, & diuretica est.

N. Sequenti modo etiam Tinctura Sulphuris componitur, Rec. Sulphuris el. sal. Nitri & Tartari ana fac, fluant in Crucib. effunde, pulverisa, ac cum spirit. vini extrahe Tincturam rubicundissimam. Sic & Tinctura sulphuris volatilis elaboratur. Rec. Sulphuris opt. pulverisat. \mathfrak{z} v. * tantundem. calc. viv. \mathfrak{z} vi. Misce & immitte pulverisat. in retortam, & la ex Aren. per ignis gradus. Calore aucto prodibit rubra tinctura Sulphuris volatilis. Hujus usus in Peste & pectoris affectibus non deprædicandus est. Digtos colore tingit nigro.

7. *Crystalli ex Tinctura Sulphuris.* Hic modus non procedit. Bene autem sequens, 8. Sal sulphuris vel ex Cap. mort. campanarii Spiritus vel ex residuo post extractionem oleosæ substantiæ cum ol. d. Tereb. vel juniperi factam, Ane leni calcinato. Sed parum Salis præber.

9. *Essentia Sulphuris.* Hæc nihil peculiaris à dictis Tincturis obtinet. *Hoffmannus.*

V. Liquatio.

Sublimatur Sulphur in sublimatorio sat alto ∇ forti, sublimatum expone liquationi in cella, aliquamdiu. *Basil. d. l. Schroderus.*

Sulphura è variis mineralibus preparanda ex Pharmac. BATEANA.

Sulphur Antimonii.

7. \odot tartari, vel Abinth. \mathfrak{z} iv. in \dagger bulo fusis injice cochlearim \mathfrak{z} crud. pulverat. \mathfrak{z} j. fluere sinatur ad horæ quadrantem, & effunde in vas æneum. Massa crocei coloris edulcetur crebris ablutionibus s. a. Ciet vomitum. Dos. à gr. 5. ad 10. cum crem. tartari purgat per secessum.

Sulph. Antim. combustibile.

\mathfrak{z} Solutum in menstruo idoneo in ∇ am projice: collige Δ r, & ∇ calidâ abluc: vel (si videtur) per se \pm a s. a. Dos. cum viribus eadem ut supra.

* Sulphur Auratum.

Fit è sconiis à Regulo \mathfrak{z} ii liberatis, in ∇ coctis & filtratis, Tando Δ cum \dagger , & abluendo. Dos. gr. 5. ad 15. In aliis vomitum ante sudorem, mover. mirè conducit febribus tertianis & quartanis horâ unâ ante paroxysmum. Pesti, variolis, &c. statim à concepto contagio, bis terve repetendo, sæpe prævenit, vel feliciter erumpere facit, Lui \mathfrak{z} rea proficuum est.

Sulphur Vitrioli.

Fit solvendo \odot in ∇ calidâ, guttatimque affundendo \mathfrak{z} o m tartari, ut \mathfrak{z} erur Δ \odot li, qd edulcoratum exicca. Confert affectibus pulmonum. Mundificat plagas putridas, cicatricesque inducit. in Epilepsia, Vertigine, & morbis chronicis valde utile. Dos. ad gr. 15.

Sulphur Vitrioli Martiale.

Abluc El. *ci Martiatos ab omni salsedine, & calcina s. a. Idem facit cum superiori; & præterea obstructions referat. Dos. etiam idem est.

Sulphur Vitrioli Narcoticum.

7. \odot p. ij. \odot p. j. Digere in \dagger , ac destilla in \mathfrak{z} ad siccitatem. Ex Massa rubra extrahe tincturam ops \mathfrak{z} i, filtra & \pm a \mathfrak{z} o tartari. Tandem Δ in fundo edulca

edulca & sicca. Ex hoc sunt anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, dolores mitigat, &c.

S U M A C H.

Nomina. Sumach sive Rhus L. B. Rhus folio ulmi C. B. Coriaria Dod. Ger. obsoniorum Lob. Clus. Sumach sive Rhus obsoniorum & coriariorum Park.

I. B. Rhus arbuscula est, altitudinem hominis superans, parvulis ramis, subhirsuto cortice, potissimum circa fastigia vestita, e quibus folia alternatim exeunt alata, sorbi quinque aut sex conjugationibus ex intervallo longiusculo dispositis conflata, costæ tenui hirsutæ hærentia; singularia folia oblonga, acuminata, hirsuta, serrata; ramulorum fastigia inter folia flores sustinent racematim congestos, sambucinis similes (Castalpino rubri & minuti quos & racemosi grana excipiunt, orbiculata, lenticulæ modo compressa, rubentia, medullâ exigua, cuticulâ acidî saporis obducta. Radix haud alte descendit, per summa cæspitum hærens.

In collibus circa Monspelium, prope Castrum novum, & Garrigues dictis copiose provenit. Clusus magnus ejus proventum Salmaticensi agro esse, istique quæstus gratiâ diligenter coli observavit. Multi (inquit) agri eo confiti, nec minore ibi cura quam vineta, alioqui nec tam late assurgit, & si cultura absit degenerat ac sylvescit.

Cæduntur singulis annis enati furculi cubitales ad radicem usque ad summam tellurem, deinde deficiantur, in pollinem rediguntur, & in usum convertuntur ad paranda coria, qui usus in Hispania celebratissimus habetur. Tarde fructus suos ad maturitatem perducit.

Rhus Ponticum, Syriacum, obsoniorum, coriariorum, Rubeum apud Galenum non sunt arbores specie diversæ. Sed Rhus obsoniorum nihil aliud est quam fructus; coriariorum quam folia & fruticis ramusculi; rubeum quam ejus semen immaturum, cui major adstringendi facultas inest quam maturo, cujus acini quantenus nigricant.

Folia & furculos teneriores hujus fruticis non minus olim quam nunc dierum ad coria spissanda perficienda que celebres fuisse nos docent Theophrastus, Dioscorides, Plinius, unde patet ea adstringentis & desiccantis naturæ esse.

Fructus ejusdem non minus usitati fuere ad cibos condiendos, vel salis loco, vel cum sale mixti, ut veteres testantur, qui usus etiamnum hodie à Turcis frequentatus est, ut scribit Bellonius, nam in Heraclea ubi in vicinis montibus abundat, magnos saccos venales videas hujus fructu plenos, quibus contulis cum sale & allis suis cibis non insuavem gratiam conciliare possunt, aspero hoc condimento tam assis quam elixis cibis.

Notat Sylvius Rhois succum esse vice omphacii in Gallia Narbonensi.

Vires. Cum ergo (ut diximus) Rhois folia & semen astringant, refrigerent & exsiccant, hinc fluxum quemcunque alvi, uteri, mensium, hæmorrhoidum compescunt, vomitum sistunt, bilem obtundunt, seu intus in jussulis & sorbitionibus sumpta, sive extus adhibita, dentes denigrant, putredini & gangrenæ resistunt: utilia experimento se agnovisse tradit Galenus ad crustas & uvulæ inflammationes: gummi dentibus inditum odontalgiam sedat.

Rhus nomen accepit à colore coccineo acinorum, à voce ῥόος Latinorum rufum Manasse contendunt. Bod. à Stapel. Rain.

SUPPOSITORIUM.

Inter medicamenta localia imprimis memorari me-

rentur Suppositoria. Videntur hæc jure suo referenda potius inter composita, quam distincta ab his præparata; Nos tamen scorsim inter hæc illis locum dedimus, quod è Pharmaciæ sinu petantur & præscribantur usitatus, prout jam præstant. Illa igitur ratio satis erit sufficiens. Cæterum de ipsis notanda veniunt.

1. *Suppositoria sunt medicamenta topica solida vel molliora.* Suppositoria dicuntur à supponendo, quod locis inferioribus imponantur, Unde ὑποδερμῶν audiunt Græcis, item βάλανος, glandes, quod teretem glandium formam aliquo modo æmulentur. Suppositoria igitur sunt quod supponantur non tam in genere quocunque modo, quam in cavitatem, q. d. inferius, seu sub corpore reliquo posita, ut denotetur insimul locus applicationis. Pro mechanicâ horum illustrandâ faciunt huc cumprimis trochisci, & turundæ chirurgorum, quas in cavitates corporis extraordinarias imponunt. Eodem modo suppositoria cavitatibus & meatibus ordinariis patentioribus supponuntur. Ut verò in dicto exemplo modò solida, modò molliora imponuntur, sicca vel uda, pro modulo diverso adionis; ita & suppositoria latius paulo præteant & strictius iterum comprehenduntur. Suppositoria audiunt, ut utrumque includant, solida primario, hæc enim promptius intrudi amant; molliora secundario, prout quidem id variat locus admittendi modus & capacitas.

2. *Suppositoria vel ano vel utero imponuntur.* Seu quod idem est, glandes & pessi sunt medicamenta symbolica. Vulgò quidem distinctis traduntur capitibus, & tanquam diversa planè tractantur, aut revera symbolizant. Strictius quidem suppositorium recepto usu audit, quod in anum solum inditur; latius verò, ut fieri debebat, & pessos omnino complectitur. Pessi, πῶρος & πῶρα nominati, utri sunt suppositoria. Latini Græcum vocabulum retinuerunt, barbari nascalia vocant, licet iterum alii pessos de fœminis sive conjugatis, nascalia de virginibus prædicent. Equidem rarius in usum hæc cedunt, neque faciliè ea suaserit medicus, nisi vel familiaritate vel auctoritate magis polleat, ne ipsi cedat in opprobrium remedium, minus ritè susceptum vel admissum. Atamen & hic est naturâ præside turpe nihil. Ut ano imponenda medicamenta sive supponenda suasit necessitas, sic & utero non minus. Satis est nobis utraque medicamenta sub uno eodemque capite commode tractari, imò tractari debere longè rectius quam rotulæ & morsuli, vel alia medicamenta affinia inter se. Unde optime suppositoria & glandes uterinæ nuncupantur, tum ratione figuræ, tum ratione compositionis.

3. *Suppositoria intestinalia & uterina solida, vel simpliciora sunt & extemporanea, vel composita; utraque rite figurata.* Materiam constituunt suppositorum varia simplicia, virtute magis vel minus stimulandi apta. Parantur enim ex caulibus viridibus viridibus betæ, brassicæ, Glis, aliisque similibus, oleo, melle aut butyro, addito sale, perunctis. Adhæc ex sapone albo, sevo, butyro indurato, & in longioris turundæ formam aptato, quævis ad molliora magis hæc referantur. Item ex lardo, caseove salito, alumine. Sic & pessos componendi simplicissimus modus est, quo radices, verbi gratia, helleb. nigr. gentianæ, aut quæ optima est, bryoniæ repurgantur à sordibus in pessorum formam aptantur, deinde oleo lil. alb. aliove oblinuntur & filo annexo in uterum immittuntur. Memorandus hoc loco est pessus secretus ad forum mortuum, quem bis cum successu probatum scribit Fontan. l. de extr. fœtus mortui per unum, p. 109.

4. Rad. tenuem nuc. jugland. recent. palmi longitudine, eam abraide cultello, quousque attenuetur instar digiti. Hoc pessarium utero inde. Ab ejus impositione

tione tantus confurgit fragor, addit, & ardor, ut uterus uti videatur. Ejus acrimoniâ sanguis provocatur & fœtus expellitur. Figura suppositoriorum æmulatur digitum minorem, cum aliqua tamen latitudine, concinnantur enim majori quantitate pro adultis, minori paulo pro infante, & quâ parte in anum induntur, acuminantur, ut facilius insigantur. Hinc oleo vel butyro inunguntur, quod facilius & minori cum molestiâ subeant. Propriè suppositoria dicuntur remedium solidum, oblongum & rotundum, aliquando tamen & globulorum formâ immittuntur, uti globulus saccharinus moschatus in alvo obstructâ convenit. Sic & pessaria similem suppositoriis habent figuram, longam scilicet atque rotundam, quanquam his aliquando sint & longiora & crassiora, tum quia altius penetrare debent, tum quia locus, in quem immittuntur, amplior est atque capacior. Adeoque globuli uterini ad procidentem uterum retinendum propriè loquendo non sunt pessi, sed nomen suum retinent.

4. *Suppositoria composita solida ex mellis coagulo & stimulantibus potissimum sunt.* Dividuntur suppositoria ratione virtutis in lenia, mediocria & fortia, quod variant hinc ingredientia. Cumque desideretur corpus solidum, quidem, ut afficere possit, resolubile verò ab humido & calido, ut agat eò promptius, optime in suppositoriis se gerit mel, tanquam excipiens. Quamvis enim ex fatinâ hordei, tritici aut siliginis cum aquâ in massam redactâ, modico sale conditâ & in glandis formam mutata, etiam confici possint, exiccanda & usus tempore in oleo inungenda; prius tamen illud in officinis usitatus est, quando ex melle aut solo, (pro simplici & leniori) aut adjunctis aliis tum simplicibus, tum compositis medicaminibus suppositoria finguntur. Primò enim mel igne lento in exiguo cacabo ad spissitudinem coquitur, id est, eoque, ut digitis formati tractarique possit deinde figura imprimitur dicta, lege artis. Stimulantium vicem obit \ominus commune, \ominus gemmæ, pulveres purgantes ex aloe, agat. scammon. colocynth. hellebor. utroque, elater. trochisc. alhand. fell. tauri, spec. hier. picr. Galen. Observandum autem, ne dum mel coquitur, species commisceantur, sed tunc demum cum mel satis est coctum ac concretum: alias enim specierum virtus ignis vehementiâ dissipabitur. Proportionem verò inter mel & pulveres hanc tenent artifices, ut \mathfrak{z} j. mellis pulverum \mathfrak{z} j. aut \mathfrak{z} ss. prout usus exigit, adjiciant. Verum distinguendi quoque sunt pulveres; mitiores enim ad \mathfrak{z} j. fortiores ad \mathfrak{z} j. \mathfrak{z} ss. gr. vi. aut iv. addi debent, v. g. \mathfrak{z} . mell. coct. & concret. \mathfrak{z} ss. vel \mathfrak{z} j. \ominus gemm. \mathfrak{z} ss. vel \mathfrak{z} j. M. F. suppositorium. \mathfrak{z} . mell. coct. & inspiss. \mathfrak{z} ss. spec. hier. picr. \mathfrak{z} j. \ominus gemm. \mathfrak{z} ss. M. F. suppositorium. Eadem ratio est pessorum v. g. \mathfrak{z} . Mell. cochl. ij. parum, addaturque pulv. irid. cyclamin. a. \mathfrak{z} j. M. F. l. a. pessus in modum digiti, exiccandi, & usus tempore oleo commun. vel butyro oblinendi. \mathfrak{z} . Mell. cochl. ij. rad. helleb. nigr. \mathfrak{z} ss. \ominus comm. \mathfrak{z} j. F. l. a. pessus. Loco mellis etiam recipiuntur, quæ in candelas formantur licet sint fere molliora, & adduntur mitigantia alia. Sic in fluxu hæmorrhoidum immodico feliciter id fieri potest, si sebo cervino vel hircino commisceantur species adstringentes ex thure, mastich. balauft. sang. dracon. Sic in ulceribus vel ardore etiam uteri fingi potest pessus ex sebo hircino, qui inungatur linimento de lichargyr. vel de cerusâ, vel diapomphol. & immitatur. Sic medicamenta pulverisata etiam aliis liquoribus, v. gr. terebinthinâ, cerâ, adipe, sebo, ladano, styrace, galbano &c. excipiuntur, probe miscentur ac in figuram pessi, cui filum alligatum sit, aptantur. Pro pessulo v. g. hysterico & discutiente \mathfrak{z} . Sem. nigell. myrrh. a. \mathfrak{z} ij. fol. salv. \mathfrak{z} j. castor. \mathfrak{z} j. gall. mosch. \mathfrak{z} ss. mosch. zibeth. a. gr. ij. ladan. styr. liquid. a. q. f. M. F. pessus, qui sindone obligetur & alligato filo immittatur.

5. *Suppositoria, utero & ano debita molliora & fœpore magis, vel saltem consistentia laxioris consueverunt.* Talia sunt pro ano quidem globuli ex ficibus inversis, præterea ex vitello ovi, croco, melle, & sale, quæ simplicia in rarium lineum induntur, & in anum intruduntur. \mathfrak{z} . vitell. ovi n. j. \ominus comm. \mathfrak{z} j. M. lineoque excepta ligentur filo, cujus appendix aliqua relinquatur, ut pro arbitrio extrahi possit; irrigatus oleo nodulis indatur. Verùm hæc paulo rariora sunt, & certis potius casibus locum habent, verbi gratia in teneismo, ubi non tam stimulare est animus, quàm demulcere; item in doloribus hæmorrhoidum &c. ita ut magis tunc sint *mitiora* quàm *moderata*. Ast in uterinis suppositoriis id frequentius in usu est, aded ut etiam virginibus hujusmodi molliora suadeantur magis, quàm pessi solidi. Cumque latius hæc pateant, operæ pretium est paulisper hæc dispicere. Sic talis generis pessi sunt (1.) ex solis pulveribus aliisque sindone exceptis. Legi meretur hanc in rem locus Ang. Sala S. 4. eff. veget. cap. 3. p. 20. ubi scribit se hellebori nigri vim & efficaciam in aliquot gravibus, præsertim matricis, ex mensium retentione, affectibus expertum. Quo casu fœminis cujuscvis ætatis, temperamenti & conditionis \mathfrak{z} j. hellebori nigri nodulo serico exceptum, per vices renovatum, locis muliebribus applicatum, quoad necessitas postulaverit, gestare præcepit, à cujus usu mutatio & quædam quasi contractio per totum corpus oborta, catenus duravit, donec menses pedetentim promanare ceperint, quod admiratione non caret. Par ratio est lanæ carptæ, gossypii vel linteaminum conceptorum, unde Paulus & Actius pessus dicunt esse lanam conceptam & ad digiti formam rotundam, quâ medicamenta, succi olea, unguenta, linimenta, imbuuntur, excipiuntur, ac pendendis muliebribus induntur. Sic in pruritu \mathfrak{z} . lanæ carmin. & ad digiti formam contort. imbuatur succo centaur. min. & indatur. In mensibus immodicis.

\mathfrak{z} . Linteamina in pessi formam accommodata, imbuantur decocto gallarum, vel liquore styptico. Item formetur pessus ex bombace, lanâ aut linamentis, & imbuatur linimento, quod habet sterc. porcin. \mathfrak{z} ss. bol. arm. \mathfrak{z} j. succ. burf. pastor. vel plantag. q. f. vel \mathfrak{z} . Gal. lar. \mathfrak{z} ij. balauft. ros. iubr. a. \mathfrak{z} ss. colcothar. pil. lepor. a. \mathfrak{z} j. succ. acac. hypocist. a. \mathfrak{z} ij. bol. armen. \mathfrak{z} ss. excip. succ. plantag. F. pessus. (2.) Sacculi oblongi & medium digitum crassi, ex linteo raro, vel tenui sindone concinnantur, ac vel simplicibus contusis succulentisque, ut allio usso, nucæ moschat. vel aridorum simplicium, ut rad. cyclam. bacc. heder. arboreæ, pulveribus implentur, filo affixo in uterum indendi, ol. lil. albor. castor. vel liquore conveniente prius perfusi.

6. *Glandes & pessi sunt vel stimulant, vel mitigantes.* Generalis hic duplex usus sufficere potest, quod reliqui speciales sub hoc alterutro militent. Sic stimulant inprimis propriè dicti & duriores sunt, quæ alvum adstrictam sollicitant, quæ ascarides exstimulant & necant, quæ exstimulant clysteres retardantes, unaque sensum quoque obtusum magis in affectibus soporosis. Frequentissimus hic est usus in constipatione alvi; item cum ægri vel præ virium imbecillitate clysteres admittere non possunt, vel præ timiditate nescio quâ aut pudore quodam subrustico eosdem sibi applicari nolunt. Suppositoria ergò clysterum sunt succedanea, & monitoria, si scilicet resistunt, nec injecta satis tempestivè reddantur, quemadmodum in colicâ fieri & alias assolet, tunc enim suppositoriis evocantur quoque. Eodem modo suppositoria uterina sive pessi stimulant in suppressione mensium, ventositate impuritate, retentione secundinarum, fœtus mortui & molarum. E contrario mitigant quoque suppositoria. Verum quidem est, omnia ano injecta stimulare, id tamen cum grano salis est intelligendum; Mitigant supposito-

ria ratione materiæ ex qua, & ratione modi applicandi considerata. Mitigant improprie dicta, molliora, & mucilagine anodyna prædita. Mitigant in hæmorrhoidibus immodicis sistendis, fissuris ani, quas rhagades vocant sanandis, in doloribus & inflammationibus siue ardoribus, è transitu acrim humorum enatis, sedandis, in diarrhœis, dysenterîis, & tenesmo ipso pro re nata. Faciunt huc inter alia ungt. de cerussa, litharg. diapompholig. Comitiss. rosat. popul. sebum hircin. cervin. mucilagine, aliaque, materia enim aliunde facile nota est. Tacemus hiantem & relaxatam alvum constringentia. Sic & pelli sistentes in mensium fluxu immodico, anodynî, mundificantes, carminativi, mitigantes, sedantes pro usibus uterinis faciunt.

7. *Adhibitionem suppositoriorum limitant partium teneritudo, affectus & circumstantie alie.* Cavendum est à suppositoriorum usu in hæmorrhoidum occlusionem in genere, metus enim est, ne rectum intestinum inflammant, exulcerent, & in dolores adigant, unde parum tuto sunt eo casu, postponenda huiusmodi, fictionibus, aut potius ipsis internis aperientibus. Abstinentium in specie (ex ptiis dictis mitigantibus) cum hæmorrhoides cœcæ ac dolentes ægrum affligunt, quando podex aut est inflammatus aut exulceratus, tenesmo afflictus aut alias tumefactus, suâ quippe duritie dolores exasperant, unde varianda sunt tunc, quod diximus. Præstant etiam adhibitis suppositoriis utrisque utentes decumbere & in lecto quiescere. &c. *Wedelius.*

Suppositoria ex IOH. MICHAELIS.

Suppositoria Purgantia.

℞. Mellis crudi ℥j. Muscerda seu sterc. mur. 3j.

F. l. a. Suppositorium.

℞. Mellis communis 3j. Spec. hieræ picæ cum agar. 3j. felle tauri inspissati ʒj.

F. l. a. Suppositorium.

℞. Suppositor. acur. N ij. Illinantur ʒo diacolocynth. & aspergatur ʒ cum ʒ fixato vel ʒ * vel ʒ gemma vel ʒ purgante. Vel

℞. Sterc. mur. ʒ ij. rad. helleb. albi ʒj. cum s. q. mellis

F. l. a. Suppositorium.

In Vermibus ascaridibus.

℞. Felle Tauri inspiss. succi absinth. inspiss. ana ʒj. aloes myrrha ana ʒss. cum s. q. mellis

F. l. a. Suppositorium.

Ad Lumbricos alliciendos.

Commendat Quidam saccharum penidium in formâ suppositorii: Ubi etiam convenit suppositorium ex lardo.

In Flatibus pellendis.

℞. Pulv. cumini carvi ana ʒj. ʒ cum ʒ fixati 3ss. c. s. q. Elect. de bacis lauri ʒ mellis

F. l. a. Suppositorium.

Suppositoria adstringentia fiunt ex extractis symph. tormentillæ cum sero hircino & cera.

Ad alvum adstrictam suppositoria ex vitell. duorum ʒ & butyro certum experimentum, & ubi nullum aliud juvat cum lineo toto instar turundæ applicatur, quod est arcanum Mulierum.

Turunda in Rhagadibus & fissuris ani.

℞. Emplastri de cerussa 3ss. camphora gr. vj. cum unguent. rosato pomato ʒ ole. rosarum.

F. l. a. Turunda, oblinatur & indatur in anum.

Suppositoria ex Hadriano à MYNSICHT.

Suppositoria.

In Epilepsia, Apoplexia, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore &c.

℞. Trochisc. alhandel. agarici trochiscat. ana 3j. hellebori nig. fol. sene ana 3ss. sal. gemma, nitri ana ʒj.

Mellis q. s. fiant suppositoria duo grossa & oblonga ut est moris.

Suppositoria Anodyna.

℞. Sem. Cymini, ruta ana 3ij. mumia transmarin. Opii thebaic. ana 3j flor. papav. errat. croci orient. ana ʒj. syrac. calamit. castorei veri ana ʒss.

Misc. & f. pulvis, qui melle excipiat.

Suppositoria Stiptica contra Dysenteriam ventrisque fluxus.

℞. Hypocistidis 3j. gallar. turc. acacia ana 3ss. cori. granator. 3ij. rad. althææ, glycyrrhiz. ana 3j. corn. cer. vi usq. croci maris, sang. draconis ana 3ss.

Misc. & cum albumine ovorum & succ. plantaginis f. l. a. suppositoria.

Suppositoria Dysenterica Anodyna & somnum conciliantia.

℞. Mellis cocti 3ij. sem. hyoscyami alb. papav. nigri, ana 3ss. opii thebaic. balaustrar. spodii, oliban. ana 3j. flor. papav. errat. croci Orient. ana ʒj.

Misc. & fiant l. a. suppositoria.

Suppositoria Carminativa.

℞. Cort. Aurantiorum, flor. chamomill. ana 3ss. sem. cymini, carvi, fœselias, ameos, agni casti, cheresolii, ruta ana 3j Pul. colocynthid. salis margaritis. ana 3j.

Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

Sus, vid. Porcus.

SYCOMORUS.

Sycomeri nomen adeptus est hic fructus à similitudine quam ad utrumque fructum, ficum & morum habet. Unde ridiculos eos esse ait Galenus, qui Sycomora dicta putant quod *μωρεῖς ὀνόματι*, id est, fatuis fructibus similes existant? quibus verbis Dioscoridem notare videtur; nec quenquam hactenus inter probatos auctores Græcos viderimus qui per *ω* scribat, inquit J. Bauhinus.

Dicitur etiam hæc arbor Sycaminus.

Est autem Sycomorus nihil aliud quam ficus genus fructu ex arboris trunco exeunte.

Vires. Pomum Sycomori alvo utile est, sed perquam exiguum præbet alimentum, stomachoque adversatur, refrigerandi & humectandi alvumque libricandi vim ei attribunt, unde feblicitantia stomacho utiliter imponitur cum rosaceo. Galenus in curatione tumoris ex crasso vaporosoque spiritu mirum in modum commendat emplastrum *ἔξ ὀνόματι*.

Lachryma arboris vim habet emolliendi, vulnera conglutinandi, & ea discutiendi quæ agre matitantur. Bibitur etiam nec non & illinitur contra Serpentum morsus in scitrum induratos lieges, stomachi dolores atque perfrictiones: celeriter vero teredinem sentit. Fiebat antiquitus & vinum è Sycomoris, quod facile in acetum acie degenerabat *Raius*.

SYLPHIUM, vid. *Laserpitium*.

SYMPHITUM.

Symphitum Matus.

Symphitum ὁ δὲ τῶν συμφοῦν κατασκι δῖκον ἐστὶν μα-
nifestum est, ὅτι τὸ κρέας συμπαρῆναι, quod carnes con-
glutinet dum coquantur additum. Floribus cylindra-
ceis, pendulis cum cerinthe convenit, seminibus ad sin-
gulos flores, quaternis iisque lucidis & politis litho-
spermi instar, ab eadem differt.

Nomina. *Consolida major Ger. Symphitum ma-*
gnum

gnum I. B. majus vulgare Park. Symphitum consolida major C. B.

J. B. Læto (& humido) solo satis obvium, radices surculosas & crassas demittit, foris nigras, intus albas, sapore satuo, sed magnopere viscido & lento. Caules sesquicubitales & altiores, (crassitudine digitali) inanes hirsuti, asperi, & membranis foliorum alatis appendicibus inæquales. Folia Helenii foliorum formam pene imitantur, acuta, rugosa, hispida (marginibus æqualibus) nullo ordine posita. Flores in summitatibus caulibus & ramorum simul multi (antequam aperiuntur caudæ Scorpii in modum revoluti, veluti flores Echii Scorpioidis dicti aut Heliotropii,) penduli nolarum instar, non raro ex pallido & luteo candicantes, interdum purpurascens, ex calice hirsuto in quinque segmenta acuta diviso, ipsi pariter summo margine in toridem acutas lacinias partiti, quibus totidem in penito flore adnatæ ligulæ herbidæ, totidemque stamina breviter cum suis apicibus albidis in interstitiis ligularum, stylus longus flori concolor e centro calicis oritur, dilapso flore residuus, circa quem semina quatuor simul juncta calicis fundo adnascuntur. Semina Echii similia calore pullo Anchusæ degeneris dictæ, splendentia velut lithospermi, iisdemque magnitudine paria.

In aquosis ad rivis & fossas: Maio mense floret.

Vires. Vulnerarium est e præcipuis celeberrimum, mucilaginosum incrassans, humorum acrimoniam obtundens. Usus præcip. in fluxionibus quibuscunque, imprimis alvi, in erosione pulmonum ac phthisi. Schrod. ego (inquit J. Bauhinus, cum quo etiam sentit C. Hofmannus) nolim uti radice Symphiti in omnibus vitis e thorace expurgandis, sed tantum in iis quæ eveniunt a tenui, subtili & calida materia

Flores in vino rubro coctos, bisque in die sumptos in cruenta urina optimos scribit Camerarius.

Extrinfecus vulnerum sanguinem sistit, & fracturas ossium consolidat, quotidianâ experientiâ attestante; unde & Anglice a nonnullis Bone-set dicitur. Hu-

jus virtutis in vulneribus agglutinandis & fracturis ossium consolidandis evidens argumentum est, si modo verum experimentum illud a veteribus præditum, quod scilicet radices Symphiti (majoris) carni frusta quibuscum coquantur cogant ita ut coalescant.

Radices recentes minutim concisas, tulas & impositas ad dolores podagricos leniendos, & ulcera serpentia aut etiam gangrænas compescendas commendat Parkinsonus. Explicatius D. Hulse.

Recipe hujus radicum quantum vis; tunde in mortario donec in massam redigantur, quæ super alutam extendatur & applicetur parti dolenti.

Medicamentum hoc ad dolores podagricos & nonnunquam etiam ischiadicum leniendum valet iteraratis experimentis attestantibus ab amico quodam certior factus sum. Quin & multos eo usos ad brachiorum dolores cum motus privatione conjunctos; aliquem etiam ad venereum quendam post multas embrochationes frustra tentatas, non sine successu.

Radix Symphiti siccata & pulverisata in aqua tepida fontana dissolvatur, agitando usquedum a ferrumine aut visco Symphyti lentescere ex parte aqua advertitur: quod simplicissimum medicamentum tum ad versus hæmorrhagias, tum fracturas & luxationes artuum solertiores Chirurgorum multis aliis compositis anteponunt laborat quidam ulcere cacoethæ, quod Chirurghi cancerum pronunciabant, sed curare non poterant: accedens Agryta accipiebat Rad. Symphiti majoris & derafo superiore cortice nigricante, reliquam ut poterat contusam & lintee indutam quotidie bis imponebat. Ager convaleuit: cancer tamen recens erat, nec octo aut decem circiter septimanas excesserat. D. Soame ex observat. Hieron. Reusneri à Velschie editis. *Raius.*

SYMPHITUM MINUS, vid. *Bugula*.

SYMPHITUM MINIMUM, vid. *Prunella herba*.

SYRUPUS, vid. *Sirupus*.

LIBER XIX.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

T

TABACUM.

Nicotiana dicta est hæc herba à Joanne Nicotio Ulyssiponæ Lusitanæ Regis Galliæ Legato, quam à Belga quodam e Florida allatam accepit, & in Galliam intulit, anno 1559.

Tabacum dicitur à Tabaco insula Floridæ adjacente C. Hofman. quod nomen aliis omnibus quibus insignitur prævaluit.

Brahiliani dicuntur vocare Patum seu Petum. Botanici nonnulli ob vim narcoticam ei cum Hyoscyamo communem Hyoscyami speciem faciunt, & Hyoscyamum Petuvianum appellant. Verum cum facie externa distet, & partium præcipuarum, floris puta & seminis ejusque conceptaculi figurâ, quantum vis viribus conveniat, ab Hyoscyamo distincta & sui potius generis planta censenda est.

Notæ ejus sunt flos e tubo longo in latitudinem expansus, vasculum seminale bivalve, seminibus minutissimis innumeris repletum, Folia in caulibus alternatim posita,

Vires & Usus. De Nicotianæ seu Tabaci viribus & usu multi multa. Peculiarem Tabacologiam conscripsit Joannes Neander, Medicus olim Bremanus, & inde Alstedius in sua Encyclopædia: Chrysothomus etiam Magnenus: Raphael Thorius hymnum composuit de Tabaco: satis iidem prolixus est in ejus descriptione Nicol. Monardes in simplicium Medicam. hist. cap. 14. vires ejus summam tradunt Schroderus & J. Bauhinus.

Herba recens absteigit, incidit, resolvit, aliquantulum astringit, resistit putredini. Sternutatoria est, apophlegmatizans, anodyna, vulneraria, vomitoria. Usus præcip. externus, ad catarrhos cerebri exsicandos, somnum inducendum, lassitudinem ex labore discutendam, uteri strangulatum compescendum.

A peste præservat (in suffitu) sedat dentium dolores dissolvit tumorem uvulæ (in gargar.) medetur lichenibus, phthiriasi, prurigini, achoribus ac favo; mundificat & consolidat vulnera & ulcera inveterata, sanat ambusta quoquomodo adhibita (balneatione scilicet vel sola impositione foliorum recentium nostratis Nicotiana-

na, &c.) nec tamen profusus usum quoque refugit internum, dum pro vomitorio exhibetur sat violento, qua ratione curat febres aliosque morbos: sed cautione hic opus est.

Fumi Nicotianæ in tubo accensæ ore attracti & redditi per totam Europam usus est creberrimus: pituitam elicit & catarrhos exlicca, unde evacuatis oris & faucium glandulis dentium dolori & capitis gravedini auxiliatur.

Verum quoniam calfacit & exsiccat, usus ejus minus utilis est, imo nocivus iis qui calidioris sunt temperaturæ, biliosis & macilentis; ut in memetipso expertus sum, nisi cum dentes dolent & fauces humore turgent.

Sunt qui fumi hoc modo accepti usum damnant, audiivi (inquit C. Hofmannus) à militibus in Belgio versatis vidisse se dissecta capita eorum quibus patera cerebri ab Anatomicis dicta tota interior esset nigra, licet à carnifice interiissent. Audiivi à Patricio Norico, qui in superiori bello Bohemico vidit omnes qui in conflictu cum hostibus interiierint Anglos habere talia capita. Hinc discant sapere qui alias sapere nolunt. Idem nobis affirmant Dom. Boucheret Pharmacop. Londinæ.

Si hæc vera sint (de quo tamen est cur dubitem) non inde tamen sequitur fumum nocivum esse, cum multos novimus qui hodie & copiose per plures annos eo uti sunt, sanos tamen & validos vitam ad extremam senectutem produxisse, nec ullum inde incommodum, sed potius maximum juvamen percepisse: alijs enim ventriculum refocillat & concoctionem promovet, alijs alvum leniter solvit: alii nullum inde incommodum, at neque damnum sentiunt, quibus usus ejus adiaphorus est.

Usus hujus fumi prius in Angliam intulisse dicitur D. Gualterus Raleghe, ex America redux, ubi servos & mancipia eo usos observavit ad somnum conciliandum.

Foliorum pulvis inspiratus attractusque naribus (qui mos in Italia usitatus est) verbera & cujusvis generis supplicia non sinit sentiri, vires addit, augeat animum & ad labores tolerandos infractam vim, verum in eo utendo cauto opus est, ne modum excedas. Hernandes.

Folia nicotianæ viridia, contusa & applicata sedant dolorem podagricum & vim obtinent narcoticam. Inde etiam æstum & pustulas ab urticis excitatas nicotianæ succus aut folium viride applicatum restinguit & sanat.

Modum quandam purgandi cerebrum singularem refert Joannes Terentius notis in Hernandes quem à Capuccino quodam didicit, qui se multos à podagra liberasse asserbat. Ex nicotianæ arido folio quantum juglandi possis includere sumitur, digitisque compressum linteolo mundo, vel serico includitur, & in nodulum nucis ponticæ magnitudine figuratur, filoque compingitur. Cum nodulum ori indimus & lingua ad palatum tublevamus per dimidia horæ spatium statim effluit pituita tenacissima, si i instar ex ore dependens, quæ capite inclinato in vas subiectum excipitur. Et licet aliqua cerebri vertigo sequatur, ea tamen nisi cerebrum admodum calidæ sit naturæ statim evanescit, estque omnino innoxia.

Nonnulli nicotianam ob vim narcoticam frigidam esse volunt. Verum calidam esse arguunt, odor resinosis non ingratus, & summa acrimonia, quæ & fauces urit, & non minore purgat per vomitum violentia quam ipse helleborus, ut experientia multorum constat. Tandem nullum (inquit Joan. Terentius) hactenus innotuit narcoticum, quod non sit calidum.

Ad calculum è renibus abigendum usus aquæ stillatiæ nicotianæ viridis plures tenaciter adherentes abegit. Chesneau ex Zacuti lib. 2. prax. mirand. observ. 66, & collectaneis D. Hulse.

Ad dentium dolorem 7. Tabaci probe calcinati in crucibulo, inde in cavum dentis, & statim dolor sedatur, ut pluries expertus sum, Chesneau. Olei Tabaci gr. j. vel altera linguae vel ori felis aliufve animalis instillata ocysimè illud interimit. Franciscus tamen Redi observat non omnia animalia interficere oleum, neque quæ perimit, eodem omnia temporis spatio; cum magna hoc respectu intercedat differentia inter Tabaci plantas, interque animalia in quæ agit, D. Tancred. Robinson, utuntur Chirurgi ad torporem ubi membra abscindunt D. Palmer è dictatis D. Hermanni.

Commendo usum Tabaci in peste; me enim liberabat peste correptum; omnesque fere domus, in quibus hæc planta vendebatur & Noviomagi & Londini liberæ erant à contagio, cum vicinæ infectæ essent. Diemerbrochius de peste. Ex adversariis D. Tancred. Robinson.

Ad paralyin, 7. Folia Tabaci viridis, infundantur in vino malvatico, hoc vino fricentur partes resolutæ post sudores. Præstat omnibus externis remediis, Hartman. Communicavit ingeniosissimus vir. D. Edv. Hulse.

Testatur Anton. Recchus fumum Tabaci in uterum inspiratum, in suffocatione ejus in difficili anhelitu, mulierum Angustia, syncope, mira præstare, atque dicto citius. Ex excerptis D. Hulse.

Folia Tabaci si manui, chartæ aut linteo affricentur colorem pulcre viridem præbent. Observante D. Merret. notis in Anton. Neri p. 265. exemplum violentæ vomitionis semper immediate sequentis inspirationem pulveris Tabaci super femur contusum & laceratum habetur Ephem. Germ. An. 12. obs. 108. ut me monuit D. Tancred. Robinson.

Nobilem vitum adeo pinguem vidi, ut equo insistere nequirit quin statim sopiretur, nec loco fere moveri posset: ille tamen nunc huc, nunc illuc vadit, mole illa deperdita, & pristinum habitum recuperavit, quod sola masticatione foliorum tabaci peractum fuit, ut ipse mihi asseveraverit; pituitosis enim & frigidis corporibus utile est. Petrus Borellius cent. 2. obs. 2.

At masticatio Tabaci non semper & in omnibus eundem effectum habet, ut ipse experientiâ didici in amico quodam nostro, qui ob id nihilo macilentior effectus est: affirmavit tamen ejus usum dentes antea vacillantes firmasse.

Novi tres juvenes robustissimos à dysenteris liberatos propinando decoctum Tabaci, quod maxima sua violentia totam mali causam evacuavit, & reliquit anodynâ & narcoticâ qualitatem Diemerbrochius obs. Medic. obs. 19. quamvis hoc iis bene cesserit, nimis tamen temerarium foret, me judice, illud in exemplum trahere, & nicotianæ decoctum dysentericis promiscue propinare, purgat enim violentè tam per vomitum quam per secessum.

Willisius noster Tabaci usum in castris commendat, posse enim commeatus inopiam, quæ inibi frequens esse solet, suppressere & milites laborum & periculorum minus sentientes efficere. Morbis insuper castrensibus, colicæ, diarrhææ, ulceribus capitis & artuum doloribus, apprimè conducit, tam præservando quam sanando.

Lixivium Tabaci frequenter adhibetur in psora & lepra præcedum ac jumentorum D. Tancred. Robinson, qui & præcedentem observationem misit.

Nocumenta & incommoda quæ usum tabaci sequi solent videri possunt in Sereniss. Regis Jacobi tract. de Tabaco, & Simonis Pauli de abusu Tabaci. Raim.

TABELLÆ.

De iis vid. sub titulo *Roula* Hic rursus tantum parvula ex Pharmacopœiæ *Lemortiana* & *Bateana*.

Tabellarum Preparatio ex D. LEMORT.

Immodicus Sacchari usus in tota fere Medicina Galenica obviam venit, unde non minimus eorundem Medicorum.

dicamentorum contemptus & fastidium ortum duxit: imo per nimiam sacchari fermentabilitatem & pulverum in eo dilutionem vehementius divisa à se invicem particula, & figuram & efficaciam suam citissime contra intentionem Medicam & cum damno Aegrorum mutant. Non alibi autem manifestius hæc ratio valet, quam in Tabellis, quæ fere totæ quantæ quantæ saccharum sunt, in gratiam autem delicatulorum hæc semi-medica-menta huic etiam ordini inferemus, præcipue, quoniam hæc non raro Aulicis Medicis, ut & gustum potius, quam vires medicamenti expectantibus delicatis, & palato suo deditis aridere observemus.

Tabellæ igitur sunt Electuaria solidissima, ob solum gummi, si vero interno usui destinantur, & masticationem gratiam paranda. Diverse atamen fieri queunt pro intentione & lubitu Medici & Aegri. Saccharum sola basis & recipiens existit in hoc medicamenti genere, unde etiam, ubi Saccharum ad soliditatem reducendum præscribit Medicus ad Tabellati consistentiam illud coquendum esse dicit. Sequentes existunt differentiæ:

1. Fiunt è meris pulveribus & Saccharo: Pulveres hi vel merè terrestres sunt, ut perla, &c. & in minori quantitate permiscuntur, vel gummosi & resinosi existunt, & in majori copia Saccharo cocto adduntur, unde præparatio variat.

Tabellæ Perlata.

℞. Sacchar. albiſſim. cum aqu. Rosar. ad consistentiam tabell. percocti ℥j. margarit. prepar. ℥ss.

M. f. s. l. a. Tabellæ.

Vires. Cardiaca sunt, acidum infringunt, sed præstat Perlas prepar. in substantia exhibere.

Tabellæ purgantes.

℞. Scammon. prepar. 3j. rad. jalapp. Fol. Senn. an. 3ij. rhubarb. el. 3ij. merc. dulc. ʒj. Sacchar. albiſſ. in aq. vel infusion. Tanaceti ad tabell. consistent. cocti ℥j.

M. f. s. l. a. Tabellæ.

Vires. Alvum leviter subducunt, vermes necant, putredini resistunt. Dosis à ʒss. ad ʒss.

Pro Vermibus Tabellæ.

℞. Sem. xedoar 3ij. corall. prepar. ʒiſs. camphor. gr. vj. merc. dulc. croc. mart. aper. an. ʒj. santal. rubr. scammon. sulph. an. 3j. sacch. albiſſim. 3vj.

Infusionis limpidæ ex Tanaceto & abrotano cum aqua ferventi factæ.

Coquatur Saccharum ad consistentiam Tabellati cum illa infusione coagulanti immisce pulveres, celerique manu effunde, & in debitas formas quadratas mediante castello reducito, quibus adhuc calentibus superliniatur aliquid olei feniculi ad gratiam, dein ad usum recondantur.

Vires. Vermibus & putredini resistunt, levissime purgant, infantibus profunt in lienis obstructione &c. Dosis à ʒj. ad 3j.

2. Fiunt & ex acidis, verum minima quantitas acidi cum possit admisceri, sequenti modo procedendum est:

Tabellæ de Berberis.

℞. Sacchar. albiſſ. pulverisat. ℥j. incalcescat, donec se reliquiescat, dein adde succi berberorum evaporat. ad medias q. s. M. f. s. a. Tabellæ.

Vires. Leviter refrigerant, sitim temperant, unde conveniunt in morbis, & febribus ardentibus &c. Dosis pro re nata.

Eodem modo fiunt Tabellæ de succo Limonum &c.

3. Olea stillatitia non facile Saccharo permiscuntur, quin solidam consistentiam tollant, ideoque hunc in modum confici solent:

Tabellæ Garyophyllatæ.

℞. Sacchar. ad consistentiam tabell. cocti ʒv. huic fere coagulato adde olei garyoph. gur. vj.

M. f. s. a. Tabellæ.

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

Vires. Ventriculum roborant, frigidis morbis è viscida intemperie ortis medentur.

Etiâ effuso in Tabellæ saccharo, cum plumaceo- lo oleo imbuto superficies sacchari calentis leviter obduci potest; sic oleum absorbetur, & Tabellæ odore & sapore olei imprægnantur.

Hæ tabellæ notiores esse solent iis, qui Condimenta varia è saccharo conficere solent, quam Pharmacopæis, quoniam, ut superius dictum potius ad gratiam, quam ad vires inde obtinendas conficiuntur, ideoque non diu hisce immoramur.

Sacchari descriptionem hic obiter addemus, ad meliorem notionem inde obtinendam tam in viribus ejus Medicis, quam in præparationibus compositionum. Saccharum est succus arundinis condensatus, naturaliter constans particulis aquosis, viscosis, ramosis & terrestribus. Viscosæ & aquosæ partes plurimæ mediante arte ab ipso separantur, unde magis solidum & durabile saccharum evadit: Aquoso-viscosa pars epim ab Aeris humido facile dissolvitur, & diffuit in nigricantem succum fluidum. Cæteræ partes viscoso-ramosæ albicant, quæ albedo eo intensior est, quo aliæ magis ab hisce separantur; inde etiam soliditas ejus major vel minor existit: Hæ maximè in usum habuntur pro Tabellis conficiendis; Cæteræ non adeo, ut dicunt, retinata pro syruporum confectioe sufficiunt, quæ & meliores ei usui sunt, quoniam non facile concreſcunt in cristallos &c. Quoad cæteras ejus actiones in ejus mixtione, extractione &c. hæ præcipuæ sunt:

1. Non facile oleum vel pinguedinibus associatur coctum, vel solum saccharum, sed tantum pulverisatum.

2. Acidum consortium ipsi inimicum, si solidam retinere & recuperare debeat consistentiam; imo & color illius exinde mutatur, ut in syrupis notavimus.

3. Valde inflammabile est quod partes ramosas ibidem existentes in sat magna copia.

4. Extraktionem difficillime admittit menstruis spiritibus vel ramosis, dissolutionem autem facilem in aqua.

5. Spiritum valde acidum in distillatione exhibet, ut & oleum empyreumaticum, ut omnia fere ramosa vegetabilia.

6. Fermentationem facillime subit dilutum cum aqua.

7. Alcalia in ipso deliquationem partium aquoso-viscosarum promovent, unde in usum trahuntur lixivium è calce confecta ad ipsius depurationem.

Ex hisce ejus natura satis patet, & quodnam Saccharum pro Tabellis præcedentibus, Syrupis & confervis eligendum sit; iis ergo nunc diutius non immorabimur brevitati studentes. Le Mort.

Tabellæ variæ ex Pharmac. BATEANA.

Tabulæ Absinthiacæ.

℞. Sacch. albiſſ. ℥j. Ag. Abs. q. s. coq. s. a. instillando ʒss. Abs. gut. 60; & effunde in marmor. Stomachicæ, hepaticæ, splenicæ, &c.

Tab. Amydaloïdes.

℞. Partium albar. benz. opt. ʒj. Fl. ʒij. irid. flor. ʒiſs. sang. dracon. 3j. sacch. alb. ʒxij. mucilag. gum. trag. in Ros. extract. q. s. f. Tabul. s. a. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. præstantissimæ.

Tabul. de Angelica.

℞. Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per setaceum traject. ʒiſs. sacch. opt. ʒxij. mucilag. gum. tragac. q. s. f. Tabulæ albiſſimæ.

Tabulæ Anthisyphanticæ.

℞. Flor. sulph. ʒj. cynopri subtilit. pulver. ʒiij. sang. dracon. 3j. olei anisi gut. vj. sacch. albiſſ. ʒviij. cum mucilag. gummi tragacantib. q. s. f. Tabellæ.

Tabellæ de Aurantiis.

℞. Cortic. externi aurant. citri limonior. candefactor. an. ʒj. confectio. anisi & zingiber. an. ʒiij.

Kkkk 3

Galang.

Galang. ʒβ. *caryoph.* num. ii. *nuc. m. condit.* num. 2. *Aromat. Rosar.* ʒiv. *Amygd. decort. rad. eryng. candefact.* an. ʒj. *pinear. pistach. an. nu. x. mosch. zibet. an. gr. 4.* *Ambr. grif. ʒj. sacchar. alb. ʒβ. mucil. tragac. in ʔ of. fact. q. s. ut f. Pasta, & exinde Tabula f. a. Antiscorbuticæ, Cordiacæ, Caminativæ &c.*

Tab. Burgehanæ.

ʒ. *Glyc. rec. ʒβ. decoct. passular. scabios & violar. ʒvi.* *Infund. per dies 3. & coq. ad dimid. f. expressio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde sacch. cand. alb. pulverat. ʒxv. gum. tragac. pulverat. ʒij. ol. anis. gr. xx. ambr. grif. gr. iij. contunde opt. ut f. massa, ex qua fermentur Tab. vel Rotula, f. a. Bechicæ, Cardiacæ, &c.*

Tab. Cardilogicæ.

ʒ. *Cret. candid. ʒij. oc. ʒj. nuc. m. ʒj. sacch. albif. xii. mucilag. sem. cydon. q. s. ut f. Tabula. Titulus demonstrat vires.*

Tab. Carminativæ.

ʒ. *Sem. Dauci com. pulverat. ʒj. sacch. opt. in decoct. sent. dauci com. solut. ʒxij. coq. & effunde f. a. Aliter.*

ʒ. *Sem. Cardamom. cras. pul. ʒj. flaved. cortic. aurant. minutiss. incis. ʒij. β. sacch. opt. in ʔ of. cum tertia parte ʔ Thymi solut. ʒxvj. coq. & effund. f. a. In statu optimum Remedium.*

Tab. Catharticæ.

ʒ. *Diagryd. ʒiβ. crem. tartari, ʒvj. ol. fl. caryoph. gr. vj. sacch. albiss. ʒiv. mucilag. gum. tragac. in ʔ of. fact. q. s. f. Tabella f. a.*

Tab. Dialthææ.

ʒ. *Pulveris Rad. alb. ʒij. glyc. ʒj. fl. ʒvj. gum. tragac. ʒij. sacch. opt. ʒxij. ʔ, & thorax q. s. f. Tab. f. a.*

Tab. Diambæ.

ʒ. *Spec. Diamb. ʒβ. sacch. alb. ʒviij. ʔ cinnamom. q. s. coq. f. a. Cardiacæ, Cephalicæ, Stomachicæ, &c.*

Tab. Diatragacanthi.

ʒ. *Spec. Diatragac. frig. rec. fact. ʒβ. mosch. ambr. grif. an. gr. j. zibeth. gr. 2. sacch. opt. ʒxij. ʔ of. Dam. q. s. contin. in massam. & f. Tab. albissima.*

Tab. Divinæ.

ʒ. *Lact. Apurothii ʒij. sacch. alb. ʒvj. mucil. cydon. q. s. f. Tab. drachmas. In hæmorrhoidibus curandis Arcanum est. Valent præterea in scabie, asthmate, &c. Dos, nu. 3. vel 4. bis vel ter in die.*

Tab. Embryonum.

ʒ. *Pulverum Rad. bistort. ebor. coral. r. coriandr. ppt. an. ʒβ. succin. alb. crystall. bacc. cherim. an. ʒij. sacch. alb. ʒxvj. ʔ cydon. q. s. coq. f. a. addendo ol. cinnam. gr. vj. & effunde. Virium sunt magnarum in Abortu præcavendo, foetu roborando, &c.*

Tab. Emeticæ.

ʒ. *Stibi subtiliss. pulverisat. ʒβ. sacch. opt. ʒiv. ol. anis. gut. v. mucilag. gum. tragacanth. q. s. f. Tabella. Dos. gr. 16. ad 40.*

Tab. Farfareæ.

ʒ. *Fol. tussilag. sereno celo collect. & (abstersâ mucositate aridâ cum linteo madido, irrigando demum Vino Hispan. & exitando) pulverisat. ʒβ. glyc. pulverisat. ʒβ. sacch. cand. alb. subt. pulverisat. ʒxij. gum. tragac. in decoct. Pector. solut. q. s. f. Tab. vel Troch. f. a. Pectorales sunt efficaces in Tussi, &c.*

Tab. Fœniculanæ.

ʒ. *Sacch. opt. ʒβ. ʔ Fœnicul. q. s. a. instillando ʒo stil. Fœnicul. gut. ʒo. effunde f. a. Ad flatum, colicam, &c.*

Tab. Griseæ.

ʒ. *Ambr. grif. ʒj. mosch. gr. vj. stypter. gr. ij. sacch. cand.*

alb. pulverisat. ʒxij. mucil. gum. tragac. in ʔ menth. ex tract. q. s. f. Tabella Cerebrum & cor confortant, Spiritus naturales, vitales, ac animales mirifice reficiunt. Dos. ʒj. ij. &c, ter vel quater in die.

Tab. Hæmoptoicæ.

ʒ. *Terra lemn. ʒij. AB ʒij. lap. Hematit. magist. eboris, an. ʒiv. rad. bistort. sem. hyoscyam. cort. limon. rec. minutiss. incis. an. ʒj. sem. papav. alb. ʒβ. rhodofacchar. ʒviij. mucilag. hum. tragac. q. s. f. Tabella. Titulus virtutes indicat. sumantur sæpe in die.*

Tab. Helenii.

ʒ. *Pulp. rad. enul. rec. coct. ʒiβ. sacch. opt. ʒβ. mucilag. gum. tragac. in ʔ hyssop. extract. q. s. f. Tab. Ad Tusses, Asthmata, &c. valde conducibiles.*

Tab. Infantum.

ʒ. *Resin. chelop. ʒj. Ziabach. dulc. subt. pulverisat. ʒvj. sacch. opt. ʒij. mucil. gum. trag. q. s. f. Tab. pondere ʒβ. comedantur manè 2, 3, vel 4. ad vermes.*

Tab. Lenthales.

ʒ. *Glyc. rec. ʒviij. anis. ʒiv. carvi ʒj. aquarum tussilag. hyssop. prassii, an. ʒβ. infund. in MB. dies 3, f. express. fortis, quæ ad mellaginem exhaletur; addendo gum. ceras. arabic. an ʒij. tragac. ʒβ. per dies 2. infus. in ʔ of. dam. ʒβ. Tum adde sacch. opt. ʒβ. mosch. ambr. grif. an. gr. vi. pulveris glyc. ʒβ. contunde opt. in dies, & exinde f. Tab. vel rotula, f. a. Pectorales sunt jucundæ.*

Tab. de Pipere.

ʒ. *Cinnam. ʒβ. ʒx. ʒij. piper. nu. ʒij. calam. arom. mac. nuc. m. an. ʒij. gr. v. cubeb. cardamom. min. an. gr. xv. caryoph. galang. flaved. cort. aurant. crud. rec. an. ʒj. flaved. cort. citri crud. rec. ʒj. Incide omnia crasso modo, & adde amygd. dulc. excort. ʒv. cort. citri condit. ʒj. sacch. alb. in ʔ menth. solut. ʒβ. coq. & effunde f. a. Cephalicæ, Stomachicæ, carminativæ, &c.*

Tab. Prunellæ.

ʒ. *Lap. prunell. ʒβ. sacch. opt. ʒvj. mucil. tragac. q. s. f. Tab. In ore sæpe tenendæ ad sitim in febribus.*

Tab. Rosicæ.

ʒ. *Ros. rub. exungul. ʒvj. gum. Arab. tragac. an. ʒβ. sacch. opt. ʒxvi. ʔ of. q. s. ut fiat pasta. Inde fiant Tab. vel rotula, f. a. Addi pt. ol. nuc. m. gut. aliquot. In Catarrhis, tussibus inveteratis, &c. proficiat.*

Tab. Saponacæ.

ʒ. *Sapon. Ven. opt. ʒiβ. glyc. ʒij. rad. irid. fl. ʒvj. fl. ʒβ. rad. angelic ʒij. ol. anis. ʒβ. sacch. opt. ʒviij. mucil. tragac. in aq. hyssop. fact. q. s. f. Tab. vel Troch. f. a. In Empyemate, Phthisi, &c. optime valent. expectorationem efficaciter promovent.*

Tab. de Styrace.

ʒ. *Styrac. cal. colas. pulp. passul. min. an. ʒj. pulv. glyc. ʒvj. xyloal. cinnam. an. ʒij. nuc. m. ʒij. ʒij. AB. ʒx. nuc. mosch. condit. siccat. ʒiβ. sacch. opt. ʒxx. mucag. trag. q. s. f. Tabella. Cararrhales, Pectorales, Cordiales, & Tabidis mirè conducibiles.*

Tab. Tartareæ.

ʒ. *Crysal. tartari subtiliss. pulverisat. ʒj. sacch. opt. ʒviij. mucil. trag. q. s. f. Tabella, frequenter in ore tenendæ urgente siti.*

Tab. Vermifugæ.

ʒ. *Pulveris c. c. crud. ebor. an. ʒiβ. corallin. ʒβ. sacch. alb. ʒviij. mucil. tragac. q. s. f. Tab. ponderantes singula ʒβ. D. nu. 3. bis in die.*

TACAMAHACA.

Nomina. Tacamahaca C. B. Park. Tecamahaca Hernand. Tacamahaca populo similis fructu colore pæonie I. B. arb. populo similis resinosa altera C. C.

Colligitur vulnerata arbore magna ut populus admodum odorata, cujus fructus ruber est pæoniæ seminis modo. Monard. Fr. Hernandez folia obrotunda, mediocria & ferrata arbori attribuit. Fructum parvum obrotundum, fulvum refertum semine nucleo perfici haud absimili in summis ramorum flagellis. Color est galbani (nec desunt qui idem esse putent) unguibus albis uti ammoniacum, odore gravi atque etiam sapore Monard. J. Bauhinus plenius describit, coloris est ruuli partim, partim flavi pallidioris, veluti ex unguibus diversis compacta, resinae strobilinae concrezione, bullatis tamen tuberculis alicubi cava, sub dente, in pulverem desiliit primum, mox rursus recolligitur, lentescensque pro arbitrio ducitur, sapore amaricante, haud ingrato & aromatico. Suffita jucundum spirat odorem, mastiches fere æmulum, minus vehementem & suaviorem nulloque relicto crassamento consumitur.

Vires. Magni est apud Indos usus in quocunque affectu, præsertim in omnis generis tumoribus in quacunque corporis parte, siquidem mitissime resolvit, maturat & dissipat: Tollit etiam omnes dolores ab humoribus frigidis & flatulentis provenientes. Prunis injecta naribusque admota mulieres uteri suffocatione laborantes illico liberat; umbilico emplastri modo imposita uterum suo loco retinet, usu familiarissimo. Delicatiores Ambra & moschum addunt. Defluxiones quascunque à capite reptimit (linteo, excepta & post autem alteram vel utramque applicata substituitve attracta) temporibus adhibita cerati modo defluxiones in oculos aut alias faciei partes revellit, dolores dentium sedat dentibus corruptis indita.

Ex ea styracis tertia parte & Ambrae momento fit emplastrum stomacho longe utilissimum, siquidem illum roborat, appetitum ciet, concoctionem juvat & flatus discutit, eodem modo cerebro imposita. Magna est efficacia in doloribus coxendicis, & omni articulorum morbo præsertim si ab humoribus frigidis vel mixtis proveniant. Sola juncturarum aut nervorum vulneribus imposita, ea curat; nam statim suppurat & spasmus prohibet. Ego (inquit Monardes) tertiam partem ceræ adjicio, ut facilius inducatur, hæc omnia Monard. emplastrum de Tacamahaca ventri applicatum cephalalgiam lenire dicitur; efficax etiam est ad Tumores lienis & durities discutiendas. *Raius.*

TALCUM, vid. sub titulo *Lapis.*

T A L P A.

Talpa, A Mole, or Mornvvarp or Want. Animal est subterraneum, coloris nigri; reperiuntur tamen nonnunquam albi, cujusmodi meminit Wagnerus in Hist. nat. Helvetiæ, qualem etiam ad me misit amicissimus vir & peritiss. Botanicus. D. Jac. Pativer. in agro Warvicensi captum, Pili mollissimi, breves & densi. Rostrum ei suillum, Dentes habet muris aranei dentibus fere similes; in superiore maxilla utrinque ad latera singulos eminentes, posteriores sive interiores multis cuspidibus ut in mure araneo exasperatos. Lingua est tanta quantum inferior oris meatus capere potest. Collum inter crura anteriora brevissimum & pene nullum. Crura ei brevissima, & ungues acuti; digiti in omnibus quinque. Vola s. palma anteriorum pedum bene lata est, & manum refert. Ungues in eisdem robusti, & majores, longiores, latioresque quam in ullâ animante pro sui corporis modo. Pedes eorumque digiti non deorsum sed ad latera spectant, ad commodius fodiendum. Cauda brevis & hirsuta. *Gesner.* Quicquid veteres & Recentiorum nonnulli dicant, oculi nec desunt talpæ nec sunt membranâ tecti, sed suâ habent in cute foramina, & cuius inquitenti se facile conspiciendos præbent, veluti puncta nigra, seminis

Minii magnitudine, nervo affixa: inter pilos latitant ut si eos pressius intueri velimus, pilos diffilare necesse sit. Humores iis insunt, & tunica nigra uvea se prodit. *Schneiderus.* Auriculæ nullæ. Lumbicis vescitur. Humum fodiendo mira celeritate viam sibi facit.

In Talpa à Schelhammero dissecta hæc observata invenio. Pellis durissima est & planè nervea, ut nisi acutissimo cultello vix cedat: ad defendendum frigus externum, & ad impediendum ne calidi vapores exhalent. Pili tenuissimi, & quovis serico molliores, ob eandem rationem, ut scilicet frigus repellant. Nec dubium, inquit, fieri adeo tenues, quia poruli è quibus ipsis eluctandum est tenuissimi sunt. Pilos enim pro ratione pororum è quibus egrediuntur majores minoresve esse videmus. Sic iis Animalibus quibus circa os ferarum more crassiores excrescunt, ut Feli, ac Lepori, poros ibi & longe majores & plane conspicuos esse, in aliis partibus minores.

2. Carnosus panniculus adeo similiter cuti adnexus est, ut innatus videatur, ad motum pelli conciliandum, & ad frigus excludendum.

3. Sub hoc membrana tenuissima ac pellucida universum abdomen unâ cum thorace involvens: sub qua demum musculi latebant.

4. Musculi inferioris ventris erant omnino bini, fibris in longum extensis, ut recti in nobis, constantes, sed latiores, in membraneam substantiam tandem degenerantes, quæ peritonæo firmissimè adhaerebant.

5. Omentum, quod multis Animalibus deest, huius aderat. Intestinorum tenuium & crassorum distinctio nulla: sed cellulis ab initio ad finem omnia plena, ad excrementa retardanda, ob commodiorem chyli fermentationem, ut in ipso etiam homine tenuia intestina ejusmodi semoris non carent. Oesophagus ut in *Sinuro*, *Lepore*, *Equo*, &c. in medium ventriculorum inferebatur. Ventriculus intus lumbricos terrestres continebat, quibus vescitur præcipuè hoc Animal.

Fel in vesicula sua contentum manifestam dulcedinem cum amarore conjunctam habebat, ut in aliis omnibus Animalibus.

Reliquis omis, quantumvis lectu dignissimis; quæ de partibus genitalibus habet duntaxat subiungam.

1. Penis, intus penè totus absconditus, longissimus erat, ut dimidium fere totus Animalis æquaret. 2. *Testes* non propendentes, sed sub cute; magnitudine renes superabant. 3. *Parastata* non modo ad testes adhaerebant, sed cum ipsis capiendis non sufficerent, singulati sacco inuper eximia earum pars erat inclusa, qui ex fibris carnis constabat; ex quo sacculo demum vas seminale prodibat. 4. Corpora extus carnosissima manifestò, indeque rubicundissima; intus nervea, canali nerveo durissimo prædita, qui longè ante vesiculas seminales in penem seorsim inferebantur. Porro 5. circa vesicam, quæ crassissima, rugosa, nervea, aliud occurrebat globosum, carneum partem exteriore, interiore nerveum, in ipso pene situm; in quod cum ex vesica aditus erat, tum etiam vasa semen deferentia terminabantur, ex quo prostatas esse apparebat. Sed post hanc demum insertionem ex dictis corporibus rotundis, canales illi nervei seorsim in penem abibant. Ita se habent hujus Animalculi genitalis partes, in quibus tantum apparatus haud immerito admittitur. Cum enim reliquis præter testes valde mediocres, quorum parastatae appendiculæ sunt, & glandulas prostatas, vesiculaeque, nihil natura dederit; huic & maximos illos, & parastatas amplissimas & reliqua; & insuper novum corpus seminale ab his diversum ac separatum, novis ductibus instructum concessit, penem etiam facile omnium, ni fallor, animalium,

lium longissimum. Ex quibus colligere est, maximam præ reliquis omnibus animalibus voluptatem in coitu, hoc abjectum & vile animalculum percipere, ut habeant quod ipsi invident, qui in hac supremæ vitæ suæ delicias collocant. Cum primis verò considerari dignum, omnes has partes carnosæ tegumentis muniti, ex quo manifestum sit contrahi eas, atque sic seminalem materiam propellere &c. Patet insuper in hoc animalium materiam seminalem non simplicem esse, sed quadruplicem, cum seorsum ex variis locis confluat idque per ductus separatos & distantes. *Ramus in Synops. Histor. Quadrup.*

OFFICIN. NAT. ex TALPA.

1. Talpa ipsa. 2. Cor. 3. Sanguis.

Vires. 1. Cinis confert lepris, strumis ac fistulis, (illitus cum albumine ovi aut melle.)

Intrinsicus cum cerevisia aut vino potus curat arthritidem vagam dictam, (die lauffende Vahren, die lauffende Gicht. The running Gout, De loopende of vliegende Gicht, Serophulas.

Dosis ʒß. quotidie assumenda.

2. Cor Herniam sanat. (siccatum, pulverisatum & exhibitum, per dies 3. aut 4. scilicet quotidie unum.) [veriginem tamen & palpitationem cordis inducere dicitur.]

N. Præstat mense Majo collectum.

3 Sanguis recens illitus, capillis calvitiam decoret.

N. Vulgi opinio est, si quis talpam manū compresserit, ut moriatur, eum a febre eo ipso anno fore securum, quin & in Paroxysmo febrili manuretenta, insultus reprimere censetur. Schroderus.

Talpa.] Loco cineris substituenda talpa exsiccata. Hujus etiam caro vel cruor arcanum est in gangræna & sphacelo, si papyro illius & exsiccatus postea aquæ intinctus ita applicetur: item in gangrænosæ mammillarum affectibus conducit. Caro per se imponi potest.

N. Talpa cum oleo Lini cocta vaporetenuis necat, unde contra hostium insultus in navibus incendiariis juxta adhibetur. Ex communic. mß. Hofmannus.

TAMARINDUS.

Nomina. Tamarindus Ger. Park. I. B. Siliqua Arabica quæ Tamarindus C. B.

Arbor est grandis, ramis densis, in latum diffusis, Alpino pruni, Garcie fraxini, uglandis, castaneæve magnitudine, Marcegravio tilie maximæ. Radix crassa est, brachia late diffundens, cortice rubescente. Stipes crassus, ambitu duorum hominum amplexum æquans, cortice crasso, cinereo in trunco & ramis vetustioribus, in furculis minoribus viridi, materie firma non fungosa. Folia pinnata, filicis faminæ foliis similia Acoftæ, pediculo communi & costa cui pinnæ adnectuntur vix spithamam longo, in quo ordinate posita pinnæ seu foliola parva, pollicari forma longitudine (Paulo plus semidigitum longa Marcegr) latitudine ferme semidigitali, æqualis undique latitudinis, paulo tamen versus apicem angustiora quam ad pediculum; bina autem exactè sibi ubique opposuntur, ac arcte se mutuo attingunt, apicibus subrotundis. Sunt autem foliola tenuia, textura solida, plana, infernè dilute viridia, supernè saturatius; ac interne nervo secundum longitudinem eminente, & venulis transversis secundum latitudinem, sed valde exilibus prædita, quæ superne vix conspiciuntur. Egregiam aciditatem sapore referunt, & ideo in febribus sitis extinguendæ gratiā manducantur flores in furculis seu pediculis & foliorum sinibus expressis octo

ant decem simul, Auræ mali floribus admodum similes formâ exteriori & odore Acoftæ, octo petalis (H. M. septem) constantes, è calyce crassiole & rotundo, (odore nullo H. M.) petala quatuor exteriora candida postmodum parum subflavescent, oblonga cuspidata, tenuia, nullis venis striata, (Acoftæ quatuor interiora alba sunt & crassiora) tria interiora extremo rotundiora, in oris tenuiter crispata, colore albo venis rubris variegato, duobus tertio longioribus & latioribus, tertium autem surrectum est minusculum, concavum, cuspidè parvo ac sufflavo eminens. Acoftæ bina è petalis exterioribus eleganti nervo radiata sunt.

E medio flore (Acoftæ quatuor) tria nascuntur stamina tenuia & incurva & viridia (Acoftæ candida & corniculorum modo inflexa) primo in unum juncta, post versus folium surrectum divaricata, exteriora, apicibus primo flavis, postea cum flores subflavescent rubro-fuscis dotata. Stylus staminibus crassior, inter hæc & folium surrectum prodit, qui siliquosum germen est.

Fructus lignosis & crassiusculis petiolis ramis appendi sunt; siliquæ oblongæ, crassæ, in glandulas tres quatuorve extuberantes, cortice crassiole, exterius viridi, fragili, pulpa per maturitatem molli, & flavo seu rubro-fusca, ad corticem ex petiolo lignosis filamentis, sed raris in longum per texta, acidi saporis gratissimi; sub carnè siliquæ in membranacea loculamenta in quibus semina, distincta sunt.

Semina quadrata sunt & plana, lupinorum æmula, dum adhuc immatura sunt cortice viridi, diluto & nitente amaro, pulpa intus alba, solida & densa, sapore adstringente, maturitatem consecutæ in osseam duritiem cortice rubro fusco evadunt.

Floret semel in anno, mense Novembri.

Folia Sole occidente ut in Acacia aliisque sese contrahere solent, eoque oriente aperire, ut tradit Alpinus. At vero fructum sive siliquam frigoris vitandi causâ foliis sese involvere ut Alpinus & Acofta scribunt & miraculi loco habent, mihi cum D. Syen fabulam redolere videtur.

Crescit hæc arbor in Arabia felici, inque India Orientali & Occidentali sive America.

Vires. Tamarindi humorum acrimoniam temperant, bilem purgant, ejusque & sanguinis fervorem compescunt, febres acutas & icterum sanant, sitim ac omnem ventriculi hepatisque ardorem extinguunt, vomitum sistunt.

Turcæ & Arabes æstate longinquum iter suscepturi (ait Bellonius) Tamarindos coemunt, magni in Turcia usus, non Medicinæ, sed sitis restinguendæ gratia.

Utuntur Ægyptii, referente Alpino foliis Tamarindi in pueris ad vermes necandos, atque ipsorum vel infuso, vel decocto ad solvendum alvum. Medici Indi (Cautore Garcia & Acofta) folia trita partibus corporis Erysipelate infectis imponunt.

Arabes condunt siliquas parvas ac virides saccharo vel melle Carob, tum etiam grandiores factas atque maturas condunt ipsarum pulpam saccharo, quam per itinera, quæ in desertis Africæ locis conficiunt, secum viatores deferunt. Quæ sæpe calefacti ac ex calore sitim restinguunt. Per alvum plurimum calidorum humorum subducentes atque evacuantes.

In febribus verò pestilentibus, atque omnibus aliis ex putridis exurentibus, aquam in qua multa copia Tamarindorum infusa fuerit cum saccharo ebibunt: potius siquidem ex calore sitientibus jucundissimus est, maximeque refrigerat & sitim extinguit, præterea ad gonorrhæam usum Tamarindorum frequentant. Fallopius etiam in gonorrhæa biliosa laudat.

In bilis redundantia, sanguinis fervore & ebullitione siti infecta, morbis cutaneis & præsertim ictero simplex medi-

medicamentum ex cassia fistula cum Tamatindo, una cum saccharo vulgo dicto Jagra de canna ab Indis datur, quod leniter alvum solvit. H. M.

Afferitur ad nos Tamarindi fructus non integer, sed contusus, ut bene compactus non admittat aerem externum.

Annos tres servantur in vase vitreato, stricti oris, & bene obstructo, & in locum purum & perflatilem seposito, nisi externus vel calor vel humor putredinis initium ipsis attulerit.

Nonnulli Tamarindum Arabicum ab Americano distinguunt. Nobis una eademque specie arbor videtur. Siliqua tamen Jutay sive Tamarindi Brasiliæ Pison, brevior & magis compressa esse videtur, *Ramus.*

TAMARISCUS.

Myrica forte *δέντρον μύρεας*, quod stillo & fluo denotat, nomen sumpsit, quod juxta fluvios nascatur, relius *δέντρον μύρεας*, quod lugere significat, quod ut fabulæ tradunt, Cinyræ filia in hac conversa sit. Hesich. erat autem Cinyras Rex Cypri: vel quod improborum esset corona: quodque lignum ejus infelix habitum esset. Vide Jo. Bod. à Stapel. Comment. in Theophrast. hist. lib. 4. cap. 7. p. 408. qui plura habet.

Ejus nota sunt folia cupressi seu ericæ vulgaris, flores spicati, multa semina lanugine involuta, simul confecta racematim in summis ramis.

Vires. Hujus Gallæ, ut & cortex, non paucam fortitæ sunt astrictionem, adeo ut Gallæ omphacitidi sint (inquit Galenus) nisi quia acerbitas evidens est in Galla, aut myricæ fructui temperatura inest inæqualis, immixta enim est naturæ ejus multa partium tenuitas atque vis abstergendi, quod sane Gallæ non accidit. Attamen ubi Galla ad manum non est, ea uti licet ad omnia ad quæ illa utimur, ad eadem & cortice.

Decoctum foliorum in vino potum lienem absumit. Diosc. succus expressus cum vino bibitus Plin. adeoque mirabilem hujus arboris antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, ut affirmant si ex alveo facto bibant sues sine liene inveniri. Hinc ex ejus ligno, ut olim ita & nunc dierum detrahantur pocula, in quibus potus lienosis præbetur. Clusius Doliola è myricæ assulis Francofurti ad Mœnum venalia memorat, quibus contentus liquor lienosis prodest. Ejusmodi etiam Doliola ex Episcopatui Salisburgensi artificiosè constructa Viennam usque venalia deferri scribit J. Bauhinus. Consimilium valorum usus est etiam apud Ægyptios ad induratum lienem, autore Alpino, Eodem tradente Tamarisci ligni usus est tum in Ægypto, tum magis supra Ægyptum, ubi hatum arborum copiosus est proventus, ad ignem major, quando fere nulla alia ligna ad comburendum habeant. Mulieres decocto ex cortice parato per os sumpto utuntur ad sistendas menstruas purgationes. Ex quo parant etiam infusiones, & clysteribus in uterum injiciunt decoctum; idem quoque fructus facere aiunt, iis siquidem utuntur in sputo sanguinis, in lienteris, & in menstribus plus justo fluentibus, atque hæmorrhoidum immodico fluxu: dentes etiam commotos atque collabentes ipsorum decocto firmant, atque in iis concitatum dolorem demulcent. Utuntur etiam ad oculorum lippitudines incipientes in collyriis, atque ad oris ulcera. Cinis quoque corticem & fructuum ulcera curat. Atque hæc vires & effectus sunt quos veteres etiam Tamarisci tribuunt.

De ligno multi decoctum, non secus quam nostri ex guajaco ad curandam luem veneream facere solent, quod exhibent leprosis, scabiosis, atque aliis multis pustulis & ulceribus affectis, feliciori cum successu: idemque faciunt in melancholicis, ictericis nigris & hydropicis ex refrigerato obstructo atque indurato liene concitatis.

Luem impura venere contractam verè scripsit Alpinus non secus Tamarisci quam guajaci decocto profligari. Non enim adeo gravia sunt quæ in Ægypto infecti patiuntur. Excludit mali impetum purior corporum constitutio, tum illa sudorum per continuum aeris æstus & balnearum frequentissimum usum consuetudine profusio. Vidi sæpius pessimè affectos, & in ossa passa fæde sevientem morbo, cum extrema omnia frustra alibi tentata fuissent, in hac regione citra magnam prædiorum vim noxiam luem evasisse. Vesting. *Ramus.*

TANACETUM.

Tanacetum forte à *Tannaco* quo nomine Parthenium appellatum fuisse Plinius testatur, recentioribus dictum est, C. inquit Bauhinus.

Ejus characteristicæ sunt flores nudi in umbellæ formam digesti, folia laciniata.

Nomina. Tanacetum *Ger.* vulgare *Park.* vulgare luteum C. B. vulgare flore luteo I. B.

J. B. In setis magnam adolescit proceritatem duorum cubitorum & amplius, caulibus teretibus, nonnihil striatis & hirsutis, medullâ albâ fungosâ plenâ. Folia ex viridi in flavum vergunt, pennata, in segmenta per ambitum crenata divisa, costæ media adnexa, odore vehemente, sapore amaro. Flores in summis caulibus velut in umbellam digesti: singuli autem corymbi seu flores totales è flosculis exiguis, adeo ut eorum partes visum pene fugiant, creberrimis, dense stipatis componuntur, iisque nudis h. e. nullo in ambitu barbularum circulo donatis, è calicibus squamosis. Caules quotannis marcescunt & erosiuntur, radice in terra superflite: hæc planta ludit interdum foliorum colore, vario ex albo & viridi; hinc Tanacetum versicolor Parkinsono.

In montosis Angliæ Borealibus plurimum oritur, & alibi etiam siccus vias & in agrorum marginibus non infrequens.

Vires. Temperamento & viribus cum masticaria convenit. Vulnerarium uterinum ac nephriticum est. Usus præcip. in lumbricis, torminibus ventris, calculo renium & vesicæ, mensibus obstructis, flatibus hydropæ.

Succus illitus manuum pedumque rimas sanat, ulcera etiam crustosa & imperigines.

Ex tenellis herbæ erumpentis foliis aut eorum succo cum ovis & farina placentas faciunt tempore Paschatis, gustui non jucundas & ventriculo utiles ad dissipandos flatus ex piscium & leguminum elu Quadragesimæ tempore contractos.

Corymbos & semen Agyræ ad expellendos lumbricos sæpe ingenti miraculo verminantibus pueris propinant. Sim. Paullus D. Bovvle conservam ex foliis & summitatibus paratam adhibet; quæ etiam resistit putredini, aperit obstructions, recreat lienem, illustrat sensus.

Succam cum quovis oleo inunctum nervorum contractionibus ac doloribus auxiliarem esse aiunt, miles Monspelienis hydropæ pertinaci laborans ad sanitatem restitutus erat solo decocto tanacet. Ephem. germ. An. 12. obs. 112. *Ramus.*

TAPSIA, vid. *Thapsia*.

TAPSUS BARBATUS, vid. *Verbascum*.

Taraxacon seu dens Leonis.

Nomina. Dens Leonis *Ger.* vulgaris *Park.* latiore folio C. B. Hedynois sive dens leonis Fuchii I. B. Aphacæ ex olerum genere Theoph. 7. hist. 10. C. B. Bodai à Stapel.

E radice digiti fere minimæ crassitudine, lactescente, surgunt nudi, & inanes pediculi palmares & plusquam

quam dodrantes, aliquando hirsuti lanugine facile cedente, quibus insident singulis singuli flores pulchri, patuli, lutei, majores quam Hieracii cujus floribus similes: sunt: exterioribus foliis prona parte ex fusco rufescentibus, calice glabro, multifido, extra quem quatuor aut quinque folia, viridantia, reflexa: flores in pappos abeunt, calyce dehiscente & circa pediculum reflexo nudam florum sedem porosa pelliculâ calvitium senile imitante obductum ostendente: unde nonnullis caput monachi dicitur.

In hortis & arcis inque pascuis ubique oritur, & per totam æstatem floret.

Variat foliis angustioribus & profundius lacinatis, itemque seminibus ruffis & citrinis.

Vires. Epatica est, cum endivia conveniens quo tamen potentius operatur usus præcip. in febribus putridis inveteratis. Schrod. aquam destillatam magnopere commendat Tragus in apostematibus & febribus ardentibus, trium aut quatuor cochlearium mensura singulis vicibus sumptam; ex qua & optima collyria adversus oculorum maculas fiunt: quia & inflammatori membrorum medetur aqua destillata, lincolis in ea madefactis & impositis.

Herba cocta stomachum dissolutum astringit. Cruda etiam alvum sistit. Eadem dysentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Matth. succus porus iis prodesse dicitur quibus genitura effluxit. Universæ plantæ decoctum potum icteritiam tollit.

Alvum supprimendo, obstructionesque referando mesentericarum, plus lotii derivat in vesicam quam pueruli retinendo sunt, præsertim inter dormiendum, eoque tunc imprudentes & inviti stragula permungunt, unde Gallis pueris *pissenliet* (nostratibus etiam eodem nomine) quasi lectiminga & urinaria herba dicitur. Radices enim plebecula Gallica in acetariis edit, aut jusculis addit.

Parkinsonus radices & folia decocta in vino aut jusculo commendat in phthisi, tabe, cachexia & febrium accessionibus. *Raius.*

TARTARUS.

Tartarus in Medicina pathologica est res naturæ lapidescentis, i.e. in lapides coagulari apta vel jam demum coagulata: potissimum tamen viscosam ac lentam mucilaginem denotat, quæ nondum in duritiem lapidis conversa est. Hinc deducitur quoque ad officinam, denotaturque sal terrestre ex vegetabilibus certis, vel per se, vel artificio separatum.

N. De Tartari origine non possum quin animi sensa communicem & Rerum principia primitus indigesta sunt, ac veluti, in chaotica sua dispositione simplicia: hinc subinde cum maturitate in partes fecernuntur crassiores & subtiliores. Crassiores ad elementalem vergunt statum, scilicet aqueo terrenum: subtiliores & potiores exaltantur subinde seu (uti dicitur,) spiritualisantur, id est, in statum spiritus evehuntur. Haec ergo ubi ad statum deducta fuerint summum, quem natura intendit, exhibent spiritualement partem, si minus eadem sint digesta, vel cum tempore retrogressa ad statum cruditiorem exhibent Tartarum constantem scilicet ex partibus potioribus, aqua, terra, & salis, adeoque Tartarus pollet viribus insignibus, spiritus vires amulantibus. Schröderus.

De Tartaro.) Hic non est Naturæ lapidescentis, ut D. Autor cum aliis docet, licet coaguletur, nullus enim lapis prout Tartarus in aqua calida resolvitur in liquorem, qui communiter cremor Tartari vocatur, sed est concretum acidum à musto, cui formaliter inest, separatum, dum acidum in vino agens mediante fermentatione in faciem vini tanquam in alkalicum saturatur, & sua activitate jam exutum transit in coagulatum, quod Tartarus vocatur. Unde Cl. Helmon-

tius in tr. Tartarus non in potu S. 4. Tartarus vini, inquit, non est inter lapides reponendus, sed est liquor concretus. Interim neque vinum, nec faeces ejus, sed ex aquobus constitutum Neutrum, ex succis vinosis spiritu vini actualiter constantibus & leviter aclescentibus. Quæ alias D. Autor de Tartari Origine adfert ex Principio chaotico, cum lubrico nitantur fundamento, & supra lib. i. cap. 4. jamdum sint à metesutata, præmittito & ad alia transgredior.

Notandum autem hoc loco, Nos non tractare de subtili illa vini parte, quæ specialissimè Tartarus dicitur & cum vino conjuncta est purissimo, quæ vino colorem tribuit & in destillatione vini sæpe in fundo remanet. Nec agimus etiam de faecibus vini, sed de Tartaro ejus genuino, qui à succis vinosis leviter aclescentibus, ut supra dictum, beneficio fermentationis scernitur.

Præstantior ille est, qui coagulatus continuè dolii lateribus in longitudinem protensus adhæret, ponderosus, durus, non porosus, aut siccis faecibus repletus, sed qui ab illa parte, qua vinum tangit plurimis apicibus instar adamantis acuminatus splendet. Has notas ut plurimum Rhenanus obtinet & Monspelienfis. Vinum rubrum rubicundum; albicans & nitescens album exhibet Tartarum. Hofmannus.

Præparata.

Præparationes Tartar. sunt 1. *Depuratio*, 2. *Destillatio*, 3. *Salificatio*.

I. DEPURATIO.

Depuratio vel fit à sordibus externis, vel parte magis arenosa ac minus solubili: illa lotionem peragitur, hæc solutione ac coagulationibus.

Lotio seu ablutio: unde Tartar. lotus.

℞. Tart. triti ac cribrati, q. v. affunde ∇ fontanam, calidam (vel lixivium forte, exempli gratia ex cineribus clavellat.) agitaque optime, hinc sine residere ac refrigerare, postea decanta aquam unâ cum impuritatibus, idque repete aliquoties, donec Tart. sit instar arene.

N. Si lixivium adhibueris, edulcorare Tartarum oportet.

Solutio & coagulatio, unde.

1. Tartarus depuratus, Acidum Tart. Cremor & Crystalli Tart.

℞. Tartari optimè loti, q. v. affunde ∇ ferventis bonam quantitatem, agitâ spatulâ ligneâ, & solvetur particula Tartari, cola per manicam Hippocrat. dum adhuc calet, aliàs coagulatur rursus, quod solum erat: restanti Tartaro affunde aliam ∇ ferventem agita & cola, idque reitera tantisper, donec nil nisi arena irresolubilis restet. ∇s has Tartaro imprægnatas reponere ut refrigerant, & videbis Tartar. putum, partim supernatare instar cuticulæ, partim instar crystallorum vel ad fundum residere, vel parietibus ac bacillis immixtis adhærete, utrumque cuticulam, scil. & crystallos collige, exicca atque serva.

N. 1. Si nimia aqua quantitas coagulationem impedit, evaporare aliquantulum sine.

N. 2. Sunt qui cuticulam supernatantem seorsim colligunt (nomine cremoris Tart.) & crystallos itidem seorsim (titulo crystallorum Tart.) verum cum utrumque ejusdem sit naturæ & efficacie, distinctionem hanc parvi momenti annuntio.

N. 3. Felicius adhærescent crystalli vasi ligneo.

N. 4. Si depuratum hoc Tart. haud satis candidum sit, solve iterum in aq. fervente, filtra & reponere ut ante ad coagulandum.

Vires, Usus hujus Tartar. depurati est crassos Tartareosque humores, præcipuè autem in prima ventris regione

regione stabulantes incidere ac attenuare: commodè itaque adhibetur in obstructione Epatis, Lienis, Mesenterii, Renum in affectu Hypochondriaco, &c. Hinc quoque sibi primas veniat inter Digestiva universalia, cuius rei gratiâ & cataractis pramitti plerumque solet. Quinimo ad laxandam alvum commodissimum medicamentum est, si saltem grano uno ac altero Diagridii vel Gummi de Gamandra acutatur.

Dosis à ʒss. ad ʒj. vel ʒij.

2. Crystalli Tart. chalybeati Acidum Tart. chalybeatum Salæ.

ʒi. Acid. Tart. ʒiv. Magister. chalyb. i.e. cristall. ʒper spir. ʒ (Vide in ʒ) ʒij.

Crystall. ʒ solve in ʒ fumar. solutionem incorpora cum acido Tartari in mortario lapideo. Exicca iterum ac pulverisa: atomati erit aliquot guttis ol. Cinamomi.

Vires. Utilissimum medicamentum est in morbis chronicis, ut sunt obstructio Lienis, quartana, icterus uterque, cachexia virginum, Hypochondriaca passio.

Dosis ʒj. ad ʒij.

3. Cremor Tartari chalybeatus compendiosior. S. Closs.

Ubi ʒ imprægnata Tartari pulverisat ʒj. solvitur in ʒ xv. aq. fluviat. per ebullitionem fuerit resoluta, & ad decidentiam unius quartæ evaporata, in ice in vas ʒ iv. limat. ʒtis moxque ab ʒ remove ac colacide. Habebis cremorem pretiosum & summe deopipilativum.

N. Infundatur limatura dum ʒ ferret nec diu relinquatur, ne cremor reddatur vomitorius.

[Tartarus Tartarizatus Tartarus est sui ipsius beneficio præcipitatus. Videtur apud Bartoletum; Tartarus solutus etiam dicitur, in frequenti apud nostrates usu.] Schroderus.

Preparationes Tartari sunt 1. Depuratio. Quoad Depurationem, Henricus ad Heer lib. i. observ. i. plus tribuit Tartaro crudo per lotionem à partibus impurioribus liberato & pulverisato, quam cremori aut cristallis inde præparatis. In Tartaro crudo, inquit plus inest alviducæ virtutis, quam in ejus cremore vel granulis auxiliis Ch. micorum manibus & animis eductis, cum coctione terrea ejus & salina parte maxime confedit, & tot ablutionibus vis ejus purgativa plurimum tenuis vanescat in aures. Depuratio peragitur, vel quando à sordibus externis lotionem liberatur, vel quando solutione & insequente cogulatione impuritates deponit. Optimus lotionis modus, est, si Tartarus grosso modo contusus aquâ frigidâ, sæpius affusâ laveretur, manibus frustra fuscando, impuram aquam decantando, usque dum nulla impuritas amplius sentiat.

Solutio & coagulatio, unde 1. Tartarus depuratus. Acidum Tartari, Cremor & Crystalli Tartari. Quomodo cremor & cristalli Tartari sint præparandi, satis sufficienter D. Autor cum annotationibus tradidit. De his plura qui desiderat, consilere potest Cl. Zuvelferum in A. ad P. A. & D. Saub. à Leuvenhaim in sua ampelograph. sect. 9. cap. 3.

2. Crystalli Tartari chalybeati, Acidum Tartari chalybeatum Salæ) Scil. crystallotum tartari sumuntur part. 3. Vitrioli Martis part. 1. coq. cum aquâ in aeno ferreo, evaporata aquæ parte alia affunditur, donec optimè mista invicem sint, tandem fit filtratio & coagulatio. Ex quo etiam Essentia Martis aperitiva cum spiritu vini parari potest.

3. Cremor Tartari chalybeatus compendiosior. S. Closs.) Recip. Cremoris Tartari ʒ iv. limatur. Martis ʒ ij. ebulliant cum aquâ in tigillo ferreo, absumptâ aliqua aquæ parte, nova affunditur, usque dum aqua probe Martis substantia imprægnata fuerit, tandem filtra, abstrahæ & coagula. Habebis Tartarum summe deopipilativum.

N. Si Tartaro Tartarizato, qui constat ex duabus salis & purioris Tartari tribus partibus in ʒ. q. aquæ ʒ. dissoluto spiritus Vitrioli instilletur & debite coaguletur, acore vitriolico exsuperante, elegantiorē habebis effectū Tartarum crystallisatum. Hofmannus.

II. DESTILLATIO unde

1. Spiritus ac Oleum.

ʒ. Tartari albi crudi loti (vel quod melius depurati,) q. v. destilla ex Retort. vitrea in arena (vel igne nudo) ʒ gradatim adhibito: primò extillat phlegma, dein spiritus in forma nebulae & tercio oleum pingue. Separa oleum à spiritu, vel beneficio chartæ ac filtrationis, vel trito iii gossypiiive auxilio.

N. Sunt qui Spiritum Tartari ternâ vice supra colcothar rectificant.

Rectificatio spiritus Tartari. Destilla ex MB. tertiâ vel quartâ vice semper vasa destillationi inservientia optime lixivio forti eluendo.

Rectificatio ol. Tartari. Affunde quantitatem magnam ʒ (vel Acet. destill. ac destilla per MB.) separa oleum ab aq. ut moris, idque rectifica aquam scilicet fragrantem aliquam addendo ac denuò destillando.

N. Ex residuo capite mortuo extrahi potest sal. Vide suo loco.

Vires. Spiritus vim habet incidendi, attenuandi, resolvendi, discutiendi. Hinc refert obstructiones viscerum, purgatque per sudorem ac urinam, ideoque utiliter adhibetur in Hydrope, Tympanite, Arthritide, Paralyfi, Scorbuto, lue venerea, impetiginibus, scabie, contractura artuum (ex materia statulenta & humoralis fluida, non Tartarea coagulata & fixa.)

Dosis à ʒj. ad ʒij.

Oleum intrinsecus adhibitum prodesse creditur adversus dolorem colicum, suffocationem uterinam, &c.

Dosis gr. iij. iv.

Extrinssecus, admisceri potest unguentis contra scabiem communem vel luis venereæ, &c. Vide Crollum, Sennert. in Instit. Salam. in Tartarologia.

N. Spiritum Tartari ex musto parat Forestus p. 1000. de morb. Tartar. collectu scilicet crystalli evaporatione lentâ, in quibus spiritum Tartari primariam remanere credit.

2. Spiritus Tartari compositus.

ʒl. Tartar. purum, destilla ut moris, prodeatque phlegma spiritus ac oleum. Ex capite mortuo extrahe Sal. com, quod solutionibus ac coagulationibus purificatum, conjunge cum phlegmate spiritu ac oleo. Hinc digere in MB. vase clauso, donec Sal. com. totus solutus sit, cum hoc liquore impasta argillam siccam, formaque globulos & destilla ex Retorta, igne nudo, (ut destillatur spiritus Sal. nitri,) prodibit cum spiritu & oleo, Sal. totus spiritualiter in posterum à spiritu Tartari inseparabilis: Oleum fortens separa à spiritu, ut moris.

Vires. Penetrantior & efficacior est priori.

3. Spiritus Tartari Vitriolatus, seu spiritus Tartari aperitivus compositus.

ʒl. Spir. Tartari (simplicis) ʒj. ʒij. ʒij. Misce & affunde colcothari: digere in MB. (ʒ 8.) ac destilla per Retort. adhibitis ignis gradibus omnibus. Totum deinceps quod prodit, funde super caput mortuum nigrum Tartari, ex quo nimium spiritus ille simplex est prolektus. Digere hor. 24. Tincturam decantata, residuum calina ad albedinem, atque ex eodem extrahe Sal. cum Tinctura illa decantata, in calido S. (hor. 24.) relinquendo: aquam hanc per filterum purifica.

Vires, Exhibetur magno cum successu ad consumaces obstru-

obstructiones viscerum, ad fœdos colores, febres diuturnas, Hydropem.

Dosis à ℥ j. ad ℥ ij. in aquis appropriatis.

Spiritus Tartari Philosophicus ad aurum potabile, S. Closs.

Reverberetur Sal Tartari super testâ probatoriâ (in einer flachen Scherben) absque fusione tamen: per horas 24. ita cœruleum evadet sal, affunde acet. destill. quousque tumultuet amplius & Acet. destill. 3. digitos super materiam emineat, digere, tingetur Acet. destill. saturato rubore, filtra & coagula. Hoc quater cum novo Acet. destill. repete. Permixtis 4. salibus spir. vin. rectific. suffunde & tincturam extrahe toties, dum colorari desinat; sal restans solve iterum in Acet. destill. iterumque cum V extrahe tincturam. Jam omnes V tinctos, & in unum collectos destilla per MB. in cucur. cui XX. infundibulo instructus imponatur, extillatum V reatunde per infund. sali tincto & cohoba toties (14. vicibus ad minimum) donec videas guttas rubentes decidere, tunc cessa, & liquorem ex Arena per O leniter destilla, ita transibit spiritus salis Tartari, nebulosus cum guttis rubris, superstitie in fundo O pulv. rubro. Illo utere ad extractionem Ois.

Vires. In obstructione mesenterii, & arthritide, dantur gutt. 4. 6. in vino, in retentione mensium, si desis ter aut quater iteretur, certo fluent menses. Schroderus.

Destillatio unde 1. Spiritus ac oleum.) Spiritus ad Dom. Auctoris præscriptum, & ut communiter elaborare solent, ne momentum quidem salis Tartari volatilis in se continet, si enim ita elaborato spiritum quandam acidum affundas, non incalescit, id quod alias contingit, adeo, ut, si recte destillatus fuerit & sale volatili turgeat, vitrum, in quo continetur, ita incalescat, ut vix manibus contineri queat, eo quod acidum sal Tartari volatile falsum absorbeat, unde minus recte faciunt, qui spiritum Tartari cum acido quoque miscent, (si sale constet Tartari volatili,) moritur enim & degenerat. Tachenius in Hippocrat. chemic.

℥ Tartari albi crudi lot. (vel quod melius depurati) &c.) Si sp. vini pauxillo imprægnabis melius destillatio succedet non ex retorta vitrea in Aren. ut Dom. Auctor describit, sed ex retortâ fictili igni aperto expositâ, adaptato capacissimo recipiente. Post destillationem separa spiritum ab oleo gossypii auxilio, & spiritum rectifica per phiolam oblongam. Ego sequenti modo optimum spiritum Tartari conficio. Recip. Tartari crudi albiss. depurat. q. v. imprægna sp. vin. rectificat. q. f. destilla ex retortâ fictili igne nudo gradatim adhibito, primò extillat phlegma, deinde spiritus & tertio oleum. Si ignis regimen per gradus probè observaveris, obtinebis etiam sal volatile. Separa post destillationem per gossypium oleum fœtidum à spiritu, & spiritum ex phiolâ oblongâ per Aren. vel MB rectifica. Post modum recipe sal Tartari ex Cap. mort. etiam ulterius calcinato extractum & O crudi anaticam partem, destilla ex retorta igne aperto, & acquires in receptaculo probè munito sal Tartari volatile elegantissimum, quod postea cum supra elaborato sp. Tartari rectificato nuptum denuo per MB. rectificandum est, adscendens cum spiritu in formâ liquidâ.

N. Componitur etiam sal Tartari volatile ex oleo Tartari fœtido cum sale tartari aliquandiu digesto & demum destillato. Fœtidum quidem hoc oleum, sed proprium est salis tartari fermentatum, quo sal tartari fermentatum ipsum Urin. & CC. sal volatilisatione superat, fœtorem autem magnum in fermentatione acquirit, fœtoris salis urinæ ferè æmulum. Et sequenti modo præparatur. Si olei tartari fœtid. part. a. cum salis tartari ex Cap. mort. post spiritus destillationem extracti part. ij. titè mixtæ in retortâ optime munitâ lentè per aliquot menses supra fornacem

tempore hyemis continuo digesta sint, instituta postmodum per Aren. destillatione sal volatile sat copiose prodit, recipientis lateribus undique adhærens.

N. Sp. vini tartarificatus unâ vel altera vice à sale tartari abstractus pro majori phlegmatis separatione secum etiam aliqualem salis volatilis partem abripit, ac idem enim instillatum non solum subtilem ebullitionem, verum etiam post lentam exhalationem salis oppido exiguum quid ostendit, & sensibilius post separatum phlegma demum prodit. *vid. Cl. D. Daniel. Ludovic. dissert. de sal. tartari volatilitate.*

Excell. D. Joël Langelot Archiater Sereniss. Holst. Datus Regentis seq. modo elaborat. Recip. tartari crudi ad nigred. calcin. ℥ ij. vel iij. Huic ollæ capacissimæ immisso affunde tantum aquæ, ut ad digitum transversum altitudinem emineat, ignem primò lentum admove, ut tantum intepefcat, postea dimidium manipulum Tartari crudi pulverisati insperge, & brevi videbis bullulas quasdam surgere. Hoc viso perge, veluti cœpisti, parvis nempe vicibus Tartari pulverem inspergendo, & sic major fermentatio excitabitur, bullis concinne surgentibus, ac si ipsas uvas naturales excepto colore conspiceres, sed accurato hic ignis regimine opus est, moderato scilicet, qualis omnis fermentatio requirit. Cavendum etiam, ne copiosiori inspergione nimia ebullitio excitetur & fermentatum ollâ elabatur. Cessante fermentatione mitte omne, quod inest ollæ, in cucurbitam ferream, ne rumpatur, cui sæpè linteam frigida madefactum applicare oportet, quo nimia tartari fermentati ebullitio prohibeatur, unde & ignis caute regendus, lento gradu augendus, in fine autem sat fortis, ut sal omne sursum pellatur. Egressum liquorem rectificâ, usque dum subalbido colore appareat. *Hec Cl. D. Langelot.* Hic quæstio oritur, Utrum in hac tartari fermentatione primariò Tartarus crudus additus solum volatilifetur, non ipsum alkali Tartari fixum? an verò præter Tartarum crudum etiam in ipso alkali Tartari quid sit quod ad volatilandum sit dispositum? *Excell. Dominus David van der Beke Phil. & Med. Mindanus in epistol. ad præcellentissimum D. D. Joël Langelot,* statuit hæc tartari fermentatione primariò non ipsum alkali Tartari fixum denuo volatilari, sed potius fermentum additum, Tartarum scilicet crudum. Et hanc rationem reddit, quia in hoc Tartaro crudo, licet salia fixata non dentur, nihilominus tamen alkalica Tartari partes volatiles ob acidis ejusdem volatilibus ad punctum saturationis usque admixtis detinentur, unde figuntur, hæc enim duo conjuncta se mutuo figunt, separa verò volatilia denuo sunt. Verum hæc ut lubens quidem omnia concedo pro parte Tartari crudi, tamen non video quid obftet, quo minus in alkali Tartari sub partibus terrestribus huic admixtis adhuc salia esse volatilia abscondita, quæ tartari crudi admixtione sui juris fiant & æthera petant, licet & ex ipso Tartaro crudo addito ad maximam etiam eleventur partem, unde enim illud sal tartari volatile, quod ex O admixtione cum Cap. mort. tartari factâ? Unde illud oritur, quod ex sale Tartar. & sp. vini? Unde illud quod ex sale tartari & Nitro? &c. nisi quod dicta salia acida sal tartari volatile in alkali Tartari latens à compedibus terrestribus liberent, adeoque sui juris faciant.

N. Spiritum tartari ex musto parat *Forestus p. 1000. de morbis tartari.* (Nec dubito succedere, si rite operatus fueris. Ex fœcibus exsiccat in furno post sp. vini destillationem residuis egregium etiam sal tartari volatile acquiritur beneficio destillationis ex retortâ igne aperto per gradus adhibito, quod per sublimationem ex cucurbita rectificandum est. Ex Cap. mort. locum sal fixum confici potest, magni etiam in Medicina usus.

2. *Spiritus Tartari compositus.*) Hic modus expectationi minimè satisfacit, dum non opus est additione phlegmatis, spiritus & olei, nec globulis ex argilla formatis, sed sufficit, si tantummodò oleum cum sale Tartari digestionem sustineat, ut sal volatile exinde conficiatur, quemadmodum suprà ostendimus.

3. *Spiritus tartari Vitriolatus seu Spiritus tartari aperitivus compositus.*] Hic nihil aliud est, quàm Tinctura salis tartari ex Cap. mort. ejus extracta cum Vini tartarificato suprà Colcothar. rectificato. Eiusdem ferè virtutis cum *Sp. aperitivo Penotti, de quo Lib. 3. de Vitriolo.* Huic persimilis vadè est sequens liquor tartari ex \odot -lo compositus.

Recip. tartari albi crudi, vitrioli ana q. v. destilla per retortam, cohoberut super Cap. mort. quousque liquor appareat clarus. Hunc recipe & adde Spiritus vini rectificati partem dimidiam & denuò destilla super vitriol. & Tartar. calcinat. s. q. quousque omnis spiritus purus & subtilissimus fuerit destillatus. Hic vel per se vel cum essentia Theriacali per sex septimanas circulatus in leni calore usurpatur in omni corporis obstructione, Lue G neræ, Ischiatico dolore, podagra, Chiragra, colica iliaca, febribus &c. Dosis est à gutt. xx. ad xxx. & ultra manè cum brodio calido.

Vel Recip. Spirit. Vitriol. non rectificat. parum tamen dephlegmat. tb j. tartari albi crudi Z vj. vel Z viiij. misce & Q la ad siccitatem Δ ne forti, ascendit spiritus acidus & penetrantissimus. Cap. mort. extrahe aqua & fac inde tartarum Vitriolatum præstantiorem vulgari.

N. Si etiam crystallis tartari affundas ol. Vitrioli, ut fiat pasta, & digeras per 3. S & ac denique affundas aquam pluvialem destillat. quam ad medietatem usque in M B. abstrahas remanentiam filtres & sic habebis crystallos ad extinguendum febrilem calorem.

Spiritus Tartari Philosophicus ad Aurum potabile S. Closs.) Huic non dissimilis est Spiritus Kessleri in Process. Cap. 3. S . II. vide suprà Lib. 3. Cap. II. de \odot potabil. spirit. Sal. Tartari parando. Hofmannus.

III. SALIFICATIO unde 1. Sal Tartari.

Sal Tartari elixiviat ex Tartaro ad albedinem calcinato, (id est, combusto,) non secus ac ex aliis cineribus Sal extrahi solet.

N. 1. Ex capite mortuo in destillatione spiritus residuo, iidem Sal elixivari potest, si ulterius comburatur. Pompe enim ignem concipit, atque etiam extra ignem comburi potest.

N. 2. Communiter calcinatur Tart. in fornace singulina.

2. Ol. Tart. p. d.

Pone Tart. calcinatum in cella liquefendum, vel dissolve Tartar. calcinatum in ∇ communi, filtra & coagula.

Vires. Optimum est remedium in serpiginibus, ulceribus, tinea, scabie, &c.

N. Est porro huius olei elegans usus in Extractis vegetabilium purgantium conficiendis. Ejus enim gutta aliquot cum menstruo mixta, tum extractionem faciunt, tum catharsin ipsam promouent.

3. Magisterium Tart. seu Sal. nit. Tart. alcoholisatus.

Imprægna Sal Tart. Sale volatili Vini, v. g. Z . Salis Tart. purissimi, q. v. affunde V ad eminent. digit.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

1. digere ac destilla lenissimo calore, iterumque V affunde, idque repete toties, donec Sal Tart. totam spirituosam Vini substantiam, seu omne Sal volatile Vini imbibierit, quod ubi factum, sublima, habebisque sal vini sublimatione ab omni phlegmate & aquositate separatum. Sennert. in institut.

4. Magisterium Tartari purgans.

Z . Sal Tart. q. v. imprægnâ aceto optimo, donec Tart. nihil amplius aciditatis retinere velit (vide correctionem flor. S ij. Crollianam l. 3.) dein affunde spirit. vini cumque abstrahæ aliquoties cohobando: tandem repone Tart. ad liquefcedum & habebis oleum rubrum

Vires Purgat per inferiora, utile in omnibus morbis deploratis.

Dosis à gr. v. ad S ss.

N. Sal illud. Tart. Acet. destill. sufficienter imprægnatum si in ∇ destill. (e.g. Borraginis) solutum atque s. a. crystallisatum sit, conveniens medicamentum evadit in morbis Tartareis.

5. Tinctura seu Sulph. Tartari.

Z . Sal Tart. optimè purificatum, calcina igne viò lentiss. ad cæritatem: dein affunde Spiritus vini, extrahe rubedinem s. a. decanta, abstrahæ ad consistentiam olei. Sic habes Tincturam Tart. quam si placeat exaltare, digere aliquamdiu cum V recenti ad emin. dig. i. affuso.

N. 1. Sunt qui ex Tart. cum Sal. com. an. calcinato Tincturam hanc extrahunt, sed prævalet modus prior.

N. 2. Maxima pars Tartar. decedit.

Vires. Urinam largiter ciet, confertque in Melancholia hypochondriaca, Scorbuto, Hydropo, aliisque Mesenterii ac Lienis morbis & obstructionibus.

Dosis gutt. aliquot 4. 5. 6. 7. 8.

6. Tart. \odot -latus.

Z . Ol Tart. purissimi per deliq. Z iiij. affunde guttatim Spir. \odot -li Z ij. vel q. s. donec strepitus cesset, idque in vitro capaci sic fiet coagulum: sedata ebullitione evaporate sine humiditatem lento calore ad siccitatem.

Vires. Digestivum est præstantissimo, Tart. in corpore humano efficacissimè resolvens. Hinc utilissimè exhibetur in obstructionibus viscerum, venarum mesaricarum, in omnibus febribus, præcipue in quartana, in obstructionibus mensium.

Dosis à S ss. ad S j. in convenienti liquore, convenientissime autem propter saporis emendationem offertur in Hydromelite.

N. Eodem modo fieri quoque poterunt salia vegetabilium Vitriolata. Sic sal (e.g. absinthii) depuratum solve in aqua absinthii, instilla spiritum Vitrioli, procedeq. ut cum Tartar. Vitriolato.

Tartarum \odot -lat. aliud.

Z . Magisterium Tart. purgans ad siccitatem evaporatum, affunde guttatim V cum \odot -li, donec strepitus omnino cesset, abstrahæ phlegma in Arena coagulatum superstes reverbera per triduum, ita tamen ut sal non confundatur, sed in continuo isto calore velut fixetur. Vocatur à Parac. lib. 7. Archidox. Specificum purgativum.

Vires. Purgat benignè per inferiora, & sudores movet in peste, scorbutico, hydropo.

LIII

Dof

Dof. ʒʒ. in syr. de ros. de thamno, &c. Ex communi-
catione S. Cloff.

7. Tart. *Glatus crystallifatus.*

℥. Crem. Tart. ʒiij. spir. Vitriol. ʒij digerendo
solvantur. Hinc affunde ∇ calid. ut penitus solutio
fiat, abstrahæ aliquantulum, & reponæ ad crystalli-
fandum.

[Tartarus nitratus Grilengii ad Anginam, febres,
spatis infarctus utilis.]

Dof. ʒj. ad 3ʒ.

8. Sal Tart. *volatilifatum.*

℥. Sal. Tart. purificat. q. v. affunde Spiritus vini re-
tificatiss. destilla ex Arena per XX cohobando ali-
quoties (3.) & adhærescet Sal Tart. lateribus alem-
bici.

N. Si per NB *Saveris*, non sublimabitur, sed exhi-
betur *Menstruum* corallis solvendis idoneum.

Vires. *Insigne est lithontripiticum.*

Dosis gr. v. vj.

9. Liqueur Tartari *pleneticus.*

℥. Tart. ʒij. Sal. com. ʒʒ. (al. ʒij.) Misc. exactè
imponesq; mortario, sartagini vel laminæ ferreæ ignitæ
ut calcinentur: Hinc pulverisa ac affunde quæ ferven-
tis ʒiij. digere in loco calido & p (6.) quotidie
agitando, postea colentur, ut omnis salsedo insit aquæ.
Huic aquæ imprægnatæ tandem adde Tart. cl. ʒij. dige-
rantur & p (8.) filtrenturque pro usu.

Vires. *Insigne est deopilarivum Lienis, aliarumque
tartarearum obstructionum, mesenterium maxime infe-
stantium, adeoque utile in hypochondriaca, scorbutica-
que affectione ac mensium obstructione.*

Dosis cochl. l. ad i. cum aliis appropriatis vehicu-
lis. *Schroderus.*

3. *Salificatio unde i. Sal tartari.*) Hoc vilibus ha-
ctenus vestibus suam Scenam ludit, teste *Tachenio* in
Hipp. Chemico, cum verò Philosophi manu spoliatur,
ut compareat in formâ nuda, lucida & resplendenti,
tunc res, quæ illi committuntur, reducit in eandem
& similem sui materiam. Sic v.g. Sal tartari calc. viv.
nuptum extrahit aliud & simile alkali, multoque po-
tentius efficit, ut ferè in igneam naturam convertatur,
si fiat cum Vi extractio, oritur inde Tinctura ad cal-
culum. Item oculi & cum sale tartari soluti in longâ
quotidiana febris conferunt. Sal tartari informæ ac-
cipit formam ejus, cum quo unicitur. *Vide Plura de
Sale Ammoniaco* Cap. 25.

N. *Ex Cap. mort. in Relatione spiritus residuo &c.*)
Ex hoc ad albedinem combusto lixivium cum aquâ
conficitur, & exinde s. a. sal elaboratur. Quomodo
ex hoc sal ejus volatile conficiendum sit, suprà jam-
dum monitum; Aliam tamen hujus elaborandi habet
processum *Cl. Zvvelferus* in *Pharmacop. Reg.* p. 248.
ex Sale tartari celebrius aëri humido exposito, & so-
luto ac iterum coagulato, usque dum à sale aëris ita
imprægnatum sit ut sublimari possit. De hoc vid. *Da-
vid van der Beete* in experiment. & meditation. De
Princip. Rerum Natural.

2. *Ol. Tartar. p. d.*) Hoc fit ex sale tartari albiſſimo
aëreæ humiditati commisso. Adhibetur in serpigini-
bus, tinea, cutis sorditie, &c. Ex hoc & Nitro. egre-
ginis conficitur liquor per deliquium, quod vinum
rubicundo tingit colore. Est porro hujus olei elegans
usus in extractis vegetabilium purgantium conficien-
dis, si enim purgantibus addatur eorum compagem fa-
cilius solvit & efficaciora reddit, dum etiam acidum
ventriculi potissimam illorum remoram infringit ac

imbibit, unde communissimè purgantibus aëdulis
addi solet.

N. Impropiè dicitur *Oleum*, quia flammam non
concepit, sed est liquor tantum salis resoluti.

3. *Magisterium Tartar. seu Sal tartari alcoholifatus.*
&c.) Verum hoc est Sal Tartari affusione Vi & sa-
pius repetita ejus abstractione sale vini volatili impræ-
gnati. An autem inde iterum sublimari possit, non
possum constanter affirmare. Aliis constat, *Balsa-
mum Samoch Paracelsi* nihil aliud esse, quàm sal tar-
tari facta Spiritus vini ab eo destillatione edulcatum,
donec sal sit sufficienter ipsius sale volatili saturatum,
ac liquorem destillari adeo efficacem sinat, atque etiam
affusus.

4. *Magisterium tartari purgans.*) Hoc nihil aliud
est, quàm *Terra foliata tartari ex sale tartari & aceti.
dist. elaborata* *Cl. Zvvelfer. in Manriff Spagyric.* Sal
vini *essentiale* vocat, ut & in apolog. *adversus Tache-
nium* p. 33. cujus etiam elaborationem communicat,
in dictæ Apologiæ p. 73. Hujus etiam Arcani salis tar-
tari seu terræ foliatæ mentionem facit *Philippus Mul-
lerus* in *miracul. Chemic. & Myſter. Medic. Lib. 3.
Cap. 4. Cl. Sennertus* in *institu. Medic. Lib. 5. par. 3.
sect. 3. cap. 6. Excell. Rolfinckius* in *suâ Chemiâ in Art.
form. redact. Lib. 4. sect. 1. art. 3. Cap. 13.* Sequenti au-
tem modò optimè elaboratur. Recip. Salis tartari al-
biſſi. ʒij. Acet. dist. fortiss. q. s. abstrahæ Acet. dist.
quod insipidum elevatur destillando per cucurbitam
fistilem, post novum Acet. dist. affunde & destilla, id
quod sæpius repetendum est, usque dum spiritus ite-
rum extillare incipiat acidus, qualis fuit affusus Tunc
Tartarus est animatus, & cessandum ab iterata affusio-
ne Acet. dist. Nigra in fundo remanebit materia, quæ
Vi solvenda, & tione per chartam bibulam filtranda
& lenissimo Aren. calore in vasis terreis exsicca-
da. Exsiccata materia iterum Vi solvenda, filtranda & ex-
sicca-
da toties, donec materia alba appareat & folio-
rum longè à se invicem diffusorum, instar concreſcat.
Hanc terr. foliatam tartari nonnulli salis tartari vola-
tilis nomine insigniunt, & rectè, ed quod particulae
terrestres alkali tartari figentes additione Acet. dist.
præcipitatæ sint. Hæc in aëre humido solvitur p. d.
& per se usurpata dosis est à gutt. v. ad ʒʒ. vel cum
aqu. aliqua destillare mixta ad plures extendi potest
guttas.

N. Potest etiam cum nudo Aceto elaborari, licet
postmodum non adeo album & purum sit, & residuum
Vi solvatur.

N. Vel compendiosius: Recip. Sal tartari ʒij. tar-
tari crudi ʒxiv. Acet. dist. ʒxxvj. Sumatur olla ferrea
alta Acet. dist. impleta, pone super carbones, dum
Acet. dist. caleſcit & ebullire incipit, tunc immitte mix-
turæ suprà dictum Sal tartari & tartarum crudum per
vices, donec omnia sint resoluta, quod spatior. ho-
rar. fieri potest. Hoc partim coagulari, partim crys-
tallificari sinas.

N. Vel adhuc compendiosius: Recip. Sal tartar. al-
biſſi. q. v. affunde in lebe-
te ferreo Acet. dist. evapo-
ret, & tamdiu Acet. dist. affunde, dum spirat acidum,
postmodum coagula, & cum Vi edulcora sæpius co-
hobando.

Vires. *Purgat per inferiora &c.*) Est summum
sanguinis depurativum, hoc sal volatile CC. vipe-
rar. Sal Armoniacum &c. associatum egregium est
anti- hypochondriacum, par non habet in arthriti-
de, calculo & in omnibus morbis Tartareis. Dosis est
à gr. v. ad ʒj. in brodio calido tempore matutino.

N. Hæc terra foliata tartari cum crystallis & vis
miscetur in mortario lapideo ex aëre sal attrahens fit
rubicundi coloris, quæ p. d. soluta in aëre humido
demum cum Vi transiit in tincturam & vis hæmatinam
aperitivam.

N. Hæc terra foliata tartari vel in ∇ quadam destillat. vel Elixir Propt. f. acidis soluta efficax est sub tincturæ nomine spleneticum, nephriticum, arthriticum &c. sive per se detur, sive aliis alkalium consortium ferentibus combinetur.

5. *Tinctura seu sulphur. tartari.*) Hic necesse est, ut ∇ sit optimè dephlegmatus, aliàs Sal tartari aqueas ∇ i imbibit partes, & instat olei tartari p. d. facti ad vasis fundum se ∇ tat. Loco sp. vini sumi etiam potest spiritus tartari. Hæc tinctura nihil aliud est, quam ∇ i ab alcali tartari volatilizzato tinctus. Hæc merè diuretica est, ex eorum censu, quæ urinam reddunt abstersivam, adnatæque sordes incidunt, excreticemque stimulant. Unde in renum impuritatibus: obstructionibus viscerum aliisque morbis qui præmissis præmittendis tandem diureticis expediuntur, apprime conducit.

N. Ex tartaro rubro affusa spiritus salis f. q. ut fiat massa quam blandè digere, tribus \circ elapsis si spir. vini affundatur, egregiam etiam præbet Tincturam aperitivam.

6. *Tartarus vitriolatus.*) Hic *Cl. Zuvelferus* animadvertit commodius tartarum vitriolatum ex sale tartari sicco, quàm p. d. soluto parari, & si lubet, crystallisari debere. Hujus asserti rationem reddit in *Maniff. spagyricæ. part. 2. cap. 11. pag. 416.* dum tartarum vitriolatum ex sale tartari soluto paratum facilè in aëre iterum liquefcere dicit. Verùm nihil refert, utrum Sal Tartari siccum, an verò p. d. solutum compositionem tartari vitriolati sumas, utrumque enim eadem ratione cum spiritus vitrioli in unum congregari & coagulari potest, abstracta humiditate. Et quod rationem *Cl. Zuvelferi* concernit, ego potius statuërem, Sal tartari resolutum p. d. jam saturatum esse, & sic non ita liquefcere cum spiritus Vitrioli unitum, atque siccum Sal tartari, quod adhuc vacuum saturari cupit, unde & humido aëri expositum liquefcit. Tartarus igitur vitriolatus tam ex sale tartari sicco, quàm p. d. resolutum confici potest, nec facilè in aëre liquefcit ullum alkali ejus acido jam saturato existente.

N. Cum certum salis tartari spiritus vitrioli pondus determinari nequeat, spiritus vitrioli magis vel minus dephlegmato, sale tartari etiam in tenuitate aut siccitate discrepante usque instillatio spiritus vitrioli in Sal tartari continuanda dum strepitus aut effervescencia cesset. Tunc à præcipitato pulvere liquor supernatans, ut inutilis non removendus, sed potius lento calore usque ad Salis vitriolati tartari siccitatem abstrahendus est.

Vires. *Digestivum est præstantissimum.*) Tartarus vitriolatus, & crystalli tartari, hodiè adeò sunt vulgaria medicamenta, ut à non paucis vix ulla Medicamenta præscribantur, quibus hæc non admisceantur. Et fateor, *Inquit Cl. Sennert. in Medicin. Prædic. Lib. 3. p. 3. cap. 4.* Sanè ex tartaro parata in humoribus melancholicis crassique incidendis & attenuandis, ideoque obstructionibus aperiendis magnam vim habere. Cum verò sæpè accadat, ut in affectione hypochondriaca bilis atra, humoresque salii & acerbi atque omninò acres, & qui ignis quasi seminaria in se continent, reperiantur: talibus certè humoribus tartarum vitriolatum & hujusmodi acria medicamenta non conveniunt, cum eorum acrimoniam non retundent, sed ea potius usurpanda, quæ pravas qualitates talium humorum temperant, & omninò contrariæ qualitates contrariis sunt opponendæ.

N. Quod ex usu tartari \odot lati tam dira quandoque orientur symptomata, ut vomitus, cardialgia &c. non Sali tartari acceptum est referendum, sed spiritui vitrioli sæpiùs imputo.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Tartarus Vitriolatus alius.) Hic est ex communi-catione S. Clossæ, & præparatur ex terrâ foliata tartari cum \circ li in coagulum redacta prout *D. Autor* describit, suas meretur laudes. Huic affinis

7. *Tartarus vitriolatus crystallisatus.*) Hic sequenti modo rectius elaboratur: Rec. tartari crudi albiij. lbj. adde spiritus vitrioli lbj. destilla per Alembicum donec nihil humidi amplius extillet, frige factum exime, superafunde aquam calidam, extrahe filtra, evapora in MB. ad medietatem, in fundo remanet, pone in locum frigidum ad crystallisandum. Ex his crystalli tartari etiam fieri possunt rubicundi seq. modo. Rec. tartarum alb. grosso modo fractum q. r. lava, & ab impuritatibus separatim exsicca: Deinde Rec. Santal. r. l. q. affunde ∇ i imprægnatum \circ u vitrioli & extrahe tincturam, quam decanta. Tartarum coque cum aqua pluviali & infunde tincturam rubicundam, urge coctionem tamdiu, donec crustam acceperit, expone loco frigido & crystallos acquies rubicundos.

N. Tartarus Vitriolatus Solaris.

Rec. \odot fulminant. part. j. tartari vitriolat. part. iij. vel iv. contere optimè & pone in Crucib. in furnum anemium per quadrantem horæ, ut optimè liquefcant, effunde, & nihil reguli de sole reperies, sed hunc à tartareo vitriolato ita exaltatum videbis, ut totum colore violaceo tinxerit, quem alias per se fufus nunquam acquireret.

Vires: juxta vim suam abstersivam habet unà dia-phoreticam & felici cum succellu in omnibus & cordis affectibus usurpatur.

N. Tartarus Vitriolatus Lunaris.

Luna optimè calcinatur per sp. Nitr. vel aq. fort. & præcipitatur per ol. tartari p. d. vel Rec. laminas Lunæ & tartarum vitriolatum f. S. S. S. cementa in tigillo clauso pe 3. horas, tunc maxima pars laminarum in Sal. com. viride abibit, hic labor tamdiu repetitur usque dum laminæ totaliter consumptæ & pulverisatæ.

Vires summo cum effectu in morbis capitis & hy-drope adhibetur.

N. Sic & tartarus vitriolatus antimonialis fit ex Cap. mort. clysti ∇ nri extracto Sale & cum \circ u vitrioli ∇ tato.

8. *Sal tartari volatilifatum.*) Hic modus respondet 3. Magisterio scilicet tartari seu sali tartari alcoholifato. Sed licet cum ∇ i aliquid Salis volatilis ex sale tartari in forma liquida elevetur, tamen in forma sicca sublimari instar vix comparebit. De Salis tartari volatilisatione vide supra alios modos Sal tartari eliciendi, qui huic surrogandi sunt.

N. Quomodo alkalia à salibus volatilibus sublimentur, vid. D. David. von. de Beße in experim. & meditat. circa naturalium rerum principia.

9. *Liquor tartari spleneticus.*) Præsentī compositione non indigemus, si loco tartari cum spiritu salis copulatum egregium obtinebimus etiam deop-pilativum, ut supra jamdum monuimus liquori tartari spleneticico Dom. Aueris præferendum Hofmannus.

Hactenus SCHRODERVS ab HOF-MANN O annotatus de variis Tartari præparationibus pluribus quidem, sed de ejusdem Sale volatili pauca admodum enarravit. Quoniam verò salem illum inter præcipua ariis arca re-posuere Chymiatrī, non incongruum fore arbitrati sumus si de eo quadam ulterius legenda præberemus, atque ea propter Tractatum Celeberrimi D. D. Danielis Ludovici, De volatilitate Salis Tartari hic infereremus. Sic enim constabit, quid in hæc

LIII 2 masen

materia querendum, quidque minimè querendam sit. Quadam præterea circa varias alias præparationes chymicas, ut & circa earundem exhibitiones ad Tractatuli elaboratissimi calcem adjecta vidimus quæ suppressere ordo materiarum aliquatenus suadebat, sed quoniam paucissimis pagellis complexa & accuratissima sunt hæc omnia constituimus Dissertationem integram exhibere, persuasi Lectori minimè tadio futurum præclara hæc quamvis extra proprium ordinem legere.

PRÆFATIO.

Ad Benevolum Lectorem.

Cum superioribus lustris Alcabestina disquisitiones complures fatigarent, fieri non potuit, quin decollante passim spe, nihilominus in tanti Liquoris Vicarium parili diligentia inquireretur. Tentavimusque hinc circa fixitatis Alcalina Volatilisationem similiter nonnulla; qua postmodum Amicorum ductu, horis succisvis è Memorialibus collecta, nunc ante septennium edidimus: saltem quo adhuc versatiorum aut feliciorum observationes & Enchirises circa huiuscemodi materiam eliceremus. Nec sanè concepta, curiosissimo hoc seculo, spes nos destituit; experimenta sua liberaliter publico conferentibus Viris exercitatissimis. Ceu inter ea quidam, qua ad manus nostras hucusque pervenerunt, ista forsan primus est Spiritus, qui quasi semidiliquis in cella, vel dum huius pigrior ut plurimum, ac minus agitatus aer est, per Substrationes, (ut ita loquamur,) post quamlibet destillationem repetitis, è Sale Tartari colligi præcipitur: consensu tamen hætenus in diversa abeunte: dum quidam saturatissimum hinc dixerunt; Alii verò phlegmaticum solum, & Alcalinum in aquam tandem resolvendorum Exemplum: ceu forsan circa Ignis genus atque gradum, Vasa, Alkali solitarium, vel accessoriorum reliquiis adhuc diversimodè infectum, ipsamque Patientiam haud exigua accedere potuit variatio. Nobis, [cum postliminio circa talia suscepto aliquando tentamine, hunc quoque processum persequeremur,] singulis vicibus, post phlegmatis egressum, urinosi volatilis liquoris quodpiam] Arena quidem, ac validissimo assumptique quantitati sufficientissimo igne, per Retortam [Sale tamen per diu prius, alios in usus, moderato calori expositio;] tantisper in sine oblatum est; donec tot repetitionum ac confractionum pertasi, abiceremus [inter alios officii] productiorem hunc, & felicioribus, cum reliquis, relictum laborem; elutriato residuo equidem Terra fixa particulam, pro horum [tandem fatiscientium] more, præbente: destillationis autem Modo cum [infra notatis] Tinctura, vel saltem Solutionis Salis Tartari [in Spiritu ardente facta, & à subsidente saturatissimo hinc phlegmate separata] Destillationibus quadantenus conveniente: Sique Ascensus aliqualis hic ratio perquirenda, sollicitato forsan sic, aut per toties repetitas ignearum & aquarum particularum alternationes, [ferè ceu quadam quasi cohobia,] vel intimiores quarundam complicationes, successive disposito magis Subiecto ad induendam sufficientis sibi Vehiculi quantitatem, aut aliter reddendam attenuationem sui portionem. Nam inter varias adhuc difficultates & perceptibiliora quadam experimenta, forsan arbitrari posset quispiam, singulariorem horum ac consimilium, [adhuc copiosius prodeuntium] suscitationem aut emersionem, per universalis istius Salis attractio-

nem vel insinuationem, [simpliciori Radiorum vibratione vel permeatione longe sublimiorem] nec dum adesse esse planam: Præsertim dum penitus expenditur & confertur exigua plerumque Proportio salina participationis tam in Rore, pluvia, Nive &c. quam in ipsa [ambiente nos] Atmosphæra [utui in suo genere seu desuper, seu ab inferioribus, quò vel copiosissima culinaris ignis effluvia ad Gas usque, referre qui posset, satis alias imprægnata,] cum ea Coagulorum quantitate, passim & brevi sepe, tam è fixis ignem variè prius perpeffis, quam è Mineris, sub diu arido fatiscientibus emergente: si porro consideratur Salis istius, [hætenus quidem notis, etiam operosioribus modis collecti,] nec dum ea passim, seu in medendo, seu solvendo deprehensa universalitas: imo ipsius concentrati quorundam Spiritus Mundi, [ni de Magneticis, collectioni communiter destinatis corporibus quidpiam simul evehat,] exigua aut nulla sepe à priore Roris destillatio differentia: ex adverso vero, [præter igneorum, sive transcurrentium sive nonnullibi coherentium effluviis varietatem,] imprimis Aqua [quasi semimercurialis cuiusdam elementi,] sub accessu complexuque suo, [vel Vegetabilium exemplo,] planè variabilis & diversimodè applicabilis, Mineralium autem, præcipuè salini quid evidentius participantium,] haud adeò facile exhaurienda vel enervanda Natura; quingliscientes inibi: & semet sensim postmodum exolventes, aut post aliqualem suppressionem vel alterationem suam,] denuò hinc induentes particula restem: & quod per lentam solum humectationem, & reposicionem, [conceptaculis interea satis obviatis,] diuturniorem, & plerisque huius generis subiectis, [vel perpeffis Colcotharibus, Aluminis usti, &c. exemplo,] nihilominus eadem producta habeantur, aut si qua [gustui odoratuive,] diversi quid præ se ferant, id pariter fortasse non tam nova extrinsecæque Substantie accessu, quam Variata solum particularum figuratione, postura, occultatione, &c. contingere queat; indeque hæc insuper non raro saltem sit temporaneum: [ceu Salè Vitrioli consummatissima destillationis capite mortuo, accuratè sic collectum, nobis nunc post 12. demum annum vitriolescere incipit:] & si qua amplius, v.g. è Calcis spontè restincta similiumque verè Calciformium observationibus; Niri muraris natura; Pyridis aramentosi coincidentia; acido salinarum particularum sub insipido vel quasi-dulci coagulo latitatione; sulphureo odore, Cephalici quorundam Spiritus haud remissiore, etiam inter vulgaris inodorique Spiritus Vitrioli rectificationem repetitò prodeunte, &c. adduci, [sed præter institutum nostrum] possent, ab animo sublimioribus huius generis præsuppositis, ad dimensionum ferè penetrationem interdum deducenibus, minus adjueto. Potius sequatur alius ex Aceti destillati Saturniorumque magmate, solitarie vel cum Jovis calce similibusve, [ad modum Spiritus Coralliorum,] valido satè igne destillatus: in variationibus chymicis jam olim etiam ad fixiora commendatus, nec quibusdam inconvenièntibus ceu conformes ferè, [post abstractiones à Solutis suis tandem] prodeunt Guajaci quoque, Mellis Manna, imò Tartari nonnunquam Spiritus, Acetumque, vel ab ipso Sale Tartari: æcumine talium, à pristino suo, haud parum differente. Verum cum nostræ nunc recensio præcipuè circa vulgare Sal Tartari, [ut illic singularius aliquod prodeat,] occupetur, sufficiat forsitan, mentionem tantum huiuscemodi Liquoris fecisse. Quemadmodum etiam Terrii, è siccatis vini fecibus; ceu in subsequa Dissertatione jam adducti; cum additione: quod commodè prius Spiritus ardens abstrahis & residuum post refrigerationem & subsidentiam, exiccare demum queat. Forsitan autem ex hoc capite

commercioque est, quod in crudi quoque Tartari destillationibus nonnunquam similis Salis quidpiam apparuerit. Amplius reuoluimus ibi etiam Tartari Tartarificati, [uti quibusdam vocatur,] Spiritum: cui quemadmodum affinis, ita laboriosior quidem, ac post debitas rectificationes penetrantior aut saturatior, processuque [cum Spiritu & Sale Tartari instituendo] tunc ferè compar est, qui post Tartari & crudi & ambusti, [tanquam præ sale fixo minus adhuc exhausti,] debitam inter se solutionem destillatur. Quod autem caput mortuum elixiriatum, alcali quidpiam nobis exhibuerit, in causa forsitan fuit ni salinarum particularum temporanea [cui Tartari quoque, cum Alumine destillati capiti mortuo contingit,] latitatio, vel consuetæ renitentia, saltem ferrea cucurbita, intensiorisque sic propulsiois defectus. Quod quidem in medio nunc felicioribusve repetitionibus relinquimus: quemadmodum etiam, si forte quispiam botriformes hic sub dissolutione, bullas, [cum non solum in crudi quoque Tartari depurationibus, aut cum Vitrioli coctionibus, verum etiam in aliis pulverulentis insperfectionibus saponariisque & albugineis mixturis concussis eveniunt,] non tam ad Sal Tartari, [tanquam intimioris adhuc participationis] Vitis genimen, quam ad simpliciorum [quadrantium congre-dientiumque,] particularum posituram, varia huius generis phenomena in Mineralibus, salinis, aliisque coagulis siccis aut congelatis &c. [circa omnem Essentialitatis primordialis accessum,] exhibentem referre voluerit. Residuas autem Formulas, v. g. Terra Alkaliæ partis subractionem, quo volatiliores facilius prodeant: [nisi de primitus notato processu, vel aliquorum persusiones depuratione, aut Acidorum accessorium arreptione, cui infra hac notauimus, intelligatur; Item, Alkali huius etiam absque igne, in aliqualem volatilitatem abiitum, [ni urinosum quidpiam, vel Aluminis miscella, singulariorve enchirisis subieruerit; cui madida quoque vegetabilia compacta, sponte concepto calore, quadam inflammabile Sulphur, quadam sal volatile copiosum eructare deprehenduntur:] & si qua insuper esse queunt, planior olim Alkali hoc persequentium explicatio deteger, hucque tunc cum aliis faciliè reducuntur. De cætero in ipsa [ut publicata primitus fuit,] nihil mutauimus; ne alia, sed [ob exemplarium defectum,] recusa saltem exiret. Præfari tamen hac volumus, ne manca in residuis videretur; addimusque insuper, tanquam pro complemento: 1. Quod rectificatio vel cohobatio super proportionalem Alkali quantitatem, complurium acumen aut saturatiorem notabiliter augeant. 2. Quod aque ac Calcis Viue Spiritus, etiam liquore competenti diluti, nihilominus admodum, [præsertim in frigido] transpirent. Et 3. quoad effectum, uti præsens quidem est [in convenientibus affectibus & exhibitionibus] hac volatilitas, ita per se inconsideratius diutiusve tenerioribus data, haud parum tandem appetitum deiciat; [aque ac ex eodem ferè capite, largior Vini Spiritus, & ipsum, nonnullis in plethoricis, Sal essentialiale Tartari:] Aliis verò per solutiones sociata, bonum quidem sub Prudentia medica remedium, non tamen protinus semi-universale vel sine pari præstet. Quæ incipientium; singularioribus sæpe processibus, formulis, aut [alia tunc ibi Praxis vulgaris facie,] præcipui Auctoris commendationibus nimis inherentium causâ, superaddere visum haud fuit inconueniens.

De Volatilitate Salis Tartari.

Quantopere Tartari crudi Volatilitas etiam Versatissimorum manus hodie dum fatigat, notorium

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I.

est: usque aded; ut istorum haud pauci, postquam nihil non per Serpentina quoque, Refrigeria, interpositum cum Spiritu Vini Globum, Furnos, Alembicosque singulares & alia huius generis Compendia, incassum ferè tentassent: tandem ad incoercibile, ac Fermentantium Effluuiis, aut Fulminantium Sylvestreitatibus consimile Gas retulerint Totum illud, quod naturæ (forsan maximam partem Salinæ,) incenso præsertim post sequestratam humiditatem Tartaro; communiter, (plus minus tamen, pro Artificis dexteritate,) evolat: quodque Caput mortuum in balance prolecto Liquori conferentibus, passim consideratur: etiam cum planè proportionale Tartari ad recipiens pondus adsumptum est: nec tot ejus libræ, Vulcano inconsideratius (licet adhuc perfrequency, una vice subjectæ, potissimam sui partem inter commissuras per relictum Epistomium, aut aliàs vi factâ, ne quicquam eructarent: aut (quamvis speciosior Recentiorum invento) successivæ Ingestiones nihilominus per Destillatorii desuper operculati continguitates, (frustraneo etiam circumfluo Plumbo,) vel si inferius adaperitum fuerit, inter Obturatorium ingratiss demiserunt. Sed ejusmodi desiderio, servandoque subtiliori (à Laborantium venali certè nimium quantum differenti) Spiritui suæ, citra dubium, adhuc supersunt Enchirides.

Majus autem negotium tædiumve curiosis facessit volatilitas, quæ inter amplissima, Alcahestinisque ferè proxima promissa, ex ipso Alkali Tartareo hæcenus (certo & aliquali copia) quæsita est. Ut inde nonnulli, dum fixitatem & resistentiam Salis illius, è præparandi modo cogitarent: herbaceorum Alkaliæ, cum Bolo vel Argilla continuato igni subjectorum Spirituum ut plurimum tandem Acidulo-salinum gustarent vel experirentur: in plerisque hac de re Libellis modò Vota tantum, aut Obscurum, super æque obscurum, modò tralatitios saltem aliquot, mutuoque (circa successus asseverationem) descriptos, vel aliàs Authoris, Ingredientium, Enchiridis, Circumstantiarumve nonnullarum causa, (jure vel injuria) suspectos Processus invenirent; dubioque hinc eventus difficiles complicatosque labores elocare nollent; aut experiundo tandem (seu proptia, seu præscribentis culpa) sæpenumero nihilominus modò nil, parum, aut phlegmaticum, modo dubium, tertiumve quidpiam ægrè nanciscerentur: totum hoc negotium inter vanas Chymicorum Assertiones, aut ipsa Non En-tia retulerint.

Sed enim levare revera posse quandam inde, & genuinam quidem partem; manifesta inibi versatorum nec subterfugiis temerè subvertenda docet Experientia. Imo simplex insuper, at paulo validior continuataque Alkaliæ, etiam prius sufficienter depuratorum aut concentratorum) calcinatio, vel cum fixioribus nonnullis, nec aded sulphureis Subjectis instituta Fusio; Salis Tartarei vel congeneris haud parum, (vel intra horam & integro adhuc nec intimius undiquaque vitrificato Crucibulo,) una cum accidentaria Accessorium humiditate elidens: naribus effluvia salina sat sentientibus

Nec tamen isti proinde sumus, qui Eleusini Sacri; vel Alcahestini Vicarii revelationem hic profiteamur, Saltem istud Alkali (pro conquiriturâ hinc proficua quadam Volatilitate) adorientium, & ab initio) circa delectum aut successum Processus hæsitantium; præterea Agrotorum (ejusmodi remediorum genere sæpe perquam adiutorum) causa simplicissime prosequamur, quæ manualis Experientia, ac longa nobis, (per aliorum præscripta, privatosque conceptus cunctibus,) dedit observatio: quæque pariter

Incipientibus quidem confirmationem, & ulterius inquisitionis, aut (Medicæ vel Chymicæ) adaptationis Fundamentum, Exercitationibus verò ansam dabunt, auctiora, exactiora, clarioraque eodem candore superaddendi; quò nos impræsentiarum, sine cuiusquam Allegatione aut Vellicatione breviter ingenuèque solum introductionem quasi quandam, cum Experimentorum potiorum, (illuc forsitan compendiarie ducentium) Syllabò proponimus; Superpondii loco hinc inde interferentes, quæ licet ad singulos Paragraphos directè non pertineant, incidenter tamen, & data sic occasione haud inutiliter, in quamplurimum operationum & expensarum compendium annecti posse videbantur.

Qui itaque in negotio operæ pretiâ facere voluerit: principio, quod Materiam Quæstii nostri concernit; equidem (ob inconvenientias cuius hinc facile concipiendas, majori difficultate, minori que scœnore occupabitur circa vulgare illud Alkali, per figulorum extremas ustulationes, aut (licet communissimè præceptas;) usque ad Vitorem Cæruleumve Calcinationes exhaustum, ac sublimandis postliminio particulis tantum non quasi spoliatum. Equè ac toties repetitas deprædatoriasque Salium Officinalium Fusiones, ea candidiora quidem, nihilo tamen hinc usibus medicis præsentiora reddere; eoque laborum minus prodigos primis illorum coagulis, vel ipsis nonnunquam Lixiviis parili successu securitateque acquiescere cernimus: siquidem defuerint, aut specialem scopum interdum haud adeo attingere posse putentur Cranulata; in Dispensationem aliàs commodiora: nec, (dum per Sulphur flagrantibus herbis moderatè interjectum conficiunt,) invententem diaphoreticamque vim sic admodum perdetia.

Porro verò nec illud citra laborum frustrationem hic assumetur; quod extemporanea anatici Tartari ac Nitri Detonatione, (de cætero compendiosè, sique liber, perforatè solum rejicula quadam Retortâ, cum Clyffiformis Spiritus prompta collectione,) paratur. Siquidem in subitanea illa exandescencia Nitrosæ Aciditatis pars tacitè arripitur, & in Alcalinum complexu, (quamvis gustantibus insensibiliter,) occultatur tamen tantisper, donec paulo violentiori igni, vel associatis, (Sali Tartareo) amicioribus subjectis denuo cedat; & penetrantem expectantibus, desidem, ac instar exhaustæ Aquæ Fortis acido nitrosæ relinquat. Uti nobis plus vice simplici, etiam cum Silicibus, ipsoque Saturni Vitro, (dum superiorum annorum commendatione ducti, nescio quæ secretâ inibi cum prædicto Alkali quæreremus,) contigit. Atque hinc procul dubio etiam est, quod in istius Oleo deliquato (concentratiori,) Tincturaque, tandem nitriformia quædam spicula inferius concrecant.

Ut itaque Sal nostrum non quidem extremè, & ad pugilli quasi remanentiam calcinatum; ita nec perfundiorè tantum, fundum tenuis, & inæqualiter combusto Tartaro extractum sit. Ne ex adverso, residuæ semicrudæ hujus partes (quemadmodum in imperfecta Spiritus destillatione, & in Tartari Tartarisati confectioe sit,) absorptæ, Liquorem postmodum prodant (ob Spiritus oleique Tartari communis aliquantillum) à quæstia nostra volatilitate haud parum differentem (atque curiosioribus in isthoc genere meritis suspectum.

Nec tamen hinc opus erit, ut Tartarum quispiam, (cum polychrestis Spiritus jactura) seorsim calcinet. Quandoquidem ipsam Caput mortuum (v. g. è duabus tribusve Crudi libris) post totalem & ultimam dicti Spiritus Oleique destillationem adeoque intimam

fidens Tartari combustionem restitans; (citra ulteriorem supervacueque vulgo repetitam ustulationem,) gratis & quasi pro superpondio suppeditat Sal, ut aliis usibus, ita huic quoque operationi sufficientissimum: præsertim si sine subitanea postmodum vehementiâ; imò penitus sine quadam, (quamvis severe operosèque nonnullis hunc in usum reiterata) Depuratione sensim saltem in seipso totaliterque exiccetur. Nec enim (post partis coagulatu difficilioris in deliquium verò magis pronæ separationem) Residuum subterconcretum, (ceu alii istud specie, vel etiam lixivii Sarmentorum crySTALLIFORME coagulum requirunt,) seorsim huic negotio aptius invenimus. Quin potius, qui è Salis culinarii spontanea nonnullibi è Cæcis Salinarumve Meris stillante Muria, v. g. ad quartæ partis remanentiam exhalatâ, per arenam quoque Spiritum elegantissimum aperitivum destillari vidit; fortè priorem illam portionem ferè commodiorem crederet.

Cæterum, si porro supradictum Alkali, à crudioris Tartari commercio, (ni quasdam oleosarum striarum vel scoriarum particulas, interdum inter eluendum, innoxie arripuerit,) aliàs sufficienter sic secretum; diuturniori mediocrique Calori per Menses aliquot, aut super Fornacem una alterave hyeme, per functione tectum exponatur: lenta ignis actione pene porosum, ac in se quasi spongiosum, eoque hujuscemodi laboribus adhuc aptius deprehendetur. Atque hæc circa vulgare quoque (justæ calcinationis,) Sal Tartari similiter maximam partem observari queunt. Nam illud hinc, dum operationum tantummodo compendia, per diversas observationes & Enchirises venamur, nequam rejicimus.

Tandem verò sicæ vini fæces, (Destillatoribus vulgò vel recentiorum aliis occupationibus haud inconvenienter cedentes,) si post vini residui expressiones &c. aut consuetas Spiritus abstractiones, in ahenò parillive modo debitè deinceps exiccantur; uti per destillationem (tùm solitarie tum alibi tradentis additamentis institutam, penetrantissimum & volatili spontaneo Sale refertissimum; (siq; per competentem super Alkali rectificationem à graveolentia nimia liberetur) perquam in compluribus affectibus proficuum, sane volatili Salis Tartari Spiritui hoc in passu ferè consimilem Liquorem sive Spiritum fundunt: ita post communem at planè mediocrem (in olla recta) calcinationem speciosum, copiosè superstant, & quasi spontè desuper sublimatum albißimum Sal præbent, ejuscemodi negotio præ reliquis convenientissimum.

Atque hæc de ipsius Alkali differentiis, (quarentibus huic spectant,) & haud inuiti Selectu: quo se in aliquali copia, sed tamen genuina & in Urinositate sua, (quoad ejus fieri poterit,) intermerata Volatilitas inde sequestrari queat. Nam licet nonnullorum asserta in Solutiones quasdam aliasque circumstantias Acidum aliquid inferre videantur: nihilominus cum in (hactenus quidem notis) hujus sortis rebus speciale ferme nil, aut parabilius ejuscemodi Menstruis adeò superius inventum fuerit ipsique potius circa dissolvenda Subjecta desides, aut circa soluta jam, (quæ intimius secum deferre debebant,) instabiles, vel alias alienigeni deprehendantur: forsan haud immeritò (donec secretior præsentiorque, citra suspensionem, modus ad Aciditatem obtigerit,) acquiescimus purè fallæ, certè consimili lixiviosæ Alcalium (ab ista translocatione seu immutatione haud penitus alienorum) naturæ præ Acido (in hoc quidem genere) viciniore; competentiaque vel prædisposita Subjecta, suo quodvis modo, sat is, adorienti & amplexanti Volatilitati. Sive de cætero Salis; sive -us, (utpote parum hinc differentis, & sal-

& salinas particulas saltem in liquamento suo vehentis) forma prodeat.

Proinde consequens nunc est, ut Modos videamus, quibus ejusmodi Volatilitas in rei veritate proluciat; an prolici putetur. Quemadmodum enim plures sunt, qui (ut ab initio notavimus,) Plegmaticum solum, (Tartarei quid olentem,) aut levidensem Liqueorem, vel nominale tantum; alienum, aut planè tertiam quidpiam genuini loco præbeant: ita non unus saltem verum aliquot inveniuntur Processus, qui revera quæsitum hic Sal, aut ipsi congenerem (à communi tamen Tartareo admodum distantem) Spiritum suppedient; & nihilominus invicem tum in odore, sapore, colore, salinarum patrum formâ, &c. tum in effectu viribusque manifestè coincidunt. Æque ac permulta v. g. Mercurii, Antimonii &c. Præparata, quamvis ad concertationem usque, diversis viis medicisque negotiose conquirantur, eodem tamen ut plurimum postmodum recidere; & quæ per operosas ambages ferè secreto confecta fuerunt, cum vulgarissimis tandem compendiis penitus convenire passim cernimus.

Amplius; quemadmodum Salinorum reliquorum pleraque (licet respectivè minus fixa,) facilius tamen atque copiosius eleantur, si dum annatum defuerit, exterius solummodo, sed competens atque continuationem destillationis in isto genere sustinens addatur Vehiculum; aut pro re nata Separatorium saltem corpus quod aliquam Subjecti partem præsertim fixiorem aut alienam invadendo, &c. Subtilioris atque hac magis pronæ substantiæ ascensum ita faciliat. Ceu inter plurima, vel solum sal culinarium, (oppidò Spiritus sui facilis aut iniquus, pro additamentorum ratione, promus condus,) liberaliter innoxieque refundit dupli, (hunc in finem adjecti) Aluminis crudi superpondium: iis qui naturam ejus & Capitis mortui (seu integri, seu in Sal tertii generis & albißimam Terram resoluti) notabilem Aluminositatem norunt, in medendo neutiquam suspectum. Sic pariter etiam Alkali Tartareum, (etsi longè forsan pigrius,) per vehiculi tamen complicati vel sollicitantis, aut certæ Materiæ (sulphureæ vel acidæ, salis portionem attripientis, & in eo ignis gradu carboniformiter aut Magisteriali coaguli instar retinentis,) accessum, equidem facilius ascendit secundum reliquam istam partem, quæ simplici ignis actioni aliàs vix, aut non sine variis inconvenientiis paritisset.

Quibus ita præmissis, ut specialibus deinceps ac ordine quodam, diversimode sic quæsitæ vel promissæ Volatilitatis nostræ rationes, quid valeant, quantique sint, (ducto per remotionem quasi, à languidioribus, suspectis, minusve talibus exordio,) perlustremus: principio Tartarificatus Vini Spiritus, unâ scilicet alterave vice ab Alkali Tartareo pro phlegmatis (sulphureo salinis istius particulis adhuc dum sat copiose intermixti) majori quadam separatione communiter abstractus; quamvis ob evidentiorē hanc concentrationem, tum per se, tum in Essentiis Mixturisque compluribus perquam in sua destinatione præstans sit: & quasi proprium sibi volatile quoddam Sal (ex ista prolapsa) participet, imò vel ab ipso Alkali insuper aliquid abreptum, secum evexisse ponatur: indeque propter alterutrum horum, si paulò validior & minus instilletur, non solum subtilem quandam Ebullitionem, verum etiam ut plurimum post lentam exhalationem Salis subaciduli nec inelegantis quidpiam ostendat: nostro tamen apparatus, & per multum hinc distanti prægnantiorique Salis Tartari Spiritui protinus haud accenseri poterit. Siquidem & Alcalinum illud quod in superficialiori hoc, æquè ac in speciosior

ri incerationis (inferius attingendæ,) processu forsitan ascendisse conjicitur, oppidò nihilominus erit exiguum; & sensibilius in ejusmodi operatione, post separatum quasi semistiptici saporis.) Phlegma, demum prodire deprehenditur. Ceu ultimas solum guttas, dum dicta residuæ humiditatis abstractio per Retortam instituitur, aut parili modo V (per Salis Tartari dissolutionem, & subito subsidentis aquositate substractio nem compendiosè Dephlegmatus,) ad siccitatem usque paulò fortiori igne destillatur, Aerēdem alcalinam gustantibus offerre tandem observamus. Quas si quis pro lubitu (nam & congeneribus Alcalium Volatilitatibus addi possunt, abstracto Vi Tartarificato (præsertim repetito dum per accidens obtingunt, permiscuerit, haud minus inde sic Alcalisatum (alios fortassis in usus) habebit, quam si vini rectificatum à globulis argilla & sale Tartari constantibus, validiori demum igni abstaxisset: aut in Eundem (prius à crudo Tartaro lentè destillatum,) intensiori postmodum Vulcano Tartareæ aquositate reliquias (sed ingratiore hinc odore) protulisset. De cætero tamen nec hi Liqueores, ob eandem Volatilitatis inibi dispersæ paucitatem, desideratorum numero convenienter associari poterunt.

Quod autem Oleosi quidpiam in prædicti Spiritus Vini Tartarificati confectio, residuo Phlegmati, (æquè ac venali generosiorum fæcum Spiritui,) nonnunquam innatet verum quidem; sed tantum ideo Cordiale non est, aut inde meretur ut guttatim sic, aut operosius adhuc rectificatum vini, cum concentratissimo Salis Spiritu digerendo, eoque sulphureis particulis abreptis salinis, liberando,) colligatur. Cum ad Mœni Rhenique tractus, fæcum destillatores passim tolerabili pretio vendant vini istud (paucissimis nostratum, dum plerique Spiritum ardentem hoc nomine proponunt, notatum) Oleum, è Rectificationis remanentia successive, more tralatitio, desuper collectum; atque hinc oppidò fæculentum quid olens; donec super Alkali vel Salis Spiritum, aut potius per vesicam rectificatum, acceptiorem & Spiritus è fæcibus prolecti similem odorem induat. Verum hæc in transitu.

Sequitur præcedentibus quadantenus affinis, ac priusdem hoc nomine traditus modus, è soluto in Vino Alkali, (post Spiritus ardentis atque phlegmatis abstractionem,) Sal volatile proponens. Experimentiæ subjectus dedit quidem è residua Massa (utpote Alkali & Tartaro vini constante, modicum Liqueoris, uti vulgari Tartari Spiritu longè graveolentioris, ita quoque acrioris, & manifestas hinc particularum salinarum notas ostendens; concretum verò cujusdam Salis vestigia quædam potius, quàm spectabilem compagem: cum Olei Tartarei circumcirca decidui aliquantillo. Ut evidentiori Volatilitate prægnantioribus, atque simul minus ingratis acquiescentes, (præsertim cum ipse vini Spiritus feculentiori odore sic infectus prodeat,) totum hoc feliciore forsan (inter frequentiores adhuc repetitiones, vini variationes &c.) inquisitioni relinquerimus.

De cætero assimilis isti, sed tamen acceptior est Spiritus, qui è Tartaro Tartarificato, (seu aperitivo illo coagulo, è tribus Tartari purioris aut depurati, & duabus Alkali partibus confecto,) haud difficulter, (proflua simul olei parte,) destillatur: de Volatilibus Salis particulis procul dubio quidpiam (vel odoris saporisque huc declinantis testimonio,) similiter participans: atque licet (in exquisitorum classē ob antedictam causam referri nequeat, nihilominus in aperiendo & resolvendo non contemnendus: si per se ac solitarius, si sub competentium, nec volatilitatem ejus adeo infringentium Spirituum tincturarumve consortio detur. Æquè ac Tartareus iste,

(sed subacidulus) qui cum Vitrioli ad crudum Tartarum subquadruplo vel subtriplo (alias in diversos usus,) haud inconvenienter prolicitur; vulgariorque officinarum Aperitivo, (etiam debito ignis regimine, ne tandem planè vitriolicus exiisse videatur: destillato,) in ejuscemodi destinationes longè præsentior deprehenditur.

Porro verò nec tralatitius ille cum Bolo consimilive Terrâ modus momentum adeo magnum huc conferre poterit, Quamvis enim ut plurimum quadantenus procedat; & Liquorem sensibilibiter urinosum, eoque destillato Vitrioli Spiritu subtiliter ebullientem præbeat: volatile tamen inibi perquam est exiguum, indeque (ceu alii quoque questi sunt,) effectus oppido remissior; sive per se, sive quæstis hinc Solutionibus. Extractionibusque fuerit adhibitus. Ut taceamus, acidulum solummodò, desidiq; Terræ sigillatæ, vel congenerum Argillaceorum Spiritui consimilem nonnunquam (pro additamenti forsitan natura, copia, &c.) cum aliquali saltem Tartareo odore prodidisse.

Quod autem nonnullorum Ignem penitus immediatum attinet; Fastigiato illi (per directâ Receptaculâ) Furno cum superioribus annis multa commendatione proponeretur,) iniecimus super prunas pro more carbones oleo Tartari rite saturatos, & circumcirca sufficienter siccatos. Sed idem nobis (fortean infelicio ribus) contigit, quod aliquibus nonnullibi Spiritum salis parili ratione quærentibus. Ignis scilicet sensim suffocatus, & phlegmatici tantummodo quidpiam, paucissimis particulis revera urinosis intermixtum, in inferiori Recipiente collectum est.

Nec saturatius quid (in exigua simul quantitate) nacti sumus, cum alia vice ipsum Alkali (mediocriter saltem siccatum,) prunis inspergeremus. Adhærescens siquidem hinc, inde, vel per contiguitates istarum secedens, illic in massulas ignitioni sustinendæ minus deinceps aptas abeundo, hic Vulcani levatoriam violentiam subterfugiendo, utrinque tunc expectationem nostram in tantum refellit.

Cum autem ipsum (à destillato Tartari Spiritu resistans) Caput mortuum, nondum elixivatum, similiter aliquando injiceremus, (uti ignem alias promptè concipit, ita) secedentis subtilioris partis manifestiores notas, in superioribus præsertim Receptaculis (etiam odorantibus) ostendit: eo ipso tamen potissimam partem effugiens, infimo salinæ urinositatis modicum reliquit. Ut facilioribus ac eodem recedentibus modis deinde contenti, hætenus in hujus generis destillationibus reperendis curiosiores esse desierimus: majori, aliorum, inter otia, felicitari relicto ejuscemodi (seu pristini, seu propter difficultates quasdam contractioris nunc) Furni proventu, sive (Sarmentorum combustorum instar) per se, sive per additamenta quoque, evidentius fortasse conquirendo.

Quò pariter remittimus singulare quoddam, nobis alicubi superioribus annis depictum Instrumentum; proculdubio Authoris famigeratissimi verbis, huc per frequenter, nec citra speciem tractis: (quod scilicet aer imprimis volatiliter sulphur concreti, cum omnimoda separatione sui Salis, &c.) inventionem debens: atque adeo circa Salis Tartari conceptaculum aërem quadantenus admittens, ut per cucurbitiformem Tubum ad Alembicum convehatur levatus à subterraccenso igne Spiritus; ferè Sulphurei campanarii instar. Nam dissipationes volatilium hujusmodi substantiæ hinc inde, præsertim repleto (per suppositionem) Receptaculo subveriti, tale quid expectari nolumus. Atque hæc de magis quidem consen-

raneis, levioribus tamen remissioris Volatilitatis modis.

Sequuntur, (ne quid in isthoc genere censuque sic reliqui) remotiores adhuc, ob accessoria magis suspecti, vel planè tertii penitusvè alieni quamvis (in sua quivis destinatione) haud inefficaces, indeque nonnullam hujus fortis ortusque speciem diversimode præ se ferentes; aut rem ex alio aliove capite penesfrantibus, præ se forsitan laturi. Quodque inter istos, principio, Spiritum ex Armoniaci, Salis Tartari, Calcis vivæ, (imò aliorum insuper, indifferenter inibi semet habentium additamentorum) mixtura, per notas passim enchirises destillatum concernit: equidem in penetrantia, sua perquam præstans, nonnullis hinc pro quasi Tartarifato habitus est. Verum; ut Acidæ Armoniaci partis, (Sal Tartari vel Calcem vivam pro more invadentis) intuitu, quædam Volatilitatum (inde secedentium) associatio, mediocri conjecturâ concedi posset: collectus tamen (& inter sufficientis humidi defectum Floribus nonnunquam intermixtus) Spiritus, (hætenus Armoniacali titulo diditus,) per istud quoque præsuppositum nihilominus maximam potissimamque partem adhuc Talis, seu Urinosus ac forsitan fulgineus foret. Caput autem mortuum ulteriori experientiæ subjicientibus, (ut incidenter hæc persequamur, siquidem è Calcis vivæ commercio fuerit, Tincturam vel Liquorem suppeditabit, (Nephritici nonnullibi nunc usualis imitamento,) haud penitus rejiculum: sin autem è simplici Salis Tartari atque Armoniaci mixtura supererit, & Spiritus Vitrioli parte perfunderetur; promptè hinc destillabitur Aperitivus Spiritus, cuius Armoniacali Acido compar: Quando verò dictum caput mortuum rectificato Vini Spiritu simpliciter extrahetur, & quod extractum est, Spiritu Vitrioli præcipitabitur, elegans salinum, & Sale Antihypochondriaco, quibusdam è Horum Armoniacalium, à Sale Tartari perfecte sublimatorum, capite mortuo extracto vix inferius) coagulum prodibit,

Sed ut ad institutum nostrum redeamus; num quoque vulgarior Calcis vivæ Spiritus (per prævias Alcohol vini abstractiones & Alkali Tartarei additionem, &c. paratus,) pariter de accessorio hoc Sale quidpiam participet; è diversis conjecturis disquiri quidem posset: & in utramque partem faciliè quis allegaverit tum ipsam Calcis vivæ naturam; & primum hinc (ut & ab Alcalibus) Volatilitatem quarundam successum; quarundam verò totalem quasi transmutationem: tum porro Spiritum Calcis, etiam absque Sale Tartari destillatum: Odorem ab hujus Spiritu quadantenus distantem, &c. Præterea & ex adverso, consimilem ferè Salis Tartari cum Silicibus, etiam calcinatis destillationem: Liquoris sub olei Saponis confectione provenientis alcalinam Acrimoniam, corporali Sale volatili (ni quis ex Animaliali prolapia prodidisse dixerit) manifesto perfusam: diversas circa Lapidem tonforum corrosivum observationes; & si quæ insuper, pro & contra, (uti loquuntur) huc proferri queunt. Verum ejuscemodi sententias operosius persequi, nostri nunc non est instituti: nec si vel maximè de Alkali Tartaro quidpiam participaret Spiritus ille (si rite paratur,) præstantissimus; ob accessorii tantillum, aut solam affinitatem, nostræ protinus fortis aut Sylloges genuina pars foret. De cætero comparem, penetrantiorum, & citratædiolas Incerationes, Tubuli bifidi, vel hamularum intus (per Retinacula quasi, phlegmatis ascensum impediencia) Serpentinarum applicationes, longè parabiliorem Liquorem nanciscuntur, quisquis saltem, Salis (haud dephlegmatum, vel

vel cum Alumine compendiosius destillatum) Spiritum anatico Calcis vivæ recentis ponderi affundendo, per Alembicum exceperit id, quod (inter conlueras effervescencias, & Acidi cum Terreo copulationes;) sponte sed copiose, urinosissimo sapore & odore stillat. Residuo in supra notati Liquoris Nephritici, (è Spiritus Salis calcisque coagulo communiter educti; confectionem adhucdum sufficientissimo.

Porro, cum Sal Tartari Aceto (tantum simplici; eodem, quo pro Terra foliata conquirenda cum destillato solet; modo) saturatur: (sic autem istud utrobique commodissime unica sufficienti affusione:) & relictum post abstractionem Magma ulterius validiori igni subijcitur: Spiritus provenit urinosam quandam acrimoniam acetositati (quasi Armoniacaliter,) intermixtam præ se ferens: indeque recensitis quadantenus quidem affinis: parabilior sane sic, atque speciosior præ isto Liquore, qui ex Aceto destillato; (dum Alkali similiter imprægnatur) Spiritui Mellis Guajacino primo similis, tandem autem appetit acetosus redit; (& aliquibus ad inspissatorum quorundam Succorum Marinorumque solubilibus extractions adhibetur:) aut qui longè carius ex ipsa Terra foliata (dum ultimæ Vulcani vehementiæ pro sublimatione, de subito sic nequicquam quæsit, subijcitur,) non sine dispersione polychrestis medicinali, acidulo sapore stillat. Eo porro, qui ex Essentiali Sale Tartari, cum Bolo subactis, nonnullis (Arcani Tartari nomine) propellitur, haud adeo hoc quidem in genere posterior. Quod tamen proinde, cum sociis hinc suis, congeneribusque (quamvis alias in usu medico vel chymico haud inefficacibus) ad expectatam Volatilitatis nostræ Syllogen propriè referri nequeat, vel acetosarum particularum associatione (etiam qualicunque) liquet. Ideoque & singulariorem istum, qui è sæpedito Essentiali Sale post plurimas spiritus Vini abstractiones quasi Tartareo velamento tandem prodit, isti confidentius accensere adhucdum distolimus. De cætero, quemadmodum Terræ foliata deliquium aut dilutum, tum per se, tum in aliarum (symbolizantium nec contenti sui nimiam præcipitationem hinc patientium) Tincturarum consortio perquam est efficax: ita nec supra notati Magmatis (sal enim sicum sic non provenit,) dilutum, inter ejuscemodi aperientes & detergentes Liquores adeo deses invenitur. Ceu aliàs Acetum simplex (in se nitrosæ potius, quam Vitriolicæ vulgò naturæ,) in compluribus operationibus (v. g. Plumbosorum Magisteriorum confectionibus, Mineralium Metallicorumque nonnullorum extractionibus, &c.) ædiôsè Destillati locum sufficienter compler: nisi compendiosius & in copia (per vesicam cum Vitreo Xbico, grandiorique Recipiente) destillatum, certis de causis impendere placet.

De Spiritu, qui sub Tartari Vitriolati communis præparatione per mediocrem (non verò violentam ultimamque, Vitriolicum postliminio reddentem) abstractionem potest colligi; & aliquibus haud penitus relictus habetur, cum in Volatilitate illa, quæ hic quidem requiritur, sit leviusculus, non est, cur in præsentiarum multa dicamus. Sic dum usualis salis Tartarei vice, istud quod Aceto destillato saturatum est, aut ipsa Terra foliata (aquæ scilicet aliquantillo diluta) recipitur, sanè penetrantissimus, sed simul (destructo per spiritum vitrioli priori coagulo) acetosissimus adeoque à nostra tunc intentione similiter alienus hinc Liquor sub debita moderataque abstractione prodit; relictis (ni validiore igne destruat,) Tartaro quoddam vitriolato, in destinationibus suis haud adeo inepto. Verum adhuc speciosior colligetur, si (quod obi-

ter talia persequamur,) Tartarizatus Tartarus, loco salis Tartari spiritum vitrioli eodem modo imprægnetur. Gratuitus autem, & quasi aliud agendo, in copiam dummodo complures isti (vulgò passim effusi) Liquores qui post Vitriolicarum Solutionum per Alkalia, (& vice versa) peractas præcipitationes, abundanter restant, (nec in rei veritate vomitoria vi, quod tamen è sulphureis Antimoni Solutionibus verendum hic non est, infecti deprehenduntur,) debita exhalationi securissimoque coagulo exponerentur. Quod etiam circa acetosarum extractionum, (per sal Tartari ac versa vice præcipitarum) supernatastem humiditatem parili compendio, (pro gratis acquirendo Terræ foliatae fundamento,) observari poterit. Sed hæc pro remissionum alienorumque modorum lustro vel recensione (feliciorum nihilominus experientia, forsan inter enchiridis aliarumve circumstantiarum variationes oppido relictæ,) hætenus sufficiant.

Consequens nunc est, ut similiter, (secundum observationes nostras) Saturatioris; magisque Consensantes, Genuinisve propinquiores deinceps videamus. Quod itaque ab initio istum cum Silicibus congeneribusque (abundantioris tamen humiditatis Alabastrum nondum tentavimus,) attinet: succedit negotium; si cum Alkali Tartarei quadruplo per retortam (cum Opercularum illud vas ejuscemodi penetrantiores successivè Ingestorum spiritus, inter quasque cautelas admodum disperdat,) debito ignis regimine, (ne prætoractiori labore Sal persuat) ritè destilletur. Et urinosa volatilitas Siliceæ (nobis neutiquam hic suspectæ vel destinationibus istius adversanti,) aquositati intermixta semet sat prodit; quin imo nonnunquam salini coaguli quidpiam seorsim apparere. Ne vero quis Alkali Tartareo nitrosam ad ejuscemodi operationem recipiat, supra jam monuimus. Quod autem residuum (magnæ superioribus annis commendationis) Massam concernit, equidem (præter alia Mechanica) Tincturam (pro assumptorum tamen Silicium natura) suppeditat aliquanto speciosiorē Vulgari sive simplici Tinctura Tartari; utpote quæ alias ab Oleo deliquato, vel potius à subsidente saturatissimoque Phlegmate, (dum Alkali in ardenti Spiritu dissolvitur, parum differt; Utramlibet tamen in plerisque intentionibus æquat aut superat, haud inlegans Tartari Tartarizati liquor, per simplicem istius Coaguli in duplo Spiritus Vini dissolutionem, & lentam secedentis (à phlegmatica sui parte) Spiritus divaporationem promptè consociendus. Sic nec Magisterium è communi Silicium Liquore tanti in medendo deprehenditur: sive per aquæ simplicis copiam, (levissimum tunc;) sive per spiritum Vitrioli (specioso Tartaro Vitriolato post filtraturam inde simul proveniente) præcipitetur. Sed hæc in transitu.

Porro verò prægnantior adhuc est hucusque recensito qui ad normam singularis istius Salificationis subtiliorum Oleorum instituitur modus. In dubium quidem aliquando tractus; quasi (cum mixtura saponiformis hinc oritur,) etiam in ultra oleum saponario compar sit suppeditaturus; aut saltem sub occultiori Digestione, (ceu Singularis alicubi à recentiori talium Autore vocatur;) sepultus lateat. Sed enim labor hic, uti jam olim à solentissimis Viris ex parte propositus est, ita ad literam quoque in nostro hoc subiecto feliciter procedit: sique simplicissime solum Olei Tartari nigri pars una, cum salis Tartari (præsertim prædispositi, vel è Vini facibus extracti) duabus partibus ritè mixta, & crassamentum hoc (saltem in Retortula sua) lentè per menses aliquot, aut su-

pra fornacem hyemali tempore, continuo, & patienter digestum fuerit, instituta postmodum [per arenam quoque si minor extiterit quantitas] destillatione, Sal volatile urinosissimum sat copiosè prodit, recipientis lateribus, cornutæque collo undique adhærens, & congeneri tandem Spiritui [unâ cum penetrantissimi ac quasi saponarii Olei aliquota parte adscendenti,] nonnunquam ad dimidium usque illiquefcens. Cujus autem parentis nunc sit progenies; & num aliqua olei Tartaræi particulæ per transformationem quandam, [quod frequens Autoris de Oleorum in Sal volatile Mutatione vel Abitu phrasis nonnemi sonare posset,] revera hic obriguisset quasi credi queant: an verò salinæ Volatilitates, [sub primam istius destillationem arreptæ vel absorptæ,] per Alkali propellentis accessum, à Sulphureis denuo sic liberatæ solam fuerint: aut demum ex ipso Sale fixo (per volatilæ substantiæ associationem, obscuriorive adhuc ratione in ejusmodi mixtura digestionemque sollicitato vel disposito) surrexit illud, quod in notabili, quantitate, relictæque simul, (dum è capite mortuo residuum Alkali elixiviat,) carboniformi, seu pinguedinum combustarum simili crusta prodit: [quamvis sit præter institutum nostrum;] dijudicatu tamen haud adeò forsan erit difficile: præsertim si quis Volatilitatis isthoc modo collectæ odorem, saporem & effectum, cum aliis processibus, [Olei Tartari ad Alkali volatilisationem sensibiliter nil accipientibus,] penitus eundem; præterea olei simul extillantæ acumen, [præsuppositarum salinarum particularum quasi concentrationem sat prodens:] item Liquoris sub Saponis (tanquam coaguli nostri Imitamenti cujusdam superficialiæ ingredientium coagulationis) destillatione provenientis falsedinem, (si per supradictam limitationem, inter consimiles observationes libet,) eadem opera perpenderit. Sed hæc de singulari hoc & delectui nostro (donec alius Salis, non Olei Spiritus reveletur in tantum genuino, ac perquam saturato, radiosiori tamen processu sufficiant.

Sequitur tertius, (sed æque ferè laboriolus, genuinus interea,) qui in plerisque ea de re Libellis per Spiritus Vini (imo Frumentacei quoque,) verum utrinque prius alcoholisati, aut (per ante notatam simplicem Salis fixi dissolutionem, Tartarisati abstractionem vulgò præcipitur. Ascendit post Spiritus, aliquoties hinc repetitas lentasque destillationes, [intensiori postmodum igne] Liquor urinosissimus, congeneri Sali plerumque, (ni parciora cohobia, ignis remissior, aut vasorum difformitas impediunt,) sociatus; ac simul perquam parvus: ut compendiosiorum modorum intuitu vix compensare videatur roties repetendos, (ut totum generali voce complectamur,) labores. Num enim revera sic increretur Alkali; sive de salinis Spiritus ardentis particulis adhæreat ipsi quidpiam, postliminio denuò sublimandum, an verò disponatur saltem ad faciliorem subliorum (& vellicationibus istis quasi sollicitatarum, liberatarum, aut qualicumque tandem ratione modificatarum) partium ascensum: aut penitus demum alternatione quadam, inter Cohobia, Volatile fiat fixum, fixum autem eadem opera Volatile: adeoque cujas tandem sit isthæc volatilitas, haud adeò difficulter forsan determinabit, qui conferet invicem (altera quidem parte) manifestum & largum (subadstringentis) Phlegmatis post singulas abstractiones proventum; (à subtracto vel planè quasi subterinverso Spiritus ardentis interiori Sale proficisci nuper quoque traditum:) secretiora insuper istud destruendi vel separandi præsupposita: Salis porro sic saturati pondus ut plurimum aliquantillo auctius,

&c. Ab altera verò Parte Phlegmatis illius forte simplicem tantum (inter salinas sulphureasque Spiritus particulas intermixtionem; atque successivam hinc (adeoque sensim proinde decrefcentem) Secretionem: (æquè ac expressa stillatitiæque Olea aquositate plurimum nihilominus occulasse destillationes rectificationesve suas deprehenduntur.) Manifestarium præterea concentratissimi hac ratione Spiritus (simul profluentis) Acumen salinum; non solum solubiliora quædam superficiæ tenuis adoriens, verum etiam (spontaneam solummodo Tincturam hic induisse dicentibus) nonnulla simultanea dimissione præcipitans; imò corporale Sal per instillatum supranotato modo Vitrioli Spiritum, inter leviculam fortè exceptiunculam demonstrans. Item consuetam Volatilium (pure salforum) an Alcalibus genuinis [in liquida & sicca forma] plerumque sic secedentium Rectificationem. Salis Tartari verò pondus (post ejusmodi incerationes) paulò auctius, æquè forsitan ab aquearum quarundam particularum (eo caloris gradu minus perfectè pro pristinae siccitatis recuperatione separabilium, Adhærentia profectum: (ne adferat ab aliquibus istarum Fixationem dum aqua destillata ab Alcalibus compluries abstracta fuerit, alilegemus.) Et si quæ insuper pro cujuslibet opinionis defensione vel singulatum conciliatione produci (è vulgarioribus quoque observationibus) poterunt. Nos practica nostra secundum institutum persequamur.

Atque hinc, quod denuò nunc quibusdam secretò commendatum Processum concernit: qui se per Spiritus Tartari digestionem aut cohobiam super Alkali perfici docetur: succedit similiter negotium; & quemadmodum supradictus Fæcum Vini siccatarum Spiritus, inter repetitas à Sale Tartari abstractiones, copiosum (ceu intimè & abundanter ipsi aliàs permixtum est) Sal volatile quæretibus sic offert; ita si bonus acrisque ille, (non autem acidus vulgò venalis) Tartari Spiritus, ritè dephlegmatus, Alkali proprio parè per vices affundatur, & (post debitam lentamque digestionem) destillando vel etiam cohobando hinc repetatur; urinosam volatilitatem sibi (pariter, at longè sensibilis, quam in Tartari Tartarisati, aut ipsius crudi Tartari, super proprium Sal rectificato Spiritu sic) complicatam, imò nonnunquam seorsum hinc inde coagulatam, diversimoda tamen proportionem secum evehit. Sed enim, dum in paulo facilitioribus modis eundem nihilominus effectum invenimus; radiosè prius conquirendum, atque aliis sat polychrestum Tartar Spiritum (sive solitatum, sive Ardenti, aliisve congeneribus sociatum,) ejusmodi laboribus vel experimentis denuò vix impendemus.

Tandem verò, & pro recensitionis nostræ complemento; cum deliquatum Tartari oleum Aluminis solutioni vel vice versa (v. g. pro explorandâ Magisteriorum Vegetabilium, Metallicorumque, sic nonnullis præparatorum, simplicitate,) instillatur; post albissimam Terram ita præcipitaram, urinosissimus per diu sentitur odor; æquè ac dum ipsam Alumen, vel destillati hinc Spiritus caput mortuum pulverisatum cum Alkali Tartareo trititando miscetur. Sique hujus observationis ductu, dicti Alkali & Aluminis crudi ana per Retortam (etiam in Arena) destillatur; atque Spiritus volatilæ copiosus: penetrantissimus; & paulò ante recensitis (ut ovum ovo) in odore, sapore, viribusque similis exit. Suspicionem de Exoterico probè novimus; & est aliquid, Urinositas ad Aluminis sequestrationem inter Metallurgorum requisita nonnullibi accedens

accedens: præterea salinarum ejus particularum facilitas, qua solitaria quidem, relicta terrestritate, notabiliter Retortam (dato sibi saltem per vires vehiculò aquèo) ascendunt: item, (quod affinitatis & ulterioris inquisitionis causa hic superaddimus, Spiritus, è crudo quoque Tartaro cum ana Aluminis crudi per arenam, nullo quasi negotio destillabilis, pariter penetrantissimus, copiosissimo Volatili Sale simul procurrenti intermixtus; cuius ex Alkali Tartareo prolecto, in sensibilibus effectuque compar, supraposito è siccis Vini facibus acceptior, &c. Verum; ut hæc pro aliena vel mixta natura demonstranda, cum verisimilitudine quadam haud inconvenienter allegantur: amplius tamen (in ulteriorem horum inquisitionem, cum uto quoque; vel ad extremum destillari Capite mortuo (etiam recentissimo) similiter labor iste procedit; sique alterutrum cum Salis Tartari anatico pondere eidem ignis generi subijcitur; eadem Volatilitas tum liquida, tum imprimis (ob vehiculi dilutioni hic sufficientis defectum, salina consistentia, quantitate haud exigua, de cætero (quia forsitan per tutionem aut destillationem præviam ab Alumine Sulphureum istud, Salis volatilis particulas diversimodè alias alterans, majori pro parte secretum est) odore minus gravi colligitur. Usque adeò, ut qui insuper ejusmodi Producti Proportionem; Vires porro (quoad speciales destinationes) simplicem Urinæ, Salis Armoniaci, Fuliginis, Cervinumque Spiritum excedentes, volatili verò Salis Tartari spiritui penitus conformes, item in residuo capite mortuo Aluminositatem cum adjecto Alkali apertè fixatam, sive in tertium quid (planè instar Arcani Duplicati) coagulatam; pariles denique Volatilitatum per consimilia additamenta modosque evendendum rationes, &c. paulò penitius consideraverit; forsitan haud adeo culpabili conjectura, nisi purè vel admodum Tartareum, Tartareis saltem longè proximiorè, lustratis sanè ab initio Processibus (in isthoc genere) oppido speciosiorè (uti faciliorem,) existimare posset. Nec caput mortuum (post extremam Aluminis destillationem,) solum apparenter insipidum, intra paucos verò dies (vel ex aère attracta humiditate pristinam adstrictionem denuò inducens,) aliave in contrarium alleganda libimet eousque obstare sineret; quominus parabilem hanc volatilitatem (ad minimum operosissimorum purè Tartareorum loco adhiberet. Sed tamen per nos cuius integer sit delectus, uti profectò postremorum omnium inter se, & cum nostro hoc Aluminis crudi vel ulti interventu comparato, imò ex ipso Tartaro cum Alumine destillato Spiritu, idem in rei veritate est effectus: præsertim si dilutiores (v. g. cum Silicibus aut sæpèdicto Alumine crudo confecti) Liquores, prius per Rectificationem, ejuscemodi purè salis Volatilitatibus debitam, (cum modico s. Spiritus Vini super Alkali priorem præstantioremque partem denuò abstrahendo;) quasi concentrentur. Quemadmodum & reliqui sale proprio, (si quod in prima destillatione vel instituta postmodum, ad minuendum odoris gravitatem, Rectificatione simul evenit,) convenientissime per circumspectam dissolutionem saturantur, vel (ut communiter loquuntur artifices) Essensificantur. Cujus intuitu supra jam, sub æquipollentia quasi quadam, Sal atque Spiritum in recensationibus nostris conjungimus. Figere verò talia per instillatum v. g. salis Vitriolive spiritum, (donec ebullitio cesserit filtratumque Liquorem ad salis consistentiam,) simpliciter vel affectata quadam quasi crystallisatione exhalare: item, istiusmodi (Armoniacò simile) Coagulum per superadditum

Alkali Tartarum denuò dissolvere, seu Volatile hinc (eo, qui in Viperino quorundam Sale, vel Florum aut Spiritus Armoniaci præparatione observatur, more) sequestrare; curiositatis in suo genere nec injucundæ, non contemnendæ, nec tamen propius hinc artificium (cui cuidam placuit) verè Alcahestinum est.

Quod autem Vires & usum volatilitatis nostræ attinet, tædiosè talia non repetemus, cum ab aliis diffusa commendatione tradantur; nos autem data opera brevitati studeamus: nec (quoad Chymicam quidam adaptationem,) animum ullatenus nunc induxerimus, hanc nostram (etsi genuinam) Volatilitatem simpliciter, & confidentia forte majori (siquidem novissimis quibusdam attributis ad literam alicubi satisfaciendum foret,) pro Alcahestino quodam vicario venditare, ac Locorum eò pertinentium explicationem persequi hinc velle: præsentanea ejus in Medendo efficacia, dum per se quoque datur, im præsentiarum & pro instituti nostri ratione satis contenti. Hoc tamen vel ulterioris curiosorum inquisitionis gratia, è nostris, (alias ejuscemodi Disquisitionibus hic nondum destinatis) observationibus quasi indice notando superaddimus: quod absoluta illa Authoris, (de Lunæ, Mercurii, Unicornu, Oculorum Sancti solutionibus,) assertio proculdubio nihilominus cum Salis quasi grano, etiam sub secretioris Tartareitatis accessu,) intelligenda videatur; sicque parili modo seu traditus quispiam, seu fortè speciosior (ex Essentia Sale,) aliisve modis exiens Spiritus adhibeatur: delectu tamen aut præparatione Solvendorum prævia (pro cujuscunque sc. natura, proclivitate, aut renitentia,) adhuc opus sit. Atque hinc in specie quidem, nostræ nunc tractationis Volatilitas. Ostracoderma, Marinaque (solubilia) cruda oppido odoritur; & inter ebulliendum absorpti quidpiam, seu vel instillati nec tamen solum denuò è talibus arripientes Liquores restantur,) retinet; reliquum nobiliori copia, eadem opera præcipitat: planè nitrosi Clissi instar. Super Magisteria eorum ut plurimum ferè coloratur magis, quam evidentè saturatur. Metallicorum verò, præsertim perfectiorum & utrobique debito prius Menstruo dispositorum particulas promptius absorbet: magisque adhuc Mineralium (v. g. Antimonii aliisque nonnullorum puriora) Sulphura, &c. Uti solutionum & Exaltationum Analogia, [ad urinosorum Spirituum recentiores genuinasque adaptationes instituta] cuius [leviter inibi versato] haud difficulter ostendit. Et cum etiam in Febrilibus, aliisque affectibus, per se quodque sat sit efficax; nec solutorum istorum substantia aut sulphureitate admodum aut destructione sic alteratur: equidem hinc per Accessoria competentia, [præsertim si contractioris dosis efficacique fuerint,] eò magis semet exercere deprehenditur. Reliquum peculiarior fortè quispiam Salis Tartari spiritus, aut singularis iode, sed exoterici intermerata Aciditas, [ex condito Dissoluta per intimiores digestionem deferens, nec inter invertentium occursum deferens,] expectantibus varieque inquirantibus expedit. Nos ad institutum nostrum: & solitatum specialemque hujus in medendo usum revertamur. Non quod distincta pertractatione totum recensere, vel in certas Digestiones usque per chilifera Sanguiferaque Vasa, [sat aliàs penetrantem] committari sedeat. Sed tantum ut [in exemplum,] manifestaria aperiendi, detergendi, resolvendi, adeoque Diurctica Diaphoreticaque vis generalis, uni alterive graviorum Affectuum [inter quæstam breviter, & sollicitantium vel cooperantium accessum,] seorsim accommodetur.

Quantum in Hypochondriacorum nostrorum Arthritide vaga parsiq; solitarius, aut alternis vicibus Cinnabari (præsertim nativa, alias nervosorum hystericorumque dolorum insigni levatorio,) largiter interposita præstet; observatio inter continuationem (pro dosi .v. g. 20. 30. guttas propinando,) facile docebit. Etiam circa Purgantia; plerumque opis parum, at nova sæpe symptomata afferentia: circa Balnea, infusus aut fomenta, & citra reliquorum vulgiorum Topicorum pleraque, Contracturas ut plurimum citius, quam languentium membrorum vigorem suscitantia: præprimis citra illisiones illas piuguedinum, oclorumque hinc vel aliunde diversiformiter, compendiosissime alias ex Adipe, Cera, Sapone, &c. sequenti ratione paratorum: sc. super eorum s. q. cineres usque ad ipsum Retortæ collum largiter ingerantur; ita unica vice clarissima rectissimaque per arenam exeunt. Sed hoc incidenter.

In Hydrope Anasarca & (Catharticis alias rarius auscultante) Ascite, similiter successu per quam felici datur; præsertim Urinis (sua de causa) aquosioribus: egregieque tum pariter se gerit Arcanum illud duplicatum; etiam compendiosiori ratione parabile; Metallicam substantiam è dissoluto Vitriolo per Nitrum verè fixum atque lixiviosum, (ceu per accidens interdum obtingit,) totaliter præcipitando, & post filtrationem Sal per exhalationem collectum fundendo.

Quemadmodum cum Rubicundiores fuerint; inter alia haud parum adjumenti confert Antimonium Martiale Cachecticum: ex ana Antimonii & Limaturæ Martis saltem in scorias liquato & cum triplo Nitri postmodum detonato confectum: Nitri singulatam fixationem (cum elutriatus pulvis primitivo longè gravior sit) haud obscure ostendens.

In reliquis quoque Hypochondriorum affectibus, & eorum affectis vel productis, (resolventia, deobstruentia atque invertentia requirentibus,) neutiquam deles est hæc nostra Volatilitas: & quod nonnullorum Tincturæ atque Spiritus, (sive clissiformiter per Mineralium sulphureorum, Tartari, Nitri, &c. detonationem; sive congenerum Volatilium more, è certis Alcalium, Armoniaci, Tartari, Calcis vivæ, cornu cervi, Antimonii, &c. Mixturis quasi secreto destillati) interdum ad hyperbolem usque promittunt; sufficienter, & (sano sensu) vel usque ad Arthritidem (è sentina ista proficiscentem,) præstant; si pro morborum, ac circumstantiarum ratione cum judicio, ac præmissis vel interpositis (sicubi hic nonnunquam opus,) Evacuantibus, (Emeticis scil. correctionibus, Laxativis, Tartareis vel Aloeticis, Antimoniatorum accisis vel tertiatis dosibus, &c. (aut Martialibus aliisve Roborantibus exhibeatur.

Atque quo dictorum, quedam, nobis usatiora, aliquoties est istis hinc inde rogati,) data sic occasione annectamur: inter alia Emeticum præstantissimum & securissimum habetur; si (Tartari Emerici Absinthiaci M. Imitatione) saltem Croci Metallosum, sive Hepatis Antimonii vulgaris (& edulcati) Acidique Tartari ana, in duodecuplo Aquæ s. ferventis infundatur, & postquam per triduum super fornacem steterit, mediocriter ad Tartari dissolutionem ebulliat; liquor calidissime filtretur & ad dimidium evaporatus per diem reponatur. Crystalli hinc elegantissimi Nostri ad granum unum, duo, tria; alibi (ceu pro Distinctum conditione purgantium doses oppido variant, ad quatuor vel etiam quinque dari, sufficienter, quod suum est, expediunt: Mercurio Vitæ per Salis triturationem, aut Acidorum abstra-

ctionem correcto, longè securiores; & præ Eodem per Nitrum aliquanto fixatiori, præque Tinctura Antimonii tartarifata, certioris in singulas doses determinationis.

Tartarea abstergentia, (solitaria diversimodè acuat) aliunde nota sunt; & horum quodam etiam supra attigimus. Quod autem Sal tri Essentiale Specifici Purgantis, (oppido diversa, & ad Sal Tartari volatile ferè accedente ratione comparandi) titulo alicubi proponitur; detergente Saponariaque visaltem utrobique intelligendum est.

Inter Aloetica laxativa, uti liquor hinc cum aliquota Nitri fixi, imò etiam Rhabarbari, si liberæ parte (notabili amaritiei remissione) paratus, haud inefficax habetur; ita speciosiores adhuc Pilulæ, forma illa numeroque minutiori semet commendantes, postquam hactenus diverso; sed ut plurimum suppresso, (cuius forte sua de causa,) compositionis modo hinc inde dispensatæ fuerunt, curiosiores in sui pervestigationem, aut imitamentum saltem quoddam præcipuè traxere. Atque hinc alii quidem modò Aloën crudam vel Rosatam violatam, aut aquoso vel ardenti menstruo simpliciter negotiosive Extractam; modo Aloëphanginas qualvis Tartareas, Ammoniacales; Mariscostinas consimileque recentiorum Pilulas Diagridio, Resina Scammoneæ vel Jalapii, vel Trochiscis Albandal aut Colocynthidis Extracto aliquantam acuerunt; Alii novas Massas (adjecto Ammoniaco, Myrrha, croco Tartaro, Sulphure, imò Marte quoque absinthii Carduique benedicti Extracto atque Sale, cum vel sine Rhabarbaro, Agarico &c.) composuerunt; aut jam pridem Usuales; imò ipsas Pestilenciales (paulò saltem auctiori Aloës pondere,) etiam Michridatio nunc, Essentiaive amaricantium vegetabilium subactas denuo (variato nonnunquam nomine) dispensarunt: Alii verò, cum Aloën quasi puram putam, citra drasticorum stimulum, exiguo sic pondere, eodem nihilominus effectui nonnullibi propinari perciperent; secretissimum seu Menstruum seu præparandi modum præsupposuerunt. Caterum, ut acuatæ illas, sub diverso Locorum Autorumve nomine, (modo brevi ante, modo post cœnam hactenus, & impune quidem) datas, durioribus forsân ileis, suoque interim in precio relinquamus; &c. circa ultimum vero, tanquam Hypochondriacis, præsertim tenerioribus, cerevisiæ adfectis, &c. longè convenientius, meritoque commendabile) genus hæsitantibus, per observationes & varia experimenta nostra, rem paulo faciatius planiorem: principio certum est, quod selectioris (ceu omnino requiritur,) Aloës Epaticæ vel Socoterinæ pars gummea, seu aquoso Menstruo resolubilis, ad alium isthoc modo sollicitandam, præ resinosa parte, vel Extracto cum Vi præparato, longè aptior; ac Tenebræ hæmorrhoidalis respectu cæteris paribus pene securior sit: quodque officium hoc suum etiam sub minima quantitate præstet: uti aliàs succus ille singulari vi stimulante pollet, eaque in nostrorum quoque hortorum planta excus deprehenditur. Quod porò Accessorium pro cuiusvis opinione potius quam intimiora necessitate, sub Corrigenarium Dirigentiumve titulo varieformiter additorum (pleraque supervacanea sunt; & molem saltem in ejusmodi quidem destinatione) augeant: quemadmodum & Purgantium, mediocrium, v. g. Rhabarbari, Agarici, Mechocannæ, &c. Extracta in ampla debitaque dosis laetis aliàs languida, sub grani parte profecto nil aut parum huc conferentia.) Proinde qui secundum ejusmodi præsupposita paulò penitus pensabit, quantum

Gummæ istius Aloëtiæ partis usualibus Pilulis, ab Aloë, hanguinis usque ad recentissimas laxativas compositiones insit; haud amplius forsitan demirabitur, ejus solum grana quædam ab additamentorum nimia mole, resinositæque propria libera pari cum effectu, adjuetis fluidioribusque dari; siquæ hinc supradictum Extractum, diligenter & vel simplicissimè vel adjecta simul, (inter extrahendum) Scillæ vel Ari non præparati, simillimæ (citra notabilioris molis accrementum) stimulantium particula confectum, cum Elixirii Proprietatis (haud adeo acidi,) Essentiæve Absinthii liquidæ parum alcalisatæ, tanquam consimilis deterforii,) tantillo postmodum subegerit, massam nanciscetur, cujus (pro constitutionis, &c. ratione,) granum unum, (tenerrimis interdum etiam dimidium,) duo, vel nonnunquam tria in exiguas, adeoque resolutu sic faciliores pilulas (v.g. quatuor præterpropter ex uno grano,) formata paulo ante vel nonnullis quoque post cœnam sumpta, sequenti die alvum salubriter laxando expediunt.

Circa accisas Antimoniatorum Emeticorum doses similiter alias certum est; quod licet v.g. Oxifaccharum (simplicissimè, citra aliorum vegetabilium accessum, è vulgari Metallorum Croco cum Aceto simplici paratum,) aliaque hujus generis (Antimonio tantum medicata, ideoque suo modo hinc mitiora) Vomitoria effectum, ob justo parciores dosi, haud fortiantur; nihilominus tamen subtractoria quædam, quamvis minus perceptibili, levi talem nonnunquam nausæ complicata, actione sæpenumero plures Hypochondriorum aliove effectus admodum levarint. Et quod fortuitarum ejusmodi observationum ductu, porro data opera non sine fructu certis in circumstantiis exhiberi queant. Equè ac sub pari procudubio operandi modo Sulphura Antimonii & ejus generis Panaceas, ipsasque Tincturas, hunc in finem profectò optimas siue non nimis fixis, verum mediæ quasi naturæ præparatis, & vel Aceto s. è communi Metallorum croco, &c. separatæ fuerint) feliciter, modo cum judicio, dari vel continuati certimus.

Inter Martialia, quemadmodum ubi adstrictiora vis magis requiritur, singulariter præ aliis confert Tinctura cum Spiritu Euginis simplici aut Sulphurato extracta; vel etiam Florum è coagulata Martis (in Spiritu Salis) solutione ritè sublimatorum, aut ipsorum quoque Salis Armoniaci Fluorum Marti alium nigrorum ultimorum (per deliquium dissolutorum) Liquor; instillata s. q. Liquoris Terræ foliatæ (cum per se adstringentissimus sit) infractus & exalatus; &c. Ita dum aperire magis est in animo; forsitan efficacior (reliquarum tantum non omnium promissa expertis) vix invenitur, præ Tinctura Tartarifata; non quidem deside ista, per simplicem ferri Tartarique coctionem confecta; sed elegantius è Vitrioli Martis factitii Tartarique depurati anatico pondere, aquæ s. ad mellis consistentiam cocto, & hinc sextuplo vel octuplo Spiritus Vini (totaliter ferè) dissoluto; per mediocrem exhalationem) præparata. Liquor enim relinquitur, qui vel sine quodam alio remedio Icterus nostratum perfectè curat, cachexias corrigit, Spleneticos affectus insigniter mitigat, &c. Sed hæc in transitu.

Redeamus ad Spiritum nostrum Volatilem; qui porro tum per se ac solitariè præstans exhibet Diaphoreticum; tum aliis quoque hujus generis Spiritibus v.g. Armoniacali urinoso, Cornu Cervi sale proprio post debitam rectificationem saturato &c. Essentiæ Camphoræ vulgari, aut (dissoluto ejus subtriplo in Spiritu Vini Tartarifato) saturatiori, aliisque

competentibus nec ejus naturæ adeo adversantibus Diaphoreticis Alexipharmacisque Tincturis, Essentiis, ipse Mixturæ simplici, aut (frequentiori nunc in compositionis tamen & effectus fundamento parum hinc distanti) Tincturæ Bezoartice hæud inconvenienter eodem fine associari poterit, Atque hujus generis Volatiles essentificatique Liquores, &c. (ut incidenter tactos breviter adhuc persequamur,) pro Diaphoresi (sed circumspicte ac cum delectu, præprimis si valdè Camphorati fuerint,) dati, in pleurisque Malignis (adjunctis interea vel interpositis, pro circumstantiarum ratione, Absorbentibus temperatis, Invertentibus, Anodynis, &c.) equidem plus præstant, quam nominatissimum illud Bezoarticum minerale, siue simplex; (aliàs longè compendiosius è Mercurio Viræ, vel crudiori quoque Sulphure Aurato, per simplicem solum sextupli Spiritus Nitri abstractionem conficiendum;) siue speciosius adhuc Solare, (propter Auri in dosi tantillum; aliquibus Antimoniali Cinnabari forsitan similiter tinctum;) aut Joviale quodlibet; cum affini suo, (sed nec certo semper nec propriè dicto (Antihæctico; ac Maximo illo (missis ambagibus, saltem per unicam primò destillationem, & filtrati postmodum Liquoris adjectique Nitri fortem abstractionem, æque feliciter præparando) Sudorifero: siquæ alia hujus cœtus fixiora sunt, communiter commendatissima, sudoremque largiter quidem moventia, intensioris autem Malignitatis seminaria & confectaria, v.g. Anxietatè præcordialem, deliquia, dolores vagos &c. rarius sic evidenter compescentia: si Nauseæ atque Vomitus ab initio symptomatice complicati, & solum fixiora illa ex Antimonio, opposita fuerint malum [quod supranotatis Alexipharmacis volatilibus, solitariis Anodynorum tantillo exaltatis, faciliè sopitur;] sæpenumero tum, [non sine præpostere coctionis, aut diuturnioris asservationis inculpatione,] quasi magis exasperantia, aut saltem longè minus inibi conferentia: in ejusmodi morborum congressu hæud rarè crudis vel simplicissimè præparatis [ex Animætorum, Fossiliisque classe] Diaphoreticis Alexiteriis [simul evidentius absorbentibus aut præcipitantibus,] ferè posteriora, uti sunt Cervinum Cornu, per coctionem, [si perfectum vel potius Decidum fuerit; sin autem Mollicellum] per debitam in vap. Balneo exiccationem, [verum non sine diffusiori hinc, adeoque ingratiiori dosi mole, præparatum; imò ipsum nonnunquam muliercularum Ustum, hæud penitus [in calciformi licet, sua congenerumque naturâ,] evanidum, aut per accidens solummodo hydroticum: item Terræ sigillatæ; Unicorni fossile; & ubi suppetit, Cera-ceum; quod tamen inde ultra modum singulare neuti-quam hic deprehenditur: cœu Rhinocerotis [selectius quoque] Cornu, nec per se, [quamvis in largissima dosi,] nec Chymicè præparatum, aut congenerum modo destillatum, Cervina, [uti multoties experti sumus,] adeo superat, Ebur Philosophicè nunc calcinatum, hoc in genere planè deses; Lapis Bezoar ab aliis satis jam notatus est. Ipsa Viperina [cruda, aut curiosius in Magisterium, Extractum, vel Essentiæ redacta,] ni debita proportionalique quantitate, [unde profectò Theriacalis dosi ob Unum Trochiscorum, vel quasi Viperinorum granum, sub eodem tamen Opii pondere, tantum colubrinum, gravidarum noxa, Purgantium suffla-men, & quid non? indifferenter æstimari nequit: præterea verò exaltantium vel penetrantiorum, v.g. Armoniaci, Nitri fixi &c. stimulo dentur, supradictorum volatiliorum pollentiæ hæud infrequenter hic cedunt. Sed quid Dissertationem tantum scribi-

mus, hic finiamus; alia quæ hinc inde interferi vel latius diduci poterant, novis forsitan pagellis reservantes. Si quibusdam hæc placuerint, gratum erit; & de ejusmodi materiis pridem perfecta, (quæ Prodro-mo quasi materiam de se dederunt,) Deo volente sequentur. Sin displicuerint, & data sic occasione secretiores commodioresque Volatilitarum Tattarearum modi proponentur; Similiter gratum erit fun-ctis vice coris acutum reddere quæ Ferrum valet, exors ipsa secandi. Sin tandem inani solū contradi-ctiori censuræ, verè bonaque intentione dicta sub-jicienter; tempus & valetudinem Topicis litigis in personalia plerumque postmodo desinentibus, & in singulis forte columnis suas sibi responsiones hic in-venientibus, nequaquam consumemus. Apprimè nobis hæcenus placuit Exteriorum nunc studium, qui observationes & experimenta sua ingenue literato or-bi communicant. Dum autem Nostratium quam-plurimi, quieri existimationique suæ consulentes, divulgatorum traductiones haud immeritò reformi-dant, sit, ut elegantissima singularissimaque inventa, magno boni publici damno, hinc inde suppriman-tur. De cætero breviter saltem & conciso scribendi genere materiam nostram pertractavimus: cum per supervacuas amplificationes Volumen condere nostra non patiatur Conditio. Quisquis paulò attentius & sedendo quasi pagellas hæc, si mereri videbuntur, perlegerit; sub aliquali laborum Chymicorum noti-ria, sententiam nostram haud difficulter (inter qua-lemcumque è brevitate natam obscuritatem) adse-quetur. Ut autem aliquid, vel in interlinearibus in-veniat, quod legisse forsitan juvet; errataque (uti ho-minibus obrepunt,) ex parte compense, perquam optamus.

TAVRVS, vid. sub titulo Bos.

TAXUS ARBOR.

Nomina. Taxus Ger. Park. I. B. C. B. & omnium fere Botanicorum Smilax Dioscoridis lib. 4. cap. 80. *pl. Theophrasti* 3. hist. 3.

I. B. Taxus perpetuæ frondis arbor, procero stipite, Abieti & piceæ similis. Folia abietis foliis ortu & numero similia, dimidium culmum lata, non ræterea ut piceæ, ab Abiegnis in hoc dispescuntur quòd infir-miora minùsque rigida, neutiquam explicata folio-rum servant agmina, quin eodem vergentia ferè coin-cidant: jam vero si singularia, spectes Taxi folia, sunt ea Abiegnis acutiore mucrone donata, supernè atro-viròre splendentia, infernè nitore destituta, unicoloria tamen & viridantia, nervo secundum longitudi-nem decurrente; cum Abiegnis elatiorem averfa parte habeant costam, coloreque glauco sunt prædita, gu-stu amaricante. Porro autem in extremis ramulis cir-cumquaque inter folia oriuntur perpusilla sed copiosa capitella, sublonga, squamata, ex quibus veluti flos-culi emicant, Juniperinis ferè similes, ex virore pal-lescentes, qui deinde in meros & muscosos apices fa-riscunt. (Cæsalpinus Taxum flosculos ferè amentaceos inter folia sine fructu tradit.) Circa mensem Augustum, uti observavimus, fert baccas ex calyce ita emergen-tes, ut simile quid habere videantur cum glande; post-quam verò maturere, quod sit mense Novembri, nihil plane simile habent cum glande, sed figura quo-dammodo referunt fluorem vitis Idææ, quippe parvo, virente atque squamato calyculo, brevipediculo ad-nato fructus inhæret, grano Juniperino Major, super-nè apertus atque hians, veluti ex carnosa cute con-stans, colore pulcherrimo & splendente coccino con-spicius, intus cavus, succo præditus viscido ac dul-

ci, in quo granum latitat pipere minus, nec exadè rotundum, sed leviter compressum, colore inter pal-lum & spadiceum medio, corrice duriusculo, medul-lam continens saporis non ingrati. Hoc granum fru-ctus capacitatem non adimplet, sed undique ferè in-tactum à fructus pellicula in medio situm est, baccæ imò adhærens, haud secus ac ipsa ex pediculo ena-tum. Suspicio autem tum cum longiusculæ fuit, & glandis formam aliquo modo demonstrant, nondum maturas esse: jam verò maturiores aperiri, & pro-pter hiatum figuram acquirere rotundiorum. Ma-teries bicolor partim rubet, partim ex albo fla-vescit.

Smilax Theophrasto arbor est glandifera è genere quercus, cavendum ergo ne confundatur cum smilace Dioscoridis seu Taxo.

Taxus in montosis, saxosis & præruptis locis ori-tur: in Occidentalibus & meridionalibus Angliæ par-tibus, in montosis sylvis & sepibus frequens est. Ma-jores nostri in cæmiteriis Taxos plantarunt, ob æter-num (ut puto) frondis virorem, uti Symbolum ef-fert immortalitatis & æternæ vitæ, quam ibi depolita cadavera post resurrectionem expectabant.

Vires. Hujus arboris fructus perniciosos esse & le-thales non veteres tantum, sed & è neotericis pluri-mi tradiderunt. Dioscorides eos qui baccas ederunt in alvi profluvium incidere scribit: Idem alibi Taxum potam frigiditatem totius corporis inducere, suffoca-tionemque ac celerem mortem.

Refert Cæsar, lib. 6. de Bell. Gall. Cativulcum Eburonum Regem Taxo (succo epoto) se exani-masse.

Sunt (inquit Plinius,) qui & Taxica hinc appel-lata dicunt venena, quæ nunc Toxica dicimus, quibus sagittæ tinguntur. Verum ostendunt Vossius & Jo. Bo-dæus Toxicum aliud veneni genus fuisse, cervarium Fe-sto dictum, quo Barbari sagittas inungere soliti erant, ut lethalia vulnera inferrent. Toxicum ergo à Tæx dictum est.

Mathiæus etiam affirmat in Tridentinis montibus non veterina solum (quod veteres tradiderunt) sed ru-minantia etiam animalia devorata Taxo interire: Pa-stores etiam & lignatores cum has edissent in febres ardentes incidisse & alvi profluvia, non sine magno vi-tæ discrimine.

Testatur etiam I. Bauhinus à fide dignis hominibus sibi affirmatum in montibus Burgundiæ foliorum ut etiam corricum esu mortuos boves & vaccas: & à Jo. Lurzio Pharmacopœo Kirchenheinenfè relatum in ædibus suis Turturem album cum torquæ nigra baccarum esu periisse, & in pago Oberentzingen Asinum de-gustata Taxo subito mortuum.

Nos è contra taxum immerito in crimen addu-ctum suspicamur. Siquidem Lobelius ejus baccas in-noxie puerulos in Angliâ esitare affirmat, seque gu-stasse sub hyemem non ingrato sapore, sed fatuo vel subamaro, ibique porcos passim eas tanquam glandes comesse. Gerardus etiam nostras tum semetipsum, tum plurimos è condiscipulis suis eas ad satietatem usque sapius ingessisse narrat, nec sub umbra tantum arboris, sed in ejus ramis aliquoties dormivisse, nec tamen minimum inde nocumentum aut incommodum unquam sensit. Sed & Camerarius Taxum innoxiam esset tradit, acinos ejus rubros avide expecti ab avibus, sed inde attonitas reddi, quæ faciliè postea capiuntur, vel ergo falsa sunt quæ de Taxo tradunt veteres, vel æris constitutio vel conditio Soli hanc in ejus quali-tatibus diversitatem efficiunt. Fateor equidem arborem triste vivere, ejusque melancholicum (si ita loqui li-ceat) adspæctum malignam aliquam qualitatem ei inesse subinnuere; eoque tempore quo florere incipit & sue-

& succo maximè prægnans est, jumentis noxiam esse posse, nihil tamen affirmo: nam & veteres ipsi de qualitate noxia & lethifera hujus arboris sibi parum constant. Theophrastus fructum ab aliquibus hominibus innoxie mandi scribit: folia etiam jumentis lethalia, ruminantibus nequaquam. Plutarchus eo tantum tempore noxiam esse tradit quo florere incipit. Dioscorides non ubique lethalem & venerosam esse innuit, cum de Italica & Narbonensi tradat lethales esse. Italiam baccis, ac etiam umbra. Fructum edentes aviculas nigrescere mirum. Taxum etiam Apibus noxiam esse nos docet Virgilius.

Sic tua Cyrenæ fugiunt examina Taxos.

Et alibi jubet.

Ne propius tellis Taxum seras.

E Taxi ligno laudatissimi arcus fiunt, etatque olim in hunc usum expetitur maximèque celebre.

Aureos Taxi torquentur in arcus.

Virg.

Ligni portio materies, quo tufescat quamplurimis intercurrentibus venis incorruptaque sit, lignatiis fabris maximè expetitur, & plurimi sit, præsertim concinnandis mensis & hastis relique conficiendis. Germani hujus afferes ad sua construenda hypocausta non exigua sibi comparant pecunia: ex hoc etiam ligno parare solent Saltzburgerles opifices pulchros Scyphos, cucurbitulas, Epistomia, aliaque subtilia, elegantia & egregia utensilia, quæ per totam Germaniam distribuuntur. Addentes rotarum molendinarum postes terræ infigendos, vehiculorum axes, nulli ligno secundum esse affirmat D. Evelynus: commendat idem ad Musica instrumenta, testudines, rotas, trullas, aliaque curiosa.

Quæ de alio genere Taxi in horto Pisano cultæ habet, cujus folia abiignis similiora sunt, arbor ipsa fruticosior seu frondosior; frondibus crebris à radice sursum instructa; adeoque densa ut sepes potius quam arbor videatur, quamvis procera admodum sit quamque Taxum Antiquorum mortiferam existimat, cum D. Belluccius horti Pisani præfectus hortulanos qui eam interdum detondere solent, non ultra dimidiam horam una vice Tondentes durare posse affirmet, tam gravem eis capitis dolorem arbor incutit; odore noxio & vitoso quem caesa expirat; vide apud ipsum *Rajm.*

TAXUS ANIMAL.

Circa ejus descriptionem vid. quæ adducuntur sub titulo *Canis*. Hic tantum pauca circa ejusdem partes officinales ex *Schrodoro*.

OFFICIN. ex TAXO.

1. *Integer incineratus*, 2. *Sanguis*, 3. *Adeps*.

Vires.

1. *Taxus integer* incineratus cum successu exhibetur pulmoniacis, sanguinem excreantibus.

2. *Sanguis* pulverisatus lepræ convenite dicitur, destillatusque pesti subvenire.

3. *Adeps* præcipue Officinalis est, qui uti paulò crassior, ita & paulò calidior ac efficacior est suillo. Renum doloribus auxiliatur, à calculo subortis, (*inun-ctus vel in Clysmate adhibitus*) febrilem æstum mitigat, contracturis ac imbecillitatibus artuum succurrit, cum adipe vulpis cativæ sylvestris.

Manges. Bibl. Pharm. Tom. II.

TEDA AROMATICA, vid. *Suffius*.

TELA GVALTERRI, vid. *Sparadrapium*.

TELEPHIUM.

Telephium dictum volunt, quod ulceribus malignis & deploratis, qualibus Telephus Myiæ Rex ab Achille vulneratus consenuit, (eam ob rem etiam Telephia vocantur) auxiliatur. Fabario vulgo à foliorum cum faba similitudine, officinis crassula major appellatur. C. B.

Folia in Telephio non conglobantur in Capitula, ut in sedo majori, nam à prima statim germinatione, excaulescit. Flores velut in umbella penta petali, quibus succedunt Theculæ plurimum quinque.

Vires. Vulneraria est & astringens. præcip. usus in consolidanda intestinorum erosione per dysenteriam introducta, in curanda hernia, in ambustis medendis: (aqua destillata exhibita, aut radix cum melle in vino tota ac pota.)

Magna dolores sedandi facultate pollet hæc herba, idque tam in recentibus vulneribus, quam in sordidis & inveteratis ulceribus efficiunt folia tusa & imposita.

Herba sub cineribus tosta & cum adipe suillo mixta & imposita paronychias egregie sanat.

Radix Telephii recens appensa (aut aliquot saltem ejus nodi, prout nodi plures vel pauciores in ano protuberant) cum filo in dorso inter scapulas, hæmorrhoidum dolores ilico levat simulque cum marcescente radice tabescit & evanescit omne tuberculum. V. Ephemet. German. Ab. 2. observ. 195. ubi D. Vvedelius Amuletum hocce miris præconiis celebrat, ejusque efficaciam duobus exemplis comprobatur. Nos ut non negamus Amuletis aliquam vim inesse posse, ita illis non multum fidimus. *Rajm.*

TEREBINTHINA, vid. *Terebinthus*.

TEREBINTHUS.

Nomina. Terebinthus *Ger. l. B.* vulgaris *G. B.* angustiore folio vulgarior *Park.*

l. B. Arbor est Terebinthus, sed quæ, Clusio teste, magna ex parte fruticat, ramis longis, tassis, cinereo cortice rectis, nec ea quidem, quantum animadvertimus, frondis suæ per hyemem tenax. Primus ferè est florum vernò tempore apparatus, quos è ramulorum tuberculis copiosos in longo racemo producit, meris stamineis fibris purpurascensibus contextos. Hinc se explicant in alam folia, quanquam non semper æquali situ, laurinis similia, sed magis obtusa: (pistachiis & ejusdem odoris Clus.) conjugatim ut in sorbo nascentia, subrubentia, quæ crebris obliquis nervulis percurruntur, fructus delapsos flores excipiunt, parvi ex rotundo oblongi rubentes, carpobalsamo offic. pæne similes, resinoso lentore viscosi nucleum continentes (ex Cæruleo virescentes tactu pingues & resinosi, manisque dum colliguntur inficientes.)

Fert etiam vindemiarum tempore concavos quosdam folliculos seu vesiculas, foliis & ramulis inhaerentes; quales ferè in ulmi foliis nascuntur, sed pallido aut purpurascens colore: interdum etiam extremis ramis oblonga & cartilaginea cornicula (tubentia, quatuor, quinque aut sex digitos longa, aut etiam longiora *l. B.*) varia formæ excrecentia concava, quæ (uti etiam folliculi) aperta lentorem quandam continere deprehenduntur, cui permixta cinerea & foliginosa excrementa, atque exigua animalcula alata, horum corniculorum meminerunt omnes ferè qui de

M m m m 1 hæc

hæc arbore scripserunt: nihil autem aliud sunt quam excreſcentiæ quædam ab infectis folia & ſurculos compungentibus. Et ibidem ova ſua deponentibus, excitatæ, ut inſerviant matriçum ſeu uterorum loco in fovendis & excludendis fœtibusque editis alendis & protegendis, mirâ naturæ providentiâ.

Adverſariorum auctores Theophraſtum [ut puto] ſecuti, Terebinthum ſemper virentem & perpetuis foliis eſſe ſcribunt. Verum Bellonio Rauvſſio, Cæſalpino, Cluſio, teſtibus *αὐλοβάτους & ἀξιοπρεπέους*, folio deciduo eſſe affirmantibus omnino abſque hæſitatione credendum.

Terebinthus libenter provenit locis ſiccis, Lapidosis & ſoli expoſitis, ut teſtatur Matthiolus. Autore Dioſcoride in Judæa, Syria, Cyprio, Africa & Cycladibus inſulis. Cluſius in plurimis Luſitaniæ, Hiſpanicæ & Galliæ Narbonenſis locis, ſponte naſci tradit, ubi interdum in arborem adoleſcit, ſed maxima ex parte fructicat. Addere potuiſſet & Italiæ, ubi nos eam obſervavimus at nuſquam, quod noverit Cluſius, commemoratis locis reſina è Terebintho elicitur. Lobellio tamen Terebinthi arbores in Valena ſylva Monſpelientium, ferro vulnuſculiis inſectis ſæpius non paucam Terebinthinam exſillarunt lucidam. Bellonius in Syria & Cilicia copioſam inveniri, ex qua gummi colligitur, quod vendendum ferunt Damalcum: quod vero in Cairo venditur adferri ex regione Turcis dicta, Aſamia, i. e. Meſopotamia & Aſſyria: florēt Monſpelii meſe Aprili Septembri cum fructibus I. B.

Vires & Uſus. Terebinthi folia, fructus & cortex (tradente Dioſcoride) qua pollent adſtringendi vi ad eadem, ad quæ etiam lentibus conveniunt ſimili parata modò, ſumptaque. ejus fructus eſculentus eſt, at ſtomacho noxiuſ: urinam verò ciet & excalefacit. Eſt & ad excitandam venetem aptiſſimus. Ex vino verò potuſ contra phalangiorum morſus prædeſt. Semen Plinio in capitis dolore bibitur.

Bellonius teſtatur veterem morem in comedendis ſeminibus Terebinthi nunc adhuc durare in Cilicia & Syria, ſibi que aliquando ruſticum Arabem occuriſſe ducentem Camelum Terebinthi fructibus onuſtum, ut Damalci venderet.

Species ſunt Gallæ, magnitudine Avellanæ, intus cavæ provenientes ex excreſcentiis foliorum Terebinthorum maſculorum. Hos circa finem Junii colligunt ruſtici Thraciæ & Macedoniæ, & carè vendunt ad tingenda ſerica ſubtilia diverſis coloribus in Urbe Bource i. e. Pruſa Bithyniæ, colliguntur autem vere, cum primum efformatæ gallarum magnitudine ſunt: quo tempore niſi colligerentur in longitudinem ſemipedalem excreſcerent ad formam Cornu. Eum duntaxat in uſum 6000. pondo quotanniſ inſumi.

Terebinthina vocata, deſcribente Cordo, eſt Terebinthi arboris reſina, colore candida, ſubſlava, vitrea, aut candida Cæruleum colorem affectans, interdum pellucida, quæ friata in plurimas micæ teritur, mox lentefcit & glutinoſa fit: odorem habet acrem, ſuavem, aliquantulum gravem, & lariçæ reſinæ non diſſimilem, præſertim, manibus tractata & prunis impoſita, guſtu modo amareſcit, & inter dentes lentefcit, iis dum maſticatur adhærens. deſtillat hæc primum liquida, deinde paulatim areſcit; ſiccam impoſtores Thuſ ſeu inſenſum vocant, & pro Thure vendunt: Thuſ autem verum Olibanum vocant, non intelligentes hæc duo vocabula, alterum Græcum, alterum Latinum ejusdem rei nomen eſſe.

Reſinas omnes (Authore Dioſcoride) antecedit

Terebinthina, proxima huic lentifcina. Galenus lentifcinam præfert. Quomodo hi conciliandi vide apud I. B. in hiſt. pl. Lib. 3. Cap. 20. & C. Hofmannum.

Vis autem reſinæ cuiuſvis [Dioſcoridi] molliendi, calefaciendi, diſcutiendi, diſſipandive, & expurgandi. Tuſſi ac tibi conveniunt in eclegmate, per ſe aut ex melle; quæque ex pectore educi oportet expurgant, urinam quoque movent, cruda concoquunt, & ventrem emolliunt: ad agglutinandos palpebrarum pilos conferunt, itemque ad lepras cum æruginē, ſutorio attramento ac Nitro: ad aures denique ſanie manentes cum melle & oleo, nec non ad genitalium pruritum ſunt utiles, emplaſtris quoque; malagmaris ac acopis admiſcentur, & per ſe illitæ aut impoſitæ laterum doloribus utiles ſunt.

Galeno cum adſtrictione moderata adjunctam habet amaritudinem quandam Terebinthina, per quam magis etiam quam maſtiche digerit: ob eam qualitatem ineſt & abſterſio, tanta quidem ut & pſoras ſanct: iſdem facultatibus & ventrem movet.

Recentioribus, purgat thoracem ab omni immunditie, item jecur, ſplenem, renes & veſicam. Conſert veteri tuſſi, ſpirandi difficultati, ſputo ſanguinis purulento, vertiginofiſ, calculoſiſ, & peculiariter etiam Iſchiatiſ, podagriciſ, Chiragriciſ: aperit, mundat, calefacit & roborat nervos.

In ſpecie utiliſſima eſt nephriticis & calculoſiſ. Hinc practici in curatione arenularum poſtquam mitetactum eſt ſymptoma, præcautionis ergo utuntur Terebinthina, ſed cocta ut dicunt, ut minus calefaciat, magis adſtringat. Idem fit in iſchiade, paralyſi, arthritide data bis in ſeptimana, vel illora, vel lora in aqua Cichorei. Hofm. Magnæ autem ipſius laudes in podagra & omnibus articularibus malis, ſi accipiat, ut docet. Avicenna, quantitas nucis avellanæ ſingulis maturiniſ à jejuno, nec mirum quod calculo conſert etiam podagræ prodeſſe, cum cognati ſint hi morbi, & eandem cauſam continentem ſeu materiam habent, unde non raro in ſe mutuo tranſmutantur.

Exhiberi poteſt 1. per ſe, placentalis quas oblatas vocant involuta. 2. in aqueo liquore adjecto tantillo vitelli ovi, ſic lacteum ſci. exhibet liquorem, 3. inſpiſſata aliquantulum, & in pilulas reducta. Verum ob evaneſcentiam ſpiritus præſtant modi priores. Schrod.

N. 1. Terebinthinam veram officiniſ eſſe ignotam: officinalemque eſſe vel reſinam lariçeam, vel reſinam Abiegnam è tuberculiſ abietum novellarum collectam.

N. 2. Odoriſ vim manere etiam in uriniſ utentium, quæ violas quodammodo redolent, audivi [inquit C. Hofman.] qui diceret in doloribus partium genitalium præſentiſſimum eſſe Anodinum.

Verno tempore ramulorum pullulantia tenella Terebinthi effracta lagella, ipſo etiam Narbonenſi aut Monſpelienſi agro inſtar ficulnæ arboriſ lac ſtillant; quod conchiſ exceptum & adſervatum in limpidiſſimum tenacem, reſinoſum laticem abit, qui dum recens eſt, id eſt, in muſto, ut [Plinii verbis utar] in leneam veſtem fuſuſ neque maculas facit, neque ſreſcetur veſtigium aut notam relinquit; ſeneſcens tempore craſſeſcit, nec abluitur niſi ovi vitello addito. Lob. de Baſſamo.

Terebinthina deſtillata, ſeu oleum Terebinthina proximum eſt oleo Baſſami, vel parum calidior, & conſert omnibuſ ægri tudinibuſ frigidiſ, ſed præcipue nervorum.

Oleum

Oleum Terebinthinæ destillatam singulare solatium præbet in doloribus nephriticis intus sumptum: exterius illitum, & calida manu diu affictum parti dolenti in nervorum contractionibus, tensionibus aut relaxationibus egregium auxilium præbet, præsertim si cum spiritu vini defecatissimo mista & conquassata adhibeatur. Modum eliciendi hoc oleum vide apud Ebrodunensis histor. plant. auctores lib. 3. cap. 20. vel etiam in Pharmacopæis vulgaribus.

Sunt qui Terebinthinam in Cerevisia infundunt, & simul defervere sinunt pro potu ordinatio in calculo, viscerumque obstructionibus. Schrod.

Dioscorides etiam vinum Terebinthinum parare docet à bacciferis ejus ramis rufis & in multo fervefactis: quod quoniam in desuetudinem abiit, omitto.

Apud veteres tam commendabiles erant Asparagi Terebinthi, ut etiam in hyemem reservarentur: Rajus.

Hæftenus Clariss. R. A. V. S., jam de Terebinthina aliquid rursus adjiciemus ex SCHRODERO ab Hofmanno annotatò.

Resina Terebinthi s. Terebinthina Cypria.

Terebinthina in officinis Resina est liquidiuscula, referens ballamum sive oleum crassiusculum, colore ex albo flavescens, sapore acris, lenta, cutique tenaciter adhærescens. Estque duplicis generis. Resina scilicet Terebinthi & Resina Laricis. Resina terebinthi προιον τερεβινθιν. Resina Terebinthina (Avicennæ gluten Albotin) est ea quam officinæ terebinthinam Cypriam, Venetam, Paracelsus Lorcher appellat. terebinthinam Resina, Maish: ter. vera, C. B. I.

Optima censetur clara, pellucida, alba, vitrei coloris in cæruleum vergentis, acris & odorata. Præfertur item quæ ex Chio insula affertur, post hanc Lybica, tum Pontica, tandem Cypria, Syriaca, Judaica, Arabica. Terebinthus arbor est mediocris magnitudinis, in plurimis regionibus sponse familiaris, v. g. in Hispania, Syria, Sicilia, &c.

N. Terebinthinam veram officinis esse ignotam, autumat Clusius, officinalemque esse resinam abiegnam à novellis abietibus collectam. Videbis class. I. in abiete.

Vires. Facultates Terebinthinæ ex lib. 2. sub titulo de Resinis hæc referre licet. Excellit enim Terebinthina præ reliquis resinis, unde & facultatibus præpollet. Confert intrinsecus, præcipue in tussi aliisque pulmonum affectibus (cum melle,) in urina ac alvo cienda: convenit Epatis, Lienis, Renibus, Vesicæ, expectorationi putulenta ac phibisi incipienti succurrit, calculum pellit, arthriticos affectus juvat, iterum à saburra liberat. Extrinsecus usitatio ex terebinthina laricea qua hujus vicaria in defectu esse potest, viribus iisdem pollens, sed èmbecillioribus.

N. 1. Lavari solet in aqua appropriata & hinc exhiberi.

N. 2. Exhiberi potest 1. per se, placentulis, quas oblatas vocant, involuta. 2. In aqueo liquore, adjecto tantillo Vitelli ovi, sic aqueam scilicet exhibet liquorem. 3. Inspissat aliquantulum, & in pilulas redacta. Verum ob evanescentiam spiritus præstant modi priores, vel si placet, fermentur modo sequenti.

Pilula de Terebinthina cum Rhab.

Pilula Podagrica.

℞. Terebinth. Cypri. ʒi. coq. in ∇ chamæpyr. dum albescat, hinc adde Rhab. opt. pulv. ʒvi. Iv. arthet. Succin. alb. ana ʒij. Glycyrrhiz. ʒj. M. & F. Massa.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Vires. Faciunt ad removendam materiam calculi & podagr.

Dosis ʒss. ad ʒj. &c. Cl. Greg. Horst. part. 2. lib. observ.

N. Crato easdem habet, sed paulo secus, cons. 143. Schroderus.

Resina Terebinthi seu Terebinthina Cypria) Vera Terebinthina ex Terebintho Arbore habetur & ex Chio insula defertur, Chia inde appellata. Post hanc Lybica probatur, deinde Pontica. Veneta Terebinthina non Terebinthi Arboris, sed vera Abietis resina est, licet vulgari sit elegantior.

Terebinthus est arbor contorta, fructuosa & mediocris magnitudinis, caudice crasso, ramis multis, oblongis, foliis fraxini modo longis, sed crassioribus & pinguioribus, flores admodum parvi sunt, muscoli & purpurascens, fructus exigui baccarum ritu racematis coherentes, rotundi, oblongi, pingues ac resinosi, odore grati.

Nascitur copiosa in Chio, Cyprio, Syria, circa Idam ac Macedoniam.

Vires.) Hæc Terebinthina Cypria reliquis præfertur resinis ob facultates & vires, quas præstat egregias in tussi & aliis pulmonum affectibus diuretica, juxta ac alviduca est, Unde in internis exulcerationibus ventriculi, intestinorum, Epatis ac lienis &c. notabilis est energiae, exhibita cum vitello ovi soluta in brodio calido, item in forma pilulari. Hofmannus.

Resina Laricis, s. Terebinthina vulgaris.

Resina Laricis est, quam terebinthinam vulgarem seu terebinthinam simpliciter ita dictam, vocant. Hæc quando terebinthinæ priori similior, tanto quoque præstantior æstimatur adeoque optima, quæ purissima, odoratissima, aliquantulum translucida, & quæ in tincto digito contumaciter & æqualiter dissolvit.

Vires. Calfac. emolli, abstergit. Usus præcipuus intrinsecus in pulmonibus expurgandis, in Gonorrhæa fistenda (cum ∇ plantag. ac succino, urinam ac alvum ciat. Extrinsecus Chirurgis usitatissima est, ferèque in Emplastris omnibus adhibetur, movet enim pus, maturat, scabiei cutis medetur.

N. Sunt qui Terebinthinam in cerevisia infundunt atque simul defervere sinunt pro potu ordinario in præservatione calculi viscerumque obstructionibus.

PRÆPARATA.

Ex terebinthina sola vulgari fieri solent, ad quem modum tamen & reliqua tractari poterunt.

Suntque 1. Spiritus Terebinthina.

2. Oleum Terebinthina.

3. Balsamus Terebinthina.

N. Oleum ac Balsamus raro seorsim, crebro conjunctim extant.

4. Colophonia.

Vires. Spiritus calfacit, siccatur, attenuat, urinam ciat, tartaream mucilaginem resolvit. Hinc confert in tussi, aliisque Pulmonum affectibus tartareis, in Lienis & uteri obstructione, in calculo Renum & Vesicæ, in stranguria, gonorrhæa virulenta, ulceribus penis ex lue venerea.

N. Urina odorem Violaceum conciliat.

Balsamus calfacit, attenuat, mundificat, consolidat. Hinc adhibetur feliciter membris frigore rigidis, tumoribus scirrhis, vulneribus inveteratis ac puridis, gangrenæ, fissuris pedum à frigore oriundis (perniosis) quas efficaciter curare creditur.

N. Conrad. Kunrath, commendat summæ spiritum Terebinth. mellitum, cujus guttulas 4, 5, 6. in li-

M m m m 3 quorè

quore convenienti quotidie ad calculum Renum & Vesicæ atterendum. Parat ex mellis puri parti. 2. & Terebinthin. p. 1. mixtis exactè & per Ret. vel XX destillatis.

3. Oleum caruleum Terebinth.

Fit S. S. S. in Vesicâ cupreâ ex scobe radicûm pin-gulium abietinarum cum flore chamom. affusa aq. q. s. fermententur per dies aliquot, donec Tereb. abie-ri inhærens tincturam & is ad se attraxerit, quàm in olei ejus prolestatione secum XX rapit, sibi que per omnia miscet. Est vulnerarium incomparabile, si Thurneusero creditur.

6. Tinctura Terebinth.

Evaporet ol. flavum illius leniter in scutella, dum restet Colophoniam rubentissima, è qua tinctura cum V trahitur eo que remoto balsamus relinquitur, quo renes junguntur in doloribus.

7. Sal volatile Terebinth. purgans.

Describ. in Myroth. Fabri

8. Pilula de Terebinthina cum Rhabarb.

M. Terebinth. cypr. ʒj. Coq. in aq. chamæpytis dum albescat. Hinc adde Rhabarb. opt. pulv. ʒvj. Iva arthe-tic. Succin. alb. ana ʒij. Extr. Glycyrrhiz. ʒj. M. F. Massa.

N. Grato aliquot hujusmodi descriptiones exhibet, at-que Rhabarbarum in minori quantitate immiscet.

Vires. Commendantur in præservatione arthritidis, calculi, &c. Assumuntur singulis trimestribus, &c.

Dosis ad ʒj.

Greg. Horst. lib. 1. observ. Schroderus.

Resina laricis seu Terebinthina vulgaris. Hæc ex Larice spontè sua destillat, & magna sæpe copia, Te-rebinthinæ priori viribus nihil cedens.

Vires. Calefac. emollit, abstergit, &c. Unde usus Ejus præcipuus internus est in pulmonibus expurgan-dis, gonorrhœa sistenda, in præservatione calculi &c. Hæc teste Foresto libr. 24. obs. 28. potius facit ad cal-culi præservationem, quam ad ejus curationem. Cu-jus egregium habetur exemplum apud Anatum Lu-sitanum Centur. 2. Curat. 68 de Monacho quodam, qui hanc singulis diebus magnitudine nucis castaneæ cum Saccharo deglutiebat, & intra sex mensium spa-tium ab hoc malo liber evasit. Quare autem hæc fre-queater usurpata, ut reliqua diuretica, non nocent, hanc causam reddit Greg. Horstius decad. 8. quæst. 1. de calculo Renum & vesicæ affect. quia caliditas hujus temperata, membris coctionis dicatis amica. Aliam reddit. Cl. Riverius Tom. 1. prax. Libr. 8. cap. 1. quia Terebinthina urinas movendo simul alvum laxat, ita ut crassiores humores per alvum deturbentur, qui ab aliis diureticis ad renes deducerentur.

Ex hac preparantur 1. Aqua 2. Spiritus 3. Oleum 4. Balsamus. 5. Tinctura &c. Horum præparationes vid. supra libr. de Oleis & in Thesaur. Pharmaceutic. annexo sect. 1. n. 53. & 54. Aquam contra Gonorrhœam D. F. H.

Vires. Spiritus calefacit, siccatur, attenuat, &c. diu-reticus est & lithontripicus, confert etiam in tussi, asthma & aliis pulmonum affectibus, in gonorrhœâ, stranguria, item in dysenteria non postremas obtinet laudes teste Petrar in Nosolog. p. 104. insignem enim vim Balsamicam, prout & Oleum obtinet anodynâ, resolutivâ & emollientem. Ex oleo agyrtæ balsamum saum Aris, conficiunt, pretio quidem inferiorem ve-

ro balsamo Aris, sed non virtute. Ingreditur etiam Eli-xir viameum balsamicum, & Balsamum Hispanicum sect. 14. n. 21. Thesauri Pharmaceutici annexi.

N. Oleum Terebinthinæ commune cum oleo Oli mixtum cum æquali vel dupla quantitate, & ex parva retorta vitrea destillatum, notabilem Aris suppeditat copiam.

N. Acetum etiam ex terebinthina per destillatio-nem elicitur postquam oleum acceperis, colophoniam subsidente, quæ etiam per retortam destillata in aci-dum abit liquorem. Ex residuo Tincturacum V elici potest. Hofmannus.

TEREDO.

In cariosis lignorum caudicibus nascitur, & fa-rina seu carie saginatur, cui involvitur, qui in na-vium tabulis, proprie Terecines; sic enim Ovidius (1. de Ponto.)

Estur in occulta vitiata teredine navis.

(Teredo, τερδών, à terendo, est vermiculus candi-dus & minutus, ligna erodens & corrumpens: cujus dentes sentiunt omnes ferè arbores, præter larycem. Evonimum & Xylosteum farina seu caries, ulceribus humidis & fluidis utiliter inspergatur: sine morsu exic-cans.) Qui in ficis cerasites vocantur. Qui in platano carabi. Qui in quercus radicibus, Rauri. Qui in corticibus, corticarii. Qui folia arborum & flores depal-cuntur, Syrones. Qui tam in lignis, Cortice, folio, floreque & fructibus arborum, quam in calce, ce-ra, &c. generantur; Acari nominantur. Qui in ipsa aridi ligni medulla generantur, Termites, vermis vi-tivorus, sic Higginio dictus, forte à colore aureo; forma annulari, & perniciè quâ arrodendo vitibus affert Blatta Tinea. Charleton.

OFFICIN. NAT. ex TEREDINE.

Caries, seu farina Terecinum.

Vires. Exiccatur, unde ulceribus humidis & fluidis feliciter inspergitur, & hoc eodem titulo mulierculis nostratibus admodum familiaris est in excoriationibus Infantum exiccandis. Schroderus.

TERRA.

De Terra in præsentiarum acturi, non consi-derabimus, quatenus Macrocosmi pars elementî simplicis nomine veniens, originalis est, nec quate-nus rerum omnium Alma mater divînâ, fertilissima ac ditissima prædita favilla, seminum incomprehensi-bili thesauro in Mundi usque finem duraturo divinitus repleta, peripheriam versus variis depicta frugum coloribus & omnis generis animalium gregibus tecta. Sed quatenus ejus fructus tam Minerales, quàm metallicos juxta sui Naturam, proprietates medicas, colores, diversitatem matricum, regionum vel alia-rum circumstantiarum examinabimus, unde & pro harum ratione diversa sortiuntur nomina. Sic v. g. Terra dicitur primò ratione soli natalis Lemnia, Tur-cica, Armenica, Chia, Melitea, Strigenfis, Brundu-siaca, seu Bohemica, Labacensis sive Wetteravica. Deinde ratione proprietatum & colorum, Terra Cla-ris Dnaris &c. De hisce Terris Medicatis vid. Atha-nas. Kircherus in Mund. subterr. T. 1. sect. 2. lib. 7. c. 4. p. m. 337. Hofmannus.

De Terra incipimus, non quatenus Elementum audit simplex, soloque conceptu comprehensibile, sed quatenus microcosmico semine imprægnata est. Mor-tua enim rectè à Paracelso perhibetur, vivere autem Elemento invisibili, id est, vapore seu spiritu universali infuso

infuso quippe hujus virtute, terra alias mortua vivificatur, sterilis fecundatur, vegetatur, inque naturam variam, tum mineralium, tum vegetabilium, tum animalium facit. Ex mineralibus sunt, quæ terræ faciē adhuc quidem retinentes, à communi tamen terra quodammodo recedunt, atque medicarum terrarum classes subeunt. Hæ pro diversitate matricum, colorum, proprietatum, regionum vel aliarum etiam circumstantiarum, diversa nomina sortiuntur. Sic dicitur 1. Ratione soli natalis; Terra Lemnia, Turcica, Armenia, Chia, Melitea, Strigenfis, Brundusiaca, seu Bohemica, Labacensis, sive VVerteravica 2. Ratione proprietatum & colorum: Terra Oris, Cris, & rea, &ialis, & nina, & 3. Ratione signi impressi; terra sigillata &c. Nos, reliquis Terrarum speciebus omisiss, Officinarum nostrarum terras solummodo enodabimus.

N. Dicitur Arabicè Teri, Græcè Τῆρ vel Τῆ, German. Erd, Terre Earth. Aert.

Vires. Terram in genere frigidam communis statuit opinio, nixa Elementorum quadruplici combinatione; quippe quæ terra per frigiditatem ad aquam accedit, aqua per humiditatem ad aërem, aër per calorem ad ignem ignis per siccitatem ad terram. Verum licet hæc de terra dici queant, quatenus ut Elementum simplex illa consideratur, id est, quatenus cum reliquis Elementis Elementorum generationem ingreditur; At tamen quatenus nobis terra offertur, minime talis censeari poterit; quippe (teste Hippocrate libro *de capnō* potius *de ægῶν*) multum calidi (spiritus illius de quo supra) terra inest, cujus vigore fecunda ipsa redditur. Fecunditas enim non nisi à principio spirituosoprocedit, eoque calido, licet in caliditate ea, maxima scilicet latitudo ac diversitas deprehendatur. Quoad qualitates reliquas adstringentis censetur natura, ac putredini resistentis.

PRÆPARATA.

Præparationes quibus terræ subjici possunt, & inde Medicamenta prodita sunt.

1. Purificatio seu Lotio: unde terra lota.
2. Præparatio officinarum: unde præparata.
3. Præcipitatio: unde Magisterium.
4. Destillatio; unde Spiritus, &c.

1. De Lotione.

Quia Terræ, ut plurimum sabulo ac calculis sca-
tent; lavari communiter solent, id est, in aqua dissolvi,
quæ solutione sabulosa ac lapidosa substantia, utpote
quæ terra utili ponderosior est, subsidet. Hinc aquam
terra turbidam decantant, exhalandoque exiccant:
verum lotio hæc, meo quidem judicio citra aliqua-
lem, imo magnam virium jacturam fieri vix poterit;
Nimirum pars quædam subtilis, (quæ magna ex par-
te terræ perfusa sunt) lotione illa recedit: Volatilis ite-
dem terræ pars (quæ imprægnatæ terræ sunt) exhalan-
do evanescit. In præparationibus itaque præstat terram
crudam non lotam recipere.

N. Non improbamus imbibitionem seu imprægnationem, quæ terræ succo aliquo medicamento iteratis vi-
cibus humectantur, rursum exiccantur, atque ita viri-
bus confortantur novis. Schroderus.

Præparata & 1. De Lotione. Si terræ superficiet-
nus à sordibus non sint mundatæ, hæc lotio ut super-
ficialis non est aded rejicienda, atque citra omnem vi-
rium jacturam peragi potest. Nemo alias est, qui in-
ficias eat, omnem terram præsertim pinguem, astris
imprægnatam & sale centrali, quod in aëre est, & per
aërem ac pluvias ad nos descendit omnisque fertilitas

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

is clavis est, imbutam esse, si hæc lotio diu durat, om-
ni hac virtute terram spoliari.

N. Non improbamus imbibitionem seu imprægnationem &c. Præstat itaque in præparationibus Terram
puram & crudam accipere; imprimis, si Solatis, Lu-
naris, Martialis aut aliis proprietatibus aut mineris
imprægnata, imbue illam rore majali vel aqua plu-
viali ingenti tonitru & fulgure delapsa, quo facto, il-
lam aëri & astris expone & sponte exsiccare sinas, à
radiis solaribus interdum præservando, & ita viribus
confortabitur mirificis. Hofmannus.

2. Præparatio.

Præparandi modus non est diversus à modo præ-
parandi generali, cap. 76. Lavigantur nimirum terræ,
subinde irrorantur aqua appropriata, v. g. Tormen-
tillæ redigunturque in pulpam per se exiccandam.
Schroderus.

Subindeque irrorantur aqua appropriata &c. Vel
decocto aliquo appropriato v. g. decocto vipera-
rum, C. C. crudi, scordii, radic. scorzonæ, tor-
mentill. &c. & rediguntur in pulpam per se exiccandam.
Hofmannus.

3. Præcipitatio.

unde

Magisterium.

Solvitur Terra in Spiritu aliquo acido, e g. Spiritu
Sal. com. vel simili, solutio decantatur, præcipitatur,
que cum oleo Tart. per del. vel cum Δ communi
largiter affusa, præcipitatum edulcoratur aqua fon-
tana.

4. Destillatio ac Sublimatio,

unde

1. Spiritus simplex.

℞. Terræ orbiculos formatos, ac destilla igne nu-
do ex Retorta. Vide infra de Terra sigillata.

2. Spiritus cum vino.

℞. Terræ, (exempli gratia, Strigenfis, de minera
antequam lavetur) q. v. affunde aquam destillatam: in-
de Retortæ, ac destilla lente, ut aliquantulum ape-
riatur corpus. Hinc superfunde Vi, digere & destilla.
Schroderus.

Spiritus cum vino. pro aqua destillata sumatur
pluvialis vel majalis vel tonitru decedens, hac terra
irretetur frequenter, iterumque exsicetur idque cre-
brioribus reperatur vicibus, inde retortæ ac destilla
lente ut aliqualis subtrahatur humiditas Hinc super-
funde Spir. vini digere & destilla, destillatum cohoba
& cohobatum aliquandiu sub coco alembico digere,
interposita semper digestionem & cohobationem, certe
si quid salinæ inerit virtutis vel per spiritum vini du-
plicatum summè volatilem vel sale fixum Cap. mort.
unitum sese exferet; & ita Minerale in vegetabile trans-
feretur. Hofmannus.

3. Spiritus Alcalisatus seu Balsamus.

℞. Terræ Strigenfis, [crudæ non lotæ,] q. v. affun-
de aquam tonitrualem, macera aliquot septimanas
ad putrescendum. Hinc destilla per XX. Ex materia su-
perstite extrahe Sal idque destillato liquori junge,
circula per mensem, postea destilla iterum; Sic li-
quor secum rapier Sal, nasciscerisque subtilem Bal-
samum.

M m m m 4 Aliet

Aliter.

24. Terræ crudæ vel loræ, e. g. lib. x. x. &c. de-
stillata per cucurbitam vitream loricatam ad latus incli-
nantem (vel per Retortam) calore sat forti gradatim
adhibito. Primum exillat Aqua, hinc Spiritus; Spi-
ritibus animadversis augeatur ignis, & sublimabitur
Sal: Conjunge salem hunc aquæ destillatæ, ac destil-
la denuo semel ac iterum, ut post destillatum liquo-
rem Sal sublimetur vel digere simul: sic Balsamum
habes pretiosum. Cunrad. Kunrath, in *Medulla de-
stillat.*

N. In copia terram destillare oportet, alias parum
Sal. nancisceris. Schroderus.

Spiritus Alkalifatus seu Balsamus. Quamvis ne-
minem fore putem, quia Terris Medicatis saltem &
quidem sui generis centalem seu spiritum suum con-
statum, non quidem alkalifatum, ut *Dnus Autor* no-
minat, inesse illumque ab aqua conitruali augmentum
capessere sit negaturus, paucillus tamen est, ut ad hu-
jus magnam copiam acquirendam innumeris aquæ
tonitrualis mensuris opus habueris alias parum salis
nancisceris. *Hofmannus.*

I. TERRÆ ARGILLACEÆ SEU SIGILLATÆ.

Omnibus Terrarum generibus laudem merito præ-
cipit Argilla, quæ à sigillo quo ferè notata venditur,
sigillata dici solet, Arabicè Terimachim, German.
Siegel Erd: Sealed Earth. Gezegelden ærde. Hanc
varii generis officinæ exhibent.

Sunt enim Terræ sigillatæ, 1. Turcicæ (Turcicis
Characteribus insignitæ) quas pro Lemniis terris com-
muniter venditant, cum veræ terræ Lemniæ Galeni
minimè respondeant: Verum enim verò si sint qui
Terram sigillatam in placentalis cinerici coloris
Constantinopoli advectam, pro vera Terra Lemnia
usurpare velint, utpote quæ inter modernas præ-
stantissima sit, ipsis bellum propterea non indi-
cam.

2. Est terra Melitea, sic dicta à Melita seu Mal-
tha Insula, in qua eruitur, terra sigillata Sancti
Pauli.

3. Est & officinalis, terra sigillata Germanica ea-
que duplex, una dicitur Strigenfis, lutei coloris, quæ
in Scaptenfula agri Svvienicenfis reperitur, Officinis
Terra sigillata Strigenfis, à Striga Silesiæ Oppido, ubi
preparari ac sigillari cœpit, dicitur & Medulla vel axun-
gia Solis, eo quod Sulphure Solis imprægnata cre-
datur: Altera Lignicenfis vocatur, estque triplex, co-
loris scilicet rubei, albi & cinerei. Hanc vocant axun-
giam Lunæ, quippe quæ Sulphure Cæ sit perfusa;
Item Unicornu minerale, quod viribus vero Unicornu
respondeat.

N. Similiter & in reliquorum metallorum cuniculis
inveniuntur terra. Sic & in Vveteravia, haud longè à
Labaco oppido, Species quadam terra datur, quæ ad
axungiam Solis accedere videtur: Est Husana prope
Marpurgum. Schroderus.

1. Terra Argillacea seu sigillata sunt 1. Turcicæ, quas
pro Lemniis terris communiter venditant. Hic ve-
nit in controversiam, utrum vera sit Lemnia illa Ter-
ra, quam hodiè Turcico obfignatam caractere ad
Nos convehunt Mercatores, an verò adulterata & il-
legitima? A Bravolo, Matthiolo, Fallopio & aliis
pro spuria & illegitima prole habetur, cum Lemnum
hæc jam deficiat, ut ex eo nihil amplius ad nos de-
ferri possit, locis illis prorsus devastatis & inhabitatis
Hinc evincere conatur Fallopius, Lemniam verè non
esse eam terram albam, quæ Turcarum Regis sigillo
munita in officinis pro terra sigillata habetur, & eum

hæc alba sit, nequeat esse Lemnia, quæ semper rubra
sit. Deinde non coherere, quod nonnulli asserunt, ve-
ram Terram Lemniam esse Bolum Orientalem offici-
narum, quamvis & hoc Bolo pro Lemnia possimus;
utpote iisdem præditus viribus quod tamen ille infi-
ciat manus, longè ab hac differt, quæ manus tangen-
tium non collinit. Non desunt contra qui legitimæ
prolis honore dignantur *Olaus VVormius in Museo*
Cap. 4. *Bellonium & Stephanum Albucarium* citat,
qui confirmant, Lemni incolas testari nullibi unquam
in hac insula effosam fuisse hanc terram, quam eo in
loco, ubi jam foditur è colle fertili Orientem spectan-
te herbis vestito propè villam dictam *Repondi*. Ter-
ram, quam ibidem fodiunt, maxima ex parte albam
esse; secundam quandoque Rubram & luteam instar
Boli armen quo jam utimur; Adeo ut aut in alio colle
tempore Galeni hanc terram effoderint, qui jam ni-
nis obrutus est, aut hanc ipsam pristinam Naturam
mutasse necesse sit. Semel tantum in anno eruitur hæc
Terra, sexto die Augusti non sine superstitione domi-
putant, nullam habere efficaciam, nisi eo die fodiat.
Operarii Græci sunt, diligenter eos animadvertenti-
bus Turcis, qui Magistratum in Insula gerunt, ne
quid clanculum auferant. Dum fodiunt, suavem spi-
rat odorem caverna. Nec omnis terra inde effossa pro
bona habetur, illam saltem eligunt, quæ intra
quasdam petras fragiles latet, pinguiorem, tena-
cem, sabulo destitutam. Oriente Sole per sex horas
saltem continuando fodiunt, mox foveam claudunt,
nec amplius in anno aperire licitum est. Hinc fit, quod
rara admodum sit hæc Terra, cum pauci fodiant, &
tam brevi tempore. Bonam, quam æstimant, unicuique
lavat, lotam sacculis includit, quos suspendunt, ut om-
nis aqua percolatur, hinc in massulas majores aut mi-
nores formant, quas Imperatoris signo sigillant, &
exsiccata, Constantinopoli ad Imperatorem mittunt
una cum sigillo. Hæc *VVormius* l. c. Ex quibus patet
non solum Rubram, sed & Albam & rubicundam ac
Luteam dari Terram Lemniam. *Insula Lemnus* ho-
diè *Stalimene* dicitur & quamvis terra, quæ jam in-
de adfertur, differat sigillo & modo erudiendi ab eâ,
quæ antiquitus inde effodiebatur, atramen minorum
non est virium. Tres species nostræ tempore inde
transportantur teste *Ferrando Imperato* Lib. V. Cap.
33. *Prima est Terra Sacra*, vel *Bolus Armenus Orien-
talis* non tingens, vel alba leviter ad cinereum vergens;
quæ quandoque etiam colore incarnato, ex quibus
sigilla, quæ hodiè tanto sunt in pretio, fiunt, quam
tangere nulli licet præter Sacerdotes. *Secunda Rubri-
ca fabrilis*, quæ fabri lignarii utuntur. *Tertia fullonum*,
quæ pannos mundant, eamque eruere & tractare cui-
vis integrum est. Vid. *Bernhard. Casius de Minerali-
bus* Lib. 2. Cap. 2. l. 7. Plura vide in *Galen. Lib. 9. si-
mplic. P. Bellonio* Lib. 1. obs. 28. *Sylvatic. Lib. 1. De*
Theriac. 20. Matthioli. in Dioscor. Lib. VI. Cap. 1. Un-
dè concludimus Terram sigillatam Lemniam modet-
no tempore adhuc dum veram obtineri, & Autores
contrarium statuentes tum ex diversis illius coloribus,
tum ex nomine loci, ex quo eruitur, mutato, dum in-
sula Lemnus hodiè Stalimene dicitur deceptos fuisse.
Utrum autem hæ Terræ diversis insignitæ coloribus
specie differant tanquam diversæ species sub eodem ge-
nere, an secus, multi ambigunt? Ego statuo, non spe-
cie, sed accidentibus, nempe colore differre: Unde &
in viribus non admodum inter se distinctæ experientia
& usu deprehenduntur.

2. Est Terra Melitea. Sic dicta à Melitâ, seu in-
sula Malta, in qua eruitur; tactu aspera est, colore al-
bo ad cinereum vergente adstringens. Ad serpentium
commendatur morsus eamque vim à Divo Paulo,
accepisse credunt, cum naufragus ad hanc insulam ap-
pulisset, unde quidam Lapidem Sancti Pauli vocant.
Quod

Quo pertinent & *Glossopetra Melitenſes*, oculi ſerpentum lutei, quæ per totam inſulam inveniuntur eâ quâ venduntur forma. Et veſtigia certiffima Nonnulli credunt Miraculorum *D. Pauli* patratorum, dum tribus integris menſibus in hac inſula Evāgelium incolis annuntiavit eoſque ad fidem Chriſti duxit, omnes ejus inſulæ ſerpentes veneno ſpolians, cicureſque & inhabiles ad lædendum faciens, ac ſi in petras eſſent converſi, terram præterea infinitis dotibus augens, ut quemadmodum Morbus naturalis per ſerpentem in vitram intravit, ita etiam viciffim ex ſerpentibus naturalis medela contra illum hauriretur, unde & ſingulare venenorum eſſe alexipharmacum tam terram, quam linguas & oculos communi fama Melitæ eſt pervulgatum, omnibus morſibus venenatis & Morbis aliqua malignitate ſuſpectis adverſa.

Uſus hic eſt; linguæ collo aut brachio appenduntur, parum dictæ Terræ vino aut aqua miſtum bibitur, vel liquor ſolus poſt linguarum inſuſionem. Loco Terræ ſigillatæ plurimis exhibentur, quibus malignitas per ſudorem debet eliminari. Annulis includuntur dicti ſerpentum oculi, ita ut geſtantis tangant carnem & inſtar aliarum gemmarum digitis ſint ornamēto. Vaſis ex Terra Melitæa præparatis, ſi vinum vel aqua inſundatur, ac ubi vim eorum abſorperint, bibantur, multos morbos curant. Non deſunt, qui linguas has Melitenſes ob vim bezoardicam vel ipſum lapidem Bezoar Orientalem ſuperantem in febribus ardentibus malignis, variolis, morbillis, lumbricis infantum, epileſia ſuffragante experientia commendant. Hæ Magnatum ſcyphis inditæ à potu venenorum præſervant immunes, dum præſente venenō in menſa ſudantes veneficium produnt. Vidit *C. L. Thom. Bartholinus* centur. 6. hiſtor. 1. Meliſſæ glossopetram ex terra erutam antiquam, cui plumbeus circulus annexus indicium præbebat, vel auribus olim, vel collo appenſam. Puerorum collo ſuſpenſas dentitionem juvare prodiit *RONDELETIUS* Libr. 32. c. 10. & puerorum pavores arcere. Glossopetram in manu parturientis retentam, donec incaleſcat, partum juvare dicunt. Vulnuſculum glossopetra inſiſtum in epilepticis paroxiſmis ſingulari remedio pueris prodeſt. Non abſonum fuerit, ſi pulveres cordiales dictæ linguæ Melitenſes ſeu Glossopetræ ingrederentur, quemadmodum Panormi fieri teſtatur *Iohann. Frid. Habela*; ſed ante omnia benè obſervandum, ut per homines omni fide majores hi veri dentes ex Melitæa apportentur, ne fraus ulla ab impoſtoribus contingat, quibus ſignis dignoſcantur deſcribit idem *Thom. Bartholinus* l. c. quod ſcilicet non eſſe debeant dentes ſerrantes, monſtrorum marinorum in formam triangularem tornati, quemadmodum alii dentes albi & ſolidi, oſſa, quia nullius ſunt valoris, ſed eligendi teneri mediæ duritiei & à natura calcinati: qui unâ cum cortice ſplendido & levi facilè maſtlicantur inſtar eboris benè calcinati. Glossopetræ veræ Vulcani examini commiſſæ non in calcem, ſed quæ oſſæ in carbonem abeunt, advertente *Fabio Columna*. Cineritias præfert *Abela* ordinis Hieroſolymitani Vice-cancellarius vid. *OLAUS VVORMIUS* in *Muſæo* Cap. 4. p. m. 7.

3. Eſt & officinalis Terra ſigillata Germanica, eaque duplex, una dicitur *Strigonienſis*, ſeu ut communiter *Strigenſis*. Terra eſt lutea, pinguis & viſcoſa, inſtar butyri in aqua & ore diſfluens dicitur & medulla, vel axungia Solis, eò quod Sulphure Solis imprægnata credatur. Generatur in aurifodinis *Montis acuti*, ſeu *Divi Georgii* ad *Strigonium* oppidum *Ducis Suidmænſis*, inter duriffimas rupes. Inde eruitur & ſumma diligentia ordinatione Magiſtratus præparatur, & in formam orbiculorum impreſſo ſigillo Urbis redigitur.

Naturæ eſt ſolaris & veluti ſolis extractum in viſceribus terræ denſatum. Non immeritò tamen Terram veram Solarem Ungaricam huic præponuimus & primas tribuimus Altera *LIGNICENSIS* vocatur, *GOLDBERGENSIS* ad *Goldbergam* in *Lygiæ* & *Siregonium*, hanc vocant axungiam Lunæ, quia colore alba eſt, & ex argento oritur, unde & agnatam & ingentiam cum argento vim in medendo ſortitur, & ad ea, quibus Medicamenta Lunaria inſerviunt, vid. *Caspar. Schwenckfeld. in catal. ſtirp. & ſoſſil. Sileſiæ* Lib. 3. *Hofmannus*.

Delectus, Præſantiſſima omnium quæ modernis in uſu ſunt, cenſetur Lemnia, rubri, hinc cinerii coloris, quæ Conſtantinopoli ad nos pervenit. Huic ſuccedere poſſet axungia Solis, in affect. cordis, vel axungia Lunæ, in capitis & Epatis morbis: Ex Lunari autem antecellit ea, quæ cineritii coloris eſt. *Schroderus*.

Delectus.) Omnibus palmam præcipit Lemnia ſuprà deſcripta, quam Conſtantinopolis ſufficit. Hujus in locum ſubit Solis axungia in cordis affectibus, vel axungia Lunæ in Capitis Morbis. Uſus hujus præcipuus eſt in febribus malignis, peſte, Dyſenteria, diarrhoeâ, morſibus animalium venenatorum. *Hofmannus*.

Nota Bonitatis in terris ſt, ſi lingua adhæreant. 2. ſi ſaliva aut humore humectata, in bullam ſeſe elevent, vel in aquam conjeſta bullas excitent.

Vires. Exiccac, adſtringit, reſiſtit putredini venenæque, reſolvit, ſanguinem dilatat, adeoque ciet ſudorem. Uſus præcipue in peſte, febribus malignis, Diarrhæa, Dyſenteria, in morſibus animalium venenatorum. Extrinſecus in vulneribus malignis mundificandis, in iſtu venenato.

N. 1. Terra Labaceniſis, Terra ſigillata vires amulari videtur, ſudores largiter movet, nec vi adſtringendi reliquis cedit.

N. 2. De axungia Solis experientia comprobavit; 1. Quod cruda, [qualis ſcilicet ex minera eruitur] ſapiſſimè Epileſiam curaverit. 2. Quod in Philtris maxime profuerit.

Dofis à ʒſ. ad ʒij.

Præparationes & Præparata Terrarum Argillacearum; ac imprimis Sigillatæ. *Schroderus*.

Præparationes & præparata Terrarum argillacearum ac imprimis Sigillatæ.) Ubi 1. occurrit Terra ſigillata præparata, quæ ſine præparatione vulgari in uſum venit. 2. Magiſterium. Hoc nullius uſus & efficacæ eſt. *Hofmannus*.

1. Terra ſigillata præparata.

N. 1. Ut plurimum terra ſigillata ſine præparatione vulgari in uſum venit.

2. Magiſterium.

ʒſ. Solve in ſpirit. Sal. nit præcipitat ol. Tart. p. d. vel ʒ. comm. ita Magiſterium ſub colore terræ nativo nancifceris.

Dofis à ʒſ. ad ʒſ. & ultra.

3. Spiritus Terræ ſigillata ſimplex.

Deſtillatur terra, per ſe ex Retorta: Nimirum

ʒſ. Terræ Sileſiæ flavæ [optima eſt, quæ duobus monticulis inſignitur] libr. 1. frange in particulas duas, ac deſtilla per Retortam, igne nudo, hor. 6. vel plures, [ad & integrum] in Receptaculum capax. Primum exſtillat Phlegma, dein Spiritus albicantes

cantes in parva quidem copia, sed grati acoris ac saporis.

N. Terra restans, ejusdem etiamnum figura extrahitur, sed quæ non amplius lingua adhaeret, nec saliva humectata in bullas exurgit.

Usus: Non opus habet rectificatione, sed in usum venit una cum Phlegmate.

Dosis ʒß. Vide Horstium in Problematis. Schroderus.

Spiritus Terra sigillata simplex.) Spiritus albicantes illos acidiusculos si in M. B. rectificaveris habebis luteos & si hunc licet parvâ in copia majorum virium exoptes, extrahe sal ex Cap. mort. in furno figulino calcinato cum aqua pluviali (quamvis paucum & non nisi ex flamma ignis forsan productum) & circula cum spiritu. Quoad vires. Dn. Samuel Glossens hoc spiritu in febribus usus fuit malignis cum sudoris elicio & Gregor. Horst. communicavit, qui illum inferuit Centur. problem. Therapeutic. decad. I. de febrib. quæst. v. Dosis est à ʒß. ad ʒj. vel ij. in liquore appropriato. Hofmannus.

4. Spiritus Terra sigillata cum Vino.

Fit macerando Terram cum aqua & destillando. Hinc digerendo eandem cum Vi atque destillando. Vide supra.

5. Spiritus Terra alcalisatus, seu balsamus. Terra.

1. Fit si eum ∇. maceretur ac destilletur, & postea cum sale suo alcalisetur. Vide supra.

2. Destilletur sine ∇, floresque forti calore propulsi, cum liquore destillato conjungantur.

Vires. Vires ex terra viribus judicari poterunt, præter quas vim quoque habet arthriticos dolores summè mitigandi, malignitatem scabiei corrigendi, &c.

N. Solvit quoque ☉.

(Spiritu Nitri, salis, vel Oli. impragnatur etiam Terra sigillata, indeque liquores styptici, & alexipharmaci parantur.)

6. Oleum Terra Strigoniensis.

℞. Terræ Strigoniens. lb. i. Affunde aq. pluvialem, destill. colloca in locum temperatè calidum per mensem vel amplius, & oleositas à corpore sua sponte separabitur, & aquæ innabit, aquam separa per infundibula & oleositatem cum part. vi. ∇ destilla & egredietur Oleum aurei coloris, cui innatans. Materiam autem instar perlæ albam in fundo relictam exime, cum aq. pluvia Sal. ut moris est, extrahe, hunc oleo redde majorumque virium, ergò circula, & ex ☉ vitrea in Arena destillata.

Dosis gutt. vj. in vehic. convenient, in febribus malignis, variolis, calculo. Schroderus.

6. Oleum terra Strigoniensis.) Num oleum propriè sic dictum Terræ instar sigillatæ valdè dubitatur, licet etiam tacta luxulet digitos, hoc tamen potius ab ipsius lentore, quam pinguedine connatâ oritur. Non igitur video, quomodo per hunc processum oleum ex terrâ sigillata elici possit. Eodem vitio laborat ☉ potabile Rhumelii in antidotar. p. 114. ex terra sigillata extractum. Alii h. m. procedunt; Recip. terr. sigillat. imbiibe Spiritus Nitri rectific. ad formam pulvis, in frigore instar lapidis indurescat, teratur in pollinem, inde vesicæ suillæ, quæ in fundo sit perforata, in loco frigido resolvitur in liquorem rubicundum. Dosis ʒj.

N. Hic liquor oritur non tam ex terra sigillata, quam Sale Nitri coagulato & per deliquium soluto in loco frigido. Eadem etiam ratio est sequentis li-

quoris styptici cum Spiritus Vitrioli præparati, qui etiam D. D. JOHANNI MICHAELIS p. m. in usu fuit.

Recip. terræ sigillatæ minutissimè contritæ, affunde Spiritus Vitrioli, digere, abstrahere, iterum affunde, idque ter repete, & videbis materiam coagulari in lapidem durum, pulverisatæ solve in cellâ in liquorem.

Vires: summum remedium audit in dysenteria, confert febribus malignis cum alvi profluvio conjunctis, vomitu &c.

Cum Spiritus sal. comm. composito etiam ex terrâ sigillata extractum fieri potest, & cum spiritu vini in liquorem redactum ad dictos affectus utile paratur h. m.

Recip. terram Olarem opt. affunde Spiritus Sal. comm. compos. extrahe tincturam, filtra, abstrahere, & postea cum spiritu quodam cordiali conjunge & denuò filtra. Vires: Egregium est Medicamentum in cordis affectibus & Morbis epidemicis. Dosis à gutt. x. xx. ad xxx. ubi abstrictione opus est in angoribus cordis, vomitu & Dysenteria maligna. Hofmannus.

Q. E. terra sigillata vide in Hodegetico Popp. p. 120.

(Terebinthina oleum ex Terra sigillata extrahitur liquorem rubicundum alexipharmacum.)

(Trochisci de terra sigillata.)

II. BOLUS.

Bolus terræ genus est, ex pallido rubrum, vaporibus ozalibus inprimis imprægnatum.

Dicitur Medicis Bolus armena, vel Orientalis, eò quod ex Armenia finitimisque locis, præcipuè advehatur. Præcipuè dico, ne excludam & alia loca, in quibus ea foditur, & ad nos transportatur, quibus nec Germania nostra caret, unde nobis VVitebergica usualis est. Schroderus.

11. Bolus Armena.) A Medicis ita dicitur, eò quod ex Armenia advehatur. De quo tamen dubitat Zacutus Lusitanus in Medicor. Principium histor. Lib. 4. histor. 51. An scilicet ille verus sit, qui ad Nos deferretur. Matthiolus ad rubricam sinopicam accedere statuit. Quidam veram terram Lemniam esse arbitrantur, sed manus inficit, quod Terra Lemnia non facit. OLAVUS VVORMIUS in Musæo suo duorum generum massas tenet, globosam unam, non signatam aut in formam artificiosam redactam, quæ pallidior, vi adstringente & pingui tenacitate aliis non cedentem. Altera in massam oblongam quadratam pondere quinque drachmarum cum dimidia redactam cui duo sigilla Turcica impressa magis saturati coloris, quam prior. Notas veri Boli Armeni etiam habet, & instar butyri in ore liquefcit.

Bolus Toccaviensis in Transilvaniâ ad Toccam seu Toccay repertus à Craione in usum traductus. Dantur & alia loca, in quibus ea foditur, unde & VVitebergica usualis est. Modò allegatus VVormius l. c. mentionem etiam facit Boli albi, ad cinereum colorem vergentis, mollis, lubrici, pulverulenti, tangentium manus colore albo inficientis, ex Heituria affertur, Ut & Boli cinerei Fionici ac Borrengholmici ex insulâ Dania Borringia transportati. Boli Norvegiæ conditionis aliquanto pinguioris & ad contactum durissimi. Hofmannus.

Delectus. Præstat pura (non arenosa) quæ in lavorem calcis instar affuso humore promptissimè solvitur ac commanducata butyri modo liquefcere videtur. Reliquis tamen præstantior censetur, quæ ex Armenia vel locis finitimis apportatur.

Vires

Vires. Valde siccatur, adstringit, roborat. Hinc usus ejus saluberrimus est in fluxu sistendo in humore inspissando, in putredine arcenda, veneno obrundendo, &c. qua ratione convenit in Diarrhea, Dysenteria, fluxu menstruo, Catarrho, spuitione sanguinis, Hemorrhagia narium & vulnere, &c. Externus ejus usus creber est in Cataplasmatibus, pulveribus adstringentibus, &c. Schroderus.

Vires. Facultatem habet admodum exsiccantem & consolidantem, adstringit, roborat, hinc usus Ejus saluberrimus est in fluxu sedando, humore tenui inspissando, putredine arcenda veneno obrundendo &c. quo modo in omni alvi fluxu convenit, dysenteria, Catarrhos falsos ad pulmones delabentes incrassat, in hemoptoe, hæmorrhagiâ narium & vulnere agit aliquantisper præcipitando; in ulceribus putridis oris & pulmonum etiam commendatur, quocirca & Phthificis utilis est, in Peste à Galeno commendatur Hofmannus.

P R A E P A R A T A.

1. Bolus armena præparata fit modo generali. Schroderus.

Præparata. Communitè Bolus Armena abluitur aqua rosacea ad sordes & arenulas removendas, si quas habuerit, alias præstat cruda & pura: & si libuerit Bolum majoribus imprægnare virtutibus, illum tore Majali vel aqua tonitruali frequenter imbue, ac ei expose ac leniter exsiccata, à radiis solatibus interdum præservando, vel etiam si volupe fuerit decocto quodam medicato appropriato imbue, ut decocto seipentum, C.C. crudi, scordii, &c. Hofmannus.

Ut de Terra sigillata monuimus, cruda potius, quam præparata terra Armenia in usu est.

2. Magisterium: fit ut Magisterium terræ sigillatæ.

[Antidotus ex Bolo.]

I I I. C R E T A.

Creta, Kreyd de la Croye. Chalk, Kreyt à Creta Insula sic dicta, ubi in copia invenitur, (licet Dania, Gallia, & aliæ regiones quàmplurimæ eâ scateant) terræ species nobilissima est, durior, & candida.

N. Renodus triplicem hujus facit speciem candidam, virentem & nigricantem; Verum, nobis non nisi candida in usu medico est, eoque rarissimo.

Vires. Siccatur, abstergit, emplastica est.

Ulus ejus internus nonnunquam in ardore Stomachi est, externus in vulneribus; ulceribus, &c. siccandis. Schroderus.

Creta Kreyd à Creta insula.) Aliæ Regiones quàm plurimæ illa etiam abundant. Inter paternos Creta lares Plinius Libr. 37. Cap. 27. numerat Thessaliam, Liciam, Sardiniam, Umbriam. Præterea Agricola Libr. 2. De Natura fossilium p. 196. Habent, inquit, pleræque regiones Crete colles ut Gallia, Britannia, Muna deserta Maris Baltici insula, quæ ex Pomerania navigatur ad Copenhagen Dania. Smyrna etiam nascitur & quidem optima. Item in Brabantia inter Lynam & Distum effoditur. Plura sunt Creta genera. Volaterranus Libr. 27. Philolog. p. 649. Inter hæc recenset Cimoliam, Sardam, Umbricam, Thessalicam, Saxum & Argentariam ita appellatam, eò quod nitorem argento reddat. Idem Creta generibus etiam annumerat Sardam, rubricam, argentariam & viridem, quam Agricola Lib. 2. De Natura fossil p. 193. optimam pronunciat, Smyrna natam, hæc virides ducit lineas OLAVS VORMIUS in Museo Cap. 3. hanc videm possidet levem, subtilem, quæ cocta ad rubedi-

nem transit. Græci Θεοδωριον vocant, quia fundus iste, in quo primò hæc creta fuit inventa, fuit Theodosii cujusdam.

Vires & Usus. Internè nonnunquam in ardore Stomachi datur vel per se, vel cum oculi & Nuc. Moschat. in aqua portulac. vel in morfulis, de quibus vid. Mynsicht. creta drachmæ unius pondere assumpta cum vino vel lacte caprino non solum vermes interimit, sed & ne alius ascendant, prohibet. Si teneatur in manu, sistit hæmorrhagias, Uteri hæmorrhagiam sistit, si applicetur umbilico. Externè etiam in vulneribus, ulceribus &c. siccandis ob ejus vim exsiccantem, absterisivam & emplasticam commendatur. Gallis Gallinaceis quoad usum domesticum est adversa vid. Thom. Bartholinus centur. 5. histor. 83. Hofmannus.

I V. TERRA JAPONICA.

Est & terræ genus exoticæ, colore purpureum; punctulis albis intertextum, ac si situm contraxisset, sapore austeriusculum, masticatum liquefcens, subdulcemque post se relinquens saporem; CATECHU vocant, seu TERRAM JAPONICAM. Hujus usum perhibent celeberrimè in exsiccandis catarrhis, capite roborando, si in ore detineatur.

[In hernia varicosa mihi non involuntaria.]

Particulam hujus obtinui à Pharmacopæo nostratè curiosissimo Dn. Matthia Banfa.

[Non rara nunc] Schroderus.

4. Terra Japonica seu Catechu. Est Terra exoticæ colore purpurea, punctulis albis intertextata ac si situm contraxisset, sapore austeriuscula, masticata liquefcens & subdulcem post se relinquens saporem. Si in lingua detenta masticetur vel globuli inde fiant, hujus usum celeberrimè perhibent in exsiccandis catarrhis, salis & capite roborando. Repertur apud Dominum Langermannum in nundinis Lipsiensibus De hujus Terræ Japonicæ singulari usu in urinæ profluvio continuo ac hernia varicosa vid. Ephemerid. Medicophysic. anno 2. observat. 129. seq. Ex hac etiam Tincturam stypticam confecit Domin. Georg. Wolfgang. Wedelius P. P. Jenens. celeberrimus l. c. Hofmannus.

Præparationes variæ Terræ Catechu seu Japonicæ ex D. D. HAGEN DORNIO & primò.

De Medicamentis Catechu in forma solida.

Præparatio generalis Terræ Catechu.

℞. Terra catechu q. v. redige in pulverem & per cribrationem à particulis lignosis & lapilloso separa, illic affunde justam aqua simpl. vel alicujus destillata proportionem [qualis aqua rubi idæi, qua omnino proficua] Digeras per unum alterumque diem ad calorem fornacis, bacillo, interdum commovendo, hinc liquorem inclum per inclinationem separa, post aquosam humiditatem evaporando, restans magna ad lenissimam calorem exsicetur & in pulverem redigatur. Hunc laborem tandiu poteris iterare, novam semper affundendo aquam, usque dum nihil præter partes impuras & inutiles in vitro superesse videris.

Magisterium Terræ Catechu.

℞. Tinctura catechu cum V paratæ q. v. Affunde Sp. Vitriol. vel alterius aciduli q. s. permittite omnia aliquandiu quiescere, postmodum ad fundum subsidens magma per exhalationem liquoris supernatantis in pulverem redige magisteriatum.

Vel

Vel affunde catechu in aq. v. g. rubi idai soluta & per inclinationem à facibus liberata aceti destill. q. s. Sic citius precipitabitur magisterium, exhalatione liquoris aquosi mox impetrandum.

Essentia Catechu sicca.

℥. Tinctura Catechu cum Spiritus vini parata q. v. abstrahere per alembicum vel evaporationem Spiritus vini totum, reliquum leniter exsiccā & in pulverem redige.

Hæc essentia tincturam omnium pulcherrimam præbet, cum liquore quovis ardente facile parandam.

Pulvis Stypticus externus.

℥. Terra vitrioli dulc. ʒb. Catechu præpar. ʒij. croci martis adstringentis ʒj. thuris ʒb. apii pulver. gr. v. circiter, cum tantillo camphoræ F. pulvis subtilissimus.

Pilulæ Catechu anodynæ, Stypticæ.

℥. Extracti catechu p. iij. pulver. anodynæ p. j. M. accuratissime; adde quandoque lap. Bezoar. orient. gr. j. vel ij.

Hæc pilula apprime juvant delicatulos & medicamentorum pluralitatem fastidientes; præter vim stypticam sudores etiam movent, ut in dysentericis aliquibus observatum à D. D. Hugendorpio.

Pilulæ Catechu odoriferæ.

℥. Extracti catechu q. v. Confectionis alkermes ambra q. s. M. F. Pilula gratum oris balium conciliantes.

Rotulæ Catechu stypticæ.

℥. Sacchari in aq. appropriata soluti q. s. adde catechu præparata & pulver. v. g. pro singula, ʒj. sacchari, ʒj. M. F. s. a. rotula, oleo cinnamomi vel alio, si lubet, irroranda.

Rotulæ Catechu odoriferæ & confortantes.

℥. Sacchari in aq. odoriferis soluti q. s. aut ʒij. circiter, catechu præparata ʒij. Confectionis alkermes cum moscho ʒb. F. Rotula.

Vel, quod compendiosius. ℥. sacchari in aq. odorifera soluti q. v. adde tinctura catechu ambrata q. s. F. s. a. massa in rotulas efformanda.

Rotulæ Catechu pectorales.

℥. Sacchari in aq. feniculi soluti q. v. Catechu præparata & olei feniculi q. s. ut fiant s. a. rotula, in hæmoptysi, tussi, catarrhis &c. multi usus.

De Medicamentis Catechu in Forma Media.

Extractum Catechu.

℥. Catechu præparata q. v. solve in aq. appropriata quam ultra dimidium evapora atque ad consistentiam extracti redige. Vel.

℥. Tincturam catechu Spiritus vini factam, evapora ad dimidium, vel ultra etiam residuum extracti faciem facile præsentabit.

Balsamum Catechu vulnerarium.

℥. Catechu pulver. q. s. adde lixivium salis tartari proportionem circiter quadrupla. Lixivium hocce mox purpureo tingetur colore, omnemque catechu substantiam in se quasi absorbere videbitur, nihil relicto sedimenti in fundo. Liquor hic lixivialis dulcore quodam remixtus per aliquot dies in gelatinam veluti quandam abie rubicundissimam, qua butyri instar se tractari, & linimenti vel balsami vice usurpari sustinet Magnarum virium in ulceribus antiquis & putridis.

Electuarium Catechu pro delicatulis.

℥. Mellis opt. ʒij. sacch. alb. in aq. appropriata soluti ʒj. extracti catechu liquidi ʒij. M. extracti sine continuo agitando, cavendone ne empyreuma contrahat. Postea ab igne remove, & dum adhuc calet, adde guttulam unam vel plures olei cinnamomi. Serve tur in fœteli.

Si excellentius desideraveris optimo consilio addes chocolata & confectionis alkermes, q. s. in actu præparationis, atque ita pro singulari analeptico id dispensabis.

Emplastrum Stypticum.

Componitur ex pulvere styptico externo, (de quo supra) cum cera, resina pini, oleo hyperici, iusta proportionem additis & s. a. rite mixtis. Massa antequam frigescat adde pro odoris gratia, guttulas aliquot olei rosar. destill. & postmodum si lubet redige eandem in magdaleones.

De Medicamentis Catechu in forma liquida.

Tinctura Terræ Catechu.

℥. Catechu pulver. q. s. affusis Spiritus vini partibus circiter quatuor, vel sex, prout dilutiorem vel spissorem eandem expetis, in leni digestionem, vel etiam sine eadem, colloca, tinctum liquorem filtra, residua in assa iterum, si volueris, Sp. vini partes solummodo tres affunde, iterum digere, usque dum Spir. vini rubinescente se commendet colore, essentiaque consistentiam amuletur. Vel.

℥. Essentia catechu sicca q. v. eidemque Vi, vel aliud menstruum ardens affunde. Sic absque digestionem, absque filtratione, absque ullius sedimenti depositione, mox impetrabitur tinctura.

Ita & alia Catechu tinctura confieri queunt, v. g. Tranmatica, cum Spir. cerefolii. Styptica cum Sp. theriacali. Antiscorbutica, cum Spiritu cochlearia. Diarrhæicis, cum Spiritu panis secalini. Confortans, cum Spiritu citri, addita confectione alkermes ambrata &c.

Ita quoque cum aliis si volupe est, menstruis, & alia tinctura, & extrahi & dispensari in agrotantium commodum possunt.

Mistura Catechu pro fœtore oris.

℥. Catechu præparata q. v. affunde aquas odoriferas, cum tantillo ambra & moschi addito: digerantur & percolentur; hæcque mistura in usum dictum usurpetur.

Dosis & Vehicula Medicamentorum ex Terra Catechu.

Dosis cum diversa sit ob diversitatem medicaminum exinde paratorum, hinc notandum. Catechu simpliciter & in forma præparatam exhiberi posse à ʒb. ad ʒb. Essentiam vero siccam à gr. v. ad ʒb. ad summum. Tinctura cum Spiritu vini parata, propinatur à gr. x. ad xi. Vel si consistentia spissioris fuerit instar extracti liquidi guttula x. vel xx. sufficiunt. Eadem dosis & reliquis competet, tincturis, siue cum Spiritu cochlearia, siue panis secalini, &c. concinnata fuerint. Tinctura tamen Catechu confortans ambrata, vix ultra guttulas 15. vel 20. exhibeatur. Pilularis catechu forma vix ʒb. transcendit.

Rotula & electuarium arbitrio assumentis relinquuntur.

Vehicula ℥. grata, interim tamen vim medicamenti non infringentia; qualia, Juscula, cerevisia calida, vinum malvaticum, ni calor præternaturalis obstiterit.

Vires Catechu gener aliores ha junt. Catechu reme-
dium est Stypticum, anodynum, alexipharmacum, aphro-
disiacum, apoplegmatizans. Sed quipura de viribus
specialioribus, ut & de oriu, anatome, natura, patria,
differentiis, electione, affectionibus, temperamento, qua-
litatibus passivis & usu catechu, volueris, consulat Do-
ctissimum D. D. HAGEN DORN IUM qui tractatum
integrum de eo conscripsit.

V. MARGA.

Marga, est portio quædam pinguis & quasi me-
dulla, in saxis nonnullis, dum franguntur reperi-
ta, unde & Medulla Saxorum dici solet, Germ. Stei-
nmark. La Moëlle des Pierres. Marle or Marrou
of stones. Merch van Steenen.

Vires. Siccatur, adstringit, consolidat, sarcotica est
tartarum sanguinemque coagulatum resolvit, (intus
exhibita.) Schröderus.

5. Marga.) Hæc est vel candida, pinguis, liqui-
da, ciustacea, vel incarnata rubra, linguæ adhærens.
In Montibus Bohemicis summâ reperitur in copiâ, &
Saxorum commissuris quemadmodum & in Lygis
montibus reperiiri scribit SCHWENCKELDIUS.
Datur etiam lutea in Grode Lapide & cinerea Lapi-
dosâ. Reperitur & Rochlitzii & Jena in montibus so-
laribus &c. Ut Jovis omnia sint plena.

Vires.) Commendatur ruptis ex alto devolutis,
hæmoptoicis, dyentericis, unde & ex hac ornat Dn.
D. JOHANN MICHAELIS pulverem suum anti-dy-
sentericum, cujus descript. vid. supra in Libr. II. &
annex. thesaur. pharmaceutico sect. 23. num. xxv.
In osium fracturis etiam convenit, in calculo re-
num; Contra epilepsiam vulgi medela existit. Ex-
terius admota siccatur sine morfu, undè ulceribus de-
siccandis inspergitur, &c.

N. Huc pertinet etiam AGARICUS MI-
NERALIS seu LAC LUNÆ candore, levi-
tate & raritate agarico vulgari prorsus similis.
Vocatur & Gleba Norvegica albicans, Marga sa-
xatilis, stenomarga &c. Et describitur à FERRAN-
DO IMPERATO Libr. V. Cap. 40. GESNERO,
OLAO WORMIO in Museo Lib. 1. sect. 1. Cap. 4.
p. 5. Respondet hæc Terra alba Veterum, cujus duo fue-
runt genera: Unum collyrium dictum, eò quod Me-
dicamentis ocularibus mistum fuerit, terra pinguis,
rara, mollis, candida, dulcis. Alterum dictum ASTER,
vel quod signo stellæ signatum, vel quod micæ qua-
dam stellarum instat in eâ emicabant.

Vim habet refrigerandi, adstringendi, sanguinis
eruptiones & fluores sistendi, uteri profluvia com-
pescendi, inflammationes sedandi. Rara est, tenuis,
levis, adstringens, micans, & granula quædam
habet permixta splendorem de se fundentia, quæ ab
aliâ sui parte, quæ saxis adhærebat, frequentiora ap-
parent, cum permixta viriditate. Hæc in fodinis cu-
preis propè Nidrosiam inventa est. A supra nomina-
to FERRANDO l. c. Agaricus Mineralis voca-
tur, candore, levitate, & raritate Agarico verò prorsus
similis. Quidam Lac Luna vocant, propter cando-
rem & teneritudinem, quàm habet. Oritur à vapo-
ribus metallicis, qui indies subriles vehunt exhalationes,
quæ ubi per saxa in cavitates exsudaverint,
humido evocato, quod siccum est, remanet, & in
medullam hanc raram, teneram & friabilem con-
crefcit. Boetius ad Galatitem refert. Hæc terra mix-
ta aquæ albo lactis colore eam tingit, insipida est,
siccatur sine morfu; supersticiosè quidam adversus
quemvis Morbum salutarem esse putant. Lac auget
drachmæ unius pondere ex jaseculo propinata, com-
modius exhibetur in emulsionibus, mammillæ evi-
denter inde turgent, in profluvio item sanguinis
commendatur, & à quibusdam tanquam somni-
Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

ferum utiliter exhibetur. Pollinem ejus ulceribus
desiccandis inspergunt. vid. OLAUS WOR-
MIUS, l. c. Hotinanthus.

De Lacæ Lunæ, sic in Appendice ad Pharma-
copœam Schröderianam.

Lac Lunare vel lac Luna describit CONRADUS
GESNEAUS, de figur. lap. p. 50. quod in altissimo-
rum quorundam montium Helveticorum speluncis re-
peritur, ut Storchornt in divione Bernensium, & Fractis
sive Pilatini Luce rersum: De quo repetam, ait GE S-
NERUS; hic ea ferè verba quæ in fracti montis descrip-
tione nostra ante annos sedec m posui, mutatis nonnullis
& additis. In Spelunca quadam, per summum montem
fornici adhærens, nascitur quadam substantia, fungosa,
friabilis, alba, levissimaquam fungum petreum dixeris,
vel agaricum saxatile, tam similis hujus est facies. Inco-
le Monmilh appellant h e lac luna, à substantia albâ &
spumosa, ex qua concretus videtur hic lapis, si lapidis
nomen meretur. Aqua mixtus, albo lactis colore eam in-
ficit. Insipidum est Siccatur sine morfu. Nulla in eo asperi-
tas, & totum cum saliva mandentis liquefcit, præsertim
quod melius fuerit, nam & crassius & asperius reperitur,
immaturius nimirum & crudius; quod odore etiam cæ-
ret. Concoctum autem & perfectum, ut asperitatem ad-
mittit, ita albius colore, & pondere levius, & suaviter
odoratum redditur. Videtur autem naturam Holosteis
dictis lapidibus qui in terra arenosa in Palatinatu effo-
diuntur proximam obtinere: & lapidi quem ab odore cy-
donitem nominant. Superstit. esè quidam, adversus quem-
cumque morbum agroti cujusvis, propter quem expresso
ipsius nomine à spelunca petatur, salutare esse putant.
Lucerna in pharmacopolo ventis solet. Pollinem ejus
Chirurgi ulceribus desiccandis inspergunt. Sunt qui ni-
tricibus pollinis hujus drachmam exhibeant, ad augen-
dam lactis copiam; è jure, ni fallor (potest autem com-
modius ex lacte amygdalarum, cui immixtus hic pollen
aliquot horis fuerit,colato propinari, cum paucis sac-
charo & aqua faniculi) Ajunt autem mammillas evi-
denter hoc auxilium turgere, & repleri lacte.

Præterea à docto quodam viro nuper proditum inve-
nio, lac Luna in profluvio sanguinis utiliter dari, tan-
quam somniferum; idque sibi experimento constare. Quod
ad nomen priscum ego aut ipsum Morochium veterum
esse aliquando putavi, aut easdem certè illi facultates
obtinere: Sed amicus quidam rerum omnium fossilium
cognitione clarus, Marga friabilis genm movit.

VI. OCHRA.

Ochra terræ species est durior, coloris flavi, seu
lutei. Germ. Ochergeel. de l'Ochre Yel louv Oker.
Geel Oker.

Vires. Siccatur, adstringit, discutit, excrescentias re-
primit.

Ufus Ejus rarissimus est, & non nisi externis ac præ-
cipue in vibicibus & collis, tum quoque in tumoribus
duris discutendis (Emplastr.) Schröderus.

6. Ochra) A luteo colore Graus Ochra dicitur;
Et est duplex, una Nativa reperta non solum in me-
tallis, sed etiam in propriis venis vid. Agricol-
Libr. 2. de Natura Fossil. pag. 199. & in Berman-
no pag. 444. Cælius de mineral. lib. 2. cap. 11.
sect. 11. Factitia altera est, & fit ex plumbo ni-
gro, quàm plumbariam vocant. Scilicet plumbum
tamdiu Vulcani vehementiæ exponitur, usque dum
colorem Ochre contraxerit, hac pictores utuntur.
Ufus ejus est rarissimus, panos tamen discit, con-
cretas circa ossa lapidosas durities frangit, & si na-
ta fuerit in ætis fodinis, vim etiam causticam ha-
bet, articulorum item tumores & tophos discutit in
emplastris adhibita. Hofmannus.

Nona

VII. RU-

VII. RUBRICA.

Rubrica terræ species est lapidosa rubea, &c. dicitur & rubrica fabrilis, quod fabris lignariis crebro inserviat, in ducendis lineis, German. *rothe Kreide*, *Rötelstein*, de la Rubrique, ou Croye rouge. *Red Earth*, *Rattlestone* or *Carpenters Ruddle*. Roo Aert, of Rat-tel-steen.

Vires. Siccatur, astringit.

Ufus ejus Medicus est in spūto sang. & in Emplastris vniuersariis & siccantibus. Schröderus.

7. Rubrica. Terra species est lapidosa, à rubro colore dicta, unde omnis Rubrica est rubea, & si quæ non rubeat, ea non dicenda rubrica. Duplex est *Nativa* & *factitia*. Illa gignitur in metallis auriferis, argentariis, ærariis, ferrariis, unde & de illorum participat naturâ, quia etiam sæpe in propriis reperitur venis. Loca autem, ex quibus effoditur, optima fuere *Cappadocia*, *Lemnus*, *Aegyptus*. Nunc in Nostræ Germaniæ metallis reperitur & propriis in venis, unde pro locorum diversitate multiplex est, *Rubrica Lemnia*, *Aegyptia*, *Sinopica*, *Africana*, *Germanica* &c. Omnium præstantissima est *Lemnia*, *Sinopica* & quæ ex *Africa* aliisque locis affertur. Ratione usus distinguit *Fallopium Rubricam* in tres species, *Unam*, quæ Medici utuntur & est *Terra Lemnia*; *Alteram*, quæ utuntur fullones; *Tertiam*, quæ fabri lignarii & Medici aliquando. In cunctis ignavior est hæc ultima. *Rubrica factitia* fit ex ustâ ochrâ, de quâ vid. *Agricola* Libr. 3. de ortu & causis subterraneis p. 40. *Cesius de Mineral.* Libr. 2. Cap. 2. sect. 13. Quoad vires, pollet adstringendi, reprimendi, & fluxum sanguinis sistendi facultatē, undē & vulgus communiter in dysenteriz curatione sibi levamen quærit. *Hofmannus*.

VIII. TRIPOLIS.

Tripolis terra est coloris Citrini intense, speciei-que videtur Ochreæ.

Vires. Ufus ejus in Pharmacopœia vel nullus, vel rarus est, nisi quod pro destillandis Spiritibus salinis, salibus admisceatur, quo minus ea suant. Schröderus.

Præter hæc recensita Terrarum Medicarum genera, aliæ adhuc dantur ad rem Medicam etiam utilissimæ. Sic *Joh. Eusebius Nierenbergius* Terræ *Damascenæ* seu *Adamicæ* meminit de *Miraculos*. Terra *Naturis* Cap. 17. p. 465. quæ reperitur in agro Damasceno, ubi asserunt, Adamum à Deo plasmatum & hinc transitum in Paradisum terrestrem, atque inde rursus ejectum ob peccatum, quo se & nos omnes perdidit, huc relatum. Hic ager terram habet rubram & mirè tractabilem, quam Saraceni deferunt in *Aegyptum*, *Indiam*, *Aethiopiam*, carè vendentes. Ferunt, foveas revolutæ anno adimpleri, & habetur tamã constanti terram hanc talis esse virtutis, ut eam gestantibus nulla telorum vis noceat, vel alia incommoda, unde & aliqui in varias abutuntur superstitiones. Hæc ex *Nierenbergio*. Nonnulli putant, in hac Terrâ Adamicâ esse Sulphur, & Sal comm. Naturæ, & habere vim ardendi, teste *Rosenkreutzero*, qui cum vellet ex hac parare spiritum, ardere cepit. Quomodo autem iste spiritus ad ☉ & ☿ solutionem destilletur, apud *Joh. Phil. Rhumelium* in *antidotar. chemico*. & in *Rosenkreutzers Astronom.* p. 363. invenies.

Aldem Terra etiam mentionem facit suprâ citatus *Nierenbergius* Cap. 59. Cujus virtutis mirabilis & fidem ferè superans, dum defunctorum corpora 24. horarum spatio in pulverem redigit, quàm virtutem etiam in aliàs devecta regiones non amittit. Dicitur Parisiis cœmeterium ejusmodi terrâ gaudere, quàm de Naturâ calcariâ participare dico.

Terra Chia suo candore se commendat, sumptâ

denominatione ex sui nominis insulâ, quæ sita est in mari Icario circâ minorem Asiam, olim *Chios*, nunc vulgo *chio* aut *schio* easdem cum samâ vires possidere dicitur. Faciem mulierum erugat, & lavigat, emendatamque reddit, in balneis utuntur famellæ ad cutem abstergendam.

Terra Iuana, optimum est in febribus malignis cum succo citri mista remedium, ac in vermibus puerorum expellendis ac compescendis abdominis cruciatibus mira præstat. Apprimè conducit motibus illis convulsivis, quibus non raro pueri tentantur. Ob facultatem adstringentem, refrigerantem & exsiccantem sanguinem, ex quâcunque corporis parte fluentem compescit.

Terra Cimolia siccatur, refrigerat, digerit, aceto dissoluta, parotides & alia tubercula discutit, item ambustis mox illitâ medetur, ne pustulæ generentur. Nit. & Acet. dist. mixta tumorem pedum sanat, testium tumores dissipat, si ceræ cypriæ permisceatur. Illita immodicos sistit sudores; achores & ulcera capitis tollit, ad erysipelata commendatur, si imponitur. vid. *Cesius* l.c. sect. 10 p. 151.

Terra Oreana, cujus *Ol. Wormius* etiam meminit in musæo p. 15. sic dicta ab Oro, quod Italici Aurum denotat, quasi Terram auream seu solarem diceret. Per Italiam enim & Galliam aliquot ante annos circulator quidam percurrerebat, hoc Terræ genus contrarios morbos venditans; sed unde advecta, & an artificio quodam depurata, non constat. Gleba est crocei coloris, minimè pinguis, arenosa & fibrosa, acida aliquantum, leviter adstringens, levis, in pulverem levissimè diffiliens. Terræ sigillatæ Naturam & vires æmulari dicunt. Intellexit tandem *Wormius* Terræ speciem non esse, sed succum inspissatum *Achioti* similem & locum in *chocolatâ* obtinere, dici verò *Oreanâ* à loco ubi crescit planta ex quâ exprimitur. *Barlaus* in rebus gestis *Mauritii* p. 128. vocat Tincturam aurantii coloris *Orellianam*.

Terram *Antiscorbuticam* commendat *Henricus Petrus* in dissert. *Harmon. de Scorbuto* 38. in *Norvegia* propè Bergas celebre emporium Terram rubram sigillatæ cuidam non absumilem effodi perhibent præsentaneum scorbuti alexipharmacum. Cur igitur Terra *Antiscorbutica* vocetur, hinc patet eò, quod radicitus scorbutum extirpare dicunt, Drachmâ unâ in aquâ antiscorbuticâ exhiberi, ut sudorem provocet. Miror autem hanc Terram ad externos non exportari. Vulgaris est morbus exotica suspicere & admirari, propria autem despiciere.

Terra Martialis, hæc in fodinis mineræ martis reperitur, & ad usum Medicum accommodat *Zacutus Lusitanus* in *Prax. Histor. Libr. 3. obs. 3*. Quæ in umbra exsiccata subtilissimè teritur, lavigatur, eademque dosi, modo, ordine & forma in iisdem affectibus ægrotantibus offerenda est, in quibus Mars solet præscribi, imò ægri mirabiliorem & efficaciorē ejus usu percipiunt utilitatem, quam ex ipso. Id quod & *Petrus à Castro* Practicus Veronenus confirmat remedium inauditum & sæpissimè expertum ad menses ciendos egregium indigitans. Quam laudem *Zacutus* & *Petrus à Castro* huic Terræ attribuit, eandem & merito mineræ Nostræ *Martiali Cassiliensi* ovum dictæ Philosophicum deferimus, quæ inibi effoditur partim cedens in crucibula fusoria, partim in Medicum veniens usum ad nos deferretur grisea intus instar pyritæ Hallam, Lipsiam, Geram &c. Hæc optimè trita aëri exposita temporis progressu in flores salinos martiales splendidissimos degenerat albos, ex quibus secundum artem cum spiritu roris majalis conficior Tincturam Martialem Rubi ni vel granati colorem æmulantem jucundo spectaculo. Non desunt, qui pro Tincturâ Olarii vendant.

tant. Hujus usus in massâ sanguineâ à salibus sylvestribus liberandâ per urinam admirabilis est; vide tractat. de Auto Auræ Anonymi. Hofmannus.

TERRA MERITA, vid. *Curcuma*.

TERRA VITRIOLI, vid. *Vitriolum*.

TERRÆ OLEUM, vid. sub titulô *Naphthæ*.

TESTICULUS CANIS, vid. *Orchis*.

TESTUDO.

TESTUDO, Græcis Χελών, *A Tortoise*. Testæ pars superior [in Testudine terrestri Indica maxima Parisiensibus descripta] è variis lamellis seu squammis diversæ figuræ, plerisque tamen pentagonis, componebatur. Lamellæ isthæc seu segmenta ossi affixa erant cranii instar, Animalis interanea cingentes cum duplici apertura, unâ anteriùs per quam caput scapulas & pedes anteriores exserit, alterâ huic oppositâ posteriùs, unde pedes posteriores & femora egrediuntur. Os isthoc cui squamæ adnascabantur nonnullis in locis fescunciam crassum erat, alibi ubi tenuissimum, lineam & dimidiam crassitudine non excedebat. Duplex est, altero dorsum integrum, altero venter, quæ in lateribus sibi mutuo commissa sunt, & ligamenti validis durisque junctæ, non ita tamen quin moribus obeundis cedant & libertatem permittant.

TESTUDO terrestris vulgaris, *The common Land Tortoise*. Luteis & nigris maculis seu arcolis in dorso distinguitur. Testa superior valde convexa est, inferior plana. Caput habet parvum, serpentinum, quod exserere & intra testam subducere potest pro libitu, aut prout res exigit. Palpebra superiore & meatibus auditoriis caret. Per hyemem sine cibo in terra latitat; & quàm diutissime vivit.

JABOTI Brasiliensibus *Marogr*. Lusitanis *Cagado de terra*. Testa nigra est, cui multæ figuræ hexagonæ insculptæ. Rostrum ut in reliquis. Caput & crura fusca, verùm maculis ex umbra variegata. Jecur sapore optimo commendatur.

Testudo aquarum dulcium, & *Lutaria*. Testudinem lutariam ab eâ quæ in Aquâ dulci vivit non sejunxit Aristoteles; illa in palustribus & limosis aquis, fossisque Uribium & Castellorum mænia ambientibus degit; Latitudo ei in dorso pectori similis, nec convexo incurva calice, ingrata visu. Vocatur à Gallis *Tortugne d'aigüe*; id est, Testudo aquatilis, ad discrimen terrestris, quæ duæ similes sunt, nisi quod aquatili cauda est longior, perinde ac in muribus, à quâ muris Aquatici nomen accepisse videtur. Testa colore est nigro, aliquot particulis veluti Tabellis pectinatim junctis constat, pro arbitrio pedes, caudam, caput modò exerit, modò recondit. Pulmones, renes, vesicam, denique partes internas easdem habent lutariæ Testudines cum marinis. Vescuntur insectis aquatilibus, limacibus, cochleis, herbis, &c. Cibo omni destitutæ diu vivunt, atque etiam abscisso capite; in foris venales sunt pro re diæreticâ.

Testudo marina, vulgaris. A terrestri præcipue differt magnitudine quâ eam excellit, Testâ, minùs pulchrâ & concinnâ, molliore; pedibus piscium pinnis similibus, ad natandum comparatis. In ingentem magnitudinem excrescit. Inveniuntur frequentes circa *Brasiliam* & insulas *Caribbeas* quarum unius caro 80. vel 100. hominibus in prandium sufficiat.

Solinus in Mari Indico tam grandes esse scribit, ut testis duabus superna parte junctis & inferne deductis ædes suas construant. In Taprobana insula *Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.*

adium recta ex testis Testudinum constare refert *Ælianus*. Populos Chelonophagos *Æthiopie* vicinos ejusmodi corticibus pro cymbis quibus ad continentem navigant, item pro tentoriis, uti docet *Diodorus Siculus*. Vidit *Herbertus* noster in mari Indico Testudines tantas ut quatuordecem homines unius dorso seu testæ superiori insistere possent. *Nico. Trigantius Jo. Fabro* pro certo asseveravit in mari *Sinico* Testudines vidisse se tantæ magnitudinis quantæ erat ejus cubiculum, quod passus erat longum decem, latum septem. In *Cuba* insula in tantam magnitudinem excrescere scribit *Joannes de Laet*; ut 5. viros testâ suâ sustineant, & cum iisdem prorepant. Mas & femina per integrum mensem Lunarem in complexu Venereo perleverant. In dorsum resupinando eas capiunt piscatores, dum in summis aquis fluitantes dormiunt tacitè appropinquantes, & resupinatas manibus præ se agentes ad cymbam usque, ut in mari Mediterraneo vidimus. Cum supini in dorso jacent, ex imo pectore suspiria ducunt, & lachrymas ubertim fundunt. Loco dentium os habent unum continuum, tam durum ut crassos bâculos unico ictu præcidere dicantur. Mandibula superior canalem insculptum habet, inferioris aciei dentatæ excipiendæ; & inferior vicissim canalem quem subintrat superioris dentata protuberantia, quorum ope gramen aliâque herbas faciliè decerpunt.

In terram egressæ in herbis pariunt ova (inquit *Plinius*) avium ovis similia, & ad centena numeros (Ova alba sunt non tamen ellipticæ figuræ ut Avium ova, sed Sphæricæ.) Quæ de incubatu habent venteres falsa sunt; nam solis calore duntaxat foventur & excluduntur: quod de omnium in universum Testudinum ovis dictum esto. Pulmones hujus Animalis non in Thorace sed in ventre inferiore sub Diaphragmate sitos esse *Joannes Faber Lynceus* notis sæpius laudatis affirmavit. Curavi (inquit) asperam arteriam aliqua ex parte detruncari, ac tubulo ex arundine immisso eam insufflari. Statim ambos pulmones in ventre imo conspicuos habui, ad extremum ejusdem ubi intestini recti exitus habentur pertingentes, & versus thoracem surgentes, in latitudine valde crescentes, rubicundos ac planè coloris elegantissimi. Descendit à latynge in thoracem aspera arteria, quæ in eadem pectoris capacitare quoque bifurcatur, & ubi ambo hi rami diaphragma perfoderunt, sub hoc in pulmones ingrediuntur.

Hi suâ substantia sunt subtilissimi, ita ut inflatæ vesicæ quædam rubræ esse appareant, sed verè tamen pulmonum substantiam obtinet, & parte illâ quâ dorsum respiciunt, firmiter adhærent; ita tamen ut digitis non cultro aufertur, & à dorso liberari valeant.

JURUCUA Brasiliensibus, *Tartaruga* Lusitanis. Loco pedum habet 4. alas; anteriorum quidem quamlibet sesquipedem circiter longam, posteriores verò breviores; caudam acutam conicam; oculos nigros magnos; os edentulum, & instar rostri volucrum. Habui 4. pedes longas, tres latas. Costæ testis inferuntur, ad quodlibet latus 8. Mediæ longiores, anteriores & posteriores breviores. Ova illorum comeduntur uti & caro. Ponunt a. ova ad litus maris, foveam in arena facientes, & deinde arenâ tumulantes. Sæpius inveni vestigia illarum ex mari egredientium, & retrò abeuntium. Variis figuris Geometricis testæ q. insculptæ videntur. Quædam testam habent nigram splendentem, flavis lineis & figuris egregiè interstinctam; aliæ aliter conformatam.

Hæc videtur esse Testudo Franca, *Tortue Françoise* Rochefort: *Hist. Naturelle Des Antilles*. Cujus solius, inquit, caro in cibis comendatur: quæ per sæpe ad ma-

gnitudinem adeo enormem excrescit, ut testa superior 4¹/₂ circiter pedum longitudinis, latitudinis 4 obtineat. E mari in terram nunquam egrediuntur nisi ovorum ponendorum gratiâ; quæ foveâ pedibus effossa in arena recondunt. Modum quo sadi è mari egressa hæc animalia in dorsum resupinando capiunt apud Autorem vide. Ducentas libras non raro pondere superant. Ova rotunda sunt, Pilæ palmaris magnitudine, Gallinaceorum modo albumen & vitellum intus continentia, non tamen testa dura fragili, sed molli tantum & membranacea testa. Ova in arena deposita, absque ulla incubatione, solo calore Solis intra sed circiter hebdomadam spatium excluduntur: quo facto recens natæ Testudines naturæ instinctu, arenam in qua sepultæ erant penetrant, & ad mare se conferunt.

TESTUDO marina *Caönanna* dicta, *Tortue Caönanne* Rochef. Eiusdem est figuræ cum præcedente, nisi quod testam habeat paulò crassior. Verum caro ejus nigra est, filamentosa, & ingrati saporis.

TESTUDO *Caretta* dicta D. Rochefort. *Tortue Caret.* A præcedentibus duabus differt, quod multo minor sit, quodque ova in arena non ponat, sed in glarea seu sabulo calculis & lapillis admixto. Caro ejus ingrata est & nullius prædii. Verum ova delicatiora sunt quam aliarum specierum. In pretio est ob testam in squamas seu laminas, 15. in universum, tam grandes quam parvas, divisam; quarum 10. planæ sunt, quatuor nonnihil incurvæ, quinta quæ collum tegit triangula est & concava veluti clypeus parvus. Spolium *Carette* plerumque 3. aut 4. lb. pendet: interdum squamæ adeo crassæ seu spissæ sunt, & laminæ longæ latæque, ut omnes unâ 6. aut 7. libras ponderent. Ex squamis hæc multa fiunt [aut incrustantur] pretiola utensilia, pectines, vaginæ, cochlearia, cultrorum manubria, cistæ, abaci, capsellæ, speculorum margines, &c.

JURURA Brasiliensibus, *Cagado d' agoa* Lusitanis *Marogr.* Minor est reliquis testudinibus. Testa superior, figuræ ellipticæ, 10. digit. habet longitudinem, latitudinem 9. convexitate considerata; inferior testa 9. dig. longa, 4¹/₂ lata & plana. Intra testam se abscondere potest, & collum rursus ad 3. digitorum longitudinem extendere. Caput tres digitos crassum, & paulò oblongius, nasus elevatus & acuminatus: os amplum, oculi nigricantes, pupilla nigra. In pedibus 4. ungues oblongi, nigri: Cauda brevis acuminata. Cutis rugosa & q. è squamis constans. Testa superior fusca, inferior flavescens. Ova ponit subrotunda, dimidii gallinacei magnitudine, testa alba, boni saporis si frignantur. In domo Autoris absque omni cibo solidior 21. menses inedia toleravit.

TESTUDO terrestris pusilla ex India Orientali. Worm. Mus. Testæ superioris longitudo vix 4. est digitorum, latitudo 4. Tribus constat tessellarum ordinibus, & limbo omnes ambiente. Hæ verò tessellæ variis coloribus pictæ sunt, nigro, albo, purpureo, subviridi, luteo, quæ ubi laminatim decidunt remanent vestigia è nigro luteola. Inferior testa tota albicat, & variis lineis denticulatis interstinguitur. Caput & rostrum Phitaci formâ habet, in cujus summitate præminencia quædam miniata, luteo interstincta. Collum angustum: Pedes anteriores, ut & crura corneis squamulis obsita. Pedes plani sunt, in 4. ungues terminati. Crura posteriora longiora sunt & tenuiora, corio communi testæ, sed pedes squamosi, & ut anteriores 4. unguibus armati. Caudam tenuem habet, in apicem terminatam, vix digiti dimidii longitudine. Alii hujus generis sunt majores & minores.

Testudo tessellata minor, an picta seu stellata *Wormi?* *The lesser chequered Tortoise.* Hist. R. S. Mus. D. Grevv. Hujus dorso operculum, si per convexum meriaris dig. 7. longitudine superat latitudine 5. colore nigro, striis rhomboidibus referto. Tres ordines prominentiarum præter limbum testam constituunt superiorem, in quorum medio 5. in lateribus 4. conspicuntur eminentiæ, à quarum centro nunc plures, nunc pauciores ad ambitum derivantur lineæ stellatim dispositæ. Inferior testa 8. discretis constat laminis, futuris q. conjunctis, quarum duæ reliquis duplo majores; nigro & subluteo colore variegatæ omnes.

Hæc est Descriptio Wormiana, Mus. p. 317. Testudo D. Grevio descripta ab hac quid differat, apud ipsum vide R. S. Mus. p. 37.

Aliarum Testudinum testas in museo Reg. Societatis Londin. asservatas describit D. Grevius in Catalogo & Historia Musci prædicti.

1. Testudo tessellata major, *The great chequered Tortoise-shell.* Ex Insula Madagascar transmissa est. Ellipticæ seu ovatæ figuræ solidæ plusquam dimidia pars est, ex omnibus quas unquam vidi maximè concava, pedem longa, 8. dig. lata, & 6. propemodum alta. Reliquam descriptionem & figuram apud Autorem vide; nam sine icone intellectu difficilis est descriptio verbis concepta.

2. Testudo tessellata ex Suranam. Cujus etiam descriptionem ob rationem prædictam omitto.

3. Testudo tessellata Virginiana.

4. TESTUDO Squamosa. *A Scaly Tortoise-shell.* Lutarii generis esse videtur, pedem plus longa, 10. uncias lata, ad altitudinem 3¹/₂ convexa; media parte secundum longitudinem in acumen insignè assurgit. Testudini *Carette* Rochefortii affinis & similis est. *Rainis in Synopsi Histor. Quadrup.*

OFFICIN. NAT. è TESTUDINE.

1. Crura. 2. Sanguis. 3. Fel.

Vires. 1. Crura pro Periapto antipodagico experientissimo adhibentur.

Videlicet.

Accipiatur Testudo masculina, cognoscitur inter cætera ex candæ discrimine, & leni sub inferiore testâ incisura, ubi Luna maximè fuerit diminuta, priusquam cum Sole conjungatur, amputentur vivæ crura omnia, ea consuta in sacculos ex pelle hædina angustos alligentur membris patientibus, ita ut dextrum crus testudinis dextro cruri ægrotantis respondeat, sinistrum sinistro. Item antè crus dextrum brachio dextro applicetur, sinistrum sinistro, *Solenand. sed.* 1. consil. medic. 20. *Schenkius in observ.* Idem refert *Bapt. Porta ex Rhafi & Constantino, libr. 4. Phytogn. cap. 4.*

2. Sanguis Testudinis marinæ & terrestris, in remediis internis pro antidoto datur ad 3ij.

Sanguis Testudinis terrestris ad Hæcticam imperatur (*recens & crudus ad 3ij.*) exiccatus ad Epilepsiam commendatur.

3. Fel, Oculis confert.

[Hepar ad suffocationes uterinas in pecto utile.]

[Ex testudine ad cancrum præsidium paratur.]

Schröderus.

TETRAPHARMACUM, vid. Unguentum.

TEUCRIUM.

Teucrium à Teucro inventore dictum planta est fruticescens, foliis Chamædryos, æmulis floribus Galea Carentibus.

Teucrium staturâ suâ & magnitudine, foliis latioribus

ribus à Chamædrys differt, quacum folijs Galea carentibus convenit. *Rains.*

Medetur morbis lienis & venenis resistit, si decoctum propinetur.

THALICTRUM.

Thalicttrum seu *Toalietrum*, *Τάλικτρον*, ή *Θαλίτρον*, similitudo figurarum & ή scripturæ varietatem peperit. Forte à *θάλασσα* vireo, dictum est, eo quod dum germina protrudit eleganter vireat.

Nota ejus Characteristica sunt folia umbellatarum in modum divisa, flores staminosi, semina ut in umbelliferis striata. Nonnullæ tamen species thalictri dicti semina folliculis inclusa gestant.

Vires. Folia in oleribus admixta alvum nonnihil commovent, autore Dodonæo, radicis decoctum idem potius præstat, Optimum Rhabarbari substitutum est. D. Palmer.

Thalicttris quibusdam in locis in Italia, teste Camerario utuntur contra pestem; in Saxonia contra icteritiam. *Rains.*

THAPSIA.

Thapsia ex eo nomen accepit, quod in thapso ejusdem nominis Insula primum inventa fuerit, autore Dioscoride.

Thapsiæ *nota generica* sunt folia tenuiter dissecta: semen alâ foliaceâ summâ parte bifida cinctum, sapore acro.

Vires. Thapsiæ radix ejusque succus aut decoctum supernè interneque cum violentia purgat, ideoque intra corpus exhiberi non debet. Quidam pro Turbith per errorem substituant. Messanenles ex numero sunt, qui pro Turbith hac planta utuntur, ut recte Imperatus. *Rains.*

THE Sive THEA

Nomina. The Sinenfium sive Tsia Japonensibus *Breyntii*. Chaa; herba Japoniæ *I. B.* lib. 27. cap. 1. *C. B.* p. 147.

The compluribus & densis ramis est frutex: foliis obscure viridibus, per circuitum serratis, non tam Chamæla agni, quam spiræ Theophrasti substantia & toto habitu æqualibus; saporis exsiccantis cum quadam amaritudine: flores proferens (quantum ex pictura, & duobus, at imperfectis, ex Japonia transmissis flosculis conjicere potui) cistiæ feminæ & gossipij mediam faciem obtinentes uberrimos, quinque foliolis albicantibus aut pallidis constantes, staminibus multis medium florem occupantibus. His demum succedunt fructus dum adhuc vigent (ut ferunt) virides, resiccati autem cortice magis rugoso, ex spadiceo fusco vestiti, in quibus non minus quam in Coccis Orientalibus mirabili varietate mutabilis Vortumnus ludit. Quidam penitus globosi sunt instar discorum Coccorum ea etiam magnitudine, aut duplo pæne aliquando majores, semen tantum unicuique continentes: alii contra geminati, sive in duos loculos dispersi, alii vero trigoni, forma & magnitudine à fructu ricino simili *J. B.* non admodum ablucentes: hi maturi ubi se aperiunt in tres, illi in duas dehiscunt partes, quarum quælibet semen continet, quod vel orbiculare planè ad styracis, vel quia minus splendet, ad fructum exoticum 15. à Jacobo Gareto acceptum *Clus.* propius accedens, vel in una parte sessilis, nonnunquam etiam triquetra est nucula, tenui putamine & lævi, spadiceo seu subrusi coloris, excepta basi (qua parte adhæsit) albidis, constans, quo nucleus subalbidus pallidusve ac valde rugosus, gustu primum dulci, postmodum amaro & nauseabundo, tandemque calido & valide exsiccante, cuticulâ tenui & Cinerea obductus continetur.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Catalogum Autorum qui de hoc frutice scripserunt vide apud *Jac. Breynium* exor. centur. 1. cap. 52. quibus adde *D. Pechlin* Belgæ Tractatum de Thea anno 1684. editum, in quo Historiam ejus plenam tradidit, & contra *Sim. Pauli* utum ejus defendit. *M. Dufour* historiam Theæ, Lugduni impressam 1685. & tractatum quendam Anglicè conscriptum Londini 1682.

Verum omnibus quæ de Thea scripta ab aliis sunt observationes *D. Wilhelmi ten Rhyne*, magni Imperatoris Japoniæ Medici, præferendas censemus; quæ apud *Jacob. Breynium* habentur in appendice ad Exor. Centur. 1.

Semen hujus fruticis circamensem Februar. terræ (ni nimio indurata gelu, vel nive altius tecta sit) mandant Japonenses sequenti methodo; in terra bona, dulci, non salia, neque limosa, neque arenosa nimis, sed temperata, rotundum ad octo aut paulò minus pollicum altitudinem scrobem effodiunt, cui à 40. ad 50. seminales folliculos confertim injiciunt, exinde Scrobem operientes, eundemque inhorrescente bruma stramineis storeis regentes. Hæ autem seminalia capitula communiter in sex octo, decem, ad quatuordecim, & quandoque plures paucioresve frutices propullulant, quos absque ulteriore cultura naturæ ingenioque suo relinquunt agricolæ, nisi quod eos ab inutilibus herbis repurgent. Stirpes autem quod spissius glomeramen alterioremque apicem (rarius tamen supra quatuor aut quinque pedes) exurgunt eo meliores judicantur, mollioribus utpote magisque benignis folijs, quæ rarenter intra primum triennium decerpunt Japonenses: decerpunt autem plerumque mense suo tertio, qui ordinario juxta nostrum Aprilem est, nonnunquam ad usque modium Maii procurrit (anno nimirum intercalari, quo vis triennio recurrente) quando matres cum suis infantibus & ancillis folia hæc calathis colligunt, novella & recens edita (subflavescente suo virore & parvitate à virentibus folijs facillime distinguenda) cum parum adoleverint sicca tempestate, quacunque diei hora, in primis intensiori solis æstu, avulsâ circa vespeream portant domum.

Tum singula folia fusæ ex ferro patellæ Sinicæ, nitidæ, candenti atque obliquè collocatæ (ne manus comburant) injectant, eademque manibus assidue versant, usque dum flaccescant, mundis tunc storeis papyrove imponenda, ac perslanda sibi bello ut frigescant; hinc in planis ex Arundine Indica confectis corbibus conteruntur, donec compactæ crispentur: hinc iterum in pura & modicè candefacta patellâ uti antea manibus continue versantur, donec mediocriter induruerint, deinde patella eximunt & flabello frigefaciunt, & in tertia ac quarta patellis per gradus minus calefactis revolvunt, ut majorem siccitatem durioremque contrahant. Tandem ollis intrinsecè vitreatis bene clausa servant, & in urbes pagosve venalia transferunt. Postquam autem per sexiduum circiter ollis referata fuere, easdem aperiunt, foliorumque delectum, minora & teneriora à majoribus & durioribus separando, faciunt, ultimâque vice in quinta patellâ securitatis ergo siccant, in annos tunc durabilia, si accuratè obturata teneantur.

Pro Imperatore & Magnatibus majore studio & cura colitur. [Prope Misko urbem locus Oasi dictus totius Japoniæ in hoc opere princeps est] frutices nempe, à nimia pluvia, vel intenso ardore frigoreve, cæterisque aeris, injuriis & pravis purgamentis, volatilibus reptilibusve infectis studiosè præmuniuntur, justo rigantur tempore &c.

Congrua tempestate scrupulosa foliorum fit electior tenerrimi fruticuli ramusculi primævis in apice folijs nudantur, quæ eapropter carissima potentioribus

reservantur emptoribus; hæc autem à mediocribus; hæc iterum à majusculis, hornotinis tamen singulis, segregantur: omnia in umbra siccantur.

Ruricolæ & tenuiores folia eo quo diximus modo præparata promiscuè in æneo cacabo aqua repleto lento coquant igne, & sic toto die pro communi potu in foco suspensum servant; donec iteratis tincturis folia illa debilitate rejiciantur, ingestis protinus novis. Primates autem & locupletiores cives nullum in re domestica opus majore diligentia, fastu atque Nitore & artificio curant quàm sui T'chia præparationem. Quandoquidem qui in cæteris parcissimæ sunt supellestilis copioso, & superbo instrumentorum famulorumque apparatu impensè imò ad superstitionem usque gestiunt.

Instrumenta sunt ex electo ophite mola (quali nostrates semen Sinapi conterunt) qua suum T'chia in tenuem pollinem commolant. Præterea fornacula, ex mixto cum aliis metallis ære artificiosè fusa, cui aqua plenam cucumam, ex eadem materia confectam superimponunt, ut semper præsto sit lymphæ fervens hinc exiguis cochlearibus (ex testudineo cornu aliove pretioso ligno, vel etiam metallis fabrefactis) viridem illum ac bene fragrantem pulverem T'chia calycibus suis infundunt, ac superfusa cum mundato haustro infundibulove aqua fervida pulverem hunc minutulis, ex Arundine indica crenarum forma artificiosè concisis, secis tandiu quassant donec in spumam elevetur. Famulos qui in hoc opere occupantur omitto. Sinenfes autem (quorum methodum nostrates sequuntur) fervefactam in cupreo cacabo aquam siccis integritque folijs Thee, singulari ollæ prius injectis superfundunt, tincturamque extrahunt, quàm limpida aqua ad gratam amaritudinem temperatam calidè sorbent, saccharumque ut plurimum unà mastificant, uti & nostrates, rarius autem Japonenses, tamen *γλυκύφιλοι*. Deinde novâ affusâ aquâ tincturam iterum extrahunt secunda vice, quæ debilior est primâ, postea folia abjiciunt; quæ socijs Navalibus meliorum defectu acetariorum vicem supplent. (Japonenses autem iisdem folijs rubentes papulas ac cutanea sudamina curant; atque in tinctoria arte eadem (vetusta licet) usurpant Mauri.

Fruticis hujus natale solum varium est in Japonia: plurimus in regione Fisien crescit. Humo gaudet neque arenosa, neque lutosa nimis, neque declivi, neque acclivi nimis, aprica & temperata planitie lætior: multis autem in locis inter ipsa frumenta in pulvillorum liris frutices Theæ confitos intuearis. In China etiam crescit.

Pretium pro foliorum magnitudine variat. Quantum namque magnitudine sursum decrescunt tantum pretio accrescunt. Tanta est autem pretij differentia, ut una libra hujus Theæ pluris veneat quàm centum libræ alterius: foliorum verò bonitas in grata fragrantia (proxime autem ad sæni accedentis odorem, tantisper aromaticum accedit) colore viridi (nam parum masticata frictaq; ubi fuerint, viror vividus emicare debet) sapore subamarè dulci.

Vires. Has ei vires tribuunt Sinenfes, sanguinem purificat, horrenda pellit insomnia, vapores à cerebro arcet malignos; vertiginem capitisque dolorem, præsertim à crapula ortum mitigat; hydropicis conducit; egregiè enim diuretica est, capitis rheumata exsiccat, humorum acrimoniam corrigit, obstructions viscerum tollit; visum instaurat; quippe quantum ego existimo, hæc decoctio T'chia primum Japonensibus est antidoton contra visus imbecillitatem ac oculorum vitia illis frequentissima, ac ex assiduo oryza calidæ & sui Sacqui potu & usu maximè contracta. Aduetos humores temperat, calidum emendat jecur, induratum lenit lienem; som-

num coercet, ut in ijs præsertim qui rarius Thee bibunt. Corpora vero reddit vegetiora; inprimis autem hebetiores à somno ac Torpore sensus exergit, cor exhilarat, timoremque propulsat, intestinorum tormina ac flatu compescit, illosque qui utrum infestant discutit: Viscera viresque roborat, reminiscendi vim exsuscitat, ingenium acuit, bilem temperat, nephritidem tollit, medicamen hoc Lithontripticum; ego saltem nunquam in Japonibus vel minimum calculi, five renum, five vesicæ indicium reperi, sat sedulo licet inquisiverim; ac tandem dulces in amplexus vertit officium Thorii.

Ad specifica stomachica pertinet herba Theæ, non tantum stomachum roborans, sed & à calculo & arthritide præservans; & capiti inprimis conveniens. Præservat ab ebrietate & somnum arcet, & stomacho inprimis confert. Ettmüller. Prax. cap. de chyleseos læsionibus.

Quæ in Bontii & Pisonis historiis hujus plantæ reprehendit & emendat apud Breynium vide.

Quòd in Europæis regionibus quædam sanitatis incommoda æquè efficaciter non arceat potus ille Thee quàm apud Sinenfes vel Japonas, non præparandi utendive modo adeo imputandum censeo quàm quidem assiduitati usus & temperatori videtur rationi.

De nocuentis hujus potus hæc apud Antonium de Heyde occurrunt in centur. observationum, obs. 76.

Tincturam è folijs Thee mediante aqua calida extrahi vulgo notum est. Ejus potum aliquando quibusdam conducere negare nolo; tamen ut eum omnibus utilem putem adduci nequeo: quippe verisimile videtur emolumenta quædam Thee adscripta ab aqua calida potius esse deducenda. Hunc potum quibusdam nocuisse videtur experimento sæpius probatum: inter alia hoc patet sequenti historia, mulier vegeta & sana, potui Thee addita, conqueritur de frigore acri interiora concutiente, præsertim noctu, quod à Thee potu derivandum putat hanc ob causam, quia eo potissimum corripitur ubi huic potui indulgit. Memini ante aliquot annos virum robustum conquestum esse de frigore acri in abdomine, quod etiam potui Thee, quem quotidie sumebat imputat. Communicavit D. Hulse de potu Theæ & Coffee, hæc occurrunt in Muis Podalirio redivo. p. 59.

Sed quid sentiendum de potu Theæ & Coffee? ego cum Lugduni Batavorum studiis operam dabam; per totum annum cephalæa misère laboravi, & postquam potui copiosiori Teè & præcipue quidem Coffee quotidie sumendo assuevi semper immunis ab ea vixi non tantum, sed & ab omni alio incommodo, quamvis antea ita vixèrim, ut mortis haberet vices lentè quæ trahebatur mihi vita gementi, qui per totum quinquennium cum longa morborum serie acriter conflictavi.

Et p. 85. ego nonnullos novi meorum familiarum antea haud parum à nephritide cruciatos qui nullum incommodum inde amplius perfererunt postquam potum Coffæ satis magna copia assumpserunt.

Cæterum hæc arbor rectius fortasse ad eas quæ fructu sicco sunt refertur.

Quidam ex Oriente reduces affirmant magnates Chinenfes & Japonenses decoquere gemmas & flores hujus plantæ, majores vires ijs attribuentes quàm folijs. *Raius*.

Thee sunt folia fruticis in Regnò Sinicò & Japonicò crescentis, quibus diversa magnitudine, diversum imponere pretium solet, minoribus, ut melioribus, majori pretio venientibus, Eligenda quæ sunt sæni recentis

centis instar odorata, non admodum nigra, aut siu corrupta, cum quadam amaritie adstringentia, & aque imposita figuram oblongam, acuminatam, & in ambitu crenatam exhibentia, inque plumbeis, stanneisve pyxidulis conservata & adportata. *Pharmac. August.*

Theriacā, vid. *Electuarium.*

Thermæ, vid. sub titulō *Aquæ.*

THLASPI.

Thlaspi à fructus forma, qui veluti infractus & contusus est, à *θλάω* infringo, conquasso, nomen accepit.

Thlaspeos nota Characteristica sunt capsulæ seu vascula seminalia compressa.

Duo autem *Thlaspeos* genera sunt, vel enim membrana cellulas seu loculamenta dissepiens ad planum seu latitudinem capsulæ parallela est, & quæ ejusmodi capsulam habent *Alyssa* dicuntur; vel ad latitudinem siliquæ transversa seu perpendicularis, quod genus *Thlaspi* simpliciter dicitur, de quo hic.

Nomina. *Thlaspi* Vulgatus *I. B.* Vulgarissimum *Ger.* vaccariæ folio *Park.* Arvense vaccariæ incano folio majus *C. B.*

J. B. Ex radice satis crassa, fibrosa, lignosa, alba, subacri caules exurgunt hirsuti, teretes, rigidi, brachiati: quibus folia sine pediculis adhærent, longa, sensim angustiora reddita, ferrata sive crenata, geminis pinnulis caulem amplectentia, sapore cum morfu acri. Flosculi minimi, albi, multi, ut in bursa pastoris dispositi, quatuor foliis virescentibus sustentati, apicibus candidis. Capsulæ præmaturo ortu flores occupant, foliaceæ, subrotundæ, infractæ, in summo fissæ, in quibus semen acre sinapi aut nasturtii.

His adde, folia quæ à radice exeunt longis pediculis inniti; siliculas seu vascula sem. longioribus pediculis insidere quàm in nasturtio hortensi, deorsum reflexis, & bina duntaxat semina, hinc inde unum continere.

Inter segetes præsertim solo arenoso aut glareoso frequens oritur.

Vires; *Thlaspeos* semen calidum est & sicc. usus præcipue in internis abscessibus rumpendis, mensibus ciendis, Ischiadicis affectibus curandis. Extrinsecus abstergit ulcera quæcumque manantia, insuperque parvum est, sed minus vulgare. *Schrod.*

Gravidis quia særum necat; infestum censetur. Idem ingreditur hoc semen Theriacam.

THORA VALDENSIS.

De qua jam sub titulō *Aconitum* cum figura addita.

J. B. Caulem habet singularem, palmarem, aut fere etiam dodrantalem, junceum: folia duo aut tria ex radice statim principio oriuntur; cauli quoque circiter medium adnascitur, nullo interveniente pediculo, folium unum aut alterum, unumquodque singulare, ordine caulem conscendens; circinata fere rotunditatis (imo latior plerunque) Cyclamini folio par aut etiam duplo majus, in medio per marginem aliquando sinuatum, interdum minus, rigidum, nervosum glabrum, argutis denticulis concinne in ambitu crenatum, reliqua superiore caulis parte parva, oblonga, acuminata, simplicia, aut in lacinias aliquot fissæ Thalictri folia æmulantur flos summo cauli insidet unicus, (interdum bifidus caulis in singulis ra-

mis singulos gerit flores) Ranunculi & figura & colore luteo; nec dissimile ranunculorum echino capitulum è seminibus coacervatis conglobatum. Radix numerosis constat, habitusculis, oblongis, Asphodeli imitatione ad caput unum obliquum annexis radiculis; in tenuia longaque filamenta desinentibus.

In altissimis jugis montis Juræ propè Thuiri copiosam invenimus. Provenit & in monte Baldo;

Clusius in Etlicheri præcipitijs, & copiosius in Sæber, observavit, cujus folia breviora; superna etiam parte latiora & magis incisa deprehendit quàm sint Thoræ Valdensem & montis Baldi. *Rainw.*

Thoracica, vid. *Pectoralia.*

THUNUS Sive THUNNUS.

Thunus, (ὄψος ὀψεν, quod est, magno impetu moveri, quia velocissimè natat: seu ab Hæbreorum Thannin, quo cetaceum piscem intelligunt, Cujus & varia nomina, pro diversitate ætatum; & historiam admirandam peras velim è Johnstoni lib. de piscibus, cap. 2. *Charleton.*

Hujus piscis caro non malè vitulinam sapore referens, sale condita asservatur & in longinqua convehitur. Non tantum autem mensis apta est, sed etiam veneno ac rabiei, imò moribus viperarum si resistere creditur, si comedatur & extus applicetur.

THUS.

Nomina. Olibanum sive Thus *Park.* Thus *I. B.* arbor Thurifera *Ger. C. B.*

J. B. Sicca ac pinguior est, Thuris Lachryma quàm mastiche, statimque in luculentam pertinacemque flammam exardet, odore multo imbecilliore, sed nihil per incendium stillat, ut mastiche; dentibus statim friatur, verum friatura non cogitur denuo, ut mastiches, neque ut ea liberè volutari potest cum dentibus eorumque præsepulis adhærescat. Sapore est amaro & modice acri, non ingrato, tamen, Cæsalpino adstringenti subamaro. Colore est ex albo fulvescente, minusque pellucet quàm mastiche, colore candicante aut subruffo; translucentæ guttæ, aliàs singulares, aliàs gemellæ Testiculos aut mammas, prout eæ majores minoresve fuerint, imitantur, unde & mammosi & masculi Thuris cognomenta: interdum quaternæ aut quinquæ magnitudine ciceris, Avellanæ, & majores, adhærentes nonnunquam suo cortici unde exudarunt: friatæ à verò immundior ex grumorum attritu decussa Thuris manna Græcis appellatur.

Quod ex eo (Thure) inquit Plinius rotunditate, guttæ pependit masculum vocamus, cum aliàs non ferè mas vocetur ubi non sit scæmina. Masculum alij putant à specie testium dictum: *Casp. Hofmannus*, quàm ob causam masculum vocabant se nescire scribit, nec enim arridere quæ Plinius dicit lib. 12. cap. 14. nobis satisfacit Plinius ob formam vel præstantiam masculum dictum.

Mammosum thus *J. Bod.* à Stapel à masculo distinguit quod illud oblongis grumis mammarum instar pendulis compositum sit; hoc parvis rotundis, candicantibus aut flavis, interdum singulis, interdum testiculorum instar gemellis constat: alij hoc ab illo non differre voluit.

De Arbore thurifera nihil certi traditur. Theophrastus arborem non magnam esse tradit, quinque fere cubitis attolli ramosam esse, folia habere pyro similia, corticem lævem ut Laurus. Alij tamen (inquit) similem lentisco esse ajunt, & ejusdem fructus subrutilo folio; alij & cortice & folio

etiam Lauri. Diodorus Siculus Acaciae Aegyptiacae formam Arbori thuriferae attribuit, salicis folia, Lentisici autem folia myrrhae Arbori, in quo Dioscoridi & Theophrasto plane contrariatur: quomodo hæc concilianda non video; nisi sit quædam transpositio. Garcias quoque thuris arborem humilem esse & folia habere Lentisco similia scribit.

At Thevetus arborem thuriferam pinus resiniferas referre tradit: verum iconi quam proponit cum pinis nulla est similitudo; quamvis se fingat adstare Arbori, aut ei adstantem pingat. De vera ergo forma hujus arboris etiamnum incerti manemus, quod neque veterum quisquam, neque recentiorum in vastas illas Arabiæ solitudines penetravit quæ Thus dant, ut Casp. Hofmanni verba usurpem.

Oportet tamen ut regio thurifera satis latè pateat, & arboribus etiam abundet, cum Thus tam vili veneat.

De loco Thuris magna lis est: nonnulli Arabiam solam Thus gignere scribunt, nec tamen eam omnem; sed Sabæam dictam, solis est thurea virga Sabæis, Virg. Juba, autore Plinio, negat in insulis nasci præter Arabiam ullis. Thus quoque præter Arabiam nullis gigni Theophrastus & Plinius tradunt. Dixere tamen postea, quod ex relato acceperant, id etiam nasci in quibusdam insulis. Thevetus etiam multas insulas & regiones hujus feraces esse scribit præter Arabiam, & quibusdam in locis tam vulgarem esse quam Aurantiæ malum: Thus tamen quod ex Arabia deferitur, ut olim ita & nunc omnium præstantissimum haberi.

Dioscorides præter Arabicum Thus inveniri & indicum scribit. At Garcias per universam Indiam Thus non nasci certissimum esse ait, cum quicquid thuris ibi consumatur ex Arabia deferatur: & miratur à quo Dioscorides id acceperit. Potuit forte à colore nigro quoddam thuris genus Indicum appellari, quemadmodum Myrobolani nigrae inde denominantur. At Bodæus à Stapel Indum Græcos vocasse ait hoc genus, non quod in terra ipsa Indiæ continente nasceretur, sed in insulis Arabiæ adjacentibus, quæ tum temporis erant sub Indorum potestate, quæ deinde ab Arabibus forte sunt recuperatae, & hodie sub eorum sunt principatu. Duplicem thuris quotannis messem esse tradit Plinius & confirmat Thevetus. Meti semel anno solebat, minore occasione vendendi; jam quæstus alteram Vindemiam affert; prior atque naturalis Vindemia canis circa ortum fragrantissimo æstu, incidentibus qua maximè videatur esse prægnans, tenuissimusque tendi cortex. Autumno legitur in æstivo partu. Secundo Vindemia est vere, ad eam hyeme corticibus incisis; Plin. quod æstate colligitur candicans, purum, nitidum, pellucidum est (inquit Thevetus) alterum quod vere rubescens, pondere, pretio, bonitate, viribus superiore longè inferius.

Vires. Quod ad vires attinet, Thus calfacit, siccat, & subastringit. Usus præcip. intrinsecus est ad varios capitis & pectoris affectus, ut & ad alvi utrique profluvia, ad tussim (deglutitur vesperi frustatim) vomitum, sanguinis excreationem, diarrhoeam, dysenteriam mitigandam. Avicenna depravatis sensibus & abolitæ memoriæ Thus opem præstare tradit. Dioscorides Thus in secunda valetudine haustum insaniam facere, & largius cum vino sumptum interficere ait. Nos ergo (inquit J. Bauhinus) consulimus, ut nulli affectui interno præscribatur, nec etiam in suffumigiis, si vera scripsit Dioscorides de ejus naturâ; sunt nobis alia tutiora medicamenta pro roboranda memo-

ria, & adversus alios pravos affectus internos.

Extrinsecus inservit suffitibus pro capite roborando; catarrhos discutit, cava ulcera carne replet & ad cicatricem perducit: cruenta vulnera, cephalica imprimis glutinat, perniones (cum suillo adipe aut anserino) sanat: ulcera cacoetha tum sedis, tum reliquarum partium demulcet (tritum cum lacte linimentum oculorum tubedini ac lippitudini medetur (scil. aq. rosarum multiplici inextinctione thuris imprægnata, lactique muliebri postmodum commixta pro collyrio liquido:) verrucas incipientes & impetigines abigit (cum pice & aceto impostum) emplastris, unguentis; balsamis ad vulnera & ulcera mundanda & carne replenda utiliter admiscetur. Præcipui usus est in cranii fracturis Olibanum cum albumine ovi tritum & temporibus applicatum hemicranii & cephalalgia prodest.

Ad aurium dolores, (aures ulcerosas Matt.) cum vino dulci (& calido) infunditur.

Cortex thuris vim habet eandem quam Thus; efficacior tamen est, & magis astringit. Quare potius magis commodat sanguinem spuentibus, & fluidis affectionibus appositus. Hodie in usu non est; nec scio an olim importaretur per se, sed duntaxat qui una cum thure ab arbore deradebatur, eique adherebat.

Alia res est Cortex thuris nonnullis dictus, vel thymiaia vel Thus Judæorum quod Judæi in suffumigis frequenter utantur est corticosum quid ex India allatum. Manna thuris dicta eandem etiam vim habet quam Thus ipsum; nec enim aliud est quam micæ thuris concussu elixæ, ut Plinius scite.

Fuligo etiam thuris olim in usu fuit ad mitigandas oculorum inflammationes, sistendas fluxiones, repurganda ulcera & cava implenda compescendaque carcinomata; verum nunc dierum non amplius in usu est. Modum autem faciendi fuliginem vide apud J. B. tom. 1. part. 2. pag. 306.

Cæterum Thuris usus antiquissimus & longe celeberrimus erat in sacris; thure enim sacrificabant olim, eoque in templis ad suffitus utebantur. Nec rarior ejus usus est nunc dierum in templis Christianorum ad suffumigia. Ejusdem (inquit Amatus) etiam usus est in lustrandis cadaveribus mortuorum. Et mirum dictu ut hic mos per omnes ætates, inter omnes fere gentes & religiones inolevit.

THURIS LIMPIDI FOLIUM Lob.

Nobis cum Parkinsono nihil aliud esse videtur quam limonio congeneris plantæ Clusio dictæ foliis. An I. B. eo nomine descriptum diversum sit inquirendum. Thus, vel rus ut in antiquis Codd. absque aspiratione legitur à tundendo dici scripsit Salspater, ut rus dicatur quasi rusum, nempe à glebis rulis, sive tunsis. Aliis placet Thus dici quasi θυῶν, ῥωτὸν ῥωτὸν, quod Vossio magis placet: nam θυῶν Græcis idem ac θυμιαμα suffitus sive ut recentiores loquuntur incensum. Quemadmodum ῥωτὸν unde ῥωτὸς, idem interdum ac θυμιαμ suffire. Voss.

Ἀβανον Græcis quidem dictum volunt à juvene Assyrio ejus nominis in hunc fruticem converso, quæ Deos studiosissime colentem invidi occiderunt: hinc diis thure gratius nihil afferunt. Alij malunt à monte Libano: sed in eo, thuris arborem reperiri veterum nemo prodidit. Verisimilior illorum opinio, qui à Ἀβανό stillo nomen accepisse scribunt. Officina Olibanum vocant à Græca voce ὀλβανός, ὀλβανός arbor ὀλβανός Lachryma. Euripidi vice versa ὀλβανός arbor, ὀλβανός Lachryma, ut recentiorum nonnulli observant.

THYMELÆA.

Thymelæam dictam volunt quasi rithymelæam, quod oleæ

oleæ ferat folia, & Tithymali instar alvum solvat: certe tum foliis tum qualitate Tithymalum refert. hujus generis *Note Characteristica* sunt flores Monopetali in quatuor laciniis acuminatas expansi, baccæ monopyreni, vis acris & cathartica.

Nomina. Thymelæa *Ger. Park.* foliis lini *C. B.* Monspeliaca *L. B.* Clus.

Frutex est pollicaris interdum crassitudinis, cubitalis vero altitudinis, aut amplior, & in multas virgas divisus, cubitales, tenues, pulchras, rectas, quæ sepiunt perpetuò virentia folia, lini fere, sed majora, latiora, non obtusa cuspide ut Chamælæa, neque adeo fragilia, sed mucronata, lenta, & gummosum quiddam si dentibus atterantur præbentia. Flores fert in extremis virgis copiosos tetrapetalos, oleæ fere similes, candidos, racematim fere propendentes; deinde fructum baccarum myrti interdum magnitudine, paulo longiorem, initio viridem, postea coralli modo rubrum, carne succi plena ceraforum instar; sub quo later unicum semen, nigra fragilique pellicula obductum; & fervidi saporis medullam obvolvens; radix ignota est & dura, in tenellis plantis raphani modo efformata, crasso cortice tecta, sed quæ admodum tota planta lento & admodum tenaci.

In Italia & Gallia Narbonensi agris depressioribus inter alios frutices passim provenit. Clusius per totam Hispaniam locis asperis nasci tradit.

Hujus fructum Coccum seu granum Gnidium Antiquorum Botanici peritiores existimant. Officinis Mezerei Germanici baccæ pro Cocco Gnidia habentur. Cocco Gnidia vis ardens & fauces adurens: unde miramur perdices & aviculas Thymelææ baccis avidissime vesci. Ast grana non sunt baccæ integræ rubræ [quæ fortè esculentæ sunt] sed semina quæ baccis celantur. Rustici Hispaniarum singulis annis propè infinitas aviculas hoc semine curvatis virgis & quibusdam lineis dispositis venantur, testibus Amaro & Clusio.

Cavendum monet Camer. Ne quis radice vescatur, quia paucis horis perimit. *Rains.*

THYMALLUS.

Thymallus, [à Thymo, quem olet; unde Bellonius Thymum vocavit. *χρυσόφωγος*, Aurivorus,] seu quod minutula auri fragmenta propter splendorem appetant: seu quod, cum majori pretio veneant, obfophagorum aurum absument, & oculos exhaustiant. Piscis est spectatu dignissimus, squamis durissimis argentei coloris tectus; ad latera juxta caudam æris rubedine splendens. Pinnis donatur subcæruleis, notis rubentibus maculatis; Lien sanguineus. Ventrículus longior crassiorque, rugosus intus, foris candidus, Cartilaginis instar durus, Appendiculis plurimis, ceu lumbricis, donatus. *Charleton.*

OFFICIN. ex THYMALLO.

Axungia.

Vires. Oculorum maculas, unguësque abstergit, [Sole liquata & melle permixta, maculas cutis tollit, foveas post variolas relictas explet, [illita] *Schrôd.*

THYMBRA, vid. *Satureia.*

THYMU M.

Θύμος vel *Θύμ* τὸ *θυμὸν* dicitur, quod adhibeatur ijs qui animi deliquium patiuntur ob crassos humores; vel *Θύμ* τὸ *θυμιασμός* ἢ τὸς *θυμὸς* quod hoc veteres in sacris quæ igne accenso fiebant primum usi sunt. Aliàs Grammaticorum Conjecturas de ratione & origine nominis vide apud J. Bodæum à Stapel. Comment. in Theophr. Hist. lib. 6. c. 2. pag. 566.

Differt à Satureia, cui aliàs similis est, odoris fragrantia, & floribus in oblonga capitella congestis.

Nomina. Thymus Capitatus, qui Diosc. *C. B.* Thymum Legitimum Capitatum *Park.* Thymum Creticum, sive antiquotum *L. B.* Thymum Creticum *Ger.*

Clus. Suffrutex est Thymum, pedem interdum altus, multis ramis lignosis, tenuibus & candidis præditus, quos per intervalla ambiunt folia, sibi invicem opposita, angusta, tenuia, candicante, acris gustus, quæ quibusdam locis hyeme decidunt: nam ubicunque sponte nascentem hanc plantam inveniebam, seu hyeme, seu veris initio, folijs viduam conspiciebam: sed utrinque ab exortu & vestigijs foliorum prominebant veluti oblonga Capitella, instar eorum quæ in origano onite sunt, ex tenellis foliolis viridibus congesta, aded confertis & numerosis, ut unicum longiusculum folium appareret. Ipsa capitella cum floribus in planta virente observare non potui. Hispalis autem, ubi maximus est ejus proventus [nam aliud Thymum non norunt] magni ejus jam resiccati fasciculi demonstrati sunt, cum suis folijs & longiusculis capitellis suos purpurascens flores adhuc retinentibus gratissimi odoris: ille enim in aqua decocto utuntur ad dolia, quibus vinum reservatur eluenda & repurganda: non minoris etiam usus est ad conciliandam odoris gratiam iis vasis quibus Uvæ conditæ asservari solent.

Non modò circa Hispalin copiosè nascitur, sed Gadibus etiam, qua parte insula ponte jungitur continenti, tota insuper Batica in maritimis collibus, meridiei obversis. Nos in Saxosis propè Syracusas, Siciliæ Urbem invenimus, D. Wheeler in Insula Corcyra.

Et in insula Cithæra nunc Cerigo aliam seu speciem, seu varietatē folijs minoribus agminatim nascēribus.

Bellonio Autore ita frequens in tota Græcia reperitur, ut nulla herba in montibus facilis proveniat, ubi pro loci diversitate florem profert omnino album vel cæruleum aut purpureum vel mixtum.

Vires. Thymum cum aceto & sale pituitam per alvum detrahit: ejus decoctum prodest anhelosis & Orthopnoicis, tinea ventris exigit, menses, partus & secundas pellit, atq; urinas cit; cum melle in eclegmate faciliores efficit excretaiones: recentes tumores discutit, cum aceto illitum; concretum sanguinem dissolvit; verrucas peniles tollit: Ischiadis cum vino & polenta impositum subvenit, hebetibus oculis in cibo: est enim & sanitatis tempore ad usum idoneus loco condimenti Dioscor.

Pares illi facultates tribuit Plinius, & insuper addit, dari Comitialibus, quos correptos olfactus excitat Thymi: & visis contra inflationes, & si venter urgeat, testesse aut vesicæ dolor exeat, articularibus morbis ac luxatis tritum ac lanæ intpersum ex oleo imponi: dari & portionem articularibus morbis trium obolorum pondere in tribus cyathis aceti & mellis.

Thymo, quia gratissimi odoris in aqua decocto utuntur Hispalenses [Clusio referente] ad dolia, quibus vinum asservatur, eluenda & repurganda: non minoris etiam usus est ad conciliandam odoris gratiam iis vasis quibus conditæ uvæ asservari solent.

THYMU INODORUM C. B. Park.

C. B. Prod. Suffrutex est, ob lævem lanuginem quæ pubescit incanus; Caule lignoso, cortice incano, rugoso vestito, qui in plures ramos palmo minores, recurvos, hique in alios & velut in orbem dispositos dividitur, quos per intervalla folia brevissima, angustissima, plura simul juncta, inodora & pæne insipida cingunt. Cauliculorum summis flores plures, purpurei, formâ & dispositione Thymi vulgaris floribus similes insident.

In Regno Valentino locis arenosis ad littora copiosè provenit.

Vires. Saporis est subacris, unde attenuat & incidit, usus præcip. in affectibus Tart.; 1. Pulmonum, ut asthma, tussis

russi &c. 2. Artium ut podagra omnia viscera referat, appetitum excitat. Extrinsecus in tumoribus frigidis, fugillationibus, inflationibus ventris, doloribus arthriticis, Schröd.

Nostratibus usurpatur pro olere, & jussulis incoqui solet: calore suo ventriculum resocillat, & concoctionem promovet. *Rains.*

TILIA.

Tilia, si Papiæ credimus, quasi Telia, quod lignum ejus ad telerum usum sit utile ob levitatem ejus. At Martinus à *tilov* penna, nempe ob foliola albicantia pennas referentia urde umbellatim flosculi efflorescunt. Cæterum A. bor hæc ligulis foliaceis oblongis communi flosculorum pediculo adnascens, floribus Pentapetalis, fructu rotundo parvo monococco, cortice lento & ad texendos habili, a reliquis hujus generis non difficulter distinguitur.

Vires. Cortex & folia tilix siccant, repellunt, urinam ac menses cient, corticis mucilago in ambustis ac vulneribus magni est solaminis (cortex commansus & illitus Dod.)

Folia trita & aqua conspersa pedum tumores discutit, ad aphthas etiam & spasmus flarulentum in gravidis singulare remedium habentur. Eorundem succus expressus, cum vino mixtus & calidus artubus infrius spasmis eidem bene facit.

Flores paritum tenuium & cephalici sunt, eorundem odor perquam suavis est; aqua destillata in frequenti usu est ad Epilepsiam apoplexiam, vertiginem. Commendatur etiam ad cordis tremorem, uteri dolores, calculum renum, sanguinem contusione aliqua concretum. Aliqui tritos Tilix carbonem admiscunt. Dosis ʒi. aut ʒiʒ. Quidam adversus ventris tormina exhibent. Mollisculæ etiam ea utuntur ad faciei fucû.

Baccæ in pulverem redactæ in dysenteria aliisque alvi profluviiis summopere laudantur; cum aceto tritæ & in nates inditæ ad hæmorrhagiam. Baccæ aliquot deglutitæ valide sanguinis è naribus profluvium compescere dicuntur.

In cortice Tilix interiore, phylira dicta, recenti adhuc, olim scriptitatum.

Sutores tabulis ex hujus ligno factis ad secanda coria utuntur, quoniam ob molliem cedit ferro nec ejus aciem retundit, contra ac veteribus visum. Quin & sculptores simulachrorum ex hujus materia omnia pæne simulachra exsculpunt. Levis enim est, tenax facile secatur, diu durat, nec teredini obnoxia est.

Carbones hujus omnium optimi sunt pro pulvere pyrio conficiendo, item pro delineationibus pictoribus expetiti.

E Cortice fines (ut diximus) & Corbes, lagenæ, & cunæ, ut Thophrastus, vel potius cistæ aliaque vasa texuntur.

Basileæ & alibi pauperiores adventante hyeme Tilix folia recondere solent pro vaccarum & caprarum pabulo, uti refert J. Bauhinus. *Rains.*

TINCA.

Tinca, *merula fluviatilis* Scaligero. Martinus dictam putat quasi tincta, sc. subviridi & nigricante colore. Piscis latiusculus, utrinque quasi compressus, squamosus, tactu lubricus, ad nigredinem tendens, pinnis cæruleis. Celeriter ad justam magnitudinem accrescit. Tinca umbilico imposita icteritiam sanat, vulgi experimento plantis pedum per medium secta, supposita, in peste venenum diverit; nec non calorem febrilem. Fal aurium affectibus, flatibus, & vermibus efficax medela, *Charleston.*

OFFICIN. NAT. ex TINCA.

1. *Integer piscis* 2. *Fel.* 3. *Lapillus.*

Vires. 1. *Integer piscis* dilectus imponitur pulgibus manuum pedumque plantis, ad mitigandum æstum febrilem, vel & ad divertendum venenum pestilentiale. Simili etiam modo adhiberi solet in dolore capitis ac artic. Vivæ tinæ (una post alteram) in umbilico ac epati impositæ, donec moriantur, Icterus curare dicuntur, luteum nimirum contrahunt colorem. Incineratam tincam, (præcipue tegumentum) in fluore albo mulierum exhiberi vidi cum successu.

2. *Fel.* commendatur ad aurium affectus.

3. In capite gerit *Lapidem* ut Carpio, qui ad similes affectus exhiberi poterit, quo dictus Carpio nis lapis. *Schröderus.*

TINCTURA.

Tincturæ, tum liquidioris, tum solidioris consistentiæ in utu sunt.

Liquidioris consistentiæ Tincturæ nihil aliud sunt, quam extractiones sine abstracto menstruo.

Solidioris consistentiæ Tincturæ sunt pulveres, sine combustionem ex liquidioribus tincturis abstracto menstruo residui. Et hoc juris sola mineralia sibi vindicare videntur.

Modus fiendi est is, quem de Extractis dedimus. Conveniunt nimirum Tincturæ cum Extractis in plurimis, adeoque non raro confundantur, quam confusionem ut in alijs, ita & hocce in loco removere, non absque commodo foret. Hinc sunt Tincturæ.

1. Ex fructibus.

4. *Rob. affunde V.* ac extrahe.

Vel 4. Baccas seu fructus exsiccatos, affunde aq. convenientem stillatitiam, ac extrahe, &c.

N. Si Tinctura lentè inspissetur, Extractum dicitur. *Quercet. P. R. cap. 26.* Sic fiunt Tinctura cerasorum, baccarum sambuci, ebuli & simil.

4. Flores siccos, infunde in aq. appropriata, (propria) vel fontana tepida, additis guttulis aliquot spiritus. Oi, vel Sulphuris.

Famulosiores Tincturæ sunt, E Mineralibus.

Tinctura

☉
☾
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

vide libro tertio.

Sulphur.
Sapphir.
Smaragdi.

E Marinis.

Tinctura Corallorum.

Succini.

Ex Vegetabilibus, & maxime ex floribus.

Tinctura Alkekengi è baccis.

Essentia croci, vid. l. 4.

Cerasorum nigrorum.

Fragarum.

Hypericonis, vide c. 57.

Flor. Bellidis.

Papav. Rheados.

Pæonia.

Rosarum.

Violarum.

Jalappa.
Rhabbarbari.
Roris Solis.
Granorum Sambuci.
Ebuli.
Tartari.

Ex Animalibus.

Tinctura fellis tauri; vide libr. 5.

[1. Tinctura anodyna D. Jo. Dan. Herstii.]

[2. Salis Tart. *, ana q. v. tublim. quinquies.]

℞. Hujus sublimati pulv. ʒj. Opii ʒss. g. ij. Benoin.
ʒj. Castor. g. ij. Croc. ʒss. Spir. Vini ʒss. diger. per
horas 48. filtr.

2. Tinctura Parac. diaphoretica correcta à
S. Cloff.

℞. Zedoar. angelic. calam. arom. galang. macis.
zinzib. cinam. gran. parad. piper. nigr. caryoph. saffr.
sarsapar. ulmar. an. ʒj. aloës. mastich. myrrh. thur.
camphor. ana. ʒss. mosch. ʒj. infund. in spir. vini &
aq. ros. moschat. an. q. s. ut superemineant digitos
4. Adde ad maturandam putrefactionem, ℞ Sulph. per
somp. ʒss. satis juniperi ʒj. stent in loco calido per
14. ʒ.

Dos. ʒj. in formâ qualibet. Eliquat glaciata, resi-
nosa diffundit, fuliginosa efflat, balsamica suâ vi putre-
dinem arceat, & soporiferis morbis auxiliatur.

[Hæc ferè ex omnibus radicibus, herbis, floribus &
feminibus Alexi-pharmacis, baccis herbæ Paris,
cortic. citri, Costo, Gran. Chermes, Agallocho,
Croco, & camphora paratur, infundendo in Spiritum
Juniperi & Sambuci, & destillato Spiritum
Theriacalem addendo, nec non spirit. Tartari, &
Vitrioli, tingitur Santalo rubro.]

Dosis à guttis x. ad xx. xxx. xl. ʒ. lata, datur ubi
æstus major in febribus malignis.

Quæ cum Spiritu Salis Tartari volatilis parata,
ubi malignitas major.]

[Præter vim alexipharmacam etiam commendat-
ur in atonia viscerum, Cachexia, melancholia hypo-
chondriaca, imò & in Epilepsia.]

4. Tinctura Catheretica S. Cloff. Arch.
Mediomatricum.

℞. Scammon. ʒj. turbitib. agar. hermodact. rha-
barb. ana ʒij. pulverisata indantur lagenæ vitreæ, ad-
dendo spir. vini per 40. ʒ. circulati, ut acrimoniam
deponat, (vel ejus loco aq. cinnam. alb. i. exstillat.) ʒss.

Infundantur per 8. ʒ. in ciner. & agitentur bis aut
ter singulis diebus, tinctus in aureo colore depleatur
serveaturque. Ejus cochl. j. m. cum ʒss. syr. ros. pallid.
viol. aut limon. adfecti cum ʒli.

Benignè admodum corpus à saburra phlegmatica aut
serosa vindicat & repurgat, Schröderus.

Tinctura variæ è variis.

Tinctura Aluminosa Magistralis ex Pharmaco.
Londinen.

℞. Aq. plantag. rosar. rubr. an. ʒij. sublimati.
Alumin. rupei an. ʒij. Terantur Alum. ei sublima-
tum, bulliante simul cum aquis in vase vitreo ori-
ficii angustioris, ad absorptionem medietatis. Post
quintiduo factam desidientiam, F. Colatura clara, ser-
vanda in vase vitrea.

Tinctura Anodyna Ludovici.

℞. Extract. opii simpl. ʒj. Aqua apoplectic. Lu-
dovici spir. vitrioli. roridi an. ʒiv. mista stent do-

nec liquor probè tinctus & opium ferè solutum enter,
tunc serva.

Præstat hæc tinctura in plurimis morbis plusquam
integra remedium phalanx, v. g. in complurium
malignarum principis, vomitu, diarrhœa, ne-
phritide, Rheumatismo, &c. Dos. gutt. vi. ad x.
xv. vel xx. præcipuè noctu data.

Tinctura Antimonii ex Pharm. August.

℞. Salis tartari ʒij. Antimonii electi ʒss. pulve-
risata & mixta fluant in crucibulo; valido igne per
horam postea ad eundem modum, quo tinctura tartari
parari paulò post monstrabitur, cum spiritu vini suæ
extractio, & liquoris tincti ad tertiam partis remanen-
tiam abstractio.

Ufus ejus est imprimis in depurando sanguine, un-
de hypochondriacis, cachecticis, ictericis, & sca-
bilosis prodest.

Tinctura Aperitiva Mœbii.

Est spiritus salis, abstractus à sale tinct. aut alio quo-
cunque alcalino, sicq; refractus, tunc tornasolis tinctus.

Famossissima olim vivente B. Mœbio, & ut palacæa
prædicata fuit, in stomachi fermento confortando,
appetitu excitando, tartaro hypochondriacum pel-
lendo, flatibus discutiendis, urina & arenulis pel-
lendis, calore præternaturali & siti sedanda &c. ubi
videlicet partes biliosæ, & humores exorbitantes &
nimium ebullientes acido mili mitigari necesse habe-
bant.

Cramerus in suo Collegio Chimico aliam tradit
hujus tincturæ aperitivæ præparat. v. g. ℞ Salis com.
ʒj. ana. ʒij. Tart. ʒij. mixta destilla per retortam, &
spir. egressum rectifica à Se Tart. ac tingatur torna-
solis. Non ergo spiritum salis hoc medicamentum
constituere, sed tantum ejus ingrediens esse, inquit.
Injectio verò ʒis Tart. tam diu continuanda est, do-
nec ebullitio cessat.

Operatio optimè instituitur in alembico supernè
foramine prædito, quod subito post injectionem
claudi debet quo spiritus subtilis exurgens in reci-
pulum transeat & capiatur.

Tinctura Aphronitri Mollenbroc.

℞. Aphronitri q. l. affunde ei spir. ʒis guttatim tam
diu, donec nulla amplius sentiatur effervescentia, tunc
filtra ac serva.

Quoad vires præbet insigne antinephreticum, in
Tartaro per urinam expellendo.

Tinctura Bezoardica Ludovici.

℞. Rad. carlin, vincetoxic. Enula, Zedoar. an.
ʒiij. croci or. integr. pulv. viperini, myrrha an. ʒj. opii
ʒvi. castor ei ʒij. g. esso modo incisa infunde cum spir. vi-
ni simpl. non adeo phlegmatici, vel spir. Juniperi opti-
me dephlegmati ʒiij. stent in leni digestionem per dies
xij. sepius agitando. Tunc ℞. Liqueoris hujus tincti
decantati ʒiv. (si forte ʒss. remanentibus speciebus
inhereat) adde essentia camphora ʒij. spir. ʒ. propria
mann elaborati, sed non rect f. ʒij. spir. ʒli. roridi
ʒxij. Misce tingatur vel santalo rubro vel floribus pa-
pav. siccatis, & servetur.

Tinctura Bezoardica D. Juncken.

℞. Rad. Angelic. Imperator. Valerian. Levistici,
Enula, Aristol. utrinque tormentill. zedoar. an. ʒj.
herb. scordis, card. bened. ruta an. mij. flor. tunic. ca-
lendl. hyperici an. mij. sem. angelic. levistici, citri, ru-
ta, an. ʒj. ecc. Juniperi ʒij. cortic. citri aurant.
an. ʒij. myrrha ʒij. croci ʒss. incisis & conquassatis
affunde, spir. juniperi mens. iv. stent in infusione probè
clausa per tempus, tunc encurbita immissa destilla, donec
mensura una circiter produat, quam serva.

Rema

Remanentiam exprime & cola ac leni calore evapora & inspissa in extracti formam. Cui tunc affunde spiritum prolectum: & stent, donec probe tinctu & saturatus existat.

Huius spiritus tincti ℥. ℥iij. spirit. Tartari propria manu parati & non rectif. ℔℔. Oli roridi, sive volatilis ℥. i. Camphor. spir. subtiliori soluta ℥i. Misce, & serva; tempore usus & ratione circumstantiarum, cum tinctura anodina, castorei, &c. maritanda.

Vires sunt admodum insignes, etenim Alexipharmaca est & sudorifera, diuretica, & emmenagoga, obstructions aperit & flatus dissipat, febres abigit, tam continuas quam intermittentes, hystericis medetur &c. Dos. gutt. xx. ad 60. in continente vehiculo.

Alia Bezoardica ex Eodem.

℥. Rad. zedoar. ℥ij. angelic. pimpinell. Valeriana ver. vinetoxici an. ℥j. herb. Scordii m. iij. millefolii, ruta, melissa an. m. j. calami arom. ℥j. costi electi, cortic. citri exter. recentium, baccar. juniperi an. ℥ij. myrrha ℥ij. camphor. ℥j. Theriac. opt. ℔℔. spir. vini boni mensur. ij. post cotidianam digestionem abstrahantur in arena spir. ℔ij. his adde spir. Tincturi genuin. ℔℔ vitrioli volatil. ℥vi. Misce & tingantur cum baccis herba paris, ac filtrentur & servantur.

Tinctura Castorei ex Pharm. Londin.

℥. Castorei pulv. ℥℔ spiritus Castorei ℔℔. digerantur simul per dies x. in frigido. Colatura servetur pro tinctura Castorei.

Tinctura Cinnamomi vulgò Aqua Clareta ex Pharm. Londin.

℥. Cinnam. contusi ℥ij. spiritus. vini rectif. ℔ij. Fiat infusio per quatrimum vase amplo, subere, & vesi a clauso, bis terve in dies agitando, seorsim verò dissolvatur ℔℔. sacchari cand. in ℔ij. aqua rosar. Misce utrumque liquorem, & indatur nodulus continens Ambra grisea ℔℔. moschi gr. iij.

Tinctura Coralliorum ex Pharm. August.

Spiritum mellis funde super fragmenta coralliorum rubicundissima pulverisata, digerendo extrahetoties Tincturam donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Omnes extractions mixtas lento igne coagula, residuumque denuò rectificatissimo vini spiritu extrahere & filtra.

Mundificare sanguinem, obstructions viscerum referare atque leucophlegmatia, cordi palpitatione, syncope, Melancholia, hydrope, podagra, calculo, utero purgando & valis urinariis proficuum medicamentum esse creditur.

Quamvis traditam hanc coralliorum tincturam pro vera & genuina venditare, nunquam nobis in mentem venerit, eandem tamen omnino hic expungere non potuimus, inprimis quod reipsa sit innocua, & ab aliis vix meliores, aut si ab examen revocentur, haud genuinæ, miris licet encomiis condecoratæ, in medium fuerunt adductæ. Nos, qui non adeo præcellentem virtutem à Coralliis sic tinctos liquores obtinere, experientia edocti scimus, & sincero Exc. D. D. Joh. Majoris iudicio, in tract. quem Genii errantis titulo donavit, pag. 203. prolato, adquiescimus, hanc operi nostro insertam volumus, ut opinioni vulgi & aliorum persuasione radicata satisfaciamus, ut & habeamus, quod expetentibus præscribamus.

Tinctura Corticum Aurantiorum ex Pharm. Norimberg.

℥. Corticum Aurantiorum exter. q. v. relinquantur in umbra per diurnum spatium; superinfundatur spiritus vini rectificati suff. quant. & relinquantur in digestionem blandi caloris, per triduum; novè denò cortices infundantur post digestionem, & pro usu asservetur.

Tinctura Cosmetica ex D. Funcken.

℥. Storac. calamit. Benzoi an. ℥j. Balf. Peruvian. ℥ij. spir. vini rectificat. ℔. ℥vi. stent. in infusione, donec spiritus est probe tinctus & saturatus, tunc filtra & serva, ac alium affunde tandem, quamdiu spiritus tingitur, tandem spiritus tinctos conjunge & serva, si ejus aliquid aqua rosacea admiscetur fit inde Lac Cosmet. cum.

Si Storax & Benzoi prius solvendo cum rore Majali, calore leni depurantur, & rursus inspissantur colata, tunc tinctura inde emergit nobilior.

Tinctura Croci ex Pharm. Londin.

℥. Croci opt. ℥ij. Aqua Theriacalis ℔℔. ℥viij. digerantur per dies vi. reservando colaturam.

Tinctura Fragorum ex Pharm. August.

℥. Fragorum recentium in mortario Marmoreo conquassatorum, Aqua cichorii an. ℔ij. Endivia, fragorum ana ℔ij. spiritus vitrioli boni ℥j. Digerantur invicem in loco calido per noctem, postea filtrentur, & cum s. q. syrupi fragorum edulcorentur.

Suave hepatis refrigeratorium vocat eam Balduin. Timæus, à quo respons. medic. 8. describitur. Præterea in Nephritide utiliter adhibetur.

Tinctura Hyperici ex Pharm. August.

℥. Summitatum hyperici florentis pulverisatarum quantum vis. Macera cotiduum in spiritu vini rectificati sufficient. quantitate, in loco tepido, postea filtrentur, & accipies Tincturam rubicundissimam instar rubini, saccharo edulcorandam.

Imbecillitatem mentis corrigit, in morbis etiam renum & vesicæ prodest, utinam provocat, & menstrua pellit.

Tinctura Jalapæ ex Pharm. August.

℥. Radic. Jalapæ resinosarum ℥ij. cortic. citri exteriorum recent. ℥j. cinamomi acutissimi ℥℔. semin. Anisi ℔℔. spiritus vini rectific. ℥ij. Fiat infusio per triduum in loco calido, postea fortis expressio & filtratio.

Suave fetosi humoris est catharticum, prælaudati Michaëlis inventum.

Tinctura Lunæ Zuelferi en D. Funcken.

℥. Argenti purissi per Furnum purgati ℥ij. spir. Opt. q. s. solvatur argentum, postea solutionem abstrahere in cucurbita vitrea, ad cuticulam, ut refrigerata in cristallum sive Oleum luna convertatur, quod leni calore in patella vitrea siccatur; pulverisato huic adde salis armoniaci sublimati duplum, mista relinquantur aliquandiu libero acri exposita, donec colore coeruleo imbuantur; tunc in cucurbitula sublima in arena, & sic anima Luna per reiteratas sublimationes cum novo semper Alco evehatur postea verò per elixivationem cum aqua simplici à sale rursus

*rimis liberetur: tunc vero spiritum vini summe recti-
fic. & sale volatili microcosmi essentificatum, repetitis
affusionibus Tinctura extrahatur; tandem spiritus om-
nis tinctus paulisper abstrahatur in MB ad tres circiter
uncias: cui si caruleus color disparuerit, nonnihil salis
communis vel microcosmi addatur, & tunc servetur tin-
ctura.*

Tinctura Martis è vitriolo ejus ex Pharm.
Norimberg.

*℥. Vitrioli martis, cum spiritu, vel oleo vitrioli,
vel sulphuris, parati q. v. calcina in sigillo ad rube-
dinem, extrahere cum spiritu vini composito (ex spiritu
salis p. 1. & spirit. vini pars. iij. per retortam rectificati)
q. s. filtra & abstrahere in M. B. ad consistentiam ju-
stam.*

Tinctura Martis tartarificata sive liquor ejus
ex Lex. Pharm. D. Juncken.

*℥. Limatur. ♂, tartari crudi pulv. ana ℥ ℥. co-
que cum aqua mensuris vii. circiter per plures horas ad
mellaginem, subinde bacillo ligneo materiam agitando:
postea affusa denuo aq. font. mens. 2. vel 3. stent in in-
fusione per noctem, tunc repetatur coctio ut prius, tandem
filtra liquorem & ad tertias evapora, ac affunde huic
spirit. vini q. s. ita ut non minus diluta fiat tinctura. Ubi
parum dracidatur, rursus liquorem filtra & serva.*

Tinctura Nephritica Amelungi ex eodem.

*℥. ♂i puriss. tartari albi minera & Silicium pulv. an.
℥ ℥. ♂i ℥ ij. roris maj. q. s. ut probe humectentur pultis
infusa, stent ita per longum tempus 12. præter propter septi-
manas quo longius, eo melius, ut probe invicem fermententur,
ac materia exsicceetur: tunc destillatur ex retorta
inbulata; per vices injiciendo, & prodiit liquor tinctus, odo-
rem spiritus ♂i referens qui servetur.*

Vires prædicantur ceu specificæ ad resolvendas con-
cretiones tartareas, arenulosæque, dos. ℥j. ad 3℥.

Tinctura Odontalgica D. Jungken.

*℥. Rasur. ligni sancti ℥ ij. saffr. ℥j. rad. pyrethri 3℥.
fol. nicot. 3 iij. se. pill. origani an. 3 ij. caryophyll. 3 i ℥.
spir. vini simpl. ℥ ℥. stent in infusione & fiat Tinctura.*

Sedat dolores dentium, & stagnantes humores acres
extrahit, si ejus aliquid in ore continetur.

Tinctura Antiphthifica ex Pharm. August.

*℥. Salis saturni, vitrioli martis artific. an. 3 ij. spi-
ritus vini, Aceti destillati an. 3 ℥. misceantur & per ali-
quot dies digerantur, liquor rubicundus filtratur.*

Præter virtutem antiphthificam & hæmopticam,
etiam in alvi fluxibus utiliter adhibetur.

Tinctura proprietatis ex Pharm. August.

*℥. Spiritus Anisi 3 xvi. elixir proprietatis Parac. 3 j.
confectionis Alkermes incompl. 3 ℥. Flor. tunica rubrorum
3 ℥. stent in digestionem, donec saturato rubore spiritus ani-
si tingatur, qui filtratus saccharo clarificato edulcore-
tur.*

In melancholia, Asthmate, ventriculi imbecillita-
te, cardialgia laudabile præbet medicamentum. Vid.
Mynsichti Thesaurus Med. Chim.

Tinctura Rhabarbari Rolsinc.

*℥. Rhabarb. Alex. 3 ℥. ▽. cicbor. ℥ ℥. ♂ tartari
alb. 3 ij. rhabarbarum conusum misceatur cum ♂e
tartari & affundatur aqua sic in momento extrahitur
Tinctura, stent verò per tempus in digestionem, postea fil-
tretur Tinct. & servetur.*

Vires sunt insignes in bile acida corrigenda, & ob-
structionibus melenterii, & alvi solvendis. Dos. ℥j. ad
3 j. & ultra mane cum jusculo.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

Tinctura Rosarum ex eadem Pharmac.

*℥. Flor. rosarum rubrar. exsiccatarum 3 ℥. aqua
fontana ℥ ℥. spiritus vitrioli boni 3 ℥. stent in balneo mar.
tepido per horas xv. postmodum in colatura rubicundissima
dissolvantur sacchari albi 3 iij. & per chartam bibulam
trajiciantur.*

In febribus aliisque caloribus præternaturalibus in-
signe refrigerans, & hepati confortans existit.

Tinctura Scordii ex Pharm. Londin.

*℥. Fol. scordii selectissimor. sereno tempore collect. ℥ ℥. &
spiritus vini tenuioris, ℥ vi. digerantur in vase conv.
oburato per triduum. Fiat levis expressio, & infusio
repetita cum foliis rec. ad tertiam vicem. Liquor per de-
sidentiam depuratus servetur ad usum; sic fieri potest tin-
ctura chelidoni, ononidis, roris salis &c.*

Tinctura Succini ex Pharm. August.

*℥. Succini flavi subtilissimo triti 3 j. spiritus vini tar-
tarificati rectificatissimi 3 viii. leni calore in phiala optime
clausa per aliquot dies digerantur, & aliquantes movean-
tur, tandem liquor tinctus filtratur.*

Ulus ejus est eximius in capitis & uteri affecti-
bus.

Tinctura Sulphuris ex Pharm. Norimberg.

*℥. Flor. sulphuris, per vitriolum sublimatorum, q.
v. solvantur in spiritu terebinthina non nimio, extraha-
tur deinde, cum spiritu vini, ex prædicta solutione, tin-
ctura, quæ ab oleo terebint. facile separabitur: spiritus
vini per balneum, quantum opus fuerit, abstrahere, tinctu-
ramque satis coloratam, servare usui.*

Tinctura Tartari ex Pharm. August.

*℥. Salis tartari depurati quantumvis. Funde illud
in valido crucibulo igne intenso, inque fluxu tandem con-
serva, donec in colorem è rubro ceruleum transferit & ef-
fusum in mortarium ferreum calefactum pulverifetur, &
mox in phiolam eadem prius calefactam indito super-
funde spiritum vini rectificatissimum, ad eminentiam
trium digitorum; digerantur per aliquot dies in arena,
interdum agitando, donec spiritus vini rubicundo colo-
re tingatur; quo decantato, novam readfunde, quan-
diu opus fuerit. Ultimo liquores tinctos filtra, & ad tertiam
partem remanentiam abstrahere, quam ad usum serva. Ab-
stractus autem spiritus pro spiritu vini tartarificato infer-
vire potest.*

Tinctura hæc ad tollendas viscerum obstructions
valet, vesicam & renes à superfluis impuris humoribus,
urinam largiter movendo, liberat.

Tinctura Theriacalis ex Pharm. Londin.

*℥. Vini cretici, vel canarini opt. aliquoties destillati,
Aceti acerrimi in quo seminum ruta 3 ℥. in octa fuerit, an.
℥ ℥. misce ac insolentur, vel hypocausti, aut balnei calorem
digerantur, & aqua colata servetur usui.*

Tinctura Viridis ex Pharm. Londin.

*℥. Auruginis æris 3 ℥. Auripigmenti 3 vi. Aluminis
3 iij. coquantur in vini albi ℥ ℥. ad absupt. dimidui &
postquam refrigerit adde aq. rosar. rub. solani an. 3 vj.*

Tinctura Uterina ex Lex. Pharm. Dom.
Jungken.

*℥. Myrrha elect. 3 ℥. croci Orient. 3 ij. castor. 3 iv.
camphor. 3 i ℥. ol. sabin. dest. gutt. xx. optime tritis
affunde spirit. vini ♂e vol. impreg. 3 vj. m. & fiat
f. a. tinctura, cujus dosis 3 ℥. ad 3 ℥. cum vehiculo
conveniente; in doloribus optime poterit addi tinctura
anodina.*

○○○○

Vires

Vires sunt inignes in affectione hysterica, mensibus obstructis &c.

Uterina Alia ex Eodem.

℞. Castor. opt. ℥ss. myrrhæ el. ℥ij. O succini vol. C. C. vol. non depurat. Flor. * ci, ☉. aribemif. an. ℥j. croci opt. ℥v. camphor. ℥ss. spir. vini rectificatiss. ℥ij. infunde in vitro probe clauso per tempus, tunc filtra & serva.

Tinctura varia ex Baldass. T. I. M. A. E. O.

Tinctura Cordialis.

℞. Flor. recent. & calo sereno ante exortum solis collect. borragin. bugloss. rosar. calendul. lynchidæ coronarie, an. q. v.

Abscissis petiolis versus colliculum inde in cucurbitam vitream affund. oleum sacchari factum cum spiritu vini alcoolisato, superpone alembicum cæcum, commissuris hermetice fetuminatis, insolentur per octiduum. Hinc flores exime & exprime per linteam mundum, liquori novos flores commisce, ubi Tincturâ spoliatos deprehenderis, procede ut prius & renova flores ter aut quater, demum ultimos flores exprime diligenter in veterem liquorem & serva usui.

Antipleuritica.

℞. Flor. papav. erratic. ℥vj. violar. purpur. ℥ij. affund. aq. taraxac. scabios. card. bened. heder. terrestr. ana ℥ss. spir. sulphuris q. s. ad gratam aciditatem.

Mixta induantur cucurbitæ vitreæ, stent in B. M. donec extrahatur tinctura, quæ filtretur & edulcoretur syrup. flor. Rhead. q. s. ad gratum saporem.

Anthiphthifica.

℞. Conserv. rosar. rubr. ℥ss. symphyt. ℥iv. fol. pilosell. heder. terrestr. veronic. pulmonar. Auræ fani- cul. pimpinell. an. ℥ss. Flor. hyperic. Rhead. salvia, violar. an. ℥ij. aq. rosis majal. ex spir. sulphuris subacid. q. s.

Stent in digestionem B. M. donec extrahatur tinctura quæ filtretur & saccharo violaceo crystallisato edulcoretur.

Epatica.

℞. Spec. trochisc. de rosis, de Absinthio, de Eupatorio, de lacca, de Rhabarb. ana ℥ij. diarrhod. Abbat. ℥iss. santal. rubr. ℥ss. affund. spir. vini simpl. q. s. mixta digerantur lento calore B. M. donec extrahatur tinctura.

Aloëtica.

℞. Pulv. aloës puriss. ℥j. myrrh. elect. ℥ij. croc. orient. ℥j. affund. spir. vini ad eminent. 4. digitor. digerantur in B. M. per triduum, postea filtrentur per chartam emporeticam.

Odontalgica.

℞. Rasur. lign. Sanctæ ℥j. buxi ℥ss. sem. hyoscyam. alb. ℥ij. fol. origan. serpill. salvia an. ℥ij. cortic. inter. pini, sambuci ana ℥ij. rad. pyrethri ℥ij. santal. rubr. ℥ij. B. caryophyll. ℥ss. balaust. ℥j. alumin. ℥ij. opii Thebaic. puriss. ℥ij. spir. vini ex laudan. opiat. residui q. s. ad eminent. 4. digitor. digerant in B. M. per triduum; postea filtrentur, in colatur. dissolv. essent. croci ℥ss. camphor. ℥j.

Rubi Idæi.

℞. Fruct. rub. idæi bene matur. ℥ij. conquassentur in mortario lapideo, postea irrorentur spir. vitrioli ℥ss. affund. aq. ferventis ℥iv. stent in fictili vitreato donec extrahatur tinctura, colatura edulcoretur syrup. rub. idæi q. s.

Eodem modo tincturæ fragorum, ribium, mororum, berberum, aliorumque fructuum, quanquam minus sint durabiles, parari possunt.

Tinctura varia ex Pharm. BATEANA.

Tinctura Absinthii.

℞. Summit. Abs. vulg. siccæ, à stipit. liberat. ℥vj. confusis adde Pyreni ℥xx. Digere in MB ad dies aliquos exprime fortiter. in liquore infunde iterum alias summit. abs. & exprime Repet. opus ad tertiam vicem. Dein filtra colaturam s. a.

Dos. gt. vi. (plus minus) in haustu Vini, vel cerevisiæ.

Tinctura Amygdaloides.

℞. Partium albar. benz. styrac. calam. an. ℥j. pyreni ℥j. Digere ad solutionem, filtra & exhala ad dimid. Pectoralis est, catarrhalis, asthmatica, nervalis, sudorifica, &c.

Dosis ℥ij. ad vi. &c.

Tinctura Antim. Emetica.

Extrahitur ex vitro antimonii cum *, filtrando & exhalando ad siccitatem. Materiam in ∇ solutam, filtratam, iterumque ad siccitatem abstractam digere cum Sp. V. ad colorem rubicundum, ac filtra. Elici etiam potest Tinctura è scorii Reguli ℥ii cum Sp. V. digestis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro ℥ii cum Sp. V. rectificato; effunde ac abstrahæ in ∞, non autem ad siccit. totalem: tum extrahe Tincturam cum Sp. V. quam filtra & exhala ad conven. spissitudinem.

Dos. ad gut. x.

Tinctura Antim. purgans.

℞. Vit. ℥ii pulverat. ℥j. Sp. ☉ non rectificat. ℥viii. Digere in MB Sic fit Tinctura nigropunctica.

Panchymagogum censetur in omnibus morbis curandis, fortificat ventriculum, obstructions aperit, convenit chlorosi, cachexiæ, &c.

Dos. à gut. 6. ad 10.

Tinctura Armoniaci.

℞. * ℥ij. massa ℥j. m. opt. simul terendo, & destilla per O per gradus. serva per se Sp. * ci. Item in fundo harentem destilla, & frequenter aqua affusa edulcora. Postea adjectis Spir. V. ℥ij. digere tepide dies 8. Dein abstrahæ in MB Spir. vini ℥ij. ut una libra Tinctura supersit.

Egregiè præstat in omnibus obstructionibus hepatis & lienis. Item in Melancholia hypochond. quartana, cachexia, hydropo, morbo virgineo, scorbuto, mensibus superfluis & retentis.

Dos. gut. vj. ad xii. in liquor. conven.

Tinctura Asæ fœtidæ.

℞. As. fœtid. ℥ij. Alcoh. V. ℥j. extrahe Tincturam & filtra.

Uterina est, traumatica, & splenetica.

Dos. ℥j. ad ℥ij. &c. in liquore conveniente.

Tinctura Asthmatica.

℞. Rad. Helen. irid. Florent. sem. anis. carvi, glycyrrhizæ ana

an. 3 ij. fol. cardui ben. m ij. uv. paß. exacim. lb j. fol. se-
na mundat. 3 vj. ▽ anis, lb vj. digere dies 4. & f. colat.
D. coch. 2. h. somni, 3. vel 4. manè seq.

Tinctura Aurea.

℞. Pulp. colocynth. à semin. liberat. concis. & cras. de-
stillat. 3 i β. caryoph. nu. vj. anis. 3 j. croc. 3 lb. Spir. v.
3xx. Digere ad mensem, & filtra.
Dof. 3 ij. ad 3 i β.

Tinctura Belloarica.

℞. Rad. enul. angel. zed. serpentar. Virg. ana 3 i β.
croc. opt. 3 j. myrrh. cinam. cort. citri sic. an. 3 vj. fol. scord.
ruta, an. m. β. theriac. androm. 3 iij. opii thebaic. 3 ij. Sp.
tartari rectif. 3 xv. Sp. B. li 3 iij. Sp. Bacc. sambuc. & Sp.
bacc. junip. rectif. an. 3 xvij. Digere f. a. ac filtra. Tum
adde Succini 3 j. camphor. 3 ij. Digere iterum ad usum.
Dof. 3 iij. ad 3 j. &c. in Peste, morbisque omnibus
malignis: Spiritus insigniter recreat.

Tinctura Cardamomi

℞. Sem. cardamom. min. extort. & contus. 3 iv. Alcoh.
V. 3xvi. Digere, exprime ac filtra f. a.
Hatus potenter discutit, & cerebrum confortat.
Dof. 3 j. ad 3 iij. &c. in vehiculo idoneo.

Tinctura Carvi.

℞. Sem. & Alcoh. V. omnino ut Cardamomi. Idem
facit cum priori.

Tinctura Cathartica Ridglei.

℞. Sena opt. 3 j. caryoph. 3 i β. croc. 3 j. V Hispan.
chalybeat lb i β. Infunde dies aliqt. exprime ac filtra.
Dof. coch. 2. 2. 4. quotidie ad longum tempus, in
febris obstinatis, &c.

Tinctura Cerussæ.

℞. Ceruss. Ven. pulverat. 3 iv. camphor. 3 β. Oo tar-
tari p. d. 3 iij. & 3xvi. macer. in frig. filtra.
In cutis scorditibus, inflammationibus, ambustis,
&c. usus est.

Tinctura Chamameli.

Extrah. ex Flor. siccis, & Pyreno, uti Absinthii. Idem
præstat cum Tinct. carvi.

Tinctura Cochleariæ comp.

℞. O mund. 3 iv. Salu rubra, agrimon. ana m. iij.
cochlear. marin. fol. selectiss. lb ij. cochlear. bovt. m. iij. abs.
com. rorism. an. m. ij. Rad. raphan. rusti. 3 iv. Incide mi-
nutis. & adde V. alb. & V. Cheriens. an. lb iv. Infund. per
dies 3. & f. colat.

Dof. ad 3 iv. bis Indies per dies 20. 30. 40. Ex de-
plorato hydrope cum scorbuto curati fuerunt multi
præter spem; aliis plurimis frustra tentatis.

Tinctura Corallii.

Solve corall. v. in Sp. Panu. filtra & evapora: exinde
Tincturam extrahe cum Sp. V. filtra & exhala ad debitam
consist. f. a.

Cardiaca, diuretica, vermifuga, &c. Dof. gut. 30.
40. &c. in liquore appropriato.

Tinctura Ferri.

℞. Battitura Ferri mundat. 3 vj Absinth. Rom. m. j.
ras. eboris, santal. alb. an. 3 i β. V. Rubelli lb ij. macer.
hor. 48. f. colat. qua filtratur.

Longè efficacior habetur, quàm Vinum chalybea-
tum in omnibus obstructionibus, &c.

Dof. coch. 2. ad 5. &c. omni manè per longum
tempus.

Tinctura Guajaci.

℞. Cort. guajac. pulverat. lb j. ambr. gris. gr. xv. sem.
Mangei Bibl. Pharm. Tom. II.

anif. glyc. an. 3 j. Sp. v. lb iv. Digere & cola ad usum.
Sudorem provocat. Optime conducit in lue Pres-
curanda. Odontalgica est, pulmonica, & catarhalis.
Dof. 3 vi. ad 3 i β. &c.

Tinctura Galbaneti.

Extrah. ex Galbaneto Seinn. cum duplo Tinctura de Se-
tartari, circulando, ac postea separando Oleum à Tinctura
f. a. Hystrica est, paralytica, scorbutica, emmenago-
ga, &c. Dof. gut. 10. 20. 30. &c.

Tinctura Hæmatitæ.

Elicitur ope Sp. v. ex Lap. Hamatit. cum * = ato.
Usus in hæmorrhagiis omnibus sistendis.
Dof. 3 j. ij. &c.

Tinctura Hieræ.

℞. Spec. Hier. simp. 3 j. coccinel. 3 j. V. Cheriens. lb iij.
m. & digere sape agitando ad dies aliqt. deinde filtra ad
usum.

Datur in ventriculi dolore cachexia, ructu, vermi-
bus necandis, &c. Ante paroxysmum Tertianæ, nec-
non Quartanæ exhibita, sæpe curat post tertiam vicem.
Dof. 3 ij. ad iv.

Tinctura Juniperi.

Fit ex Rob. de baccis 3 j. Sp. de Baccis fermentatâ lb j.
digestis & filtratis f. a.
D. coch. 2. ter in die. In hydrope, colica, &c. singu-
lare remedium.

Tinctura Martis.

Extrah. ex Flor. * ci Martis ope Alcoh. V. f. a.
Eisdem vires obtinet, quas Tinctura Armoniaci.

Tinctura Martis Aurea.

℞. Croc. martis 3 j. Sp. B. 3 iv. Infund. dies 2. sape agi-
tando: dein adde pyreni 3 v. Digere tepidè dies 3. vel 4.
filtra, & erit Tinct. coloris auri.
Dof. ad gut. 20.

Tinctura Martis Tartarifata.

℞. Tartari alb. pulverat. lb ij. O rubiginat. lb j. m.
& coq. in vase ferreo in F ont. cong. ij. per hor. 12. agi-
tando subinde spatulâ ferreâ, & addendo pro re natâ plus
Væ bullientis. Post resedent. debitam filtra liquorem, &
exhala ad spissitudinem convenientem f. a.
Dof. 3 j. ad 3 iij. &c.

Tinctura Melampodii.

℞. Rad. melampod. 3 i β. calam. arom. 3 ij. galanga
3 β. croc. 3 i β. cardamom. min. 3 iij. V. Hispan. lb iv.
macer. (vase clauso) hor. 20. in loco tepido: postea in fri-
gido dies 4. 5. 6. f. expres. & filtra.
D. coch. 2. h. somni, & 3. manè, ad dies aliqt. Usus
est insignis in capitis intemperie, cephalalgia, melan-
cholia, asthmate, &c.

Tinctura Melissæ.

℞. V. Rubelli cong. ij. meliss. rec. m. viii. destilla in
MB. ad fuit. aqua destillata adde fol. meliss. parum succat
m. viij. destilla per XX lb iv. in recipientem lagenam foliis
meliss. recentis. & selectis. integris repletam. Postea colat.
admisce sacch. opt. 3 ix suspendendo in nodulo ambr. gris.
gr. v. mosch. gr. i.
Insigniter Cardiaca est.

Tinctura Mellis.

℞. Mell. opt. lb ij. 3. mund. succat. lb iij. Spir. v.
lb ij. Digere tepidè, filtra, & in MB. evapora ad Syrup.
consist.
Exhibetur phthisicis pro nutrimento. Dof. coch. 2.
vel 3. pro vice.

Tinctura Myrrhæ.

℞. Aloës opt. myrrh. an. ℥j. Alc. V. ℥j. Digere & filtra.

Vulneraria est insignis, astringit, consolidat, extergit, putredinem avertit, & gangrenam præcavet.

Tinctura Oculor. Canc. orum.

℞. Oc. & pulverat. ℥iv. + opt. ℥xvi. extrah. Tinct. & filtra.

D. coch. 2. ter in die, ad ulcera, &c. curanda. K. D. I. A.

Tinctura Odontalgica.

℞. Guajac ℥ij. pyrethr. ℥j. malicor. gallæ. sem. hyocyam. Staphisag. an. ℥j. Caryoph. 2x piper. l. oliban. an. ℥j. opii, camph. r. an. ℥j. peti. Indici, sal. mentastr. an. ℥j. Sp. V. ℥ij. macer. & f. collat.

Tantillum de hac calidè in ore teneatur, postea iterum expuatur, & reiteretur. v. Mynicht.

Tinctura Paralytica.

℞. Pulveris Cantharid. ℥ij. Amicos ℥vj. pyran. ℥℥. Extrah. tincturam, quam cola.

Pro membris paralyticis fricandis.

Tinctura Perlatum.

Fit omnino ut Corallii.

Tinctura Piperis.

F. ex Pipere n. & Alc. V. uti Cardamomi. vires habet piperis.

Tinctura Proprietatis.

℞. Aloës opt. myrrh. el. et. an. ℥vj. croc. opt. ℥℞. in pulv. rem red. et. adde ol. tartari. p. d. ℥ij. Digere (vase clauso) hor. 24 dein adde Alcohol V. ℥xvi. Digere ac filtra s. a.

Easdem vires obtinet quas Elix. Propriet. dulce.

Tinctura Rhabarbati.

℞. Rhab. opt. glyc. an. ℥ij. uv. p. s. enucleat nu 60. anis. ℥j. sacch. cand. ℥vj. Sp. V. ℥ij. Digere s. a. f. colat. D. coch. 2. 3. 4. manè. In ventriculi cruciatibus, &c. mira præstat.

Tinctura Rosarum.

℞. Flor. ros. r. exungul. ℥℥. el. & gr. 20. Font. calentis ℥℥. macer. ad hor. 3. colat. cl. re adde sacch. ab. ℥ij.

In febribus refrigerativa hepaticæ confoiativa. Coddionem juvat. Dicit hæc. Mensium fluxibus, &c. succurrit. Dos. ℥ij. ad iv.

Tinctura Sassafras.

℞. Cort. sassafr. ℥iv. salu. sic. ℥ij. nuc. m. ℥j. cinam. ℥℥. Ambr. grif. ℥℥. Extrah. tincturam ut Sp. V. ℥ij. s. a. Dos. coch. i. Lenit. arthritidem vagam.

Tinctura Saturai.

℞. Feni laminat. q. v. extrah. tincturam cum Sp. Feni essentificato. filtra ac abstrah. s. a.

Apprimè conducit mania, in lancholix, quartana, phibili, &c. Dos. gut. j. ad 5. &c.

Tinctura Scorbutica.

℞. Fol. cochlear. nasturt. 2. aquat. m. j. rad. raphan. rustu. ℥ij. rhab. ℥℥. polypod. qu. ℥i. Sena ℥j. Sp. V. ℥ij. infund. dies 2. & f. colat.

Dos. ℥j. vel ij. omni manè cum Vā cochlearix. Mirum est quantum levaminis affert hydropicis ac scorbuticis.

Tinctura Serpilli.

F. ex herba flore. sic & Pyreth. eodem modo qua ab Anthui. Diuretica, hysterica, itomachica, &c.

Dos. gut. 5. ad 15. &c.

Tinctura Stomachica.

℞. Spec. hier. simp. ℥j. cocinel. ℥j. Sp. V. ℥ij. Digere ac filtra s. a.

D. coch. 1. 2. 3. ante pastum, in stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad ℥ij. hora dimid. ante p. rox. per 3. vel 4. vices efficacissimè curat Tertiana: interdum & Quartanam.

Tinctura Succini.

℞. Succin. alb. sub. pulverat. ℥iv. Alc. V. ℥j. Digere ad solutionem succini. D. canta, filtra, & 3. nam partem abstrah. in MB.

Cephalica est, hysterica, colica, nervalis, &c.

Dos. ℥j. ad ℥ij. &c.

Tinctura Sulphuris.

℞. Hepat. Δrū ℥ij. Sp. V. ℥ij. Digere ac filtra Extrah. etiam per op. Sp. V. ex Bals. Δrū terebinthinæ in MB. ad siccit. cocto.

Valde pectoralis. Dos. ad gr. xii.

Tinctura Veneris.

Extrah. op. Spe Sp. V. ex Fl. ⊕ is p. j. *ci. p. ij. in + bulo supra Δem mixtis s. a.

Præsentissima habetur in epilepsia, passione hysterica, &c. cum liquor. conven. exhibita

Tinctura Virginiana.

℞. Rad. S. pentar. Virg. pulverat. ℥ij. tinct. Δ. tart. ℥xvi. Extrah. tincturam per digest. s. a.

Alexiteria, cardiaca, sudorifica, iecorutica &c.

Dos. ℥j. ad ij. &c.

Tinctura ex Hadriano à M T N S I C H T.

Tinctura Corallorum.

Spiritus mellis verum, Philosophicè destillatum, non autem corruptum illum & venenatum vulgi funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se prius pagyrica, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractions omnes mixtas, post debitam ablationem & coagulationem in B. M. lentè abstrah. & reinduat essentiam rei solutæ, & non mensit ut solvens denuò rectificatissimo Vini spiritu extah. utquedum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acceperis, quam in forma olei, alcohole saltem ad medietatem evacuato, tanquam veram & genuinam Corallorum; & nequaquam aq. mellis tincturam (ut multi hactenus, invidiosè secretum hoc occultando, somniaverunt) ad usum retinere feceris.

Vires, Usus, Dosis.

Hac nobilissima & pretiosissima Essentia hactenus se extulerunt artifices Hæmerici; Uti enim sunt eadem contra Phantasmam, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu & magno fructu; Quia mundificat & renovat plenissime sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto sanguine orientibus, omnesque morbos inter nos radicatos evellit. Confortat quoque septem membra principia, præsertim autem Cor & vitales Spiritus, quod contra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstructions in præcipuis membris, Pulmone, Jecore, Splene, & Renibus mirifice referat, & inflammationes sedat. Febrim æstam compellit, eamque materiam consumit, &c. In vehementissima suffocatione matricis, mensibus superfluis, Hydrops, Paralyti, Scorbuto Lue venerea, Lepa, Dysenteria, Gonorrhœa, Spasmo & Sanguine concreto medicamentum divinum est. Dos. à guttis vi. ad ℥℥. & ℥ in vehiculis convenientibus & morbos propriè respicientibus.

Tin-

Tinctura Martis.

℞. *Salis armoniaci p. ij. limatur chalybis p. j.*
Misce & per Retortam, secundum gradus destilla, primum lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucurbitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cumque desit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahere, usque ad medietatem: reliquum manens cum essentia extracta, per chartam filtra, idque ipsum, utpote veram Martis tincturam ad usum asserua.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholia, hypochondriaca, Quartana, Cachexia, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis, &c. Dosis à gut. vi. ad ℥ β. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eo melius penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In usu autem hujusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta observanda.

Tinctura Antimonii.

Recipe Vitrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum. Stent loco calido per bîdnum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea Rec. Antimonii crudi q. i. optimè pulverisa, & affunde menstrui jam dicti ℥ q. digerantur ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer, & recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto omnes depletiones mixtæ ad spissitudinem mellis destillentur; tandem cum Sp. vini de novo extr. he, & ad medietatem iterum abstrahere, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

In Epilepsia, Melancholia, Mania, Philtris, & Venenis hæmorrhoidis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis gr. vi. in vehiculo convenienti.

Tinctura Sulphuris.

Flores sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ, more usitato, quo facto, Spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cum deliquaveris, misce affundendo, quantum illius est, de aqua nostra pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, reponere: Postea Spiritum vini in B. M. lento igne abstrahere, & sic Tinctura Sulphuris remanet in aqua pectorali. Hanc aufer per inclinationem & ad medietatem seu oleatatem saltem evaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra & ad usum communem serva.

Vires, Usus, Dosis.

Hæc Tinctura non solum pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim & anhelitus difficultatem causante, liberat; sed pulmonum etiam & vicinarum partium apostemata in thorace purgat, earundem curationem promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frigidatum, consumptis catarrhis delabentibus, refovet, siccatur & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibentur, sed hominibus præsertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates pravas in Sanguine colligentibus, ideoque infectioni huic magis, quam alii subiectis & obnoxiiis. Dosis ordinaria est à v. vi. vii.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

usque ad guttulas, in vehiculis appropriatis.

Tinctura Tartari.

℞. Salis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summe depurati, quantum vis; affundere de Spiritu Vini alcoholisatum ad eminentiam trium vel quatuor digitorum: Pone in digestionem per aliquot dies, quotidie aliquoties, ut decet, movendo, sed cavendo, ne Spiritus vini vitrum rumpat, & tingeretur colore rubi undissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec non amplius tingatur vel omnis tinctura extracta sit. Ultimò Spiritum vini tinctum, simulque mixtum filtra, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Vesicam & Rencs à superfluis liberat, atque calculos, urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit, conterit, farinæque instar, expellit. Omnes etiam obstructiones & purpurationes, præ omnibus ferè aliis medicamentis & arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregie tollit. A Patalysi & Podagra præservat, si bis quotidie exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specialis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Ictericis utraque, Colica, Lepra, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus recentis, Pleuritide, puncturis laterum, febribus, contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à cochl. semis, ad integrum, per se vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habita ratione ætatis, sexus, complexionis, & consilium circumstantiarum augeri minui potest.

Tinctura Laccæ.

℞. Gum. Lacca subtiliter pulv. ℥ β. aluminis ussi 3 ij.

Mixtis affunde aq. Lap. Medicam. cum aq. Salviæ & Rosar. fact. ℥ iij. Stent in digestionem, donec perfectè tingantur, postea filtrantur, & tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

Vires, Usus, Dosis.

In gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fetorem oris, curat & carnem amissam reparat: præsertim quando hac Tinctura gingivæ laxæ, flaccidæ & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

Tinctura Proprietatis.

℞. Spir. vini anisati ℥ xvi. elix. proprietatis 3 j. conf. alhermes 3 β. flor. tunica rub. 3 j.

Stent in digestionem, donec perfectè tingantur: postea Spiritum tinctum & filtratum sacchari candi alb. ℥ q. edulcora & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

In melancholia, hæmorrhoidis, vertigine, paralyti, cætharcho, asthma, tussi, ventriculo debilitato, cordialgiâ, quartana, calculo, &c. medicamentum est illustre. Insuper cor confortat, canitiem retardat & lætitiâ adfert, &c. Dosis à 3 j. ad 3 i. in vehiculo conveniente & specifico.

Tinctura Bac. Juniperi.

℞. Bac. juniperi rec. & crassiusculè contus. ℥ j. sem. anisi cont. 3 iv. rad. angelica 3 j. lig. nephriticæ 3 β. macis elect. 3 ij.

Mixta infundantur in vini malvat. ℥ viii. Stent in infusione per 14. dies, quotidie aliquoties movendo, Postea B. M. destillantur; & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juniperi Tincturam extrahe, ut est artis: quæ deinde filtratur & parum edulcorata ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Excalescit, aperit, attenuat, discutit, stomacho

Oooo 3 utilis

utilis. Contra Pectoris vitia, Tussim, Inflationes, Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis misce adversatur, quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque renibus pellit. Urinam ciet: Unde ruptis, convulsis & Vulvæ strangulati subvenit. Dosis à Cochlj. ad tria, manè jejuno Stomacho.

Tinctura Papaveris erratici.

℞. *Conserv. flor. Papaveris errat.* ℥j. *flor. papav. errat. Spir. vitrioli irrorat.* ℥j.

Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill ℥xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea filtra & adde

Syr. è suc. flor. Papav. errat. parum violat. ℥viij.

Misc. & ad usum reponere.

Vires, Usus, Dosis.

In defluxionibus calidis, tenuibus & acerbis, asperam arteriam & fauces exasperantibus, insomniarumque facientibus, quàm maxime valet: Tussim quoque inde natam, nec non Catarrhum & Phthisin sedat, refrigerat atque somnum conciliat. In Pleuride & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendum, sudoremque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium & dysenteriam ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatam, valde prodest. Dosis ab ℥j. ad ℥ij. per se vel cum aliis vehiculis idoneis.

Tinctura Cassiæ Lignæ.

℞. *Aq. Cinamomi cum vino Malvatico vel alio genoso destillat.* ℥vj. *cassia lignea vera* ℥vj.

Stent tamdiu in digestionem, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Omnibus frigidis affectibus idonea est: Stomachum, Jecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum, & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisque ictibus ac moribus prodest. Hæc gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, referare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterisque locis partium inflammatione laborant, temere non utantur.

Tinctura Hyperici.

℞. *Suc. herb. & flor. hyperici exp. & depurat.* ℥ij. *Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat.* ℥j. *Sang. Asinini ex venis post aures ext.* ℥℥. *flor. buglossæ rosar. rub. Anthos ana* ℥vj. *conf. Alkermes Cassia lignea ana* ℥℥. *croci or.* ℥j.

Infundantur per noctem, & B. M. distillantur ad secundum cohobium.

℞. *Hujus aq.* ℥ij. *eff. flor. hyperici cum spir. v. ext.* ℥℥.

Stent in loco tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipias: quæ sacchari candi albi f. q. edulcoranda & ad usum servanda.

Vires, Usus, Dosis.

In Melancholia, Mania, Dementiis, fascinationibus, & incantationibus, nec non in imminuta & abolita Phantasia rationatione hæc aqua valde secreta est; imbecillitatem enim, habitudinem, stupiditatem, torporemque mentis & tarditatem ingenii emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Urinam ciet. Menstrua pellit. Tertianis & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad v. bis in die, mane scilicet ante Solis ortum, & vespere eundo cubicum.

Tinctura Vitiæ.

℞. *Sp. vini simpl.* ℥vj. *aq. rosarum opt.* ℥iv. *cor. aurantiorum, citri, rosar. rubr. exsic. menta crisp. melissæ, santali alb. cinamomi ana* ℥viij. *lig. aloes, macis ana* ℥ij. *sem. angelica, coriand. anisi, foeniculi ana* ℥i℥. *spic. nardi, galang. min. croci orient. cardamom. min. caryophyllor. ana* ℥℥. *ambra grisea, moschi, alexand. ana* ℥℥. Stent in digestionem per octiduum; postea per alembicum destillantur.

℞. *Sp. evocati* ℥viij. *cassia lignea vera* ℥ij. *conf. alkermes* ℥℥. *croci orient.* ℥j.

Digerantur, donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sach. candi alb. f. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur & ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Sua odoris eximi gratia Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat, Cerebrum & Stomachum confortat, Ventriculi calorem auget, Robur firmat, Flatus dissipat, Concoctionem juvat, Tormina ventris sedat, Intestina sana conservat; nec non ad frigida Thoracis, Hepatis & Lienis vitia valde utilis est. Dosis à Cochlj. j. ad Cochlj. ij.

Tinctura Ligni Guajaci.

℞. *Ras. lign. guajaci* ℥iv. *masticis elect.* ℥j. *lig. aloes resinos.* ℥j. *flor. tunica exsic.* ℥℥.

Mixtis superaffundatur Sp. vini f. q. ad extrahendum tincturam, quæ postea filtrata ad usum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Cum hac Tinctura sæpius quotidie abluantur os & dentes dolentes, dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum, sistit, Catarrhum inhibet, fetorem & putredinem oris auferit, ejusque halitum emendat. Temporib. etiam Empl. de Gum. Elemi vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optime calefiat. Item post expuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

Tinctura Ligni Sassafras.

℞. *Aq. fontana bene coct.* & adhuc summè calide ℥viij. *lign. sassafras in taleolas tenues incis.* ℥ij.

Stent in infusionem per noctem in olla nova vitreata & bene cooperata; donec per se refrigerent; Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Lignæ parum aromatizetur, & ad usum potu quotidiano servetur.

Vires, Usus, Dosis.

Catarrhis & Arthriticis Nectar est. Obingentem enim siccitatem & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absumit, nec non calculum ejicit. Flatus discutit. Uterum ad conceptionem præparat. Menfes provocat, Concoctionem juvat. Vomitus cohibet, & alvum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt & imbecilles, non convenit. Dosis propriè non observatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

Tinctura Odontalgica.

℞. *Ras. lig. guajaci* ℥ij. *sassafras, sars. parill. ana* ℥j. *rad. pyrethri, aluminis crud. nitri præp. ana* ℥℥. *sem. saphid. agria. hyoscyami ana* ℥ij. *opii spagyricæ præp. caryophyllor. ana* ℥i℥. *serpilli, origani, croci or. ana* ℥j.

Misce & f. pulvis, quem inde vitro & superfunde Sp. v. simpl. & aceti viniani f. i℥. & f. Tinctura.

Vires, Usus, Dosis.

De hac Tinctura tantillum calidè in ore continetur, loco illo, ubi sunt dolentes dentes; postea iterum expuatur, & reiteretur, si opus est: efficacissimè omnes dentium dolores, etiam acutissimos affluxus inhibendo, sedat atque placat. Immo mirabiliter extrahit humo-

humores illapfos: ab initio quidem videtur sapius dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desipit.

Tinctura Uterina.

℞. Bac. Chamaeactes, Sambuci ana ℥iv. rad. bryoniae 3j. herba majorana. 3j.

Manifestissimam hystericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes uteri, etiam periculosissimas; nec non præcordiorum compressiones & dolores tollit. Dosis à Cochl. β. ad Cochl. j. per se, vel in aq. singulati hystERICA.

Tinctura Diaphoretica.

℞. Spir. vini ex confectiōe Bezoartici solaris nostr. residui flor. sambuci rectif. ana ℥iv. tartari aliquoties rectif. 3ij. vitrioli opt. 3j. conf. alhermes. 3vj.

Digere per aliquot dies, sapius movendo, usque dum perfecte tingatur.

Vires, Usus, Dosis.

In peste, putredine, morbis Capitis, paralyti, reſtificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexia, Hyſtope, ictero, Asthmate, Pleuritide, Angina, puncturis laterum, Luc Venerea, Lepra, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos & medullam vi sua diaphoretica penetrat; nec non omnia in pristinum naturalemque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum in aq. Card. benedict. Sambuci, jaceæ, &c.

Tinctura Stiptica.

℞. Vitell. ovorum ad duritiem coctorum num. xxi. Conf. rad. consolid. major flor. papav. errat. ana ℥iv. ras. coll. Piscium, nuc. moschata, gum. arabici ana 3ij. Cap. papaver. cum seminib. flor. urticae mortua rubr. succ. acacie ana 3j.

M. & infund. per 24. horas in vini rubr. stiptici ℥vi. postea adde Aq. hypnotic. nostr. 3x. M. & in B. M. destillentur.

℞. Liquoris stillat. ℥iv. sanguini dracon. spir. vitrioli parum irrorati q. s.

M. donec perfecte tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima syr. è succo flor. papaver. errat. prius edulcorata ad utrum servetur.

Vires, Usus, Dosis.

In omnibus alvi fluoribus, nempe Dysenteria, Diarrhea, Lienteria, Tenesmo &c. valde utilis, & magnæ efficacæ est. Dos. ad 3 iv.

TIPHA, vid. Typha.

TITHYMALUS.

Tithymalus & *Tithymallus* cum duplici ll à Tidos mamma & μάλλος tener dictus putatur, quod tenerum lac non secus ac mamma quædam effundat. Lobelius Adv. autor est hanc vocem scribendam esse per diphthongum Tithoimalus, quod mammam sive papillam uberis exitiosam virosamve non inepte interpretatur. Nam μάλλος vocem exitiosam significare Eustathius docet. Hujus una species Characias dicitur, id est, vallis, sic dicta quia vallis septisque munitis apta sit, aut quod plerumque his in locis proveniat.

Nota Tithymali characteristica sunt vasculum seminale tricoccum in summo stylo, & succus lacteus, acer in plerisque speciebus, in una alterave insipidus.

Pityusa, Apios, peplus, peplis, lathyrus, chamelyce, esula, cataputia nomina sunt variis Tithymali speciebus imposita.

Pityusa dicitur quasi *πυρσός*, quod folia piceæ similia ferat.

Apios à radice pyriformi.

Peplus & Peplis à Peplo sive flammeolo, quod ramulorum ambitu & quasi rotundo amictu velum efformet, ac tellurem operiat, Lob. & alibi, quia ita tunc uberiore undequaque ramulorum comosa concinnaque sobole, in pepli speciem collecta.

Lathyrus quod folia duo, quæ caulis partem summam amplectuntur cavitatem satis magnam ostendunt. Etenim inter duo folia quæ umbellam ambiunt semen quasi inter duas januas seu bivalvi continetur.

J. Bod. à Stapel.

Cataputia, quod semen in pilulis quibusdam sive catapotis ferat; vel (quod magis aridet,) quod semen in catapotis sumptum purget. Stapel.

Chamelyce à lacteo fici succo & humiditate nomen accepit. Idem.

Esula non invenio etymon probabile, nam quod J. Bodæus adfert non placet.

Vires. Omnia Tithymalorum genera adure ad vim obtinent (inquit Tragus) imprimis vero lacteus eorum succus, quare raro citra noxam sumi possunt. Dodonæus Tithymalorum omnium succum inferna purgandi validam vim habere scribit, bilem, pituitam & aquosos humores ducere, etiam in exigua quantitate sumptum, sed ventriculum vehementer conturbare, & interna viscera inflammare; eamque ob causam ab ejus usu doctos ac prudentes medicos abstinere,

Esula pituitam validissime, præcipue per inferiora, purgat, unde & rusticorum Rhabarbarum audit. Est autem acris, ignea & erodens, aded ut impudentium mendicorum fraudi inserviat, qui ejus succo cutem si bibet exulcerant scabietici specie. Schrod.

C. Hofmannus se nunquam consuluisse ait, sed fuisse tantum spectatorem audaciæ vulgaris quæ tota cochlearia admetitur. Si quis tamen (inquit) uti velit. Esula præparata offic. utatur, quæ per viginti quatuor horas steterit in infusione acerrimi aceti, iterumque exsiccata. Hujus dosis est à 3ij. ad 3j. & sine noxa purgat. Casp. Dornavius ita corrigit. ℞. Esula præp. 3iv. macis, galangæ an. 3ij. spodii præp. 3j. Trag. Bdellii ana 3ij. fiat pulvis cujus dos. an. 3ß. ad j. Raius.

TORAZIUS, vid. sub titulo Lapis.

TORMENTILLA.

Tormentilla, *επτάφυλλον*, quod radice pulvis cum aluminis & pyrethri momento cavis dentium inditum eorumdem tormentum sive cruciatum sedet. Lob. alii à dysentericis torminibus sanandis à recentioribus ita nominatam censent.

A Pentaphyllo distinguitur, foliis septenis in eodem pediculo quod & Pentaphyllis nonnullis commune est, sed præcipue flore tetrapetalo, quod huic proprium.

Vires. Tormentilla, cum pentaphylli revera species sit flore tetrapetalo, easdem cum eo vires obtinet.

Siccatur & potenter astringit; hinc in fluxionibus quibuscunque alvi, uteri, &c. non aliud remedium utilitius quam Tormentilla radix, quomodocunque exhibita; præterea diaphoretica & alexipharmaca unde & omnibus medicamentis quæ adversus venena, pestem, variolas & morbillos aliosve morbos malignos componuntur adhibenda præsertim. Si cum fluxu alvi conjuncti sint. Tandem vulneraris portionibus, unguentis & emplastris adjungi solet, nam vetera & putrida ulcera & abscessus sanat.

In insulis Ferroensibus Tormentilla utuntur, defectu corticum in pellibus animalium præparandis. Th. Bartholin. Act. Med. An. 1671. obl. 49. D. Tancred. Robinson.

Ad Diarrhæam commendat Etmullerus extractum Tormentillæ præmissæ si opus est Rhabarbaro una alterâve vice: hinc exhibitum ana 3ß. ad 3j. quod remedium præcellit omnibus aliis medicamentis in dysenteria epidemica. D. Hulse ex Etmulleri prax. cap. de diarrhæa, *Raius*.

Toxicum, vid. *Venenum*.

TRACHELIUM.

Trachelium est planta de campanularum genere, sic dicta, quod morbis colli medeatur, unde etiam Cervicaria, & Uvularia vocata est: Quamvis alii Trachelium ab asperitate denominatum credant, *τεχνυτις* enim apud Græcos asperitatem significat: Trachelium autem Campanula hirsuta etiam vocatur, nec est quo ulterius in hac plantâ describendâ immoremur.

TRAGACANTHA.

Tragacantha, id est, hircispina folia habet pinnata, viciâ in modum, costæ mediâ cui pinnulæ annexæ sunt in longam, rigidam, acutam spinam procurrentem; siliquas geminatas, duplici alveolo duplicem seminum seriem continentes.

Est & Tragacantha gummi è vulnere radicis incisæ emanans: quale autem ad nos adfertur (inquit J. Bauhinus) est glutinosum, candidum aut flavum, aut ex rufo pallescens, contortum in erucarum vermiculorumve formam tanquam violentiore pressu per densius colum transmissum, sapore subdulci & frè satuo aquam cui infunditur in lentam sequacemq; mucaginem conversus.

Ufus. Vim habet, auctore Dioscoride, meatus obstruendi & acrimoniam obtundendi. Usus ejus ad meddamenta ocularia, & ad tussis & arteriæ asperitates, & vocem retusam, & destillationes in eclegmate cum melle. Subdita etiam linguæ liquecente succo devoratur. Sed & macetata in passo drachmæ pondere bibitur ad renum dolorem & vesicæ rosionem, admixto cornu cervino ulso ac loto, aut modico alumine scisso. Extrinsecus (inquit Schroderus) ad dysenteriam valet (in clysteribus) ad rubedinem & acres destillationes oculorum, (soluta in aqua rosacea vel lacte) ad palpebrarum scabritiem.

Aqua calida solvitur, mucilaginemque exhibet, aliis medicamentorum formulis, e. gr. trochiscis formandis convenientem. *Raius*.

TRAGEA, vid. *Pulvis*.

TRAGEMATA, vid. *Confectio*.

TRAGOPOGON, vid. *Barbula Hirci*.

TRAGORIGANUM.

Tragoriganum Latine hircinum origanum sonat; sic dictum non quod hircum oleat, sed quod gratum sit hircis pabulum, ut onitis asinis; Nicandri Scholiastes ad hunc versum, *τετραγολίγανον ἔστιν ὄρεον ὅπερ ἐδίοντες οἱ τετράγοι γίνονται καὶ ὠφελεῖς* i. e. in venerem proclives seu præcipites.

Non videtur differre genere à Thymo vulgari.

Vires. Tragoriganum herba est calida & acris, & ad eadem utilis ad quæ Thymus, satureia, hyssopus, nimirum ad pulmonis affectus, tussim, & c. ad menses & urinas remotantes, ad cruditatem ventriculi & ructus acidos & c. *Raius*.

TRAGOSELINUM, vid. sub titulo *Pimpinella*, item *Saxifragia*.

TRAGUS; De ejus præparatione vid. sub titulo *Triticum*.

TRANSMUTATIO METALLORUM, vid. sub titulo *Chrysopæia*.

TRAGI.

Cyperi quædam species est. Cyperus rotundus, esculentus, angustifolius *Casp. Bauh. Tournefortio & Raro* dictus, cujus radix pectoralis est resolutive, emolliens, antidyenterica; imo in urinæ ardoribus est pro seminis generatione confert, si comedatur, aut in decocto assumatur.

TRAUMATICA, vid. *Vulneraria*.

TRIBULUS.

Nomina. Tribulus terrestris J. B. Ger. Park. terrest. Ci. ceris foliæ, fructu aculeato.

Radicem prolixiâ, albam, simplicem, paucis fibris capillatâ, coliculos emittit plures, humi stratos, teretes, hirsutos, geniculatos, rubentes, palmates aut etiam dodrantes, ramis multis divisos. Folia pinnata lenticulæ aut ciceris, ad singulos geniculos singula, alternatim posita, in summitatibus tamen ramulorum bina & adverso, papaveris erratici in modum pilosa. Flores pediculis satis longis, & foliorum sinubus ortis insident, lutei, pentapetali. Succedunt muricata capitula, spinis majusculis hærentia, ad spinachiam accedentia (inquit J. Bauhinus) nobis capitula ex quinque velut triangulis conflata videbantur, quorum omnium cuspides in centro concurrunt, reliqui anguli in longam & acutam spinam exeunt; sunt & aliæ spinulæ breviores quæ pediculum amplectuntur.

Sub Maii finem exit, Julioque & Augusto cum flore & semine in calidioribus regionibus, Italia & Gallia Narbonensi, passim conspicitur.

TRIBULUS AQUATICUS.

Tribulus dicitur *τρίβλος τοῦ τοῦ ἑλίου*, quod fructu suo tria vulnuscula iussit, vel quod cuspidatum trifariam feriat. Bod. à Stapel.

Nomina. Tribulus aquaticus J. B. C. B. Ger. aquaticus major Park.

J. B. Ex uno capite *πομπόειδης* folia multa, sesquicantia, duobus quadrantibus superioribus serrata, supra glabra; subtus rugosa, populneis quodammodo similia, pediculo palmari & sesquipalmari, fungoso & paulo intra insertionem ruberose hærentia. Flores parvos albos sequuntur muricati fructus, spinulis armati, nigricantes, castaneis pares, pulpâ nucleove non diffimiles, candido, eduli, gustu haud ingrato, qui, auctore Dod. & recens mandi, & arefactus, molique contritus in panem cogi posse fertur. Radices longissimæ ex intervallis, veluti ad genicula staminum utrinque Cæsariam premunt, partim in aqua natantes, partim limo hærentes.

Nascitur variis in locis, ac fere stagnantibus fluviorum partibus, lutosi lacubus, & urbium fossis, quibus limosus sit fundus. Inter Montbelgardum & Basileam observavit Joh. Bauhinus, ubi fleret mense Junio. Matthiolus in plerisque Italiæ fluminibus & lacubus provenire ait, præsertim in agro Mantuano & Ferrariensi: neque solum in dulcibus aquis gigni, sed etiam in mari, quod non credimus.

Nos fructus Venetiis venales vidimus.

Pleniorum hujus plantæ descriptionem videtis apud Jo. Bod. à Stapel. Comment. in Theophr. hist. lib. 4. cap. 11. *Raius*.

TRICOMANES, vid. *Adiantum*.

TRIFOLIUM.

Legumina trifoliata sunt vel trifolia proprie dicta, quæ terna duntaxat habent folia in extremo pediculo; vel minus proprie sic dicta, quæ præter folia terna in extremo pediculo bina insuper habent ad ejus à caule exor-

sortum seu basin, quæ Loti appellantur & quodammodo pentaphylla sunt.

Trifolia proprie dicta sunt vel floribus in capitula aut spicas congestis, vel eisdem magis sparsis & rarius sitis.

Quæ floribus sunt in capitula aut spicas congestis, sunt vel 1. feminibus & siliquis in calycibus plerumque occultatis, floribus erectis capitulis aut spicis summos in plerisque caules terminantibus, seu spicæ, lanugine nulla aut rariore obsita sunt, calycibus florum vel strigosioribus & striatis nec à delapso aut marcescente, flore in vesicas intumescens ut in trifolio pratensis, montano, &c. vel in vesicas tandem intumescens, ut in trifolio fragifero, &c. five spicæ molles sunt & villosæ mollitie sua pedem leporinum referentes, ut in lagopo. 2. Seminibus & siliquis visui expositis & extra calyces apparentibus, floribus pendulis, capitulis aut spicis è foliorum alis egressis, siliquis seu folliculis scabris aut rugosis, in meliloto.

Quæ floribus sunt magis sparsis & rarius sitis sunt vel siliquis rectoribus, seu productioribus in fenugræco, seu brevioribus in Anonide vel iisdem intortis & cochlearis in Medica.

TRIFOLIUM ASPHALTION.

Frutex hic ad cubiti altitudinem in America Septentrionali attollitur; virgam habet tenuem junceam, atropurpuream, quæ statim ab infima parte *ægæquodas*, hoc est, ramulæ propagines emittit; summitate in plures diducitur, à quibus folia Loto arbori similia prodeunt, acutiora tamen & angustiora, qualia *ἐξυφύα* Dioscorides nominare consuevit, leviter etiam hirsuta sunt, ac velut oleosa pinguedine obsita, ex uno longiori pediculo nascuntur. Hæc defracta aut ex attritu non olent, verum cum levius attrahantur, oleosus hic humor digitis apprimitur, molestus gravitate odoris, qui quidem odor in novella planta Ruræ est, in adultiore hirci aut bituminis. Cujusque rami extremum flos occupat purpureus, ut scrophularia tribus exsertis foliis constans, & uno semper intus reflexo, quod postremum superant tenuia filamenta tria, albo apice donata. Floris foliola intus alba sunt, licet à tergo sint purpureo. Flori succedunt siliquæ digitum longæ, æquæ quam folia hirsuta, oleosæ, virides; extremo purpureæ, in quibus alveolis discreta conduntur semina, lata, oblonga ut Cythi, medio sinu excavata, ut faba purgatrix, aut renes animantium, quo fit ut intortum veluti corniculum efforment. Radix longa, fibrosa, insigni fervore prædita est, ac fere pari acrimonia linguam mordicat quæ Anemone.

Annua est, & non nisi satù perennat.

TRIFOLIUM ACETOSUM.

Ab acido sapore voce diminutiva Acetosella dicitur: Oxys Plinii creditur Calabris Juliola dicitur, ridicule Barbari corrumpere in Lujula & Alleluya. Scal. in Theophrast. de caulis plant.

Notas insignes habet quibus ab omnibus aliis plantarum generibus facile distinguitur, nimirum folia in eodem pediculo terna, florem pentapedaloidem, saporem acidum, vasculum seminale pentagonum, quod per maturitatem levi tactu dissiliens cum impetu semina ejaculatur.

Nomina. Trifolium acetosum vulgare *Park. C. B.* Oxys alba *Ger.* Oxys five Trifolium acidum flore albo & purpurascens *J. B.* Acetosella & Lujula five Alleluis offic.

J. B. Ex crassiuscula, squamata, alba, vel ex albo rubente radícula longæ & crebræ pendent fibræ albicantes, indicemque emergunt pediculi infirmi, tennes, rotundi, palmares & longiores, terna gerentes folia satis magna, latiora quam longiora, cordata, hirsuta, ex vi-

ridi flaventia, sæpe reflexa, ut capitum ad puliculum coitus turbinatam reddat formam, sapore acido. Inter hæc alii surgunt pediculi, florem singuli sustinentes unicum, magnum, albicantem, striatum, tenerum (quinque petalis ad ipsos tamen ungues junctis compositum, unguibus (præsertim interioribus) flavicantibus folliculus pentagonus, quo attracto semen exilit rufum nucleo Petici simile, striatum.

Opacis plurimum provenit locis, in sylvis & ad sepes.

Vires. Ut sapore ita & viribus cum Acetosa convenit, ideoque æstum febrilem mitigat, sitim sedat, & ventriculi ardores, jecur refrigerat & cor roborat, quoque modo sumpta. Fit enim ex ea syrupus, conserva, aqua destillata ad hos usus. Extrinsecus adhibetur aqua destillata ad collutiones oris, ad erysipelata, ad ulcera sordida mundanda, &c. observasse autem sese scribit Fuchsius, atque adeo multorum experientia comperit, quod ejus herbæ copiosi flores crebras illius anni pluvias & aquarum inundationes certo portendunt pauci contra siccitatem.

TRIFOLIUM FIBRINUM.

Nomina. Trifolium palustre *J. B. C. B.* paludosum *Ger.* *Park.* Trifolium fibrinum *Tabernamont.* & *Ger.* manorum.

J. B. Geniculata radix longa, alba, prorsum incedit, fibris subinde demissis firmata; pediculi inferius latiores vaginæ instar, dodrantaes, tria habent annexa folia, magna, fabaceis forma & magnitudine respondentia, lævia; inter hæc caulis surgit cubitalis, levis, graciis, virens, Thyrsus gerens florum, ex albo purpura centium, speciosorum, qui antequam aperiuntur exterius rubent, reclusi in quinque segmenta acuta expanduntur (sunt enim Monopetali) superficie interna tenuissimis & candidis filamentis crispis, velut lanugine seu pube quodam obducta; è singulis floribus exeunt stamina quinque alba cum apicibus flavis; in medio stylus brevior & viridior. Succedunt capitula seu vascula subrotunda, in quibus semen Helianthemo simile ex fusco flavescens.

In palustribus & aquosis frequentissimum occurrit extra aquas non diu durat. Maio & Junio floret.

Vires. In morbo articulatū debellando vires insignes exserit hæc planta nulli hæcenus Botanicorum proditas, sed Thoracii Prossia in nonnullis ægris feliciter expertas. Folia herbæ in cerevisia decoquunt & bis aut ter de die cum dolores sentiunt, decoctum bibunt, quamvis ingratis odoris & saporis sit. Qui autem eo utuntur levamen omnes percipiunt. Quin & matrona quædam folia in aqua decocta & calide parti affectæ applicata in Arthritide vaga admodum deprædicat. Gravior reddi poterit herba præparatione usitata in spiritum, extractum liquidum, & syrupum. *Ephemer. German. Ann. 4. & 5. observ. 123.*

D. Tankredus Robinson Trifolium paludosum in hydropicis affectibus commendat; seque sæpius observasse ait oves tabidas in paludes hac herbâ abundantes, compulsas, ejus esu sanitati restitutas, quin Germanicos nonnullos scriptores etiam laudare in scorbutico febrilibus intermittentibus & catarrhis.

Simon Paulus cum succum cochleariæ scorbuticis valde prodesse scripserit vel cum sero lactis vel per se exhibitum, sed tamen Trifolium fibrinum, inquit, ei præferendum est.

P. Tilingius præparat varia medicamenta è Trifolio paludoso ut spiritus, salia, essentias, tincturas, olea, quæ in morbis chronicis egregie deprædicat, omnibusque aliis plantis hanc longe præfert. *Ephem. German. Ann. 12. Obs. 74.* recte observavit *D. Tankredus Robinson* herbam hanc Germanis aliisque gentibus Septentrionalibus nunc dierum unice charam & in magno

magno pretio esse, & assiduo usu frequentari in omnibus fere morbis ut certissimam panaceam, ad quam etiam in deploratis affectibus velut ad sacram Anchoram confugiunt.

TRIFOLIUM INDIVISUM.

Nomina. Trifolium hepaticum flore simplici C.B. Trif. hep. sive trinitatis herba flore cæruleo J.B. hepatica nobilis sive Trifolia Park. hepaticum Trifolium Ger.

Radices crassiusculæ in plurima capita divisæ, fibris innumeris ex rubro nigricantibus varic intertextis capillate, aded ut totæ fibris hisce occultentur, nec aliud esse videantur quam massæ seu congeries fibrarum glomeratarum & mitis modis implexarum. E singulis autem radicis capitulis seu nodulis quotannis progerminant primo flores; deinde folia cum primum emergunt complicata & hirsuta, postquam extenduntur glabra, superne obscurius viridia, averfa parte pallidiora & interdum cyclamini modo purpurascentia, in tria segmenta non tamen ad pediculum usque divisæ, per margines æqualia, pediculis sesqui palmaribus & longioribus insidentia. Caules ex eadem radice plures tenues, breviores quam sint pediculi foliorum, nudi, singuli singulos flores sustinentes speciosos, sex & interdum septem aut octo foliis compositos, plerumque cæruleos, rarius carneos aut albos, staminibus cum suis apicibus intus plurimis. E calice trifolio à flore delapso superstiti, semina aliquot nuda, acuta, ranuncolorum modo in globulum congesta protegente.

Vires. Probatum maximè à recentioribus Medicis, (inquit Joh. Bauhinus) ad vulnera glutinanda tam foris illita, quam intus sumpta: item ad enterocelas, in quem usum pulverem dimidii cochlearis mensurâ ex vino austero propinant. Tota planta decoquitur in vino eodem ad columellæ fauciumque inflammationes: refrigerat enim siccatur & roborat. Quare adversus intemperies calidas, & inflammationes hepatis & februm calores perutilis. Rarius præscribitur à medicis nostratibus, & in illis quicquid usi sunt se nullum potuisse effectum observare scribit Parkinsonus. *Raim.*

TRITICUM.

Triticum inde dictum creditur quod ex spicis trititando facile excutitur, Græcis *τῖν* quasi *τῖν* à *τῖν* semen. Pro qua etymologia facit, quod Herodianus scribit, à Syracusanis *τῖν* dictos fuisse *τῖν* quasi *τῖν* quibusdam *τῖν*; dicitur ab acutis & pyramidali spicæ figura.

Est autem Triticum frumenti genus, grano majore in hoc genere oblongo, nudo, hoc est glumis non arte adhaerentibus, sed trititando facile abscedentibus tecto, turgido, lucido & flavescente, ab uno latere sulcato, farina candidiore & levior, nutrimenti optimi.

Vires & Usus. E Tritici farina fermentata optimus conficitur panis. Verum & Amylum ex ea fieri Plinius asserit. Pulvis quoque infantibus commodissimæ ex ea in aqua aut lacte decocta sunt, quæ & optime nutriunt, & in canina appetentia & veneris defectu commendantur. Eadem in faucium & pectoris affectibus, renum & vesicæ exulceratione, fluxionibus alvi, præsertim dysenteria, peritiles sunt, vel è jusculis cum butyro confectæ; crudi Tritici esu alvus inflatur; nec facile conficitur. Galenus Tritici elixati in cibis usum damnat; verum nos ab ejus butyro conditi, & saccharo edulcorati, usu frequenti nullum damnum aut noxam sensimus.

Grana Triticæ confectio apud Cratonem, (sic vo-

cat psisanam Triticæ pulmentumve ex ea paratam) parum differt à præparatione pulvis Triticæ apud nos in Anglia usitatæ frumenti dictæ. Selibram Tritici puri in mortarium purum indat, lavet bene, corticemque detrahat bene, eluatque bene, postea in ollam indat & aquam puram, coquatque, ubi coctum erit, lac addat paulatim usque adeo donec cremor crassus erit factus.

Extrintecus ad visum & debilem & obscurum & ad maculas tollendas collyrium quod Triticum ingreditur vide apud C. Bauhinum in Theat. ad maculas tollendas succus è Tritico expressus valet. Faciem erugat farina Tritici, si cum aqua fabarum calida solvatur.

Ad lichenas recentes in mento aut alia faciei parte Crispi apud Galeum è Tritico medicamentum.

Tritici grana multa in incudem imposito, deinde laminam (æris aut ferri petinde enim est) igne calefactum Tritico superposito, & resolutum ab eo liquorem calidum adhuc afferto ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus, nec solum ad lichenas faciei, sed experientia nostrâ ad omne genus herpes & impetigines valet. Idem ad ulcerum sinus, pedum & manuum rimas à frigore, & cutem asperam lævigandam facit.

Farina cum oleo mixta & in forma cataplasmati imposita, sed melius in aqua cocta, oleo addito, mammarum duritiem emollit. Eadem Apostemata hepatis, lienis, aliarumque partium maturat.

Nervorum contractionibus & mammis dependentibus ex aceto cocta & imposita prodest.

Triticum crudum commanducatum & impositum commotis à cane rabido auxiliari dicitur. Idem oculorum Apostemata maturat.

Ad alvum irritandam, è farina partibus duabus & unâ salis cum albumine ovi pasta conficitur, in formam suppositorii reducitur, oleo vel butyro inungitur & ano inditur. Podagræ conferte dicitur pedes ad genua usque in Triticum mergere, quo levatus est inopinatè Sextus Pomponius referente Plinio, melius succedit curatio, si Triticum conquassatum in vase ad ignem caleseat.

Ad omnes quorumcunque artuum dolores mitigandos valet cataplasma ex farina Triticæ & Hordeaceæ, florum chamæmeli & rosarum, singulorum uncis duabus, in aqua decoctis dein olei chamæmelini & rosacei singulorum uncia una adultis, ac in modum cataplasmati calide parti impositum.

Fermentum ex farina Triticea calefaciendi, extrahendi & maturandi vi prædicitur est, privatum callos in plantis pedum extenuat, & cum alia tubercula tum etiam furunculos ex sale maturat atque aperit.

Furfurum multiplex usus est. Inserviunt manibus purgandis saponisve vice, si aqua in qua abluntur immisceantur, quin & manus molles albaque reddunt.

Furfuribus purgandis inservit aqua in qua calefacta per diem & noctem infusa fuerint. Gargarisma ex decocto faucium asperitatem & dolorem lenit.

In aqua decocti & sacculo inditi omni humore expresso si calide applicentur, pleuriticorum punctiones mitigant, modo sacculus refrigeratus in eadem aqua calefactus & expressus sæpius applicentur.

Alia præterea multa juvamenta præstant quæ si placeat apud C. Bauhinum vide:

DE PANE.

Panis multiplex Etymon adfertur. Vel enim deducitur à Panus, J.C. *πῶν* sive fili glomus ad cujus similitudinem panes fingi solent. Varro. vel dicitur Panis quasi palci-

pascinis à pascendo, vel est Panis à Deo Pane, quod Pan primus consperfas fruges coxisse perhibetur, Cassiodor. vel ab adjectivo *πᾶν*, quasi, *ἡ ζῶνα πάντων ἐφ' ἑνταῦθα*. Panis dictus quod cum omni cibo apponatur, vel quod omne animal eum appetat Isidor. vel quod instar omnis cibi sit.

Sed omnium (inquit Vossius in Etymolog.) horumce sententias diluit Athenæus, ex quo discere est Romanis Panem vocari quod Dores dicunt *πᾶν*, vel *ἀμείσως* Panem à *πᾶσι* deducere licebit.

Panis desinente C. Bauhino est cibus ex frumenta- ceis molitis, aqua maceratis, pinis ac coctis apparatus.

Quatuor Panis genera apud antiquos à tritico fie- bant;

1. Siligineus panis, *σιλιγίνης*, ex siligine, id est, flore farinæ, sive purissima parte, ab omnibus furfuribus exactissime repurgata.

Tener & niveus mollique Siligine factus, Juvenal.

Similagineus, *σεμιδαλίνης*, ex simila seu similagine, id est, farinæ parte tenui quidem, sed siligine impurio- re, ut pote ex quo non omnes excussi furtures, sed cras- siores tantum.

3. Confusaneus, *αὐτόπυρος* & *συγκόμιστος* ex farina omnes frumenti partes in se continente, cui nihil vel floris, vel furfurum decessit.

4. Cibarius, gregarius, sordidus *ἀγροαῖος*, *ῥυπαρὸς* è furfuracea farina coactus, ex quo mollissima puris- simaque farina excussa est. Nonnulli his addunt quin- tum genus, quod furfuraceum vocant, *πίσυραν* seu *πίσυστον* Athenæo, qui Canicaceus Panis dicebatur, quod in canum fere gratia confici solebat, & hic ex Tritici extis constat quæ Latini furtures, canicas & apludas vocant.

Fiebat & olim (Marcello fides) e Polline frumen- ti tenuissimo, ad molæ parietem adhærescente, inde- que multis cum sordibus deterfo.

Optimus ac saluberrimus Panis est qui concoctu facilissimus. Talis autem est, monente Galeno, qui plu- rimum est fermentatus, & pulcherrime subactus, qui- que in clibano igne moderato fuerit assatus.

In summa (inquit C. Bauhinus) Panis optima com- mendatio constat Tritici bonitate, justaque ejus moli- tura ac pistura, cribri tenuitate, mitione plurima, fer- menti, salique modico; dein apparatu subactione- que exacta, & proba coctura, de quibus copiose disce- rere nostrum non est institui.

Notandum tamen in Anglia spumam cerevisiæ con- cretam usitatissimum fermentum esse, nec nostrates alio fere uti, nisi in hujus inopia. Hoc autem fermen- ti genus (teste Plinio) apud Septentrionales olim in usu fuit; Galliæ & Hispaniæ frumento in potum resolu- to, quibus diximus generibus, spumâ ita concreta pro fermento utuntur. Qua de causa levior illis quam cæteris Panis est Plin. Hist. lib. 18. cap. 7. est ergo, Plinii testimonio, laudatissimum hoc fermenti ge- nus.

Certum est furfur vires abstergitorias obtinere, quibus intestina, si intus sumatur, ad dejectionem stimulantur. Hinc panis qui fit ex farina cui furtures omnes excussi non sunt, modo probe fermentatus fit salubrior nobis videtur, sapidioreque etiam quam qui ex mero flore seu ex siligine. Extrinsecus mica panis ad ea- dem fere utilis est ad quæ farina triticea. Galenus scribit cataplasma ex pane factum magis digerere quàm quod ex tritico fit, eò quod panis salem & fer- mentum adjuncta habeat, cujus sententia rationi consentanea videtur & experientia etiam eam confir- mat.

Chondrus & Alica quid sint diximus in explicatione

terminorum quantum sufficere videtur: cum enim jam in desuetudinem abierint, non est cur de eorum præparatione aut usibus in Cibo & medicina admo- dum solliciti simus, qui pleniorum eorum explicatio- nem desiderat C. Bauhini Theatrum & Joh. Bauhini historiam petat.

Amylum etiam quid sit ibidem dictum est: cujus Vires & usus vide apud Bauhinum utrumque.

Far duplex est, naturale & factitium: naturale est certum quoddam frumenti genus: factitium Plinius, pro Faris farina, sive pulve, sive grano decorticato sumptisse videtur, cum ex Verii sententia scribit popu- lum Romanum farre tantum è frumento trecentis an- nis usum fuisse. Far ex Ætio ostenditur esse quodvis frumenti genus, decorticans & ab utriculis repurga- tum, ac deinde in partes aliquot contractum & sicca- tum.

Athera, puls & gluten consistentia tantum differunt, Athera enim pulcicula liquida est, infantibus conve- niens quæ ex farina tenuiore cerevisia tenui aliove li- quore coquitur.

Athera crassius & solidius est gluten Græcis *κόλλα*, ex similagine & farina Tritici, quo ch. ita glutinantur, quod propter eam quam habet glutinandi vim sangui- nis excreationibus prodest.

In utriusque medio *κόλλος* sive puls est, solidior qui- dem ac spissior Atherâ, liquidior vero glutine, proinde minus glutine, plus autem quàm Athera viscera obstru- ens. Athera aut potius pultis genus est, Edulium quod Galenus ex multa Tritici farina lacti permixta fieri scri- bit, quo hac ætate universa inferior Germania frequen- tissime utitur. (Pulvem puto intelligit quam nos *pasta pudenda* vocamus) cibus boni succi & multi alimen- ti, sed eos qui eo assidue utuntur offendens. Nam in hepate obstructions parit, & calculos in renibus gi- gnit, autore Galeno. J. B.

Tragus est res factitia. Fiebat autem ex diversis fru- mentorum generibus, ut ex Dioscoridis, Galeni, Plinii locis ubi de eo agunt inter se collatis patet. A Chondro & Alica præparatione potissimum differt. Chondrum siquidem gypsum & arena perficiunt: Halicam cre- ta emundat, Tragus sola aqua maceratus excoquitur.

TRITICUM INDICUM.

Hæc planta insignibus notis ab aliis omnibus fru- mentaceis, differt est enim paniculata simul & spicata: Panicula scilicet calva, acerosa summo culmo insidet, spicæ crassæ tres quatuorve è foliorum sinubus exeunt.

Nomina. Triticum Indicum J. B. frumentum Indi- cum Mays dictum C. B. Item frumentum Indicum Mays dictum alterum ejusdem, milium Indicum ma- ximum Mays dictum seu frumentum Indicum Park. frumentum Turcicum & Indicum Ger.

C. Bauhinus. Radicibus nititur numerosis, duris, fi- brosis, sed minime crassis, & albis: quibus ab imo cau- lis geniculo fulcra quædam in terram demittuntur, quibus Culmi à vento agitati sustineantur, qui Arun- dinei septem vel octo pedes alti, rotundi, pollicem cras- si, rigidi, multis geniculis articulati, inferna parte pur- purascentes, qui paulatim extenuantur, solidi densâ & alba medullâ, instar Arundinis saccharinæ, farcti, qui dum adhuc virides & succulenti sunt, dulcedine sunt sacchari. Foliis & Arundineis, cubito plerunque lon- gioribus, tres aut quatuor uncias latis, venosis, margini- bus aliquantum asperis: paniculis summo caule dodran- talibus gracilibus, raris, jubæ modo multiplicibus ali- quando in 15. 20. & etiam 30. spicas procumbentes divi- sis, aristis carentibus, & flori tantum emittendo natis. Etenim flores summo culmo putant, non foeturae estinati

destinati, non umbræ, sed ornatu spectatores oblectantes, naturæque luxum ostentantes, quod raro in aliis conspicitur: nam cum defloruerint exarescunt, & nullum semen producunt; floret autem secalis instar, flore nunc candidi, nunc lutei, nunc purpurei coloris, prout videlicet fructus sive frugiferae spicae coloratae erunt. Et quod singulare huic plantae videtur esse, quod alia parte florem, alia fructum ferat, & non reliquarum frugum more in panicula semen fructumve proferat, sed à latere ex culmorum geniculis, medio foliorum & geniculorum sinu spicae aristis carentes, longæ, crassæ, rotundæ; cylindracea effigie, fructum ferentes, & ab uno culmo tres quatuorve alterno ordine exeunt, at à singulis nodis singulae, quæ multis foliaceis, tunicis vaginæ instar obvolvuntur, in summo tam arcte convolutæ ut ne aquam quidem transmittant; quæ spica, contumpepere possit: & spicae cum ad justam magnitudinem pervenerint piceæ arboris connotum longitudine tum crassitudine æquant, & è vaginularum verticibus filamenta capillacea eodem cum granis colore dependent, quo ab avium & vermium injuriis tutæ esse possint. Vaginis cum exaruerint denudatis grana apparent Pili magnitudine, omnino nuda, nulloque folliculo inclusa lævia, subrotunda, & quæ mediastino fuliginoso undique hærent; propter compressionem angulosa, frequentia, quæ sæpe in uno racemo apud Indos 700. (apud quos sæpe in uno grano 300. modia colliguntur) coacervata, at arctissime juncta, ac in octo, aut decem, rarius duodecim ordines, in longitudinem rectis lineis digesta: quæ ratione coloris variant, modo candida, interdum lutea, modo purpurea; nonnunquam fusca aut rubra, medullâ tamen candidâ, & sapore cæteris frumentaceis dulciori ac suaviori.

Interdum Paniculae, Camerario monente, etiam grana adnascuntur, ubi nondum plene sese explicavit, potissimum circa imam partem, quæ tunicis vestitur, quasi fecunditas nuditate evanescens pereat, eademque à tempestatum injuriis operimentis integra conservetur.

Quod paniculas floriferas infæcundas à semine seu fructu remotas gerit non huic frumento proprium est, sed & lachrymæ Jobi dictæ commune.

Quod vero paniculae hæc omnino ad generationem inutiles sint, & ad spectaculum seu luxas naturæ ostentationem duntaxat comparatae, Bauhino non assensior: verisimile enim est apices floridos spermatis masculini vicem præstare & semen fecundum reddere, ut in parte generali docuimus.

Frustra Gerardus nostras, Tabernamontanum sequens, pro granorum colore species multiplicat, cum ex eo dem semine pleræque hæc varietates haberi possint.

Frumentum hoc Indiæ Occidentalis indigenam esse (in cujus omnibus ferè regionibus reperitur) indeque in Africam, Asiam, & Europam delatum, Matthiolo consentimus. Quicquid contradicendi studio repugnant adversariorum auctores: milium autem Indicum Plinii, quod Neronis principatu in Italiam fuit convectum Melicam seu sorgum esse minime dubitamus.

Seritur Martio, in singulas scrobes, inter se passum unum distantes, quaternis quinifve granis coniectis, nascitur paucis diebus, & quarto in India mense demetitur. Apud Germanos feri in agris observavimus: ubi terram probe stercoreatam, pinguem & humidam expetit. Frigoris & pruinarum impatiens est. Tempus ferendi pro regionis qualitate & temperamento variat: alibi serius, alibi citius seren-

dum, alibi etiam breviori temporis spatii semen perficit & ad maturitatem perducit, alibi longius requirit. Est genus trimestre, est quod duobus tantum mensibus & seritur & metitur. Quinetiam aliud est quod 40. tantum diebus à satione maturefcit; si auctoribus fides, Quod in altitudinem excresecat, & plures spicas producat, vel loci fertilitati, vel cœli temperiei debetur.

Vires & Usus. Quidnam hoc frumentum in Medicina possit nondum satis constat (inquit Joh. Bauhinus) quia autem dulcedinem & lentorem quandam grana præ se ferunt, haud dubie idem cum Tritico habebit temperamentum, ac proinde eadem etiam facultates obtineat necesse est. Grana itaque teruntur in candidissimam farinam, quæ in panificia subinde cogitur. Panistamen ille lentoris quiddam & obstruentis naturæ habet. Hinc est, quod in Asia & Turcia illius nullum in cibo usum esse, nisi cum annonæ premittitur inopia, dicunt. Panis ex eo paratus (auctore Dodonæo) mediocriter quidem candidus est, fufuribus concinnatus sed durus ac siccus, veluti biscoctus, nihilque lentoris habens; concoctu eas ob causas difficilis, corporique nullum aut omnino exiguum alimentum præbenstarde descendens ac alvum constringens, veluti ex milio aut panico factus.

Franciscus Hernandes frumentum hoc valde celebrat: temperatum est (inquit) aut ad caliditatem humiditatemque paulisper declive. Substantiâ mediocri, concoctu facile, præcipue his qui eo victu uti consuevere, non crassa, aut veluti quidam opinantur, obstruenti & viscosa, quod vel Indis ipsis, qui ex eo Pane in placentulas formato vivunt, nec tamen obstructi aut decolores conspiciuntur, periclitari licet: iisdem affirmantibus, nullam in ventriculo gravitatem sentire post epulas, imo post paucashoras rursus ac si nihil ingessissent esurire, & magna aviditate, si adsit copia repetere nutrimentum, nec vel de nomine solo ad adventum usque Hispanorum lithiasin novisse; quin quod nullus est apud Mexicanos celebrior ægritudinum acutarum & commodior victus qui etiam pituitæ præfertur, quod mille experimentis comprobatum confirmatumque est: celeriter utique (aiunt) coctum descendere, corpora quantum sat est nutrire, nullum inferre gravitatis sensum, mollire ventrem & pectus, calorem subtilem demulcere (præsertim si pulvis ejus ex aqua permixtatur humali tempore gelare) urinam evocare, viasque omnes extergere. Reliqua apud ipsum vide, ut & varios modos illius patandi tum sanis, tum morbo aliquo affectis.

C. Bauhinus nescio à quo edoctus, scribit Indos si nimium utantur hoc frumento in cibis, tumidos & scabiosos reddi. Imò (inquit) pueri Guineensium, qui hoc frumento sæpe Panis loco utuntur, videlicet granis è spicis excussis, iisque nonnihil tostis & præstis si paulo frequentius utuntur, à scabie se vindicare non possunt, cum sanguinem nimis calidum & quasi adustum gignat.

Panis & vini ex hoc fermento conficiendi apud Indos modum vide in Histor. C. Bauh. lib. 1. sect. 4. cap. 31.

Farinæ usus est ad cataplasmata mollientia & suppurantia, nam suo lentore meatus obstruens apostematibus suppurandis peridonea est. Foliorum item recentium succus refrigerandi facultatem obinet, & Erysipelatibus, si Panni inuncti applicentur conducit.

TRITICUM INDICUM ALTERUM.

Nomina. Frumentum Indicum Mays dictum minus C.B. Indicum alterum sive minus Park.

Quod

Quod mediam præcedentis altitudinem vix attingat, cujusque spicæ frugiferæ non ad culmorum latera prodeunt, sed paniculis cum defloruerint succedunt cætera similis, cum invalido tibicine solius Tabernamontani fide & auctoritate nitatur, nobis quidem dubium & suspectum est.

Pro Cultura & usu frumenti indici Mays dicti consulantur, Transact. philosoph. n. 142. pag. 106. 5. Rajus.

MODUS PRÆPARANDI TRITICI aliæque GRANA quo unus eorum **MODIUS** terra commissus duplum omnino producat quàm quod alias naturaliter eadē GRANA producere soleant.

7. Tritici mundi & recentis modium v. g. unum, bulliat igne lento in aq. f. q. horis tribus, illud interea tubinde agitando, trajiciatur postea decoctum per linteam, illudque & ipsum triticum seorsim asserventur: triticum scilicet corbi ligneæ impositum, furno eodem tempore quò panis in id ad coquendum intruditur, committatur, atque ex ipso, sc. tritico probè tostò fiat pulvis unde sal secundum artem eliciatur, quòd in decoctum tritici projiciatur ac dissolvatur. rum 7. Decoctum sale tritici sic imprægnatum & aque è fimeto stillantis aa. stercoris ovilli, vel caprini modii quartarium, salis nitri puri, 3iv. reponantur omnia in vase idoneo super igne lentissimo per horæ quadrantem, materias interina spatulâ continuò commovendo ut exquisitè misceantur ac dissolvantur: quòd peractò compositio ab igne removeatur, & in vasis ligneis, aut aliis aptis asservetur, Hæc autē compositio continet verum nitri spiritum cujus efficaciâ triticum etiam terris sterilibus ac modicè & sine stercoreatione cultis commissum abunde vegetat. Quando autem triticum serere volueris, necessarium erit ut per horas 24. in prædictâ compositioe maceretur, sicq; maceratum post effusam per inclinationem aquam (quæ pro novâ infusione peragenda reservari debet) retrahatur, posteaq; corbis super charta impositum in umbrâ siccat; Sic enim ad sationem præparatum erit. Eodem tempore quò illud serere volueris, ipsi commiscendum erit, terræ levioris, vel etiam arenæ duplum, quò scilicet clare admodum conferatur, nam in agro quatuor aut saltem trium modiorû capaci, unus tantum conferendus est. Nullatenus autem stercoreandæ sunt terræ quibus triticum sic præparatum immittitur, quia illud jam in se firmum, seu nitrum essentiale continet, unde quodlibet granum 15, 20, 25, 30. imò etiam 40. spicas longiores producit. Si verò ejus major quantitas quàm quæ præscripta est in certò spatio feratur, suffocatur semen, aut culmus postquâ adolevit ac spicâ suâ agit in humû spargitur & prostrernit. Debet autē feri statim ac siccû est.

Eadem ratione præparantur alia omnia grana, observando tantum quòd decoctum primo locò præscriptû ex eodem ipso confici debet granò quod serere animus est. Sic præparatum granum contra omnes aëris injurias, præterquam grâdinem &c. tutum est. Non inutile præterea fuerit si triticò macerato, eodem scilicet quòd compositioe educitur momento boli pulvisculus leviter inspergatur, quòd desiccatio acceleretur.

TRITICUM SARRACENICUM, vid. Fegopyrum.

TROCHISCATIO & TROCHISCUS.

Requiruntur ad trochiscationem duo (1.) subiectum, quod in hanc formam aptari debet, trochi scilicet, seu orbiculi majoris aut minoris, vel oblongi, sive carnes, seu pulveres, aliæque in officinis viperæ, squilla, agaricum, colocynthis, præparari assueverunt; priora pro theriacâ imprimis, posteriora pro usu polychresto purgante. (2.) Liquidum subiens & inviscans, ut coire particulæ & ex massâ forma debita coccinnari queat. Adeoq; fundamentum hæret in cohæsiōe particularû, qualis laxior etiam in pulveribus præparatis vulgò ob-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

tinet, in aliis magis, in aliis minus compactâ, diverso pro usu. Hæc igitur inviscans vis vel domestica est jam, ut in agarico, item in terris, unde terræ sigillatæ nihil aliud sunt, quàm trochisci, prout afferri & prostare consueverunt. Est enim terrarum hæc nota, quod cum aquâ in lutum coeant. Par ratio est succi glycyrrhizæ trochiscati. Vel ad scititia, quem in finem gummi tragacanthæ, Arabicum, imò & farinæ vel panis biscoctus in trochiscis de viperis & de squillâ adhibentur, quæ nempe in se habent lentorem.

Hinc enim trochiscatio fit (1.) pulverisationis melioris extemporaneæ gratiâ, quod de agarico valet, quatenus pulverisatum & per cribrum trajectum maceratur cum vini albi generosi sufficiente quantitate, in quo ziagib. 3ii. fuerint infusæ.

(2.) Ob adseruationis & dispensationis commoditatem, quod forma sit portatilis, & cohæreant magis partes, unitæ verò meliores etiam hoc loco sint quàm dispersæ, accedente in primis, quod id comprobat, usu & consuetudine, quæ hanc syncrifin stabilivit.

(3.) Ad præservatiōem à corruptione, quod in trochiscis de viperis & aliis manifestum. Pulveres enim corruptibiles magis sunt, nec ferût etatē. Inviscatio verò defecit à corruptore aëre, accedente in primis siccatione probâ.

(4.) Ad correctionem; lentor enim particulas salinas obtundit & inviscat ex parte, ut colocynthis hinc minus abraderi vi illâ suâ acri intestina queat, quod etiam de agarico leviori sunt qui scribunt, porositate nimia ejusdem hoc pacto retusâ.

(5.) Ad deglutitionem, seu assumptionem meliorem. Forma trochiscorum masticabilis est, unde præbia divisa quasi jam exhibet, qui usus cum compositis est communis. Wedelius.

Materia Trochiscorum sunt omnis generis Medicamenta, quæ pulverisata, liquore conveniente, (viscoso,) suscipi, compilari ac impastari queunt.

Parantur autem in Officinis Trochisci, partim ut pulveres viscoso aliquore compacti ab injuria aëris eodem melius asserventur, exigenteque necessitate, adhiberi queant, partim quoque, ut per se applicentur, e. gr. Trochisci bechici sublinguales, prophylactici, trochisci pro fumo, & simil.

Modus fiendi.

7. Medicamenta subtiliter pulverisata, redige in massam cum liquore conveniente mucilaginoso, e. g. cum mucilagine aliquâ (Tragac.) cum succo, syrupo, & simil.

Ex massa impastata formantur trochisci, seu parvi pastilli, (quibus character pro libitû imprimitur,) vel sunt inde bacilli oblongi.

Trochisci usitatiores alterantes.

Trochisci.

de Absinthio, Mesuæ, August.

de Agno casto, Rhafis, Aug.

Alexiterij s. contra pestem, r.

Aliptæ moschatæ, cum ambra ac moscho, A.

Aliptæ moschatæ, sine ambra & moscho.

de Alkekengi, cum opio, A. sine opio,

de Aniso, Mesuæ, A.

Bechici albi, cum moscho; A. sine moscho. nigri, rubri, sive è bolo.

de Benzoin.

de Berberibus.

de Camphora, Mesuæ.

N. Renodus alios è Myrepsò substituit.

de Capparibus, Mesuæ.

de Carabe, s. succino, Mesuæ.

de Corallio, Nicol.

Diacorall. Gal.

Cypheos Damocratis.

de Eupatorio, Mesuæ

pro fumo vulgares, 2.

P p p p

opti:

optimi, f. cum moscho, 3.
 de Gallia moschata
 Gordonii
 Hedychroi
 de Violis, Nicol.
 de Lacca, Mesuæ
 Moschardini. 4.
 de Myrrha, Rhaf.
 Pectorales. Baculi pectorales, 5.
 Prophylactici cum mithrid. 6.
 Ramich Mesuæ.
 Diarrhodon. N. col.
 de Santalis, Mesuæ.
 Diaspermaton Gal.
 de Spodio.
 de Terra sigillata, Mes.
 de Vipera, Gal.
 de Xyloaloe, Mesuæ.

Huc referendi sunt 1. Trochisci ophthalmici, quibus imponitur nomen Sief. 2. Candelæ pro fumo. 3. Sapo odoratus; ac 4. Poma Ambra, de quibus partim suis locis, partim hoc loco.

[Trochisci de Catech. muscerda minima formâ, muschati, qui sub lingua pro fragrantia & apophlegmatismo tenentur:]

Collyria sunt usitatoria.

Sief. album cum & sine Opio, album
 Galeni.
 citrinum Mesuæ
 de plumbo Mesuæ
 de rosis siccis.
 de thure Rhafis.

Vide Dispensator.

Trochisci purgantes.

Trochisci de Agarico, Mesuæ.

Agaricus Trochiscatus,
 Alhandal. f. de Colocynthide,
 de Rhabbarbaro.
 de Violis solutivi.

1. Trochisci Alexiterii Renodæi. ex Schrod.

℞. Rad. Zedoaria, gentiana, tormentilla, rad. treos flor. ana 3i. angelic. cinamomi. caryophyllor. macis, ana 3ß. Zinziber. 3j. coriandri præp. rosar. ana 3j. cort. curi. sic. 3ii.

F. Pulvis subtilissimus, & cum succi Glycyrrhizæ 3vi. f. pasta mollis, de qua formentur trochisci, vel potius bacilli oblongi.

Vires. Pesti præcavenda multum conferunt, si in ore detineantur, vel & in ventriculum demittantur.

2. Trochisci pro fumo vulgares. F. F. ex Schrod.

℞. Santal. citrin. rosar. rubr. Caryophyll. cinam. ana 3vi. benzoin. 3i. 3ß. styrac. calamit. 3i. sacchar. pulv. 3xii.

Cum mucilag. Tragac. in ∇ ros. fact. f. trochisci.

3. Trochisci pro fumo cum moscho F. F. ex Schrod.

℞. Benzoin. 3i. styrac. calamit. 3vii. rosar. rubr. 3i. ligni aloes 3ß. caryophyll. santal. cur. ana 3i. sacchar. alb. 3viii. mosch. zibet. ana 3ß.

M. & cum infusione tragacanth. in ∇ rosar. formentur trochisci.

Trochif. hysterici è Ph. Colleg. Reg. London.

℞. Ase feride, galbani an. 3i. 3ß. myrrhe 3j. castorei 3is. rad. asari, aristolocia longa, folior. sabine, matricarie, nepeta an. 3i. dictamni 3s. gummi, in succo, vel decocto, ut a maceratis, colatis, & ad mellis crassitatem coctis, adiciantur reliqua tenuissime pulverata fiantq; trochisci f. a.

Trochisci Caustici ex D. Charraz.

℞. Cinerum clavellator. & calcis vive recenter coctæ

an. 3j. sublimati corrosivi & thuris masculi an. 3s. Subtiliter pulverentur & misceantur, & cum aqua rosarum, fiant exigui trochisci, in umbra siccandi.

Hæ trochisci brevi temporis spatio canterisant partes corporis quibus imponuntur.

Trochisci odorati vel aviculæ Cypreæ ex eodem.

℞. Pulver carbon. salicis 3ii. labdani 3ii. storacis benzoini an. 3s. mastiches. gummi racamahaca odorata, succi niflavi an. 3ii. santoli citrini, ligni rhodij an. 3ß. cum mucilagine gummi tragacantha in aq. rosar. extracta, fiant ex a. trochisci in umbra siccandi.

Trochisci vel aviculæ Cypreæ aliæ ex eodem.

℞. Carbonum rorismar. pulverator. 3iv. labdani 3j. storacis benzoini an. 3j. rad. cyperi, calami aromatici, mastiches, succini an. 3j. caryophyllor. 3j. moschi, ambre griseæ, zibethi an. g. x. cū mucilagine gummi tragacantha in aqua florū arantiorū extracta fiant trochisci in umbra siccandi.

Trochisci alii Nobiliores ex eodem.

℞. Resina styracis, benzoini electi, carbonum salicis an. 3j. racamahaca odorata purissima, ligni aloes veri subtilissimè pulverati an. 3s. ambra grisea 3j. moschi 3ß. Zibethi g. vi. oleorum stillat. ligni rhodij, cinnamomi, caryophyllor. an. g. vi. cum mucilagine gummi tragacantha in aq. rosar. extracta fiant ex a. trochisci.

4. Trochisci Moschardini, alias confectio moschardina; Corpus sine anima, ex Schrod.

℞. Moschi ex ∇ rosar. dissolut. 3j. sacchari. alb. 3vi. amyli. 3v.

Atterantur pistillo, & cum mucilagine tragacanth. (ex 3i.) in ∇ rosar. fact. f. grana instar hordeaceorum, quæ exiccantur in umbra, pro usu:

N. Sunt qui sanguinis Draconis 3ii. addunt.

Vires. Graveolentiam oris emendant, si pastillus unus ac alter in ore detineantur.

5. Baculi Pectorales F. F. ex Schrod.

℞. Spec. diatragac. frigid. diatreos simpl. an. 3i. rad. liquirit. 3ß. sacchar. alb. 3vi.

Cum mucilagin. Tragacanth. F. Baculi.

Vires. Tussim leniunt, asperitatem demulcent.

6. Trochisci Prophylactici cum Mitridatio, F. F. ex Schrod.

℞. Boli armen. in succo citri infusi & exiccati 3i. corall. rubr. præpar. 3ii. rasur. c. c. 3i. succin. alb. 3ii. rad. tormentill. pimpinell. imperator. angelic. zedoar. cinamom. an. 3ii. croc. 3j.

F. Pulvis subtilissimus.

℞. Hujus pulveris 3ii. mithridatii opt. 3i. 3s. cinamom. angelic. an. gut. i. sacchar. alb. 3iii.

Cum mucilagine G. Tragac. in ∇ angelicæ facta.

F. Trochisci.

Vires. Frequenti hic in usu sunt ad pestem præcavendam.

Hujus quoque loci sunt, candelæ & baculi fumales, quæ sunt ex pulveribus odoriferis, impastatis mucilagini Tragacanth. Syrac. & similib. uti trochisci pro fumo, a quo non differunt, quoad modum fiendi.

Sic sunt

7. Candelæ fumales. F. F. ex Schrod.

℞. Benzoin. 3xvi. lign. aloes, rhod. santal. citrin. labdan. an. 3iv. oliban. mastich. caryophyll. an. 3iii. sacchar. alb. 3ii. carbon. tilia 3iv. 3j.

F. omnium pulvis subtilissimus & cum mucilagine tragacanth. in ∇ rosar. major. n. & cort. citri facta, formentur candelæ, addendo partem styacis liquid. & terebinth.

8. Massa seu baculi pro Fornace ex Schrod.

℞. Benzoin. storac. cal. an. ℥vi. ladan. opt. ℥vi. bal. am. indic. ℥iii. lign. aloes ℥iii. (probat extract.) mosch. alexand. zibett. an. ℥j. m. s. a. f. massa.

Formeturque instar ceræ Hispanicæ baculi formaci affricandi.

Trochisci alij varij, ad varios usus, ex variis Autoribus.

Trochisci de Absinthio Mesuæ ex Ph. Aug.

℞. Rosar. Absinth. pontici, Anisi an. ℥ii. rhabarb. succi Eupatorii Mesuæ, Asari, sem. Apij. Amygdalorum amarorum, spica indica, mastiches, Folij an. ℥j. succi endivia quantum sufficit. Fiant Trochisci.

In diuturnis febribus proficui, obstructions ventriculi, hepatis & dolores eorum levant, partes naturales omnes roborant, dejectamque adpetentiam suscitant.

Agaricum Trochiscatum ex Ph. Aug.

℞. Agarici elect. ℥iv. vini cretici aut malvatici, in quo ℥j. Zingiberis infusa fuerit, quantum sufficit, formantur Trochisci.

Pituitam crassam bile permixtam expurgat, ac viscerum obstructions tollit.

Agaricum selectissimum per incerniculum transfusum cum justa quantitate infusi Zingiberis in mortario Lapideo in pastillos cogatur, qui aere libero in umbra siccantur, ut evadant candidi, cum alioquin facile nigrescant.

Trochisci de Agarico Mesuæ ex eadem Ph.

℞. Agarici elect. ℥iii. salis gemmae ℥i. Syrupi acetosi simpl. quantum sufficit. Formantur Trochisci, qui reponantur in loco calido & siccato.

Confert agaricum sic præparatum antiquis Capitis doloribus, viscerum obstructionibus à crassa, tenaci ac pituitosa materia obortis, stomachum, renes, lienem, hepatis ac uterum mundificat, Epilepsiam & vertiginem abolet, vermes enecat & expellit, prodestque ut plurimum morbis patrium naturali facultati dicatarum, unde forsitan Democrito Medicina familiaris dictum fuerit; venenis quoque resistit, asthma conducit, & respirationem faciliat.

Hic sunt communes illi Trochisci de Agarico, solemniore tamen & magis correctæ eorum componendorum ratio pluribus videtur ea, quæ sequitur:

℞. Agarici albi & levis ℥ii. salis gemmae ℥ß. Zingiberis ℥iii. oxymelitis simpl. quantum sufficit. Formantur Trochisci.

Antiquior mos in corrigendo Agarico hic erat, ut ei salem gemmeum tres potissimum ob causas adderent, quæ prima, exigui tamen ponderis est, ut is jam dictum Agaricum ob levitatem suam os ventriculi alioquin petiturum, ac vomitum vel stomachi subversionem citatissimum, ad ventriculi fundum deprimeret, deinde vero, ut, cum agaricum tardè ac seghiter purget, sal gemmeus magis irriter, stimulet, atque excretionem promoveat. Tandem quoque ut abstergat & mundificet, unde priscos omnibus ferè medicamentis purgantibus salem indidisse notavimus. Oxymeli porro adiciebant, ne agaricum intestinis adhereret, sed protinus abstergeretur, cum aliàs vitium hoc ei peculiare existat, unde Avicenna eundem colicis non exhibendum esse docet, ne levitate suâ intestinis adherens novos dolores procreet, insuper etiam oxymeli crassos ac lentos humores incidit, prout & zingiber, quod tenacem pituitam liquat attenuatque, & agarici infirmam vim

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

ad longinquiores partes deducit, cum interim calore suo aromatico eandem confortet.

Trochisci de Agno Casto Rhafis ex Ph. Aug.

℞. Sem. Agni casti ℥v. Endivia, portulaca an. ℥ii. cort. tamarisci ℥v. Formantur Trochisci cum decocto scolopendrij.

Profluvio seminis & gonorrhææ, morbis itidem splenis medentur.

Trochisci Albi Rhafis ex Pharm. Londin.

℞. Cerussæ aquæ rosar. lota ℥x. sarcocolla ℥iii. Amygdali ℥ii. gum. Arabici, Tragacantha an. ℥j. camphora ℥ß. excipiantur omnia aquæ rosar. vel lacte muliebri & Fiant Trochisci s. a.

Trochisci Alexiterii ex eadem Pharm.

℞. Rad. zedoaria, pulv. è chelis cancerorum an. ℥i. cort. exter. citrificæ condit. Sem. Angelicæ, an. ℥j. boli armene ℥ß. sacchari crystallini, triplum pondus omnium. Fiat pulvis subtilissimus, & cum s. q. mucilaginis gum. Tragacantha in Aq. Theriacali stillat. extracta, f. pasta ex qua formantur Trochisci.

Trochisci Alhandal ex Ph. August.

℞. Tragacanthi, gummi arabici, bdellij an. ℥ii. macerentur in aqua rosacea, donec liquecant, & cum majori parte hujus mucilaginis pulpa colocynthidis à seminibus mundata ac minutim incisa ℥x. imbuantur, siccantur, pulveriscentur & tandem cum reliqua mucilagine formantur Trochisci.

Pituitam, & humores alios Crassos ac glutinosos è profundis longeque distantibus partibus, utpote cerebro, nervis, musculis, juncturis, pulmonibus, ac Thorace evacuant, quo nomine in Cephalalgia, hemicrania, apoplexia, vertigine, asthma, diuturna tussi, dyspnœa, thoracis angustia, ischiade morbisque articularibus frigidis usurpantur, exhibentur in dolore Colico flatulento ad vitream & viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.

Correctionem, quam ex Mesuæ præcepto, cum amygdalor. dulcium oleo instituisse olim consueverunt, cum facile carere eâ possimus, consules omisimus.

Trochisci Alkekengi Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Fructuum Halicacabi ℥iii. sem. citruli, Anaguræ, cucurbitæ an. ℥iii. Boli armene, gummi Arabici, Thuris masculi, sanguinis draconis, Amygdalorum amarorum, succi glycyrrhizæ, Tragacanthi. Amyli, pinearum mundatar, sem. papav. albe an. ℥vi. Apij, hyosciami, charabæ, seu succi ni albi, Terra sigillata, opij an. ℥ii. cum succo Halicacabi vel cum aq. rosacea, in qua ejusdem fructus sicci fuerint macerati, Fiant Trochisci.

Dicuntur etiam diaphysalidon & de vesicaria, ad urinae ardorem, in fistula urinaria, vesica, renibus, & ureteribus exulceratis, feliciter exhibentur, dum ulcera detergant, glutinant, & cicatrice tegunt, lotij acrimoniam mitigant, indeque urinæ tarditatem & dysuriam natam tollunt.

Trochisci Alkermes ex Pharm. August.

℞. Confectionis Alkermes completa ℥ß. lacca florentina ℥i. v. Ambre, moschi ana ℥ß. sacchari albi ℥xvi. mucilaginis Tragacanthi cum aqua rosarum salis quantum satis, Fiant Trochisci.

Viribus cum ipso electuario sive confectione conveniunt.

Eisdem etiam sine moscho & Ambra paratos in usu habemus.

Trochisci Aliptæ Mosehatæ Nicolai ex Ph. Aug.

℞. *Ladani purissimi* ℥iii. *styracis calamita* ℥iib. *ligni aloes veri* ℥ii. *Ambra* ℥i. *camphora* ℥b. *moschi* ℥b. *aqua rosar. quantum sufficit.* Formentur Trochisci.

Conferunt hi Trochisci infantibus ac puerulis asthmaticis & pectoris angustia vel anhelitus difficultate pressis, ventriculorum eorum laxum ac imbecillum roborant, unde lactis à nutrice præbiti evomitiones compescunt; nec non ad pretiosos suffitus expetuntur.

Parandi modus hic est, ut ladanum & styrax, in calido mortario, pistillo calido, validè contusa commisceantur, & emolliantur, deinde lignum aloës in tenuem pollinem tritum inspergatur, & denique camphora, Ambra & Moschus in sufficiente quantitate aquæ rosacæ odoratissimæ soluta addantur, & omnia in pastam cogantur, quæ in pastillos aut orbiculos efformari queat.

Trochisci de Aniso Mesuæ ex Ph. August.

℞. *Anisi, succi Eupatorii Mesuæ inspissati an.* ℥ii. *sem. Anethi, spicæ indicæ, mastiches, Folij, Folior. Absinthij, radicis Asari, Apij, Amygdalor. amarorum, an.* ℥b. *Aloes* ℥ii. *succi absinthij quantum sufficit.* Fiant Trochisci.

Obstructiones hepatis referant, flatus discutunt, stomacho auxiliantur, atque chronicos frigidos morbos, febresque diuturnas sanant.

Trochisci de Antispodio Mesuæ ex Renodæo.

℞. *Rosar. ℥vii. antispodij* ℥iv. *sem. portulacæ, succi glycyrrhizæ an.* ℥ii. *cum mucagine seminis psyllij.* Fiant Trochisci.

Si aliquando fas sit balbutire cum balbutientibus, hos pastillos ad electuarij de psyllo condituram accommodatos, de spodio vocavimus, sed inviti quidem, quod illorum basis spodium non sit, sed potius antispodium, vel verius ustum, quod hucusque Pharmacopæorum familia pro canna seu Tabaxir radicibus ustis usurpavit, valeat tamen istud pseudospodium, vel imaginarium Arabicæ gentis spodium, quod valere poterit, ex eo antispodio à nobis vocato, parandi & nominandi sunt Trochisci descripti, additis rosis, semine portulacæ, & succo glycyrrhizæ, psylli glutine comprehensis.

Vires. sic autem parari non modo in Electuarij dici veniunt compositionem, sed & per se dantur ad febres acutas, ventriculi & hepatis inflammationem, & sitim vehementiorem.

Alij dantur adhuc à Mesuæ magis compositi, cum semine videlicet acerosæ, pulpa sumach, amylo, coriandro, balauistiis, berberis & Gum. Arabico, omphacij succo exceptis, minus tamen usuales sunt; nec probè congruunt electuario nominato.

Trochisci Bechici Albi ex Pharm. August.

℞. *Sacchari albiss. ℥vj. ℥viii. ireos* ℥ib. *Amyli* ℥iiss. *mucilaginis Tragacanthi albissimi cum aq. rosarum facta quantum satis.* Formentur Trochisci parvi.

Faucium asperitati prosunt, ac tussientibus & difficulter spirantibus opem ferunt.

Bechici Nigri ex eadem Pharm.

℞. *Succi liquiritiæ inspissati* ℥viii. *sacchari* ℥vii. *cum mucilaginis Tragacanthi fiant Trochisci, in mortario calido massam miscendo.*

Tussi sicca à materia acri & calida profectæ conferunt, guttur ac fauces leniunt, difficilesque excretaiones promovent.

Pulveris liquiritiæ ℥j. olim huic compositioni destinatam, si quis addere voluerit, per nos liceat, quam-

vis hac ratione Trochiscorum, colorem nigrum, à multis vulgo expetitur immutari contingat.

Bechici Nigri alij ex eadem Pharm.

℞. *Succi glycyrrhizæ inspissati* ℥iv. *styracis calamita* ℥iib. *sacch. cantij* ℥iib. *specierum diareos Salom. Joboch. sani an.* ℥b. *sacchari penidij* ℥b. *albissimi* ℥ii. *℥ia. mucilaginis. Tragacanthi cum aqua hyssopi facta quantum satis.* Fiant Trochisci.

Viribus cum Trochiscis Bechicis nigris, superius descriptis conveniunt.

Bechici Rubri ex eadem Pharm.

℞. *Specier. Trochiscos, bechicos albos constituentium* ℥ij. *boli Armenæ orient. preparata* ℥ij. *℥. ℥ij. cum infuso Tragacanthi facto in aqua rosar. Fiant Trochisci.*

Catarrhos tenues interceptiunt, leniter enim adstringunt & exsiccant, ac sputum Sanguinis inhibent.

Bechici Grisei ex Pharm. Norimberg.

℞. *Pulveris liquiritiæ* ℥ij. *spec. de iride* ℥b. *pulv. seminis anisi* ℥j. *styracis calamita* ℥ib. *sacchari alb.* ℥ij. *Cum mucilaginis Tragacanthi fiat massa, addantur olei anisi guttæ aliquot.*

Bechici Antipleuritici Zuelferi.

℞. *Species omnes Trochisc. bechic. albos ingredienti* quib. adde *extracti flor. papav. errat. vel Rhead.* ℥ij. *rad. Enule* ℥ii. *pulv. boli Armenæ prep.* ℥ib. *croci* ℥j. *℥i.*

Ex omnibus probè unitis fiat, beneficio mucilaginis tragacanthi (si pulpæ seminum & pinearum non suffecerint) cum infusione flor. papav. Rhead. factæ massa seu pasta s. a. ex qua formentur Trochisci: qui in omnibus pectoris, Tussi antiqua, pleuritide, sputo cruento, imò in phthisi ipsa cum emolumento exhibentur.

Trochisci de Bdellio Avicentæ ex Baderond.

℞. *Rosar. rubrarum* ℥x. *Bdellij* ℥iii. *nardi indicæ* ℥ii. *amygdalar. amararum* ℥. *costi, utriusque* ℥b. *myrrha* ℥. *mastiches, utriusque* ℥i. *dissolve Bædium cum vino, & finge pastillos pond.* ℥ii.

Trochisci de Benzoë ex Pharm. August.

℞. *Benzoë* ℥vi. *ligni Aloes optimi* ℥vii. *styracis calam.* ℥iii. *moschi* ℥b. *ireos* ℥ii. *sacchari cantij* ℥vii. *pulverisatis omnibus, Fiant Trochisci cum aqua rosar.*

Caput & pectus roborant & ticcant, nec non ad suffitus ac odora menta expetuntur.

De Benzoë ad usum internum Zuelferi.

℞. *Sacchari can. albi* ℥vj. *solutum in s. q. aquæ rosarum frag. ad consistentiam Tabulati coquendo redigatur, in quo ab igne remoto dissolve, resina storacis calam. per expressionem facta & item ubi parum refrigerint, pulv. Benzoës et. in granis* ℥vi. *ligni aloes opt. gum.* ℥b. *rad. ireos flor. ℥j. moschi orient. in nonnullis guttulis aq. rosar. ad pulvis soluti* ℥j. *& si in promptu sit, olei Benzoës still. fragr.* ℥j.

E quibus omnibus mixtis addita s. q. mucilaginis tragacanthi, cum aq. Flor. Arant. facti, efformetur pasta, ex quâ tandem formentur Trochisci laudatissimi pro usu interno, in affectibus pectoris & asthmaticis utiliter adhibendi.

Trochisci de Berberibus Mesuæ ex Ph. August.

℞. *Berberum* ℥ij. *spodij, ligni aloes, seminis acetosæ, mastiches, galie moschatæ, nardi indicæ an.* ℥i. *arabici* ℥ii. *rosar. rub.* ℥v. *aquæ rosarum quantum sufficit.* F. Trochisci.

Ingrediuntur Elect. rosarum Mesuæ, in eumque solum potissimum parantur, licet usurpari etiam possint ad intemperiem calidam, febrium ardores, linguæ ariditatem, & sitim sedandam.

Trochisci de C. mphora Mesuæ ex Ph. Aug.

℞. Rosar. rub. ℥iv. sacchari albi, manna an. ℥iij. sandali citrini ℥i. ℥. glycyrrhizæ, spodij an. ℥ii. sem. 4 frigidior. major. gummi arabici, Tragacanthi, nardi indicæ, croci an. ℥j. ligni aloës, cardamomi majoris, Amyli, camphoræ an. ℥ii. cum mucilagine sem. psyllij, extracta cum aqua rosacea, formentur trochisci.

Ad febres acutas, bilis & sanguinis fervorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim intensam, isterum quoque, phthisin & hæticam utiliter adhibentur.

Trochisci de Capparibus Mesuæ ex Ph. Aug.

℞. Cort. radicis capparum, sem. Agni casti an. ℥vi. nigella, nasturtij, calamintha, succi Eupatorii Mesuæ, Acori. Amygdalor. amarorum, Folior. ruta, Aristolochia rotunda vera, Ammoniaci an. ℥ii. cyperi rotundi, scolopendrij veri seu ceterachi an. ℥i. Trita omnia tum ammoniaco in aceto dissoluto formentur in trochiscos.

Commeñdantur ad lienis & hepatis obstructions à crassa & melancholica materia profectas; potenter enim humores attenuant, natamque inde viscerum duritiem emolliunt, ac flatus hypochondiacos, catarrarumque partium solvunt.

Trochisci Cephalici seu Capitales Zuelferi.

℞. Sacchari cancr. albi ℥vi. solvatur in f. q. aq. rosar. ac denuo ad consistentiam tabulati parum coquatur, in quo ab igne remoto dissolve Ambra gryseæ ℥i. vel ℥ss. prius tamen cum sem. citri extort. ℥j. probe subacta, resina storacis calamitæ ℥j. his bene mixtis & dissolutis superadde statim conf. flor. betonica, arantiorum ana ex anatica quantis. Flor. & sacch. parat. ℥i. pulv. rad. dionici veri, ligni aloës an. ℥ii. nucum moschatar. ℥ii. macis, Cardamomi, cubebæ an. ℥i. ℥. Eleosacchari, cinamomi. ℥vi. caryoph. ℥ss. sumendo ℥ss. oleorum pro ℥j. pulv. sacchari, sacchari rosati superius edocti ℥j.

Et cum suffic. quant. mucilagine Tragacanthi, cum Aq. rosarum fragr. extracta fiat pasta seu massa enax, ex qua Trochisci formandi, cerebrum & totum caput, ut & ventriculum insigniter roborantes.

Trochisci de Charabe Mesuæ ex Ph. Aug.

℞. Charabe ℥vi. cornu cervi nsti, gummi Arabici, corallij rubri, Tragacanthi, succi Acacie hypocistidis, balaustior. mastiches, lacca, papaveris nigri an. ℥ii. Thuris, croci, opij an. ℥j. gr. xv. mucilaginis psyllij quantum satis est. Formentur Trochisci.

Sanguinem excreantibus, tabidis, purulenta exspuentibus, coeliacis & dysentericis auxiliantur, sanguinem undecunq; emanantem supprimunt.

Trochisci de Corallio Nicolai ex Ph. Aug.

℞. Corallij rubri, cinnamomi, myrrhæ, amomi, sem. papaveris an. ℥ss. schœnanti, croci ℥ii. calami aromatici, Xylobalsami, cassia lignea, Folij mastiches, folior. polij montani, pedis columbini, radic. phu, Asari an. ℥j. mucilaginis tragacanthi quantum sufficit. Formentur Trochisci.

Sanguinolenta excreantibus, dysentericis, coeliacis, & cibum fastidientibus mirè subveniunt.

Diacoralliu Galeni ex eadem Pharm.

℞. Corallij rubri, terra samia, aut Boli Armena an. ℥j. lemnia, balaustior. Amyli an. ℥ss. hypocistidis, sem. Hyoscyami, opij an. ℥ii. succi plantaginis quantum sufficit. Formentur Trochisci.

Iisdem affectibus probè tollendis, quibus præcedentes succurrunt.

Mangesi Bibl. Pharm. Tom. II.

Trochisci de Croco Nicolai ex Ph. Aug.

℞. Croci ℥iij. rosarum rubr. Ammeos, myrrhæ an. ℥ss. ligni aloës ℥ij. cum mucilagine Tragacanthi aqua rosacea facta fiant Trochisci.

Lienis & hepatis obstructions aperiunt, flatus dissipant, humorum putredinem arcent, ac cordi vires addunt.

Crocomagma Damocratis ex Galeno ex eadem Pharm.

℞. Croci ℥xxv. myrrhæ, rosarum an. ℥xi. ℥ss. Amyli, gummi. Arabici an. ℥vii. ℥ss. vini Chij quantum sufficit. F. Trochisci.

Trochisci Cypheos Damocratis ex Galeno, ex eadem Pharm.

℞. Uvarum passar. major. seu cubebæ, Terebinthina cocta an. ℥ii. myrrhæ, schœnanti an. ℥ss. calami Aromatici ℥ix. cinnamomi ℥iv. bdellij electi, spica indica, cassia lignea vera, cyperi, baccar. Juniperi an. ℥ii. Aspalathi ℥ii. ℥ss. croci ℥j. mellis quantum sufficit, vini cretici modicum.

Bdellium, myrrhæ, & Terebinthina cocta in vino dissoluta redigantur ad crassitiem mellis, & carni pascular. ex melle diu trita misceantur: deinde reliqua in tenuissimum pulverem redacta adiciantur, ac simul agitando commisceantur, formenturque Trochisci, qui in umbra siccentur.

Describuntur à Galeno 2. de Anidotis in Mitriddatio Damocratis cujus compositionem ingrediuntur. Quamquam per se quoque commodè ijs deantur, qui jecur, aut pulmones vel renes, aut aliud aliquod viscus exulceratum habent.

Trochiscos hos inter obsoletos reposuimus, ut & qui Hedychioi dicuntur, postea describendi; cum nobis pro alijs usibus haud interserviant, quam ut Theriacæ ac mithridatij compositionem, ingrediuntur; quibus tamen species pro ijs requisitas commodè substituimus, & etiam substituere hæcenus consuevimus.

Trochisci de Eupatorio Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Manna, succi eupatorii an. ℥j. rosarum ℥ss. spodij ex ebore ℥ii. ℥ss. spica indica ℥ii. rhabarbari, Asari, Anisi an. ℥ii. ℥ss. cum aqua cuscuta fiant Trochisci, qui in umbra siccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lienis & hepatis obstructionem, tumoremque præter naturam; febres antiquas, earumque rigorem sanant, morbo regio & hydropi incipienti succurrunt, stomachicos juvant, & corporis flatus discutunt.

Trochisci de Gallia Moschata Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Ligni aloës ℥v. Ambra ℥ii. moschi ℥j. mucilag. Tragacanthi extracta cum aqua rosarum quantum sufficit.

Cerebrum, cor, ventriculum, & reliqua viscera roborant, vomitum reprimunt, pectoris angustias & respirationis difficultatem juvant, oris halitum commendant, & ad varias Compositiones expetuntur, sutfitu ac vaporazione gratissimi, nec non ad delicias odoris suavitate quàm maximè adcommodati.

Trochisci Gemmati ex Pharm. Norimberg.

℞. Residuum à Julepi gemmati solutione, addantur aliquot grana moschi, & ambra, cum sufficiente sacchari quantitate fiant Trochisci.

Trochisci ad Gonorrhœam Renodei.

℞. Sem. viticis, seu agni casti, lactuca, rosarum, balaustiorum an. ℥j. scobis ebore, electri an. ℥ii. boli

P P P P 3 arme-

armena in aqua centinodia lota ℞ii. *sem. plantaginis* Div. *sassafras* ℞ii. *cum mucagine seminis citoniorum in aqua nenupharis extracta, fiant Trochisci.*

Gonorrhæa vel est voluntaria, ut cum semen per coitum & cum voluntate excernitur, vel indita, ut cum citra venerem effluit: atque ea vel simplex est, & nullius qualitatis malignæ particeps, quæ aut à seminis plenitudine, aut qualitate, aut labore, cursu, equitatione, & piperatorum usu nimio oritur: vel scæda & virulenta, quæ ex impuro Concubitu, cum lue Indica affectis contrahitur, in qua virus albicans, aut ex virore flavescens è vasis feminalibus sine sensu excidit vigilantiter pariter atque dormienti, frequens quidem malum est, mulieribus perinde atque viris commune, quod tempore nonnunquam tantas vires acquirit, ut per totum corpus serpat & partes singulas afficiat.

Vires. Ad utramque verò utiliter nostri pastilli usurpantur ad simplicem quidem, sola sanguinis educatione præmissa: ad virulentam, incipientem, vel monduum inveteratam, corpore semel atque iterum repurgato & sanguine immundo, dantur cum decoctione seminum papaveris & melonum, vel cum aq. rosarum. Dosis est à ℞i. ad ℞iiss. aut ℞iii. ad summum. Horum ut præcedentium eadem est, ac facilis præparatio.

Trochisci Gordonii ex Phar. August.

℞. *Sem. 4. frigid. major. mundatorum, papaveris albi, malva, Bombacis, portulaca, cydonior, baccar, myrcillorum, Tragacanthi, gummi Arabici, pinearum mundatar. pistacior, liquirit, munda, hordei mundi, mucilag. psyllij, Amygdalor, dulcium, an. ℞i. boli armene, sanguinis draconis, spodij, rosarum myrrha an. ℞ß. sacchari cantij* ℞ii. *cum Hydromelite Fiant Trochisci.*

Describuntur à Gordonio de passionibus renum, partic. 6. Cap. 10. Quorum exulcerationes sanant, sanguinis mictum inibent, diabeti & gonorrhææ conferunt, ac stranguriam levant. Propinquantur si absterfio expetitur ex hydromelite, aut decocto liquiritiæ vel hordei; sin verò consolidandi intentio prævalet, ex lacte aut aqua Chalybeata cum syrupo vel succo plantaginis; ac si exulceratio in vesica existerit, lacte distemperati per syringam injiciuntur. Aliam descriptionem similium Trochiscorum ponit idem præfatus Autor eodem loco Cap. 11. quæ Ambra, succinum, spicam, schænantum, & alia recipit; verum hæc, quam adposuimus, usitatio existit.

Trochisci Hedychroi Andromachi ex Galenô Pharm. August.

℞. *Mari, radicum Asari, Amaraci, Aspalathi an. ℞ii. schœnanthi, calami odorati. phn. pontici, Xylobalsami, cinnamomi, costi an. ℞iii. myrrhe, Folij. nardi Indicæ, croci, cassie lignea an. ℞vi. Amomi ℞xii. mastiches ℞i. vini Falerni quantum sufficit. Fiant Trochisci.*

Describuntur à Galeno I. de Antidotis Cap. 10. ad Theriaces compositionem expetiri, in his cum quædam requirantur interdum succedanea, pro maro si defuerit (quod tamen ad nos jam deferri cœpit) dictamnicretici folia, pro Aspalatho sandalum citrinum, pro opobalsamo oleum caryoph. pro costo Angelicam, pro Amomio citri semina, ac denique pro Falerno creticum vinum adsumere licebit.

Trochisci Hepatici Refrigerantes Zuelferi.

℞. *Cremoris Tartari ℞i. sæcula seu potius salis essentialis Acetosella ℞ß. nitri crystallini cum papav. errat. vel potius cum rosis, essentificati ℞ii. Essent. citri saccharina, rosata sacch. an. ℞i. pulv. sacchari cant. albi ℞ß. santali rubri ℞ii.*

Ex his omnibus probè mixtis, additâ s. q. mucilag. Tragacanthi cum tinctura rosarum extrahe, fiat pasta, ex qua formentur Trochisci, qui custodiantur. Refrigerant & humedant, viscerum intemperiem calidam contemperant, & sitim inexhaustam extinguunt.

Trochisc. Hysterici ex Pharm. London.

℞. *Asa foetida, galbani an. ℞iiss. myrrhe ℞i. costi rei ℞iß. Rad. Asari, Aristolochia longa. Fol. sabina, matricaria, nepeta an. ℞i. dictamni ℞i. gummi in succo vel decocto rutæ maceratis, colatis, & ad mellis crassitiem coctis, adijciantur reliqua tenuissime pulverata. Fiantque trochisci s. a.*

Trochisci Diaion seu de Violis Nicolai Alexandr. ex Ph. August.

℞. *Flor. violarum purpurearum recentium ℞v. sem. papaveris albi ℞iiss. rhabarbari ℞v. sem. plantaginis ℞i. opobalsami vel olei caryophyllor. ℞i. Trita subigantur, & cum aqua rosarum formentur Trochisci.*

Thoracis angustias levant, guttur leniunt, ac alvum emolliunt.

Trochisci de Lacca Mesuæ ex Pharm. August.

℞. *Lacca mundata, succi glycyrrhizæ, Eupatorii, Absinthij, berberum, rhabarbari, Aristolochia longa, costi, Asari, Amygd. amarorum, rubia, Anisi, Apij, Schœnanthi an. ℞i. cum decocto Aristolochia & schœnanthi, vel succo eupatorii, aut Absinthij fiant Trochisci.*

Jecinorosos, lienesos & hydropicos adjuvant, febresque ex viscerum obstructione natas propellant, ac urinas potenter movent, quo nomine Ascitem pellunt.

Trochisci de Ligno Aloes ex Pharm. London.

℞. *Xyloaloes, rosar. rubr. an. ℞ii. mastiches, cinnamomi, caryoph. spica nardi Indicæ, nucis moschata, sem. pastinacæ, cardamom. majoris, cubebar, gallie mosch. cortic. citri, macis an. ℞i. Ambre gryzæ, moschi an. ℞ß. cum muc. lagine passul. f. Trochisci.*

Trochisci de myrrha Rhafis ex Phar. August.

℞. *Myrrha ℞iii. lupinor. ℞v. Fol. or. ruta, mentastri, pulegij cervini, cumini, Rubia, Asa foetida, sagapeni, opoponacis an. ℞ii. dissolvantur gummia in aceto scillino, & cum succo Artemisie singantur Trochisci.*

Describuntur à Rhase 9. ad Almanforem, utiles in menstruæ purgationis retentione, quæ ex crassorum & frigidior. humorum copia aut sanguine concreto ortum duxit: attenuant, incidunt, & infarctos meatus aperiunt, fœtum mortuum, & præcipuè secundinam tardantem expellunt, exhibentur in decocto granorum juniperi.

Pro pulegio cervino quidam vulgare capiunt, ejus enim maxima vis est in ciendis menstruis.

Trochisci Narcotici Fernelii ex Renodô.

℞. *Gummi Arabici, Tragacanthi, amili an. ℞ß. cerusæ lota aqua rosarum ℞vi. styracis calamita, myrrhe, castorij, opij sapa soluti an. Div. Croci ℞ß. Trita omnia excipiantur mucagine seminis psyllij in aqua rosarum deprompta & fiant Trochisci.*

Superiunt duo pastilli usuales tantum exterius adhibendi, quos eadem serie describere, nec ad posteriorem officinæ partem, quæ de medicamentis tantum externis agit, differre non libuit, quorum priores vocantur à Fernelio narcotici, quod parti cuiuspiam admoti sensum stupefaciendo dolorem illius confopiant,

piunt, horum autem apta est Compositio & usus pernecessarius, neque ulli ante extant ad similes affectus accommodati ad præparationem singula primum seorsim tenenda, dein confusè mixta, mucagine seminis Psyllij excipienda & in massam coagenda.

Trochisci Narcotici debite admoti, Capitis dentiumque dolorem consopiant, in febrium ardoribus somnum accersunt, Erysipelata, inflammationes extinguunt, partium omnium externarum dolores alijs medicamentis soluti compefcunt.

Trochisci Pectorales cum Ambra ex Pharm. August.

℞. Specier. diareos simplit. ℥viii. diambra completa, pulv. radic. ireos Florentina an. ℥iv. Amyli ℥b. Trochiscorum galie moschata vera ℥iv. grana viii. sacchari albiissimi ℥i. mucilaginis Tragacanthi cum aqua rosar. facta quantum salis Fiant Trochisci.

In Catarrho & de fluxionibus è capite varijs ad asperam arteriam & Cavitatem pectoris in primis utiles sunt, lentorem catarrhi incidunt, sputum premovent, & expectorationi humoris conducunt.

Trochisci Antiphthifici Zuelferi.

℞. Rad. Enula camp. ℥vi. ireos Florent. ℥i. liquiritia coquantur in aqua simpl. suff. quant. ad remanentiam circiter ℥i. coletur decoctum, & ad ℥iv. evaporet, quod interim asservetur, jam vero

℞. Sem. melonum, cucurbita ana extort. ℥vi. papav. albi, Amygd. dulc. decort. an. ℥i. Benzoes opt. ℥b. contundantur junctim in mortario ad pultis formam cum superioris decocti asservati suff. quant. ac per setaceum transmittantur huic pulpa adde pulv. sacchari can. albi ℥viii. croci Austriaci ℥iii. ireos Florent. ℥i. Flor. sulphuris ℥vi. liquiritie ℥b. Eleosacchari Anisi ℥i. & contundendo in mortario lapideo efficiatur pasta, ex qua formentur pastilli oblongi, vel etiam Trochisci.

Trochisci Polyidæ, seu Sphragis Andromachi ex Ph. Londin.

℞. Flor. mali punici, i. Cytinorum ℥xii. Aluminis scissilis, vel rupei ℥iii. Thuris, myrrha, an. ℥b. Chalcanti ℥ii. Fellis taurini ℥vi. Aloes, ℥i. vini austri, vel succi solani, aut plantaginis q. s. f. Trochisci f. a.

Trochisci Ramich Mesuæ ex Ph. August.

℞. Succo acetosa ℥xvi. rosar. rubr. ℥i. baccar. myrti ℥ii. semel fervefiant & coletur, adde colato gallarum recent. accuratè tritarum ℥iii. Coquantur iterum aliquantulum, deinde inspergatur sequentium specierum minutissimus & optime commixtus pulvis.

℞. Rosarum ℥i. sandali citrini ℥x. gummi Arabici ℥i. sumach. spodij an. ℥i. omphacij ℥vii. gran. myrti ℥iv. ligni aloes, caryophyllor. macis, nucis moschata an. ℥iv.

Misce omnia, & extende in scutella lapidea usque dum siccantur, Exsiccata rursus in tenuissimum terantur, & formentur Trochisci parvi cum camphoræ aureo seu denario uno, hoc est, ℥i. & septima ejusdem parte, & sufficienti aqua rosarum ac in umbra libera exsiccati reponantur.

Hos Trochiscos aliquor Compositiones recipiunt, usurpari tamen etiam possunt in intestinorum & alvi totius lævitate, acrimque humorum per sedem profluvio: infusi enim acrimoniam obtundunt, & impetum refranant, eoque nomine cholera morbo succurrunt, hæmorrhagiam omnem sistunt, naribus immissi, viscerum languores, ventriculi, hepatis & cordis imbecillitates firmant.

Illius receptæ antiquitus præparationis loco, commodiùs, omittendo commendatam in principio coctionem & infusionem, pulvis rosarum & granorum myrti dosis duplicari, gallæ etiam contritæ admisce-ri, & cum reliquis, ope gummi Arabici in omphacij & succi acetosæ sufficienti quantitate soluti, in Trochiscos effingi possent.

Trochisci de Rhabbarbo Mesuæ ex Pharm. August.

℞. Rhabbarbari optimi ℥x. succi Eupatorii, Amygdalor. amarorum, an. ℥iv. rosarum rubr. ℥iii. spica indica. Anisi, Rubra, radic. Absinthij. Asari, sem. Apij an. ℥i. mucilaginis Tragacanthi cum aqua cuscuta facta quantum sufficit. Fiant Trochisci.

Horum usus est in febrium diuturnarum declinatione, imminente malo corporis habitu, plurimum namque profunt ictericis, hydropicis, hepaticis, & Cachecticis; tumoribus, doloribusque ventris inferioris medentur, obstructions referant, formæ corruptionem ac fœditatem emendant, nec non affectus jecoris inveteratos; aquei acris ac ferofi humoris dejectione tollunt.

Trochisci Diarrhodon Nicolai ex Pharm. August.

℞. Rosarum recent. ℥iii. spodij ℥ii. sandali rubri ℥i. grana viii. albi ℥i. gr. xii. croci ℥i. camphoræ ℥b. rosas contunde in mortario lapideo, tum reliqua in pulverem redacta adde, & cum aqua rosacea. sub finem camphoram addendo, formabis Trochiscos, quos in umbra siccatos usui reserva.

Dysentericis, Cœliacis, jecinorosis, & Stomachicis conferunt.

Trochisci de Rosis Rhafis ex Pharm. August.

℞. Rosarum rub. ℥b. ligni aloës ℥ii. mastiches ℥i. cinnamomi, Absinthij pontici, nardi Indica, cassia lignea vera, schœnanthi an. ℥i. cum decocto quinque radicum aperientium formentur Trochisci.

Efficaces sunt ad jecoris obstructionem, ac febres antiquas, icterum, & aquam intercutem; ventriculi & nutritioni dicatarum partium imbecillitatem corrigunt.

Trochisci de Sandalis Mesuæ ex Ph. August.

℞. Trium sandalor. an. ℥b. rosarum ℥iii. berberum aut succi eorundem inspissati ℥iii. boli Armena. sem. cucumeris, cucurbita, citruli, portulaca, spodij an. ℥ii. Camphoræ ℥b. cum mucilagine Tragacanthi aqua portulaca soluta, Fiant Trochisci.

Ad febrem ardentem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam & sitim levandam usurpantur:

Trochisci de Scilla Galeni ex Phar. August.

℞. Scillam plenam & candidam, cortice primo, de tracto, & parte duriore cui radícula adherent, abjectâ farinâ subactâ involves & ed usque in clibano coques, donec farina crustam contraxerit qua perforatâ, stylo ligneo explorabis, num scilla tenera sit, eam exemptam diligenter teres, & admiscebis farina Ervi tenuissimè cribrata ℥viii. ad singulas ℥b. formabisque Trochiscos ponderis ℥ii. quos in umbra siccabis, sapus invertendo, donec probe siccati fuerint.

Describuntur à Galeno I. de Antidotis, & in Theriaca ad Pisonem, ejus enim Compositionem ingrediuntur.

Pro farina orobi seu Ervi rectè hîc à nobis substituitur Pulvis radicum dictamni albi, seu Fraxinellæ.

Trochisci Diaspermaton Galeni ex Pharm.

August.

℞. Sem. Apij, ammeos an. ʒʒ. Anisi, fœniculi an. ʒi. opij, cassia an. ʒi. cum mucilagine Tragacanthi aquâ pluviali facta formentur Trochisci.

Dantur ex passo, aut aqua, ad omnes internos affectus dolorificos, sanguinem rejectantibus adprimè conferunt, ac somnum conciliant.

Trochisci de Spodio cum Semine acetosæ ex Phar. August.

℞. Rosarum rubr. ʒi. spodij ʒx. sem. Acetosæ ʒvi. portulacæ, coriandri, sumach. an. ʒi. Amyli, balastiorum, berberum an. ʒii. gum. Arabici ʒi. omphacij quantum satis F. Trochisci.

In Febribus biliosis cum alvi fluore præstantes sunt, inflammationem ventriculi & hepatis ac sitim continuam sedant.

Trochisci Sublinguales Completi contra Pestem ex Ph. August.

℞. Extracti ligni Aloës gr. x. specier. cordialium temperat. ʒi. diamoschi dulcis ʒʒ. radicum ireos florent. ʒii. olej cortic. citri gutt. iii. sacchari albi ʒviii. Ambra grisea gr. v. moschi gr. iv. Zibethi gr. j. mucilaginis Tragacanthi cum aqua rosarum facta, quantum satis Fiant Trochisci.

Sublinguales Incompleti ex eadem Phar.

℞. Pulv. radicum Angelicæ ʒʒ. pimpinellæ, seminis Angelicæ, corticis citri sicci, Zedoaria an. ʒi. sacchari albi ʒvii. cum mucilagine Tragacanthi ex aqua rosarum facta q. s. Formentur Trochisci parvi.

Sublinguales Zuvelferi.

℞. Sacchari albiss. lbʒ. vel ʒvi. solvantur in succi scordij recenter expressi & depurati ʒ. circiter iv. & ad consistentiam tabulati satis solidam coquendo redigatur, in quo ab igne remoto dissolve Extr. Zedoaria, succi scordij inspissati an. ʒii. cort. citri recent, ext m. radulâ prius comminut. & subtiliss. confusorum ʒvi. Ambra grysea ʒj. prius cum sem. citri excort. ʒj. probè subacta, moschi orient. ʒʒ. ol. still. cinamomi, ruta ʒj. nuc. mosch. expr. ʒʒ. quæ omnia ac singula l. a. probe adunata, superaddita f. q. mucilaginis Tragacanthi, redigantur in massam, & qua formentur Trochisci.

Hi in peste, desavientibus morbis malignis, ac contagio, cum emolumento adhibentur, singulis aurores aliquot eorum assumendo, & si penetralia ut domos arcana Contagio suspectas invisas, sub lingua nonnullos oculando.

Nota: quod si tempore hyberno, deficiente succo scordij recenti, Trochisci hi forent parandi, conducet loco succi scordij, syrupum scordij præfato saccharo addidisse, quæ ambo etiam, additâ portiunculâ aquæ rosarum, ad prædictam Tabulati consistentiam concoquenda.

Sublinguales alij ex eodem.

℞. Sacchari can. albi ʒvi. solvantur in succi rute recenter expr. & depurati ʒiii. & ad consistentiam Tabulati coquantur, in quo ab igne remoto dissolve Extr. Zedoaria, Angelicæ, Enulæ an. ʒi. addendo porro pulv. succini albi præp. ʒii. myrrhæ rubræ ʒii. ol. still. ruta ʒi. nuc. mosch. expressi ʒi.

Ex omnibus probè unitis efformentur Trochisci f. a. qui in contagiosis & pestilentialibus morbis profunt, cum horis matutinis manducati, tum etiam sub lingua detenti, si loca suspecta, & contagio infecta, visitanda veniunt.

Trochisci de Sulphure & Tuthia ex Pharm. August.

℞. Sulphuris vivi, camphoræ, Tragacanthi an. ʒi. Tuthiæ preparatæ ʒʒ. cum aqua rosarum quantum satis Fiant ex arte Trochisci.

Ad varia superficiali corporis vitia, impetiginem, phlogosin, harpetem, phygenas, ragades, erysipelata, conducunt, si cum aqua adpropriata dissolvantur, & parti dolenti sæpius imponantur.

Trochisci de Terra Sigillata Mesuræ ex Phar. August.

℞. Sanguinis draconis, gummi Arabici, Trochiscorum Ramich. rosarum rubr. Amyli, Acacia, Hypocistidis, lapidis Hematitæ, balastior. boli Armenæ, Terra Sigillatæ, Corallij rubri, Charabæ an. ʒi. spodij de ebore margaritarum preparat. Tragacanthi, sem. papaveris nigri an. ʒi. rosarum ʒi. portulacæ, cornu cervi usti, Thuris masculi, conorum cupressi, croci an. ʒii. aquæ plantaginis quantum sufficit. Fiant Trochisci.

Sanguinem undecunque manantem & spûta cruenta cohibent, hinc menstruam fœminarum purgationem immoderatiùs fluentem morantur, intus sumti, vel cum succo polygoni aut plantaginis ac ovi albumine coxis & pubi illiti, aut cum conveniente liquore utero immissi, cruento item lotio medentur, ac dysenterias, diarrhæas & alvi produria compescunt, potentius id præstant, si eis addatur opium, quod aliqui Compositioni hinc ʒii. pendere adiiciunt.

Trochisci de Terra Lemnia ex Pharm. Londin.

℞. Terra Lemnia, sive sigillatæ, boli Armenæ, Acacia Hypocistidis gum. Arabici tosti, sanguinis ar. an. ʒi. Amyli tosti, rosarum, rub. Antheræ, seu sem. rosarum, rubrarum, lapidis Hematitæ, corallij rubri, succini, balastior, spodij ex ebore, sem. portulacæ, parum tostorum, olibani, cornu cervi usti, nucum cupressi, croci an. ʒii. sem. papaveris nigri, Tragacanthæ margaritarum an. ʒi. opij preparati ʒi. cum succo plantaginis, Fiant Trochisci.

Trochisci de Violis solutivi Mesuræ ex Pharm. August.

℞. Violarum martialium mediocriter exsiccatarum ʒvi. Turbith. ʒiv. succi glycyrrhizæ, scammonij præp. manna an. ʒii. cum syrupo violato Fiant Trochisci.

Usurpantur in expurganda pituita lenta & viscida, quæ Thoracis vias intercipit, & suspitiosos facit, bileque vitellina permixta deturbanda.

Trochisci de Viperis Galeni ex Pharm. August.

℞. Carnis viperinæ, Anetho, sale & aqua cocta, & post factam à spinis separationem nonnihil expresse ʒviii. panis triticeï purissimi, bis cocti, triti & cribrati ʒii. Formentur Trochisci, cum jure, in quo decocta fuerint carnes viperinæ, prius tamen cocti à minore molem deducto, & unguantur oleo Caryophyllor, quod proximè accedit ad naturam balsami. Siccantur in loco umbroso & aeri pervio, sæpe commutendo, deinde in vase vitreo, aut vitreato, bene obturato, reponendo. Annum integrum perseverant, quanquam longè melius fuerit, recentes semper pro conficienda Theriaca adhibere.

Trochisci hi Theriacæ conficiendæ inserviunt, cæterum cutaneis morbis, viperar. morbis, & febribus pestilentialibus conveniunt, Elephanticos

uuant, oculorum caliginem atque obscuritatem emendant, nec non visum ipsum acuant.

De Viperis Zuvelseri.

R. Pulveris viperar. fideliter & dextrè juxta modum. Animadversionibus præmissis. pag. 215. 216. edotum. parati hji panis è farina tritici, cum jucco lecrdij vel ruta (loco aqua simplicis) facti, pisti & biscocti, ut in pulverem conteri queat, ℥iv. vel ℥v. ol. caryoph. still. 3℔. vel ℥ij. succi oleaginosi ex recentibus limoniorum cort. radu. a Communiis expressi 3℔. vel 3ij. & cum suffic. quant. decoct. Cort. limoniorum fiat contundendo in mortario pasta seu massa tenax. ex qua formantur trochisci figura viperarum aut serpentum signandi: sigillum verò sæpius oleo nucista expresso innungatur, ne pasta illi adhareat.

Nota: horum trochiscorum non minus legitimam quam elegantem structuram, si quis accuratioris rationis trutinâ perpendere dignabitur, facere non poterit, quin hanc ipsam reliquis illis antiquo, ac illegitimo profus modo, paratis Trochiscis præferat, adeoque album experientia nostræ adjiciat calculus, Revolvantur, quæ in animadversionibus n. locis diversis, de viperis, earum natura veneno & præparatione, quæque de adulterina Trochiscorum videlicet ex illis confectio, imo de fraude & impostura revelavimus; è contra verò in parando ex illis verò pulvere fundamentaliter atque ad oculum fideliter ostendimus: lugendi proinde sunt ij, ne dicam detestandi, quicquid vesaniæ & pertinaciæ procedunt, ut potius livore ac invidiæ tabe consumi se sinant, propria sectantes ac cum turba & grege aberrantes, quàm ut nostro & paucorum melioris notæ Authorum nutu ad meliora se sinant manuduci: præclari tanè naturæ æmulatores, sibi ultro, quæ alijs revelare tenentur peplum & tenebras, pervicaciter inducentes, qui licet, convicti, meliora probent, sequi tamen detrectant, quod vel maximè in Theriacis dispensatione elucet, cujus licet elegans & maximæ energiae ac virium proster composio, superciliose tamen negligunt, veterem Cantilenam ac tonum resonantes, quanquam (Cæteris, qui languent & periclitantur, ex animo condoleo) optandum sit, ut dum ipsi morbo succumbunt, hanc sibi etiam, cum meliorem cæteris invideant, cramben apparent. Tandem hisce Trochiscis de viperis, qui velut agmen claudunt, huic quoque classi finem facio: palam interim confiteor, quod ipsi hi Trochisci in veteri hac formâ ac consistentiâ ad integrandum Theriacam, sive quibuscunque usibus destinantur planè inepti sint, nisi repente labore denud in pulverem terantur: nihilominus tamen, cum usus Trochiscorum de viperis ad apparandam Theriacam in tantum prævaluerit, ut potius clavam herculi manu extorqueas, quàm ut ab imo eximas inviolabile eorum judicium & fiduciam, quam dura ejusmodi ingenia sancivere: facere tamen, quod probi viri est, volui, & nova Methodo genuinum trochiscorum de viperis, uti & reliquorum, parandi modum edocere, cum, insistendo veterum modo, citra dolos & mille fraudes dispensari aut preparari nequant. Faxint Superi; ut in nocte hæc densa & ægyptiacâ caligine, facem ijs præferam, qui olim ad meridianum tetra caligine detenti, oberrant, ut saniora dogmata sectantes, legitimè ac cum ægrorum proventu viperinos hosce Trochiscos apparent, priusquam tamen classem hanc absolvam, hoc te L.B. denuò monere volui, quod (uti in Animadversionibus etiam assertum) pulveris viperini Trochiscatio ad Theriacæ confectioem strictè adeò necessaria non sit, quin pulvis viperinus, nostro nutu

paratus legitime succedere possit: nam panis biscoctus, quem etiam ipse pro massa facilius cum pulvere Viperino efformanda, è qua deinde Trochisci parandi, non simpliciter, nec magna quantitate superaddidi, aliam Viperino pulveri naturam aut virtutem, non tribuit, nec corrigit, nisi quod instar basis aut Corporis pro massa acquirenda subternatur, verum non simpliciter sed virtute alexiteria prius imbutus; quod succus Rutæ præstat, & succus Cortic. citri oleaginosus cum eorundem decocto; quæ omnia ac singula ut æquo judicio tractes, amicè pervelim.

Trochisci de Xylaloe Mesuæ ex Pharm.

August.

R. Ligni Aloës, rosar. rubrarum an. 3℔. mastiches, cinnamomi, caryophyllor. galie moschate, spica indicæ, macis, nucis moschate, cubebar. cardamomi utriusque, pastinacæ, corticis citri an. 3℔. moschi, Ambre an. 3℔. cum melle passulato Fiant Trochisci.

Ventriculum, cor & hepar, ac membra alia debilia roborant, oris foetorem abigunt, Cordis palitationem & syncopas auferunt, hydropicis auxiliantur, ac pestilenti Constitutioni medentur.

Trochisci varii ex Baldass. TIMÆO.

Cephalici.

R. Magister. succin alb. 3ij. spec. diambra, diamosch. dulc. an. 3ij. cardamom. min. Div. ambra grysea gr. v. moschi Alexandr. gr. ij. misc. c. Tragacanth. in aqua apoplect. solut. Fiant Trochisci.

Cordiales.

R. Confect. alhermes Monspel. 3℔. spec. de Hyacinth. complet. 3ij. ambra grysea gr. vj. moschi gr. ij. sacchari albiss. in aqua cinam. soluti 3iv. m. Fiant Trochisci.

Pectorales.

R. Succo liquiritia depurati 3j. spec. diatrag. frigid. 3j. lactis Asis Div. diacodij 3℔. sacch. penid. 3ij. mucilag. Tragacanth. c. aqua rosarum extract. q. s. m. Fiant Trochisci.

Contra Dolores Dentium.

R. Opi purissimi 3ij. pulv. caryophyll. 3℔. ol. nuc. moschat. per express. fact. 3j. camphor. Extract. croci an. 3j. m. f. Trochisci illinendi oleo caryoph. vel si scorbutus infestet oleo cochlearia.

Regij. pro Suffitu.

R. Gran. benzoes styracis calamit. an. 3ij. ambra grysea, moschi, zibethian. 3ij. ol. rosar. ex floribus 3℔. cinamom. 3j. caryophyllor. citri an. 3℔. balsami indicis q. s. pro incorporatione. Fiat massa ex qua formantur Trochisci.

Trochisci ex Hadriano à MYNSICHT.

Trochisci Vitæ.

R. Man. christi simpl. 3vij. conf. alhermes 3℔. margarita trochisc. nest. ambra grysea an. 3j. moschi laudatiss. lap. s. pretios. præp. an. 3j. eleosach. cinnamomi caryophyllor. an. 3℔.

Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parvi pro usu.

Vires, Usus, Dosis. Omnes vires delapsas mirificè atque celesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renovant. Caput, Cor, Ventriculum, Jecur, &c. supra

supra modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt. Obstructiones venarum parant. Omnibus morbis frigidis conveniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem juvant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem avertunt. Visum acuunt. Ab Epilepsia & Apoplexia præservant. Partum accelerant. Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis unus atque alter pro una vice. Præparantur etiam sine Moscho.

Trochisci de Radice Rhodia.

℞. Rad. rhodia ℥j. cort. rad. mandrag. nucl. persicorum, opii spagyricæ præp. myrrha rub. an. 3. vi. flor. papaveris errat. croci orient. rosar. rub. ana ℥ss. sem. Hyoscyami, alb. anethi apij ana ℥ij. nuc. moschate cubearum, camphora ana ℥ij.

Misc. & cum mucilag. sem. Psylli & Cydoneori cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires & Usus. Ego expertus sum in Melancholia, Mania, Phrenesi, vigilis immodicis, nec non in omni dolore & discrasia caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in Lacte muliebri & fronti & temporibus tepidè applicentur.

Trochisci Ophthalmici.

℞. Cerase lota ℥j. corn. cervi f. igne calc. sarcocolla. nutrit. tutia præp. ana ℥ss. gum. arabici tragacanth. alb. amyli. ana ℥ij. matris perlar. præp. nihili albi olibani ana ℥j. opii spagyricæ præp. camphora ana drach. β.

Misc. & cum albumine ovorum f. trochisci oculares pro collyrijs cum appropriatis parandis.

Vires & Usus. Valent ad omnis generis passiones oculorum; imprimis autem ad rheumatismos, lipitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inflammationes, prolapsus, confusiones, rupturas, concavitates, scabritiem, pruriginem & ophthalmicos dolores leniendos profunt; nec non oculorum vulnera replent & consolidant.

Trochisci de Papavere.

℞. Sacchari penidij ℥ij. sem. Papav. alb. ℥ss. melonum excort. cucurbita ana ℥ij. suc. glycyrrhiz. ext. bol. armen. rub. præp. flor. Sulphuris comp. ana ℥i β. tragacanth. alb. amyli ana ℥j. ext. flor. Papav. errat. 3 β.

Misc. & cum mucilag. Sem. Cydoneor. cum aq. Papaveris errat. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Usus, Dosis. Utimur hisce feliciter contra omnes catharros acutos à capite ad pectus descendentes; quos egregiè sistunt, caput pristinae functioni restitunt, pectorisque dolores potenter leniunt. Pro dosi singulis vel alternis saltem horis, duos vel tres pedetentim per se linguae & palato affricandos ægiotantibus ordinamus.

Trochisci de Glycyrrhiza.

℞. Sacchari candi alb. & Penidij ana ℥iv. suc. glycyrrhizæ ext. 3x. spec. dia-Ileos simplic. diarrhod. Abb. diamarg. frig. ana ℥j sem. 4. frig. major. Alipta moschata, lact. sulphuris ana ℥ss.

Misc. & cum mucilag. rad. Altheæ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Usus, Dosis. Tussi calidæ & siccæ imperando, vocem abscissam resarciendo, thoracem expurgando. Sputum facilitando, cæteris remedijs dignitate excellunt. Pueris singulariter profunt. Dantur quotidie multoties duo tresve pro una vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

Trochisci Cordiales.

℞. Sacchari candi alb. ℥viii. conf. alhermes ℥j. lap. quinque pretios. præp. ana ℥j. ol. caryophyllor. cinamomi ana ℥ss.

Misc. & cum Mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta fiant Trochisci parvi.

Vires, Usus, Dosis. Cor singulariter confortant, ejusque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejecto & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque fastidia tollunt, ejusque concoctionem juvant. Dosis tres, quinque ad sex, pro una vice.

Trochisci Joviales.

℞. Mag. Jovis Anglici, matris perlar. corallor. rub. ana ℥j. ol. succini alb. rect. ℥j.

Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hystrica nostra dissolut. f. l. a. Trochisci parvi Scrupulum semis ponderantes.

Vires, Usus, Dosis. Admirandæ potestatis & operationis sunt; Suffocata enim, quæ de his unum vel duos horis trium dierum matutinis, ex aqua nostra hystrica, vel alio appropriato vehiculo assumitur, post Dei providentiam, libera censenda & nuncupanda sit: pro quo divino experimento solus Deus sit benedictus.

Trochisci de Alumine.

℞. Aluminis crudi. rad. pyrethri, ana ℥ss. piperis long. ℥j. sem. hyoscyami, farinae siliginis, creta, alva, natri præp. ana ℥i β. zingiberi, alb. caryophyllorum, opij præp. ana ℥j.

Misc. & cum succo Urticæ min. f. Trochisci.

Vires, Usus, Dosis. Super dentes & gingivas positi (factis tamen prius debitis purgantibus per phlebotomiam, si expediat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

Trochisci de Satureia pro Lixivio.

℞. Satureja exsic. ℥ss. majorana, origani ana ℥ij flor. lavendula, rosarum, rub. anthos, an. ℥i β. lig. Aloes pond. gum. arabici, tragacanth. alb. rad. caryophyllat. Ireos florent. ana ℥j. caryophyllorum. nuc. Moschate cardamom. min. cubearum. opt. ana ℥j. ambra græca, moschi op. an. ℥j.

Misc. & cum albumine ovorum formentur Trochisci ℥j. ponderantes.

Vires, & Usus. Horum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivijs, quoque Caput manente ante cibum, corpore excrementis vacuo, abluatur, sic tamen, ut statim linteis calidis abstergatur & exsicceatur: Sudores enim & sordes Capitis detegit, illudque roborat, & cutis meatus referat. Catarrhos exsiccat, Memoriam confortat & sensus acuit.

Trochisci de Nitro.

℞. Rot. de succo Berber. de suc. Ribum, ana ℥viii. spec. Diarrhod. Abbat. sp. Vitrioli irrorat. natri præparat. ana ℥j. sul. rosar. rub. vitriolat. ℥ii. ol. Cinamoni, Gut. iii.

Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri dissolut. f. l. a. Trochisci.

Vires, Usus, Dosis. In Angina, Inflammatione oris & linguae, ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodie die *stiegender Histe* vocent) ardore urinae, Febris ardentibus & præsertim Hemitritico putrido, vulgo die *Haupt-Krankheit* valde commendabiles sunt. Dosis ē 3 j. ad Drach. i j. in vehiculis specificis.

Styli Dentificij.

℞. Farin. Silicium fluviat. calcinat. ℥i. lap. pumi-
cis præp. Aluminis usti, an. ℥ss. rad. ireos florent. cine-
ris Tabaci Ind. albiss. ana ℥i. gallia moschat. ve-
re, ol. lig. rhodini. an. ℞i.

Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar.
dissolut. f. l. a. Styli dentificij.

Vires, & usus. Ad dentium sordes tollendas & co-
lorem vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt:
Dentes enim à naturali suo candore vel ad flavum
vel lividum aut nigrum colorem deflecentes, mi-
rè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius
fricentur & mundificentur.

Pomum Ambræ.

℞. Rad. ireos Florentin. Caryophyllorum, macis elect.
cinamomi, ana ℥ss. lig. aloes veri, santali citrini, sty-
racis, calamit. assa dulcis, ana ℥i. ambræ, griseæ, ℥i.
moschi, alexand. ℥ss. bals. Peruviani odorif. ol. Lig.
Rhodini, ana ℞i. Omnibus diligenter mixtis & trius
adde: Zibetta non falsat. ℥i.

Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. f. q. in aq.
Majoranæ. Narciss. Rosarum, Lavendulæ & Ba-
silic. dissolut. f. Massa, ex qua postea formentur vel
Trochisci, vel Poma.

T R U T T A.

Trutta, seu *Trocta*, (à trudendo, quoniam sem-
per in adversum & impetuosum flumen nitatur,
adversus undas superare:) Italis Torrentina (quod
in torrentibus & rivis montanis abundet, varius ad-
modum est piscis, squamulis minutissimis contectus,
purpureis seu rubentibus maculis totum corpus pin-
gentibus, carne intus rubra; quemadmodum in sal-
mone: Lingua ossea & spinosa, ventriculus longius-
culus, cui parte inferiore ac intestino appendices
longiores adnascuntur, quarum superiores ventri-
culum ipsum attingunt, extra quam citissimè expirat;
indubiè ob amplam branchiarum scissuram, pin-
guedo Mariscis & ani fissuris utiliter illinitur: hu-
jus species sunt.

1. *Trutta fluviatilis vulgaris*, χρύσοψυς.
2. *Taurina* (ab insigni magnitudine) apud nos in
Northumbria. a Bull - Trout.
3. *Minor*, Cornubiensibus ashote dicta, agri Lin-
colnienfis incolis, a shard.
4. *Salmoneta*, parvus salmo, a Salmon Trout, re-
liquæ differentiæ à coloribus duntaxat desumtæ vi-
dentur. *Charleton*.

Officin. Nat. ex Trutta.

Pinguedo. Hæc illinitur utiliter mariscis & ani
fissuris,

(Maxillæ dentatæ è vivis truttis evulsæ ad epile-
psiam usurpantur.)

(Eadem utiles ad dolores mensstruis advenienti-
bus urgentes.

(Dof. ℥i.)

(Lapilli etiam colliguntur viribus Carpionum la-
pidibus pares.) *Schroderus*.

TRYPHERA, vid. *Electuarium*.

T U B E R.

Tuber Latinis à *Tumeo* dictum est, quomodo à fa-
cio faber, ab humeo huber & per aphæresin uber,
à glabo glaber, & alia multa, Voss. Etymolog. Græ-
cis ὄνιον dicitur ὁπὸ τῆς ὄνειν, id est nutriendo, pluri-
mum enim alimenti præbet, in Aldino & Basileensi
(Theophrasti hist.) Codd. observante Io. Bodæo,
ὄνιον legitur, & fortasse rectius, ὁπὸ τῆς ὄνειν vel
ὀδόνειν quia sunt ὀδῆματα τῆς γῆς, terræ tumores.

Nomina. Tuberæ I. B. C. B. Tuberæ terræ Ger.
Tuberæ terræ edulia Park.

J. B.

Nihil aliud sunt Tuberæ quam sine caule, sine fo-
liis radices, magnitudine varia, pugillari interdum,
alias juglandis castaneæ aut avellanæ, Tuberculis ex-
tantibus inæquales, externa superficie rugosâ & ni-
grâ, substantiâ albâ, consistentia carnis castaneæ, &
gustu fatuo, odore nonnihil gravi, & hircino.

Imperato Tuberæ è genere vegetabilium sunt, sub
terræ cortice latentia, figurâ inæqualiter globosâ, sub-
stantia eorum callosa est, tenera, nutritioni apta. Cre-
scunt locis arenosis & inter stirpes. Nostratia ut plu-
rimum ad melonum magnitudinem accedunt, cortice
tectâ nigro, scabro atque rimoso; substantia internâ,
colore lacteo, sapore communiter grato, dignoscun-
tur Tuberum loca natalia ex rimis quæ in terræ super-
ficie spectantur,

Modus quo rustici in Italia (ut nobis relatum
est) tuberæ indagant, perridiculus est, por-
cellum scilicet Autumni tempore funiculo alteru-
tri posteriorum pedum alligato præ se agunt in
pascua ubi horum proventum solere esse norunt:
qui ubi ad locum venit in quo tuber latitat, odo-
re mox id percipit rostroque eruit, erutum qui
insequitur præripit, & ad alia indaganda porcel-
lum abigit. Christianus Menzelius porci actorem
ipsum sue, quam primum rostro indicium dederit re-
sti retracto, Tuberæ effodere, inque usum humanum
gulæque delicias colligere scribit.

Tuberæ quæ Bononiæ & Florentiæ vidit Mentze-
lius exterius fusci coloris erant, interius quoque ejus-
dem, sed multo candore instar marmoris interfusi, fri-
xa cum oleo recenti & pipere gustui grata sunt, vene-
remque stimulant.

Idem Mentzel. in Marchia Brandeb. propè Fur-
stenvvaldiam Tuberæ quædam à porcis eruta ob-
servavit, quæ testiculos humanos proxima simili-
tudine referant, & hircinum odorem spirent, in-
dicium est non leve ea veneri stimulando idonea
esse.

Tuberæ cocta & pro emplastro imposita Angino-
sis adeo prosunt, ut quidam jam morituros hoc au-
xilium liberarunt. Cardan. de variet. rerum, cap.
28. *Rajus*.

TUBERÆ CERVINÆ, vid. *Boletus Cervinus*.

TUNICA, vid. *Caryophyllus Hortensis*.

T U R B I T H.

Est Convolvuli Indici Althææ foliò, modò Cor-
tex, modò radix oblonga, crassa, resinosa, foris
ferruginea, intus albida, saporis subacris, resinosi,
nauseabundi.

Eadem quæ Jalappa & Mechoacanna, HERMAN-
NUS in *Materia Med. Manuscr.*

Colliguntur in usum Medicum non caules, ut
perhibet Garcias; sed radices crassiores, turgen-
tes lacte & resinâ copiosiore. Quæ ad nos trans-
feruntur fodiuntur in Guzarata, ubi proventus
luxuriosus in locis opacis, humidis, ad fossarum
marginibus, retro hororum sepes aliisque locis sylve-
stribus à mari longè distitis. *Rajus*.

Turbith. Radix plantæ lactiferæ ex Cambaiâ abis-
ve Indiæ locis ad nos deveniens, mediocriter pon-
derosum sit, subalbidum, aut cineritium, recens,
ac fractu facile, non cariosum, aut pulverulen-
tum, intus resinosum. Adulteratur Gummi dissolu-
tò radicibus aliis illis: verum hæc resinositas non
extrinsecus tantum, sed in fractæ radicis substantiâ
etiam requiritur. *Pharm. AUGUST.*

Offi-

Officin. Nat. ex Turpetho.

Cortex seu Radix à medulla lignosa sequestrata. Vires. Calf. 3. crassos viscososque humores, siue pituitam fortiter & à remotioribus partibus, juncturisque elicit: unde & diuturnis morbis maxime conducit. Inprimis proficiuus ejus usus est in Arthritide, ventriculo pituita abundante, Asthmate, Lue venerea, Hydropse, Elephantiasi, scabie, &c.

Quia ventriculo nauséam & vomitum procreare per se solet, corrigitur Zinzibere, Mastiche, Pipere, Cinam. Fœnicul.

Dosis à ℥i. ad ℥iij. in infusione à ℥i. ad ℥iij.

N. Infantibus ac gravidis dare caveto.

Præpar.

1. Species Diaturbith. C. Rhab. Vid. Disp.
2. Pulvis Stockstaldi dictus. V. D.
3. Pilula de Turbith. stomachica Mesue. V. D.
4. Acetum de Turbith. Varii generis.

Vires. Commendatur in Peste, sique ex Turbith, ruta, myrrha, aloë, aliisque putredinem arcentibus in Crucibulum infusis.

5. Extractum.

N. Quia Turpethum resinosum est, seu ut ajunt gummosum, convenit cum Spiritu vini Extractum ejus conficere.

Mosis hujus Extract. à g. vi. ad x. & plura Schroderus.

Turpethum, siue Turbith plantæ nomenclatio Arabica semi-Maurave est, eademque Persis ac Turcis recepta, in Guzarata verò, ubi frequens est, Barchaman, in Conara, cujus civitas est Goa, Tignar nuncupatur. Magna est inter Authores de hac plantâ controversia. Serapion radicem esse Tripoli Dioscoridis asserit, à quo non dissentit Avicenna. Mesues verò esse radicem herbæ ferulaceæ lacte turgentis scriptum reliquit. Hanc plantam peritiores quidam esse Thapsiam Dioscoridis affirmant. Non desunt, qui dicunt, Plantam à Mesue descriptam esse Alipum Dioscoridis. Inter recentiores Græcos Actuarius ponit duplex Turbith, album nempe, quod idem Autor esse Alipum Dioscoridis asserit; Alterum verò Pityusa radicem esse Tithymali Myrsinitis, minus tamen rectè. Turbith verò, quo hæc tempestate in officinis utuntur, recentiores quidam duplex esse ajunt. Unum quod ex Alexandria afferitur, esse radicem Scammonii Antiocheni, quod adhuc differt. Nam Alterum est album & melioris notæ. Alterum nigrum & deterioris notæ. Secundum Officinarum Cineritium à colore puncupatur, & est cortex radicis Thapsie vulgaris, quæ Hispania frequens est, ejusque radice pleræque officinæ pro legitimo Turpetho utuntur, & Apuli ex Gargano Monte per Universam ferè Italiam afferunt. Turbith verò Indicum longè aliud est à prænatis. Herba namque est folia ferens ibisci, caules volubiles per terram repentes, digitos paulò crassiores, duos dodrantes longos, quandoque verò valdè prolixiores, floresque interdum candidos, interdum ex albo rubescentes. Radicem neque magnam nec longam. Utilis autem est in medicinâ caulis pars inferior duntaxat radici proxima. Alii dicunt, corticem illum, quem officinæ ostendunt, esse hujus plantæ caudicis inferioris corticem exteriorem medio exempto.

Nascitur in Cambayâ, Surate, Dio Insulâ, Bazaim & in ipsâ urbe Goâ. Francisc. Hernandez. l. c. Lib. V. cap. 58. Hofmannus.

TURPETHUM, vid. Turbith.

TURDUS.

Hoc nomine & merulas & sturnos complectimur. Notæ omnibus communes sunt, magnitudo inter columbas & alaudas media; rostrum longitudinis & crassitiei mediocris, deorsum modice in flexum; os intus flavum, cauda longa; victus ex baccis & insectis promiscuus, pleræque hujus generis aves canora sunt & humanis vocibus imitandis dociles.

Hoc genus tres sub se complectitur species, nimirum turdos strictè & propriè sic dictos, quibus colore in dorso cinericeo pectus maculosum; merulas, colore nigro insignes; sturnos denique & congeneres, quibus rostrum latius & planius seu depressius quam Turdis aut merulis.

Adagium illud Turdus malum sibi ipse cecat, de iis dictum qui sibi ipsis exitii causa sunt, inde ortum dicitur, quòd planta illa parasitica, è cujus baccis viscum avibus capiendis olim fiebat, ex semine à Turdo excreto nasci credebatur; Plinius viscum (inquit) satum nullo modo nascitur, nisi per alvum avium redditur, maxime palumbis & Turdi, hæc est natura, ut nisi maturatum in ventre avium non proveniat. Verum viscum è semine non provenire omnino, plurima sunt quæ suadent argumenta; quorum præcipuum est, quod in ramis etiam surrectis & in averâ seu Terram spectante ramorum parte oriatur, qui plura velit, consulat sub hac re, Aldrovandum & Scaligerum.

Turdi quatuor species Angliæ notæ & familiares sunt, duæ apud nos perennant & nidificant, nimirum 1. Viscivorus major, 2. Simpliciter dictus seu viscivorus minor: duæ adventitiæ sunt, quæ per hyemem hic commorantur, æstate abeunt, nec unquam apud nos nidificant, Turdus scilicet pilaris & Iliacus. Merularum tres species alit Anglia 1. Merulam vulgarem 2. Mer. Torquatam. 3. Mer. aquaticam, de qua alio loco inter terrestres piscivoras agimus. Merula montana seu rupicola. Derbientium Rock-ouzel, fœmina est, ni fallor, Merulæ torquata, quamvis in pectore torquis nec vola (ut ajunt) nec vestigium sit. Sturni unam duntaxat speciem agnoscimus. Merula saxatilis seu rutilicilla major. Itemque passer solitarius & galbula, quas in transmarinis vidimus, Angliæ ignotæ sunt & peregrinæ. WILLUGHBEIUS in Ornithologia.

Commendatur hæc avis ab aliquibus contra Epilepsiam.

TURTUR.

Turtur à Turtle Dove, Τρυγών Græcis.

Mas quem descripsimus à summo rostro ad ultimam caudam longus erat 12. digitos. Latitudo alarum extensarum 21. Rostrum ipsum gracile, ab apice ad angulos oris digitale ferè, exterius cœruleo-fuscum, interius rubens. Lingua parva non divisa, oculorum irides ex rubro flavæ, circulus nudus rubeus oculum ambit, ut in multis hujus generis.

Pedes rubri; ungues nigri, digiti ad fundum usque divisi: latus interius medij: unguis in aciem tenuatur.


Caput & medium dorsum cœrulea cinereave columbæ vulgaris colore, interscapulium & uropygium sordide rufescunt, pectus & venter alba, gula vinaceo colore pulchro tingitur. Colli latera perbellè illustant, ceu torquis quidam, pulcherrimæ plumulæ apicibus albæ, cætera nigre.

Remi-

fig. I.
Soldanella Minor Alpina.



fig 2
Tussilago Rotundifolia Minor Alpina



Remiges pennæ exteriores fusæ, mediæ cinereæ, interiores ad margines ruffæ. Secundus peninarum ordo cinereus: ordines minores nigri. Cauda 12. pennis constat, quarum extimæ utrinque tum apex albus, tum pinnulæ ad scapum exteriores; interiores enim ex cinereo nigricant. Sequentibus ordine albor paulatim minuitur seu contrahitur, unde & medijs duabus omnino deest. Longitudo caudæ 4. digitorum.

Testes magni, digitum longi, intestina 26. digitos æquant. Appendices brevissimæ. Ingluvies magna in qua Cannabis Semina observavimus. Ventriculus Musculosus, supra ventriculum Oesophagus in folliculum glandulosum dilatatur. *Willughb ejus.*

Officin. Nat. ex Turture.

1. Integer Turtur. 2. Adeps.

Vires. 1. Turtur viribus cum columba convenit peculiariter tamen commendatur in dysenteria ac præcipuè in sistendo mensium profluvio, [sive cinis combusti turturis, sive exinde extractum exhibeatur,] [Dosis gr. 4. 6.] sive turtur deplumatus & exenteratus insuta in ventre mastiche ʒi. (aceto rosaceo, inter assandum asperso, butyri loco,) assetur postmodumque in olla clausa exsicceatur, atque in pulverem convertatur, & cochl. j. singulis mane exhibeatur.

2. Pinguedo inter assandum collecta illinitur renibus, ventri, pectori, inguinibus, &c. *Vide Forest. lib. 28. observat. 10.*

N. Sunt è podagricis, qui sibi persuadent paroxysmos arceri, podagramque præcaveri, si in cubiculo turtures alant. *Schroderus.*

T U S S I L A G O.

Tussilago latinis, Græcis Βήχιον dicitur eodem sensu, à commodo compertissimo quod præstat anhelosis & tussi afflictis, nonnullis chamæleuce dicta putatur quod foliam subius albescat instar populi albæ, ungula caballina à similitudine foliorum.

Note ejus *Characteristica* sunt flores folia antevvertentes & brevi marcescentes, in singulis cauliculis singuli, radiati: folia subrotunda subius incana.

Vires. Folia hujus recentia temperatis proxima sunt: unde extrinsecus imposita (cum melle trita Diosc.) ulceribus calidis & inflammationibus (ut & Erysipelati) profunt. Siccata vero modice acria & calida evadunt, eorum fumus (per infundibulum ore exceptus ac deglutitus secundum veteres, rectius tubo inditorum & incensorum haustus, ad modum nicotianæ) tussi, orthopnæ, vomitibusque pectoris conducit, ad hos usus paratur syrupus ex succo foliorum recentium; Item conserva, tabellæ, & eclegmata, ad eadem valent & radices siccata, summâ Thoracica est insignis.

Ubi sylvestris nascitur *Tussilago* subesse aquis credunt & hoc habent signum Aquilæges, teste Plinio lib. 16. cap. 6.

Hujus radicis adnasci dicitur subalbida quædam lanugo quæ à radicis segmentis prius expurgata, & deinde linteolis involuta, & in lixivio parum decocta, addito salis nitri aliquanto, ac demum sole siccata, omnium optimus est fomes ad ignem ex silice excussum excipiendum: quippe adeo ignis capax est, ut primo statim chalybis concussu accendatur. Jo. Bod. in Theophr. hist. lib. 7. Cap. 12. pag. 877.

Tussilaginis foliorum cum flore sulphuris & succino in pulverem comminuto mixtorum: & incensorum fumus ore haustus instar nicotianæ phthisin aliquando sanavit. D. Boyl. de utilitate philosoph. nat. ad medicinam.

D. Hillerus Med. Marchionis. Brandenburgici pueros Atrophiam laborantes plurimos restituit solis folijs ungulæ caballinæ, quæ & concisa oleris ritu, & pulte farinacea imbuta atque in butyro salviæ in modum frixa comedenda diutius exhibeat D. Soame ex observat. Hieron. Reusneri à Velschio editis. *Rajus.*

Dantur aliæ *tussilaginis* species, inter quas recentiori merentur *Tussilago Alpina folio longo*, & *Tussilago Alpina minor rotundifolia flore purpurascens* quæ non parum vulneraria, ac pectori apta, cujusque iconem hic tabulâ, scilicet xxiv. exhibemus.

T U T H I A, vid. sub titulô *Æs.*

Desiccativa est, deterfiva, morbis oculorum apta; valet itidem pro cicatrifandis vulneribus, &c. extus autem tantum adhibetur porphyrite quam subtilissimè lavigata.

T Y P H A.

Typha Florum effigies turbinata & in clavam composita (quæ & plantæ nota characteristica est) quasi typhonis sese gyantis turbinem, aut gigantis statueram minacem signaret, nomen dedisse videtur. C. B.

Hanc nos eodem in loco ubi olim Lobelius & J. Bauhinus observavimus, nimirum ad fluvium Arve quâ Rhodano confluit, prope Genevam. Cum eam primum vidimus perexigua fuit, Clava, gracili & strigosa, ut non dubitaverimus distinctam speciem esse: postea vero caput cylindraceum clavatum in tantam intumuit crassitiem ut suspicati caperimus parvitatem loco potius (siquidem extra aquis crevit) quam plantæ naturæ deberi, quod vero Clavas geminas in eodem scapo proferat perpetuum non est & accidentarium esse videtur: nec minus quod Clava superior inferiorve major sit, vel minor. *Rajus.*

Valet in herniis & ambustis si in pinguedine frixa iis applicetur.

LIBER XX.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

V

VACCA, vid. sub titulô *Bos.*

VACCINIA, vid. *Myrtillus.*

VAINILIA, vid. *Vainillas.*

V A L E R I A N A.

Valeriana à Valerio nescio quo dicta existimatur: aliis à valore seu valentia, quia multis & insignibus facultatibus valet.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

Characterum abunde habet quibus ab aliis herbarum generibus facile possit distingui, ij sunt caulis teres concavus foliis ad intervalla binis adversis cinctus: flores monopetali velut in umbella, semina ad singulos flores singula, nuda, pappo innascente alata.

Qqqq

Vires

Vires Valeriana Majoris.

Radix ut & herba ipsa alexipharmacæ, sudoriferæ & diureticæ sunt, Ufus præcip. in imbecillitate, visus, peste, (hinc miscentur antidotis, Theriacæ & mithridatio) asthma, vetere tussi (cum dulci radice uvis passis & aniso decoctæ) pleuritide, obstructione hepatis (ictero) lienis, Ureterum hernia, &c. extrinsecus confortant visum, maculas oculorum abstergunt (in aqua aut vino decoctæ & guttatim instillatæ) cephalalgiam sedant, menses cient, sudorem promouent (in balneis) exsiccant, catharos (suffitu) bubonum ac Anthracum malignitatem corrigunt, globulos sagittasve extrahunt; ulcera inveterata mundificant, hæc omnia Schrod. & nimis sane multa: audiamus C. Hofmannum, non opus habes (inquit) honoratis illis titulis, quibus Dodonæus illam onerat, hoc imprimis certum est valde diureticam esse.

Pulvis radicis hujus plantæ sponte ortæ, antequam caulem edat Cochlearis dimidij mensurâ cum vino, aqua, lacte, aut alio quovis decenti succo semel aut bis sumptus Epilepsia correptos, liberat, siquidem *âro* & *nâro* purgat: hujus vim & in aliis multis, & in semetipso expertus est doctissimus & veracissimus F. Columna & confirmat Panarola; Sylvius quoque plus ei tribuendum putat, quam pœoniæ, ut quod sale volatili abundet.

Vires Valeriana Minoris seu Sylvestris.

Hæc, autore Dodonæo, ruptis, convulsis, ex alto præcipitatis utilis est, sed & folia ad oris & gingivarum cum inflammatione exulcerationes & aphthas prodesse dicuntur, ajunt & radices aridas tulasque drachmæ pondo cum vino sumptas infra supraque purgationes moliri: superius diximus Epilepticis conducere.

VALERIANA quæ Nardus dicitur.

Nomina. Nardus celtica I. B. Ger. Celtica Dioscoridis C. B. Alpina Clus. Nardus sive spica celtica Park.

Clus.

Integros interdum Cæspites occupat serpendo radix, & late summa tellure sese inter muscum diffundendo: oblongi procumbentesque humi ramuli, tenues, plurimis veluti foliolis aut siccis squamis circumsepti, subinde fuscæ & nonnihil capillatas fibras agunt, summa parte in unicum aut bina ternave extuberant capitula, aliquot longis, secundum caput angustis, deinde in latitudinem paulatim se laxantibus foliis, satique crassis & succulentis plena, colore dum primum emergunt viridi, deinde sub autumnii initium aut æstatis finem flavescente, gustu amariuscule: palmaris aut dodrantalis, nonnunquam etiam major, inter ista emergit cauliculis, satis firmis, ut in minoribus valerianis sylvestribus geniculatus, bina ad singulos nodos habens inter se opposita exigua foliola; cui circa summum ex singulis alis enascuntur pedicelli, binos aut ternos flosculos coloris pallidi sustinentes, quibus succedunt semina valerianæ sylvestris Alpinæ, saxatili præsertim (valerianæ minimæ nardifoliæ) proxima, paullo tamen minora, tota planta aromatica est, & radicem valerianæ sylvestris odorem æmulatur.

Copiose provenit (inquit I. Bauhinus) in Alpibus Germaniam ab Italia discescentibus, montosis gaudet Genuensibus, Liguriæque Alpibus sterilibus.

Autore Clusio, copiose nascitur in summo Judenberg Sirciacarum Alpium jugo inter muscum, saxosis

locis. Ibi mense Augusto floret sub ipsis fere nivibus; folia deinde promit cum illa dissolvere & diffuere incipiunt, legitur autem ab incolis sub Augusti finem & Septembris initium cum folia flavescere incipiunt, tum enim summam habet odoris gratiam, quæ caret cum folia primum promit, & adhuc viridis est. *Rajus.*

VAYNILLAS HISPANIS.

Nomina. Volubilis filiquosa Mexicana foliis plantagineis. Aracus aromaticus, Tlilxochitl, seu flos niger Mexicanis dictus *Hernandes.* p. 38. Vaynillas Hispanis à vaginarum similitudine *Pise, Mantis, Arum.* p. 200. lathyri Mexicani species *Amman.*

Hern.

Volubilis herba est, arbores conscendens & amplectens *Hernand.* foliis undecim uncias longis, sex latis figurâ plantaginis sed pinguioribus & longioribus, viroreque infectis saturato: Singulis ex utraque parte caulibus alternatim exorientibus: floribus nigricantibus, filiquis longis, angustis & pane teretibus nigris, olentibus muscum aut balsamum indigenam.

Calidis regionibus, humentibus locis provenit, & filiquas Verno tempore profert.

Vires. Siliquæ binæ aquâ resolutæ & potæ urinæ cient, menstrua evocant, cum meaxochitl partum accelerant, ac secundinas mortuumque foetum expellunt: ventriculum calefaciunt & roborant, flatu discutiunt: humores crudos concoquant, cerebrum confortant; ad ictus venenatos utiles esse dicuntur, hinc chocolata compositionem ingrediuntur. Elegantes Icones, foliorum filiquarum, & seminum Microscopio conspiciuntur exstant in D. Francisci Redi Experiment. Circa res naturales. *Rajus.*

V E N E N U M.

De Venenis, & eorum Antidotis in Genere, ac Primo

De Venenis in Genere.

Ut cognitio remedii supponit cognitionem morbi, & vice versâ, si juxta rationem velimus procedere; ita de alexipharmacis seu BRZOARDICIS, tanquam venenis resistentibus remediis, vix feliciter possumus differere prius, quam de venenis, quæ & qualia sint, penitus constet.

Dictum esse venenum ex philologiâ constat, quod citò per venas transeat, seu salubre, seu noxium sit. In genere enim pro medicamento accipitur; seu latiori significatione veneni appellatione continetur omne, quod adhibitum naturam ejus, cui adhibitum est, mutat; propriè vero prædicatur de noxio & contradistincto alimento & medicamento.

Adeoquæ venena propriè sunt, quæ per se nocent, & adversa sunt corpori, non item, nisi lotius, quæ per accidens id præstant, quorum Sciligeri illa venenorum genera spectant. *Exercitat.* 33. tom. 2. nocere eadem vel à primis qualitatibus, ut aqua opota frigida homini labore & sole æstuant, ut gypsum exuccando strangulat; Vel à secundis, ut crocus laxando nimis spirituum viam, quod vulgo statunt, nos verò quid sentiamus, mox patebit; Vel à tertiis, ut cantharides vesicæ, lepus marinus pulmonis. Tacemus exemplum vini spiritus vini & aliorum.

Præsupponimus ergo 1. Venena esse & dicenda, quæ corpus citra externam violentiam aliam, (ut conformatione vel unitate solutâ) violentè destruant.

norunt. Hinc enim intoxicati vel veneno potionati sunt & dicuntur, qui citra aliam quandam causam manifestam periculum vitæ subeunt, vel moriuntur.

2. Adeoque esse peregrina corpori, sive illata, sive in eodem producta. Illa propriè dicuntur venena, hæc maligna & veneno analogæ; unde differunt potissimum quoad modum inficiendi. Alia inspirata lædunt, ut seminata pestis, & morborum malignorum, febrium &c. quatenus *Scorpius* seu effluvia, vel exhalationes ex infectis corporibus & locis spirantes communicantur; Alia haustu, ut quæ ore assumuntur; Alia solo contractu, ut illa quæ foris nos contingunt, etiam ex supra dictis pestis & febres maligniores; Alia denique ex ictu & morfu, cujus generis sunt animalia, quæ vel dentibus nos mordent, vel aculeo pungunt, vel contactu nocent.

3. Alia esse externa, alia interna, quod ex dictis satis patet; Externa iterum vel vi illata, ut morsus animalium, vel inadvertenter, ut pestis, per poros irrepens; Interna verò vel ore hausta in pulmones, vel deglutita in ventriculum, vel generata in massa sanguinea, etiam citra ullam extraneam, saltem immediatam, communionem, seu contagium.

4. Alia esse magis cita & activa, quæ, præsentaneâ vi, exiguo temporis spatio occidunt; alia lenta, temporaria, efficacix remissioris, quæ post multos demum dies necant. Priora v. g. calida tenuia, & ferè erodentia ac putrefaciencia; posteriora frigida & crassa, quæ minus in vasa subeunt, censentur.

5. Venena alia esse homini, alia brutis; multa siquidem homini sunt venena, quæ tamen aliis animantibus in alimoniam cedunt, ob diversum nexum principiorum vitalium, sanguinis & feri. Sic cigutæ sturmi vesci scribuntur; hyoscyamo & mandragorâ, lues; Cantharidibus, hiruindines; serpentibus, cervi, quod vide *Sachsi Gammatol. & Ann. I. Ephem. Germ. obs. 14.* attractis iisdem è speluncis suis; araneis gallinæ; serpentibus & bufonibus ciconiæ &c. Contra ea aloë medicamentum est hominibus utilissimum non minus ac amygdala amara, lupis, vulpibus & canibus verò venenum. *Vid. Mæb. Fundam. Med. Physiol. v. 10. p. 159.*

6. Alia venena esse universalia, alia particularia, quæ distinctio tum in specie humanâ, tum generalius quoque de aliis valet. Universalia omnibus atque singulis animalibus venena sunt arsenicum & mercurius sublimatus, nullum quippe vitum est, quod sciam, innoxie per omnia hisce utrum. Specialia venena, præter jam dicta, in specie humanâ alia sunt nervis & spiritibus inimica, ut solanum furiosum, alia pulmoni, ut lepus marinus, alia ventriculo, ut corrosiva, alia vesicæ, ut cantharides ardore & mictu cruento infames.

7. Alia partes spirituosas, alia humidas, alia solidas magis afficere; inprimis verò cum humidæ mediæ sint inter reliquas & quasi vinculum quoddam, præcipue etiam easdem pati certum est.

8. Alia esse vegetabilia, ut aconitum, cicuta, nappellus &c. Alia animalia, sive toto, sive partibus saltem, ut scorpius, vipera, quorsum & caudam cervinam quidam referunt; Alia mineralia; ut arsenicum, mercurius sublimatus, cobaltum. Adeoque pauca quidem nota sunt venena, reliqua tamen, cum magis & minus non variant speciem, itidem huc referenda. Nondum innovit vel publicatum est venenum, quo in Galliâ hætenus tot cædes patrata occultæ, *Poudre de succession* vocant, in pulveris formâ; licet sint, qui carnes infantum ex utero materno excisorum (horrendum dictu) cum aspidibus aliisque confermentatas nominent.

9. A venenis assumtis oboriri ab aliis aliâ, omnia tamen in subitanæ conspirare perniciem; ad vomitum cieri ventriculum, cardialgiæ, anxietates, tremores, pallores, lipothymias, pulsus frequentem, abdominis inflationem, capitis turbationem fieri. A demorsis verò scorpio vel viperâ, auriginem contrahi, dolorem, ardorem, tumorem, inflammationem partis affectæ.

Ex his colligere est: Venena non tam occultis, quàm manifestis agere qualitatibus. Utut enim occultæ qualitates, quatenus manifestis sunt contradistinctæ, concedi possint, quo sensu venena communiter à totâ substantiâ, sive virtute specificâ agere asserunt; si tamen penitus eadem investigemus & occultum humanus pro eo, cujus nulla omnino ratio dari queat, ratum est atque certum, venena agere manifestis atq; investigabilibus, intellectui notis, qualitatibus. Hinc notanter *Scaliger, loco citato*, qualitas hæc dicta, ait, cum multum absit à sensibus, solâ ratione comprehendendi potest; (loquitur verò de remediis venenorum totâ substantiâ agentium) sed in hujus cognitionem pervenimus per vestigia tertiæ, scilicet qualitatibus, seu ad normam manifestarum.

2. Venena sine dubio subruere principia vitalia, quorum nexu indissolubili vita propagatur, violenter verò destructo sufflaminatur. Nequidem ulla ratio dari alia potest tam citæ *venæ* & immutationis, præcipue cum omnia id testentur phænomena, unde meritò causæ talismodi universali eorundem vis adscribitur, in quâ omnia adeo conveniant, licet admodum diversa.

3. Pollere venena sale, sulphure & mercurio, machina humana peregrinis & destructoriis. Id verò est tota illa substantia, occulta qualitas, textura nempe & modus mixtionis. Uti enim particulæ alimentorum sunt benignæ, familiares & subjugabiles, similes, saltem à posteriori, medicamentorum diversæ, ut alium sita: um alterando vel purgando inducere queant; ita venenorum adversæ, in internectionem partium spirantes.

4. Esse eadem vel CORROSIVA, vel FERMENTATIVA, vel VAPOROSA, vel MIXTA. In his quippe effectibus vel qualitatibus vis venenorum in genere consistit. CORROSIVA si fuerint, ventriculo eschatam & *venæ* inducunt, unde parte ad vitam absolutè necessariâ destructâ, necessum est machinam ipsam tubui & principia vitalia destrui. FERMENTATIVA quæ sunt, motum p. n. eumq; vel absolutè lethalem, vel summè tamen periculosum inducunt, unde calor febrilis, æstus, deliria. VAPOROSA spiritus obnubilant, suffocant, destruunt. Adeoque corrosiva solidis, fermentativa humidis, vaporosa spirituosos inprimis sunt hostica, mixta universis. Quæ verò de his non participant, ut pix assumpta & plurima alia inter venena vulgò relata, inter venena tantum per accidenis talia & improprie dicta referenda fuerint.

5. Venena mineralia Φ ium Ω matum & arsenicum ejusque species, agere solâ potissimum corrosivitate. Hæc ipsa *venæ*, *venæ* sanguinis & feri destructio-nem inducit, secundariò quoque fermentatione peregrinâ & spirituum turbatione consequente. Hinc si statim revomantur, delicatiori archæi sensu & robore, non nocent. Hinc in ventriculum plenum, vel pingui-bus præsumtis ingesta minus necant, faciliiori vomitu consequente, & acrimoniâ obrusâ. Hinc qui mortui sunt ab horum usu, sive incauto, sive malitioso, ventriculum & intestina sphacelata & erosa exhibuerunt, quod ipsi in cane observavimus. Par ratio est aquæ fortis, butyri antimonij &c. Patet id ipsum quoque ex analysi Φ ij Ω mati, neque enim Φ ius vivus, nec Θ , nec Ω , nec Θ -lum, quibuscum sublimatur, est venenum, sed solâ textura inde emergens, quâ iterum immutatâ, per additionem Φ ij vivi & sublimationem, in Φ io dulci, eadem quoque venenositas emori-

tur. Neque mirandum est, hinc ardorem stomachi, convulsiones, livores, tumores & alia symptomata ab his oriri, de quibus videantur Practici. Sic & ☉ corrosivitate & causticâ vi ablata innoxium est, vel solius magnetis ☉-olis exemplo.

6. *Venena animalia* (loquimur verò de universalibus magis) agere potissimum vi fermentativâ peregrinâ; sive viperæ mortis exempli loco sit præcipuè, seu canis rabidi, seu alia consimilia. Hinc cum salivâ talismodi sal peregrinum, irato cum primis animali, in vulneratam partem illatum, mox serum & sanguinem immutat, ut corrumpantur, sicut, fermentationem, vaporem patiantur, factâ hinc, recursum ad cor, communicatione, etiam reliquam massam sanguineam mox inficiendo. Par ratio est ictus cum aculeo scorpionis, morsus atanei & similia. Hinc factâ statim exsuctione vel destructione fermenti hujus peregrini, vel non nocet planè, vel saltem citius debellari potest. Caravimus aliquando puerum à cane rabido demorsum 1. dato intrinsecus bezoardico volatili, 2. exterius vulnere cum rutâ, theriacâ & aceto eloto, felicissimo cum successu. Hinc ligaturæ etiam locum habent. Verbo, omnia φανώμενα testantur de inducâ fermentatione præternaturali. Hinc etiam si ictus apum, vel vespæ excipiat ungue, & hinc gustetur, salinum talismodi quid manifestè deprehendi potest.

7. *Venena vegetabilia potissimum agere vaporositate peregrinâ.* Quatenus sulphure v. g. impuro, mucilaginoso, nervis inimico pollent. Hinc hyoscyamum, seu ejus semen, imaginationem distocasse observavit in causidico Helmont. lib. demens idea. p. m. 224. ipsumque ibidem. pag. 225. exoticam phantasiâ imprimere asserit, quod itidem in puellâ observavimus observatione 21. ann. II. Ephemerid. German. consignatâ. Sic napellus, verbis ejusdem, suam furoris in nobis imaginem communicat, de cujus φανώμενους ab assumptione evenientibus, ut & de arsenico studio experimentandi propinato, videri meretur Cornarius histor. admir. 12. & 13. pag. 41. & seqq. A 3j. pulveris napelli, pectoris angustia, ventriculi dolor, oculorum obtenebratio vertiginosa, pulsus immutatus, paulò post etiam delirium accidit, ut in folio lacero alitè cecinerit ager. Legi hanc in rem quoque seorsim meretur I. I. Wepferus libro historia & noxa cicuta aquatica inscripto, & I. M. Faber in Strychnomaniâ, tractatibus curiosis. Sic & crocus risu scribitur interimere, risus verò stultorum est. Par ratio est opij ipsius, aliorumque, quæ vaporositate suâ spiritus turbant & nocent.

8. *Venenum in corpore genitum in febribus malignis esse fermentationis peregrina sobolem, sæpe tamen non tam à priori, quam posteriori factum.* Quando enim vel ob aëris austrinum frigidiorēve statum, ob errores diætæ, vel contagium quoque leges proportionis sanguinis & feri violantur enormius, consistentiâ, motu & calore læsis, periculum ruinæ subit machina, peregrino induto æstu, varijs cum effectibus sinistris. Inprimis sal volatilius redditum, rarefaciens sulphur, sero diluente excusso, ferociens hinc & quassans corpus accusari meretur. Unde sanguis emissus rutilans, cinnabarinus, sero quasi incoctus visitur, quo de alibi latius.

9. *Venenum pestis, solo contagio propagandum & illatum, singula conjunctim possidere.* Non in aëris corruptione, præterquam particulari, consistit id ipsum neque à priori aquè, unde primitus emergat, cognitura est; à posteriori verò oprime. Est nempe venenum hoc corporeum, feminale, calore nativo expansivum, sui multiplicativum, humorum corruptivum & principiorum vitalium destructi-

vum. Corrosivum esse demonstrant satis carbunculi & pustulæ quasi ab ambustione factæ, dysenteria, pleuritis, cardialgia, aliaque conjuncta; Fermentativum, febris, bubones, anxietates &c. Vaporosum, deliria, sopores, vertigo, ipsos sanos quoque impetens eadem dumo versantes. Eminent tamen tanquam magis activa vis corrosiva, unde reliqua quasi obscurat, & eadem potissimum necat, si v. g. ventriculus fuerit carbunculo affectus, si mictus cruentus accedat, si hæmorrhagiæ; variat etiam effectus hic ratione recipientium subjectorum. Hinc clavis patet, quare tam subitò internecionem inferat pestis; quare nullum remedium specificum & appropriatum, idque certum & infallibile, quod communiter desiderant, detur; quidque sit sentiendum de varijs hypothesibus de veneno pestilenti hodiè agitari solitis. Pigrum id & lentum est, omnisque præcautio hinc fieri debet, ne in actum deducatur: ne hauriatur, vel haustum maturè profligatur, ne nidum sibi paret, cum perniciè certâ corporis. Omnia, uno verbo, sic velut panfa patent φανώμενα.

10. *Venena particularia magis esse subjugabilia, minusque vincula vitalia destructum ire.* Noxia quidem sunt, unde venena audiunt quoque; attamen non toti æquè, secreta ab archeo victore, seu superiore, huc illuc. Satiùs enim est hanc illam partem lædi, quam totam machinam subire periculum lethi. Sic cantharides, sale volatili acriori constantes, inficiunt non tam ventriculum; acriora etiam exterius ulcerantia & rubefaciencia, allia, sinapi, lepidium ferre aduetum, quam expansis salinis particulis suis serum, unde excretioni destinatum in tubulis renum, ardorem delicatioribus longè partibus insupportabilem conciliant. Par ratio est leporis marini, de quo cum minus constet nobis, pluribus dicere non licet, à posteriori tamen exulceratio decantata id probat satis.

11. *Ubi virus, ibi virtutem deprehendere licet.*

Præstat enim ex venenorum quoque doctrinâ alios depromere usus. Neque enim solum utilissima est, tum ut venena cognoscantur, cognitaque vitentur, tum ut infecti melius & rectius curari valeant; verum quoque ut cognitâ virulentâ virtutem, quam natura illâ condidit, noscamus. In genere enim virtuosa esse & potentia ex effectu patet satis; quod si ad leges temperamenti humani redigere mitigareque illa pergamus, pro vinculis vitalibus roborandis facient, quæ contra ea destinata videbantur. Exemplo sint vegetabilia plurima, ut cicuta, v. g. opium, crocus, semen hyoscyami, & alia, ut arsenicum, araneas, & alia non laudemus.

De Bezoardicis primi generis.

Sed visis hisce jam judicium ferre poterimus de bezoardicis accuratius, generalibus & specialibus. Contra enim juxta se posita elucescunt magis. Ut itaque venena sunt non una, sed diversa; ita quoque non uno nomine veniunt iisdem opposita. Generali notione dicuntur alexipharmaca, alexiteria, latine amuleta, (quæ vox hodiè de extremis apensis ferè usurpantur,) ab amoliendo, i. e. submovendo, depellendo, eò quod venenis resistunt: item bezoardica, ex eo haud dubiè, quod lapidem bezoar putarint omnibus venenis resistere, modò sit genuinus. Atque sic eleganter & usitatus hodiè dicuntur. Sin specialius ea consideremus, prout à Veteribus demominata fuere, divisa sunt etiam quoad nomina hinc, ratione objecti potissimum, i. e. veneni, in quod agunt, teste Galeno 6. Epid. Comment. 6. tom. 5. & alibi. Cum enim venena vel

vel ab animalibus, vel ex vegetabilibus, mineralibusve proficiantur (pharmaca vocant) idem remedia ijs resistentia duplicis quoque generis esse scribit *idem*: Alia quæ venenatorum morsus, ictus aut venena sanant; alia deleterijs pharmacis medentur. Illa alexiteria, ἀπο τῆ ἀλέξειν, arcere, depellere, propulsare, item opitulari, καὶ τῶν θηρίων, à feris vel belluis, nominantur. Hinc & simpliciter θηριακά φάρμακα, seu theriaca, propriè dicuntur, quæ moribus animalium debentur. Dicta enim est theriaca partim ab effectu, eò quod serpentum moribus maximè succurrat, partim ab ingrediente carne viperinâ. Hæc alexipharmaca ἀπὸ τῆ ἀλέξειν καὶ τῆ φαρμάκx, quod lethalibus medeantur morbis. Exemplo sit jam dicta theriaca, quæ cum primariò moribus animalium infligitis debeat, non protinus contrà omnia & singula venena potest adhiberi alia, frustra adversus vegetabilia, mineralia, & plura quoque animalia. Utraque alijs terminis dicuntur etiam alexicaca, item antidota, licet hæc quoque de internis tantum prædicentur magis.

Nos generalia illa jam vocabimus usitato nomine BEZOARDICA, tanquam communia magis & universalia; hæc scilicet malignitati ex dissolutione humorum vitalium, minori vel majori, quam venena intentat, exurgenti debita cor defendunt, & νεγίσιν, consistentiam ac motum sanguinis contra venena in vigore suo asserunt. Monuit enim jam ipse *Galenus l. 5. de simpl. medic. facult. cap. 18.* nihil interesse, an alexiteria, an alexipharmaca remedia venenis opem ferentia appellemus, quod scilicet in unum demum eundemque finem funestum illa conspirent. Antidota verò specialissimè notant, quæ his vel illis speciatim & in individuo notis venenis, quoad illam qualitatem, quâ particulariter noxia sunt, in corpus illata, adversantur, ut ὄϊο πτο, cantharidibus, & similibus, de quibus in seq.

Cum verò ex dictis clarum sit, bezoardica hæc respicere potissimum venenum animale, in motu fermentativo & destructivo consistens, adeoque convenire v. g. ad morbos malignos, & prodesse in febb. malignis & morbis epidemijs, pleuritide, dysenteria, variolis, morbillis, peste, febribus Hungaricis, petechialibus, inflammationibus febrilibus, anginosi &c. meritò veneni hujus ἐνέπυσαν respiciunt præcipuè. Tertia enim pars hominum moritur febrì, unde facillè colligere est, quantum momenti situm sit in bezoardicis.

Respiciunt nempe vel calorem, vel consistentiam, vel motum sanguinis & feri, quippe bene habentibus, vel defensis & fartis testis, vita producit & contrà. Seu I. Bezoardica respiciunt exclusionem fermenti peregrini, quo calidum nativum impetitur. Quæ verò id ipsum excludunt, balsamum nativum necessariò roborant.

Excludunt id ipsum Balsamica, putredini simul resistentia, physicæ, & hinc medicæ, Sulphurea, ut è simplicibus, Radices angel. carlin. contrayerv. diptamn. gentian. imperator. petasit. olsnit. Zedoar. Ex herbis ruta, scordium, galega, salvia. Ex floribus sambuc. calend. bacc. laur. juniper. myrrha, cortic. citr. aurant. camphora, succinum, sulphur, hinc δέον vocatum, & ex his parata, ut oleum angel. citr. succin. ruta, camphor. pestil. Heinsij; Elixir pestil. Croll. Tinctura Bezoard. Michael. Rolsinc. Mæb. Ludov. Wedel. essentia myrrha, theriaca, balsamica, spir. theriac. camphorat. bezoardici; Theriaca Andromach. celestis, mithridat. orviet. spir. Ἄρ. myrrhat. &c.

Excludunt Balsamica salina, volatilia & mixta, ut ebor. C. C. serpent. viperat. Tinctura bezoard. volat. liq. C. C. succinat.

Excludunt item, sed concentrando & penetrando Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

magis, acida, ut Acetum si. bezoard. rutac. theriacale, succus citri, aliaque, de quibus mox plura.

Ut hæc illustrentur magis, tenendum est (1.) esse sua morborum talismodi seminia, seminaria & quasi ovaria, imprimis malignorum, & inter hos maximè pestis, sive aliunde illata, quod de peste quasi absolutè, de alijs secundum quid verum est; sive concepta & fabricata in corpore. Patet hoc, quod sint sui multiplicativa, cum alijs communicentur, radices & fomitem habeant in putredine & corruptione humorum, & quæ alia adduci possunt argumenta plura. Adeoque consequenter opus est, ut, qui curare eosdem feliciter velit, hæc potissimum sibi habeat commendata.

(2.) Impeti ab his archeum, seu calorem nativum, spiritum vitalem, qui nisi roboretur, exterminando & excludendo fermento morbifico est insufficiens. Debilitatur hic reverà, licet efferato calore id minus compareat, quin ipsi ægri sæpe non credant se ægrotare, per aliquot dies circumambulantes, denken sie vollen ubergehen, habe nichts zu bedeuten, sed hinc demum magno suo malo id expectantur. Maximè verò in malignioribus id videas, ubi simul decollant vires, summèque prostratæ viuntur, ita ut sæpe de nullo alio conquerantur, quam solâ lassitudine, sie vwaren nur matt, pessimo tunc degentes in statu.

(3.) Esse in sanguine illa seminia & fermenta heterogenea, peregrina, non desidia, sed summè activa, seu sanguini seu sero magis inhæreant, quod vel bubonum, & carbunculorum uno exemplo clarum esse potest. Sin maturè secludantur, brevi patatos reddi excitatos fluctus microcosmicos, idque per sudorem, ipsius naturæ inclinatione & optimâ viâ, quæ à centro ad circumferentiam has sordes sequestrat, ac ab ipsdem se liberat.

Hæc si vera sunt, uti sunt verissima, patere potest, qualia sint hæc ipsa bezoardica & quomodo agant, activiora potissimum recensita & volatilia, tùm καὶ ἀπὸν, tùm δέον.

Καὶ ἀπὸν dicimus (a) non sola esse bezoardica & unica, quæ animatam verminosam putredinem respiciunt. Notum est per Kircheri, Langij, Hauptmanni hypothesen, statuere quosdam pestis venenum consistere in animato seminio, aërem repletum esse vermiculis tunc temporis plurimis, qui illati & hausti M. S. destruant, & φανόμωα omnia illa producant. Quin, ut taceamus omnes adeò morbos & mortem ipsam duos illos posteriores pro animatis habere, reptos esse in cadaveribus peste defunctorum, cultro audaciori subjectorum, vermes copiosos in ventriculo. Hinc rentur vim illam omnem bezoardicorum adscribendam uni soli huic causæ, quod vermibus & verminosa putredini adversentur.

Verum utur non negandum sit, posse animata seminia & in aëre & in corpore reperiri, imò in quibusdam reperta esse acta; posse item à vermibus symptomata enormia excitari, quin ipsa hæc bezoardica esse simul anthelmintica; exinde tamen concludere non licet, quod volunt, pestem & febres malignas unicè ab animatâ putredine esse oriundas. Neque enim (1.) phaenomena comitantia tam diversi generis ex hac hypothesi possunt derivari, non bubones, v. g. non carbunculi, præcipua pestis signacula; Vis illa corrosiva, fermentativa, vaporosa gravior est, quam ut possit per verminosam putredinem explicari firmiter. (2.) Quia ipsa illa animata putredo non tam producens est, quam productum, ubi enim putredo, ibi facillè vermes generantur, adeoque posito illo dari & reperiri in his subjectis, quod tamen universaliter verum non est; potior tamen ratio habenda erit cacochymia tanquam causæ, quam ejusdem

efficitur (3.) Non sunt propositiones convertibiles: quæcumque sunt bezoardica, illa sunt anthelmintica & vice versa: omnia anthelmintica sunt bezoardica, utraque enim latius patent, exemplo *Scilla dulcis*, *absinthij*, *purgantium*, *corallinae*, *tanaacetii*. (4.) Neque etiam omne seminium verminosum esse oportet. Hinc hypothesis hæc illustrare quidem potest bezoardicorum vim agendi, & tanquam effectus specialis considerari, non verò absolute & universaliter locum habet, præcipue cum hoc ipso pacto dubiis non fiat satis, nec exhauriatur malignitatis & veneni vis. Unde nisi ulterius in principia prima entis venenosi inquiramus, paulo minus est hoc ipsum, quàm ignorantiaæ asyllum.

(3.) *Non sola esse bezoardica & unica, quæ viriditatem perpetuam servant.* Sunt ex recentioribus, quæ remedia pestis genuina in his quarantant, omnia verò alia cariei obnoxia, ut angelicam, zedoariam, carlinam, & alia nauci esse habenda contendunt; Juniperum contra ea, laurum & alia generosissima & vera largiri præstidia. Sed nec ipsa hæc propositio verificari poterit, omnia perpetuò virentia esse pestis remedia, ita ut universaliter concludat. Ut argumentum topicum & particulariter valet, non universaliter. Si enim inquiramus in causas viroris perpetui, vel sulphuri ille est adscribendus, vel sali volatili, utrique minori respectivè aquæ, tanquam principij congelascentis, proportionem pollenti. Jam verò propter quod unumquodque est tale, illud magis est tale. At propter sal & sulphur perpetuò virent. E. hæc ipsa sal & sulphur balsamica magis attendenda, quàm effectus, viror solus. Neque, si exempla attendamus, id ipsum succedit & firmo stat talo. Non enim sabina, cedrus, abies, cupressus, pinus, præbent bezoardica, nisi quatenus resinositate suâ ignem, ætis purgatorium, alunt; non cochlearia, nasturtium aquaticum, & hybernium, lepidium, aliaque virentia semper. Adeoque licet verum sit, utraque hæc posse tutari corpus à putredine; quamvis concedamus virorem esse signaturam quandam & characterem externum, testantem de virtute internâ, ipsa tamen hæc ratio non sufficit, quin plus ultra progredi satius sit, & hæc penitus inquirere.

(γ) *Non sola esse bezoardica diata & triata.* Fuisse hæcenus alij quidam, qui ponentes pestem in metallicâ arsenicali consistere malitiam, imò salum illud quoque, in locis mineralibus, ubi effodiuntur opes irritamenta malorum, pestem grassari magis & frequentius; non sufficere ulla aliqua autumant bezoardica alia, quàm sola metallica. Quàm lubricum verò hoc sit assertum, facile ex dictis & dicendis mox patet, & posito, veram esse hypothesin; ipsa tamen diata & triata non eo modo arsenicale virus corrigere norunt, uti actuali igne commixta in magnete arsenicali illud dominant, & figunt.

Kata δειν verò displodunt & excludunt, quod diximus, peregrinum illatum sanguini, quatenus sulphur & sal volatile sanguinis vigorant, idque in motum citant, exsuscitant calorem, circulationemque sanguinis & lymphæ promovere, δειν verò omnem nocentissimam impediunt. Hinc bubones in peste quidem boni sunt, sed incompletè, quin visi sunt, per sola bezoardica insensibiliter quoque discussi. Unâ verò, si viscosus fuerit seminium, dissipant & annihilant; si vaporosum, poros cerebri referant & in halitus id ipsum resolvunt; si fermentativum, despumando ad extima *ὀψοσποδον* vertunt; si corrosivum & vi-

scorum, ut pestis, affigi id non patiuntur maturè propinata, sed dissipant & excludunt; idque omne obstetricante & adjuto inprimis calore. At quando vis corrosiva vel fixa est nimis, ut in arsenico, *Scilla*, vel in peste jam fixata, infixæ partibus intimis, minus possunt, minus profunt.

Præcipue ergo conveniunt in omnibus malignioribus, ubi penitior putredo, *σείρις* major; seminium efficacius, & speciatim etiam in moribus tarantulae, viperae, canis rabidi, &c. Punctus studiosus ab araneâ in collo, brevi convaleuit, solo usu sudoriferi ex theriacâ.

De Bezoardicis secundis & tertij generis.

Ut verò primum in hisce morbis est exclusio fermenti peregrini maligni; id quod nisi maturè fiat, necessum est alia unâ consequi non minus periculosa, quæ omnia cessare oportet, f. c. illâ exclusione, & demto, quod fermentationem peregrinam interire queat; ita effectus porro consequentes quæ respiciunt, bezoardicorum titulo mentò quoque veniunt.

Adeoque II. talia sunt resolutionem nimiam impediunt; non neglecto penitus prior. Respicent scilicet hæc productum primum malignitatis, quatenus ex ordine dimovetur sanguis & serum, seu resolvitur. Primum nempe genus bezoardicorum respicit quasi sanguinem & serum simul; alterum hoc elementum alterum, nempe sanguinem, particulas sulphureas & salinas seorsim, quatenus sulphureas has particulas & volatiles salinas nimis efferatas obtundunt, enervant & alterant. Alia enim necessariò vincula destruantur & sulphur nimis rarefit.

Talia diverſo respiciunt sunt 1. *adstringentia* temperata, ut *tormentalia*, *historia*, potissimum in febribus malignis cum diarrhoeâ, quæ pessimi est omnis, ceteris paribus, item *pulvis stypticus*.

2. Paria faciunt, licet remissius, *mucilaginosæ*, ut *cornu cervi*, ejusque *gelatina*, *C. C. Phil. ppt.* & *maggister*. Item *scorzonera*, inprimis montana, Italica, & nostras; *terra lemnia sigillata*, *bolus armena* &c. Hæc ipsa hoc censu venire palam faciunt tum diarrhoeæ malignis febribus solennissimæ, etiam in ipsis puerperis, tum hæmorrhagiæ, quin imò non raro sudores ipsi. Eoque maligniores cum sint febres putandæ, quod magis alterutrum horum comitem sibi adiciunt; tanò magis locum inter bezoardica habent hæc ipsa adstrictoria, ita tamen comparata, ut simul calorem p. n. respiciant. Mucilaginosæ verò sal illud peregrinum, quod expulsionem fecerni non possunt, inviscant quasi & sic temperant, unaque remoram ponunt sali volatili rarefactivo. Adeoque & freno in his morbis eget natura & stimulo; stimulum addunt expulsiua, quæ laudavimus, frenum reliqua secundi ordinis.

3. *Præcipitantia* quoque huc faciunt, tum absorbentia, si qua aciditas peregrina se immiscuerit, tum reverà invertentia humorum *ὀψοσποδον*. Utroque modo fluxiles redduntur, seu in motum citantur & circulum debitum humores. Neque aliâ ratione agit *lapis bezoar* uterque, *orientalis*, majori virtute conspicuus, & *occidentalis*, minori commendabilis, ut & prætio. Idem præstant bezoardica mineralia quæcumque. Illa nempe non tam diatâ suâ origine eunt malignitati, quàm ipsa hæc suâ præcipitandi virtute, unde dispiantur humores & præcipitantur. Talia sunt *diaph. bez. miner. f. Zle orientale*, *Dre*, &c. Hinc frustra sunt, qui eadem hæc reliquis omnibus unice anteferunt, cum potius homogeneis aliis miscenda sint, uti v. g. *gium diaph. cum. C. C. phil. oz. 69. a.* & *extracto scorzon. mont. par.*, qui *pulvis bezoardicus minor* est, abundè facit officium. Uti major esse

esse potest sequens : *xy. rad. contrayerv. terr. lemn. unicorn. fossil. corall. rubr. ppt. & diaph. succin. alb. ppt. a. 3j. C. C. philos. 3ii. lap. bez. occid. 3ß. ol. citr. M. P. pulvis*, alterandi & confortandi sine utilissimus, in febribus malignis, variolis, morbillis, dysenteria & aliis hujus generis morbis. Datur ad ʒß. g. xii. xv. ʒj. remiscendus cum *cinnab. nat. anodynis*, \ominus *C. C. volat.* aliisque. Taceamus pulverem bezoardicum *Sennerti*, *Rolfincii*, aliorumque. Præter illam verò exsiccandi & serum corrigendi vim eadem bezoardica mineralia sunt *æquæ*, omnis qualitatis heterogeneæ expertia, & tantò magis huic scopo propria, quò magis sunt pura, fixata, & particulis metallicis foeta. Hæc ipsa tamen præcipitantia non sunt unius & ejusdem generis. Exemplo sit unicornu fossile & animale; illud magis adstringit & siccat, hoc magis gepium naturæ suæ retinet, & ad exemplum aliorum similium sal volatile suum facile ostendit reconditum.

Quæcunque enim vel volatile in sinu gerunt, vel quoque mucilaginem blandam obviscantem & infringentem, illa ipsa vel mineralibus dictis palmam dubiam reddunt, unde non fidendum iisdem magis, quàm aliis cujuscunque regni bezoardicis.

4. Nec acida sunt excludenda ex hac classe, siquidem illa sulphur quàm maximè obtundunt, & sal volatile peregrinum rarefaciens figunt. Hinc *Acetum f. & bezoard. succ. citr. granator. aurant. Tinctura ros. viol. fl. 4. cord. ▽ bez. Ruland. sirupi acetos. citr. sunt bezoardica*, inprimis verò *elyssus & ʒiatus*, \ominus *bezoardicus* pluribus nominibus.

5. Ipsa quoque opiata huc faciunt, licet incomplerè & cum aliis, quatenus & ipsa insigne hoc habent beneficium, quod (1.) in centro ligant fermentum febrile, idque (2.) ad exteriora postigare juvant & sudorem unice promovent, (3.) coagulum simul avertunt, (4.) spirituum profligationem prohibent, (5.) sanguinis & seri vincula quàm accuratissimè defendunt, modò providè in usum vocentur.

Hæc ipsa tùm in genere malignitatè obstitunt & bezoardica sunt, licet secundariò factim, tùm speciatim illis morbis malignis debentur, ubi humor serosus freno indiget, ut in fluoribus quibuscunque cum febribus conjunctis, tunc enim maxima semper horum habenda est ratio. Et ex hac ratione consilium est, Tincturam bezoardicam constituere varij generis ingredientia, ut eò magis polychresta sit. Hinc eà occasione dicendi datà duo libabimus speciatim, Theriacam & Tincturas bezoardicas. Asseruimus cum *Platero & Waleo* Theriacam sine opio confectam sudorem non movere, duplici ex fundamento, tùm quod opium sudoriferum esse quotidiana testetur experientia, minimà nempe quantitate, uti datur, assumtâ, ægrotos in sudorem blandum & copiosum diffuere. Si ergò opium movet potenter sudorem ad gr. j. v. g. meritò eandem vim exeret in theriacâ id ipsum, siquidem hujus 3j. circiter gr. j. opii recipit. Hoc vero ablato, necessum est, destitui theriacam virtute tam insigni sudoriferâ. Tùm experientiâ, de quâ illud vulgatum notum est, unam experientiam plus valere, quàm centum rationes. Audiamus *Walaum* ipsum præeuntem, medicamenta sudorifera, *inquit*, pauca vera sunt, & inter hæc excellit opium; quod enim theriaca, quod mithridatium sudorem moveant, hoc omne ab admixto faciunt opio. Expertus ego sum, *addit*, hæc duo electuaria, absque opio præparata sudorem prorsus non movisse, *m. m. p. 65*. Ad sunt ergò duo immota hæc fulcra, ratio & experientia, nisi velimus negare

experientiam viri fide digni, eamque sublestem vocare, stabilitam tamen ratione. Cui accinit in *disqn. therapeut. Suvvalbins*, hoc est, *inquit*, (scilicet opium,) quo theriaca, quo mithridatium, quo diascordium, & pleraque antidota sudores præcipuè eliciunt. *S. 4. p. 89.*

Contra hæc verò sunt, qui assertum hoc negant, & ejusdem veritatem impugnant. Modestius paulò *Velschius in comment.* id negat, quod reliqua theriaca ingredientia videantur id satis præstare posse citra opium. Experientiam verò laudat in contrarium nullam. Idem facit *Hannemannus Tract. de inebriamentis p. 13.* concedens opium vi diaphoreticâ pollere, ast omnem vim diaphoreticam, quâ theriaca, mithridatium, diascordium prædita sunt, soli opio velle acceptam referre, esse postulatum nimis liberale. Ratio additur eadem; *multa illa electuaria ingredi, quæ sunt naturâ suâ diaphoretica*. Ad experientiam verò *Wale*, dicit: hæc electuaria fortè sudorem non provocant, non quia opium absuit, sed vitium fuit in assumentibus. Experientia verò itidem in contrarium assertur nulla. Sed respondemus, negando, in theriacâ esse naturâ suâ diaphoreticâ, quibus in 3j. vel ʒi. opij vim sudoriferam quas adscribere. Ponamus esse talia ex farragine myrrham, rad. mei, gentianæ, phu pontici, & terram lemniam, tot enim forte excerptis horum verò dosis tam exigua est, virtus tam pauca sudorifera, ut minimè sudorem istis adscribere queas. Nulla ergò insunt theriacæ diaphoretica seu sudorifera potius propriè dicta, nisi velimus hypothesein illam supponere, calida sudorem movere, quod saniores medici negant, neque enim *Vi*, piper, cardamomum, id faciunt, & fixâ contrarium testantur. Deinde experientiam viri probati negamus posse lubrui frustraneâ conjecturâ. Omnes nempe circumstantiæ reclamant. Assumpta fuit theriaca sudandi finè, nullum in hoc vitium esse potest vel fingi saltem adsumendum; non motus inde prorsus fuit sudor, neque hinc vitium adsumendis adscribi potest ullum.

Hæc de theriacâ. Quod Tincturas bezoardicas attinget, usu obtinuit hodiè, ut *M. S.* quasi basin præbeat his ipsis, unde & eadem vocari solet *veffel Bezoar. Tinctur*; ita ut nihil aliud videatur Tinctura bezoardica *Michaëlis & aliorum*, quàm *M. S.* tinctura & concentratio, mutuante Tincturam medicamento à sandalo rubro. Ut adeò quod theriaca & huic affinia sunt in formâ mediâ, pulvis bezoardicus in formâ siccâ, id in liquidâ sit Tinctura bezoardica, tantoque magis se commendat præ reliquis, quò magis constar, liquida citius penetrare & fundere humores, magisque adeò esse activa. Præter unum hunc modum Tincturæ bezoard parandæ, nempe citra extractionem specierum, Tincturâ aliunde veniente, vel peregrinâ sandali, vel extractorum bezoardicorum, alter quoque in usu est ex speciebus bezoardicis selectioribus, beneficio ω us bezoardici, (utrisque majoris vel minoris apparatus assumendis,) extractis, adeoque proprâ Tincturâ, vel adscititiâ innoxia, simul gaudentibus, de quo *vid. Schulz. Tract. de Tinctura bezoard.* Et posterior hic modus vel medius polychrestus est magis, utrique verò opiata refractâ dosi adduntur concinnè, juvandi & refrenandi virtute; ita enim rarefactionem & resolutionem nimiam infringunt, tutando sanguinis & seri vincula. Par ratio est acidorum, unde instar regulæ esse potest; acida & opiata bezoardicorum adjuvamenta esse certissima, exemplo *M. S. & theriacæ*. Exempli loco esse potest Tinctura bezoardica sequens: *ʒ. rad. zedoard. gentian. ver. angelic. anthor. contrayerv. carlin. bistorr. diptamn. alb. torment. scorzon. Ital. montan. vincetox. olivnit. a. unc. i. fl. galeg. (vel onobrych. sylv. fl. rubr.) vulmar. calend. scabios. rut. a. 3ß. sem. fraxin. card. bened. aquileg. rut. a. 3ii. bacc. parid. 3ß. cub.*

beb. gran. kerm. g. opobals. ā. ʒʒ. cort. citr. ʒvi. camph. myrrh. elect. ā. ʒi. croci ʒi. Conc. cont. g. m. Affund. — bezoard. seu ex ʒ extracti prioris, seu sambuci citratum, ē fl. sambuc. & cort. citr. &c. q. i. Cum per aliquot dies steterit in leni digestionē, add. — Sal communis striat. ʒii. sandal. robr. ʒiʒ. Tinctura saturata decantetur & exprimatur, servanda ad usum, in febribus continuis & malignis, variolis, morbillis, peste, pleuritide, febribus puerarum, doloribus capitis, erysipellate, dysenteria, inflammationibus, defluxionibus catarrhalibus, casu ab alto, & ubi alias sudore opus est, probatissimi usus. Miscetur per se cum subduplo vel subtriplo mistura simplicis, Tinctura anodynæ guttulis aliquot; cum alijs verò pro indicationum modulo variā.

Tertiò, ut opus est per dicta excludere seminum, tutari sulphur & sal volatile sanguinis; ita non minus tutandum est studiosè serum ipsum, adeoque bezoardica quoque sunt, licet itidem respectu priorum secundaria quasi, *qua seri defectum solantur*. Plurimi in hoc falluntur, qui unice expulvis illis utuntur, neglectis hisce; licet contra ea & in his excessus fieri possit,

Solantur serum substantificè humectantia, aquea temperata, aqua ipsa. Laudabimus hanc in rem non tam veterum morem, qui aquæ frigidæ potum in febribus maximi æstimantur teste vel uno Galeno, quàm locum egregium Georg. Hornij in arcæ Moysis pag. 124. Ab alcali, inquit, sitis est inextinguibilis, nisi per acida & puram aquam, crudam, incoctam, copiosissimè ingestam, etiam si vomitu, flammâ prævalente, regurgiet, donec aqua in stomacho remoretur; mox sequitur cessatio sitis, calor, sopor, sudor, sanitas intra 12. horas, quod ipse multoties in acutissimis febribus probavit. Præcipuam in eo consistere curam remedio, ubere frigidæ potu, citra ullam Venæsectionem & purgationem, asserit etiam ibidem pag. 150. Faciunt huc *aquæ scorzonera, sambuc. cord. Sax. frigid. galeg. bezoardica Rul.* aliorumque simplicium, ut *acaciæ, cerasorum nigr. &c. decoct. hordei c. CC. & scorz. julepi, potiones*, & ipsæ inprimis *emulsionēs*. Cum enim tunc & per rationem, calor velut Vesuvianus præsentiam, & *αὐροφλας*, si fiat V. S. deprehendatur sanguis spissus, colore cinnabarino vel alio sero omni quasi privus; quo sensu solemus dicere serum quasi omne incoctum esse, impossibile est, ut possit machina subsistere; quin hoc ipsum malignum est, & malignorum morborum multorum essentiale; meritò studendum, ut principium hoc vitale, serum, seu humidum acido subternatur. Quod nisi fiat, vigilæ deliria, deliria motus convulsivos, singula mortem inferunt.

Solantur serum acida, & inprimis nitrosa, quatenus illud fluxile reddunt, & sal peregrinum infringunt & temperant, v. g. *lap. prunella* inde nomen indeptus, quod prunæ huic vel fervori febrili conveniens sit, sal petrae ʒiatum, ʒlatum duplex, viâ siccâ & humidâ paratum, sal petrae perlatus, corallatus, saturnisatus. Hæc scilicet singula ardorem, fivorem, rarefactionem nimiam, adeoque seri consequentem defectum, exhalationem & incoctionem remorantur, vel saltem non promovent, fluxile illud reddunt, temperant, simulque resolutionem & ichorescentiam impediunt, quatenus sulphureas particulas & salinas volatiles sanguinis nimis efferatas coercent, obtundunt, diluunt, enervant & alterant.

Et speciatim in delirijs, ardore majori, & ubi inflammatio in internis metuitur, ʒla præstò sunt, ut in peste. Hinc cum in hac ipsâ *σάρις* facillè concipiat sanguis & carbunculos intentet, etiam interius,

ut ipso ventriculo, nitrosa quoque cum alijs fecere officium, si non immediate, tamen mediate veneno debita,

Pertinent verò huc & illa, quæ serum in motum cient, ejusque quietem & *σάρις* ac vappescientiam corrigunt. Eaque necessaria esse demonstrat effectus, v. g. in peste bubones, qui non aliunde, nisi ab hac *σάρις* seri in glandulis, eademque ob fermentantem vim attollentis, confiunt. Fieri quæ ipsam facile, non difficile est colligere etiam à priori, ob sal peregrinum viscidum corrosivum, unde illabitur promtè suis secericulis, non verò elabitur.

Par ratio est in malignis, quando vel ob hanc causam, vel viscidius serum sudor nullus à medicamentis etiam propinatis obtineri potest. Hoc casu & volatilia & fixiora profunt. Ex illorum censu sunt urinosa, ex posteriorum cinnabarina, utraque ex ipsissimâ hac ratione in peste utilissima. Hinc observatum est volatilia urinosa, nominata jam superius, in principio pestis summè fuisse proficua, & mediam quasi Tincturam bezoardicam, seu acidis extractis gaudentem, seu volatilem urinosa fecisse stenuè officium; nec minus cinnabarina, reliquis interpolata, ut ʒialia alia tacemus, Genim diaphoreticus, cujus præparationem ipse Paracelsus & Helmontius docent, non minimum in peste præstat. Novimus medicum, qui in peste Viennensi evasit & gloriam reportavit, ab adhibito talismodi medicamento ʒiali. Cum verò hinc alibi vel nimis sibi fideret, Deo forsitan non primariò in auxilium vocato, vel medicamento abuteretur, nec legitime æquè applicaret, saltim sibi ipsi, mori in rapinam cessit non minus ac alij. Quemadmodum enim, posita hac indicatione, seu hoc intuitu sudorem alias difficulter mobilem excitare cum successu licet; ita, ad ichorescentiam vel rarefactionem nimiam inclinante massâ sanguineâ volatilia, cinnabarina & ʒialia hæcce tantum abest, ut convenient, ut convulsionēs abigant, ut potius sudores adaugeant & nimios reddant, ultra sphaeram suam efferatis & diffatis humoribus.

De Legitimo bezoardica adhibendi Modo.

Sed prius, quàm provehamur ulterius & de hoc adhibendi bezoardica legitimo usu monita & cautelas addamus, illud facillè ex dictis pater, distinctionem esse summè necessariam inter bezoardica illam, de quâ mox plura, quâ in volatilia, media & fixa, non minus ac alia plura specifica, dividuntur. Hæc ipsa distinctio fundamentum habet in re, estque utilissima; nos verò h. l. non tam secundum materiale dividere eadem voluimus, quàm secundum medendi methodum simul, ut & pateat statim, quid agendum, & quomodo agendum sit in talismodi casibus, quæ vitam concernunt.

Hinc nota 1. *Ut diversa venena, ita etiam diversa sunt bezoardica.* Utraque penitus, quod annisi sumus, investigata & juxta se posita, quæ quibus convenient, monstrant magis. Nisi enim, quæ regula universalis est, inter indicans & indicatum, morbum & remedium, iusta intercedat oppositio, & oppositorum proportio, nullo modo morbus tollitur, quin sæpe augetur magis, & contra. Tribuat hinc unusquisque, quantum voler, Tincturæ suæ bezoardicæ, electuario Orvietano, pulveri bezoardico specifico, vel quibuscumque etiam centum alijs; Tinctura bona, electuarium bonum, pulvis bonus, æger moritur. Neque est quod quis dicere possit, in peste v. g. esse reverâ *τὸ θεῖον*, frustra esse singula, non adjutos à peste incipiente ullos, quemlibet suo fato mortuum; Verum enim est, si à peste evaderent plurimi, vel omnes, non pestem, sed benignissimum æstimandum fore morbum. Est enim de naturâ & c.

& essentiâ pestis, plures simul corripere & citius mori, quàm succurri ferè possit. Sed si fateri volumus quod res est, Deus & cum blanditur pater est, & cum cædit pater est; Unde & pesti suam, pro salute humani generis, in naturæ sinu locavit antidotum, quamvis non talem, qualem sibi vulgo imaginantur, vel ut postulatum impossibile fingunt. (Loquimur de causis & remedijs naturalibus, non Theologicis.) Quin hoc ipsum apparet ex naturâ veneni pestilentis. Torpidum hoc est, sed efficax; lentum, sed tarditatem, si tamen ita descendenda est sæpe, vel lentorem suum efficaciam suâ compensat. Non instar basilisci est, ut obtutu velut suo quemvis enecet, unde nec in aurâ venenum locatum est, sed in contactu vel quasi tali, in seminio propagabile unice, reliquis obstetricantibus solum. Sed habet se instar viperæ, instar arsenici, instar napelli, si rem rectè concipiamus. Vipera lentum est animal, quod tractari potest innoxie, modò caput prehendas, (quod vel centies experti sumus,) nec temerè nec timide rem aggrediaris. Arsenicum medela est, modò non hauriatur intro & sibi relictum; eadem ratio est napelli. Adeoque pro capto tractantis habent sua fata venena. Frustra sunt ergò & absurdi, sive è vulgo, sive ex medicis, qui unicornu aliquod, qui lapidem bezoar fingunt, omnium venenorum antidotum, qui medicamenta crepant, vel simplicia, ut à lapide serpentino confecta pocula, aliaque, quæ venenum omne pellant, ad præsentiam ejus statim sudant, nullum inadvertenter ad vitalia dimittant. Ludicra sunt hæc & superstitiosa vulgi figmenta, quod ipsum tamen velut promissuè per tot secula credit facile & decipitur, non minus ac assentientes medici.

2. Fluit ex his promptè, non esse confundenda bezoardica, cum in genere, tum in specie. In genere nemo non percipit, veneno corrosivo arsenicali non prodesse theriacam vel tincturam bezoardicam, nec morsui animalis crystallum, quem antidotum Oci statuunt; sed alia esse mineralium, alia animalium, alia vegetabilium antidota. Et licet sint bezoardica polychresta, pluribus scopis debita, nec illa tamen sunt confundenda & permiscenda temerè. In specie verò id valet in febribus malignis, fermentativo veneno magis conspicuis, & præcipuè in peste ipsâ. Mirandum non est, vel hoc nomine mori plurimos peste quod fidant his illis remedijs, pro probatis ab alijs habitis. Mori item febribus malignis affectos æquè ac peste non paucos, qui nedum medicamenta assumunt, sed corpus hosti exicendum exponunt istâ suâ negligentia, donec prostratis viribus medicinâ se opus habere, an habuisse, serò nimis intelligant. Ausim dicere, imò expertus asserere, jugulari posse febres ardentes, pestem, dysenteriam, aliove morbos epidemios in primâ herbâ, si statim ad primum mali sensum mederi liceat. Novimus virum satis timidum, qui sexies dysenteriam invadentem, quâ affecti erant domestici, & duo infantes, tories repulit extemplo, momento invasionis sumtâ Tincturâ bez. Nec minus exempla nota sunt, qui visitantes peste infectos passi jam vertiginem, lassitudinem & alia, sumto bezoardico volatili, Tincturâ bez. alcalisatâ, Mich. nostrâ, liberarunt se à præsentaneo veneno & periculo mortis. Si verò promiscuus usus non convenit bezoardicorum, facile patet, quid judicandum sit de pluribus hoc tempore editis scriptis, concernentibus regimen pestis præservandæ & curandæ. Sanè maxima pars, si non promissuè, tamen confusè hæc tradit: commissio legenti

negotio, ut eligat cui dicat medicinæ, Tu mihi sola places. Quicumque mederi vult tum alijs agris, tum à peste præservandis & curandis, debet omnino 1. distinctè, breviter, & clavis verbis exponere, quid, quando, quomodo agendum, ut nullum supersit dubium, ut sciat probè agenda patiens; 2. morbo conformia remedia, selecta, pauca & probata proponere, quæ juvent, non noceant; eaque 3. quæ diffusa sint nihilominus, pluribus communicabilia, citra pretij magnitudinem. Maxima enim intentio est mederi pauperibus, tertiæ ad minimum parti urbis vel pagi. Hinc & brevis sæpe schedula sufficit, neque usum habent ullum, (hunc quidem, quem intendunt,) exasciata & pluribus folijs constantia consilia, quibus lectis, plebejos indoctior redit, vel incertior agendorum.

3. Volatilia magis heroica, primò hosti opponenda, fixiora interpolanda. Ut in bello appetente hoste non levis amatura milites impetum sustinere, nedum retundere norunt, primus confictus est acerrimus, & turpius epicitur, quàm non admititur hostis; pariter in medicinâ se res habet cum bezoardicis. Brevi rem conficiunt priora, nisi morbus radices jam egerit & vitalia occuparit; quo facto nihilominus principem tenent locum. Ratio immota & principalis est, quia excludendum seminium morbosum, sive illatum, sive conceptum interius. Neque timendus est calor, productum ejusdem, brevi compescendus, modò exclusum sit peregrinum motum hunc excitans. Ratio secundaria est, quia citius subeunt, ætiora sunt. Exemplo sint variola, morbilli, malignæ febres, dysenteria epidemia, pleuritis, pestis ipsa. Mox inde vel tollitur morbus, vel mitigatur, vel symptomata ab obsessione foci vitalis orta, anxietas, respiratio difficilis, retrocessio bubonum, exanthematum præcaventur. Dato verò hoc stimulo, freno hinc moderamur archæum, ut non ultra quàm par est effractus, resistere queat. Fixiora autem reliquorum sunt subsidia, ut quies concedatur natura, quâ interruptâ facile fatiscit. Imò hæc absolvunt curationis reliquum, Media & communia sunt acida, fervori & seminio, ut & sero ipsi tutando, debita. Et ipsa quidem satis sunt efficacia, solis tamen illis principalem expellendi provinciam demandare non æquè licet. Utut enim aliquibus profuisse visa fuerint; potior tamen semper observata est volatilium, & quasi talium, medorum efficacia.

Cumquæ denuò exclusionis seminifici meminerimus, operæ pretium est addere, sive illud alienis debeat illatis, sive in proprijs undis, sive etiam, quod Helmontius & hunc sequentes volunt, ipsa sola terroris concepti idea generandæ pestis semen suggererit. Perinde hoc est, posito hypothesin veram esse; neque enim mutatur ob id curatio. Supponunt nempe, sæpe fidem experientiam fecisse, quod quis terrore solo pestem absentem sibi atque suis paraverit, attamen grassante peste, occurrentibus objectis, quæ ad terroris imaginationem conducant. Sed quando huc devenimus, certum quidem est, terrorem esse obstetricem, non æquè verò patrem pestis, cum experientia ipsa adducta sine dubio cum objecto illo terrifico, seu vitali, seu alio, seminium actuale non excludat, imò quam maximè foveat. Vel unicum exemplum sit, quod plures milites, successivè tunicâ induti eadem, peste correpti & mortui sunt, etiam nescij quasi fari prioris; quod cordatissimi, quique jam non semel pesti interfuerant actores, quos jam habitum contraxisse & consuevisse cum morbo putes, succubuerint tamen; quod contagium per plurimas domos sub initium grassantis luis deprehendi potuerit illatum, unde in solo ideali illo terrifico seminio si acqui-

acquiescere velimus, non æquè πάντοτε omnia ita patent, ut dubium relinquatur nullum, Omne id inde videtur ortum, quod seminium illud à priori non æquè notum sit, unde ex reali, ideale conceptum fuit, quod fugiens sensum nullum omnino fuisse reale creditum est. Ponamus vestimentum vel integumentum quodpiam peste infecti nescienti cuidam, unde sit, imò non credenti ab infecto tactum, offerri, quo induatur, uti toto die observatum est. Ille, disposito corpore ad recipiendum, certo certius peste corripietur, eandemque propagabit mox ulterius. Imo compertum, bruta, canes & feles, peste reverà obisse, arbores vicinas domui intermortuas & ariduram concepisse manifestam, quod Alsteri factum novimus.

4. *Ubi cumque volatilia contraindicantur, temperatis magis, vel illis parcius solum utendum.* Contraindicantur, ut sic loquar, ratione ætatis, ab infantibus, quorum sanguis texturæ est teherioris, ut faciliè efferrari nimis possit. Contraindicantur à gravidis, unde floribus Δ ris quoque, multò magis verò theriaca, ω bus \square nositis mitius utendum, ne in ὀργασμὸν ruat sanguis, & menses cum abortu & vitæ periculo consequantur. Unde & hic valet, gravidam morbo acuto, ob hanc ipsam causam, corripì, lethale esse, quod aliquoties observavimus. Contraindicantur à debilibus, pulsu frequenti & rarefactione intensâ, quam hoc ipso non corrigere licet. Ubi obiter notamus, pulsum frequentem in febribus malignis, si statim à principio talis sit, plerumque esse funestum. Contraindicantur à fluoribus sanguinis, quando ob dictam rarefactionem nimiam resolvitur in hæmorrhagias, in menses nimios, in sudores. Media inter hæc est Tinctura bezoardica, cui vel ob hanc quoque causam commodè maritantur anodyna. Verbo, ita semper stimulo opus, ne frenum negligamus debitum; ita freno, ne stimulum adimamus expulsiuri archei.

5. *Bezoardica sudore non æquè rigorosè continuando faciunt officium; sudor verò ab impellente externo vel frustraneus vel noxius.* Observatum fuit sudore imperato nimio, ultra εὐπορίαν scilicet, ægros malè habuisse in peste ipsâ; in variolis verò suffocatos ægros, tantoque magis, si crucientur continuo udore; neque gutta potus, quod perabsurdum est, concedatur; cum tamen potu levetur sudor, & promoveatur magis, fitis verò sudore multo profogetur, ut loquitur *Helmontius*. Quodcunque nempe sudoriferum non valet fermentum peregrinum expellere, internum vel externum potissimum, illud non adæquatum morbo, quin exitiosum est. Pulvis cardui benedicti, rob sambuci, C. C. usum &c. debiliora longè sunt, quàm ut iis demandari possit tam ardua provincia. Quodcunque verò privat nimis sero suo sanguinem, itidem damnosum est quàm maximè. Hinc solemus, quod jam monuimus, impetare quidem sudorem primâ vice, sequentibus verò præbijs non item, potiunculis verò aliisque humectantibus domesticis solari defectum seri.

6. *Bezoardica etiam magni nominis citrà rationem adhibita infida sunt presidia.* Non tam scilicet occulta qualitas venenorum spectanda, quàm certa & indubitata læsionis ratio. Quod nisi fiat, andabatarum more pugnamus, & experimenta per mortes facimus. Sit sua laus viperinis, ut bezoardicum animale audiant; vel horum affinibus serpentinis, quicquid præstant, faciunt temperatâ mucilagine, cui \odot volatile immersum later. Neque enim, ut mors per serpentem irrepsit, ipsa quoque per serpentis mortem, seu medicinam vindicatur. Vid. *Helm. Tum. pest. p. m. 890. & antec.* ubi & Hippo-

cratem hoc uno soldo arcano, carne viperinâ vel colubrinâ, exiccatâ & pulverisatâ, divinos sibi honores acquisivisse scribit. Lapis bezoar uterque sit venenorum antidotus, modò sobriè de eodem iudices in applicando. Est enim præcipitans, temperans, cui non dubitant recentiores lapides quoscunque alios, equinos, humanos &c. conferre, si non anteposere. Unicornu quoque vim contra araneas, & alijs modis utcunque probatam non vilipendimus, sed intra modulum activitatis suæ conclusam, non ultra.

7. *In dubiis mitiorem & tutiorem sequimur viam.* Cum itaque & bezoardica quædam malè audiant & suspecta, præstare eadem ex antidotis omittere, prostantibus melioribus. Idque tum in se bonum & necessarium est, tum propter calumnias inde faciliè & imputationes consequentes. Novimus sartorem empiricum usu nucis vomicæ non paucos liberantem tertianarios, hinc necis inquisitionem subisse, cum pro viro ægro idem peteret scæmina malefica, ipsi verò hæc venenum aliud porrexisset, & culpam in medicamentum hoc derivaret.

8. *Principis si ullibi, sanè in peste obstandum & febrium insultu.* Omnis hæc mora periculosa, omnis dilatio mortifera. Hinc ipso invasionis momento maturè sumenda antidotus prius, quàm cibus capiatur, vel somnus ineatur, utroque enim casu promptè vitæ subit malum, radicesque agit, vix nisi cum morte finiendas.

9. *Corpora impura quò magis volatilibus agites, eò magis laferis.* Summatim enim opus omnino est cautelis pluribus in usu bezoardicorum, quæ omnes tamen in proportionem agentis ergà patiens, veneni & antidoti, indicantium & prohibentium, vi universalis medendi methodi consistunt.

De Antidotis Specialibus.

Quæ hæcenus diximus de effectu & remedijs venenorum in corpore, eadem quoque illustrari possunt, si antidota suis venenis opposita breviter spectemus. Duo verò monita circa hæc attendemus, factâ duplici divisione: Aut enim 1. Venena sunt incognita, aut nota; 2. Aut mineralia, aut animalia, aut vegetabilia.

Incognita si fuerint dubijs effectibus, faciliè tamen dignoscendis, si vel agendi modum intueamur, an ardore circa ventriculum sint infamia, an vitalia magis pefant, an stuporem vel quasi inducant turbulentum; lex generalis in scholis medicis obtinet, ut communi potius expulsiivo vel defensiivo utamur, quàm nullo. Notis verò sua quibusvis opponenda remedia; debita qualitati excessivæ & corpori vim inferenti.

Non temerè credendum, ut de venenis sic de antidotis quoque scribentibus, unde, vastitas maxima & confusio cum ignorantia enata sunt.

Inprimis ergò ex dictis superius, hypothesibus ad triplicia venena, triplex erit antidotorum ratio, & quidem VENENIS MINERALIBUS generalem præbent antidotum, *quæcunque corrosivitati sunt opposita*, adæquate vomitoria, quæ exturbando maturè operationem illorum sufflaminant & impediunt statim. Opposita corrosivitati duo laudantur & celebria usu sūt, (1.) pinguis, quibus inviscari & obrundi particule acres, saline, quibus & oblini parietes ventriculi possint, itaque defendi ac muni, v.g. oleum amygd. d. butyrum, hoc prætervativè, illud & curativè. Hinc tum ad operationes metallicas commendatur panis butyro illitus, ut sumatur prius, quàm labores ineantur, tum ad chemicas quoque diatas; aliasque idem multis consuetum est.

(2.) Præcipitantia & acorem corrosivum infringentia, quo nomine crystallus à *Sennario* alijsque, tanquam unica & præcipua antidotus, contra \square acrum & \odot ocum, quæ instar omnium sunt,

sunt, ut & contra ∇ laudatur, quo de exemplum habet *Heerus*, & nos observavimus & curavimus quoque studiosum, qui istam locò ∇ ni hauserat, (1.) dato pulvere crystalli præparatæ, (2.) emulsionis temperante, (3.) jusculo avenaceo &c. Commendatur verò ad 31. pondus cum oleum amygd. d. Idque tanto magis, quod eadem crystallus porracei ac æruginosi humoris, seu bilis acido confermentatæ, proprium & præcipuum habetur remedium à medicis probatoribus, quos inter præcipui sunt *Lang. in Epist. & Fr. Valeriola lib. 4. enarr. 3. p. 536.* & *Poterius* tribuit crystallis naturam famelicam vel esurinam, quâ aliorum acrimoniam vel aciditatem in se absorbendo, egregiè se saturent, *pharmac. spag. l. 2. p. 523.*

Notanter verò addendum est, habere quidem locum & prodesse crystallum in leviori casu, minus in graviore, neque enim subigi vomitu non eductum medicamentum æquè hoc opposito remedio potest.

Sin alia quoque metallica venenosa qualitas, velut extraordinaria vel comitans, sit corrigenda, iidem hæc præsidia habent locum, non neglectis tamen tunc universalibus quoque antidotis; quando in alteram classem communem quasi fermentativorum secedunt, vel potius accidentariò seu secundariò conjunctam habent. Legi hanc in rem meretur liber egregius. *Samuel. Stockhæusij de Lithargyrii fumo noxio morbifico, ejusque metallico frequentiori morbo, vulgo dicto die Huttenkafze, odor Huttenrauch*, in quo probare satagit, morbum, obstructionem alvi tanquam præcipuum symptomati conjunctum habentem, non fieri ab arsenico pag. 28. non à mercurio, nec à Sulphure vel vitriolo, sed unice à fumo Saturni. Speciatim verò pingua per os præbita felicissimè operari; Id, ait, hæctenus luculentissimè comprobavit experientia, pag. 104. Et in appendice de *Asphm. montano* pag. 50. oleosa & pingua unice latius commendat.

Reliqua hujus classis pro speciali noxâ, quâ agunt in corpus, etiam specialia habent antidota, quod in reliquis quoque dicemus regnis. Sic *Œæa* cuperosa ventriculum exsolvens vis antemeticis, inprimis acidis, corrigitur. Curavimus fœminam quæ grossum deglutiverat, spiritu *Œis* subinde dato, unde conquevit feliciter sapor cuperosus in ore; alia accidentia. Idem valet de saturninis, uti exempla plura collecta dedimus anno III. *Ephem. Germanic. obs. 141.* Tacemus *Œalia* & alia minorum gentium.

VENENIS ANIMALIUM optima sunt, quæcunque fermentativum venenum illatum explodentia activiora, & secundariò acida figentia. Sic demorsus quis sit à viperâ, cane rabido, araneâ, extemplo dentur theriaca, Tinctura bezoardica, oviætanum, ut arceæ. ut fermentativa vis, etiam in minimo consistens. Utque hæc interius conveniunt, ita & pars affecta statim confimili sine curanda, eluendo vulnus theriacalibus, rutâ, Aceto &c. quod superius jam innotuit.

Not. verò (1.) diversa esse venena animalium, ratione graduum & lacerandi modi, unde & alia aliis facilius superantur antidotis, tantò magis verò curanda vel attendenda noxia vis, quantò est major ipsa. Sic non confundendum est venenum serpentis & viperæ, inprimis fœminæ. Siquidem mas duos habet dentes uncinos, fœmina quatuor, qui quantum lacerare vel aculeo suo possint, faciliè ex autopsiâ colligi potest.

(2.) Proprio antidoto, ex lacerantibus animalibus desumpto, fidendum æquè non esse. Solent curationis loco, tum præservationis quoque hæc talia commendari, ut per symbolismum seu magneticam suam similitudinem auferatur venenum, appositâ carne v. g. canis rabidi, vel, quod nonnullis placuit, jecore ipso come-

sto. A particulari enim & hoc loco ad universale non valet consequentia. Deinde & hæc causæ & remedia probè examinanda. *Œo* scorpion. ad proprios istus laudatur, sed magis ut remedium secundarium; demulcens partem, quod omnia pingua faciunt, non neglectâ theriacâ; scorpionum etiam venenum respectivè mitius est, unde videmus innoxie oleum assumere quamplurimos in calculo & aliis. Nec ineptum fuerit statuere sal volatile animalis oleosum, aliis sibi relictum venenosum, ob hanc olei olivarum additionem alterarum vires fortiori discutendi majores, sive insignes. Si causam attendamus, res clara est.

(3.) Carnem viperinam in specie talismodi magnetismo non pollere. Utur enim agat in corpus, sit sudoriferum & demulcens remedium eg. egium, debilior tamen est, quàm ut sola fermentum peregrinum excludat, citra additionem aliorum. In carne viperinâ non consistit venenum; Ergò nec id ad trahere potest, multò minus verò præservat, ut à morsu tutus sit, qui eum pulverem sumserit. Fit id omne, si feliciter res cadat; peraccidens, quatenus audaciusprehendunt illa animalia, & quando eadem offendunt torpidiora, non irritata prius. Consultuimus sæpius captores viperarum, an ullum aliquod deprehenderint inde auxilium vel præservativum, sed semper asseruere contrarium; cautiore & candidiores. Magis astu, quàm fortitudine, seu audaciâ apprehendendi promiscuè, capiuntur hæc bestiolæ; Unde opinio hæc orta sine dubio ab illo putativitio experimento, quod serpentes ceperint innoxie, præsumto serpentum pulvere. Ista verò vanissima est persuasio & fallacia, serpentum enim venenum respectu viperarum quasi nullum est, unde serpentum captor quæsitus, num revera hoc fretus pulvere assumpto tractaret innoxie serpentes, an vero per se magis innoxii sint serpentes, accedente præsertim, per consuetudinem, habitu & audaciâ majore; falsus est, hoc ipsum posterius esse verissimum, & hanc in rem iussit tunc imitari hoc ipsum. Qui verò confundunt viperam cum serpente, hæc maximo cum suo periculo experiuntur quantum distent. Insignissima quædam persona cum serpentibus tractandis assueta esset, offensam viperam cordatissimè prehendit, putans tutam se fore, quod perinde esset an serpens an viperâ caperetur, sed inflatum vulnus gravissimè post se symptomata trahens, cum metu gangrænæ ipsius, aliud docuit.

(4.) Neque etiam magnetibus venenorum aliis tutum fidendum esse. Non solum *Galenus* dudum lib. 1. de facultat. natur. cap. 14. scripsit, dari medicamenta nonnulla, quæ venenum eadem ratione attrahant, quæ magnes feritum; sed & recentiores non pauci id asserunt promptè & experimentis id demonstrare conantur. Inprimis laudandi sunt lapides serpentum Indiarum orientalis, quos Cobras de Cabelo dicunt Lusitani. Hos tanquam probatæ fidei experimentum inservire statuunt, & securissimi antidoti loco, si imponantur morsui viperarum, aspidum & quorumcunque aliorum animalium morsu vel istu interficientium, & vulnere sagittarum venenatarum. Adhærere lapides applicatos tali vulnere tenacissimè, nec prius dimoveri, quàm omne venenum sugendo imbibierint, quo facto suâ sponte soluti in terram cadant; omni deleta veneni caractere. Describit hos ipsos cum dictis latius & depictos exhibet *Fr. Redi in experim. natural. par. 5.* & contra *Kircherum* aliosque experimentis certis demonstrat, tum nullum in istis lapidibus subsidium adversus venenum viperarum & scorpionum esse, pag. 14. & 80. tum eosdem tenaciter vulneribus æquè venenosis ac non venenosis adhærere, pag. 86. Hæc ipsa cum sint verissima, & à viro docto & peritissimo scrutatore rerum naturalium profecta, non dubitamus

bitandum de eo amplius est, quicquid etiam alij in contrarium statuunt. Nullibi obscurior veritas, quam quæ ex longinquo adfertur.

Speciatim *cantharidum* antidotum præsentaneum præbet lac, nativum & artificiale. Si minori dosi dentur, benè est, neque effectus sinister inde timendus, ut in rot. stimul. Mynl. sin paulo majori dosi idem fiat, ardor urinæ, & mictus cruentus ipse promptè inde confurgit, quale exemplum *Langius l. 1. epist. 47.* unà cum curatione recenset, id quod ipsi quoque nos cum veritate respondere, experientiâ comperimus.

Similium verò aliorum, & in quibusvis Regnis, eadem est ratio, neque enim nostri instituti ratio patitur, ut ad omnia jam digrediamur amplius.

Denique VENENA VEGETABILIA principaliter acida, adequatè reliqua domant. Effectum puta venenosum præcipuum, vaporosum, & consequenter quoque inde producta alia, exceptis specialiori conjunctâ qualitate gaudentibus. Acida quippe, maximè crucibulum simpl. & destillatum sulphur vaporosum domant, mucilaginem peregrinam annihilant, & conjuncta symptomata alia tollunt.

De *helleboro* verò aliisque, speciali noxâ aliâ infamibus, non attinet plura addere. *Wedelius.*

Plura de ANTIDOTIS vid. subtitulò *Bezoardica.*

VENEREA. MEDICAMENTA & ANTIVENEREA, vid. *Aphrodisiaca.*

VENTREM SUBDUCENTIA, vid. *Purgantia.*

VENUS, vid. *Æs.*

VERATRUM, seu ELLEBORUS ALBUS.

Helleborus, autore Etymologo, Græcis dicitur *παρα τοῦ ἐλαίου τῆ βορῆς*, quod esu perimat. Veratrum latinis dictum volunt quòd mentem vertat.

Scribitur & *ἐλάβερος*, sine aspiratione.

Duorum generum est, albus & niger, hi quamvis nomine, & aliquatenus etiam viribus convenient, facie tamen externâ minime, unde & toto genere nobis differunt.

Flore sex foliolis constructo, semine triquetrum cum lapatho convenit; ab eodem differt folijs nervosis, tenuioribus, lirate striatis & velut plicatilibus; radice fibrosa, purgatrice, emeticâ & sternutatoria vi prædita.

Nomina. *Helleborus albus* Ger. *J. B.* albus vulgaris *Park.* albus flore subviridi *C. B.*

J. B.

Helleboro albo radices subsunt fibrosæ, albæ in caput collectæ: caulis bicubitalis interdum, teres, folijs stipatus quorum pediculi caulem involvunt, sunt vero ipsa folia formâ quidem quodammodo plantaginea, vel potius gentianæ similia, longitudine vero pedali, haud multo angustiora, mollia, liris densissimis striata, & veluti plicata, subhirsuta. Caulis à medio ferè ad cacumen usque ex foliorum quorundam parvorum alis Thyrsos emittit palmares & sesquipalmares, florum creberrimorum, senis ex herbaceo albicantibus foliolis radiatis constantium; quibus succedunt semina parva, longiuscula, triquetra, albicantia nuda, nec ullo præter florem folliculo aut vasculo tecta, ut rectè *Parkinsonus.*

Locus. Gaudet veratrum album montanis & asperis; non modo in Græcia, Italia, aut aliis calidioribus regionibus; verùm & in Germaniæ ac Helvetiorum montibus viret, nos in montosis pascuis palustribus propè summitatem montis *Jura* offendimus copiosissimum.

Vires. *Hellebori albi* radix (quæ sola hujus plantæ pars in usum medicum venit) ob violentiam purgationis quam per superiora ac inferiora movet, usum purgandi internum soli ferè *helleboro nigro* reliquit. *Schrod.* potest tamen (inquit *Tragus*), per viginti quatuor horas vino aut oxymelite macerata, posteaq; reficcata, 3ß. pondere cum vino exhiberi furiosis & melancholicis, *helleborum* utrumque, dicit *Gesnerus*, (si cum aceto & melle temperetur & decoquatur ut syrupus fiat) medicamentum innoxium, & ad plerisque phlegmaticos morbos (thoracis & capitis inprimis, ut asthma, dyspnœam, Epilepsiam) *πολύχρηστον* sæpè utilissimè se expertum esse: alvum enim, urinam & meatus omnes, etiam cutis, mirifice nulla molestia expurgare.

In usu *hellebori albi* (inquit *C. Hofmannus*) duo præcipuè videnda, alterum ut morbi sint perinacissimi, alterum ut vires consentiant, hinc non debet radix hæc seni, puero, scæminæ, ullivè delicato dari. Accedit tertium, nè quidquam fiat nisi prægressa & corporis & *hellebori* diligenti præparatione.

Vetustissimus mos est dandi cum raphano, idque tripliciter, vel enim raphanum radicibus transfixum in oxymelite infundebant, & oxymel solum offerebant: vel raphanum ita habitum per noctem relinquerebant, manè abjectis *helleboris* in oxymelite infundebant, oxymelque propinabant: optima ejus præparandi ratio (inquit *Parkinsonus*) est ut succo mali cydonii infundatur, aut cydonio indurata in furno aut sub cineribus coquatur, quin si ab *helleboro* sumpto strangulationis periculum imminet, cydonia comesta eorumve succus aut syrupus præsentaneo remedio sunt, radix in aceto decocta, ac in ore aliquandiu tentata dolorem dentium tollit: in lixivio decocta, si eo caput abluatur, pediculos & furfures enecat & abstergit. Idem unguento aliquo permixta efficit: scabies, impetigines, serpigines sanat; animalia pleraque interimit talpas, mures, lacertas, aves, &c. in pasta exhibitæ, *Trag.*

Pulvis naribus inditus sternutamenta movet, unde & anglicè... id est, sternutamentaria herba seu pharmaca dicitur.

De Hispanorum Toxico ex succo radicum in vase fictili fermentato confecto, quo sagittas intingunt ut vulnera insanabilia infligant, contule *Parkinsonum*, & *To. Langium* *Epist. medicinalium lib. 1. Epist. 68.* maximè mirum alicui videri possit, quod venenum hoc epotum nullam saltem lethalem noxam infert, sed tantum vulnere infusum, adeoque sanguini permixtum; verùm idem est de veneno viperino, quod intro assumptum nullâ perniciofa symptomata inducit, verùm Sanguini immixtum per vulneris aut puncturæ orificium maximas illico *Tragadias* excitat, & in opportunis remediis occurratur, brevi animal interimit.

Cæterum *helleborus* uterque in furiosis & insanis sanandis olim fuit celeberrimus; neque nunc nisi in morbis magnis, ut Epilepsia, vertigine, mania, hydropse, ischiade, convulsione & similibus adhibendus est. *Rajus.*

VERBASCULUM, vid. *Primula Veris.*

VERBASCUM.

Verbascum nonnullis quasi *Barbascum* dictum putatur; quia folia ejus pilosa sunt; Italici enim *Barbasso*, & prima species vulgo *Tapus Barbat* dicitur, *Plinius* à *Verbena* deducit. Græcis, *φλόμος* appellatur, ἀπὸ τῆς φλογὸς à flamma, quod ejus folijs & caulibus in lanternis pro ellychniis uterentur.

Notæ ejus sunt folia in caulibus alterna, flores in Thyrsis oblongis conferti, non horizontaliter siti, sed potius ad horizontem perpendiculares; capsulæ bivalves conicæ aut Turbinatæ.

Vires. Verbalcum [summitates & lanugo] in hæmorrhoidum doloribus à Godartio & Riverio, item à Dan. Sennerto & Weikardo commandantur.

Taplus barbatus specificum est contra tympanitem, autore Grembs.

Verbalcum primum præcipue utile est in morbis pectoris, tussi, expuitione sanguinolenta, torminibus ventris. Ad pulmonum affectus in jumentis & vaccis à veterinariis nostris adhibetur, unde nostratium vulgo id est pulmonaria vaccarum appellatur. Extrinsecus flores & folia præcipue æstimationis sunt in sopiendis doloribus quibuscunque, imprimis in affectibus ac tumoribus ani, hæmorrhoidibus, in capillis luteo colore tingendis Schrod.

Hujus folia plantis pedum nudis intra calceos supposita, paucis diebus ante debitum purgationis tempus mentes remorantes leniter movent & educunt. R A I V S.

VERBENA.

Verbena ἱεροβοτάνη, Grammaticis quasi herbena quia qualibet herbam in sacris usitatam significat. Verbena, autore Plinio, quoddam Jovis mentem verrendam præparandamve ad sacrificium adhiberetur. Vide Plin. lib. 22. c. 8. & lib. 25. c. 9.

Hierobotanæ live *herba sacra* dicitur, quia autore Dioscoride, in lustrationibus suspensa alligatave felicem habeat usum. Aded autem usitata erat hæc herba in sacris apud Ethnicos, ut ejus nomine [ut diximus] uti solebant ad quamlibet herbam in sacris utilem significandam; ut unanimiter cum Servio testantur omnes Critici & Grammatici.

Plantam hanc ob notas genericas communes, nimirum folia in caulibus ex adverso bina & semina ad singulos flores quaternaria, nec non dotes monopetalos mentha æmulos, ad verticillatas retulimus.

A congeneribus differt foliis rugosis, laciniatis & floribus in specieis longissimis angustis, nullis intermixtis foliis.

Vires. Verbenæ plurimas virtutes attribunt veteres; quas summatim recenset Schroderus Cephalica ac vulneraria est. Usus præcipue in dolore aliisque affectibus capitis à frigidis humoribus, in affectibus oculorum & pectoris, tussi inveterata: in obstructionibus hepatis ac lienis, ictero, torminibus ventris, dysenteria; imprimis atterit & expellit calculum, libidinem coarctet, febrem tertianam fugat, arthritidem mitigat, vulnera sanat, partum faciliat; extrinsecus in cephalalgia, odontalgia, alopecia, melancholia; in oculorum lippitudine, imbecillitate, rubore; in angina, raucedine, [collo circumplasmata:] in tumore glandularum, in faucibus [gargatis.] In dolore lienis [cum axungia porci] ac podagrico mitigando; in ulceribus adstrindis, ac putridis abstergendis; in procidentia ani, mariscis, &c.

Cum tot viribus polleat, quid mirum tanto eam olim in honore fuisse, ut herba sacra dici meruerit. Ad lienis tumorem ℥. Verbenæ contusæ cum album. Ovorum & farina hordei aut frumenti, fiat cataplasma; linteo raro involutum & applicatum supratumorem attrahit quasi sanguinis tenuioris portionem: quidam addunt betonicam, est popolare remedium, Chelneau.

Verbena Capiti vel sub pulvinari imposita, vel fermento acerrimo & oleo rosaceo in emplastro subacta Capitis dolorem à vino ortum levat. E. Dol. l. i. c. 9. S. Ib. D. Soame. R A I V S.

VERMES, vid. Lumbrici.

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

VERMES NECANTIA, vid. Anthelmintica.

VERMICULARIS, vid. Sedum.

VERNIX, idem est quod Sandaracha;

De qua vid. sub proprio titulo.

VERNICES ARTIFICIALES

Vernices, nil aliud sunt, nisi mixtura vel potius solutio- nes corporum solidiorum valde plana & aquali superficie prædictorum, quam aliis postea communicant corporibus duris, asperis, & inæqualibus. Dantur insuper & talia corpora, quæ post levem suarum vel utilium partium fugam corpuscula magis solida & terrestria post se relinquunt, superficiem aliorum corporum obducunt, eandemque levem reddunt, ut ol. lini, nucum, papaveris alibi &c.

In earundem præparatione hæc præcipue observanda:

1. Ut corpora solvenda sint rigida & fragilia, quam consistentiam in ipsa solutione debent retinere.
2. Ut menstrua adhibenda pro solutione, ex parte, vel ex toto sint volatilia, relicto corpore plano, solido, duro.
3. Ut pulvres ingredientis sint in minima copia, vel ut plane dispareant, ne minus aqualis & lucida reddatur superficies.

Secundum hanc normam sequentes satis egregiæ sunt Vernices ad quæcunque corpora obducenda; hæc tamen cum observatione, eo magis tenuem & limpidam debere esse Vernicem, quo corpora vel eorundem color sunt magis albicantia aut variegata.

Vernix.

℥. Ol. lini ℥j.

Litharg. aur. opt. pulv. ℥vj.

Macerentur, aut potius insolentur simul in vase plumbeo aperto per aliquot septimanas, donec plane limpidum & clarum appareat oleum; crusta in superficie apparentes quod ad usum reservetur.

Alio modo.

℥. Olei Lini ℥j.

Coquatur super ignem, donec spuma dispareat, postea sensim injice frusta aliquot exigua panis, sic plurima spuma & ebullitio observabitur, mediantibus particulis aqueis, oleosæ crassæ de loco pellentibus. Remotis dein trassulis adustis insperge oleo calcem quamcunque plumbi sicciorum ad drachmas duas vel tres, ab igne tunc remotum subsideat & frigeat oleum, ab acido sale liberatum, & quodammodo illa calce soluta repletum.

Vernix è Succino.

℥. Succini fragment. q. v.

Liquefiat in retorta vitrea, donec sal volatile ascendat, & frigidum in pulverem vertatur, qui tribus partibus olei immediate præcedentis inspergatur. Coquantur simul in MB. per horam unam, ultimo addatur drachma una vel altera Vitrioli albi leviter calcinati. Oleum frigidum nigricantis coloris dicitur Vernix; hæc, si crassior extiterit, cum media parte Sp. Tereb. dilui potest ad usum.

Vernix è Mastiche.

℥. Mastichis elect. ℥B.

Ol. Terebinth. subr. ℥ij.

Creta calcinat. ℥j.

Committantur omnia Vitro in MB. bulliente per horam unam, dein super natans limpidus liquor decantatus usui servetur in vitro clauso.

Eodem modo è Sandaracha &c. præparatur.

R. 12

Vernix

*Vernix de Gummi Copal.**℥. Terebinth. Venet. ℥ij.**Gum. Copal. lucidi ℥j.*

coquantur simul, donec consistentiam fragilem acquir-
verint, massâ planè transparente;

*℥. Hujus Massa ℥j.**Ol. Tereb. tenuis ℥ij.*

Coquantur in MB. per horam semis, dein adde Vitrioli
albi calcinati ℥ij. & post subsidentiam refrigeratum li-
quorem à fecibus separa.

*Vernix Japonica.**℥. Gum. Lacc. depurati ℥j.**Sp. Vini optime rectif. ℥j.*

In subtilissimum pulverem vertatur gummi, optimeque
agitetur cum Sp. vini primâ horâ ter vel quater, dein sin-
gulis duabus vel tribus horis, ne coalescat, tertio die ad
usum citissime coletur per pannum, ut in artissimè clau-
so vitro reservari possit.

Si *Colorata* expectatur, attamen *limpida Vernix*, prius
pro *rubro* extrahatur tinctura à sanguine draconis, tanta-
lo rubro, cocco &c. pro *aureo* & *flavo* ex croco, curcu-
ma, aloë &c. Hi colorati spiritus solutioni laccæ post-
modum inserviunt. Ut *colores* amariore, & *magis refie-*
centes reddantur, *folia metallica* subternantur, ex g. au-
ri, argenti, cupri, stanni &c. LE MORT.

VERNICES SINENSIS varia Præparatio
ex REVER. Athanas. KIRCHERO CHINA
Illustratâ.

Gummi quod *Cié* vocant Sinenfes stillat ex arbori-
bus, & haud ab simile est lachrymæ quam Terebinthus
apud nos fundit. Æstate colligitur, purgaturque à Si-
nis, & quò volunt colore inficiunt; optimum quod au-
reo flavescit colore judicatur, proximum quod nigerri-
mum, cum nondum siccatum est, venenatam quandam
emittit exhalationem, cui inassueti intumescunt, & pal-
lescunt vultu: Nam remedio, quod ipsi soli norunt,
non statim adhibito, in phthisin lapsi, lenta paulatim ta-
be moriuntur; remedium tamen sub initium morbi fa-
cilè paratum habent, antidotum infallibile. Res materia-
les istiusmodi gummi, sive vernice illitæ; tardè, nisi in
humido sint loco, siccantur; ubi tamen exsiccatae fue-
rint, nunquam amplius liquefactum defluit, quàm au-
tem res sit elegans, jucunda ac splendida, jam dudum
Europa ex capsulis, quæ ex *Sinis* quotannis adducuntur,
didicit: Et quamvis multi ex *Europæis* hucusque allabo-
raverint, Vernicem similem præparandi, nemo tamen
hucusq; inventus fuit, qui perfectionem artis attigerit;
venit tandem *Romam* ex ordine S. Augustini, Pater Eu-
stachius Jamart, Ordinis Sancti Augustini Religiosus,
qui vernicem tam dextrè apparare novit, sive propria
inventione, sive ab aliis ipsi communicato invento
nescio, ut in rerum eò tinctarum à *Sinarum* artificio, ni-
tore rerum & splendore in nullo discrepare, visus sit:
Verùm ut is mecum multoties de novarum, arcanarum-
que rerum reperiis, quàm familiarissimè amicissimèque
versatus est, ita quoque reciproca arcanorum communi-
catione, illud suæ Vernicis Secretum communicare non
est dedignatus: uritur ipse gummi quodam si non idem
cum Sinico, saltem non disparis conditionis, quod *Gum-
mi Laccæ* vulgò vocant, & ex arboribus Indiæ colligi-
tur, non ut nonnulli ridiculè sibi persuadent, à formicis
collectum, etuctatumque, sed arbóri à Natura insitum;
colorem ei admiscet, sanguinem Draconis vocant, ex
quibus deindè tincturam extrahit, per menstruum spiri-
tus vini sæpius rectificati; atque hoc pacto nitidissimas,
politissimasque res conficit, Verùm cum multi hujus
arcani desiderio teneantur, ego totius rei processum sin-
gerè & Germana fide & candorè, ad bonum publici

emolumentum, ne unâ cum pereunte authore, & ipsum
intereat, prodendum duxi. Ita autem res se habet.

Confectio Vernicis pro poliendis variis rebus.

A. 1. Recipe Gummi Laccæ benè purgatum (de
quo infra) hoc ponatur in vase vitreo ne frangatur, sat
capaci.

2. Huic superaffundatur Spirit. Vini optime rectifi-
catus ad quatuor digitorum eminentiam.

3. Uno vel duobus diebus digeratur, indies liquorem
in vase spatula agitando ne gummi vitro adhæreat.

4. Hoc peracto, illud per linteam transcoletur, idem
digitis exprimendo in vitreum aliquod strictioris
colli vasculum.

5. Hoc in digestionem pones in loco calido, vel balneo
cinerico moderato per 24. circiter horas.

6. Et comperies Vernicem intentam supernata relin-
pidam, prorsus & diaphanam, quam per inclinationem
decantabis. *Atque hac est Vernix rebus poliendis desti-*
nata.

Purgatio Gummi Laccæ.

H. Gummi Laccæ, ubi variis quisquiliis mixtum
repereris, ejus purgatione opus est, ita autem proce-
des.

1. Separandum est gummi à ramulis suis, quibus ac-
crevit.

2. Hoc separatum in mortario contundendum non
omniò in pollinem farinaceum, sed in pulverem gra-
nitum.

3. Ponatur hic pulvis in crassiori panno, *Pezzo* vo-
cant, eique adjungantur aliquot fragmenta Saponis, seu
Smegmatis puri & defœcati, deindè hoc intra concham
aquâ limpida refectam integrâ nocte immersum relin-
quatur.

4. Postero die exemptus sacculus unâ cum imposita
materia agitetur tam diu donec rubedo seu tinctura ru-
bra exeat, quæ addito nonnihil aluminis, absque tamen
Sapone, ad varios usus conferretur: quod verò in sacculo
manet, est Vernix illa purgata, quam deindè in usum in
Recipe A. præscriptum applicabis.

*De modo imbuendi bacculos cateramque
suppellect. lem.**Vernix Rubra.*

4. Recipe Lachrymam Sanguinis Draconis melioris
notæ, quam dissolves in Vernice illa, quæ in fundo sac-
culi remansit juxta 4. punctum, operationis H. id est, si
colore rubro imbuenda sit materia ligni; tum lachryma
Sanguinis Draconis miscenda est Vernici dictæ, & bac-
culus imbuendus, de quo paulò infra pluribus.

Vernix Nigra.

C. Fit pro fundamento nigro color niger ex ossibus
combustis, & quàm optime contritis, & subigatur Ver-
nice in fundo sacculi repetitâ. Ubi paulò ante monui-
mus.

Modus procedendi in praxi.

1. Fiat cistula seu baculus ex ligno laevi, & quàm exa-
ctissimè politus, & si quidem variè maculatum velis, sic
age. Accipe cerussam in pollinem redactam, quam subi-
ges Vernice A.

2. Hoc peracto hujusmodi mixturâ teritè illinies ci-
stam aut baculum; sive quodcunque aliud materiale, ita
tamen, ut prima illitio non fiat per liquorem nimis cras-
sum, sed per optime dilutum; Secunda illitio instituenda
erit per liquorem paulò densiorem; & Tertia per adhuc
densiorem, & deindè materiale ad siccandum sepones, sic-
catum verò pumiceo pulvere per cribrum, seu seta-
cum

ceum prius colatō, usque ad polituram perficatis.

3. Maculæ depingantur cum vernice nigra C et si maculæ siccæ jam non bene comparuerint, aut perfricatione abrasæ fuerint, denuò tinctas ad siccandum se-
pone, & hoc semper quater aut quinquies cum dicta Vernice A.) deindè denuò pumice perfricandus bacu-
lus siccatus, usque dum politè sese exerant maculæ testu-
dinacæ.

4. Bacillus denique ita politus purgatusque ultimam
subibit tincturam Vernicis H.) Tertio aut quarto, dein-
dè denuò pulvere pumice poliendus est, & denuò stanni
adusti perfricatione opus absolvitur, quæ sit panno ma-
defacto prius.

Ad Baculum Venturini colore imbuendum.

Sic age. 1. Accipe fila aurea, per prelum subtilissimè
raducta, quibus passim textores & acupictores utuntur,
latitudinis minimæ, ita ut propè in pulverem ex subtilis-
sima scissione redigantur, non tamen in pulverem impal-
pabilem, sed qui corpus habeat.

2. Vernix crassa misceatur rubro vel violaceo co-
lore.

3. Accipe sedimentum Vernicis, & eà imbuatur bac-
culus, deindè aspergatur adhuc humidus Vernice bacu-
lus pulvere hoc aureo, & ubi siccatus fuerit.

4. Accipe Vernicem colore Sang. Dracon. mixtam,
& illines eà baculum, & ubi siccatus fuerit, denique re-
petes illitionem, deindè siccato, Vernicem A. dabis, &
deindè pulvere pumiceo, & stanni combusti reliquam
polituram ultimam absolves.

Nota, non omnem Vernicem sustinere; Cæuleo enim
colore alia Vernix imbuenda est, quam multi præscri-
bunt. Atque hæc de Vernice Sinica sufficiat.

*De AURO MUSIVO seu MOSAICO
sub titulo AURUM promisso.*

Ut Pictoribus & Statuariis (si e *ωλοσται* sint, siue γυφο-
χοι, siue λιθοβοι, siue ex ligno desectores: horum quip-
pe omnium rem perspectam habere interest) atcanum,
quò inter Chymica nil reconditius, patefaciendo, qua-
dantenus gratificarer; addere lubuit AURUM MUSI-
CUM, quod aliis *Musivum*, vulgò *Mosaicum* dicitur,
fortè ex eò, quòd similitudinem habere videatur cum eò
Auri factitii genere, quò Veteres Muscarii utebantur in
operibus suis *Musivis*, hoc est pavimenti & lacunari-
bus; quæ ex variis lapillis tessellatulis siue quadratis, in
piscium, quadrupedum, Satyrorum, aliarumque rerum
effigies emendatè & graphicoterè dispositis & cōag-
mentatis constabat: quorum hodiè etiam nonnulla, sed
temporis injurias perpeffa, supersunt exempla. Unum
ostenditur juxta *Gumas* Italiæ, in antro *Sybilla* dicto:
Alterum Romæ, inter *Neronis* Palatii auro reliquias.
Nos etiam ejusmodi opere Musivo superbimus; eò ni-
mirum, quo Nobilissimum illud *Edvardi Confessoris*
monumentum sepulchrale, in magnificentissimo tem-
plo Westmonasteriensi extraps, elegantissimè exornatur.
Sed ne longius ab instituto digrediar, Aurum hoc Musi-
cum hujusmodi artificio præparatur.

1. Stanni illius generis, quod Stannariis nostris
Black Tin vocatur, libram unam in catino liquefiat, il-
lique, dum adhuc in fusione est, sensim addantur primò
Mercurii crudi libræ duæ, deindè *Salis Ammoniaci*
libra una, & post pauca temporis momenta, *Sulphu-
ris* communis tantundem: Spatula lignea leviter agi-
tando, ut arctius cōsodiantur. Tum ab igne remota, te-
nantur simul super laminam marmoream & in pulverem
tenuissimum ac levissimum laboriosè redigantur. Qui
in vas vitreum vel fictile, sublimationi accommoda-
tum, & capite cæco (ut vocant Chymici) in cuius ta-
men vertice foramen exiguum, nempe apicis digiti mi-
nimicapax, factum est, instructum, immisus in for-

Pharm. Bibl. Mang. Tom II.

naçe sublimatoria collocetur: & succensis carbonibus
urgeatur, donec bona mixtura pars vaporum specie
exhalaverit: interm prospiciendo, ne dictum foramen
exhalationum agmine planè obstruatur. Cessante fumo,
subtrahatur ignis & postquam omnia spontè refrixerint,
auferatur caput. His itè peractis, collo vasis circum-
circa, annuli in modum, adhaerentem videbis florem
quendam autèi coloris, & butyri instar mollem: qui
exemptus: & à Mercurii crudi una ascendentibus par-
ticulis quibuscunque separatus, est verum *Aurum Musi-
vum*. Quo *ωλοσται* patissimum utuntur, ut ex gypso ar-
gillave effictis Magnatum statuis colorem Aëis vel Ori-
chalci æmulum inducant.

Quod ut melius præstent, statuas primò obliunt pig-
mento quodam, ex *Umbria* & *Ochra* *terra* partibus
æqualibus, lævigatione in polinem redactis, *resque*
puro probè contemperatis, confecto: eique jam penè ex-
siccatò & alterum deinde superinungunt, quod ex *Auri*
Musivi polline, & pinguiori oleo *seminum Lini*, radiis so-
laribus prius clarificato, commixtis, & in marmore diu-
turna circumactione contritis, constat. Si verò *Cupri*
colorem Paradigmati suis Gypseis inducere consti-
tuant: tunc priori pigmento admiscant dimidiam pro-
portionem *Ochra rubra* cum *Cinnabaris* vel *Minii* pau-
xillo. Sin *Aëris* jam veterascentis atque ad viriditatem
in superficie inclinantis color [qualem in æneis anti-
quorum statuis, & vetustioribus tormentis bellicis cer-
nimus] gratior videatur: tunc *Ochra rubra*, & *Minii*
loco, *Aëris viridis* tantillum substernunt. Hocque pacto
alterutrum è dictis Metallis tam affabrè, mentiuntur, ut
sic coloratas statuas, non ex Gypso. Argillave in pro-
plasmate siccata, sed ex solido ære vel Orichalco arte fu-
soria effictas esse, haud immeritò crederes. Hanc colora-
tionem (qua nulla alia aut oculis magis grata, aut aëris
injuris obnoxia, eis, qui in arte plastica versantur, hæ-
ctenus innotuit,) nostrates *Bronzing* vocant. CHAR-
LETON.

VERONICA.

Veronicam recentioribus quasi *φερωνικη* dictam exi-
stimat C. Hofmannus, quia triumphat inter plantas no-
viter tepertas.

Veronica notæ sunt, flosculi parvi tetrapetaloides, nam
quæ videntur petala distincta ad ungues juncta sunt,
adeò ut flos integer decidat, unde stri dè & propriè lo-
quendo flores monopetali non sunt tetrapetali. 2. Vas-
cula seminalia in bina loculamenta divisa & plerumque
compressa *Thlaspeos* instar.

In hoc genere calycis folia non decidunt una cum
flore, ut in tetrapetalis siliculosis, nascuntio *Thlaspi*,
&c. sed à flore delapso restant ad seminis usque maturi-
tatem: præterea flores è sinu foliorum exeunt, præter il-
lorum normam, in quibus nulla ad florum exortum ap-
ponuntur foliola.

Veronica autem in triplici sunt differentia. Aliæ
enim flores spicatos produçunt, spicis summos caules
& ramulos terminantibus, quæ *Veronica* spicata di-
cuntur. Aliæ *Veronica* foliosas produçunt è foliorum alis
exeuntes: quod genus *Teverii* seu *Chamaedrys* spuria
nomine insignitur.

Aliæ denique flores singulares seu solitarios secun-
dum caules, è foliorum sinibus proferunt, quæ *Alina*
spuria consentur.

Vires. Vulneraria insignis ac si dorifera est. Usus præ-
cip. in erosione ac obstructione pulmonum ac lienis:
hinc & imprimis in colica, phthisi, scabie, pruritu, pes-
te, vulneribus. Extrinsecus famosissima est in vulneribus
abstergendis, in duritie lienis, & in colica, Schrod.

Summatim in us sumpta valet. 2. adversus tussim &
vicia pulmonum. 2. adversus pestem & morbos conta-
giosos. Extrinsecus ad vulnera, ulcera, scabiem, cutis vi-
tia commendatur.

Rrrr 2 Decoctum

Decoctum veronicæ satis magnâ dosi aliquando assumptum feminam quandam calculo, quem per sedecim annos in rene sinistro aluerat liberavit. Calculus nempe primo ad ureteres protrusus est, deinde in Vesicam delatus, tandemque continuo ejusdem decocti usu foras ejectus. Ephemer. Germ. An. 1. observ. 107.

Insigniter Veronica sterilibus prodest. Nobilissima quædam femina post septennium sterilitatis meo consilio pulverem Veronicæ in aqua ejusdem per multos dies sibi propinabat, & statim concepit. Postea illa hoc consilium aliquot aliis dedit, & x. vel xij. ex illis ex sententia profecit. Syrupus Veronicæ ulceribus pulmonis est admirabilis. Hofman.

Cum immedicabili tibiæ ulceri Illustrissimus Guntherus per aliquot annos laborasset, ac serpentis ulceris totam propemodum tibiæ obfidentis cacoethis dolores per intervalla septimanarum aut mensium recrudescerent mitigari deberent, nullum præsentius percepit levamen quam si madefaceret lintea aquâ Veronicæ, eaque tibiis applicaret. Cessabat enim inflammatio, & alia quæ eam comitari solebant symptomata.

Veronica vim insignem traumaticam obtinet: fistula thoracis quæ balnearum industriam, omniumque medicamentorum vires elusit, tandem sanata est, solius aquæ hujus plantæ usu interno Ephemer. German. Ann. 13. observ. 166.

Extractum Veronicæ mixtum cum extracto baccarum Juniperi in obstructionibus viscerum & pectoralibus morbis est præstantissimum remedium; maximo cum fructu non raro eo usus sum: materiam morbosam per urinam expellit, sed præmittenda sunt laxativa & aperitiva. D. Tancr. Robinson, & G. Fabric. Hildani Epist. 73.

Ingenue fateor cum aliquando variis medicamentis adversus crustosam scabiem puerorum usus essem incassum, me ad recensiti exempli imitationem jussisse parentibus dicto modo aquâ Veronicæ intincta lintea applicarent compressa ne stillarent furis brachii, & que pueruli ejusdem, meque sic eum ex voto restituisse pristinae valetudini; jussi tamen ut nutritrix decoctum fumariz ex sero lactis quotidie hauriret. Sim. Paulus.

In colica, calculo, ipsa peste Crato plurimi fecit hanc herbam; imò vel simplex decoctum Veronicæ longè præfert omnibus aliis generosioribus internis medicamentis contra calculum, cujus hæc sunt verba. Idem.

Usus clysteris ex solo decocto Veronicæ cum saccharo magis quam ulla medicamenta per os sumpta proderit. In decoctum vel adeps Vervecinus ad renes, vel cuniculi, vel capi adjiciatur, ut ita lubricitatem faciat. Si ista non sunt ad manum parum butyri recentis addatur. Idem.

Ipsæ sanctè testare possum sæpiculè plus commodi & levaminis percepisse multos ægros, sive colicis passionibus, sive nephriticis doloribus tortos, ab usu simplicis clysteris, ex lacte vaccino, & saccharo parati, in quo ad exemplum Cratonis, vel Veronicæ, vel florum chamomil. non Romanæ, sed vulgaris temperationis decoxi, quam ex aliis majoris apparatus, v.g. ex pulegio, origano, ruta, calamintha &c. confectis: cum hi sæpe exagitant humores. Idem. Ex collectaneis D. Edv. Hulsii cui ob plurimas observationes communicatas ego & Lectores mei, si qui futuri sunt, multum debemus. R A I V S.

VERRUCARIA seu HELIOTROPIUM.

Quod *Heliotropium* folia cum Sole circumagat veteribus traditum est; nos nihil tale nunc dicere in ejus foliis experitur, at neque in alterius ejusvis plantæ. Ingenue fateor (inquit P. Laurentbergius) quæ tot Botanici prodidere de foliis Malvæ cum sole conversis, de *Tithymalo helioscopio*, de *Lupinis*, de *cichorio*, de ca-

lenda, de flore Solis, pluribusque aliis quotidie cum Sole circumactis, cæloque nubilo horas ostendentibus, me nulla uspiam in regione, nullo tempore etiam studio, sissime observare gestientem deprehendere potuisse. Flos Solis caput equidem versus meridiem plerumque inclinat: at quorsum semel inclinavit Capitis pondus ibidem semper retinet, ubi ubi Sol versetur.

Ut Dodonæus *Heliotropium* dictam hanc herbam asserit, non quod ad solis diurnum motum convertatur sed quod æstivo solstitio floreat, cum sol longissime ab æquinoctiali circulo digressus ad ipsam rursus *veronica* sive conversionem faciat.

Nomina. *Heliotropium* majus Lob. Ger. Park. majus flore albo J. B. majus Dioscoridis C. B.

J. B. Planta est dodrantalis & major interdum minor ratione loci, radice simplici lignosa: caulis fungosi medullâ plenus, foris ex viridi incanus, tomentosus, multis alis concavus. Folia ad ramulorum exortum & per ipsos ramulos disposita, ocyms foliis paria, ex rotundo oblonga, nervosa, cauli concoloria, hirsuta. Flores ramosi, albi, parvi, foliolis lanuginosis obfusi: cæterum racemus ille spicatus cacumen in se Scorpionis caudæ instar contorquet. Semina succedunt triangula, brevia, cinerea, quaterna juncta, acuminibus coeuntibus globosum capitulum efficientia.

In Gallia Narbonensi, inque Italia & Sicilia in agris ubique fortè luxuriat. Vidimus etiam circa Moguntiam & alibi in Germania.

Vires. Quæ de viribus *Heliotropii* habent veteres apud ipsos vide.

Verrucas & Myrmecias & Thymos affricata herba valenter adimere dicitur. Efficacissima est adversus carcinomata & ulcera gangrenosa & tumores strumosos (tota planta Matthiolo, semen Lobelio) folia ex rosaceo illita Capitis dolorem mulcent. Epotum foliorum decoctum unâ cum cumino renum calculos pellit & frangit, & intestinorum animalia necat. R A I V S.

VERVEX, vid. Oris.

VESICANTIA & VESICATORIA.

Vesicatoria, ab effectu nomen sortita, easunt, quæ vesicam in partibus cutaneis ardore suo, seu pustulas excitant, prolicientia humores & succos à sanguine diversos, inprimis serosos & ichorosos.

Utuntur vesicatoriis generali usu ad revellendum, vacuandum & derivandum. Sive enim humores serosi acres in parte quâdam ipsâ restitent, eamque circa inflammationem tamen, vel ruborem, vel manifestum hiatum, (tunc enim non conveniunt) vellicent, rendant, & rodant; sive in aliâ vicinâ inflammatio, ipsâque in massâ sanguineâ confusio & inquinamentum majus fuerit, faciunt officium: illo casu evocandi & derivandi, hoc evocandi & revellendi magis sine.

Hinc in exemplum prioris scopi applicantur verbi gratia, femori, in dolore ischiadico, ut & derivetur & evocetur humor morbosus: partibus carnosis aliis, in doloribus profundioribus similibus, in foco epileptico alicubi expirante, uti exemplum habet *Heerius in Obs.* Nosque in puellâ ex pede sinistro consimilem auram sentiente prius, quam malo contiperetur, experti sumus. Item in bubonibus pestilentibus & lue venerea, ut venenata materia eò citius & potentius extrahatur.

Revellimus eorum usu, itidem in epilepsiâ, si posteriori capitis parti seu nuchæ applicentur; in caractâ seu suffusione, in diurno acerboque capitis dolore, in phrenitide. Applicari possunt nuchæ, bregmati ipsi, quod non semel cum successu fecimus, pone aures, & utrique brachio. Ut racemus insignem & hinc inde decantarum ac praxi probatum eorundem usum in hemiplegiâ, dolore dentium, ophthalmiâ,

miâ, febribus ardentibus & malignis, de quò vid. *Senn. l. de feb. & Excellentiss. Borri. b. libr. de somniferis pag. 29.* febrium intermittentium paroxysmis & aliâs. Sunt etiam, qui in hydropse vacuandi sine ambobus cruribus, aut etiam abdomini ipsi, in ascite, admovent eadem; verum id nec tutum æquè, nec porportionatum remedium alibi jam asseruimus. Non tutum, quod hydropicorum ulcera exorta non æquè faciliè consolidentur. Aquâ inter eutem laborantibus, inquit *Com.* seu hydropicis, exorta in corpore ulcera, à causâ sive internâ seu externâ, non faciliè sanantur, ob copiam ichoris affluentis & effluentis, ob stimulum salinum perpetuum, ob gangrænâ & erosionis majoris metum, 6. *aphorism.* 8. Videndum igitur, quid æger ferat, quid minus.

Materiam vesicatoriorum tum alia præbent, ex dictis rubificantibus, tum imprimis usitatissimè cantharides, insectorum genus notissimum, ligustri, fraxini, tritici præcipuè amans. Eniguntur verò vel nostrates vel exoticæ; quatum hæc cum sæpe vetustæ sint, non æquè semper præferendæ illis; 2. recentes, vetustæ enim & pulverulentæ thinus sunt aptæ.

Lis est 3. an totæ, quoad corpus; alas, pedes & caput recipiendæ, an abjectis alis & pedibus *Galenus libro secundo, de antidot. cap. 10.* totas & integras usurpavit perpetuè, quia persuasum habuit, alas & pedes esse antidotum adversus vim maleficam truncorum; Cui & *Matthiolus comm. 3. lib. 2. Dioscor.* assentitur. Contra *Hippocrates lib. de nat. mul.* & alibi passim detractis capitibus, pedibus & alis, cum liquore conveniente bibendas propinat. Unde sunt, qui cum *Mercuriali* statuunt *lib. de venenatis morbis & venenis c. 14.* Cantharides toto corpore venenatas esse, extremitates tamen magis ipso truncò, unde Hippocratem h. c. non immeritò illas abjecisse scribit.

Ut alios taceamus, pro interno usu præstat recipere corpus cantharidum, licet id non fieri debeat faciliè, nisi refractâ & minimâ dosi, ut in rot. stim. Myns. videre est, abjectis alis, capite & pedibus, quia partes illæ sunt leviores, & aculeatas particulas habent majores. Exterius verò vel integras scitâ delectum, quod commodius, vel, si mitius velimus operari, solum truncum possumus recipere. Illud verò antidotum, quod ab alis expectandum fuerit, vix tanti æstimandum erit.

Pondus quoque 4. notandum, quod exprimitur vel implicitè numero, vel expressè additâ mensurâ; neque verò opus semper est majore pondere, siquidem & vñ v. g. corpore tenus imposita exulcerandi vi potest; possunt igitur recipi ad ʒj. ʒʒ. circiter, siquidem agens & hic agit ad mensuram recipientis corporis; ubi cumprimis spatium definit virtutem. Ut verò explicari spicula magis queant.

5. Forma quoque externa memoranda venit. Sine dubio verò optima illa erit, quæ & spatium desideratum non excedit, & partem melius tegit, adhæretque, adeoque intentionem magis explet, in formam unguenti quidam, vel cataplasmatis mollioris redigant, cum melle anacardino, vel theriacâ. Frequentissimum est cataplasma cum fermento, ad ʒʒ. cantharidum ʒij. vel ʒʒ. recipiendo, ne quid nimis tamen, quantum satis pro explendo spatio; & hinc optimum est emplastrum.

6. Additamenta si spectemus, solent vel corrigendi, vel augendi sine addi verbi gratia, semen ammiòs, sinapios, euphorbium, acetur simplex, idque potissimum in formâ cataplasmatis. Additur acetur pro formandâ consistentiâ. Ponamus verò ipsum & infringere vim catharidum ex parte, id potius in bono habendum est; mitigat quippe vim acrem & suam confert. Unde consultò in cataplasmate retinetur, cum præsertim ipsum sit rubefaciens, & experientia effectum testatur. Possumus tamen & in simplici acquirere mixturâ fermenti, & cantharidum, unde tales pastæ ra-

Manget. Biblioth. Phar. Tom. II.

rius solent præscribi, sed chirurgis ferè jam in usu sunt, & ad manus.

Optimè verò, citra ulla alia additamenta, cantharides impastantur cum quocunque emplastro vel corpore emplastico, sive soli ceræ & terebinthinæ, quod *Martianus* facit; sive emplastro diaphoretico *Mynsichti*, aliisque.

7. Effectus in aliis citius, in aliis tardius consequitur. In validis & robustis, strigosis, serius trahuntur vesicæ; in teneribus, serosioribus citius. Unde quatuor, quinque, sex horas relinquere par est, & hinc tempus eligimus magis matutinum, ut ne somnus interturbetur.

Applicata enim maxime in emplastri formâ, partem aliâs in texturâ suâ integræ & sanæ, à calore vitali actuatâ vesicatoria non minus ac rubefacientia salinas tum acidas, tum in cantharidibus & aliis salinas volatiles causticas atomos in poros cutis vibrant, unde latex in glandulis cutaneis fluxilior redditus rarefit, confluit, & rubidam partem reddit, vel ichoris formâ, ceu à fervente aquâ, cuticulâ à cutæ separatâ, in bullulas plures, tandemque in unam ferè vesicam colligitur, hinc ruptione factâ evacuandus.

8. Post agenda quædam sint prius, quàm dicamus, non timendum est, ne noxa cantharidum ad interiora redundet, & quod *Soleander* scribit *cons. 2. pag. 13.* ab iis vesicam affici etiam capiti appositis ita, ut exulceratis internis partibus mixtum cruentum excident, id non valet quantum nostra experientia nos confirmavit, quàm in rarioris texturæ & serosioribus subiectis.

Excitata verò vesica forficè discinditur, seu perforatur & aperta servatur, nec ante exulceratio siccatum finitur, quàm omnis humor quasi, sufficiente quantitate, ex parte affectâ sit exhaustus, idque efficitur *Diopiscus* folio brassicæ crudæ, butyro vel oleo, vel unguento alio pingui illito & vesicæ imposito, cujus loco & folio hederæ arboreæ, plantaginis, item rufilaginis utuntur alii, tempore præsertim verno & æstivo, ubi brassica vel caulibus minus præstè est.

Unâ hoc ipsum ardorem lenit vi nitrosâ & aquosâ; conveniunt enim eadem ferè hocce sine, quæ ad ambusta. Consultius tamen, præsertim in delicatis, emplastrum refrigerans applicatur. Sin hoc ipsum refractâ dosi cantharidum roboretur, & mulcet & ichoris profluvium continuat, unde etiam ad duodecim nonnunquam dies servavimus apertum ulcusculum, non sine insigni *Diopiscus*.

Hic usus ut generalis est, ita non attinet specifica vesicatoria hoc vel illo affectu præscribere, quod nonnulli faciunt. Sumque cautelæ quædam de eo observandæ.

Affectus, quibus præmissis universalibus conveniunt sunt e. g. inprimis oculorum & capitis, hemierania, ophthalmia, suffusio & alii.

Alii quibus minus ex usu, imò sæpe nociva sunt, exemplo sint pedes hydropicorum, dolor spinæ dorsæ, tumor, calor partium, crura œdematosa, arthritidis, quæ & rubefacientia & vesicantia excludit. Minus etiam profunt, ubi copia vel influentis humoris major est, vel extrahendi ejusdem improporcionata, cujus exemplum præbet hydrops. Non educunt quidem parum vesicantia respectu ipsius partis & ichoris sensim & sensim exudando parum tamen est illud respectu molis totius hydropicæ aquæ, quæ ad plures mensuras extenditur, & in cavitare abdominis hæret, quorsum vis extrahens seu liquans minus penetrare potest.

Ab adhibitis attrahentibus demulcentia poros proficiunt. Exemplo sit paralytis & gibbus. In paralytico adolescente post balneum fornicarum sedulo reperitum cataplasma ex radice symphyti recentis faciebat officium. *WED. ELIVS.*

Vesicatorium est topicum remedium, quod cuti ad-

R III 3. metum

motum epiderma in bullas elevat, & ichorosam materiam ad cutem educit.

Componitur ex variis, facilius tamen & utiliùs paratur, vel ex emplastro vesicante solo, aut addito pulvere cantharidum; vel ex fermento & cantharidibus præparatis, id est, quibus alæ & capita præcisa sunt.

Sinapismi & phænigmi olim fiebant ex pulpa caricarum & sinapi, sed horum usus obsolevit, vices efficacius suppleant vesicantia, Quorum

Usus est ad humores ad cutem educendos, vacuandos, revellendos & derivandos, in soporosis affectibus, catarrho dilabente in pectus, aures, dentes, &c. In articulorum, & ischiadicis contumacibus doloribus exostosis venereis, &c.

In morbis capitis admoventur supra colli vertebrae: in affectibus oculorum etiam pone aures, &c. In aliis vero casibus supra partem affectam. Volunt aliqui prodesse feбри malignæ si carpis admoventur.

Quantitas vesicatorii pro ægri, & partis cui apponitur magnitudine præscribitur.

Vesicatorium ex solo emplastro vesicante pro pueris, vel quando non est opus forti.

℞. *Massæ emplastr. vesicantis* ℥ij. vel iij. *Malaxa cum aceto acri, & fiat vesicatorium.*

Vel

Ex emplastro vesicante, & cantharidum pulvere, quando fortius desideratur.

℞. *Massæ emplastrum vesicant.* ℥ij. *pulver. canthar. præpar.* gr. iv. Cum aceto acri fiat vesicatorium admoventum colli vertebrae.

Vel

Massæ empl. de gumm. ℥ij. *pul. canthar.* ℥ss. Cum aceto forti fiat vesicatorium

Ex fermento & cantharidibus.

℞. *Cantharidum præpar.* ℥j. fermenti acris aceto acerrimo emolliti q. s. Fiat vesicatorium admoventum colli vertebrae

In apoplexia, & cæteris soporosis affectibus pro partibus posticis aurium.

℞. *Massæ emplastr. vesicantis* ℥ss. *cantharid. præparat.* drach. j. Cum aceto acri fiant duo emplastra ad formam semi-lunæ admovenda parti aurium posticæ

Vesicatorium parti admotum, tandiù relinqui debet, quandiù opus est, ut plures vesicæ excitentur. Quod fit aliquandò intra horam, aliquandò non operatur nisi intra tres, quatuor, aut sex horas.

Sublato vesicatorio bullæ tunc aperiendæ, & folia betæ alterâ quâque horâ, præsertim æstate, admoventur. Si superveniat inflammatio; inungendæ partes inflammatae unguento rosato & albo Rhasis lotis in aqua plantag. si gangræna, scarificationibus & ablutionibus cum aqua vitæ, tum & cataplasmate supra dicto utendum.

Non est adhibendum vesicatorium nisi præmissa fuerint universalia. In apoplexiâ statim post purgationem, aut venæ sectionem. T E N C K E.

Vesicatoria ex Hadriano à MYNSICHT.

Vesicatorium in dolore Capitis & dentium occipiti post aures applicandum.

℞. *Theriaca Venet.* ℥ij. *cantharid. dempsis alis & capitibus ping. leporis an.* ℥ss. *rad. pyretri nuc. moscat. an.* ℥ss.

Misc. & cum s. q. Fermenti fiat l. a. Vesicatorium in parte, ubi dolores.

Vesicatorium aliud in Cephalæa, &c.

℞. *Cantharid. in aceto macerat.* ℥j. *zingib. alb. pip. ris long. an.* ℥ss. *Majorana* ℥j.

Misc. & cum Fermenti s. q. fiat optima incorporatio; postea cum dimidiâ nucis cortice superpone, donec vesica excitata fuerit; quia postea rumpitur, illique superimponitur folium brassicæ, & aperta detinetur.

Vesicatorium in omni mentis alienatione, Phrenesi, Melancholia, Mania, &c. probatum.

℞. *Cantharid. abjectis alis & capitibus* Ser. iv. *ping. leporin.* ℥j. *succini alb. cubebarum an.* Ser. j. *ficuum ping. No ij. aceti parum.*

Misc. & cum s. q. Fermenti & aliquot guttulis sp. Vini, sine igne redigantur in formam Emplastri, & vertici à capillis nudo apponatur.

Vesicatorium in angina expertum.

℞. *Fermenti* ℥ss. *rad. alibæ ireos flor. an.* ℥ij. *cantharid. præpar.* ℥ss. *pul. suc. glycyrrhiz. croci orient. an.* ℥j. *ficuum ping. no. ij.*

Misc. & incorporentur pro emplastro, quod ponatur super pectus. Divertit materiam ad pectus & est experimentum nobilissimum.

De Vesicatoriis plura vid. in Emplastris & Cataplasmatibus.

VESPERTILIO.

Vespertilio, Græcis Νυκτερίς, The Bat or Flittermouse. Hoc Animal malè à nonnullis Avibus accensetur, ob alas & volatum; cum nec pennatum sit, nec rostratum, nec oviparum, quæ certæ & characteristicae Avium notæ sunt, ut alia multa omittam. Præter alas enim & volatum nihil ferè cum Avibus commune habet, sed per omnia cum Animalibus Quadrupedibus viviparis convenit. Nec major est ratio cur vespertilio quàm cur Lacerta alata (talem enim apud Ornatißimum Virum D. Guilielmum Courtiue vidimus) Avibus annumeretur.

Vespertilio tum figurâ corporis, tum magnitudine murem minorem domesticum [nostratem intellige, dantur enim Gallinis in Guinea & alibi æquales] tum etiam vellere s. pilis, refert; unde nomen *Flittermouse* s. *Fluttermouse*, i. e. Mus alas motitans, Anglis cum Germanis commune.

De numero dentium in hoc animali non conveniunt Autores. *Bellonius* 34. in mandibula inferiore 18. in superiore 16. observavit: *Aldrovandus* 24. in singulis scilicet mandibulis 12. *Clusius* in superiore mandibula utrinque senos, in inferiore septenos, quorum anteriores cæteris longiores, omnes valdè albos. Verùm *Clusius* exoticum Vespertilionem è maximis describit, cujus longitudo plus quàm pedalis, nec ambitus corporis minor: Singulæ pinnae [ita alas appellat] 21. unciarum longitudinem habebant, 9. latitudinem. Descriptionem integram vide apud *Clusium*, *Exot. libro quinto, capite primo*

Aliæ membranaceæ cutaneæve, seu pinnae mavis dicere, corpus circumambiuunt, & sibi mutò continuæ sunt, & pedibus connexæ. Ad alarum flexum seu articulum pro pede anteriore uncum habet, quo parietibus aut arboribus adhærescit.

In nonnullis, adnotare *Clusio*, oris rictus magis obtusus,

obtusius, ad felini formam quodammodo accedebat, in aliis magis longus & angustus, vulpeculæ rictui proprior erat.

Verum cum Vespertilio Animal sit singulare & sui generis non opus est longa verborum ambage ad eum describendum.

Locis obscuris & cavernis subterraneis interdum & per hyemem latitat, crepusculo & diluculo evolat. Cuculibus & muscis, fortè etiam phalænis, victitat quas inter volandumprehendit. Geminis volitat (inquit Plinius) amplexa infantes secumque portat, nec plures una vice parit, cum bina duntaxat ubera habeat. R A I U S. In Syn. Hæstor Quadrup.

Aliqui dicunt vespertilionem tufam & applicatam in doloribus podagricis conferre, forsitan eadem ratione quâ cranunculi tuberosi radix, quæ Gallicè *irigoutte* dicitur, folia urticæ urentis tufa, imò alia omnia vi vesicante prædita à multis in hoc morbo commendantur. Nam quod vis vesicans & magna acrimonia in Vespertilione resideat exinde patet quod sanguis ejus depilatorium sit non infimum; jam vero isti operationi perficiendæ remedia caustica & arsenicalia, de quibus propriò locò, veniunt adhibenda.

VE T O N I C A, vid. *Caryophyllus Hortens.*

VIBURNUM.

Nomina. Viburnum Park, vulgo C. B. Lantana five Viburnum German. Lantana vulgo, aliis Viburnum J. B.

J. B.

Hic frutex arborecens est, grandis quandoque, licet in amplitudinem magis diffundatur quàm in altum assurgat, lignoque constat fungoso & meduloso. E radice summo cæspite vagante ramos digitali crassitudine emittit bicubitales etiamque longiores, cortice ruffo farinaceo pulvisculo conperso, materie pauca ac viridi, medulla amplissimâ ac albâ, folia ad Alnum vel potius ad Sorbum Alpinam accedentia, opposita, lata, sublonga, crassiuscula, in ambitu crenata, hirsuta, & pulvisculo albo, maxime inferna parte, quæ ob id etiam magis candicat; conspersa, gustu adstringente. Flores in umbella, odore florum. Sambuci, candidi, quinque petalis, extorsum modice reflexis, constantes singuli, in quorum medio stamina quina surguntur, longa, albicantia; quos excipiunt supervenientes bæcæ, primum virides, deinde rubræ, per maturitatem nigræ compressæ, dulces & viscosæ, sapore tamen nostro palato minus grata; quamvis è rusticis multi iis vescantur, quos ut citius maturescant supra paleas aut fenum reponere alterno stratu solent; semen intus continent latum, compressum & striatum, osseo, cortice interctum.

In sepibus non infrequens est, solo maxime inculto & argilloso ætate floret citius aut serius pro tempestate Cæli, temperie & conditione Solis magna ex parte acini rubescunt Julio, Augusti fine demum & Septembri maturescunt, ut testatur J. B.

Vires. Tum folia tum bæcæ siccant & adstringunt, unde ad tonsillarum & gutturis inflammationes, columellæ procidentiam, dentes vacillantes, alvi fluxiones commendantur. Folia in lixivio decocta capillos denigrant, & eisdem fluentes sistunt. Paratur è radicibus corticibus sub terra maceratis, & subinde decoctis ac diu rufis viscum ad aucupia haud inutile. Matth. Dod. veremur cum J. B. ne Marthiolus multa tribuerit Viburno quæ sunt Rhois, cum eisdem aliquando putaret, Ruellium secutus.

Ex furculis paratur optima aqua ad oculos. Camer.

Rura nostra (inquit Ruellius) viurnam appellant, fluxu ferè invictam, & ob id fascibus ligandis utuntur: prout & alibi fere passim provenit unde peritiores Botanici eam *Spiræam Theophrasti* esse existimant.

Cæterum Viburnum à viendo seu ligando dictum est: Viburnum enim non est alicujus particularis fruticis nomen apud antiquos: à recentioribus huic arbori ut proprium tribuitur quia rami ejus sunt lenti unde & lantana dicitur. R A I V S.

VICIA.

Vicia aliis à vinciendo ut Varr. de R. R. c. 31. quod cæpreolos habet, ut vitis, quibus scandit, & alias plantas vincit. At nos cum Vossio in Etymolog. viciam à Græcis esse censemus. Nam Asianis Βίχιον vocatur, teste Galeno, lib. 1. de aliment. facult. cap. penult.

Notæ Vicie characteristice quibus à reliquis leguminibus scandentibus distinguitur sunt folia minime cæsia seu glauca, sed viridiora & plerunque hirsuta, è minoribus & pluribus pinnis composita.

Ufus ejus est apud nostrates cum pilis & avenâ mixta pro equorum pabulo, feritur interdum seorsum & viridis in herba demeritur pro jumentorum pabulo in graminis inopia, &

Vicia pasta distendunt ubera Vacca. R A I V S.

VICTORIALIS.

Nomina. Allium Alpinum J. B. montanum latifolium maculatum C. B. Alpinum latifolium, seu victorialis German. anguinum Park. victorialis longa Clus.

Radix nonnihil obliqua est, in longam bulbum definens, multasque fibras perplexas emittens, multiplici cortice, variis fibris transverse sim cocuntibus quodammodo reticulato involuta, singulis annis (autore Clusio) feliciter aliis bulbis circa ipsam adnatis seu propagans fibris adeo implicatis, ut difficile sit bulbos conjunctim nato & coherentes sejungere. Hinc emergit cauliscubitum altus, minimi digiti crassitudine, propter terram rubescens, enodis, lævis, superius viridis, striatus, fungosus, cui insident glomeratim congesti flores, ceparum floribus similes, unciâ longioribus pediculis hærentes; candidi (in planta nobis observata flores non candidi prorsus erant, sed ex albo palliduli) quibus trigonâ succedunt capitula, seminibus rotundis, pullis repleta. Folia duo aut tria vaginâ suâ caulem complectuntur, forma foliorum Allii urfni, nervosa sublonga & lata, acuminata, sed majora, rigidiora, gentianæ majoria foliis pænè similia, ut non male censet Clusius.

In summis Jugis altissimorum montium maximo Carthusianorum cænobio in Delphinatu imminet. Viribus cum reliquis aliis Sylvestribus per omnia convenit.

Vires. Plebi nostrati (inquit Schroderus) Judæis-que amuletum est familiarissimum, quo à spectris æreque infecto se tutos fore persuasi sunt, unde & victorialis nomen ei inditum. R A I U S.

Victorialis alia minor datur foliis non male Liliium Convallium referens, atque Allii saporem non minus quàm prior exhibens, verum ejus nullas novimus vires peculiare & propterea ab ulteriori abstinemus descriptione.

VINCETOXICVM, vid. *Asclepias.*

VINCA PERVINCA.

Clematis hæc dicitur, qui instar κλημάτων repentes proferat cauliculos, quos κληματα (Sarmenta) R I E T 4. Græci

Græci vocant: Daphnoides vero, cum à lauri foliorum figurâ, tum ad differentiam aliarum cognominum. Dod. vincapervinca, quod humi serpar, & se in modum fruticuli porrigat, vicina quæque Vinciens Fuch.

Notæ ejus sunt sarmenta longa, repentia, folia glabra, colore & consistentia hederaceorum, flos amplus, siliqua ad singulos flores gemina non lanigera.

Nomina. Clematis Daphnoides minor C. B. 7. B. Vincapervinca minor Ger. vulgaris Park.

Flagellis reptatricibus, humi fusis, late se propagat. Radix fibrosa est: sarmenta multa, tenuia, teretia, videntia & geniculata, è geniculis emissis fibris rursus radicanur. Folia è geniculis bina opposita, Laurinis similia (colore & consistentia hederaceorum ut nobis quidem videtur) minora tamen multo, acuta, rigida, lævia, brevibus pediculis appensa, supernè virore saturato nitentia, internè dilatiore, sapore adstringente, subamaro; flos pediculo è geniculis enato, duas uncias longo, singulari singularis infidet, oblongus gelsemini modo, nunc simplex, in quinque lacinias altiusculas & latas dissectus, nunc aucto foliorum numero multiplex, quorum interiora modo bina, modo terna, ad imum integra, superius ut extima laciniantur duntaxat, aliàs penitus separata. Color simplici cæruleus cum apicibus concoloribus, sed dilioribus parum, vel albus cum staminulis luteis, pistillo albo, fundo candidis versibus striato; vel pulcherrimo spectaculo violaceum florem per singulas lacinias à summo ad imum linea decurrit lactea, id quod & in multiplici observatur. Verum quæ multiplex est flore eam non alio quàm purpureo aut purpuro violaceo colore observavi; & bicolore ut dictum. Flori succedit sed rarissimè siliqua bicornis, Cæsalpinus. Cornicula tenuia sunt, arcuata, utraque extremitate coherentia, bina plerumque semina continentia, oblonga, Sefelios.

Ad sepes & in aggeribus fossarum.

Vires. Vulneraria insignis est. Usus præcipuè in fluxionibus alvi, dysenteria, hæmorrhoidibus, expuitione sanguinis, hæmorrhagia narium, vulneribus sero liquore manantibus. Extrinsecus in profluvio mensium, in laxitate ac dolore dentium: lac extinctum revocat. Schrod.

Folia ore retenta sanguinis fluxum è naribus erumpentem compressisse frequenter vidimus, inquit Costæus libro suo destirpium differentiis.

Folia recentia super chartam bibulam vel emporeticam imposito superius lino pexo interbastata, & thuris odore suffita, consilio mulierculæ cujusdam in strumis adhibita, discutere tumorem brevi tempore, qui per anni spatium aliis medicamentis à Medico docto præscriptis contumax obstiterat. Eodem medicamento ejusdem mulieris monitu pro deplorato relictus curatus est antea. D. Hulse.

Vinum turbidum, quodque colorem amisit, hujus herba q. s. vasi imposita, intra quindecim dies purum clarumque & genuini coloris reddit. Expert. Trag. præstabit tamen ut vinum prius in alium vas transferatur. RAIVS.

VINUM.

De eo in genere sub titulo VITIS VINIFERA. Hic tantum VINA quædam MEDICATA, ad varios usus variè composita.

Vinum Absinthites è Phar. Londin.

℞. Absinthii sicci m. j. pro uno quoque vini congio, immittatur in vas bene obturatum, & sic maneat in infusione.

Vinum Antimoniæ ex Phar. Londin.

℞. Reguli antimoni pulv. ʒiij. vini albi opt. lbij. ma-

cerentur simul in vase obturato, post primam agitationem permittendo subsidere regulum.

Vinum Benedictum ex eadem Phar.

℞. Croci metal. pulv. ʒi. macis ʒj. vini Hispani lbij. macerentur.

Vinum Cerasorum Nigrorum ex eadem Phar.

℞. Susci ceras. nigr. congium unum, servetur in vase clauso, donec fermentari incipiat. Tum coletur, & adjectâ sacchari albi ʒj. ad unamquamque libram, per manicam hip. trahatur, & in lagenis optime obturatis servetur in usum.

Vinum Chalibeatum ex eadem Phar.

℞. Chalybis preparati ʒj. croci pulverati & in nodulo inclusi gr. viij. vini albi odori lbij. infundè frigide per triduum, aut quatrimum saepe interea agitando. Inverso vase, tum F. colatura per manicam Hip. serveturque usui.

Chalibeatum aliud ex Weickardò.

℞. Accipiantur verbi gratia chalybis diligenter preparat. ʒviij. Fol. menth. ceterach, beton. iya arthritica, stachad. melissa, saffras, sappar. Tamarisci ana m j.

Hæc omnia minutim incisa infundantur per 8. dies in lb x j. vini albi generosi & sub radiis solaribus in vase vitreo sæpius agitando diligenter macerentur, postea de hoc bibat æger pro una vice ʒiij. mane in initio pastus.

Vinum Elleboratum ex Phar. Londin.

℞. Ellebori albi minutim incisi ʒiv. vini Hispanici opt. lbij. macerentur simul in phiola conv. optime obturatâ ad solis calorem per dies caniculares, vel alios æstivos.

Vinum Hippocraticum ex Phar. Augst.

℞. Cinnamomi ʒib. zingiberis ʒb. caryophyllor. ʒb. macis, cardamomi, gran. paradisi an. ʒj. galange ʒib. sem. anisi ʒb. vini lb x sacch. albi lbij. fiat potus secundum artem per infusionem in colaturam.

Cerebrum & ventriculorum roborat, spiritus auget, vitales facultates fulcit, amissas vires reparat, ac infirmæ coctioni opem præstat.

Hippocraticum aliud ex eadem Phar.

℞. Cinnamomi electi ʒij. zingiberis, galange an. ʒij. nucis moschata ʒj. sacch. albiss. ʒxvj. vini albi generosi ac odoriferi lbv.

Macerando probè recta per horas viij. vel x. posteaque sæpius vinum aromatibus in manica Hippoc. contentis denuo adfundendo & percolando, redigantur in potum Hippocraticum.

Hippocraticum extemporaneum Heurnii ex eadem Pharmac.

℞. Cinnamomi electi ʒib. zingiberis acuti ʒiij. caryophyll. nucis moschata an. ʒb. granorum paradisi ʒij. piperis ʒj. pulveriscentur crassiuscule ac macerentur in lbij. spiritus vini optimi, probè obturato vase, postea filrentur.

Hippocraticum Laxativum Zuelferi.

℞. Vini albi boni lb i v. collocetur in olla terrea supra ignem carbonum, ollâ nonnihil rectâ, quamprimum autem incipit fervescere injiciantur sequentia saltem incisa, utpote Rad. mechoaca alba, gualappa an. ʒj. Rhabarb. opt. ʒvj. Asari ʒb. cinnamomi acuti ʒvj. cardamomi min. ʒib. caryophyllor. ʒb. cori. Arantiorum, citri ana recentior. extim. ʒib. cremoris tartari ʒb. his

his omnibus vino ferventi immersis, statim desuper etiam superinfundantur sacchari can. albi ℥v. & Album. Ovorum numero ij. conquassatorum scopula despumatoria, addita nec non particula aque cinamomi.

Atque unicâ ebullitione factâ statim removeantur ab igne & manicæ Hippocratis, sacculo scilicet in cuspidem deficiente, infundantur, & vinum hoc sæpius trajiciatur, donec clarificatum & putum defluat, ad instar vini Hippocratici boni saporis & odoris, delicatulis propinandum, repetitis vicibus, quibus per Epieralin materia moribifica educenda. Dosis ℥ij. ad ℥iij.

Hippocraticum Laxativum *Wickhardi*

℥. Fol. sen. Alexand. purgat ℥j. rhabarb. elect. interior. ℥ss. agar. albiss. ℥j. mechoaca ℥ss. diagryd. ℥ss. cinam. acutiss. zingiber. galang. caryophyll. an. ℥j.

Hæc omnia crasse incisa misc. in vini opt. lb. iv. vel v. ac in loco calido ponantur per 12. horas, deinde colentur per pannum laneum septies, & postea addatur sacchari albiss. lb. vel plus minusve & bene agitentur. Quotiescunque igitur quis se purgare voluerit, summat ℥ix. hujus portionis, reliquum, in vitro bene obturato reservetur.

Hippocraticum pro Hydrope ex eodem.

℥. Rad. quinque aperitivar. ana ℥ss. rad. iridis ℥j. Azari ℥ij. cort. rad. sambuc. cortic. ebuli & dulcamara an. ℥v. summ. Absynth. ℥iij. major. ℥ij. fol. card. bened. m. j. Flor. centaurii minor. ℥ij. genist. ℥ss. sem. fenic. Anisi, petroselin. an. ℥ij. sem. Ebuli, Hedera an. ℥ij. fol. sen. s. stip. ℥ij. rhabarbari opt. ℥j. agar. ℥ss. soldanell. ℥iij. spic. schananii an. ℥ss. cinam. cort. aurant. citri an. ℥j.

His omnibus arefactis ac in vase vitreo collocatis affunde vini mens. ij. deinde cum aliquandiu hæc infusio steterit haustus sumatur mane duabus horis ante prandium singulis vel alternis diebus prout operabitur.

Vinum Rubellum ex Phar. Londin.

℥. Vitri antimon. pulver. ℥j. caryophyll. incis. ℥ij. vini clareti sive rubelli lb. ij. ferventur in phiola bene clausa.

Vinum Scilliticum ex eadem Phar.

℥. Rad. scille alba montana circa canis exortum collecta, in laminas concisa, & per mensem exsiccata lbj. gallici lbviij. macerentur per quadraginta dies, deinde scilla eximatur.

Vinum Stomachicum D. Le Mort.

℥. Rad. enula campanæ ℥iv. calami aromatici ℥ss. galange, gentianæ, zedoariæ, zinzib. ana ℥iij. cubebæ, cort. arantior. ana ℥j. cardamomi, caryophyll. ana ℥v. summitat. Absinthii m. iv. musti generosi, vini Gallici, vel Rhenani Stop. xx.

Contundantur omnia grosso modo, dein Sp. vini tartarifato irrorentur, mox in sacculo lineo species illæ reponantur per horas 2. vel 3. dein denuo irrorentur, idque bis vel 3. repetatur, donec sufficienter species vini præcedenti imprægnatæ sint, id est molliores evaserint spiritu interno tumidæ; hæc Sp. musto fermentati cum sacculo injiciantur: fermentationem ineant simul per 14. circiter dies, quibus elapsis species cum sacculo extrahantur, & exprimantur, vinum postea clarificatum per subsidentiam, usui exhibere successe.

Nota: Species etiam facilius seorsim in parva quantitate Sp. vini tartarifati macerari possunt; qui à simplicibus absorptus, faciliorem postea extractionem & fermentationem præbet.

Vires. Omnibus ventriculi cruditatibus confert, concoctionem adjuvat, appetitum ciet, morbis & febribus exinde oriundis medetur. Dosis ab ℥ij. ad ℥ij.

Vires plerorumque simplicium à textura pororum & meatuum dependentes infinitis modis alterantur intestino motu cohesionem & figuram illam multum dilacerante: unde salia illis interstitiis minoribus atque hac proportionata nunc magis sui juris facta quæcunque corpuscula terrestria eliminant, vel alio modo disposita aliam agendi qualiter inire cogunt. Quod potissimum observabile in acrioribus resinosissis particulis, majori quantitate aquæ dilutis & tumidis, quæ, ubi disruptionem suam cellularum semel admittere coactæ fuere, per ventiformem æream expansionem suorum tubulorum, statim à summa acedine & calore manifesto, ad acidorum & frigidorum dictorum classem transeunt plane mutata actione suarum partium, jam fere ad nutum tantummodo salium prædominantium in sua extravasione se se exercentium. Salia autem quamvis in numeras videantur mutationes suæ figuræ inivisse, attamen illas non nisi mediante aliquali immixtione acquirunt, ubi separati à se invicem pulvisculi salini hic illic interstitiis, meatibus, & poris corporum terrestrium intruduntur, quibus se se adaptare coguntur, ibidemque latitare debent, ut cultri in vaginis reconditi, nullasque postea operationes exhibere illis permissum, nisi per hoc vel illo modo dispositos tubulos & poros. Verum hi solutionem diversam continui patientes ubi liberius fluere possunt ad se invicem denuo accumulati acidam pristinam indolem recipiunt, è qua ortum primo duxere, ut in Chimia latius. Hæc salia terrestribus adhuc particulis sociata austera & astringentia sunt, quamvis aperientia & purgantia extiterint simplicia adhibita. Sedulo igitur cavendum est, ne hæc infusa & fermentata vires suas amittant aut immutent; in primo enim statu & motu incipiente potissima vis nativa, uti dictum, consistit; qualitas autem à pristina declinans, alterationem virium concomitatur. Præstat igitur in minori copia vina infundenda præparasse, nisi illa statum suum integrum per artem vel spirituosas ramolasque molles particulas diutius conservare possint.

Vina Medicata ex Pharmac. BATEANA.

Vinum Arithriticum. Recipe Sarsapatill. guajac. ana ℥j. Visc. quere. ℥vj. Fol. sic. chamædr. chamæpit. sal. an. ℥iij. Fl. primul. veris, rorism lil. convall. an. ℥ss. hyperic. ℥vj. V. alb. lbx. infund. dies 3. f. colat. D. ℥ij. bis in die per dies 30. aut 40. post usum Vinæ seq.

Vinum Arithriticum purgans. Recipe Chin. sarsapatill. ana polypod. ℥iij. rhabarb. Senæ, ana ℥j. chelop. ℥vj. caryophyll. ℥j. V. alb. lbvj. Infund. f. a. & cola. Dos. ℥iv. quotidie per dies 8. Vere & Autumn.

Vinum Chalibeatum. Recipe & crud. ℥viiij. Rad. eryng. enul. ana ℥ss. santal. citr. ℥j. coral. rub. ral. ebor. ana ℥vj. caryophyll. mac. cinamom. zz. ana ℥iij. ceterach, anth. Fl. genist. epichym. ana p. ij. Leucoen. opt. lbvj. macer. in MB. dies 8. sæpe agitando, post residuum filtra ad usum. Dos. coch. 3. ad 6. &c. omni mane ad dies 20. 30. &c. in Chlorosi, hydrope, ictero, mensibus obstructis, quartanis, &c.

Vinum Ephraëdicum. Recipe. Lumbric. terrestr. vivent. circulis rubris in collo signatos numer. 4. contund. in mortar. marmor. cum uv. corinthior. mund. ℥ij. addendo V. Rhen. lbij. crystal. mineral.

amincral. [in V. Rhen. solut.] ʒʒ f colat. limpidiff. sape trahiendo per manic. Hip. D ʒij. ter in die cum Aq. cin. nam. hord. ʒj.

Vinum Hippocraticum. ʒ. Caryoph. zz. an. ʒj. cinam. nuc. m. an. ʒij. contusis adde Vin. Hispan. ʒij. sacch. alb. ʒij. m. cum lactis rec. ʒij. stent 8 24. f. colat. de super limon. ii incis. & rorism. virgultas duas sape per manic. Hip. trahiendo ad claritatem. Dos. ʒij. vel iv. in languoribus.

Vinum Hydropicum. ʒ. Rad. irid. nostrar. ʒj. enul. scilla preparat. an ʒʒ. marrub. mi. cort. rad. sambuc. ebul. an. ʒj. Fol. senæ, ʒi ʒ. agaric. ʒj. ʒz. ʒj. vin. alb. ʒi v. infunde f. a. f. colat. *Alter.* ʒ. Frum genistæ & juniper. an ʒj. Vin. Rh n. ʒij f. lixivium; cui adde Rad. ireos nostrar. ʒi ʒ. cort. intern. sambuc. & ebuli, ana ʒj. cort. dalcamar. ʒʒ. rhab. ʒij. mechoac. ʒʒ. Senæ, ʒj sem. carvi, ʒvj cort. cassia. & VVinteran an. ʒij. infunde tepide per noctem; colat. adde sacchar. alb ʒj v. fl. ros. Dam. mij. stent aliquantisper, & denuò cola. Dos. ʒij. &c. omni mane per dies aliquot.

Vinum Scolotyrbicum. ʒ. Fol. acetos. becabung nasturt. aquat. cochlear. hort. an. mij. Rad. enul. ireos nostrar. raphan. rustic. an ʒi ʒ. sem. cochlear. ʒj. V. alb. ʒi v. macer. per dies 2. & f. colat. *Tuulus monstrat vires.*

Vinum Viperinum. Recipe. Viperas famellas vivas tempore verno collectas numer. vi. Vin. Hispan. opt. ʒi vj. macer. (vase opt. clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt, qui macerant viperas excoriatas (rejectis interaneis, cauda ac capite) in Vin. Hispan. per dies aliquot. *In Lepra Græcorum, Elephantiasi, sterilitate, Peste, &c. celeberrimum est, vitam prolongat, &c. Dos. ʒij. vel iv. his in die, ad longum tempus.*

Vina Medicata ex Collectione Theophil.

BIERLINGII.

Vinum laxativum.

ʒ. Rad. mechoac. gyalapp. an. ʒʒ. Flav. cort. citr. recentior. ʒj. grosso modo inciduntur; & in vini Rhenani ʒviij. infundantur, adde sacchar. ʒʒ. filtrantur.

Vinum Arthriticum.

ʒ. Fol. chamædr. chamæpyth. salv. an. ʒij. Flor. primul. ver. ʒij. anthus, ras. visci quercin. an. ʒij. cort. lign. sanct. ʒiv. rad. chin ʒij. Incisa reponantur in einer Tonne Most.

Vinum Martiale D. M.

ʒ. Eßent. vel extract. ʒi. Myos. ʒj. cass. lign. ver. ʒij. cinamom. elect. ʒʒ. anisophyll. ʒj. Superfunde vini Malvativi ʒij. stent in loco calido per triduum, postea colentur. Dos. ab ʒj ad ʒij.

Vinum preservativum in podagra.

Ejusdem.

ʒ. Herb. chamæpyth. anagall. c. flor. an. Mj. Flor. hyperic. p. iij. anthus, betonic. an. p. ij. Rad. hellebor. nigr. gyalapp. an. ʒj. hermodact. turpeth. an. ʒvj. cremor. ʒr. ʒj. cesti aromat. ver. ʒʒ. Incisa & contrusa dentur in nodulum; dulcoretur ad palatum.

Vinum antepilepticum purgans.

Ejusdem.

ʒ. Rad. peon. just. tempor. collect. ʒij. herb. primul. ver. Mj. flor. peon. lilior. convall. silia, an. p. iij. visc. quercin. ʒʒ. ras. uran. human. agric. albiss. ʒvj. radic. helleb. nigr. ʒj. giale. ʒʒ. cardamom. cubeb. an. ʒi ʒ. sem. peon. ʒj. Asperguntur spiritu epileptico. f. l. a. Nodulus.

Ein herrlicher Holzweine vor die Fürstin von Hohenzollern.

ʒ. Lign. guajac. ʒvj. saffas. ʒj. rad. eichor. ʒi ʒ. dielamn. alb. ʒʒ. lign. rhod. ʒj. cort. tamarisc. ʒvj. herb. scolopendr. ceterach. an. Mj. rad. rhapont. ʒi ʒ. fol. sen. f. ʒj. ʒjv.

Vinum Gallicum D. P. C.

ʒ. Rad. sarsaparill. ʒij. polypodii, hermodactyl. an. ʒj. brusci ʒʒ. fol. sen. f. ʒʒ. schœnant. femin. an. ʒv. infundantur in X. mens. vini albi.

VINA alia varia MEDICAMENTOSA CCM. POSITA vid. sub tituli. INFUSUM & CLARETUM.

VIOLA.

Viola per diminutionem à Græco ὄβυ dicta est, spiritu in literam converso, ut in aliis multis.

Nata ejus generica sunt flos pentapetalos difformis, calcari donatus vasculum seminale ternis loculamentis distinctum.

Duplex est, alia foliis rotundis, alia foliis oblongis, quæ & jacea dicta,

Vires. In *Viola* odorata, ut & in aliis compluribus plantis, maltæ sunt partes viribus distinctæ. Radix enim, umbilicus & semen vim habent catharticam: radicem enim tres uncia concitæ, & in aquam ferventem, cum ab igne removeretur injectæ, aut vino per noctis spatium infusæ, vim purgatricem ipsis conferunt. Semen pulveratum & liquori immixtum, si quid diagma pondere idem præstat. Umbilicus malo est debilior, eamque vim communicat aquæ cui infunditur ex qua fit Sympus violarum quem ex infusionibus vocant: humores autem dejiciunt biliosos, sterotos, nec admodum pertinaces.

Folia vero subfrigida & aqueam substantiam habent superantem: itaque phlegmonas mitigant, æstuantem in ventriculo & oculis calorem sedant, in oleresumpta leniunt alvum. P. Rencalm.

Flos recens refrigerat, humectat, emollit, laxat. Cordialis est & quatuor illorum famosorum numero, & pectoralis. Usus præcip. in fervore febrium compescendo, doloreque capitis inde nato, in tussi, asperitate gutturis & pleuritide. Sympus creberrimi usus est ad sitim febilem restinguendam & alvum leniter subducendam.

Violarum semen est lithontripticum insigne. D. Bultero Cantabrigienfi Medico Celeberrimo olim interat. cana. D. Needham.

Dioscorides & Plinius id quod in flore purpureum est cum aqua potum angina correptis & Comitialibus maxime pueris mederi affirmant. Quod autem aiant Comitialibus mederi (inquit Paul. Rencalmus) experientia docuit non vacare imposturæ: Antiquorum scripta non sine mendis ad nos traducta malit asserere MAIUS.


VIOLA LUNARIA.

Nomina. *Viola* Lunaria Major siliquâ rotundâ C. B. Lunaria Major siliquâ rotundiore f. ʒ. *Viola* Lunaria sive Bulbonach Ger. Park.


J. B.

Caule assurgit sesquicubitali aut altiore, [digiti minimi interdum crassitie] colore glauco aut ruente, hirsuto. Folia urticæ, majora aliquando duplo aut triplo, hirsuta, serrata, opposita interdum, alias ad ramulorum propagationes singularia, sapore oleraceo. Ramis (& lumnitati caulis) insident flores multi, (eodem ferè modo dispositi quo in brassica) purpurascetes aut carnei, striati (brassicæ vulgaris floribus pares, Leucoi minores, alias iis similes) odore debili, ungue intus conspicuo & albicante. Stamina quatuor virentia apicibus luteis seu chloris (vix è calice emergunt) hæc omnia excipit cauliculus oblongus, phaniceus, è quatuor foliolis, duobus majoribus totidem minoribus, compositus, (Leucoi

Fig. 1.







(Leucoli Calici similis) filiquæ latæ, subrotundæ (non-nihil tamen longiores) compressæ, bivalves, argenteæ bracteolâ exteriores utrinque laminas intercedente, filum summa parte emittentes, seminum orbicularum compressorum duplicem ordinem continentes. Radix strumosa seu glandulosa (unde nomen Bulbonach) semen ut in hoc genere maximum est, ex ruffo nigricans, & cum aliqua amaritudine accerrimum. Folia per hyemem retinet: secundo à satione anno caulem fundit, & cum semen maturuit perit.

Copiosè crescit in Saltibus Turingiæ Sylvæ Cam. in Montanis Sylvis Austriæ, Stiræ, vicinarumque sylvo-sis locis, atque etiam in Pannonia interamni sponte magna copia provenit. Clus.

Violam Lunariam majorem alteram & Cam. C. B. quam præcedente minorem & flore albo esse scribit; à sequente Planta non differre puto, nihil tamen temere affirmare ausim. J. Bauhinus Lunariam majorem aliam flore albicante odorato perennem Cam. hort. sequentis Plantæ Synonymam facit.

Vires. Calido, acrique & amaro gustu est; præsertim semina, sed tamen radices in acetariis ut Rapuntia manduntur. Abstergit, modice calfacit, & urinam citut Rapunculus. Pulvis seminis amarissimi cum aqua appropriata exhibetur in Epilepsia. Cam. Schvvenckt.

Quidam in Helvetia Chirurgus ex Lunariæ perennis contulis foliis & panicula parabat unguentum vulnerarium non contemnendum. Idem. R A I V S.

VIOLARIA, vid. Viola.

VIPERA.

Viperæ descriptio vid. sub titulô SERPENS, seu SERPENTINUM GENUS.

Hic itaque tantum post figuratum Tabulis xxv. xxvi. & xxvii, delineatarum explicationem, de hujus animalis, viribus atque præparationibus ex SCHRÖDERO & c. paucis agemus.

EXPLICATIO EORUM QUÆ CONTINET TABULA XXV.

AAA. Designat Viperam fœminam catulos suos excludentem, ac in ventrem obversam, ubi conspiciuntur majores squamæ, quibus ad serpendum utitur.

BBBB. Quatuor Viperei catuli, in unoquoque Tabula angulo, involuti depicti, eodemque situ & positu quo ipsos vivos conspeximus, & exitui proximos: Quorum duo involucri carent, alter propria tunica obvolutus, tertius secundina portionem umbilico appensam trahit.

CCCC. Quatuor alii Viperini fœtus, intra circulum à Vipera efformatum; quorum unus serpere videtur, à secundina liberatus: Secundus hanc adhuc ex umbilico pendulam gerens: Tertius è latebra emergens ac secum secundinam trahens; eo videlicet in statu qui natiuitati proximus fuit.

DDD. Pars corporis Vipera fœmina per ventris longitudinem, dissecta; scilicet ab eò locò in quò sita est vesicula fellis ad orificium usque uteri.

E. Fel.

F. Pancreas, à plurimis Lienis nomine donatum.

G. Fundum Ventriculi.

H. Principium Intestinalium.

III. Ova in ambobus uteri cornibus contenta, sed majori multo numero in latere dextro quam sinistro.

K. Portio postremi Intestini.

MM. Amba perula, contigua principio amborum uteri cornuum.

NN. Portio utriusque Renis.

EXPLICATIO EORUM QUÆ EXHIBET TABULA XXVI.

AA. Prima pars dimidiati corporis Vipera maris excoriati, resapinati & secundum ventris longitudinem dissecti ab uno ad aliud extremum, continens.

BB. Tracheam Arteriam.

CC. Pulmonem.

D. Thymum glandulam.

E. Cor.

F. Hepar.

G. Venam Cavam.

HH. Oesophagum.

I. Ramum Arteriae Aorta ascendens.

L. Ramum Arteriae Aorta descendens.

M. Ventriculum.

NN. Alterum dimidiatum corpus, eodem quo prius in statu, comprehendens in se.

O. Fundum Ventriculi.

P. Vesiculam Fellis.

Q. Pancreas, vel si mavis, Lienem.

RRR. Intestina.

SS. Testiculos una cum Epidydimide.

TT. Vasa spermatica.

VV. Renes.

aa. Azaris cauda, cui adnexa sunt sunt partes subsequentes.

bb. Uterque Penis, quo modo tempore coitus erumpunt.

cc. Amba Parastata, aut Receptacula seminis.

dd. Ambo vasa spermatica.

ee. Ambo Testiculi.

ff. Amba Epidydimides.

ggg. Intestina.

hh. Ambo Renes.

ii. Cauda fœmina, cui adjuncta sunt partes sequentes.

ll. Orificium uteri.

mm. Amba perula.

nnn. Duo corpora uterina.

oo. Ambo Testiculi, una cum Epidydimibus & vasis spermaticis.

pp. Intestina.

qq. Ren uterque.

rr. Maxima pars corporis lacerta, ejus longitudinis & magnitudinis, quâ per vomitum exclusa fuit à Vipera jam ante plures dies capta.

ff. Reliqua capitis pars, & crurum anteriorum ejusdem lacerta, eodem egesta tempore.

tt. Oesophagus, in quò cohibita fuerat pars maxima corporis lacerta.

uu. Ventriculus qui exceperat, & paulatim ad se allexerat substantiam reliqui corporis prædicti animalis.

EXPLICATIO CONTENTORUM

TABULA XXVII.

A. Sceleton Vipera integrum.

B. Caput cujus os oclusum, cum colli parte depictum.

C. Caput, cujus os ex parte hiat, parte laterali excoriatum, ubi occurrunt Glandula Salivares una cum vasis Lymphaticis, supra majores dentes.

D. Caput collo nudatum, ore patulo designatum.

E. Aliud caput sine collo magis hians, cunctas partes interiores distinctè exhibens quæ depingi possunt.

F. Cranium Vipera integrum.

G. Pars inferior istius Cranii ablata.

H. Glan-

- H. Glandula salivares Conglomerata, una cum vasis propriis Lymphaticis depicta, naturalibus paulo majores quo melius innotescant, quam si in naturali sua exilitate exprimerentur.
- I. Eadem Glandula Salivares. Oculi ambo cum nervis opticis. Cerebri corpora quinque (cum medulla spinali, coherencia, à Cranio liberata, superna sua facie depicta.
- L. Eadem corpora conjuncta, sed facie inferiori exhibit.
- M. Varii Dentes majores, quidam solitarii, alii intra vesicam reconditi: alii quibus adstant dentes subsidiarii, inferius intra eandem vesiculam infixi.
- N. Maxilla superior, Officulo cuidam coarticulata, quod altero extremo coarticulatur radici majoris dentis.
- O. Maxilla inferior, ex duobus ossibus constituta, coarticulata ossi inferiori clavicula cubiti in morem inflexa, deducta ex parte laterali postica cranii.
- P. Palmo una cum Aspera arteria extra corpus.
- Q. Cor intra pericardium.
- R. Jecur in duos lobos divisum mediante Vena Cava.
- S. Vesicula Fellis, una cum vase succum in intestinum deferente.
- T. Pancreas, à quibusdam pro Splene acceptum.
- V. Intestina.

Viperis solis peculiare esse voluit, vivum sætum parere, unde & Viperæ, quasi Viviparæ dictæ sunt, at tamen & in serpente sat magno, quem in Finlandia secui, fœtus vivos deprehendi.

Non tota Vipera venenata ac lethifera est, sed solum caput & fel, reliqua ut caro, epar, ossa veneno carent, vide supra de Serpente.

Præstat: 1. Fœmellæ, collectæ tempore Verno, postquam aliquamdiu à cavernis suis hybernis fuerint egressæ, victuque quadantenus refectæ.

2. Juvenulæ, (non effœtæ, nec gravidæ,) quæ ablati partibus auferendis, diu adhuc moventur, quæque degunt locis aridis & montanis.

Vires. Vide in serpentum descriptione.

Nimirum:

Vires ibidem recensitas præ aliis serpentum generibus Vipera excellenti gradu obtinent. Præter eas sunt qui Vipera caput ad anginam notham commendant (collo appensum.)

PREPARATA.

1. Oleum ex Viperis.

℞. Viperæ nigræ. ℥ ii j. Ol. Sesamin. sextarium. j. b. in vase vitreato angusti oris probè obturato, ne vapor inde exhalet, incoquantur, donec caro ad ossibus decidat, dein cum refrigerint, reponantur. Andernacus.

N. Alii per descensum eliciunt ex Viperis scilicet capite, cauda, & orbibus.

Vires. Cuius extergit & impotigines, aliaque id genus vitia sanat.

2. Sal Theriacale, vide Dispens. August. & si placet Querc. in Phar. Rest. Aërium & Galenum.

3. Trochisci de Viperis v. Disp.

N. 1. Sunt qui Theriacam de Cacula (Cacilia Blindschleich, The Blind Worm,) confecerunt, summoque cum successu tempore pestis ad sudorem eliciendum semel ac iterum propinarunt. Gesn. de Serpent. Schövenckfeld ex Platero.

N. 2. Fieri patet & vinum Viperinum (id est, in quo Vipera interfecta sunt,) ad Elephantiasin celebre (bibulum) Galen.

4. Pulverem alium egregium reperies in Pharm. Pæteri.

5. Essentiam Viperarum in Myroth. Fabri.

6. Alcohol. Viperarum describit Burgr. in Bolychn.

Sal Viperarum volatile & Spiritus & Sal fixum, & fixatum.

Vipera exiccata, concisa ac leviter contusa una cum Epate & Corde, indantur in Om. loricam usque dum impleatur. Qla in vas recip. amplum gradatim. Exhibet phlegma & Spiritus, hinc sal volatile undique lateribus recipientis, colloque O adhærens, tandem & fœtidum & crassum, quod chartâ separandum. Exemplum v. sal volatile purificetur in phiola satis longa cum amplo, si placet X sublizando per arenam moderato Δ ne aquositas aliqua sale sequatur, quod aucto Δ contingere solet. Salis hujus partes sublimes reliquis sunt odoris penetrantioris, idcirco in X optime clauso custodiantur.

Medicamentum summè penetrans, putredinem argens, in toto corpore obstructions reserat, febres resolvit omnes, & quarianas, si hora 1. vel altera ante paroxysmum propinetur in liquore appropriato, qui acriminam ejus nonnihil obviandere, non tamen obstruere valeat, utpote in emulsion. sem. melon. vel amygd. d. addita portunculâ ∇ & rosar. vel cinam. & sacch. alb.

Dosis g. ad ℥ss.

Figitur eodem modo, quo sal volatile microcosmi, nisi quod loco Sp. proprii ex sale fixo, (qui paucus est in viperis & ex O elicitur) sumitur Sp. Salcom.

Vires. Sic fixatus medicamentum est immutabile totum corpus permeans resolvit enim excrementa quacunque, eaque abstergit instar saponis, ubicunque locorum adhaeserint non assimilata, ut faciliè commode à materia repellantur: vel per sudorem, insensibilem transpirationem, aut quod plerumque fieri solet per □ propterea in melancholia quacunque, podagra, renum calculo & vesicæ obstructionibus viscerum omnibus ac putredine præstantissimum est remedium. In deperditis viribus pertingit ad loca affecta, naturam confortat, adjuvat purgando se & resolvendo excrementa natura contraria.

Dosis ℥ss. ad ℥j.

Essentia Viperarum.

℞. Jecinora & corda Viperarum N. 100. exiccata & contusa cum V rectif. 8 ℞ (3. vel 4.) dicere, extrahel. a. Junctis destillationibus adde (ad ℥j. Essentia) Salis volat. 3j. fixi 3ss. Digere ut optime uniantur, adhuc & uno atque altero, & habebis summum quod à Viperis separari potest medicamentum.

N. Usuatissima hæc medicamenta sunt in Italia, magnoque cum successu & eorum applausu adhiberi dicuntur. SCHRODERVS.

Vipera.) Quasi Vivipara, quia vivum fœtum parere dicitur. Nulla tamen est differentia inter hæc vipera & Serpentes ratione virium, ut supra monuimus. Et in Serpentibus etiam vivi fœtus deprehenduntur.

N. Vide observationes de viperis Francisci Redi Nobilis Arerini ex Italica in latinam translatis.

N. Non tota vipera venenata, sed solum Caput & Fel. &c.) Unde & D. Auctor supra scribit, si quis dentibus vipera etiam jam dudum interemptæ pungatur, veneno infici. Verum quod non denti viperarum, neque humori illi bilioso salivari, qui in vesicula dentium basi adhærenti continetur, virus venenosum insit, hoc Patavii sequenti modo aliquot retrò annis detexerunt Medici curiosi. Caudæ scilicet canis currendo se primum exercentis recens ex vipera non incandescente extractum dentem infixerunt, à quo nec tumor, nec dolor ullus est subortus. Altero die biliosum humorem in vesicula

scilicet conclusum eidem obtulerunt, verum nec quicquam inde vitæ periculi emerfit. Ultimo caput jam detruncatæ viperæ ad caudam canis applicuerunt, quod diductis irâ cæstroque maxillis confestim caudam dentibus suis transiit, ut non modo clamor subortus, & ejulatus in cane fuerit, sed & tumor, dolor, & convulsionēs horrendæ successerint, finemque vitæ paucorum horarum spatio induxerint. Ex Communic. D.D. Theodor. Schenckii P. P. Jenesf. p. m. Ex quo patet Caput & bilem in viperis demortuis non esse venenata, sed in vivis venenosam oriri ab accensâ voluntate nocendi per iram imaginem, Modernorum tamen Acalorum experientia & curiositas patefecit, ut D. Reali Archiatri Florentini, in viperis liquorem salivalem in dendum vesiculis contentum expressum in quovis liquore adsumptum innoxium esse, sin vero vulnere vel levi cutis incisurâ illinatur, seu ex viperâ vivâ seu ex mortuâ fuerit desumptus, mortem inferre, unde Cornelius Celsus venena animalium non potu, sed vulnere nocere docet.

Præstant 1. Fœmella collecta tempore verno &c.) Nihil refert, sive Mæsculi, sive fœmellæ fuerit, modò non ex locis paludosis, metallicis exhalationibus infectis, sed è montanis optimis vegetabilibus luxuriantibus capiantur. Has colligendi opportunum tempus est Vere finiente, nondum tamen æstate incipiente: vel si Ver quoad magnam sui partem hyemale fuerit, circa principium ætatis non multo post Pleiadum ortum. Et eo tempore etiam, quo Libeto Patri Sacra fiunt, vindemiæ scilicet tempore.

Viperæ excellenti gradu obtinent &c. Verum inter has & Serpentes nullam ratione virium agnoscimus differentiam, ut supra ostendimus.

Vires.) Viperæ simul renovandi ac restaurandi pollet facultate, ex quâ balsamum contra qualibet venena est eliciendum & propinandum. Quicquid enim se renovat balsamo aliquo, illud etiam aliam Naturam eodem balsamo renovat. Ubi virus, ibi etiam est virtus. Nollus in *Systemat. Hermet. Medic. cap. 9. p. 32.*

Hic præterire nequeo Modum illum leprosis per viperas curandi in Italia usitatum, quem recenset Kircherus in *Arte Magnetic. lib. 3. part. 7. de Medicinal. magnetismo.* Et Caspar. Ens de singul. in Italiâ invenientis, quæ curatio cum admodum curiosa sit, huc asserre lubet. Ager scilicet præviis purgationibus primò depositus in speluncâ supra stratum exponitur totus nudus, qui vix ingressus statim ex evaporatione halituum calidorum in sudorem resolvitur, sudorem somnus sequitur, & dum ita somno sopitus, immotusque jacet æger, viperæ ex cavernis suis sudore allectæ egredientes, totum dormientis corpus spiris suis implicant, illud innoxie lingendo stringendoque, quæ tamen ad minimum motum aufugientes latibula quærunt. Necessè igitur est, ut æger corpore immotus jaceat, hinc aliqui, tum ut cura conducibilior sit, tum ne viperarum aspectu linctuque terreamur, opio potò spontaneo sopore stupefunt: ubi verò duabus, tribus, aut quatuor horis ita jacuerint, il, qui curam ægri habent, è Speluncâ erutum, vestimentisque indutum in vicinam Fumarolæ domum introducunt; ubi postea requie captâ, variis confortativis reficitur, duratque hæc cura, donec intentus sanitatis effectus fuerit insequutus. Hæc Kircherus, qui hujus rationem unice in exhalationes minerales, salubres & suaveolentes refert; Attamen potior curatio est viperis accepta referenda, quæ saniosos humores ex agro dimanantes lambunt, & unâ cum spiritibus effluviis emanantibus exsugunt hæc effluvia & spiritus morbosam constitutionem producentes viperæ vi suâ balsamica & alexiteriâ corrigunt, & per magnetismum ac mutuam consensum unâ spiritus reliquos corpus informantes sanant.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. I I.

Præparata.

1. *Oleum ex Viperis.*) *Oleum Sesaminum*, hoc est, quod ex Semine Sefami exprimitur, quod ex Sicilia & Cretâ adfertur, de quo supra vide lib. 4. commendatur externe contra porriginem seu furfurationem. vid. *Zacut. Lufitan. in Praxi Medic. admir. obs. 2.* Et omnes cutis affectus. Idem *Lib. I. de Medicor. Princip. histor.* ult. 84.

2. *Sal Theriacale &c.*) De hoc vid. *Clar. Zuvelser. in animadv. ad P. A. p. 273. D. Tackentium in suo Hipocrat. Chemic. cap. 2. & 11. D. Luc. Schreck. in P. A. R. p. 269. & seq.*

3. *Trochisci de viperis &c.*) Hisce melius substituantur pulveres viperarum aut serpentum rite præparati. vid. *Zuvelser. l. c. Pharmacop. Reg. p. 150.*

4. *Pulverem alium egregium reperies.*) in *Pharmacop. Poterii & Cl. Zuvelser. l. c.*

5. *Essentiam viperarum.*) Alias Essentias vide in *Zuvelser. l. c. p. m. 214.*

Sal Viperarum volatile, ol. spiritus & sal fixum & fixatum.) Confcitur, ut reliqua salia animalium volatilia. Hoc per se usurpatum majoris est energię, atque illud quod cum spir. salis, vitrioli aut Terra foliata tartari præparatum est, tunc enim aliam planè induit naturam, & magis diureticum, quàm diaphoreticum exilit. Nil profuisse vid. supra lib. 4. de Cito.

Nisi quod loco spiritus proprii ex Sale fixo &c.) Ex Cap. mort. viperarum planè nullum Sal fixum elicitur, quare nec spiritus inde proprius præparari potest. Nullæ enim animalium partes post illarum distillationem Sal fixum relinquunt.

Vires. Sic fixatus Medicamentum est immutabile.) cum aliis etiam salibus volatilibus urinosus procedit, ut sp. CC. Cruoris cervi, humani &c. quæ vel per distillationem vel aliorum additionem, et Sale Tartari, CC. ust. &c. inde iterum separari possunt, & puriora evadunt. Cum arcano Tartari Sal viperarum volatile fixatum egregiam præbet Medicinam in Malo hypochondriaco, podagra, calculo &c.

Essentia viperarum.) si sp. vini substituitur Sal Tartari volatile & hoc ipso extrahatur mediante digestionem, melius succedet. Omisso Sale fixo, quod in rerum natura non est. *Hofmannus.*

Hactenus de Viperæ viribus ejusque variis præparationibus è *Schrodoro* ac *Hofmanno*. Jam nos hic adderemus quædam de fabrica peculiari salis viperarum volatile elegantiſſimæ sanè ac non ingrati cujus innumeros usus experti sumus, verum alias de eo dicendi locus. De hujusce autem salis volatilis ut & aliorum omnium quocunque demum, ac vulgari etiam artificio, è viperæ prosectorum, in iis qui ab isto animali commoti sunt, curandi, vi verè specifica vid. in *Bibliothecæ nostræ Medico-Practicæ Tom. 4. pag. 835.* ut & præcedentibus, ubi etiam fusè satis differimus de Viperarum veneno, de hujus scaturiginibus, operandi ratione & effectibus. Juscula viperina quod atinet tabidis, febribus lentis consumptis, ac ipsis etiam qui senio confecti sunt & languidis, tantopere, ac non minus quàm in variis cutis affectibus, utilia; de iis nihil hic adjicimus quandoquidem eorum præparatio satis omnibus nota est.

VIPERINA VIRGINIANA.

Quæ ad nos adfertur eo nomine insignita, est *Vincetoxici Virginiani* radix tenuis, fibrosa, vulgari, candidior, plures ex uno capite dependentes fibrillas emittens, saporis incidentis, aromatici, subamanticantis, odoris vincetoxico vulgari fragrantioris & gravioris.

Nascitur in Novâ Angliâ; vires ejus fortiores sunt quam

SSS

quam Vincetoxici vulgaris: Specificè pellit febres quartanas, & hinc cum felicissimo successu in iisdem profligandis usurpata fuit à D. Talbot in Curâ Gallicâ, cuius remedium adeò celebratum fuit: scilicet,

℞ Vincetoxici Virginiani 3j. urtic. Peruviani 3iſſ. macerentur in vino Hispanico & exhibeantur paulò ante paroxysmum. *Hermannus in Materia Medic. manuscr.*

Hanc plantam Clariss. Raius Botanicus magno suo merito verè celebris ex iudicio Thomæ Johnsoni qui eam in horto Joh. Tradescanti prope Londinium cultam & florentem viderat, non ad vincetoxicum, sed ad Pistolochiam Creticam *Casp. Bauh.* eò quòd ejus omnes notas characteristicas possideat, refert. Circa odorem autem nobis visa est hac planta ad valerianatum odorem, & præcipuè ad illam speciem quæ Valeriana Alpina prima dicitur accedere. Vires in affectibus Epilepticis, & omnibus propè nervosi generis morbis ac ipsis etiam febribus tum intermittentibus, tum malignis non semel experti sumus.

VIRGA AUREA.

De eâ vid. Tab. xxviii. hic adjectam.

Virga aurea à forma & floris dicta, Asteris genus videtur, floribus parvis aureis, plurius in summis caulibus in thyrsos aut corymbos, umbellæve congestis.

Nomina. Virga aut eâ *Ger.* aurea vulgaris *Park.* aurea vulgaris latifolia *J. B.* aurea angustifolia minus serrata *L. B.*

J. B. Geniculatim hujus incedit radix, oblique per terram acta, fusca, frequentes demittens fibras, albicantes, sapore aromatico. Caules recti & rigidi, duos aut tres circiter cubitos alti, striati, subhirsuti, medulla fungosa facti. Folia tum à radice, tum in caule, & hæc quidem alternatim, longis pediculis appensa, interdum nullis aut perquam brevibus donata, quorum quæ ima sunt, palmum fere lata existunt, duos circiter longa (in multis regionibus eam longitudinem & latitudinem non assequuntur) superiora minora atrovirentia, utraque hirsuta & per ambitum serrata. Flores tum in summo caule, tum in pediculis peculiaribus ex foliorum alis exortis frequentes insident Doricæ vocatæ floribus similes, lutei, in pappos evanescentes.

In ericetis ac montosis sylvis & saltibus frequens oritur. Augusto mense floret.

Variat foliis (ut recte *C. B.*) quæ sæpe sine crenis, aliquando saltem minus conspicuis serrata sunt.

Vires. Vulneraria est & celeberrimis intus & extrinsecus adhibita, ipsi etiam solidagini saracenicæ præfrenda in vulneribus internis (inquit *C. Hofmannus*) prodest subductione ichorum per urinas. Quod enim notantur summi viri pleræque omnes potiones vulnerariæ sunt diuretici: & pugiles solent in potu ordinario valerianam sumere, quæ inter diuretica familiam ducit: in externis juvat exsiccatione & absterfione, quibus qualitatibus valde excellit.

Lithonriptica diureticaque est non è postremis omnium consensu è calculo primam experientiam habuit Villanovanus, qui in pulvere usurpavit: & celebrat in hoc affectu Barclaius Argem. & Euphorm. Dos. 3ij. in vino albo calido quoque mane sumptæ.

Insigni vi absterforia dotatam esse ait Hofmannus: hinc tantæ ipsius laudes in viscerum obstructionibus, ad hydropem jam inclinantibus, ut diu in secretis fuerit habita in decocto. Ad fluxus tamen omnes alvi & uteri sistendos, necnon hæmorrhagias internas commendatur, quæ adstrictoriam potius quam absterforiam esse arguunt, nisi forte exsiccatoria vi hæc præster, quam omnes ei attribuunt.

VIRGA AUREA ALIA, seu CONSOLIDA SARRACENICA.

Nomina. Solidago Sarracenica *Dod. Lob.* Saracenica vera, salicis *Park.* Virga aurea angustifolia serrata *C. B.* aurea Angustif. serrata, sive solidago saracenica *J. B.*

J. B. Bicubitalis est hæc & tricubitalis, caulibus striatis, glabris: ex quibus alternatim folia nascuntur palmum & sesquipalmum longa, unciam unam aut duas lata, similia fere foliis salicis auriculatæ, Doricæ instar per ambitum cremata, sed tenuiora, glabra, non hirsuta ut in vulgari sapore quodam aromatico prædicta, calidiusculo. Flores non secundum caulem ut in virga aurea vulgari, sed in extremis furculis, ut in Doricæ, ut umbellam quodammodo mentiantur, lutei, foliis longiusculis ternis vel quaternis constantes, flosculis confertis in pappos resolvendis medium obtinentibus.

In fossis prope Argentoratum in Germania, inque summis jugis montis Juræ collegimus; *J. Bauhinus* in monte Rosberg prope Masmünster.

Floret Septembri atque etiam Octobri. Consolida sive solidago à conjungendis vulnerum labris Turcis & Saracenis dicta est. Lugd. ad eadem valet ad quæ virga aurea, cujus etiam species censetur. *Raius.*

VIRGA PASTORIS.

Dipsacus Ἀΐψακος, id est sitibundus nomen à contrario invenisse dicitur, quoniam cohærentium foliorum sinu concavo rorem vel imbrem recipiat, quo velut ad sitis injurias abigendas uratur. At *Vossius* Etymologias hæc per antiphrasin rejicit & explodit. Labrum vero Veneris à foliorum etiam positu, pelvis vel lavacri speciem constituinte, humorem faciei nitorem concilium antem continente.

Note generica sunt caules spinosi, flosculi squamis distincti, singuli singulis seminibus insidentes in capitula congesti flores compositos imitantia.

Vires. Radicis hujus usus est in rhagadibus ani consolidandis (decoctæ in vino) commendatur & in verrucis abigendis.

Aqua quæ in concavo foliorum reperitur caliginosa & rubentibus oculis prodesse creditur: eadem maculas faciei emendat & exterit. Mulierculæ formæ studioliæ usum ejus optime tenent. Trag. à nostratibus ad verrucas abigendas commendatur.

Hujus sed præcipue sequentis, singulis caputulis singuli vermiculi, quos idcirco non immerito solitarios dixeris non raro innascuntur, *Mouffetto* in sect. theat. lib. 1. cap. 20. descripti.

Hos impari numero pennâ anserinâ inclusos febre quartanâ laborantium collis annuleti aut remedii loco appendere vulgus nostratum solet. Sunt autem amphibæna hæc animalcula, & caput tangentis digitorum rectorum incedendo propere devitant. Descriptionem vide in Cat. Cant.

Præcipuus usus capitulorum dipsaci est ad pannos depectendos.

Scrofulas sanat carduus fullonum: in genere specifica qualitate omni putredini resistit, & est medicina cibalis & sapida. Coctus in vino purgat per urinam non secus ac asparagus. *D. Soame* ex observ. Marc. Cumanii à Velschio editis.

Phthificis etiam quodammodo desperatis experimento Guidonis Helidei & Henrici Stromageri Chirurgi mite proficuum comperi radicem cardui fullonum tusam & melle exceptam. Idem ex observat. Achillis Gasserii.

Si mulieres laborant appetitu depravato laudat Agneta aquam virgæ pastoris potatam, & præsertim post cibum. *D. Soame* è Dolæo. *Raius.*



VIRGA SANGUINEA.

Nomina. Cornus femina *Germ. C. B. Park.* Cornus femina putata, vitga sanguinea *L. B.*

J. B. Ex fruticum familia est quam Cornum feminam vulgo vocant, multis stolonibus luxurians, ramis plurimum oppositis, cortice spadiceo, sed ramorum sanguineo, odore vinoso prædito, materia alba & dura. Folia ad corni sativæ quam proxime accedunt, atrovi-
rentia, nonnunquam rubore asperso bina ex opposito nascuntur. Flores in umbella gerit odoratos, candidos, quatuor foliis radiatis constantes: in medio oblique surgunt totidem ejusdem coloris stamina, stylo recto subviti. Baccæ hederaceis vel juniperinis pares sanguineis petiolis appensæ, primum virides, per maturitatem nigricant, lacunâ in umbilico parva perfossæ, in quibus ossiculum pulpa virente, acerba, involavi, nec sine amatore immersum, striatum, nucleum continens album amarum. Ligni materies, autore Matthiolo dura osseaque corno minime cedens, virgis corno tenuioribus, robustis nodosis, cortice sanguinis modo rufescente.

Cæsalpino fructus niger, ut in ligustro rotundus, ossæ binas cavitates habente, in quibus singula semina continentur.

In sepibus & sylvis seu frutetis passim provenit tam in Angliâ quam in exteris regionibus. Æstare florat, baccæ Septembri maturantur.

Lignum lanionibus ad verucula conficienda in frequenti usu est; nam durum admodum est & renitens, ideoque carnes facile penetrat exacutum. Tragus ad utensilia & rustica instrumenta, potissimum vero ad carros pertinentia conficienda expeti scribit ob durabilitatem.

Camer. tradit Italos ex hujus ligno aquam stillatiam elicere, quâ solâ strumas (si qua id fieri possit ratione) penitus discutiant; sin minus maturare parum & diminueret.

Fructum ingustabilem omnibus animalibus producit cornus femina. At Cæsalpinus à turdis multum expeti asserit: cui contradicit Dodonæus, baccas sapore in gratas, & volucrem nulli desideratas esse scribens.

Ananienſia ruta in agro Tridentino oleum ad Lucernarum usum conficiunt à cornus feminae baccis decoctis primo in aqua deinde Torculari expressis. Matth.

In demorsis à cane rabido eundem habere effectum dicitur hujus lignum quem habet corni maris.

Modestinus in l. penult. ff. ad legem Pompon. de parricidis, antequam sacco parricidæ inderentur, ostendit in mote fuisse positum, ut virgis sanguineis cæderentur, nempe ex hac arbore sumptis, non, ut quidam legunt, sagmineis, aut, ut alii interpretantur sanguine rubentibus, quoniam infelicissimum haberetur & maxime infame. Magius, & ex eo Delechamp.

Hinc fortasse verecibus virga sanguinea dicta est hæc arbor: ni potius quod virgæ ejus magna ex parte ruberent sanguinis instar. *Ramus.*

VIRIDE ARIS, vid. *Ærugo.*

VISCUM.

Viscum seu *viscus* ab Æolico *βίσκος* pro *βίος*, quod idem significat. Latini Æoles sequuntur, unde est quoddam non tantum asperum spiritum in V. convertunt quo modo ab *εσπερος* est vespas, sed & lenem, ut in *divos* vinum, *εμω* vomo, *βίτλος* vitulus, *εἶδω* video, *εἶπε* ipse ver, *οἶκος* vicus, *ἡ ἰνὸς* vena, *ἡ* vis, aliisque quæ apud Caninium legi possunt.

Viscus est planta parasitica, seu frutex arboribus aut fruticibus aliis innascens. baccifera, monopyrenos.

Vires. Viscum ad aucupia ex hujus fruticis baccis tum olim tum etiam nunc dierum aliquibus in locis parabatur; postea contundunt & tandiu lavant in aqua

Manget, Bibl. Pharm. Tom. II.

quousque fursutacea excrementa eximant. Paratur optimum ex castaneæ visco. Quod apud nos in usu est viscum è cortice Agrifolii fit. In Damasco è myxis si-
ve sebesten paratur. Quod Venetias inde transvehitur.

Viscum seu gluten ad Aucupia paratum multi apud veteres in Medicina usus erat. Vim habet emolliendi & discutiendi tumores, parotides & abscessus resinæ parique ceræ admixtum: Epinyctidas quoque in splenio sanat. (Strumas siccæ, comitialibus medetur. Plin.) reliqua vide apud Dioscoridem, Plinium & Gale-
num.

Ligni usus præcip. & specific. in Epilepsia. Præscribitur etiam contra apoplexiam, & vertiginem, tum intus epotum, tum vero collo appensum: quibus in morbis multum præstare tum veterum tum recentiorum Medicorum unanimis est sententia. Scimus quosdam (inquit J. B.) visci ligno in vino macerato non inutiliter usos contra vertiginem, Pulvis visci (maxime quercini) non Epilepsiæ tantum medetur, sed & mentes movet. Arcanum etiam est contra pleuritidem semel atque iterum & tertio in aqua cardui & papav. exhibitus. *D. Borelle.*

J. B. Contusum & aquis convenientibus maceratum adversus vermes intestinorum, in pueris aliquos suavis usus scribit.

Visci oxyacanth. innascentis pulvis vino albo aut Hispanico infusus, & duabus ante paroxysmum horis exhibitus, doli subinde repetita si opus fuerit, febrem quartanam non raro fugat & perfecte sanat.

Commanducata fruticis frondes & depasta à jumentis & vaccis à rusticis nostris ad secundas remorantes ejiciendas utiles censentur.

Quod viscus quercinus præ aliis in honore & pretio sit, Druidum superstitioni tribuendum, autumo, qui visco & arbore in qua nascebatur, (si modò ea quercus fuerit) nihil habere sacratius. Plin. lib. 16. cap. 44. aiunt & Druidas solitos fuisse per adolescentes suos viscum suum anni principio mittere, quo viso clamarent omnes annum esse novum: atque hinc manasse quoddam juvenes hodieque anni principio ostiatim discurrentes, stipemque carmine poscentes appellant id *agnilæneus* quati à *qui l'an neus*, id est, ad viscum annus novus. Voss. Etymolog. fecunditatem eo potò dari cui-
cunque animali sterili arbitrantur Druidæ, contraque venena omnia esse remedium. Plin. apud quem plura vide.

Est viscum corylinum in epilepsiis & aliis capitis affectibus longè efficacius quercino: sed non nascitur in corylo nisi post centesimum annum ex opinione Henrici ab Heers. Joh. Helf. Juncher. in Chym. experimenta l. Curiosa. p. 618. utraque utatis perinde effig puto. *Ramus.*

VITEX, vid. *Agnus Castus.*

VITIS VINIFERA.

Vitis non à *vino* ut voluit Varro quatuor de l. l. sed ut Donatus è viere, quod Festus alligare. Nonius interpretatur, vincere & inflectere. Sane vitis lenta est facileque inflectitur, unde ut ea centurionum errat insignis, quo milites cædebant, ut ostendit Vossius in Etymolog.

Vinum à vi, ut quidem scribit Varro quatuor de l. l. Sic autem dicitur quia vim inferat menti: unde Plinianum illud sapientiam vino obrumbrari. Aliis placeat vinum dici quasi vitinum à viti. Ego cum Vossio in Etymologico plane censco vinum dici ab *divos*, *divos* vero esse à l'unico & Hebræo *jain*, quod & sentit doctissimus Angelus Caninius. Etymolog. Voss.

Notior est (inquit J. B.) vitis vinifera quam ut describi debeat. sed gratificemur frigido subjectis Septentioni: ut vel lectione novisse discant notissimi etiam ipsi nectarei liquoris parentem, qua nihil abjectius in-

tueri videri possit, alienæ opis indiga, ridiculum & pedamentarium ad miniculo iunites, tortuoso stipite, fulco-
ri o oq; cortice hinc, quæ ubi tepidiorem benignio-
ris cæli autum sensit, gemmas protrudit, in pampinos
postmodum ut familiare illis comparatione utar; lupi-
fali & rii a. ituros mihi tamen inamæna illa aspre-
dine horridos, sed lato virore splendentes: ita ut dixi-
mus humo sublata, capreolorum beneficio adminicula
sua, complexa à contemptu vindicatum sese it; floscu-
lorum suaveolentium quinque fib. illis herbis, luteo-
fos a. ices, sustinentibus compactilium (Cæsalpinus flos-
culos parvos & candidos ut oleæ ei attribuit) rac-
emis divitem colonosperm excitat uvarum, quas alias ne
colori p. es obligatam generositatem, ochrâ, alias ru-
brica, alias nigritie tinctas, aliisve coloribus insignes
producit: tantatæque saporum vitiumque varietate
quantam qualemque tam adversa quam secunda vale-
tudine quotidie experimur. Florem (addit Cæsalpinus)
non in summo fructu, sed in sede habet, ac plura semina
in communi conceptaculo: brevi tempore in magnam
altitudinem crescit, ita ut nisi crebra amputatione coe-
ceatur multitudine viticularum luxurians sylvescat fo-
lia fert ampla, variegata laciniata vi ficus, quos pampinos
vocant.

Vitis Theophrasto, ut & Varroni, arbor est, verum
cum alienæ opis indiga, nisi in propinquo sint quæ arri-
piat, humi proolvatur, arboris nomen non meretur,
quamvis caudex interdum in humani corporis aut etiam
femoris cr. sinem excreseat. Pisci magnitudinis res-
ctu arboribus annuerant, qua revera arboris non-
nullas vincit. Plinium attendamus id demonstrantem,
vol. 14. c. 1. Jovis simulacrum in urbe Populonia ex
una (vite) conspiciamus, tot ævis incorruptum. Item
Massiliæ pateram, Petaponti templum Junonis vitigi-
neis columnis stetit. Etiam nunc scalis rectum Ephæ-
Dianæ scanditur vite una Cypria, ut ferunt, quoniam
ibi ad præcipuam amplitudinem exeunt. Nec est ulli
ligno diuturnior natura. Huc pertinent quæ de earum
proceritate ramorum & palmitum mira extensione &
densitate habet. Nullo (inquit) sine crescunt. Villas &
domos ambit singularem palmitibus & sequacibus lo-
ris memoria dignum, una Vitis Romæ in Livie por-
ticibus subdiales inambulationes umbrosis pergulis opa-
cat, eadem duodenis musti amphoris fecunda. Ulmos
quidem ubique exsuperant: miratumque altitudinem
earum Aricia ferunt Legatum Regis Pyrrhi Cineam fa-
cere lussisse in austriorem gustum vini, merito matrem
ejus pendere in tam alta cruce.

De Vitium Generibus.

C. Bauhinus vitem dividit in sativam & sylvestrem,
sativa (inquit) alia major est, cujus plurimæ species, alia
minor. Majoris uvæ & colore & magnitudine diffe-
runt: alterius namque acini aut virides albicantesve,
aut fulvi, aut saturato rubore nigricant aut cærulei, aut
subrubentis coloris: aliæ acinis oblongis magnitudine
& forma prunorum, quæ pergulana dici potest: aliæ
rotundis iisque vel magnis, vel parvis: aliæ acinis sunt
frequentioribus, aliæ rarioribus. Sunt quæ granis aut vi-
naceis carent, interdum unicum vel alterum granum
habent. Rarius uva barbata reperitur. Minor vero est
acinis nigris, rarissime albis aut fulvis, nucleo minimo
ac molli: sapore etiam differunt, ut dulci acerbo, mus-
cato, quæ Vitis Apiana Plinio.

In foliis quoque differentia est, alia majora, profun-
dus incisa ut Italica, foliis ad pediculum usque in laci-
nias acutas divisis, alia minora sunt. Sic alia tenuiora,
alia crassiora, alia viridia, alia rubentia, alia maculata,
alia ad tactum duriora, molliora, alia lævia, alia de-
nique hirsuta. Hactenus C. Bauhinus.

De uvarum generibus breviter Plinius, uvarum ge-

nera magnitudine, colore, saporibus, acinis innumera,
etiamnum multiplicatur Vitis. Hinc purpureæ lucent
colore, illic fulgent roseo, nitentque viridi; candidas
enim nigerque vulgares. Tument vero mammatum
more bumasti: præ longis dactyli porriguntur acinis
&c.

Genera vitium innumera & infinita esse non secus
ac pyrorum & pomorum apud veteres etiam in con-
fesso fuit, cum (ut recte Plinius totidem pene sint quot
ægri, & nova in dies producantur & usque producen-
tur.

Vires. Vitis viniferæ folia cum claviculis trita, & im-
posita capitis dolores mitigant, itemque stomachi in-
flammationem & ardorem cum polenta. Idipsum etiã
folia per se imposita præstant, quippe quæ refrige-
randi astingendique vim habent. Potus eorundem ju-
cus juvat dysentericos, sanguinem excreantes, stoma-
chicos, & mulieres malacia laborantes; lachryma vi-
tium, quæ velut gummi est, quæque circa illarum cau-
dices concrevit (in Vitis nostris huiusmodi gummi
sp. n. exudans non invenitur) ex vino pota calculos
pellit, nuncta lichenas, psoras, lepraque nullo alio
præparatis sanat. Eadem cum oleo sapius pilis illitis
pustulæ effectum habet; maximeque liquor quem accen-
sa sarmenta vitium viridia exsudant quo & peruncta
myrmecia tolluntur. Cinis autem sarmentorum, & vi-
naceorum circa sedem condylomatis & Thymis illi-
tus ex aceto medetur. Prodest & luxatis ac viperarum
moribus; quia & contra l. n. inflammationes f. cit
cum rosaceo; rata & aceto impositus. Plures adhuc ci-
neri & lixivio ex eo parato vi. es ascribunt Botanici:
verum cum cineres lignorum eorumque lixivium non
multum inter se differre nobis videntur; nisi quatenus
salem fixum copiosius aut parciorum contineant,
cas omittimus.

Uvæ ex sententia Galeni, quemadmodum inter fru-
ctus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus
omnibus magis nutriunt, minimumque pravi succi ha-
bent præsertim cum exactam maturitatem sint adeptæ.
J. B. qualibet uva recens alvum turbat & stomachum
indat ideoque earum esus in febribus interdicitur: quæ
vero decerpta aliquandiu pendit, propterea quod ea
ventilatione magna humidatis portio decessit, inno-
centior est, ac tum stomacho utilis est, tum appeten-
tiam ciborum restituit, atque adeo ægris languentibus
ve proficua; & alvum emollit. Cæterum magna est
inter uvas differentia, dulces enim magis nutriunt &
corpus pinguefaciunt, ventriculum inflant & alvum
subducunt: austere è contra parum nutriunt & ven-
trem cohibent.

Memini me alicubi legisse Matronam quandam
Germanam toto vindemiæ tempore per unum aut al-
terum mensem quo uvis victitabat, nullum omnino
potum haurire solitam, unde patet uvas sicim restin-
guere.

Uvæ passæ non à patientia dictæ sunt, ut vult Plinius,
quasi solem passæ, sed à pando quod ad solem expan-
dantur. Monspeffilani uvæ passas hoc modo parant,
racemos binos hinc illinc filis ligatos vitiosis acinis
forfice detractis, ferventi lixivio, addito olei paululo
immergunt quoad stacceant tantum & corrugentur;
deinde periculis imponunt ut siccescant, ac post triduum
quatuordecim dies insolant ut Columella docet. J. B. uvæ
passæ vinaceis exemptis alvum leniunt; pectoris an-
gustia, tussi, exasperatis faucibus & renum velica-
que vitis maxime conveniunt, unde & pilanis dictis
immiscuntur: zibæ dictæ h. e. passæ maximæ seu
damascenæ exemptis gigartidis in aqua fontana vel stil-
latida convenienti infusæ, potum ægrotis exhibent sa-
tis gratum sitque convenientem. Passæ Apianæ Co-
rinthiæ dictæ aciditate grata commendabiles. Ma-
gis refrigerant & febricitantium jusculis utiliter inco-
quantur.

quantur. Gigarta vim habent adstrictoriam, conveniuntque in vomitu & alvi fluxu, sive intrinsecus, sive extrinsecus adhibeantur, (torrentur scilicet ac teruntur.)

Vinacea, id est, filiquæ cum gigartis in expressione multi residuæ, magnarum virium perhibentur in arthriticis doloribus sedandis, si membrum affectum vinaceis per se calecentibus imponatur.

Uvæ passæ calore suo acri & penetranti dentes & gingivas vellicant, maleque afficiunt; & frequenter comestæ eos ad putredinem disponunt.

Liquor ille generosus ex uvis ut moris est, calcatis vel sponte defluens, vel torculari expressus & pressus & fermentatus vinum vocatur, quod nomen à Græco οἶνος factum est spiritu leni in V mutato, οἶνος autem ab Hebræo jain ut jam diximus.

Vini usus & facultates explicare omnino super vacuum esset, cum non possint non omnibus esse notissimi. Licet tamen hic inferere observationem à D. Hulse ex Antonii de Heide Centuria observationum quæ tertia in ordine est descriptam & ad me missam, ad Aphthas prætermittendum haud videtur. Quod in quibusdam ægris aphthosa crusta non crassa linguæ & palato adeo pertinaciter adhæret, ut lenientibus gargarismatis scilicet à decocto raparum, hordei &c. quæ contra aphthas maxime conducunt, intra paucos dies abstergeri haut potuerat, ægri licet à febre immunes essent, brevi tamen fugatur potu vini Gallici quia particulæ aphthosæ subinde acriore stimulo ad suiliberationem egent,

Genera vini veteribus celebrata recenset Plinius lib. 4. c. 6. D. Augustus (inquit, Setinum cunctis prætulit, & secuti principes, confessa propter experimenta &c. nalcitur supra forum Apii (Seria oppidum est in colle à Teracina quinque millibus distitum; hodie Zezza,) jantea Cæcubo erat generositas, celeberrima in palustribus populetis, sinu Amyclano, quod jam intercidit & incuria coloris, locique angustia, magis tamen Fossa Neronis, &c. Secunda nobilitas Salerno agro erat, & ex eo maxime Faustiano. Exolevit quoque hoc copiarum potius quam bonitatis studentium: Falernus ager à Ponte Campano lava petentibus Rhanam Colouam Syllaniam, nuper Capuæ contributam incipit. Faustianus autem circiter 4. mill. à vico propè Cedias, qui vicus à Sinuesse 6. millibus abest: nec ulli in vino major autoritas. Solo vinorum flamma accenditur, Tria ejus genera, Austerum, dulce, tenue. Quidam ita distinguunt: summis collibus Gaurarum gigni, mediis Faustianum, imis Falernum. Non omittendum autem, nulli eorum quæ celebrantur jucundum saporem uvæ esse. Ad tertiam palmam varie venere, Albana urbi vicina prædulcia ac rara in austero. Item Surrentina, in vineis tantum nascentia convalescentibus maxime probata propter tenuitatem, salubritatemque. Tib. Cæsar dicebat consensisse medicos ut nobilitatem surrentino darent, alioquin esse generosum Acetum. Certant Massica æque ex monte Gaurano Puteolos Bajasque prospectantia. Inter Græca vina maxime celebrata fuisse Maroneum in Chersoneso Thraciæ, Thasium, Creticum, Coum, Chium, Lesbium, Icarium, Smyrnæum, &c. inter Asiatica Cyprum, & Montis Lybani vina. Reliqua genera videt apud Plinium loco citato, nostri enim instituti non est omnia vini genera quorum nomina apud veteres & recentiores occurrunt enumerare. Sufficiat aliqua eorum quæ apud nos hodie in usu & pretio sunt breviter indicasse. Ea sunt à Gallicis 1. Parisinum, tenue & oligophorum, ubi bene maturum grati saporis & studiosis aptum, *vin de Paris*, 2. Campanum *de Champagne*: omnium Gallicanorum delicatissimum; 3. Bardegallense seu Gravianum, 4. Vinum Burgundiacum, inter Burgundiacæ autem primum locum obtinet Beau-

Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

nense, secundum vulgare proverbium vinum Belneense super omnia recenset, 5. Vinum Albū vulgare, 5. vinum Frontinianum generosissimum & Moschū redolens. 7. Vina Aurelianensia magni fiunt in Francia ob generositatem & salubritatem 8. Vinum emeteticum.

Ex Hispanicis usitatissima & notissima sunt, 1. Canarinum omnium laudatissimum, generosum & lenē, naturæ amicum, 2. Malacense vetus, præcedente etiam optimus & pinguius, at si copiose sumatur caput gravas. 3. Xeranthum austerius & palato minus gratum. 4. Alonense, rubrum & crassum palato quidem gratum, ad stomacho minus utile & caput gravans. Huic non multum dissimile est genus illud quod adfertur etiam ad nos ex Lusitania vinum Portuense sed rarius. Vinum Maderæ insulæ ex majori parte in Americam transfertur. Ex Italicis pauca importantur, ex Hetruria vinum Florentinum rubrum, stomacho commodissimum & in conviciis saluberrimum. 2. Verdea dictum itidem ex Hetruria, album dulce, & lenē, magis gratum palato, quam stomacho utile. In Italia ipsa celebrantur, Venetiis vin. Malvaticum, Malvasia Canarino proximum, non in Italia natum sed in Creta insula; Vicentinum rubrum dulce & piccante dictum. In Hetruria Faliscinum sive de Monte Fiascone; Romæ Albanum olim celebre, & de Monte Pulciano; Syracusanum ex Sicilia insula; Neapolitanum rubrum lachrymæ Christi dictum, & vinum Græcum ad radices Vesuvii Montis ortum.

Vinum Moschatellinum rubrum ex insula Creta defertur.

Ex Germanicis Rhenana sola aut non procul à Rheno remotæ originis ad nos importantur, ut Nicrianum, Rinchoavianum, Machamore, Mosellanum, & Baccherac.

Vinum autem aliis potulentis quibuscumque cerevisiæ, melicerato, pomaceo, Apici, cæterisque de fructibus factitiis tum voluptatis tum salubritatis respectu longe antecellit. Nunc dierum vina austeriora quamvis palato minus arrideant, ventriculo tamen commodiora & cibo concoquendo magis idonea censentur; ut vina rubra Gallica & Florentina, quæ asperiuscula & styptica linguæ & palato sentiuntur; quam alba, quæ lenia & dulcia. Verum à omnia quæ de vinis dicta sunt & adhuc dicenda restant persequi vellem huic soli Historiæ non unum volumen sufficeret. Qui plura velit legat Andreæ Bacci eruditissimum opus de vini generibus anno 1596. Romæ impressum, in quo quicquid ab antiquis & recentioribus de historia uvæ proditum occurrit complexus est, unâ cum observationibus plurimis propriis & animadversionibus in vina Græca, Italica, Hispanica, Gallica & Rhenana, eorundem culturas, locos, nomina, varios præparandi & tractandi modos, morbos & remedia, vasorum veterum & novorum multiplicem varietatem, cellas, &c. respicientes.

Omphacium veteribus succus erat acerbæ & nondum maturæ uvæ, sole resiccatus & densatus ad consistentiam Rob. recentioribus est succus uvæ immaturæ expressus, colatus, in doliis reconditus & vase clauso asservatus. Utrumque refrigerat & siccatur; hoc non ad medicamenta tantum, sed ad ciborum condimenta & intrinsecus utile est, nauseam ac cibi fastidium tollit, apperentiam excitat, alvi fluores reprimat, ardorem stomachi aliorumque viscerum mitigat, non modo intus sumptum, sed & foris admotum.

Dioscoride auctore, omphacium veterum oculorum claritati confert, eorundemque scabritiæ & angulis arrosis, quod hodie de pomorum sylvestrium agrestia verum experimur.

Schroderus omphacium calidis morbis omnibus
SSSS 3 felicior

feliciori iuvamento esse ait quam acetum, quod præter refrigerandi vim & caliditate acri pollet, secus ac omphacium.

Sapa Græcis ἐφῆμα & σιπαῖον ingenii non naturæ opus est, musto usque ad tertiam partem mensuræ decocto. Plin. lib. 14. c. 9. & lib. 23. c. 2.

Defrutum Columellæ idem est, quod Sapa Plinio, nimitum mustum ad tertias decoctum, Plinius defrutum à Sapa distinguit, quod sit mustum ad dimidiam decoctum. His addit Palladius,

Carznum, quod ait fieri cum duabus partibus deperditis tertia remanserit.

De vitibus & usu Sapæ nihil attinet dicere cum jamdudum in desuetudinem abiit.

Lora Græcis δολιχὰ seu vinum secundarium, sit ex maceratis, aqua vinaceis. Tria ejus genera Plinio. Decima parte aquæ addita, quæ multi expressa sit, & ita nocte ac die madefactis vinaceis, rursusque prælo subiectis. Alterum quomodo Græci fecerunt, tertia parte ejus quod expressum sit addita aquæ, expressoque decocto ad tertias partes, Tertium est facibus vini expressum, quod facatum Cato appellat.

Spiritus vini seu aqua vitæ est liquor à vino destillando in vasis idoneis elicitus. Calidus est & liccus, penetrantissimus: eximii usus in animi deliquiis, ut vel naribus admotus odore suo animam revocet, in cordis palpitatione ac tremore; resistit putredini, in tantum ut carnes vel cadavera ei immersa, diu servari possint incorrupta; spiritus languentes refocillat, apoplecticos & Comate oppressos juvat; extirpatus, resolvit tumores frigidos ac scirrhusos, arceat coagulationem sanguinis in contusionibus, cruentemque resolvit ac disciuit. Nimis copiose & frequenter pro potu ordinatio sumptus calorem naturalem paulatim extinguit, ventriculi tonum relaxat, appetitum prostermit, totamque naturæ economiam subvertens tabem & mortem inducit, mentium est (ut vocant Chymici) h. e. solvens, ad tincturas extrahendas aliæque nobilissimum.

Acetum fit ex vino vel in loco nimis calido detento, vel diutius reservato, vel soli exposito. Arte fit cum vinum aut cerevisia coquitur, refrigeratque fermentum; aut panis calidus hordeaceus (qui unus omnium pravallet) aut pisa, aut hordeum tostum imponitur J. B.

Aceti usus frequentissimus est & fere quotidianus in cibo & Medicina; in cibo ad condimenta & intinctus. Appetentiam cibi excitat & concoctionem promovet acidum ventriculi, quod sibi maxime conficiuntur R. p. borondo.

In Medicina usus est ad æstum febrilem contemperandum, putredinem arcendam, phlegmaticos & glutinosos humores incidendum ut excrctioni & expectorationi habiles fiant. Extrinsecus scabiem prurium, herpetem, &c. calorem eorum contemperando malignitatem corrigendo sanat. Nervis nervosisque partibus inimicum est: corpus quoque extenuat, unde macilentis ejus usus incommodus est: memorabilis in hanc rem est historia quam narrat F. Strada de bello Belgico l. 8. Chiapinus Vitellius Generalis Castrorum Præfectus sub mediam fere ætatem, crescente adeo mole, ut fascia è collo demissa sustinendus est venter, videns inde quotidie tardiores se reddi ad belli munia, vino sua sponte sibi interdicto, acetum exinde bibere ad vitæ usque finem perseveravit, efficitque ut detumescere abdomine, defluenteque ventris pelle, qua ipse se thoracis instar involvebat, octoginta septem librarum pondo decrevisse compertus sit,

Ad suspensos aut suffocatos etiam si spumam emittant, da bibendum acetum mustum cum pipere, aut acetum cum pulvere pulegii & pipere, tres servatos vidit Christophorus à Vega. Chesneau.

Ad tineam & Zinzib. ʒiij. decoque in aceti acerrimi & butyri an. ʒʒ. quousque acetum sit consumptum:

deinde contunde & cum butyro fiat ung. quo mane & sero tinea inungatur, & intra quatuor aut quinque dies sanabitur, (inquit lib. arcanorum) idem observationes è Chesneau excerptas transmittit D. Hulse.

Vaporis aceti in peste usus est eximius de quo Medici consulendi pro tartari historia usu, preparationibus, &c. vide Chymicos scriptores: plenam uvæ historiam scribere mihi locus nec opportunità est. Tartarus est vel albidus vel rubescens; albidus magis æstimatur, ut purior & minus terrestris; optimus è Germania detetur ejus præparationes habent facultatem attenuandi, incidendi, & aperiendi cremore tartari ad ʒʒ. dato ardor ventriculi jam desperatus fuit sublatus, Etmuller. Prax. cap. 8.

Ad singultum ex inanitione & vini Hispanici & facchar. q. s. f. syrup. sumat æger frequenter ex manuscripto, D. Page Medici Suffolcientis.

Bulimos curatur optime per vinum, quod quo vetustius eo melius malvaticum præ cæteris convenit.

In picâ & malacia specificè commendatur à quibusdam aqua pampinorum vitis verè ex vitium furculis stillans.

Quidam sani siti matutinæ obnoxii sunt, hos optime curare solet haustus vini abunthitis.

Tumor cancrusus omnino curatus est in quodam viro mihi familiari ex usu vini rhenani ʒʒ. cui infundebantur Raph. sylv. ʒij. per horas 12. in cujus usu perseverabat per dies octo vel decem matutino tempore. Ex MS. D. Fisber, M. D. communicavit D. Hulse ad mixtionem sanguinis & Pulv. fol. vitis quæ post vindemiam rubescunt ʒj cap. in vino albo è lib. Arcanor. Chesneau.

De spiritu vini illud annotandum quod ille qui conficitur ex frumento multo magis anodynus sit quam alius. Muis in Podalyr. redivo p. 31.

ʒ. Uvas suspensas putidas, projice in aq. ferventem per horæ dimidium; eas supra arduas prunas injice, sumumque excipiat mulier septies in die ad deturbandum sætum mortuum. Mirabile (inquit Zacutus) quod in tam facili remedio tanta vis recondita sit, quod ego feliciter sum expertus, lib. 3. prax. hit. c. 17. observ. 2.

Spiritum vini vulgarem cum pulverisat. zingib. mixtum, & fortiter insufflatam in ejusdem lateris cum parte affecta narem, vel parti dolenti applicatum ab experientia frequenter commendat D. Hulse in odontalgia, cum alterutra ex gingivis afficitur absque ulla dentium carie aut cavitate. Rainus.

È facibus vini desiccatis & ad calcinationem combustis fit sal ille qui Cimis Clavellatus quibusdam Gravelatus dicitur. Item à facibus vini desiccatis per operationes necessarias Clar. Wepferus educit sal volatile acerrimum, cui tamen non ita forsitan meritò salis tartari volatilis nomen attribuit, cum potius sal volatile sæcum vini quarum volatilitatem nemo non novit, appellari debeat. De hac autem encheiresi pluribus hic non agimus quia nihil peculiare habet, & quod aliorum salium volatilium elaborationi non conveniat.

VITIS ALBA, vid. Brionia.

VITRIFICATIO, vid. Vitrum.

VITRIOLUM, vid. sub titulo Sal.

VITRIFICATIO & cum eâ CHRYSSTALLISATIO.

§. A calce & Cinerib. opacis tanquam Vitri materia, transeo ad Vitrificationem seu productionem concreti diaphani, crystallum naturale æmulantis. Operatio eadem hæc communiter inter inspirationum seu coagulationum genera refertur, cum tamen peculiaris & ab his diversissima videatur: quatenus fluidis minime similitudinem dat, sed solidorum potius texturam ita immutat. ut ex opaco fiat pellucidum, & ex illo, quod in aqua solubile, tale corpus quod hujus non tantum fluit, sed ignis quoque potentia destructivæ, maxime resistit, adeoque metallo perfectiori ac puriori, Auto, fixitate & immutabilitate propius accedit hoc pyrotechnia productum.

etiam, ut cum illo idem ignis purgatorium intrepide sustineat, pliusque splendoris & precii ab ejus tortura, ac illud a natura excoctum minerale, si quod inallecabilitas huic præ illo acquisivit, excipias, petat.

§. 2. Non coagulationis modum, sed solidorum corporum certam transmutationem, dum Vitrificationem assero, autem illud *Celeb. Morhofi* vellicat quod ex *Nob. Boylei* ore refertur quendam poculum aqua plenum per inspersionem pulveris cujusdam albiissimi in substantiam solidam & crystallinam convertisse: Quia tamen hoc similiaque secretioris minusque quotidianæ indolis videntur, nec cum asserum haud turbabunt Vitrificationis subiectum non tam fluida coagulanda, quam solida, diaphaneitate ornanda, esse, licet vitris quoque accenseantur metallorum Scoria, parum, aut nihil perspicuitatis habentes, adeoque artifici haud desiderata.

§. 3. Perspicuitatis vitri æque, ac aliorum corporum, rationem subministrare videtur *Aristot. sect. 11. probl. 61.* per motuum rectitudinem seu correspondentiam talem, quæ radiorum lucis rectam incidentiam haud impediatur, id est, cum recta particularum lucis translatio ad omnem eius propagationem requiratur, adeoque hæc per corporum substantiam fieri nequeat, nisi illa poris rectis formalitas primario in dicta pororum rectitudine consistat: ita quidem, ut annotante *Berigar do, du Hamel* aliisque, vel ullum corpus adeo opacum sit, quin in tenuiores laminas redactum aliquid diaphaneitatis monstret, v.g. asserrula tenuiora, aut argentique folia, quæ luci exposita nonnihil pellucere, imo dictorum metallorum bracteæ instar cribri perforatæ, observantur, poris eorum hactenus totius per attenuationem ad rectitudinem redactis. Nihilominus adeo exquisita semper pororum rectitudo in diaphanis necessaria vix erit, quatenus aliqualis eorum tortuositas, modo breviores fuerint, non omnem lucis transitum turbat, licet cum aliquali radiorum refractione hic contingat: ratione cujus luxilla penetrans non omni tinctura destituta, sed in asserrulo rut lans, in folio auri ex viridi cærulea, compareret. Præterea nec multitudinem pororum horum rectitudini interdum succedenti, absurdum est, si sc. illa numerum particularum solidarum æquet, vel notabiliter superet, ita ut hæc illis interceptæ pauciores tantum radios inhibeant aut à recto motu detorqueant.

§. 4. Porositatem quidem Vitro *Vossius de Natura Lucis*, *Zwelferus contra Teubonium*, *P. Cherubin de Impenetrabilitate du Verre* &c. magno conatu denegant, alii contra eisdem asseruerunt; atque hoc per argumenta haud levis armaturæ sibi visa. Sc. 1. quod subtilissimorum spirituum minima effluvia, item argentum vivum ipsas etiam hermetice sigillatas phialas permeant, illaque odore etiam se prodant annotante *E. Bartholino de natura mirab. qu. 4. 23* *Cornel. Consensino de Circumpulsione Platonica. 2. Hiddens* referente *Nob. Borrichio de Ortu & progr. chym.* aquæ communis guttulas vesicularum vitrearum tenuissimarum parietes penetrasse sicque vascula hæc sensim exhausta fuisse, refert. 3. Idem *Borrichius Act. Hafn. Vol. 1. c. 72.* Partibus quosdam sibi compertum tradidisse, vulgata Chymicorum vitra vacua, hermetice clausa si vivaceis calentibus aliquandiu imponantur, notabilem liquoris copiam intra se colligere, à tantilla aeris inclusi portionem haud orundam. 4. Per experientiam ejusdem *Borrichii* illa mixtura ex floribus sulphuris & nitri, intra retortam vitream ab arenæ calore in flammam ab ipitur. 5. Sub directione *Boylei de poros. Vitri* imatura flammæ & plumbi intra vas pariter vitreum sigillatum à flamma sulphuris & spirituum ardentium in calcem cum ponderis augmento fuit mutata; ac 6. observante *Eodem. de vi aeris elast. exper. 36* in destillatione materiæ cujusdam, sale volatili sulphurea maxime turgidæ igne supra modum aucto, externo recipientis superficiem procul à commissura guttulæ adhærescebant, ejusdem cum destillata materia naturæ.

§. 5. At quoad penetrat onem liquorum volatilium & Mercurii obitat non tantum experientia contraria *Boylei & Borrichii*, quorum hic, spiritum Salis Armoniaci intra phiolam hermetice obstruatam & per aliquot menses asservatum nihil odoris urinosi exhalasse nihilque ponderis perdidisse refert, ut ut notabilem intra hoc tempus virium jacturam passus fuerit: Sed si *Saggi di Naturali Esperienze fatte in Firenze*, oleum cæcæ, balsamum sulphuris & spiritum urinæ equinæ odore suo acutissimo vitrum hermetice sigillatum haud permeasse, nec spiritum seu oleum corticum citri vasculum vitreum tenerium satis subintrasse & in hoc contentam aquam odore suo infecisse, quoque testantur. Tentarunt idem Florentini, an effluvia seu exhalationes perdicis, intra vitrum subtilissimum ac pariter sigillatum detenti, hujus substantiam eoque penetrarent, ut à cane venatico percipi possent: Frustraneo tamen successu. Quod verò spiritus Salis armoniaci phiolæ inclusi activitas sensibilibiter interim fracta fuerit, vel ideo particularum volatilium secessui haud attribuendum, quod sine ponderis detrimento id contigerit, vel quod spiritus illi salini, continuo motu exagitati, non possunt non mutuo ac frequentiore attritu aculeos suos perdere, potissimum cum salia quoque fixa frequentiore calcinatione ac solutione aculeos suos successive ita perdant, ut in terram inspidam plane convertantur, docente experientia quotidiana.

§. 6. Pariter quod aquæ substantiæ per vitrum transudationem Vesiculis illis tenuioribus, quales *Hiddens* formaverat, cum *Borrichio* facile largior, quod propter summam sui subtilitatem rectiores & breviores earum pori humoris transitum intercludere nesciant, in ordinariis tamen & crassioris compagis vitrum adeo notabilem porositatē mihi persuadeere non possum, admonitus à Florentinis dictis experimentatoribus, qui sal tituli probeque totum in vase sigillo spagyrico munito, per descendium in imo cysterinæ postmodum æquè diu in crystallophylaceo, asservarunt, sine ulla humiditatis externæ inhibitione. Patentur equidem, se aliquando aliquid ejus in sale ejusmodi observasse: quod tamen, cum semper in una vas parte contingeret, impetui frigoris potentioris, a liquido humiditatis impellenti, tribuunt; forsitan texturæ vitri potius illius lateri laxiori imputandum. Etenim negari haud queat, variisq; experientis constet, singulari virtute penetrativa glaciem & nivem poltere, e ipso tamen, dum in modo memorato experimento humiditas solis particularis tantam depresso fuit, unum valis latus compactius, alterum laxius & porosius, suspicari licebit; quorum illud humiditatis æque ambientis sub ingressum, ac frigoris illum impulsus, inhibuit, hoc iisdem aditum concessit.

§. 7. Quam vitrorum habitudinem diversam conciliatricem nuncupo disparis illius experientiæ, quam rebus naturæ alium toleriores animadvertiores pro diversis suis partibus allegant, dum v.g. *Bartholinus, Hiddens, Cornelius Consensino*: fluidorum, præter radios solares & flammam, vim vitra penetrandi testantur, alii v.g. *Boyle & Academici Florentini*, negant aut suspectam salis reddunt contra *Dan. Bartoli, del Suono de Tremori armonici & dell'udito, tratt. 3. c. 7.* autoritati Magni *Boylei* contradicens, se nihilominus certum esse, inquit, liquores duri chymicos, maxime & adeo sicciores, qui ex vasi hermetice sigillatis simili ratione, ac per fenestras conspicuas valde aperturas avolent imò Egregium quendam Philosophum ac Medicum, reumque Chymicarum experientissimum vitrum, per experientiam propriam ac reiteratam sibi asseverasse refert, quod Mercurii vivi, ovo chymico incarcerati substantia ad calorem Balnei per gradus auctum & aliquandiu continuatum illud, sipe ulla ruptura, permeaverit, ejusque superficiem incrustavit. Experientia liquidem suffragio constat, haud ejusdem densitatis cuncta esse vitra, eorumque nonnulla observantur,

quæ uberiore sale turgida aut minus sufficiente coctione subacta, non modò à spirituum acidorum contactu brevi corrodantur & in fragmenta minima resolvuntur, sed in locis uliginosis ac humidioribus sudorem quoq; salum emittunt, quod nec in aliis, nec iisdem, modò ignem diutius sustineant, videre contingit. Bisariam hanc, i. e. strictiorem ac laxiorem, vitrorum texturam confirmat experientia *Redi*, quæ aquam cinamomi in vitris crystallinis, Pisis conflatis, intra paucas horas suam diaphaneitatem cum lactea opacitate commutare, imò paucis interpositis diebus aliqualem amarorem induere, in vasis Romanis & Venetianis post aliquot demum dies, in Parisiensibus verò tardius & vix leviter, lactescere, nunquam amarescere perhibet.

§. 8. Præterea hanc vitrorum penetrabilitatem non parum juvare videtur calor ignis intensior, sive poros eorum dilatando, sive fluida contenta summè attenuando, hisque irrefragibilem quasi impetum imprimendo, ut Experimenta ex *Boyllo*, *Bartolo ac Borrichio* producta probabile reddunt. Adeo, ut, vitrorum poros illos exilissimos, quorum rectitudinem ac multitudinem radii solaribus, ignis flammæ & corpusculis frigorificis concedere, palam est, ordinariè adæquatos aliis fluidis credere jubeat multijuga experientia: eorum verò penetrabilitas aut vitrorum imperfectio i, aut caloris violentiæ in acceptis referenda venit.

§. 9. Subjectum Vitrificationis mineralia diversa sunt sc. arena, silices, Antimonium, Plumbum &c. & quidem modò per se, modò invicem, aut cum salibus vegetabilium alcalisatis miscenda: imò ipsa vegetabilia incinerata per continuatam violentioris ignis torruram in vitrum, ut ut minoris densitatis ac brevioris durationis, deliquari posse præter experientiam, qua alcalia quoq; à terra sua minus liberata, aut crebrioribus solutionibus ac calcinationibus magna sui parte in terram conversa nonnunquam vitrescere, constat, ratio jubet, quatenus tetrea cinerum substantia, sulphureis massulis expullis, cum salina denuo & per novam texturæ rationem coit.

§. 10. Ad Vitrum vulgare & quotidianum conficiendum duo, tanquam partes essentielles, concutunt, silices seu arena & sal alcalisatum, hujusq; non tantum illa species, quam vulgo sodam Hispanicam vocant, quæ ex certo vegetabili, Kali dicto, educitur, sed quam quæcunque vegetabilia, sc. filix, stipites fabarum, Arundo, ligna foci & cineres clavellati suppeditant. Nempe lapidea portio cujuscunque etiam generis hæc fuerit, vitro consistentiam & firmitudinem dat, pari ratione, ac metalla vitriolis, ita quidem ut si sal hac proportionem superet, vitra facile in aere humidior deliquecant, quale quid in vitriolis quoque, metallo pauperioribus, observatur, ut tantum non semper madescant & sponte quasi diffluant. Alcalia verò eum in finem adduntur, ut lapidum deliquationem faciliorent, utpote quæ sine illorum commiscela difficilis, imò impossibilis, foret: Hinc Antimonio similibusque facilioris fusionis mineralibus tali additamento haud opus est, imò interdum, v. g. in Vitro Saturni, plumbum, ut metallum maximè fusibile silicibus idem quod sal lixiviosum, præstat, ut taceam, borracem, arsenicum, Nitrum ejusdem virtutis esse, cum arena subtiliore in gemmas artificiales, appropriatis suis coloribus tingendas deliquescentia. Additur binis his vitri quotidiani ingredientibus essentialibus aliquid Magnesiæ, non tam vitri formandi, quam ejusdem vitris minus grati expurgandi & diaphaneitatis exaltandæ gratia: quod tamen minerale, si paulo largius admisceatur, nigro colore idem vitrum obscurat.

§. 11. Proportionem silicum seu arenæ & Salis vix absolute determinare licet, nisi de utriusq; conditionibus optimè constet. Ita flex macrior, & difficilius fusionis, v. g. pyrites, plus salis alcalisati exigit, sin pinguior existat, ac facilius deliquecat, v. g. qui circa littora maris colligitur, minor salis quantitas ipsi sufficit, cum hic ali-

quid salis nitrosi, fusionem juvantis contineat, adeoque talis futuri accessorii tantum haud possulet, imò plus æquo admixtum sal vitrum in aere humido sponte dissolvit. Pariter nec salium semper eadem videtur habitudo, quatenus quæ cum Sale tartari aut Calcis vivæ exaltata plus efficaciam sub minore mole præstant. Atque hæc quidem probè deparata si in igne fluant, coeunt in corpus illud solidum, pellucidum ac fragile, quod Vitrum vocant, densius & nitidius, quo diutius ignis fusionis gradus sustinuerunt.

§. 12. Reliquas & speculiores hujus mechanicæ circumstantias, quia ad vitrarios potius spectant, transeo, vitrorum merè mineralium & metallicorum structuram contemplaturus, inter quæ ut simplicissimum, ac in officinis Chymicorum frequentissimum, observatur Vitrum Antimonii, cui etiam ideo primum præ reliquis hic concedo locum. Paratur hoc ex simplici Antimonii calce, coloris hyacinthini, per meram fusionem, ipse tamen, ut communiter philosophantur, quod postquam sulphur ejus per calcinationem exhalavit, salina ipsius particula, vitrificationis potissimi autores, densius sibi agglomerata, terrestres, ab igne interfundendum magis attenuatas, comprehendant, & cum his in Vitrum abeant. Quamvis enim negari haud queat per calcinationem antimonii crudi aliquid sulphuris externi exhalare, quod sine dubio vitrificationem turbat & ab ejus regulo jamdum per fusionem separatur nihilominus quia 1. per calcinationem hanc diutius continuatam tota simul antimonii substantia, non sulphur tantum, in flores elevatur, ex quibus nihilominus vitrum parari potest, 2. nec regulus, sulphure illo licet exutus, in vitrum, nisi ad calcem usque cineream tostus, in vitrum abit, 3. ex Capite mortuo quoque Butyri antimonii ac cinabaris regulus perfectus, & ex utroque novum patitur butyrum & cinabaris conficitur, ideoque incongruè forsitan illa nomenclatura notata. 4. ipsum vitrum facile negotio in regulum redigitur, omnibus antimonii partibus essentialibus instructum, 5. ex eodem vitro etiam cinabaris parari valet: haud per spoliationem sui sulphuris antimonium ad vitrificationem disponitur.

§. 13. De cætero quod pro hypothese sua firmanda proferunt, quasi nempe illa butyri antimonii remanentia fusionem equidem in vitrum deliquecat, album tamen & virtutis emeticæ expers, ideo quod omnes partes sulphureæ massam istam deseruerint, diversis implicatur difficultatibus. Quippe coloris mutatio in vitro antimonii vim emeticam haud semper tollit, quatenus quod cum borrace, albicans & ex mercurio vitæ succineum seu flavum, conficitur, Vitrum æquè superiora ac inferiora movet, ac hyacinthinum hinc meliore jure succinum antimonii, quam mercurii, appellandum. Multo minus eadem coloris in vitro hoc mutatio sulphur antimonio decessisse, necessario arguit, dum borax vitro equidem antimonio rubedinem, haud tamen, sulphuris reliquias, demit, ita quidem, ut cum borrace paratum vitrum, si denuò in regulum fluat, post novam calcinationem vitrum splendentis rubedinis promat. Imò colorum reliquorum cum albedine transmutationem non semper à certarum particularum detractione, sed earum determinata tantum modificatione, dependere, per infinita experimenta constat: quorum unicum, utpote Vitrificationis mechanica petium, allegasse, sufficiat, quod magnesia vitro certa ratione adjecta huic viriditatem sine particularum quarundam secretionem detergat. Præterea vix omni sulphure spoliata esse hoc remanens, docet ejusdem fumus sulphureus, quem dum calcinationi exponitur, eructat, item, summa inflammabilitas, qua retorta dum adhuc calet, fracta, quasi sponte exardescit. Deniq; ex eodem Capite mortuo non adeo commode vitrum hyacinthinæ rubedinis parare licet, nec tamen album est, quod inde prodit, sed fuscum potius ac nigricans emeticumq; satis potens, scens, ac *Willisus* asserit.

§. 14. Hinc nec à sale Antimonii in vitrum abundi dispositio erit expectanda, potissimum cum 1. non quodvis sal, sed alcalisata tantum, quale tamen in concreto hoc concipi nequit, ad vitrificationem ordinariam concurrant. 2. In *Transact. Angl. Philos. num. 110.* modus describitur, totum fere Antimonium, sine ulla præparatione aut calcinatione præcedente, in vitrum, opacum equidem, splendens nihilominus summeque politum, redigendi, ipsi duntaxat, dum fluit, lapidis certe cretacei, mineris plumbariis frequentis, frustum candefactum immergendo. 3. Denique Plumbum quoque cum filicibus solis ac ejus saccharum per se & sine omni sale facillimè in vitrum deliquantur.

§. 15. Ita ut verosimilius videatur, percoqui ad clarum pellucidumque splendorem Antimonium, non per harum aut illarum partium secessum & secretionem, sed ejusmodi tantum illarum, ratione figuræ, situs ac magnitudinis modificationem, ut liberum luminis transitum concedant. Pari nempe ratione, ac cinabaris & sulphur nativum, mixta alias opaca, interdum intra venas sua diaphaneitatem egregiam nanciscuntur, contra crystal'us vitrumque sola comminutione omnem pelluciditatem deponunt, molculatum suarum figura ac situ saltim immutato: potissimum, cum, ut jam dictum, quod modo vitrum Antimonii erat, levi artificio in regulum pristinae naturæ ac integritatis convertatur.

§. 16. Ratione mechanicæ adhuc monendum, calcem, quæ Vitri hujus confectioni inservire debet, haud per unum alterumve diem asservendam esse; quin mox in vitrum fundatur: videtur enim sub mora hæc eam ab aere ita disponi, ut ad diaphaneitatem desideratam deluci nequeat. Quare pulvis antimonii, ad gtyseum seu cynereum colorem, & donec fumus ejus imminuatur, calcinati, illico crucibulo candenti inmittatur & igni fusorio tradatur, qui, si reverberatorius fuerit, ac probè applicetur, intra quadrantis horulæ spatium illum in perspicuum liquamen fundit. Addunt nonnulli operationis facilitandæ causâ, suasa Matthioli, aliquid Antimonii crudi, v. g. ad Calcis antimonii uncias tres antimonii crudi 3 ij. alii tantillum sulphuris communis, dum Antimonium in fluore existit, pelluciditatem tamen separatam adhuc detrectet, frustulatum adjiciunt, quo illud id momento quasi, depurare & ejus colorem exaltare contendunt. Sunt, qui eundem in finem aut pigmentum, it. qui boniorem admiscunt: cum tamen illius virtus deleteria hoc dissuadeat, hic verò rubedini ejus multum detrahat. ita quidem ut, si in majore copia addatur, loco illius flavedinem, hinc pallorem, ipsi introducat.

§. 17. Qui in fusione diaphaneitatem bacillo ferro, aliquoties immisso, explorare contendunt, minus securè agunt, faciliusque vel frequentiore, vel diuturniore, illius immersione aut vitri pelluciditatem turbant, aut colorem ejus fuscum magis reddunt, quatenus antimonium cuncta metalla, & inter hæc Martem, avidissimè devorat: simile que ipsi contingere videtur, quod à filicibus, qui venas ac maculas flavescentes intertextas gerunt, sibi metuunt Vitriarii, ferreis scilicet, quas continent, particulis splendorem ac puritatem vitri turbantibus.

§. 18. Vulgò pro Vitri hujus feliciore confectione cœlum quoque sudum ac serenum præ fluvioso commendant, Solis aliorumque astrorum potentiorum influentiam ad coloris ac diaphaneitatis nitorem maximè necessariam æstimantes: quæ tamen vana videtur curiositas vel quod iste astrorum influxus adhuc satis precarius videatur, vel quod experientia magistra sæpe eundem effectum sub diversa constellatione ac atmosphæra concedat, & vitrum antimonii hyacinthinum aut flavum in cameris uliginosis ac sub cœlo pluvioso seu nebuloso æquè: ac in loco & aere sereno, præparetur.

Quamvis non dubitem, ad vitrorum crystallinorum splendorem atque nitorem acri diversam habitudinem multum confectæ, quatenus referente *Velschio Hecatæst. obs. med. phys. obs. 41.* Murani v. g. altera littoris parte è regione suarum officinarum vitra minus confici possunt quod borealibus flatibus locus hic, officinæ verò Vitri Ægyptiaci nobilitatem præter materiæ excellentiam acri quoque aliquid debere, idem largitur. Quibus accedit, quod in officinis vitriariis, multo fumo scintillantibus, vitri splendor & puritas haud parum obnubilatur; quæ tamen circumstantia quemadmodum vitra tingenda parum lædit, sic in Vitri antimonii confectione parvi momenti vixque attendenda est.

§. 19. Inter Metalla vitrificationi aptiora sunt stannum & plumbum; atque hoc præ illo, hincque ejus vitrum frequentius paratur, figulis potius quam aliis artificibus utratum. Sc. Plumbi calx modo cum alcalibus & filicibus, & quidem sub diversa horum proportionem, funditur, dum, v. g. ordinariè equidem filicum pars una cum duplo minii pondere deliquatur, minii tamen quantitas ad triplum & quadruplum augeri, aut vitro confecto addi potest. Ita nonnulli, vitrum smaragdini viroris consistere annuntiant, vitrum plumbi ordinatum denuo cum æquali, ac tertio cum duplo minii pondere deliquando: quamvis vitiditatem illam promissam nunquam videtis, succinea semper permanente flavedine. Imo Plumbum per se quoque in Vitrum abit, modò prius in saccharum Saturni fuerit redactum. Postquam enim, quod brevi contingit, Aceri particulae salinæ, metallicis intertextæ, in crucibulo exhalant, fluore equidem videtur in pristinam plumbi substantiam, quæ tamen successive & per partes, igne continuato, in vitrum flavum accessit, ejus verò quod haud vitrificatum extrahitur varietate & elegantia colorum caudam pavonis si non superat, certè æquat.

§. 20. Spectat hæc ex plumbo & arsenico conflatum vitrum, pariter coloris succineæ, ad mineras metallorum nobiliorum rigidiores fundendas, hæque in regulum præcipitandas maximè idoneum: ut *Gebri* doctrinæ taceam, qua plumbum & stannum per colliquationem cum vitro ad puritatem nobiliorem evahere jubet, cui etiam *Isaac. Hollandus* subscribit, metalla, si in vitrum redigantur, hincque demum reducantur, nobiliora magis evadere. Denique ex calce stanni cum Aqua forti parata ac duplo Antimonii calcis vitrum Smaragdini coloris à nonnullis paratur, quamvis hoc interdum chrysolithum colore æmuletur.

§. 21. Sunt qui ex Auro pariter Vitrum parare satagunt, à *Rhenano* & *Poppio* hoc persuasi, verbi gratia, *Schröderus, Zuvelferus, Grülingius*, sub Vitri Antimonii Solaris, Auri transparentis & Rubini Solaris nomine, Aurum scilicet cum sedecim Antimonii partibus fundendo, calcinando ac demum in vitrum deliquando: quod tamen expectationi vix satisfacit, nescioque, utrum cautela illa, quam in Colliquatione Antimonii & Auri prima commendat *Rhenanus*, cavendum sit, esse, ne regulus fiat, Lectorem illudere potius, an animadvertere, intenderit. Cum quibuscunque etiam modis hanc fusio-nem tractes, aurum adeò intimè, prout quidem requirebatur, antimonio connubat, hinc nec ambo in Vitrum abeant: quod multo minus sperabis si secundum *Poppium* operatus fueris duplum tantum antimonii auro adjicientem.

§. 22. Idem *Rhenanus* & *Hartmannus* ex Luna quoque & Mercurio aliquam Vitri confectionem docent, ast nec horum promissis successus respondet, quippe & hic labor, hic opus, quo (momentibus illis) per Oleum Vitrioli totus Mercurius dissolvatur & sub ejus fluore abscondatur, illumque solutionis terminum nec ego nec amici, idem molientes, assequi potuerunt, accuratius licet operantes: ita ut quid de reliquarum in hac operatione circum-

circumstantiarum eventu mihi aliisque polliceri de-beam, dubius sim.

§. 23. Progrediar ad *CrySTALLISATIONEM*, operationem, sali us & salinis concretis propriam & à qua horum nonnulla CrySTALLI dicuntur, v.g. CrySTALLUM minerale, crySTALLI tartari, Lunæ, Veneris &c. quatenus post evaporationem liquoris, illa dissolventis, quantitatem proportionem tam corpuscula salina, hæcenus per illius fluorem dispersa & agitata, congregari & eousque uniri incipiunt, donec vel sola, vel cum aliis, metallicis nempe & mineralibus, combinata rigidiorē faciem acquirant, hinc cum aqueis quibusdam particulis in diaphanam compagem diversæ, cuius tamen sali propriæ, figuræ abeant. Adornatur eum præprimis in finem, quo dicta salia à terreis similibusq; heterogeneitatibus sufficienter expurgentur: quamvis à Vitriolo partes terreas seu metallicas omnino separari posse dubium videatur, prout inferius constabit, nec salia simpliciora per calcinationes, solutiones & crySTALLISATIONES repetitas omni terrestreitate exui hinc colligitur, quod sine terra quadam intrinseca haud corporeiscent, adeoque stabilitamentum sui floris in terra soliditate demum inveniant.

§. 24. Encherisis operationis hujus potissima in proportionata humiditatis aqueæ separationē constitit, quam evaporation ut plurimum rarius destillatio, præstat, cuiusque terminum pellicula seu crusta tenuior, superficiē solutionis innatans, tanquam primum crySTALLISATIONIS inchoamentum, monstrat: quem qui non attingit, propter nimis discontinuatas & commotas adhuc particulas salinas, crySTALLOS frustra expectabit, aut exilissimum tantum sibi comparabit) qui transit seu se excedit, loco crySTALLORUM diaphanorum crassamentum inconditum & ab illorum forma sæpe quam alienissimum acquirere, vel quod particula salina per spaciū mediū fluidi angustias confusæ magis sibi adigantur, vel quod illo aquæ dimenso, quam ad crySTALLISATIONEM postulant, defraudentur.

§. 25. Præter solidiores quippe Salium ac mineralium particulas aquæ non levem portionem crySTALLI salinis subesse credere jubet præprimis eorum pondus notabiliter à crySTALLATIONE auctum, deteria & absumpta quamvis humiditate superficiali. Accedit, quod quæ per decrepitationem, destillationem, similemve rationem ab omni phlegmate liberata, salia & vitriola, si denuo crySTALLIFERENTUR, patem quantitatem aquositatis fundant, sine dubio, quam sub crySTALLATIONE sibi adaptant. Ac Vitriolum, si intra cucurbitam, probe obturatam Balneo Maris immergitur, ratione hujus aquæ intinsecæ & integrantis ab illius calore exagitæ, facile solvitur, refrigerens: verò pristinam soliditatem repetit: Imo per eandem Vitriolum & sacharum saturni sibi commixta mollescent ac fluidiora evadunt, aqueis nimium utrorumque particulis per præcipitationis aliquem modum in libertatem naturalem vindicatis.

§. 26. Evaporatione autem liquoris rite ac proportionabiliter peracta crySTALLATIONE ut plurimum haud parum juvat, si aeri frigidiori liquamen crySTALLIFERANDUM committatur, & ut communiter fieri solet, cellæ imponatur: forsan quatenus aer ille gravior ambitu suo solventis poros constringit seu comprimit, hincque massas salinas lentæ & blandæ præcipitatione exprimit ac cum tantillo aquæ interfluentis in concretionē crySTALLINAS majores cogit, unde etiam in vase, è quo per machinam pneumaticam aer exantlatus, salia, motore & directore hoc externo destituta, vix adeo promptè crySTALLIFANTUR. Zuveltero nihilominus in hoc condescendere jubet mechanica, afferenti, quasdam crySTALLIFICATIONES in aere calido aut temperato commodius fieri, v.g. tartari crySTALLORUM, item salium lixiviosorum ac Nitrum: quatenus frigus impetu velut quodam solutionem condensat, & ut salern inhaerentem præcipitanter magis deponat, cogit, ita ut, quia plana illius minimorum sibi exacte conti-

gua haud sunt, crySTALLI minus pellucidi, sed lumen variis modis refringentes, prodeunt: cujus contrarium observatur, si successive & sub aere temperatiori hoc fiat, item, si in vasis, probè cooperetis, aërisque ambientis impetu hoc modo fracto, illud adorneatur.

§. 27. Fixa seu alcalifata salia per se, & sine aliquo ad-ditamento, in crySTALLOS cogi possunt: paradoxum chymicum hæcenus visum fuit multis, hæc de causa eadem, vel cum sulphure calcinantes, vel cum aqua forti similibusque acidis irrorantes: Verum quia hoc modo eorum textura alcalica plane immutatur, aut notabiliter satis infringitur, à sagacioribus chymicis ille, quamvis crySTALLATIONI proficius & ad ornatum faciens, damnatur: atque hoc quidem eo majore jure, cum alcalia etiam fixa per se & absque ullius heterogeneitatis admiscela in crySTALLOS egregios, casu fortuito in sale tartari mihi primò observatos redigere licet. Evaporentur scilicet horum solutiones lento magis atque blandissimo igne, usque dum crusta quædam in harum summitate appareat, quæ studiosè à fractura præservanda, ne nimia & pro crySTALLATIONE necessaria aqua portio exhalat, sed à tegmine hoc salino aliquatenus coercentur: in calore vero leniore per aliquot adhuc horas soluio detineatur & sub crusta illa crySTALLI egregii, ac non raro satis magni, concreverint, in calore moderato uti producti, sic in eodem conservandi, quamvis salis tartari crySTALLOS ab annis sex possideam, ultra biennium, tempore æque æstivo ac hyberno in loco frigidiorē ac interdum humidiorē repositos.

§. 28. Concurrere proin in operatione hac duo ad minimum videntur, solutio nempe & inspissatio, quamvis in salibus lixiviosis crySTALLATIONIS calcinatione seu distillatione, in aliis, v.g. nitro tartaricis seu essentialibus suffione, simul opus sit: cum repetitis solutionibus & coagulationibus alternantibus, ac viscidiores terrestres partes cum pinguedine fuliginosa absumentibus seu ad seorsum faciliorem eas disponentibus. Quibus tamen posterioribus ac reliquis salibus cunctis, live acidis, live acido-salis, incongrua, imò damnosa est calcinatio, nisi in salis aliquam aconis partem expellere mensit, prout Mynichtum, Zuvelterum alioque in præparatione Panacæ Holsticæ agere constat.

§. 29. Sicut autem ex salibus & vitriolis unum alero promptius in crySTALLUM densatur, ita in specie quæ de saccharo saturni hujusque crySTALLATIONE communiter traduntur, experientiam minime faventem habent. A plerisque enim dum quasi uno ore, afferitur primum statim plumbi seu calcis hujus extractionem, ad quartæ partis remanentiam evaporatam, in crySTALLOS majores congelascere, si cum aceto destillato operatus quis fuerit, minime succedit, sed solutio illa, quamvis ad oleaginositatem abstracta fluida maneat: adeoque ad salis potius coagulationem ultimo blando satis caloris gradu, humiditas, non tamen ad siccitatem omnimodam, evocetur, ne flavescat coagulum, sed sub butyri sissamento è vase producat, & super chartam bibulam expansum, in loco temperatè calido exsicceatur. Quod si tamen crySTALLOS pellucidiores desideres, cum aceto denuo solvatur massa hæc vitriolica & crySTALLATIONI convenienter evaporata humiditate, tradatur: crySTALLOS nihilominus majores, nitidiores & instar metalli sonantes Tibi comparabis, si priores cum sp. vini solvas & post sufficientem hujus abstractionem liquorem loco frigidiori exponas, habet enim sp. vini sibi peculiare quid, quo crySTALLATIONEM salum, alcalifatorum quoque, juvat.

§. 30. Præterea sine multis ambagibus elegantiores supereditabit crySTALLOS plumbum, si loco aceti destillati Spiritum Vinidi æris, aut spiritum Nitri solutionis adhibueris. Fevre pro congelatione hac maturanda vaso stannea commendat, quasi scilicet his mediantibus intra viginti quatuor horas maximam liquoris partem in crySTALLOS congelare liceat: At nec sub hac encherisi effectus

effectus expectationi responderet, multo minus ætiologia, quam Autor dictis sibi concipit; spiritum nempe acidum stanno inexistentem partes hujus liquoris salino metallicas condensare, admittenda erit, quatenus v. g. extractio violarum, alias purpurea, non, nisi intra stannea vasa, cæruleitatem induit, quod ab acido vix separandam. Eadem vasa alii fumo sulphuris eundem in finem imbuere jubent, quamvis nec hujus suffumigationis singularem vim testati queam.

§. 31. Vitriolum qui à terrestritatibus metallicis liberare contendunt, secundum Basilium frequentiore solutione & crystallisatione hoc moluntur, solvendo sc. vitriolum in aqua tepida, haud fontana, sed potius pluvia destillata aut phlegmate Spiritus vini, utpote mollioribus & ad sustinendas illas particulas terreas graviore minus adæquatis, imo pro salinis magis discomtinuandis, earumque vi interreas infringenda, aquam largius quam ad solutionem vitrioli necessarium, affundendo: Hinc digestionem viginti quatuor horarum adhibita semper terra quædam ochrea seu flavescens subidet, qua per filtrationem separata evaporatur & crystallifatur liquor, ut moris solutionem & crystallisationem toties repetendo, usque dum nullum amplius ejusmodi Sedimentum compareat. Vereor tamen, ne vitriolum, quamdiu natura vitrioli gaudet, semper ejusmodi terram dimittat & præcipitati patiatur, imo tandem per repetitas has solutiones notabiliter immutatur, ac in nihilum redigatur; quatenus metallica & essentiali hac parte decepta acidum volatilius cum phlegmate solvente successive exhalat. Alii cum Bismutho præcipationem hanc brevius absolvent, sicque sal album magis, ac nitro simile quodque spiritum suum facilius dimittat, remanente capite mortuo non rubicundo, sed albicante ac spongioso, acquirunt: alii idem circa hunc operandi modum mihi manet scrupulus, i. e. ex Vitriolo non vitriolum fiet. Aliam adhuc operandi rationem exhibent *Anglor. Philosoph. Transact. N. 103.* scil. cucurbitæ angustioris colli & orificii, fundi vero plani, vitriolum pulverisatum ita immittitur, ut mole sua crassitiem digiti haud transcendat vaseque probe clauso in Mariæ Balneo, sub calore mediocri & æquali per aliquot dies detinetur; sic enim absque ulla humiditate æterna illud deliquescit & ochrea terra ad fundum vasis subsidens in solidiorem massam coagulat vitrioli solutione vel in eodem vase, vel in aliud effusa, in crystallos sub aere frigidiore abeunte, excepta portione exigua alienius liquaminis, quæ oleum vitrioli aciditate, igneitate & ponderositate emulatur. Quæ deliquatio si semel aut his reiteratur, Vitriolum ad summum puritatis gradum evchi testantur. Idem tamen circa hanc enchirism quoque videtur judicium, scilicet totam Vitrioli substantiam hac ratione tandem destrui, prout vel ex liquamine illo haud coagulabili, quod salina vitrioli substantia, metallo exuta est, colligere convenit.

§. Circa Nitri Crystallisationem diversa pariter monenda forent, inopinata tamen paginarum angustia conceptus hos alii & spaciosiori occasione reservare jubet. *Bohnus.*

DE VITRIS.

In destructione mixtorum quoddam perpetuitatis mysterium condidit æternum numen, ut dum esse desinunt, perpetuari incipiant. Quid magis destructa eadem notat, quam cineres, seu terra damnata? Ex cineribus tamen his constat Vitrum. Vitrum à destructore summo igne vitam seu esse suum fortitur, vitrum lemma resurrectionis nostrorum corporum. Hinc not. de vitris, cum primis medicis.

1. *Vitra sunt corpora dura, pellucida & fragilia.* Dura sunt, flecti nescia, præterquam in igne & capillata; dura, ob renitum, quo cum metallis conveniunt. Dura ob cœnitas intine particulas, unde & inter contundendum

acumina produnt sua, fortiora quidem, & mortaria aculeis suis quasi vulnerant satis. Dura vel ideo quod cedere nesciant, sed frangi malint, quam malleari, & sic cedere. Pellucida sunt, si tenuentur; densitatem tamen si fortiantur, vel admisceatur confusum sulphur emittens, minus hoc valet. Pellucida sunt & fragilia ob paucitatem sulphuris, quod de essentia est vitrorum. Hinc vitrum ductile inter postulata & quaesita est chemicorum. Cum vero ductilitas propria sit metallis, & vitrum à metallis differat eo ipso, tanquam essentiali differentia, vitrum malleabile idem erit, ac metallum vitreum ac pellucidum, quod an lapide philosophorum illo præstari possit, incertum est. Nec de nobilioribus vitris id sperandum est. Quid enim aliud sunt gemmæ vitriiformes, ut adamas, crystallus & alia, quam vitra nativa? unde etiam arte parari queunt nativis contra elegantes. Repugnat in omnibus metalli naturæ: vitrum fragile, metallum malleabile; vitrum sulphure paucissimo pollet, metalla plurimo. Vitra sunt durissima respective, metalla in duritie suâ molliem condunt.

2. *Vitra à terrâ fluorem adeptâ constantur.* Maximus est usus fluoris, contradistincti fusioni. In fusione fluor est seu liquatio universalis totius compagis; in fluore particularis. In fusione æqualis omnium particularum, in fluore inæqualis. Hinc ex fluore salium consurgunt spiritus, ex fluore sulphuris olea singula liquida. Terra vero cum sit primum siccum & stabile, non fluorem humidum constantem patitur, sed siccum post se relinquit, eocundo sic statim, quod ipse fluor impostat hujus subiecti; adeoque fluor terræ producit vitra. Videtur primo intuitu contradictionem implicari, terram fluorem pati, quippe eidem potius videtur resistere & fluori maxime contraria ac inepta. At quid non tortuta ignis præstat? quid alia ipsi juncta? Hinc subiectum primum omnium vitrorum est terra, cinis, calx. Terram intelligimus tum proprie dictam, arenam, cretam, aliasque his analogas, tum damnatam, i. e. exutam particulis prædominantibus activis, & calcem vel vegetabilem, seu cineres plantarum, arborum vegetiores: vel animalium, ut calces ossium, quæ peculiare genus vitrorum albidiorum præbent: vel mineralium quæ vitra sunt medica cum primis & ferè unica, ut vitrum antimonii, saturni, &c. Subiectum ergo est terra, quæ fluorem adipisci debet, unde absque terrâ ne conciperet quidem vitrum, nedum conficere licet.

3. *Terra fluorem conciliant ignis, sal, & sulphur fixum, calci ac fluori proportionatum.* Materiam præbet terra, primam & communem, terra levis, subtilis & pura sal & sulphur adæquatam. Efficiens est ignis, isque violentissimus, fusorius ultimi gradus, in aliis tamen minor, in aliis fortior, sufficiens uno verbo fluori inducendo. Sal requiritur alcalinum, fixum, quod in igne perdurare potest, ut omnis fluor alius absit exclusus. Sulphur in idem fixum, quod ignis destruentis vehementiam effugit, & sub sale vel terrâ occultatum & defensum remansit. Cum itaque fixa sint hæc omnia, nec ignis propellere possit in fluorem amplius, seu sulphur seorsim, in antimonio respective salum fixum, minus desagrabile, seu sal alcali illud, fluorem terræ præstat, obstentantibus his ipsis geminis. Fundamentum enim omnis vitificationis præbet colliquatio, seu fusio & fluoris partium terrearum cum salinis, quæ intimiori & arctiori complexu igne externo eoque extremo unita coextenduntur in vitrum. Principium extrinsecum & latens sulphur, medium, modò patens, modò latens, sal. Sulphur verò requiritur, utpote vinculum ordinatum omnis compagis densæ, paucum, nam dum evaporat adhuc, vel quæ vitrificationi ineptum est; fixum, ut perdurare in igne possit, sal & terræ vinculum largiens, immersum & coexpandum: paucum, unde fragile est, nec viscido metallico amplius pollet. Sic sal tartari per se extremo igne vitrescit, & cum silicibus ad essentiam seu

unctus

tingituram silicum, ad ductum *Glauberi*. Sic vitrum saturni ex minio & silicibus fit. Sic in specie antimonium vitra præbet, & optime quoque metallorum calcēs.

4. *Vitrum antimonii ex calce antimonii, cum vel sine salibus additis, hyacinthinum, puniceum & succineum confit.* Triplex est vitrum antimonii, καὶ ἑξῆς verò ita audit hyacinthinum, ita dictum à consuetudine & aliquali pe spicuitate, superiori sæculo inventum, & hunc in diem usque usu celebratum. Quando nempe partes sulphureæ & perfluæ non fixæ, & vitrificationi contrariæ, abiguntur, leni tostione, ut partes metallicæ terreæ & sulphureæ reliquæ sub grisei pulveris seu calcis specie remaneant, fulorio igne vitrum emergit hyacinthinum dictum. Absolvitur ergo duplici ἐγχειρήσει. (1.) calcinatione antecedente, eaque successivâ, si solum pulverisatum, in patinâ terreâ expansum, subdito igne conveniente subinde agitur, ne tam citò grumescat, interrim vero pars mercurialis quædam avolet, & sulphurea comburatur, quod ad sensum patet. Grumescens factâ pulverisatur denud, & calcinatio hæc bis vel ter peragitur, tertiâ enim vice utplurimum ad vitrificationem aptatur, pulvere griseo conspicuo, non grumescens amplius vel quasi. Obteno hoc adhibetur (2.) fulio: inditus in crucibulum pulvis ille griseus, seu calx hoc modo apparata, igne fortiori liquatur, & fufum hinc in pelvim vel mortarium æneum effunditur. Sic citra additionem per se paratum, non minus ac cum borace quoque fufum, innoxium est, nocentissimum vero cum arsenico. Quod si verò cum nitro ana pulverisatum antimonium fundatur, breviori morâ locum obtinetur, ex quo plerumque flagrantibus particulis sulphureis abactis, unde vitrum fit, puniceum dictum, à colore, alias croci metallorum fortioris & purioris nomine veniens. Idem hoc quandoque per accidens in præparatione ὃ ii diaphoretici emergit, si non ite procedatur. Succineum denique vitrum, à colore iudem nominatum, ex ὃ vitæ, qui iudem calx est sui generis, fit, si igne fundatur, ubi pars regulina ferè adhærescere adhuc solet. In singulis abactis acido & sulphure, quantum par est, partes reliquæ alcalinæ & terreæ metallicæ in fluorem adactæ vitrescunt, quod etiam in vitro saturni videas,

5. *Usus vitrorum tum mechanicus & curiosus, tum medicus est;* ad expansionem sulphuris & salis metallici. Prior usus ad gemmas etiam artificiales satis notus & superius tactus est, alter de antimonio potissimum valet. Utur enim & vitro vulgari suus usus sit salibus affinis, nephriticis, v. g. quo de vid. *Langius*, uti quoque pulveri vitri refringi possunt spiritus acidi, v. g. salis ad tincturam aperitivam; ille tamen aliis satis suppletur. Vitrum antimonii expansionem sulphuris & salis metallici exhibet ad oculum, & fit hoc modo emeticum, (quale crudum non erat,) in substantiâ quidem nunquam dandum, ast in infuso optimum, ad tartarum emeticum quoque unice expetitur. Basin nempe præbet (1.) emeticorum, formâ siccâ & humidâ variorum; (2.) tincturæ antimonii, ad morem *Zwelferi* parandæ. Præbet etiam calices chemicos, quo de *Primerosius*, *Sala*, *Walens* & alii legi merentur. Idem quoque ad alia vitra applicari potest. *Wedelius*.

De Vitri vulgaris cum stipitibus fabarum, seu etiam eorundem Cinere s. a. calcinato hic nihil addimus, quia scilicet de eo jam in Calcinationibus actum est. Continuo itaque ad curiosa quædam ex Antonio NERI circa vitrum ac ejus colorationes indeque efformandas varias Gemmas Artificiales progredimur. Esto itaque.

ANTONII NERI

Florentini de Arte Vittraria

*Tractatus & in eum CHRISTOPHORI MERRETTI
M. D. & Societ. Reg. Anglican. Socii Observationes & Nota.*

PRÆFATIO.

Dubium nullum est, quin inter vetos artis igniarum fructus vitrum sit. Utur enim compositum & arte factum sit; quam proximè tamen accedit ad omne genus mineralium, & eorum quæ medio inter mineralia loco habentur. Igne funditur & in eo permanet: quin auri, metalli perfecti & lucidi instar igne perficitur, purgatur & nitescit. Manifesta res est, usum ejusdem in vasis potioris, aliisque homini inservientibus commodis multo magis liberalem, magisque venustum & nobiliorem esse, usu cujuscunque alterius metalli, vel lapidis, ad hæc talia apti. Etenim, præterquam quod vitrum facile, exiguo sumtu, & nullibi non parari potest; tenerius, nitidius & speciosius est, quam alia quævisque materia, quæ quidem hodie nota sit. Porro, ad distillatoriam & Spagiricam artis usum, & componenda medicamenta, res est usque adeo utilis, ne dicam necessaria, ut quasi impossibile sit, sine vitri adminiculo quidquam efficere. Hinc enim tot vasorum & instrumentorum genera sunt, qualia sunt, Cucurbitæ, alembici, recipientes, pellicani, retortæ, serpentina, phiolæ, vitra quadrangula, ampullæ, ovæ philosophica, pilæ, & infiniti generis alia vasa, quæ usus quotidie invenit, ad componendum alexiteria, arcana, quintas essentias, salia, sulphur, vitriolum, mercurium tincturas, separationes elementorum, omniâque negotia metallica, & illius genera plura alia; præter aquas fortes & regias, tam necessarias illis, qui aurum ab argento separant, & remonetariæ à Principibus præfecti sunt, ut aurum & argentum perpurgent, atque ad perfectionem suam deducant. Tot certè beneficia, quod ad usus humanos attingit, vitro debentur, ut quasi impossibile videatur, sine illius ope vitam transigere: indeque haud secus atque ex omni alia re, maxima Dei providentia cognoscitur, quæ rei tam homini utilis & necessaria materiam, ex qua vitra sunt, ubi vis tertarum usque adeo copiose produxit ut nullibi non parari facillime possit. Sed inter magna etiam templorum, ornamenta vitrum est, quando præter multa alia tot ex vitro fenestrae sunt, elegantibus picturis adornatæ, in quibus metallici colores tot modis & tanta vivacitate increpant, ut totidem gemmæ orientales videantur: & in fornacem inditum, tot colorum, tantæque venustatis & perfectionis capax vitrum est, ut similis ei materia inventi in terris non posse videatur. Inventionem vitri antiquissimam esse credimus, cum S. Scriptura Jobi 28. dicat: *Non adequabitur ei aurum vel vitrum &c.* evidenter testimonio, inter antiquitatis inventa vitrum esse; dicente S. Hieronymo, inter Abrahami posteros, & filium Zanechi Jobum fuisse, qui per Elavum quinto loco ab Abrahamo descenderit. Multi volunt, & fortassis non sine ratione, à Chymicis inventum esse vitrum, qui gemmas æmulando vitrum repererint; non multum fortassis à verò abluente sententia, quando modum imitandi omnes gemmas libro quinto hujus operis evidenter demonstrò; quâ eadem ratione videre licet modum producendi vitrum ex lapideis, qui per se nunquam liqueferent, nec in vitrum abirent. Plinius vult, ad Beli fluminis in Syria ripam casu inventum fuisse vitrum à mercatoribus, qui tempestate eo delati, dum necessitate cogente ibidem morantur, & cibi coquendi gratia focum in littore struunt, ubi ingens copia erat herbæ, quam plures *Calis* vocant, & e cujus cineribus Soda pariter & Rochetta constant, vitrum fecerint; ignis

violentiâ unitis sale & cineribus, illius herbæ, cum arena & lapidibus ad vitrificandum aptis: id quod intellectui humano modum monstravit & rationem, quâ non vitrum modo, sed crystalli etiam, & crystallina, torque alia venustissima opera, quæ vitro debentur, fierent. Fama præterea tenet, inventam Tiberio imperante rationem, quâ vitrum malleabile fieret; res postea formidabilis visa, & hodie prorsus ignota. Etenim, si id nunc innotesceret, ob elegantiam & incorruptibilitatem suam in maiore quam aurum argentumque pretio vitrum esset, quando non rubiginem aliquam attrahit, non saporem, non odorem, nec qualitatem ullam. Aliud etiam præterea grande commodum homini vitrum adfert speculorum & perspicillorum usu: utut enim hæc crystallo naturali, quam montanam dicunt; illa verò ex æris & stanni partibus mixtis, quam chalybis misturam vocant parari possint, multo tamen utraque commodius, nec non impensâ minore, & elegantia, effectumque maiore ex vitro parantur: specula præsertim, quæ præter difficultatem & sumptum in construendo, vivas imagines æque ut vitrum non reddunt, & quod pejus est, brevi pallescentia nihil omnino repræsentant. Quare ex his multisque aliis rationibus concludere licet, inter res nobilissimas, quatum usus nunc quidem in terris homini datus est, vitrum esse. Mihi, qui diutius in arte vitraria laboravi, plurimumque in ea vidi, propositum est, partem illius quod vidi & perfeci, aliquam publico dare. Utut enim modus, parandi salia, decoctiones, & pastas notus quamplurimis; mihi tamen illud requirere operis materia videbatur, ut clare & distinctè, id quod ego facio pertractaretur, adjectis quibusdam observantibus & regulis quæ si probe considerentur, non otiosè inutiles, sed fortassis necessariae & paucis notæ videbuntur: ut de mea particulari methodo extrahendi sal nihil dicam, ex quo crystallus nobilissima sit. Quod si artifex tam in laborando diligens erit, quam ego in docendo claris demonstrationibus utor, opus efficiet tam elegans & nobile, quam id fortassis hodie sit, aut fieri aliquaratione poterit. Et hæc quidem, omnique alia in requam ego hic pertracto, inveniet diligens & curiosus operarius, me scripsisse, & demonstrasse veritatem, non haustam vel acceptam ab alio aliquo, sed quam his meis manibus operando & experiendo didici cum sit, per hic mihi scopus fuerit, ut nisi quod verum esset mihi scriberem diceremve. Quod si cuiquam experienti hæc meas compositiones & modos parandi colores, pastas & tincturas, id quod ego scribo, non successerit, ne animum propterea despondeat, credatque me negas scripsisse; sed hoc cogitet, errasse sese in aliquo, hi præsertim, qui istiusmodi negotiis nunquam manum admovent: impossibile enim est, ut prima vice Magistri evadant. Repetant igitur opus, eo quo à me scriptum est modo, & sensim melius, tandemque perfectum erit quicquid egerint. Specialiter illud moneo, uti colorum ratio habeatur, quorum certa & determinata dotis præscribi non potest, sed praxi & experientia discendum, & oculo judiciosè discernendum est, satis ne pro ratione operis & pastarum, quæ gemmarum nimirum imitatione sunt magnitudine infectum colore vitrum sit, notando, quod gemmæ omnes, quæ substratis foliis aut includuntur, qualia sunt annuli alique istiusmodi, dilutum magis; contra, quæ autem inclusa in libero aëre dependent, ut irrauria & res aliæ, magis plenum colorem requirant; quæ omnia doceri nulla ratione possunt, sed curiosi hominis iudicio relinquuntur. Notetur itidem, idque sedulo, ut colores & ingredienti bene præparata lavigataque sint; & ut tanto quivis magis securus esse possit, ipse colores, eo quo dixi modo præparet faciatque, quisquis exquisiti aliquid facere in animo habet.

Ignis in hac arte non levis momenti, sed talis est, ut rem omnem absolvat, & fieri absque eo nihil omnino possit.

no possit. Cum ratione igitur adhibendus est, & speciatim ex lignis durioribus & aridis, vitandusque fumus, ut qui semper noxius est, maxime in fornacibus, ubi ollæ & vasa semper patent, vitrumque ipsum minus perfectum evadit valdeque deforme. Uterius dico, siquidem operarius diligens & exercitatus fuerit, nec non accuratè, eo quo à me scriptum est modo egerit, inveniet vera esse, quæ hoc libro continentur omnia, nec me quidquam divulgasse & publico dedisse, nisi quod opere ipso probatum est: ac si cognovero publice gratos esse hos meos labores, ut quidem spero, si mihi fortassis animos addam edendi etiam alios meos labores chymicos & spagyricos, quos per tot annos in diversâ parte terrarum sustinui: nec credo; si usus & commoda hominum respicias, quidquam in rerum natura majus antiquitati notum fuisse: quæ quidem antiquitas ex hominibus in hac arte subactis Deos fecit, eosque Deorum loco habuit, & divinis honoribus prosecuta est. Non extendam me ulterius. Etenim quia particularia quæque in hoc opere usque adeò clarè & distinctè descripti, securus sum animi, impossibile ferè esse, ut errare quis in tam regia via, nisi volens possit, tantum ut artis experimentum ante faciat, exerceaturque. Quare omnia mea tam in bonam partem capiantur velim, quam ego præsens hoc opus candidè, primò in gloriam Dei, & postea in usus utilitatemque omnium perfeci.

Contenta universi Operis.

Demonstratur verus modus extrahendi sal ex pulvisculo, rochetta Orientali, Soda Hispanica, sive aliisque herbis, quas Thusia affatim suppediat, parando decocto, quod Bollico, & crystallum artificialem vocant: nec non methodus chymice extrahendi hæc salia, perficiendo crystallo mirabili, item modus parandi fructum crystalli, crystallini & communi vitri, crystallique montane. Cum modo ita præparandi multos colores, ut multo magis splendeani; maximamque eorundem partem in vitro producere, quales sunt pica marina, aureus, granati, amethysti, sapphiri, holoserico niger, marmoreus, carneus, lacteus, persicus, baccharum orientalium, æreus & berillinus: cum modo faciendæ vitrum plumbi, quod colorem smaragdi orientalis, topasii, chrysopathii, caelestem, sapphiri, aureum, incarnatum, aliosque referat. Modus item tingendi crystallum montanum colore permanente rubini, balassii, topasii, opali, heliotropii: & verus modus faciendi pastam omnium colorum, quæ verum smaragdi, topasii, chrysopathii, sapphiri, granati & berilli colorem reddat: cum modo novo chymico, quo magis duri, & solito magis venusti reddantur: nec non modo parandi omne genus encaustorum, pingendo variis coloribus auro, præsertim roseo & rubro transparente, id quod in Europa novum est. Modi item facillimi extrahendi laccam ex granis Kermes, ligno Brasiliensi, rubia tinctorum, floribus geniste, liliis, floribus brassica, borraginis, rosis agrestibus, balaustris, rosis rubris, incarnatis, omnique alio herbarum & florum genere; cum modo faciendi colorem ultramarinum, aliasque res curiosas.

ANTONII NERI

Florentini de Arte Vitraria

Liber Primus.

CAP. I. Extrahere sal ex pulvisculo, Rochetta & Soda Hispanica, quo fritta crystalli, Italici Bollico dicta, sit, quod Artis vitraria fundamentum est: cum novo quodam & secreto modo.

Pulvisculus vel Rochetta, quæ ex Oriente & Syria advchitur, cinis est herbæ cujusdam ibidem abundantis. Dubium nullum est, quin sal multo

Tunc quam

quam *Soda Hispanica* candidus reddat : ideoque si cui animus est crystallum facere omnibus numeris absolutam, sale id fiat extracto ex pulvere vel rochetta orientali; Soda enim Hispanica, utut plus salis contineat, crystallus tamen sale illius facta, semper cærulei quid refert, neque illum colorem, candorem & elegantiam habet, quam ex pulvere vel rochetta orientali facta obtinet. Modus autem perfectè extrahendi salex rochetta pariter & soda, is est qui sequitur, & quem ego sæpius expertus sum.

Cinis Syriacus pistillo ferreo in pila lapidea contusus, cribretur cribro angustiore, ut solus cinis transeat, non frustula: in hoc enim consistit omne plus minusve salis extrahendi artificium. In emenda hac vel illa specie illud fervetur, ut quæ plus salis continet eligatur; id quod linguâ & gustu cognoscitur: tutissimus tamen omnium modus est, crucibulo experimentum facere, & videre; utrum atenæ plus habeat, an tarsi; id quod inter artis rudimenta, & his qui vitra constant notissimum est.

Adint lebetes ænei cum suis furnulis, quales tinctorum sunt, ique vel majores vel minores, pro majore vel minore conficiendi salis copia. Hi lebetes aqua impleantur limpida, adhibeaturque ignis ex ligno non fumante arido, & ubi jam aqua bene bullire cœperit, injiciatur ea cribrati pulveris quantitas, quam bullientis aquæ copia requirere videbitur, continueturque ignis & aqua bulliat usque ad consumptionem tertiæ partis, agitando illam semper in fundo palâ ligneâ, ut pulvis aquæ incorporetur & sal omne extrahatur. Inde repleantur lebetes recenti aqua, bulliantque ad consumptionem usque partis dimidiæ, & paratum erit lixivium, sale fœtum. Cæterum ut sal tanto magis candidum & copia majorque exeat, in lebetes, ante pulverem, ubi jam aqua bullire cœperit, injiciantur libræ decem grumorum, qui cadis vini rubri adherere solent, & vulgo *tartari* nomine veniunt, ad nigredinem usque adustorum, solvanturque in aqua illa calida, quam palâ ligneâ agitabis; atque tum demum pulverem addes ut supra. Hic addendi tartari modus secretus est, quo plus salis acquiritur, & crystallus candidior fit magisque speciosa. Ubi jam duæ tertiæ bullientis aquæ exhalaverint, & fœtum sale lixivium fuerit, minuatur ignis, ponanturque ordine aliquot vasa terrea, quæ per sex dies aqua communi repleta fuerint, ut tanto scilicet minus lixivii & salis imbibant, magnisque cochlearibus æneis cineres simul & lixivium ex lebeate transfundatur in vasa illa terrea, illisque repletis, bidui spatio stare permittatur, quo exacto, subsidente interea cinere, lixivium omne limpidum, sensim, ne quidquam à fundo ascendat, atque opus turbet, cochlearibus æneis in alia vasa transmittatur, & per alterum biduum stare permittatur, subsidentibusque denuo reliquis terrestribus particulis lixivium eo magis clatum & limpidum reddetur, idque tertio repetatur, & lixivium habebis limpidissimum, & ab omni terrena sorde liberum, ex quo postea sal paratur satis purum perfectumque. Impleantur denuo lebetes, denturque in singulos lebetes tartari, ut supra, libræ decem, nec non pulveris quantitas solita, continueturque opus dum aliqua pars materiæ superfuerit. Ut jam dictum lixivium constringatur & sal extrahatur, primum lavandi erunt lebetes aquâ purâ, adimplendique hoc purgato clarificatoque lixivio, bulliantque lente, ut supra; hac adhibita cautela, ut lebetes perpetim dicto lixivio adimpleantur, donec crassescere lixivium & sal projicere cœperit, id quod viginti quatuor horarum spatio, aut circiter, evenire solet ut in superficie lebetis sal reticuli aut telæ instar candidum apparere incipiat: tunc adit rudicula, pluribus in locis perforata, teneaturque in fundo lebetis, ut quicquid salis subsederit excipiat, quod successive, atque ita eximes, ut lixivium guttatim in lebetem

effluat, indaturque sal in vasa terrea, aut percolare lixivium tanto melius possit, quæ colatura denuo excepta in lebetem immittitur: sal autem siccatur, eademque ratione proceditur, usque dum omne ablatum fuerit. Notandum autem est, ut ubi apparere sal cœperit, ignem adhibeas lentum: Etenim si violentum adhibeas, sal lebeti adglutinabitur, & quia potens admodum est, lebetem corrumpet, id quod mihi nonnunquam accidit: quare hoc supra omnia observandum, magna adhibenda diligentia est. Sal autem ex vasculis, ubi bene percolatum fuerit: eximatur, mittaturque in scrinium vel receptaculum ligneum, ut omnis humiditas tanto melius absorbatur, id quod plurimum dierum spatio, & pro anni tempestate citius vel tardius evenire solet. Totum autem conficiendi plurimum egregii salis artificium in tartaro situm est, ut supra demonstravimus. Ego ex libris trecentum cineris orientalis ordinariæ ab octuaginta in nonaginta libras salis extraxi. Ubi jam sal bene siccatum fuerit, frangatur grosso modo, & mittatur in fornacem calcariam, ut lento admodum calore siccetur, & instrumento ferreo, quod rotabulum artifices vocant diffingatur, misceaturque haud secus ac frita solet. Absumpta jam omni humiditate in fornace moderate calida, eximatur sal, tundaturque in pila lapidea, cribretur angustiore cribro, ne grana salis, quæ excidunt, majora sint granis frumenti. Hoc sal ea ratione contusum, cribratum & siccatum, seorsim, & in loco ab omni pulvere immuni adservatur, ut inde frita crystalli fiat, id quod eo qui proxime sequitur modo fit.

CAP. II. *Modus, quo Frita crystalli, vulgo Bollito dicta fit.*

Crystallum facturus pulchram & omnibus numeris absolutam, id age, ut *tarsus* habeas candidissimum. Murani silice utuntur Ticinensi, cujus lapidis in Ticino flumine ingens copia est. Tarsus marmoris duri & candidi species est, quæ in Thuscia ad pedem Verucolæ Pifarum, nec non Seravezza, & Massæ di Carrara, itemque in Arno flumine subter & supra Florentiam, alibique nascitur, & vulgo satis nota est. Hujus ergo Tarsi illam tibi speciem parabis, quæ candidissima sit & venis nigris, maculisque croceis, & omni rubigine careat: animadvertendo, quod omnis lapis, qui chalybe vel ignitabulo percussus ignem reddit, vitro vel crystallo aptus sit: & contra, quod omnes illi lapides, qui ignitabulo vel chalybe percussus ignem non reddunt, nullo unquam tempore in vitrum abeant, id quod monitorii loco inservire poterit, ad discernendum omne genus lapidum. Hic tarsus, quam maxime pulcher & candidus minutatim contundatur in pulverem, idque in mortario lapideo, non alio quocunque metallico, ne, quod eventurum esset, colorem metalli arceat, vitrumque & crystallum eo colore infectum minus absolutum reddat. Pistilla ferrea sint necesse est. Tarsus bene & exacte pulverisatus cribretur cribro angustiore: omnis enim negotii cardo in eo vertitur, ut tarsus in modum farinæ quam optime tundatur, & per angustissimum cribrum transeat. Et recipiantur, exempli gratia, hujus tarsi optime pulverati libræ bis centum, nec non salis pulveris triti, & cribrati ut supra, centum & triginta circiter libræ, omniaque optime misceantur, unianturque, atque ea ratione mixta unitaque in fornacem calcariam probe calefactam mittantur: si enim in frigidam fornacem mitterentur, frita non fieret. In principio per horæ unius spatium ignis adhibeatur temperatus, ita tamen, ut rotabulo frita nunquam non misceatur, tantoque melius incorporetur calcineturque. Postea augeatur ignis, micundando semper frittam rotabulo, id enim ad rem plurimum facit: eademque ratione procedatur per quin-

quehorum adhibendo semper ignem potentem.

Calcaria fornacis calcinatoriæ species est, qua in contlandis vitris utuntur: res maxime nota & vulgaris. *Rutabulum*, instrumentum ferreum & oblongum, & inter vitrarios non minus notum est, quo fritta continue movetur. Exactis ergo quinque horis frittam eximi è calcaria curavi; eo enim temporis spatio, siquidem ignis recte administratur, prompta & parata est: atque hanc frittam, ad arcendum omnem pulverem, velamento quodam opertam in tabulato, loco sicco seposui; magna diligentia opus est, si crystallum desideras venustum. Fritta, eo, quo diximus modo facta, nivis instar candida est. Si tarsus macer fuerit, addantur ad prædictam dosin salis libellæ circiter decem. Sed qui in arte excitati sunt, è prima semper fritta argumentum capiunt, mittendo partem ejus aliquam in crucibulum, indeque in patinam vitream mundam, ut videant, an bene & cito coeat: quo ipso etiam apparet, tenerior an dura sit fritta, ac proinde salis dosis vel augetur vel minuitur. Hæc fritta crystalli ut supra dictum est, loco sicco adservatur; humida enim & terrestria loca non fert, sed dissoluto sale in aquam convertitur, solo remanente tarso; nec unquam in vitrum abit. Sed neque, ut alias fieri solet, humectatur hæc fritta, & fiet ratione præparata per tres vel quatuor menses adservetur, operi magis apta est, & tanto citius unitur. Atque hic modus est faciendi frittam crystalli, cum sua dosi, & circumstantiis, qua ratione illam sæpius feci.

CAP. III. *Alius modus novus, & à me inventus, extrahendi sal ex pulvere, quo crystallus aequè formosa & pellucida fit, quam montana crystallus est.*

Recipiatur pulvis orientalis beticè cribratus, mittaturque in ampullas vitreas in fundo lutatas, quas, ubi prius aqua communi repleta fuerint, in fornace super cineres vel arenam repones, adhibitoque per aliquot horas igne temperato, aquæ pars dimidia evaporare permittatur. Refrigeratâ postmodum fornaculâ, quicquid superest aquæ, leniter decantetur, in vasa terreâ vitriata, aliâque super pulverem recenti aqua, bulliat ut ante, idque toties & tam diu iteretur, usque dum aqua sal omne extraxerit, id quod gustu simul atque oculis cognoscitur, si nimirum aqua salsedinis nihil habeat, & coloris omnis experta sit. Hujus lixivii quantum quisque voluerit recipiatur, idque filtretur, & filtratum per dies quatuor vel sex in vasis vitriatis quiescat; ea enim ratione magnam partem illius terreni quod continet, deponet. Inde filtretur denuo, eritque purificatum, & à maxima parte terrestrium particulatum separatum lixivium. Mittatur denuo in ampullas in fundo lutatas, adhibitoque lento igne arenæ vel cinerum evaporare permittatur, animadvertendo, ut ubi materia siccata fuerit, ignis adhibeatur quam maxime moderatus & lenis, ne sal adustum corumpatur: quo bene siccato exemptoque dispendendum est, integrane sint illa vasa in fundo, an rupta, quod frequenter accidit, quo casu sal in alias ejus generis in ampullas in fundo lutatas & aqua communi repletas immittendum, & in fornace super arenam vel cineribus detinendum est. Semper autem octavam illius aquæ partem evaporare sines, refrigerataque postmodum fornace effundenda est aqua sale plena in vasa terreâ vitriata, & ubi per viginti quatuor horas requieverit, filtretur diligenter: feces enim aliasque terrestres particulas deponet. Exhalet hoc lixivium filtratum in ampullis vitreis ad lentum, & ubi jam ferè exhalaverit ad summè temperatum ignem, ne sal adustatur, quod denuo missum in ampullas aqua communi solvitur ut supra, iteraturque hic labor, us-

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

que dum sal nihil fecum aut terrestris materiæ post se relinquit: tunc enim purum erit atque perfectum, ex quo, nec non tarso subtili & candido, frittam facies, & crystallum; tantæ pulchritudinis & candidi splendoris, ut crystallum montanum orientalem superatura sit. In vitreis autem, non æneis vasis peragendus hic labor est. Etenim sal nunquam non aliquid coloris metallici attrahit; ideoque semper viret. Hæc ut magis laboriosa via sit minusque salis reddat, crystallum tamen dabit quovis magno Principe dignum, ut inde omnis generis vasa & labores fiant. Atque hoc meum inventum est, cujus ego cum magna mea delectatione & felici successu multoties experimentum feci.

CAP. IV. *De Aureo crystalli colore Observatio.*

Notetur, quod fritta sale pulveris, cui sal tartari admixtum est, facta, ad imbibendum auri colorem, inepta sit, nec unquam istiusmodi color, ex ea educi possit; sed reliqui in universum omnes. Quare ut aureum colorem habeas, frittam facies ex mero sale pulveris, ut supra purificati: nisi enim hoc fiat, aurum, colorem non acquies.

CAP. V. *Modus extrahendi sal ex herba, quem filicem vocant, quo crystallus satis elegans fit.*

Pilis experimentum feci cinetis herbae cujusdam, quæ vulgo *Filix* vocatur, & in *Thusia* copiose crescit. Hæc herba virens sub finem mensis Maii ad dimidium usque Junii resecanda est, idque crescente Luna & oppositioni vicina: summè enim tunc perfecta est & sal reddit copiosius, magisque candidum & notæ melioris; quam si alio tempore resecetur: si enim sic cari per se supra tetram permittatur, exiguum salis minime boni copiam præbet. Resectâ ergo ut supra, & accumulata, statim flaccescit, & si comburatur optimum cinerem relinquit, ex quo servatis regulis, ut supra de sale pulveris orientalis dictum est, sal extrahitur purificatum & bonum, ex quo, nec non tarso pulchro & bene cribrato frittam feci, quæ in patella optime percolata crystallum mihi dedit pulchram, & solito magis dulcem. Satis enim roboris habebat, & magis quam crystalli natura fert fledebatur. Intenuia enim fila duci potest, quemadmodum ego illam duci curavi. Hæc fritta aureum colorem mirum in modum reddit, tantum ne sal tartari addatur, ut supra annotatum est; & aureus ille color, quem hoc crystalli genus reddit, multo sese exerit venustius, quam in crystallo ex sale pulveris orientalis facta, & ex eodem non minus, quam hoc priore omnis generis vasa fieri possunt.

CAP. VI. *Modus parandi sal aliud, ex quo crystallus fit stupenda pulchritudinis.*

Patetur secundum prædictam methodum cinis ex filiquis & culmis fabarum siccatarum, excussis antea fabis, & hoc cinere, servato eodem, ut in sale pulveris orientalis ordine, sal extrahitur admirandum, quod cum tarso candido & bene cribrato, ut supra fusa dictum est, frittam nobilissimam, & crystallum reddit elegantissimam. Idem fiet ex cinere brassicæ, & rubi spinosi, qui moros fert, nec non cinere scaporum panicæ, juncorum item atque cannarum palustrium, multatumque aliarum herbarum, quæ sal suum dabunt, ex quo fritta more solito facta crystallos reddet formosissimas, ut curiosus quisque experiri poterit. Longè enim plus experientia docet quam diuturna studia.

Tert 2 CAP.

CAP. VII. *Sal ex quo crystallus satis venusta fit.*

Extrahatur sal ex calce muraria & depuratum admisceatur sali pulveris orientalis ordinarii, ad rationem librarum duarum in centum : id est libræ duæ salis calcis addantur ad salis pulveris ut supra facti, libras centum. Ex hoc sale ita mixto, ordinario more fritta fiat, mittaturque in patellam ut purgetur, quemadmodum postea dicitur, ubi de modo faciendi crystallum crystallinam & vitrum commune agitur : ita enim crystallum habebis satis venustam & pulchram.

CAP. VIII. *Modus faciendi frittam ordinariam, ex pulvere scilicet orientali, rochetta & Soda Hispanica.*

Fritta nihil aliud est, quam calcinatio materialium ex quibus vitrum fit. Ut enim vel citra calcinationem liquecerent, & in vitrum abirent, id tamen non sine dispendio temporis & fastidio magno succederet. Quare inventa ratio est, ut fritta in fornace, vulgo *calcaria* dicta calcinetur. Etenim ubi bene calcinata, & pondus materialium iustum fuerit, habita scilicet ratione bonitatis Sodæ, in olla celerrimè funditur & mirè purgatur. Fritta quæ ex pulvere fit, vitrum candidum, sed commune debet. Fritta quæ ex rochetta, sed orientali fit, vitrum dat formosissimum, quod crystallinum vocatur. Soda Hispanica sicut magis unguinosa plerumque fit, vitrum tamen minus candidum, minusque formosum reddit, quam rochetta orientalis. Semper enim aliquid ex cæruleo trahit.

Ut ergo singula rite præparentur, pulvis cribretur cribro angustiore, & quæ non transeunt minutæ, in mortario lapideo, nec aliter, tundantur, ne colorem attrahant. Idem de rochetta & Soda, sed separatim fiat, idque agatur, ut omnia bene tundantur, transeantque per cribrum angustum. Etenim ut vulgare vitrariorum proverbium fert, in cribro angusto & lignis aridis situm est omne decus fornacis. Qualis ergo cunque Sodæ quantitas detur, libræ centum Sodæ, exempli gratia, requirunt ordinariæ libræ octuaginta quinque usque ad nonaginta tarsi, quem secundum ea, quæ de crystallo dicta sunt, necessum est subtiliter tundere in mortario lapideo, non alio, & tum demum trahere per cribrum angustum, idque ea quantitate, quam bonitas & pinguedo Sodæ requirit, de qua experimento tibi conitare debet, ut in arte notum est. Atenæ postea, & maxime illius quæ in Hetruria & Arni valle nascitur, tarsi quoque pinguior est, & plus salis continet, semper libræ sex vel octo in singulas centum libras dantur. Hæc tamen arena bene antea lota, & ab omni sorde purgata, & postea bene cribrata sit necesse est, ita enim vitrum reddit candidum & pulchrum. Tarsis tamen elegantius vitrum præbet, quam alia qualiscunque arena, quæ in Hetruria nascitur. Ubi jam inventa fuerit debita dosis arena vel tarsi, primum optime miscenda est cum Soda vel pulvere orientali bene cribratis, & sic mittenda in calcariam calentem, & bene extendenda, miscendo & agitando omnia ope rutabuli, ita ut bene calcinentur, continueturque hic labor, usque dum omnia coeant in massam vel mustula magnitudine nucis Ponticæ, idque per horas quinque, servato eodem gradu ignis. Etenim si ignis debite continuatus, & materia rutabulo quinque horarum spatio bene agitata fuerit, fritta omnibus numeris absoluta evadet, id quod cognosces, si abrupta à refrigerante materia aliquâ ejusdem particulâ levis atque ita candida appareat, ut tamen flavedinis non nihil secum ferat. Diutius autem quam per horas quinque frittam calcinare licet. Quanto enim plus agitata, quantoque melius calcinata est materia, tanto in olla

solvitur citius, & aliquantò durius, in calcaria permanens deponit consumitque rudem illam flavedinem, quam secum vehit, vitrumque magis purgatur. Exempta jam è fornace fritta, ita ut est calida & ignita, tribus vel quatuor mediolis frigida perfunditur, & aliquantò post in loco humido frigidoque seponitur. Lutum autem quod superat, cum sal conficitur, ut plurimum in eadem vasa immittitur, quibus lixivium pulveris continebatur, adjectaque communi aqua, quicquid per illud lutum paulatim restagnat, submissis caninis excipitur, & lixivium satis acre præbet, quod ubi subsidere & clarescere coepit, seorsim servatur, eoque fritta per intervalla conspergitur quæ quidem fritta loco humido accumulata, atque hoc lixivio per duos vel tres, aut quod melius est plures menses confersa, lapidis instat concrevit, ut ligone opus sit ad diffingendam illam, atque tunc parvis admodum horis in olla liquecit, vitrumque reddit candidissimum, & crystallo fere simile. Lixivium enim illud sal ei suum largitur, cujus hic effectus est. Quod si lixivium istiusmodi ad manum non sit, aqua communi conspergatur, quæ ut ut easdem quas lixivium vires non habeat utilis tamen est, & fusionem promovet. Et fritta quidem semper spatium aliquot mensium requirit : augetur enim ea ratione, minus lignorum absumit, vitrumque reddit magis candidum & operi aptum.

CAP. IX. *Crystallum perfectissimum facere.*

Recipe frittam crystalli, sedulo, & ad normam eorum, quæ in principio dicta sunt, factam, eamque in ollam conjice, semotis quæ colores continent ollis aliis : sumus enim metallorum, quibus major colorum pars conficitur, crystallum reddit deformem & pallidam. Ut autem candida, fulgens & venusta fiat, fritta in ollam demissa tantum magnesiæ da, quantum ollæ magnitudo & capacitas requirit, id quod in illorum qui vitra constant experientia consistit, & ab eorum munere dependet. Magnesiæ autem intelligo Pedemontanam, præparatam uti postea dicitur. Fornax lignum requirit durum aridumque, quale quæcumque. Mollioribus enim lignis quasi inter-motua nihil agit. Præterea necessum est, ut assidue & leniter instigetur, excitandæ flammæ & fumi vitandi gratia, id enim ad venustatem crystalli plurimum facit. Liquata bene fritta eximatur ex olla, mittaturque in labrum grande terreum, frigida repletum, vel in vasa lignea munda, projici etenim in aquam vult, quo illud efficietur ut salis quoddam genus, *Alcali* dictum, absumatur : quod quidem sal crystallo noxium est, illamque obscuram & nebulosam reddit : atque in causa est, ut, quod sedum visu, in opere ipso sal expuat. Mittatur denuo in ollam puram, & sæpius, pro rei exigentia, in aquam projiciatur, ut crystallus ab omni sale liberæ & immunis sit : totum autem hoc negotium à peritia vitrarii dependet. Inde per quatuor vel sex dies bulliat, ac quam id fieri potest minime ferro moveatur, semper enim tincturam ejus nigricando recipit. Ubi jam exacta & clara fuerit, videndum est, satine magnesiæ contineat, ac si aliquid ex viridi colore trahere videbitur, magnesiæ plus addendum est : animadvertendo, ubi crystallum quærimus formosam, semper adhibendam esse magnesiæ Pedemontanam, ut *Morani* fit : quæ enim ex Thuscia & Liguria advehitur, plus ferruginei coloris continet, ac nigrum semper opus reddit, ideoque vitrarii Pedemontana semper utuntur, ut qua meliorem non agnoscunt. Parcè autem & cum judicio addenda est magnesiæ : colorem enim crystallo tribuit ferrugineum, qui tandem in nigrum degenerat, eademque splendorem detrahit. Additâ magnesiâ vitrum bulliat, usque dum colorem acquirit clarum & fulgentem, Proprium magnesiæ in debita quantitate adhibere hoc

hoc est, ut ablata rudi viriditate crystallum perficiat, eique candidum splendorem tribuat. Parce igitur & gradatim adhibenda est, ne crystallum corrumpat: totum autem hoc negotium à diligentis & ingeniosi artificis peritia dependet, nec pondus aut mensura certa dari potest. Ubi jam crystallum habueris exactam limpidam & formosam, id age, ut sine interruptione in talia vasa vel opera formetur, quæ tibi quam maxime arrident, minore tamen quam in elaborando communi vitro igne, sed maxime lucido, & ex lignis durioribus & aridis, sine fumo. Instrumenta autem ferrea, quibus operatius utitur, munda & polita sint, advertendo, ne collum vel extremitas vitri, quæ cannæ adhæret, in ollam crystalli projiciatur, semper enim aliquid ferrei coloris secum trahit, quod crystallum vitiat. Hoc ergo specialiter notandum, & particula illa vitri, quæ cannæ annexa fuerat, in ollam vitri, communis conjicienda est, unde minoris momenti vasa conficiuntur, quibus hoc nihil obest. Atque hic modus est elaborandi crystallum, quo semper usus sum.

CAP. X. Ut crystallinum & vitrum candidum, alias vitrum commune dictum fiat.

Si frittam pulvere factam in ollam miseris, vitrum habebis candidum & pulchrum, quod vitrum commune vocatur. Quomodo autem frita ex pulvere & rochetta fiat, suo loco perspicue demonstratum est. Quod si frittam rochetta factam adhibeas, vitrum habebis pulcherrimum, quod medio inter vitrum commune & coctum, Bollito dictum loco est, & crystallus vocatur. Fornax semper calefiat lignis durioribus & siccis, cavendo fumum, qui semper noxius est, & nigrum opus reddit. Vitro, tam communi, quam crystallino sua doli, & sua magnæ Pedemontanæ præparatæ pars detur ut de Bollito vel crystallo dictum est, & pulchrum evadet. Magnesia enim quicquid viriditatis habent auferit. Crystallinum semper in aquam projiciendum est, & vitrum habebis candidum & speciosum. Idem vitro communi fieri potest, ut perfectum evadat. Inde in ollam redeant more solito, & ubi purgata fuerint, elaboranda sunt, prout usus postulat: notando, projectionem in aquam in uniuscujusque arbitrio sitam esse, & omitti, si voles, possit: verò si vitrum solito formosius desideras, necessaria est: præterquam enim quod vitrum redeat candidum, etiam hoc ei præstat, ut calcinetur & bene purgetur, minusque pustulatum habeat. Animadvertendum etiam quam maxime hoc est, si libris centum crystallini totidemque communis vitri, singulis seorsim, libras decem salis tartari purificati addideris, vitrum efficies & crystallinum citra controversiam solito elegantius & operi magis aptum cavendo ne in crystallinum projecias extremitates illas vitri, quæ cannæ ferreæ adherent, semper enim colorem nigrum progenerant, ideoque in vitrum commune projiciuntur, sal tartari addendum, interim, dum frita sit, miscendumque cum tarso vel arena, & cum pulvere vel rochetta cribrata, fritaque more solito paranda est. Modus autem purificandi in hos usus sal tartari, is est, qui sequitur.

CAP. XI. Ut sal tartari purificetur.

Recipe tartarum, vel grumos vini rubri, crassiores, non pulverulentos, colque in ollis terreis inter accensos carbonem ure, ut in nigram calcem redigantur, omnisque pinguedo absumatur, ac jam albescente incipiant, albi tamen nondum sint, id enim ex re non esset. Hoc tartarum ea ratione calcinatum mittatur in vasa terrea vitriaria, & aqua communi repleta, bulliatque ad ignem lentum ita ut horis duabus quarta pars

aquæ absumatur. Tunc auferatur ab igne, & aqua refrigerescens, ubi inclauit, decantetur & aceto lixivium dabit. Impleantur vasa, quibus reliquæ tartari continentur aqua communi, bulliantque ut antea, idque repetatur, ut salis nihil in aqua remaneat, quo facto aqua omnis filtretur, & lixivium clarum filtratumque in ampullis vitreis super cinere ad lentum ignem evaporet, ac in fundo sal candidum remanebit, quod aqua communi solutum, ubi per biduum quievit, denuo filtretur, & ad lentum ignem in ampullis ut antea evaporet, remanebitque in fundo sal longe quam antea candidius. Repetatur hic processus ter quaterque, & sal habebis nive candidius, & à magna parte terreitatis suæ liberum, quod pulveri vel rochetta cribrata, cum debita quantitate tarfi vel arenæ admixtum, fittam, & postea crystallinum & commune vitrum multo quam alias melius dabit.

CAP. XII. Zafferam præparare, ut coloribus in arte vitriaria inserviat.

Recipiantur frusta majora Zafferæ, mittanturque in vasa terrea, & per dimidium diem in camera fornacis serventur: inde in tudicula ferrea ad ignem fornacis candescant, extractaque acri aceto conspergantur. Postea ubi jam refrigerint super porphyrite ad lævorem subigantur, & in vasis vitriatis calidâ sæpius laventur, ita tamen ut Zafferæ semper residere in fundo permittatur: quo facto aqua leniter decantetur, ita enim spurcities & terreitatis omnis auferetur, & sola Zafferæ in fundo remanebit, quæ siccata & vasis clausis in usus asservata, vitrum egregie & longe quam antea melius tinget.

CAP. XIII. Magnesiâ præparare, tingendo vitro.

Recipiatur magnesia Pedemontana: omnium enim, quas nunc quidem vitriarii norunt, optima est, & Veneriis copiose prostat, eaque solâ Muranenses utuntur. Utut enim in Thuscia & Liguria large proveniat, ferri tamen plurimum continet, nigrumque & spurcum colorem reddit, cum econtra Pedemontana spanum pulcherrimum faciat, & postremo vitrum ablata viriditate candidum relinquit. Hujus ergo magnesiæ frusta in tudicula ferrea igne fornacis reverberentur, ac jam candentia acri aceto conspergantur; postea maceant subtiliter, laventurque aliquoties calidâ, non secus atque Zafferæ frusta. Inde siccantur, redigantur in pulverem, & serventur vase clauso ad usum.

CAP. XIV. Ut Ferretum Hispanicum fiat colorando vitro.

Ferretum facere nihil aliud est, quam æs ea ratione calcinare, ut reclusum tincturam suam vitro communicare possit: atque hac calcinatione bene facta illud efficitur, ut in vitro colores diversi & valde speciosi appareant. Variis autem modis illa fit, quorum ego duo describam, faciles, & quibus non sine insigni effectui multoties usus sum: ac prior quidem hic est.

Habeas laminas ætis tenues, crassitie Florentinarum, adsitque unum vel plura crucibula, in quorum fundo stratum facies ex pulverisato sulphure, impositisque alternatim laminis & pulvere, eodem ordine procedes, usque dum crucibulum impleatur, id quod stratificate vocant. Crucibulum hoc luto bene obductum & siccatum in fornacem anemiam mittitur, & accensis infra carbonibus per duas horas igne urgetur valido: refrigerato postea crucibulo æs calcinatum invenies, quod digitis instar terræ siccioris contractum colorem redder nigricantem & subruffum. Hoc æs subtiliter maceratum, cribro angustiore cribratur & servatur usui.

CAP. XV. *Alius modus faciendi Ferretum.*

Hic secundus modus faciendi ferretum, magis quidem operosus est, sed effectum in vitro extraordinarium producit. Æs ergo loco sulphuris cum vitriolo stratificetur calcineturque, & per triduum in camera fornacis prope foramen, Italis *occhio* dictum detineatur. Deinde extrahatur, recenti vitriolo stratificetur, reverbereturque ut supra; atque hæc calcinatio cum vitriolo sexies iterata ferretum dabit nobilissimum, quod tingendis vitris effectum præbet plus quam ordinarium.

CAP. XVI. *Ut crocus ferri, vel ut vulgo dicitur, Martis fiat, tingendo vitro.*

Crocus Martis nihil aliud est quam subtilis calcinatio ferri, qua mediante tinctura ejusdem quæ in vitro rubicundissima est, ita recluditur, ut communicata vitro, non ipsa modo sese manifestet, sed hoc etiam efficiat, ut omnes alii colores metallici, qui alias in vitro occulti & quasi mortui interciderent, formosi & splendidi appareant. Hoc enim illud remedium est, quo occulta metallica in lucem producantur. Ego quatuor modos præparandi crocum dabo, quorum primus hic est.

Recipiatur limatura ferri, vel quod melius est chalybis, misceatur cum tribus partibus pulverati sulphuris, & in crucibulo, uti supra de ferreto dictum est, calcinetur, omneque sulphur comburatur, id quod propere fit, & inter carbones ardentes per horas quatuor detineatur. Postea extrahatur, redigaturque in pulverem, & per cribrum angustum trajiciatur. Deinde mittatur in crucibulum opertum & lutatum, stetque in camera fornacis prope foramen *occhio* dictum per dies quindecim vel plures, & colorem assumet ex subrusto puniceum, & quasi purpurascentem, servetur vase clauso, ad tingendum vitrum: plures enim egregios effectus præstat.

CAP. XVI. *Ut crocus Martis alia ratione fiat.*

Hic secundus modus præparandi crocum Martis, quanquam perfacilis, magnificandus tamen potius quam sperendus est. Etenim crocus ea ratione facta, efficit, ut vitrum sanguineum colorem referat, estque talis.

Recipiatur limatura ferri, vel quod melius est chalybis, misceatur bene in vasis fictilibus aceto forti, id est irroretur hætenus, ut massa tota humedetur & madescat. Postea extendatur in vase, exponaturque soli, ut siccescat, vel absente sole, relinquatur in aëre. Ubi jam siccata fuerit, tundatur; globata enim erit, irroreturque recenti aceto, siccet & tundatur ut antea, idque octies repetatur, ac tandem confusa transeat per cribrum angustum, & pulverem dabit subtilissimum, colore lateris confusi, qui vase bene clauso servetur ad coloranda vitra.

CAP. XVII. *Alius modus faciendi crocum Martis.*

Hic tertius modus præparandi crocum Martis, beneficio aquæ fortis istiusmodi est, ut intimus color ferri seipsum, magis quam credibile est, manifestet, id quod in vitro apparet. Ferri ergo vel chalybis limatura in vase terreo viriato irroretur aqua forti, & siccet in sole. Deinde redigatur in pulverem, conspergatur aqua forti, & siccet, idque sæpius repetatur. Assumpto postea colore subrusto, ut de croco Martis sulphure facto dictum est, teratur, cribretur, & tingendo vitro servetur,

CAP. XIX. *Alia ratio præparandi crocum Martis.*

Hic quartus & ultimus, ac fortasse omnium optimus modus est, faciendi crocum Martis, quem nunc demonstratio, ita tamen ut nullus eorum, quos demonstravi, non per se bonus ac perfectus, atque adeo propter diversos, qui requiruntur colores, necessarius sit. Solvatur ergo limatura ferri, vel quod melius est chalybis in vase vitreo bene clauso aqua forti regiâ, sale armoniaco, ut moris est facta, uti postea de calcedonio dicitur, serveturque per triduum, ita ut quotidie bene agitur: advertendo, ut sensim limaturam addas, valde enim intumescit, & nisi cautè tractetur, vitro periculum rupturæ minatur, vel omnia foras evomit. Exacto triduo aqua ad ignem lentum evaporet, atque in fundo crocum Martis nobilissimum invenies, quo vitra stupendum in modum tinguntur, quem in usus tuos servabis.

CAP. XX. *Quomodo bracteola cupri tremula vel crepitantes, Italis tremolante vel orpello dictæ, calcentur, quibus vitrum caruleo vel piceo colore tingitur.*

Bracteolæ aris crepitantes, à tremendo, quod nobilissimum est, Italis tremolante dictæ, aris quædam à cadmia aureo colore tincti species sunt: atque hæc cadmia non æs modo tingit, sed cum eodem conjuncta pondus quoque ejusdem non parum auget, & ab hoc augmento, æs ubi bene calcinatum fuerit, etiam hoc habet, ut vitrum, quod visu jucundum est, medio inter aquæ marinæ, & cæli, cum sudum est colorem modo tingat; quare necesse est ut cum cura calcinetur, id quod apposite hac ratione fit.

Recipiatur æs crepitans vel tremulum, tale scilicet (ut impenitè minuantur) quod usui antea & corollis intersuit, idque forfice concidatur, & in crucibulum opertum lutatumque inditum, in medios carbones fornacis ardentes mittatur. Ego illud in præfurnio, ubi ignis suscitatur, per dies quatuor igne valido detinebam, ita tamen ut non liquefceret: frustranea enim omnis opera fuisset. Exacto hoc quattiduo optime calcinatum erat, id quod minutissime confusum per angustius cribrum trajiciebam, & in porphyrite optime terebam, prodibatque pulvis nigricans, quem in tegulis extensum per dies quatuor in area camera fornacis, prope forandum ejusdem foramen detinebam, & demum is qui inciderant cineribus, in pulverem redactum, cribratumque in usus meos servabam. Bonæ calcinationis signum est, si vitrum addito hoc pulvere valde intumescat: nisi enim hoc fiat æs male calcinatum, vel nimio calore adustum est, quo utroque casu vitrum neque tingitur, neque intumescit. Hoc ergo notetur, cum ad præxin pertineat.

CAP. XXI. *Ut idem æs aliter calcinetur, & color ruber pellucidus nec non flavus onychinus fiat.*

Recipe æs tremulum, forfice ut antea dictum est minutim concisum; stratificetur in crucibulo sulphure pulverato & in candentes carbones mittatur. Ego illud ad calcinandum in præfurnio per horas viginti quatuor detinebam, confusumque & cribratum in terreo vase operto ad reverberandum in camera fornacis per decem horas stare permittebam, & deinde pulveratum tritumque ad usus meos servabam.

CAP. XXII. *Color aquæ marinæ, in arte vitraria primæ us.*

Aqua marina, vel color eo nomine dictus è præcipuis

pulis, quibus vitra inficiuntur, coloribus est, & si pulchrum illum & exquisitum facere desideras, è bollito vel artificiali crystallo fiat necesse est. Etenim vitro communi factus, pulcher non est. Jam qui crystallino fit, magis quidem elegans, sed omnium optimus est qui bollito vel artificiali crystallo paratur: notando, ut aqua marinæ colorem facturum, nulla ratione magnesiæ addas; utur enim igne consumatur, vitro tamen istiusmodi qualitatem dat, ut aqua marina semper nigricare videatur, ac minus perfecta magisque deformis appareat. Ut ergo aquam marinam elegantem & venustam facias, frittam crystalli recipe, eamque nulla addita magnesiæ in ollam mitte, & ubi jam vitrum bene costum purgatumque fuerit, sal quod vitro instat olei innatat cochleari vitrariorum ferreo, ut notum est diligentissime auferatur; nisi enim id fiat color deformis & unguinosus reddetur. Ubi jam vitrum optime purgatum fuerit, ad viginti libras crystalli, aut circiter, addatur æstremuli, eo, qui *capite vigesimo* occasione coloris cœrulei & picæ marinæ descriptus est modo calcinati præparatique uncia sex, nec non zafferæ præparatæ pars quarta, sed ita, ut hi duo pulveres antea bene misceantur, & sensim ac per vices in ollam mittantur. Etenim æs tremulum, bene & sufficienter calcinatum, usque adeo intumescit, ut vitrum omne è catino propellat: quare attentione opus est, & assiduo vitri motu. His peractis vitrum per tres horas quiescat, ut colorem imbibat, & postea denuo misceatur, captoque experimento videatur, an satis plenus color sit, nec ne, ut intendere illum vel diluere, si opus sit, possis. Etenim vasa & pocula operis tenuioris colorem magis plenum, vasa majora dilutum magis requirunt, & pro ratione operis vel intendendus vel diluendus est color, id quod iudicio vitrarii relinquatur. Usitamen receptum est, ut experimento facto semper id quod minus est sequamur, cum intendere colores, illos præsertim, quos vitro bene depurato damus, nunquam non in proclivi sit. Exactis ab addito pulvere horis viginti quatuor, elaborandum erit vitrum: animadvertendo semper, uti antea quam operi manus adhibeatur, vitrum inde à fundo ollæ, & per totum bene misceatur, & color miscendo diffundatur. Etenim quiescente vitro color fundum petit, & pars vitri superior colore destituitur: misceatur ergo subinde, prout necessitas requirit. Idem ordo, eademque dosis & regula in ollis crystalli majoribus servatur. Atque hunc modum faciendi aquam marinam Florentiæ anno 1602. expertus sum, & plurimè egregii coloris vasa in usus domesticos feci. Notetur *Murani* ad istiusmodi opera æquale pondus frittæ crystalli & rochettæ adhiberi, nec tamen eo minus elegantem aquæ marinæ colorem prodire. Elegantissimus tamen ex sola crystallo.

CAP. XXIII. Cæruleus vel aqua marina.

Habeas in fornace ollam vitri depurgati ex frita rochettæ vel sodæ Hispanicæ: rochetta tamen orientalis huic negotio apissima est. Ubi vitrum optime purgatum fuerit, in ollam librarum viginti dantur æstremuli, ex præscripto *capitis vigesimi* bene calcinati, servatâ eadem, ut in aqua marina dictum, methodo, uncia sex: advertendo, ut sal vitro innatans, id quod vitrarii optime norunt, diligentissime auferatur, & color prodibit cæruleus & picæ marinæ admirandus, qui, ut artifices norunt, pro ratione operis vel augetur vel minuitur. Elapsis duabus horis vitrum denuo bene misceatur, factoque experimento videatur an color satis plenus sit, ut augeri adjecto novo pulvere, vel dilui possit: ac ubi jam voto responderit, per horas viginti quatuor relinquatur, ac tum demum misceatur & elaboretur, color enim erit cæruleus & aquæ ma-

rinæ pulcherrimus, & ab omnibus aliis coloribus qui in arte vitraria sunt, diversus; atque hoc colore Pius anno 1602. ollas longe plurimas infeci, pulcherrimas & omnium perfectissimas.

CAP. XXIV. Pulvis ruber, multis in vitro coloribus inserviens.

Recipe laminas æris tenues easque in arcu fornacis muro seclusis tantisper detineto, donec simplici igne solæ & per se calcinatæ fuerint, ita tamen ut non liquefiant: nihil enim inde boni fieret. Ubi jam calcinatæ fuerint, tundantur, & in pulverem redigantur, prodibitque pulvis ruber, qui ad varios in arte vitrariæ necessarios alius servetur.

CAP. XXV. Æs ter calcinatum tingendo vitro.

Pulvis ruber supra dictus mittatur in fornaculam vel arcum fornacis, circa foramen oecchio dictum in tegulis vel lateribus coctis, calcineturque per quadraginta continuum, & pulverem dabit nigrum conglobatumque. Teratur denuo, cribreturque cribro angustiore, & calcinetur in arcu fornacis, ut antea, per dies quatuor, vel quinque; & neque coacervabitur amplius, neque pulvis usque adeo niger erit, sed in leucophæum colorem inclinabit & per se dissolvetur. Hoc pulvere, qui *Italis ramina di tre cotte* vocatur, aqua marina, viride smaragdinum, color Arabicus, vel us vulgo Turcinus, nec non cæruleus admodum speciosus multique alii colores sunt. Advertatur tamen ne tertia vice vel plus vel minus quam par est calcinetur, neutro enim casu vitrum bene tingeret. Signum autem perfectæ calcinationis est, si vitrum in ollis purgatum addito hoc pulvere derepente intumescat & infletur: nisi enim hoc fiat, malæ notæ, & minus bene calcinatus est pulvis. Huc ergo res deducatur, ut perfectæ calcinetur.

CAP. XXVI. Aqua marina in crystallo artificiali, Italis Bollito dicta.

In ollam frittæ crystalli librarum quadraginta, quæ magnesiæ admistam non habeat, sed accuratissime, ut ego citra trajectionem in aquam soleo, despumata, nec non optime excocta purgataque sit, dentur uncia duodecim æris, ut supra *capite vigesimo quinto* dictum est, ter calcinati, nec non zafferæ, eo qui *capite duodecimo* demonstratus est modo præparatæ uncia dimidia, unisque bene hi duo pulveres, & in quatuor partes divisi quatuor distinctis vicibus in ollam mittantur, ut eo melius à vitro recipiantur. Misceatur vitrum diligentissime, & ubi per duas horas requieverit, ac denuo mistum fuerit, experimento facto videatur, an color satis plenus sit, & si voto respondeat, stare permittatur. Utur enim aqua marina virefcere videatur, sal tamen, quod vitro inest, abluet illam viriditatem, & semper in colorem inclinabit cæruleum. Exactis viginti quatuor horis operi sese accingere licebit omniaque parata & color vel plenus vel dilutus erit, prout plus minusve pulveris addideris. Colores enim ut addito novo pulvere intenduntur, ita demta vitri tincti, additaque alia ejusdem naturæ & qualitatis vitri non tincti parte diluuntur, atque ea ratione ad optatum terminum deducuntur. Nullis enim certis regulis hoc comprehendi potest, sed à vitrarii & artificis prudentia dependet. Hunc aquæ marinæ colorem parandi modum sæpius expertus sum nunquam fallente experientia: quod si frittæ crystalli partem dimidiam frittæ rochettæ admiscueris, aquam marinam habebis pulchram: omnium tamen longe pulcherrima ex sola crystallo fit.

CAP. XXVII. *Observationes generales in omni colorum genere.*

Ut colores pulcherrimi & summe perfecti evadant, advertatur, quod olla quævis recens, dum prima vice incalescit, ob terrestrem suam qualitate in vitro rude quidpiam impiimit, quo mediante colores omnes, qui tunc sunt, sylvestres & illepidi apparent, quare olla non admodum magnæ vitri albo fuso, quod artificibus notum est, induci possunt. Secunda tamen vice petiisse videbitur sylvestre illud & illepidum. Notetur secundo, in ollas huic vel colori inservientes, non esse mittendam vitrum alterius generis colori destinatum. Exempli gratia: Olla flavo colori inserviens, parando coccineo apta non est, nec quæ coccineo inservit viridi, uti nec rubro inserviens aquæ marinæ colorem fert, & sic porro: sed unusquisque color, ut perfectus evadat, propriam suam ollam desiderat. Notetur tertio ut pulveres debita ratione, & neque plus neque minus quam par est calcinati sint. Quarto. ut omnia in debita proportionem & dosi adhibeantur, & mixtura ex præscripto fiat fornaxque bene calida sit, & lignis incalescat siccis, & durioribus. Ligna enim viridia, minusque dura exiguo suo calore, & fumo omnia corrumpunt. Quinto notandum est, ut color per partes adhibeatur, id est, ut pars una frittæ altera vitro fuso & bene purgato detur. Alia etiam observanda sunt quæ suo loco, ubi speciatim de coloribus egerimus, dicentur.

CAP. XXVIII. *Es alio faciliore modo, & sumtu minore ter calcinare.*

Recipe scoriam, quæ dum fabri ærarii urnas, situas, aliaque ex ære candefacto armamenta fabricantur, decidit; minoris enim quam æs solidum emitur, neque ut calcipetur stracto vel destructo in arcu vel testudine fornacis muto, ut antea, opus habet. id quod per se molestum est, & magnas in fornace turbas dat. Hanc inquam scoriam ab omnibus heterogeneis purgatam, calidamque bene loram & in lateres vel tegulas coctas impositam, in arcu fornacis circa foramen vel in fornaculâ huic operi specialiter dicata seponet. Ego Pisis, extructa istiusmodi fornaculâ in modum parvæ calcaris nonnunquam viginti vel viginti quatuor libras hujus scorisæ exiguo aliquot horarum spatio calcinavi. Ergo in arcu proprio foramen fornacis per dies quatuor stet, extractaque tundatur, transeatque per cribrum angustum, ac de novo in tegulis vel lateribus coctis in eodem loco & caloris gradu, ut supra per dies quatuor destinetur, & prodibit pulvis niger, qui conglobatus, tundatur, cribretur cribro angusto, & in tegulis coctis in eodem ut antea calore & loco seponatur, & minore quam supra fastidio & sumtu optime præparata erit, eundemque semper in tingendo vitro effectum præstabit: advertendo, ut quemadmodum supra dictum est, antea quam calcinetur ab omni terrestri materia sedulo purgetur laveturque. Scorisæ bene præparatæ signum est, si vitro addita intumescere illud atque turgere faciat.

CAP. XXIX. *Elegans ex hac scorisæ aqua marinæ color in crystallo.*

Recipe ollam librarum sexaginta frittæ crystalli, à sale ut supra dictum est, optime purgatæ & in aquam non trajectæ, (mibi enim in more positum non fuit, ut aquam marinam facturum crystallum in aquam trajicerem; videbaturque mihi ea ratione melius procedere negotium: liberum tamen cuivis erit, uti illud sequatur, quod experimento facto optimum videbitur) in hanc ollam librarum sexaginta crystalli bene pur-

gata, sensim & per vices mitte libram unam cum dimidia scorisæ, ut antea dictum est, minore sumtu factæ, nec non zafferæ præparatæ, & cum pulvere scorisæ bene mittæ uncias quatuor, eaque omnia cum vitro per duas horas sedulo misceantur, omnibusque bene mixtis experimentum fiat, & si color placuerit, itare permittatur: neque enim opus est ut color viginti quatuor horarum spatio augeatur. Deinde movendo ut antea, misceratur vitrum, ut colorem bene imbibat, elaboreturque ut cuique placuerit, & aquam marinam pulcherrimam dabit, quemadmodum ego felici successu multoties expertus sum. Color autem minus vel magis augendus est pro ratione operis cui inservire debet. Præcipue autem id agendum est, ut scorisæ bene calcinata sit. Si frittæ rochètæ alterum tantum frittæ crystalli admisceas, aqua marina omnibus modis pulchra erit.

CAP. XXX. *Aquæ marinæ color impendio minore factus.*

Eadem ut antea dictum est, præparatæ scorisæ, nec non prædicta dosis zafferæ, eadem ratione & forma detur rochètæ orientali & Hispanicæ, ita tamen ut neutra earum magnesiæ contineat, nec in aquam projecta, sed à sale optime purgata sit, servatis, quantum ad reliqua, istiusmodi regulis, quas supra in crystallo memoravimus, & aqua marina satis pulchra & cuicunque operi apta evadet, multoque minore quam crystallus pretio emittitur. Hac ratione illam sapius Pisis & semper felici cum successu feci.

CAP. XXXI. *Aqua marina propria inventionis supra omnes alias admiranda.*

Caput mortuum vitrioli Veneris, sine corrosivis Chymice factum, si per aliquot dies in aëre steterit, sponte sua citra omne artificium, colorem recipit viridem subalbum. Ex hac materia, si in pulverem redigatur, & cum eadem zafferæ præparatæ, ut in aliis scorisæ præparationibus dictum est dosi, eodemque procedendi modo crystallo detur, aqua marina fiet admirabilis & stupendæ pulchritudinis, qualem ego Antverpiæ sapius feci, mirantibus cunctis qui illum viderunt. Modus spagyricæ sine corrosivis faciendi vitriolum Veneris hic est, ut bracteis aristæ nives, magnitudine dimidiati Florentini recipias, & in promptu sit unum vel plura crucibula, in quibus alternatim litratum ex sulphure communi pulverato & æris bracteis facies, usque dum crucibula impleantur, & omnes æris bracteis absumentur signis, id quod stratificare vocant. Hoc peracto tegantur crucibula, eo qui capite 131. sequitur modo, ut experimentum fieri possit. Hunc modum nullus quod sciam expertus est, sed ego Antonius Neri Sacerdos experimento facto admirandum illum, ut supra dictum est, inveni, ideoque propriæ inventionis illum esse dico.

CAP. XXXII. *Viride in vitro smaragdinum.*

Dum viridis color sit, considerandum est, ne vitrum multum salis contineat. Etenim si istiusmodi vitrum adhibeas, quod salis plurimum habet, quale illud est, quod ex rochètæ & crystallo fit, viride pulchrum non fiet, sed aqua marina potius. Sale enim viride illud absumentur, & vitrum semper in cyaneum vel aquæ marinæ colore propendet. Quare si pulchrum viride facere animus est, metallum commune, id est ex pulvere, ut capite octavo demonstratur, factum in ollam mitte: atque hoc vitrum magnè nihil contineat, opus enim nigrum & deforme redderet. Ubi vitrum optime fustum & purgatum fuerit addantur exempli gratia ad libras centum vitri, uncis

circiter tres croci Martis, aëto, ut *capite decimo septimo* demonstratum est calcinati. Misceatur bene vitrum, & per horæ spatium quiescat, ut tincturam croci imbibat: ita enim nonnihil flavescet, absumeturque rude illud cœruleum, quod eidem semper inest, facietque ut suscipere colorem viridem possit. Tunc ergo adfit scoria ætis, eo qui *capite decimo septimo* demonstratus est modo, ter cocta, denturque in centum vitri libras, libræ duæ ejusdem scoriam, idque sex vicibus, bene miscendo pulverem cum vitro. Postea quiescat per duas horas, uniaturque cum vitro. Inde misceatur de-
novo, videaturque an pro ratione operis cui inservire debet satis plenus sit color: in ipso enim opere plus scoriam addere licet, & colores vel intendendi, vel diluendi sunt, pro ratione illius operis, quod faciendum suscepimus: nulla enim hic certa regula præscribi potest. Quod si color viridis in marinum vel cœruleum tenderet nonnihil croci Martis, ea, ut dictum est ratione addi posset, & viride smaragdi pulcherrimum haberis, quod alio nomine viride porri vocatur, & exactis viginti quatuor horis deduci in opus poterit, advertendo semper ut vitrum antea misceatur, quam operi manus admovetur. Colores enim semper fundum petunt, & circa verticem ollæ dilutiores sunt. Hoc viride sæpius Pissis & nunquam non eleganter feci, idemque eveniet omnibus, qui ea quæ supra dicta sunt curiosè servaverunt.

CAP. XXXIII. Viride eo quod supra dictum est elegantius.

At vero si viride eo, de quo supra dictum est, elegantius, magisque coruscans desideras, in olla crystallinum habeas quod magnesia careat, & semel vel bis in aquam projectum sit, ita ut omnis salsedo absumatur. Huic crystallino detur pars dimidia vitri communis albi, istiusmodi scilicet, quod magnesiæ non habeat. Ubi hoc vitrum mixtum fustum, & bene fuerit purgatum, recipe in centum vitri libras, libras duas cum dimidia pulveris laminarum æris, in arcu fornacis ut *capite vigesimo quinto* demonstratum est, ter calcinatatum, nec non uncias duas croci Martis, sulphure ut *capite decimo sexto* dictum est calcinati & reverberati, omniaque bene mixta, servatis iisdem ut supra in dicto viridi regulis vitro da. Et intendere quidem colorem plus minusve, prout videbitur poteris, ac si cœrulei quid habuerit, exigua supradicti croci portio addenda, vitrumque ipsum huiusmodi atque aliud viride elaborandum erit, & viride habebis pimpinellæ stupendum, idque sæpius Pissis felici cum successu feci. Notetur autem semper, ut scoria bene præparata sit, si colores desideras elegantes & pulchros.

CAP. XXXIV. Color viridis admirandus.

Recipe scoriæ ætis caldarii, ter ut supra demonstratum est calcinatam, & loco croci Martis, tot modis, ut supra præparati, scoriæ ferri ab incude decidenter & à pulvere carbonibus & cinere purgatam, eamque tunde, & quam id fieri potest subtilissime cribra. Misceatur in supra dicta dosi cum scoriam ætis, denturque vitro communi, facto ex pulvere, qui magnesiæ non habeat, servatis iisdem ut in viridi regulis. Et hic crocus vel scoria Martis colorem tibi dabit viridem smaragdinum mirabilem, qui absumto omni colore cœruleo & marino, qui ordinarie vitro adhæret, instar smaragdi flavescet, ac fulgorem nitoremque præ reliquis viridibus obtinebit. Ut hæc scoria ferri detur scoriam ætis, id ego Antonius Neri inveni. Quod à reliqua, eadem quæ in reliquis viridibus doses & regulæ serventur, & rem habebis stupendam, id quod experientia me sæpius docuit.

CAP. XXXV. Color alius viridis, qui palmam reliquis à me factis viridibus præcipit.

In ollam vitri librarum decem, cujus pars una crystallino sæpius in aquam projecto, altera vitro communi albo pulvere constet, recipe fritæ communis pulveris libras quatuor. Huic admisce libras tres minii, omniaque bene unita in ollam mitte, & paucis horis purgahuntur. Ubi jam purgata fuerint, trahantur in aquam, bene advertendo, coheret ne in fundo aliqua plumbi pars; diligenter enim eximenda & abjicienda est, ne quod evenire solet olla frangatur. Deinde vitrum in aquam projectum denuo mittatur in ollam, & per diem unum purgetur. Postea addatur coloritium ex pulvere capitis mortui spiritus vitrioli ætis chymice facti, cum exigua admodum quantitate croci Martis, & viride prodibit admirandum, & eorum quæ unquam feci pulcherrimum, quod smaragdum orientalem optimum refferet, formando cujuscunque generis operi.

CAP. XXXVI. Color cyaneus vel turcinus, in arte vitraria præcipuus.

Recipe sal marinum, vulgo nigrum vel rude dictum; candidum enim, quod Volaterris fit, huic operi aptum non est: Mittatur in calcariam, vel furnulum, ut calcinetur, omnisque humiditas absumatur, & album evadat; quo facto teratur, & pulverem dabit candidum. Hoc sal ea ratione calcinatum fervetur, ut inde color cyaneus vel turcinus fiat. Porro in olla fritam habeas crystalli, aquæ marinæ colore tinctam, de cujus non una præparandi ratione dictum est; & color ille quidem venustus & satis plenus sit: omnis enim parandi coloris cyanei ratio ab aquæ marinæ qualitate dependet. Huic vitro ita tincto detur sal marinum supradictum, sensim, & bene miscendo, ut in scoria sit, & aqua marina ex pellucida & transparente opaca fiet: sal enim dum in vitrum abit, pelluciditatem illam aufert, & pallorem quandam inducit, quo sensim color cyaneus vel turcinus, in arte vitraria præcipuus, fit. Cæterum ubi color jam voto responderit, statim elaborandum est vitrum; sal enim absumitur & in vapores abit, vitrumque transparens & deforme fit. Quod si dum elaboratur color evanescat, addatur ut supra nonnihil salis calcinati & color redibit. Notet vitrarius hoc sal nili bene calcinatum sit, semper crepare; in adhibendo ergo caute agat, oculosque & visum à periculo præservet. Dosis salis hæc est, ut sensim & per intervalla addatur, usque dum color voto respondeat: nulla enim certa mensura aut pondere hic usus sum, sed respondente colore subsistebam, & totum hoc negotium in experientia situm est. Sæpius hunc colorem feci, ut qui in re familiari necessarius, & in arte vitraria maximi momenti & præcipuus est: sufficit tamen in hos usus recepisse aquam marinam ex æqualibus crystalli & rochettæ partibus factam, & color evadet optimus.

ANTONII NERI

Florentini de Arte Vitraria

Liber Secundus.

Quo demonstratur verus modus faciendi Calcedonium, colore Achatidis vel Iaspidis orientalis: nec non præparandi in hunc usum omne genus colorum; cum modo faciendi aquas fortes & regias, in hac materia necessarias: modus præterea calcinandi tartarum, idemque uniendi cum rubri illius coloris genere, quod Itali Roschiero vocant,

& varios undantesque diversorum colorum in vitro lusus representat, eique opacitatem illam tribuit, quæ gemmis orientalibus naturalis est.

CAP. XXXVII. Quandoquidem in eo sum, ut demonstrarem modum faciendi Calcedonium, Jaspidem, & Achatem orientalem, necessum erit ut primo doceam præparationem aliquot mineralium huic compositioni inservientium. Utur enim nonnulla ex his passim veneant; quia tamen id ago, ut opus prodeat summe perfectum, ex te mihi visum est, demonstrare modum exquisitum & chymicum, quo mediante hujus artis periti & curiosi, sine cujusquam adminiculo quidvis magis perfecte & impensa minore facere possint. Etenim ubi materia debite præparata, & color metallicus bene reclusus, atque ab omni immunditia & particulis terrestribus, separatus fuerit, quæ unionem tincturarum cum vitro ordinarie impedire solent, dubium nullum est, quin vitrum tingatur coloribus vivis, splendidis & venustis, qui vulgares vitrationum colores longissime superant. Et quia color Calcedonii, vel potius compositi illius ex quo fit, nihil aliud est, quam coacervatio quædam omnis fere generis colorum, quos vitrum recipit, & vulgo omnibus æquè noti non sunt; colores etiam ipsi nisi bene præparati sint, illam venustatem & splendorem illum, qui requiritur, non exhibent, necessum erit, ut metalla aqua forti bene calcinentur, attenuentur, & retolvantur, æs, sulphur, vitriolum, sal armoniacum, & illius generis alia materia diuturnitate temporis & lento igne aperiatur, præpareturque: Ignis enim violentia hic maxime nocet. Ruber ille color, de quo cap. 124. & tartarum, utrum summæ perfectionis & bene calcinata sint, in debita tamen dosi atque proportionem, nec non suo tempore adhibenda, observandumque est, ut vitrum bene coctum, purgatum, & operi maturum sit; & talis in opere industria adhibenda est, qualem periti artifices adhibere solent: hac enim ratione Jaspidem, Achatem, & Calcedonium orientalem perfecte imitabimur, idque tanta colorum varietate, & undantium macularum venustate, tantaque & tam intensa vivacitate, ut quasi impossibile videatur naturam ad illud fastigium operis ascendere posse. Quamquam enim vulgo dicatur, verumque esse videatur, quod ars naturam æquate non possit, experientia tamen constat, in rebus plurimis, & specialiter in hoc tingendi negotio attem non æquare tantum, sed longissime etiam superare naturam, id quod nisi oculus testis nemo crederet. Elegancia ludorum & varietas, nec non undantes & cum venustate variegati colores, qui in calcedonio, si materia bene præparata & vitrum probe elaboratum fuerit, apparent, atque effectus qui inde resultat, omnem imaginationem & conceptum humanum transcendit. Tribus illis, quos doceo, modis, ni fallor apparebit, quo pertingere ars vitraria in hoc negotio possit. Etenim omnia particulatim, & usque adeo distinctè demonstro, ut nullus dubitem, quin periti & subacti in similibus negotiis hoc intellecturi sint, ideoque nisi sciens volensque errare nemo possit: si quis ex præscripto meo laboraverit, plus inveniet, quam ego dico & revelo.

CAP. XXXVIII. Modus faciendi aquam fortem, vulgo separationis dictam, quæ Argentum & Mercurium solvit, cum modo secreto.

Recipe nitri purgati partem unam, aluminis roccæ, quod in patella hamocem omnem exhalaverit, partes tres, deturque in singulas hujus materie libras uncia una arsenici crystallini, qui modus secretus,

nec vulgo notus est, & præterquam quod aqua vires addit, etiam hoc efficit, ut spiritus, in quibus verus aquæ nervus & potentia consistit, & quibus demtis, aqua foris fontanæ similis esset, tanto melius extrahantur. Redigantur omnia in pulverem, misceanturque, & adjecta decima totius compositi parte arenati optime pulverati, remisceantur. Hujus materie tantundem in ampullam vitream mittatur, ut tres circiter vasis illius partes impleat: sintque vasa hæc more solito lutata, idque fortis luto, cujus rei, utur vulgaris, & artificis ingenio committenda, modum tamen non vulgarem docebo. Recipe partem unam limi fluminum pinguioris, qualis est *Arni*, arene partes tres, cinerum ex lignis ordinariis bene cribratorum partem dimidiam, & tormenti dimidiam alteram. Misceantur, unianturque hæc omnia, & aqua communi excepta in pastam redigantur, subiganturque optime: quo enim subacta magis, eo melior passa erit. Adverte tamen, ut duricula sit hæc massa, addaturque salis communis pars tertia, incorporeturque optime: in hoc enim cardo negotii vertitur. Omnibus bene incorporatis lutentur vitra, & lutum erit perfectum. Postea ampullæ mittantur in fornaces ventro expositas, & huic operi apras, quæ terra cocta consent, & sustinendo igni pares sint. In fundo ampullarum arena sit quatuor digitorum altitudine, nec non ferrum crassiusculum transversum, oneti ferenda par & vasa ad collum usque arenâ circumdantur. Imponatur suis cuique ampullæ alembicus, ique satis magnus & capax, & junctura optime lutentur luto ex farina tenui, & calce, pulveratis militique & albumine ovi optime agitato exceptis, & fascia ex lino tenui obducantur, siccataque ter quater vel quater luto muniantur, superinducta toties fascia, ac tantum temporis intercedat, ut siccati commode possint, ita enim ignis violentiam & imperum spirituum melius sustinebunt. Apponatur porro cuique vitro recipiens ex vitro capacissimum, ut imperum & furias spirituum ferre possit, & qua parte rostro alembici jungitur, eadem ut supra dictum est ratione luto & legimento telæ, quam id fieri optime potest, obducatur, nec ante ignis adhibeatur, quam siccata fuerint junctura: magni enim hæc res momenti est. Postea ignis adhibeatur, sed carbonum & temperatus, idque per tres horas, quo temporis spatio stultentus ille humor, qui vitris rupturam minatur, transit. Continuetur hac ratione per horas sex igne temperato, & postea sensim augeatur ignis, adjiciendo ad carbonem frusta ligni aridioris quercini, idque per proximas sex horas usque dum alembicus flavescere, & transire spiritus incipiant: atque in hoc gradu seruetur ignis, donec alembicus simul & recipiens ruffo & tandem intenso rubini colore tingantur, quo tempore augendus est ignis, continuandumque donec alembicus rubere incipiat, qui color quandoque per integrum biduum durat. Instandum ergo operi, usque dum omnes spiritus transferint, & alembicus atque recipiens incalescere pedetentim, atque ad naturalem suam albedinem redire & refrigerari cœperint. Nihilominus tamen minus per horæ spatium adhibeatur ignis, & tum demum fornax per se refrigeret: advertendo, ne dum ignis aestuat, & alembicus pariter & recipiens rubent, ventus vel aura frigidior subintret, aut frigidi quidquam vitra attingat: Etenim quia tum maxime calent, facillime disumpuntur, idque cum jactura laboris, impensarum & temporis. Ubi jam omnia frigent alembicus simul & recipiens panniculis madidis, & frigidâ bene repletis tegantur, ut spiritus aquæ fortis tanto lidant citius, & omnia per 12. horas in eo statu relinquantur. Junctura postea & lutum aqua tepida madefiant, ut iisdem humefcentibus demiligature & alembicus atque recipiens dissolvi possint: plerum-

plerumque enim hæc integra manent. Et ampullæ quidem frangantur: usui enim amplius esse non possunt. Feces autem & sedimenta aquæ fortis, id est pars ejusdem tertia optime pulverata, adjectis in singulas libras uncias quatuor nitri purgati in ampullam novam mittatur, additaque eadem, quæ antea prodierat, aqua forti, cum suo alembico & recipiente bene junctis, lutatis & siccatis ut supra in fornace deponatur, & primis quatuor horis ignis lentus adhibeatur, isque postea sensim augeatur, usque dum alembicus & recipiens albescant & spiritus omnes transferint, quo tempore ignis ultra stimulus non est, sed cuncta refrigerari permittantur, & alembicus simul & recipiens panniculis madidis obvolvatur, idque per horas duodecim, & junctura eo quo dictum est modo solventur. Aqua fortis vasis vitreis excipiat, & vase clauso ne optimi spiritus exhalent adservetur. Hæc est illa aqua fortis vulgo separationis dicta, quæ infra scriptis usibus inservit. Nonnulli loco aluminis roccæ vitriolum optimum, Romanum scilicet vel aliud simile adsumunt. Utrum autem ad hos usus aptum sit vitriolum, nec ne, ex eo cognoscitur, si fricatum super ferro polito, æris colorem ei tribuat: & hoc vitriolum infra scripto modo purgatum præ alumine aquam fortem dabit longe potentissimam.

CAP. XXXIX. Ut vitriolum purgetur & aqua fortis potentissima fiat.

Habeas vitriolum optimum: quanto enim vitriolum melius est, tanto potentior aqua fortis erit. Hoc vitriolum aquâ communi calida solvatur, & per triiduum quiescat. Postea filtretur aqua vitriolo gravis. Feces flavescences removeantur, evaporetque hæc aqua in ampullis vitreis, ita ut tertia tantum ejusdem pars remaneat, quæ catillis vitreatis terreis, loco frigido servetur, & duodecim horarum spatio lapilli vitrioli, instar crystalli montanæ, coloris smaragdini, in superficie aquæ circæ labrum catillorum apparebunt, & in fundo terra relinquetur flavescens sulphurea, & huic operi minus apta, solvantur hi lapilli communi calida, & aqua solutiones filtretur evaporetque in vasis, & procedatur ut supra, semper abjiciendo terram illam flavam, quæ in fundo residet, & tertia vice vitriolum bene purgatum aptumque erit, ut aqua fortis optima & solito potentior, fiat maximæ si nitrum bene purgatum sit.

CAP. XL. Ut aqua regia fiat, qua aurum & metalla reliqua dissolvuntur, solo argento excepto.

Recipiatur aqua fortis supradicta, mittaturque in ampullam minorem vitream, atque in singulas aquæ libras dentur salis armoniaci pulverati uncia duæ, ipsaque ampulla mittatur in vas calida repletum, & sal armoniacum commota sæpius aqua statim solvetur, tingeturque flavo colore. Addatur denuo tantum salis, quantum dissolvere aqua potest, & ubi jam solvere defuerit aliquantisper requiescat. Postea quicquid limpdatum erit leniter decantetur. Etenim in fundo remanere solet, quidquid terreni sal armoniacum continet: habebisque aquam potentem, quæ aurum aliaque metalla, excepto argento dissolvit: id enim non attingit.

CAP. XLI. Ut Tartarum, sex vini dictum, uratur.

Habeas tartarum vel feces vini rubri, melior enim est quam albi, idque constet ex frustis majoribus crassiusculis & scintillantibus, remoto ejusdem pulvere, qui nulli hic usui esse potest, Mittatur ita uti est in vasa

nova terrea, & sub incensis carbonibus uratur, usque dum non amplius fumeret, atque calcinatum & in massam redactum sit coloris ex nigro purpurascens, &ustum præparatum erit.

CAP. XLII. Ut Calcedoniis ex vitro satis formosus fiat.

Recipe aquæ fortis libras duas, in ampulla vitrea, quæ collum gracile & oblongum habeat, in eandemque mitte argenti in tenuia frusta concisi uncias quatuor, & admotâ ad ignem, vel in aquam calidam missâ ampullâ argentum statim dissolvi contingeret. Soluti omni argento in ampulla ejusdem generis & formæ alia habeas aquæ fortis libram unam cum dimidia, & in ea solves argenti vivi uncias sex, illisque solutis, aqua solutionis in ampulla majore misceatur, addanturque salis armoniaci uncia sex, & solvantur more solito ad ignem lentum. Solutioni addatur Zafferæ præparatæ uncia una, magnesiæ præparatæ uncia dimidia, nec non ferretti Hispanici tantundem, sed sensim: timere enim & ebullire magnesia non sine periculo, & vel evomere materiam, vel disrumpere vasa, & omnia pessumdare solet. Addatur porro croci Martis sulphure calcinati uncia pars quarta, nec non scoriz æris caldarii ter calcinata dimidia pars uncia, quæ non minus quam magnesia ebullire solet: smalti item cœrulei pictorum, nec non minii tantundem. Omnia hæc bene pulverata seorsim & per gradus mittantur in ampullam, agenturque leniter, ut aqua pulvères bene imbibat, ita tamen ut semper tibi caveas ab effervescencia. Ampulla bene clausa sit, ac per dies decem sæpius agitetur, ut pulvères bene incorporentur, & ab aqua visceratæ eidem pateant: postea mittantur in fornacem & arenam, adhibeaturque ignis temperatissimus, ut omnis aqua fortis exhalet, id quod viginti quatuor horarum spatio evenire solet, notando bene, ut ignis, non vehemens, sed temperatissimus adhibeatur, & spiritus aquæ fortis asserventur, remanebitque in fundo pulvis fulvi coloris, qui optime pulveratus in vasis vitreis servatur ad usum. Ubi jam Calcedonium facere volueris, in promptu habeas vitrum bene purgatum, & ex frustis scyphorum confractorum crystallinis vitroque albo sæpius liquato factum. Etenim vitrum ex fricta recens factum formando Calcedonio aptum non est, nec colores eidem sese applicant, sed à fricta consumuntur. Semper ergo fragmenta adhibeantur, & vitrum quod in usu antea fuit, & exempli gratia in ollam vitri librarum viginti aut circiter, dentur hujus medicamenti vel pulveris duæ, cum dimidia, vel tres uncia, idque tribus distinctis vicibus, miscendo bene vitrum, ut pulverem optime imbibat, qui additus fumum quendam cœruleum emittit. Cum bene mixtum fuerit vitrum, quiescat per horam, eique altera mixtura detur, & per viginti quatuor horas quiescat, misceturque bene, & experimentum fiat, exhibebitque colorem ex flavo cœruleum. Hoc specimen in fornace sæpius ignitum & extractum, ubi refrigerare cœperit, undas repræsentabit marinas & colores satis elegantiores. Adhuc tartari, ex præscripto capitis quadraginti usui, uncia octo, fuliginis camini bene vitrificatæ uncia duæ, nec non croci Martis sulphure calcinati uncia pars dimidia. Omnia bene pulverata & unita vitro dentur, quatuor vel sex vicibus, observando, quod vitrum addito istiusmodi pulvere mirum in modum intumescat, & nisi industrius in administrando vitratius sit, omnia pessum itura sint: paulatim ergo adhibeatur, & per intervalla, miscendo semper vitrum, ut pulvis bene incorporetur. Porro addito omni hoc pulvere vitrum bullire, & non minore quam viginti horarum spatio quiescere permittatur, quo tempore exacto cucurbitula ex eo fiat, & aliquoties in fornace

fornace candefactâ illa videatur, an vitrum voto respondeat, & foris æreum & viride quid, nec non aquam marinam, rubrum, flavum, aliosque varios colores, lufusque & undas elegantissimas instar Calcedonii, Jaspidis vel Achatis orientalis exhibeat, ac si in aëre introspicias velut ignis rubeat; id enim si fiat, tempestivum erit & vasa formentur diversi generis, ut sunt pocula, crateres, salina, vascula pro asservandis floribus & illius generis alia, sed semper plana & levigata, non varie elaborata: decus enim nullum habent: Notabit autem semper vitrarius, ut dum in opere est, forcipe vitrum bene vellicet, & cum judicio candefaciat, ut fluctus & undas marinas lufusque colorum elegantissimos reddat. Ex hac etiam massa patinas majores, ovi formâ, vel triangulares aut quadratas, prout visum fuerit, facere, illaque instar geminarum rotâ polire licebit: polituram enim & splendorem recipit, ac pro tablinis & pluteis inservire poterit, verum lapidem, Achatem & Chalcedonium repræsentantibus. Quod si colorem evanescere, vitrumque ex opaco pellucidum fieri contingat, id quod in hoc opere noxium est, suspendendus est labor, & vitro tartarum ustum, cum fuligine & croco, ut supra, addendum est, ita enim corpus recipit, & opacitas facit, ut colores appareant. Cæterum, ut pulvis recens additus bene incorporetur, necessum est, ut vitrum per plures horas purgetur quo peracto labor ut antea procedet. Atque hic ille modus est, quo ego anno cdo 10 ci Florentiæ in Casino & fornace vitraria usus sum, qua æstate egregius Dn. Nicolaus Landus, familiaris meus, & insignis in smalti ad lucernam elaborandi negotio artifex fornacem illam extrui curabat, quo tempore etiam præparatâ ante materiam, & servatis iisdem regulis, plures ex hujus generis Calcedonio patellas insigniter pulchra feci.

CAP. XLIII. Secundi generis Chalcedonius.

1. In libra una aquæ fortis solvi, & vase bene clauso seposui argenti puri minutim concisi uncias tres.

2. In vas aliud vitreum misi aquæ fortis libram unam, in eaque solvi, & solutas vase bene clauso seposui argenti vivi bene purgati uncias quinque.

3. In ampullam ejusdem generis aliam misi libram unam aquæ fortis, in eaque solvi, uncias duas salis armoniaci, illisque solutis addidi dimidiam unciam croci Martis, aqua forti, ut *capite decimo nono* dictum est, facti, nec non ferreti Hispanici, ex præscripto *capitis decimi quarti* præparati, & scoriz rubræ, ad normam *capitis vigesimi quarti* factæ, nec non ætis tremuli, sulphure ut *capite vigesimo primo* demonstratum est, calcinati ana vel singulorum unciam dimidiam. Omnia hæc, (singula tamen seorsim, & per se) in pulverem redacta gradatim, & lente, addita patientiâ in ampullam misi, frita enim non minus quam ferretum Hispanicum & æs tremulum aquam fortem efferverescere & rurgere facit. Quare seorsim singula, nec non lente & in exigua per vices quantitate hæc immittenda sunt, ne intumescendo ebulliant, & vitrum frangatur, quod facile evenire solet. Diligentia itaque & patientia opus est.

4. In vasculum aliud vitreum misi libram unam aquæ fortis, & in ea solvi salis armoniaci uncias duas, illisque solutis sensim (quia intumescit, & strepidum magnum excitat) addidi antimonii crudi pulverati unciam dimidiam, & aliquanto post cœrulei vel smalti pictorum tantundem, nec non minii unciam unam, & vitrioli ut supra dictum est, purgati, unciam dimidiam. Omnibus antea bene tritis & solutis, vas clausum seposui.

5. In aliam ampullam vitream misi aquæ fortis libram unam, & in ea solvi salis armoniaci uncias duas.

Postea addidi uncias duas Zafferæ, ut supra *capite decimo*, præparatæ, nec non magnetis Pedemontranzæ ad normam *capitis decimi tertii* præparatæ, quaitam partem unciz, & dimidiam unciam scoriz, ex laminis æris, in testudine fornacis, ter, ut supra *capite vigesimo quarto*, & *vigesimo quinto* demonstratum est, calcinatæ, cum uncia una cinnabaris. Atque hæc omnia seorsim optime trita in ampullam misi, cavendo ab his quæ inflare vitrum solent: quibus peractis vas clausum seponebam.

6. In aliud ejusdem generis vas misi libram unam aquæ fortis, in eaque more solito dissolvi salis armoniaci uncias duas. Postea addidi unciam cerussæ dimidiam, quæ valde strependo intumescit, ideoque lente procedendum est: nec non laccæ pictorum rubræ, æruginis item, & scoriz ferri ab incude decidentis ana unciam semis. Atque hæc scoriz vehementer intumescit, ut jam cautione opus sit. Omnia seorsim bene trita in ampullam misi cavendo bene ab his, quæ aquam fortem rurgere & efferverescere faciunt, atque hac ratione agendo vitrum clausum seposui.

Has sex ampullas per dies duodecim sepositas, quotidie sexies optime agitabam, ut aqua fortis penetrare & attenuare ingredientia posset; ita enim tincturam suam vitro communicant. Exacto illo tempore materiam omnem sex illis ampullis contentam lentè (ne efferverescendo vitrum disrumpere) in ampullam gradem, & in fundo lutatam, agitatis antea mistisque bene omnibus super cineres misi, & ignem adhibui maxime lentum, quo mediante aqua fortis viginti quatuor evaporavit. Notandum autem est, ignem postremo adhibendum esse summè lentum, ne pulvis nimio calore corrumpatur. Qui aquam fortem recuperare volet, lutatis probè juncturis capellum adhibeat atque recipiens. Evanescente aqua, in fundo pulvis remanet ex rubro fulvus, qui vase clauso servetur usui.

Hunc pulverem dedi vitro, ex fragmentis vitri veteris, ut supra in primo Calcedonio dictum est, facto, recens enim frita hic nulli usui est, antea demonstravi si tamen crystalli fragmenta adhibeas, melius succedet negotium. Dofin autem eandem, eundemque miscendi modum, & eadem temporis momenta in hoc, quæ in priore illo, secutus sum: & corpus eidem dedi tartaro usto, nec non fuligine camini vitrificatâ, & croco ferri, aceto mediante facto, idque lente admodum & sensim, pulvis enim hic terribiliter rurgit. Deinde cum per horas viginti quatuor quievisset, vas ex eo quoddam mihi parari curavi, eoque sæpius bene candefacto videbam an corpus opacitatem acquisivisset, atque illam colorum varietatem & undantes lufus exhiberet, quo animadverso, varii generis vasa ex eo fieri & forcipe vel vofsellis opus more solito vellicare jussi, ad exprimenda varii generis phantasmata. Ex hac Calcedonii specie plurima pocula, eaque pulcherrima feci, & ex hac eadem massa aliquot centum corollæ in usus equitum speciosissimæ in Flandria per me factæ sunt, quas magnus Hetruriæ Dux Ferdinandus, felicitis memoriæ, multique alij Principes & Domini viderunt.

CAP. XLIV. Tertius modus faciendi Calcedonium.

1. In ampulla vitrea & aquæ fortis validæ libra una solvi, & solutas vase clauso seposui uncias quatuor bracteolarum argenti puri.

2. In alia ejusdem generis ampulla & libra una aquæ fortis solvi uncias quinque argenti vivi, sale communi & aceto purificati. Et sal quidem aceto forti irroratum in scutella lignea pistillo ligneo assidue agitabam, & aqua limpida communi, ut liqueceret, omnemque Mercurii nigredinem secum aveheret, lavabam: idque

idque sæpius repetij, addito semper novo sale & aceto: quo peracto Mercurium per pellem caprinam trajeci, & in aqua forti solutam vase clauso seposui.

3. In alia cucurbitula vitrea & libra una aquæ fortis solvi uncias tres argenti puri hac ratione calcinati. Argentum Mercurio, ut moris est, amalgamatum, misceatur cum æquali pondere salis communis, ab omni terrestri substantia purificati, id quod solutione per aquam communem facta assequimur: aqua cocta bidui spatio quiescat, in hunc finem, ut particulæ salis terrestres sidant, quo facto aqua filtratur, & alio vase vitreo excepta, evaporando absimitur, & sal bene siccatum denuo solvitur, quiescit, filtratur, & evaporat ut supra: idque tantisper continuatur donec sal feces in fundo nullas relinquat, & præparatum erit purificatumque. Atque hæc salis purificatio non ideo tantum fit, ut tanto in Lunam efficacius agat, sed ne Luna terrestrium particularum quidquam assumat, quod postea non nisi difficulter separari ab ea possit. Mittantur omnia in crucibulo super carbones, ut Mercurius avolet, ac argentum in fundo remaneant calcinatum pulveratumque, cui æquale pondus salis communis, ut supra præparati, adjunges, mixtaque omnia in crucibulo per sex horas in ignem ad calcinandum mittes. Hanc materiam aqua calida sæpius lavabis, ut falsedo omnis abeat. Postea argentum in ampulla vitrea, communi aqua repleta, ad consumptionem quartæ partis coques, & refrigerari ac residere argentum permittes. Decantetur quod residuum est aquæ, idque additâ semper recenti aqua ter iteretur, & quarta demum vice in ampullam aquæ fortis mittatur, agitetur & servetur in usum.

4. In vas vitreum aliud misi libram unam aquæ fortis, & in ea solvi uncias tres salis armoniaci, & solutione facta, id quod limpidum erat decantavi, abjectis quæ in fundo resederant fecibus. In hac aqua solvi drachmas duas argenti, & solutas vase clauso seposui.

5. In cucurbitulam aliam misi libram unam aquæ fortis, in eaq; solvi uncias duas salis armoniaci, & solutione facta addidi cinaprij, & croci Martis sulphure, ut *capite decimo sexto* demonstratum est, calcinati, nec non lapidis Armenij & Ferretti Hispanici, ex præscripto *capitis decimi quarti* facti, ana drachmas quatuor. Singula seorsim bene trita mittebam in ampullam, cavendo mihi ab his, quæ aquam fortem turgere & effervesce faciant. Lentè enim hîc agendum est, ne exundante materia labor omnis frustraneus sit; quo facto vas clausum seponebam.

6. In ampullam vitri aliam misi aquæ fortis libram unam, solvendo in eadem, more solito, uncias duas salis armoniaci: postea addidi croci Martis, aceto, ut supra *capite decimo septimo*, calcinati, nec non calcis stanni inter vitrarios notissimæ, & zafferæ, ut *capite duodecimo* demonstratum est, præparatæ, atq; cinaprij, ana, unciam dimidiam. Singula seorsim bene trita, sensim, & ne effervescente aqua omnia pessum irent, adhibita ingenti diligentia, addebam, eoque facto vas clausum adservabam.

7. In cucurbitulam ejusdem generis aliam misi aquæ fortis libram unam, solvendo in eadem salis armoniaci uncias duas. Postea addebam æris tremuli, sulphure ad normam *vigesimi primi capitis* calcinati unciam unam, scorix æris, ex præscripto *vigesimi octavi capitis* ter calcinatæ, nec non Magnesiæ Pedemontanæ, ut supra *capite decimo tertio* præparatæ, & scorix ferri ab incude decidentis ana unciam dimidiam: singula seorsim bene trita, sensim, & metu effervescentiæ cum cautela, & quasi per otium addebam, eoque facto vas clausum seponebam.

8. In vas vitreum aliud misi aquæ fortis libram unam, & salis armoniaci more solito uncias duas. So-

lutione facta addebam minij drachmas quatuor, æuginis unciam unam, antimonij crudi & cap tis mortui vitrioli purificati ana unciam dimidiam. Singula seorsim bene trita, & ad præcavendam ebullitionem, ut fieri solet, sensim addebam, eoq; facto vas clausum seponebā.

9. In cucurbitulam aliam misi aquæ fortis libram unam, & in eadem solvi salis armoniaci uncias duas. Deinde addidi auripigmenti, arsenici crystallini, & lacæ pictorum ex granis Kermes ana unciam dimidiam. Singulis seorsim bene tritis, additisq; ab effervescentiâ mihi more solito bene cavebam, eoque facto vas clausum seponebam.

Has novem ampullas per quindecim dies bene clausas in calore fornacis detinui, & easdem quotidie sæpius optime agitavi, ut aqua fortis agendo in materiali eadem bene attenuaret, tincturamq; eorundem aperirer, quæ nisi bene reclusa male operatur. Postea omnem aquam fortem cum suis ingredientibus in ampullam unam capaceam vitream bene firmam lente & per gradus mittebam; Etenim dum uniuntur effervescent. Inde clausam per sex dies, & quotidie agitatam ampullam cineribus imposui, & adhibito per viginti quatuor horas lento igne id solum egi, ut aqua evaporaret; Notetur autem ampullam hanc inde à fundo ad medietatem usque bene lutatam esse debere, & postremo ignem adhibendum esse summè lentum, ne pulveres nimio calore corrumpantur, sed aqua tantum evanescat, & pars spirituum melior pulveri affixa remaneat: ea etenim ratione pulvis optimos in vitro effectus exhibet. Qui aquam recuperare volet, lutatis bene juncturis capellum & recipiens adhibeat: cui enim deinde, ut suo loco dicitur, potest. In fundo ampullæ pulvis relinquebatur coloris ex virescente fulvi, cujus eandem, ut in primo Calcedonio, dosin & quantitatem vitro purificato, & ex fragmentis crystalli, non vero ex fritta facto, addebam; neque enim in illo vitri genere succederet negotium. Circa temporū momenta & cautelas eadem ut in primo Calcedonio regulæ serventur. Deinde, ut in primo Calcedonio dictum est, oportuno tempore tartaro usto, fuligine camini & croco Martis aceto mediante facto opacitatem ei tribuebam, adhibita, eadem ut ibidem dosi, industria, & spatio temporis, & exactis viginti quatuor horis id agebam, ut vitrum elaboraretur, forcipe, illud ut supra dictum est, diligenter vellicando, & sæpius recalefaciendo.

Hunc tertium modum expertus sum Antverpiæ anno 1609. mense Januario, quo tempore morabar, & per plures annos habitabam in adibus Domini Emanuelis Ximenij, Equitis S. Stephani, natione Portugallensis, & civis Antverpiani, hominis ingeniosi, & in omnibus scientijs supra omnes alios quos ego in Germania inferiore unquam vidi vel cognovi, maxime subacti. Atq; hoc pulvere Antverpiæ in fornace vitraria Domini Philippi Giridolfi, hominis valde officiosi, Calcedonium feci, usque adeo pulchrum & venustum, ut verum Achatem imitaretur, & venustate coloris quam longissime superaret. Et plures Portugallensium nobiles gemmarii eundem cum admiratione aspicientes, aiebant, naturam ad illud fastigium ascendere non posse. Atque hic Calcedonius omnium quos ego feci, pulcherrimus erat, pensante operis pulchritudine fastidium laboris, & diuturnitatem operationis, ex eoque vasa duo Princeps Auriacus sibi comparavit, & grata acceptaque sibi esse demonstravit. Quod si aqua fortis bona, & ingredientia bene præparata fuerint, opus prædabit longe quam ego dico pulchrius.

ANTONII NERI DE ARTE VITRARIA,

LIBER III.

*Quo demonstrantur veri modi producendi in vitro
colorem aureum, Granati, Amethysti, Sapphiri: nigrum
Vuuu item*

item holosericum, lacteum, marmoreum, & rubrum plenum: nec non modus faciendi frittam ex crystallo montana: modus item tingendi vitrum colore margarita, aliaque particularia in exercitio Artis Vitraria necessaria.

CAP. XLV. Hoc libro tertio demonstratur ratio producendi in vitro colorem aureum, nec non colorem Granati, Sapphiri, nigrum holosericum, lacteum, marmoreum, rubrum plenum, & colorem margaritæ, idque variis modis, quorum unus præstantior est altero: modus item singularis faciendi frittam ex crystallo montana quæ non minus quam fritta ordinaria tunditur, ut inde vasa fiant planè candida, pulchra & speciosa. Dubium non est, quin eorundem colorum plurimi his qui circa artem versantur jam noti sint: sed non omnes omnibus. Aureum enim & rubrum plenum, seu colores in arte vitraria difficiles & fastidiosos pauci bene facere norunt: ut enim fiant tanta opus est attentione circa dosin, tempus, circumstantias & ingredientia, ut si vel minimum in aliquo eorundem errare contingat, res omnis corrumpatur, & colores plane diversi prodeant. Ego in his duobus æque ac in aliis omnibus coloribus circumstantias & minutissima quæque usque adeo evidenter & perspicue describo, ut dubium nullum sit quin omnes me ita capiant, ut nullos non colores & nominatim supradictos, aurum & rubrum plenum perfectè & non sine jucunditate & satisfactione sua facere possint.

CAP. XLVI. Aureum in vitro colorem producere.

Recipe frittæ crystalli tarso factæ pattes duas: longe enim melior est, quam quæ arenâ sit: frittæ rochetta itidem tarso factæ partem tinam. Misceantur omnia, & contundantur bene, atque in singulas centum libras hujus compositionis assumatur tartari rubri, crassioris & bene vitrificati libra una. Hoc crementum vini, ita ut est crudum, tundatur bene, & per cribrum angustum transeat, deturque in singulas hujus tartari libras libra una magnesiæ Pedemontanæ, eo qui capite decimo tertio docetur modo præparatæ, Misceantur bene hi duo pulveres, mistique cum frittis supradictis commisceantur optime, & mistura in ollam missa igne formacis ordinario per dies quatuor coquatur. Cæterum quandoquidem hi pulveres vitrum inflant & bullire faciunt, mistura sensim & per gradus in ollam mittenda est, ne vitrum per orificium fornacis effluat. Ubi vitrum jam bene purgatum & tinctum fuerit (id quod exactis diebus quatuor frequenter evenire solet) in vasa & istiusmodi opera alia elaborandum est: hæc enim dosis materialium colorem dabit pulcherrimum. Quod si colorem ad opera magna magis dilutum requiris, minus pulveris addendum est & dosin habebis istiusmodi laboribus aptam; at vero ut opera pellucida & tenuia fiant, servando dosin priorem color satis dilutus & perspicuus erit; plus enim materiæ tingentis requirunt. Canna autem vitrariorum crassa, quam Itali da Spici vocant, minus tartari & quasi dimidium magnesiæ postulat. Noretur autem utramque frittam, crystalli & rochetta optime unitam & permistam esse debere. Tartarum sit rubrum, non album: id enim huc nihil facit: sitque crassum & in frustis, non pulvereum; nam etiam illud inutile est. Magnesia semper sit Pedemontana. Pulvis materiæ detur, non vitro fuso: neque enim tingeret, omniaque sensim & per pattes in ollam mittantur. Servatis his regulis color evadet aureus satis pulcher. Si vero pulcherrimum desideras, loco rochetta meram crystalli frittam recipe, & colorem habebis aureum magis pulchrum, magisque speciosum. Aque hunc modum ego servavi in producendis dictis coloribus, & quotiescunque illum expertus sum, semper mihi pulchrè successit.

CAP. XLVII. Color Granati.

Recipe pondus æquale frittæ crystalli & rochetta optime mistum, atque singulis hujus misturae libris centum libram unam magnesiæ Pedemontanæ, ex præscripto capitis decimi tertij præparatæ, nec non Zafferæ præparatæ, & cum magnesiâ bene mistæ unciam unam. Misceatur bene hic pulvis cum frittis supradictis, & postea sensim mittatur in ollam, notando magnesiâ in causa esse, cur vitrum turgat. Ergo lente agendum erit, ne vitrum pessum eat. Zafferâ magnesiâ bene admista sit: etenim vivum colorem reddit, eique splendorem conciliat atque venustatem. Exacto quatrinduo, ubi vitrum purgatum & bene tinctum erit, operi admovenda manus est. Atque hæc iusta dosis est magnesiæ pro vasis modicæ magnitudinis, ut color satis plenusevadat. Minora vasa plus, majora minus & dimidium prædicti pulveris requirunt: & revera color vitri vel intendendus, vel diluendus est pro ratione operis quod agendum suscipitur, idque totum à judicio & discretionem ejus dependet, qui pulverem adhibet.

CAP. XLVIII. Color Amethysti.

Recipe frittam crystalli tarso optime factam, & antea quam in ollam aut vas mittatur, singulis frittæ libris adde infra scripti pulveris bene misti unciam, misceanturque omnia bene, & sensim in fornacem mittantur: haud secus etenim atque supradictus Granati color turgit. Ubi vitrum purgatum, & vero Amethysti colore infectum fuerit, operi manus admoveatur. Norandum, hunc colorem non aliam quam crystalli frittam desiderare, eundemque vel intendendum vel diluendum esse pro ratione operis. Pulvis producendo huic colori aptus est qui sequitur. Recipe magnesiæ Pedemontanæ, ex præscripto capitis decimi tertij præparatæ unciam unam cum dimidia. Misceantur bene hi duo pulveres, denique frittæ crystalli, & vitrum dabunt veri Amethysti colorem infectum.

CAP. XLIX. Color Sapphiri.

Recipe frittam rochetta, & in centum hujus frittæ libras detur libra una Zafferæ, ad normam capitis duodecimi præparatæ, & cum uncia una magnesiæ Pedemontanæ præparatæ antea bene mistæ. Mittatur fritta in fornacem, vitrumque fluat atque purgetur optime, eoque purgato misceatur bene, videaturque an color satis plenus, sit ut augeri vel dilui, si opus sit, possit, atque sic elaboretur, & colorem sapphiri habebis, qui violæ duplicis Constantinopolitanæ colorem referet, id quod exigua magnesiæ dosis eidem præstat: ut Pissis sæpius, & semper cum successu expertus sum, Magis tamen quam ego dicere ausim admirandus ille color erit, si ex sola crystalli frittâ fiat ut proxime demonstro.

CAP. L. Color Sapphiri magis venustus.

Loco frittæ rochetta habeas frittam crystalli optimam, deturque ei prædictus pulvis in dicta dosi, & colorem sapphiri referet fulgentem & pulchrum, quo facere, quicquid voles, poteris: notando coloritum ex magnesiâ & Zafferâ frittæ dandum, non vitro fuso: vitrum enim fusum colorem non nisi ægre, atque ita recipit, ut nullius valoris sit.

CAP. LI. Niger Color.

Recipeamenta varij coloris, illisque adde magnesiâ & Zafferam, & magnesiâ quidem quam Zafferâ dimidio minus. Hoc vitrum bene purgatum elaboretur, & nigrum dabit instar holoserici, nec conflandis tantum vitris nitens & pulcherrimum, sed cuiusque operi aptissimum,

CAP. LII. *Nigrum pulchrum.*

Recipe fritte crystalli & pulveris ana, libras viginti; calcis plumbi & stanni libras quatuor: misceantur omnia bene, & in olla calente mittantur in fornacem & ubi vitrum bene purgatum fuerit, recipe chalybis bene calcinati & pulverati, nec non scorix ferri ab incude decidit & pulverata partes æquales, easque bene misce. Hujus pulveris bene misti uncia sex datur vitro fuso, misceanturque omnia: vitrum enim addito hoc pulvere vehementer turgit. Deinde quiescat per horas duodecim, ita tamen ut nonnunquam misceatur, ac tandem manus operi admoveatur, prodibitque nigrum holoserici instar pulcherrimum, & cuicunque operi aptum.

CAP. LIII. *Nigrum aliud pulchrum.*

In libras centum fritte rocchetti datur tartari rubri pulverati libras duas, nec non magnesiæ pulverata & cum tartaro mista uncia sex. Fritta sensim in fornacem mittatur, vehementer enim turgit, purgeturque, id quod spatio dierum quatuor vel circiter fiet. Misceatur bene vitrum, leveturque; & nigrum dabit admiratione dignum & multo quam superscripti nigri colores magis operibus aptum.

CAP. LIV. *Lacteus color egregius.*

Recipe fritte crystalli libras duodecim, & calcis plumbi stannique libras duas. Misceantur omnia bene, & addatur uncia magnesiæ præparata pars dimidia, unitaque omnia mittantur in ollam calentem, stentque per horas duodecim: misceatur postea bene vitrum, & si color satis plenus non fuerit, addatur nonnihil calcis supradictæ, misceaturque bene cum vitro, ut incorporetur, & octo horarum spatio vitrum operi aptum erit, dabitque colorem lacteum pulcherrimum, qualem ego sæpius feci.

CAP. LV. *Color lacteus pulcher, magisque candidus.*

Recipe fritte crystalli quadringentas sexaginta, & magnesiæ Pedemontanæ præparata libras duas cum dimidia. Pulverentur omnia bene, mittanturque in ollam & purgentur, id quod exactis octodecim diebus accidit. Hanc materiam projeci in aquam, ac denuo in ollam misi, eaq; purgata experimentum feci, & quia transparenere videbatur, addidi calcis supradictæ libras quindecim. Calx stanni in officinis vitrariis notissima res est. Vitrum aliquoties miscui, & unius diei spatio supra quam id dici potest pulchrum, & quavis nive candidius evasit. Dedi operam ut elaboraretur, idque multoties ea ratione feci, & semper mihi bene successit. Ex rocchetta lacteus quoque color, sed minus quam ex cristallo candidus fit. Crystallum ergo semper adhibeat, qui exquisiti quidquam facere desiderat.

CAP. LVI. *Ut color marmoreus fiat.*

Frittam crystalli in ollam mitte, & ubi liquata fuerit, manum operi admove, antea quam purgetur, & marmoreum satis pulchrum erit.

CAP. LVII. *Perfici color in lacteo.*

Magnesiæ Pedemontana præparata in lacteo dabit colorem floris mali perfici. Notandum autem est, in tempore elaborandum esse vitrum: color enim evanescit.

CAP. LVIII. *Rubrum plenum.*

Recipe fritte crystalli libras viginti, ramentorum vitri candidi libram unam, stanni calcinati libras duas. Misceantur omnia, mittantur in ollam, fundantur & purgentur. Fusis omnibus habeas chalybis calcinati, & bene lavigati, nec non scorix ferri ab incude decim.

Mangeli Bibl. Pharm. Tom. II.

dentis & bene trita partes æquales. Recipe hujus pulveris misti uncias circiter duas, easque vitro supradicto, ubi purgatum fuerit optime admisce: formidabilem enim in morem hic pulvis vitrum inflat: sine incorporari, id quod quinque vel sex horis evenire solet. Advertatur ne pulveris nimium adhibeatur: vitrum enim nigrum fieret, cum tamen non opacum, sed pellucidum aut obscure flavescens coloris esse debeat. Id ubi assecutus fueris, bene habet, atque tunc recipe eris rubri, in arcu fornacis ut capite vigesimo quarto demonstratum est calcinati, & bene triti drachmas circiter sex; addantur vitro, misceanturque sæpius, & tertia vel quarta vice color instar sanguinis ruber apparebit. Sæpius ergo experimentum capiatur, & ubi color responderit, statim elaboretur; nisi enim id fiat, color ruber evanescit, succedente in locum ejus nigro. Præterea ne color pereat, olla aperta sit, omniaque cum cura agantur necesse est, & dum chalybis & ferri scorix additur, attendendum est, ne modum excedas, vitrumque nigrum evadat, sed transparentem & obscure flavescens colorem obtineat, tunc enim addito ære rubro color pulcherrimus apparebit, qualem ego sæpius feci. Denique id agatur ut olla quam id fieri potest minime incalcescat, neque plus decem horis in fornace permaneat, ac si colorem interea evanescere contigerit, id quod aliquando accidit, addito novo pulvere ex scorix ferri color redibit, & quia fastidiosum hoc negotium est, cum cura præparandum & peragendum erit.

CAP. LIX. *Crystallus montana.*

Crystallus montana in crucibulo operito, procul ab omni cinere & immunditia ignescat, frigidâ restinguatur & caloinetur, idque octies repetatur, & ubi resiccata fuerit, super porphyrio lapide in pulverem redigatur impalpabilem. Hic pulvis cum sale pulveris in ampulla vitrea, ut capite tertio dictum est, præparato, & sæpius purificato misceatur, & fritta fiat, quæ in ollam calidissimam cum debita dosi magnesiæ missa, in fornace detineatur, & suo tempore, ut in crystallo dictum est, in aquam sæpius projiciatur, deinde optime purgetur, & more solito instar alterius generis crystalli elaboretur, videbisque mirabilia.

CAP. LX. *Margaritæ color in crystallo.*

Crystallo fuso purgatoque detur ter vel quater tartarum bene & ad albedinem usque calcinatum, misceaturque bene cum vitro, idque tam diu repetatur, addito semper novo tartaro, usque dum vitrum margaritæ colorem assumat: nulla enim hic certa regula dari potest, cum totum hoc negotium in experientia situm sit. Ubi color responderit, statim elaboretur, facillime enim evanescit. Hic meus processus est, quem sæpius experientia comprobavit.

ANTONII NERI FLORENTINI
DE ARTE VITRARIA,

LIBER VI.

Quo verus modus demonstratur faciendi vitrum plumbei, nec non plumbum ipsum calcinandi, & ex eodem extrahendi colorem Smaragdi, Topasii, Cyaneum vel picæ marinæ, Incarnatum, Saphiri, aureum & lapidis Lazuli: nec non modus tingendi crystallum montanum colore permanente Rubini, Balassii, Topasii, Opali, Heliotropii, aliisque coloribus pulcherrimis.

CAP. LXI. Vitrum plumbi, paucis in arte vitraria notum, si de coloribus agatur, vitrum est, omnium, quæ nunc quidem in fornace fiunt, pulcherrimum & nobilissimum, quo veros gemmarum orientalium colores imitatur, id quod crystallo vel alterius generis vitro fieri non potest. Verum est, nisi sedulo admodum attendas, cujuscunque generis ollas & vasa perumpit, &

Y u u u 2 in

in cineres abit. Omnia ergo usque adeo distinctè describo, ut credam nullum non periculum evitari posse. Totum autem hoc negotium in eo consistit, ut veram plumbum calcinandi recalcinandique rationem noscamus. Quanto enim calcinatum est sapius, tanto ad se redit minus, & consequenter minus ollarum dissolvit. Semper autem in aquam projiciendum, & exemptum denuo in suis generis massam conflandum est: & quoties aliqua ejusdem particula in ollæ fundo reperitur, toties cum cura eximenda est, nisi enim id fiat, ollas perrumpit, & fundum earundem consumendo, simul cum vitro per angustissimas rimas transit, ollasque relinquit vacuas. Observentur ergo sequentes hoc libro descriptæ regulæ, & omne evitabitur periculum.

CAP. LXII. *Plumbum calcinare.*

Primo plumbum in fornacula calcinetur (quod his qui fictilia preparant notum est) idque in quantitate non exigua: bidui enim spatium multa plumbi centenaria calcinabuntur: notetur tamen, uti fornacula hæcenus ita calefiat, ut fundendo vitro sufficiat, nec ultra; non enim calcinaretur. Ubi plumbum aliquantisper liquatum fuerit, & cuticulam flavescens contraxerit, par ejusdem calcinata ferro ad talia apto attrahenda, & in extremitate interiore fundi fornaculæ extendenda est, quæ quidem extremitas lapide constet tenero, qui ignem ferat, & orificium versus propendeat, quæ omnia ceu vulgo nota hic consulo præterimus; id tantum notando, plumbum semel calcinatum denuo in fornacem moderate calidam ad reverberandum mittendum & distendendum, nec non ferro per plures horas assidue agitandum esse, quâ secundâ calcinatione flavedinem acquirat. Postea per cribrum trajicitur angustum, & si quæ ejusdem particulæ non transeunt, plumbo novo addito denuo calcinantur. Atque hac ratione magna plumbi quantitas ad vasa fictilia, & in usus figulorum calcinatur. Cæterum id vel maxime agendum est, ut moderate calida fornax sit: etenim si justo calidior sit, plumbum nunquam calcinabitur.

CAP. LXIII. *Vitrum plumbi facere.*

Recipe exempli gratia hujus plumbi calcinati libras quindecim, frittæ crystalli, vel pro ratione coloris quem intendimus, rocchetti, aut pulveris libras duodecim. Omnia accuratissime unita mittantur in ollam, & exactis decem horis (eo enim temporis spatium optime liquata erunt) projiciantur in aquam, notando, sapius contingere, ut in fundo ollæ aliqua pars plumbi coeat in massam sui generis, quæ diligentissime eximenda est: nisi enim id fiat, diffingentur ollæ, atque omnia pessum ibunt. Hoc ergo unum ex præcipuis in hac operatione observationibus est. Præterea cavendum est sedulo, ne grana plumbi, quæ in aqua sunt, & vitro non coherent, denuo in ollam redeant; eadem enim ratio, idemque fracturæ & damni metus subest. Servatis his vitrum in ollam redeat, & exactis summum decem horis operi aptissimum erit. Atque hic modus est faciendi vitrum plumbi.

CAP. LXIV. *Modus elaborandi vitrum prædictum.*

Si cui potiora, vel diversi generis alia vasa in usus domesticos ex vitro plumbi parare animus est, exiguum ejusdem particulam cannâ vitriariâ attollat, sublatam nonnihil deservescere patiat, ac tunc demum manum operi admoveat. Antea tamen marmor bene purgetur, & interea, dum vitrum parumper refrigerat, frigidâ bene humectetur: nisi enim id fiat, marmor nunquam non decorticatur à vitro plumbi, & vitrum assumptâ aliquâ marmoris particulâ deforme opus reddit. Assidue ergo, dum sub manibus vitrum est,

humectetur marmor, alioquin omnis vitri elegantia & pulchritudo perit. Præterea, quanto durius est marmor, tanto minus periculi subest. Atque hic procedendi modus, in refrigerando vitro, & humectando marmore, semper locum habet, quotiescunque nova vitri particula elaboranda suscipitur. Usque adeo enim tenerum hoc vitri genus est, ut nisi refrigerat, & in exigua admodum mole attollatur, elaborari nulla ratione, nec cannâ vitriariâ eximi de fornace possit: atque hanc suam teneritudinem, jusclylo simillimam, plumbo debet. Ut ergo commodè elaborari possit, parum vitri attollatur, sublatum nonnihil deservescat, marmor continue humectetur, & olla moderate calida sit.

CAP. LXV. *Vitrum plumbi colore Smaragdi admirando.*

Recipe frittæ pulveris cribratæ libras viginti, calcis plumbi cribratæ libras sedecim. Misceantur optime, transeantque per cribrum, & mittantur in ollam moderate calidam, & octo vel decem horarum spatium optime omnia liquefcent. Projiciantur in aquam, & quidquid in fundo ollæ, vel aquæ, plumbi est, cum cura eximatur, ne ollam dissolvat. Hoc peracto, materia in ollam redeat, & sex vel octo, aut circiter horis optime liquefcat. Projiciatur denuo in aquam, & plumbum omne semoveatur, ut antea, & vitrum ab omni pinguedine calcis plumbi & falis pulveris liberum, splendorem acquirat lucidissimum, & paucis horis liquefcat ac purgabitur optime. Ubi jam liquefactum purgatumque fuerit, addantur unciz sex scoriz æris caldarij, ter, ut capite vigesimo octavo demonstratum est, calcinatæ, & cum granis 24. croci Martis aceto facti permixtæ, idque per intervalla, quæ recitandis fidei articulis, vel ut vulgo vocant *Credo* &c. sufficiant, sextam singulis vicibus hujus medicinz partem adjiciendo, & vitrum optime miscendo. Postea quiescat per horam, misceaturque, & capiatur specimen, & siquidem color voto responderit, per alias octo horas quiescat, ut omnia incorporentur & exactis illis, vitrum elaboretur, atque ex eodem pocula fient coloris usque adeo splendidi fulgentisque, ut ex smaragdo de trupe orientali veteri facta videri possint. Hoc vitrum, ubi debito modo tinctum fuerit, tantisper in olla detineatur usque dum feces omnes absumptæ, vitrumque satis purgatum sit, & colorem habebis smaragdum naturali adeo similem, ut discerni ab eodem vix possit.

CAP. LXVI. *Viride smaragdinum aliud, super omnia alia admirandum.*

Ut viride istiusmodi admirandum fiat recipe eandem frittæ, calcisque plumbi, nec non croci Martis, ut antea cap. 65. quantitatem, substitutâ in locum scoriz æris eadem quantitate capitis mortui vitrioli Veneris, ex præscripto capitis 131. & 132. præparati: atque hoc viride tam est rarum, quam quod fieri alio quocunque modo potest, id quod ergo non citra delectationem sapius expertus sum.

CAP. LXVII. *Color Topasii in vitro plumbi.*

Loco frittæ pulveris recipe frittæ crystalli libras quindecim. Misceantur, cribrentur & in ollam transeant moderate calidam, exactisque octo horis projiciantur in aquam, ablatoque omni, ut antea, plumbo, in ollam, & successu temporis denuo in aquam redeant, servatisque servandis addatur vitri aureo colore, ut suo loco dictum est, tincti, pars dimidia. Incorporentur, purgenturque, & verum imitabitur hæc materia Topasium orientalem.

CAP. LXVIII. Cœruleus vel aquæ marinæ
in vitro plumbi color.

Recipe frittæ crystalli libras sedecim, calcis plumbi libras decem. Misceantur, cribrentur, cribratæ in ollam mittantur moderatè, ut antea, calidam, & exactis duodecim horis materia optime liquefacta erit, quam una cum olla in aquam projicies, separatoque plumbo, ut antea, in fornacem, atque sub finem horarum octo in aquam denuo mittes, & optime purgabitur. Hoc factò recipe æris tremuli ut supra cap. 20. demonstratum est, præparati uncias quatuor, nec non zafferæ præparatæ partem uncia quartam. Hi pulveres optime permisti per intervalla quatuor dentur vitro plumbi, & exactis duabus horis vitrum denuo bene misceatur, captoque specimine videatur, an color pro ratione operis satis plenus sit, nec ne. Deinde quiescat per horas decem, incorporato colore vitrum operi aptissimum erit, & operando, ut suo loco dictum est, vitrum habebis coloris satis pulchri.

CAP. LXIX. Color Granati in vitro
plumbi.

Libræ viginti frittæ crystalli permisceantur cum libris sedecim calcis plumbi, additisque tribus uncis magnesiæ Pedemontanæ, nec non uncia zafferæ dimidia præparatis, mittantur in ollam solito more calidam, & sub finem horarum duodecim projiciantur in aquam, semotoque omni plumbo in fornacem redeant & horis decem purgabuntur. Misceatur materia, videatur an color respondeat, & manus operi admoveatur, habebisque vitrum pulcherrimum, & colorem Granati satis speciosum.

CAP. LXX. Color Saphiri in vitro
plumbi.

Recipe frittæ crystalli libras quindecim, & calcis plumbi libras duodecim. Misceantur optime & cribrentur, cribratæque dentur zafferæ præparatæ uncia duæ, nec non grana viginti quatuor magnesiæ Pedemontanæ præparatæ, omniaque misceantur, & per horas duodecim in olla & fornace detineantur. Postea omnis hæc materia projiciatur in aquam, separatoque cum cura omni plumbo, per alias duodecim horas in fornace purgetur, captoque specimine, si color responderit, elaboretur, & vitrum habebis colore Saphiri orientalis oppido formosi, qui violæ duplicis colorem admixtum habebit, & aspectu jucundissimus erit.

CAP. LXXI. Color in vitro plumbi Aureus.

Recipe frittæ crystalli, nec non calcis plumbi, ana libras 16. Misceantur benè, cribrentur, addanturque scorix æris caldarii ter calcinatæ uncia sex, & croci Martis aceto facti grana 48. Omnia benè mista mittantur in ollam moderatè calidam, & exactis duodecim horis projiciantur in aquam, separatoque plumbo per alias duodecim horas in ollam redeant, & optime purgabuntur. Misceatur materia, & experimentum capiatur, an color respondeat, & si virefcere videbitur, addatur parum croci Martis, & ablata viriditate color prodibit auri pulcherrimus. Elaboretur, & colorem habebis pulchrum, qualis est auri & qualem ego sæpius feci.

CAP. LXXII. Color lapidis Lazuli.

Lactæum pulcherrimum, ex præscripto capituli quinquagesimi quinti, & crystallo candidissimâ factum in olla funde, fuso sensim addatur tantum smalti pictorum cœrulei, quantum tingendo vitro sat erit. Misceatur bene vitrum, videaturque an color respondeat, eoq; respondente per bihorium stet, ac denuo misceatur.

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

tur, & coloris experimentum fiat, omnibusque bene sese habentibus, per horas decem quiescat. Misceatur iterum, & omnibus in eodem coloris gradu permanentibus, vasa fiant, quæ verum Lazuli lapidem referent. Quod si materia, dum in opere vitrarius est, turgear, addantur aliquot frusta foliorum auri, quæ per vasa, dum turgent, distributa, naturalem lapidis Lazuli speciem tanto magis reddent,

CAP. LXXIII. Modus tingendi crystallum
montanum colore viperæ.

Recipe fragmenta crystalli montanæ pellucida, & sine omni terrestri materia, undantis aquæ speciem representantia, diversæ magnitudinis, antimonii crudi & auripigmenti flavi bene pulveratorum ana uncias duas, & salis armoniaci unciam unam. Pulverata mistaque omnia mittantur in fundum crucibuli, quod ignem ferat, hisque imponantur frustula crystalli prædicta. Tegatur crucibulum, crucibulo alio inverso, ita ut orificium orificio respondeat, luteturq; optime & siccatum mittatur in medios carbones, qui adhibito sensim igne, sponte sua incenduntur, & crucibulum, ubi ignem senserit, fumare plurimum incipiet. Et hæc quidem operatio caminum requirit largum, & ubi exhalare fumus cœperit, laboratorio exivisse tutius erit. Perniciosissimus enim, & quasi mortiferus est hic fumus, ut cautione opus sit, ne quoque modo attrahatur. Cessante omni fumo ignis per se extinguatur, & crucibulum spontè sua refrigescat. Deinde eximantur frusta crystalli, & quæ in summitate vel fastigio crucibuli posita fuerunt colore aureo, rubini, balassii, maculisque pulchris; contra quæ in imo, & prope pulverem posita fuerunt, maximam partem colore serpentis viperæ tincta erunt; & gemmarum instar rotâ poliuntur, & fulgorem acquirunt splendidum: frusta reliqua, substratis pro ratione colorum foliis, auro inclusa, jucundum aspectum præbent: & quia exigua hoc opus impensæ, nec fastidiosum est, nihil prohibet, cur non major eorundem quantitas tingatur: semper enim horum fragmentorum aliquot speciosa & pulchra erunt.

CAP. LXXIV. Color Balassii, Rubini, Topasii, Opali & Asteriæ, in crystallo
montano.

Recipe auripigmenti flavo crocei, nec non arsenici crystallini ana uncias duas, antimonii crudi & salis armoniaci ana unciam unam. Pulveratæ & bene mistæ species mittantur in crucibulum satis capax, superimpositis primo segmentis crystalli minoribus, & successive majoribus, omni vitio carentibus, & crucibulum totum impleatur. Applicetur huic crucibulo, crucibulum aliud, & orificium orificio, lutenturque optime, relicto prius in fundo superiori crucibuli foramento magnitudine ciceris: atque hoc ideo fit, quia fumus materialium rectâ ascendens, quicquid impositum est in transitu melius tingit, quam si ad latus & oblique per juncturas crucibulorum transiret. Siccato luto crucibula in medios carbones ita mittantur ut crucibulum inferius plane totum, & superioris pars dimidia carbonibus tegatur. Postea ignis adhibeatur, sed sensim, & carbones sufflante nullo per se accendantur, nisi si plane cessent, quo casu incitandi erunt, ut ignescant. Et carbones quidem majores & quercini sint, procedaturque ut antea, studiose vitando fumum, ceu internecinum & vehementer noxium. Danda tamen est opera, ut carbones succensi exurantur: nisi enim id fiat, opus minime procedet. Fumus autem materialium, qui diutius aliquanto durat, per se cesset, nec non ignis sua sponte extinguatur, omni aura frigidiore & vento exclusis: fragmenta enim crystalli calida diffringerentur, & fragilia minimeque bona evaderent. Refrigeratis omnibus, resolutisque crucibu-

Vuuu 3 lis,

lis, pars crystalli major vero Topasii, Balassii, Rubini, Chrysoliti, Asteriæ & Opali colore tincta erit, aspectu admirando. Ex his fragmentis, quæ melius tincta & colorata erunt gemmariorum rotâ poliantur, & splendorem acquirant, splendori gemmarum naturalium parem, & fortasse majorem, sine ullo duritiæ detrimento, quam satis constat in crystallo naturaliter esse magnam. *Antverpia* non mediocrem eorundem copiam feci, & erant ex his fragmentis nonnulla Opali & Asteriæ colore elegantissime tincta. Hi lapides varie aptati, & substratis, ut naturales, foliis, auro inclusi, aspectum præbunt extraordinarium. Auripigmentum autem eligendum & frondens & aureum: in hoc enim totum rei artificium consistit, & ignis in principio adhibendus est lentus, omniaque per se refrigerant; quibus servatis, si prima vice non successerit, reperatur labor, & operando fieri, ut nunquam fallat experientia.

ANTONII NERI FLORENTINI
DE ARTE VITRARIA,

LIBER V.

Quo demonstratur verus modus faciendi massam Smaragdi, Topasii, Chrysoliti, Hyacinthi, Granati, Saphiri, Berilli vel Aquæ marine, aliorumque colorum: idque tanta venustate & elegantia, ut gemmas naturales in omnibus, solâ duritiæ exceptâ superent.

Cum novo, & hætenus minus usitato modo chymico Isaaci Hollandi faciendi massam supradictam, quæ omnes alias, quæ nunc quidem in usu sunt, venustate & elegantia coloris longissime superet.

CAP. LXXV. Smaragdos, Topasios, Chrysolitos, Saphires, Granatos, & omne quasi gemmarum genus usq; adeo perfecte imitari posse, ut colore, splendore, elegantia & politura, solâ duritiæ exceptâ, veras orientales, gemmas superent, res est usq; adeo suavis & pulchra, ut paucos esse credam, qui eandem non desiderant atq; omni studio quærant. Quare hoc præsentis libri modum ejus rei describo, nec non circumstantias & observationes ad hoc necessarias, ut non similes modo sint naturalibus, sed easdem etiam exceptâ duritiæ superent. Et vero dubium nullum est, quin solertes in hoc opere & industrii plus effecturi sint, quam ego scribo. Cæterum supra alios omnes admirandus ille modus est, quem ex *Isaaci Hollandi* opere desumptum; experimento ductus primus comprobavi, quo pastæ gemmarum usq; adeo elegantes, pulchræ & perfectæ fiunt ut fidem fere superent. Verum quidem est, laboris & molestiæ plenum hoc opus esse. Ego tamen, qui id sæpius peregi, facile illud atq; expeditum, & quod caput rei est, solidum esse pronuntio, ut jam levis & nullius momenti labor & sumtus censeri debeat, qui in istiusmodi negotia impenditur.

CAP. LXXVI. Modus præparandi crystallum montanum.

Habeas crystallum montanum, omnium quam id fieri potest, maxime pellucidam & pulchram, semotis Calcedonio, Tarso, aliisque lapidibus duris: vitrum enim quod ex his talibus fit, minus perspicuum est, minusq; fulget, quam quod ex crystallo montana paratur; & lapides semper aliquid terreni & obscuri habent; cum econtra crystallus ærei quiddam & pellucidi habeat, proximèq; ad naturam & qualitatem gemmarum accedat; orientalis præsertim, quæ effectum multo quam Italica & Germanica præstantiorem præbet. Ad sint ergo vasa vel opera crystallo facta, & in crucibulum opertum indita, mittantur in medios carbonēs arduentes, & ignescant, optimeque ignita in vas majusculum frigidâ limpidiora plenum projiciantur, idque minimum duodecies repetatur, substitutâ semper recenti frigida, notandoque crucibulum semper debere esse

opertum, & ab omni cinere & carbonibus immune: munditiâ enim hic opus est, & industria singulari. Crystallus ea ratione calcinatâ, siccataque non alio quam porphyrite lapide, idque ter, cum cura & assiduitate summa, teratur, ita ut tenuissimæ farinæ instar sit, & tantum omnem effugiat. In hoc enim totius rei cardo versatur. Nam si in mortario illam teras, æris, & ferreum pistilli colorem assumeret, nec præter smaragdi speciem quidquam refert. Jam nisi exquisitè admodum super Porphyrite teratur, deforme opus erit, & nihil minus quam naturales gemmas representabit. Summâ ergo hic patientiâ opus, atque exigua semper pulveris quantitas, & quæ dimidii cochlearis modum non excedat, assumenda, & sæpius repetendus ille labor est, ut pulvis fiat longe omnium tenuissimus. Et quia hæc prima omnium artificialium gemmarum materia est, in hoc incumbes, ut tanto majorem hujus bene præparati pulveris copiam habeas, fingendis cujuscunque generis coloribus.

CAP. LXXVII. Modus faciendi Smaragdum orientalem.

Recipe crystalli montanæ ut supra præparatæ uncias duas, minii ordinarii uncias quatuor. Misceantur optimè hi duo pulveres, ut incorporentur; addanturq; æruginis benetrîtæ & coloratæ grana 48. nec non croci Martis, aceto, ut supra capite decimo septimo, facti, & cum æruginè permixti grana octo. Misceatur diligentissime omnis hæc materia, & in crucibulum mittatur, quod ferendo igni par, atque illius, capacitatis sit, ut intromissâ omni hac materiâ digiti unius spatium superfit. Postea tegatur crucibulum operculo fœdili & lutetur optime, mittaturq; in fornacem figularem, sterq; calidiore loco per totum illud tempus, quo vasa figulina coquuntur: & deinde fracto eo materiam invens vitream smaragdi colore pulcherrimam, quæ si operibus magnis gemmarum instar inferatur, smaragdum de rupe veteri orientalem superabit. Quod si pasta hæc vice satis excocta, & purgata non sit, denovo mittatur in fornacem, & purgabitur. Signum bonæ coctionis est, si levato non nihil operculo materia pura & pellucida appareat: sin minus, lutetur operculum, omniaq; in fornacem redeant. Atque adeo notandum est, non ante diffringendum esse crucibulum, quam constet pastam optimè coctam & purgatam esse. Etenim si rupro priore crucibulo in aliud transmittatur, utur purgetur, opus tamen deforme & bullis pustulisque plurimis obnoxium reddit. Quod si fornax figulina ad manum non sit, extrui in hunc usum levioris operis fornacula, & per horas 24. adhiberi ignis poterit, appositis pluribus coloris diversi crucibulis. Ligna autem adhibeantur dura, (quale est quercinum) & arida; ignis sit perennis & non interruptus: opus enim redderet imperfectum.

Ego *Antverpia* istiusmodi fornaculam mihi præparavi, quæ crucibula diversi coloris viginti capiebat, & horis 24. opus totum absolvebatur. Majoris tamen securitatis gratia continuari ignis per alias sex horas, aut diutius aliquanto poterit, & omnia optimè excocta erunt, minusque lignorum absumeretur; danda tamen est opera, ut istiusmodi adhibeantur crucibula, quæ ignem ferant. Hæc pastæ gemmarum instar naturalium poliuntur, splendorem accipiunt, & substratis solito more foliis auro alligantur, atque hæc doctis pastam solito duriores reddit.

CAP. LXXVIII. Smaragdi coloris magis pleni.

Recipe crystalli montanæ, ut supra tritæ, unciam unam, minii vulgaris uncias sex cum dimidia. Misceantur bene, addanturque æruginis grana 75. nec non croci Martis aceto facti grana decem. Procedatur porro ut supra per totum, & colorem habebis.

habis smaragdi orientalis aliquanto magis plenum & admirabilem, qui in parvis operibus auro alligatus, substrato folio, supra quam id dici potest pulcher evadet. Magis tamen quam prior illa pasta excoquenda est, ut omnis consumatur imperfectio, quam ordinariè plumbum producit. Et hæc dosis pastam reddit teneriorem, sed color elegantissimus erit.

CAP. LXXIX. Pastam Smaragdi *elegantior* rem facere.

Recipe crysalli ut supra præparatæ uncias duas, minii ordinarii uncias septem, Misceantur, & in singulas hujus mixturæ uncias dentur æruginis grana decem, totidemque grana, sed semel tantum, croci Martis aceto facti, ita ut totum hoc compositum efficiat pondus unciarum novem, nec non drachmæ unius, & scrupulorum duorum. Omnibus bene mixtis procedatur ut supra *capite septuagesimo septimo*, & smaragdum habebis egregium, satisque speciosum, & ob plenitudinem coloris exiguis operibus aptum, sed propter plumbi copiam minus durum: necessum ergo est ut solito diutius excoquatur, & pallor ille ac pinguedo, quam plumbo naturaliter debet, absumatur; & vitrum erit colore smaragdi orientalis pulcherrimum.

CAP. LXXX. Smaragdus *alius* pulcherrimus.

Recipe crysalli montanæ ut supra præparatæ uncias duas, minii ordinarii uncias sex. Misceantur optime: & in singulas hujus materiæ uncias dentur æruginis bene tritæ grana decem; Omnibus bene mixtis procedatur ut supra, & colorem smaragdi pulcherrimum habebis.

CAP. LXXXI. *Topasius orientalis*.

Recipe crysalli montanæ, ut supra tritæ, uncias duas, minii ordinarii uncias septem. Misceantur omnia optime, & in crucibulum mittantur, igni ferendo par, & in quo vacuum relictum sit transversi digiti latitudine. Etenim quia hæc pasta dum coquuntur turgēt, hinc fit, ut repleto crucibulo materia vel adhæreat operculo, & opus deforme reddat, vel sese proripiat foras, & omnia imperfecta relinquat. Diligentia ergo & spatio opus est. In reliquis eadem ut supra ratione procedatur, & colorem habebis topasii orientalis admirandum, quo facere quodcumque voles poteris.

CAP. LXXXII. *Chrysolitus orientalis*.

Recipe crysalli montanæ ut supra factæ uncias duas, minii ordinarii uncias octo. Omnibus optime mixtis, addantur croci Martis aceto facti grana duodecim: postea mittantur in crucibulum, & procedatur more solito, nisi quod diutius excoquenda est hæc massa, idque ob plumbi naturam minus perfectam, & colorem obtinebis Chrysoliti orientalis summe perfectum, qui substrato folio effectum dabit admirandum.

CAP. LXXXIII. *Color cælestis*.

Recipe crysalli montanæ ut supra præparatæ uncias duas, minii ordinarii uncias quinque. Misceantur optime, addanturque Zafferæ præparatæ & tritæ grana 21, & cum materia permisceantur. Postea mittantur in crucibulum, servatis regulis & observationibus ut supra, & colorem habebis cælestem formosissimum.

CAP. LXXXIV. *Color ex violaceo cælestis*.

Recipe crysalli montanæ, ut supra tritæ, uncias duas, minii ordinarii uncias quatuor cum dimidia. Misceantur, addanturque smalti pictorum cærulei grana 26, mixtisque omnibus, fiat ut supra, & colorem habebis violaceum pulcherrimum, & cæruleum satis elegans.

CAP. LXXXV. *Saphirus orientalis*.

Recipe crysalli montanæ ut supra præparatæ uncias duas, minii ordinarii uncias sex. Mixtis his pulveribus, addantur Zafferæ præparatæ scrupuli duo, nec non magnesiæ Pedemontanæ præparatæ, & cum Zafferæ permixtæ grana sex. Omnibus bene unitis pergatur ut supra, & saphirus prodibit orientalis, coloris violacei speciosissimus.

CAP. LXXXVI. *Saphirus orientalis colore saturo*.

Recipe crysalli montanæ ut suo loco dictum est tritæ, uncias duas, minii ordinarii uncias quinque. Addantur Zafferæ præparatæ grana 42, misceanturque cum granis octo magnesiæ Pedemontanæ præparatæ. Omnia bene mixta mittantur in fornacem, percoquantur ut supra, & saphirum dabunt orientalem magis saturum, & cum insigni pulchritudine violacei quid referentem.

CAP. LXXXVII. *Granatus Orientalis*.

Recipe crysalli montanæ ut supra tritæ uncias duas, minii ordinarii uncias sex. Misceantur optime, addanturque grana sedecim magnesiæ Pedemontanæ præparatæ, & cum granis duobus zafferæ præparatæ permixtæ. Mittantur omnia in fornacem, coquanturque more solito, & granatum habebis pulcherrimum & speciosum.

CAP. LXXXVIII. *Granatus orientalis magis plenus*.

Recipe crysalli montanæ præparatæ uncias duas, minii ordinarii uncias quinque cum dimidia. Misceantur, addanturque magnesiæ Pedemontanæ præparatæ grana quindecim, & cum granis quatuor zafferæ præparatæ permisceantur. Omnibus bene unitis procedatur ut supra, nisi quod plus vacui in crucibulo relinquendum est, cum materia magis turgeat, & colorem habebis granati orientalis ex violaceo pulcherrimum.

CAP. LXXXIX. *Alius Granatus pulcher*.

Recipe crysalli montanæ præparatæ uncias quinque, magnesiæ Pedemontanæ præparatæ grana 35, & zafferæ præparatæ cum magnesiæ permixtæ grana quatuor. Omnia probe mixta mittantur in crucibulum, relictæo majore quam antea vacuo, cum materia valde turgeat. Lutetur crucibulum, siccetur & in fornacem mittatur, procedaturque ut supra, & colorem habebis granati orientalis supra reliquos speciosum.

CAP. XC. *Monita, pastas earumque colores concernentia*.

Notetur, colores in his pastis magis vel minus perfectos fieri, prout cuique placuerit, vel operis ratio exigere vidibetur. Etenim annuli minores colorem saturum, majores magis dilutum, in aures & monilia plenum requirunt, totumque hoc negotium ab ingenio laborantis dependet, neque certis regulis circumscribi potest; & si quæ hic regulæ à me præscriptæ sunt, ex huc tantum faciunt, ut curiosi artificis ingenio viam commonstrent inveniendi meliora. Et colorum quidem præterquam æruginis, zafferæ & magnesiæ hic nulla mentio fit. Curiosus tamen & ingenuus quisque ex auro colorem rubrum admirandum, ex ferro rubrum elegantem alium, ex ære viridem pulcherrimum, ex plumbo aureum, ex argento cæruleum, ex granato Bohemico aëreum pulcherrimè extrahere poterit. Hi enim granati, quia minores sunt, exiguo veniunt, & tincturam præbent maxime insignem, id quod ego in *Flandria* sæpius expertus sum. Idemq; de rubino,

saphiro aliisque gemmis iudicium esto, ut subacti in operationibus chymicis norunt: quæ omnia si hic perspicue, ut antecedentia describere vellem, diffusi operis materia esset & alioqui prædicti colores sufficiunt parandis operibus jucundis. Adeo autem ad illud, quod in hoc negotio essentiale & præcipuum est, ne videlicet crucibula antea quam materia probe cocta & purgata sit, frangantur. Etenim si pastæ ex uno in aliud crucibulum transmittantur, ob reliquias adhærentis crucibuli plenum spurcitiei, scabrosum & prorsus inutile opus erit. Quare si pastæ satis excoctæ non sint, neutiquam diffringendum, sed luto inducendum, & in fornacem denuo mittendum est crucibulum, & pastæ ea ratione purgatæ, cuicumque operi aptæ erunt.

CAP. XCI. *Admiranda & hætenus minus usitata ratio, faciendi pastas supradictas, atq; imitandi omne genus gemmarum.*

Hic modus imitandi gemmas, quem ab *Isaaco Hollando*, cum in Flandria essem mutuatus sum, quod ego sciam, minime usitatus, & paucis fortasse notus, ut laboriosus, eorum tamen, qui alibi hætenus in usu sunt, aut certe ad notitiam meam pervenerunt, pulcherrimus & elegantissimus est. Quare usque adeo perspicue, & adjectis tot circumstantiis monitisque illum demonstrabo, ut exercitatus quisque in arte Chymica eundem facillime capere, & perficere opus possit.

Cerussam tenuiter tritam in ampullam capacem vitream mitte, eique tantum aceti distillati affunde, ut palmi altitudine tegatur; notando acetum in principio vehementer effervesce, lente ergo & sensim agendum, & spatium furori dandum est. Deinde ampulla mittatur in cineres fornacis calidæ, ut octava pars aceti evaporet, removeaturq; ignis, & refrigerante ampulla, quod reliquum est aceti leniter decantetur. Et acetum quidem illud bene coloratum & sale grave erit ideoq; in vase vitreo seponatur. Affundatur cerussæ acetum novum, evaporetq; & decantetur ut antea, idque tam diu repetatur, donec acetum coloris & dulcedinis nihil secum serat, id quod sexta frequenter vice succedere solet. Filtretur tunc omne acetum coloratum cum cura, filtratumque in ampulla vitrea plane exhalet, & in fundo sal plumbi candidum remanebit, quod in ampulla lutata & arena fornacis satis calidæ per 24. horas ita detineatur, ut ampulla tota ab arena tegatur, solo eminente collo, eoq; aperto. Postea eximatur ampulla, & sal teratur, ac si quidem cinnabaris instar rubrum sit, bene est: sin flavescere videbitur, in ampulla vitrea per alias viginti quatuor horas ignem experiatu satis calidum, ita tamen ut non liquefiat, (frustraneus enim omnis labor esset) & cinnabaris instar rubrum evadet. Hoc ea ratione calcinatum plumbum rubrum in ampullam vitream mittatur, & affuso ut antea aceto destillato, procedatur ut supra, usque dum sal omne extractum, & feces vel omnes vel minimam partem separatæ sint. Acetum hoc coloratum omne in ollis vitriatis per sex dies asserva, ut particulæ terrestres, & impura quæque sistant, quo tempore exacto filtretur, semotis quæ in fundo sunt inutilibus particulis. Deinde acetum hoc bene filtratum & ab omnibus particulis terrestribus separatum in ampulla operta detineatur, & in fundo ejusdem sal remanebit. Saturni candidissimum, & sacchari instar dulce, quod bene siccatum aqua communi solvatur, & solum per sex dies in ollis asservetur, ut quicquid superest materiæ terrestris, in fundo vasis remaneat. Filtretur tunc aqua sale gravis, & reliquiis terrestribus separata, in ampulla vitrea evaporet, remanebitq; in fundo sal, nivis instar candidissimum, nec minus quam saccharum dulce. Repetatur hæc solutio per aquam communem, nec non filtratio & evaporatio ter, & saccharum habebis Sa-

turni, quod in ampulla vitrea & arena fornacis per dies pulculos igne temperato calcinatum, colorem contrahet, magis quam cinnabaris rubicundum, & calcem reddet quavis farina cribrata teneriorem, & quæ tactum effugiat. Atq; hanc calcem verum Saturni, & ab omni sorde, nigredine, & materia terrestri purificatum sulphur vocant. Quod si jam Smaragdi, Saphiri, Granati, Topasii, Chrysoliti pastas & cæruleum aliumve colorem facere animus est; recipiantur eadem ut supra materiæ, colores & doses, minio tantum excepto, cujus vires in eadem dosi supplebit hoc Saturni sulphur, & in reliquis exactissime procedatur ut supra, & gemmas habebis diversi coloris mire elegantes, & quæ alias omnes mediante minio factas longissime superabunt. Etenim hoc verum sulphur Saturni alia omnia, pluribus quam ego scribo parafrangis antecedit, id quod Antverpiæ sæpius deprehendi. Pastæ hoc sulphure factæ, pingue illud atq; flavum non habent, quod reliquis ordinariè adhæret, & quo successu temporis fœdantur: nec humore aut halitu humano maculas ut aliæ contrahunt. Quare neminem pœniteat illius laboris, qui opere ipso & successu pensatur.

CAP. XCII. *Modus faciendi pastas cujusque coloris durissimas.*

Recipe crystalli montanæ ut supra calcinatæ, & tritæ, libras decem, salis pulveris orientalis ut supra capite tertio optime purificati libras sex. Hoc sal probe siccatum, prophyrite tritum, & bene cribratum admisceatur crystallo supradictæ. Deinde addantur sulphuris saturni chymicè facti libras duas, atq; hi tres pulveres in olla vitriata & pura optime permisceantur, & adjectâ modicè aquâ communi & limpida ita impastantur, ut massa fiat duriuscula, ex qua postea placentalæ fiant trium unciarum pondere, & circa medietatem perforatæ, ut siccari in sole possint. Deinde mittantur in fornacem figuralem, & ibidem in summitate fornacis calcinatæ, tundantur, terantur porphyrite & cribrentur. Quibus peractis in ollam & fornacem vitriariam transeant, & per triduum purgentur: purgatæ in aquam trajiciantur, siccatae in ignem redeant, & per dies quindecim optime purgentur, ut bullis & pustulis, omniq; scabritie careant, & massa remaneat gemmarum naturalium instar purissima. Et hoc quidem vitri purissimi genus vario colore tingi potest, videlicet icoriâ ter calcinatâ smaragdi, necnon aquæ marinæ; zafferâ topasii; eademq; zafferâ & magnesiâ, ut vitrum ordinarium, saphiri colore, adhibendo tincturam, ubi vitrum purgatum fuerit. Eadem industriâ colo flavus tartaro & magnesiâ, nec non color granati magnesiâ & zafferâ per intervalla adhibitis, ut in vitro ordinario producitur. Et revera omnes in universum gemmas, coloresque omnes hac pasta vitri purissima durissimaque imitari licebit, & splendorem obtinebunt mire lucidum, atque adeo ipsam etiam naturalium duritiem æmulabuntur: smaragdus præsertim, qui ex hac massa conficitur pulcherrimus, & duritie naturali fere par.

ANTONII NERI FLORENTINI
DE ARTE VITRARIA,

LIBER VI.

Quo demonstratur verus modus faciendi omne genus encastorum, quo aurifices auro varios colores inurant; una cum regulis & ingredientibus, quibus utuntur: nec non modis administrandi ignem, ut encasta illa, vel ut vulgo vocantur smalta accuratissime fiant, additis demonstrationibus pro negotij natura satis evidentibus. Hoc sexto libro demonstratur modus faciendi encasta varii coloris, in usus aurificum, quibus aurum aliisque metalla inurant: res jucunda & elegans, nec minus laboriosa quam necessaria, quandoquidem metalla et en-

caustorum coloribus ornata aspectum præbent jucundum & insignem, alliciendo supra modum intuentium oculos. Et quia hæc ars una ex artis vitrariæ precipuis partibus & necessaria est, omnibusque hoc gnatum fore putavi, in eo totus fui, ut plures modos faciendi varia encausta, vel ut vulgo vocantur smalta, describerem, cujus rei notitia, quemadmodum per se vitrariam spectat, & ab illa tota dependet, ita minime vulgaris, & inter penitiora illius artis secreta est. Quare ne opus hoc tam pulchræ, utili & necessariæ materiæ destitueretur, præsentem hunc sextum, librum omnium usus & commodis dicatum volui.

CAP. XCIII. *Materia ex qua smalta omnia fiunt.*

Recipe exempli gratia plumbi optimi libras triginta, & stanni optimi libras triginta tres. Hæc metalla, ut de plumbo suo loco dictum est, simul calcinentur, & calcinata cribrentur. Calx bulliat in aqua limpida & vase vel olla pura. Ubi parum bullierit, auferatur ab igne, & inclinando ollam aqua effundatur, quæ calcem subtilissimam secum feret. Residuo calcis affundatur aqua recens, bulliatq; & decantetur ut supra, idque tantisper repetatur, donec aqua nihil calcis secum ferat, & quicquid crassioris metalli in fundo residet, calcinare denuo, & partem ejus subtilissimam ebullitione in aqua communi, ut antea, extrahere licebit. Evaporet jam omnis aqua, quæ calcem tulit subtilissimam, idque ad lentum ignem, in fine præferim, ne calx vitietur, quæ in fundo residet, & tenuitate calcem ordinariam superat. Postea recipe hujus calcis subtilissimæ, nec non fritæ, tarso candido præparatæ, atque optimè tritæ, & per cribrum angustum transmissæ ana libras quinquaginta, & albi satis tartari, de quo supra, uncias octo. Omnia optimè trita, mixta cribrataque mittantur in ollam, ex terra cocta novam, admovendo ignem per horas decem, quibus exactis auferantur ab igne, & bene pulverata loco sicco & à pulvere immuni servantur: hæc enim illa materia est, ex qua varii coloris smalta fiunt.

CAP. XCIV. *Encaustum lactis instar album.*

Recipe hujus materiæ, exempli gratia, libras sex, magnesiæ Pedemontanæ præparatæ grana quadraginta octo, totumque hoc compositum mitte in ollam vitro albo obductam. Deinde liquecat & purgetur in fornace, igne lucido, & lignis quernis, sine fumo, id quod brevi absolvitur. Ubi soluta & liquata fuerit hæc materia, in aquam limpida projiciatur, ac denuo in ollam redeat, solvatur, purgetur & in aquam projiciatur, ut antea, idque tertio fiat; ac tum demum, ubi quarto soluta & bene purgata fuerit experimentum capiatur, sit ne, ut esse solet albissima, ac si virescere videbitur, non nihil magnesiæ, ut supra, addatur, & lactis instar alba, nec non auro metallisque pingendis aptissima erit.

CAP. XCV. *Smaltum quod turcoidis colorem refert.*

Recipe materiæ, ex qua encausta fiunt, libras sex, mittatur in ollam vitriatam vitro albo, fundantur, purgentur, & in aquam projiciantur, ac denuo in ollam redeant, & cum bene purgatæ fuerint, addantur uncia tres scoriz æris, ter, ut suo loco dictum est, calcinatæ, nec non zafferæ præparatæ grana nonaginta sex, & magnesiæ præparatæ grana 48. Misceantur bene hi duo pulveres, & in quatuor partes divisi, quatuor distinctis vicibus addantur, optimè omnia miscendo, ut pulvis bene incorporetur. Quod si periculo facto color satis plenus videbitur, aurificibus, eundem exhibebis, atque id ages, ut ex selegmine massæ de quibusunque coloribus oculo judicium ferre possis, id quod ego semper feci: neq; enim hic certa dosis præ-

scribi potest, cum colores modo plus, modo minus tingant. Oculo itaq; d judicandi sunt colores, & si nimij fuerint, plus materiæ, unde smalta fiunt, addendum est: statim enim solvetur, & color reddetur magis dilutus: & contra si dilutiores fuerint, plus pulveris, quo tingantur, addendum est, atque ita colorem vel minus vel magis plenum reddes, prout exigere natura negotii videbitur, id quod ego Pisis semper feci, & oculi judicium secutus sum, nullo adhibito certo pondere aut mensura.

CAP. XCVI. *Aliud encaustum cæruleum.*

Recipe materiæ smaltorum libras quatuor, zafferæ præparatæ uncias duas, scoriz æris ter calcinatæ grana 48. Misceantur primò optimè pulveres inter se, & postea quam id fieri maxime potest cum materia, mittanturq; in ollam vitro albo inductam, & consequenter in fornacem. Ubi jam omnia soluta & unita fuerint, projiciantur in aquam, redeantque in ollam, coquantur, & uniantur optime, eoque peracto eximantur ex fornace, & smaltum dabunt pro aurificibus satis speciosum.

CAP. XCVII. *Smaltum viride.*

In ollam vitro albo, ut moris est inductam, atque in fornacem mittantur materiæ smaltorum supradictæ quatuor libras, & horis decem vel duodecim optimè solvantur & purgabuntur. Projiciantur in aquam, redeantq; in ollam, & purgentur optime. Ubi bene purgata fuerit hæc materia, addatur scoriz æris, ter, ut suo loco dictum est, calcinatæ, uncia duæ, nec non scoriz ferri bene tritæ grana 48. Addantur autem hi pulveres, antea bene misti, sensim, & tribus vicibus, bene semper miscendo materiam, ut colorem imbibat, observandoque an color respondeat: & si quidem ex voto sit, purgari omnia & bene uniri permittantur. Deinde, ut moris est, eximantur ex fornace, & smaltum erit viride, pro aurificibus pulchrum.

CAP. XCVIII. *Aliud encaustum viride.*

Recipe materiæ ex qua smalta fiunt libras sex, eiq; que quam id fieri accuratissime potest admisce ferretti Hispanici optimè triti uncias, nec non croci Martis cum ferretto permixti grana 48. Omnia bene unita & permixta mittantur in ollam vitro albo inductam, & ubi optimè purgata fuerint, trajiciantur in aquam, redeantque in ollam ut purgentur, videaturque an color ex voto sit, quo animadverso, purgari permittatur, extrahaturque more solito. Et hæc quidem smalta omnia quatuor, vel sex, aut circiter unciarum pondere parantur.

CAP. XCIX. *Smaltum aliud viride.*

Materiæ smaltorum libras quatuor in ollam vitriatam mitte, & paucis horis purgabuntur. Purgatæ trajiciantur in aquam, redeantque in ollam & purgentur. Deinde per tria intervalla pars sequentis permixti pulveris terria addatur. Recipe scoriz æris ter calcinatæ uncias duas, & croci Martis aceto præparati grana 48. Pulverata addantur materiæ, ubi jam soluta & purgata fuerit, omnia bene miscendo & incorporando, & ubi color placuerit, purgetur & eximatur, ut moris est.

CAP. C. *Encaustum nigrum.*

Recipe materiæ, ex qua smalta fiunt, libras quatuor, nec non zafferæ præparatæ & magnesiæ Pedemontanæ ana uncias duas. Hi pulveres optimè misti uniantur cum supradicta materia, mittanturque in ollam vitriatam & purgentur. Et quia flatulenta admodum est hæc materia, olla adhibeatur aliquanto major, ad prohibendam ebullitionem. Ubi pur-

purgata fuerint omnia, trajiciantur in aquam, redeantque in ollam, & statim purgabuntur. Videatur an color satisfaciatur, & prout ex usu videbitur, satur magis vel magis dilutus reddatur, & ubi voto responderit, in placentas orbiculares, ut reliqua encausta cogatur, & encaustum erit holoserico nigrum pro aurificibus satis pulchrum.

CAP. CI. *Aliud encaustum nigrum.*

Recipe materiae smaltorum supradictæ libras sex, zafferæ præparatæ, nec non croci Martis aceto facti, & ferretti Hispanici ana uncias duas. Hi pulveres bene subacti & uniti misceantur optime cum supradicta materia, mittanturque in ollam vitriatam & fornacem more solito. Ubi jam omnia bene soluta & unita fuerint, trajiciantur in aquam, redeantq; in ollam & brevi purgabuntur. Videatur an color respondeat, cogaturque massa in placentam more solito, si tamen antea bene purgata fuerit, & colorem imbibere, & nigrum erit pulchrum, quo aurifices metalla inurunt.

CAP. CII. *Aliud encaustum nigrum.*

Recipe materiae smaltorum supradictæ libras quatuor, tartari rubri uncias quatuor, magnesiæ Pedemontanæ præparatæ uncias duas. Hi pulveres bene subacti misti permisceantur cum supradicta materia, mittanturq; in ollam vitriatam aliquanto majorem, ut spatium vacuum supersit: intumescit enim valde hæc materia. Deinde fusa unitaq; omnia trajiciantur in aquam mittanturq; denuo in ollam & purgentur, advertendo utrum color placeat, quo respondente in placentas ut moris est cogantur, & nigrum erit holoserici instar elegantissimum.

CAP. CIII. *Smaltum purpureum.*

In libras materiae smaltorum quatuor, dentur magnesiæ Pedemontanæ optime præparatæ uncia duæ, mittanturq; in fornacem in olla more solito vitriata grandiuscula, ut vacuum reliquatur: bulliet enim & intumescet valde hæc materia. Ubi jam soluta & unita fuerint omnia, trajiciantur in aquam, redeantq; in ollam & purgentur. Deinde videatur an ex voto color sit, & si quidem talis fuerit, cogatur more solito, & color purpureus erit satis elegans, ita tamen ut dum in olla est, pro negotij natura vel saturetur magis, vel magis diluatur.

CAP. CIV. *Smaltum aliud purpureum.*

Habeas materiae ex qua encausta fiunt libras sex: magnesiæ Pedemontanæ præparatæ uncias tres & lcoriæ aris caldarii, ter calcinatæ uncias sex. Hi pulveres bene uniti permisceantur cum materia supradicta, mittanturque in fornacem more solito & purgentur optime. Postea trajiciantur in aquam, redeantq; in ollam & purgentur, videaturq; an color respondeat, ut saturate vel diluere eundem possis, & si quidem debite præparatus fuerit, eximatur & procedatur more solito.

CAP. CV. *Encaustum flavum.*

Recipe materiae smaltorum libras sex, tartari uncias tres, & magnesiæ præparatæ grana 72. Pulveres bene subacti unitique misceantur cum supradicta materia, quam id fieri potest optime, mistaq; omnia in fornacem, & ollam vitro albo inductam, & aliquanto majorem mittantur: valde enim intumescere solent. Ubi omnia bene purgata fuerint, trajiciantur in aquam, redeantq; ut in ollam & purgentur, observando utrum color placeat, nec ne, ut intendere illum vel diluere si opus sit possis, & encaustum erit flavum, pingendis metallis aptissimum, excepto auro, quo splendor illius obscuratur, nisi superinductis coloribus aliis, quod aurificibus in usu est, adjuvetur.

CAP. CVI. *Smaltum Cœruleum.*

Ut cœruleum & picæ marinæ colorem efficias, in promptu sint uncia duæ bracteolarum aris, ut supradictum est, calcinatarum, & zafferæ præparatæ grana quadraginta octo. Hi pulveres bene misti redigantur in unum corpus, cum libris quatuor materiæ, ex qua encausta fiunt, & uniti trajiciantur in aquam more solito, redeantque in ollam & purgentur. Unitis & purgatis bene omnibus videatur an color respondeat, ut, sicut alias dictum est, vel intendere illum vel diluere, si ex usu sit possit, & si quidem probus fuerit, procedatur ut artis est.

CAP. CVII. *Encaustum violaceum.*

Ut smaltum facias violaceum, omnibus numeris absolutum, adfint libræ sex illius materiæ, ex qua encausta omnia fiunt, nec non magnesiæ Pedemontanæ præparatæ uncia duæ, & scorix aris ter calcinatæ grana 48. Pulveres bene misti permisceantur cum supradicta materia, & more solito mittantur in fornacem, propiciantur in aquam, & denuo purgentur, vocatoq; in examen colore, si neq; minuere illum nec augere necesse sit, procedatur more solito, & encaustum erit pulchrum & aurificibus utile.

ANTONII NERI FLORENTINI
DE ARTE VITRARIA,

LIBER VII.

Quo-modus demonstratur extrahendi laccam flavam ex floribus genistæ in usus pictorum: nec non modus alius extrahendi laccam rubram, viridem, cœruleam, purpuream, omnemque alium colorem ex quibuscunque floribus & herbis.

Modus item faciendi cœruleum Germanicum & ultramarinum: nec non modus extrahendi laccam ex cocco, ligno Brasiliensi, & rubia tinctorum, cum modo colorandi turcoidem decolorem. Alius item modus faciendi colorem rubrum transparentem, nec non smaltum roseum pro auro aliisque metallis: res non vulgares minimeque communes.

Hic presenti & ultimo libro demonstro modum extrahendi omne genus colorum ex floribus & herbis in usus pictorum, qui quidem colores etiam tingendis vitris inservire poterunt. Modum item extrahendi laccam ex multis coloribus, nec non modum extrahendi colorem ultramarinum ex lapide lazuli, quæ omnia quidem in usus pictorum cedunt, sed ita ut etiam arti vitraria inservire possint; idque tam in superficie quam in igne fornacis. Præterea demonstro modum faciendi colorem rubrum transparentem in vitro, qui hodie ceu res minus utilis in oblivionem venisse videtur: modum item faciendi encaustum rubrum colorando & pingendo auro, quæ omnia ad artem vitrariam pertinent, & hodie in occulto latent ac paucis nota sunt; præter multas alias res, quæ huic operi debent, & curiosis nobilibusque ingenius gratiore putavi.

CAP. CVIII. *Lacca flava ex floribus genistæ pro pictoribus.*

Ex soda vitrariorum & calce lixivium facies mediocriter potens, & in hoc lixivio ad lentum ignem recentes genistæ flores ita coque, ut lixivium omnem florum tincturam attrahat, id quod cognosces si flores extracti albicantes & decolores, & contra lixivium instar elegantis Trebiani flavum sit. Exemptis tunc floribus lixivium in vasis fictilibus vitriatis foco ad bulliendum admove, eique tantum aluminis roccæ superaddito, quantum dissolvi ab igne poterit. Deinde ablatum ab igne lixivium in vas aquâ limpida instructum effunde, & color flavus fundum petet, quo facto, quiescat aqua, decanteturq; atque alia recens affundatur, & ubi tinctura refederit, decantetur, idque

tantisper hat, donec sal lixivi & alumen omne à tinctura ablatum sit: notando tanto magis pulchrum & elegantem fore colorem, quanto tincturam à sale lixivi & alumine aquâ magis purgaveris. Aquam autem intelligo communem, cujus beneficio sal lixivi & alumen aufertur: subiinde autem, antea quàm decantetur aqua, subsidete tinctura permittatur, idque tam diu repetatur, donec aqua sine omni salsedine & non mutata exeat: id enim ablatis salis & aluminis signum est, & lacca in fundo remanebit elegans atque pura, quam aquâ bene decantatâ super segmentis lini candidi extendes, & lateribus recens coctis in umbra siccabis, & laccam habebis flavam, quâ pictoribus simul & vitariis inservire poterit.

CAP. CIX. *Extrahere laccam ex papavere, iride, rosis & violis rubris, omnique genere herbarum virulentum.*

Recipe florum vel herbarum unius, ejusdemque coloris quam volueris quantitatem, & eadem, ut capite centesimo octavo dictum est ratione procede, & laccam vel colorem habebis & tincturam cujuscunque floris vel herbarum pro pictoribus pulchram, & jure magni faciendam.

CAP. CX. *Extrahere laccam & colorem ad pingendum ex floribus aurantiis, papavere erratico, iride, violis ordinariis, violis rubris, rosis incarnatis, & rubris, floribus borraginis, brassicæ, gladioli, & quibuscunque aliis: nec non colorem viridem ex malva, pimpinella, omnibusque aliis herbis.*

Recipe cujuscunque generis & coloris florem vel herbam, quâ recens trita chartam colore suo inficiat: si qua enim hunc effectum non præstat, huic operi apta non est. Mittatur in ampullam vitream aquæ vitæ ordinariæ, & in protuberantiam capitelli, quâ latissima esse debet, mittantur folia florum vel herbarum, ex quibus elicere tincturam & extrahere colorem cupis. Aptato postea recipiente capitello, lurentur juncture, Ignisque adhibeatur temperatus, & pars aquæ vitæ maxime subtilis ascendens in capitellum, primo in protuberantiam ejusdem super florum & herbarum folia, & porro extractâ eorundem tincturâ in recipiens decider. Hæc pars aquæ vitæ tenuior in vase vitreo denuo distillata, peregrini coloris expers transibit, iisdemq; ut antea usibus inservire poterit, remanente in fundo tinctura, quam modice siccabis, & laccam habebis ex omni genere florum & herbarum pro pictoribus optimam.

CAP. CXI. *Cæruleum instar Germanici.*

Recipe argenti vivi partes duas, florum sulphuris partes tres, & salis armoniaci octo. Omnia super porphyrite trita, cum argento vivo in ampullam vitream longioris colli & in fundo lutatam mitte, iisq; ignem arenæ lentum admove, usque dum omnis abcesserit humiditas, quo facto claudatur orificium vitri, augeaturque ignis, ut in sublimationibus fieri solet, contineturque ad finem usque, & cæruleum habebis satis elegans & pulchrum.

CAP. CXII. *Modus quo Turcoïdi naturali nativus suus color deperditus restituitur.*

Turcoïdes subalbi & decolores mittantur in ampullam vitream, adjecto oleo amygdalarum dulcium, detineanturque in cinere temperato & tepido, & bidui spatio colorem acquirant pulcherrimum.

CAP. CXIII. *Mistura pro speculis.*

Recipe stanni bene purgati libras tres, æris purgati libram unam, fundatur primo æs, & postea stannum, optimeque fusis & liquatis illis, addantur tartari rubri tantummodo usque uncia sex, salis nitri uncia una

cum dimidia, aluminis drachmæ duæ, nec non Arsenici uncia duæ. Sine omnia evaporare, & in typos speculorum mitte, & materiam habebis speculorum optimam, quæ ubi polituram recepit figuras exacte reddet, atque hæc illa mistura est quam chalybeam vocant.

CAP. CXIV. *Modus tingendi interiorem spherarum, aliorumque ex vitro albo vasorum superficiem omni genere colorum, ita ut lapides preciosos naturales referant.*

Pilam seu spheram, vel aliud ex vitro albo & candido vas concavum, vario genere colorum inducturus, recipe glutinis piscium, bidui spatio in aqua communis macerati, & tenuissimi quantitatem debitam, eamque in ollula & aqua limpida tantisper coque, dum optime dissolvatur. Hoc decoctum ablatum ab igne & jam tepidum in spheram vel vas vitreum aliud infunde, & circumacto vase cura, ut tota vitri interior superficies à glutine humectetur & madescat, quo facto quicquid superest humoris effundatur. Inde ad manum sint colores pulverati, & primo quidem minium, quod statim per tubulum ex arundine ita injicies, ut fluctus representet, & ubi vitrum hinc inde minio tinctum fuerit, beneficio illius tubuli idem smalto cæruleo, & postea ærugine, nec non auripigmento, & tandem lacca, omnibus probe tritis undulatum & diversis in locis ita facies, ut mediante glutine, quo vitrum humectatum est, hi pulveres vitro adhæreant. Atque eadem plane ratione cum reliquis in universum coloribus procedes. Postea gypsum recipe bene pulveratum, idque in sufficiente copia in spheram vel vitrum mitte, confestim circumagendo, & si quidem statim atque dum recens est gluten id feceris, gypsum ubiq; & per totum adhærebit, quo facto, quicquid ejusdem superaverit, aufer, & exterior vitri superficies jucundissimo aspectu variis coloribus tincta, & ludentis in duro lapide naturæ hoc opus esse videbitur, siccatoq; bene glutine colores illi vitro usque adeo firmiter adhærebunt, ut resolvi postea nunquam possint, & semper pulcherrimi appareant. Hæ spheræ pedi applicantur ligneo, vel ex alia qualicunque materia, picto, & decoris atque ornamenti causa in tablina vel pluteos jucundo admodum aspectu reponuntur.

CAP. CXV. *Color Cyaneus vel ultramarinus.*

Recipe fragmenta lapidis lazuli, bene, & cæruleo colore tincta, quæ Venetiis copiose & exiguo pretio veniunt, eaq; in crucibulo & igne carbonum calcinata, ignitaq; in frigidam, bis repetito opere projice, & super porphyrite lapide in pulverem, farinæ cribratam instar tenuissimum & impalpabilem tere. Postea recipe resina pini, picis nigra, mastichis, ceræ novæ, erebinthinæ ana uncias tres, olei lini, thuris ana unciam unam. Dissolvantur omnia ad lentum ignem in vase terreo, agenturq; bacillo, ut optimè coeant, & bene incorporata in frigidam projiciantur, servanturq; in usum. His peractis in singulas lapidis lazuli, ut supra triti, libras recipe uncias decem massæ, ex supradictis speciebus compositæ, iisdemq; in ollula ad lentum ignem resolutis sensim pulverem lapidis lazuli asperge, & virgula ut incorporetur bene subige. Incorporatis bene omnibus quicquid est materiæ subito in vas frigidâ plenum projicies, unctisq; oleo lini manibus, pastillos unum vel plures pro ratione materiæ oblongos, & rotundos forma, formatosq; in frigida per dies quindecim detine, mutando aquam de biduo in biduum. His pastillis, in catillo terreo, bene vitriato & puro, sepositis, affundatur calida, in caldario seorsim cocta & limpida, eaque refrigerante substituantur in locum ejus calida recens alia, idque tantisper continetur, dum pastilli aquæ calore dissolvantur, quo animadverso addatur recens calida, & videbis aquam infici colore cyaneo. Decantetur aqua in ollam vitriatam & puram,

ram, & pastillis affundatur calida recens, eaque colore infecta decantetur ut antea, transeatque per cribrum angustum, idque tamdiu repetetur, donec aqua colore nullo inficiatur. Advertendum tamen est, ne aqua nimis calida, sed tepida tantum sit: nimio enim calore nigredinem contrahit hic color: probè ergo hoc observandum est, plurimum enim refert. Hæ aquæ coloratæ & per cribrum in ollam transmissæ, pinguedinem quandam in superficie habent, quare per horas 24. quiescant, & color omnis fundum petet. Decantetur tunc aqua, & pinguedo lentè, affusq; recenti limpida color per cribrum angustum in ollam vitriatam & puram transeat, agiturq; frequenter, & magna pars spurcitiei & pinguedinis in cribrello permanebit; idq; iter, adjuncta semper recenti aqua, repetatur. & cribrum toties ab omni immunditia purgetur. Color in ollis servetur vitriatis, sensim decantando aquam: per se enim siccescit, & ultramarinum habebis pulcherrimum, quale ego *Antverpia* sæpius feci. Cæterum major vel minor massæ supradictæ quantitas in singulas lapidis libras danda est, prout lapis plus minusve coloris continet, & color pulchrior fuerit. Optime autem atq; ita terendus est lapis, ut tactum effugias, & color optimus erit. Si smaltum cæruleum ordinarium eadem ratione tri veris, & massæ gumminæ incorporaveris, nec non per dies quindecim cum lapide lazuli in digestionem detinueris, & porro ut de lapide lazuli dictum est operatus fueris, materiam habebis elegantem satis & speciosam, quæ ultramarinum mentietur. Atque hic color non pictoribus modo, sed tingendis etiam vitris inservit.

CAP. CXVI. Lacca coccinea pro Pictoribus.

Recipe libram unam tomenti albi tenuioris, eamq; per diem integrum in frigida detine, exemtamq; bene exprime, ut unguinosum illud quod tundendo recipit dematur, & postea alumine illam infice, eo qui sequitur modo. Recipe aluminis roccæ uncias quatuor, tartari crudi pulverati & in cacabum parvum cum quatuor mensuris aquæ missi uncias duas; ubi bullire aqua cœperit, tomentum injice, idq; per dimidium horæ spatium ad lentum ignem coq; & ablatum postea ab igne per horas sex refrigerare permittit. Exemtum deinde tomentum aqua limpida lavabis, & ubi per bithorium steterit exprimes & siccare permittes.

CAP. CXVII. Magisterium quo cocci color extrahitur.

Recipe mensuras frigide quatuor, fursurum frumenti libras quatuor, pyrethri orientalis & sceni Græci ana drachmas duas, omnibus in cacabum missis admoveatur ignis, donec aqua tepesciat, & manus ferre calorem ejusdem possit. Inde aqua auferatur ab igne & cacabus panno tegatur, ut calorem quam diutissime ferveret, quiescendo per horas 24. quibus exactis lixivium decantetur in ulus infra scriptos.

Recipe ollulam puram, in eandemq; mitte mensuras tres frigida, & unā magisterij, & ubi jam bullire cœperit, adde grana Kermes, hac ratione contusa. In Mortario æneo, contunde unciam unam granorum Kermes, eamque bene contusam per cribrum toties trans mitte, ut tota transeat. Postremo recipe aliquantum tartari crudi, idq; in mortario illo tunde, & tartarum omnem fundo mortarij & pistillo adhærentem tincturam in se recipiet. Hoc tartarum cum cribratis granis Kermes permixtum, in aquam, ubi bullire cœperit, mitte, ibidemq; ut aqua tingatur, per tantum temporis spatium, quantum recitando *Miserere mei* &c. sufficit, relinq; Postea recipe alumine, ut supra, infectum tomentum, ubi per dimidiam horam in frigida steterit, &

aqua in ollula bene tincta fuerit, idq; expressa bene aqua mittatur in ollulam, & bacillo bene versetur, ut promptè tincturam suscipiat. Per dimidiam horam in eo statu permaneat, ita tamen ut leniter bulliat. Postea auferatur ab igne ollula, exemtumq; dum ligno puro versetur tomentum, in vas frigidâ plenum projiciatur, & sub finem dimidiæ horæ aqua omnis derivetur, submittendo recentem frigidam: quâ iterum derivatâ tomentum exprimitur, & in loco à pulvere immuni ad siccandum seponitur, sed extensum ne vel situm contrahat, aut alias incalescat. Advertatur ut ignis semper oppidè lentus sit: fortior enim ignis tincturam reddit nigram. Postea lixivium facies hoc modo: Cineres samentorum vel salicis, aut cujuscunq; alterius mollioris ligni telæ cannabinæ duplici impone, affusamq; sensim frigidam percolare in subiectum vas permittit, & quicquid percolatum fuerit, denuo cineri ad percolandum affunde. Postea quiescat lixivium per horas viginti quatuor, ut cineres fundum petant, & lixivium purum atq; limpidum reddatur, quibus exactis decantetur in vas aliud, removendo quicquid est terrestre, quia bonum non est.

In hoc lixivium, dum friget, mitte tomentum illud cocco tinctum, & cura ut ad ignem bulliat, maxime moderatum: eâ enim ratione lixivium tincturam assumet. Primo ergo nonnihil tomenti recipe, atq; bene exprime, & siquidem coloris expers fuerit, aufer leberem ab igne. Hoc enim est signum lixivium assumpsisse tincturam tomenti coccineam.

Postea tibiale lineum, vel ut vulgo manicam Hippocratis super capaci lebere vel cacabo suspendes, & per hoc tibiale tincturam omnem percolabis, ipso etiam immisso tomento: & ubi lixivium omne percolatum fuerit exprime tibiale simul & tomentum, ut omnem tincturam habeas, & invertendo illud à pilis lava, ut purum evadat nitidumque.

Peractis his recipe aluminis roccæ pulverati uncias duodecim, easque in vitrum grande frigidâ plenum mitte, ibique tamdiu detine, donec alumen omne solutum fuerit, & ubi jam illud in aquam abierit, manicam à pilis optime mundatam super duobus baculis ita extende, ut quâ parte orificium ejus patet, superiora, quâ in pyramidem exit inferiora & subiectum vas spectet. Postea aquam omnem alumine infectam in leberem vel ollam, qua cocci tinctura continetur effunde, & statim tinctura beneficio hujus aquæ, quodam quasi coagulo, à lixivio separabitur. Ergo lixivium simul & tincturam omnem ex ollulâ purâ in manicam effunde, & lixivium transibit purum & limpidum, remanente in manica cocci tinctura; vel si omnino aliquid coloris secum traxerit lixivium, denuo in manicam redeat, & confectum erit negotium. Deinde globulos tincturæ, manicæ adhærentes, ligulâ ligneâ purâ movendo misce, positisque ordine lateribus recens coctis, laccam à manica solutam, & segmentis lini exceptam, & latius aliquanto extensam illis impone, ut cito & bene siccescat: etenim diuturno humore situm contrahit, & colorem reddit illepidum. Quare si lateres plus humoris imbiberint, substituendi erunt recentes alij, tanto enim citius siccescit, siccatajam lacca auferatur à segmentis lini, & color erit pro pictoribus optimus, qualem ego *Pisis* sæpius paravi. Notandum autem est, si color magis quam decet plenus & satur sit, plus aluminis roccæ, si dilutior, aluminis minus addendum esse, & colores efficies ad gustum & voluntatem tuam.

CAP. CXVIII. Lacca ex ligno Brasiliensi & rubia, valde pulchra.

Si ex speciebus seorsim & unaquaque earum per se laccam extrahere volueris, eadem plane, ut supra de gra-

granis Kermes dictum est, ratione procedes, tingendo aquam hac vel illa specie, ita tamen ut minus aluminis in singulas ligni, & rubiæ uncias quam granorum des. Etenim tinctura granorum altius latet, quam quæ ex ligno Brasiliensi & rubia extrahitur. Cum ratione ergo dandum est alumen, id quod praxis docebit. Præterea in singulas tomenti libras plus ligni Brasiliensis & rubiæ dabis, minus enim quam grana Kermes tincturæ habent, & hac ratione laccam pro pictoribus satis pulchram, & minore quam ex granis impensa habebis; ex rubia præsertim, quæ laccam præbet pulcherrimam & coloris speciosi.

CAP. CXIX. *Lacca ex granis Kermes: modus alius magis expeditus.*

In hoc modo à me Pisis invento, non tomentum occurrit, non magisterium, non lixivium, non tinctura læ, nec tot alia, quot in supra dicto, ut ut verissimo, revera tamen laboriosissimo modo. Expeditissimus ergo hic modus est, & eundem effectum producit, atque hac ratione peragitur. Recipe aquam vitæ, quæ primo destillaverit, & in lagenam ejusdem mitte libram unam aluminis bene pulverati, ut dissolvatur. Postea addatur uncia una granorum Kermes pulveratorum, cribatorumque, ut supra. Omnis hæc materia servetur vase vitreo, quod collum habeat minime angustum, agiturque bene, & aqua vitæ mirum in modum tingetur. Hoc peracto stet per quatrimum, & effundatur in vas terreum vitro obductum. Deinde recipe aluminis roccæ uncias quatuor easque in aqua communi dissolve, atque hanc aquam solutionis effunde in vas illud, quo aqua vitæ granis Kermes tincta servatur, & super vase terreo per manicam extensam, ut de lacca & tomento dictum est, cola, & aqua vitæ transibit coloris omnis expers, relinquendo tincturam in manica. Quod si coloratior aliquanto transiverit, coletur denuo, & clara evadet. Hæc lacca cochlearibus parvis ligneis & puris excipitur, & eadem prorsus, ut antea dictum est, ratione siccatur, & exiguo labore quantitatem laccæ granorum Kermes multo majorem & nobilissimam habebis, uti Pisis probatum est.

CAP. CXX. *Rubrum in vitro pellucidum.*

Recipe magnesiā subtilissime tritam, eamque cum altero tanto salis nitri purificati permisce, & in vase terreo ad reverberandum & calcinandum per horas 24. in igne detine, extractamque postea & aqua communi calida lotam, atque à sale separatam sicca, & colorem referet rubicundum. Addantur æquale pondus salis armoniaci, omniæque super porphyrite trita aceto destillato imbuantur, siccanturque. Postea mittantur in retortam, quæ ventrem habeat largum, & oblongius collum, atque per 12. horas ignis arenæ sublimatorius adhibeatur. Postea confracto vitro, permistiisque omnibus, quæ sublimata, erunt, vel in fundo residébunt, pondus materiæ exquiratur, tantumque salis armoniaci addatur, quantum sublimatione decessit, omniæque trita, & aceto ut antea imbuta, in ejusdem formæ retorta ad sublimandum seponantur, idque tamdiu repetatur, usque dum magnesiā in fundo fusilis remaneat.

Hæc illa medicina est, quæ crystallum & pastas colore rubro diaphano, instar rubini tingit, atque hujus medicinæ viginti uncia in singulas crystalli vel vitri uncias dantur. Plus tamen vel minus dari poterit, prout exigere coloris ratio videbitur. Magnesiā autem oportet esse Pedemontanā & bonā, hæc enim vitrum pulchro rubini & mirum in modum specioso colore tingit.

CAP. CXXI. *Rubrum instar sanguinis.*

Vitri plumbi libras sex, nec non vitri communis libras decem in ollam vitro albo-obductam mitte, & ubi vitrum coctum purgatumque fuerit, adde, sed moderate & cum judicio, scoriam rubram. Incorporetur, misceaturque vitrum optimè. Postea addatur tartarum rubrum pulveratum, & vitrum sanguinis instar rubicundum evadet. Quod si color nimis dilutus fuerit, addatur plus scorix & tartari, & vase bene ignito, vitrum dubio procul bene tingetur.

CAP. CXXII. *Color Balassii.*

Frittam crystalli ollā exceptam in fornacem mitte, & in aquam ter projice, posteaque magnesiā Pedemontanā præparatā tinge, & purpurascet. Adde aluminis catini per incerniculum trajecti quantum sat est, ut purpureum evadat vitrum: idque osties facies, notando, vitrum addito alumine non nigricare, sed flavescere, & in rubrum colorem vergere, abscedente magnesiā. Postremā vice magnesiā solam, & nihil aluminis, nisi intensus nimis color sit adde, & colorem habebis balassii pulcherrimum.

CAP. CXXIII. *Extrahere animam Saturni, in negotio smaltorum & vitri plurimis rebus inservit.*

Lithargyrium bene tritum in vas fictile vitriatum mitte, affundendo tantum aceti, ut quatuor digitorum altitudine exundet. Sine stare, donec acetum lactis colorem attrahat, id quod confestim fieri solet. Decantetur acetum coloratum, affuso, ut antea recenti alio, & ubi coloratum fuerit, decantetur ut supra, idque tamdiu fiat, dum acetum colorem nullum assumat. Mittatur acetum omne coloratum in vas terreum vitriatum, & quiescat, donec materia lactea resederit, & acetum limpidum decantetur. Lactea enim illa materia anima & pars Saturni nobilissima est, quæ in negotio encaustorum & vitri plurimis rebus inservit. Quod si lactea illa materia non bene residerit, frigidam affunde: ea enim hoc præstare solet, ut fundum petat, si vero ne sic quidem resederit, acetum & aqua evaporet: pars enim aceti maxime subtilis, & multi in re vitriaria usus in fundo residet.

CAP. CXXIV. *Smaltum roseum, Italis Roschiero dictum, quo aurum pingitur.*

Habeas frittam crystalli hac ratione factam: Recipe salis pulverei libras decem, tarti candidi tenuissimè triti libras octo. Hanc materiam aquâ subige, ut massa solidior fiat, ex qua placentulas formabis exiguas, & tenues. Hæ placentulæ in vasa fictilia & fornaculam mittantur, ad exemplum calcaris fornacis factam, & per horas decem calcinentur: vel si istiusmodi fornax ad manum non sit, mittantur in cameram fornacis prope spiraculum vel aperturam, per tres quatuorve dies, donec bene calcinatæ fuerint. Adde calcis plumbi stannique ex præscripto capituli 93. præparatæ, nec non tartari albi calcinati ana libras duas, mixtaque omnia in vas vitro candido obductum mitte, & ubi jam bene fusa purgataque fuerint in aquâ projice, idque bis fiat, eoque facto in fornacem denuo redeant, & ubi bene purgata fuerint, addantur uncia decem scorix rubræ, & incorporentur. Postea crocus Martis aqua forti factus, haud aliter ac magnesiā solet, sensim addatur, & per sex horas quiescat, & si color nondum responderit, addatur ut antea sensim nonnihil croci Martis, usque dum desideratum colorem obtineas.

CAP. CXXV. *Smaltum roseum pro Auro aliud.*

Recipe frittæ crystalli, ut capite præcedente 124. dictum est præparatæ, libras quatuor, easque in vase vitriato puro liquatas purgatasque in aquam

effunde, iterumque in fornacem mitte, & ubi bene purgatæ fuerint, addatur sensim, & singulis vicibus uncia semis calcis plumbi & stanni, ut supra *capite 93.* præparatæ, & incorporetur, & videaturque an color cinereus appareat, quo animadverso subsistendum, neque plus pulveris addendum est, ne color cinereus in album degeneret: id enim bonum non est. Calce & vitro purgatis, dentur minii optimi uncia duæ, & ubi omnia incorporata purgataque fuerint, projiciantur in aquam, & in fornacem redeant, ibidemque per horas octo detineantur. Postea addatur æris calcinati vel scorix rubræ, nec non tartari albi crudi ana uncia semis & bene permisceatur, ac tandem adjiciatur hæmatitis, quo machæropæi in poliendis gladiis utuntur, nec non sulphuris fixi ana drachma una. Misceantur, & incorporentur, videanturque an color respondeat, & si nimis satur sit magnesiæ nonnihil addatur, & diluetur, & contra si nimis dilutus sit, addatur parum sulphuris fixi, nec non lapidis hæmatitis, cum modico scorix rubræ, & tartari albi, idque tantisper donec color ex voto sit.

CAP. CXXVI. *Quomodo sulphur in usus supradictos figatur,*

Flores sulphuris per horæ unius spatium in oleo communi coque, Deinde removeantur ab igne, acetumque affundatur fortissimum, & sulphur statim fundum petet, innabitque oleum aceto. Evacuetur utrumque & sulphuri affundatur oleum recens, procedaturque ut supra, idque ter, & sulphur habebis fixum ad usus supradictos.

CAP. CXXVII. *Vitrum instar sanguinis rubrum, quod smalti rosei loco inservire poterit.*

Vitri plumbi libræ sex & frittæ crystalli libræ decem in olla liquecant, purgentur, in aquam projiciantur, ac denuo in ollam redeant, & bene purgentur. Ubi bene purgatæ fuerint, addantur scorix rubræ calcinatæ quatuor vel sex uncia, & bene percoquantur ac purgentur. Postea addatur tartarum rubrum pulveratum, & incorporetur, purgeturque & videatur an color placeat: & si quidem satis plenus non sit, addatur tantum scorix rubræ & tartari, quantum satis esse videbitur, capiaturque specimen, idque denuo incalciscat, donec satis rubrum sit, id enim intendendi coloris gratia sit.

CAP. CXXVIII. *Modus faciendi smaltum roseum, experimento comprobatus.*

Frittæ crystalli, ut supra *capite 124.* præparatæ, exempli gratia, libræ sex, mittantur in ollam vitriatam, & ubi bene purgatæ fuerint, addantur quatuor distinctis temporibus, & per intervalla, quatuor uncie calcis plumbi & stanni, ex præscripto *capitis 113.* factæ, incorporenturque bene. Ubi omnia incorporata & bene purgata fuerint, projiciantur in aquam, ac denuo in ollam redeant, fundantur & purgentur optime, eoque facto addatur scorix rubræ, massam pleno colore inficientis, uncia una semis, idque tribus distinctis temporibus, bene miscendo vitrum. Incorporetur, purgetur, & post bihorium addatur croci Martis, ut supra *capite 16.* præparati, uncia una semis, idque tribus distinctis temporibus. Misceatur bene, incorporetur, & purgetur trium horarum spatium. Postea addantur uncia sex tartariusti, & fuliginis camini bene vitrificatæ uncia una. Tartarum, ut in Calcedonio dictum est, uratur, admisceaturque croci Martis, sulphure ut supra facti, uncia semis. Atque hi pulveres bene triti, quatuor distinctis vicibus vitro dentur, misceanturque omnia bene, sed ita ut semper temporis aliquod spatium intercurrat. Etenim intumescunt, atque hoc efficiunt, ut vitrum mirabiliter effervescat. Addito omni pulvere

vitrum per horas tres quiescat & purgetur. Postea misceatur denuo, & experimento facto, si vitrum sanguinis instar rubicundum & translucentum appareat, bene habet; sin, addatur denuo tartarum ustum, cum foliagine, & croco Martis, ut supra, idque sensim, donec defractus color exeat, permittendo, ut vitrum addito pulvere per horæ spatium quiescat, quo exacto, & exempto frustulo vitri, eoque candefacto, si sanguinis instar rubicundum & pellucidum sit, bonum est, & pingendo auro inservit, ut *Pisr* sapius probatum est.

CAP. CXXIX. *Rubrum translucentum.*

Calcinetur aurum aquâ regiâ, idque sapius, affusa quinquies vel sexies eadem aquâ. Hic auri pulvis in ollam fictilem, & fornaculam mittatur, tantisper, usque dum in pulverem abeat rubrum, id quod plurimum die-rum spatio eveniet. Atque hic pulvis ruber si crystallo purgatæ, & in aquam sapius projectæ, pedetentim, & cum judicio addatur, verum transparentis carbunculi ruborem exhibebit, ut experimento compertum est.

CAP. CXXX. *Modus figendi sulphur, ut smalto rosei coloris inserviat.*

Fiat lixivium ex calce & acricinere, qualis est quercinus, in eoque sulphur optimè coquatur. Hoc enim lixivium sulphuri unguinosum & combustibile illud adimit, quod naturaliter habet, mutatoque lixivio sulphur candidum evadit, nec non incombustibile & fixum, atque aurificibus inservit, ut aurum pingant.

CAP. CXXXI. *Vitriolum Veneris, de quo supra in fine capitis 31 dictum est.*

Crucibula lutata mittantur in medios carbones ardentes fornacis anemix, & carbonibus bene operata stent per bihorium, quo exacto, fornax per se refrigerat, exemptisque crucibulis æs calcinatum colotis erit nigricantis, qui purpurei obscurioris aliquid admixtum habeat. Hoc æs ea ratione calcinatum, teratur optimè, & cribretur. Adsit postea vas fictile rotundum, & in fundo planum, in *Thuscia tegame* dictum, quod ignem ferat, & fornax in summitate vel fastigio ferrum transversum habeat, cui vas carbonibus plenum imponatur, succensisque illis, immittatur supradictum æs calcinatum, adjectis prius in singulas æris libras uncis sex sulphuris communis pulverati, & cum ære permistis. Ubi jam vas incalciscere, & sulphur inflammari atque comburi cœperit, unco longiore ferro vertatur, agiteturque continuè, ne vasi adhæreat, vel in massam cœat, idque continuetur, donec sulphur omne ablutum sit, & fumum nullum emittat. Tunc vas, ita ut est calidum, ab igne auferatur, exemptumque æs cochleari vel quo simili instrumento ferreo, optimè in mortario æneo tundatur, transeatque per cribrum, & pulverem dabit nigrum. Procedatur eadem plane ratione ter, hæc adhibita cautela, ut vas tertâ calcinatione finitâ tandem in igne detineatur, donec æs quod eidem inest, colorem assumat rubescens fulvum, quo suscepto auferatur ab igne, tundaturque in mortario æneo ut antea, & colorem habebis prædictum, nec non calcem, parando vitriolo, de quo infra dicetur, aptam.

CAP. CXXXII. *Vitriolum æris, vel ut vulgo Veneris, sine corrosivis, ex quo verus & intensus color cœruleus extrahitur: res mirabilis.*

Ut jam ex supradicto ære calcinato vitriolum extrahatur, habeas pro ratione æris calcinati novam vel plures ampullas, debite capacitatis, vitreas, & exempli gratia libra una illius æris mittatur in ampullam sex librarum aquæ capacem. Aqua sit communis & limpida, & una cum ære calcinato arenæ for-

fornacis imponatur, adhibeaturque ignis temperatus per horas quatuor, donec libræ circiter duæ illius aquæ evaporaverint, id quod oculo discernere licet. Postea refrigescat fornax, & aqua leniter decanteretur in vasa vitriata; æs autem quod in fundo reliquum est, redeat in fornacem, ut omnis evanescat humiditas. Quicquid aquæ decantatum fuerit, colorem habebit cæruleum plenum, admirandæ pulchritudinis. Quiescat aqua per biduum, & pars quædam æris, ruffum quid referens, fundum petet. Filtratur aqua more solito, subjectis vasis vitreis, & pars æris, quæ in fundo residet, mittatur in vas fictile, ut omnis abscadat humiditas, & cum singulis æris libris permisceantur uncie sex calcinati sulphuris, calcinenturque denuo, ut supra, & dum sulphur fumat, ferro ut antea agitetur, ne vasi adhæreat, & ut bene calcinetur. Calcinatione optime facta, eximatur ex olla, ita ut est calidum, tundaturque bene, & pulverem dabit nigrum, qui cum uncis sex triti pulveris ut antea permixtus, agitetur, calcinetur, & ferro continue ut supra agitetur, id enim necessum est, atque tantisper in igne detineatur, donec æs colorem acquirat ex ruffo fulvum. Auferatur ab igne, atque ita ut est calidum, in mortario æneo optime tundatur, cribreturque cribro angustiore, & eadem ut antea ratione, adjectis sex aquæ libris in arena fornacis ad ignem lentum per quatuor horas, usque ad consumptionem tertie detineatur. Decanteretur, filtratur, & quiescat aqua, & reliquæ æris in fornacem redeant, adjectis ad singulas æris libras uncis sex triti sulphuris, ut supra. Et quia in hac operatione non unum plerumque vas dirumpitur, in locum eorum quæ vel dirupta sunt, vel rimas egerunt, substituenda sunt alia, ne ære in cineres & carbonem delapso totum opus pereat. Repetatur hic processus quinquies, vel sexies, & æs terræ molioris instaret, tincturamque suam cæruleam in aquis filtratis relinquet, quæ collectæ denuo solito more filtrantur, abjectis fecibus, & aquam habebis limpidissimam, coloris cærulei, & admirandæ pulchritudinis.

CAP. CXXXIII. *Modus extrahendi vitriolum ex his aquis coloratis.*

Ampullam vitream, quæ tres aquæ libras recipiat, hæc aqua coloratâ repletam, in cinere vel arena fornacis ad ignem lentum ut evaporet detine, positis prope fornacem pluribus ampullis, coloratâ illâ aqua repletis, ut incallescant, unde postea quicquid humoris ampullæ majori evaporando decedit, sensim cochlearibus vitreis calidè restituitur, idque ne affusâ frigidâ rumpatur, & omnia pessum eant. Hujus aquæ coloratæ libræ decem, evaporando ad duas cum dimidia, vel tres libras redactæ, tincturæ plurimum continebunt. Mittantur in vasa fictilia vitriata, & per noctem in loco humido & frigido quiescant, & vitriolum invenies æris lapillatum, & crystalli instar acuminatum, quod Smaragdi orientalis speciem referet. Decanteretur omnis aqua, siccetur vitriolum, ut non cohæreat, & quod reliquum est aquæ usque ad consumptionem dimidiæ evaporet, collectoque denuo vitriolo, eadem ratione procedatur, donec aquæ nihil superfit. Hujus vitrioli libra una mittatur in retortam, luto forti optime lutatam, non admodum magnam, sed quæ recipiens habeat amplum & capax, & per quatuor horas continuas ignis adhibeatur maxime moderatus. Etenim si in principio ignem vel tantillum adauges, humidus illi & flatulenti spiritus vitrioli tantâ violentiâ erumpunt, ut recipiens nullum sit, quod sustinere impetum eorundem possit. Hoc ergo maxime observandum est, ut ignis in principio, & per quatuor horas bene temperatus, & junctura optime lutata sint. Postremo ubi sicciores spiritus sub candida specie ascendere incipient, ignem adhibe potenter, continuando,

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

usque dum recipiens inclarescere & plane frigere coeperit. Cesset jam ignis, exactæque 24. horis junctura dissolvantur, & quicquid in recipiente liquoris est, vasis vitreis optime sigillatis asserveretur. Hoc enim verum illud & intensum cæruleum est, quo admiranda plurima peraguntur, quod ex odore illius haud difficulter percipitur, qui rerum naturalium omnium potentissimus & acutissimus est. Plurima hic dicenda restant, sed quæ tanquam aliena ab arte vitraria silentio transmittimus, & data meliore occasione fortassis explicabuntur. Feces in retorta nigri coloris reliquæ, si per dies aliquot aëri exponantur, per se colorem assument cæruleum, sed pallidum, & pulveratæ, atque cum zaffera ut supra permixtæ, si crystallo in debita dosi dentur, aquam efficiunt marinam admirandam, qua de causa modum preparandi hunc pulverem tanta perspicuitate descripsi, hac opinione fretus, minime vulgarem, sed ex reconditoribus naturæ esse, quam indicavi procedendi rationem: atque hæc omnia in gratiam eorum, qui ingenio sunt nobili & curioso.

CHRISTOPHORI MERRET,

Med. D. & Societatis Regiæ membr.

In Libros de Arte Vitraria

NOTÆ.

C. Merretti Nota in Novi Prefationem.

Authorem nostrum, atque hoc opus quod attinet nemo ejusdem meminit, præter Gersonem in suo *de doctrina universali*, & Bornetium *de sufficientia* pag. 141. idque nominatè nec ultra: ac ne curiose quidem inquirendo invenire unquam potui, alterum illud, in *epistola dedicatoria & prefatione* promissum, & res Chymicas concernens opus publici Juris factum esse: nec à quòquam Spagiricorum illud allegatum vidi: ex quo facile est concludere nunquam illud in publicum prodisse. Neque id mirum: nullum enim hic liber ei stimulum addebat, ut alterum illum ederet, ex quo hoc genus doctrinæ homini utilissimum inter sordida, atque infra speculationem virorum hujus ævi numerari cepit, quorum subtile ingenium unice versatur circa contemplationes inutiles vel indeterminate, quæ rationes maximam partem meræ logomachia sunt. Cæterum doctissimus noster Baco, sublimioris & perspicacioris ingenii vir, in incomparabili suo *Novo organo* vanitatem atque impotentiam illius viæ solidè refutavit, & majore sapientia aliam substituit, magis efficacem & activam, promovendis artibus & scientiis. Atque hæc fructuosa doctrinæ via captis pluribus experimentis, nonnullis privatim, non vero publicè ab omnibus trita est. Cæterum in eo est, ut maximos progressus factura videatur, ex quo eandem sibi designavit nobilissima & maxime venerabilis *Regia Greshamensis Collegii societas*, quæ sacræ Regiæ apud populum suum restauratæ Majestatis indulgentiâ, promovendis omnium virtuosorum conatibus, hujus veri finis & propositi ergo singulis septimanis congregatur, & quotidie materiam suppeditat huic pulchro ædificio intervenientem.

Partem hujus propositi alteram præsens hic liber continet, in quo plenè & fideliter expōita est omnis vitrum faciendi & colorandi ratio, quam author noster inde à juventute sua ab ingeniosis & industriis hominibus didicerat, vel ab igne & experientia haustam perceperat: ac in plurimis tempus tibi, locumque operis & inventionis suæ dinumerat, idque cum omnibus circumstantiis huc spectantibus.

Vitrum. Anglica nostra vox *Glass* eadem est cum Germanica, derivaturque à Latino *Glassum*, ex quo demta syllaba finali *Glass* fit. Atque hoc *Glassum*

Cæsari commentar. quanto *vitrum* vocatur, cum ait: *Omnes Britanni se vitro inficiunt*: qua de re *Mela* lib. 3. cap. 6. *Britanni vitro corpora infecti*: & *Varronius*, *Lana vitro infecta*: ita enim eruditus *Turnebus* hunc locum restituit cum antiquitus pro *vitrum* legeretur *ultrum*. Vitrum autem illud *Isatis* est, id quod ex his *Vitruvii* verbis liquet: *defectu Indicis coloris vitro inficiunt, quod Græci Isatin vocant*. Nec aliter *Apulejus tractatu de herbis* nondum edito, sed qui in *Emerici Casauboni* manibus prodijt auctior, magisque emendatus est, ubi sic legitur: *Herbam Isatin alii Aogigneme, Propheta Apefion, Itali alutam, alii herbam vitrum*. Sed scribendum: *Isatin alii angionem, Propheta arosion, Itali rutam, alij herbam vitrum*. *Salmalius* tamen constanter pro *Glastum* ponit *Gnastrum*, quod *Britannis Gnadum* est quibus *caruleus color Glas* vocatur. Idem *Plinius* lib. 22. cap. 1. testatur his verbis: *Simile plantaginis Glastum in Gallia vocatur, quo Britannorum conjuges nurusque toto corpore oblita quibusdam in sacris nudæ incedunt*. Et *Cambdenus* in sua *Britannia*: *Hæc illa herba est, quam Glastum vocamus, & quæ nonnihil carulei coloris reddit, quem Britanni in hodiernum usque diem Glas vocant*. Ratio, cur *Glastum* acquisiverit nomen *Vitri* vel *Glass* forte hæc est, quod vitrum, quemadmodum noster author & experientia docet, naturaliter aliquod carulei in se habet. *Vitrum* descendit à *visum*, haud aliter atque *aratrum* & *rutrum* ab *aratum* & *rutum*, ultimâ syllabâ mutatâ in *Trum*, quod juxta *Isidorum* lib. 16. cap. 15. *visui perspicuitate transluceat*. Etenim quicquid metalla reliqua continent, in obscuro latet; cum contra liquores omnes, & quæcunque vitro continentur, appareant, ac si extra vitrum essent: atque inde est, quod plurima corpora translucida vitrea vocantur, qualia apud *Physicos*, *Horatium*, *Ovidium*, *Boëthium* & *Apulejum* de fonte sunt albumen ovi, mare, flumina, aquæ.

Inter veros pyrotechnia fructus ignis est: id quod verissimum est: totum enim artis, non naturæ opus est, nec sine vehementi igne produci potest. Egregium artificem audiui facere dicentem, artem vitriariam artium omnium toto orbe postremam fore; quandoquidem Deo hoc universum ignis violentiâ contumente, omnia in vitrum abitura essent: id quod suppositâ rationabili mistura salis & arenæ vel lapidum omnino eventurum esset.

Proxime accedit ad omne genus mineralium &c. Authores in referendo vitro ad suam speciem plurimum inter se differre video. *Agricola* lib. 2. de re metallica succum statuit esse concretum. *Vincentio Bellovacensi* lib. 11. lapis est. *Fallopium* illud inter media mineralia numerat. Vitriarius, ubi fluxa vitrum cœpit, metallum illud vocat. Mihi nullum horum esse videtur, id quod generale hoc argumentum satis evincit, quod supradicta omnia naturaliter concretâ sunt, cum vitrum arte compositum, & ab igne productum sit, nec ullibi, ut reliqua omnia, in cavernis terræ inveniatur. Quare, quemadmodum factitia artium nomina à prædicationis Logicis excluduntur, ita vitrum à prædictis speciebus secludendum, nec magis metallum dicendum est, quam cerevisia, byne, gluten, lateres &c. Sed regerit *Fallopium*, quærendo, quale illud vitrum sit, de quo loquamur: idne, quod in propriis suis venis, & propriè lapis est; an vero illud, quod extractum & depuratum est, nec magis artificiale vocari potest, quam metallum extractum ex sua minera & jam purificatum? Si enim id, quod in primo illo lapide est intelligamus, vitrum quod in illo lapide existit, ubi jam educum est, non minus naturale esse, quam metallum quod ex venis suis & proprio lapide educum est. Ad quod respondeo, vitrum nullibi eâ ratione inveniiri, sed arenam & lapides

tantum, quæ vitri materia sunt. At vero alia metallorum ratio est, quorum certam speciem natura in suis venis formavit, ut ut nonnunquam ignis violentiâ educantur ex venis & terra vel lapidibus, in quibus minimæ earundem particule & atomi latent: hæc tamen differentiâ, quod ignis innatâ suâ efficaciâ separando heterogenea, & congregando homogenea tantum producit, aut potius detegit metallum, cum in vitro longe aliter sese res habeat, ut quod uniendo & miscendo diversas salis & arenæ particulas perficitur. Hæc *Fallopium*, quod mirum est, negat, dicens, vitrum ex cinere non fieri: subijciendo vitriarios quidem cineres ab *Alexandria* vel aliis locis allatos addere, sed hoc fieri loco nitri, quod in usu antiquitus fuit, idque hunc in finem, ut vitrum ex lapidibus metallicis tanto melius educatur: nec tamen ideo dicendum esse, cineres metallo admistos esse, ut vitrum fiat, sed ut vitrum tanto facilius è minimis lapidis particulis, id est ex proprio suo metallo extrahatur. Sed absurda hæc opinio facile refutatur: etenim si vitrum ex solo lapide extraheretur, pondus metalli necessario multo minus futurum esset pondere solius lapidis. Jam vero pondus lapidis longe superatur à pondere metalli: etenim libræ centum arenæ supra centum quinquaginta libras metalli reddunt. Præterea sal, ex quo vitrum componitur, magis fixum est, quam ut igne vehementissimo dissolvi possit. Jam in antiquis fenestris, ex vitro Gallico factis, quâ parte æerem respiciunt, manifestè, non discam discere, nec, sedprehendere licet particulas salis, gustu naturam suam liquidò demonstrantes. Porro nitidissimum vitrum, quod sale magis defæcato constat, & majus quam pro ratione arenæ salis pondus habet, si diutius sub terra, aut locis humidis asservetur, in frusta dissolvi inveniæ, solutâ unione salis & arenæ. Atque hæc ratio est, cur vitrum Venetum veneno dissolvi dicatur: id enim verum est de nonnullis mineralibus, non vero vegetabilibus, aut aliis venenis: quo ipso manifestè evincitur sal in vitro permanere. Atque huc facit experimentum *Helmontii*, cap. de terra, ubi hæc habet: *Si vitri pollinem pluri alkali quis colligaverit, ac humido loco exposuerit, reperiet mox totum vitrum resolvi in aquam, cui si affundatur chrysocale, addito quantum saturando alkali sufficerit, inveniæ statim in fundo arenam sedere, eodem pondere, quo prius faciendo vitro aptabatur*. Ex in hoc experimento sal ab alkali & aqua regia assumitur, atque eâ ratione partes componentes, quæ in composito antea confusæ erant, in sua prima principia resolvuntur.

Alterum generale argumentum hoc est, quod utut concreti illi succi, de quibus supra, nec non lapides & vitrum igne fundantur, non omnes tamen lapides, nec omnes succi concreti & metalla vel semimetalla fusionem recipiunt: non talem, nec sal armoniacum multaque alia quæ inter succos concretos numerantur: sed neque adamas, nec achates, oculus felis, jaspis, nec lapides pretiosi complures alii, nec marmore alique plures lapides, quibus interior fornacum facies constat: uti nec *Mercurius* inter metalla, nec auripigmentum inter medi generis mineralia liquefcit: atque ut ut maxima pars eorundem fundatur, sola tamen metalla ductilia sunt, idque tum demum, ubi ad magnum frigoris gradum pervenerunt particule eorundem non cohærent, nec vitri instar tenacia sunt, quod ubi probè incaluit, exiguo spiritu & sufflando per cavitatem in quamcunque figuram mutatur, quod nulli prædictorum corporum accidit. Præterea metalla liquefacta diffiunt, & in plures globulos & frusta abeunt: vitrum autem coit in cumulum, etiam tum ubi fractæ in fornacibus ollæ sunt: & hæc vitri ductilis & tenax natura, nihil aliudmodi qualitas esse videtur, quæ ab omnibus aliis corporibus, essentialiter differt, etiam aliis quibus vitri

nomen obtigit, qualia sunt vitrum antimonii, vitrum Moscoviticum, lateres alique lapides vitrificati, quæ omnia istiusmodi examen non sustinent, & denominationem suam, non tam ab intrinseca sua proprietate & natura, quam ab eo receperunt, quod translucet. (sic *vitriolum à vitro*) Cæterum ut huic comparationi finem imponamus, proprietates vitri hic subijcimus, quibus à corporibus reliquis omnibus facile discerni potest.

1. Concretum est ex sale & arenâ vel lapidibus.
2. Artificiale est.
3. Igne vehementi funditur.
4. Fusum tenax est & coheret.
5. Igne non absumitur.
6. Ultimus ignis effectus est.
7. Fusum ferro adhæret.
8. Ubi benè incaluit, ductile est, & quamcunque figuram assumit: malleabile non est, sed statim in concavitatem formatur.
9. Cum tenuius est, nisi calefiat frangitur.
10. Ubi friget friabile est: unde nostrum proverbium: æque ut vitrum fragile.
11. Sive frigidum sit, sive calidum translucet.
12. Flexibile est, & in fila ductum habet motum rectitudinis.
13. Frigido & humido dissolvitur, præsertim si liquor salis sit, & vitrum derepente calefiat.
14. Solo adamante & smiride sculpiri.
15. Æque ut pretiosi lapides diaphanum est & coloratum.
16. Aqua forti, Regia & Mercurii non dissolvitur.
17. Succo acidi, & res aliæ quævis, colorem, gustum vel qualitatem aliam ab eo non recipiunt.
18. Polituram recipit.
19. Ponderi ejusdem à frequentissimo usu nihil decedit.
20. Fusionem aliorum metallorum promovet, eademque teneriora facit.
21. Quemcunque colorem metallicum internè simul & externe suscipit, ideoque picturis magis aptum est, quam res alia quævis.
22. Omnium quæ in toto orbe sunt maxime flexibile est, & quamcunque formam suscipit, & susceptam servat.
23. Liquefcit, non calcinatur.
24. Vitrum patens si æstatis tempore aquâ repletur, in externo latere guttas aquæ colligit, idque ad eam altitudinem, ad quam aqua ascendit, & anima hominis manifeste humectatur.
25. Globuli vitrei, nucis magnitudinè, si Mercurio adimpleantur, & in ignem conjiciantur, haud secus ac gutta vitri viridis quaquaversum, non sine sonoro & acuto strepitu diffiliunt.
26. Vini, cerevisiæ, vel cujuscunque alterius liquoris saporem non recipit, neque colorem mutat, aut rubiginem contrahit.
27. Lapidum & metallorum instar cementari potest.
28. Vitrum potorium, affusâ aquâ, si digito circa marginem dextrè fricetur, tonum musicum reddit, acutum, vel gravem, pro aquæ majore vel minore copia, ipsumque liquorem subtilire facit.

Antiquitas vitri.

Antiquitatem vitri quod attinet, auctor noster illam deducit ex *Jobi capite* 28. v. 17. ubi sapientia à versu 15. ad 20. cum rebus selectissimis comparatur, & hoc versu 17. dicitur; *Anrum & vitrum non æquabitur ei*. Ita auctor noster secutus vulgarem latinam translationem: ita septuaginta, nec non Hieronymus, Elias in Nomenclatore, Pineda, Biblia Tigurina, *Mangeti Bibl. Pharm.* Tom. II.

& Syriaca: sed Arabica translatio habet *Hyacinthus*. *Crystallus*, ut habet Chaldaica translatio, nec non Xantes, Arias Montanus, Forsterus, & Hebræi, quos sequitur Nicetas, nec non Regia Hispanorum & Anglicæ translatio. *Lapis pretiosior auro*, ut Pagninus ex Rabino Levi Kimhi. *Speculum*, ut Thargum: forte quia tum temporis noviter inventa & in pretio erant specula, ut quæ materia constarent pretiosa: atque ita Munzerus vertit. *Vitrum crystallinum*, ut Complutensis. *Beryllus*, ut Vatablus, *Adamas*, ut Rabbi Abraham, Rabbi Mardocai, Pagninus, Cajetanus, versio Italica, Hispanica, Gallica, Germanica & Belgica. *Pyropus, vel Carbunculus, vel quæ similis, elegans, & pretiosa gemma*, ut Pineda. Sed hæc quidem nomina sunt unius ejusdemque gemmæ, quam nostrum relucere credidit antiquitas, sed quam in rerum natura frustra quærās. Recentiores illius loco substituerunt *Rubinum*.

Ratio differentiae inter Interpretēs hæc est, quod vox primitiva *Zechuchih*. descendit à radice *Zacac* quod est *purificare, emundare, lucere, album & translucentum esse*. Eadem vox *Incenso* applicatur, *Exod.* 30. 24. & à septuaginta interpretibus reddita est *Pellucidum*: ut jam manifesta sit ratio varietatis in transferendo textu: quia enim vox illa in genere significat, quicquid pellucidum est & speciosum, hinc Interpretibus licuit illam applicare istiusmodi rebus, quæ in æstimatione & pretio erant, ita requirente textu; nec non pellucidis, ita requirente vi vocis. Cæterum mihi non *Adamas*, nec *Carbunculus*, neque *Hyacinthus* denotari videntur. Horum enim lapidum mentio fit in pectorali Aaronis, *Exod.* 28. quo tamen capite vocem illam non reperias. Sed nec vitrum, neque crystallus incongruum enim esset, res usque adeo exigui valoris in comparisonem venire, cum illud materiâ constaret verè communis, hoc vero non esse vulgare. Præterea probabile est, vocem hanc auro additam esse amplificandi gratiâ. Adde vitri in Vet. Testamento nullam, in Novo apud Paulum, Jacobum & in Apocalypsi frequentem fieri mentionem. Et quis credat, rem tot modis illustrationi & similitudini aptam silentio præteriri à scriptura, elegantiarum in hoc dicendi genere plenâ, si in usu tum communi fuisset? Quare in ea sum sententia, ut putem vocem illam generaliter sumendam, neque restringendam esse ad hanc vel illam pretiosam & pellucidam rem vel gemmam, sed extendendam esse ad omne illud, quod utramque illam proprietatem habet. Sed nimis multa in alienam esse.

Aristophanes primus eorum esse videtur, qui meminert vocis *yalos*, quam nunc *vitrum* interpretamur. Etenim in *nubibus act. 2. scen. 1.* Schrephiadem introducit illudentem Socrati, & docentem novam methodum solvendi debita antiqua, nimirum inter solem & scriptam dicam interponendo lapidem pulchrum & pellucidum, quem unguentarii vendebant & quo ignis accendebatur. Sol enim deleturus erat literas intentæ dicæ, qui lapis Socrati *yalos* est: ad quæ Scholiastes: *Unguentarii pretiosos lapides aquæ ac medicamenta vendunt*. Et veteribus *xpos* idem est quod *xposyalos*. Homero ignotum fuisse hoc nomen, eidemque simul & antiquitati in usu fuisse vocem *Electri* Scholiastes ibidem testatur, dum perspicue vitrum nostrum his verbis describit: *Nos proprie vitrum illud vocamus, quod ex herba usta igne liquatur ad præparanda certi generis vasa*. Apud Helychium vox *hyalos* eo sensu non extat, sed *hyale, hyalois, pellucidus, diaphanus*. Etymologista eadem in hoc sensu utitur, atque vocis etymon deducit ab *veiv*, quod est plueret, idque ob similitudinem, quam quoad consistentiam & pelluciditatem cum glacie habet, quæ congelata pluvia vel aqua est: atque hoc sensu nonnulli à *glacie glass* deducunt.

Aristoteles duo de vitro problemata habet; primo: *Cur per vitrum videamus?* Secundo: *Cur flecti vitrum nequeat?* Hæc problemata, si Aristotelis sint, de quo eruditi dubitant, inter vetustissima antiquitatis de vitro monumenta sunt: nullibi enim apud antiquos Græcorum Poëtas vel Oratores vitri, ut ut cum proposito eorum, ut supra dictum est, convenientissimi, mentionem factam invenies. Et nota ambiguitatem vocis *hyalos*: *crystallus* enim, ut supra *Scholias* & *Hugo Grotius*, eo nomine veniebat, permutatis ob similitudinem rei nominibus: & *Goræus* ait, ceteram succini flav, & vitri instar pellucidam speciem, à nonnullis *hyalum* dictam esse. Primus ergo Græcorum, qui citra omne dubium vitri mentionem fecit *Alexand. Aphrodisæus* fuit, qui hunc in modum: *Vigor coloris si per vitrum conspiciatur. Et magis clare: lib. 1. Vitra, si tempore hyemis de repente calefiant, franguntur.* Et rursus: *Corpus vitri frangere. Lucianus* prolixè admodum meminit vitreorum poculorum. Et *Plutarchus* in *Sympotiacis*, ignem tamaricis vitro formando aptissimum esse ait.

Egyptios hujus artis peritos fuisse ex *Flav. Vopisco* liquet, citante *Ma. cell. Donato*, his verbis: *Alexandria, civitas opulenta, & frugum plena, in qua nemo otiosus vivit: nonnulli vitrum constant; alii papyrum consciunt.* *Kircherus* tamen, in *Oedipo* suo, ubi de *Egyptiorum* artibus agit, mentionem ejus rei nullam facit.

Lucretius, inter Latinos Poëtas primus vitri mentionem facit, cujus versus addam, quia de vitri pelluciditate agunt. *nisi recta foramina tranant,*

Qualia sunt vitri. lib. 4. 602 603. Et rursus:

Atque aliud per ligna, aliud transire per aurum,

Argentoque foras, aliud vitroque meare l. 6. v. 98. 990. & posteriores Poëta omnes.

America ignota erat hæc ars, nec non universa *Asia*, exceptâ *Sidone* & *Chinâ*, quibus sero admodum innotuit ars faciendi vitrum, ex oryza plane perspicuum, sed prorsus fragile, ideoque nullo modo comparandum cum nostro: prope tamen ad illud accedit. *Atlas Sinicus. pag. 6.*

Cæterum ut hanc controversiam decidamus, manifestum est, vitrum antiquitati non ignotum, nec minus antiquam vitri quam figlinæ & artis formandi lateres cognitionem esse: vix enim est, ut fornacem laterariam exuras, aut figularem percoquas, quin lateres nonnulli, & aliqua illius mercimonii pars in vitrum abeat, Quare vitrum sine omni dubio tunc temporis, cum turris *Babylonica* exstrueretur, & ex quo ars illa formandi lateres innotuit, simul notum fuit. Etenim dum filii *Israël* captivi detinebantur, magna pars servitutis erat formare lateres. Et hujus naturæ fossile illud vitrum fuerit necesse est, de quo *Ferr. Imperatus l. 25. c. 7.* hunc in modum: *Vitrum artificiali simile inventum est, iis in locis, ubi magni ignes excitati fuerant, quod percussum ignem non reddebat. Inventasunt alia vitri segmenta, formâ orbiculari, & pyriti similia, quæ confracta splendebant, colophonia speciem referentia: atque hæc percussa ignem reddebant, haud aliter atq; pyrites, à quo tamen differunt, tam ratione vegetationis quam pyriti peculiaris est, quam respectu splendoris, & quia, quod vitro proprium est, facillimè liquantur. Horum segmentorum alia fragilia, alia solida erant. Fragilia vel friabilia in ignem missa intumescendo albi pumicis speciem & postea fulgorem vitri artificialis assumebant. Sed quæ continua & solida erant, post exiguum in igne mutationem à nigredine in vitrum album artificiale transiebant. Hoc fossile vitrum ab Americanis factum est, quo ferri loco scindunt, & foramina cavant: Hæc tamen ille. Et forte ex hoc vitri genere, tegmentum illud fuit, quod ad *S. Albani*, ubi verus *Rom. statio* fuit, à Romana latere abrumpebam, ejusdemque cum hodierno nostrate coloris & substantiæ est.*

Nec vero dubium ullum est quin hoc vitri generis frequentius in illorum quam nostris lateribus inventum fuerit; terram enim suam per biennium cogendo temperabant, quo ipso opus reddebatur magis firmum solidumque; præterquam quod lateres suos magis exurebant. Atque hæc vitrificatio terræ lateribus accidit, non à prima tantum eorundem coctura, sed uti *Imperatus* observavit, à quovis magno igne, istiusmodi scilicet, qualis in calcaria & figulari fornace adhibetur, & cujus usus in *Asia* *Africa*que antiquissimus est, ubi lapides ut plurimum vitrificant. Nunquam tamen vel vidi, vel audiui, in domo lateritia, ab igne domestico vitrificasse lateres. Mihi enim ita videtur à solo igne, quo strues crudorum & exsiccatorum laterum excoquitur, hunc effectum produci, nisi per viam reverberationis id fiat, in fornacibus, ubi vehemens, cæcus, & continuus ignis alitur.

Hoc vitrum diu sub terra durabat, ut ut *Helmontius* affirmet, vitrum exiguo aliquot annorum spacio sub terra dissolvi, putrescere & in aquam abire, id quod de *crystallo* nostrate verum, nec tamen omni generaliter Vitro commune est.

Methodum ab autore nostro adductam, & à mercatoribus inventam quod attinet, illa mihi fide non admodum digna videtur, quando non assidua exustio herbæ kali apud Hispanos & *Egyptios*, nec alterius materiæ apud nos, in copia quam à mercatoribus majore, atque adeo consequenter calore magis intenso & durabili facta, ullo unquam tempore producere vitrum potuit, ac ne ingens quidem & cæcus calcariæ ignis producere illud possit. Forte metallorum excoctores, quam artem *Tubalca* in primis invenit, vel veteres *Chymici*, dum metalla fervidis fornacibus & igne diutius urgent observare vitrum ea ratione non potuerunt?

Horum *Chymicorum* antiquissimi *Egyptiorum* Principes fuisse videntur, qui inde ab *Hermete Trismegisto* omnes hanc artem profitebantur, universalem medicinam molientes, non vero suppositam illam transmutationem metallorum, ut *Kircherus* in *Oedipo* suo affirmat. Atqui irritus fuisset ille conatus, citra magnum ignem & fornaces, quos æque ac materialia eorundem quandoque in vitrum abire necesse erat: ut jam ex his quæ dicta sunt evidenter appareat, ipsam vitri cognitionem antiquissimam, sed artem elaborandi vitrum inter recentiorum inventa esse, primumque hoc artificio & fornace vitraria nobilem locum *Sidonem* fuisse testante *Plinio* lib. 36. cap. 26. quemadmodum primus inter Romanos *Tiberius* fuit, cujus ætate, secundum ea quæ legimus, vitrum constitutum sit, ut ex historia viri illius apparet, quem ob id casum *Plinius* refert, quod vitrum malleabile fecerat, de quo postea.

De usu vitri

In domesticis negotiis vasa ex vitro sunt infiniti generis, coloris, & magnitudinis: calices plati, effigati, vel per totum, vel pro parte colorati pro vino *Rhenano*, *Hispanico*, clareto, cerevisia: lagenæ aliæque vasa, excipiendo vino, cerevisia, spiritu, oleo, pulvere; in quibus videre licet liquorum perspicuitatem, bonitatem, nec non fermentationem, separationem, omnemque aliam mutationem, quam natura in iisdem cum tempore operatur. Præterea paretellæ excipiendis servandisque cibis calidis: vitra quibus horas & tempora dimetimur, quibus lineas vestes complanamus: ornamenta item pro mulieribus & pluteis: nec non fenestræ ad arcendum frigus & humorem, admittendumque lumen in aedes nostras, quod per coloratum vitrum transiens, opposita soli

corpora proprio vitri colore tingit : & tandem vitra specularia , deliciae atque opus Narcissi & sequacium.

In Phycis perspicilla convexa pro senibus, concava pro myopibus, qui contraria quam senes ratione nisi prope oculos posita non vident : præter cucurbitulas & vitra, quibus urinam excipimus, quibus ubera mulierum sugimus, & quibus cœlatores atque gemmarii, dum res minimas accuratas perficiunt, oculos præservant ; præter oculos etiam illos artificiales, quibus delectationis vel ornamenti causa objecta minui-mus, dilatamus, prolongamus, multiplicamus, figuras eorundem & situm diversimode muramus, & varia eorum collocatione in vulgo spectatorum metum excitamus atque consternationem, prout videre est in opticis, catoptricis, catoptrocausticis, catoptrographis, dioptricis & telescopicis, quorum partem maxime raram & admirabilem Scottus ex Kirchero, Porta aliisque collegit. In Astronomicis quam rara & admiranda detecta sunt beneficio telescopiorum, quæ Galilæus de Galilæis, vel Scheinerus (de eo enim inter se contendunt) invenit, & quæ Paulus Nealius Anglicanæ gentis decus, nec non doctissimus Hugenius, incomparabilis Hevelius & Eustachius Divini Romæ vehementer promoverunt ; quorum usus doctrinam astrorum vere illustravit, detectis indies novis stellis, novisque orbibus, antiquitati plane incognitis : præter usum quem terræ marique nautis, militibus, aliisque personis exhibent, in discernendis, distinguendisque rebus procul distantibus. His ad de insignem illam spheram vitream, de qua Claudianus ingeniosum hoc epigramma scripsit :

*Jupiter in parvo cum cerneret æthera vitro,
Risit & ad superos talia dicta dedit :
Hucine mortalis progressa potentia cura ?
Jam meus in fragili luditur orbe labor.
Jura poli, rerumque fides, legemque virorum,
Ecce Syracusius transtulit arte senex.
Inclusus variis famulatur Spiritus astris,
Et vivum certis motibus urget opus.
Percurrit proprium mentitus signifer annum.
Et simulata novo Cynthia mense redit.
Jamque suum volvens audax industria mundum,
Gaudet, & humana sidera mente regit.
Quid falso insontem tonitru Salmonæa miror.
Æmula natura parva reperta manus.*

Rationem cur hanc spheram vitream fuisse statuas, Cardanus in suo de subtilitate libro prolixè tradit.

In Philosophia doctrina reflectionum & refractionum ad detegendos effectus & affectiones aëris & aquæ, aliorumque liquorum, & varios eorundem motus in tubis & syphonibus. Experimenta vacui mediante Mercurio ; nec non infinita experimenta rarefactionis & condensationis in thermoscopiis, hydraulicis, & pneumaticis, in Florentino, Romano & Magdeburgico experimento, quod Da. Roberto Boyle occasione dedit rari illius inventi, quo mediante tot insignes conclusiones demonstravit, atque tot singularia experimenta invenit, quibus illustris factus est, apud omnes suæ gentis, nec non apud exterorum Legatos, & doctorum in vicinia quemque.

Nec omittenda sunt vitra ustoria, vel illa, per quæ lux in locum obscurum admittitur, quibus Plempius & Scheinerus veram visionis naturam demonstrarunt, haud secus atque Renatus Cartesius vitris aliis generationem Iridis.

Nec oblivioni danda sunt rosaria, monilia, inauria, aliaque ornamenta, quæ magnum nobis auri ex Guinea cumulum procurarunt, dum illius loci

incolæ nasum, aures, labia & crura istiusmodi rebus vitreis exornant.

Ita vitrum ædibus templisque nostris ornamenta suppeditat, in quibus res naturales simul & artificiales coloribus gloriosissimis & orientalibus ad vivum depictæ sunt.

Concludemus triangulari illo vitro, quod Paradisus stultorum vocatur, & dignum est, cognitione sapientum, quodque colorem rubrum, caruleum & viridem usque adeo vivè repræsentat, ut nulli colores cum iis conferri possint. Referam ex Trigaultio, quanti illud fecerit sagacissima gens Sinenfium. In urbe Sinenfi Tanian graviter & periculose decumbebat Jesuita Riccius. Ceterum amicus ejusdem Chiutaiso illis erga egrotantem defungebatur officiis, ut mensis unius quo ibidem morabatur spacio, ita vires suas recolligeret, ut melius quam unquam antea valere sese arbitraretur.

Riccus hanc amici sui urbanitatem inter alia remunerabatur istiusmodi triangulari vitro, quo ille plurimum delectabatur, & ut vitro dignitatem adderet, religatis auræ catenâ extremitatibus, thecæ illud includebat argenteæ, adjecto eleganti encomio, quo probare conabatur, hanc gemmam fragmentum esse illius materie, ex qua cœlum constat. Hæc ornamenta alliciebant plurimos, nec ut fertur defuit, qui vitrum illud paulo post quingentis coronatis licitaretur, abnuente pretium Chiutaiso, ob hanc maxime causam, quod sciret Regi isthoc vitrum muneris loco deberi, metueretque, ne emtor illud ad eundem, præveniendū Ricciū, mitteret. Sed cum rescivisset, oblatum jam tum istiusmodi munus Regi, aucto nonnihil pretio illud vendidit, exsolutisque eâ ratione pluribus debitis societatem sibi obligavit.

Malleabilitatem vitri quod attinet, cui Chymistæ possibilitatem sui Elixiris superstruunt, illa pro fundamento, sed debili habet locum Plinii lib. 36. cap. 26. ubi. *Ferunt, inquit, Tiberio principe excogitatum vitri tempore amentum, ut flexibile esset, & totam officinam artificis ejus abolitam, ne æris, argenti, auri metallis pretia detraherentur, eaq; fama crebrior diu quam certior fuit. Plinius vixit tempore Imperatoris Vespasiani, qui tertius à Tiberio fuit, ut diutius tenuisse hæc fama videatur. Idque plures post Plinium referunt, sed ita, ut nonnihil ab eo differant. Dion Cassius l. 67. inquit: Eo tempore, cum ingens porticus inclinaret in latas, architectus quidam (cujus nomen ignoratur, quia Caesar invidiâ motus id prohibuerat in libros referri) mirâ illam ratione erexit, firmatis utriusque fundamentis, ut immobilis staret. Tiberius solutâ mercede urbe illum eiecit. At ille rediens, cum specie supplicantis Principem adisset, poculum vitreum consilio prolabi passus est. & confractum manibus suis restituit, veniam per hoc sese obtenturum sperans : sed mori ob id jussus est. Isidorus affirmat, Imperatorem indignantem illud illis pavimento, quod artifex quassatum, & æris instar complicatum, producto è sinu malleo reconcinnaverit, eoque facto quævisse Imperatorem, an quis alius hujus artis gnarus esset, & cum id mediante juramento negasset artifex, jussu Imperatoris eidem præcisum esse caput, ne divulgata hac arte aurum pro luto haberetur, & pretia metallorum detraherentur. Et certe, nisi rupturæ obnoxia essent vasa vitrea, auro argentoque meliora essent. Gravem horum trium auctoritatem sequitur Pancirollus, aliique, ex auditu tantum id referentes ; At Mathesius, Goclenius, Valensis, Libavius, & universa Chymicorum cohors, magnâ confidentiâ illud asserit, virtute Elixiris id factum esse contendens. Sed statuunt illi fidenter quicquid volent : Plinius referendo hanc historiam, addit, *Ferunt, & Fama, ac tertio cre-**

brior quam certior est. Quod ter repetitæ dictionis genus satis arguit, exiguam illam, quam huic historiæ tribuit fidem. Sufficisset in narranda re non admodum probabili, addidisse, ad asserendam auctoritatem suam, vulgatum illud, *Ferunt*, sed addit de suo, *Fama crebrior* &c. quo ipso, si externam speciem sequaris, aliquid fidei huic historiæ ab aliquibus; si vim verborum, nihil à sapientioribus tributum esse evidenter probatur. Quid enim verba illa *Ferunt*, sed *incerta fama* &c. inferre aliud possunt, quam diffidentiam narrantis? Et fama tantum erat: nemo Physicorum, Poëtarum, vel Historicorum illud refert: nemo personæ, nemo, quod mirum est pœnæ meminit insolitæ, cum tamen libri eorum scateant observationibus raro contingentium. Et an cuiquam probabile videri poterit, Imperatorem non incubuisse huic arti, eandemque inter peiora tabularii non transmisisse ad successores, ceu rem notatu dignam, cujus in rerum natura exemplum non existeret, nec fortè existitum esset unquam, artifice cæso? Et totum hoc, quanquam rarissimum inventum, & infuetum pœnæ genus, intra paucos annos sub unius vocis *Ferunt* præconio evanuerit. Vox ergo populi fuit, & quidem Romani; imo vero crudelitatis Neronianæ, quæ tueri hanc fabulam haud difficulter potuit.

Sed quam ob causam Plinius hoc retulit? Non ob aliam certe, quam ut obsequeretur genio suo, qui huc scribatur, (nepote ejusdem in epistolis, & hoc præsentis opere testibus) ut literis consignaret, quicquid in arte vel natura rarum erat: Forte etiam narrando rem suo judicio non impossibilem, & quæ effectum aliquando sortitura esset, id egit, ut suæ nationi ascriberet laudem inventionis alienæ. Præterea non aliud hoc temperamentum fuit, quam ut vitrum redderetur flexibile. Et quis credat posteritati defuisse attentionem, in re vulgatissimi usus, & ad quam præter duo materialia nihil requiritur? Et quid sibi vult fama, cum de diminutione pretii auri & argenti loquitur? Fateor me nihil hic videre, quod vel Imperatorem non deceat, vel auri Argentique obstitutum sit pretio, sed commoda longe plura, & in verbis Cæsaris vim consequentiæ nullam. Ac tantum de Plinii testimonio. Sed quid est, quod illi, qui hæc à Plinio sumserunt, addere huic negotio, præter auctoritatem primi referentis possint? Profecto nihil: specialiter, ex quo ea in textum Plinii commentari fuit, quæ verba ejusdem non ferunt, omnia suis additionibus transformando in formalem relationem. Plinius ait: *flexibile esset*: Dionis commentum est: *artificem restituisse vitrum confractum*: qui primus ad malleabilitatem gradus est. Sed complementum Isidorus addit, dicens, *malleo id refectum esse*. Hinc videre licet, per quod gradus ad nos pervenerit hæc opinio, & quam mirâ variatione & interpretatione id actum sit, ut posteritati verisimilis videretur; Id quod Plinius ex vulgari traditione refert, addêdo censuram incertitudinis, Chymici, ut suam de omnipotente Philosophico lapide sententiam tueantur, omittunt, & flexibilitatem Plinii in malleabilitatem convertunt, ac si nulla inter flexibilitatem & malleabilitatem differentia esset; cum tamen omnia corpora aliquâ ratione flexibilia, sed nulla malleabilia sunt, præter metalla. Segmentum vitri vulgaris Muscovitici, & infinita alia plurimum flectuntur, quæ tamen malleum non ferunt, & in tenues laminas, ut malleabilia, non dilatantur. Quin vitrum ipsum, ut apparet, aliquo gradu naturaliter flexibile est: Vitra enim crystallina, oppido tenuia, si debite incallescunt, parum sed visibiliter flectuntur; & tubos habui duodecim vel amplius pedum experimento Mercuriali dicatos, qui Mercurio repleti insigniter flectebantur: ut jam in ea sim sententia, si quidquam omnino veri his Plinii narratis inest, id huc redire, ut cum vitrum ætate Plinii maxime fragile, &

cujuscunque vel minimæ injuriæ incapax esset, ceu facile nitro constans, ignorâ adhuc arte calefaciendi, de qua nihil Plinius, prodierit hic artifex, qui mediante Kali, & via calefactionis, vitrum invenerit alio priore firmitus & quod ferre aliqua ratione casum & vim majorem posset, id quod fama, occasionem dedit (de quâ Virgilius: *parva motu primo, mox sese attollit in auras*) ut additis, ut fit, nonnullis circumstantiis, formaret illam historiam, quam Plinius refert.

Possibilitatem autem faciendi vitrum malleabile quod attinet, nihil rationis, præter hanc Chymicorum relationem invenio, qui ratiocinando per circulum ab Elixire ad vitrum, & à vitro ad Elixir argumentantur. Et multo certe alterum altero factu facilius esset. Etenim ut Elixir producat, necessum est, ut *ex ente non tali fiat ens tale*, non repugnante, nec inhabili existente *materia ex qua*. Sed in vitro aliter sese res habet: etenim res omnium naturâ suâ maxime fragilis vitrum est, & ut malleabile fiat, necessum est introducere qualitatem naturæ suæ contrariam. Præterea nullum malleabile diaphanum est: & quis vitrum vocaret, quod diaphanum non est? Eodem sane jure quis aurum vocaret, id quod ponderosum & malleabile non est, quo vitrum, id quod malleabile, sed diaphanum, non est. Adde naturam malleabilitatis consistere in ætæa & perpetua cohesionem partium, nec non capacitatem recipiendi quamcumque figuram, quoad minutas partes, id quod cum naturâ vitri non convenit. Materialia enim vitri, sal scilicet & arena, istiusmodi figuram habent, quæ cohesionis illius incapax videtur. Sal præ aliis omnibus determinatam suam figuram habet, quam etiam cum maxime solvitur, & igne urgetur, servat, nisi totalis ejusdem destructio accedat, id quod pluribus argumentis evincere licet. Et hæc figura pro ratione cujusque salis varia est. Sal, nitrum, & quodvis acolitatum sal acuminatum est, & quia acuminatum & causticum est, ex infinitis acutissimis acubus constare videtur. Arenæ autem figura varia, imo, ut in microscopiis videre licet, infinita est. Jam quis sibi persuadeat, hanc tantam figuræ in arena varietatem ita quadrare ad determinatam figuram salis, ut cohereant in minimis id quod ad efficiendam malleabilitatem necesse est? cum econtra, ut vitrum fiat, satis sit, ut partes in hoc vel illo puncto sese mutuo tangerent, ex quo contractu istiusmodi unio oritur, quæ formam vitri absolvit, & malleabilitatis omnis incapax est. Atque ab hac unione in vitro pori sunt, quibus mediantibus, ut ex Lucratio didicimus, diaphanum est: Præterea, quod jam dictum est supra, utrumque in composito id est & manet, quod erat antea. Concludam hoc argumentum, dicendo, me in ea sententia esse, ut putem, à solo Elixire sperandum esse hunc effectum, & eodem utrumque tempore proditurum in lucem.

De Fornacibus.

Antea quam artem ipsam aggrediamur, necessum est, subministrare formas fornacum, earumque, præcipua instrumenta, nec non modum elaborandi metalla, ubi jam excocta sunt, id quod ab autore nostro prætermisum, nec tamen eo minus scitu necessarium est. Ac tres quidem fornacum species sunt, ita distinguente Agricola de re metallica. Prior *Calcariâ* vocatur, & ad modum furni fabricata est, longitudine decem, latitudine ubi quam maxime patet, septem, & profunditate duorum pedum. In uno ejusdem latere fossam habet sex circiter pollicum, quadratam, cujus superior facies cum superficie fornacis in eodem plano jacet, & ab eadem prope orificium lateribus,

novem circiter pollicum latitudine, fecernitur. In hanc fossam carbones suos conjiciunt, quorum flamma omnem quaquaversum fornacem pertransit & à fornice in frittam reflectitur, cujus superficiem fumus ater supervolitans; per orificium calcarie egreditur. Et vitrarius quidem frittam antea non commovet, quam fumus omnis abierit. Carbones, ut in aliis fornacibus, super ferreis cratibus recumbunt, unde cineres in cinerarium, quod in eodem cum pavimento vel area plano jacet prolabantur. Vitrarius, quem in officinis vitri vulgaris *Fusorem* vocant, ille est, qui debitum sali, cineribus & arenæ pondus assignat, atque vehementi igne illud efficit, ut in massam coeant, & albedinem acquirant: quod si metallum iusto durius, atque adeo fragile sit, sal vel cineres, si tenerius vel mollius, arenam addit, miscendo, usque dum illud temperamentum assequatur, quod non aliter quam operando dignoscitur. Ubi fritta jam præparata est, è calcaria illam eximit, & refrigeratam ad usum seponit. Apud nos frittam aquâ non perfundit, nec lixivio, ut author noster vult, madesfacit, sed exactis aliquot diebus operi se accingit, ut ex fritta metallum fiat, idque ubi jam liquatum est, rastro scarrit, commovet, miscetque, & ubi rastrum incaluit, in situlam aquâ plenam illud immergit, ne vitrum ei adhæreat. Tudicula sal Alkali eximit, vel metallum ex olla in ollam transfert, atque cum suo *Porteglo* vitrum despumat, & exemptâ cum suo *Spiei* (ferro, quod in extremitate uncum habet, atque acuminatum est) aliquâ metalli particulâ, dispicit, an color respondeat, & metallum operi aptum sit. Nonnulli ollas in hac fornace suas calefaciunt, ut Agricola.

Secunda vel operaria fornax illa est, in quam ollæ reponuntur, & quæ focum adjunctum habet atque cinerarium. Hæc fornax rotunda, trium in diametro ulnarum latitudine, & duarum profunditate, nec non circa fastigium fornicata est, ad cujus internum latus octo vel plures ollæ, & inter has operariæ collocatæ sunt. Numerus ollarum pro ratione *Boccarum* vel orificiorum ad opus designatorum semper duplex est, scilicet ut operarius quilibet ollam unam habeat, metallo repurgato & operi apto plenam, itemque alteram, purgando metallo, dum in opere est, dicatam. In duas hæc fornax diversa est partes, quarum inferior ollas à foco dividit, & in centro suæ superficiem foramen habet rotundum, ferreis cratibus munitum, quatuordecim in diametro vel plurium digitorum, per quod flamma transiens à fornicatis lateribus & fastigio in ollas reflectitur. Altera & superior pars fornacem à *Leera* dividit.

Foramina istiusmodi fornacis hæc sunt: 1. *Bocca*, os vel orificium ergasterii, per quod metallum ex ollis majoribus eximitur, & ollæ in fornacem mittuntur. Hoc orificium operculo obturatum est, quod ex luto & lateribus constat, & removeri, ubi ita visum est, potest, atque huic usui inservit, ut oculi operariorum præservari ab æstu foci possint. In medio hujus operculi palmo majus foramen est, calefaciendis, ubi id opus requirit, utensilibus. Ad hanc *Boccam* pertinent *Halfinella*, quæ nihil aliud sunt, quam *unci* quidam in latere fornacis firmati, in quibus utensilia, dum calefiunt vertuntur & quiescunt. 2. *Boccarella* vel orificia minora, ad utrumque *Bocce* latus unum, eidemque ut plurimum horizontale, quo mediante ministri metallum tinctum vel magis repurgatum ex ollis, quas *Pilin-pots* vocant, eximunt. 3. *Fornaces* vel *foramina* proxime *Leeram* duos, quæ in eodem cum *Bocca* plano jacent, in quibus tartarum, ferrum &c. calcinatur. Atque huc *focis* pertinet, qui *Tizonajos* vel *præfurnia* duo, & in unoquoque fornacis latere unum habet, per quæ minister nocte dieque carbones injicit, ut hunc Vestalem ignem conservet: & hæc quidem præfurnia lateritia sunt.

Hæ fornaces alibi aliter sunt, majorisque muniti causa quinque vel plures quandoque arcus habent; tres tamen ad instruendam crystalli officinam necessario requiruntur. Varias earundem formas apud Agricola de re metall. lib. 12. Libavium Comment. Alchem. part. 1. c. 20. Ferrant, Imperatum 1. 12. c. 14 15. & Portam 1. 6. c. 3. vide.

Fornaces vitri viridis quadratæ sunt, (cum priores sint rotundæ, sed quarum unum arcum *Leera* occupat) & in unoquoque angulo arcum habent, in quo vasa calefiunt.

Leera (quæ apud Agricola tertiam fornacis loco est, in qua vasa calefiunt & refrigerentur, quæque eandem cum secunda formam obtinet, in qua metallum funditur, & in fluxu conservatur) duas partes comprehendit, quas Angli vulgo *the tower & Leer* vocant. *The tower*, vel turris illa pars est, quæ directè supra fornacem fusoriam posita, septo transverso, pedis unius crassitie, ab eadem secernitur, in cujus septi medio, & in eadem cum foramento inferiore perpendiculari foramen est rotundum (Imperatus & Agricola quadratum illud & angustum faciunt) per quod flamma calorque in fornacem transit. Hoc foramen *Occhio* vel *Lumella* vocatur, & annulo cingitur ferreo, quem vulgo *Cavale* vel *Coronam* vocant; atque in hujus terris area vel pavimento vasa, ubi jam formata sunt, à vitrario ut calefiant seponuntur. *Bocce* vel orificia ex adverso duo habet, per quæ vitra, statim ac parata sunt, à ministris furca in pavementum turris, & paulo post in patellas, quas Agricola argillaceas facit, & apud nos ferreæ sunt, & vulgo *fraches* vocantur, ac tandem ab homine huic operi dicato, quem *Saroleman* vocant, gradatim & successivè per universam *Leeram*, quinque vel sex cubitos longam, deferuntur, ut sensim refrigerant, id quod in fine demum *Leera* fit. Orificium *Leera* in locum quandam definit, in quo vitra, ubi refixerunt, deponuntur. Hic locus *Sarofel*, & ab eodem *Saroleman* is vocatur, qui patellas ferreas, *fraches* vulgo dictas, per *Leeram* deducendo refert.

In fornacibus vitri communis duo sibi invicem opposita latera elaborando metallo inserviunt: reliqua duo calcarias adjunctas habent, in quas ignis à fornacibus ascendens per foramina admittitur, coquendæ simul præparandæque frittæ, & evitandi fumi gratiâ. Et ignem quidem intra arcus fornacis suscitant, calefaciendis vasis, totumque opus suum in hac una fornace absolvunt.

Interior harum fornacum facies, non lateribus (statim enim, ut lapides molliores reliqui, in vitrum abierunt) sed lapide constat arenaceo duriore, quod genus lapidis Imperatus *Pyromachium* vocat, & *Novo Castello* affertur, albicans, & percussu mutuo ignem reddens. Et hic tamen prædurus lapis trimestri ut plurimum spatio absumitur, aut certè sulcos dudit. Exterior vero fornacum facies lateritia est. Calor istiusmodi fornacum longe omnium intensissimus, observatumque à me est, conjectas in hanc fornacem tertio post ignis restinctionem die stipulas statim ignem concepisse: retulitque mihi operarius, ignem hujus fornacis altero tanto quam in reliquis fornacibus vehementiorem esse.

Proximum est, ut de *ollis fusoriis* agamus, quæ argilla constant, *Purbecko* Vectis insulæ loco allatâ, ex qua pro peto fistulas concinnant. Hæc argilla optimè lota in fornacibus ad hoc opus destinatis calcinatur, & molâ in pulverem tenuem redigitur, qui pulvis aquâ mistus nudis pedibus calcando in debitam consistentiam cogitur, manibus in certam formam deducitur, formatus convenienti loco siccatur, & postea in vel super fornace incallescit. Sed quæ vitro communi inserviunt ollæ ex argilla *Non-sucho*

fucho allata fiunt, sed cui admista sit ex *Worcestria Comitatu* alia, ut quæ ignem quam simplex *Nonfuchana* melius fert. Hæ ollæ metallo adimplentur, & eodem cum *Bocca*, vel orificio plano consistunt.

In crystalli fornacibus duo ollarum genera in usu sunt: unum majus, trecentas: vel quadringentas metalli libras continens, crassitie pollicis, & in fundo pedes prope duos latum, totidemque profundum, sed quod circa apicem in latitudine pollices viginti obtinet. Alterum minus, quod vulgo *Piling-pots* vocant, quia ollis majoribus incumbit, quæ metallum excoctum & tinctum continent.

Postremo operis erit videre modum elaborandi vitrum, quem additis nonnullis ab Agricola lib. 12. de re metall. mutuabimur. Minister, ubi metallum satis excoctum est, ferrum cavum in ollam demittens, idque nonnihil versans, quantum operi, quod intendit, sat est, recipit: metallum ferro glutinosi atque tenacis succi instar, & haud aliter, quanquam firmitus, ac terebinthina vel theriaca, ubi à mercatore ex olla depromitur, adhæret. Figura quam ferro adhærens obtinet, orbicularis est, & minister illud, dum fervet, hinc inde super marmore versat, ut partes tanto firmitus adunentur: quo facto ferrum cavum leniter inflat, & metallum ab anima haud aliter atque vesica intumescit. Quoties ferrum inflat, id quod sapissime fieri necesse est, toties remotum derepente ab ore ferrum maxillæ admoveat; ne flammam spiritu reducto attrahat: mox fistulam sublatam circum caput aliquamdiu rotans, vitrum prolongat, refrigerat, & si opus sit modulis & marmoris fundum ejusdem imprimit, eoque peracto vitrario illud offert, qui leni vi colum ejusdem, vel partem illam, qua ferro adhæret, abrumpons, eandemque vitro communi addicens, cum suo ponteglo vitrum figendo glabrum reddit, & cum passago suo globum format, atque cum procello capacitatem ejus concavitatemque adaugens, & cuncta complanans, forfice quicquid redundat amputat, atque ea ratione inflando, premendo, subinde calefaciendo, amplificando, refecando illam, quam mente concepit, figuram format, & si usu requirat, pedes affigit, & cum suo *Spies* marmor & undis repræsentat: quibus peractis minister opus ferreâ furcâ prehensum derepente in turrim, ut calefiat, & per gradus ascendens in loco conveniente collocat, ne temere vagando offendens, hoc mercimonii genus fragile & tenerum, ac nisi calefiat per se ruiturum, corrumpat. Quot vitrarii, tot ollæ, totidemque foramina vel *Bocce* adsint, necesse est: quisque enim propriam suam stationem habet, ubi fervidum illum calorem excipit, qui rectâ in faciem, os & pulmones eorum delatus, in causa est, cur veluti *Cyclopes* & *nudi membra Pyragmones* subuculâ vestiti opus suum peragere necesse habeant, caput, ad arcendum nimium calorem & lumen, late fimbriato stramineo pileo tegentes. In largis & latis ligneis sellis resident, quæ longos cubitos habent, à quibus instrumenta artis dependent, ea ratione firmata, ut moveri non possint. Sex horis operantes, unico vitro tempus dimetiuntur, exactoque illo spatio alii succedunt, qui ubi dimensum suum absolverunt, locum denovo dant prioribus; ita fit, ut nunquam dum in statu est vacua sit fornax, nisi vel vitium ollæ fecerint, vel metallum fluere desinat. Libavius observat, illos maximam partem esse pallidos, siticulosos & brevis ævi, idque ob colliquationem, & vitia capitis & pectoris; & quia corpus habent infirmum & debile, facillime vino inebriari & cerevisiâ, qui verus eorundem character est.

C. Merretti Nota In Neri Librum Primum de Arte Vitraria.

CAP. I. Absolutis illis, quæ necessario præmittenda erant, ad textum ipsi accedimus.

Pulvisculus vel *Rochetta* unum idemque denotant, nec quicquam aliud sunt, quam cineres unius ejusdemque plantæ, sed bonitate differentes, quemadmodum apud autorem nostrum diversis in locis apparet. Posterius nomen nostris officinis plane ignotum est, ac ne Morani quidem distinctionem ullam recipit *Pulvisculus* nomen usu receptum, omnique cineri commune est, qui ex Oriente in usus vitrariorum advehitur. Ratio diversitatis mihi hæc esse videtur, quod pulvisculi nomine id venit, quod in forma pulveris advehitur; & contra nomine *Rochetta*, quicquid frustulentum, vel lapidis instar durum est. Et certè inter operarios experimento constat, ex frustis maximè duris & majoribus sal prodiere candidius, acriusque, quam ex pulvere & frustulis minoribus. Cæterum idne ob diversitatem plantæ, & diversum ejusdem crescendi, colligendi, urendique tempus & modum, an vero ob sophisticam admistionem heterogenei salis vel aquæ falsæ, aut alterius humoris, quo multum læditur, fiat id in medio relinquo. Illud constat, ut sal producat acerrimum, & quod in dura & lapidea frusta coeat, lixivium illos parare ex cineribus primum uestis, quo herbas porro comburendas conspergunt: quâ ratione singulis vicibus novum lixivium aspergendo, cineres patant pro smegmatopæis & tinctoriis longe acerrimos. Ubinam autem hic modus faciendi *Rochetta* inventus, & cur nunc minus in usu sit, affirmare non auserim.

Ex oriente & Syria. Syria Orientis pars est. Nunc autem hi cineres ab Alexandria & Tripoli advehuntur.

Herba cujusdam. Hæc herba ab autore in epistola *Kali* vocatur, quo nomine etiam apud alios plerique venit, non tamen sine aliqua levi variatione, Alpino l. de plant. Egypt. *Kalli* & *Kallu*; nonnullis *Cali*; Gesnero *Alkali*; Lobelio *Soda*; Dodonæo *Salicornia*, & Gallice, nec non in hist. Lugd. *Salsola*; Camerario, *Cordo*, & maxime Fuchio & Lusitano *Anthyllis Dio-scoridis* vocatur, id quod Mathioli in apologetico contra Lusitanum solide refutavit, affirmans hæc plantam crescere circa Tergestum Mauritaniam. Postremo *Anthyllodes* vocatur apud Thaliæ. Nomina *Soda*, *Salicornia* & *Salsola* manifestè derivantur à sale, quo vehementer abundat. Ita de antiquitate notitiæ, & nominibus hujus plantæ eruditus noster popularis D. Turner in suo herbario. Quod sciam, nomen Anglicum hæc planta non habet, & quanquam pluribus in locis abundè apud nos crescat, invenire tamen neminem potui, qui illam nosset. Ut aliquod tamen nomen inveniat, *Salt-Wurr*, vocetur, quia sal gustu refert, vel *Galf-Weed*, quia cineres ejusdem parando vitro inserviunt. Parkinsonius refert, illam à nostratibus *Froggrass* & *Crabgrass* vocari, forte quia his animalibus nutrimentum præbet, cum succum habeat substantialem, nec ingratam palato salsedinem. Galp. Bauhinus in sua Pinace decem ejusdem species recenset, quarum nomina & descriptiones, quia hujus loci non sunt, omittimus, trium tantummodo mentione facta, ex quibus referente Alpino c. 42. Alexandrini & Egyptii reliqui suum pulverem in usus vitri & smegmatis parant. Prima species *Kali genicularum*; secunda à nonnullis, apud Alpinum *Anthyllis*, sed *Kaliripens Neapolitanum* à Columna vocatur, qui hanc plantam Neapoli à se inventam designat, describit, & utilis vitrariis inservire dicit. Tertia species *Egyptiacum*, foliis valde longis & hirsutis vocatur. Præter has tres species vidi, & penes me habeo quar-

quartam ejusdem speciem, ex cadis pulvisculi receptam, & à Botanicis *Kali spinosum* dictam. Harum prior & posterior (si minus & minimum excipias) prope nostrum Thamesin, & in locis Anglię maritimis, (non aliis Septentrionalioribus) copiosè crescit. Cæterum nostrates ex hoc *Kali Spinoso* cineres in usus crystalli aut alterius vitri parare nolunt, & experimento in domo vitrariorum factò compertum est, herbam hanc candenti ferro impositam, in fumum abire, nullo aut exiguo sale relicto: cum econtra Kali ex Oriente advectum, eidem ferro inditum, prope maximam sui partem in cineres nigricantes falsos, quod ei proprium est, abeat. Hoc Kaliustum vermis instar sese contrahit, flammam diu servat, & sal reddit acre admodum candidumq; Nostrum Kali collectum, gustu aquam marinam & plane falsum quid refert, ac si locis humidis aservetur, seipsum contrahit, id quod Salsgamarus mihi notus suo damno expertus est: qui loco critimi illud sibi comparaverat. Cum enim illud lavisset, & in acre acetum immergisset, ut in muriam abiret, parum ejusdem superesse deprehendit, consumptis ab aceto fere omnibus. Atque ingens hæc plantarum respectu natalis differentia, non in hoc nostro Kali magis quam in aliis manifeste percipitur, in petro scilicet, quod ab eodem semine nascitur, nec non Canariensi & Rhenano vino, quod ab eadem vite provenit, ut & in cicutâ Græcorum & alterius regionis, pluribusque aliis: atque hac eadem ratione pulvisculus à Soda fecernitur. Hæc diversæ Kali species, utut naturaliter ex aquis proveniant, & prope falsos lacus naturaliter floreat, in mediterraneis tamen Hispaniæ & Aegypti locis feruntur, id quod dubio procul in calidis hiæ regionibus ad quantitatem, acrimoniam & fixationem talis plurimum facit: in Aegypto præsertim, quæ pluviam nunquam sentit, sed anni spatio semel à Nilo Fluvio irrigatur, qui fangi lutiq; plurimam post se relinquit. Et hæc Kali species circa æstatis medium, ubi quam maxime vigent, resecantur, & calore solis siccatæ in strues colliguntur, nec non super ferreis cratibus comburantur, decedente in foveam, & in lapides vel massam duriores corunte cinere, qui deinde collectus servatur, & restante Lobelio *Soda* nomen recipit. Quando hæc planta in usum deduci cœperit, incertum est. Primi qui eandem noverint, eidemq; nomen suum imposuerint. Arabes fuere, id quod addita particula *Al*, quæ mere Arabica est, satis demonstrat. Inter hos mentionem ejusdem factam invenio apud Serapionem & Avicennam Physicos, qui eandem contra calculum, ulcera & oculorum incommoda commendant. Lobelius putat, nos plantam ipsam ejusque nomen & rationem præparandi debere Græcorum & Arabum recentioribus Philosophis, qui Chymiam exercentes circa vitrum occupabantur. Advers. p. 169. Sed Græcos, & Græcorum de hac planta notitiam quod attinet, aliter sentio. Nulla enim ejusdem apud Græcorum Physicos, aliove scriptores mentio fit: præterea nulum in Græca lingua nomen obinet: ideoque sine dubio ab Arabibus aut recentioris ævi hominibus notitia ejusdem ad nos deducta est.

In emenda. Optima & expeditissima ratio cognoscendi qualitatem cineris hæc est, triplicem qua smegmatopæi uruntur. Cineris in aqua limpida dissolvunt, & filtratum lixivium examinant, & cognita lixivii quantitate, factaque comparatione inter pondus aque & cinerum antequam dissolverentur, inventum, quantum falsis data cinerum quantitas contineat.

Lebetes anei. Author noster ubique improbat usum æris, nisi si viridem vel cæruleum colorem parare velimus. Et certe acia hæc lixivium nonnihil æris absument, vel humiditas æris & lixivii partem ejus aliquam in æruginem convertit. Quare nostrates vasis utuntur intus plumbo obductis, qualia illorum sunt, qui alumen excoquant.

Tartarum. Tartarum ab autore nostro *Greppela & grumè dei botti* dictum, revera fex vini, & à tartaro ipso distinguenda est, quia tartarum semper lateri vasis adheret, atque in frustra duriora concrevit, nec nunquam restante Helmontio in regione secum invenire est, cum econtra feces nunquam non in fundo vasis inveniuntur, humidæ; tenuium particulatum. Tartarum vini rubri ad hos usus optimum est, & sal continet magis quam vini albi acre & copiosum. Calcinatur, ut quicquid heterogenei admixtum est absumat, & sal candidius evadat, tantoque citius in aqua dissolvatur & tanto facilius è pulvisculo extrahatur, cujus corpus tartaro recluditur, haud secus atque nitri corpus, dum aqua fortis vel spiritus nitri fit, ab alumine & vitriolo aperitur, id quod citra istiusmodi additamentum non procederet. Et eandem ob causam tartarum aquâ dissolvendum est, antea quam pulvisculus in vas mittatur. Tartarum suum in fornace sex horarum spatio calcinant, usque dum albedinem contrahat, cum experimento constat, id genus calcinationis plus operari, quam si auctiore temporis spatio absolvetur. Quanti autem momenti sit extractio humiditatis ex tartaro, id secreta Chymicorum nonnullorum procedendi ratio demonstrat. Nimirum, ut crystallum, vel cremorem tartari majore copia & magis candidum faciant, tartarum grosso modo comminutum calcinant, vel potius in fornace & patellis stanneis probè siccant, quâ ratione cremor multo melior evadit, quam sine hac exsiccatione & moderatâ calcinatione. Sal fundum vasis petit, & ligulâ eximendum est, ita, ut humor omnis in vas decadat. Ubi feces lixivii jam sident, siphone detrahuntur.

CAP. II. *Tarsum.* Alterum materiale, quod vitro consistentiam, corpus & firmitudinem dat arena vel lapis est, non aliter ac ferrum chalcantho Anglico; cuprum Hungarico, Dantiscano & Romanorum vitriolo, id quod alias loco & tempore humido in aquam abiret. Et lapides quidem quod attinet, Agricola lib. 12. ait *liquefcentes, candidi fuerint, cæteris præstare*: quibus de causis crystallo primæ debentur, ex his enim fractis in India fieri vitrum usque adeo translucidum ut nullum cum eo comparari possit; autores esse Plinius scribit: secundas tribuunt lapidibus, qui, tametsi eis duritia crystallosum non sit, tamen simili modo candidi sunt & translucent: tertias dant his lapidibus candidis qui translucidi non sunt. Post *tarsum* autor noster *Quocolos* commendat, quos Ferant. Imperatus lib. 24. cap. 16. sic describit: *Lapis vitrarius, marmoris candidi speciem refert, nonnihil translucent; sed duritia ab eo differt, quam silicis instar habet, unde percussus scintillat, & coniectus in ignem non calcinatur.* Hic lapis frequentes aliquid ex dilutione viridi secum trahit, serpentini lapidis instar. Reperitur in propriis suis locis; admixtis venis, crustati talci. Projectus in ignem pelluciditatem suam amittit, & candidior leviorque fit, ac postremo in vitrum transit. Vitriarii, materiam vitri præbet & *Cuogolo* vocatur: in fundo enim colligunt, testacei lapidis forma. Et hos quidem Morani in usu esse autor noster ait. Extra controversiam est, lapides omnes candidos & translucentes, qui in calcem non abeunt, vitro inservire. Autoris tamen nostri axioma universaliter verum non est: neque enim lapides Novo Castello allati, quorum in discursu de fornacibus facta est mentio, nec silices ignarii, nec lapides illi quibus pavimenta constant, pluresque alii, qui chalybe percussi vel ungula equi ignem reddunt, nec rhedarum rotæ huic proposito inserviunt. Silices revera omnes illas proprietates obtinent, & si calcinantur, & in pulverem minutissimi.

tissimum & in palpabilem redigantur, atque per se-
taceum angustissimum trajiciantur, metallum reddunt
crystallinum, longe omnium purissimum & nitidissi-
mum. Sed maximus in preparandis illis labor domi-
nos fornacum deterruit ab usu eorundem.

Deficientibus aptis lapidibus succedit *arena*, & se-
cundum ea quæ autor noster narrat, prior in usu fuit :
Candida, minuta & bene lota sit oportet, antea quam
operi admoveatur: atque in hoc omnis præparandi ra-
tio consistit. Reperitur ut plurimum in ostiis & circa
latera fluviorum. Crystallus arenam requirit teneram,
mollem & candidam: vitrum commune magis duram
& scobi similem desiderat. Ingens in hoc materiali va-
rietas est: alia enim prompte liquetur, & cum cinere
mista in vitrum abit. Joseph. l. 2. c. 9. de bello Jud. de
arena mirabilia narrat, quorum hæc summa est: *Ptole-
maidem Galilee Belus fluvius præterlabitur, qui Carmelo
monte Ptolemaidem inter & Tyrum oritur. Prope hoc exi-
guum flumen Memnonis statua est cui spatium adjacet
cubitorum fere centum, & admiratione dignissimum. Val-
lis enim hic est in speciem rotunda, arenam vitro præbens,
quæ si à navibus ibidem congregatis exhauriatur, locus
vacuus statim denuo repletur. Venti siquidem, ut verissi-
mile est, de circumstantibus supercilis arenam huc con-
vehunt. Locus autem metalli statim in vitrum, quicquid
susceperit mutat. Mirabilis autem mihi hoc videtur, quod
jam conversa arena in vitrum, quæcumque pars super mar-
gines loci illius fuerit jacta, in vulgarem arenam denuo
convertitur. Et Tacitus historicarum quinto, Belus mare
Judaicum intrat, cujus ostium arena collecta, (ita Lipsius
non comp. & c.) quia nitrum admistum habet, in vitrum
excoquantur. Exiguus littus sed inexhaustum illud
est, à quo suppetitur. Item Strabo docet, l. 12.
Plin. l. 6. Agricola. de fossil. & quotquot de
vitro scribunt autores illius loci mentionem fa-
ciunt, unde arena depromitur. Nostri Londinenses
vitriarii arenam habent admodum candidam illius ge-
neris, quo vulgo literæ recens scriptas conspergimus,
vel utensilia tergemus, quæ, Maidstonio Cantii adve-
hitur; itemque aliam, quæ vitro communi intersit, &
Wolvvicho advehitur. Prioris generis arena cum me-
tallo vitri ordinario misceri non vult: posterioris, cum
havibus advehatur, exiguo venit.*

Cardanns lib. 5. de vires. *Magnesiam* addit, eamque *sy-
deream* vocat, seu tertium ingrediens: *Ex tribus*, inquit
*vitrum constat, lapidibus nimirum, vel arena, sale Calii, &
sydereâ.* Atqui exigua Magnesiæ quantitas addita me-
tallo parum ad rem facit. Præterea non in omni pro-
miscue vitro Magnesiæ locum habet.

CAP. III. Docet, quomodo sal secundum commu-
nem Chymicorum methodum beneficio solutionis, fil-
trationis & coagulationis figatur.

CAP. V. *Resecanda.* Plantæ in universum omnes
suo quævis tempore resecandæ atque colligendæ sunt,
nimirum ubi jam maturuerunt. Tempus tamen om-
nium, sive caules earundem, sive folia desideres, opti-
mum, idemque Chymicis operationibus, & extrahendo
ex vegetabilibus oleo spiritibusque commodissimum
illud est, quod maturitatem earundem paulo antecedi-
dit: duplo enim major quam alio tempore quantitas
extrahitur. Sed autem tunc melius extrahitur, ubi semen
produxerunt, id quod filici circa hæc tempora accidit.
Vulgaris error est, scilicet, aliasque herbas capillares non
producere semen, cum tamen illud ab interiore folio-
rum latere producant copiosum pulverulentum & ni-
gricans. Quia ipse etiam muscus semine abundat, id
quod certum genus non descriptæ, & in horro meo sic-
co conspicuæ chamaepeuces evidentissime demon-
strat, in cujus ramis, & inter usum quodque folium ejus-
dem copia seminis rotundi & nigricantis invenire est.
Quantum pro ratione tempestivitatæ anni vegetabi-

lia differant, hi qui globulos pro thoracibus ligneos
formant optimè norunt, qui pyrum æstate, illicem
hyeme dejectam operi aptissimam esse deprehendunt.
Buxus circa festum Paschatos durissima, tenerior
æstate est. Oxyacanthus circa Octobrem, fortibus
æstate marescit.

CAP. VI. Plantas enumerat, quæ sal reddunt vitro
aptum. Uno verbo: Nullum non vegetabile vitro
aptum est, quod copiam subministrat Alcalisati salis.
Sal alcalisatum Chymici illud vocant, quod ignem
fert vehementiorem, nec avolando evanescit in auras,
denominatione facta à Kali, id est sale extracto ex
Cali. Et horum nonnulla hoc capite recenset. No-
strum Kelp à Cali sic dictum, & cineres smegmatici
crystallino metallo inservunt. Kelp maximam partem
ex planta marina fit, quam *Seathongs* vel *Laces* voca-
mus, de qua Joh. Baubinus l. 39. c. 2. de hist. plant.
Alga angustifolia vitrariorum, si paulo postquam colle-
cta fuerit, ita ut est humida, diutius aliquanto servetur,
in superficie foliorum attentius spectanti, sal exhibebit
candidum. Matthiölus in Dioscoridem hanc algam
vulgarem Venetorum vocat, non tantum ob dictam
rationem, sed etiam, quia Veneti vitra sua, quæ in exte-
ras regiones transmittunt, hac alga vestiunt. Et sane
hæc rejicula, cum tempestuosum est mare, scopulis il-
lisa refunditur alga, juxta Virgilium, & copiose per
scopulos dispersa, in ipso littore, ab incolis illius loci
æstivo tempore colligitur, & pro re nata sæpius circû-
acta, fœni instar ad solem & ventos siccatur, com-
bustaque cineres reddit, alumini non minus, quam
vitro inservientes, quos Kelp vocamus. Neque hæc so-
lum per omne nostrum mare copiosissime dispersa,
sed omnis in universum alga, & fucus, & quercus ma-
rina, aliæque plantæ marinæ sal copiosum continent.
Cineres smegmatici è Polonia & Russia, nec non An-
glia nova advehuntur, & maximam partem ex abietis
& strobili cinere parantur. In vitri communis usum
apud nos omne genus cinerum coemunt, ab his, qui
potissimam Angliæ partem illius mercimonii causa
pervagantur. Optimi tamen & acerrimi in Anglia ci-
neres ex carduis vulgaribus fiunt, quanquam omne
genus carduorum huic rei inserviat. Proximum à car-
dis locum lupulus occupat, caules scilicet & germi-
na ejusdem, postquam flores collecti sunt: atque hæc
omnia nuperæ inventionis sunt. Morus inter arbores
optimum sal reddit, nec non genista spinosa, & post
hanc Oxyacanthus & kali spinosum inter plantas ma-
rinas, ut jam spinosæ & aculeatæ plantæ optimum sal
reddere videantur. Succedunt herbæ amaræ omnes,
lupulus scilicet, absinthium, Carduus benedictus,
Centaurium, Gentiana, Abrotonum, Tanacetum,
Glastum, &c. quarum cineres copiosè & exiguo sum-
tu parari possunt. Adde petum, cujus caules collecti
& combusti plurimum salis reddunt, unde non exigua
lucris spes affulget, sed cum aliquo soli detrimento.
Mercator quidam mihi relulit, obrulisse sese Carolo
primo Regi, suo se sumtu extructurum, & facta testæ
servaturum aliquot templa, constitutâ in unum quod-
que eorum annua dote librarum centum, tantum ut
sibi cederent trunci vel caules peti in Virginia nascentis,
demonstrabatque quantum inde ad se emolumen-
ti rediturum fuisset. Proximus post petum locus le-
guminum plantis debetur, quales sunt pisa, fabæ, &c.
quæ aliquam cum reliqua tribu affinitatem habent;
Specialiter, lupini, vicia, ciceræ & lentes, quo-
rum hi nuper in Comitatu Oxoniensi copiosè ad-
modum, alendi pecoris gratia feri caperunt, & ex-
perientia teste huic negotio inserviunt. Adde inter
lacteas plantas omne genus rithymali, vel carapu-
tiorum, & ficum arborem, quæ omnia inflamman-
di vim habent: nec non sarmenta, & sonchum

nonnihil aculeatum & flore declivi, in quo ei cum carduis convenit, & saccum instar tithymali lacteum habet. Porro hæc fixa salia quod attinet, notandum est, optima esse ea; quæ à terra & omni heterogeneo corpore quam maximè libera sunt, nec non in fæsta duriora & candidiora coierunt, & gustu insignem acrimoniâ præferunt. Secundo optimos cineres, puro puto sale plenos, in calcaria citissimè dissolvi. Tertiò eos cineres vegetabilium optimos esse, qui vigen- tibus illis, & ex eorumdem maximè insignibus ramis facti sunt. Atque hinc Chymici cineres clavellarios denominasse videntur, quasi clavo latos, à clavola, qua de re Varro l. i. de re rust. c. 40. In oleagineis semi- nibus videndum, ut sit de tenero ramo ex utraque parte aquabiliter præcisum, quos alii clavolas, alii tales appellant, & faciunt circiter pedales. Ubi Clavolam interpretatur tenerum ramum. Nonus legit Clavula, eamque definit esse resedionem ligni. Id certum est Clavolam vel Clavulam descendere à clava, quæ vox Anglicum nostrum Club sonat. Quarto salia hæc in sicco & procul ab omni humore servanda esse: Val- dè enim obnoxius humor est. Postremò horum ci- nerum alios aliis candidius vitrum reddere. Querni ci- neres vitrioli naturam induentes, vitrum obscurius reddunt: Cineres fraxini & Oxiaeanthi, quorum sal ad nitri naturam accedit, metallum reddunt candidius.

Agricola hac ratione ex sale vitrum facit: primas nitro; secundas sali fossili candido & translucido; ter- tias sali ex cinere anhyllidis aut aliterius herbæ salis factio defert.

Nonnulli inq: primas cineri anhyllidis, non nitro deferunt, quo deficiente vitrum faciunt ex duabus par- tibus cineris querni vel lignei vel roborei vel cerrei, aut si hi in promptu non fuerunt, sagini vel abiegni cum una sabuli vel arenæ parte, addito modico sale, ex aqua salsa vel marina factio, & exigua magnetis par- ticula: sed isti minus candidum & translucidum vi- trum faciunt: verum cinis ex antiquis arboribus fit; quorum trunco, ubi assurrexit ad altitudinem sex pedum, cavatur, & injecto igne arbor tota comburitur, ac in cinerem convertitur: quod fit hyeme, cum nives diutina cessant, vel æstate cum non pluit: nam imbres aliis anni temporibus, quod cineres cum terra misceant, impuros reddunt, quomobrem tunc ex iisdem arboribus in plures partes sectis & sub tecto combustis cinis confiat. Hactenus Agricola. Cæterum tempore & experien- tia usus nitri & salis fossilis exolevit, & primas pul- visculus obtinuit: nimis enim hæc mollia & teneriora sunt, cum vitrum requirat sal lixiviale & fixum quod gustu acre & causticum sit, & pinguedinis parum ha- beat qua nitrum & sal fossile abundant, ideoque ma- ximam partem in sal alkali resolvuntur, cui nitrum gustu & pinguedine affine est. At verò Agricola alii- que male mihi Plinium cœpisse videntur, qui nitrum huic alcalisato sali præponunt: ita enim lib. cap. 10. Quercu cremata nunquam multum nitrum facturatum est: & Virgilius eodem ut videtur sensu priore Geor- gicorum.

Semina vidi equidem multos medicare serentes

Et nitro prius, & nigra perfundere amurca.

Quod genus agriculturæ antea expressit, inquiens:

Arida tantum

Ne saturare fimo pingui pudeat sola: neve

Effætos cinerem immundum jactare per agros.

Et, ultimi quidem hi versus manifestè evincunt, salè stercoreari agros; ideoque nitri vox in priore versu ne- cessario denotat vel sal extractum ex cineribus, vel ci- neres ipsos, in quibus sal later: eodemque respiciunt hi versus eodem libro:

Sepe etiam steriles incendere profuit agros,

Atque levem stipulam crepitantibus urere flammis.

Qua combustione stipulæ præter sal nihil produci-

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

tur, cujus natura est destruere inutiles herbas, quæ diu & altius radicatae recens satis omne nutrimentum adi- munt, solumque reddunt sterile, & semen absumunt: ut raceam sale & cineribus vermes necari, qui grana fru- menti depascunt. At nitri frigiditas, affumante Dn. Bacone satis omnibus inimica est. Præterea eruditus Cæsalpinus lib. 3. c. 23. de metall. cineres Kali, genus quoddam nitri vocat. His adde in partibus Angliæ occidentalioribus algas hasce, ex quibus Kalp vel Kulp constat, inservire agricolis ad stercoreandum agrum, id quod Ferr. Imperato teste apud illos qui mediterra- nea inhabitant frequens est. Nitrum tamen ex aqua ma- rina, nec non quibuldam vegetabilibus extrahi potest, sed in fornacem missum maxima sui parte in sal alkali resolvitur.

CAP. VI. Sal ex calce muraria. Apud nos in usu non est, sed nonnunquam in vetustis muris reperitur, ideoque paretonium vocatur. & multo quam sal ordi- natum acrius est. Non exiguum ejusdem frustum in- ter cimelia mea asservo, plane diaphanum, & alumi- ni simillimum, necnon gustu ut sal acre. Ferr. Impe- ratus sal commendat factum ex crustaceis, testaceisque; ut sunt ostrea, & cancri, ex quibus sal optimum in usus vitri extrahitur: & experientia didici, calcem, quæ cæmentarii in Hollandia utuntur acerrimi salis pluri- mum continere. Cæterum, hoc sal, ut vitrum red- dat plane candidum, minus tamen quam illud quod ex Cali fit pellucidum est, & maximam partem in sal al- kali abit.

CAP. VIII. Frittam. Fritta videtur derivari à Frit- tare, quod idem est quod Frigere: Fritta enim nihil aliud est, quam sal, cinereve cum arena frigendo con- creti, quam etiam ob causam Angli totam illam mas- sam, quæ ex fornace calcaria educitur, a batch, id est frictum vocant. Et secundo, Fritta ubi liquecere cœ- perit in massam fri&illarum instar coit; quas Itali Fri- telli, Angli little frits vocant. Antiquitus à nonnullis Hammonitrum, ab aliis commodiore etymologia Am- monitrum vocabatur, voce composita ab ἀμύων arena, & νίτρον vitrum: ita enim Plinius lib. 36. cap. 26. Are- na alba in Vulturno mari nascens, miscetur tribus par- tibus nitri, pondere vel mensura, ac liquata in alias fornaces transfunditur. Ibi fit massa, quæ vocatur Am- monitrum: atque hæc recoquitur, & fit vitrum purum, ac massa vitri candidi. Et expressè magis Cæsalpinus: Ex arena & nitro fit massa, quam Plinius Hammoni- trum appellat; hodie Fritta dicitur. Atque hæc frittas faciendi ratio id efficit, ut ingredientia optimè com- misceantur, & supervacuis humor, si quis adsit, eva- porando consumatur. Fritta vitri communis, quæ ma- teriam habet minus politam, pro ratione bonitatis & tenebritudinis cinerum & arenæ, decem vel duodecim plus minusve horis absolvitur. Nobis tres frittarum species in usu sunt: Primò cristalli ad opera crystallina ex sale pulvisculi & arena. Secundo ordinaria, ex me- ris pulvisculi vel Sodæ cineribus, nulla salis extra- ctione prævia facta. Tertiò communis, in usum vitri viridis, quæ ex promiscuis cineribus, sine omni præ- paratione fit: vel cineribus in pulverem tenuiorem re- ductis additur arena duriuscula à VVooluyco Cantii petita.

Materialia in tenuissimum pulverem rediguntur, la- vantur, cribantur, commiscuntur, & in ignem cal- caria fornacis missa, exactè & per minimas particulas minutissimosque atomos uniantur. Secus si fieret, sal & arena, dum liquantur, diversa corpora constitue- rent, id quod etiam servatis his regulis facillimè con- tingeret, nisi rutabulo frequenter agitentur.

In mortario lapideo. Magis expedita ratio est, qua nunc utuntur. Massam cinerum duriorum, nec non magnesiæ & zafferam calcinatas, argillam item, & sal molâ terunt, quam jumenta versant, quæ lapidem mola-

rem marmoreum habet; latum novem vel decem pollices, & septem vel octo pedes in diametro profundam, circumagiturque in pavimento æque marmoreo, in quod comminuenda quæque deponuntur: atque hac terendi ratione unius diei spatio plus efficitur, quam viginti homines tundendo effecturi essent.

Nos fritram aqua non perfundimus, nec lixivio irroramus, sed, siquidem ita res ferat, opus intra paucos dies in olla absolvimus: Irrorationem tamen illam ad puritatem vitri multum conferre necesse est.

CAP. IX. *Tantum magnesia.* In causa est diversa colorum qualitas, quorum alii pleni, alii dilutiones sunt. Jam magnesia & zaffera tantum bonitate differunt, ut hæc paupercula, illa dives admodum; alia inter utramque media sit, id quod nec à vitrariis nec figulis, utut in sua arte exercitatissimis nisi examine fornacis prævio dijudicari ulla ratione potest. Præterea, quæ ex iisdem ingredientibus uno eodemque procedendi modo præparantur metalla, colores mutant, pro ratione ollarum, in quibus excoquuntur. Quam ob causam vitrius colores suos non pondere nec mensura, sed sensim & per intervalla admiscens, metallum subinde commoveret, & experimento facto de qualitate coloris oculi iudicium sequitur. & siquidem nimis dilutus sit, quod visum est addit, usque dum id quod intendi assequatur.

Fornax lignum requirit aridum. Anthos noster perpetuo quercum commendat, ut quæ ignem aut alar vehementem & flammam durabilem. Ferr. Imperatus lib. 14. cap. 16. ait, *vitriarium, dum in opere est, quia vividam magis & substantialem, quam ingentem flammam amat, fraxini truncis uti, quorum flamma in vorticem fornacis recta pertingens, vim suam ollis ipsis communicet.* Fraxinus certe ignem præbet luculentissimum, sed qui cito deficit, & nisi assidue instauretur, metallum nec lignatur, nec operi aptum est. Camerarius in horto non sine causa juniperum commendat, si modo copia ejusdem daretur. Haud satis capio, quid Plinius sibi velit, inquiens: *Levibus vitrum aridisque lignis coquitur: nec quomodo Plutarchus audeat dicere, tamaricem vitro formando aptissimam esse: neque enim ignis istiusmodi, qualem vitrum desiderat, istiusmodi lignis excitatur.* Temperare mihi nequeo, quin adducam effectum ignis, memoratum ab Arabibus Physicis, eorumque lectoribus: nimirum vitrumustum, si spongiam calcinatam admisceas, frangere calculum vesicæ & renum, nec non externa ulcera sanare. At vero modus urendi vitrum, qualem ipsi describunt, plane ineptus est, cum satis constet, ignem vel validissimum, & maxime perennem, id quidem efficere, ut in fluxu permaneat vitrum, ut vero in pulverem redigatur nequaquam.

Sal exspuat. Sal Alkali, Gallis *Suin de verre*, id est *pinguedo vitri*, & Anglicè per contractionem *Sandever* dictum. Plane candidum hoc sal est & gustu nitrum refert, & ab aëre ac humiditate loci facillime dissolvitur. Nostros vitrarii metallum in aquam non projiciunt, ut sal ab eodem separaretur, sed ligula illud excipiunt, cum in superficie metalli natet. Nisi enim despumando separaretur, vitrum operi minus aptum, & maxime fragile, minusque lentum redditur. Olla continens libras bis centum metalli optimi, salis alcali pondo quinquaginta reddet; quantoque sal magis ignavum, magisque languidi cineres sunt, tanto salis alcali copia major prodibit, ita ut metallum aliud ab alio quinta vel sexta parte superetur, & si vitrum commune & cineres pravi sint, vitrarii ob nimiam salis alcali copiam quinquies vel sexies ollam cineribus impleant necesse est, ut tandem metallo adimpleant, ac dum salis alcali quidquam in olla reliquum est, vitrariis non licet frigidam suffundere, ut ebullitionem vitri impediant: id enim si facerent, olla simul & fornax cum impetu dissiliret. Sal

alcali efficit, ut metallum fluat; & exigua ejusdem quantitas, cum antimonio & nitro mista, dum crocus metallorum sit, quantitatem croci adauget, atque hoc efficit, ut à scoria facilius separetur. In Galliis copiosè prostat, & incolæ eodem utuntur loco salis communis, ad condiendum cibum potumque. Solutio ejusdem erogata in semitas hororum, vermes necat & herbas inutiles.

Collum. Colla vocantur reliquæ illæ vitri, quæ cannis ferreis semper adhærent, quas antea quam metallum recens ex olla promant, decutiunt, & loco ad hoc destinato seponunt, ex quibus deinde tritis & metallo additis nihil præter vitrum commune purissimum sit, etiamsi ab optimo omnium metallo producantur.

CAP. X. *Ut bene calcinetur.* Vitrum non horis 24. aut eo amplius, sed per integrum biduum triduumve in igne valido perseveret: quanto enim diutius, tanto melius: ita enim defecatu & maculæ pustulæque omnes absumuntur.

CAP. XI. *Tartarum vel grumos.* Tartarum generosissimi vini soboles, atque index est vinum nihil incommodi passum esse ab aqua marina vel incommodis aliis, quibus virtus ejusdem imminuitur, & tartarum in minutissimas partes dissolvitur. Apud nos loco ad id destinato, in camera fornacis tertiæ, prope utrumque exterius orificium, sex horarum spatio ad albedinem usque calcinatur, atque hæc calcinatio eodem in vitro effectus producit, quo calidiore loco facta producere solet.

CAP. XII. *Zaffera.* Zaffera & Magnesia non aliam hic præparationem recipiunt, quam ut mola in pulverem tenuiorem redigantur, & eodem quo pulvisculus & materialia reliqua cribro cribrentur. Quid Zaffera sit, apud nullum authorem invenio, & pauci mentionem ejusdem faciunt Cardanus lib. 5. de subtil. terram vocat: Est, inquit, *alia etiam terra, quæ sic vitrum tingit, carulei coloris, quam Zapheram quidam appellant.* Sed Cæsalpinus post Cardanum lib. 2. cap. 55. eandem lapidibus annumerat, *Alius est lapis (sunt verba Cæsalpini) vitrum tingens colore caruleo, & si plusculum addatur, inficit nigredine: Zafferam vocant. Hic ex cinereo tendit in purpureum: ponderosus & friabilis est: per se non funditur, sed cum vitro fuit aqua modo.* Aldrovandus in Musæo utrumque sequitur & hoc loco terram, alio lapidem vocat. Ferr. Imperatus l. 28. c. 8. lapidi illam plumbario & magnesiæ assimilat. Sed terra non est, cum aquæ non admisceatur, nec cum eadem componatur: & nullus lapis æque ac Zaffera friabilis est, ut quæ digitis facili negotio in tenuem arenaceam substantiam redigitur, id quod tactu experiri licet. Et certe, si alterutrum horum, aut naturalis quidam color esset, non omnem eorum qui de hoc argumenti genere scripserunt diligentiam effugisset: præsertim, cum tam frequenti apud omnes usu sit, tantaque ejusdem copia à vitrariis figulisque absumatur: industrius Agricola illam non novit, neque mentionem ejusdem facit. *Julius Scaliger*, qui librum conscripsit vitri negotia concernentem, Cardanum eo nomine non redarguit. Quare in eo sum, ut putem, nuperæ inventionis rem, & ab homine Germano arte factam esse, ideoque inter secreta asservari. Certe ex Germania advexitur, & si conjecturæ locus esset, putarem ex ære illam & arenam, forte aliqua etiam lapidis calaminaris portione factam esse. Cæruleus ille color, quem reddit, meâ quidem sententia æri debetur, haud secus ac Magnesiæ color ferro. Certe enim nihil est quod vitro colorem tribuat præter metalla, & ab omni metallo vitrum tingitur. Lapis Lazuli, quanquam durus, colorem suum in igne deponit, & sic pretiosi lapides reliqui. Verum quidem est, ab Antimonio vitrum tingi, sed à metallica ejusdem parte & regulo tantum. Multo minus aliqua terræ pars ferendo igni par est. Quanquam ochra

Scotica & rubrum Indicum calcinationis beneficio in colores haud malos, si debite adhibeantur, degenerent, fornacem tamen vitriariam non ferunt. Reliquum est, ut à nulla alia quam metallica re produci hic color possit, & si metallica est, quid præter cuprum esse poterit? Utut enim ab argento procedere hic color credatur, æri tamen cui argentum alligatum est, soli debetur. Etenim argentum ter excoctum aquam separationis plane non tingit. Secundum quod zafferam ingreditur arena est, id quod lingua & tactu discernere licet: ac si aquam fortem adhibeas, nonnihil candidæ & translucentis glazæ evidentè videbis, quæ pulverem pellucidorum illorum lapillorum, quos nostrates Angli *Plebes*, Itali & Ferrantus *Quocolos* nominant, egregie æmulatur: nonnihil etiam videbis, quod ab arena nostravulgari non multum abicit, & colorem refert subnigrum, atque haud difficulter liqueat.

Tertio, cur supponam lapidem calaminarem zafferæ admistum esse, in causa illud est, quod neque aqua fortis, neque spiritus vitrioli, zafferæ affusus, sensibilibiter quicquam operatur, siue excitando bullas, siue solvendo vel tingendo: cujus rei experimentum feci, affundendo aquam fortem ordinariam, & spiritum vitrioli, nec unquam percipere potui, vel minimam ebullitionem & motum liquorum, nec tincturam strepitumque ullum, id quod in solutione metallicorum corporum frequenter evenire solet. Et lapidem quidem calaminarem obstare solutioni, nec non illis quæ solutionem consequuntur, id ex hoc experimento liquet, quod statim adducemus. Præterea hanc ebullitionem impedire potest admistis resinæ alicujus vel gummiis quæ vim istiusmodi liquorum non sentit. Quæ præparatio- ne æris vel cur id fiat, eone quem authores tradunt modo, vel qua alia ratione, determinare non possum. Pauca aliquot experimenta detegere hoc secretum, & dissolvere hunc nodum possent, ad quæ lectorem remitto. Potherno qui pondus ejusdem consideraverit, nec non pretium coloremque ex purpureo authorum nunc nigricantem (ita enim sese habet, quicquid hætenus videre mihi contigit) is haud difficulter in meam opinionem concedet. *Zafferæ* vocatur à *Saphiro* lapide, cujus cæruleum colorem æmulatur.

CAP. XLII. *Magnesia* sic dicta quia pondere & colore *magnetem* refert. Materia vitri maxime universalis est, qua utuntur, non in hunc modo finem, ut viridantem & cæruleum colorem vitri absumat, quo de Virg. Georgic. quarto:

----- *Eam circum Milesia vellera Nymphæ
Carpebant hyali saturafucae colore*

ad quæ commentator: *vitreo viridi: Nymphis apto*, qui color omni vitro inest: ut jam *magnesia saporis* vocari possit; sed etiam, ut vitrum tingat, id quod præstat efficiendo rubrum, nigrum, purpureum vel pullum, quia potissimum colorum omnium ingrediens est, id quod præsens hoc opus demonstrat, & prolixè & vere de eo Casalpini his verbis: *Hoc genus magnesie hodie vulgo Manganese & ab Alberto magnesia vocatur: addi solet ad confectiorem vitri, quoniam in se liquorem vitri quoque ut magnes ferrum trahere creditur. Lapis est niger, magneti similis, quo utuntur vitriarii. Si enim modicum ejus vitro admisceatur, illud purgat ab alienis coloribus, & clarius reddit: si vero amplius, colore purpureo. Afferitur ex Germania: foditur quoque in montibus Viterbii & alibi. Meminit & Plinius pseudomagnetis, ita enim inquit: In Cantabria non ille magnes verus, caute continua, sed sparsa, nescio an vitro fundendo aque utilis, nondum enim expertus est quisquam: ferri (inquit) inficit vocem, quo fundamento equidem ignoro, & per errorem pro rubro cæruleum ponit, ad quæ Scaliger exercit. 194.23. *Magnesiam non novi: cæterum in MS. codice de conflandis vitris Pan-
Mangesi Bibl. Pharm. Tom. II.**

thei civis Veneti scriptum erat, vitrum à magnesia colore purpureo infici. Memini, cum puer essem, & Ladrone viverem effusum in montibus, ni fallor, Solodonianis, & Venetiis delatum, nescio quid, quo ipso vitrum usque adeo candidum purumque fieri perhibebant, ut crystalli nomen assumere. Ferri colorem mihi reulisse videtur. Præceptor meus Secundus docebat me, vitrum admistione ferrei colore albicare, utriusque rei substantia adeo arcte unita, ut compositis earum partibus ipsi etiam colores alii alios invaderent: & magnesiæ ferreæ cujusdam substantiæ & ignis impatientem exhalare, auferendo secum sordes vitri, haud aliter atque lixivium quo lineæ vestes mundantur. Similem huic judicio opinionem apud Aristotelem invenio, ubi vires origani demonstrat in purgando vino. Cæterum ferreæ hæc substantia, metallo admista, non exhalat, igne etenim vel tempore minore excoquitur. Et hæc sunt quæ de magnesiâ didicimus. Ac in hoc discursu duo notanda sunt, attractio, & purgatio. Et attractionem quidem quod attinet, non alio illa nititur fundamento, quam quod à nominis ratione proficiscitur, quod nomen eidem ex placito impositum est. Etenim si vel maximam magnesiæ quantitatem exiguæ fracti vel liquefacti vitri particulæ addas, non movebitur. Quod si per liquorem vitri intelligant sal alkali, seu partem quandam vitri, certum est viriditatem adhærere metallo, etiam bene despumato, ac tum magnesiâ, si addatur, purgare vitrum. At vero si per liquorem vitri non aliud intelligant quam vitrum jam liquefactum, gratis ea omnia dicuntur, nullo in medium allato argumento, nullo experimento. Cæterum quam obscura attractio, tam evidens purgatio, modus autem plane obscurus est. Scaliger, ejusque præceptor Secundus, per modum exhalationis id fieri putant: ac Plinius forte & Casalpini per attractionem suam non aliud intelligunt, quam purgationem, sed minus tunc dicunt, quam utrumque decet. A metallo separetur necesse est, vel per modum præcipitationis, vel exhalationis. Per præcipitationem illud fieri non potest. Etenim commoto metallo rediret color, vel quod in aliis præcipitationibus fieri solet in fundo ollæ pulveris instar appareret. Nec verisimilis magis exhalatio est, cum vitro jam depurato de pondere nihil decessisse appareat. Et quomodo fixum corpus magnesiæ, tenaci substantiæ vitri innexum, assurgere exhalando posset? ac quæ major in magnesiâ varietas supponi potest, quam si dicamus, illam attracta viriditate metalli onustam, avolare in auras & vapores insensibiles? Mihi sola mutatio figuræ & minutissimarum metalli particularum in causa esse videtur. Ignis enim, liquefaciendo magnesiâ, minutissimis illam metalli atomis per omnia miscet, & variâ ejusdem agitatione & revolutione has atomicales figuras format, quæ aptæ natæ sunt, ad reflectendam maximam partem illius lucis, quam nos candidam vocamus. Longe plures instantiæ adferri possent, ad illustrandam doctrinam de productione colorum ex sola transmutatione partium: sed contenti erimus adduxisse ea tantum corpora, quæ admistione coloratorum corporum albedinem acquirunt. Recipe terebinthinam flavescenscentem vel oleum capevæ, nigricans, vel terebinthinæ oleum ærogine (quæ facile in eo dissolvitur) tingito, ad illum usque coloris gradum, qui vitro naturalis est & singulis cum vitello ovi optime agitat, recipe lixivium acre smegmatis opæiorum, eique agitando admisce oleum viride sambuci, & medicinam parabis, quam Physici lac virginis vocant: idemque efficies, si oleum aliquod eidem lixivio addideris. Hic colorem habes lixivii ex flavo rubescenscentem, qui viriditatem olei destruit. Rursus, si oleum tartari effundas in aquam viridem, solutione pyritis in aqua

pluvia factam, candidum colorem efficit: idemque oleum infusum, in aquam communem solutionis viridis vel cærulei vitrioli eundem præstat effectum, sed color minus quam in priori illo experimento candidus est, nisi magnam olei tartari quantitatem affundas: quibus instantiis via exhalationis sufficienter refutatur, nec non evidenter efficitur, hanc vitri purgationem à sola texturæ diversitate & dispositione partium metalli dependere, quam recens addita magnesia operatur. Et vero quæ alia ratio assignari potest, cur à sale & arena, corporibus utrinque candidis, metallum procedat coloris plane diversi? vel cur Zaffera & Magnesia nigro colore tingant? Magnesium ferri plurimum continere, extra controversiam mihi esse videtur, idque hoc experimento evincitur. Pulveris ejusdem in vitro angusti oris aquam fortem affundebam, & aqua in hoc vitro suscitatis ingentibus bullis valde; in alio majoris orificii vitro minus ebulliens, fumum emittebat acrem, & maxime penetrantem, qui nares graviter offendeat. Spiritus autem vitrioli affusus parum quidem coquebat, sed scintillis pluribus emissis vitrum usque adeo incalescebat, ut manu illud continere amplius non possem; & quod magnesiæ ut mihi quidem videtur, peculiare est, si limpidam affundas, calor decrescens plurimum augebitur. Tinctura hujus lapidis saturum clareti colorem referebat: atque hæc omnia ferro, affusis iisdem spiritibus, eveniunt. Et certe color magnesiæ à ferro, quod continet, descendit: utriusque communis est rubeo, & rubedine magis plenus purpuræ color, cum aliqua cærulei specie, eosdem colores nonnullæ præparationes Martis obtinent: & quomodo pullus color à zaffera & magnesia, ita fericum optime nigro tingitur, si scobinam adhibeas, ab arena cotis & acie ferri proficiscentem, quam ii efficiunt, qui forfices & alia ejusmodi utensilia acuunt: & dubio procul hæc scobina colorando in olla & fornace metallo inservit, si vitriarii utrum ejusdem noscent, vel eam uti non dedignantur. Secundo, hæc Magnesia facit, ut metallum vehementer intumescat, non secus atque chalybs, vel crocus Martis, aliave aliqua ejusdem præparatio, vel compositum, id quod ei cum cupro, ære & plumbo commune est. Observabis hic, autorem nostrum præcipere ut nihil horum nisi sensim & per vices, atque ita in ollam mittatur, ut semper aliqua pars ollæ vacua maneat, ne metallum æstuando in ignem cineresque effluat, & jacturam temporis pariter & sumptuum facias, id quod pari plerumque passu procedere solet. Author noster magnesiæ hic commendat Pedemontanam, ut quæ omnium toto orbe optima sit: ideoque ubi Magnesiæ mentionem facit, loci mentionem subijcit. Atqui solertia nostrorum ante aliquot annos in hac nostra regione, circa Mendippi colles, famoso ob plumbi mineras in Comitatu Sommerfensi loco, inventa est Magnesia, quæ cum optima, quæ Morani utuntur, confertur possit. Ubicumque foissores metallici eam inveniunt, firmiter concludunt subesse plumbi mineram, eamque vulgo *Pottern Ore* vocant, quod figuli maximam ejusdem quantitatem absumant, ut quæ solâ merces suas nigro colore inficiunt, haud aliter atque zaffera cæruleo. Optimam eam esse perhibent, quæ micantibus scintillis caret, ac subnigra est, vel in pulverem redacta atrum plumbi colorem reddit. Res est oppido dura & gravis: quo autem magis plenus est color, eo metallum magis inficit. Eodem quo fricta tempore in ollam mittenda est.

CAP. XIV. & XV. *Ferretum Hispanicum.* Ferretti vox quæ æsustum vulgo denotatur, Italica, & Latinitate donata est, à Casalpino, lib. 3. capite quinto, ubi inquit: Optimum æsustum conficiebatur in Ægypti Memphide, deinde in Cipro, cujusnotæ sunt, ut sit rubrum, & attritu colorem Cinnabaris imitetur:

nam nigrum plus quam decet exustum est. Hodie in Hispania conficitur: appellant autem Ferretum, sed nigrum est, & inficit nigredine: ideo utuntur ad capillitium denigrandum. Cæterum si mediocriter calcinetur, rubrum apparebit, eundemque colorem retinebit in pulverem redactum: atque hinc nomen ejusdem deductum esse videtur, ut sit *ferretum à ferreo colore*: Crocus enim Martis, si oculum confusas, rubrum colorem exhibebit, sed multo quam ferretum magis dilutum. Eodem discursu Casalpino asserit, alias regiones aliis melius ferretum reddere, prorsus ut Castilia saporem, Venetiæ vitrum optimum dant. Cæterum non tantam diversitatis climatis differentiam nobis habere videtur, ut nos cogat aliqua eorundem ex Hispania perire.

Duo maxime insignes & præcipui colores, tam in se, quam relativè ad animalia atque hanc artem vitrariam sunt cæruleus & viridis. In se, quia multum à loco mutuatur, ut videre est in vitris illis triangularibus: & hanc ob causam istiusmodi colores jucundissimi, & visui animalium gratissimi sunt, quia pupillam oculi neque nimis contrahunt, neque nimis dilatant, quorum utrumque cum dolore conjunctum est, & oculum offendit. In arte vitraria autem & patris, encaustis & vitro plumbi, ob maximam quam cum pluribus gemmis habent affinitatem & convenientiam, aliosque innumeros usus: ut taceam varias gradationes, quas vel simpliciter & per se, vel mixti alius cum alio recipiunt. Cæruleus color simplex est in quibuscunque artibus, qui circa illum versantur: sed viridis in curiosa arte tinctoria compositus est, ex cæruleo & superinducto flavo, vel contra, constans. In aliis autem artibus simplex hic color est, & uterque tam cæruleus, quam viridis ex eadem cupri vel æris materia diversimode præparata generatur. Porro simile, nec sine grandi mysterio est videre, quam levi & vix perceptibili momento, adhibita eadem materia hic vel ille color fiat, quod illi, qui metalla purgant, quotidie experiuntur, dum ex eadem unius ejusdemque materiae quantitate pro aqua forti adhibitis iisdem aris bracteis & albedine nonnunquam elegantissimum cæruleum, quandoque elegantius vel magis lutescentem viride producant, cujus rei nec rationem reddere nec negotiis suis ita moderari possunt, ut non cum magno rerum suarum dispendio loco elegantis cærulei, viride assequantur, quorum hoc longe vilios est illo. Jam ut ut genuinus & naturalis æris & cupri color thalassicus, & ex utroque compositus sit, in hunc tamen, quam illum inclinat magis, & dissolventia in hoc negotio utramque ferè paginam absolvent. Etenim ærugo ex cupri bracteis & uvis sub terra sepulta facta viridem colorem, at chalcanthum cupro factum, & pyritis liquor aquâ pluvia solutus, in vitriolo Dantiscano, Hungarico & Romano cæruleum exhibet, id quod non aliunde præcedit, quam à resolutione materiae in partes magis tenues, & variâ texturâ atomicalium partium dissolutæ materiae. Ratio autem cur æs cæruleum producat quam cuprum præstantius, hæc mihi esse videtur, quod Lapis calaminaris, quo uno inter se differunt, recipit, & in societatem sui corporis assumit aciditatem illam, quæ cupro naturalis est, & qua mediante, ut in æruginis fictitia aciditate uvarum exaltata apparet, in viridem substantiam convertitur: quod ipsum etiam in causa est, cur uvæ Gallicæ, ut quæ aciditatis plus habent quam Hispanicæ, huic operi magis aptæ sint, ut ut clima Hispanicum aëre fruat magis calido. Et hinc videre licet virtutem & efficaciam succorum vitriolarum in chalcantho Anglico, nec non vitriolo Martis, spiritu vitrioli & chalybe facto, in quibus flavus feri color in viridem convertitur, id quod etiam lapidi Armeno accidit, si cum aceto vini vel tinctoria ex eodem extracta teratur. Effectus hujus imbibitionis

in lapide calaminari, cum uno ex ingredientibus in aquam fortem liquido apparuit in nobili illo & perspicuo experimento, quod vicinus mihi meus, purgator metalli, appeti ostendit, qui cupri bracteas emerat precipitando argento, quod aqua forti dissolverat: sed frustraneus erat ille labor, relictis in aqua citra precipitationem libris decem de triginta: & inventa ratio est: Etenim hæc bracteæ liquatæ erant in olla in qua æs antea liquefactum fuerat: ergo bractearius assumpta recenti olla igne vehementi ut fieri assoler, flores lapidis calaminaris volatiles suâ naturâ, & qui circumvolitando, vestes, barbam & crines opificis, haud secus ac farina molitores, tingunt, adurebat, quibus probe separatis, argentum aquæ forti innatans universum precipitabatur. Et in hoc experimento lapis calaminaris imbibens partem aciditatis chalcantii, ideoque bracteis minus corrosis, & consequenter ab aqua forti minus absumptis, spatium argento reliquerat, ut innatante aqua posset, in quo precipitationis ratio consistit. Metallum enim aquæ recens additum, argenti locum occupando illud cogit, ut bracteis candidi pulveris instar adherens, descendat. Quod autem hic effectus requatur imbibitionem aciditatis aquæ fortis, id ex eo manifestum evadit, quod aqua fortis, acetum, vel ejusdem spiritus, aut quivis alius liquor eidem affusus magis dulcis magisque gravis evadit, quam si corallio, oculis cancri (ut vulgo male) vel conchis piscium aut lapidi Lyncis &c. affundatur. Et hic erat, quod aqua his bracteis facta elegantissimum colorem cœruleum redderet, qualem purgator metallorum nunquam viderat: quâ eadem occasione in mentem mihi rediit, æs aqua forti dissolutum, additis cancri oculis, cœruleum reddere elegantissimum.

Metallorum omnium maxime malleabile cuprum est, auti argentique malleabilitatem in cudendis nummis promovet, modico igne funditur, facillime à spiritibus acidis vel sale corroditur, & citra magnam difficultatem ab igne in pulverem resolvitur, id quod quinque modis fieri author noster docet. *Primo* calcinatione cupri cap. 14. *Æris*, cap. 21. *Sulphure*, nec non vitriolo cap. 15. *Tertio* simplici calcinatione æris in igne, cap. 20. *Squammæ æris* cap. 24. *Quarto* trinâ calcinatione æris, cap. 21, 28. *Quinto* præparatione vitrioli Veneris, cap. 31, 132, 133. quæ omnia cum inter tyrocinia artis Chymicæ sint, pauca addere necesse habeo, præsertim cum usque adeo prolixè differrerim, quâ ratione primi illi colores, cœruleus & viridis generentur. Inter omnes ergo has præparationes illa quæ vitriolo Veneris sit primas ducit. Secundas obtinet calcinatio eadem viâ & methodo, mediante sulphure facta, vivo præsertim, quo si ignem adhibeas fortem & luculentum, color redditur melior, quam alia quavis ratione, cujus author mentionem facit. Ut enim sulphur & chalcantum ab eodem marcasitæ genere fiant, & Spiritus producant nulla notabili differentia discretos, sulphur tamen acutissimis flammarum stimulis magis adactum in corpora metallorum citius faciliusque penetrat, & consequenter particulas eorundem maxime tennes optime dissolvit. Igne præterea Spiritus sulphuris absumuntur qui naturaliter apti sunt, ut nigredine inficiant, & colores reddant lutulentos. Vitriolum enim, ut vulgo notum est, si gallam vel quodcunque aliud astringens vegetabile adjicias, atramentum dat, atque, nigredinem pro tinctoribus. Si tamen cui vitriolum experiri placuerit, ab Anglico sibi caveat, ut quod ferro constat, & illius loco assumat id, quod ex cupro factum est. Experientia enim purgatores metallorum docuit, aquam fortem Anglico vitriolo factam, sordes suas communicare universas solutioni, quo ipso color necessario lutulentus redditur: quare aquam fortem ex

solo Gedanensi vitriolo sibi parant.

Quisquis igitur aquâ forti bene notæ colorem extrahere voluerit, id quod auctori nostro præterquam in præparatione croci Martis infrequens est, halonitro & alumine illud faciat loco vitrioli, ut infra de Chalcedonio cap. 38. vel vitriolum assumat Hungaricum vel Romanum: hoc præsertim, ut quod aquam reddit fortissimam, cum cupro scatet, & quam proximè ad vitriolum Veneris accedat: simul enim cum his aquis exigui quidam atomi cupri ascendunt, qui si (ut apparet) cultum bullientis aquæ fumo admoveas, æreo colore eundem tingunt: ac si in hac aqua forti cuprum optimum dissolvas, idque precipitaveris (quod nonnunquam aqua forti purgatorum secundaria & cupro plena feci) cœruleum habebis elegantissimum & tingendo vitro accommodum: mihi enim dubium nullum est, quin ignis fornacum vehemens circum omne cum sulphureæ naturæ vel dissipaturus, vel in vitrum mutaturus sit: etenim solutione per aquam fortem facta, crystallos emittit virides, superante cupro, quo vitrum tingitur. Quod autem hæc precipitationis viâ melior sit quam extractio spirituum mediante calore facta, id ex eo liquet, quod partes cupri tenuiores & magis puræ simul cum aqua ascendunt, ut in cultri pluribusque aliis in scriptis Chymicorum obviis experimentis videre est. Unum adhuc experimentum addam, quod tinctura ex cupro extrahitur: Recipiebam cupri calcinati & æruginis ana unciam unam, repletaque duas ampullas vitreas succo & foliis hortensis & sale volatili abundantis cochleariæ, bene clausas per menses unius spatium in cella, & postmodum per menses æstivos soli exponebam, eoque tempore exacto liquorem omnem per chartam emporeticam trans mittebam, & ampulla una elegans cœruleum, altera exactum aquæ marinæ colorem mihi suppeditabat, id quod tanto libentius refero, quia nullum istiusmodi de sale volatili experimentum tum sese mihi obtulit, & probabile admodum est, plantas illius generis alias, isthoc sale plenas & succo tenaci præditas, quale est allium, rarum in cupro effectum edituras: etenim folia earundem vel viride saturum continent, vel cœruleo mistum. Ergo universa acidorum cohors, & fixa salia, quæ aciditatem in se continent, solvere cuprum possunt, & ingens procul dubio circa menstrua & processus in extrahendis tincturis varietas sese offerret.

Author noster cap. 20. æs ex cupro & lapide calaminari factum esse narrat, cujus rei processum, quia nullibi plene descriptus est, hic recitabo. Lapis calaminaris in Comitatu Sommersetano & septentrionali Valliæ parte inventus est: utur enim Gedano afferatur, bonitate tamen Anglicano nostro cedit. Hic lapis antea quam in usum deducatur, bene præparetur necesse est. Et primo quidem calcinandus est in fornace, quæ in altero latere orificium habeat angustum, suscitando igni dicatum. Ignis autem carbonibus, vel quod melius est ligno suscitatur: majorem enim flammam alit, & consequenter reverberationem meliorem. Calcinatio horis circiter quinque absolvitur, quo temporis spatio sapius rotabulo majore commovetur: ut autem bene calcinetur, acri judicio opus est. Etenim nisi bene calcinatum sit, cupro admisceri non vult: si plus justo, cuprum reddit fragile, & utroque casu minus quam par est vitrum tingit. Signum probæ calcinationis est, si in pulverem evadat candidum & maxime tenuem. Dimidia fere hujus Cadmiæ (ut vocant) pars perit, & in flores abit, adherens orificio fornacis sub diversa specie, & exigui usus, utut haud difficulter probari possit, hanc genuinam veterum pompholigem esse qua in unguentis quæ inde nomen sortita sunt, frequenter utebantur. Egregium exsicicans est, & si tendinibus & nervis stil-

lantibus applicetur, citra dolorem celeriter exsiccat. Hunc pulverem communicavi incomparabili & æterno Anatomix & nationis Anglicanæ ornamento, nec non Chirurgo excellenti, & curioso rerum naturalium indagatori Dn. Harvey, cujus perennis apud me memoria erit, & fatebatur hanc veram sibi veterum pompholigem videri, eaque frequenter & cum felicissimo successu utebatur. Calcinatum lapidem calaminarem terunt cribantque in pulverem tenuissimum, eundemque cum carbonibus tenuissime pulveratis permiscunt, & omnem hanc misturam in fundum ollæ conjiciunt, superimposita cupri bractea, sed est libris quinque cupri, super libras septem hujus misturæ, quam ordinarie proportionem servant. Ollæ hujusmodi ex argilla Nonfuchana constant, eaque vel sola, & calcinata, vel cum æquali quantitate ollarum fractarum permista, & si bene omnia subigantur per duodecim vel quatuordecim dies durant.

Fornaces, in quibus cuprum & cadmiam fundunt, sex circiter vel septem pedum profunditate sub terra jacent, suffosso per gradus & circulariter ab area officinæ ad orificium usque cavernæ solo, per quod orificium ignis simul & materialia in fornacem conjiciuntur, quæ in meditullo suffossi soli & eadem cum solo & area fornacis perpendiculari sita est. Tres vel quatuor in diametro circa fundum pedes lata est, sensim & per gradus in coniformam circa orificium desinens, quod quidem orificium pedis unius in diametro latitudinem habet, & extrahendis igni & ollis abunde est. Hoc orificium ferreo gaudet operculo, & exiguo foramine, moderando igni. In fundo fornacis tubus est oblongus, vel locus concavus, per quem foliis ignem excitant. In principio ignem adhibent maxime moderatum, gradatim illum augendo, usque dum cuprum liquari, & cum cadmia permisceri videant, id quod frequenter horis duodecim exactis contingit. Singulis duodecim horis, numerando à quinta matutina ad quintam vespertinam, bracteas suas immittunt, & ollas suas octo ut plurimum vel decem numero oblongo forcipe extrahunt, & aliquantisper loco calidiori deponunt, ut metallum citra congelationem nonnihil defervescat, ac tum demum illud in typos lapideos effundentes, bracteas æris formant, tres pedes longas, unum cum dimidio latas, & à sexaginta ad octoginta libras pendentes. Typi duobus constant lapidibus, ut mihi quidem videntur, & calcariorum genere; plures enim exiguas micantem particulas obtinent, quæ longo usu non absumentur, sed perpetim durant, ut color lapidum ex casto in rubentem arcum degeneret. Hi lapides primitus ab Hollandia advehebantur; sed postea nonnunquam in montanis Cornvallix inventi sunt, magnitudine & forma sepulcralium. Calefaciendi sunt horis aliquot ante quam metallum injiciatur, nisi enim id fiat, metallum diffugit, vel typis ruinam minatur. Plures istiusmodi typos in promptu habeant necesse est, nam post tridui usum, ut ajunt, delectantur & sebo atque carbonibus reficiendi sunt. Notandum est, misturam lapidis calaminaris & carbonum semper subjiciendam esse bracteis cupri, ita enim cadmia calore fornacis & carbonum admittance suscitata, facillime penetrat, & cum liquato cupro sensim permista, unam massam constituit, atque illud compositum perficit, quod æs vocamus: cum è contrario cadmia cupro imposita avolutura sit; quanquam ne sic quidem omnis ejusdem ascensus impeditur, sed magna pars ejusdem avolando lateri fornacis adhærens, pro diverso situ, nec non figura & colore diversa nomina sortitur, & à Plinio lib. 34. cap. 10. *Capnitis, Boricis, Placitis, Onychitis, Ostracitis* vocatur, & semper aliquam cupri particulam continent, quæ affusione aquæ fortis, vel si diutius libero aëri exponatur separari ab iisdem haud diffuciliter potest: quin ubi è fornace eximuntur, colo-

rem quandoque in illis deprehendes ex cæruleo viridantem. Augmentum ponderis à libris 38. ad 40. ascendit, ita ut sexaginta libræ cupri, addita cadmia, efficiant centum libras æris. Nota ignis ne sit vehementior, nec ollæ fuso cupro diutius in fornace permaneant, ne cadmia ante avolet quam carbones eidem admitti & in fundo ollæ quiescentes in cineres conversi sint, qui non raro integri & illæsi reperiuntur, utur ollæ per plures horas in continuo calore steterint, id quod necessarium est fieri, cum cuprum & cadmia simul plus temporis ut fundantur requirant, quam cuprum per se & solum separationem cadmiæ & metalli quod atinet, his quæ jam dicta sunt illud subjiciens, æs ubi in fila ducitur, toties calefaciendum esse quoties trahentis vim sentit, secus si fiat dirumpitur: ita tamen temperandum est calori, ut cerasi instar rubescat cuprum, nec ultra: etenim si ultra hunc caloris gradum procedas, cum magno possessoris damno cadmia decedit, id quod levi momento evenire potest, cum æs in tenuia fila ducitur.

CAP. 16. 17. 18. 19. Tradit diversas vias efficiendi crocum Martis, sed quas cum pluribus aliis tradiderunt authores Chymici, & referri ad hæc summa capita possunt. 1. *Ad simplicem reverberationem*, citra misturam, qualem in ferreis cratibus vidi, quibus fornaces sustinebantur: atque adeo colorum quos ego nunquam vidi optimus, & maxime profundus hac ratione factus erat, in fornace, quæ distillationi aquæ fortis continue interviebat, cratibus ferreis sensim in crocum resolutis, cujus verrendo satis magnam quantitatem collegerant. 2. *Ad calcinationem vel reverberationem sulphure, sale, urinæ, vel aceto factam.* 3. *Ad solutionem* in aqua forti, Regiâ, spiritu salis vel nigri: qua ratione, exhalante aqua, colorem obtinebis rubicundum. Solutione ferri in spiritu vitrioli vel sulphuris, vitriolum Martis fit, chalcanto Anglico bonitate fere par, sed viribus in arte tinctoria & medicina minus: ex hoc vitriolo calcinato colcothar fit, communi vitriolo non ab simile, quod pictoribus subministrare materiam fraudulentæ coloris potest, sed in vitrariis fornacibus nulli usui est: omne enim colcothar plurimum terreitatis habet, quæ vitrum reddit obscurum & sordidum: atque hoc mihi in causa esse videtur, cur author noster hac in re vitriolo non utatur, ut antea in cupro.

Quantum ad tincturam Martis, id solum dicam, acida omnia, & quicquid succorum corrodendi vim habet, & in cuprum agit, eundem in ferro effectum præstare, sed ita, ut semper rubrum colorem, aliud tamen alio magis translucidum & excellentem, producat, ut jam inservire multis coloribus, & misceri cum metallicis aliis varia ratione possit: Sic croco Martis aceto mediante facto convenit cum viridi, cap. 32. 34. 35. nec non cum Smaragdo ex vitro plumbi, cap. 65. idemque crocus in pastis promiscuè ærugini additur cap. 77. 78. 79. & nigro cap. 101. At vero ut rubrum elegans habeas, crocus Martis sulphure, cap. 128. ut elegantius, crocus Martis aqua forti factus desideratur. Cæterum quomodo vitriolum vel Venus optimus ex ære color est, ita primus & præcipuus ferri vel chalybis color is est, qui aqua Regis fit, idque partim ob misturam salis Armoniæ, partim ob solutionem magis exactam.

Absolutis nunc illis, quæ primam materiam & præparationem colorum in vitro spectant, pars reliqui operis præcipua consistit in debita mistura eorundem, cum suis circumstantiis, quam partem author noster plane absolvit, quare in his quæ sequuntur oppido breves erimus, id tantum memorasse contenti, quod quondam ceu magnæ æstimationis secretum ad notitiam meam pervenit, nunc vero satis notum est pluribus. Recipe antimonii & halonitri optime triti & misti

misti ana libras duodecim, communis vitri materiæ libras centum septuaginta sex. Omnia benè mista & unita calcinentur in calcaria, & redigantur in frictam, vel quod eodem redit, Regulum antimonii ex antimonio crudo, & halonitro parat: modum Chymici omnes norunt hic regulus cum metallo mistus finalium præbet percandidum, & variis coloribus inservit.

CAP. XXIX. Porta lib. 6. cap. 5. Cyaneam gemmam colorare, quam vulgus *aquam marinam* vocat, specie Sapphiri. *Æs combustum in tenuissimum pulverem seritur, ut omnem tactum, effugiat: sin' aliter, rudior gemma proveniet, ac vitreo immisceatur. Quantitas determinari nequit: nam & meraciores & dilutiores sunt scilicet pro singulis libris singula drachmæ satis sunt.*

CAP. XXXII. De colore Smaragdino Porta lib. 6. c. 5. *Quum aquam marinam tinxeris, facile in smaragdum vertes, addendo crocum ferri, sed crocum medietas aris sit, videlicet, si primò quartam aris partem addebamus, nunc octavam croci addemus, & tantundem aris. Notabis, post colorem injectum per sex horas simul coquantur: ut materies gemmarum exclarecat, quod colorum injecta nubila contraxerat. Ignis post paululum decreseat, donec fornax refrigeretur: tunc olla detrahatur è fornace, confractaque ementitos pretiosos lapides largientur.*

De roseo colore, quem *Rosachiero* vocant, Porta lib. 6. c. 9. *Peritiores recentiores vitrarii in colorando smalto rosei clari coloris; vulgus rosachiero vocat, non parum insubane, videntes majores nostros, quod illud satis artificiose & pulcherrimè consunxerint.*

CAP. XXXVII. Author noster suadet, ut ipsi aquam fortem præparemus, atque id quidem non sine ratione. Etenim libra una aquæ fortis vulgaris; ut sæpius expertus sum, non continet nisi quatuor uncias boni Spiritus: quicquid superest phlegma vitrioli est. Arsenicum album in præparatione aquæ fortis addendum esse, apud Dominam Isabellam Cortesiam invenio, cujus liber Venetiis impressus est, octodecim annis ante quam hoc authoris nostri opus in lucem prodit. Variæ sunt compositiones hujus aquæ, sed omnes halonitrum, seu maximæ virtutis, ingrediens recipiunt. Plures illam ex vitriolo parant: nonnulli ex calcantho Anglico, quod aquæ genus communi usui & vulgo tinctorum inservit. Gedauensi tamen vitriolo facta melior esset, quâ purgatores metallorum utuntur, qui intolenti aliquid in nostro Anglico deprehendunt. Nonnulli loco Vitrioli alumen addunt; sed hoc præter debile phlegma nihil reddit. Alii sal gemmæ addiderunt; sed usu compertum est, istiusmodi sal nihil spirituum largiri, sed collo retortæ adhærendo obstruere aditus spirituum, & diffingere vasa. Ubi ruber fumus transit, omnes halonitri spiritus ascenderunt, & extinguendus est ignis, quicquid enim sequitur, vitrioli spiritus est, qui operationem spirituum nitri in solvendis metallis impedit. Apud purgatores metallorum sæpius vidi, intra viginti quatuor horas bis extractam optimæ notæ separationis aquam quo temporis spatio & ignis gradu parum spirituum vitrioli ascendere poterat, ut qui trium dierum ignem continuum & ultimo quidem biduo vehementissimum ut extrahantur desiderant: sed validitas nitri in aqua fortassis adjumento est, ut citius ascendant. Unum author noster omittit, quod tamen summe necessarium, & purgatoribus metallorum semper in usu est, nisi aquam velint sordidam, cujus rei modum & summam Beguinus tyronicus Chymici lib. 2. cap. 3. tradit: *Cape inquit quartam partem istius destillati, injice puri argenti drachmam unam, & solve super prunis: solutionem infunde tribus aliis paribus, alba evadent instar lactis, sine residuo & purum effunde: id quod resedit purgatores fixum vocant, & in vas aquæ mensuras viginti continens effundunt, & statim omnis aqua la-*

teum colorem acquirit. Novi purgatorem, qui omnem suam aquam fortem in olla ferrea præparat, & experimento deprehendit, aquam prodire solito fortiorum, præterquam quod compendium ollarum & ignis facit: methodum apud commentatorem Beguini vide.

CAP. XL. Ut aquæ Regis tantum salis armoniaci addas, quantum dissolvere potest, id verò necessarium non est: unciam unam cum dimidia in pintam dedisse sat erit. Miror Beguinum in præparanda hac aqua halonitrum & sal armoniacum distillando conjungere: me experientia docuit, dimidiam aquæ Regiæ quantitatem, in qua sal armoniacum dissolutum est, idem fere præstare, quod alterum tantum illius aquæ cum eodem sale distillatæ. Aqua regis argentum denigrat tantum: bractæas cupri stannique tenuissimas ægrè, & haud secus ac aqua fortis auri folia corrodit. At verò si aquam, dissoluto jam auro, detraxeris, argentum & reliqua metalla aggreditur.

CAP. XLII. Methodus faciendi Chalcedonium, Iaspidem & Achatem mihi eadem esse videtur cum illa qua chartis varios colores & undas, marmoris instar inducunt, quamque Kircherus lib. 10. de Luce & umbra & ex eo Schottus part. 1. l. 5. chrom. 9. exactè describit. Methodus est. In conveniente liquore cætos, & istius modi colores dissolvunt, qui in aquam missi, tarde, aut nunquam, ac tum demum inter se coeunt, ubi chartæ ad inducendam varietatem colorum applicantur. Eadem ratione diversi generis materialia, quæ utut mista perfectam unionem respuunt, necessitatio metallum variis coloribus inficiunt. Plurima tinctorum experimenta profiteri possent in quibus utut agitari & confusi, suum tamen liquores singuli locum & stationem occupant. Circa trinam præparationem Chalcedonii observo. 1. Quod omnis colorantia materialia, zaffera scilicet, magnesia, argentum, chalybs, smaltum, & plumbum, sed non eodem semper modo præparata, unamquamque Chalcedonii præparationem ingredientur. 2. Quanto major ingredientium varietas est, tanto meliorem esse Chalcedonium: prior enim simplicior est secundo, & secundus tertio, & author noster tertium præ secundo, & hunc præ primo commendat. 3. Esse in unoquoque præparationis genere aliqua ingredientium, quæ vitro nullam omnino colorem tribuunt, qualia sunt tartarum, fuligo, sal armoniacum, Mercurius. 4. Nonnulla ex his unguinosæ naturæ esse, ut sunt plumbum, fuligo, tartarum, smaltum, id quod unionem materialium impedit, & in causa est, cur aliis ab alio secedentibus in metallo refrigerato undæ appareant, & diversi generis elegantissimi colores. Magna pars artis in debito caloris gradu & methodo procedendi sita est; & in hoc postremo totum marmoris instar colorandæ chartæ artificium consistit.

Porta vitrum variis coloribus inficere docet, idque aliis intentus casu invenit. *Calx stanni colorem perspicuum vitri crystallini tollit, & variè colorat: nam dum vicissim inspargitur vitris crystallinis rotæ perpoliis, & succenso igni expositis, variè colorat, & tenebrosa reddit: nam pars una lapidescit, altera coloratur variè, ut opalus videatur. Sed oportet sæpius ex igne eximere, & accommodare, usque dum voti compos fiat.*

Hic & pluribus aliis in locis author noster docet, vitrum in quamcunque figuram elaborari posse. Ego, ut Lector quo delectetur habeat, curiosissima eorum quæ legi enumerabo. Card. l. 10. c. 52. de rerum varietatibus vidit, & boves duos, ala muscæ & cætos. Agricola lib. 12. de re metall. Morani arbores, naves & alia plura famosa & mirabilia opera vidit. Dominus Hovvelius pag. 39. navem vidit vitream cum malis, velis, funibus, & omni armamento, nec non proâ, puppi, anchoris, & scaphâ: vitrum item armatum. Vormius in Musæo suo parvas vitreas statuas, tam virorum,

quam rerum aliarum habet; insigne item templum S. Marci apud Venetos, intus musaico opere elaboratum & certas historias aptis coloribus representans, atque hic illic auro exornatum.

CAP. XLVIII. Porta lib. 6. c. 5. ut amethysti colorem reddat, drachinam unam Magnesiæ in singulas metalli libras dat.

CAP. XLIX. Porta pro Saphiro drachmas duas Zafferæ metallo dat, & quanto diutius in igni morabitur (sunt verba ejusdem) nitidior colore suffunditur, sed irrequiete remiscendum est.

CAP. LVIII. Rubrum plenum, quod rosso in corpo vocant, de quo Imperator l. 4. cap. 1. Corpus habere dicuntur illi colores qui opaci sunt & non transparenti: Corpus non habere ille qui transparenti.

CAP. LXI. Vitrum plumbi apud nostrates vitrarios in usu non est, idque propter nimiam suam fragilitatem: Sed ratio calcinandi plumbum, quo merces suas inducunt, satis nota, & in usu communi apud figulos est. Quod si hoc vitri genus atque ut crystallinum tenax esset, ob elegantiam coloris sui reliqua omnia longe superaret, id quod nemini ignotum esse potest, qui metallum illud novit, & experimento Kircheri, quod facile & nullo sumptu paratur, evincere licet, ita enim ille lib. 1. de luce & umbra par. 3. c. 5. Si argentum vivum, vapore plumbi congelatum, cohibeantur aneo impositum, carbonibus accensis calefeceris ecce mox tibi in liquefacta materia tanta comparebit colorum varietas, ut nulla major in mundo concipi possit. ita lucidorum, ut nulli eorum quos apparentes vocant iis comparari possint. Memini, cum in eo essem, ut cerussam igne in plumbum reducerem, me immittendo ferreum acuminatum, præter aliquot grana plumbi acquisivisse satis magnam quantitatem materiae fragilioris & opacæ, sed elegantissimis coloribus, ceruleo, viridi & qui reliquos superabat flavo exornatæ, Italiquatum plumbum, addita aliqua sulphuris particula, colorum reddebat consulem, omnium quos unquam ego vidi optimum, nec non colores alios minime deciduos, & qui duodecim jam annum perdurant. Libavius de transmut. metall. l. 7. cap. 10. ait excoctores metallorum, nec non illos qui rei metallicæ examinando præstant; quotidie plumbum in vitrum convertere idque vitrum nigro, rubro, flavo aliove colore infectum esse, prout plumbum diversimodè calcinatum, vel calcinatione lithargyrium, cerussam vel minium convelluntur est. Quercianus in Hermet. med. defens. cap. 9. affirmat se propriis oculis vidisse anulum, ex vitro plumbi factum, qui vino per noctem infusus, vim purgandi nunquam non exerebat. Eadem in bismuto vel stanni vitro varietas videre est, de qua Libavius Synonym. arcant. l. 6. c. 4.

Plumbum in se rediens, fundum ollarum perumpit. Plumbum difficulter ita calcinari potest ut non aliqua ejusdem particulae integræ permancant, quæ postea calore fornacis in plumbum reducuntur: idem de cerussa dictum est, idemque in minio locum habet, quomodocunque etiam calcinetur. Cur autem ollas perumpat, hoc mihi in causa esse videtur, quod denudè ibidem calcinatum, pinguedine & mole corporis sui poros ollarum occludit, & impedimento est, quominus ignis in metallum agat, quâ actione impediri vis omnis in argillam vertitur, ex qua ollæ constant, ac si ulterior plumbi calcinatio accedat, ollam perfringi necesse est. Solum autem inter metalla plumbum deorsum vergere, cum metalla reliqua in superficie ollarum nacent, id præterquam quod reductione plumbi satis liquet; etiam crucibula aurifabrorum & excoctorum testantur, quæ externa facie & pondere quantitatem assumpti corporis produnt. Certum est, testas nonnihil argenti inhibere, quam ob causam iterata fusio & ignis vehemens adhibetur: nec du-

bium nullum est, quin idem crucibulis accidat: utrum enim Regii apud nos rei monetariæ perfecti id contra eos, qui aurum in massa inferunt, strenuè negent, illi tamen, qui aurifabris præstant, recoquendo argentum extrahunt. Exiguas tamen aliquot argenti particulas hoc casu tantum recuperare licet, idque mediante plumbo, quo purgatores metallorum simul & qui examini præstante atuntur, nec est præter argentum ullum aliud metallum, quod in testa descendat. Altera hujus accidentis ratio esse potest, quod plumbum in poros ollarum sese insinuans, & sensim prorepens, ac gravitate ac pondere corporis sui fundum ollæ pertransiens foramina post se relinquit, per quæ metallum effluit.

Author noster nullam hyacinthi ex vitro plumbi, nec vitri stanni vel capri mentionem facit, supplet hunc defectum Porta lib. 6. cap. 7. ubi hæc leges: Hyacinthum effingere satis pulchrum, nec à verò admodum dissimilem. Fictili olla & dura plumbum immitatur, ac vitrariorum fornaci igni accommodetur, immoreturque per aliquos dies, sic plumbum in vitrum vertitur, & hyacinthinum colorem imitabitur. & cap. 9. Testaceo vase igni durabili conjicito stanni libram, sinio calefiat & liquecat, & vitrariorum fornaci in assu flammæ accommodetur ferreis forficibus, viduo vel quadratio: post amoto & frigescente vase frangatur, & in superficie vitrum invenies croci coloris, turbidi, & si diutius in igne steterit, evadit perfectum nec melius in hoc genere cognovimus, ex multis quæ experti sumus. Sed in pulverem vidè redactum injici oportet, quod non solum pila & molis, sed porphyretico lapide, uti opus erit. Si flagrantius evenierit, vitrum addendo diluamus. Est alius consociendi modus amicis reservatus. Sine novem partes stanni combusti, septem plumbi, bina cinnabaris, ferrei vocati Hispanici & tartari pars dimidia, lapidis sanguinei simplex, rubri pictorum quarta, age ut scis. De vitro cupri l. 6. sic. Argentum valde dissolves aqua, projectis in aquas arcis lamellis, herebit illis; collectum & exsiccatum vase fictili vitrariorum fornaci accommodabis, non enim multo dierum spatio in smaragdum convertitur. Sic de aliis metallis periculum vobis relego, sat erit nobis viam aperuisse & investigasse.

CAP. LXXII. Smalti pictorum cerulei. Hujus compositionem nullibi apud scriptores invenio, sed ab honesti nominis vitrario edoctus sum, ex zaffera & cineribus smegmaticis simul calcinatis illud in fornace, ejusdem cum vitraria formæ fieri, idque à se in Germania factum esse. Sed de hoc omnique alio naturali & artificiali colore in tractatu huic rei speciali dicato.

Aurum impedit effervescentiam vitri: Eadem ratione si parum olei vel sevi in ollam bullientis sacchari miseris, non exundabit, utut cum impetu sursum feratur.

CAP. LXXIV. Hæc crystallum colorandi ratio veram & naturalem methodum demonstrat, qua opalus, achates, jaspis, chrysolitus, oculus cati, marmor &c. varietatem colorum, quam possident, acquirunt: nimirum ab exalatione mineralium, quæ præexistens materia lapidis afficitur, haud secus atque corpus crystalli ab auripigmento ignium vi suscitato & adæto vario colore tingitur. Quod si materia lapidis primo liquida, ideoque tincturæ capax, istiusmodi matricem vel alvum habet, ex qua exhalatio simplex procedit, simplex quoque & uniformis ille color erit: si varia, color quoque pro diversitate ascendens vaporis varius erit. Veritas hujus rei frequenter observatione in lapidibus translucidis majoribus confirmatur, quorum pars naturali colore tincta; pars ab omni calore vacua est, & instar glaciæ transpatet ut jam universus lapis aquæ congelatæ speciem referat, cujus pars primo congelans accessionem coloris sensit, reliqua non item, id quod in amethystis frequentius quam gemmis aliis

alijs videre est, quorum nonnulli aliquâ sui parte colorati sunt, nonnulli colore vel plane vacant, vel certis locis diversos colores referunt, quod alijs etiam quandoque gemmis evenit.

C A P. LXXV. *Smaragdos imitari posse, &c.* Nihil hic quod alicujus momenti sit, tantum inventa sophismati vel fraudi via est. Cæterum, quandoquidem ars perfecte imitandi gemmas inventori plus lucri allaturâ esset, quam adulterina alia quævis, idque sine aliquo forte hominûm damno, imo si Chymicis credimus, cum magno eorum emolumento; cumque illa ars legibus quod ego sciam obnoxia non sit, nisi aurifaber gemmam adulterinam pro verâ vendat; mitum non est, ad consequendum hunc finem adhibita esse tot remedia pastarum, duplicationum, foliorum, tincturarum in fundo, aliarumque compositionum & artificiorum, quorum maximè genuina & naturalia videntur, quæ author noster profert. De fraude in duplicando Ferr. Imperatus lib. 20. c. 14. refert: Mediolanensis quidam gemmarius smaragdum vendebat duplicatum novies mille ducatis, & fraus diu latuit.

Chymici his pastis peculiare, sed barbarum nomen imposuerunt, quod nullibi præterquam apud illos invenias: *Amausa* vocant: ita Libavius, Joannes Isaacius: sed Glauberus *Amausus*: id utrum à *Musaico* [non *Mosaico*, ut Vossius in glossa: in suo prolixè demonstrat] derivetur, determinare non auserim: etymon certe probabile admodum est: etenim *Musaicum* opus Hermolaus Barbarus ita describit: *Musaicum opus, quod vulgo Museacum vocant, testiculatum lapillis variorum colorum, ex quæis arte compositis & coagmentatis omne genus imaginum redditur.* Hæc opera antiquitus ex varii generis, & colore frustis marmoreis in figurâ animalium formabantur, interposito nonnunquam auro, ut ex Plinio l. 36. c. 1. & Seneca ep. 86. apparet. Philander in Vitruvii lib. 7. c. 1. meminit reliquiarum pavimentorum quorundam, quæ ipse viderat, in quibus tessellatum marmor, crassitie minoris fabæ, sub variis coloribus piscium aliarumque rerum effigiem accurate æmulabatur. Nunc in locum marmoris, aliorumque lapidum successit vitrum tinctum. Libavius in suo syntagmate ait: *Saraceni is authoribus terracenea vocatur.* Sed pastas & *Amausa* inter se confundit. Verum est, si genus respicias, alterum ad alterius naturam quamproxime accedit, in eo tamen differunt, quod pastæ crystallo præparatæ, & cum modico vitri mista constant & in pelluciditatem gemmæ elaborantur: sed encausta vel *Amausa* plumbum calcinatum & stannum pro basi habent, à quo ob magnam ejusdem ingredientibus admixtam copiam opacitatem, corpus, & soliditatem accipit. Glauberus Furni Phil. lib. 4. putat casu in ventas esse pastas, ab iis, qui igne vehementi calcinata corpora reducentes, eadem in vitrum convertunt, & ex Isaaco Hollando addit, ex metallis vitrificatis & reductis nobilissimum metallum produci, ab auro nempe tincturam, ab argento aurum, & ab ære argentum &c. & insigne vitrum ex metallis fieri posse, si crucibula satis valida adessent. Quicquid porro pluribus verbis prosequitur, præparationem crystalli, ejusdemque efformationem & tincturam concernens, nil nisi vulgare est.

C A P. LXXVI. Hartmannus in praxi Chym. hanc peculiarem viam præparandi crystallum pro gemmis habet: *Salis inquit tartari uncia duæ in aqua solvantur, hoc pondus unum cineris fagi ut cineri cappella fiat similis, humectetur: inde globuli in magnitudine pomorum formentur, exsiccantur, & olla operculo connecta, in fornace figuli exsiccantur: ita enim globuli aliquantulum colliguescent, sibi que invicem adhærebunt: hi itaque subtilissime conterantur, & lixivium ex eis paretur: hoc in saltem usque coaguletur, & in hoc lixivio crystalli rotæ & tandem exstinguantur, donec intra digitos con-*

terere possit: hoc peracto, de sale in vase relicto aliquid per solutionem, coagulationem, & calcinationem rotæ repurgetur, donec nulla amplius facies in solutione compareant. Eodem modo etiam saltem tartari, ex tartaro albo præparatum, toties per solutionem, coagulationem & fusionem debet purgare, donec ab omnibus fecibus sit mundus, & in igne non amplius strepet. Recipe hujus salis tartari partes duas, salis præcedentis præparati partem unam, hæc invicem fiant fluida habebis materiam, quæ omnes colores totius mundi recipit, & gemmæ Orientalibus similis apparet. Authores Chymici plerique omnes crystallum hac ratione præparant: nonnulli aceto vini utuntur, aquæ limpidæ loco. Ex iis, quæ de vitris stillatitiis postea dicturi sumus, facile est discernere, quænam optima ratio, ideoque sequenda sit: & optima proculdubio hæc erit, ut eandem forti lixivio restinguamus.

Pastæ eadem quâ vitrum ratione conficiuntur, nisi quod hoc metallo cryallino, illæ crystallo præparatæ constant, adhibitis iisdem utrobique coloribus, ideoque Porta vitrum suum tinctum, amethysti, rubini &c. nomine dignatur: periculum fieri poterat in adamante nostro Anglico, ut qui crystallo durior puriorque est.

C A P. LXXVII. Boetius de Boot, insignis de regemmaria scriptor, de smaragdo ita habet: *Omni-bus fere modis adulterari smaragdus possunt: nobilior modus sit crystallo, vitro, & silicibus calcinatis, & fuscis, si iis exigua quantitas minii adjiciatur. Ita ego præstantes feci. Alii as ustum in tenuissimum pollinem redactum addunt, adjecto croci ferri dimidiato pondere, ac sex horarum spatio coquunt, ac vas per se refrigerari sinunt, gemmamque politura committunt. Si exacte quis operatus fuerit, Americanis omnino similes efficiet smaragdos.* Garcias ab Horro eodem in Balaguata & Bisnager ex fragmentis vitri majoribus egregie coloratos & prægrandes fieri tradit. Dalechampius putat jaspidem addendum esse. Birellus libro octavo, cap. 9. & 10. &c. eandem quam auctor noster compositionem, aliasque plures tradit. Aliiter etiam ex minio & æris squama fit, capite quinto, cap. 78. Hartmannus varias rationes tradit, ac prior quidem, quæ animâ Lunæ, Solis & crystalli, nec non modico salis armoniaci fit, obscura est, & intelligi non potest: *Secunda* ex uncis quatuor minii, duabus crystalli præparatæ, & drachmis duabus auri fit. *Tertia* ære calcinato & in pollinem redacta constat, additâ duplici quantitate arenæ vitrariæ, omnibus qui per dies quatuor igne vehementi, ac tandem per diem dimidium vehementissimo excoctis. *Quarta* crystallum ipsius præparatam & æris modicum recipit, eaque materiâ ollæ ad medietatem usque adimplentur; inde per sex vel septem horas leni igne, & postea vehementi liquatur, ignis aufertur, & ollâ contractâ, quicquid intus est plumbi spuma obductum, ab heterogeneis purgatur, & smaragdus apparebit elegans, qui in frustra dissectus debite præparandus est. Sed non eodem semper modo succedit hoc negotium, & aëre opus est sereno. Quare augendo dosin, ollas adhibet quatuor, & una eademque opera diversi coloris smaragdos alijs præstantiores producit. In primam ollam scrupulum unum æris; in secundam scrupulos duos; in tertiam drachmam unam; in quartam drachmam unam cum dimidia recipit: atque hic subsistit; si enim plus æris addas, vitrum minime translucidum erit. Idem processus in Jaspide & topasio, addito croco Martis, & in saphiro additâ zafferâ locum habet.

Sed in hac compositione Mars Veneri suæ neque corpus, neque splendorem dat. Cardanus de var. lib. 10. cap. 52. hunc colorem ex lapidibus fluviorum, in albedinem calcinatis, & cum æquali quantitate minii in crucibulo mixtis & liquatis, bis repetito opere, producit: sed

sed hæc procedendi ratio plane obscura est.

Isaacus affirmat, vitriolo id fieri calcinato, & residuo calcis, primo aquâ falsâ, & postea recenti limpidâ, utrinque calida, subactis, qua ratione effectum reddunt longè quam antea maiorem, & facilius, magisque perfecte liquefunt.

Seneca epist. 91. Democritum ait invenisse rationem vertendi lapides in smaragdos: & Plinius l. 37. c. 12. tradit, ex parte in scriptis authorum diversas rationes tingendi crystallum, colore smaragdi, aliarumque gemmarum, quæ omnia ab iis quæ l. 36. c. 26. de vitro obsidiano & myrrhino diversicolore dicta sunt fortassis non longe abeunt.

CAP. LXXXI. Bapt. Porta topasium ita fingit: *Ad singulas vitri libras quarta uncia pars ferrei croci remiscetur, atque additur tantillum minii, ut nitidius ruilet, & ad singulas libras tres minii uncias addemus: sed primò inditur minium post crocum.* Bootius hæc transcribens, ex autore nostro hæc subjungit, adjiciens: *Fac pollinem ex are usto, cinnabari nativo: ac crystallo, quadruplumque stanni usti adde, fusorioque vase ex terra fortissimo inde, fornacique committe per diem; sed non sit ignis vehemens, ac semper eodem gradu permaneat, facile enim fluit pulvis predictus.* Birellus hoc ultimo processu utitur, mutato cinnabari in minium, sed retentis iidem verbis, ita ut Bootius hæc Birello, Birellas Portæ debeat. Hartmannus & Libavius cerussæ uncias tres, cristalli præparatæ dimidiam adhibent. Author *quadrig. chym:* sal stanni in usus topasii facit.

CAP. LXXXII. Porta chrysolitum ita eementitur; *ubi topasium effeceris addito plusculum aris, & hoc ut aliquantisper vireat; nam chrysolithus à topasio non nisi quod nitidius niteat differi.* Claveus argentum vidit per duos menses in fornace vitraria calcinatum, cujus pars duodecima vitrum reddebat citrinum.

CAP. LXXXV. Glauberus saphiri colorem fingit marchasitâ argenti in aqua Regis dissolutâ, & liquore silicum præcitâ.

CAP. XC. *Ex auro colorem rubrum admirandum.* Chymistæ menstruis suis auream ex auro tincturam promittunt: ego non infirmæ conditionis Chymicum audiivi deposito haud levi pignore offerentem, reducturum sese in pauca numero grana omnem auri quantitatem, quam extracta ab illustri ejusdem professionis viro vel optima tinctura contineret, sed oblata conditione nemo utebatur, ut jam in hoc processu aliquid deperisse necesse sit. Certo novi aurum aquâ Regis dissolutum, eundem tingere saturo purpuræ colore, idque per dies aliquot, & magnam aquæ copiam, assusâ ac solutione eodem colore tingi. Glauberus egregium saphiri colorem eidem tribuit, si liquore silicum præcipitur. Tinctura argenti cœruleum colorem non exhibet, sed album, teste omnem exceptionem superante auctoritate Dn. Boylæi, in experimentis suis physiologicis p. 60. ideoque jam antea dixi, Cœruleum colorem procedere ab ære, cui argentum admistum sit.

Ex granatico Bohemico. Boetius de Boot affirmat, granatos Bohemicos colorem in igne suum servare, id quod aliis ferè omnibus datum non est, ideoque Bohemici ad hos usus optimi sunt: calor tamen vitrariæ fornacis colorem eorundem absorbit, quem in igne ordinatio servat.

CAP. XCI. *Cerussam iritam.* Author noster in præparando saccharo Saturni duabus viis utitur, una quæ mediante cerussa, altera quæ lithargyrio fit: cap. 123. hic saccharum calcinat, & ex saccharo calcinato novum saccharum producit. Chymistæ communiter minio, nonnulli plumbo calcinaao utuntur: sed omnes eodem tendunt. Observatum tamen est, à minio majorem salis copiam prodire, neque id mirum, majorem enim quam alia omnia calcinationem expertum est.

Omnes solo vini aceto distillato utuntur. Begninus tamen plegma ejusdem substituit, ad quæ jure Commentator, *Deleatur.* Duo hic notabo: 1. Multo melius & minus sumptuosum esse, si recenti semper minio acetum affundas distillatum, quam si illi: quo usus es antea. vi. lius enim est minium, & quicquid eidem boni sacchari inest, prima statim vice extrahitur; ut taceam compendium aceti fieri, id quod in emolumentum operatoris cedit. 2. Alterum, quod hic inferendum mihi videtur nova ratio est, quam apud Chymicorum neminem legi, sed operando ipsemet inveni, quæque citius & uno momento rem perficit, atque in Chirurgicis negotiis, quibus illam dicavi, ordinariâ non peior, sed, quod fac scio, melior est: modus procedendi hic est: Recipe tenuissimas plumbi laminas, vel quod melius est, illud plumbi genus, quod in fenestris diu persistit, idque aqua forti dissolve, (aqua bonæ notæ suo ponderi æquale plumbi pondus absorbet) & plumbum dissolutum brevi in fundo vitri saccharum acquirit. Dimidiatæ horæ spatio non exigua ejusdem quantitatem in exiguo vitro, & modico arenæ, vel cinerum calore, & ut battillo super igne perfeci, & certe hic processus, ut magis expeditus, ita minus sumptuosus est: quid autem hæc medicina in vitro præstare possit, dicere non habeo.

CAP. XCIII. Hic sextus liber de encaustis agit, quæ Anglis *Emanuels* vocantur, fortè quia multis eorum in annulis usus est, vel voce deducta à Germanico *Emallieren*, quod Gailli, à *maille* vel *macula*, quam representat, *Esmailler* vocant. Latinis ab *invenendo*, quod *καίνω*, *Encausta* vocantur; atque inde Lexicographorum *Encauston*, *encaustice*, *encaustes*. Veterum tamen *encausta*, de quibus Vitruv. l. 7. c. 9. Plin. l. 35. c. 11. Mart. l. 1. &c. à nostris plane diversa erant. Salmastium in exerc. Solin: vide, qui de veterum encausto; & tribus ejusdem speciebus prolixè agens, tandem vere concludit; periisse hanc artem. Porta ex Italorum *Smalto* vocem Latinam facit, & *Smaltos* vocat, quæ Libavio *Smalta* vocantur.

CAP. XCIV. *Encaustum album.* Aliter ex Regulo antimonii fit, de quo dictum est supra Libavio & Porta illud ex una parte plumbi calcinati, duabus stanni calcinati, & dupla quantitate vitri perficiunt.

CAP. XCV. *Colorem Turcoïdis.* Porta solâ Zaffra parat.

CAP. XCVII. Porta, ut *smaltum viride* saturum efficiat, æs ustum, vulgo, ut ait: *Raminella*, & ut author noster habet: *Ramina* dictum; ut dilutius, scoriam æris igniti adhibet, quæ dum malleo percutitur, decidit.

CAP. C. *Nigrum*, quod Libavius & Porta ex purpureo & cœruleo colore faciunt, magnâ constat atque Zafferâ, idemque processus, eademque per omnia dosis est; cum ea, quam author noster præscribit.

CAP. CII. *Rubrum aurinatum*, quod in textu purpureum redditum est, ego rubrum voco, & Libavio croco Martis fit.

CAP. CVIII. *Lixivium ex Soda vitrariorum & calce.* Multum curæ impensum est in hoc menstruo: id quod calce & Soda sit, optimum est; cineres tamen ut vocant, ollares & alumen idem præstant. Novi ingeniosum virum nobilem, qui omne genus colorum pro plantis, mediantibus his sibi comparavit, & flores cujusque generis, maximè conspicuos, propriis suis atque genuinis coloribus in ingenti volumine ad vivum adumbravit. Virtus cinerum ollarum, quos tinctores nostri *Vpare* vocant, in Indico & Gasto conspicua est, quorum neutrum sine his cineribus tincturam suam reddit. Colores magis perspicui solutionem aluminis tantum requirunt, à sale acriore destruuntur, ut in arte tinctoria & cineribus smegmaticis apparet, & à tartaro ut cap. 4. flavus vitri color non producitur.

CAP. CX. Ex quibuscunque herbis vel floribus. Experimentum authoris bonum est, at verò si panniculus lineus colore inficiatur melius signum erit. Nautis peregrè euntibus à Mercatoribus illud præscribitur ut plantam mandentes videant an saliva benè tincta sit, quo casu bona est: idemque, in charta tenui & linea veste locum habet.

Ego catalogum vobis exhibebo plantarum &c. quæ colorem suppeditant, & consequenter aptæ sunt ad extrahendam laccam, & primò quidem earum, quibus tinctores utuntur, quales sunt *lignum nephriticum*, & tres illius plantæ species quam *Fusticks* Angli vocant, pro flavo & viridi colore, *Campegiana* & *Sylvester* duo scilicet granorum vel baccatum minorum genera, quæ ex India occidentali ad nos devehuntur, & eundem quem *coccum insectorum* colorem, sed minus illustrem præbent, ideoque cocci vices obeunt: *papaver erraticum*, *sumach*, *glycyrrhiza*, *curcuma*, *flores caribæini*, anotto quod ex fūco marino tinctorio, urina & adipe fit, & venustum colorem coccineum præbet: *genista tinctoria* pro flavo.

Alia sunt quibus tinctores non utuntur, *crocus* scilicet, *phalangium*, *iradescanti* quod plenum & elegans cæruleum reddit: *cyaneus*, quo illustris tinctorem cyaneus constat, *alga marina tinctorum*, diversa à fūco: utriusque mentionem Joh. Bauhinus facit: *hæacinthis colchicum nostrum purpureum*: *baccifera triplex rubrum profundum exhibens*: *heliotropium*, in ejus succo panniculi tincti colorem illum exhibent, quem vulgo *Tur-sole* vocamus: *Blattaria* flore cæruleo & flavo: *convolvulus Americanus* folio contracto. Nonnullæ plantæ succum coloratum habent, quales sunt *tithymalus*, *sonchus asper*, *dens leonis* folio hirsuto, *herci barba*, *periploca*, *rapunculi*, *lactuca* &c. quantum pars maxima, si in sole siccetur flavescit, quo ipso inducor ut credam, cambajam tithymali succum esse, at verò *hypericum* & *androsamum* rubentem succum in capite gerunt: *chelidonium majus* & *felsel Alpini* flavescentem præbent. Ita plurium plantarum baccæ colorem exhibent, ut sunt *solanum hortense* & *lechale*, *uraque bryonia*, *rufcus*, *polygonatum*, *aconitum bacciferum*, *rubus Idæus*, *cerasus ferax*, *Spina cervina*, *pidiorum succus virides*, *nucis juglandes*, *Bezetta* seu *terna-solis* *Bezadini* apud *VVormium* in musæo l. 2. cap. 34. ubi illam sic describit: *Pannus subtilis est lineus tinctura rubicundissima & eleganti imprægnatus, mihi à Serenissimi Principis Christiav. V. Pharmacopæo industrio, Christophoro Hersfuri dono data, sed quomodo præparetur, quæque ejus sit conficiendi ratio ignorabat ipse. Samali rubri tinctura videtur, qua pannus est infectus. Ad rubram tincturam corpori & esculentis inducendam utuntur, ut *terna solis* vulgari: sed hæc longè elegantior: cosmeticis apta hæc habens peculiare, quod aqua colorem suum immersa communicet, agrè vino, neuiquam Spiritui vini. Hactenus ille. Vidi hanc tincturam gossipio factam, quæ pro fūco inserviebat, ac nostratibus satis familiaris est. Et insignis procul dubio laccæ, inde præparari possent: *Amaranthi*, *balaussia*, *semen heliotropii tricoeci*, quod primo affricu viridem, inde cæruleum, & postremo purpureum colorem reddit, teste Libavio: *fragmenta Alaterni*, teste Clusio, *nigrum flores eichorei*, *flores scabiosi Indica chrysanthemum Creticum*, *nasturtium Indicum*, aliæque plures, de quibus volente Deo post hæc prolixè; specialiter, quia Botanicorum nemo tincturas plantarum observavit, nec easdem in certas classes digessit, cum tamen usus earundem in negotiis longè maximus sit & nonnullæ ex his, de quibus antea locuti sumus à mercatoribus in usum deductæ sint. Quorum folia colorem producant, hæc sunt: *Siramonium*, *arbor tinctoria Virginienisium*, cujus folia si manu fricentur, viride dabant, omnium quot*

quot ego ex vegetabilibus vidi maximè saturum: *folia acanthi*, *folia perigenuini*; *flores nigelle Hispanica*, utut cærulei, si manus charta vel panno linceo fricentur, elegans viride præbent.

Hæc via extrahendi colores beneficio distillationis optime nota & in usum deducta est: omnes enim chymicè extracti spiritus, dum ascendunt, albicant, & infusione materialium, quæ tincturam continent, tinguntur ut in *Pharmac. Londinensi Spiritus Lavandulae compositus*, & aqua *papaveris composita*, & aqua *Mariae*, &c. & *Pharmacopœi* ferè omnes hanc authoris nostri viam docent.

At verò hæc extractio spiritus vini, ita tincti, colorem reddit emortuum, & nullius pretii, nisi in exigua quantitate, & moderato B. M. calore fiat: calor enim magis vehemens colores vegetabilium nigros reddit quin ipse *lapis Lazuli*, utut durus, calore nimio colorem suum amittit.

CAP. CXI. Hanc præparandi viam secutus sum, sed nihil mihi præter lutulentum cæruleum, ad figlina opera, ineptum reddidit. Author noster hoc *cæruleum Germanicum* vocat, nec aliter *Bicellus* l. 11. c. 106. sed hic sulphur addit, & quatuor tantum salis armoniaci partes recipit; plura ejusdem naturæ alia apud eundem invenies.

CAP. CXII. *Turcoidi deperditum colorem restituere*. Subdubito, atque adedò fando accepi, non succedere hoc negotium: melior tamen forte hæc quam *Isab. Cortesæ* ratio est, l. 3. 53. *Lapidem ultramarino* fricat, quod per diem in aqua forti steterit eaque evaporatâ siccatum pulverem adhibet. Deinde eundem primò in aquam fortem ex ære & vitriolo factam, postea in acerrum vini, ac postremo in aquam, & quavis vice per aliquod temporis spatium infundit.

CAP. CXIII. *Mistura pro speculis*. Varias earundem compositiones apud authores invenio, & quia singularem in opticis usum habent, nec Anglico sermone hactenus descriptæ sunt, quales inveni, tales hic describam. Hæc specula vel vitra *metallica* vocantur, non quod metallo constent, sed quia aliquot metallica corpora hanc compositionem ingrediuntur, & quia pondere simul & externa facie metallica corpora æmulantur. *Porta Mag. l. 17. c. 23.* *misturam pro his speculis* ita præparat: *Accipiatur olla nova igni contumax, & intus luto inducatur, ut firmiter perduret, resicari curato, idque bis iterum repetas. Igni appone, & in ea biga tartari libra liquefiant. & eisdem arsenici crystallini, ubi fumare conspicias, injice libras quinquaginta aris antiqui, atque usu autris septies, vel sexies liquefcat, ut purgeatur, defaceturque mox adde viginti quinque libras stanni Anglici, & simul liquefcat patiaris. paululum ex mistura extrahes seramento aliquo, & experimentum capies, si frangibilis, vel dura sit, si frangibilis, as adde, si dura stannum vel coqui sio, ut aliqua stanni pars evanescat, quum ad optatum temperamentum pervenerit, projectio supra binas uncias boracis, & finito quousque in fumum solvatur, deinde in typum projicito, & refrigerare finito, frigidatum pumice adfricabis mox smiri pulvere, ubi perfectè superficiem adæquatam, & perpolitam conspexeris, tripoli adfricabis: postremo stanno uto nitorem, & lucem induces. Plerique tertiam stanni partem addunt ari, ut durior massa fiat, & majorem perspicuitatem recipiat.*

Porta in prior editione l. 4. c. 23. hanc misturam ita componit: *Ita communiter ab omnibus fit. Recipe as & triplum stanni, ac parum arsenici vel tartari, ut liquefcat & incorporentur: Aliqui stanno triplum aris, nec non parum stibii argenti & albi pyritidis addunt: nonnulli plumbo & dupla portione argenti id efficiunt: ex alio etiam metallo & aliter temperato fit. Vbi jam formata fuerint, necessum est, ut poliantur & levigen-*
tur, in

zur, in hoc ut radius reflexus imaginem rei secum ferat, & specula imitentur, id quod à levigatione & apertitudine partium maximè dependet. Si mistura non fuerit satis levis deme vel tere, ut hinc imago major, illinc minor & diversa representetur. Si scabra fuerit, rotam adhibe, qua arma poliuntur, & polita erunt. Si vitrum feceris concavum vel convexum, ne motu rota vitrum frangatur, frustum ligni in vtri figuram dola, & vitrum, ne moveri possit, pice agglutina. Tunc corio vel linco & smiride, & postea pulvere pumicis tenui vel dum ligno adhaeret stanno calcinato, ab aurifabris Putty dicto, & tripoli, ac postremo fuligine, tartaro & cinere salicis vel juniperi, quo maxime nitet, fricetur. Smiris terendo, cribrando & infundendo preparatur.

Cardan. lib. 2. de variet. cap. 57. *Specula, chalybea* vulgo dicta, ex tribus partibus aris, una stanni & argenti, & decima octava antimonii sunt. Plures argentum ad minuendos sumptus omittunt: alii partem ejusdem vigesimum quartam addunt, referente Aldrovando Musci metall. l. 1. c. 4. Nonnulli ex libra una stanni, & aris liquati parte tertia illa faciunt, ac tum demum unciam unam tartari, & dimidiam auripigmenti albi, dum fumant coctorum, addunt. Postea metallum fustum in speculi figuram super tabula plana, fumo resina siccata & calefacta, redigunt, & ligno agglutinatum, primo aqua & arena, deinde smiride vel lapi-pumice, ac tandem stanno calcinato lavigant. Haecenus Cardanus, & ex eo Kircherus & Schvventerus.

Harldorfferus tom. 1. part. 6. 4. 13. delic. math. tres quartas stanni, & unam quartam aris purgati fundit, ac tum tartari calcinati quatuor, antimonii crystallini sex, antimonii limati duas, olei communis quatuor, & marchasitæ tres uncias recipit, mistisque omnibus uncias hujus mixturæ duas in singulas prædicti metalli libras dat, & ubi jam evaporarunt & purgata sunt, nonnihil picis Burgundicæ addit, eaque consumpta materiam in typos conjicit.

Scaliger exerc. 82. sect. 3. ita de mistura: uncias stanni novem & aris tres funde, ac tum demum unciam unam tartari siccati & arsenici albi dimidiam adde, omniaque dum fumant in igne perseverent, & infingendo & poliendo ut reliqui auctores procede.

Cornæus Schotto hanc methodum communicavit: Recipe aris partes decem, eique ubi liquatum erit, adde stanni partes quatuor, & nonnihil antimonii & salis armoniaci asperge, & movendo omnia misce usque dum periculosus ille fumus, à quo tibi cavebis, evanuerit, & postea in typos conjice. Multo usu (inquit) deprehendi optimam esse hanc mixturam.

Nonnullas harum mixturarum, nec non illius generis plures alias, ut & diversa materialiam usum polituræ invenies apud Birellum l. 9. ac 47. usque ad 55. quo te brevitatis causa remitto.

CAP. XIV. Hæc methodus tingendi interiorem sphaerarum vitrearum superficiem, mutata est in aliam, quâ exterior earundem superficies glutinosis coloribus depingitur; res oppido jucunda, & quam frequenter in ædibus videas.

Gessum. De qua Cæsalpinus, inter Latinos auctores unicus, qui ejusdem mentionem facit lib. 1. c. 9. *Est alia terra pallida glebis lapideis, qua utuntur ad aurichalcum detergendum, Gessum vulgo vocant.* Quid autem propriè sit, id ignorasse mihi videtur. Calcis in elegantem duram & per candidam lapideam, ac valde ponderosam substantiam ustæ species est, maculis, ut in plumbi stannique venis, micantibus. Externa specie & fragilitate alabastritem refert, tale enim est frustum illud haud exiguum, quod penes me servo. In Hispania sit, atque inde in Insulas Canarias deferretur, & vinis eo delatis albicantem & fermentationem tribuit, qua mediante præservantur, cum sine hoc condimento in

in exteras regiones delata in vappam abitura essent.

CAP. CXV. *Vitramarinus.* Ita vulgo, ut Cæsalp. speciosissimus omnium, & pretio aurum, si non superans certè æquans color est. Qui de lapidibus & coloribus agunt Auctores in universum omnes præparandi rationem docent. Tenerrimus hic color est, & nisi lapidem lazuli adhibeas omnibus numeris absolutum, irritus erit omnis labor. Suffecerit indice digito demonstrasse auctores, qui de eo scripserunt, omisiss eorum processibus, ceu prolixis admodum & tedious. Boetius de Boot de gemm. & lapid. l. 2. à capite 123. usque ad cap. 142. longa serie verborum docet, quomodo hic lapis eligendus sit, (alii enim ignem ferunt, quos Aldrovandus fixos vocant, alii colorem in igne amittunt) item quæ calcinandi ratio sit, quomodo vasa, lixivium emplastra fortia & mitiora, quibus color tanto facilius extrahatur, fiant, & quomodo lavandum sit extractum, ut colori inservire possit. Vltimò autem capite viam docet, qua mediante color facilius & sumptu minore extrahitur. Hunc proximè Birellus sequitur, qui lib. 9. à cap. 80. ad capite 109. omnes hos processus compendiosiore methodo describit. Nonnulli pictores lapidi lazuli tenuiter terunt, eoque sic trito utuntur.

CAP. CXVI. *Lacca coccinea.* Dubium nullum est, quin hæc vox descendat à gummi, quod Laccam vocamus, & colorem atque tincturam eandem habet, quam lacca pictorum. Mathiolus lib. 1. in Dioscoridem c. 23. asserit varias esse laccarum artificialium species, quæ ex sedimentis diversarum tincturarum parentur. Una ex baccis vel apice pimpinellæ, ab Anglis vulgo *Cremese* & *Cremesino* (*Crimson*) dictæ, altera ex baccis vel granis Kermes: tertia ex genuino Gummi laccæ: quarta denique atque omnium optima ex Brasiliensi sit: at vero modum, quo hæc vel illa fiat, non describit.

Sed de hoc loco, & erroribus à Mathiolo hic commissis posthac in tractatu speciali de coloribus Birellus l. 11. cap. 39. viam docet faciendi laccam ex hoc gummi. Recipe inquit *urina viri libras circiter viginti, easque bene coque & despuma, adde gummi lacca libram unam, & aluminis uncias quinque, omniaque igni committe, ac tandem coque, donec color omnis extractus sit: capio experimento aluminis saccharini tantum, quantum sufficere videbitur, adde, & ut laccas alia cola.*

Apud diversos scriptores diversas rationes parandi laccas invenio, sed quæ tantum materia ex qua vel menstruo per quod differunt. Nonnulli baccis vel granis Kermes utuntur (ex quibus Pharmacopœi Syrupum sibi parant egregiè tinctum) Et hæc quidem grana lex supeditat, Coccigera dicta, cujus generis arborem videre poteris in horto quodam vici vulgo *the Old street London* dicti, prope ædes peste infectis dicatas, sed qui fructum nunquam protulit.

Alia illius generis arbor *White-halli* in privato Regiæ Majestatis horto succreverat, quam nuperi usurpatores ex inscitia dejecerunt. Alii cochinnella uruntur, quæ vermis est, vel musca, quam ficus Indica progenerat, de qua prolixè differentem Johan. de Laet descript. Ind. l. 5. c. 3. item Herreram & Zimenem vide. Sunt qui floccis tinctis utuntur, atque hæc via, quem author noster hic docet, ut maxime vulgaris, ita omnium optima est. Alii loturâ & depurgatione utuntur vestium cocco infectarum.

Hernandes in historia sua lib. 3. cap. 45. de ratione faciendi Laccas in India sic: Ex Nochetzeli, id est Cochinnella nonnunquam purpureus, aliquando coccineus color fit, pro diverso præparandi modo.

Exquisitissima omnium ratio est, si in aqua decoctionis arboris *Totznart* dicti, addito alumine maceretur, & quod resederit in placentas formetur.

Quantum ad menstrua, author noster lixivium parat ex cinere salicis, vel alterius ligni mollioris. Alii

roborcos, vel alterius durioris ligni cineres adhibent: quales tamen cumq; adhibeantur, lixivium ne sit fortius, quam ut lingua degustatum eandem leviter pungat. Certe aqua fortis plurimum in hac re posset, quando incomparabilibus nostris officialis tinctoriis testibus constat, quantos Cochinellæ color progressus mediante hac aqua fecerit. Id solum obstat videretur, quod Laccæ hac ratione præparatæ, & aëri expositæ, vel madefactæ, colorem suum amittunt essent, diffuente sale: sed etiam huic malo forte remedium adhiberi poterat, extractione, vel ablutione salis, citra detrimentum coloris. Exemptionem, præcipationem, colaturam, & exsiccationem laccatum, & coloris quod attinet, eodem scriptores omnes pede procedunt. Postremo illud addam, lapides calcitios imbibendo humorem citius exsiccare quam lateres, id quod constans pictorum & excoctorum in exsiccando praxis satis confirmat. Antea quam plane siccetur Laccæ in globulos illam, vel ligneo [non ferreo qualicumque] cultro in quamvis figuram formant, vel si ita visum fuerit exemplo pictorum luleis in lapide factis illam committere possunt.

CAP. CXVII. *Orientalis, Saline of the Levant*, vel ut author noster habet *Pilatro di Levante*: Vocem *Pilatro* apud Italorum neminem invenio. Expositionem ejus provectæ ætatis operario Moranensi debeo, qui addebat, esse salis genus, extractum ex spuma maris, & extremo calore regionis coagulatum. Ac nomen quidem *Saline*, & modum generationis ejusdem ab alio etiam operario accepi, sed expositionem vocis ab illo solo.

CAP. CXVIII. Birellus hanc laccam ex ligno Brasiliensi ita parat: Primo tincturam ex floccis extrahit; postea recipit libram unam ligni dissecti [melius esset contriti] & lixivium ad consumptionem latitudinis unius digiti coquit, colat, & colato liquori addit unciam unam gummi Arabici, pulverati; inde colaturam omnem ad consumptionem dimidii digiti recoquit, & utrumque liquorem bacillo miscet, adhibendoque manicam Hippocratis procedit ut antea.

CAP. CXXIV. *Flegans rubrum osium*: Roschiero. Porta l. cap. 9. *Rosacernum* vocat, aque hanc præparandi rationem docet:

Denas crystalli libras in ollam injicito, ubi optime liquefactum noveris, immergit libram minui optimi, dimidiatis vicibus, ser eo veru quam citissime remiscendo, nam sui ponderositate facile infundum consider, ubi remistum noveris, ex ollula instrumentis ferreis, ad id apris, evellito, & in aquam mergito, idque tertio repetere ne pigeat mox supra, aris, in calcem redacti, unius quinquæ, admisceo coloris fragrantissimi cinnabarum, & maxime exagratum tribus horis conquiescere sinito. Ubi id feceris, stanti vitri superaddito ternas uncias, sine intermissione remiscendo, & floridissimum rose coloris in vitro perspicies, quo exornando auro uti poteris. Hoc tamen modo poteris.

CAP. CXXVI. Quomodo sulphur alia ratione figatur, capite 129 docet. Alium processum, sed multo quam hunc magis prolixum Birellus l. cap. 50. describit. Atqui sulphur, ea ratione præparatum, facile una cum sale armoniaco sublimatur. Nemo eorum, quibus cum ego versatus sum, istiusmodi fixationem sulphuris probat qualem Helmontius tenet in suo de elementorum mistura, nosse sese viam inquit, qua mediante sulphur quomodocumque dissolutum reducat in pulverem terrestrem fixum. Quem hic pulvis in arte vitratia usum habeat author noster nullibi docet.

CAP. CXXIX. *Rubrum pellu idum*. Libavius l. 2 tract. 1 cap 3. conjecit hunc ex auro colorem quasi acu tergit, his verbis: *In ea sum sententia, à tinctoria rubra auri, in liquorem vel oleum dissolvi, & specialiter à crystallo Rubinum haud incommodè formari* Mang. Pharm. Bibl. Tom II.

posse: cujus suæ conjecturæ hanc rationem assignat, quod Rubini frequenter in locis, ubi aurum adest, inveniuntur, ideoque consentaneum sit aurum ibidem de generare in hanc gemmam.

CAP. CXXXI. *Vitriolum Veneris*. Glauberus l. 2. furni philosoph. compendiosam hanc viam demonstrat: *Spiritus salis armoniaci, ari, beneficio frequentis ignitionis & resictionis calcinato, affusus, horæ unius spatio caeruleum colorem extrahit: hunc dissolutum are decanta, & loco frigido committe, & vitriolum dabit longe elegantissimum*. Crollius in sua Basil. Chym præparationem hujus Medicinæ optimè describit. Beguinus cap. hanc viam commonstrat: *Cuprum calcinatum, sive squamas cupri reduc in pulverem subtilem, quem in aceto distillato per diem naturalem digerere. Tinctum acetum per inclinationem effunde: & aliud reeffunde toties, donec non tingatur amplius. Depletiones filtra, & tres partes facie evaporare, vel distilla, quodque relinquitur in fundo vasis, ponatur in locum frigidum, sic generabitur vitriolum viride, obscurum.*

HISTORIA VITRI STILLATICI.

Hoc vitri genus Serenissimus Princeps *Rupertus* primus ex Germaniâ in Angliam intulit, & Regiæ Majestati exhibuit, quæ illud Societati suæ in Collegio *Gre. hamensi* communicavit. Statim à Societate delegatus est *Commissarius*, qui de eo quod sequitur retulit, prout in libro ejusdem Societatis, quod ad hanc rem attinet, consignatum, & eadem consentiente huc transcriptum atque publicatum est: id quod tanto magis desideravi, ut hæc usque adeo exacta procedendi ratio idea & exemplar esset cujusvis alterius experimenti. Ita anno 166. Societati retulit *Dn. Rupertus Moray*.



A. B. filum. B. C. corpus. B. collum. A. terminus vel extremitas filii.

Vitro constant viridi, bene purgato; ac nisi metallum ut vocant, probe excoctum sit, nullius pretii sunt, sed crepant, frangunturque statim atque in aquam decidunt.

Optima ratio faciendi istiusmodi vitra hæc est ut virgæ ferreæ nonnihil metalli ex olla assumas, & immediate in frigidam stillatæ, ac tantisper ibi jacere permittas, donec refrigeret.

Si metallum nimis ferveat, stilla vitri, ubi in aquam deciderit, dubio procul crepabit & frustillatim dissiliet.

Quodcumque vitrum in aquâ sine crepitu, donec refrigererit perdurat, id certo bonum est.

Exercitissimus operarius debitum caloris gradum ignorat, nec quidquam effecturum sese, quod examen sustineat, promittere audent pluraque dum sunt pereunt, quandoque duo, quandoque tria, prius quam unum succedat.

Nonnulla quasi frigore diffusa fatiscunt, non dissoluta corpore alia, dum adhuc minus vel magis fervent, sine magno crepitu in frustula dirumpuntur: alia cum magno strepitu, non multo post quam defervuerunt: alia neque franguntur, neque crepant, antea quam plane refrigerent: alia dum in aqua sunt, integra manent, & sponte sua non sine magno crepitu dissiliunt, statim atque ex aqua prodierunt: nonnulla post horæ unius spatium, alia ubi per dies vel septimanas aliquot perduraverunt, nullo tangente dirumpuntur.

Si vitrum istiusmodi aliquando dum fervet, ex aqua refrigeret, Z z z z mesis,

meris, pars colli tenuior, & quicquid à collo sili dependet, & in aqua fuit, in minutas partes decidet, salvo manente corpore, utut cavitates non minores, quam quod dissiliit, habeat.

Quodcumque in aëre à filo dependens, vel in solo jacens refrigerat, eandem per omnia, quam vitrum aliud soliditatem &c. acquirit.

Vitri stilla in aquam decidens, cum exiguo quodam sibilo strepit, corpus ejusdem per exiguum aliquod spatium ferret, pluresque ab eodem vel ut crepitantes scintillæ erumpunt, quibus mediantribus subsilii & moverit: complures etiam ab eodem ubique bullæ in aqua, dum refrigerat, ascendant. Quod si aqua decem vel duodecim pollicum profunditatem habeat, bullæ antea quam superficiem aquæ attingant, evanescent, eoque casu nihil præter exilem sonum observare licet.

Exterior vitri stillatici superficies æque ut aliorum vitrorum glabra & lævis, vitrum vero ipsum intus spongiosum & cavernis pustulisque plenum est.

In fundo maximam partem orbiculare, margaritisque pyriformibus non absimile est, & in collum oblongius terminatur, ita ut nulla ex his vitris directa, sed maximam partem incurva, & in exiguas plicas atque arcus sinuata sint, ac tandem à collo in exiguum apicem desinant.

Maxima pars eorum, quæ in aqua sunt protuberantiam & gibbum quandam habet, imminente parti corporis capacissimæ, & frequenter in illud latus inclinantem, ubi collum terminatur: ita tamen, ut nonnunquam illam partem vitri occupet, quæ in vase, in quo vitrum fit, superior est.

Si vitri stilla in aquam decidat ferventem, certo frangetur & crepabit, antea quam defuerit, vel momento post. In oleo olivarum minus quam in frigida periclitatur.

In oleo plures numero, & aliquanto quam in aqua majores bullas emittunt, & ebullitio illa diutius quam in aqua dura. Quæ in oleo sunt, sulcos minus quam in aqua facta spatiosos habent, eorumque nonnulla prorsus lævia sunt, & protuberantiis illis carent, quas alia possident.

Aliqua pars colli eorum, quæ in oleo facta sunt, nec non aliqua sili tenuioris in oleo restincti pars instar vitri communis frangitur. At vero si collum prope corpus frangas, & corpus ipsum cavâ manu detineas totum crepabit & frangetur, sed minore quam quæ in aqua sunt vi & strepitu, & ita, ut in æquæ minutas partes non dissiliat, & frusta, usque dum dirimantur, cohæreant: atque hoc casu tractus & lineæ in eo apparebunt oblongæ, in centrum corporis collimantes, & cavernas vel cavitates ejusdem transversim secantes, sed minores numero & mensurâ quam in his, quæ in aqua sunt. Quod si vitrum in acetum vini distillet, crepabit utique, & antea quam refrigerat, certo diffingetur, atque dum decidit, majorem quam in aqua strepitum edet, sed bullas excitabit, minus quam in aqua notabiles.

In lacte strepitum nullum edit, nec bullas, quæ quidem percipi possint, excitat: nihilo tamen minus crepat, & in frusta, antequam refrigerat dissolvitur.

In spiritu vini plures quam in alio quovis liquore bullas excitat, & dum integrum est, ultro citroque volutat, magis quam in aliis liquoribus agitur, & nunquam non crepat & in frusta concidit. Si quinque, sex vel plura vitra stillaticia eodem tempore in spiritum vini decidant, flammam quidem vinum concipiet, ac saporem particularem nullum.

In aqua solutionis natri vel salis armoniaci nihilo quam in aceto vini melius succedit.

In oleo terebinthinæ vitrum unum haud secus atque in spiritu vini frangebatur: ab altero flammam concipiebat ut jam nulli amplius usui esset.

In Mercurio, bacillo & vi, ut mergeretur, subactum, superficiem acquisivit rudem & depressam: at vero expre-

mentum perfici non potuit, cum subigi, usque dum refrigerasset non posset.

Cum in vitro instar calicis cylindraceo & frigida repleto experimentum caperetur, unum successit, vitris sex vel septem aliis in frusta diruptis. Id tantum à nonnullis à Societate vitrum statim à lapsu manu prehendentibus observatum est, ad primum ejusdem lapsum in aquam, & aliquanto post, durante rubro illo colore, rubras ab eodem scintillas in aqua promanasse, eodemque momento, quo hæ particule, nec non bullæ, ab eodem manifeste prodeuntes, erumpebant, non diffingi tantum, idque aliquando non sine satis magno strepitu, sed moveri etiam atque subsilire corpus vitri, tam illius quod permanet, quam quod frangitur.

Ab ictu levioris mallei, vel alterius cujusque durioris armamenti vitrum stillaticium non atteritur, si tamen non alibi quam in ventre percutiatur.

Apicem ejusdem frange, & statim in minutissimas partes dissiliat, idque non sine ingenti vi & crepitu, & particula illæ facili negotio in pulverem rediguntur.

Vitro fracto, si liberum quaquaversum sese extendendi spatium scintillæ inveniant, in orbem, eadem quæ pyroboli minores, quos ob similitudinem mali granati *Granatos* vocant, violentiâ disperguntur.

Nonnulla vitra affricu siccis lateris in frusta dissiliunt, statim atque in fundo nonnihil attrita sunt: alia nisi semirrita perdurant. Fuit, quod dimidia circiter parte absumpta sepositum, paulo post nullo tangente dissiliet. Aliud affricu lapidis, & adjectâ aquâ & smiride ad collum usque detritum, perdurabat.

Vitrum in manu cujusquam sub aqua fractum, minus gravius & strepitu majore percellit, quam in aëre, ac etiam si prope superficiem aquæ decineatur, minutarum tamen particularum nulla extra aquam fertur, sed contrario quam in aëre modo, citra dispersionem in aquam decidit: ac si unum ex his vitris in Dn. Boylei machinam mittas, bene vacuato recipiente ruptum, haud secus atque in libero aëre quaquaversum dissiliet.

Si vitrum istiusmodi in igne calefeceris instar vitri ordinarii sese habebit, nisi quod temperamentum ejusdem ita debilitatur, ut citra fracturæ periculum minus quam antea flecti possit.

Vitrum stillaticium lithocollâ collo tenui munitum, fracto apice strepitum edit, quam si manu detineatur, minorem, sed ita ut totum intus diffusum esse liquido appareat; ipse etiam color in cæsiu degenerat, planâ manente externâ superficie, sed illum in modum collisâ, ut exemptæ partes in floccos abeant, conicas quandoque figuras representantes & usque adeo fragiles, ut facili negotio in pulverem redigantur.



Vitrum istiusmodi aliud lithocollâ undequaque pollicis unius crassitie, tectum, rupto apice lithocollam omnem, haud secus ac granatus minor bellicus, in frusta comminuebat.

Duo vel tria illius generis vitra ad gemmarium in hunc finem missa, ut margaritarum instar perforarentur, adacto propiis terebello, statim in frusta dissiliabant, haud aliter, ac solent, qui rupto apice dissiliunt.

APPENDIX.

Quia frequens fornacum in hoc opere mentio fit, ex re visum fuit, subungere quæ de hoc negotio Agricola non minus eleganter quam perspicue tradidit, adjectâ figurâ fornacum & instrumentorum, quæ apud Amstelodamenses in usu sunt, nec non nomenclaturâ eorum, quibus Londinenses vitrarii, Dn. Merretto teste in elaborando vitro communi utuntur. Et Agricola quidem lib. 12. de re metall. sic habet.

Restat vitrum, cujus confectura propterea huc pertinet, quod ex succis quibusdam concretis, & sabulo, vel arena vi ignis & arte subtili exprimitur: & quod expres-



sum, ut succi concreti & gemmæ atque lapides quidam, transluceant: ut lapides liquefcentes & metalla fundi possint: sed primò mihi dicendum est de materia, ex qua vitrum conficitur: deinde de fornacibus, in quibus conflatur: tum de ejus conficiendi ratione. Confit autem ex lapidibus liquefcentibus & ex succis concretis, aut ex aliarum rerum succis, qui cum his naturali cognatione junguntur. Lapidem quidem liquefcentes, si fuerint candidi & translucidi, ceteris præstant: quibus de causis ad crystallos primas deferunt: ex his contractis in India fieri vitrum tam translucida facultate præcellens ut nullum cum eo comparari possit, auctores esse Plinius scribit: secundas tribuunt lapidibus, qui, tametsi eis duritia crystallosum non sit, tamen simili modo candidi sunt & translucent: tertias dant his lapidibus candidis, qui translucidi non sunt. Eos autem omnes prius urere necesse est: postea pilis subjectos sic frangere & comminuerè, ut inde sabulum fiat: tum cribrare: quocirca, si tale sabulum vel arena, se vitrariis ad ostia fluminum ostendit, eos urendi & tundendi labore levat. Quod verò ad succos concretos attinet, primæ deferuntur nitro: secundæ sali fossili candido & translucido: tertiæ sali, qui conficitur ex lixivio, ex cinere anthyllidis, aut alterius herbæ salis facti. Sunt tamen qui huic sali, non illi, secundas tribuunt. Verum sabuli vel arenæ, ex lapidibus liquefcentibus confectæ: portiones duæ cum nitri vel salis fossilis, aut ex herba salis facti unâ commisceantur: ad quas adjiciatur minuta magnetis particula: ceterè singularis illa vis nostris etiam temporibus æquè ac prisca ita in seliquorem vitri trahere creditur, ut ad se ferrum allicit: tractum autem purgat, & ex viridi vel luteo candidum facit: sed magnetem postea ignis consumit: qui verò jam dictis succis carent, ipsi duas portiones cineris quærnei vel lignei, vel cerrei, aut si hi in promptu non fuerint, fagini vel abiegni cum sabuli vel arenæ permiscet, & addunt modicum salem, ex aqua salia vel marina factum, atque exigua magnetis particulam, sed isti minus candidum & translucidum vitrum conficiunt: verum cinis ex antiquis arboribus fit: quarum truncus, ubi assurrexit ad altitudinem sex pedum cavatur, & injecto igni arbor tota comburitur, ac in cinerem vertitur: quod sit hyeme cum nives diutius sedent, vel æstate, cum non pluit, nam imbres aliis anni temporibus quod cineres cum terra misceant, impuros reddunt: quamobrem tunc ex istis arboribus in plures partes sectis, & sub tecto combustis, cinis confiat. Sed vitrariis aliis tres sunt fornaces, aliis duæ, aliis una: quibus tres, hi in prima coquunt materiam, in secunda eam recoquunt, in tertia refrigerant vitrea vasa & cætera opera candentia: eorum prima fornax concamerata & furno similis sit: in cujus superiori camera, longa pedes sex, lata quatuor, alta duos, lignis aridis accensis res mistæ coquantur acri igni donec liquefcant, & in massam vertantur vitream: etsi nondum satis à trectamento purgatam: ea refrigerata extrahatur & in partes dividatur: in eadem fornace ollæ, quæ continebunt vitrum, calefiant.

Prima fornacis inferior camera A.
Superior B. [Vid. Tab. xxix. fig. 1.]
Vitrea massa C.

Secunda fornax rotunda & lata pedes decem, alta octo, extrinsecus, ut sit firmior, cingatur quinque arcibus sesquipedem crassis: ea item constet ex duabus cameris: quarum inferioris testudo sit crassa sesquipedem: ipsa camera habeat à fronte os angustum, ut ligna in focum, qui est in ejus solo, imponi possint: in summa verò & media ejusdem testitudine magnum foramen rotundum: quod ab ea pateat ad superiorem cameram, ut flammæ in ipsam penetrare possint. At in superioris camerae muro inter arcus sit octo fenestræ tantæ, ut per eas ollæ ventrosæ in solo camerae circum magnum foramen collocari possint: quarum

Manger. Bibl. Pharm. Tom. II.

ollarum crassitudo sit ad digitos duos, altitudo ad totidem pedes, latitudo ventris ad sesquipedem, oris & fundi ad pedem. In posteriori fornacis parte sit foramen quadrangulum, cujus altitudo atque etiam latitudo ad palmum: per quod calor penetret in tertiam fornacem, cum hac conjunctam: ea quadrangula & longa pedes octo, lata sex, similiter constet ex duabus cameris: quarum inferior à fronte habeat os, ut ligna in focum, qui etiam est in ejus solo, imponi possint ab utroque oris latere in muro sit oblongi vasis fictilis receptaculum, longum circiter pedes quatuor, altum duos, latum sesquipedem. Superior vero camera habeat duo foramina, alterum à dextro latere, alterum à sinistro, tam alta & lata, ut vasa illa commode in eam imponi possint: quæ vasa sunt longa pedes tres, alta sesquipedem, lata inferiori parte pedem, superiori rotundata: in his opera vitrea jam conflata reconduntur, ut mitiori calore refrigerentur: quæ ni ita paulatim fuerint refrigerata, distumpuntur. Deinde vasis istis ex superiori camera extractis & repositis in receptaculis prorsus refrigerentur.

Secunda fornacis arcus A. [Vid. Tab. xxix. fig. 2.]
Ejus camera inferioris os B.
Fenestra superioris camera C.
Olla ventrosa D.
Tertia fornacis os E.
Receptacula vasorum F.
Foramina superioris camera G.
Vasa oblonga H.

At quibus duæ sunt fornaces, eorum partim in prima coquunt misturam, & in secunda non modò eandem recoquunt, verum opera etiam vitrea reponunt: quanquam in diversis cameris partim in secunda materiam coquunt, pariter & recoquunt, in tertia verò opera vitrea recondunt: atque ita illi carent tertia fornace, hi prima: sed istiusmodi fornax secunda differt ab altera fornace secundâ: etenim rotunda quidem est, sed ejus cava pars lata pedes octo, alta duodecim, quod constet ex tribus cameris: quarum infima non dissimilis est inferiori alterius secundæ fornacis. In mediæ verò camerae muro sunt sex fornices: quæ cum ollæ calefactæ in eam impositæ fuerint, etiam luto obstruuntur reliquis modicis fenestellis: in hujus mediæ camerae summa & media parte est foramen quadrangulum, cujus longitudo itemque latitudo ad palmum: per id calor penetrat in supremam cameram: quæ posteriori parte habet os, ut in oblongum vas fictile, in ea locatum, opera vitrea paulatim refrigeranda reponi possint. Ea autem parte solum officinæ est altius, aut scannum habet appositum, ut vitrarii conscendentes commodius opera possint recondere.

Alterius fornacis secunda camera infima A.
Media B.
Suprema C.
Ejus os D.
Foramen rotundum E.
Foramen quadrangulum F. [Vid. Tab. xxviii. fig. 3.]

Sed qui carent prima fornace, hi cum munus diuturnum perfecerint, vespere materiam in ollas injiciunt: quæ noctu cocta liquefit & in vitrum abit. Duo autem pueri interdum noctuque alternatim ignem alunt aridis lignis in focum impositis. At quibus una tantummodo fornax est, utuntur ea secunda, quæ ex tribus cameris constat: nam ut proximi materiam vespere injiciunt in ollas: manè verò trectamenti detractis opera vitrea conficiunt: quæ in supremam cameram, ut alteri, recondunt. Verum secunda fornax, siue ex duabus, siue ex tribus cameris constiterit, atque etiam prima, siant ex lateribus crudis in sole siccatis: qui deducti sint ex terra,

Z z z z 2

quæ

quæ facili igni neque liquefcit, nec in pulverem refolvitur; & quæ à lapillis purgata fit, atque bacillis verberata: eadem terrâ calcis loco lateres interlinantur: ex eadem figuli forment tam vafa quàm ollas; eaque in umbra ficcent. Duabus partibus absolutis refat tertia. Maſſa vitrea in prima fornace eo, quo dixi modo; confectâ & fractâ miniſtri ſecundam excalfaciunt, ut ea fragmenta recoquant. Dum verò hoc agunt, interea ollæ in prima fornace primum lento igni caleſcunt, ut humorem exhalent: deinde acriori: ut ſiccatae ruſcant: mox vitrarii hujus os aperiunt, & ollas forciſe prehenſas, ſi rimis non fatiſcunt, celeriter in ſecunda reponunt: & recalcſctas fragmentis vitreæ maſſæ, vel vitri complent; deinde feneftras omnes luto & lateribus obſtruunt: cujuſque loco duobus tantummodo fenefteſtis relictis, de quarum altera inſpectant & fiſtula recipiunt vitrum, quod ollæ in ſe continent: in altera reponunt alteram fiſtulam ut calida fiat: utraque orichalcea, vel ænea, vel ferrea eſt, tres pedes longa: quin ante fenefteſtas cruſta marmoris fornici imponitur: atque ei iuſus terra aggerata & ferrum: hoc fiſtulam in fornacem immiſſam retinet, illa oculos vitrarii ab ignis calore tuctur: his omnibus ordine factis vitrarii opus perficiendum aggrediuntur. Lignis autem aridis, quæ flammam, non fumum emittunt, fragmenta recoquant: ſed quanto diutius recoxerint, tanto puriora & magis tranſlucida ex eis fiunt opera: tanto minus maculoſa & veſiculis turgeſcentia: tanto denique facilius vitrarii ſuum munus exequentur, quocirca qui materiam, ex qua vitrum conficitur, unam modo noctem coquunt, ac mox ex ea opera vitrea efficiunt, minus pura & tranſlucida faciunt, quam qui primo maſſam conficiunt vitream, dein ejus fragmenta diem noctemque recoquant, atque hi etiam minus pura & tranſlucida, quam qui duo dies nocteſque eadem recoquant: nam vitri bonitas non ſolum in materia, ex qua conficitur, ſita eſt, ſed etiam in coquendo. Sæpius autem vitrarii fiſtulis rapiunt experimentum: ſed quam primum ex eo didicerint fragmenta recocta ſatis eſſe purgata, quiſque altera fiſtula in ollam demiſſa, & paulatim verſata, recipit vitrum: quod tanquam lentus aliquis & glutinoſus ſuccus ad eam adhæreſcit; & quidem globuloſum. Recipit verò tantum, quantum ad opus, quod efficere vult, ſatis eſt. Id marmoris impreſſum volvit & revolvit, ut adveniat: atque per fiſtulam inſpirans veſicæ inſtat inſtat: quam fiſtulam quoties inſpirat, ſæpius verò inſpirare necelle habet: toties eam repente remotam ab ore ad maxillam admover, ne flammam ſpiritu reducto in os trahat: mox fiſtulam ſublata circum caput in orbem torquens vitrum facit longum, aut idem in æreo instrumento cavo verſans figurat: tum recalcſciendo, inſtando, premendo, amplificando in poculi, vel vaſis, vel alterius rei figuram mente conceptam format: deinde ruſſas marmoris imprimit: atque ſic fundum dilatat: quod altera fiſtula in partem interiorem compellit: poſtea ſciſſice ejus os amputat, pedes & anſas affigit: quinetiam, ſi ei libitum fuerit, inaurat, & variis coloribus pingit. Poſtremo in oblongo vaſe fictili, quod eſt in tertia fornace, vel in ſuprema ſecundæ camera reponit, ſnitque refrigerari: quod cum talibus operibus ſenſim refrigeratis plenum fuerit, bacillo ferreo lato, ſub ipſum acto, ſublatus in ſiniſtrum brachium in altero receptaculo collocat.

Vitrarii autem diverſas res efficiunt: etenim ſcypſos, phyalas, urceos, ampullas, lances, patinas, ſpecularia, animantes, arbores, naves: qualia opera multa præclara & admiranda, cum quondam biennio agerem Venetiis, contemplantus ſum: in primis vero anniverſariis diebus feſtis aſcepfionis dominicæ cum venalia eſſent apportata Morano: ubi vitriatæ officinæ omnium celeberrimæ ſunt: quas vidi cum aliâs, tum ma-

ximè cum certis de cauſis Andream Naugerium in ædibus; quas ibi habebat, unâ cum Franciſco Aſulano convenirem.

Fiſtula A

Fenefteſta B

Marmor C (Vid. Tab. xxx. fig. 3.)

Forceps D

Instrumenta quibus forma ſunt data E.

Reſtat ut non formas modo fornacum, quæ Amſtelodamenſibus in uſu ſunt, earumque instrumenta, ſed omnem etiam univerſi, operis apparatus & procedendi rationem ſuccincte & breviter adumbraremus. Sed enim quia poſſiſſima illius artificii Dn. Merrettus cum cura proſecutus eſt, contenti erimus ea adduxiſſe, quæ ſi rem per ſe obſcuram non omnino planam reddere, certe illuſtrare tanti viri labores poterunt.

INSTRUMENTA ET FORNAX VITRARIA

apud Amſtelodamenſes

[Vid. Tab. xxx. fig. 1.]

- a.a.a. *Lamina marmorea vel ferrea, ſuper quibus metallum ubi ex fornace recens prodit, ut adveniat hinc inde verſant.*
- b. b. *Bocca, os vel Oriſcia, per qua ollas in fornacem inferunt & metallum ex ollis eximunt.*
- c. *Oriſcium aliud minus, Italis Boccarella dictum, per quod diverſum vitri genus educunt.*
- d. *Murus tranſverſus qui arcendo calori & firmandis, ut vocant Halſinellis inſervit.*
- e. *Halſinella vel unci in quibus instrumenta recumbunt.*
- f. *Instrumenta vitrariorum, qualia ſunt canna, ſpici, pontello.*
- g. *Rutabulum quo carbonες cineresque verſant & commovent.*
- h. *Cochleare majus æneum quo cineres lixiviumque ex lebeſe tranſfundunt.*
- i. *Cochleare minus quo metallum in fornace verſant, & ex olla in ollam tranſferunt.*
- k. l. *Batillus major & minor, quibus decuſſas à canni vitri parti particulas excipiunt, & in ollas conſiciunt. Quorum minor. l. ejus magnitudinis eſt, ut per oriſcia b. b. commode tranſire poſſit.*
- m. *Pars fornacis quam Leeram vocant, in quo vitra ſenſim deſerveſcunt.*
- n. *Oriſcium Leera, per quod vitra in Leeram inferuntur.*
- o. *Extremitas Leera, qua in cameram deſinit, ubi vitra jam refrigerata ſeponuntur.*
- p. *Olla vitrariorum triangularis qua Amſtelodamenſes utuntur.*
- q. *Olla vitrariorum rotunda qua Harlemi utuntur.*

[Vid. Tab. xxx. fig. 2.] de Fornacibus.

- A. *Forſex Italis tagdante dicta, qua ſuperſuitates vitri reſecant.*
- B. *Tudicula pluribus locis perforata, qua ſal Alkali ſubſidens excipiunt.*
- C. *Instrumentum Italis Borſella dictum, quo vitra pro re nata coarctant vel extendunt, & levigant.*
- D. *Borſella da fiori Italis, qua vitrum vellicando diverſi generis flores vel ornamenta efficiunt.*
- E. *Borſella puntata, qua vitrum extendendo & replicando ſunis in morem contorquent.*
- F. *Canna vitrariorum, aliqua ſui parte ligno, ob calorem & ut tanto commodius tractari poſſit, veſtitâ.*
- G. *Instrumentum quo in conſlandis vaſis urinaris utuntur.*

fig. 1.




fig. 2.




fig. 3.





De Instrumentis quibus Vitarii apud Anglos utuntur, Cl. Dn. Merreus Appendicis loco hæc habet.

Capite de Fornacibus recensui instrumenta quibus utuntur in elaborando metallo crystallino : Cæterum quia nullam eorum mentionem feci, quibus utuntur in elaborando vitro communi, en illa tibi eo qui sequitur ordine.

Tyre Bats, *Vestes* duo, quatuor aut circiter cubitos longi, quibus ollas attolentes in fornacem mittunt.

A Padle. Pala qua cineres & arenam in calcaria versant atque commovent.

Rakes. Rutabulum quo cineres & arenam hinc inde corradunt.

Procers. Instrumenta sunt ferrea, in extremitate uncinata, quibus ollas suo loco, & ad utrumque orificii fornacis laus unam, ita collocant ut nec procul vident, nec nimis prope adsint.

Ladles. Tudicula, quibus metallum ex olla alia in aliam transfundunt, sive id fiat obstruendam olla: sive aliam ob causam.

Smal ladles. Tudicula minores, quibus operarii sal alkali & recrementa despumando ab ollis operi infervientibus auferunt.

Strocals. Instrumentum est oblongius ferreum instar bacilli, quo metallum ex olla dirupta in integram transferunt.

Forks. Furca, quibus intermedia clathrorum foci vellicant, ut cineres tanto facilius descendant, & ignis reddatur luculentus.

Sleepers. *Vestes* vel clathri majores, quique transversa incumbentes minores alii impedimento sunt, quo minus alii carbones descendant, & Oberum cineribus transsum permittunt.

Fertets. Instrumenta sunt ferrea, quibus experimentum capiunt an metallum operi aptum sit, nec ne: quibusque orificia ampullarum vitrearum formant.

Falcets. Instrumenta sunt ferrea, qua in ampullas mittuntur, ut deferri commod. ad calefaciendam possint.

The pipes. Cannæ sunt ferrea, quas inflando vitrum formant.

Pontec stake. Ferrum est, cui ligni particula incumbit, in qua vitrum à cannis ablatum hinc inde versant. ut instrumento ponte dicto adnectatur.

Shears. Instrumenta sunt quibus vitrum formatur & absoluitur.

Scissors. Quibus vitrum refecant lavigantque.

Cranny. Ferrum est orbiculare, in quo vitrum versantes collum ejusdem tenuius reddunt.

Tovver. Ferrum est, cui Pontec dam vitrum calefit incumbit.

Diverse formarum vel typorum species, quibus medianibus varias figuras, & protuberantias, pro cuiusque typi qualitate & figura efformant.

U L M A R I A.

Ulmaria à foliorum quadam cum Ulmi foliis similitudine dicta, à *Filipendula* differt radicibus fibrosis, magnitudine qua illam excellit, seminibus intortis, in globulum congestis.

Nomina. *Ulmaria* I. B. *Vulgaris* Park. regina prati, Ger.

Barba Capri floribus Compactis C. B.

Radicum fibræ rubentes Lignosæ. I. Bauhinus radicem digitalem. i. finitis fibris rubentibus capillatam ei attribuit. Caule exurgit, sesquicubitali & altiore, recto, anguloso, lævi, rubente, firmo, concavo, ramoso. Folia per intervalla alternatim Cauli adnascuntur tribus aut quatuor pinnularum majorum Conjugationibus compositi cum impari in extrema ala folio trifariam diviso ad modum fere foliorum Rubi Idæi: majoribus hisce pinnulis interpositæ sunt minuscule aliquot, ut in *Filipendula* ac acrimonia, omnes circum oras serrata, interne canescentes superne virides: folia

autem Crispo plicarum Contextu ad ulmi folia accedunt, unde & plantæ nomen. Flores in intermixtis foliis suaveolentes, positi & forma *Filipendula* vulgaris albidii, pentapetali, apicibus crebris, similiter albis, singulis floribus plura succedunt Semina, nuda, oblonga, contorta, ac in globuli fere formam coacta.

In pratis humidis & ad rivulorum ripas passim & copiose provenit.

Vires. Sudorifera ac alexipharmaca est, proin convenit in fluxibus omnis generis, diarrhæa, dysenteria, fluxu menstruo, expuitione Sanguinis, resistit pesti. Folia Vino aut Cerevisiæ immissa gratum ei saporem & odorem conciliant, non secus ac pimpinella.

Flores odoris grati sunt, Cor exhilarant, nec tamen Caput gravant, unde & æstivo tempore Conclavibus & tricliniis ornandis sternendisque conveniunt. Rupelensis Renatus, referente I. Bauhino, dicit hydromelitem ex ejus flore conciliari gratum odorem, & ita parari ut æmuletur vinum Creticū, quod malvaticum vocant.

Ipse vidi & sanctorum testari possum, in Lethali vulnere vesicæ cujusdam puellæ, itemque brachii fractura propemodum immedicabili reginam prati præclaros edidisse effectus; unde merito ingreditur emplastrum Felicis Wurtz, toto orbe celebratissimum & usitatissimum Sim. Pauli quadrip. Botan. p. 452. è Collectaneis D. Tancredi Robinsan.

Felix Wurtz hujus radices miris laudibus effert imo omnibus aliis vulnerariis herbis aut adversus fracturas ossium commendabilibus præponere videtur. Idem. Rain.

U L M U S.

Ulm vox (ut videtur) primitiva est: Siquidem nulum ejus Etymon apud Grammaticos aut Botanicos reperire potuerim græcis Πιρæα dicitur.

Ejus nota *Characteristica* sunt folliculi seminales compressi Atriplicis hortensis folliculorum æmuli antequam folia erumpant præcoci maturitate decedentes.

Vires ac usus. Ulmorum olim eximius usus fuit ad vires maritandas, & ad pecudum Cibaria: nam Capræ & oves libentissime hac fronde vescuntur, itemque boves, sed magis Atinæ, ideoque veteres, & præcipue Columella, quomodo *Ulmaria* facienda sunt, reliquumque harum arborum cultum fusc ea eleganter exponit. Nunc dierum in honore minore sunt.

Materia vel in sicco vel in aquis durissima durat: ac vicissitudinum siccitatis ac humoris minus patiens est; reliquas post Cornum firmitate facile vincere auctor est Theophrastus. Nostrates (ut diximus) pro rhedarum ac vehiculorum axibus ea utuntur proque rotarum Modiolis, ad quem usum aptior est quæ verrucosis & nodosis extrescentiis tota superficie obducta, quibus hæc arbor præsertim deorsum valde obnoxia est, succo nutritio ob ubertatem, & quia exitum non invenit, perruptis vasis ei devehendo destinatis altistato tramite decerrans, & in irregulares motus, flexuosos, circulares, undantes, raptus hujusmodi tumores excitat; hinc Theophrastus & Plinius *Ulmum*, quod virorem fortissime fervet, Cardinibus assamentisque portarum utilem esse scribunt; Celebratur & ad fores, præla & torcularia; utilis etiam est ad asseres pro tabularis conclavium in domibus & ad alia multa, quæ vide in Sylva D. Evelyn.

Quod ad vires in medicina (authore Dioscoride) *Ulm* folia, rami & cortex adstringendi vim habent. Folia trita ex aceto ad lepram efficaciter illinuntur. (Corticis hoc tribuit Galenus, Plinius & libro & foliis) & *Vulgera* glutinant. Multo verò magis Cortex si fasciæ loco circumvolvatur. Radices eandem vim habent vulnera glutinandi? Nam decocto earum (Corticis radicem Dioscor.) quidam perfundunt fracturas, unde eas celerius obducto callo consolidant.

Idem decoctum articulorum duritias emollire, & ner-

vorum cōvulsiones resolvere dicitur: decocto rad. supernatans pinguedo illita pilos defluxio restituit. Cortex rad. Contusus, & muria usque adeo subactus, ut malagmati similis sit, illicitus podagricos dolores mulcet.

Corticis denarii pondus (uncie pondus) in hemina aquæ frigidæ [in vino aut aqua Diosc.] porum alvum purgat, pituitasque & aquas privatim trahit. Plin. Diosc. mirum astringens purgare.

• Lachrymam commendat Plinius ad collectiones, vulnera & ambusta; at ulmus nostras nec sponte, nec vulnerata lachrymam fundit.

Cortex arboris si in aqua communi decoquatur, donec aqua consistentiam ferè Syrupi acquirit, decocto autem admisceatur tertia pars aquæ vitæ; singulare est remedium adversus dolorem ischiadicum, si pars affecta eo ad ignem aliquandiu foveatur.

Humor qui in folliculis foliis innascentibus reperitur faciei illitus cuti nitorem inducit faciemque gratiorem præstat. Matthiolus puerorum enterocelis mederi scribit, si splenica in eo madefacta inguini supraponatur atque sub femorali subligentur. Fallopius se nihil reperisse opportunius scribit in agglutinatione hoc liquore, seque vidisse mirabilia in Villicis: modumque ejus conservandi tradit, plura vide apud J. B. tom. I. part. 2. lib. 8. cap. 51. pag. 144. 145. & Sennertum in Paralipom. ad lib. I. præf. cap. 19. Hentius ab Heers in observat. medic. duas narrat Historias imprimis memorabiles de hoc liquore quorum priorem non pigebit huc transcribere.

Anre annos 29. multum maris & terræ emensus sum cum quodam Lithuanò, Chemiam, variasque artes, serias, ludicras, etiam magicas, quarum tamen me præsentente nullum unquam specimen, etsi serio conaretur, edere potuit, proficiente. Hic ab omnibus Medicis, agyrtis, anubus, veneficis, Chemicis, in tota quam obiebat Asia & Europa, secreta, ut vocabat, prece vel pretio, vel permutatione plurima collegerat: inter alia gallum gallinaceum utraque illum manu tenens, mihi obtulit, jussit me oculum sapius acutissimo cultello punctum, interque digitos pressum orbitæ cranii reponere: Affudit illi liquoris duas guttas, obligatoque capite cistæ inclusit. E qua post horas octo eduxit, utroque oculo ita sibi simili, ut nec ego qui secueram, nec astantium aliquis sectum oculum à sano posset distinguere. Altera Historia est de Filia Viri Nobilis, cujus oculum acupunctum postquam totus humor aqueus & pars vitæ effluerat, liquore hoc intra unius noctis spatium perrecte sanavit: mansit tamen lumine & visu caesa: verum ita ut etiam vigesimo post anno nemo exæcatum oculum videns, etsi curiosè indagabat, discriminare potuit, imo multos annos cum marito orbitatis ejus inseio vixit. Hæcenus ab Heers.

Verum ex recentiore & acuratiore observatione Franc. Redi, & Antonii Nuck colligitur liquorem prædictum ad vulnera inflicta sananda & humorem oculi, aqueum expressum restituendum nihil contulisse, sed naturam solam totum opus perfecisse: id quod cuius manifestum esse poterit, [inquit D. Redi,] cui placuerit oculos hirundinum, aut alterius cujuscunque Aviculæ acu vel scalpro solerter terebrare. Ego ejus rei periculum feci in Gallinis, anseribus, anatibus, gallis nostratibus & Indicis & animadvertendo omnia hæc volatilia sua sponte minore quam 24. horarum spatio sanari veracem deprehendi Cornel. Celsum lib. 6. dicentem extrinsecus vero interdum, si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est quam sanguinem columbæ, vel palumbis, vel hirundinis inungere, neque id sine causâ sit cum harum acies extrinsecus læsa, interposito tempore in antiquum statum redeat, celerrimèque hirundinis, unde locus fabulæ factus est aut per parentes, aut id herba Chelidonia restitui quod per se fit. Antonius Nuck in libello quem nu-

per evulgavit, de Ductu Salivali novo, Saliva, ductibus oculorum aquosis & humore oculi aqueo; ductus hosc aquosos in oculi bulbum inferi observavit, quibus humor aqueus assidue suppletur, & effusus intra paucarum horarum spatium restituitur: unde in vulneribus & puncturis oculorum non aliud medicaminis genus magis necessarium putat quam quod musagine quadam labia vulneris oblinere & viam quodam modo præcludere valeat.

Quod humor oculi aqueus sponte restituitur absque ullius medicamenti ope, experientiâ probat; expertus (inquit) novi, loco saltem obscuriore servato animali (post Corneæ læsionem & humoris aquei expressionem, decem horarum spatio, oculo humorem visumque redditum fuisse & nuperrime in theatro nostro Anatomico [Leydensi] publice idem demonstravimus in cane cui ex vulnerato oculo tam copiose effluxit humor aqueus, ut flaccidus appareret oculus læsus: observatum tamen elapso sex horarum spatio oculi bulbum humore suo iterum repletum fuisse, idque sine ulla medicamento-rum applicatione, ipsum Galenum hoc non lauit, oculos vulneratos restitui posse; cæterum incredibile quiddam, nec fieri vulgo solitum in puero vidimus, qui situlo in pupillæ loco fuerat compunctus, nam cum statim effluxisset aquosus humor, tum pupilla ipsa minor est reddita, tum tota cornea apparuit rugosior, cæterum sanatus postea recte vidit collecto scilicet paulatim in eo qui effluerat humore. Et si fides Historiæ Bizantinæ scriptoribus, testantur hi Imperatores Constantinopolitanos quosdam, quorum oculi pungente instrumento, (qua de causa supervacaneum hic dixisse) ita lædebantur ut aqua efflueret, brevi tamen postea oculorum & vigorem & præter expectationem visum recuperasse. Hoc si minus verisimile videatur, testem adduco Josephum Zambecarium, qui de doctore quodam Nerio narrat sequentia. Canis (inquit) binos oculos scalpello Chirurgico, quo venas aperire solent, dextre confodit, ex iis totum humorem aqueum expressit, ita ut oculi tanquam duo laculi vacui corrugati manserint: cane deinceps sub solius beneficiæ naturæ tutela relicto, post sex horas & breviori forsan tempore, ipsius oculos repletos fuisse, & ad statum naturalem rediisse; cicatricis nota solum remanserant, & canis lætus & alacer erat, ac si nullo affectus fuisset incommodo, & quod pluris interest, cæcus non mansit & acutè videbat. Idem experimentum in variis aliis canibus, super cuniculis, Indicis porcellis & Agno rursus tentavimus, semper omnes intra paucas horas felicissime sanati sunt, & adeo incolumes evaserunt, ut unus quidem ex ipsis ex inflicto vulnere cæcus remanserit. Hæc autem quæ Nerius expertus est verissima sunt, sed locum saltem habeat in oculis quibus pungente acu, aut alio quopiam instrumento, sed tenello vulnera infliguntur exigua: si vero majusculum fuerit vulnus, intimiusque adactum instrumentum pungens aut secans, sanandi methodum quam supra proposuimus observare præstabit.

Ex hoc liquore oleum paratur, teste Sylvio, in vulneribus præstantissimum. Nobis vero hæcenus observatum, inquit J. B. olea quæcunque in vulnere simplici minus profecisse: nam & eis fere fordescit vulnus, & glutinatio, quæ imprimis desideratur, impeditur.

Cæterum apes, ubi se post hybernæ famem Samarâ impleverint, profluvio alvi, nisi succurgatur, intereunt. Hinc in regionibus Italiæ ulmis confitis, raro frequentes durant apes; ut prodidit Columella. Nihil tale à nobis hæcenus observatum, at neque ab aliis fide dignistræditum accepimus RAY S.

UMBILICUS MARINUS.

Nomina. Androsaces Matth. sive fungus Petrus Marinus, sive Umbilicus Marinus J. B. Andr. Matth. sive Coryledon Marina & Umbilicus Marinus Park. Andros

Androsaces Chamaeconchæ innascens, vel minor C. B. Item Androsacca Petræ innascens, vel major ejusdem.

J. B.

Vitam agit sub aquis, concharum striatarum gibbis scopulisve innascens; staminibus fili instar tenuibus, uncialibus & sescuncialibus; quorum singulorum extremum excipit umbilicus clypeoli, circumscriptæ rotunditatis, lineolis à centro creberrimis productis striatis color cinereus, sapor saluginosus.

Androsaces Dioscoridis non est, nec enim semen fert; sed Fungi Petræ species. Duplex habetur major & minor.

Circa montem Cetium in stagno Volcarum petris & conchis innascens abundè invenitur; ut & nos observavimus.

Quæ de hujus viribus traduntur, conjecturis nituntur & incerta sunt. Lobelius tamen ventrem sistere novit. Ut hic scrupulus (inquit) Anguillare eximatur, nec expeti ut alvum solvat. RAIUS.

UMBILICVS TERRÆ, vid. Cyclamen.

UMBILICUS VENERIS.

Nomina. Cotyledon verà radice tuberosa J. B. cor. major C. B. Umbilicus Veneris Germ. Veneris vulgaris Park.

J. B.

Ex radice tuberosa, exiguis fibris donatâ pediculi exeunt palmates, in medium peltati circinarique folii, crassi, succulenti, glauci umbonem inserti, saporis viscosi & aquei, indidemque adeo caules prodeunt duo aut tres, dodrantes aut altiores, aliàs simplices, aliàs ramosi, ab imo fere ad summum usque confertis floribus oblongis, herbaceis comosi, floribus polygonari similibus, concavis, minoribus tamen: semen exiguum portulacæ simile.

Folia quæ in imo caule dubi vel tria plerumque sunt, non ut reliqua circularia, neque in eorum centrum seu Umbilicum inseritur pediculus, sed ad latus. Folia interdum superne concava sunt in fundibuli aut acetabuli fere in modum. In Saxis & vetustis parietibus.

Alterius species è Lusitania allata à Boelio meminit Parkinsonus quam Lusitanicam majorem, foliis pallidius virentibus vocat.

Superiore æstate in Cotyledonis plantis, quas in horto suo coluit, observavit mihiq; ostendit D. S. Dale pro vasculo seminali quinque Theculas seu siliquas discretas seminibus repletas singulis flosculis succedentes, adeoque de ejus loco omnem mihi scrupulum eximit.

Vires. Cotyledon Galeno 7. simplic. mistæ est facultatis, nempe humidæ, subfrigidæ & cujusdam obscure adstringentis, & cum ea leviter amaræ: valde refrigerat, repercutit, abstergit & discutit, itaque phlegmonas Erysipelatodes & Erysipelata Phlegmonode curat. Et maxime stomachi ardore æstuantis utile Epiplasma. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere & urinam movere.

Dioscoridi Cotyledon φῦμα τῆς ἐν αἰδοῖς καλῆς lucco ejus cum vino circumlito instillatove. Inflammationibus, lactis ignibus, strumis pernionibus illitæ auxiliatur, stomachi ardorem refrigerat, hydropicis folia ex melle dantur. Herba utuntur ad amatoria. RAIUS.

UNCIA, vid. sub titulò Mensuræ & Pondera.

UNEDO, vid. Arbutus.

UNGUENTUM.

Notum est apophthegma illud veteris cujusdam sa-

pienis, qui rogatus quomodo ad illam ætatem pervenisset? intus, ajebat, intus melle, extus oleo. Nobis id facillè licebit applicare ad præsentem, scopum; non solum interna medicamenta ad sanitatem facere; sed & localia externa, siquidem præ reliquis animalibus glabra cutis homini obigit, litui peraspera.

Neque verò opus est, ut de LINIMENTIS & UNGUENTIS seorsim, duobusve agatur capitibus siquidem magis & minus non variat speciem & ex eodem fundamento utriusque fabrica propullulat.

Nomen sortita sunt ab applicandi modo, sive ab ungue unguenti nomen arcessas, quod apud antiquos maximè valebat, quibus voluptuaria magis erant unguenta, & ad gratiam serviebant, quod hodiè de balsamis similiter locum habet; sive ab unguendo, ut ab illinendo linimentum dictum, non attinet dicere pluribus.

DEFINIRI potest unguentum, quod sit medicamentum topicum, modò liquidius, modò spissius maximè ex oleosis, teni affictu corpori pro variis usibus externis, applicandum.

Topicum est medicamentum, in quo genere cum reliquis convenit aliis, emplastro, epithemate, &c. Differentia verò specifica consistit in duobus potissimum, 1. in materiali, quod præcipue sunt oleosa & pingua, 2. in applicandi modo, qui non solum simplici impositione, sed affictu fieri consuevit.

Ut verò ab aliis jam laudato pacto differunt, ita & à se invicem paulò sunt discriminata, idque præcipue quoad consistentiam, alia quippe sunt fluida magis, ut linimenta, (siquidem strictâ notatione vocis unguentis contradistinguantur,) alia spissiora & mollia, ut unguenta; tum quoad virtutem & efficaciam, quam vel diffusam habent majori mole, ut linimenta & unguenta vulgaria; vel concentratam, in exiguo corpore, ut balsama odorifera.

Ut verò omnia liquida & mollia in se spectata litu mediante externo corpori applicari queant, nihilominus tamen, testante experientiâ, magis huic rei inserviunt, cetera elementa simpliciora, sulphurea & principaliter quidem oleosa, seu quæ resinâ fluida pollent & instructa sunt, adæquatè etiam spirituosâ fluida.

Spirituosa quidem, quatenus leniter affricata citissimè penetrant, qualia sunt in specie linimenta nervina (non oleosa,) quæ ex spirituum urinosorum & φλαγίσων consortio emergunt, licet commodissimè quoque cum his conquassari possint olea destillata, v.g. oleum saponis in arthritide. Et hæc quidem posterioribus seculis nata sunt, unde mirandum non est, in tantâ Chimiæ ignorantia talia apud veteres unguenta non occurrere.

Oleosa verò huic negotio præ aliis sunt aptissima. Sic enim 1. vel ex solis quandoque oleis litus fit, ut notum est, Chirurgo commodè terminos partis vulneratæ oleo rosato illinere, quod ipsum & in affectibus capitis talibus non intermittunt, idque vel eo commodè nomine, quod blandâ hac emolitione & tepore tumores à circulatione sanguinis impeditâ tollere possint: par ratio est, si unum alterumque oleum secum invicem remisceatur, & compositum constituat.

2. Ex oleis, pinguedinibus ac medullis, quæ ipsæ quoque oleorum vices subeunt omnino, pinguedine humana, v.g. butyro insulso &c.

3. Ex oleis, seu coctis & infusis seu expressis, varii generis, & oleis destillatis, qui modus sanè commodissimus est & eximius, siquidem illa merum quasi offerunt oleum, merum corpus; hæc verò concentrata seu destillata, si fateri volumus, quod res est, animam. Adeo & hic commodum est Galenicorum & Chemicorum matrimonium. Et hæc hoc pacto nihilominus seu tutelari præsidio gaudent, quæ aliàs inuncta facillè

transpirarent citius. Unde concinno stratagemate alterum alteri hic commode subvenit.

4. *Ex oleis cum aquis mixtis, sive succis expressis & in primis liquidis, sive coctione proleclis ex plantis cum aqua simplici, (singulis iis incoquendis, ut homogeneitas emergat), sive analogis aliis his liquoribus, v.gr. vino uti unguentum vulgò Samaritanum fit ex vino & oleo, illo coctione consumpto: mucilagibus tum vegetabilibus, uti ejusmodi linimenta in febrium ardentium Vesuvianò ardore & squalore lingvæ in praxi necessaria sunt; tum animalibus, ut albumen ovi, quod tamèn videri posset paulò rarius, quale est v.gr. unguentum ad ambusta Myns. satis euporiston ex oleo lini & albumine ovorum simul conquassatis.*

Notabilis h. l. est terminus *nutriti* ubi imbibitione, (id enim nutrire hic notat medicis) infuccatur quasi liquor pulveri vel calci metallica, & hinc miscetur cum oleo, uti sic fit unguentum de lichargyrio cum aceto & oleo, &c.

5. *Ex oleis, spiritibus, & extractis.* Notabile enim est, olea cum spiritibus, mediante hoc interprete, spisso scilicet corpore quovis, dissipata in minimas particulas; intimè consociari in linimenta, uti facile est v. gr. cum confect. alkerim. & aliis talia linimenta cordialia componere.

6. Ex oleis cum gummatis extractis, emplastris, cerâ; & quidem cum vel sine pulveribus & illis affinis, quæ quidem unguenta magis sunt composita.

7. *Ex melle, & aquis & pulveribus*, quale exemplum præbet unguentum *Aegyptiacum*, quod ex aceto, melle & viridi aris confit. Ubi notandum aqua h. l. latius dici pro omnibus his liquoribus, qui non sunt oleosi. Deinde etiam quod omnibus hisce speciebus addi possint & misceri pulveres, & quod hæc invicem quoque commisceri ulterius queant. Adeoque summam res eo redit, oleosa, pingua & his conformia & liquida spissa inter se & cum pulveribus posse misceri, addenda verò his heterogenea concorporanda esse.

8. *Ex unguentis effluantibus cum oleis simplicibus & destillatis, pinguedinibus, pulveribus*, in unum corpus facta mixtione, quem in finem præstat cognita habere usitata officinarum unguenta, variis scopis debita, & hic modus communissimus & facillimus quoque est.

Notabiles verò sunt circa hanc ipsam corporaturam
linimentorum & unguentorum CAUTELÆ.

1. *Pulveres grossiores & magis corporeos minus bene
conjugi & sociari*, unde laudem meretur *Heurniana*
observatio rectius fieri unguenta cum herbarum succis
quam cum eorundem pulveribus, idque ad facilio-
rem penetrationem & illinitionem, *meth. ad pr. p. 58.*
Adde quod vegetabilia jam indigitato modo coqui &
colari possint commodius.

2. *In unguentis curandum, ut & virtuosa sint & penetrantia.* Neque enim solum in extrema pelle consistere debet eorum virtus; sed intimius adigi ad locum affectum, ut commodè sine suo potiri queant. Et in hoc sanè magna differentia est unguentorum vulgarium, veterum illorum, & selectiorum; ut enim veterum illorum, & selectiorum; ut enim verum fateamur, plurima illa unguenta pinguedine oblinunt magis v. gr. regionem ventriculi, hypochondriorum, lumborum, quam, ut de se experiri spirant efficaciam. Hinc v. gr. in affectibus hepatis non sola olea, nec linimenta unguinosa præscribenda, frustra quippè id fit ob situm visceris profundiorum, quo hæc ipsa torpida penetrare nequeunt. Hinc & vinum, acerum, & alia redduntur.

3. *Unguenta tonum viscerum respiciant*, ut nempe singulis, quibus debentur, convenient, hinc cordi & ventriculo magis spirituosæ & aromatica convenient, utrisque odorata; hinc hypochondriis etiam magis car-

4. *Aquea in unguentis, cum fini heterogenea, si non possint coaquassari incoqui & inspissari oportet.* Nam ut aquea epithematibus cataplasmatibus magis conveniunt, ita unguentis & emplastris oleosa, unde huc pertinet cautela *Helmontii* quoque: nihil emplastris & unguentis admiscendum esse, quod in eis nequeat per totam homogenealiter resolvi. Ex quo inferre licet, illa unguenta, (par ratio est emplastrorum) in quibus olea, seu excipiens, simul solventis. quasi vicem obeunt, esse prastantiora, quam ubi simplex sit mixtura qualia sunt præter s. i. dictos pulveres vegetabilium, alii terrei quoque. Et hinc potè est, quod talia subtilissime sint læviganda, ut secum quantum fieri potest, incorporentur, homogenea fiant, & saltem ad sensum, se invicem transeant. Hinc & in unguentis mercurialibus mercurius prius extinguendus, & in minimas atomos dispergendus est, id quod optime fit non tam salivâ, non tam ipsis pinguibus, quam addito modico terebinthinæ Cypriæ, qui inviscatus, hinc terendo in expetitam formam facit.

5. *Salia, in primis corrosiva refractè magis ingredi debent; cum enim & maxime activa sint, & minus cerè definiatur termino, ut emplastra, sed fluxilia sint, facili indè, si contrarium fiat, sit læsio; Hinc ad ℥j. olei seu pinguedinis, vel hujus analogi, gut. j. ad vj. ℞. ri. 〇-〇&c. sufficit.*

3. *Basis ex opio ut plurimum primo loco prescribi-
tur, seu oleum fuerit, seu pinguedo, seu unguentum
officinale, additis hinc pro re nata aliis accommodis,
ut aded hinc.*

FORMA externa illinibilis emergat, ubi in primis dicendum venit de consistentiâ. Præsuppositio enim solâ consistentiâ fluidiori vel spissiori inter se differre habet, sæpè tamen confundi utraque alterumque præ altero prædicari, nihilominus maxima in hoc ipso occurrit latitudo, unâ quævis vulgò unguenta v. gr. instar electuarii se habere linimenta instar sumpi vel linctus dicantur, facile tamen fuerit ex iisdem ingredientibus oleosis modò linimenti, modo unguenti formam prodire posse, & hæc ipsa rursum ab his terminis secedere, magis quippè vires, quam consistentiâ, attenduntur. modò commodâ sit illinitioni.

In primis corporaturam hanc ipsis fecerat, cetera
ubi notandum,

1. *Cera non esse de essentia unguentorum*, & in primis *linimentorum*, unde & post principia stat, & ad virtutem parum confert, unde nec omnibus unguentis additur, sed plurima citra eam consunt. Cera enim per se non bene inungitur, sed conglobatur affictu, unde & in balsamica unguenta seu balsam. odorifera non ingreditur. Cera poros obstruit, unde minus penetrare ad partem affectam potest linimentum, quod cera recipit. Quando verò intentio est poros obstruendi & magis ea adhærere debent, magis recipi potest.

2. *Selectus in cerâ minus observatur*, unde licet sint, qui veram flavam in affectibus frigidis, albam in calidis eligant, parum tamen interest.

3. *Cera quantitas varo exprimitur.* Utot enim auctores hanc proportionem expriment, ut ad ℥j. y. g. olei, cære suboctuplum seu 3℔. in linimentis, subquaduplum seu ℥ij. in unguentis, & pulverum circiter ℥j. recipiant, usitatus tamen termino vulgari, quantum sufficit, id effertur.

4. In linimentis & unguentis praescribendis non peccandum excessiva quantitate. Et hoc in genere notandum.

dum; in specie verò vix ultra 3j vel ij. facile trans-
cendimus, præterquam pro usu magis universali, v.g.
in atrophîâ, in paralyfi, & similibus affectibus, ubi spina
dorsi, articuli, plantæ pedum, inungendæ. Imò præstant
italia unguenta, quæ penetrantia, & animâ magis instructa
sunt, in minori quantitate, etiam duplo aliorum minùs
salium.

5. *Odorata unguenta decorant*, præcipuè enim
& externis medicamentis gratia inesse debet; ne fœto-
re, colore ingrato, sordida & invisa reddantur; hinc v.
g. unguenta scabiosa non tam ingrata illa & fœtida, quàm
suaviora seligenda. Neque verò solùm decorem, sed &
virtutem largiuntur, siquidem subtili suâ *avardupidore*
maximè penetrant, & reliquorum virtutem secum trans-
vehunt.

Denique forma hæc emergit & mixturæ inducitur,
vel cum igne, præcipuè si sint vel magis homogenea, ut
hoc modo solvantur & subeant se invicem, vel hetero-
genea aquea, ut diffiliari vel inspissari possint: vel sine igne,
solâ triturâ & subactione solerti, id quod in fluidioribus
magis succedit.

Unguentum in dolore capitis: *℥. unguenti alabastr.*
3ij. populn. 3j. philon. Rom. 3ij. ol. nuc. mosch. expressi. gr. vj.
nucleorum persic. q. s. M.

Antiparalyticum: *℥. unguenti nervin. 3℔. vel j. ol. pe-*
trrol. 3j. anth. succini salvia, spica, an. gtt. vj. balsami de Pe-
ru 3j. spirit. formic. 3ij. M.

Pectorale: *℥. unguenti rubri potab. 3℔. ol. avisi, fœnic.*
an. gtt. iij. croci gr. iv. M.

Splenicum: *℥. ol. cappar. 3℔. Gri fœt. re-*
ctif. carvi, anisi, junip. succini, ana gtt. vj. M. D. in
vitro.

Nephriticum: *℥. unguent. anod. ol. scorp. Matib. an.*
3℔. junip. 3℔. succini gtt. vj. anisi, carvi, ana gtt. iv. ligni
Rhod. gtt. iij. M.

Anticolicum & hystericum: *℥. ol. hyosc. 3ij. nuc.*
mosch. destillati, anethi, carvi, anisi, ana gtt. vj. zibethi gr.
ij. M.

Contra scabiem: *℥. unguenti enulati cum Qio 3℔. fi.*
myrrhat. 3j. ol. Gri per deliquium 3℔. lign. Rhod. gtt. vj.
Bals. Peru. 3℔. M.

Notanda hæc in specie sunt unguenta officinalia, quæ
& per se pro usu chirurgico, polychresto, & aliàs conve-
niant, ut singulorum quis virtutem nôrit ut in specie
unguentum digestivum, quod tale in usu est Chirurgis:
℥. cereb. cum vino vel aq. rosar. lot. ad albed. 1℔. 3℔. sebi cer-
vini 3ij. ol. rosar. 3℔. cere alba, mastich. olivani, ana 3℔.
camph. 3j. M. F. l. a. unguentum.

Hoc ipsum porro in sordidis ulceribus permif-
ceri potest cum unguento Egyptiaco, quod & so-
lum officium facit. Pertinent quin imò huc balsa-
ma vulneraria & alia similia in praxi occurren-
tia.

Uti verò latissimus est unguentorum & linimen-
torum campus, ita ipsorum UTENDI ET AP-
PLICANDI MODVS non minùs venit atten-
dendus.

1. *Ratione partium affectarum*, quibus debentur
unguenta & linimenta, notandum est *Oribasii*
effatum 10. coll. vigesimo septimo, apud *Bauhinum*:
Quibuscunque partibus cataplasmata applicari ne-
queunt, nec madefactioni locus est, ibi præcipuè
unguenta locum habent, verbi gratia, palpebris, au-
ribus, totaque facie affectâ, in his enim consistere mi-
nus possunt cataplasmata, adeoque commodissimè un-
guenta ferunt. In reliquis videndum, an nullum adsit
contraindicans, de quo paulò post dicemus. Latior itaque
est usus unguentorum & linimentorum, quàm cataplas-
matum & epithematum, quin ausim dicere, & empla-
strorum ipsorum.

2. *Quoad locum applicationis in specie*, quæ

pars ipsa indicat, seu immediatè, seu mediatè, illi
quoque debentur eadem. Climata verò illa præci-
pua juxta corporis fabricam lustrabimus *Bregmati*
adhibentur in catarrhis. quale unguentum est *Herstii* ex
gummi elemi in oleo succini soluto, modò non hisce
calidioribus materiam serosam à naturâ illuc motam
in vasa præcipitemus, & febrem aliaque mala excite-
mus, id quod à nonnullis factum meminimus cum pe-
riculo. Oleo verò succini in uvulæ laxitatibus eodem
loco sapiùs felicissimè uti sumus. *Temporibus* & *pa-*
nè aures somnifera in agrypnâ, id quod & *naribus*
solent quidam applicare. *Oculorum palpebris* inungun-
tur eodem unguenta, præsertim aciora paulò, ver-
bi gratia, essentia fellis lucii piscis, pinguedo vipera-
rum, ascia piscis, quibus frequentissimè cum suc-
cessu utimur, non solùm in suffusione & aliis malis
oculorum, verùm quoque pro confortando visu. Tâ
peronæ & narium in coryzâ, ut & ipsis *naribus*,
lingua ex thetiacâ, sinapi, castoreo, in aphoniâ, qua-
le exemplum habet *Heer. obs. 21. Spina dorsali* in pa-
ralysi, robotandisque nervis & mitigandis, siquidem
& in epilepsiâ consultum & proficuum hanc illinatio-
nem deprehendimus: in febribus item ante paroxysmum
in hecticâ, atrophîâ, tæbe, & sudore colliquativo *Scrb-*
bitula cordis pro ventriculo, & quidem non tam ex oleis
coctis, quàm balsamicis, aliàs quippe facilè laxum tonum
eidem & debilitatem inducunt.

Lis quidem est inter autores, an anticâ vel posticâ
parte circa spinam dorsalem melius applicentur hæc
topica, quod prolixius deducere possemus, nisi brevi-
tati magis studeremus. Qui posterius applicare volunt,
perhibent officium ventriculi sinistrum vertebriis dor-
si vicinior esse, quàm cartilagini ensiformi; contrâ ea
verò calorem antèrius facilius communicari cum hepa-
te, nullo ad stomachum redundante commodo; sed
juxta alios rectè obijciuntur. 1. Medicamenta per tan-
tum ossium vallum vix penetrare posse. 2. Vires eo-
rum hoc modo multum exsolvi & deperdi priùs, quàm
ad locum affectum pertingant. 3. Hepat ibi valdè te-
nue esse & fastigiatum, ut, si omnino aliquid caloris
concipiat, quod tamen ob refractam topicì vim erit
perexiguum, non sit ob id metuendum toti visceri.
4. Medicamenta ejusmodi non esse intenso gradu cali-
da. Sin quis nimis calida adhibeat, hunc scopulum im-
pingere potest.

Sit ergò & hæc sua laus unguentis stomachicis, siqui-
dem ut nonnunquam fit, & circa dorsum, circa intersti-
tium scapularum dolcat, potior tamen ratio est partis
anticæ habenda.

Porro *hypochondriis* inunguntur pro viscerum ibi si-
torum, hepatis & lienis, solamine: *dorso* & *lumbis* pro
renibus in calculo, item affectibus uteri, ob metum
abortûs: in pollutione nocturnâ &c. *umbilico* antepilep-
tica, diuretica, & purgantia, uti eo nomine unguen-
tum de arthanitâ id est, de cyclamine in usu est, item
carminativa & paregorica in colicâ, pellentia in partur
difficili, quod pars sit maximè perspirabilis. *plantis pedum*
somnifera & pectoralia quædâ uti pinguedo lucii piscis
eo casu vulgò adhibetur. *Digitis pedum* phrodisiaca: *ar-*
ticulis Mercurialia pro pyralismo excitando in lue ve-
nereâ, scabie fugandâ; *Pubi* in ischuriâ, affectibus uteri,
& partium genitalium.

Tacemus partes alias, *uteri orificium* in partu, *thoracem*
in affectibus pectoris, &c.

Ut verò 3i. penetrare & adluantur magis, duo potis-
simùm conferunt, tum antecedens *frictio*, quæ maximè
locum habet in *andromis*; seu, quæ dolori debentur &
similibus, tum consequens *calefactio*, quibus utrisque
virtus unguentorum & linimentorum sanè maximè
promoveretur. Notabile in hoc est consilium *Helmontii*,
qui utut aliàs causas illas occasionales, ut vocat, Ar-
cheum

chéum ad furorem vel iram concitantes, parùm curret, in quo nonnulli eundem *ἄσθμα* sequuntur, nescio tamen quo favore prosequatur unguenta. Præsupposito etenim, unguentis quamplurimos morbos superari, *lib. imago fermenti &c. inscripto pag. nonagesima tertia*, in altero *pharmacopolio moderno*, ubi affectus est externus, tepida suadet eadem apponere; ubi verò internus, unguina hæc lapide calefacto vel arenâ calidâ [sacculo calido uno verbo,] foveri jubet; illud in balsamis vulnerariis potissimum & similibus; hoc in doloribus, pleuritide, nephritide, &c. locum habet. Dici epim non potest, quantum sacculis talibus paregoricis, vel lapide serpentino calefacto &c. tensiones & dolores partium sopiantur, ut alia mittamus.

4. *Tempus est vel definitum & determinatum, vel indefinitum.* Opus habent illo gladiatorum termino antiquo: repete, unde nonnunquam in calculo, pleuritide, singulis 23. horis jubemus eadem illinere.

5. *Modicè, parum, & frequenter sunt inungenda ut plurimum;* semper tamen vel ad extrinsecum, vel intrinsecum scopum frequentius habito respectu, vi methodi medendi.

Et hæc quidem de utendi modo; quam tractationem obfigillabimus digno scrutatu isto cotollario: Utrum dentur unguenta universalis, uti de lapide Butleri scribitur, ipsum solo quasi linguæ contactu plurimos, si non omnes morbos sanasse, unâ cum paucis saltem adhibitis circumstantiis. Sequuntur hunc ex parte alii, qui ad bregma id fieri præcipiunt.

Non negamus illud *Helmontii* effatum, odores habere immediatum cum spiritibus contactum, & multum posse in excitando archéo: utrum verò hæc ipsa illinitione cum lapillo tali ex ente veneris &c. ille ipse Archéus ita confortari possit, ut omnes causas occasionales à se avertere queat, magnum est & vix concedendum postulat.

Misso itaque generali & communi hoc usu de particulari jam & privativè & positivè erimus solliciti.

Unguenta 1. *minus refrigerant*, respectivè scilicet seu frequentius calefaciendi, quam refrigerandi sine præscribuntur, & per consequens refrigerantibus quoque, v. g. ungu. refriger. Gal. rosato Mesue, non æquè & per omnia fideandum, ob adjunctam quippe oleosiratem.

2. Unguenta *minus adstringunt*, ex generali illâ inductione, quod olea & pingua omnia laxent, unde improprie magis sunt adstringentia. Hinc & præter unguentum comitissæ, quod inunctum *lumbis*, in pollutione nocturnâ; *pubi* in mensium fluxu &c. commendatur, pauca in officinis sunt adstringentia unguenta. Et quæ hoc sine adhibentur, magis roborante aromaticâ vi in dysenteria, abortus metu, vomitu, cholera, prosunt, quam aliâ.

3. *Unguenta ubi laxitas vitanda, minus conveniunt*, hinc quod jam de stomachicis diximus & aliis, valet etiam de articulis, in podagricis quippe & arthriticis unguinosa transpirationem impediunt, affluxum majorem cient, & loco affecto faciliè humores impingunt, adeoque consultius omittuntur. Quin &, ex *Craonis* præcepto, *conf. 8.* in pulmonum affectibus cautè sunt inungenda, ut enim laxent materiam bronchiis inhaerentem, attamen faciliè affluxum majorem ipsis inferunt, unde eo casu resolutiva magis prosunt, ut unguentum rubrum potabile. Hinc quæ viscera adstrictione gaudent, per unguenta laxari, ventriculus, quæ verò laxitate gaudent, nimis laxari renuunt.

4. Unguenta *canero, hamorrhoidibus, inflammationibus, ulceribus, tumoribus laxis & præhumidis* minus conveniunt, in canero quidem, quia emollientibus acrimonia illa acidâ salina magis exacerbatur & disseminatur, unde vel ex solo hoc errato, intempestivâ unguento-

rum applicatione, tumores non cancrofi in cancrofos sæpè degenerant, præcipuè in membris delicatis, mammis, naribus, Hæmorrhoidibus, quod dilatent magis folliculos venarum, sorditiem ibi collectam, vel sanguinem etiam floridum fervidiorem exasperent, transpirationem prohibeant, &c. Unde licet apud omnes adèo practicos deprædicentur unguenta, & in specie de linaria in eo casu, nescio tamen, quibus observationibus id confirmati scripserint; siquidem aliquoties observavimus, hæmorrhoidibus cæcis dolorificis minus hæc profuisse, quia potius dolorem, fervoremque intendisse. In inflammationibus, præterquam ad suppurationis promotionem, unde unguenta in erysipelate proscripita sunt, licet sint v. g. *Rondeliius*, qui & in hoc affectu unguenta præscribant. Certum quoque est, inflammationibus externis, scilicet gravioribus, unguenta improvidè applicata sæpè gangrænam excitasse. Hinc & in anginolis non promiscuè, uti in libellis practicum fit, locum habent. Ulceribus laxis, v. g. labiorum, siquidem sordities his faciliè promovetur.

Notabile tamen est, id potissimum intelligendum [1.] de *purè pinguibus oleis*, inprimis vulgaribus unguentis, [2.] non *immutatis*, & sibi relictis, cæteroquin cuius notum est, unguentum de lithargyrio in ambustis & aliis esse laudatissimum. Verbo, quicumque affectus læduntur pinguibus, læduntur etiam unguentis.

Contrà ea verò usu se commendant eximio i. *paregorico, digerente, leniente & mitigante*, hinc unguenta *ἀνοσπία* in lassitudinibus & doloribus ita dicta peculiariter quasi nomen obtinuerunt, hinc in pleuritide, colicâ, calculo, ileo, dysenteria, nil præsentius est unguentis, quibus dimidia quasi pars curationis horum affectuum absolvitur.

2. *Emolliente*, de naturâ enim pinguium est, ut eximè & eminenter emolliant, hinc ad partum facilitandum ante & in ipso unguenta oleaque inprimis ex oleo momordicæ, quàm commendatissima sunt. Notabile etiam est eo casu linimenta præ unguentis, utpote fluidiora, esse præferenda, lubricant quippe magis. Hinc etiam ob emolliendi & irritandi lenem virtutem unguenta epomphalia officium faciunt, quæ vulgus sæpè etiam in pinguedine asperinâ, stercote murium, & pipere cum succellu parat, ut cataplasma ex pomis putridis, item unguentum de cyclamine huic scopo inservit; Paulò tamen rarior hic esse usus consuevit, & vix alius quàm leniens, qui ipse tamen in inductione stercorum satis commodus & necessarius est. Hinc in calculo & ischuria ex eodem quoque capite præstat eadem.

3. *Maurante & suppurante.* Hinc, ut alia taceamus unguenta, præter emplastra emollientia, chirurgi axungiam leporinam tuberculis feliciter inungunt, maxime paulò vetustiore & acriore; faciunt verò id inprimis unguinosa, quod poris obstructis calor digerens roboretur.

4. *Humectante & roborante*, hinc unguenta squalorem cutis aridæ & exsuccæ corrigunt, glandulas subcutaneas demulcent, & in atrophia, tabe, hecticâ tum particulari, tum universali, officium faciunt, & audiunt talia hinc resumtiva & analeptica, ex pinguedinibus, humanâ, taurinâ, & nervinis. Roborant verò inprimis balsamica, nervina, aphrodisiaca subtilitate & suavitate particularum oleosarum volatilium, penetrante. Et id quidem sociâ operâ sæpè cum balneis simulante & post ea, quod de emolliente & aliis quoque usibus non minus valet.

5. *Mundante & abstergente*: hinc unguenta cosmetica non solum ad faciem, verum etiam cutem in genere laudabilia sunt, scabiem, varos, impetiginem, herpetem curant, & pellem nitidam reddunt ac æqualem, unde in foveis variolarum explendis ex pinguedine asciæ piscis, quam vel cum o. ligni rhodini solo mixtam feliciter eo casu abhibere soleamus, proficiunt.

font. Quin & in pforâ, siue fœdâ scabie & in ipsâ elephan-
tiali fissuris & furfuribus squamosis infami, officium fa-
ciunt. &c. *W E D E L I V S.*

Unguentum est topicum medicamentum, ex oleo,
pinguedine, medullis, resinâ, pulvere, cerâ & similibus
compositum, ad firmiorem linimento consistentiam de-
ductum.

Proportio ingredientium talis esse debet, ut pro ℥j.
olei, sit pulveris, & ceræ utriusque quarta pars. Plerum-
que non limitamus ceræ copiam, sed ejus præscribi-
mus q. s.

Solum unguentum nutritum sit sine cera &
igne.

Dosis totius est ad ℥iij. vi. vel ℥vj. pro partis
inungendæ magnitudine. Aliqui immiscent succos oleis
ut bulliant ad succorum consumptionem.

Unguentum aliud officinale, quod in officinis serva-
tur paratum, ut ung. ros. populeum, de alch. quibus vel so-
lis, vel simul mixtis utimur.

Aliud magistrale, quod à Medico ex tempore præ-
scribitur, cujus usus est multiplex.

Primo, ad emolliendum, & resolvendum in tumori-
bus, & doloribus à causa frigida.

℥. *Ung. de alib. vel resumpt. an. ℥j. ung. Agrip. & a-
xung. anatis an. ℥b. Misce, fiat unguent.*

Unguentum nutritum ad herpes cutis, ulcuscula,
phlogoses.

℥. *Litharg. aur. tenuissimè triti, olei rosar.
& aceti ana quantum lithargyrus agnatus in
mortario ebibere poteris, & justam crassitiem acqui-
siverit.*

Loco aceti quando magis refrigerandi, quam ex-
siccandi opus est, nutritur lithargyrus cum aqua ros. vel
plantag.

Secundo, ad scabiem & pruritum.

℥. *Sulphur. pulv. succo limon. loti & nutriti ℥j.
axungia suilla, vel butyri recentis ℥j. salis comm.
℥j. Fiat unguent. quo vespere dum in cubitum illinia-
tur.*

Tertio, ad salivationem provocandam in lue venerea
extirpandâ.

℥. *Mercurii optimi cum terebinth. vel saliva
perfectè extincti ℥iv. axungia porci ℥vj. unguen-
ti martiati ℥j. olei chamamel q. s. Fiat unguentum,
quo illiniantur ut artis est, artus, nares, & spina dor-
si.*

Fortius fiet unguentum, si Mercurii quantitas au-
geatur, ad ℥b. pro ℥vj. axungie: Adhuc for-
tius erit si ad ℥viiij. Fortissimum verò si Mer-
curii & axungie ana partes æquales præscriban-
tur.

Pro delicatis, gracilibus, & ad sputum plocivibus
minor dosis, pro robustioribus aut robustissimis pro-
portionaliter cæteræ conveniunt. Aliquando incipi-
mus à minori dosi, & deinde augemus Mercurii qua-
ntitatem dum videmus sputum lentè apparere, & proce-
dere.

Tempestas idonea est verna, vel autumnalis. De-
bet fieri inunctio manè horâ sextâ. In debilibus non
longè ab assumpto iusculo; alioquin jejuno ventri-
culo, vel immediatè post assumptum cyathum bo-
cheri ex schina: incipiendò à partibus inferiori-
bus ad superiores. Rarò sit his in die inunctio
universalis, nec unquam nisi in robustis: sed
aliquandò particularis vespere, secundum extre-
mas partes, ut juvetur prior inunctio, ipsius ope-
ratio, utque natura citius proferat *πρωϊνός*
μὲν.

Inunctio fiat per tres, quatuor, aut quin-
que dies, donec procedat oris fluxus; qui si
quando apparuit, lentè progrediatur, promovendus
est frictionibus particularibus manè, vel vespere horâ
quartâ.

In obesis, pituitosis, iisque in quibus timeatur nervo-
rum imbecillitas, addenda est styrax liquida ad ℥b. in
unguentis.

Aliquando dum incipit pyralismus abstinemus ab
inunctione, in debilibus potissimum & delicatis cor-
poribus; nec enim tamdiu celebrari debet, dum
liberrimè oris fluor procedat, quia motus natu-
ræ optimè regulari incipiunt debilitet, postea au-
gentur: ideoque aliquando per unum aut alterum
diem sit intermissio, quo tempore si videamus
naturam quasi sopitam, & penitus languentem ad
oris fluxum, ulterius quantum satis videatur, inungi-
mus.

Quibus lues est implicita febris lentæ, immi-
nenti hecticæ, tabi, vel spato sanguinis; aut talis
vitiū tenuitas, quæ sine mortis periculo hydrar-
gyrosim sustinere non possit, in his per novem vel
decem vices, alternò tantum die ab inguinibus ad
plantas pedum, frictiones celebrandæ sunt, cum victus
regimine, fracto robore, inunctioni atque ejus operatio-
ni convenienti.

Crisim in procinctu, & proximè accedentem cognos-
cimus, quandò adest lassitudo insignis, oris & gin-
givarum inflammatio, tumor, & ulcuscula nascun-
tur.

Inunctus æger linteis involvendus calidis, postea in
lecto componendus, & stragulis coopertus per horam
sinendus.

Nota, quod non sit admodum opprimendus stra-
gulis, ne copiosus eliciatur sudor, sed his so-
lùm, quibus sufficiat ad majorem transpirationem.
& unguenti ad interiora penetrationem. Per horam sic
relinquitur, plus minus, pro vitiū robore, deinde
detergitur sudor, & post horam iusculum exhibe-
tur.

Quandiu celebratur hydrargyrosis, iusculis optimis
& panatellis æger est nutriendus: accedente crisi solis
iusculis, tùm & quandiu natura fatigatur, aut adest febris
insignis.

Aliquando accidentia superveniunt, quæ impe-
diunt salivationem, ut febris, convulsio; angina;
suffocatio; sudor copiosus, alvi fluxus, ob fer-
vorem & motum humorum, qui in varias partes
feruntur, naturâ non determinante motum ad os
quia opprimitur & nimis irritatur, tum verò non
est pertinaciùs insistendum frictionibus, sed, ut
prudenti Medico videbitur, vena secanda aut put-
gandum, aut utrumque agendum, aut clysteribus de-
tergentibus, & anodynis laxior alvus coercenda. Se-
data tempestate, si non moveatur oris fluor, ad inunctio-
nes rursus procedendum, si non satis fuerint celebratæ,
& vires ferre possint.

Iisdem linteis diu noctuque immaneat æget, per
sex vel octo dies, ut oris fluxus conservetur, nisi
si febris intensior, copiosus sudor, aut alvi flu-
xus, aliudve insigne symptoma mutare cogat.
Quando sudor & alvi fluxus superveniunt insigni-
ter dum celebrantur frictiones, dandæ sunt induciæ
& intervallum sufficiens ponendum inter unam & alte-
ram inunctionem, ut desuescat natura, quod minimè
confert, movere. Quo tempore clysteribus convenien-
tibus, cæterisque indicatis frenandus humorum mo-
tus.

Præparantia inunctionibus præmittantur, in usu
erant antè venæ sectio, purgatio per apozemata
diata

diata sudorifica per xx. aut xxx. dies addebant aliqui hydrargyrosim : jam experientia ostendit securius extirpari radices luis veneræ, & salivationem obtineri, si venæ sectioni semel, bis, tervē pro sanguinis copia, & viribus, purgationibus interpolatis, primò ex senna, cassia, manna vel confect. hamech. & syrupo rosati. postea ex aquila alba & præcipitato albo, diagridio & similibus, tum & jusculis aperientibus & refrigerantibus, balneis quoque ad sufficiens tempus, id est per xv. aut xx. dies celebratis; ultimo tandem soli luis veneræ *σιζοτόμα* hydrargyrosi confidamus.

Nota, quod si luis veneræ, quod plerumque fit, implicentur alii affectus, ut viscerum obstructions, infarctus, febris continua, vel intermittens, tussis, macies insignis, prius auferendi sunt convenientibus remediis, non neglectis specificis. Iis verò vel penitus, vel ex majori parte sublatis, procedendum ad regularem luis veneræ curationem.

Sinendum ut oris fluor procedat per xxx. dies ad minus xx. postea purgatio celebranda, cui præmittatur venæ sectio sinecessaria videatur. Si calida viscerum intemperies supersit, jusculis refrigerantibus & balneis, & si macies etiam reperiatur lacte asinino utendum.

UNGUENTA VARIE COMPOSITIONIS.

Unguentum Adstringensex Phar. Londin.

℞. Olei rosati in aqua aluminosa sape loti ℥ss. cera alba ℥iv. gallarum iminatur. nucum upressi, baccar. myrti, balaustror. malicorii, cort. glandium, Aca- cia, Rhois, mastiches ana ℥j. omnia optime trita mace- rantur in succis mespilor. & sorborum per quatuordecim; dein siccantur igne miti; sicque cum oleo & cera, F. un- guentum f. a.

Unguentum Aegyptiacum simplex Mesuræ ex Phar. August.

℞. ℥v. mellis ℥xiv. Aceti fortis ℥vj. coquantur omnia, donec fiat unguentum spissum, & colore purpureum.

Valentissimum ad saniem siccandam, sordes detergen- das, & carnem abluendam, ulceribus malignis, putridis & sinuosis convenit.

Aegyptiacum compositum ex eadem Phar.

℞. Bruginis, vulgo viridis aris ℥iv. Aluminis, sa- lis ammoniac ana ℥ss. jucci scordii ℥iv. Alliaris, ru- te ana ℥ij. Aceti scilliti ℥vj. mellis cum desotto Absin- thii & scordii despinati ℥xvj. omnia simul lento igne co- quantur ad mediocrem unguenti consistentiam: addendo theriacæ electæ, mitridatis ana ℥ss. camphoræ ℥j. ex probè mixtis fiat unguentum.

Ulus hujus unguenti plurimum commendatur in gangræna, & sphacelo, omnibusque aliis ulceribus val- de putridis, & sinuosis; putredini siquidem resistit, & carnem mortuam à sana separat, exsiccac ac detergit, vaporesque putridos & venenatos partibus nobiliori- bus præcipuè infestos, discutit; à Guiljelmo Fabricio Hildago, chirurgus quondam experientissimus, in tractatu de gangræna & sphacelo, instar singularis experimenti ad prædicta dilaudatum.

Unguentum Agrippæ ex Nicolao Phar. August.

℞. Radicum bryonia ℥ij. cucumeris asinini ℥ij. scil- la ℥ss. ireos ℥ij. filicis, ebuli, tribulorum aquaticorum ana ℥ij. cera alba ℥xv. olei olivarum ℥iv. radices omnes iste recentes mundatæ, in. i. j. & confusæ cum tribulis mace- rantur in oleo per dies octo. Deinde coquantur exprimantur, & in colato ac expresso oleo resolvatur cera, fiatque

unguentum secundum artem.

Ad Regem Agrippam auctorem referunt hanc com- positionem; ad aquæ suffusiones, partium tumores laxos seu cedemata, & nervorum contractiones valet, nephriti- cis succurrit, ac ventri illitum alvum movet, itrangui- riam sedat, ad lienosos quoque, & ventrem dolentes uti- le existit.

Unguentum de Alabaistro ex Phar. August.

℞. Flor. & herb. chamameli, ruta ana m. ij. rosar. beto- ni ana m. j. rad. althææ ℥ij. olei rosati ℥ss. contundan- tur, & ad aquæ humiditatis exhalationem coquantur, postea colentur & exprimantur. Ex colatura cum ala- bastro puri & pulveritati ℥ij. & cera alba sufficienti quantitate, F. unguentum.

Describitur hoc unguentum, ab auctore Benedicto Faventino in Emperic. cap. i. de dolore capitis in quo ta- men succorum loco, ipsas herbas & flores recipere ha- denus nost. i. consueverunt. Confect autem omni capitis dolori, sive is per essentiam, sive per consensum, cum & citra febrem obortus fuerit.

Unguentum Album, sive de Cerussa dictum Avi- cennæ ex Phar. August.

℞. Lithargyri albi loti ℥ss. cerussa lota ℥xx. cera alba ℥xxxvj. olei rosati ℥vij. albuminum ovorum num- ro iv. cera in oleo rosato liquata, in i. j. cerussam & li- thargyrum probè contrita, misce, ac postremo adde albu- mina ovorum.

Commendatur ad ambusta, erysipelata, sca- biem & cutis vitia, à scalla pituita, & bile usta enata, ad pruriginis ac pustularum eruptiones, acrem serpiginem, attrita, & intemperiem ulcerum calidam.

Album Camphoratum ex eadem Phar.

℞. Olei rosati, cerussa ana ℥ij. cera alba ℥ij. albumi- num ovorum num. vi. camphoræ diluta cum spiritu rosa- rum ℥j. F. unguentum f. a.

Ad prædicta Valentius est propter camphoram ery- sipelata reprimat, & ambustis medetur.

Unguentum de Althæâ simplex Nicolai ex Phar. August.

℥ss. Radicum Althææ ℥ij. semen lini, Fennigra- ci ana ℥ss. butyri ℥iv. cera ℥ij. Terebinthinæ ℥ij. resina ℥vj. Radices & semina confusa macerantur in aqua f. q. deinde coquantur donec emittant cras- sam & viscosam mucilaginem, quæ exprimatur, Tum.

℞. Expressæ mucilaginis ℥ij. eoque cum butyro, & cum aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ce- ram cum resina liquidam & colatam, hisque ab igne de- positis Terebinthinam adadit, & secundum artem unguen- tum peracto.

Ulu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum & humectandum, pectoris dolorem à frigore contrā- ctum abolet, laterumque doloribus felicissime adhibetur viscerum durities laxat, ac stomachi inflationes discutit valet ad nervorum duritiem ac resolutionem, eoque præcisos glutinat, vulnera claudit, inprimis vesicæ bene- facit, periodicalque febres emolitur, lentè incidit & di- gerit.

De Althæa compositum Nicolai ex eadem Phar.

℞. Radicum Althææ ℥ij. seminum lini Fennigra- ci ana ℥ss. scilla recentis ℥vj. olei ℥iv. cera ℥ij. Tere- binth. gummi bedera. galbani ana ℥ij. colophoniæ, re- sina ana ℥vj. radices & semina confusa macerantur in f. q. aquæ, deinde coquantur donec evascescat mucilago, postea. ℞. mucilaginis expressæ ℥ij. & cum oleo ad humiditatis aquæ consumptionem coque- Add

Adde ceram cum Colophonia & resina liquefactam & colatam, ab igne verò depositis & semirefrigeratis, galbanum cum Terebinthina liquatum, ut & gummi hedera pulverisatum.

Nonnulli ex pharmacopœis, ut colorem Unguenti magis intendant, illudque oculis gratius efficiant; nonnihil de radicibus Curcumæ adiciunt, id autem, si Cera pulchra & citrina fuerit, facere non opus est, nec curcuma ad medicamenti intentionem facit. Qui etiam parare voluerit hoc Unguentum, posset dimidia, imò vel tertia, quartave parte radicem Althææ, & seminum contentus esset cum præscripta quantitas nimia esse videatur.

Unguentum Marum ex Pharmac. Londin.

℞. Olei rute, sabina, mentha, Absinthii, Amygd. amararum an. ℥i. succi Flor. vel folior. persica, absinthii an. ℥ss. Tormenilla an. ℥j. sem. Caulium, pulpa Colocynthis, an. ℥ij. Aloës hepaticæ ℥ij. Farina Lupinorum ℥ss. myrrha, in aqua graminis lota ℥ss. Fel taurini ℥ss. Cum succi Limonis q. s. & cera ℥j. & B. Fiat Unguentum s. a.

Unguentum ad Ambusta ex D. Lemery.

℞. Olei napi lb. ij. axung. ovilla, cera flava, ana lb. ss. minii, cerussa ana ℥ij. F. Unguentum l. a.

Unguentum Anodynum ex Pharm. Augst.

℞. Olei lilior. alborum ℥vi. Anethini, chamamelini an. ℥ij. Amygdal. dulcium ℥j. pinguedinis Anatis, galline an. ℥ij. Cera alba quantum satis est, in oleis & pinguedinibus ceram liquando fiat Unguentum.

Dolores quacunq; in corporis parte mitigat unde nomen quoque contraxit.

Anodynum aliud, vulgò Iovis dictum ex eadem Pharmac.

℞. Fol. Hyoscyami, Verberna, parietaria, sambuci, geranii, an. m. iij. violar. papaveris albi, Cicuta an. m. vj. semper vivi m. iij. radicis liquiritiæ lb. iij. omnia sumantur recentia, Concendantur & cum s. q. butyri recentis probe simul confusa impastentur, postea coquantur & exprimantur.

Inflammationes, at calidos quosvis tumores reprimunt, scroti præsertim incendiis salutare.

Anodynum Jovis aliud ex eadem Pharmac.

℞. Verberna recentis, Hyoscyami recentis an. m. ij. butyri recentis ℥viij.

Contundantur simul, atque sic maneant per dies quatuordecim: deinde coquantur ad consumptionem humiditatis, & colentur.

Unguentum de Apio ex Pharm. Londin.

℞. Succo Apii, lbj. mellis ℥viij. Farina tritici. ℥ij. ex coctis ad justam spissitudinem fiat unguentum secundum artem.

Unguentum Apostolotum Avicennæ ex Pharm. Londin.

℞. Terebinthina, resina, cera alba, Ammoniæ præparati an. ℥xij. Aristolochia longa, thuris masculi, bdellii an. ℥vj. myrrha, galbani præparati an. ℥iij. opoponacis præpar. Erguinis an. ℥ij. Lithargyri ℥ix. olei communis lbij. oleum cum Lithargyro sufficiens coquatur lento igne, postea immisceatur cera cum resina liquefacta & colata, atque his ab igne remotis & nonnihil refrigeratis Ammoniacum, galbanum & opoponax cum terebinthina soluta, ac tandem reliqua in pulverem contrita.

Sic dictum quòd ex duodecim (oleo, ut fieri solet, non numerato,) constet simplicibus. Usu fre-

Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

quentis ad vulnera & ulcera difficilia, cuniculosos sinus & fistulas, sordidaque ulcera emendat, exsiccat, ac detergit, & exesa putrilagine carnem restituit, duramque emollit. Unguentum istud cum venere antiquorum consentit. quo usi sunt attrahendo, molliendo, glutinando, & contra Ferarum Morfus.

Unguentum Aregon' Nicolai ex eadem Pharmac.

℞. Radicum ari, cucumeris Asinini an. ℥iij. bryonia ℥ij. pyretri ℥j. rorismarini, majorana, serpyll. li, ruta an. ℥iij. Foliorum Coccognidii ℥ix. cucumeris asinini ℥vj. lauri, salvia, sabina an. ℥ij. persicaria ℥viij. calamintha ℥vj. mastiches, olibani ana ℥vij. euphorbii, zingiberis, piperis an. ℥j. olei moschelini ℥ss. communis lbv. laurini, adipis ursini an. ℥ij. petrolei clari ℥j. butyri ℥iij. aut quantum satis est. Cera lbj. ℥ij. herba & radices recentes confusa cum oleo communi aliquandiu macerentur, deinde sufficienter coquantur & colentur; Colato oleo admisce ceram, Adipem, butyrum, olea, & aliquantulum refrigeratis cera in pulverem redacta.

Unguentum hoc ab effectu ἀπρὸν, seu auxiliare dictum, numeratur inter quatuor unguenta calida, ideoque corporis vitis frigidis, convulsioni, paralyti, tetano, & nervorum distensionem conducit; spinæ & renum dolores, ac colicos cruciatus sanat, ad omnem stomachi & ventris dolorem, uterinæ quoque mulierum mala, quartanas, & morbum Comitialem conducit, arthriticos morbos & scabiem ex lue venerea juvat, & rigores febrium spinæ illitum discutit.

Moschelinum oleum si deest, rutaceo aut laurino utendum.

Unguentum de Arthanita majus Mesuæ ex Pharm. Augst.

℞. Radicum cyclaminis lbij. Cucumeris agreæ ℥ss, butyri vaccini an. lbj. olei irini lbj. pulpa colocynthidis ℥iij. polypodii ℥vj. Contundenda terantur, & macerentur in succis & oleis diebus octo in vase vitreo; postea additis Fellis taurini ℥viij. coquantur ad aquosarum partium consumptionem; colentur & exprimantur: in colato dissolvantur cera ℥v. & ferè refrigeratis inspergatur paulatim pulvis subsequens:

℞. Euphorbii ℥vij. Sagapeni, scammonii, aloës, colocynthidis, mezerei, turbit. an. ℥viij. salis gemma ℥iij. myrrha, piperis longi, zingiberis, chamamelini an. ℥ij. misce, fiat unguentum.

Illitum stomacho per vomitum purgat, hypogastrio autem inunctum, alvum dejicit, ob id hydropicos juvat, serosum excrementum evacuando; vermes quoque enecat & educit, adhibetur iis qui purgans medicamentum sumere nequeunt.

Unguentum Aureum Mesuæ ex eadem Pharmac.

℞. Cera citrina ℥vj. olei olivarum lbij. Terebinthina ℥ij. resina, colophonia vn. ℥ss. thuris, mastiches an. ℥j. croci ℥j. confice s. a. oleo ceram cum resina & colophonia liquefactam & colatam immiscendo, postea terebinthinam & reliquorum pulveres addendo.

Aureum à colore & virium pretio dicitur, quibusdam regis unguentum; Vulnera glutinat, præsertim in corporibus mollioribus.

Unguentum Basilicon Majus ex Pharmac. Londin.

℞. Cera citrina pini, Sevi Vaccini, picis græcæ, sive navalis, terebinth. olibani, myrrha an. ℥j.

A a a a a olei

olei ℥v. pulverentur olibanum & myrrha, caterisque liquidis rite inspergantur, ut fiat Vnguentum s. a.

Basilicon Minus seu Tetrapharmacon ex eadem Pharmac.

℥. Cera flava, resina pinguis, picis græca, an. ℔b. olei ℥x. liquata commisceantur; & fiat s. a. Vnguentum.

Unguentum de Bdellio Mesuæ ex Pharm. August.

℥. bdellii ℥vj. Euphorbii, sagapeni an. ℥iiij. castorei ℥iij. olei leucioij ℥iiij. cera quantum satis est. Cera cum oleo liquata addatur sagapenum, nec non reliqua in pulverem redacta, fiatque ex arte Vnguentum.

Commendatur ad paralyfin, & spasmus jam confirmatum, valenter namque digerit, atque emollit, ut nervorum & articularum tophos dissipet; eorundem etiam frigidos affectus juvat, ac membrorum resolutionem sanat, ad Epilepsiam quoque plurimum facit.

Unguentum de Bolo ex Renodao.

℥. Bol. Armena ℔b. succorum solani, & plantaginis an. ℥iiij. Accu ℥ij. olei rosati ℔b. Sensim agitentur in mortario donec Unguenti spissitudinem acquirat.

Eandem aut parum dissimilem descriptionem tradit Guido Cauliacus s. doct. 1. 1. tract. 7. quam ex gal. lib. 9. simpl. accepisse fatetur: cum tamen librum evolvens; minimè tale quid inveni, à quocunque verò autore prodeat, ut optimum medicamentum à chirurgis plurimum expetitur. Eadem est hujus atque præcedentis præparatio, & utrumque cum fiat abique igne, crudum nominari potest.

Vim habet refrigeratorem, astringentem & robustantem optimèque convenit initio fluxionum calidarum, proinde incipienti phlegmonæ, Erysipelati, & similibus affectionibus valde prodest.

Unguentum de Calce ex Pharm. August.

Calcem vivam aliquoties lavabis, aqua priori, postquam subsederit, decantata semper novam substituendo, postea exsiccabis. ℥. hujus calcis ita præparata ℥ij. olei rosati ℔b. cera alba ℥iiij. Ceram oleo liquato; huic ab igne remota & jam concrevere incipienti calcem levissime iritam admisceto, & reponito.

Aliud Ἀνρίσιον: Calci vivæ superinfundè aquam puram cui mox detractæ adde tantundem olei communis & agita simul donec fiat Vnguentum. Ambusta felicissime inter initia percurrat. Aliud ad Ambusta ex Corticibus mediis sambuci refert Foësius Sect. XI.

Vnguentum Carminativum Zuelferi.

℥. Axungia porcina recentis ℔b. olei chamamelii n. m. parati ℔b. cera flava odorata ℥iiij. Vel ℥iiij. quibus invicem leniter liquata immergantur, successu temporis, & per vices sequentia. summitat. recent. Anethi, majorana, roris marini, pulgii an. ℥ij. Flor. recent. chamamelii rom. ℥iiij. sambuci ℥ij. lavendula, sem. anethi, anisi, carvi, Coriandri, cumini, feniculi an. ℥i. macis, nucis moschat. an. ℥vj. Syracis calamita ℥iij. Sicut in infusione, septimana una vel altera: factaque post una alterave ebullitione colentur & exprimantur species: expresso adde camphora ℥i. ol. still. anisi, carvi, ol. still. chamamelii, feniculi an. ℥ij. majorana ℥j.

Fiat Vnguentum nobile, tam clamorosos infantium

abdominis, quàm Adultorum colicos, & hystericos dolores insigniter compescens; cum intra corpus sumptum, tum externè regioni umbilici, non attingendo ventriculorum, inunctum, vel etiam gutturi inferiori immisum.

Unguentum Cephalicum ex eodem.

℥. Axungia recent. ℔b. Cui successu temporis immergantur sequentia incisa & contusa: gemmar. populi arbor. recent. ℥iiij. herb. recent. betonica, basilici, majorana, mentha aquat. roris marini, ruta an. ℥iij. Fol. recent. nucis juglandis, Flor. sambuci, tunica an. ℥ij. croci austr. vel orient. ℥b. Sicut in infusione, in celario; donec omnia collecta & immersa sint: facta post aliquanti Ebullitione; non vero ad totalem humiditatis exhalationem, in alembico quidem vitreo, suo capitiello munito. ut id, quod transit, sequenti pulsi paranda infervere possit, colentur & exprimantur species: expresso adde pulpam sequentem.

℥. Nucleorum persicor. ℥iiij. cerasor. ℥iij. camphora ℥b. Contundantur optimè in mortario, cum s. q. aqua superius in ebullitione & coctione per Alembicum, asservata, ad pulvis unguento expresso viridi & odorifero, sub continua agitatione: uniat, addendo adhuc ol. still. majorana ℥ij. nuc. moschat. expressi ℥j. lapid. Alabastris præp. ℥j. vel ℥iiij.

Fiat unguentum nobile, capitale seu cephalicum, fronti, temporibus, & occipiti applicandum, in doloribus Capitis continuis, cephalæa, hemiplegia, febribus continuis, tertianis & aidentibus, utiliter adhibetur.

Vnguentum Citrinum seu Basilicon Nicolai ex Pharm. August.

℥. Boracis ℥ij. camphora ℥j. corallii albi ℥iiij. Amiantii ℥j. Umbilici marini, iragacanti albiss. Amyli, crystalli, Antali, dentali, thuris, nivi an. ℥iiij. marmoris albi, aut alabastris ℥ij. gersa serpentaria ℥j. cerusse ℥vj. axungia porcina recent. munda ℔b. Sevi caprini præp. ℥b. adipis gallin. præp. ℥j. Confice sic: Axungiam porcina. atque adipem gallinacum liqua simul & impone repidis adhuc corticem Citri mali satis magnam quantitatem, & macerentur per mensem unum, Deinde eximito cortices, & serum caprinum addito postea camphora in spiritu rosar. diluta, & reliqua tenuissime irita addantur.

Citrinum officinæ vocant, cum potius Citrium dicendum sit, à pomis citri, vel eorundem succo. Aspera lævigat, faciei maculas & lentigines extirpat, Ephelides ac ex insolatu unctiones factas, & cicatrices emendat, ruborem oculorum aufert, nec non pustulas in cute à falsa pituita productas sanat.

Vnguentum Clysmaticum ex eadem Pharmac.

℥. Parietaria, malva, mercurialis, beta an. m. iij. Fol. Athæ violaria, flor. chamamelii, meliloti omnium recent. an. m. iij. coque cum ℔b. butyri recent. non saliti donec virescat, addendo colatura olei Amygdalor. dulc. ℥viiij. misce fiat Vnguentum.

Vires, cum illo, quod in priori sectione describitur convenient.

Clysmaticum aliud ex eadem Pharmac.

℥. herb. malva, bismalva, branca ursina, parietaria, mercurialis, an. m. iij. radicum altheæ, lilior. albor. an. ℥iiij. Flor. chamamelii, meliloti an. iij. butyri recent. ℔v. pistentur simul, & sic sicut per mensem

menſem: poſtea coquantur & exprimantur
Adhibetur in enemata, vel per ſe liquatum iniicitur:
emollit enim, lenit, digerit, dolores leuat, duras fæces
emollit, ac ventrem blande ſubducit.

Unguentum Comitiffæ Guilielmi de Varignana ex
Pharm. Auguſt.

℞. Cort.med. glandium, Caſtaneæ. quercus arboris, baccar. myrti equiſeti, gallar. coriſcum Fabar. Acinor. uvar. Calycum glandium, Sorbor. immatur. ſiccior. meſpilor. acerbor. ſiccior. Foliorum capparis, pruni ſylveſtr. rad. Tormentillæ an. ℥iſ. contundantur aliquantulum & coquantur in aqua ſimpl. ſ. q. donec media pars conſumpta fuerit. Colatura ulterius coquatur cum olei myrtill. ℥iſ. ad humiditatis aquoſæ conſumptionem, poſtea in ea diſſolvantur cere novæ ℥viiiſ. ab igne depoſitis addatur olei maſſichini ℥iſ. aique inſpergatur ſequentium rerum tenuiſſimus pulvis:

℞. Cort. med. caſtaneæ. glandium, quercus arboris an. ℥i. gallar. ſucci hypociſtidis, cineris offium cruris bubuli, baccar. myrti, Acinor. uvar. ſorbor. immatur. an. ℥ſ. trochiſcor. de carabe ℥ij. miſce Fiat unguentum.

Unguentum hoc à Comitiffa Vandrenſi nomen ſortitum, ad menſtrua ſupprimenda, & ad abortum prohibendum concinnatum à Varignana lib. 16. de morbis Cur. cap. 4. Fæminei fluxus abundantiam compeſcit, locos muliebres firmat, uterum roborat ac renes laxatos ſtringit, ſi eo innungantur, hæmorrhoid. ſuperfluum profluviū ſiſtit.

Unguentum Cordiale Zvvelſeri.

℞. axungia porcine. recent. ℥iſ. cui immergantur, ſucceſſu temporis, ſubſequentia, minutim prius inciſa, & conuſa: nempe herb. recent. meliſſa citrata, baſilici, roſmar. majoran. Flor. recent. borraginis, bugloſſa, arantior. lavendula, iunica an. ℥iſ. roſar. fragr. ℥iij. violar. martial. ℥j. Coriſc. arant. citri ana. recent. & extim. ℥vj. croci auſtr. vel orient. ℥ij. cinamomi opt. acuti, caryophyll. macis nucum moſchat. an. ℥ſ. ligni aloës gum. ℥ij.

Peracta maceratione brevi, & poſtquam omnia collecta fuerint, coquantur parum in alembico vitreo, capitello ſuo munito, & recipiente præpoſito, non ad totalem, ſed aliqualem, humiditatis exhalationem vel proſtectionem; quæ ipſa tamen exſtillata humiditas unguento ultimo colato addi poteſt. Ulterius fiat colatura cum forti expreſſione ſpecierum; inque expreſſo & colato ſolve Reſinæ ſtyracis calamitæ pulv. Benzoës opt. an. ℥vj. his ſolutis porro adde olei nucum moſchi expreſſi ℥vi. ligni rhodii ſtill. Extraſti croci opt. an. ℥ij. ex omnibus benè mixtis Fiat unguentum cordiale, præſtans, cui & ambra & moſchus pro placito adjungi queunt: tam recreandorum per odores acceptabiles ſpirituum gratia, quàm pro ditionum exigentia.

Præſtantiſſimum etenim & excellentiſſimum, Unguentum Cordiale, hoc, vix reperies ullum; quod ita in omnibus debilitatibus cordis, lipothymiis, animi defectionibus, morbis malignis & calidis peſtilentibus ipſis, utroque ſexui, excellentiſſimè medetur; coque non ſolum cordis regio, ſed & pulſus, & vola manus, ſpina dorſi, & tempora bina, inungi ſæpius debent.

Unguentum de Cyclamine, Vid. Unguentum de Arthanita.

Unguentum de Cynogloſſo ex Pharm. Auguſt.

℞. radicem Cynogloſſi rubr. recent. conuſarum ℥iſ. bulbi recent. ℥iſ. coquendo & colando Fiat Unguentum.

Valet ad conuſa & ſuggillata, ſanguinem contritum tam intus aſſumptum, quàm extus illitum diſſolvit, pleuritidi auxiliatur, dolores à cauſa calida, etiam podagricos, mitigat, & anodynum eſt præſtantiſſimum.

Unguentum Diachylon molle ex Pharm. Auguſt.

℞. Emplaſtri diachyli ſimpl. ℥iij. Unguenti dialtheæ ℥viii. olei chamomillæ, liliorum albor. roſarum an. ℥iſ. ſpicæ ℥j. Terebinthina ℥ij. miſce Fiat Unguentum.

Unguentum Enulatum ex Pharm. Londin.

℞. radicem enula in aceto minus acri coſtarum, conuſarum, & per cribrum traſſætarum ℥j. Terebinthina eodem decocto olei veteris an. ℥iij. ſalis communis ℥ſ. axungia, cere & oleo liquefactis adde terebinthinam, pulpam enula, ſalemque minutiſſime pulveratum, & fiat Unguentum ſ. a.

Enulatum cum mercurio ex eadem Pharm.

Fit ex priori Unguento; immixtis ℥ij. Hydrargyri, non ſolum ſaliva aut ſucco limonum, ſed etiam tota terebinthina ad hoc ſervata, & axungia parte, in mortario, lapideo, indefeſſa agitatione extindit.

Unguentum Fucum Nicolai ex Pharm. Auguſt.

℞. Olei ℥iſ. cere novæ ℥iij. picis græcæ, nigre, ſagapeni præp. an. ℥ij. maſſiches, galbani præp. Thuris, terebinth. an. ℥ij. Fiat Unguentum, Ceram cum pice liquatam & colatam, poſtea ſemirefrigeratæ maſſichen & Thuris pulveriſata, ut & ſagapenum galbanum & terebinthinam invicem liquefacta, oleo immiſcendo.

Dicitur & nigrum. Vulnere mundificat; emollit, & concoquit, carnem generat, putridamque depalcit.

Unguentum Gummi Elemi ex Pharm. Londin.

℞. Gummi elemi, terebinthina abietina an. ℥ſ. ſervi veteris & depurati, ℥ij. pinguedin. porcine, veteris & depurati. ℥ij. miſce F. Unguentum ſ. a.

Unguentum ad Hæmorrhoides. Norimberg.

℞. Amyli albiſſimi, ceruſſæ lotæ, lithargyri puri, plumbi uſti, iragacanthi an. ℥iſ. opii thebaici, camphoræ an. ℥j. Albumen ovi unius, olei roſacei, violacei an. ℥iſ. cere quantum ſatis. Ceram in oleis liquefaciendo, poſtea juxta curam camphora in aceti diſtillati portunculæ diluta, reliquorum pulveres, & albumen ovi addendo. Fiat Unguentum.

Ad Hæmorrhoides aliud ex Pharm. Auguſt.

℞. Thuris ℥ſ. ſucci pranor. ſylveſtr. myrrhæ, Croci an. ℥iij. opii. ℥j. mucilaginis pſyllii ℥ſ. olei roſacei ℥iij. lactis caprini ℥iij. Vitellum ovi unum. Succus pranorum, & opium coquantur cum mucilagine, oleo & lacte ad debitam conſiſtentiam, tandem addatur pulvis Croci, thuris & myrrhæ, cum ovi vitello. Fiat Unguentum.

Acerbiſſimos Hæmorrhoidum dolores placat, eandemque inflammationes retundit.

Ad Hæmorrhoides aliud ex Pharm. Londin.

℞. mucilaginis e ſem. pſyllii, cydonior. extraſta aqua ſolani an. ℥ſ. olei roſati completi ℥j. Vitellum unius ovi, pingued. gallinæ ℥ij. Agitentur ſimul in mortario plumbeo. cum piſtillo plumbeo; addendo cere citrina liquata parum in. F. Unguentum ſ. a.

Ad Hæmorrhoides Zovelferi.

℞. Rad. Tormentiſſe, cyperi rot. ireos Flor. an. ℥j. liquoritæ ℥℔. herb. plantaginis, millefolii, equiseti, hyperici, pyrolæ, an. recent. ℥ij. Linaria recent. ℥iiij. Flor. roſar. rubr. ℥℔. verbaſci, papav. errat. ſambuci an. ℥j. Croci opt. ℥℔. vel ℥ij. ſucci Acaciae ℥℔. opii Thebaici ℥ij. incifa & conuſa coquantur in ſ. q. aqua chalybeata, ſeu fabrorum, ad reman. ℔℔. coletur: colatura adde.

Mellis roſati ſimpl. ℔℔. Coquantur porro ad exhalationem decocti, & ad priſtinam mellis conſiſtentiam; Cui tandem adde, & immiſce vitell. ovor. num. iij. olei ovorum, & vitellis expreſſi ℥℔. pulv. otibani, ſang. draconis, ſuccini albi ana ſubtiliſſ. triij. Flor. verbaſci, ſambuci ſubtiliſſ. an. ℥℔. roſarum ſubtiliſſ. an. ℥vj. Croci martis adſtringentis, Croci auſtr. opt. ſacchari ſaturni, an. ℥ij.

Fiat omnibus l. a. mixtis, veluti opiatum, ſeu Vnguentum præſtans ad acerbiffimos hæmorrhoidum dolores placandos eorundem inflammationes retundendas; fluxumque nimium ſiſtendum.

Aliud Hæmorrhoidale ex eodem.

℞. Rad. recent. Tormentiſſe, biſtoria, ſanicula, ſymphyti maj. liquorit. an. ℥j. herba recent. millefolii, plantag. min. hepatic. nobil. pyrolæ, achimilla an. mij. Flor. roſar. rubr. ℥vj. verbaſci, ſambuci, balauſt. an. ℥℔. Antimonii crudi pulv. & in peria ligati ℥iiij. Fiat cum ſ. q. aqua ſimpl. repetitis vicibus aſuſa, decoctio, ad totalem virtutum extractionem: decoctiones junctim clarificentur, & ad ſpiſſitudinem mellis, ſeu extracti, leniter in patella ferrea, vel in diplomate evaporent.

Huic decocto inſpiſſato, ſi fuerint ℥iiij. adde mellis virginiei albi craſſi, & nunq. cocti, ſed legitime, uti ſuperius ex alveolis extracti, ℥viiij. vel ℥x. Terebinthina clara ℥ij. ſ. irex, in qua ſoluta ſint, gummi Elemi, maſtichis an. ℥℔. baſami vulnerarii martial. ſuperius deſcripti ℥℔. quibus omnibus exactè mixtis ſuperi inſpergantur ſequentes pulveres: niſpoſe, pulv. otibani ſubtiliſſ. ℥j. Flor. ſambuci verbaſci, roſar. rubr. an. ℥iiij. lapid. calamitar. cum ſucco millefolii præparat. Tutia, cum ſucco plantaginis præpar. an. ℥vj. ſacchari ſaturni ex minio parat. ℥iiij. miſceantur omnia exactè, fiatque Vnguentum præſtans: Cujus virtutes ex ſuperiori patent.

Ad Hæmorrhoides aliud Godardi.

℞. Ol. roſ. ℥℔. Emp. de minio ℥j. Cera alb. ℥℔. liquatis adde Ethiop. mineral. ℥ij. opii ℥℔. Croci, nuc. m. Fl. chamamel. an. ℥j. ſyrup. roſat. ℥j. leni calore exhaleatur humiditas & miſce ſ. a.

Vnguentum Hepaticum Zovelferi.

℞. Axungia porcine recent. ℔℔. cui immergantur ſequentia incifa atque conuſa, ſucceſſu temporis, niſpoſe, rad. Apii recent, enula, ſæniculi, Calami Aromat. pimpinella, Cichorii, Rubia tinctor. ana recent. ℥j. herb. Abſinthii, agrimonia, chamadryos, botonica, hepat. nobilis, naſturtii hortiſ. ana recent. ℥℔. Flor. recent. roſar. rubr. ℥iiij. papav. errat. ℥℔. baccar. Lauri, Iuniperi vitriol. an. ℥j. myrrha rubra, ſem naſturtii an. ℥vj. ſæniculi, ſaniali rubri raſpati, an. ℥℔.

Peracta maceratione, poſtquam omnia collecta fuerint, coquantur ad aliqualem humiditatis exhalationem; & ſi lubet, in alembico vitreo, Capitello ſuo munito; uti læpius monui: fiatque poſt

colatura & expreſſio: Colato & expreſſo adde pulv. gum. Ammoniac. ℥ij. ſoluti cum ſ. q. Umi albi ad pulvis formam, item Camphora ℥j. ol. ligni Rhodii ſtill. ℥j. & fiat ex omnibus legitime mixtis, Vnguentum hepaticum, aperiens & roborans, aperit obſtructiones hepatis, & lienis, Conſtatque virtute confortandi dicta viſcera, ab extra applicatum: multo præſtantius eſt unguento, aut ſantalino Emplaſtro; quemadmodum ingredientia ipſa, ejuſque legitima præparatio demonſtrant?

Unguentum ad Hernias Zovelferi.

℞. Buryri majalis recent. non toti ℔℔. Axungia Taxi ℥viiij. hominis ℥viiij. his mixtis immergantur ſequentia, ſubtiliter incifa & conuſa, rad. recent. Tormentiſſe, biſtoria an. ℥℔. ſymphyti maj. ℥iiij. ſanicula, bardan. maj. an. ℥ij. herb. recent. perfoliata, hyperici, conſolid. Sarracen. pyrolæ, millefolii, Fol. recent. quercus, hedera arbor. an. ℥℔. glandul. ſeu nuc. arboris laricis ſive abietis ℥iiij. aſuſis vini boni rubri ℥vj. facta maceratione, donec omnia ac ſingula collecta ſint, Coquantur leni igne, in ſartagine ferrea, ad humiditatis totalem ſe exhalationem? Coletur: poſt expri-mantur ſpecies fortiter? fiatque ſic unguentum: ſerveatur uſui.

Certum remedium eſt pro ſanandis herniis, quo inungendæ partes affectæ: ſive in inguine ruptum ſit peritoneum, aut aliquo alio in loco abdominis, inteſtinis prolabantibus, ſive peritonei proceſſus, qui ad ſcrotum, tendit, dilatarus ſit, per quem inteſtina in ſcrotum etiam prolabuntur, perinde erit modo inunctio ſemper verſus ſuperiora fiat. Inteſtinis tamen prius reſpoſitis, & Cingulo appoſito, ſive ligatura adhibita, paucarum ſeptimanarum ſpatio cura abſolveretur, hoc tamen inſuper notandum, quod, ſi hoc unguento partes anteriores inungantur, rerro, in dorſo cum Axungia urſi, tanquam ex oppoſito, inunctio quoque peragenda ſit.

Vnguentum inſtigidans Galeni ex Pharm. August.

℞. Olei roſati ℔℔. cera alba ℥iiij. Ceram in oleo liquabis & paucillum Aceri roſati adicies.

Vbicunq; refrigeratione & humedatione opus eſt, ejus Uſus eſſe poterit, hæcticis prodeſt, nec non renuq; dolori à cauſa calida provenienti opem fert,

Vnguentum ad Inſecturas ex Pharm. Norimberg.

℞. Vnguenti Dialtheæ ℥x. pingui. Canis, Porci Taxi an. ℥iiij. ol. Lauri ℥iiij. Euphorbii, de piperibz. Iuniperini ex granis an. ℥ij. pulv. ſem. Eruca, ſinapi. piperis longi, Euphorbii an. ℥j. vini ſublimati, cera an. ℥ij. Fiat ſ. a. Vnguentum citra coctionem.

Vnguentum Laxans Alvum Ieſſenii.

℞. Fell. Tauri, buryri inſuſi an. ℥iiij. Extr. bil-leb. nigr. colocynth. an. ℔j. diagridis gr. iij. croci gr. iij. M. leni igne ad mellis conſiſtentiam, cum nucis juglandis ſemitecta excipiat & umbilico alligetur.

Vnguentum Laurinum Vulgare ex Pharm. Londin.

℞. Folior. Lauri conuſ. ℔℔. baccarum ejusdem conuſ. ℔℔. Folior. braſſice ℥iiij. olei ex pedibus bovinis ℔℔. Sevi bovini ℔℔. coquantur ſimul. & coletur, ut fiat Vnguentum ſ. a.

Vnguentum

Unguentum de Linaria ex Pharm.
August.

℞. Herb. linaria cum floribus, Adipis porcini an. ℥ij. Contundantur, coquantur ad aquæ humiditatis consumptionem, & exprimantur.

• Dolotibus hæmorrhoidalibus medetur cum lana vel gossipio parti affectæ applicatum, vid. de eo Gregorius Høltius lib. 4. obs. med. 42. & Iohannis Hartmanni praxis Chimiatrix.

De Vicellis ovor. juxta descriptionem addendis, Notamus posse illa, ad evitandam Unguenti corruptionem demum ex tempore, ubi à medico præscribitur pro ejus libitu immisceri.

Unguentum de Liquiritia ex Pharm.
August.

℞. Butyri recent. liquiritiæ recentis ac succulentæ an. ℥ij. pistentur simul in mortario, posteaque frignantur in sariagine, colentur & exprimantur; Tandem butyro sit preparatio adde pompholygis ℥ij. Cerussæ lotæ ℥iij. Albumin. ovi Conquassati ℥iij. Camphoræ ℥ij. Fiat s. a. unguentum.

Inflammationes partium, erysipelata, sacros ignes ac pustulas ab ichoribus sanguinis Calidis aut bile natas per sanat, nec non manantibus ulceribus dolorificis à salis feri acrimonia profectis eximie confert, estque id Civibus, ex suasu Raimundi Mindereri, med. doctoris & Collegæ nostri quondam admodum familiare.

Unguentum de Lithargyro ex Pharm.
August.

℞. Lithargyri ℥ij. cerussæ ℥ij. Aceti ℥ij. olei rosari ℥iij. Fiat s. a. unguentum in mortario plumbeo optime agitatum.

Prodest Scabiei & cutis vulneribus, pruritum ac desquamata juvat, & siccat sine morbo. Sarcoticum est & epuloticum, difficiliaque ulcera per sanat, & Cruentâ glutinat.

Unguentum Martiatum ex Nicolao,
Pharm. August.

℞. Fol. Tamarisci ℥vj. Lauri, roris-marini ℥viij. rute ℥vij. Ebuli, sabina, balsamita, seu mentha aquatica, salvia, ocimi, polii veri, calamintha, Ariemisia. Enula, betonica, branca ursina, aparines, parietaria, pimpinella, sanguisorba vel vulgaris, agrimonia, absinthii, primula veris, persicaria, Cymarum sambuci, millefolii, sempervivi minor. Majoris, chamædrys, centaurii, plantaginis minor. Fragaria, orobi, quinque folii an. ℥iij. radicum althea, Cumini, myrrha an. ℥iij. butyri ℥j. ℥ij. sem. Fanugraci ℥iij. urtica, Violar. papaveris albi, mentha agrestis Crispa, seu mentastri, Lapaib. acuti, Adianthi, albi, Cardui benedicti, matri sylva valeriane, geranii odorati, Trifolii acetosi, lingua cervina, Cotula non foetida, abrotani, Medula cervina, Syracis Calamita an. ℥ij. Adipis ursini, Gullinacei, mastiches, Thuris an. ℥j. olei nardini ℥ij. Cera ℥ij. herba omnes recentes, colligantur, & incisa ac confusa maceventur, exprimantur atque cum cera circiter ℥ij. & reliquis F. unguentum.

Usus est ad frigida corporis, mala, capitis, thoracis, stomachi, jecoris, lienis aliosque dolores à frigore natos, Convulsiones, nervorum relaxationes & coxarios juvat, tumores ac durities emollit, lieni indurato præcipue, ut & hydropi confert.

Mangeli Bibl. Pharm. Tom. II,

Unguentum Mastichinum ex Pharm. Londin.

℞. Olei mastichini, absinthii, nardini an. ℥j. mastiches, mentha, rosar. rubrarum, Corallii rubri, caryophyll. cinnamomi, ligni aloës, schenanthi an. ℥j. cera q. s. F. Unguentum s. a.

Unguentum ad membra igne Ambusta ex Pharm. August.

℞. Camphora ℥j. olei rosarum ℥iij. cerussæ alba ℥vj. pulveris olivani electi ℥ij. Albuminis ovorum numero vij. plumbeo mortario misceantur & agitentur optime.

Vires ex nomine parent.

Aliud ex eadem Pharmat.

℞. Coricorum interiorum sambuci succulentor. ℥iij. olei rosari ℥vj. decoquantur ad humiditatis aquosæ consumptionem, & exprimantur, in colatura liquefiant, cera alba ℥iij. postea admisceantur. vicellar. ovorum numero iij. Fiat unguentum.

Euporiston est, in sedando dolore & ardore partium ab igne læsarum, nullo cicatricum relicto vestigio.

Aliud ad ambusta ex Pharm. Norimberg.

℞. Olei rosarum ℥iij. Camphoræ ℥j. dissolve in vitro clauso, in leni calore, postea Coque cerussæ ℥vj. in Aceti destillati ℥iij. ad pulvis formam, & oleo camphorato admisce, diu multumque invicem agitando & Ultimo, albumina ovorum Conquassata, & in aquam resoluta, vj. addantur, & porro agitando, Fiat unguentum.

℞. Pinguedini cati sylvestris, seu cervini, olei laurini, cera novæ an. ℥ij. Camphoræ ℥j. diluatur camphora in Spiritu vini rectificati ℥ij. & reliquis invicem liquatis ex arte misceatur.

Vires nomini respondent.

Unguentum Mercuriale, ex Pharm. August.

Mercurii vivi purificati, Axungia porcina veteris an. ℥ij. Lithargyri argenti, Cerussæ an. ℥ij. myrrha electa, Thuris inasculi, bdellii, gummi Ammoniaci an. ℥j. Theriaca Andromachi, mihridatii Damocratis an. ℥ij. Unguenti Agrippæ, Martiati an. ℥ij. de althea ℥iij. olei Laurini ℥iij. Axungia Viperina vera ℥j. resina pini ℥ij. Mercurium Axungia porcina agitatione permiscendo, ac cum reliquis jungendo lege artis fiat Unguentum.

Vires Unguenti hujus D. D. Ioannes Udalricus Rumberus Collega quondam noster, multo tempore in nosocomio gallico feliciter est expertus.

Mercurius cum aceto ac sale agitur, ac aliquoties abluitur, ac per Corium expressus purgatur.

Unguentum de Mucilaginis ex Pharm. Londin.

℞. Olei Lilior. alb. irini, violar. chamameli an. ℥vi. mucilag. sem. lini Cydonior. Fanugr. rad. Althea an. ℥iij. pingued. Anatis gallin. an. ℥v. cera alba ℥ij. M. F. lege artis unguentum.

Unguentum Mundificativum expertum ex Ronodao.

℞. Absinthii, Centaurii minor. agrimon. Veronica, hormini, plantag. an. m. macerentur in ℥ij. aqua cæ decoquantur lento igne donec marcescant in ℥ij. Colatura expressa injice mellis communis. ℥ij. bulliani rursus ad aquæ fere dissipationem. Tum adde olei rosari ℥ij. Cera in eodem liquata ℥iij. pulv. Cancror. ustorum ℥iij. farina lupenor. pulv. radic. gentiana an. ℥ij. Myrrhæ Aaaa 3 aloës

aloes an. ℥i℥. ireos, viridis aris an. ℥i. Fiat unguentum ut artis est.

Cum nullum extaret in vulgatis dispensariis mundificativum eximium de cujus efficacia Chirurgi ad ulcerum deterfionem possit sibi felices satis effectus polliceri, in illorum gratiam hoc rhypticum seu medicamentum extergens (mundificativum nominant) concinnavimus, his præditum viribus, quas Galenus cap. li. 5. simpl. requirit, ratio postulat, & probat usus. Nam cum ejusmodi medicamentum tenuitate substantiæ mediocriter exsiccantis ulcus exerceat, seu sordes à parte, cui adhibetur, separet, & foras emendet præter eam substantiæ Tenuitatem, & qualitatem exsiccantem, & sæpius nitrosam ab emplastico, & viscido, quod in parte cohibet, excrementa ac sordes aggerit longe distare videtur. At verò mundificativa vulgaria, magna sui parte, ex sarcocolla, Thure & Mastiche, componuntur: nonnunquam ex resinis, simphyto toto, & sempervivo quæ tantum abest, ut effectus præstat, quos illa promittunt, cum sæpius ulcera sordidiora reddant. Proin illis relictis felicius in ægrotum salutem hoc nostrum rhypticum, seu extergens medicamentum in officinis servabitur.

Cancros autem fluviatiles istos excipit, quibus vis est ad extergendum, & exsiccandum insignis. feligendi verò sunt fluviatiles quorum tamen defectu, marini poterunt assumi. Vtendi verò in patella ignita coulque, dum facile redigi possint in lavorem, qui miscebitur unà cum pulveribus reliquorum simplicium seorsim tritorum. Tum omnia incorporata agitabuntur, ut in unguenti Crassitiem uniantur idoneam.

Vim habet excrementa serosa ab Ulceribus ablumendi: crassiora separandi, & extergendi: sed quæ sordibus Crassissimis, vel Cadaverosa carne conspurgantur, validius detergens, & sæpè Catharticum postulant: insigni autem virtute, eaque peculiari prodest vulneribus à cane rabido inflictis, Eorum enim virtus specifica proprietate extinguit, & humores infectos veneno exeret, siccatur, absumit.

Unguentum Neapolitanum ex Pharm. Londin.

℥. *Axungia suilla, succo salvia lota ℥ij. Hydragryri per alutam trase℥i ℥iij. olei laurini, chamamelini lumbricor. an. ℥ij. de spina ℥i℥. spiritus vini ℥j. cera flava ℥ij. Terebinthina succo Enula lota ℥iij. pulveris chamæpyrios, Salvia an. ℥ij.*

Axungia cum salviæ succo leni igne ferveat, ad hujus dissipationem: admisceantur olea chamæm. lumbric. de spica, & cera. Agitentur spathula, donec cera probe liquata & commixta fuerit. Tum ab igne femoris laurinum adjungatur. Interea Mercurius cum Axungia parte in Terebinthina extinctus in mortario accuratè ducatur, postea totum: simul agitando commisceatur. Tandem addantur pulveres & spir. vini; rursusque agitatione multa fiat ex arte unguentum.

Unguentum Nervinum ex Pharm. August.

℥. *Herb. salvia, camæpyrios, majorana, roris marini, mentha, ruta, lavendula, hyperici, parafiscos cum flore, Florum Chamæm. meliloti, summit. Anethi, rad. pyrethri. an. ℥ij. baccar. lauri. juniperi, an. ℥j. Mastiche ℥℥. benzoini ℥vi. Terebinth. ℥iij. ol. lumbric. vulpini, Anethi, hyper. an. ℥iij. Terebinth. ℥j. Axungia humana, cati sylvestris, Canis an. ℥℥. Terebinthina cum oleis & axungis liquata, reliqua in pulverem subtiliss. irita immisceantur, & cum cera s. q. Fiat s. a. unguentum.*

Frigidos nervor. morbos tollit, ac doloribus eorundem opitulatur.

Unguentum Nicotianæ Jouberti ex Pharm. August.

℥. *Fol. Nicotiana ℥ij. pingued. porci recens diligenter lota ℥ij. succi Nicotiana de purati ℥℥. herba recens contusa cum succo & pingued. per noctem maceretur, mane igne lenio coquatur ad humiditatis aquæ consumptionem coletur & exprimatur. In expresso liquefaciendo resina Abietis ℥iij. cera nova quantum satis est, additisque Aristolochia rotunda subtilissime pulverisata ℥ij. F. Unguent.*

Describitur hoc Unguentum à Laurentio Jouberto in sua Pharmacopæia, cui miram in scrophulis dissipandis vim inesse ait. Celebratur etiam in ulceribus & vulneribus, tam recentibus quam antiquis persanandis. Ad ista quodque morphæam & Tincam Capitis juvat, ac cutem à scabie mundificat.

Qui ceratum maluerit, pondus ceræ augeat, cui verò exsiccandi & consolidandi mens fuerit, Mumie & succini an. ℥iij. adjicere poterit.

Unguentum Nihili ad Oculos ex Pharm. August.

℥. *Tutia preparata, nihili albi an. ℥j. Corall. rub. preparat. matris perlar. an. ℥℥. Camphora ℥ij. pingued. porci mund. ℥ij. Fiat lege artis unguentum.*

Calidas oculor. fluxiones demulcet ac sistit, eorundem rubedinem, & inflammationem, nec non dolores inde natos aufert.

Unguentum Nutritum seu Tripharmacum ex Pharm. Londin.

℥. *Lithargyri Auri tenuissime levigati ℥℥. Aceti Vini ℥v. Olei rosati, ℥ij. in mortario nutriatur lithargyrius, viceissim affuso modo oleo, modo Aceto; donec continua agitatione acetum amplius non compareat, & unguentum evadat albidum.*

Unguentum ad Oculos ex Pharm. August.

℥. *butyri recent. ℥iij. cera albissima ℥j. Tutia preparata ℥℥. camphora ℥ij. Fiat ex arte Unguentum.*

Eisdem Vires obtinet quas Unguentum nihili, paulo tamen inferiores.

Aliud ex Pharm. Amstæd.

℥. *Lapid. calaminaris preparati ℥ij. Tutia prepar. ℥j. Vitrioli albi, Caphura an. ℥ij. Unguenti rosati ℥ij. F. s. a. Unguentum.*

Unguentum Ophthalmicum, ex Pharm. Londin.

℥. *Sevi Vervecini in aq. plantaginis & rosarum optimè loti, ℥j. Lapid. calaminaris, Tutia prepar. an. ℥ij. plumbi albi loti ℥ij. misce diutina agitatione, ut F. Unguentum s. a.*

Unguentum ex Oxylapatho. Pharm. Londin.

℥. *rad. oxylapathi in aceto ad putrilaginem cocta & per setaceum irascita, sulphuris in succo limoni abluti, an. ℥i℥. Axungia suilla in succo scabiosa sapius lota ℥℥. Unguenti populnei succo enula nutriti ℥℥. olei ligni rhodii guttulas aliquot. Omnibus in mortario subactis, F. unguentum s. a.*

Unguentum pectorale ex Pharm. August.

℥. *Olei amygdalor. dulc. ℥iij. Chamæmilini, vit. lati an. ℥iij. butyri recent. ℥vj. Adipis gallinae, Anatis an. ℥ij. ireos ℥ij. croci ℥℥. cera alba ℥iij. ceræ & adipis in oleis liquato, postea addito ireos & Croci pulver. F. s. a. Unguentum.*

Laterum ac pectoris dolores mitigat, Tussim sedat, maturat, excreationem juvat, humores crassos digerit & attenuat.

Unguentum pediculorum ex Pharm. August.

℞. Sem. Staphidis agria ℥ij. bellebori albi ℥j. salis ℥ij. Argenti vivi ℥ij. axung. porcina lbj. olei laurini ℥viii. saponis veneti lbj. F. Unguentum s. a.

Sapo in lixivio communi solutus, Cum oleo coquatur ad humiditatis aquosæ consumptionem, postea mercurius cum axungia subactus & reliquorum pulvis commisceantur.

Aliud ex eadem Pharm.

℞. Olei laurini lbj. argenti vivi ℥iiij. Staphidis agria, bellebor. albi, an. ℥j. axungia porcina lb. vj.

Argentum Vivum agitetur cum oleo laurino, donec splendor, amittat, postea s. a. Cum reliquis jungetur.

Unguentum de plumbo ex Pharm. Londin.

℞. Olei rosacei ℥vj. plumbiusti, lithargyri an. ℥x. Terebinth. ℥j. Cerussa, Antimonii ann. ℥ss. cera alba ℥ij. F. unguentum s. a. in mortario plumbeo optime agitando.

Unguentum pomatum ex Pharm. August.

℞. Axung. suilla lbiiij. Syracis calam. Asa dulcis, radicum ireos Florent. Cinnamon. caryophyll. an. ℥j. pomor. citri, aurantior. an. numero ij. borsdorfferianor. n. 4. omnia s. a. ad humid. aqueæ consumptionem coquantur, Colentur, & juncta cera alba s. q. F. Unguentum, cum spiritu rosarum aliquandiu agitando.

Ad oris fissuras, & decorem Cuti conciliandam, utiliter adhibetur.

Aliud ex eadem Pharm.

℞. Syracis Calam. benzoi electi an. ℥x. Cinnamon. electi, caryophyll. an. ℥vj. radicum ireos Flor. ℥j. nuc. moschata ℥ij. macis ℥j. Flor. lavendula, spina an. p. ij. pomor. Aurantior. recentium Citrior. recent. an. numero ij. odoriferor. n. 24. aq. rosar. optima ℥viiij. vini albi opt. ℥iiij. Unguenti rosati albi lb. iij. Sebi castrati lb. j. Cera alba ℥. iij. F. lege artis unguentum

Viribus cum illo, superius descripto, convenit.

Aliud ex Pharm. Londin.

℞. Axung. porcina recent. lb. iij. sevi ovilli recent. ℥ix. pomor. excorticior. & concisor. lb. j. & ℥ix. aqua rosar. odoratiss. ℥vj. rad. ireos Flor. crassiuscule pulverata ℥vj. bulliant simul in B. M. donec poma liquecat. Dein cola sine expressione & servetur usui.

Interim calefiat denuo parum, & nova aq. rosacea laveatur, addanturque singulis ejus lb. olei ligni rhodii guttula xij.

Pomata sive Sebum Confectum ex Amato Lusitanq ex Pharm. August.

℞. Adip. cervini, vel illius qui ab hœdi renibus separatur lb. ij. pingued. suilla recent. lb. s. pinguedines à membranis purgatas albo vino abluito, deinde lineo panno exprimito, ut vinum à pinguedinibus separetur, eas postea in olla virescens aqua rosac. semiplena infundito, ut aqua supereminet, & pinguedines cooperiat, quibus demum addes pulveris caryophyllor. ℥ss. nucis mosch. ℥ij. spica indica gr. iij. pomor. camusiorum mundator. & incisor. n. 8.

Postea optime cooperta olla, lenibus prunis totum admovere, & baccillo agitato, fervereque permittito, ut aquositas pene tota consumatur. Tandem remota ab igne olla, quod residuum est per lineum novum rarum in vas fictile aqua rosacea respersum, percolato, feces tamen relinquendo, Colatur. denuo in alteram infundatur ollam viriatam, Cui adde olei Amygdal.

dula. ℥vj. cera alba ℥iiij. ad ignem omnia liquefacta iterum Colato, & in vasculum virescens rosacea aq. insperitum cadere sinito, demum omnia illa aqua rosacea abluta, in vase virescens optime cooperio servato, & tum candidissimum sebum habebis quod interdum minio coloratur. Potest isdem addi corallior. rubr. ℥ss.

In hujus Unguenti præparatione facile quis inveniat, quod mutationem exposulet, quam tamen cuivis illud parare qui voluerit potius relinquimus; ipsam verò descriptionem addere voluimus, ut & hæc tot inter alias, passim usuales, si forte alicubi in usu sit prosteret.

Unguentum Diapompholygos Nicolai vulgò Nihili dictum ex Pharm. August.

℞. Olei rosacei ℥vj. cera alba ℥iiij. succi fructus Vva lupina ℥iiij. cerussa ℥ij. plumbiusti & loti, pompholygis, Thuris puri an. ℥j. Confece s. a. oleum cum succo ad humid. aquosæ exhalationem coquendo, postea Ceram in oleo liquefaciendo, & pulveres reliquorum immiscendo.

prodest Ulceribus calidis, & iis quos acres & falsi humores infestant, refrigerat enim, siccatur & consolidatur, nec non absque ullius acrimoniæ sensu Cicatricem ducit.

Unguentum Populeum Nicolai ex Pharm. August.

℞. Oculor. sive Gemmar. populi arboris recentium lbj. axung. porcina præp. lbj. oculi populi contundantur, & macerentur in axungia, donec sequentes herbe per aestatem colligi queant scilicet. ℞. cymar. rubi tenerimar. Folior. papaveris albi, mandragoræ, hyoscyami, herb. solani, vermicularis id est, semper vivi minor. Lactuca, semper vivi major. bardana, violaria, Umbilici vener. an. ℥iiij. herbe contundantur, & misceantur oculis populi & axungia, deinde coquantur lento igne ad humiditatis aquæ consumptionem, colentur & exprimantur.

Febrium ardoribus cum rosaceo aut violaceo convenit, somnum conciliat, fronti, temporibus, aut manuum ac pedum pulsibus illitum.

Quidam, ut virescat magis, ac refrigerandi facultate sit efficacius coctioni addunt solani triti m. ij. in defectu folior. mandrag. augeri potest quantitas hyoscyami pro umbilico verò veneris herba patis assumenda.

Unguentum Potabile ex Pharm. August.

℞. Butyri recent. non saliti lbj. rad. rubra tinctor. tormentilla, Castorei, spermatis ceti an. ℥ss. rad. & sperma ceti cum butyro bulliant in vini odorati sufficienti quantitate ad ejus consumptionem, colentur & exprimantur, ac addito pulvere Castorei. Fiat Unguentum s. a.

Eorum qui ex alto ceciderunt vulnere interna glutinat sanguinem concretum dissolvit, ut & in concussis auxilio est.

Potabile Rubrum ex Pharm. Norimberg.

℞. Butyri recent. non saliti lbij. Cinoglossa ℥iiij. rad. rubia tinctor. Tormentilla an. ℥ij. Castorei ℥j. bulliant simul in vini odoratiss. sufficienti quantitate, ad ejus consumptionem & Fat Unguentum.

Potabile Viride ex Eadem Pharm.

℞. Herb. Salvia, Hyssopi, Marrubii, herb. mentha, betonica, Scolopendria, scabiosa, cichorei, Foeniculi, melissa, Veronica, mairisylva, Aquilegia rupea, petroselinum, millefolium, Centaurii minor. Agrimonia, aristolochia rotunda, plantaginis cum toto an. m. ij. butyri maiialis lb. viij.

Infunde herbas omnes recentes, suo quamlibet Colationis

lectionis tempore in butyro, stentque donec omnes collegeris, & infuderis, postea exprime; expressam coque ad consumptionem aquositate F. s. a. Vnguentum.

Unguentum Resinum ex Pharmac. Londin.

℞. Resina pini puriss. Terebinthina cera citrina lota, olei puri an. partes aquales: cera & resina in oleo liquefiant: dein addita Terebinthina omnia percolentur & ad ignem lenem bulliant, ut decet.

Unguentum Resumptivum Fernelii ex Pharmac. August.

℞. Sem. Lini, Althea, Fanugraci, gum. Arabici Tragacanthi an. ℥ij. macerentur & bulliant in ℔ss. aqua simpl. eliciatur Mucilago, qua cum butyri recentis ℔ss. Adipis suilli, gallina, Anseris, Anatis an. ℥ij. coquantur ad humiditatis aquosa consumptionem, postea addantur cœpyi ℥ss. ol. violar. chamameli, Amygd. dulcis an. ℥ij. medulla vituli, cera alba an. ℔ss. F. s. Vnguentum.

Adhibetur commodè Asthmaticis, hæticis, Tabidis, pleuriticis ac è longo morbo emergentibus quibus muda cutis ossa vestit.

Vnguentum ex Rhamno & Frangula Mindereri ex Pharm. August.

℞. Rad. recentium Scrophulariæ ℥ij. Enula Lappathi acuti, Chelidonii major. Corticum med. Frangulae, rhamni, ana recentium ℥j. butyri recent. ℥xvi. pistentur simul fortiter, posteaque additis Aceti rutacei ℥ij. coquantur ad humiditatis aquosa consumptionem, colentur, & fortiter exprimantur, deinde addantur Terebinthina Venetæ ℥vj. syr. liquidi ℥ij. Vitelli ovor. n. iij. salis nitri ℥ss. sulphuris vini ℥j. Aceti Scillini ℥vj. misceatur omnium primo Terebinthina cum syraco, & Vitellis ovor. postea additis reliquis Fiat Vnguentum.

Ad cutis vitia ex Scabie utile est, tutius longè omnibus mercuriatis.

Unguentum Rosatum Mesux ex Pharm. August.

℞. Axungia porcina ℔j. Lavetur aliquoties aqua simplici, deinde addantur rosar. albarum recent. ℔ij. probe iterantur, & coquantur lento igne usque ad humiditatis aquosa consumptionem postea colentur.

Usa frequentissimum ad phlegmonas, ignem factum, ulcera serpentia, & cephalalgiam calidam, ventriculi & jecoris intemperiem calidam mitigat, renum ardoribus ac hæmorrhoidum inflammationi salubre, & cordi robur addit.

Quidam parum opii in aqua rosarum colliquati inter decoquendum injiciunt, sed id unguenti candorem destruit.

Unguentum Rubrum, sive de Minio camphoratum ex Pharm. August.

℞. Olei rosati ℔ss. litargyri ℥ij. minii ℥ij. Cerrussa ℥ss. Tutia præp. Camphora an. ℥ij. Cera alba ℥ij. liquatam coram cum oleo lento igne, misce in mortuario plumbeo cum reliquis rebus tenuissimè tritis.

Refrigerat & siccatur potentissime, ideoque igni sacro felicissime adhibetur, Cancros sanat, ulcera quæ humorum acrimonia serpunt, eam namque obtundit.

Rubrum Desiccativum ex Pharm. Londin.

℞. Olei rosati omphacini ℔j. cera alba ℥v. liquatis insperge in mortuario plumbeo, Terra Lemnia vel bolli Armena lapid. Calaminaris subtilissima pulverat. an. ℥ij. lithargyri auri Cerrussa an. ℥ij. Caphura ℥j. Fiat Vnguentum.

Vnguentum Rutaceum ex Pharmac. Londin.

℞. Fol. ruta viridis m. iij. origani, pulegii mentha, absinthii, salvia an. mij. Confusus in mortario lapideo adde axungia suilla salsa, sive veteris ℔ij. digerantur quatrimum in fimo vase fictili, donec liquecat axungia: Tum Torculari validè exprimatur, postea addantur nova herba, fiatque quater, ut antea.

℞. Hujus valentia, ℥xvi. medulla Cervina, olei Laurini, an. ℥ij. gum. Tacamahaca Elemi an. ℥ij. olei nucis mosch. per express. ℥j. baccar. juniperi, voris mar. spica, petroli an. ℥j. saponis veneti ℥vi. essentia Castorei extracta cum Spir. vini opt. ℥ij. Misce & lento igne liquatis liquandis, oleis vero sub finem mixtionis additis, fiat s. a. Vnguentum sive balsanum.

Vnguentum ad Scabiem ex Pharmac. August.

℞. Syracis liquidi ℥j. Terebinthina Venetæ, butyri an. ℥ij. Succu limonum ℥ss. cerussa lota ℥j. salis ℥j. Fiat s. a. miscendo Vnguentum.

Confert ad Scabiem & pruritum, cujus fervorem temperat, vitiosum humorem cuti impactum extergit, & emendat.

Vnguentum Scabiosæ ex Pharm. Londin.

Celebre inter nostrates Chirurgos, ante recensitos fere annos Vnguentum pro quo ℞. Succu vitent. Scabiosæ prælo expressi & per pannum colati, axung. porcine mund. an. q. v. contundatur axungia in pila lapidea, elato, non in orbem acto, pistillo; paulatimque interea affundatur succus, commodioris misturæ & tincturæ causa. Mox simul in vas idoneum soli obvertendum, conficito, & ut succus axungiam supereminet curato. Exactis in hunc modum novem diebus, ad pilam & pistillum ut ante revoca; ejiciaturque quam contundendo, non distendendo expressisti, tenuis, & decolor humiditas; rursusque per s. dies in suo vase recondatur axundia. Quibus elapsis, contonde de novo, sensimque admisce recentem scabiosæ succum; iterumque post quindecim dierum in sole & suo vase moram, ab aquosa humiditate, ut prius liberetur. Tandem cum recenti lucco, in alijs 15. dies reponatur, & quinta demum vice diligenter contusa, in vase vitreo, vel in vitreata fervetur ului.

Vnguentum de Solano ex Pharm. Londin.

℞. Succu è solano, lithargyri loti an. ℥v. Cerrussa lota ℥vij. cera alba ℥vij. Thuris pulveris ℥x. olei rosacei, pluries in aqua simpl. loti ℔ij. Fiat Vnguentum s. a.

Vnguentum Somniferum è Pharm. Norimberg.

℞. Vnguenti populeonis, Alabastrini an. ℥ij. olei nucisæ express. nymphææ alba an. ℥ss. opii in aqua rosar. dissolut. ℥j. Croci orientalis ℥ss. m. Fiat s. a. Vnguentum.

Vnguentum Splanchnicum ex Pharm. Londin.

℞. Olei Cappar. ℥j. Lilior. albor. chamamel. butyri recent. ab agitatione succu bryonia, Cyclaminis an. ℥ss. coctis ad succorum exhaustum adde gummi Ammoniaci aceto soluti ℥ij. & B. pingued. gallina, Oesypi, medulla cruris vituli an. ℥ss. pulv. cortic. Tamarisci, rad. Casparum, radicum Filicis, ceterach. an. ℥j. sem. Agni casti, geniste an. ℥j. cera q. s. Fiat vnguentum s. a.

Splanchnicum Magistrale ex eadem Pharm.

℞. Corticis rad. Cappar. ℥vj. rad. bryonia, iridis Flor. farina sem. Faniculi dulcis, Ammoniaci aceto soluti an. ℥ss. comar. absinthii, Flor. chamameli an. ℥j. Vnguentu è succis aperitiuis, è floribus Aurantiorum

PHARMA CEUTICO-MEDICÆ Lib. XX. *Vnguentum* 113

*um an. ℥vj. Olei irini, Cappar. an. ℥ij. pulveren-
tur pulveranda, & cribentur, Ceterisque in mortario Calido diligenter admixtis. F. Vnguentum s. a.*

Splanchnicum Zovelferi.

*℥. axungia porcina recent. ℔ij. cui immergantur
sequeantia incisa & confusa: uipoe rad. recent. Apii,
bryonia nasturtii hortien. aquatisis maris, sylva, ver-
bena, rorismar. abrotani an. ℥ij. plantag. men. ℥ij. cor-
tic. Tamarisci recent. ℥j. Cappar. recent. sale condit.
℥i℔, baccar. juniperi virid. ℥ij. Lauri excori. ℥vj.
sem. nasturtii opi. conquassati ℥ij. facta maceratione,
septimana una vel altera, coquantur parum; post co-
lentur & exprimantur species, fortiter expresso Vn-
guento adde pulv. gum. ammoniaci ℥i℔. sagapeni ℥j. so-
lutorum cum vini albi s. q. ad pulvis formam.*

*Verum non multum ea coquantur, ne subtiliores & pe-
netrantiores gummatum partes in coctura exhalent,
propterea pulveres prædictor. gummatum, non abs re su-
mendos præcipio, quia facilius dissolvi, vel dilui possunt
& sine Colatura. (Ob quam liquidiora effici gummata,
& denuò, ac necessario, coquendo ad competentem con-
sistentiam pulvis inspissari deberent) unguento dextrè
commisceri. Item adde Camphora ℥j. vel ℥i℔. solius pa-
riter prius ad pulvis formam cum olei de Capparibus s. q.
Fiatque Vnguentum splenicum omnibus exade mixtis
Cui si libitum esset, olea Coriandri, lavendula vel ma-
jorana propter gratum odorem, addi possent.*

*Est Unguentum præstans & efficax, in obstructio-
nibus lienis; cujus duritiem resolvit, emollit & egre-
giè roborat, externa & sæpius repetita, inunctione.*

Unguentum Stipticum Fernelii ex Renodeo.

*℥. Olei rosati sæpius in aqua aluminosa loti ℔i℔.
cera alba ℥iij. galar. immatur. nucum Cupressi, bac-
car. mirri, balaustior. malicorii, corticum glandium,
acacia, rhois, mastiches an. ℥. cum succis mespilor. &
sorb. immaturor. Fiat Vnguentum.*

*Unguentum hoc astringens quod validissimum sit, ac
paratè facile, inquit Plantius, usurpandum erit pro
unguento Comitissæ & alio quovis astringente, ut
ritè paretur omnia tenuissimè pulveranda, & dies cir-
ci. et quatuor maceranda in succis sorbor. & mespil-
lor. vel horum tantum alterutro; deinde lento igne
siccanda; Tum cere oleo liquatæ commiscenda.*

*Inter astringentia primum locum obtinet: ob id
admoveatur partibus imbecillis roborandis, ad humor.
irruentium tuendis & laxioribus constringendis ac
angustandis. Nam fluxiones omnes intercipit, vulvæ,
uteri, sedis, intestini que prolapsus cohibet, & pro-
fluentem sanguinem admodum sistit, mammillas pen-
dentes retrahit, minores efficit, & ventris rugas à
partu tollit.*

Unguentum de Succis Arantii ex Pharm. August.

*℥. olei rosati ℥vj. omphac. ℥iij. succor. plantagin. solani
hortens. Centaurii minor. Lapaiki acuti an. ℥i℔. bulliant
ad succorum consumptionem, postea addatur cera alba
seorsim liquata quantum satis, inspergendo paulatim
lithargyri triti ℥i℔. plumbiusti ℥ij. pompholygis ℥ij. hor-
dei usti p. i℔. boli Armena orient. Camphora an. ℥j. his
omnibus simul mixtis, ultimus loco adde Unguenti po-
pulei ℥j. infrigidantis Gal. ℥i℔. Fiat Vnguentum.*

*Vlceribus sædis at malignis opitulatur, mundificat
enim, siccatur, fluxiones acres in iisdem temperat, in-
flammationes reprimat, at sinus citatice regit.*

Vnguentum de Succis Aperitivis ex Pharm. Londin.

*℥. Succiebuli ℥viij. Apii, petroselin. an. ℥iij.
absinthii, ireos an. ℥v. olei communis ℔i℔. lilior. albor.
℥x. Absinthii, chamemelini an. ℥vj. pingued. Anatis
gallina an. ℥ij. coquantur simul lento igne, donec succi*

*absumentur, dein cola, & cum cera alba ℥viij. Accit
vini albi tantillo, Fiat unguentum s. a.*

Vnguentum Sumach ex Pharm. Londin.

*℥. Sumach. gallar. immatur. baccar. mirri, balan-
stiorum, malicorii, corticum glandium, nucum Cupres-
si, acacia vera, vel germanica, mastiches ana ℥x. cera
alba ℥v. olei rosati, in aqua aluminosa sæpius loti ℔ij.
& ℥x. pulverandor. fiat pulvis tenuissimus, quatuor quo-
dies integros maceretur in succi mespilor. & sorbor. im-
matur. an. q. s. dein siccetur. ad ignem minus acrem, &
cum oleo & cera præscriptis coque in Vnguentum.*

Vnguentum Tegularum ex Pharm. Norimberg.

*℥. Tegularum subtiliter pulverisatar. calcis viva
aqua ros. lota an. ℥vi. olei rosarum ℔ij. Camphora ℥i℔.
boli armena ℥ij. m. F. Vnguentum.*

Vnguentum Thetrapharmacum. Vid. Vnguentum Basilicon minus.

Vnguentum ad Tineam ex Pharm. August.

*℥. Olei rosati, Juniperi ex ligno an. ℥vi. sulphuris
vivi, Stercoris Columbini, Floris aris an. ℥i℔. cera
quantum sufficit. Fiat Unguentum.*

Vnguentum de Tuthia Nicolai ex Pharm. August.

*℥. Olei rosati, Cera alba an. ℥i℔. succi solani
℥ij. Cerussa lota ℥i℔. plumbiusti & loti, Tutia
prap. an. ℥ij. Thuris ℥j. Ceram liqua cum oleo, len-
to igne, postea paulatim succum prædictum instil-
lato & remissa in pulverem redacta immisceo.*

*Differt ab Unguento diapompholygos in eo, quod
hoc cadmiæ fornacum botrytim dictam recipiat, no-
stris Tutiam adpellatam, alterum vero pompholyga,
id est Nil album dictum. Eiusdem penè facultatis, ad
exsiccanda Erysipelata, sanandaque vulnera sordida
& Tibiarum ulcera, in putridis & cancerosis, ubi
fervor aliquis est, summa fiducia usurpari debet quod
nulli veterum compositioni cedat.*

Tapfi Valentia & Tapfemel ex Pharm. Londin.

*℥. Succi chelidonia, Tapfi barbati, an. pariem
unam mellis despumati, partes duas, coque sensim,
donec succi evanuerint, additisque præcipiente Ar-
tifice vitriolo & Alumine Combustis, & auramen-
to, rursus coque, ut F. Vnguentum.*

Unguentum ad Vermes ex Pharm. August.

*℥. Succi Absinthii, Abrotani, Centaurii mi-
nor. persicaria, Folior. persici, arb. Lupini, rad. Ebuli
porri, nasturtii aquat. an. ℥ij. balaustior. ℥j. olei
absinthii ℔i℔. cera q. s. Fiat Unguentum, succos
cum oleo coquendo, postea ceram in eo liquando, &
pulverem balaustiorum immiscendo.*

*Umbilico superpositum ac ventri inunctum ver-
mes enecat & expellit.*

Ad Vermes aliud ex Pharm. Norimberg.

*℥. Succu persicaria, Folior. pers. arbor. lupini
radicis aristolochia rot. an. ℥i℔. ebuli, corticum mal-
punici an. ℥ij. de Absinthio, Abrotano, Centaureo
min. an. ℥i℔. porri ℥ij. nasturtii aquatici ℔ij. olei,
absinthii ℔i℔. cera q. s. F. Vnguentum.*

Unguentum ad Verrucas seu Carunculas in meatu Urinario ex Pharm. August.

*℥. Mercurii præcipitati ℥ij. Unguenti de Ci-
russa ℥i℔. misce, addi his potest pro magnitudine af-
fectus aliquid olei vitrioli aut aque fortis immittendo
hujus Unguenti parum supra Candelam ceream in
canalem*

canalem. Potest autem loco unguenti de Cerussa à principio sumi unguentum anodinum in aqua cum precipitato portione, aut etiam aliàs pro lubitu & intentione medici variari. Candela sic fiunt.

℞. Cera alba ℥ij. Terebinthina Veneta ℥j. liquefcat cera, postea addatur Terebinthina, & in liquatis inungantur Ellychnia, fiantque candela justam crassitiem habentes.

Vtebatur hoc unguento feliciter Alphonsus Ferrarius Neapolitanus in extirpandis Carunculis seu Verrucis in pene natis, urinæ non raro suppressionem causantibus; id quoque commodissimè quondam usurpabat Ioannes Thanmullerus Lithotomus ac chirurgus insignis, qui multis annis in urbe nostra praxin suam exercuit, id verò D.D. Vdalricus Rumlerus Collega quondam noster communicaverat.

Vnguentum violatum ex Ph. Aug.

Fit ut rosatum.

Calidis pectoris noxis prodest, refrigerat & humectat.

Vnguentum Viride Reginæ ex Pharm. August.

℞. Fol. Lauri, rosmarin. salvia, majorana, Ruta, millefolii, Anagallidis aquatica, nigella cum floribus & seminibus an. mij. urtica major. minor. hyssopi, prunella, Artemisia an. mij. Agrimonia Centinodii, plantaginis minor. Rad. cichorii, Bellidi, Consolida media, Saracenica, vinca pervinca, lavendula, Absinthii, rosarum rubr. albar. an. mij. herbe & radices mundate incidantur, contundanturque cum butyri recentis ℥vi. postea additis olei olivar. ℥ij. Coquantur lento igne, rudicula continuo agitando: Colentur & exprimantur, addaturque cera alba ℥℥. ac tandem olivani & Mastiches subtilissimè pulverisator. an. ℥iij. Redigantur in Unguentum.

Non tantum externè adhibetur, sed etiam internè. datur ruptis, convulsis ac ex alto prolapsis, ubi gravioris sanguinis suspicio subest, suggillata curat, dolores partium lenit, estque ad varios usus adcommo- datum.

Vnguentum Vulnerarium Aureum ex Pharmac. Norimberg.

℞. Ol. communis Vetus ℥ij. petra ℥j℥. philosophor. cera Terebinthina, juniperi an. ℥ij. C. galbani ℥j. pinguedinis Taxi balsami peruviani an. ℥℥. cera ℥iij. vel quantum satis misce.

Vnguenta varia è Schroderi Pharmacopœa illustrata vel aucta.

Vnguentum Acopum DD. Meisneri ex DD. Schulzio in Miscell. curios. Germanor.

℞. Rad. Hiosciani mij. herbar. cicuta, solani, pavieraria, lactuca, ana gallid. sempervivi ana mij. herb. paridis cum uvis vel baccis, papaveris, rosa canina, verbasci ana, mij. ranar. virid. No viij. lumbricor. terrestr. ℥iij. axungia porcina ℥viiij. confisis, ac in vitrem probe mixtis adde vini hispanici ℥iij. Peracta dein digestionem dierum sex, fiat decoctio ad consumptionem vini, colatura expressa adde succor. inspissat. Rad. & herb. hyosiani, herb. solari ana ℥iij. pulpa assia ℥vi. opii thebaici ℥ij. styracis calam. ℥j. pulver. herba solari, corticis mandragora ana ℥℥. croci orientalis ℥ij. camphora ℥℥. Cum sufficienti q. olei papaver. & hyosiani M. F. s. a. Vnguentum, quod Thorunii usitatum est in podagra.

Vnguentum ad ambusta ex D. Charraz.

℞. Butyri recentis ℥ij. in liquefactum igne moderato butyrum, injiciatur extra ignem nivis quan-

tum calor butyri liquefacere poterit; colloque butyro aquam nivis supernatanti, addatur cerussa veneta pulver. ℥j. caphura, cum tantillo spir. vini pulverata ℥j. & factum erit unguentum.

Vnguentum aliud ad ambusta ex Eodem.

℞. Axungia porci masculi ℥ij. vini albi ℥ij. folior. salvia minor. hederæ terrestr. & muralis, majorana, semper vivi mai. ana mij. coquantur simul igne lenio saepius movendo, ad humidi consumptionem, deinde colentur & fortiter exprimantur, & servetur unguentum ad usus.

Vnguentum CC. Anodynum Guilhelmi Simonidis.

℞. C. C. dimidium minutim incisum ponatur in cado vino pleno, addito semper vino q. s. bulliant, ad vini consumptionem. Deinde abjecta crassiore C. C. parte, medulla remanens fricetur manibus, adde postea. Ol. Abrotan. Hyperic. Aneth. Scorpion. Lumbricor. terr. Nucum Laurin. Rut. Spic. Sabin. ana ℥℥. Axung. human. ℥j℥. Castor. ℥ij. Niri ℥℥. Euphorb. ℥℥.

M. F. s. a. Vnguent.

Vires. Summe prodest in doloribus scorbutico-colicis atrocissimis, tum & in pareticis & podagricis, aliisque torminibus.

Vnguentum Anodynum in Podagra.

℞. Flor. Rosar. sylvestr. M. x.

Herb. & Cortic. exterior. hyoscyam. recent. M. vi.

Concisa coquantur in vini mensur. s. hinc exprimantur & colentur. Colatura l. Δ ad mellis consistentiam inspissata, adde pingued. suill. castrat. ℥ij. misce optime ad Δ, tandem ubi parum refrigerata fuerint: admisce. Opii in vino solui. ℥j. Croci pulv. ad magnitudinem avellanar. duarum, Extract. flor. verbasci. ℥℥.

F. Vnguentum

Vires. Singulare est in sistendo dolore Podagrico & Nephritico, si calide affectus illo inungatur. N. Ubi dolori nephritico velis applicare, opera pretium feceris, si manipul. duos vel tres baccarum lupiperi ab initio compositionis cum hyoscyamo iteras & exprimas Croll.

Vnguentum butyraceum nervale S. Closs.

℞. Herb. absinth. virid. Majoran. Sisyambr. Hif. sop. Meliss. Calamentib. Orig. Basilic. Hyperic. Rut. Calend. Sabin. Tanac. Aritemif. Abrotan. Flor. Chamem. Melil. Hyperic. Beion. Agrimon. Centaur. min. ana M. j. Concidentur minutum & in magno fictili bull. in butyr. Majal. V ℥vi. Percollis herbis & consumpio V exprimantur per torcular & coquantur simul cum butyro, admiscendo succi nicot. depurat. ℥ij. Tereb. lot. ℥ij. Cera ℥vi. F. Vnguentum.

Vires. Valeat ad omnes affectus frigidos nervorum, spasmus Cynicum, præsertim si spondyli cervicis & partes illæ quæ movent masculos faciei eo inungantur, si verò totum pectus cartilago Xiphoides, tunc cedat singultum, tuncque sic præscribitur.

℞. Bals. Peruvian. ℥j. Butyrosi nostri ℥ij. V ℥j. M. omnia ad exalationem usque V.

Vnguentum Cataploras è Pharm. Colleg. Reg. Londinensis.

℞. Cerussa in acq. portulacæ prius lota, deinde in aceto) post maceratas in eo raphani sylvestris radices expresso, lapidis calaminaris, chalciticos ana ℥vi. plumbi usti, sanguinis hircini ana ℥℥. argenti virisublimati ℥j. succorum sempervivi, solari plantaginis ana ℥ij. axungia porcina à pelliculis mundata ℥ij. olei violarum, papaveris, mandragora ana ℥j. Primo subli-

mò sublimatum & axungia, deinde olea succi & pulve-
res rite misceantur, ut F. Vnguentum f. a.

Vnguentum Cardiacum.
Herizgespan. Salb.

℞. Herb. Cardiac. Camedr. Malv. Senecii, lacee
Amar. dulc. Scabios. Semperviv. Morsus galin. ana
M. ij.

Incidantur & coquantur in ℥viii. butyri recentis ad
consumptionem aquositate, dein exprimantur, & F.
Vnguentum.

Vites. Frequens usus est in affe^{ctu} infantum, quem
Cardiacam appellant. Eriant eo hypochondria & lo-
cum cardiac, &c.

Vnguentum Cordiale, DD. Arnold. Weickhardi pro
Officinis FF.

℞. Vng. rosar. Mef. ℥ij. Ol. Scorpion. simpl. ℥ss
Nucist. express. Stillat. cort. citri. camphor. ana ℥j.
Antidot. Mattiol. Theriac. Andr. ana ℥ss. Aloes ro-
sat. ℥ij. M. F. Linimentum.

Vites. Corroborat Balsamum vite languidisque vi-
ribus subvenit, cordi injunctum.

Vnguentum Cordiale Cl. Ludovic. ab Horning.

℞. Vng. ros. opt. loti ℥ij. Balsam. Apople^{cti}. ℥j.
Ol. nucist. express. ℥j. Still. corr. citri ℥ss Cinam. g. v.
Rosar. g. vi. M. optimè. Vlus idem qui prioris.

Vnguentum Narcoticum.

℞. Sacchar. Hni ℥ij. Opii ℥j. Camphor. ℥j. So
express. nuc. mosch. ℥j. nucleorum persic. ℥ij. ambr.
Moch. an. D. F. f. a. Vnguentum.

Vites. Non tantum tolluntur ardores & dolores
Capitis, sed etiam suaviter conciliatur somnus, si iura-
que tempora eo illinantur.

Vnguentum Nevriticum secretum familiæ cujusdam
nobilis ex D. Daniele Protenio in Act. medic.
Hafnienfibus Bartholinianis.

℞. Canem juniorem per totam cutem rubicundi
coloris, hunc duorum mensium, vel sex ad minimum
septimanarum spacio, ad satietatem ciba ac sagina juf-
cultis ex lacte, cui simplicia neuritica (n. i sunt iestudi-
nes, conche, lumbrici, ossicula pedum animalium
confusa; herba itidem floresque rorismar. lavendula,
salvia, betonica, hyperici) fuerunt incocta, paratis.
Deinde bene saginatum eundem ac evisceratum, imple-
terum modo recensitis speciebus, præsertim verò lum-
bricis, cum terrestribus, cum humanis, limacibusque
tam albis quàm rubris, quibus insuper axungiam hu-
manam atque castoreum adungere, ac loco lardi ex-
terioribus ejus partibus, limaces lumbricosque circum
circa intertexere poteris. Atque sic demum hoc modo
preparatum canem una cum pilis lenio Carbonum igni
admove, ac destillata exinde penguedine sapius hume-
cta eundem superficialiter, idque tamdiu repere, us-
quedum liquor iste satis sit imbutus supradictarum
specierum virtutibus. Tum recipe hujus oleosa pingue-
dinis ℥ij. eique antequam prorsus frigescat, infunde
axungia humana ac castorei destill. ana ℥ij. olei laven-
dula, rorismar. succini destill. ana ℥ss. Atque tunc de-
mum preparatum est admirabile unguentum in vasis be-
ne custodiis servandum, quod in doloribus arthriti-
dis, tam vage, quam simplicis, luxationibus, ariduris
membrorum spasmo & quamplurimis aliis nervoso ge-
neri familiaribus morbis, presentaneum ac admiranda
virtutis est remedium.

Vnguentum Ophthalmicum, F. F. D. D. de Spina.

℞. Tut. preparat. ℥ss. Camphor. ℥j. Aqu. rosar.
alb. ℥j. Butyr. rec. ℥j. Virid. aris parum. M. F. Vnguent.

M. F. Vnguent.

Vlus. Applicatur ciliis, in inflammatione ac ru-
bedine oculorum.

Vnguentum ophthalmicum aliud ex D. D. Willia in
Adis Hafnienf. Bartholin.

℞. Vnguenti nihili & de turia ana ℥ij. margaritar.
corallor. oculor. cancri turia, omnium preparator. ana
℥j. camphora gr. vj. fol. auri & argenti ana No iij. M.
F. unguentum hora decubitus lenis magnitudine cantho
oculi majori indendum, & infra palpaberas allinendum
Dici non potest quàm citò unguenti hujus usu ophthal-
mia violentia laxetur, adeo usque abstergi malum vi-
deatur, ex moderate quippe quibusdam refrigeranti-
adstringentib. & desiccantibus constat rite jam cele-
bratis universalibus omnibus non potest non esse con-
ducibile. Potest etiam addi sacch. saturni D. atque cam-
phora pondus duplicari sicque sentietur effectus prom-
ptior felicitas.

Vnguentum aliud ophthalmicum ex D. Charraz.

℞. Unguenti rosati ℥ij. mellis narbonens. ℥ss. aloes
electæ & sarcolla pulveratar. & in lacte muliebri per
dies tres sine agitatione fusar. mutato lacti unaquaq; die,
ana, ij. pulver. trochiscorum albor. rhasis, boli armenæ
turia prepar. ana ℥ij. Virioli albi, sacch. candi ana
℥j. pulveris croci, myrrha & olibani ana ℥ij. opii the-
baici gr. F. f. a. Unguentum, ocul. ad modum preceden-
tis indendum, mane subsequ. oculum aqua plantag. aut
rosar. albar. ablundo.

Vnguentum ad perniones mirandum.

Cer. flav. piscis, resin. alb. ol. olivar. lin. ana ℥ss. Se-
vi bovini, Dervco. liquat. ana quart. iij. thur. albis. ℥j.
Mintii H officinarum ℥iv. F. Vnguentum.

De quo illinatur. calide cum pluma pernio ulceratus
suppositio linicolo mundo. Non ulceratus v. fortiter pe-
treolo ante Δ confriceatur. Tante utilitatis est, ut quo-
tannis plures istius Vng. libras in pauperes erogat, S.
Closs. Effusas insuper mammillarum & Erysipelata le-
viora sanet precedente foin cum V.

Vnguentum ad capiendos pisces ex D. Charraz.

℞. Axungia humana & cai ana ℥ss. munia sub-
tiliter pulver. ℥ij. sem. cumini similiter pulver. ℥j.
oleor. stillat. anisi & de spica ana gutt. vj. Zibehi &
camphora ana gr. v. F. f. a. unguentum, illinendum li-
nea piscatoria pro capiendis piscibus.

Vnguentum contra scabiem.

℞. Lythareyr. Ceruss. alb. ana ℥ss. Acet. rosar.
℥ss. Ol. rosar. ℥vi. Sulphuris viv. ℥vj. Sal comm. ℥ij.
Butyr. recent. ℥ij. Terebinth ℥ss. M. f. a.

Vnguentum somniferum FF.

℞. Opii thebaic. ℥j. Croc. ℥ss. Vng. rosar. ala-
bastr. ana ℥ij. Ol. nucist. ℥v. ℥j. Acet. sambuc.
parum. F. f. a. Vnguent.

Vites. Inungitur temporibus, fronti, & cervici
pone aures, ad conciliandum somnum.

Vnguentum spleneticum.

℞. Ol. Amigdal amar. ℥j. Cappar. ℥ij. Nucl.
persic. express. ℥ss. Succ. rad. Brion. Cyclamin. Ci-
cut. ana ℥ij. Gummi. Ammoniac. in ℥ dissolut. Bdell.
ana ℥ss. Pulv. cort. cappar. Tamarisc. ana ℥ss. Fra-
xin. ℥vj. Ceterach. Summ. centaur. min. ana ℥ss. Sem.
Cymen. aceto macerati, & iterum exsiccati, ℥ij.
Cera nova, q. s. F. Vnguent. Vites. Vim habet cale-
facientem, emollientem, resolventem, aperientem, robo-
rantem.

N. Penetrandi gratia potest addi ℥j. vel ij Ol. spic.
vel Ol. stillat. absinth. ℥ss.

Vnguentum

Vnguentum Stipticum ex D. Charraz.

℞. Olei comm. ℥iij. mirrillor. siccor. contusor. ℥iij. alumin. rupei ℥ss. succi myrrillor. & sorbor. immaturor. ana ℥j. Omnia vasi fictili cooperto commissa in ferventi B. coquantur ad integram fere humoris consumptionem, deinde colentur & forisiter exprimantur; oleumque facibus liberetur. Tunc ℞. Olei illius ℥iij. cera alba ℥ix. cod. B. calore incisa cera in oleo liqueatur, semique refrigeratis sequentia pulverata permisceantur. ℞. Nuc. cupressi, myrrillor. balaustrior cortic. granator. & glandium, acinor. uva, ossis è crure bovis calcinati, granor. sumach, mastiches, acacia, aluminis usti & corticis mediani castaneæ. ana ℥vi. F. omnium pulvis unguento permiscendus.

Hoc Vnguentum dorsi parti inferiori illitum uteri ligamenta corroborat, potest etiam adhiberi utiliter pro constringendo matricis collo post partum, ut & pro consolidandis lacerationibus quibus affliguntur quandoque puerpera difficilem partum passa, remedium etiam est uteri hamorrhagiis immodicis, quo casu applicatur regioni renum, hepatis ut & toti abdomini, eo etiam inungitur stomachus pro sistendis vomitibus.

Vnguentum è succis è Pharm. Colleg. Reg. Londin.

℞. Olei rosati opt. ℥j. cera alba novella ℥viiij. folior. plantag. solani, oxilapathi, centaurei min. ana ℥ij. Cera cum oleo leni igne liqueat. Addantur postea herba, bulliantque donec probe decocta fuerint. Postea colentur, torcularique exprimantur. Expressum, abjectis herbis, denovo moderate ferveat donec omnis aqua humiditas absorpta fuerit, & solidiusculam unguenti formam acquisiverit: quo fere jam refrigerato, camphora pulverata semunciam inspergito, tandemque agita donec refrigerit.

Vnguentum Sympatheticum, Crollii.

℞. Adip. Veteris aprugn. Vrsin. ana ℥iv.

Bulliant per horæ dimidiam, in Vino rubro, fundanturque super aquam frigidam, colligaturque pinguedo supernatans. Dein,

℞. Lumbricorum lotorum pulveris. Cerebri aprugni Santal. rubr. Mumia. Hamatit. ana ℥i. Vsnæ è cranio hominis interempti, ℥i. F. s. a. Vnguentum cum pinguedinibus illis.

N. 1. Animalia illa quo seniores, eo adeps melior.

N. 2. Vsnæ colligenda ☾ crescente, & in bona domo existente, ☿ scilicet si fieri possit non ☿, aut ♀. Parandumque Vnguentum ☉ in libra existente.

N. 3. Sunt qui omittunt Vsnæ & Mumiam,

Usus. Hoc Unguento sanantur omnia Vulnere, (modo nervi, arteriæ, &c. non sint læsæ.) Ungatur telum, quo vulnus inflictum, quotidie semel, si necessitas urgeat, & vulnus sit ingens, alioquin secundo vel tertio die inunxisse sufficit.

N. 1. Telum servetur in linteolo mundo, & loco non nimis calido, ne damnum inferatur Patienti. Cavendum etiam ne pulvis super telum cadat, nec venius afflet in loco frigido, alioquin Patientis mirè affligetur.

N. 2. Si vulnus punctum inflictum, ungatur telum versus mucronem descendendo.

N. 3. Si telum desit, sanguis ex vulnere lignello suscipiendus, quod dein ut de telo distulm tractandum. Hac ratione dolor dentium mitigari quoque potest, si nimirum lignellum sanguine gingivarum imbutum, eodem unguento inungatur.

Operatio huius Unguenti perficitur identitate Balsami, sive spiritus illius Balsamici, qui in homine & cruore idem est. Inter hos enim spiritus non alia est differentia, quam quod in homine spiritus ille adhuc vitali actu vigeat, in cruore autem coagulatus sit. Quare cum experiamur, affinitatem sanguinis tantum

posse, ut uno fratre, vel consanguineo proximo, peste correpto, & alter etsi longo viæ intervallo absit eadem afficiatur; quid non fieri posse autumabimus, sanguinis identitate?

Hofman. Vnguentum Sympatheticum Crollii.) Dicitur hoc Vnguentum Sympatheticum, eo quod cum vulnere quandam habere videatur sympathiam seu consensum, ut si nonnihil cruoris, quod telo adheret, eo imbuatur, virtus sanativa in vulnus deferatur, ut aiunt, spiritus mundi beneficio, & in hoc ex unitatis solutione unionem efficiat naturalem. Magneticum etiam appellatur ab actione, qua instar Magnetis in distans agit sanando vulneratos. Alias armarium, quod non vulnere, sed armis Vnguentum applicetur, & sic sanatio peragatur. Vocatur etiam stellatum, quia ab Astris suas accipere operationes sibi persuadent, vel pro certo stellarum positu componendam esse dicunt. Alii aliter describunt.

Recip. Adipis Veteris aprugn. Vrsin. &c.) Dnus Autor Crollianam retinuit descriptionem. Aliam Th. Paracelsus proponit in archidox. Magic. Libr. 1. Johann. Baptist. Porta Magiæ natural. Libr. 8. cap. 12. Aliam tradiderunt Franciscus Tidæus de theriac. p. 279. & VVeickardus Libr. 4. de extern. corporis human. affect. p. 641. Plurimi tamen in eo conveniunt, quod statuunt Vsnæ, Mumiam cruorem & adipem humanum ad hoc necessaria esse. de Vsnæ inter se diversæ sunt opinionis. Dum alii, ut Goclenius asserat. Vsnæ ex solis craniis suspensorum diligendam esse, quod spiritus vitales strangulari in calvariam intrarint. Alii parum referre aiunt, sive sit ex strangulatis, sive ex alterius cuiusdam capite. Et Paracelsus usu comprobatum dicit, Vsnæ ex cranio rota interceptorum non minus laudabilem esse, quam laqueo suspensorum. Et colligendam esse inquit in Dnæ incremento in ☿ domo existentis, vel Dnæ in ☿ vel ☿ aut ☿ versante.

Mumiam.) per mumiam intelligitur vel Arabica & Ægyptiaca illa, constans ex myrrha, aloë, croco, balsamo & aliis odoramentis, vel caro humana mucedolosa; in qua spiritus insitus mumialis & fermentatus est superstes, surroganda est.

Crollius cruorem & pinguedinem humanam, omisit, cum tamen etiam sint necessaria, eo quod vulnerato per ea arctissima cum unguento sit cognatio. Ex rebus humanæ naturæ optimè convenientibus, inquit Robertus Fludd hoc unguentum conflatum est. Vnde ad ejus sanitatem respectum necesse est, nam vsnæ tanquam ossium humanorum vigor fermentatus, sanguis & caro in mumia ad huius compositionem cum adipem concurrere debent, in quibus virtus mumialis delitescit & cum his omnibus sanguis permiscetur, qui omnium prædictorum origo & quasi pabulum est, ita ut integra corporis humani perfectio quasi ad huius unguenti compositionem concurrere videatur.

Usus.) Ferrum seu telum, aut in ejus defectu lignum aut ramus salicis in cruore madefactus in unguentum immergitur, & ita relinquitur. Ager quotidie propriam suam urinam vulnus eluat & deligat panno mundo, semper pus extergendo, vulnusque qualibet aurora mundificando, Illud quod cruore madefactum est in locum temperatum ac mundum reponendum est, si enim aer vel minio frigori exponatur, excitabitur dolor, Attendendum etiam an cæsum vel punctum vulnus sit factum. In cæsura ab apice versus tergum telum inungendum est, in punctura autem à cuspide versus capulam, si non possis cognoscere, quam profundè vel quomodo telum in carnem introiverit, poteris illud perungere; aliàs sufficit locum teli, quo aliquis læsus est, inunxisse. Quo die telum inungitur abstinere à venere & vulneratus, & is, qui telum inungit. In fracturis & ruptura ossium aliquid pulveris symphyi majoris

majoris ostiocolle Unguento addi potest. Idem modus procedit & in aliis affectibus. Sic in dolore dentium sanando dens dolens tamdiu scalpello fricetur, donec sanguinem emittat. Scalpellum postea cruentum hoc unguento inungatur. In Dysenteria excrementa cruenta cum hoc misceantur unguento, translata in locum temperatum patienti afferent levamen ex observatione D.D. Ioannis Michaelis.

Operatio huius Unguenti perficitur identitate Balsami &c.) Quæ causa sit huius operationis sympathetica, magna contentionis terra inter Authores trahitur Dnus Autor cum Crollio identitati Balsami sive spiritui illius balsamico qui in homine & cruore idem est, adscribit, hoc tantum intercedente discrimine, quod in homine spiritus iste adhuc vitali actu vigeat, in cruore autem coagulatus sit. Alii illam sanationem per meram naturam & magneticam quandam efficientiam peragi putant. Vnde R. Goelenius in synarthrosi. Magnetica asserit virtutem magneticam à telo Vnguento delibuto propagari ad vulnus propter Naturæ coactionem & continuationem, quam sequitur successiva impulsio per medium aerem spiritu stellato & primario quodam ac magnetico vigore ac potentiâ imprægnatum. In Vnguento est spiritus balsamicus, hic evocatur à spiritu consimili sibi que sympathetico, ut spiritum mundi stellato ad effectum singularem producendum. Fit igitur cura vulnerum magnetica per meram virtutum transplantationem, quam efficit & perfecit appetitus inter spiritum balsamicum & spiritum mundi. Alii contra curationem hanc tanquam pro fallaci, suspecta & minimè naturali agnoscunt, ut Cl. Sennerius in Practic. Medicin. Lib. V. Cap. X. CL. Conring. de Hermetic. Medicin. Cap. 18. Athanas. Kircherus de Arte Magnæ. Lib. 3. part. 7. de Magnetism. Medicinal. Sylvester Rattray Theatr. sympathet. Mos medium tenentes locum, nec planè huius virtutem adspernamur, nec nimium ei huic attribuimus. Interrogati autem de ratione & modo huius operationis, præterea cogimur prætere.

Vnguentum Terebinthinæ vulgò

Eintersalbichen. Onguent qui facilite ou qui aide la suppuration des ulcères. Oynement of Turpentin. to make suppuration of matter in a wound. Turpentin-Salfom materie in een wond te make.

℞. Terebinth. ℔ij. vitell. ovis. num. vi. mastich. myrrh. oliban. ana ℥i. F. Vnguent.

Vires. In vulneribus generationem puris promovet.

Vnguentum Viride potabile, Butyrum viride, F.F.

℞. Herb. salv. hyssop. prassii menth. betonic. scopolendr. scabios. cichor. fencul. meliss. veronic. matrisylv. aquileg. rut. petrosel. millefol. centaur. min. agrimon. aristoloch. rot. plantag. c. tuto ana mij. butyri majalis, ℔viiij.

Infunde herbas omnes recentes suo quamlibet collectionis tempore in butyro, stentque donec omnes collegeris & insuderis, postea exprime, expressum coque ad consumptionem aquosissimis. F. s. a. Vnguentum.

Vires. Expetitur à vulgo assumiturque ad sanguinem coagulatum resolvendum dolores leniendos, pulmonum mucilaginem demulgendam & expellendam. Quin & extrinsecus ad dictos effectus adhibetur.

Vnguenta varia ex Iacobo Le MORT.

Vnguentum Rubrum.

℞. Axungia Porcina, Olei Hyperici an. ℥iiij. Cera ℥ij. Cræta ℥j. Minii ℥ß. Camph. ℔ij. M. F. s. a.

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

Vnguentum

Vires. Acidum temperat, consolidat, inflammationibus prodest, oculorum vitis succurrit, ut & manibus & pedibus frigore & calore adustis.

Vnguentum Nervinum.

℞. Vnguenti Althææ ℥ij. Pingu. Anatis, Anseris, Canis, Felis, Olei Anethini, Chamamelini, Laurini, Lumbricorum, Vulpini an. ℔j. Euphorbii, Petreæ, Spicæ, Terebinth. an. ℥ß. Cera q. s. M. f. s. a. Vnguentum molle.

Brevius sic habe.

℞. Ol. Laurini ℥ij. Lumbricorum, petreæ, spicæ, Terebinthina an. ℥j. de palma ℥ß. camphor. ℔ij. pinguedinis anseris ℥j. unguent. althææ q. s. Sp. Vini, in quo sapon. vener. ℥iiij. dissol. fuerint, ℥j. M. f. s. a. Vnguentum.

Vires. Frigidis nervorum affectibus convenit, valde penetrat, & dolores à contractura & spasmo ortos lenit.

Vnguentum Populeum.

℞. Oculorum Populi recent. ℔ij. axungia porcina recent. ℔vj.

Gemmæ Populi confusæ macerentur in axungia, donec sequentes herbæ in vegeto suo statu collectæ fuerint:

℞. Herb. Bardana, hyoscyami, lactuca, mandragoræ, papaveris nigri, semperivi majoris, minoris, Solani, violarum, umbilici veneris, Cymarum rubi tenerimarum an. mij.

Hæ confusæ cum axungia & oculis Populi coquantur in MB ad humidi succi privationem, ut fiat s. a. Vnguentum.

Vires. Inflammationes & dolores ex acri humore ortos sistit, motum nimium compescit, leviter astringit, & anodynum est, unde convenit in affectibus calidis, &c.

Vnguentum Pomatum.

℞. Axungia porcina, Sevi Ovilli an. ℔ij. Aq. rosarum fragrant. ℔ij.

Coquantur in MB. per horam semis, refrigeratis lentè omnibus, fœces in fundo deciduæ cultello auferantur, idque bis vel ter repetatur, donec fragrantè odore & colore albo seva imbuta sint: his adde

Poma redolentia mundata No. xvj. Iridis Florentina Gran. Macalep. an. ℥j. Storac. Calamita, bensoes alb. an. ℥ß.

Coquantur simul in MB. ad exhalationem superflui liquoris, dein coletur sebum à fœcibus, cui adde

Fl. Iasmini ℥ß. Ligni Rhod. ℥j. cinamom. ℔j. garyophill. ℔ß. Florum bensoes ℔ij. mosci, zibeth. an. gr. iij. M. f. Vnguentum fragrans.

Vires. Odoriferum halitum gratissimum spargit, frigidis affectibus succurrit, cor & spiritum reficit suo odore.

Vnguentum Martiatum.

℞. Herb. absinthii, abrotani, basilici, calamintha, centaurei minoris, chamædryos, costi hortensis, illecebræ majorana, mentha aquatica, paratylis, sabina, salvia, sambuci an. ℥ß. Lauri fol. rorismarini ruta an. ℥iiij. Sem. cumini, fenugraci, urtica majoris an. ℥ß. adipis ursini, medulla Cervina, Syracis liquida an. ℥iiij. butyri ℔j. Olei nucistæ expressi ℥j. Olivarum ℔iiij. Cera cirina ℔j. Vini generosi q. s.

Macerentur per octiduum in tepido MB. dein leviter coquantur ad humoris absorptionem, ut f. s. a. Vnguentum.

Vires. Efficax est Vnguentum in quibuscumque morbis externis à frigore & obstructione oriundis. Ver-

B b b b b

mes

mes necat, ventriculum roborat &c.

Vnguentum ad Scabiem.

℥. Laterum rubror. ℥ij. Flor. sulphur. ℥i℥. merc. precipit. rubr. ℥iij. aluminis ℥ij. axungie Porcin. ℥x. Ol. Iasmini ℥j. Ligni Rhod. gtt. xij. M. f. a. Vnguentum.

Vires. Scabiei, affectibus subcutaneis ex acriori sale oriundis conducit &c.

Vnguentum Magistrale.

℥. Succ. mucilag. symphit. maj. barb. caprin. cum toto an. ℥j. chelidon. major. hyperic. an. ℥iv. Mellis ℥xvj.

Coquantur, & despumentur simul, donec consistentiam Vnguenti acquirant. Deinde insperge

Pulv. Barb. caprin. Symphit. major. Solidag. Sarac. an. ℥vj. aloes ℥ij. camphora ℥j. M. F. Vnguent.

Vires. Omnibus conducit ulceribus, & vulneribus, præcipue in corporibus scorbuticis, & acri acido succo pradiis.

Vnguentum Aegyptiacum.

℥. Aeruginis ℥v. aluminis crudi ℥j. mellis optimi ℥xiv. aceti fortiss. ℥vij. M.

Coquantur simul in consistentiam Vnguenti.

Vires. Mundificat & vulnera, astringit, colluioni oris inservit, &c.

Vnguenta varia ex Pharmac. BATEANA.

Vnguent. Albuminum.

℥. Fit miscendo exactiss. ☉ Ros. ℥ij. cum album. ovor. ℥iv. f. a.

Ad ambusta, inflammationes, &c. optimum remedium.

Vnguent. Antipyreticum.

℥. Chenopii rec. ☉ oliv. an. ℥iv. ung. Dialth. ☉ Ros. an. ℥j. ▽ nivis ℥vij. coq. l. ▽. f. a. colat. adde camph. ℥j. m. Valet opt. in ambustis, &c.

Vnguent. de Aurantiis.

℥. Poma aurantia rec. sed immatura & viridentia in pulpam. cum cortic. confusa num. vj. Fol. lauri miv. sal. acetos. calend. an. mij. succi nasturt. aquar. ℥ij. Butyr. rec. ℥ij. coq. ad succor. consumpt. f. expres. fortis: cui adde recentia folia lauri, & salvia confusa, cinnam. ℥j. nuc. m. ℥℥. coq. iterum ad herbarum purvilag. & f. expressio. In Scabie, pruritu, &c. insignit.

Vnguent. de Betonica aquatica.

℥. Fol. beton. aquar. acetos. an. mvj. confusis adde Butyr. rec. ℥ij. coq. ad herbar. siccis. f. expressio Repei. collio ter foliis rec. colat. adde ☿ viv. sub. pulvis pulverare ℥i℥. ☉ stil. cori. auram. ℥j. m. f. a. In pruritu. Scabie, &c.

Vnguent. Cephalalgicum.

℥. Vng. Alabastrin. Rosat. an. ℥ij. opii ℥j. croc. ℥℥. ol. nuc. m. f. Vng. Pro temporibus ac fronte inungendis.

Vnguent. Crinificum.

℥. Labdan. ℥vj. Axung. ursin. ℥ij. mell. crud. ℥℥. pulveris Abrotani ℥iij. Cinerum Rad. arundin. ℥i℥. ☉ nuc. m. ℥j. Bals. Peruan. ℥iij. m.

Vnguent. Depilatorium.

℥. ☿ ℥iv. ☉ ℥i℥. Rad. irid. Fl. ℥j. nitri ☿ an. ℥℥. Lixiv. fortiss. ℥ij. coq. ad consist. debitam: adde ☉ caryoph. gt. xx. m. f. ung. seu Pulmentum.

Vnguent. Digitalis.

℥. Butyr. Maial. ℥iij. Flor. Digitalis rec. confus. quot infarciri pt. Insolentur dies 30. deinde coq. f. a. & f. expressio. Pro locis affectis scrophulosis inungendis. Nil æquale.

Vnguent. Faciale.

℥. Camph. Apyroth. an. ℥ij. Diasnap. fortiss. colat. ℥j. ol. Rhodii gr. 4. m. f. Vng. Ad faciei ruborem curandum, præmissis universalibus.

Vnguent. Familiare.

℥. Butyr. Maial. ℥vij. cera, resin. an. ℥4 mell. crud. ℥x. aleuri ℥vi. m. f. a.

Calfacit, humectat, laxat, emollit, discutit, absterget, lenit, concoquit & digerit. Vfus est familiaris in paronichiis, ac pernionibus subito curandis. Ulceribus pedum scorbuticis mirè auxiliatur.

Vnguent. ad Fissuras.

℥. Myrrh. 22. lithargyri Dna, an. ℥j. mell. ℥iv. cera, ℥ij. ☉ Rosat. ℥vj. m. f. a. Pro disioribus addi pt. ☉ Rhodii, gr. xij. Fol. auri num. x. aliter.

℥. Bolus Armena, myrrh. cerus. ann. ℥j. cum axung. anatis q. f. f. ung. citò curat.

Vnguent. ad Foveas.

℥. ☉ Amygdal. dulc. ℥ij. ☉ stil. Rhodii, gr. iv. m. f. unguent. f. a. Ad foveas Variolarum delendas præstantissimum est unguentum. Dolorem lenit, acrimoniam tollit, &c.

Vnguent. Fulcum.

℥. Colcothar. & Phlegm. Oli, an. ℥j. Aceti chelidoniat ℥i℥. Flor. ☉ 3. v. mell. despum. ℥j. f. Vng. f. a. Mundificatium optimum in vulneribus & ulceribus.

Vnguent. Hæmorrhoidale.

℥. Butyr. Maial. rec. ℥iij. Flo. Sambuc. & geniff. rec. qu. infarciri pt. confusos. Insolentur per mensem. Deinde agitentur, & sub Terrâ desossa simul putrescant per mensem. Postea coq. f. a. & f. expressio. aliter.

℥. Pulv. suberis combusti ℥j. opii, gr. vi. Ung. Populn. ℥i℥. m. pro loco affecto.

Vnguent. Herpeticum.

℥. ☿ ☉ an. Tartarum, Sis, nig. sapon. com. an. ℥ij. ☉ Sambucin. q. f. ut f. Unguent. f. a. Inunge locum per optimè, maneat desuper Horas 24. superveniet crusta, removenda Vngent. albo.

Vnguent. ad Lumbricos.

℥. Est. absinth. vulg. menth. tanacet. ruta, porri, jugland. an. miiij. sabina, miv. belleborasfri, mvi. contunde probe cum Sem. Santon. ℥ij. Rad. bryon. rec. ℥iv. colocynth. aloës, an. ℥ij. Fellis Taurin. ℥ij. Butyr. rec. insuls. ℥iv. V. alb. ℥ij. coq. l. ☿ ad Vinum & succor. consumpt. f. expressio.

Vnguent. Ophthalmicum.

℥. Butyr. Maial. ℥iv. cera alb. ℥j. lique & laoa sepius cum Aq. Ros. dein (effusa aqua) adde Lap. Turca præp. ℥℥. camph. ℥j. m. f. ung.

Vnguent. Peragoricum.

℥. Cera, ℥vj. tereb. ℥iv. Mell. ℥ij. Aleuri, ℥i℥. Oleo Rosat. Unguent. Hæmorrhoidale. an. ℥iv. Liquefiant f. a. ut f. Vnguent. Ad Perniones curandas egregium.

Vnguent.

Unguent. Piperinum.

℞. Pulveris Enul. Fl. Δ an. ℥ij. piper. n. ℥i℥. ung. Rosat. ℥xvj. ol. Rhotii. ℥ij. m. f. unguent. Ad Scabiem, Pruritus, &c. Elegantissimum.

Unguent. Solcare.

℞. Rad. allii confus. ℥iv. Axung. ℥vii. coq. ad succi consumpti. f. f. expressio: adde croc. pulverat. ℥j. Sp. Sal. commune ℥ij. m. f. Unguent. Pro plantis Infantum inungendis, ad tussim, &c.

Unguent. Sympatheticum.

℞. Ol. Rosar. Bolus Armena an. ℥j. ol. Lini ℥ij. Axung. humana. Vinea cranii hominis interempti pulverat. an. ℥ij. Mumie. Sanguin. human. an. ℥℥. Vng. f. a. Unguento hoc sanantur omnia vulnera, unguendo telum, quo vulnus inflictum fuit quotidie semel si vulnus sit magnum: alioquin secundo vel tertio quoque die inunxisse sufficit. Telum servetur in linteolo mundo, & loco non nimis calido, ne damnum inferatur Patienti.

Unguent. Virilitatis.

℞. Anaphromel. Olei nuc. m. per express. an. ℥℥. pyreth. piper. nucib. an. ℥i. mosch. ℥℥. Bals. Peruvian. ℥i. m. f. a.

Unguenta varia ex Frid. HOFMANNO.

Unguentum contra Epilepsiam & alios Morbos malignos.

℞. Cinnabar. nativ. ℥℥. Lapid. Ophit. ℥℥. Magnesi ℥ii. ol. d. Macis. d. guajac. corilin. ana gutt. iii. Confect. alkerim. de hyacinib. ana ℥℥. expr. Nuc. Moschat. Ung. alabastrin. q. s. M. f. Vn. Utus est ad bregma, frontem, tempora &c.

Unguentum ad faciei ruborem.

℞. Piperis. zinziber. ana ℥i. Iris vivi ℥℥. Ung. pomad. q. s. pro Ung.

Unguentum ad guttam rolaceam.

℞. Vng. Pomad. opt. ℥℥. ol. camphor. gutt. iii. & rii precipitat. ℥℥. benzoi. ℥i. aq. vit. ℥i. M. omnia accuratissime in mortario plumbeo & cum cera f. Vng.

Unguentum de Cerussa & nli.

℞. ol. expr. ex semin. papav. ac cum ∇ ros. lot. ℥vi. Ceruss. & ℥ii. alb. vener. ℥℥. f. ung.

Usus & Vires. Refrigerat mitigat, moderate, exsiccat, confert mitigandis doloribus arthriticis calidis, fervori erysipelatum, præcipue defluxionibus salis acris in oculos delabentibus inungendo circum circa palpebras & oculos, item prodest ad maculas faciei, Ad fissuras & rimas in manibus & facie hyeme provenire solitas.

Unguentum Pectorale.

℞. pingued. gallin. butyr. rec. ol. amygd. d. viol. li. alb. ana ℥iv. Croci Or. ℥℥. Cera alb. q. s. m. f. Vng.

Unguentum Anti-Pleuriticum Romæ usitatissimum.

Rec. butyri vetustiss. ung. alb. pulv. tormentarii ana ℥ii. semin. cymmin. pulveris. eruca ana ℥℥. succi urtic. vulg. ℥i℥.

Pulverisanda opt. pulveris. in succo Urtic. coq. Ung. alt. & butyr. ad succi consumptionem. Deinde paulatim adde pulveres. Ultimo loco tandem pulv. tormentar. f. Δ l. Unguentum.

Modus utendi. Locus affectus cum paxillo aq. vitæ Mangeti Bibl. Pharm. Tom. II.

tepede leviter manu fricetur, deinde unguentum in quantitate nucis avellanæ crassioris calidum applicetur manu bene confricando. Ac deinde foveatur duobus vel tribus foliis brassicæ, quæ in patella frixaria cum aliquantulo butyro itidem veteri calefacta sint & postea superligetur pannus lineus aut laneus, qui sit vetus cum fasciâ, aut medicamentum eo. firmitus conservari possit supra partem si opus sit, post singulas 6. horas tenovetur Unguentum.

Unguentum Anodynum DD. R.

Rec. alabastris pulveris ℥℥. camphor. ℥ij. ol. Nymphis ℥℥. Vng. populeon. rosat. Mes. ana ℥j. cum cera Modico f. Vng.

Usus est; in capitis doloribus inungatur temporibus, & nuchæ.

Unguentum contra Calculum.

Rec. ol. lil. alb. scorpionum. violarum: chamamel. Vng. diali. ana ℥j. Mucilagin. radic. alth. Sem. fœn. grac. psyl. ana ℥℥. cera f. q. s. f. Unguentum.

Unguentum ad infantum alvum laxandum.

Rec. Aloes epatic. ℥ij. fell. tauri ℥j. Scammon. ℥j. butyri q. s. f. unguentum, quo restæ nucis juglandis inpleatur & umbilico apponatur.

Unguentum ad Partum facilitandum.

℞. Mucilagin. Sem Lini. fœn. grac. rad. alth. ana pingued. anseris ol. coct. chamamel. n. lil. alb. ana ℥j. Croci ℥j. Cera q. s. f. Unguentum.

Unguentum ad hæmorrhoides prominentes.

℞. Succo verbasco ℥℥. vitell. ovi j. conguassata omnia optime ad usum reserventur.

N. Pannus laneus parvi affectæ imponatur prædicto Unguento inunctæ.

Aliud in eodem Affectu.

℞. Butiri cancorum, seu hircini ana ℥℥. adde modicum cerussæ & f. unguentum.

Aliud.

℞. fl. linaria mij. adipis porcina rec. q. s. coque & exprime, expressam vitell. ovar. misce & applica cum lana vel gossypio.

Unguentum Singulare contra urinæ profluvium mulierum, seu stillicidum, quo mulieres post partum difficilem ob labefactatam vesicam non raro affici solent, urinamque perpetuo fluentem spongia pudendis admodum excipere coguntur.

℞. Lapid. calaminar. opt. in \times & ∇ ros. bis vel ter loti & subtiliss. pulveris. ℥iv. lithargyr. argent. ℥ij. Ceruss. opt. ℥ij. ol. coct. ros. chama. nel. n. ana ℥iv. agitentur simul per hor. 2. & cum axungia hyrci ℥ij. f. Unguentum, agitando ad 4. hora partem, donec consistentiam acquirat debitam.

Usus. Hoc pars affecta leniter est inungenda & linteo cooperienda. Miræ est efficaciz & multiplici experientia probatum.

Unguentum ad Contusiones.

℞. Off. Sepia Cerussa ana p. æq. Saponis nigri q. s. ad conficiendum unguentum.

Vires; hoc una nocte omnem removet nigredinem in facie ex contusione & percussione.

Unguentum in Contusionibus & Doloribus.

℞. ol. olivar. bene matur. ℥℥. medull. cruris butulin. resin. pini cera flav. ana ℥ij. butyr. recent. insulf. ℥ii. Liquefiant omnia Δ l. cumque medulla liquefacta fuerit remove.

Bbbbb 2

Unguent.

Vnguentum pro caruncula penis.

℞. O Roch. ℥b. lithargyr aur. ℥ij. pulveris. pone in vas vitreum & affunde tantundem X ut duos supernatet digito, deinde ad ☉ expone, donec exsiccata sint, tunc iterum in pulverem redige. Huic adde ℞ nitri crudi ℥ij. rutie ppt. ℥ib. auripigment. ℥ij. f. pulvis subtiliss. qui cum ol. ros. complet. ℥ij. in unguentum redigatur, in sine coctionis adde camphor. ℥ib. cerat. diapalm. ℥b. hoc tepidum adhuc extendere super candelas.

Aliud ad carunculam Penis erodens.

℞. Ol. rosar. compl. cerus. ana ℥ij. rut. ppt. ℥b. camphor. ℥ij. aloës epatic. olivani. myrrh. ana ℥ij. sieff. alb. f. op. ℥b. M. f. unguentum s. a. in mortario plumbeo, & hoc candela inungantur.

Aliud carunculas consolidans.

℞. pingued. capreol. ℥ij. ceruss. ana ℥ij. camphor. ℥j. m. f. unguentum.

Vnguentum ad Carbunculos D. R.

℞. Calcis extinct. saponis venet. fermenti acris. Aris vivi. ana ℥b. Oxi. iuxta ppt. ana ℥ij. Theriac. A. ℥ij. Opii Theb. ℥j. ol. lil. alb. f. q. f. unguentum.

Vnguentum gryseum ad ulcera manantia tibiæ.

℞. Cerusse lithargyrii ana ℥ij. lapid. calam. Hyurini ussi an. ℥ij. rutie ppt. ℥b. calcis lot. terr. sigill. ana ℥j. Oxi. ℥ij. ol. Myrrill. cum album. ovor. an. q. f. f. unguentum in mortario plumbeo.

Vnguentum Vulnèrarium.

℞. Salvia part. q. millefolii part. iij. colligantur in fine Mensis Maii, minutim insis. coq. per 2. h. in vase cum butyri majalis depurat. ℥viij. filtratur & colatura iterum Δ imponatur, admixtis sevi hircini ℥j. & cervini eadem quantitate. cera ℥b. refin. Pini quartar. terebinth. ℥b. coque omnia invicem donec dissoluta sint, ab Δ remotis adde tantum aruginis minutim confusa, ut viridi colore tingantur, immiscenda etiam olei spica ℥ij. M. f. unguentum.

Usus. Utimur hoc in vulneribus recentibus & inveteratis, in nervorum resolutione & aliis affectibus.

Aliud ad vulnera & ulcera.

℞. Mastichis ℥j. terebinth. venet. ℥ij. cera flav. ℥iv. liquefiant in olla fictili, primò cera cum terebinth. posita remove & adde ol. mastich. q. s. pro unguento.

Vnguentum Patavinum in ulceribus malignis.

℞. Ol. rosar. compl. ℥b. succi plantag. Lapat. acut. folani. centaur. minor. ana ℥vj. cera alb. q. s. coq. ad succorum consumptum, deinde insperge pulv. seq. lithargyrii ℥vj. plumbi ussi. & lot. ℥xj. boli Armeni. camphor. ana ℥ib. lapid. calaminar. vel rutie ℥vj. ung. popul. refriger. gal. ana ℥ij. M. f. unguentum.

Usus. Hoc filamenta imbuantur & imponantur ulceribus superimposito cerato de cerussâ.

Vnguentum ad tineas.

℞. ☉ ol. O roch. uss. chalcit. uss. ana ℥ij. aristoloch. rot. ver. virid. aris ana ℥ij. picis navalis ℥j. pingued. an. ℥b. butyri antiquiss. ℥vj. M. f. unguentum.

Usus. Abluatur caput lixivio facto ex herba & radic. cichor. loti tum siccetur & inunctio fiat dicto Unguento post tres dies lotio & inunctio repetatur, quod cum ter feceris, tineas evasisse videbis.

Vnguentum contra Veneficiâ.

℞. adipis canis bene liquata & Ursi ℥viij. caponis ℥xxiv.

Visci corylini tres truncos adhuc virentes, frustatim sectos & tusos, dum humescant, contunde autem simul lignum, folia & baccas. Misce in phiola quam Soli ix. septimanas cum exposueris, virentem balsamum extrahes.

Usus. Hoc veneficatorum corpora, loca, maxime dolentia & juncturas inunge & certo curabis experimento.

Vnguentum pro Pueris fasciatis.

℞. Ol. rosar. nardin. mastich. ana ℥ij. succi menth. absinth. cidonior. pomor. redo ent. ana ℥ij. corallar. scobis eboris, xyloaloes ana ℥b. cum pauca quantitate cera f. unguentum.

Usus. Hoc bis aut ter indies stomacho applicetur. Solent etiam Hispanicæ mulieres suffumigare fasciatis pueros gummi ammoniaco Sape etiam observavit Rod à Castro proficere suffitus ferrei calcei candentis equi nigri & ter extincti.

Vnguenta varia ex Johanne MICHAELIS.

Vnguentum contra Dolorem Capitis.

℞. Ol. anethi, chamomilla, nuc. Persic. per expr. ana ℥j. hyosc. expr. ℥b. succi inspissati verbena ℥j. c. f. q. cera. F. l. a. Unguentum.

Vnguentum ad Dolorem Capitis in causâ calidâ.

℞. Unguent. alabastr. ℥b. ☉. ros. parum. D.

Ad Vigiliâs.

℞. Ungu. somniferi ussi. ℥ij. ☉. stillat. anethi g. vi. S. Eßerlich. Schläffalblein.

℞. Ol. papav. expr. ℥j. nuc. Persic. expr. ℥b. extr. opii gr. iv. croci gr. v. ☉. nuc. mosch. q. s.

F. Linimentum.

Contra Pediculos Capitis.

℞. Semstaphysagr. ℥ij. helleb. albi ℥ib. nicot. ℥j. c. f. q. ☉. nic. & cera parum.

F. l. a. Linimentum.

adde ☉. spica g. viij. M.

Vnguentum Paralyticum.

℞. Ol. nervini ℥j. Pingued. castor. ℥vj. ol. de piperibus ℥j. stillat. roris mar. salvia ana g. vj. junip. lauri ana ℥b. succini ℥j. c. f. q. cera.

F. l. a. Linimentum, quod principium Nervorum illinatur.

In spasmo potest addi ☉. stillat. limacum nigrorum, quod singulare specificum in hoc affectu censetur.

Vnguentum Pectorale.

℞. Unguent. pector. ℥j. pingued. hum. ℥vj. ☉. amygd. dulc. ℥ij. M.

Vnguentum Dorsuale in Hecticâ.

℞. Unguenti resumptivi ℥ib. refriger. Galeni ros. M. f. ues an. ℥ij. ol. juniperi express. ℥j. ping. hum. ℥b. M.

Vnguentum Pleuriticum.

℞. Succu papav. errat. inspiss. card. bened. ana ℥j. pingued. muris montani ℥ij. cum f. q. cera & ☉. anod. M. yns.

F. Linimentum.

In nimio Dolore Pleuritico.

℞. Ol. anod. Myns. ʒiij. papav. express. ʒj. hyosc. express. ʒij. cum paucâ quantitate cera.

F. Linimentum.

Unguentum pro corroborando Ventriculo.

℞. Ol. stomach. Craton. ʒij. mastich. menth. an. ʒj. still. menth. g. vj. caryoph. g. iv. cum paucâ quantitate cera & ol. nuc. mosch. expr.

F. l. a. Unguentum.

Unguentum expetum in Ardore Ventriculi.

℞. Sevi hircini ʒß. ung. pomatum ʒij.

F. Linimentum.

Unguentum hepaticum.

℞. Cerot. santal. usitat. ʒß. c. f. q. ol. ros. & cera.

F. Linimentum immiscendo spec. diar. santal ʒj. M.

Potest etiam aliquid de extracto vel succo inspissato radicis cichor. addi.

Unguentum in duritie Lienis.

℞. Ungu. de cicut. ʒß. c. f. q. ol. lil. alb. & cera

F. Linimentum.

adde ol. stillat. gum. x g. vj. sacchari ʒ g. viij. M.

℞. Ungu. splenet. usitat. ʒij. extract. vel succi inspiss. rad. filicis ʒj. cum paucâ quantitate cera

F. l. a. Linimentum.

Linimentum Carminativum.

℞. Ol. cham. anethi ruta ana ʒij. stillat. cham. anethi ana ʒß. cumini. carvi. fœnic. an. g. vj. c. f. q. cera

F. l. a. Linimentum.

In Dysenteria & fluxibus alvi.

℞. Ungu. comitissa ʒß. rer & optime duscif. ʒij. eroci & adstring. ʒj. c. f. q. cera & ol. mastich.

F. Linimentum.

Unguentum Nephriticum.

℞. Ol. lil. alb. amygd. dulc. cham. anethi ana ʒj. nucl. ceras. per express. scorp. simpl. an. ʒij. c. f. q. cera

F. l. a. Linimentum.

℞. Unguent. dialth ʒß. & scorpion. simpl. nucl. ceras. ana ʒj.

M. F. Linimentum.

In calore Renum.

℞. Unguent. ros. refriger. Galeni an. ʒij. sacch. ʒ & ʒo nymph. parum c. f. q. cera

F. Linimentum.

Contra Herniam.

℞. Unguent. contra herniam ʒij. [Mins. ʒß. croci & astring. ʒß. c. f. q. cera

F. Linimentum.

Contra Vermes.

℞. Unguent. contra vermes usit. ʒj. ol. stillat. absinth. ʒj. ruta. tanacet. ana g. vj. fellis. tauri. inspiss. ʒij. ʒo diacol. loc. q. s. M.

℞. Olei diacoloc. Quercet. ʒß. amygd. amar. per expr. nucl. persicor. per expr ana ʒj. aloës. myrrhæ ana ʒj. fellis tauri inspiss. ʒß. ʒo stillat. coryli ʒß. cera q. s. M.

Maquet. Bibl. Pharm. Tom. II.

Unguentum Externum purgans.

℞. Elaterii ʒij. troch. alband. ʒij. scammon. ʒiß. c. f. q. cera & ʒo diacoloc.

F. l. a. Unguentum. M.

℞. Elect. hier. picra ung. dialth. an. ʒj. N. j. M. applic. plantis pedum vel umbilico.

Unguentum ad Partum.

℞. Mucilag. sem. lini. fœnugr. alt. cum aq. lil. extract. ana ʒß. axung. anserin. ʒvj. ol. lil. alb. ʒß. amygd. dulc. & cera q. s.

M. F. Linimentum.

Illinitur venter post balneum, vel etiam absque balneo.

Aliud.

℞. Olei cheirini, lil. alb. ana ʒij. auxung. ser. pent. ʒj.

F. l. a. Unguentum cum paucâ cera.

Unguentum contra cardialgiam, præsertim flatuosam.

℞. Ungu. rubr. potab. ʒß. ʒo chamom. ʒß. M.

℞. Ungu. cardiac. Francos. ʒvj. olei stillat. chamom. ʒß. angelic. g. iv. M.

Unguentum in Dolore hæmorrhoidum.

℞. Mucilag. sem. psylli cydon. cum aq. verbasci extract. ana ʒij. conunde in mortario plumbeo cum pistilla plumbeo & c. f. q. ʒo linar. scarab. atque cera.

F. Linimentum.

Contra Scabiem.

℞. Ungu. rosati ʒj. arcani corallini ʒj. M.

℞. Succu. beleni, lapathi acuti ana ʒj. & vivi ʒij. lap. medicamentos. ʒj. c. f. q. ʒo nic. & cera.

F. Linimentum.

℞. Ung. enulati ʒj. flor. ʒi. ʒi. lap. medicamentosi ʒj. c. f. q. ʒo nicot.

F. Linimentum.

Contra Atrophiam seu Ariduram membrorum.

℞. Unguent. Agrippæ. alth. ʒv. pingued. taxi. vulpis. muris. montani, ursi, canis ana ʒß. spec. diarrion pipereon ʒij. sem. urtica ʒj. O plumos. ʒß. euphorbii ʒiß. c. f. q. ʒo nervin. atque cera.

F. l. a. Linimentum.

℞. Unguent. arragon. alth. ana ʒj. ol. still. rorismar. lavend. an. ʒj. euphorb per infus. ʒij. D.

Unguentum ad livorem partium imprimis faciei.

℞. Mucilag. rad. symph. cum ʒ rad. sigill. Salom. extr. ʒß. pulv. rad. sig. Salom. ʒij. cera.

Unguentum ad Gingivas in scorbuto.

℞. Pulverat. flor. aquileg. fol. salu. ana ʒij. rad. irid. florent. ʒiß. myrrh. electa ʒij. O crud. ʒiß. c. f. q. mellis rosati

F. Linimentum.

Unguentum ad facilitatem Dentium.

℞. Mucilag. sem. alth. cum ʒ ros. extr. ʒij. eduleor. rot. manus Christi ʒ.

Si adest insignis calor, aliquid de mucilagine seminis psylli addi potest: Est in frequenti usu D. Mich.

Bbbbb 3 Unguen-

Vnguentum in & Mammillarum.

℥. *Succ. herb. virg. aur. solan. plantag. card. bened. 3℔. & calcinat. 3℔. ranarum, calparum calcinat. ana 3℔. Contunde in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad consistentiam linimenti. S. Brustsalbe.*

Vnguentum Ophthalmicum.

℥. *Bulyr. rec. cum ∇ euphras. lot. 3℔. Tutia 3℔. camphora 3℔. Sacch. candi 3℔. m. pro linimento.*

Vnguentum Cosmeticum.

℥. *Ol. amygd. dulc. non rancid. 3℔. jasmini 3℔. Instilla guttatim 3℔. Tartarum p. d. q. s. M. exacte in formam linimenti, adde cosmet. Cluvii vel ceruss. 3℔. vel Div. M.*

Vnguentum ad Ambusta præstantissimum.

℥. *Ol. recentiss. vel quod melius sambuc. p. j. album ovor. p. ij.*

Conquassa diligenter, donec F. Linimentum. Illinitur pars sæpè pluma gallinæ nigræ, nullis adhibitis linteolis aut ligatura vid. *Mynsicht.* qui ita de hoc linimento scribit: In tota Republica Medica secretius experimentum nullum: Perfectè, tunc, cito exstinguit, dolorem sedat, nullo cicatricis vestigio relicto.

℥. ∇ ∇ 3℔. *lini vel flor. sambuci vel cort. samb. vel filicis M. Pro Linimento.*

Præparatur etiam linimentum ad inflammationes ex album, ovi & O crudo. Alumen crudum in albumen ovi injicitur, agiturque tamdiu, donec alumen solutum sit.

Egregium etiam unguentum est unguentum viride Reginæ; ut & unguentum potabile in & externè. Dantur ad 3℔.

Vnguentum ad Alopecias.

℥. *Olei ovorum 3℔. laudani 3℔. pingued. urfi 3℔. chariæ castæ, nuc. avellana una 3℔. pulv. myrrha 3℔. F. Unguentum.*

Cum quo caput inungatur, deinde abluatur cum lixivio, in quo abrotanum & capill. Veneris decocta fuerint.

Linimentum ad Ambusta.

℥. *Album. ovor. N. ij. Ol. rosarum 3℔. Aqua rosarum 3℔.*

Conquassentur simul omnia & cum linteolis in eo madefactis imposita loco ambusto, relinquendo, donec convalescat, superponendo panniculum eadem mixtura inrorandam. Vel

℥. *Mucag. sem. cydon. ex ∇ ros. 3℔. Vitelli ovorum N. iv. 3℔. lini 3℔. croci 3℔. M. Adde sub finem curationis cerussa 3℔.*

Ung. anod. 3℔. *Opis gr. v. ol. chamom. 3℔. S. Euserliche Oel.*

Vnguentum resumptivum 3℔. Ol. violar. 3℔. S. Zucker-salb.

℥. *Ol. nucist. 3℔. mastich. menth. absinth. cydon. ana 3℔. M. S. Euserliche Salb.*

℥. *ol. cappar. 3℔. Vnguent. dialib. 3℔. ol. de palm. 3℔. S. Miltzsalbe.*

℥. *Vnguent. popul. rosar. ana 3℔. alabastr. 3℔. ol. nucist. 3℔. S. Salblein auf die Schloff in schmieren.*

℥. *Olei amygd. dulc. Unguent. anod. ana 3℔. M. C. in Pleuritide.*

In Dolore Dentium.

℥. *O q. s. Fluat in crucibulo, hujus.*

℥. *3℔. Nuc. musch. N. j. Mellis ros. 3℔. M. F. Linimentum gingivis applicandum.*

Vnguentia varia ex Collectione Theoph. BIERLINGII.

Vnguentum singulare Fuscari in contusionibus magnis & doloribus è Turcia ab ipso allatum.

℥. *3℔. oliv. benè matur. 3℔. Medull. crur. bubuli Resin. pin. cera flava an. 3℔. butyr. recent. insuls. 3℔. liquefiant omnia lento igne cumque liquefacta fuerit medulla, removeo. Miraculosum est experientia. D. Pius votii, Ex MSS. D. Burseri.*

Vnguentum ad contusiones.

℥. *Sepia, ceruss. an. p. eq. Sapon. nigr. q. s. ad confectum unguentum, hoc una nocte omnem remouet nigredinem in facie ex contusione & percussione Ex MSS. D. Burseri.*

Vnguentum lenitivum, emolliens, digerens, summum in omnibus ulceribus.

℥. *Fol. salu. rubr. ruta an. 3℔. absinth. commun. tenerim. laur. an. 3℔.*

quidam addunt chamomill. 3℔. ophagogloss. 3℔. colligantur circa meridiem, mundentur, non laventur. Incidantur virentes herbæ minutim, & in mortario conterantur, una cum adipis arietini 3℔. facta diligenti mixtione, imponantur ollæ crustate cum 3℔. olivar. antiquiss. 3℔. iterum subigantur in putrefactione per octiduum (olla sub terra defossa), postea in æneo lebeate admoveantur lento igne, & post 10. horas ab igne removeantur, cum nimirum placuerit color, qui exploratur gutta una vel altera super patellam stannicam effusa, factis prius cæbris agitationibus baculo ligneo, tandem facta forti expressio. ne colentur per spissam telam, & conserventur in vase vitreo. Instillatur calidè vulncri, & linteum eodem 3℔. madefactum superponitur.

Vnguentum quo usus est D. Krause in contusione dorfi & læsione nervi felicissimè.

℥. *3℔. chamomill. rut. an. 3℔. vidi optim. 3℔. Flor. lavend. p. j. stachadi. Arab. 3℔. Coq. ad vini consumpt. ad de 3℔. juniper. lumbric. terrestr. an. 3℔. castor. 3℔. Cera, q. s. F. Vnguent. Molle.*

Vnguentum certissimum ad generandos capillos & barbam D. Bueretii.

℥. *Fol. abrot. masc. capill. vener. ad. Mj. Favi mell. 3℔. lapar. 3℔. myrrid. 3℔. scilicet lin. feni græc. an. 3℔. 3℔. amygdal. dulc. amat. vini albi generos. an. 3℔. Facta infusione per 24. hor. bulliant lento igne ad humiditatis consumptionem, & F. expressio, cum colatura crescente luna debet fieri inunctio. Ex literis D. Affelmanni.*

Vnguentum ad Venerem.

℥. *Rad. piper. Piper. zingiber, cinnamom. Sem. sinap. an. 3℔. euphorb. 3℔. 3℔. laur. 3℔. spic. 3℔. cera parum. F. l. Vnguent. quo illinatur regio intra anum & testes.*

Vnguentum ad Partum facilitandum D. Seinerhausz.

℥. *Cancror. vivor. n. ij. Contunde in mortario & succus exprimat per pannum fortiter postea 3℔. lumbr. terr. laß sich dieselben ein rein 3℔. wohl reinigen, schneid ihne die Zippel abe, und zerlosse sie wohl, exprimire sie durch ein reines Tuch, dieser 2. Saffie müssen einer so viel als des andern seyn, postea.*

℥. *axung. vulp. lepor. an. laß in einem reinem Pfanlein auf linden Kohlfewer zergehen, schneid die 2. Saffie darein, und rühre es wohl untereinander, und*

und koeche es zu einer geschmeidigen Salben, asserverug in vitr. pro usu. Liegt ein Veib in Kindesnoethen, und kan der Frucht schoverlich genen.

℥. einen Schlangenbalck, nicht der abgestreiffi, sondern den die Schlango selbstn abgelegt, und fallen lassen, streich die gemelde Salbe darauff, neize den Balck sambt der Salben in aqua artemis. und also Pflaster weise auf das Dicke der Frauen an der Seien, vvo das Kind am meisten liege, bestreiche ihr auch dieselbe Seite mit dieser Salben, so kempt das Kind mit frælichen Amblick hervor, so es heraus, nimb das Pflaster hinweg, vñsche auch die Salbe ab, sonst ziegt es die Mutter herfür.

Vnguentum ad exulcerationem canceri aliaque ulcera depascentia.

℥. Balsam. p. 3ß. 3. hyperic. Myrh. Terebinth. card. sancti. subtilis. pulv. & cribrat. a 3j. 3. vitell. ovor. 3ij. cum ceranova q. s. F. Vnguent. P R A V O T. ex communic. D. Hanemann.

Vnguentum ad somnum.

℥. Vnguent. alabast. 3j. 3. nuc. moschat. express. 3j. opii gr. iij. Croc. gr. j. M. F. Vnguent.

Vnguentum contra Pestem.

℥. 3. scorpion. Matthiol. citri. an. 3j. benz. gr. ix. Balsam. rosar. gr. xvij. Peruvian. 3ß. Flor. Benz. gr. viij. pingued. viperin. 3j. Mosch. gr. ij. M. F. Vig. pro corde & pulf.

Vnguentum contra Calculum.

℥. 3. lilior. albor. scorpion. chamomill. Vng. diali. ana 3j. mucilag. rad. alih. fœni grac. scyllit. an. 3ß. Cera q. s. F. l. a. Ungu. ex MSS. A. G.

Vnguentum Polychrestum contra quosvis dolores arthriticos D. Arnisei.

℥. Axung. porc. recent. 7. samb. lot. & repug. q. s. taxi 3j. medull. human. 3ß. succ. surcul. recent. sambuc. ebul. fol. plantag. chamadr. an. 3vi. pingued. vel nuc. limac. 3vi. unguent. diapalm. 3j. post addatur succ. chamadr. V. l. a. Vnguent.

Vnguentum contra rubedinem oculorum.

℥. Vnguent. nihil. alb. q. v. mica simila q. s. Contunde in mortario cum 7. rosar. & paucis croco orient. M. F. Vnguent. quo inunge palpebras oculorum, consumet rubedinem.

Vnguentum lapathi acuti in scabiæ.

℥. Lapat. acut. 3viij. 7r. 3ij. 3. rad. curcum. 3viij. vitell. ovor. n. viij. acct. destill. q. s. F. l. a. Vnguent.

Vnguentum singulare contra stillicidium urinæ post partum difficilem.

℥. Lap. calamin. optim in Acet. destill. extinct. & in 7. ros. bis vel ter lot. & pulver. subtil. 3iiij. Lythargyr. 3ij. ceruss. ppt. 3j. 3. rosar. chamomil. an. 3v. agitentur simul per horas duas & cum axungia hirci 3iiij. F. l. a. Vnguentum, agitando ad quartam horæ partem, donec consistentiam debitam acquirat. Hoc unguento pars affecta leviter est inungenda, ac linteo cooperiendâ, mira est efficacia & multiplici experientia probatum.

M. Vilhelms von Vittenberg Stichpflaster

℥. 3. olivar. 3iiij. litharg. 3iß. Acet. vin. 3ß. pic. naval. Colophon. Terebinth. an. 3j. 3. rosar. 3vj. pulv. mastich. olivad. sarcocoll. alumin. ust. camphor. an. 3j. sanguin. Dracon. cortic. granat. lumbric. sangu.

human. an. 3v. Lap. magnet. 3j. 3. ovor. juniper. an. 3ß. galban. verb. alb. 3ß. M. F. Vnguentum.

Vnguentum defensivum Reinesii.

℥. Bol. Armen. 3ij. cort. granat. Sanguin. dracon. an. 3ß. Capbur. 3iiij. farin. leni. 3j. cum 3. & 4. rosar. F. Vnguent.

Vnguentum suppurativum Ejusdem.

℥. Butyr. recent. 3. hyperic. an. 3iiij. Bals. 4r. Ruland. mastich. sarcocoll. an. 3j. thur. myrrh. an. 3ß. vitell. ovor. n. ij. Terebinth. 3ß. Vnguent. apostol. 3j. m. f. Vnguent.

Vnguentum maturativum. Ejusdem.

℥. Terebinth. Cyprin. 3v. pollin. Thur. mastich. an. 3ß. 3. hyperic. 3ij. vitell. ovor. n. ij. croc. 3j. M. F. Vnguent.

Vnguentum ad Urtionem.

℥. Rad. althæa 3j. fiat cum 7. simpl. mucilag. cui adde Butyr. 3viij. ad mucilaginis consumptionem, injiciendo sub finem vitell. ovor. n. ij. Minii 3j. M. F. Vnguent.

Vnguentum contra Paronichiam.

℥. Rasur. ebor. 3ß. 3. rosar. 3j. unguent. populion. 3ij. cera 3ß. M. F. unguent. imponatur, unguibus.

Vnguentum in Memoria diminuta Laurenbergii.

℥. Nicotian. m. ij. basilic. meliss. prim. ver. majoran. an. m. j. contunde in mortario & fiat cum 3. olivarum & insulso butyro massa quadam, qui adae vini Rhenani 3iiij. malvat. 3iiij. 7. borrag. bugloss. major. paon. an. 3ß. M. ad crassitiem unguenti.

Vnguentum viride Casareum contra casum, vulnera, contusiones, sugillationes, luxationes & dolores.

℥. Flor. laur. recent. flor. spic. lavendul. rosmar. solara, rosar. rubr. albar. basilic. rubr. major. Ebuli, Agrimon. Chamomill. Flor. sambuc. rad. tormentil. Lilior. albor. absinth. rut. tenacet. plantag. acut. rad. & Fol. alibæ, hedera, abrotan. mar. praon. an. 3iiij. rad. enul. bosti amari, bugloss. hyssopi, urtica major. cum caulib. menth. crispa, Millefolii an. 3j. malv. pulegii, Carvi an. 3iij.

Conscinde omnia & contunde usque dum formam pullis acquirant, inde in ahænum, adde butyr. majal. 3vj. misceantur bene, bulliant horam unam absque intermissione, lento tamen calore inde postea in sacculum exprime fortiter, & committe iterum ahæneo. Postea

℥. medul. cervin. 3iiij. cera recent. Sebi hyrcin. pingued. gallina an. 3ß.

Fluant in tigillo, cola per pannum vel linteum, commisce cum prioribus, bulliant lento calore per semihoram, remove ab igne, ut parum refrigeret, adde 3. olivarum, lini. pulv. myrrh. mastich. an. 3iiij. Misceantur exactissime.

Vnguentum pomatum D. Resenbodts.

℥. Axung. porc. alb. 3ij. pomor. acidor. dulc. an. n. ij. cort. citr. 3vi. santal. citrin. rad. ireos Florent. an. 3iiij. benz. pur. 3iß. nuc. moschat. macis, Cinamom. elect. Caryophyl. Syrac. calami. an. 3i. Aq. ros. opt. q. s. Decoquantur simul lento 7. F. f. a. Vnguent. Adde sub finem moschi orient. gr. ij.

Vnguentum Cordiale D. Reinesii.

℥. Cerat. santal. 3ij. Mithridat. 3viij. capbur. 3j. Aceti rosar. 3ß. 3. hyperic. 3iiij. M. F. Vnguent.

Vnguentum anodinum Eiusdem.

℥. Vnguent. alabastr. ℥℥. Caphur. ℥ij. ʒ. nymph. ℥℥. Vnguent. popul. rosat. Mcl. an. ℥j. Cera modicum F. l. Vnguent.

Vnguentum ad delenda Variolarum vestigia D. Solæ.

Primo facies lavetur decocto cicer. phaseol. furfur. tritic. fol. Scabios. malv. & lapath. subinde quoque madefiat lact. tepido.

Deinde ℥. Terebinth. cum pauxillo bals. nigr. orient. & occid. extende super pellem caprinam, & faciei applica, ut adhæreat, ita ut auferendo pellem, cutis aliquantulum eleuetur, estque hoc continuandum per integrum mensem bis de die. Tandem hoc unguento illinatur.

℥. ʒ. myrrh. vitell. ovor. an. ℥j. pingu. human. suilla an. ℥ij. lytharg. Tartari, Borrac. Alumin. an. ℥℥. Cera parum M. F. Vnguentum.

Vnguentum mundificativum ex melle.

℥. Mellis rosat. simpl. Terebinth. an. ℥ij. sarcocol. ibur. an. ℥ij. myrrh. ℥℥. m. f. Vnguent.

Vnguentum Placentini Palatii all' Angelo.

℥. Liniment. simplic. cum ʒ. rosar. prepar. ℥j. lytharg. ceruss. minii an. ℥iis præcipitat. opt. ℥j. alumin. ℥j. m. f. Vnguent.

Vnguentum stomachale del Monsig. Duce di Sinvérse.

℥. ʒ. Ment. Mastich. nardin. an. ℥℥. spic. tantum ut superiorum odorem superet. lign. aloes, calam. arom. caryophyll. nuc. moschat. macis an. ℥℥. ambr. moschi an. ℥ij. corall. arbor. rubror. an. ℥j. Cera alb. Δ. rosar. lot. q. s. F. l. a. Vnguentum.

Ufus ad refrigerationem ventriculi vel ab æstare, vel potu aquæ vel immodica venere, vel destillatione, vel nimis studiis, vel potu glaciali, vel cibis frigidis, & flatu ejusdem, humectando prius cum Elixire vitæ, ad appetitum deperditum, ad indigestionem Sumitur quantitate fabæ dimidiæ. Liguatur in cochleari argenteo super cineribus calidis vel candela & inungitur mucronatæ cartilagini usque ad umbilicum ferè.

Vnguentum præstantissimum ad vulnera, ulcera, luxationes, fissuras manuum, aliaque vicia externa Zapponii.

℥. ʒ. Olivar. ℥ij. myrrh. oliban. an. ℥j. Aloës, mastich. colocynth. Sarcocoll. an. ℥℥. Colophon. utriusque, Terebinth. venet. an. ℥vj. cera ℥iij. ping. porc. an. ℥ij. Coq. s. a. addendo sub finem styrac. calamis. ℥℥. Spirit. vin. ʒ. petra an. ℥j. hyperic. spic. an. ℥j. Benzoin. pingued. human. an. ℥℥. Rad. alkane q. s. in nodulo ad colorandum. M. F. Vnguent.

Vnguentum stomachale à Patre Francisco de Salis communicatum.

℥. Comar. menth. fol. absinth. salu. Roman. ruta, major. charéfol. meliss. calaminth. inc. Lobelii, origan. Crelici an. Mj. Flor. chamam. aneth. lavendul. roris-mar. spic. nard. calendul. rosar. rubr. an. p. ij. Rad. angelic. odor. carlin. levisstic. hippomarathr. calam. arom. galang. acori, zedoar. imperator. an. ℥℥. Cori. citr. aurant. an. ℥vj. Sem. fœnic. cummin. Baec. laur. juniper. an. ℥ij. Macis ℥ij. Vini malvat. & moschat. generos. Miiij. l. v. ʒ. absinth. mastich. laurin. de menth. an. ℥iij.

Bulliant omnia lento Δ in duplici vase ad totalem vini consumptionem & colentur olea quibus addè. Gumm. samabac. Acetum destillatum diss. ℥ij. Bals. oriental.

Liquidambr. ʒ. nucist. an. ℥℥. Sal. absint. spec. diarrhod. Abbat. arom. rosat. caryophyll. an. ℥℥. Pulv. mastich. Benzoin. an. ℥ij. trochisc. de gallia mosch. ℥j. ʒ. anis. destill. ℥℥. caryophyll. gr. xv. ceba nova q. s. F. Vnguent. iusta consistentia.

Vnguentum contra tabem.

℥. Vnguent. dialib. ℥ij. arregon. axung. taxi, urfi an. ℥j. canis ℥℥. Ol. castor. vulpin. an. ℥vi. juniper. later. terebinth. an. ℥ij. palv. alum. ust. ℥℥. piper. nigr. Euphorb. an. ℥j. caryoph. ℥ij. castor. ℥℥. Croci ℥j. Aq. vit. alb. ℥ij. cer. ℥vij. m. f. l. a. Vnguent.

Vnguentum cordiale D. Meuveri.

℥. Theriac. veter. ℥j. succ. acetos. citr. limon. an. ℥℥. margar. coral. rubr. sem. acetos. an. ℥℥. Camphor. gr. iij. croci ℥℥. M. F. l. a. Vnguent.

Vnguentum Cordiale ad pulsus D. Landgravi.

℥. Santal. omnium ℥ij. ebulliant in * & ∇. ros. an. q. s. colentur & exprimantur. Colatura addè Vnguent. rosat. opt. non rancid. ℥ij. spec. cordial. temper. ℥℥. F. f. a. super lento ∇. Vnguentum, sub fin. addè succ. citr. purif. q. s. & ol. è cort. citr. destillat. ℥℥.

Vnguentum contra scabiem.

℥. Rad. lapath. acut. helen. lilior. albor. an. ℥ij. Summit. lupul. fumar. scabios. absinth. an. Mij. cicer. lentium, hordei an. Mj. Chamamel. m. vij. decoq. in f. q. ∇. pura coleitur. colatur. ℥. ℥vij. ol. rosar. mastich. laur. an. gut. xv. bulliant ad consump. post adde: thur. lytharg. mastich. storac. myrrh. an. ℥j. Terebinth. ℥vij. sarcocoll. Ceruss. an. ℥j. m. f. Vnguent.

Vnguentum contra serpiginem.

℥. Pulv. hellebor. nigr. ℥j. Lithargyr. sulphur. citrin. an. ℥℥. Tartar. ℥ij. alumin. ust. ℥j. Zingiber. iragacanth. Aristolech. rot. alumin. rocha an. ℥j. ʒ. amygdal. amar. mastich. nuc. jugland. an. ℥℥. sevi cervin. Buiyri ssale an. ℥ij. in fine ad ʒ. Tart. M. F. Vnguent.

Vnguentum somniferum.

℥. Vnguent. dialib. popul. an. ℥iij. alabastr. ℥vj. ʒ. rosar. violar. nymph. an. ℥v. hyoscyam. papav. alb. an. ℥ij. nuc. mosch. express. ℥j. nuc. mosch. express. ℥j. opii thebaic. * diss. ℥vj. croc. orient. ℥ij. cera nova ℥vj. M. F. Vnguent.

Vnguentum spleneticum.

℥. Ol. cappar. ℥j. aneth. ℥vj. absinth. ℥℥. amygd. dulc. amar. an. ℥ij. spec. diacym. ℥℥. Gumm. ammoniac. bdell. an. ℥ij. Trochisc. de cappar. ℥℥. cera parum. M. F. Vnguentum.

Vnguentum vesicatorium D. Dordri.

℥. Farin. lupin. ʒ. ℥ij. sinap. alb. ℥vj. succin. ℥ij. ℥ij. cantharid. ℥℥. Tragacanth. ℥j. gr. iij. ac. * scilicet q. s. incorporantur pro Vnguento.

Vnguentum umbilicale purgans Eiusdem; quod in colica quoque adhibetur.

℥. Pulp. colocynth. ℥ij. zedoar galang. Irid. an. ℥j. agaric. ℥ij. sal. gemm. ℥ij. ℥ij. Maacerentur per horas XII. in vin. absinth. ℥ij. Express. addè galban. in * scilicet solut. ℥ij. ℥ij. Inspissato lento Ignis ad crassitiem unguentis.

Vnguenta varia ex Hadri. no à MTNSICHT.

Vnguentum Paralyticum.

℥. Ol. Succini rect. Laterini ana ℥℥. Juniperini Templini terebinth. an. ℥j. laurini petra spica an. ℥℥. de Castoreo de piperib. an. Drach. ij.

Mixtis affunde sp. paralytic. nost. unc. iij. & coq. ad sp. consumptionem, postea adde:

Aluminis plumos. præp. ol. stil. Roris marini Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Origani Crei. Absinthii, Lavendula, Angelica, Salvia an. ʒj. misc. & cum f. q. cera cirin. f. l. a. Vnguentum.

Vires, Vfus, Dosis. Efficacissimè membra paralytica recreat, materiam peccantem inhaerentemque nervis, musculis atque tendinibus, digerendo absumit: Partes nervosas calefaciendo confortat, & pristinae motioni restituit, frigidaque Arthritidi confert. Insuper in Ischiatica affectione medicamentum est stupendum. Fit autem inunctio mane & vespere in loco calido, Medicamentis tamen universalibus præmissis.

Unguentum Ophthalmicum.

℞. Buryri majal. non salit. & aq. euphras. abluti ʒiv. Sang. Draconis veri & subtilissime pulverisat ʒb. succb. candi alb. iutia præp. ana ʒj. margaritar. præp. sarcocolla ana ʒb. camphora ʒb. opii spagyricè præp. gr. iv.

Misce & fiat Vnguentum secundum artem.

Vires & usus. Si huius Vnguenti tantillum, præmissis prius universalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem sedando, ruborem auferendo acrimoniam mitigando lachrymas sistendo & exsiccando, arcet, oculosque mire roborat.

Unguentum Pectorale.

℞. Ol. de Pistatiis exp. de pineis exp. Amygd. dulc. an. ʒis. Buryri non salit. majal. axung. Caponis Sevi Hircin. an. ʒj.

Mixtis affunde Aq. Pectoral. nost. ʒij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde:

Ess. croci orient. ʒij. Ol. stil. Chamomilla Rom sœniculi, macis, anethi, anisi an. ʒj.

Vires & Vfus. Valet propriè ad dolorem pectoris, super illud enim inunctum, pituitam in eo resolvit, & sanat omnia loca, calefacit humectat, mollificat: &c. Fiat autem inunctio manè & vespere coram lento ignis aut fornacis calore.

Unguentum pleuriticum.

℞. Ping. muris mort. ʒij. buryri mai. sine sale Nuc. jugland. amygdal. dulc. papav. expl. laurini suc. Flor. pap. errat. ʒvj.

Misce. & coq. ad succi consumptionem deinde, adde:

℞. Ol. stil. Camomilla anethi an. ʒis. de laterib. Cymini an. ʒj.

Denuò Misce & cum f. q. Cera alb. F. Vnguentum.

Vires & Vfus. Post principium in sedatione doloris pleuritici & resolutione apostematis Vnguentum est mirabilis effectus; Quod administratur loco dolenti, non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quod hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente & tibi honorem, ægroti autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus ante & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera.

Unguentum Anodynum.

℞. Anodyn. nost. septem Florum ʒj. amygd. dulc. hyoscyami exp. Papav. exp. lambricor. ter. hyperi an ʒj. Ping. Catii Sylvest. Anserina an. ʒvj. Suc. depurat. Ni-

coliana, chamedryos, verbenæ an. ʒij.

Misce. & coq. ad succorum consumptionem, postea cum cera alb. f. q. fiat la. Vnguentum.

Vires & Vfus. Dolores in quacunque corporis parte mitigat, unde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigida Unguenti ʒj. adde. Ol. Petreæ, juniperi, de lateribus ana Sr. j. & misce pro usu.

Unguentum Splenicum.

℞. Ol. de Capparib. ʒij. sem. Eruca exp. Nigella exp. Canabis exp. Amygdal. an. ʒj. Juniperi ʒb.

Mixtis affunde suc. Scolopend. exp. ʒij. Et coq. ad succi consumptionem; postea adde:

℞. Ol. stil. mastichis cymini myrrha an. ʒj. Gum. ammoniaci Chamomilla absinthii an. ʒb. Ext. Croci or. Scr. ij.

Denuò misce & cum cera alb. f. q. fiat Vnguentum.

Vires, & Vfus. Lieni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à scirrho præcavet, præterea dolores & inflationes sedat & discutit.

Vnguentum Spasmodicum.

℞. Ol. Limacum per descens. destill. lumbricor. ter. s& samini an. ʒb. Ping. arctis castrat. erinacei, vulpis an. ʒj. Buryri majal. f. sale Medul. Cervina an. ʒb. Sp. Juniperi ʒij.

Misce. & coq. ad Sp. consumptionem; Postea adde: Ol. Stil. succini alb. ʒij. Chamomilla, laurini an. ʒb, Roris marini, salvia an. ʒj.

Misce. & cum f. q. Cera alb. f. Vnguentum.

Vires & Vfus. In convulsione, post debitam evacuationem; est præcipuum; membris enim Spasmo correptis applicatum nervorumque origini inunctum mollificat, resolvit, nervosque refocillat. Locus autem spasmodicus manè & vespere calidè inungatur & citò videbis alleviationem.

Vnguentum Renale.

℞. Ol. Anodyn. nost. vel 7. flor. ʒij. Sem. papav. alb. exp. ʒj. Vng. Rosæ reg. Populeon. ʒj. medul. Cervin. santalirub. Nitri præp. an. ʒij. suc. flor. malva arbor. rub. ʒj.

Misce. & coq. ad succi consumptionem; Postea cum cera citrina f. Vnguentum.

Vires & Vfus. In refrigerando & humectando præcipuum habet dignitatem: Propterea ubicunque refrigeratione ac humectatione opus, ejus usus esse poterit. Imprimis autem dorso, lumbis, &c. illitum, Renum inflammationi calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacunque corporis parte à causa calida proveniente mitigat atque placat.

Vnguentum Nephriticum.

℞. Ol. Scorpionum simpl. ʒvi. Flor. Verbasci chamomill. populini, anethini an. ʒj. amygd. amar. ping. gallinarum, Anserina, Anatis an. ʒvi. Buryri rub. è Cancris conf. Vng. Dialthea an. ʒij. Bals. Terebinthina ʒij. suc. parietaria exp. ʒb.

Misce. & coq. ad succi consumptionem. Postea cum cera fiat l. a. Vnguentum.

Vires & Vfus. Renes, lumbi, deorsum usque ad pubem hoc unguento quotidie aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, ut calculos & arena cò facilius dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando lapidem & tartaream molem comminucando, descendere possit.

Unguentum

Vnguentum ad Ambusta.

℞. *Album Ovorum* p.ij. *Ol. Olivæ* p. j.
Conquassando diligenter & exacte misceatur, ut fiat
Vnguentum album.

Vires & Usus. Hoc præfens præstantissimum linimentum nullius ferè authoritatis & pretii esse videtur, sed dico vobis, quod in tota Repub. Medica secretius & præsentius experimentum ad omnia ambusta nondum inventum & excogitatum sit: Quia adeo perfectè, citò, & tutò caloris vim extinguendo dolorem leniendo & sistendo, omnia adustionis ulcera, etiam à quavis materia facta, nullo citatricis veltigio remanente, sanat, ut merito inter arcana domestica referatur ac posteritati communicetur. Talis autem utendi & applicandi modus requiritur: patiens multoties in die cum pluma gallinæ nigæ (nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crusta sponte decidat, continuando inungat.

Vnguentum de Calce viva.

Calcis vive ℥iij. *auripigmenti* ℥i℥. *rad. ireos flor.* ℥j. *Sulphuris citrin.* niiri an. ℥℥. *Lixiv. ssp. fabarum* fort. ℥ij.

Misc. & coq. in olla nova vitreata ad justam consistentiam, quod cognosces, si penna oblitata facile plumas dimittat: tunc adde: *Ol. Spicæ* ℥℥. vel alia odorifera & fiat unguentum seu pulmentum.

Vires & Usus. Ex hujus Vnguenti illinitione crines seu pili in quacumque etiam corporis sunt parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus ungatur *Ol. seu Vng. Rosato.*

Vnguentum de Rapis.

℞. *Axung. Porcina* ℥ij. *Ol. Camomilla rosarum* *Diolarum* an. ℥j. *tritici exp. urina* an. ℥℥. *Ossyp. human.* *Sevi cervin.* an. ℥ij. *ciner. Cancror. Fluv.* *Olibani* an. ℥ij. *mucilag. rad. alibea, sem. lini* *Fennugrac.* an. ℥vi. *Suc. Raparum exp. ana* ℥viiij.

Mixta bulliant ad succi consumptionem & cum Cera citrina fiat l. a. Vnguentum. Cui circa finem immisce vitel. ovorum Nro. iij.

Vires & Usus. Scissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosivo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

Vnguentum Medicamentosum.

℞. *Ping. Lardi veteris* ℥ij. *Terebinthina alb.* ℥vi. *Lap. Medicamentos.* *Ol. Tartari* an. ℥℥. *Sulphuris vivi & citrini, cerusa lota, litargyrii, Minii* an. ℥j. *Hellebori viridisque Piperis longi, Tutia præp.* *Nibili albi* an. ℥℥.

Mixtis affunde succor. depurat. *Rad. Lapathi acut.* & *Scrophulariæ*, *Herb. Fumaræ scabiosæ*, *Cort. int. virid. Sambuc.* *Limonum* ana ℥iij. *Coc.* ad succorum consumptionem; postea adde:

Syrac. liquid. cinnab. factit. an. ℥i℥. *Ol. Laurini, Juniperini, ovorum* an. ℥j. *Mercurii sublimati* ℥ij. Misc. & f. Vnguentum pro usu.

Vires & Usus. Scabiem manuum, & totius corporis sanat: Item Impetiginem, Verpiginem, Tentiginem pravam, Pruritus, Syrones, Elephantiasin, horribilem Ophiasin sive thiriam & Alopeciam curat: *Furcures Capitis & psyracia* tollit. Inungantur autem

partes extremæ omni mane vel de tercio in tertium diem præsertim in declinatione. Sed cave ne inunctio ante corporis evacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositates clauduntur, prohibita verò malorum humorum expiratione magis intus putrescant, unde febres ac apostemata sæpius inducuntur.

Vnguentum de Sevo Hircino.

℞. *Sevi Hircini* ℥j. *Ol. vitell. ovorum amygdal. dulc. hyoscyam. exp. de papaver. ana* ℥℥. *adip. anseris gallinæ anatis* an. ℥ij. *Lithargyr. arg. præp. Cerusa lota, Tutia præp. Minii* an. ℥℥. *Nibili albi alumin.* *ust. sacch. cand. alb. olibani* an. ℥j. *Ser. j. camphora opii præp. an. Ser. ℥.*

Misc. & cum Cera alb. f. q. f. l. a. Vnguentum.

Vires, Usus, Dosis. Fissuras, rimas, Rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibi à frigore, calore, siccitate, humoribus, que biliosis, salis atque acribus, sine molestia sanat, & omnes inde ortos dolores placat.

Vnguentum nobile.

℞. *Gummi Galbani elect.* *opopanax. ammoniac.* ana ℥j.

Solvantur in aceto vini & soluta forti cum expressione colentur, expressum ab aceto separantur, & sepiato tandem adde.

Axung. humana, canis, cervi, ursi an. ℥℥.

Mixta inde cucurbitæ superaffundendo:

℞. *Oleor. terebinthina bac. lauri* ana ℥℥. *corn. cervi* ℥ij. *Sulphuris mediantio ol. juglandis præp. Antimonii dulcis ex Pulvere Emetico per Ro oriam distillat. Purioli per laminas ferri edulcorat. Saturni* ana ℥j.

Iterum misce; Postea ad Solem vel alio loco calide digerantur per aliquot dies, & quotidie cum spatula lignea agitentur, & sic Vnguentum pretiosissimum tibi comparabis, quo Theophrastus Paracelsus, tam recentia vulnera, quam inveterata ulcera intra paucos dies consolidavit.

Vires & Usus. Curat omnia inveterata, putrida, & Cacoëthica mala: Item Vulnera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis musculis & membris medetur. Leucophlegmatica Capitis laborantibus, abasis prius capillis & postmodum loco affecto impositum, bene facit. Herniosis item & plaga antiqua in inguinibus affectis præstat auxilium: & ut omnia paucis comprehendam, virtus hujus Vnguenti, verbis satis exprimi non potest. Immitatur cum pluma gallinæ nigæ, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Stictico vel Disulphuris.

Vnguentum Carminativum.

℞. *Flor. Sambuci* ℥ij. *Baijri majalis non salit.* ℥ij. *Suc. Chamomill. cum vino express.* ℥℥.

Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde:

℞. *Ol. Cavi* ℥vj. *cymini* ℥ij. *saniculi* ℥j.

Misc. & fiat Vnguentum seu linimentum.

Vires & Usus. In Tympanite & inflatione Vetriculi, secretum est: totus autem venter inungatur, bis in die, mane scilicet & vespere cuncto cubitum.

Vnguentum Stipricum.

℞. *Ol. myrtillorum* ℥viiij. *cydonæorum, nonupbar.* an.

an. ℥iij. Hyperici roſe: um an. ℥ij. Suc. Herb. Plantaginis, Buſa paſtoris, millefolii, an. ℥vij.

Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem: poſtea adde:

℥. Sang. Draconis, croci martis an. ℥j. Bol. rub. or. præp. terra vitriol. dulc. Corallor. rub. præp. ana ℥ß. Rad. Tormentiſſe, biſſorte ana ℥ij. Anthera, roſar. Sem. plantag. berber. an. ℥j. aceti parum

Miſc. & cum Cera ſ. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires, Uſus, Doſis. Stipticum eſt; Ideo Renibus & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in ſtendis menſibus, & fluxionibus immodicis.

Unguentum contra Vermes.

℥. Aloes Hepatic. ℥iij. Ext. Gentiana ℥ß. Solvantur ſimul in ſ. q. ſp. Vini & ſolutis adde: Ol. Amygdal. amar. nuc. perſicor. abſinthii com. ana ℥vi. Fellis Taurini ℥iij. aceti vini ℥ß.

Miſc. & coq. ad ſp. V. & aceti & fellis conſumptionem & circa finem adde:

Myrrha rub. ℥j. troch. Alhandel, Ol. Sabina an. ℥ij.

Et cum ſ. q. cera fiat l. a. Unguentum.

Unguentum Hernioſum.

Vitell. ovorum rec. ad duritiem coſtor. No. xxxv. Butyri majal. ſ. ſa'e tßß.

Miſc. & in igne carbonum lento ſemper agitando & deſpumando coquantur, & quando olei puri inſtar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur, poſtea in expreſſo Oleo calido diſſolvantur:

Ol. Balaſtici noſt. ℥vi. Petra ℥iij. Empl. Oxyroccei ℥v.

Miſc. & fiat l. a. Unguentum.

Vires & Uſus. Curat Herniam inteſtinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies ſupinus, ſobrius, cavendo à cibis ventofis, jaceat, & quotidie bis manè & vesp̄i locum affectum inungat, ſimulque debitæ ligaturæ ſciſciæque convenientes applicentur, & per Dei miſericordiam certiffimè liberabitur. Interea autem manè & vesp̄i de decocto noſtro contra Herniam bibat pro vice Coch. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio reſtitui.

Unguentum contra Pediculos.

℥. Ol. Laurini, templini an. ℥iij. Suc. Ruta. exp. ℥vi.

Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem: Poſtea adde:

Argenti vivi ſalivâ jejuni exting. ℥ß. ſem. Staphid. agr. nitri præp. aloes epatic. an. ℥ß. rad. Hel-lebori alb. lapath. acut. tabac. indic. an. ℥ij. Camphora Ol. Spica. an. ℥j.

Miſc. & cum Cera ſ. q. fiat l. a. Unguentum.

Vires & Uſus. Hujus Unguenti Celeberrimum uſum ipſa experientia docebit: omne enim pediculorum genus interficit, & caſtris tam Martialibus quam Venereis longè propellit.

Unguentum ad Livorem faciei.

℥. Tragacanth. alb. ℥ß. Diſſolve in aq. roſar. in formam linimenti. Poſtea adde, rad. Sigil. Salomon. ſubtiliſſ. pulveriſata ℥ij. camphor. ℥ij. M. f. Linimentum.

Vires & Uſus. Contra livorem faciei experimentum eſt, cutim enim conſtitutionibus, verberibus, aliſque violentis iſtibus liventem, priſtino, nativæque co-

lori reſtituit; ſi loco affecto illinitum permaneat uſque dum per ſe arcſiat.

VNGUIS ODORATUS, vid. Blatta Bizantia.

UNGULÆ VARIÆ, vid. ſub nomine ANIMALIUM & quibus deſumuntur.

UNICORNU ANIMAL, vid. Monoteros.

UNICORNU MINERALE, vid. titulo Lapis.

UNIFOLIUM, vid. Biſſolium.

UNIONES, vid. Margarita.

VOLVIBILIS.

Convolvuli nota ſunt viticulæ ſeu cauliculi pettiſciæ aut plantis vicinis ſe circumvolvendo ſcandentes, quamvis hæc nota non perpetua eſt in omnibus ſpeciebus, nam Dorycinium Creticum Alpini aliis notis eſſentialibus & genericis cum convolvulis, convenit, & tamen erectum eſt. Vasculum ſeminale interna loculamenta, quorum unumquodque ſemina bina majuscula, anguloſa continet, diviſum; ſiſ campanulatus margine integro, Succus in plerisque ſpeciebus lacteus. Raius.

Deterſiva eſt hæc planta, appetitiva, vulneraria, aſthmati, aurium ulceribus, & alvo laxandæ apta.

VOMITIVA, vid. Emetica.

UPUPA.

Nomina. Upupa Aldrov. & Geſn. Upupa Græciſ. Angliche Hoopoor Hoopo.

Vncias tres pendet. Longitudo ab initio roſtri ad ſinem caudæ 12. digitorum: Latitudo alis expanſis 19. roſtrum digitos 2. æquat, nigrum, acutum, nonnihil arcuatum. Lingua parva, ut rectè Aldrovandus, in profundo latitans, trigone item, initio lata, extremo acuta; inſtar perfecti & æqualium laterum trianguli. Figura corporis ad pluvialem accedit. Caput ornat pulcherrima Criſta, duos digitos alta, duplici pennularum ordine conſtans, à noſtro ad extremum uſque occipitium protenſa, quam pro libitu arrigere aut demittere poteſt, pennis autem numero 24. aut 26. componitur, quarum aliæ aliis longiores, quarumque extrema nigræ, deinde albicant, quod reliquum eſt coloris eſt Caſtaneæ ad flavum vergentis. Collum pallidè ruſcit, pectus album atrolis nigris deorſum tendentibus varium, adultioribus nullæ erant in pectore maculæ, ſed in lateribus ſolum. Cauda 4. (Aldrovando ſex) digitos longa 10. dumtaxat pennis componitur, nigra verum in medio atrolata parabolæ aut lunulæ figuram referens eam diſtinguit vertice pennarum radices, cornibus extremitates ſpectantibus. Cauda alias complicatas excedit. Remiges pennæ in utraque ala 18, quarum priores decem nigræ, atrola tranſverſa alba, quæ in ſecunda, tertia, quarta, quinta, ſexta, & ſeptima ſemidigitatio latior eſt, in reliquis anguſtior, ſeptem ſequentibus quatuor aut quinque ſunt atrolæ Tranſverſæ albæ, ultimarum limbi nonnihil ruſcunt. Uropygium album pennæ ſcapulares per dorſi longitudinem exporrectæ atrolis albis & nigris variantur, eodem modo ac alæ, oculorum irides avellaneæ. Palpebra inferior ſuperiore major. Tibiæ breves extimus pedis digitus medio adnaſcitur, nulla interveniente membrana. Aſpera arteria (deſcribente Aldrovando) initio divaricationem quibus in pulmones utroſque finitur duo velut oſcula extrinſecus laryngis vicem ſupplementa exhibet, quibus pellicula tenuiſſima prætenditur, annuli cartilaginei nobis obſervantibus, poſt divaricationem dimidiati, ut in Ardeis. In ventriculo ſcarabæos, invenimus, unde eam infectis veſci manuſtum

manifestum est; an verò & uvis aliisve baccis, ut veteres nonnulli tradiderunt, nescimus. Audio eam (inquit Aldrovandus) formicis inter cætera vesci. Appendices seu intestina cæca nulla. Numero pennarum caudæ, appendicum intestinalium carentiâ, alarum transversis maculis cum picis mattis convenit, quibus idcirco eam subjunximus.

Circa Coloniam & alibi in Germania superiore frequentes observavimus, ubi VVidehuppe appellant. Terræ plerumque interdum salicibus insident. Turnerus in tota Britannia nusquam reperiri ait, verum falsus est, nam & in Northumbria & in agro Surreiano interdum quamvis rarius cerni, idoneis testibus nobis constat.

Nidum è stercore, humano potissimum, facere testatur Aristoteles, cum scil. hoc luti vice circumlinentem.

Nomen in utraque Lingua à vocis quam edit sono inditur. Cæterum literatores plerique omnes Britannici (inquit Turnerus) Upupam eam vocant avem, quam Barbari ab alarum strepitu Vannellum, & ipsi suâ Lingua Lapvvingam. Errorem hunc inveteratum Scholæ nostræ triviales etiamnum retinent feminam mare majorem semper esse aiunt. WIL LUGH BEIUS.

OFFICIN. NAT. ex UPUPA.

1. Caro. 2. Pennæ.

Vires.

1. Caro ejusque decoctum proprietate suâ colicos juvat, (assumpta) Avicenn. Pen. 16. 17 4. c. 11.

2. Pennæ, dolores capitis demulcere dicuntur, (imposita.) SCHRODERVS.

URCEOLARIA, vid. Parietaria.

URETICA, vid. Diuretica.

URINA, vid. pro usu Medicò in Animalibus unde desumitur.

URINARIA, vid. Taraxacum.

URSUS.

Ursus, Græcis Ἀρκτος, a Bear Angl. Quamvis hoc Animal figurâ capitis productiore à reliquis hujus generis differre videatur, cum tamen notis præcipuis, Dentium numero, figurâ, situ, ut & facultate illa pedibus anterioribus veluti pugnis feriendi, cum iisdem conveniat, omnino huc referendum est.

Totum ejus corpus tam denso pilorum crassiorum vellere undique obregitur & occultatur, ut rudis quædam indigestaque moles potius quàm animal membris distinctum esse videatur, ut non injuriâ à Virgilio informis appelletur. Verum detracta pelle vera ejus figurâ & partium situs in conspectum venit.

In urso à Parisiensibus Academicis dimenso corporis totius longitudo ab extremo rostro ad ultimos ungues 8. pedum erat & trium digitorum; ad initium caudæ 5. ped. ad occiput 1. ped. & 5. dig. caudæ 5. uncias longa erat. Dentes Leoninis similes, sed multò minores: musculi temporales quàm in illo minùs carnosæ, Thorax quàm in Leone latior, longa insuper, & 14. costis composita. Collum non, ut in Porco, pro magnitudine breve, quamvis ob pilos densos & longos innascentes ita videatur: Erat enim 7 tantum digitos latum, 9 longum. Os femoris longius quàm in plerisque Brutis. Patellam in genu habet.

Curis in dorso admodum dura & crassa, sub ventre tenuis & delicata. Pili molliores & minùs asperi quàm in Leone aut Aprò, lanam quodammodo referentes, crispiores quàm in capris, multò tamen minùs quàm in ovibus. Cranium quàm in Leone duplo tenuius seu minùs crassum; durum tamen & sub terra ferro renitens: verum quod cranii crassitie deest cerebri copia abun-

de compensat; est enim quadruplo majus huic quàm illi. Oculi pro magnitudine Animalis valdè exigui, quod imprimis notabile. Membrana nictitans oculum regit.

Pedes tam posteriores quàm anteriores in 5 digitos fissi; maximus & qui pollicem simulat, contrario humanis situ, locum minimi digiti seu extimum occupat, suntque omnes crassi, breves, deformes. Super calcaneo incedit, èive inter incedendum innititur more humano D. Willughby. Idem radices unguium duris annullis firmari observavit: item sub humeris mammas binas; Sceletum humano simillimum; os coccygis habent quamvis caudâ careant; claviculas nullas, costas 14. utrinque, vertebrae 33. in collo septem. Ventriculus perexiguus, & velut in duos divisus. Intestina uniformia, nec colore, nec substantia, neque magnitudine diversa, adeoque tenuium & crassiorum distinctio nulla. Intestini cæci nec vola, nec vestigium, uti neque cellularum in collo: ut non intestina, sed potius unicum & simplex Intestinum dicenda sint: erant a. duplo longiora Leoninis, nimirum 40 pedum. Renum structura singularis: membranâ etenim peculiari velut sacculo inclusi, & in 56 parvos reñes, actu à se invicem separatos, suisque singulos membranis cinctos; divisi erant. Hæc renulorum massa seu congeries uvarum racemum, aut potius conum Pineum maturum referebat.

Hæc omnia Parisienses.

Invenitur in Alpiis inque Germania, Polonia, Lithuania, Norvegia, aliisque Regionibus Septentrionalibus, colore etiam variant; namque & nigri & albi observantur, in Nova Zemla maximi. RAIUS. in Synops. Historia Quadrup.

OFFICIN. NAT. ex URSO.

1. Pinguedo. 2. Fel. 3. Oculus.

Vires.

1. Pinguedo calfacit, resolvit, emollit, discutit &c.

Usus præcipui in alopecia (illius cum mure conbusto) medetur doloribus arthriticis, parotidibus, Obrenklamm, [axungia ejus & cerâ ano in Empl. redactâ,] ulcera crurum tibiæque sanat.

N. 1. In Hernia s. Enterocoele uterique prolapsu, muliercularum vulgare remedium [dorso s. ossi sacro illita.]

N. 2. In usu externo pinguedinis hujus observare expedit, quod pilis albedinem conciliat.

2. Fel commendatur intrinsecus, ad morbum comitalem, ad asthma, & icterum.

Extrinsecus ad ulcera cancrorsa, ad serpentia (illius,) ad odontalgiam, oculorum hebetudinem, &c.

N. In Finlandia ubi urforum datur copia, vulgatum rusticis est fel exsiccatum instar Panacæ exhibere, sudoreque superveniente morbos quamplurimos fuisse solutos audiri.

3. Oculi dexter effossus, exiccatus & infantibus applicatus, reitorem quibus in somnis vexantur accere dicitur.

Sunt & qui ajunt, oculum urfi sinistro brachio alligatum, quartanam fugare. SCHRODERVS.

Ursus.) Hujus pinguedo calefacit, resolvit, emollit, discutit &c. medetur doloribus arthriticis, in hernia ac uteri prolapsu commendatur cum gossypio ossi sacro, imposita. Ursi albi pinguedo pro magno arcano cosmetico commendatur. Ursi fel exsiccatum egregium est diaphoreticum in plurimis affectibus utilissimum. HOFMANNVS.

URTICA.

Urticam ab urendo dictam esse consentiunt Grammatici.

matici, quod igne sit naturæ, unde admodum cuti vel levi tantum tactu, pruritus ac pustulas excitat, quomodo hoc præstat paulo post ostendimus. Ἀκαλῆφι Græcis dicitur ὅτι τὸ μὴ ἔχειν καλὴν ἀφίω, quod injucundo sit tactu, & pruritus cieat. Athenæus. dicitur & κνίδη quod lanugine noxia, vellicet pungat, & suo morfa sentum laceſſat à verbo κνίζειν, quod punge-re, & vellicare ſignificat.

Urtica quatuor tantum ſpecies novimus, duas racemiferas, duas piluliferas, racemiferas voco quæ flores ſuos & ſemina in quibuſdam velut racemulis è foliorum alis egreſſis geſtant; piluliferas quæ eadem in pilulas ſeu globulos congeſta, eodem tamen ſitu, proferunt; illarum ſemina minora ſunt; harum majora ſplendentia & lini ſeminum æmula, racemiferæ ſunt:

1. Urtica vulgaris major I. B.
2. Urtica minor annua ejuſdem piluliferæ;
3. Urtica Romana Ger.
4. Urtica Romana altera parietariæ foliis Hort.

Paris.

Præter has, alias exoticas, & nobis nendum cognitæ, ex Hiſtor. Margravii & Horto Malabarico proponemus.

URTICA MAIOR VULGARIS.

Nomina. Urtica major Vulgaris I. B. major Vulgari & media Sylveſtris Park. Urens prima & ſecunda ſive Urens maxima & altera urens C. B.

Radicibus luteis ſub terra reptat & latè ſe propagat. Caules ſurrigit bicubitales, interdum etiam altiores, quadratos, rigidos, ſtriatos, urida lanugine hirtulos, concavos, ramoſos, & foliis veſtitos per intervalla ex adverſo binis, pediculis oblongis inſidentibus, à lara baſi in acutum mucronem ſenſim anguſtatis, majusculis, & profundioribus denticulis per margines ſerratis, Spinulis minacibus horridis. Vexuſ ſummitates Caulium & ramorum ad ſingula foliorum paria quatuor exeunt racemuli in formam crucis diſpoſiti, ſoſculis vel ſeminibus onuſti; nimirum ad latera ramuli è ſinu uniuſcujuſque folii exeuntis hinc inde unus, appoſita ligula ad racemuli pediculum utrinque. Flores herbacei, quadriſolii, perexigui, ſtamina quatuor apicibus donata continent. Vacula ſeminalia velut triquetra, duabus lamellis conniventibus compoſita, ſingula ſemina occultant, exigua, ſublonga, ruſſa, ex urticis autem uliæ mares ſunt, aliæ foeminae, aliæ nempe ſoſculos duntaxat inutiles proferunt, aliæ ſemen. Mordacibus ſpinulis, quibus tum caulis tum folia obſita ſunt. Urtica ab aliis plantarum generibus abundè diſtinguitur. Spinulæ autem omnes (ut obſervavit Clariff. Hockius) concavæ ſunt & ſituloſæ, mucronibus acutis, tactu levi cutem perforantes, & folliculis quibuſdam liquore venenoso repletis innāſcuntur, Singulæ ſingulis: qui ſpinularum tactu compelli per earundem cava ſyringarum modo liquorem ſuum in carnem transfundunt, qui pruriginem illam moleſtam & puſtulas excitat.

Æſtate floret. Superficies quotannis marceſcit, radice reſtibili, ad ſæpes in locis ruderatis nimis frequens.

Vires. Urtica omnis diuretica eſt & lithontriptica, peculiariterque cicutæ adverſari dicitur, ut & hyſocyamo, in olere ſumpta ſolvit alvum, abſtergit renes, calculos expellit, expectorationem morbillorumque eruptionem prodeget. Matronæ noſtrates novella Urticarum germina, & folia primulum erumpentia verno tempore juſculis incoquere ſolent ad languinem depurandum. Succus herbæ aut ſyrupus ex ea confeſtus in hæmoptyi efficaciffimus eſt. R. Succus Urticæ ʒiv. ʒ. aut 6. diebus continuis manè bibatur ꝑc.

Mangeii Bibl. Pharm. Tom. II.

juno Ventrículo, & ipſa urtica juſculis incoquatur. Aegri deſiti à Medicis hoc remedio convaluerunt. Amatus. Communicaverunt D. Needham & D. Hulſe, Aq. ſtill. Sp. vini q. ſ. ad largam aciditatem mirificè reſtringit hæmophthyſin.

Hæmorrhagiam narium ſibi frequentiffimam certo experimento ſistere ſolebant Hier. Rehlīngetus Duumvir & Udalricus Jungius radice urticæ rubræ alba, lignoſa & tereti naribus indita, & aqua attracta. D. Soame à Cumani obſerv. à Velfchio editis.

Extrinfecus putridis, gangrænoſis & malignis ulceribus auxiliatur, duritias ac tumores diſcutit, reprimat ovulam inflammaram (gargarizat.) Sedat hæmorrhagiam narium (Urtica minor ſcilicet contuſa, aut ſuccus ejus naribus inditus) Schrod.

Semen urticæ (Romanæ præcipuè) uſus crebri eſt in pulmonum effectibus, aſthmate, tuſſi contumace, pleuritide, peripneumonia; Conſervâ quæ fit ex racemulis ſorum, & ſeminum in calculo renum, inque thoracis affectibus & ſputo ſanguineo medicamentum eſt præſtantiffimum. Semen urticæ urinam & menſes ciere, & Venerem ſtimulare inter medicos convenit; unde à meretricibus amaſiſ ſuis propinari ſolet. Radix urticæ majoris commendatur maximopere ad icterum: Eadem vino & melle decocta non vulgare medicamentum eſt adverſus frigidas tuſſes & orthopneas.

Æſtum, puſtulas & pruriginem ab urticis excitatas ſedat & extinguit oleum olivarum, oleum roſarum, Nicotianæ ſuccus illitus, aut etiam folium viride applicatum: ipſius denique urticæ ſuccus expreſſus, referente Parkinsono.

Quin & eruditiffimus vir, amicus noſter ſummus. D. Tancredus Robinſonus è Riverii centur. obſerv. p. 640. centur. 4. obſ. 81. aliſque medicinæ practicæ ſcriptoribus ſuggeſſit nobis exempla immodici hæmorrhoidum fluxus cum omnia fruſtra adhibita fuiſſent ægro admodum debilitato, tandem curati à ſolo uſu ſucci urticæ, levi ebullitione depurati, & dati ad ʒij. cum paucis ſaccharo.

Populares mei certo experimento cereviſiæ recentis intempeſtivam fermentationem inhihent, & à tonitru deſcendunt collocando in doliis urticam urentem, maximam & fruſta Chalybis, S. Pauli quadr. Bot. Cl. 4. pag. 536. 537.

URTICA MINOR.

Nomina. Urtica minor Ger. minor annua I. B., Vrens minor D. B.

Radix ei alba, ſatis craſſa, ſimplex, ſurculosa tamen ſurculis fibrillis aliquot tenuibus capillatis. Caules craſſi pro plantæ modo, ſemipedales & interdum pedales, quadrati, ſolidi, ſtriati, ſpinulis rarioribus horridi, ramoſi minus recti quàm præcedentis: folia per intervalla ex adverſo bina, pediculis longis appenſa atroviſcentia, quàm præcedentis breviora & obtuſiora, per margines profundè dentata, ſpinulis venenatis utrinque minacia. Ad ſingulos caulium nodos ut in præcedente; ſoſculorum aut ſeminum racemuli quatuor in Crucis formam diſpoſiti. Floſculi ſinguli tetrapetali, caduci. Vacula ſeminalia exigua, bivalvia, è duabus lamellis conniventibus compoſita ut in atriplice, ſingula ſemina continent, exigua, longiuſcula, ſplendentia, figura ſerè ſeminum lini.

In hortis oleraceis & locis ruderatis, frequens oritur, nec ultra annum durat.

URTICA ROMANA.

Nomina. Urtica Romana Ger. Park. Romana ſive mas cum globulis I. B. urens, pilulas ferens, prima Dioſcoridis, ſemine lini C. B.

Ccccc J. B. Ra-

J.B. Radix sublutea plurimas fibras spargit longiusculas: quibus terram firmiter apprehendit (non alia (inquit J. Bauhinus) quam urticae vulgari) non tamen perinde vivax. Caulis quatuor aut quinque interdum pedes altus, hominis altitudinem interdum multum superans J.B. rotundus, ramosus, infirmior, rigidioribus pungentibus spinulis pro urida vulgata lanugine donatur, perinde ut & folia, quæ ad nodos bina opposita quàm in illa altius incisa: è foliorum superiorum alis exeunt pilulæ virides asperæ & mordaces, pediculis, in quibus inclusum continetur semen, quod & compressa laterum forma, & lubrica superficie semen lini æmulatur, flosculis præcedentibus fibrosis luteolo pulvisculo plenis.

Spontaneam observavimus in ipsis pluteis oppidi Yarmouth, & in arenosis circa Aldeburgum oppidum in Suffolcia, inveniri ajunt, & in plateis Romanicæ oppidi in Cantia & Liddæ prope Romaniam. J. Bauhinus Monspelii passim in sepibus observavit florentem & semina ferentem mensib. Aprili, Majo & Junio, Basileæ in pratis. *Raim.*

VRVCV.

Nomina *Arbor Mexicana fructu Castaneo coccifera* C. B. *Daburi* Clus. ex l. 3. c. 19. *Bixa Oviæ* ejusdem. ex l. c. 20. l. B. l. 12. *Vrucu Brasiliensibus* Marc. gr. Piso. è qua fit tinctura *Orellana dicta*. *Arbor finium regundorum* Scaligeri. *Achiol.* Hernandez. *Orellana seu Orellana folliculis lappaceis* Herman.

Frutex est arborecens (Mali Medicæ magnitudine *Hern.*) ligno albo instar Coryli, cortice fusco. *Folia* habet alternatim posita, in pediculis tres, quatuor aut quinque digitos longis, etiam brevioribus, oblonga, mucronata, cordis ut pingitur figura, quinque, sex etiam decem & duodecim digitos longa, nervo secundum longitudinem, & venis obliquis inferius prominentibus prædita, latè viridia.

Ad extremitatem ramorum in brevibus pediculis multi enascuntur *Flores*, in uvæ figuram dispositi, quilibet magnitudine Rosæ, quinque foliis constans, albis incarnato dilutis: in medio ingens numerus staminulorum luteorum, apicibus purpureis. Vix sensibilem habet odorem.

Florem sequitur *fructus*, nimirum Siliqua, Myrobalani, oblongi formæ, seu pyramidalis rotunda, duos, aut tres digitos longa magnitudine Pruni (quatuor modicis distincta angulis, qui secundum longitudinem discurrent *Hern.*) quæ immatura virefcit exterius, matura rufescit, estque tota hispida ob fila quæ habet prominentia, sed non aculeata: In qualibet siliqua ultra 30. aut 40. grana, suo pediculo innitencia continentur, figuræ conicæ acutæ, aut exigui Pisi, at in duobus lateribus quasi digito compressa. Granorum color insigniter miniatus & splendescens, atque tali succo madens, ita ut ad tactum inficiat manus egregio miniato colore. Grana recentia mollia sunt, instar granorum Pomi, quodlibet exterius punctulo argenteo notatum. Siliqua matura spontè se aperit. Grana siccata evadunt obscurè rubra, nihilominus tamen ut ante tincturam continent, & recentia sive siccata usurpari possunt. Trita simpliciter in aqua simplici seu stillatitia egregiam dant tincturam miniatam, quæ pota per se prodest contra varia venena, & est boni saporis, subamara & quid aromatici sapiens. Collata in massam cogitur, sphaerulæque & tabellæ in multos annos durabiles inde conficiuntur, & in Europam transmittuntur. Cum urina mixta tam pertinaci colore tingit lineos pannos, ut in posterum elui non possit. Magisterium etiam inde more Coralli, præparant, & in usus reservant. Brasilienses patinas suas & lagenas è Cucurbitarum corticibus factas hac tinctura exterius tingunt.

Radix cum carne Gallinæ vel alia tingit instar Croci optimi, & bonum saporem illi conciliat. Barbari maximi faciunt hanc arborem, atque colunt circa tuguria sua: Viret toto anno, fructum autem fert Vere: & tum materies ejus cædi solet, quæ utilis est ad ignem eliciendum instar Silicis, confricando inter se. Hujus proprietatis & usus ligni mentionem factam invenio à D. Rochefort in Hist. Insularum Antillarum, & D. Hugues in Medico Americano.

Cortex idoneus est ad funes & rudentes, quæ robustiores sunt Cannabinis.

Tinctura cum aliqua aqua ejusdem temperaturæ hausta aut foris adhibita mitigat æstus febriles, sistit sanguinolentas dejectiones, discutit tumores & abscessus, quapropter commodè miscetur potionibus refrigerantibus, atque etiam cibis.

Miscetur etiam delicatæ porioni è Cacao, *Chocolata* dicta ad refrigerandum & bonum colorem atque saporem illi conciliandum, efficitque ne quavis quantitate hausta noceat: illius quippe ope facile digeritur sine ulla cruditate. Mitigar dolores dentium à calida causa natos, promover urinam, cedat sitim.

Tincturam è fructu faciunt hoc modo. Sumunt grana bene matura eaque infundunt aquæ calidæ, & ex subsidientia tabellas conficiunt.

Observandum tamen (inquit *Ioh. de Laet.*) duplicem tincturam ad nos afferri, unam simplicem & perfectissimam, coccineam, cujus usus ad fucum scæminarum, (Insulani etiam Americani corpora sua ea inungunt elegantiz causa & ad Bellum ituri ut terribiliores hostibus videantur) alteram cum Resina mixtam & in magnos globos coactam, cui & credo succum radicis admixtum, tingit enim croceo colore magis quam miniato.

Granum parvum figura & colore Vrucu non multum dissimile ex Insula Barbados *Noita* nomine ad nos deferretur, quo in panes coactæ tinctores utuntur pro pannis colore Limonis inficiendis. *Raim.*

USNEA.

Nomina. Muscus cranio humano innatus.

Non videtur nobis species musci ab omnibus aliis distincta, sed musco arboreo crustaceo congener. Celebratur ille à plurimis Auctoribus in hæmorrhagia præsertim à Chymicis *Ysneæ* titulo. Ingreditur autem compositionem famosi illius Unguenti Armarii dicti vide Ephemer. German. an. 2. p. 100. & sequentibus *Raim.*

VTERINA.

Audiunt alias *Hysterica*, & magnam quidem cum aliis, ut omnia hæc habent convenientiam; attamen seorsim quoque non minus attendi merentur, & tantò quidem magis, quod ipse uterus quasi ζωον εν ζωῳ est, & multas in corpore turbas & symptomata excitat.

Respiciunt verò hæc ipsa.

I. Vel *vasa & vias*, quæ exituro sanguini debent patere, adeoque huc pertinent è supradictis *aperientia & obstructions* seu remoras tællentia, *incidentia & expurgantia*, tum *interna*, salina & sulphurea, quæ huc repetere superfedemus: tum *externa*, balnea *clystères*, tum *communes*, quæ hinc in partu difficili prosunt egregiè: tum *uterini*, suffusus, infusus, pessum inunctiones, aliaque abstergentia; licet, ut farcamur, quod res est, una quasi fidelia hæc obstructions tolli possint, si sanguinis & humorum aliorum turgescencia & naturalis dispositio restituantur, de quibus jam.

Vel enim II. respiciunt *conientia vasorum*, seu sanguinem

nem. Sanguinis motus litoralis quasi hic est extremus, quo alluitur ad uterum, & lunaris, singulis enim mensibus eo fœminæ bene habentes exsolvuntur, Litoralem itaque hunc sanguinis ad uterum motum respiciunt uterina.

Tum 1. *promoventia*, quæ fermentationem, turgescen-
tiam, & motum procurant.

Sive *rarefaciendo & attenuando*, quæ speciali nomine audiant emmenagoga sive menses moventia, ut sunt *volatilia oleosa, sulphure volatili pollentia*, v.g. sabina, crocus, angelica, myrrha, camphora, &c. *salina*, sal artemisiæ, borax, & imprimis *volatilia*, cochlearia, & *olis* *ci, aliaque acrida, amara, ut imprimis aloë, quæ hinc ad pallidos colores est eximia, item elixir proprietatis; *aromatica*, quæ simul glutinositatem humorum expediunt, ab infarctu oscula sive extremitates vasorum, ubi sæpe contingunt obstructions, liberant, humoresque pituitosos, tartareos, mucilaginosos eadem obviscentes expediunt, porosque dilatant, & uno verbo vias liberae præstant, & patulas, naturamque ad excretionem blande sollicitant. Ubi obiter notandum: *Quæcunque menses promovent, illa etiam fœtus exitum accelerant*, v.g. salia, borax, & exinde parata, quæ etiam in mola, si quidem certa sit mola, conducunt: attamen non sola stimulantia rem absolunt, sed etiam confortantia balsamica, ut oleum succini, cinnabarina, cinnamomum, vinum malvaticum. Pertinent etiam huc varia ex his dictis parata, & constantia, infusa præsertim, decocta, mixtura, elixiria, &c.

Imò spectant huc ipsa *purgantia*, quæ sæpe eodem die, quo assumuntur, mensium fluxum accerunt, & ipsa enim tum stimulant, & pellunt, tum sanguini novam fermentationem addunt: *diaphoretica*, præsertim volatilia. Hinc sæpe vidimus à Tincturâ bezoard. Mich. etiam extra ordinarium tempus menses accersitos, in succulentis præsertim magis.

Sive *absorbendo*, humores acidos, austeros, stypticos abundantes, eundemque sanguinem nimis figentes & concentrantes tollendo, uti sunt *fixa*, non quidem æque omnia, neque enim lapides cancorum, vel creta, conchæ, corallia, inter emmenagoga recensentur, vel locum habent; sed *edulcantia* eisdem intimius & saturantia, qualia præ aliis omnibus sunt martialia. Vnde qui feliciter mederi vult mensium obstructionibus, omnium optimè id præstare potest martialibus, croco ortis aperitivo O-lato, saccharino, pulvere cachectico Querc. vel stomachali ejusdem cum martialibus mixto addito v.g. oleo cinnamomi, qui sanè intentioni huic laudatissimè inservit.

Conveniunt itaque hæc, uti ex jam dictis facillè patet, in mensium obstructionibus, & inde oriundis mille symptomatibus, in quibus omnibus principaliter semper ad menses respectus habendus est, si feliciter progredi velimus.

Tum 2. *refrenantia & retardantia*, seu serosior nimis sit, & acris, biliosus sanguis, oscula vasorum reserans & erodens; seu copiosè irruat ob rupturam aliasque læsiones. *Excedentem vero hanc fermentationem & turgescen-
tiam inhibent tum refrigerantia aquea*, quæ partes sanguinis volatiles salinas sulphureas abundantes temperant, ac diluunt; tum *terrea & styptica*, quæ easdem præcipitant, disgregant, & in motu retardant ac ligant, plantago, bursa pastoris, corallia, hæmatics, & alia ex adstringentibus huc repetenda: tum *acida & austera*, easdem infringentia & domantia, ut *abus* O-li, Tinctura O-li, violarum, rosarum, Tinctura styptica, antiphthifica Gramanni, quæ in mensibus immodicis officium facit, ipsaque opiata.

Et hæc conveniunt in mensibus immodicis, lochiorum nimio fluxu; quin & ex parte fluori albo nimio.

Vel III. respiciunt *nervosum genus & ipsam uteri*
Mang. Pharm. Bibl. Tom II.

substantiam, ceu notum est, eam esse membranosa, cum capite maximum habere consensum, & nervis maximè irrigari; talia sunt *nervina* omnia supra sub cephalicis enumerata, sulphure balsamico volatili pollentia, *spiriuosa*, suavia ut melissa, rosmarinus, salvia, &c. castorium, succinum, utraque sale volatili oleoso fœta, &c. & præ omnibus aliis *cinnabarina*, uti certum est experientiâ practica, cinnabarinativam Hungaricam maximè solari affectus hystericos & motus uteri convulsivos, item secundina humana præparata, ebur sine igne, & ex C. C. parata, aliaque. Ex quo patet, canonem medico-practicum, omnia cephalica esse quoque uterina, sive in specie: *omnes herbas cephalicas etiam uterum respicere*, & vice versa, hoc sensu potissimum valere; ob societatem substantiæ, & convenientiam ac analogiam partium nervosarum.

Et hæc, imprimis *aromata confortantia*, sunt uterina, & profunt specificè in suffocatione hysterica, ejusque variis gradibus, & consequenter lipothymia & syncope, &c. Suffocationem verò hanc eo sensu falso hypochondriacam hodiè appellant, si uterum excludunt pro subiecto; eo verò sensu verè, si eundem ut contentam simul sub hypochondriis partem respiciunt, & quatenus pleræque hystericae sunt etiam hypochondriacæ. Probantur eadem in partu difficili, quatenus vel roborant naturam & nervos, ut cinnabarina, quæ ob hanc causam & in calculo prodeste diximus; vel simul stimulant, ut cinnamomi, succini, &c. item in hysteralgia & fluore albo, quatenus in eo laxior sanguinis compages & ichor serosus partibus oleosis sanguinis præponderans ob laxitatem & debilitatem fibrarum conjunctam excernitur, unde confortantia talia uterina, & oleosa balsamica, v.g. rosmarinus, profunt Patere hinc potest, cur ab *hippocrate* & hinc sequentibus eundem practicus omnibus *acetum* dicatur *ὀσπαραγός*, quia nempe nervis est inimicum, quia figit sanguinem ejusque sulphur & partes volatiles salinas deprimat & subjugat; aliàs enim, ubi incidendi est intentio, vel sulphur domandi, ut in amore infans, mensibus immodicis, optimè conveniunt, modò parèe adhibeantur.

Vel IV. respiciunt *humores extravasatos* circa uterum restagnantes, & inde oriundos flatus, miasmata putrida, &c. quod quidem sæpe contingit, & varia symptomata, & atrociora quidem illa sæpe excitat, qualia sunt.

Tum *balsamica*, putredini resistentia, amara & *gummosa*, ac *resinosa*, aloë, myrrha, scordium, asa fœtida, gummi, galbanum, essentia succini, myrrha, asa fœtida, elix. uterino, Crollii, &c.

Tum *resolventia* *g* *to* *ti* *atem sanguinis extravasati*, tum in fieri, tum in *sa* *to*, uti v.g. chærefolium, lapides bezoard. Zale, & iata, & alia similia, quidquid restitit, egregiè dissipant, & symptomata convulsiva & hysterica inde producta tollunt.

Tum *discussientia*, *diaphoretica & sudorifera* penetrantiora, ut Tinctura bezoardica, *abus* *fri*, mixtura simplex quæ ipsa quoque putrida miasmata arcent, uti ipsa quoque *diuretica* uterum egregiè mundificant.

Tum imprimis *carminativa*, unde *carminativa optima sunt uterina*, & experimento practico, quæ colicæ debentur, eadem & suffocationi hystericae opem ferunt, ut zedoaria, semina carminativa, galanga, essentia carminativa cum elixir uterino, Tinctura *fri*, bezoard. Zale, quæ in hysteralgia & doloribus post partum insignia sunt & nobilissima.

Et hæc profunt in flatibus uterinis, quos instar flatuum ventris in cacochymicâ per uterum excretos observavimus & inde ac ab ibi restagnante sanguine putrido productis suffocationibus hystericis, mensibus & lochiis dolorificis, cum anxietatibus, dorsi doloribus, torminibusque &c.

Quoad APPLICANDI HORVM USUM licet plura
Ccccc 2 dici

dici possent, pauca tamen libabimus.

1. Canon est practicum, imprimis Heurnio laudatus: *Dulcibus uteris demulceatur*. Is verò non tam intelligendus de dulcibus actu talibus absolute, quæ quidem, ubi fermentatio sanguinis instauranda est, insignem habent usum, quatenus turgescientiam ejusdem promovent, item in abortus periculo externe mel, panis mellitus cum vino Hispanico; attamen, *ubi sanguis refrenandus est*, ut in nimio mensium fluxu, & in reliquis casibus potius nocent. Sic dulcia saccharata & mellita lædunt hystericas, turbas enim excitant, & symptomata consopita revocant & exasperant; adeoque ex his rectus dulcium applicandi modus patet.

2. *Acida*, quod ceu porisma ex dictis consequitur, & *dulcia nec semper vitanda, nec promiscue danda*, imprimis id valet de aceto, illud enim sulphureis particulis minus est instructum; quæ verò acida sunt sulphurea simul, ut α -us Θ is, Θ i vel Θ li cephalicus, utero magis sunt amica, unde sirupus bysantinus oxymel simplex & squilliticum, & reliqua acida, uterum lædunt; hæc vero sulphurea moderate, ubi licet, adhiberi queunt. Patet id etiam ex diarræa, si fœmina menses patiens aceraria vel alia acida comedit, illi sistuntur. Sunt scilicet tono uteri tum quoad turgescientiam sanguinis, tum quoad substantiam nervosam adversa.

3. *In gravidis volatilia pellentia cavenda*: unde, si dubius occurrat casus, suppressive sint menses, vel fœmina gravida, vix ultra martialia solemus ascendere, quod nobis sæpe obtrigit in praxi, offerentibus, urinam meretriculis, & conceptum suppressione mensium simulantibus postulat purgatione, vomitorio, ibi non facile credendum, etiam si Jovem jurent lapidem; martialia verò non nocent, sed simul roborant. Aliàs ipsis attemperantia & adstringentia, quoad vasa uterina, & spiruosa quoad vitale fœtus robor, ut balsamum embr. conveniunt.

4. *Ubi aperiendum est, non sola pellentia fortia conveniunt, sed humectantia una non omittantur*; ubi adstringendum, non omittantur siccantia. Hinc peccant medici, qui in mensium defectu solis oleosis volatilibus utuntur, oleo juniperi, α -u Θ lis, \ast ci, oleo fabinæ, borace, & aliis. Hinc etiam sæpe meretriculæ, præsertim, ubi dispositio ad abortum non adest, fabinæ & similibus frustra utuntur. Respicendum nempe una est ad serum, quod æquè ac sanguis ad turgescientiam potissimum requiritur, hinc plùs semper præstitimus humectantibus, ut Tincturâ Θ tis φ ilatâ, Tincturâ Θ ispomatâ, infusis & decoctis uterinis, quàm alia.

5. *Non adstringendum in non gravidis citra revulsivum & evacuationem*: in gravidis autem citra fœtus respectum, v.g. si qua mensibus immodicis, quod sæpe ex obstructione valorum fit, & seorsim excuti meretur, laborer, Venæ Sectione præmissa melius conducunt adstringentia; sin gravida mensium fluxu corripitur, semper fœtus debilitas est respicienda.

6. *In adstringentibus quoque semper tonus uteri est respiciendus*, tum quoad sanguinem, tum quoad laxitatem fibrarum. Hinc in fluore albo non tam sola adstringentia vulgaria prosunt, quàm aromatica cum his mixta, ex roremarino, cheiri, ebore, castorio, magist. oc. Θ cum oleo anisi, succini, quod optimum, aliàs enim feliciter res non succedit.

7. *Clysteres uteris egregiè quidem elutriant & abstergunt*: virginibus vero & gravidis non conveniunt, velut & pessi & similia topica, de quibus suo loco plurius. Torum potius respiciendum in his, neque enim extravasatio facile locum habet; sin verò quid faciendum in his topicis, communicandum id prius bene est cum adstantibus quibusdam. WEDÉLIVS.

UTERINA Specifica ex Andrea CNOFFELIO.

ANTIHYSTERICA.

Essentia Uterina D. D. Cnoffellii.

\mathcal{L} . Galbani, castorei, opii correcti n.m. an. \mathfrak{z} ij. spir. sambuci, \mathfrak{v} utriusque rectificati an. \mathfrak{z} xij. Misceantur probè, & in vitro benè clauso, stent in digestionem supra fornacem per octiduum, & diutius; extractio prius benè transcolata in usum servetur.

Essentia Uterina alia.

Sedativum uterinum Cnoffelianum dictum.

\mathcal{L} . Theriacæ opt. \mathfrak{z} ij. extr. castorei \mathfrak{z} j. croci \mathfrak{z} ij. spir. nostr. sedativi \mathfrak{t} bj. Fiat infusio, & post digestionem aliquod dierum, Tra extracta, & per chartam empori filtrata [absque ulteriore destillatione] usui asservitur. Cui & adhuc admisci possunt in \mathfrak{v} i φ risat. s.g. prius dissolut. ol. stil. mentha carvi an. \mathfrak{z} ij.

Misce. Dosis à \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} ij. & \mathfrak{z} ij. in aqua aliqua hysterica, scilicet melissæ, matricariæ, artemisiæ, seu vino: datur & per se cum expectato sudore, ante, & in ipso paroxysmo hysterico. Medicamentum est in qualicunque suffocatione matricis præstans. Præservationis causa sumitur, & singulis mensibus, & circa illud tempus, quo purgationes menstruorum instant.

Mixtura uterina Officinæ Cnoffelianæ, Budissini, Dn. D. Nitzschio olim familiaris.

\mathcal{L} . Extr. liquidi galbani, cum spir. sambuci fact. castorei cum spirit. sambuci extr. opii, simili modo, cum spirit. sambuci parat. an. part. equal. Mixta digerantur in vicem, postea filtrentur & pro usu necessario serventur. Virescit. indicat. Dosis est hujus mixturæ \mathfrak{z} ss ad \mathfrak{z} j. & \mathfrak{z} ss. in haustu aquæ hirundinum, per tres dies.

Proportio hujus mixturæ sit, ut ad unciam unam specierum, sumantur uncie duæ spiritus sambuci.

Mixtura hysterica alia Dn. D. C.

\mathcal{L} . Mixtura antiepileptica nostr. in forma liquida, essent. nostr. uterina ana \mathfrak{z} ss. aqu. meliss. c.v. \mathfrak{z} ij. Misce. Dosis cochlear semis, exhibitum aliquoties remediis aliis multis frustra factis, semper profuit, inde hæc mixtura à Clariss. Cnoffel. in communi usu habebatur.

Pilulæ Hystericæ Dn. D. C.

\mathcal{L} . Extract. castorei, sedativi nostr. pro mulieribus ana. gr. j. M. Formetur pil. num. ij. auri folio obducenda.

Una capiatur cubitum eunti, superbibendo scyphum trium unciarum emulsionis nostræ; & si mulier non dormiat & paroxysmus revertatur, altera etiam pilula post mediam noctem danda erit. Loco pilularum propinavit & infusionem corculi sui benedicti per emulsionem institutam.

Emulsio Hysterica Dn. D. Cn.

\mathcal{L} . Sem. papaveris albi \mathfrak{z} ss. paonia, tilia an. \mathfrak{z} j. nucelcor. cerasor. nigror. Div. aq. artemisiæ, nymphaeæ, flor. sambuci, liquor tilia ana \mathfrak{z} ss. Fiat emulsio, cui adhuc admisceatur man. Christi pralat. \mathfrak{z} j. sedativi magni Archei, q. videbitur (quod ipsemet author emulsioni, prius in officina paratæ adjiciebat) spir. melissa gtt. xxiv. Misce.

Aqua Hysterica compos. perlata.

\mathcal{L} . Aq. meliss. curat. artemisiæ, epilept. Lang. ana \mathfrak{z} j. hirund. compos. flor. Cheiri, cinamomi ana \mathfrak{z} ss. spir. sedativi nostr. compos. \mathfrak{z} ss. melissa \mathfrak{z} ij. conf. manus Christi perlata \mathfrak{z} j. magister. perlar. butyrac. \mathfrak{z} ij. corall. butyr. \mathfrak{z} j. M. Fiat aqua. Datur

Datur hysterici mulierculis, in paroxysmo & extra eum à cochleari uno ad duo, singulis binis horis, agitando tamen semper prius optimè vitrum.

Ex præscriptione Cl. Dn. D. Andr. Cnæssellii pro Magnifica Domina Bussicovva.

Pomum Vterinum Cnæssellianum.

℞. Castorei opt. rec. ʒiʒ. gum. galbani ʒiij. asse fœzida ʒij cera q. s. Milce & F. s. a. pomum, quod ol. succini seu rui inungendum, auri foliis obducendum, & capsula argentea, seu lignea includendum est.

In ascensione & strangulatione uteri, naribus admotum, subito uterum sistit; contra vero suaveolentia utero admovenda: ut moschi aut zibethi grana aliquor, cotone involuta, ut gratum odorem utero inspirent, ipsumque retrahant.

Vteri affectus, maximè strangulatio, suffocatio & furor fiunt ex productis à vitiata digestionem, scilicet ex fœmine corrupto, quæ archeum uterinum furibundum reddunt, ut is vel inflammatioem uteri pariat, vel in animum sæviat, mentemque perturbet.

Itaque Helmontiano modo hunc affectum si quis curare cupit, illi opus absolvendum erit per remedium sedativum archæi, si vero causam occasionalem abstuleris, & hujus acrimoniam sedaveris, tum forsitan uteris de furore remittet. Modum procedendi vide in Franc. Osvald. Grembs tract. medico theoricæ præct. lib. 2. cap. 1. de Defectibus organ. hum. generationis.

In Mensium defectu & retentione

Menstrua retenta multorum morborum causæ sunt, quemadmodum ipsorum purgatio naturalis à multis malis foeminas præservare solet; qua de causa vitio citò occurrendum, ne natura assueta defuescat ab excretionem. Primò. Ex multorum consilio venæ sectio instituitur, & quidem statim à principio, & commodissimè, tribus vel quatuor diebus, ante tempus consuetæ evacuationis, ut materia ad motum concitetur. Vena quæ aperienda, in talo eligitur; sectio & aliquando in robustioribus, & in plethora repetenda est, una die nempe ex uno pede, postmodum verò ex altero, in quantitate, prout Medico videbitur, & natura seu constitutio personæ & morbi permittit. Vbi & hoc observare licebit, quod in junioribus Luna decresciente, menstrua promovenda sunt, unde versus:

Luna vetus vetulas, juvenes nova Luna repurgat.

Sed hoc experientiæ non semper respondet.

Post ad medicamenta lenientia, præparantia & evacuantia deveniendum est. Tandem ad medicamenta, menses moventia, tam interna, quam externa; deveniendum, è quorum numero præcipua & quasi propria sunt; 1. Cremor Tart. 2. Tartarus martiatus. 4. Crocus martis aperitivus. 5. Tartarus solutus. 6. Pulv. cachecticus simpl. & compos. 7. Pulv. chalybeatus simpl. & compos. 8. Diaphoret. antimoniale de regulo fact. 9. Bezoart. minerale 10. TRa. Tart. simpl. & compos. 11. Essentia citri soluta simpl. & compos. 12. Spirit. Tartari aperitivus. 13. Spir. aperitivus acidular. Penori. 44. Spir. de tribus, & plura adhuc alia, quæ Cl. Dn. D. A. Cn. in continuo usu erant.

Vinum Chalybeatum.

℞. Limatura chalyb. ʒiv. rad. arist. O, pimpinella, diſtanni albi ana ʒʒ. fol. rorismarin. majorane, puleg. meliss. ana mʒ. Spica Indica ʒʒ. flor. cheiri, calendula, calcatrippa ana p. ij. cort. aurant. ʒij. cassia lignea ʒʒ. caryophyll. ʒij. ʒij. Spir. ʒ. gtt. aliquot. Species incisa Mangelii Bibl. Pharm. Tom. II.

& grosso modo contusa includantur sacculo, ex sindone rubra, cui superfundatur vini opt. q. s. pro extractione ad supereminentiam scilicet 4. vel 6. digitorum, addendo post saccharum pro lubitu.

Dos. ʒiij. per dies septem, & antequam menses fluere solent.

Nodulus sive sacculus alius, pro vino

℞. Herb. sabina ʒvj. artemis. rub. puleg. meliss. an. p. iʒ. rad. asari, rub. vincl. lil. alb. an. ʒij. gramin. petroselin. an. ʒij. sene elect. ʒij. croc. or. mac. an. ʒʒ. borac. ven. cinam. el. an. ʒʒ.

Incidantur, & contundantur grosso modo, includantur nodulo; pro vino medicato.

Electuarium Martiale.

℞. Conf. melissa, pulegi, flor. anibos an. ʒij. cheiri, cyani, calendula, calcatrippa ana ʒʒ. cond. rad. pimperinella, cort. aurant. an. ʒʒ. magist. florum citri ʒʒ. Diu. gt. v. crystallor. Tartari citri ʒij. ʒij. Diu. Cum sir. de artemisia & cynamomo ana q. s. F. elect. molluscul. Dos. ʒij. per octiduum post egressum è balneo & antequam menses aliàs fluere solent.

Crystallorum Tartari chalybeatorum præparatio.

℞. Cremoris Tartari albiss. ʒviiij. solvatur prius in aqua, seu decocto clarificato sabina q. l. vel in alio decocto idoneo, post adde Citri citri, seu chalybis dulcis cum spir. Citri fact. ʒij.

Et post totalem dissolutionem, liquorem per chartam filtra, filtratum ad medietatem evapora, ac frigido loco ad crystallandum reponere.

Egregium est aperitium, ad menstrua retenta provocanda. Dosis à ʒj. ad ʒiʒ. & ʒij.

In brodio carnis seu pulli, vel in alio liquore destillato & convenienti.

Simili processu fit saccharum chalybeatum.

Electuarium aliud Chalybeatum.

℞. Rasura chalybis subtil. ʒij. cinamomi opt. pulv. ʒij. caryophyllorum ʒj. conf. flor. anthos, pulp. passul. min. an. ʒij. ʒij.

Et cum sir. meliss. & cinamomi simpl. ana q. s. F. Elect. chalybeatum. Dos. ʒj. ad ʒij. superbibendo haustum vini opt. malvatici.

1. Pulvis ad promovenda menstrua.

℞. Cremoris Tartari citri ʒj. succini albi pulv. chalyb. simpl. q. s. Citri nost. m. parat. an. ʒʒ. sacchari citrati gr. xij.

M. F. pulvis, pro dosi, & tales doses n. 20. in tot chartis. Pro Magnif. Domina Rutska.

2. Alia compositio Cl. D. Cn.

℞. Cremoris Tartari ʒj. croci citri n. aperitivi ʒʒ. tartari soluti gr. viij. ol. cinamomi gtt. j. eleosacch. citri ex rec. cort. gr. iij.

M. F. pulvis pro dosi, & tales doses n. 54. pro Damoifella Kriska.

Item ℞. Rasur. chalybis subtiliss. præparat. ʒʒ. conf. rosar. meliss. ana ʒij. eleosacch. citri in rec. cort. gr. vj. M. F. bolus, decies sumendus.

Pulvis Chalybeatus Cl. Dn. D. F.

Chalybis subtiliss. limati ʒij. corallior. rub. ʒj. rad. rubric. ʒiʒ. fol. lauri ʒʒ. sabina, rorismarini, specier. arom. rosar. ana ʒj. boracis ʒij. macis ʒʒ. croci ʒʒ. sacchari Canari albi. duplum omnium M. F. pulvis. Efficacissimus est in suppressione menstruorum & partus promotione Dos. ʒj. cum vino albo dulci, repetitis vicibus, & ante tempus illud, quo menses in ægra fluere consueverunt.

Pilulæ ad promovenda Menstrua Dn. D. Kr.

℞. Troch. de myrrh. ʒss. extr. sabinae ʒj. castorei ʒss. borracis Venet. cinamomi pulv. an. ʒij. ol. cinam. gtt. ij. cum sir. de artem. q. s. Formentur pil. ad placitum. Dos. ʒj.

Vel ℞. Extr. sabinae, borracis Venet. an. gr. xv. salis succini volat. ʒss. ol. sabinae gtt. ij. cinamomi gtt. j. M. F. pilulæ pro una dosi, & tales doses num. 4. in 4. chartis separatim.

Rotulæ Martiales Dn. D. C.

℞. Pulv. cachectici, ʒ fixi diaph. an. ʒss. bezoarici ʒiialis ʒss. succini albiss. preparat. ʒij. sacch. Canar. alb. ʒiv. cum aq. artemisia & melissæ ana q. s. ol. carvi gtt. v. F. rotulæ.

Dos. nu. 6. ad 7. mane in ingressu lecti, per octiduum; & antequam menses prorumpant, etiam iis fluere incipientibus: si non bene procedant.

Tabulæ Martiales Dn. D. P.

℞. Cremoris tartari ʒiiali ʒss. croci ʒiis aperitivi ʒij. bezoari. miner. ʒiialis ʒss. succini alb. preparat. ʒss. sacch. albiss. ʒvss. cum aqua conveniente q. s. Fiant tabulæ seu rotulæ, irrorentur ol. anisi gtt. v. Dos. n. 6. 7. ad 8. bis in die, per 14. dies ante tempus conluctum, ut supra dictum.

Trochisci de Borrace Offic.

℞. Borracis Venet. ʒss. salis succini volat. extr. sabine ana ʒviiij. croci ʒiis aperitivi ʒiv. ol. cinamomi gtt. iv. sacch. alb. subtiliss. pulv. ad pondus omnium. Cum mucilag. irag. per aq. conv. fact. q. s. F. ʒiv. plus minusve. Menstrua potenter movent.

Essentia florum Dn. D. M.

℞. Fol. pulegii, rorismarini, flor. cheiri, cyani, calceatrippæ, calendulae ana m. j. anther. seu fluminum, lil. alber. ʒij. ʒj. cassia lignea ʒij. croci Hungar. ʒivss. Incisa & confusa, grosso modo irrorentur ol. tartari per de. liq. fa. gtt. aliquot, adde spir. secundina ʒiv. ʒviiij. Digerantur per aliquot dies, in vitro bene munito, ad totalem fermè extractionem specierum. Post filtrantur, & ad usum servantur.

Vires essentia, Menstrua retenta promovet, & partum atque secundinam faciliat.

Dos. Coch. j. ij. & iij. per se, vel cum aq. cinamom.

INFLUXU MENSIVUM NIMIO.

Julapium Cnæcellianum gratissimum in fluxu immodico menstruorum.

℞. Aq. spermatis ranar. destill. ʒxii. miva cydoniæ aurea ʒv. sir. spermatis ranar. corallior. an. ʒij. spir. melissæ citrata ʒiv. ʒris per campan. fact. q. s. adde sedativi nostri q. s. pro morbi indigentia. In omni sanguinis profluvio, scilicet menstruorum, lochiorum, hæmorrhoidum, est remedium excellens, maximè pro foeminis delicatioribus.

Dosis ʒij. per plures dies, & donec malum cesset, datur & bis in die, scilicet mane & vespere cum corallior. rubr. præp. ʒj. Pro potu ordinario laudatur à multis.

Decoctum Ligni lentisci.

℞. Scob. ligni lentisci ʒij. cort. aurantior. adhuc sub viridium ʒvj. aqu. fontan. ʒvj. coqu. ad duarum partium consumptionem; colaturæ adde sir. coralliorum, mastichini, myvæ cydoniæ aurea ana ʒss. Misc. Validius redditur, si in aqua aliqua specifica destillata fiat. Lignum lentiscium etiam infundi poterit vi-

no rubro & austero, quo maximè viscera corroborantur.

Electuarium ad fluxum Menstruorum.

℞. Conserv. rosar. antiq. flor. tunic. condit. fr. cynor. rhod. ana ʒj. cydonior. cort. virid. aurantior. flor. aurant. cond. ana ʒss. corallior. rub. c. sperniol. præp. ʒij. sedati vi nost. gr. v. confect. alkerm. sam. & a. ʒv. cum sirup. corallior. q. s. f. electuarium, Vires ex tirulo deprehendantur. Dos. ʒij. mane & vespere sumitur, & per intervalla aliquoties in die, magnitudinis castaneæ dimidiæ.

Pulvis Corallatus Offic. Regiæ.

℞. Coralliorum rub. propria TRa insuccatur. cort. ovorum cum liq. sperm. ranar. præp. ana ʒss. cornu fossilis ʒij. pulv. sperniolæ n. simpl. ʒij. gr. iij. essent. rosar. seu eleosacch. rosar. ʒss. M. fiat pulvis. Fluxum sanguinis menstruorum, etiam post partum laboriosum, nimium sistit. Dos. ʒj. in ʒ appropriata, præscribebatur à Cl. D. D. C. sub hac formula.

℞. Pulv. præscripti ʒj. croci ʒiis astringentis, boli insuccati Cl. Zuvelf. seu speciei nostri dysenterici an. gr. xv. usnea humana ʒss. [ex ossibus scilicet] sedati vi nost. gr. j.

M. Fiat pulv. pro una Dosi. Sign. pulvis specificus in fluxu nimio mensium.

Topicum externum Vitriolatum.

Dn. D. M. L.

℞. Vitrioli Hungarici ad albed. phil. calcinati q. v. spermatis ranar. in cella seu alio loco frigido (beneficio alum. & niri) asservati, pro incorporatione ad pulvis formam q. s.

Hæc mixtura, linteis cinnabinis inclusis & imbutis, dorso & lumbis, circum circa usque ad umbilicum frigide applicetur. Omnem fluxum sanguinis, partium inferiorum miraculose & incantamenti instar cohibet: Et est certissimum experimentum, in contumacissimo affectu, reliquis nihil juvantibus, & ubi periculum vitæ imminet.

Laudatur quoque.

Cataplasma ex Gypso.

℞. Gypsi pulverisati ʒij. pulv. nigr. ex oculis nigris sperm. ranar. rad. consolide pulv. sang. draconis pulv. balanstiorum an. ʒj. albuminis ovorum, (in quo aliquid gummi Arabici & cerafor. dissolutum sit.) pro incorporatione cataplasmatum, q. s. M. optime.

In extrema necessitate, ubi de periculo vitæ agitur, hoc emplastrum seu cataplasma, in linco extensum, & regioni pupis, & lumborum impositum, fluxum nimium sistit mensium. Est remedium extremum.

Mensium fluxus immodicus in S. R. P. L.

curatus à D. D. A. C.

Ser. Reginam L. M. tunc temporis viduam, à fluxu uteri cruento satis feliciter liberavit D. D. C. duabus emulsionibus cum mag. butyr. coralliorum sub noctem exhibitis: De die vero adhibito croco ʒiis adstr. cum coralliis, & topico ex fimo porcino.

Emulsio.

℞. Sem. 4. frig. maj. an. ʒj. papaveris albi ʒss. decocti hordei ʒij. ʒ sperm. ranar. ʒss. F. emulsio, adde man. Christi perlat. ʒss. magist. corallior. rubr. butyracii ʒj. ʒ rosar. gutt. aliquot, misceatur propè. Sign. Nacht-Milch vor Ihr. Majest. die Königin.

Pulvis Corallatus ʒ.

℞. Coralliorum rub. præp. magist. corall. rub. butyracii an. ʒss. gr. v. croci ʒiis adstr. ʒss. eff. citri sic.

ex rec. cort. ext. fact. gr. iij. M. F. pulvis. Sign. Corallen Pulver alle Tagesdes Morgens nüchtern. in vehiculo confusio zunehmen.

Pessarium.

℞ Fimi porcini, pulv. sperniol. simpl. ex nigris oculis parati, & proprio mucagine insuccat. ana q. s. ▽ aluminis & Oli per aqu. sperm. ranar. fact. q. s. Fiat massa, ex qua cum sindone rubra fiant pessaria, competentis magnitudinis, immittantur utero ad reprimendos & adstringendos menses valde profluentes si nempe venæ cervicis uteri apertæ sint.

* Not. Sunt qui loco fimi porcini alinum sibi eligunt, & tam extra quam intus exhibent.

Lotio tibiarum in aqua frigida, aut decocto adstringente, & hoc conducit.

De reliquo omnia illa remedia, quæ alias in hæmorrhagia nimia hæmorrhoidum præscribuntur, & hic (in excessu magno mensium) locum habent, præcipue illa, quæ ex occulta & specifica qualitate fluxui sanguineo resistere solent. Aliquando & ad narnotica devenire licet; in cujus finem commendantur illæ pilulæ, quæ in *Miscellaneis Medico-Physicis Natura Curiosorum*, Ann. secundi obs. LIII. à nobis describuntur, quorum delineationem per unam & alteram formulam hic reperio.

℞ Vinea microcosmi pulv. eboris fossilis, seu corallior. rub. præp. ana ℥j. opii nostri correcti, gr. j. cum sir. idoneo.

F. pilulæ foliato auro obductæ, quæ secundo semper die (in emulsione aliqua appropriata, ex seminibus scilicet 4. frig. maj. cum aq. sperm. ranar.) à cubito eunte sumuntur.

Aliquando & hæc formula placuit.

℞ Vinea cranii humani, vel in aliis ossibus humanis collecta ℥j. corallior. rub. insuccatorum pulv. sperniolæ ana ℥ss. sedativi nostri gr. j. misceantur & cum sir. sperm. ranar. seu miva cydoniata formentur pilulæ. Vfus cum superioribus convenit.

Cubilia & Culcitæ herbaceæ.

℞ Herb. bursa pastoris, artemisia rub. polygoni utriusque, lysimachia, folior. quercus, musci quercini, prunor. sylvestr. ana q. s.

Ex istis herbis & foliis, quæ ubique locorum facile haberi possunt, parantur cubilia & culcitæ, in quibus infirma noctu jacere & quiescere potest.

Amuleta.

Inter alia remedia, hic à viris doctis adducuntur & amuleta quæ collo appensa seu manibus tractata ac cutim corporis attingentia omnem hæmorrhagiam corporis humani sistere creduntur.

Hic verò loquor de amuletis Physicis, Medicis, licitis & naturalibus, quæ occulta sua proprietate, divinitus in prima sui creatione indita semper eodem modo agunt in corpora, quibus applicantur, sive sua sympathiâ, sive antipathiâ. Magicis & superstitionis periaptis, quæ & nos improbamus, & detestamur, hic nullus debet esse locus.

Præ aliis commendatur à multis Medicis bufo transfossus, sole in leone existente exsiccatus, & sindoni alligatus, ac regioni cordis applicatus, vel brachio ejusdem lateris. Et hoc erat Cl. Dn. D. A. C. p. m. amuletum ex quo & suum parabat empl. magneticum, cujus conciliatio suo loco inter medicamenta antipestifera describitur. A nonnullis celebratur & glomus ex musco arboreo, ligni quercini seu pruni sylvestris sub axillis gestatus. Præstantissimum amuletum fit ex pulv. bufonum, succino, vinea humana & sperniola [ex oculis nigris parat.] cum mucilagine tragacanthæ per

aq. sperm. ranar. facta quod omnem hæmorrhagiam immedicabilem subito quasi cohibere solet; Ejus accuratorem descriptionem, inveniet B. L. in *Ephemerid. Naturæ Curiosior. German. anni secundi obs. 53. p. 101.* ubi & armillæ, corallia, poma & tabulæ in eundem usum pro fœminis describuntur.

APPENDICE.

Circa usum topicorum superius recitatorum sequentia etiam sunt observanda.

Primo. Si cruor peccat vitio alieno, vel ob qualitatem vel quantitatem aut materiæ alienationem, tunc temporis aliquantisper fluor sinendus est, quia conducit & à multis morbis mulieres liberat gravioribus. Si verò vires dejiciat, tunc cohibere oportet prius quidem per revulsiones & derivationes: postea medicamentis tam internis quam externis & quidem incrassantibus & adstringentibus, & quæ ex specifica qualitate fluxum sistunt & à nobis proposita sunt, ubi & tempore curationis, viscerum corroboracioni, & viribus prospiciendum erit.

Secundo, ne remedia topica nimis astringentia, & refrigerantia adhibeantur, priusquam revulsiones sufficienter celebratæ fuerint, ne postea tumores in utero, aut graviora symptomata concitentur; idque consentientibus aliis medicis insinquare debui. Revulsiones autem instituuntur per sectiones venarum in partibus superioribus cum impetu, & quidem reiteratis vicibus & digito per vices foramini admoto; tamen cum discretione, & præstat missionem sanguinis partiri, & bis, vel ter repetere, quam copiosiore sanguinis extractione, vires dejicere. Quod si fluxus adhuc perseveret, vires sectionem venarum non permittant, ejus loco cucurbitulæ dorso & regioni hepatis sunt applicandæ. Quæ & mammis, iussu Hipp. 4. aphor. 50. applicari possunt; quod tamen Galenus in *Comm.* non ipsis mammis, sed infra ipsas institui vult; si etiam difficultas aliqua spirandi superveniret, cucurbitulæ statim à mammis removendæ sunt. Plura alia quæ in hac curatione observatu digna sunt, ab Authoribus recensentur, nobis solum hic materiam medicam tractare libuit.

UVA CRISPA, sive UVA SPINA, vid. *Grossulata*.

UVA LUPINA, vid. sub titulo *Solanum*.

UVA PASSA, De ea vid. sub titulo *Vitis Vinifera*.
Hic tantum.

Passulæ laxativæ ex *Pharm. August.*

℞ Folior. Senæ Alexand. ℥iij. cinnamoni elect. zingiber. an. ℥iij. endivia ℥iij. Infunde per hor. viij. deinde ebulliant ac leniter exprimantur: huic decocto addantur, sacch. alb. ℥iij. passular. minor. mundat. ℥j. atque post justam collationem reponantur.

Eodem modo parantur & Cybebæ & Pruna laxativa nostris usitata.

Addictam alvum leniunt fœcesque detentas expellunt. Dantur puerulis delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus.

Efficaciores sed minus quidem gratæ, & nonnihil amarelcentes evadunt hæ passulæ, aut cybebæ, si loco aquæ endiviæ, mucharum rosarum sumatur.

Passulæ laxativæ siccæ D. Immanuelis Didymi ex *Pharmac. August.*

℞ Passularum minor. ℥j. radic. esula ppt. radic. hellebori nigri ppt. āā ℥ij. Bulliant in ℥j. aq. ad medias, colentur, foris exprimantur, addendo postea pulveris diacrydii ℥j. Quæ mistura passularum minorum succulentarum & optime mundatarum ℥vi. adsum-

CCCC 4

dantur.

datur, omniaque in patina collecta prope concutiendo permisceantur; deinde passula extendantur in eadem patina, & prope fornacem exsiccentur.

Passulæ purgantes siccæ ex Zouelfero.

℞. Passular. probè repurgatar. ℥i℥. macerentur una alterave die in aq. cinnam. vel rosar. fragr. ℥iij. circiter, quod totam absorbent aquam, propterea sæpius commove. de, postquam verò lenissimo in calore parumper siccata fuerint conspergantur pulvere sequenti, ut potè Diagrydii sulphur. amygdalis dulcib. probè subacti, ℥i℥. crenior vari. ℥vi.

His mixtis pulveribus passulæ obvolutæ & conspersæ, leniter & ferè totaliter exsiccentur & servantur usui.

Valide operantur hæ passulæ neque ingratae sunt palato, cavendum tamen ne iis in affectibus adhibeantur quibus diagridium, vel scammonium obesse & tormina excitare potest. Dosis ℥ss. ad ℥vi.

UVA VULPINA.

Vid. Tabulam xxxi. hic adjectam.

Herba Paris dicta caulibus non ramosis, unico in singulis flore & bacca, de terminatè sive ex una distinctione foliatis ab aliis omnibus plantis distinguitur.

℞ B. Radicem obtinet tenuem, geniculatam, repentem; Caulem mediocriter crassum, teretem, solidum, duos palmos altum, prope terram rubentem, superius viridem: folia duobus cis summum caulem digitis quaterna, rarius quina [tenere antequam hastam producat terna sunt], ex angusto principio lata in acumen desinentia, rugosa, & nervosa, per margines æqualia, internè splendentia, supernè non item flos in hastula singularis, ex quatuor latiusculis, acuminatis, viridantibus foliis inter quorum duo quilibet foliolum tenuissimum acutissimumque ejusdem coloris intercedit. Stamina pro foliorum numero octona, longa, acuta, viridia; additamentis croceis [aliàs albenibus] obfita, in medio sessilis baccula quadrangula, & interdum pentagona, atro purpurea, ex cujus umbilico quaterna filamenta ejusdem cum ea coloris emicant. Semen acino inclusum album, minutum [magnitudine papaverini aut Amaranthi] copiosum. Odo: virosus & ingratus.

In montium, sylvarum, convallium & frutetorum opacis, ac perinde aliis umbrosis pingui, ac lato reperitur solo, ut rectè I. Bauhinus. Aprili mense è terra exit, & Maio aut Junio baccam perficit. De hujus viribus sic breviter Schroderus: bacca & folia refrigerant & siccant. Vitis baccatum internus est alexipharmacus in peste, venenatis morbis, venenisque assumptis (ex gr. Arsenico) extrinsecus foliorum usus est in bubonibus pestilentialibus aliisque calidis tumoribus, in paronychia, in ulceribus inveteratis.

Plantam hanc non Aconitum credendum esse, sed potius Alexipharmacum probat Lobelius experimento duorum canum, quibus Arsenicum & sublimatum dederat, quorum alter, cui pulverem Saxonicum exhibuit, convaleuit; (hic error adest, nam pulvis Saxonicus nihil prorsus Vvæ vulpinæ, seu Herbe paridis continet,) alter, cui nihil dedit, extinctus est. Vid. historiam integram *Adv.* p. 104.

An tutum sit pestilentialibus morbis applicare narcotica, merito controversatur, inquit J. Bauhinus. Cap. i. Hofmannus ad fidam experientiam provocat Marthiolus adversus veneficia commendat, atque se novisse quosdam veneficiis semistultos factos, hujus plantæ semine ad vicissimum usque diem hausto drachmæ pondere, pristinae sanitati omnino restitutos esse, nos contra pronunciamus eos semistultos vel plane stultos esse, qui credunt veneficia à sagis illata

[Si tamen intulerint] tolli posse per verba, aut ejusmodi præstigias.

Quod ad verba attinet & nos Cum Bauhino sentimus: non videmus tamen Cur herbæ non possint corrigere & sanare morbos, quos Spiritus mali humores corporis depravando intulerint. *Raim.*

Hæc omnia de viribus Vvæ vulpinæ ex Aconito Salutifero, seu Herba Parid. enata, parum accurata sunt, & nexum inter se non habent.

WINTERANUS CORTEX vid. Cortex *VWinteranus.*

VULNERARIA, sive Traumatica Medicamenta.

Latè patens & usu commendata est materia traumaticorum. Dicimus *Traumatica* in genere, ut latitudinem illam exprimamus & complectamur omnia sub hoc genere militantia, sumendo vocem *τετραμαχικόν* latius, ut *καὶ ἐξ ὅλης* quidem vulnus, adæquatè tamen omne unitatis solutæ vitium sub se contineat. Idque & necessarium & convenientius esse patet, quod traumatica merito non ad sola externa sint restringenda, verum & ad interna, quod hoc pacto omnia illa dicamus, quæ affectis hoc modo partibus debentur, quo sensu initio hujus capituli traumaticis generalibus internis & externis agitur; sine & sequentibus de specialibus, externis puta solum.

Ut itaque vulnerariorum generale nomen & usus est ita locum habent, ubicunque integritas partium, in unitate quocunque modo solutarum, restituenda est, sive vulnera indistincta casum & punctum interna & externa, in primis graviora, curanda obveniant; sive contusæ partes livorem, inflammationem, gangrenam minitentur, sive ulcera occurrant varii generis, simplicia, sinuosa, fistulosa, phibistica; quosdam abscessus quoque varii spectant, sive erosiones parietum, membranarumque & vasorum, ventriculi, intestinorum, pulmonum, renum in vomitu, sputo & mictu cruentis; seu rupturæ & fracturæ, rupturæ processum, ligamentorumque & vasorum, in herniis veris quibusvis, fracturæ ossium patentes & latentes.

Verbo impedimenta quæcunque obstantia auferunt, naturamque in consolidatione unicè occupatam juvant unde si ulus speciales attendamus, velificantur in genere requisitis necessariis (1.) labiorum distantium adductioni, (2.) adductorum conservationi, mediantibus fasciis, fibulis, suturis; [3.] ne quid labii vulneris intercidat, cautioni, & [4.] partis ipsius toni conservationi, quæ ad omnem vulnerrum unionem requiruntur. Hinc & infixæ ipsa, tela, globulos, officula, aliaque natura his adjuva ejicit.

Sin materiam ipsam spectemus, sunt illorum duo quasi genera summa: 1. *salina*, & principaliter quidem alcalina, quæ particulis alcalinis; salinis cum terreis remixtis pollent, citra mortuum desiccant, præcipitant & absorbent; adæquatè etiam alia, ut saccharum, vinum, urina ipsa. Illorum exempla præbent herbæ traumaticæ dictæ, in quibus alcalinum principium veneratur *Helimontius*, v. g. agrimonia, alchimilla, aristolochia, bellis, beronica, cerefolium, consolida omnis, virga aurea, hederæ utraque, herniaria, millefolium, pilosella, plantago, pyrola, sanicula, scabiosa, scordium, veronica, vinca pervinca, nicotiana, ophioglossum. Ex radicibus, radix aristolochiæ rotundæ, ulmaria, plantaginis, diptamni, gentianæ, rubiæ tinctorum, scrophul. primulæ veris, flores balaustrorum.

Singulæ hæ salina gaudent facultate prædominante, detergente, abstergente & consolidante. Inprimis verò etiam lapides cancerorum, lapis osteocollæ, bolus armena, terra sigillata, antimonium diaphoreticum, lapis hæmatites, pulvis contra casum, saturnina omnia, ut



E & P





nia, ut lithargyrium, cerussa, minium, lac lunæ, lapis calaminaris, & venerea, pompholyx, æs ustum, rutia.

2. *Balsamica* & sulphurea oleosa, rosida, unctiosa & glutinosa, & substantiâ & effectu talia; v.g. radix symphyti, gentianæ & alia ex dictis, de utroque principio participantia. Ex plantis laudatissimum est hypericum, totum rosido resinoso balsamo fœctum. Sic lignum sanctum, tassafra, fraxini, semen persoliatæ, plantaginis, nux moschata, mumia, spermaceti, sanguis draconis, sarcocolla, flores sulphuris, oleum terebinthinæ, tartari sœridum, balsama omnia quasi, de Peru de Capivva, vulnerarium Mindereri, sulphuris ad extra; essentia traumatica Rolsincii, N.O. hyperici, catechu, symphyti, mumia; extractum agrimonis, hyperici, plantaginis, scabiosæ huc faciunt.

Horum agendi modum quod spectat, facile is enitescit, si attendamus & materiam hanc dictorum, & quæ in vulneribus accidunt. Cum enim per vulnera quæcunque partes lædantur, ut liquores vitales eadem minus vegetare, ibidem recipi & remitti queant, continuo vigore; Hinc consolidantia & traumatica hæc sunt, quæcunque eisdem liquores, sanguinem & serum ad id aptant, ut & ipsi partis clima non destituant, aliàs communi vitâ privandum, & ita conservetur in tono suo, ut defectus resarciri omnis, hiatus suppleri, & factâ successivâ appositione cuncti divisa possint, factâ demum plenariâ per callum, vel cicatricem obfiguratione.

Hinc ex dictâ divisione balsamica sulphurea respiciunt potissimum sanguinem, seu partes ejus oleosas, balsamicas, calorem innatum roborant & fœvent, gluten carniū juvant & *πλεονέκτην* necessarium suggerunt; alcalina verò serum ichorelscens corrigunt, ejusque *σάρον* & vappescantiam prohibent. Utraque putredini resistunt, sanguinem in ordinem redigunt, tonum ac balsamum conservant. Hinc & insignis eorum usus apparet in ichore ulcerum & vulnerum seroso, *Glied Waffer*, ubi sola conveniunt & potissimum partis calorem roborantia.

Hinc & speciatim usibus illis præstandis præstò sunt, quæ desiderantur vel concurrunt circa vulnerum curationem, ut coindicantia; quatenus simul quædam illorum sunt quoque styptica, laxitatem pororum concentrantia, exemplo plantaginis nûc. mosch. ulmar. alchimill. agrim. vinc. pervinc. sanic. &c. ut muniam & alia tacuimus; quædam sunt deterfentia & mundificativa, ut vitriolica, venerea &c. sanici, ichori, putrilagini debita; quædam resolvunt, in apostematibus internis variis, & sanguine extravasato; à casu ab alto aliisque casibus utilia; ut cerefolium, bellis, millefolium, lapides cancerorum, mumia, sperma ceti, essentia traumatica nostra &c.

Inter hæc traumatica exempli loco inservire possunt potiones vulnerariæ communiter dictæ, *τραυματωρύματα*, *Wund-Tränke*. Usus horum celebrant recentiores. respectu antiquorum Chirurgi, tum empirici, tum dogmatini, *Guido*, *Vigo*, *Paræus*, *Fallopius*, *Tagaulcius*, *Joh. Andr.* à *Cruce*, *Aquapendens*, *Fernelius* & alii. Sic speciatim *Guido* eas in ulceribus antiquis, fistulosis & cancris, nec non in sanguine congelato, in partibus internis, ac sanie concretâ in pectore, itemqua in herniis exhibet. *Paræus* l. 18. cap. 18. observasse se scribit, naturam hujusmodi potionibus adjutam mira non raro in cariorum ossium correctione, in ulcerum consolidatione, in fracturum ossium fermentatione, innervorum unionis restitutione fecisse. Adde & infixorum telorum expulsionem inservire, quod ipsi observavimus. Studiosus globulo plumbeo in pede læsus, cum citra graviolem noxam eximi hic non posset, ab infuso traumatico per aliquot dies sentiebat manifestam ab intrâ protrusionem, ut levissimâ manu

extraheretur. Imò & ad vulnera externarum partium & profundiora usum horum extendunt, ipsumque etiam externum ad usum, licet tunc non tam potiones, quàm foris audire debeant, siquidem traumatica cum vino decocta tum vulnera capitis, tum alia curant.

Utut verò unanimi ferè consensu autores chirurgici potiones seu decocta vulneraria commendent; eas tamen *Baldwinus Rensseus Epist.* 66. p. 226. rejicit atque contemnit; (1. quod Hippocrates nullam earum faciat mentionem, (2.) quod externis vulneribus externa tantum competant glutinantia, cum distantiora sint, quàm ut eò dictæ potiones penetrare valeant; (3.) quod denique pro vulneratarum partium varietate traumatica etiam remedia varianda sint, non unum potiones genus indiscriminatim omnibus adhibendum. Unde concedit solum, in ulceribus gulæ: ventriculi & intestinorum ea exhiberi posse, & læsis gulæ atque ventriculo per os assumenda decocta talia; intestinis autem affectis, per anum injicienda esse, verum in aliarum partium vulneribus nihil utilitatis asserre sibi persuadet.

Infirmiora sanè hæc argumenta sunt, quàm ut evincant aliquid. Neque enim [1.] sequitur, si Hippocrates nullam facit mentionem potionum vulnerariarum, ergò non sunt adhibendæ; cum notum sit, multa pristinis seculis incognita fuisse, quæ posterioribus innotuere, longò usû & experientiâ; ut taceamus plura fuisse ipsis ipsis in usu, quæ posteris non æque nota sunt. [2.] Falsa est hypothesis, externis externarum tantum competere, tum alia, tum traumatica. Sæpè in præxi occurrunt, qui ob sanguinem acrem Scorbicum vulnera, etiam levia, longa & minus curabilia sentiunt. Traumatica vero & suo loco faciunt ad inemperatum sanguinem alterandum, vitiosum depurandum, concretum dissolvendum, putredinem inhibendam; & ut character balsamicus consolidativus eidem inducatur; quò factò ipsa postmodum curatio eo felicius & facilius succedit, cum sanguis & serum futuræ *σαρκογενεως* & *νοσησεως* sit materia. Quare, licet potiones vulnerariæ non suâ substantiâ & corpore ad vulnera & ulcera pertingant, atque ita immediatè prodesse queant, eò tamen virtute suâ penetrant, & mediante sanguine, cujus curam gerunt, plurimum conducunt.

Notandum tamen est, potiones vulnerarias in usum potissimum non tractas, quòd non nisi simplicior præparatio illis seculis innotuerit, esse tamen & illam satis hodiernam selectoribus prostantibus, usitatam, modò cautelæ adhibeantur, quæ omnes innituntur aquisitati & cruditati conjunctæ, ne inde vel pars affecta imprimis, quæ sicciora amat, vel ventriculus lædantur.

Quemadmodum autem certum est & constans fîdumque assertum, vulneraria pro interno usu ad externam curationem plurimum prodesse, quò nomine expressissimam deprehendimus essentiam traumaticam, in *Tr. de terra Japonicâ Hagendornii* descriptam, ut lapides cancerorum vel solos cum successu usurpatos taceamus; Ita alterum illud certum quoque est, traumatica varianda esse pro ratione affectuum & effectuum. Illorum ratione, quòd variet contusio ab ulcere, utraque à vulnere simplici, à fracturâ, quin vulnus à vulnere, ulcus ab ulcere distat. Variant ratione locorum affectorum; variant ratione materiæ ipsius dictorum traumaticorum.

Hinc traumatica alia sunt generalia, alia specialia, tum simplicia, tum inter se nupra, undè selectu opus est. Sic v.g. in vulneribus capitis usitatissima præ reliquis est betonica undè & emplastrum de betonicâ unicè tunc expetit; scabiosa, veronica, symphytum, bugula, veronica pulmoni magis favent, undè in phthisi optima, & aliàs quoque pectoralia cum traumaticis, ut v.g. elixir pectorale cum essentia traumatica mixtum, agrimonia magis hepate affecto & renibus, v.g. in mictu cruento & gonorrhœâ etiam virulentâ, laudem meretur, quo casu optima

optima sunt traumatica illa decocta.

Hæc in genere tùm de traumaticis ipsis, tùm de usu interno dicta suntque. Ejusdem commatis verò sunt & sarcotica, glutinantia & epulotica, de quibus suò locò. WEDELIVS.

Vulneraria specifica ex Andrea CNOFFELIO.

Oleum anodynum refrigerans.

℞. Ol. spermatis ranar. lunbricorum, ex succo cancror. ana ℥ss. medulle crurum boum ℥iv. His mixtis immergantur fol. hyoscyami, solani, semperivi ana ℥ib. flor. nymphaeae, verbasci, sambuci, rosar. ana ℥ij.

Digerantur aliquandiu, postea coquantur leniter, & ad humiditatis exhalationem; colentur: post exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; In febribus ardentibus, spina dorsi eò inungenda est. Ex hoc oleo fit

Unguentum refrigerans.

℞. Olei anodyni antea præscripti ℥iv. cera alba ℥j. quibus invicem liquatis sub continua agitatione adde Aq. rosar. odor. ℥vj. in qua prius dissol. sit anodyni mineralis ℥ij. spermatis ceti res. ℥vj. camphora ℥ij. Fiat l. a. unguentum refrigerans, quod potenter sistit omnes inflammationes; Efficacissimum est ad combustiones, dolores podagricos, & ulcera dolorifera maxime antiqua.

In doloribus renum & inguinum à causa calida & inflammatione ortis egregiè conducit.

Unguentum auratum, in scabie & alopecia leprosa, remedium certum.

℞. Bals. Aris terebinth. ℥ib. o. Frisæidi rectificum ℥ss. flor. Aris ℥ij. sulph. aurati ex scor. Reguli ℥ij. ℥j. mercurii dulcis gr. xxiv. M fiatque linimentum.

Præmissis præmittendis, loca scabiosa, bis in die inungenda sunt. Tollit & psoriam, & in alopecia leprosa remedium est singulare & sæpius probatum.

Balsamum Samaritanum.

℞. Olei olivarum crud. ℥ss. rectif. per cineres ℥ss. herb. memord. ophioglossæ ana mj. balsamina, millefolii ana m℥ss. flor. hypericonis m℥ij. verbasci, mj. Maerentur per o. iduum, post adde Tinct. flor. hypericon. per vinum odor. fact. ℥ss. Bulliant deinde in duplici vase opt. clauso, ad consumpt. vini. Post colaturam exprimantur species fortiter; oleo expresso rursus infunde Flor. hypericonis m℥ij. momordica mj. balsami Indici ℥ij. crudi de Botin. ℥iv. Digerantur denuo in MB. vitro benè clauso, postea exprimantur iterum; & balsamum ita conciliatum usui aservetur. Balsamum est præstantissimum, quod omnia vulnera inflicta brevissimo tempore sanat, agglutinat & conjungit absque suppuratione, etiam dissolutum reparat, carnem renovat & ab omnibus aliis symptomatibus defendit.

Balsamum Saturni, aliàs butyrum Saturni
D. D. Craft.

℞. Olei anodyni refrigerantis ℥ij. sacch. Saturni crystallisati ℥ss. aceti rosacei q. s. Redigantur in mortario plumbeo, seu, patina stannea, agitando in butyri consistentiam adde ol. stil. ver. rosarum gr. iij. Omnibus inflammationibus, ambustis, erysipelati, multisque aliis convenit, est enim unguentum nobile refrigerans.

Empl. Samaritanum vulnerarium domesticum.

℞. Olei seu balsami Samaritani ℥ij. lithargyrii pulv. ℥ss.

Coqui. lento igne, spatula fraxinea semper agitando ad empl. consistentiam, cui statim adde, prius liquefact. cera ℥bj. Terebinthina Venet. ℥iv. ol. lauri ℥ib. In quibus dissolutum (scilicet in Terebinth seu oleo) gummi elemi ℥x. post immisceantur & pedecentim, sub continua agitatione, gummi purgat. *i. oppanacis galbani ana ℥ij. soluta prius in phlegmate Oli. ad pulvis formam q. sitandem add. aristoloch. Ode, & longe an. ℥ij. masticeis & olibani ana ℥ij. myrrha ℥j. camphora dissoluta, (in balsam. de Peru) ad pulvisculi formam q. s. ℥ss. Fiat, omnibus exactè mixtis & copulatis, [cum pistillo, ex ligno fraxineo] emplastrum universale omnibus vulneribus, antiquis & recentibus conducibile, quod brevissimo tempore conglutinat, sanat, & ab omnibus symptomatibus defendit, & quidem absque alio remedio balsamico adhibito.

Empl. vesicatorium Cnoffelianum.

℞. Axung. ursti, leporis ana ℥ss. cera virginea, ℥ib. cantharid. pulv. ℥ss. cinab. præparat. ℥j. euphorbi ℥ij. camphora ℥ij. Fiat massa emplastri, cujus ℥j. vel ℥ib. & ℥iib. extenditur super alutam, ad loca à Medico monstrata.

Emplastr. ad fracturas ossium Illustriss. Domini Adergast, Præfecti Tabuli
S. R. M.

℞. Ol. olivarum m℥ij. lithargyrii pulv. ℥bj. Coquantur ac consistentiam cerati. Adde in alia parcella prius liquefact. cera ℥iv. resina ℥ij. Quibus omnibus exactè mixtis superinspergantur sequentes pulveres, ut pote.

Rad. consolid. maj. pulv. boli Armena subtil. pulv. an. ℥vij. farina fabarum ℥ij. mumia Egyptiaca, tragacantha ana ℥j.

Misceantur omnia exactè, fiatque emplastrum justæ consistentiæ.

Vires hujus emplastri sunt insignes, ad fracturas ossium sanandas; Eorum enim coalitum promover, calum, quo semel agglutinantur, auget, insuper fovet calorem partis nativum, genus nervosum roborat, & humorum fluxiones sistit, partibus vero prius reductis & ligaturis, ferulisque idoneis probè adjunctis. Commendatur in herniis quoque sanandis, & in doloribus podagricis placandis; quemadmodum Seren. Majestas J. C. H. CASIMIRVS, p. m. Rex Pol. hujus emplastri auxilio sæpius restitutus est.

Pulvis pro cataplasmate ad fracturas & luxationes ossium. [German. Darband.]

℞. Rad. consolidate majoris ℥ij. ulmaria, farina farbarum volatilis ana ℥j. boli Armena ∇ Oli dulcis, flor. osteocolle ana ℥ss. ℥ij. sacchari Hni ℥ij. pulv. simplicis ex spermate ranarum ℥ss.

M. fiat pulvis subtilissimus:

Usus hujus pulveris: ℞. Pulveris præscripti ℥ij. vel iij. albuminis ovi in spumam agitatione, redacti q. s. ad incorporandum, & fiat cum stupa & ro madi cataplasma frigide applicandum membro luxato. In sanandis ossium fracturis ejusdem virtutis est cum emplastro superius descripto: omnes namque fluxiones ad partem affectam impedit, & ne humores affluxi corrumperentur, cavet. Necesse est, ut hoc cataplasma per septem vel octo dies cum adhibita ligatura in parte affecta relinquatur, donec ægrotus perferat se melius habere. Plura vide apud authores, qui chirurgiam tractant.

Postquam de Medicamentis Vulnerariis in genere ex Clariss. VV. EDELIO; deque quibusdam inter

inter ea Specificis ex Andrea CNOFFELIO hætenus egimus; Lectori nihil ingratum forsam fecerimus, si ipsi etiam de Herbis Vulnerariis, seu Traumaticis apud Nos aliosque sanè multos non parum usualibus, de quo earumdem variis præparationibus ac effectis ex propria experientia aliquid addamus.

Herbæ Traumaticæ apud nos familiares sunt, Alchimilla, seu Per Leonis, Sanicula fæmina, seu Heliborus niger Saniculæ folio, Bugula repens, Pyrola utraque ac præcipuè major, Veronica montana, Virga aurea eique affinis Consolida Sarracenica, & Angelica montana, quibus quandoque adducuntur Vinca Perwinca, Consolida, minima, seu Prunella, Pulmonaria variæ, Betonica, Lingua cervina, & flores Hyperici, verùm septem plantæ primo enumeratæ propriè & præcipuè constituunt herbas quas vulnerarias nuncupamus, quasque eo nomine usurpamus, & non paucis inter externos usurpandas mittimus; aliæ verò in casibus quibusdam specialibus, nunc scilicet hæc, nunc illa, superadjiciuntur.

Quò autem pateat effectuum quibus ejusmodi plantarum congeries prædita reperitur ratio, aliquid dicendum venit de principiis unde illi deducuntur, quapropter solidis experimentis innixi affirmamus eas non parum continere succi cujuspiam verè glutinosi ac balsamici partibus nutriendis ac consolidandis verè apti, & præterea sal alkali possidere, indolis aliquatenus stypticæ, ac propterea naturæ mixtæ ipsisque admodum specificæ, quo mediante non tantum sero excludendo vias reserunt, sed etiam fibris partium per quas prædictum serum extruditur, novum robur addunt. Volatiliores particulas quod attinet, parè admodum eas possident, si Angelicam exceperis quæ inter alias non est sanè nobilissima. Hoc autem per transennam dictum fuerit contra eorum præconceptam opinionem qui vulnerarias nostras coquere pertimescunt, easque in infuso tantum parandas volunt, ne scilicet pars volatiliior abeat: Etenim dum conservandæ qualitati non parum chymice allaborant, negligunt interim quod præcipuum est, scilicet unctuositatem balsamicam ac sal illud naturæ mixtæ de quo mox; quæ sanè coctionis paululum protractæ vi ab iis educuntur, dum modò in vasis probè coopertis hæc perficiantur.

Ex iis quæ mox enarrata sunt satis patet plantas nostras vulnerarias, 1. ratione salis sui, in succis coagulatis dissolvendis; putulentia in carnes vel viscera effusa detergenda; fibrisque harumce partium corroborandis verè efficaces esse. 2. ratione glutinositatis balsamicæ, ulceribus ac vulneribus consolidandis; salibus præterea acrioribus & corrodentibus ulcerationes conficiendis & conservantibus, sopiendis ac mortificandis; sanguinisque consistentiæ restituendæ, aptas esse. Vno verbo, eas privilegio quodam non parum speciali duobus principiis descriptis manante, duas actiones aliquatenus oppositas de se promere debere, dissolutionem nimirum illius & quod præter naturam coagulatum fuerit, & inspissationem seu condensationem illius quod ultra modum, rarefactum ac subtiliatum sit, adeout si in superbioribus illis panacearum nominibus versari gestiremus majori suo merito plantæ nostræ iis insigniri ac pro talibus obtundi potuerint, quam non paucæ compositiones ac præparationes Chymicæ quas quidam Autores de se & operibus suis magnificenter sentientes magno fastu oggerunt, nam utrumque morbidum principium secundum recentiores quosdam alkali scilicet & acidum extra modum evehum, oppugnant: Ac etiam condensando & rarefaciendo in variis casibus,

quicquid requirebant Methodici veteres, ut & quidam inter recentiores verè nobiles Medici, absolute complent. Sicque in omnibus morbis facere debent. Verum animo omni præjudicio verè libero rem intueamur, & inde patebit, pauca admodum medicamenta nobis occurrere quorum effectus sint universaliiores quàm qui ab hisce plantis emanant, præcipuos autem quos experientia plurium annorum nos docuit, ut & methodum secundum quam in variis casibus præparantur jam describamus.

Nobilissimi sunt affectus in febribus lentis ac phthisica dispositione, si modò præmissis præmittendis, nec neglectis aliis auxiliis diutius usurpentur matutinis horis juscule è pullis gallinaceis, vel alii tenuiori abundè coctæ, aut etiam earundem decoctum saturatius lacti in asinino, caprino vel vaccino ad medias admistum ægris propinetur, quod præterea decoctum in emulsionibus è seminibus frigidis & pistaciis recentioribus extrahendis ac vesperti iisdem ægris exhibendis commodè impenditur. Adnotandum autem quod pro decocto herbæ siccæ sunt aptiores, pro jusculis verò eadem recentes & virides.

In ulcerationibus partium corporis externarum, item in ulcerationibus oris & narium succo ex iisdem plantis viribus expresso, aut viridium tempore brumali defectu, siccarum decocto saturatiori cum fructu utor, alterutrum scilicet, sed præcipuè succum, dum prostat subinde applicando & iniiciendo. Inter præmemoratas autem ulcerationes, profundiores quasdam in naso cum ossis vomeris non parva deperditione, palati itidem grandiores, ut & pectoris fistulosas, per intus & extus adhibitum medicamentum non semel vidi curatas.

In Diarrhæis ac Dysenteriis specificum præbent remedium, si non tantum vino rubro, si absit febris, vel aquæ aut juscule, si eadem adsit, incoctæ propinentur; sed etiam earundem succo aut saltem decocto admodum enematum injecto, intestina subinde proluantur.

In ulcerationibus oris, palati, faucium, intestinorum &c. mox memoratis non terminatur earum virtus, siquidem etiam extenditur ad renem, vesicæ, colli uteri ulcerationes. Verum in hisce omnibus casibus per longum tempus continuandus venit earum usus, adhibendo itidem injectiones quotiescunque ad partem affectam progredi illæ possunt. In œsophagi ulcerationibus ac illa trachæa ulcerosa affectione quæ raucedines pertinaces & molestas procreat, non tantum juscule, aut decocta ex vulnerariis herbis parata propino, & eclegmata ex succo earundem cum necessariis additionibus confecta præbeo. Sed præterea fumus ex earundem decocto ferventiori ex vini rubri ac aqua anaticis partibus parato evehitur per infundibulum in fauces frequentius excipitur quàm maximè curo.

In vulneribus recentibus post primò adhibita ea quæ, si necessarium fuerit hæmorrhagiam comprimere valent partem vulneratam succo, aut validiori decocto harumce herbarum, quotiescunque ea deligatur, perlucet, eundemque præterea succum, paucoli admistum ac plumaceolis exceptum prædictis vulneribus, imò & ulceribus applicandum jubeo, non neglecto interim usu interno ex vino, dum febris abest, vel ex aqua, aut hydromelite ex quo ea advenerit.

In casibus ab alto, ac corporis generalioribus contusionibus illas continuo post venæ sectionem largam manu celebratam ex vino propino, tanquam remedium quod apprimè sanguinis coagulationi inde nascendæ occurrat, quodque symptomata magis aut minus pro majori aut minori partium affectarum dignitate, atrocia commodè prævertat.

In suppressionibus mensium, ut & in fluore mulierum

rum albo utiliter intus ex vino assumuntur; sed præterea respectu fluoris albi adjicienda veniunt injectiones, ut & vapores ex earumdem decocto ferventi elevati. Hic subnectam rem observatione omnino dignam, quod scilicet non secus ac aquæ Spadanæ à Celeberr. Henrico ab Heer's pro mensibus in excessu ac in defectu peccantibus æquè prædicantur, asserere itidem possum quod nostrum hoc medicamentum in suppressis mensibus provocandis, ac iisdem nimis moderandis verè efficax reperiatur, foetuique ad justum terminum in utero conservando non parum faciat in iis quæ per matricis hæmorrhagias abortiunt. Verum in hocce ultimo casu selectus aliquis requiritur removendo scilicet & virgam auream & angelicam, reliquasque tantum quinque cum prunellâ & vincâ pervincâ usurpando.

Atque hac de nostris herbis traumaticis sufficiant donec experientia nos alia in eodem argumento rursus edoceat.

VULNERARIA HERBA, seu *Vulneraria Prætenfis.*

Nomina Anthyllis leguminosa Ger. leguminosa vulgaris Parkins. Loto affinis vulneraria prætenfis Casp. Bauh. vulneraria rustica Joh. Bauh.

Notissima est hæc planta & in omnibus prope pratis satis abundè occurrens. Quidam illam Capogallinaceum vocant, quia scilicet flores subflavos in summis caulibus gerit non absimiles cucullis illis quos quædam gallinæ super capite gerunt. Reputatur autem vulneraria insignis cujus flores olivo infusi præstans in vulneribus recentibus præbeant medicamentum.

VULPES.

Circa hujus animalis descriptionem vid. quæ sub titulo *Canis.*

Hic itaque tantum de partibus Vulpis officinalibus ex Schrodero.

Officin. Nat. ex *Vulpe.*

1. *Pinguedo.* 2. *Pulmo.* 3. *Iecur.* 4. *Fel.* 5. *Lien.* 6. *Pellis.* 7. *Sanguis.* 8. *Integra Vulpes.* 9. *Stercus.*

Vires.

1. *Pinguedo* auxilio est convulsionibus, contracturis, tremoribus, &c. [*illius;*] aurium doloribus, vulneribus capitis & alopeciis.

(Lingua pro acuendo visu appenditur.)

2. *Pulmo* consolidat, abstergit; hinc valet ad vitia pulmonum & angustiam pectoris, (*exsiccatum saltem & combustum.*)

3. *Iecur.* Hepaticis & Splenicis confert, (*simili modo ut pulmo adhibetur.*)

4. *Fel.* Oculorum Pterygio succurrit [*illius.*]

5. *Lien,* Lienis duritiei ac tumori medetur, [*impositum.*]

6. *Pellis pilosa* membris refrigeratis ac articulis morbo infestatis feliciter imponitur.

7. *Sanguis* arefactus & tritus calculo Renum & Vescicæ medetur: idem felicius præstare perhibetur sanguis recens, potus ad *cyath.* scilicet vel abdomidi, pubis, inguinibus ac renibus *illius.*

8. *Vulpes integra, vel caro ejus combusta,* ad vitia pectoris commendatur.

Vulpes in aqua vel oleo optimè cocta, nervinis affectibus, ideoque contracturis ac doloribus articulorum medetur [*si locus affectus eo lavetur.*]

9. *Stercus.* scabritiem cutis sanat [*cum & illius.*]

PRÆPARATA.

1. *Ol. Vulpinum v. Dispens.*

2. *Loch de Pulmone Vulpis. Vid. Dispens.*
3. *Pulmo preparatus s. lotus & exsiccatus.*
- [4. *Parari etiam potest Extractum pulmonis.*

Schroderus.

Vulpes) Hujus pinguedo in affectibus nervosi generis commendatur; convulsionibus scilicet, contracturis, tremoribus &c. Hac si mulierum calceos vel indosium inungas, canes illas permingunt, *Lingua* ejus maximè commendatur Mense Martio excisa ex viva vel modo occisa vulpe & exsiccata, atque usus tempore in vino macerata vulnerique calida admota extrahit omnia; etiam ex profundis partibus D. *Victor Schneider* aegroti cuidam, cui Pulmo globulo tormentatio laceratus, & frequenti sanguinis expuitione frustra pulmonis eiecit, Medicamentum consiciendum curavit ex pulmone vulpis eruento adhuc & recenti statim ex vulpe exempto, qui in aqua symphyti leniter coctus fuit, deinde minutissimè concisus, cui admixta fuere conserva radic. symphyti, amili & in primis sarcocolla purgata sota & lacte muliebri nutrita. Quo felicissimo cum successu usus fuit. Et nulla ferè datur Aqua antiphthastica aut Asthmatica quam pulmones vulpis non ingrediantur.

Testes vulpis exsiccati venerem stimulant intus assumpti. *Hofmannus.*

VULTUR.

Notæ *Vulturum* Characteristicae sunt, 1. quod magnitudine aquilis pares sint, aut etiam majores 2. quod rostrum eis non confestim atque ubi à fronte enascitur, in hamum curvetur, verum post duorum digitorum seu medii palmi continuam rectitudinem, quod Gesnerus in pluribus vulturum speciebus se observasse scribit. 4. quod eximiam præ cæteris omnibus Avibus odorandi sagacitatem obtineant, adeo ut Cadaverum putorem è longinquo percipiant 5. Cadaveribus solis contentos esse & à viventium raptu & lanienâ abstinerere veteres præcipuè tradunt Bellonius, Gesnerus aliique à recentioribus eas vivas volucres insectari, agnos, hædos, lepores, hinnulos, &c. Rapere affirmant. 6. Collum fere implume habere. Bellonius asserit inter reliquas rapaces atque recurvis unguibus præditas aves vultures turnatim volare, quorum magnas turmas & in singulis non pauciores quinquagenis observavit cum è Cairo in montem Sinai proficisceretur, hinc falsitatis arguitur observatum illud Aristotelis *Γαμψανύχον ἔδεν ἀγέλαον.* 7. quod cura tota ad pedes ulque plumosa sint, quâ notâ eos ab aliis raptu viventibus distinguere existimat Bellonius. Verum id nec omnibus vulturibus commune est, nec vulturino generi proprium, cum & aquilis quibusdam competat. 8. quod sub gutture spatium habeat palam latitudine non tam plumis quam pilis, qui vitulinis simillimi sunt vestitus. Hoc verum comperimus in vulture quem in ornithotrophio regio in Vivario S. Iacobi dicto enutritum vidimus; ingluviens ante ventrem velut sacculus propendat; quod in gypæcto dicto Venetiis observavimus. 10. Matrem famina præter morem aliarum rapacium, magnitudine non superat. 11. Alarum incumbens corpori pars leni tota vellere, quod soli inter rapaces peculiare, integitur. Quæ de vulturum generatione traduntur quod sci. Mares inter eos non reperiantur; quod faminae vento impleantur; nec ova sed vivos pullos pariant, &c. frivola omnino sunt & falsa vix memoratu nedum refutatu digna, ex notis hætenus recensitis maxime propria & vulturis characteristica mihi esse videtur, collum implume habere. Dūd certè illi quos solos nobis hætenus videre contigit, non collatantum, sed & capita plumis destituta, & molli dumtaxat brevique lanugine alba inecta habuere. *Villughbeius.*

Officin.

OFFICIN. NAT. ex VULTURE.

1. Caro. 2. Pinguedo. 3. Cerebrum. 4. Fel. 5. Penna. 6. Fimus.

Vires.

1. Caro convenire judicatur affectibus capitis, Epilepsia, Hemiplegia, & simil. Decoctum cutis vitia sanare perhibetur.

2. Pinguedo convenit nervis.

3. Cerebrum subvenit capitis imbecillitati, [illitum vel naribus inditum.]

4. Fel, Epilepsiam arcere dicitur, [assumptum cum vino.]

5. Penna, de pennis nugantur si pedibus subdantur,

quod partum potenter promoveant.

6. Fimus, nidore partum excutit. SCHRODERVS.

VULVARIA.

Vulvaria, seu *Atriplex fetida*, planta est capropter sic nuncupata quod fœtore suo urinoso animalium quasi vulvam redoleat. Descriptionem autem peculiarem non meretur, siquidem cum aliis atriplicibus propriò locò descriptis omnino convenit, nisi quod illis sit multò minor ac odore se distinguat. Ex illà melli incoctâ medicamentum paratur quod Dn. Charas Mel vulvaria vocat, quodque in uterinis affectibus summopere commendat, si modò in clysteriis dissolutum injiciatur, aut aliàs etiam usurpetur.

LIBER XXI.

Continens ea quæ incipiunt à Litera

X.

XANTHIVM, vid. *Bardana*.

XILALOE, vid. *Agallochum*.

XILOBALSAMVM, vid. *Balsamum*.

XILOGASSIA, vid. *Cassa lignea*.

XILUM.

Gossipium seu Xylon duplex est arboreum & herbaceum. Teophrastum lanigeræ arboris in Tylo insula nascentis nomine arboreum intellexisse verisimile est, ut & Plinium. Errasse ergo videntur Botanici nonnulli ipsi, dum Plinium & Theophrastum erroris infimulant, quasi Xylon herbaceum peregrinam & incognitam sibi stirpem pro arbore habuerint. Horum sententias vide apud J. Bauhinum.

Xylon recentioribus bombax & coroneum dictum est, ut Ruellio videretur à mali coronci similitudine. Cæterum xylon tum foliis, tum etiam flore Alceam Indicam dictam refert; vasculo seminali interna tantum loculamenta divisa, & mollissima lanugine candida seminibus intermixta aut adhærente repleto.

Vires & Usus. Quod ad usum attinet, nullum lini genus est quod huic candore & mollicie præferatur (inquit Jo. Bauhinus) quanquam firmitatis in eo parum esse videatur. Hallucinantur autem nonnulli putantes bombacem arte dealbari, nam naturâ candidissima cum lavatur non accipit (quod nec potest accipere) aliquid albedinis, sed è contra amittit magnam partem nivei candoris, secus quam linum quod quò sæpius lavas eò candidius efficit.

E corone autem camisia, femoralia, aliæque vestes fiunt; eaque lanugine passim hodie utuntur ad faciendas vestes, fovendi caloris ergo.

Quod ad usum in Medicina attinet, ulla sistit sanguinis profluvia & præsertim in vulneribus. Seminis medulla tussientibus & difficulter spirantibus mirificè auxiliatur. Genituram quoque auget, proinde venerem stimulat. Oleum è seminis medulla expressum, lentigines, albos & cæteras cutis infectiones delet, palpebrarum quoque asperitates lenit. Lanugo accensa, & naribus subdita uteri strangulatus avertit.

Aegyptii lanugine Xyli arborei [nam herbaceum apud ipsos non feritur] utuntur, linearum peciarum loco quibus nostri tantum utuntur ad ulcera vulneraque omnia sananda. Adhibetur & ipsa, ut nostri faciunt ad fluentem sanguinem sistendum. Seminis quoque mucilaginis usus frequentissimus ad omnes febres ardentes,

Mangui Bibl. Pharm. Tom. II.

atque venena erosionem ventriculo & intestinis inferenda. Ad tussientes ex acrimie salsoque humorum destillationibus plurimus apud eos usus.

Semina in xyllo herbaceo nobis observata strobilis multo erant minora, & ordinatè posita, non tamen coherrentia, neque nigra, ut in xyllo Brasiliano.

Folia trita & cum lacte vaccæ mixta in unctione capitis adhibita somnum conciliant, atque eodem etiam modo sedant dolorem capitis ac ejus vertiginem. Fructus triti, & in aqua epoti fluxui dysenterico sistendo conferunt, serviuntque pro sulcis oris RAIUS.

XIPHIVM, vid. *Gladulus*.

XYRIS.

Nomina. Xyris Ger. Xyris five Spatula fœtida Park. Spatula fœtida, plerisque Xyris ? B. Xyris J. five Gladulus fœtidus C.B.

J. B.

Radix incurva Dod. in novellis plantis rotunda, & veluti bulbi aut cepæ alicujus caput, è qua fibræ dependent crassiusculæ, veteribus & multorum annorum plantis multæ, longæ, geniculatæ, sibi invicem implicatæ, magnum veluti cespitem constituentes. Denique ut formâ ita & acrimoniâ intesa ad tridem accedit. Folia multa cubitalia & sesquicubitalia, in cultrum mucronem desinunt, angustiora quàm vulgaris iridis, atro virore splendentia, fœtidum cimum odorem attritu obolentia: inter hæc caules plures, glabri, crassitie mediocri, per media folia recti assurgunt, quorum singuli canaliculato calici insidentem ferunt florem iridis, sed minorem novem foliis constantem, quorum tribus repandis ex purpura obsoleta albicantibus, virgatis, nulla fimbria villosa donatis, terno modico intervallo imposita, fuliginoso colore, bifida, ligulas concolores occultantia: reliqua tria modice erecta, ab exortu ad medium usque circiter fusca, deinde ex albidò leviter purpurascencia floribus succedunt siliquæ oblongæ, vel [ut ait cordus] Iridis Sylv. similes utriusque, sed paullo majores & triquetri, quæ per maturitatem pæoniæ instar dehiscences semen ostendunt rotundum rubrum, minoris pisi magnitudinis, gustu fervido.

Ad sepes & in dumetis apud nos provenit, sed rarius, observavimus cum Lobelio & ad litoreos maris aggeres: passim Monspelii locis similibus invenitur.

Vires. Ea vi & acrimonia prædita est radix, tamen si

D d d d

cotulam

cotulam aut cimices oleat, & contra capitis vulnera Diosc. teste, faciat & fracturas, educat aculeos & omne telum extrahat citra dolorem: admixta floris æris tertia parte, radicis centaurei quinq; & melle sanat tumores & inflammationes cum aceto imposita. Radix cum passo contusa bibetur ad convulsa, rupta, coxendicum dolores, urinæ stillicidia & alia profluvia. Semen ad ciciendam urinam efficacissimum est trium obolorum pondere in vino potum: Idem & lienem absorbet cum aceto potum.

Lob. ad alvi profluvia bibitur non secus ac Rhabbarum & asarum: Ventris fluores materiam per uri-

nam deducendo & avertendo supprimit. Cæterum opilionibus & rusticorum plebi in præfectura Somerseti Angliæ hujus radicis decoctum aut etiam infusum purgationes Iridis modo molitur.

In omni alvi profluvio nolimus experiri hanc fervidam radicem, inquit J. Bauhinus; forte posset tolerari usus in profluvio alvi pituitoso.

Hujus radices maximarum sunt virium in scrophulis intus sumptæ, D. Needham.

Pulvis radicum exsiccatarum in hysterica passione orthopnæa, & hypochondriacis affectibus utilissimus est, D. Boovle R A I V S.

LIBER XXII.

Continens ea quæ incipiunt à Litera

Y.

YERA, vid. *Contrayerva*.

YPECACOANNA, sive YPECACUANHA.

Nomina. *Ypecacoanna Brasiliensibus; Marg. rario* Herba paris Brasiliana polycoccus.

Maggr.

Ex radice spithamæ longitudine & ampliori, flexuosa, nodosâ seu geniculatâ, multis filamentis lateralibus præditâ, quæque corticem habet subruffum instar Tormentillæ, interius autem alba est & in medio habens medullam, à qua reliqua substantia viridis radicis detrahi potest, medullaque removeri, progeneratur unus aut alter caulis, semipedalis aut paulò longior, teres, lignosus, lentus, coloris cinerescens, partim terræ incumbens aliasque radices agens, partim surrectus. In uniuscujusque hujus summitate sex, septem aut octo ut plurimum folia insident modo herbæ paris, superius saturatè viridia, inferius dilutiora, nervo uno secundum longitudinem, & multis venis transversis prædita instar foliorum lupini, ad tactum ut folia Asari sed molliora. E medio horum in proprio pediculo enascuntur decem, duodecim, aut quindecim flosculi, in capitulum congesti, parvuli, albi, pentapetali, cum toridem staminibus albis. Post flores sequuntur toridem baccæ brunneæ seu saturatè laccæ coloris, magnitudine cerasi sylvestris: baccæ intus continet pulpam albam succulentam, cum duobus granis seminis duris, flavescentibus lenticularis figuræ.

Amat planta humidæ sylvas & in hortos translata nullum sumit incrementum.

Radix contusa, & drachmæ unius pondere in poculo vini aquâ mixti macerata, deinde leviter bullita, si bibatur, per vomitum & secessum purgat, & non solum in dysenteria, sed etiam in affectibus ventriculi datur optimo successu. R A I V S.

Ypecacuanha præter facultatem purgatricem per superiora & inferiora, omni veneno eximè adversatur. Nec credo præstantius remedium adversus plurimos morbos ex longâ obstructione ortos, in primis in ventris fluxibus medendis in hisce terris reperiri facile.

Dux existunt species, neutra à nemine quod sciam, descripta. Utraque eidem usui dicata, sed gradibus facultatum, & facie, & natali solò differunt. Una enim earum humi depressa exiguior in pratis crescit pulegio non admodum dissimilis; nam caulis foliis lanuginosis exsurgit multis, albisque flosculis cingitur: radix illius est crassa, filosa, albicans, à Lusitanis dicta *Ipecacuanha bianca*; quæ quòd minùs turber corpus, & venenis validissimè resistat æquè pueris ac gravidis exhibetur. Altera est longitudinis semicubitalis, trinis

vel quinis tantum foliis ornata. Gaudet locis opacis & tantum in densioribus reperitur nemoribus. In summitate caulis baccas producit nigras, sed paucas. Radice est tenui, tortuosâ, nodosâ, fusci coloris, saporis ingiati, amari, calidi & acris. Exsiccata in multos annos reservatur, nec facile vires deponit antido- tales, sudoriferas; sed quidem vomitivas. Ejus in pulverem redactæ dosis est ʒj. in infusò ʒ. plus minis dux. Facultatem habet abstergendi, meatus referandi, ac infarctus exsolvendi. Utriusque quotidianus est usus, maluit tamen dilutum, quod vel usius noctis sub diò maceratione, aut coctione in aquâ medicam suam virtutem abundè liquoribus communicet. Postea caput mortuum reservatum, denuòque eodem modò præparatum, in eundem usum exhibetur; minùs quidem efficax ad purgandum, vel vomendum, sed magis adstringens. Itaut radix hæc non solum materiam mor- bificam, licet tenacissimam, à parte affectâ revellat, eamque per superiora expellat; sed & adstringendo viscerum tonum restituat. Præterquam enim quòd fluxibus ventris aliisque morbis medeatur, venenis adversatur, virisque, tum occultâ qualitate, tum manifestâ, per vomitum statim expellit. Quamobrem religiosè à Brasiliensibus reservatur, qui illius vires primi nobis revelarunt. Hæc ex *Guilielmo Pisone*.

Ipecaya, vel *Pigaya*, optimè, ut dicunt, dysenterias sanat: Ejus caulis semicubitus est altus, radixque ejusdem est longitudinis: quatuor, aut ad summum quinque folia pessimi odoris promit. Radix pulverata, & per noctem sub diò in aquâ macerata, ac post trahitionem per setaceum mane ab ægrò epota, eum ita ex purgat, ut identidem alvi fluxum sistat. *Joh. de Læet in India Occidentalis Historiâ, ubi de Brasiliâ.*

Ipecacuanha quæ itidem vocatur *Beguquella*, *Speacacuanha*, *Cagosanga*, *Beculo*, *Beloculo*, & *Radix Anri*, est radix pusilla quam Batavi ac Lusitani ad nos deportant è Brasiliæ regione quæ *Rio de Genecyro* dicitur, & quæ non alibi quàm in mineris auri, à quibus nomen mutuata est, reperitur. Colligitur ab iis qui minerarum, seu fodinarum labori sunt adjudicati, & ea propter majoris est pretii, quòd diligentissimus ejus collector unò annò quantitatem duodecim librarum excedere non valeat, & si cum aliis mercibus commutaretur, cæterior multò foret.

Batavi autem, aut alii tres *Ipecacuanhæ* species ad nos dimittunt, nempe *fuscam*, quæ prima est & optima, ac propterea cæterior, *griseam*, quæ minùs vehemens est quàm fusca, & *albam*, de quâ in sequentibus.

Ipecacuanæ tum fusæ, tum griseæ, plantæ sunt medicis

diocri altitudinis, partimque repunt, partim ad dimidii pedis altitudinem eleuantur. Folia gerunt parietariæ foliis non multum abſimilia, è quorum medio flores pronasuntur albi, pentapetali, parvulis capitibus innixi, quibus ſuccedunt bæccæ fuscæ, quæ cum maturuerunt ceraſorum Sylveſtrium magnitudinem æquant. Hiſce bæccis concluditur pulpa albida, ſucculenta in quâ reperiuntur arilli duo duri, ſub flavi, lentis figuram non malè repræſentantes.

Seligatur hæc radix recens, bene nutrita, fuſca, fractu difficilis, reſinoſa, ac nervum in ſui medio habens, advertendumque ne ipſi admiſceatur caulis, ac varia præterea filamenta, & inſuper videndum ut ſit ſaporis acris, amari, ac ingrati. Quidam amici quos Liſbonæ, Maſſiliæ & in Batavia habeo, mihi aſſeruerunt. Quod Ipecacuanha fuſca ſit aliis efficacior, quodque hæc præcipue in auri mineris reperiatur, dum aliæ ſpecies in montium radicibus, ac ipſis pratis & locis humidioribus colliguntur.

Inſervit hæc radix dyſenteriis curandis, alii præterea credunt vires poſſidere alexiterias, verum nemini autor ut facim eâ, niſi maximis cautionibus adhibitis, utatur, atque ex conſilio prudentiorum medicorum, quia vehementioris eſt effectus, ſive in infuſo, ſive in ſubſtantiâ præbeatur.

Dofis huius radicis eſt à ʒſ. ad ʒj. exhibetur autem pulverata in liquore convenienti, manè, jejunò ſtomachò; hauſtò, duabus poſt horis, juſculò pingui, vel lacte. Vomitus autem ciet, priuſquam facultatem ſuam exerat adſtrictoriam.

Ipecacuanha alba ab aliis duabus ſpeciebus differt in eò quod radicem habeat albam *behen albi*, vel *diſtami albi* radicis proſus ſimilem. Folia proſertim foliis acetofæ rotundæ non abſimilia, ſeu ut aliis placet ad polii folia proximè accedentia.

Hiſpani & Luſitani Ipecacuanham albam aliis præferunt, præcipue pro mulieribus gravidis ac pro puerulis, quia ſcilicet cum minori agit vehementiâ, eam autem in ſubſtantiâ ad drachmæ dimidium, in infuſo vero ad ʒij. præſcribunt. Hæc Petrus Poncet in ſua *Aromatum Hiſtoriâ univerſali Gallicè conſcriptâ*. Quibus quædam in ejuſdem operis *Appendice*, præterea addit quæ hic conſultò reticemus, quia ſimilia ex *Nicolao Lemery* jam ſumus allaturi.

Etiãſi *Ipecacuanha* inter præſtantiffima reponi mereatur medicamenta pro dyſenteriâ curandâ, exhibetur tamen aliquando ſine exoptatò effectû, ac propterea poſtquam bis, vel ter propinata fuerit, ſi morbum non ſiſtat, ab ulteriori exhibitione abſtinendum & ad alia remedia, confugiendum. Eam in enematiſus ſæpius immiſcui pro dyſenteriarum curâ, ſed ſemper cum mediocri admodum effectû, vim enim ſuam non exeric ni vomitus ciet. Vidi interim aliquos quos ſine vomitibus ſanavit; verum in iis alvum impetuoſius movit.

Primus qui Ipecacuanham in Galliam adduxit fuit Dominus le Gras, Medicus, qui ter anno 1672. Americam viſitaverat. Eam nobis commonſtravit apud D. Abbatem Bourdelot, dum Chymicum Curſum perageremus, & in meò Aromatario aliquid ejuſmodi radicis ab eò tempore concluſum habeo, ipſius virium rum interim neſcius. Poſt Domini le Gras obitum bona iſtiusmodi radicis quantitas ad me ex illius domò adſportata fuit, verum quandoquidem de eâ experimenta nulla ſumpſeram, nolui illam cõemere; ac propterea ad Dominum Craquel Pharmacopolam delata fuit, qui eam tanquam vilis pretii mercem in proximâ regulis contignatione repoſuit ac per plures annos aſſervavit, donec ſcilicet Domino Helvetio ipſam venderet qui medicamentum in magnò ſecreto habuit, donec à Rege vulgatum ſit, Hæc *Nicolaus Lemery* in ſua *Aromatum ſimplicium univerſali Hiſtoriâ Gallicè conſcriptâ*.

Haſlenus multos audivimus Doctos Autores de Ypecacuanha tum ex propriâ experientiâ, tum ex aliorum relatione ſcribentes quibus forſan cum aliquo Lectoris emolumento quid nos ipſi de hæc plantâ ac ejus effectibus adnotaverimus, paucis ſubjungemus.

Triplitem Ypecacuanham vidimus, Albam ſcilicet, Nigram, & aliam quæ coloris eſt cinnamomici; in hæc ultima, quæ Domini Poncet *Fuſca* dicitur, experimenta noſtra ſumpſimus. Eſt autem ſaporis in primâ manducatione ſubdulcis ac naſeoſi, poſtmodum vero & quando dentibus optimè contrita fuit, valdè amari ac aliquatenus auſteri & vitriolici. Nam ut plurimum ad ʒi. in pollinem redactam in aq. plantagiñis ʒvj cum paucò ſyr. roſar. rubr. & maſtich. puræ pulver. ʒſ. vel ſimul & ſemel, vel partitis vicibus, ſcilicet in duas diſtinctum doſes, duobus diebus continuis exhibuimus, vidimusque ſic curatas dyſenterias, etiã eas in quibus plenò erumpebat fluenſ, & diarrhæas aliquatenus cõercitas fuiſſe. Vomitus præterea ſanguineos, hæmoptiſes horrendas, urinas cruentas, fluxus hæmorrhoidales, imò hæmorrhagias narium abundantiffimas & pertinaciſſimas ſic vidimus ſanatas, dum ſcilicet vel plenâ doſi pulverem in prædictis aquis cum adjecta maſtiche propinavimus, vel in pilulis ex eo cum baſſamo Judaicò, vel etiã de Copaiâ conſectis, ut ſenſim vaſa occluderentur, ſanguiniſque impetus reprimeretur, prout ſcilicet natura morbi, vel circumſtantiæ concomitantes exigebant, vorandam, tradidimus Ypecacuanham. At nunquam de facultate huius radicis in ſiſtendis hæmorrhagiis nobis plenius conſtitit quàm ubi proſtuvia uterina ejus ope aggreſſi ſumus, quò in morbo unicum caſum adducimus, unde ſatis ſuperque efficacia medicamenti patebit. Honeſtiſſima Matrona annos præterpropter 35. nata, jamque quartâ vice prægnans, tertio gravitatis menſe in hæmorrhagiâ incidebat uterinam tam horrendam, ut ſubinde de ejus vitâ conclamatum crederetur: Sanguis etenim plenò excidebat torrentò, nec aliquid in venis pro vitâ protrahendâ ampliùſ ſuperſeſſe videbatur. Cum tamen Medicus Doctus curæ prædictæ Matronæ præfectus fætum contentum pro hæmorrhagiæ cauſâ genuinâ agnoſcens illius expulſionem per trochiſcos de Myrrhâ aliæque in id adhibenda methodica auxilia omnino ſuadebat. Verum ego regerebam per expulſiva non tam fætum quàm ſanguinis ac vitæ debiles reliquias ejectum iri, proptereaque autor potiùs eram ut hæmorrhagiâ quâcunque demùm ſiſteretur arte, perſuaſus quod etiã ſi non ut in noſtrò caſu vires proſus attritæ forent, ſanguiniſque maſſa penitùs prope exhausta, nihil tamen durantibus turbis ab impetuoſiſſimò profluviò commotis, à naturæ etiã exquisitoribus remediis adjunctæ conatibus expectari poterat. Propoſui itaque radicem Ypecacuanhæ ad drachmam integram in aq. plantag. cum maſtiche &c. modo prædictâ hauriendam. Quid ſit? Sic vomitus continuo ciebatur ut in aliis omnibus qui doſim integram, vel etiã dimidiam unâ vice ſumunt, evenit; ſed qui agræ, ut ipſa referebat, levamini tantum, moleſtiæ nullatenus fuit, ipſoque vomitus momento ſanguis parciùs erupit, ac ſub finem diei ſubſequentis cum excluſione fætus proſus ceſſavit: Unde mulier ab orci faucibus verè erepta, recuperatis in dies viribus adhuc dum plena fruitur valetudine, quintoque prægnans ac vegeta vivit.

Y U C C A.

Nomina. Sive Yucca Peruana *Ger.* Yucca nova gloriòſe clara & opinata planta *Lob. Ad. pari. alt.* Yucca ſive Jucca *Park. Parad.* Yucca foliis aloes *C.B.*

Radice niſitur craſſa, tuberola, grandi, ſucceſſa
Dddd a rem.

temporis in multa capita protuberante, intus candida; foris rufa, rari substantia sed duriore, succi plena, Sapore subdulci, folia emittente plurima, in orbem se mutuo amplectentia, cubitum longa, dura, carinata, è cinereo viridia, in acutum & fuscum mucronem convoluto utrinque cacumine desinentia, æterno virore, lenta insuper & fractu contumacia: in quorum medio, postquam planta adoleverit, at ne tunc quidem singulis annis, exurgit caulis tripedalis, teres, firmus, superiore parte in ramos divisus, quibus innascuntur flores plurimi, satis ampli, hexapetali, albi, deorsum dependentes, tribus exterioribus petalis venis multis dilute rubentibus aversa parte striatis, è petalorum unguibus ad mediam eorum partem extensis, non ad margines usque. Flores in septentrionalibus & frigidioribus regionibus nullo succedente semine aut pericarpio crescunt & decidunt: Verum in locis naturalibus, Indiæ sci. Occidentalis provinciis plurimis triangulares Capsulas in tria loculamenta dispersitas producere dicitur,

seminibus rotundis aut quodammodo angularibus repleta.

Abrahamus Muntingius in herbario Belgico aliam depingit & describit Yuccæ speciem quam vocat Iucam Americanam & Brasilianam stellatam eamque folio mucronato & folio obtuso.

Alteram Yuccæ speciem exhibent Muntingius & Morisonus quæ donatur foliis filamentosis, seu foliis filamentis albis interspersis.

Vires. Nullius in medicina usus, imo venenatus esse dicitur, sed perperam; Cum non solum ad vitæ sustentationem conducatur, sed etiam ex radice in farinam comminuta panis elculentus conficiatur.

Radix insuper sine omni injuria, imo cum commodo comeditur absque ulla ejus præparatione. Dom. Palmer. ex dictis D. Hermannii.

Non est autem hæc planta ex cujus radice panis in America usitatissimus Callayi dictus sit, ut nonnulli per errorem crediderunt. *Rains.*

LIBER XXIII.

Continens ea quæ incipiunt à Literâ

Z

Z E A.

Z E A Triticum quoddam genus est, glumis aded arcte adherentibus ut eas trititando non deponat. *Zelan* aut *Zelan* dicitur & *glu* dictam volunt, quod ea ante inventum frumentum homines vitam tolerabant. Antiquissimis ætem Romanis (teste Dionysio Halicarnassensi) *Zea Far* dicebatur. Farris tamen vox ambigua & æquivoca.

Vjus. Panes ex ea Germani conficiunt, non minus albos quam ex Triticis, leviores tamen, minusque nutrites, recens suavis est & concoctu facilis, antiquus non ita gratus & concoctu difficilis.

Ex eadem pulvis cum Lacte, vel amygdalato, vel vino vel cervisia & saccharo sunt & sanis & ægis utiles. Pulicula ex farina adstringunt, unde ad eadem valent ad quæ pulvis ex oryza, hæmoptysin, dysenteriam diarrhæam &c. præcipue cum pedibus vervecinis & vitulinis decoctæ exterius quoque ad eadem utilis est.

Not. Veteres uno quasi ore panem ex Zea dammare, Quare manifestè (inquit C. Bauhinus) patet Zeam illam aliam esse ab ea, quam Plinius semen Romanis vocari tradidit, ex quo tam præclarus cibus Alicæ fiebat. *Rains.*

Z E D O A R I A.

Zedoaria Græcis veteribus incognita; recentioribus, ut Aëtio & Actuarius *Zadag*, *Zadæga*, & *Zadæga* dicta est, ab Arabibus mutuato nomine.

Foliis est Zingiberis, sed majoribus, longioribus & latioribus, ut & radice; Sapore etiam Zingiber æmulatur, unde in Calecut Zingiber sylvestre Garcia auctore vocatur, hujus tres species faciunt, quas tamen omnes unius & ejusdem plantæ radices esse peritiores Botanici existimant.

Vires. Zedoræ radix calida & sicca censetur, corpus impinguat & imbecillum reficit, ut volunt Arabes, flatum discutit, odorem sumptorum alliorum, Ceparum & Vini aufert; morsui venenosorum confert, alvum sistit, ueri apostemata resolvit, vomitum reprimat & colicæ ventolæ confert, nostræ ætatis medici contra

pestilentis cœli contagia utuntur, & permixtis medicamentorum compositionibus miscunt, ventriculo utilis est concoctionem juvando, eumque & reliqua viscera calefaciendo, Germani ex ea vinum Zedoriatum conficiunt ad usus prædictos. Zedoariam contusam & sacculo inditam in doliolo musti cocti pleno suspendendo. *Rains.*

Z I B E T H U M.

De Animalis Zibethici & de capsis unde Aroma Zibethum, dictum extrahitur, vid. sub titulo *Canis*. Hic itaque tantum de Zibethi electione & viribus paucis agemus.

Zibethum animalis cujusdam, quod Hyænis non nulli adnumerant, excrementum pingue & unctuosum, in certis à naturâ circa inguina ei concessis glandulosis folliculis collectum: Quod Butyri mollioris consistentiam habere, coloris subpallidi esse (quem tamen ætas in flavedinem magis immutat) & odorem omnino terrem spirare debet, cum aliis tamen permixtum eximia suavitate commendabilem. Insuper si papyro adfrictum sine corpore remanente totum sit solubile, aut vasi in quo aqua bullit, infusum aquæ supernatet, heterogeneis nullis partibus fundum preteritis, bonum iidem æstimari solet, odore tamen omnium optimè sinceritatem confirmare apto. *Pharmac. August.*

Zibethum præfertur pallidum in Anglia collectum butyro non sophisticatum; rejicitur nigrum ex India orientali transportatum. *Dale in Manuductione ad Materiam Medicam.*

Vires. Usus crebri in colica passione umbilico inunctum, in torminibus ventris infantum; strangulationem ab utero tollit vulvæ applicatum. Ad virgæ erectionem & proritandam in virginibus venerem, plurimum etiam facit glandi penis ante pugnam inunctum cum tantillo theriacæ mistum. Ex hoc etiam cum ambra & moscho aqua externa de cypro præparatur. *Fridericum Hoffmannus in Clavi Pharmaceutica Schroderiana.*

Z I N C U M.

Zincum, Species est marcasitæ, seu materiæ metallicæ

licæ Bismutho non multum abſimilis verum minus frangibilis ac ſub malleo aliquatenus extenſibilis. Nalcitur in fodinis, ſeu mineris Goſlarienſibus in Saxonia. Seligatur durum, fractu difficile, album ac è ſquamis latioribus & ſplendentibus conſtitutum ſtannarii eo utuntur pro dealbando ac purificando ſtanno non ſecus ac aurifabri plumbo utuntur pro purificando auro ac argento: Et ea propter dum ſexcentas verbi gratia ſtanni libras fundendas habent, Zinci libram unam immiſcent. Zincum præterea adhibetur in ferruminandis metallis, & cum cureuma admiſtum pro cupro deaurando. Extus applicatum reſolvens eſt ac deſiccans medicamentum.

Z I N G I B E R.

Zingiber, Ζιγγίβερ Græcis dictum, nomen accepit ab Indorum vocabulo zingibil. Omnibus Botanicis eodem nomine dicitur. C. Bauhinus ſic deſcribit, radice eſt ad ternos vel quaternos palmos, Arundinum modo, in profundum acta, inæquali modicè plana, frequentibus geniculis in laterales partes diviſa quoquoſum reptante, longitudine ſequiunciali, nonnunquam majore pollicis craſſitudine ac minore foris albicante ut in candido ſubſuſca, carne alba friabili, tenerâ per cujus longitudinem venæ nervoſæ feruntur, guſtu piperis modo, fervida, acerrima, odore Aromatico, quæ teſte Acoſta, etiamnum viridis leviter adurit, minusque quam cum ſicca eſt mordicat, & quo loca in quibus naſcitur magis humida ſunt, eo minus acrimoniæ retinet.

Foliis eſt [ut Garcias ſcribit] ſimilibus Iridi aquaticæ, aut gladiolo [non Arundini] at Acoſta folia lachrimæ Jobi foliis ſimilia ei attribuit; alii Arundinacæ, ut Linſchotanus & Ruellius quod nobis veriſimilius videtur; cum Lobelius & Io. Bodæus à Stapel, qui plantam ipſam videntem viderunt, foliis & Calamo novellam ſive nuper enatam arundinem præ ſe ferre dicant; & G. Piſo folia admodum ſimilia eſſe foliis Arundinum teſtetur, ut qui nunquam viderit creſcentem hanc plantam, Arundinetum verò dixerit quod primum è terra ſurgit. Vnde cum Margravius & F. Hernandez folia Iridi aut gladiolo ſimilia faciant minus exacta Comparatione uſi videntur. Caulis ei haud craſſus in pedalem altitudinem aſſurgit Arundini ſimilis, in ſtigio Capitulum ſtæchadi quadantenus ſimile geſtans. Hernand.

Duplex eſt, fœmina, quam deſcripſimus, & mas, Anchoas Mexicanis dicta: Cui deſcribente Piſone, folia non ultra tres pedes in altitudinem excreſcunt, alperiora ſunt & craſſiora vulgari Zingibere unico nervo recto in longitudinem excurrente conſpicua, caulibus hinc inde ſine pediculo, inferius ſolitariè, ſuperius frequentiori Coma adnata radice majore & craſſiore ſapore acriore cum quadam amaritudine. Hernand. radices diverſi ſunt ponderis & amplitudinis, omnes tamen imbelles & tuberoſæ atque in ſuperficie terræ ſicut Arundineta expaſæ.

Naſcitur in omnibus Indiæ provinciis ex cultum ſatumque ſemine: nam quod ſponte provenit flocci penditur. Americæ non videbitur naturalis, ſed ex India orientali aut inſulis Philippinis in Braſiliam & novam Hiſpaniam translata, Malabaricum autem habetur laudatiſſimum: pingui ſolo, ſtercoratoque & probè ex culto ſeritur (radice cui ſuperſit unum alterumve internodium in ſcrobem depaſta) & ſtatim à ſatu aqua dulci plus minus pro terræ ſiccitate rigatur proximo anno à ſatu radix eruitur denud, ipſum ſci. Zingiber. Vindemia ejus ſit creſcentibus foliis, quod juxta initium Januarii accidere ſolet, paulo exſiccata limo obducuntur ne evaneſcente nativa humiditate tere dine, cui alias maxime obnoxie ſunt, afficiantur at Linſchotus aſſerit evulſarum radicum certam molem argilla ſigulina regi, & tumulum exquiſita contra

Mangeri Bibl. Pharm. Tom. II.

omnem aeris & ventorum vim obliniri: ſic enim & recentiores radices ſervari, & à vermium eroſione promptius defendi. Apud aromatarios radices reperiuntur albæ & rubentes: ſed diverſa genera non ſunt: rubrica infectæ ſunt rubentes, creta albæ, quo à teredinibus præſerventur. Stapel.

Siliqua à Lobelio depicta & deſcripta non videtur eſſe Zingiberis, ſaltem illius ſpeciei quæ à Franc. Hernandez pro fœmina deſcribitur, cui Capitulum ſeu ſpica ſtæchadi ſimilis.

Ut condiantur radices, prius decorticantur, moxque in muriam vel acetum conjiciuntur & macerantur per horam unam atque alteram, dein æquali fere temporis momento ſub dio probe inſolantur, ac denuò ſtragula ſub teſto cooperiuntur, donec omnis humiditas exalaverit; ſi aliunde transferendæ ſint radices, tunc thecis incluſæ & aqua irrigatæ noctu terra operiuntur, interdiu Cælo patent. His omnibus ritè inſtitutis ab exercitato agricola, poſtea ſaccharo non ſolum, ſed muria vel aceto condiuntur, nulloque tum inſigni calore palatum afficiunt nec filamenta ulla ingrata in ore relinquant, ſinimio ramen magonio, nimilique lotionibus fatigentur, pars quoque aromatiçæ ejus acrimoniæ evaneſcit.

Vires & Uſus. Viride conditum ſaccharo ex India aſſertur, ſenibus & pituitolis ac frigidis & malè concoquentibus ſtomachis accommodatum, præſertim quod recens conditum fuerit: valet etiam ad lentam in pulmonibus pituitam.

Indi foliis Zingiberis in juſculis & coquinariorum uſu atque aceratio utuntur. Radices virides cum aliis herbis minutim conciſæ ex Oleo, ſale & aceto acerarii loco illis ſunt. Præterea Zingiber recens etiam remedio illis eſt præſantiſſimo ad Colicos dolores. Cæliacæ & Lientericæ paſſionem, Diarrhæas diuturnas è frigore natas, ſtatus ventrisque tormina, & gravia hiſ ſimilia accidentia, ut multoties in India ſe feliciter comprobaffe teſtatur Bontius. Ea tamen perpetuò adhibenda cautela, ut qui ſanguine ſunt fervidore, ſive ſani, ſeu ægri, parciſſimè eo utantur, quia Zingiber ferè omne ſanguinem accendit, & oriſicia venarum aperit, Piſo Zingiberis ut & Piperis major in culinis quàm in medicina uſus eſt, cum hæc duo inter omnia aromata plurimum acrimoniæ & parùm aromaticæ qualitatis habeant. C. B. Galenus Zingiber minus tenuium eſſe partium quàm Piper inde colligit, quod calor ejus, quamvis æquè fortis, non primo ſtatim occurſu ſentitur. Caliditas autem quæ proſciſcitur à Zingibere diutius perſeverat, quàm quæ à Pipere, unde inferit ſubſtantiam ejus & craſſiorem eſſe & humidam ſeu aqueam, Nam ut ab aridis calamis flamma celeberrimè accenditur, atque etiam undequaque diſpergitur; quæ autem ab humidioribus, ceu ligna ſunt viridia & tardius accenditur & durat diutius, ita etiam in medicamentis ſit.

Dioſcorides Zingiber alvum leniter emollire ſcribit, ſed intelligendum, ſi teneræ & adhuc recentes radices edantur, multa in eis adhuc humiditate alvum lubricante & emolliente reſidua: ut videmus id Iride, nam vetuſtiores ſiccant potius & ſiſtunt alvum, facta ſc. proba concoctione.

Addi ſolent interdum hæ radices medicamentis catharticis ad eorum vim argendam. Data autem cum purgantibus vehementioribus eorum malitiam corrigunt. Zingiber Ventriculi & pulmonum ſarctus abſtergit & diſſipat ſupervacuo humore abſumpto, cerebrum & memoriâ roborando juvat.

Hebetudini etiam viſus quæ ab humiditate provenit prodeſt. Venerem ſtimulat & ſtatus diſcutit. Quo cumque modo ſumptum, ſive recens, ſive ſiccum ventriculum roborat & concoctionem promovet; Antidotis admilceſtur.

D d d d d ; ZIN

ZINGIBER ALIUD.

Zingiber fulcum C. B. Zingiberis species Mechinum dicta I. B.

A vulgari Zingibere differt non tantum quod immatius aut improbius sit, sed quod consistentia sit compactiore, duriore & paucioribus fibris intertexta, colore ex cinereo nigricante, acriore gustu, nec teredine exedi solita, quod etiam conditur & in quibusdam officinis prostat.

ZINGIBERIS AFFINIS PLANTA.

Zingiberi affinis cortice squamato C. B. Zingiberis Mechini rara varietas I. B.

Radix est Zingiber vulgatum aut Mechinum referens, sed elegantior aspectu, multis nodis distincta, & fere veluti Doronicum articulata, Corticem habet Zingiberi similem, coloris subcitrini, pollicari crassitie, fibrisque caret: gravis est ac solida, fracta venas albas ostendit; sapore est acri, aromatica, & si carie non exesa sit, gustu Zingibere multo acriore & ficiore.

Pona Doronicum Arabum nominat, & pro Doronico legitimo agnoscit, siquidem notæ à Serapione & Arabibus Doronico adscriptæ convenient, quo etiam pro Doronico utendum censeret, cujus loco multi hæcenus Aconito Pardalianche minore, quod facultatibus Doronico planè contrariis sit usi sunt. Raim.

ZITHUM, vid. Zythum.

Z O P I S S A.

Zopissa species est picis nigræ quæ è navibus post longas navigationes detrahitur, scilicet postquam, pix ipsa quæ impicata fuit naves sale marino abundantius penetrata fuit ac imprægnata, unde novam qualitatem acquirit. Hæc autem materia resolvens est ac desiccans extus applicata.

Z Y T H U M.

De Zythi, seu Cerevisia præparatione in genere vid, sub titulo *Hordeum*. Hic tantum de Zythiis quibusdam compositis ac medicamentosis.

Cerevisia Galieni ex D. D. Junge. *Lexico Pharmaceut.*

℞. Cerevis. recentior cocta & nondum ferment. q. l. infunde urceis ad acidulas usualibus, & immitte singula mensura cinnam. ℥ij. irid. Florent. ℥j. sem. coriandri ℥ss. ac sacchari cochlear. Tunc optime agita, ac subere probe claude, & ad usum repone in cella.

Cerevisia purgans D. D. Sydenham.

℞. Radic. polypod. querni lb. j. rhabarb. monach. fol. sem. possular. enucleat. ana lbss. rhabarb. ven. incidi & radic. raphani rusticani ana ℥ij. folior. cochlearia hortensis & salvia ana m. iij. aurantia incisa n. iij. Infunde in congiis s. vel 6. cerevisia non lupulata fermentationis tempore & quando ad maturitatem pervenerit.

Purgat leniter per alvum & urinæ vias seross humores ac propterea utilis est in Scorbuto Rheumatismo, ut & pro sanguine purificando, quem in finem Author suadet ut in potu ordinario, præcipue matutinis horis, adhibeatur per quatuordecim aut viginti dies.

Cerevisia varie composita ex Pharmac.

Bateana.

Cerevisia Butleri.

℞. Beton. salv. agrimon. cochl. hort. absinth. Rom. ana m. iij. Rad. enul. raphan. rustic. ana ℥iv. m. f. Sacculus in cerevis. non-lupulat. cong. iv. suspendendus, cum lapide in fundo sacculi. Cephalica, Stro-

machica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica, diuretica, &c. Sanguinem rectificat, fixos ac crudos humores reddit volatiles. Tartarum pulmonum renunquæ attenuat ac educit, Cachexiæ, Hydropi, Scorbuto, Melanch. hypochondriacæ, Scabiei, &c. subvenit. Sit pro potu communi, aut saltem ter in die bibatur.

Cerevisia Cataploras.

℞. Fol. Senæ ℥vj. mechoac. ℥ij. glyc. unc. iij. sem. carvi ℥j. Rau. oxylapath. lbss. polyd. rubie tinctor. ana lbss. Fol. Scabios. agrimon. ana m. iij. & crud. crass. pul. lbj. m. f. Sacculus pro cong. s. vel 6. cerevis. Sanguinem purgat. Optimè valet in Pruitu, Scabie, aliisque cutis fœditatibus curandis. Detur lbj. (plus minus.) bis in die per dies aliquot.

Cerevisia Embryonum.

℞. Raf. ligni cotonei lbj. sans. alb. ebor. an. ℥iv musci roboris ℥ij. Rad. tormentil. ℥ss. bistort. ℥j. nuc. m. Sem. coriand. ana ℥vj. uvar. passar. lbss. m. & suspende in sacculo in cerevis. rec. cong. vj. pro potu ordinatio. Abortum præcavet, infirmum foetum roborat, uteri ligamenta firmat,

Cerevisia Hydropica.

℞. Fol. prassii. ling. cervin. Hepat. c. absinth. vulg. acios. ana m. plenum. Incide, & postea in farina hordeacea obvolvatur: dein coque in clibano. Tum pasta cum herbis in frustra fracta adde & abs. ℥ij. suspend. in sacculo in cerevis. rec. conjug. pro potu communi. Multos curavit hydropicos.

Cerevisia Jovialis.

℞. B. Limat. ℞. lbj. sans. alb. raf. ebor. ana ℥ij. uv. pass. lbj. Fol. abs. Rom. ling. cervin. veron. agrim. ana m. j. cort. aurant. ℥ij. m. f. Sacculus, pro cong. iv. cerevis. rec. pro potu ordinat. Uteri morbis peculiariter curandis intersit. Hepatica etiam est, & splenetica.

Cerevisia Oxydorcica.

℞. Fol. rura, salv. verben. Euphrag. ana m. millepedas vivas n. 400. Sem. fœnic. d. ℥j. uv. pass. exacinat lbss. Indantur sacculo pro cong. iv. cerevis. rec. pro potu ordinario. ad visus hebitudinem. Tern.

Cerevisia Scorbatica.

℞. Fol. cochl. marin. parum siccet. lbj. falsapar. ℥iv. sassifr. ℥j. nasturt. aquat. betabung. ana m. j. salv. rubr. m. j. caryoph. ℥ij. nuc. m. ℥vj. contund. & impone cong. v. cerevis. rec. cum frustulis Ovis ℥vj. in fundo sacculi, pro potu communi.

Cerevisia Scrophularia.

℞. Sarsapar. ℥vj. lign. sancti. ℥vij. cortis arbor. jugland. Rad. Scrophular. sassifr. ana ℥ij. Herb. Roberti in iij. uv. pass. exacin. milleped. viventi. an. lbj. m. f. Sacculus pro cong. iv. cerevis. rec. Usus præcipuus in Strumis Scrophulosis, ficiis & mariscis an cancerosis ac similibus serpentibus ulceribus, maligna scabie, &c. bibendo hanc cerevisiam pro potu communi, & purgando semel in septimana cum appropriatis.

Cerevisia Vernalis.

℞. Fol. Senæ ℥v. Rad. polyp. qu. ℥vj. Rhab. Monach. oxylapath. ana ℥x. uv. corinth. lbj. glyc. Sem. fœnic. d. ana ℥ss. raf. sassifr. ℥ij. Fol. salv. rub. agrimon. nasturt. aquat. cochl. marin. ana m. j. m. f. Sacculus pro cerevis. cong. v. Eadem vires obtinet, quas Cerevisia Cataploras.

ZYZIPHA, vid. Injuba,

F I N I S.

INDEX



INDEX RERUM

Quæ in Utroque Tomo

BIBLIOTHECÆ

PHARMACEUTICO-MEDICÆ

continentur, Locupletissimus.

A



- BIETIS* varia species. Tom. 1. Pag. 1.
Abrotani varia species. tom. 1. pag. 2.
Absinthii varia species, ejusque varia preparata. tom. 1. pag. 3.
Abutilum. tom. 1. pag. 4.
Acacalis. ibid.
Acacia vera descriptio, & vires ibid.
Acacia Germanica vires, & preparata varia t. 1. p. 5.
Acanthus. ibid.
Accessorium apud Pharmacopœos quid significet ibid.
Accipiter ibid.
Accipitrina, vid. *Hieracium.*
Acer Arbor. t. 1. p. 6.
Acer Sapor quid sit. ibid.
Acerbus Sapor quid sit. ibid.
Acetabulum, vid. *Umbilicus veneris*
Acetosa. ibid.
Acetofella, vid. *Trifolium acetosum.*
Acetum, & de eo in genere. ibid. & seq.
Acetorum simplicium varia species. t. 1. p. 9.
Aceti Crystalli, & spiritus. ibid.
Acetum Agrestinum solutivum Clossæi. ibid.
Alexicacum destillatum F. F. t. 1. p. 10.
Aromaticum odoratum à Mynsicht. t. 1. p. 11.
Bezoarticum F. F. t. 1. p. 10.
Diemerbroeckii. ibid.
D. à Mynsicht. t. 1. p. 11.
Timæi. t. 1. p. 10.
Consortans Clossæi. ibid.
Diaphoreticum D. à Mynsicht. t. 1. p. 12.
Febrifugum de le Boe Sylvii. t. 1. p. 10.
Hystericum à Mynsicht. t. 1. p. 12.
Lithargyrii Pharm. Aug. t. 1. p. 10.
Myrrhatum à Mynsicht. t. 1. p. 11.
Mithridaticum ejusdem ibid.
Pestilentielle Zvvelferi. t. 1. p. 10.
Philosophicum Quercetani t. 1. p. 889.
Prophylacticum F. F. t. 1. p. 10.
Pro Rabi morfu Hannemani. t. 1. p. 11.
Rhizoticum Mynsichti ibid.
Rutaceum F. F. ibid.
Siccum Collect. Chymic. Leydensi ibid.
Theriacle Pharm. August. ibid.
Pharm. Londin. ibid.
D. à Mynsicht. ibid.
Antonii de Scobbis. ibid.
Mangeti Bibl. Pharm.
Acetum Vomitorium destillatum Mynsichti. t. 1. p. 12.
Zedoarticum Mynsicht. t. 1. p. 11.
Acharefts, vid. Sub titulo *Lapis* t. 2. p. 91.
Achillea, vide *Millefolium.*
Acidus Sapor quid sit. t. 1. p. 12.
Acinos. t. 1. p. 13.
Acinus. ibid.
Aconitum, ejusque species, & preparata curiosa. ibid.
& seq.
Acorus. t. 1. p. 14.
Acustica medicamenta, quid, & quanam sint. t. 1. p. 15.
Adamas, vid. *Gemma* sub titulo *Lapis* t. 2. p. 92.
Adarca ibid.
Adianthum ejusque species varia ibid.
Egagropila t. 2. p. 730.
Aer quatenus instrumentum Pharmaceuticum t. 2. p. 8.
Es quid sit, & quomodo in orichalcum mutetur t. 1. p. 16.
Es quomodo coloretur, & ejus varia preparata ibid.
Aetnes vid. sub titulo *Lapis.* t. 2. p. 90.
Aetitis Lapidis preparata, ac præcipue *Quinta Essentia* ad calculum frangendum t. 2. p. 121.
Agallochum t. 1. p. 20.
Agaricum, & ex eo preparata ibid. & t. 2. p. 999.
Ageratum t. 1. p. 20.
Agnus castus t. 1. p. 21.
Agrifolium ibid.
Agrimonium, vid. *Eupatorium.*
Alabastrites, vid. sub titulo *Lapis* t. 2. p. 122.
Alanda t. 1. p. 22.
Album Græcum, vid. sub titulo *Canis*
Alce, vid. sub titulo *Cervus*
Alcis Cornu, nervi, & Vngula ibid.
Alcea ibid.
Alchimilla ibid. & seq.
Alchymia quid sit t. 1. p. 23.
Alchymia, quam *Chrysopoeiam* vocant t. 1. p. 24.
Alchymia Antiquitas ibid. & seq.
Alcyonium, vid. *Spuma* & *flos maris.*
Alexipharmaca medicamenta quid, & quanam sint. t. 1. p. 26.
Alga t. 1. p. 28.
Alhandal, vid. *Colocynthis.*
Alica ibid.
Alkaest. vid. *Menstruum* sub titulo *Extractum.*
Alkali ibid. & seq.
Alkali & Acidi pro Principiis rerum naturalium Insufficiencia demonstratur, & in hoc argumento *Epistola* Dddd 4 Clar.

INDEX RERUM.

- Clar. Iob. Bohnii ad Nob. Ioëlem Langelottum con-*
scripta adfertur. Tom. 1. Pag. 29.
- Alkali & Acidi universa doctrina à Clar. Iacobo Bar-*
nero ad examen revocatur. t. 1. p. 36.
- Alkekengi* t. 1. p. 40.
- Alkermes, vid. Kermes.*
- Alkool quid sit.* ibid.
- Alleluia, vid. Trifolium acetosum.*
- Alliaria* ibid.
- Allium* ibid. & seq.
- Allium serpentinum, vid. Victorialis.*
- Alnus* t. 1. p. 41.
- Albe, & ejus preparata varia.* ibid. & seq.
- Alfine* t. 1. p. 43.
- Al ercum, vid. Hyosciamus.*
- Al-bea* ibid.
- Alumen, vid. sub titulo Sal.* t. 2. p. 755. & seq.
- Alumen plumbeum, vid. Amiantus.*
- Album subducentia, vid. Hypactiea.*
- Alyssum* t. 1. p. 44.
- Anaracis, vid. Majorana.*
- Amaranthus* ibid.
- Amaranthus Luteus, vid. Stæchas.*
- Ambarum, & Ambra, ejusque historia*
- Ambra, Pifcus.* ibid. & seq.
- Ambra nativa an detur?* t. 1. p. 45.
- An sit spuma maris?* t. 1. p. 44.
- An sit jecur cujusdam pifcis?* ibid.
- An sit sperma Ceti?* t. 1. p. 45.
- An sit fructus arboris sub mari crescentis?* ibid.
- An sit Camphora species?* t. 1. p. 46.
- An sit species Naphthæ?* ibid.
- An generetur in mari in speciem fungorum, & à flu-*
idibus maris in littuse jectari soleat? t. 1. p. 47.
- An sit gemma quadam?* ibid.
- An sit verum & nativum sulphur?* ibid.
- An sit terra?* ibid.
- An fiat ex quodam fructu ad maris littus nascen-*
te? t. 1. p. 48.
- An sit manatio fontis in mari ad instar bitumi-*
nis? ibid.
- An sit succinum?* t. 1. p. 49.
- An sit excrementum bellue marine?* t. 1. p. 10.
- An sit excrementum Balanæ?* ibid.
- An sit finis odoratissimus avis India orientalis?*
t. 1. p. 51.
- An efavis Apum confletur?* t. 1. p. 52.
- Ambra grysea Vires, & preparata.* t. 1. p. 53.
- Ambra moschata in forma sicca ex Cnœffelio* t. 1.
p. 636.
- Ambrosia* t. 1. p. 53.
- Ambrosia ex Pharm. Persica* t. 1. p. 784.
- Archilei ex VVeckero* t. 1. p. 765.
- Ambusta, seu Remedia ad Ambusta, quid & quanam*
sint. ibid.
- Ametistus, vid. sub Titulo Lapis.* t. 1. p. 91.
- Amiantus, vid. sub Titulo Lapis.* t. 2. p. 87.
- Amiantus vires medicæ* t. 2. p. 122.
- Ammi* t. 1. p. 54.
- Ammoniacum* ibid. & t. 2. p. 757.
- Ammoniaci salis preparata* t. 2. p. 757. & seq.
- Amomum* t. 1. p. 54.
- Ampelitis, vid. sub titulo Terra.*
- Amuleta, eorum historia, & varia species.* t. 1.
p. 55.
- Amuleta Cnœffelii varia in fluxu hæmorrhoidum* t. 2.
p. 904.
- Amuleta varia Cnœffelii ad fluxum menstruorum mi-*
nium t. 2. p. 1135.
- Amuletum cœlestinum contra vertiginem, melancholiam,*
epilepsiam &c. Cnœffelii. t. 1. p. 538.
- Amurca quid sit.* t. 1. p. 56.
- Amygdala*
- Amylum,* ibid. & seq.
- Ανοχονήματα seu agglutinamenta quid sint?* t. 1. p. 58.
- Anacardium* ibid.
- Anacardium, vid. Pectoralia.* ibid. & seq.
- Anagallis* t. 1. p. 59.
- Anagallis Aquatica, vid. Beccabunga.*
- Anagyris* ibid.
- Analeptica medicamenta quid sint* ibid.
- Ananas* ibid.
- Anas* t. 1. p. 60.
- Anastomotica medicamenta quid sint* ibid.
- Anarum, vid. sub titulo sal.* ibid.
- Anchusa*
- Androsæum, vid. Hypericum.*
- Anemone*
- Anethum*
- Angelica*
- Anguilla*
- Anguis, vid. Serpens.*
- Animal quid sit*
- Animalium solertia varia historia*
- Animalium generatio an sit spontanea, aut equivoca?*
t. 1. p. 64.
- Animalia. An omnia quæ unquam fuerunt & futura*
sunt initio creata fuerint, an novâ in dies generatione
producantur? t. 1. p. 66.
- Animalcula quæ generatione augentur, & perficiuntur*
in ovo femineo, an in semine masculo hospitantur?
t. 1. p. 69.
- Animalium distinctio in Vivipara, & Ovipara.* t. 1.
p. 71.
- Divisio* ibid. & seq.
- Tabula Generalis* t. 1. p. 73.
- Quadrupedum viviparorum pilosorum divisio* t. 1.
p. 74.
- Viviparorum Quadrupedum Tabula* ibid.
- Partes carnosæ usitatioræ* t. 1. p. 75.
- Partes membranosa* ibid.
- Cornua & ossa* ibid.
- Animalia Crustacea, seu Testacea* ibid.
- Animalium Lapilli* ibid.
- Lac. ejusque serum* ibid. & seq.
- Eel, eaque usitatiora* t. 1. p. 76.
- Medulla officinales* ibid.
- Axungie, serum & sanguis.* ibid.
- Stercus, & Urina* ibid.
- Vngues, Vngula usitatioræ, & Coagula* t. 1. p. 77.
- Animal moschiferum, vid. Moschus*
- Anime Gummi* t. 1. p. 77.
- Anisum* ibid.
- Annulus Stellatus Helmontii ex Cnœffelio* t. 2.
p. 904.
- Anodyna, & Narcotica, Eorum explicatio, quid*
sint, & quomodo agant t. 1. p. 78.
- Anodynum minerale, vide Crystallus mineralis.*
- Anonis, vide Ononis.*
- Anser, ejusque partes medicamentosa* t. 1. p. 80.
- Anserina, vid. Argentina.*
- Antalia* ibid.
- Antiepilepticum solare* t. 1. p. 81.
- Antiepilepticum Lunare* ibid.
- Antihelminthica remedia, quid sint, quanam sint, &*
quomodo agant. t. 1. p. 81.
- Anthora* t. 1. p. 83.
- Anthos, vid. Rosmarinus.*
- Anthrax, vid. Rubinus.*
- Antidota specialia* t. 2. p. 1018. & seq.
- Antidorum, vid. Alexipharmaca.*
- Antidotus Analeptica ex Pharm. Lond.* t. 1. p. 766.
- Asyncritica Actuarii ex Renodæo* ibid.
- Esdra ex VVeckero* t. 1. p. 765.
- Aliud*

INDEX RERUM.

- Aliud ex eodem* Tom. I. Pag. 766.
Antidotus Hamagoga, ex Pharm. Lond. t. I. p. 767.
Lysipyreos D. Cnoëffellii t. I. p. 911.
Matthioli, ex Pharm. Aug. t. I. p. 765.
Theriacalis ex Pharm. Reg. Zvvelferi t. I. p. 768.
Secunda, antidyfenterica, ex eod. t. I. p. 769.
Antihypnotica medicamenta, vid. *Hypnotica* t. I. p. 1016.
Antimonium quid sit, ejusque delectus t. I. p. 83.
Antimonij Vires in genere ibid.
Preparata varia t. I. p. 84.
Calcinatio sicca in Crocos, Diaphoretica, Regulos, & Vitra ibid. & seq.
Preparatio in Crocum metallorum t. I. p. 86.
Rulandi ibid.
Crocus Regulatus. t. I. p. 87.
Antimonium Diaphoreticum, ejusque varia preparatio- nes. t. I. p. 87 & seq.
Antimonium diaphoreticum solare D. Cnoëffellii. tom. I. p. 717. & 1005.
Antimonij Regulus, ejus varia preparationes, ex eoque varia preparata remedia. t. I. p. 90 & seq.
Regulus Martialis. ibid.
Iovialis. t. I. p. 91.
Solaris. ibid.
Antimonij Cerussa diaphoretica. ibid.
Solaris. ibid.
Antimonij Vitrum album. t. I. p. 84.
Diaphoreticum. ibid.
Flavum. ibid.
Hyacinthinum. ibid.
Nigrum. ibid.
Purgans. t. I. p. 85.
Regulinum. t. I. p. 84.
Rubeum. ibid.
Solare. ibid.
Vitri Correctiones varia. ibid.
Antimonij Precipitata varia. t. I. p. 92. & seq.
Sublimatio, unde Cinnabaris & Flores. t. I. p. 93. & seqq.
Florum correctiones varie. t. I. p. 94. & seq.
Destillatio, unde Aceta, Olea, Spiritus, eorumque varia preparationes. t. I. p. 95. & seq.
Extractio, unde Sulphura & Tinctura. t. I. p. 99.
Sulphuris varia preparationes. t. I. p. 100.
Tinctura varia. t. I. p. 101. & seq.
Crudi Infusio. t. I. p. 106.
Vitri, tum Croci metallorum varia. Infusa, tom. I. p. 107.
Salificatio, unde Antimonij Sal, ejusque varia prae- parationes. ibid. & seq.
Mercurificatio. t. I. p. 108.
Currus Triumphalis Basilii Valentini à Theodoro Kerckringio commentarius. t. I. p. 108. & seq.
Antirrhinum. t. I. p. 145.
Antiscorbutica Medicamenta quid, & quanam sint, t. I. p. 146.
Antithora, vid. Aconitum.
Antaphrodisiaca, seu Antiuenerica Medicamenta, quid & quanam sint. ibid. & seq.
Aparine. t. I. p. 147.
Aper, ejusque partes medicamentosa. t. I. p. 148.
Aperientia Remedia quid & quanam sint, & quomodo operentur. ibid. & seq.
Aperituum martiale hepaticum D. Cnoëffellii t. I. p. 576.
Apes, earumque partes officinales. t. I. p. 150.
Aphaca. t. I. p. 151.
Apium. t. I. p. 152.
Apocroustica, quid & quanam sint. ibid.
Apocynum. ibid.
Apollinaris, vid. Hyosciamus.
Apophlegmatisma, vid. Masticatoria.
- Apostema aperientia quid, & quanam sint.* t. I. p. 153.
Apozema quid sit, & quomodo fiat, ejusque varia spe- cies. ibid. & seq.
Apozema cholagogum. t. I. p. 154.
Hydragogum. t. I. p. 155.
Melanagogum. t. I. p. 154.
Mixtum. t. I. p. 155.
Phlegmagogum. t. I. p. 154.
Aphrodisiaca Remedia quid, & quanam sint in genere. t. I. p. 155.
Aphrodisiaca aliquot specifica ex Cnoëffellio. t. I. p. 156. & seqq.
Aqua in genere & de ejus variis Differentiis & qualita- tibus. t. I. p. 157.
Aqua, quatenus instrumentum Pharmaceuticum. t. I. p. 33. & seqq.
Aqua simplex. t. I. p. 157.
Aqua mixta seu composita medicata in genere, de earum causis, & de mixtionis cum mineralibus diverso modo & ratione. t. I. p. 158.
Aqua aurifera, gemmifera, aliaeque terrâ infecta. ibid.
Aqua sive Fontes, terreno luto infecti. t. I. p. 159.
Aqua & fontes salsi. ibid.
Aqua & fontes Nitrosi. ibid.
Aqua Sulphurea & bituminosa. t. I. p. 160.
Aqua Aluminosa. ibid.
Aqua succo lapideo, seu petrifico pollentes. ibid.
Aqua metallica. ibid.
Aquarum medicatarum miscera; id est; Quomodo & qua industria, quanam mineralia ac metallica corpora cuius Aqua medicata insint, per nonnulla experimen- ta cognosci potest. t. I. p. 161.
Aqua, Fontes, & Therma Europa & primò de Lusitania & Hispania fontibus & Thermis. t. I. p. 162.
Aqua seu Fontes Medicati Gallia. t. I. p. 163.
Aqua, Fontes, & Therma Germania. t. I. p. 164.
Aqua, Fontes, & Therma Hungaria, Transilvania, ca- terarumque adjacentium Regionum Septentrionalium. t. I. p. 165.
Aqua, Fontes, & Therma Italia. ibid.
Aqua, Fontes, & Therma Asia, Africa, & America. t. I. p. 168.
Aquarum Medicatarum facultas, contra tot ac tam dif- ferentes morbos, unde profluat. t. I. p. 169.
Aquarum mineralium, plurimarum Gallia Provincia- rum, Observationes in Academia Scientiarum facta ex Du Clos. t. I. p. 171.
De Aquis, sive Fontibus Medicatis Anglia Exerciti- io, Nova & Prior Clariss. Martini Listeri. tom. I. p. 176.
De Aquis, sive Fontibus medicatis Anglia, Exercitatio altera Clar. Listeri. t. I. p. 188.
Aqua sive Balnea metallica artificio paranda ex libro Posthumo Francisci Frizimelica. t. I. p. 211.
Aqua metallica in genere, & de generatione ipsarum. ibid. & seqq.
Aqua acidulae artificiales Kyperi. t. I. p. 218.
Mangeti. ibid.
Aqua Fluvialis. t. I. p. 218.
Fontana. ibid.
Nivea. t. I. p. 219.
Palustris. t. I. p. 218.
Pluvialis. ibid.
Puicalis. ibid.
ex Rore, unde multa ex rore preparata. t. I. p. 219. & seqq.
Aque pluvialis Spiritus acidus, & ardens Joh. Fabri. t. I. p. 220.
Aque stillativae tam simplices, quam compositae in genere, & de Aquas destillandi modis variis. t. I. p. 222.
Aquas per vesicam destillandi modus. t. I. p. 224.
Aqua rosarum nobilis ex Rosis salitis. t. I. p. 225.
Aquam

INDEX RERUM.

Aquam odoriferam ex fermentatis floribus Sambuci eliciendi modus. t. 1. p. 225.
Aqua ex floribus Caryophyllorum. t. 1. p. 226.
Liliorum convallium. ibid.
Nobilis Veronica. ibid.
Aquarum destillatarum ad solem insolatio, & earundem conservatio. ibid.
Aqua & Spiritus Absinthii compositi. D. Goddard. t. 1. p. 265.
magis compos. Londin. t. 1. p. 226.
minus compos. Londin. ibid.
Acustica, sive ad auditum D. Mindereri. ibid.
ad Auditum difficilem D. Belzeri. t. 1. p. 276.
Alba pro pueris D. Doreri. ibid.
Alexipharmaca Amstelodamens. t. 1. p. 227.
Alexipharmaca, sive Alexiteria D. Clementis. tom. 1. p. 276.
Alexipharmaca, sive Alexiteria D. Goddard. t. 1. p. 265.
Alexipharmaca, sive Alexiteria alia, ejusd. ibid.
D. Mayerne. t. 1. p. 278.
D. Musitani. t. 1. p. 284.
D. Zvelferi. t. 1. p. 226.
Aloëtica solutiva D. à Mynsicht. t. 1. p. 284.
Aluminosa Pharm. Bat. t. 1. p. 262.
D. Fallopii. t. 1. p. 227.
D. B. ex Hoffmanno. t. 1. p. 272.
D. Liebauii. t. 1. p. 227.
Analeptica ex animalium partibus destillata Rolfin. ibid.
D. Schillengii. t. 1. p. 276.
Angelica Pestsionialis Collect. Leyd. t. 1. p. 227.
Angelorum odorata D. de Scobbis. ibid.
Anbalsina Schroderi. ibid.
Animalis Ph. Bat. t. 1. p. 262.
Anisi cum Spiritu Vini, Belzeri. t. 1. p. 276.
Antiepileptica Pharm. Aug. t. 1. p. 233.
Ex cerebro humano. t. 1. p. 992.
Daniæ Regis. t. 1. p. 273.
Reginæ. t. 1. p. 274.
Hartmanni. t. 1. p. 273.
D. R. ex Hoffmanno. t. 1. p. 265.
Langii. t. 1. p. 233.
D. Mayerne. t. 1. p. 278.
D. à Mynsicht. ibid.
& cephalica D. Zvelf. t. 1. p. 33.
& podagrica ejusd. ibid.
Seu hyrundinum composita ejusd. ibid.
è Volucrum specie differentium pullis ejusdem. t. 1. p. 234.
Anticolica P.H.D. ex Hofm. t. 1. p. 269.
Antifebrilis D.B. t. 1. p. 274.
alia ejusd. ibid.
D. à Mynsicht. t. 1. p. 282.
Timæi. t. 1. p. 259.
Antihæctica D. Musitani. t. 1. p. 284.
Schroderi. t. 1. p. 235.
alia ejusd. ibid.
Antihydrica D. à Mynsicht. t. 1. p. 282.
Antihypochondriaca D. Coci. t. 1. p. 276.
Seu Aperitiva Hoffman. t. 1. p. 269.
Antimelancholica Fischeti. t. 1. p. 227.
Antimonii per inferiora purgans ex collect Bierling. t. 1. p. 273.
Antiparalytica Amstelodamens. t. 1. p. 239.
Charraz. ibid.
Anisophisica Ph. Bat. t. 1. p. 262.
in phibisi valde utiles Weickard. t. 1. p. 258.
ex Sanguine humano, ex collect. Bierl. t. 1. p. 271.
certissima, D. Bucetii. ibid.
D. à Mynsicht. t. 1. p. 280.
Antipodagrica P.H. D. ex Hartmanno. t. 1. p. 273.

Aqua Antipodagrica Quercetani. t. 1. p. 257.
Joh. Raici. ibid.
Antiscorbutica Ph. Bat. t. 1. p. 261.
alia ejusd. ibid.
Bierlingii. t. 1. p. 271.
Bontekoe. t. 1. p. 241.
Dornkreilii. t. 1. p. 240.
D. B. O. ex Hoffmanno. t. 1. p. 269.
D. R. R. ex eodem. ibid.
D. V. S. ex eodem. t. 1. p. 270.
ad phibisi ejusd. ex eodem. ibid.
D. Kistii. t. 1. p. 276.
D. à Mynsicht. t. 1. p. 281.
Norimbergens. t. 1. p. 241.
Calida ex Succis Timæi. t. 1. p. 239.
frigida ex succis ejusd. ibid.
Zvelferi. t. 1. p. 241.
Antivenerea Musitani. t. 1. p. 284.
Aperitiva Landgravii. t. 1. p. 276.
Schroderi. t. 1. p. 227.
Timæi. t. 1. p. 249.
Apoplectica Charraz. t. 1. p. 228.
Crollii. t. 1. p. 227.
D. H. ex Hoffmanno. t. 1. p. 265.
P. H. D. ex eodem. ibid.
H. ex eodem. ibid.
vidua Hoffmann. t. 1. p. 278.
Spirituosa Juncken. t. 1. p. 228.
Sine Castoreo Kolreiteri. t. 1. p. 277.
Langii vid. Aqua mirabilis Langii. t. 1. p. 228.
Ludovici. t. 1. p. 278.
D. Mayerne. t. 1. p. 279.
D. à Mynsicht. t. 1. p. 281.
Norimbergensis. t. 1. p. 277.
cum Ambra & moscho D. Rothii. t. 1. p. 228.
Saxoniz Electrici s. ibid.
Sennerti. t. 1. p. 237.
Heroica Timæi. t. 1. p. 228.
Wedelii. ibid.
Zvelferi. ibid.
Alia ejusd. ibid.
Mineralis ejusd. ibid.
Apostematica D. Kolreiteri. t. 1. p. 266.
Ad Ariduras ex Hoffmanno. t. 1. p. 219.
Aromatica Norimbergensis. t. 1. p. 277.
Ariemisia composita D. Joh Jac. Reiteri. t. 1. p. 281.
Arterialis Musitani. ibid.
alia ejusd. t. 1. p. 229.
Arthritica Ph. Aug. ibid.
alia ejusd. Ph. Aug. t. 1. p. 265.
D. C. ex Hoffmanno. t. 1. p. 266.
D. L. M. ex eodem. ibid.
P. H. D. ex eodem. t. 1. p. 229.
Mollenbrockii. t. 1. p. 273.
Tilemanni. ibid.
alia ejusdem. t. 1. p. 259.
ex herbis calidis Timæi. t. 1. p. 264.
ex Radicibus calidis ejusd. t. 1. p. 229.
Zvelferi. t. 1. p. 229.
Asthmatica Ph. Aug. ibid.
alia ejusd. Pharm. t. 1. p. 266.
D. R. ex Hoffmanno. ibid.
D. P. ex eodem. ibid.
Alia pro D. S. B. ex eodem. t. 1. p. 275.
Alba D. Mavii. t. 1. p. 229.
Zvelferi. t. 1. p. 276.
Aurea D. Doreri. t. 1. p. 229.
Langii. t. 1. p. 275.
Aurum solvens sine corrosione, & deaurans. t. 1. p. 229.
Bardana composita Ph. Aug. t. 1. p. 261.
Bechica Ph. Bat. t. 1. p. 261.
Benedicta

INDEX RERUM.

<i>Aqua Benedicte</i> Ph. Bat.	Tom. I. Pag. 262.
<i>Composita</i> ejusd. Ph. Bat.	ibid.
<i>Beuardica Altenburgens.</i> ex Hoffm.	t. I. p. 269.
Michaelis Angeli Rotæ.	t. I. p. 230.
Chartaz.	t. I. p. 229.
Collegii Regal. Lond.	t. I. p. 230.
<i>Temperata</i> D. F. H. ex Hoffm.	t. I. p. 269.
Landgravii.	t. I. p. 276.
Musitani.	t. I. p. 284.
Schroderi.	t. I. p. 229.
Timæi.	t. I. p. 258.
<i>Bryonia composita</i> Timæi.	ibid.
<i>Bursa pastoris</i> D. Le Mort.	t. I. p. 255.
<i>Contra Calculum</i> D. Doreri.	t. I. p. 276.
D. L.	t. I. p. 173.
<i>ab Hungaro communicata.</i>	t. I. p. 275.
Norimbergens.	t. I. p. 230.
<i>Chalybeata</i> Ph. Bat.	t. I. p. 263.
<i>Chamamel. compos.</i> Ph. Bat.	t. I. p. 263.
<i>Chamamel. compos.</i> D. Godd.	t. I. p. 265.
<i>Camphorata</i> Ph. Bat.	t. I. p. 262.
<i>Cancrorum simplex.</i>	t. I. p. 230.
ex D. Cnæstilio.	t. I. p. 914.
<i>Composita ophthalmica</i> D. l'Emery.	t. I. p. 230.
<i>Ad Capillos denigrandos</i> ex Hoffm.	t. I. p. 271.
alia	t. I. p. 272.
<i>Caponis composita</i> Ph. Aug.	t. I. p. 230.
D. à Mynsicht.	t. I. p. 280.
<i>Carbunculi</i> Ph. Aug.	t. I. p. 230.
<i>Cardiaca</i> D. Doreri.	t. I. p. 276.
<i>Cardui benedicti</i> D. Le Mort.	t. 2. p. 252.
<i>Carminativa</i> Doitnceilii	t. I. p. 231.
D. Mayerne.	t. I. p. 278.
<i>Sive de chamomilla composita</i> Schrod. tom. I.	p. 270.
Schvvalenbergeri.	t. I. p. 277.
Zvelferi.	t. I. p. 231.
<i>Caryophyllorum</i> Ph. Bat.	t. I. p. 262.
<i>Cassitatis</i> D. à Mynsicht.	t. I. p. 282.
<i>Et Spiritus Castorei</i> Londin.	t. I. p. 231.
<i>Contra catarrhos</i> ex Hoffmanno.	t. I. p. 266.
<i>ad catarrhos desiccandos</i> ex Schrodero	t. I. p. 230.
<i>caustica</i> F. F.	t. I. p. 251.
alia.	ibid.
<i>Cephalica</i> Ph. Bat.	t. I. p. 262.
I. A. ex collectione Bierling.	t. I. p. 273.
<i>Interna</i> D. P. H. ex Hoffm.	t. I. p. 266.
<i>Externa</i> P. H. D. ex eodem.	ibid.
<i>ad intra</i> Kolreiteri.	t. I. p. 276.
<i>Calida ad intra</i> Mavil;	t. I. p. 275.
<i>ad extra</i> ejusd.	ibid.
Regis Poloniæ.	ibid.
Schroderi.	t. I. p. 231.
Schvvalenbergeri.	t. I. p. 276.
<i>Calida</i> Timæi.	t. I. p. 257.
ex Succis ejusd.	ibid.
ex herbis calidis ejusd.	t. I. p. 259.
ex herbis frigidis ejusd.	t. I. p. 260.
ex floribus calidis ejusd.	ibid.
ex floribus frigidis ejusd.	ibid.
ex Radicibus calidis ejusd.	ibid.
ex seminibus calidis ejusd.	t. I. p. 261.
ex seminibus frigidis ejusd.	ibid.
ex Aromatibus ejusd.	ibid.
ex lignis & corticibus ejusd.	t. I. p. 262.
de VVeickard.	t. I. p. 231.
<i>Ceraforum composita</i> Ph. Bat.	t. I. p. 262.
<i>Cinnamomi buglossata</i> D. à Mynsicht.	t. I. p. 281.
<i>Cardiaca.</i> Pharm. Aug.	t. I. p. 231.
Pharm. Bat.	t. I. p. 263.
<i>Cydoniata</i> Pharm. Aug.	t. I. p. 231.
<i>Mordeata</i> Pharm. Bateau.	t. I. p. 263.

<i>Aqua Cinnamomi contra epilepsiam</i> Norimberg. tom.	I. p. 231.
<i>Cochlearia composita</i> D. Goddard.	t. I. p. 265.
D. Le Mort.	t. I. p. 254.
<i>Celestis</i> Londinens.	t. I. p. 231.
<i>Contra colicam</i> D. Doreri.	t. I. p. 277.
<i>Communitatis ophthalmica</i> Schroderi.	t. I. p. 231.
alia ejusd.	ibid.
<i>Confortans usitata</i> Pharm. Aug.	ibid.
Norimbergens.	ibid.
<i>Cordialis temperata</i> Pharm. Aug.	t. I. p. 232.
D. P. H. ex collect. Bierling.	t. I. p. 274.
Doreri.	t. I. p. 276.
<i>Frigida</i> D. V. S. ex Hoffmanno.	t. I. p. 267.
<i>Confortans</i> P. H. D. ex eodem.	t. I. p. 268.
ex Corde Cervi, ex eodem.	t. I. p. 267.
alia ex Corde Cervi. D. G. ex eodem.	ibid.
D. Goddard.	t. I. p. 265.
<i>Saxonia</i> Pharm. Lond.	t. I. p. 232.
<i>Calida</i> D. à Mynsicht.	t. I. p. 281.
<i>Frigida</i> ejusd.	ibid.
Norimbergens.	t. I. p. 232.
D. Pleisueri.	t. I. p. 274.
<i>ad pulsum</i> D. Schillingii.	t. I. p. 277.
<i>Restaurans</i> P. de Spina.	t. I. p. 232.
<i>Calida</i> Timæi.	t. I. p. 258.
<i>Frigida</i> ejusdem.	ibid.
<i>Odorata</i> ejusdem.	ibid.
<i>de Succis</i> ejusdem.	t. I. p. 232.
ex herbis calidis ejusd.	t. I. p. 260.
frigidis ejusd.	ibid.
ex floribus calidis ejusd.	ibid.
ex seminibus calidis ejusd.	t. I. p. 261.
ex fructibus ejusd.	ibid.
ex radicibus calidis ejusd.	ibid.
ex Aromatibus ejusd.	ibid.
<i>Cordium composita</i> Pharm. Bat.	t. I. p. 263.
<i>Cordis Cervi ex collectione</i> Bierlingii.	t. I. p. 273.
D. Mayerne.	t. I. p. 281.
D. à Mynsicht.	t. I. p. 281.
<i>de Cordibus animalium</i> D. Mayerne.	t. I. p. 278.
<i>de Cornu Cervi</i> D. à Mynsicht.	t. I. p. 284.
<i>Citrata.</i> Valdschmid.	t. I. p. 232.
<i>Contra Cordis palitationem,</i> Doreri.	t. I. p. 277.
<i>Corrosiva</i> D. B. ex Hoffmanno.	t. I. p. 271.
Alia ex eodem.	t. I. p. 272.
<i>Cosmetica</i> Pharm. Bateau.	t. I. p. 263.
<i>Cosmetica capillos augentes.</i>	t. I. p. 645.
capillos elongantes.	t. I. p. 644.
capillos renasci prohibentes.	t. I. p. 645.
capillos tingentes.	t. I. p. 644. & seq.
dentes dealbantes.	t. I. p. 646.
oculorum vitia tollentes.	t. I. p. 645.
<i>odorata varia variorum</i> Authorum tom. I.	p. 644.
faciem illustrantes.	t. I. p. 646.
faciem dealbantes & rubificantes.	t. I. p. 649.
faciem denigrantes.	t. I. p. 650.
faciei maculas tollentes.	t. I. p. 651.
faciem juvenilem reddentes.	t. I. p. 651.
<i>myrrhata</i> S. Clossæi	t. I. p. 232.
<i>Columborum</i> Chartaz.	ibid.
alia ejusd.	ibid.
D. à Mynsicht.	t. I. p. 284.
Schroderi.	t. I. p. 232.
<i>pretiosa</i> ejusdem.	ibid.
<i>Criminalis</i> Pharm. Bateau.	t. I. p. 63.
<i>Cucumerum compositum</i> Ph. Bat.	t. I. p. 263.
<i>Cynobati composita</i> Ph. Bat.	ibid.
<i>de Cypro</i> ex Hoffmanno.	t. I. p. 71.
Alia ex eodem.	ibid.
<i>Damascena</i> Doreri.	t. I. p. 277.
<i>Aqua</i>	

INDEX RERUM.

Aqua Damascena

<i>Hamburgens. ex Hofm.</i>	t. i. p. 268.
<i>odorifera Schroderi.</i>	t. i. p. 232.
<i>contra Dentium dolores D. Luchtenii.</i>	t. i. p. 277.
<i>pro dentium ablutione ex Hoffmanno.</i>	t. i. p. 274.
<i>D. Berger.</i>	ibid.
<i>Digerens simplex.</i>	t. i. p. 259.
<i>Digitalis Ph. Bat.</i>	t. i. p. 263.
<i>Divina.</i>	t. i. p. 991.
<i>Diuretica D. D'Aquin.</i>	t. i. p. 231.
<i>Charraz.</i>	ibid.
<i>S. Clofazi.</i>	ibid.
<i>ex nucleis F. F. Schroderi.</i>	t. i. p. 232.
<i>Timæi.</i>	t. i. p. 259.
<i>Dominarum D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 283.
<i>Dysenterica D. G. R. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 70.
<i>alia P. H. D. ex eodem.</i>	ibid.
<i>alia D. D. R. ex eodem.</i>	ibid.
<i>Schroderi.</i>	t. i. p. 233.
<i>Sive Balsamum Embryonum Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Pharm. Bat.</i>	t. i. p. 263.
<i>Epidemi. Londinens.</i>	t. i. p. 233.
<i>Pharm. Bat.</i>	t. i. p. 263.
<i>pro Epithemate Cordis.</i>	t. i. p. 234.
<i>Expulsiva D. Veckeri.</i>	t. i. p. 274.
<i>Faciei maculas delens.</i>	t. i. p. 271.
<i>ex lue Venerea delens.</i>	ibid.
<i>Febrifuga Pharm. Bat.</i>	t. i. p. 263.
<i>ad Quartanarios Charraz.</i>	t. i. p. 234.
<i>D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 282.
<i>Schroderi.</i>	t. i. p. 234.
<i>contra Febres Helicas Timæi.</i>	t. i. p. 259.
<i>Malignas ejusd.</i>	ibid.
<i>pro Fœtore oris D. Weickard.</i>	t. i. p. 234.
<i>Formicarum Ph. Bat.</i>	t. i. p. 263.
<i>Fortis Aluminata Ph. Bat.</i>	ibid. & t. 2. p. 895.
<i>Duplex Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Fumaria composita Ph. Aug.</i>	t. i. p. 234.
<i>D. Le mort.</i>	t. i. p. 255.
<i>ad Gangranam D. Lemery.</i>	t. i. p. 235.
<i>Geniana composita Londinens.</i>	ibid.
<i>Gilberti Pharm. Lond.</i>	ibid.
<i>ad Gingivarum exulcerationem & putredinem ex Hoffmanno.</i>	t. i. p. 271.
<i>Contra Gonorrhœam D. F. H. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 270.
<i>Juncken.</i>	t. i. p. 235.
<i>Musitani.</i>	t. i. p. 285.
<i>virulentam Quercet.</i>	t. i. p. 235.
<i>Hemoptica Ph. Bruxellens.</i>	ibid.
<i>Hellebori nigri D. Gantzlands.</i>	t. i. p. 273.
<i>Hepatica P. H. D. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 270.
<i>alia ejusd. ex eodem.</i>	ibid.
<i>calida D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 281.
<i>Frigida ejusdem.</i>	ibid.
<i>ex herbis calidis Timæi.</i>	t. i. p. 260.
<i>frigid. ejusd.</i>	ibid.
<i>ex floribus calidis ejusd.</i>	ibid.
<i>frigidis ejusd.</i>	ibid.
<i>ex seminibus calidis ejusd.</i>	t. i. p. 261.
<i>frigid. ejusd.</i>	ibid.
<i>calida ejusd.</i>	t. i. p. 258.
<i>frigida ejusd.</i>	ibid.
<i>Hepatica ex Radicibus calidis Timæi.</i>	t. i. p. 261.
<i>frigidus ejusd.</i>	ibid.
<i>ex lignis & corticibus ejusd.</i>	t. i. p. 262.
<i>ex fructibus ejusd.</i>	ibid.
<i>Herpetica Ph. Bat.</i>	t. i. p. 263.
<i>Hirundinum ustata Ph. Aug.</i>	t. i. p. 235.
<i>composita ejusd. Ph.</i>	ibid.
<i>major ejusd. Ph.</i>	ibid.
<i>Ph. Barcan.</i>	t. i. p. 263.
<i>D. Le Mort.</i>	t. i. p. 257.
<i>Hormini Ph. Bat.</i>	t. i. p. 263.

Aqua Hungarica Ph. Bat.

<i>Hydropica D. Coci.</i>	t. i. p. 263.
<i>P. H. D. ex Hoffmann.</i>	t. i. p. 277.
<i>Hydrotica tempore pestis. D. Weickard.</i>	t. i. p. 270.
<i>Hypnotica, seu somnifera ex collect. Bierling.</i>	t. i. p. 233.
<i>P. 273.</i>	
<i>Altenburgensis ex Hoffm.</i>	t. i. p. 266.
<i>D. V. S. ex eodem.</i>	ibid.
<i>D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 279.
<i>D. Reinesii.</i>	t. i. p. 273.
<i>D. Veckeri.</i>	ibid.
<i>Hysterica vulgò Panalis Heraclei compos. Pharm.</i>	t. i. p. 236.
<i>Aug.</i>	t. i. p. 272.
<i>ex collectione Bierlingii.</i>	t. i. p. 236.
<i>Charraz.</i>	t. 2. p. 132.
<i>composita perlata D. Cnœffellii.</i>	t. i. p. 235.
<i>Crollii.</i>	t. i. p. 270.
<i>D. G. R. ex Hoffmanno.</i>	t. i. p. 271.
<i>Alia D. R. ex eodem.</i>	ibid.
<i>Alia P. P. ex eodem.</i>	t. i. p. 235.
<i>Mathæi Martini.</i>	t. i. p. 278.
<i>D. Mayerne.</i>	t. i. p. 283.
<i>D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 236.
<i>Succincta & efficax D. Le Mort.</i>	t. i. p. 239.
<i>Timæi.</i>	t. i. p. 260.
<i>ex herbis calidis ejusd.</i>	t. i. p. 236.
<i>Zvvelferi.</i>	t. i. p. 258.
<i>Contra Icterus Timæi.</i>	t. i. p. 236.
<i>Imperialis è Ph. Lond.</i>	t. i. p. 236.
<i>Inaurans.</i>	t. i. p. 274.
<i>Inflaurans D. Mayerne.</i>	t. i. p. 278.
<i>Ischiatica.</i>	t. i. p. 274.
<i>Ingladium composita Ph. Lond.</i>	t. i. p. 236.
<i>Invenutus D. Weickard.</i>	ibid.
<i>Lactis Alexiteria Ph. Bat.</i>	t. i. p. 263.
<i>Nephritica ejusd. Ph.</i>	ibid.
<i>Pectoralis ejusd. Ph.</i>	ibid.
<i>Scorbutica ejusd. Ph.</i>	t. i. p. 264.
<i>Lamii composita ejusd. Ph.</i>	ibid.
<i>& Spiritus Lavendula composit. Matthie è Ph. Colleg. Reg. Lond.</i>	t. i. p. 26.
<i>Lavendula composita Schroderi.</i>	ibid.
<i>Laxativa efficax D. D. Zvvelfer.</i>	ibid.
<i>Lenitiva D. Goddard.</i>	t. i. p. 265.
<i>Limacum magistral. è Pharm. Coll. Reg. Lond.</i>	t. i. p. 237.
<i>Lithontripica D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 283.
<i>& Spiritus Lumbricorum magistral. è Ph. Colleg. Reg. Lond.</i>	t. i. p. 237.
<i>Magnanimitatis K. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 268.
<i>Laurenbergii.</i>	t. i. p. 274.
<i>in Officina Regia.</i>	t. i. p. 258.
<i>ex Schrodero.</i>	t. i. p. 237.
<i>alia ex eodem.</i>	ibid.
<i>Maria è Ph. Colleg. Reg. Lond.</i>	ibid.
<i>Martialis D. Le Mort.</i>	t. i. p. 27.
<i>Masticina è Ph. Aug.</i>	t. i. p. 237.
<i>D. D. L. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 270.
<i>D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 279.
<i>Stomachica Zvvelfer.</i>	t. i. p. 237.
<i>Melluminata Ph. Bat.</i>	t. i. p. 264.
<i>ad memoriam confortandam Nobilis Silesii. t. i. p. 273.</i>	
<i>D. VVeikard.</i>	t. i. p. 237.
<i>Mercuriata Ph. Aug.</i>	t. i. p. 237.
<i>Pharm. Bat.</i>	t. i. p. 264.
<i>Mirabilis M. H.</i>	t. i. p. 275.
<i>Et divina ferè virtutis senio confectos quasi rejuvenescere faciens, etiam vulnera & ulcera sanans, O. B. ex Hoffmanno.</i>	t. i. p. 268.
<i>ad Morpheam.</i>	t. i. p. 274.
<i>Muscarum Crinalis D. Lemery.</i>	t. i. p. 237.
<i>Narcotica</i>	

INDEX RERUM.

<i>Aqua Narcotica Mynsicht.</i>	t.1. p. 279.	<i>Aq. Pectoralis ex herbis frigidis Timæi</i>	t.1. p. 260.
<i>Nephritica Ph. Aug.</i>	t.1. p. 238.	<i>Ex floribus calidis Ejusd.</i>	ibid.
<i>Amstelodamensis.</i>	ibid.	<i>Frigidis Ejusd.</i>	ibid.
<i>correcta D. de Bellegarde.</i>	ibid.	<i>Ex seminibus frigidis Ejusd.</i>	t.1. p. 261.
<i>D. Cnæffellii.</i>	t.2. p. 443.	<i>Calidis Ejusd.</i>	ibid.
<i>D. G. R. ex Hoffmanno.</i>	t.1. p. 270.	<i>Ex radicibus calidis Ejusd.</i>	ibid.
<i>Alia D. R. ex eodem.</i>	ibid.	<i>Ex fructibus Ejusd.</i>	ibid.
<i>Alia R. G. ex eodem.</i>	ibid.	<i>Perlarum composita Mustani</i>	t.1. p. 286.
<i>è Miscellan. Curios. Dec. 1. Ann. 7.</i>	t.1. p. 238.	<i>Confortativa Zvvelferi</i>	t.1. p. 240.
<i>D. à Mynsicht.</i>	t.1. p. 283.	<i>In officina Vjsualis</i>	t.1. p. 250.
<i>Rolfincii.</i>	t.1. p. 272.	<i>Periscaria composita Pharm. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>ex herbis calidis Timæi.</i>	t.1. p. 260.	<i>Petastidis composita Londinensis</i>	t.1. p. 240.
<i>frigidis ejusd.</i>	ibid.	<i>Philosophica Ex collect. Bierling.</i>	t.1. p. 273.
<i>ex floribus calidis ejusd.</i>	ibid.	<i>Philosophorum Ex Schrodero</i>	t.1. p. 240.
<i>ex seminibus calidis ejusd.</i>	t.1. p. 261.	<i>Physagoga è Pharm. Aug.</i>	ibid.
<i>frigidis ejusd.</i>	ibid.	<i>Picarum composita Ph. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>ex fructibus ejusd.</i>	ibid.	<i>Norimbergens.</i>	t.1. p. 240.
<i>ex radicibus calidis ejusd.</i>	ibid.	<i>Plantaginis. D. Lemort.</i>	t.1. p. 254.
<i>frigidis ejusd.</i>	ibid.	<i>Pneumonica Pharm. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>ex lignis & corticibus ejusd.</i>	t.1. p. 262.	<i>Frigida Timæi</i>	t.1. p. 258.
<i>Wedelii.</i>	t.1. p. 238.	<i>Calida Ejusd.</i>	ibid.
<i>composita Weickard.</i>	ibid.	<i>Alia Ejusd.</i>	ibid.
<i>Zvvelferi.</i>	ibid.	<i>Ad Podagricos dolores Charraz.</i>	t.1. p. 240.
<i>Nervina Timæi.</i>	t.1. p. 259.	<i>Pæonia composita Londinensis</i>	ibid.
<i>Nigra Chirurgorum ad gangranam & Sphacelum</i>		<i>Polychresta composita Rolfincii</i>	t.1. p. 271.
<i>t.1. p. 275.</i>		<i>Hepatica Ejusd.</i>	ibid.
<i>ad oculos Sapphirea.</i>	t.1. p. 250.	<i>Præservativa Ex collect. Bierling.</i>	ibid.
<i>Ocularis D. V. S. ex Hoffmanno.</i>	t.1. p. 266.	<i>Prolifica Pharm. Batean.</i>	t.1. p. 264.
<i>Alia ejusd. ex eodem.</i>	ibid.	<i>Pulmonica D. Coci</i>	t.1. p. 277.
<i>Externa D. Cnæffellii.</i>	t.2. p. 489.	<i>Pulmonum vituli D. à Mynsicht</i>	t.1. p. 280.
<i>ad Oculos usitata è Ph. Aug.</i>	t.1. p. 238.	<i>Purgans Zvvelferi</i>	t.1. p. 240.
<i>Odontalgica externa P. H. D. ex Hoffm.</i>	t.1. p. 271.	<i>Raphani composita Londinens.</i>	ibid.
<i>Odorata egregia Charraz.</i>	t.1. p. 239.	<i>Regia Pharm. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>Odorifera Ph. Aug.</i>	t.1. p. 238.	<i>Regia cum & sine destillatione</i>	t.2. p. 892.
<i>Pharm. Bat.</i>	t.1. p. 264.	<i>Regina Hungaria simplex</i>	t.1. p. 240.
<i>Zvvelferi.</i>	t.1. p. 238.	<i>Composita</i>	ibid.
<i>pro epithemate Cord. & pulsum ejusd. Zvvelfer.</i>		<i>Salivalis Pharm. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>t.1. p. 239.</i>		<i>Salvia composita Norimberg.</i>	t.1. p. 240.
<i>Omnium florum Ph. Bat.</i>	t.1. p. 264.	<i>Sarsa composita Pharm. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>Ophthalmica D. D' Aquin.</i>	t.1. p. 250.	<i>Sarsa parilla destillata Rolfincii</i>	t.1. p. 272.
<i>Ophthalmica ex Collection. Bierling.</i>	t.1. p. 272.	<i>Sassafras Timæi</i>	t.1. p. 258.
<i>Pharm. Bat.</i>	t.1. p. 264.	<i>Scordii composita Londinens.</i>	t.1. p. 241.
<i>Sapphirina ejusd. Ph.</i>	ibid.	<i>Norimbergens.</i>	ibid.
<i>Ophthalmica Bruni.</i>	t.1. p. 249.	<i>Senclorum composita Ph. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>Ophthalmica Cnæffellii</i>	t.2. p. 489.	<i>Serpilli Composita D. VV. ex Iunken</i>	t.1. p. 241.
<i>Ophthalmica Donzelli ex floribus cichorii.</i>	t.1. p. 250.	<i>Benedicta D. à Mynsicht.</i>	t.1. p. 282.
<i>Ophthalmica F. F.</i>	t.1. p. 249.	<i>Siphyltica Ph. Bat.</i>	t.1. p. 264.
<i>D. D. K. ex Hoffman.</i>	t.1. p. 271.	<i>Somnifera ex collectione Bierling.</i>	t.1. p. 273.
<i>Alia D. M. ex eodem.</i>	ibid.	<i>Mustani.</i>	t.1. p. 286.
<i>D. Krausens.</i>	t.1. p. 275.	<i>Timæi.</i>	t.1. p. 257.
<i>carulea Juncken.</i>	t.1. p. 239.	<i>Zvvelferi.</i>	t.1. p. 251.
<i>preciosa Mustani.</i>	t.1. p. 285.	<i>Splenetica D. Mavii.</i>	t.1. p. 275.
<i>compendiosior ejusd.</i>	ibid.	<i>D. à Mynsicht.</i>	t.1. p. 282.
<i>Aurea D. à Mynsicht.</i>	t.1. p. 279.	<i>F. F. Schroderi.</i>	t.1. p. 241.
<i>Viridis ejusd.</i>	ibid.	<i>Timæi.</i>	t.1. p. 258.
<i>Subnigra ejusd.</i>	t.1. p. 280.	<i>alia ex succis ejusd.</i>	ibid.
<i>de Cancris ejusd.</i>	ibid.	<i>ex herbis calidis Timæi.</i>	t.1. p. 260.
<i>Interna ejusd.</i>	ibid.	<i>frigidis ejusd.</i>	ibid.
<i>Quercetani.</i>	t.1. p. 250.	<i>ex floribus calidis ejusd.</i>	ibid.
<i>Rulandi.</i>	t.1. p. 272.	<i>ex seminibus calidis ejusd.</i>	t.1. p. 261.
<i>Timæi.</i>	t.1. p. 259.	<i>ex Radicibus calidis ejusd.</i>	ibid.
<i>Valentini Villii.</i>	t.1. p. 250.	<i>frigidis ejusd.</i>	ibid.
<i>Zvvelferi</i>	t.1. p. 239.	<i>ex lignis & corticibus ejusd.</i>	t.1. p. 262.
<i>Panis</i>	t.1. p. 275.	<i>ex fructibus ejusd.</i>	ibid.
<i>Papaveris composita</i>	t.1. p. 239.	<i>Stapediana prima è Pharm. Aug.</i>	t.1. p. 241.
<i>Pectoralis D. Goddard.</i>	t.1. p. 265.	<i>Secunda ex ead. Pharm.</i>	ibid.
<i>Propectoralis Ejusd.</i>	ibid.	<i>D. Stephani è Pharm. Londinens.</i>	ibid.
<i>Pectoralis Pharm. Batean.</i>	t.1. p. 264.	<i>Stomachica Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>D. à Mynsicht.</i>	t.1. p. 280.	<i>D. Hochstetteri è Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Norimbergens.</i>	t.1. p. 239.	<i>P. H. D. ex Hoffmanno.</i>	t.1. p. 269.
<i>Ex herbis calidis Timæi</i>	t.1. p. 260.	<i>acetosa D. à Mynsicht.</i>	t.1. p. 281.
<i>Mangeti Bibl. Pharm.</i>		<i>calida ejusd.</i>	ibid.
		Eccccc	Aqua

INDEX RERUM.

<i>Aqua Stomachica Timæi.</i>	t. I. p. 258.	<i>Aqua vise Carminativa</i>	t. I. p. 248.
<i>ex herbis calidis ejusd.</i>	t. I. p. 260.	<i>Cephalica alba</i>	t. I. p. 246.
<i>frigidis ejusd.</i>	ibid.	<i>Nobilis</i>	ibid.
<i>ex floribus calidis ejusd.</i>	ibid.	<i>Cordialis præstantissima</i>	t. I. p. 245.
<i>ex fructibus ejusd.</i>	t. I. p. 262.	<i>Alia.</i>	ibid.
<i>ad Stranguriam Musitani.</i>	t. I. p. 286.	<i>Diambra per distillationem</i>	t. I. p. 244.
<i>Syptica Pharm. Barcan.</i>	t. I. p. 264.	<i>Diascyrionis</i>	t. I. p. 246.
<i>D. Matte la Faveur ex Charraz.</i>	t. I. p. 251.	<i>Seu Elixir Vita</i>	ibid.
<i>alia ejusd.</i>	ibid.	<i>Liliorum convallium composita</i>	t. I. p. 247.
<i>D. Lemery.</i>	ibid.	<i>Limonum & Arantiorum</i>	t. I. p. 48.
<i>D. D. Weber, Anchora Sauciatorum ipsi dicta.</i>	t. I. p. 272.	<i>Memba.</i>	t. I. p. 247.
<i>Syptica processa è Miscellan. Curios. Decur. 2.</i>	ibid.	<i>Nobilis cum Ambra per infusionem.</i>	t. I. p. 244.
<i>Ann. 4.</i>	ibid.	<i>Pectoralis optima</i>	t. I. p. 247.
<i>ad suffusionem expertissima.</i>	t. I. p. 250.	<i>Rubra optima</i>	t. I. p. 274.
<i>Sudorifera D. Musitani.</i>	t. I. p. 286.	<i>Tartarizata Quercetani</i>	t. I. p. 889.
<i>Temperata Basilii.</i>	t. I. p. 889.	<i>Theiæacalis</i>	t. I. p. 48.
<i>Contra Terrorem ex Schrodero.</i>	t. I. p. 242.	<i>Contra Ulcera Renum & Vesicae Timæi.</i>	t. I. p. 259.
<i>Terebinthinata è Ph. Lond.</i>	t. I. p. 242.	<i>Antiqua carnem depascentia.</i>	t. I. p. 272.
<i>Theriæacalis è Pharm. Aug.</i>	ibid.	<i>Vomitiva Esculapii, sive saturnina, ex Schrodero</i>	ibid.
<i>ex D. Charraz.</i>	ibid.	<i>Plateri, ex Schrodero</i>	ibid.
<i>Crollii, seu spiritus theriæacalis camphoræ ex Schrodero.</i>	ibid.	<i>Contra Urinæ ardorem D. à Mynsicht.</i>	t. I. p. 283.
<i>Seu Sudorifera D. Diemerbroeck.</i>	t. I. p. 243.	<i>D. Timæi.</i>	t. I. p. 259.
<i>Cordialis, Bezoartica, D. Donzelli.</i>	t. I. p. 242.	<i>Uterina D. R. ex Collect. Bieri.</i>	t. I. p. 272.
<i>alia ejusd.</i>	ibid.	<i>Arcana ex collect. ejusd.</i>	t. I. p. 273.
<i>è Pharm. Colleg. Reg. Lond.</i>	t. I. p. 243.	<i>ex Radicibus calidis Timæi.</i>	t. I. p. 261.
<i>Protheriæacalis ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Vulneraria è Ph. Bat.</i>	t. I. p. 264.
<i>Theriæacalis Bezoartica sive Chylostagma Diaphoreticum D. Mindereri.</i>	t. I. p. 242.	<i>D. V. S. ex Hoffmanno.</i>	t. I. p. 271.
<i>Theriæacalis D. à Mynsicht.</i>	t. I. p. 283.	<i>de Xyloaloe D. à Mynsicht.</i>	t. I. p. 79.
<i>Per infusionem Norimbergens.</i>	t. I. p. 242.	<i>Zedoarie D. Doreri.</i>	t. I. p. 277.
<i>Seu contra Pestem ex Schrodero.</i>	ibid.	<i>Aquifolium, vid. Agrifolium.</i>	t. I. p. 286.
<i>D. Steinmerz.</i>	t. I. p. 277.	<i>Aquila.</i>	t. I. p. 286.
<i>Aqua de Tribus, vid. Mixtura de Tribus.</i>		<i>Aquila alba, vid. Mercurius dulcis.</i>	
<i>Tristantis ex Schrodero.</i>	t. I. p. 243.	<i>Aquila cælestis, vid. Sal Ammoniacum. item t. I. p. 289.</i>	
<i>Tussilaginis composita Ph. Bat.</i>	t. I. p. 264.	<i>Aquilegia.</i>	t. I. p. 287.
<i>Veltheimiana.</i>	t. I. p. 274.	<i>Arabi, vide Draba.</i>	
<i>Contra Variolas in oculis.</i>	t. I. p. 274.	<i>Arachus, vid. Aphaca.</i>	
<i>& Morbillis Timæi.</i>	t. I. p. 259.	<i>Araneus</i>	ibid.
<i>Venusianus è Ph. Bat.</i>	t. I. p. 264.	<i>Arbor quid sit</i>	ibid.
<i>Contra Veneream luen ex lignis & corticib. Timæi.</i>	t. I. p. 262.	<i>Arbor Dysenteria, vide Macer.</i>	
<i>Vernisuga è Ph. Bat.</i>	t. I. p. 264.	<i>Arbor Vita</i>	ibid.
<i>Contra Verines P. H. D. ex Hoffm.</i>	t. I. p. 271.	<i>Arbor foetida, vide Frangula.</i>	
<i>D. à Mynsicht</i>	t. I. p. 283.	<i>Arbustum, quid sit.</i>	t. I. p. 288.
<i>Viridis Harumanni correcta à D. Charraz.</i>	t. I. p. 243.	<i>Arbutus</i>	ibid.
<i>Sive Collyrium viride ad oculorum morbos.</i>	t. I. p. 250.	<i>Arcanum Alemeth. D. Cnæffli in Epilepsia, Hydrope, Podagra, Quartana, & Venerea lue.</i>	t. I. p. 531.
<i>Virtutum D. R. ex Hoffm.</i>	t. I. p. 268.	<i>Arcanum Aluminis è Ph. Bat.</i>	t. I. p. 288.
<i>alia Hamburgens.</i>	t. I. p. 269.	<i>Cephalicum</i>	t. I. p. 329.
<i>Virtutis ad extra ad Cor & pulsus D. Mavii t. I. p. 275.</i>		<i>de Cironia.</i>	t. I. p. 764.
<i>ex Schrodero.</i>	t. I. p. 249.	<i>Corallinum Ph. Bat.</i>	t. I. p. 288.
<i>Vita pro mulieribus Altenburgens.</i>	t. I. p. 269.	<i>Paracelsi, & S. Closs.</i>	ibid. & t. 2. p. 281.
<i>pestilentialis Altenburgens.</i>	ibid.	<i>Cosmecticum Pharm. Bat.</i>	t. I. p. 288.
<i>Composita è Ph. Aug.</i>	t. I. p. 243.	<i>Arcanum rarissimum quo Auri scriptoris conscribendi modus traditur</i>	t. 2. p. 103.
<i>Regia D. Charraz.</i>	ibid.	<i>Arcanum Duplex Ph. Bat.</i>	t. I. p. 288.
<i>pro muliebribus D. Doreri.</i>	t. I. p. 277.	<i>foviale, ejusd. Ph.</i>	t. I. p. 288.
<i>Matthioli è Ph. Aug.</i>	t. I. p. 243.	<i>Arcanum Oticum in surditate</i>	t. 2. p. 524.
<i>Loimica Norimbergens.</i>	ibid.	<i>Sanguinis hirci contra calculū ex Cnæff. t. 2. p. 445</i>	
<i>Hibernis popularis, Usquebach dict. è Pharm. Lond.</i>	t. I. p. 249.	<i>Sanguinis humani</i>	t. 2. p. 985.
<i>Mulierum camphorata seu spiritus mairicalis camphoræ ex Schrodero.</i>	ibid.	<i>Scriptorium Ph. Bat.</i>	t. I. p. 288.
<i>Aurea D. Reinholt.</i>	t. I. p. 275.	<i>Tartari Solare</i>	t. I. p. 635.
<i>Mulierum, D. VVeickard.</i>	t. I. p. 249.	<i>Arcanum tartari Cnæff. & Helmonti</i>	t. I. p. 733.
<i>Angelica.</i>	ibid.	<i>Archemi, vid. Cinnami.</i>	
<i>Anisi.</i>	t. I. p. 247.	<i>Arcium, vid. Bardana.</i>	
<i>Aromatica per infusionem</i>	t. I. p. 244.	<i>Ardea</i>	t. I. p. 288. & seq.
<i>Aurea.</i>	t. I. p. 245.	<i>Areotica Medicamenta, quid & que sint</i>	t. I. p. 289.
		<i>Aresta, vid. Ononis</i>	
		<i>Argentilla, vid. Potentilla</i>	
		<i>Argentifera fodina, ejusque natura & proprietates</i>	t. I. p. 289.
		<i>Argentæ natura & proprietates</i>	ibid.
		<i>Argentæ inveniendi & preparandi ratio</i>	t. I. p. 290.
		<i>Argentæ in Medicina Usus</i>	ibid.
			Purgatio

INDEX RERUM.

Argenti Purgatio à sordibus superficialiis t.1. p.290
ab alienis metallis ibid.
per calcinationem immersivam ibid.
per fusionem cum Saturno ibid.
per nixum ibid.
Calcinatio immersiva t.1. p.291
Amalgamatoria ibid.
Reverberatoria ibid.
Cementatoria ibid.
Solutio & extractio t.1. p.292
Argentum potabile per spiritum vini simplicem ibid.
Sale urine acutum, & simil. ibid.
tartarizatum ibid.
vitriolatum ibid.
Argenti Tinctura Basiliana ibid.
Argentum Potabile S. Clossæ ibid.
Batei t.1. p.293
Argenti salificatio ibid.
Spiritus S. Clossæ ibid.
Argentum Sophisticandi artificia duo t.1. p.294
Argentum vivum, vide Mercurius
Argilla, vide sub Titulo Terra t.2. p.968
Arguropœia vid. Chrysopœia
Aries, vid. Ovis ibid.
Arisarum ibid.
Aristolochia, ejusque species ibid.
Armeniaca, vid. Mala Armeniaca.
Armenius Lapis, vid. sub titulo Lapis t.2. p.89
Armeni Lapidis vires medicæ t.2. p.123
Amoracia, vid. Radicula Sylvestris
Aromata, quid & quam sint? t.1. p.295
Aromatisare, quid sit ibid.
Aronia, vid. Dracunculus.
Arrhenticum, & Arsenicum, vid. Auripigmentum.
Arihemisia, vide Herba S. Johannis ibid.
Arihanita, vid. Ciclamen
Arithritica Medicamenta, quid & quam sint t.1. p.296
& seq.
Arithritica Medicamenta varia D. Schulzii t.1. p.297
Arithriticum emplastrum miraculosum ejusd. ibid.
Johannis Casimiri Poloniæ Regis ibid.
Regis Daniæ ibid.
Aliud in Arithritide vaga ibid.
Unguentum Acopum dictum D. Meissneri. ibid.
Burri t.1. p.298
Decoctum è Miscell. curios. Dec.1. Ann.8. ibid.
Arithritica Remedia externa varia D. Cnæffellii. ibid.
& seq.
Articulis, vid. Cinara
Arum t.1. p.300
Arundo ibid.
Saccharina t.1. p.301.
Asa fœtida, vide Asa fœtida.
Asa dulcis, vide Benzoinum.
Asarina t.1. p.302.
Asarum ibid.
Asbestus, vide Amianthus, sub Titulo Lapis. t.2. p.57.
Ascalonica Cepa t.1. p.303.
Aschiotta, vide Achioti. ibid.
Asclepias ibid.
Ascyrum, vide Hypericum.
Aselli, vide Millepedæ. ibid.
Asellus ibid.
Asinus, ejusque partes officinales. t.1. p.87.
Asius Lapis, vide sub Titulo Lapis. t.1. p.304.
Aspalathus. ibid.
Asparagus. ibid.
Asperugo. ibid.
Asperula. ibid.
Asper sanor. vid. Acerbus sapor.
Asperum Tactu vid. Qualitates Tactiles.
Asphaltum, vide Bitumen.
Mangeti Bibl. Pharm.

Asphodelus t.1. p.305
Aspis, vide sub titulo Serpens
Asplenium, vid. Ceterach.
Asa fœtida ibid.
Asa fœtida eligendi modus ibid.
Assatio, & Frictio, quid sit t.1. p.306
Asservatio medicamentorum ibid. & seq.
Astacus, vid. Cancer
Aster Atticus t.1. p.308
Asteria, vid. sub titulo Lapis t.2. p.89.
Astragalus t.1. p.309
Astrantia nigra ibid.
Astrum duplicatum D. P. P. t.1. p.634
Athanasia magna Nicolai ex Pharm. Aug. t.1. p.767
ex Pharm. Persicâ t.1. p.784
Atactylis, vid. Carthamus
Atramentum t.1. p.309
Atriplex ibid.
Attenuantia Medicamenta, quid & qua sint tom. I.

310.
Attenuantia Medicamenta, quid & quam sint
 ibid. & seq.
Aubertica, vid. Mala Persica
Auditum Infantia, vide Acoustica
Avellana vid. Corylus
Avellana Mexicoana, vid. Cacao
Avena t.1. p.312
Avicula Cypria, vid. Trochisci Odorati t.2. p.998
Avis ibid.
Avium partes externa ibid. & seq.
Interna t.1. p.314. & seq.
Generatio t.1. p.317. & seq.
Ætas, quamdiu scilicet vivant t.1. p.319. & seq.
*Proprietates quædam, & Accidentia, v.g. Fi-
 gura & Magnitudo, color, ingenium, instinctus
 naturales, &c.* t.1. p.320. & seq.
Divisio t.1. p.321. & seq.
Avornus, vid. Frangula
Aurania, vid. Mala Aurea
Aurea Alexandrina, vid. Electuarium
Aurelia, vid. Elichyfon
Aurelia Hadrianea ex D. à Mynsicht. t.1. p.902
Auricalcum, vid. Cadmia, Item Æs,
Auricula Iuda t.1. p.322
Auricula Leporis, vid. Bupleurus
Auricula muris, vid. Pilosella
Auricula Ursi t.1. p.322
Auripigmentum, & ejus species ibid.
Auripigmenti Sublimatio t.1. p.323
Fixatio, seu Calcinatio ibid.
Liquatio t.1. p.324.
Destillatio ibid.
Aurum Sordes, vid. Cerumen ibid.
Aurum, Aurifodina, ejusque conditiones ibid.
Auri Generatio. ibid.
Natura, & proprietates.
Antipathia & sympathia t.1. p.325.
Inveniendi & preparandi ratio t.1. p.326
*& Argenti Fodinarum, qua in Peru, Novo
 Regno & Novâ Hispaniâ in America repe-
 riuntur, mira fecunditas ex Relatione P.S.I.*
 ibid.
*Et Argenti separatio, & preparatio in Americâ
 usitata* t.1. p.328
*Argentique, hydrargyri beneficio, preparatio, in
 Regno Peruano usitata* ibid.
*Aurum ab Argento separandi, processus in Hungaria
 usitatus* t.1. p.329
Auri ejusque minere probationes varia t.1. p.330
Purgatio t.1. p.331
Calcinatio Immerisiva ibid. & seq.
Cementatio ibid.

INDEX RERUM.

<i>Auri Calcinatio Vaporosa</i>	tom. I. p. 332	<i>Balneum ad menses movendos</i>	t. I. p. 356
<i>Amalgamatoria</i>	ibid.	<i>in paralyfi, stupore membrorum, & contr.</i>	t. I. p. 355
<i>Cementatoria</i>	ibid.	<i>Eturis</i>	t. I. p. 355
<i>Reverberatoria</i>	t. I. p. 333.	<i>ad Parium facilitandum</i>	ibid.
<i>Volatilizatio</i>	t. I. p. 334	<i>ad Pedes reborandos post Podagrā</i>	t. I. p. 356
<i>Extractio</i>	ibid.	<i>in Pedum faetore</i>	ibid.
<i>Essentia varia</i>	t. I. p. 875 & seq.	<i>Tumore</i>	ibid.
<i>Aurum potabile, sive Auri Tinctura</i>	t. I. p. 334	<i>In scabie</i>	t. I. p. 355
<i>per Spiritum vini sale urina acuatum</i>	t. I. p. 336.	<i>in Soporosis affectibus</i>	t. I. p. 356
<i>alkalisatum</i>	ibid.	<i>contra sterilitatem</i>	t. I. p. 355
<i>per butyrum antimonii</i>	ibid.	<i>In Teneſmo</i>	ibid.
<i>per Oleum antimonii Saccharatum</i>	ibid.	<i>in Vigiliis nimis</i>	ibid.
<i>per spiritum Salis Nuri bezoardicum</i>	ibid.	<i>Balnearum varia Species, ad varios affectus</i>	t. 2. p. 19. 20
<i>per oleum Saturni</i>	ibid.	<i>& seq.</i>	
<i>per Spiritum Salis communis</i>	ibid.	<i>Balsamatio quid sit</i>	t. I. p. 356
<i>per oleum Sulphuris</i>	t. I. p. 337	<i>Balsamandi Corpora Humana, aliaque majora sine eviſ-</i>	
<i>per essentiam salis communis</i>	ibid.	<i>ceratione, & sectione hucusque soluta, & c. Aethiops</i>	
<i>per spiritum manna</i>	ibid.	<i>ex Gabriel Claudero M. D.</i>	ibid.
<i>cum Spiritu salis communis Tartari</i>	ibid.	<i>Balsamatio quid sit traditur</i>	t. I. p. 358
<i>Auri varia preparationes, variorum Aetherum</i>	ibid.	<i>Balsamationis in genere ortus & progressus monstratur</i>	t. I. p. 359.
<i>& seq.</i>		<i>Sive Pollinctura Aegyptiorum, atque Iudeorum</i>	
<i>Auri scriptorii consociendi modus rarissimus</i>	t. 2. p. 103	<i>Specialiora exhibentur</i>	t. I. p. 362
<i>Auri potabilis Novi, paucisque cogniti processus</i>	t. I. p. 340	<i>Balsamandi Aetherum Veterum ritus describuntur</i>	t. I. p. 364.
<i>Aurum alkoolisatum Cnœſſel.</i>	t. I. p. 636	<i>Et condiendi Veterum materia & modus mediante</i>	
<i>Aurum potabile Aliud</i>	t. I. p. 345	<i>exenervatione factus exponitur.</i>	t. I. p. 365.
<i>Aliud</i>	t. I. p. 346	<i>Balsamatio, & Conditura in melle & cera olim facta, ut &</i>	
<i>Quercetani</i>	ibid.	<i>mumia in Lybia arenâ siccata, aliaque chymicè se</i>	
<i>Auri Mercurius</i>	ibid.	<i>vocata explanantur</i>	t. I. p. 368
<i>Aurum transparens D. Cnœſſelii</i>	t. I. p. 637	<i>Balsamandi Materia & modus Recentiorum exenerva-</i>	
<i>Aurum vitæ Quercetani</i>	t. I. p. 346	<i>tione factus declaratur</i>	t. I. p. 371
<i>Aliud ejusd.</i>	ibid.	<i>Balsamatio prout conditura Balsiana nova offeritur</i>	t. I. p. 377
<i>Emeticum</i>	t. I. p. 816	<i>De Balsamatione Cadaverum, etiam saporum, sine eviſ-</i>	
<i>Potabile Basilii Valentini</i>	t. I. p. 349	<i>ceratione nonnulla, ex eod. Claudero in Miscell.</i>	
<i>Aliud ejusd.</i>	ibid.	<i>Curios. Dec. 2. Ann. 8.</i>	t. I. p. 387
<i>Aliud ejusd.</i>	t. I. p. 350	<i>De Balsamandi Arie ex Blancardo quâdam traduntur</i>	
<i>famosissimum Angli illius Francisci Antonii</i>	ibid.	<i>ibidem</i>	
<i>Joelis Langelotti</i>	t. I. p. 351	<i>Balsamina</i>	t. I. p. 390
<i>Aurum sophisticandi modus</i>	ibid.	<i>Balsamita</i>	ibid.
<i>Auri à lapide lazuli separatio</i>	t. 2. p. 102	<i>Balsanum quid sit, & quomplex</i>	t. I. p. 391
<i>Aurum Musivum, vide Vernix</i>	t. 2. p. 1023	<i>Naturale</i>	ibid.
<i>Axungia quid sit</i>	t. I. p. 351	<i>Verum</i>	ibid.
<i>Anatis</i>	ibid.	<i>Copaiba</i>	t. I. p. 393
<i>Anseris</i>	ibid.	<i>Maripendani</i>	t. I. p. 394
<i>Canis</i>	ibid.	<i>Peruvianum</i>	t. I. p. 392
<i>Gallorum</i>	ibid.	<i>Toluanum</i>	t. I. p. 393
<i>Felis Sylvestris</i>	ibid.	<i>Opobalsami Noxi & succedaneum</i>	t. I. p. 394
<i>Suis</i>	ibid.	<i>Balsanum Peruvianum artificiale preparandi modus</i>	
<i>Urſi</i>	ibid.	<i>Dn. Pomēt</i>	t. I. p. 395
<i>Ciconiarum, vide Oleum Ciconiarum</i>		<i>Balsama Artificialia Varia in varios usum, ac ratio ipsa</i>	ibid.
<i>Viperarum, vide Vipera</i>		<i>componendi</i>	
<i>Viri</i>	t. I. p. 351	<i>Balsanum Absinthiacum D. à Mynſicht</i>	t. I. p. 407.
<i>Azoth quid sit</i>	ibid.	<i>Alexiacum Reinesii</i>	t. I. p. 406
<i>Heslingii</i>	ibid. & seq.	<i>ad Ambuſta ex Collect. Bietling.</i>	ibid.
		<i>Angelica Sennerti è Ph. Aug.</i>	t. I. p. 396
		<i>Anodynum è Ph. Bat.</i>	t. I. p. 403
		<i>Anti-arthriticum D. D. de Bernitz in Miscell. Cu-</i>	
		<i>rios. Gerin.</i>	t. I. p. 401
		<i>Anti-arthriticum ex Hoffmanno</i>	ibid.
		<i>Antiparalyticum è Ph. Bat.</i>	t. I. p. 403
		<i>S. Clossai</i>	t. I. p. 401
		<i>D. D. B. O. Sive dorsale ad extra ex</i>	
		<i>Hoffm.</i>	t. I. p. 405
		<i>D. à Mynſicht</i>	t. I. p. 407
		<i>Antipeſtilentiale Rolſincii</i>	t. I. p. 398
		<i>Antipodagricum ad extra ex Hoffm.</i>	t. I. p. 405
		<i>Aliud D. D. I. Z. ex eod.</i>	ibid.
		<i>Aliud ad extra ex eod.</i>	ibid.
		<i>D. à Mynſicht</i>	t. I. p. 408
		<i>ex Sanguine humano</i>	t. I. p. 985
		<i>Apopleſticum Auguſtanor.</i>	t. I. p. 396
		<i>è Pharm. Baccan.</i>	t. I. p. 403
		<i>Collegii</i>	

B.

<i>Bacca quid sit</i>	t. I. p. 352
<i>Baccæ officinales, vide Fructus & Baccæ officinales</i>	
<i>Baccharis</i>	ibid.
<i>Balana, vid. Cetus.</i>	ibid.
<i>Balanus, vide Ben. Item Suppositorium</i>	
<i>Balanſtia, vide Granata</i>	
<i>Balneum, & pediluvium quid sit</i>	t. I. p. 352
<i>in Agrypnia</i>	t. I. p. 355
<i>in Arthritide</i>	ibid.
<i>ad confortandos pedes post arthrit. Mol-</i>	ibid.
<i>lembri.</i>	ibid.
<i>in Calculo</i>	t. I. p. 356
<i>ad Capillorum deſtium</i>	ibid.
<i>Cosmetica corpus mundantia</i>	t. I. p. 651
<i>in Hemorrhoidum dolore</i>	t. I. p. 355
<i>in Ictero</i>	ibid.

INDEX RERUM.

<i>Balsamum Apoplecticum Cl. D. Cnöffel.</i>	t. 1. p. 529	<i>Balsamum Samaritanum</i>	t. 1. p. 398
Collegii Romani R. P. S. I.	t. 1. p. 529	D. Cnöffelii	t. 2. p. 11, 8
Crollii secundum F. F.	t. 1. p. 396	Sive Liqueor Saponis	t. 1. p. 402
ad extra	t. 1. p. 405	Oleum Saponis alio modo	ibid.
Aliud ad extra	ibid.	Saponis Cosmeticum	t. 2. p. 925
Kiikeri	t. 1. p. 396	Saponis D. à Mynsicht.	t. 1. p. 408
D. J. Michael	ibid.	Saturni	t. 1. p. 398
D. à Mynsicht	t. 1. p. 406	aliàs Butyrum Saturni D. Crafft.	t. 2. p. 1138
Norimbergens.	t. 1. p. 396	Saturninum è l. h. Bat.	t. 1. p. 403
Arcei Bruxellens.	ibid.	Sclopetarium è Ph. Bat.	ibid.
Aromaticum D. à Mynsicht	t. 1. p. 407	Spasmodicum D. à Mynsicht	t. 1. p. 407
Anratum in scabie & alopecia leprosa ex Cnöff.	t. 2. p. 1138	Spinale è Pharm. Bat.	t. 1. p. 403
Balsamita D. Charraz	t. 1. p. 396	Spleneticum ejusd. Pharm.	t. 1. p. 404
Benedictum vid. sub Titulo Oleum		externum D. Cnöffel.	t. 2. p. 903
Benzoinum fragrantissimum Tenzelii è Pharm.		Stipticum D. à Mynsicht	t. 1. p. 408
Aug.	ibid.	Stomachicum ejusdem	t. 1. p. 407
Bezoardicum pestilentiale Schroderi	ibid.	Norimbergens.	t. 1. p. 398
Carminativum Norimbergens.	ibid.	Regium Zvvelferi	ibid.
Caryophyllor. August.	ibid.	Succini è Ph. Bat.	t. 1. p. 403
contra Catarrhos	t. 1. p. 405	Sulphuris varia, vid. Sulphur.	t. 1. p. 887. & seq.
Catechu Vulnerarium	t. 2. p. 972	t. 2. p. 933. & seq.	
Cordiale odoratum Cnöffel.	t. 1. p. 638	Sulphuris Anisatum è Ph. Bat.	t. 1. p. 404
Cordiale Sennerti	t. 1. p. 396	D. à Mynsicht	t. 1. p. 407
<i>Balsama Cosmetica Cnöff.</i>	t. 1. p. 672	Antimonii è Ph. Bat.	t. 1. p. 404
Dentientium puerorum D. Charraz.	t. 1. p. 98	Bateanum	ibid.
D. Cnöffelii	t. 1. p. 451	Benzoinatum è Ph. Bat.	ibid.
D. à Mynsicht.	t. 1. p. 407	Knöpheli ex ead. Ph.	ibid.
<i>Balsamum Dolorem leniens D. Lemery</i>	t. 1. p. 396	Minerale ex ead. Ph.	ibid.
Epilepticum ad extra D. F. H.	t. 1. p. 405	Rulandi ex ead. Ph.	ibid.
Feminarum è Pharm. Bat.	t. 1. p. 403	Succinatium ex ead. Pharm.	ibid.
Galbanetum uterinum Sennerti è Pharm. Au-		Tabaci ex collect. Bierling.	t. 1. p. 406
gust.	t. 1. p. 96	Tartari è Pharm. Batean.	t. 1. p. 404
D. Goddard magis composit.	t. 1. p. 404	Therebinthina D. à Mynsicht	t. 1. p. 407
minus composit.	ibid.	Tranquillum Abbatis Rousseau	t. 1. p. 398
Guidonis, vid. infra in Balsamis vulnerariis.		Veneris è Pharm. Bat.	t. 1. p. 404
Heurnii	t. 1. p. 397	ad extra	t. 1. p. 405
Hispania ex Schrodero	ibid.	Venerum D. Mynsicht	t. 1. p. 408
Hyperici magistrale ex Schrodero	ibid.	Verum è Pharm. Bat.	t. 1. p. 404
Hypnoticum D. Charraz	ibid.	Viride Mercurium	t. 1. p. 399
D. à Mynsicht	t. 1. p. 406	Nostratum	ibid.
Jacobi de Pinto	t. 1. p. 397	Vita ex Hoffmanno	t. 1. p. 401
Italicum è Collect. Chym. Leyd.	ibid.	Aliud ex eodem	ibid.
Læmicum Hemstannu, è Ph. Aug.	ibid.	Aliud ex eodem	t. 1. p. 404
Lucatelli, vid. sub Titulo Oleum.		pretiosum D. W. S. ex eod.	ibid.
Pharm. Bat.	t. 1. p. 403	Uterinum D. Charraz	t. 1. p. 398
Magicum de hyperico D. à Rabenstein	t. 2. p. 463	D. à Mynsicht	t. 1. p. 408
Magistrale è Ph. Bat.	t. 1. p. 406	Vulnerarium Comitum à Solms ex collect.	
pro manibus egregium D. Char.	t. 1. p. 397	Bierlingii	t. 1. p. 405
Martiale è Ph. Bat.	t. 1. p. 403	Insigne D. Charraz.	t. 1. p. 400
Matricale ad extra P. H. D.	t. 1. p. 405	Aliud ejusdem	ibid.
Medicamentosum D. à Mynsicht	t. 1. p. 408	Aliud ex Schrod.	ibid.
Medicorum I.orentinorum	t. 1. p. 400	Crollii	ibid.
Memoria D. à Mynsicht	t. 1. p. 406	Aliud ejusdem	ibid.
Mercurii ex Collect. Bierling.	ibid.	D. Evonimi	ibid.
Mirabile, seu compositum S. Clossel ex Schrode-		Fallopil	t. 1. p. 399
ro	t. 1. p. 397	Hollertii ex Renodæo	ibid.
Mneme cephalicum ex Hoffm.	t. 1. p. 402	D. Mesu. falso Guidoni tributum, ex Re-	ibid.
Momordica è Ph. Bat.	t. 1. p. 403	nodæo	ibid.
Mortuorum D. Le Mort	t. 1. p. 402	D. Præf. & Perna	t. 1. p. 398
<i>Balsamo artificiale del Napolitano per ferite è The-</i>		Vulgare Renodæi	t. 1. p. 400
<i>sauro Pharmaceut. Italico Donzell.</i>	t. 1. p. 397	Mirabile ejusd.	ibid.
<i>Balsamum aliud ad idem ex eodem</i>	t. 1. p. 398	Aliud ejusd.	
Nephriticum D. Le Mort	t. 1. p. 402	Merensium ex Schrod.	t. 1. p. 400
Nervinum ex Hoffm.	t. 1. p. 401	Samaritanum ex eod.	ibid.
Nucisla è Ph. Bat.	t. 1. p. 403	Zvvelferi	t. 1. p. 399
Odontalgica Clar. Cnöffel.	t. 2. p. 451	Martiale ejusd.	ibid.
Odoriferum D. Le Mort	t. 1. p. 402	Zibetha D. à Mynsicht.	t. 1. p. 407
Plumbi ex Schrodero	t. 1. p. 400	Baptifecula, vid. Flos frumenti.	t. 1. p. 408
Polychrestum, vid. sub Titulo Oleum.		Barba Capra	ibid.
D. à Mynsicht.	t. 1. p. 405	Barbarea	
Radicalè Margaritarum Cnöffel.	t. 1. p. 633	Barba Jovis, vid. Sempervivum.	t. 1. p. 409
		Barbula Hirci	ibid.
		Barbus	

R E R U M.

Serulenti

INDEX

R E R U M.

Caruleum, vid. Lapis Lazuli.
Caffe, sive Coffee t.1. p. 444. & seq.
Calamandrina, vid. Chamædrys.
Calamentum t.1. p. 446
Calaminaris Lapis, vid. sub Titulo Lapis t.2. p. 124
Calamus Aromaticus Veterum ibid.
Calamus Aromaticus Officinarum, vid. Acorus Verus.
Calamus Saccharinus, vid. Arundo.
Calcanium, vid. Vitriolum.
Calcarius Lapis t.2. p. 123. & seq.
Calcarepola, vid. Calcitrappa, seu potius Carduus Stel-
latus.
Calcatrippa ibid.
Calceolus Mariae ibid.
Calceifraga, vid. Empetrum.
Calcinatio quid sit ibid.
Calcitis, vid. Chalcitis.
Calculus Humanus, vid. sub Titulo Homo.
Calculi Humani preparata varia t.1. p. 986
Calcraftio, quid sit t.1. p. 448
Calendula ibid.
Caliga, vid. Instrumenta Pharmaceutica.
Calin quid sit ibid.
Calix quid sit ibid.
Callitrichum, vid. Capillares.
Callum obducentia, vid. Catagmatica.
Calor, vid. Ignis.
Caltha, vid. Calendula.
Calx quid sit ibid. & seq.
Calx Viva, vid. sub Titulo Lapis t.2. p. 123
Cum Calce viva Experimenta facta tom.1. p. 449
& seq.
Camelina, vid. Myagrum.
Camelopardalis t.1. p. 453
Camomilla ibid. & seq.
Cammarus, vid. Cancer.
Campana, vid. Instrumenta Pharmaceutica.
Campanella, vid. Volubilis.
Campanula, vid. Trachelium.
Camphora, ejus origo, & natura tom.1. p. 454.
& seq.
Camphora Usus internus & externus tom.1. p. 48
& seq.
preparationes, & usendi modi varii t.1.
p. 460. & seq.
Abusus, & Noxa t.1. p. 462 & seq.
Camphorata t.1. p. 463
Canapus, vid. Cannabis.
Cancanum ibid.
Cancanon, vid. Cacalia.
Cancer, ejus differentia, partes officinales, & preparata
ibid. & seq.
Candela quid sit t.1. p. 455
Candela ad Verrucas, seu carunculas in meatu Urina-
rio, Ph. Aug. ibid.
Candela pro suffitu, vid. suffitus tom. 2. pag. 923.
& 998
Canella, vid. Cinnamomum.
Canella Alba ibid.
Canirubus, vid. Cynosbatus.
Canis ejus varie species, partes officinales & preparata
t.1. p. 465. & seq.
Cannabis t.1. p. 471
Cantharides ibid.
Cantharus, vid. Scarabæus.
Caper, vid. Capra.
Capillares t.1. p. 472
Capillus Veneris, & Terra, vid. Adiantum.
Capilli Humani, vide Homo.
Capitellum, vid. Alembicum.
Capnitis, vid. Fumaria.
Capo, vid. Gallina.

Capparis t.1. p. 472
Caper, & Capra, ejus varie species, partes Officinales, &
preparata ibid. & seq.
Capra Alpina, vid. Rupicapra.
Capra Moschifera, vid. Molchus.
Crapreolus, vid. sub Titulo Cervus ejus descriptionem.
Capreoli, partes officinales t.1. p. 475
Capricervæ partes Officinales t.2. p. 730
Capricervæ, vid. Bezoar.
Caprifolium, vid. Periclymenum.
Capruncula, vid. Capra.
Capsicum, vid. Piper Indicum.
Capsula, vid. Bursa Pastoris.
Capus, vid. Gallina.
Caput Monachi, vid. Taraxacum.
Caput mortuum quid sit t.1. p. 475
Caput purgantia, vid. Errhina, Masticatoria.
Carabe, vid. Succinum.
Caragna, sive Carenna ibid.
Carbo Petra, & Gagates, ei affinis materia ibidem
Carbon, seu Stercus Humanum, vid. sub Titulo Ho-
mo.
Carbunculus, vid. sub Titulo Lapis t.2. p. 92
Carcarias t.1. p. 476
Cardamine ibid.
Cardamomum, ejusque species t.1. p. 477
Cardiaca medicamenta quid, & qua sint ibid. & seq.
Cardiaca plama t.1. p. 479
Carduus t.1. p. 480
Carduus Benedictus ibid.
Centiceps, vid. Eryngium.
Maria t.1. p. 481
Stellatus ibid.
Tomentosus ibid.
Vulgatissimus ibid.
Carice, vid. Ficus.
Carlina t.1. p. 482
Carminativa Medicamenta, quid & qua sint ibid.
& seq.
Carota, vid. Pastinaca.
Carpentaria, vid. Millefolium.
Carpesium t.1. p. 483
Carpio, ejusque partes Officinales t.1. p. 484
Carpobalsamum ibid.
Carthamus, ejusque preparata ibid.
Carvi, sive Carum ibid.
Caryocostinum, vid. Electuarium.
Caryophyllata t.1. p. 485
Caryophyllus Aromaticus ibid. & seq.
Regius t.1. p. 487
Caryota, vid. Dactylus.
Casus, vid. sub Titulo Lat.
Cassamum, vid. Carpobalsamum.
Cassia Fislula Nigra t.1. p. 488
Caryophyllata t.1. p. 489
Ligneæ, seu Aromatica, vid. Cinnamomum.
Cassida ibid.
Cassia, vid. Alauda.
Cassonada, vid. Saccharum.
Cassuta, vid. Cuscuta.
Castanea ibid.
Castor, & Castoreum ibid. & seq.
Castorei Historia ac Vires à Clariss. Joh. Mario.
cum additamentis D. Franci t.1. p. 490. & seq.
Castrangula, vid. Scrophularia.
Catagmatica Remedia t.1. p. 512
Catapasma, Diapasma, & Empasma ibid.
Cataplasma quid sit, & quomodo fiat t.1. p. 512
Ad Ambusta ex quacunque re ex Hoffman.
t.1. p. 517
In Angina Michael. t.1. p. 518
Aliud ejusd. ibid.
Eccccc 4 *Antiarthritica*

INDEX RERUM.

<i>Caplasma Antiarthriticum Mollenbrock</i>	t. 1. p. 515	<i>Cathartica Medicamenta quid & qua sint.</i>	tom. 1.
<i>Antifebrile</i>	t. 1. p. 516	P 519	
<i>ex D. Cnœffelio</i>	t. 1. p. 914	<i>Catharsis, vid. Purgatio.</i>	
<i>ex Hoffmanno</i>	t. 1. p. 517	<i>Cathartica, vid. Purgantia.</i>	
<i>D. à Mynsicht</i>	t. 1. p. 519	<i>Catholicon, vid. Electuaria.</i>	
<i>Pharm. Noriberg.</i>	t. 1. p. 515	<i>Catillus, vid. Instrumenta Pharmaceutica.</i>	
<i>Apoplecticum Ph. Bat.</i>	t. 1. p. 518	<i>Catinus, vid.</i>	ibidem
<i>ad Ascitem Celebre Vidii</i>	t. 1. p. 519	<i>Cattagauia, vid. Gummi Gutta.</i>	
<i>ad Bubones in Peste, Michael.</i>	t. 1. p. 518	<i>Catus, vid. Felis.</i>	
<i>pro Canis rabidi morsu Hannemann.</i>	t. 1. p. 517	<i>Catus Zibethicus, vid. sub Titulo Canis Zibethicus.</i>	t. 1. p. 510
<i>in confusionibus Capitis D. Weickard.</i>	t. 1. p. 515	<i>Caucalis</i>	
<i>ad Carbunculos Diemerbroeck</i>	t. 1. p. 517	<i>Cauda Equina, vid. Equisetum.</i>	
<i>ex Hoffmanno</i>	ibid.	<i>Cauda muris, vid. semper vivum.</i>	
<i>ad Catarrhum J. Michael.</i>	t. 1. p. 518	<i>Cauda Tremula, vid. moracilla.</i>	
<i>Cephalicum Ph. Bat.</i>	ibid.	<i>Caudela Amygdalina</i>	ibid.
<i>extemporaneum in delirio Zvvelf.</i>	t. 1. p. 515	<i>Nenupharina</i>	ibid.
<i>de Cineribus D. à Mynsicht</i>	t. 1. p. 19	<i>Cautis</i>	ibid.
<i>Cordiale Zvvelfer.</i>	t. 1. p. 515	<i>Caulis Herba, vid. Brassica.</i>	ibid.
<i>contra Cruorem effusum vulgò Terband</i>	t. 1. p. 516	<i>Cautica Medicamenta, quid & quanam sint.</i>	ibid.
<i>Cynanchicum Ph. Bat.</i>	t. 1. p. 518	<i>Cauticum perperuum, vid. Lapis Infernalis; sub Titulo</i>	
<i>In Dolo post phlebotomiam, quando nervus, aut</i>	ibid.	<i>Argentum.</i>	
<i>arteria ex imperitiâ lœditur</i>	ibid.	<i>Cauterium, vid. Pyroticum.</i>	
<i>ad Dolores in scorbuto mitigandos, ex Hoffman.</i>	t. 1. p. 517	<i>Cedria, seu Cedrus Conifera</i>	t. 1. p. 522
<i>Emolliens & discutiens ejusdem</i>	ibid.	<i>Cedria, seu Cedri Lacrima</i>	ibid.
<i>Escharam tollens biduo, ut sponte decidat</i>	ibid.	<i>Celopa, vid. Jalapa.</i>	
<i>Febrifugum Principis Anhaltini</i>	t. 1. p. 518	<i>Cementare, & Cementatio</i>	t. 1. p. 523
<i>In Febris & delirio ad plantas pedum, Mich.</i>	ibidem	<i>Cementationis aliquot exempla</i>	ibid.
<i>de Fermento D. à Mynsicht</i>	t. 1. p. 519	<i>Cementi vulgaris compositio</i>	ibid.
<i>Frontale</i>	t. 1. p. 516	<i>Cementum Regale quod soli Auro probatissimo parcat</i>	ibid.
<i>Aliud in hemorrhagia narium</i>	ibid.	<i>Cencrus, vid. sub Titulo Serpens</i>	
<i>ad arcendam Gangranam D. Weickard</i>	t. 1. p. 515	<i>Centaurium, ejusque species</i>	ibid. & seq.
<i>ad Hernias Zvvelferi</i>	ibid.	<i>Centinodia</i>	t. 1. p. 524
<i>Cataplasmata in Hydropse varia ex D. Cnœffelio</i>	t. 1. p. 998	<i>Centum capita, vid. Eryngium.</i>	
<i>J. Michael.</i>	t. 1. p. 518	<i>Centum morbia, vid. Numulatia.</i>	
<i>Pharm. Noriberg.</i>	t. 1. p. 515	<i>Cepa, & Cepula</i>	t. 1. p. 525
<i>Cataplasma Hypnoticum ex Hoffm.</i>	t. 1. p. 517	<i>Cephalica Medicamenta quid & quanam sint.</i>	t. 1.
<i>Ischiadicum Ph. Noriberg.</i>	t. 1. p. 515	P 526 & seq.	
<i>Laxativum pro Adultis</i>	t. 1. p. 516	<i>Cephalicum Cnœff.</i>	t. 1. p. 531
<i>Puerilis</i>	ibid.	<i>D. Podochocioski</i>	t. 1. p. 529
<i>de Nido Hirundin. D. à Mynsicht</i>	t. 1. p. 519	<i>Cera, de ea in genere, vid. Apes.</i>	
<i>Pharm. Norib.</i>	t. 1. p. 516	<i>Cera Hispanica ad obfignandas Literas compositio</i>	t. 1.
<i>In Oculorum affectibus J. Michael.</i>	t. 1. p. 518	P 539	
<i>ad Paronychiam Ph. Bat.</i>	ibid.	<i>Cera Catholica Burrhi</i>	ibid.
<i>Pestilentielle ejus Ph.</i>	ibid.	<i>Ceraſtes, vid. sub Titulo Serpens.</i>	
<i>ad Pleuritidem Ph. Norib.</i>	t. 1. p. 516	<i>Ceraſum, & Ceraſus</i>	t. 1. p. 529. ibid. & seq.
<i>Podagricum, Pharm. Bat.</i>	t. 1. p. 518	<i>Ceratonia</i>	t. 1. p. 540
<i>Purgans, ex Hoffm.</i>	t. 1. p. 517	<i>Ceratum quid sit, & quomodo componatur</i>	ibid.
<i>Resolutionum, Forelli</i>	t. 1. p. 516	<i>Album Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Revulsorium in febribus ardentibus, ad pulsus</i>	t. 1. p. 517	<i>Alexandri Mes.</i>	t. 1. p. 541
<i>manuum Hoffm.</i>	t. 1. p. 517	<i>de Ammoniaco Foresti è Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>pedum ejusdem</i>	ibid.	<i>Andromachi</i>	ibid.
<i>Contra singulum J. Michael.</i>	t. 1. p. 518	<i>de Arnoglossa Galen. ex Bauderon</i>	ibid.
<i>D. à Mynsicht</i>	t. 1. p. 519	<i>Astringens</i>	t. 1. p. 541
<i>Soleare Ph. Bat.</i>	t. 1. p. 518	<i>Barbarum Galeni</i>	ibid.
<i>Spleneticum Zvvelfer.</i>	t. 1. p. 516	<i>ex Betonica Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Suppurans scrophulas nobile, ex Hoff.</i>	t. 1. p. 517	<i>hyberno etiam tempore parabile Zvvelf.</i>	ibid.
<i>In tumoribus scirrhosis mammillarum, qui in</i>	ibid.	<i>Capitale Phar. Aug.</i>	ibid.
<i>cancrum vergunt, D. B. C. ex Hoff.</i>	ibid.	<i>Diabotanium cum Mercurio</i>	ibid.
<i>contra tumores Scorbuticos pedum</i>	t. 1. p. 519	<i>Diachalciteos Galeni, vulgò Diapalma Ph. August.</i>	
<i>In tumore scroti D. Michael.</i>	t. 1. p. 518	ibid.	
<i>Ad tumores œdematosos & duros, Zvvelf.</i>	t. 1.	<i>seu Cataplasma majoris compositionis.</i>	
P 516		<i>ad commotionem Cerebri, Vigonis</i>	ibid.
<i>duros arrium, ejusd.</i>	ibid.	<i>Minoris compositionis ejusdem ad idem.</i>	ibid.
<i>In Urine suppressione J. Michael.</i>	t. 1. p. 518	<i>Diadictamnium seu Sacrum Galeni Ph. Aug.</i>	t. 1.
<i>Vescatorium</i>	t. 1. p. 517	P 542	
<i>Usitatum Norimberg.</i>	t. 1. p. 516	<i>De Euphorbio Galeni</i>	ibid.
<i>Cattaria, vid. Nepeta.</i>		<i>De Galbano, vid. Ceratum Matricale.</i>	
<i>Catechu, vid. sub Titulo Terra</i>	tom. 2. p. 971. 972.	<i>De Grazia Dei, Nicolai, Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>& seq.</i>		<i>Pro herniosis DD. Noribergensium</i>	ibid.
		<i>Ad Hernias Zvvelferi</i>	ibid.
		<i>Aliud</i>	

INDEX RERUM.

- Ceratum ad Hernias aliud Zywelferi* t.1. p.542
Isidis ex Galeno, Ph. Aug. ibid.
De Lithargyro Galeni ibid.
Mairicale, vel de Galbano, Ph. Aug. ibid.
de Minio ibid.
de Mucaginibus ibid.
Oesypi Philagrii Ph. August. ibid.
ex Pelle arietina Arnoldi de Villa Nova Ph. August. ibid.
dia Pente Mes. t.1. p.543
Diapipereos Galeni, Ph. Aug. ibid.
Diapyrutis Galeni ibid.
Refrigerans Galeni, ex Renodæo ibid.
Santalinum è Pharm. Lond. ibid.
Sparadrapum, vide. Sparadrapum
Stomachicum Galeni, è Ph. Aug. ibid.
De Sulphure, vid. Emplastrum de Sulphure
Ceraunias, seu *Lapis Fulminaris*, vide sub titulo *Lapis* t.2. p.90.
Cerebrum Humanum, vid. sub titulo *Homo* ibid.
Cerefolium ibid.
Cerevisia, vid. *Zythum*
Cerinthe t.1. p.544
Cerimen, sive *Cerumen* ibid.
Ceroneum, vide *Emplastrum*
Cerussa, vide *Plumbum*
Cervus, *Cervinum Genus* ibid. & seq.
Cervi partes officinales, ex iisque preparata varia t.1. p.547.
Cervi Cornu auratum t.1. p.549
Cervus fugitivus, vide *Mercurius*
Cervus volans, vid. *Scarabæus*
Ceterach ibid.
Cetus, sive *Balanæ* ibid.
Ceti partes officinales ibid.
Ceti sperma t.1. p.550.
Cha, vide *Thé*
Chalastica, sive *Relaxantia Medicamenta quid sint* t.1. p.551.
Chalcedonius Lapis, vid. sub titulo *Lapis* t.2. p.91.
 1055. & seq.
Chalcedonii adulterini compositio t.2. p.101
Chalcitis, *Sory*, & *Misy* t.1. p.551
Chalta, vide *Calendula*
Chalybs, vide *Ferrum*
Chamaæcte, vid. *Ebulus*
Chamacyparissus, vide *Abrotonum*
Chamaecyssus, vide *Hedera terrestris*.
Chamadrys ibid.
Chamalea, vide *Mezercon*
Chamaleagnus t.1. p.552
Chamaleon Alb. vide *Carlina*
Chamaleuce, vid. *Tussilago*.
Chamamelum, vide *Camomilla*
Chamamelium, vide *Fraxinella*
Chamamorus, seu *Chamarubus* ibid.
Chamapitys ibid. & seq.
Chamaesyce, vide *Peplus minor*
Chamezylum, vid. *Gnaphalium*
Charta di Spania, sive *Charta Hispanica purpurea cosmeticæ* t.1. p.671
Cheiri, vid. *Keiri*
Chelidonium majus t.1. p.553
 Minus t.1. p.554
Chelonitis, vid. *Bufonitis*
Chelopa, vide *Jalapa*
Cherephyllum, vide *Cerefolium*
Chermes, vide *Kermes*
Chersa, vide *Gerfa*
Cherva, vide *Kerva*.
Chia, vide *Terra Chia* t.2. p.974
Chimia, vide *Chymica*
China t.1. p.554 & seq.
Chinchina, vide *Kinkinna*
Chocolara, vid. *Cacao* t.1. p.438
Chocolara varia præparaciones t.1. p.440
Chocolara quibus affectibus conveniat t.1. p.441.
Chocolara qualitates ex ingredientium mixtione resultantes ibid.
Chalagogum simplex, vide *Scammonium*
Chalagoga Medicamenta, quænam sint t.1. p.555
Chondrilla ibid.
Chopina, vide *Sextarius*
Chrysanthemum t.1. p.556
Chryseletrum, vide *Succinum*
Chrysocolia ibid. & seq.
Chrysites, sive *Chrysocome* t.1. p.562
Chrysolum, vide *Topazius* tom. 2. pag. 93. 107. 1059
 & seq.
Chrysolampis, vide sub titulo *Lapis*
Chrysotegnum, vide *Attriplex*
Chrysometum, vide *Malum Armeniacum* ibid.
Chrysopaia ibid.
Chrysosplenium, vide *Saxifraga aurea*.
Cyrtophyllum, vide *Millefolium*.
Chymia, & *Chymista*, ac *Chymica Medicamenta*, ibid.
 & seqq.
Chrystallus, vide *CrySTALLUS*
Cicada t.1. p.564
Cicarrices delentia medicamenta t.1. p.565.
Inducentia Medicamenta vide *Epulonica* ibid.
Cicer t.1. p.566
Cicera t.1. p.566
Cicerbita, vide *Sonchus*
Cicerula, vide *Lathyrus* ibid.
Cicindela ibid.
Cicla, vide *Beta*
Cicorium, sive *Inrybus*, & *Cicoracea* ibid.
Ciconia t.1. p.567
Ciccus, & *Cicum* t.1. p.568
Cicuta ibid.
Cicutaria ibid.
Cimex ibid. & seq.
Cimolia, vide *Terra Cimolia* t.2. p.974
Cinara vide *Cynara*
Cinnamalis, vide *Adiantum nigrum* t.1. p.569
Cinesacere, sine *Cinerare*
Cineraria, vide *Jacobea*
Cineritium, vide *Furnus*
Cinis Clavellatus, vide *Gravellata* t.1. p.569
Cinnabaris t.1. p.570
Cinnabaris nativa præparata varia t.1. p.570
De Cinnabari nativa Tractatus, D. Gabriel. Clauderi t.1. p.571.
Cinnabaris nativa laudes extolluntur t.1. p.573
Sublimatio tractatur t.1. p.576
Cinnabarin nativam circuliandi modus detegitur, tom.1. p.577
Cinnabaris nativa partes essentielles describuntur t.1. p.579.
Cinnabaris officinarum artificialis t.2. p.281
Cinnami t.1. p.583
Cinnamomum ibid.
Laxativum D. à Mynsicht t.1. p.791
Cionia, vide *Purpura*
Circulare, & *Circulatio* t.1. p.585.
Circulatorium, vide *Instrumenta Pharmaceutica*.
Cirsum ibid.
Cirsum, vide *Buglossum*
Cissus, vide *Hedera*
Cistus Genuinus ibid.
Montanus ibid. & seq.
Ladaniferus t.1. p.586
Citræa

INDEX RERUM.

<i>Citrato</i> , vid. <i>Melissa</i> .	
<i>Curinella</i>	t. i. p. 586
<i>Citrium</i> , vide <i>Mala Citria</i>	
<i>Citrullus</i>	ibid.
<i>Clareum Absynthiacum laxativum</i> D. à Mynsicht.	t. i. p. 588.
<i>Ansatum</i> ejusd.	ibid.
<i>Anapoplecticum</i> ejusd.	ibid.
<i>Antiepilepticum laxativum</i> ejusd.	t. i. p. 587
<i>Antinephriticum</i> ejusd.	t. i. p. 589
<i>Antipodagricum laxativum</i> ejusd.	t. i. p. 588
<i>Antiscorbaticum</i> ejusd.	t. i. p. 589
<i>Chalybeatum</i> ejusd.	ibid.
<i>Hydragogum Zvvelferi</i>	t. i. p. 587
<i>Juniperinum</i> D. à Mynsicht	t. i. p. 588
<i>Laxativum Zvvelferi</i>	t. i. p. 587
<i>Moschatum</i> D. à Mynsicht	t. i. p. 589
<i>Passularum laxativum</i> ejusd.	t. i. p. 588
<i>Purgans</i> ejusd.	t. i. p. 589
in <i>Catarrho</i> ex <i>Schrodero</i>	t. i. p. 587
<i>Rhabarbaratum</i> D. a Mynsicht	t. i. p. 588
<i>Stomachicum</i> , consortans ejusd.	ibid.
<i>Clarificare</i>	t. i. p. 589
<i>Clavicula</i> , vide <i>Capreolus</i>	
<i>Clematis</i>	t. i. p. 590
<i>Clinia</i> vide <i>Cadmia</i>	
<i>Clinopodium</i>	ibid.
<i>Clymenum</i> , vid. <i>Peryclimenum</i>	
<i>Clyster</i>	ibid. & seq.
<i>Clysterum exempla aliquot</i>	t. i. p. 592. & seq.
<i>Cnicus</i> , vide <i>Ca thamus</i>	
<i>Coagulare</i> , & <i>Coagulatio</i>	t. i. p. 593.
<i>Coagulum</i>	ibid.
Equinum, vid. <i>Hippace</i>	
<i>Cobolium</i> , vid. <i>Cadmia</i>	
<i>Cocci Orientales</i> , vide <i>Coculae</i>	
<i>Cocconiglia</i> , vide <i>Cochoniglia</i>	
<i>Coccus</i>	ibid.
<i>Coccum Infectorium</i> , vid. <i>Coculae</i> sub titulo <i>Ilex</i> .	
<i>Cochlea</i> , ejusque partes officinales	ibid. & seq.
<i>Cochentia</i>	t. i. p. 599. & seq.
<i>Cochlearia</i>	t. i. p. 603.
<i>Cochlear</i> , vide <i>Instrumenta Pharmaceutica</i>	
<i>Costio</i>	t. i. p. 604
<i>Cocula</i>	ibid. & seq.
<i>Coffee</i> , vide <i>Café</i>	
<i>Cobobare</i> , vid. <i>Coobare</i>	
<i>Colare</i>	t. i. p. 605
<i>Colatorium</i>	ibid.
<i>Colchicum</i> , vid. <i>Ephemerum</i>	
<i>Colchotar</i> , vid. <i>Vitriolum</i> sub titulo <i>Sal</i>	
<i>Collectio na ivorum</i>	ibid.
<i>Colligendi tempus secundum constitutionem caeli univer-</i>	
<i>salio rem</i>	t. i. p. 606
influencias particulares	t. i. p. 607
<i>Modus</i>	t. i. p. 613
<i>Colletica</i>	ibid.
<i>Collyrium</i>	ibid.
<i>Collyrii species varia</i>	t. i. p. 615. & t. 2. p. 489
<i>Colocynthis</i> , ejus preparata	ibid. & seq.
<i>Colophonis</i>	t. i. p. 616
<i>Color ejus varia species</i> , & explicatio	ibid. & seq.
<i>Coloratio</i>	t. i. p. 620
<i>Colores Varii pro viris tingendis quomodo fiant</i> tom. 1.	
p. 1065. & seq.	
<i>Coloris ultra marini usus</i> , & quomodo à <i>Lapide</i> separetur	
t. 2. p. 102.	
<i>Coluber</i> , vide <i>Anguis</i>	
<i>Colubrina</i> , vid. <i>Clematis Indica</i>	
<i>Columba</i>	ibid.
<i>Columba partes officinales</i> , & preparata varia	ibid.
& seq.	
<i>Columbina</i> , vid. <i>Verbena</i>	
<i>Colus</i> vid. <i>Colatorium</i>	
<i>Colura Scorpioides</i>	
<i>Colymbades</i> , <i>Olive condita</i> , vid. <i>Conditura</i>	t. i. p. 621
<i>Colymbas</i> , vid. <i>Stabe</i>	
<i>Coma</i> quid sit	ibid.
<i>Coma Aurea</i> , vid. <i>Stachas citrina</i>	
<i>Comarus</i> , vid. <i>Arbutus</i>	
<i>Compositio Medicamentorum quid sit</i> , & quomodo fiat	ibid.
<i>Comprimentia</i> , vid. <i>Hypocrica</i>	
<i>Conceptaculum</i> , vid. <i>Alembicus</i>	
<i>Conceptionem Iuvantia</i> , vid. <i>Uterum corroborantia</i>	
<i>Concha</i>	t. i. p. 622
<i>Conchylium</i> , vid. <i>Blatta Bizantia</i>	
<i>Conchyria</i>	t. i. p. 623
<i>Condensantia</i> , vid. <i>Pycnotica</i>	
<i>Conditum</i> , vid. <i>Struthium</i>	
<i>Conditura</i>	ibid.
<i>Caulium</i> , <i>Corticum</i> , & <i>Radicum</i>	ibid.
<i>Fructuum</i> , <i>Nucum</i> , & <i>Florum</i>	ibid. & seq.
<i>Conditorum varia species</i>	t. i. p. 624. & seq.
<i>Conditio composita</i> , vid. in <i>Electuariis</i>	
<i>Conficere</i> quid sit	t. i. p. 627
<i>Confectio saccharata quomodo fiat</i> , & quid sit	ibidem
& seq.	
<i>Confectio Alkermes ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 764
<i>Mesue ex ead. Pharm.</i>	t. i. p. 765.
<i>Aniscardina Mesue ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Anisi solutiva ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 68.
<i>Alia ex Zvvelfecto</i>	ibid.
<i>Emetica</i> , ex eod.	ibid.
<i>Archigenis ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 766
<i>Aurea Alexandrina Nicolai</i> , ex ead. Ph.	ibid.
<i>Cure D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 788
<i>de Corallis</i> , <i>Diacorallium dicta Pharm. Norib.</i>	
t. i. p. 629.	
<i>Cordialis Regia ex Pharmac. Reg. Zvvelferi</i> t. i.	
p. 768.	
<i>Hamech major Mesue ex Pharm. Aug.</i>	t. i. p. 759
<i>De hyacintho correcta D. Lemery</i>	t. i. p. 769
<i>Adversus Lumbricos</i> , ex Ph. Aug.	t. i. p. 628
<i>Magnanimitatis D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 789
<i>Narcotica D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 788
<i>Opjata</i> , ex eod.	t. i. p. 787
<i>Pacifica de Succolata Inda</i> , ex eod.	t. i. p. 789
<i>Passulata ex eod.</i>	t. i. p. 792
<i>post Pastum</i> , ex Ph. Aug.	t. i. p. 629
<i>Pectoralis ex ead. Pharm.</i>	ibid.
ex D. à Mynsicht	t. i. p. 788
<i>Pretiosa ex eod.</i>	ibid.
<i>de Rebecha</i> , ex <i>Renodæo</i>	t. i. p. 629
<i>Saryris ex D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 789
<i>De Syrace Mesue</i>	t. i. p. 774
<i>Syrpica ex D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 789
<i>Terebinthinata ex eod.</i>	ibid.
<i>Theriacalis ex eod.</i>	t. i. p. 788
<i>Confectio de Thure</i> , ex <i>Pharm Norimbergens.</i> tom. 1.	
p. 629.	
<i>Zingiberis cocti ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Indi ex D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 788
<i>Solida purgans</i> , ex Ph. Aug.	t. i. p. 628
<i>Confectiones compssue varia</i> , vide sub titulo <i>Electua-</i>	
<i>ria</i>	
<i>Congelare</i> , vid. <i>Coagulare</i>	
<i>Conjungere</i> , <i>Conjunctio</i>	t. i. p. 629
<i>Conquassare</i>	ibid.
<i>Conus</i>	ibid.
<i>Conila</i> , vide <i>Myrrhis</i>	
<i>Conisterium</i> , vide <i>Cineritium</i>	
<i>Conopann</i> , vide <i>Papilia</i>	
<i>Conserua</i> , quid sit, & quomodo fiat	ibid.
<i>Antiboi</i>	

INDEX RERUM.

- Conserua Antibos* t. I. p. 631
Betonica ibid.
Borraginis ibid.
Buglossi ibid.
Elissi t. I. p. 632
Nenupharis t. I. p. 631
Rosarum ibid.
Salvia, & stachados t. I. p. 632
Violarum t. I. p. 630
- Conserua composita, vide in Ele&uariis*
Consolida, vide Symphitum
Consolida Regalis, vide Calcatripa
Media, vide Bugula
Sarrafenica, vide Virga Aurea
- Consummatum, vide Jusculum*
Contrayerua t. I. p. 632.
Convolutulus, vide Volubilis
Conyza, sive Pulicaria ibid.
Coobare, & Coobario ibid.
Copal, sive Pancopal Resina t. I. p. 633
Coquo, vide Coccus, item Palma
Corallina ibid.
Corallina Aginea, vide Anagallis
Corallum, vide sub titulo Lapis t. 2. p. 111. & seq.
Coralliorum differentia t. 2. p. 112.
Calcinatio, unde Sal t. 2. p. 113. & seq.
Magisteria varia t. 2. p. 114. & seq.
Olea varia ibid.
Salia varia ibid. & seq.
Syrupi varii t. 2. p. 113
Tinctura varia a variis Authoribus tom. 2. p. 115
 116. & seqq.
Infuscatio singularis ex Cnœff. t. I. p. 637
Corallia fide quomodo parentur t. 2. p. 103
Fatilia contra Epilepsiam Cnœff. t. I. p. 538
Nigri coloris contra epilepsiam ejusd. ibid.
- Corcorus, vide Anagallis*
Corculum benedictum Cnœffelianum t. I. p. 538
Cordumeni vide Carvi
Cordialia medicamenta quanam sine t. I. p. 633
Coriandrum t. I. p. 638
Cor Indum ibid.
Corneolus, vide Carneolus sub titulo Lapis tom. 2.
 pag. 91.
Cornix ibid.
Cornatina, vid. sub titulo Lapis
Cornua t. I. p. 639
Cornu Cervi, vide Cervus
Cornumusa, vide Retorta
Cornus ibid.
Conuta, vide Retorta
Corona Regia vide Melilotus
Corona Imperialis t. I. p. 640
Coronopus ibid.
Corrigere, & corrigentia t. I. p. 641.
Corrodere, vide sub titulo Calcinatio
Corrosivum, vide Causticum
Corruca, vide Asparagus
Cortex quid sit ibid.
Corrices officinales usitatiores quanam sine ibid.
Cortex maceris, vide Macer
Bugia, vide Aspalatus
Febrilis, vide Kinkina
Nucis moschata, vide Macis
Thuris, vide Thymiana
Winteranus ibid.
- Corvus* t. I. p. 642
Corvi partes officinales ibid.
Corvus Aquaticus ibid.
Corylus t. I. p. 643
Corymbus ibid.
Cosmetica quid & quanam sine ibid. & seqq.
- Cosmeticorum variorum preparatio* t. I. p. 644. & seqq.
Cosmetica varia capillos argentea tom. I. p. 645. 654. 655.
 & 658.
elongantia t. I. p. 644. 654. 656. 657.
renasci prohibentia t. I. p. 645. 654. 658.
vario colore tingentia. t. I. p. 644. 645. 652. 653.
 654. 655. 660. 661.
crispos reddentia. t. I. p. 654. 661.
Dentes dealbantia. t. I. p. 646. 669. & 670.
Faciem illustrantia t. I. p. 646. 654. 663. & 664.
dealbantia & rubificantia. t. I. p. 649. 654.
 663. & 664.
Denigrantia t. I. p. 650.
Faciei maculas tollentia. t. I. p. 651. 655. 663. 672.
Faciem juvenilem reddentia t. I. p. 650.
Cutis Capitis vitia curantia t. I. p. 662.
ad Ambusta t. I. p. 665.
Manus dealbantia t. I. p. 666. 670.
ad manuum tumores, & scissuras ex frigore t. I.
 p. 667.
Verrucas. ibid.
Mammillas parvas reddentia, & conservantia
papillarumque scissuras curantia. t. I. p. 668.
Oculorum, & palpebrarum vitia tollentia t. I.
 p. 645. 661. 662.
Superciliorum vitia tollentia. t. I. p. 661.
ad Scabiem. t. I. p. 665. & seqq.
Veneris rugas a partu abstergentia t. I. p. 669.
 t. I. p. 672.
- Costus.*
Cotonaria, vide Pilosella. Item Pes cati, seu Gnaphalium
 verum.
Cotonea, vide Cydonia.
Conula. t. I. p. 673.
Coturnix, ejusque partes officinales. ibid.
Coryledon, vide Umbilicus Veneris.
Cracca, vide Aphaca.
Crap. ibid.
Crassula, vide Telephium,
Crassula minor, vide Sempervivum.
Crategon, vid. Aquifolium.
Crates, & raticula, vid. Instrumenta Pharmaceutica.
Cremor Lactis, vide Lac.
Cremor Tartari, vide Tartarus.
Cremor Pisanæ, vide Pisana.
Crepitus Lupi, vide Orbicularis.
Crescio, vide Silymbrium. Item Nasturtium.
Crespinus Matthioli, vid. Oxyacantha.
Creta, vide sub titulo Terra
Cribrum, vide Instrumenta Pharmaceutica.
Crinita, vid. Adiantum.
Crispula, vide Bursa Pastoris.
Crista Galli, vide Pedicularis.
Crista marina, vid. Crythamum.
Croci variorum mineralium, & metallorum, vide sub
titulis Mineralium & Metallorum & quibus præpa-
rantur.
Crocodilus, vide ejus descriptionem sub titulo Lacertis.
Crocomagma Democratis Galeni, ex Pharmac. August.
 t. 2. p. 1001.
Crocus. t. I. p. 674.
Crocus, sive Sulphur Solis D. Cnœff. t. I. p. 634.
Metallorum. t. I. p. 814.
Cruciata, vide sub titulo Gentiana.
Crucibulum, vide Instrumenta Pharmaceutica.
Crustam Inducentia, vid. Escharotica.
Crux Cervi, sive Os de Corde Cervi, vid. Cervus.
CrySTALLISARE, CrySTALLISATIO. t. I. p. 675.
CrySTALLUS vid. sub titulo Lapis CrySTALLUS naturalis. t. 2.
 p. 91. 125. 1047. & seqq.
CrySTALLI adulterini compositio. t. 2. p. 100.
Crythmum. t. I. p. 677.
Cubeba ibid.
Cuculus

INDEX RERUM.

<i>Cuculus</i>	ibid.	<i>Decoſtum Ambroſianum</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
<i>Cuculi partes officinales</i>	t. I. p. 678.	<i>Analepticum</i> ejusd. Pharm.	ibid.
<i>Cu. minor</i>	ibid. & ſeq.	<i>Contra Anaſarcam probatiſſimum</i> D. Beckii tom. 2	ibid.
<i>Cucupha, quid ſit, ejus materia, parandi modus, & uſus.</i>	t. I. p. 679. & ſeq.	p. 699.	
<i>Cucupha Corroborans Caput.</i>	t. I. p. 681.	<i>In Angina augmento, & Status principio</i> t. I. p. 703.	ibid.
<i>Alia.</i>	ibid.	<i>declinatione</i>	ibid.
<i>in Capitis dolore</i>	ibid.	<i>Antiartriticum</i> D. Hoffm.	t. I. p. 704.
<i>in Catarro</i>	ibid.	<i>in arthritide vaga ſcorbut. ejusd.</i>	ibid.
<i>Cucurbita</i>	ibid.	D. à Mynſicht	t. I. p. 706.
<i>Cucurbita citrina, vid. Citrullus.</i>		<i>Antilepticum</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
<i>Cucurbita Chimica, vid. Alembicus.</i>		D. à Mynſicht	t. I. p. 706.
<i>Culcul, vid. Secacul</i>		D. Timæi.	t. I. p. 698.
<i>Culex</i>	ibid.	<i>Aliud pro delicatis ejusd.</i>	ibid.
<i>Cuminum</i>	ibid. & ſeq.	<i>Antihypochondriacum ſcorbuticum</i> Timæi	ibid.
<i>Cuminoides</i>	t. I. p. 682.	<i>Antimoniale</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
<i>Cuminum</i>	ibid.	D. Ludov. ab Hornig.	t. I. p. 696.
<i>Cumula Bubula Plinii, vid. Origanum</i>		<i>Antiphthiſicum</i>	t. I. p. 700.
<i>Cumulus</i>	ibid.	Pharm. Bat.	t. I. p. 701.
<i>Cupa, vid. Instrumenta Pharmaceutica.</i>		Pharm. Norib.	t. I. p. 695.
<i>Cupreſſus</i>	ibid.	D. Timæi	t. I. p. 698.
<i>Cupreſſus herba, vid. Abrotonum.</i>		Zvvelſeri	t. I. p. 695.
<i>Cuprum, vid. Aſ.</i>		<i>Antipleuriticum</i> D. Timæi	t. I. p. 698.
<i>Curcas</i>	ibid.	<i>Antſcorbuticum</i> Zvvelſeri	t. I. p. 695.
<i>Eurevio</i>	ibid.	<i>Aperitivum majus</i> Pharm. Aug.	t. I. p. 693.
<i>Eureuma</i>	ibid.	<i>Lenitivum majus cum Rhabarb. ejusdem</i>	ibid.
<i>Eufcuta</i>	ibid. & ſeq.	ibid.	
<i>Cyanas, vide Flos Frumenti.</i>		<i>Minus ejusd. Ph.</i>	ibid.
<i>Cyclamen</i>	t. I. p. 683.	<i>Decoſta aperitiva quadam in ſclero, ex Hoffmanno</i> t. I.	
<i>Cydonia</i>	ibid. & ſeq.	p. 703.	
<i>Cygnus</i>	t. I. p. 684. & ſeq.	<i>Decoſtum aperitivum tempore verno</i> Zvvelſeri. tom. I.	
<i>Cyna</i>	t. I. p. 685.	p. 693.	
<i>Cymbalaria</i>	ibid.	<i>hyemali ejusd.</i>	ibid.
<i>Cymbalum, vid. Umbilicus Veneris.</i>		<i>Aſtacorum</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
<i>Cyninum, vid. Cuminum.</i>		<i>ad calculum</i> Timæi	t. I. p. 698 & 700
<i>Cynara</i>	ibid. & ſeq.	<i>Nephriticum</i> Zvvelſer.	t. I. p. 695.
<i>Cynosrambe, vid. Mercurialis.</i>		<i>Foreſti à Zvvelſer. correct.</i>	t. I. p. 693.
<i>Cynogloſſum</i>	t. I. p. 686.	<i>Ad Canis Rabidi morſum</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
<i>Cynorrhodos, vid. Roſa.</i>		<i>Capillorum Veneris</i> Meſuæ	t. I. p. 693.
<i>Cynobatos, vid. Rubus.</i>		<i>Caponis pro conſumptis</i> Zvvelſeri	ibid.
<i>Cynoforehis, vid. Orchis.</i>		<i>Carminativum</i> Ph. Aug.	ibid.
<i>Cypariſſus, vid. Abrotonum.</i>		<i>Catharrale</i> D. à Mynſicht.	t. I. p. 705.
<i>Cyperus</i>	t. I. p. 687.	<i>ad Catharros</i> Timæi.	t. I. p. 700.
<i>Cyperoides</i>	ibid.	<i>Cephalicum</i> D. I. M. ex Hoffm.	t. I. p. 703.
<i>Cyprinus</i>	ibid.	<i>preparans & purgans</i> Timæi.	t. I. p. 697.
<i>Cytinus</i>	ibid.	<i>Ciri</i> D. à Mynſicht	t. I. p. 706.
<i>Cyſius.</i>	ibid.	<i>Conſortans & corroborans in malignis</i> ex Hoffm.	
		t. I. p. 703.	
		<i>pro Clyſteris deterſivum</i> D. Lemery	t. I. p. 694.
		<i>commune ejusd.</i>	ibid.
		<i>cum ſol. ſen.</i> Ph. Norib.	ibid.
		<i>Cosmeticum</i> D. à Mynſicht	t. I. p. 706.
		<i>Cupreſſi nucum ejusdem</i>	t. I. p. 709.
		<i>In deſluxionibus ſaliſis ad oculos externa</i> t. I. p. 704.	
		<i>Digitalis</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
		<i>Diureticum</i> D. Augenii	t. I. p. 700.
		D. Timæi	t. I. p. 698.
		<i>contra Dyſenteriam</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
		D. Zvvelſeri	t. I. p. 694.
		<i>contra Epilepſiam</i> Timæi	t. I. p. 700.
		<i>Epithymi Meſuæ ex</i> Ph. Aug.	t. I. p. 694.
		<i>Euphraſia ejusdem</i>	t. I. p. 697.
		<i>Decoſta Expellentia quadam in peſte & febris malignis</i>	
		<i>ex Hoffmanno.</i>	t. I. p. 703.
		<i>Decoſtum Expulſivum in variolis & morbillis ejusdem</i>	
		ibid.	
		<i>In febris ardentibus ejusdem</i>	ibid.
		<i>Ficuum</i> D. à Mynſicht	t. I. p. 706.
		<i>Florum & fructuum</i> Ph. Aug.	t. I. p. 694.
		<i>Fumariae Meſ. ejusd. Pharm.</i>	ibid.
		<i>Galli antiqui farcinati</i> D. à Mynſicht	t. I. p. 708.
		<i>in malo hypochondriaco & ſcorbutico</i> Timæi	
		t. I. p. 700.	
		<i>Inſtaurans.</i>	

D.

<i>Daſtiliſcum, vid. Palma.</i>	
<i>Dathylus</i>	t. I. p. 688.
<i>Dama, vid. Rupicapra.</i>	
<i>Daphne, vid. Laurus.</i>	
<i>Daphnides, Bacca Lauri, vid. Laurus</i>	
<i>Daphnoides, vid. Laureola.</i>	
<i>Datura, vid. Saramonium.</i>	
<i>Daucus officinarum</i>	ibid.
<i>Creticus</i>	ibid.
<i>Daullontas</i>	ibid.
<i>Decantare</i>	t. I. p. 689.
<i>Decoſtio, ſive Decoſtum quid ſit</i>	ibid.
<i>Decoſtum quomodo riſe parari debeat</i>	ibid.
<i>Decoſtorum exempla aliquot proponuntur</i>	t. I. p. 692.
<i>Decoſtum, Adſtringens</i> D. à Mynſicht.	t. I. p. 708.
<i>Album</i> D. Sydenham.	t. I. p. 692.
<i>Alterans pro Magiſtrato</i> ex Hoffm.	t. I. p. 702.
<i>ex Schrodero</i>	t. I. p. 695.
<i>Aliud</i>	ibid.
<i>Amarum alterans</i> Ph. Bat.	t. I. p. 701.
<i>purgans ejusd. Pharm.</i>	ibid.
<i>Pharm. Loudin.</i>	t. I. p. 693.

INDEX RERUM.

<i>Decoctum Galli Instaurans</i> Timæi	t. i. p. 700	<i>Decoctum Purgans violatum</i> n. à Mynsicht	t. i. p. 708
in Pectoris affectibus ejusd.	ibid.	Pro delicatulis Quercetani	t. i. p. 696
ad extra ad gangrenam & Sphacelum	t. i. p. 705.	Bilem, ex Timæo	t. i. p. 697
in gingivarum putredine	ibid.	Humorem melancholicum, ex eod.	ibid.
Guajaci D. à Mynsicht.	t. i. p. 708.	Pituitam ex eod.	ibid.
contra Hemoptysin & omnes fluxus sanguinis	t. i. p. 698.	ad Rachitidem Pharm. Bat.	t. i. p. 701
Timæi	t. i. p. 696.	Rhabarbari, ejusd. Pharm.	t. i. p. 702
Hepatis visuli Ph. Bat.	t. i. p. 696.	D. à Mynsicht	t. i. p. 708
In Hepatis scirrbo Timæi	t. i. p. 698.	Reguli Pharm. Bat.	t. i. p. 702
Hepaticum Ph. Bat.	t. i. p. 696.	ad Renum dolorem & exulcerationem ex Hoffm.	t. i. p. 704.
<i>Decocta Hepatica quadam in viscerum obstructione</i> ex Hoffmanno	t. i. p. 703.	Rubicundum Ph. Bat.	t. i. p. 701
<i>Decoctum Hepaticum</i> D. à Mynsicht	t. i. p. 706.	Rubia tinctorum ejusd. Pharm.	ibid.
Calidum D. Timæi	t. i. p. 698.	Sanguinem purificans in scabie ex Hoffmanno	t. i. p. 704.
Frigidum ejusdem.	ibid.	D. à Mynsicht	t. i. p. 708
Zvvelferi	t. i. p. 694.	Satyracum ex eod.	t. i. p. 707
contra Herniam intestinalem D. à Mynsicht	t. i. p. 707.	contra scabiem, ex eod.	ibid.
Hydragogum Zvvelferi	t. i. p. 694.	in scirrbo Hepatis Timæi.	t. i. p. 698
Hysterium Ph. Bat.	t. i. p. 696.	Scorbuticum Pharm. Bat.	t. i. p. 702
in Hystericiis affectibus ex Hoffm.	t. i. p. 704.	Senæ D. à Mynsicht.	t. i. p. 708
Laxativum Ph. Aug.	t. i. p. 694.	cum Rhabarbaro	ibid.
D. Petri de Spina	t. i. p. 696.	ad stim Ph. Bat.	t. i. p. 702
D. Timæi	t. i. p. 697.	Splenis Bovis ejusd. Ph.	t. i. p. 696
Ligni Guajaci D. à Mynsicht	t. i. p. 701.	<i>Decocta splenetica, aperitiva, antiscorbutica</i> , ex Hoff.	t. i. p. 704.
in Lue Venerea Berigardii	t. i. p. 699.	<i>Decoctum spleneticum</i> D. à Mynsicht	t. i. p. 706
D. I. Z. ex Hoffm.	t. i. p. 704.	Timæi.	t. i. p. 698
ad Luis Venerea preservationem ex Ligno Guajaco	t. i. p. 699.	contra sputum Sanguinis Zvvelf.	t. i. p. 695
Herculis de Saxonia	t. i. p. 699.	ad strumas Ph. Bat.	t. i. p. 702
In Lue Venerea Secretum Zvvelferi	ibid.	Traumaticum ejusd. Ph.	ibid.
Majale Ph. Batean.	t. i. p. 696.	Ph. Lond.	t. i. p. 695
Schroderi.	t. i. p. 694.	<i>Decoctum in Venerea Lue Berigardii</i>	t. i. p. 699
<i>Decocta quadam in Mensium obstructione</i> ex Hoffman.	t. i. p. 704.	D. I. Z. ex Hoffm.	t. i. p. 704
<i>Decoctum in mensium suppressione</i> D. à Mynsicht tom. I.	p. 707.	ad Venerea luis preservationem ex ligno Guajaco	t. i. p. 699
Timæi	t. i. p. 699.	Herculis de Saxonia	t. i. p. 699
Zvvelferi	t. i. p. 695.	in Venerea lue Secretum Zvvelferi	ibid.
<i>Decoctum contra mensium immoderatum fluxum</i> Timæi	t. i. p. 699.	Violatum purgans D. à Mynsicht.	t. i. p. 708
In missione cruenta ex Hoffmanno	t. i. p. 704.	Ulm Ph. Bat.	t. i. p. 702
D. à Mynsicht	t. i. p. 707.	contra Uteri hemorrhagiam D. à Mynsicht tom. I.	p. 707.
D. Timæi	t. i. p. 699.	Vulnerarium D. à Mynsicht	ibid.
ad morsum Canis Rabidi Ph. Bat.	t. i. p. 701.	Quercetani pro omnibus vulneribus internis	t. i. p. 697
Nigrum D. à Mynsicht.	t. i. p. 709.	& externis	t. i. p. 709
Nucum cupressi ex eodem	ibid.	<i>Decrepitare</i>	
Odontalgicum Timæi	t. i. p. 698.	Defensiva, vid. Intercipientia	
<i>Decocta ad Odontalgiam externa</i>	t. i. p. 705.	Defrutum, vid. Sapa	
<i>Decoctum Ophthalmicum</i> Timæi.	t. i. p. 697.	Dejectoria, vid. Purgantia	
Pacificum Pharm. Bat.	t. i. p. 701.	Deleteria	ibid.
Passulatum D. à Mynsicht	t. i. p. 706.	Deliquium, per deliquium solvere, quid sit?	ibid.
<i>Decocta Pectoralia in tussi desperatissima ex hamoptysi</i>	t. i. p. 702.	Delphinium, vid. Consolida Regalis	
cum discrasia sanguinis calida	t. i. p. 702.	Dens caballinus, vid. Hyosciamus	
Attenuantia in tussi ex crassis humoribus	ibid.	Dens canis, vid. Gramen	
ex Hoffm.	ibid.	Dens caninus.	t. i. p. 710.
<i>Decoctum Pectorale incrassans</i> D. D. L. M. ex Hoffm.	t. i. p. 703.	Dens Elephantis, vid. Ebur.	
Consolidans ejusd. ex eodem	ibid.	Leonis, vid. Taxacum	
Subacidum D. à Mynsicht	t. i. p. 705.	Dentalium	t. i. p. 711
Subdulce ejusdem	ibid.	Dentaria	t. i. p. 710
ex Radice China ejusdem	t. i. p. 706.	Major	t. i. p. 711
Pharm. Noriberg.	t. i. p. 695.	Dentellaria, vid. Plumbago	
Timæi.	t. i. p. 697.	Dentifricia, vid. Odontica	t. 2. p. 451
pro potu ordinario ejusd.	t. i. p. 700.	Dephlegmare quid sit	ibid.
Polychrestum Ph. Bat.	t. i. p. 701.	Depilatoria, vid. Psyllotta	
Polypodii purgans D. à Mynsicht	t. i. p. 708.	Desiccare quid sit	t. i. p. 711
Præparans Bilem incrassatam, Timæi	t. i. p. 697.	Desiccativum rubrum, vid. Unguentum	
tenuem, ejusdem	ibid.	Despumare, quid sit	ibid.
Humorem melancholicum, ejusd.	ibid.	Detergentia Medicamenta quid & quanam sint	ibid.
Pituitam ejusd.	ibid.	Detonare quid sit	ibid.
Præservatorium Ph. Bat.	t. i. p. 701.	Diacalamenches, vid. Pulvis.	
<i>Decocta Purgantia quadam ex Hoffm.</i>	t. i. p. 704.	Diacarthami, vid. Electuarium	
		Diacassia, vide Electuarium, aut etiam Looch pro clysteribus	

INDEX RERUM.

- Diacatholicum*, vide *Electuarium*.
Diacerasum, vide *Diamarenatum*.
Diachalsireos, vid. *Emplastrum*.
Diachylum, vide *Emplastrum*.
Diacinnamomi, vide *Pulvis*.
Diacodium Asthmaticum contra *tussim diurnam*,
Zvvelf. t.i. p. 713
Dysentericum ejusdem ibid.
Joan. Bapt. Montani, alias *syrupus de siliquis* Ph.
Aug. t.i. p. 712
simplex Galeni ex Ph. Aug. ibid.
solidum ejusd. Ph. ibid.
Aliud ejusd. Ph. ibid.
contra spiritum sanguinis, ex *Zvvelfero*
p. 713 tom. i.
Diacrocron, vide *pulvis*
Diacuminum, vide *pulvis*
Diacydonites, vide *pulvis*.
Diacydonium Aromaticum Ph. Aug. ibid.
Lucidum Scammoneatum t. 2. p. 800
Pharm. Lond. t. 1. p. 14
Purgativum e Ph. *perficâ* ibid.
simplex Ph. Aug. t. 1. p. 713
solutivum ibid.
pellucidum ibid.
Stipticum Ph. *perficâ* t. 1. p. 714
Diacynorrhodon, vide *sub Titulo Conserva*, item *Cynor-*
rhodon. ibid.
Dietâ quid sit, & quomodo pareatur
Diagalanga, vide *pulvis*
Diagydiu, vid. *scammoneum*.
Diakyssoys, vide *pulvis*.
Diatreos, vide *pulvis*.
Dialacta, vide *pulvis*.
Dialthia, vide *Unguentum*.
Diamarenatum t. 1. p. 714
Diamargaritum, vide *pulvis*.
Diambra, vide *pulvis*.
Diamorum compositum Galeni, ex *Pharm. Aug.* t. 1.
p. 715
simplex ejusdem Ph. t. 1. p. 714
usitatum Nicolai ex eadem Ph. t. 1. p. 715
Diamoschi, vide *pulvis*.
Diamygdalarum, vide *Martius panis*.
Diansi, vide *pulvis*.
Dianthos, vide *pulvis*.
Dianicum, Ph. Aug. ibid.
Diapajna, vide *Cataplasma*.
Diapenidi, vide *pulvis*.
Diapentia, vide *Sanicula*.
Diaphenicum, vide *Electuarium*.
Diaphoretica Medicamenta, quid & quanam sint.
ibid & seq. t. 1. p. 718
Diaphoretica Medicamenta, vide *Hydrotica*.
Diaphoreticus pulvis diurnus ibid.
nocturnus t. 1.
Diaphoreticorum formula, species, & Aetiologia
p. 1003
Diaprasii, vide *pulvis*.
Diaprunum, vide *Electuarium*.
Diarrhodon, vide *pulvis*.
Diascordium, vide *Electuarium*.
Diascebesten, vide *Electuarium*.
Diasenna, vide *Electuarium*.
Diatestrarum, vide *Theriaca, Electuarium*.
Diathamaron, vide *Diacomeron*.
Diatragacanthi, vide *pulvis*.
Diatrisantali, vide *pulvis*.
Diatrion, *Pipereon*, vide *pulvis*.
Diastilalos, vide *pulvis*.
Diellamum ibid.
Digerere quid sit ibid. & seq.
- Digestiva Medicamenta* quid & quanam sint
p. 720 t. 1.
Digestivum pulvis ordinarius D. Cnæffell. t. 1. p. 721
Digitalis ibid.
Dionysia t. 1. p. 722
Diphryges ibid.
Diploma, vide *Ignis*.
Dipsacus, vide *Virga pastoris*.
Dipsas, vide *Serpens*.
Diptamum, vide *Dictamnus*.
Discus ibid.
Discuientia, vide *Resolventia*. ibid.
Dispensare ibid.
Dispensatorium, vide *Antidotarium*. ibid.
Dissolvere, & *dissolutio* ibid. & seq.
Distillare, & *distillatio* t. 1. p. 727. & seq.
Distillatum Instaurans Timæi t. 1. p. 700
Distillatum vide *Aqua Carnis*, sive *Aqua Analeptica*.
Diuretica Medicamenta quid, & quanam sint. t. 1.
p. 728 & seq.
Diureticus pulvis ordinarius ex *Cnæffelio* tom. i.
p. 733
in ardore urina ejusdem ibid.
Dokimastice Metallica ibid.
De Dokimastice Metallica Olai Borrichii Tractatum.
ibid. & seq. ibid.
Dolichus, vid. *Phaseolus*.
Dolorem lenientia, vid. *Anodyna*.
Doronicum t. 1. p. 744
Dorychnium t. 1. p. 745
Dosis medicamentorum ibid. & seq.
Draba t. 1. p. 748
Drachma, vid. *Pondera*.
Draco marinus. ibid.
Draco mitigatus. t. 2. p. 280
Dracontium. t. 1. p. 748
Dracunculus Hortensis. ibid.
Dracacanthum, vid. *Tragacanthum*.
Drakena, vid. *Serpentaria Virginiana*, seu *Viperina Vir-*
giniana.
Dropax quod sit. t. 1. p. 749
compositus, ex *Weickard*. ibid.
simplex, ex eodem. ibid.
Dropaces ex *Joh. Michael*. ibid.
Dryopteris ibid.
Dulcamara, vid. *Solanum scandens*.
Drynus, vid. *sub titulo Serpens*.
Dulcis Radix, vid. *Liquiritia*.
Dulcorare quid sit ibid.
Durio ibid.
Dysenterica Medicamenta quid & quæ sint. t. 1. p. 750
Dysentericus Bolus D. Cnæffellii ibid.
Dysenteria D. Cnæffellii ibid.
Dysentericus Pulvis Castrensis D. Cnæffellii ibid.
Dysentericum specificum D. Cnæffellii. ibid.
- ## E.
- Ebenus*. tom. i. pag. 750
Ebiscus, vid. *Althæa*.
Ebullitio, quid sit t. 1. p. 751
Ebulus ibid. & seq.
Ebur, vid. *Elephas*.
Eccoproctica medicamenta, quid sint t. 1. p. 752
Echinomelactos ibid.
Echinopus ibid.
Echinus castaneæ ibid.
Echinus Animal ibid.
Echini partes officinales ibid.
Echinus marinus ibid.
Echium ibid.
Eclegma, vid. *sub titulo Looch*.
Egyptica

INDEX RERUM.

Egyptica, vid. Pepastica.
Erythrica, sive Eradicantia Medicamenta. t.i.p.753
Effervescentia quid sit ibid.
Egetea ex Pharm. Bauderon. t.i.p.771
Elaphoboscum t.i.p.775
Elaphoselinum, vid. Orcoselinum.
Elate, vid. Abies.
Elaterium, vid. Cucumer Sylvestre.
Elatine t.i.p.755
Eletica, vid. Epispastica.
Eleagnon, vid. Agnus Castus.
Electrum, vid. Succinum.
Electuarium, quid sit, idque componendi ratio ibid & seq.
Electuarii exempla aliquot t.i.p.756. & seq.
Electuarium Absynthiacum ex D. à Mynsicht. tom. I.
 p.790
Album ex Pharm. Bat. t.i.p.782
Alexipharmacum de Ciconiâ t.i.p.764
D. Pet. de Spina ibid.
Alexiterium camphoratum D.D.R. ex Hoffmanno
 t.i.p.783.
Alkermes dictum, vid. Confectio Alkermes.
de Allio t.i.p.765
Amarum magistrale majus ex Pharm. Lond.
 t.i.p.758
minus ex ead. Pharm. ibid.
Ambrosia Archilei ex Weckero t.i.p.765
ex Pharm. Persica t.i.p.764
Anacardium Mesue, ex Ph. Aug. t.i.p.765
Anodynum ex Pharm. Aug. ibid.
Antepidemicum D. Goddard. t.i.p.769
Antidotal pro familia Stapedii ex Phat. August.
 t.i.p.765
Matthioli ex Ph. Aug. ibid.
Hamagogum ex Ph. Lond. t.i.p.767
Analepticum ex Ph. Lond. t.i.p.766
Asyncriticum Aethuarii ex Renodæo ibid.
Ejdra, ex VVeckero t.i.p.765
Aliud ex eodem t.i.p.766
Theriacle ex Phar. Reg. Zvelf. t.i.
 p.778
Secundum, antidyfentericum ex
ead. Ph. Zvelf. t.i.p.779
Antiepilepticum singulare M. Ducis Hetturiz
 t.i.p.783
D. Timæi t.i.p.781
Aliud ex eodem. ibid.
Antifebrile ex Ph. D. Le Mort. t.i.p.769
Antimorum Nicolai, ex VVeckero t.i.p.758
Antiphibiscum F. ex Hoffm. t.i.p.783
ex Timæo t.i.p.781
Antiscorbuticum D. H. ex D. à Mynsicht t.i.p.793
ex Timæo t.i.p.782
Aristotelicum ex Ph. Persica t.i.p.784
Asthmaticum ex Ph. Bat. t.i.p.782
contra Asthma & orthopneam, ex Hoffmann.
 t.i.p.783
Aibanasia magna Nicolai, ex Pharm. August.
 t.i.p.767
ex Ph. Persicâ t.i.p.784
de Baccis Lauri Rhasis, ex Ph. Aug. t.i.p.767
Benedicta laxativa Nicolai, ex Pharm. August.
 t.i.p.758
Bzoardicum D.D.K. ex Hoffm. t.i.p.783
Aliud ex eodem ibid.
Papæ Leonis t.i.p.793
de 7. radicibus, & 7. herbis Georgii Mo-
ral ex Theat. Ph. D. de Sgobbis t.i.
 p.767
ex Bolo Armena, ex Hoffm. t.i.p.784
contra calculum Cnæffeli t.i.p.744
Camphoratum Keglri t.i.p.767

Electuarium Cardiacum ex Ph. D. Le Mort t.i.p.767
Carmativum, ex Timæo t.i.p.782
Caryocostinum, ex Ph. Aug. t.i.p.758
Caryophyllorum, ex Ph. Bat. t.i.p.782
Castitatis ex Ph. Bat. t.i.p.782
Catharticum Casareum D. à Mynsicht t.i.p.760
Caryophyllatum ex eodem t.i.p.791
Cholagogum ex eodem ibid.
Passulatum ex eodem t.i.p.792
Peruvianum liquidum ex eodem ibid.
Solidum pretiosum ex eodem ibid.
Commune ex eodem ibid.
Regium ex eodem t.i.p.791
Risatum ex eodem ibid.
Theribinthinatum ex eodem t.i.p.792
Violarum ex eodem t.i.p.791
Vita, ex eodem ibid.
Catechu pro delicatulis t.i.p.792
Cephalicum confortans D.D.B.O. ex Hoff. t.i.p.783
D. à Mynsicht t.i.p.787
D. Timæi t.i.p.781 & 782
Chalibeatum, ex Ph. Aug. t.i.p.767
ex Ph. Bat. t.i.p.782
Arcularii, ex Schrodero t.i.p.767
Augenii, ex Schrodero ibid.
Cholagogum F. De le Boë Sylvii t.i.p.760
de Cincibus ex Ph. Aug. t.i.p.768
de Ciro solutivum ex Ph. Aug. t.i.p.759
Stomachicum Mesue ex Ph. D. Lemery
 t.i.p.768
ad Coitum, ex Hoffm. t.i.p.784
Aliud ex eodem ibid.
Cordiale D.D.K. ex Hoffm. t.i.p.783
Cordiale ex Ph. Ind. Grimom. t.i.p.787
Timæi t.i.p.781 & 782
Cor latificans D. Michael. t.i.p.787
Corroborans septem membra principalia, Crollii
 t.i.p.768
Diabalymer, sive Sennatum Renodæi, ex Ph. Aug.
 t.i.p.758
Diabryonias Democriti, ex VVeckero ibid.
Diacapparis ex Ph. Lond. t.i.p.767
Diacarthamum Arnoldi de Villa-Nova, ex Phar.
Aug. t.i.p.758
Solidum ex Ph. Aug. t.i.p.759
Diacassia cum manna ex Ph. Aug. t.i.p.759
D.D. Donzelli ibid.
Diacastorium, ex VVeckero t.i.p.767
Diacatholicon Nicolai Præpositi, ex Pharm. August.
 t.i.p.759
Diacinnamomum ex Pharm. Ind. Grimom. t.i.
 p.786
ex Ph. Lond. t.i.p.768
Diacorallion ex Ph. Lond. ibid.
Diacorum Altenburgens. t.i.p.783
ex Ph. Aug. t.i.p.764
Mesue, ex eadem Ph. ibid.
Diacrocuma ex Ph. Lond. t.i.p.768
Diakermes solutivum ex Timæo t.i.p.782
Diaphanicon Fernelii ex Ph. Aug. t.i.p.762
Mesue ex ead. Ph. ibid.
Solidum ex ead. Ph. ibid.
Diaphoreticum Platerii, ex Schrodero t.i.p.768
Diaprunum D.F. De le Boë Sylvii t.i.p.760
Diarrhodi ex Ph. Bat. t.i.p.782
Diasarum Fernelii t.i.p.758
Diasatyron Nicolai, ex Ph. Aug. t.i.p.773
Discoordinum Fracastorii ex Ph. Aug. ibid.
Sylvii ex eadem Pharm. ibid.
Rosarium ex D. à Mynsicht t.i.p.790
Diaspermaton ex Ph. Lond. t.i.p.774
Diasulphur, Mesue, ex VVeckero. ibid.
 Fffff 2
Diaturbuh

I N D E X

Electuarium Diaturbith Minerale ex D. à Mynsicht

t.1.p.791

cum Rhabarb. Montagnana, ex Ph. Aug.

t.1. p.764

Ducis Sabaudia, ex Ph. Bat.

t.1. p.782

contra dysenteriam ex Cnæff.

t.1.p.750

Hæchsteri, ex Ph. Aug.

t.1.p.768

D.à Mynsicht

t.1.p.790

pro Nosocomio Argent. D. D. Segleri ex

Hoffm.

t.1 p.784. 793

ex Ph. Reg. Zvvelf.

t.1.p.769

Emolliens in atvi constipatione, ex Timæo

t.1.p.781

Epilepticum ex Ph. Bat.

t.1.p.782

Episcopi, quod Elefcoph, vocatur Mesua, ex Ph. Aug.

t.1. p.759

Solidam ex eadem

ibid.

in Exulceratione Renum & Vesica ex Timæo

t.1.p.782

contra Gallicum morbum D. Marchetti

t.1.p.793

Gorgostinum D. Beyer

ibid.

in Hamorrhoidum fluxu nimio, ex Hofm.

t.1.p.784

Hamech major Mesu. ex Ph. Aug.

t.1. p.759

ex Hedera terrestri compos. Ph. Aug.

t.1.p.769

Hepaticum calidum ex Timæo

t.1.p.781

frigidum ex eodem

t.1.p.782

ex D. Cnæffelio

t.1.p. 976

Hiera picra Galeni simplex Ph. Aug.

t.1.p.761

cum Agarico ex cad. Ph.

ibid.

composita Nicolai ex Ph. Aug.

ibid.

Logadii Myrepsi ex cad. Ph.

ibid.

Paschii Diacolocynthidos, ex eadem Ph.

ibid.

Hydragogum eximium Renodæi

t.1.p.760

F. de le Boe Sylvii

ibid.

primum ex Ebulo Zvvelferi

ibid.

secundum, de Spina Cervina, ejusd.

ibid.

Hydropicum de soldanella, ex Bierlingt

t.1.p.792

Hypnoticum ex Timæo

t.1.p.782

de Hyssopo Nicolai, ex Weckero

t.1.p.769

Hystericum, sive Landanum facile, ex Schrodero

ibid.

Indum majus Mesua ex Ph. Aug.

t.1.p.761

Izzebaer mithridaticum Papæ Leonis

t.1.p.793

Juniperinum ex Ph. Bat.

t.1.p.782

Lenitivum Florenzola ex Ph. Aug.

t.1.p.760

ex Tamarindis ex cad. Ph.

ibid.

de Manna Nicolai ex Ph. Aug.

ibid.

ex Ph. Ind. Grimom.

t.1.p.787

Suavissimum ex Ph. D. Le Mort

t.1.p.761

Pharm. Parisiens.

t.1.p.761

Lithontripicum ex Ph. Bat.

t.1.p.782

contra luem Veneream D. Marchetti

t.1.p.793

Pittaretia Veneti dictum,

ibid.

Macis ex Pharm. Bat.

t.1. p.782

Magnanimitatis ex Pharm. Aug.

t.1. p.769

Martiale Cnæffel.

t.1.p.1133

ad menstruorum fluxum nimium Cnæff.

t.2 p.1134

Mioleta Nicolai Myrepsi ex Pharm. August.

t.1.p.770

Mithridaticum Damocratis ex Ph. Aug.

ibid.

resolutum, ex eadem Ph.

ibid.

Musa Anea, sive Zazenea, seu Egesea.

ex Ph. Bauderoni

t.1.p.771

de Napello ad Leporam ex Ph. Persica

t.1.p.785

de Niro D. à Mynsicht

t.1.p.790

de Nucibus in peste ex Hoffm.

t.1. p.784

ex Schrod.

t.1.p.771

Ophthalmicum, D. Timæi

t.1. p.781

Opiata Solomonis Juberii, ex Renodæo

t.1.p.771

Opticum D. à Mynsicht

t.1.p.790

Orvietanum ex Ph. Bat.

t.1.p.775

R E R U M.

Electuarium Orvietanum ex collect. Bierling

t.1.p.792

verum ex Ant. de Sgobbis

t.1. p.771

ex Schrodero

ibid.

de Ovo Max. Imperat ex Ph. Aug.

ibid.

Oxydorsicum ex Pharm. Bat.

t.1.p.782

Panchymagogum ex Ph. Reg. Zvvelferi

t.1.

p.762

Paralyticum ex Ph. Bat.

t.1.p.782

Passulatum ex Ph. Lond.

t.1.p.762

ex D. à Mynsicht

t.1. p.792

ex D. Timæo

t.1.p.781

Pectorale ex Pharm. Bat.

t.1.p.782

ex Ph. Lond.

t.1.p.772

contra Pestem Guidonis : sive *Electuarium Papa*

ex Pharm. Aug.

ibid.

D. R. ex Hoffman.

t.1. p.784

de Nucibus D. D. R. ex eodem

ibid.

Philonium Romanum majus Nicolai Myrepsi ex

Pharm. Aug.

t.1. p.772

Mesua, ex Ph. Aug.

ibid.

Persicum ejusdem, ex cad. Ph.

ibid.

Tarfense Galeni, ex cad. Ph.

ibid.

Magistrale ex Ph. Lond.

ibid.

In phibisi D. Michaelis

t.1.p.787

ex Schrodero

t.1.p.772

Incipiente ex D. V Venclero

t.1.p.773

ex Ph. Reg. Zvvelferi

t.1. p.772

Piperinum ex Pharm. Bat.

t.1.p.783

Podagricum S. Cloffæi

t.1.p.762

Pretiosum Regis Franciæ

t.1. p.793

de Prunis lenitivum ex Ph. Aug.

t.1.p.762

Solutivum Nicolai, ex cad. Ph.

ibid.

Timæi

t.1.p.781

Pseudo acori Stomachicum ex Schrodero

t.1.

p.764

de Psyllio Montagnana ex Ph. Aug.

t.1. p.762

Pulmoniacum D. Cocci, ex D. à Mynsicht

t.1.p.793

Regum, ex Schrodero

t.1.p.773

in Renum & Vesica exulceratione ex Timæo

t.

t.1.p.782

Requies Nicolai ex Ph. Aug.

t.1.p.773

è Succo Rosarum Nicolai ex Ph. Aug.

t.1.p.763

solidum ex cad. Ph.

ibid.

Rosatium Mesua ex cad. Ph.

ibid.

Sanguinem purificans D. Michael.

t.1 p.787

in Sanguinis spurio ejusdem

ibid.

è Sassafras ex Ph. Lond.

t.1.p.773

Scorbuticum ex Schrodero

ibid.

de Scoria ferri Rhabis, ex Ph. Aug.

t.1. p.774

In Scorbutio D. Michael.

t.1.p.787

de Scorzonera D. à Mynsicht

t.1.p.790

de Sena Nicolai ex Ph. Aug.

t.1.p.763

cum Ambra ex Ph. Norimb.

ibid.

de soldanella hydropicum ex Bierling.

t.1.p.792

solutivum ex Timæo

t.1. p.782

Sotirella parva acidum ex Ph. Aug.

t.1.p.774

Spagiricum ex Ph. Aug.

ibid.

Spleneticum ex Timæo

t.1.p.782

Stomachicum D. C. ex Hoffm.

t.1.p.783

Aliud ex eodem

ibid.

Confortans D. Michael.

t.1.p.787

D. à Mynsicht

t.1.p.790

Stromayeri

t.1.p.774

Calidum ex Timæo

t.1.p.781

Frigidum ex eodem

ibid.

Aliud ex eodem

t.1.p.782

de Syrrace Meluz

t.1. p.774

de Sulphure ex Ph. Persica

t.1.p.786

de Tamarindis Georg Horstii

t.1.p.763

Therebinthinatum de Lemery

t.1.p.774

purgans D. à Mynsicht

t.1.p.792

laxativum ejusdem

ibid.

Electua-

INDEX RERUM.

- Electuarium therebinthinatum laxativum* ex Timæo
t.1. p.781
- Theriaca Andromachi Senioris* ex Galeno. ex Ph.
Aug. t.1.p.774 & seq.
- Theriaca Andromachi magis restricta & correctæ*,
ex Ph.Reg.Zvvelferi t.1.p.778
- Theriaca benedicta Quercet.* t.1.p.897
- Theriaca cœlestis* t.1.p.898
- Communis Augustanor.* ex eadem Pharm.
t.1.p.779
- de Cancris* ex Ph. Persica t.1.p.786
- Ceylonica* ex Ph. Ind. Grimom. ibid.
- Contracta* ex Ph. D. Le Mort t.1.p.780
- Contractior alia* ex eodem ibid.
- Diatessaron* ex Ph. Aug. ibid.
- Febrilis* ex D. à Mynsicht t.1.p.790
- Londinensis* ex Ph. Lond t.1.p.779
- Mulierum* ex D. à Mynsicht t.1.p.789
- de Oïlo* ex Ph. Persica t.1.p.786
- Pauperum* ex Ph. Ind. Grimom. ibid.
- Resoluta* ex Ph. Norib. t.1.p.779
- Saxonica* ex D. à Mynsicht t.1.p.789
- Selecta* ex Pharm. Persica t.1.p.785.
& seq.
- Simplex* ex Ph. Reg. Zvvelferi t.1.p.778
- Smaragdina* ex Ph. Aug. t.1.p.780
- Tryphera ad Lumbricos* ex Ph. Persica t.1.p.784
- Magna Nicolai* ex Ph. Aug. ibid.
- Minor Phæonis Mesuæ* ex ead. Ph. ibid.
- Persica Mesuæ* ex Ph. Aug. t.1.p.763
- Sarracenica ejusdem* ex ead. Ph. ibid.
- ad Strumas* ex Ph. Persica t.1.p.784
- Electuaria Varia ad Venerem* ex Weckero t.1.p.780.
& seq.
- Electuarium contra Veneream luem* D. à Mynsicht.
t.1.p.793
- D. Marchetti ibid.
- Vermifugum* ex Ph. Bat. t.1.p.783
- In vesica & rerum exulceratione* ex Timæo t.1.
p.782
- ad visum recuperandum* ex Hoffm. ibid.
- Vita Arnoldi de Villa Nova* ex Pharm. August.
t.1.p.781
- Electuaria varia Confectiones dicta, vid. Confectio.*
- Elemi Gummi* t.1.p.793
- Elenium, vid. Enula Campana.*
- Eleosaccharum quid sit, & quomodo paretur* t.1.p.794
- Cordiale ibid.
- Compositum D. Cnæff. t.1.p.637
- Eleosaccharorum exempla aliquot* t.1.p.794
- Eleoselinum, vid. Apium Palustre*
- Elephas* ibid.
- Elephantis partes officinales, & preparata* tom.1.
p.797
- Elichryson* ibid.
- Elixatio, quid sit* ibid.
- Elixyr quid sit, & quomodo paretur* ibid & seq.
- Alexipharmacum* ex Hoffmanno t.1.p.806
- Allium antipestilentielle* ex Pharm. Reg. Zvvelf.
t.1.p.798
- Antiepilepticum Cratonis*, ex Schrodero t.1.p.799
- Crollii, ex eodem ibid.
- DD Freyer, ex eodem ibid.
- & Hystericum Schroderi ibid.
- Antihypochondriacum, & Antiscorbuticum* Rol-
fincii t.1.p.800
- Antifebrile*, ex Bierling. t.1.p.806
- ex D. Cnæffelio t.1.p.913
- ex D. J. M. ex Hoffmanno ibid.
- ex D. à Mynsicht t.1.p.808
- Antimoniale Purgans D. Sachsii*, ex Bierling.
t.1.p.807
- Mangeri Bibl. Pharm.*
- Elixyr Antipestilentielle* ex Ph. Reg. Zvvelf. t.1.p.802
- Antipodagricum*, ex Timæo t.1.p.804
- Antiscorbuticum D. Michael* ex Bierling. t.1.p.807
- D. F. H. ex Hoffmanno t.1.p.805
- Aperitivum* Claudei t.1.p.799
- Arthriticum* ex collect. Bierling. t.1.p.806
- ex Hoffmanno ibid.
- Balsamicum P. Emmer. correct.* à D. Jungken.
t.1.p.798
- ex Ph. Indic. Grimom. t.1.p.806
- Bezoardicum* ex Bierlingio t.1.p.807
- Camphora* ex D. Le Mort Pharm. t.1.p.803
- Carminativum* ex Ph. Indic. Grimom. t.1.p.806
- Cephalicum* ex Bierlingio t.1.p.806
- ex Hoffmanno t.1.p.804
- D. D. G. M. ex eodem ibid.
- Rolfincii t.1.p.799
- Timæi t.1.p.803
- Wedelii t.1.p.799
- Cinnamomi* ex Ph. Noriberg. ibid.
- Citri* ex D. Le Mort Ph. t.1.p.803
- ex Ph. Norimberg. t.1.p.799
- Purgans D. Michael. t.1.p.807
- Cordiale* ex Timæo t.1.p.803
- Epilepticum & hystericum* ex Hoffm. t.1.p.805
- ex Timæo t.1.p.804
- Hypochondriacum*, ex Schrodero t.1.p.804
- Hystericum, & antiepilepticum*, ex eodem t.1.
p.799
- Juniperinum* ex Ph. Norimb. t.1.p.800
- Mumie* t.1.p.991
- Nephriticum Arnicæ*, ex Bierlingio t.1.p.807
- ex Schrodero t.1.p.800
- Ophthalmicum* ex collect. Bierling. t.1.p.806
- Panchymagogum Crollii*, ex Ph. Aug. t.1.p.800
- Panis* ex Ph. Indic. Grimom. t.1.p.806
- Pectorale D. D. J. M.* ex Hoffm. t.1.p.805
- Ducis Saxonia, ex eodem ibid.
- ex Ph. Indic. Grimom. t.1.p.806
- Wedelii t.1.p.800
- Pesilentielle Crollii*, ex Ph. Aug. ibid.
- ex Ph. Indic. Grimom. t.1.p.806
- ex Schrodero t.1.p.799
- Paonia* D. à Mynsicht. t.1.p.808
- Proprietatis compositum*, ex Bierling. t.1.p.807
- Dulce ex Ph. Aug. t.1.p.801
- Fischeri, ex Bierling. t.1.p.807
- D. Herbstii, ex Bierling. t.1.p.806
- D. D. G. ex Hoffm. t.1.p.805
- Aliud ex eodem ibid.
- Aliud D. F. F. ex eodem ibid.
- A. S. ex eodem ibid.
- Paracelsi, ex Ph. Aug. t.1.p.801
- correctum ex Ph. Aug. ibid.
- Purgans ex collect. Bierling. t.1.p.807
- Rhabarbarinum t.1.p.801
- Purgans Herbigolensium*, ex Bierling. tom.1.
p.807
- elegantissimum D. Michael. ibid.
- Rorella* ex Ph. Norimb. t.1.p.801
- Spleneticum* ex Timæo t.1.p.803
- Stomachale D. D. J. M.* ex Hoffm. t.1.p.805
- ex Timæo t.1.p.804
- ex eodem Aliud t.1.p.803
- Sulphuris* ex D. à Mynsicht t.1.p.808
- Synopticum S. Clossii*, t.1.p.801
- Venerem* ex Timæo t.1.p.804
- Vita Bononiense*, ex Bierling. t.1.p.807
- Cephalicum, & Stomachicum ex Zvvelf.
t.1.p.802
- Majus Quercetani, ex Schrod. t.1.p.801
- Minus ejusdem, ex eodem t.1.p.802
- Fffff 3 Elixar

INDEX RERUM

<i>Elixir Rubrum D. D. R. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 805	<i>Emplastrum Caesaris ex Pharmac. Colleg. Reg. Lond.</i>	t. i. p. 825.
ex Timæo	t. i. p. 804	<i>de Calaminari lapide, ex Pharm. August.</i>	t. i. p. 826
<i>Vitrioli ex D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 807	& 629.	
ex Ph. Norimb.	t. i. p. 802	<i>De Calcetide, sive de Palma, ex Pharm. Norib.</i>	t. i. p. 827.
ex Timæo	t. i. p. 804	<i>Procallis pedum ex Pharmac. Italic. de Sgobbis</i>	t. i. p. 826.
<i>Uterinum ex Bierling.</i>	t. i. p. 806	<i>Aliud ex eod.</i>	t. i. p. 827.
Crollii	t. i. p. 802	<i>Aliud ex eodem</i>	ibid.
<i>D. G. M. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 805	<i>Camphoratum ex Ph. Bat.</i>	t. i. p. 838
<i>Aliud D. I. M. ex eod.</i>	ibid.	<i>Ad caneros persanandos infallibile D. Fr. t. i.</i>	p. 840.
<i>Aliud D. F. M. ex eodem</i>	t. i. p. 806	Joh. Vigierii	t. i. p. 827
Michael.	t. i. p. 802	<i>Carminativum ex D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 844
Rolfincii	ibid.	D. F. de le Boe Sylvii	t. i. p. 825
Schroderi	t. i. p. 801	Sylvii ex Ph. D. Le Mort	t. i. p. 837
ex Timæo	t. i. p. 804	<i>De carne bubala D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 845
Wedelii	t. i. p. 802	<i>Ad carunculam, seu carnositatem virga anferendam ex D. Lemery Ph.</i>	t. i. p. 827
<i>Elleborus, vide Helleborus</i>		<i>Catagmaticum ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Embrocatio, quid sit, & quomodo paretur</i>	t. i. p. 809	<i>Catharrate ex Ph. Bat.</i>	t. i. p. 838
<i>Embrocationum ad varios morbos exempla aliquot ibid.</i>	& seq.	<i>In catharris suffocativis, & Aboribus ex Bierling.</i>	
<i>Emetica quid sint</i>	t. i. p. 809	<i>Pro catharris sistendis, & capite Roborando</i>	Mich.
<i>Emeticorum exempla proponuntur</i>	t. i. p. 810. & seq.	<i>Cephalicum ex Ph. Indic. Grimom.</i>	ibid.
<i>Emeticorum formula, & quorundam ex iis, quoad preparationes, & Analyses Chymicas, & Ethologia, ex Willisio</i>	t. i. p. 813. & seq.	ex D. Le Mort Ph.	t. i. p. 837
<i>Emenagoga quid sint, & quomodo operentur, t. i. p. 817.</i>	& seq.	F. F. ex Schrodero	t. i. p. 826
<i>Emollientia Medicamenta quid sint</i>	t. i. p. 818.	<i>Regium ex Ph. Reg. Zvvelf.</i>	t. i. p. 827
<i>Emollientium modus agendi, & materia medica t. i. p. 819. & seq.</i>		<i>Ceroneum Nicolai ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Empasma, vid. Cataplasma</i>		<i>De Cicuta Schroderi, ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 828
<i>Empetrum</i>	t. i. p. 820	<i>De cinnabari ex Ph. Coll. Reg. Lond.</i>	t. i. p. 826
<i>Emphrastica</i>	ibid.	<i>Curinum vulgare ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 828
<i>Emplastica</i>	ibid.	<i>Ad clavos pedum ex collect. Bierling.</i>	t. i. p. 842
<i>Emplastrum quid sit</i>	ibid.	ex D. Le Mort	t. i. p. 837
<i>quomodo paretur</i>	t. i. p. 821. & seq.	<i>Aliud ex eodem</i>	t. i. p. 828
<i>Emplastrorum exempla varia proponuntur</i>	t. i. p. 822.	<i>de Creta ex Ph. Colleg. Reg. Lond.</i>	t. i. p. 826
<i>Emplastrum Abbatis de Grace ex D. Lemery Pharm.</i>	t. i. p. 822.	<i>De Crusta Panis Montagnana ex Pharm. August.</i>	t. i. p. 828.
<i>de Absinthio ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>de Cymino ex Ph. Colleg. Reg. Lond.</i>	t. i. p. 826
<i>Adhasivum ex Ph. Bat.</i>	t. i. p. 828	<i>Defensivum ex Ph. Reg. Zvvelferi</i>	t. i. p. 828
<i>Album coctum ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 824	<i>Ad Dentium dolores ex Ph. D. Lemery</i>	t. i. p. 829
<i>frigidum ex Ph. Ind. Grimom.</i>	t. i. p. 840	<i>Ad tempora applicandum ex D. Michael.</i>	t. i. p. 840
<i>de Allio Alexandri, ex Mesuc. correctum à D. Lemery</i>	t. i. p. 825	<i>Diachylon Album, sive simplex Mesua, ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 837
<i>De ammoniaco ex Ph. Norib.</i>	ibid.	<i>Anodynum, ex D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 845
<i>In Ani proidentia certum, ex Michael.</i>	t. i. p. 840	<i>Compositum, seu de mucilagibus ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 828
<i>Antiepilepticum, ex eod.</i>	t. i. p. 829	<i>Gummatum Vigonis ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Antipleuriticum ex Bierling.</i>	t. i. p. 842	<i>Ireatum ex Ph. Lond.</i>	ibid.
<i>Canonici Romani, ex eod.</i>	ibid.	<i>Magnum Mesua ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Antipodagricum ex eod.</i>	ibid.	<i>Parvum ejusdem ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>N. à S. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 839	<i>Diadichamnium Galeni, vid. Emplastrum Sacrum</i>	
<i>D. Sachsi</i>	t. i. p. 825	<i>Diagalbani ex Ph. Bat.</i>	t. i. p. 838
<i>Tackenii</i>	t. i. p. 826	<i>Diapalma ex Ph. Reg. Zvvelferi</i>	t. i. p. 827
<i>Antiquarium I. B. U. H. ex Hoffm.</i>	t. i. p. 839	<i>Diaphoenicum calidum Mesua, ex Pharm. August.</i>	t. i. p. 833.
<i>Apostolicum Nicolai Alexandrini Pharm. August.</i>	t. i. p. 825.	<i>frigidum ejusd. ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Arbriticum ex Hoffmanno</i>	t. i. p. 839	<i>Diaphoreticum D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 844
<i>D. à Mynsicht</i>	t. i. p. 845	ex Schrodero	t. i. p. 826
ex Schrodero	t. i. p. 825	ex Ph. Reg. Reg. Zvvelferi	t. i. p. 828
<i>Ioh. Casimiri Seren. Polonia & Suecia Reg. ex D. Schultzio</i>	ibid.	<i>Diapompholigos ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 833
<i>Aliud ex eodem</i>	ibid.	<i>Diasulphuris camphoratum ex Ph. Ind. Grimom.</i>	t. i. p. 140.
<i>Aliud ex eodem</i>	ibid.	Rulandi, ex Schrodero	t. i. p. 836
<i>De Baccis Lauri, ex Ph. Aug.</i>	t. i. p. 826.	<i>Divinum ex Ph. Lond.</i>	t. i. p. 828.
<i>Barbarum magnum, ex Ph. Lond.</i>	ibid.	<i>De Elemi ex ead. Ph.</i>	t. i. p. 829
<i>Basilicon majus Mesua ex Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>Epilepticum ex D. à Mynsicht.</i>	t. i. p. 843
<i>Minus Mesua, ex Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>Epispaticum ex Ph. Bat.</i>	t. i. p. 838
<i>Vulnerarium ex Ph. Reg. Zvvelferi</i>	ibid.	ex Ph. Lond.	t. i. p. 829.
<i>De Betonica ex Ph. Bat.</i>	ibid. & p. 831	<i>Febrifugum ex Pharm. Bataan.</i>	t. i. p. 838
<i>contra Bubones pestilenciales, ex Doræro tem. i. p. 843.</i>		<i>Emplastrum</i>	
<i>Burgundicum ex Pharm. Bat.</i>	t. i. p. 838		

I N D E X

R E R U M

<i>Emplastrum Febrifugum</i> ex D. Cnæffelio	t. 1. p. 914
ad Febres quasvis ex Hoffm.	t. 1. p. 839
ex Ph. Le Mort	t. 1. p. 838
Scribelbergere, ex Ph. Aug.	t. 1. p. 829
<i>Flos unguentorum dictum</i> , ex Ph. Colleg. Reg. Lond.	t. 1. p. 826.
<i>Fluxus attractivum ad fonticulos, & Vesicatoria</i> , D. D. M. ex Hoffm.	t. 1. p. 840
<i>Fœtidum</i> D. à Mynsicht	t. 1. p. 845
<i>Pro fonticulis Stegmanni</i> , ex Bierl.	t. 1. p. 242
ex Schrodero	t. 1. p. 829
<i>De Fuligine</i> ex Ph. Aug.	ibid.
<i>De Galbano</i> D. à Mynsicht	t. 1. p. 844
Costum ejusdem	t. 1. p. 845
Crocaturum ejusd.	t. 1. p. 844
ad Ganglia D. Charraz	t. 1. p. 829
Aliud ex eod.	ibid.
ad Globulos & sagittas extrahendas Hoffmanno	t. 1. p. 840.
<i>de Gratia Dei</i> ex Ph. D. Le Mort	t. 1. p. 837
ex Ph. Lond.	t. 1. p. 829
<i>Griseum, seu de lapide Calaminari</i> Pharm. Aug.	ibidem
ex Ph. D. Le Mort.	t. 1. p. 837
<i>de Gummi Elemi</i> ex Ph. Lond.	t. 1. p. 829
<i>Gummatum Paracelsi</i> , ex Ph. Schrod.	ibid.
<i>Hæmorrhoidale</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 838
<i>Hepaticum</i> ex Ph. Reg. Zvvelf.	t. 1. p. 829.
Aliud ex ead. Ph.	t. 1. p. 830
<i>de Hermodactylis</i>	ibid.
<i>Contra Hernias</i> , ex Bierling.	t. 1. p. 842
Carnosæ D. Donzelli	t. 1. p. 830
Doreti	t. 1. p. 843
C. G. ex Hoffman.	t. 1. p. 840
ex Ph. D. Le Mort.	t. 1. p. 837
ex Ph. Lond.	t. 1. p. 830
ex D. à Mynsicht	t. 1. p. 845
ex Ph. Norib.	t. 1. p. 830
ex Schod Ph.	ibid.
ex Pharm. Reg. Zvvelf.	ibid.
ad Hydropem ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Hydroticum</i> ex Ph. Norib.	ibid.
<i>de Hyosciamo</i> Ludovici	ibid.
<i>Hypnoticum</i> D. à Mynsicht	t. 1. p. 843
<i>Hystericum</i> ex Ph. Lond.	t. 1. p. 831
ex Ph. Norib.	t. 1. p. 830
<i>De Ianua simplicius</i> ex Ph. Lond.	t. 1. p. 831
<i>Ischiadicum</i> ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Ad Ischiadicos dolores</i> , ex Bierl.	t. 1. p. 841
<i>Laterale</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 838
<i>De Linamento Rambaudi</i> , ex Pharm. Bauder. t. 1.	p. 831.
<i>Magneticum Angel. Sala</i> ex Pharm. Aug.	ibidem
<i>Malaeticum cum gummat.</i> ex Ph. Aug.	ibid.
sine gummat. ex eod. Ph.	ibid.
<i>Mammillare</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 838
<i>Manus Dei</i> , ex Ph. D. Le Mort	ibid.
<i>De Marcasita</i> D. Donzelli	t. 1. p. 831
<i>De Mastiche</i> ex Ph. Lond.	ibid.
<i>Matricale</i> D. à Mynsicht	t. 1. p. 844
D. Renodæi	t. 1. p. 831
<i>de Meliloto Mesue</i> , ex Ph. Aug.	ibid.
Simplex, ex Ph. Lond.	t. 1. p. 832
<i>Mylæonitæ</i> ex Ph. Lond.	ibid.
<i>De Minio</i> D. Goddard	t. 1. p. 839
Compositum Ph. Lond.	t. 1. p. 832
simplicius ex ead. Ph.	ibid.
costum ex D. à Mynsicht	t. 1. p. 844
Nicolai Massa ex Ph. Aug.	t. 1. p. 832
Vigonis ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Miraculosum</i> ex D. Schultzio	ibid.

<i>Emplastrum Mitigativum emolliens, sedans</i> , ex D. à Mynsicht	t. 1. p. 844
<i>De Mucilagibus simplex</i> , ex D. Lemery t. 1.	p. 832.
ex Ph. D. Le Mort	t. 1. p. 837
<i>Gummatum Textoris</i>	t. 1. p. 832
<i>Mundificativum</i> ex Schrod.	ibid.
<i>Narcoticum</i> D. à Mynsicht	t. 1. p. 845
<i>Nervinum Vigonis</i> ex Ph. Aug.	t. 1. p. 832
ex Ph. Indic. Grimom.	t. 1. p. 840
<i>Nicotiana</i> D. Neandri, ex Ph. Baud.	t. 1. p. 832
<i>Nigrum</i> ex Ph. Aug.	ibid.
Ad fracturas & contusiones	t. 1. p. 842
Ad Nodos Venereos emolliendos, & sanandos. ex Collect. Bierl.	ibid.
& podagricos, ex Hoffm.	t. 1. p. 839
<i>Norimbergensis vera descriptio</i> ex Authoris Erenfingeri manuscripto	t. 1. p. 843
S. I. ex Hoffm.	t. 1. p. 840
<i>Nuchale</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 838
<i>Opium</i> ex Ph. Bat.	ibid.
<i>Opodeltoch</i> D. Mindereri ex Ph. Aug.	t. 1. p. 833
ex Pharm. Norib.	ibid.
<i>Pro ossibus fractis</i> Vigonis	ibid.
Cnæffelii	t. 2. p. 1138
<i>Oxyprocum commune</i> Nicolai, ex Pharm. Aug.	ibidem
Vigonis, vide Emplastum pro ossibus	
<i>Paralyticum</i> Ph. Bat.	t. 1. p. 838
<i>De Pice diaphoreticum</i> ex D. à Mynsicht t. 1.	p. 844
<i>Podagricum</i> Ph. Bat.	t. 1. p. 838
& Nervinum ex Pharm. Reg. Zvvelferi	t. 1. p. 833.
Ad Punctionem pedis equini D. Charraz t. 1.	p. 834
<i>de Ranis Vigonis cum mercurio</i> , ex Pharm. August.	ibidem
<i>de Rhabbarbo Manardi</i> ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Sacrum, sive diadictamnium Galeni</i> , ex Pharm. Lond.	ibid.
<i>de Sandyce</i> ex Ph. Lond.	ibid.
<i>Santalinum, Olim Incognitum dictum</i> , ex Ph. Aug.	ibidem
<i>de Sapone</i> ex Ph. Lond.	ibid.
<i>Salurnium</i> ex Ph. Aug.	ibid.
ex Ph. Bat	t. 1. p. 838
ex D. à Mynsicht	t. 1. p. 845
<i>Ad Scirrhus S. Clossai</i> , ex Ph. Schrod.	t. 1. p. 834
<i>Scorbuticum</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 838
<i>ad Scrophulas</i> D. Ios. M. ex Hoff.	t. 1. p. 840
<i>Sicyonium</i> ex Ph. Lond.	t. 1. p. 834
<i>Sine pari</i> ex Ph. Lond.	ibid.
<i>Smeiticum</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 838
<i>Solare</i> ex Ph. Bat.	ibid.
<i>Spasmicum</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 839
<i>è Spermate Ceri</i> ex Ph. Aug.	t. 1. p. 834
ex D. à Mynsicht	t. 1. p. 846
<i>Ranarum</i> , ex Ph. Aug.	t. 1. p. 834
<i>Spleneticum Fabrii. ab Aquapend.</i> ex Pharm. Aug.	t. 1. p. 835.
ex collect. Bierling.	t. 1. p. 842
Pauli Jenischii	t. 1. p. 843
cum Succo Nicotiana D. Landgravii	ibid.
D. à Mynsicht	ibid.
ex Ph. Reg. Zvvelf.	t. 1. p. 835
<i>Strophylax</i> ex Ph. Lond.	ibid.
<i>De stercore columbino</i> ex Ph. Norib.	ibid.
<i>Sticticum Crollii</i> ex Ph. Aug.	ibid.
ex Ph. D. Le Mort	t. 1. p. 838
<i>Sticticum</i> D. à Mynsicht	t. 1. p. 844
Aliud ejusd.	ibid.
<i>Stomachicum</i> ex Ph. Ind. Grimom.	t. 1. p. 840

I N D E X R E R U M.

<i>Emplastrum Stomachicum Kestii</i>	t.1.p.843	<i>Epicarpia</i>	
Laurentii	ibid.	<i>Epicarpium febrifugum</i>	t.1.p.853
ex Ph.D. Le Mort	t.1.p.837. & 838	<i>Epiceraftica Medicamenta</i>	ibid.
magiftrale ex Ph. Lond.	t.1.p.835	<i>Epileptica Medicamenta, vide sub Titulo Cephalica.</i>	ibid.
D. à Mynficht	t.1.p.843	<i>Epilepfia cura per acidulas vegetabiles</i>	t.2.p.553
de Tacamahaca, ex Schrod.	t.1.p.835	<i>Epimedium</i>	t.1.p.853
Regium ex Ph. Reg. Zvvelf.	t.1.p.836	<i>Epifpafica, vid. Aitrakentia</i>	ibid.
Aliud ex Ph. Reg. Zvvelf.	t.1.p.835	<i>Ephema quid fit</i>	ibid.
ad Strumas ex Ph. Bat.	t.1.p.839	<i>Epihematum exempla varia proponuntur</i>	t.1.p.
Stypticum de Catechu	t.2.p.972	855. & feq.	
de Symphyto ex Ph. Norimb.	t.1.p.836	<i>Epithymum, vide Cufcuta minor</i>	
ad Hernias ex Ph. Reg. Zvvelf.	ibid.	<i>Epulonica Medicamenta, quid & quanam fint</i>	t.1.
Synanchicum ex Ph. Bat.	t.1.p.839	p. 860	
Talpinum ex D. à Mynficht	t.1.p.845	<i>Equicervum, vide Alce.</i>	
ad Testium inflammationem ex Bierling.	tom.1.	<i>Equisetum</i>	
p.842		<i>Equus, ejus partes officinales, & preparata varia</i>	t.1.p.861
Tetrapharmacum Galeni, ex Ph. Aug.	t.1.p.836	& feq.	ibid.
Tibiale ex Ph. Bat.	t.1.p.839	<i>Equus marinus, vide Hippopotamus.</i>	
Tonforis ex Ph. Aug.	t.1.p.836	<i>Eradicantia, vide Ecrifotica.</i>	
ad Tophos Podagricos ex Hoffm.	t.1.p.839	<i>Erica</i>	
Venercos diffolvendos ex eodem	ibid.	<i>Erigeron, vide Senecio.</i>	t.1.p.862
Ulceratos, ex eodem	ibid.	<i>Erigeron marinum, vide Jacobea.</i>	
ex Schrodoro	t.1.p.836	<i>Erinaceus, vide Echinos.</i>	
Triapharmacum Mefue ex Ph. Aug.	ibid.	<i>Errhina, & piarmica Medicamenta quid fint</i>	ibid.
ad Tumores canerosos prohibens ne letius ulcera	t.1.p.839	<i>Errhinorum exempla varia</i>	ibid. & feq.
ferpant ex Hoffm.	ibid.	<i>Errhinum Cnæffelianum in fuffufione oculorum</i>	t.2.
Scrophulofos, ex Scirrholofos ejusd.	ibid.	p.490	
Vermifugum ex Ph. Bat.	ibid.	<i>Eruca plantia</i>	
contra Vermes Infantum ex Bierling.	t.1.p.843	<i>Eruca Animal</i>	t.2.p.865
contra Verrucas expertum Timæi	t.1.p.842. & 843	<i>Ervilia</i>	ibid.
Veficatorium ex Ph. Aug.	t.1.p.836	<i>Ervum, vid. Orobus.</i>	ibid.
Cnæffelii.	t.2.p.1138	<i>Ervum Sylvestre, vide Astragaloides.</i>	
Uluenfium ex Pharm. Reg. Zvvelf.	t.1.	<i>Eryngium</i>	
p.836		<i>Eryfinum</i>	t.1.p.866
Aliud ex Ph. Reg. Zvvelf.	ibid.	<i>Eriurodanum, vide Rubia Tinctorum.</i>	ibid.
In Vigiliis Michael.	t.1.p.839	<i>Efcaloia, vide Alcalonia.</i>	
Ad Ulcera maligna ex Bierling.	t.1.p.842	<i>Efcharotica Medicamenta</i>	t.1.p.867
Uulnerarium ex Hoffm.	t.1.p.840	<i>Effentia quid fit</i>	ibid.
Paracelfi, ex Ph. Bauder.	t.1.p.836	<i>Effentia Absinthii ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.869
& Peftorale, ex Ph. Reg. Zvvelf.	ibid.	compofita, ex Rolfincio	t.1.p.872
ad Renes exulceratos, ex eodem	t.1.	<i>Alexipharmaca ex Ph. Reg. Zvvelf.</i>	t.1.p.869
p.837		<i>Ambra gryfea</i>	t.1.p.878
Verum, ex eodem	ibid.	<i>Mofchata in forma ficca</i>	t.1.p.875
Filii Zacharia, i.e. Rhafis, ex Mefu. ex Phar. Aug.		Mindereri	t.1.p.869
ibidem		<i>Liquida ex Ph. Norimb.</i>	ibid.
<i>Emplastra itidem varia ex superioribus emplastris ad</i>		<i>Sicca ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>varios morbos, ex variis Authoribus compofita</i>	t.1.	<i>Mofchata ex Cnæffelio</i>	t.1.p.637
p.841. & feq.		<i>Anagallidis, contra Melancholiam & Maniam</i>	
<i>Emulfo quid fit, & quomodo paretur</i>	tom.1.p.846.	ex Rolfincio	t.1.p.873
& feq.		<i>Antimonii</i>	t.1.p.876
<i>Emulfionum exempla varia proponuntur</i>	t.1.p.848 & feq.	Cnæffeliana	t.1.p.634
<i>Enaimos medicamentum quid fit</i>	t.1.p.852	<i>Antipodagrica ex Bierling.</i>	t.1.p.879
<i>Encaustum</i>	ibid.	<i>Antifcorbutica</i>	ibid.
<i>Encausta ex qua materia fiant</i>	t.2.p.1063	<i>Aperitiva D. M. ex Bierlingio</i>	ibid.
<i>Encaustum caruleum</i>	ibid. & feq.	<i>Aphrodisiaca Wedelii</i>	t.1.p.869
Flavum	t.2.p.1062. & feq.	<i>Argenti</i>	t.1.p.875
Lactis instar album	t.2.p.1061	<i>contra Arbritidem vagam Scorbuticam</i>	t.1.
Nigrum	ibid.	p.871	
Purpureum	t.2.p.1061. & feq.	<i>ad Audium D. M. ex Bierling.</i>	t.1.p.879
Turcoidis colorem referens	t.2.p.1061	<i>Effentia Auri varia</i>	t.1.p.875
Violaceum	t.2.p.1062	<i>Effentia Baccarum Juniperi ex Rolfincio</i>	t.1.p.873
Viride	t.2.p.1061	<i>Benzoin. compofita D. Jungken.</i>	t.1.p.869
<i>Endivia, vide Cichorium</i>		Cofmetica, Rolfincii	t.1.p.874
<i>Enema, vide Clyfter.</i>		<i>Bezoardica, ex Timæo</i>	t.1.p.873
<i>Ens Veneris Boylei ex Lex. Pharm. D. Jungk.</i>	tom.1.	<i>Cardiaca Ph. Indic. Grimom.</i>	t.1.p.878
p.853		<i>Carminativa ex Bierlingio</i>	t.1.p.879
<i>Ens primum Tilia ex Cnæff.</i>	t.1.p.532	ex Timæo	t.1.p.871
<i>Entalium, vide Pantalium.</i>		<i>Castitatis ex Bierlingio</i>	t.1.p.879
<i>Entula campana</i>	t.1.p.853	<i>Effentia Castorei ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.869
<i>Enula Egyptia, vide Nepenthe.</i>		Sennerti	ibid.
<i>Epatica, vide Hepatica.</i>		<i>Catechu ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Ephemeron</i>	ibid.	<i>Centaurii minoris Dioscoridis</i>	t.1.p.872
		<i>Cephalica</i>	

INDEX RERUM.

<i>Essentia Cephalica</i> ex Ph. Aug.	t. 1. p. 869	<i>Essentia Sacchari Beguini</i> , ex Ph. Bat.	t. 1. p. 878
<i>Ambrata Cnœffellii</i>	t. 1. p. 529	<i>Sacchari rubra</i> , ex Bierling.	t. 1. p. 880
<i>composita</i> , ex eodem	t. 1. p. 328	<i>Sanguinis Humani</i> , ex eodem	ibid.
<i>Cinnamomi</i> ex Ph. Ind. Guimom.	t. 1. p. 878	<i>Saryionis</i> ex eodem	t. 1. p. 879
<i>Citri liquida</i> ex Ph. Aug.	t. 1. p. 870. item	ex Ph. Norimberg.	t. 1. p. 870
t. 2. p. 204		Paracelsi	t. 1. p. 873
<i>Sicca</i> ex Ph. Aug.	ibid. & t. 2. p. 204	<i>Scorzoneræ ex radicibus</i>	ibid.
<i>Corallina D. Cnœffellii</i>	t. 1. p. 637	<i>Silicum</i>	t. 1. p. 878
<i>Coralliorum liquida</i> Cnœffel.	ibid.	<i>Essentia Solis varia</i>	t. 1. p. 875
<i>Sicca</i> , ejusdem	ibid.	<i>Essentia Succini</i>	t. 1. p. 877
<i>Varia ex variis Authoribus</i>	t. 1. p. 878	<i>Essentia, seu balsama sulphuris varia</i>	ibid.
<i>Cordialis</i> Cnœffellii	t. 1. p. 637	<i>Essentia Tartari composita</i>	t. 1. p. 874
<i>odorifera ejusdem</i>	t. 1. p. 638	<i>Simplex</i>	ibid.
D de Bernitz	ibid.	<i>Antiarthritica, & Lithonriptica</i>	ibid.
<i>Corticum aurantiorum liquida</i> ex Pharm. August.		<i>Terra Catechu Sicca.</i>	t. 2. p. 972
t. 1. p. 869		<i>Traumatica P. A. R.</i> ex D. Jungken	t. 1. p. 871
<i>Sicca</i> ex eadem Ph.	t. 1. p. 870	Vvedelii	ibid.
<i>Corticis Febrifugi</i>	t. 1. p. 873	<i>Trifolii fibrini P. A. R.</i> ex D. Jungken.	ibid.
<i>Cosmetica Benzoin. Rolfinc.</i>	t. 1. p. 874	<i>contra Vermes</i> ex Bierling.	t. 1. p. 879
<i>Croci</i> ex Rolfinc.	t. 1. p. 872	<i>Viperarum</i> , ex eodem	ibid. & t. 2. p. 1032
<i>ad fluxum album</i> , ex Bierling.	t. 1. p. 879	<i>Virioli martis antiscorbutica</i> Vvedelii	t. 1. p. 871
<i>Essentias ex variis floribus, Herbis & fructibus parandi</i>		<i>Vierina</i> Cnœffellii	t. 2. p. 1132
<i>modus</i>	t. 1. p. 871. 872. 873. & seq.	<i>Vulneraria</i>	t. 1. p. 874 & 879
<i>florum</i> ex Cnœffellio	t. 2. p. 114	<i>Zedoaria</i> , ex Timæo	t. 1. p. 871
<i>Essentia Galanga</i> ex Timæo	t. 1. p. 871	<i>Esula</i> , vid. Timæus	t. 1. p. 880
<i>Gemmarum</i> ex Bierling.	t. 1. p. 880	<i>Evaporatio, Evaporare</i>	ibid.
<i>Granorum Kermes</i> ex Cnœffel.	t. 1. p. 637	<i>Evonymus</i>	ibid.
<i>Hepatica</i> ex Bierling.	t. 1. p. 879	<i>Eupatorium verum</i>	t. 1. p. 881
<i>Hypochondriaca Cassellana</i> , ex Bierling.	t. 1.	<i>Cannabinum</i>	ibid.
p. 810		<i>Euphorbium</i>	t. 1. p. 882
ex Timæo	t. 1. p. 871	<i>Euphorbii correctiones præstantissimæ</i>	tom. 1.
<i>contra Icterus</i> ex Bierling.	t. 1. p. 879	p. 883	
<i>Kermes</i> , ex granis	t. 1. p. 637	<i>Euphorbii extractum, & preparata reliqua</i>	ibid.
<i>Lapidum Cancrorum fluviatilium</i>	t. 1. p. 875	<i>Euphrasia</i>	ibid.
<i>Lapidis Nephritici</i>	t. 1. p. 878	<i>Exacinare</i>	t. 1. p. 884
<i>Porcini</i>	ibid.	<i>Exaltare</i>	ibid.
<i>Lignorum</i> ex Pharm. Bat.	t. 1. p. 870	<i>Excipulum</i> , vid. Instrumenta Pharmaceutica.	
<i>Ligni febrifugi</i>	t. 1. p. 873	<i>Expressum, Expressio, & exprimere</i>	ibid.
<i>Sancti Gummosi</i>	ibid.	<i>Extergentia</i> , vid. Detergentia.	
<i>Liliorum convallium</i> ex Rolfinc.	t. 1. p. 872	<i>Extinctio</i>	ibid.
<i>Lithonriptica</i> Cnœffel.	t. 2. p. 444	<i>Extractio vid. solutio.</i>	
<i>Luna</i>	t. 1. p. 875	<i>Extractum quid sit, & quomodo paratur</i>	ibid. & seq.
<i>Malva externa ex floribus</i> , ex D. Cnœffellio		<i>De Extrahendorum Menstruis variis</i>	t. 1. p. 886.
t. 1. p. 914.		& seq.	
<i>Martis composita</i> Cnœffel.	t. 1. p. 902	<i>Extractum Absinthii</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 900
<i>Martis aperiens</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 870	<i>Agarici</i> ex Pharm. Bat.	t. 1. p. 892
<i>liquida</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>compositum</i> , ex Phar. Bat.	ibid.
<i>ex regulo stellato</i>	t. 1. p. 879	<i>Alexiterium D. D. Z.</i> ex Hoffm.	t. 1. p. 901
Hartmanni	t. 1. p. 875	<i>Albandal</i> ex Ph. Bat.	t. 1. p. 900
<i>ex limatura & ammom. D. à Myn-</i>		<i>Aluës</i> ex Phar. Aug.	t. 1. p. 892
<i>sicht</i>	t. 1. p. 876	<i>Angelica sudorificum</i> , ex collect. Chym. Leyd.	ibid.
<i>ex viriolo martis ope terra solata</i>		<i>Antiarthriticum G. P.</i> ex Hoffm.	t. 1. p. 901
<i>variari</i>	ibid.	<i>Anticolicum specificum</i> ex D. à Mynsicht.	t. 1. p. 904
<i>Tartarisata</i>	ibid.	<i>Antiepilepticum</i> ex Ph. Reg. Zvvelferi.	t. 1. p. 903
<i>Nigra cum succis acidis, aceto, &</i>		<i>Aniusebrile</i> , ex D. Le Mort	ibid.
<i>succis acetosa, & pomorum</i>		ex Ph. Reg. Zvvelferi	ibid.
t. 1. p. 875. & seq.		<i>Antipestilentiale T. d. B. à D. D. J. R.</i> ex Hofman.	
<i>Varia</i>	t. 1. p. 521. & seq.	t. 2. p. 901	
<i>Adstringens</i>	t. 1. p. 876	D. Le Mort.	t. 1. p. 896
<i>Ad membra</i> ex Ph. Ind. Guimom.	t. 1. p. 878	Schroderi	t. 1. p. 895
<i>Moschi & Ambra liquida.</i>	t. 1. p. 875	<i>Tychonis de Brahe</i> , ex Schrodero	t. 1.
<i>Ambrata</i> ex Cnœffellio	t. 1. p. 637	p. 896	
<i>Mumia Egyptiaca</i>	t. 1. p. 874. & 991	ex Pharm. Reg. Zvvelferi	ibid.
<i>Myrrha</i> ex D. Jungken	t. 1. p. 870	<i>Aperitivum D. Rothii</i> , ex Bierling.	t. 1. p. 902
<i>Ononidis</i> , ex Timæo	t. 1. p. 871	<i>Aurelia Hadrianea dictum</i> , ex D. à Mynsicht.	ibid.
<i>Pectoralis</i> ex D. Jungken	t. 1. p. 870	<i>Benedictum</i> , ex Hoffman.	t. 1. p. 898
<i>Paeonia</i> ex Radicibus, Rolfinc.	t. 1. p. 873	<i>Berzardicum solare</i> , ex D. à Mynsicht.	t. 1. p. 902
<i>Prunella</i> ex floribus, ex D. Cnœffel.	t. 1. p. 914	<i>Quercetani</i> , ex Schrodero	t. 1. p. 892
<i>Purificans</i> Claudi	t. 1. p. 870	<i>Catechu</i>	t. 1. p. 972
<i>Essentia Purgantium vegetabilium</i>	t. 1. p. 874	<i>Catholicon Arnici</i> , ex Bierling.	t. 1. p. 901
<i>Essentia Reguli Martis Stellati</i> , ex Bierling.	t. 1. p. 879	ex Pharm. Aug.	t. 1. p. 892
<i>Rosella</i> ex Rolfincio	t. 1. p. 872	<i>Francofurtense</i>	t. 1. p. 893
		<i>Extractum</i>	

INDEX RERUM

<i>Extractum Catholicon Sennerti</i>	t.1.p.898	<i>Extractum Uterinum specificum D. à Myns.</i>	t.1. p.904
D. VVeickard	t.1.p.899	<i>Extrahentia, vide Menstruum</i>	
<i>Cephalicum nervinum ex Hoffm.</i>	t.1.p.900	<i>Exuvia serpentum, vide Serpens.</i>	
Aliud ex eod.	ibid.		
<i>Chalybis ex Pharm. Bat.</i>	ibid.		
ex Ph. Norib.	t.1. p.893		
<i>Chalybeatum magnum ex Schrod.</i>	t.1.p.892		
Schvvallenbergeri	t.1. p.902		
<i>Cholagogum Quercetani ex Ph. Aug.</i>	t.1. p.893		
<i>Diacaribami Andernaci, ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.892		
<i>Diacitri Reusneri, Ph. Aug.</i>	t.1. p.893		
<i>Diapœonias Mindereri ex Ph. Aug.</i>	t.1. p.895		
<i>Diasena D. à Mynsicht</i>	t.1. p.903		
<i>Diateffaron ex Ph. Bat.</i>	t.1. p.900		
<i>Drasticum ex Ph. Bat.</i>	ibid.		
<i>Ecephræticum ex Ph. Bat.</i>	ibid.		
<i>Emericum specificum, ex D. à Mynsicht</i>	t.1.p.903		
<i>Esula minoris Quercetani</i>	t.1.p.880		
Rulandi	ibid.		
Salæ	ibid.		
<i>Febrifugum ex Ph. Bat.</i>	t.1.p.900		
<i>Fellis ex Ph. Bat.</i>	ibid.		
<i>Gummi gorta rosatum, ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.893		
<i>Hellebori nigri purgans Petri Fabri</i>	t.1.p.899		
<i>Herbipolensium nobile, ex Bierl.</i>	t.1. p.901		
<i>Holagogum Andernaci ex Ph. Aug.</i>	t.1. p.894		
<i>Hydragogum ex Ph. Reg. Zvvelf.</i>	ibid.		
<i>Hydropicum specificum D. à Mynsicht</i>	t.1.p.903		
<i>Hystericum ex Schrodero</i>	t.1. p.894		
<i>Ictericum ex Ph. Bat.</i>	t.1.p.900		
<i>Malta compositum ex Ph. Aug.</i>	ibid.		
<i>Marcocostinus Mindereri ex Pharm. August.</i>	t.1. p.894		
<i>Matricale S. Gloss. ex Schrod.</i>	ibid.		
<i>Melampodii ex Ph. Bat.</i>	t.1. p.900		
<i>Melanagogum Quercet. ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.894		
<i>In mensum suppressione, ex Bierling.</i>	t.1.p.901		
<i>Nepenthes Aureum ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.894		
<i>Nobile Herbipolensium, ex Bierling.</i>	t.1.p.901		
<i>Seu Laudanum Opiatum ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.894		
<i>Cydoniatum ex Pharm. August.</i>	t.1. p.895		
D. Langelotti	ibid.		
Minerale	t.1.p.907		
ex D. à Mynsicht	t.1.p.904		
ex Ph. Reg. Zvvelferi	t.1.p.895		
<i>Extracti seu laudani Opii varia ad varios affectus</i>	p.904. & seq.		
formula	t.1. p.899		
<i>Extractum Panchymagogum Crollii</i>	ibid.		
Hartmanni	t.1. p.895		
ex D. Lemery	t.1. p.903		
D. à Mynsicht	t.1. p.900		
<i>Paregoricum ex Ph. Bat.</i>	ibid.		
<i>Pectorale Ph. Bat.</i>	ibid.		
<i>Peticum Ph. Bat.</i>	ibid.		
<i>Phlegmagogum Quercet. ex Ph. Aug.</i>	t.1. p.896		
<i>Pilularum variarum ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.896		
<i>Polychrestum ex D. à Mynsicht.</i>	t.1. p.903		
<i>Pulmenum, ex Schrodero</i>	t.1. p.896		
<i>Purgans Arnisai M. R. Dan. ex Bierling.</i>	t.1. p.909.		
<i>Magenbucchii, ex eodem</i>	t.1.p.902		
<i>Umbilicale D. Doreri</i>	ibid.		
<i>Satyrri compositum ex Ph. Schrod.</i>	t.1.p.897		
<i>Scammonii</i>	t.2. p.797. & seq.		
<i>Scorzonera compositum Magni Hetruriz Ducis,</i>	t.1.p.897		
<i>Sedativum Generale D. Cncæffellii</i>	t.1.p.536		
<i>Extracta Theriaca varia ex Ph. Schrod.</i>	t.1.p.897		
<i>Extractum contra Vermes, ex Bierlingio</i>	t.1.p.901		
egregium D. Le Mort	t.1. p.897		
<i>Umbilicale purgans D. Doreri</i>	t.1.p.902		
		<i>Faba</i>	t.1.p.908
		<i>Faba purgatrix</i>	t.1.p.909
		<i>Fabago</i>	ibid.
		<i>Faba inversa, vid. Telephium</i>	
		<i>Faba suilla, vide Hyosciamus</i>	
		<i>Fabaria, vide Telephium</i>	
		<i>Facultas, vide Qualitas</i>	
		<i>Faces Vini, vide sub titulo Vinum</i>	
		<i>Facula quid sit</i>	ibid.
		<i>Radicis Ari ex Ph. Aug.</i>	t.1.p.910.
		<i>Fax quid sit</i>	ibid.
		<i>Fagopyrum, vide Fegopyrum</i>	
		<i>Fagus</i>	ibid.
		<i>Falco Avis</i>	ibid.
		<i>Farcire quid sit</i>	ibid.
		<i>Farraria, vide Tussilago</i>	ibid.
		<i>Farina quid sit</i>	ibid.
		<i>Farina in Officiis usitatiores que sint</i>	t.1. p.911
		<i>Faseolus, vide Smylax Hortensis</i>	
		<i>Febrilia Medicamenta quoniam sint</i>	ibid.
		<i>Febrilia medicamenta specifica D. Cncæffellii</i>	ibidem
		& seqq.	
		<i>Febrim quartana, & tertiana curandi methodus ex</i>	
		D. Cncæffell.	t.1. p.912. & 913
		<i>Fegopyrum</i>	t.1. p.915
		<i>Fel terra, vid. Centaurium minus</i>	
		<i>Felis Animal</i>	ibid.
		<i>Felis partes officinales, & præparata</i>	ibid.
		<i>Felis odorata, vid. Canis Zibethicus</i>	
		<i>Fermentare, Fermentatio, Fermentum</i>	t.1.p.916
		<i>Ferraria, vide Scrophularia</i>	
		<i>Ferretum Hispanicum vitro colorando, ut fiat tom. 2.</i>	
		p.1049.	
		<i>Ferrum quid sit</i>	t.1. p.917.
		<i>Ferri natura & proprietates</i>	t.2. p.318
		<i>Ferri purgatio à sordibus superficialibus</i>	t.1.p.918
		<i>Gradatoria, unde Chalybs</i>	ibid.
		<i>Calcinatio, unde Crocus</i>	ibid.
		<i>Fusoria, unde Crocus Aperitivus</i>	ibid.
		<i>Cementatoria, unde Vitriolum martis</i>	ibid.
		<i>Immersiva</i>	ibid.
		<i>Vaporesa</i>	t.1.p.919
		<i>Illinitionis</i>	ibid.
		<i>Ferri in chalybem mutatio</i>	t.2.p.321
		<i>Ferri in as transmutatio</i>	t.2.p.321
		<i>Ferri fodina Ilva describuntur</i>	t.2. p.320
		<i>Ferri volatilisatio, unde aqua, spiritus, & oleum</i>	t.1. p.919.
		<i>Exunctio, unde Tinctura varia</i>	t.1.p.920 & seq.
		<i>Sublimatio, unde Flores</i>	t.1. p.923
		<i>Salificatio, unde Salia varia</i>	ibid. & seq.
		<i>Liquatio</i>	t.1.p.924
		<i>Ferrum diaphoreticum ex Ph. Bat.</i>	ibid.
		<i>Potabile ex Ph. Bat.</i>	ibid.
		<i>Ferri præparandi & temperandi ratio</i>	t.2. p.319
		<i>Ferrum Equinum</i>	t.1. p.924
		<i>Ferruminatrix, vide Sideritis</i>	
		<i>Ferula</i>	ibid.
		<i>Festuca</i>	t.1. p.925.
		<i>Fiber, vid. Castor</i>	
		<i>Ficaria, vide Scrophularia</i>	
		<i>Ficaria Herba, vide Clymenum</i>	
		<i>Ficedula</i>	ibid.
		<i>Fistile, vid. Instrumenta Pharmaceutica</i>	
		<i>Ficus</i>	ibid.
		<i>Ficus Indica, vid. Oponitium</i>	
		<i>Ficus</i>	

I N D E X R E R U M

<i>Ficus Aegyptia</i> , vid. Sycomorus	
<i>Ficus Infernalis</i> , vid. Ricini Semen	
<i>Ficula</i> , vid. Polypodium	
<i>Filago</i> , vid. Gnaphalium	
<i>Filicula</i> , vid. Adiantum	
<i>Filipendula</i>	t. 1. p. 926
<i>Filius ante patrem</i> , vid. Tussilago	
<i>Filix</i> , ejusque species	ibid. & seq.
<i>Filtrare</i> , & <i>Filtratio</i> , quid sit	t. 1. p. 927
<i>Fimus</i> , vid. Stercus	
<i>Fimus equinus</i>	t. 1. p. 928
<i>Fistici</i> , vid. Pistacia	
<i>Fixare</i> , & <i>Fixatio</i> , quid sit	ibid.
<i>Flammula Iovis</i> , vid. Clematidis	
<i>Flatus discutiendus</i> , vid. Carminativa	
<i>Flos</i> quid sit	t. 1. p. 929
<i>Flores officinales varii describuntur</i>	ibid.
<i>Flores Sal. Armoniaci</i>	t. 1. p. 1005
<i>Flos Adonis</i>	t. 1. p. 929
<i>Flos Amoris</i> , vid. Amaranthus	
<i>Flos Chrystalli</i> , vid. Azungia vitri	
<i>Flos Aeris</i> , vid. Squama Aeris, sub voce Metallica	
<i>Flos Frumenti</i>	ibid.
<i>Flos maris</i> , vid. Spuma maris	
<i>Flos passionis</i>	t. 1. p. 930.
<i>Flos Sancti Jacobi</i> , vid. Jacobæa	
<i>Flos</i> , & <i>spuma Nitri</i> , vid. Aphronitrum	
<i>Flos Regius</i> , vid. Calcattippa	
<i>Flos Salis</i> , vid. sub titulo Sal	
<i>Flos Solis</i> , ejusque species	ibid.
<i>Flos trinitatis</i> , vid. Jacca	
<i>Flores preparati</i> , quid sint	t. 1. p. 931
<i>Flores preparati officinales</i>	t. 1. p. 932
<i>Fœmina</i> , vid. Homo	
<i>Fœniculum</i>	ibid.
<i>Fœniculum marinum</i> , vid. Crythamum	
<i>Fœniculum porcinum</i> , vid. Peucedanum	
<i>Fœniculum tortuosum</i> , vid. Sefeli	
<i>Fœnum Camalorum</i> , vid. Schœnanthum	
<i>Fœnum græcum</i>	t. 1. p. 933
<i>Fœtum conservantia</i> , vid. Uterina	
<i>Folium</i> quid sit.	t. 1. p. 934
<i>Folia officinalia</i> , vid. Herba officinales	
<i>Folia Orientalia</i> , vid. Senna	
<i>Folium Indum</i> , vid. Malabathrum	
<i>Folium Leonis</i> , vid. Leontopetalum	
<i>Foliculus</i> quid sit	ibid.
<i>Fomentatio</i> quid sit, & quomodo fiat	ibid.
<i>Fomentationes varia</i> , pro variis affectibus describuntur	ibid. & seq.
<i>Fontalis</i> , vid. Potamogeton	
<i>Formica</i>	t. 1. p. 935
<i>Ex formicis officinalia</i> , & preparata	t. 1. p. 936
<i>Fornax</i> , sive <i>furnus</i> , vid. sub titulo Ignis	
<i>Fossilia</i>	ibid.
<i>Forus</i> , vid. Fomentatio	
<i>Fragaria</i>	ibid.
<i>Frangula</i> , vid. Frangaria	
<i>Frambesia</i> , vide <i>Mora Item Rubus</i>	
<i>Frangula</i>	t. 1. p. 937
<i>Fraxinella</i>	ibid.
<i>Fritta crystalli</i> , vulgo <i>Bollito dicta</i> , quomodo fiat t. 2.	
	p. 1046.
<i>Fritillaria</i>	t. 1. p. 938
<i>Frixio</i> , vid. Affatio	
<i>Frontalia</i> , eorumque exempla	ibid. & seq.
<i>Frontatum</i>	t. 1. p. 939
<i>Fructus</i> , quid sint, iique in officinis usitatores	ibid.
<i>Fruentum</i>	ibid.
<i>Frutex</i>	ibid.
<i>Fu</i> , sive <i>Phu</i> , vide <i>Valeriana</i>	
<i>Fucus</i> , Animal	ibid. & seq.
<i>Fucus marinus</i> , vid. Algæ	
<i>Fuga Damonum</i> , vid. Hypericum	
<i>Fuligo</i> , ex eaque preparata	t. 1. p. 940
<i>Fulminatio</i> , vide <i>Detonatio</i>	
<i>Fumaria</i> , ejusque species	ibid. & seq.
<i>Fumigatio</i> , <i>Fumare</i>	t. 1. p. 942
<i>Fundus plantæ</i> quid sit	ibid.
<i>Fungus</i>	ibid.
<i>Fungorum historia</i> ex Kirkeo	ibid.
<i>Fungi officinales quinam sint</i>	ibid.
<i>Fungus marinus</i> , vid. Spongia	t. 1. p. 943
<i>Funis Arborum</i> , vid. Smylax levis	
<i>Furnus</i> , vide <i>Ignis</i>	
<i>Furfur</i> quid sit	ibid.
<i>Fusco</i> quid sit	ibid. & seq.
G.	
<i>Gagates</i>	t. 1. p. 945
<i>Galaclites</i> , vid. sub titulo Lapis	t. 2. p. 89
<i>Galanga</i>	ibid.
<i>Galbanum</i>	t. 1. p. 946.
<i>Galbani natalia</i> , vid. sub titulo Ferula	
<i>Galbulus</i> , vid. Cupressus	
<i>Galega</i>	t. 1. p. 946
<i>Galena</i> , vid. Molybdena	
<i>Galeopsis</i>	t. 1. p. 947.
<i>Gallera</i> , <i>Galla Cupressi</i> , vid. Cupressus	
<i>Galeria</i> , vid. Alauda	
<i>Galla</i> , vid. Quercus	
<i>Gallina</i> , & <i>Gallus</i>	t. 1. p. 947. & seq.
<i>Gallium</i>	t. 1. p. 949
<i>Gallitricum</i> , vid. Horminum	
<i>Gallus</i> , vid. Gallina	
<i>Gargarisma</i> quid sit	ibid. & seq.
<i>Gargarismatum in variis affectibus exempla varia</i> t. 1.	
	p. 950.
<i>Gargarismi variorum Authorum pro pluribus Affectibus describuntur</i>	t. 1. p. 951. & seq.
<i>Garum</i>	t. 1. p. 954.
<i>Gariophyllata</i> , vide <i>Caryophyllata</i>	
<i>Gariophylli</i> , vide <i>Cariophylli</i>	
<i>Gataria</i> , vid. Mentha	
<i>Gelatina</i> quid sit, & quomodo paratur	ibid. & seq.
<i>Gelatina Cydoniorum simplex Mesue ex Pharm. Aug.</i>	
	t. 1. p. 955.
<i>Aromatica Nicolai</i> , ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Laxativa cum Turbit</i>	t. 2. p. 800
<i>Purgans ex Zvvelsero</i>	t. 1. p. 955
<i>Corroborans ex Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Ichthyocolla ex Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Ossium de Corde Cervi</i>	ibid.
<i>Gemma Plantæ</i> , quid sit	ibid.
<i>Gemma Lapis</i> , vid. Lapis	t. 2. p. 91 & seq.
<i>Gemmarum preparationes quæ sint, & quomodo fiant</i> t. 2.	
	p. 106. & seq.
<i>Gemmarum adulteria varia</i>	t. 2. p. 95. & seq.
<i>Geniculum</i> quid sit	t. 1. p. 955
<i>Geniculata</i> , vid. Sigillum Salomonis	
<i>Genista</i> , ejusque species	ibid. & seq.
<i>Genistella</i>	t. 1. p. 956
<i>Gentiana</i>	ibid.
<i>Geranium</i>	t. 1. p. 957.
<i>Gersa</i> , vide <i>Fœcula</i>	
<i>Gesminum</i> , vid. Jasminum	
<i>Ghitra Lemoni</i> , vid. Gummi Gutta	
<i>Gilla</i> , vid. Vitriolum, sub titulo Sal	
<i>Gingiber</i> , vid. Zingiber	
<i>Gingidium</i> , vid. Lepidium	
<i>Gith</i> , vid. Nigella	
<i>Gladiolus</i>	ibid.
<i>Glans</i> , quid sit	ibid.
	Glans

INDEX RERUM.

<i>Glans subdititia</i> vid. Suppositorium		<i>Hedypnois</i>	
<i>Glans Unguentaria</i> , vid. Ben.		<i>Hedysarum</i>	t. 1. p. 971 ibid.
<i>Glastum</i>		<i>Helenium</i> , vid. Enula Campana	
<i>Glastum Indicum</i>	t. 1. p. 957	<i>Helianthemum</i> , majus & minus, vid. Flos Solis	
<i>Glaucium</i> , vid. Papaver Corniculatum	t. 1. p. 959	<i>Heliotropium vulgare</i> , vid. Flos Solis	
<i>Glaux</i>		<i>Heliotropium Majus</i> & minus, vid. Verrucaria	
<i>Glebra</i> , vid. Terra	t. 1. p. 960	<i>Heliotropius Gemma</i> vid. sub titulo Lapis	t. 2. p. 971
<i>Glessum</i> , vid. Succinum		<i>Helix</i> , vide Hedera	
<i>Glis</i>		<i>Helleborine</i>	
<i>Globuli ad barbam</i>	ibid.	<i>Helleborastrum</i>	t. 1. p. 972 ibid.
<i>Glossopetra</i> , vid. sub titulo Lapis	t. 2. p. 925	<i>Helleborus albus</i> , vid. Veratrum	
<i>Gluma</i>	t. 2. p. 89	<i>Helleborus Niger</i>	
<i>Gluten</i> , vid. Icthyocolla	t. 1. p. 960	<i>Hemerocalis</i>	ibid. & seq.
<i>Glutinantia</i> , vid. Epulorica		<i>Hemionitis</i>	t. 1. p. 973 ibid.
<i>Glycyrrhiza</i>		<i>Hemina</i> , vid. sub titulo Mensura	
<i>Gnaphalium</i> , ejusque species	ibid.	<i>Hemmenagoga</i> , vid. Emenagoga	
<i>Gossipium</i> , vid. Xylum	t. 1. 961	<i>Hepatica</i>	ibid.
<i>Gobius</i>		<i>Hepatica nobilis</i> , vid. Trifolium Indivisum.	
<i>Graculus</i>	ibid.	<i>Hepatica stellata</i> , vid. Asperula	
<i>Gramen</i> , ejusque species	ibid.	<i>Hepatica Medicamenta quid & quanam sint</i> : ibidem	
<i>Gramen Tridactylites</i> , vid. Paronichia	ibid. & seq.	<i>Hepatica specifica quadam ex D. Cnæffellio</i>	t. 1. p. 976
<i>Granadilla</i> , vid. Flos passionis		<i>Hepatorium</i> , vid. Eupatorium	
<i>Grana Paradisi</i> , vid. Cardamomum		<i>Heptaphyllum</i> , vid. Tormentilla	
<i>Grana Tinctorum</i> , vid. Kermes		<i>Heraclea</i> , vid. Herba Judaica.	
<i>Granata</i>		<i>Heractia</i> , vid. Nenuphar.	
<i>Granatus Lapis</i>	t. 1. p. 962	<i>Herba quid sit</i>	ibid.
<i>Granatus Orientalis quomodo fiat</i>	t. 1. p. 963. t. 2. p. 92	<i>Herba Officinales ustiores que sine</i>	ibid. & seq.
<i>Ex Granato Lapide preparata varia</i>	t. 2. p. 1059	<i>Herba Fullorum</i> , vide Saponaria	
<i>Granulare quid sit</i>	t. 2. p. 107	<i>Herba Gallica</i> , vid. Galega	
<i>Granum quid sit</i>	t. 1. p. 963	<i>Herba Iudaica</i>	
<i>Granum</i> , vid. Pondus	ibid.	<i>Herba Lactaria</i> , vid. Tithymalus	t. 1. p. 978
<i>Granum Gnidium</i> , vid. Thymælea		<i>Herba Muralis</i> , vid. Parietaria	
<i>Granum Infectorium</i> , vid. Kermes		<i>Herba Pappa</i> , vid. Senecio	
<i>Granum Regium majus</i> , vid. Ricinus		<i>Herba Paralyseos</i> , vide Primula Veris	
<i>Grapole</i> , vid. Gravellata		<i>Herba Paris</i> , vide Uva Vulpina	
<i>Gratia Dei</i> , vid. Gratiola		<i>Herba Pedicularis</i> , vid. Staphisagria	
<i>Gratia Dei</i> , vid. Emplastrum		<i>Herba Pulicaris</i> , vid. Psyllium	
<i>Gratiola</i>	ibid.	<i>Herba Regia</i> , vid. Artemisia	
<i>Gravellata</i> , vid. Cinis Gravellatus, sub titulo Vitis Vi-		<i>Herba Roberti</i> , vid. Geranium	
nifera, ubi de Vino, & Vini fœcibus		<i>Herba sacra</i> , vid. Nicotiana	
<i>Grossi</i> , vid. Ficus		<i>Herba Salivaris</i> , vid. Pyrethrum	
<i>Grossularia</i>	ibid. & seq.	<i>Herba Sancti Iacobi</i> , vid. Jacobea	
<i>Grossula Rubra</i> , vid. Ribes		<i>Herba Sancta Kunigundis</i> , vide Eupatorium Avicen-	
<i>Gruaria</i> , vid. Germanium		na.	
<i>Grus</i> , ejusque partes officinales	t. 1. p. 965	<i>Herba Trinitatis</i> , vid. Jacea	
<i>Gruum quid sit</i>	ibid.	<i>Herba Venti</i> , vid. Anemone, Item Pulsatilla	
<i>Gryllus</i>	ibid. & seq.	<i>Hercules Bovis</i>	t. 1. p. 816
<i>Guajacum lignum</i>	t. 1. p. 967	<i>Hermetice Claudere</i> , vid. Sigillare	
<i>Gummi quid sit</i>	ibid.	<i>Hermodaetylus</i>	
<i>Gummi Arabicum</i>		<i>Herniaria</i> , vid. Centinodia	t. 1. p. 978
<i>Gummi Hedera</i> , vid. Hedera		<i>Hesperis</i>	ibid.
<i>Gutta Gemon</i>	ibid. & seq.	<i>Hidrotica</i> , vid. Idrotica	
<i>Gutta Gemon correctum per spiritum vitrioli</i> , aut Tar-	t. 1. p. 968	<i>Hiera</i> , ejusque species varia, vide Electuarium hic-	
tari Mindereri	ibid.	ra.	
<i>Gutta Gemon Magisterium</i> , seu extractum	ibid. & t. 2. p. 86.	<i>Hieracium</i>	t. 1. p. 979
<i>Gypsum</i>		<i>Hippocampus</i>	ibid.
		<i>Hippecacuaana</i> , vid. Ypecacuaana	
		<i>Hippace</i> , vid. Equus	
		<i>Hippoglossum</i> , vid. Bilingua	
		<i>Hippolapathum</i>	ibid.
		<i>Hippolithus</i> , vid. sub titulo Lapis, item sub nomine	
		Equus.	
		<i>Hippomanes</i>	t. 1. p. 980
		<i>Hippopotamus</i>	t. 1. p. 981
		<i>Hipposelinum</i> , vid. Levisticum	
		<i>Hippuris</i> , vid. Equisetum	
		<i>Hippurus</i>	t. 1. p. 982
		<i>Hircus</i>	ibid.
		<i>Hirundinaria</i> , vid. Chelidonium Majus	
		<i>Hirundinaria</i> , vid. Vincetoxicum	
		<i>Hirundo</i>	t. 1. p. 982 Ex

H.

<i>Hematites</i> , vid. sub titulo Lapis	
<i>Ex Hematite Lapide varia preparata</i> tom. 2. p. 126	t. 2. p. 88
& seq.	
<i>Hemionitis</i> , vid. Scolopendrium	
<i>Hemorrhoidalia</i> , vid. Splenica	
<i>Hemorrhodus</i> , vid. sub titulo Serpens	
<i>Halcedo</i>	
<i>Halec</i>	t. 1. p. 969
<i>Halecis partes officinales</i>	ibid.
<i>Halimus</i>	ibid.
<i>Hastula Regia</i> , vid. Asphodelus	ibid.
<i>Hedera Arborea</i>	ibid.
<i>Hedera Terrestris</i>	t. 1. p. 971

INDEX RERUM.

Ex Hydridinibus expertum ad Epilepsiam Remedium
t. 1. p. 982
Hirundo ibid.
Hispidula, vid. *Pilosella*
Hædus, vid. sub titulo *Capra*
Holli ibid.
Holosteon ibid.
Holosteus Lapis, vid. *Osteocolla*
Holothurius ibid. & seq.
Homo, ejusque partes in *Medicina* usitatiores tum
è corpore vivo, cum è corpore demortuo desumptæ
t. 1. p. 983
Hominis partium rum è corpore vivo, cum è corpore
demortuo desumptarum preparata varia descri-
buntur ibid. & seq.
Hordeum t. 1. p. 994. & seq.
Hordeum exoticum causticum Bâuhini t. 1. p. 996
Horminum ibid.
Hortulanus, Avis ibid.
Hyacinthus t. 1. p. 997
Hyacinthus Gemma ibid. & t. 2. p. 92
Ex Hyacintho Gemma preparata varia t. 2. p. 108
Hydrargyrus, vid. *Mercurius*
Hydragoga, vid. sub titulo *Purgantia*
Hydrolapathum t. 2. p. 997
Hydromel quid sit ibid.
Hydromel compositum Ph. Aug. ibid.
laxativum tartarisatum Ph. Aug. ibid.
purgans commune Ph. August. ibid.
D. Zvvelferi t. 1. p. 998
Hydropica Medicamenta quid sint ibid.
Hydropis curanda methodus ex D. Cnæffelio ibidem
& seq.
Hydrotica Medicamenta quid & quamam sint t. 1. p. 999
& seq.
Hyosciamus t. 1. p. 1006
Hyosciamus Peruvianus, vid. *Tabacum*
Hypastica, vid. *Purgantia* t. 2. p. 1008
Hypeocum
Hypercathartica Remedia, vid. *Purgantia* ibid.
Hypericum ibid. & seq.
Hypnotica Medicamenta quid sint t. 1. p. 1017
Hypocaustum ibid.
Hypocistis ibid.
Hysopus ibid.
Hysterica Medicamenta, quid & quamam sint ibid.
Hystericorum formula varia ibid. & seq.
Hystrix t. 1. p. 1019

I.

Jacea t. 2. p. 1
Jacoea ibid.
Jalap ibid.
Jasminum t. 2. p. 2
Jasps, vid. sub titulo *Lapis* t. 2. p. 90
Iberis ibid.
Ibis ibid.
Ichneumon t. 2. p. 3
Ichthyocolla ibid.
Ignis ibid.
Ignis, quatenus *Instrumentum Pharmaceuticum* tom. 2.
p. 23. & seq.
Ilex t. 2. p. 3
Ilex Coccigera, è qua bacca *Kermes* icte veniunt t. 2.
pag. 4
Illecebra, vid. sub titulo *Sedum*
Imperatoria t. 2. p. 5
Incarnativa, vid. *Sarco ica*
Incerniculum, vid. *Instrumenta Pharmaceutica* ibid.
Incinerare quid sit ibid. & seq.
Incrassantia Medicamenta ibid. & seq.
Manget. Bibl. Pharm. Tom. II.

Indicum, & *Indigo*, vid. *Glastum Indicum*.
Infundibulum, vid. *Instrumenta Pharmaceutica*
Infusio quid sit, & quomodo fiat t. 2. p. 6. & seq.
Infusionum exempla varia t. 2. p. 8. & seq.
Inguinalis t. 2. p. 9
Injectio quid sit, & quomodo fiat ibid.
Injectionum exempla varia ibid. & seq.
Insecta t. 1. p. 10. & seq.
Insectorum generatio, & *historia ex Clar. Rhedi* ibid.
& seq.
Insectorum divisio generalis, ex *Charlet*. t. 2. p. 14
Infessus quid sit ibid.
Adstringentes ibid.
Infessus aperientes, Varii ibid.
Calculum Frangentes t. 2. p. 15
Discutientes ibid.
Dolorem mitigantes ibid.
Emollientes t. 1. p. 14
Inspidans sapor, vid. sub titulo *Sapor*
Insolatio quid sit t. 2. p. 19
Inspergere, vid. *Aspergere*
Insipissatio, vid. sub titulo *Solutio cui opponitur*.
Instrumenta Pharmaceutica in genere ibid.
Instrumenta Pharmaceutica Interna, Ignis, Aer, Aqua,
Terra, & Menstrua t. 2. p. 23. & seq.
Intercipientia Medicamenta t. 2. p. 34
Inyibacea, vid. *Cichoracea*
Inyibus, vid. *Cichorium*
Ipecacoanna, vid. *Ypecacuana*
Iris, vid. *Erysimum*
Iris ibid.
Iris nostras ibid.
Florentina ibid. & seq.
Palustris t. 2. p. 55
Isatis, vid. *Glastum*
Ischaima Medicamenta quid & quamam sint ibidem
& seq.
Itzehoer mihradicum Papæ Leonis t. 1. p. 793
Iva Arthritisca, vid. *Chamæpyris*
Juba quid sit t. 2. p. 60
Judaicus Lapis vide sub titulo *Lapis* t. 2. p. 89. & 128
Juglans t. 2. p. 60. & seq.
Jujuba, seu *Zizyphus* t. 2. p. 63
Jujuba Domestica Sativa t. 2. p. 63
Sylvestris ibid.
Julepus quid sit & quomodo fiat ibid.
Julepi ad varios affectus formula varia tom. 2. p. 64
& seq.

Julus t. 2. p. 65
Juncago ibid.
Juncus ibid.
Juncorum varia species describuntur ibid. & seq.
Juniperus t. 2. p. 68. & seq.
Juniperus Arborea t. 2. p. 70
Jupiter, vid. *Stannum*
Jusculum, quid sit, & quomodo paretur ibid. & seq.

K.

Kali t. 2. p. 78
Karabæ, vid. *Succinum*
Keiri, vid. *Leucosium*
Kermes, vid. *Ilex Baccifera*, sub titulo *Ilex* ibid.
Kermia ibid.
Kinkina, vide *Quinquina*
Kolla, vid. *Gluten*
Komaros, vid. *Arbutus*

L.

Labdanum, vid. *Ladanum*
Labrum Veneris, vid. *Virga Pastoris*
G g g g g La-

INDEX RERUM.

<i>Labrusca</i>	t. 2. p. 72	<i>Lasfer Medicum, & Syriacum, vid. Asa foetida</i>	
<i>Lac & ejus Serum</i>	ibid. & seq.	<i>Laserpitium</i>	t. 2. p. 141
<i>Lac Muliebre, ex eoque preparata varia</i>	t. 1. p. 983	<i>De Laserpitio Raii, item Plinii sententia</i>	ibid. & seq.
<i>Lac Aluminis</i>	t. 2. p. 76	<i>Lathyrus vid. Cataputia</i>	
<i>Ammoniaci</i>	ibid.	<i>Lathyrus</i>	t. 2. p. 144. & seq.
<i>Benzoini</i>	ibid.	<i>Lavacrum, vid. Balneum</i>	
<i>Luna</i>	t. 2. p. 76	<i>Landanum, vid. sub titulo Extractum Opiatum, item</i>	
<i>Mercurii</i>	ibid.	<i>Opium</i>	
<i>Saturni, vid. Magisterium Saturni</i>		<i>Lavendula</i>	t. 2. p. 146
<i>Scammonii</i>	ibid.	<i>Laureola</i>	t. 2. p. 147
<i>Sulphuris</i>	ibid.	<i>Laurus</i>	ibid. & seq.
<i>Virginale, è Ph. Aug.</i>		<i>Laxantia, vid. Chalcastica</i>	
<i>Aliud</i>	t. 1. p. 251	<i>Laxativum minerale</i>	t. 2. p. 284
<i>Lacca</i>	t. 2. p. 77	<i>Lazuli Lapis, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 88. & 128
<i>Lacca pictorum</i>	ibid. & t. 2. p. 1062. & seq.	<i>Lectipes, vid. Lycopodium</i>	
<i>Lacerius</i>	ibid. & seq.	<i>Legumen</i>	t. 2. p. 149
<i>Lacertorum varia species</i>	ibid. & seq.	<i>Lenientia dolorem, vid. Anodyna</i>	
<i>Lacertorum preparata</i>	t. 2. p. 82	<i>Lenientia purgantia</i>	ibid. & seq.
<i>Lachryma quid sit</i>	t. 2. p. 83	<i>Lenitivum, vid. Electuarius Lenitivum</i>	
<i>Lachryma lobi, vid. Miliolum Solis</i>		<i>Lens</i>	t. 2. p. 150
<i>Laconicum, vid. Hypocautum</i>		<i>Lenticula palustris</i>	ibid.
<i>Lactria, vid. Esula</i>		<i>Lentiscus</i>	t. 2. p. 151
<i>Lactuca</i>	ibid.	<i>Lentiscina resina, mastiche dicta</i>	t. 2. p. 152
<i>Ladanum</i>	ibid.	<i>Leo, & ex eo preparata varia</i>	t. 2. p. 153. & seq.
<i>Levigare</i>	t. 2. p. 84	<i>Leontica, vid. Cacalia</i>	
<i>Lagannum, vid. Panis</i>		<i>Leontopodium, vid. Alchimilla</i>	
<i>Lagopus</i>	ibid.	<i>Lepidium</i>	t. 2. p. 154. & seq.
<i>Lamium</i>	ibid.	<i>Lepus, ac Leporinum Genus</i>	t. 2. p. 155. & seq.
<i>Lampetra</i>	ibid.	<i>Leporum varia species</i>	ibid. & seq.
<i>Lampjana</i>	ibid.	<i>Leporis Medicamenta officinalia</i>	t. 2. p. 161. & seq.
<i>Lampyrus, vid. Cicindela</i>		<i>Leucacantha, vid. Carduus Maris</i>	
<i>Lana</i>	ibid.	<i>Leucanthemum, vid. Bellis Major, Item aliquibus Chi-</i>	
<i>Lanugo</i>	ibid.	<i>momilla</i>	
<i>Lanugo perlata, sive flores & argentei S. Clossæ tom. 2.</i>		<i>Leucosum</i>	t. 2. p. 162
<i>p. 280.</i>		<i>Levisticum</i>	t. 2. p. 163
<i>Lanceolata, vid. Plantago</i>		<i>Libanotis Cachryophora</i>	ibid.
<i>Lapathum, ejusque species varia</i>	t. 2. p. 84. & seq.	<i>Libra, vid. sub titulo Pondera</i>	
<i>Lapides naturales in genere</i>	t. 2. p. 85	<i>Libyus Lignor, vid. Benzoinum</i>	
<i>Lapidum naturalium varia species</i>	ibid. & seq.	<i>Lichen, vid. Hepatica</i>	
<i>Lapides variis coloris describuntur</i>	ibid.	<i>Lichenes Equorum, vid. sub titulo Equus</i>	
<i>Lapidum molliorum Classis</i>	t. 2. p. 86. & seq.	<i>Lignum quid sit</i>	ibid.
<i>Lapidum ex animalibus desumptorum Classis tom. 2.</i>		<i>Lignum Aloes, vid. Agallochum</i>	
<i>p. 87. & seq.</i>		<i>Lignum Aquila</i>	ibid.
<i>Lapidum pretiosorum Majorum Classis t. 2. p. 90 & seq.</i>		<i>Brazilianum</i>	ibid.
<i>Lapidum pretiosorum minorum Classis tom. 2. p. 92.</i>		<i>Citri</i>	ibid.
<i>& seq.</i>		<i>Corallinum</i>	ibid.
<i>Lapides & gemma adulterini seu arte Confecti, eorumque</i>		<i>Colubrinum, ejusque varia species</i>	ibid. & seq.
<i>parandorum ratio</i>	t. 2. p. 94. 95. & seq.	<i>Ferri</i>	ibid.
<i>Lapides fictitii quomodo fiant, & saxa ingenia pro co-</i>		<i>Heracleum, vid. Corylus</i>	
<i>lumnis, ceterisque monumentis</i>	t. 2. p. 103	<i>Indicum, vid. Guajacum</i>	
<i>Lapidis fusilis experimentum</i>	ibid.	<i>Molucense</i>	t. 2. p. 165
<i>De Lapidibus & Gemmis specialius, quatenus nempe ad</i>		<i>Nephriticum</i>	ibid.
<i>Medicinam faciunt, eorumque Preparationibus</i>		<i>Rhodium</i>	ibid.
<i>t. 2. p. 104.</i>		<i>Violaceum</i>	ibid.
<i>Lapidum Calcinatio</i>	t. 2. p. 105	<i>Ligusticum, vid. Levisticum</i>	
<i>Coagulatio</i>	ibid.	<i>Ligustrum</i>	t. 2. p. 166
<i>Liquatio</i>	ibid.	<i>Lilac</i>	ibid.
<i>Pulverisatio, & preparatio</i>	ibid.	<i>Lilium</i>	ibid.
<i>Solutio</i>	ibid.	<i>Lilium convallium</i>	ibid. & seq.
<i>Syrupisatio</i>	t. 2. p. 106	<i>Lilium Aquaticum, vid. Nenuphar</i>	
<i>Volatilisatio</i>	t. 1. p. 105	<i>Lilium Cæleste, vid. Iris</i>	
<i>Lapidum seu Gemmarum preparationes varie</i>	ibid.	<i>Limax, vid. Cochlea</i>	
<i>Lapis Contrayerva describitur</i>	t. 2. p. 140	<i>Limonada</i>	t. 2. p. 167
<i>Nephriticus factus, internus & externus Cnæff.</i>		<i>Limonada antinephritica D. Cnæffellii</i>	t. 2. p. 443
<i>t. 2. p. 445. 446</i>		<i>Limones, & Limonia mala vid. Malum Citrium</i>	
<i>Lapidis de Goa compositio</i>	t. 1. p. 140	<i>Limonum</i>	t. 2. p. 167
<i>Lapidis Medicamentosi descriptio</i>	ibid.	<i>Linauentum</i>	ibid.
<i>Lapidis Salutaris compositio</i>	ibid.	<i>Linaria</i>	ibid.
<i>Lappa vid. Bardana</i>		<i>Linctus, vid. Looch</i>	
<i>Lardaria, vid. Euonimus</i>		<i>Lingua Agnina, vid. Arnoglossum</i>	
<i>Laxex</i>	ibid.	<i>Avis, vid. Ornithoglossum</i>	
<i>Laridum, vid. Porcus</i>		<i>Bovis, vid. Buglossum</i>	

INDEX RERUM.

- Lingua Canis, vide Cynoglossum.*
Cervina, vide Scolopendrium.
Equina, vide Hippoglossum.
Serpentina, vide Ophioglossum.
Linimentum, vide Litus.
Linteum ceratum pro larvis D. Cnœffel. t.1.p.67
Linum t.2.p.167. & seq.
Linum in Sericum transmutatio t.2.p.103
Linum Catharticum t.2. p. 68
Liquare, & liquefactio ibid.
Liquidambar ibid. & seq.
Liquiritia, vid. Glycyrrhiza.
Liquor, quid sit t.2.p.169
Liquor Acuens, vide Lac Scammonii.
Alexipharmacus D. Zvvelf. t.2 p.170
Antipodagricus trinunus ex D. à Mynsicht. t.2.p.174
Arthriticus ex eodem ibid.
Camphoratus ex eodem ibid.
Cephalalgicus è Ph. Bar. t.2.p.172
ex D. à Mynsicht t.2.p.173
Cerussa, ex eodem t.2. p.175
Coralliorum Rubrorum acidus, ex eodem t.2.p.173
Cordialis ex eodem ibid.
Refrigerans ex Ph. Reg. Zvvelf. t.2.p.171
temperatus, ex eadem Ph. ibid.
Cornu Cervi succinatus ex D. Jungken ibid.
Diaphoreticus ex D. à Mynsicht t.2.p.173
Diureticus Suinfuitensium t.2. p.122
Febrilis D. Cnœffel. t.1 p.913
ad Gonorrhœam virulentam ex Phar. Reg. Zvvelf. t.2.p.171
Hepaticus D. Cnœffellii t.1.p.976
& splenicus ex Ph. Reg. Zvvelf. t.2.p.171
Linacum ex Ph. Bar. t.1.p.172
Lithontripicus ex D. Hoffman. ibid.
ex Cnœffelio t.2.p.443
ex Ph. Reg. Zvvelf. t.2.p.172
Mercurii vivi D. à Mynsicht t.2.p.175
Acetosus ex eodem ibid.
Saccharatus ex eodem ibid.
Liquores Mercurii varii t.2.p.290
Nectar Virioli dictus t.2 p.173
Nephriticus D. D. Ch. ex Hoffm. t.2.p.172
ex D. à Mynsicht t.2.p.173
Nitratus D. D. L. ex Cnœffel. t.1.p.914
ex D. à Mynsicht t.2.p.173
Oculorum cancerorum ex Hoffm. t.2.p.172
Ophthalmicus subalbidus ex D. à Mynsicht t.2.
p.173
Pectoralis ex eodem ibid.
Perlaram ex D. Hoffm. t.2.p.172
Orientalium acidus ex D. à Mynsicht t.2. p.173
contra Prunellam ex Cnœffel. t.1.p.914
Refrigerans ex D. à Mynsicht t.2.p.174
S. licum t.2.p.172
Splenicus aperiens ex Ph. Reg. Zvvelf. ibid.
Sulphuris è Pharm. Bar. ibid.
Tartari ex Lexic. Ph. D. Jungken ibid.
Splenicus t.2.p.170
Tartareus ex D. à Mynsicht t.2.p.174
Tilia ex D. Cnœff. t.1.p.532
Tutia ex D. à Mynsicht t.2.p.175
Vesimentalis ex eodem ibid.
Viriolatus ex eodem t.2. p.173
Vulnerarius ex eodem t.2.p.174
Lithantrax, vide Carbo Petreæ.
Lithargyrus t.2.p.175
Lithopritum, vide Corallina.
Lithontripica, vide Nephritica.
Eithospermum, vide Milium Solis.
Litus in genere quid sit, & quomodo paretur. t.2.p.176
Mangeri Bibl. Pharm.
- Linum varia formula* t.2.p.176
Litus ad Ambusta vulnera ex D. Weickard. t.2.p.177
paratu facilis, ex eodem ibid.
Antipodagricus ex Hoffman. t.2. p.178
contra Ariduram Agricola, ex Bierling. t.2.p.179
ex Hoffm. t.2. p.178
In arthritide vaga egregius ex D. Le Mort ibid.
ad Cancrum D. Spigelii, ex Bierling. t.2.p.180
capillorum productionem prohibens ex Phar. Persica t.2.p.179
ad capitis dolorem sistendum, ex eadem Ph. ibid.
ex VVeickard t.2.p.177
Vulnera cum Crani fractura, ex eodem ibid.
In contractura ex Hoffm. t.2.p.178
Cordialis ex D. VVeickard ibid.
Alius in peste correptis, ex eodem ibid.
Cosmeticus D. Cnœffel. t.1. p.672
Defensivus, cujus beneficio plures è vesti-
giis Variolarum immunes manserunt ibid.
Defensivus, ex D. VVeickard t.2.p.177
Dentifricius ex Schrod. t.2.p.176
Dolorem ex inflammatione sistens ex D. VVeick. t.2.p.177
Empyreuma simplex extinguens, ex eodem ibid.
pulveris Tormentarii extinguens, ex co-
dem ibid.
Errhinus ex Schroder. t.2.p.176
Fœtorem sub brachiis dissipans, ex Ph. Pers. t.2.p.179
ad Gingivas tumentes & putidas D. Cnœff. t.2. p.451
ad Hamorrhoides ex Bierling. t.2. p.180
Hamorrhoidalis ex D. Charraz t.2.p.176
ad Herpetes ex eodem ibid.
Infrigidans puerorum, ex D. VVeick. t.2.p.177
Ischiadicus ex D. Charraz t.2.p.176
ad Intertrigines ex D. VVeickard t.2. p.177
pro Lumbis in dolore calculi, ex eodem t.2.p.178
ad Mammillarum lacte turgenrium dolores, & in-
flammationes, ex eodem t.2.p.177
Melluminatus ex Ph. Bar. t.2.p.178
Mollis ex Bierling. t.2.p.179
ad motus imbecillitatem ex eodem t.2.p.178
Nasalis ex Hoffman. ibid.
pro plebeis D. Mochingeri t.2.p.180
Nephriticus ureteres dilatans ex D. Weickard t.2.p.177
pro Nervo retracto, ex Hoffm. t.2.p.178
Ad Ossa corrupta, & ulcera maligna, ex VVeick. t.2.p.177
in Paralyti & resolutione membrorum, ex eodem t.2. p.178
ad Pediculos, ex Ph. Persica t.2.p.179
pro Penis erectione, ex Hoffm. t.2.p.178
In Pleuritico dolore, ex VVeickard. t.2. p.177
Alius ex eodem t.2.p.178
In podagrico dolore, ex eodem t.2. p.177
contra prurium & scabiem siccam ex Ph. Persiana t.2.p.179
ad pustulas humiditas in facie parvulorum ex cres-
centes ex eadem Ph. ibid.
pro Renibus ex D. VVeick. t.2. p.176
In Renum dolore, & expectando calculo, ex eodem t.2.p.177
Inflammatione, ex eodem ibid.
Salutis ex arbore vite, ex eodem t.2.p.180
cum theriaca, & mirridatio, ex eod. ibid.
D. R. ex Hoffm. t.2.p.178
ad sanguinem è naso fluentem, ex Ph. Pers. t.2.p.179
de Saturno ex Schroder. t.2.p.176
compositum ex eodem ibid.
ad Scabiem humidam, ex Ph. Pers. t.2.p.179
Ggggg 2 *Litus ad*

I N D E X R E R U M

<i>Litus ad scissuras papillarum Lactans</i> , ex Weicht. t. 2. p. 177	<i>Ludum antiphriticum Cnœffelianum</i> tom. 2. p. 443
<i>Simplex</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 178	<i>Ludus</i> , vide <i>Calculus</i> .
<i>Somniferus</i> ex D. Charraz t. 2. p. 176	<i>Lujula</i> , vide <i>Oxytriphylum</i> .
<i>ad variolarum Cicatrices prohibendas</i> , ex eod. ibid.	<i>Lumbrici</i> , & ex iis preparata varia remedia t. 2. p. 189
<i>Ventrem adstringens</i> , ac <i>diarrhaam compescens</i> ex Ph. Persic. t. 2. p. 179	<i>Lumbricos necantia</i> , vide <i>Anthelmintica</i> .
<i>contra Vermes Infantum</i> ex Bierling. t. 2. p. 180	<i>Lumbricorum artificialis productio</i> ex R. P. Athan. Kircher. ibid.
<i>ad Verrucas eradicandas</i> , ex Ph. Persic. t. 2. p. 179	<i>Luna</i> , vide <i>Argentum</i> .
<i>contra Ulcera Cervicis Uteri</i> ex Bierling. ibid.	<i>Luna Caustica</i> , <i>Lapis Infernalis</i> , vide sub <i>Titulo Argentum</i> ;
& seq. ibid.	<i>Lunaria minor</i> ibid.
<i>ad Ulcera corrodenia</i> , ex Ph. Persic. t. 2. p. 180	<i>Lupinus</i> t. 2. p. 190
<i>Lixivium quid sit, & quomodo paretur</i> t. 1. p. 182	<i>Lupulus</i> ibid.
<i>Antiasthmaticum</i> ex D. à Mynsicht t. 2. p. 181	<i>Lupus</i> , ejusque partes officinales, & preparata varia t. 2. p. 191. & seq.
<i>Benedictum</i> ex eodem t. 2. p. 654	<i>Lupus marinus</i> t. 2. p. 192
<i>Lixivia Capillos Augens</i> ibid.	<i>Lupus Salictarius</i> , vide <i>Lupulus</i> .
<i>Prolongantia</i> ibid.	<i>Lucinia</i> ibid.
<i>Renasci prohibentia</i> ibid.	<i>Luteola</i> ibid.
<i>Crispos reddentia</i> ibid.	<i>Lutra</i> ibid.
<i>Albos reddentia</i> t. 1. p. 653. & seq.	<i>Lutum Chymicum</i> ibid.
<i>Denigrantia</i> ibid.	<i>Lychnitis</i> , vide <i>Verbascum</i> .
<i>Flavos reddentia</i> t. 1. p. 652	<i>Lychnis</i> ibid.
<i>Rubros reddentia</i> t. 1. p. 653	<i>Lycium</i> ibid.
<i>Lixivium Cephalicum</i> ex D. Jungken. t. 2. p. 181	<i>Lycoperdon</i> , vide <i>Orbicularis</i> .
ex D. à Mynsicht t. 2. p. 182	<i>Lycopersicon</i> , vide <i>solanum tomiterum</i> , sub <i>Titulo Solanum</i> .
<i>Diureticum</i> ex Jungken t. 2. p. 181	<i>Lycopodium</i> , vide sub <i>Titulo Muscus</i> .
ex D. à Mynsicht t. 2. p. 182	<i>Lyaius Lapis</i> , vide sub <i>Titulo Lapis</i> t. 2. p. 86
<i>Sapientia</i> ex eodem t. 1. p. 181	<i>Lynx Animal</i> t. 2. p. 193
<i>Tartari</i> ex eodem t. 2. p. 182	<i>Lymachia</i> , ejusque species t. 2. p. 194
<i>Tingens</i> ex eodem ibid.	
<i>Lixivia varia ad affectus varios</i> t. 2. p. 20. & seq.	
<i>Locusta in Phytologia</i> t. 2. p. 181	
<i>Locusta Animal</i> ibid.	
<i>Lolium</i> t. 2. p. 183	
<i>Lonchitis</i> ibid.	
<i>Looch quid sit, & quomodo paretur</i> ibid.	
<i>Looch varia exempla</i> ibid.	
<i>Album</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 185	
<i>Antiphetiscum</i> ex D. à Mynsicht t. 2. p. 186	
<i>Benedictum</i> Ph. Bat. t. 1. p. 753	
<i>de Caulibus Gordonii</i> , ex Ph. Aug. t. 2. p. 184	
<i>sen Diacodium Crocatum</i> ex D. à Mynsicht t. 2. p. 186	
<i>Domesticum</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 185	
<i>Expectorans</i> ex eadem Ph. t. 1. p. 753	
<i>de Farfara</i> ex Ph. Aug. t. 2. p. 184	
<i>compositum</i> ex D. Lemery ibid.	
<i>Hemopticus</i> ex Ph. Bat. t. 1. p. 753	
<i>Lentum Avicennæ</i> t. 2. p. 184	
<i>de Papavere Mesue</i> , ex Ph. Aug. ibid.	
<i>Passulatum</i> ex ead. Ph. ibid.	
<i>Pectorale</i> ex D. à Mynsicht t. 2. p. 186	
<i>de Pineis Mesue</i> ex Ph. Aug. t. 2. p. 184	
<i>de Perulaca</i> , ex ead. Ph. t. 2. p. 185	
<i>de Pulmone Vulpi Mesue</i> ex ead. Ph. ibid.	
<i>Rosatum</i> ex D. à Mynsicht ibid.	
<i>Sanum & experium</i> ex Ph. Aug. ibid.	
<i>de Scilla succo</i> ex ead. Ph. ibid.	
<i>compositum</i> ex ead. Ph. ibid.	
<i>Synanthicus</i> ex Ph. Bat. t. 1. p. 753	
<i>de Testudinibus</i> Ant. de Sgobbis t. 2. p. 185	
<i>Violarum</i> ex D. à Mynsicht ibid.	
<i>pro Ulceribus pulmonum</i> ex Ant. de Sgobbis ibid.	
<i>Lotio quatenus est Operatio Pharmaceutica</i> t. 2. p. 186	
<i>Lotio quatenus est Medicamentum</i> , vide sub <i>Titulo Fomentatio</i> , item sub <i>Titulo Balneum</i>	
<i>Lotiones varia ad varios affectus</i> t. 2. p. 17. & seq.	
<i>Lorium</i> , vide <i>Urina</i> .	
<i>Lotus Arbor</i> t. 2. p. 187	
<i>Lubricantia</i> , vide <i>Hypæctica</i> .	
<i>Lucius Piscis</i> ibid. & seq.	
<i>Lucii partes officinales, & preparata varia</i> tom. 2. p. 188	
	<i>M.</i>
	<i>Macer</i> t. 2. p. 194
	<i>Macerare, & Maceratio quid sit</i> t. 2. p. 195
	<i>Macis</i> , vide <i>Nux Moschata</i> .
	<i>Macropiper</i> , vide <i>Piper</i> .
	<i>Magisterium</i> , quid sit, & quomodo fiat. ibid. & seq.
	<i>Magisteria ex mineralibus quomodo fiant</i> t. 2. p. 195
	<i>ex animalibus quomodo fiant</i> t. 2. p. 196
	<i>ex Vegetabilibus quomodo fiant</i> ibid.
	<i>Magisterium Antiepilepticum Prævotii Hoffmani</i> t. 1. p. 518
	<i>Antimonii diaphoretici</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 196
	<i>Auri</i> t. 1. p. 636
	<i>Benzoini</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 196
	<i>Bismuthi</i> ex Ph. Bat. ibid.
	<i>Cosmeticum Rolfincii</i> t. 2. p. 418
	<i>Cinnabaris antimonii</i> t. 1. p. 531
	<i>Cordiale D. D. G. M.</i> ex Hoffm. t. 2. p. 197
	<i>Aliud D. D. K.</i> ex eodem ibid.
	<i>Crystallo mont.</i> t. 2. p. 443
	<i>Gummi Gamandra</i> ex Ph. Aug. t. 2. p. 196
	<i>ex Ph. Bat.</i> ibid.
	<i>Hepaticum rubrum</i> ex Ph. Aug. t. 2. p. 196
	<i>Galappa</i> ex Ph. Aug. tom. 2. p. 196
	<i>Jovis</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 196
	<i>Lithontripicon Cnœffalii</i> t. 2. p. 443
	<i>Luna S. R. M. Uladislai IV.</i> t. 1. p. 530
	<i>Martii albidissimum</i> t. 2. p. 521
	<i>Saturni</i> ex Ph. Bat. ibid.
	<i>Sulphuris</i> , vide <i>Lac Sulphuris</i> .
	<i>Terra Catechu</i> t. 2. p. 971
	<i>Talci D. Cnœffel.</i> t. 1. p. 670
	<i>Tartari</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 196
	<i>purgans</i> t. 2. p. 949
	<i>Turpethi</i> ex Ph. Bat. t. 2. p. 197
	<i>Urina</i> t. 1. p. 94
	<i>Magistrantia</i> , vide <i>Imperatoria</i> .

Magnes.

INDEX R E R U M.

<i>Magnes</i>	t. 2. p. 89. & 197	<i>Masticatoria & Salivantia Remedia quid sint</i>	t. 2.
<i>Ex Magnete preparata varia</i>	t. 2. p. 130	p. 216. & seq.	
<i>Magnes Arsenicalis</i>	t. 2. p. 197	<i>Mastiche, ejus delectus, & preparata</i>	t. 2. p. 220
<i>Magnetica Saturni, vid. Antimonium</i>		<i>Mater perlarum</i>	t. 2. p. 221
<i>Magnetica Opalina, vid. Antimonium</i>		<i>Maturatum vid. sub titulo Instrumenta Pharmaceu-</i>	
<i>Magnesia tingendo vitro, ut preparetur</i>	t. 2. p. 1049	<i>tica</i>	
<i>Majorana. & Origanum</i>	t. 2. p. 197	<i>Matricaria</i>	ibid. & seq.
<i>Malabathrum</i>	t. 2. p. 198	<i>Marrisylya</i>	t. 2. p. 222
<i>Malaguetta, vid. Cardamomum</i>		<i>Maturantia, vid. Pepastica</i>	
<i>Malaxare quid sit</i>	ibid.	<i>Mayz, vid. Triticum Indicum</i>	
<i>Malicorium</i>	ibid.	<i>Mechoacan</i>	ibid. & seq.
<i>Malleolus</i>	ibid.	<i>Mechoacanna extracta varia</i>	t. 2. p. 223
<i>Malva, ejusque species</i>	ibid.	<i>Meconium, vid. Opium</i>	
<i>Malvaticum Luniperinum, vid. Essentia baccarum Luniperi</i>		<i>Medica Herba</i>	ibid.
<i>Malum, vid. Malus</i>		<i>Medicamentum crystallinum antinephriticum Cnœffellii</i>	t. 2. p. 442
<i>Mala Adami</i>	t. 2. p. 199	<i>Medulla in genere</i>	t. 2. p. 224
<i>Armeniaca</i>	ibid.	<i>Medulle animalium officinales quanam sint</i>	ibid.
<i>Aurea</i>	t. 2. p. 200	<i>Mel, vid. sub titulo Apis</i>	
<i>Citria</i>	t. 2. p. 201. & seq.	<i>Mellis preparationes varia</i>	t. 1. p. 150
<i>Cotonea, vid. Cydonia</i>		<i>Mel Anacardinum Alzaravii ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 224
<i>Limonia</i>	t. 2. p. 204	<i>Anthosatum ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Punica vid. Granata</i>		<i>Emblorum, ex ead. Ph.</i>	t. 2. p. 225
<i>Malus</i>	t. 2. p. 205	<i>Helieboratum e Ph. Lond.</i>	t. 2. p. 224
<i>Manati, & ex eo preparata</i>	t. 2. p. 207	<i>Meniha ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 225
<i>Mandragora, ejusque species</i>	ibid. & seq.	<i>ex Zvvelfero</i>	ibid.
<i>Manna</i>	t. 2. p. 208	<i>Mercurialis ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Manna preparata varia, spiritus, syrupi, &c.</i>	ibid. & seq.	<i>Mororum, vid. Diamorum</i>	
<i>Manna Iulepata</i>	t. 2. p. 210	<i>Nucum vid. Dianucum</i>	
<i>Manna preparationes quadam Curiosa, ex Abbate Rouffleau</i>	ibid.	<i>Passulatum ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Marcassita</i>	ibid. & seq.	<i>Rosarum Mesue e Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Marcus Panis, vid. Panis Marcius, & Pasta Regia</i>		<i>Agaricatum e Ph. Norib.</i>	t. 2. p. 226
<i>Marga</i>	t. 2. p. 211	<i>Anthosatum ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Margarita</i>	ibid.	<i>Citratum e Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 225
<i>Margaritarum generatio, ac ratio qua ex imo maris cum suis ostreis educuntur</i>	ibid. & seq.	<i>Laxativum ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Margaritarum adulterinarum confectio</i>	t. 2. p. 103. & seq.	<i>Simplex ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Margarita, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 94	<i>Saponis e Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Ex Margaritis preparata varia</i>	t. 2. p. 119. & seq.	<i>Scilliticum Ph. Lond.</i>	ibid.
<i>Marmelada quid sit</i>	t. 2. p. 212	<i>de Tussilagine ex Ph. Norimb.</i>	t. 2. p. 226
<i>Carminativa D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 214	<i>Violatum simplex e Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 225
<i>Cephalica e Laboratorio Ceylonico</i>	t. 2. p. 212	<i>Solutivum ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 213	<i>Melampyrum</i>	t. 2. p. 226
<i>Frigida ejusd.</i>	ibid.	<i>Melanagoga, vid. sub titulo Purgantia</i>	
<i>Cum Gummi Gotti ex Laboratorio Ceylonico</i>	ib.	<i>Melanthium, vid. Nigella</i>	
<i>Hepatica e Laboratorio Ceylonico</i>	ibid.	<i>Melicraum, vid. Hydtomel</i>	
<i>Calida D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 214	<i>Melilotus</i>	t. 2. p. 226
<i>frigida ex eod.</i>	ibid.	<i>Melis, vid. Taxus</i>	
<i>Hysterica ex eod.</i>	ibid.	<i>Melissa, & ejus species</i>	ibid. & seq.
<i>Laxativa e Laboratorio Ceylonico</i>	t. 2. p. 213	<i>Melones</i>	t. 2. p. 227
<i>Magnanima ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 214	<i>Menses provocantia, vid. Emmenagoga</i>	
<i>Nephritica ex Ceylonico Laboratorio</i>	t. 2. p. 213	<i>Menses sistentiâ quanam sint</i>	ibid. & seq.
<i>ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 214	<i>Menstruum, vid. Instrumenta Pharmaceutica Interna</i>	
<i>Pectoralis ex Ceylonico Laboratorio</i>	t. 2. p. 213	<i>ubi in specie de mensuris agitur</i>	
<i>ex D. à Mynsicht</i>	ibid.	<i>Mensura famosissima qua sint</i>	t. 1. p. 889
<i>Splenerica ex eod.</i>	t. 2. p. 214	<i>Menstruum universale</i>	t. 1. p. 890
<i>Stegnotica ex eod.</i>	ibid.	<i>Boyles non corrosivi</i>	t. 2. p. 229
<i>Stomachica e Laboratorio Ceylonico</i>	t. 2. p. 212	<i>Mensura</i>	ibid.
<i>Calida ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 213	<i>Mensurarum & ponderum species varia ordine Alphabetico breviter explicantur</i>	ibid. & seq.
<i>Frigida ex eodem</i>	ibid.	<i>Mensurarum & ponderum initium, & oriens</i>	tom. 2. p. 233
<i>Therebinthinata ex eodem</i>	t. 2. p. 214	<i>Mensurarum & ponderum diversorum inter se comparatio</i>	t. 2. p. 234
<i>Marmor, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 130. & seq.	<i>Mensurarum & ponderum mutationis causa & modus per Nicolaum</i>	ibid. & seq.
<i>Marrubium, ejusque species</i>	t. 2. p. 215	<i>Mensura & pondera Veterum & recentiorum describuntur</i>	t. 2. p. 235. ad 268
<i>Mars, vid. Ferrum</i>		<i>Meniha, ejusque species</i>	t. 2. p. 269. & seq.
<i>Mars diaphoreticus ex Ph. Bat.</i>	ibid.	<i>Meniha Saracenica, vid. Balsamita</i>	
<i>Fulminans, ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Mercurialis</i>	t. 2. p. 270
<i>Potabilis, ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Mercurius, ejusque delectus</i>	t. 2. p. 271
<i>Martagum, vid. Hemerocalis</i>		<i>Mercurii usus, & vires describuntur</i>	t. 2. p. 271. & seq.
<i>Marum</i>	ibid.	<i>Gggggg i</i>	<i>Mercurius</i>
<i>Marum Vulgare Dodonæi, vid. Clynopodium</i>			
<i>Massula varia odontalgica Cnœff.</i>	t. 1. p. 451		
<i>Manger. Bibl. Pharm.</i>			

INDEX RERUM.

<i>Mercurii Destillatio</i>	to. 2. p. 274	<i>De Metallis fodinis Bohemia Clariss. Reifellii sententia</i>	t. 2. p. 322
<i>Lotio</i>	ibid.	<i>Men, sive menum</i>	t. 2. p. 326
<i>Purgatio</i>	ibid.	<i>Mezereon Germanorum, & ex eo preparata varia</i>	ibid.
<i>Præcipitatio & calcinatio</i>	ibid.	& seq.	
<i>Mercurius præcipitatus per se</i>	ibid.	<i>Micleta Nicolai ex Ph. Aug.</i>	t. 1. p. 776
<i>per silices</i>	ibid.	<i>Milium, ejusque varia species</i>	t. 2. p. 327
<i>Fixatus, Panacea</i>	ibid.	<i>Milium Solis</i>	t. 2. p. 328
<i>Præcipitatus per oleum Sulphuris</i>	ibid.	<i>Millefolium</i>	ibid.
<i>Viridoli rubic.</i>	ibid.	<i>Millepedes</i>	ibid.
<i>per spiritum Sal. nitr.</i>	t. 2. p. 275	<i>Milvus</i>	ibid.
<i>per aquam Ovorum</i>	ibid.	<i>Minium, vid. sub titulo Plumbum</i>	ibid.
<i>per tincturam siniridis</i>	ibid.	<i>Minorativa, vid. Purgantia</i>	
<i>Communis</i>	ibid.	<i>Mineralia quæ sint</i>	
<i>Albus Vomitivus Catharticus</i>	ibid.	<i>Mistio, vid. Mixtio</i>	t. 2. p. 329
<i>Dulcis</i>	ibid.	<i>Mistura, vid. Mixtura</i>	
<i>Mercurii præcipitatus Redificatio</i>	t. 2. p. 277	<i>Misy</i>	t. 2. p. 329
<i>Mercurius præcipitatus incarnatus</i>	ibid.	<i>Mithridatium, vid. Electuarium</i>	
<i>Latens</i>	ibid.	<i>Miva, vid. Gelatina</i>	
<i>Viriolatus fixus, dulcificatus</i>	ibid.	<i>Miva Borragnis ex Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Mercurii præcipitatio egregia</i>	ibid.	<i>Consolida ex ead. Pharm.</i>	t. 2. p. 330
<i>Mercurius præcipitatus Solaris</i>	ibid. & t. 1. p. 815	<i>Dialthea ex ead. Pharm.</i>	ibid.
<i>Regulinus diaphoreticus</i>	ibid.	<i>Sagryi ex ead. Pharm.</i>	ibid.
<i>Viridis, seu Venerens</i>	t. 2. p. 278	<i>Mixtura quid sit</i>	ibid.
<i>Mercurius sublimatus Officinarum</i>	t. 2. p. 279	<i>Anisaploetica Rolfincii</i>	ibid.
<i>Regulinus</i>	ibid.	<i>Anasthmatica ex eod.</i>	ibid.
<i>Mercurius dulcis vulgaris</i>	t. 2. p. 280	<i>Anicolica ex Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Sublimatus rubem non corrosivus</i>	t. 2. p. 281	<i>Antiepileptica ordinaria ex Cnœffelio</i>	t. 2. p. 336
<i>Dulcis Solaris</i>	ibid.	& <i>Antiparalytica Rolfincii</i>	t. 2. p. 330
<i>Mercurius vira</i>	t. 2. p. 284	<i>Antiepileptica in forma solida</i>	t. 1. p. 336
<i>Mercurii extractio</i>	t. 2. p. 289	<i>in forma liquida</i>	ibid.
<i>Salificatio</i>	t. 1. p. 290	<i>Antipestilentiales ex Bierlingio</i>	t. 2. p. 331
<i>Mercurii præparationes aliquot ex Ph. Bat.</i>	t. 1. p. 291	<i>Antiscorbutica Rolfincii</i>	t. 2. p. 330
<i>Mercurius vira</i>	t. 1. p. 314	<i>Bezoardica Angel. Sal.</i>	t. 2. p. 331
<i>Mercurius præcipitatus albus ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 291	<i>Contra calculum Rolfincii</i>	t. 2. p. 331
<i>Correctus ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Kolbii</i>	ibid.
<i>Flavus ex Ph. Bat.</i>	ibid.	<i>Catechu pro oris fœtore</i>	t. 2. p. 371
<i>Fixus ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Cephalica Cnœffeli</i>	t. 1. p. 329
<i>Griseus, ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Contra Cordis infirmitates Rolfincii</i>	t. 2. p. 330
<i>Incarnatus ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Diaphoretica simplex Rolfincii</i>	ibid.
<i>Laxativus ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Hydropica D. Cnœffeli</i>	t. 1. p. 998
<i>Ruber ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Hypochondriaca - Scorbutica D. Finckii tom. 2.</i>	p. 331
& <i>Flavus ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Hysterica Cnœffeli</i>	t. 2. p. 1132
<i>Solaris per se ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Lithonriptica Cnœffeli</i>	t. 2. p. 444
<i>Viridis ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Odontalgica Bierlingii</i>	t. 2. p. 331
<i>Mercurius Vira correctus ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Ophthalmica Rolfincii</i>	t. 1. p. 330
<i>purgans ex eadem Pharm.</i>	ibid.	<i>Contra Pestem ejusdem</i>	t. 2. p. 331
<i>Mespilus, ejusque species</i>	ibid. & seq.	<i>Simplex vid. Spiritus Diarrhon. ex Ph. Aug. to. 2.</i>	p. 844
<i>Metallum quid sit</i>	t. 1. p. 292	<i>Splenetica Cnœff.</i>	t. 2. p. 903
<i>Metallorum præparationes quæ sint</i>	t. 2. p. 294	<i>Stomachalis ejusd.</i>	t. 2. p. 330
<i>Metallorum probationes vid. Dokimastice Metallica</i>		<i>Sudorifera catholica ejusdem</i>	t. 2. p. 331
<i>Metallurgia Arhanas. Kircheri in Mundo subterraneo</i>	ibidem	<i>Topica, sive localis Interna Cnœffeli tom. 1.</i>	p. 536
<i>Metallurgia Obiectum</i>	t. 2. p. 295	<i>Tubularis ex Pharm. Bat.</i>	t. 2. p. 230
<i>Metallorum causa materialis & formalis</i>	ibid.	<i>Contra Tussim Rolfincii</i>	ibid.
<i>Ad Metallorum productionem, utrum Cælum & stella</i>	t. 2. p. 296	<i>Uterina Cnœffeli</i>	t. 2. p. 1132
<i>concurrere possint</i>	t. 2. p. 298	<i>Molucca</i>	t. 2. p. 331
<i>Metalla quomodo ex humore unctioso à Natura elaborantur</i>	t. 2. p. 299	<i>Molybdæna, vid. Plumbago</i>	
<i>Metallum quare in igne fluida reddantur</i>	t. 2. p. 299	<i>Momordica, vid. Ballamita</i>	
<i>Metallum auri perfecta notitia, Item de condicione Præ-</i>	t. 1. p. 301	<i>Monoceros</i>	ibid. & seq.
<i>fecti fodinarum</i>	ibid.	<i>De Monocero D. Stalpartii sententia</i>	t. 2. p. 332. & seq.
<i>Metallurgia curantium officia varia</i>	ibid.	<i>Morselini, vid. Rotula</i>	
<i>Metallorum morborum Curatio</i>	t. 2. p. 302	<i>Morsus Diaboli</i>	t. 2. p. 242
<i>Metallognomia, sive de signis Metallum latentis, & qua</i>	t. 2. p. 305. & seq.	<i>Morus</i>	ibid.
<i>Arte metallorum vena cognoscantur</i>	t. 2. p. 305. & seq.	<i>Moschata, vid. Nux Moschata</i>	t. 2. p. 243
<i>Metallorum Fodinarum Natura, proprietates, varia ac-</i>	t. 2. p. 308. & seq.	<i>Moschatellina</i>	ibid.
<i>ci tentia, &c. variis ad Kircherum responsis dete-</i>	t. 2. p. 313	<i>De Moscho, Moschiferoque animali Clariss. Schrockii</i>	ibid. & seq.
<i>guntur</i>	t. 2. p. 315	<i>tractatus elegans</i>	t. 2. p. 245
<i>Metallorum purgatio</i>	t. 2. p. 316	<i>De Moschi nomine</i>	t. 2. p. 247
<i>Mistura</i>	ibid.	<i>De Moscho, ex folliculo ab animali deposito</i>	De
<i>Sympathia, & antipathia</i>			
<i>Scoria & excrementa</i>			

INDEX RERUM.

G g g g g 4

Nigella

INDEX RERUM.

<i>Nigella</i>	t. 2. p. 446	<i>Oleum Anipestilientiale Bonacurtii</i>	t. 2. p. 464
<i>Nigrica Fabrilis</i>	t. 2. p. 447	<i>D. Coci</i>	t. 2. p. 484
<i>Nitrum de eo vid. sub titulo Sal</i>	t. 2. p. 750 & seq.	<i>ex VVeickard.</i>	t. 2. p. 472
<i>Nitrum rubrum essentificatum Cnæff.</i>	t. 1. p. 912	<i>Antipleuriticum Petri à Castro</i>	t. 2. p. 464
<i>Noctua</i>	t. 2. p. 447	<i>Antipodagricum D. Ch. ex Hoff.</i>	t. 2. p. 482
<i>Nucamentum, vid. Julus</i>		<i>Aranearum Mindereri ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 466
<i>Nuces Cupressi, vid. Cupressus</i>		<i>Arthriticum Arnisai ex Bierling.</i>	t. 2. p. 483
<i>Nucista, vid. Nux Moschata</i>		<i>Aurantiorum destillatum ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 476
<i>Nuclei Pinei, vid. Pinus</i>		<i>Balaninum ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 466
<i>Nucula Terrestris, vid. Bulbo Castanum</i>		<i>Balsamicum è Pharm. Bat.</i>	t. 2. p. 480
<i>Nummularia</i>	ibid.	<i>ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 483
<i>Nutritio in preparatione Medicament. quid sit ib. & seq.</i>		<i>Benedictum è Ph. Lond.</i>	t. 2. p. 466
<i>Nutrium, vid. Unguentum</i>		<i>Bufoinum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 480
<i>Nux Juglans, vid. Juglans</i>		<i>ex Calculo humano</i>	t. 1. p. 986
<i>Nux Medica</i>	t. 2. p. 448	<i>Contra Calculum ex Bierlingio</i>	t. 2. p. 484
<i>Nux Metella</i>	ibid.	<i>ex Ph. Reg. Zvvelf.</i>	t. 2. p. 466
<i>Nux Moschata, & macis</i>	ibid.	<i>Camphora è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 481
<i>Nux Pineæ, vid. Pinus</i>		<i>destillatum Sennerti</i>	t. 2. p. 476
<i>Nux Pontica, vid. Avellana</i>		<i>Olea Capillos Argentia & conservantia</i>	t. 1. p. 655
<i>Nux Regia, vid. Juglans</i>		<i>Elongantia</i>	t. 1. p. 656
<i>Nux Vomica, vid. Nux metella</i>		<i>vario colore tingentia</i>	t. 1. p. 655
<i>Nycticorax, vid. Noctua</i>		<i>Oleum de Capparibus è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 466
<i>Nymphaea, vid. Nenuphar</i>		<i>Carminativum ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 482
		<i>ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 484
		<i>è Ph. Reg. Zvvelf.</i>	t. 2. p. 466
		<i>Carthami è Pharm. Aug.</i>	ibid.
		<i>Caryophyllorum destillatum è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 476
		<i>D. Le Mort</i>	t. 2. p. 479
		<i>Cassia lignea destillatum D. Le Mort</i>	ibid.
		<i>De Castoreo Iacob. de Manliis ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 467
		<i>Compositum Zvvelferi</i>	ibid.
		<i>Catellorum è Ph. Lond.</i>	ibid.
		<i>Cera destillatum è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 477
		<i>Cerebri humani</i>	t. 1. p. 992
		<i>Chamæmelinum è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 467
		<i>Chamæmeli Roman. destillatum è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 476
		<i>Charia è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 481
		<i>Cheirinum Mesuæ è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 467
		<i>Chrysomelinum è Ph. Lond.</i>	ibid.
		<i>è Ciri granis Ph. Aug.</i>	ibid.
		<i>Cordiale ex Bierling.</i>	t. 2. p. 483
		<i>Cosmeticum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 481
		<i>Coffinum Mesuæ è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 467
		<i>Cremoris è Pharm. Bat.</i>	t. 2. p. 481
		<i>de Croco Mesuæ è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 467
		<i>Cydoniorum Mesuæ è Ph. Aug.</i>	ibid.
		<i>ad defluxiones externum, ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 482
		<i>Diacolocynthis è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 467
		<i>de Enula Mesuæ è Ph. Aug.</i>	ibid.
		<i>de Euphorbio Mesuæ ex ead. Ph.</i>	ibid.
		<i>Excestreense è Ph. Lond.</i>	t. 2. p. 468
		<i>Olea Faciem illustrantia</i>	t. 1. p. 654
		<i>Faciei maculas delentia</i>	t. 1. p. 655
		<i>Faciem vario colore tingentia</i>	t. 1. p. 656
		<i>Oleum Febrifugum D. Cnæff.</i>	t. 1. p. 915
		<i>Strobelbergeri</i>	t. 2. p. 463
		<i>Fœniculi destillatum ex D. Le Mort</i>	t. 2. p. 477
		<i>Formicarum Nicolai, è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 468
		<i>ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 485
		<i>Hæmorrhoidale Cnæffellii</i>	t. 2. p. 903
		<i>Hæmorrhoidale Faventini</i>	t. 2. p. 463
		<i>Heracelinum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 481
		<i>Hirundinum ex Ph. Lond.</i>	t. 2. p. 468
		<i>ad Hydropem ex Bierlingio</i>	t. 2. p. 483
		<i>Hysciami è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 468
		<i>Hyperici ex ead. Ph.</i>	ibid.
		<i>è Ph. Reg. Colleg. Lond.</i>	t. 2. p. 464
		<i>Compositum D. Ellenbergii</i>	t. 2. p. 465
		<i>è Pharm. Lond.</i>	t. 2. p. 468
		<i>D. à Rabenstein</i>	t. 2. p. 463
		<i>Hypnoticum ex Ph. Reg. Zvvelf.</i>	t. 2. p. 468
		<i>Isaminum è Ph. Aug.</i>	ibid.
		<i>Irinum Mesuæ è Ph. Aug.</i>	ibid.
		<i>Oleum</i>	
<i>Obolus, vid. sub titulo Mensuræ, & pondera</i>			
<i>Ocellus Cervi, idem quod Elaphobolcum</i>			
<i>Ochra, vid. sub titulo Terra</i>	t. 2. p. 973		
<i>Ocimum, vid. Basilicum</i>			
<i>Ocularis plama, vid. Eufrafia</i>			
<i>Oculi in Physiologia</i>	t. 2. p. 450		
<i>Oculus Bovis, seu Buphrthalmum</i>	ibid.		
<i>Oculus Cati vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 94		
<i>Oculis nilia, vid. Ophthalmica</i>			
<i>Ocymastrium Tragi, vid. Scrofularia</i>			
<i>Odontalgica, seu odontica Medicamenta</i>	ibid. & seq.		
<i>Odoramentum, vid. Suffitus</i>			
<i>Oeluropus, vid. Pilosella</i>			
<i>Oenothera</i>	t. 2. p. 45		
<i>Oelypus</i>	ibid.		
<i>Olea Arbor</i>	ibid. & seq.		
<i>Oleander, sive Nerium</i>	t. 2. p. 453		
<i>Oleum, quidque de Oleis notandum</i>	ibid. & seq.		
<i>Olea destillata ex herbis, Floribus, seminibus, fructibus,</i>			
<i>radicibus, corticibus, lignis & viscis, Aromatibus,</i>	t. 2. p. 460 & seq.		
<i>resinisque quomodo parentur</i>	t. 2. p. 461		
<i>Olea destillata usitiora</i>	ibid. & seq.		
<i>Olea expressa, eaque parandi modus</i>	t. 2. p. 462		
<i>Olea expressa usitiora</i>	ibid.		
<i>Olea per infusionem, & expressionem, eaque parandi mo-</i>	ibid.		
<i>dius</i>	ibid.		
<i>Olea Insolata simplicia usitiora</i>	t. 2. p. 463		
<i>Olea cocta composita varia</i>	t. 2. p. 465		
<i>Oleum Abrotini ex Ph. Aug.</i>	ibid.		
<i>Absinthii ex ead. Pharm.</i>	t. 2. p. 476		
<i>destillatum ex ead. Ph.</i>	t. 2. p. 465		
<i>Acousticum ambratum ex ead. Ph.</i>	t. 2. p. 484		
<i>D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 480		
<i>Alœticum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 465		
<i>Amygdalorum amarorum è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 466		
<i>dulcium ex ead. Ph.</i>	ibid.		
<i>Anagallidis ex ead. Pharm.</i>	ibid.		
<i>Anethum ex eadem Pharm.</i>	ibid.		
<i>Angelica destillatum ex ead. Ph.</i>	t. 2. p. 476		
<i>Anodynum refrigerans Cnæffellii</i>	t. 2. p. 1138		
<i>Antapoplecticum cephalicum Zvvelferi</i>	t. 2. p. 466		
<i>Antiepilepticum pretiosum ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 482		
<i>ex Ph. Reg. Zvvelf.</i>	t. 2. p. 467		
<i>Antimonii dulce ex Bierlingio</i>	t. 2. p. 484		
<i>destillatum è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 476		
<i>Sennerti</i>	ibid.		
<i>Saccharatum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 480		
<i>Antimonii Mercuriale</i>	t. 2. p. 283		

INDEX RERUM.

<i>Oleum Irinum</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 469	<i>Oleum Pomatum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 487
ad Ischuriam ex Bierling.	t. 2. p. 483	ex Pomis amoris. ex Bierling.	t. 2. p. 487
<i>Lacertarum contra hernias</i> ex Phar. Reg. Zvvelf.	t. 2. p. 469	<i>Populinum Nicol. Alexand.</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 473
<i>Laurinum</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Purgans compositum</i> Si. Glosari	t. 2. p. 465
<i>Lignorum</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 485	ex Ph. Reg. Zvvelferi	t. 2. p. 473
<i>Ligni Gu. jaci</i>	t. 2. p. 891	<i>Ranarum</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Iuniperi</i>	ibid.	è Ph. Bat.	t. 2. p. 481
<i>Ligustrinum Mesua</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 469	<i>Resolacium</i> è Phat. Aug.	t. 2. p. 473
<i>Liliorum Alborum simplex</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Rhudii ligni destillatum</i> ex ead. Ph.	t. 2. p. 476
compositum Mesua ex ead. Ph.	ibid.	ex D. Le Mort	t. 2. p. 480
<i>Lini ex semine</i> ex ead. Ph.	t. 2. p. 470	<i>Rosatum</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 473
<i>Linicorum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 481	compositum Mesua ex ead. Ph.	ibid.
<i>Liracelli</i> è Phar. Lond.	t. 2. p. 470	<i>Omphacinum</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Ludi</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 481	<i>Ruta</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Lumbricorum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 470	<i>Rutaceum Linalcum</i> ex ead. Ph.	ibid.
è Ph. Bat.	t. 2. p. 481	<i>Sabina</i>	t. 2. p. 473
compositum è Ph. Aug.	t. 2. p. 470	erodeum D. à Mynsicht	t. 2. p. 483
<i>Macis destillatum</i> D. Le Mort	t. 2. p. 479	destillatum D. Le Mort	t. 1. p. 478
<i>Mandragora</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 470	<i>Sacchari compositum</i> ex Ph. Bat.	t. 2. p. 481
<i>Martis</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 481	<i>Sambucinum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 473
<i>Martiale Album</i>	t. 1. p. 919	<i>Sampuchinum</i> ex ead. Ph.	t. 2. p. 474
præstans	ibid.	<i>Sanguinis humani destillatum</i>	t. 1. p. 983
<i>Rubrum</i>	ibid.	<i>Sanctatis</i> ex Bierlingio	t. 2. p. 483
<i>Sulphureum</i>	ibid.	<i>Saponis destillatum</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 477
<i>Massichinum Mesua</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 470	ex Ph. Bat.	t. 2. p. 481
<i>Massiches destillatum</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 476	ex Hoffm.	t. 2. p. 482
contra Matricem probatam ex Bierling.	t. 2. p. 482	<i>Sarcocicum</i> D. Le Mort	t. 2. p. 474
<i>Meliloti</i> ex Ph. Lond.	t. 2. p. 470	<i>Sassafras destillatum</i> ex eodem	t. 2. p. 479
<i>Mentha</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Saturni destillatum</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 477
<i>Mercurii antimonialis</i>	t. 2. p. 289	è Ph. Bat.	t. 2. p. 481
diaphoreticum Album	t. 2. p. 286	<i>Scorpionum simplex Mesua</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 474
dulce	ibid.	compositum Mesua ex ead. Ph.	ibid.
fragrans	t. 2. p. 287	<i>Madiboli</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Rubrum</i>	t. 2. p. 286	<i>Magnum Angustanorum</i>	ibid.
<i>Saccharatum</i>	t. 2. p. 287	<i>Sanguineum</i>	t. 2. p. 803
<i>Milvinum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 481	<i>Septem florum</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 483
<i>Momordica</i>	t. 2. p. 470	<i>Sesaminum</i> è ex Ph. Aug.	t. 2. p. 475
<i>Moschelinum Nicolai Alexand.</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Sitronium</i> è Ph. Lond.	ibid.
è Ph. Lond.	ibid.	<i>Silicum</i> è Pharm. Bat.	t. 2. p. 481
<i>Mucaginum</i> è Ph. Amstelodam.	t. 2. p. 471	<i>Solani</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 473
<i>Myracum</i> ex Renodro	ibid.	<i>Spermatis ranarum</i> è Ph. Noriberg.	ibid.
<i>Myrrha</i> è Ph. Lond.	ibid. & 435	<i>Stercoris humani</i>	t. 1. p. 987. & seq.
<i>Myrtillorum</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Stomachicum Cratonis</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 475
<i>Myrtinum</i> ex ead. Ph.	ibid.	Florentinum ex ead. Ph.	ibid.
<i>Narcissinum</i>	t. 2. p. 471	ex Phat. Reg. Zvvelf.	ibid.
<i>Nardinum simplex</i> è Ph. Aug.	ibid.	ad strumas D. Coci	t. 2. p. 483
compositum Mesua ex ead. Ph.	ibid.	ex Syrace è Ph. Aug.	t. 2. p. 475
<i>Nephriticum</i> ex Hoffm.	t. 2. p. 482	<i>Succini destillatum</i> ex Ph. Aug.	t. 2. p. 476
ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 485	<i>Sulphuris varia</i>	t. 2. p. 896. & 933
<i>Nervinum Slotani</i>	t. 2. p. 471	contra Surditatem D. Charraz	t. 2. p. 465
ex Ph. Reg. Zvvelferi	ibid.	<i>Tabaci</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 481
<i>Nicodemi</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 472	<i>Talchi per deliquium</i> ex eadem Ph.	ibid.
<i>Nicotiana</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Tartari fixidum</i>	t. 2. p. 892. & 948
<i>Nucis Indica</i>	ibid.	<i>Tartari per deliquium</i> ex Bierling.	t. 2. p. 482
<i>Nucum Juglandium</i>	ibid.	<i>Terra Vide Naphtha.</i>	
<i>Nucis Moschata</i>	ibid.	<i>Terra sigillata</i> ex eodem	ibid.
<i>Nucleorum persicorum</i>	ibid.	<i>Trigonensis</i>	t. 2. p. 970
<i>Nymphaea</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Terebinthina destillatum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 477
<i>Olivarum communis</i>	ibid.	<i>Texopiles</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 481
Mummatum	t. 1. p. 991	<i>Triuci</i> ex eadem Ph.	ibid.
<i>Omphacinum</i>	t. 2. p. 472	contra Venena mirabile D. Caranitz	t. 1. p. 43
<i>Othalicum</i> D. Le Mort	ibid.	Magni Ducis Hetruriz	t. 2. p. 475. & 483
D. à Mynsicht	t. 2. p. 484	<i>Verbenaceum</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 475
<i>Papaverinum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 472	contra Vermes egregium ex Bierl.	t. 2. p. 483. & seq.
<i>Paralyticum</i> è Pharm. Bat.	t. 2. p. 481	<i>Violaceum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 475
de Piperibus Mesua è Ph. Aug.	t. 2. p. 472	<i>Viperarum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 481 & 1032
è Pistachiis & pineis ex ead. Ph.	t. 2. p. 473	<i>Viridis aris</i> ex Ph. Bat.	t. 2. p. 482
in Pleuritiide admirandum ex Hoffm.	t. 2. p. 482	<i>Viridoli dulce</i> ex ead. Pharm.	ibid. & 896
contra Podagram ex Bierling.	t. 2. p. 483	Orthelii, ex Bierling.	t. 2. p. 483
è Paonia granis Ph. Aug.	t. 2. p. 472	<i>Vulnerarium</i> ex Bierling.	t. 2. p. 484
<i>Polychrestum</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 473	D. à C. ex Hoffm.	t. 2. p. 482
<i>Polypodii</i> è Pharm. Bat.	t. 2. p. 481	<i>Mindereri</i>	t. 2. p. 476
		<i>Oleum</i>	ibid.

INDEX RERUM.

<i>Oleum Vulnerarium</i> VVeickardi	t.2. p. 476	<i>Oxymel Compositum Mesuae</i> ex Ph. Aug.	t.2. p. 527
<i>Vulpinum Mesuae</i> , ex Ph. Aug.	ibid.	<i>Diureticum</i> ex Ph. Aug.	t.2. p. 528
<i>Olibanum</i> , vide Thus.		J. Michael.	ibid.
<i>Oliua</i> , vide Olca.		<i>Elleboratum majus Juliani</i> Ph. Aug.	ibid.
<i>Olla</i> , vide Instrumenta Pharmaceutica.		<i>Julianizans</i> è Ph. Lond.	ibid.
<i>Olor</i> , vide Cygnus.		<i>de Ligustrico Mesuae</i> , ex VVeckero.	ibid.
<i>Olus</i>	t.2. p. 485	<i>Scilliticum Mesuae</i> ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Olus Atrum</i> , vide Smyrnum.		<i>Compositum</i> è Ph. Lond.	ibid.
<i>Omasa</i>	ibid.	<i>simplex Galeni</i> , & <i>Mesuae</i> è Ph. Aug.	t.2. p. 527
<i>Omphacium</i>	t.2. p. 486	<i>Oxyrhodinum</i> quid sit, & quomodo pareatur	t.2. p. 528
<i>Onager</i>	ibid.	<i>Oxyfacccharum</i> quid sit	ibid.
<i>Onagra</i>	ibid.	<i>Oxyfacccharum compositum Nicolai</i> Prepositi è Ph. Aug.	ibid.
<i>Onobrychia</i>	ibid.		
<i>Ononis</i>	ibid.	<i>Emeticum Ludovici</i>	t.2. p. 529
<i>Onyx</i> , vide sub Titulo Lapis	t.2. p. 91	<i>Mynfichti</i>	ibid.
<i>Onychis adulterini</i> , seu <i>Pseudonychis compositio</i>	t.2.	<i>Salz</i> , vide sub Titulo Syrupus.	t.2. p. 528
P. 101		<i>Simplex</i> è Ph. Aug.	
<i>Opalm</i> , vide sub Titulo Lapis	t.2. p. 93	<i>Oxytriphyllum</i> , vide <i>Trifolium acetosum</i> .	t.2. p. 528
<i>Opali adulterini confectio</i>	t.2. p. 100		
<i>Ophioglossum</i>	t.2. p. 486		
<i>Ophioscorodon</i> , vide <i>Victorialis</i> .			
<i>Ophites</i> , vide sub Titulo Lapis	t.2. p. 130. & seq.		
<i>Ophris</i>	t.2. p. 487	<i>Paonia</i>	t.2. p. 529
<i>Ophthalmica Medicamenta</i>	ibid. & seq.	<i>Patea Camelorum</i> , vide <i>Schoenanthum</i> .	
<i>Opium</i> , vide aliquid de eo sub Titulo papaver.		<i>Palimpissa</i>	ibid.
<i>Opiologia</i> , seu tractatus de opio Clar. VVedelii.		<i>Palurus</i>	ibid.
quadam exponuntur	t.2. p. 490. & seq.	<i>Palma</i>	ibid. & seq.
<i>Circa opiatarum usum cautela</i>	t.2. p. 518. & seq.	<i>Palma majoris vulgaris Vires</i> & usus	t.2. p. 530
Item t.1. p. 1011. & seq.		<i>Palma Indica coccifera Vires</i> & usus	t.2. p. 531
<i>Opiatarum usus</i>	t.1. p. 1009. & seq.	<i>Palma Christi</i> , vide <i>Ricinus</i> . Item <i>Orchis</i> , seu <i>Satyrium</i> .	
<i>Opiatarum nocumenta & incommoda</i>	t.1. p. 1011.	<i>Paludapium</i> , vide <i>Apium</i> .	
& seq.		<i>Palumbus</i>	t.2. p. 532
<i>Opiatarum species, preparationes, & formula varia</i>		<i>Palus sancti</i> , vide <i>Guajacum</i> .	
t.1. p. 1013. & seq.		<i>Panacea quid sit</i>	t.2. p. 532
<i>Opiata Salomonis Juberti</i>	t.1. p. 771	<i>Panacea Arduvaldina Volkameri</i>	ibid.
<i>Opobalsamum</i>	t.2. p. 521	<i>Essentificata D. Cnœffel.</i>	t.2. p. 637
<i>Opobalsami nota & succedanea</i>	t.1. p. 394	<i>ex cinnabari nativa ejusdem</i>	t.2. p. 635
<i>Opopanax</i>	t.2. p. 521	<i>Hartmanni</i>	t.2. p. 52
<i>Opuntia</i>	ibid.	<i>Solaris duplicata D. Cnœfelii</i>	t.2. p. 635
<i>Orbicularis</i>	ibid. & seq.	<i>Mercurii purgans</i>	t.2. p. 281
<i>Orchis</i>	t.2. p. 522	<i>Panax</i>	t.2. p. 532
<i>Oreoselinum</i> , vide <i>Daucus Apii folio</i> , sub Titulo <i>Daucus</i> .		<i>Panchymagogum</i> , vide extractum panchymagogum.	
<i>Orichalcum</i> , vide <i>Aurichalcum</i> .		<i>Panicum</i>	t.2. p. 533
<i>Origanum</i> , vide <i>Majorana</i> .		<i>Panis</i> , vide sub Titulo <i>Triticum</i>	t.2. p. 994
<i>Orixa</i> , vide <i>Oryza</i> .		<i>Panis Diasarsæ</i> ex Ph. Bat.	ibid.
<i>Orminum</i> , vide <i>Horminum</i> .		<i>de Vipera</i> ex eadem Ph.	ibid.
<i>Ornithoglossum</i> , vide sub Titulo <i>Fraxinus</i> .		<i>Pannus linteus crocatus</i>	t.1. p. 519
<i>Ornithopodium</i> , vide <i>Polygala</i> .		<i>Papaver</i>	t.2. p. 533. & seq.
<i>Orobanchæ</i> , siue <i>Limodorum</i>	t.2. p. 522	<i>Papaveris</i> , & <i>Opii</i> ex eo educti vires	t.2. p. 534
<i>Orabus</i>	ibid.	<i>Papaveris Rhæados Vires</i>	ibid.
<i>Oryza</i>	ibid.	<i>Papyrus</i>	t.2. p. 535
<i>Orvietanum</i> , vide <i>Electuarium Orvietanum</i>	t.1. p. 771.	<i>Paralytica Medicamenta</i> , vide sub Titulo <i>Cephalica</i> .	
& 792		<i>Paralysis euporista</i>	t.1. p. 529. & 530
<i>Osmunda Regalis</i> , vide <i>Filix Florum</i> .		<i>Paralytica Herba</i> , vide <i>Primula veris</i> .	
<i>Os de Corde Cervi</i> , vide sub Titulo <i>Cervus</i> .		<i>Paregorica</i> , vide <i>Anodyna</i> .	
<i>Ostifragus Lapis</i> , idem quod <i>Osteocolle</i> de quo vide		<i>Parietaria</i>	t.2. p. 535
<i>Lapis</i> .		<i>Paronychia</i>	ibid.
<i>Ostracites</i> , vide sub Titulo <i>Lapis</i>	t.2. p. 90	<i>Parus</i>	t.2. p. 536
<i>Ostrea</i>	t.2. p. 523	<i>Passer</i> , ejusque species	ibid.
<i>Ostrites</i> , vide <i>Osteocolle</i> , sub Titulo <i>Lapis</i>	t.2. p. 87	<i>Passula</i> , vide <i>Uvæ passæ</i>	t.2. p. 1135. & seq.
<i>Ostritis</i> , seu <i>Osteocolle preparata</i>	t.2. p. 131	<i>Passula laxativa ex variis Authoribus</i>	t.1. p. 781.
<i>Ostrutium</i> , vide <i>Imperatoria</i> .		& 792.	
<i>Ovis Avis</i>	ibid.	<i>Pasta odorata vilior pro mulieribus Zvvelferi</i>	t.2.
<i>Otica Medicamenta quid & quæ sine</i>	t.2. p. 524	P. 537	
<i>Oticum Arcanum in surditate</i>	ibid.	tempore pestis ex eodem	ibid.
<i>Ovis</i> , & sub ea <i>Ovinum</i> genus	t.2. p. 525. & seq.	<i>pro placentulis stomachalibus ex eodem</i>	t.2. p. 536
<i>Ovum</i> , vide sub Titulo <i>Gallina</i> .		<i>Regia</i> , seu <i>panis Martius</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Oxalis</i> , vide <i>Acetosa</i> .		<i>Composita ex eadem Ph.</i>	ibid.
<i>Oxyacantha</i> , vide <i>Berberis</i> .		<i>Pastilli</i> , vide <i>Trochisci</i>	
<i>Oxylapathum</i>	t.2. p. 527	<i>Pastilli pro fumo</i> , vide sub Titulo <i>Suffitus</i>	t.2. p. 914
<i>Oxymel quid sit</i>	ibid.	<i>Pastinaca</i>	t.2. p. 537
<i>Oxymel de Calamentha Mesuae</i> , ex Weckero	ibid.	<i>Pavo</i> , ejusque partes officinales	t.2. p. 538
		<i>Pectoralia</i>	

INDEX RERUM.

<i>Pectoralia Medicamenta, quid & qua sint</i>	tom. 2.	<i>Pilula de Aloe lota incerti Authoris ex Ph. Aug. t. 2. p. 558</i>	
p. 539. & seq.		& mastiche Nicol. Mireps. ex eadem Ph.	
<i>Pedicularis</i>	t. 2. p. 540. & seq.	ibid.	
<i>Pediculus Animal</i>	t. 2. p. 541	<i>Rosata ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum</i>	ibid.	<i>Violata Ph. Norib.</i>	ibid.
<i>Peplus, vide sub Titulo Tithymalus.</i>		<i>de Ambra ex Ph. Lond.</i>	ibid.
<i>Pepo</i>	ibid.	<i>de Ammoniaco Quercetani ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 559
<i>Perca</i>	ibid. & seq.	<i>Magistrales ex Phar. Bat.</i>	t. 2. p. 571
<i>Percepierre</i>	t. 1. p. 22	<i>Angelica seu de Aloe & rhab. ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 559
<i>Perdix</i>	t. 2. p. 542. & seq.	ex Ph. Bat.	t. 2. p. 571
<i>Perfoliata</i>	t. 2. p. 543	<i>Anodina Cortesii</i>	t. 2. p. 559
<i>Perforata, vide Hypericum.</i>		<i>Mynsichti</i>	t. 2. p. 575
<i>Periannata, vide Amuleta.</i>		<i>Anticolica ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 571
<i>Perianthium, vide Calyx.</i>		<i>Antiepileptica S. Clossai ex Ph. Schrod.</i>	t. 2. p. 561
<i>Periclymenum, vide Matrisylva.</i>		<i>Antimonialis ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 571
<i>Perla, vide Margaritæ.</i>		<i>Febrifuga Hartmanni</i>	t. 2. p. 562
<i>Persica, vide Malus Persica.</i>		<i>Antipestilentialis ex Michael.</i>	t. 2. p. 574
<i>Persicaria, ejusque species</i>	ibid. & seq.	<i>Antipodagrica ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 571
<i>Personata, vide Bardana.</i>		<i>Arabica Nicolai ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 559
<i>Pervinca, vide Vinca Pervinca.</i>		<i>Arthritica Nicolai ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Pes Cati, vide Gnaphalium.</i>		<i>Hebipolentes</i>	ibid.
<i>Pes Columbinus, vide Geranium.</i>		<i>Norimbergensium</i>	ibid.
<i>Pes Corvinus, vide Ranunculus.</i>		<i>Schefferi ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Pes Læti, vide Clynopodium.</i>		<i>Articulares ex Michael.</i>	t. 2. p. 574
<i>Pes Leonis, vide Archimilla.</i>		<i>Assajeret Avicenna ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 559
<i>Pes Leporis, vide Lagopus.</i>		<i>Aurea Nicolai ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Pes Lupi, vide Mulcus Terrestris repens.</i>		<i>Balsamica ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 571
<i>Pes Vituli, vide Arum</i>		<i>de Bdellio majores Mesua, ex Pharm. August.</i>	
<i>Pessarium, quid sit, idque parandi modus</i>	t. 2. p. 545	t. 2. p. 559	
<i>Pessi varii ad varios usus</i>	ibid. & seq.	<i>de Benedicta ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Pestifuga Medicamenta</i>	t. 2. p. 547	<i>Benedicta Mynsicht</i>	t. 2. p. 574
<i>Petasis</i>	ibid.	ex Ph. Schrod.	t. 2. p. 559
<i>Petroleum, vide Naphta.</i>		<i>Cachectica D. Chartaz.</i>	t. 2. p. 560
<i>Petroselinum</i>	ibid. & seq.	<i>de Calce viva D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 575
<i>Petum, vide Tabacum.</i>		<i>in Calculo renum & Vesica D. Cnoëssel.</i>	t. 2.
<i>Peucedanum</i>	t. 2. p. 58	p. 443	
<i>Phanigmus, vide Sinapismus.</i>		<i>Castitatis ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 571
<i>Phalangium</i>	ibid.	<i>Catarrhales ex Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Phalaris</i>	ibid.	D. Michael.	t. 2. p. 573
<i>Pharmacia Ars quid sit</i>	t. 2. p. 549. & seq.	<i>Catechu anodyna Symplicæ</i>	t. 2. p. 972
<i>Pharmacia Artis divisio & forma</i>	t. 2. p. 550	<i>Odorifera</i>	ibid.
<i>Phaseolus</i>	t. 2. p. 551	<i>Catholici extracti ex Pharm. Amstel.</i>	t. 2.
<i>Phasianus Avis</i>	ibid. & seq.	p. 560	
<i>Philanthropos, vide Aparine.</i>		<i>Catholica D. Michaëlis</i>	t. 2. p. 573
<i>Philonium, vide Electuarium Philonium.</i>		D. à Mynsicht	t. 2. p. 574
<i>Phlegmagoga, seu Hydragoga Medicamenta, vide sub Titulo Purgantia.</i>		<i>Cephalica D. Michael.</i>	t. 2. p. 573
<i>Phlomis, vide Verbascum Salvifolium.</i>		D. à Mynsicht	t. 2. p. 574
<i>Phoenix, vide Palma.</i>		<i>pro Chlorosi D. Chartaz</i>	t. 2. p. 560
<i>Phosphorus quid sit</i>	t. 2. p. 552. & seq.	<i>Cholagoga de Centauro Quercetani ex Phar. Schrod.</i>	
<i>Phosphori præparandi ratio</i>	t. 2. p. 53	ibid.	
<i>Phu, vide Valeriana.</i>		<i>Cicera Tartari dicta D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 577
<i>Philliræa</i>	ibid.	<i>Cochia Rhafis ex Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 60
<i>Phyllitis, vide Scolopendrium.</i>		<i>pro Colico morbo D. D'Aquin ex Phar. D. Chartaz</i>	ibid.
<i>Phyllon, vide Mercurialis.</i>		ibid.	
<i>Pica</i>	ibid. & seq.	<i>de Colocynthide Mesua, ex Ph. Aug.</i>	ibid.
<i>Picatio, vide Dropax.</i>		<i>Cordiales & Cephalica Zveclerferi</i>	ibid.
<i>Picea, vide Abies.</i>		<i>Crapularia ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 571
<i>Piger Henricus, vide Furnus in Instrumentis Pharmaceuticis.</i>		<i>Cretacea ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Pila marina</i>	t. 2. p. 554	<i>de Creta Palmarii ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Pila ad manus eluendas</i>	t. 2. p. 95	<i>de Cynoglossa Nicolai Præpositi ex Ph. Aug.</i>	t. 2.
<i>Pileolus</i>	t. 2. p. 555	p. 561	
<i>Pilosella</i>	ibid.	<i>cum Castoreo ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Pilula quid sint, de iisque in genere</i>	ibid. & seq.	<i>Diaphoretica in lue Gallica ex Michael.</i>	t. 2. p. 574
<i>Pilularum exempla quedam</i>	t. 2. p. 556	ex Ph. Schrod.	t. 2. p. 561
<i>Pilula Ethiopica ex Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 571	<i>Diuretica ex Ph. Schrod.</i>	ibid.
<i>de Agarico Mesua ex Ph. Aug.</i>	t. 1. p. 558	<i>ex Duobus ex Ph. Lond.</i>	ibid.
<i>Aggregativa Majores Mesua ex Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>in Dysenteria ex Michael</i>	t. 2. p. 574
<i>Minores ejusdem ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>de Esula Fernelii ex Ph. Schrod.</i>	t. 2. p. 561
<i>Aloephagina Mesua ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>de Eupatorio majores Mesua ex Pharm. Aug.</i>	
<i>D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 574	ibid.	
		<i>de Euphorbia Mesua ex Pharm. August.</i>	ibid.
		dem	

Quercetani

I N D E X

<i>Pilula Quercetani</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.561
<i>Familiares</i> D. à Mynsicht	t.2.p.574
<i>Febriles</i> D. Cnæff.	t.1.p.912
<i>antimoniales</i> Hartmanni	t.2.p.562
<i>Michaelis</i>	t.2.p.574
<i>varia ex Variis Authoribus</i>	t.2.p.562
<i>Fetida majores Mesua</i> , ex Ph. Aug.	t.2.p.561
<i>Francofurtenses</i> è collect. Chym. Leyd.	t.2.p.562
<i>de Fumaria Avicenna</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>ad Gallicum morbum</i> è Ph. Pers.	t.2.p.572
<i>ad Sistendam Gonorrhæam</i> D. Charraz.	t.2.p.562
<i>contra Gonorrhæam</i> ex Michael.	t.2.p.573. & seq.
<i>Gummosa Clossæ</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.562
<i>de Gutta Gamandra</i> è Ph. Lond.	t.2.p.563
<i>ad Hamicraniam</i> Michael.	t.2.p.574
<i>Hepatica</i> Michael.	t.2.p.573
<i>de Hermodactylis majores Mesua</i> è Ph. August.	t.2.p.563
ibid.	ibid.
<i>de Hieracum Agarico</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>composita Nicol. Myrepsi</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Hiera Galeni</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Hydragoga</i> Mynsichti	t.2.p.576
<i>de Hydrargyro</i> ex Renodæo	t.2.p.563
<i>Hydropica</i> è Ph. Bat.	t.2.p.571
<i>Bontii</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.564
<i>Michaelis</i>	t.2.p.573
<i>ad Hydropem</i> è Ph. Persicâ	t.2.p.572
<i>Hydrotica</i> è Ph. Aug.	t.2.p.564
<i>Hypochondriaca</i> Michaelis	t.2.p.573
Ph. Norib.	t.2.p.564
<i>Sylvii</i>	ibid.
<i>Hysterica</i> è Ph. Bat.	t.2.p.571
Charraz	t.2.p.564
Cnæff.	t.2.p.132
<i>de Ladano Horstii</i> , è Ph. Schrod.	t.2.p.564
<i>appropriata</i> Michaelis	t.2.p.573
<i>Zvelferi</i>	t.2.p.564
<i>Iliaca Rhasis</i> è Ph. Schrod.	ibid.
<i>Immanuelis</i> è ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Imperiales incerti Authoris</i> , è Ph. Aug.	ibid.
<i>Inda Haly</i> ex Mesua, Ph. Aug.	ibid.
<i>Ipsa die</i> è Ph. Persicâ	t.2.p.573
<i>de Lapide Lazuli Mesua</i> è Ph. Aug.	t.2.p.565
<i>Libonitripica</i> è Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>Lucis majores</i> , è Ph. Aug.	t.2.p.65
<i>Linnæus Boylei</i>	ibid.
<i>Macri</i> è Ph. Lond.	ibid.
<i>Marocostina Mindereri</i> è Ph. Schrod.	ibid.
<i>Martiales</i> D. Jungken	t.2.p.566
<i>Mastichina Conciliatoris</i> , sive Petri Aponens, è Ph. Schrod.	ibid.
<i>Matthæi</i> , aliàs Starkii Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>Marricales</i> Michaelis	t.2.p.573
<i>Schefferi</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.566
<i>de Mechoacanna</i> Renodæi	ibid.
<i>Melanagoga</i> è Ph. Bat.	t.2.p.572
D. à Mynsicht.	t.2.p.576
<i>ad Memoriam</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.566
<i>ad Menses promovendos</i> Cnæff.	t.2.p.1134
<i>ad Menses faciendos</i> Michael.	t.2.p.573
<i>Mercuriales</i> D. Charraz	t.2.p.566
<i>Mesenterica</i> D. D' Aquin, ex D. Charraz.	t.2.p.567
<i>de Mezergo Mesua</i> , è Ph. Aug.	ibid.
<i>de Myrobolanorum 5 generibus</i> , è Ph. Aug.	ibid.
<i>Narcotica</i> D. à Mynsicht	t.2.p.575
<i>Plateri</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.567
<i>de Nitro diacolocynthidos Tralliano dicta</i>	ibid.
<i>de Ocho rebus</i> , seu Othomera Nicolai præpositi	ibid.
<i>Odontalgica</i> Mynsichti	t.2.p.575
<i>Zvelferi</i>	t.2.p.567
<i>Odorifera</i> Mynsichti	t.2.p.575

R E R U M.

<i>Pilule de Opoponace Mesua</i> , è Pharm. August.	t.2.
p.567	
<i>de Origano Cretico</i> Mynsichti	t.2.p.576
<i>Pacifica</i> è Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>Panchymagoga Quercet.</i> è Ph. Aug.	t.2.p.568
<i>Zvelferi</i>	t.2.p.567
<i>Papales</i>	t.2.p.568
<i>Pavii</i> è Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>Pectorales</i> D. Michaelis	t.2.p.574
Mynsichti	t.2.p.576
<i>Peruviana</i> Mynsichti	ibid.
<i>Pessilentiales Avicenna</i> è Pharm. August.	t.2.
p.568	
<i>Diemerbroeckii</i>	ibid.
<i>Plateri</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Rufi</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>composita</i> è Ph. Schrod.	ibid.
<i>de Pice</i> è Ph. Bat.	t.2.p.72
<i>Polychresta</i> Michaelis	t.2.p.576
è Ph. Schrod.	t.2.p.568
<i>Proprietatis</i> Michaelis	t.2.p.575
<i>Regia</i> è Ph. Persicâ	t.2.p.573
<i>contra Renum exulcerationem</i> Michaelis	ibid.
dem	
<i>Restringentes</i> è Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>de Rhabbarbo Mesua</i> è Pharm. August.	t.2.
p.568	
<i>Riverii in morbis desperatis</i>	t.2.p.574
<i>Rojata</i> D. à Mynsicht	t.2.p.576
<i>Rudii</i> è Ph. Lond.	t.2.p.569
<i>de Sabina</i> D. à Mynsicht	t.2.p.577
<i>de Sagapeno Mesua</i> è Pharm. August.	t.2.
p.569	
ex Ph. Bat.	t.2.p.573
<i>Quercetani</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.569
<i>de Sandaracha</i> D. à Mynsicht	t.2.p.577
<i>de Sarcocolla Mesua</i> è Ph. Aug.	t.2.p.569
<i>Senecutis</i> D. à Mynsicht	t.2.p.575
<i>Sinapina</i> ex Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>Sine quibus ipse nolo Nicolai</i> , è Pharm. Aug.	t.2.
p.569	
<i>Smaragdina</i> D. à Mynsicht	t.2.p.575
<i>Spadenses</i> D. de Maets	t.2.p.569
<i>Spei</i> è Ph. Persicâ	t.2.p.572
<i>Splenetica</i> Michaelis	t.2.p.573
D. à Mynsicht	t.2.p.576
<i>Zvelferi</i>	t.2.p.569
<i>Stiptica</i> D. à Mynsicht	t.2.p.577
<i>Stomachica Alkindi</i> è Ph. Aug.	t.2.p.569
<i>cum Gummi</i> , è Ph. Lond.	ibid.
<i>Michaelis</i> .	t.2.p.574
<i>Balsamica</i> Zvelferi	t.2.p.569
<i>ad strumas</i> è Ph. Persicâ	t.2.p.572
<i>de Syrace</i> è Ph. Aug.	t.2.p.569
è Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>Sylvii</i>	t.2.p.569
<i>de Succino Cratonis</i> è Pharm. August.	tom.2
p.570	
<i>de Succis</i> è Ph. Noriberg.	ibid.
<i>Sudorifera</i> D. Le Mort	ibid.
<i>de Tartaro Bontii</i> è Ph. Schrod.	ibid.
è Ph. Lond.	ibid.
<i>Quercetani à Sennerto Correcta</i>	ibid.
<i>Schroderi</i>	ibid.
<i>de Therebinthina simplices</i> D. Charraz	ibid.
D. à Mynsicht	t.2.p.576
<i>contra Gonorrhæam virulentam</i>	t.2.p.571
<i>cum Rhabbarbo</i>	t.2.p.566
<i>de Tribus</i> è Ph. Lond	t.2.p.577
<i>Turbib. Aurea Mesua</i> , è Pharm. Aug.	ibid.
<i>Varicana</i> è Ph. Bat.	t.2.p.572
<i>In Venerea lue</i> Michaelis	t.2.p.573
<i>Vernisfuga</i>	

INDEX RERUM.

<i>Pilula Vermifuga</i> è Ph. Bat.	t.2. p.572	<i>Porci partes officinales, & preparata</i>	tom.2. p.605.
de Vermibus, Anti-icterica & deoppilativa D. Maycine	t.2. p.571	<i>Porrum</i>	
<i>Vinum Roborantes</i> Michaelis	t.2. p.574	<i>Portulaca</i>	t.2. p.606
<i>Vomitoria</i> ex Ph. Bat.	t.2. p.572	<i>Potamogeton</i>	t.2. p.605
<i>Uterina</i> D. à Mynsicht	t.2. p.577	<i>Potentilla</i>	ibid.
<i>Pimpinella</i> , ejusque species	t.2. p.577. & seq.	<i>Poterium Lobelii</i>	ibid.
<i>Pinaster</i>	t.2. p.578	<i>Potio quid sit</i>	t.2. p.607
<i>Pincolatum quid sit</i>	t.2. p.579	<i>Potionum exempla varia</i>	ibid. & seq.
<i>Pincolatum Album</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Præcipitare, & præcipitatio</i>	t.2. p.608. ad 614.
<i>Viride</i> ex cad. Ph.	ibid.	<i>De Præcipitatione</i> Cl. Bohnii sententia	t.2. p.614. & seq.
<i>Pinei nuclei</i> , vide Pinus.		p.616	t.2.
<i>Pinguedo</i> , vide Adeps.		<i>Præcipitata</i> , vide Magisteria.	
<i>Pinguicula Gesneri</i>	ibid.	<i>Præcipitata ex Mercurio</i> , vide sub Titulo Mercurius.	
<i>Pinus</i>	ibid. & seq.	<i>Præparantia & digerentia Medicamenta quid sint</i>	t.2.
<i>Piper</i>	t.2. p.580	p.619. & seq.	
<i>Piper Indicum</i> , sive Capsicum	t.2. p.581	<i>Præparatio, & preparata</i>	t.2. p.620
<i>Piper aquaticum</i> , vide Peisicaria urens.		<i>Præparata usitata</i>	ibid.
<i>Piscis</i>	ibid.	<i>Præparatio Asellorum</i>	t.2. p.621
<i>Pisum</i>	ibid.	<i>Aluminis plumosi</i>	ibid.
<i>Pis. descriptio</i>	t.2. p.582	<i>Cornu Cervi, Alcis, Cranii humani &c.</i>	t.2. p.620
<i>Pisa artificialia pro fonticulis varia</i> è Ph. Bat.	ibi-	<i>Heltebori albi</i>	t.2. p.621
dem		<i>Niri</i>	ibid.
<i>Pissasphaltum</i> , vide Naphtha.		<i>Opii Thebaici</i>	ibid.
<i>Pistacia</i>	ibid.	<i>Pumicis Lapidis</i>	ibid.
<i>Pistareia Veneti</i>	t.1. p.793	<i>Silicum fluviatilium</i>	ibid.
<i>Pyrisa</i> , vide Esula.		<i>Terra Vitrioli dulcis</i>	ibid.
<i>Pix</i> , ejusque species	t.2. p.583. & seq.	<i>Testarum Cochlearum</i>	ibid.
<i>Planta quid sit</i>	t.2. p.584	<i>Præssum</i> , vide Marrubium.	
<i>Plantarum divisio generalis</i>	t.2. p.585. & seq.	<i>Primula Veris</i>	ibid. & seq.
<i>Plantago, & ejus species</i>	t.2. p.588. & seq.	<i>Probatio Metallorum</i> , vide Docimastice Metallica.	
<i>Plantanus</i>	t.2. p.589	<i>Propolis</i> , vide Cera sub Titulo Apis.	
<i>Plumbago, planta</i>	ibid.	<i>Pruna</i>	t.2. p.622
<i>Plumbum</i>	ibid.	<i>Pruna Laxativa</i>	t.1. p.781
<i>Plumbi minera</i> , ejusque conditiones	t.2. p.317	<i>Prunella Herba</i>	t.2. p.622
<i>Plumbi præparationes quanam sint</i>	t.2. p.589	<i>Prunella fructus</i> , vide Pr. na. Item Acacia Germanica.	
<i>purgatio</i>	t.2. p.590	<i>Pseudometanidium</i>	t.2. p.623
<i>Calcinatio reverberatoria</i> , unde Minium	ibid.	<i>Psyllium</i>	ibid. & seq.
<i>Cementatoria</i> , unde Plumbum ustum	ibidem	<i>Psilothra</i> , seu Depilatoria	t.2. p.624
<i>Immersio</i> , unde Saccharum, Magisterium, Lac Plumbi &c.	ibid. & seq.	<i>Psilothrorum aliquot formula</i> ex VVeickardo	ibid.
<i>Vapores</i> , unde Cerussa.	t.2. p.591	<i>Piarmica Medicamenta</i> , vide Errhina.	
<i>Destillatio</i> , unde spiritus, & oleum Plumbi	t.2.	<i>Piarmica Herba</i>	ibid.
p.593		<i>Pisanna quid sit</i> , & quomodo paretur	t.2. p.625
<i>Sublimatio</i> , unde Sal volatile plumbi	tom.2.	& seq.	
p.594		<i>Pugillus</i> , vide sub Titulo Mensura.	
<i>Extractio</i> , unde Sulphur & Tinctura varix plumbi	ibid.	<i>Pulegium</i>	t.2. p.626
<i>Mercurificatio</i> , unde Mercurius plumbi	t.2. p.595	<i>Pulicaria</i> , vide Psyllum.	
<i>Salificatio</i> , unde Sal Saturni verum	ibid.	<i>Pulmo Vulpis</i> , vide Vulpes.	
<i>Plumbum Nigrum</i> , vide Nigrica Fabrilis.		<i>Pulmonaria</i> , ejusque species	ibid. & seq.
<i>Pneumonica</i> , vide Pectoralia.		<i>Pulmonaria Medicamenta</i> , vide Pectoralia.	
<i>Pocula febrilia</i> D. Cnæff.	t.1. p.915	<i>Pulpa quid sit</i>	t.2. p.627
<i>Polium</i>	t.2. p.596	<i>Pulpa Cassie simplex</i> ex Ph. Aug.	ibid.
<i>Polygala</i>	ibid.	<i>composita</i> , seu extracta, ex cad. Ph.	ibid.
<i>Polygonatum</i>	ibid.	<i>Prunorum</i> ex cad. Ph.	ibid.
<i>Polygonum</i> , vide Centinodia.		<i>Tamarindorum</i> ex cad. Ph.	ibid.
<i>Polypodium</i>	ibid.	<i>Pulsatilla</i>	ibid.
<i>Polytricon</i> , vide Adiantum.		<i>Pulverisare, & pulverisatio</i> , vide sub Titulo comminutio.	
<i>Pompholix</i> , vide Tutia.		<i>Pulvis quid sit</i>	ibid. & seq.
<i>Pomum in Genere</i> , vide Malum.		<i>Pulverum simplicium exempla aliquot</i>	t.2.
<i>Pomum Ambra</i> è Ph. Aug.	t.1. p.597	p.629	
<i>pretiosum</i> ex Zvvelfero	t.2. p.598	<i>Pulvis contra Abortum</i>	t.2. p.630
<i>Poma Ambra varia</i>	t.2. p.597. & 1007	<i>Zvvelferi</i>	ibid.
<i>Pomum Odoriferum Crollianum</i>	ibid.	<i>Absorbens Wedelii</i>	ibid.
<i>Epilepticum</i> Cnæff.	t.1. p.537	<i>Acidus ex succo limonum</i> D. Cnæff.	t.2. p.443
<i>Febrile</i> ejusdem	t.1. p.915	<i>Adstringens Galeni</i> , è Ph. Aug.	t.2. p.630
<i>Uterinum</i> Cnæffelianum	t.2. p.1133	<i>Aethiopicus</i> è Ph. Bat.	t.2. p.650
<i>Pondus</i> , vide de eo sub Titulo Mensura.		<i>Albus</i> ex cad. Ph.	ibid.
<i>Populus Arbor</i> , ejusque species	t.2. p.598	<i>Alexicacus</i> D. Laurentii	t.2. p.663
<i>Porcus, & Porcinum genus</i>	ibid. & seq.	<i>Alexipharmacus, & cordialis</i> D. Podchozinski	t.1. p.635
<i>Manget. Bibl. Pharm.</i>		<i>Alexiarius</i> D. Barbetie	t.2. p.631
		H h h h h	<i>Viperinus</i>

INDEX RERUM

<i>Pulvis Alexiterius Viperinus</i> , ex Hoffm.	t.2.p.653	<i>Pulvis Bezoardicus Nicolai Praepositi</i> ex Ph. Aug.	t.2.
<i>Specificus Sala</i> , è Ph. Schrod.	t.2.p.630	p.632	
<i>Althea</i> è Ph. Lond.	t.2.p.631	Timæi	t.1.p.650
<i>de Ambra Mesua</i> ex Ph. Aug.	ibid.	Vvedelii	t.2.p.633
<i>Analepticus frigidus</i> è Ph. Aug.	ibid.	Zvvelferi	t.2.p.632
<i>in Angina laudatissimus</i> ex Bierling.	t.2.p.657	& seq.	
<i>Anglicus</i> , seu Comitissæ de Kent	t.2.p.635	<i>Buxtehudensis</i> ex collect. Bierling.	t.2.
<i>de Aniso Mesua</i> ex Ph. Aug.	t.2.p.631	p.657	
<i>Anodynus Ludovici</i>	ibid.	<i>Cachecticus</i> ex Bierling.	t.2.p.661
<i>Anonymus</i> è Ph. Aug.	ibid.	ex Hoffman.	t.2.p.654
<i>Antapoplecticus Regius Cnœffellii</i>	t.2.p.528	Ludovici	t.2.p.634
Zvvelferi	t.1.p.631	<i>Quercetani</i> è Ph. Aug.	t.2.p.633
<i>Antiepilepticus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.651	<i>ad Cadavera condienda</i> , vide sub Titulo Balsama-	
D. Charraz	t.2.p.637	tio.	
D. Cnœffellii	t.1.p.531	<i>ad Calculum</i> ex Ph. Aug.	t.1.p.634
Dania Regis	t.2.p.659	è Ph. Bat.	t.2.p.650
D. Doreri	t.2.p.663	ex Bierling.	t.2.p.658
D. Heidleri	t.2.p.661	P. Capucin. Vitzsburg.	t.2.p.661
ex Hoffm.	t.2.p.652	<i>pro Dania Rege fortior</i>	t.2.p.658
D. Lujæ	t.2.p.661	mitior	ibid.
<i>Magistralis</i> ex Timæo	t.2.p.649	D. Doreri	t.2.p.662
<i>Mirabilis Mynsicht</i>	t.2.p.663	D. Rosæ	t.2.p.658
Ph. Noriberg.	t.2.p.638	D. Plateri	ibid.
Peuceri	t.2.p.659	<i>de Canceris</i> ex Ph. Persic.	t.2.p.654
<i>pro pueris</i> D. Podchozinski	t.1.p.531	<i>contra Cancrum</i> D. Andigethi ex Bierling.	t.2.
<i>Rubens</i> ex Ph. Norib.	t.2.p.638	p.657	
Rudolphi 2. Imperat.	t.2.p.661	<i>Cantianus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.651
<i>de secundina</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.637	<i>Capitalis Agricolæ</i>	t.2.p.659
<i>diaphoreticus</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Cardiacum Corallatus</i> ex Ph. Bat.	t.2.p.651
Timæi	t.2.p.659	<i>Eboratus</i> ex ead. Ph.	ibid.
Baronis à Wallenstein	t.2.p.661	<i>Perlatus</i> ex ead. Ph.	ibid.
Weickardi	t.2.p.637	<i>Rubens</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Viridis</i>	t.2.p.662	<i>Magistralis</i> è Ph. Lond.	t.2.p.654
ex Bierling.	ibid.	<i>Carminativus</i> ex Bierling.	t.2.p.659
S.R.M. Uladislai IV.	t.1.p.530	ex Hoffm.	t.2.p.654
Zvvelferi	t.2.p.638	D. à Mynsicht	t.2.p.658
<i>Anticardialgicus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.650	ex Timæo	t.2.p.650
<i>Anticolicus</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>ad Casum</i> è Ph. Aug.	t.2.p.634
<i>Antidotalis</i> Bierling.	t.2.p.659	è Ph. Bat.	t.2.p.651
<i>Antidysentericus</i> ex Bierling.	t.2.p.657	Zvvelf.	t.2.p.634
<i>Anisfebrilis</i> ex Hoffm.	t.2.p.653	<i>pro Cataplasmate in fracturis & luxationibus os-</i>	
perlatus ex Timæo	t.2.p.650	sum	t.2.p.1138
<i>Aninephriticus</i> ex Hoffm.	t.2.p.654	<i>Cathareticus pro ossibus</i> S. Closs. è Pharm. Schrod.	
<i>Pulveres Antiphibisici varii</i> ex eodem	t.2.p.652	t.2.p.634	
<i>Antipleurici varii</i> ex eodem	t.2.p.653	<i>in Catarrhis pro fumo</i> ex Michael.	t.2.p.656
<i>Pulvis Antipodagricus</i> D. Andersoni Angli	t.2.	<i>pro insperione</i> ex eodem	ibid.
p.659		<i>Causicus D. Casseri</i> ex Bierling.	t.2.p.657
<i>Anipyreticus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.650	<i>Cephalicus Arnisæi</i>	t.2.p.659
<i>Aperitivus Spleneticus</i> ex Hoffm.	t.2.p.654	Frankfurtentium	t.2.p.634
<i>contra Apoplexiam</i> è Ph. Aug.	t.2.p.631	<i>pro suffum</i> S.R. Cæcilæ Renatz	t.1.
Zvvelferi	ibid. & seq.	p.529	
<i>Ari radicum compositus</i> è Ph. Lond.	t.2.p.632	ex Timæo	t.2.p.649
<i>Aromaticus caryophyllatus Mesua</i> è Ph. Aug.	ibid.	Zvvelferi	t.2.p.634
<i>Rosatus Gabrielis</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Chelis cancerorum compositus</i> è Ph. Lond.	ibid.
<i>Arterialis Musitani</i>	t.1.p.285	<i>Chelidonium</i> è Pharm. Lond.	t.2.
<i>Arthriticus Turneri</i> è Ph. Bat.	t.2.p.650	p.635	
<i>Paracelsi</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.632	<i>Cholagogus Insuccatus</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Asthmaticus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.650	<i>Chalybeatus Cnœffellii</i>	t.2.p.1133
<i>Auratus</i> Zvvelferi	t.2.p.632	<i>Cholagogus simplex</i> è Ph. Aug.	t.2.p.635
<i>Aureus pretiosus Doreri</i>	t.2.p.662	seu species Cholagoga Mynsichti	t.2.p.668
ex talcolis Timæi	t.2.p.650	<i>Quercetani</i> è Ph. Schrod.	t.2.p.655
<i>Basilicus</i> è Ph. Bat.	ibid.	ex Timæo	t.2.p.649
<i>Bezoardicus albus Rolfini.</i> ex Bierling.	t.2.	<i>Cibarius</i> ex Ph. Bat.	t.2.p.651
p.657		<i>Chelidonium Avicenna</i> è Ph. Aug.	t.2.p.635
Charraz	t.2.p.633	<i>Cinnabaris compositus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.651
cum pretiosis Francofurt.	ibid.	<i>contra Colicam Arnisæi</i>	t.2.p.656
sive pretiosis F.F.	ibid.	Doreri	t.2.p.662
ex Hoffman.	t.2.p.653	Schalleri	t.2.p.659
<i>Imperialis Mynsichti</i>	t.2.p.663	<i>pro Collyrio</i> D. Andreæ	t.2.p.661
Laurentii	t.2.p.662	<i>Comitissa de Kene</i> , ex Charraz Ph. Reg.	t.2.p.655
<i>Magistralis</i> è Ph. Lond.	t.2.p.632	ex Jungken	ibid.
D. à Mynsicht	t.2.p.663	<i>Comitis de Vvarovich</i> è Ph. Aug.	ibid.
		<i>Pulvis Confortans</i>	

INDEX R E R U M.

<i>Pulvis Confortans Muffatii</i> ex Bierling.	t.2.p.657	<i>Pulvis Diamoschu amari</i> à Ph.Lond.	t.2.p.643
& Specific.Michael.	t.2.p.656	<i>Dulcis Mesue</i> à Ph.Aug.	ibid.
<i>Corallatus ad menstruum fluxum</i> ex Cnœffelio	t.2.p.1134	<i>Diamunie</i> D.à Mynsicht	t.2.p.666
<i>ad Cordis palpitationem</i> ex Hoffmanno	t.2.p.653	<i>Dianisy Mesue</i> à Ph.Aug.	t.2.p.631
<i>seu species cordiales temperata</i> ex Pharm.August.	t.2.p.635	<i>Dianius</i> à Ph.Lond.	ibid.
<i>Alexand.Bened.</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Dianiri</i> D.à Mynsicht	t.2.p.665
<i>Cordialis aureus</i> Cnœffellii	t.2.p.635	<i>Diabolibani</i> ejusdem	t.2.p.666
<i>Bezoardicus</i> ex Hoffm.	t.2.p.653	<i>Diapeniason Nicolai</i> à Ph.Aug.	t.2.p.644
<i>In Saxonicis & Brandenburgicis officinis</i>	ibid.	<i>Diaphoreticus ad morbum Gallicum</i> Bierling.t.2.	
<i>usitatus, ex eodem</i>	ibid.	p.658	
<i>Nymmanni</i>	t.2.p.659	<i>Diurnus</i> D.Cnœffellii	t.1.p.718
<i>pretiosus ex Timæo</i>	t.2.p.636	<i>Nocturnus</i> ejusdem	ibid.
<i>Cornachini</i> à Ph. Bat.	t.2.p.651	<i>Reinesii</i>	t.2.p.660
<i>Coronatus</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Diaplanginis</i> D.à Mynsicht	t.2.p.666
<i>Corpus impinguiatum gracile reddens</i> à Ph. Persicâ	t.2.p.655	<i>Diaprasin Nicolai</i> à Ph. Aug.	t.2.p.645
<i>Cosmericus</i> Cnœffellii	t.1.p.670	<i>Diarrhodon Abbatis Nicolai</i> à ex Pharm. Aug.	t.2.p.646
<i>Cremoris tartari purgans</i> Arnisæi	t.2.p.658	<i>DiaSaturni</i> D.à Mynsicht	t.2.p.664
<i>Crimalis</i> à Ph. Bat.	t.2.p.651	<i>Diaspoliteicon Galeni</i> à Ph. Aug.	t.2.p.646
<i>Cucuphalis</i> à Ph. Bat.	ibid.	<i>Diasucini</i> D.à Mynsicht	t.2.p.665
<i>de Cypero Odoriferus</i> à Pharm. Schrod.	t.2.	<i>Diasulphuris</i> D.à Mynsicht	t.2.p.664
p.616		<i>Diatabaci</i> ejusdem	t.2.p.666
<i>Cyprius Comititis</i> à Solus	t.2.p.661	<i>Diathamaron Nicolai</i> à Ph.Aug.	t.2.p.647
<i>Moschatius</i> ejusdem	ibid.	<i>Diataritari</i> D.à Mynsicht	t. p.665
<i>Violato Moschatius</i> ejusd.	ibid.	<i>Diatherebinthina</i> ejusdem	t. p.666
<i>Mos hatius</i> D.à Mynsicht	t.2.p.669	<i>Diatrageacanthum frigidum Nicolai</i> à Phar. Aug.	t.2.p.648
<i>Violato rosatus</i> ejusdem	ibid.	<i>calidum</i> ejusdem, ex ead.Ph.	ibid.
<i>pretiosus Zvvelf.</i>	t.2.p.636	<i>Diatrion pipereon Galeni</i> à Ph. Aug.	t.2.p.644
<i>Contra defluxiones Francosure.</i> à Pharm. Schrod.	ibid.	<i>Mesue</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Pulveres dentes dealbantes & confirmanes</i>	tom. 1.	<i>Diatrion Santalon Nicolai & Myrepsi</i> à Ph.Aug.	t.2.p.646
p.669		<i>Diaturbith cum rhabarbato</i> Pharm. Norimberg.	t.2.p.648
<i>Pulvis in dentium vacillatione</i> Bierlingii	t.2.p.660	<i>DiaVeneris</i> D.à Mynsicht	t.2.p.664
Michaelis	t.2.p.656	<i>DiaVirrioli</i> ejusdem	t.2.p.665
<i>Pulveres dentificii varii</i>	tom.2. p.450. 656.660.	<i>Diazilaloës Mesue</i> à Ph. Aug.	t.2.p.649
& 663		<i>Diazingiber Nicolai</i> Ph. Aug.	ibid.
<i>Pulvis Deopillativus Zvvelferi</i>	t.2.p.643	<i>Digestivus ordinarius</i> D.Cnœffellii	t.1.p.733
<i>Diabalanstia</i> D.à Mynsicht	t.2.p.666	<i>in ardore urina</i> ejusdem	ibid.
<i>ad Diaberen</i> à Ph. Persicâ	t.2.p.655	<i>Ordinarius Uladislaï IV.</i>	t.1.p.731
<i>Diaborracis</i> D.à Mynsicht	t.2.p.666	Michaelis	t.2.p.655
<i>Diabuglossi</i> ejusdem	ibid.	<i>Dysentericus</i> ex Bierling.	t.2.p.660
<i>Diacalamenibes Galeni</i> à Ph. Aug.	t.2.p.624	<i>Castrensis</i> Cnœff.	t.2.p.750
<i>Mesue</i> ex ead Ph.	ibid.	<i>Crollii</i> à Ph.Schrod.	t.2.p.632
<i>Diacinnabaris</i> D.à Mynsicht	t.2.p.665	<i>Doteri</i>	t.2.p.662
<i>Diacinnamomi Mesue</i> à Ph. Aug.	t.2.p.635	<i>Hoffm.</i>	t.2.p.661. & seq.
<i>Diaconitem sine speciebus</i> à Ph.Baud.	t.2.p.636	<i>Langii</i> à Ph. Aug.	t.2.p.637
<i>Diaceræ</i> D.à Mynsicht	t.2.p.665	Michaelis	t.2.p.656. & seq.
<i>Diacrifalli</i> ejusdem	ibid.	<i>D.à Mynsicht</i>	t.2.p.667
<i>Diacube arum</i> à Ph. Schrod.	t.2.p.635	<i>ex Timæo</i>	t.2.p.650
<i>Diacuminu Nicolai</i> à Ph.Aug.	ibid.	<i>Zvvelferi</i>	t.2.p.637
<i>Diacurcuma Mesue</i> ex ead.Ph.	ibid.	<i>Electoris Saxonie</i>	t.2.p.658
<i>Diaesula</i> D.à Mynsicht	t.2.p.667	<i>Electuarii Ducis ex Nicolao</i> , Pharm. August.	t.2.p.637
<i>Diagalange Mesue</i> à Ph Aug.	t.2.p.639	<i>Jusini</i> ex Nicolao. à Ph.Aug.	ibid.
<i>Diaphysopu Nicolai</i> à Ph. Aug.	t.2.p.641	<i>Epidemicus Aureus</i> à Ph. Bat.	t.2.p.651
<i>Diajalapæ</i> D.à Mynsicht	t.2.p.667	<i>Epilepticus</i> D.Cnœffel.	t.1.p.530
<i>Diajevis</i> ejusdem	t.2.p.664	<i>Doteri</i>	t.2.p.66
<i>Diareos simplex</i> à Ph. Aug.	t.2.p.641	<i>Hoffman.</i>	t.2.p.652
<i>Salomonis ex Nicol. Myrepsi.</i> à Ph.Aug.	ibid.	<i>Mirabilis</i> Mynsicht	t.2.p.663
<i>Usitata</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Pulveres Epileptici varii</i>	t.2.p.638
<i>Dialacca major Mesue</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Pulvis pro Epithemate cordis</i> à Ph. Aug.	ibid.
<i>Dialauri</i> D.à Mynsicht	t.2.p.667	<i>Zvvelferi</i>	ibid.
<i>Dialuna</i> ejusdem	t.2.p.663	<i>Hepatis</i> à Ph. Aug.	t.2.p.639
<i>Diamajorana</i> ejusdem	t.2.p.666	<i>Errhinus</i> à Ph. Aug.	t.2.p.653
<i>Diambra Mesue</i> ex Ph.Aug.	t.2.p.631	<i>Erysipelatodes</i> D.à Mynsicht	t.2.p.669
<i>Diamargariti Calidi Avicenna</i> à Pharm. August.	t.2.p.642	<i>Farina Virginea nobilis dictus,</i> ex Mynsicht	t.2.
<i>Frigidi</i> ex ead.Ph.	ibid.	p.668	
<i>Diamayri</i> D.à Mynsicht	t.2.p.664	<i>Febrilis, seu contra febrem</i> Arnisæi	t.2.p.660
<i>Diane curii</i> ejusdem	ibid.	<i>Certus</i> à Ph. Bat.	t.2.p.651
<i>Manget. Bibl. Pharm.</i>		<i>D. Cablovvitzki</i>	t.1.p.912
		<i>H h h h h</i>	D. Charraz

INDEX RERUM.

<i>Pulvis Febrilis</i> D. Charraz	t. 2. p. 639	<i>Pulvis Mantuanus</i> Ph. Noriberg.	t. 2. p. 642
Crollii	ibid.	<i>Manualis</i> ex Bierling.	t. 2. p. 660
Hoffmanni	t. 2. p. 653	ex Michael.	t. 2. p. 656
<i>Lithuanicus</i> Georgii Iuſchs	t. 1. p. 912	<i>Odoratus</i> D. à Mynſicht	tom. 2. p. 669
<i>Probatuſ</i> D. à Mynſicht	t. 2. p. 668	& 925.	
<i>Senſ ſpecies febrifuga</i> Mynſichti	ibid.	<i>Pulveres Mannuſ dealbantes</i>	t. 1. p. 670
<i>Specificuſ</i> D. Podchoziński	t. 1. p. 912	<i>Pulvis Marchionis Epilepticuſ</i> è Pharm. Auguſt.	t. 2.
<i>Riverſi</i> ex D. Charraz	t. 2. p. 639	p. 642.	
ex Rolſincio	ibid.	<i>De Margaritiſ</i> è Ph. Perſic.	t. 2. p. 654
Sennerti	t. 2. p. 660	<i>Martialiſ compoſituſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 651
ex Schroderi Ph.	t. 2. p. 639	<i>Melanagoguſ Quercet.</i> è Ph. Schrod.	t. 2. p. 642
Stützel Eremitæ	t. 1. p. 912	Timæi	t. 2. p. 649
<i>Contra fluorem albuſ</i> Timæi	t. 2. p. 650	<i>Ad Memoriam reſtaurandam</i> Anderſoni Angli	t. 2. p. 659
<i>Ad ſudorem anheluſ</i>	t. 2. p. 658	Rolſincii	ibid.
<i>In fœtuſ moriunt expulſione</i> D. Krauſenſ tom. 2.	p. 661.	<i>Contra menſuſ fluxuſ</i> Agricolaë	t. 2. p. 657
<i>Pro ſumo</i>	t. 2. p. 660	<i>Ad menſeſ promovuendos</i> ex Cnœſſ.	t. 2. p. 1133
<i>Pro ſumo tempore peſtiſ</i> D. Leuſchneri	t. 2. p. 663	<i>Menſtruſ provocanſ</i> Timæi	t. 2. p. 650
D. Mochingeri	ibid.	<i>Siſſenſ</i> ejuſd.	ibid.
<i>De Gemmiſ frigidiſ</i> Meſua è Ph. Auguſt.	t. 2.	<i>Contra morbilloſ</i> ejuſd.	ibid.
p. 639		<i>Ad morſuſ Caniſ rabidi</i> è Pharm. Norib.	t. 2.
<i>calidiſ</i> ex ead. Ph.	ibid.	p. 643.	
<i>Ad Gonorrhœam</i> ex Anglia	t. 2. p. 662	<i>Ad Naſalia</i> è Ph. Aug.	ibid.
Michaeliſ	t. 2. p. 656	<i>De Naſurtio</i> è Ph. Perſic.	t. 2. p. 652
<i>Gravidarum præſervativuſ</i> D. Pleiſneri	t. 2. p. 657	<i>Nephriticuſ</i> è Ph. Amſtelod.	t. 2. p. 643
<i>Grifeuſ contra peſtem</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 640	Charraz	ibid.
è Ph. Bat.	t. 2. p. 651	Hoffmanni	t. 2. p. 652
<i>De Gutta antepilepticuſ</i> D. Lemery	t. 2. p. 640	<i>Senſ ſpecies Nephritica</i> Mynſichti	t. 2.
<i>Hamopticoſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 651	p. 668	
<i>Ad Hamophyſin</i> ex Hoffm.	t. 2. p. 653	<i>Quercetani</i> è Ph. Schrod.	t. 2. p. 643
<i>Contra Hamorrhagiã</i> D. Hertod.	t. 2. p. 640	Timæi	t. 2. p. 650
Zvelferi	ibid.	<i>Odoratuſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>Hamorrhoidaleſ variuſ</i> ex C. æſſelio	t. 2. p. 904	<i>Ophthalmicuſ</i> ejuſd. Ph.	ibid.
<i>Hamorrhoidaliſ</i> D. Lemery	t. 2. p. 640	<i>externuſ</i> Michaeliſ	t. 2. p. 656
D. à Mynſicht	t. 2. p. 668	<i>internuſ</i> ejuſd.	ibid.
<i>Hepaticuſ</i> D. Cnœſſeli	t. 1. p. 976	D. à Mynſicht	t. 2. p. 664
<i>Ruber Dreſdenſ.</i> ex Hoffm.	t. 2. p. 654	<i>Oſvaldi, pulveri VVeinlini hand abſimiliſ</i>	t. 2.
<i>Quercetani</i> è Ph. Schrod.	t. 2. p. 640	p. 658.	
Timæi	t. 2. p. 650	<i>Oxytocuſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>Rubeuſ</i> Zvelferi	t. 2. p. 640	<i>Panchymagoguſ</i> Timæi	t. 2. p. 649
<i>Pulveres Hepatici variuſ</i> ex cod.	ibid.	<i>Pannonicuſ ruber</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 645
<i>Pulvis Hermodactylorum compoſituſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 651	è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>Contra Herniaſ</i> Quercet. è Ph. Schrod.	t. 2. p. 640	<i>Paruſ provocanſ</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 643
<i>Senſ ſpecies de Hyacinto</i> è Ph. Aug.	ibid.	Doreri	t. 2. p. 663
<i>Hydragoguſ</i> Timæi	t. 2. p. 649	Helidæi de Paduanis	t. 2. p. 643
<i>Hydragoguſ</i> Zvelferi	t. 2. p. 640. & ſeq.	Michaeliſ	t. 2. p. 656
<i>Hystericuſ</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 641	Ph. Norib.	t. 2. p. 643
è Pharm. Bat.	t. 2. p. 651	<i>& tormina ſedant</i> è Ph. Schrod.	
Charraz	t. 2. p. 641	ibidem	
Hoffmanni	t. 2. p. 654	<i>Paſſavanticuſ</i> è Ph. Schrod.	t. 2. p. 644
<i>Iovialiſ</i> è Ph. Schrod.	t. 2. p. 641	<i>Pectoraliſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>Quercetani</i> è Ph. Schrod.	ibid.	Bierlingii	t. 2. p. 662
Timæi	t. 2. p. 650	<i>Baſamicuſ</i> ex Hoffm.	t. 2. p. 653
Zvelferi	t. 2. p. 641	Michaeliſ	t. 2. p. 656
<i>Iſtericuſ</i> Ph. Bat.	t. 2. p. 651	<i>Pepticuſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>Specificuſ</i> Michael.	t. 2. p. 655	ex Bierlingio	t. 1. p. 657
<i>Ieſuitarum memoria conſecraſſimuſ</i>	t. 2. p. 660	<i>Perſumatoriuſ</i> ex cod.	t. 2. p. 662
<i>Senſ ſpecies Imperatoruſ</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 641	<i>Contra peſtem</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 644
<i>Inaurauſ</i> è Bierlingio Germanicè deſcriptuſ	t. 2.	<i>Peſtilentialiſ</i> Imperatoruſ Ferdinand.	2. tom. 2.
p. 660.		p. 661.	
<i>Indaicuſ</i> è Ph. Perſica	t. 2. p. 654	<i>Phlegmagoguſ</i> Bierling.	ibid.
<i>Pro Laſte generando</i> Zvelferi	t. 2. p. 641	Quercetani & Salæ	t. 2. p. 644
<i>Laſificanſ</i> Galeni è Ph. Aug.	t. 2. p. 642	Timæi	t. 2. p. 659
Rhaſiſ ex ead. Ph.	ibid.	<i>Senſ ſal Philoſophoruſ</i> è Pharm. Schrod.	tom. 2.
<i>Lateralis</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 651	p. 644	
<i>Laxativuſ completuſ</i> Schneideri	t. 2. p. 657	<i>Pleruſ-arconicon</i> Nicol. è Ph. Schrod.	ibid.
<i>Mineraliſ ſimplex</i>	t. 2. p. 658	<i>Pleuriticuſ</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Lentivuſ</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 642	<i>Propileoliſ</i> S. R. M. Uladiſlai IV.	t. 1. p. 529
<i>Liberanſ</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Pleuriticuſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>Liliacenuſ</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 651	ex Bierlingio	t. 2. p. 657
<i>Lithontripcticuſ</i> Nicolai è Ph. Aug.	t. 2. p. 642	ex Hoffmanno	t. 2. p. 653
<i>Contra Lumbricoſ</i> Timæi	t. 2. p. 650	Ludoviçi	t. 2. p. 645
		D. à Mynſicht	

INDEX R E R U M.

<i>Pulvis pleuriticus</i> D. Mynsichti	t. 2. p. 667	<i>Pulvis ad strumas</i> ex Ph. Bat.	t. 2. p. 652
Timæi	t. 2. p. 650	Donzelli	t. 2. p. 647
<i>Polichrestus imperialis</i> Mynsichti	t. 2. p. 667	ex ph. Norib.	ibid.
Schneideri	t. 2. p. 657	<i>Suaevolens</i> ex Bierling.	t. 2. p. 657
<i>Nobilis</i> ejusdem	ibid.	<i>Sudoriferus</i> D. Lemort	t. 2. p. 647
<i>Pretiosus</i> Brenneri	t. 2. p. 663	<i>Ad suppositoria</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Probanus ad sanandas Variolas</i> ex Mynsichti	t. 2. p. 668.	Zvvelferi	ibid.
<i>Ptarmicus</i> Reinesii	t. 2. p. 660	<i>Sympatheticus</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>in Phthisi</i> ex Michaële	t. 2. p. 655	<i>Syrus</i>	t. 2. p. 799
<i>Puerorum</i> ex Bierling.	t. 2. p. 659	<i>Thuraloës</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 648
<i>Pulmonarius Altenburgensis</i> ex Bierlingio, ibi-		<i>Tragea varia</i> è Ph. Aug.	ibid.
dem		<i>Tribemii</i> è Pharm. Schrod.	ibid.
<i>Pulveres Purgantes Varii</i> ex Michaël.	t. 2. p. 655	<i>Contra infim Infantium</i> D. à Mynsicht.	t. 2. p. 665
<i>Pulvis Purgans ex antimonio per secessum</i>	t. 2. p. 658	è Ph. Norib.	t. 2. p. 648
Scott. Manchreni	ibid.	Zvvelferi	ibid.
ex Sulphure	ibid.	<i>Contra Variolas</i> ex Timæo	t. 2. p. 650
<i>Purpureus</i> ex Ph. Bat.	t. 2. p. 652	<i>De Verbasco</i> D. à Mynsicht	t. 2. p. 668
vide Arcanum Alemeth. Cnœffellii		<i>Ad Vermes</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 648
<i>Pyrus</i>	t. 2. p. 669	è Pharm. Bat.	t. 2. p. 652
<i>ad Rachitidem</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652	ex Bierlingio	t. 2. p. 660
<i>Resectivus</i> ex Mynsicht.	t. 2. p. 665	Charraz	t. 2. p. 649
<i>Resumptivus</i> L. Beieri	t. 2. p. 663	Zvvelferi	ibid.
<i>Rosata Novella Nicol.</i> è Pharmac. August.	t. 2. p. 645	<i>Ad Vestes odoriferas</i>	t. 2. p. 925
<i>Rosetta Isalorum dictus</i>	t. 1. p. 670	<i>Violatus odoratus</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 649
<i>Rubens Pannonicus</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 645	<i>Viridis contra verriginem</i> ex Bierling.	t. 2. p. 663
<i>Contra Pestem</i> ex cad. Pharm.	ibid.	<i>Vna Comitum de Salzburg.</i>	t. 2. p. 662
<i>Sabandicus</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>pro Ulceribus Gutturis</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 649
<i>Sarceticus</i> D. Charraz	t. 2. p. 646	<i>Ad Urinam cruentam</i> è Pharmac. Persic.	t. 2. p. 654.
<i>Saxifragia compositus</i> è Ph. Lond.	ibid.	<i>Uterinus</i> ex Bierling.	t. 2. p. 659
<i>Saxonicus</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Vulnerarius</i> Zvvelferi	t. 2. p. 649
<i>in Scirrho Hepatis, & lienis</i> D. Fabricii	t. 2. p. 657	<i>Voularis</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652
<i>Sena Montagnana</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 646	<i>Pumex, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 86. & 669
<i>Compositus major</i> è Ph. Lond.	ibid.	<i>Ex Pumice preparata</i>	t. 2. p. 131
<i>Sine pari</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652	<i>Purgantia Medicamenta quid, & quæ sint</i>	t. 2. p. 669
<i>Solaris</i> D. Cnœffellii	t. 1. p. 634	& seq.	
& <i>acidula</i> D. Dietrici	t. 2. p. 660	<i>De Purgantibus Medicamentis non usitatis</i>	t. 2. p. 672
<i>Solearis</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 652	& seq.	
<i>Solutivus</i> è <i>crystallis tartari</i> , è Pharm. August.	t. 2. p. 647	<i>De Purgantibus rarius usitatis</i>	t. 2. p. 674. & seq.
<i>Magistralis</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 646	<i>De Purgantibus usitatioribus, & Selectis</i>	tom. 2. p. 677
<i>de tribus</i> ex cad. Ph.	ibid.	& seq.	
Timæi	t. 2. p. 649	<i>De Purgantibus aliis</i>	t. 2. p. 683. & seq.
<i>Contra Somnia horribilia</i> ex Timæo	ibid.	<i>Purpurea</i>	t. 2. p. 685. & seq.
<i>Sperniola</i> è Ph. Norib.	t. 2. p. 646	<i>Putreficare, & Putrefactio</i>	t. 2. p. 686. & seq.
<i>Spleneticus</i> Timæi	t. 2. p. 650	<i>Pyracem</i>	t. 2. p. 690
<i>Ad Sputum cruentum</i> è Ph. Persic.	t. 2. p. 654	<i>Pyresbrum</i>	ibid.
<i>Stegnoticus Caspari Guttmanni</i> è Pharm. August.	t. 2. p. 646	<i>Pyrites, vid. sub titulo Lapis</i>	
<i>Sternutatorius</i> Anderloni Angli	t. 2. p. 659	<i>Pyrola</i>	t. 2. p. 691
ex Ph. Aug.	t. 2. p. 646	<i>Pyrotica, seu Caustica</i>	ibid. & seq.
ex Ph. Bat.	t. 2. p. 652	<i>Pyrus</i>	t. 2. p. 692
Joh. Baumanni	t. 2. p. 647	<i>Pyrastrum, seu Pyrum Sylvestre</i>	t. 2. p. 693
ex Bierlingio	t. 2. p. 662		
<i>Cephaticus</i> Cnœffellii	t. 2. p. 529		
Michaëlis	t. 2. p. 656		
ex Ph. Norib.	t. 2. p. 647		
<i>Rulandi</i> è Ph. Schrod.	ibid.		
Zvvelferi	ibid.		
<i>Stipticus</i> D. à Mynsicht	t. 2. p. 666		
externus	t. 2. p. 972		
<i>Stomachicus</i> Bertoldi	t. 2. p. 657		
<i>Birkmanni</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 647		
è Ph. Bat.	t. 2. p. 652		
Bierlingii	t. 2. p. 657		
<i>Nobilis</i> Mynsichti	t. 2. p. 667		
<i>Seu species stomachica</i> Mynsic.	ibid.		
Timæi	t. 2. p. 650		
Zvvelferi	t. 2. p. 647		
<i>Ad strumas</i> Arnoldi de Villanova è Ph. Aug.			
ibidem.			
Mangeti Bibl. Pharm.			

Q.

<i>Quercula, vid. Chamædrys</i>	
<i>Quercus</i>	t. 2. p. 693. & seq.
<i>Quinquina quid sit</i>	t. 2. p. 695. & seq.
<i>Quinquina varia preparata Medicamenta</i>	t. 2. p. 697. & seq.

R.

<i>Radicula Sylvestris</i>	t. 2. p. 699
<i>Radix quid sit</i>	t. 2. p. 700. & seq.
<i>Radices officinales usitatiores, quænam sint</i>	t. 2. p. 702
<i>Radix Brasiliensis, vid. Ypecacuanha</i>	
<i>Radix Dulcis, vid. Liquiritia</i>	
<i>Radix Yerva, vid. Contrayerva</i>	
<i>Rana aquatica, & terrestis</i>	t. 2. p. 703
<i>Ranarum partes officinales, & preparata</i>	t. 2. p. 704
& seq.	

Hhhhh 3 Ranun-

INDEX RERUM.

<i>Ranunculus animal</i>	t. 2. p. 705	<i>Rotula Anglicæ præservativa pro Gravidis</i>	Mynsicht t. 2.
<i>Ranunculus Planta</i>	ibid.		p. 727
<i>Rapa, vid. Rapum</i>		<i>Antimelancholica ex Hoffmanno</i>	t. 2. p. 724
<i>Raphanus</i>	ibid.	<i>Antiphthifical ejusdem</i>	ibid.
<i>Raphanus Rusticanus, vide Radicula Sylvestris</i>		<i>Contra ardorem Gula ex Bierling.</i>	t. 2. p. 725
<i>Rapistrum</i>	t. 2. p. 706	<i>Stomachi, ex Dorero</i>	ibid.
<i>Rapum</i>	ibid.	<i>Aromatica D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 727
<i>Rapunculus esculentus</i>	ibid. & seq.	<i>Sen Morsuli ad Caput Doreri</i>	t. 2. p. 725
<i>Realgal, vid. Auripigmentum</i>		<i>Caput confortantes ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 724
<i>Rectificare, & Rectificatio</i>	t. 2. p. 707 & seq.	<i>Carminantes ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 727
<i>Regina prati, vid. Ulmaria</i>		<i>contra Catarrhos ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 724
<i>Relaxantia, vid. Chalastica</i>		<i>Catarrhales calida Mynsichti</i>	t. 2. p. 727
<i>Repellentia, & Repellentia, vid. Apocroustica</i>		<i>frigida ejusd.</i>	ibid.
<i>Resina in specie in aëre</i>	t. 2. p. 708. & seq.	<i>Confortantes</i>	ibid.
<i>Resolventia Medicamenta</i>	t. 2. p. 709	<i>pectorales</i>	ibid.
<i>Resta Bovis, vid. Ononis</i>		<i>Catechu Styptica</i>	t. 2. p. 900
<i>Resumptiva, vid. Analeptica</i>	t. 2. p. 711	<i>Cephalica D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 728
<i>Reverberare, & Reverberatio</i>	ibid. & seq.	<i>Timæi.</i>	t. 2. p. 723
<i>Rhabarbarum</i>		<i>Zvvelferi</i>	t. 2. p. 722
<i>Rhabarbarum Monachorum, vid. Hippolapathum</i>	t. 2. p. 712	<i>Cinnamomi cocti ejusdem</i>	ibid.
<i>Rhamnus Catharticus</i>		<i>de Citro</i>	t. 2. p. 721
<i>Rhamnus vulgare, vid. Centaurium majus.</i>		<i>ex Hoffmanno</i>	t. 2. p. 724
<i>Rheum, vid. Rhabarbarum</i>		<i>Solutivi Dresdens</i>	t. 2. p. 725
<i>Rhinoceros</i>	t. 2. p. 713	<i>Confortantes ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 724
<i>Rhodia radix</i>	t. 2. p. 714	<i>Virides Zvvelferi</i>	t. 2. p. 727
<i>Rhodum lignum, vid. Lignum Rhodinum</i>		<i>Cordiales Mynsichti</i>	t. 2. p. 723 & 724
<i>Rhododaphne, vid. Oleander</i>		<i>Timæi</i>	t. 2. p. 729
<i>Rhodomet, vid. Mel colatum</i>		<i>Diacrete Mynsichti</i>	t. 2. p. 727
<i>Rhodofaccharum, vid. Saccharum rosatum</i>		<i>Diacybini ejusd.</i>	t. 2. p. 721
<i>Rhus obsonorum, vid. Sumach.</i>		<i>de Diagrydio</i>	t. 2. p. 722.
<i>Ribes</i>	ibid.	<i>Diaireos cum extracto liquiritia è Pharm. Augst.</i>	t. 2. p. 722.
<i>Ricinus planta</i>	ibid.	<i>Hepatica Mynsichti</i>	t. 2. p. 721
<i>Ricinus Animal</i>	t. 2. p. 715	<i>Zvvelferi</i>	t. 2. p. 726
<i>Risagallum, vid. Auripigmentum</i>	ibid. & seq.	<i>Hyacinthina Mynsichti</i>	t. 2. p. 723
<i>Rob quid sit, & quomodo pareatur</i>	t. 2. p. 716	<i>Hydragoga Timæi</i>	t. 2. p. 722
<i>Rob de Agresta è Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>Imperatoris è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 723
<i>de Berberibus ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>purgantes Timæi</i>	t. 2. p. 726
<i>Ceraforum simplex ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Lac provocantes Mynsichti</i>	t. 2. p. 722
<i>Purgans Zvvelferi.</i>	ibid.	<i>Laxativa infantiles</i>	t. 2. p. 725
<i>de Cornis è Ph. Aug.</i>	t. 2. p. 717	<i>ex Bierling.</i>	ibid.
<i>Cydoniorum ex ead. Pharm.</i>	ibid.	<i>Doreri</i>	t. 2. p. 723
<i>Cynosbati ex eadem Ph.</i>	ibid.	<i>ex Pharm. Norib.</i>	ibid.
<i>Ebulinum ex eadem Ph.</i>	ibid.	<i>Adversus Lumbricos Zvvelferi</i>	ibid.
<i>Glycyrrhizæ compositus ex Ph. Lond.</i>	ibid.	<i>Mannus Christi simplex & cum margaritis è Ph.</i>	ibid.
<i>Simplex ex Ph.</i>	ibid.	<i>Aug.</i>	t. 2. p. 723
<i>Juniperinum è Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>Purgantes Timæi</i>	t. 2. p. 728
<i>Morum, vid. Diamorum</i>		<i>Martiales Cnæff.</i>	t. 2. p. 728
<i>Nucum, vid. Diamucum</i>		<i>Martiales D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 728
<i>Prunorum Acidorum è Ph. Lond.</i>	ibid.	<i>de Mechoaca F. F.</i>	t. 2. p. 723
<i>Ribium è Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>ex Mercurio vitæ correcto Zvvelferi</i>	t. 2. p. 727
<i>Purgans Zvvelferi</i>	ibid.	<i>Mithridatica præservantes Mynsichti</i>	t. 2. p. 726
<i>Sambucinum ex Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>Moschardina optima ex Bierling.</i>	t. 2. p. 725
<i>Veronica ex Ph. Aug.</i>	ibid.	<i>Nutritiva & refrigerantes in bellica</i>	t. 2. p. 721 & 722
<i>Vvarum Sapa dictum è Pharm. Norimbergens.</i>	ibid.	<i>Pectorales</i>	t. 2. p. 726 & 728
<i>Roberti Herba, vid. Geranium</i>		<i>Varia ex Mynsicht</i>	t. 2. p. 723 & 724
<i>Robur, vid. Quercus</i>		<i>Timæi</i>	t. 2. p. 723
<i>Rocon, vid. Urtica</i>		<i>Zvvelferi</i>	t. 2. p. 725
<i>Rorella</i>	ibid. & seq.	<i>Contra Pestem D. Steinmetzens</i>	ibid.
<i>Ros Virioli Cnæffeli</i>	t. 1. p. 533	<i>Præservativa D. Landgravii</i>	t. 2. p. 726
<i>Rosa, ejus species, & ex ea parata Medicamenta</i>	t. 2. p. 718.	<i>Laurentii</i>	t. 2. p. 724
<i>Rosmarinus</i>	t. 2. p. 720. & seq.	<i>à peste & morbis Epidemicis tom. 2</i>	p. 724
<i>Ros Solis, vid. Rorella</i>		<i>Purgantes Bierling.</i>	t. 2. p. 724 & 725
<i>Rostrum Gruis, vid. Geranium</i>		<i>M. Lehmanni</i>	t. 2. p. 725
<i>Rotula, seu morselli quid sint, & quomodo parentur</i>	t. 2. p. 721	<i>D. Sultzbergeri</i>	ibid.
<i>Rotula alterantes usitatores</i>	ibid. & seq.	<i>& Emerica Zvvelferi</i>	t. 2. p. 725
<i>Rotula seu morsuli ad aërem in benignum</i>	Andersoni	<i>De Rhabarbaro D. Landgravii</i>	t. 2. p. 725
<i>Angli</i>	t. 2. p. 725	<i>Pharm. Norib.</i>	t. 2. p. 726
<i>Ambrata D. Ofsvvalds</i>	ibid.	<i>Refectiva Mynsichti</i>	t. 2. p. 728
		<i>de Cancris ejusd.</i>	Rotula

INDEX RERUM.

<i>Rotula Refrigerantes ejusdem</i>	t. 2. p. 727	<i>Salium Destillatio</i>	t. 2. p. 744
<i>Sen Morsuli Regia</i> è Ph. à Mynsicht	t. 2. p. 728	<i>per retortam tubulatam</i>	ibid.
<i>Rosata ejusdem</i>	ibid.	<i>Fixatio</i>	t. 2. p. 745
<i>Smaragdina ejusdem</i>	t. 2. p. 726	<i>Liquatio</i>	ibid.
<i>Stomachica ejusdem</i>	t. 2. p. 728	<i>Sublimatio</i>	ibid.
<i>Timæi</i>	t. 2. p. 723. & 724	<i>Sal Alumen, ejus genera, & preparata</i>	t. 2. p. 755 & seq.
<i>Zvvelferi</i>	t. 2. p. 723	<i>Ammoniacum, & ex eo preparata</i>	t. 2. p. 757 & seq.
<i>Sublinguales ex Bierlingio</i>	t. 2. p. 726	<i>Commune, ejusque preparata</i>	t. 2. p. 745. & seq.
<i>De Confectione Alkermes ex cod.</i>	ibid.	<i>Gemma, & ex eo preparata</i>	t. 2. p. 749. & seq.
<i>De Tartaro Borbonii, ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 724	<i>Nitri, & ex eo preparata</i>	t. 2. p. 750. & seq.
<i>Theriacales liberantes Mynsichti</i>	t. 2. p. 727	<i>Vitriolum, & ex eo preparata</i>	t. 2. p. 759. & seq.
<i>In Tussi inveterata ex causa frigida Hoffm.</i>	t. 2. p. 724	<i>Salium artificialium variae preparationes</i>	t. 2. p. 770
<i>Venerem Stimulantes ex Bierling.</i>	t. 2. p. 725	<i>Salia ex plantis quomodo fiant</i>	t. 2. p. 771
<i>ex Hoffm.</i>	t. 2. p. 724	<i>Salia simplicia usitatoria quae sint</i>	ibid.
<i>D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 726	<i>Sal Absinthii crystallinum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 777
<i>Contra Vermes ex Bierling.</i>	ibid.	<i>Aceu essentiale, è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 727	<i>Fixum, ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Timæi</i>	t. 2. p. 724	<i>Alkali è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Contra Veriginem, & Apoplexiam, ex Timæo</i>	ibidem	<i>Compositum</i>	t. 2. p. 772
<i>Viriles ex D. à Mynsicht</i>	t. 2. p. 728	<i>Alembrot</i>	ibid.
<i>ex Kuro animonii, è Bierlingio</i>	t. 2. p. 724	<i>Aluminis è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 777
<i>Vomitorii ex eodem</i>	t. 2. p. 726	<i>Ammoniacum fixatum è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Zedoarica, Salvificantes pro pueris, Mynsichti</i>	t. 2. p. 727	<i>Volatile ex eadem Pharm.</i>	ibid. & 775
<i>Rubefaciencia, vid. Attrahentia</i>		<i>Oleosum ex ead. Ph.</i>	ibid. & 775
<i>Rubeta, vid. Rana</i>		<i>Anatron è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 777
<i>Rubia tinctorum</i>	t. 2. p. 729	<i>Cachecticum chalybeatum D. Charraz</i>	t. 2. p. 773
<i>Rubinus, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 92	<i>& 752</i>	
<i>Rubini adulterini confectio</i>	t. 2. p. 99	<i>Calculi humani</i>	t. 1. p. 986
<i>Ex Rubino preparata varia</i>	t. 2. p. 109	<i>Chalybis è Ph. Batean.</i>	t. 2. p. 773
<i>Rubiola, vid. Aparine</i>		<i>Cardui benedicti essentiale</i>	t. 2. p. 776
<i>Rubrica, vid. sub titulo Terra</i>	t. 2. p. 974	<i>Cibarius, vid. Pulvis Cibarius</i>	
<i>Rubricatoria, vid. Sinapismus</i>		<i>Coralliorum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 773
<i>Rubus, ejusque species, & vires</i>	t. 2. p. 729. & seq.	<i>Cornu Cervi Succinatum è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Rumex, vid. Lapathum</i>		<i>Volatile D. LeMort</i>	t. 2. p. 777
<i>Rupicapra descriptio, vid. sub titulo Capra</i>		<i>Decrepitatum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 777
<i>Rupicapra partes officinales</i>	t. 2. p. 730. & seq.	<i>Diureticum è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Ruscus</i>	t. 2. p. 732	<i>D. Charraz</i>	t. 2. p. 773
<i>Ruta</i>	ibid. & seq.	<i>Febrifugum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 777
<i>Ruta capraria, vid. Galega</i>		<i>Compositum Cnoss.</i>	t. 1. p. 913
<i>Ruta muraria, vid. Salvia Vitæ</i>		<i>Salia Fixa, eaque parandi modus</i>	t. 2. p. 776
S.		<i>Sal Iovis è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 777
<i>Sabina</i>	t. 2. p. 733. & seq.	<i>Lithargyrites è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Saccharum, vid. sub titulo Arundo Saccharifera</i>		<i>Maris subdulce</i>	t. 1. p. 923
<i>Sacchari varia preparationes</i>	t. 2. p. 734	<i>purgans</i>	ibid.
<i>Saccharum tabulatum, vid. Tabellæ</i>		<i>Saccharinum S. Clossæi</i>	ibid.
<i>Saccharum Saturni, vid. sub titulo Plumbum</i>		<i>Catharticus è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 778
<i>Sacculus quid sit, & quomodo paretur</i>	ibid.	<i>Mixtum</i>	t. 2. p. 777
<i>Sacculus in capitis, dolore, Michaelis</i>	t. 2. p. 735	<i>Navigantium</i>	t. 2. p. 773
<i>Contra colicam ex eodem</i>	ibid.	<i>Perlarum è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 78
<i>ad Cor ejusdem</i>	ibid.	<i>Philosophorum è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Cordialis, Cratonis</i>	t. 2. p. 734	<i>Polychrestum è Ph. Bat.</i>	ibid. & 788
<i>Zvvelferi</i>	t. 2. p. 735	<i>Saturni, vid. Saccharum Saturni, sub titulo Plum-</i>	
<i>in Pleuritide Notha Michaelis</i>	ibid.	<i>bum.</i>	
<i>Contra Pestem ex Zvvelfero</i>	t. 2. p. 735	<i>Scordii</i>	t. 2. p. 777
<i>ad pulsum Michael.</i>	ibid.	<i>Spongia volatile è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 778
<i>Stomachalis Cratonis</i>	t. 2. p. 734	<i>Sudoriferum</i>	t. 2. p. 776
<i>ad Ventriculum Michaelis</i>	t. 2. p. 735	<i>Sulphuris è Ph. Bat.</i>	t. 2. p. 778
<i>Sepia, vid. Sepia</i>		<i>Tartari è Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Sagapenum</i>	ibid. & seq.	<i>Volatile ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>Sagitta in genere quid sit</i>	t. 2. p. 736	<i>Viperarum volatile ex ead. Ph.</i>	ibid. & 1032
<i>Sagitta planta in specie</i>	ibid.	<i>Veneris, vid. Flores Viridis æris</i>	
<i>Sal, ac de Salibus in genere</i>	ibid. & seq.	<i>Urina volatile</i>	t. 2. p. 778. & t. 1. p. 983. & seq.
<i>Salium Vires</i>	t. 2. p. 642. & seq.	<i>De Sale Volatili Plantarum Experimentum Chymicum Novum ex Clarissim. VVedelio tom. 2. p. 778</i>	
<i>De salibus natiuis in specie, eorumque preparationibus</i>	t. 2. p. 744	<i>& seqq.</i>	
<i>ex Schrodero & Hoffm.</i>	ibid.	<i>Salia volatililia plantarum dari extra dubium est</i>	ibid.
<i>Salium purificatio</i>	ibid.	<i>& seq.</i>	
<i>Calcinatio</i>	ibid.	<i>Salia volatililia ex seminibus, extractis, & oleis destilla-</i>	
<i>Mangeti Bibl. Pharm.</i>		<i>tis Parandi modi</i>	t. 2. p. 779. & seq.
		<i>Salia volatililia quomodo Oleosa reddantur</i>	to. 2. p. 787
		<i>& seq.</i>	
		<i>Sal Vitri</i>	t. 2. p. 788
			H h h h h 4 Sala-

INDEX RERUM

<i>Salamandra</i>	t. 2. p. 788	<i>Scorodonia, sive salvia Sylvestris</i>	t. 2. p. 802
<i>Salicaria, vid. Lyfimachia</i>		<i>Scorpio Animal</i>	t. 2. p. 803
<i>Salivantia, vid. Masticatoria</i>		<i>Ex Scorpionibus preparata Medicamenta</i>	ibid.
<i>Salivaris Herba, vid. Pyrethrum</i>		<i>Scorpium Artificialis productio describitur à R. P. Arhan. Kircher. Mund. Subterr.</i>	ibid.
<i>Salix</i>	ibid.	<i>Scorzonera</i>	t. 2. p. 804
<i>Saljaparilla</i>	ibid.	<i>Scripulus, vid. sub titulo, Mensuræ & Pondera</i>	ibid.
<i>Salvia</i>	t. 2. p. 789	<i>Scrofularia</i>	ibid.
<i>Salvia vira, vid. Adiantum album, sub titulo Adian- thum</i>		<i>Scripulus, vid. sub titulo, Mensuræ & Pondera</i>	ibid.
<i>Sambucus</i>	t. 2. p. 790	<i>Scutum apud Medicos quid sit</i>	ibid. & seq.
<i>Sampfucus, vid. Majorana</i>		<i>Scutorum exempla afferuntur</i>	t. 2. p. 85
<i>Santalum, vid. Santalum</i>		<i>Scutum Emplasticum ex D. Lemery</i>	ibid.
<i>Sandaraca</i>	t. 2. p. 790	<i>Sebesten</i>	ibid.
<i>Sanguinalis, vid. Centinodia</i>		<i>Secalis, vel Secale</i>	ibid.
<i>Sanguinem spongia, vid. Ischiaia</i>		<i>Sectio, vid. sub titulo Limatio</i>	ibid.
<i>Sanguis</i>	t. 2. p. 791	<i>Secundina Mulieris</i>	t. 2. p. 806
<i>Sanguis Draconis</i>	ibid.	<i>Securidaca</i>	ibid.
<i>Sanguinis Humani crudè assumpti usus</i>	t. 1. p. 987	<i>Sedum</i>	ibid.
<i>Ex Sanguine Humano preparata</i>	t. 1. p. 987, 988	<i>Sedum majus vulgare, vid. Sempervivum</i>	ibid.
<i>& seq.</i>		<i>Semen quid sit</i>	ibid.
<i>Sanguisorba, vid. Pimpinella</i>		<i>Seminum officinalium enumeratio</i>	ibid. & seq.
<i>Sanguinaga, vid. Hirculus</i>		<i>Semen contra, seu sementina, vid. Santonicum</i>	t. 2. p. 808
<i>Sanicula, ejusque species</i>	t. 2. p. 971. & seq.	<i>Sempervivum, ejusque species</i>	ibid. & seq.
<i>Santalum Album</i>	t. 2. p. 792	<i>Sena</i>	t. 2. pag. 809
<i>Cinnum</i>	ibid.	<i>Ex Sena foliis preparata officinalia tom. 2. pag. 809</i>	
<i>Rubrum</i>	ibid. & seq.	<i>& seq.</i>	
<i>Santonicum, & Santonica</i>	t. 2. p. 793	<i>Senecio</i>	t. 2. p. 810
<i>Sapa quid sit</i>	ibid.	<i>Senecta Anguim, vid. Serpens</i>	t. 2. p. 811
<i>Sapphyrus, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 92	<i>Sepia</i>	
<i>Sapphyrus Orientalis quomodo fiat</i>	t. 2. p. 1059	<i>Serapinum, vid. Sagapenum</i>	
<i>Sapphyri adulterini confectio</i>	t. 2. p. 100	<i>Sericum, vid. Sagapenum</i>	
<i>Sapphyrus in adamantem, quomodo converti possit</i>		<i>Sericum, vid. Bombyx</i>	
<i>ibidem</i>		<i>Serpens & Serpentinum Genus</i>	ibid. & seq.
<i>Sapphyri vires medica, & preparata</i>	t. 2. p. 109	<i>Serpenium varia species describuntur</i>	t. 2. p. 811. 812
<i>Sapones, seu Smegmata varia</i>	t. 2. p. 793	<i>& seq.</i>	
<i>Sapo Cosmeticus levis ex Lex. Ph. D. Jungken</i>	ibid.	<i>Ex Serpentibus preparata officinalia</i>	t. 2. p. 823. & seq.
<i>Albus Odoratus</i>	t. 1. p. 669	<i>Serpentaria, vid. Dracontium</i>	
<i>Sapones ad Impetigines & scabiem</i>	t. 2. p. 793. 924	<i>Serpentaria Virginiana, vid. Vipera Virginiana</i>	
<i>Moschari e Pharmac. August. tom. 2. pag. 793</i>		<i>Serpillum</i>	t. 2. p. 825
<i>& seq.</i>		<i>Serratula</i>	ibid.
<i>Damasceni</i>	t. 1. p. 669	<i>Serum Lactis vid. sub titulo Lac</i>	
<i>ex D. VVeickard,</i>	t. 2. p. 793	<i>Serum lactis Aluminatum e Ph. Bat.</i>	ibid.
<i>Sapo odoratus Zvvelferi</i>	t. 2. p. 794	<i>Hepaticum ex ead. ph.</i>	t. 2. p. 826
<i>Tartareus ex Ph. Bat.</i>	ibid.	<i>Scorbuticum ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Saponaria</i>	ibid.	<i>De Sedo ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Sapor quid sit</i>	ibid.	<i>Sinapinum ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Sarcocolla</i>	ibid.	<i>Sesamum</i>	ibid.
<i>Sarcotica Medicamenta</i>	t. 2. p. 795	<i>Seseli</i>	ibid. & seq.
<i>Sarda, seu Sardina</i>	ibid. & seq.	<i>Sevum, vid. Axungia</i>	
<i>Sardonix, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 91	<i>Sextarius, vid. Mensura</i>	
<i>Sassafras</i>	t. 2. p. 796	<i>Siola, vid. Beta</i>	
<i>Satureia</i>	ibid.	<i>Siderites, vid. Magnes</i>	
<i>Saturnus, vid. Plumbum</i>		<i>Sideritis</i>	t. 2. p. 827
<i>Satyrum, vid. Orchis</i>		<i>Sief album Galen. e ph. August.</i>	t. 1. p. 615
<i>Saxifraga Medicamenta, vid. Lithonriptica</i>		<i>Cum & sine Opio, ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Saxifraga Herba, ejusque species</i>	t. 2. p. 797	<i>De Plumbo Mesue, ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Saxifraga, vid. Pimpinella Saxifragia</i>		<i>De Rosis ejusdem, ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Scabiosa</i>	ibid.	<i>Viride Antai, ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Scammonium</i>	t. 2. p. 798	<i>De Thure Rhasis, ex ead. ph.</i>	ibid.
<i>Ex Scammonio preparata varia</i>	tom. 2. pag. 799	<i>Sief reliqua varia, vid. sub titulo Collyrium</i>	
<i>& seqq.</i>		<i>Sigillum Beata Maria, vid. Brionia nigra</i>	
<i>Scandix</i>	t. 1. p. 800	<i>Siler Montanum</i>	t. 2. p. 827
<i>Scarabeus</i>	ibid.	<i>Silex, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 85
<i>Scarlea, & Sclarea, vid. Horminum</i>		<i>Ex Silicibus preparata varia</i>	t. 2. p. 132
<i>Schananthum</i>	ibid.	<i>Siligna dulcis</i>	t. 2. p. 828
<i>Scilla</i>	t. 2. p. 801	<i>Siligna Egyptiaca, vid. Cassia fistula</i>	
<i>Scincus</i>	ibid.	<i>Silphium, vid. Lascipitium</i>	
<i>Scolopendra Animal</i>	ibid. & seq.	<i>Simia, ejus descriptio, & species</i>	ibid. & seq.
<i>Scolopendrium verum, vid. Ceterach.</i>		<i>Sinapi</i>	t. 2. p. 831
<i>Scolopendrium officinarum</i>	t. 2. p. 802	<i>Sinapisinus</i>	t. 2. p. 832
<i>Scolymus, vid. Cynara</i>	ibid.	<i>Sirupus, quid sit, & quomodo paritur</i>	ibid. & seq.
<i>Scordium</i>	ibid.	<i>Sirupus de Absinthio e ph. Aug.</i>	t. 2. p. 833
		<i>Sirupus</i>	

INDEX

RERUM.

Sirupus de Absinthio compositus è Ph. Lond. t. 2. p. 834
Stomachalis & hepaticus, ex Zvvelfero
 ibidem
De floribus Acaciae purgans t. 2. p. 850
De Acetosa succo Mesua è Ph. Aug. t. 2. p. 834
De Acetosella succo ex cad. Ph. ibid.
Acetosus simplex Mesua ex cad. Ph. ibid.
Compositus Mesua ex cad. Ph. ibid. & seq.
Diarrhodon Mesua ex cad. Ph. t. 2. p. 835.
Adianthinus Fernelii è Ph. Aug. ibid.
De Agno Casto è Ph. Lond. ibid.
De Agresta Mesua è Ph. Aug. ibid.
De Albuminibus Ovorum ibid.
Alleluia è Ph. Bat. t. 2. p. 837
De Althea Fernelii è Ph. Aug. t. 2. p. 835
Ambrosianus è Pharm. Bat. vid. Decoct. Ambrosiae
De Ammoniaco è Ph. Lond. ibid.
Anagallidis è Ph. Aug. ibid.
Anisi cum vino, Quercetani è Ph. Schrod. ibid.
Anticausodicus è Ph. Aug. ibid.
Antiepilepticus Quercetani, è Pharmac. Schrod.
 t. 2. p. 841
 Ex Timæo t. 2. p. 857
 Witzelii è Ph. Schrod. t. 2. p. 841
Antifebricitus ex Timæo t. 2. p. 857
Antifebrilis de Centauryo minori, ex Zvvelfero
 t. 2. p. 839
Antihelicticus Riverii è Ph. Schrod. t. 2. p. 842
Antipleuriticus ex Timæo t. 2. p. 857
Antiphthisicus vulnerarius ex Zvvelf. t. 2. p. 846
Antiscorbuticus è Ph. Bat. t. 2. p. 857
 ex Hoffmanno t. 2. p. 858
 ex D. à Mynsicht t. 2. p. 860
 ex Timæo t. 2. p. 856
Aperiens Magistralis è Ph. Aug. t. 2. p. 835
 ex Timæo t. 2. p. 856
Spleneticus, & hepaticus, ex Zvvelf.
 t. 2. p. 836
De Artemisia è Ph. Aug. ibid.
Compositus è Ph. Lond. ibid.
Asthmaticus ex D. à Mynsicht. t. 2. p. 860
 ex Zvvelfero t. 2. p. 836
De Aurantium cortex ibus è Ph. Aug. ibid.
Floribus ex cad. Ph. ibid.
Succo ex cad. Ph. ibid.
Balsamicus è Ph. Bat. t. 2. p. 857
De Bellidis Floribus è Ph. Aug. t. 2. p. 836
Benedictus è Ph. Bat. t. 2. p. 857
De Berberibus è Ph. Aug. t. 2. p. 837
De Betonica simplex ex cad. Ph. ibid.
Compositus ex cad. Ph. ibid.
 ex Zvvelfero ibid.
Bezoarticus Donzelli ibid.
De Borragine è Ph. August. ibid.
Botrys è Ph. Lond. t. 2. p. 838
De Bryonia simplex Mesua, ex Weckero to. 2.
 p. 850
Compositus Mesua, ex cod. ibid.
De Buglosso è Ph. Aug. t. 2. p. 838
Byzantinus simplex Mesua, ex eadem Pharm.
 ibidem
Compositus Mesua ex cad. Ph. ibid.
De Calamintha Mesua è Ph. Aug. ibid.
Chalybeatus Catharticus D. D'Aquin tom. 2.
 p. 850.
 è Ph. Bat. t. 2. p. 857
 ex Hoffmanno t. 2. p. 858
 ex Timæo t. 2. p. 856
 purgans ex eodem ibid.
 pro mulieribus & Cachecticis, ex
 Zvvelfero t. 2. p. 839

Sirupus Chamadryos Bauderoni t. 2. p. 840
De Chamalo è Ph. Aug. ibid.
De Capillis Veneris simplex Mesua, è Ph. August.
 t. 2. p. 838
Compositus ex cad. Ph. ibid.
Cardiacus auratus è Ph. Bat. t. 2. p. 857
 ex Hoffmanno t. 2. p. 858
 è Pharm. Lond. t. 2. p. 838
 Francosuri, è Pharm. Schrod. ibid.
De Cardui Benedicti succo è Ph. Aug. ibid.
Carminativus è Ph. D. Le Mort. ibid.
De Carthamo è Ph. Aug. t. 2. p. 850
Caryophyllorum aromaticorum ex Marcgravio t. 2.
 p. 838
Hortensium è Ph. Lond. ibid.
De Cassia lignea ex D. à Mynsicht. t. 2. p. 860
Catharrhalis cum herba Thee è Pharm. Schrod.
 t. 2. p. 839
Catholicus ex Bierling. t. 2. p. 858
 è Ph. Norib. t. 2. p. 850
De Centauryo minori antifebrilis, ex Zvvelfero
 t. 2. p. 839
Cephalicus ex D. à Mynsicht t. 2. p. 859
Ceraserum acidorum è Ph. Aug. t. 2. p. 839
De Cicchorio simplex è Ph. Aug. t. 2. p. 840
 Cum Rheo Nicol. Florent. ex eadem
 Pharm. t. 2. p. 851
De Cinnamomo ex cad. Ph. t. 2. p. 840
De Cirri acetositate è Ph. Aug. ibid.
 Corricibus ex cad. Ph. ibid.
Cochlearia è Ph. Amstelodam. ibid.
Coralliorum Quercetani, è Ph. Aug. ibid.
 Compositus è Ph. Lond. ibid.
 Ruborum ex D. à Mynsicht t. 2. p. 859
 ex Timæo t. 2. p. 857
Cordialis ex D. à Mynsicht t. 2. p. 860
 Perlatus ex Timæo t. 2. p. 857
 Gemmarum calidus ex Zvvelfero t. 2.
 p. 840
 Frigidus ex eod. t. 2. p. 841
De Croco è Ph. Bat. t. 2. p. 857
Cydonorum è Ph. Aug. t. 2. p. 841
Diacutri rosatus ex Mynsichto t. 2. p. 860
Diasereos Andernaci è Pharmac. August. t. 2.
 p. 851.
Domesticus, seu de spina insectoria è Pharm. Aug.
 ibid.
Dysentericus laxativus ex D. à Mynsicht t. 2.
 p. 860
Contra Dysenteriam ex Zvvelf. t. 2. p. 841
Emeticus Angeli Sala è Ph. Aug. t. 2. p. 851
 Glauberi t. 2. p. 852
 seu Oxysaccharum è Ph. Aug. t. 2. p. 851
 Correctus, ex Zvvelf. ibid. & seq.
De Endivia simplex è Ph. Aug. t. 2. p. 841
 Compositus ex cad. Ph. ibid.
Epilepticus puerorum ex Cnæff. t. 1. p. 572
De Epithymo Mesua è Ph. Aug. t. 2. p. 852
De Erysimo Lobelii è Ph. Aug. t. 2. p. 841
De Eupatorio Mesua è Ph. Aug. ibid.
Exhilarans Laurentii, ex Renodæo t. 2. p. 842
 D. Schillingii t. 2. p. 859
De Farfara è Ph. Aug. t. 2. p. 842
Ad Fissuras è Ph. Bat. t. 2. p. 857
De Fragis è Ph. Aug. t. 2. p. 842
De Fumaria composita Mesua è Pharm. August.
 t. 2. p. 853
 Simplex ex cad. Ph. t. 2. p. 842
Gemmatum Paravinum Ducalis ex Bierlingio t. 2.
 p. 858.
Generalis seu laxatio-purgans Catholicus ibid.
De Gialappa ex Hoffmanno ibid.
 Sirupus

I N D E X R E R U M.

<i>Sirupus De Glycyrrhiza Mesua</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 842	<i>Sirupus Panchymagogus</i> ex Timæo t. 2. p. 856
<i>Granatorum dulcinum</i> è Ph. Aug. ibid.	<i>Pantagogus</i> D. à Mynsicht t. 2. p. 861
<i>Hemopticus</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857	<i>De papavere simplex Mesua</i> è Pharm. Aug. tom. 2. p. 846.
<i>De Hedera terrestris succo</i> è Pharm. August. t. 2. p. 842.	<i>compositus Mesua</i> ex eadem Pharm. ibidem
<i>Helleboratus Quercetani</i> è Ph. Schrod. t. 2. p. 852	<i>Plurimum infusionum</i> ex Hoffmanno t. 2. p. 858
<i>De Hermodactylis Nicolai</i> , ex VVeckero ibid.	<i>Erratico</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 846
<i>Holagogus Francofurt.</i> è Ph. Schrod. ibid.	<i>De Paralysos floribus</i> è Ph. Aug. ibid.
<i>Hydragogus</i> ex D. D'Aquin t. 2. p. 853	<i>Pectoralis Altemburgens</i> t. 2. p. 858
ex D. à Mynsicht t. 2. p. 861	ex D. à Mynsicht t. 2. p. 859
ex Zvelfero t. 2. p. 842. & 853	ex Timæo t. 2. p. 856
& <i>Hepaticus</i> ex eod. t. 2. p. 843	<i>De Pede Cani</i> è Ph. Norimb. t. 2. p. 846
<i>De Hyperici floribus</i> è Ph. Aug. ibid.	<i>Peponum</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857
<i>De Hyssopo Mesua</i> ex ead. Ph. ibid.	<i>Perlarum Orientalium</i> ex D. à Mynsicht. tom. 2. p. 859.
<i>Iovialis</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857	<i>De persicorum floribus</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 854
<i>Iva Arthritica</i> è Ph. Lond. t. 2. p. 843	<i>De peto</i> è Ph. Bat. ibid.
<i>De Iujubis Mesua</i> è Ph. Aug. ibid.	<i>De pilosella Renodai</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 847
<i>Laxativus de lignis VVizelii</i> è Pharm. Schrod. t. 2. p. 853	<i>compositus</i> è Ph. Lond. ibid.
de manna è Ph. Aug. ibid.	<i>De plantaginis succo</i> è Ph. Aug. ibid.
de sene foliis Peuceri t. 2. p. 858	<i>De polypodio</i> ex ead. Ph. t. 2. p. 854
è Succis D. Landgravii t. 2. p. 859	<i>Compositus</i> è Ph. Norib. ibid.
<i>Lientericus</i> D. D'Aquin t. 2. p. 843	<i>purgans</i> ex Dorero t. 2. p. 859
<i>Limacum</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857	<i>De pomis simplex Mesua</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 847
<i>De Limonibus</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 843	<i>Magistralis</i> è Ph. Lond. t. 2. p. 854
<i>Lunbricorum</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857	<i>Regis Saporis Mesua</i> è Pharm. Aug. ibid.
<i>De Lupulo</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 843	<i>Solutivus</i> ex Timæo t. 2. p. 857
<i>Magistralis purgans primus</i> ex Zvelfero t. 2. p. 853	<i>De porulaca Mesua</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 847
<i>Secundus</i> ex eod. ibid.	<i>De prassio Mesua</i> ex ead. Ph. ibid.
<i>tertius</i> ex eod. ibid. & seq.	è Ph. Lond. ibid.
<i>quartus</i> ex eod. t. 2. p. 854	<i>Prunorum Sylvestrium</i> è Ph. Aug. ibid.
<i>Masticinus</i> è Ph. Norib. t. 2. p. 843	<i>Purgans Almeratus</i> D. Krauticus t. 2. p. 858
ex Timæo t. 2. p. 857	<i>Polychrestus</i> ex Hoffm. ibid.
<i>Stomachalis</i> ex Zvelfero t. 2. p. 843	<i>De pyrethro</i> ex D. à Mynsicht t. 2. p. 860
<i>Melanagogus cum tartaro</i> D. Laurend. tom. 2. p. 859	<i>De rhabarbaro solutivus</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 855
D. Rindfleischs ibid.	<i>De dnabus Radicibus</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 847
<i>De Melissa succo compositus</i> è Pharm. Lond. t. 2. p. 844	<i>De quinque Radicibus Mesua</i> ex ead. Ph. ibid.
<i>De Melissa phylli succo</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 843	<i>Raphani compositus</i> è Ph. Lond. ibid.
<i>De Mentha major Mesua</i> ex eadem Pharm. t. 2. p. 844	<i>De Rapis</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857
<i>Minor Mesua</i> ex ead. Ph. ibid.	<i>De Rhapontico</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 855
<i>De Menthe succo</i> è Ph. Aug. ibid.	<i>Regius</i> è Ph. Lond. t. 2. p. 848
<i>De Mercurialis succo</i> ex ead. Ph. ibid.	<i>Resumptivus de restitutinibus</i> è Pharm. Schrod. t. 2. p. 850
<i>Mercurialis purgans</i> ex Zvelf. t. 2. p. 854	<i>De Ribibus</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 848
<i>Mineralis purgans</i> D. Krauticus t. 2. p. 858	<i>Rosatus simplex</i> è Ph. Aug. ibid.
<i>De Moris compositus</i> ex Rænodæo t. 2. p. 844	<i>Aureus</i> D. Donzelli t. 2. p. 856
<i>De Mucilagibus</i> è Ph. Lond. ibid.	<i>Laxativus cum ambubeia</i> è Ph. Aug. tom. 2. p. 855.
<i>De Myrrha</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857	<i>compositus Helleboratus</i> ibid.
<i>Myrrhinus compositus Mesua</i> è Pharm. Londin. t. 2. p. 844.	<i>sine Helleboro</i> ibid.
<i>Nephriticus</i> D. D'Aquin. t. 2. p. 845	<i>Lenitivus de tribus</i> è Ph. Aug. ibid.
ex D. à Mynsicht. t. 2. p. 860	<i>Solutivus Aureus</i> è Ph. Aug. ibid.
ex Timæo t. 2. p. 857	<i>Simplex</i> , ex ead. Ph. ibid.
<i>primus</i> ex Zvelfero t. 2. p. 845	<i>Quercetani</i> ex ead. Ph. ibid.
<i>Secundus</i> ex eod. ibid.	<i>Rosatus compositus</i> ex Bierling. t. 2. p. 859
<i>tertius</i> ex eodem ibid.	<i>Solutivus compositus</i> ex Timæo t. 2. p. 856
<i>Nephrocatharticus Jouberti</i> è Pharm. Aug. t. 2. p. 844.	<i>De Rosis siccis</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 848
<i>Nicotiana</i> è Ph. Schrod. t. 2. p. 845	<i>De Rubo Ideo</i> ex ead. Ph. ibid.
ad Asthma ex Timæo t. 2. p. 857	<i>Sambuci compositus</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857
<i>Nymphaea simplex Nicolai</i> è Pharm. August. t. 2. p. 845	<i>Sambucinus laxativus</i> ex Timæo t. 2. p. 856
<i>compositus Franc. Pedemontani</i> ex ead. Pharm. t. 2. p. 846	<i>De scabiosa</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 848
<i>De Olibano Rhafis</i> , ex VVeckero ibid.	è Ph. Lond. ibid.
<i>Ophthalmicus</i> ex Timæo t. 2. p. 856	<i>De Scammonio</i> è Ph. Bat. t. 2. p. 857
<i>Contra Oris fetorem</i> ex Bierlingio t. 2. p. 858	<i>Scelecorbicus</i> ex D. D'Aquin t. 2. p. 848
<i>De Paonia</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 846	è Ph. Aug. ibid.
<i>Compositus</i> è Ph. Lond. ibid.	è Ph. Norimberg. ibid.
	ex Zvelfero ibid.
	<i>De Scolopendrio Fernelii</i> è Ph. Aug. ibid.
	<i>De Scordio simplex</i> è Ph. Aug. t. 2. p. 849
	<i>Sirupus</i>

INDEX RERUM.

<i>Syrupus de Scordio compositus</i> Hier. Mercur.	t.2 p.849	<i>Sphondilium, vide</i> Spondilium.	
<i>de Semper-vivo simplex</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Spica, in genere, vide</i> Lavendula.	
<i>compositus ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Spica Indica</i>	t.2.p.876
<i>Sidereus ex Ph. Bat.</i>	t.2.p.857	<i>Spica Spuria Narbonensis</i>	ibid.
<i>de Siliquis, vide</i> Diacodium.		<i>Spica Celtica, vide sub titulo</i> Valeriana.	
<i>Solutivus Aureus ex Timæo</i>	tom.2	<i>Spinachia</i>	t.2.p.871
p.856		<i>Spiritus quid sit</i>	ibid. & seq.
<i>de Spina infectoria, seu Domestica</i> è Pharm. Aug.		<i>Spiritus acidi, quid sint, & eliciendi modus</i>	t.2.p.875.
t.2.p.851		& seqq.	
<i>Spleneticus ex Zvelfero</i>	t.2.p.849	<i>Spiritus Urinosi, quid sint, & modus eliciendi</i>	t.2.
<i>Purgans D. Verbezzii</i> è Pharmac. August.		p.879 & seqq.	
t.2 p.856		<i>Spiritus Absinthii</i> è Ph. Aug.	t.2.p.883
<i>Stipticus ex D. à Mynsicht</i>	t.2.p.860	<i>Aceti</i> è Chymica D. Le Mort	t.2.p.893
<i>de Stachade Fernellii</i> è Ph. August.	t.2.p.849	<i>Philosophicus ex eodem.</i>	ibid.
<i>Major Mesuae, ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Alchermes</i> è Ph. Bat.	t.2.p.897
<i>Minor ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Aluminis</i> è Ph. Bat.	t.2.p.897
<i>Somachalis D. Donzelli</i>	ibid.	<i>dulcis ex ead. Ph.</i>	ibid.
<i>de Sulphure</i> è Ph. Bat.	t.2.p.858	<i>Ambra</i> è Ph. Bat..	ibid.
<i>de Symphyto Fernellii</i> è Ph. Aug.	t.2.p.849	<i>Analepticus Panis similaginei, ex Rolancio</i>	t.2.
<i>de Testudinibus ex Hoffman.</i>	t.2.p.858	p.886	
<i>Resumptivus Renodæi</i>	t.2.p.850	<i>Anhalitinus</i> è Ph. Aug.	t.2.p.884
<i>de Therebinthina Donzelli</i>	ibid.	<i>Anisi</i>	ibid.
<i>Tolutanus Magistralis</i> è Ph. Bat.	t.2.p.858	<i>Anapoplecticus S. Glossæi</i> ex Schrod.	t.2.p.885
<i>de Tunica floribus, vide</i> Sympus caryophyll.		<i>Antepilepticus</i> è sanguine humano	t.1.p.985
Hortens.		è Ph. Norimb.	t.2.p.884
<i>Vermifugus</i> è Ph. Bat.	ibid.	<i>Antiscorbuticus</i> è Chimia D. Le Mort	t.2.p.889
<i>de Veronica succo</i> è Phar. Aug.	t.2.p.850	<i>Aphrodisiacus</i> è radicibus Saryrii, ex Rolancio.	
<i>Violatus ex succo florum ex ead. Ph.</i>	ibid.	t.2.p.884	
<i>simplex ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Balsamicus antiparalyticus</i>	t.1.p.830
<i>compositus Mesuae ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Benzoini</i> è Ph. Bat.	t.2.p.897
<i>Solutivus</i> è Ph. Aug.	t.2.p.86	<i>Camphora ex Ph. Bat.</i>	ibid.
ex Hoffm.	t.2.p.858	<i>Carminativus D. Francisci de Le Boc Sylvii</i>	t.2.
<i>Viriolato-Rosæus ex D. à Mynsicht</i>	t.2.p.859	p.885	
<i>Zibeborum</i> è Phar. Aug.	t.2.p.856	<i>Cephalicus</i> è Chymia D. Le Mort	t.2.p.889
<i>Sisarum, sive Siser</i>	t.2.p.861	<i>Cerasorum nigrorum</i>	t.2.p.884
<i>Sisymbrium, vide</i> Nasturtium Aquaticum.		è Ph. Bat.	t.2.p.897
<i>Sium, vide</i> Nasturtium Aquaticum.		<i>Cerebri humani</i>	t.1.p.1006
<i>Smaragdus, vide sub titulo</i> Lapis	t.2.p.92. & seq.	<i>Citri Cardiacus</i>	t.2.p.204
<i>Smaragdum Orientalem faciendi modus</i>	t.2.p.1058.	<i>Cochlearia</i> è Ph. Bat.	t.2.p.897
& seq.		<i>Convulsivus Geilfulsi</i>	t.2.p.884
<i>Smaragdi adulterini confectio</i>	t.2.p.103	<i>Coralliorum</i> è Ph. Bat.	t.2.p.897
<i>Smaragdus quid sit, ejus vires Medica & preparata</i>		<i>Cordialis Balsamicus ex Rolancio</i>	tom.2.
t.2.p.110. & seq.		p.885	
<i>Smilax</i>	t.2.p.861	<i>Cordis Cervi compositus ex eodem</i>	ibid.
<i>Smyris, vide sub titulo</i> Lapis	t.2.p.88	<i>Diapente</i> è Ph. Aug.	t.2.p.884
<i>Smyrniun</i>	t.2.p.861	<i>Diatrion, seu mixtura simplex</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Soda, vide</i> Kali.		<i>Dracunculi</i> è Ph. Bat.	t.2.p.898
<i>Sol, vide</i> Aurum		<i>Embryonum</i> è Ph. Bat.	ibid.
<i>Solani species varia</i>	t.2.p.862. & seq.	<i>Euphrasia Mindereri</i> è Ph. Aug.	t.2.p.884
<i>Soldanella</i>	t.2.p.863	<i>Formicarum</i>	t.1.p.530
<i>Solidago, vide</i> Symphytum.		<i>Frumenti ardens</i>	t.2.p.886
<i>Solidago Sarracenia, vide</i> Virga aurea.		<i>Gratior</i>	ibid.
<i>Solutio quid sit</i>	t.2.p.863. & seq.	<i>Fuliginis</i>	t.1.p.1005
<i>Somnifera, vide</i> Hypnotica.		& <i>Oleum Guajac ligni</i>	t.2.p.891
<i>Sonchus</i>	t.2.p.868	<i>Hormini compositus, vide</i> Aqua Hormini com-	
<i>Sophia</i>	ibid.	posita.	
<i>Sorbeta antinephritica Cnæcellii</i>	t.2.p.443	<i>Hyssoi verus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.898
<i>Sorbus</i>	t.2.p.868	<i>Juniperi</i> è baccis	t.2.p.884
<i>Sotirella parva, vide</i> Electuarium.		è Ligno	t.2.p.891
<i>Sotirella parva</i> è Ph. Aug.	t.2.p.774	<i>Verus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.898
<i>Sparadrapum quid sit, & quomodo fiat.</i>	t.2.p.869	<i>Manna</i> è Ph. Bat.	ibid.
<i>Sparadrapum pro fonticulis</i> è Ph. Lond.	ibid.	<i>Martis</i>	t.1.p.919
<i>seu Tela Gualteri, ex ead. Ph.</i>	ibid.	<i>Mellis ardens</i>	t.2.p.887
<i>Vigonis</i> è Ph. Aug.	ibid.	<i>Mercurii dulcis ex D. Donzello</i>	t.2.p.885
<i>Usuale pro mammis post parum obdurefcentibus</i>		<i>Millepedum</i> è Ph. Bat.	t.2.p.898
ibid.		<i>Nephriticus ex Schrod.</i>	t.2.p.885
<i>Sparium</i>	ibid.	<i>Niri vari</i>	t.2.p.754.893. & 898
<i>Spatula ferida, vide</i> Xyris.		<i>Niri Bezoarticus</i> è Ph. Bat.	t.2.p.898
<i>Species Officinales, vide</i> Pulveres.		<i>Dulcis</i>	t.2.p.897. & 898
<i>Sperma Ceti, vide</i> Cetus.		<i>seu Aqua Polychresta ex Rolancio</i>	t.2.p.886
<i>Sperma Generantia, vide</i> Aphrodisiaca.		<i>Pomorum</i>	t.2.p.887
<i>Sperniola, vide</i> Pulvis Sperniolæ.		<i>Purgans ex Scammonio</i>	t.2.p.800
		<i>Spiritus</i>	

INDEX RERUM.

<i>Spiritus Rheados crapularius</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Spondylium</i>	
<i>Regina Hungaria</i> , vide <i>Aqua Regina Hungaria</i> .		<i>Spongia</i>	t. 2. p. 904
<i>Roris majalis</i>	t. 2. p. 890	<i>Spuma Maris</i> , sive <i>Alcyonum officinarum</i>	t. 2. p. 905
<i>Rosarum</i>	t. 2. p. 884	<i>Spuma Argenti</i> , vide <i>Lithargyrium</i> .	ibid.
<i>Rosarum ardens</i>	t. 2. p. 889	<i>Spuma Nitri</i> , vide <i>Aphronitrum</i> .	
<i>Salis variis</i>	t. 2. p. 746. & seq.	<i>Sputum Moventia</i> , vide <i>Pectoralia</i> .	
<i>mediane Oleo Vitrioli</i>	t. 2. p. 894	<i>Squama Metallorum</i> vide <i>Metallica</i> .	
<i>coagulatus</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 898	<i>Stachys</i>	ibid.
<i>compositus Harumanni</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 884	<i>Stalle</i> , vide <i>Myrrha</i> .	
<i>concentratus</i>	t. 2. p. 894	<i>Stannum</i>	ibid. & seq.
<i>Martialis</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Stanni Purgatio</i>	t. 2. p. 906
<i>Salis Armoniaci Varii</i>	t. 2. p. 757. & 898	<i>Calcinatio Incinerationis; & Reverberationis</i>	ibid.
<i>Chalybeatus</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 98	<i>dem</i>	
<i>Succinatus</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Immersiois</i> , unde <i>Sal</i> , & <i>Magisterium</i>	
<i>Tartarisatus</i> ex eadem Ph.	ibid.	<i>ibid.</i>	
<i>Salis Gemme Variis</i>	t. 2. p. 750	<i>Vaporosa</i>	ibid.
<i>Sambuci</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Destillatio</i> , unde <i>Stannum diaphoreticum</i> , <i>Sulphura Stanni varia</i> , <i>crystalli &c.</i>	ibidem
<i>Sanguinis</i> è Ph. Bat.	ibid.	& seq.	
<i>Sanguinis humani</i> è Ph. Bat.	t. 1. p. 1005	<i>Extractio</i> , unde <i>Tinctura stanni Basiliana</i>	t. 2. p. 907
<i>Saturni</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Mercurificatio</i>	t. 2. p. 908
<i>Spongiarum</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Salificatio</i> , unde <i>Sal verum</i>	t. 2. p. 907. & seq.
<i>Sulphuris Varii</i> , vide <i>Sulphur</i>	t. 2. p. 932	<i>Sublimatio</i>	ibid.
<i>Tabaci</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Staphisagria</i>	t. 2. p. 903
<i>Tartari</i>	t. 1. p. 1006. & t. 2. p. 948	<i>Ex stercore humano preparata varia</i>	t. 1. p. 984.
<i>Tartari compositus</i> , ex <i>Cnæffell.</i>	t. 2. p. 903	& seq.	
<i>Volatilis cum oleo fetido</i>	t. 2. p. 892	<i>Sternutatoria</i> , vide <i>Præmice</i> , & <i>Errhina</i> .	
<i>Subtilior compositus</i>	ibid.	<i>Sigli densificati</i> , vide <i>Trochisci</i>	t. 2. p. 1007
<i>Theriacalis camphoratus</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Sibium</i> , vide <i>Antimonium</i> .	
è Ph. Aug.	t. 2. p. 885	<i>Stachadis varia species</i>	t. 2. p. 908. & seq.
<i>Terra sigillata</i> , vide <i>Terra sigillata</i> .	t. 2. p. 970	<i>Stomachica Medicamenta quid sint</i>	ibid. & seq.
<i>de Tribus Cnæffellii</i>	t. 1. p. 913	<i>Storax</i> , vide <i>Stryax</i> .	
<i>Veneris</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Stramonium</i>	t. 2. p. 912
<i>Vini Aconitici</i> D. à Mynsicht	t. 2. p. 899	<i>Stratigotes</i> , vide <i>Millefolium</i> .	
<i>Aromaticus</i> ex eodem	ibid.	<i>Strutium</i> , sive <i>Struticamelus</i>	ibid. & seq.
<i>Cephalicus</i> ex eodem	ibid.	<i>Ex Struticamelo officinalia</i>	t. 2. p. 913
<i>Juniperinus</i> ex eodem	ibid.	<i>Stupefacientia</i> , vide <i>Narcotica</i> .	
<i>Lubontripicus</i> ex eodem	t. 2. p. 900	<i>Sturro</i>	ibid. & seq.
ex <i>Cnæffellio</i>	t. 2. p. 444	<i>Sturnus</i>	t. 2. p. 914
<i>Nephriticus</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 900	<i>Styptica</i> , vide <i>Adstringentia</i> .	ibid. & seq.
<i>Odontalgicus</i> ex eodem	t. 2. p. 899	<i>Suber</i>	t. 2. p. 915
<i>Otalgicus</i> ex eodem	ibid.	<i>Sublimatio quid sit</i>	ibid. & seq.
<i>Paralyticus</i> ex eodem	t. 2. p. 900	<i>Succinum antimonii</i>	t. 2. p. 918
<i>Pectoralis</i> ex eodem	t. 2. p. 899	<i>Succini adulterini confectio</i>	t. 2. p. 104
<i>Rectificatus</i>	t. 2. p. 887	<i>Succus quid sit, & quomodo eliciatur</i>	t. 2. p. 910. & seq.
<i>Stomachicus</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 900	<i>Succi inspissati officinales</i>	t. 2. p. 922
<i>Succinatus</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Succus Cyrenæicus</i> , vide <i>Laserpitium</i> .	
<i>Tartarisatus</i>	t. 2. p. 888. & 898	<i>Sudorifica</i> , vide <i>Hydrotica</i> .	
<i>Theriacalis</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 900	<i>Suffius quid sit</i>	t. 2. p. 913
<i>Viperarum</i>	t. 2. p. 898. & 1032	<i>Suffius exempla varia</i>	ibid. & seq.
<i>Viridis Eris</i>	t. 1. p. 533	<i>Sulphur in genere</i>	t. 2. p. 926
<i>Vitrioli Varii</i> tom. 1 p. 533. & tom. 2. p. 761.		<i>Sulphur Minerale in specie</i>	t. 2. p. 928
ad 766		<i>Sulphuris Mineralis delectus</i>	t. 2. p. 929
<i>Vitrioli</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Sulphuris destillatio</i> , unde <i>Aquæ</i> , <i>Olæ</i> , & <i>Spiritus</i>	t. 2. p. 932
<i>coagulatus</i> ex eadem Ph.	ibid.	<i>Extractio & Infusio</i> , unde <i>Balsama</i> , & <i>Salia</i> .	
ex <i>Cnæffellio</i>	t. 2. p. 443	<i>Sulphuris varia</i>	t. 2. p. 933. & seq.
<i>Cordialis Angeli Sala</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 885	<i>Liquatio</i>	t. 2. p. 935
<i>Diaphoreticus</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 898	<i>Præcipitatio</i> , unde <i>Lac.</i>	t. 2. p. 931
<i>Martis</i> è Ph. Bat.	ibid.	<i>Sublimatio</i> , unde <i>Flores variis</i>	t. 2. p. 929
<i>Philosophicus</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Sulphur antimonii</i>	t. 1. p. 814. & t. 2. p. 935
<i>Tartarisatus</i> ex ead. Ph.	t. 2. p. 899	<i>Auratum antimonii</i>	ibid.
<i>Urina Volatilis</i>	t. 1. p. 983. & seq.	<i>Mercurii</i>	t. 2. p. 289
<i>Uterinus</i> ex D. Charraz	t. 2. p. 886	<i>Vitrioli</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 935
<i>Splenetica Medicamenta quid sint</i>	t. 2. p. 902.	<i>Martiale</i> ex ead. Ph.	ibid.
& seq.		<i>Narcoticum</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Splenetica specifica Varia</i> ex <i>Cnæffellio</i>	t. 2. p. 902	<i>Sumach</i>	t. 2. p. 96
& seq.		<i>Suppositorium quid sit</i>	ibid. & seq.
<i>Splenium</i> , vide <i>Scolopendrium</i> .		<i>Suppositoria varia</i> ex D. Michael.	t. 2. p. 938
<i>Spodium</i> , vide <i>Ebur</i> , sub <i>Titulo Elephas</i> .		<i>Sycomorinus</i>	ibid.
		<i>Sylphium</i>	

INDEX RERUM.

Sylphium, vid. *Lascerpitium*
Symphytum majus t. 2. p. 938
Symphytum minus, vid. *Bugula*
Symphytum minimum, vid. *Prunella Herba*
Syrupus, vid. *Sirupus*

T.

Tabacum t. 2. p. 939
Tabella quomodo parentur t. 2. p. 940 & seq.
Tabella Absinthiaca è Ph. Bat. t. 2. p. 941
Amygdaloides ex eadem Pharm. ibid.
De Angelica ex eadem Pharm. ibid.
Anticynanchica ibid.
De Aurantiis ibid.
De Berberibus ibid.
Burgesiana t. 2. p. 942
Cardiologica ibid.
Carminativa ibid.
Cathartica ibid.
Dialthea ibid.
Diambra ibid.
Diatragacanthæ ibid.
Divina ibid.
Embryonum ibid.
Emetica ibid.
Farfareæ ibid.
Fœniculata ibid.
Garyophyllata t. 2. p. 941
Grisea ibid.
Hæmorrhœica ibid.
Helenii ibid.
Infantum ibid.
Lentiales ibid.
Martiales ex D. Cnocephalo t. 2. p. 1134
Perlata t. 2. p. 941
Prunella t. 2. p. 942
de Pipere ibid.
Purgantes t. 2. p. 941
Rosacæa t. 2. p. 942
Saponacæa ibid.
De Syracæ ibid.
Tartarea ibid.
Vermifuga t. 2. p. 941 & 942
Tacamahaca t. 2. p. 942 & seq.
Talcum, vid. sub titulo *Lapis* t. 2. p. 133
Talci electio ibid.
Calcinatio sicca ibid. & seq.
humida, unde Cremor, liquor, oleum,
& Tinctura t. 2. p. 134
Talpa t. 2. p. 943
Talpa partes officinales t. 2. p. 944
Tamarindus ibid.
Tamariscus t. 2. p. 945
Tanacetum ibid.
Thapsia, vid. *Thapsia*
Tapsus barbatus, vid. *Verbascum* ibid.
Taraxacon ibid.
Tartarus t. 2. p. 946
Tartari Depuratio, unde Tartarus depuratus, Acidum
tartari, Cremor, & crystalli tartari ibid.
Destillatio, unde Oleum, ac Spiritus tom. 2.
p. 947
Tartari Salsificatio, unde Sa t. 2. p. 949
Tartari liquor Spletticus t. 2. p. 950
Magisteria varia t. 2. p. 949
Oleum per deliquium ibid.
Sulphur, seu Tinctura ibid.
Tartarus viriolatus ibid. & seq.
De Tartari volatilitate D. Ludovici tractatus t. 2. p. 951
& seqq
Taurus, vid. sub titulo *Bos*.
Manget. Bibl. Pharm.

Taxus Arbor t. 2. p. 962
Taxus Animal t. 2. p. 963
Teda Aromatica, vid. *Suffitus*
Tela Gualteri, vid. *Sparadrapum*
Tela Aromatica pro suffitu t. 2. p. 924
Telephium t. 2. p. 963
Terebinthina, & Terebinthus ibid. & seq.
Ex Terebinthina preparata varia tom. 2. pag. 965
& seq.
Teredo t. 2. p. 966
Terra quatenus instrumentum pharmaceuticum t. 2. p. 33.
& seq.
Terra in genere t. 2. p. 966
Terra Destillatio, unde Spiritus t. 2. p. 967 & seq.
Præcipitatio, unde Magisterium t. 2. p. 967
Præparatio: unde preparata ibid.
Purificatio, seu lotio, unde terra lota ibid.
Terra Argillacea, seu sigillata t. 2. p. 968
Ex Terræ sigillatis præparationes varia tom. 2. p. 969
& seq.
Terra Bolus dicta, & ex ea preparata varia t. 2. p. 970
& seq.
Creta dicta, & ex ea preparata varia t. 2. p. 971
Iaponica, & ex ea preparata varia ibid. & seq.
Terre Iaponica præparatio generalis t. 2. p. 971
præparationes speciales t. 2. p. 972
Terra Marga dicta t. 2. p. 973
Ostra dicta, & ex ea preparata varia ibid.
Rubrica dicta t. 2. p. 974
Tripolis dicta ibid.
Terra merita, vid. Curcuma
Terra Vitrioli, vid. Vitriolum
Terra Oleum, vid. sub titulo Naphtha
Testiculus Canis, vid. Orchis
Testudo t. 2. p. 975 & seq.
Tetræpharmacum, vid. Unguentum
Tencrium t. 2. p. 976
Thalictrum t. 2. p. 977
Thapsia ibid.
Thé, sive Théa ibid. & seq.
Theriaca varia, vid. Electuarium Theriaca dictum
Therma, vid. sub titulo Aqua
Thlapsi t. 2. p. 979
Thora Valdensis ibid.
Thoracica, vid. Pectoralia ibid.
Thunus, sive Thunnus ibid. & seq.
Thus t. 2. p. 980
Thymelæa t. 2. p. 981
Thymallus ibid. & seq.
Thymum t. 2. p. 982
Tilia ibid.
Tirca, ejusque partes officinales t. 2. p. 982
Tinctura quid sit t. 2. p. 982
Tinctura absinthii è Ph. Bat. t. 2. p. 968
Aloetica ex Timæo ibid.
Aluminosa magistralis è Ph. Lond. t. 2. p. 983
Amygdaloides è Ph. Bat. t. 2. p. 986
Anodyna Ludovici t. 2. p. 983
Antimonii è Ph. Aug. ibid.
ex D. à Myngicht t. 2. p. 989
Emetica è Ph. Bat. t. 2. p. 986
Purgans ex ead. Pharm. ibid.
Antiphthifica è Ph. Aug. t. 2. p. 985
ex Timæo t. 2. p. 986
Antipleuritica ex eod. ibid.
Aperitiva Mæbii t. 2. p. 983
Aphronuri Nollenbroc. ibid.
Armoniaci è Ph. Bat. t. 2. p. 986
Assa fœtida ex ead. Pharm. ibid.
Asthmatica ex ead. Ph. ibid.
Ex Aurantium corticibus è Pharm. Norimb.
t. 2. p. 984

INDEX RERUM

<i>Tinctura Aurea</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Tinctura Rosarum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 985
<i>Bezoarica</i> è Ph. Bat.	ibid.	è Ph. Bat.	t. 2. p. 988
ex D. Jungken	t. 2. p. 983. & seqq.	<i>Rubi Idai</i> ex Timæo	t. 2. p. 986
Ludovici	ibid.	<i>Sapphiri colorem referens</i>	t. 2. p. 102
<i>Carbunculi colorem referens</i>	t. 2. p. 102	<i>Sassafras</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988
<i>Cardamomi</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 990
<i>Carvi</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Saturni</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988
<i>Cassia lignea</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 990	<i>Scorbutica</i> è Ph. Bat.	ibid.
<i>Castorei</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 984	<i>Scordii</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 985
<i>Cathartica</i> S. Cloßæi	t. 2. p. 983	<i>Serpilli</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988
<i>Cathartica Ridley</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Smaragdi colorem referens</i>	t. 2. p. 101
<i>Cephalica ambrata</i> D. Cnæff.	t. 1. p. 529	<i>Siptica</i> ex D. à Mynsicht.	t. 2. p. 991
<i>Cerussa</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Stomachica</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988
<i>Chamæmeli</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Succi</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 985
<i>Cinnamomi</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 984	è Ph. Bat.	t. 2. p. 988
<i>Cochlearia composita</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Sulphuris</i> è Ph. Bat.	ibid.
<i>Coralliorum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 984	ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 989
è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	ex Ph. Norib.	t. 2. p. 985
ex D. Cnæff.	t. 1. p. 637	<i>Tartari</i> è Ph. Aug.	ibid.
ex D. à Mynsicht.	t. 2. p. 988	Cnæff.	t. 2. p. 444. & 907.
<i>Cordialis</i> ex D. Cnæff.	t. 1. p. 637	ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 989
ex Timæo	t. 2. p. 986	<i>Terra Catechu</i>	t. 2. p. 971
<i>Cosmetica alba</i> ex D. Cnæff.	t. 1. p. 671	<i>Theriacalis</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 985
<i>rubra</i> ex ead.	ibid.	<i>Veneris</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988
ex D. Jungken	t. 2. p. 984	<i>Virginiana</i> è Ph. Bat.	ibid.
<i>Croci</i> è Ph. Lond.	ibid.	<i>Viridis</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 985
<i>Diaphoretica</i> ex D. à Mynsicht.	t. 2. p. 991	<i>Vua</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 990
Paracelsi à Cloß. correctæ	t. 2. p. 983	<i>Vierina</i> ex D. Jungken. tom. 2. pag. 985. &	
<i>Ferri</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	seqq.	
<i>Fragorum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 984	ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 991
<i>Galbaneti</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Tubymalus</i>	t. 2. p. 991
<i>Ad gingivas tumentes, & sanguinolentas</i> t. 2. p. 450		<i>Topazius, vid. sub titulo Lapis</i>	t. 2. p. 93
<i>Guajaci</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 897	<i>Topazii adulterini compositio</i>	t. 1. p. 103. & 1039
ex D. à Mynsicht.	t. 2. p. 990	<i>Topica varia ad Gangranam specifica ex Cnæffilio</i>	t. 1. p. 999
<i>Hamatitidis</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Tormentilla</i>	t. 2. p. 991
<i>Hepatica</i> ex Timæo	t. 2. p. 986	<i>Toxicum, vid. Venenum</i>	t. 2. p. 992
<i>Hiera</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Trachelium</i>	ibid.
<i>Hyperici</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 984	<i>Tragacantha</i>	
ex Timæo	t. 2. p. 990	<i>Tragea vid. Pulvis</i>	
<i>Ialapa</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 984	<i>Tragemata, vid. Confectio</i>	
<i>Iuniperi</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Tragopogon, vid. Barbula Hirci</i>	
ex bacis ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 989	<i>Tragoriganum</i>	ibid.
<i>Lacca</i> ex eodem	ibid.	<i>Tragoselinum, vid. Pimpinella, item Saxifragia</i>	
<i>Luna Zouelferi</i> ex D. Jungken	t. 2. p. 984	<i>Tragus, de ejus preparatione, vid. sub titulo Triticum</i>	
<i>Martis</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Transmutatio Metallorum, vide sub titulo Cryso-</i>	
ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 989	<i>pocia</i>	
<i>Aurea</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Tragi</i>	t. 2. p. 992
<i>Tartarifata</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Traumatica, vid. Vulneraria</i>	ibid.
ex D. Jungken.	t. 2. p. 985	<i>Tribuli species</i>	ibid. & seqq.
ex ejus vitriolo è Ph. Norib.	ibid.	<i>Tricomanes, vid. Adiantum</i>	ibid. & seqq.
<i>Melampodii</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 987	<i>Trifolium, ejusque species varia</i>	t. 2. p. 924
<i>Melisse</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Triticum, ejusque species, & ex iis preparata</i>	
<i>Mellis</i> ex ead. Ph.	ibid.	& seqq.	
<i>Myrrha</i> ex ead. Ph.	t. 2. p. 988	<i>Triticum, preparandi Modus, quo terra commissum dup-</i>	
<i>Nephritica Amelungi</i> ex D. Jungken tom. 2. p. 985.		<i>plum producat, quam quod alias producere solet</i>	
<i>Oculorum cancorum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988	t. 2. p. 997	
<i>Odontalgica</i> ex D. Cnæff.	t. 2. p. 450	<i>Triticum Sarracenicum, vid. Fegopyrum</i>	
è Ph. Bat.	t. 2. p. 988	<i>Trochiscatio, & Trochiscus quid sit</i>	ibid.
ex D. Jungken.	t. 2. p. 985	<i>Trochisci quomodo fiant</i>	ibid.
ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 990	<i>Trochiscorum alterantium usitatorum enumeratio</i>	ibid.
ex Timæo	t. 2. p. 986	& seqq.	
<i>Papaveris erratici</i> ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 990	<i>Trochiscorum purgantium usitatorum enumeratio</i> t. 2. p. 998	
<i>Paralytica</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988	<i>Trochisci de Absinthio Mesue</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 999
<i>Perlarum</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>De Agarico</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Piperis</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Mesue</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Proprietatis</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 985	<i>De Agno Casto Rhasis</i> ex ead. Ph.	ibid.
è Ph. Bat.	t. 2. p. 988	<i>Albi Rhasis</i> è Ph. Lond.	ibid.
ex D. à Mynsicht	t. 2. p. 989	<i>Alexiterii</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Rhabbarbari</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 988	<i>Renodæ</i> ex Schrodero	t. 2. p. 998
ex Rolfincio	t. 2. p. 985	<i>Trochisci</i>	

I N D E X R E R U M.

IIIII 2 0 0 Vernix

INDEX RERUM.

<i>Vernix Iaponica</i>	t. 2. p. 1022	<i>Vitriolum</i> , vid. sub titulo Sal	t. 2. p. 759
è <i>Mastiche</i>	t. 2. p. 1021	<i>Vitrioli Calcinatio aperta</i> , unde Colchotar	t. 2. p. 761
<i>Nigra</i>	t. 2. p. 1022	<i>Clausä</i>	ibid.
<i>Rubra</i>	ibid.	<i>Destillatio</i> , unde <i>Aquæ</i> , <i>Olea</i> , <i>Spiritus</i> varii, <i>Ros</i> ,	t. 2. p. 761. & seq.
<i>Vernicis Sinensis varia preparatio</i>	ibid.	&c.	t. 2. p. 768. & seq.
<i>Vernix è succino</i>	t. 2. p. 1021	<i>Extractio</i> , unde <i>Tincturæ</i> , <i>essentiæ</i> , & <i>extracta</i>	t. 2. p. 767
<i>Veronica</i>	t. 2. p. 1023. & seq.	varia	t. 2. p. 767
<i>Verrucaria seu Heliotropium</i>	t. 2. p. 1024	<i>Præcipitatio</i> , unde <i>Terre</i> , & <i>Sulphura</i>	t. 2. p. 767
<i>Vervex</i> , vid. <i>Ovis</i>		& seq.	
<i>Vesicantia</i> , & <i>Vesicatoria</i>	ibid. & seq.	<i>Purificatio</i> , unde <i>Vitriolum album Vomitivum</i> ,	t. 2. p. 760
<i>Vesicatoriorum varia exempla</i>	t. 2. p. 1026	aliaque præparata <i>Emetica</i>	t. 2. p. 768
<i>Vesicatoriorum exempla</i> , vid. in <i>Emplastris</i> , & <i>Cataplas-</i>		<i>Salificatio</i> , unde <i>Sal Vitrioli</i>	t. 2. p. 767
<i>matibus</i>		<i>Sublimatio</i> , unde <i>Flores Vitrioli</i> ,	t. 1. p. 913
<i>Vesperilio</i>	ibid. & seq.	<i>Vitrioli Martis preparatio</i>	t. 1. p. 920.
<i>Veronica</i> , vid. <i>Caryophyllus Hortensis</i>		<i>Destillatio</i>	
<i>Viburnum</i>	t. 2. p. 1027	<i>Vitrum antimonii</i> , vid. sub titulo <i>Antimonium</i>	
<i>Vicia</i>	ibid.	<i>De Vitris</i>	t. 2. p. 1043 & seq.
<i>Victorialis</i>	ibid.	<i>De Viraria Arte Antonii Neri Tractatus</i>	t. 2. p. 1044
<i>Vincetoxicum</i> , vid. <i>Asclepias</i>		& seqq.	
<i>Vinca peruviana</i>	ibid. & seq.	<i>Vitra quomodo vario colore tingantur</i>	t. 2. p. 1049. & seq.
<i>Vinum</i> , de eo in genere, vid. sub titulo <i>Vitis vinifera</i> .		<i>Vitri antiquitas</i>	t. 2. p. 1069. & seq.
<i>Vinum</i> , <i>Absinthiacis</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1028	<i>Vitri Usus</i>	t. 2. p. 1070. & seq.
<i>Antiepilepticum purgans</i> ex Bierling.	t. 2. p. 1030	<i>De Virariis fornacibus</i>	t. 2. p. 1072. & seqq.
<i>Antimoniale</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1028	<i>Vitri stillatitii historia</i>	t. 2. p. 1091. & seqq.
<i>Arthriticum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1029	<i>De Virariis instrumentis</i>	t. 2. p. 1096. & seq.
ex Bierling.	t. 2. p. 1030	<i>Ulmaria</i>	t. 2. p. 1097
purgans è Ph. Bat.	t. 2. p. 1029	<i>Ulnus</i>	ibid. & seq.
<i>Benedictum</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1028	<i>Umbilicus marinus</i>	t. 2. p. 1098
<i>Ceraforum nigrorum</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Umbilicus terra</i> , vid. <i>Cyclamen</i>	
<i>Chalybeatum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1019	<i>Umbilicus Veneris</i>	t. 2. p. 1099
ex <i>Cnœffelio</i>	t. 2. p. 1133	<i>Vncia</i> , vid. sub titulo <i>Mensuræ</i> , & <i>Pondera</i>	
è Ph. Lond.	t. 2. p. 1028	<i>Vnedo</i> , vid. <i>Arbutus</i>	
ex <i>VVeickardo</i>	ibid.	<i>Vnguentum quid sit</i> , & <i>quomodo paretur</i>	t. 2. p. 1099
<i>Ecphraticum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1029	& seqq.	
<i>Gallicum</i> ex lignis <i>D.P.C.</i>	t. 2. p. 1034	<i>Vnguentum Acopum D. Meissneri</i> è Pharm. Schrod.	t. 2. p. 1114.
<i>Helleboratum</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1028	<i>Adstringens</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1104
<i>Hydropicum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1030	<i>Agyptiacum simplex Mesuæ</i> è Ph. Aug.	ibid.
<i>Hippocraticum</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 1028	<i>Compositum</i> ex ead. Ph.	ibid.
è Ph. Bat.	t. 2. p. 1030	ex <i>D. Lemort</i>	t. 2. p. 1118
<i>Hauronii</i>	t. 2. p. 1028	<i>Agrippa ex Nicolao</i> è Pharm. August. tom. 2.	
pro <i>hydrope</i> <i>VVeickard.</i>	t. 2. p. 1029	p. 1104.	
<i>Laxativum</i> ex eod.	ibid.	<i>De Alabastro</i> è Ph. Aug.	ibid.
ex <i>Zvvelfero</i>	t. 2. p. 1028	<i>Album sive de Cerussa Avicenna</i> , ex ead. Pharm.	
<i>Laxativum</i> ex Bierling.	t. 2. p. 1030	ibidem	
<i>Martiale D.M.</i> ex eod.	ibid. & t. 1. p. 998	<i>Camphoratum</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Præservans in podagra</i>	ibid.	<i>Albuminum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1118
<i>Rubellum</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1029	<i>Ad Alopecias</i> ex <i>D. Michael.</i>	t. 2. p. 1122
<i>Scelotyrhicum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1030	<i>De Althææ simplex Nicol.</i> è Pharm. Aug. tom. 2.	
<i>Stomachicum</i> ex <i>D. Lemort.</i>	t. 2. p. 1029	p. 1104.	
<i>Viperinum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1030	<i>Compositum Nicol.</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Vina varia Medicamentosa</i> , vid. sub titulo <i>Infusum</i> &		<i>Ad alvum infantum laxandam</i> ex Hoffmanno	t. 2. p. 1119.
<i>Claretum</i>		p. 1119.	
<i>Viola</i>	ibid.	<i>Alvum laxans Jessenii</i>	t. 2. p. 1108
<i>Viola Lunaria</i>	ibid.	<i>Amarum</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1105
<i>Violaria</i> , vid. <i>Viola</i>		<i>Vnguentum ad Ambusta varia</i>	t. 1. p. 665
<i>Vipera descriptio</i> , vid. sub titulo <i>Serpens</i> , & <i>Serpenti-</i>		<i>Vnguentum ad Ambusta</i> ex <i>D. Lemery</i>	t. 2. p. 1105
<i>num genus</i>		ex <i>D. Michael.</i>	t. 2. p. 1122
<i>Ex Viperis preparata varia</i> ex <i>Schrodero</i>	t. 2. p. 1032	ex <i>D. à Mynsicht.</i>	t. 2. p. 1126
& seq.		<i>Anodynium</i> è Ph. Aug.	t. 2. p. 1105
<i>Piperina virginiana</i>	t. 2. p. 1033. & seq.	vulgo <i>Iovis dictum</i> ex eadem Pharm.	
<i>Virga aurea</i> , ejusque species	t. 2. p. 1034	ibidem	
<i>Virga Pastoris</i>	ibid.	<i>D. D. R.</i> ex Hoffm.	t. 2. p. 1119
<i>Virga Sanguinea</i>	t. 2. p. 1035	ex <i>D. à Mynsicht.</i>	t. 2. p. 1125
<i>Viride Aris</i> , vid. <i>Ærugo</i>		in <i>Podagra</i>	t. 2. p. 1114
<i>Viscum</i>	ibid.	<i>D. Reinesii</i>	t. 2. p. 1124
<i>Visci aucuparii preparatio</i>	t. 1. p. 21	ex <i>C. C. Simonidis</i>	t. 2. p. 1114
<i>Vitex</i> , vid. <i>Agnus Castus</i>		<i>Antipleuriticum Romæ usuatissimum</i>	tom. 2. p. 1119
<i>Vitis Vinifera</i>	t. 2. p. 1035. & seq.	<i>Antipyreticum</i> è Ph. Bat.	t. 2. p. 1118
<i>De Vitium generibus</i>	t. 2. p. 1036. & seq.	<i>De Apio</i> è Ph. Lond.	t. 2. p. 1105
<i>Vitis alba</i> , vid. <i>Brionia</i>		<i>Apostolorum Avicenna</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>Purificatio</i> , vid. <i>Vitrum</i>		<i>Vnguentum</i>	
<i>Purificatio</i> , & cum ea <i>Chrysellisatio</i>	t. 2. p. 1038. & seq.		

INDEX RERUM.

<i>Unguentum Aregon Nicolai</i> ex eadem Ph.	t.2.p.1105	<i>Unguentum in Dentium dolore</i> ex Michael.	t.2.p.1122
<i>de Arthanita majus Mesua</i> e Pharm. August.	ibid.	<i>ad Dentium facilitatem</i> ex eodem	tom.2.
<i>Arthriticum Burthi</i>	t.1.p.298	p.1121	
<i>Acopum dictum D.Meissneri</i>	tom.1.	<i>Depilatorium</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118
p.297		<i>Digitalis</i> ex ead.ph.	ibid.
<i>contra Atrophiam membrorum</i> ex D.Michael.	t.2.	<i>Dorsuale in Hæctica</i> ex D. Michael.	tom.2.
p.1121		p.1120	
<i>de Aurantiis</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118	<i>in Dysenteria & fluxibus alvi</i>	t.2.p.1121
<i>Auratum in alopecia leprosa, & scabie,</i> ex Cnæffel.	t.2.p.1138	<i>Emolliens & lenitivum in omnibus ulceribus</i> ex	Collect.Bierling.
<i>Aureum Mesua</i> e Ph.Aug.	t.2.p.1105	<i>Enulatum</i> e Ph.Lond.	t.2.p.1107
<i>ad Barbam & capillos generandos</i> ex Bucretio	t.2.p.1122	<i>cum Mercurio</i> ex ead.ph.	ibid.
<i>Basilicon majus</i> e Pharm. Lond.	tom.2.	<i>contra Epilepsiam, & alios morbos malignos</i> ex	Hoffman.
p.1105		<i>Faciale</i> e ph.Bat.	t.2.p.1119
<i>Minus, seu Tetrapharmakon,</i> ex ead.Ph.	t.2.p.1106	<i>Unguentum ad faciei vitia varia</i>	t.2.p.1118
<i>de Bellio Mesua</i> e Ph. Aug.	ibid.	<i>Unguentum ad faciei ruborem</i> ex Hoffmann.	t.1.p.663
<i>de Betonica Aquatica</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118	p.1119	t.2.
<i>de Bolo</i> ex Ren. dæo	t.2.p.1106	<i>ad faciei livorem</i> ex Michael.	t.2.p.1121
<i>Butyraceum nervale S. Clossæi</i>	t.2.p.1114	<i>ex D. à Mynsicht</i>	t.2.p.1127
<i>de Calce</i> e Ph.Aug.	t.2.p.1106	<i>Familiale</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118
<i>Vivâ</i> ex D. à Mynsicht	t.2.p.1126	<i>pro fascinatiis pueris</i> ex Hoffman.	t.2.p.1110
<i>contra calculum</i> ex collect. Bierling.	t.2.p.1123	<i>ad Fissuras</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118
<i>ex Hoffm.</i>	t.2.p.1119	<i>ad Foveas</i> ex ead.Ph.	ibid.
<i>In Cancro exulcerato</i> ex collect. Bierling.	t.2.	<i>Fuscum Nicolai</i> e Ph.Aug.	t.2.p.1107
p.1123		<i>e Ph. Bat.</i>	t.2.p.1118
<i>Mammillarum</i> ex D.Michael.	t.2.	<i>ad Gingivas in Scorbuto</i>	t.2.p.1121
p.1122		<i>Griseum ad ulcera tibiæ manantia</i>	tom.2.
<i>Unguenta Capillos crispis reddentia</i>	t.1.p.661	p.1120	
<i>desuæos conservantia</i>	t.1.p.656	<i>e Gummi Elemi,</i> e Pharm.Lond.	t.2.
<i>restituentia</i>	t.1.p.657	p.1107	
<i>renasci prohibentia</i>	t.1.p.658	<i>ad guttam rosaceam</i> ex Hoffmann.	tom.2.
<i>dealbantia</i>	t.1.p.661	p.1119	
<i>flavos reddentia</i>	t.1.p.660	<i>ad Hemorrhoides</i> e Ph.Aug.	t.2.p.1107
<i>nigros reddentia</i>	ibid.	<i>e Ph.Bat.</i>	t.2.p.1118
<i>Unguentum contra capitis dolorem</i> ex Michael.	t.2.	<i>ex Cnæffel.</i>	t.2.p.903. & seq.
p.1120		<i>ex Godard</i>	t.2.p.1108
<i>ad Carbunculos D.R.</i> ex Hoffm.	ibid.	<i>prominentes</i> ex Hoffmann.	tom.2.
<i>contra Cardialgiæ</i> ex D.Michael.	t.2.p.1121	p.1119	
<i>Carminativum</i> ex eodem	ibid.	<i>e Ph.Lond.</i>	t.2.p.1107
<i>ex D. à Mynsicht</i>	t.2.p.1126	<i>dolentes</i> ex Michael.	t.2.p.1121
<i>ex D. Zvvelfero</i>	t.2.p.1106	<i>Norimberg.</i>	t.2.p.1107
<i>pro Caruncula penis</i> ex Hoffm.	t.2.p.1120	<i>ex Zvvelfero</i>	t.2.p.1108
<i>Cataploras</i> e Ph.Colleg. Reg.Lond.	t.2.p.1114	<i>Hepaticum</i> ex D.Michael.	t.2.p.1121
<i>Cephalicum</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118	<i>ex Zvvelfero</i>	t.2.p.1108
<i>ex Zvvelfero</i>	t.2.p.1106	<i>Herniosum</i> ex D. à Mynsicht	t.2.p.1127
<i>de Cerussa antimoniæ</i> ex Hoffm.	t.2.p.1119	<i>ad Hernias</i> ex Zvvelf.	t.2.p.1108
<i>Citrinum</i> e Ph.Aug.	t.2.p.1106	<i>Herpeticum</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118
<i>Clymasticum</i> ex ead. Ph.	ibid.	<i>Infrigidans Galeni</i> e Ph. Aug.	t.2.p.1108
<i>Comitissa</i> ex ead. ph.	t.2.p.1107	<i>ad Functuras</i> e Ph.Norib.	ibid.
<i>ad Comiſiones</i> ex Collect Bierling.	t.2.p.1122	<i>Lauripum vulgare</i> e Ph.Lond.	ibid.
<i>singulare Fucari e Turcia allatum,</i> ibi-		<i>in Lienis duritie</i> ex D. Michael.	t.2.p.1121
<i>dem</i>		<i>de Linaria</i> e Ph.Aug.	t.2.p.1109
<i>ex Hoffman.</i>	t.2.p.1119	<i>de Liquiritia</i> ex ead.Ph.	ibid.
<i>Cordiale Ludovici ab Horning.</i>	t.2.p.1115	<i>de Lithargyro</i> ex ead. Ph.	ibid.
<i>ad pulsum D.Landgraviæ</i>	t.2.p.1124	<i>ad Lumbricos</i> e Ph. Bat.	t.2.p.1118
<i>D.Meureri</i>	ibid.	<i>Magistrale</i> ex D.Le Mort	ibid.
<i>D.Reineſii</i>	t.2.p.1123	<i>Mammillas parvas reddens & conservans</i>	t.1.
<i>D.VVeickard</i>	t.2.p.1115	p.668	
<i>D.Zvvelferi</i>	t.2.p.1107	<i>Manus dealbans</i>	t.1.p.666
<i>Cosmeticum Cnæffel.</i>	t.1.p.671	<i>ad Manuum tumores & Scissuras</i> ex frigore	t.1.
<i>ex D.Michael.</i>	t.2.p.1122	p.667	
<i>Criniscum</i> e Ph.Bat.	t.2.p.1118	<i>ad Manuum Ferrucas</i>	ibid.
<i>Cutis capitis vitia curantia</i>	t.1.p.662	<i>Martiatum</i> ex Nicolao, e Ph.Aug.	t.2.p.1109
<i>de Cyclamine, vide Unguentum de Arthanita.</i>		<i>ex D.Le Mort</i>	t.2.p.1117
<i>de Cynoglossa</i> e Ph.Aug.	t.2.p.1107	<i>Masticinum</i> e Ph. Lond.	t.2.p.1109
<i>Diachylon molle</i> ex ead.ph.	ibid.	<i>Maturativum</i> ex Collect. Bierling.	t.2.
<i>Diapompholigos Nicol.</i> ex ead. ph.	t.2.p.1111	p.123	
<i>Defensivum D.Reineſii</i>	tom.2.	<i>Medicamentosum</i> ex D. à Mynsicht	t.2.
p.1123		p.1126	
<i>Mangeti Bibl. Pharm.</i>		<i>ad Membra igne ambusta</i> e Phar. Aug.	t.2.
		p.1109	

INDEX

Unguentum in Memoria diminuta ex Lauremb. t.2.

p.1123	
Mercuriale è Ph. Aug.	t.2.p.1109
de Macilaginibus è Ph. Lond.	ibid.
Mundificativum de Melle ex Collect. Bierling.	t.2.p.1124
ex Renodæo	t.2.p.1109
Narcoticum ex Schrod.	t.2.p.1115
Neapolitanum è Ph. Lond.	t.2.p.1110
Nephriticum ex D. à Mynsicht	t.2.p.1121
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1125
ex D. Prostenio	t.2.p.1115
in Nervi Casione, & dorfi contusione D. Krause	t.2.p.1122
Nervinum è Ph. Aug.	t.2.p.1110
ex D. Le Mort	t.2.p.1117
Nicotiana Jouberti, è Ph. Aug.	t.2.p.1110
Nibili ad oculos è Ph. Aug.	ibid.
Nobile ex D. à Mynsicht	t.2.p.1126
Nutritum è Ph. Lond.	t.2.p.1110
ad Oculos è Ph. Amstælod.	ibid.
è Ph. Aug.	ibid.
Contra oculorum rubedinem ex Bierling.	t.2.
p.1123	
Oculorum lacrymas sistens	t.1.p.662
palpebrarumque livorem tollens	t.1.
p.661	
Ophthalmicum è Ph. Bat.	t.2.p.1118
D. Charraz	t.2.p.1115
è Ph. Lond.	t.2.p.1110
ex D. Michael.	tom. 2.
p.1123	
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1125
F.F.D.D. de Spina	t.2.p.1115
ex D. VVillio	ibid.
ex Oxylapatho è Ph. Lond.	t.2.p.1110
ad papillarum scissuras	t.1.p.668
Paralyticum ex D. Michael.	tom.2.
p.1120	
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1124
Paregoricum è Ph. Bat.	t.2.p.1118
contra Paronychiam ex Collect. Bierling.	tom. 2.
p.1123	
ad partum faciendum ex Hoffmann.	t.2.
p.1119	
ex D. Michael.	t.2.p.1121
D. Seintrancz	t.2.p.1122
Patavinum in ulceribus malignis	t.2.p.1120
Pectorale è Ph. Aug.	t.2.p.1110
ex Hoffm.	t.2.p.1119
ex D. Michael.	t.2.p.1110
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1125
ad Pediculos è Ph. Aug.	t.2.p.1111
Capitis ex D. Michael.	t.2.p.1120
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1127
ad Perniones ex Schrod.	t.2.p.1115
contra Pestem ex Collect. Berling.	t.2.p.1123
Piperinum è Ph. Bat.	t.2.p.1119
ad Pisces capiendos ex D. Charraz	t.2.p.1115
Placentini Palatii all' Angelo	t.2.p.1124
Pleuriticum ex D. Michael.	t.2.p.1120
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1125
de Plumbo è Ph. Lond.	t.2.p.1111
Polychrestum contra dolores arthriticos	t.2.
p.1123	
Pomatum è Ph. Aug.	t.2.p.1111
ex D. Le Mort	t.2.p.1117
ex Ph. Lond.	t.2.p.1111
Rubrum pro labiis tingendis	t.1.p.672
ex D. Regnbodis	t.2.p.1123
Populeum Nicolai è Ph. Aug.	t.2.p.1111
ex D. Le Mort	t.2.p.1117

RERUM.

Unguentum Potabile è Ph. Aug.	t.2.p.1111
Rubrum è Ph. Norimb.	ibid.
Viride F.F.	t.2.p.1117
è Ph. Norimb.	t.2.p.1111
Purgans externum ex D. Michael.	t.2.p.1111
de Rapis ex D. à Mynsicht	t.2.p.1126
Refrigerans ex D. Cnæff.	t.2.p.1138
Renale ex D. à Mynsicht	t.2.p.1125
in Renum calore ex D. Michael.	t.2.p.1121
Resinum è Ph. Lond.	t.2.p.1112
Resumptivum Fernelii è Ph. Aug.	ibid.
ex Rhamno & Frangula Minaereri è Ph. Aug.	ibid.
ibid.	ibid.
Rosatum Mesue è Ph. Aug.	ibid.
Rubrum sive de Minio camphoratum è Ph. Aug.	ibid.
ibid.	ibid.
ex D. Le Mort	t.2.p.1117
Desiccativum è Ph. Lond.	t.2.p.1112
Rugas venis à partu tollentia	t.1.p.669
Ruiaceum è Ph. Lond.	t.2.p.1111
ad Scabiem	t.1.p.665
ad Scabiem è Ph. Aug.	t.2.p.1111
Ad Scabiem ex Lapatho acuto, ex	Bierlingio
ex D. Le Mort	t.2.p.1118
ex D. Michael.	t.2.p.1121
ex Schrodero	t.2.p.1115
Scabiosa è Ph. Lond.	t.2.p.1112
contra serpiginem ex Collect. Bierling.	t.2.p.1124
de sevo hircino ex D. à Mynsicht	t.2.p.1126
ex Amato Lustiano, è Ph. Aug.	t.3.p.1111
de Solano è Ph. Lond.	t.2.p.1112
Solare è Ph. Bat.	t.2.p.1119
ad Somnum ex Collect. Berling.	t.2.p.1121
Somniferum ex eodem	t.2.p.1124
è Ph. Norimb.	t.2.p.1112
F.F. ex Schrodero	t.2.p.1115
Spasmaticum ex D. à Mynsicht	t.2.p.1125
Splanchnicum è Ph. Lond.	t.2.p.1112
ex Zvvelfero	t.2.p.1113
Spleneticum ex Collect. Bierling.	t.2.p.1124
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1125
ex Schrodero	t.2.p.1115
Stipticum ex D. Charraz	t.2.p.1116
ex D. à Mynsicht	t.2.p.1126
Fernelii ex Renodæo	t.2.p.1113
Stomachale del Monfig. Duce di Stinuerse	t.2.
p.1124.	
à Patre Francisco de Salis communica-	rum
ibid.	ibid.
è Succis è Ph. Collect. Reg. Lond.	t.2.p.1113
Arantii è Ph. Aug.	t.1.p.1115
Aperitivis è Ph. Lond.	ibid.
Sumach è Ph. Lond.	ibid.
Superciliorum vitia tollens	t.1.p.661
Suppurativum Reinesii	t.2.p.1123
Sympathicum è Ph. Bat.	t.2.p.1119
Crollii	t.2.p.1116
contra tabem ex Collect. Bierling.	t.2.p.1124
TapsiValentia, & Tapsimel è Pharm. Lond.	t.2.
p.1113	
Tegularum è Ph. Norimb.	ibid.
Theribinchina	t.2.p.1117
ad Tineas è Ph. Aug.	t.2.p.1113
ex Hoffm.	t.2.p.1120
de Tutia Nicolai è Ph. Aug.	t.2.p.1113
contra Venesicia ex Hoffmann.	t.2.p.1120
ad Venerem ex Collect. Bierling.	t.2.p.1123
in Ventriculi ardore ex D. Michael.	t.2.p.1121
pro Ventriculo corroborando, ex eodem	ibi.
ad Vermes è Pharm. Aug.	tom.2.
p.1113	

I N D E X R E R U M.

- Unguentum ad Vermes* ex Michael. t. 2. p. 1121
 ex D. à Mynsicht t. 2. p. 1127
 è ph. Norimb. t. 2. p. 1113
Ad verrucas, seu carunculas in meatu urinario
 ibidem
Vescatorium ex D. Dorero t. 2. p. 1124
Violatum è ph. Aug. t. 2. p. 1114
Viride Casareum, contra casum, luxationes, contu-
siones, dolores, vulnera ex collect. Bicerling.
 t. 2. p. 1123
Viride Regina è Ph. Aug. t. 2. p. 1114
Virilitatis è ph. Bat. t. 2. p. 1119
Umbilicale purgans ex D. Dorero t. 2. p. 1124
Contra Urina Stillicidium ex Bicerling. t. 2. p. 1123
Ad ustionem ex eod. ibid.
Ad vulnera, & ulcera, ex Hoffm. t. 2. p. 1120
Vulnerarium ex eod. ibid.
Aureum è ph. Norimb. t. 2. p. 1114
Unguis odoratus, vid. Blaſta Bizantia
Ungula varia, vid. Sub nomine Animalium è quibus
 desumuntur.
Unicornu animal, vid. Monoceros
Unicornu minerale, vid. sub titulo Lapis t. 2. p. 87. 134
 & 135
Unicornu artificiale D. Cnœffellii t. 1. p. 637
Unifolium, vid. Bifolium
Uniones, vid. Margaritæ
Uolubilis t. 2. p. 1127
Vomitiva, vid. Emetica
Vpupa, ejusque partes officinales ibid. & seq.
Urceolaria, vid. Parietaria
Ureica, vide Diuretica
Urina, vid. pro usu medico in animalibus unde desu-
 mitur
Urina humana, & ex ea preparata remedia t. 1. p. 983
Urinaria vid. Taraxacum
Ursus, ejusque partes officinales t. 2. p. 1128
Urtica, ejusque species varia ibid. & seqq.
Uruçu t. 2. p. 1130
Usnea ibid.
Uterina Medicamenta quid & quanam sint? ibidem
 & seqq.
Uterina specifica varia ex D. Cnœffel. t. 2. p. 1132 & seqq.
Uva, crispa, seu uva spina, vid. Gloſſularia
Uva Lupina vid. sub titulo Solanum
Uva passa, vid. sub titulo Vitis Vinifera
Uva passa, sive passula laxativa varia t. 2. p. 1133
 & seq.
Uva vulpina t. 2. p. 1136
Winteranus Cortex, vid. Cortex Winteranus
Vulneraria, sive Traumatica Medicamenta quid &
quanam sint? t. 2. p. 1136. & seq.
Vulneraria quadam specifica ex D. Cnœffel. t. 2. p. 113
De Vulnerariis Herbis quadam asseruntur t. 2. p. 113)
 & seq.
Vulpes, ejusque partes officinales t. 2. p. 1140
Vultur, ejusque partes officinales ibid. & seq.
Vulvaria t. 2. p. 1141
 X.
Xanthium, vid. Bardana
Xilaloe, vid. Agallochum
Xilobalsamum, vid. Balsamum
Xylocassia, vid. Cassia lignea
Xilum
Xiphium, vid. Gladiolus t. 2. p. 1141
Xyris ibid. & seq.
 Y.
Yera, vid. Contrayerva
Ypecacoanna, sive ypecacuanha t. 2. p. 1142. & seq.
Yucca t. 2. p. 1143. & seq.
 Z.
Zazanea è Ph. Baud. t. 1. p. 771
Zea t. 1. p. 1144
Zedoaria ibid.
Zibethum ibid.
Zincum ibid. & seq.
Zingiber t. 2. p. 1145 & seq.
Zingiber purgans ex D. à Mynsicht t. 1. p. 88
rosatum ex eod. t. 1. p. 791
Zingiberis affinis planta t. 2. p. 1146
Zopissa ibid.
Zythum seu Cerevisia, ejusque preparatio, vid. sub titu-
 lo Hordeum
Butleri è Ph. Bat. t. 2. p. 1146
Cataploras ex ead. ph. ibid.
Embryonum è Pharm. Bat. t. 2. p. 1146
Galieni ex D. Juncken ibid.
Hydropica è Ph. Bat. ibid.
Jovialis ex ead. Ph. ibid.
Oxydoreica ex ead. ph. ibid.
Purgans ex D. Sydenham ibid.
Scorbutica è Ph. Bat. ibid.
Scrophularia ex ead. Ph. ibid.
Vernalis ex ead. Ph. ibid.
Zizipha, vid. Jujubæ

F I N I S.



MONITIO BIBLIOPEGO

de Modo inferendi Tabulas Figurarum.

IN TOMO PRIMO.

TABVLA I.	Pag. 14.
II.	Pag. 140.
III.	Pag. 437.
IV.	Pag. 552.
V.	Pag. 553.
VI.	Pag. 866.
XXXII.	Pag. 13.
XXXIII.	Pag. 20.
XXXIV.	Pag. 711.

IN TOMO SECVNDO.

TABVLA VII.	Pag. 48.
VIII.	Pag. 49.
IX.	Pag. 50.
X.	Ibid.
XI.	Ibid.
XII.	Pag. 52.
XIII.	Pag. 53.
XIV.	Pag. 144.
XV.	Pag. 167.
XVI.	Pag. 269.
XVII.	Pag. 363.
XVIII.	Pag. 547.
XIX.	Pag. 555.
XX.	Pag. 691.
XXI.	Pag. 772.
XXII.	Pag. 797.
XXIII.	Pag. 808.
XXIV.	Pag. 1009.
XXV.	Pag. 1031.
XXVI.	Ibid.
XXVII.	Ibid.
XXVIII.	Pag. 1034.
XXIX.	Pag. 1095.
XXX.	Pag. 1096.
XXXI.	Pag. 1136.

